

小儿百病

石效平 编

秘方



中医古籍出版社

小儿百病秘方

石效平 娄 畅 编
彭颖华 方 策

中医古籍出版社



(京)新登字027号

责任编辑 吴炳银

封面设计

小儿百病秘方

石效平 等编

中医古籍出版社出版

(100700北京东直门内北新仓18号)

新华书店北京科技发行所发行

河北省定兴县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 11.5印张 258千字

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数: 0001~6000

ISBN 7-80013-467-9/R·464

定价: 5.50元

序

中医儿科学的历史源远流长，是我国传统文化科学结晶之一。数千年来，历代宗师辈出，著述浩瀚，记载着对小儿保健、调护、预防、治疗各方面的丰富经验，并且创立了无数行之有效的方剂造福小儿，在历史上对我中华民族的繁衍昌盛，曾经作出了卓越的贡献。即使在现代科学突飞猛进的今天，它不仅在鞠养保育小儿方面具有特色，尤其在诊疗技术方面，仍有很大优势，具有不可替代的地位和作用，这是炎黄子孙的骄傲，也是全人类的共同财富。

由于年代久远，文献散佚，致使很多宝贵经验失传，或者散见于各种类书之中，查阅困难，以致大量卓效之方，未被采用。因此，发掘古代儿科医药遗产，整理儿科前辈临床经验，收集归类儿科有效验方、单方、秘方，是中医儿科工作者的一项重大工程，具有特殊意义。石效平等同志为了弘扬中医事业，促进儿科学说发展，长期以来，广泛收集了古今儿科医家治疗小儿疾病的各种有效方药，编著成《小儿百病秘方》一书，既有名家秘方效方，也有民间偏方验方；既有内服汤剂散剂冲剂，也有外治敷脐贴穴诸法，剂型多种，内容丰富，广撷精华，选方确当，科学性强，实用性大，尤其书中侧重介绍了儿科名医的独特医疗经验，以及儿科世家的祖传秘方，这些屡经临床验证，疗效确切，久用不衰的方药和技能，实有推广应用的价值，故乐为之序！

刘子厚

前 言

疾病是危害少年儿童健康的重要原因，已越来越多引起全社会的普遍关注和重视。积极预防和减少儿童发病机会，不断提高临床疗效，保证少年儿童健康成长，是临床医务工作者义不容辞的责任。

传统医学在儿科方面积累了极其宏富的经验，历代先贤医哲对儿科疾病的发生发展多有论述，著述颇丰。普遍认为小儿形体娇小，脏腑柔弱，气血未充，易为外邪所感。在诊断上因为“小儿多未能言，言亦未足取信”，给诊断和辨治增加了难度。有鉴于此，国内从事儿科临床的医务工作者在诊断治疗儿科疾病方面进行了积极的探索，对一些儿科常见病、多发病和疑难病的治疗经验屡有报道。这些有效治验和专病验方在儿科诊治方面发挥了明显作用。对这些治疗经验进行较为系统的整理，使之汇为一帙，昭示于世，无疑是一件极有意义的工作。为使这些临床治验更好地发挥作用，满足儿科临床工作者和广大人民群众对防治儿科疾病的迫切需要，笔者收集了近些年来有关经验报道，并综合多年从事儿科工作的经验，编成这本《小儿百病秘方》。

全书共分10类，所录儿科常见病100种，秘验方近千首。以病名为纲，以方为目。每种验方依此分为组成、用法、功效、主治、来源等项。有的验方并加有按语。

由于时间紧迫，加之笔者水平所限，书中难免有错误疏漏之处，敬请广大读者指正。

编 者

1993年5月

目 录

新生儿疾病····· (1)	流行性脑脊髓膜
新生儿黄疸····· (1)	炎····· (57)
新生儿肺炎····· (5)	流行性乙型脑炎
新生儿硬肿症	····· (59)
····· (7)	病毒性肝炎····· (63)
新生儿脐炎····· (11)	呼吸系统疾病····· (69)
新生儿破伤风	上呼吸道感染
····· (13)	····· (69)
新生儿呕吐····· (17)	急性支气管炎
新生儿腹胀····· (19)	····· (75)
新生儿脓疱疮	慢性支气管炎
····· (21)	····· (80)
传染性疾病····· (23)	毛细支气管炎
麻疹····· (23)	····· (84)
风疹····· (28)	肺炎····· (87)
幼儿急疹····· (30)	支气管哮喘····· (94)
猩红热····· (31)	肺脓肿····· (101)
水痘····· (33)	脓胸····· (104)
流行性腮腺炎	营养及消化系统疾
····· (36)	病····· (106)
百日咳····· (41)	营养不良····· (106)
脊髓灰质炎····· (47)	佝偻病····· (111)
细菌性痢疾····· (51)	厌食症····· (114)

婴幼儿腹泻…… (120)	再生障碍性贫血 …………… (179)
秋季腹泻……… (127)	血小板减少性紫 癜…………… (183)
小儿溃疡病…… (130)	白血病………… (188)
霉菌性肠炎…… (132)	病毒性心肌炎 …………… (192)
急性坏死性小肠 炎…………… (134)	泌尿及内分泌系统
中毒性肠麻痹 …………… (137)	疾病…………… (196)
肠套迭………… (141)	急性肾炎……… (196)
先天性巨结肠 …………… (142)	慢性肾炎……… (202)
蛔虫性肠梗阻 …………… (145)	紫癜性肾炎…… (205)
胆道蛔虫病…… (149)	肾病综合征…… (208)
蛔虫病………… (152)	尿路感染……… (213)
蛲虫病………… (154)	尿崩症………… (217)
绦虫病………… (158)	性早熟………… (221)
钩虫病………… (161)	神经及精神疾病
婴儿肝炎综合征 …………… (164)	…………… (224)
呕吐…………… (166)	癫痫…………… (224)
便秘…………… (169)	婴儿痉挛症…… (231)
腹痛…………… (172)	脑发育迟缓综合 征…………… (233)
血液及循环系统疾	脑性瘫痪……… (236)
病 …………… (177)	进行性肌营养不 良…………… (238)
营养性贫血…… (177)	重症肌无力…… (241)

感染性多发性神	五官疾病…………… (309)
经根炎…………… (243)	急性扁挑体炎
脑积水…………… (246)	…………… (309)
抽动秽语综合征	鹅口疮…………… (312)
…………… (251)	口腔溃疡…………… (316)
儿童多动症……… (253)	疱疹性咽峡炎
幼儿习惯性阴部	…………… (321)
摩擦症…………… (258)	流涎症…………… (322)
遗尿症…………… (260)	化脓性中耳炎
外科及皮肤疾病	…………… (326)
…………… (267)	其它常见疾病……… (331)
淋巴结炎…………… (267)	过敏性紫癜……… (331)
淋巴结结核……… (269)	皮肤粘膜淋巴结
鞘膜积液…………… (274)	综合征…………… (334)
脱肛…………… (277)	传染性单核细胞
疝气…………… (282)	增多症…………… (337)
脐疝…………… (286)	手足口病…………… (339)
肌性斜颈…………… (288)	夏季热…………… (341)
荨麻疹…………… (290)	发热…………… (344)
婴儿湿疹…………… (294)	惊厥…………… (347)
带状疱疹…………… (299)	夜啼…………… (352)
尿布皮炎…………… (303)	盗汗…………… (357)
脓疱疮…………… (304)	

新生儿疾病

新生儿黄疸

新生儿黄疸是临床常见的疾患。以全身皮肤、双目、小便均出现黄色为特征，中医称为“胎黄”。传统医学认为本病的发生是由于湿热之邪阻滞，肝胆疏泄失常所致。治疗主要采用清热利湿之法。并针对其不同的病因，审因论治。

1. 消黄利胆汤

组成 茵陈15g，炙大黄3g，泽泻3g，茯苓9g，金钱草9g，栀子6g。

用法 水煎服，每日1剂，少量频服。

功效 清热利湿退黄。

主治 新生儿黄疸。

来源 《中西医结合杂志》 1986(7):415

按语 茵陈、金钱草均有促进胆汁分泌及扩张胆管的作用，故可增加胆红素的排泄，从而达到退黄的作用。本方观察治疗45例，除1例发生核黄疸外，余全部治愈，退黄时间3~12天。

2. 胎黄方

组成 茵陈10g，瓦松10g，紫草5g，青皮6g，茜草6g，穿肠草10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服，并予青矾散（由青黛、明矾组成）随汤剂冲服。

功效 清湿热，利肝胆。

主治 新生儿不完全性胆道阻塞或胆汁粘稠综合征所致的黄疸。

来源 《北京市老中医经验选编》

3. 茵陈茅根汤

组成 茵陈10g,白茅根15g,茯苓6g,车前草6g,猪苓5g。

用法 水煎服，每日1剂，分3~4次服。

功效 清热利湿退黄。

主治 新生儿溶血病和新生儿败血症所致的黄疸。

来源 《中西医结合杂志》1989(7):423

4. 利疸汤

组成 茵陈6g,蒲公英4.5g,茯苓4.5g,郁金3g,花粉3g,泽泻3g,栀子2g,木通1.5g,生甘草1g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热利湿，利疸除秽。

主治 新生儿黄疸。症见皮肤粘膜黄染，身热烦躁，腹胀便秘，尿色深黄。

来源 《幼科条辨》

5. 龙胆柴胡汤

组成 龙胆草6g,茵陈蒿10g,生栀子10g,黄芩10g,柴胡10g,车前草9g,虎杖10g,田基黄10g,干油菜10g,泽泻10g,炒黄柏6g,莱菔子10g。

用法 水煎服，每日1剂，分次频服。

功效 清肝利胆，除湿化浊。

主治 新生儿阻塞性黄疸。

来源 《成都中医学院学报》1985(3):14

按语 本病为儿科临床难治病，其病机是由于湿热蕴结，肝郁血淤所致，治宜分消湿热，理气行淤，初起宜用苦寒之剂直折其火势，不必畏其寒凉。继之当加用健脾和胃之品，以免损伤脾胃。

6. 茵栀车前汤

组成 茵陈10g，栀子4g，车前草6g。

用法 水煎服，每日1剂，浓煎频喂。

功效 清热利湿，利胆退黄。

主治 新生儿溶血症及新生儿败血症所致高胆红素血症。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 方中茵陈为主药，具有清利湿热，利胆退黄作用，栀子清三焦湿热，车前草利尿渗湿，诸药配伍，切合病机。临床见有便秘者可加大黄，浮肿加泽泻、茯苓，热重加黄芩、黄连。

7. 茵陈四苓汤

组成 茵陈15g，茯苓10g，白术7.5g，猪苓5g，泽泻7.5g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热健脾利湿。

主治 小儿胆汁淤积综合征之黄疸。症见黄疸持续不退，小便黄赤，大便灰白，腹胀食少。

来源 《中医杂志》1989(7):32

按语 本方系由茵陈合四苓散而成。茵陈清热利湿，通淤逐秽，四苓散健脾利水，合之可使湿热之邪从小便而解，从而使黄疸自退。本方药味平和，无苦寒攻伐之品，阳黄阴

黄皆可用之。

8. 羚角茵竹汤

组成 羚羊角1g, 茵陈15g, 竹叶5g。

用法 羚羊角先煎, 后入茵陈、竹叶, 煎煮30分钟, 每日1剂, 频频喂服。

功效 清热利湿, 凉血除黄。

主治 新生儿黄疸, 属阳黄者。症见全身发黄, 黄色鲜明如桔, 神烦少乳。

来源 《中国当代名医秘验方精粹》

9. 复方白茅根汤

组成 白茅根10g, 木贼草6g, 板蓝根9g, 郁金6g, 枳壳6g, 金钱草9g, 滑石9g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分4次服。

功效 清热利湿, 活血化淤。

主治 新生儿梗阻性黄疸。症见面目皮肤发黄, 大便灰白, 腹胀, 肝脏肿大。

来源 《上海中医药杂志》1987(3):26

10. 地黄饮子

组成 生地黄6g, 赤芍6g, 羌活5g, 当归3g, 甘草3g。

用法 共为细末, 以灯心草煎汤送服, 于乳前服。

功效 清热活血利湿。

主治 新生儿黄疸。症见全身面目皆黄, 面赤身热, 大便不通, 小便黄赤, 眼闭不开。

来源 《幼科类萃》

11. 犀角散

组成 犀角3g, 茵陈蒿12g, 瓜蒌根6g, 升麻3g, 龙胆

草3g，生地6g，寒水石6g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，不拘时服。

功效 清热解毒，利湿退黄。

主治 新生儿黄疸，属阳黄者。症见皮肤深黄，大便干结，小便黄赤。

来源 《医宗金鉴》

新生儿肺炎

新生儿肺炎是新生儿期发病率较高的疾患，一般根据其病因分为吸入性肺炎和感染性肺炎。临床主要以呼吸急促，面色发绀，口吐白沫等为主要表现。传统医学认为，本病发生是由于初生之儿卫外机能未健，感受外邪所致。其治疗一般采用宣肺平喘之法，尤应注意扶正祛邪。

1. 肺炎一号

组成 白人参3g，麦冬6g，五味子6g，麻黄0.8g，杏仁3g，桔梗5g，天花粉5g，陈皮5g，川贝母1g，甘草3g。

用法 水煎浓缩至20毫升，频服或鼻饲。

功效 宣肺平喘，扶正祛邪。

主治 新生儿肺炎。症见憋气，喘促，发绀，肺部罗音较多。

来源 《何世英儿科医案》

按语 本方系由生脉散与三拗汤加味而成。适于新生儿肺炎正虚邪盛者，能扶正祛邪，标本兼顾。本方为天津市儿童医院协定处方，临床疗效较好。

2. 肺炎二号

组成 麻黄1.5g, 杏仁5g, 葶苈子3g, 丹参6g, 红花6g, 桃仁5g, 白人参3g, 麦冬6g, 五味子3g, 生黄芪9g。

用法 水煎浓缩至20毫升, 每服5毫升, 日服4次。

功效 宣肺平喘, 益气活血。

主治 新生儿肺炎。症见憋气发绀, 呼吸微弱, 肺部罗音少或无。

来源 《何世英儿科医案》

按语 本方在宣肺平喘之中佐以益气活血化淤之药, 对平素体质虚弱患儿及肺炎并有循环衰竭者较为合适。本方为天津市儿童医院协定处方。

3. 肺炎敷胸散

组成 天花粉、黄柏、黄芩、乳香、没药、胆南星, 白芥子、生大黄、桃仁、山栀、白芷各等分。

用法 共研细末过筛, 每次取20克左右, 以食醋调成糊状, 涂于纱布, 外敷胸部或后背(交替外敷), 每日换药1次。

功效 清热活血祛痰。

主治 新生儿肺炎, 肺部罗音经久不消。

来源 《北京中医》1993(1):24

4. 银翘生脉散

组成 银花6g, 连翘6g, 人参6g, 陈皮3g, 麦冬4g, 五味子4g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分3次服。

功效 清热宣肺, 益气扶正。

主治 新生儿肺炎。

来源 《湖南中医杂志》1992(6):14

按语 本方为新生儿肺炎之基本方，临床应用中可在此基础上辨证加减。偏风寒者可合用三拗汤，偏风热者可合用银翘散。皮肤黄染可加茵陈蒿汤，紫绀甚加丹参、赤芍。本方观察治疗54例患儿全部治愈，平均疗程6天。

新生儿硬肿症

新生儿硬肿症是由受寒、早产、感染、窒息等多种原因引起的皮肤和皮下脂肪硬化与水肿的一种疾病。临床以体温降低，皮肤僵硬，凹陷性水肿为特征。本病与中医“五硬”相类似。传统医学认为，本病的发生是由于先天禀赋不足，复感风寒，寒凝血滞所致。治疗多采用温阳、活血等方法。

1. 硬肿膏

组成 肉桂12g，丁香6g，川草乌各15g，乳香15g，没药15g，干姜15g，红花30g，当归30g。

用法 共为细末，以羊毛脂及凡士林搅拌成50%软膏，涂抹硬肿部位，外用纱布包裹，每日1次。

功效 温阳祛寒，活血化淤。

主治 新生儿硬肿症。

来源 《中西医结合杂志》1987(3):177

2. 活血敷方

组成 肉桂6g，丁香9g，乳香7.5g，没药7.5g，当归15g，红花15g，赤芍15g，川芎15g，透骨草15g，川乌7.5g，草乌7.5g。

用法 水煎成250毫升，与100毫升煮开后冷却的茶油混匀，用时加温，外敷按揉硬肿部位，注意按揉时保温。每隔

2~4小时重复应用。

功效 温阳活血化淤。

主治 新生儿硬肿症。

来源 《中西医结合杂志》1989(7):435

3. 温阳活血汤

组成 附子2.4g, 干姜2.4g, 炙甘草3g, 丹参12g, 当归9g, 红花6g, 黄芪12g, 红参3g。

用法 水煎服, 红参另煎后兑入, 每日1剂, 分3~4次服。

功效 温阳益气, 活血化淤。

主治 新生儿硬肿症。

来源 《上海中医药杂志》1982(6):24

4. 逐淤软坚汤

组成 丹参10g, 红花5g, 桃仁3g, 川芎3g, 鸡血藤5g, 黄芪5g, 仙灵脾3g, 制附子1.5g, 甘草2g。

用法 先加温水浸泡半小时, 煎煮后去渣, 取汁30毫升, 冲服僵蚕0.3~0.5克, 每次取5~10毫升喂服或鼻饲, 每日3~4次。

功效 化淤软坚, 温经散寒。

主治 新生儿硬肿症。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

5. 硬肿汤

组成 生黄芪9g, 茯苓9g, 猪苓9g, 白术6g, 泽泻6g, 麦冬6g, 白人参2g, 五味子0.6g, 甘草3g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分次频服。

功效 补气行水。

主治 新生儿硬肿症。

来源 《何世英儿科医案》

按语 本方为天津著名老中医何世英之验方。方中生脉散助先天不足之气，合四苓散补后天未充之气，并以黄芪补脾益气，固表强肌。用治小儿轻度及中度硬肿症效果较好，对重症疗效不著。

6. 益气活血汤

组成 党参6g，当归6g，茯苓6g，赤芍6g，白芍6g，野菊花6g，黄芩6g，丹参6g，鸡血藤9g。

用法 水煎服，每日1剂，分3~4次服。

功效 益气和营，清热活血。

主治 新生儿硬肿症，属寒凝血滞者。症见体温不升，反应迟钝，全身皮肤硬肿而冷，啼哭无声，精神萎靡。

来源 《名医奇方秘术》

按语 本方为徐迪三教授之经验方。治疗新生儿硬肿症重点应从“淤”着手，盖淤血不去则新血不生。另有不少病例见有外寒里热之证，用附子、肉桂等温和药治疗往往效果不理想，故用清热活血之法。治疗本病除服药外，尚需注意保暖，结合外治法。

7. 助阳化淤方

组成 桂枝5g，白芍5g，当归5g，木通5g，小茴香5g，丹参6g，红花2g，橘核12g，细辛3g，甘草1g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 助阳祛寒，活血化淤。

主治 新生儿硬肿症。

来源 《全国名老中医验方选集》

8. 清热活血汤

组成 青黛3g, 紫草9g, 乳香 6g, 千年健 9g, 白芨 6g, 木瓜9g, 寒水石9g。

用法 水煎服, 每日 1 剂, 分 2~3 次服。

功效 清热利湿, 调气活血。

主治 新生儿硬肿症。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

9. 益气温阳汤

组成 人参2g, 附子3g, 黄芪5g, 茯苓5g, 桂枝3g, 陈皮3g, 白术3g, 川芎3g, 防风3g, 肉桂2g, 甘草2g。

用法 水煎服, 每日 1 剂, 分 3~4 次服。

功效 益气温阳。

主治 新生儿硬肿症, 阳气虚弱型。症见皮肤不温, 苍白肿亮, 头项板硬, 哭声无力。

来源 《中医药信息》1993(1):31

10. 温经通络汤

组成 当归3g, 赤芍3g, 细辛0.3g, 桂枝3g, 木通3g, 黄芪5g, 党参 5 g, 乌药 3 g, 木香1.5g, 甘草 2 g, 生姜 2 片。

用法 水煎服, 每日 1 剂, 分 3~4 次服。

功效 温经通络。

主治 新生儿硬肿症, 寒凝血滞型。症见肌肤拘急, 肿硬发亮, 皮色紫暗。

来源 《中医药信息》1993(1):31

11. 小续命汤

组成 麻黄30g, 人参30g, 黄芩30g, 川芎30g, 芍药

30g, 杏仁30g, 汉防己30g, 官桂30g, 甘草30g, 防风15g, 附子15g。

用法 共为粗末, 每服3克, 以生姜、大枣煎之温服, 日服2~3次。

功效 温阳益气, 祛风通络。

主治 新生儿硬肿症。症见四肢冰冷而硬, 难以动摇, 胸腹硬肿, 仰头取气, 面色青灰。

来源 《婴童百问》

新生儿脐炎

新生儿脐炎多由脐带脱落后残端细菌感染所致。临床以脐部发热, 红肿, 有粘液或脓性渗出为特点, 中医称为“脐疮”。传统医学认为, 本病的原因是由于秽毒之邪侵于脐部, 壅于肌肤所致。故治疗主要以清热解毒为主, 佐以疏风散邪, 同时结合外治疗法。

1. 黄龙乌贼散

组成 川黄连2份, 煅龙骨2份, 乌贼骨1份。

用法 共研细末, 装瓶备用。用时先以双氧水清洗脐部, 用药棉擦干, 将药面均匀撒在疮面上, 以纱布包扎, 每日换药1次。

功效 清热解毒敛湿。

主治 新生儿脐炎。症见脐部红肿, 浸渍不干, 渗出液较多。

来源 《中医杂志》1984(8):40

2. 三妙散

组成 槟榔、苍术、黄柏各等分。

用法 上药共研细末，脐部以双氧水或生理盐水清洗后，将药面撒于脐上，每日换药1~2次。

功效 清热渗湿。

主治 新生儿脐炎，局部渗出较重者。

来源 《医宗金鉴》

3. 渗脐散

组成 枯矾6g，煅龙骨6g，麝香少许。

用法 上药共研细面，以双氧水或生理盐水清洗脐部，药面撒于脐中，每日1~2次。

功效 清热燥湿收敛。

主治 新生儿脐炎，肚脐浸渍不干，疼痛作痒不止。

来源 《医宗金鉴》

4. 一效散

组成 朱砂1g，炙炉甘石3g，冰片1g，滑石粉70g。

用法 先将朱砂、冰片研成细末后过筛，再将炉甘石粉和滑石粉分别兑入，脐部清洗后将药面涂擦于脐部，每日数次。

功效 祛湿收敛，止痛止痒。

主治 新生儿脐炎。

来源 辽宁中医学院王品山老中医方

5. 白降雪散

组成 煅石膏6g，焰硝3g，胆矾1.5g，元明粉1.5g，冰片0.5g。

用法 共为极细末，撒于脐部，外以纱布绷带包扎，每日换药1~2次。

功效 清热燥湿。

主治 新生儿脐炎。

来源 《古今儿科临床应用效方》

6. 脐带粉

组成 黄连20g，枯矾30g，朱砂10g，冰片2g，炉甘石粉10g，氧化锌10g。

用法 共研细末过筛，高压消毒。用前以3%双氧水清洗拭干，取2%甲紫溶液适量，调脐带粉少许为糊状，涂于患处，外以消毒敷料包扎，每日2~3次。

功效 清热解毒，渗湿收敛。

主治 新生儿脐炎。

来源 《四川中医》1985(5):5

7. 冰硼散

组成 硼砂15g，冰片1.5g，元明粉15g，朱砂1.8g。

用法 共研极细末，每次取1克敷于患处，外以消毒纱布覆盖，绷带包扎，隔日换药1次。

功效 清热敛湿。

主治 新生儿脐炎。

来源 《浙江中医杂志》1986(4):182

新生儿破伤风

新生儿破伤风是由破伤风杆菌引起的急性感染性疾病，传统医学称为“脐风”、“七日风”、“锁口风”。临床以出现唇青口撮，牙关紧闭，苦笑面容，四肢抽搐为特点。中医认为，本病是由于脐部为风冷水湿秽毒之邪所侵而致。治

疗以宣通经络，驱风镇惊之法，并结合外治。

1. 脐风汤

组成 生天南星9g，钩藤9g，防风6g，蝉蜕6g，僵蚕6g，天麻6g，全蝎3g。

用法 加水共煎3次，取药液100毫升，加黄酒2毫升，不拘时喂服。

功效 驱风止痉。

主治 新生儿破伤风。症见口禁不乳，牙关紧闭，唇青口撮，啼声不出，四肢抽搐。

来源 《四川中医》1989(7):19

2. 撮风散

组成 赤脚蜈蚣（炙）半条，钩藤3g，朱砂3g，直僵蚕（焙）3g，全蝎梢3g，麝香0.3g。

用法 上药共为细末，每服1.5克，以竹沥水调服，日服2~3次。

功效 宣通经络，驱风镇痉。

主治 新生儿破伤风，抽搐发作时。

来源 《幼科类萃》

3. 四物消风饮

组成 当归6g，川芎3g，红花3g，牛膝4g，地龙6g，白附子2g，钩藤3g，菊花3g，陈皮3g，半夏2g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 祛风活血。

主治 新生儿破伤风，抽搐等症状缓解或减轻时。

来源 《幼科条辨》

4. 新破汤

组成 全蝎1.5g,僵蚕6g,蝉衣6g,胆南星6g,葛根6g,田基黄6g,双花6g,防风6g,钩藤6g,蓖麻根15g。

用法 水煎至80~100毫升,每次5毫升鼻饲给药,每2小时1次。

功效 清热熄风止痉。

主治 新生儿破伤风。

来源 《湖南中医杂志》1991(2):15

5. 于氏脐风方

组成 僵蚕10个,蝉蜕10个,蜈蚣1条,朱砂1.5g,牛黄0.15g。

用法 前三味药先炒黄,上药共为细末,每次用1/4量,用乳汁送服。

功效 清热镇惊,祛风止痉。

主治 新生儿破伤风。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 本方系根据于氏祖传秘方整理,本方组成严密,药少力专,在临床应用屡用屡验。一般服药1次即可,多于服药1~2小时肠鸣音活跃排气,抽搐逐渐停止。

6. 祛风镇惊饼

组成 杏仁7粒,桃仁7粒,青黛3g,全蝎3尾,芒硝6g,山栀6g,薄荷6g。

用法 共研细末,加飞罗面30克,米醋煮沸调匀做饼,趁热敷于脐部,每日换药1次。

功效 祛风清热镇惊。

主治 新生儿破伤风。

来源 《全国名老中医验方选集》

7. 四虫散

组成 蜥蜴 7 只，蝉蜕 7 个，僵蚕 7 条，全蝎 7 条，琥珀 1.5g，朱砂 1.5g，赤金 7 张，牛黄 0.3g，麝香 0.3g，甘草 1.5g。

用法 共研细末，每服 0.3 克，日服 4 次，以灯心草、薄荷少许，煎汤送服。

功效 清热通络，祛风解痉。

主治 新生儿破伤风。

来源 《河南省名老中医经验集锦》

8. 追风汤

组成 蜈蚣 2 个，全蝎 10g，胆南星 10g，僵蚕 10g，钩藤 15g，防风 10g，蝉蜕 30g。

用法 水煎 2 次，浓缩取汁 60 毫升，首次取 15 毫升，加 10% 水合氯醛 2 毫升，高位灌肠。此后，每隔 4 小时取煎剂 9 毫升加 10% 水合氯醛 1 毫升灌肠。

功效 祛风镇痉，解毒消痰。

主治 新生儿破伤风。

来源 《云南中医杂志》1982(2):20

9. 脐风豆豉膏

组成 豆豉、天南星、白蔹、赤小豆各等分。

用法 共研细末，每次取 6 克，用芭蕉自然汁调之，涂于脐四边，每日 1 次。

功效 祛风止痉。

主治 新生儿脐风。

来源 《幼幼新书》

10. 秘传立圣散



组成 赤蜈蚣1条，蝎梢7个，瞿麦1.5g，僵蚕7个，蝉蜕7个。

用法 共为细末，每服1克，以薄荷煎汤调服，日服3次。

功效 祛风止痉。

主治 新生儿脐风。

来源 《仁斋小儿方论》

新生儿呕吐

呕吐是新生儿期一种常见的临床症状，中医亦称“呕吐”、“初生吐乳”。呕吐的发病原因主要是由于初生之儿脾胃功能未臻完善，运化功能未健，胃气上逆所致。故治疗主要采用健脾助运，和胃降逆等方法。

1. 吐乳验方

组成 莲心21个，香附子3个，吴茱萸¹7个，丁香7个。

用法 在瓦上炒黄，共研为细末，用母乳汁调敷乳头上，令儿吮食。

功效 温胃止呕。

主治 初生儿吐乳。症见乳后呕吐，腹胀不舒，大便稀薄，口中气冷。

来源 《世医得效方》

2. 初生吐乳方

组成 丁香3粒，陈皮1g，生姜2片。

用法 水煎服，每日1剂，分次频饮。

功效 温中降逆止呕。

主治 初生儿吐乳。症见时常呕吐，吐出乳块，不酸不臭，腹胀且冷，按揉则舒。

来源 《验方汇辑》

3. 香苏饮

组成 藿香3g，苏叶3g，姜炒厚朴3g，陈皮5g，茯苓5g，木香2g，炒枳壳2g，炙甘草2g。

用法 水煎服，生姜为引，每日1剂，分次频服。

功效 温散寒邪，宣通胃气。

主治 初生儿感受风寒之呕吐。症见呕吐不止，曲腰而啼，口吐清稀涎沫。

来源 《医宗金鉴》

4. 清热导滞饮

组成 姜黄连1g，枳壳1g，桃仁1g，竹茹1g，大黄1.5g，陈皮1.5g，赤芍1.5g，生姜1片。

用法 水煎服，每日1剂，少量多次频服。

功效 清热和胃，通便逐秽。

主治 生后胎秽未净，郁积化热之呕吐。症见生后即常吐乳，伴有黄色粘液，腹部胀满，二便秘涩，面红唇赤。

来源 《幼科条辨》

5. 清胃导赤散

组成 姜黄连1.5g，陈皮1.5g，半夏1.5g，竹茹1.5g，枳壳1.5g，茯苓3g，神曲3g，炒麦芽3g，生姜1片。

用法 水煎服，每日1剂，少量多次频服。

功效 清胃泻热。

主治 胎热壅盛之呕吐。症见乳后即吐，口中气热，腹

腹胀 大便臭秽，手足心热。

来源 《幼科条辨》

6. 加味丁香汤

组成 丁香0.9g，橘红3g，姜半夏3g，姜竹茹3g，太子参5g，川朴1.5g，甘草1.5g，炒麦芽9g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 温中行气止吐。

主治 新生儿呕吐。

来源 《江苏中医》1980(4):36

7. 扩幽解痉汤

组成 木香4.5g，砂仁4.5g，蝉蜕9g，陈皮6g，枳壳4.5g，半夏3g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 行气降逆。

主治 新生儿幽门痉挛之呕吐。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

按语 方中木香、砂仁、蝉蜕对幽门痉挛有良好的缓解作用；陈皮、枳壳能行气止呕；半夏有镇吐之功。本方能缓解幽门痉挛，调整胃肠功能。观察治疗24例患儿，多于服药24小时呕吐减轻，48小时呕吐停止。

新生儿腹胀

腹胀是新生儿期临床较常见的症状之一，属传统医学“积滞”范畴。导致腹胀的原因主要是由于小儿初生之时，脾胃功能尚未健全，运化无力。治疗主要以调理脾胃，行气

消食等为主，可采用内治，外治诸法。

1. 消积散

组成 木香6g，鸡内金3g，陈皮3g。

用法 共研细末，置纱布袋内，用绷带固定于新生儿脐上一夜，次日晨去之。

功效 行气消积。

主治 新生儿腹胀。症见腹部胀满，或见呕吐，大便少，不欲吮乳，烦躁多啼。

来源 《中医杂志》1988(2):8

2. 玄香散

组成 玄明粉15g，小茴香2g。

用法 共研细末，置纱布袋内，敷于脐上一夜，外以绷带固定，次日晨取下。

功效 行气通便消胀。

主治 新生儿腹胀。症见腹部胀满，大便不通，不欲吮乳，哭闹不安。

来源 《新中医》1986(6):37

3. 消胀散

组成 萝卜子2g，苏梗2g，葛根2g，陈皮1.5g，白术1.5g，枳壳1.5g，甘草1.5g。

用法 水煎服，每日1剂，分次频饮。

功效 健脾行气消胀。

主治 新生儿腹胀，属脾虚食滞者。

来源 《保幼新编》

4. 麝硝散

组成 麝香少许，芒硝黄豆大。

用法 共为细末混匀，将药置于患儿脐内，外以棉垫敷盖，绷带围腰固定，一般敷10余小时即可。

功效 行气消胀。

主治 新生儿腹胀，大便不通，属实证者。

来源 《中国当代名医秘验方精粹》

按语 方中芒硝咸寒软坚，为重夺下浊之品，麝香辛香走窜，为性烈搜剔之物，临床用一定要辨证施治，不能冒昧求效。本方虽是外用，误用之为害亦大。对实证者使用本方收效甚捷，且方法简便。

5. 调气汤

组成 广陈皮2g，花槟榔2g，炒枳壳2g，广木香1g，莱菔子1g，蝉蜕5个。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 调理脾胃，行气消胀。

主治 新生儿腹胀。症见腹胀如蛙，按之柔软，时而吐乳。

来源 《李聪甫医案》

新生儿脓疱疮

新生儿脓疱疮是由细菌感染引起的新生儿皮肤疾患。临床以皮肤皱摺处脓疱，疱壁较薄，基底微红为特点，多发生于生后一周内。传统医学认为，本病是由于小儿肌肤嫩薄，外感湿热邪毒所致。治疗以清热解毒，利湿排脓为主，内治与外治相结合。

1. 解毒祛湿汤

组成 金银花9g，连翘9g，陈皮3g，桔梗3g，甘草2g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 解毒祛湿。

主治 新生儿脓疱疮。

来源 《实用中医药杂志》1993(1):27

按语 方中金银花、连翘清热解毒，陈皮、桔梗祛湿排脓，使热去湿尽，疮疮自愈。本方观察治疗40例，多数于服药2~5天治愈。

2. 三黄油

组成 黄柏、黄芩、大黄、地榆、五倍子、罂粟壳各等分。

用法 将植物油适量烧沸，投入上药，炸至深褐色，去药渣加冰片制成油剂。脓疱壁未破溃时先吸去脓液，已破溃者直接涂擦本品，每日3~4次。

功效 清热解毒，敛疮止痛。

主治 新生儿脓疱疮。

来源 《陕西中医》1992(12):539

传染性疾病

麻疹

麻疹是由麻疹病毒引起的急性呼吸道传染病。临床以发热，麻疹粘膜斑，全身皮肤出现红色皮疹为特征。传统医学认为，麻疹属于温热病，其发生主要是由于感受麻毒时邪所致。在治疗上，根据病程各期的不同表现，采用辛凉透表，清热解毒等法。

1. 托麻透发汤

组成 葛根15g，白茅根15g，淡竹叶10g，紫草10g，升麻5g，薄荷3g，甘草5g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 发表托麻透疹。

主治 小儿麻疹初期，麻疹欲出，出而不畅，发热口渴，咳嗽喘促，面赤唇红。

来源 《全国名老中医经验方选》

2. 辛凉透表汤

组成 芦根15g，白茅根15g，薄荷6g，荆芥穗6g，茺牛子6g，杏仁10g，连翘10g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 辛凉透表，清宣肺卫。

主治 小儿麻疹之疹前期。症见发热咽痛，鼻塞流涕，面红目赤，麻疹隐现。

来源 《效验小金方》

3. 透疹合剂

组成 麻黄15g，浮萍15g，芫花15g、黄酒60g。

用法 加水适量煮沸，使水蒸气布满室内，用热毛巾蘸药液，揩拭额面及四肢等皮肤暴露部分，或擦洗全身。

功效 发表透疹。

主治 小儿麻疹之疹前期。

来源 《儿科应用必备》

4. 荆芥透疹汤

组成 荆芥10g，牛蒡子6g，蝉衣3g，连翘5g，桑叶5g，板蓝根6g，薄荷3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 发表透疹。

主治 小儿麻疹初起，欲出未出。症见发热咳嗽，泪水汪汪，口内可见麻疹粘膜斑。

来源 《上海中医药杂志》1986(11)：14

5. 解毒透疹散

组成 肉桂3g，附子3g，天麻6g，薄荷6g，钩藤6g，僵蚕5g，土元6g，雄黄1.5g，蟾蜍1个。

用法 蟾蜍冬季采集，风干入药。上药共为细面，贮存密封备用。2岁小儿每服1.5~2克，日服3次。

功效 辛温透表，散寒通络。

主治 小儿麻疹早期，或正出之际。症见发热咳嗽，眼泪汪汪，麻疹隐现或初现，疹点不密，或疹未出齐而骤然隐陷。

来源 《河南中医》1981(5)：48

按语 本方历经五代相传，疗效显著。此方妙用所在，就是把握麻疹在发病初期或正出之际，解表透疹，驱邪外出，以防邪毒内陷。即使疹毒内陷，此方亦可驱疹毒外泄。

6. 清热解毒汤

组成 银花10g，连翘10g，牛蒡子6g，蝉衣6g，桑叶5g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热解毒，佐以透疹。

主治 小儿麻疹之出疹期，属肺热壅盛者。症见发热持续，口渴，目赤眵多，咳嗽，疹点依次透发，渐次加密。

来源 《浙江中医杂志》1987(9)：403

7. 加减升降散

组成 蝉衣3g，芦根12g，钩藤6g，僵蚕3g，片姜黄3g。

用法 水煎代茶频饮。

功效 疏卫凉营透疹。

主治 小儿麻疹，卫营合邪者。症见发热咳嗽，两目流泪，心烦啼哭，疹出不畅。

来源 《千家妙方》

8. 透疹热敷方

组成 芫荽子30g，西河柳30g，浮萍12g。

用法 布包煮沸，用毛巾在煮沸的药液中打湿拧干，热敷额面、四肢等皮肤暴露部分，每日3次。

功效 清热透疹。

主治 小儿麻疹之出疹期。症见麻疹隐伏，或出而不透，持续发热。

来源 《江西名老中医经验选编》

9. 牛蒡山楂饮

组成 牛蒡子15g, 山楂15g, 蝉蜕5g, 青皮5g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分3次服。

功效 解毒透疹。

主治 小儿麻疹, 疹出不透。

来源 《新编偏方秘方汇海》

10. 养阴解毒汤

组成 元参6g, 石斛5g, 麦冬9g, 紫花地丁5g, 金银花5g, 连翘5g, 山栀1g, 竹叶1g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 养阴清热解毒。

主治 小儿麻疹恢复期, 麻疹消退, 余毒未尽。症见咽干唇裂, 手足心热, 便干尿黄。

来源 《临证医案医方》

11. 透疹汤

组成 牛蒡子3g, 蝉蜕3g, 葛根3g, 桔梗3g, 橘红3g, 归尾3g, 升麻1.5g。

用法 水煎服, 分次频频服之。

功效 透疹解毒平喘。

主治 小儿麻疹逆证。症见疹隐不出, 高热不退, 咳嗽气促, 神志昏迷。

来源 《痘疹心法》

12. 犀角解毒汤

组成 犀角6g, 生石膏30g, 木通9g, 元参12g, 连翘12g, 生知母12g, 鲜茅根12g。

用法 先用茅根煎水，再用茅根水煎上药，每日1剂，日夜不断，连连服之。

功效 清热解毒，滋阴降火。

主治 小儿麻疹后肺炎。症见高热神昏，气急喘促，时而抽搐，躁扰不宁。

来源 《医学衷中参西录》。

按语 疹后肺炎多因余毒未清，内犯于肺所致。治疗当清热解毒以祛邪，并用养阴以扶正。方中重用鲜茅根，既能除余热，又能滋胃中津液，合寒凉之石膏，有清热消炎之功效。本方经几十年临床应用，疗效显著，久用不衰。

13. 新定柴胡清热饮

组成 北柴胡3g，生地5g，地骨皮5g，玄参5g，沙参5g，麦冬5g，鲜桑叶3g，知母3g，连翘3g，淡竹叶3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 养阴清热。

主治 小儿麻疹后期，身热延绵不清，口渴纳呆，便干尿黄。

来源 《麻疹专论》

14. 解毒活血合剂

组成 当归30g，生地90g，柴胡24g，葛根45g，连翘90g，枳壳30g，赤芍45g，桃仁泥90g，生甘草24g。

用法 水煎浓缩成500毫升，加糖浆100毫升，每服20毫升，每2小时服1次。

功效 解毒活血。

主治 麻疹期间疹出不明，并发肺炎或脑炎时，高热气急，神识昏迷。

来源 《幼科刍言》

风 疹

风疹是由风疹病毒引起的一种较轻的发疹性传染病，临床以发热，细小浅红色皮疹，耳后及颈部淋巴结肿大为特征。本病属传统医学“风痧”范围。其病因主要是由于外感风热时邪，搏于气血，毒热发于皮肤所致。治疗采用疏风清热之法，因势利导，驱邪外出。

1. 银花紫草汤

组成 银花15g，紫草9g，玄参15g，蝉衣6g，薄荷9g，生石膏25g。

用法 水煎服，每日1剂，分5~6次服。

功效 疏风清热，透疹凉血。

主治 小儿风疹。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 方中银花、蝉衣、薄荷有疏风清热，透疹止痒之功；紫草清热凉血；石膏有良好的退热作用，临床可根据年龄和病情酌情增减药量。本方治疗1200例风疹患儿，均获痊愈，多数服用1~2剂明显好转。本方适于邪郁肺卫或邪热炽盛者，能因势利导，祛邪外出。

2. 治风疹方

组成 生地15g，骨碎补9g，白蒺藜12g，羌活9g，蝉衣3g，炒胡麻仁9g，豨莶草9g，地骨皮6g，炒丹皮3g，蜂房9g，荷叶9g，地肤子12g。

用法 水煎服，煎好药液中入蜂蜜60克，每日服1/2~1

剂，早晚各服1次。

功效 清热凉血，燥湿止痒。

主治 风疹。

来源 《百治百验效方集》

3. 风疹外洗方

组成 地肤子30g，苦参30g，蜂房15g，荆芥15g。

用法 水煎去渣，熏洗患处，每日2次。

功效 清热祛风止痒。

主治 风疹，皮肤瘙痒较甚者。

来源 《百治百验效方集》

按语 方中苦参清热，地肤子祛湿，荆芥散风，蜂房止痒。诸药合之，养血凉血，祛风走肌，效验多端。临床可以上方煎服，配合本方外洗，内外合治，效果更佳。

4. 豆蔻蝉桔汤

组成 黄豆卷12g，牛蒡子10g，蝉蜕6g，桔梗10g，前胡6g，薄荷1.5g，浙贝母10g，生甘草1.5g。

用法 水煎服，每日1剂，每4小时服1次。

功效 清热解毒，祛风止痒。

主治 小儿风疹。

来源 《小儿病的防治方法》

5. 苍耳洗剂

组成 苍耳子根叶24g，苦参24g，川椒6g，紫草10g。

用法 水煎外洗患处，每日数次。

功效 清热利湿止痒。

主治 小儿风疹，皮肤痒甚者。

来源 《中医临床验方集》

幼 儿 急 疹

幼儿急疹是一种多发于婴幼儿时期的急性出疹性传染病。临床以起病急，高热持续几天后体温骤降，热退后皮肤出现红色粟粒样皮疹为特点。本病传统医学称“奶麻”，其发病主要认为是外感风热时邪所致。在治疗上主要采用疏风清热解毒等方法。

1. 幼儿急疹散

组成 蝉蜕10g，地龙5g，天竺黄3g，胆制僵蚕12g，升麻10g，桔梗3g，甘草3g。

用法 共为细末，3~6个月 每服0.2~0.3克，6~12个月 每服0.3~0.5克，1~2岁 每服0.5~1克，日服3次。

功效 透疹清热，熄风止痉。

主治 幼儿急疹。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

2. 青黛地骨皮汤

组成 青黛3g，地骨皮9g，寒水石9g，藿香9g。

用法 水煎服，每日1剂，分4次服。

功效 清热解毒凉血。

主治 幼儿急疹早期及出疹期。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 方中青黛清热凉血，为解毒要药，地骨皮能凉血，寒水石擅清热，藿香解表化湿，四药相配，治疗幼儿急疹恰中病机，收效良好。

3. 解毒防风汤

组成 防风25g, 地骨皮12g, 黄芩12g, 芍药12g, 荆芥12g, 枳壳12g, 牛蒡子12g。

用法 共为粗末, 每服10克, 水煎去渣温服, 日服2~3次。

功效 疏风清热, 透疹解毒。

主治 幼儿急疹之出疹期。症见全身皮肤密集皮疹, 伴咽赤肿痛, 烦躁口渴。

来源 《幼科类萃》

猩 红 热

猩红热是由链球菌感染引起的急性传染性疾病, 中医称为“烂喉痧”、“疫痧”。临床以发热、咽喉肿痛, 全身弥漫性猩红色皮疹为其特征。传统医学认为, 本病是由于痧毒疫邪侵入, 蕴于肺胃, 上攻咽喉, 外透肌肤所致。临床治疗一般根据病程的不同阶段, 病邪的深浅, 分别采用清热解毒, 养阴清热等诸法。

1. 清热解毒饮

组成 银花10g, 连翘10g, 芥穗5g, 蝉蜕3g, 牛蒡子3g, 射干6g, 马勃5g, 黄芩6g, 芦根3g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清热利咽, 解毒宣透。

主治 猩红热初期, 皮疹未透。症见发热头痛, 咽喉肿痛, 皮疹稀少。

来源 《赵心波儿科临床经验选编》

2. 解毒汤

组成 青黛6g，儿茶6g，生石膏12g，知母9g，生地9g，连翘9g，黄芩6g，马勃6g，蒲公英9g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热解毒。

主治 猩红热之重证。症见壮热不退，咽喉肿痛，口渴烦躁，舌红苔黄厚。

来源 《中医儿科临床浅解》

3. 甘桔汤

组成 桔梗9g，天花粉9g，连翘9g，地骨皮9g，麦冬6g，大青叶6g，锦灯笼6g，蝉蜕3g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热养阴。

主治 猩红热后期。症见痧疹消退，身热咽痛减轻，皮肤脱屑，身有微热。

来源 《中医儿科临床浅解》

4. 桑桔土贝汤

组成 霜桑叶9g，苦桔梗4.5g，土贝母6g，生大黄3g，连翘心3g，生甘草1.5g，灯心1g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热泻火，利咽解毒。

主治 小儿猩红热。症见高热，咽喉肿痛，皮疹密集，大便干燥。

来源 《小儿病的防治方法》

5. 山梔子汤

组成 山梔子仁30g，白鲜皮30g，赤芍30g，升麻30g，寒水石15g，甘草15g。

用法 共为细末，每服3克，以紫草、薄荷各少许共煎之，去渣温服，日服2次。

功效 清热凉血解毒。

主治 小儿猩红热之出疹期。症见高热烦躁，咽喉肿痛，全身密集皮疹，便干尿黄。

来源 《证治准绳》

6. 化斑汤

组成 人参3g，知母3g，石膏末12g，甘草1.5g，粳米1撮。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热凉血，益气生津。

主治 小儿猩红热。症见发热口渴，小便黄赤，烦躁，皮疹色红而密。

来源 《保婴撮要》

水 痘

水痘是由病毒引起的急性传染病，中医又称“水花”、“水疱”。临床以成批全身皮肤出疹，斑疹、丘疹、疱疹、结痂同时存在为特征。传统医学认为，本病是由于外感时邪病毒，内有湿热蕴郁而致。在治疗上一般采用疏风清热，解毒祛湿等方法。

1. 银翘二丁汤

组成 银花10g，连翘10g，六一散10g，车前子10g，紫花地丁15g，黄花地丁15g。

用法 水煎取汁50~100毫升，分3次服，二煎外洗患

部。

功效 清热解毒渗湿。

主治 小儿水痘，轻证重证皆宜。

来源 《中医杂志》1989(3)：10

按语 本方系著名老中医王玉玲经验方。经临床治疗小儿水痘114例，全部治愈。用药后退热时间平均1天，水痘结痂时间平均2.6天。经临床观察，本方对减轻临床症状，预防局部感染有显著的疗效。

2. 贯射合剂

组成 贯众15g，黄芩15g，射干9g，板蓝根30g，鸭跖草30g。

用法 水煎浓缩取汁，每日1剂。

功效 清热解毒。

主治 水痘初起，发热，咽痛，舌红。

来源 《新中医》1983(6)：35

按语 上方诸药均有清热解毒之功效，近代药理研究有较强的抗病毒作用。临床治疗小儿水痘效果显著，一般服药3~5剂即可治愈。

3. 银石汤

组成 银花30g，石膏30g，玄参15g，紫草15g，泽泻15g，薄荷9g，荆芥6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热解毒，凉血祛湿。

主治 小儿水痘属湿热盛者。症见痘疹瘙痒，疹色紫暗，疱浆混浊，舌红苔黄厚，脉滑数。

来源 《黑龙江中医药》1990(1)：15

4. 水痘方

组成 柴胡3g, 茯苓6g, 桔梗3g, 黄芩1.5g, 生甘草1.5g, 竹叶3g, 灯草2g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分3次服。

功效 清热渗湿。

主治 小儿水痘属湿盛者。症见痘疹较密, 疱浆清亮, 或见发热, 舌苔白厚。

来源 《神仙济世良方》

5. 清热解毒汤

组成 金银花9g, 连翘9g, 黄连3g, 紫草6g, 木通6g, 生甘草3g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清热解毒祛湿。

主治 小儿水痘。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 本方具有较强的清热解毒之功, 并有祛湿之力, 对感受时邪, 内蕴湿热之水痘颇为适用。对水痘轻证可去其黄连、紫草, 加竹叶、牛蒡子等。对水痘重证可酌加赤芍、薏仁等。

6. 麦汤散

组成 地骨皮3g, 滑石3g, 甜葶苈6g, 麻黄6g, 大黄6g, 知母6g, 羌活6g, 人参6g, 甘草3g。

用法 共为粗末, 每服6克, 以小麦7粒煎汤服之, 日服2次。

功效 清热泻火利湿。

主治 小儿水痘初起。症见发热, 疹色红润, 疱浆清

亮，便干尿黄。

来源 《证治准绳》

7. 消毒饮

组成 炒牛蒡子60g，荆芥穗15g，甘草15g。

用法 共为粗末，每服9克，水煎去渣温服，日服2~3次。

功效 疏风清热解毒。

主治 小儿水痘初起。症见发热咳嗽，咽赤，皮肤红色斑丘疹，疱浆清亮。

来源 《证治准绳》

流行性腮腺炎

流行性腮腺炎是由腮腺炎病毒引起的急性传染病，属传统医学“痄腮”范围。临床以发热、耳下腮部漫肿疼痛为主要特征。中医学认为，本病之发生是由于外感风温邪毒所致。其治疗主要采用清热解毒，散结消肿之法。

1. 绿豆菜心汤

组成 绿豆30g，白菜心3个。

用法 先将绿豆煮熟，再加入白菜心煮熟，一起食用。每日食用2次，连用4~5天。

功效 疏风清热解毒。

主治 腮腺炎初起，邪毒在表。症见发热咽痛，耳下腮部肿胀疼痛。

来源 《效验小金方》

2. 清解汤

组成 龙胆草9g, 黄芩6g, 连翘9g, 板蓝根9g, 蒲公英9g, 山栀子6g, 夏枯草9g, 甘草3g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清热解毒消肿。

主治 腮腺炎, 邪毒炽盛者。症见发热头痛, 咽红肿痛, 烦躁口渴, 腮部肿痛较甚。

来源 《中医儿科临床浅解》

按语 本方系著名儿科专家王伯岳治疗小儿腮腺炎之习用方。多年应用于临床, 屡屡效验。临床若见睾丸肿痛, 应加入橘核、荔枝核、延胡索等药。

3. 腮腺炎糊剂

组成 胡黄连15g, 大黄15g, 吴茱萸15g, 胆南星10g。

用法 共研细末, 以陈醋调成糊状, 敷于两侧足心涌泉穴, 再以纱布包扎, 每次1剂, 每日换药2次。

功效 清热消肿散结。

主治 热毒蕴结之腮腺炎。症见耳下腮部肿痛, 坚硬拒按, 咀嚼困难, 伴发热咽痛。

来源 《吉林中医药》1990(4): 28

按语 用本方外敷后可迅速退热, 减轻疼痛。一般连续敷药2~4天即可治愈。

4. 军白散

组成 大黄15g, 白矾15g, 黄柏15g, 栀子10g。

用法 共为细末, 用鸡蛋清调之, 敷于患处, 每3~4小时取下药物, 加调鸡蛋清, 继续敷用。

功效 清热解毒, 消肿散结。

主治 流行性腮腺炎, 腮部肿痛较甚者。

来源 《吉林中医药》1986(1):23

5. 相思子粉

组成 相思子20g, 鸡蛋清适量。

用法 相思子微火炒至黄色, 研成细面, 以鸡蛋清调成糊状, 敷贴患处, 每日1次。

功效 清热解毒消肿。

主治 流行性腮腺炎。

来源 《新中医》1974(6):48

按语 本方外敷治疗流行性腮腺炎485例, 全部治愈。一般用药半天即可消肿, 最长用药3天, 相思子有毒, 不宜内服。

6. 二黄膏

组成 生大黄30g, 川黄柏15g, 胆南星15g。

用法 先将前两味药共碾成极细粉末, 然后将胆南星用水煎成浓汁, 再调和药粉成厚糊状, 每取药糊适量敷于患处, 药糊干燥后再重新换药。

功效 清热解毒消肿。

主治 流行性腮腺炎。

来源 《中草药外治验方选》

7. 野菊花外敷方

组成 鲜野菊花叶、鸡蛋清。

用法 先将野菊花叶捣烂如泥, 然后将鸡蛋打一小孔, 倒出蛋清适量, 调和药泥, 敷于患处, 通常连用3~4次即可。

功效 清热解毒消肿。

主治 流行性腮腺炎。

来源 《中草药外治验方选》

8. 大黄散

组成 大黄30g, 木香9g, 姜黄9g, 槟榔9g。

用法 共研细末, 以醋调之敷于患处, 中间留一孔出气。

功效 清热泻火, 消肿止痛。

主治 流行性腮腺炎。症见腮部及耳部皆肿, 剧痛难忍, 连及齿痛。

来源 《万病验方》

9. 消肿膏

组成 大黄100g, 芒硝100g, 赤小豆100g, 白矾20g。

用法 共研细末过筛, 取凡士林300克加温溶化, 与药粉调匀为膏, 敷于患处, 每日换药1次。

功效 清热解毒, 散瘀消肿。

主治 小儿腮腺炎, 肿胀较甚。

来源 《四川中医》1985(5): 6

10. 车梔膏

组成 车前草60g, 梔子90g。

用法 二药共研细末, 以凡士林油适量调成软膏。将患处用米醋洗净, 然后贴敷药膏, 每日换药1次, 连用3~5天。

功效 清热解毒消肿。

主治 小儿流行性腮腺炎。

来源 《广西中医药》1982(1): 39

11. 龙黛浸膏

组成 活地龙10条, 青黛粉20g, 白糖50g。

用法 将地龙置白糖内，集取浸出液，与青黛粉调匀外敷患处。

功效 清热解毒，消肿止痛。

主治 流行性腮腺炎。

来源 《新中医》1991(3)：32

12. 二味拔毒散

组成 明雄黄、白矾各等分。

用法 二药共研细末，与3倍之米醋调匀，每日外涂患处4~6次。

功效 清热解毒 软坚消肿。

主治 流行性腮腺炎。

来源 《医宗金鉴》

13. 青黄赤药糊

组成 青黛、大黄、赤小豆各10g。

用法 先将大黄、赤小豆研成细末，再与青黛粉和匀，分成2包，先取1包与鸡蛋清2个调成稀糊状，用鸡毛蘸药糊涂敷两腮部，干后再涂，每日5~6次。

功效 清热解毒，凉血消肿。

主治 流行性腮腺炎。

来源 《小儿外治疗法》

14. 仙冰膏

组成 仙人掌100g，冰片5g。

用法 取仙人掌鲜品去刺，捣烂摊于纱布上，表面撒匀冰片，敷于患处，2天换药1次。

功效 清热解毒 软坚散肿。

主治 流行性腮腺炎。

来源 《四川中医》1993(3):35

15. 四顺清凉饮

组成 大黄6g, 当归3g, 赤芍3g, 甘草3g, 羌活3g, 防风3g, 栀子3g, 连翘3g, 灯心1.5g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 祛风清热, 凉血解毒。

主治 流行性腮腺炎, 邪热炽盛者。症见腮部肿胀疼痛, 口干口渴, 大便秘结。

来源 《医宗金鉴》

16. 连翘漏芦汤

组成 连翘3g, 漏芦3g, 麻黄3g, 升麻3g, 黄芩3g, 白藜3g, 枳壳1.5g, 甘草1.5g。

用法 共为粗末, 每服3克, 以水煎之, 去渣温服, 量儿大小不拘时服。

功效 清热解毒, 消肿散结。

主治 流行性腮腺炎。症见腮部肿甚, 咽喉肿痛。

来源 《婴童百问》

百 日 咳

百日咳是由百日咳杆菌引起的呼吸道传染病。中医称“顿咳”、“疫咳”、“鹭鸶咳”。临床以痉挛性咳嗽, 咳后有鸡鸣样回声为特征。病程一般较长, 往往可持续2~3个月。传统医学认为, 本病由外感时行疫气, 伤于肺系, 肺失宣降所致。其治疗以宣肺止咳化痰为原则。

1. 百日咳散

组成 百部50g, 桔红50g, 葶苈50g, 瓜蒌仁50g, 车前子35g, 清半夏35g, 生桃仁40g, 白糖500g。

用法 共为细末, 1岁每服0.5克, 每增1岁增量0.5克, 每日3次, 随证加用引药煎服。

功效 镇咳降逆祛痰。

主治 百日咳。咳嗽频作, 痰多而呕。

来源 《中医儿科诊治验篇》

按语 本方为辽宁省著名老中医赵圣渝经验方。方中百部止咳化痰, 半夏化痰止呕, 葶苈、蒌仁等降气化痰, 白糖色白入肺, 有消痰祛热之功。本方治疗小儿百日咳40例, 全部在短期内治愈。

2. 百日咳方

组成 蒲公英30g, 北秦皮10g, 天竺子10g, 炙百部10g, 炙甘草10g。

用法 水煎服, 每日1剂, 日服3次。

功效 清热解毒, 降逆止咳。

主治 百日咳。

来源 《中医杂志》1988(12): 4

3. 百马汤

组成 百部10g, 马兜铃3g, 炙甘草6g, 大枣4枚。

用法 水煎服, 每日1剂, 日服3次。

功效 降气止咳。

主治 百日咳。

来源 《中医杂志》1988(12): 4

4. 百咳灵

组成 百部粉20g, 石胡荽末20g, 甘草粉50g, 牛胆粉

30g，蜈蚣粉10g，侧柏叶20g，黄豆粉10g。

用法 将新鲜牛胆1个刺破取汁，文火煎熬，使水份蒸发成固体，离火干燥，研为细末。其余各药均为细末，混匀贮瓶备用。1岁以内每服0.3克，1~3岁每服0.5克，日服3次，用冰糖水或白开水送服。

功效 清肺镇咳。

主治 百日咳之痉咳期。症见连咳不已，日轻夜重，咳后有鸡鸣样回声。

来源 《四川中医》1986(12):16

按语 本方治疗小儿百日咳百余例，一般均在3~7日内治愈，无不效验。

5. 胆汁百部丸

组成 鲜猪胆汁2份，百部3份，白糖25份。

用法 先将白糖加热溶化，再加入百部粉、猪胆汁，文火熬2~3分钟，去火稍冷后制成丸剂，如桐子大。1~3岁每服2丸，4~6岁每服4丸，日服3次。

功效 清肺止咳。

主治 百日咳之痉咳期。

来源 《山东中医杂志》1984(4):42

按语 猪胆汁苦寒，入肺经，具有清肺热止咳之功，百部止咳作用较强。近代药理研究，二药均有抗百日咳杆菌作用。本方治疗百日咳250例，2周内治愈率达95%以上。

6. 月梨合剂

组成 青皮梨1个，月石2~4g。

用法 将梨横切平分成3片，再用月石研成细末，均匀撒入梨切面上，置口杯内蒸熟，每次服药梨1片，日服3

次。

功效 清热润肺止咳。

主治 百日咳。

来源 《湖南中医杂志》1987(3) : 37

7. 白花二子膏

组成 白前25g, 桑白皮25g, 款冬花25g, 葶苈子25g, 莱菔子25g, 海浮石10g。

用法 水煎去渣, 加入荸荠汁30克, 冰糖60克, 文火浓缩至200毫升, 每次20毫升, 早晚各服1次。

功效 清肺止咳。

主治 百日咳痉咳期。症见咳而面肿, 喉头有水鸡声。

来源 《浙江中医杂志》1985(1) : 18

8. 小儿消咳汤

组成 白屈菜15g, 百部12g, 天门冬10g, 沙参7g, 白前5g, 侧柏叶5g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分3次服。

功效 润肺化痰止咳。

主治 百日咳。

来源 《中国当代名医验方大全》

9. 鸡胆百合散

组成 鸡胆1个, 百合10g。

用法 鸡胆焙干, 与百合共研细末。1岁以内分3日服, 1~2岁分2日服, 3~6岁1日服, 每日量均分3次服用。

功效 清肺止咳。

主治 百日咳。

来源 《浙江中医杂志》1989(6) : 243

10. 百日咳验方

组成 鲜萝卜汁50ml，薄荷霜0.04g。

用法 取鲜萝卜（青皮红皮均可，以辣为宜）切片榨汁，再将薄荷霜研为细末入汁内搅匀，每日早晚各服1次，每次50毫升，凉服。

功效 降气化痰，镇痉止咳。

主治 小儿百日咳。

来源 《新中医》1983(6)：4

11. 顿咳散

组成 猪胆汁150g，黄连100g，葶苈子250g，炙百部100g，大蒜250g，甘草250g。

用法 上药分别研成粉末，大蒜去皮捣成泥，再将猪胆汁与诸药和汁搅拌均匀，置阴凉处阴干，装瓶备用。1岁小儿每服1~2克，以后可按年龄增减，日服2~3次，服时将散剂置容器内煎3~5分钟后去渣内服。

功效 清热泻肺镇咳。

主治 百日咳痉咳期。

来源 河南省安阳市中医院儿科协定方

12. 痉咳灵

组成 黄精15g，百部15g，沙参12g，麦冬12g，枳实15g，紫菀12g，甘草10g，蜈蚣1~2条。

用法 水煎服，每日1剂，分3~6次服。

功效 滋阴化痰，降气止咳。

主治 百日咳痉咳期。

来源 天津市传染病院经验方

13. 熊胆抑咳散

组成 熊胆、朱砂、姜半夏、橘红、川贝母、款冬花各6g。

用法 将熊胆、朱砂以乳钵研细取出，再研余4味药，诸药和匀，装瓶备用，1~2岁每服0.3~0.5克，2~4岁每服0.5~1.5克，日服3次。

功效 清热化痰镇咳。

主治 百日咳痉咳期。

来源 《新中医》1987(2)：42

14. 款冬花丸

组成 款冬花、桑白皮、乌梅肉、茯苓、杏仁、紫菀、川贝、五味子、百合、阿胶、百部各等分。

用法 共为细末，炼蜜为丸，如芡实大，每服1丸，日服2~3次，以竹沥送服。

功效 清热宣肺，化痰止咳。

主治 小儿百日咳。症见咳嗽频作，连声不已，痰涎粘稠，日久不愈。

来源 《幼科金针》

15. 旋磁百部汤

组成 旋复花4g，灵磁石10g，白芍6g，百部6g，鹅不食草6g，蝉衣3g，黄芩5g，大贝母4g，枇杷叶4g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 肃肺镇咳，清肝降逆。

主治 小儿百日咳之痉咳期。

来源 《中医杂志》1984(11)：36

按语 小儿百日咳是具有特殊症状的咳嗽，其病位不仅在肺，且与肝有密切关系。本方能肃肺止咳化痰，清肝调气

降逆。临床应用多年，治疗100余例，疗效显著。

脊髓灰质炎

脊髓灰质炎又称小儿麻痹症，是由脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病。临床以发热，肌肉疼痛，继而出现肢体痿软，肌肉萎缩为特点。本病属传统医学“痿证”、“软脚瘟”等范畴。中医学认为，本病是由于外感湿热之邪，阻遏经脉，气血运行不畅，筋脉失养所致。其治疗主要根据病程的不同阶段，采用相应的治疗方法。

1. 加味葛根芩连汤

组成 生石膏18g，葛根12g，甘草9g，金银花12g，杭芍12g，川连4.5g，黄芩9g，全蝎3g，蜈蚣3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热解毒，祛风逐秽。

主治 脊髓灰质炎之急性期。症见发热较甚，头痛咽痛，烦躁不安，肢体疼痛。

来源 《赵锡武医疗经验》

按语 本方系名老中医赵锡武之经验方。方中重用清热解毒之品，并以全蝎、蜈蚣驱散风邪。急性期应用本方，可祛邪解毒，避免病邪深入，缩短疗程，减少后遗症。

2. 加味金刚丸

组成 萆薢30g，杜仲30g，肉苁蓉30g，菟丝子30g，巴戟天30g，天麻30g，僵蚕30g，蜈蚣50条，全蝎30g，牛膝30g，乌贼骨30g，精制马钱子60g。

用法 共为细末，制成蜜丸，每丸重3克，每服1~2丸，

口服3次。

功效 解毒通络，补益肝肾。

主治 脊髓灰质炎之恢复期。症见肢体麻痹，痿软无力。

来源 《赵锡武医疗经验》

按语 本方重用补益肝肾之品，意在强筋骨，通经络，以促进患肢功能的恢复。方中所用虫类药物较多。全蝎、蜈蚣能祛风活络，调节神经。马钱子的有效成份是士的宁，为脊髓神经兴奋药，故用量较大。马钱子必须严格炮制，以解其毒。

3. 小儿麻痹外洗方

组成 鸡血藤100g，桂枝20g，艾绒10g，荆芥10g，川红花10g，陈皮10g，食醋100ml。

用法 将上药加水煎煮后倒入盆内，患肢用布覆盖，置于盆上，先熏蒸20~30分钟，待药液温度适中时边浴边擦，每日1~2次。

功效 活血通络舒筋。

主治 脊髓灰质炎之后遗症期。症见肢体瘫痪，肌肉萎缩，关节弛缓不收。

来源 《福建中医药》1989(6):23

4. 通络活血方

组成 桑枝15g，川芎10g，当归10g，桑寄生10g，土牛膝10g。

用法 水煎浓缩取汁，加黄酒1盅，用纱布蘸药液在瘫痪部位揉擦，每日2~3次。

功效 活血脉，通经络。

主治 脊髓灰质炎之后遗症期。

来源 《中医儿科学》

5. 牛膝马钱子丸

组成 川牛膝9g，马钱子0.3g。

用法 马钱子用油炸黄，与川牛膝共研细末，用蜂蜜调之成丸，每丸重3克，每服1丸，日服2~3次。

功效 活血通络。

主治 脊髓灰质炎之恢复期或后遗症期。症见下肢痿痹无力，肌肉萎缩。

来源 《中国民间小单方》

按语 川牛膝具有活血通络，补肝肾强筋骨之功效。马钱子能疏通经络，兴奋脊髓。二药合之，可促进患肢功能之恢复。

6. 起痿丸

组成 黑犬胫骨30g，马钱子15g，地龙20g，大蜈蚣15g，党参50g，白术20g，玉竹50g，当归20g，红花8g，牛膝15g，茯苓20g，黄柏15g，黄芪30g。

用法 黑犬胫骨用香油炙酥，马钱子用温水浸10天，刮去皮毛，在香油中炸黑，去净油气，与上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重5克，每服1丸，日服3次。

功效 宣肺清胃，化湿通经。

主治 小儿麻痹症瘫痪各期。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 本方阴阳俱补，活血通经，且重用虫类药相得益彰，共奏起痿振筋之效。

7. 廋虫僵蚕散

组成 廋虫9个，僵蚕12g，川牛膝12g，马钱子1g。

用法 马钱子用油炸黄，上药共研细末，分成9包，每日服1包，晚睡前用黄酒冲服。

功效 活血逐瘀，疏通经络。

主治 小儿麻痹后遗症。

来源 《中国民间百病良方》

8. 温经通络方

组成 荆芥20g，陈艾叶20g，石菖蒲20g，葱白20g。

用法 将上药同入锅中炒热，装入布袋，熨烫患肢。

功效 温经通络。

主治 小儿麻痹后遗症。症见肢体瘫痪，患肢发凉，肌肉萎缩。

来源 《效验小金方》

9. 蝙蝠散

组成 蝙蝠2个，乌蛇10g，朱砂10g，蝎尾10个。

用法 蝙蝠在新瓦上焙干，与上药共研细末，每服1克，上肢麻痹用桂枝煎汤送服，下肢麻痹用黄芪。川牛膝煎汤送服，日服3次。

功效 活血通络。

主治 小儿麻痹后遗症。

来源 《梁秀清家传秘方选》

按语 本方系梁秀清老中医家传秘方，近二十年来治愈小儿麻痹后遗症数十例。临床应用中可配合外用血竭花散（见下方），并应坚持长期服药。

10. 血竭花散

组成 血竭10g，朱砂4g，儿茶3g。

用法 共为细末，再用公鸡冠血10克和匀，晾干成块，

用时碾成细末，以米醋调匀，每次取0.01克，抹于手足心、腋窝、腹股沟处，每日1次。

功效 活血通络。

主治 小儿麻痹后遗症。

来源 《梁秀清家传秘方选》

11. 桃红熨方

组成 桃仁30g，红花60g，生姜120g，鹅不食草30g，防风20g。

用法 上药共捣烂拌匀，加酒炒熟，布包后热熨患处，每日2~3次。

功效 活血祛瘀，温阳通脉。

主治 小儿麻痹后遗症。

来源 《小儿外治法》

12. 鹿角胶丸

组成 鹿角胶30g，鹿角霜15g，熟地15g，当归12g，人参9g，牛膝9g，菟丝子9g，白茯苓9g，白术9g，杜仲9g，虎胫骨3g，龟板3g。

用法 先将鹿角胶用无灰酒溶化，虎骨及龟板炙酥，共为细末，炼蜜为丸，如梧子大，每服20丸，空腹盐姜汤送服。

功效 补益脾肾，舒筋活络。

主治 小儿麻痹后遗症。

来源 《景岳全书》

细菌性痢疾

细菌性痢疾是由痢疾杆菌引起的小儿常见的肠道传染

病。临床以发热，腹痛，里急后重和泻下脓血粘液便为主要表现。本病属传统医学的“肠癖”范畴。中医学认为，本病是由于外感时邪疫毒，内伤饮食，损伤肠胃所致。治疗以祛邪为主，同时注意调理脾胃。

1. 新加白头翁汤

组成 白头翁9g，黄连3g，黄柏6g，秦皮12g，生川军4.5g，马齿苋18g，生甘草3g。

用法 水煎服，生川军后入，每日服1剂，分2次温服。

功效 清化湿热，通积止痢。

主治 急性细菌性痢疾。症见下利不止，日便数次，大便粘液或脓血，腹痛，里急后重。

来源 《中国当代名医验方大全》

2. 参香散

组成 苦参60g，木香10g。

用法 共研细末，每次用1~2克，以温水调成糊状敷于脐上，外以胶布固定，每日换药1次。

功效 清热止痢，行气止痛。

主治 湿热痢疾。症见大便次数增多，粘液脓血便，腹痛，肛门灼红。

来源 《中国当代名医验方大全》

按语 方中苦参清热燥湿，木香行气止痛。现代药理研究其含有挥发油，对痢疾杆菌有一定抑制作用。一般用药1~2天即可收到满意效果。本方临床应用30余年，疗效颇佳。

3. 三黄秦芍汤

组成 黄连6g，黄芩10g，大黄5g，秦皮10g，白芍10g，白头翁12g，广木香5g，当归10g，甘草5g。

用法 水煎取汁250毫升，分3次微温保留灌肠，3天为1疗程。

功效 清热解毒，调气行血。

主治 急性细菌性痢疾。症见泻下红白粘液，次多量少，腹痛，便前哭闹，发热。

来源 《辽宁中医杂志》1990（9）：38

4. 儿科十号

组成 生白芍50g，槟榔片50，枳壳20g，泽泻20g，当归25g，地榆炭25g，猪苓20g。

用法 共研细末，每周岁小儿服0.5克，每增1岁药增0.5克，每日3次。

功效 调和气血，固肠止痢。

主治 小儿红白痢疾。症见腹痛下痢，里急后重，便带脓血。

来源 《中医儿科诊治验篇》

5. 止痢饮

组成 马齿苋30g，白木槿花15g。

用法 清水煎汤，加食糖少许，当茶频饮，连服5~7日。

功效 清热利湿止痢。

主治 湿热痢疾。症见大便粘液脓血，腹痛，里急后重，口渴，小便短赤，舌苔黄腻。

来源 《广西中医药》1982（5）：8

6. 止痢敷脐散

组成 黄连1g，滑石5g，车前子5g。

用法 共研细粉过筛，用时每次取1~2克填脐中，外敷胶布，每日换药1~2次。

功效 清热利湿止痢。

主治 急性细菌性痢疾。

来源 《四川中医》1989(9):22

7. 解毒化浊汤

组成 大黄3g, 黄连4.5g, 连翘6g, 大青叶9g, 白芍9g, 鲜藿香6g。

用法 水煎服, 每日1剂, 另取紫雪散1.8克, 分2次冲服。

功效 清热解毒, 芳香化浊。

主治 小儿疫毒痢。症见壮热恶寒, 呕吐频作, 大便脓血, 里急后重, 重者神昏抽搐。

来源 《祁振华临床经验集》

按语 本方重在清热解毒, 通积止痢, 并用紫雪以清热开窍, 对疫毒痢用之收效甚佳。

8. 止痢散

组成 广木香4.5g, 川黄连6g, 白芍9g, 西川军1.5g。

用法 共研细面, 6个月~1岁每服0.3~0.9克; 1~3岁每服0.9~1.8克; 4~6岁每服2.5克。每日服3次, 温开水加白糖少许冲服。

功效 清利湿热。

主治 细菌性痢疾, 属湿热证者。症见大便带脓血, 腹痛下坠, 发热呕吐。

来源 河南中医学院附属医院儿科协定方。

9. 柏马汤

组成 黄柏100g, 鲜马齿苋200g, 食用大蒜50g, 陈皮50g, 蔗糖200g。

用法 加水800毫升，煎至600毫升，每次服100毫升，日服3次。

功效 清热解毒，行气利湿。

主治 急性细菌性痢疾。

来源 《河北中医》1990(4):12

10. 三黄粉

组成 黄芩、黄连、黄柏各等分。

用法 共研极细面，1岁以内每次用1克，2~3岁每次用2克，4岁以上用3克。加盐水30~50毫升，以无菌注射器调匀药液后注入肛内，每日1次，重者2次。

功效 清热利湿解毒。

主治 小儿湿热痢疾。

来源 《浙江中医杂志》1989(2):115

11. 止痢汤

组成 黄连100g，炒大黄200g，黄芩250g，川楝子炭150g，炒白芍200g，荆芥炭150g，元胡50g，灶心土500g。

用法 将灶心土放容器中，加水约5000毫升，搅拌、静置，取上清液煎煮上药，煎成2000毫升药液，滤出、装瓶，高压灭菌备用。1~3岁每次40毫升，3~5岁每次50毫升，5~7岁每次60毫升，保留灌肠，每日1次。

功效 清热利湿止痢。

主治 小儿细菌性痢疾。

来源 《河南中医》1985(3):42

12. 痢疾神方

组成 当归3g，黄连0.6g，白芍4.5g，枳壳1.5g，槟榔1.5g，甘草0.9g。

用法 水煎服，每日1剂，日服3次。

功效 清热解毒，行气止痛。

主治 小儿湿热痢疾。症见下利脓血，里急后重，肠鸣腹痛。

来源 《神仙济世良方》

13. 香连散

组成 木香0.3g，黄连15g，炒当归0.3克，炮姜0.3g，炒阿胶15g。

用法 共研细末，每服1.5克，以粥饮调服，频服。

功效 清热利湿，和血止泻。

主治 小儿冷热不调，腹痛下利，大便粘液或脓血。

来源 《幼幼新书》

14. 圣效散

组成 赤石脂30g，白龙骨30g，阿胶30g，诃子肉15g，木香15g，黄连15g，干姜15g，甘草15g。

用法 共为细末，每服3~6克，粟米汤调，空腹服之，日服3次。

功效 清热调脾，涩肠止利。

主治 小儿久痢。

来源 《奇效良方》

15. 双金饮

组成 罂粟壳30g，醋川芎15g。

用法 罂粟壳用蜜水炒之，与川芎共捣为末，每服3~6克，米汤送服，日服2~3次。

功效 涩肠止利。

主治 小儿赤白痢疾，下利频繁，久泻不止，无明显

热象。

来源 《幼科释谜》

流行性脑脊髓膜炎

流行性脑脊髓膜炎是由脑膜炎双球菌引起的急性呼吸道传染病。临床以发热、头痛、项强、呕吐、神志昏迷，或有惊厥为特征。本病属传统医学“春温”、“温疫”范畴。其治疗以清热解毒为大法。根据邪之深浅不同，分别采用不同的方药治之。

1. 龙胆石膏汤

组成 龙胆草12g，生石膏50g，白茅根15g，大青叶15g，知母12g，玄参15g，生地15g，甘草10g，银花15g，蒲公英15g。

用法 水煎服，每日1剂，分3~4次服。

功效 清热凉血。

主治 流行性脑脊髓膜炎，属气营两燔者。症见发热，头痛剧烈，呕吐，烦躁不安，或见肌肤发斑。

来源 《中国当代名医验方大全》

2. 除风散

组成 炒乳香6g，炒没药6g，全虫3g，僵蚕9g，蜈蚣3条。

用法 共为细末，1~2岁每服0.5~1克；2~5岁每服1~1.5克。日服3次。

功效 清热镇惊除风。

主治 流行性脑脊髓膜炎。症见壮热昏迷，惊厥抽搐，

角弓反张，频频呕吐。

来源 《儿科证治》

3. 治脑膜炎方

组成 淡竹叶1g，生地12g，生麦芽9g，杭白菊4.5g，南豆花4.5g，苏梗1.5g，白薇1.5g，小环钗6g，瓜蒌皮6g，北杏仁6g，甘草1.2g，羚羊角尖1g。

用法 羚羊角和竹叶另煎水和药，余药共水煎，另取橙子1个，取汁兑服，每日1剂，分3次服。

功效 清热救阴。

主治 流行性脑脊髓膜炎。症见久热不退，昏睡不醒，肢体偏瘫。

来源 《著名中医学家的学术经验》

4. 化斑汤

组成 石膏30g，知母12g，玄参9g，犀角6g，粳米15g，甘草9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热凉血，解毒化斑。

主治 流行性脑脊髓膜炎，气血两燔证。症见高热口渴，烦躁头痛，甚则神昏，肌肤发斑。

来源 《温病条辨》

5. 雷击散

组成 广香6g，牙皂10g，细辛10g，朱砂7.5g，雄黄7.5g，薄荷9g，藿香9g，枯矾3g，白芷3g，桔梗6g，陈皮6g，防风6g，贯众6g，法半夏6g，生甘草6g。

用法 共研细末，贮于磁瓶内蜡封备用。2~4岁每服1.5克；5~9岁每服1.5~3克；10~15岁每服3~6克。日服2

次，姜汤或开水冲服。亦可取药末少许吹鼻，每天多次。

功效 豁痰开窍，祛风解毒。

主治 流行性脑脊髓膜炎。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 本方作用全面，有调节中枢，保护神经作用，制方与用法独具一格。喷鼻法来自古法，对神昏者最为合适。本方治疗98例患儿，全部治愈。一般多在用药1~3天体温恢复正常，2~5天主要症状与体征消失。

流行性乙型脑炎

流行性乙型脑炎是由乙脑病毒引起的，通过蚊虫为媒介传播的，多发于夏秋季节的急性传染病。临床以高热、头痛颈强、惊厥、昏迷为特征。属传统医学“暑温”范畴。中医认为，本病系感受暑邪疫毒所致。根据其发病情况和传变过程，按温病之卫气营血的规律进行辨证施治。

1. 乙脑一方

组成 石膏60g，寒水石60g，蝉衣9g，大青叶9g，芦根60g，炙甘草6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解表。

主治 小儿乙脑初期，邪在卫气阶段。症见发热微恶寒，口渴，呕吐，脉浮数。

来源 《中医杂志》1987(4):34

2. 清瘟辟秽方

组成 大青叶30g，鲜藿香30g，鲜佩兰30g，连翘12g，

黄芩9g, 青蒿12g, 银花12g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分3次服, 每次冲服玉枢丹1粒。

功效 清瘟辟秽。

主治 乙脑初起, 温热夹湿。症见发热, 烦躁不安, 头痛呕吐, 胸闷, 便溏。

来源 《中医内科新论》

3. 夺痰定惊散

组成 炙全蝎15只, 巴豆霜0.25g, 犀黄0.35g, 硼砂1g, 飞朱砂1.5g, 飞雄黄1.2g, 陈胆星3g, 川贝1.5g, 天竺黄1.5g, 麝香0.15g (后入)。

用法 共研极细末密贮, 每服0.4~0.7克, 日服1~2次。

功效 涤痰泄热, 清心开闭。

主治 乙脑极期。症见高热口渴, 头痛呕吐, 神昏谵语, 颈项强直, 四肢抽搐。

来源 《全国名老中医验方选集》

按语 本方泻热之力较强, 一般鼻饲3~4小时排出黑色而杂有黄白色粘液的大便, 即痰消神苏, 未排便者可继服1次。

4. 清热开窍汤

组成 红参9g, 羚羊角1.5g, 黄连3g, 胆南星6g, 蜈蚣2条。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次服, 每次冲入三蛇胆川贝末2支, 鼻饲给药。

功效 清热熄风, 化痰开窍。

主治 乙脑极重型。症见壮热不退, 昏不知人, 颈项强

直，频繁抽搐，口禁不开。

来源 《浙江中医杂志》1985(6):247

5. 清营熄风汤

组成 犀角15g，生石膏60g，川连4.5g，黄芩9g，银花9g，连翘9g，炒天虫9g，钩藤9g，天竺黄9g，生川军9g，元明粉9g。

用法 水煎鼻饲给药，每次冲服羚羊角粉0.2克，安宫牛黄丸1粒。

功效 清营解毒，平肝熄风。

主治 流行性乙型脑炎，邪已入营，热传心包。症见高热神昏，肢体强直，牙关紧闭，四肢抽搐，脉象洪数，大便不通。

来源 《名医奇方秘术》

按语 本方为徐迪三教授之经验方，治乙脑重症。乙脑重症患者多有便秘，对热结便秘者虽用大量清营解毒之品，但邪无外泄之机，故应采用通腑泄热，釜底抽薪之法，使郁热从下而泄，故用川军、元明粉。

6. 养阴清热汤

组成 鲜石斛20g，谷芽10g，稻芽10g，知母10g，竹茹12g，鲜菖蒲12g，天竺黄10g，麦冬10g，竹叶3g，糯稻根12g，鲜藕20g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 养阴清热，兼清余邪。

主治 流行性乙型脑炎之后期，热势已去，神志转清。

来源 《名医奇方秘术》

7. 三黄石膏汤

组成 黄连6g, 黄芩6g, 黄柏6g, 石膏60g, 知母6g, 板蓝根30g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次服。

功效 清热解毒。

主治 重症流行性乙型脑炎。

来源 《新中医》1981(10):37

8. 乙脑合剂

组成 生石膏120g, 知母10g, 京赤芍10g, 粉丹皮10g, 生地15g, 僵蚕15g, 全蝎3g, 双钩藤12g, 九节菖蒲10g, 生军10g。

用法 每剂浓煎成500毫升, 3岁以上每日1剂, 3岁以下酌减, 每剂分为2次, 直肠点滴给药。重症病例每日可用2剂。

功效 清热凉血, 镇惊开窍。

主治 流行性乙型脑炎。症见高热神昏, 颈项强直, 口噤不开, 四肢抽搐。

来源 《中西医结合杂志》1989(1):45

9. 解热镇惊汤

组成 钩藤6g, 羚羊粉1.2g, 大青叶9g, 西香薷3g, 益元散12g, 连翘9g, 银花9g, 鲜佩兰12g, 鲜竹叶50片, 川连2.4g。

用法 羚羊粉先煎, 钩藤后入, 益元散以荷叶包之, 水煎服, 每日1剂。

功效 清火解毒, 熄风镇惊。

主治 流行性乙型脑炎, 属暑热动风之证。症见高热, 呕吐, 四肢强直, 抽痉频繁, 嗜睡半昏, 喉有痰声, 大便

不通。

来源 《幼科刍言》

按语 乙脑为暑温热毒，病势急骤，治疗应迎头截击，使邪毒早有出路。本方以羚羊、钩藤镇惊熄风为主，待热势稍缓，见有热结阳明即应抓住时机，投以白虎、承气，以使毒泄热减，方能奏效。

10. 活血通络汤

组成 黄芪30g，当归6g，赤芍6g，桃仁6g，红花6g，郁金6g，贝母6g，桑枝10g，菖蒲9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 益气活血，化痰通络。

主治 小儿乙脑后期，痰淤留阻型。症见神志迟呆，言语不利，精神异常，或见肢体瘫痪。

来源 《陕西中医》1990(7):301

病毒性肝炎

病毒性肝炎是由肝炎病毒引起的消化道传染病。临床以肝脏肿大，或有黄疸，肝功能异常为主要特点。本病属传统医学“黄疸”、“癰疾”等范畴。中医学认为，本病主要是由于湿热之邪侵于中焦，肝胆疏泄失常所致。治疗以疏肝、健脾、补肾为其大法。根据临床不同证候类型辨证施治。

1. 肝炎合剂

组成 青黛5g，紫草12g，贯仲10g，寒水石10g，焦楂10g，乳香6g，茜草10g，木瓜10g，绿茶10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热利湿，调气活血。

主治 小儿黄疸性肝炎，非黄疸性肝炎，乙型肝炎。

来源 《中医杂志》1985(4):33

按语 本方为儿科名医王鹏飞治疗小儿肝炎之基本方。王老应用本方加减治疗小儿肝炎200余例，发现本方对退黄，降转氨酶、降浊、降絮均有良好效果，并可使部分乙肝患者表面抗原转阴。

2. 愈肝膏

组成 斑蝥20g，雄黄20g，猪胆汁60g，蜂蜜100g，麝香2g。

用法 斑蝥米炒，去头足及翅研末，雄黄研末。先将猪胆汁和蜂蜜文火煮沸去渣，再入上药搅匀后收膏。将药膏摊于伤湿止痛膏上，敷于穴位上。穴位分为3组，1组为双侧足三里，右侧腹哀；2组为双侧阳陵泉，右侧日月；3组为双侧阴陵泉，右侧脾俞。7~10日1次，每次用1组穴，3组穴位交替使用，3次为1个疗程。

功效 清热解毒。

主治 小儿病毒性肝炎，急慢性均宜。

来源 《四川中医》1985(6):35

按语 本方外敷后局部可有轻微烧灼感，应揭下膏药，所出水泡一般可自行消失。本方治疗小儿病毒性肝炎56例，除1例因故中断治疗外，均在2个月内治愈。

3. 茅根木贼汤

组成 白茅根30g，木贼15g，板蓝根15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~4次服。

功效 清热解毒，散邪除疸。

主治 小儿急性传染性肝炎。

来源 《陕西中医》1980(5):6

按语 本方重在清热解毒。在临床应用中,可根据不同症状随证加药。经观察治疗503例患儿,治愈428例,显效45例,好转30例,近期有效率100%。

4. 补益降酶丸

组成 五味子240g, 黄芪15g, 党参15g, 黄精15g, 当归15g, 熟地15g, 枸杞子15g, 丹参15g, 香附15g。

用法 共研细末, 炼蜜为丸, 每丸重9克, 每服1丸, 日服3次。

功效 补益气血, 滋养肝肾。

主治 小儿慢性肝炎, 血清谷丙转氨酶持续升高而无明显湿热证候者。

来源 《中国当代名医验方大全》

按语 方中以五味子为主药, 五味子补虚降酶, 与上药合用, 可补益气血, 降低谷丙转氨酶。本方除湿热实邪较明显患者暂缓应用外, 对慢性肝炎均可服用。转氨酶降至正常后, 仍需继续服药3个月, 以巩固疗效。

5. 参芪虎蚤汤

组成 党参20g, 黄芪15g, 虎杖15g, 蚤休15g, 板蓝根20g, 女贞子20g, 贯众3g, 山楂10g, 首乌10g, 菟丝子10g, 平地木10g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分3次服, 连服6个月。

功效 清热解毒, 补肾健脾。

主治 小儿慢性乙型肝炎。

来源 《中西医结合杂志》1991(8):488

6. 活血截黄汤

组成 酢浆草25g, 绵茵藤15g, 茯苓15g, 丹参 15g, 薏苡仁18g, 滑石18, 郁金9g, 赤芍10g, 山楂10g, 甘草3g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分5次服。

功效 清热化湿, 活血化淤。

主治 小儿急性黄疸型肝炎。

来源 《四川中医》1988(4):20

按语 本方退黄利尿作用显著, 一般服药2~5剂黄疸及临床症状即明显改善。治疗215例患儿, 痊愈208例, 好转4例, 无效3例。

7. 病毒肝炎合剂

组成 茵陈15g, 板蓝根10g, 白术10g, 法半夏 10g, 茯苓10g, 丹参10g, 麦芽10g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清热利湿活血。

主治 小儿病毒性肝炎。

来源 《云南中医学院学报》1981(2):22

8. 利湿退黄汤

组成 茵陈30g, 白茅根20g, 白术6g, 蒲公英10g, 白薏仁3g, 麦芽6g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次服。

功效 清利湿热, 利胆退黄。

主治 小儿黄疸性肝炎, 属湿热内蕴者。症见全身皮肤粘膜皆黄, 黄色鲜明, 小便黄赤。

来源 《陕西中医函授》1986(4):30

9. 小儿乙肝煎剂

组成 党参、黄芪、白术、云苓、山药、玫瑰花、当归、赤白芍、蚤休、丹参、败酱草各10g。

用法 水煎服，每日1剂，分次服完。

功效 健脾利湿，解毒活血。

主治 小儿乙型肝炎之慢性活动性肝炎及慢性迁延性肝炎。症见肝区疼痛，食少腹胀，大便时干时稀，倦怠乏力，肝功化验异常，乙肝表面抗原阳性。

来源 湖北中医学院儿科教研室方

10. 乙型肝炎方

组成 生大黄3g，虎杖8g，黄柏3g，丹参8g，白术5g，贯众3g，女贞子5g，艾叶3g，苍术5g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 健脾利湿，清热解毒。

主治 急慢性乙型肝炎。症见腹胀纳呆，大便稀溏，面黄乏力，低热，尿黄。

来源 《中医杂志》1987(3):54

11. 金茵六一散

组成 金钱草10g，茵陈30g，滑石20g，枳壳3g，甘草5g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热利湿，利胆退黄

主治 小儿急性黄疸型肝炎。

来源 《湖北中医杂志》1986(2):18

12. 加味黛矾散

组成 青黛10g，明矾40g，山药60g。

用法 共研细末混匀，每日3克，分2~3次吞服，可装

入胶囊服用。

功效 清热解毒，利湿退黄。

主治 急性病毒性黄疸型肝炎。

来源 《浙江中医杂志》1984(5):208

12. 和肝散

组成 全瓜蒌60g,广郁金15g,片姜黄15g,枳实15g,生甘草15g。

用法 共研细粉，1~3岁每服1~2克；4~6岁每服3~5克。日服3~4次，白糖开水冲服。

功效 清热化湿，健脾和肝。

主治 小儿黄疸型肝炎，属湿热型。

来源 《千家妙方》

呼吸系统疾病

上呼吸道感染

上呼吸道感染是小儿最常见的疾病，中医称为“感冒”。临床以发热、恶寒、鼻塞、流涕、咳嗽、全身不适为主要表现。传统医学认为，本病主要是由于外感风寒或风热之邪，客于肺卫所致。其治疗主要采用发表、解毒等方法。并根据临床不同证型，分证治之。

1. 紫苏陈皮汤

组成 紫苏9g，陈皮5g，生姜5片，大葱1根。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 疏风散寒解表。

主治 风寒感冒初起。症见恶寒发热，鼻塞流清涕，无汗，咳嗽，舌红苔薄白，脉浮紧。

来源 《万病验方》

2. 葱豉泥

组成 香豉3g，葱白头3根。

用法 香豉研为细末，葱白捣烂如泥，二药混合，加入滚开水少许调和，敷于两侧劳宫穴。

功效 疏风散寒。

主治 风寒感冒。症见恶寒发热，无汗，鼻塞，喷嚏，流清涕。

来源 《上海中医药杂志》1979(2)：14

按语 本方系《时后方》之葱豉法。葱豉相合能散风寒，劳宫穴属手厥阴心包经，药之能发汗，故可使风寒之邪从汗而解。

3. 解热合剂

组成 薄荷叶6g，青蒿穗9g，荆芥穗9g。

用法 水煎服，煎2沸为度，不宜久煎。每剂药煎2次，去渣取汁，饭后服用，服药后取微汗。

功效 疏风清热。

主治 小儿外感风热。症见发热重，恶寒轻，头痛，鼻塞，咳嗽，舌红苔薄黄，脉浮数。

来源 《古今儿科临床应用效方》

4. 荷菊茶

组成 薄荷10g，菊花15g，竹叶5g。

用法 共用开水冲泡，代茶饮。

功效 辛凉清热解表。

主治 小儿风热感冒。症见发热，咽红肿痛，汗出，鼻流浊涕，舌红，脉浮数。

来源 《中医非药物疗法》

5. 柴蒲葶草汤

组成 北柴胡6g，蒲公英10g，葶草10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒。

主治 小儿暑热感冒。症见发热，口渴多饮，无汗或少汗，多尿。

来源 《湖北中医杂志》1981(4):27

6. 清热饮

组成 青黛3g, 天竺黄6g, 藿香9g, 寒水石12g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清热解毒。

主治 小儿感冒, 邪热炽盛者。症见肌肤灼热, 面色红赤, 咽喉肿痛, 口渴尿黄。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

7. 七味茶

组成 连翘12g, 钩藤12g, 前胡12g, 防风9g, 木通9g, 荆芥6g, 蝉衣6g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分次口服。

功效 疏散风邪, 清热止咳。

主治 小儿外感发热, 咳嗽。

来源 《中医杂志》1984(9): 34

按语: 本方系流行于闽西山区治疗小儿外感的验方, 数年应用效果很好。临床应用中, 可根据外感的不同证候, 随证加减。

8. 清解二号

组成 银花9g, 连翘9g, 地骨皮9g, 青黛3g, 白薇9g, 生石膏15g, 生地9g, 藿香9g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分3次服。

功效 疏风清热。

主治 小儿感冒重症, 汗出而热不退, 咽痛, 咳嗽。

来源 《金厚如儿科临床经验集》

9. 大青蚤休饮

组成 大青叶30g, 蚤休9g, 苏叶6g, 薄荷6g, 桔梗9g, 甘草6g, 玄参9g。

用法 水煎服，1~3岁每日1/3剂，3~6岁每日1/2剂。

功效 发汗解表，清热解毒。

主治 上呼吸道感染。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

10. 健儿散

组成 人参3份，五味子2份，川贝1份。

用法 研成细末，制成散剂，3岁以下每服0.3克；4~6岁每服0.6克；7~10岁每服1克。日服2次，一般连服1~2个月，于夏季服药。

功效 益气固表。

主治 上呼吸道感染反复发作。

来源 《中医杂志》1981(6):46

11. 小儿退热合剂

组成 生麻黄10g，葛根10g，青蒿15g，生石膏30g。

用法 水煎二次混合液直肠点滴。1岁以下每次100毫升，1~3岁每次150~200毫升，3~5岁每次250毫升，每日2次。

功效 清热解毒。

主治 小儿外感高热。

来源 江西中医学院附属医院儿科协定方

12. 解表退热液

组成 石膏300g，连翘30g，荆芥15g，薄荷15g，芦根10g，赤芍10g。

用法 将石膏先煎30分钟，加连翘、赤芍、芦根再煎10分钟，加荆芥、薄荷煎15分钟，共煎2次，煎成300毫升，过滤后加适量泥泊金备用，以每公斤体重3毫升保留灌肠。

功效 疏风解表清热。

主治 小儿外感高热。

来源 《新中医》1985(7):13

13. 感冒舒冲剂

组成 大青叶30g, 连翘30g, 荆芥12g, 防风12g, 白芷12g, 薄荷12g, 牛蒡子12g, 桔梗12g, 甘草6g。

用法 上药1剂制成冲剂3袋。5岁以下每服1/3~1/4袋, 5岁以上每服1/2袋, 日服3次。

功效 疏风清热。

主治 小儿上呼吸道感染。

来源 《中西医结合杂志》1989(1):38

14. 柴葛石刺汤

组成 柴胡10g, 葛根12g, 石膏30g, 皂角刺15g, 金银花15g, 连翘15g, 牛蒡子10g, 黄芩10g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分3次于饭后服。

功效 解表清热, 解毒利咽。

主治 小儿上呼吸道感染, 以发热为主证者。

来源 《湖北中医杂志》1990(4):7

按语: 本方为表里双解剂, 临床用于小儿上感发热, 表里同病者。表证者, 无论风寒风热, 里证者不论肺热胃热, 均可用之。

15. 三拗药饼

组成 麻黄、杏仁、甘草各等分, 葱白头适量。

用法 上药共研细末, 加葱白头一起捣烂和匀, 做成直径5厘米大小的药饼置脐部, 盖上塑料薄膜, 胶布固定, 每日贴敷1~2次。

功效 表散风寒，宣肺止咳。

主治 小儿风寒感冒。

来源 《和剂局方》

16. 退热灵

组成 犀角3g，川黄连9g，栀子9g，滑石9g。

用法 共研细末，1岁小儿每服0.3克，每增1岁可增服0.15克，4～6小时服药1次。

功效 清热解毒，泻火凉血。

主治 小儿上呼吸道感染之高热。

来源 《千家妙方》

17. 青山菊合剂

组成 青蒿6g，山芝麻1g，野菊花1g，一点红9g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 疏风清热。

主治 小儿上呼吸道感染之风热型。

来源 广西中医学院附属医院儿科方

18. 石板柴胡汤

组成 生石膏30g，板蓝根15g，大青叶15g，柴胡9g，僵蚕9g。

用法 水煎服，每日1剂，分3～4次服。

功效 疏风清热。

主治 小儿外感发热。

来源 《广西中医药》1987(3)：15

急性支气管炎

急性支气管炎是小儿时期常见的呼吸系统感染性疾病，临床以咳嗽为主要表现，故属中医“咳嗽”之范畴。传统医学认为，本病多系风邪束肺，肺失宣降所致。其治疗以清热宣肺，止咳化痰为基本方法，根据其寒热虚实之不同，辨证论治。

1. 止咳散

组成 半夏15g，葶苈子8g，川贝8g，熟大黄6g，竹沥汁6g。

用法 前4味药烘干研末，竹沥混入药中，此为1包剂量。1岁以下每服1/3包，1~3岁每服1/2包，3~5岁每服2/3包。将药面用纱布包裹，置锅中用少许水煎5~10分钟，将药包内汁挤净，加白糖少许，日服2次。

功效 清热止咳化痰。

主治 小儿急性支气管炎，属热证者。症见发热，咳嗽气喘，喉中痰鸣。

来源 《中医杂志》1984(12)：47

2. 苏子饮

组成 苏子9g，姜制竹沥30g，法半夏3g，沉香3g，川朴3g。

用法 水煎服，竹沥后入，每日1剂，分早晚2次服。

功效 清热化痰，止咳平喘。

主治 急性支气管炎。症见咳嗽频作，喉中痰鸣，或见呼吸气促。

来源 《古今儿科临床应用效方》

按语 本方系吴克潜教授治咳家传效方，一般服药3剂即效。对汗不易出者可加入麻黄2克，不宜冷服。

3. 清肺散

组成 前胡45g，杏仁90g，炙桑皮60g，川贝母60g，炒枳实24g，莱菔子45g，橘红45g，桔梗30g，生甘草15g。

用法 川贝、甘草研为细末，余药煎煮浓缩成膏，兑入川贝、甘草粉，烘干轧成细粉，每服1克，日服3次。

功效 清肺化痰，利气止咳。

主治 外感风热咳嗽。症见咳嗽流涕，咯痰不爽，咽喉不利。

来源 北京中医学院东直门医院儿科协定处方

4. 咳嗽二号

组成 百部9g，白前9g，紫菀9g，乌梅9g，杷叶9g，青黛3g，前胡9g，杏仁6g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清肺止咳化痰。

主治 急性支气管炎。咳嗽频作，痰多微喘，久咳不止，无明显发热。

来源 《金厚如儿科临床经验集》

5. 化痰散

组成 川贝末9g，猴枣0.3g。

用法 共研细末混匀，每包重1克。1岁每服0.3克，3岁每服0.6克，6岁每服1.0克。日服3次。

功效 清热化痰。

主治 急性支气管炎，属肺热盛者。症见咳嗽气促，喉

中痰鸣。

来源 《何世英儿科医案》

6. 麻辛汤

组成 炙麻黄6g, 细辛4g, 炙冬花10g, 五味子 8g, 炙枇杷叶30g, 射干12g, 川贝5g, 石膏20g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 宣肺化痰, 止咳平喘。

主治 急性支气管炎。症见发热, 咳嗽不止, 喘促气急。

来源 《湖北中医杂志》1984(4): 29

按语 本方寒温药并用, 具有止咳化痰平喘之功效。治疗214例, 服药3天治愈者195例, 好转11例, 总有效率为96.24%。多数患儿经服药2剂即热退咳止。

7. 加味三拗汤

组成 麻黄6g, 前胡8g, 杏仁8g, 半夏8g, 黄芩10g, 桑白皮10g, 橘络1.5g, 甘草3g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清热宣肺, 化痰止咳。

主治 急性支气管炎, 属风热挟痰型。症见发热咳嗽, 喉中痰鸣。

来源 《新中医》1986(8): 31

8. 儿咳糖浆

组成 生麻黄30g, 光杏仁60g, 款冬花90g, 天竺子90g, 大青叶120g, 炙甘草18g。

用法 加入蔗糖120克, 防腐溶液6毫升, 制成糖浆300毫升。6个月~1岁每服2~4毫升, 日服3次。以后每岁加1毫升, 最大量不超过10毫升。

功效 宣肺止咳化痰。

主治 急性支气管炎，风寒或风热者皆可用之。

来源 上海市中医院儿科协定方

9. 桃花散

组成 生石膏25g，川贝25g，朱砂5g。

用法 共为细末，6~12个月每服0.25~0.5克，1~3岁每服0.5~0.75克，3~6岁每服0.75~1.5克。日服3次。

功效 清热宣肺，止咳化痰。

主治 小儿肺热咳嗽。症见咳嗽喘促，鼻干唇红，喉中痰鸣，睡眠不安。

来源 黑龙江中医学院儿科经验方

10. 小儿清肺散

组成 川贝母100g，生石膏60g，朱砂30g，冰片2g，牛黄1g，琥珀1g。

用法 共为细末混匀，1~3岁每吸0.5~1克，3~6岁每服1~1.5克，日服3次。

功效 清热宣肺，镇惊止咳。

主治 小儿肺热咳嗽。症见发热，咳嗽频作，喘促痰鸣，或见惊惕。

来源 辽宁中医学院附属医院儿科验方

11. 麻皂散膏

组成 麻黄10g，牙皂6g，细辛10g，白豆蔻6g，白芥子16g。

用法 共研细末，过筛备用。用时取药粉0.7克，置万应膏中间铺匀，稍加热后贴患儿背部肺俞穴处，一张膏药可贴3天，连贴3~5张。

功效 祛风散寒，宣肺止咳。

主治 小儿风寒咳嗽。症见咳嗽频作，咳痰色白清稀，无热或低热，舌淡苔白。

来源 《湖北中医杂志》1985(3)：24

12. 止嗽护肺汤

组成 荆芥6g，苏子6g，莱菔子6g，杏仁5g，前胡7g，黄芩9g，百部9g，陈皮9g。

用法 水煎服，每日1剂，分3~5次服。

功效 清热宣肺，止咳化痰。

主治 小儿急性支气管炎。症见发热，咳嗽咳痰，气急烦躁，疲倦食少。

来源 《中西医结合杂志》1986(10)：619

13. 清宁散

组成 桑白皮10g，炒葶苈10g，赤茯苓10g，车前子10g，栀子仁10g，甘草5g。

用法 共为细末，每服1~2克，日服3次，以姜枣煎汤服之。

功效 清肺宁心，止咳化痰。

主治 肺热咳嗽。症见发热面赤，心烦，咽喉肿痛，咳嗽频作，喉中痰鸣。

来源 《育婴秘诀》

14. 加味华盖散

组成 麻黄3g，杏仁6g，苏子10g，前胡10g，橘红6g，桑白皮9g，桔梗10g，赤茯苓10g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 温肺降气，止咳化痰。

主治 肺寒咳嗽。症见咳嗽声重，痰白而多，鼻塞流涕。

来源 《医宗金鉴》

慢性支气管炎

慢性支气管炎是由感染或理化刺激等因素引起的支气管慢性炎症。临床以咳嗽反复发作作为特点，属传统医学“内伤咳嗽”、“痰饮”等范畴。中医认为，本病多由咳嗽日久不愈，伤及肺阴，酿津为痰所致。治疗以止咳化痰为原则，根据临床不同证型，采用相应的治疗方法。

1. 百花膏

组成 凤凰衣（微炒）30个，麻黄30g，款冬花50g，百合50g。

用法 上药先浸一宿，文火煎2遍，滤汁加入炼蜜60克，鲜生姜汁1匙，收成清膏约500克，分为1周服。每次1匙，每日2～3次。

功效 宣肺止咳，顺气化痰。

主治 小儿咳嗽反复发作。

来源 《当代名医临证精华》

按语 本方系丁光迪教授之家传秘方。方中凤凰衣能治久咳气结，麻黄、冬花宣肺理气，诸药合之平淡清灵，每能奏效。

2. 阿胶散

组成 明阿胶45g，鼠粘子3g，马兜铃15g，杏仁7个，甘草3g，糯米30g。

用法 明阿胶用面炒，鼠粘子微炒，杏仁去皮。上药共为细末，每服1.5~3克，日服3次，食后服。

功效 滋阴清热，润肺止咳。

主治 小儿阴虚久咳。症见干咳无痰，口燥咽干，口渴喜饮，便干尿黄，舌红少苔。

来源 《小儿药证直诀》

3. 咳嗽神方

组成 北五味子40粒，杏仁40粒，麦冬6g，山药6g，莲子15粒，红枣15个，百合每岁1片。

用法 取猪肺一个切开，将上药入内扎口，煮烂并汤食用。

功效 养阴清热止咳。

主治 小儿久咳不止。

来源 《秘传奇方》

4. 参蛤三七胎盘丸

组成 人参30g，蛤蚧4对，三七参30g，紫河车2具，蜂蜜250g。

用法 取新鲜紫河车洗净，入花椒汤中煮2~3分钟，剪成碎块，置瓦上焙干研末。余药均烘干研末，共炼蜜为丸，每丸重3克，每服1~2丸，日服2次，30天为一疗程。

功效 扶正益气，润肺止咳。

主治 小儿慢性支气管炎。症见咳嗽反复发作，自汗乏力，气短，食少纳呆。

来源 《河南中医》1987(3):17

5. 三仁三糖油浆

组成 杏仁、白果仁、核桃仁、白糖、冰糖、蜂糖、香

油各120g, 艾叶6g。

用法 三仁去皮研碎,香油放锅内烧开,先炸艾叶至黄微黑,放三糖溶化,再放三仁粉搅匀。每服4~7克, 日服3次。

功效 润肺止咳化痰。

主治 小儿慢性支气管炎。

来源 《辽宁中医杂志》1991(9):36

6. 贝霜散

组成 川贝30g, 百部9g, 陈皮9g, 柿霜12g, 杏仁15g, 核桃仁60g。

用法 共为细末, 1岁以下每服0.5克, 1~2岁每服1克, 3~4岁每服1.5克, 5~6岁每服2克, 日服3次。

功效 滋阴润肺止咳。

主治 慢性支气管炎, 肺阴亏虚, 久咳少痰。

来源 青岛市中医院儿科协定方

7. 外熨散

组成 白芥子、紫苏子、莱菔子各40g, 生姜5片, 食盐250g。

用法 焙干共研细末, 炒热至50°C左右, 装入纱布袋内, 在两侧胸背及腋下来回熨烫, 每次30~40分钟, 每日2~3次。

功效 止咳化痰平喘。

主治 小儿顽固性咳喘, 咳嗽经久不愈, 时有喘促, 喉中痰鸣。

来源 《广西中医药》1990(2):6

8. 喘宁三号

组成 砒石0.33g, 枯矾1.33g, 豆豉100g, 银杏100g,

五味子100g，百部100g，前胡100g。

用法 粉碎共研细末，压制成1000片，2~3岁每服2片，4~6岁每服3片，7~10岁每服4片，日服2次。连续服药2~3个月为一个疗程。

功效 敛肺止咳平喘。

主治 虚寒型慢性喘息性支气管炎。

来源 《古今儿科临床应用效方》

按语 本方为北京儿童医院刘韵远主任医师经验方，临床治疗84例患儿，总有效率为95%以上。本方对年龄太小及肝肾功能不好者不宜使用，对发热者亦需停药。

9. 提金散

组成 罂粟壳30g，乌梅10g，陈皮10g，甘草10g，薄荷叶30g。

用法 共为细末，炼蜜为丸，每丸重3克，每晚睡前嚼化1丸。

功效 益气敛肺止咳。

主治 小儿肺虚，久咳不已。

来源 《育婴秘诀》

按语 本方为劫涩之剂，重镇止咳，对久咳而纯虚无邪者甚效。对实证之咳及虚中夹实、夹热、夹痰者，不可与之。

10. 气管炎膏

组成 牙皂120g，冬虫夏草90g，肉桂9g，生半夏9g，天南星9g，冰片6g，铅粉220g。

用法 先将前五味药放入500克芝麻油中炸枯成炭，捞出去渣过滤，再将滤后的芝麻油熬至滴水成珠时，入铅粉收膏，离火略停，喷水去火毒后纳入冰片搅匀，待成形时摊于

油纸上备用，贴敷于膻中穴，3天换药1次，9天为一疗程。

功效 镇咳祛痰，解痉平喘。

主治 小儿慢性支气管炎。症见咳嗽气喘反复发作，喉中痰鸣。

来源 《新中医》1982(7):31

11. 胆星天竺丸

组成 胆南星30g，半夏15g，白附子15g，天竺黄9g，天麻6g，防风6g，朱砂3g。

用法 共为细末，甘草熬膏为丸，如芡实大，每服1丸，空腹以薄荷淡姜汤送下。

功效 清热燥湿，化痰止咳。

主治 小儿咳嗽不止，痰涎壅盛。

来源 《证治准绳》

12. 人参蛤蚧散

组成 人参60g，蛤蚧1对，杏仁150g，炙甘草150g，茯苓60g，贝母60g，桑白皮60g，知母60g。

用法 蛤蚧水浸5天，每天换水，洗净后炙成黄色，与上药共研细末，每服3克，日服2~3次，米汤送服。

功效 补益肺气，化痰止咳。

主治 久病咳嗽，气喘痰鸣，面目浮肿，少气乏力，体弱消瘦。

来源 《卫生宝鉴》

毛细支气管炎

毛细支气管炎是婴幼儿较常见的下呼吸道感染，多见于

6个月以内的婴儿。临床以喘憋、呼吸困难为特征。本病属传统医学“肺炎喘嗽”、“马脾风”范畴。其发病主要是由感受外邪，壅遏肺气，肺失宣降所致。在治疗上主要采用宣肺平喘之法。

1. 苏地止哮汤

组成 苏子5g，地龙5g，前胡5g，侧柏5g，刘寄奴5g，降香2.5g，苦参2.5g。

用法 水煎服，每日1剂，频服。

功效 降气活血，平喘止哮。

主治 小儿毛细支气管炎。症见咳嗽频作，喘憋明显，喉间哮鸣，鼻翼煽动，便干尿黄。

来源 《吉林中医药》1984(3)：17

按语 本方能降气平喘，又能活血，因而可改善呼吸功能。临床观察治疗130例患儿，总有效率为98.4%，尤对实喘疗效更佳。

2. 葶苈五子汤

组成 葶苈子2g，紫苏子1g，牛蒡子3g，杏仁1g，莱菔子1g，川贝母2g，化橘红2g，海浮石3g。蝉蜕1g，大枣3枚。

用法 水煎服，取汁60毫升，分3次服，每日1剂。

功效 清热化痰，宣肺平喘。

主治 毛细支气管炎，属痰热闭肺型。症见发热咳嗽，喘促痰鸣，鼻翼煽动，烦躁不安，口唇青紫，或见抽搐。

来源 《河南省名老中医经验集锦》

3. 射干麻黄细辛汤

组成 射干10g，麻黄5g，细辛3g，葶苈子9g，钩藤

10g, 青黛10g, 乌梅10g, 大枣10g, 干姜5g。

用法 水煎服, 每日1剂, 少量频饮。

功效 止咳平喘, 清热解毒。

主治 小儿毛细支气管炎。症见呼吸急促, 喉中喘鸣, 痰白而粘, 面色晦滞, 脉快而细。

来源 《吉林中医药》1987(2): 20

4. 定喘汤

组成 麻黄3g, 桔梗3g, 青黛3g, 杏仁5g, 川椒目5g, 甜葶苈5g, 冬花5g, 地龙5g, 天竺黄6g, 桑白皮8g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 宣肺降逆, 清化痰热。

主治 小儿毛细支气管炎。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 本方在麻杏石甘汤基础上加川椒平喘, 天竺黄化痰, 青黛清热, 葶苈泻肺, 地龙解痉。临床见有高热加生石膏、地骨皮; 腹泻加茯苓、车前子。临床以本方观察治疗30例患儿均获痊愈, 28例均在3天内哮鸣音消失, 喘憋缓解。

5. 止哮灵

组成 炙麻黄3g, 白果3g, 甘草3g, 射干6g, 杏仁6g, 茶叶6g, 生姜1片, 葱白1支。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清热宣肺, 降痰平喘。

主治 小儿毛细支气管炎。

来源 《浙江中医杂志》1990(3): 103

肺 炎

肺炎是儿科临床最常见的一种疾病，传统医学称“肺炎喘嗽”。临床以发热，咳嗽，喘促为特征。中医学认为，本病之发生多由外感风邪，内蕴痰热，以致肺气郁闭所致。其治疗以宣肺定喘，止咳化痰为基本原则。根据临床不同证候特点遣方用药。

1. 银黛合剂

组成 青黛3g，银杏12g，地骨皮9g，苏子6g，天竺黄9g，寒水石9g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次口服。

功效 清热化痰，止咳平喘。

主治 小儿肺炎，痰热闭肺型。症见咳喘气急，口唇紫绀，喉间痰鸣，呼吸困难，发热面赤，舌红脉数。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

按语 本方为著名儿科专家王鹏飞家传验方，经临床观察治疗小儿肺炎120例，治愈率为77.5%，有效率为98.3%

2. 枳星牛黄散

组成 生枳壳30g，胆南星15g，黑牵牛15g，酒大黄30g。

用法 将上药共为细粉，1岁以内每服0.15~3克，1~3岁每服0.3~0.6克，3~6岁每服0.6~1.2克，每日3次，开水送服。

功效 泻肺定喘，涤痰通闭。

主治 热邪闭肺之肺炎。症见高热咳喘，呼吸困难，胸痛，便秘尿黄。

来源 《当代名医临证精华》

3. 平喘二号

组成 黄芪15g, 丹参12g, 红花9g, 桃仁9g, 瓜蒌12g, 胆南星6g, 细辛3g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 活血通淤, 宽胸豁痰。

主治 小儿呼吸道合胞病毒肺炎。症见咳逆喘促, 鼻扇, 口周发青, 舌暗红。

来源 《中医杂志》1987(1): 32

按语 本病多表现为喘憋, 面色青紫, 此系咳伤脉络, 淤血乘肺, 阻塞气道所致。故治以通淤活血, 宽胸豁痰之法。本方经北京友谊医院儿科临床观察疗效满意。

4. 新加味太极丸

组成 蝉蜕9g, 僵蚕6g, 花粉6g, 姜黄2g, 胆星2g, 麻黄2g, 天竺黄3g, 大黄1.5g, 黄芩4g, 冰片0.01g。

用法 水煎, 昼夜频服, 每日1剂, 冰片用汤剂冲服。

功效 宣肺开闭, 祛痰平喘。

主治 小儿喘憋性肺炎。症见喘憋明显, 面色青紫, 咳嗽频作, 发热, 双肺喘鸣音。

来源 《中医杂志》1988(8): 41

按语 本方对小儿喘憋性肺炎有确切疗效。经观察治疗124例, 总有效率为96%。观察结果表明, 本方对喘憋有类似西药的近控疗效, 说明对支气管炎内病毒引起的炎性变态反应有阻断作用。

5. 肺炎熨敷方

组成 生川军末9g, 生枳实末9g, 鲜松柏1把, 青萝

卜(中节)3寸,生姜1块,带根葱白3寸,麸子半碗,黄酒1杯。

用法 共捣烂置锅内炒热,用纱布分包,轮流敷胸前,见鼻尖及面部有汗为止。

功效 宽胸散结,宣肺定喘。

主治 小儿肺炎。症见咳嗽喘急,鼻翼煽动,喉中痰鸣,口渴烦躁。

来源 《幼科条辨》

按语 方中大黄、枳实取承气之义,荡涤肺蕴之热结,松柏清热凉血,葱姜酒及萝卜皆辛温发散之品,与麸子共捣炒热敷胸,以散发结胸之毒热,通里达外,纵横齐开。本方是蒯仰山老中医的经验,屡经临床应用效果很好。

6. 芥末泥

组成 芥末粉、面粉各等份。

用法 将芥末粉和面粉混匀,用50~60℃热水调成糊状,涂于双层纱布中间,面积大约15×10厘米,敷于胸部或背部罗音最多的部位,局部皮肤先涂凡士林以保护皮肤,每次敷7~10分钟,每日2次。

功效 利气豁痰,散寒通络。

主治 小儿肺炎。

来源 《中西医结合杂志》1986(2):124

按语 芥末泥敷胸可刺激皮肤,使局部血管扩张,促进炎症吸收。本法无论哪类小儿肺炎均可应用,无副作用。敷胸时应尽量避开心前区,新生儿忌敷。

7. 苦降辛开方

组成 黄连1g,黄芩10g,干姜1g,半夏3g,枳壳5g,

川郁金5g，莱菔子3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 宣肺开闭，泻火逐痰。

主治 痰热闭肺之肺炎。症见高热喘急，喉中痰鸣，胸满腹胀，舌苔白腻。

来源 《北京中医学院学报》1986(5)：36

8. 降气消痰汤

组成 苏子、瓜蒌、沙参、白芥子各15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 降气消痰，止咳平喘。

主治 小儿迁延性肺炎。症见咳嗽喘促经久不愈，喉中痰鸣，肺部罗音久不吸收。

来源 《吉林中医药》1983(2)：20

9. 熊麝散

组成 熊胆0.9~1.5g，麝香0.03~0.06g。

用法 共研细末化服，每日1剂。

功效 清热解毒泻热。

主治 小儿腺病毒肺炎，中毒症状较重者。症见稽留高热，咳逆喘促，便秘尿赤，双肺较密集干湿罗音。

来源 《中国当代名医验方大全》

按语 熊胆苦寒无毒，有泻风热，开郁结，清心平肝，凉血泄火之功。麝香味苦而辛，气温而香，开结通窍，解毒定惊。二药相合，切合温毒犯肺，痰火内结的病机。在临床应用，在辨证论治服用汤药的基础上，投以本品疗效显著。本方以病初实证为宜，中病即止。

10. 麻杏天贝散

组成 麻黄45g, 炒杏仁45g, 生石膏60g, 甘草30g, 川贝母30g, 天花粉45g。

用法 杏仁单轧成泥状, 余药共研极细面过筛, 与杏仁混合。1岁小儿每服0.5克; 1~3岁每服2~1.5克; 3~5岁每服2~2.5克。日服3次。

功效 清热宣肺, 止咳平喘。

主治 小儿肺炎, 风热或痰热闭肺型。

来源 辽宁中医学院赵纯璞老中医方

11. 地铁合剂

组成 地锦草15g, 铁苋菜15g, 钩藤15g, 板蓝根15g。

用法 水煎取汁20毫升, 每服10毫升, 日服2次。

功效 清热解毒。

主治 小儿各型肺炎。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 实验研究证明, 以上四药对呼吸道多种病毒均具有抑制作用。临床应用, 可以此为基本方, 根据不同症状随症加药。

12. 麻黄吸入合剂

组成 生麻黄100g, 白芍250g, 鱼腥草250g, 苏子100g。

用法 上药加5%尼泊金25毫升, 加微量糖精, 煎成1000毫升备用, 其中鱼腥草单独蒸馏。将药液置雾化器中, 每次2~5毫升雾化吸入, 每日1~3次。

功效 宣肺止咳平喘。

主治 小儿肺炎喘促较甚者。

来源 上海市中医院儿科协定处方

13. 芦白散

组成 芦根50g，白矾50g。

用法 共研细末，用鸡蛋清调药面，外敷后背部，敷干为度，可连续用。

功效 清热化痰。

主治 小儿各型肺炎。症见喘憋严重，痰壅气塞，呼吸困难。

来源 哈尔滨市中医院儿科协定方

按语 本方经几十年临床观察，对风寒、风热、痰热闭肺型肺炎疗效均著，有效率达95%以上，对阴虚邪恋型效果不明显。

14. 银杏散

组成 白果仁30g，杏仁30g，小茴香30g，麻黄15g。

用法 共为细末，1岁以内每服0.3~0.9克，2~3岁每服1.5~1.8克，4~6岁每服2.4克，7~9岁每服3克，日服3次，白开水加白糖少许冲服。

功效 温肺散寒，化痰平喘。

主治 风寒闭肺之肺炎。症见发热畏寒，喉间痰鸣，呼吸急促，咳嗽吐痰。

来源 河南中医学院附属医院儿科协定方

15. 苏葶丸

组成 炒南苏子、炒苦葶苈子各等分。

用法 共研细末，蒸枣肉为丸，如麻子大，每服5~7丸，淡姜汤送服，日服3次。

功效 泻肺降逆平喘。

主治 小儿痰热闭肺之咳喘。症见咳嗽喘急，痰涎壅盛，不能平卧。

来源 《医宗金鉴》

16. 肺炎热熨散

组成 苏子30g，白芥子30g，芜荑30g，香附30g，细辛10g，食盐30g，食醋少许。

用法 上药共入铁锅，炒至芳香灼手，装入布袋，立即在脊柱及其两旁或罗音密集处来回推熨，开始可隔衣而熨，待药物温度下降再直接熨于皮肤，每日2次。

功效 辛温芳化，燥湿祛痰。

主治 小儿肺炎恢复期，咳喘好转，肺部罗音久不消失。

来源 《湖北中医杂志》1990(2):5

按语 脊内为督脉，夹脊乃太阳经所循，两经在背部的穴位均能治咳喘。此部位施以外熨之法，既有推拿按摩之功，又有热力药味渗透之效，能激发经络之气，促进血液循环，故可促进肺部罗音吸收。

17. 宣肺降浊汤

组成 大生地龙4条，鲜透骨消20g，鲜五月艾10g。

用法 地龙放碗中捣溶，后二味药煎沸3~5分钟，乘沸冲入地龙碗中，澄清后去渣，2岁小儿每日1剂，分4次服，余随不同年龄增减药量。

功效 宣肺降浊，止咳平喘。

主治 小儿各型肺炎。

来源 《广西中医药》1983(2):49

按语：方中透骨消、五月艾辛苦微温，气味芳香，有宣肺祛风，通经活血之功。地龙咸寒，可清热解毒，定喘利尿。三药合用，寒温并进，辛温可升散，咸寒可重降，达宣肺降浊，止咳平喘之功效。对各型肺炎可根据临床见证而调整药量。

支气管哮喘

支气管哮喘是一种反复发作的变态反应性疾病。临床以发作性哮喘气促，呼气延长为特征。传统医学亦称“哮喘”。导致本病的外因主要是感受风寒或接触异物，其内因主要在于肺脾肾三脏不足，痰饮留伏。在治疗上宜分清寒热虚实，急则治标，缓则治本。在发作期以祛邪为主，缓解期以扶正为主。

1. 蛤海散

组成 蛤蚧 1 对（约 80g），海螵蛸 100g。

用法 焙干研成细末，每服 6 克，日服 3 次，连服 4 个月。

功效 补肺益肾。

主治 支气管哮喘。

来源 《中医杂志》1989(8):55

按语 蛤蚧入肺肾经，有补肺益肾之功。海螵蛸入肝肾经，有祛湿、收敛、补肾作用。两药伍用则相辅相成。本方治疗哮喘效果显著，多于服药 8~11 天停止发作，且疗效巩固。多数患者经服药后哮喘不再发作，收到治本之功效。

2. 哮喘二号

组成 麦冬 9g，五味子 6g，银杏 9g，紫菀 9g，百合 9g，马兜铃 9g。

用法 水煎服，每日 1 剂，分 2~3 次服。

功效 益气平喘。

主治 虚性哮喘反复发作。症见咳嗽无力，出汗气短，

口淡食少，脉缓无力。

来源 《金厚如儿科临床经验集》

按语 本方系北京市著名老中医金厚如之经验方。经北京市儿童医院列为合剂处方，多年应用于临床，疗效显著。

3. 平喘汤

组成 麻黄7.5g，地龙10g，川贝10g，细辛3g，僵蚕7.5g，车前子10g，蚤休10g。

用法 水煎服，每日1剂，分4次服。

功效 宣肺止咳，解痉平喘。

主治 哮喘发作期。症见咳嗽哮喘，夜间尤甚，痰涎上壅，不能平卧，口周发绀。

来源 《中医儿科诊治验篇》

按语 本方系赵圣渝老中医之经验方。方中地龙、僵蚕具有抗过敏作用，止喘效果较好。细辛对顽咳有卓效。蚤休能抗感染，具有清热解毒之功。该方观察治疗小儿哮喘50例，总有效率为96%。

4. 祛痰平喘散

组成 郁金9g，菖蒲6g，明矾3g，胆星9g。

用法 共研细末，以萝卜汁适量温调服之。1岁每服0.5克，每增1岁增量0.5克，每日3次。

功效 祛痰平喘。

主治 哮喘发作期。症见咳嗽痰多，气喘鼻煽，胸闷膈满，呼气延长。

来源 《周小农医案》

5. 抗敏定喘散

组成 地龙30g，全蝎30g，僵蚕30g，麻黄15g，细辛

9g, 蚤休15g, 川贝15g, 甘草15g。

用法 共研细末, 3岁以下每服0.5~1.0克, 3~6岁每服1.0~1.5克。日服3次。

功效 抗敏解痉, 止咳平喘。

主治 哮喘发作期。症见哮喘气促, 呼气延长, 口周发绀, 烦躁不安。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

6. 寒喘敷贴方

组成 细辛9g, 延胡索9g, 白芥子15g, 甘遂15g。

用法 共研细粉, 用鲜生姜汁调制成药饼6个, 药饼中心放麝香少许, 敷于两侧百劳、肺俞、膏肓穴上。用于夏日三伏, 每10天用药1次, 共用3次。

功效 温肺化痰。

主治 寒性哮喘之缓解期。

来源 《辽宁中医杂志》1984(2):15

7. 热喘敷贴方

组成 麻黄9g, 杏仁4.5g, 生石膏60g, 辛夷4.5g, 苍耳子9g, 黄芩4.5g, 白芍9g, 甘草9g。

用法 共研细粉, 用夏枯草煎液调制成药饼6个, 敷于两侧百劳、肺俞、膏肓穴上。用于夏日三伏, 每10天用药1次, 共用3次。

功效 清热宣肺。

主治 热性哮喘之缓解期。

来源 《辽宁中医杂志》1984(2):15

8. 止哮豆

组成 猪胆、黄大豆。

用法 取腊月新鲜猪胆，勿使胆汁溢出。将黄大豆计好粒数，纳入猪胆中，使豆没入胆汁中，将胆囊口扎紧，挂于阴凉通风处。待百日后取出吹干，用炭火加瓦上炙焦存性，摊在地上一宿，然后研成粉末。每次服约10粒豆之量，3岁以上小儿加倍，粥浆或温水调服。每日1~2次，连服1~3个冬春。

功效 清热补脾，肃肺止哮。

主治 小儿哮喘，无论寒热久暂均可用之。

来源 《当代名医临证精华》

按语 本方系丁光迪教授祖传验方，祖辈相传，屡验不爽。方中猪胆汁能凉肝脾，去郁热，黄大豆宽中下气，补脾生金，使其不治喘而喘自平。此药应干燥保存，不能暴晒及受潮湿，防止变腐发臭，并要坚持冬春服药。

9. 参蛤麻杏膏

组成 生晒参60g，蛤蚧2对，麻黄（去节）60g，杏仁100g，炙甘草50g，生姜60g，红枣120g，白果肉20枚。

用法 将生晒参另煎，收膏时冲入。蛤蚧去头足研末，冲入收膏，其它药加水浸泡一宿，浓煎3次去渣，滤取3次清汁再浓煎，加入冰糖500克收膏。每日早晚各一食匙，开水冲服。

功效 补肾脾，宣肺气。

主治 支气管哮喘缓解期。

来源 《中医杂志》1987(9):34

10. 紫河车散

组成 紫河车9g，坎炁9g，煅龙骨9g，五味子6g，炙甘草6g，制黄精6g，鹿角霜3g，野山参3g，制附片1.5g，肉桂1.5g。

用法 共研细末，每服3~6克，日服3次。

功效 补肾纳气固本。

主治 肾虚型哮喘。症见咳嗽哮喘，面灰不泽，精神疲倦，手足欠温，纳少便溏。

来源 《当代名医临证精华》

11. 复方地龙散

组成 地龙30g，全蝎 30g，僵蚕 30g，蚤休 15g，麻黄 15g，象贝母15g，甘草15g。

用法 将三味虫类药分别炒焦黄色，研成细粉。余四味药煎成浓缩药汁，将药粉兑入药汁中和匀，置于太阳下晒干，制成散剂。1~2岁每服1~1.5克；3~6岁每服2克。日服3次。

功效 祛风逐邪，温肺平喘。

主治 小儿哮喘发作期，咳喘较重者。

来源 《中国中医秘方大全》

12. 截哮汤

组成 炙麻黄6g，炒杏仁6g，炙桑白皮10g，防风10g，炒白果10g，全瓜蒌6g，旋复花6g，地龙20g，制僵蚕10g，全蝎10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 理肺祛痰，降气平喘。

主治 支气管哮喘发作期。

来源 《山东中医杂志》1988(2):21

按语 本方具有祛痰和缓解支气管痉挛的作用。在具体应用中，对寒哮者加桂枝、细辛、五味子；对热哮者加鱼腥草、黄芩、生石膏、葶苈子；对肺阴虚者加蛤壳、海浮石、太子参等。一般服药1~3剂哮喘即有明显缓解，4~6剂哮喘即可控制。待症状完全控制后改为扶正固本治法。

13. 哮喘一号

组成 炙麻黄6g,杏仁8g,陈皮8g,半夏8g,苏子10g,紫苏8g,款冬花8g,白前6g,干姜4g,桂枝4g。

用法 水煎服,每日1剂,分2~3次服。

功效 温肺化痰平喘。

主治 小儿寒性哮喘。

来源 安徽中医学院附属医院儿科方

14. 哮喘二号

组成 生麻黄5g,生石膏20g,杏仁8g,桑白皮8g,葶苈子6g,川贝6g,化橘红6g,百部8g,车前子10g,马兜铃8g,黄芩6g,海蛤壳15g。

用法 水煎服,每日1剂,分2~3次服。

功效 清肺化痰平喘。

主治 小儿热性哮喘。

来源 安徽中医学院附属医院儿科方

15. 河车丸

组成 紫河车1个,蛤蚧1对,黄芪40g,白术30g,川贝20g,甘草10g。

用法 共为细面,炼蜜为丸,每丸重3克,早晚各服1丸,6岁以下小儿减半。

功效 补益肺脾,扶养正气。

主治 小儿慢性支气管哮喘。

来源 《河南中医》1981(2):38

16. 葶苈散

组成 炒葶苈15g,麻黄3g,贝母3g,炙甘草3g,炒杏仁3g。

用法 共为粗散,每取3克,水煎温服,日服4~5次。

功效 泻肺定喘，止咳化痰。

主治 哮喘发作期，证属实热者。症见哮喘气促，胸高息涌，坐卧不安。

来源 《幼幼新书》。

17. 五圣丹

组成 煨天南星30g，制半夏30g，陈皮30g，杏仁49粒，甘草12g。

用法 先将南星、半夏研末，以姜汁、皂角汁拌匀。再将陈皮、甘草研末，以竹沥调和。研杏仁泥，与上药共蒸蜜和为丸，每晚睡前噙化1丸，薄荷煎汤送下。

功效 温化顽痰。

主治 小儿哮喘之缓解期。

来源 《片玉心书》

按语 哮喘一证，多以痰饮留伏为患。本方重在温化顽痰里结，使气旺痰化，哮喘则自平，故为治本断根之法。

18. 二黄二子汤

组成 炙麻黄2g，生大黄10g，苏子10g，葶苈子15g，浙贝母10g，杏仁10g，橘红5g。

用法 水煎服，每日1剂，分次频服。

功效 清热化痰，泻肺平喘。

主治 支气管哮喘发作期，属热哮者。症见哮喘气促，不能平卧，发热面赤，便秘尿赤，舌苔黄腻，脉滑数。

来源 《湖北中医杂志》1989(4):21

19. 固本培元粉

组成 紫河车60g，广地龙60g，蛤壳60g，苍耳子30g，甘草30g。

用法 共研细末，每服3克，日服2次。

功效 填补肾精，固本培元。

主治 支气管哮喘缓解期。

来源 《名医奇方秘术》

按语 本方以河车为主，具有益气填精，滋养强壮的作用，地龙可缓痉挛，蛤壳能清肺化痰，苍耳子有抗过敏作用，甘草调和诸药，并具有一定的抗炎抗过敏功效。本方对哮喘缓解期，脾肾俱虚者疗效颇著。

20. 虫草芪肺汤

组成 冬虫夏草6g，黄芪6g，大枣10枚，猪肺1具。

用法 取猪肺与诸药炖烂，饮其汤，食其肺，每于哮喘发作先兆时用。

功效 益肾养肺，补气和营。

主治 支气管哮喘。

来源 《浙江中医杂志》1989(5):237

按语 哮喘多由肺气虚弱，卫外不固，或肾气不足，营血亏虚所致。本方以猪肺为引，益肺肾之气，并调补气血，针对病因先其发作而治之，可预防哮喘之发作。

肺 脓 肿

肺脓肿是由致病微生物所引起的肺化脓症，中医称为“肺痈”、“肺脓疡”。临床以发热、胸痛、咳吐脓血为主要表现。传统医学认为，本病的发生主要是由于风热邪毒熏蒸于肺，热积血淤，聚而成脓。治疗主要采用清热解毒，托里排脓之法。

1. 肺脓疡合剂

组成 青黛3g, 紫草9g, 乳香9g, 天竺黄9g, 寒水石9g, 牙皂6g。

用法 将上药用水浸泡30分钟, 煮沸后煎15~20分钟, 每剂煎2次, 将2次煎出药液混合, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清热解毒, 祛痰排脓。

主治 肺脓肿早期及中期。症见发热不退, 咳嗽有痰, 胸痛。

来源 《中国当代名医验方大全》

按语 本方为儿科名医王鹏飞祖传验方, 曾观察治疗50例肺脓肿患儿, 全部治愈。为此曾获北京市科委三等奖。

2. 逐淤排脓汤

组成 葶苈子5g, 杏仁10g, 桔梗5g, 瓜蒌12g, 冬瓜子15g, 鱼腥草15g, 花粉10g, 白芷6g, 苇根15g, 甘草5g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清热化痰, 逐淤排脓。

主治 肺脓肿之溃脓期。症见咯脓血痰, 胸闷胸痛, 喘息不能平卧。

来源 《何世英儿科医案》

3. 清热化淤方

组成 桑白皮9g, 地骨皮9g, 寒水石9g, 青黛3g, 生薏苡仁30g, 紫草6g, 白薇6g, 乳香4.5g。

用法 水煎服, 冲服淡竹沥1支, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清热解毒, 活血化淤。

主治 早中期肺脓肿。

来源 《中国中医秘方大全》

4. 瓜蒌杏贝散

组成 全瓜蒌1个，杏仁100个，川贝30g。

用法 将瓜蒌开一小孔，杏仁去皮尖炒后入瓜蒌内，用纸糊口，再用盐和泥将瓜蒌周围包好，炭火烧至存性，去泥，研为细末，加川贝末合匀，每服1~2克，日服3次。

功效 清热化痰排脓。

主治 肺脓肿。

来源 《新编偏方秘方汇海》

5. 桔梗苇茎汤

组成 干芦根15g，薏仁15g，冬瓜子30g，鱼腥草30g，地丁草30g，桃仁10g，全瓜蒌10g，黄芩10g，桔梗10g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热解毒，化痰排脓。

主治 小儿肺脓肿。

来源 《浙江中医杂志》1985(5):211

按语 小儿肺脓肿各期均可以本方治之。临床应用中，可根据病程各期的不同症状，随证加减。病之初期宜加重清热解毒之品，病程中期宜强化排除脓痰，溃脓期宜佐用活血化淤之品，病程后期宜清化余邪，佐以益气养阴。

6. 肺痈验方

组成 银花12g，薏苡仁18g，白及9g，桔梗9g，葶苈子9g，甘草6g，生黄芪12g，生姜3片。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热散结，解毒排脓。

主治 肺脓肿。

来源 《百治百验效方集》

按语 方中银花清热散结解毒，薏苡仁、黄芪功专排脓，桔梗祛痰。肺脓肿时咳吐腥臭痰浊，胸痛不止，可迳投本方，每收良效。

7. 复方清热解毒汤

组成 野荞麦根15g，鱼腥草15g，芦根15g，红藤9g，黄芩6g，丹参9g，桃仁9g，桔梗6g，金银花15g。

用法 水煎取汁60毫升，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒，逐瘀排脓。

主治 小儿肺脓肿。

来源 《中西医结合杂志》1991(5):311

8. 托里排脓汤

组成 生黄芪6g，当归6g，川贝母4.5g，党参6g，孩儿茶1.5g，皂刺4.5g，生地6g，玄参6g，天花粉6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 扶正祛邪，托里排脓。

主治 小儿肺脓肿之后期。症见咳吐脓痰，气味腥臭，或痰中带血，心烦口干，自汗盗汗，咳逆气短。

来源 《祁振华临床经验集》

脓 胸

脓胸是由化脓感染造成的胸膜积脓，多继发于肺部感染和败血症。临床以咳嗽，胸痛，呼吸音减弱为主要表现。本病属传统医学“肺痈”范畴，其发病主要是由郁热日久，聚而成脓。治疗主要采用清热解毒，化脓排脓之法。

1. 青皂合剂

组成 青黛3g, 乳香6g, 紫草9g, 牙皂6g, 寒水石9g, 瓜蒌9g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清热解毒, 排脓利膈。

主治 小儿脓胸, 属痰热蕴肺型。症见高热, 咳嗽, 食少, 气短, 胸部膨隆, 呼吸音弱, 舌红, 脉滑数。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

按语 本方系儿科名老中医王鹏飞之经验方。本方药少力专, 具有清热解毒, 活血化淤, 化痰排脓之功效。对脓胸患儿采用本方加穿刺抽脓治疗, 见效迅速。经北京儿童医院观察治疗28例, 多数于治疗2~3周脓液吸收, 疗效满意。

2. 散结活血液

组成 川芎20g, 过山龙20g, 葛根20g, 红花10g, 青蒿10g, 丹参10g, 乳香15g, 没药10g, 赤芍10g, 莪术30g, 三棱15g, 黄芩15g, 黄柏15g。

用法 每50克中药加用75%酒精725毫升, 先将中药在酒精中浸泡7天, 将多层纱布用中药浸透, 敷于患侧胸部, 用中药离子透入仪透入, 每日1次, 15~20天为一疗程。

功效 散结止痛, 活血化淤。

主治 小儿脓胸。

来源 《新中医》1992(2):42

按语 本方通过离子透入可起到消炎止痛, 软坚散结, 活血化淤, 促进吸收, 防止和减轻胸膜增厚的作用。中药透入的最好时机是脓胸处理后, 引流拔管, 刀口愈合1周, 此时开始透入效果较好。

营养及消化系统疾病

营 养 不 良

营养不良是一种慢性营养缺乏性疾病，临床主要表现为渐进性消瘦，皮下脂肪减少，水肿，常伴各器官不同程度的功能紊乱。本病属传统医学“疳证”范畴。中医学认为，本病主要是由于脾胃虚损，运化失司，水谷精微长期吸收障碍，以致气血不荣，脏腑失养所致。治疗总以调理脾胃为大法。

1. 治疳散

组成 朱砂0.1g，蟾蜍1只，白公鸡肝1叶。

用法 蟾蜍去内脏，脱皮。将鸡肝划开口后，朱砂撒入里面，然后一同放入蟾蜍内，用鲜荷叶包好，将其焙干致焦香后，立即趁热将混有少许白糖的醋喷洒在上面，使其酥脆，研末，分3次1天吃完。

功效 健脾和胃，消积除疳。

主治 小儿营养不良。症见形体消瘦，面黄无华，毛发稀疏，发育迟缓，大便溏泻。

来源 《陕西中医》1987(7):325

按语 本方具有消积除疳，健脾之功效，治疗小儿营养不良症100例，痊愈91例，好转9例，治愈和好转时间8天，疗效满意。

2. 磨积散

组成 鸡内金30g，生谷芽30g，焦麦芽30g，生黄芪25

g. 胡连12g, 五谷虫30g, 蛭螂30g。

用法 共研细面, 每晚服3~6克, 以红糖水调服。

功效 扶脾健胃, 清热消疳。

主治 小儿营养不良, 属阴虚有热者。症见面黄肌瘦, 腹大青筋暴露, 皮肤干燥, 毛发稀疏, 结膜干燥, 肢体浮肿, 嗜凉多饮, 困倦多眠。

来源 《北京市老中医经验选编》

3. 鸡肝散

组成 鲜母鸡肝1具, 草决明20g, 鸡内金10g, 山楂10g。

用法 三药研为细面, 鸡肝捣碎如泥, 共拌匀搓成团, 如鸡蛋大小, 以纱布包之孔紧, 用2次淘米水500毫升并入瓦罐, 煎为100毫升, 先服药后饮汁, 1次服完。

功效 健脾和胃, 消食导滞。

主治 小儿疳积。症见面黄肌瘦, 腹部膨胀, 大便腥臭, 小便短少。

来源 《湖北中医杂志》1986(6):53

按语 本方以鸡肝补脾益胃, 补益气血, 辅以草决明清热降火, 鸡内金和山楂消食导滞, 米泔水健脾消食, 合之使脾运复, 积滞除, 疳自消。本方一般服1次即可见效。观察145例, 有效率为97.9%。

4. 鸡虫散

组成 鸡内金150g, 五谷虫150g。

用法 先把二药烘干, 碾成细粉, 每服3克, 以糖开水调服, 日服3次。

功效 健脾消食。

主治 小儿营养不良。症见腹部胀满，形体消瘦，食少纳呆，睡眠不安。

来源 《名中医治病绝招》

5. 健脾合剂

组成 党参10g，炙黄芪9g，生薏仁9g，茯苓9g，大枣15g，陈皮4.5g，生谷芽9g，生麦芽9g，生山楂9g。

用法 以上为1日量，制成合剂20毫升，每服10毫升，日服2次。

功效 健脾益气，消导和胃。

主治 小儿脾虚痞证。症见面色无华，形体消瘦，食欲不振，大便溏薄或秘结。

来源 《中西医结合杂志》1987(4):208

按语 本方重在健脾益气，用之可使脾虚痞证患儿机体免疫能力增强，并可使血锌含量增加，从而增进食欲。

6. 加味三甲散

组成 制鳖甲15g，制龟板15g，炮山甲15g，鸡内金15g，炒大白15g，砂仁6g，番泻叶1.5g。

用法 共为细面，1岁以内每服0.5~1克，2~3岁每服1.5~2克，4~6岁每服2.5克，日服3次。

功效 滋阴健脾，行气消食。

主治 小儿痞证，属脾胃虚弱者。症见面黄体瘦，毛发枯槁，腹大胀满，食欲减退，皮肤干燥，手足心热，大便秘结或稀粘臭秽。

来源 河南中医学院附属医院儿科协定方

7. 八仙膏

组成 鸡内金、焦山楂、神曲、麦芽、怀山药、芡实、

薏苡仁、莲子肉各9g。

用法 焙干共研细面，加入面粉500克，芝麻100克，红糖50克，烙焦饼食用，量不限。

功效 健脾益胃消食。

主治 小儿疳积。症见食欲不振，腹胀便溏，面色萎黄，形体消瘦，肚腹胀满，青筋显露。

来源 《河南中医》1985(4):23

8. 茯苓糕

组成 白茯苓、白莲肉、大麦粉、胡桃肉、黑芝麻各50g，白糖200g。

用法 以上各药（除茯苓外）均先炒至微焦，共研细末，加白糖拌匀后上蒸笼，蒸后取出切成小方糕，冷却后收贮，干燥后随时取食，每日食10~15克。

功效 补益脾胃。

主治 疳积初起，面黄肌瘦，胃纳欠佳，大便不调。

来源 《古今儿科临床应用效方》

9. 疳积验方

组成 焦三仙1份，鸡内金2份，淮山药3份。

用法 共研细末，每服1.5~4.5克，以红糖水送服，日服2次。

功效 健脾和胃，消积化食。

主治 小儿疳积。

来源 《浙江中医杂志》1989(1):45

按语 本方为名老中医蒲辅周所拟，经多年临床应用疗效显著，蒲老认为，小儿疳积多为饮食所伤，治疗当以消积调脾为主。

10. 猪肝散

组成 煅牡蛎3g，大白3g，文蛤3g，夜明砂3g，去壳使君子3g，炒莱菔子3g，鲜猪肝125g。

用法 诸药研成极细粉，混匀后与切碎之猪肝混之蒸熟，不加油盐，适量服之。

功效 补肝消积，佐以杀虫。

主治 小儿营养不良。症见四肢干瘦，腹大青筋暴露，毛发黄而稀少，眼角膜混浊，畏光不睁，时常啼哭。

来源 《千家妙方》

11. 蟾砂散

组成 大癞蛤蟆1个，砂仁适量。

用法 将砂仁研为细末，装入蛤蟆腹内，令满缝合，用泥固封，炭火煨红侯冷，将蛤蟆研末，分3次服，以陈皮煎汤送下。

功效 健脾行气消积。

主治 小儿疳积。症见面黄肌瘦，肚腹胀满，不思饮食，体弱乏力。

来源 《降囊撮要》

12. 胡黄连丸

组成 胡黄连1.5g，阿魏4.5g，神曲9g，黄连6g，麝香少许。

用法 共为细末，以猪胆汁调和为丸，如黍米大，每服20丸，日服2次。

功效 健脾消食，清热化积。

主治 小儿疳积。症见腹部胀大，青筋显露，不思饮食，面黄体瘦。

来源 《万病验方》

13. 养元粥

组成 莲子肉、山药、薏苡仁、粳米各等分。

用法 共为末煮粥，常常服之。

功效 补益脾胃。

主治 小儿疳积，面黄体瘦，食少纳呆，腹胀便溏。

来源 《保幼新编》

14. 集成肥儿丸

组成 建莲肉72g，砂仁18g，白术30g，人参3g，山楂肉12g，杭白芍12g，陈皮12g，半夏12g，云苓30g，黄连6g，薏仁18g，六神曲18g，炙甘草6g。

用法 共为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每服1丸，日服3次，米饮送服。

功效 健脾益气，行气消食。

主治 小儿疳积，脾胃虚弱。

来源 《幼幼集成》

佝 偻 病

佝偻病是婴幼儿较常见的营养缺乏症。主要是由于维生素D缺乏而使钙磷代谢失常，以致骨骼发生改变。本病属传统医学“五软”、“龟背”等范畴。传统医学认为，本病的发生主要是由于先天不足或后天失养，导致脾肾亏虚所致。治疗主要以补益脾肾为原则。

1. 益儿糖浆

组成 黄芪9g，党参9g，丁香1.5g。

用法 水煎浓缩，每剂煎成15毫升，每次服5毫升，日服3次。

功效 补益气血，温中暖肾。

主治 小儿佝偻病。症见多汗易惊，睡眠不安，毛发稀疏，齿迟行迟。

来源 《中医杂志》1988(1):35

按语 方中黄芪、党参健脾益气以生化气血，丁香温中暖肾，可振奋阳气以化精血。本方观察治疗小儿佝偻病105例全部治愈。其治愈时间及各项理化指标的恢复与用维生素D₃相同。并且中药治疗尚能增进食欲，控制腹泻，增强体力，从而提高疗效。

2. 佝偻病糖浆

组成 黄芪、菟丝子、白术各10g。

用法 水煎服，每剂煎成200毫升，每次服10毫升，日服3次。

功效 补肾健脾。

主治 小儿佝偻病。

来源 《上海中医药杂志》1989(6):9

3. 壮骨散

组成 龙骨15g，牡蛎15g，太子参15g，淫羊藿15g。

用法 共研极细面，6个月以下每日2~4克，1~3岁每日4.5~6克，4~8岁每日6.5~7.5克，分3~4次于食前20分钟加糖服。

功效 补肾壮骨。

主治 小儿佝偻病。

来源 《古今儿科临床应用效方》

4. 黄芪菟丝子方

组成 黄芪20g，菟丝子20g，牡蛎10g，苍术10g，麦芽10g，甘草10g。

用法 以上为1剂量，将7剂制成糖浆200毫升。3~18个月每服10毫升，18个月以上每服15毫升，日服3次。

功效 健脾益气，补肾壮骨。

主治 小儿佝偻病。

来源 《中国中医秘方大全》

5. 皂矾散

组成 皂矾9g，建曲15g，鸡蛋壳30g。

用法 共为细末，6个月~1岁每服0.25~0.5克，1~2岁每服0.5~1克，日服3次，白开水送服。

功效 补肾健脾壮骨。

主治 小儿佝偻病。

来源 《儿科证治》

6. 羚羊角丸

组成 羚羊角15g，虎胫骨15g，生地15g，酸枣仁15g，白茯苓15g，肉桂7.5g，防风7.6g，当归7.5g，黄芪7.5g。

用法 共研细末，炼蜜为丸，每丸重3克，每服1丸，日服2次。

功效 补益脾肾，活血壮骨。

主治 小儿五迟五软，属肾虚之证。

来源 《保婴撮要》

7. 加味地黄丸

组成 熟地30g，山萸肉30g，炒山药24g，茯苓24g，

泽泻15g, 丹皮15g, 鹿茸9g, 五加皮15g, 麝香1.5g。

用法 共为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大, 每服4~6克, 盐汤送服。

功效 补肾壮骨。

主治 小儿五迟五软, 属肾虚者。症见筋骨软弱, 行步艰难, 齿不速长, 坐立不稳。

来源 《医宗金鉴》

8. 强壮散

组成 五加皮25g, 川牛膝12.5g, 香木瓜12.5g。

用法 共研细末, 每服2.5克, 以米汤入酒2~3滴调服, 日服2次。

功效 补肾气, 强筋骨。

主治 小儿行迟, 属先天肾气不足者。

来源 《中国当代名医秘验方精粹》

厌 食 症

厌食是由多种原因引起的消化功能紊乱, 主要表现为较长时间食欲减退或消失。与传统医学文献记载的“恶食”、“不嗜食”基本相同。传统医学认为, 厌食的发病原因主要是由于喂养不当, 脾胃运化功能失调。故其治疗当以调理脾胃为原则, 并针对偏实、偏虚之不同, 采用运脾、健脾、和胃等诸法。

1. 调中一号

组成 木香1.5g, 木瓜9g, 建曲9g, 焦山楂9g, 草薢3g, 生谷芽9g, 生麦芽9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 行气消食导滞。

主治 乳食壅滞之厌食。症见食欲不振，腹胀不舒，大便酸臭，舌苔厚腻。

来源 《金厚如儿科临床经验集》

按语 本方为儿科名医金厚如之经验方，经北京市儿童医院列为协定处方，多年应用于临床，疗效显著。

2. 皂荚散

组成 皂荚、食糖。

用法 取皂荚适量，放入铁锅内，先以武火炒，以文火煨存性，剥开荚口，以内无生心为度，研为细末，每服1克，以食糖适量拌匀后吞服，每日2次。

功效 醒脾开胃，缓中健运。

主治 小儿厌食症。症见不思乳食，面黄体瘦，腹部胀满，大便干结，舌苔厚腻。

来源 《湖北中医杂志》1987（1）：25

按语 皂荚性味辛散，能升发胃气，辅食糖甘以补中，二药合之能醒脾健运，从而增进食欲。本方治疗小儿厌食症110例，总有效率为94.5%，平均疗程5天。

3. 药米健脾粉

组成 怀山药250g，薏仁米250g，芡实200g，大米600g。

用法 前三味药分次下锅，用微火炒成淡黄色。大米淘洗后晒干，用微火炒成淡黄色，与前三味混合碾细过筛。每次取一汤匙，加入糖或盐，芝麻油，用开水拌成糊状，每日服2次。

功效 健脾益气。

主治 小儿厌食症。

来源 《中医杂志》1986(2):64

4. 橘白散

组成 橘白60g, 炙鸡内金15g, 红枣6枚。

用法 橘白焙干, 与鸡内金共研细末, 每服4~5克, 日服2次, 以红枣煎汤送服。

功效 补脾和中, 助胃消食。

主治 小儿厌食症。症见不思纳谷, 脘满嗳饱, 口干嗜饮, 面黄体瘦, 便少尿清。

来源 《上海中医药杂志》1986(3):34

按语 橘白为橘皮之去红者, 有补胃作用, 其性和缓, 补中有散, 无碍胃之弊。对小儿脾胃过虚, 暂不宜大补者宜之。

5. 增食饴

组成 贯众250g, 藿香250g, 前胡120g, 荷叶10张, 淮山药200g, 太子参300g, 白萝卜2斤(取汁)。

用法 上药文火煎熬, 取二次汁混合, 浓缩至1500毫升, 加入白萝卜汁及白糖半斤, 继续浓缩至滴水成珠, 掺入山药粉100克, 停火待冷, 拌上适量香料, 制成饴糖块, 每块重5克。每次1~3块, 日服3次, 7天为1疗程。

功效 健脾助运, 和中化湿。

主治 小儿厌食症。

来源 《上海中医药杂志》1986(6):17

6. 消化散

组成 炒神曲10g, 炒麦芽10g, 焦山楂10g, 炒莱菔子

6 g, 炒鸡内金 5 g。

用法 共研细末，加淀粉 1 ~ 3 克，用白开水调成稀糊状，睡前敷于患儿脐上，以绷带固定，次晨取下，每日 1 次，5 次为 1 疗程。

功效 消食和胃，理气健脾。

主治 小儿厌食症。

来源 《中医杂志》1986(2):31

7. 金术饼

组成 炒鸡内金 30g, 炒白术 60g。

用法 共研细末过筛，与红糖、炒芝麻粉各 30 克，精面粉 500 克，加水适量和匀，制成面团，分做成 20 个小饼，文火烙制成焦黄色，每次服 1 个，每日 2 ~ 3 次。

功效 健脾助运，开胃和中。

主治 小儿厌食症。

来源 《四川中医》1990(3):17

8. 调中进食汤

组成 丁香 3g, 代赭石 10g, 白芷 5g, 青皮 8g, 炒山楂 10g, 香稻芽 10g, 陈皮 3g。

用法 代赭石先煎 20 分钟，后纳入诸药，再煎 20 分钟，煎煮 2 次混匀，每日 1 剂，分 5 次温服。

功效 升降兼施，平肝调气。

主治 小儿厌食。症见厌食拒食，强饮则欲呕，性急心烦。

来源 《中国当代名医验方大全》

9. 参梅养胃合剂

组成 沙参 30g, 石斛 30g, 乌梅 30g, 扁豆 30g, 山药

24g, 火麻仁20g, 甘草10g, 鸡内金24g。

用法 上药煎成500毫升, 加入适量防腐剂装瓶。1~3岁每服30~40毫升, 4~6岁每服50毫升, 日服3次。

功效 滋阴健脾, 养胃调中。

主治 脾胃阴虚之厌食。症见不思饮食, 口干喜饮, 大便偏干, 舌红少苔, 脉细数。

来源 安徽中医学院附属医院儿科方

10. 开胃消食饮

组成 神曲15g, 炒麦芽15g, 焦山楂15g, 槟榔9g, 陈皮6g, 木香6g, 炙甘草4.5g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 健脾开胃消食。

主治 小儿厌食症。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

11. 全蝎内金散

组成 全蝎8g, 鸡内金10g。

用法 共研极细末。2岁以下每服0.3克, 3岁以上每服0.6克。日服2次。

功效 消食和胃。

主治 小儿厌食症。

来源 《河北中医》1990(6): 20

12. 藿香饮

组成 人参30g, 半夏30g, 赤茯苓30g, 苍术60g, 陈皮25g, 藿香25g, 厚朴45g, 炙甘草30g。

用法 上药共为细末, 每次6克, 用生姜2片, 大枣1枚煎服, 日服2次。

功效 行气化湿，醒脾开胃。

主治 小儿厌食症，属脾呆不运者。症见不思饮食，腹胀不舒，面黄肌瘦。

来源 《证治准绳》

按语 脾贵在运，不在补。本方重在运脾悦脾醒脾，方中用苍术而不用白术，意在运脾，并以藿香芳香化湿，醒脾开胃。本方治疗小儿厌食甚效。

13. 神术散

组成 苍术60g，陈皮60克，厚朴60g，炙甘草35g，藿香25g，砂仁12g。

用法 共为细末，每服6克，开水调下，日服2次。

功效 健脾消积进食。

主治 小儿厌食症，属食积不消者。症见不欲乳食，腹部胀满，暖气呕吐，大便为不消化状。

来源 《医学心悟》

14. 健脾散

组成 茯苓30g，人参30g，厚朴90g，苍术120g，陈皮150g，草果60g，甘草60g。

用法 共为细末，每服3克，加姜、枣水煎服，日服2~3次。

功效 健脾益胃，除湿助运。

主治 小儿厌食症，属脾虚湿盛者。症见不思饮食，腹胀呕恶，消瘦乏力。

来源 《证治准绳》

婴幼儿腹泻

婴幼儿腹泻是由不同原因引起的胃肠功能紊乱综合征，传统医学称为“泄泻”。本病多见于3岁以下小儿，临床以大便次数增多，粪质稀薄为特征。传统医学认为，本病的发生多由于感受外邪，内伤饮食等因素。其内因主要责之于小儿脾胃功能薄弱。对于本病的治疗，总以调理脾胃为原则，针对其不同的病因，审因论治。

1. 肠炎宁

组成 刺黄芩9g，泥鳅串12g，铁马鞭12g，石榴皮12g，马齿苋15g，糯米草根9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热解毒，渗湿止泻。

主治 湿热型腹泻。症见粪便呈水样或稀糊状，或有粘液，肛门灼热，小便短黄。

来源 《当代名医临证精华》

按语 本方重用清热渗湿之品，并辅以健脾止泻之药，于清中寓补，利中寓涩，治疗婴幼儿湿热经久不愈之腹泻疗效甚佳。

2. 暖脐止泻散

组成 木香10g，丁香10g，肉桂10g，白胡椒10g，冰片5g。

用法 先将前4味药研极细末，再入冰片研匀，贮瓶备用。每次取10克，装入三层纱布袋内，药袋敷脐上，再以布带盖脐束腰一周，2日换药1次。

功效 温中止泻。

主治 虚寒腹泻。症见久泻不止，大便稀薄，食少腹胀，肠鸣漉漉。

来源 《中医杂志》1991(7)：42。

按语 本方对发热者宜慎用之。用药期间忌食生冷油腻之品，可进食米粥、淡盐汤等，以护固胃气。

3. 复方五倍子散

组成 五倍子9g，生姜6g，吴茱萸6g，白胡椒7粒，葱白1段。

用法 生姜、葱白捣烂如泥，余药研成细末，取食醋20毫升，加热至50~60℃，与上药调成糊状。脐部先以凡士林涂擦，然后趁热将药敷于脐部，外以纱布固定，每日换药1次。

功效 温中散寒止泻。

主治 婴幼儿寒湿泻，虚寒腹泻，迁延型腹泻。

来源 《中西医结合杂志》1986(6)：344

4. 五肉汤

组成 莲子肉15g，山楂肉10g，诃子肉7.5g，乌梅肉3g，大枣肉20g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 健脾消食止泻。

主治 婴幼儿迁延性腹泻。症见腹泻经久不愈，时轻时重，大便溏薄。

来源 《陕西中医》1980(5)：12

按语 本方治疗婴幼儿迁延性腹泻62例，治愈42例，好转16例，无效4例，总有效率为93.5%。

5. 止泻方

组成 肉蔻6g, 丁香1g, 赤石脂9g, 伏龙肝 9g, 莲子肉9g, 寒水石9g。

用法 水煎浓缩取汁30毫升, 6个月以内婴儿每服5毫升; 1岁小儿每服10毫升。日服3次。亦可制成散剂, 6个月以内婴儿每服1克; 1岁小儿每服1.5克。每日服3次。

功效 健脾和胃, 温中固肠。

主治 虚寒腹泻。症见大便稀溏, 完谷不化, 面白肢冷, 舌质淡, 脉沉细。

来源 《古今儿科临床应用效方》

按语 本方系儿科名医王鹏飞家传验方。经北京儿童医院临床治疗794例, 疗效甚佳。

6. 五子炒煎饮

组成 五味子5g, 莱菔子5g, 车前子5g, 吴茱萸子5g, 黄荆子7g。

用法 将上药分别炒至黄黑色待冷再炒, 重复7次, 然后将诸药入瓦罐, 加水200毫升, 煎取100毫升, 分2~3次服完, 连服2~3剂。

功效 健脾燥湿止泻。

主治 小儿迁延性腹泻, 日久不愈。

来源 《湖南中医杂志》1988(4): 48

按语 本方治疗小儿腹泻306例, 除5例效果欠佳外, 均在2天内治愈。

7. 七味白术散

组成 藿香5g, 木香5g, 葛根5g, 人参5g, 茯苓10g, 炒白术10g, 甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次口服。

功效 健脾益气止泻。

主治 小儿慢性腹泻，迁延性腹泻。症见腹泻时轻时重，经久不愈，大便稀薄，色淡不臭，面黄消瘦。

来源 《小儿药证直诀》

8. 健脾止泻散

组成 山药15g，薏苡仁10g，鸡肝1具。

用法 山药、薏苡仁共研细末，鸡肝切成片与药末拌匀，置碗中加食醋适量蒸熟，早晚分服。

功效 健脾止泻。

主治 婴幼儿慢性腹泻。

来源 《湖北中医杂志》1985(5)：35

按语 本方治疗婴幼儿慢性腹泻千余例，均获较好疗效。一般患儿经服药3天腹泻即明显好转。

9. 吴萸散

组成 吴萸2g，丁香1.5g，木香1.5g，肉桂3g，苍术3g。

用法 共研细末，每次取1~2克，以食醋调成糊状，敷于脐部，用胶布或伤湿止痛膏封严，每2日换药1次。

功效 温中散寒，行气利湿。

主治 婴幼儿腹泻。症见大便清稀如水，便中有不消化食物，肠鸣腹痛。

来源 《中西医结合杂志》1988(9)：565

10. 加味天水散

组成 生山药30g，滑石18g，粉甘草9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清暑利湿，和中止泻。

主治 小儿暑日腹泻不止，尿少，发热，烦躁口渴，恶心呕吐。

来源 《医学衷中参西录》

11. 参香散

组成 苦参 6 份，木香 1 份。

用法 共研细末，用温水调制成饼状，用伤湿止痛膏将药固定在脐部，24 小时更换 1 次。

功效 清热燥湿，实肠止泻。

主治 湿热腹泻。症见粪便粘稠，或有粘液，肛门灼热而红，尿少而黄。

来源 《当代名医临证精华》

12. 麝桂散

组成 麝香、丁香、肉桂。

用法 共研细末，用温水调制成饼状，用伤湿止痛膏将药固定在脐部，24 小时更换 1 次。

功效 健脾燥湿止泻。

主治 脾虚久泻。症见大便稀薄，水谷不化，经久不愈，反复发作，面黄乏力。

来源 《当代名医临证精华》

13. 代针丸

组成 五倍子、吴茱萸、公丁香、灵磁石、白芥子各等份。

用法 共研细末，加冰片或麝香少许，用油膏制成黄豆大之丸剂。选足三里、天枢，中脘、关元穴，置药丸于穴位上，以伤湿膏封贴，每日换药 1 次，5 次为 1 疗程。

功效 调理脾胃，疏清肠道。

主治 小儿消化不良。

来源 《中医杂志》1982(9)：45

按语 代针丸之取名是以药物代替针灸疗法。用药物刺激人体的一定穴位，通过经络传导作用激发经气，调整脏腑功能，从而达到治疗目的。本方观察治疗小儿消化不良 250 例，总有效率为96.8%。

14. 伤乳腹泻方

组成 山楂炭12g，青皮6g。

用法 共研极细末混匀，以水 160 毫升调成浆水状，加红糖适量，隔水蒸20分钟，每服15毫升，1日4次。

功效 行气消乳止泻。

主治 婴儿伤乳腹泻。症见大便稀薄，便中夹奶块，日便数次，不思乳食。

来源 《中医杂志》1983(5)：42

15. 诃子四味饮

组成 诃子3g，石榴皮6g，泽泻6g，栗壳1.5g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 收涩止泻。

主治 小儿久泻不止。

来源 《四川中医》1989(10)：12

16. 木香豆蔻散

组成 肉豆蔻12g，诃子肉12g，木香3g。

用法 肉豆蔻面煨去油，诃子及木香均先煨之，共研细面，每服10~12克，以砂仁煎汤调服，每日2~3次。

功效 温中行气止泻。

主治 小儿虚寒腹泻。症见久泻不止，大便稀薄，水液澄清，腹痛肠鸣，面青气冷。

来源 《幼科金针》

17. 集成止泻散

组成 车前子60g，白茯苓60g，山药60g，炙甘草 18g。

用法 先将车前子用青盐水炒 7 次，白茯苓及山药分别炒之，共研细末，每服 6 克，以乌梅煎汤调服，日服 2 次。

功效 健脾实肠止泻。

主治 小儿脾虚久泻，症见久泻不止，大便稀溏，食少纳呆，神倦乏力。

来源 《幼幼集成》

按语 方中车前子乃止泻要药，能分清泌浊，用青盐水炒之可去滑利之性。茯苓、山药能健脾实肠。用乌梅煎汤意在收敛。亦可用炒米煮汤调服。

18. 诃子散

组成 诃子30g，肉豆蔻30g，炒白术30g，人参 30g，茯苓30g，煨木香30g，陈皮15g，炙甘草15g。

用法 诃子、肉豆蔻以面煨之。上药共为细末，每服 3 克，以姜汤调服，日服 2 次。

功效 温中补虚，收敛止泻。

主治 脾胃虚寒之腹泻。症见泻下清稀，肠鸣腹胀，肢冷面白，饮食懒进。

来源 《医宗金鉴》

19. 健脾止泻汤

组成 孩儿参9g，焦白术9g，茯苓9g，夏枯草 9g，白鲜皮9g，扁豆花9g，罂粟壳3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 健脾利湿，佐以固涩。

主治 脾虚湿盛之腹泻。症见反复腹泻，久泻不止，泻下为水样或稀糊状，并不消化食物，皮肤反复出现湿疹。

来源 《名医奇方秘术》

秋 季 腹 泻

秋季腹泻是由轮状病毒感染所引起的肠道炎症，因多发于秋末冬初，故名秋季腹泻。多见于6个月至2岁的婴儿，临床以起病急，发热，呕吐，水样或蛋花样便为特征。本病属传统医学“泄泻”范畴，其病因主要是由于风寒之邪客于肠道所致，治疗以补脾止泻等方法。

1. 五味秋泻饮

组成 土茯苓20g，白术6g，煨葛根6g，炒鸡内金3g，藿香6g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次口服。

功效 健脾利湿止泻。

主治 小儿秋季腹泻。症见发热咳嗽，呕吐，大便稀水或蛋花样。

来源 《广西中医药》1987(2)：20

2. 秋泻汤

组成 藿香9g，地榆9g，寒水石9g，伏龙肝9g，赤石脂9g，丁香1g。

用法 水煎浓缩成100毫升，每服10~15毫升，日服3次。

功效 清热利湿止泻。

主治 婴幼儿秋季腹泻。

来源 《中医杂志》1984(10):35

3. 温中止泻汤

组成 肉桂3g, 肉豆蔻3g, 藿香3g, 党参6g, 白术6g, 茯苓6g。

用法 水煎服, 每日1剂, 频服。

功效 温中健脾止泻。

主治 婴幼儿秋季腹泻。症见大便稀薄如水, 时有呕吐, 咳嗽。

来源 《广西中医药》1989(5):20

4. 秋泻合剂

组成 银花6g, 鸡内金6g, 地榆10g, 车前子10g, 泽泻10g, 葛根10g, 白术10g, 甘草3g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分4~5次服。

功效 清热利湿止泻。

主治 婴幼儿秋季腹泻。

来源 《广西中医药》1983(4):20

5. 止泻汤

组成 葛根3g, 藿香3g, 茯苓5g, 乌梅5g, 石榴皮6g, 青黛2g, 草蔻2g, 白术10g, 板蓝根15g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分次频服。

功效 健脾化湿止泻。

主治 婴幼儿秋季腹泻。

来源 《中级医刊》1982(1):52

6. 温脐散

组成 吴茱萸5 g，肉桂5 g，木香5 g，公丁香4 g，地榆4 g。

用法 共研细末，装入纱布袋内，敷于脐上，包扎固定，48小时去除。

功效 温中散寒止泻。

主治 婴幼儿秋季腹泻。症见大便稀水，腹痛肠鸣。

来源 《中医杂志》1983(4)：35

7. 除湿和胃煎

组成 藿香4 g，紫苏4 g，苍术6 g，厚朴6 g，砂仁3 g，茯苓9 g，车前子6 g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 健脾和胃，除湿止泻。

主治 小儿秋季腹泻。症见大便水样，日便5~10次，伴呕吐，脱水。

来源 《河南中医》1990(4)：37

8. 诃子散

组成 诃子60 g，干姜30 g，木香12 g，丁香4.5 g，肉桂少许。

用法 共为细末，每服3~6克，以砂仁煎汤调服，日服2~3次。

功效 温中散寒止泻。

主治 小儿秋季腹泻，属风寒泻者。症见泻下如水，肠鸣腹痛，足冷气逆。

来源 《幼科金针》

9. 治泻秘方

组成 白胡椒3 g，铅丹3 g。

用法 共为细末，取药末2克，用唾液少许湿润，填入脐中，外以纱布覆盖，胶布固定，24小时去掉。

功效 温中止泻。

主治 小儿秋季腹泻。

来源 《四川中医》1992(5):11

按语 本方系范林老中医之秘方，观察治疗30例患儿，全部治愈。一般敷药5分钟腹痛即缓解，腹泻次数逐渐减少，敷药1~2次即可治愈。

10. 腹泻效灵汤

组成 党参6g，茯苓9g，白术6g，乌梅15g，干姜3g，泽泻9g，车前子9g，滑石3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 健脾利湿，温中止泻。

主治 小儿秋季腹泻。

来源 《山西中医》1992(3):28

按语 本方重用乌梅，乌梅味酸，主收敛，生津止渴，涩肠止泻，与利湿之品合用，可起到调节水液代谢作用。本方在临床应用10余年，疗效卓著，一般服药1~3剂即可获愈。

小儿溃疡病

小儿溃疡病以往并不多见，近年来由于小儿内窥镜的开展，检出率有所上升。临床以腹痛，呕吐，便血，消瘦等为主要表现。本病属传统医学“胃脘痛”范畴。其病因主要与情志紧张，饮食不节有关。治疗以健脾扶胃，调养气血为主。

1. 活血理气汤

组成 藿香9g，小茴香6g，神曲9g，伏龙肝9g，青黛3g，紫草9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2～3次服。

功效 活血化淤，理气和胃。

主治 小儿溃疡病。症见上腹隐痛，并见黑便，呕吐，消瘦，低热，贫血。

来源 《中医杂志》1992(6)：39

按语 本方以活血化淤为主，兼以理气止痛，和胃健脾。方中藿香、小茴香、神曲能调理脾胃，温中散寒，疏通郁滞；青黛、紫草清热凉血活血。临床应用中见胃痛剧烈者加丁香、荔枝核；体质虚弱者加黄精、黄芪；便血较重者加服止血宁。

2. 止血宁

组成 白及9g，五倍子6g，诃子6g，明矾3g。

用法 水煎浓缩成100～130毫升，随服。

功效 收敛止血。

主治 小儿溃疡病，便血较重者。

来源 《中医杂志》1992(6)：39

按语 小儿溃疡病往往以便血、呕血等症状较多见，治疗应在辨证论治的基础上配合应用本方。方中白及收敛止血，五倍子涩肠止血，诃子下气涩肠，明矾清热止血，诸药合之，共奏止血之效，对溃疡病便血者用之效佳。

3. 儿溃散

组成 黄芪500g，桂枝20g，血竭20g，炒白芍200g，炙甘草50g，九香虫50g，枯矾30g，黄连45g，白及300g，

乌贼骨300 g，徐长卿300 g。

用法 共研细末，每服10~20克，日服3次，于饭前半小时以热水或蜂蜜将药粉调成糊状吞服，勿饮水。

功效 温中补气，生肌敛溃。

主治 儿童胃十二指肠溃疡。

来源 《浙江中医杂志》1988(11)：489

按语 本方以温中补气，和里缓急之黄芪建中汤为基础方，加黄连清热和胃，白及、血竭收敛止血，枯矾燥湿止血，乌贼骨收敛制酸，徐长卿解毒镇痛，九香虫温中理气，诸药合用，可健脾益气，促进溃疡愈合。本方治疗53例患儿，痊愈30例，好转17例，无效6例。

4. 黄芪建中膏

组成 黄芪250 g，白芍240 g，炙甘草50 g，桂枝120g，生姜50 g，党参200 g，大枣200 g，当归200 g，白术200g，陈皮100 g，半夏100 g，炒曲芽100 g。

用法 上药共冷水浸泡12小时后，文火煎煮三遍，取其药汁与饴糖360克和蜂蜜1000克熬炼成膏剂，每服20克，日服3次，饭后服。

功效 温中补虚，缓急止痛。

主治 小儿溃疡病。

来源 《湖北中医杂志》1990(4)：26

霉菌性肠炎

霉菌性肠炎是由白色念珠菌侵犯消化道所引起，临床以大便次数及量增多，大便发绿色，有泡沫粘液或呈豆渣样，

口腔出现白膜为主要表现。本病属传统医学“泄泻”范畴。多因素体虚弱，脾肾不足，湿热内蕴所致。治疗常采用健脾益肾，清热利湿等法。

1. 连梅汤

组成 黄连3 g，乌梅9 g，麦冬9 g，生地9 g，葛根9 g，山药9 g，诃子9 g。

用法 水煎服，每日1剂，分次频服。

功效 健脾益气，清热利湿。

主治 小儿霉菌性肠炎。

来源 《山西中医》1993(1)：17

按语 方中黄连清化湿热，抑杀霉菌；乌梅酸敛，与苦药相伍酸苦泄热，与甘药同用酸甘化阴；葛根能升发清阳之气，退热止泻；山药健脾。方中诸药合用，可健脾气，益肾阴，清湿热，平虚火。本方观察治疗27例，全部治愈。其退热及止泻时间均优于西药治疗。

2. 凉膈散加味

组成 栀子6 g，甘草6 g，熟川军6 g，黄连6 g，连翘15 g，土茯苓15 g，半枝莲15 g，黄芩8 g，薄荷叶10 g，芒硝3 g（冲）。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清上泄下，解毒祛湿。

主治 小儿霉菌性肠炎。

来源 《湖北中医杂志》1989(1)：47

3. 化湿导滞汤

组成 山药30 g，扁豆20 g，泽泻10 g，黄连5 g，熟川军4 g。

用法 水煎服，每日1剂，浓煎取汁80毫升，分服。

功效 健脾化湿，导滞止泻。

主治 小儿霉菌性肠炎。

来源 《上海中医药杂志》1988(6)：8

4. 马鱼合剂

组成 马鞭草15g，鱼腥草15g，防风5g，广木香3g，石榴皮4g，淮山药8g，炒山楂6g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分4～5次服。

功效 清热解毒，利湿止泻。

主治 小儿霉菌性肠炎。症见反复腹泻，黄稀泡沫样便或绿色水样便，形体消瘦，低热，纳差。

来源 《湖南中医杂志》1987(1)：34

按语 本方既能清热解毒，又能健脾利湿，从而达止泻之目的。治疗10例患儿全部获愈。服药期间应忌生冷油腻和过甜食物，药物剂量可根据年龄和病情调整。

急性坏死性小肠炎

急性坏死性小肠炎是一种发病急骤，病死率高的儿科危重症，多见于3～9岁儿童。临床以腹痛、呕吐、腹泻、便血和毒血症为主要表现。本病属传统医学“腹痛”、“便血”等范畴。其病机为热毒蕴结肠胃，热伤血络所致。治疗以清热解毒，活血化淤，凉血止血等方法。

1. 三七白及散

组成 参三七粉、白及粉各3～6克。

用法 二药等量以温开水调成糊状，口服或鼻饲给药。

3岁内每服3克；4岁内每服4克；5岁内每服5克；大于5岁每服6g。日服2次。便血停止后药量减半继服3日。

功效 清热止血。

主治 急性坏死性小肠炎。症见腹痛，红果酱样血便。

来源 《古今儿科临床应用效方》

按语 本方止血作用迅速而可靠，经临床与西药止血剂对照观察，其治愈率和平均止血天数均优于西药组。

2. 导毒化淤汤

组成 黄连6克，黄芩10g，大黄10g，炒地榆10g，炒槐花10g，白头翁10g，丹皮10g，炒枳实10g，甘草3g。

用法 每日2剂，1剂水煎服，分4次口服或鼻饲，另1剂保留灌肠，每日2次。

功效 清热解毒，除湿导滞。

主治 急性出血性坏死性肠炎。

来源 《成都中医学院学报》1980（1）：40

3. 泻热止血汤

组成 熟大黄6g，丹皮3g，桃仁3g，没药3g，地榆3g，三七3g，银花6g，公英6g，红藤10g。

用法 水煎取汁100毫升，每服20毫升，日服2次，口服或胃管给药。

功效 泻热破淤，止血消肿。

主治 新生儿坏死性小肠炎。症见频繁呕吐，呕吐咖啡样物，腹部胀满，便血，大便气味腐臭。

来源 《中医杂志》1992（4）：41

按语 本方系大黄牡丹汤加减而成。坏死性小肠炎之病理与肠痈相似，由湿热淤聚郁结而成。本方以大黄之苦寒行

血，荡涤一切湿热淤结之毒，且能化淤解毒，为主药。服本方后可排出大量脱落腐烂之肠粘膜，而后便血自止。

4. 解毒活血汤

组成 紫花地丁16g，凤尾草16g，刘寄奴16g，红藤16g，地榆16g，仙鹤草31g。

用法 水煎服，每日1剂，随服。

功效 清热解毒，活血化淤。

主治 小儿急性出血性坏死性小肠炎。症见腹痛，腹胀，腹泻，便血，呕吐。

来源 《浙江中医杂志》1987（7）：295

5. 马齿苋合剂

组成 鲜马齿苋200g，生大黄10g，蒲公英30g，槐花30g，桃仁5g，赤芍10g，白芍10g，生地榆10g，槟榔10g。

用法 马齿苋取汁兑入煎液中，生大黄后入，余药水煎，每日1剂，随服。

功效 清热解毒，化淤通腑。

主治 小儿急性出血性坏死性小肠炎。症见突发腹痛，腥臭味血便，高热不退。

来源 《浙江中医杂志》1987(7)：296

按语 本病多由热毒郁积小肠，伤及肠络所致。故本方以马齿苋、蒲公英等清热利湿，凉血解毒，大黄、槟榔导淤热下行，桃仁、赤白芍活血化淤，槐花、地榆凉血止血。本方与西药常规疗法同用治疗42例患儿均愈。

6. 清肠解毒汤

组成 川军6g，当归6g，败酱草6g，白芍6g，玄明粉2g，桃仁5g，丹皮5g，红藤5g，地榆5g，枳实10g。

用法 水煎服，川军后入，玄明粉冲服，每日1剂，分3次服。

功效 清肠解毒，活血化淤。

主治 小儿急性出血性小肠炎。症见腹痛腹泻，泻下腥臭脓血。

来源 《江苏中医》1990(5):4

中毒性肠麻痹

中毒性肠麻痹是小儿严重感染并发症之一，多继发于重症肺炎、肠炎、败血症等。临床以腹胀、腹痛、呕吐及不排便为特点。传统医学认为，本病是由于外邪壅滞脾胃，阻遏气机所致。在治疗上主要采用行气导滞，通腑消胀等方法，内治与外治相结合。

1. 温脐散

组成 丁香1.5g，木香1.5g，肉桂1.5g，麝香0.15g。

用法 共研细末，用熟鸡蛋去壳，对剖去黄，纳药末于半个蛋白的凹处，复敷脐上，外扎纱布固定。

功效 温运燥湿行气。

主治 小儿肠麻痹。症见腹胀如鼓，食入即吐，大便次多量少，神疲息短。

来源 《中医杂志》1985(7):4

按语 本方为董廷瑶教授之经验方，临床用之屡获良效。肠麻痹为小儿重症，因其呕吐而不能受药，本方用温香之品，借麝香渗透之气深入肠内，旋运气机。一般用药2小时后可闻肠蠕动，矢气转频。若无转气当再敷1次。

2. 消胀散

组成 鲜橘叶100g, 小茴香30g, 麸皮30g, 食盐50g。

用法 将前两药捣粗末, 然后加麸皮、食盐炒热, 装入纱布袋, 外敷脐部3~4小时。

功效 健脾和胃, 行气导滞。

主治 小儿中毒性肠麻痹。

来源 《中西医结合杂志》1989(7):420

按语 本法治疗80例患儿, 包括重症肺炎、小儿肠炎, 中毒性痢疾所致的肠麻痹, 全部有效。多数外敷3~4小时腹胀即消失。

3. 行气整肠汤

组成 木香、厚朴、大腹皮、槟榔片、莱菔子、枳壳各30g。

用法 加水2500毫升, 煎至500毫升, 待温置于瓶中经肛管滴入, 每分钟80~100滴。1岁以内每次滴入200~300毫升, 1~3岁每次滴350~400毫升, 3岁以上滴500毫升。

功效 疏通气机, 排气消胀。

主治 小儿中毒性肠麻痹。

来源 《辽宁中医杂志》1990(9):17

按语 本方灌肠后可使肠蠕动增强, 气机通畅。经86例临床观察, 多于滴入2~4小时获效。86例患儿全部治愈。

4. 大黄液

组成 生大黄10~20g。

用法 将大黄用50~100毫升开水浸泡, 待温度适宜(约37°C)行直肠灌肠, 保留10~20分钟, 每日2~3次。

功效 通下泻热。

主治 小儿中毒性肠麻痹。

来源 《四川中医》1989(4):13

按语 大黄有泻下作用，可促进肠蠕动，改善肠道微循环，并有抑菌作用。本法治疗50例患儿，包括婴幼儿肺炎，中毒性消化不良，中毒型菌痢等所致的肠麻痹，多在用药半小时至2小时内见效。

5. 莱菔葱白消胀散

组成 莱菔子100g，芒硝50g，公丁香10g，葱白葱头适量。

用法 分别将莱菔子、丁香研末，芒硝水化，葱洗净捣烂，共同混合后加入适量清水和白酒（或松节油）调成泥糊状，外敷脐部，将毛巾覆盖于上做湿热敷。

功效 温运行气消胀。

主治 婴幼儿腹泻所致的中毒性肠麻痹。症见腹胀如鼓，恶心呕吐，大便稀而量少。

来源 《古今儿科临床应用效方》

6. 理气消胀散

组成 冰片1g，葱白50g，生姜50g。

用法 冰片碾碎置脐孔内，葱白、生姜捣烂炒热，布包敷于脐腹中。

功效 化气开闭，清热解毒。

主治 小儿肺炎合并中毒性肠麻痹。

来源 《新中医》1991(3):32

按语 肺与大肠相表里，邪毒闭肺，热移大肠，传导失职，浊毒内闭则致腹胀。本方化气开闭，使气机通畅，腑气通降，热毒下有出路，故腹胀和咳喘均会减轻。

7. 补脾通腑汤

组成 人参3g，制附片3g，生大黄3g，干姜3g，甘草3g，木香6g，槟榔6g，厚朴6g。

用法 水煎服，连煎2次，取汁80~120毫升，分2~3次鼻饲或喂服。

功效 温补脾阳，通腑消胀。

主治 麻痹性肠梗阻。

来源 《中医杂志》1993(1):24

按语 本方针对平素脾胃虚弱之患儿，由于外邪侵入或其它脏腑病变影响及脾，而导致中阳虚损，冷积湿滞内停所致肠麻痹。方中人参、甘草补脾；干姜、附子温阳；大黄荡涤积滞；木香、槟榔、厚朴行气导滞。一般服药1~3剂肠鸣音即恢复，排气排便。

8. 消胀散

组成 苍术10g，白芷50g，细辛50g，牙皂50g，丁香10g，肉桂10g。

用法 共研细末，装瓶备用。用时取葱白适量，捣烂如泥，将上药20克左右倒入葱泥中拌匀，摊于布上，外敷脐部，12小时取下。

功效 温中散寒，行气散结。

主治 小儿中毒性肠麻痹。

来源 《江苏中医杂志》1987(10):5

9. 敷脐散

组成 鲜葱白30g，头发10g，橘叶20g，皂荚6g，滑石20g，生栀子10g，冰片2g。

用法 共捣烂如泥，加鸡蛋清调匀，敷于脐部，药干后

加蛋清调匀再敷。

功效 行气通下，解毒散结。

主治 小儿麻痹性肠梗阻之热毒型。症见严重腹胀，二便不通，烦渴呕逆，气促。

来源 《上海中医药杂志》1990(12)：17

按语 方中葱白和里通阳，头发通利二便，橘叶消肿散结，皂莢通大肠之气，梔子、滑石、冰片清热解毒。一般用本方敷脐后10分钟即可听到肠鸣音，30分钟左右可得矢气，腹胀缓解后可予甘露消毒丹治之。

肠 套 叠

肠套叠系指肠管的一部分套入到邻近肠管内的一种肠梗阻，是婴儿时期最常见的急腹症。临床以腹痛、呕吐、便血和腹部肿块为主要特征。本病属传统医学“腹痛”范畴。传统医学认为，本病的发生主要是由于寒凝气滞，腑气不通所致。治疗一般采用行气通腑之法，必要时手术治疗。

1. 散寒行淤汤

组成 当归尾6g，醋炒五灵脂6g，小茴香4.5g，广木香2.4g，官桂1.8g，红花4.5g，青皮4.5g，乳香3g，没药3g，延胡索4.5g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 温经散寒，行淤定痛。

主治 小儿肠套叠，属寒滞淤结证。症见腹痛剧烈，纳呆泛恶，便下泄利，四肢不温，面青唇黯。

来源 《名医奇方秘术》

2. 柴胡承气汤

组成 熟军10g，炒枳壳10g，淡黄芩10g，元明粉10g（冲服），柴胡5g，青木香5g，姜川朴5g，甘草5g，酒元胡6g，姜半夏6g，川连2g。

用法 水煎服，先吞服八宝红灵丹1支。

功效 升上攻下，以通腑气。

主治 小儿肠套叠肠梗阻。症见腹痛如绞，呕吐频频，神昏嗜睡，烦躁不安。

来源 《名医奇方秘术》

按语 本方系大柴胡汤合大承气汤而成。承气能攻下肠中燥屎与食积，使腑气通畅，承胃气下降。柴胡能升阳疏肝行气，使肝气条达，胃气和降，一升一降，可使胃肠升降功能恢复正常，而解除其肠套叠。

先天性巨结肠

先天性巨结肠是一种较常见的消化道畸形，临床以便秘为主要表现，新生儿往往伴有呕吐及腹胀等症状。本病属中医“大便不通”、“腹胀”范畴。其发病原因主要是由于先天不足，脾胃本虚，腑气不畅所致。治疗以健脾利气，行滞消胀，化积通便等法。

1. 利气通便汤

组成 陈皮3g，炒神曲9g，大腹皮9g，佛手6g，瓜蒌仁10g，炒莱菔子9g，通草3g，炙内金6g，玄明粉6g，枳壳6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 利气行滞，化积通便。

主治 先天性巨结肠症。症见大便秘结，排便艰涩，脘腹时痛，纳呆口臭。

来源 《幼科撮要》

按语 方中陈皮、枳壳等药能利气开结，内金、莱菔子等消积行滞，玄明粉、瓜蒌仁润燥通便，尤以通草淡渗通阳为使，全方平淡之中寓有深意，建功甚速。

2. 通便汤

组成 茯苓9g，橘红9g，伏龙肝9g，麦冬9g，钩藤9g，白茅根9g，甘草9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 健脾行气通便。

主治 先天性巨结肠症。症见生后即便秘，每用泻药方能排便，经常腹胀。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

3. 白蔻散

组成 白蔻2g，砂仁2g，醋青皮3g，陈皮3g，香附3g，莪术2g，苏梗3g，炙甘草2g。

用法 武火煎煮2次合匀，每服3~5毫升，不拘时温服。

功效 温中通腑，调气散结。

主治 先天性巨结肠症。症见胎粪排出延迟，大便不通，腹胀，呕吐。

来源 《湖北中医杂志》1986(5):20

4. 消导利气汤

组成 陈皮10g，厚朴10g，炒莱菔子6g，枳壳5g，焦三

仙各7.5g, 槟榔5g, 酒军5g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分3次服。

功效 消食导滞, 利气排便。

主治 先天性巨结肠症。症见大便数日一行, 便前腹胀腹痛, 便后则舒, 脉多弦实。

来源 辽宁中医学院赵纯璞老中医方

5. 通腑外敷散

组成 当归6g, 苡仁6g, 白术6g, 桔梗6g, 陈皮6g, 白芍6g, 玄明粉6g, 大腹皮6g, 莱菔子9g, 云苓9g。

用法 共研粗末, 加麸皮少许, 共炒黄后喷醋, 乘热敷脐腹部。

功效 健脾行气, 化浊通腑。

主治 先天性巨结肠症。

来源 《上海中医药杂志》1985(4):34

6. 宽肠理气汤

组成 木香6g, 乌药6g, 陈皮6g, 白芍6g, 黄芪6g, 大黄3g, 桃仁3g, 青皮3g, 枳壳3g, 柴胡3g。

用法 上药煎沸5分钟(大黄后入), 取汁100毫升, 频频喂服, 每日1剂。

功效 宽肠理气, 导滞通腑。

主治 先天性巨结肠症。

来源 《四川中医》1992(11):46

按语 本方观察治疗18例患儿, 一般均于服药1~2剂取效。治疗期间能保持每日大便1~2次, 质软, 腹胀呕吐消失, 食欲增进。本方虽由诸多行气之品组成, 但配伍得当, 并未发现久用致虚。只要灵活增减大黄, 即不会导致腹泻。

蛔虫性肠梗阻

肠蛔虫病在儿科临床较为常见。蛔虫在肠内聚集成团可阻塞肠腔，形成肠梗阻。其临床主要表现为阵发性腹痛，伴恶心、呕吐、便秘等。本病传统医学称“虫结”，治疗以通腑驱蛔为大法。在临床治疗过程中，要注意严密观察病情变化，必要时采用手术治疗。

1. 乌梅承气汤

组成 大黄9g，芒硝6g，川朴6g，枳实6g，乌梅6g，川椒2g，川连3g。

用法 水煎取汁150毫升，冲服芒硝，顿服或分2次服，日服1~2剂。亦可以本方煎取300~500毫升灌肠。

功效 通下导滞，驱虫消积。

主治 蛔虫性肠梗阻。

来源 《广西中医药》1981(4):19

2. 改良安蛔散

组成 鲜苦楝根皮300~400g，鲜四季葱100~150g，食盐100~150g。

用法 共捣如泥，加食醋适量调成糊状，外敷全腹12小时，外用布巾固定。

功效 行气驱虫止痛。

主治 小儿蛔虫性肠梗阻。症见腹痛呕吐，腹部可摸到索条状肿物。

来源 《中西医结合杂志》1986(11):694

按语 方中苦楝根皮有驱虫作用，加葱与食盐可行气通

络。一般敷 5~15 分钟即可使腹痛缓解，呕吐渐止，肿物消散。在症状缓解后予服驱蛔灵或左旋咪唑片，1~4 小时后加服石腊油或硫酸镁 1 次，次日即可排出蛔虫。

3. 通下驱虫汤

组成 使君子 15g，大黄 10g，乌梅 10g，厚朴 10g，枳实 7.5g，槟榔片 7.5g，元明粉 5g。

用法 水煎服，大黄后入，元明粉冲服，水煎 100 毫升，分 2 次服。

功效 通便导滞驱虫。

主治 蛔虫性肠梗阻。症见腹胀痛拒按，大便不排，时时泛呕，面色青白。

来源 《新中医》1989 (3) : 19

4. 大黄花椒油

组成 大黄 20g，花椒 10g，麻油 100g。

用法 先将花椒置于油中，加温至沸，继投入大黄，随即离火，待凉去渣，分 2 次服。

功效 润肠散结，驱虫通便。

主治 蛔虫性肠梗阻。

来源 《四川中医》1985(8):40

5. 三根油

组成 马鞭草根、野棉花根、扁竹根各 30g，菜油或麻油 20~30ml。

用法 上三味药以鲜品为佳，洗净切片，加水适量煎煮半小时，滤出后再煎 2 次。先服菜油 20~30 毫升，半小时后服头煎药液，30 分钟后续服二三煎混合液。

功效 清热驱蛔散结。

主治 蛔虫性肠梗阻。

来源 《四川中医》1987 (1) : 23

6. 番泻叶

组成 番泻叶1~3g。

用法 将番泻叶用开水浸泡半小时，1次或分次饮服。

功效 泻热导滞，利肠通便。

主治 蛔虫性肠梗阻。

来源 《新中医》1983(6):29

7. 莱菔大黄粉蜜汤

组成 莱菔子18g，大黄15g，玄明粉9g，川椒6g，蜂蜜60g。

用法 莱菔子、川椒先煎，大黄后入，取汁300毫升，蜂蜜单煎，沸后与药汁混合，玄明粉用药汁冲服，一次或两次服下。

功效 驱蛔散结，导滞通腑。

主治 蛔虫性肠梗阻。症见发热，大便秘结，腹胀呕吐，按之剧痛，舌苔黄厚而干。

来源 《名医奇方秘术》

按语 本病在治疗中要抓住邪实内阻的特点，不失时机地大剂量应用泻下剂。方中莱菔子、大黄、玄明粉荡涤肠胃，攻逐积滞，有夺关斩将之功，宜在重用。伍以蜂蜜，加强润燥通结，并调和大黄、玄明粉之峻猛，攻邪而不忘扶正，其效更佳。

8. 减味乌梅汤

组成 乌梅15g，细辛6g，川椒3g，党参9g，当归3g，黄连6g，黄柏6g，干姜6g，桂枝9g。

用法 水煎成500毫升，直肠滴注，每分钟40~50滴。

功效 驱虫通下。

主治 蛔虫性肠梗阻。

来源 《千家妙方》

按语 本方治疗蛔虫性肠梗阻200余例，无一例转为手术治疗，疗效满意。用本方治疗缓解后24小时可予驱蛔灵口服。

9. 木香槟榔丸

组成 木香30g，槟榔30g，青皮30g，陈皮30g，莪术30g，黄连30g，黄柏90g，大黄90g，香附120g，牵牛120g。

用法 共研细末。水丸如小豆大，每服30丸，研碎以葱汁送服，每日2~3次。

功效 杀虫通腑。

主治 蛔虫性肠梗阻。

来源 《儒门事亲》

10. 乌黄姜蜜饮

组成 乌梅30g，大黄30g，干姜20g，蜂蜜100g。

用法 先将乌梅、干姜加水300毫升煎煮10分钟，再加入大黄、蜂蜜煎2~3分钟，每服50毫升，每2小时服1次。

功效 驱蛔止痛。

主治 蛔虫性肠梗阻。

来源 《浙江中医杂志》1988 (3):102

按语 本方乌梅以酸伏蛔，大黄解毒攻积，解除肠痉挛，利于蛔虫排出，干姜温中，蜂蜜滑肠，诸药配合，酸辛苦温，简便易行。本方治疗80例，其中56例于用药6~24小时解除肠梗阻，75例于用药6~48小时排虫。

11. 万应丸

组成 槟榔150g, 沉香30g, 木香30g, 雷丸30g, 大黄240g, 黑丑120g, 皂角60g, 苦楝根皮60g。

用法 前6味共研细末, 后2味水煎熬膏, 和药末为丸, 每服6~9克, 日服2~3次。

功效 清下驱虫。

主治 蛔虫性肠梗阻。症见腹痛剧烈, 疼痛拒按, 大便秘结。

来源 《医学正传》

胆道蛔虫病

胆道蛔虫病是由寄生于肠道的蛔虫进入胆道而引起的, 以腹部阵发性剧痛为主要表现的疾病。本病中医称“蛔厥”。蛔虫性动好窜, 虫动则气机郁滞而痛。故治疗以安蛔定痛, 继之驱虫为原则。

1. 梅椒二黄汤

组成 乌梅10g, 花椒5g, 黄连2g, 生大黄10g, 使君子10g, 鹤虱10g。

用法 水煎服, 大黄后入, 煎2次, 共取汁200~300毫升, 每日1剂, 分数次频服, 痛剧者每日2剂。

功效 清热伏蛔止痛。

主治 小儿胆道蛔虫病。症见腹部绞痛, 辗转不安, 恶心呕吐, 常吐出蛔虫。

来源 《云南中医杂志》1989(5):12

2. 山楂伏蛔汤

组成 山楂30g, 广木香20g, 苦楝皮10g, 榧实5g, 黄柏10g, 大黄6g, 细辛4g, 甘草10g。

用法 水煎服, 3~6岁日服1/3~1/2剂, 6~9岁日服1/2~2/3剂, 分2~3次服。

功效 伏蛔导滞, 解痉止痛。

主治 小儿胆道蛔虫病。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

按语 蛔虫遇酸则伏, 遇苦则安, 故用山楂酸以伏蛔; 黄柏、大黄苦以安蛔; 苦楝皮、榧实杀虫; 细辛有麻痹虫体的作用; 木香行气止痛, 缓解痉挛; 甘草和中。诸药合之, 可收安蛔止痛之效果。

3. 猪胆汁方

组成 猪胆1枚, 川椒20g, 胡椒20g, 酸醋300ml。

用法 川椒、胡椒共研细末, 以猪胆汁和酸醋调和, 分2次服下。

功效 清热安蛔止痛。

主治 胆道蛔虫病。

来源 《新中医》1989(2):13

按语 本病多因胃热肠寒, 而蛔虫喜温畏寒, 循肠道上窜于胆道所致。本方有性寒味苦之猪胆汁清胃中热, 又有川椒、胡椒温散肠中之寒, 另以辛酸之醋使蛔虫安静, 故收安蛔止痛之效。

4. 胆蛔汤

组成 槟榔15g, 苦楝根皮6g, 使君子6g, 炒榧子9g, 乌梅3g, 木香3g, 炒枳壳3g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分次频饮。

功效 驱蛔解痉止痛。

主治 小儿胆道蛔虫病。症见右上腹阵发性剧痛，面色苍白，肢冷汗出。

来源 《临证医案医方》

5. 乌梅篇蓄伏蛔汤

组成 乌梅10g，篇蓄8g，川椒6g，山楂10g，黄柏8g，广木香8g，川楝子8g，元胡8g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 伏蛔行气止痛。

主治 胆道蛔虫病。症见右上腹阵发性绞痛，痛止如常人。

来源 《古今儿科临床应用效方》

6. 胆蛔定痛汤

组成 乌梅7.5g，川楝子6g，川花椒5g，花柳槟3g，广木香3g，细辛0.5g，黄连1g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 安蛔驱虫定痛。

主治 胆道蛔虫病。

来源 《河南中医》1983(5):42

按语 本方以乌梅之酸以制蛔，黄连之苦以下蛔，细辛之辛以驱蛔，且用理气止痛之品，一般服药1~2剂即能缓解疼痛，3~4剂疼痛可除。本方治疗400余例，疗效颇佳，且无任何不良反应。

7. 胆蛔止痛验方

组成 川椒20g，鸡蛋1个，香油50g。

用法 将川椒研面备用。把铁锅放武火上，倒入香油，

油沸后炒鸡蛋，鸡蛋炒黄后立即倒入川椒面，翻炒均匀，不可炒焦，顿服。

功效 安蛔止痛。

主治 小儿胆道蛔虫病。

来源 《河南中医》1983(6):7

蛔 虫 病

蛔虫病是儿童最常见的肠道寄生虫病。本病是由于食入感染性虫卵，蛔虫寄生于人体所致。临床以阵发性脐周疼痛，时作时止，饮食异常为特征。传统医学对本病的治疗以驱虫为主，虫去后再予调理脾胃。由于蛔虫具有游走、钻孔、扭结成团的特点，能引起一系列并发症，故临床应针对其不同的并发症，采用相应的治疗方法。

1. 驱虫汤

组成 炒使君子肉6g，花槟榔6g，苦楝根皮9g，贯众6g，乌梅2枚，甘草3g。

用法 水煎2遍，混合药汁50~80毫升，晚睡前或晨起空腹顿服，连服2天。

功效 驱蛔杀虫。

主治 肠道蛔虫病。

来源 《浙江中医学院学报》1988(6):24

按语 本方为马莲湘教授之经验方，主要为腹痛缓解时的驱虫剂。在腹痛剧烈时应先安蛔止痛，待疼痛缓解后再服本方驱虫。一般服药24小时内蛔虫随便排出，不必另加泻药。

2. 驱虫止痛方

组成 川楝子6g，细辛1.5g，使君子6g，乌梅6g，元胡9g，生槟榔9g，尾连6g。

用法 水煎服，每日1剂，早晚空腹服。

功效 驱虫导滞，行气止痛。

主治 肠道蛔虫病。

来源 《金厚如儿科临床经验集》

3. 驱虫散

组成 石榴皮10g，苦楝皮10g，生贯众10g，槟榔10g。

用法 共为细面过筛，3岁小儿每服0.25克，5岁小儿每服0.5克，日服2次，早晚饭前服。

功效 驱虫止痛。

主治 小儿蛔虫性腹痛。

来源 辽宁中医学院儿科协定方

4. 驱虫导滞汤

组成 苦楝根皮10g，槟榔6g，厚朴6g，使君子6g，麻仁6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 驱虫导滞。

主治 肠蛔虫病。症见腹痛，痛有来去，乍作乍止。

来源 《周慕新儿科临床经验选》

5. 驱蛔汤

组成 槟榔15g，芜荑9g，使君子9g，川楝子9g，元胡9g，木香5g，乌梅3枚。

用法 水煎服，每日1剂，晨起或晚睡前顿服，连服3天。

功效 驱虫止痛。

主治 肠蛔虫病。

来源 《何世英儿科医案》

6. 雷丸槟榔汤

组成 雷丸7.5g，槟榔6g，鹤虱6g，苦楝皮6g，熟大黄6g，使君子6g，生甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 导滞行气杀虫。

主治 小儿肠蛔虫病。症见腹痛绕脐，时作时止，面黄体瘦，纳呆呕吐。

来源 《祁振华临床经验集》

按语 本方为祁振华老中医方。祁老认为，诸驱虫药中以雷丸及生槟榔效力最峻，在用驱虫药时，须佐大黄以推导，方能奏效。

7. 连梅安蛔汤

组成 胡黄连3g，白雷丸9g，生黄柏2.4g，川椒10粒，乌梅2枚，槟榔2枚。

用法 水煎服，槟榔不煎，磨汁冲服，每日1剂，频服。

功效 安蛔止痛。

主治 蛔虫性腹痛。症见腹痛不止，甚则吐蛔，不欲饮食。

来源 《通俗伤寒论》

蛲 虫 病

蛲虫病是小儿常见的一种肠道寄生虫病。临床以夜间肛

门及会阴部奇痒为特征。本病的发病原因是由于吞入蛲虫卵所致。中医对本病的治疗多采用内治与外治相结合的方法，以杀虫止痒为原则。

1. 蛲虫熏洗方

组成 苦楝根皮20g，鹤虱15g，蛇床子15g，生百部15g，野菊花15g，生甘草5g。

用法 将上药放入砂罐内，加水煎沸3分钟，倒入洁净容器内坐熏，温度适中后以药液洗肛门，每晚睡前1次。

功效 杀虫止痒。

主治 小儿蛲虫病。

来源 《中医杂志》1992(1):38

按语 苦楝皮、鹤虱、蛇床子、生百部均为杀虫要药，药专力猛。野菊花清热解毒，为治奇痒感染而投。甘草调和诸药，可减少其它药对肛门的刺激。因蛲虫于晚间到肛门外产卵，故以晚间熏洗为宜。笔者应用本方治疗300多例蛲虫患儿，疗效甚佳。

2. 百部汤

组成 百部9g，槟榔9g，使君子9g，青皮6g，苍术6g，黄柏6g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次早晚空腹服，连服3剂。

功效 驱虫导滞。

主治 小儿蛲虫病。症见肛周搔痒，夜间为甚，睡眠不安，夜啼夜惊，尿频，消瘦。

来源 《中医儿科临床浅解》

3. 百椒汤

组成 百部150g，川椒60g，苦参200g，明矾10g。

用法 加水500毫升，煮沸20~30分钟，去渣过滤备用。
每次用15~25毫升，睡前保留灌肠，日1次，连用2~4天。

功效 杀虫止痒。

主治 小儿蛲虫病。

来源 《湖北中医杂志》1981(3):37

按语 本方治疗小儿蛲虫病50例，全部获愈。多数患者用药2~4天即愈。

4. 蛲歼膏

组成 生百部30g，雷丸粉9g，麝香0.15g。

用法 上药研极细末和匀，加凡士林1倍搅拌成膏，每晚睡前以棉签蘸药膏涂抹肛门周围，并涂入肛门少许。

功效 灭蛲杀虫。

主治 小儿蛲虫病。

来源 《何世英儿科医案》

按语 本方作用是针对雌蛲虫夜间爬出肛门外产卵的特点，局部用药予以杀灭。因本方有麝香，也可将雄虫引诱出来一同杀灭。一般用药一周内即收显效。

5. 灭蛲验方

组成 白头翁25g，槟榔6g，花椒3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服，连服3剂。

功效 清热利湿杀虫。

主治 小儿蛲虫病。

来源 《中国民间百病良方》

6. 香君汤

组成 槟榔12g，使君子12g，广木香3g，大黄3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服，连服2剂。为巩固

固疗效，可过3天再服2剂。

功效 杀虫消积，行气通便。

主治 蛲虫病。

来源 《中国当代名医验方大全》

7. 榧黄散

组成 榧子、生大黄各等份。

用法 榧子去壳取肉焙干，与生大黄共研细末，开水冲服，每次用量为（年龄+1）×0.4克，日服3次，连服1周。

功效 杀虫消积。

主治 小儿蛲虫病。

来源 《辽宁中医杂志》1991(5):38

8. 复方吴茱萸汤

组成 吴茱萸10g，大黄3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服，连服7天。

功效 通腑杀虫。

主治 小儿蛲虫病。

来源 《广西中医药》1984(3):54

9. 百苦汤

组成 百部30g，苦楝皮60g，苦参10g。

用法 上药加水适量，浓煎取汁，熏洗肛门，每晚1次，连用5~7天。

功效 杀虫燥湿。

主治 小儿蛲虫病。

来源 《小儿外治疗法》

10. 百紫膏

组成 紫草25g，百部25g，凡士林100g。

用法 上药研末，加凡士林调成软膏，每晚睡时涂于肛门，7天为1疗程。

功效 杀虫解毒。

主治 小儿蛲虫病。

来源 《小儿外治疗法》

11. 蛲虫粉

组成 百部15g，苦楝根皮30g，鹤虱15g。

用法 共研极细面，装入胶囊，每晚用温水洗肛门后，纳入肛门1粒，保留至次日自然消化，连续5天为一疗程。

功效 灭蛲杀虫。

主治 小儿蛲虫病。

来源 《祁振华临床经验集》

绦 虫 病

绦虫病是由各种绦虫成虫或幼虫所致的寄生虫病。临床以隐性腹痛，腹泻，消瘦，便中可见虫节片为特点。中医治疗本病主要采用驱虫外出的方法，使绦虫排出，然后施以调理脾胃之法治之。

1. 驱绦汤

组成 槟榔62g，雷丸15g。

用法 水煎服，两次煎液合之，不得少于100毫升，清晨空腹顿服。

功效 驱逐绦虫。

主治 肠绦虫病。症见大便中杂有白色节片，时有腹痛，或见腹泻。

来源 《何世英儿科医案》

按语 本方剂适用于6~10岁儿童，用后效果显著，一般服药2小时后排虫。

2. 驱绦汤

组成 槟榔150g，生军75g，枳实75g，川椒75g，乌梅15g。

用法 先将槟榔砸碎，加水400毫升，煎20分钟后再加入余药煎15分钟，煎取100~150毫升，滤过备用。在驱虫前日晚口服硫酸镁10~15克，当日早晨空腹温服驱绦汤剂100~150毫升，一次服完。

功效 驱绦杀虫。

主治 绦虫病。

来源 《辽宁中医》1979(6):19

3. 槟榔南瓜子汤

组成 南瓜子100g，雷丸30g，槟榔50g，蜀椒3g，乌梅20g，芒硝3g。

用法 晨起先食南瓜子，1小时后取槟榔、蜀椒、乌梅之煎剂的1/2量冲服雷丸粉，半小时后再取其煎剂的1/2量冲服芒硝。

功效 涤肠杀虫。

主治 绦虫病。

来源 《云南中医杂志》1983(5):48

4. 雷丸散

组成 雷丸15g。

用法 研为细末，晨起空腹时以凉开水150毫升调服，一次顿服。

功效 去绦杀虫。

主治 绦虫病。

来源 《北京中医》1989(6):60

5. 下绦汤

组成 鸡心槟榔60~120g, 大黄6~9g。

用法 槟榔打碎, 用净水浸泡24小时后, 煎煮1小时, 放入大黄, 10分钟后过滤取汁, 空腹顿服。

功效 驱下绦虫。

主治 绦虫病。

来源 《儿科证治》

按语 方中槟榔为驱虫要药, 大黄泻下。本方服后半小时即有便意, 需坐温水盆上, 待其虫体自然排出体外。

6. 槟花二丑汤

组成 槟榔15g, 花椒10g, 广木香10g, 二丑30g。

用法 前3味药加水浸泡2小时后煎沸, 煎煮2次, 将2次煎液1次服下, 半小时后冲服二丑粉15克, 若绦虫未整体排出, 再服二丑粉15克。

功效 行气通下驱绦。

主治 绦虫病。

来源 《中原医刊》1982(3):144

7. 驱绦汤

组成 生南瓜仁150~200g, 生槟榔70~90g。

用法 生南瓜仁去皮捣碎, 空腹顿服, 2小时后服槟榔煎剂150毫升, 再隔2小时服33%硫酸镁60毫升。

功效 驱逐绦虫

主治 小儿绦虫病。

来源 《山东中医杂志》1985(5):27

按语 本法驱绦虫已在临床广泛应用多年，疗效确切。然有用之不效者，多因用药剂量和方法有误。南瓜仁和槟榔要生用，槟榔要完整，煎时再打碎，以免有效成份丢失。应按上述方法服药，使虫体处于麻痹状态，然后以硫酸镁泻下，这样方可使虫体完整排出体外。

钩 虫 病

钩虫病是由于钩虫寄生于小肠所引起的疾病。临床一般以贫血，营养不良和消化道症状为主要表现。本病传统医学又称“黄胖病”、“懒黄病”等。治疗以驱虫为大法，但应注意调理脾胃，补益气血。

1. 青矾丸

组成 青矾30g 制没药16g，干姜12g。

用法 青矾以火煨、醋淬，使之变红，与上药共研细末，水蜜为丸。每服2~5克，日服3次，于饭后1小时开水送下。

功效 利毒杀虫，温中燥湿。

主治 钩虫病。

来源 《百治百验效方集》

按语 方中青矾杀虫燥湿，没药活血止痛，干姜温运脾阳，合之共奏利毒杀虫，温中燥湿之功，治钩虫病每可获佳效。

2. 铁矾丸

组成 铁砂15g，煨青矾15g，苍术9g，茯苓15g，生地

6g, 熟地6g。

用法 共研细末, 以甜酒调拌, 装入瓦钵, 清早放铁锅中蒸1小时, 取出晾晒, 夜晚亦晾露在外, 次晨再蒸, 如是9次后, 制成药丸如黄豆大, 每服3~6丸, 服7日后量酌减。日服2次, 饭前米粥送下。

功效 益气养血杀虫。

主治 钩虫病。

来源 《中国当代名医秘验方精粹》

按语 本方乃家传秘方, 方中铁砂系打铁时落下之铁屑, 应用本方需注意, 先补血时勿忘杀虫, 而先杀虫时勿忘补血。

3. 大温中丸

组成 针砂250g, 香附250g, 青皮90g, 白芍75g, 厚朴75g, 苍术75g, 山楂75g, 陈皮45g, 白术45g, 茯苓45g, 苦参45g, 甘草30g。

用法 共研细末, 水泛为小丸, 每服3~6克, 日服1~2次。

功效 清热化湿健脾。

主治 钩虫病。症见面黄无华, 浮肿, 脘腹胀满, 舌苔厚腻。

来源 《丹溪心法》

4. 黄病绛矾丸

组成 厚朴30g, 陈皮30g, 苍术90g, 皂矾90g, 甘草15g, 大枣4枚。

用法 皂矾煅成绛色, 与上药共研细末, 枣肉面糊和丸, 每服1.5~3克, 日服2次, 饭后温开水送服。

功效 健脾燥湿补血。

主治 钩虫病。症见面色萎黄浮肿，心悸气短，倦怠乏力，消化不良。

来源 《中药方剂简编》

5. 钩虫丸

组成 梔子9g，黄柏9g，甘松9g，白矾9g，甘草9g，茵陈30g，苍术18g，青矾18g。

用法 青矾煅赤，上药共研细末，红糖为丸，每日早晚各服1次，7日服完。

功效 清热燥湿，利胆杀虫。

主治 钩虫病。症见心悸气短，肢体面色黄肿，喜吃生米或泥土。

来源 《中医治法与方剂》

6. 樵君大蒜煎

组成 香樵子15g，使君子15g，大蒜15g。

用法 上药共捣烂，水煎去渣，空腹温服，日服3次。

功效 解毒杀虫。

主治 小儿钩虫病。

来源 《妇儿疾病小偏方》

7. 马齿苋煎液

组成 马齿苋鲜品250g，白醋50g。

用法 马齿苋加水250毫升，煎至150毫升，每日1剂，早晚空腹各服1次，每次服完后饮醋50克，7天为一疗程。

功效 清热杀虫。

主治 小儿钩虫病。

来源 《广西中医药》1986(6):17

婴儿肝炎综合征

婴儿肝炎综合征是一组临床症候群，以肝脏肿大，阻塞性黄疸，肝功能损害为主要表现。本病属中医“黄疸”范畴。传统医学认为，本病之病因多为肝胆湿热蕴郁于里，不得宣泄所致。故治疗以清热利湿退黄为主，同时注意补益脾胃，升发胃气。

1. 利胆合剂

组成 茵陈12g，金钱草12g，广郁金12g，赤芍12g，当归9g，生山楂9g，虎杖6g，生大黄3g。

用法 水煎，生大黄后下，每剂药浓缩成20毫升，每次10毫升，日服2次。

功效 清热利湿，活血化淤。

主治 婴儿肝炎综合征。症见皮肤黄染，肝脾肿大，纳呆腹泻，大便色淡。

来源 《中医杂志》1988(11):41

按语 本方在传统清热利湿的基础上加用活血化淤药。活血化淤药可改善肝脏微循环，扩张胆管，有利于病情改善。本方观察治疗35例，痊愈31例，好转4例。

2. 退黄汤

组成 生麦芽9g，茵陈15g，金钱草9g，穿肠草6g，通草8g，黄柏3g。

用法 水煎服，茵陈后入，每日1剂，分3次服。

功效 健脾化湿，利胆退黄。

主治 婴儿肝炎综合征黄疸期。症见皮肤巩膜黄染，色

泽晦暗，尿黄染布，大便浅黄。

来源 《中国当代名医验方大全》

按语 本方以茵陈为主药，并用金钱草等通利之品，退黄效果显著。对黄疸较重或日久不愈者，可加用活血化瘀之品，多可获效。

3. 清热利胆汤

组成 西茵陈30g，车前草15g，金钱草15g，黄芩9g，焦山栀9g，生甘草4.5g，炙鸡内金3g，广郁金9g，片姜黄4.5g。

用法 水煎服，每日1剂，分3~4次服。

功效 清热利湿，疏肝利胆。

主治 婴儿肝炎综合征，属阳黄者。症见面目皮肤皆黄，黄如桔色，小便短赤，大便色白。

来源 《名医奇方秘术》

4. 婴肝汤

组成 绵茵陈7g，鲜虎杖15g，败酱草10g，炒山栀7g，广郁金10g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清利湿热，利胆退黄。

主治 婴儿肝炎综合征。症见皮肤粘膜发黄，大便灰白，小便深黄，肝脾肿大。

来源 《湖北中医杂志》1989(4):19

5. 茵陈四苓合剂

组成 茵陈9g，金钱草9g，郁金9g，茯苓9g，白术9g，党参9g，丹参9g，焦山楂9g，平地木9g，青皮3g，陈皮3g，白芍9g。

用法 水煎浓缩成合剂，每服 5 毫升，日服 3 次。

功效 利胆祛湿，行气活血。

主治 婴儿肝炎综合征。

来源 《上海中医药杂志》1987(3):27

呕 吐

呕吐是小儿常见的一个症状，它可以是单一的症状，也可与其它疾病症状并见。传统医学认为，呕吐主要是由于胃失和降，气逆于上所致。其病因不一，临床症状也各有所异。故治疗当以去除病因，和胃降逆为总的治疗原则。

1. 呕吐一号

组成 藿香6g，竹茹9g，法半夏3g，陈皮3g，伏龙肝9g，生姜 1 片。

用法 水煎服，每日 1 剂，分 3 次服。

功效 和胃降逆止呕。

主治 小儿各种证型之呕吐。

来源 《金厚如儿科临床经验集》

按语 本方为金厚如老中医经验方，列为北京儿童医院之协定处方，对小儿一般呕吐皆宜。在临床应用中可针对不同病因及症状加减。

2. 枇杷叶饮

组成 枇杷叶6g，党参6g，茯苓10g，半夏6g，槟榔 6 g，白茅根15g，生姜3g。

用法 水煎服，每日 1 剂，频频饮之。

功效 调中补虚，降逆止呕。

主治 小儿胃虚呕吐。

来源 《辽宁中医杂志》1982(9):36

3. 锅焦丸

组成 锅焦150g, 神曲 12g, 砂仁 6g, 山楂 12g, 莲肉(去心) 12g, 鸡内金3g。

用法 将上药分别炒黄, 共为细末, 加白糖米粉和匀, 焙作饼用, 每服3克, 日服3次。

功效 健脾消食, 和胃止呕。

主治 小儿伤食呕吐。

来源 《集验良方》

4. 参香散

组成 人参、上沉香、公丁香、藿香梗、南木香各等分。

用法 共为细末, 每服1~2克, 木瓜煎汤调服, 日服3次。

功效 温中补虚, 和胃降逆。

主治 小儿胃虚呕吐。症见呕吐时作时止, 吐物不多, 为清稀粘液或不化食物。

来源 《幼幼集成》

5. 香朴散

组成 藿香21g, 陈皮21g, 厚朴 21g, 半夏 30g, 炙甘草3g。

用法 共为粗末, 每取9克, 加生姜5片, 大枣1枚同煎, 分2次服。

功效 温胃降逆行气。

主治 小儿胃寒呕吐。症见呕吐频繁, 吐物清稀, 脘腹冷痛。

来源 《婴童百问》

6. 和胃降逆汤

组成 建曲9g, 橘红9g, 砂仁3g, 木香3g, 芡实9g, 焦楂9g, 伏龙肝9g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 健脾和胃, 逆降止呕。

主治 脾胃不和之呕吐。症见呕吐, 腹胀不欲食, 大便不行, 舌淡, 脉无力。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

7. 周期呕吐散

组成 天麻30g, 僵蚕30g, 姜半夏20g, 广木香20g, 白蔻仁20g, 竺黄20g, 旋复花5g, 白术20g, 茯苓20g, 甘草10g。

用法 共研细末, 3~6岁每服0.5~1克, 6~9岁每服1~1.5克, 日服3次。

功效 熄风解痉, 和胃止呕。

主治 周期性呕吐。症见反复发作顽固呕吐, 数周或数月发作一次, 常伴腹痛和便秘。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

8. 止呕冲剂

组成 沉香6g, 厚朴12g, 陈皮12g, 乌梅12g, 竹茹20g, 代赭石20g。

用法 共为细末, 每次1~4克, 以开水冲服, 每日2次。

功效 和胃降逆止呕。

主治 各种原因引起的急性呕吐。

来源 《陕西中医》1987(7):324

便秘

便秘是小儿时期常见的一个症状，有时单独存在，有时继发于其它疾病过程中。便秘可由多种原因引起。习惯性便秘多与体质禀赋有关，一过性便秘多与饮食起居失调有关。对便秘的治疗当通便开秘，以下为主。根据其病因的不同，采用清热、消导、行气、补阴等多种方法治之。

1. 增液合剂

组成 生地12g，女贞子12g，玄参9g，麦冬9g，石斛9g，生白术15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 养阴增液，润肠通便。

主治 小儿虚证便秘。多见于热病之后，津液亏虚。

来源 《上海中医药杂志》1985(11):21

按语 方中麦冬、玄参、生地增液润燥，石斛、女贞子等养阴润肠，枳实行气消痞，合之实有增水行舟之功。实验研究证明，枳实、石斛均有增强胃肠蠕动之功。

2. 通便汤

组成 钩藤10g，茯苓10g，化红6g，伏龙肝10g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 调理脾胃，理气行滞。

主治 小儿习惯性便秘。

来源 《北京中医学院学报》1985(1):30

按语 本方为儿科名医王鹏飞之经验方。方中诸药均无

泄下通便之功，但可通过调理脾胃，调畅气机而使浊气降，津液生，从而使大便自通。本方对小儿习惯性便秘用之效佳。

3. 调脾通结汤

组成 白术30g，苍术30g，枳壳10g，肉苁蓉20g。

用法 先将药浸泡30分钟，每剂煎2次，每次慢火煎1小时，每次药液混合，每日1剂，1次温服。

功效 健脾调气，养血润肠。

主治 各种虚性便秘，习惯性便秘。

来源 《中医杂志》1988(4):52

4. 泻胃汤

组成 大黄6g，葛根3g，桔梗1.5g，枳壳1.5g，前胡1.5g，杏仁1.5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 泻火清热通便。

主治 小儿胃热便秘。症见大便秘结，烦躁口渴，唾流口涎，小便黄赤。

来源 《医学入门》

5. 润肠散

组成 南瓜籽、松籽、黑芝麻、花生仁、白糖各等量。

用法 将南瓜籽和松籽炒香后去壳，加入炒香的黑芝麻和花生仁，一起研细后加入白糖，每服1匙，日服2~3次，温开水冲服。

功效 润肠通便。

主治 小儿阴虚便秘。症见大便干燥，口渴喜饮，五心烦热。

来源 《常见病食疗食补大全》

6. 大黄粉

组成 大黄10 g，酒适量。

用法 大黄烘干研粉，与酒调成糊状，涂于脐部，纱布覆盖固定，再以热水袋外敷10分钟，每日1次，疗程1~3天。

功效 清热通腑。

主治 小儿便秘。

来源 《浙江中医杂志》1988(7):305

6. 滋阴润燥汤

组成 生地10 g，玄参10 g，麦冬10 g，当归7.5 g，天花粉7.5 g，桃仁5 g，火麻仁5 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 滋阴润燥通便。

主治 小儿阴虚便秘。症见大便干燥，口渴喜饮，手足心热，食少纳呆，性情急躁。

来源 辽宁中医学院赵纯璞老中医方

8. 便秘验方

组成 当归10 g，知母10 g，木香10 g，泽泻10 g，大白6 g，炒大黄6 g。

用法 上药加水400毫升，浸泡20分钟，急火煎沸，再以文火煎15分钟，煎熬2次，各取汁50~80毫升，混匀后分5~6次服，每日一剂。

功效 行气开郁，润肠通便。

主治 小儿习惯性便秘。

来源 《四川中医》1991(12):17

腹 痛

腹痛为小儿常见的临床证候。引起腹痛的原因很多，主要有寒积，虚寒、食积、淤血等诸种原因。对小儿腹痛的治疗，应根据其疼痛性质，辨明疼痛原因，审因论治，不可盲目止痛。尤当注意鉴别急腹症，以免贻误病情。

1. 小茴香散

组成 小茴香6g，丹参12g，木香6g，砂仁6g，白芍12g，台乌药6g，党参6g，槟榔6g，沉香3g，蒲黄6g，五灵脂6g，炙甘草6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 行气活血，温中止痛。

主治 寒凝腹痛。症见腹痛阵作，得温则缓，尿清便溏，面白肢冷。

来源 《中医杂志》1991(11):39

按语 本方主要治疗寒邪凝滞所致的小儿脐周腹痛。笔者以本方观察治疗145例，其中包括肠痉挛、肠系膜淋巴结炎、腹型癫痫、结肠过敏症、肠道蛔虫症等，全部治愈，并且远期效果良好。方中党参与五灵脂虽属相畏之药，但以群药相伍临床未见不良反应。

2. 延胡索散

组成 延胡索12g，姜黄6g，七叶一枝花18g，枳实6g，

用法 共研细末，每服3~6克，日服3次，白开水冲服。

功效 行气缓中止痛。

主治 腹部痉挛性疼痛。症见腹痛阵作，时痛时止、按

揉则舒。

来源 《中国民间百病良方》

3. 术附散

组成 苍术、香附、良姜、白芍各1.5g。

用法 苍术、香附俱用盐炒，与上药共为细末，每服3克，日服2次，调酒送下。

功效 温中行气止痛。

主治 寒凝气滞之腹痛。症见突然腹痛，腹部有寒凉感，喜温喜按，面色苍白。

来源 《秘传奇方》

4. 脘腹痛验方

组成 桂枝6g，白芍12g，香附10g，甘草6g，炮姜6g，大枣10枚。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 行气散凝，温中缓痛。

主治 虚寒腹痛。症见腹痛绕脐，隐痛阵发，脘腹胀满，食欲不振。

来源 《中国当代名医验方大全》

5. 行气祛寒汤

组成 广木香5g，乌药5g，枳壳4g，槟榔4g，郁金3g，延胡索3g。

用法 水煎服，每日1剂，分5~7次服。

功效 行气祛寒止痛。

主治 气滞夹寒之腹痛。症见时常啼哭，不欲乳食，腹部胀满，面白肢冷。

来源 《四川中医》1984(1):50

6. 肠痉缓解汤

组成 白芍20g, 白蔻10g, 广木香10g, 香附10g, 党参10g, 白术6g, 茯苓10g, 延胡索10g, 甘草9g。

用法 水煎服, 3~6岁日服1/3剂, 6~9岁日服1/2剂, 分2次服。

功效 解郁活血, 行气止痛。

主治 小儿肠痉挛之腹痛。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

7. 槟砂止痛汤

组成 槟榔5g, 砂仁5g, 白芍10g, 香附15g, 枳壳15g, 佛手15g, 麦芽15g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 温中行气止痛。

主治 小儿虚寒性腹痛。症见腹痛阵作, 以脐周为甚, 缓解后如常人。

来源 《吉林中医药》1987(1):22

8. 丁桂散膏

组成 公丁香30个, 上肉桂10g, 白胡椒40粒, 白豆蔻30粒。

用法 共研细末过筛, 取1.5克填敷脐中, 外贴万应膏, 3天后去除, 或换药再贴1次。

功效 温中散寒止痛。

主治 小儿受寒后腹痛。症见腹痛阵作, 啼哭不止, 肠鸣漉漉, 腹部柔软, 喜温喜按。

来源 《湖北中医杂志》1985(3):24

9. 芍枳陈草汤

组成 赤芍8g，枳实6g，陈皮7g，甘草5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 健脾行气，消食导滞。

主治 小儿食积之腹痛。症见腹痛胀满，呕恶纳呆，时有呕吐，粪便秘臭。

来源 《新中医》1991(1)：56

10. 莱菔葱姜熨方

组成 莱菔子10g，连须葱头1把，生姜2块。

用法 上药共捣烂，用酒炒后布包热熨脐腹部。

功效 散寒理气，消积止痛。

主治 小儿受寒积滞之腹痛。症见腹痛，得温则缓，面白，口中气冷，不欲进食。

来源 《小儿外治疗法》

11. 栀子厚朴汤

组成 栀子14枚，厚朴6g，枳实6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 泄热行气止痛。

主治 小儿热结肠胃之腹痛。症见腹痛胀满，口渴噎气，烦闷不舒，口臭流涎。

来源 《诚书》

12. 三香止痛汤

组成 丁香1.5g，茴香6g，藿香6g，青黛3g，紫草9g，竹茹3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热和胃，行气止痛。

主治 小儿实热腹痛。症见腹痛骤起，痛则拒按，腹胀

口臭。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

13. 三甲散

组成 制鳖甲15 g，炮穿山甲15 g，鸡内金15 g，白术15 g，炒槟榔15 g，焦三仙各10 g，砂仁6 g，番泻叶1.5 g。

用法 共研细末，装瓶备用。2岁每服2克，3岁每服2.5克，每增1岁递增0.5克，服时药末加少量开水与糖，煮沸5~10分钟，温服，日服2次。

功效 健脾消食，散结行滞。

主治 小儿功能性腹痛。

来源 《新中医》1990(7):10

14. 参香丸

组成 人参、乳香、木香、石菖蒲、良姜各等分。

用法 共为细末，酒糊为丸，如麻子大，1岁小儿每服10丸，以米汤送服，1岁以上小儿用量酌增。

功效 温中健脾，行气止痛。

主治 小儿脾胃虚寒之腹痛。症见心腹冷痛，喜温喜按，大便色青。

来源 《奇效良方》

血液及循环系统疾病

营养性贫血

营养性贫血是体内营养造血物质不足所致的疾患，在小儿时期比较多见。临床以面色苍白，睑结膜苍白，头晕乏力，红细胞及血红蛋白减少为主要表现。本病属传统医学“血虚”、“虚劳”范畴。其发病主要是由于脏腑虚损，气血化源不足所致。治疗以补益脾肾为其大法。

1. 生血汤

组成 党参9g，白术9g，茯苓9g，仙灵脾15g，肉苁蓉6g，黄精9g，女贞子9g，龙骨12g，牡蛎12g，甘草6g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 健脾补肾，滋阴生血。

主治 小儿营养性贫血，属脾肾两虚型。症见面色苍白，虚肿腹胀，自汗无力，纳呆食少，行立迟缓。

来源 《中医儿科血液病诊疗经验》

2. 补血灵糖浆

组成 制首乌30g，鸡血藤30g，熟地黄30g，当归30g，炒白术27g，炒谷麦芽各30g，陈皮18g，五味子18g，大枣15枚。

用法 浓煎成500毫升，加白糖及防腐剂适量装瓶，1岁以内每服10~15毫升，1~3岁每服20~30毫升，每日3次。

功效 补气生血，健脾和胃。

主治 小儿营养性贫血。症见面黄体瘦，毛发稀黄，食纳呆，皮肤干燥，发育迟缓。

来源 《河南中医》1987(3)：17

3. 小儿升血灵冲剂

组成 皂矾6g，黄芪12g，阿胶9g，大枣10枚，山楂9g。

用法 除阿胶外上药水煎浓缩，入烊化阿胶，加工炮制成颗粒冲剂。1～3岁每服5克；3～7岁每服10克。日服3次。

功效 健脾益气，养血生血。

主治 小儿缺铁性贫血。

来源 山东中医学院附属医院儿科方

4. 绿矾散

组成 绿矾、苍术、枳壳、陈皮、茯苓、白术各等分。

用法 上药共研细末，用时取药末18克，与小麦面粉500克和匀，做成焦饼4～5个，随时服之。

功效 健脾生血。

主治 小儿营养不良性贫血。

来源 《新医药学杂志》1975(9)：15

5. 益气养血汤

组成 青黛3g，黄精9g，何首乌9g，紫草9g，白及9g，千年健9g

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 益气养血，健脾和胃。

主治 小儿缺铁性贫血，症见面色发黄，胃纳不佳，倦

怠乏力。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》。

6. 术矾散

组成 苍术9份，皂矾1份。

用法 共研细末混匀，每服1~1.5克，日服3次，饭后以大枣汤送服。

功效 健脾生血。

主治 小儿营养性贫血。症见面白无华，食少纳呆，消瘦乏力，大便不调。

来源 《中医杂志》1986(8):65

7. 健儿蜜

组成 党参10g，白术10g，茯苓10g，山药10g，山楂10g，大枣5枚，硫酸亚铁2g。

用法 浓煎，加入蜂蜜50克，制成糖浆100毫升。1~3岁每服10毫升，3~8岁每服15毫升，日服3次。

功效 健脾益气生血。

主治 小儿缺铁性贫血，属脾虚者。症见食欲不振，面色萎黄，乏力多汗。

来源 《新中医》1991(5):30

再生障碍性贫血

再生障碍性贫血是由于骨髓造血功能低下所引起的全血细胞减少综合征。临床以贫血、出血和反复感染为三大特点。本病属传统医学“虚劳”、“血虚”等范畴。传统医学认为，贫血的发生主要是由于脾肾不足，气血生化乏源所致。

治疗以培补脾肾，益气养血为其大法。

1. 再障生血饮

组成 制首乌15g，熟地黄9g，仙灵脾15g，黄芪15g，丹参30g，茜草9g，党参20g，白术9g，茯苓9g，炙甘草6g。

用法 水煎服，3~6岁每日1/2剂，6~12岁每日2/3剂，分3次服。

功效 补肾健脾，活血生血。

主治 小儿再生障碍性贫血。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

按语 方中仙灵脾具有雄性激素样作用，能刺激干细胞分化，黄芪能刺激造血系统。丹参能改善微循环。本方治疗再障效果较好。

2. 参马鹿茸散

组成 红人参30g，制马钱子10g，鹿茸10g。

用法 共研细末，3~6岁每服0.2~0.3克，6~9岁每服0.3~0.4克，9~12岁每服0.4~0.5克，日服3次，饭后温开水送服。服10天停5天，再开始服用，共服60天为一疗程。

功效 补肾助阳，益气生血。

主治 小儿再生障碍性贫血。

来源 《中医儿科血液病诊疗经验》

按语 马钱子具有壮阳固肾功效，能兴奋脊髓神经，改善骨髓微循环，活跃骨髓造血功能。人参大补元气，可增加红细胞的生成。鹿茸补肾益精，有促进网织红细胞和血红蛋白生成的作用。本方治疗再障取得了较好效果。在临床应用中

要注意马钱子有积蓄中毒作用，必须严格掌握马钱子的炮制方法和剂量，严密观察用药反应。

3. 生血片

组成 胎盘粉84g，肉桂24g，海螵蛸24g，皂矾160g，阿胶32g。

用法 前4味药共研细末，将阿胶化开，加适量淀粉制成糊状，与药面混合制成片剂，每片0.5克，每服1片，日服2次。

功效 补虚生血，收敛止血。

主治 再生障碍性贫血。

来源 辽宁中医学院王仲贤老中医方

4. 复血汤

组成 山萸肉9g，黄精9g，生黄芪9g，当归9g，阿胶9g，玉竹9g，生地9g，熟地9g，何首乌15g，旱莲草15g，生山药15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 补益脾肾，养阴补血。

主治 再生障碍性贫血，属气血两虚者。症见面色苍白，身倦乏力，腰膝酸软，舌淡，脉细弱。

来源 《何世英儿科医案》

5. 黑麻羊肝汤

组成 羊肝1具，黑芝麻1000g。

用法 羊肝蒸熟，竹刀切片，瓦上焙干，去筋杂，黑芝麻炒微黄，二味共研细粉，每日早晚各服10克。

功效 补肝养血。

主治 再生障碍性贫血。

来源 《浙江中医杂志》1989(5):237

按语 本方来自民间，用于治疗再生障碍性贫血效果较好。羊肝和黑芝麻均有生血养血之功，且便于长期食用。羊肝以青灰色山羊为佳。

6. 海参大枣汤

组成 海参（干品）50g，大枣10枚，猪骨200g。

用法 加水炖服，每日1剂，10天为一疗程，每疗程间隔2~4天。

功效 滋阴养血，益精填髓。

主治 再生障碍性贫血。

来源 《广西中医药》1984(2):18

7. 大菟丝子饮

组成 菟丝子10g，女贞子10g，枸杞子10g，首乌10g，熟地10g，山萸肉10g，旱莲草12g，桑椹子10g，补骨脂6g，肉苁蓉5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 滋阴补肾。

主治 慢性再生障碍性贫血，属阴虚型。症见面色苍白，出血，低热，手足心热，盗汗，舌尖红，脉细数。

来源 《中医杂志》1982(5):28

8. 造血二号

组成 仙茅10g，仙灵脾10g，葫芦巴6g，肉苁蓉5g，补骨脂10g，菟丝子12g，女贞子10g，当归10g，黄芪15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 补肾助阳。

主治 慢性再生障碍性贫血，属阳虚型。症见面色苍

白，手足发凉，大便溏薄，畏寒，舌质淡，脉细无力。

来源 《中医杂志》1982(5)：28

9. 活血化淤方

组成 川芎15g，丹参15g，红花10g，当归15g，鸡血藤15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 活血化淤。

主治 再生障碍性贫血。

来源 《中医杂志》1981(12)：37

按语 本方为活血化淤之基本方，临床应用中根据不同证型随证加药。肾阳虚者加补骨脂、菟丝子；肾阴虚者加女贞子、枸杞子；脾气虚者加党参、黄芪。活血化淤药具有促进骨髓造血，调整机体免疫机能等多方面作用，治疗再障疗效较好。

血小板减少性紫癜

血小板减少性紫癜是儿童时期较常见的一种出血性疾病。临床以皮肤粘膜自发性出血，血小板减少为特征。本病属传统医学“血证”之范畴。其病因主要是由于脏腑气血亏损，血失统摄，离经外溢所致。治疗以益气摄血为主，血热者宜清热，阴虚者宜养阴。

1. 清热凉血方

组成 白茅根30g，紫草15g，丹皮10g，青连翘15g，青黛10g，白芍10g，天花粉18g，玄参15g，藕节10g，生侧柏10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热凉血止血。

主治 血小板减少性紫癜，属阴虚血热型。症见皮肤紫癜大小不等，颜色鲜红，伴鼻衄，齿衄，心烦口渴，便秘尿黄。

来源 《古今儿科临床应用效方》。

2. 清热凉血汤

组成 青黛3g，紫草9g，丹皮9g，侧柏炭9g，生地10g，黄柏9g，炒栀子9g，仙鹤草15g，丹参15g，阿胶9g，木香3g，甘草5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热凉血，活血化淤。

主治 小儿特发性血小板减少性紫癜。症见皮肤淤斑淤点，斑色鲜红，鼻衄齿衄，肝脾肿大，血小板减少。

来源 《中医杂志》1986(10)：43

按语 本方治疗小儿血小板减少性紫癜45例，痊愈16例，好转28例，无效1例，总有效率为97%。一般服药1周左右出血症状控制，2~3个月血小板上升。

3. 补肾活血汤

组成 生地9g，当归9g，赤芍9g，茜草9g，补骨脂12g，炙黄芪12g，菟丝子12g，鸡血藤30g，大枣15g，生大黄6~9g(后下)。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 益气补肾活血。

主治 血小板减少性紫癜。

来源 《中西医结合杂志》1991(1)：14

按语 本方以益气补肾活血法为主，根据不同辨证类型予以加减，对急性及慢性血小板减少性紫癜均可收到较好疗效。本方观察治疗41例患儿，有效率为97.6%。治疗后在血小板增加的同时，血小板聚集功能亦恢复正常。

4. 紫地汤

组成 紫草18g，生地榆24g，蒲公英15g，旱莲草15g，牡丹皮9g，阿胶15g(烔化)。

用法 水煎服，每日1剂，将药液与烔化阿胶混合，分2次服。

功效 养阴清热，凉血止血。

主治 血小板减少性紫癜，属阴虚血热型者。症见皮肤紫癜断续出现，伴五心烦热，潮热咽干，舌红少苔，脉细数。

来源 《中国当代名医验方大全》

5. 复方益血散

组成 大叶鹿含草100g，还阳参100g，紫丹参50g。

用法 上药洗净晒干，共研细末。取鲜猪肝或鲜瘦肉50克剁细，与药末10克拌匀，入白蜜1勺，加水半小碗，隔水蒸熟后服用，每日或隔日1次，10次为一疗程。

功效 养血活血生血。

主治 血小板减少性紫癜。

来源 《新中医》1983(12):51

按语 大叶鹿含草为菊科植物紫贝天葵草，还阳参为菊科绿茎还阳参。本方对升高血小板有较好效果，一般服药1疗程自觉症状即有改善，血小板计数有不同程度上升。使用本方过程中，可根据中医辨证论治服用中药汤剂，以进一步

增进疗效。

6. 胶景健脾摄血汤

组成 阿胶10g, 景天三七15g, 党参10g, 当归10g, 熟地10g, 制首乌12g, 黄芪12g, 黄精15g, 槐花炭15g, 炒白术15g, 莲子肉15g, 山药15g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 健脾益气摄血。

主治 血小板减少性紫癜, 属气不摄血型。症见皮肤淤斑淤点, 时常鼻衄, 食少便溏, 面黄体瘦, 多汗。

来源 《湖北中医杂志》1990(1): 15

7. 凉血养阴汤

组成 水牛角15g, 生地30g, 藕节30g, 鳖甲15g, 白芍10g, 丹皮10g, 参三七粉3g。

用法 水煎服, 水牛角磨冲, 三七粉冲服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 凉血清营, 养阴增液。

主治 血小板减少性紫癜, 属阴虚血热者。

来源 《名医奇方秘术》

8. 荆枣汤

组成 紫荆叶4片, 红枣4枚, 红糖少许。

用法 先煎前2味药, 煎取药汁后加入红糖调服, 每日1剂。

功效 调营补血。

主治 血小板减少性紫癜。

来源 《浙江中医杂志》1989(5): 237

9. 调补气血方

组成 青黛3g, 黄精9g, 何首乌9g, 白及9g, 白芷6g, 紫草9g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次服。

功效 调补气血, 活血养血。

主治 血小板减少性紫癜。症见皮肤不断出现淤斑, 鼻衄, 面色不华。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

10. 复仙汤

组成 土大黄5g, 仙鹤草15g, 鸡血藤15g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次服。

功效 益气养血, 祛瘀生新。

主治 血小板减少性紫癜及各种原因引起的血小板减少。

来源 《浙江中医杂志》1989(8): 349

按语 方中土大黄有凉血止血, 活血祛瘀之功, 仙鹤草收敛止血, 鸡血藤活血补血, 三药合之, 使血止而不留瘀, 血补而不腻滞。对气虚者可加黄芪、党参; 血虚者加当归、阿胶; 食少加焦三仙、白术; 便秘可加大土大黄之剂量。本方观察治疗30例患儿, 收效良好。

11. 消斑饮

组成 鸡血藤15g, 当归6g, 商陆15g, 蔓头回12g, 仙鹤草15g, 侧柏叶7.5g, 生黄芪60g, 生地30g, 生甘草15g。

用法 水煎服, 每日1/2~1剂, 日服2次。

功效 活血化瘀, 益气滋阴。

主治 血小板减少性紫癜。

来源 《中西医结合杂志》1987(10): 627

按语 方中重用活血化淤之品，并用滋阴泻火，补气健脾之药，意在治本。全方药物配伍精当，阴阳相合，补泻兼顾，收效甚捷。

白 血 病

白血病是造血系统的恶性增殖性疾病。临床以发热、贫血、出血、肝脾及淋巴结肿大等为主要表现。传统医学中无白血病之病名，根据其临床表现，属于“血证”、“虚劳”、“症积”等范畴。本病多属正虚邪实，因此在治疗上应根据邪与正之消长，随证施治。同时，尚应根据化疗的不同时期，采用不同的中药以配合化疗。使扶正与祛邪相结合，以提高白血病的长期生存率。

1. 青黄散

组成 青黛7份，雄黄3份。

用法 共为细粉混匀，每日口服4~6克，分3次服，饭后服用。

功效 解毒凉血，散淤消积。

主治 急性非淋巴细胞白血病。

来源 《上海中医药杂志》1986(2):15

按语 青黛可消肿散淤，凉血解毒，雄黄可解百毒，消积聚。白血病早期以邪实为主，用本方可祛邪除实。实验研究证明，青黄散有抑制细胞DNA和RNA合成的作用。服用本方应注意从小量开始，饭后服用，可减轻胃肠道反应，雄黄中含砷，注意防止砷中毒。

2. 杀癌七号

组成 龙葵6g, 薏苡仁10g, 黄药子6g, 乌梅10g, 白花蛇舌草15g, 甘草5g, 三七3g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次口服。

功效 清热解毒。

主治 急性非淋巴细胞性白血病。

来源 《上海中医药杂志》1986(2): 15

按语 本方清热解毒之力较强, 多数药物经药理研究证明有抗癌细胞的作用。主要用于白血病早期, 邪气亢盛者。

3. 抗白解毒汤

组成 银花10g, 连翘10g, 公英10g, 桑叶6g, 生地10g, 生石膏15g, 大青叶10g, 车前草6g, 薏仁10g, 黄药子6g, 冬葵子6g, 莪术6g, 白花蛇舌草15g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次服。

功效 清热解毒利湿。

主治 急性白血病初期, 邪实正盛阶段。症见发热不退, 鼻衄, 皮肤淤斑淤点, 舌红苔黄, 脉数。

来源 《中医杂志》1987(8): 21

按语 急性白血病初期病势凶险, 多有高热、出血、感染等表现, 类似温热毒邪所引起的急性热病表现。用清热解毒法治疗可控制疾病发展, 扭转病机。

4. 人参黄芪汤

组成 人参3g, 黄芪12g, 补骨脂10g, 龟板6g, 当归10g, 生熟地各10g, 山萸肉10g, 山楂10g, 紫河车12g, 狗肾5g, 猪苓6g, 白花蛇舌草15g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次服。

功效 益气扶正养血。

主治 急性白血病后期，邪退正虚阶段。症见面色苍白，唇甲色淡无华，体倦乏力，自汗心悸，舌淡苔白，脉无力。

来源 《中医杂志》1987(8)：21

按语 急性白血病后期病邪已退，气血两虚，治应大补气血，兼以解毒。本方可增强机体抵抗力。坚持化疗并长期服用本方，可减少复发，延长缓解期，对长期存活有良好作用。

5. 五虫一马散

组成 白花蛇50g，白僵蚕50g，蜈蚣50g，水蛭30g，廔虫30g，制马钱子10g。

用法 共研细末，过筛制成散剂。1~3岁每服0.2~0.5克；3~6岁每服0.5~1.0克；6~9岁每服1.0~1.5克；9~12岁每服1.5~2.0克。日服3次。

功效 化淤通络，攻毒散结。

主治 脑膜白血病。症见头痛，呕吐，或见抽搐，嗜睡或昏迷。

来源 《中医儿科血液病诊疗经验》

按语 白花蛇、蜈蚣对颅内压增高、头痛有缓解作用；僵蚕熄风，控制抽搐；水蛭、廔虫消肿散结，还有抑制白血病细胞的作用；本方对脑膜白血病有一定疗效。在初期应用效佳，在脑白前用药可能减少发病。应用马钱子应注意剂量，防止过量中毒，长期服用应服2周停3天，以防蓄积中毒。

6. 消毒化血丸

组成 乳香60g，没药60g，雄精30g。

用法 乳香、没药去油，三药各研极细末，合以米饭适量捣和为丸，如莱菔子大小，晒干收贮备用。每服1克，每日1~3次。

功效 化淤消肿。

主治 急慢性白血病，有肝脾、淋巴结肿大和其它部位浸润者。

来源 《中国当代名医验方大全》

按语 方中乳香、没药消肿定痛，且能化淤止血，雄精即雄黄之上品，可消积散结。本方治疗34例患者，证实对肝脾、淋巴结肿大能使之缩小。雄精有毒，一般连续用药不超过3周为宜。有心肝肾脏器损害者忌用。

7. 助解血癌汤

组成 黄芪20g，党参30g，制首乌12g，青黛3g，半枝莲20g，夏枯草20g，白花蛇舌草20g，生地10g，熟地10g，补骨脂10g，山慈菇10g，甘草10g。

用法 水煎服，3~6岁每日1/3剂，6~9岁每日1/2剂，分3次服。

功效 补益气血，清热解毒。

主治 小儿急性淋巴细胞性白血病。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

按语 本方扶正与祛邪药并用。方中黄芪、党参能提高机体免疫功能；补骨脂具有升高白细胞作用；首乌能促进血细胞新生；半枝莲、白花蛇舌草、山慈菇有抗癌作用。本方配合化疗治疗白血病，可提高缓解率，减轻化疗的骨髓抑制，并能减少合并症。

病毒性心肌炎

病毒性心肌炎是由病毒侵犯心脏所引起的，以心肌炎性病变为主要表现的疾病。临床以胸闷、心悸、心前区不适，心律紊乱为特征。本病属中医“心悸”、“怔忡”等范畴。传统医学认为，本病发生是由于感受外邪，扰及心系，心之气血不足，心失所养而致。治疗以清热解毒，补益气血，养心安神为主。

1. 玉竹丹参饮

组成 玉竹20g，丹参30g，蝉蜕20g，生地12g，麦冬15g，僵蚕10g，甘草6g。

用法 水煎服，取汁100毫升，3～6岁每次服20毫升，6～9岁每次服30毫升，9～12岁每次服50毫升。日服2次。

功效 养阴清热，活血生脉。

主治 病毒性心肌炎。症见心悸气短，多汗乏力，咽赤。

来源 《中西医结合杂志》1989(4)：243

按语 玉竹、麦冬、生地均有强心利尿作用。蝉蜕、僵蚕能降低心率。丹参扩张血管而改善心血循环，有利于心肌的恢复。本方治疗小儿病毒性心肌炎效果较好。

2. 调心复脉汤

组成 党参10g，麦冬10g，五味子10g，生地15g，桂枝3g，阿胶10g，丹参30g，郁金10g，赤芍10g，炙甘草5g，生姜2片，大枣5枚。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 调心复脉，益气养阴。

主治 病毒性心肌炎，气阴两虚型。症见心悸气短，自汗乏力，胸闷不舒，脉结代。

来源 《中国医药学报》1989(5)：40

按语 本方系刘弼臣教授之经验方。方中调心与复脉相兼而用，并用活血之品，治疗小儿病毒性心肌炎，心气心阴两虚证疗效较好。方中桂枝、生姜为温燥之品，用量宜小，丹参用量要大，以利于纠正脉结代。

3. 活血养心汤

组成 丹参20g，赤芍15g，川芎10g，生地15g，麦冬10g，五味子10g，牡蛎25g。

用法 水煎服。每日1剂，分2次服。

功效 活血化淤，兼养心阴。

主治 病毒性心肌炎。症见心悸乏力，胸中憋闷，时有头晕，多汗。

来源 《辽宁中医杂志》1979(1)：11

4. 银花益母饮

组成 银花30g，益母草20g，苦参15g，党参15g，当归15g，炙甘草6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 益气强心，解毒活血。

主治 病毒性心肌炎。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 方中银花有清热解毒之功效。益母草可明显减慢心率，改善心肌微循环。苦参能降低心肌应激性，防治心律

失常。党参益气扶阳，增强心脏功能。本方用于治疗病毒性心肌炎疗效显著。

5. 清心饮

组成 青黛3 g，茯苓9 g，珍珠母30 g，枣仁9 g，莲心9 g，柏子仁9 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清心平肝安神。

主治 病毒性心肌炎。症见胸口憋闷，喜长出气，头晕乏力，食少。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

按语 本方以青黛清热解毒，茯苓健脾宁心，珍珠母、枣仁、柏仁宁心安神，莲心既能清热又能宁心。本方对小儿心肌炎之心律不齐，期外收缩效果较著。

6. 补血复脉汤

组成 白蒺藜9 g，白芍9 g，阿胶9 g，柏子仁9 g，松子仁9 g，酸枣9 g，生地9 g，生龙齿15 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 滋阴补血复脉。

主治 小儿病毒性心肌炎。

来源 《中国当代名医秘验方精粹》

7. 调补气血方

组成 黄芪30 g，党参15 g，丹参15 g，益母草15 g，甘松15 g，白术10 g，白芍10 g，当归10 g，川芎10 g，泽兰10 g，麦冬10 g，五味子5 g，甘草6 g。

用法 水煎服，每剂取汁2~3次，合并混匀后分2天服用。

功效 益气养阴，活血通脉。

主治 病毒性心肌炎，顽固性心律失常。

来源 《上海中医药杂志》1988(6)：2

按语 本方重在调补气血。方中黄芪补气升陷，为主药，剂量可用至50克。甘松能健脾理气，善通经络，近代药理证实其所含缬草酮有抗心律不齐作用。临床使用本方应根据不同见证随证加减。

泌尿及内分泌系统疾病

急性肾炎

急性肾炎是小儿时期常见的一种疾病。临床以水肿，尿少，血尿，高血压为主要表现。本病属传统医学“水肿”、“尿血”等范畴。传统医学认为，本病发生是由于感受外邪，伤及脏腑，导致肺脾肾功能失调，水液代谢障碍所致。治疗多采用发汗、利尿、清热、健脾等方法。

1. 鱼腥草汤

组成 鱼腥草15g，倒扣草30g，半枝莲15g，益母草15g，车前草15g，白茅根30g，灯芯草1g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒，凉血止血。

主治 小儿急性肾炎，以血尿为主者。症见小便黄赤，发热咽红，浮肿。

来源 《北京中医学院学报》1986(1):31

按语 本方系著名儿科专家刘弼臣教授经验方。方中重用清热解毒之品，治疗小儿急性肾炎疗效卓著。在临床应用中，对血尿严重者可加女贞子、旱莲草，止血效果更佳。

2. 五草汤

组成 鱼腥草15g，旱莲草15g，益母草15g，车前草10g，灯心草1.5g，半枝莲15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热解毒，凉血止血。

主治 小儿急性肾炎。症见血尿，浮肿，发热，咽赤，舌红苔黄，脉数。

来源 中医杂志1991(3):20

3. 肾炎血尿方

组成 生地20g，阿胶9g，生玉竹9g，丹皮9g，旱莲草9g，汉三七末3g（冲服）

用法 水煎服，每日1剂，分3次服，汉三七分次冲服。

功效 滋肾育阴止血。

主治 小儿急性肾炎迁延不愈。

来源 《何世英儿科医案》

按语 本方系著名老中医何世英之经验方，在天津市儿童医院列为肾炎协定处方，多年应用于临床，疗效显著。

4. 三七琥珀粉

组成 参三七粉1g，琥珀粉0.5g。

用法 二药合之，以适量蜂蜜调服，每日3次。

功效 凉血止血。

主治 急性肾炎，血尿经久不消。

来源 《中医杂志》1987(11):7

5. 青葱豆豉饼

组成 青葱管、淡豆豉、麝香。

用法 青葱同豆豉捣烂后，加入少量麝香，做成饼状，盖于脐中外加艾灸。

功效 疏风宣肺利水。

主治 急性肾炎之风水肿。症见咳嗽，气喘，无尿，

浮肿。

来源 《中医杂志》1989(11):7

6. 龙蝉解痉汤

组成 地龙9g, 蝉蜕24g, 白术9g, 茯苓9g, 白茅根60g, 车前子60g, 泽泻12g, 木通9g, 夏枯草30g。

用法 水煎服, 3岁以下每日1/3剂; 3~6岁每日1/2剂; 6~12岁每日1剂。分3次于饭后服。

功效 清热凉血, 利尿消肿。

主治 小儿急性肾炎初期。症见面目及四肢浮肿, 小便不利, 尿血, 头晕目眩。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

7. 复方白茅根汤

组成 白茅根30g, 黄芩10g, 黄连3g, 黄柏6g, 银花10g, 连翘6g, 蝉衣6g, 浮萍15g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分4次服。

功效 清热解毒, 利尿消肿。

主治 小儿急性肾炎之风水肿。症见眼睑浮肿, 继之全身四肢皆肿, 发热咽痛, 小便不利或赤黄。

来源 《中国当代名医验方大全》

8. 茅根茯苓汤

组成 白茅根30g, 车前子30g, 赤小豆30g, 玉米须15g, 连翘12g, 茯苓10g, 山药10g, 生薏仁20g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次服。

功效 清宣利湿, 健脾益气。

主治 小儿急性肾炎之急性期。

来源 《中西医结合杂志》1989(10):630

9. 固涩补气汤

组成 五味子10g, 金樱子25g, 杭白芍15g, 炙黄芪10g, 太子参25g, 焦白术10g, 黄芩7g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分3次服。

功效 健脾益气固涩。

主治 小儿急性肾炎恢复期。

来源 《中医杂志》1988(3):37

按语 本方主要用于急性肾炎恢复期, 临床症状基本消失, 尿中仍可见蛋白及红细胞。这些均属人体精微物质, 故以固涩补气之法治之。本方治疗81例患儿, 疗效满意。

10. 水肿外敷方

组成 萱草根、马鞭草、乌柏叶各60g, 葱白7根, 生姜6g。

用法 上药分别捣绒混匀, 做成2个药饼, 每取1个药饼敷于脐部, 以塑料纸覆盖, 包扎固定, 每日更换药饼2次, 并以热水袋在敷料上热熨2~3次, 每次30分钟。

功效 利水消肿。

主治 小儿肾炎水肿较甚者。

来源 《四川中医》1987(2):57

11. 商陆麻黄汤

组成 麻黄3g, 商陆6g, 茯苓皮10g, 泽泻6g, 赤小豆10g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次服。

功效 疏表通里, 健脾利水。

主治 小儿急性肾炎, 属阳水实证者。症见一身尽肿, 肿势较甚, 小便涩少。

来源 《浙江中医杂志》1986(9):393

按语 小儿急性肾炎多属风水之类，与肺脾肾三脏有关。本方以麻黄宣上焦肺气，茯苓、泽泻运脾而畅中焦，商陆通下焦水道，故利水消肿之效迅速。本方乃急则治标之剂，待水肿消后必速撤峻药，投以健脾之剂以扶正。

12. 丹坤二白汤

组成 丹参10g，益母草10g，白花蛇舌草10g，白茅根10g，黄柏10g，生地10g，赤芍10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热利湿，活血化淤。

主治 小儿急性肾炎，血尿迁延不愈。

来源 《中医杂志》1988(11):43

13. 急性肾炎方

组成 青黛3g，紫草9g，寒水石12g，乳香6g，白芨9g，五倍子3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒，理气活血。

主治 小儿急性肾炎。症见尿少色红，眼睑浮肿，食少纳呆，有时恶心，脉滑数。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

按语 本方系儿科名老中医王鹏飞之经验方，本方旨在清热解毒，活血化淤，佐以利水。临床应用数十年之久，疗效卓著。临证见有高血压可加钩藤、珍珠母；四肢浮肿加木瓜、灵仙；有腹水加牙皂、木香。

14. 瓜蒜利水方

组成 成熟西瓜1个（约6~8斤），大蒜150g。

用法 将西瓜开一口，大蒜去皮后纳入，再将西瓜口盖好，削去西瓜硬皮，放入锅中蒸熟，连瓜带蒜服下，1日分次服完。

功效 清热解毒，利湿消肿。

主治 急性肾炎，水肿较甚者。

来源 《湖北中医杂志》1986(2):51

15. 急肾汤

组成 金银花8g，野菊花8g，公英10g，紫花地丁10g，白茅根10g，小蓟10g，茯苓12g，猪苓12g，泽泻12g，益母草15g，蝉蜕6g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热解毒，利尿活血。

主治 小儿急性肾炎。

来源 《广西中医药》1990(6):7

16. 三白散

组成 白牵牛、桑白皮、白术、木通、陈皮、甘草各15g。

用法 共切碎片，每取6克，水煎温服。

功效 清热宣肺，健脾利水。

主治 小儿水肿初期。症见四肢皮肤及阴囊浮肿，小便不利，痰嗽气喘。

来源 《活幼心书》

17. 消风散

组成 荆芥10g，防风10g，大力子10g，当归10g，苍术10g，蝉衣5g，木通5g，苦参10g，生地10g，羌活子10g，知母5g，石膏20g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 疏风清热，利湿消肿。

主治 小儿急性肾炎。

来源 《浙江中医杂志》1986(9):392

按语 急性肾炎属变态反应性疾病，其病机主要是由于风湿热邪客于肌表所致。消风散具有疏风清热之功，能祛邪外出。本方观察治疗100例患者，总有效率为96%。

慢性肾炎

慢性肾炎是以起病缓慢，临床见有浮肿，高血压，贫血，血尿及蛋白尿，并伴有不同程度的肾功能不全为主要表现的肾脏疾患。本病属传统医学“水肿”范畴。其病因主要是由于脾肾虚弱，肝肾阴虚所致。治疗主要采用补益脾肾，滋补肝肾等方法。

1. 芡实合剂

组成 芡实15g，白术6g，茯苓10g，怀山药10g，菟丝子12g，金樱子12g，黄精12g，百合10g，枇杷叶6g，党参6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 补益脾肾，利尿固精。

主治 慢性肾炎，脾肾两虚证。症见下肢浮肿，腰膝酸软，面白神疲，经常感冒，尿蛋白长期不消。

来源 《岳美中医案集》

2. 黄芪粥

组成 生黄芪30g，生苡仁30g，赤小豆15g，鸡内金

9g，金橘饼2枚，糯米30g。

用法 先以水600毫升，煮黄芪20分钟，捞去药渣，次入薏苡仁、赤小豆煮30分钟，再次入鸡内金（研细末）和糯米，煮熟成粥。此为1日量，分2次服，食后嚼服金橘饼1枚。

功效 健脾益气补肾。

主治 慢性肾炎恢复期，属肾阳虚或肾气虚者。症见浮肿长期不消，尿蛋白长期不去，或起伏无常。

来源 《岳美中医案集》

按语 方中黄芪健脾益气，能助肾功能之恢复。赤小豆利水消肿，薏苡仁渗湿消肿。内金能助消化，糯米温中益气。金橘饼下气开膈消胀，并可佐黄芪服后壅胀的副作用，若无金橘饼可用广木香3克与黄芪同煎。本方对慢性肾炎后期消肿，消蛋白作用甚好。

3. 消蛋白粥

组成 芡实30g，白果10枚，糯米30g。

用法 煮粥食服，每日1剂，10天为1疗程，间歇服2~4疗程。

功效 健脾补肾，固涩敛精。

主治 慢性肾炎中后期，正气虚损，尿蛋白经久不消。

来源 《中医杂志》1985(9):47

4. 黑豆薏仁饮

组成 黑大豆30g，生熟薏仁各20g，赤小豆15g，荷叶6g。

用法 加水1000毫升煮极熟，任意食豆饮汁。

功效 补肾健脾，行水散淤。

主治 慢性肾炎，蛋白尿长期存在，久治不愈。

来源 《中医杂志》1988(6):63

5. 消尿蛋白饮

组成 黄芪15 g，龟板30 g，淮山药15 g，薏米15 g，粟米须30 g，杜仲12 g，扁豆15 g，谷芽15 g。

用法 水煎服，龟板先煎，每日1剂，分2~3次服。

功效 健脾固肾，利湿化浊。

主治 慢性肾炎，属脾肾两虚型，以持续蛋白尿为主要表现者。

来源 《千家妙方》

6. 慢肾水肿方

组成 生地25 g，山萸肉12 g，茯苓15 g，泽泻15 g，丹皮9 g，车前子15 g，冬葵子15 g，山药15 g。

用法 水煎服，每日1剂，频服或分3次服。

功效 补益肾气，利水消肿。

主治 慢性肾炎，以水肿为主者。

来源 《何世英儿科医案》

7. 南星腹皮散

组成 南星30 g，大腹皮15 g，生姜皮15 g，陈皮15 g，青皮15 g，桑白皮15 g，扁豆15 g，炙甘草15 g。

用法 共切碎片，每取6克，加生姜2片水煎服。

功效 健脾行气利水。

主治 小儿脾虚水肿。症见周身浮肿，小便不利，面色萎黄，神疲纳呆，腹胀胸满。

来源 《活幼心书》

紫癜性肾炎

紫癜性肾炎是由过敏性紫癜引起的肾脏损害，临床以尿血、浮肿等为主要表现。本病根据其临床证候，属传统医学“尿血”、“水肿”之范畴。传统医学认为，本病之发生是由于邪热久羁，灼伤肾络，水液代谢失常所致。在治疗上多采用清热凉血，活血化淤，利水消肿等方法。

1. 紫癜三号

组成 青黛3 g，紫草9 g，白茅根30 g，丹参9 g，丹皮9 g，大小蓟各15 g，赤芍9 g，威灵仙9 g，生地12 g，生薏仁20 g，凤尾草9 g，倒扣草30 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热凉血，活血化淤。

主治 小儿紫癜性肾炎。症见皮肤紫癜，关节肿痛或腹痛，尿化验检查异常。

来源 《中医杂志》1988(6):74

2. 清热活血方

组成 益母草30 g，白茅根30 g，荠菜花15 g，银花9 g，连翘9 g，大蓟9 g，小蓟9 g，王不留行12 g，三七粉2 g（吞服）。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热活血。

主治 小儿紫癜性肾炎。

来源 《中西医结合杂志》1985(5):262

3. 紫癜肾炎汤

组成 丹参30 g，旱莲草20 g，防风10 g，荆芥10 g，黄芩10 g，车前子15 g，地肤子10 g，麻黄6 g，苦参10 g，甘草4 g。

用法 水煎服，3~6岁每日1/2剂；6~9岁每日2/3剂；9~12岁每日1剂。分3次服。

功效 化淤消癥，祛风抗敏。

主治 小儿紫癜性肾炎。症见反复血尿，但无明显浮肿。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

4. 五草消毒饮

组成 白花蛇舌草15 g，益母草15 g，紫草30 g，旱莲草15 g，仙鹤草15 g，野菊花30 g，地肤子30 g，白茅根15 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热解毒，凉血止血。

主治 紫癜性肾炎。症见皮肤紫癜，血尿浮肿，舌红，脉数。

来源 《中国中医秘方大全》

5. 清热行淤汤

组成 生地10 g，大黄12 g，生山楂30 g，鹿含草12 g，紫草15 g，甘草12 g，防风10 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 疏风清热，行淤解毒。

主治 紫癜性肾炎。

来源 《中医杂志》1985(2):38

按语 方中生地、紫草、大黄活血凉血，逐内伏营血之

热毒，生山楂善入血分，为活血化淤之要药；防风疏散风热，鹿含草祛风利湿，止血而不留淤。诸药合之可使风热能清，淤血得散，切合病机。临床应用可以此为基本方，随证加减。

6. 大黄桃仁汤

组成 大黄7.5 g，桃仁15 g，丹皮15 g，焦栀子15 g，蒲公英50 g，白花蛇舌草50 g，藕节20 g，侧柏叶20 g，生地20 g，甘草10 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热利湿，凉血止血。

主治 紫癜性肾炎，属血热内淤证者。症见皮肤紫癜时隐时现，持续尿血，手足心热，大便干燥。

来源 《新中医》1991(7):12

按语 本方宜于紫癜性肾炎之中期，以血热内淤症状为主者，特别是对屡用激素有淤热之象者。方中大黄与桃仁配伍，有泄热化淤之效，必不可少。但不宜久用，热象消退即应在凉血止血之中酌加益气之品，清补兼施。

7. 活血化淤方

组成 丹参15 g，赤芍10 g，川芎7.5 g，益母草10 g，红花6 g，当归10 g，茜草10 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次口服。

功效 活血化淤。

主治 小儿紫癜性肾炎。症见肉眼或镜下血尿，小便短少，或见浮肿。

来源 《中医杂志》1993(3):175

按语 本方以活血化淤为主，在临床应用中可根据不同

证候随证加减。血热型加小蓟、白茅根；气虚型加黄芪、茯苓；阴虚型加旱莲草、女贞子。本方观察治疗30例患儿，总有效率为93.3%。

肾病综合征

肾病综合征是以肾小球基底膜通透性增高为主的症候群。临床以全身水肿，大量蛋白尿，低蛋白血症和高胆固醇血症为特点，属传统医学“水肿”范畴。传统医学认为，水肿的发生，主要是由于肺脾肾三脏功能不足，水液代谢失常所致。治疗以补肾、健脾、温阳、利水等方法。

1. 三草一须汤

组成 玉米须、车前草、金钱草、篇蓄草各30g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 健脾利水。

主治 肾病综合征初发。症见眼睑及下肢浮肿，面色无华，舌淡脉细。

来源 《中医杂志》1984(9):4

2. 肾病汤

组成 生地10g，丹皮6g，女贞子9g，茯苓10g，泽泻6g，生山药10g，黄芪9g，丹参9g，川断10g，桑寄生10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 滋阴补肾，益气活血。

主治 小儿肾病综合征。

来源 《中西医结合杂志》1987(9):552

按语 本方有活血化淤，增强免疫功能，降低血脂，改善血循环的作用。配合激素疗法应用，可避免强的松副作用，使尿蛋白消失及血浆蛋白上升均较快，可提高疗效。

3. 肾病一号

组成 炒党参10g，白术10g，茯苓10g，猪苓10g，黄芪10g，陈皮6g，大腹皮10g，生姜皮6g，泽泻8g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 健脾利水消肿。

主治 肾病综合征脾虚湿泛型。症见全身浮肿，尿少腹胀，食少便溏，面白神疲。

来源 安徽中医学院附属医院儿科方

4. 肾病二号

组成 仙灵脾6g，巴戟天6g，炒党参10g，黄芪10g，山药10g，白术10g，泽泻8g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 补脾益肾，温阳利水。

主治 肾病综合征脾肾阳虚型，症见全身浮肿，下肢尤甚，小便短少，面白肢冷。

来源 安徽中医学院附属医院儿科方

5. 肾病三号

组成 生地10g，熟地10g，女贞子10g，山药12g，山萸肉8g，炒知母8g，炒黄柏8g，泽泻6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 滋肾养肝，育阴潜阳。

主治 肾病综合征肝肾阴虚型。症见浮肿消退后咽干唇红，头晕目眩，多汗时烦。

来源 安徽中医学院附属医院儿科方

6. 肾病缓解汤

组成 黄芪30g，党参15g，白术10g，茯苓10g，仙灵脾20g，泽泻12g，车前子20g，甘草6g。

用法 水煎服，3~6岁每日1/2剂；6~9岁每日2/3剂；9~12岁每日1剂。分3次服。

功效 健脾补肾，温阳化水。

主治 小儿肾病综合征。症见全身浮肿，尿少，食少纳呆，神疲肢冷。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

7. 二丑甘遂散

组成 黑白丑各12g，甘遂3g，千金子6g，沉香6g。

用法 共研细末，每服1~2克，清晨空腹服下，以达每日3~4次水泻为度。

功效 泻下逐水。

主治 肾病综合征之顽固性水肿。

来源 《中医杂志》1984(9):4

8. 黑大豆丸

组成 黑大豆250g，淮山药60g，苍术60g，茯苓60g。

用法 共研细末，水泛为丸，每服3~6克，日服2~3次。

功效 健脾利湿。

主治 肾病综合征之恢复期。

来源 《中医杂志》1984(9):4

9. 肾病水肿方

组成 桑白皮15g，大腹皮18g，广陈皮9g，生姜皮9g，麻黄9g，冬瓜皮25g，茯苓皮25g。

用法 水煎服，每日1剂，频服或分2次服。

功效 利湿消肿。

主治 肾病综合征。症见面目四肢皆肿，脘腹胀满，小便不利，阴囊肿甚。

来源 《何世英儿科医案》

10. 鲤鱼汤

组成 鲤鱼1条，砂仁，蔻仁、生姜、葱各适量。

用法 鲤鱼去鳞及内脏，放入上药少许清蒸，不放盐，每日1条。

功效 利尿消肿。

主治 肾病综合征，低血浆蛋白之浮肿。

来源 《中西医结合杂志》1987(10):629

11. 四黄粥

组成 黄芪30g，大黄粉30g，鸡蛋黄12个，黄小米50g。

用法 鸡蛋煮熟，将12个鸡蛋黄放锅中用文火炒出油，再将炒过的大黄粉兑入，搅拌均匀，即成二黄散。每晚睡前以小米与黄芪共煮成粥，取二黄散10克放入粥中，趁热徐徐服下，然后盖好衣被，微取汗出。

功效 健脾益气。

主治 小儿肾病综合征，尿蛋白持续不消者。

来源 中日友好医院汪月琴主任医师方。

按语 本方为清补兼施之剂，以补为主。方中黄芪益气健脾，大黄祛瘀生新，鸡蛋黄补血养阴，小米补中益气。四

黄合之，可补益脾肾，固摄精微，故可促使尿蛋白转为阴性。本方经中日友好医院儿科临床应用多年，疗效满意。

12. 香陆胃苓丸

组成 丁香60g，商陆60g，赤小豆60g，陈皮60g，炙甘草60g，苍术90g，泽泻75g，赤茯苓45g，猪苓45g，白术45g，肉桂30g，厚朴60g。

用法 共研细末，水糊为丸，如绿豆大，每服20~50丸。

功效 实脾导水，利尿消肿。

主治 小儿水肿日久不愈。

来源 《活幼心书》

13. 茯苓导水汤

组成 赤茯苓90g，麦门冬90g，泽泻90g，白术90g，桑白皮30g，紫苏30g，槟榔30g，木瓜30g，大腹皮20g，陈皮20g，砂仁20g，木香20g。

用法 共切碎片，每取30~60克，加灯草30根水煎，饭前服。

功效 健脾行气导水。

主治 小儿水肿之重证。症见遍身皆肿，按之凹陷，腹满不得卧，饮食不下。

来源 《景岳全书》

14. 海龙玉桂口服液

组成 海龙2g，生黄芪15g，桂枝15g，生龙骨24g，生牡蛎24g，防风3g，白术6g，白芍10g，生姜2片，大枣10枚，甘草3g。

用法 制成口服液，每服10毫升，日服3次，饭前服，3个月为一疗程。

功效 补肾固精。

主治 小儿肾病综合征经常复发。

来源 《吉林中医药》1993(1):25

按语 本方由玉屏风散和桂枝加龙骨牡蛎汤加海龙等中药组成。有益气固表，调和阴阳，补肾固精作用，因而使蛋白不致随尿流失。临床观察证明，本方有提高肾病患者免疫功能，增强抗病能力的作用。因此对肾病经常复发的患儿用之可增强免疫功能，减少复发。

15. 二仙汤加味

组成 仙茅9g，淫羊藿9g，肉苁蓉9g，巴戟天3g，山萸肉9g，山药9g，白术9g，玄参9g，麦冬9g，瓜蒌9g，菟丝子30g，生薏仁30g。

用法 水煎服，每日1剂，分2～3次服。

功效 调补阴阳，补肾健脾。

主治 小儿肾病综合征缓解期，激素减量或撤除阶段。

来源 《辽宁中医杂志》1992(11):21

尿 路 感 染

尿路感染是由于大量细菌繁殖而引起的尿路炎症。临床以高热、尿频、尿急、排尿痛为主要特征。本病属传统医学“淋证”范畴。传统医学认为，本病主要是由于湿热之邪蕴结下焦所致，故治疗多采用清热利湿通淋之法。

1. 三草汤

组成 凤尾草10g，旱莲草10g，车前草10g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热利湿，消肿解毒。

主治 小儿尿路感染，属湿热下注者。症见恶寒发热，尿频尿急，排尿疼痛。

来源 《河南中医》1985(3):9

2. 五淋散

组成 茵陈3g，淡竹叶3g，木通4.5g，滑石4.5g，甘草4.5g，炒栀子6g，赤芍6g，赤茯苓6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热利湿通淋。

主治 尿路感染，属膀胱有热者。症见排尿疼痛，淋沥不止，脐腹急痛，或见尿血。

来源 《景岳全书》

3. 清热利尿方

组成 青黛3g，紫草9g，白芨9g，乳香6g，益元散9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒，活血利尿。

主治 泌尿系感染。症见尿急，排尿痛，尿频，或见血尿。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

按语 方中青黛、紫草清热解毒，白芨、乳香凉血活血，益元散利尿，使下焦湿热得以清泻，从而使感染得到控制，诸证尽除。

4. 白茅根汤

组成 白茅根30g，黄柏3g，银花12g，连翘12g，黄芩9g，滑石12g，马齿苋15g，甘草3g，半枝莲9g，

半边莲9 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热利湿解毒。

主治 泌尿系感染之急性期。症见发热恶寒，尿频尿急，排尿疼痛，烦躁口渴。

来源 《儿科证治》

5. 黄柏石韦汤

组成 黄柏15 g，石韦30 g，蒲公英30 g，地丁15 g，篇蓄15 g，瞿麦15 g，车前子30 g，甘草9 g。

用法 水煎服，每日1/2~1剂，分3次服。

功效 清利湿热，通淋解毒。

主治 泌尿系感染。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

6. 石韦散

组成 石韦15 g，冬葵子15 g，木通15 g，赤茯苓15 g，车前子15 g，瞿麦15 g，榆白皮15 g，滑石9 g。

用法 共研粗末为散，每取3克，入葱白5寸，水煎去渣，分2~3次服。

功效 清热通淋利湿。

主治 小儿湿热淋证。症见排尿疼痛，脐下痞满，小便色赤。

来源 《太平圣惠方》

7. 木通散

组成 木通3 g，桑白皮3 g，滑石150 g，冬葵子3 g，川芒硝3 g。

用法 共研细末，每服1.5克，以葱白煎汤调服，日服

3~4次。

功效 清热利湿通淋。

主治 小儿湿热淋证。症见发热，小便不利，赤涩不通。

来源 《太平圣惠方》

8. 金沙散

组成 海金沙、郁金、滑石、甘草各等份。

用法 共为细末，每服3克，以灯心、木通煎汤调服。

功效 清热通淋。

主治 小儿淋证，小便淋沥不通。

来源 《婴童百问》

9. 滑石散

组成 滑石30g，黄芩15g，冬葵子1g，车前子15g，木通2g。

用法 共捣粗末为散，每服3克，以水煎之，去渣温服。

功效 清热通淋。

主治 小儿热淋。症见小便频数，热涩刺痛，尿辄大啼，尿色黄赤混浊。

来源 《太平圣惠方》

10. 犀角屑散

组成 犀角屑15g，黄芩15g，石韦15g，当归15g，赤芍15g，蒲黄30g。

用法 共捣粗末为散，每服3克，入生地、青竹茹各少许，水煎去渣温服。

功效 清热止血。

主治 小儿血淋。症见尿血，刺涩疼痛，身热烦躁。

来源 《太平圣惠方》

11. 黄芩滑石汤

组成 黄芩9g，滑石9g，茯苓皮9g，猪苓9g，大腹皮6g，白蔻仁3g，通草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热化湿。

主治 尿路感染，属下焦湿热证。

来源 《温病条辨》

尿 崩 症

尿崩症是小儿时期较常见的内分泌疾病，临床以多尿、多饮为特征。本病属传统医学“消渴”范畴。本病多因燥热伤阴，津液亏乏所致，其病主要责之于肺脾肾三脏。故治疗多以补益脾肾，滋阴润肺，止渴生津等方法治之。

1. 尿崩方

组成 制首乌60g，黑芝麻60g，红枣60g，淮山药30g，黑枣30g。

用法 取黑毛小母鸡1只，除去毛及内脏，和上药一起用小火炖8~12小时，分次食汤吃肉，可在2~3天内食完，每周1剂。

功效 补益脾肾，固摄守阴。

主治 小儿尿崩症。症见口渴多饮，尿频清长，神疲消瘦，皮肤干燥，纳食减少。

来源 《新中医》1980（增2）：39

2. 麦门冬饮

组成 麦门冬15g，黄芩15g，葛根15g，知母10g，竹叶10g，乌梅10g，芦根40g，花粉20g，沙参20g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热润肺，生津止渴。

主治 小儿尿崩症。症见多饮多尿，尿比重低，食少消瘦，神疲烦躁，皮肤干燥。

来源 《辽宁医药》1980(8):35

3. 二至滋阴饮

组成 旱莲草9g，女贞子9g，麦冬9g，南沙参9g，玉竹9g，山药15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 滋补肾阴，兼益脾肺。

主治 小儿尿崩症。症见口渴，饮水不已，尿量多而频，舌红，脉细弱。

来源 《何世英儿科医案》

4. 葛根沙参汤

组成 葛根9g，北沙参6g，麦冬9g，花粉12g，生石膏15g，石斛9g，芦根9g，竹叶3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热生津。

主治 小儿尿崩症。症见烦渴多饮，饮水不解，小便频数。

来源 《儿科证治》

5. 五汁饮

组成 梨汁20g，荸荠汁15g，鲜芦根汁30g，麦冬汁

12 g，鲜藕汁9 g。

用法 以上五汁共合之，加凉开水适量，每日1剂，频频饮用。

功效 养阴生津止渴。

主治 小儿尿崩症。

来源 《儿科证治》

6. 益气固摄汤

组成 桑螵蛸15 g，破故纸10 g，益智仁10 g，台乌药10 g，黄芪15 g，山药12 g，五味子10 g，白果10 g，炙鸡内金10 g。

用法 水煎服，每日1剂，煎时可加生姜、大枣。分2~3次服。

功效 温肾益气固摄。

主治 小儿尿崩症，属肾虚不摄者。症见心烦口渴，多饮多尿，面色萎黄，舌淡苔白。

来源 《北京中医》1988(5):8

7. 尿崩基本方

组成 生地15 g，山药15 g，龟板15 g，党参9 g，甘草15 g，黄连3 g，黄柏3 g，羚羊角1 g。

用法 水煎服，羚羊角另煎，每剂煎4~6次，取汁500~2000毫升，分4~6次服完。

功效 滋阴清热止渴。

主治 尿崩症。

来源 《大众方》

按语 治疗尿崩症可以此为基本方。口渴甚者加石膏、葛根、鲜芦根；尿频明显者加枸杞、五味子、桑螵蛸；便秘

加火麻仁、生大黄；纳差加玉竹、山楂。

8. 玉泉丸

组成 麦门冬30g，人参30g，茯苓30g，黄芪30g，
乌梅30g，甘草30g，花粉46g，干葛45g。

用法 共为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每服1丸，不拘时细嚼。

功效 养阴生津益气。

主治 尿崩症。

来源 《奇效良方》

9. 莲花饮

组成 白莲须3g，干葛3g，云苓3g，生地3g，正雅莲1.5g，天花粉1.5g，人参1.5g，北五味1.5g，知母1.5g，炙甘草1.5g，淡竹叶1.5g，灯芯10茎。

用法 水煎服，每日1剂，频服。

功效 益气养阴，生津止渴。

主治 小儿尿崩症，上消口渴，饮水不休。

来源 《幼幼集成》

10. 五汁莲花汤

组成 黄连，花粉，人乳，藕汁，生地汁，生姜汁，
蜂蜜。

用法 二药共为细末，以上五汁共和为丸，每丸重3克，每服1丸，日服3次。

功效 滋阴生血，养脾益肺。

主治 小儿尿崩症。

来源 《幼科铁镜》

11. 白茯苓丸

组成 白茯苓30g，覆盆子30g，黄连30g，瓜蒌根30g，萆薢30g，人参30g，熟地30g，玄参30g，石斛0.9g，蛇床子0.9g，鸡内金30个。

用法 共研细末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服10～20丸，饭前磁石汤送服。

功效 养阴清热生津。

主治 小儿尿崩症。症见口渴多饮，小便频数，尿浊。

来源 《普济方》

12. 天花散

组成 天花粉30g，生地30g，葛根15g，麦冬15g，五味子15g，甘草3g。

用法 共为粗末，每服9克，加梗米30克水煎服，日服2次。

功效 养阴生津止渴。

主治 尿崩症。

来源 《仁斋直指方论》

性早熟

性早熟是指女孩在8岁以前，男孩在10岁以前出现性征的表现。传统医学认为，性早熟的发生是由于肾阴不足，阴虚火旺，虚火妄动所致。故治疗一般多以滋阴降火为原则。

1. 滋阴泻火方

组成 生地9g，知母9g，元参9g，夏枯草9g，黄柏9g，泽泻9g，赤芍9g，三棱9g，炙龟板12g，龙胆草12g，生麦芽30g，生甘草4.5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 滋阴泻火。

主治 女童性早熟。症见乳房增大，白带增多，急躁易怒，口渴便秘，五心烦热。

来源 《中医杂志》1990(2):30

按语 本方治疗25例女性性早熟，获效23例。用药后各类阴虚火旺症状均有明显减轻，血卵泡刺激素明显降低。方中龙胆草应从小剂量开始，逐渐加量至12克，以免克伐胃气。

2. 滋阴安神汤

组成 夜交藤15g，枣仁10g，知母10g，黄柏10g，熟地10g，枸杞10g，山药10g，丹皮10g，泽泻10g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次口服。

功效 滋补肾阴，降火安神。

主治 儿童性早熟。

来源 《全国名老中医验方选集》

3. 薏田薏合剂

组成 薏田薏30g，荔枝草30g，甜菜子30g，卤地菊30g，泽兰15g，蒲公英15g，白背叶15g，赤地利15g，丹参9g，香附9g，炙草5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 疏肝清热，调和气血。

主治 肝经湿热，肝气郁结所致之女童性早熟。症见月经过早，白带较多，乳房增大。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 本方为马长福老中医祖传验方。治疗30例性早熟

女童，一般服药15剂后患儿月经、白带逐渐消失，色素沉着消退，全身病态体征明显消失。

4. 舒肝清热汤

组成 柴胡8g，黄芩8g，泽泻8g，枳壳8g，白芍8g，元参10g，当归10g，生地10g，浙贝10g，夏枯草12g，茯苓12g，赤芍6g，丹皮6g，甘草6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 舒肝散结，清热利湿。

主治 女童性早熟。症见双乳发育，白带量多，性情急躁，舌苔薄黄。

来源 《四川中医》1992(3):31

神经及精神疾病

癲 痫

癲痫是小儿时期常见的一种病因复杂的反复发作的神经系统综合征。临床以突然仆倒，昏不知人，四肢抽搐，发过即苏，醒后如常人为特征。传统医学亦称“羊痫风”、“痫证”。中医认为，导致本病的原因除先天因素外，尚有惊、风、痰、淤等诸多因素。因此治疗宜针对病因，审因论治。

1. 千金龙胆汤

组成 龙胆草9 g，钩藤6 g，天麻6 g，柴胡6 g，黄芩6 g，赤芍6 g，胆南星6 g，远志6 g，地龙6 g，甘草3 g

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清肝泻热，祛痰定搐。

主治 肝郁痰结之癲痫。症见突然昏倒，面色发红，手足抽搐，口吐涎沫，片刻即醒。

来源 《中医儿科临床浅解》。

按语 本方系著名中医儿科专家王伯岳习用方，临床屡经应用，疗效显著。

2. 涤痰定痫汤

组成 僵蚕3 g，青礞石12 g，天竺黄5 g，龙胆草5 g，胆南星5 g，九节菖蒲9 g，郁金9 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 涤痰熄风，开窍定痫。

主治 痰痫。症见癫痫频繁发作，四肢抽搐，口吐涎沫，痰涎壅盛，多汗。

来源 《何世英儿科医案》

3. 久痫丸

组成 升麻120 g，贝母60 g，田螺盖60 g，鲫鱼1条。

用法 田螺盖焙干，鲫鱼焙干，上药共为细末，炼蜜为丸，每丸重6克，早晚各服1丸。

功效 祛痰定痫。

主治 久痫不愈，体质虚弱，神志模糊，失神痴呆，面色不华。

来源 《赵锡武医疗经验》

按语 本方为癫痫经久不愈而设。在临床上，对各型癫痫宜先依证而治，久病体虚则可应用本方治疗。此方药力缓和，作用持久，长期服用方可获效。

4. 癫痫验方

组成 生白矾3 g，朱砂12 g，虎杖12 g，生姜9 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 安神化痰定痫。

主治 小儿癫痫。

来源 《中国民间百病良方》

5. 镇惊散

组成 牛黄1.5 g，珍珠3 g，僵蚕9 g，全蝎9 g，麝香0.5 g，天竺黄4.5 g。

用法 共为极细末，每服1克，日服3次。

功效 镇惊熄风，安神定志。

主治 小儿惊痫。症见发作时惊叫急啼，惊惕不安，发

作后面青目直，睡中易惊。

来源 《幼科条辨》

6. 全蝎韭糖汁

组成 全蝎1条，新鲜韭菜250g，红糖25g。

用法 全蝎不去头足，用瓦片焙干研成粉末，韭菜洗净，二者混合，用力搓揉韭菜至泥状，挤取汁液，放入红糖，然后将其置入干饭锅中与干饭同蒸，熟后取出，凉至温热，空腹一次服下。

功效 熄风定痫。

主治 原发性癫痫。

来源 《中医杂志》1987(9):18

按语 使用本方疗程应灵活掌握。每月发作不足1次者，每周服药1次。每月发作1~3次者，每周服药2~3次。5周为一个疗程。

7. 五味止痫散

组成 全蝎、僵蚕、蝉蜕、丹参、蜈蚣各等分。

用法 共研细末，每次服1~2克，早晚各1次口服。

功效 镇肝熄风，安神定痫。

主治 癫痫小发作。症见突然痴呆失神，肢体或面部抽搐，或频频点头，为时短暂。

来源 《中医杂志》1988(2):4

8. 青黛加味片

组成 青黛12g，硼砂10g，山药12g，明矾4g，木香8g，地榆8g。

用法 共研细末，制成片剂，每片0.3克。每次1~2片，日服3次，1个月为1疗程。

功效 清热泻火祛痰。

主治 肝火痰热型癫痫。症见平素烦躁易怒，手足心热，大便干燥，发作时全身抽搐，两目直视。

来源 《中医杂志》1984(12)：31

9. 癫痫四味散

组成 乌梢蛇200g，干地龙200g，代赭石150g，白僵蚕150g。

用法 焙至焦黄，共为细末，和匀。7岁以下每服2克；7岁以上每服5克。日服2次，30天为1疗程，停药10天，继服1疗程。

功效 化痰熄风止痛。

主治 小儿癫痫。

来源 《四川中医》1985(11)：27

10. 痫灵汤

组成 蚤休15g，胆南星6g，炒竹茹6g，僵蚕10g，川贝母10g，石菖蒲10g，郁金10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热化痰，凉肝解痉。

主治 小儿痰热之癫痫。

来源 《中国当代名医验方大全》

11. 止痉散

组成 煅瓦楞子40g，天竺黄4g，硼砂2g，朱砂0.2g，白胡椒0.4g。

用法 瓦楞子煅至存性，白胡椒炒至红色出黑油为度，与上药共研细末。每服3～5克，每晚睡前服。

功效 镇惊祛痰，止痉止痛。

主治 小儿癫痫。

来源 辽宁中医学院王乐善老中医方。

12. 南星五生丸

组成 南星、半夏、川乌、白附子、大豆各30g。

用法 共为细末，滴水为丸，每服2~5丸，以姜汤送服。

功效 豁痰定痫。

主治 小儿癫痫之痰盛者。

来源 《幼科类萃》

13. 胆蚕附星散

组成 胆制僵蚕60g，胆制附子30g，生南星20g，天麻30g，全蝎30g，蜈蚣30条，地龙20g。

用法 共研细末，1~3岁每服0.5~1.0克；3~6岁每服1.0~1.5克；6~9岁每服1.5~2.0克。日服3次。

功效 镇肝熄风，止痉抗痫。

主治 原发性癫痫，大发作型。

来源 《中西医结合儿科试用新方》。

14. 神赭散

组成 建神曲、生赭石各等分。

用法 共研极细面，1~5岁每服6~10克；6~10岁每服10~15克。日服3次，饭后开水冲调服，1个月为1疗程。

功效 豁痰降逆，镇惊熄风。

主治 各类型癫痫。

来源 《名医奇方秘术》

按语 癫痫一证，以气逆、痰浊邪实者居多，故镇其逆

气，化其痰浊为治疗大法。赭石入肝及心包经，镇逆气，降痰涎。神曲入脾胃经，善消食，化痰浊，且有助于赭石的吸收。本方对癫痫各类型的大发作、小发作及久病体弱者均有卓效。

15. 镇痉化痰汤

组成 蚤休5g，石菖蒲3g，钩藤6g，制胆星3g，僵蚕5g，广郁金5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2～3次服。

功效 镇痉熄风，化痰清热。

主治 小儿癫痫，属痰火上扰者。症见四肢抽搐，口流痰涎，目光呆滞。

来源 《千家妙方》

16. 宁痫散

组成 槟榔30g，黑丑30g，酒大黄25g，制南星120g，皂角30g。

用法 共研细末，砂糖调拌。间歇期每日晨起空腹服3克，发作期入麝香少许，用姜汤送下，用量与间歇期同。疗程必须在1个月以上。

功效 豁痰化浊，降逆通督。

主治 各种类型之癫痫。

来源 《中国医药学报》1989(6)：46

按语 本方系汤铁城家传秘方，对癫痫之大发作、小发作、精神运动性发作均有良效。癫痫之病位在脑，属督脉为病，故治疗应突出通降督脉法。本方药物均有降逆通督之功，且有大黄泻降下行，使浊泛者降，乱逆者平，督脉通畅，癫痫自愈。

17. 镇心丸

组成 朱砂3g, 龙齿3g, 牛黄3g, 铁粉6g, 琥珀6g, 人参6g, 茯苓6g, 防风6g, 焙全蝎7个。

用法 共为细末, 炼蜜为丸, 如桐子大, 每服1丸, 薄荷汤送服。

功效 镇心安神止痫。

主治 小儿惊痫。症见发作时吐舌惊叫, 惊恐意乱, 惊惕不安。

来源 《小儿药证直诀》

18. 紫霜丸

组成 代赭石30g, 赤石脂30g, 杏仁50个, 巴豆30个。

用法 杏仁去皮尖, 巴豆去皮膜心, 共入乳钵内, 细研如膏。代赭石醋淬7次, 与赤石脂共为细末入膏和匀, 制成粟米大丸, 1岁小儿每服5丸, 米饮吞下。

功效 熄风降气定痫。

主治 小儿风痫。症见发作时两目上视, 手指搐动, 颈项强直, 神志昏迷。

来源 《幼科类萃》

19. 茶耳散

组成 黑木耳60g, 胡桃格30g, 紫阳茶15g, 明白矾15g克。

用法 共研细粉, 1~3岁每服1~2克, 3~6岁每服1.5~3克, 日服3次, 开水送服。

功效 清心醒脑, 安神定惊。

主治 小儿痫病。症见抽搐, 口吐白沫, 精神萎靡, 目光呆滞。

来源 《当代名医临证精华》

婴儿痉挛症

婴儿痉挛症是婴儿时期一种特殊类型的癫痫发作。临床以全身肌肉突然痉挛，头及躯干前屈，四肢屈曲，伴有叫喊，意识障碍为特点。本病属传统医学“慢惊风”范畴。其发病与先天禀赋不足，脾肾虚寒，惊恐及淤血有关。治疗可根据不同证候类型，采用培土抑木，养血熄风，镇痉安神，活血化淤诸法。

1. 滋阴熄风汤

组成 熟地10g，龟板10g，鳖甲10g，淮山药8g，茯苓8g，丹皮5g，天麻5g，泽泻4g，山萸肉6g，僵蚕6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 补益肝肾，育阴潜阳。

主治 肝肾阴虚型婴儿痉挛症。症见阵发性抽搐，表情呆滞，反应迟钝。

来源 《新中医》1991(7):46

按语 本方系六味地黄丸加味而成，主要用于肝肾阴虚型婴儿痉挛症。此类患儿多属先天禀赋不足，脑髓失养，以滋阴之品治之可熄虚风，止痉挛，益脑髓，故可获效。

2. 通窍活血汤

组成 赤芍3g，川芎3g，柏子仁3g，红花1.5g，丹参6g，石斛6g，茯神6g，石菖蒲5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 活血化淤，通窍定痫。

主治 血淤型婴儿痉挛症。症见阵发性抽搐，面色泛青，智力迟钝，动作发育迟缓。

来源 《新中医》1991(7)：46

按语 本方系王清任通窍活血汤加味而成，主要用于血淤型婴儿痉挛症。此类患儿多属出生时窒息或产伤所致，故以活血化淤之法，通其血脉，开其神窍，窍通脉利，抽搐自止。

3. 可保立苏汤

组成 炙黄芪10g，党参6g，白术6g，生白芍6g，白附子6g，补骨脂4g，炒枣仁10g，钩藤10g，夜交藤15g，核桃1个。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 培土抑木，养血熄风。

主治 婴儿痉挛症，属脾胃虚弱者。症见频发抽搐，智力落后，面黄体瘦，便溏洩清。

来源 《浙江中医杂志》1988(5)：214

按语 本方系《医林改错》之可保立苏汤加减而成，主要用于脾胃虚弱之婴儿痉挛症。方中重用健脾之品，佐以安神镇惊之剂，培土抑木，临床只要辨证准确，用之即效。

4. 醒脾散

组成 人参3g，白茯苓3g，白术3g，石莲肉3g，木香3g，石菖蒲3g，天麻3g，白附子3g，全蝎1.5g，炙甘草3g。

用法 共为粗末，每服9克，加生姜、大枣煎服，日服2次。

功效 健脾益气，熄风安神。

主治 婴儿痉挛症，属脾虚风动者。症见抽搐频作，面黄体瘦，发育落后，食少便溏。

来源 《婴童百问》

脑发育迟缓综合征

脑发育迟缓综合征是以智能落后为主要表现的疾患。本病常常在出生时就存在，属传统医学“痴呆”、“五迟”等范畴。传统医学认为，本病多属先天肾气不足，髓海空虚，心脾不足所致。治疗一般采用补肾益精，补心健脾，开窍益智等方法。

1. 益智灵冲剂

组成 红参1.5g，白参1.5g，龙眼肉10g，五味子3g，山药15g，茯苓10g，菖蒲3g，远志5g，陈皮6g。

用法 用上药制成冲剂，每服15~20克，日服2~3次，3个月为1疗程。

功效 补心健脾，益智开窍。

主治 儿童智力低下。

来源 《上海中医药杂志》1988(1):10

按语 中医认为心主神明，心气不足可导致智力迟钝，故本方以补心脾，开神窍为主。治疗51例患儿，并观察治疗前后智商变化，结果认为，本方对智商平均值明显提高，尤其对动作和语言能力的提高最为显著。

2. 益智丸

组成 益智仁9g，何首乌30g，合欢花9g，菖蒲9g，

女贞子9g，炒杜仲9g，牛膝9g，莲子心5g，竹叶9g，芡实9g，旱莲草9g，瓦松9g，黄精9g，神曲9g。

用法 共为细末，炼蜜为丸，每丸重1.6克，1岁小儿每日2丸；3岁每日4丸；6岁每日6丸，年长儿酌增，分2～3次服。

功效 滋补肝肾，健脑益智。

主治 儿童智力低下。

来源 《广西中医药》1983(4)：4

按语 方中女贞子、何首乌等药能滋补肝肾精血；菖蒲、益智仁等益智安神。方中诸药配伍可共奏促进智力发育之效。本方应用中可根据症状随证加减。偏肾阴虚者加生地、山萸肉等，偏肾阳虚者加鹿茸、菟丝子等，有热象可酌加龙胆草、栀子等。

3. 益脑片

组成 党参10g，白术10g，茯苓10g，熟地10g，山萸肉10g，泽泻10g，当归10g，黄芪10g，菖蒲10g，珍珠母15g。

用法 以上剂量制成片剂18片，每服3片，日服3次。

功效 滋肾益髓，培补元气。

主治 儿童精神发育迟滞。

来源 《中医杂志》1988(11)：44

4. 扶元散

组成 人参3g，炒白术4g，茯苓12g，熟地黄9g，炙黄芪12g，炒山药9g，炙甘草6g，当归9g，白芍9g，川芎9g，石菖蒲12g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 补脾益肾，补脑益智。

主治 儿童智力低下。

来源 《医宗金鉴》

5. 补肾益脑汤

组成 鹿角粉6g（冲），熟地20g，砂仁4.5g，生龙骨30g，石菖蒲9g，炙远志3g，丹参15g，炙龟板15g，枸杞子9g，益智仁6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服，3个月为1疗程。

功效 补肾益精，补脑益智。

主治 儿童精神发育不全。症见智力低下，反应迟钝，心神不安，失眠健忘。

来源 《中医杂志》1985(1)：38

按语 本病多为先天不足所致，故治疗重点应着眼于补肾益精。方中鹿角、龟板、熟地大补精血，治病之本。生龙骨、石菖蒲、远志等镇静安神，开窍益智，治病之标。本方治疗19例患儿，服药后多数患儿智力有不同程度的改善。

6. 益智散

组成 当归10g，茯神10g，益智仁10g，菖蒲7.5g，远志7.5g，黑芝麻7.5g。

用法 共研细末，每服1.5克，日服3次。

功效 养心益气，补血安神。

主治 儿童智力发育障碍，心肾不足型。症见智力低下，语言不灵，反应迟钝，甚者痴呆，傻笑妄动。

来源 《新中医》1984(4)：26

脑 性 瘫 痪

脑性瘫痪是非进行性中枢性运动功能障碍性疾病。临床以运动障碍为主要表现，可伴智力低下，惊厥，视觉与听觉障碍。本病属中医“五迟”、“五软”等范畴，其病因多系禀赋不足，脾肾虚弱，或产时受伤，感染邪毒所致。治疗多采用补肾健脾，填精益脑等方法。

1. 治瘫散

组成 桑寄生10g，桑椹子10g，五加皮10g，木瓜10g，伸筋草10g，当归7.5g，桑枝7.5g，淫羊藿7.5g。

用法 共研细末，每服1.5克，日服3次。

功效 补肾养肝，柔筋祛风。

主治 脑性瘫痪，肝肾亏损型。症见肢体瘫痪，发育迟缓，四肢拘紧，甚则惊搐。

来源 《新中医》1984(4):27

按语 本方系在民间方六桑散基础上加減而成。方中重用补肾之品，可促进肢体功能恢复。年龄越小，治疗越早，收效越明显。本方观察治疗26例患儿，显效9例，有效16例。

2. 补肾地黄汤

组成 熟地50g，山茱萸30g，炒山药24g，茯苓24g，牛膝24g，丹皮15g，泽泻15g，鹿茸15g。

用法 共研细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服6克，盐汤送服，日服2次。

功效 补肾强筋益脑。

主治 小儿脑性瘫痪。症见发育迟缓，肢体软弱，肌肉

无力，智力低下。

来源 《医宗金鉴》

3. 鹿茸益智散

组成 鹿茸20g，云木香20g，羌活20g，益智仁50g，鸡内金50g，石菖蒲30g，茯苓30g，羚羊角粉2g。

用法 共研细末，每服3克，日服2次。

功效 补肾强筋，健脑益智。

主治 小儿脑性瘫痪。症见运动发育障碍，语言落后，智力低下。

来源 《四川中医》1992(3)：25

按语 方中鹿茸峻补先天，补肾长骨生髓，益智仁、石菖蒲益肾开窍增智，鸡内金、茯苓调气养脾，羚羊粉可制鹿茸之热，羌活引经入脑。诸药合用，补肾填精，健脾益气，切合病机。临床观察治疗23例，治愈6例，有效11例，无效6例。

4. 补肾健脑片

组成 人参2g，鹿茸1g，白术2g，云苓2g，熟地2g，砂仁1g，炙甘草2g，杜仲2g，巴戟天2g，山萸肉2g，肉苁蓉2g，牛膝2g，菟丝子2g，当归2g，枸杞子3g，山药2g，连翘2g。

用法 按以上比例配制成片剂，每片0.3克。1岁以内每服0.5~1片；2岁以上每服2~3片。日服3次。

功效 补肾健脑。

主治 小儿脑性瘫痪。症见抬头、翻身、坐、走等运动发育均迟缓，不认人，智力低下。

来源 《山东中医杂志》1985(2)：17

按语 肾藏精生髓，脑为髓海，肾与脑关系密切。通过

补肾，可使髓海充实，脑力旺盛。本方治疗42例患儿，经服药对智力和运动发育均有明显效果。

进行性肌营养不良

进行性肌营养不良是一组遗传性骨骼肌原性退行性变性疾病。临床以鸭形步态，肌力减弱，肌肉萎缩为特征。属中医“痿证”范畴。中医认为，本病之发生主要是由于先天禀赋不足，脾肾俱虚所致。治疗主要以补益脾肾，益气养血为大法。

1. 马钱复痿灵汤

组成 熟地10g，肉苁蓉10g，地龙10g，川牛膝10g，杜仲10g，桑寄生30g，附子6g，黄芪10g，山药10g，白术10g，炙甘草6g，丹参10g，川芎6g，当归10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2～3次服，每次冲服马钱子0.1～0.2克。

功效 补脾益肾，活血通络。

主治 进行性肌营养不良。症见鸭形步态，四肢无力，走路摔跤，肌肉萎缩。

来源 《北京中医》1986(6)：18

按语 本方健脾益气，补肾填髓，活血通络药并用，同时亦用马钱子。马钱子含有番木鳖碱，能使脊髓兴奋，增强肌紧张度，改善肌肉无力状态，并有通络生肌作用，对进行性肌营养不良用之最宜。但马钱子有毒，应用时必须严格炮制，用量宜从小量开始，以后酌增，并不得空腹服用。本方配合针灸按摩治疗30例患儿，总有效率为80%。

2. 复肌宁粉

组成 明天麻60 g，全虫60 g，蜈蚣30条，地龙30 g，牛膝20 g，杜仲炭30 g，黄芪30 g。

用法 蜈蚣去头足，上药共为细粉，每服2.5克，日服2次。

功效 疏风通络，平肝健脾。

主治 肝风型进行性肌营养不良，症见面色青暗，走路呈鸭步，摇摆不稳，性急易怒。

来源 《北京中医》1988(5)：5

3. 复肌汤

组成 胆南星10 g，麦冬10 g，菖蒲15 g，佛手10 g，伸筋草15 g，桃仁15 g，党参15 g，黄芪20 g，珍珠母20 g，牡蛎20 g，白僵蚕10 g，钩藤15 g，枸杞15 g，杜仲炭15 g，焦白术15 g，焦三仙各10 g，陈皮10 g，姜半夏10 g，甘草10 g。

用法 水煎服，每日1/2~1剂，分2次服。

功效 疏风通络，平肝健脾。

主治 进行性肌营养不良。

来源 《北京中医》1988(5)：5

按语 本方为中国中医研究院尚尔寿主任医师方。尚老认为，本病病机之本虽在肾脾，但其标在肝，治宜标本兼顾。复肌汤药味较多，既注重疏风通络，又注意平肝镇潜，健脾益气，组方严谨，切合病机。本方在临床应用中，可根据不同证候类型灵活化裁。肾阴阳两虚型可伍用健步虎潜丸等，脾气虚型可伍用补中益气汤等方药。

4. 川椒治痿汤

组成 川椒1.5g，淡附片4.5g，淮牛膝9g，当归6g，鸡血藤12g，伸筋草9g，党参9g，黄芪9g，杜仲9g，狗脊9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 温通养筋，扶元益肾。

主治 进行性肌营养不良，属元气怯弱者。症见腰背软弱，步行易跌，蹲后不能站立，大腿细瘦，小腿腓肠肌假性肥大。

来源 《幼科撮要》

按语 本方为儿科专家董廷瑶所立。董老治痿，擅用川椒为主的复方。川椒辛温有毒，入脾肺肾经，具有辛热通络，振痿强筋之功，配以温阳养阴，扶元益肾之品，相得益彰，治痿屡验。

5. 治痿汤

组成 党参15g，黄芪20g，熟地9g，当归9g，山药15g，菟丝子9g，枸杞9g，白术9g，茯苓9g，川芎9g，赤芍9g，牛膝6g，地龙9g，甘草30g，制马钱子0.3g（冲服）。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 补肾健脾，活血化淤。

主治 进行性肌营养不良。

来源 《中西医结合杂志》1987(4)：202

按语 马钱子含番木鳖碱，能使脊髓兴奋，从而增强骨骼肌紧张度。马钱子有毒，需严格炮制，并以大剂量甘草解其毒性。

6. 虎潜丸

组成 黄柏250 g，龟板120 g，知母30 g，虎骨30 g，熟地30 g，陈皮30 g，白芍30 g，锁阳45 g，干姜15 g。

用法 共研细末，酒糊为丸，每服3～6克，淡盐汤送服，日服2次。

功效 滋阴降火，强壮筋骨。

主治 进行性肌营养不良，属肝肾阴虚者。症见筋骨软弱，行走无力，五心烦热。

来源 《丹溪心法》

重症肌无力

重症肌无力是一种与自身免疫有关的疾病，表现为神经肌节的功能障碍，以活动后肌肉无力加重为特征。本病属传统医学“痿证”范畴。其发病原因主要是由于脾虚气弱，肌肉失养所致。对于本病的治疗，总以补脾为大法。同时注意补肾固本。

1. 温肾益脾汤

组成 党参20 g，黄芪25 g，芡实10 g，金樱子10 g，巴戟10 g，仙茅25 g，肉桂5 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2～3次服。

功效 补脾益肾。

主治 重症肌无力眼肌型。症见眼睑不能抬举，目珠斜视，颈项软弱无力，神疲肢倦，腹胀便溏，畏寒自汗。

来源 《千家妙方》

2. 补脾培肾汤

组成 黄精9 g，木瓜9 g，千年健12 g，草薢6 g，伸

筋草9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 补脾培肾，舒筋活络。

主治 重症肌无力。症见肢体痿软无力，行走易跌跤，肢体抬举无力。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

3. 补气升提汤

组成 党参10g，黄芪10g，茯苓10g，炒白术10g，炒白芍10g，当归10g，柴胡10g，葛根10g，陈皮5g，升麻5g，制马钱子0.15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 补气升提，祛风通络。

主治 小儿眼肌型重症肌无力，属中气下陷者。症见眼睑下垂，眼肌不耐疲劳，面色萎黄，倦怠乏力。

来源 《中医杂志》1985(10)：43

4. 益气升清汤

组成 党参10g，白术10g，茯苓10g，葛根10g，柴胡10g，炙甘草3g，半夏3g，陈皮3g，煨木香3g，升麻5g，制马钱子0.15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 运脾化湿，益气升清。

主治 小儿眼肌型重症肌无力，属脾虚湿困型。症见眼睑下垂，晨轻暮重，头晕困倦，纳少便溏，口淡不渴。

来源 《中医杂志》1985(10)：43

按语 本方系六君子汤加味而成。方中四君健脾益气，半夏、陈皮理气燥湿，与四君同伍则补而不滞，具有运脾化

湿之功；脾以升为健，故用升麻、柴胡、葛根升举清阳；马钱子通经络。合之使湿化中和，升降得宜，脾气健运，气血相荣则可使睑力恢复。

5. 滋阴补肾汤

组成 生地15 g，山药10 g，茯苓10 g，党参10 g，麦冬10 g，菟丝子10 g，白芍10 g，当归10 g，山萸肉6 g，泽泻6 g，丹皮6 g，枸杞子6 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 滋阴补肾。

主治 肝肾阴虚型重症肌无力。症见肌肉无力，面色不华，手足心热，盗汗或自汗。

来源 《浙江中医杂志》1988(2)：64

感染性多发性神经根炎

感染性多发性神经根炎亦称格林巴利综合征，是一种与病毒感染有关的急性或亚急性周围神经麻痹。临床以突然出现肢体对称性、进行性、弛缓性麻痹为特征。本病属中医“痿证”范畴。在治疗上，早期以清化湿热之法，恢复期多采用健脾益气，滋补肝肾等方法。

1. 清热复痿汤

组成 青黛3 g，钩藤15 g，威灵仙9 g，木瓜9 g，独活9 g，伸筋草9 g，寒水石9 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2～3次服。

功效 清热解毒，调和气血。

主治 感染性多发性神经根炎之早期。症见下肢无力，

不能站立，双手不能握物，多汗喜睡。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

2. 健脾复痿汤

组成 黄精9 g，何首乌9 g，狗脊9 g，千年健12 g，茯苓9 g，建曲6 g，草薢6 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2～3次服。

功效 健脾补肾，强筋壮骨。

主治 感染性多发性神经根炎之恢复期。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

3. 疗瘫健步灵

组成 天麻500 g，鸡血藤1000 g，仙灵脾500 g，黄芪500 g，牛膝120 g，制南星30 g，全蝎30 g，蜈蚣50条，僵蚕30 g，地龙60 g。

用法 前6味植物中药加水煮沸2小时，去渣留液，加热蒸发成流浸膏。后4味虫类药共研细粉，掺入流浸膏内和匀，干燥后制成粉剂。3岁以下每服0.5～1克，3～6岁每服1～1.5克，日服3次。

功效 舒筋活血，祛风通络。

主治 感染性多发性神经根炎。症见双下肢弛缓性麻痹，肌肉萎缩，腱反射消失。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

4. 附子马钱散

组成 制附子90 g，制马钱子1 g。

用法 共研细末，3～6岁每服0.5～1克；6～9岁每服1～1.5克。日服3次。

功效 温阳通脉，祛寒活络。

主治 感染性多发性神经根炎之后遗症。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

按语 附子温阳通脉，能改善血液循环；马钱子固肾助阳，有兴奋脊髓神经作用。二药相伍，可促进患肢麻痹的恢复。本方可与疗瘫健步灵同时服用。

5. 三妙丸加味

组成 苍术10g，怀牛膝10g，茯苓10g，车前子10g，黄柏5g，半夏5g，薏苡仁30g，藿香30g，银花15g，泽泻15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2～3次服。

功效 清热解毒，利湿化浊。

主治 感染性多发性神经根炎，属湿热证者。症见肢体瘫痪，腱反射消失，小便黄赤，舌苔黄腻，脉濡或滑。

来源 《浙江中医杂志》1988(2)：69

按语 本病初期多表现为湿热症状，故以三妙丸为主，清热燥湿，以祛其邪。本方治疗69例患者，全部治愈，无留有后遗症。

6. 扶本治痿汤

组成 当归25g，党参25g，白术15g，淮山药15g，茯苓15g，白芍15g，木瓜15g，锁阳15g，龟板20g，鳖甲20g，牛膝10g，甘草10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2～3次服。

功效 健脾补肾，强筋壮骨。

主治 感染性多发性神经根炎之恢复期。

来源 《新中医》1991(1)：35

按语 本病之恢复期多属脾肾虚弱之痿证，故治以健脾

补肾之法，补其先天之本，壮其后天之气。气血旺盛则筋脉得以滋养，肌肉充实有力，痿证自愈。

脑 积 水

脑积水是由于脑脊液过量而产生的疾病，多发于生后六个月内婴儿，属中医“解颅”之范畴。中医学认为，本病的发生主要是由于胎元禀赋不足，肾气亏损所致。临床以头颅增大，头缝开解，前凶胀满，目珠下垂为特征。治疗以培元补肾为大法，根据不同病因，可分别采用清热、通络、利水、活血等治法。

1. 赵氏脑积水方

组成 人参6g，炒白术10g，茯苓12g，熟地12g，黄芪15g，山药10g，当归6g，白芍6g，炙甘草3g，石菖蒲6g，黄精12g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 益气温阳，驱寒利水。

主治 儿童脑积水，属肾气亏损者。症见面色㿔白，神情呆滞，囟门宽裂，头皮光亮，目珠下垂。

来源 《赵心波儿科临床经验选编》

2. 丹参桃红芎蚓汤

组成 丹参25g，桃仁12g，红花7.5g，川芎5g，地龙12g。

用法 水煎服，周岁小儿每日1剂。

功效 行气导滞，散瘀通阻。

主治 淤阻型脑积水。症见头颅增大，头上青筋显露，

烦躁头痛，哭闹不安，面色眊白，呆滞，舌质暗红。

来源 《中医杂志》1991(8):20

按语 本方所治之证，包括西医所称梗阻型脑积水。在临床应用时，对症重便秘者可加入麝香、水蛭。有毒热证者可加入牛黄、冰片、大黄。笔者近20年已治验51例，疗效满意。

3. 加味封囟散

组成 柏子仁120g，天南星30g，防风30g，白芷30g，羌活30g。

用法 共研细末，每次用60克，以猪胆汁调匀，摊于纱布上，按颅裂部位外敷，干则以淡醋润之，3日换药1次。

功效 祛风除湿，化痰散结。

主治 儿童脑积水。症见颅缝合而复开，头皮青筋怒张，头痛面赤，便秘尿黄。

来源 《山东医药》1975(2):30

按语 方中柏子仁不寒不燥，其气清香，能透心肾，引水下行。天南星能散结消肿止痛，且专走经络。防风、白芷、羌活可祛风除湿。猪胆汁能清热解毒。诸药合之，能祛风除湿，清热通络，故对肾虚髓热之脑积水疗效颇佳。

4. 袁氏脑积水方

组成 鹿角(镑)6g，淡附片6g，茯苓皮25g，干姜5g，白术12g，生白芍12g，生地10g，狗脊6g，羌活2g，泽泻10g，紫石英12g，山药6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 培元益气，温通利水。

主治 原发型脑积水。症见生后即见头颅逐渐增大，前

囟饱满，颅缝开解，颈软无力，四肢软弱。

来源 《医门真传》

按语 本方系著名老中医袁述章之经验方。袁老治疗原发型脑积水主要采用培元补肾，温通督阳之法，经多年临床验证疗效卓著。

5. 脑积水外用方

组成 官桂30g，黑附子24g，干姜24g，细辛10g，透骨草15g，地骨皮15g。

用法 共研细末，用猪骨煎汤去油，调成糊状，涂敷头顶部。

功效 温阳利水。

主治 原发型脑积水。

来源 《医门真传》

6. 三神散

组成 干姜20g，细辛15g，桂心15g。

用法 上药共为细末，取姜汁适量调成糊状，敷于颅上。

功效 温经通络逐水。

主治 小儿脑积水。

来源 《保幼新编》

7. 柏仁散

组成 防风45g，柏子仁30g，白及36g。

用法 上药共为细末，每用适量，以乳汁调成糊状，敷于囟门。

功效 祛风利水。

主治 小儿脑积水。

来源 《奇效良方》

8. 加减通窍活血汤

组成 赤芍10g, 川芎10g, 桃仁 10g, 红花 10g, 生地 10g, 白芷10g, 丹参15g, 老葱10cm。

用法 取黄酒60克洒在干药上, 密封20分钟, 使黄酒渗入药中, 然后加水煎煮, 每日1剂, 冲服麝香0.5~1.0克。

功效 活血化淤, 理气通窍。

主治 小儿脑积水。症见头颅增大, 囟门不合, 两目下视, 睡中虚惊。

来源 《中国当代名医验方大全》

9. 通窍化淤利水汤

组成 桃仁7.5g, 红花5g, 赤芍6g, 地龙 5g, 牛膝5g, 黄芪12g, 骨碎补12g, 茯苓7.5g, 木通5g。

用法 水煎, 冲服麝香0.1克, 每日1剂, 分2~3次服。此为1岁小儿剂量。

功效 通窍化淤利水。

主治 脑积水之实证。症见发热, 时作抽搐, 头颅增大, 头皮光亮, 骨缝裂开。

来源 《上海中医药杂志》1982(7): 23

11. 控水丹

组成 苦丁香3g, 白丁香0.3g。

用法 共研极细粉, 每次取少许, 吹入鼻中, 1日3次。

功效 开宣清窍, 逐湿利水。

主治 小儿脑积水。

来源 《河南省名老中医经验集锦》

按语 小儿脑积水系由先天不足, 后天失养, 元气大伤, 气化不利, 阴津不化而聚为痰湿, 停蓄于脑所致。鼻窍

上通于脑，故以善于逐湿消痰行散之苦丁香，白丁香 鼻，直达病所，开宣清窍，以逐湿浊。一般用药后“鼻中淌水流涕，头颅可渐变小。同时可配以内服药，取冬虫草、野党参、酒川芎、辽细辛四味研为细末，每服1.5克，日服3次。

12. 通脑利水散

组成 紫河车粉30g，商陆9g，海藻15g，龟板 15g，鳖甲15g，全蝎9g，蜈蚣 8 件，土元9g。

用法 共研细末，每服1.5克，日服 2 次。

功效 兴阳通络，通脑利水。

主治 小儿脑积水，属脾肾阳虚，阴寒内盛者。症见面白神呆，智力低下，头颅宽大，颅缝开裂，目无神采，头皮光亮。

来源 《河南省名老中医经验集锦》

13. 升降散

组成 僵蚕15g，蝉衣15g，姜黄6g，生军6g，杏仁6g，厚朴6g，藁本6g，瓜壳6g，瓜蒌仁15g。

用法 水煎服，每剂服 2 天，每天空腹时服4~5次，每次20~30毫升。

功效 降气化痰，逐淤祛风。

主治 先天性脑积水。

来源 《中医奇证新编》

14. 解颅外敷方

组成 通草24g，白芷15g，蜂房15g，青皮 15g，陈皮 15g，蝉衣15g，僵蚕15g，川红花6g。

用法 共为细末，以酒15~30克，童便40~50 毫升，水适量，面粉10克调成糊状。将药直接涂于头颅（包括枕、颞、

额部及太阳穴），再用纱布包裹，每天换药1次，若药敷干可用温水湿润。

功效 通淤活络。

主治 先天性脑积水。

来源 《中医奇证新编》

按语 解颅一证，古医多主先天不足，从虚证论治。本方祛风化痰，活血通下，从实证论治而取效。临床以外敷方与上方（升降散）内服同用，内外合治，取效甚捷。

抽动秽语综合征

抽动秽语综合征是一种以运动、语言和抽搐为特点的行为障碍综合征。根据本病的临床表现可归属于传统医学“风证”范畴。其病因主要在于肝肾阴虚，水不涵木，虚风内动。故治疗多以滋补肝肾，柔肝熄风之法为主。

1. 豁痰熄风汤

组成 九节菖蒲10g，郁金10g，紫丹参15g，青礞石15g，黄芩10g，半夏5g，制大黄10g，石斛10g，钩藤10g，全蝎3g，焦三仙各10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 豁痰通窍，柔肝熄风。

主治 抽动秽语综合征，属痰热内扰，肝风内动者。症见挤眉眨眼，动肩摇头，喉出怪声，口角抽动流涎，心烦性急，时作惊惕。

来源 《中医杂志》1992（6）：19

2. 扶土抑木汤

组成 党参10g，黄芪10g，茯苓10g，炒白术10g，白芍10g，炙甘草3g，钩藤10g，陈皮5g，半夏5g，焦三仙各10g，炙鸡内金10g，香谷芽10g，全蝎3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 扶脾抑肝。

主治 抽动秽语综合征，属脾虚肝亢，虚风内动者。症见挤眉眨眼，时轻时重，口角歪斜，肢体抽动，语声低弱，纳少面黄。

来源 《中医杂志》1992(6):19

3. 三甲复脉汤

组成 龟板15g，鳖甲15g，生牡蛎15g，炙甘草10g，白芍15g，麦冬10g，生地10g，阿胶10g（烔化）。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 滋阴熄风。

主治 抽动秽语综合征，阴虚风动者。症见挤眉眨眼，肌肉抽动，喉中发声，性情急躁，手足心热。

来源 《温病条辨》

按语 本方出自《温病条辨》，为温病后期热邪久留，真阴被烁，虚风内动所设。近年刘弼臣教授应用本方治疗小儿抽动秽语综合征，病虽不同，但病机相似，故亦取效。

4. 宁肝熄风汤

组成 琥珀末9g，龙胆草6g，白僵蚕12g，刺蒺藜12g，白芍15g，生栀子9g，蝉蜕6g，蚤休9g，槟榔9g，钩藤12g，白茯苓9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 安神镇惊，清化热痰。

主治 抽动秽语综合征，属痰火扰动肝风之证。症见歪嘴眨眼，摇头耸肩，肢体振颤，频频狂叫，入夜尤甚。

来源 《中医奇证新编》

5. 化痰熄风汤

组成 半夏5g，陈皮10g，茯苓10g，胆南星5g，竹茹5g，僵蚕5g，郁金5g，合欢花7.5g，龙骨15g，牡蛎15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 化痰熄风。

主治 抽动秽语综合征，属风痰上扰型。症见点头眨眼，歪嘴耸肩，肢体抖动，口出怪声，夜惊，舌苔白腻，脉滑。

来源 《中医杂志》1987(7):38

6. 镇肝熄风汤

组成 白芍7.5g，天冬7.5g，元参7.5g，牡蛎15g，代赭石10g，川楝子5g，龙骨15g，钩藤7.5g，百合7.5g，郁金5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 镇肝熄风。

主治 抽动秽语综合征，属肝风内动型。症见摇头眨眼，肢体抖动，急躁易怒，舌质红，脉弦。

来源 《中医杂志》1987(7):38

儿童多动症

儿童多动症是一种较常见的儿童行为异常性疾患。临床

以注意力涣散，情绪不稳，任性冲动，活动过多为特点。传统医学认为，本证之发生是由于阴虚阳亢，虚阳浮动，阴阳失于平衡所致。故治疗以调整阴阳平衡为原则。根据临床不同证候，采用滋阴潜阳，养心宁神，补肾健脾，疏肝解郁，化痰开窍等方法。

1. 清脑益智合剂

组成 益智仁6g，熟地20g，砂仁4.5g，生龙骨30g，丹参15g，炙龟板15g，石菖蒲9g，枸杞子9g，炙远志3g。

用法 水煎取汁，冲服鹿角粉6克，每日1剂，分2次服。

功效 滋阴潜阳，涤痰开窍。

主治 儿童多动症。症见记忆不良，精力涣散，多言好动，情绪不稳。

来源 《中西医结合杂志》1982(1):22

按语 本方重在培补精血，调整阴阳，开窍益智。临床观察治疗20例患儿，收效良好。

2. 益智糖浆

组成 煅龙牡各30g，珍珠母30g，钩藤15g，黄芪15g，浮小麦15g，夜交藤15g，当归9g，黄柏9g，红枣30g，白芍20g，五味子6g，炙甘草6g。

用法 以上为1日量，可取7日量制成糖浆，每瓶200毫升，每次服10毫升，日服3次。

功效 平肝潜阳，养心安神。

主治 儿童多动症。

来源 《中医杂志》1992(9):36

按语 方中煅龙牡、珍珠母等平肝潜阳，黄芪、红枣健脾益气，浮小麦、夜交藤养心安神，当归、白芍柔肝抑木，诸药合用，脾土得扶，肝阳得潜，心神安宁，多动症自可消除。本方观察治疗66例患儿，治疗后行为评分明显降低，学习成绩显著提高，软神经征阳性率显著下降，总有效率为84.8%。

3. 生脉饮

组成 红参3g，麦冬6g，北五味子6g。

用法 水煎代茶频服，每日1剂。

功效 益气养阴健脑。

主治 儿童多动症。

来源 《中医杂志》1992(1):32

按语 本方有改善脑功能的作用。小儿阴常不足，生脉饮益气养阴生津，故可对脑功能的改善起调节作用。本方治疗36例患儿，与西药组对比疗效满意。

4. 三七脑髓汤

组成 鲜猪脑（或羊脑）1具，三七粉3g。

用法 猪脑洗净，加入三七粉，加少许食盐及葱姜等调味品，隔水炖熟当菜服之。

功效 活血化淤，生髓益智。

主治 儿童多动症属淤血内阻者。症见神思涣散，多动不安，毛发不荣，舌质暗，有淤斑，多有产伤或颅脑损伤史。

来源 《儿童多动症临床治疗学》

按语 猪脑或羊脑含丰富的蛋白质、热量及微量元素等维持脑功能的营养物质，有生髓益智之效。三七活血化淤，通经活络。合之可化淤益智。

5. 宁心补血汤

组成 熟地15g，竹叶12g，莲子芯3g，猪肝50g。

用法 上三药放布袋中，与猪肝同煮，30分钟后取出布袋，加青盐少许，食肝喝汤。

功效 滋阴补血。

主治 儿童多动症属心肝血虚者。症见精力涣散，冲动任性，睡眠不安，小便短少。

来源 《儿童多动症临床治疗学》

6. 菖志龙牡汤

组成 九节菖蒲15g，炙远志4.5g，生龙骨30g，生牡蛎30g，琥珀2g（研末吞服）。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 镇心安神，益智开窍。

主治 儿童多动症。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 本方以龙牡、琥珀宁心重镇安神，菖蒲、远志开窍。本病有虚实之分，实者宜加黄连、龙胆草、竹叶。阴虚者宜加地黄、百合、石斛。阳虚者宜加附片、鹿角、黄芪。病因消除，神宁窍开，诸症可愈。

7. 菖蒲五味散

组成 石菖蒲30g，五味子30g，益智仁20g，僵蚕30g，广地龙20g，白芷10g。

用法 共研细末，4~6岁每服0.6~0.8克，6~8岁每服0.8~1克，8~10岁每服1~1.2克。日服3次，饭后半小时服用。

功效 益智开窍，聪耳明目。

主治 儿童多动症。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

8. 补肾益智汤

组成 鹿角粉6g，制首乌15g，生龙骨30g，生牡蛎15g，石菖蒲9g，郁金10g，丹参15g，益智仁6g，枸杞子9g。

用法 鹿角研粉，余药水煎3次，浓缩过滤，每毫升含生药1克，加入2%苯甲酸，装瓶备用。每服25毫升，冲服鹿角粉2克，日服3次，连服2个月为1疗程。

功效 培补精血，安神益智。

主治 儿童多动症。

来源 《中国当代名医秘验方精粹》

9. 补肾活血汤

组成 熟地10g，枸杞子10g，何首乌10g，丹参15g，当归10g，赤芍10g，茯苓10g，钩藤10g，生龙牡各15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 补肾健脑，活血益智。

主治 儿童多动症。

来源 辽宁中医学院儿科姚晶莹教授方

10. 补肾二仙汤

组成 仙茅9g，仙灵脾9g，巴戟天9g，肉苁蓉9g，当归9g，熟地9g，女贞子9g，山萸肉9g，鹿角胶9g，龟板9g，炒枣仁9g，益智仁9g，炙甘草3g。

用法 取上药5剂研末，每次用药末9~15克，水煎煮散服，日服2次。

功效 滋肾填精，补脑充髓。

主治 儿童多动症，属肾精不足型。

来源 《上海中医药杂志》1993(3):22

幼儿习惯性阴部摩擦症

幼儿习惯性阴部摩擦，又称情感性交叉擦腿动作，是由于某种诱因引起局部刺激而形成的一种不良习惯。临床以时常两腿交叉上下移擦，表情兴奋，两颊潮红，两目凝视为特点。传统医学认为，本病的发生是由于肾阴不足，虚火妄动所致，治疗多采用滋阴降火之法。

1. 安腿降火汤

组成 生地12g，泽泻10g，丹皮8g，山栀6g，知母6g，苦参6g，黄芪15g，赤芍8g，防风6g，钩藤10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 滋阴降火。

主治 幼儿习惯性阴部摩擦症，属阴虚火旺者。症见平素烦躁不安，惊啼，夜寐不安，发作时两腿交叉摩擦，面红微汗，双目凝视。

来源 《中医杂志》1993(2):84

按语 本方针对其病机而设，重在滋补肾阴而降其虚火。一般服药1周即可见效，2周收功。临床应用时，夜寐不安者可酌加龙齿、牡蛎；肠燥便秘者可加麻仁、制军。

2. 地萸泽苓汤

组成 生地6g，山萸肉10g，泽泻10g，茯苓10g，白芍10g，杭菊花6g，黄柏10g，丹皮6g，知母6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 滋阴降火，柔肝缓急。

主治 小儿情感性交叉擦腿症。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 本病多由阴虚火旺所致，本方以六味地黄丸为基础，重在滋阴降火，恰中病机。同时又与杭菊花清肝，白芍柔肝，以缓和紧张之筋。本方临床治疗数十例患儿，均收显效。在治疗中应注意患儿有否蛲虫病及会阴炎症，以便对症治疗。

3. 龙胆泻肝汤加味

组成 龙胆草6g，炒柴胡6g，车前子15g，泽泻9g，黄芩9g，当归9g，生地9g，黄柏9g，甘草3g，木通3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3~4次服，14天为1疗程。

功效 清热利湿泻火。

主治 小儿情感性交叉擦腿症。症见双腿交叉，上下移动，面色通红，大汗淋漓，男孩可见阴茎勃起，女孩阴道充血，分泌物多。

来源 《浙江中医杂志》1991(6):262

按语 本病多因湿热下注于阴部所致，故治以清热利湿之法。本方治疗35例患儿，治愈31例，显效3例，无效1例。

4. 滋阴降火汤

组成 泽泻15g，龟板15g，白芍30g，生地9g，麦冬9g，知母9g，黄柏9g，钩藤9g，酸枣仁9g，竹叶6g，蝉蜕6g，生甘草6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 滋阴降火。

主治 小儿情感性交叉擦腿症，属阴虚火旺型。

来源 《浙江中医杂志》1992(11):497

遗尿症

遗尿是指没有器质性疾病的3岁以上的小儿，睡中小便自遗，醒后方觉的一种病证。传统医学亦称“遗尿”、“遗溺”、“尿床”。传统医学认为，遗尿的发生主要是由于脏腑虚寒，肺脾肾三脏气化失常，膀胱不约所致。其治疗一般以补益为主，佐以固涩。

1. 麻黄益智汤

组成 炙麻黄10g，五味子10g，益智仁10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 补肾宣肺，固精缩泉。

主治 小儿遗尿症。

来源 《中医杂志》1989(5):46

按语 本方立意新颖，组方独特，辛散酸敛同用，肺肾精气并调，药少力专。笔者用本方治疗30余例，有效率达80%。

2. 益气缩泉固关散

组成 黄芪30g，炒山药20g，益智仁100g，桑螵蛸40g，白果仁100g，补骨脂10g。

用法 共研细末，3~5岁每服3克，6~10岁每服5克，日服2次，早晚空腹冲服。

功效 补肾益气，缩泉固涩。

主治 脾肾虚寒之遗尿。症见尿频而短，自汗乏力，形寒肢冷，舌淡苔白，脉沉细无力。

来源 《中医杂志》1989(8):44

3. 赵氏遗尿方

组成 桑螵蛸10g, 补骨脂10g, 益智仁10g, 覆盆子10g, 菟丝子10g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次口服, 7天为1个疗程,

功效 补肾固涩止遗。

主治 肾虚遗尿。症见一夜数遗, 小便清长, 面色㿔白, 智力迟钝。

来源 《赵心波儿科临床经验选编》

4. 遗尿验方

组成 鸡蛋1个, 覆盆子5~7个。

用法 覆盆子研为细末, 将鸡蛋打一小孔装入。外用和好之面粉包住, 放火中烧至面焦蛋熟即可服用。5日为1疗程。

功效 固涩缩泉。

主治 小儿遗尿症。

来源 《河南中医》1987(3):23

5. 遗尿效方

组成 胡椒粉、伤湿止痛膏。

用法 取胡椒粉适量, 于晚睡前放入脐窝中, 以伤湿止痛膏贴盖, 周围压紧。24小时后去掉或更换, 7天为1疗程。

功效 温阳散寒。

主治 脾肾虚寒之遗尿。症见形寒肢冷, 面色㿔白, 自汗乏力, 尿频数而少。

来源 《中医杂志》1986(7):28

按语 本方对肾虚遗尿疗效颇佳。胡椒粉具有温阳散寒之功，脐为生命之根蒂，真气所系。胡椒粉敷于脐中，可使寒气得散，膀胱开阖有度，遗尿自止。

6. 温肾止遗方

组成 丁香3g，肉桂3g，覆盆子6g，白术6g，补骨脂6g，硫黄粉6g，炙甘草3g。

用法 共研细末，以凡士林调成糊状，外敷脐部，隔日1次。

功效 温肾固涩止遗。

主治 虚寒型遗尿。症见经常遗尿，小便清长，遇寒加重，肢凉怕冷。

来源 《中国民间百病良方》

7. 遗尿粉

组成 覆盆子60g，金樱子60g，菟丝子60g，五味子60g，补骨脂60g，桑螵蛸60g，山萸肉60g，仙茅60g，丁香30g，肉桂30g。

用法 共研细末，每次取药粉1克，以酒调之敷脐，用胶布密封固定，每3日换药1次。

功效 温补脾肾，固涩小便。

主治 小儿遗尿症。

来源 《中医杂志》1984(4):59

8. 加味四神丸

组成 补骨脂5g，五味子4g，熟肉蔻5g，吴茱萸5g，益智仁5g，猪膀胱1具。

用法 猪膀胱洗净，将上药装入，将口扎好，用粗针头将猪膀胱刺数孔，放入盆内，加水1.5公斤，煮沸后1小时

左右去渣及汤液，取猪膀胱切片食之，可分2~3次服完。

功效 温补肾阳，固涩缩尿。

主治 小儿虚寒遗尿。

来源 《中医杂志》1982(2):14

按语：本方以四神丸温补肾阳，以固其本。加益智仁以增强缩尿之功。妙取猪膀胱1具引药直达病所，以助其膀胱气化。本方观察治疗20例均获痊愈，且经随访未见复发。

9. 药煮膀胱汤

组成 益智仁10g，乌药10g，小茴香10g，鸡内金10g，新鲜猪膀胱1具。

用法 猪膀胱洗净，装入益智仁、乌药、小茴香，用棉线扎口，与鸡内金一起，砂锅文火煮至膀胱烂，倒出药渣，加入大青盐10克，早晚空腹分2次吃膀胱喝汤，连服5剂为1疗程。

功效 温肾固涩。

主治 小儿及青少年遗尿。

来源 《中医杂志》1986(7):50

10. 遗尿敷脐方

组成 公丁香5粒，八角茴香1个，桂圆核1粒，益智仁3g。

用法 共碾成极细面，用老姜捣取自然汁，调和做一小饼，于晚睡前将药饼烘温，敷于脐上，外用纱布敷盖固定，翌晨去掉。

功效 温肾固涩止遗。

主治 小儿虚寒遗尿。

来源 《中草药外治验方选》

11. 山药补骨脂散

组成 山药120 g，补骨脂60 g。

用法 将补骨脂去除杂质，放锅内炒10~20分钟，发出爆声，取出放冷，研为细末。山药焙干研末，与补骨脂混匀。每次口服10克。日2次服。

功效 补益脾肾。

主治 脾虚遗尿。症见时常遗尿，睡中不易叫醒，白日尿频而量不多，纳少便溏。

来源 《百病良方》

12. 鸡肠散

组成 鸡肠（烧）15 g，牡蛎灰15 g，白茯苓15 g，桑螵蛸15 g，辣桂7.5 g 龙骨7.5 g。

用法 共为细末，每服3克，用生姜、大枣煎汤送服，每日服2次。

功效 固涩止遗。

主治 肾与膀胱俱虚之遗尿。

来源 《仁斋小儿方论》

13. 遗尿外治方

组成 白芥子、公丁香、益智仁、乌药、细辛各等份。

用法 共研细末，用醋调成糊状，置于中极、大赫、三阴交穴位上，外贴伤湿止痛膏固定，每日1次。

功效 温阳补肾止遗。

主治 小儿肾虚遗尿。

来源 《内蒙古中医药》1987(2):7

14. 补骨脂红枣汤

组成 补骨脂6 g，红枣12 g，猪膀胱1具。

用法 猪膀胱洗净，将补骨脂和红枣放入猪膀胱内，共煮熟食下，每周1~2次。

功效 补益脾肾。

主治 小儿遗尿症。

来源 《四川中医》1990(1):29

15. 秘元丹

组成 白龙骨90g，诃子10g，缩砂30g，灵砂60g。

用法 共为细末，每服6克，每晚睡前以人参煎汤调服。

功效 补肾固涩。

主治 小儿虚寒遗尿。

来源 《名医类证医书大全》

16. 夜尿警觉汤

组成 益智仁12g，麻黄9g，桑螵蛸15g，石菖蒲9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 开窍益智，固肾缩尿。

主治 小儿遗尿症。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

按语 方中麻黄有较强的兴奋作用，可促使大脑皮质建立夜间排尿的警觉点。与开窍益智之药相合，可协同发挥治疗作用。

17. 葱白硫黄药泥

组成 连须葱白3根（6厘米长），硫黄3g。

用法 共捣烂如泥，临睡前将药泥敷于脐上，外用纱布覆盖固定，次日晨去之，每晚1次，7天为1疗程。

功效 温阳祛寒。

主治 小儿遗尿症。

来源 《小儿外治疗法》

18. 桂苓猪脬汤

组成 桂圆肉30 g，茯苓30 g，鲜猪脬2个。

用法 猪脬洗净，茯苓、桂圆肉研末，每个猪脬中各放入一半，装瓷器中蒸2~3小时，睡前将猪脬同药一起吃尽，次日晚再吃1次。

功效 温肾固脬，健脾养心。

主治 肾虚不固之遗尿。

来源 《新中医》1983(7):43

19. 五子衍宗丸

组成 菟丝子250 g，覆盆子125 g，车前子60 g，五味子30 g，枸杞子250 g。

用法 共研细末，炼蜜为丸，每服6克，日服2次。

功效 温补肾阳，固涩止遗。

主治 小儿遗尿症，属肾虚型。

来源 《证治准绳》

按语 本方重在温补肾阳，固摄肾气。原主要为治男子肾虚，阳萎早泄，遗精不育所设。近年有人用此方治脾肾阳虚型小儿遗尿，收效尚好，恰合病机。

外科及皮肤疾病

淋 巴 结 炎

淋巴结炎在儿童时期比较常见，多由细菌或病毒等感染所致。本病属传统医学“瘰癧”范畴。临床以颈部、腋下或腹股沟等处淋巴结肿大，按之较硬，推之能动为特征。传统医学认为，瘰癧的发生是由于邪毒蕴结，聚液为痰所致。其治疗以解毒化痰，消肿散结为主。

1. 瘰癧散

组成 雄黄、五倍子各等量。

用法 共为细面，用蜂蜜调合，敷于患处，每日换药1次。

功效 消肿化坚止痛。

主治 急性淋巴结炎。症见颈部及腋下淋巴结肿大，按之较硬，或伴发热，按之疼痛。

来源 《中医儿科诊治验篇》

按语 本方为赵圣渝老中医之经验方，经辽宁省本溪市中医院多年临床应用疗效显著。方中五倍子能消肿散淤，雄黄解毒消肿，两药伍用，药少力专。在临床应用中，对瘰癧破溃成脓者不可用之。

2. 颌下淋巴汤

组成 蒲公英10g，芦根6g，玄参10g，桔梗10g，黄药子5g，尖贝母5g，夏枯草6g，青蒿10g，白芷10g。

用法 水煎服，每日1剂，分4次服。

功效 解毒化痰，消肿散结。

主治 急性颌下淋巴结炎，症见颌下淋巴结肿大，疼痛，发热，口渴，甚或化脓。

来源 《中医杂志》1989(6)：52

按语 本方治疗幼儿急性颌下淋巴结炎135例，全部治愈。其中服药2剂痊愈者35例，服3剂痊愈者45例，服4剂痊愈者53例，服6剂痊愈者2例，临床效果满意。

3. 内托合剂

组成 银花15g，公英15g，桔梗10g，白芷10g，皂刺10g，花粉10g，元参10g，赤芍10g，陈皮10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒，活血透脓。

主治 急性淋巴结炎，属于毒热炽盛，溃腐成脓者。症见高热不退，局部脓肿，胀痛或跳痛，按之应指。

来源 《中医杂志》1981(2)：44

4. 消痰化结汤

组成 浙贝母10g，连翘10g，夏枯草10g，牡蛎6g，鸡内金6g，柴胡6g，陈皮5g，甘草3g，玄参10g，水蛭2g（先煎）。

用法 水煎服，每日1剂，分4次服。

功效 软坚化痰，清热解毒。

主治 小儿淋巴结炎。

来源 《新中医》1991(2)：32

5. 圣惠犀角散

组成 犀角15g，牛蒡子15g，丁香15g，木通1g，

元参1g，沉香30g，川朴硝30g，麝香0.3g。

用法 共为粗末，每服3克，取适量水煎之温服，日服2次。

功效 清热解毒，通腑泻火。

主治 小儿急性淋巴结炎。症见疔核焮肿，发热疼痛，便干尿黄。

来源 《幼幼新书》

淋巴结结核

淋巴结结核是小儿常见的一种结核病，临床以颈、颌下及腋窝部淋巴结结核为多见。本病属传统医学“瘰癧”、“痰核”范畴。中医认为，本病多由阴虚火旺，灼津为痰，痰气郁结所致。治疗以滋阴降火，扶正祛邪为原则。

1. 消瘰散

组成 玄参15g，银花藤15g，蜈蚣9g，浙贝9g。

用法 共研细末，以枣汤调服，每服2~6克，日服2~5次，15日为一疗程。

功效 化淤通络，解毒化痰。

主治 小儿颈淋巴结结核。症见颈部淋巴结肿大，累累如珠，按之坚硬，不红不痛。

来源 《四川中医》1991(1):26

2. 家传瘰癧方

组成 白英30g，凤尾草20g，海金沙20g，夏枯草15g，何树籽20粒。

用法 上药配精猪肉100克，共煎1小时，吃肉喝汤，

每日1剂，分2次服，10天为一疗程。

功效 清热解毒，消肿散结。

主治 颈淋巴结结核。

来源 《四川中医》1991(1):31

3. 一嗅灵

组成 麝香2g，煅珍珠1粒，鸡爪皮5个，蜈蚣3条，轻粉1.5g，壁虎半条。

用法 共为细末，以大枣3枚研泥调匀，装瓶，石蜡密封瓶口备用。用时取上药量的一半，用鼻嗅1~3小时，10日1次。

功效 通络化痰，解毒排脓。

主治 颈淋巴结结核，已破或未破溃者均宜。

来源 《浙江中医杂志》1985(6):260

按语 本方为张小顺老中医家传秘方，具有通经活络，清火化痰，解毒散结，排脓祛腐，生肌敛疮等多种功效。对肿者能消，溃者能敛。且方法简便，疗效确切。在用药7日内禁食盐、碱、油等，肝功能损害者禁用。个别患者用药后出现下肢浮肿，恶心厌食等，不需特殊处理。

4. 八味瘰癧丹

组成 琥珀0.1g，血竭0.1g，麝香0.1g，牛黄0.05g，雄黄0.1g，冰片0.1g，紫脑0.1g，蜈蚣1条。

用法 共研细末，合入15克太乙膏中，外敷患处。并每日配合用白头翁30克水煎服。

功效 解毒散结消瘰。

主治 颈淋巴结结核。

来源 《中国当代名医验方大全》

5. 瘰癧民间验方

组成 全蝎6个，七星蜘蛛6个，蛇蜕1g，鸡蛋2个。

用法 将全蝎和蜘蛛用滚开水烫死，阴干，捣碎，蛇蜕剪碎，调入2个鸡蛋内，用芝麻油煎成鸡蛋饼，每晨空腹食用1次，7天为1疗程。

功效 通络化痰散结。

主治 颈淋巴结结核。

来源 《中医杂志》1981(5):58

6. 猫爪蜈蚣散

组成 猫爪草5g，蜈蚣半条。

用法 共研细末混合，每日晨空腹服下，白开水送服。

功效 通经散结。

主治 颈淋巴结结核。

来源 《河北中医》1990(1):10

7. 蜈蚣全蝎蛋

组成 蜈蚣1条，全蝎3条，鸡蛋1个。

用法 蜈蚣去头足，与全蝎一起焙干，共研细末，取鸡蛋开一小孔，纳入药末搅匀，用面团包裹，放草木灰烧熟食之，每次1个，每日1次，10天为一疗程。

功效 通经活络，化痰散结。

主治 颈淋巴结结核。

来源 《四川中医》1991(4):41

8. 消瘰膏

组成 生半夏30g，生山甲9g，生甘遂3g，生马钱子12g，皂角9g，朱血竭6g。

用法 前五味药用香油煎枯去渣，加黄丹收膏，血竭研

末掺膏中熔化和匀，摊做成膏药，用时在膏药上加麝香少许，外敷患处。

功效 化痰消瘰散结。

主治 淋巴结结核。

来源 《医学衷中参西录》

9. 散瘰膏

组成 全蝎1.2g，血竭1.2g，松香1.2g，壁虎1只，蜈蚣2只，大马蜂2个，黄豆120粒。

用法 上药诸味先以麻油180克和熬，滤渣后复熬成膏，然后下黄丹适量，俟熬好起锅后始下麝香0.9克，做成膏药，外敷患处。

功效 活血通络，消瘰散结。

主治 淋巴结结核。

来源 《赛金丹》

10. 瘰癧神效方

组成 木香、松香、白胶香、海螵蛸各等分。

用法 共研极细末，水调成膏，外敷患处。

功效 软坚散结，消肿止痛。

主治 瘰癧初起，尚未破溃。

来源 《梅氏验方新编》

11. 雄黄蚯蚓蛋

组成 雄黄3g，活蚯蚓2条，鸭蛋1个。

用法 蚯蚓放入冷水中浸泡，排尽泥土后切碎，雄黄研末。鸭蛋开一小孔，倒出蛋清少许，将蚯蚓和雄黄共入鸭蛋搅匀，以胶布封口，置火边焙黄，熟透后食用，每天1个，间隔3天服第2个，3个药蛋为1疗程。

功效 清热解毒，软坚散结。

主治 瘰癧。

来源 《广西中医药》1986(1):17

12. 阿胶散

组成 阿胶块200g。

用法 研为细末，摊开后用紫外线治疗灯消毒，包好备用。同时先清创消毒患处，后将阿胶粉敷于创面或填入窦道，以无菌纱布覆盖，每日换药1次。

功效 活血补血。

主治 破溃性颈淋巴结结核。

来源 《中医杂志》1990(3):41

13. 灵仙膏

组成 新鲜威灵仙根适量。

用法 取威灵仙根洗净砸破，除去根中硬基，捣烂成泥。取30毫米见方的胶布，中央剪一直径15毫米之圆孔，将孔对准内关穴位（男左女右）或患处，在孔中放适量药泥，盖上纱布，固定24小时后弃药渣，可见敷处起一水疱，用消毒针将其挑破，外涂龙胆紫，以无菌纱布包扎。

功效 消瘰抗癆。

主治 颈淋巴结结核。

来源 《新中医》1990(7):50

按语 威灵仙为毛茛科植物，其主要成份为白头翁素，有抑菌作用，可使皮肤发泡，尚未见抗结核菌报道。本药治疗淋巴结核的机理不详，推测可能为抑制结核菌素繁殖，以其发泡作用刺激有关。该药不论病程长短，多能彻底治愈。注意敷药期间忌食葱、盐、蒜、牛羊肉及酒类，保持局部

清洁。

14. 大戟蛋

组成 红芽大戟100g，红皮鸡蛋7个。

用法 大戟、鸡蛋放铁锅中，加水1250毫升，煮沸后用文火继续煮4小时，去药渣和水，每晨空腹吃1个鸡蛋，连服21天为一疗程。

功效 消肿散结。

主治 颈淋巴腺结核。

来源 《吉林中医药》1993(1):34

按语 大戟有消肿散结之功，药效迅速，经药煮鸡蛋可起到减轻毒性的作用。本法简便易行，临床只要诊断明确即可大胆应用。本方治愈近千人，确可收到药到病除之神效。大戟有毒，鸡蛋若煮破不要服用。

鞘膜积液

鞘膜积液是指睾丸或精索的鞘膜腔内积存液体，临床以睾丸肿大，透光波动为特点。本病属中医“水疝”之范畴。传统医学认为，本病之发生多因先天不足，肾的气化不利，水液下注而致。其治疗主要从肝肾两经论治，利水消肿为治其标，温肾化气为治其本。

1. 加味五苓散

组成 桂枝3g，云苓5g，白术5g，猪苓5g，泽泻5g，桔核6g，小茴香1.5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 利水消肿。

主治 小儿鞘膜积液。

来源 《效验小金方》

2. 五倍子枯矾煎剂

组成 五倍子10 g，枯矾10 g。

用法 加水300毫升，煎半小时，温度适宜时浸洗湿敷患处，每次20~30分钟，每日2~3次。用药前先洗净外阴部，每次用药先加温。

功效 燥湿消肿。

主治 小儿鞘膜积液。

来源 《中医杂志》1981(10)：34

3. 水疝汤

组成 附子7.5 g，炮姜7.5 g，白术10 g，泽泻10 g，猪苓10 g，桂枝10 g。

用法 水煎服，每日1剂，分3~4次服。

功效 温中散寒，健脾燥湿。

主治 小儿鞘膜积液。

来源 《中医儿科诊治验篇》

4. 消液汤

组成 小茴香5 g，乌药9 g，青皮9 g，川楝子9 g，鱼腥草20 g，黄芪20 g，车前子9 g，防己8 g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次饭前温服。

功效 温中行气利湿。

主治 小儿睾丸鞘膜积液。

来源 《广西中医药》1987(6)：42

5. 苏叶枯矾煎

组成 苏叶15 g，枯矾10 g，五倍子10 g，蝉蜕15 g。

用法 上药以纱布包之，加水1500毫升，煎沸10分钟，乘热先熏后洗，至微温时将阴囊放入药液中浸泡，每日2次，每次10~30分钟，再次用药时需将药液加热，每2日用药1剂，3剂为1疗程。

功效 渗湿消肿，收敛散结。

主治 小儿鞘膜积液。

来源 《浙江中医杂志》1991(1):16

6. 母丁香粉

组成 母丁香40g。

用法 取母丁香研末过筛，装瓶备用。用时取2克填入患儿脐中，盖上敷料，胶布固定，每2日换药1次，20天为1疗程，间隔5~10天进行第2疗程。

功效 温中利湿。

主治 小儿睾丸鞘膜积液。

来源 《河北中医》1990(3):6

7. 桃杏仁药泥

组成 炒桃仁30g，炒杏仁30g，川楝子60g，蓖麻子120g，麝香1.5g。

用法 先将前4味药捣烂如泥，再加入麝香拌匀，分成5份，每晚1份，平摊于布上，入睡时敷贴患处，次晨取下，连敷5天为一疗程。

功效 活血散瘀，理气散结。

主治 小儿鞘膜积液。

来源 《小儿外治疗法》

8. 牡蛎石膏散

组成 煅牡蛎、生石膏各等份。

用法 共研细末，以鸡蛋清适量调为糊状，敷于患处，外以纱布固定，次日晨取下，每晚1次，连用3剂为一疗程。

功效 收敛渗湿，软坚散结。

主治 小儿鞘膜积液。

来源 《广西中医药》1989(3):48

9. 金钮头汤

组成 金钮头25g，赤小豆25g，土茯苓25g，荔枝核8g。

用法 水煎取汤，用其汤炖鸡肉100~250克，3天1次，3次为1疗程。

功效 活血通络，消肿除湿。

主治 小儿鞘膜积液。

来源 《新中医》1987(5):26

按语 方中金钮头是一种有刺灌木，味微苦性凉，有小毒，有活血通络，消肿除湿止痛之功效，与土茯苓、赤小豆合用，更增其利水消肿作用。荔枝核行气散结。本方观察治疗40例患儿，疗效满意。

脱 肛

脱肛是直肠粘膜或直肠和部分乙状结肠脱出于肛门之外的病证。临床以肛门脱出，便后有下坠感等为主要表现。传统医学认为，脱肛的发生主要与肺气不足及中气下陷有关。因此，在治疗上多以补益为主。并采用内治与外治相结合的方法，以涩肠固脱。

1. 黄芪升麻四物汤

组成 生黄芪30 g，升麻3 g，防风3 g，郁李仁10 g。

用法 水煎服，煎煮25分钟，两次煎量共得150毫升，每服50毫升，日服3次，食前服用。

功效 健脾和中，益气升陷。

主治 气虚下陷之脱肛。症见经常脱肛，不能自收，大便干燥，小便淡黄，不欲饮食，面黄体瘦，脉沉无力。

来源 《古今儿科临床应用效方》

按语 本方能升提中气，药少力专。一般服药4~6剂可愈。服药期间禁食辛燥之品。

2. 四鲜膏

组成 鲜鱼腥草150 g，鲜桃树叶120 g，鲜薄荷叶180 g，鲜马齿苋90 g。

用法 上药洗净，共捣烂如泥，每日1剂，分2次用纱布包好，于中午及晚上睡觉前敷于脐部，连敷7日为1疗程。

功效 清热利湿。

主治 湿热下注之脱肛。

来源 《中国民间百病良方》

3. 石榴皮洗剂

组成 石榴皮30 g，生大黄30 g，大乌梅30 g。

用法 上药共放入陶土罐中，加水1000毫升，慢火熬浓汁备用。将药汁放洁净容器中，嘱患者坐上熏之，待温度适宜时坐浴，每次大便后用1次。

功效 涩肠固脱。

主治 小儿脱肛。

来源 《中草药外治验方选》

4. 五倍子散

组成 五倍子30 g，煅枯矾3 g，陈胆星10 g。

用法 将五倍子、枯矾共碾成极细粉，将陈胆星加水适量，熬成稀糊状，再加入药粉调成膏状。每次大便脱肛后，经以药物熏洗并托上，即以此膏涂于肛门周围。每晚睡前可再涂搽1次。

功效 涩肠固脱。

主治 小儿脱肛。

来源 《中草药外治验方选》

5. 倍矾洗剂

组成 五倍子20 g，明矾18 g，石榴皮25 g，虎杖15 g，黄连9 g。

用法 共研细末，加水适量煎成汤剂，每日1剂，分2次洗患处。

功效 清热固摄。

主治 小儿脱肛。

来源 《中国民间百病良方》

按语 五倍子入肺及大肠经，有敛肺涩肠之功，明矾燥湿，石榴皮能涩肠而治脱肛，虎杖、黄连清热。诸药合之，既能清大肠湿热，又能固摄大肠，治疗小儿脱肛疗效颇著。

6. 枳壳黄芪汤

组成 枳壳30 g，黄芪12 g，赤石脂6 g，升麻6 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 补中益气，升陷固脱。

主治 中气下陷之脱肛。症见每于大便脱肛，不能自收，乏力自汗，食少纳呆。

来源 《中国秘方全书》

7. 伏龙肝散

组成 伏龙肝30g，鳖头骨15g，百药煎7.5g。

用法 共焙干，研为细末，和清油调成糊状。用前先以荆芥、生葱、五倍子煎水洗患处，轻轻擦干，然后敷药。

功效 升陷固脱。

主治 虚证脱肛。

来源 《活幼心书》

8. 蟠龙散

组成 干地龙30g，风化硝6g。

用法 共为细末和匀，每用6~9克，肛门湿润干涂药末即可，肛门干燥则以清油调敷。

功效 涩肠固脱。

主治 小儿脱肛。

来源 《活幼心书》

9. 赤石脂散

组成 赤石脂，伏龙肝各等份。

用法 共为细末，敷于患处，每日3次。

功效 温脾涩肠固脱。

主治 小儿泻痢后脱肛。

来源 《育婴秘诀》

按语 本方系明代儿科医家万密斋之方。方中赤石脂甘温调中，酸涩质重，善固滑脱。伏龙肝能温脾涩肠，二药合之外用可收温涩固脱之功效。

10. 涩肠散

组成 诃子、赤石脂、煅龙骨各等份。

用法 共为细末，用陈茶叶调敷，和药掺肠头上，绵帛

揉入。

功效 益气涩肠固脱。

主治 小儿气虚脱肛。

来源 《婴童百问》

11. 缩砂散

组成 缩砂仁、黄连、木贼各等份。

用法 共研细末，每服3~6克，空腹以米汤调服。

功效 清热涩肠。

主治 小儿脱肛，肛周红肿。

来源 《类方准绳》

12. 棉花根饮

组成 棉花根30~60g，升麻9g，防风3g，白术9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 益气升提，健脾燥湿。

主治 气虚下陷之脱肛。症见时常脱肛，面色萎黄，神疲消瘦，食少纳呆。

来源 《新中医》1981(11):56

13. 芪苈合剂

组成 炙黄芪60g，马齿苋60g，升麻30g，大枣30g。

用法 上药加水1500毫升，煎水去渣，乘热熏洗肛门10~20分钟，每日2~3次，10天为1疗程。

功效 益气升提，清热利湿。

主治 小儿脱肛。

来源 《浙江中医杂志》1989(5):214

按语 本方以黄芪、升麻益气升提，马齿苋清热利湿。适于因久泻久利，久咳气虚而致之脱肛。

疝 气

疝气是小儿时期较多见的一种疾病，它是腹内脏器或组织经腹壁的薄弱点或缺损向体表突出而形成。临床以患部有肿物突起，按之柔软，卧则入腹，立则复出为主要表现。传统医学认为，小儿疝气多系先天禀赋不足，寒凝气滞所致。治疗以温中理气为主。

1. 香苓散

组成 小茴香30 g，猪苓30 g。

用法 将上药洗净晒干，取2个碗，分别放食盐1克，黄酒30克，待盐溶化后，将二药分别放入碗内浸泡24小时，待酒液完全被药吸干后，取出晒干，分别在锅内用文火炒成淡黄色，形成极细末混匀。1岁以内小儿每服0.5~1克；1~2岁每服1.5克；2岁以上每服3克。1日3次，温开水冲服。

功效 温通利湿，理气止痛。

主治 小儿腹股沟斜疝。

来源 《中国当代名医验方大全》

2. 提升理气汤

组成 小茴香10 g，党参20 g，升麻15 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 健脾益气升提。

主治 小儿疝气。症见阴囊肿大下坠，按之柔软，痛引腰腹，平素体弱，面黄食少。

来源 《四川中医》1985(10)：54

3. 治疝方

组成 佛手9g，香附6g，槟榔9g，吴萸6g，荔枝9g，小茴香6g，橘核6g，青皮6g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，日服2次。

功效 疏肝理气，散寒止痛。

主治 小儿疝气。症见阴囊肿胀坠痛，少腹不舒，脘腹不适，痛则面白肢冷。

来源 《四川中医》1985(9):24

4. 疝气熏洗方

组成 艾叶9g，川朴9g，透骨草9g，槐枝7寸，葱须7个。

用法 加水适量熏洗局部，并用药液浸湿纱布，托住阴囊，边揉边还纳脱出之疝。

功效 温中散寒止痛。

主治 小儿寒凝气滞之疝气。

来源 《四川中医》1990(6):24

5. 疝气验方

组成 壁虎1只，生鸡蛋1枚。

用法 将鸡蛋一端破一小孔，把壁虎（以活壁虎为好）装入蛋内，外敷软泥，埋入火灰内，烧至有炸裂声，弃泥及蛋壳，顿服。

功效 升提固涩。

主治 小儿气虚下陷之疝气。

来源 《河南中医》1987(5):50

按语 本方一般服后2小时左右，即自觉腹气上提，阴囊回缩。若1次未效可于8小时后再服1次。

6. 小茴香汤

组成 川楝子10g，黑豆10g，桃仁6g，青皮6g，小茴香10g，丹皮5g，木通3g。

用法 上药加葱白、生姜适量水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 行气温中散结。

主治 小儿寒疝。

来源 《幼科金针》

7. 大小茴香丸

组成 大茴香、小茴香、吴茱萸、川楝子、川椒各30g。

用法 上药共为末，与连须葱白240克同时捣成饼晒干，用粘米30克同药饼捣碎，微火炒黄为末，酒糊为丸，如梧桐子大，每服10~20丸，空腹盐汤送下。

功效 温中散寒止痛。

主治 小儿寒凝气滞之疝气。

来源 《万病回春》

8. 荔香散

组成 荔枝核6g，木香2g，小茴香3g，升麻6g，乌药3g，白芍6g。

用法 水煎服，每日1剂。

功效 散寒消肿，疏肝理气。

主治 婴幼儿疝气。

来源 《河南中医》1982(4):37

9. 补中升陷汤

组成 党参9g，川楝子9g，陈皮5g，炙甘草5g，柴胡5g，木瓜5g，升麻7g，云苓6g，橘核12g，荔枝核

12 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 补中升陷，兼以利湿。

主治 小儿寒疝及气虚下陷之疝气。

来源 《湖北中医杂志》1990(6):18

10. 治疝验方

组成 山甲珠6g，广木香6g，全蝎6g。

用法 共研细面混匀，分为7份。以7个鸡蛋各打一小孔，将药面装入搅匀，微火烧熟，每日服1个，青盐为引。

功效 行气固托。

主治 各种疝气。

来源 《中医临床验方集》

11. 治疝神方

组成 川楝肉3g，吴茱萸3g，紫苏3g，苍术3g，陈皮3g，制半夏2g，甘草2g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 温中散寒，行气利湿。

主治 小儿疝气。

来源 《婴童类粹》

12. 立消散

组成 赤小豆、赤芍、枳壳、风化朴硝、商陆各15g。

用法 共研细末，每次取6~9克，以柏枝煎汤调之，涂敷患处。

功效 活血消肿止痛。

主治 小儿疝气。

来源 《活幼心书》

13. 治疝秘方

组成 川朴9g，透骨草9g，艾叶9g，槐树枝7寸，葱白7个。

用法 水煎，先薰后洗，每日1次。

功效 温散消肿。

主治 小儿疝气。

来源 《祖传秘方大全》

按语 本方为李宽武五代秘传方，治疗小儿疝气屡用屡验，轻者用药2次，重者用药5次即可治愈。

脐 疝

脐疝为婴儿常见病。临床以脐部圆形局限性肿块，按压可纳回腹中为特点，传统医学称为“脐突”。本病主要是由于婴儿腹壁肌肉嫩薄松弛，脐部发育不全，用力屏气可使肠管突入脐中而成。治疗多采用外治方法。

1. 吴丁散

组成 吴茱萸12g，苍术12g，丁香3g，白胡椒12粒。

用法 文火焙干，共研细末，装瓶密封备用。用时取3~4克，用麻油调成糊状，敷于脐疝上面，外覆纱布，1~2天换药1次。

功效 散寒止痛，温中降逆。

主治 婴儿脐疝。症见脐部凸起，腹胀腹泻，时常啼哭。

来源 《四川中医》1989(7):22

2. 二豆散

组成 赤小豆、淡豆豉、天南星、白蔹各3g。

用法 共为细末，用芭蕉自然汁调成糊状，敷于脐部，每日换药1次。

功效 消肿收缓。

主治 小儿脐疝。

来源 《诚书》

3. 脐疝散

组成 猪牙皂2g，雄黄1.5g，细辛1.5g，地龙1条，吴茱萸1.5g，乳香1.5g，没药1.5g，冰片1.5g。

用法 共研细末，每次用3克，以开水少许调成糊状，外敷于脐疝处，再以铜钱1枚压于药上，以绷带固定，每日换药1次，5日为1疗程。

功效 温经散寒。

主治 小儿脐疝。

来源 《广西中医药》1985(6):18

4. 鲜竹沥汁

组成 鲜竹沥适量。

用法 取鲜竹沥适量滴于纱布上，将纱布敷于脐部，上覆以塑料薄膜，再垫压适量纱布块，绷带固定，每日换药1次，5天为1疗程。

功效 开经络，收缓气。

主治 小儿脐疝。

来源 《小儿外治疗法》

5. 外消散

组成 大黄15g，煅牡蛎15g，朴硝6g。

用法 共研细末，用活田螺数10枚洗净，放清水中养之，取过宿之田螺清水调药末，敷于脐部。

功效 下气缓收。

主治 小儿脐突。

来源 《活幼心书》

6. 角薢术防汤

组成 黄牛角3g，牛薢子3g，白术6g，防风3g，白芍6g，金银花10g，生甘草3g。

用法 水煎服，每日1/2~1剂，分2次服。

功效 清热缓急。

主治 小儿脐突。

来源 《小儿病的防治方法》

肌 性 斜 颈

肌性斜颈是由颈肌病变而引起的，以斜颈为特征的先天性畸形。本病多因在胎之时，胎位不正，使颈肌不能伸展而成，或因产时颈肌受伤而血肿，使病肌短缩而致。中医治疗本病主要采用活血化瘀，消肿散结之法。

1. 化淤散

组成 血竭、芒硝，僵蚕各等分。

用法 共研细末，以地塞米松软膏调匀，涂于麝香止痛膏上，贴于患侧肿块上。隔日换药1次，换药前将局部洗净，休息2~4小时后换上新药，以避免皮肤损伤。

功效 破血化淤，消肿散结。

主治 小儿先天性肌性斜颈。

来源 《新中医》1991(9):38

按语 本病属气血不和，淤血凝滞，局部阻塞所致。本

方针对病机，并用麝香止痛以引药归经，集药力于患处。本法操作简单，疗效可靠。

2. 牵筋膏

组成 桃仁50 g，红花50 g，芒硝50 g，郁金50 g，血竭10 g。

用法 共研细末，取蜂蜜、糖料各100克以文火煎熬10～15分钟，待冷后加入药末调匀即成。用时将药膏涂于纱布上，贴于肿块部位，外以胶布固定，隔日换药1次。

功效 活血消肿，通络祛淤。

主治 婴幼儿斜颈。

来源 《小儿外治疗法》

3. 正颈散

组成 大黄、木香、桃仁、红花、栀子、玄明粉各等量。

用法 共研细末混匀，醋调成糊状，敷于患处，外以纱布包扎固定，每次取药末30～50克。

功效 活血消淤。

主治 小儿肌性斜颈。

来源 《广西中医药》1989(3):24

4. 舒筋散

组成 当归10 g，赤芍10 g，红花10 g，泽兰10 g，威灵仙10 g，透骨草15 g，伸筋草15 g，香樟木15 g，五加皮15 g。

用法 水煎，待温后以毛巾浸湿，在患处作湿热敷，每日1～2次，并配合按揉硬结。

功效 舒筋活血通络。

主治 小儿肌性斜颈。

来源 《小儿常见病外治偏方验方》

5. 舒筋解疼汤

组成 威灵仙12g，伸筋藤10g，王不留行6g，桂枝3g，防风3g，丹参6g，茯苓6g，炙草2g。

用法 水煎服，加水250毫升，煎至70毫升，分1~2次服完，每3天一剂。

功效 宣通散结，舒筋活络。

主治 小儿肌性斜颈。

来源 《中医杂志》1986(2):57

按语 本方有散结舒筋活血之功，配合按摩疗法应用，可起到消除肌筋挛缩，分离软组织粘连的效果。

荨 麻 疹

荨麻疹是由于各种刺激因素引起皮肤、粘膜小血管扩张及渗透性增加而出现的一种血管反应性皮肤病。临床以瘙痒性皮肤风团疹为特征。中医称“瘾疹”，俗称“风疹块”。传统医学认为禀赋不足为发生本病的基本原因，外感风邪为本病发病的主要诱因。其治疗以祛风养血为大法。

1. 紫草散

组成 青黛3g，紫草12g，白芷6g，寒水石12g，乳香9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热散风，凉血解毒。

主治 小儿荨麻疹。症见皮肤风团，焮红作痒，伴恶风微热，烦躁不安。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

2. 僵蚕荆蜕饮

组成 白僵蚕6g，荆芥穗6g，蝉蜕3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 祛风止痒。

主治 荨麻疹。症见皮疹色赤，灼热奇痒，随出随隐，此起彼伏。

来源 《中国秘方全书》

3. 浮萍鸭蛋汤

组成 红浮萍100g，青壳鸭蛋2个。

用法 浮萍与鸭蛋加水同煮，去除浮萍，喝汤吃蛋，每日1剂，分2次服。

功效 透疹祛风止痒。

主治 荨麻疹。

来源 《效验小金方》

按语 本方对荨麻疹之急性期效果较好，一般连服3~4日即可治愈。

4. 风疹洗方

组成 大枫子30g，大蒜15g。

用法 加水1000毫升，煮沸约5分钟，擦洗患处。

功效 清热祛风止痒。

主治 荨麻疹。

来源 《幼科条辨》

5. 祛风止痒散

组成 僵蚕、蝉衣、大黄、姜黄各等分。

用法 上药共为细末，每服3克，日服2次，以蜜调黄

酒送服。

功效 清热祛风止痒。

主治 荨麻疹。

来源 《妇儿疾病小偏方》

6. 紫浮萍洗剂

组成 紫背浮萍、地肤子、荆芥穗各30g。

用法 上药用一纱布袋装好，以清水2500毫升煎汁，待温后以毛巾蘸药汁洗患处，每日洗2次。

功效 祛风清热止痒。

主治 风热型荨麻疹。症见皮疹色红，灼热奇痒，遇热加剧，夏重冬轻。

来源 《中草药外治验方选》

7. 蚕砂洗剂

组成 晚蚕砂90g，花椒叶90g，地肤子60g。

用法 上药用一纱布袋装好，以清水5000毫升煎汁，待温后以毛巾蘸药汁洗患处，每日洗2次。

功效 祛风除湿止痒。

主治 湿热型荨麻疹。症见皮疹红赤瘙痒，缠绵难愈，伴小便黄赤。

来源 《中草药外治验方选》

8. 祛风消疹方

组成 路路通10g，乌梅6g，地龙6g，北防风6g，蝉衣3g，丹皮6g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热通络，透疹止痒。

主治 风热型荨麻疹。症见皮肤红色疹块，瘙痒，发热

口渴。

来源 《中医杂志》1988(11):58

9. 中药香袋

组成 蛇床子20g，丁香20g，白芷20g，细辛10g，苍术10g，艾叶10g，香附10g，雄黄10g，硫黄10g。

用法 共研细末，过筛加入冰片5克混匀，25克为1袋。发给患者2袋，1袋放于贴身内衣口袋，1袋放于床单或枕下，每2个月换香袋1次。

功效 祛风防湿。

主治 小儿丘疹性荨麻疹。

来源 《中医杂志》1985(7):56

按语 丘疹性荨麻疹往往每年届时复发，故在发病季节前应用香袋，可预防复发。对初发患者应用香袋，一般2周内即可治愈。

10. 止痒洗剂

组成 夜交藤200g，苍耳子100g，白蒺藜100g，白鲜皮50g，蛇床子50g，蝉蜕20g。

用法 加水约5000毫升，煎开20分钟，乘热先熏，候温用旧布浸药液外洗患处。药液放阴凉处，用时煮热，每剂可洗用3~5次。

功效 祛风除湿止痒。

主治 荨麻疹。

来源 《中医杂志》1983(2):77

11. 蝉蜕黄酒煎

组成 蝉蜕10g，黄酒20ml。

用法 取一搪瓷缸，加水150毫升左右煮沸，将蝉蜕研

成极细末，同黄酒一起加入缸中，再用武火煎1~2分钟即可，待温后饮，一次服下，每晚睡前服1次，不可间隔。

功效 解表透疹。

主治 小儿荨麻疹。

来源 《新中医》1986(4):18

按语 荨麻疹病因在风，蝉蜕解表散风，加黄酒之辛散温通之力更能透疹。本方临床治疗86例，均获良效。

12. 消荨方

组成 苍术6g，厚朴6g，陈皮6g，荆芥6g，防风6g，蝉蜕6g，金银花10g，连翘10g，生甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 健脾燥湿，散风止痒。

主治 小儿丘疹性荨麻疹。

来源 《陕西中医》1990(10):454

婴儿湿疹

婴儿湿疹是一种与变态反应有关的，有明显渗出倾向，反复发作的皮肤炎性反应。临床以皮肤弥漫性皮炎、渗出、剧烈瘙痒为特征。本病中医称“奶癣”。传统医学认为，本病主要是由于素体脾虚湿重，内有胎火，复感外邪所致。其治疗主要采用清热利湿等法。

1. 硫黄霜

组成 黄连30g，黄柏30g，硫黄粉5g，冷霜100g。

用法 黄连、黄柏加水20毫升，文火煎40分钟，过滤去渣，加硫黄粉搅匀，再入冷霜加湿调糊。外涂患处，每日2~

3次。

功效 清热利湿止痒。

主治 湿热蕴结型湿疹。症见皮肤密集斑丘疹，有渗出及结痂，剧烈瘙痒。

来源 《浙江中医杂志》1983(8):351

按语 方中黄连、黄柏清热利湿作用较强，硫黄粉能祛风止痒。本方治疗婴儿湿疹70例，治愈54例，有效12例，无效4例。总有效率为94.3%，平均治愈时间为8.4天。

2. 湿疹洗剂

组成 紫背浮萍120g，苦楝叶120g，苦参60g，虎杖60g。

用法 共煎煮成汤，加米醋少许调匀，外洗全身，或涂搽患处，每日2次。

功效 清热利湿止痒。

主治 婴儿湿疹，属湿热内盛者。症见皮肤密集小丘疹及疱疹，奇痒糜烂，渗出较重。

来源 《中国民间百病良方》

3. 湿疹饮

组成 半边莲15g，乌韭15g，白英15g，双花6g，红枣7枚。

用法 水煎服，每日1剂，代茶频饮，以5~10剂为1疗程。

功效 清热解毒利湿。

主治 婴儿湿疹。症见密集斑丘疹，不久即转成疱疹、糜烂、渗出，伴发热尿黄。

来源 《浙江中医杂志》1983(8)351

按语 本方清热解毒之力较强。治疗婴儿湿疹80例，治愈60例，显效15例，无效4例，总有效率为95%。

4. 湿疹药袋

组成 雄黄3g，樟脑3g，冰片3g，滑石粉3g。

用法 共研细末混匀，装入布袋中，挂于胸前，与皮肤直接接触，半个月换药1次。

功效 解毒除湿。

主治 婴儿湿疹。症见皮肤弥漫性皮炎，此起彼伏，经久不愈。

来源 《陕西中医》1985(6):323

5. 利湿止痒洗剂

组成 苦参、黄柏、地肤子、蛇床子、败酱草各30g。

用法 共煎水，去除药渣，趁热用纱布外敷患处，待温度适宜后外洗患处，每日3次。

功效 清热利湿，祛风止痒。

主治 小儿急性湿疹。症见皮肤丘疹疱疹，溃烂渗出，痒甚，烦躁不安，小便黄赤。

来源 《效验小金方》

6. 复方松香软膏

组成 松香20g，熟石膏10g，枯矾10g，雄黄3g。

用法 共研极细粉末，加入冰片2克，以凡士林100克调匀。用时先以1%双氧水或3%硼酸水洗患处，然后涂药膏，每日1次。

功效 清热止痒。

主治 小儿慢性湿疹。症见皮疹瘙痒，干燥脱屑，皮肤粗糙增厚。

来源 《中医儿科学》

7. 松花硫黄粉

组成 松花粉100g，硫黄粉60g，真青黛30g，煅枯矾15g，冰片3g。

用法 共碾成极细面，瓶贮勿泄气。患处渗出较多时，取药粉适量撒敷患处。患处无渗出液时，取药粉适量用淡猪油调成软膏涂搽。

功效 清热燥湿止痒。

主治 小儿湿疹，急慢性皆宜。

来源 《中草药外治验方选》

8. 复方黄连霜

组成 黄连粉15g，青黛10g，冰片3.5g，强的松150mg。

用法 共研细末，加冷霜或市售雪花膏搅匀制成100克，外涂患处，每日2~3次。

功效 清热燥湿止痒。

主治 婴幼儿湿疹。

来源 《中医杂志》1986(5)：13

9. 四黄油

组成 大黄、黄连、黄芩、黄柏各等量。

用法 共研细末，放入于3倍药物重量的油菜籽油内，一般浸3~7天，用棉棒蘸油涂患处，每日3~4次。

功效 滋润祛风，泻火解毒。

主治 急、慢性湿疹。

来源 《中医杂志》1984(7)：42

10. 湿疹膏

组成 生石膏120 g，滑石120 g，黄柏60 g，青黛9 g。

用法 共研细末，加香油熬成膏，敷于患处，每日1次。

功效 清热解毒止痒。

主治 小儿干性湿疹或湿疹结痂较厚，皮肤干裂。

来源 《四川中医》1990(6)：24

11. 四石粉

组成 海浮石、花蕊石、寒水石、炉甘石各30 g。

用法 共研极细末，薄撒于皮损处，外用干纱布包扎，每日换药1次。

功效 清热燥湿。

主治 湿热型湿疹。症见皮肤疱疹为主，糜烂渗出，尿黄，舌红。

来源 《湖南中医学院学报》1986(3)：26

12. 清热化湿汤

组成 青黛3 g，紫草9 g，白芷6 g，白及9 g，乳香6 g，藿香9 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热化湿，行气活血。

主治 婴儿湿疹，属胎内毒热盛者。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

13. 湿疹验方

组成 银花9 g，连翘9 g，地肤子6 g，白鲜皮6 g，生地6 g，青黛3 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒化湿。

主治 婴儿湿疹。

来源 《中国当代名医验方大全》

14. 湿疹粉

组成 青黛10g，枯矾10g，黄柏15g，黄连5g。

用法 共研细面过筛，用药粉与麻油调搽患处，每日2次。

功效 清热解毒，燥湿止痒。

主治 小儿湿疹。

来源 江苏省盐城县中医院儿科协定方

15. 小儿化湿汤

组成 苍术6g，陈皮6g，茯苓6g，泽泻6g，六一散6g，炒麦芽9g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 健脾化湿。

主治 婴幼儿湿疹伴消化不良者。

来源 《古今名方》

带 状 疱 疹

带状疱疹是由病毒引起的疱疹性皮肤病。中医学称为“缠腰火丹”，俗称“蜘蛛疮”。临床以皮肤成簇出现水疱，排列成带状为特点。传统医学认为，本病主要是由于外感邪毒，湿热内蕴于血分所致。治疗主要采用清热利湿，凉血解毒等方法。

1. 三黄二香散

组成 大黄30g，黄连30g，黄柏30g，乳香15g，没药15g。

用法 共研细末，加细茶叶泡浓汁适量，调为糊状，外敷患处。

功效 清热解毒，消肿止痛。

主治 带状疱疹。

来源 《新中医》1987(2)：44

2. 疱疹膏

组成 雄黄10g，白矾10g，乳香5g，没药5g，冰片少许。

用法 共研细末，装瓶备用。用时取饱和生石灰水之上清液50毫升，香油50毫升，二者充分搅拌为乳状，加入药粉调成膏，外涂患处，无需包扎，每日2~3次。

功效 渗湿解毒，消肿止痛。

主治 带状疱疹。

来源 《浙江中医杂志》1992(11)：523

3. 解毒散

组成 明雄黄粉3g，王不留行20g。

用法 先将王不留行研成细末，与雄黄混匀，以麻油适量调成糊状，敷于患处，每日2~3次。

功效 清热解毒。

主治 带状疱疹。

来源 《广西中医药》1982(6)：50

4. 二术地榆散

组成 苍术、白术、地榆各等分。

用法 上药共研极细末，以香油适量调为糊状，敷于患处，每日1次。

功效 清热燥湿，凉血止痛。

主治 带状疱疹。

来源 《河北中医》1989(5):12

5. 明矾解毒汤

组成 生明矾4.5g, 杭菊花10g, 板蓝根10g, 神曲10g, 钩藤15g, 地丁15g, 生甘草3g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次服。

功效 清热解毒, 消肿止痛。

主治 带状疱疹。

来源 《新中医》1986(7):41

6. 两面针散

组成 细辛15g, 两面针(根皮)15g, 冰片0.5g。

用法 共研细末混匀, 加米醋或小麻油调为糊状, 涂于患处, 每日数次。

功效 清热止痛消肿。

主治 带状疱疹。

来源 《广西中医药》1985(4):7

7. 滑石榆柏散

组成 滑石100g, 黄柏30g, 地榆30g, 甘草15g。

用法 共为细末, 以香油调之, 敷于患处, 每日换药1次。

功效 清热利湿, 凉血解毒。

主治 带状疱疹。

来源 《广西中医药》1987(4):36

8. 雄黄倍矾散

组成 雄黄64g, 五倍子70g, 枯矾50g。

用法 共为粉末, 加豆油适量调匀, 敷于患处, 外以纱布覆盖, 每日2~3次。

功效 清热解毒，收敛祛湿。

主治 带状疱疹。

来源 《广西中医药》1984(1)：22

9. 二味拔毒散

组成 明雄黄、白矾各等份，茶叶适量。

用法 二药共研细末，以浓茶调化，用棉签蘸药液外涂患处，每日2~3次。

功效 燥湿解毒。

主治 带状疱疹。

来源 《小儿外治疗法》

10. 雄蚣膏

组成 雄黄9g，蜈蚣3条。

用法 蜈蚣用瓦焙干，与雄黄分别研末，混匀后以香油调之，涂于患处，每日3次。

功效 清火解毒。

主治 带状疱疹。

来源 《千家妙方》

按语 本方乃王法昌家传方，曾治疗带状疱疹百余例，均收到满意效果。

11. 大黄五倍子膏

组成 生大黄2份，黄柏2份，五倍子1份，芒硝1份。

用法 共为细末过筛，加凡士林配成30%的软膏，常规消毒皮肤后，将软膏平摊于纱布上贴敷患处，以胶布固定，隔日换药1次。

功效 清热泻火，燥湿止痛。

主治 带状疱疹。

来源 《中医杂志》1988(8):15

尿 布 皮 炎

尿布皮炎是指尿布覆盖处的皮肤炎症。临床以臀部皮肤粗糙发红，继之出现斑丘疹或小脓疱，甚则出现皮肤糜烂及渗液为主要表现。本病属传统医学“红臀”、“赤游丹”范畴。其发病是由于尿布粗糙及潮湿，湿热邪毒侵袭皮肤所致。治疗主要采用清热祛湿收敛之法。

1. 苍柏牛膝方

组成 苍术10g，黄柏10g，牛膝10g，茵陈10g，知母10g，白鲜皮10g，白矾10g，苦参30g，土茯苓20g，地肤子20g，银花20g。

用法 水煎至200毫升，待药液冷却后，用软布浸湿，敷于患处，每隔30分钟1次，每次湿敷5分钟。

功效 清热燥湿，止痒解毒。

主治 小儿尿布皮炎。症见皮肤潮红，糜烂，渗液淋漓。

来源 《中国中医秘方大全》

2. 滑黛粉

组成 滑石5份、青黛1份。

用法 共研细粉合匀，用时先将患儿臀部洗净拭干，以滑黛粉外扑患处，每换尿布时涂药粉1次。

功效 清热渗湿。

主治 小儿尿布皮炎。

来源 《新中医》1987(12):12

按语 滑石能清热渗湿，青黛可凉血解毒，二药相伍，

可协同发挥治疗作用。本方对尿布皮炎之轻症重症皆宜。对脓疱渗液较重者，可以黄连6克煎水外洗后再涂药粉，以加强清热解毒之力。

3. 青茶膏

组成 青黛10g，儿茶10g，黄柏10g，马齿苋10g，五倍子6g，冰片1g。

用法 共研细末，用凡士林和甘油调成软膏，涂于患处，每日涂药2~3次。

功效 清热解毒渗湿。

主治 小儿尿布皮炎。

来源 《小儿病的防治方法》

4. 红臀膏

组成 煅龙牡各10g，紫草10g，儿茶1g，枯矾10g，冰片1g，凡士林100g。

用法 上药共研细末，与凡士林调成软膏，涂于患处，每日1~2次。

功效 清热燥湿，解毒敛疮。

主治 尿布皮炎。

来源 《小儿外治疗法》

脓 疱 疮

脓疱疮为常见化脓球菌传染性皮肤病，临床以皮肤丘疱疹或水疱，迅速扩大成脓疱为特点。本病传统医学称“黄水疮”，其病因主要是由于暑湿热毒之邪外侵，阻遏气机，外发肌表所致。治疗以清热利湿解毒为大法。

1. 紫草散

组成 青黛3g，紫草12g，白芷6g，乳香9g，寒水石12g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热解毒，消肿祛瘀。

主治 小儿脓疱疮。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

按语 方中青黛、紫草清热解毒之力较强，白芷消肿排脓，乳香能活血祛瘀，寒水石能清热利湿。本方药味虽少，力专而强，治疗小儿脓疱疮颇宜。

2. 脓疱洗剂

组成 黄柏30g，生大黄30g，苦参30g，蒲公英20g，百部20g，银花20g。

用法 水煎外洗患处，有粘液渗出或结痂时宜先以温热盐水清洗后再用药洗，每日洗3~5次。

功效 清热祛湿，解毒止痒。

主治 小儿脓疱疮。

来源 《新中医》1985(7):10

3. 青倍散

组成 青黛10g，五倍子30g。

用法 二味共研细末，以麻油调之，敷于患处。

功效 清热解毒，收敛生肌。

主治 小儿脓疱疮。

来源 《浙江中医杂志》1988(10):47

按语 青黛能清热解毒，凉血散肿，五倍子有收湿敛疮之功，二药合之外用，治疗脓疱疮疗效甚佳，一般用药数次

即愈。

4. 双叶液

组成 鲜桃树叶100g，丝瓜叶100g，明矾3g。

用法 上药一起捣烂取汁，涂于患处，每日2~3次。

功效 清热祛湿敛疮。

主治 小儿脓疱疮。

来源 《小儿外治疗法》。

5. 清热洗剂

组成 生甘草12g，生薏仁12g，苦参15g。

用法 加水2000毫升，煮至1000毫升，洗患处。

功效 清热解毒祛湿。

主治 脓疱疮。

来源 《北京中医》1986(6)：58

6. 金素丹

组成 雄黄2份，枯白矾3份，生明矾3份。

用法 共研细末，患处用双氧水棉球擦干后敷药粉，不必包扎。

功效 清热燥湿收敛。

主治 小儿脓疱疮。

来源 《陕西中医学院学报》1988(2)：17

按语 本方清热敛湿作用较强，治疗患儿852例，治愈833例，治愈率为97.76%。

7. 龙蜂散

组成 龙胆草6g，蜂房6g，苦参10g，枯矾3g，黄豆8粒。

用法 黄豆炒黑，与上药共研极细末混匀，装瓶备用。

先将疮面用淡盐水洗净，继以香油调上药末成糊状，涂于患处，每日换药2次。

功效 清热解毒，燥湿敛疮。

主治 小儿脓疱疮。

来源 《山东中医杂志》1990(3)：48

8. 黛蛤散

组成 青黛60 g，煅海蛤粉45 g，黄柏30 g，冰片5 g，煅石膏45 g。

用法 共研细末，密封备用。用时以麻油调成糊状，涂于患处，每日涂药1~2次。

功效 清热解毒燥湿。

主治 小儿脓疱疮，皮损有糜烂及渗出者。

来源 《上海中医药杂志》1986(6)：18

9. 三黄二香散

组成 黄连30 g，黄柏30 g，生大黄30 g，乳香15 g，没药15 g。

用法 共为细末，用香油调成糊状，敷于患处，每日换药1~2次。

功效 清热解毒，消肿止痛。

主治 小儿脓疱疮。

来源 《温病条辨》

10. 膏蛤粉

组成 青黛30 g，蛤粉30 g，石膏30 g，轻粉15 g，黄柏15 g。

用法 共为细末，以麻油调成糊状，调搽患处，每日1~2次。

功效 清热燥湿止痛。

主治 小儿脓疱疮。

来源 《医宗金鉴》

五官疾病

急性扁桃体炎

扁桃体炎是小儿常见的上呼吸道感染性疾病，临床以发热、咽喉肿痛为特征，传统医学称为“乳蛾”。中医认为，本病多由外感风寒或风热之邪伤于肺卫，邪热上结咽喉所致。治疗主要以清热解毒，利咽消肿为基本方法。

1. 清喉饮

组成 青黛3g，青果9g，白芷3g，茶叶6g，金果榄9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒利咽。

主治 急性扁桃体炎。症见发热，咽喉红肿疼痛，或见扁桃体化脓。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

2. 十甘汤

组成 十大功劳30g，甘草15g。

用法 加水500毫升，煮沸5~10分钟，每剂可煎2次，加适量白糖，分数次口服，每日1剂。

功效 清热解毒消肿。

主治 急性扁桃腺炎。

来源 《湖南中医杂志》1987(1):54

3. 青勃汤

组成 大青叶30 g，马勃8 g，生甘草5 g。

用法 水煎服，每日1剂，分3~4次服。

功效 清热解毒，消肿止痛。

主治 急性扁桃体炎，急性化脓性扁桃体炎。

来源 《中国当代名医验方大全》

4. 乳蛾验方

组成 芦根15 g，白茅根15 g，菊花10 g，板蓝根10g，
贝母10 g，玄参10 g，僵蚕10 g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热解毒，疏表利咽。

主治 急性扁桃腺炎。

来源 《北京中医》1988(6):7

5. 清热解毒合剂

组成 生石膏25 g，玄参10 g，板蓝根10 g，儿茶5g。

用法 水煎服，每日1剂，分3~4次服。

功效 清热解毒，利咽消肿。

主治 小儿急性扁桃体炎。症见高热口渴，咽喉肿痛，
便干尿黄。

来源 北京中医学院东直门医院儿科方

6. 冰连散

组成 冰片1.5g，黄连9g，青黛6g，硼砂3g，寒水石
9g。

用法 共研极细面，过筛为散，咽部喷涂，每日3~
4次。

功效 清热解毒，消肿止痛。

主治 急性扁桃体炎。

来源 《祁振华临床经验集》

7. 扁桃一号方

组成 九里明12g，一点红9g，射干9g，岗梅根9g，甘草6g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热解毒利咽。

主治 小儿急性扁桃腺炎。

来源 广西中医学院附属医院儿科方

8. 元参桔梗饮

组成 元参9g，桔梗9g，黄芩9g，黄连3g，板蓝根12g，射干9g，山豆根9g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热解毒，消肿利咽。

主治 急性扁桃腺炎之风热型。症见发热恶寒，咽部红肿，灼热而痛，舌红，脉浮数。

来源 《儿科证治》

9. 加味青梅汤

组成 大青叶15g，岗梅根15g，西瓜翠衣15g，蒲公英15g，野菊花10g，玄参10g，射干7.5g，牛蒡子7.5g，赤芍5g，薄荷3g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1次，分2次服。

功效 疏风清热，解毒利咽。

主治 急性扁桃腺炎之风热型。

来源 《新中医》1990(7):39

10. 银翘马勃散

组成 金银花、连翘、马勃、射干、牛蒡子各9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒利咽。

主治 急性扁桃腺炎。

来源 《温病条辨》

11. 冰蝎散

组成 冰片5g，全蝎10g。

用法 将二药捣碎，调入菜油2毫升拌匀，做成小药饼，用胶布贴于外廉泉穴，24小时调换1次。

功效 清热解毒，清肿散结。

主治 小儿急性扁桃腺炎。

来源 《浙江中医杂志》1991(7)：292

按语 方中全蝎祛风通络，散结解毒；冰片辛香气窜，能引火热之气外出；菜油散火消肿解毒。外廉泉穴乃网络扁桃体，上药外敷常获佳效。本方治疗46例患儿，疗效满意。

鹅 口 疮

鹅口疮是由白色念珠菌感染所致的口腔炎。临床特征是在口腔粘膜上出现白色点块状物，状如鹅口，故名“鹅口疮”。传统医学认为，本病多由心脾积热或虚火上浮所致。故治疗主要采用清热泻火，滋阴潜阳等方法。

1. 清热泻火汤

组成 板蓝根7.5g，薄荷2g，生栀子3g，黄柏4.5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热解毒泻火。

主治 心脾积热型鹅口疮。症见口舌布满白屑，周围焮

红，面赤唇红，烦躁不宁，便秘尿黄，舌红脉数。

来源 《祁振华临床经验集》

2. 砂蔻膏

组成 蔻仁3g，硼砂6g，白矾3g，上梅片3g，蜂蜜30g。

用法 先将蔻仁去壳，与上药共研细末，加入蜂蜜混合后放入勺内，武火煮开三沸离火，待温后加上梅片装瓶封口备用。用时先将口腔用3%硼酸水洗净，然后涂此膏，每日3次。

功效 解毒燥湿止痛。

主治 小儿鹅口疮。

来源 《湖北中医杂志》1985(6)：9

3. 倍明散

组成 五倍子、明矾各等量，冰片少许。

用法 五倍子和明矾打碎，文火炙炒如枯矾状，离火研细末，加冰片少许拌匀，涂于患处，每日1~3次。

功效 解毒燥湿，生肌疗疮。

主治 小儿鹅口疮。

来源 《新中医》1981(10)：29

按语 五倍子能解毒消肿，明矾燥湿，二药合之，相得益彰。本方治疗小儿鹅口疮200例，经用药1~3次全部治愈。

4. 口疮散

组成 梅片18g，枯矾9g，青黛15g，元明粉30g。

用法 共为细末，清洗患处后以药粉少许敷于患处，每日3次。

功效 清热燥湿敛疮。

主治 小儿鹅口疮。

来源 《儿科证治》

5. 桂附散

组成 肉桂、附子各等量。

用法 共研细末，另加面粉适量，以高粱酒调成饼状，外敷两侧足心，每日更换1~2次。

功效 补益脾肾，引火归原。

主治 小儿鹅口疮。症见口舌白屑散在，周围淡红，时好时发，迁延日久。

来源 《中医儿科学》

6. 地龙白糖浸液

组成 活地龙10~15条，白糖50 g。

用法 地龙用清水洗后置于杯中，不要弄断，撒上白糖，然后用镊子轻轻搅拌，使其与白糖溶化在一起呈黄色粘液。将此液涂于创面上，3~5分钟后用盐水棉球擦掉，每日3~4次。

功效 解毒止痛。

主治 小儿鹅口疮。

来源 《中医杂志》1986(5):63

7. 青连散

组成 青黛15 g，黄连9 g，朱砂4.5 g。

用法 共为细末，清洁口腔后涂于患处，每日3~4次。

功效 清热泻火解毒。

主治 心脾积热之鹅口疮。症见口舌白屑满布，周围焮红，流涎拒食，便干尿黄。

来源 《秘传奇方》

8. 生肌散

组成 象皮30g，牙皂3g，松花粉15g，乳香13g，松香12g，冰片3g。

用法 共研极细面，外敷患处，亦可用香油调用，每日1~2次。

功效 消肿止痛，祛腐生肌。

主治 小儿鹅口疮。症见口腔溃烂疼痛，久不愈合。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

9. 敷穴膏

组成 巴豆仁1g，西瓜子仁0.5g。

用法 二药共研碎出油，加少许香油调匀，揉成团状贴于印堂穴，15秒钟取下，每日1次。

功效 清热泻火。

主治 小儿鹅口疮。

来源 《中西医结合杂志》1987(9)：548

按语 本法简便易行，一般用药2~3次即可治愈。注意敷药时间不可过久，否则会使穴位处皮肤发红脱屑。

10. 吴萸膏

组成 吴萸10g，陈醋适量。

用法 吴萸研为细末，用陈醋调为糊状，敷于两足心涌泉穴，每天换药1次，一般连续1~2次即可。

功效 引热下行，收敛消疮。

主治 小儿鹅口疮。

来源 《辽宁中医杂志》1990(11)：44

11. 冰黛散

组成 冰片3g，青黛6g，朱砂5g，硼砂5g，乌贼骨

5 g。

用法 共研细面，用前先将患处清洗干净，取适量药面吹撒于患处，每日4~5次。

功效 清心泻火敛疮。

主治 小儿鹅口疮。

来源 《湖北中医杂志》1989（5）：34

口腔溃疡

小儿口腔溃疡属中医“口疮”范畴。临床以口腔粘膜反复出现大小不等之溃疡为主要表现。传统医学认为，本病的发生主要是由于小儿口腔粘膜薄弱，易为外邪所侵，以及心脾积热，虚火上炎所致。治疗以清热为主，常常配合局部外治。

1. 黄白一三汤

组成 川黄连1份，杭白芍3份。

用法 水煎内服，隔日1剂，日服1次，连服3剂为一疗程。1岁以内每次用黄连1克，白芍3克，1~3岁服2倍量，3~6岁服3倍量。

功效 清热解毒。

主治 小儿复发性口腔溃疡。症见唇口及两颊等处粘膜红肿溃疡，持续疼痛。

来源 《中医杂志》1987（7）：32

2. 口疮方

组成 煅炉甘石2g，煅人中白1g，青黛2g，冰片0.3g，枯矾0.5g。

用法 上药共为极细末，搽于患处，每日1次。

功效 燥湿收敛，清热止痛。

主治 口腔溃疡。症见口腔溃疡经久不愈，疼痛拒食，流涎。

来源 《中医杂志》1987(12):53

按语 本方为祖传验方。方中炉甘石有燥湿消肿，收敛生肌之效。据药化分析，其主要成份为氧化锌，有防腐收敛，保护创面的作用。青黛清热解毒，有抑菌作用。

3. 硼砂散

组成 硼砂6g，蒲黄6g，净硝5g，孩儿茶6g，甘草6g，青黛3g，冰片少许。

用法 共研细末，每用少许，涂于患处。

功效 清热燥湿。

主治 小儿口舌生疮，破溃疼痛。

来源 《奇效良方》

4. 吴茱萸散

组成 吴茱萸、地龙各等份。

用法 共研细末，以米醋调成糊状，敷于足心，男左女右，每晚敷之。

功效 引热下行，消疮止痛

主治 小儿口疮。

来源 《普济方》

5. 天门冬汁

组成 鲜天门冬。

用法 取鲜天门冬适量，洗净捣烂取汁，频频噙服，连服1周。

功效 清金降火，养阴润燥。

主治 小儿口舌生疮，经久不愈，或愈后又发，小便短赤，舌红口干。

来源 《上海中医药杂志》1986(3):34

6. 口腔溃疡散

组成 青黛6g，五倍子6g，柿霜面6g，冰片2g。

用法 共研细面，用时以棉棒蘸香油少许，再沾药面涂于患处，日涂2~3次。

功效 清热解毒，消炎止痛。

主治 小儿各种类型之口腔溃疡。

来源 《中国当代名医验方大全》

7. 口疳八味汤

组成 生石膏30g，芦根30g，大青叶20g，生地10g，玄参10g，赤芍10g，丹皮10g，生甘草5g。

用法 水煎服，每日1剂，分3~4次服。

功效 清热解毒凉血。

主治 口腔溃疡，伴发热，口臭，疼痛。

来源 《中国当代名医验方大全》

按语 本方为徐小洲祖传秘方，适于口腔粘膜的各种溃疡及糜烂。药虽八味，功效擅一，临床应用屡获良效。

8. 苓砂汤

组成 茯苓6g，白术6g，桂枝4g，灯芯草6g，生甘草2g，朱砂0.5g（冲服）。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热泻火。

主治 小儿复发性口腔溃疡。

来源 《辽宁中医杂志》1991(9):39

9. 山茱萸散

组成 干山茱萸、陈醋。

用法 山茱萸碾碎成末，每晚睡前取10克，用陈醋调成糊状，敷贴于双侧涌泉穴，外以纱布固定，次日晨取下，10天为一疗程。

功效 滋阴泻火，引热下行。

主治 复发性口腔溃疡。

来源 《新中医》1992(3):16

按语 本方系民间秘方，用之临床多年，疗效满意。

10. 泻黄散

组成 藿香叶10g，山梔6g，石膏15g，防风6g，甘草6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热解毒泻火。

主治 脾胃积热型口疮。症见发热，口腔疱疹或溃疡，口痛流涎，便干尿黄。

来源 《小儿药证直诀》

按语 方中石膏清热之力较强，山梔苦寒泻火，藿香芳香醒脾，防风发越脾气而散其伏火，甘草解毒且调和诸药。全方清泻与升发并用，组方严谨，临床用之屡收奇效。

11. 釜底抽薪散

组成 吴茱萸40g，胆星10g，大黄20g。

用法 共研细末，用时取药末适量调为糊状，待患儿晚上睡熟后涂敷于双侧涌泉穴，外以纱布包扎，12小时后去之。

功效 清热泻火，引热下行。

主治 心脾积热型口疮。

来源 《新中医》1991(6):22

12. 大黄冰片粉

组成 大黄10g，冰片2g。

用法 共为细粉，以冷开水将消毒棉签浸湿，蘸药粉少许涂于患处，每日3～6次。年长儿可将此二药煎成汤液，口腔含漱。

功效 清热解毒，生肌止痛。

主治 小儿口疮及其它口腔疾患。

来源 《新中医》1991(3):32

13. 绿豆鸡蛋饮

组成 绿豆适量，鸡蛋1个。

用法 鸡蛋打入碗中调匀，绿豆放入砂锅，冷水泡10～20分钟后煮沸，沸后3～5分钟即可。将沸绿豆水冲入鸡蛋为蛋花饮用，每日早晚各1次。

功效 清心导热。

主治 复发性口腔溃疡。

来源 《新中医》1989(4):17

14. 绿袍散

组成 黄柏120g，炙甘草60g，青黛30g。

用法 先将前二味研成细末，后入青黛共研混匀，每用1.5克涂于口内。

功效 清热敛湿。

主治 小儿口疮，日久不愈者。

来源 《幼科类萃》

疱疹性咽峡炎

疱疹性咽峡炎是由病毒感染引起的咽峡部炎症，临床以咽部疱疹，周围红晕，甚则破溃糜烂为特征。传统医学认为，本病是由于热毒郁肺，熏蒸咽喉而引起。故治疗以清热解毒，消肿利咽为大法。

1. 清热利咽饮

组成 板蓝根10g，金银花10g，芦根15g，生石膏20g，钩藤6g，薄荷6g，地骨皮6g，藿香6g。

用法 水煎取汁100~150毫升，每日1剂，少量多次频饮。

功效 清热解毒，消肿利咽。

主治 疱疹性咽峡炎。

来源 《新中医》1991(11):12

2. 青黛蚤休饮

组成 青黛4.5g，蚤休6g，连翘9g，知母6g，黄芩15g，黄连9g，石膏15g，竹叶9g，神曲15g，甘草6g。

用法 水煎服，每日1剂，分4次服。

功效 清热解毒，和中降火。

主治 疱疹性咽峡炎。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

3. 菊花青叶饮

组成 野菊花15g，大青叶10g，蚤休7.5g，牛蒡子7.5g，桔梗5g，薄荷5g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分3~4次服。

功效 清热解毒利咽。

主治 疮疹性咽峡炎。

来源 辽宁中医学院儿科姚晶莹教授方

流 涎 症

流涎是婴幼儿时期常见的一种现象，中医称“滞颐”，俗称“流口水”。临床以口角流涎，缠绵不愈为特征。传统医学认为，导致流涎的原因不外脾胃虚寒和脾胃积热之两端。故在治疗上宜首辨寒热，随证施治。

1. 控涎丸

组成 乌药100g，益智仁100g，石榴皮50g。

用法 共研细末，用酒煮烂之山药150克糊匀为丸，每服4克，日服3次，淡盐汤送服。

功效 温脾燥湿收敛。

主治 脾胃虚寒之流涎。症见口角流涎，涎液清稀，小便清长，大便溏薄。

来源 《中医儿科学》

2. 南黄府醋饼

组成 制南星30g，生蒲黄12g。

用法 共研细末，以府醋（保宁醋）适量调制成饼，包敷涌泉穴12小时，男左女右。

功效 平调脾胃，控涎固涩。

主治 小儿流涎。

来源 《四川中医》1986(10):13

按语 本方对各型流涎均有良好疗效。笔者以本方治疗132例，治愈118例，好转11例，无效3例，总有效率为

97.7%。

3. 黄连儿茶散

组成 黄连4 g，儿茶12 g。

用法 共研细末，匀分4份，每日早晚各服1份，以梨汁调匀吞服。

功效 清胃泻热，燥湿涩涎。

主治 脾胃湿热之流涎。症见口角流涎，稠粘腥臭，口角赤烂，颐下皮肤红赤。

来源 《四川中医》1984(6):20

4. 益智白术饼

组成 益智仁30 g，土炒白术40 g，白面粉400 g，食盐10 g，炒芝麻10 g。

用法 益智仁、白术碾细过罗，与面粉、食盐、芝麻一起，用适量水和面，焙焦饼40个。1~2岁每次半个；3~4岁每次1个。日服2次，用前放火上烤焦后再食。

功效 健脾补肾，摄涎止唾。

主治 脾肾阳虚之流涎。症见口角经常流涎，口水清稀，色白不稠，纳呆，畏寒。

来源 《中医杂志》1987(4):53

5. 清热止涎散

组成 白术6 g，滑石10 g，扁豆6 g，茯苓10 g，石斛6 g，黄连3 g，葛根5 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热泻脾。

主治 脾胃积热之流涎。症见口涎自流，口舌疼痛，口腔粘膜粗糙糜烂，尿黄便干。

来源 《实用中医儿科手册》

按语 本方系我国名老中医秦伯未之经验方。脾胃积热之流涎多见于口腔炎及舌炎等口腔疾患，应用本方治疗效果显著。

6. 抽薪散

组成 吴茱萸3份，胆南星1份。

用法 共研细末，取药15克用陈米醋调成糊状，敷贴涌泉穴，男左女右，睡前敷药，次日晨取下。

功效 温补脾肾，渗湿除涎。

主治 小儿流涎症。

来源 《小儿外治疗法》

7. 二术汤

组成 白术10g，苍术10g，人参3g，乌梅6g。

用法 水煎服，每日1剂，频服。

功效 健脾燥湿。

主治 脾胃虚寒之流涎。症见涎液清稀，小便清长，大便稀溏，面色萎黄。

来源 《中医儿科诊治验篇》

8. 肉桂散

组成 肉桂10g，醋适量。

用法 肉桂研细末，以醋调至糊饼状，贴敷两侧涌泉穴，每晚睡前敷药，次日晨取下，连敷3~5次。

功效 温脾燥湿止涎。

主治 小儿脾胃虚寒之流涎。

来源 《中医杂志》1983(8):78

9. 抑制唾液饮

组成 益智仁5 g，五味子3 g，诃子2 g，甘草2 g。

用法 共捣成粗末，以纱布包裹，开水冲泡，当茶频频喂饮。

功效 开窍益智止涎。

主治 小儿流涎症。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

10. 温胃散

组成 人参15 g，白术15 g，干姜15 g，甘草15 g，肉果15 g，半夏15 g，丁香5 g。

用法 上药共为细末，每服1~2克，以生姜汤调服，每日2次。

功效 温脾燥湿。

主治 小儿脾胃虚寒之流涎。

来源 《幼科金针》

11. 控涎散

组成 益智仁10 g，滑石10 g，车前子6 g，冰片6 g，甘草3 g。

用法 共研细末，填入脐中，外以麝香虎骨膏固定。

功效 健脾利湿。

主治 小儿流涎。

来源 《陕西中医》1990 (2):174

12. 倍南散

组成 五倍子、天南星、吴茱萸各等分。

用法 共研细末，米醋调成糊状，外贴双侧涌泉穴，用量以盖住穴位为宜，夜贴晨取，3次为1疗程。

功效 温阳化湿止涎。

主治 小儿流涎症。

来源 《山西中医》1992(1):40

化脓性中耳炎

化脓性中耳炎是因化脓病菌侵入中耳而发生的婴幼儿常见耳病。临床以发热、耳痛、鼓膜穿孔流脓为主要表现。本病属传统医学“耳疳”、“聤耳”之范畴。中医认为，本病主要是由外感邪毒和肝胆郁火窜犯于耳所致。治疗以解毒泄火为其大法。

1. 三黄滴耳油

组成 黄连10g，黄柏10g，大黄10g，栀子10g，冰片4g。

用法 共碾极细末放入瓶中，将香油100克倒入瓶内，与上药混合，搅拌数次，放1天后将上清油倒入另一容器备用。用时以3%双氧水滴入耳内冲洗、擦干，再将药油滴入耳内2~3滴，在耳内留10分钟倾出，每日早晚各滴1次。

功效 清热解毒。

主治 小儿化脓性中耳炎。

来源 《中医杂志》1984(8):70

2. 桑叶汁

组成 新鲜桑叶数片。

用法 将桑叶洗净捣烂取汁，每次将桑叶汁滴入耳内1~2滴，日用3次。

功效 清热解毒。

主治 小儿化脓性中耳炎。

来源 《四川中医》1985 (5) : 57

3. 荷叶汁

组成 金丝荷叶、香油适量。

用法 金丝荷叶捣烂，用细纱布挤滤药汁，加适量香油。双氧水洗耳后滴入药液1~2滴。

功效 清热解毒。

主治 小儿急性化脓性中耳炎。

来源 《四川中医》1991 (1) : 45

4. 耳炎散

组成 黄连30 g，大黄50 g，白矾100 g，石膏100 g，龙骨100 g，冰片10 g。

用法 黄连、大黄焙干研细末，白矾、石膏、龙骨煅后加入冰片研粉，混匀过筛，高压消毒30分钟贮瓶备用。每次用前先以3%双氧水清洗，再用75%酒精棉球拭净患处，然后将药粉少许吹入耳中，每日3~5次。

功效 清热解毒，收敛生肌。

主治 小儿急、慢性中耳炎。

来源 《湖北中医杂志》1984 (2) : 42

5. 龙矾散

组成 煅龙骨、煅明矾各等量。

用法 分别研末，过120目细筛，两药混匀，装瓶密封，用时先以3%双氧水清洗耳道分泌物，然后将药面吹入，每日1~2次。

功效 敛湿止痒。

主治 急、慢性中耳炎。

来源 《四川中医》1991 (9) : 37

6. 耳疳散

组成 已出蛾蚕茧10个，冰片0.15 g。

用法 茧壳剪碎，置瓦上煨存性，加入冰片，共研极细末，用3%双氧水清洗耳道，取药末少许吹入耳中，每日2次。

功效 清热消疮。

主治 慢性化脓性中耳炎。

来源 《中医杂志》1988 (2) : 59

按语 本方来自民间，适于肝肾阴虚的化脓性中耳炎。蚕茧甘温无毒，可疗诸疮。冰片清热止痛开窍。用时注意鼓膜穿孔情况，以免药粉使穿孔堵塞，脓不外流。忌食鱼虾及辛辣之品。

7. 参柏冰矾油

组成 苦参10 g，黄柏10 g，冰片2 g，枯矾3 g。

用法 取麻油或香油100毫升倒入铁勺，加热后入苦参、黄柏，炸焦变枯即捞出弃之，待油冷后将研细的冰片、枯矾放入，搅拌均匀，用时先以双氧水清洗局部，用药棉擦干后再滴入此油，每次3~4滴，每日3次。

功效 清热解毒燥湿。

主治 小儿化脓性中耳炎。

来源 《辽宁中医杂志》1991 (6) : 37

8. 冰连散

组成 黄连10 g，冰片1 g。

用法 黄连研细末，加冰片再研匀，用时以双氧水洗净耳内脓液，擦干后吹入药末，每日2~3次，连用3~5天。

功效 清热解毒。

主治 化脓性中耳炎，属单纯型者。

来源 《中医杂志》1981（7）：52

9. 青白散

组成 青黛5g，白矾5g，炉甘石5g，海螵3g，黄连3g，龙骨3g，乳香3g，五倍子3g，冰片2g、

用法 共研细末，消毒后装瓶备用。用时先以双氧水清洗耳道，吹药入耳，每日1次。

功效 清热渗湿，排脓止痛。

主治 化脓性中耳炎。

来源 《浙江中医杂志》1989（11）：518

10. 中耳散

组成 黄连30g，儿茶30g，没药30g，枯矾30g，青黛20g，冰片5g，新鲜猪胆（保留胆汁）1个。

用法 上药分别研粉，置猪胆中，以丝线扎口，悬于高处，阴干后取下研粉，过120目筛，贮于高压消毒之瓶中备用。用时先以双氧水清洗耳道，将药粉少许吹入耳中，每日3次。

功效 清热敛湿，解毒止痛。

主治 小儿中耳炎。症见耳道疼痛，流脓，听力下降，或见发热。

来源 《新中医》1991（5）：32

11. 黄枯散

组成 黄连10g，枯矾10g，轻粉10g，冰片3g。

用法 先将黄连烘焦，与枯矾、轻粉共研细末，再将冰片研细末，拌匀装黑色瓶备用。用时先以双氧水洗患耳，然后吹入药粉，每隔3天上药1次。

功效 清热解毒，收湿敛疮。

主治 化脓性中耳炎。

来源 《河北中医》1989（5）：22

12. 麝香枯矾散

组成 麝香3g，枯矾15g，硼砂3g，冰片2g，炙乌贼骨15g。

用法 共研细末，过筛混匀，用时先以双氧水清洗患耳，用棉球擦干脓液，每次取药末0.1克吹入耳内，每日3次，1周为一疗程。

功效 清热敛湿。

主治 慢性化脓性中耳炎。

来源 《北京中医》1986（6）：58

13. 龙骨散

组成 煅龙骨9g，煅白矾9g，胭脂胚3g，炒真铅丹9g，麝香0.15g。

用法 共研极细粉，先用棉签将耳内脓汁擦拭干净，用小竹管将药粉吹入耳中。

功效 敛湿排脓。

主治 小儿化脓性中耳炎。

来源 《幼幼集成》

其它常见疾病

过敏性紫癜

过敏性紫癜是一种变态反应性疾病，在儿科临床较为常见。主要表现为皮肤紫癜，关节肿痛，腹痛便血。本病传统医学亦称“紫癜”，或称“肌衄”，属血证范畴。中医学认为，本病发生主要是由于感受外邪，化火动血，灼伤脉络所致。治疗多以清热凉血之法。对久病体虚者宜益气摄血。

1. 甘草白药煎

组成 甘草100g，云南白药2g。

用法 将甘草加水400毫升煎煮，浓缩成150毫升，取甘草汁10毫升冲云南白药0.2克。1岁以内每服3毫升，3岁以内每服5毫升。日服3次，连服5天为1疗程。

功效 清热凉血止血。

主治 小儿过敏性紫癜。症见皮肤紫癜，颜色鲜红，分布对称，或伴衄血，舌红脉数。

来源 《湖北中医杂志》1986(2)：48

2. 过敏煎

组成 防风、银柴胡、乌梅、五味子各10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 疏风清热，凉血滋阴。

主治 过敏性紫癜。症见皮肤紫癜较密，略突出皮肤，颜色暗红或鲜红。

来源 《名中医治病绝招》

3. 四草化斑汤

组成 紫草12g，茜草10g，益母草15g，白花蛇舌草30g，生地15g，炒芥穗9g，连翘12g，赤芍9g，生蒲黄5g，大枣10枚。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热解毒，活血化淤。

主治 过敏性紫癜，属血热证者。症见皮肤紫癜，发热，咽干，关节肿痛，小便黄赤。

来源 《辽宁中医杂志》1991(6)：24

4. 紫癜一号方

组成 水牛角10g，生地炭12g，丹皮6g，玄参10g，赤芍8g，仙鹤草10g，连翘10g，紫草根8g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热凉血止血。

主治 过敏性紫癜，属血热妄行者。症见皮肤紫癜鲜红或紫红，心烦口渴，尿黄便干，或见血尿，便血。

来源 安徽中医学院附属医院方

5. 紫癜二号方

组成 炒党参10g，炙黄芪15g，白术10g，炙甘草8g，当归10g，白芍8g，何首乌10g，鸡血藤8g，仙鹤草10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 益气摄血止血。

主治 过敏性紫癜，属气不摄血者。症见皮肤紫癜紫暗，反复不愈，面唇色淡。

来源 安徽中医学院附属医院方

6. 鲜地龙汤

组成 生地龙50条，乌贼骨10g，阿胶15g，白糖100g。

用法 生地龙洗净置清水中，加植物油3~5滴，使之吐出腹内泥土至透明为止，然后将其置于干净钵内，撒上白糖，不久地龙即化为糖浆。另取阿胶烊化后与地龙糖浆混合，冲服乌贼骨粉。此为9次量，日服3次，连服3天。

功效 清热凉血，祛瘀生新。

主治 过敏性紫癜。

来源 《浙江中医杂志》1991(1):13

按语 本方以地龙凉血活血，清热通瘀为主，辅以乌贼骨收敛止血，阿胶养血和血，诸药相伍，系针对病机而设，对过敏性紫癜及紫癜性肾炎均有良效。

7. 解毒活血汤

组成 青黛3g，紫草9g，白芷6g，乳香6g，茵香6g，沉香面0.6g(分2次冲服)。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 解毒行气，活血化淤。

主治 过敏性紫癜。症见皮肤紫癜反复出现，腹痛呕吐，柏油样便，或见血尿。

来源 《王鹏飞儿科临床经验选》

按语 方中青黛、紫草能清热解毒，白芷、乳香活血止血，沉香擅行气止痛，对腹痛效果较好。沉香面用量为1~5岁每次0.6克，5岁以上每次1.2~1.5克，每日2次冲服。

8. 紫赤汤

组成 丹参15g，紫草10g，大青叶15g，赤芍10g，丹皮10g，干地黄10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热解毒，凉血活血。

主治 小儿过敏性紫癜。

来源 《中国中医秘方大全》

按语 本方重在清热凉血，活血散瘀，对于邪热迫血妄行所致紫癜颇多适用。临床见有关节肿痛者加虎杖、牛膝；皮肤瘙痒加地肤子、蝉蜕；便血加地榆炭、槐花炭；尿血加大小蓟、旱莲草。

皮肤粘膜淋巴结综合征

皮肤粘膜淋巴结综合征又称川崎病，是一种原因未明的发热出疹性疾病。临床以持续发热，四肢末端硬肿、充血、脱皮，皮肤多形红斑皮疹，结膜及口腔粘膜充血，颈淋巴结肿大特征。本病属传统医学“温病”范畴，其病因主要是由于感受温热时邪，侵犯营血所致。治疗以清热解毒凉血为原则。

1. 清热凉血方

组成 生石膏15g，知母10g，生地10g，丹皮10g，金银花10g，连翘10g，玄参10g，青黛5g，竹叶5g，羚羊角粉0.3g（冲）。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒，凉血化斑。

主治 小儿皮肤粘膜淋巴结综合征，气营两燔者。症见持续高热，皮肤斑疹色红，唇红焦干，口腔及粘膜红润充血，杨梅舌，脉洪大。

来源 《新中医》1990(9):16

2. 凉血化毒汤

组成 当归5g，蝉蜕5g，木通6g，赤芍6g，青天葵6g，牛蒡子6g，红花6g，生地10g，红条紫草10g，羚羊角0.5g。

用法 水煎服，羚羊角先煎，每日1剂，分2~3次服。

功效 凉血解毒，活血化淤。

主治 小儿皮肤粘膜淋巴结综合征，热入营血型。症见发热目赤，皮肤红斑，淋巴结肿大，口唇干裂，关节肿痛。

来源 《新中医》1991(2):31

3. 白虎地黄汤加味

组成 生石膏25g，知母5g，生地10g，天竺黄5g，元参10g，蝉衣3g，赤芍10g，山梔2g，黄连1g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热生津，解毒透疹。

主治 小儿皮肤粘膜淋巴结综合征，属气营两燔者。症见发热不退，烦躁不安，全身皮疹，目赤唇红，杨梅舌。

来源 《中医杂志》1991(6):18

按语 本方以石膏、知母清气分之热，元参、生地解营分之毒，黄连、山梔清心泻火，蝉衣宣肺透疹。对气营两燔型患儿用之颇宜。

4. 元参牡蛎汤加味

组成 元参10g，生牡蛎15g，生石膏25g，海藻10g，昆布10g，薄荷3g，天花粉10g，穿山甲10g，山慈姑3g，黄连1g，灯心草1g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热豁痰，软坚散结。

主治 小儿皮肤粘膜淋巴结综合征，属痰凝阻络者。症见发热，淋巴结肿胀疼痛。

来源 《中医杂志》1991(6):18

5. 清热化淤汤

组成 水牛角15g，生地10g，生石膏15g，知母10g，丹皮10g，丹参10g，赤芍10g，当归10g，川芎5g，甘草5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热凉血，活血化淤。

主治 皮肤粘膜淋巴结综合征。症见四肢皮肤硬肿，颈淋巴结肿大，血小板增高。

来源 辽宁中医学院儿科姚晶瑛教授方

6. 养阴清热汤

组成 生石膏20g，生地20g，水牛角20g，银花20g，连翘20g，芦根30g，玄参30g，天花粉30g，石斛30g，赤芍30g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热凉血，养阴生津。

主治 皮肤粘膜淋巴结综合征，属余毒伤阴型。症见低热烦躁，目赤唇红，手足心热，便干尿黄。

来源 《浙江中医杂志》1992(9):396

传染性单核细胞增多症

传染性单核细胞增多症是由EB病毒所致的急性传染病。临床以发热、脾脏及淋巴结肿大，周围血中出现大量异常淋巴细胞为特征。本病属传统医学温病范畴。中医学认为，本病的发生是由于外感温热邪毒所致。治疗主要以清热解毒，化淤散结等方法。

1. 传单合剂

组成 大青叶30g，蚤休12g，夏枯草30g，连翘12g，甘草9g，丹参20g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热解毒，化淤散结。

主治 传染性单核细胞增多症，属热毒上侵型。症见发热，咽喉肿痛，颈部或周身淋巴结肿大，皮肤红色斑丘疹。

来源 《中西医结合儿科试用新方》

按语 方中大青叶、连翘、蚤休有清热解毒之功。连翘、夏枯草能清热散结，并能使异常淋巴细胞减少。本方治疗88例患儿，大都于服药3~5天热退，7~10天肿大的淋巴结消失，10~20天血中异常淋巴细胞减少或消失。

2. 解毒通淤汤

组成 黄芪12g，青黛9g，紫草9g，丹皮9g，黄芩9g，莪术10g，当归10g，桃仁6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒，活血化淤。

主治 传染性单核细胞增多症，属热毒内蕴者。症见发

热，咽喉肿痛，淋巴结肿大。

来源 《中西医结合杂志》1989(4)：233

3. 清热凉血汤

组成 柴胡9g，白花蛇舌草30g，黄芩9g，板蓝根9g，银花12g，丹皮9g，赤芍9g，白茅根60g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热凉血解毒。

主治 传染性单核细胞增多症，属实热型者。症见发热、咽痛、咳嗽、淋巴结肿大。

来源 《中医杂志》1981(3)：26

4. 清热化痰汤

组成 黄芩10g，板蓝根15g，银花10g，连翘10g，公英10g，贝母9g，夏枯草9g，白僵蚕6g，玄参9g，山慈姑5g，海藻9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热化痰，通络散结。

主治 传染性单核细胞增多症，属痰热阻络型。症见发热，淋巴结明显肿大，舌红苔黄腻，脉滑数。

来源 《北京中医》1987(5)：25

5. 青黛散

组成 青黛3g，紫草9g，寒水石9g，乳香9g，地骨皮9g，丹皮10g，丹参10g，生地9g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热凉血，活血散结。

主治 小儿传染性单核细胞增多症，属热入气营，血淤明显者。症见发热较甚，咽喉红肿，皮疹隐隐，肝脾及淋巴

结肿大。

来源 《中医杂志》1988(6):46

6. 解毒活血汤

组成 半枝莲15g, 板蓝根15g, 黄芩10g, 丹皮10g, 丹参10g, 赤芍10g, 泽兰10g, 夏枯草10g, 甘草5g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2次服。

功效 清热解毒, 活血化淤。

主治 传染性单核细胞增多症。症见热势较甚, 咽喉肿痛, 淋巴结肿大, 或见斑疹。

来源 辽宁中医学院儿科姚晶莹教授方

手足口病

手足口病是由肠道病毒引起的传染性疾病, 多见于4岁以下小儿。临床主要表现为口腔炎及手足皮疹。传统医学认为, 本病主要是感受风热湿邪, 侵犯肺胃所致。在治疗上一般多采用疏风、清热、渗湿、解毒等方法。

1. 清热泻脾散

组成 山栀8g, 元参10g, 灯心草10g, 生石膏10g, 生地10g, 薏苡仁10g, 黄连6g, 黄芩6g, 银花12g, 连翘12g。

用法 水煎服, 每日1剂, 分2~3次服。

功效 清心泻脾, 解毒渗湿。

主治 小儿手足口病。症见手足躯干等部位皮肤疮疹, 口腔粘膜疮疹及溃疡, 食少呕吐, 便秘尿黄, 口臭。

来源 《浙江中医杂志》1988(4):159

按语 本病多因心脾素蕴湿热而发，故以清心脾积热之山栀、石膏为主，并以灯心、苡仁利湿，黄芩、黄连等清热解毒。本方治疗94例患儿，多于用药5天治愈。

2. 解毒凉血汤

组成 银花藤12g，板蓝根12g，蒲公英12g，连翘9g，重楼9g，紫草9g，竹叶8g，牛蒡子8g，薄荷8g，桔梗8g，赤芍10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒，凉血透疹。

主治 小儿手足口病。

来源 《浙江中医杂志》1990(9):419

3. 清热解毒饮

组成 银花10g，连翘10g，竹叶10g，生地10g，大青叶10g，板蓝根15g，生石膏20g，知母8g，蝉蜕6g，滑石6g，白茅根15g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 清热解毒，凉血祛湿。

主治 小儿手足口病。症见手足充血性丘疹，口腔疱疹，咽赤，发热。

来源 《新中医》1985(8):19

按语 本方重用清热解毒之品，并用滋阴凉血，利湿透疹之剂，切合病机。临床观察治疗71例，一般早期患儿服药1~2剂即愈，较重患儿4~6剂即可治愈。

4. 疏风清热饮

组成 生石膏15g，黄芩6g，元参6g，儿茶6g，板蓝根10g，蝉衣5g，竹叶3g，银花10g，连翘10g，牛蒡

子6g，薄荷5g。

用法 水煎服，每日1剂，分2~3次服。

功效 疏风清热，利湿透表。

主治 小儿手足口病，属风湿外侵证。症见发热咳嗽，咽喉红肿，口腔及手足心出现疱疹或红色丘疹，稍痒，舌红苔薄黄。

来源 《中医杂志》1989(6)：63

5. 清热利湿汤

组成 金银花10g，连翘10g，桔梗6g，板蓝根12g，滑石10g，荆芥10g，蝉蜕6g，生地10g，甘草5g。

用法 水煎服，每日1剂，频服。

功效 清热利湿，凉血解毒。

主治 小儿手足口病。症见发热咳嗽，口腔疱疹，咽赤，手足水疱及丘疹。

来源 《辽宁中医杂志》1991(3)：26

夏 季 热

夏季热是婴幼儿时期特有的一种发热性疾病。临床以夏季长期发热不退，口渴多饮，多尿无汗为特征。中医认为，本病的发生是由于感受暑热之邪，灼伤津液所致。其治疗以清暑益气生津为原则。

1. 清络饮

组成 鲜荷叶6g，鲜银花6g，西瓜翠衣10g，丝瓜皮10g，鲜竹叶心6g，鲜扁豆花1枚。

用法 水煎服，每日1剂，频饮。

功效 清暑热，生津液。

主治 小儿暑热郁表，发热口渴。

来源 《温病条辨》

2. 祛暑退热饮

组成 荷叶5g，西瓜翠衣5g，地骨皮3g，生地3g，五味子2g，大枣2g。

用法 水煎冷服，每日1~2剂，频饮。

功效 祛暑清热，养阴生津。

主治 小儿夏季热。

来源 《湖北中医杂志》1986(2)：54

3. 乌苦薄荷汤

组成 乌梅15g，苦瓜叶15g，薄荷10g，鲜荷蒂10g，木瓜10g，梨皮1个。

用法 上药加水500毫升，煮沸10分钟，过滤去渣，加入少许白糖，每日1剂，分3~5次服。

功效 养阴清热。

主治 小儿夏季热。

来源 《湖南中医杂志》1989(4)：35

4. 羊耳菊合剂

组成 羊耳菊10g，桑椹子10g，黄芪6g，葛根6g，麦冬6g。

用法 水煎服，每日1剂，分4次服。

功效 益气养阴，生津止渴。

主治 小儿夏季热。症见长期发热，口渴，无汗或少汗，多尿。

来源 《广西中医药》1984(3)：53

5. 西瓜麦竹汤

组成 西瓜皮30g，麦冬6g，淡竹叶6g，甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，当茶频饮。

功效 清暑化热，养阴生津。

主治 小儿夏季热。症见持续发热，早热暮凉，无汗，口渴喜饮，尿多且清，口唇干红。

来源 《广西中医药》1982(5)：53

6. 五叶芦根汤

组成 藿香叶3g，薄荷叶3g，佩兰叶2g，鲜荷叶15g，麦冬10g，芦根10g，花粉10g，参须5g。

用法 麦冬、花粉加水20毫升，煮沸5~10分钟，再入余药煎1分钟即可，每日1剂，分2次服。

功效 清暑泄热，益气养阴。

主治 小儿夏季热之气阴两虚型。症见发热不退，口渴引饮，尿多而清，五心烦热。

来源 《中医杂志》1987(2)：21

7. 竹叶三梗汤

组成 淡竹叶6g，薄荷梗6g，青蒿梗6g，荷叶梗6g，北沙参6g，麦冬6g，鲜石斛9g，知母6g。

用法 水煎服，每日1剂，频频饮之。

功效 清暑养阴生津。

主治 小儿夏季热之初期。

来源 《当代名医证治汇粹》

按语 本方系浙江中医学院马莲湘教授经验方。全方以清热养阴为主，适于病之初期。若见汗闭，皮肤干燥可加香薷、淡豆豉以散热发汗；高热著者可加生石膏、天花粉以清

热生津，烦躁不宁可加生龙齿、夜交藤以平肝安神。

8. 石膏汤

组成 生石膏15g，青蒿9g，银花15g，知母9g，黄连6g，厚朴6g，益元散10g，荷叶12g。

用法 水煎服，每日1剂，频频饮之。

功效 清暑解热。

主治 小儿夏季热。症见持续高热，身热头痛，大汗大渴，烦躁惊厥。

来源 《当代名医证治汇粹》

按语 本方适于夏季热之持续高热者。若见口渴甚者可加麦冬、花粉；大便结者加生军；惊厥者加抱龙丸、紫雪丹。一般服药2~3剂即可热退病解。本方临床应用数十年，多获良效。

发 热

发热是儿科临床最常见的一个症状，可见于急性传染病及其它多种疾病过程中。传统医学认为，发热主要是由感受外邪，邪正相争所致。在治疗上，根据其不同的病因及热势的轻重，分别采用清热、泄热、疏风、解毒等诸方法。

1. 蒿柴薇丹汤

组成 青蒿、银柴胡、白薇、丹皮各10g。

用法 水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 清热益阴凉血。

主治 小儿外感之高热。

来源 《北京中医》1988(1):31

按语 本方既能清热凉营，又能护阴。治疗小儿外感发热320例，多于用药1~3天热退。

2. 汤氏玉露散

组成 石膏30g，寒水石30g，甘草15g。

用法 共为细末，每服3克，不拘时服。

功效 清暑除热凉血。

主治 小儿中暑发热，烦渴，头痛。

来源 《奇效良方》

3. 退热散

组成 青蒿50g，石膏50g，滑石30g，茶叶20g，燕子泥50g，冰片20g。

用法 共研细末，加甘油和适量蛋清调成浆糊状，外敷于神阙穴，上以纱布覆盖，注意敷药湿度。

功效 清热解毒。

主治 各种原因所引起的小儿高热。

来源 《湖南中医杂志》1989(6):13

按语 方中石膏泻阳经之火，青蒿散阴经之热，燕子泥含有百草花叶，解毒清热之力较大，茶叶清心，冰片开窍，滑石引热毒从小便而排出。上药敷于神阙穴，可迅速达到退热的效果。且方法简单，无副作用。本方观察137例患儿，包括肺炎、乙型脑炎、夏季热等，用药后均很快退热，疗效满意。

4. 梔子粉

组成 生梔子10g，鸡蛋清适量。

用法 梔子研面过筛，鸡蛋打一小孔，滤出蛋清，与梔子粉调成稠糊状，做成药饼，敷于涌泉穴，男左女右，每日

1次,敷8小时左右,连用3天。

功效 清热解毒泻火。

主治 各种原因引起之小儿高热。

来源 《四川中医》1990(10):29

5. 退热膏

组成 吴萸10g,牛膝10g,大黄10g,生山栀10g,黄连5g。

用法 共研细末,取药末适量,以陈醋调成糊状,敷于双侧涌泉穴,12小时更换1次,连用2~3次。

功效 清热泻火。

主治 小儿发热。

来源 《四川中医》1991(10):4

6. 火府丹

组成 生地10g,木通6g,黄芩10g,甘草3g。

用法 水煎服,每日1剂,分3次服。

功效 清热泻火。

主治 小儿高热,烦躁口渴,便干尿黄。

来源 《幼科类萃》

7. 白虎苍术汤

组成 生石膏20g,知母8g,板蓝根10g,青天葵6g,蝉蜕6g,苍术6g,甘草3g。

用法 水煎服,每日1剂,分2次服,服后啜热稀粥。

功效 清热燥湿,生津止渴。

主治 小儿外感高热。

来源 《新中医》1993(3):38

按语 本方出自《类证活人书》,具有清热燥湿,生津

止渴之效。方中石膏、知母相须为用，有极好的清气分热作用。苍术芳香化湿，板蓝根、青天葵清热凉血，蝉蜕擅疏风热。

8. 银芩石草汤

组成 银花10g，黄芩6g，生石膏30g，白花蛇舌草15g。

用法 水煎取汁250毫升左右，每次用50~150毫升高位保留灌肠，每日2~3次。

功效 清热解毒。

主治 小儿外感之高热。

来源 《浙江中医杂志》1990(9)：419

惊 厥

惊厥是小儿时期最常见的急症，可由多种原因引起。临床以突然发作的全身或局部肌肉阵挛性抽搐，多伴有意识障碍为特点。中医称之为“急惊风”。传统医学认为，本病的原因主要是感受外邪，化热生风所致。治疗以清热、豁痰、镇惊、熄风为基本原则。

1. 清宫粉

组成 广郁金30g，生山栀30g，寒水石30g，黄芩30g，黄连30g，玳瑁30g，琥珀1.5g，朱砂1.5g，冰片9g。

用法 共研极细面，过筛为散。1~5岁每服0.6~1克，每日服2次。

功效 清热凉血镇惊。

主治 小儿高热惊厥。

来源 《祁振华临床经验集》

2. 防惊汤

组成 蝉衣6g，钩藤8g，甘草8g，珍珠母10g，炒枣仁10g，栀子4g，黄连3g，防风3g，杭白芍8g，青黛3g。

用法 水煎服。第1周每日1剂，第2、3、4周隔日1剂，共服4周。

功效 清热熄风，镇惊安神。

主治 小儿高热惊厥反复发作。

来源 《中国当代名医验方大全》

按语 本方用于小儿高热惊厥，热退风止后之善后调理。小儿高热惊厥后热蕴心肝，易再发惊风，坚持用本方调理1个月，可达预防再发热抽风之效果。

3. 麝香地龙白糖膏

组成 麝香0.3g，活地龙3~5条，白糖10g。

用法 取白项活地龙（红项亦可，紫项不用）洗净，与白糖一起捣烂，加面粉做成小饼，麝香置于神阙穴，再将药饼盖于脐上，外用绷带固定，直至热退、惊厥停止后保留数小时取下。

功效 醒脑镇惊，清热熄风。

主治 小儿高热惊厥。

来源 《四川中医》1983(1):30

4. 山栀桃仁泥

组成 山栀、桃仁等量。

用法 山栀为末，桃仁捣成泥，以面粉、鸡蛋清适量调成

糊状，敷于双侧涌泉穴。

功效 清热镇惊。

主治 小儿高热惊厥。

来源 《上海中医药杂志》1979(2)：14

5. 加味小承气汤

组成 厚朴5g，枳实5g，青蒿8g，柴胡8g，蝉蜕6g，生大黄5g。

用法 前5味药煎沸10分钟，滤出药汁即入生大黄浸泡，温后频服，以泻为度。

功效 通腑泄热熄风。

主治 小儿高热惊厥。

来源 《四川中医》1989(8)：19

6. 急惊风验方

组成 生石膏50g，代赭石25g，朱砂23g，巴豆霜_{2g}。

用法 共研极细末，1岁以内每服0.2克；1~3岁每服0.3克；3~5岁每服0.5克。日服3次。

功效 清热除痰，熄风镇惊。

主治 小儿高热惊厥。症见发病急，高热，痰鸣气促，颈项强直，四肢抽搐。

来源 《新中医》1983(7)：19

7. 清热散

组成 朱砂24g，琥珀15g，钩藤15g，薄荷1g，滑石45g，柿霜30g，豆蔻15g，甘草45g。

用法 共为细面，1岁以内每服0.5~1克，2~3岁每服1.5~2克，4~6岁每服2.5克，日服3次。

功效 清热安神，镇惊熄风。

主治 小儿高热抽搐，烦躁不安，夜眠惊叫，呕吐腹泻。

来源 河南中医学院附属医院儿科协定方

8. 蟋蟀镇惊丹

组成 蟋蟀2只，全蝎10g，僵蚕10g，地龙20g，天竺黄20g，钩藤20g，防风10g，朱砂10g。

用法 朱砂研细水飞，洒在南瓜花上，使活蟋蟀吃后全身发红，去其头足，干燥备用。全蝎用清水淘去盐沙，去足备用。僵蚕用麦麸炒成黄色。钩藤只用钩。上药共研细末，水打成赤小豆大粒。1~2岁每服1粒；3~5岁每服2粒；6~10岁每服3粒。沸水烱化送服。

功效 镇惊熄风安神。

主治 小儿各种原因所致惊厥。

来源 《四川中医》1983(6):32

按语 本方系李银寿祖传秘方，用于治疗小儿各种惊厥均收显效。

9. 天竺黄散

组成 天竺黄、川郁金、山栀子、白僵蚕、蝉衣、甘草各等分。

用法 共研细末，1岁小儿每服1.5克，以薄荷煎汤服之，不拘时服。

功效 清热祛痰，熄风镇惊。

主治 小儿高热惊厥。

来源 《奇效良方》

10. 钩藤散

组成 钩藤、龙胆草、犀角、茯苓、黄芩、炙甘草各等分。

用法 共研细末，每取3克，水煎去渣温服。

功效 清热熄风镇惊。

主治 小儿高热惊厥。

来源 《幼幼新书》

11. 钱氏抱龙丸

组成 雄黄12g，天竺黄12g，胆星24g，朱砂12g，麝香0.9g。

用法 共研细末，煮甘草膏为丸，如芡实大，每服1丸，薄荷煎汤送服。

功效 镇惊安神。

主治 小儿高热惊厥。

来源 《幼科发挥》

12. 牛黄丸

组成 牛黄0.3g，炒蝉蜕0.3g，大黄15g，黄芩15g，龙齿15g。

用法 共研细末，炼蜜为丸，如麻子大，每服9克，薄荷煎汤送服。

功效 清热解毒，镇惊祛痰。

主治 小儿高热惊厥。

来源 《太平圣惠方》

13. 凉惊丸

组成 龙胆草9g，防风9g，青黛9g，钩藤6g，黄连15g，牛黄3g。

用法 共研细末，面糊为丸，如粟米大，量儿大小与

之。

功效 清热泻火，镇惊熄风。

主治 小儿高热惊厥。

来源 《医宗金鉴》

夜 啼

夜啼主要见于初生婴儿。临床以白天如常，入夜则啼哭不安为特点。传统医学认为，导致婴儿夜啼的原因主要有脾寒、心热和惊恐。因此，在治疗上必须仔细观察，详审病因，针对其不同的原因，采用相应的治疗方法。

1. 钩藤饮

组成 钩藤10g，蝉衣3g，木香3g，槟榔3g，乌药6g，益元散10g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热平肝，熄风安神。

主治 小儿夜啼。症见入夜惊闹，日间倦乏，食欲不振，指纹淡紫。

来源 《名中医治病绝招》

2. 蝉花散

组成 蝉蜕、薄荷适量。

用法 蝉蜕下半截为末，每服0.3克，以薄荷适量煎汤送服，每晚睡前服。

功效 清热安神。

主治 小儿夜啼。

来源 《普济方》

3. 泻心导赤方

组成 木通2.5g，生地4.5g，黄连1.5g，甘草1.5g，灯芯1.5g。

用法 共研细末，加入白蜜滚开水调和成饼，敷贴于双侧劳宫穴。

功效 清心泻热。

主治 小儿心脾积热之夜啼。症见入夜啼哭，哭声响亮，面赤唇红，烦躁不安。

来源 《上海中医药杂志》1979(2)：14

4. 黑丑散

组成 黑丑7粒。

用法 将药捣碎，用温水调成糊状，临睡前敷于肚脐上，用胶布固定。

功效 清热安神。

主治 小儿夜啼。症见白日如常，入夜即哭，天明即止，经检查无其它疾病者。

来源 《中医杂志》1983(4)：34

5. 朱砂散

组成 朱砂适量。

用法 朱砂研极细末，棉签以温开水浸湿，蘸少许药末，涂于神阙、双侧劳宫、膻中、双侧风池穴，不用包扎，每晚睡前1次。

功效 镇心安神。

主治 小儿夜啼。症见长期夜间哭闹，梦惊，易醒，醒后哭闹不止。检查无明显阳性体征。

来源 《中西医结合杂志》1989(7)：422

按语 本法治疗夜啼患儿71例，全部治愈。一般用药1次即效，可连用3日。

6. 二香汤

组成 广木香6g，小茴香6g，紫苏叶6g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 温中行气散寒。

主治 小儿夜啼之虚寒证。症见夜间啼哭，手足不温，不吮乳食，大便稀溏。

来源 《中国当代名医验方大全》

7. 夜啼方

组成 黄连6g，竹叶6g，甘草3g。

用法 黄连用姜汁炒，与竹叶、甘草一起煎汤服，每日1剂，分2次服。

功效 清热安神。

主治 小儿夜啼之肝热证。症见夜间啼哭不止，烦躁不安，面赤唇红，小便黄赤。

来源 《丹溪手镜》

8. 麦砂灯芯饮

组成 麦冬8g，朱砂0.3g，灯芯0.5g。

用法 先加水40毫升浸泡，置于锅内隔水蒸，每日1剂，中午及晚上睡前各服1次。

功效 清心养阴，镇静安神。

主治 心脾积热之夜啼。症见夜间惊醒，醒后烦哭不休，唇红口干，小便短黄。

来源 《广西中医药》1982(2)：19

9. 蝉蜕钩藤饮

组成 蝉蜕6只（去足），钩藤6节，生龙牡各2g，甘草0.5g，薄荷0.5g。

用法 水煎服，日服5~6次，1剂分2天服完。

功效 熄风镇静安神。

主治 小儿夜啼，检查无其它疾病者。

来源 《中医杂志》1981(4)：75

10. 朱砂五倍散

组成 朱砂0.5g，五倍子1.5g，陈细茶适量。

用法 前两药研末，取细茶适量嚼烂，共混匀，加水少许，捏成小饼，敷于脐中，外以纱布包扎，每晚更换1次。

功效 清热安神镇惊。

主治 小儿夜啼。

来源 《四川中医》1984(6)：50

11. 朱连散

组成 朱砂3g，黄连6g，钩藤3g。

用法 共为细末，每服0.5克，每晚睡前服1次。

功效 清热泻火，镇惊安神。

主治 心火亢盛之夜啼。症见夜间啼哭，恶见灯火，两目发红，舌尖红。

来源 《新中医》1981(3)：56

12. 小儿夜啼方

组成 蝉蜕21个，灯花1g，乳香末3g。

用法 蝉蜕去头足，乳香以竹叶炙之，共为细末，每服1克，日服2次，以灯草煎水送服。

功效 清热安神镇静。

主治 小儿夜啼。

来源 《保安堂三补简便验方》

13. 夜啼简便方

组成 朱砂1.5 g，牛黄0.3 g。

用法 共为细末，每服0.3~0.6克，以犀角磨汤调服，
口服2次。

功效 清心热，安神志。

主治 小儿心经热盛之夜啼。

来源 《幼幼集成》

14. 朱铅药糊

组成 朱砂、铅粉各等分。

用法 共研细末，每次取6克，用鸡蛋清调成糊状，睡前
涂敷两足心，盖上油纸，包扎固定，白天洗去，连用2~3
天。

功效 安神定惊。

主治 小儿夜啼。

来源 《小儿外治疗法》

15. 枣梅二黄汤

组成 酸枣仁9 g，乌梅9 g，川黄连2 g，生大黄6 g。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 清热除烦，消食安神。

主治 小儿夜啼。

来源 《浙江中医杂志》1988(3)：113

16. 蝉蜕薄荷汤

组成 蝉蜕15个，薄荷6 g，远志6 g，茯神9 g，灯心草
9 g，黄连3 g，龙齿3 g。

用法 水煎服，取汁30毫升，加白糖适量，每日下午或

晚上服5~10毫升。

功效 清心除烦，安神定志。

主治 小儿夜啼。

来源 《北京中医》1989(4)：63

盗 汗

盗汗是小儿常见的一种证候，临床以睡中汗出，醒时汗止为特点。传统医学认为，盗汗的原因主要是由于阴虚热扰，气不敛阴，津液外泄所致。治疗主要以益气养阴敛汗为主，并针对不同的病因，审因论治。

1. 牡蛎止汗汤

组成 生牡蛎6g，五味子6g，浮小麦9g，鱼腥草12g，鸡血藤9g，大枣3枚，炙甘草3g。

用法 水煎服，每日1剂，分4次服。

功效 滋阴敛汗。

主治 阴虚盗汗。症见盗汗频作，午后潮热，两颧发红，五心烦热。

来源 《中国民间百病良方》

2. 芪防止汗汤

组成 黄芪9g，防风6g，白术9g，虎杖6g。

用法 水煎服，每日1剂，分4次服。

功效 益气固表。

主治 表虚盗汗。症见睡中汗出，以头汗为著，面白肢冷，常易感冒。

来源 《中国民间百病良方》

3. 止汗散

组成 郁金粉0.24 g，牡蛎粉0.06 g。

用法 将上药和匀，以米汤适量调和，分为2份，放在左右乳中穴，用胶布贴好，24小时更换1次，连续外敷3~4天。

功效 滋阴清热，理气收涩。

主治 小儿盗汗。症见寐则汗出，醒后即止，以头颈及胸背汗出多。

来源 《中医杂志》1985(6)：10

按语 郁金理气，牡蛎固涩。二药合之敷于乳中穴，可通过经络作用，健脾益气，固涩止汗。本方治疗50例患儿，多于用药3~4天即止汗，有效率100%。

4. 牡蛎散

组成 牡蛎12 g，麻黄根9 g，黄芪9 g，浮小麦6 g。

用法 共为细末，1~3岁每服0.5~1.0克，4~6岁每服1~2克。日服3次。

功效 益气固表敛汗。

主治 小儿盗汗。

来源 《育婴秘诀》

5. 黄芪散

组成 黄芪、煅牡蛎、生地黄各10 g。

用法 上药共为粗末，水煎服，每日1剂，分3次服。

功效 益气止汗。

主治 小儿虚热盗汗。

来源 《小儿药证直诀》

6. 止汗红粉

组成 麻黄根30 g，牡蛎30 g，赤石脂15 g，龙骨15g。

用法 共为细粉，装入布袋中，睡时频频扑于身上。

功效 收敛止汗。

主治 小儿盗汗。

来源 《世医得效方》

8. 五味敷剂

组成 五倍子、赤石脂、没食子、煅龙牡各100g，辰砂5g。

用法 共研细末，每次用10~20克，用凉水食醋各半调成糊状，每晚临睡前敷脐，以纱布固定，翌晨揭去，3~5次为1疗程。

功效 收敛止汗。

主治 小儿顽固性盗汗。

来源 《陕西中医》1985(5):6

8. 龙骨散

组成 白龙骨15g，牡蛎粉15g，黄芪15g，人参15g，熟地黄15g，炙甘草15g，麦冬30g。

用法 共捣粗末为散，每服3克，以水煎之，去渣温服。

功效 益气固摄止汗。

主治 小儿阴虚盗汗。

来源 《太平圣惠方》

9. 四物牡蛎散

组成 当归3g，黄芪5g，白芍2g，川芎2g，生地3g，牡蛎3g，官桂1g，龙眼肉5个，浮小麦100粒。

用法 水煎服，每日1剂，分2次服。

功效 益气养阴，收涩止汗。

主治 小儿盗汗，属体虚者。

来源 《婴童类萃》