

总主编 / 蔡光先

专科专病特色方药丛书

肿瘤特色方药

主 编 / 潘敏求
黎月恒



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE



专科专病特色方药丛书

肿瘤特色方药

妇科病特色方药

肝胆病特色方药

脾胃病特色方药

肾脏病特色方药

糖尿病特色方药

心脑血管病特色方药

肿瘤特色方药

皮肤病特色方药

责任编辑 / 李 丽

封面设计 / 李 蹊

版式设计 / 盖 伟

责任校对 / 常淑玉

ISBN 7-117-08273-9



9 787117 082730 >

定 价: 34.00 元



专科专病特色方药丛书

肺癌特色方药

主 编 潘敏求 黎月恒

副主编 蔡 美 蒋益兰 潘 博

编 委 (按姓氏笔画排序)

王云启	卢壮丽	李东芳	杜小艳
吴玉华	陈四明	张传红	袁晓清
梁 慧	曹 文	蒋益兰	曾普华
蔡 美	黎月恒	潘 博	潘敏求

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

肿瘤特色方药/潘敏求等主编. —北京:
人民卫生出版社, 2006. 12

(专科专病特色方药丛书)

ISBN 7-117-08273-9

I. 肿… II. 潘… III. 肿瘤-验方-汇编
IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 143412 号

专科专病特色方药丛书
肿瘤特色方药

主 编: 潘敏求 黎月恒

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 北京市后沙峪印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 19.25

字 数: 478 千字

版 次: 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-08273-9/R·8274

定 价: 34.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

内 容 提 要

本书是《专科专病特色方药丛书》的肿瘤分册。介绍了33种现代临床常见肿瘤病的用方特色和常用中药。

全书共分上、下两篇。上篇为专病方剂篇，主要对32种肿瘤科常见病从【辨证用方】、【辨病用方】、【对症用方】、【专病成药】、【专病单方】5方面进行论述，重视用方的辨证、辨病和辨症的辨证统一，突出临床用方特点；下篇为药物篇，主要收集整理85味肿瘤科常用的中药，重点介绍该药在本专科的【临床应用】、【配伍经验】和【药理作用】。

本书旨在突出专科专病，以科议病，就病论方，以方议药，从药论病。力求对肿瘤病专科的用方经验、用药经验进行系统全面的整理和总结，同时能充分反映当代肿瘤科遣方用药的新成就、新进展。

本书内容丰富，条理清晰，简明实用，非常适合广大中西医内科医师，特别是肿瘤科医生、基层医生临床使用，亦不失为高等医药院校本科生、研究生临床实习的参考资料。



专科专病特色方药丛书

编 委 会

总 主 编 蔡光先

副总主编 何清湖 周 慎

编 委 (按姓氏笔画排序)

马宇滢	尤昭玲	朱明芳	刘 芳
刘柏炎	杨正望	杨志波	杨运高
杨卓欣	杨维华	杨曙东	李 点
李佑生	李顺民	李翠萍	何清湖
张雪花	周 慎	周德生	段逸群
唐利文	蒋益兰	雷 磊	蔡 美
蔡光先	翟小翔	熊 焰	霍 荻
黎月恒	潘 博	潘敏求	戴飞跃
魏飞跃			

学术秘书 刘朝圣 雷晓明

《专科专病特色方药》丛书

前 言

谈及中医，必言“整体观念”、“辨证论治”；谈及中医，必言其理论的奥妙，临床的效验；谈及中医，也必言其浩如烟海、汗牛充栋的方书和实用、有效、丰富多彩的方剂与中药。“欲诣扶桑，无舟莫适”，成为中医，成为名中医，必须谙熟中医方药理论与方药之用；成为名中医医院，必须有其特色的专科专病和专方。

东汉张仲景既创辨证论治体系，更以创制经方而奉为方书之祖；唐代孙思邈既重视脏腑辨证和医德修养，更以《千金要方》、《千金翼方》而流芳百世；明代李时珍足迹踏遍大江南北，所著《本草纲目》因其丰富的方药理论和经验而名垂千古；清代余霖潜心于温病之研究，因创制清瘟败毒饮鸡尾酒方而成为温病学家。

现今，国家中医药管理局从医政管理与学科建设上，已非常重视各地中医医院专科专病建设，将重点专科专病建设作为发展中医药事业的一个重要途径与方法。各地中医医院除加强整体和综合诊疗实力的建设外，相当重视各自医院的专科专病建设，弘扬自己的特色与优势。在专科专病建设中，其核心内容就是要有自己的独特诊疗经验和专方专药。《专科专病特色方药》丛书的编纂是在上述背景情况下选题设计的，经人民卫生出版社立项进行专题研究与编写。

该丛书是一套立足于中医专科专病建设，突出中医专科专病方药的应用经验，以临床实用为主的临床专著。丛书第一批

共 8 本，有：《心脑血管病特色方药》、《脾胃病特色方药》、《肝胆病特色方药》、《肾病特色方药》、《肿瘤特色方药》、《皮肤病特色方药》、《妇科病特色方药》和《糖尿病特色方药》。每一部书均分上、下两篇，上篇为专病方剂篇，下篇为药物篇。上篇以病名为目，首先简要概述该病的概念、发病情况、西医病理基础、中医病名和中医的基本病机；后主要分题介绍该病治疗的辨证用方、辨病用方、对症用方、专病成药和专病单方，重视用方的辨证、辨病和辨症的辩证统一。下篇药物篇重点介绍各专科专病常用中药的基本知识、临床应用、配伍经验和药理作用。

《专科专病特色方药》丛书的编纂，从立题到定稿，历经 3 年，几易其稿，多次修订，虽然凝聚了作者大量的心血与努力，但学术上永无止境，其中疏漏、错误之处亦在所难免，祈望专家、学者、读者能予以指正，以便再版时进一步修订与完善。

蔡光先

2006 年 10 月 28 日

编写说明

编写说明

肿瘤特色方药

近些年来肿瘤患者的生活质量明显提高，生存时间明显延长，其中很重要的原因是采用了综合治疗，特别是中医药的治疗。有统计资料表明，我国恶性肿瘤三分之二以上的患者均服用中药，中医药可单独治疗，但多与西医结合。中医药治疗，术前可改善机体状况，增强体质，术后可帮助恢复脏腑功能，减少复发、转移，减轻放化疗毒副反应，增加放化疗的敏感度。对中晚期患者，通过中医的辨证或对症治疗可起到延长生命，提高生活质量，减轻痛苦的作用。中医药在恶性肿瘤治疗中有其特有的地位，已成为恶性肿瘤综合治疗中的重要组成部分。

我们曾于 1994 年组织专家广泛收集整理资料，以自己临床实践为基础，结合当时治疗进展，编著了《中华肿瘤治疗大成》，至今已有 10 年，许多方药疗效现今已得到进一步临床证实，且这些年来中医药在肿瘤防治方面又有了长足的发展，这在本书资料的收录中给予了应有注意。

《肿瘤病特色方药》是一部立足于中医肿瘤专科专病，突出肿瘤病特色方药的应用经验，以临床应用为主的临床专著。本书充分反映了当代中医治疗肿瘤方、药的新成就、新进展。在体例编排上，我们遵循中医治病精髓，以辨证论治为主，辨病用药、对症治疗为辅，并收录了近年来新开发出来的肿瘤专科中成药及常用单方验方，

其目的是使其更加贴近临床，更实用、更规范。

本书共分上、下两篇。上篇为专病方剂篇，主要编辑了 33 种恶性肿瘤（诊断明确）的辨证用方、辨病用方、对症方药、专病成药、专病单方等内容。下篇为药物篇，主要收集整理了 85 种常用抗肿瘤中药的临床应用、肿瘤药理作用，并结合编著者临床实践介绍了其在临床上的合理配伍。同时，每个方和药的临床应用、药理作用都标明来源出处，以方便临床医务工作者或读者查找翔实的材料和有用的信息。因此，本书不仅适合于中医及中西医结合第一线临床医务人员，对科研工作者及医学院校的师生也有一定的参考价值。

编著过程中我们特别注重本书的临床实用性，虽尽了最大努力，由于时间紧，水平有限，难免有不妥和疏漏之处，恳请广大读者指正。

潘敏求

2006 年 10 月



上篇 专病方剂篇

头颈部肿瘤·····	3
鼻咽癌·····	3
舌癌·····	25
恶性涎腺肿瘤·····	36
喉癌·····	44
甲状腺癌·····	56
胸部肿瘤·····	67
原发性支气管肺癌·····	67
胸膜肿瘤·····	93
纵隔肿瘤·····	101
食管癌·····	109
腹部肿瘤·····	135
胃癌·····	135
大肠癌·····	154
原发性肝癌·····	170
胆囊癌·····	196
胰腺癌·····	206
泌尿及男性生殖系肿瘤·····	222
肾癌·····	222
膀胱癌·····	235
前列腺癌·····	249
妇科肿瘤·····	260

乳腺癌·····	260
宫颈癌·····	288
卵巢癌·····	308
神经系统肿瘤·····	325
神经胶质瘤·····	325
脑垂体肿瘤·····	342
脊髓肿瘤·····	360
造血系统肿瘤·····	370
急性白血病·····	370
慢性粒细胞白血病·····	385
慢性淋巴细胞白血病·····	395
恶性淋巴瘤·····	402
多发性骨髓瘤·····	413
恶性骨肿瘤·····	424
骨肉瘤·····	424
尤文肉瘤·····	434
恶性皮肤及软组织肿瘤·····	441
皮肤癌·····	441
恶性黑色素瘤·····	452
软组织恶性肿瘤·····	461

下篇 药物篇

清热解毒类药·····	473
一枝黄花·····	473
十大功劳·····	474
了哥王·····	475
土茯苓·····	476
大蒜·····	477
山豆根·····	479

马蔺子·····	481
天葵·····	482
木芙蓉·····	483
牛黄·····	484
白花蛇舌草·····	486
石上柏·····	488
龙葵·····	489
龙胆草·····	491
白鲜皮·····	491
冬凌草·····	492
半枝莲·····	494
半边莲·····	497
青黛·····	498
苦参·····	500
鱼腥草·····	502
蚤休·····	503
茵陈蒿·····	505
鸦胆子·····	506
拳参·····	508
黄芩·····	509
黄连·····	511
紫草·····	512
槐角·····	514
蒲公英·····	515
墓头回·····	516
藤梨根·····	517
活血化瘀类药·····	518
大黄·····	518
三七·····	520

川芎.....	522
山楂.....	525
水蛭.....	526
丹参.....	527
全蝎.....	530
穿山甲.....	533
莪术.....	534
软坚散结类.....	536
土贝母.....	536
天南星.....	538
白僵蚕.....	539
半夏.....	540
牡蛎.....	542
昆布.....	543
海藻.....	544
夏枯草.....	546
黄药子.....	548
鳖甲.....	549
以毒攻毒类药.....	551
马钱子.....	551
白屈菜.....	552
壁虎.....	553
肿节风.....	555
砒石.....	556
钩吻.....	558
急性子.....	559
斑蝥.....	560
蜈蚣.....	562
藤黄.....	564

蟾酥·····	565
露蜂房·····	567
扶正培本类药 ·····	568
人参·····	568
女贞子·····	570
白术·····	572
冬虫夏草·····	573
当归·····	575
灵芝·····	576
补骨脂·····	578
茯苓·····	579
枸杞子·····	580
香菇·····	582
黄芪·····	583
猪苓·····	584
猴菇菌·····	585
蜂乳·····	586
薏苡仁·····	586
其他类药 ·····	588
八月札·····	588
天花粉·····	589
仙鹤草·····	591
沉香·····	592
泽漆·····	593
柴胡·····	594
菝葜·····	595
药名索引 ·····	597

上篇

专病方剂篇

头颈部肺癌

鼻咽癌

鼻咽癌是指发生于鼻咽腔顶部和侧壁的恶性肿瘤。本病发生一般认为与 EB 病毒感染、环境、饮食、遗传等因素有关。

本病相当于中医病名国家标准的鼻咽癌，亦属于头痛、鼻痔、鼻衄、失荣、上石疽等范畴。中医认为本病的病因病机为上焦积热，鼻窍不通，气机阻遏，肺气失宣，津液不敷，热毒侵袭，灼津为痰，痰火蕴结而成。

【辨证用方】

鼻咽癌的辨证，当辨明热、寒、虚、实。以鼻塞流浊涕、咯痰黏稠、耳鸣耳闭为主症者，多为热证（热毒）、实证；以鼻干头痛、耳鸣耳聋、腰膝酸软为主症者，多为虚证。证属实热者，治以清热解毒、凉血散结为主；证属虚者，治以滋阴补肾、补气益血为主。

1. 痰热内结证

主症：鼻塞浊涕，咯痰黏稠，头痛头重，耳鸣耳闭，小便短赤，颈部瘰疬，舌暗红，苔黄腻，脉弦滑。

治法：清热化痰，解毒化浊。

清气化痰汤加减（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕胆南星 10g，法半夏 10g，陈皮 10g，黄芩 20g，枳实 10g，辛夷 10g，苍耳子 10g，石菖蒲 10g，土贝母 15g，土茯苓 30g，十大功劳 30g，半枝莲 30g，夏枯草 30g，蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清气化痰，解毒化浊。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 头痛者，加僵蚕、白芷；口干欲饮者，加天花粉、生地、芦根；涕中带血者，加仙鹤草、白茅根；颈部瘰癧者，加昆布、海藻。

2. 热毒蕴结证

主症：鼻塞浊涕或脓涕稠厚，偏侧头痛，视物不清，耳聋耳鸣或口眼歪斜，面部麻木，口苦咽干，舌红绛，苔黄，脉弦数。

治法：清热解毒，凉血泻火。

(1) 加减清瘟败毒饮（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 生地 15g，连翘 15g，黄芩 20g，生石膏 30g，栀子 12g，竹叶 10g，知母 15g，赤芍 10g，菊花 12g，辛夷 10g，石菖蒲 10g，桔梗 10g，半枝莲 30g，蚤休 30g，葵树子 30g，石上柏 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，凉血散结。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 鼻衄不止者，加仙鹤草、白茅根；口眼歪斜，面麻者，加全蝎、僵蚕。

(2) 加减龙胆泻肝汤（广东省中医院肿瘤科方）

〔组成与用法〕 龙胆草 15g，炒栀子 10g，黄芩 10g，茯苓 10g，泽泻 10g，生地 10g，当归 10g，蚤休 30g，车前子 10g，人参 10g，麦冬 10g，五味子 10g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，益气养阴。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 头痛甚者，加白芷、川芎；发热甚者，加青蒿等；口干者，加天花粉、石斛等；便秘者，加瓜蒌仁、枳实；淋巴结肿大者，加黄药子、胆南星；鼻衄者，加仙鹤草、紫珠草。

3. 气滞血瘀证

主症：鼻涕带血，耳内胀闷或蝉鸣，头痛眩晕，胸胁胀闷不舒，纳少，舌暗或有紫斑，苔薄白，脉弦。

治法：舒肝理气，化瘀解毒。

(1) 加减逍遥散（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 柴胡 10g，茯苓 12g，白术 10g，当归 10g，赤芍 12g，香附 12g，郁金 12g，栀子 10g，黄芩 12g，苍耳子 10g，丹参 30g，葵树子 30g，石上柏 30g，仙鹤草 15g，石菖蒲 10g，蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕 舒肝解郁，健脾养血。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 口干舌燥者，加天花粉、麦冬、参须（蒸兑）；视物模糊、复视者，加密蒙花、枸杞、红花。

(2) 疏肝散结汤（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 赤芍 10g，丹参 10g，蜈蚣 3 条，全蝎 10g，钩藤 12g，川芎 3g，夏枯草 15g，玄参 15g，白花蛇舌草 30g，浙贝 15g，生牡蛎 30g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀，解毒通络。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 发热甚者，加黄芩、连翘、石膏；失眠心烦者，加炒枣仁、珍珠母。

4. 阴虚内热证

主症：鼻干头痛，口干舌燥，腰膝酸软，耳鸣耳聋，大便秘结，小便黄少，舌红，苔薄黄，脉沉细或数。

治法：滋阴补肾，解毒散结。

杞菊地黄汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 枸杞 15g，菊花 15g，生地 15g，丹皮 10g，泽泻 12g，茯苓 12g，玄参 10g，麦冬 15g，天花粉 20g，竹叶 10g，陈皮 10g，蚤休 30g，白英 15g，石上柏 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 滋肾养肝明目。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 涕血者，加白茅根、仙鹤草；汗多者，加炙黄芪、五味子、煅牡蛎（先煎）；气短者，加太子参；尿黄，加白花蛇舌草；低热、潮热，加地骨皮，西洋参；失眠，加远

志、酸枣仁；鼻出血，加旱莲草、藕节、白及。

5. 气阴两虚证

主症：鼻干不适，耳鸣头昏，涕中带血，神疲乏力，少气懒言，五心烦热，咽燥口干，舌淡，少苔，脉细数。

治法：益气养阴，解毒散结。

(1) 芪贞增液加减方（潘敏求经验方）

[组成与用法] 太子参 30g（或西洋参 10g），黄芪 15g，女贞子 15g，玄参 15g，麦冬 15g，生地 15g，石斛 20g，天花粉 20g，穿山甲 15g（打碎先煎），白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g，蚤休 30g，甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴，解毒散结。主治鼻咽癌。

[加减应用] 鼻塞者，加苍耳子、辛夷花；涕血者，加仙鹤草、旱莲草、白茅根；头痛者，加白芷、羌活；面麻、舌歪、复视者，加蜈蚣、僵蚕、钩藤；咳嗽无痰者，加北沙参、百合、川贝母（另研末，冲服）、桔梗；颈淋巴结肿大者，加生南星、生牡蛎、夏枯草；咽喉肿痛者，加射干、牛蒡子、山豆根、胖大海；舌质红绛或青紫、舌尖边有瘀点或瘀斑者，加丹参、赤芍、红花。

(2) 扶正生津汤（潘明继经验方）

[组成与用法] 党参 15g，生黄芪 15g，女贞子 12g，麦冬 12g，生地 15g，天冬 12g，白茅根 12g，茯苓 12g，沙参 10g，白花蛇舌草 25g，白毛藤 25g，丹参 15g，白术 10g。水煎服。

[功能主治] 滋阴益气，清热凉血。主治鼻咽癌。

[加减应用] 脾胃虚寒者，酌减茅根、天冬、麦冬，加大枣、砂仁、丁香；气血两虚，白细胞降低者，减白茅根、天冬，加枸杞、紫河车、熟地、鸡血藤，重用黄芪；头痛者，减白花蛇舌草、茅根，加川芎、独活、防风、藁本、菊花；发热者，加黄芩、青蒿、连翘、石膏；食欲不振者，加麦芽、山楂、神曲、鸡内金、芡实；便秘，加干瓜蒌、麻仁、大黄；失

眠烦躁，加五味子、枣仁、珍珠母。

【临床报道】配合放疗治疗 150 例，3 年存活率 72%；5 年存活率 58%；10 年存活率 39%。（中西医结合杂志，1985，2）

【辨病用方】

放射治疗是目前鼻咽癌首选方法，但因其放射损伤等副作用常影响疗效和患者的生活质量。因此，鼻咽癌的辨病治疗，当注重三个方面。一是根据肿瘤病情早晚期、病人体质强弱，合理选用或合用具有抗鼻咽癌作用的药物，如苍耳子、白花蛇舌草、山慈菇、石上柏、半枝莲、蚤休、浙贝母等；二是放疗增敏可选用汉防己、丹参、赤芍、毛冬青、鸡血藤等；三是要预防或减轻放射线损伤，常用补益脾肾、益气养阴、清热生津之补骨脂、黄芪、沙参、生地黄、生首乌、黄精、枸杞、石斛、芦根、旱莲草、女贞子等。

1. 鼻咽癌早、中期体实用方

（1）葵树白花汤（广州中医学院第一附属医院方）

【组成与用法】牡蛎 30g，葵树子 30g，白花蛇舌草 30g，石见穿 30g，佛手 10g，生南星（先煎）10g，生半夏（先煎）10g，七叶一枝花 15g。水煎服。

【功能主治】化痰软坚，解毒消肿。主治鼻咽癌。

【加减应用】咳嗽无痰者，加北沙参、紫菀、百合；声嘶，加木蝴蝶、桔梗、僵蚕；咽喉疼痛，吞咽困难，加薄荷、射干、木蝴蝶；口干咽燥，加天花粉、石斛、玉竹；失眠，加酸枣仁、五味子、珍珠母；淋巴结肿大，加黄药子、夏枯草、猫爪草。白细胞低者，加鸡血藤、女贞子、黄芪、黄精、补骨脂、党参；气血两虚者，加党参、茯苓、金樱子、鸡血藤、大枣；便秘，加瓜蒌仁、枳实、牛蒡子；恶心呕吐，加陈皮、法夏、砂仁。

（2）地柏汤（上海中医学院附属龙华医院方）

【组成与用法】生地 30g，石上柏 30g，紫草根 30g，牡蛎

30g, 天花粉 24g, 苍耳草 15g, 海藻 15g, 元参 12g, 山豆根 12g, 夏枯草 12g, 白芷 9g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 化痰散结。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 头痛, 加白芷、羌活、川芎; 发热, 加黄芩、青蒿、连翘; 腹胀, 加大腹皮、砂仁、厚朴; 纳差, 加炒谷芽、山楂、山药。

(3) 白苍散 (《现代中医肿瘤学》)

〔组成与用法〕 七叶一枝花 30g, 夏枯草 20g, 白花蛇舌草 30g, 苍耳子 15g, 生南星 (先煎) 9g, 生半夏 (先煎) 30g, 茯苓 30g, 白术 15g。水煎服。

〔功能主治〕 解毒化浊。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 鼻塞者, 加辛夷花、丹参。

(4) 桃红活血汤 (中国医学科学院肿瘤医院方)

〔组成与用法〕 黄芪 15g, 赤芍 15g, 当归 10g, 川芎 10g, 桃仁 10g, 红花 10g, 鸡内金 12g, 葛根 10g, 陈皮 9g, 丹参 15g。水煎服。

〔功能主治〕 益气补血, 活血化瘀。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 痛甚者, 加全蝎、乳香、没药; 食欲不振者, 加麦芽、山楂、神曲; 便秘者, 加全瓜蒌、麻仁、大黄; 口腔糜烂者, 加金银花、白花蛇舌草、赤芍。

(5) 双龙消瘤方 (《中国中医秘方大全》)

〔组成与用法〕 柴胡 4.5g, 龙胆草 6g, 地龙 6g, 制鳖甲 24g, 地骨皮 18g, 土贝母 12g, 海藻 12g, 昆布 12g, 凤尾草 12g, 败酱草 12g。水煎服。另: 消瘤丸 (全蝎、蜂房、龙衣各等份, 研末水泛为丸) 9g, 吞服。

〔功能主治〕 清泻肝火, 化痰消肿。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 鼻衄目赤者, 加贯众炭、藕节炭、白茅根、金银花、蒲公英、牡丹皮、生地黄、玄参。

(6) 加减银翘汤 (《抗癌中草药制剂》)

〔组成与用法〕 金银花 20g, 连翘 15g, 紫花地丁 30g, 板蓝根 15g, 大青叶 15g, 桃仁 10g, 红花 10g, 丹皮 10g, 蜈蚣 3 条, 莪术 10g, 全蝎 3g, 当归 15g, 白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 化瘀散结。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 头痛者, 加川芎、白芷。久病体虚加太子参、当归、黄芪。

(7) 蜈蚣贝母方 (《当代名医临证精华·肿瘤专辑》)

〔组成与用法〕 生瓦楞子 90g, 浙贝母 15g, 紫草 25g, 石斛 (单包另煎) 30g, 丹参 25g, 金银花 30g, 海藻 25g, 昆布 25g, 谷精草 25g, 怀牛膝 15g, 青黛 9g, 蜈蚣 3 条, 全蝎 9g, 三棱 9g, 莪术 9g, 蚕砂 9g, 生谷芽 18g。水煎服。

〔功能主治〕 软坚化瘀, 养阴解毒。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 气血亏虚者, 加首乌、黄精、补骨脂、鸡血藤、黄芪。

(8) 术星煎 (《现代中医肿瘤学》)

〔组成与用法〕 党参 30g, 白术 15g, 怀山药 30g, 三棱 12g, 莪术 12g, 生南星 9g, 蜈蚣 3 条, 制鳖甲 12g, 郁金 15g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾理气, 解毒化瘀。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 舌质红绛或有青紫、舌尖边有瘀点或瘀斑者, 加丹参、赤芍、红花; 鼻出血者, 加仙鹤草、连翘、紫草; 张口困难者, 加丹参、赤芍、鸡血藤。

(9) 沙参玄参汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 玄参 30g, 北沙参 30g, 石斛 25g, 党参 25g, 白术 25g, 紫草 20g, 麦门冬 15g, 黄芪 15g, 女贞子 15g, 卷黄柏 15g, 苍耳子 15g, 辛夷 15g, 菟丝子 15g, 知母 12g, 山豆根 10g, 白芷 10g, 山药 10g, 石菖蒲 10g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴清热, 益气利咽。主治鼻咽癌。

〔加减应用〕 头痛、耳聋者, 加防风、龙胆草; 口干咽燥

者，加天花粉、芦根；痰湿重、颈部淋巴结肿大者，加海藻、昆布、川贝、山慈菇；苔黄厚腻、食少纳呆者，加藿香、佩兰、薏苡仁、焦三仙。

(10) 灵脂山甲汤（浙江中医杂志，1987，2）

〔组成与用法〕 赤芍 20g，川贝 10g，杏仁 10g，生蒲黄 10g，五灵脂 10g，土鳖虫 15g，穿山甲（先煎）15g，丹参 15g，瓜蒌 15g，当归 15g，制乳香 8g，制没药 8g。水煎服，并用药渣外敷。

〔功能主治〕 化痰祛瘀，活血散结。主治鼻咽癌中期。

〔加减应用〕 肿块消退慢者，加血竭、莪术、皂角刺；癌毒甚者，加山慈菇、壁虎、制木鳖子、急性子；口干便结者，加浙贝、紫草、莱菔子；痰涎多者，加法半夏、胆南星。

2. 鼻咽癌转移用方

(1) 消瘰汤（《中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 川楝子 10g，石菖蒲 10g，白芍 12g，夏枯草 30g，生牡蛎（先煎）30g，玄参 12g，生硼砂（冲）1.5g，瓜蒌 30g，皂刺 15g。水煎服。

〔功能主治〕 解毒化痰，消瘰散结。主治鼻咽癌淋巴结转移者。

(2) 南星慈菇方（新中医，1981，11）

〔组成与用法〕 制川乌 12g，制南星 12g，法半夏 12g，海藻 24g，昆布 24g，山慈菇 12g，山豆根 12g，夏枯草 12g，当归 12g，漏芦 12g，连翘 12g，金银花 15g，土茯苓 30g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰软坚，解毒散结。主治鼻咽癌淋巴结转移，痰瘀毒聚，邪毒弥漫型。

〔加减应用〕 同时口服六神丸或西黄丸。

(3) 海藻慈菇汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 海藻 15g，昆布 15g，辛夷 3g，红藤 24g，

马勃 3g, 夏枯草 15g, 升麻 4.5g, 山慈菇 30g, 白毛藤 30g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒散结。主治鼻咽癌颈部淋巴结转移者。

(4) 夏枯馒头汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 木馒头 2 个, 龟甲 15g, 瓜蒌 15g, 金银花 15g, 夏枯草 15g, 蚤休 30g, 丹参 15g, 丹皮 10g, 白蔹 10g, 蛇床子 10g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 活血散结。主治鼻咽癌耳下淋巴结转移者。

(5) 花粉磁石汤 (钱伯文经验方)

[组成与用法] 天花粉 30g, 北沙参 24g, 天冬 12g, 麦冬 12g, 象贝 12g, 茯苓 25g, 生薏苡仁 30g, 生地 30g, 昆布 24g, 海藻 24g, 白扁豆 30g, 孩儿参 24g, 女贞子 12g, 绿豆衣 12g, 谷芽 12g, 麦芽 12g, 灵磁石 24g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴, 清热消肿。主治鼻咽癌淋巴结转移放、化疗后, 肿块不消者。

[加减应用] 同时口服六味地黄丸、生脉饮、消瘤清。鼻腔分泌物多者, 加蒲公英、金银花。

[临床报道] 治疗 1 例鼻咽癌颈部淋巴结转移化疗后肿块不消者, 口服该方 2 年, 肿块消失。(《二十世纪上海百名名中医学学术经验集成》)

(6) 寄牛汤 (《现代中医肿瘤学》)

[组成与用法] 川断 20g, 补骨脂 20g, 怀牛膝 20g, 杜仲 20g, 骨碎补 15g, 透骨草 60g, 桑寄生 30g, 人地金牛 30g, 女贞子 15g, 自然铜 20g。水煎服。

[功能主治] 补肝肾, 强筋骨, 解毒化瘀。主治鼻咽癌骨转移者。

[加减应用] 气血不足者, 加首乌、鸡血藤、黄芪; 食欲

不振者，加麦芽、山楂、神曲、鸡内金。

(7) 解毒散结饮（《中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 生地 15g，丹皮 10g，石上柏 30g，山豆根 10g，钩藤 15g，全蝎 6g，夏枯草 15g，丝瓜络 10g，虎杖 30g，僵蚕 10g，鸡血藤 30g，苍耳子 10g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒。主治鼻咽癌合并脑神经损害者。

(8) 蜈桔散（《现代中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 生南星（先煎）9g，蜈蚣 3 条，北杏仁 15g，桔梗 15g，贝母 13g，夏枯草 20g，七叶一枝花 20g，郁金 15g，党参 30g，北沙参 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 润肺解毒。用于鼻咽癌肺转移。

〔加减应用〕 涕血者，加仙鹤草、旱莲草、侧柏叶；气血虚者（或白细胞减少者），加何首乌、黄精、补骨脂、鸡血藤、黄芪。

3. 鼻咽癌放疗后复发方

益气养阴方（中国医师，2003，5）

〔组成与用法〕 太子参 15g，北沙参 15g，天花粉 12g，石斛 10g，玄参 15g，麦冬 10g，生地 15g，女贞子 15g，石见穿 30g，地龙 15g，穿山甲（打碎先煎）15g，田七粉（装胶囊吞服）3g，桃仁 10g，金银花 15g，白花蛇舌草 30g，蚤休 15g，蛇莓 15g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，化瘀解毒。主治鼻咽癌放疗后复发。

〔加减应用〕 食欲减退者，加鸡内金、神曲；咽痛者，加射干、山豆根；头痛者，加蔓荆子、全蝎（研末装胶囊吞服）；呕吐者，加法夏、竹茹。

〔临床报道〕 配合放疗治疗复发性鼻咽癌 65 例，完全缓解 70.77%，部分缓解 20.00%。

4. 放疗增敏方

(1) 复方水蛭方（中国中西医结合杂志，2003，10）

〔组成与用法〕 黄芪 20g, 鸡血藤 20g, 白术 10g, 赤芍 10g, 当归 12g, 茯苓 6g, 红花 6g, 丹参 6g, 桃仁 6g。水煎服。水蛭胶囊, 每次 1g, 口服, 每天 3 次。

〔功能主治〕 活血化瘀。主治鼻咽癌。

〔临床报道〕 配合放疗治疗晚期鼻咽癌 119 例, 鼻咽部原发灶的消失率 90.2%; 5 年存活率为 53.7%。

(2) 神龙口服液 (中国中西医结合杂志, 2000, 11)

〔组成与用法〕 黄芪 20g, 女贞子 15g, 川芎 10g, 太子参 15g, 丹参 20g, 肿节风 10g, 地龙 20g, 麦冬 15g, 半枝莲 15g, 白花蛇舌草 15g, 薏苡仁 15g, 大黄 4g。每次 20ml, 每日 3 次。

〔功能主治〕 扶正固本, 活血解毒。主治鼻咽癌。

〔临床报道〕 配合放疗治疗 60 例, 肿瘤消退率为 91.67%。

(3) 散结方 (中医研究, 2001, 3)

〔组成与用法〕 生南星 50g, 生半夏 30g, 蜈蚣 3 条, 夏枯草 20g, 丹参 20g, 赤芍 20g, 葛根 30g, 太子参 30g。用水久煎 (持续煎沸达 2 小时以上), 餐后服, 每天 1 剂, 服至放疗结束。

〔功能主治〕 化痰散结。主治鼻咽癌。

〔临床报道〕 配合放疗治疗 54 例, 放疗结束时鼻咽病灶全消率为 92.59%, 颈部淋巴结转移全消率为 96.3%。

(4) 活血养阴二方 (广东中医药大学学报, 2003, 1)

方一

〔组成与用法〕 丹参 30g, 川芎 10g, 红花 10g, 赤芍 12g, 沙参 30g, 金银花 10g, 甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀, 养阴清热。用于鼻咽癌放疗期间。

〔加减应用〕 口干甚, 加天花粉、太子参、玄参; 热甚, 加蒲公英、黄芩、水牛角。

方二

〔组成与用法〕 玄参 20g, 麦冬 15g, 生地 20g, 北沙参 20g, 天花粉 15g, 石斛 15g, 白花蛇舌草 30g, 蒲公英 20g, 甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕 养阴清热, 生津润燥。用于鼻咽癌放疗后。

〔加减应用〕 口腔溃疡或咽喉肿痛, 加射干、马鞭草; 颈淋巴结肿大, 加鳖甲、浙贝母、猫爪草; 头痛, 鼻塞, 加辛夷花、白芷、苍耳子; 涕血, 加侧柏叶、仙鹤草、旱莲草; 复视、面麻, 加全蝎、蜈蚣、地龙; 恶心呕吐, 加法半夏、竹茹、鸡内金; 气血两虚, 加枸杞、何首乌、党参、北黄芪。

〔临床报道〕 两方联合配合放疗治疗 76 例, 完全缓解率为 84.6%, 部分缓解率为 15.4%。

(5) 养阴活血汤 (中国中西医结合杂志, 2002, 12)

〔组成与用法〕 天花粉 20g, 沙参 30g, 麦冬 30g, 玄参 15g, 山豆根 10g, 岗梅根 25g, 丹参 25g, 红花 10g, 赤芍 10g, 山楂 30g, 白茅根 30g, 金银花 20g, 黄芩 10g, 白花蛇舌草 30g, 西洋参 6g, 生黄芪 20g, 地龙 10g。制成浓缩液, 每次 50ml, 每日 3 次。

〔功能主治〕 养阴活血。主治鼻咽癌。

〔临床报道〕 配合放疗治疗鼻咽癌 100 例, 能减轻放疗反应, 提高放疗及时完成率, 减轻放疗后复发和转移。

(6) 公英射干汤 (浙江中西医结合杂志, 2004, 6)

〔组成与用法〕 夏枯草 15g, 丹皮 12g, 蒲公英 15g, 射干 9g, 金银花 15g, 焦山栀 9g, 天花粉 15g, 赤芍 12g, 生地 15g, 玄参 9g, 竹叶 9g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 化瘀散结。用于鼻咽癌放疗初期。

〔临床报道〕 配合放疗治中晚期鼻咽癌 30 例, 治后唾液腺功能下降程度较单纯放疗组轻。口干程度也明显轻于对照组。

(7) 黄芪丹皮汤 (浙江中西医结合杂志, 2004, 6)

〔组成与用法〕 生黄芪 30g, 沙参 12g, 麦冬 12g, 石斛 12g, 天花粉 15g, 生地 12g, 熟地 12g, 鲜芦根 30g, 丹皮 12g, 赤芍 12g, 夏枯草 15g, 金银花 15g, 鸡血藤 15g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 凉血生津。用于鼻咽癌放疗中后期。

〔加减应用〕 涕血者, 加仙鹤草、旱莲草、侧柏叶; 头痛者, 加白芷、羌活; 面麻、舌歪、复视者, 加蜈蚣、僵蚕、钩藤。

(8) 益气生津方 (海南医学, 1998, 3)

〔组成与用法〕 沙参 30g, 太子参 30g, 黄芪 30g, 百合 30g, 何首乌 20g, 白花蛇舌草 20g, 枸杞子 15g, 怀山药 15g, 白术 15g, 生地 15g, 石斛 15g, 当归 15g, 黄精 15g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 清热解毒。主治鼻咽癌放疗中后期。

(9) 导赤散加味 (湖南中医学院学报, 2003, 4)

〔组成与用法〕 生地 15g, 木通 6g, 淡竹叶 10g, 柴胡 12g, 麦冬 15g, 玄参 15g, 芦根 15g, 蒲公英 30g, 白花蛇舌草 20g, 当归 12g, 川芎 10g, 生甘草 3g。水煎服。连续用药至放疗结束。

〔功能主治〕 养阴清热解毒。配合放疗治疗鼻咽癌。

〔加减应用〕 鼻塞严重者, 加苍耳子、辛夷花; 咽痛明显者, 加赤芍、射干; 口干明显者, 加太子参、天花粉。

【对症用方】

鼻咽癌的对症用方, 要根据患者主要症状进行选择, 尤其适宜于证候不典型而主症又突出者, 并且要针对放、化疗后病人出现的不良反应予以对症用方。

1. 放疗减毒方

(1) 金石蛇草汤 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 黄芪 30g, 参须 10g, 麦冬 10g, 石斛 15g, 金银花 30g, 连翘 10g, 蚤休 30g, 怀山药 15g, 茯苓 10g, 生地 10g, 玄参 10g, 竹茹 10g, 女贞子 10g, 旱莲草 10g, 白花蛇舌草 30g, 夏枯草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 清热解毒。用于鼻咽癌放疗热毒伤阴。

〔临床报道〕 配合放疗治疗鼻咽癌 30 例, 并与单纯放疗 30 例比较, 治疗组、对照组的放疗完成率分别为 96.67%、53.33%。并能改善和保护鼻咽癌放疗患者的外周血象、免疫功能、提高生活质量。

(2) 二竹参麦汤 (黎月恒经验方)

〔组成与用法〕 参须 (蒸兑) 10g, 沙参 15g, 粉葛根 30g, 麦冬 15g, 玉竹 15g, 桑白皮 15g, 天花粉 15g, 菊花 15g, 金银花 12g, 连翘 12g, 夏枯草 15g, 竹叶 10g, 甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴、清热解毒。用于鼻咽癌放疗后气阴两虚。

〔加减应用〕 若呕吐恶心, 加竹茹、陈皮; 体虚乏力, 加白参 (蒸兑)、黄芪; 头痛者, 加川芎、白芷、全蝎; 口干舌绛显著者, 加石斛、天门冬; 失眠烦躁者, 加酸枣仁、夜交藤。

(3) 益气养阴汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 参须 (蒸兑) 10g, 麦冬 15g, 沙参 12g, 玄参 12g, 生地 12g, 桃仁 10g, 菊花 15g, 金银花 15g, 怀山药 15g, 白花蛇舌草 30g, 白英 30g, 蚤休 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 清热解毒。用于鼻咽癌放疗后气阴两虚。

〔加减应用〕 头痛者, 加川芎、白芷、全蝎; 食欲不振者,

加麦芽、党参、白术、茯苓；便秘者，加大黄（后下）；失眠烦躁者，加酸枣仁、夜交藤。

（4）参麦夏枯汤（湖南医科大学学报，2000，3）

〔组成与用法〕 参须 10g，麦冬 15g，竹叶 10g，生石膏 15g，夏枯球 30g，天花粉 15g，辛夷 10g，法夏 10g，玄参 15g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 生津，利咽，健脾，活血，化瘀。用于鼻咽癌放疗后余毒未尽。

〔临床报道〕 配合放疗治疗 47 例，并与单纯放疗组比较，显示中药能减轻放疗不良反应。

（5）芩柏公英冲鼻液（张秀香经验方）

〔组成与用法〕 黄柏 40g，黄芩 40g，蒲公英 60g，薄荷 10g。制成鼻腔冲洗液，常规冲洗鼻腔，每日 1 次。

〔功能主治〕 清热利湿解毒。用于鼻咽癌放疗前减毒。

〔临床报道〕 放疗前用该液冲鼻腔治疗 100 例，中药组放疗副作用明显低于单纯放疗对照组。

2. 防治放疗所致口腔黏膜反应方

（1）花粉豆根汤（北京中医药大学学报，2003，3）

〔组成与用法〕 太子参 20g，北沙参 15g，玄参 15g，天花粉 15g，生地 15g，百合 12g，金银花 15g，山豆根 9g，麦冬 10g，陈皮 8g，鸡内金 12g，生黄芪 20g，女贞子 15g，丹参 15g，川芎 9g，红花 9g，生甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 养阴生津，清热解毒。用于鼻咽癌放疗后口腔炎。

〔临床报道〕 配合放疗治疗鼻咽癌 41 例，口腔黏膜反应明显较单纯放疗组轻。

（2）沙参蛇草汤（中国现代应用药学杂志，2003，4）

〔组成与用法〕 沙参 30g，麦冬 30g，生地 15g，玄参 15g，白花蛇舌草 30g，射干 15g，桔梗 15g，二面针 15g，金银花

15g, 甘草 3g, 白茅根 20g。水煎服。

〔功能主治〕 清热养阴, 解毒活血, 利咽止痛。主治急性放射性口咽炎。

〔加减应用〕 伴有涕血、痰血, 酌加仙鹤草、白及; 伴恶心、呕吐, 酌加代赭石、川厚朴、竹茹; 鼻塞严重者, 加苍耳子、辛夷花; 如乏力、纳差者, 酌加太子参、白术、麦芽、谷芽; 如舌质紫暗或有瘀斑者, 加丹参、田七末。每日 1 剂, 水煎成汁 150ml, 分 5~8 次含服, 从放疗开始至放疗结束。

〔临床报道〕 该方配合放疗治疗 102 例, 减轻口咽放射症状及口咽黏膜反应状况的有效率为 90.2%。

(3) 养阴清肺汤 (吉林中医药, 1998, 3)

〔组成与用法〕 生地 15g, 玄参 12g, 天冬 15g, 沙参 12g, 石斛 12g, 金银花 15g, 连翘 15g, 茯苓 10g, 生甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴生津。用于鼻咽癌放射性口腔炎。

〔加减应用〕 咽喉肿痛伴溃疡者, 加板蓝根、山豆根、外敷珠黄散; 伴恶心呕吐, 苔白滑或白腻者, 去生地、玄参、甘草, 加藿香、佩兰、薏苡仁、陈皮; 咳嗽痰血者加仙鹤草、旱莲草。

〔临床报道〕 治疗 36 例鼻咽癌放射性口腔炎, 服药 3~14 天口腔炎及溃疡即可消退。

3. 治放疗后青紫舌方 (新中医, 2003, 5)

(1) 活血祛瘀汤

〔组成与用法〕 丹参 18g, 玄参 12g, 桃仁 12g, 太子参 20g, 生地黄 15g, 麦冬 15g, 芦根 15g, 天花粉 30g。水煎服。

〔功能主治〕 活血祛瘀。主治鼻咽癌放疗后青紫舌。

(2) 清热养阴汤

〔组成与用法〕 金银花 30g, 玄参 15g, 生地黄 15g, 芦根 15g, 菊花 18g, 天花粉 30g, 板蓝根 25g, 太子参 20g。水

煎服。

〔功能主治〕 清热养阴。主治鼻咽癌放疗后青紫舌。

(3) 补气活血汤

〔组成与用法〕 生黄芪 30g, 太子参 30g, 玄参 12g, 桃仁 12g, 生地 15g, 麦冬 15g, 赤芍 15g, 丹参 18g, 板蓝根 25g。水煎服。

〔功能主治〕 补气活血。主治鼻咽癌放疗后青紫舌。

〔加减应用〕 咽痛甚, 加射干、牛蒡子、蝉蜕; 咳嗽, 加苦杏仁、瓜蒌皮、桔梗; 痰、涕多, 加浙贝母、苍耳子、辛夷。

〔临床报道〕 中山大学附属肿瘤医院张蓓等用以上 3 方观察 109 例中药消除放疗青紫舌的效果, 结果 3 组间比较, 补气活血组最优, 活血祛瘀组次之, 清热养阴组最差。

4. 防治放疗后视后路损伤方

睛明方 (中国中西医结合杂志, 2003, 9)

〔组成与用法〕 女贞子 15g, 旱莲草 15g, 菟丝子 15g, 怀牛膝 15g, 茺蔚子 9g, 丹参 20g, 夏枯草 15g, 田七末 (冲服) 3g。水煎服。

〔功能主治〕 补肝益肾, 清热祛瘀。主治鼻咽癌放疗后视神经受损。

〔临床报道〕 配合放疗治疗 35 例, 结果表明该方能有效防治放射线对视后路损伤。

5. 治放疗中面神经麻痹方

钩藤桑枝饮 (江苏中医杂志, 1986, 5)

〔组成与用法〕 金银花 15g, 生甘草 10g, 天麻 10g, 钩藤 15g, 生石膏 20g, 生石决明 (先煎) 20g, 白菊花 10g, 生白芍 15g, 丹皮 10g, 炒桑枝 10g。水煎服。

〔功能主治〕 清热息风通络。主治鼻咽癌放疗中面神经麻痹。

6. 鼻咽癌化疗后专方

(1) 癌复康加减方 (潘敏求教授经验方)

[组成与用法] 白参 (蒸兑) 10g, 黄芪 30g, 白术 10g, 陈皮 10g, 枸杞子 12g, 女贞子 15g, 旱莲草 15g, 菟丝子 12g, 鸡血藤 30g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 10g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾, 补气养血。主治鼻咽癌化疗后正虚体弱者。

[加减应用] 腰酸耳鸣, 加仙灵脾、石菖蒲; 恶心呕吐, 加姜半夏、砂仁; 纳差, 加鸡内金、山楂; 腹泻, 加吴茱萸、黄连; 失眠, 加酸枣仁; 潮热盗汗, 加丹皮、山萸肉、煅牡蛎、五味子。

(2) 蓝天丸 (医学理论与实践, 2001, 8)

[组成与用法] 乌梅 30g, 焦山楂 30g, 山萸肉 15g, 绞股蓝 50g, 天冬 20g, 土茯苓 15g, 炮山甲 (先煎) 30g, 黄芪 30g。水煎服。

[功能主治] 益气健脾补肾, 活血散结化积。主治鼻咽癌化疗后体虚纳差。

(3) 加减青蒿鳖甲汤 (贵阳中医学院学报, 1989, 4)

[组成与用法] 青蒿 10g, 鳖甲 10g, 秦艽 9g, 地骨皮 12g, 玄参 12g, 生地 12g, 金银花 15g, 天花粉 15g, 丹皮 10g, 赤芍 10g, 白芍 10g, 蝉蜕 6g, 灯心草 15g, 鲜苇茎 30g。水煎服。

[功能主治] 滋阴清热。用于鼻咽癌化疗后低热不退。

[加减应用] 恶心呕吐者, 加姜半夏、砂仁; 食欲不振者, 加鸡内金、谷芽、山楂; 腹泻者, 加薏苡仁、神曲; 失眠者, 加酸枣仁; 汗多者, 加煅牡蛎、五味子。

7. 鼻咽癌头痛方

(1) 苍耳白芷汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕茜草根 9g, 凤尾草 12g, 金银花 12g, 黄芩 9g, 苍耳子 9g, 白芷 9g, 夏枯草 12g, 升麻 3g, 鱼脑石 15g (研末冲)。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒, 辛散开窍。主治鼻咽癌头痛鼻塞。

(2) 黄药仙鹤汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕黄药子 9g, 桔梗 9g, 蔓荆子 9g, 红藤 15g, 仙鹤草 15g, 鲜马棘根皮 9g, 苍耳子 9g, 紫花地丁 12g。水煎服。一粒珠 1 粒 (另吞)。

〔功能主治〕解毒散结, 活血止血。主治鼻咽癌头痛鼻衄。

8. 鼻咽癌出血方

(1) 枯矾止血方 (《癌的扶正培本治疗》)

〔组成与用法〕五倍子粉、冰片粉、田三七粉、枯矾粉各等份。共为细末, 以凡士林纱条黏药粉, 塞入出血鼻孔内。

〔功能主治〕化瘀解毒, 收敛止血。主治鼻咽癌出血。

(2) 凉血止血汤 (江苏中医杂志, 1986, 5)

〔组成与用法〕生石膏 50g, 制大黄 5g, 蝉衣 4g, 生地 30g, 玄参 30g, 淡黄芩 10g, 丹皮 10g, 金银花 10g, 川芎 5g, 白芷 5g, 人中黄 10g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒, 凉血止血。主治鼻咽癌放疗后大出血。

【专病成药】

1. 鼻咽清毒冲剂 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕野菊花、茅莓、两面针、重楼、龙胆草、党参、苍耳子等。

〔功能主治〕清热解毒, 消炎止痛。可用于鼻咽癌。

〔用法用量〕口服, 1 次 1 袋, 1 次 2 日。

2. 西黄丸 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕牛黄、麝香、乳香、没药、黄米饭。

〔功能主治〕清热解毒, 活血消肿。主治鼻咽癌放疗后骨

转移。

〔用法用量〕 每次 3g，每日 2 次。

3. 鼻咽灵片（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 山豆根、麦冬、半枝莲、石上柏、白花蛇舌草、天花粉等。

〔功能主治〕 清热解毒，消肿散结，养阴益气。可用于鼻咽癌放疗、化疗的辅助治疗。

〔用法用量〕 1 次 5 片，1 日 3 次。

4. 平消胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》（2004））

〔处方组成〕 郁金、马钱子粉、仙鹤草、五灵脂、白矾、硝石、干漆、枳壳等。

〔功能主治〕 活血化瘀，止痛散结，清热解毒，扶正祛邪。主治鼻咽癌。

〔用法用量〕 每次 4~8 片，1 日 3 次。

5. 梅花点舌丹（《中华人民共和国药典》2000 年版）

〔处方组成〕 乳香、没药、硼砂、熊胆、冰片、雄黄、葶苈子、血竭、沉香、珍珠、牛黄、麝香、朱砂、制蟾蜍、白梅花、生石决明等。

〔功能主治〕 清热解毒，消肿散结。适用于鼻咽癌。

〔用法用量〕 含化，每次 3 丸，舌下含化，徐徐咽之。

6. 安康欣胶囊（《中华人民共和国国药标准》）

〔处方组成〕 半枝莲、山豆根、夏枯草、鱼腥草、石上柏、枸杞子、穿破石、人参、黄芪、鸡血藤、灵芝、黄精等。

〔功能主治〕 活血化瘀，软坚散结，清热解毒，扶正固本。主治鼻咽癌。

〔用法用量〕 每次 4~6 粒，1 日 3 次。

7. 安替可胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》（2004））

〔处方组成〕 蟾皮等中药提取物。

〔功能主治〕 软坚散结，解毒定痛，养血活血。主治鼻

咽癌。

〔用法用量〕 1次2粒，1日3次。

8. 复方皂矾丸（《国家基本医疗保险药品目录》（2004））

〔处方组成〕 皂矾、西洋参、海马、肉桂、大枣（去核）、核桃仁。

〔功能主治〕 温肾健髓，益气养阴，生血止血。主治鼻咽癌放疗和化疗引起的骨髓损伤、白细胞减少属肾阳不足、气血两虚证者。

〔用法用量〕 0.2g/丸，口服，1次7~9丸，1日3次，饭后即服。

9. 艾迪注射液（胶囊）（《国家基本医疗保险药品目录》（2004））

〔处方组成〕 人参、黄芪、刺五加、斑蝥。

〔功能主治〕 清热解毒、消瘀散结。配合放疗治疗鼻咽癌。

〔用法用量〕 口服，1日2次，每日3粒。静滴，每次50~100ml，加入0.9%氯化钠注射液或5%~10%葡萄糖注射液400~500ml中静脉滴注，1日1次；与放、化疗合用时，疗程与放、化疗同步。

10. 肿节风注射液（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 肿节风提取液。

〔功能主治〕 清热解毒，消肿散结。配合放疗治疗鼻咽癌。

〔用法用量〕 肌肉注射：每次4ml，每日2次；静脉滴注：每次10~16ml，每日1次。

11. 康莱特注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 注射用薏苡仁油。

〔功能主治〕 益气养阴，消癥散结。主治鼻咽癌。

〔用法用量〕 缓慢滴注200ml，每日1次，20天为1个疗程，间隔3~5天可进行下1疗程。

【专病单方】

1. 半枝莲 用法：每取50g，配独角莲50g，水煎，每日

1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒。主治：鼻咽癌毒甚者。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 石竹根 用法：每取 30~60g，水煎，每日 1 剂，分两次服。功用：清热解毒、消肿止痛。主治：鼻咽癌各期。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 天龙粉 用法：炙天龙末，口服，每次 5g，每日 2 次。功用：清热解毒、活血消肿。主治：鼻咽癌各期。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 石见穿 用法：每取 30g，水煎 2 小时，日 3 次分服。功用：破癥散结，消肿止痛。主治：鼻咽癌各期。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 辛夷 用法：每取 15g，配苍耳子 7.5g，薄荷叶 1.5g，香白芷 30g。上药共研末，每次服 6g，食后清茶送下。功用：疏风清热。主治：鼻咽癌风热型。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 鲜石黄皮 用法：每取 120g，配十大功劳 60g，夏枯草 45g，甘草 9g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒散结。主治：鼻咽癌有颈部淋巴结转移者。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 牛黄 用法：每取 0.3g，配夏枯草 30g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒散结。主治：鼻咽癌热毒型。（《中华肿瘤治疗大成》）

8. 鲜蒲公英 用法：每取 30g，配侧柏叶 30g，生地 30g。捣烂与蜜调匀，外敷颈部肿块。功用：清热解毒。主治：鼻咽癌颈部淋巴结转移者。（《中华肿瘤治疗大成》）

9. 鱼脑石 用法：每取 9g，配金银花 9g，黄柏 6g，硼砂 6g，冰片 0.6g。共研末，用香油、凡士林调成软膏。用棉球蘸药膏塞鼻孔内；或将药粉吹鼻孔内，每日 3 次。功用：解毒化浊。主治：鼻咽癌分泌物较多，有腐败气味者。（《中华肿瘤治疗大成》）

舌 癌

舌癌是指发生于舌前 2/3 游动部的恶性肿瘤。舌癌的发病与牙的残根或残冠、锐利的牙尖等长期刺激、口腔卫生不良、长期过度嗜烟酒以及营养和代谢障碍等因素有关。此外，遗传、机体易感性、放射线、舌黏膜长期溃疡、白斑与外伤，可致上皮增生，也与舌癌的发生有关。

本病相属于中医舌疳、舌菌等范畴，中医认为舌本属心，心脉系于舌根，舌边属脾，脾脉络于舌旁。故本病的病因病机为情志不遂，心绪烦扰则生火，致心火炽盛。思虑过度则伤脾，脾气郁结，日久化火。心脾郁火循经上行于舌，灼津成痰，阻塞经络，痰瘀互结而成本病。

【辨证用方】

舌癌的辨证，当辨明虚实，分清标本缓急。以舌体胖大，肿物溃烂味臭，舌质红，苔黄，脉弦数或滑数者，属实；舌癌肿块增大，面色苍白，眩晕，少气懒言，舌红绛，少苔，脉细数或舌质淡，苔白，脉沉细无力者，属虚。局部癌肿表现为标，全身气血变化为本，临证宜分别标本缓急以施治。

1. 心脾郁火证

主症：舌体变厚，或为硬结，如菌如豆，或有糜烂，流涎臭秽，疼痛难忍，口渴喜饮，尿黄量少，舌淡苔黄，脉数。

治法：清心泻脾，解毒化郁。主治舌癌。

(1) 导赤散合泻黄散加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕生地 20g，竹叶 10g，生石膏（先煎）15g，藿香叶 15g，栀子 10g，黄连 6g，山豆根 15g，蒲公英 30g，蚤休 30g，夏枯草 20g，生牡蛎（先煎）30g，甘草梢 6g。水煎服。

〔功能主治〕清心泻脾，解毒养阴。主治舌癌。

[加减应用] 热毒炽盛，溃破而成翻花状者，加半枝莲，马勃；便秘、烦躁、失眠者，加莲子心、酸枣仁、大黄；肿处灼热疼痛者，加金银花、白花蛇舌草。

(2) 莲心豆根汤（《临床中医肿瘤学》）

[组成与用法] 莲子心 2g，山豆根 12g，夏枯草 15g，大生地 15g，金银花 12g，淡竹叶 10g，川黄连 6g，黄芩 10g，茯苓 20g，车前草 15g，赤芍 10g，白花蛇舌草 30g，甘草 3g。水煎服。

[功能主治] 泻心清火，化瘀解毒。主治舌癌。

[加减应用] 失眠者，加酸枣仁；汗多者，加煅牡蛎、五味子。

2. 热毒蕴结证

主症：舌痛胖大，肿物溃烂味臭，进食困难，口干苦，便秘溲黄，舌质红，苔黄厚，脉数。

治法：清热解毒，消肿散结。

(1) 加减仙方活命饮（黎月恒经验方）

[组成与用法] 金银花 30g，天花粉 15g，白芷 10g，赤芍 10g，制乳香 5g，制没药 5g，皂角刺 10g，当归尾 10g，陈皮 10g，蚤休 30g，半枝莲 30g，炮山甲（打碎先煎）10g，山慈菇 30g，石见穿 30g，甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒，消肿溃坚，活血止痛。主治舌癌。

[加减应用] 热毒蕴结、气滞血瘀、疼痛难忍者，加全蝎、露蜂房；颈项结块者，去甘草加昆布、夏枯草、海藻；大便结者，加生大黄，玄参。

(2) 银花豆根汤《临床中医肿瘤学》

[组成与用法] 金银花 12g，山豆根 10g，射干 10g，胖大海 10g，桔梗 6g，生牡蛎 30g，浙贝母 15g，夏枯草 12g，茅根 12g，玄参 15g，生地 15g，淡竹叶 10g，川黄连 6g，白花蛇舌草 30g，甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 清热泻火，解毒散结。主治舌癌。

〔加减应用〕 热毒阴虚、口干舌红、光剥无苔者，加沙参、麦冬、鲜芦根。

(3) 清胃解毒汤（《中西医肿瘤诊疗大全》）

〔组成与用法〕 生石膏 30g，生地 15g，水牛角粉 3g（冲服），黄连 9g，黄芩 9g，知母 9g，栀子 12g，桔梗 12g，赤芍 12g，玄参 12g，土茯苓 30g，僵蚕 12g，石见穿 15g，白花蛇舌草 15g。水煎服。

〔功能主治〕 泻火解毒。主治舌癌。

3. 气血虚衰证

主症：舌体肿块大如泛莲，舌本短缩，不能舒展，妨碍饮食言语，或溃疡明显，口秽恶臭，局部触之易出血，甚者透穿舌腮，项颌肿块坚硬疼痛，面色苍白，眩晕，少气懒言，肌瘦无力，舌质暗淡，苔白腻，脉细弱。

治法：补气养血，解毒散结。

(1) 加味八珍汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 党参 15g，茯苓 15g，白术 10g，生地黄 20g，当归 15g，黄芪 30g，蒲公英 30g，仙鹤草 30g，山豆根 10g，紫河车 15g，蚤休 15g，青黛（包）12g，淡竹叶 10g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 益气补血，解毒清热。主治舌癌。

〔加减应用〕 局部溃疡出血者，加紫珠草、白茅根；疼痛甚者，加三七末（冲服）；痰多黄稠者，加海浮石、竹茹。

(2) 加减归脾汤（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 人参 15g，黄芪 20g，白术 15g，茯苓 15g，远志 9g，当归 15g，生地黄 15g，夜交藤 15g，酸枣仁 20g，赤芍 30g，白芍 30g，石菖蒲 10g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 益气补血。主治舌癌。

〔加减应用〕 口干舌燥、心烦失眠者，加麦冬、百合。

4. 肾火燔灼证

主症：舌体溃烂无皮，疼痛不已，舌红不鲜，午后潮热，朝轻暮重，腰酸腿软，头晕耳鸣，舌质红绛少苔，脉细而数。

治法：滋阴降火，解毒消肿。

(1) 知柏地黄汤合玉女煎加减方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕知母 15g，黄柏 10g，熟地黄 20g，山药 20g，生石膏（先煎）20g，麦门冬 15g，沙参 15g，女贞子 15g，旱莲草 15g，枸杞子 15g，白花蛇舌草 30g，蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕滋阴降火。主治舌癌。

〔加减应用〕乏力、膝软者，加黄芪、牛膝、补骨脂；舌体糜烂者，加竹叶、蒲公英、连翘。

(2) 地黄解毒汤（《中西医肿瘤诊疗大全》）

〔组成与用法〕知母 9g，黄柏 9g，熟地 24g，山萸肉 24g，泽泻 9g，茯苓 9g，竹叶 15g，山豆根 10g，龙葵 12g，青黛（包）15g，半枝莲 15g，石斛 15g，玄参 20g。水煎服。

〔功能主治〕滋阴降火，解毒散结。主治舌癌。

【辨病用方】

舌癌的辨病治疗，当注重虚、火、毒三个方面。根据肿瘤病期早晚、病人体质强弱，选用或合用清热解毒、益气养血等治疗方药。

1. 舌癌早期体质实者用方

(1) 龙蛇点舌汤（《段凤舞肿瘤积验方》）

〔组成与用法〕白花蛇舌草 30g，龙葵 15g，生牡蛎 12g，野菊花 9g，蒲公英 9g，海藻 9g，象贝 9g，车前子 9g，生大黄 9g。水煎服。

〔功能主治〕清心泻火，解毒散结。主治舌癌。

〔加减应用〕热毒甚者，加半边莲、蚤休、马勃。

(2) 蛇草二陈汤（山西中医，1989，1）

〔组成与用法〕白花蛇舌草 30g，夏枯草 24g，连翘 24g，茯苓 15g，赤芍 15g，苍术 9g，陈皮 9g，半夏 9g，莪术 9g，香附 9g，柴胡 6g，焦山楂 12g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，化痰软坚。主治舌鳞状上皮细胞癌。

〔加减应用〕同时以冰硼散外敷。痰火壅盛者，加牛蒡子、栀子、贝母、桔梗。

(3) 龙葵豆根汤（《段凤舞肿瘤积验方》）

〔组成与用法〕龙葵 30g，山豆根 20g，山慈菇 20g，白花蛇舌草 20g，土贝母 20g，半枝莲 20g，蚤休 10g，木芙蓉 10g，薜荔果 10g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒散结。主治舌癌。

〔加减应用〕舌缘赤烂者，加生地、金银花、蒲公英、龙胆草、白茅根。

(4) 二陈二乌汤（《现代中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕元参 15g，生牡蛎 15g，法半夏 12g，贝母 9g，茯苓 9g，陈皮 9g，制川乌 4.5g，制草乌 4.5g。水煎服。

〔功能主治〕行气软坚，祛痰软坚。主治舌癌。

〔加减应用〕痰热互结者，加胆南星、天葵子、夏枯草。

(5) 枳金汤（四川中医，1989，6）

〔组成与用法〕枳实 9g，郁金 9g，延胡索 9g，丹皮 9g，鸡内金 4g，红花 4g，蚤休 12g，金银花 12g，党参 12g，土茯苓 24g，白术 10g。水煎服。

〔功能主治〕理气解郁，活血化瘀。主治舌癌。

〔加减应用〕肿块硬结者，加黄药子、莪术、三棱、露蜂房；血瘀气滞者，加郁金。

2. 舌癌中晚期体质偏虚用方

(1) 加味黄连解毒汤（陕西中医，2002，12）

〔组成与用法〕黄芩 12g，黄连 12g，山豆根 15g，山慈菇

15g, 生地 20g, 竹叶 10g, 白花蛇舌草 30g, 守宫 5 条, 冰片 5g, 甘草 9g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 化瘀止痛。主治舌癌。

[加减应用] 舌体溃烂、痰多者, 加浙贝; 瓜蒌皮、天花粉; 体虚纳少者, 加黄芪、党参; 肝肾阴虚者, 加女贞子、旱莲草; 气滞血瘀者, 加三七、丹参、赤芍; 瘀毒化热明显者, 加蒲公英、蜈蚣、栀子、水牛角 (先煎)。

[临床报道] 治疗舌癌 30 例, 生存期 3 年以上 20 例, 5 年以上 5 例, 总有效率为 83.3%。

(2) 豆根河车汤 (《中医肿瘤学》)

[组成与用法] 山豆根 15g, 草河车 30g, 夏枯草 15g, 土贝母 15g, 蒲公英 20g, 儿茶 9g, 苦参 10g, 川连粉 (冲服) 3g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 龙葵 30g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒泻火。主治舌癌中期。

[加减应用] 体虚纳少者, 加黄芪、炒白术、茯苓。

(3) 生地竹叶汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 生地 20g, 竹叶 10g, 甘草 10g, 黄连 6g, 丹皮 20g, 山豆根 10g, 草河车 20g, 丹参 30g, 栀子 10g, 蒲公英 20g, 郁金 10g, 藤梨根 30g。水煎服。

[功能主治] 滋阴清热, 解毒化瘀。主治舌癌。

[加减应用] 五心烦热者, 加麦冬、地骨皮; 便秘者, 加大黄, 用蜂蜜调服。

(4) 加味泻黄汤 (北京中医杂志, 1989, 4)

[组成与用法] 藿香叶 20g, 炒山栀 10g, 黄连 10g, 炙露蜂房 10g, 生石膏 30g, 防风 10g, 甘草梢 12g, 滑石 12g, 怀山药 15g, 白花蛇舌草 60g, 肉桂 (泡服) 2g, 细辛 3g。水煎服。

[功能主治] 清心泻脾, 解毒化瘀。主治舌癌。

[加减应用] 口干唇燥者, 加石斛、芦根、天花粉。烦躁

易怒口苦臭者，加玄参、地丁、龙胆草；胃灼痛，舌龈肿烂红赤者，加蒲公英、连翘。热盛阴虚，口干舌红、光剥无苔者，加生地、玄参；颈部结块者，加昆布、牡蛎、海藻。同时局部予以吹喉散（牛黄、硼砂、冰片、黄连各等份，共研细末）。

（5）舌疳灵汤（河北医学院第二医院方）

〔组成与用法〕 黄芪 30g，党参 15g，丹参 15g，半枝莲 15g，连翘 12g，蒲公英 12g，山慈菇 10g，山甲珠（先煎）10g，藕节 10g，金银花 10g，鸡内金 10g，菟丝子 10g，枸杞子 10g，当归 9g，川芎 9g，三七 6g，砂仁 6g，黄连 6g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 补气养血。主治舌癌。

〔加减应用〕 食欲不振者，加炒谷芽、炒麦芽；心烦失眠者，加茯神、柏子仁、远志。（山西中医，1989，1）

（6）慈菇甲珠汤（河北中医，1986，1）

〔组成与用法〕 山慈菇 10g，山甲珠（先煎）10g，黄芪 30g，当归 15g，党参 15g，川芎 12g，丹参 20g，半枝莲 15g，三七 6g，藕节 10g，陈皮 15g，金银花 15g，连翘 12g，蒲公英 12g，黄连 10g，砂仁 6g，鸡内金 10g，菟丝子 10g，枸杞 10g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 益气活血，解毒散结。主治舌癌。

（7）白茯苓汤（《现代中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 白茯苓（去黑皮）9g，牛黄（研）9g，甘草（炙）6g，人参 6g，羚羊角屑（先煎）6g，白术 6g，桂枝 6g，熟干地黄（焙）6g。水煎服。

〔功能主治〕 清心泻火，解毒消肿。主治舌癌。

〔加减应用〕 津伤痰凝者，加海蛤壳、马兜铃。

（8）四君解毒汤（《中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 党参 15g，沙参 30g，茯苓 10g，白术 10g，当归 15g，黄芪 30g，生地 20g，仙鹤草 30g，知母 10g，竹叶

10g, 山豆根 15g, 蚤休 15g, 青黛 (包) 12g。水煎服。

【功能主治】健脾养血, 清热解毒。主治舌癌晚期。

【对症用方】

舌癌的对症用方, 除根据患者主要症状 (舌体溃烂疼痛) 进行选择外, 当区分是否手术或放疗、化疗等治疗。术后治疗以健脾补益气血为主, 放疗病人以养阴清热解毒为主, 化疗病人以健脾和胃、益肾养血为主。

1. 舌癌手术后专方

黄芪茯苓汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】黄芪 20g, 茯苓 12g, 玉竹 10g, 石斛 10g, 生地 10g, 白术 10g, 当归 10g, 枸杞子 10g, 黄精 10g, 麦冬 15g, 陈皮 10g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

【功能主治】健脾补益气血。主治舌癌。

【加减应用】动则汗出、气短乏力者, 加防风、浮小麦、煅牡蛎 (先煎)、五味子; 口干烦躁, 舌质红绛、光而无苔者, 加丹皮、芦根; 食欲不佳者, 加神曲、炒谷芽。

2. 舌癌放疗后专方

(1) 二竹参麦汤 (黎月恒经验方)

【组成与用法】参须 (蒸兑) 10g, 沙参 15g, 麦冬 15g, 玉竹 15g, 天花粉 15g, 菊花 15g, 金银花 12g, 连翘 12g, 竹叶 10g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 10g。水煎服。

【功能主治】益气养阴, 清热解毒。主治舌癌。

【加减应用】若呕吐恶心者, 加竹茹、陈皮; 小便短少疼痛者, 加生地; 体虚乏力者, 加黄芪。

(2) 白茅芦根汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】白茅根 30g, 芦根 30g, 天花粉 15g, 麦冬 15g, 玄参 15g, 生地 15g, 菊花 10g, 沙参 15g, 石斛 15g, 女贞子 15g, 竹叶 10g, 薄荷 5g, 白花蛇舌草 30g。水煎服。

【功能主治】养阴清热解毒。主治舌癌。

〔加减应用〕胸闷不畅、恶心，苔厚腻者，加藿香、法夏、薏苡仁；气虚乏力，大便溏薄者，加黄芪、党参、白术、茯苓；咽喉红肿疼痛者，加山豆根、板蓝根。

(3) 养阴清肺汤（吉林中医药，1998，3）

〔组成与用法〕生地 15g，玄参 12g，天冬 15g，沙参 12g，石斛 12g，金银花 15g，连翘 15g，茯苓 10g，生甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕滋阴生津。主治舌癌。

〔加减应用〕咽喉肿痛伴溃疡者，加板蓝根、山豆根，外敷珠黄散；伴恶心呕吐，苔白滑或白腻者，去生地、玄参、甘草，加藿香、佩兰、薏苡仁、陈皮；咳嗽痰血者，加仙鹤草、旱莲草。

3. 舌癌化疗后专方

(1) 旋覆二香汤（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕白参（蒸兑）10g，白术 10g，茯苓 10g，陈皮 10g，法半夏 10g，广木香 10g，砂仁 5g，旋覆花（布包）10g，代赭石（先煎）15g，藿香 10g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕健脾和胃止呕。主治舌癌化疗后呕吐。

〔加减应用〕舌红口干，加麦冬、石斛；腹胀甚，加沉香末（冲服）、香附；腹痛，加延胡索、白芍；大便稀溏，加炒麦芽、吴茱萸、炒谷芽；困倦嗜睡，加佩兰、薏苡仁。

(2) 红参车前汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕红参（蒸兑）15g，车前子（布包）15g，黄精 30g，肉桂（泡服）2g，山萸肉 30g，生地 20g，丹参 20g，丹皮 10g，怀山药（另蒸）100g。水煎服。

〔功能主治〕滋阴降火，引火归元。主治舌癌化疗后虚火上炎，舌痛齿摇。

〔加减应用〕脾运失常，大便溏稀者，加炒白术、薏苡仁、葛根。

(3) 黄连生地汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 黄连 6g, 生地 15g, 淡竹叶 12g, 栀子 12g, 玄参 15g, 牛膝 12g, 大黄 (后下) 6g, 生甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 清心泻火。主治舌癌化疗后舌红肿疼痛。

[加减应用] 湿热便溏者, 加广木香、黄连、吴茱萸。

4. 舌体溃烂疼痛方

(1) 硃砂散 (《中西医肿瘤诊疗大全》)

[组成与用法] 硃砂 13g, 轻粉 1g, 雄黄 1g, 冰片 0.15g。共研细末, 水调, 外敷患处。

[功能主治] 解毒祛腐。主治舌癌溃烂腐物多者。

(2) 锡类散 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 西瓜霜 6g, 生硼砂 6g, 硃砂 6g, 生寒水石 6g, 珍珠 9g, 青黛 18g, 冰片 1.5g, 牛黄 2.4g。共研细末, 撒患处。

[功能主治] 祛腐止痛。主治舌癌溃烂疼痛。

(3) 生津止痛饮 (李佩文经验方)

[组成与用法] 沙参 20g, 麦冬 15g, 菊花 10g, 射干 10g, 山豆根 10g, 金银花 10g, 地丁 10g, 蒲公英 10g, 延胡索 10g, 金铃子 10g, 猫爪草 10g。水煎, 早餐后 2 小时服, 勿空腹。腹泻慎用。

[功能主治] 清热生津, 解毒止痛。主治舌癌口咽部疼痛。

[加减应用] 腹泻, 加薏苡仁、石榴皮; 血象低者, 加党参、黄精、枸杞, 少用黄芪; 放疗所致口干, 咽痛, 可用胖大海、菊花、芦根、麦冬各等份泡水漱口, 不宜过多下咽。(中国中西医结合杂志, 2003, 8)

(4) 漱口方 (《中医肿瘤学》)

[组成与用法] 苦参 30g, 五倍子 30g, 山豆根 30g, 龙葵 30g, 草河车 30g, 白茅根 30g, 仙鹤草 30g, 冰片少许。煎汤

代水漱口，每日数次。

〔功能主治〕清热利湿，凉血解毒。主治舌癌口痛。

【专病成药】

1. 梅花点舌丹（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕乳香、没药、硼砂、熊胆、冰片、雄黄、葶苈子、血竭、沉香、珍珠、牛黄、麝香、朱砂、制蟾蜍、白梅花、生石决明等。

〔功能主治〕清热解毒，消肿散结。主治舌癌。

〔用法用量〕含化，每次3丸，舌下含化，徐徐咽之。

2. 博尔宁胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕黄芪、女贞子、山慈菇、马齿苋、重楼、龙葵、紫苏子、鸡内金、大黄、冰片、僵蚕。

〔功能主治〕扶正祛邪，益气活血，软坚散结，消肿止痛。用于舌癌辅助治疗。

〔用法用量〕1日2粒，1日3次。

3. 贞芪扶正胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》（2004））

〔处方组成〕黄芪、女贞子等。

〔功能主治〕补气养阴。配合放射治疗气阴不足型舌癌。

〔用法用量〕口服，1次6粒，1日2次。

【专病单方】

1. 一枝黄花 用法：每取15g，加水500ml，煮沸，每日漱口。功用：清热解毒。主治：舌癌各期。（《段凤舞肿瘤积验方》）

2. 半夏 用法：每取10g，配黄连10g，刀豆子60g，赤小豆60g。水煎服。功用：清热解毒化痰。主治：舌癌热火毒偏盛者。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 黄柏末 用法：适量，时时点之。功用：清热解毒。主治：舌癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 山豆根 用法：每取10g，配冰片1g。共研细末，外

敷患处。功用：清热解毒，化瘀止痛。主治：舌癌各期。（《段凤舞肿瘤积验方》）

5. 黄柏 用法：每取 30g，配青黛 9g，肉桂 3g，冰片 1g。共研细末，每取少许，敷患处。功用：清热解毒抗癌。主治：舌体癌。（《段凤舞肿瘤积验方》）

6. 地鳖虫 用法：每取 10g，配生薄荷 10g。共研汁，点舌。功用：化瘀解毒。主治：舌癌各期。（《中华肿瘤治疗大成》）

恶性涎腺肿瘤

恶性涎腺肿瘤又称为唾液腺恶性肿瘤，是指起源于唾液腺体或间质、血管和淋巴网状组织的恶性肿瘤。其发病与放射线及遗传等因素有关，另有报道维生素 A 缺乏可能是一个重要因素，也有少数文献报道本病的发生与暴露在烟雾、灰尘中和接触化学品的职业有关。

本病相当于中医失荣、上石疽、颜面翻花疮等范畴。中医认为本病的主要病因病机为忧思恚怒，气机郁结，以致气血凝滞经络而成。

【辨证用方】

涎腺恶性肿瘤的辨证，当辨明虚实，以局部肿痛、舌红苔腻等为主症者，多为热证、实证；以肿块溃破，伴乏力、食少神倦者为主症者，多为虚证。证属实者，治以清热解毒、化痰软坚散结为主；证属虚者，治以补气养血、祛瘀散结为主。

1. 肝郁络阻证

主症：初期局部微肿，皮色不变，不热不痛，胁肋疼痛，神疲食少，舌淡红，苔白腻，脉弦缓。

治法：舒肝解郁，通络散坚。

舒肝溃坚汤加味（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕柴胡 10g，夏枯草 20g，僵蚕（炒）10g，

香附 10g, 石决明(煅) 20g, 当归 10g, 白芍(醋炒) 15g, 陈皮 10g, 川芎 9g, 穿山甲(炒) 15g, 红花 10g, 片姜黄 5g, 生甘草 10g, 灯心草 5g, 石上柏 15g, 半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕舒肝解郁, 通络散结。主治恶性涎腺肿瘤。

〔加减应用〕失眠、心烦者, 加远志、酸枣仁、柏子仁; 纳呆脘痞者, 加山药、鸡内金、薏苡仁。

2. 肝胆湿热证

主症: 局部肿块胀痛, 烦躁易怒, 口干口苦, 便秘尿赤, 舌质红, 苔黄腻, 脉弦滑。

治法: 清肝泻火, 消肿散结。

加减龙胆泻肝汤(《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕龙胆草 6g, 黄芩 10g, 栀子 9g, 泽泻 10g, 车前子(布包) 10g, 当归 10g, 生地 10g, 柴胡 6g, 白花蛇舌草 30g, 夏枯草 30g, 大黄 5g。水煎服。

〔功能主治〕清利湿热。主治恶性涎腺肿瘤。

〔加减应用〕肿块坚硬、舌质暗或有瘀斑者, 加三棱、莪术、土鳖虫; 食欲不振者, 加薏苡仁、砂仁、藿香。

3. 痰湿内蕴证

主症: 肿块坚硬, 不红不痛, 口中痰涎较多, 胸闷脘痞, 身重体倦, 头痛头重, 舌淡红, 苔黄腻, 脉弦滑。

治法: 行气化痰, 软坚散结。

莪术消核饮(潘敏求经验方)

〔组成与用法〕莪术 10g, 石见穿 30g, 生牡蛎(先煎) 30g, 瓜蒌仁 10g, 玄参 10g, 夏枯草 15g, 露蜂房 12g, 法夏 10g, 桃仁 12g, 蚤休 30g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕化痰散结。主治恶性涎腺肿瘤。

〔加减应用〕便溏者, 去桃仁、瓜蒌, 加吴茱萸、黄连、鸡内金; 痰热、舌苔黄腻者, 加胆南星、杏仁、连翘。

4. 热毒蕴结证

主症：局部肿块红肿，质硬，表面凹凸不平，触之灼痛，头面漫肿，唇红伴头痛，身热耳灼，口渴喜饮，舌红绛，苔黄燥，脉滑数。

治法：清热解毒，消肿散结。

清瘟败毒饮加味（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕生石膏（先煎）30g，水牛角（先煎）30g，生地 10g，黄连 3g，栀子 10g，桔梗 10g，黄芩 10g，知母 10g，赤芍 15g，玄参 15g，连翘 10g，丹皮 10g，竹叶 10g，甘草 3g，白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，凉血泻火。主治恶性涎腺肿瘤。

〔加减应用〕火毒极盛、头面烘热者，加山豆根、青黛；便秘溲赤者，加大黄（后下）、芒硝（冲）、泽泻。

5. 正虚邪盛证

主症：肿块破烂流血水，表面紫暗，疲乏无力，心烦失眠，食少神倦，舌红苔少津干，脉细涩。

治法：补气养血，祛瘀散结。

（1）加减归脾汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕人参 10g，白术 10g，黄芪 30g，当归 10g，茯苓 12g，远志 6g，酸枣仁 10g，木香 10g，龙眼肉 10g，三棱 10g，蚤休 20g，土茯苓 20g，金银花 30g，连翘 15g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕益气养血，健脾养心。主治恶性涎腺肿瘤。

〔加减应用〕口干舌燥、舌红苔少津者，加沙参、麦冬、天花粉；纳少神疲者，加山楂、神曲、鸡内金。

（2）内托千金散（《段凤舞肿瘤积验方》）

〔组成与用法〕白芍 10g，黄芪 10g，川芎 10g，当归 10g，防风 10g，桔梗 10g，天花粉 10g，金银花 10g，人参 10g，肉桂 5g，白芷 5g，甘草 5g。水煎服。

【功能主治】益气养血，托里解毒。主治恶性涎腺肿瘤。

【加减应用】痛甚者，加乳香、没药；虚甚者，配阳和汤、十全大补汤。

【辨病用方】

恶性涎腺肿瘤的辨病治疗，当注重虚、毒、瘀三个方面。并根据患者病期早晚、体质强弱，选用补气养血、祛瘀散结、清热解毒等方药。

1. 恶性涎腺肿瘤早期体质较实用方

(1) 舒郁散结汤（新中医，1976，2）

【组成与用法】柴胡 4.5g，白芍 9g，当归 9g，玄参 9g，山慈菇 9g，漂昆布 9g，海藻 9g，炮穿山甲 9g，皂角刺 9g，僵蚕 9g，川芎 2.4g，白芷 4.5g，桔梗 6g，黄药子 6g，牡蛎 30g，夏枯草 12g。水煎服。

【功能主治】舒肝解郁，软坚散结。主治恶性涎腺肿瘤。

【加减应用】肿块疼痛较甚者，加露蜂房、全蝎。

(2) 解毒散结汤（江苏中医杂志，1985，5）

【组成与用法】柴胡 10g，赤芍 10g，象贝 10g，制僵蚕 10g，陈皮 10g，花粉 10g，当归 15g，金银花 15g，白头翁 15g，蒲公英 30g，猫爪草 30g，夏枯草 30g，甘草 10g。水煎服。

【功能主治】活血解毒，软坚散结。

【加减应用】纳差者，加炒山楂、神曲、鸡内金。

(3) 夏枯鳖甲汤（《段凤舞肿瘤积验方》）

【组成与用法】夏枯草 30g，丹参 15g，海藻 15g，王不留行 30g，生鳖甲 30g，石见穿 30g，牡蛎 30g，天花粉 24g，瓜蒌仁 15g，苦参 15g，昆布 12g，桃仁 12g，生地 12g，露蜂房 12g，干蟾皮 9g，天龙片（分3次吞服）15片。水煎服。

【功能主治】化痰散结，解毒化瘀。主治恶性涎腺肿瘤。

【加减应用】阴虚者，加沙参、天冬、生地、石斛。

(4) 夏枯丹参汤 (中医杂志, 1984, 3)

[组成与用法] 夏枯草 90g, 丹参 30g, 海藻 30g, 黄芩 12g, 白花蛇舌草 100g, 三棱 15g, 莪术 15g, 玄参 15g, 生蒲黄 10g, 甘草 10g, 钩藤 (后煎) 24g。每剂加水约 1200ml, 小火煎成约 500ml, 取汁, 再加蜂蜜 100ml 合煎, 分多次服用。

[功能主治] 软坚散结, 清热解毒。主治恶性涎腺肿瘤。

[加减应用] 同时口服六神丸。局部涎液较多者, 加瓜蒌、杏仁、生牡蛎 (先煎)。

2. 恶性涎腺肿瘤中晚期体质较虚用方

(1) 生地银翘汤 (刘炳凡经验方)

[组成与用法] 生地 20g, 赤芍 10g, 丹皮 10g, 紫草 10g, 金银花 10g, 连翘 10g, 麦冬 10g, 山豆根 10g, 川楝肉 10g, 夏枯草 10g, 玄参 15g, 马勃 5g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 清热凉血, 解毒散结。主治恶性涎腺肿瘤。

[加减应用] 配合外涂方: 信枣散: 鼠妇 1: 9, 共研细末, 外涂肿块上 (用药前先用苦参 15g, 甘草 5g, 米醋 100ml, 熬汁漱口)。 (《名老中医肿瘤验案辑按》)

(2) 海藻昆布汤 (浙江中医杂志, 1981, 2)

[组成与用法] 海藻 9g, 昆布 9g, 夏枯草 9g, 枸杞子 9g, 山慈菇 9g, 黄药子 9g, 海蛤壳 15g, 络石藤 15g, 忍冬藤 15g, 太子参 15g, 干地黄 15g, 制鳖甲 15g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴, 祛瘀解毒。主治恶性涎腺肿瘤。

[加减应用] 口干便秘, 加大黄、玄参。体虚, 创口久溃不愈, 加黄芪、当归。

【对症用方】

恶性涎腺肿瘤的对症用方, 除患者的主要症状进行辨证用方外, 还应区分是否手术或放疗等, 术后治疗以益气养血、健脾和胃为主, 放疗后以益气养阴、清热解毒为主。

1. 恶性涎腺肿瘤术后专方

芪麦六君汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 党参 25g，麦冬 15g，黄芪 25g，白术 10g，茯苓 12g，陈皮 10g，法半夏 10g，炒山楂 10g，麦芽 10g，炒谷芽 10g，当归 10g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气。主治恶性涎腺肿瘤。

〔加减应用〕 盗汗、自汗、气短者，加五味子、浮小麦、煅龙骨（先煎）、煅牡蛎（先煎）；面部麻木者，加僵蚕、全蝎；局部涎液较多，加瓜蒌、杏仁、生牡蛎（先煎）。

2. 恶性涎腺肿瘤放疗后专方

四参二冬汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 麦冬 12g，天冬 12g，沙参 10g，玄参 9g，生地 10g，白茅根 12g，玉竹 9g，金银花 9g，党参 12g，云茯苓 12g，白术 10g，丹参 12g，山慈菇 15g，白花蛇舌草 30g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，清热解毒。主治恶性涎腺肿瘤。

〔加减应用〕 口干舌燥明显者，加石斛、知母；头晕面胀，舌质暗，苔厚腻者，加藿香、佩兰、薏苡仁、苍术；呕吐恶心者，加竹茹、陈皮；体虚乏力者，加黄芪。

3. 恶性涎腺肿瘤化疗后专方

癌复康加减方（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 白参（蒸兑）10g，黄芪 30g，白术 10g，茯苓 10g，陈皮 10g，枸杞子 12g，女贞子 15g，旱莲草 15g，菟丝子 12g，鸡血藤 30g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 30g，甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾，补气养血。主治恶性涎腺肿瘤。

〔加减应用〕 若腰酸耳鸣，加仙灵脾、石菖蒲；恶心呕吐者，加姜半夏、砂仁；纳差，加鸡内金、山楂；腹泻者，加吴茱萸、黄连；失眠，加酸枣仁；潮热盗汗，加丹皮、山萸肉、

煅牡蛎、五味子。

4. 口腔疼痛方

生津止痛饮（李佩文经验方）

〔组成与用法〕沙参 20g，麦冬 15g，菊花 10g，射干 10g，山豆根 10g，金银花 10g，地丁 10g，蒲公英 10g，延胡索 10g，金铃子 10g，猫爪草 10g。水煎，早餐后 2 小时服，勿空腹。腹泻慎用。

〔功能主治〕清热生津，解毒止痛。主治恶性涎腺肿瘤口咽部疼痛。

〔加减应用〕腹泻，加薏苡仁、石榴皮；血象低者，加党参、黄精、枸杞，少量黄芪；放疗所致口干，咽痛，可用胖大海、菊花、芦根、麦冬各等份泡水漱口，不宜过多下咽。（中国中西医结合杂志，2003，8）

【专病成药】

1. 平消胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕郁金、马钱子粉、仙鹤草、五灵脂、白矾、硝石、干漆（制）、枳壳（麸炒）。

〔功能主治〕活血化瘀，止痛散结，清热解毒，扶正祛邪。对肿瘤具有一定的缓解症状、缩小瘤体、抑制肿瘤生长、提高人体免疫力、延长患者生命的作用。主治恶性涎腺肿瘤。

〔用法用量〕口服，1 次 4～8 粒，1 日 3 次，60 天 1 疗程。

2. 西黄丸（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕麝香、牛黄、炙乳香、炙没药。

〔功能主治〕清热解毒、和营消肿。用于痈疽疔毒，瘰疬，流注，癌肿等。

〔用法用量〕每次 3g，每天 2 次，温开水送服。

3. 博尔宁胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕黄芪、女贞子、山慈菇、马齿苋、重楼、龙葵、紫苏子、鸡内金、大黄、冰片、僵蚕。

〔功能主治〕扶正祛邪、益气活血、软坚散结、消肿止痛。用于恶性涎腺肿瘤的辅助治疗。

〔用法用量〕1次2粒，1日3次。

4. 华蟾素注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕中华大蟾蜍。

〔功能主治〕清热解毒，消肿止痛，活血化瘀，软坚散结。用于中、晚期恶性涎腺肿瘤。

〔用法用量〕静滴，每次10~20ml加入5%葡萄糖注射液500ml稀释后缓慢滴注，每日或隔日1次。每个疗程4周，用药1周后休息1~2日或按医嘱使用。

5. 复方苦参注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕苦参、白茯苓。

〔功能主治〕清热利湿，凉血解毒，散结止痛。主治恶性涎腺肿瘤的疼痛及出血。

〔用法用量〕①静脉滴注：以本品12~20ml加入200ml生理盐水中滴入，每日1次，或以本品8~10ml加入100ml生理盐水中滴入，每日2次。②瘤体内注入：视瘤体大小而定，一般每次2~4ml，每周2次。

6. 梅花点舌丹（《中华人民共和国药典》2000年版）

〔处方组成〕乳香、没药、硼砂、熊胆、冰片、雄黄、葶苈子、血竭、沉香、珍珠、牛黄、麝香、朱砂、制蟾蜍、白梅花、生石决明等。

〔功能主治〕清热解毒，消肿散结。用于恶性腮腺肿瘤。

〔用法用量〕含化，每次3丸，舌下含化，徐徐咽之。

【专病单方】

1. 蛇蛻 用法：每取50g，配全蝎50g，露蜂房50g，上药共研末，每服5g，日2次。功用：攻毒消肿散结。主治：涎腺肿瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 白头翁 用法：每取 120g，浸泡于 200ml 黄酒内 8 小时，然后加水 1000ml 煎服。每日 1 次，分 2 次服。功用：解毒抗癌。主治：腮腺混合瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 苦参 用法：每取 1.5g，配甘草 5g，米醋 100g。共熬汁，噙漱取涎。功用：清热解毒，燥湿敛疮。主治：涎腺肿瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

喉 癌

喉癌系指发生在会厌喉面以下的喉内部的恶性肿瘤。喉癌的发生与吸烟、有害粉尘的吸入、接触放射线、人乳头状病毒（HPV）及口腔卫生不良、喉角化症、喉部白斑等喉部慢性病变有关。

本病相当于中医喉瘤、喉菌、喉百叶等范畴。中医认为其病因为元气亏虚，过食炙煇，肺经受热，或郁怒伤肝，肝气郁结，气滞痰凝，瘀壅咽喉而成。

【辨证用方】

喉癌的辨证，重在辨别实、热与虚证，以声音嘶哑，咳嗽痰黄，大便秘结，小便短赤为主症者，多为实证、热证；以声音嘶哑、咽喉疼痛，口干不喜多饮，头晕眼花，腰膝酸软为主症者，多为虚证。实证、热证者治疗以降火化痰、清咽利喉为法，虚证治疗以滋阴降火、清利咽喉为法。

1. 痰火凝结证

主症：声音嘶哑，咳嗽黄痰，痰中带血，甚则咽喉出血，肿胀疼痛，吞咽不利，呼吸困难，恶寒发热，大便秘结，小便短赤，舌质红，苔黄，脉洪数。

治法：降火化痰，清咽利喉。

（1）加减清咽利膈汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕连翘 10g，栀子 10g，黄芩 10g，黄连 5g，

玄参 10g, 桔梗 10g, 贝母 10g, 瓜蒌 10g, 金银花 15g, 山豆根 10g, 大黄(后下) 6g, 蚤休 30g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 利咽化痰。主治喉癌。

[加减应用] 口干咽燥者, 加天花粉、生地; 恶心厌食者, 加白术、茯苓、山药。

(2) 龙马饮(《临床中医肿瘤学》)

[组成与用法] 马勃 10g, 龙葵 30g, 黄连 6g, 黄芩 10g, 牛蒡子 10g, 岗梅 10g, 山豆根 6g, 夏枯草 20g, 沙参 15g, 玄参 10g, 甘草 6g, 桔梗 10g。水煎服。

[功能主治] 泻火解毒, 清咽散结。主治喉癌。

[加减应用] 热甚者, 加生石膏、龙胆草; 头痛剧烈者, 加田七、五灵脂等; 痰多者, 加陈皮、瓜蒌仁、浙贝母。

(3) 利咽清金汤(《中医肿瘤学》)

[组成与用法] 山豆根 10g, 板蓝根 20g, 草河车 15g, 金果榄 6g, 桔梗 10g, 浙贝母 10g, 黄芩 10g, 薄荷 6g, 牛蒡子 15g, 紫苏 6g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 化痰散结。主治喉癌。

2. 肝郁血结证

主症: 喉有异物感, 咽下疼痛, 声音嘶哑, 咯痰带血, 口干咽燥而不多饮, 面色黯黑, 肌肤甲错, 舌暗红而有瘀斑, 苔薄白, 脉细数。

治法: 疏肝活血, 软坚散结。

牡蛎莪术汤(潘敏求经验方)

[组成与用法] 参须(蒸兑) 10g, 枳仁 10g, 麦冬 10g, 沙参 10g, 牛蒡子 10g, 玄参 10g, 桔梗 10g, 茯苓 10g, 白术 10g, 莪术 10g, 生牡蛎(先煎) 30g, 仙鹤草 30g, 丹皮 10g, 全蝎(研末装胶囊吞服) 3g, 蜈蚣 3 条, 白花蛇舌草 30g。水煎服。

[功能主治] 疏肝清热, 活血散结。主治喉癌。

[加减应用] 咽部梗阻感较甚，肿块坚硬者，加山慈菇、猫爪草、蚤休；肋胁疼痛者，加香附、郁金；纳差者，加山药、鸡内金。

3. 阴虚火毒证

主症：声嘶音哑，咽喉疼痛，吞咽不利，口干不喜多饮，头昏眼花，耳鸣耳聋，腰膝酸软，虚烦失眠。

治法：滋阴降火，清利咽喉。

加减知柏地黄汤（黎月恒经验方）

[组成与用法] 知母 10g，黄柏 10g，生地 15g，山药 15g，丹皮 10g，泽泻 10g，茯苓 15g，山茱萸 10g，玄参 10g，山豆根 10g，蒲公英 20g，牛蒡子 10g，半枝莲 20g，甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 滋阴降火。主治喉癌。

[加减应用] 潮热盗汗者，加银柴胡、煅龙骨（先煎）、煅牡蛎（先煎）；咽痛剧烈、火毒偏盛者，加夏枯草、连翘；咯血者，加白茅根、茜草炭、藕节炭；气短，口干，加麦冬、太子参、黄精。

4. 气阴亏虚证

主症：发声不扬，声音嘶哑，咽喉疼痛，气短喘促，语音低微，形体消瘦，多汗口干，舌淡红或嫩红，光薄少苔，脉细弱。

治法：益气养阴，润肺化痰。

加减百合生脉汤（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 西洋参（蒸兑） 10g，麦冬 15g，五味子 10g，沙参 15g，生地 20g，百合 20g，川贝母 6g，石斛 15g，黄精 15g，生黄芪 20g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 30g，甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴，润肺化痰。主治喉癌。

[加减应用] 咽喉干燥疼痛者，加玄参、山豆根；口干舌

绛明显者，加知母，重用沙参、麦冬；食欲不振者，加麦芽、谷芽、神曲；汗多气短者，加白术、防风；烦躁失眠者，加酸枣仁。

【辨病用方】

喉癌的辨病治疗，当根据肿瘤病期早晚、病人体质强弱，选用或合用滋阴降火，化痰软坚散结方法；并可配合局部用药治疗。

1. 喉癌早期体质较实者用方

(1) 龙葵蛇莓饮（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕龙葵 30g，蛇莓 15g，白英 30g，蚤休 15g，开金锁 15g，灯笼草 10g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒利咽。主治喉癌。

〔加减应用〕肿瘤溃烂，加蒲公英、半枝莲。热毒壅盛者，加蒲公英、夏枯草；热甚津伤者，加鱼腥草、石韦、山甲珠、玄参、麦冬。

(2) 蛇莓山豆根汤（《抗癌中药一千方》）

〔组成与用法〕半枝莲 30g，蛇莓 15g，山豆根 15g，丹参 20g，急性子 15g，僵蚕 10g，蜈蚣 2 条，射干 10g，夏枯草 15g，昆布 15g，威灵仙 12g，浙贝母 20g。水煎服。

〔功能主治〕化痰散瘀，清热解毒。主治喉癌。

〔加减应用〕津伤者，加沙参、天冬、麦冬、玉竹、百合、玄参；痰多者，加法半夏、茯苓、桔梗。

(3) 银翘四物饮（四川中医，1989，7）

〔组成与用法〕连翘 10g，金银花 10g，升麻 10g，金橘叶 7 片，夏枯草 12g，当归 10g，川芎 10g，赤芍 10g，田三七 10g，玄参 10g，熟地 12g，红花 3g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，活血散结。主治喉癌。

(4) 加减旋覆花汤（浙江中医杂志，1993，6）

〔组成与用法〕旋覆花 10g，柿蒂 10g，沉香粉 10g（冲

服), 厚朴 10g, 延胡索 10g, 陈皮 10g, 生姜 10g, 公丁香 6g, 党参 20g, 山药 20g, 甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 健脾理气, 降浊利咽。主治喉癌。

[加减应用] 痰多者, 加瓜蒌仁、浙贝、法半夏。

(5) 贝母枯草汤 (浙江中医杂志, 1990, 1)

[组成与用法] 金银花 10g, 浙贝母 6g, 桔梗 6g, 皂角刺 3g, 葫芦茶 15g, 夏枯草 15g, 连翘 6g, 当归 6g, 赤芍 6g, 胆南星 3g, 柴胡 3g, 甘草 3g。水煎服。

[功能主治] 活血行瘀, 化痰清热。主治喉癌。

2. 喉癌中晚期体质较虚者用方

(1) 二参汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 太子参 10g, 沙参 10g, 生地 10g, 丹皮 10g, 女贞子 15g, 白芍 10g, 冬虫夏草 3g, 川贝母 5g, 木蝴蝶 6g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 30g。水煎服。

[功能主治] 滋阴润肺, 解毒清热。主治喉癌。

[加减应用] 另含咽青果。舌黄无苔者, 加熟地、怀山药、金樱肉。

(2) 当归川芎汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 当归 10g, 川芎 10g, 赤芍 10g, 连翘 10g, 升麻 10g, 田三七 10g, 金银花 10g, 党参 10g, 熟地 12g, 夏枯草 12g, 蚤休 30g, 甘草 3g, 金橘叶 7 片。水煎服。

[功能主治] 补血活血, 清热解毒。主治喉癌。

[加减应用] 恶心呕吐者, 加法半夏、竹茹。

(3) 二冬射干汤 (《段凤舞肿瘤积验方》)

[组成与用法] 天门冬 10g, 麦冬 10g, 五味子 10g, 党参 10g, 山豆根 10g, 射干 10g, 天花粉 15g, 夏枯草 15g, 贝母 10g, 黄芪 15g, 枸杞子 15g, 女贞子 15g, 神曲 15g, 山楂 15g, 龙葵 15g, 蛇莓 15g, 白英 15g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴, 解毒散结。主治喉癌。

[加减应用] 热甚者，加黄连、天葵子、鱼腥草；体虚者，加菟丝子。

(4) 牛蒡解毒汤（《段凤舞肿瘤积验方》）

[组成与用法] 牛蒡子 10g，黄芩 10g，黄连 6g，桔梗 10g，连翘 10g，升麻 10g，防风 10g，生地 15g，玄参 15g，天花粉 15g，青皮 10g，葛根 10g，甘草 6g，白花蛇舌草 30g，栀子 9g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒，滋阴润喉。主治喉癌。

3. 喉癌局部用方

(1) 吹喉消肿散（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 西月石 4.5g，玉丹 0.015g，黄柏 0.03g，牛黄 0.6g，蒲黄 0.06g，白芷 0.03g，大梅片 0.6g，甘草 0.3g，薄荷 0.09g。研细末，吹喉，每日 6~10 次。

[功能主治] 清热解毒，利咽消肿。主治喉癌。

(2) 斑蝥全蝎粉（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 斑蝥，制乳香，制没药，全蝎，玄参，血竭各 2 份，麝香，冰片各 1 份。共研细末，外敷肿块对应的颈项部。

[功能主治] 破血祛瘀镇痛。主治喉癌各期。

【对症用方】

喉癌的对症用方，当根据患者的主要症状及是否手术或放疗、化疗等采用相应治疗。

1. 喉癌术后专方

(1) 益气养阴汤（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 太子参 15g（或西洋参 5g），沙参 12g，麦冬 10g，石斛 12g，生地 12g，黄芪 15g，黄精 12g，枸杞子 12g，川贝母 6g，百合 10g，茯苓 10g，白英 20g，仙鹤草 20g，甘草 3g，炒麦芽 30g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴散结。主治喉癌手术后。

〔**加减应用**〕胃纳不佳、苔厚腻者，去生地，加焦山楂、怀山药；汗多气短者，加白术、防风、煅牡蛎（先煎）、浮小麦。

（2）杏苏散合三子养亲汤加味（《现代中医肿瘤学》）

〔**组成与用法**〕杏仁 15g，陈皮 10g，法半夏 20g，桔梗 15g，前胡 15g，生南星 30g，紫苏子 15g，白芥子 15g，莱菔子 15g。水煎服。

〔**功能主治**〕清肺祛痰。主治喉癌腹胀喘促。

〔**加减应用**〕肿块坚硬者，加牡蛎、贝母；咽喉疼痛者，加马勃。

（3）人参北芪汤（《现代中医肿瘤学》）

〔**组成与用法**〕人参 9g，北芪 30g，五味子 10g，紫菀 15g，熟地 20g，白术 12g，升麻 15g，怀山药 30g，百合 15g，北沙参 30g，蝉蜕 12g，水煎服。

〔**功能主治**〕补肺益气。主治喉癌气短。

〔**加减应用**〕喉痛，咳嗽不爽，舌有瘀斑者，加丹参、三七。

2. 喉癌放疗后专方

（1）二竹参麦汤（黎月恒经验方）

〔**组成与用法**〕沙参 15g，麦冬 15g，玉竹 15g，桑白皮 15g，花粉 15g，菊花 15g，金银花 12g，连翘 12g，竹叶 10g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 30g，甘草 10g。水煎服。

〔**功能主治**〕益气养阴，清热解毒。主治喉癌热毒伤阴。

〔**加减应用**〕口干、舌绛显著者，加石斛、天冬、知母，重用麦冬；失眠、烦躁者，加酸枣仁、五味子。

（2）养阴清肺汤（吉林中医药，1998，3）

〔**组成与用法**〕生地 15g，玄参 12g，天冬 15g，沙参 12g，石斛 12g，金银花 15g，连翘 15g，茯苓 10g，生甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴生津。主治喉癌热毒伤阴。

〔加减应用〕 咽喉肿痛伴溃疡者，加板蓝根、山豆根，外敷珠黄散；伴恶心呕吐，苔白滑或白腻者，去生地、玄参、甘草，加藿香、佩兰、薏苡仁、陈皮；咳嗽痰血者，加仙鹤草、旱莲草。

(3) 桔梗射干汤（新中医，2001，6）

〔组成与用法〕 桔梗 12g，甘草 6g，射干 15g，赤芍 15g，浙贝 15g，麦冬 15g，玄参 30g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，养阴生津。主治喉癌失音。

〔加减应用〕 淋巴结肿大者，加夏枯草、海蛤壳；失音者，加千层纸；胸痛或伴有咳嗽者，加瓜蒌皮、丝瓜络；胸痛者，加郁金；腰背痛甚者，加葛根、豨莶草；齿龈及口干较甚者，加太子参或西洋参（另煎兑服）、五味子、石斛；胃纳差者，加麦芽、山楂；大便秘结者，加干地黄、大腹皮、槟榔。

〔临床报道〕 配合放、化疗治疗 9 例喉癌术后，对患者失音者语言的恢复起到重要作用。

(4) 射干连翘汤（《现代中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 射干 15g，连翘 15g，黄芩 10g，板蓝根 20g，岗梅根 30g，天花粉 30g，生地 20g，玄参 15g，西洋参（蒸兑）6g，川贝 10g，白花蛇舌草 30g，北沙参 30g。水煎服。

〔功能主治〕 泻火解毒，清热生津。主治喉癌咽喉疼痛。

〔加减应用〕 咽喉溃烂者，加蒲公英；头痛者，加白芷、川芎。

(5) 益气养阴方（山西临床医药杂志，1998，7）

〔组成与用法〕 西洋参 16g（蒸兑），地黄 18g，元参 15g，麦冬 15g，白术 12g，川石斛 24g，山萸肉 15g，百合 15g，山药 30g，陈皮 12g，鸡内金 12g，炙甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕养阴益气。主治喉癌。

〔加减应用〕多汗、怕风甚者，加入黄芪、防风；咽燥口干显著者，加入葛根、花粉；喉中有痰，咯吐不利者，加川贝母、紫菀、炙冬花；心烦，手足心热，潮汗，盗汗，寐差者，加北沙参、五味子、炙远志；咽部明显红肿疼痛者，加入丹皮、赤芍、半枝莲或蒲公英。

〔临床报道〕配合手术治疗 30 例，3、5 年生存率分别为 81.9%、64.9%。

3. 喉癌化疗后专方

(1) 癌复康加减方（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕白参（蒸兑）10g，黄芪 30g，白术 10g，陈皮 10g，枸杞子 12g，女贞子 15g，旱莲草 15g，菟丝子 12g，鸡血藤 30g，牛蒡子 10g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 30g，甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益肾，补气养血。主治喉癌化疗后正虚余毒未尽。

〔加减应用〕腰酸耳鸣，加仙灵脾、石菖蒲；恶心呕吐者，加姜半夏、砂仁；纳差，加鸡内金、山楂；腹泻者，加吴茱萸、黄连；失眠，加酸枣仁；潮热盗汗，加丹皮、山萸肉、煅牡蛎、五味子。

(2) 旋覆二香汤（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕白参（蒸兑）10g，白术 10g，茯苓 10g，陈皮 10g，法半夏 10g，广香 10g，砂仁 5g，旋覆花（布包）10g，代赭石（先煎）15g，藿香 10g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕健脾和胃止呕。用于喉癌化疗后呕吐。

〔加减应用〕舌红口干，加麦冬、石斛；腹胀甚，加沉香末（冲服）、香附；腹痛，加延胡索、白芍；大便稀溏，加炒麦芽、吴茱萸、炒谷芽；困倦嗜睡，加佩兰、薏苡仁。

(3) 健脾益肾汤（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 党参 15g, 麦冬 12g, 茯苓 15g, 砂仁 6g, 白术 12g, 沙参 15g, 黄芩 10g, 金银花 15g, 桔梗 10g, 牛蒡子 10g, 绞股蓝 15g, 栀子 10g, 女贞子 10g, 菟丝子 10g, 蚤休 30g, 生薏苡仁 20g, 甘草 3g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾解毒。主治喉癌化疗后脾肾两亏。

[加减应用] 脾肾虚寒者, 减栀子、黄芩、蚤休, 加怀山药、吴茱萸; 恶心呕吐者, 减栀子、桔梗, 加法半夏、柿蒂、旋覆花(布包)、代赭石(先煎); 白细胞下降者, 加黄芪、紫河车、锁阳、鸡血藤; 乏力神疲者, 加黄芪; 面白心悸者, 加枸杞、当归。

(4) 益气补血汤(《现代中医肿瘤学》)

[组成与用法] 人参 20g, 北黄芪 30g, 当归 15g, 白术 15g, 升麻 15g, 怀山药 30g, 鸡血藤 30g, 补骨脂 30g, 阿胶 30g(烊化兑服), 何首乌 20g, 枸杞子 15g。水煎服。

[功能主治] 益气补血。用于喉癌化疗后骨髓抑制。

[加减应用] 白细胞降低者, 加仙灵脾、锁阳。

3. 喉癌咽喉肿痛溃烂方

(1) 紫雪散(《现代中医肿瘤》)

[组成与用法] 升麻 50g, 水牛角 50g, 生石膏 50g, 寒水石 50g, 玄参 100g, 甘草 40g, 沉香 25g, 木香 25g, 共碾细粉, 每次服 5g, 每日 2 次。

[功能与主治] 清热解毒, 镇痛开窍。主治喉癌咽喉肿痛溃烂。

[加减应用] 头痛剧烈者, 加五灵脂、全蝎。

(2) 硼砂丸(《现代中医肿瘤》)

[组成与用法] 硼砂 30g, 赤练蛇粉 30g, 乌梅肉 15g, 桔梗 15g, 礞石 15g, 薄荷 11g, 胆南星 24g, 饴糖 12g, 共研细粉, 糖蜜为丸, 每丸 3g。经口含化, 每日 3~4 次。

[功能主治] 清热化痰, 解毒防腐。主治喉癌咽喉肿痛

溃烂。

〔加减应用〕热甚者，加石膏、龙胆草。

(3) 生津止痛饮(李佩文经验方)

〔组成与用法〕沙参 20g，麦冬 15g，菊花 10g，射干 10g，山豆根 10g，金银花 10g，地丁 10g，蒲公英 10g，延胡索 10g，金铃子 10g，猫爪草 10g。水煎，早餐后 2 小时服，勿空腹。腹泻慎用。

〔功能主治〕清热生津，解毒止痛。主治口咽部疼痛。

〔加减应用〕腹泻，加薏苡仁，石榴皮；血象低者，加党参、黄精、枸杞，少用黄芪；放疗所致口干，咽痛，可用胖大海、菊花、芦根、麦冬各等份泡水漱口，不宜过多下咽。(中国中西医结合杂志，2003，8)

【专病成药】

1. 六神丸(《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕麝香、牛黄、冰片、珍珠、蟾酥、雄黄。

〔功能主治〕清热解毒，消肿止痛。有明显的抗肿瘤、消炎、镇痛作用。适用于喉癌。(《中华肿瘤治疗大成》)

〔用法用量〕每次 10~15 粒，每天 4 次。亦可研末外用。

2. 铁笛丸(《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕麦冬、玄参、瓜蒌皮、诃子肉、青果、凤凰衣、桔梗、浙贝母、茯苓、甘草。

〔功能主治〕清肺利咽，生津止渴。适用于喉癌放疗后肺热津伤，咽干口燥，声音嘶哑，咽喉疼痛。(黎月恒经验)

〔用法用量〕每次 6g，每日 2 次，温开水送服。

3. 新瘰片(《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔主要成分〕肿节风、三七、牛黄等。

〔功能与主治〕清热解毒，活血化瘀，消肿止痛。用于喉癌热毒瘀血所致的咽喉肿痛。(潘敏求经验)

〔用法与用量〕口服，1 次 2~4 片，1 日 3 次，小儿酌减。

外用，用冷开水调化，敷患处。

4. 喉症散（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔**处方组成**〕板蓝根、牛黄、冰片、猪胆汁、玄明粉、青黛、雄黄、硼砂、蟾酥、百草霜。

〔**功能与主治**〕清热解毒，消肿止痛。用于喉癌。（潘敏求经验）

〔**用法用量**〕含化，每次 5~10 粒，1 日 2 次。

5. 康莱特注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔**处方组成**〕薏苡仁油。

〔**功能主治**〕益气养阴，扶正抗癌。主治喉癌。（哈尔滨医科大学学报，2004，3）

〔**用法用量**〕缓慢静脉滴注 200ml，每日 1 次，20 天为 1 疗程，间隔 3~5 天，可进行下一疗程。联合放、化疗时，可酌减剂量。

6. 复方苦参注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔**处方组成**〕苦参等多味中草药。

〔**功能主治**〕抗癌镇痛，提高免疫功能。主治喉癌引起的疼痛及出血。

〔**用法用量**〕以本品 12~20ml 加入 200ml 生理盐水中滴入，每日 1 次，或以本品 8~10ml 加入 100ml 生理盐水滴入，每日 2 次。

【专病单方】

1. 青果 用法：每取 1 粒，剖开去核，以硼砂少许入青果内，纳口中含化咽吞。功用：解毒利咽。主治喉癌急性咽喉肿塞。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 佛甲草 用法：每取 50g，捣汁，加陈京墨磨汁，和匀，漱口，每日 4~5 次。功用：清热解毒。主治喉癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 牛蒡子 用法：每取 60g，水煎服，分 2 次服用。功

用：解毒抗癌。主治喉癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 夏枯草 用法：每取 60~90g，水煎服，分 3 次服用。
功用：解毒散结。主治喉癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 白药子 用法：每取与朴硝等份为末，以小管吹入患处。功用：解毒消肿，化痰散结。主治喉癌。（《仁斋直指方·喉中热塞肿痛》）

甲状腺癌

甲状腺癌是发生于甲状腺腺体的恶性肿瘤。其发生与服同位素、低碘饮食、致甲状腺肿物质或放射线外照射、甲状腺部分切除及家族遗传性等有关。

本病相当于中医病名石瘰范畴，中医认为其主要病因病机为情志抑郁，肝气郁滞，脾失健运，痰湿内生，气、血、痰相互凝结而成。

【辨证用方】

甲状腺癌的辨证，当辨明虚、实。以颈前肿块，伴面部烘热、心烦易怒为主症者，多为实证；以颈前肿块伴心悸气短，乏力神疲为主症者，多为虚证。证属实者，治以清肝泻火，软坚散结；证属虚者，治以养心益肾，化痰散结。

1. 肝火旺盛证

主症：颈前肿块，灼热疼痛，咳唾黄痰，声音嘶哑，面部烘热，口干口苦，小便黄赤，舌红苔黄，脉细数。

治法：清肝泻火，软坚散结。

栀子清肝合藻药汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 栀子 10g，丹皮 10g，柴胡 10g，赤芍 12g，当归 10g，海藻 10g，黄药子 10g，瓜蒌 15g，土贝母 12g，丹参 10g，夏枯草 15g，生牡蛎（先煎）30g。水煎服。

〔功能主治〕 清泻肝火，软坚散结。主治甲状腺癌肝火旺

盛证。

〔加减应用〕 肋胁胀痛者，加香附、郁金；腹胀，大便秘结者，加枳壳、大黄（后下）；口干咽燥，加麦冬、沙参。

2. 痰毒内蕴证

主症：颈前肿块，胀痛，咳嗽痰多，胸闷纳差，大便干，舌质暗红，舌厚腻，脉数滑。

治法：化痰软坚，解毒散结。

(1) 海藻玉壶汤加味方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 海藻 10g，昆布 10g，陈皮 10g，法夏 10g，贝母 10，连翘 15g，当归 10g，川芎 10g，茯苓 12g，香附 10g，郁金 15g，穿山甲（先煎）15g，土贝母 12g，蚤休 15g，石见穿 15g，天南星 10g。水煎服。

〔功能主治〕 理气消瘿，化痰散结。主治甲状腺癌痰毒内蕴证。

〔加减应用〕 郁久化火、灼热、舌红者，加丹皮、栀子、夏枯草；神疲乏力，便溏者，加白术、山药。

(2) 散肿溃坚汤（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 柴胡 12g，黄芩 15g，甘草 15g，桔梗 10，昆布 15g，归尾 15g，赤芍 30g，白芍 30g，三棱 10g，莪术 10g，白术 15g，黄药子 30g，天花粉 30g，夏枯草 30g，干蟾皮 8g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰解毒，活血散结。主治甲状腺癌痰毒内蕴证。

〔加减应用〕 同时服西黄丸，每次 3g，每日 2 次。

3. 气滞血瘀证

主症：颈前肿胀，质硬固定，胸闷气憋，心烦易怒，头痛目眩，舌质紫暗，苔薄白，脉弦涩。

治法：疏肝行气，祛瘀散结。

柴胡疏肝散加减方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 柴胡 10g, 陈皮 10g, 重楼 10g, 枳壳 10g, 赤芍 10g, 丹参 15g, 炮穿山甲 (先煎) 12g, 莪术 10g, 栀子 10g, 夏枯草 10g, 龙葵 20g, 郁金 10g, 生牡蛎 (先煎) 30g, 海藻 12g, 制鳖甲 (先煎) 12g, 猫爪草 15g。水煎服。

〔功能主治〕 疏肝解郁, 活血散结。主治甲状腺癌气滞血瘀证。

〔加减应用〕 神疲乏力、大便溏薄者, 加茯苓、白术; 纳呆脘痞者, 加藿香、薏苡仁、鸡内金。

4. 心肾阴虚证

主症: 颈部肿块, 绵绵不息, 心悸气短, 全身乏力, 自汗盗汗, 精神萎靡, 头晕目眩, 腰膝酸软, 舌质暗红, 苔黄, 脉沉细。

〔治法〕 养心益肾, 化痰散结。

生脉散合二至丸加减方 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 党参 15g, 麦冬 10g, 五味子 10g, 黄精 15g, 黄芪 20g, 女贞子 20g, 旱莲草 10g, 煅牡蛎 (先煎) 15g, 仙鹤草 10g, 海藻 10g, 黄药子 10g, 山慈菇 15g。水煎服。

〔功能主治〕 益气生津, 敛阴止汗。主治甲状腺癌心肾阴虚证。

〔加减应用〕 口干口渴、苔少者, 加玉竹、芦根; 纳差便溏者, 加茯苓、白术。

【辨病用方】

甲状腺病的辨病治疗, 当根据肿瘤病期早、晚, 病人体质强弱, 选用不同的方药。

1. 甲状腺癌各期体质较实用方

(1) 昆布海藻汤 (《抗癌中药一千方》)

〔组成与用法〕 昆布 12g, 海藻 12g, 夏枯草 15g, 牡蛎 (先煎) 30g, 生地 30g, 三棱 10g, 莪术 10g, 炮穿山甲 10g,

甘草 3g。水煎服。

[功能主治] 活血解毒，软坚散结。主治甲状腺癌。

[加减应用] 热盛者，加牛蒡子、连翘、紫花地丁、板蓝根；痰多者，加法半夏、陈皮、茯苓；热痰，加浙贝母、冬瓜仁、瓜蒌；口干咽痛者，加玄参、天花粉。

(2) 海浮枯草汤（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 玄参 30g，白芍 12g，制香附 12g，夏枯草 30g，海浮石 30g，生牡蛎（先煎）30g，白芥子 12g。水煎服。

[功能主治] 理气化痰，软坚散结。主治甲状腺癌早期。

[加减应用] 纳差者，加炒山楂、炒麦芽；寐差者，加大枣、茯神、百合。

(3) 棱莪二甲汤（上海中医学院附属龙华医院方）

[组成与用法] 柴胡 9g，莪术 9g，三棱 9g，木香 9g，桃仁 9g，红花 9g，丹皮 9g，栀子 12g，郁金 12g，赤芍 15g，夏枯草 30g，制鳖甲 30g（先煎），煅牡蛎 30g（先煎）。水煎服。

[功能主治] 理气化瘀，软坚散结。主治甲状腺癌。

[加减应用] 痰多者，加法半夏、陈皮、茯苓；口干咽痛者，加天花粉。

(4) 五海丸（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 海螺粉 20g，海蛤粉 20g，海藻 15g，海螵蛸 15g，昆布 10g，龙胆草 10g，青木香 10g。共研细末，蜂蜜为丸，每丸 6g，每次 2 丸，每日 3 次。

[功能主治] 软坚散结，疏肝解郁。主治甲状腺癌。

[加减应用] 大便秘结者，加麻仁、杏仁等。气滞血瘀加当归、香附、青皮、陈皮；肿块坚硬加黄药子、莪术、丹参。

(5) 甲瘤汤（《现代中医肿瘤学》）

[组成与用法] 当归 12g，夏枯草 12g，海藻 12g，柴胡 10g，甲珠（先煎）10g，皂刺 10g，浙贝母 10g，青皮 6g，僵蚕 6g，法半夏 6g，水煎服。

〔功能主治〕疏肝理气，活血散结。主治甲状腺癌。

〔加减应用〕舌红，口干，咽燥，心烦者，加麦冬、生地、沙参。

(6) 夏枯草山豆根汤（《抗癌中草药制剂》）

〔组成与用法〕夏枯草 15g，山豆根 15g，生牡蛎（先煎）15g，黄药子 15g，白芍 15g，橘核 12g，王不留行子 12g，天葵子 12g，甲珠 9g，苏梗 9g，射干 9g，马勃 9g，昆布 30g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，软坚散结。主治甲状腺癌。

〔加减应用〕痰多者，加法半夏、陈皮；血虚者，加首乌、归身、黄精、大枣；气虚体弱者，加黄芪、党参、茯苓。

(7) 消瘰蛇草汤（湖北中医杂志，1988，3）

〔组成与用法〕白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g，牡蛎（先煎）30g，丹参 30g，海藻 15g，夏枯草 15g，玄参 15g，赤芍 15g，法半夏 15g，柴胡 9g，桔梗 9g，川贝母 9g，厚朴 9g，挂金灯 9g。水煎服。

〔功能主治〕散结消肿，活血解毒。主治甲状腺癌。

〔加减应用〕体胖苔白腻者，加胆南星、茯苓。

(8) 柴胡半夏汤（陕西中医杂志，1982，2）

〔组成与用法〕柴胡 10g，法半夏 10g，陈皮 10g，昆布 10g，黄药子 10g，山慈菇 10g，白芍 15g，茯苓 15g，白术 15g，瓦楞子 30g，牡蛎（先煎）30g。水煎服。

〔功能主治〕疏肝解郁，化痰散结。主治甲状腺癌属肝郁痰湿证者。

〔加减应用〕肿块质地坚硬，无明显虚弱征象者，酌加三棱、莪术、大黄、炮穿山甲。

(9) 海藻茯苓汤（中医杂志，1982，7）

〔组成与用法〕海藻 12g，茯苓 12g，昆布 9g，牡蛎（先煎）9g，贝母 9g，莪术 9g，赤芍 9g，当归 9g，青皮 9g，陈

皮 9g, 柴胡 9g, 川芎 9g, 黄药子 6g, 桔梗 6g。水煎服。

[功能主治] 疏肝解郁, 软坚散结。主治甲状腺癌。

[加减应用] 口干舌燥者, 加麦冬、沙参等。

2. 甲状腺癌中晚期体质较虚用方

(1) 黄芪首乌汤 (中国医药学报, 1987, 1)

[组成与用法] 生黄芪 30g, 生首乌 30g, 生牡蛎 (先煎) 30g, 白花蛇舌草 30g, 茯苓 15g, 夏枯草 15g, 生山药 15g, 玄参 15g, 半枝莲 15g, 制鳖甲 15g, 生薏苡仁 15g, 生白术 12g, 山慈菇 12g, 露蜂房 12g, 生大黄 12g, 泽漆 12g, 制半夏 9g, 全当归 9g, 粉丹皮 9g, 人中黄 9g, 浙贝母 9g, 守宫粉 (吞服) 9g, 绿升麻 6g, 芋艿丸 (分吞) 6g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾, 软坚散结。主治甲状腺乳头状癌术后复发, 淋巴结转移。

[加减应用] 形瘦多火, 伴舌红口干, 咽燥, 心烦者, 加麦冬、生地、沙参、丹皮。

(2) 黄芪瓦楞汤 (陕西中医研究院方)

[组成与用法] 黄芪 60g, 沙参 30g, 夏枯草 30g, 山豆根 10g, 重楼 10g, 黄药子 10g, 瓦楞子 30g, 仙灵脾 15g, 野菊花 30g, 昆布 15g, 生地 30g, 料姜石 60g。水煎服。

[功能主治] 益气养血, 解毒散结。主治晚期甲状腺癌气血双亏者。

[加减应用] 大便秘结者, 加生大黄; 体胖苔白腻者加胆南星、厚朴、茯苓; 体弱或年高或久服行气活血、化瘀破积药不效者, 酌加人参、白芍、丹参。

(3) 加味二至汤 (北京中医药大学方)

[组成与用法] 女贞子 30g, 旱莲草 30g, 骨碎补 30g, 补骨脂 30g, 鸡血藤 30g, 海藻 30g, 络石藤 30g, 透骨草 30g, 肉苁蓉 30g, 山药 15g, 牛膝 15g, 木瓜 15g。水煎服。

[功能主治] 滋阴益气, 化瘀散结。主治晚期甲状腺癌淋

巴结转移。

[加减应用] 纳差便溏者，加茯苓、白术；肿块坚硬者，加牡蛎、莪术。

(4) 急性黄药汤（上海中医药杂志，1982，4）

[组成与用法] 猫人参 15g，凤尾草 20g，黄药子 10g，金银花 20g，蔊菜 15g，急性子 10g，威灵仙 15g，夏枯草 20g，蒲公英 20g，穿山甲 15g，柴胡 10g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒，化痰软坚。主治晚期甲状腺癌咽梗塞。

(5) 归芪昆藻汤（《段凤舞肿瘤积验方》）

[组成与用法] 当归 12g，生地 12g，青皮 12g，黄芪 30g，昆布 30g，海藻 30g，夏枯草 30g，白芍 15g，甲珠 15g，芦荟 9g，天南星 9g，龙胆草 9g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴，解毒散结。主治甲状腺癌。

(6) 消瘰丸加味（新中医，1984，12）

[组成与用法] 生牡蛎（先煎）30g，玄参 24g，浙贝母（先煎）15g，夏枯草 15g，海藻 15g，昆布 15g，明党参 15g，鳖甲（先煎）15g，连翘 12g，山萸肉 12g。水煎服。

[功能主治] 养阴清热，化痰散结。主治晚期甲状腺乳头状癌。

[加减应用] 热盛者，加牛蒡子、板蓝根；气虚者，加北黄芪、党参、云茯苓。

(7) 消瘰软坚汤（《现代中医肿瘤学》）

[组成与用法] 海藻 30g，夏枯草 10g，射干 12g，七叶一枝花 16g，泽泻 15g，赤小豆 12g，王不留行 12g，莪术 12g，白术 12g，茯苓 12g，猪苓 12g，丹皮 9g，艾叶 9g，椒目 9g，白芥子 6g。水煎服。

[功能主治] 健脾祛湿，化痰软坚。主治甲状腺癌纵隔淋巴结转移。

〔**加减应用**〕头痛者，加白芷、川芎、天麻。

【对症用方】

甲状腺癌的对症用方，根据患者主要症状进行选择及是否手术或放疗、化疗，分别论治。

1. 甲状腺癌手术后专方

(1) 益肾软坚汤（潘敏求经验方）

〔**组成与用法**〕生地 15g，沙参 30g，麦冬 15g，女贞子 15g，半莲草 15g，首乌 30g，茯神 10g，远志 10g，夏枯草 15g，野菊花 10g，生牡蛎（先煎）15g，黄药子 10g。水煎服。

〔**功能主治**〕养阴益肾，清热解毒，软坚散结。主治甲状腺癌。

〔**加减应用**〕纳差，腹胀者，加党参、白术、茯苓、陈皮；动则汗出者，加太子参、五味子、浮小麦；口干舌燥、舌红无苔、大便干者，加石斛、玉竹、天花粉。

(2) 一贯煎加减（现代中西医结合杂志，2003，5）

〔**组成与用法**〕生地 15g，沙参 30g，麦冬 15g，玄参 15g，白芍 10g，生牡蛎 30g，当归 10g，夜交藤 30g，枣仁 15g，炙远志 6g，太子参 15g，黄芪 30g，制首乌 15g，茯苓 15g，莲子心 6g。水煎服。

〔**功能主治**〕滋阴潜阳，补气益血，养心宁神。主治甲状腺癌。

〔**临床报道**〕治疗 6 例甲状腺癌术后患者，其中 1 例未分化癌，现已存活 18 年。

2. 甲状腺癌放疗后专方

(1) 二竹参麦汤（黎月恒经验方）

〔**组成与用法**〕沙参 15g，麦冬 15g，玉竹 15g，桑白皮 15g，天花粉 15g，金银花 12g，连翘 12g，竹叶 10g，鸡血藤 30g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 30g，甘草 10g。水煎服。

〔**功能主治**〕养阴清热，解毒散结。主治甲状腺癌。

[加减应用] 呕吐恶心者，加竹茹、陈皮；体虚乏力，加白参（蒸兑）、黄芪。

(2) 参芪石斛汤（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 太子参 30g，沙参 15g，生黄芪 20g，当归 10g，赤芍 10g，白术 10g，石斛 10g，玄参 10g，夏枯草 15g，紫河车 15g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴，清热解毒。主治甲状腺癌。

[加减应用] 恶心呕吐者，加陈皮、竹茹、砂仁；咽痛、进食困难、口干舌燥者，加麦冬、天花粉、女贞子。

3. 甲状腺癌化疗后甲状腺癌专方

(1) 癌复康加减方（潘敏求经验方）

[组成与用法] 白参（蒸兑）10g，黄芪 30g，白术 10g，茯苓 10g，陈皮 10g，枸杞子 12g，女贞子 15g，旱莲草 15g，菟丝子 12g，鸡血藤 30g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 30g，甘草 10g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾，补气养血。主治甲状腺癌化疗后正虚余毒未尽。

[加减应用] 腰酸耳鸣，加仙灵脾、石菖蒲；恶心呕吐者，加姜半夏、砂仁；纳差，加鸡内金、山楂；腹泻者，加吴茱萸、黄连；失眠，加酸枣仁；潮热盗汗，加丹皮、山萸肉、煅牡蛎、五味子。

(2) 旋覆二香汤（黎月恒经验方）

[组成与用法] 白参（蒸兑）10g，白术 10g，茯苓 10g，陈皮 10g，法半夏 10g，广香 10g，竹茹 10g，砂仁 5g，旋覆花（布包）10g，代赭石（先煎）15g，藿香 10g，甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 健脾和胃止呕。用于甲状腺癌化疗后呕吐。

[加减应用] 舌红口干者，加麦冬、石斛；腹胀甚，加沉香末（冲服）、香附；腹痛，加延胡索、白芍；大便稀溏，加

炒麦芽、吴茱萸、炒谷芽；困倦嗜睡，加佩兰、薏苡仁。

【专病成药】

1. 六味地黄丸《中华人民共和国卫生部药品标准》

〔处方组成〕熟地黄、山萸肉、山药、丹皮、茯苓、泽泻。

〔功能主治〕滋补肝肾，养血育阴。有显著提高细胞免疫功能，提高机体抗肿瘤能力。主治甲状腺癌属肝肾阴虚者。
(中医药信息, 1999, 1)

〔用法用量〕每次 6g，每天 2~3 次。

2. 西黄丸《中华人民共和国卫生部药品标准》

〔处方组成〕牛黄、麝香、乳香、没药。

〔功能主治〕清热解毒，和营消肿。用于痈疽疔毒者，瘰癧，流注、癌肿等。主治甲状腺癌。(潘敏求经验)

〔用法用量〕口服，1 次 3g，1 日 2 次。

3. 小金胶囊(《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕麝香、木鳖子、制草乌、枫香脂、乳香、没药、五灵脂、当归、地龙、香墨。

〔功能主治〕散结消肿，化瘀止痛。用于阴疽初起，皮色不变，肿硬作痛，多发性脓肿，瘰癧，瘰癧，乳岩、乳癖。主治甲状腺癌。(黎月恒经验)

〔用法用量〕口服，1 次 3~7 粒，1 日 2 次。

4. 肿节风注射液(《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕肿节风提取液。

〔功能主治〕清热解毒，消肿散结。适用于甲状腺癌。

〔用法用量〕肌肉注射：4ml，每日 2 次；静脉滴注：10~16ml，每日 1 次。

5. 华蟾素注射液(《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕中华大蟾蜍。

〔功能主治〕清热解毒，消肿止痛，活血化瘀，软坚散结。适用于中晚期甲状腺癌。

【用法用量】 10~20ml，加入5%葡萄糖注射液500ml静滴，每天1次，连用28天为1周期。用药1周，休息1~2日或遵医嘱。

【专病单方】

1. 山慈菇 用法：每取30g，配黄药子15g，肿节风30g，核桃树枝30g。水煎，每日1剂，分2次服。功用：活血祛痰，解毒抗癌。主治：甲状腺癌痰凝血瘀者。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 水红花子 用法：每取鲜品30g，水煎，每日1剂，分2次服。同时用鲜品适量，捣烂外敷患处。功用：活血解毒。主治：甲状腺癌未溃破者。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 乌菟莓根 用法：每取12g，配蒲公英12g，金银花6g。水煎，每日1剂，分2次服。功用：清热解毒抗癌。主治：甲状腺癌偏热毒者。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 夏枯草 用法：每取30g，配丝瓜络30g，甘草1g。水煎服。功用：清热散结，通经活血。主治：甲状腺肿瘤。（江西中医药，1983，4）

5. 黄药子 用法：每取60g，配海藻30g（酒洗）。共研细末，每用3g，时时舔之，待肿消2/3即停药。功用：软坚散结。主治：甲状腺肿瘤痰热甚者。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 生南星 用法：每取1枚，研末醋调，贴患处。功用：化痰软坚。主治：甲状腺肿瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

胸部肺癌

原发性支气管肺癌

原发性支气管肺癌是原发于支气管黏膜和肺泡的恶性肿瘤，其发病主要与吸烟、职业性因子、大气污染、电离辐射、生物学因子相关。

本病相当于中医病名国家标准的肺癌，亦属于肺积、咳嗽、痰饮、息贲等病证范畴。中医认为其发病乃因年老体衰，慢性肺部疾患导致肺气耗损而不足，或七情所伤，气机不畅，或劳累过度，肺气、肺阴亏损，导致正气虚损，阴阳失调，邪毒乘虚袭肺，肺之气机不利，宣降失司，津液不布，聚而为痰，气滞血瘀，痰凝气滞，瘀阻络脉，痰瘀胶结，日久而形成肺部积块。

【辨证用方】

原发性支气管肺癌的辨证，重在辨别虚实之主次，以咳嗽无痰或少痰，或痰中带血为主症者，多为虚证；以咳嗽痰多或咳嗽不畅，血痰或咯血，胸胁胀痛，痛有定处为主症者，多为实证。虚证有阴虚、气虚、气阴两虚或阴阳两虚之不同，以阴虚和气阴两虚多见；实证以气滞、血瘀、痰凝、毒聚为主。本病多因虚致实，全身属虚，局部属实。治疗应注意虚实与轻重的夹杂，宜根据虚实主次的不同各有侧重。“肺主气”，“肺为娇脏，喜润恶燥”，气虚阴伤是肺癌的本质，滋阴清肺、温阳益气、化痰解毒是主要的治疗法则。

1. 阴虚内热证

主症：咳嗽无痰或少痰或痰中带血，气急，口渴，心烦，失眠，潮热，盗汗，舌质红或绛，少苔或光剥无苔，脉细数。

治法：滋阴润肺，解毒清热。

(1) 肺复方加减（黎月恒经验方）

[组成与用法] 百合 10g，生地 10g，熟地 10g，玄参 12g，麦冬 15g，当归 15g，白芍 10g，沙参 15g，杏仁 10g，桑白皮 20g，瓜蒌壳 20g，黄芩 15g，川贝母 10g，臭牡丹 30g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 滋阴生津，润肺化痰。主治肺癌阴虚内热证。

[加减应用] 气短乏力者，加黄芪、党参；胸痛、舌质紫暗有瘀斑者，加红花、桃仁、川芎；痰血者，加蒲黄炭、藕节炭、仙鹤草；低热者，加银柴胡、地骨皮；高热者，加生石膏。

[临床报道] 治疗 78 例，治疗后症状改善、病灶稳定 55 例，瘤体稳定率 70%，一年生存率 59%。（北京中医药杂志，1988，1）。

(2) 加减沙参麦冬汤（《现代中西医肿瘤学》）

[组成与用法] 生薏苡仁 30g，猫爪草 30g，制鳖甲（先煎）30g，沙参 15g，麦冬 10g，猪苓 15g，天冬 15g，浙贝母 15g，生地黄 15g，桔梗 12g，守宫 10g。水煎服。

[功能主治] 益气养血，通络止痛。主治肺癌阴虚内热证。

[加减应用] 咯血不止者，加白茅根、白及、田七粉（冲服）；自汗气短者，加人参、冬虫夏草、黄芪、五味子；便秘者，加大黄。

2. 气阴两虚证

主症：咳嗽少痰或痰中带血，气短，神疲，乏力，自汗或盗汗，口干不多饮，面白无华，舌质淡红，苔薄，脉细弱。

治法：益气养阴，解毒清肺。

(1) 加减生脉饮（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 白参（蒸兑）10g，黄芪 20g，麦冬 15g，五味子 12g，北沙参 15g，天冬 15g，杏仁 10g，百部 15g，瓜蒌 20g，桑白皮 20g，蚤休 30g，白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，清热解毒。主治肺癌气阴两虚证。

〔加减应用〕 咳嗽痰黏者，加紫菀、款冬花、枇杷叶、淡竹叶；痰中带血者，加仙鹤草、白茅根、蒲黄炭；胸胁疼痛者，加红花、桃仁、郁金；纳少者，加砂仁、炒麦芽、鸡内金；盗汗者，加煅牡蛎（先煎）、浮小麦、麻黄根。胸痛者，加延胡索、薤白。

〔临床报道〕 用生脉饮加减与其他辨证方结合放、化疗和免疫治疗中晚期肺癌 117 例，完全缓解（CR）19 例，部分缓解（PR）44 例，总有效率 53.84%。（河北中西医结合杂志，1999，3）

（2）二黄养肺汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 黄芪 30g，白术 20g，黄精 20g，山药 30g，麦冬 15g，沙参 15g，陈皮 10g，瓜蒌 20g，白花蛇舌草 30g，山豆根 10g，太子参 20g，法半夏 15g，丹参 15g，海藻 30g，昆布 20g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，化痰软坚。主治肺癌气阴两虚证。

〔加减应用〕 热毒盛者，加蒲公英、连翘；阴虚重者，加玄参、天花粉。

（3）鹤草生脉饮（《现代中西医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 党参 15g，仙鹤草 15g，浙贝母 15g，黄芪 15g，天冬 15g，百合 15g，西洋参 15g，麦冬 10g，五味子 10g，首乌 10g，北杏仁 15g，山慈菇 15g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，化痰散结。主治肺癌气阴两虚证。

〔加减应用〕 痰中带血者，加白及、花蕊石、三七；胸背疼痛者，加延胡索、枳壳、郁金；高热不退者，加水牛角（先

煎)、白薇、止血丹;大便干结者,加生地黄、大黄;胸腔积液者,加桑白皮、葶苈子、大枣;颈部肿核者,加猫爪草、海蛤、炮山甲。

(4) 扶正养阴方(上海中医医院肿瘤科经验方)

[组成与用法] 生黄芪 15g, 潞党参 15g, 生、熟地各 12g, 天麦冬各 12g, 玄参 12g, 升麻 15g, 鱼腥草 30g, 土茯苓 30g, 漏芦 30g。水煎服。

[功能主治] 补益肺气, 滋养肺阴。主治肺癌气阴两虚证。

[加减应用] 临床运用时选加白花蛇舌草、臭牡丹、蚤休等;胸痛者,加赤芍、丹参、郁金、瓜蒌;有胸腔积液者,加龙葵、葶苈子、薏苡仁;咯血者,加藕节、白茅根、仙鹤草。

3. 脾虚痰湿证

主症:咳嗽痰多,胸闷气短,纳少腹胀,神疲乏力,大便溏薄,面色萎黄,舌质淡胖有齿印,苔白腻,脉濡缓或濡滑。

治法:健脾祛痰利湿。

(1) 加减参苓白术汤(《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 党参 15g, 白术 12g, 茯苓 12g, 陈皮 10g, 法半夏 10g, 黄芪 15g, 怀山药 20g, 薏苡仁 20g, 扁豆 10g, 神曲 15g, 补骨脂 15g, 仙灵脾 15g, 臭牡丹 30g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 益气健脾, 理气化痰。主治肺癌脾虚痰湿证。

[加减应用] 痰多难咳者,加海浮石、瓜蒌;多汗气短者,加白参、麦冬、五味子、冬虫夏草;胸腔积液难消、浮肿者,加葶苈子、龙葵、大枣、车前子;痰湿蕴而化热,咳痰黄稠,苔黄腻,脉滑数者,加川贝、桑白皮、瓜蒌壳、黄芩、鱼腥草;高热者,加生石膏、知母、水牛角(先煎)。

(2) 四君守宫饮(《现代中西医肿瘤学》)

[组成与用法] 党参 15g, 茯苓 15g, 白术 15g, 猪苓 15g, 浙贝母 15g, 桔梗 12g, 守宫 10g, 麦芽 30 克, 猫爪草 30g,

全瓜蒌 30g, 生薏仁 30g, 生半夏 10g。水煎服。

[功能主治] 健脾化湿, 宣肺祛痰。主治肺癌脾虚痰湿证。

[加减应用] 气虚喘咳者, 加西洋参、冬虫夏草、山海螺; 痰热壅肺者, 加半枝莲、白花蛇舌草; 痰中夹血丝者, 加白茅根、白及、田三七(冲服)。

4. 肾阳亏虚证

主症: 咳嗽气急, 动则喘促, 耳鸣目眩, 腰酸膝软, 形瘦神惫, 面青肢冷, 舌质淡红, 苔薄白, 脉沉细。

治法: 滋肾壮阳, 解毒软坚。

(1) 金匱肾气丸加减(《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 熟地 12g, 山茱萸 15g, 肉桂 6g, 山药 20g, 北沙参 15g, 胡桃肉 15g, 五味子 10g, 牛膝 15g, 肉苁蓉 15g, 补骨脂 15g, 陈皮 12g, 蚤休 20g, 白花蛇舌草 20g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 补肾纳气, 佐以解毒。主治肺癌肾阳亏虚证。

[加减应用] 咯血不止者, 加仙鹤草、藕节炭、蒲黄炭; 喘息不宁者, 加葶苈子、苏子; 胸痛不减者, 加香附、郁金; 阵发虚脱者, 加黄芪、红参或西洋参; 纳差乏力者, 加砂仁、炒麦芽、鸡内金; 有癌性胸腔积液者, 加龙葵、葶苈子、大枣。

(2) 赞育丹合大补元煎加减(河北中西医结合杂志, 1999, 3)

[组成与用法] 淫羊藿 12g, 仙茅 12g, 锁阳 12g, 肉苁蓉 12g, 补骨脂 12g, 蚕蛹 12g, 北芪 15g, 党参 15g, 白术 15g, 杜仲 15g, 枸杞 15g, 山药 15g, 炙甘草 15g。水煎服。

[功能主治] 温补脾肾, 大补元气。主治肺癌肾阳亏虚证。

[加减应用] 喘甚者, 加苏子、杏仁、炙麻黄。

(3) 温阳散结汤(《中医肿瘤学》)

[组成与用法] 制附子(先煎4小时) 20g, 淫羊藿 30g, 仙茅 30g, 补骨脂 15g, 党参 15g, 黄精 15g, 山药 15g, 全瓜蒌 20g, 法半夏 12g, 杏仁 12g, 茯苓 15g, 白术 15g, 莪术

15g, 王不留行 30g, 黄芪 15g。水煎服。

〔功能主治〕 温阳扶正, 化痰散结。主治肺癌肾阳亏虚证。

〔临床报道〕 治疗肺癌 46 例, 有效 21 例, 无效 25 例, 1 年生存率 41.3%。

5. 气滞血瘀证

主症: 咳嗽不畅, 血痰或咯血、气急, 胸胁胀痛, 痛有定处, 失眠, 唇暗, 大便秘结, 颈部及前胸青筋暴露, 舌有瘀斑或瘀点, 脉细涩或弦细。

治法: 理气活血, 软坚散结。

(1) 加减桃红四物汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 桃仁 10g, 红花 10g, 当归 10g, 赤芍 10g, 生地 10g, 郁金 15g, 丹参 15g, 三棱 10g, 莪术 10g, 枳实 10g, 露蜂房 10g, 瓜蒌 30g, 八月札 20g, 白花蛇舌草 30g, 石见穿 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀, 理气行滞。主治肺癌气滞血瘀证。

〔加减应用〕 痰血多者, 加三七粉 (冲服)、蒲黄炭、丹皮、茜草根、仙鹤草; 瘰疬难消者, 加黄药子、山慈菇、生牡蛎 (先煎)、夏枯草、猫爪草; 低热者, 加银柴胡、青蒿、地骨皮; 胸胁或周身痛甚者, 酌加桂枝。

(2) 加减桃仁红花煎 (上海中医院经验方)

〔组成与用法〕 桃仁 9g, 红花 9g, 赤、白芍各 12g, 当归 15g, 川芎 6g, 制香附 9g, 八月札 12g, 延胡索 30g, 生莪术 15g, 炙鳖甲 (先煎) 9g, 露蜂房 30g, 两面针 30g, 炙天龙 6g, 乌梢蛇 9g。水煎服。

〔功能主治〕 行气宽中, 活血化瘀。主治肺癌气滞血瘀证。

〔加减应用〕 痰血多者, 加三七粉 (冲服)、蒲黄炭、茜草根、仙鹤草; 胸胁或周身痛甚者, 酌加大黄、桂枝。

【辨病用方】

原发性支气管肺癌是一种全身属虚, 局部属实的疾病。因

此，原发性支气管肺癌的辨病治疗主要针对肺部局部肿块的特点，治疗中常选用一些具有一定抗癌作用的中草药。常用的抗肺癌中药有清热解毒类药，如龙葵、白英、白花蛇舌草、大青叶、蚤休、石见穿等；化痰消结类药，如夏枯草、山慈菇、土贝母、土茯苓、瓜蒌、贝母、南星、半夏、杏仁、百部、菝葜、干蟾酥等；活血化瘀类，如丹参、苏木、三棱、莪术、泽兰、桃仁等；攻逐水饮类，如葶苈子、泽泻等。并可根据病理类型不一选用不同的药物，如未分化癌选龙葵、白英、白花蛇舌草、雷公藤、干蟾皮；腺癌选乌骨藤、槲寄生、前胡、苦参、山慈菇；鳞癌选牛蒡子、山豆根、牡荆子或牡荆叶、半枝莲。

1. 肺癌基本通用方

(1) 棱莪汤（上海中医药杂志，1982，7）

〔组成与用法〕 三棱 15~30g，莪术 15~30g，王不留行 15~30g，大黄廑虫丸（布包）12g，桃仁 12g，丹参 15g，海藻 30g。水煎服。

〔功能主治〕 化瘀软坚。主治各期肺癌。

〔加减应用〕 阴虚者，加南沙参、北沙参、天冬、麦冬、天花粉、百合；气虚者，加黄芪、党参、白术、茯苓；阳虚者，加附子、肉桂、补骨脂；痰湿者，加生半夏、生南星（先煎）、薏苡仁、杏仁、瓜蒌、马钱子；内热者，加肺形草、石豆兰、蚤休、苦参、草河车、黛蛤散；有胸腔积液者，加龙葵、葶苈子、桑白皮。

〔临床报道〕 治疗 62 例，总有效率 61.3%，有效的 34 例中，癌灶缩小者 5 例；生存 1、2、3 年以上者分别为 14 例、4 例、2 例。

(2) 清热润肺汤（广西中医药，1985，4）

〔组成与用法〕 夏枯草 30g，玄参 30g，生牡蛎（先煎）20g，白茅根 30g，蒲公英 30g，北沙参 30g，鱼腥草 30g，藕

节 30g, 薏苡仁 30g, 黄芪 30g, 炙百合 20g, 黄精 20g, 生鳖甲 (先煎) 15g, 麦冬 15g, 五味子 10g。水煎服。

[功能主治] 养阴润肺, 解毒化痰。主治各期肺癌。

[加减应用] 气虚者, 加黄芪、党参、白术; 痰中带血者, 加旱莲草、大蓟炭、小蓟炭; 阴虚者, 加玉竹、生地; 痰多者, 加川贝; 发热, 癌毒盛者, 加半枝莲、白花蛇舌草; 肿块不消者, 加三棱、莪术。

(3) 软坚散结汤 (辽宁省中医研究院方)

[组成与用法] 蚤休 20g, 半枝莲 30g, 昆布 20g, 海藻 20g, 白花蛇舌草 30g, 太子参 20g, 鳖甲 (先煎) 20g, 三七粉 (冲服) 5g, 川贝母 10g, 仙鹤草 30g。水煎服。

[功能主治] 软坚散结, 化痰祛瘀。主治肺癌。

[临床报道] 治疗晚期肺癌 30 例, 部分缓解 (PR) 11 例, 稳定 (SD) 14 例。最长生存期为 3.5 年。

(4) 蛤蟆蛇莓汤 (《癌症的治疗与预防》)

[组成与用法] 白花蛇舌草 15g, 白茅根 15g, 百部 30g, 干蛤蟆 10g, 急性子 10g, 鱼腥草 15g, 蛇莓草 15g, 薏苡仁 15g, 藤梨根 15g, 天葵子 15g, 党参 10g, 黄芪 30g, 陈皮 10g, 半夏 15g, 竹茹 10g, 代赭石 (先煎) 30g, 海藻 15g, 牡蛎 (先煎) 15g, 生姜 5 片, 大枣 5 枚。水煎服。

[功能主治] 宣肺散结。主治肺癌。

[加减应用] 证属寒者, 加干姜、肉桂、制附子、熟地; 证属热者, 加生石膏、知母、黄芩; 口渴者, 加麦冬、天花粉、石斛; 腹部按痛、便秘者, 加大黄、玄明粉; 咳痰带血者, 加大蓟炭、小蓟炭、白及或用三七粉 (冲服); 胸闷憋气者, 加瓜蒌、薤白、桔梗、枳壳; 胸腔积液者, 加赤小豆、葶苈子、大枣、茯苓、猪苓。

(5) 八角金盘汤 (浙江中医杂志, 1986, 11)

[组成与用法] 八角金盘 10g, 干蟾皮 12g, 黄芪 30g, 蛇

莓 30g, 八月札 30g, 半枝莲 15g, 鱼腥草 15g, 蚤休 30g, 丹参 15g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒。主治肺癌。

〔加减应用〕脾虚痰湿者, 加党参、白术、茯苓、法半夏、陈皮; 阴虚内热者, 加北沙参、生地、地骨皮、麦冬; 气滞血瘀者, 加桃仁、红花、三棱、莪术、皂角刺、赤芍; 气阴两虚者, 加人参、沙参、麦冬; 咯血者, 加阿胶、大蓟、小蓟、血余炭、藕节炭、或吞服云南白药; 胸腔积液者, 加葶苈子、冬瓜仁、石上柏。

〔临床报道〕治疗 45 例, 存活 5 年以上者 5 例, 3 年以上者 20 例, 1 年以上者 5 例。

(6) 天龙健脾汤 (广州医学院第一附属医院方)

〔组成与用法〕党参 20g, 黄芪 20g, 仙灵脾 12g, 莪术 12g, 郁金 15g, 天葵 10g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益气, 清热解毒。主治肺癌。

〔加减应用〕血瘀毒热证, 加白花蛇舌草、半边莲、桃仁、玄参; 气阴两虚证, 加海底椰、石斛、百合、生地; 气虚痰湿证, 加法半夏、茯苓、盐干蛇。

〔临床报道〕配合放、化疗治疗 38 例, 1、2、5 年生存率分别为 57.89%、36.84%、18.42%。(中医药学刊, 2004, 8)

(7) 星夏健脾饮 (周岱翰经验方)

〔组成与用法〕生南星 (先煎) 15g, 生半夏 (先煎) 15g, 守宫 6g, 薏苡仁 30g, 桔梗 12g, 全瓜蒌 15g, 浙贝母 15g, 猪苓 20g, 茯苓 20g, 党参 30g, 白术 15g。水煎服。

〔功能主治〕补中健脾, 润肺祛痰。主治肺癌。

〔加减应用〕痰涎壅甚者, 加陈皮、牛蒡子; 肢倦思睡者, 加人参、黄芪。面肢浮肿者, 加葶苈子、郁金; 神志昏蒙者, 加全蝎、蜈蚣、石决明。

(8) 黄藻化痰汤 (王沛经验方)

[组成与用法] 黄精 15g, 白术 15g, 茯苓 30g, 海藻 30g, 昆布 30, 制半夏 (先煎) 15g, 陈皮 10g, 生薏苡仁 30g, 牡蛎 (先煎) 30g, 象贝 15g, 银杏 15g, 肉蔻 10g。水煎服。

[功能主治] 健脾利湿, 化痰散结。主治肺癌。

[加减应用] 舌红而干、苔光如镜面者, 加玄参、知母、鳖甲、龟甲。

(9) 解毒润肺汤 (上海中医院经验方)

[组成与用法] 生石膏 (打碎, 先煎) 30g, 熟地 9g, 鱼腥草 30g, 野荞麦根 30g, 升麻 15g, 苦参 20g, 麦冬 12g, 漏芦 30g, 土茯苓 30g, 百部 30g, 野百合 30g, 炙天龙 6g, 黄精 12g, 生黄芪 30g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 养阴润肺。主治肺癌。

[加减应用] 胸痛者, 加红花、桃仁、蜈蚣; 痰中带血者, 加仙鹤草、白茅根、蒲黄。

(10) 滋阴清热方 (福州市第一医院验方)

[组成与用法] 沙参 15g, 麦冬 15g, 茯苓 15g, 地骨皮 12g, 百合 12g, 石斛 12g, 枸杞 10g, 川贝 9g, 绞股蓝 15g, 山药 15g, 白花蛇舌草 24g, 半枝莲 24g。水煎服。

[功能主治] 滋阴润肺, 清热化痰。主治肺癌。

[加减应用] 气短乏力者, 加黄芪、党参; 低热者, 加银柴胡、青蒿; 舌红而干, 苔光如镜面者, 加玄参、知母、鳖甲、龟甲。

[临床报道] 用该方配合辨证、化疗治疗肺癌 80 例, 总有效率 (CR+PR+SD) 为 77.5%。(福建中医药杂志, 2000, 2)

2. 肺鳞癌方

(1) 二根汤 (《中医肿瘤学》)

[组成与用法] 紫草根 30g, 山豆根 15g, 草河车 15g, 蚤休 15g, 前胡 15g, 马兜铃 15g, 海藻 15g, 山海螺 30g, 土贝

母 20g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒散结。主治肺鳞癌。

(2) 百蚤蛇舌汤 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 百合 10g, 生地 10g, 熟地 10g, 玄参 10g, 麦冬 10g, 当归 10g, 白芍 10g, 南、北沙参各 15g, 桑白皮 15g, 蚤休 30g, 黄芩 10g, 臭牡丹 30g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴生津, 润肺化痰。主治肺鳞癌。

〔加减应用〕 气短乏力者, 加黄芪、党参; 胸痛者, 舌质紫暗有瘀斑, 加红花、桃仁、川芎; 痰中带血者, 加蒲黄炭、藕节炭、仙鹤草; 胸腔积液者, 加葶苈子、芫花; 痰多者, 加生南星、生半夏 (均先煎半小时); 低热者, 加银柴胡、地骨皮; 高热者, 加生石膏。

〔临床报道〕 治疗中晚期肺鳞癌 80 例, 治后 1 年生存率 57.5%, 中位生存期 420 天。(中国医药学报, 1990, 3)

3. 肺腺癌方

复方蜀羊泉汤 (《中医肿瘤学》)

〔组成与用法〕 蜀羊泉 30g, 龙葵 30g, 蛇莓 15g, 山海螺 30g, 生薏苡仁 30g, 生牡蛎 (先煎) 30g, 夏枯草 15g, 浙贝母 10g, 山慈菇 15g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 软坚散结。主治肺腺癌。

4. 肺未分化癌方

羊泉蛇草汤 (河南中医, 1991, 5)

〔组成与用法〕 西洋参 10g, 鱼腥草 30g, 黄芩 12g, 蜀羊泉 30g, 薏苡仁 30g, 丹参 30g, 瓜蒌 30g, 当归 15g, 赤芍 15g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 南星 (先煎) 10g, 露蜂房 15g, 茯苓 15g, 枳壳 12g, 甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 补气活血, 解毒化痰。主治肺中央型未分化癌。

5. 肺癌中晚期用方

(1) 益肺败毒汤（湖南省中医药研究院肿瘤科方）

〔组成与用法〕 生黄芪 30g，白参 10g（蒸兑），灵芝 10g，沙参 12g，麦冬 12g，百合 15g，生地 12g，浙贝母 10g，桔梗 10g，丹参 15g，臭牡丹 30g，石见穿 30g，白花蛇舌草 30g，瓜蒌 10g，甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肺，化痰解毒。主治中晚期肺癌。

〔加减应用〕 痰多者，加法半夏、胆南星；咯血者，去丹参，加蒲黄炭、三七粉（冲服）、大黄粉；纳呆者，加白术、茯苓、炒山楂；胸腔积液者，加炒葶苈子、桑白皮。

〔临床报道〕 治疗 56 例，瘤体稳定率（CR+PR+NC）为 80.4%。（湖南中医杂志，2002，3）

(2) 养阴益肺汤（刘嘉湘经验方）

〔组成与用法〕 生黄芪 15g，半枝莲 30g，生白术 12g，北沙参 30g，天冬 12g，石上柏 30g，白花蛇舌草 30g，蝉衣 15g，山豆根 15g，夏枯草 15g，海藻 15g，昆布 12g，生南星（先煎）30g，瓜蒌皮 15g，生牡蛎（先煎）30g，五味子 6g，杏仁 10g，百部 10g，川贝母 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，扶正抗癌。主治中晚期肺癌。

〔加减应用〕 阴虚者，加百合、麦冬、玄参、生地，去黄芪、白术；气虚者，去北沙参、天冬，加党参、茯苓；肾阳虚者，加仙灵脾、补骨脂、菟丝子、锁阳、肉苁蓉。

(3) 养阴清肺方（中日友好医院中医肿瘤科方）

〔组成与用法〕 党参 10g，沙参 10g，五味子 10g，百合 10g，桑白皮 15g，川贝母 10g，全瓜蒌 10g，鱼腥草 30g，白花蛇舌草 30g，白及 10g。水煎服。

〔功能主治〕 养阴清肺。主治中晚期肺癌。

〔加减应用〕 痰多者，加生南星（先煎）、生半夏（先煎）、皂角刺、白芥子、白前、礞石；咳嗽者，加桔梗、瓜蒌皮、前

胡、葶苈子、杏仁、竹沥；痰黄稠者，加黄芩、天竺黄、海浮石、海蛤壳；痰血或咯血者，加白茅根、仙鹤草、生地榆、黛蛤散、花蕊石、藕节炭；喘咳气急者，加苏子、白石英等；发热者，加银柴胡、金银花、地骨皮、生石膏；胸背疼痛者，加八月札、延胡索、乳香、没药、徐长卿、藤梨根；胸腔积液者，加车前子、川椒目、龙葵、葶苈子。

〔临床报道〕 治疗非小细胞肺癌 50 例，瘤体稳定率 51%，中位生存期 13.7 个月。（中国临床医生，2004，2）

（4）加减葶茎汤（广州中医药大学第一附属医院方）

〔组成与用法〕 葶茎 30g，生薏苡仁 30g，太子参 30g，冬瓜子 30g，生南星（先煎）15g，生半夏（先煎）15g，山慈菇 15g，丹参 15g，桃仁 15g，枳实 6g，守宫 6g，甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 清肺解毒，祛痰化瘀。主治中晚期肺癌。

〔加减应用〕 肺热痰黄黏者，加浙贝母、黄芩；咯血明显者，加仙鹤草、侧柏叶；胸腔积液者，加葶苈子、猪苓；脑转移者，加全蝎、蜈蚣；气阴两虚者，加人参、黄芪、五爪龙、天冬、百合，另用西洋参炖服。

〔临床报道〕 治疗 124 例，治疗后 1、3、5 年生存率分别为 56%、16%、3%。（新中医，2004，7）

（5）扶正养阴肺积方（上海中医医院王羲明经验方）

〔组成与用法〕 生地 12g，熟地 12g，天冬 12g，麦冬 12g，玄参 12g，生黄芪 15g，党参 15g，漏芦 30g，土茯苓 30g，鱼腥草 30g，升麻 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，清热解毒。主治中晚期肺癌。

〔加减应用〕 口渴甚者，加知母、石斛、天花粉、制首乌；脾虚甚者，加茯苓、薏苡仁、山药、黄精；咳嗽痰盛者，加炙百部、马兜铃、射干、佛耳草；热盛痰血者，加芙蓉叶、野荞麦根、七叶一枝花、花蕊石；气滞血瘀者，加八月札、延胡

索、两面针、露蜂房。

(6) 养阴解毒汤 (中医杂志, 1988, 2)

[组成与用法] 生地 12g, 五味子 10g, 北沙参 15g, 王不留行 10g, 麦冬 15g, 蒲公英 20g, 石见穿 30g, 百部 12g, 徐长卿 15g, 地骨皮 15g, 南沙参 15g, 望江南 15g, 野菊花 15g, 怀山药 15g, 白花蛇舌草 30g, 煅牡蛎 (先煎) 30g, 夏枯草 15g, 海藻 15g, 海带 15g, 玄参 12g, 天花粉 15g, 丹参 15g, 川贝 10g, 炙穿山甲 10g, 制鳖甲 (先煎) 15g, 蜀羊泉 15g, 丹皮 10g, 鱼腥草 10g, 紫花地丁 15g, 象贝 10g。水煎服。

[功能主治] 滋阴清热, 解毒散结。主治中晚期肺癌。

[加减应用] 咳嗽痰黏者, 加紫菀、款冬花、枇杷叶、淡竹叶; 痰中带血者, 加蒲黄、仙鹤草、白及、紫草根、地榆炭、三七 (冲服); 低热者, 加红藤、银花、板蓝根、败酱草、连翘; 胸痛者, 加瓜蒌、郁金、川楝子、延胡索、赤芍、桃仁; 肢节酸楚者, 加寻骨风、炙乳香、炙没药、防己、桑寄生、怀牛膝、全蝎、地龙、蜈蚣; 气阴不足者, 加石斛、芦根、天冬、太子参、黄芪。

[临床报道] 治疗 502 例, 2 期患者 263 例, 1、3、5 年生存率分别为 55.89%、14.87%、6.47%; 3 期患者 157 例, 1、3 年生存率分别为 40.76%、11.51%; 4 期患者 157 例, 1、3 年生存率分别为 24.39%、10.64%。

(7) 沙参贞芪方 (江苏中医, 1988, 12)

[组成与用法] 南沙参 12g, 北沙参 12g, 麦冬 9g, 女贞子 15g, 生黄芪 20g, 太子参 12g, 玄参 12g, 象贝母 15g, 蜈蚣 3 条, 三棱 9g, 莪术 9g, 山豆根 20g。水煎服。

[功能主治] 补肺益气, 化瘀散结。主治中晚期肺癌。

[加减应用] 发热者, 加金银花、黄芩、水牛角 (先煎); 咳嗽痰多者, 加鱼腥草、桔梗、杏仁、炙款冬、白芥子; 胸腔

积液者，加苍术、白术、葶苈子、车前子、茯苓；肺不张，气急者，加炙麻黄、丹参、地龙、旋覆花；胸胁疼痛者，加瓜蒌、延胡索、炒白芍、炙甘草。

〔临床报道〕 治疗 32 例，1、3、5 年生存者分别为 13 例、2 例、1 例。

(8) 蚤黄汤 (辽宁中医杂志, 1991, 2)

〔组成与用法〕 炙黄芪 15g, 蚤休 30g, 柴胡 15g, 生半夏 (先煎) 15g, 西洋参 (蒸兑) 10g, 香附 10g, 神曲 10g, 瓜蒌 20g, 鱼腥草 20g, 川贝母 20g, 白豆蔻 6g, 陈皮 6g, 升麻 6g, 白及 6g, 生三七 (冲服) 4g, 炙甘草 4g, 灯心、竹叶为引。水煎服。

〔功能主治〕 扶正解毒，理气化痰。主治中晚期肺癌。

〔加减应用〕 咳嗽不止者，加炒杏仁、炙枇杷叶、咯血者，加仙鹤草、阿胶珠，并加重生三七、白及；喘促不能平卧者，加葶苈子、地龙；高烧不退者，加生石膏、石菖蒲、羚羊角粉；胸胁痛者，加忍冬藤、九香虫；胃脘胀闷疼痛者，去升麻、炙甘草，加白芍、炒莱菔子；淋巴结转移者，加黄药子、石上柏；骨转移者，加续断、没药、血竭；胃转移者，加石见穿、瓦楞子；肝转移者，加半枝莲、鸡骨草、铁树叶；肠转移者，加御米壳、赤石脂。

〔临床报道〕 治疗 42 例，存活 5 年以上者 10 例，2 年以上 18 例。

(9) 夏藻汤 (《抗癌中草药制剂》)

〔组成与用法〕 夏枯草 30g, 海藻 30g, 海带 30g, 生牡蛎 (先煎) 30g, 石见穿 30g, 徐长卿 30g, 丹皮 9g, 瓜蒌 15g, 生地 30g, 野菊花 30g, 王不留行 30g, 铁树叶 30g, 蜀羊泉 30g, 望江南 30g, 鱼腥草 30g, 蒲公英 30g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰散结，清热解毒。主治中晚期肺癌。

〔加减应用〕 咳嗽者，加制半夏、陈皮、枇杷叶、白芥子；

咯血者，加生地榆、大蓟、小蓟、花蕊石、仙鹤草。

(10) 南北沙参汤 (浙江中医杂志, 1986, 11)

[组成与用法] 南沙参 15g, 北沙参 15g, 天花粉 15g, 海蛤壳 15g, 麦冬 12g, 白薇 12g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 川贝粉 (冲服) 3g, 生甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴, 清热解毒。主治中晚期肺癌。

[加减应用] 气虚者, 加党参、黄芪; 咯血者, 加仙鹤草、旱莲草、白茅根; 咯血量多者, 加生石膏、鲜芦根、知母; 发热持续不退者, 加服安宫牛黄丸; 胸痛者, 加丹参、赤芍、蜈蚣、三七粉 (冲服)。

[临床报道] 治疗肺癌 105 例, 存活 1、3、5 年以上者分别为 32 例、3 例及 2 例。

(11) 清肺散结方 (浙江中医杂志, 1981, 2)

[组成与用法] 瓜蒌壳 9g, 桑白皮 9g, 知母 9g, 竹沥 9g, 法半夏 9g, 百部 9g, 海浮石 15g, 虎耳草 15g, 鱼腥草 30g, 半枝莲 30g, 白毛藤 30g, 黄毛耳草 30g。水煎服。

[功能主治] 清肺化痰, 解毒散结。主治中晚期肺癌。

[加减应用] 痰中带血者, 加仙鹤草、白及、黛蛤散; 胃纳不佳者, 加陈皮、神曲、谷芽、麦芽; 化疗而致白细胞下降者, 加党参、当归、鸡血藤、黄芪、虎杖根; 气阴亏虚较甚, 加西洋参 (蒸兑)。

6. 肺癌合并肺部感染方

鱼腥蛇草汤 (中医研究, 1996, 2)

[组成与用法] 百部 20~30g, 皂角刺 6~10g, 白花蛇舌草 30~60g, 白芥子 6~10g, 天葵子 15g, 牡蛎 (先煎) 15g, 海藻 15g, 鱼腥草 30g, 荆芥 10g。水煎服。

[功能主治] 宣肺涤痰, 解毒散结。主治肺癌合并肺部感染。

[加减应用] 素体虚寒, 体温不升, 发热而不口渴, 咳嗽

咯白痰者，加干姜、附子、肉桂；见胸闷，气短，乏力，多汗者，加党参、黄芪、瓜蒌、制半夏、陈皮；胸胁胀满，心烦易怒，咳痰带血者，加柴胡、白芍、郁金、大蓟、小蓟、仙鹤草、三七粉（冲服）等。

7. 肺癌脑转移方

化痰解毒汤（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕天麻 10g，白术 15g，土茯苓 15g，白花蛇舌草 30g，法半夏 15g，车前草 20g，羚羊角粉（冲服）2g，鸡内金 15g，薏苡仁 30g，山慈菇 25g。水煎服。

〔功能主治〕化痰解毒，软坚散结。主治肺癌脑转移。

〔加减应用〕头晕，视物模糊者，加青箱子、决明子；呕吐者，加益母草、泽泻、牛膝；头痛剧烈者，加全蝎、蜈蚣、僵蚕。

8. 肺癌并心律失常方

纠律汤（青海省人民医院肿瘤内科方）

〔组成与用法〕柴胡 15g，陈皮 15g，制半夏 10g，赤芍 10g，川芎 10g，枳壳 10g，香附 10g，白术 15g，党参 15g，黄芪 15g，当归 10g，茯苓 15g，远志 10g，酸枣仁 15g，生姜 3 片，大枣 6 枚，甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕疏肝祛痰，补益心脾。主治肺癌并心律失常。

〔临床报道〕配合治疗 69 例，化疗后 1、2、3、4 周心律失常治愈率分别为 38.9%、30.3%、22.0%、5.5%。

9. 肺癌骨转移方

（1）白鹿止痛汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕熟地 30g，鹿角胶（烊化）10g，姜炭 5g，炙麻黄 5g，白芥子 10g，桂枝 10g，枸杞 10g，菟丝子 10g，徐长卿 10g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕温阳散寒，通络行滞。主治肺癌骨转移。

〔加减应用〕痛甚，固定不移者，加制乳香、制没药、莪

术；食纳减少者，加谷芽、麦芽；大便溏薄者，加神曲、薏苡仁。

(2) 秦艽寄生汤（李佩文经验方）

【组成与用法】 桑寄生 20g，秦艽 10g，桑枝 30g，木瓜 15g，苏木 10g，骨碎补 10g，透骨草 10g，海桐皮 10g，千年健 10g，茜草 10g，狗脊 10g，徐长卿 10g。水煎服。

【功能主治】 通阳壮骨，祛风止痛。主治肺癌骨转移。

【加减应用】 针对焦虑、神志不安症状者，加用安神、解郁、除烦、宁心之剂。

【对症用方】

肺癌的对症治疗主要针对其并发症及手术、放疗、化疗的合并症、不良反应进行相应的中药治疗。

1. 肺癌各期咯血方

(1) 解毒凉血方（《中华肿瘤治疗大成》）

【组成与用法】 白花蛇舌草 20g，猫爪草 20g，猪苓 20g，大蓟 20g，小蓟 20g，延胡索 20g，黄芪 20g，党参 20g，薏苡仁 20g，生半夏（先煎）20g，黄芩 15g，三七粉（冲服）6g，壁虎（冲服）2 条。水煎服。

【功能主治】 清热解毒，凉血止血。主治肺癌各期咯血。

【加减应用】 口淡纳差者，加藿香；血止者，去大、小蓟。

(2) 养阴止血方（《肿瘤的诊断与防治》）

【组成与用法】 白及 15g，阿胶 9g（烔化），二蓟炭、藕节炭各 30g。水煎服。

【功能主治】 养阴止血。主治肺癌各期咯血。

2. 肺癌胸痛方

(1) 宽胸理气汤（李佩文经验方）

【组成与用法】 全瓜蒌 15g，枇杷叶 10g，木蝴蝶 10g，浙贝母 15g，百部 15g，薏苡仁 20g，延胡索 10g，五灵脂 10g，川楝子 10g，葶苈 3g，百合 15g，矮地茶 15g。水煎服。

〔功能主治〕行气宽胸，散结止痛。主治肺癌胸痛。

〔加减应用〕胸腔积液抽取后疼痛加重者，加茯苓、葶苈子；胸痛彻背者，加狗脊、桑寄生。

(2) 活血止痛方（福建中医药，1993，1）

〔组成与用法〕罂粟壳 9g，乳香 3g，没药 6g，延胡索 12g，田三七粉（冲服）3g，白屈菜 9g，三棱 9g，莪术 9g，红花 10g，丹参 10g，川楝子 10g。水煎服。

〔功能主治〕活血理气止痛。主治肺癌胸痛。

〔加减应用〕胸痛甚者，加赤芍、郁金、瓜蒌、桃仁。

(3) 平消方（陕西省中医研究院方）

〔组成与用法〕仙鹤草 15g，枳壳 18g，净火硝 18g，白矾 18g，郁金 18g，干漆 6g，五灵脂 15g，制马钱子 12g。制成片剂，每片 0.48g，1 次 4~8 片，1 日 3 次，3 个月为 1 个疗程。

〔功能主治〕化痰软坚，活血止痛。主治肺癌胸痛。

3. 肺癌上腔静脉综合征方

(1) 宣肺利水方（《肿瘤良方大全》）

〔组成与用法〕半边莲 30g，露蜂房 9g，葶苈子 9g，半枝莲 30g，瓜蒌 30g，茯苓 15g，车前草 30g，夏枯草 30g。水煎服。

〔功能主治〕宣肺利水。主治肺癌出现胸腔积液，头颈四肢肿胀发绀者。

〔加减应用〕面肢浮肿者，加泽泻、郁金；兼悬饮而不能平卧者，加白芥子。

(2) 治肺利水方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕壁虎 5 条，蜈蚣 3 条，干蟾皮 3g，羊乳 30g，徐长卿 30g，玉竹 30g，甜葶苈子（包煎）30g，茯苓皮 15g，泽泻 15g，生甘草 10g，蛤蚧 1 对。水煎服。

〔功能主治〕通经利水。主治肺癌面浮肢肿者。

〔加减应用〕喘促多汗者，加生黄芪、白花蛇舌草、麦冬；

下肢浮肿甚者，去马庵子，加牛膝。

(3) 瓜蒌葶苈汤（《肿瘤学》）

〔组成与用法〕 瓜蒌 25g，葶苈子 15g，泽泻 20g，龙葵 15g，夏枯草 30g，牡蛎（先煎）15g，昆布 15g，土贝母 15g，土鳖虫 12g，苏子 15g。水煎服。

〔功能主治〕 宽胸行水，软坚散结。主治上腔静脉综合征。

4. 肺癌手术后治疗专方

(1) 扶正抗癌方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 太子参 15g，北沙参 15g，丹参 12g，麦冬 15g，五味子 10g，川贝 10g，薏苡仁 15g，鱼腥草 20g，蚤休 20g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，解毒抗癌。主治肺癌术后正虚毒邪未尽。

〔加减应用〕 气促、自汗者，加黄芪、白参；低热盗汗、口干、舌红少苔、脉细者，加石斛、天花粉、炙鳖甲（先煎）、地骨皮；发热胸痛，咳嗽气急，痰多黄稠，心烦口干，便秘，舌红，苔薄黄，脉细而数者，加黄芩、玄参、桑白皮、瓜蒌、天竺黄。

(2) 玉屏风散加减方（郁存仁经验方）

〔组成与用法〕 生黄芪 30g，炒白术 9g，防风 9g，浮小麦 30g，煅龙骨 12g，煅牡蛎 12g，炙前胡 12g，马兜铃 9g，生枇杷叶 9g，草河车 30g，夏枯草 13g，川贝母 9g，北沙参 9g，五味子 9g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾化痰，益气固表。主治肺癌术后气阴两虚，痰湿内生，症见咳嗽、胸痛动则汗出等。

5. 肺癌放疗后治疗专方

(1) 滋阴清肺方（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕 沙参 25g，麦冬 20g，鱼腥草 20g，蒲公英 20g，红花 16g，丹皮 10g，枇杷叶 15g，贝母 10g，桑白皮

15g, 黄芩 15g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴清肺。主治肺癌放疗后毒热伤肺。

〔加减应用〕 气虚咳嗽气短者, 加黄芪、党参; 咳嗽痰多者, 加法半夏、瓜蒌; 恶心呕吐者, 加竹茹、代赭石 (先煎); 食少神疲者, 加砂仁、谷芽、麦芽、鸡内金; 口燥咽干者, 加天花粉、芦根、石斛、乌梅。

(2) 金石清解方 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 黄芪 30g, 参须 10g, 麦冬 10g, 石斛 15g, 金银花 30g, 连翘 10g, 蚤休 30g, 怀山药 15g, 茯苓 10g, 生地 10g, 玄参 10g, 竹茹 10g, 女贞子 10g, 旱莲草 10g, 白花蛇舌草 30g, 夏枯草 15g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 清热解毒。主治肺癌放疗后热毒伤肺。

〔加减应用〕 恶心呕吐者, 加法半夏、砂仁; 白细胞下降者, 加锁阳、仙灵脾。

(3) 扶正增效方 (中国中西医结合外科杂志, 1998, 5)

〔组成与用法〕 生黄芪 15g, 太子参 15g, 白术 10g, 北沙参 15g, 枸杞子 10g, 苏木 10g, 红花 10g, 鸡血藤 15g, 石斛 10g, 金银花 30g, 鸡内金 5g。水煎服。

〔功能主治〕 生津润燥, 清热解毒, 健脾和胃。主治肺癌放疗后气阴两虚。

〔加减应用〕 临床运用时可佐加白花蛇舌草、半枝莲等抗癌; 阴虚重者, 加玄参、天花粉。

〔临床报道〕 张代钊等的研究显示扶正增效方能提高肺癌放射治疗的近期疗效, 其有效率为 69.7%; 毒副反应出现率明显低于单纯放射组 ($P < 0.05$)。

(4) 蛇莓龙葵饮 (郁仁存经验方)

〔组成与用法〕 鱼腥草 30g, 前胡 12g, 夏枯草 15g, 白英 30g, 蛇莓 15g, 龙葵 30g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 金

银花 30g, 蒲公英 30g, 赤芍 13g, 贝母 12g, 太子参 30g, 麦冬 12g, 天冬 12g, 干蟾皮 3g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 清热解毒。主治肺癌放疗后放射性肺炎。

〔加减应用〕 咳甚者, 加沙参、桔梗、杏仁、百部; 瘀毒较甚者, 加土贝母、蜀羊泉、桃仁、水蛭; 白细胞下降者, 加鸡血藤、菟丝子、生黄芪。

6. 肺癌化疗期间及化疗后专方

(1) 癌复康方加减 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 白参 (蒸兑) 10g, 黄芪 30g, 白术 10g, 茯苓 10g, 枸杞 10g, 女贞子 10g, 菟丝子 10g, 广木香 10g, 仙灵脾 10g, 法半夏 10g, 砂仁 5g, 旱莲草 15g, 夏枯草 15g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾, 和胃理气。主治肺癌多种化疗副反应。

〔加减应用〕 恶心呕吐甚者, 加姜竹茹、代赭石; 气虚多汗, 加黄芪、防风; 腹泻者, 加神曲。

〔临床报道〕 该方能明显提高化疗的完成率, 降低食欲减退、恶心呕吐、腹胀腹痛等临床症状发生率, 抗多种化疗反应总有效率达 80.75%。(中国中西医结合外科杂志, 1999, 4)

(2) 四君子汤加减 (福建中医药, 2002, 6)

〔组成与用法〕 党参 12g, 白术 12g, 茯苓 15g, 炙甘草 9g, 薏苡仁 30g, 山楂 20g, 麦谷芽 9g。水煎服。

〔功能主治〕 温脾养胃, 除湿助运。主治肺癌化疗后脾虚湿滞, 食欲不振者。

〔加减应用〕 呕吐甚者, 加旋覆花、代赭石、竹茹等; 腹胀甚者, 加陈皮、八月札; 气血亏虚者, 加黄芪、当归; 湿热蕴蒸者, 加黄连、茵陈。

〔临床报道〕 治疗 30 例, 治后恶心呕吐, 纳差等症状缓解

率观察组明显优于对照组 ($P<0.01$)。腹胀 2 组间差异无显著性 ($P>0.05$)。

【专病成药】

1. 金复康口服液 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕 黄芪、北沙参、麦冬、女贞子 (酒制)、山茱萸、绞股蓝、淫羊藿、胡芦巴 (盐水炒)、石上柏、石见穿、重楼、天冬。

〔功能主治〕 益气养阴，清热解毒。主治肺癌。

〔用法用量〕 口服，1 次 30ml，1 日 3 次，30 天为 1 个疗程。

2. 复方斑蝥胶囊 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕 斑蝥、刺五加、半枝莲、黄芪、女贞子、山茱萸、人参、三棱、莪术、熊胆粉、甘草。

〔功能主治〕 破血消癥，攻毒蚀疮。主治肺癌。

〔用法用量〕 口服，1 次 3 粒，1 日 2 次。

3. 益肺清化膏 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕 黄芪、党参、白花蛇舌草、北沙参、麦冬、败酱草、仙鹤草、川贝母、苦杏仁等十多味药物组成。

〔功能主治〕 益气养阴，清热解毒，化痰止咳。适用于气阴两虚，阴虚内热型晚期肺癌的辅助治疗。

〔用法用量〕 口服。1 次 20g，1 日 3 次。2 个月为 1 个疗程，或遵医嘱。

4. 清肺散结丸 (原名：参灵丸) (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕 灵芝、冬虫夏草、阿胶、珍珠、牛黄、川贝、绞股蓝等 10 余味。

〔功能主治〕 清热解毒，活血止痛，消肿止痛，止咳化痰。主治肺癌。

〔用法用量〕 口服，每次 3g，1 日 2 次，2 个月为 1 个

疗程。

5. 紫龙金片（又名白龙片，《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 黄芪、当归、白英、龙葵等。

〔功能主治〕 益气养血，清热解毒，理气化痰。为肺癌气血两虚兼瘀热证患者化疗的辅助用药。

〔用法用量〕 口服，1次4片，1日3次，与化疗同时使用。每4周为1个周期，2个周期为1个疗程。

6. 鹤蟾片（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 仙鹤草、干蟾皮、猫爪草、浙贝母、生半夏、鱼腥草、天冬、人参、葶苈子。

〔功能主治〕 解毒除痰，凉血祛瘀，消癥散结。主治原发性支气管肺癌，肺部转移癌。

〔用法用量〕 口服，1次6片，1日3次。或遵医嘱。

7. 金龙胶囊（《最新国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 鲜守宫、鲜金钱白花蛇等。

〔功能主治〕 扶正荡邪，解毒消肿，理气止痛，破瘀散结。具有增强免疫功能，促进新陈代谢，抑制多种肿瘤，改善体质等作用。主治肺癌。（北京中医，1999，6）

〔用法用量〕 口服，1次2~4粒，1日3次，1~2个月为1个疗程。

8. 鸦胆子油乳剂（《最新国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 鸦胆子。

〔功能主治〕 清热燥湿，解毒消癥。有明显抗肿瘤作用，增强免疫功能，促进骨髓造血。主治肺癌及肺癌脑转移。（中国中西医结合杂志，1985，2）

〔用法用量〕 静滴，每次10~40ml，加入5%葡萄糖注射液500ml静脉滴注，1日1次；或口服，每次20ml，1日2~3次。

9. 康莱特注射液 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

[处方组成] 注射用薏苡仁油。

[功能主治] 益气养阴，消癥散结。适用于不宜手术的气阴两虚、脾虚湿困型肺癌。配合放疗、化疗有一定的增效作用。

[用法和用量] 静脉滴注 200ml，1 日 1 次，21 天为 1 个疗程。

10. 香菇多糖注射液 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

[处方组成] 香菇多糖。

[功能主治] 免疫调节剂，用于肺癌及胸腔积液。(青海医学杂志，2003，10)

[用法用量] 每周 2 次，1 次 1mg，加入 250ml 生理盐水或 5% 葡萄糖注射液中滴注，或用 5% 葡萄糖注射液 20ml 稀释后胸腔内注射。

11. 艾迪注射液 (《国家基本医疗保险药品目录》2002)

[处方组成] 人参、黄芪、刺五加、斑蝥。

[功能主治] 清热解毒、消癥散结。主治肺癌。也可与化疗药物配合使用，减少化疗药物用量，增强疗效，减少不良反应。

[用法用量] 静滴，每次 50~100ml，加入 250ml 生理盐水或 5% 葡萄糖注射液中滴注，1 日 1 次。

12. 榄香烯乳注射液 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

[处方组成] 榄香烯，为中药莪术中提取的抗癌活性物质。

[功能主治] 抑制肿瘤细胞生长；增强 T 淋巴细胞亚群功能；与放疗、化疗有协同作用；能为机体提供高能量营养；缓解癌痛；改善微循环；能通过血-脑脊液屏障。主治肺癌及癌性胸腔积液。

[用法用量] ①静脉注射：1 日 1 次，400~600mg/次，15 天为 1 个疗程。②胸腔注射：200~300mg/m²。注药后，嘱患者

多次改变体位，以增大药液接触面积，1~3次为1个疗程。

【专病单方】

1. 龙葵 用法：每取鲜品或干品 500g，水煎，1日1剂，分2次服。功用：清热解毒，利尿。主治：肺癌并胸腔积液者。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 猫爪草 用法：每取 50g，配夏枯草 50g。1次水煎送服小金丹 60粒，1日3次。功用：解毒散结。主治：肺腺癌并淋巴结转移。（江西中医药，1986，2）

3. 海浮石 用法：60g，捣为末，炼蜜为丸，每丸 3~5g，1次以粥饮下 10丸，1日3次。功用：清肺解毒。主治：肺癌高热，咳嗽不止。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 鲜葫芦 用法：每取 1个，捣烂，绞取汁液，1次 100ml，加入适量蜂蜜调服，1日2次。功用：清热利湿。主治：肺癌并胸腔积液。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 五倍子 用法：每取 10g，研末炒黑，用米醋调膏外敷脐上。功用：收敛止汗。主治：肺癌汗出不止。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 活蟾蜍 用法：每取 1只，白胡椒 20粒，将胡椒放入蟾蜍口内，3天后于火上焙干，研成细粉。1次 1g，1日2次。功用：通经活络，消肿止痛。主治：肺癌放疗所致的慢性放射性肺炎。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 赤小豆 用法：每取 90g，配鱼腥草 30g。水煎，1日1次，分2次服。功用：清热利湿。主治：肺癌有感染发热者。（《中华肿瘤治疗大成》）

8. 铁树叶 用法：每取 30g，配芙蓉叶 30g，泽漆 15g。水煎，1日1剂，分2次服。功用：清热解毒。主治：中晚期肺癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

9. 白英 用法：每取 30g，配垂盆草 30g，水煎服。功用：清热解毒。主治：肺癌。（《全国中草药汇编》）

胸 膜 肿 瘤

胸膜肿瘤是发生于胸膜上的肿瘤，可分为原发性和转移性两大类。绝大多数胸膜肿瘤为转移性，其中最常见者为肺癌的转移。原发性胸膜肿瘤发病率较低，常见者为胸膜间皮瘤。其发生主要与石棉粉尘吸入有关。

本病相当于中医病名胸痛、悬饮、息贲等范畴。中医认为其发病乃因正气虚损后，内伤饮食、情志，外感邪毒，致肺气壅塞，气机不利，津液不布，使气滞、痰浊、瘀血内生，阻结胸中，日久成积。

【辨证用方】

胸膜肿瘤的辨证当以辨虚实，虚证涉及肺脾肾三脏，以气血亏虚为主，治疗应补肺健脾益肾，并补气血；实证多见气滞，血瘀及痰饮内停，治疗应理气、化瘀、祛痰、化饮利水。

1. 脾气壅滞证

主症：咳嗽气短，胸闷咳痰或伴胸痛不适，苔薄或薄黄，脉细弦。

治法：健脾理气。

加减导痰汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕姜半夏 10g，陈皮 10g，茯苓 10g，制南星 10g，枳实 10g，生牡蛎（先煎）20g，玄参 10g，生薏苡仁 20g，浙贝母 10g，桃仁 10g，瓜蒌壳 15g，五灵脂 10g，蚤休 20g。水煎服。

〔功能主治〕宣肺降逆，软坚化痰。主治胸膜肿瘤。

〔加减应用〕气急者，加苏子、葶苈子、桑白皮；纳差者，加山楂、麦芽。

2. 气滞血瘀证

主症：胸闷胸痛，胁肋胀痛或刺痛，咳嗽不畅，痰中带

血，喘促气促，舌质紫暗或有瘀斑，苔薄腻，脉弦。

治法：活血化瘀。

加减血府逐瘀汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕当归 15g，生地 15g，桃仁 10g，川芎 10g，赤芍 15g，枳壳 10g，桔梗 10g，郁金 12g，生蒲黄（布包）10g，蚤休 30g，白花蛇舌草 30g，鱼腥草 15g，夏枯草 20g，茯苓 15g，生甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕通络止痛，清热散结。主治胸膜间皮瘤。

〔加减应用〕发热者，加生石膏、黄芩；胸痛甚者，加延胡索、三七粉（冲服）；纳差者，加砂仁、麦芽、鸡内金。

3. 饮停胸胁证

主症：胁痛，咳唾则更甚，转侧呼吸均牵引而痛，肋间饱满，气短息促，有时只能偏卧于一侧，舌苔薄白，脉沉弦。

治法：健脾、泻肺、利水。

四君子汤合葶苈大枣泻肺汤加减方（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕党参 15g，白术 12g，茯苓皮 30g，葶苈子 30g，大枣 10g，山慈菇 30g，陈皮 10g，薏苡仁 30g，半边莲 30g，姜皮 10g，陈葫芦 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益气，逐水祛饮。主治胸膜间皮瘤。

〔加减应用〕胸部满闷，舌苔浊腻者，加薤白、杏仁；体弱食少者，加砂仁、麦芽；喘咳吐黄痰者，加桑白皮、瓜蒌、黄芩、胆南星。

4. 肺脾两虚证

主症：咳嗽痰多，胸闷气促，四肢倦怠，纳呆腹胀，大便溏薄，舌质淡胖，舌苔白腻，脉濡滑或濡缓。

治法：健脾补肺，化痰散结。

六君子汤合导痰汤加减方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕党参 30g，白术 15g，茯苓 15g，法半夏 10g，制南星 10g，枳壳 10g，生牡蛎（先煎）30g，薏苡仁

30g, 佩兰 10g, 龙葵 30g, 甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 益气健脾, 理气化痰。主治胸膜间皮瘤。

〔加减应用〕 咳嗽气促, 难以平卧者, 加人参、麦冬、五味子、瓜蒌壳; 咳痰黄稠者, 加鱼腥草、瓜蒌。

5. 气血两虚证

主症: 气促咳嗽, 咳痰黏稠, 动则自汗, 头晕目眩, 神疲乏力, 食纳差, 小便短少不利, 面色无华, 舌质淡, 苔少, 脉细弱无力。

治法: 益气养血, 健脾化痰。

加减十全大补汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 黄芪 30g, 党参 20g, 白术 15g, 茯苓 15g, 当归 10g, 川芎 10g, 白芍 10g, 熟地 10g, 附片 (先煎) 6g, 陈皮 10g, 海浮石 10g, 胡桃肉 10g, 仙灵脾 15g, 蚤休 20g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血, 补肾纳气。主治胸膜间皮瘤。

〔加减应用〕 心动悸, 脉结代者, 加炙甘草、人参、麦冬、五味子; 肢冷畏寒, 便溏者, 加干姜、桂枝。

【辨病用方】

胸膜肿瘤的辨病治疗主要针对瘀毒内结胸中, 肺气壅塞的特点, 早期治疗采用以清热解毒、活血化瘀、软坚散结、以毒攻毒等中药为主, 晚期根据体质强弱配以健脾益气等扶正中药治疗。

1. 软坚方 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 乳香 50g, 没药 50g, 牛黄 1.5g, 麝香 7.5g, 马钱子 9g, 壁虎 20g, 蟾酥 1g。用法: 上药共研细末为丸, 如火麻仁大, 1次 3g, 1日 2次。

〔功能主治〕 理气止痛, 活血软坚。主治胸膜间皮瘤。

〔加减应用〕 临床运用时气短乏力者, 加黄芪、白术、西洋参; 胸痛者, 加赤芍、丹参、郁金、瓜蒌; 胸腔积液者, 加

龙葵、葶苈子、薏苡仁。

2. 解毒抗癌方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 牛黄 3g，麝香 9g，乳香（去油）30g，没药（去油）30g，山豆根 30g，山慈菇 30g，田三七（冲服）30g，人参 30g。用法：上药共研细末，装胶囊备用，1次 1g，开水或黄酒送下，1日 2次。

〔功能主治〕 解毒抗癌，调气行血。主治恶性胸膜间皮瘤。

〔加减应用〕 胸背疼痛者，加延胡索、枳壳、郁金；胸腔积液者，加桑白皮、葶苈子、大枣。

3. 解毒散结方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 黄药子 30～60g，草河车 60g，山豆根 120g，夏枯草 120g，白鲜皮 120g，败酱草 120g。用法：上药共研细末，制成片剂，每片 0.5g，或药末加蜜为丸，每丸约 6g，片剂 1次 5片，1日 3～4次；丸剂 1次 1丸，1日 2次。

〔功能主治〕 解毒散结。主治胸膜恶性肿瘤。

〔加减应用〕 偏气虚者，加北黄芪；偏阴虚者，加知母、生地。

4. 通络解毒方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 白花蛇舌草 250g，地龙 30g，蜈蚣 3条，露蜂房 30g，蒲公英 30g，板蓝根 30g，全蝎 30g，蛇蜕 30g。用法：上药共研细末，炼蜜为丸。每丸 6g，每天早、晚各服 1丸。

〔功能主治〕 通络解毒。主治胸膜恶性肿瘤。

〔加减应用〕 胸胁或周身痛甚者，酌加大黄、桂枝；体弱食少者，加砂仁、麦芽、鸡内金。

5. 菱海蛤汤（内蒙古中医药，1990，1）

〔组成与用法〕 瓜蒌 20g，薏苡仁 15g，桑白皮 15g，海藻 15g，昆布 15g，赤芍 15g，杏仁 10g，法半夏 10g，海蛤 10g，射干 10g，陈皮 10g，桃仁 10g，鱼腥草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热化痰，行瘀散结。主治胸膜间皮瘤。

〔加减运用〕 胸痛者，加全蝎、苏木。

6. 解毒活血汤（河北中医，1990，1）

〔组成与用法〕 白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g，龙葵 30g，大黄 15g（后下），芒硝 15g（后下），金银花 30g，丹参 15g，当归 12g，赤芍 12g，制乳香 12g，制没药 12g，牛膝 12g，郁金 12g，生地 18g，田三七 3g（研末冲服），枳壳 9g，桔梗 9g，柴胡 9g，桃仁 9g，红花 9g，川芎 6g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，活血通腑。主治胸膜恶性肿瘤。

【对症用方】

胸膜肿瘤的对症用方，主要根据患者主要症状（如疼痛、胸腔积液等），是否手术或放疗、化疗等治疗。术后治疗以益气养血、健脾理气为主，放疗病人以益气养阴清热为主，化疗病人以健脾益气和中为主。

1. 胸膜肿瘤手术后治疗方

益气祛邪方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 黄芪 15g，太子参 15g，白术 12g，茯苓 12g，陈皮 10g，香附 15g，郁金 15g，红花 10g，补骨脂 15g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g，白英 20g，麦芽 15g，龙葵 15g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气，兼攻邪。主治胸膜肿瘤手术后纳差胸痛。

〔加减运用〕 阴虚者，加石斛、天花粉；血瘀者，加丹参、三七粉（冲服）；发热，咳嗽，吐黄痰者，加黄芩、瓜蒌、天竺黄。

2. 胸膜肿瘤放疗后治疗方

（1）益气养阴方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 北沙参 15g，麦冬 15g，石斛 20g，天花粉 30g，五味子 10g，鸡血藤 15g，女贞子 15g，黄芪 15g，谷芽

15g, 麦芽 15g, 竹茹 10g, 陈皮 10g, 生甘草 6g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

〔功能主治〕 益气养阴。主治胸膜肿瘤放疗后胸闷气短干呕者。

〔加减运用〕 气短者, 加人参 (蒸兑); 咳嗽痰多者, 加瓜蒌; 咯血者, 加仙鹤草、云南白药 (冲服); 恶心呕吐者, 加法半夏、砂仁。

(2) 金石清解方 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 黄芪 30g, 参须 (蒸兑) 10g, 麦冬 10g, 石斛 15g, 金银花 30g, 连翘 10g, 蚤休 30g, 怀山药 15g, 茯苓 10g, 生地 10g, 玄参 10g, 竹茹 10g, 女贞子 10g, 旱莲草 10g, 白花蛇舌草 30g, 夏枯草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 清热解毒。配合放疗主治胸膜肿瘤。

〔加减应用〕 胸痛者, 加延胡索、桃仁。

3. 胸膜肿瘤化疗配合用专方

癌复康加减方 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 白参 (蒸兑) 10g, 黄芪 30g, 白术 10g, 茯苓 10g, 枸杞 10g, 女贞子 10g, 菟丝子 10g, 广木香 10g, 仙灵脾 10g, 法半夏 10g, 砂仁 5g, 旱莲草 15g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

〔功能主治〕 健脾益肾, 和胃理气。用于配合化疗治疗胸膜肿瘤。

〔加减应用〕 恶心呕吐甚者, 加姜竹茹、代赭石; 气虚多汗, 加黄芪、防风; 腹泻者, 加神曲。

〔临床报道〕 该方能明显提高化疗的完成率, 降低食欲减退、恶心呕吐、腹胀腹痛等发生率, 抗多种化疗反应总有效率达 80.75%。(中国中西医结合外科杂志, 1999, 4)

4. 胸膜肿瘤胸痛专方

(1) 三王止痛膏 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 大黄 50g, 马钱子 15g, 全蝎 30g, 干蟾皮 30g, 蚤休 60g, 山慈菇 60g, 姜黄 50g, 麝香 1g, 冰片 10g, 红花 40g, 桃仁 50g, 当归 50g, 血竭 30g, 莪术 50g, 蜈蚣 30g, 桂枝 60g, 制乳香、制没药各 30g, 细辛 15g, 各为细末和匀。取适量药粉调入凡士林内, 摊于纱布上, 贴敷肿块或疼痛处, 隔日一换。

〔功能主治〕 化瘀软坚, 解毒止痛。主治胸膜间皮瘤疼痛。

〔临床报道〕 用该膏贴敷治疗各种癌性疼痛, 止痛总有效率为 93.3%, 止痛平均持续时间 16.6 小时。

(2) 解毒活血方 (河北中医, 1990, 1)

〔组成与用法〕 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 龙葵 30g, 金银花 30g, 丹参 15g, 大黄 (后下) 15g, 芒硝 (后下) 15g, 当归 12g, 赤芍 12g, 制乳香 12g, 制没药 12g, 牛膝 12g, 郁金 12g, 生地 18g, 田三七 (研末冲服) 3g, 枳壳 9g, 桔梗 9g, 柴胡 9g, 桃仁 9g, 红花 9g, 川芎 6g, 甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 理气活血止痛。主治胸膜间皮瘤胸痛。

〔加减应用〕 气急者, 加苏子、葶苈子、桑白皮; 纳差者, 加山楂、麦芽。

5. 胸膜间皮瘤合并恶性胸腔积液专方

(1) 健脾利水方 (内蒙古中医药, 1990, 1)

〔组成与用法〕 党参 20g, 白术 10g, 茯苓 10g, 当归 10g, 川芎 10g, 白芍 10g, 熟地 10g, 甘草 10g, 肉桂 10g, 葶苈子 (布包) 10g, 车前子 (布包) 10g, 大枣 10g, 黄芪 40g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾利水。主治胸膜间皮瘤合并胸腔积液者。

〔加减应用〕 胸腔积液甚, 加龙葵、半枝莲。

(2) 椒目瓜蒌汤 (四川中医, 2003, 3)

〔组成与用法〕 葶苈子 30g, 蚤休 30g, 臭牡丹 30g, 桑白皮 20g, 瓜蒌皮 15g, 茯苓皮 15g, 川椒目 10g, 苏子 10g, 半夏 10g, 白芥子 10g, 陈皮 10g, 生姜皮 5g。水煎服。

〔功能主治〕 泻肺行水, 理气化痰。主治胸膜间皮瘤合并胸腔积液者。

〔加减运用〕 胸痛甚者, 加赤芍、桃仁、红花; 口干咽燥, 潮热盗汗者, 加丹皮、地骨皮、麦冬; 咳嗽甚者, 加川贝、杏仁。

〔临床报道〕 治疗 24 例, 显效 8 例, 有效 11 例, 无效 5 例。

【专病成药】

1. 天蟾胶囊 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕 夏天无、炙川乌、蟾酥、白芷、白芍、白屈菜、川芎、甘草等。

〔功能主治〕 通络止痛。主治恶性胸膜间皮瘤引起的疼痛。

〔用法用量〕 1 日 3 次, 1 次 3 粒, 饭后服用。

2. 华蟾素片 (《最新国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕 干蟾皮提取物。

〔功能主治〕 解毒, 消肿, 止痛。用于中、晚期恶性胸膜间皮瘤。

〔用法用量〕 口服, 一次 3~4 片, 1 日 3~4 次。

3. 博尔宁胶囊 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕 黄芪、女贞子、山慈菇、马齿苋、重楼、龙葵、紫苏子、鸡内金、大黄、冰片、僵蚕。

〔功能主治〕 扶正祛邪, 益气活血, 软坚散结, 消肿止痛。用于胸膜间皮瘤辅助治疗。

〔用法用量〕 1 日 2 粒, 1 日 3 次。

4. 华蟾素注射液 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕 中华大蟾蜍。

〔功能主治〕 清热解毒, 消肿止痛, 活血化瘀, 软坚散结。

直接杀伤肿瘤细胞、抑制肿瘤细胞生长及乙肝病毒的复制，减轻放疗辐射及化疗的不良反应。主治中、晚期恶性胸膜间皮瘤。（《中国肿瘤临床与康复》，2001，4）

【用法用量】 静滴，1次10~20ml加入5%葡萄糖注射液500ml缓慢滴注，1日或隔日1次。每个疗程4周，用药1周后休息1~2日或按医嘱使用。

【专病单方】

1. 龙葵 用法：每取500g，或干龙葵200g。水煎，1日1剂，分2次服。功用：清热解毒、利水消肿。主治：恶性胸膜间皮瘤并胸腔积液者。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 赤小豆 用法：每取90g，配鱼腥草30g。水煎，1日1剂，分2次服；功用：利水清肺。主治：恶性胸膜间皮瘤有胸腔积液者。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 半边莲 用法：每取30g，配陈葫芦30g，了哥王根12g。水煎，1日1次，分2次服。功用：解毒抗癌利水。主治：恶性胸膜间皮瘤有胸腔积液者。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 甘遂 用法：每取9g，配砂仁9g。共研细末，取大蒜头捣烂，和药末，水调敷脐。功用：利水消肿。主治：胸膜间皮瘤并胸腔积液者。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 五倍子 用法：每取1.5g，配朱砂0.6g。共研细末，水调敷脐。功用：收敛止汗。主治：胸膜间皮瘤汗多，夜间尤甚者。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 癞蛤蟆（干品）用法：取6g，雄黄3g，姜黄0.6g。共研细末，加酒调敷患处。功用：解毒消痈。主治：胸膜间皮瘤疼痛。（《中华肿瘤治疗大成》）

纵 隔 肿 瘤

纵隔肿瘤是指发生于纵隔内各种组织和结构的肿瘤和囊

肿，包括位于纵隔的胸腺、神经、淋巴、生殖细胞及间质组织等。分原发性肿瘤和继发性肿瘤或转移性肿瘤。成人纵隔肿瘤以胸腺瘤多见，儿童纵隔肿瘤以神经源性肿瘤多见。前上纵隔肿瘤主要为胸腺瘤，其次为淋巴瘤、生殖细胞肿瘤和癌，中纵隔肿瘤最常见囊性肿瘤，其次为淋巴瘤、间质肿瘤和癌；后纵隔以神经源性肿瘤多见，其次为囊肿、间质和内分泌肿瘤。

本病相当于中医胸痛、咳嗽、悬饮、肺积、肺胀等范畴。中医认为其发病乃因正气亏虚，内伤饮食，情志不调，外感邪毒，使脏腑功能紊乱，气血失调，导致气滞、痰浊、瘀血内生，阻结胸中，日久成积。

【辨证用方】

纵隔肿瘤多为本虚标实之证，虚证应注意气血阴阳之不同，实证应辨痰、瘀、毒。

1. 痰气凝结证

主症：胸膈疼痛，胀闷不舒，咳嗽，痰多不畅，食纳减少，苔薄腻或黄腻，脉弦或弦滑。

治法：化痰理气散结。

海藻玉壶汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕海藻 15g，昆布 15g，煅牡蛎（先煎）30g，浙贝母 12g，制半夏 10g，陈皮 10g，夏枯草 15g，橘叶 9g，蜈蚣 2 条，桔梗 6g，丹参 12g，川芎 10g，香附 15g，蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕化痰软坚，理气散结。主治纵隔肿瘤。

〔加减应用〕大便溏薄者，加炒白术、炒扁豆、怀山药；发热者，加石膏、蒲公英、黄芩。

2. 痰热郁肺证

主症：胸痛不适，咳嗽喘息气粗，痰多，质黏厚或稠黄，咳吐不爽，口渴欲饮，面赤身热，溲黄便干，舌质红，苔黄或黄腻，脉滑数。

治法：清肺化痰。

清气化痰汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕胆南星 10g，法半夏 10g，陈皮 10g，杏仁 10g，枳实 10g，黄芩 15g，贝母 10g，茯苓 12g，苏子 6g，桑白皮 20g，瓜蒌仁 20g，山慈菇 15g，蚤休 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕清肺化痰，降逆平喘。主治纵隔肿瘤。

〔加减应用〕便秘者，加大黄；痰有腥味者，加鱼腥草、冬瓜皮、薏苡仁、芦根。

3. 气滞血瘀证

主症：胸闷，胸痛，胁肋胀痛或刺痛，咳嗽咳痰不爽，舌质紫暗，苔薄黄，脉弦。

治法：理气活血。

血府逐瘀汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕当归 10g，生地 10g，红花 6g，赤芍 12g，枳壳 10g，地龙 10g，川芎 10g，丹参 12g，瓜蒌 12g，蒲公英 15g，夏枯草 20g，茯苓 12g，壁虎 2 条，白花蛇舌草 30g，郁金 10g，生甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕活血化瘀，宽胸理气。主治纵隔肿瘤。

〔加减应用〕发热者，加知母、黄芩；胸痛甚者，加延胡索、三七粉；食纳差者，加炒麦芽、炒谷芽、砂仁。

4. 肺阴亏虚证

主症：胸部隐痛，干咳，咳声短促，痰少黏白，口干咽燥，或午后潮热，盗汗，起病缓慢，日渐消瘦，舌质红，苔少，脉细数。

治法：润肺养阴。

沙参麦冬汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕沙参 15g，麦冬 15g，玉竹 10g，天花粉 15g，百合 10g，桑叶 10g，扁豆 10g，川贝母 10g，杏仁 10g，

地骨皮 15g, 桑白皮 15g, 蚤休 30g, 半枝莲 30g, 甘草 5g。水煎服。

【功能主治】滋阴润肺, 止咳化痰。主治纵隔肿瘤。

【加减应用】咯吐黄痰者, 加胆南星、黄芩; 痰中带血者, 加生蒲黄、仙鹤草、白及; 食纳少者, 加砂仁、麦芽。

【辨病用方】

纵隔肿瘤的辨病治疗, 当注重虚、瘀、毒三个方面。根据肿瘤情况、病期早晚、病人体质强弱, 选用或合用益气养阴、活血化瘀、清热解毒等治疗方药。常用中药有白花蛇舌草、半枝莲、天花粉、蜈蚣、莪术等。

1. 夏枯瓦楞汤 (陕西新医药, 1977, 5)

【组成与用法】夏枯草 15g, 昆布 9g, 瓦楞子 9g, 连翘 9g, 海蛤壳 12g, 丹皮 12g, 冬瓜仁 12g, 海藻 12g, 煅牡蛎 (先煎) 18g, 赤芍 3g, 桃仁 3g, 象贝母 4.5g, 芦根 1 枚, 壁虎 1.2g。水煎服。

【功能主治】活血解毒散结。主治小儿纵隔恶性肿瘤。

【加减应用】发热者, 加蒲公英、黄芩、金银花; 咳嗽痰多者, 加鱼腥草、前胡、生甘草、佛耳草、瓜蒌; 食欲不振者, 加炒山楂、焦神曲、炒谷芽; 大便溏薄者, 加炒白术、炒扁豆、怀山药。

2. 益气软坚方 (新中医, 1983, 11)

【组成与用法】丹参 25g, 红花 25g, 白术 25g, 黄芪 25g, 党参 25g, 怀山药 25g, 清半夏 15g, 白芍 15g, 三棱 15g, 莪术 15g, 柴胡 15g。水煎服。

【功能主治】益气活血软坚。主治胸腺瘤。

【加减应用】颈部不舒者, 加葛根; 恶心吞酸者, 加海螵蛸。

3. 补中益气汤 (河北中医, 1988, 60)

【组成与用法】黄芪 30g, 党参 30g, 白术 10g, 当归 10g,

陈皮 10g, 甘草 5g, 升麻 10g, 柴胡 10g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

【功能主治】 益气扶正。主治晚期胸腺肿瘤。

【加减应用】 发热者, 加蒲公英、黄芩; 食纳差者, 加炒麦芽、炒谷芽、砂仁; 贫血者, 加当归、鸡血藤。

【对症用方】

纵隔肿瘤的对症用方, 除根据纵隔肿瘤的主要并发症及区分是否手术或放疗、化疗等治疗。术后治疗以健脾补益气血为主, 放疗病人以养阴清热解毒为主, 化疗病人以健脾和胃、益肾养血为主。

1. 纵隔肿瘤手术后治疗专方

健脾益气方 (《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】 党参 15g, 白术 10g, 茯苓 12g, 黄芪 12g, 麦冬 10g, 木香 10g, 红花 10g, 陈皮 10g, 何首乌 15g, 莲子肉 15g, 鸡内金 10g, 麦芽 15g, 谷芽 15g, 神曲 10g, 甘草 5g。水煎服。

【功能主治】 健脾益气。主治纵隔肿瘤手术后气血两虚。

【加减应用】 口干舌燥者, 加石斛、白茅根、天花粉; 恶心呕吐者, 加姜半夏、竹茹; 大便秘结者, 加火麻仁、大黄; 失眠者, 加酸枣仁、五味子; 贫血者, 加当归、鸡血藤。

2. 纵隔肿瘤放疗后治疗专方

养阴益气方 (《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】 生地 15g, 玄参 15g, 麦冬 15g, 南沙参 15g, 石膏 (先煎) 15g, 知母 10g, 连翘 10g, 桃仁 10g, 丹皮 10g, 金银花 15g, 甘草 10g。水煎服。

【功能主治】 养阴益气。主治纵隔肿瘤放疗后热毒伤阴。

【加减应用】 气虚者, 加党参、黄芪; 血虚者, 加当归、首乌; 胸痛者, 加延胡索、川楝子; 恶心呕吐者, 加代赭石 (先煎)、旋覆花 (布包); 纳差者, 加神曲、谷芽、麦芽。

3. 纵隔肿瘤化疗期间及化疗后专方

癌复康方加减（潘敏求经验方）

[组成与用法] 白参（蒸兑）10g，黄芪 30g，白术 10g，茯苓 10g，枸杞 10g，女贞子 10g，菟丝子 10g，广木香 10g，仙灵脾 10g，法半夏 10g，砂仁 5g，旱莲草 15g，夏枯草 15g，甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾、和胃理气。主治纵隔肿瘤化疗后多种综合症。

[加减应用] 恶心呕吐甚者，加姜竹茹、代赭石；气虚多汗，加黄芪、防风；腹泻者，加神曲。

[临床报道] 该方能明显提高化疗的完成率，降低食欲减退、恶心呕吐、腹胀腹痛等发生率，抗多种化疗反应总有效率达 80.75%。（中国中西医结合外科杂志，1999，4）

4. 纵隔肿瘤胸蓄血合并感染者专方

（1）活血化痰方（新中医，1976，4）

[组成与用法] ①生桃仁 60g，花蕊石 60g，冬瓜子 30g，生薏苡仁 30g，芦根 30g，白茅根 30g，阿胶（烔冲）20g，仙鹤草 30g，大黄 30g，桔梗 15g，五味子 15g，葶苈子 15g，大枣 10 枚。②生桃仁 60g，花蕊石 60g，瓜蒌皮 30g，冬瓜子 30g，生薏苡仁 30g，白茅根 30g，阿胶（烔冲）30g，仙鹤草 30g，大黄 30g，桑白皮 15g，桔梗 15g，五味子 15g，葶苈子 15g，大枣 10 枚。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服，两方交替使用。

[功能主治] 清热活血，开胸化痰。主治纵隔肿瘤胸蓄血合并感染者。

[加减应用] 痰多难咳者，加海浮石、瓜蒌；高热者，加生石膏、知母、水牛角（先煎）。

（2）化痰凉血方（新中医，1976，4）

[组成与用法] ①杏仁 2g，桃仁 12g，五味子 15g，葶苈子

(布包) 15g, 苏子 15g, 桔梗 15g, 生薏苡仁 24g, 冬瓜子 30g, 芦根 30g, 枳壳 6g, 大枣 5 枚。②夜明砂 3g, 花蕊石 24g, 生薏苡仁 24g, 五味子 15g, 葶苈子 (布包) 15g, 桔梗 15g, 桃仁 12g, 仙鹤草 30g, 冬瓜子 30g, 芦根 30g, 大枣 10 枚。③桔梗 6g, 枳壳 6g, 柴胡 3g, 前胡 3g, 花蕊石 15g, 仙鹤草 21g, 甘遂细末 1.5g, 大黄 12g, 阿胶 (烔冲) 12g。④阿胶 (烔冲) 12g, 桔梗 15g, 五味子 15g, 葶苈子 (布包) 15g, 夜明砂 3g, 桃仁 12g, 大黄 30g, 花蕊石 30g, 仙鹤草 30g, 生薏苡仁 24g, 大枣 10 枚。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。以上 4 方交替使用。

〔功能主治〕 宣肺化痰, 清热凉血。主治纵隔肿瘤胸蓄血合并感染者。

〔加减应用〕 高热者, 加生石膏、知母、水牛角 (先煎); 胸痛甚者, 加延胡索、三七粉 (冲服)。

【专病成药】

1. 平消胶囊 (《国家基本医疗保险目录》2004)

〔处方组成〕 郁金、仙鹤草、五灵脂、白矾、硝石、干漆、枳壳、马钱子粉。

〔功能主治〕 活血化瘀, 止痛散结, 清热解毒, 扶正祛邪。可用于治疗恶性胸部肿瘤。

〔用法用量〕 口服, 1 日 3 次, 每次 4~8 粒。60 天 1 个疗程。

2. 鸦胆子乳剂 (《国家基本医疗保险目录》2004)

〔处方组成〕 鸦胆子。

〔功能主治〕 清热燥湿, 解毒消癥。有明显抗肿瘤作用, 增强免疫功能, 促进骨髓造血。用于纵隔肿瘤。

〔用法用量〕 每次 10~40ml, 加入 5% 葡萄糖注射液 500ml 中, 静脉滴注, 1 日 1 次。

3. 榄香烯乳注射液 (《国家基本医疗保险目录》2004)

〔处方组成〕 榄香烯，为中药莪术中提取到的抗癌活性物质。

〔功能主治〕 直接抑制肿瘤细胞生长；增强 T 淋巴细胞亚群的功能；与放、化疗有协同作用。用于纵隔肿瘤引起的胸腔积液。

〔用法用量〕 ①静脉注射：1 日 1 次，400～600mg/次，15 天为 1 个疗程。②口服给药：100～200mg/次，1 日 3 次，餐前半小时服用。③介入给药：1 次 600～800mg，每月 1 次。④胸腔注射：放尽胸腔积液后，先注入 10ml 普鲁卡因注射液，再按 200～300mg/m² 体表面积剂量注入胸腔。1～3 次为 1 个疗程。

4. 复方苦参注射液（《国家基本医疗保险目录》2004）

〔处方组成〕 苦参等多味中草药。

〔功能主治〕 抗癌镇痛。主治纵隔肿瘤引起的疼痛。

〔用法用量〕 静脉滴注：以本品 12～20ml 加入 200ml 生理盐水中滴入，1 日 1 次，或以本品 8～10ml 加入 100ml 生理盐水中滴入，1 日 2 次。以总量 200ml 为 1 个疗程，可连续使用 2～4 个疗程。

【专病单方】

1. 壁虎 用法：每取 15g，配地龙 9g，僵蚕 6g。上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重 1.5g，1 次 1～2 丸，1 日 2 次。功用：清热解毒消肿。主治：纵隔恶性肿瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 白花蛇舌草 用法：每取 60g，配铁树叶 50g，大枣 10g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒，利湿消肿。主治：胸腺肿瘤肺转移伴大量胸腔积液证属邪实正虚者。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 半边莲 用法：每取 30g，配陈葫芦 30g，了哥王根 30g。水煎服。功用：清热解毒利湿。主治：纵隔肿瘤有胸腔

积液者。《《中华肿瘤治疗大成》》

4. 鲜龙葵 用法：每取 50~500g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒，利水消肿。主治：纵隔肿瘤合并胸腔积液者。《《中华肿瘤治疗大成》》

5. 赤小豆 用法：每取 90g，鱼腥草 30g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒，排脓利尿。主治：纵隔肿瘤合并胸腔积液者。《《中华肿瘤治疗大成》》

食管癌

食管癌是指发生于食管黏膜上皮或腺体的恶性肿瘤。食管癌的发生与环境因素密切相关，同时与饮食习惯关系密切。食管鳞状细胞癌的发生与饮酒和吸烟有一定相关性。而食管腺癌与饮酒吸烟的关系不明显，与 Barrett 食管、胃食管反流及食管裂疝有一定关联。遗传易感性在食管癌的发病中也起一定的作用。

本病相当于中医病名国家标准的食管癌，亦属于“噎膈”、“膈中”、“关格”、“反胃”等范畴。中医认为本病的主要病因病机以内伤饮食、情志，脏腑功能失调为主，互为因果，共同致病，形成气滞、痰阻、血瘀阻滞食管，使食管狭窄，或造成津伤血耗，失于濡润，食管干涩，食饮难下阻于食管而成。

【辨证用方】

食管癌的辨证，先当辨明虚实，实证当辨气滞、血瘀、痰结、毒蕴之偏重，虚证当辨气、血、阴、阳之不同。实证治以舒肝和胃、化瘀解毒、化痰散结为主，虚证治以健脾和胃、补气益血、滋阴润燥为主。

1. 肝胃不和证

主症：咽部似有物梗阻，或进食发噎，呃逆，胸骨后疼痛串及两胁，胸闷口苦，不欲饮食，或头痛目眩，舌质淡红，舌

苔薄黄或微黄腻，脉弦或弦细。

治法：舒肝和胃。

(1) 逍遥散加减方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕醋炒柴胡 10g，当归 10g，赤芍 12g，白芍 12g，茯苓 12g，炒白术 12g，法半夏 10g，威灵仙 15g，急性子 5g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕舒肝和胃，散结止痛。主治食管癌。

〔加减应用〕上腹部胀闷者，加厚朴、枳壳；胸背疼痛者，加香附、郁金、八月札。

(2) 开郁降逆汤（吴良村经验方）

〔组成与用法〕旋覆花 12g，刀豆子 30g，焦山楂 30g，制香附 6g，苍术 10g，威灵仙 30g，山豆根（先煎）6g，急性子 15g，藤梨根 30g，生南星（先煎）6g，生半夏（先煎）6g，全瓜蒌 30g，神曲 10g，守宫粉（另吞）3g。水煎服。

〔功能主治〕开郁降逆，抗癌止痛。主治食管癌。

〔加减应用〕血瘀明显者，加桃仁、红花、莪术；发热便秘者，加大黄、玄参。

2. 痰气交阻证

主症：吞咽梗阻，胸膈痞闷，情志舒畅时稍减轻，口干咽燥，舌质偏红，舌苔黄腻，脉弦滑。

治法：理气化痰。

(1) 启膈散加减方（《中华肿瘤大成》）

〔组成与用法〕丹参 15g，郁金 15g，砂仁 10g，沙参 15g，贝母 10g，茯苓 10g，陈皮 10g，瓜蒌 20g，法半夏 10g，壁虎 10g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕开郁化痰，清热润燥。主治食管癌。

〔加减应用〕津伤便秘者，加生地、玄参、麦冬、火麻仁；纳差者，加麦芽、焦山楂。

(2) 加减四逆散合旋覆代赭石汤（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕柴胡 10g，枳壳 10g，白芍 10g，旋覆花 10g，代赭石（先煎）15g，法半夏 10g，郁金 10g，陈皮 10g，山豆根 10g，草河车 15g。水煎服。

〔功能主治〕开郁降气，化痰散结。主治食管癌。

〔加减应用〕疼痛明显者，加延胡索、白屈菜；口干，津伤明显者，加玄参、石斛；吞咽困难较严重者，加威灵仙、赤芍。

（3）健脾化痰汤（吴良村经验方）

〔组成与用法〕党参 15g，苍术 12g，白术 12g，猪苓 15g，茯苓 15g，炒薏苡仁 30g，狼毒（先煎）5g，生半夏（先煎）10g，生南星（先煎）10g，乌不宿 30g，桔梗 10g，浙贝母 15g，川朴 10g，陈皮 10g，淡附片（先煎）6g，鸡内金 10g，焦三仙 15g，砂仁（后下）3g。水煎服。

〔功能主治〕健脾祛湿，化痰散结。主治食管癌。

〔加减应用〕吞咽梗阻者，加威灵仙、山慈菇。

3. 津亏热结证

主症：吞咽梗涩疼痛，食物难下，汤水可下，形体逐渐消瘦，口干咽燥，大便干结，五心烦热，舌质红干，或有裂纹，脉弦细数。

治法：生津散结。

加减麦门冬汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕白参（蒸兑）10g，麦冬 30g，法半夏 10g，桃仁 10g，丹参 15g，沙参 15g，石斛 12g，梨汁 20g，藕汁 12g，陈皮 10g，茯苓 12g，大枣 10g，蚤休 30g，半枝莲 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕生津益胃，降逆解毒。主治食管癌。

〔加减应用〕潮热盗汗者，加地骨皮、五味子、煅牡蛎（先煎）；胸背痛者，加香附、郁金。

4. 瘀毒内结证

主症：胸膈疼痛，食不得下而复吐出，甚至水饮难下，大便坚如羊屎，或吐出物如赤豆汁，面色晦暗，口唇青紫，形体消瘦，肌肤枯燥，舌红少津，或带青紫，脉细涩。

治法：化瘀解毒。

(1) 加减通幽汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕熟地 10g，生地 10g，当归 10g，升麻 10g，桃仁 10g，红花 10g，丹参 12g，郁金 12g，枳壳 12g，瓜蒌 20g，急性子 15g，蜣螂虫 10g，海藻 15g，昆布 15g，半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕养血活血，润燥破结。主治食管癌。

〔加减应用〕呕吐物呈咖啡色，或大便隐血阳性者，加生大黄粉、或三七粉（冲服）、云南白药（冲服）、仙鹤草；腰背痛甚者，加黄药子、延胡索；服药呕吐，难于下咽者，可先服开道散（由硼砂、火硝、硃砂、礞石、沉香、冰片共碾细末制成散），噙化缓下，每 1～3 小时 1 次，连服 2 日后，再服煎药。

(2) 加减血府逐瘀汤（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕当归 10g，生地 10g，桃仁 10g，红花 10g，枳壳 10g，赤芍 10g，川芎 10g，桔梗 6g，柴胡 10g，急性子 15g，制半夏 10g，瓜蒌 30g。水煎服。

〔功能主治〕祛瘀散结，化痰解毒。主治食管癌。

〔加减应用〕胸背痛甚者，加延胡索、白屈菜、八月札；便干者，加郁李仁、火麻仁；口干舌红者，加黄连、麦冬、知母；合并出血者，加三七粉（冲服）、白及、血余炭。

5. 气血双亏证

主症：噎塞梗阻日重，水饮难下，面色萎黄，消瘦无力，甚则大肉困脱，大骨枯槁，舌质淡，苔薄，脉弦细或沉细。

治法：益气养血。

(1) 加减八珍汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 人参 10g，生黄芪 30g，炒白术 10g，茯苓 10g，陈皮 10g，当归 10g，白芍 12g，川芎 10g，生地 12g，广木香 12g，阿胶（烔化）15g，丹参 30g，白花蛇舌草 30g，炙甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 益气补血，解毒散结。主治食管癌。

〔加减应用〕 呕恶痰涎者，加法半夏、生姜；干呕者，加砂仁、代赭石；颈部瘰核者，加生牡蛎（先煎）；形寒气短，面浮足肿，腹胀者，加肉桂、制附片、杜仲、鹿角胶（烔化）。

（2）加减当归补血汤（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 黄芪 30g，当归 10g，干姜 10g，党参 20g，白术 10g，熟地 15g，白芍 15g，桂枝 10g，急性子 10g，半夏 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血，温阳开结。主治食管癌。

〔加减应用〕 呃逆者，加威灵仙、丁香、柿蒂；呕吐黏痰者，加陈皮、胆南星、青礞石；出血者，加仙鹤草、露蜂房、白及、三七（冲服）；畏寒肢冷明显者，加炮附子；呕吐清水较多者，加吴茱萸、黄连。

【辨病用方】

食管癌的辨病治疗，当注重培补脾胃和化瘀解毒及通下。无论病期早晚，均有不同程度的脾胃损伤，保持胃肠道的通畅是治疗该病的关键之一。常用中草药：硃砂、黄药子、石见穿、山豆根、冬凌草等。

1. 食管癌各期基本用方

（1）食管癌方（《中医胃肠病学》）

〔组成与用法〕 瓜蒌 30g，刀豆子 30g，枳壳 15g，山豆根 15g，白花蛇舌草 30g，夏枯草 15g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰理气，解毒散结。主治各期食管癌。

〔加减应用〕 胸胁窜痛，胃脘胀气，郁闷不舒者，加柴胡、陈皮、郁金、川楝子；胸背或剑突后疼痛明显，舌质紫暗，舌

面有瘀点或瘀斑，舌下静脉怒张者，加赤芍、丹参、当归、鸡血藤、三七粉（冲服）；痰涎壅盛，浊气上逆，舌苔厚腻者，加陈皮、半夏、前胡、桔梗、藿香、佩兰；病久偏于气虚者，加黄芪、党参、白术、茯苓；偏于血虚者，加当归、阿胶、熟地；偏于阴虚者，加生地黄、麦冬、石斛、玉竹；偏于阳虚者，加淫羊藿、肉苁蓉、菟丝子。

（2）参贝汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 沙参 12g，川贝母 6g，桃仁 6g，砂仁 3g，郁金 10g，茯苓 10g，丹参 10g，荷叶 10g，米糖 30g。水煎服。白蜜（冲）30g。

〔功能主治〕 生津理气，活血散结。主治食管癌。

〔加减应用〕 胸背疼痛者，加香附、郁金、八月札；疼痛明显者，加延胡索、白屈菜。

（3）消噎汤加减（青海医药杂志，2002，10）

〔组成与用法〕 雄黄、贯众、木香、三棱、莪术、陈皮、大黄、干漆、玉片、威灵仙等。1日1剂，水煎分2次服。15天为1个疗程，连服2~3个疗程。

〔功能主治〕 活血通络，解毒散结。主治食管癌。

〔加减应用〕 气虚者，加黄芪、红参；痰凝者，加昆布、制胆南星（先煎）。

（4）夏竹降逆方（四川中医，1988，5）

〔组成与用法〕 姜半夏 12g，姜竹茹 12g，旋覆花（布包）12g，代赭石（先煎）30g，木香 9g，公丁香 6g，沉香曲 9g，白豆蔻 9g，川楝子 9g，川厚朴 9g，南沙参 9g，北沙参 9g，天冬 12g，麦冬 12g，急性子 15g，蜣螂 12g，当归 12g，仙鹤草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰养阴降逆。主治各期食管癌。

〔加减应用〕 泛吐涎痰者，加生南星（先煎）、青礞石；大便秘结者，加生大黄、玄明粉；胸痛者，加延胡索、乳香、没

药、瓜蒌；咯血者，加白及、生蒲黄、贯众炭。

(5) 黄药斑蝥汤（内蒙古中医药，1988，2）

〔组成与用法〕 白花蛇舌草 30g，蒲公英 30g，半枝莲 12g，山豆根 15g，山慈菇 10g，鸦胆子 10g，黄药子 10g，露蜂房 10g，三七粉（冲服）9g，斑蝥（去头足）1只，蟾酥 0.015g。

〔功能主治〕 解毒抗癌。主治食管癌。

〔加减应用〕 形寒气短，面浮足肿，腹胀者，加肉桂、制附片、杜仲、鹿角胶（烔化）；气短乏力者，加黄芪、党参；大便干结者，加大黄。

(6) 旋覆降逆方（《抗癌中草药制剂》）

〔组成与用法〕 旋覆花（布包）15g，威灵仙 15g，姜半夏 9g，刀豆子 9g，急性子 9g，姜竹茹 9g，代赭石（先煎）30g，冰球子 9g，五灵脂 9g，菝葜 15g。水煎，1日1剂，分2次服。

〔功能主治〕 理气化痰，解毒散结。主治食管癌。

〔加减应用〕 梗阻重者，加硃砂（另吞）；贫血者，加阿胶珠（烔入）、仙鹤草；呕吐者，加姜汁（冲服）。

(7) 理气降逆方（四川中医，1983，5）

〔组成与用法〕 代赭石（先煎）30g，旋覆花（布包）15g，法半夏 12g，茯苓 15g，瓜蒌 30g，郁金 15g，丹参 30g，香附 18g，甘松 12g，檀香 12g，砂仁壳 10g，黑栀子 10g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g，甘草 6g，荷梗适量为引。水煎，1日1剂，分2次服。

〔功能主治〕 理气降逆。主治食管癌。

〔加减应用〕 大便秘结，坚硬如羊屎者，增玄明粉（冲服）；阴亏较甚者，口燥咽干，舌红无苔者，去半夏，加增液汤；呕吐痰涎者，加海浮石；心烦、口苦、舌苔黄者，去半夏，加黄连；正气虚弱，少气懒言，神疲乏力者，加党参；病

情好转，用养阴益气之品善后。

(8) 健脾通下方 (四川中医, 1984, 5)

[组成与用法] 旋覆花 (布包) 15g, 法半夏 15g, 茯苓 15g, 急性子 15g, 山楂 15g, 神曲 15g, 代赭石 (先煎) 30g, 党参 30g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 黄芪 30g, 陈皮 6g, 木香 6g, 砂仁 10g, 莪术 12g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服, 或每周 4 剂。

[功能主治] 健脾通下。主治食管癌。

[加减应用] 便干加郁李仁、火麻仁; 呕恶痰涎者, 加生姜。

(9) 八角丹参方 (辽宁中医杂志, 1985, 8)

[组成与用法] 八角金盘 10g, 八月札 30g, 石见穿 15g, 急性子 15g, 半枝莲 15g, 丹参 12g, 青木香 10g, 生山楂 12g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

[功能主治] 理气活血, 解毒抗癌。主治食管癌。

[加减应用] 上腹部胀闷者, 加厚朴、枳壳; 胸背痛者, 加香附、郁金。

[临床报道] 治疗 178 例, 存活 5 年以上 25 例, 3 年以上生存率为 51.6%。

(10) 丹参寄奴方 (辽宁中医杂志, 1986, 3)

[组成与用法] 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 刘寄奴 30g, 金佛草 10g, 代赭石 (先煎) 30g, 柴胡 10g, 香附 10g, 郁金 10g, 炒枳壳 10g, 沙参 10g, 麦冬 10g, 玄参 10g, 清半夏 10g, 丹参 10g。水煎服, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

[功能主治] 清热解毒, 养阴理气。主治各期食管癌。

[加减应用] 呕恶痰涎者, 加法半夏、生姜; 形寒肢冷者, 加肉桂、制附片、杜仲、鹿角胶 (烊化)。

(11) 斑蝥蛇舌方 (四川中医 1986, 8)

[组成与用法] 制斑蝥 0.2g (龙眼肉包, 分早、晚 2 次

服), 生地 18g, 山药 12g, 茯苓 12g, 山茱萸 12g, 丹皮 10g, 泽泻 10g, 白花蛇舌草 45g。水煎服。

〔功能主治〕 解毒化瘀, 健脾益气。主治食管癌。

〔加减应用〕 上腹部胀闷者, 加厚朴、枳壳; 口干舌红加黄连、麦冬、知母; 合并出血者加三七(冲服)、白及、血余炭。

(12) 莪术牡蛎汤(《肿瘤的辨证施治》)

〔组成与用法〕 炒苏子 9g, 乌药 6g, 焦槟榔 9g, 青皮 9g, 三棱 9g, 莪术 9g, 当归 15g, 吴茱萸 4.5g, 生牡蛎(先煎) 15g, 法半夏 4.5g, 甘草 4.5g, 生姜 9g, 干蟾皮 6g。水煎服。

〔功能主治〕 散寒理气, 活血通经。主治食管癌。

〔加减应用〕 胸前疼痛者, 加全蝎粉; 津伤便秘者, 加生地、玄参、麦冬、火麻仁; 纳差者, 加麦芽、焦山楂。

2. 食管癌中、晚期用方

(1) 四君汤合二术郁灵丹(余桂清经验方)

〔组成与用法〕 党参 10g, 白术 10g, 茯苓 10g, 莪术 10g, 郁金 10g, 威灵仙 10g, 丹参 20g, 急性子 10g, 石见穿 30g, 白花蛇舌草 30g, 夏枯草 15g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾活血, 化痰散结。主治食管癌。

〔加减应用〕 血虚者, 加当归、生地、鸡血藤; 血瘀者, 加桃仁、赤芍、丹参; 肾虚者, 加枸杞、女贞子、菟丝子; 痰湿者, 加清半夏; 热毒者, 加金银花、菊花、栀子; 肝郁者加柴胡、川楝子; 阴虚者, 加麦冬、玉竹; 淋巴结转移者, 加贝母、玄参; 骨转移者, 加狗脊、杜仲; 肺转移者, 加贝母、桔梗、杏仁; 疼痛者, 加徐长卿、白屈菜、延胡索。(中国中医药信息杂志, 2003, 6)

(2) 理气化结汤(刘嘉湘经验方)

〔组成与用法〕 八月札 12g, 枸杞 30g, 急性子 30g, 干蟾皮 12g, 白花蛇舌草 30g, 丹参 30g, 炙马钱子 0.5g, 公丁香

9g, 广木香 9g, 生胆南星 (先煎) 9g, 蜣螂虫 9g, 夏枯草 15g, 紫草根 30g, 苦参 30g, 瓦楞子 30g, 天龙 9g。水煎服。

[功能主治] 理气化痰, 消肿散结。主治食管癌。

[加减应用] 呕吐黏液者, 加旋覆花、代赭石、生半夏 (先煎)、茯苓、青礞石; 胸痛者, 加延胡索、乳香、没药、瓜蒌; 大便秘结者, 加瓜蒌仁、生大黄、元明粉; 大便隐血者, 加白及、生地榆、血见愁; 化痰软坚者, 加海藻、海带、山慈菇; 活血祛瘀者, 加桃仁、红花、地鳖虫、水蛭; 清热解毒者, 加山豆根、石打穿、黄连; 扶正补虚者, 加党参、黄芪、白术、当归; 养阴生津者, 加生地、沙参、麦冬。

(3) 噎膈方 (湖南中医杂志, 2004, 4)

[组成与用法] 生半夏 (先煎) 10g, 石见穿 30g, 礞石 10g, 急性子 20g, 莪术 20g。加水 500ml, 分煎 2 次后混匀, 1 日 3 次分服, 吞咽困难明显者则宜少量频服, 少数水饮难入患者可用药液 500ml 灌肠, 1 日 1 次。

[功能主治] 涤痰逐瘀, 解毒抗癌。主治食管癌。

[加减应用] 伴乏力、体虚者, 加炙黄芪、太子参; 胸痛明显者, 加延胡索、郁金; 呕吐明显者, 加黄连、生姜、苏梗; 纳差消瘦者, 加炒谷芽、炒麦芽、神曲、怀山药。

[临床报道] 治疗中晚期食管癌 49 例, 1、2、3 年生存率分别为 80%、51%、31%。

(4) 食岩散 (实用中西医结合杂志, 1996, 1)

[组成与用法] 全蝎 100g, 蜈蚣 100g, 白花蛇舌草 500g, 半枝莲 500g, 党参 500g, 研成细末。每取 30g, 水冲服, 1 日 3 次, 连用 1 个月为 1 个疗程。

[功能主治] 补脾益气, 解毒抗癌, 兼化痰开郁, 软坚生津。主治食管癌。

[加减应用] 痰气郁阻型, 附方 I (夏枯草、全瓜蒌各 300g, 郁金 100g, 研成细末, 每取 30g)。津亏热结, 配附方

Ⅱ（女贞子、黄芩、熟地各等份，研成细末，每取 30g）；气阴两虚者，配附方Ⅲ（太子参、黄芪、丹参、鸡内金各等份，研成细末，每取 30g）。

〔临床报道〕用此方配合噻替哌治疗晚期食管癌 24 例，缓解率为 8.33%，有效率 58.33%，稳定率 79.17%，恶化率占 20.83%。

（5）灵仙代赭汤（河南中医，1994，6）

〔组成与用法〕太子参 15g，黄芪 30g，薏苡仁 30g，枸杞子 15g，威灵仙 10g，代赭石 30g，白花蛇舌草 30g，莪术 10g，法半夏 10g，枳实 10g，猪苓 15g，茯苓 15g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕扶正固本，调理脾胃，化痰降逆。主治食管癌。

〔加减应用〕食入梗阻，吞咽困难者，加急性子、礞石、磁石、黄药子；痰多黏滞，咳之不爽者，加瓜蒌、贝母、桔梗、炙远志；恶心呕吐，反胃呃逆者，加陈皮、竹茹、刀豆壳；胸骨疼痛者，加延胡索、罂粟壳。

〔临床报道〕治疗 108 例，缓解率 4.63%，有效率 43.51%，稳定率 90.74%，恶化率仅 9.26%。

（6）蚤芪水蛭汤（福建中医药，1992，5）

〔组成与用法〕黄芪 60g，水蛭 4 条，廔虫 15g，蚤休 30g，黄药子 10g，穿山甲 10g，甘草 10g。水煎服，并每天以红参 10g、石斛 30g 水煎成 500ml 代茶频饮，10 天为 1 个疗程。

〔功能主治〕解毒通经。主治食管癌。

〔加减应用〕大便秘结者，加大黄；多痰者，加莱菔子、天竺黄。

（7）蛭虎玉竹方（中医杂志，1990，9）

〔组成与用法〕①黄芪 30g，北沙参 15g，玉竹 15g，怀山

药 15g, 莪术 8g, 白花蛇舌草 30g, 生薏苡仁 30g, 瓜蒌 30g, 参三七末 (冲服) 3g, 炙全蝎末 (冲服) 3g。②海藻 30g, 水蛭 10g, 壁虎 10g。①方水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服; ②方研细末, 分作 10 包, 1 次 1 包, 1 日 2 次。

〔功能主治〕 滋阴清热, 解毒散结。主治食管癌。

〔加减应用〕 津伤便秘者, 加生地、玄参、麦冬、火麻仁; 呕恶痰涎者, 加法半夏、生姜; 干呕者, 加砂仁、代赭石。

(8) 活血通经方 (中西医结合杂志, 1989, 8)

〔组成与用法〕 斑蝥 (去毒烧炼) 10~16 枚, 大枣 (去核) 30 枚, 人参 30g, 黄芪 40g, 莪术 30g, 白术 30g, 急性子 30g, 田三七粉 (冲服) 30g, 法半夏 30g, 炮山甲 30g, 草河车 50g, 茜草 25g, 茯苓 30g, 沉香 25g, 补骨脂 25g, 甘草 20g。水煎服。

〔功能主治〕 活血通经。主治食管癌。

〔加减应用〕 胸背痛者, 加血竭、炒刺猬皮、干蟾皮、威灵仙; 口气腐臭者, 选加紫花地丁、鱼腥草、金银花炭、大黄炭、土茯苓、生薏苡仁; 气阴虚者, 用太子参、怀山药、女贞子、天门冬、生地黄; 气血虚者, 选加当归身、熟地、鸡血藤。

〔临床报道〕 治疗 126 例, 完全及部分缓解率为 14.28%, 1、3、5 年生存率分别为 48.41% (61 例)、13.49% (17 例)、2.38% (3 例)。

(9) 解毒散结复方 (《安徽单方验方选集》)

〔组成与用法〕 ①山豆根 15g, 急性子 15g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 60g, 泽漆 15g, 制南星 9g, 元明粉 (后下) 3g, 硼砂 1.5g, 威灵仙 30g, 生薏苡仁 30g。②山慈菇 120g, 海藻 60g, 法半夏 30g, 浙贝母 60g, 三七粉 (冲服) 18g, 红花 30g, 制乳香 15g, 制没药 15g, 柿蒂霜 60g。①方水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。②方药物共研极细末, 1 次 6g, 1 日 3 次,

加蜂蜜适量用温开水冲服。

[功能主治] 活血解毒散结。主治食管癌。

[加减应用] 上腹部胀闷者，加厚朴、枳壳；便干者，加郁李仁、火麻仁；胸背痛者，加香附、郁金。

(10) 通经活血解毒方（《抗癌中草药制剂》）

[组成与用法] ①全蝎 6g，蜈蚣 5 条，僵蚕 5 条，天花粉 15g，龙衣 18g，皂刺 6g，当归 9g，连翘 9g，杏仁 9g，金银花 9g，大黄（后下）9g，土茯苓 9g，山梔 9g，穿山甲 6g，红花 6g，甘草 6g。②全蝎 6g，蜈蚣 5 条，水蛭 6g，白花蛇舌草 30g，夏枯草 30g，蚤休 30g，急性子 15g，天花粉 15g，丹皮 15g，黄药子 9g，皂刺 9g，大枣 5 枚。①方、②方均水煎，两方交替使用，1 日 1 剂，分 2 次服。

[功能主治] 通经，活血，解毒。主治食管癌。

[加减应用] 偏气虚者，加北黄芪；偏阴虚者，加知母、生地。

(11) 苦参羊泉汤（《抗癌中草药制剂》）

[组成与用法] 苦参 6g，丹参 9g，紫草 6g，刺猬皮 9g，麦冬 9g，急性子 9g，天花粉 9g，炒陈皮 9g，旱莲草 9g，远志 9g，瓜蒌 12g，海浮石 12g，蜀羊泉 18g，枸杞子 18g，石见穿 15g，薤白 4.5g，炒灵脂 3g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。

[功能主治] 解毒活血。主治食管癌。

[加减应用] 胸背痛甚者，加延胡索、白屈菜、八月札。

(12) 牡蛎散结降逆方（辽宁中医，1982，5）

[组成与用法] 煅牡蛎（先煎）30g，夏枯草 20g，海藻 15g，海带 15g，急性子 6g，蜣螂 6g，川楝子 6g，姜半夏 10g，姜竹茹 6g，旋覆花（布包）6g，代赭石（先煎）15g，广木香 6g，公丁香 6g，沉香曲 6g，川厚朴 6g，南沙参 6g，北沙参 6g，当归 10g，石斛 10g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。

〔功能主治〕 散结，理气，降逆。主治食管癌。

〔加减应用〕 胃气上逆者，加降香、白豆蔻、炙九香虫、刀豆子、藿香、青皮；泛吐黏痰者，加南星（先煎）、板蓝根；胸部隐痛者，加延胡索、制乳香、制没药、郁金、丹参、桃仁；呕血、便血者，加白及、蒲黄炭（布包）、仙鹤草、藕节炭；体虚乏力者，加太子参、黄芪、白术、熟地；软坚消聚者，加石见穿、徐长卿、黄药子、蚤休。

〔临床报道〕 治疗晚期食管癌 184 例，0.5、1、2 年生存率分别为 52.75%、14.83%、2.2%。

(13) 通润利膈汤（中医杂志，2004，4）

〔组成与用法〕 太子参 30g，灵芝 30g，当归 30g，茯苓 20g，川贝母 15g，枳实 12g，厚朴 12g，藿香 10g，白豆蔻 10g，代赭石（先煎）30g，旋覆花（布包）30g，蜈蚣 2 条。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，和胃化痰。主治食管癌。

〔加减应用〕 体虚乏力者，加黄精、怀山药、大枣；阴亏者，去法半夏，加天冬；热毒盛者，加黄连、竹茹；肝脾不和者，加香附、生姜。

(14) 益气养阴方（成都中医学院学报，1983，2）

〔组成与用法〕 党参 12g，麦冬 15g，天冬 15g，怀山药 15g，代赭石（先煎）30g，知母 10g，天花粉 10g，当归 10g，法半夏 10g，枸杞子 10g，瓜蒌仁 10g，廔虫 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴散结。主治食管癌。

〔加减应用〕 胸背疼痛，胸膈满闷者，选加檀香、沉香、台乌药、郁金等；舌质瘀斑明显，脉细涩者，选加桃仁、红花、蒲黄、花蕊石、三七粉（冲服）、蜈蚣、茜草等；口干舌燥，大便秘结，属阴津亏耗者，去廔虫，选加桂圆肉、石斛、肉苁蓉、生地、火麻仁、黑芝麻、柿饼、醋大黄等；颈部瘰癧（肿瘤转移者），选加海藻、昆布、牡蛎、龙葵、半枝莲、夏枯

草、鬼针草等；涎多，舌质胖，舌上有黏涎者，选加法半夏、海浮石、贝母、黄药子等；气阴两亏，饮食难入，气短脚肿，面色苍白无华，舌淡者，去麝虫，以人参易党参，选加黄芪、白术、茯苓、灶心土，或另服人参，徐徐咽下；食管异物感，咽痛，吞咽不利，自觉胸骨后有食管烧灼感者，选加射干、山豆根、鬼针草、连翘、半枝莲等；体质壮实者，配合蜈蚣散；体质一般或服蜈蚣散吐者，本方汤剂配合含化丸；身体羸瘦，食入则吐者，先以汤剂滋阴镇逆、扶正，待体质渐复再辅以含化丸、蜈蚣散。

(15) 海藻蜈蚣汤（《癌症的治疗与预防》）

〔组成与用法〕 黄药子 30～60g，川断 15g，沙苑子 15g，蜈蚣 3～5 条，海藻 15g，牡蛎 15g，砂仁 6g，枇杷叶 15g，钩藤 15g，远志 15g，熟地 20g，党参 10g，鸡内金 6g。黄药子用白酒 50ml 浸泡 1 小时后单煎，其他各药水煎 2 次，与黄药子煎液混合，水煎服。

〔功能主治〕 健脾散结。主治食管癌。

〔加减应用〕 呃逆不止，加柿蒂、降香、沉香（冲服）、旋覆花（布包）、代赭石（先煎）；食管黏膜炎症者，加乌贼骨、瓦楞子、蛤粉。

(16) 旋覆代赭汤加减（四川中医，1984，5）

〔组成与用法〕 北沙参 30g，明百合 30g，川贝母 15g，怀山药 30g，紫丹参 15g，川郁金 9g，金石斛 30g，茯苓 15g，杭麦冬 15g，旋覆花（布包）9g，代赭石（先煎）15g，白花蛇舌草 30g，半枝莲 15g。水煎服。

〔功能主治〕 生津降逆。主治食管癌。

〔加减应用〕 体虚乏力者，加党参、黄芪、白术；大便秘结者，加白术、火麻仁；火毒盛者，加黄连、黄芩；痰涎多者，加海浮石、南星（先煎）；进食好转后去旋覆花、代赭石，加白扁豆、明玉竹。

(17) 启膈通噎汤 (中国中西医结合杂志, 2002, 1)

〔组成与用法〕 北沙参 30g, 丹参 30g, 黄芪 30g, 太子参 30g, 鸡血藤 30g, 白花蛇舌草 30g, 石斛 15g, 广豆根 15g, 旋覆花 15g, 代赭石 12g, 姜半夏 12g, 桃仁 12g, 当归 12g, 茯苓 12g, 川贝母 12g, 补骨脂 12g, 黄药子 15g, 露蜂房 9g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾补肾, 通瘀解毒, 启膈和胃。主治晚期食管癌。

(18) 龙蛭通噎汤 (安徽中医学院学报, 1997, 6)

〔组成与用法〕 守宫 9g, 水蛭、急性子、甘草各 10g, 黄药子、山慈菇各 12g, 代赭石 30g, 冬虫夏草 (分冲) 6g, 沉香粉 (分冲) 4g, 蚤休 20g, 威灵仙 15g。1 日 1 剂, 水煎 2 次, 分 4 次服。

〔功能主治〕 化瘀解毒, 降气益肾。主治晚期食管癌。

〔加减应用〕 口干甚者, 加天冬、麦冬、石斛; 疼痛者, 加川芎、当归、炒五灵脂; 痰涎壅盛者, 加海浮石、苏子; 吐酸者, 加乌贼骨、煅瓦楞子、浙贝母; 便干者, 加肉苁蓉、决明子。

〔临床报道〕 治 110 例, 缓解率 6.36%, 稳定率 88.82%。

(19) 参蝎汤 (新疆中医药, 1987, 2)

〔组成与用法〕 人参 (蒸兑) 6g, 香附 6g, 全蝎 6g, 生地 15g, 麦冬 15g, 瓜蒌 15g, 丹参 10g, 当归 10g, 白花蛇舌草 20g, 生甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 化瘀解毒, 益气生津。主治晚期食管癌。

〔加减应用〕 纳差者, 加麦芽、焦山楂; 疼痛明显者, 加延胡索、白屈菜; 口干, 津伤明显者, 加玄参、石斛; 吞咽困难较严重者, 加威灵仙、赤芍。

〔对症用方〕

食管癌的对症用方, 主要根据患者主要症状 (如梗阻、呃

逆、呕吐、疼痛等)，并区分手术前后或放疗、化疗等进行相应选方用药。

1. 食管癌手术前专方

健脾补肾方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕党参 15g，白术 12g，茯苓 12g，甘草 3g，太子参 15g，沙参 10g，黄精 12g，女贞子 12g，黄芪 15g，白花蛇舌草 24g，金银花 10g，白毛藤 24g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。另：人参 10g 或西洋参 6g，另煎顿服。术前连服 2～3 日。

〔功能主治〕健脾补肾，清热解毒。主治食管癌。

〔加减应用〕上腹部胀闷者，加厚朴、枳壳；呕恶痰涎者，加法半夏、生姜；干呕者，加砂仁、代赭石；津伤便秘者，加生地、玄参、麦冬、火麻仁；纳差者，加麦芽、焦山楂。

2. 食管癌手术后治疗专方

（1）黄芪增免散（中国中西医结合脾胃杂志，1998，3）

〔组成与用法〕红参、黄芪、枸杞子、女贞子、肉苁蓉等组成，按 1：5：2：2：2 比例配方，称重后烘干（60～70℃），粉碎，过 120 目筛，混匀，成药粉装瓶备用。1 次 10g，1 日 3 次，水煎服。

〔功能主治〕益气扶正。主治食管癌。

〔加减应用〕酌加冬凌草、白花蛇舌草、半枝莲攻邪；胸背疼痛者，加香附、郁金、八月札。

（2）参麦扶正汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕沙参 10g，麦冬 10g，茯苓 12g，黄精 12g，黄芪 15g，太子参 15g，党参 12g，瓜蒌 24g，麦芽 24g，鸡内金 9g，人参（蒸兑）或西洋参（蒸兑）4～6g，金银花 15g，连翘 10g。水煎，1 日 1 剂，分 3 次服。

〔功能主治〕益气养阴，健脾消食。主治食管癌。

〔加减应用〕气虚者，加黄芪、党参；汗出恶风者，重用

黄芪、加白术、防风、五味子、浮小麦、生牡蛎（先煎）；血虚者，加当归、首乌；阴虚明显者，加重沙参、麦冬；阳虚者，加制附片、桂枝；胸痛者，加延胡索、丹参；腹胀者，加木香、厚朴；纳差者，加砂仁、枳壳、炒山楂；便溏者，加炒白术、吴茱萸、炒扁豆。

3. 食管癌术后反流性食管炎方

(1) 复方反流安方（河南省肿瘤医院方）

〔组成与用法〕 桂枝 15g，白芍 15g，甘草 10g，干姜 10g，瓦楞子 30g，茯苓 30g，白术 12g，制半夏 12g，大枣 12 枚。水煎服。

〔功能主治〕 通阳化气，降逆蠲饮。主治食管癌术后反流性吻合口炎，食管炎。

〔临床报道〕 治疗 32 例贲门癌术后反流，全部有效，优于西药。（陕西中医，2004，1）

(2) 旋覆代赭安中方（河北中医，1987，1）

〔组成与用法〕 旋覆花（布包）12g，代赭石（先煎）15g，党参 20g，法半夏 15g，炙甘草 6g，韭菜汁 30g，牛乳 30g，藕汁 30g，甘蔗汁 30g，梨汁 30g，生蜂蜜 30g，薤白头 10g，刀豆子 10g，半枝莲 30g，半边莲 30g，藤梨根 30g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾养胃，降气解毒。主治食管癌术后反流性食管炎。

〔加减应用〕 痰湿盛者，去炙甘草、党参，加陈皮、佛手、瓜蒌、鲜竹沥；脾胃虚弱者，重用党参，加黄芪、白术；阴虚者，去法半夏、党参，加麦冬、白芍、太子参、石斛；肝胃不和者，去法半夏、薤白头，加磁石（先煎）、香附、柴胡；瘀血内阻者，去党参、薤白头，加丹参、延胡索、瓜蒌、黄芪。

〔临床报道〕 治疗食管癌术后反流 46 例，总有效率为 91.3%。

4. 食管癌放疗后治疗专方

(1) 益气养阴方 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 麦冬 12g, 天冬 12g, 沙参 10g, 玄参 9g, 生地 10g, 白茅根 12g, 玉竹 9g, 金银花 9g, 知母 10g, 白花蛇舌草 30g, 白英 30g, 党参 12g, 茯苓 12g, 白术 10g, 甘草 3g, 丹参 15g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴。主治食管癌放疗后发热。

〔加减应用〕 气虚者, 加黄芪; 血虚者, 加当归、首乌; 胸痛者, 加延胡索、川楝子; 恶心呕吐者, 加代赭石 (先煎)、旋覆花 (布包)、法半夏; 纳差者, 加神曲、谷芽、麦芽; 口干甚者, 重用麦冬、知母、天冬, 加石斛、芦根; 便秘者, 加瓜蒌仁、火麻仁、大黄 (后下); 腹泻、里急后重者, 加黄连、葛根、白芍; 失眠、烦躁者, 加枣仁、五味子。

(2) 金石清解方 (潘敏求教授经验方)

〔组成与用法〕 黄芪 30g, 参须 10g, 麦冬 10g, 石斛 15g, 金银花 30g, 连翘 10g, 蚤休 30g, 怀山药 15g, 茯苓 10g, 生地 10g, 玄参 10g, 竹茹 10g, 女贞子 10g, 旱莲草 10g, 白花蛇舌草 30g, 夏枯草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 清热解毒。配合放疗主治食管癌。

〔加减应用〕 胸痛者, 加延胡索、桃仁, 甚者加乳香、没药、苏木。

5. 食管癌化疗期间及化疗后专方

(1) 癌复康方加减 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 白参 (蒸兑) 10g, 黄芪 30g, 白术 10g, 茯苓 10g, 枸杞子 10g, 女贞子 10g, 菟丝子 10g, 广木香 10g, 仙灵脾 10g, 法半夏 10g, 砂仁 5g, 陈皮 10g, 旱莲草 15g, 夏枯草 15g, 甘草 5g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

〔功能主治〕 健脾益肾, 和胃理气。配合化疗主治食管癌。

〔加减应用〕 恶心呕吐甚者, 加姜竹茹、代赭石; 气虚多

汗，加白芍、防风；腹泻者，加神曲。

[临床报道] 该方能明显提高化疗的完成率，降低食欲减退、恶心呕吐、腹胀腹痛等发生率，抗多种化疗不良反应，总有效率达 80.75%。(中国中西医结合外科杂志，1999，4)

(2) 补阳还五汤(中国中医药信息杂志，1999，12)

[组成与用法] 黄芪 30~100g，赤芍、川芎各 15~30g，当归、地龙各 30~60g。1 日 1 剂，水煎服。

[功能主治] 益气化瘀。配合化疗主治中晚期食管癌。

[加减应用] 上腹部胀闷者，加厚朴、枳壳；吞咽困难较严重者，加威灵仙、郁金。

[临床报道] 用该方对 92 例中晚期食管癌的临床观察，表明补阳还五汤对化疗能起到减毒增效的作用。

6. 食管癌梗阻专方

(1) 通逆方(辽宁中医杂志，1991，1)

[组成与用法] 生南星(先煎) 30g，生半夏(先煎) 30g，瓜蒌 20g，黄药子 10g，旋覆花(布包) 10g，代赭石(先煎) 30g，石打穿 30g，急性子 30g，天龙 3g，蜈蚣 3 条。水煎服。

[功能主治] 化痰理气降逆。主治食管癌梗阻者。

[加减应用] 纳差者，加麦芽、焦山楂。腹胀者，加木香、陈皮、佛手。

[临床报道] 治疗 36 例食管癌，贲门癌梗阻患者，结果食管癌有效率为 92%；贲门癌有效率为 72.73%。

(2) 解毒降逆方(浙江中医杂志，1989，5)

[组成与用法] 生南星(先煎) 30g，金银花 30g，党参 10g，石斛 10g，枇杷叶 10g，生麦芽 10g，枳实 10g，代赭石(先煎) 15g，青黛 3g，生甘草 3g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。15 剂为 1 个疗程。初治时可缓慢饮服，如有呕吐，吐后再饮，治疗期间可不用其他疗法。

〔功能主治〕理气降逆。用于食管癌梗阻者。

〔加减应用〕痰涎雍甚者，加白芥子、姜半夏；瘀血内阻者，加急性子、郁金；疼痛剧烈者，加延胡索、麝虫。

〔临床报道〕治疗 73 例，总有效率为 95.8%。

(3) 化积散 (湖北中医杂志, 1997, 1)

〔组成与用法〕炙守宫 (壁虎)、炙蜂房、僵蚕、蜈蚣、山慈菇、三七 (冲服) 等药组成。取化积散 0.5g 含化慢慢咽下。隔 1~2 小时重复含服，1 日 5~6 次。如梗阻缓解，改为 1 日 3 次，1 次 1g，饭前服。

〔功能主治〕散结化瘀通络。主治食管癌梗阻者。

〔加减应用〕加服汤剂：旋覆花、代赭石、厚朴、苍白术、威灵仙、刀豆子、瓜蒌、枳壳、郁金、丹参水煎服。阴津枯竭、痰瘀互结者，加北沙参、玄参、麦冬、天花粉、玉竹、石斛、夏枯草、当归、石见穿、威灵仙、莪术、赤芍；气虚阳微者，加人参、黄芪、白术、茯苓、枸杞子、生地、山药、肉桂、附片、甘草。

〔临床报道〕用此散治疗因食管癌出现的咽下困难症 21 例，经服上药 1 周后咽下困难消失者 13 例，好转 6 例，无效 2 例。

(4) 散结通幽方 (浙江中医杂志, 1994, 3)

〔组成与用法〕制半夏 60~120g，人参 15~20g，白蜜 100~200ml，威灵仙 40g，代赭石 (先煎) 40g，昆布 30g，海藻 30g，瓜蒌壳 30g，丹参 30g，当归 30g，薏苡仁 30g，三棱 15g，莪术 15g，僵蚕 12g，郁金 12g，象贝 12g，云南白药 (冲服) 4g。上药除白蜜外，水煎 3 次取液，混合，加入蜂蜜、云南白药搅匀，频饮，1~2 日服完。

〔功能主治〕益气化痰，化瘀散结，通下。主治食管癌梗阻者。

〔加减应用〕纳差者，加麦芽、焦山楂，煎水饮。服药后

大便溏泻者，酌减白蜜、当归、瓜蒌壳之量，再加白术；兼阴虚者，加沙参、麦冬、生地；有热者，加蒲公英。

(5) 活血降逆方（新中医，1993，5）

〔组成与用法〕 代赭石（先煎）30g，仙鹤草 30g，人参 30g，红花 60g，蜂蜜 60g。前 4 味加水 500ml，煎至 100ml，加蜂蜜搅匀，频频饮服。1~2 天服完。

〔功能主治〕 活血降逆。主治晚期食管癌梗阻。

〔加减应用〕 上腹部胀闷者，加厚朴、枳壳；胸背疼痛者，加香附、郁金、八月札。

(6) 天夏开道汤（江苏中医，1995，10）

〔组成与用法〕 天龙 3g，生半夏（先煎）15~30g，生南星（先煎）12g，黄药子 9g，威灵仙 5g，旋覆花 9g，代赭石 30g，急性子 12g，降香 9g，枳实 12g，郁金 12g，贝母 12g，茯苓 12g，生薏苡仁 30g，太子参 15g，橘皮络 6g，路路通 12g，半枝莲 15g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰降逆。主治中晚期食管癌吞咽梗阻。

〔加减应用〕 便秘严重者，加生大黄、肉苁蓉。

〔临床报道〕 治疗 38 例，总有效率为 81.58%。

7. 食管癌穿孔并发食管纵隔瘘、肺脓疡专方

利湿解毒方（江苏中医，1990，4）

〔组成与用法〕 芦根 20g，生薏苡仁 20g，冬瓜仁 20g，鱼腥草 20g，金荞麦根 20g，黄芩 10g，杏仁 10g，桃仁 10g，浙贝母 10g，桔梗 10g，生甘草 6g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。

〔功能主治〕 清热利湿，活血解毒。主治食管癌穿孔并发食管纵隔瘘、肺脓疡。

〔加减应用〕 痰热雍肺者，加半枝莲、白花蛇舌草；痰湿蕴而化热，咳痰黄稠，苔黄腻，脉滑数者，加川贝、桑白皮、瓜壳；呕恶痰涎者，加法半夏、生姜。

8. 食管癌疼痛专方

化痰宽胸汤（李佩文经验方）

〔组成与用法〕旋覆花 10g，代赭石 15g，柿蒂 20g，竹茹 10g，石见穿 10g，石上柏 10g，浙贝母 15g，山豆根 10g，全瓜蒌 10g，清半夏 10g，台乌药 10g，白屈菜 6g。水煎服。

〔功能主治〕化痰宽胸，降逆止痛。主治食管癌疼痛。

〔加减应用〕放疗中食管出现烧灼样疼痛者，加金银花、紫花地丁等；肿块外侵，致胸背疼痛者，加狗脊、桑寄生；中晚期患者，加党参、当归、枸杞子。（中国中西医结合杂志，2003，8）

【专病成药】

1. 食管平（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕西洋参、三七、白矾、冰片、珍珠等多种中药材组成。

〔功能主治〕降逆止呕，涤痰解毒，软坚破瘀，蚀腐生新，凉膈消积，行气宽中。主治食管癌、食管狭窄梗阻、食管炎和各种咽喉炎。主要用于早、中、晚食管癌引起的食管不适；吞咽困难、滴水不下、噎膈、反涎及各种食管疾患，也可用于放疗化疗的配合治疗及正常人食管的癌变防治。

〔用法用量〕1次 0.3～0.5g，1日 3～5次，或遵医嘱饭前用凉开水搅匀服下；服药后做挺胸、提气深呼吸 5～7次，1个月为1个疗程。

2. 金蒲胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕蟾酥、牛黄、蜈蚣、黄药子、红花、乳香、没药、黄芪、姜半夏等 24味。

〔功能主治〕清热解毒，消肿止痛，益气化痰。主治食管癌痰湿瘀阻及气滞血瘀证。

〔用法用量〕饭后温开水送服，口服，1次 3粒，1日 3次，或遵医嘱。42天为1个疗程。

3. 仙蟾片（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔**处方组成**〕 马钱子粉、半夏（制）、人参、仙鹤草、补骨脂、郁金、蟾酥、当归。

〔**功能主治**〕 化瘀散结，益气止痛。主治食管癌。

〔**用法用量**〕 口服，1次4片，1日3次。

4. 复方天仙胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2002）

〔**处方组成**〕 天花粉、威灵仙、急性子、蜈蚣、蟾酥、龙葵、黄芪、麝香、牛黄、乳香、没药、猪苓、白花蛇舌草、冰片、白术、女贞子、甘草。

〔**功能主治**〕 清热解毒，活血化瘀，散结止痛。主治各期食管癌。

〔**用法用量**〕 口服，1次2~3粒，1日3次，1个月为1个疗程，停药3~7天后，可继续服用。

5. 珍香胶囊（《国家基本医疗保险目录》2002）

〔**处方组成**〕 珍珠、人工牛黄、血竭、三七、麝香、冰片、西洋参等。

〔**功能主治**〕 清热解毒，活血化瘀，消痰散结。对于证属痰瘀凝聚，毒热蕴结的食管癌患者的放疗有协同作用。

〔**用法用量**〕 口服，1次6粒，1日3次。

6. 增生平片（原名抗癌乙片）（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔**处方组成**〕 黄药子、草河车、山豆根、夏枯草、白鲜皮、败酱草等。

〔**功能主治**〕 清热解毒、化瘀散结。主治食管癌，具有呃逆，进食吞咽不利，口干、口苦、咽痛、便干、舌暗，脉弦滑等热瘀内结表现者。

〔**用法用量**〕 口服。1次4~8片，1日2次，每疗程6个月，或遵医嘱。

7. 金龙胶囊（《国家基本医疗保险目录》2004）

〔**处方组成**〕 鲜守宫、鲜金钱白花蛇等。

【功能主治】扶正荡邪，解毒消肿，理气止痛，破瘀散结。具有增强免疫功能，促进新陈代谢，抑制多种肿瘤，改善体质等作用。主治食管癌。（北京中医，2001，5）

【用法用量】口服，1次2~4粒、1日3次，1~2个月为1个疗程。

【专病单方】

1. 威灵仙 用法：每取90g，1日1剂，煎水频饮。功用：祛风通络。主治：食管癌术后吻合口狭窄者。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 干蟾酥 用法：每取30g，配田三七30g、三棱30g、五灵脂30g。上药用微火焙干存性，研成细末，过筛既得，1次1.5~3g，1日3次，用醋调和后，温开水冲服。功用：清热解毒，消肿散结。主治：食管癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 雄黄 用法：每取3g，配甜瓜蒂3g、赤小豆3g。上药共研细末，1次1.5g，温开水调糊，入狗油数勺，服下，以吐为度。功用：以毒攻毒，破积散结。主治：食管癌梗阻者。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 鲜桑白皮根 用法：每取30g，米醋90ml，共煎2小时，为一日量。开始1日3次，7天后每日2次，可加糖。功用：消肿利水，破积散结。主治：食管癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 木芙蓉花 用法：每取120g。研为细末，1次3g，1日2次。功用：清热解毒，消肿排脓。主治：食管癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 山慈菇（整个破开） 用法：每取120g。洗净后清水浓煎，加入蜂蜜收膏。1次9~15g，1日2次。功用：清热解毒，消肿散结。主治：食管癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 威灵仙 用法：每取30g，配白蜜30g。水煎3次，每煎分2次服，每4小时服1次，一日服完，7日为1个疗程。

功用：祛风通络。主治：食管癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

8. 狗宝 用法：每取 5g，配麝香 0.5g。上药共研细末，1 次 0.5g，1 日 2 次。功用：活血通络，消肿散结。主治：食管癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

9. 槐角 用法：每取 100g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。功用：活血止血，消肿散结。主治：食管癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

10. 棉花根 用法：每取 50g，配半枝莲 50g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒，消肿散结。主治：食管癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

11. 水蛭 用法：每取 10g，配海藻 50g。上药共研细末，1 次 10g，1 日 2 次，黄酒冲服，1~2 个月为 1 个疗程。功用：破血消癥，软坚散结。主治：食管癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

腹部肿瘤

胃 癌

胃癌是消化系统常见的恶性肿瘤，约占消化系统肿瘤的50%~60%。在我国，胃癌的发病率和死亡率均居恶性肿瘤之首。胃癌的病因与环境因素有关，不良饮食习惯、胃部良性疾病以及致癌物如N-亚硝基化合物、真菌污染以及幽门螺杆菌感染都是胃癌的致病因素。

本病相当于中医病名国家标准的胃癌，亦属于反胃、胃脘痛、噎膈、心腹痞、积聚等范畴。本病的主要病因病机为饮食不节、情志失调、劳倦内伤或邪毒外侵，致气滞、血瘀、痰凝、毒蕴，互结于胃，形成胃癌。

【辨证用方】

胃癌的辨证，先当辨明虚实，实证当辨气滞、血瘀、痰结、毒蕴之轻重，虚证当辨气、血、阴、阳之不同。胃脘疼痛、拒按，或胸闷脘痞，脉弦为实证；胃脘隐痛、喜按，脉细弱为虚证。实证治以舒肝和胃、化瘀解毒、化痰散结为主，虚证治以健脾和胃、补气益血、温中养胃为主，临床当根据虚实的轻重、夹杂、转化，辨证选用方药。

1. 肝胃不和证

主症：胃脘胀满，时时作痛，窜及两胁，口苦心烦，暖气陈腐或呃逆，吞咽困难，纳少或呕吐反胃，舌淡红，苔薄白或薄黄，脉弦或弦细。

治法：舒肝和胃，降逆止痛。

(1) 逍遥散合旋覆代赭汤加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 醋炒柴胡 6g, 制香附 6g, 广木香 5g, 炒枳壳 9g, 川厚朴 10g, 青皮 10g, 陈皮 10g, 砂仁 5g, 降香 6g, 杭白芍 12g, 旋覆花 (布包) 9g, 代赭石 (先煎) 15g, 法半夏 10g, 木瓜 10g, 沉香粉 (冲服) 6g, 全蝎 10g, 白花蛇舌草 30g, 八月札 10g。水煎服。

[功能主治] 疏肝理气, 和胃降逆。主治胃癌。

[加减应用] 兼腑实便秘, 加大黄、槟榔; 兼火热内郁, 加黄连、栀子、黄芩。脘胀暖腐者, 加鸡内金、炒山楂、炒麦芽。

[临床报道] 旋覆代赭汤加黄芪、麦冬、半枝莲等治胃癌化疗后呕吐 40 例, 总有效率为 82.5%。(中医药学报, 2000, 6)

(2) 柴胡舒肝散加减 (《中西医临床肿瘤学》)

[组成与用法] 柴胡 10g, 枳壳 10g, 郁金 10g, 法半夏 10g, 川芎 10g, 丹参 20g, 白芍 15g, 白花蛇舌草 30g, 炙甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 舒肝理气, 和胃止痛。主治胃癌。

[加减应用] 恶心苔腻者, 加藿香、陈皮; 反酸者, 加吴茱萸、黄连; 脘胁痛甚者, 加川楝子、延胡索、木香或砂仁、三七粉 (冲服)。

2. 瘀毒内结证

主症: 胃脘刺痛, 痛时拒按, 心下痞块, 按之疼痛, 或呕血便血, 肌肤甲错, 舌质紫黯或见瘀点, 苔薄白或薄黄, 脉沉细或涩。

治法: 解毒祛瘀, 活血止痛。

(1) 失笑散合桃红四物汤加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 生蒲黄 (布包) 10g; 五灵脂 10g, 桃仁 9g, 红花 9g, 当归尾 15g, 赤芍 15g, 丹参 15g, 延胡索 12g, 川楝子 15g, 乌药 9g, 三七粉 (冲服) 3g, 莪术 10g, 仙鹤草

30g, 乌贼骨 10g, 侧柏炭 12g, 露蜂房 6g, 血余炭 12g, 净蛇蛻 6g, 干蟾皮 6g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀, 清热解毒。主治胃癌。

〔加减应用〕 出血兼见舌质光红, 口咽干燥, 脉细数者, 加沙参、生地、麦冬、阿胶; 失血日久, 心悸少气, 多梦少寐, 体倦纳差, 唇白舌淡, 脉虚弱者, 加炒酸枣仁、黄芪、茯神、远志。

(2) 加减膈下逐瘀汤 (《中西医临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕 当归 10g, 川芎 10g, 桃仁 10g, 红花 10g, 延胡索 10g, 香附 10g, 枳壳 10g, 郁金 10g, 丹皮 15g, 赤芍 20g, 蚤休 30g, 炙甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 舒肝理气, 活血化瘀。主治胃癌。

〔加减应用〕 肿块明显者, 去川芎、丹皮, 加三棱、莪术; 呕吐宿食者, 去香附、郁金, 加厚朴、莱菔子、山楂; 呕血、柏油样便者, 去桃仁、红花、赤芍, 加三七粉 (冲服)、白及、蒲黄、仙鹤草。

3. 痰湿凝结证

主症: 胸闷膈满, 胃脘饱胀或疼痛隐隐, 面黄虚胖, 呕吐痰涎, 腹胀便溏, 舌淡, 苔滑腻, 脉细濡或滑。

治法: 化痰散结, 健脾和胃。

(1) 加减开郁二陈汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 苏子 10g, 莱菔子 10g, 贝母 10g, 胆南星 10g, 法半夏 10g, 海藻 10g, 生牡蛎 (先煎) 30g, 苍术 10g, 白术 10g, 茯苓 10g, 夏枯草 15g, 陈皮 10g, 生薏苡仁 15g, 白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰祛湿, 软坚散结。主治胃癌。

〔加减应用〕 脾虚中寒痛甚、呕吐、肢冷者, 加人参、干姜、砂仁、川椒目; 恶心呕吐者, 加旋覆花、代赭石、生姜汁; 食滞者, 加炒山楂、鸡内金; 气滞甚者, 加厚朴、大腹皮。

(2) 加减导痰汤 (《临床中医肿瘤学》)

[组成与用法] 枳实 10g, 胆南星 10g, 法半夏 10g, 陈皮 10g, 茯苓 10g, 生牡蛎 30g, 山楂 15g, 象贝母 15g, 神曲 15g, 木馒头 15g, 黄药子 15g, 海藻 15g, 昆布 15g。水煎服。

[功能主治] 理气化痰, 软坚散结。主治胃癌。

[加减应用] 脘痞腹胀者, 加厚朴; 便溏、喜热饮、舌淡者, 加干姜、草豆蔻、苍术。

4. 脾胃虚寒证

主症: 胃脘隐痛, 喜按喜温, 朝食暮吐, 或暮食朝吐, 呕吐清水, 面白无华, 或四肢发凉, 神倦无力, 浮肿便溏, 舌质淡而胖, 有齿痕, 苔白滑润, 脉沉缓或弦细而弱。

治法: 温中散寒, 健脾和胃。

(1) 加减理中汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 党参 15g, 白术 10g, 干姜 3g, 红蔻仁 10g, 吴茱萸 6g, 丁香 6g, 柿蒂 12g, 檀香 6g, 肉桂 5g, 制附片 6g, 法半夏 9g, 诃子 6g, 石见穿 30g, 白英 15g, 半枝莲 15g。水煎服。

[功能主治] 温中健脾, 和胃止呕。主治胃癌。

[加减应用] 痛甚者, 去党参加五灵脂、高良姜、三棱; 形寒肢冷者, 加肉桂、补骨脂、仙灵脾; 恶心呕吐甚者, 加灶心土、代赭石。

(2) 加减六君子汤 (《中西医临床肿瘤学》)

[组成与用法] 党参 20g, 白术 10g, 法半夏 10g, 制附片 10g, 陈皮 10g, 草蔻仁 6g, 干姜 6g, 猪苓 15g, 补骨脂 15g, 白花蛇舌草 15g, 甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 温中散寒, 温肾助阳。主治胃癌。

[加减应用] 寒凝血瘀者, 加鸡血藤、桃仁、红花、三七粉 (冲服)、桂枝; 寒凝气滞者, 加乌药、木香; 肾阳虚甚者, 去干姜、草蔻, 加肉苁蓉、仙灵脾、杜仲; 水湿内停明显, 苔

白腻者，加茯苓、泽泻、车前子、桂枝。

〔临床报道〕以六君子汤加牡蛎、莪术、三棱、藤梨根、枳壳、干姜为基本方，阳虚者，加肉桂、附子、桂枝；血虚者，加当归、熟地；腹胀者，加枳实、大腹皮、槟榔；湿重者，加苍术、厚朴、生南星（先煎）；便秘者，加生大黄、玄明粉；瘀血甚者，加地鳖虫、穿山甲。治疗胃癌术后未化疗患者68例，1、3、5年生存分别为67例、65例、64例。（江苏中医药，2002，8）

5. 气血双亏证

主症：胃脘隐痛，全身乏力，心悸气短，头晕目眩，面黄无华，虚烦不寐，自汗盗汗，甚则四肢浮肿，舌淡少苔，脉沉细无力。

治法：补气益血。

（1）加减八珍汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕黄芪30g，党参30g，白术10g，茯苓10g，当归15g，熟地12g，白芍15g，紫河车10g，黄精15g，阿胶（烔化）10g，白花蛇舌草30g，甘草6g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益气养血。主治胃癌。

〔加减应用〕黑便者，加白及、灶心土。

（2）加减十全大补汤（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕黄芪30g，党参30g，白术15g，茯苓15g，当归15g，熟地10g，白芍10g，川芎10g，枳壳10g，肉桂6g，枸杞子12g，菟丝子12g，法半夏10g，半枝莲20g，甘草6g。水煎服。

〔功能主治〕气血双补，健脾和中。主治胃癌。

〔加减应用〕气虚甚者，党参改人参、或加西洋参；血瘀甚者，加三棱、莪术、陈皮；瘀毒内阻，癥瘕形成者，酌加山慈菇、半枝莲、土茯苓、莪术、生山楂、全蝎、土鳖虫、蜈蚣等；气滞甚者，加木香、大腹皮、郁金。

6. 胃热伤阴证

主症：胃脘灼热，口干欲饮，喜冷饮，嘈杂，食后痛剧，纳差，五心烦热，大便干燥，舌质红绛或光红少苔，脉滑或数。

治法：养阴清热解毒。

(1) 加减养胃汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕生地 15g，玉竹 10g，石斛 30g，玄参 10g，麦冬 10g，生石膏（先煎）15g，白芍 10g，知母 10g，沙参 30g，竹茹 10g，天花粉 9g，藤梨根 15g。水煎服。

〔功能主治〕养阴和胃，清热解毒。主治胃癌。

〔加减应用〕胃脘灼热疼痛明显，嘈杂反酸者，加黄连、吴茱萸。

(2) 加减麦门冬汤合益胃汤（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕生地 15g，玉竹 15g，石斛 15g，麦冬 18g，白扁豆 15g，谷芽 15g，法半夏 10g，鸡内金 10g，丹皮 10g。水煎服。

〔功能主治〕益胃养阴，清热解毒。主治胃癌。

〔加减应用〕津少口渴甚者，加芦根、天花粉、知母；热毒内蕴甚者，加金银花、玄参、竹茹、黄连；热灼胃络出血者，去白扁豆，加仙鹤草、侧柏叶或生地榆、生石膏；气虚者，加西洋参或太子参、生黄芪。

【辨病用方】

胃癌的辨病治疗，当注重脾胃亏虚，痰、瘀、毒互结。根据肿瘤情况、病期早晚、体质强弱等选用或合用健脾和胃、化痰解毒、豁痰散结等治疗方药。

1. 胃癌各期体质较实者用方

(1) 昭黄散（中国民间疗法，1999，3）

〔组成与用法〕壁虎、三七、大黄、藤梨根、蓬术、白术、太子参等。三七、壁虎、大黄按 4：3：3 的比例，研磨，过

120目筛。藤梨根等药按煎煮法制成合剂。1日散剂10g，合剂150ml分3次服。2个月为1个疗程。

〔功能主治〕 健脾活血，解毒散结。主治胃癌。

〔临床报道〕 配合化疗治疗46例，总有效率33.3%。

(2) 芍药莪术饮（北京东直门医院方）

〔组成与用法〕 杭白芍30g，莪术15g，五灵脂、干蟾皮各10g，半枝莲20g，萆薢10g，青、陈皮各12g，枳壳、延胡索、香附、厚朴、菖蒲、肉豆蔻各10g。水煎服，1日1剂。

〔功能主治〕 疏肝和胃，祛瘀散结。适用于胃癌（肝胃不和型）。

(3) 茵陈鹤草汤（北京东直门医院方）

〔组成与用法〕 茵陈25g，银柴胡12g，仙鹤草30g，蜂房12g，五灵脂、干蟾皮各9g，半枝莲30g，制胆星10g，紫草、石斛各15g，生地、麦冬各20g，黄芩15g，知母12g，枳实6g。1日1剂，水煎服。

〔功能主治〕 解毒散结，育阴清热。适用于胃癌（瘀毒内阻型）。

(4) 牡蛎失笑饮（上海曙光医院方）

〔组成与用法〕 生牡蛎30g，炙穿山甲10g，木馒头12g，郁金9g，赤芍10g，丹参12g，失笑散（包）12g，夏枯草10g，石斛12g，姜半夏9g，陈皮6g，广木香6g，太子参10g。1日1剂，水煎服。

〔功能主治〕 活血散结，理气和胃。主治胃癌。

〔加减应用〕 食滞难下，脘腹挛急者，去木香，加莱菔子、厚朴、白芍；舌质暗，见瘀点者，加三七粉（冲服）；胸闷脘痞者，加薏苡仁、白蔻仁、藿香。

(5) 蜈蚣地龙散（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕 蜈蚣20条，地龙30g，乌梢蛇30g，虻虫30g，三七30g，穿山甲30g，共研细末，炼蜜为丸。每丸3g，

1 日 1 丸。

〔功能主治〕 解毒化瘀。主治胃癌。

(6) 蚤休黄药颗粒 (河南林县方)

〔组成与用法〕 蚤休 60g, 黄药子 60g, 山豆根 120g, 败酱草 120g, 白鲜皮 120g, 夏枯草 120g, 共研细末, 炼蜜为丸。每丸 9g, 1 日 4~6 丸。

〔功能主治〕 清热解毒。主治胃癌。

(7) 解毒化瘀饮 (湖北中医学院方)

〔组成与用法〕 白花蛇舌草 120g, 煨莪术、煨三棱、赤芍各 9g, 代赭石粉、海藻、昆布、制鳖甲各 15g, 旋覆花 (包煎) 9g, 夏枯草 60g, 白茅根 30g, 蜂蜜 60g。1 日 1 剂, 水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 化瘀散结。主治胃癌。

(8) 复方藤梨根汤 (武汉市胃癌防治协作组方)

〔组成与用法〕 藤梨根 60g, 虎杖、石打穿、白花蛇舌草、半枝莲各 30g, 瞿麦、丹参各 15g, 延胡索、陈皮、茯苓、姜黄、香附各 9g, 甘草 6g。1 日 1 剂, 水煎服。

〔功能主治〕 解毒化瘀, 理气和胃。主治胃癌。

(9) 银蜈糖浆 (《中西医临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕 金银花 95g, 蜈蚣 6 条, 水蛭 25g, 海藻 15g, 昆布 15g, 三棱 12g, 莪术 12g, 枳实 12g, 共煎浓缩制成糖浆。1 次 30~50ml, 1 日 3 次。

〔功能主治〕 清热解毒, 化瘀散结。主治胃癌。

2. 胃癌中晚期体质较虚者用方

(1) 理胃化结汤 (潘明继经验方)

〔组成与用法〕 党参 15g, 茯苓 12g, 熟地 12g, 黄芪 15g, 黄精 15g, 沙参 15g, 白术 12g, 枸杞子 9g, 芡实 15g, 莲肉 15g, 白毛藤 30g, 羊肚枣 6g, 鸡内金 6g, 木香 6g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 3g, 大枣 5 个, 三七粉 1.5~2g (冲服)。水

煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，解毒化结。主治中晚期胃癌。

〔加减应用〕 脾胃虚寒，加砂仁、蔻仁、制附子，重用三七（冲服），酌减白毛藤、沙参、白花蛇舌草；气血两虚、白细胞下降者，加鸡血藤、女贞子、当归，重用生黄芪。

〔临床报道〕 配合化疗治疗 320 例，结果比国内同期单纯西医治疗为优。（中国中西医结合杂志，1986，5）

（2）异功散合当归补血汤加味（孙桂芝经验方）

〔组成与用法〕 党参 10g，炒白术 10g，茯苓 10g，炒陈皮 10g，生黄芪 10g，当归 10g，血余炭 10g，白芷 10g，陈皮 10g，半枝莲 15g，白花蛇舌草 15g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气，和血解毒。主治中晚期胃癌。

〔加减应用〕 肝胃不和者，加白芍、柴胡、佛手、香橼、八月札、绿萼梅、炒枳壳；胃热伤阴者，加麦冬、石斛、天花粉、生石膏、知母；痰湿凝结者，加制半夏、竹茹、枳实、石菖蒲、藿香、砂仁、生薏苡仁、白蔻仁；脾胃虚寒者，加人参、干姜、桂枝、小茴香、炙甘草；气阴两虚者，加黄芪、肉桂、白芍、熟地、枸杞子、女贞子、山药、山茱萸、阿胶；有骨转移者，加透骨草、鹿含草、骨碎补、鸡血藤。

（3）益胃散结汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 党参 15g，白术 10g，干姜 3g，茯苓 10g，法半夏 9g，广木香 10g，女贞子 10g，姜黄 5g，莪术 12g，石见穿 30g，夏枯草 15g，半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益胃健脾，化瘀散结。主治胃癌。

〔加减应用〕 胃脘胀甚者，加隔山消、佛手、炒枳壳；胃热伤阴者，加麦冬、天花粉、知母；气虚者，加黄芪、人参；瘀甚，加蜈蚣、全蝎。

（4）木核汤（浙江中西医结合杂志，2003，1）

〔组成与用法〕 木贼草 60g，山药 20g，路路通 10g，核桃

树枝 100g, 石斛 20g, 沙参 10g, 铁树叶 20g, 白术 10g, 木香 10g, 茯苓 10g, 桂枝 4g, 炙甘草 4g, 枳壳 10g, 露蜂房 10g。水煎服。

[功能主治] 补气健脾, 开胃消胀。主治中晚期胃癌。

[加减应用] 呕吐者, 加法半夏、生姜、佩兰; 瘀血内阻胃痛者, 加延胡索、香附、五灵脂; 便干者, 加火麻仁、郁李仁; 呕血、便血者, 加仙鹤草、血余炭; 便溏者, 加白术、薏苡仁; 脾胃虚寒者, 加高良姜、荜茇; 气血亏虚者, 加黄芪、人参、白术、熟地、阿胶。

(5) 扶正软坚胶囊 (镇江医学院学报, 2000, 4)

[组成与用法] 黄芪 300g, 白花蛇舌草 150g, 莪术 150g, 生薏仁 150g, 石见穿 150g, 威灵仙 100g, 鲨鱼软骨粉 150g。先将前六味药水煎, 过滤, 浓缩, 再加入鲨鱼软骨粉调匀, 干燥成粉, 装为 500 颗胶囊。1 次 5 粒, 1 日 3 次。

[功能主治] 扶正散结, 解毒止痛。用于胃癌体虚和各种中晚期肿瘤。

(6) 扶正通瘀汤 (中医药学刊, 2003, 11)

[组成与用法] 潞党参 10g, 白术 10g, 茯苓 10g, 薏苡仁 10g, 仙鹤草 10g, 莪术 10g, 重楼 10g。水煎服。

[功能主治] 扶正通瘀。主治中晚期胃癌。

[加减应用] 上腹饱胀者, 加制香附、砂仁、厚朴; 胃气上逆者, 加制半夏、竹茹、干姜; 胃脘疼痛者, 加延胡索、香橼、全蝎; 出血者, 加三七 (冲服)、乌贼骨、女贞子; 便秘者, 加枳壳、白术、川贝母; 体质虚弱者, 加黄芪、熟地、枸杞子等。

(7) 加味黄芪建中汤 (内蒙古中医药, 1996, 1)

[组成与用法] 生黄芪 30g, 炒白芍 15g, 炙甘草 15g, 桂枝 18g, 生姜 12g, 大枣 6 枚, 饴糖 40g, 炮山甲 (先煎) 10g, 制鳖甲 (先煎) 10g, 砂仁 10g, 白及 10g, 三七粉 (冲

服) 5g, 露蜂房 20g, 瓦楞子 20g。水煎服。

〔功能主治〕 温中补虚。主治溃疡型胃癌。

〔加减应用〕 便血、吐血者, 加生地榆、仙鹤草, 加大三七、白及的用量; 纳呆者, 加鸡内金、佛手; 畏寒者, 加吴茱萸、小茴香; 气滞者, 加广木香、厚朴; 血瘀者, 加郁金、丹参; 反酸者, 加海螵蛸; 疼痛难忍者, 加没药、九香虫; 脘腹胀满者, 加枳实、炒莱菔子, 去大枣, 减炙甘草的量; 肿块大而坚者, 加黄药子、穿山甲, 鳖甲加量。

(8) 扶正抑瘤颗粒 (中国中西医结合杂志, 2003, 12)

〔组成与用法〕 红芪、当归、莪术、墓回头按 3:1:1:3 比例配方, 制成浓缩颗粒, 1 次 18g, 1 日 3 次。

〔功能主治〕 益气活血解毒。主治胃癌。

(9) 益胃解毒方 (福建中医药, 2002, 1)

〔组成与用法〕 党参 30g, 炙黄芪 30g, 铁树叶 30g, 白术 15g, 白花蛇舌草 15g, 莪术 9g, 廔虫 9g, 露蜂房 9g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾补中, 散结解毒。主治晚期胃癌。

〔临床报道〕 治晚期胃癌 45 例, 平均生存期 12.5 个月。

(10) 温胃化瘀饮 (北京东直门医院方)

〔组成与用法〕 人参 (另煎) 10g, 猪、茯苓各 30g, 焦白术 10g, 生、炙黄芪各 30g, 补骨脂 15g, 吴茱萸 10g, 山萸肉 15g, 肉豆蔻 12g, 半枝莲 20g, 椿根皮 30g, 赤芍、白芍、禹余粮各 10g, 仙鹤草、女贞子各 20g。1 日 1 剂, 水煎服。

〔功能主治〕 温补脾肾, 解毒化瘀。适用于胃癌脾肾虚寒型。

【对症用方】

胃癌的对症用方, 主要根据患者主要症状 (如呕吐、疼痛等)、合并症 (如幽门梗阻等) 进行选择, 并区分是否手术或放疗、化疗等进行相应选方用药。术后治疗以健脾益气养胃为

主，放疗患者以养阴和胃为主，化疗患者以健脾益肾为主。

1. 胃癌手术后专方

(1) 加减六君子汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 黄芪 30g，党参 15g，白术 10g，茯苓 10g，陈皮 10g，枳壳 10g，法半夏 10g，石斛 15g，砂仁 6g，鸡内金 10g，神曲 10g，炒山楂 10g，炒麦芽 10g，甘草 4g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气养胃。用于胃癌手术后乏力腹胀食欲不振者。

〔加减应用〕 血虚者，加当归、白芍、熟地；湿热者，加黄芩、薏苡仁；气滞、气逆者，加八月札、厚朴、旋覆花；血瘀者，加丹参、桃仁；恶心、腹胀者，加炒谷芽；疼痛者，加川楝子、延胡索、徐长卿；白细胞减少者，加黄精、补骨脂。

(2) 小金丸加减方（中西医结合杂志，1990，6）

〔组成与用法〕 马钱子 0.5g，当归 6g，制乳香 6g，制没药 6g，白胶香 9g，地龙 9g，五灵脂 9g，丹参 9g，制草乌 9g，陈皮 9g，厚朴 9g，木香 9g，砂仁 4.5g。加工成片剂，每片 0.4g，1 次 4 片，1 日 3 次。

〔功能主治〕 活血化瘀，散积消肿。主治中晚期胃癌术后腹痛。

〔临床报道〕 治疗 44 例，患者术后 1 年、2 年生存率分别为 93.2%、80%。

(3) 加减大承气汤（中医药学刊，2001，6）

〔组成与用法〕 大黄（后下）5~10g，芒硝 10~15g，枳实 15~20g，厚朴 10~15g，桃仁 10~15g，赤芍 15~20g，莱菔子 15~20g。水煎服。

〔功能主治〕 通里攻下，祛满行气。主治胃癌术后肠梗阻。

〔加减应用〕 体虚者，加黄芪、当归、阿胶等。

〔临床报道〕 治疗 60 例，54 例梗阻症状消失，胃肠功能

恢复。

(4) 健脾活血解毒汤 (中西医结合学报, 2003, 3)

〔组成与用法〕 黄芪 30g, 女贞子 20g, 薏苡仁 30g, 猪苓 15g, 仙鹤草 30g, 鸡血藤 30g, 苦参 15g, 白花蛇舌草 30g, 威灵仙 30g, 玄参 20g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气, 活血解毒。用于抗胃癌术后复发和转移。

〔临床报道〕 治疗 42 例, 1 年后复发率和转移率均明显低于单纯化疗组。

2. 胃癌放疗后专方

养阴和胃汤 (黎月恒经验方)

〔组成与用法〕 北沙参 30g, 麦冬 15g, 玉竹 10g, 石斛 15g, 连翘 15g, 鸡血藤 30g, 陈皮 10g, 姜竹茹 15g, 木瓜 10g, 女贞子 15g, 砂仁 6g, 鸡内金 10g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 养阴和胃。用于胃癌放疗后。

〔加减应用〕 恶心呕吐明显者, 加代赭石、旋覆花 (布包)、法半夏; 腹痛腹泻者, 加山药、乌梅; 白细胞及血小板下降者, 加黄芪、黄精、当归、紫河车; 口腔溃疡者, 加天花粉、儿茶。

3. 胃癌化疗后专方

(1) 癌复康加减方 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 白参 (蒸兑) 10g, 茯苓 10g, 白术 10g, 黄芪 10g, 陈皮 10g, 女贞子 10g, 旱莲草 10g, 枸杞子 10g, 菟丝子 10g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾, 扶正固本。用于胃癌化疗后脾肾亏虚, 气血不足。

〔加减应用〕 恶心欲吐明显者, 加法半夏、姜竹茹、砂仁; 白细胞下降者, 加仙灵脾、锁阳、巴戟天; 心悸失眠者, 加远志、炒酸枣仁、石菖蒲; 谷丙转氨酶高者, 加茵陈、蒲公英、

虎杖。

(2) 健脾补肾汤 (余桂清经验方)

[组成与用法] 党参 15g, 鸡血藤 15g, 枸杞子 15g, 女贞子 15g, 白术 9g, 菟丝子 9g, 补骨脂 9g。水煎服。

[功能主治] 健脾益气, 滋补肝肾。主治胃癌化疗后免疫功能下降。

[加减应用] 肝胃不和, 呕吐, 呃逆, 加降香、白芍、旋覆花、法半夏、青陈皮、白木瓜; 脾胃虚寒, 呕吐清水痰涎, 便溏, 加干姜、附片、良姜、吴茱萸、肉桂、法半夏、丁香; 胃热伤阴, 口干, 呕吐, 胃脘灼热, 加知母、天花粉、沙参、麦冬、竹叶、玉竹、石斛、竹茹; 痰湿凝结, 呕吐痰涎, 腹胀便溏, 加藿香、佩兰、香附、川朴、莱菔子、苏子、法半夏、苍术。

[临床报道] 治疗晚期胃癌术后化疗 669 例, 化疗完成率为 94.44%。(北京中医杂志, 1990, 1)

(3) 养胃健脾汤 (河北医学, 2003, 4)

[组成与用法] 党参 15g, 黄芪 20g, 当归 10g, 茯苓 15g, 白术 15g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 麦冬 15g, 沙参 15g, 山药 15g, 阿胶 10g, 砂仁 6g, 焦山楂 30g。水煎服。

[功能主治] 养胃滋阴, 健脾益气。主治胃癌化疗后脾胃虚弱。

[加减应用] 气虚甚者, 加人参; 阴虚甚者, 加西洋参; 气滞者, 加枳实, 青皮; 瘀血者, 加桃仁、红花; 恶心, 脘痞者, 加法半夏、陈皮; 畏寒怕冷者, 加桂枝、白芍。

[临床报道] 治疗 44 例, 总有效率 90.9%。

(4) 扶正祛邪汤 (上海中医药杂志, 2002, 3)

[组成与用法] 党参 10g, 黄芪 30g, 当归 10g, 茯苓 10g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 薏苡仁 10g, 何首乌 10g, 焦六曲 10g, 焦山楂 10g。水煎服。

[功能主治] 扶正祛邪。主治胃癌化疗后正虚不足。

[加减应用] 脾胃虚弱者，加白术、怀山药；阴虚者，加生地、麦冬；血虚不足者，加枸杞子、菟丝子、女贞子；气滞血瘀者，加桃仁、延胡索和失笑散；胃气上逆加旋覆花、代赭石、姜半夏。

[临床报道] 辅助化疗、免疫疗法，治疗胃癌术后患者149例，5年生存率达50.34%。

4. 胃癌幽门梗阻专方

(1) 加减丁香透膈散（《中西医结合临床肿瘤学》）

[组成与用法] 白参10g，白术10g，木香10g，砂仁8g，丁香10g，白蔻仁10g，神曲10g，麦芽15g，三棱10g，莪术10g，石见穿30g。水煎服。

[功能主治] 温中健脾，降逆和胃，兼活血化瘀。主治胃癌幽门梗阻。

[加减应用] 肾阳虚者，加制附片、干姜、肉桂。胃阴虚者，加沙参、麦冬、天花粉、白芍。

(2) 幽门梗阻方（《中西医结合临床肿瘤学》）

[组成与用法] 炙黄芪30g，丹参30g，白术15g，茯苓15g，鸡内金15g，白芍15g，桂枝9g，枳实9g，厚朴9g，皂角刺9g，三棱12g，莪术12g，蜚虫12g，山慈菇12g，炙甘草12g。水煎服。

[功能主治] 扶脾温胃，活血化瘀，软坚散结。主治胃癌幽门梗阻。

5. 胃癌呕吐专方

(1) 丁香柿蒂饮（《临床中医肿瘤学》）

[组成与用法] 丁香10g，柿蒂10g，陈皮10g，法半夏15g，茯苓15g，党参15g，生姜5g，大枣5g，甘草6g。水煎服。

[功能主治] 温中和胃止呕。主治胃癌呕吐。

(2) 竹茹二陈汤 (《临床中医肿瘤学》)

〔组成与用法〕 陈皮 10g, 法半夏 15g, 茯苓 15g, 竹茹 15g, 黄连 5g, 麦冬 10g, 枇杷叶 10g。水煎服。

〔功能主治〕 清热和胃止呕。主治胃癌呕吐。

6. 胃癌出血专方

(1) 加味大半夏汤 (江苏中医, 1994, 3)

〔组成与用法〕 人参 10g, 姜半夏 10g, 白蜜 20ml, 茜草炭 10g, 墨旱莲 10g, 甘草 4g, 代赭石 (先煎) 20g。水煎服。

〔功能主治〕 和胃降逆, 益气止血。主治胃癌呕血。

(2) 加减补中益气汤 (江苏中医, 1994, 3)

〔组成与用法〕 人参 10g, 炙黄芪 30g, 升麻 10g, 柴胡 10g, 炒白术 10g, 炙甘草 4g, 茜草炭 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气止血。主治胃癌便血。

〔加减应用〕 无论呕血、便血, 上述 2 方均可加入白及、乌贼骨、三七 (冲服); 呕血、便血缓解, 见胃中灼热、口干口苦、小便黄赤等胃腑蕴热证, 加黄芩、大黄炭、蒲公英。

〔临床报道〕 用以上二方治胃癌出血 32 例, 控制胃癌出血总有效率为 93.8%。

7. 胃癌疼痛方

加味四君汤 (李佩文经验方)

〔组成与用法〕 党参 15g, 茯苓 15g, 白术 15g, 陈皮 10g, 香橼 10g, 佛手 10g, 绿萼梅 5g, 木香 10g, 乌药 10g, 川楝子 10g, 刘寄奴 8g, 萆澄茄 3g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾和中, 理气止痛。主治胃脘疼痛。

【专病成药】

1. 复方天仙胶囊 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕 天花粉、威灵仙、急性子、蜈蚣、蟾酥、龙葵、黄芪、麝香、牛黄、乳香、没药、猪苓、白花蛇舌草、冰片、白术、女贞子、甘草。

〔功能主治〕 清热解毒，活血化瘀，散结止痛。对胃癌有一定抑制作用；配合化疗可提高其疗效。（实用新医学，2001，7）

〔用法用量〕 口服，1次2~3粒，1日3次。饭后半小时用蜂蜜水或温水送下（吞咽困难可将药粉倒出服用）。1个月为1个疗程。停药3~7天再继续服用。

2. 金珠胃泰胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 高良姜、丹参、檀香、砂仁、五灵脂、诃子、寒水石等。

〔功能主治〕 温中和胃，行气止痛。主治胃癌。（中国中西医结合杂志，2004，1）

〔用法用量〕 口服，1次2~3粒，1日3次；或遵医嘱。

3. 参莲胶囊（国家基本医疗保险药品目录（2002））

〔处方组成〕 苦参、山豆根、半枝莲、防己、三棱、莪术、丹参、补骨脂、苦杏仁、乌梅、白扁豆。

〔功能主治〕 清热解毒，活血化瘀，软坚散结。用于由气血瘀滞、热毒内阻而致的中晚期胃癌患者。

〔用法用量〕 口服，1次6粒，1日3次。

4. 平消胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 郁金、仙鹤草、五灵脂、白矾、硝石、干漆、马钱子粉、枳壳。

〔功能主治〕 活血化瘀，止痛散结，清热解毒，扶正祛邪。主治胃癌。（中国中西医结合杂志，1998，6）

〔用法用量〕 饭后服用，1次4~8粒，1日3次。

5. 安替可胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 蟾皮等提取物。

〔功能主治〕 软坚散结，解毒定痛，养血活血。主治胃癌。（中成药，2003，10）

〔用法用量〕 口服，1次2粒，1日3次。

6. 金龙胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔**处方组成**〕 鲜守宫、鲜金钱白花蛇等。

〔**功能主治**〕 扶正荡邪，解毒消肿，理气止痛，破瘀散结。主治胃癌。(北京中医，2001，2)

〔**用法用量**〕 1次2~4粒、口服，1日3次，1~2个月为1个疗程。

7. 华蟾素注射液 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔**处方组成**〕 中华大蟾蜍。

〔**功能主治**〕 清热解毒，消肿止痛，活血化瘀，软坚散结。直接杀伤肿瘤细胞，抑制肿瘤细胞生长。主治中、晚期胃癌。(成都中医药大学学报，2005，1)

〔**用法用量**〕 静滴，1次10~20ml加5%葡萄糖注射液500ml稀释后缓慢滴注，1日或隔日1次。每个疗程4周，用药1周后休息1~2日或按医嘱使用。

8. 肿节风注射液 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔**处方组成**〕 肿节风水提取液。

〔**功能主治**〕 清热解毒，消肿散结。主治胃癌。(中医杂志，2003，6)

〔**用法用量**〕 肌肉注射：4ml，1日2次；静脉滴注：10~16ml，1日1次。

9. 复方苦参注射液 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔**处方组成**〕 苦参等多味中草药。

〔**功能主治**〕 抗癌镇痛。主治胃癌及其引起的疼痛及出血。(广西医学，2003，9)

〔**用法用量**〕 本品10~20ml加入200ml生理盐水中静滴，1日1次。

10. 鸦胆子油乳剂 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔**处方组成**〕 鸦胆子。

〔**功能主治**〕 清热燥湿，解毒消癥。有明显抗肿瘤作用，增强免疫功能，促进骨髓造血。主治胃癌。(中成药，1991，9)

[用法用量] 静滴，每次 20~30ml，加生理盐水 250ml 稀释后立即使用，1 日 1 次；或口服，1 次 20~25ml，1 日 3 次。

11. 香菇多糖注射液（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

[处方组成] 香菇多糖。

[功能主治] 免疫调节剂。主治晚期或复发胃癌。（国医论坛杂志，2003，12）

[用法用量] 每周 2 次，1 次 2ml（1mg），加入 250ml 生理盐水或 5% 葡萄糖注射液中滴注，或用 5% 葡萄糖注射液 20ml 稀释后静注。

12. 榄香烯乳注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

[处方组成] 榄香烯，为中药莪术中提取到的抗癌活性物质。

[功能主治] 直接抑制肿瘤细胞的生长；能增强 T 淋巴细胞亚群的功能，有免疫保护作用；与放疗、化疗有协同作用；能为机体提供高能量营养；缓解癌痛；改善微循环；能通过血-脑脊液屏障。主治胃癌。（中国肿瘤临床，1997，7）

[用法用量] 静脉注射：1 日 1 次，400~600mg/次，15 天为 1 个疗程。腹腔注射 1 次 500~800mg，用药 1~3 次为 1 个疗程。

13. 艾迪注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

[处方组成] 人参、黄芪、刺五加、斑蝥。

[功能主治] 清热解毒，消瘀散结。适用于老年晚期胃癌。（华西药学杂志，2004，2）

[用法用量] 成人一次 50~100ml，加入 0.9% 氯化钠注射液或 5%~10% 葡萄糖注射液 400~500ml 中静脉滴注，1 日 1 次，连用 30 天为 1 个疗程，或视病情而定。

14. 参芪扶正注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

[处方组成] 党参、黄芪。

[功能主治] 益气扶正，提高机体免疫功能。主要用于气

虚证胃癌的辅助治疗。(中华实用中西医杂志, 2000, 5)

【用法用量】 静脉滴注。1次 250ml, 1日 1次, 疗程 21天; 与化疗合用, 在化疗前 3天开始使用, 疗程可与化疗同步结束。

【专病单方】

1. 蚤休 用法: 每取 50~100g, 水煎, 1日 1剂, 分 2次服。功用: 清热解毒。主治各期胃癌。(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 藤梨根 用法: 每取 90g, 加水 1000ml, 小火煮 2小时以上。1日 1剂, 10~15天为 1个疗程, 休息几天后再服, 共服 4个疗程。功用: 清热解毒。主治: 各期胃癌。(《中西医结合临床肿瘤学》)

3. 草乌 用法: 每取制草乌 24g, 文武火水煎 2次, 混合, 共 480ml, 1日 2次, 1次 20ml, 连服 12天, 休息 4天, 再重复上述疗程; 最多完成 4疗程。功用: 回阳救逆, 温胃止痛。主治晚期胃癌阳虚者。(陕西中医, 2002, 12)

4. 威灵仙 用法: 每取 60g, 水浸 24小时, 捣烂取汁, 加食盐 4.5g, 狗宝末 1g, 调和顿服, 连用 3日。功用: 软坚散结。主治: 胃癌梗阻者。(中国民族民间医药杂志, 1999, 39)

5. 大黄 用法: 每取 3g。研末冲服。功用: 祛瘀生新。主治胃癌出血。(肿瘤, 1983, 4)

大 肠 癌

大肠癌为结肠癌、直肠癌等的统称, 是指发生在盲肠、阑尾、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠、直肠及肛门等部位的恶性肿瘤。大肠癌的发生与饮食关系密切, 如高脂肪、高动物蛋白、少纤维等。遗传因素、大肠慢性炎症、大肠腺瘤、血吸虫病、放射线损害和其他因素亦有影响。

本病相当于中医病名国家标准的肠癌, 亦属于肠覃、脏

毒、肠癖、癥瘕、锁肛痔、便血等范畴。中医认为本病的主要病因病机为饮食不节、肥甘厚味、过食炙煿、或喜怒不测、或房劳太过、阴阳失调、脏腑虚弱，湿热蕴毒，壅塞肠中，气血瘀阻，结为癌瘤。

【辨证用方】

大肠癌的辨证，当辨明热、寒、虚、实证。以腹胀疼痛、大便脓血、里急后重、肛门灼热为主症者，多为热证（湿热）、实证；以腹部隐痛、便血黯淡、肛门坠胀为主症者，多为虚证、寒证。证属实热者，治以清热利湿、化瘀解毒为主，证属虚寒者，治以温中健脾、软坚散结为主。

1. 湿热蕴结证

主症：腹部阵痛，大便脓血，里急后重，肛门灼热，或有发热，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热化湿，宽肠散结。

（1）加减白头翁汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕白头翁 30g，黄柏 12g，黄连 5g，秦皮 15g，广木香 15g，厚朴 15g，苍术 15g，赤芍 12g，槐花 20g，甘草 5g，败酱草 30g，生薏苡仁 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕清热燥湿，凉血解毒。主治大肠癌。

〔加减应用〕痛引两胁者，加柴胡、郁金；热结便秘者，加大黄；便血多者，加地榆炭、炒荆芥、三七粉（冲服）。

（2）加减槐角丸（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕地榆 15g，槐花 15g，白头翁 15g，败酱草 30g，枳壳 10g，黄柏 10g，生薏苡仁 30g，黄芩 10g，红藤 15g，半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕清热利湿，宽肠散结。主治大肠癌。

〔加减应用〕大便下血者，加血余炭、血见愁、茜草、三七粉（冲服）；热结便秘者，加大黄、枳实、厚朴；腹部胀痛

者，加木香、陈皮、延胡索、赤芍、白芍；腹部肿块者，加夏枯草、海藻、昆布、三棱、莪术。

2. 瘀毒内结证

主症：烦热口渴，腹痛腹胀，大便脓血，血色紫黯，里急后重，舌质紫黯或有瘀点，脉滞涩或细数。

治法：清热解毒，化瘀软坚。

(1) 加减仙方活命饮（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 金银花 20g，炮山甲（先煎）10g，天花粉 20g，炒皂角刺 12g，当归 10g，赤芍 10g，乳香 5g，没药 5g，广木香 15g，厚朴 15g，败酱草 30g，生薏苡仁 30g，蚤休 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，活血祛瘀。主治大肠癌。

〔加减应用〕 腹硬满痛甚者，加枳实、槟榔；排便困难者，加大黄、桃仁；发热偏甚者，加丹皮、生地。

(2) 加减膈下逐瘀汤（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕 归尾 15g，红花 15g，栀子 15g，赤芍 15g，生地 15g，薏苡仁 30g，枳壳 10g，红藤 15g，败酱草 30g，半枝莲 30g，藤梨根 30g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀，清热解毒。主治大肠癌。

〔加减应用〕 脓血便甚者，加地榆、槐花、银花炭、侧柏炭；里急后重明显者，加广木香、乌药。

(3) 加减桃红四物汤（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 当归 10g，川芎 10g，赤芍 15g，桃仁 10g，红花 5g，枳壳 10g，乌药 10g，丹皮 10g，香附 10g，延胡索 10g，红藤 30g，半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕 养血，活血，逐瘀。主治大肠癌。

〔加减应用〕 腹硬满而痛者，加川楝子、炮山甲、丹参；里急后重者，加广木香、藤梨根；腹内结块而体实者，加三棱、莪术；大便秘结属体虚者，加火麻仁、郁李仁、柏子仁；

体实便秘者，加生大黄、枳实、玄明粉。

3. 脾胃虚寒证

主症：腹胀隐痛，大便带血，血色黯淡，久泻不止，面色萎黄，四肢不温，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。

治法：温阳健脾，止血散结。

(1) 加减黄土汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 伏龙肝（先煎取汁）30g，熟地 10g，白术 10g，制附片（先煎）10g，黄芩 10g，阿胶（烊化）12g，陈皮 10g，甘草 5g，蚤休 20g，夏枯草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 温阳健脾，养血止血。主治大肠癌。

〔加减应用〕 里急后重者，加广木香、巴戟天；便血黯红量多者，加炒艾叶、地榆炭；大便泻下无度者，加诃子、罂粟壳。

(2) 加减附子理中汤合四神丸（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 党参 15g，白术 10g，茯苓 10g，炙甘草 3g，干姜 10g，制附子（先煎）10g，肉豆蔻 10g，补骨脂 10g，五味子 10g，吴茱萸 10g，生薏苡仁 30g，白花舌蛇草 20g。水煎服。

〔功能主治〕 温补脾肾，益气固涩。主治大肠癌。

〔加减应用〕 若肾阳虚明显者，加仙灵脾、巴戟天、肉桂；便血量多色黯者，加灶心土、艾叶；大便无度者，加诃子、白槿花、罂粟壳；兼腹水尿少者，加白茅根、大腹皮、茯苓皮。

4. 脾虚下陷证

主症：腹部坠胀，气短懒言，食少乏力，大便稀溏，面色苍白，甚则脱肛，舌质淡胖，苔薄白，脉沉细无力。

治法：益气健脾，升阳举陷。

(1) 加减补中益气汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 炙黄芪 20g，党参 20g，白术 12g，陈皮 10g，炙升麻 10g，炙柴胡 10g，当归 10g，炙甘草 5g，怀山药 20g，枳壳 10g，桔梗 10g，蚤休 20g，白花蛇舌草 20g。水

煎服。

〔功能主治〕补中益气，升阳举陷。主治大肠癌。

〔加减应用〕大便带血、心悸失眠者，加酸枣仁、炒艾叶、伏龙肝；短气汗多者，加红参、麦冬、五味子。

(2) 加减参苓白术散（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕党参 15g，白术 12g，苍术 12g，茯苓 20g，薏苡仁 30g，扁豆 30g，白芍 30g，儿茶 6g，石榴皮 15g，半枝莲 30g，厚朴 12g，广木香 12g，甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕健脾化湿，清热解毒。主治大肠癌。

〔加减应用〕肛门坠胀者，加黄芪、升麻、葛根；纳呆者，加炒山楂、炒麦芽。

5. 气血双亏证

主症：面色苍白，肌肤甲错，头昏眼花，心悸气短，体瘦腹满，腹胀硬满拒按，舌淡红，苔薄白，脉细弱。

治法：益气补血，健脾养心。

(1) 加减归脾汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕黄芪 15g，党参 15g，白术 12g，茯苓 12g，广木香 15g，陈皮 10g，当归 10g，龙眼肉 10g，酸枣仁 12g，甘草 5g，枳实 10g，蚤休 20g，虻虫 10g。水煎服。

〔功能主治〕补益气血，健脾养心。主治大肠癌。

〔加减应用〕气虚甚者，加红参；大便秘结者，加大黄、桃仁；便血不止者，加炮姜炭、伏龙肝；腹胀甚者，加厚朴、沉香粉。

(2) 加减八珍汤（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕当归 15g，白芍 10g，熟地 15g，川芎 10g，党参 15g，白术 10g，茯苓 10g，升麻 5g，生黄芪 15g，炙甘草 5g，白花舌蛇草 20g。水煎服。

〔功能主治〕补气益血，扶正固本。主治大肠癌。

〔加减应用〕兼心悸失眠者，加炒枣仁、柏子仁、远志；

脱肛下坠、大便频繁者，加柴胡、白槿花、诃子；大便带血者，加艾叶、三七（冲服）、灶心土。

【辨病用方】

大肠癌的辨病治疗，当注重虚、瘀、毒三个方面。根据肿瘤病期早晚、患者体质强弱，选用或合用健脾和胃、化瘀解毒等治疗方药。

1. 大肠癌各期体质较实者用方

(1) 仙莪汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 石见穿 30g，莪莢 30g，槐角 10g，枳壳 10g，大黄 5g，莪术 9g，制附片 5g，延胡索 10g，细辛 3g，仙鹤草 30g，生牡蛎（先煎）30g，夏枯草 12g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，化瘀散结。主治大肠癌。

〔加减应用〕 大便带黏脓者，加苦参、白头翁；大便带血者，加地榆炭、蒲黄炭；气虚乏力者，加党参、黄芪。

(2) 三根蛇草汤（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕 藤梨根 30g，白花蛇舌草 20g，苦参 10g，水杨梅根 15g，生薏苡仁 15g，凤尾草 15g，野葡萄根 15g，白茅根 20g，槐角 15g，草河车 15g，丹参 15g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，利湿消肿，凉血止血。主治大肠癌。

〔加减应用〕 便脓血者，加地榆、槐花、侧柏炭、银花炭；里急后重者，加广木香、枳壳、乌药；大便秘结体实者，加大黄、枳壳、桃仁；体虚者，加柏子仁、郁李仁、火麻仁、松子仁、或麻仁丸（吞服）；便次增多者，加栀子、白菊花、椿根皮；阴虚者，加石斛、玉竹、玄参、天花粉、麦冬；气血不足者，加太子参、黄芪、当归、地黄。

(3) 牡夏汤（上海中医药大学附属曙光医院方）

〔组成与用法〕 生牡蛎（先煎）30g，夏枯草 12g，海藻 12g，海带 12g，白花蛇舌草 30g，玄参 12g，露蜂房 15g，白

英 15g, 丹参 15g, 川贝母 9g, 川楝子 12g, 贯众炭 30g。水煎服。

[功能主治] 软坚散结, 清热解毒。主治大肠癌。

[加减应用] 大便带黏脓者, 加白芍、马齿苋、一见喜、白头翁; 大便带血者, 加金银花炭、蒲黄炭; 大便频繁者, 加诃子、补骨脂、白术、罂粟壳; 大便困难者, 加枳实、火麻仁。

(4) 棱莪汤 (《中医肿瘤学》)

[组成与用法] 三棱 10g, 莪术 10g, 川楝子 10g, 木香 10g, 厚朴 10g, 马尾连 20g, 败酱草 30g, 红藤 20g, 半枝莲 30g, 土茯苓 30g, 藤梨根 30g, 马齿苋 30g, 白英 30g, 儿茶 10g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 化瘀散结。主治大肠癌。

(5) 排毒散结汤 (现代中医药, 2002, 4)

[组成与用法] 乌梅 15g, 槐角 15g, 露蜂房 15g, 夏枯草 15g, 连翘 15g, 浙贝 15g, 地榆 30g, 马齿苋 30g, 丹参 30g, 黄芩 30g, 炮甲珠 10g, 苦参 50g。文火水煎 40 分钟, 过滤取汁 200ml, 肛门点滴, 1 日 1 次。

[功能主治] 清热解毒, 软坚散结。主治大肠癌。

(6) 三藤贯众汤 (刘嘉湘经验方)

[组成与用法] 野葡萄藤 30g, 白毛藤 30g, 红藤 15g, 贯众炭 30g, 白花蛇舌草 30g, 生薏苡仁 30g, 瓜蒌仁 30g, 菝葜 30g, 八月札 15g, 苦参 15g, 丹参 15g, 凤尾草 15g, 木香 9g, 地鳖虫 9g, 乌梅 9g。水煎服。

[功能主治] 清热燥湿凉血。主治直肠癌, 也用于结肠癌。

[加减应用] 加天龙 4.5g, 研末, 分 3 次吞服。另可保留三分之一煎剂灌肠。

(7) 慈菇蛇莓汤 (辽宁中医杂志, 1986, 1)

[组成与用法] 八角金盘 5~10g, 山慈菇 30g, 蛇莓 30g,

八月札 15g, 石见穿 15g, 败酱草 15g, 薏苡仁 15g, 黄芪 30g, 鸡血藤 15g, 丹参 15g, 大黄 6g, 枳壳 12g, 水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 益气养血。主治大肠癌。

[临床报道] 配合化疗治直肠癌 78 例, 5 年生存率 80.77%。

(8) 二槐蛇草汤 (浙江中医杂志, 1990, 6)

[组成与用法] ①白花蛇舌草 35g, 槐角 35g, 槐花 35g, 龙葵 20g, 当归 10g, 仙鹤草 30g, 生黄芪 10g, 败酱草 10g, 穿山甲 15g, 昆布 15g, 三七参 5g, 生大黄 5g, 黄药子 30g。水煎服。②槐花 15g, 鸦胆子 15g, 皂角刺 10g, 血竭 10g, 白花蛇舌草 40g, 生大黄 40g, 败酱草 40g。水煎灌肠。③鲜大葱 9 根, 大枣 (去核) 21 枚, 巴豆 (去壳) 21 粒, 黑砒霜 10g。共捣成饼, 掌心握药。

[功能主治] 益气活血, 化瘀解毒。主治各期直肠癌。

[加减应用] 便血不止者, 加茜草、阿胶; 大便不畅者, 加炒莱菔子、火麻仁; 肿块不消者, 加皂角刺、野百合; 小腹坠胀者, 加生黄芪、木香; 脱肛不收者, 加莲子、刺猬皮; 小便涩滞者, 加猪苓、海金沙; 淋巴结转移者, 加黄药子、石上柏; 子宫转移者, 加野百合、半枝莲; 肺转移者, 加鱼腥草、全瓜蒌; 肝转移者, 加铁树叶、刘寄奴。

[临床报道] 三方同用治疗 72 例, 未经手术而用上方者 53 例, 显效 13 例, 有效 20 例, 无效 20 例; 已经手术而经上方治疗者 19 例, 显效 3 例, 有效 6 例, 无效 10 例。

(9) 龙蛇马齿汤 (中日友好医院方)

[组成与用法] 龙葵 20g, 蛇莓 20g, 马齿苋 30g, 白英 20g, 代赭石 30g, 旋覆花 9g, 鸡血藤 30g, 当归 9g, 川芎 6g, 白头翁 20g。水煎服。

[功能主治] 清热燥湿, 活血解毒。主治大肠癌。

(10) 梨根灌肠方 (浙江中医学院学报, 1986, 1)

〔组成与用法〕 黄柏 60g, 黄芩 60g, 紫草 60g, 虎杖 120g, 藤梨根 250g, 苦参 60g, 乌梅 15g。浓煎成 300ml, 1 日 1 次, 30~50ml/次, 睡前作保留灌肠。

〔功能主治〕 清热燥湿凉血。主治大肠癌。

(11) 槐花地榆汤 (周岱翰经验方)

〔组成与用法〕 苦参 15g, 肿节风 15g, 生薏米 20g, 槐花 10g, 地榆 10g, 败酱草 15g, 金银花 15g, 木棉花 10g, 白花蛇舌草 15g, 茵陈 15g, 厚朴 10g, 黄连 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清肠泄热, 祛湿止痢。主治大肠癌。

〔加减应用〕 配合鸦胆子、七叶一枝花煎水灌肠。

2. 大肠癌中晚期体质较虚者用方

(1) 芪精败酱汤 (孙桂芝经验方)

〔组成与用法〕 黄芪 30g, 黄精 15g, 枸杞子 15g, 鸡血藤 15g, 槐花 15g, 败酱草 15g, 马齿苋 15g, 仙鹤草 15g, 白英 15g。水煎服。

〔功能主治〕 益气活血, 补肾解毒。用于 3 期大肠癌手术后。

〔加减应用〕 脾肾两虚者, 加党参、白术、菟丝子、女贞子; 脾胃不和者, 加党参、白术、陈皮、茯苓、法半夏; 心脾两虚者, 加党参、白术、炒枣仁、当归; 大便秘结者, 加火麻仁、冬瓜仁、番泻叶; 大便溏薄者, 加焦薏苡仁、儿茶; 大便黏液或便血者, 加地榆、石榴皮、槐花、马齿苋; 腹痛腹胀者, 加延胡索、香附、乌药、川楝子; 解毒加白花蛇舌草、半枝莲、藤梨根。

〔临床报道〕 治疗 3 期大肠癌术后 92 例, 1、3、5 年生存率分别为 97.83%、92.11%、70.59%。随访 10 年以上者 16 例, 存活 10 例。(中国中西医结合杂志, 1988, 5)

(2) 扶正抑癌汤 (中国中西医结合杂志, 1999, 1)

〔组成与用法〕 薏苡仁 60g, 生晒参 10g, 灵芝 10g, 三七

10g, 黄芪 15g, 白术 15g, 苦荞头 15g, 无花果 15g, 猪苓 15g, 山慈菇 15g, 北豆根 10g, 丹参 30g, 败酱草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 扶正固本, 清热解毒, 理气散结, 养血活血。主治大肠癌。

〔加减应用〕 湿热下注引起里急后重者, 加白芍、升麻、甘草; 瘀毒阻滞导致腹部肿块者, 加夏枯草、海藻、昆布; 脾肾阳虚引起大便溏薄者, 加赤石脂、煨诃子; 肝肾阴虚导致低热者, 加地骨皮、银柴胡; 气血两虚出现神疲乏力者, 加西洋参、仙鹤草。

〔临床报道〕 大肠癌术后配合化疗的巩固治疗中, 其复发率 (20.05%) 低于单纯化疗组 (48.34%)。

(3) 复方三根汤 (辽宁中医杂志, 1992, 7)

〔组成与用法〕 藤梨根、虎杖根、野葡萄根各 30~60g, 党参、白术、茯苓、八月札各 15g, 生薏仁 30g, 生山楂 12g, 甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 益气健脾, 清热解毒。主治大肠癌。

〔加减应用〕 便秘者, 加生大黄、望江南、全瓜蒌; 腹胀者, 加广木香、大腹皮; 疼痛者, 加延胡索、川椒、全蝎; 呕恶者, 加姜半夏、姜竹茹; 便血者, 加仙鹤草、地榆炭; 远处淋巴结转移者, 加山豆根、蜈蚣; 化疗后白细胞减少者, 加仙茅、仙灵脾、羊蹄根; 阴虚者, 加北沙参、枸杞子、丹皮。

〔临床报道〕 结合化疗治疗中晚期大肠癌 120 例, 1 年、5 年生存期为 96.5% 和 20.8%。

(4) 二术汤 (《中医肿瘤学》)

〔组成与用法〕 苍术 10g, 白术 10g, 生薏苡仁 30g, 茯苓 10g, 厚朴 10g, 黄柏 10g, 白英 30g, 龙葵 30g, 藤梨根 30g, 败酱草 30g, 白头翁 20g, 延胡索 10g, 川楝子 10g, 黄连粉 (冲服) 3g。水煎服。

〔功能主治〕 清热燥湿解毒。主治大肠癌。

(5) 健脾化瘀解毒方 (浙江中西医结合杂志, 2000, 6)

〔组成与用法〕 党参 15g, 白术 10g, 茯苓 12g, 薏苡仁 15g, 蒲黄 12g, 五灵脂 12g, 枳实 10g, 延胡索 12g, 败酱草 15g, 蒲公英 15g, 半枝莲 15g, 白花舌蛇草 15g, 蚤休 15g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾化瘀解毒。主治大肠癌。

〔加减应用〕 兼血虚者, 加当归、白芍、鸡血藤; 阴虚者, 加旱莲草、生地、沙参、麦冬; 肾虚者, 加枸杞子、续断; 气滞者, 加莱菔子、厚朴、木香; 胃气上逆者, 加法半夏、陈皮; 瘀血甚者, 加桃仁、红花; 出血者, 加茜草、白及、仙鹤草。

【对症用方】

大肠癌的对症用方, 除根据患者主要症状进行选择外, 当区分是否手术或放疗、化疗等治疗。术后治疗以健脾补益气血为主, 放疗患者以养阴清热解毒为主, 化疗患者以健脾和胃、益肾养血为主。

1. 大肠癌手术后专方

(1) 益气调腑汤 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 白参 (蒸兑) 10g, 黄芪 20g, 白术 10g, 茯苓 15g, 枳壳 10g, 香附 10g, 广木香 10g, 砂仁 6g, 炒山楂 10g, 大黄 5g, 石见穿 30g, 败酱草 20g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 补脾益肠, 调腑祛瘀, 解毒抗癌。主治大肠癌。

〔临床报道〕 配合化疗治疗大肠癌术后 43 例, 临床症状改善率为 79.3%; 5 年生存率为 53.4%。(湖南中医药导报, 2003, 11)

(2) 扶正健脾汤 (潘明继经验方)

〔组成与用法〕 黄芪 30g, 党参 30g, 白术 12g, 茯苓 12g, 怀山药 12g, 女贞子 15g, 熟地 15g, 芡实 15g, 枸杞 12g, 首乌 12g, 甘草 3g, 黄精 10g, 沙参 10g, 麦冬 10g, 鸡血藤 25g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 健脾和血。主治大肠癌。

(3) 肠益煎 (浙江中西医结合杂志, 2000, 6)

〔组成与用法〕 太子参 15g, 白术 10g, 茯苓 10g, 怀山药 15g, 黄连 6g, 木香 10g, 枳实 10g, 地榆 10g, 半枝莲 30g, 土茯苓 30g, 蜀羊泉 10g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气, 清热利湿。主治脾气虚、湿热蕴结型大肠癌。

〔临床报道〕 治疗脾气虚、湿热蕴结型大肠癌术后患者 50 例, 总有效率为 90%。

(4) 健脾理气汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 黄芪 20g, 党参 20g, 白术 12g, 茯苓 15g, 陈皮 10g, 当归 10g, 白芍 12g, 广木香 10g, 香附 10g, 砂仁 5g, 炒麦芽 15g, 炒谷芽 15g, 沉香粉 (冲服) 3g, 蚤休 20g, 白花蛇舌草 20g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益血, 理气通腑。主治大肠癌。

〔加减应用〕 气虚甚者, 改党参为红参 (蒸兑) 5g 或白参 (蒸兑) 10g。

(5) 加味大承气汤 (浙江中医杂志, 2003, 1)

〔组成与用法〕 生大黄 (后下) 10~15g, 枳壳 10g, 厚朴 10g, 红藤 30g, 金银花 30g, 玄明粉 (冲服) 9g, 广木香 9g。水煎服, 配合葱白醋炒外敷腹部。

〔功能主治〕 通腑泄热。主治肠癌术后肠梗阻 (早期炎症)。

(6) 熏蒸方 (现代中西医结合杂志, 2005, 1)

〔组成与用法〕 苦参 10g, 五倍子 30g, 龙葵 30g, 马齿苋

40g, 败酱草 30g, 黄柏 15g, 土茯苓 30g, 山豆根 20g, 黄药子 30g, 枯矾 3g, 漏芦 30g, 冰片少许 (后下)。水煎, 坐蒸, 1 日 2 次, 1 次 30 分钟。

[功能主治] 清热利湿, 祛腐生肌。主治直肠癌术后长期黏液脓血便。

[临床报道] 治疗 31 例, 总有效率为 87%。

2. 大肠癌化疗后专方

癌复康方加减 (潘敏求经验方)

[组成与用法] 黄芪 20g, 党参 20g, 白术 15g, 茯苓 15g, 砂仁 10g, 陈皮 12g, 法半夏 12g, 怀山药 20g, 炒麦芽 15g, 炒谷芽 15g, 女贞子 12g, 旱莲草 12g, 肉苁蓉 12g, 菟丝子 10g, 莪术 12g, 白花蛇舌草 20g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾, 活血解毒。主治大肠癌。

[加减应用] 头昏乏力者, 加红参或白参; 汗多者, 加煅牡蛎 (先煎)、五味子。

3. 肠癌放疗后专方

扶正养阴方 (潘明继经验方)

[组成与用法] 黄芪 30g, 党参 15g, 太子参 15g, 白花蛇舌草 15g, 茯苓 12g, 白术 12g, 甘草 3g, 人参 8g, 麦冬 20g, 沙参 20g, 玉竹 20g, 丹参 20g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴。主治大肠癌。

[加减应用] 便血者, 加大黄炭、地榆炭、生地炭; 失眠多梦者, 加炒枣仁。

[临床报道] 配合其他辨证方法治疗 260 例, 平均 5 年生存期为 52.78%。(中医杂志, 1996, 4)

4. 肠癌便血方

当归地榆汤 (《肿瘤的辨证施治》)

[组成与用法] 当归 9g, 地榆 12g, 槐花 6g, 生黄芪 12g, 茯苓 12g, 紫草根 12g, 天龙 2 条, 三七粉 (冲服) 2g。水

煎服。

〔功能主治〕 清热凉血，益气养血。主治大肠癌便血。

5. 肠癌疼痛方

(1) 肠癌栓 (《中西医结合临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕 硃砂 3g，鸦胆子 9g，乌梅肉 15g，冰片 1.5g，辅剂适量，1次1粒塞肛，1日1~2次。

〔功能主治〕 清热解毒，消肿止痛。主治大肠癌疼痛。

(2) 石英瓦楞汤 (《肿瘤中医防治研究》)

〔组成与用法〕 紫石英 15g，花蕊石 15g，瓦楞子 30g，山豆根 9g，槐角 15g，连翘 30g，蒲公英 15g，牛蒡子 15g，大黄 9g，金银花 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，活血止痛。主治大肠癌疼痛。

【专病成药】

1. 消癌平注射液 (片) (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕 乌骨藤。

〔功能主治〕 抗癌，消炎，平喘。主治老年大肠癌。(中国临床医药研究杂志，2003，93)

〔用法用量〕 口服，1次8~10片，1日3次。肌内注射，1次2~4ml，1日2次。30天为1个疗程。

2. 金龙胶囊 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕 鲜守宫、鲜金钱白花蛇等。

〔功能主治〕 扶正荡邪，解毒消肿，理气止痛，破瘀散结。主治大肠癌。(北京中医，2000，4)

〔用法用量〕 口服，1次2~4粒，1日3次，1~2个月为1个疗程。

3. 复方斑蝥胶囊 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕 斑蝥、刺五加、莪术、熊胆粉、人参、三棱、山茱萸、甘草、黄芪、半枝莲、女贞子。

〔功能主治〕 清热解毒，消瘀散结。主治直肠癌。

〔用法用量〕 口服，1次3粒，1日2次。

4. 西黄丸（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 麝香、牛黄、炙乳香、炙没药。

〔功能主治〕 解毒散结，消肿止痛。主治结肠癌。（浙江中医杂志，2001，4）

〔用法用量〕 1次3g，每天2次，温开水送服。

5. 贞芪扶正胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 黄芪、女贞子等。

〔功能主治〕 补气养阴。用于肠癌术后化疗。（医师进修杂志，2005，6）

〔用法用量〕 口服，1次6粒，1日2次。

6. 平消胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 郁金、马钱子粉、仙鹤草、五灵脂、白矾、硝石、干漆（制）、枳壳（麸炒）。

〔功能主治〕 活血化瘀，止痛散结，清热解毒，扶正祛邪。主治中晚期肠癌。（陕西肿瘤医学，2001，1）

〔用法用量〕 口服，1次4~8粒，1日3次，60天1个疗程。

7. 慈丹胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 莪术、山慈菇、鸦胆子、马钱子粉、蜂房等。

〔功能主治〕 化瘀解毒，消肿散结，益气养血。主治直肠癌。（中华医学全科杂志，2003，3）

〔用法用量〕 口服，1次5粒，1日4次，1个月为1个疗程。

8. 艾迪注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 斑蝥、人参等。

〔功能主治〕 清热解毒，消瘀散结。主治直肠癌。（中医药学刊，2004，6）

〔用法用量〕 1次50~100ml，加入0.9%氯化钠注射液或

10%葡萄糖注射液 400~450ml 中静滴。1 日 1 次。15 天为 1 个周期，间隔 3 天，2 周期为 1 个疗程。晚期恶病质者，30 天为 1 个疗程。

9. 复方苦参注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 苦参等多味中草药。

〔功能主治〕 抗癌镇痛，提高免疫功能。主治直肠癌。（中国临床医师，2005，6）

〔用法用量〕 12~20ml 加入生理盐水中静滴，1 日 1 次。

10. 康莱特注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 注射用薏苡仁油。

〔功能主治〕 祛邪扶正。治疗肠癌。（实用肿瘤杂志，1999，5）

〔用法用量〕 缓慢静脉滴注 200ml，1 日 1 次，20 天为 1 个疗程。联合放、化疗时，可酌减剂量。

11. 参附注射液（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 红参、附片。

〔功能主治〕 回阳救逆，益气固脱。用于老年肠癌术后。（上海中医药杂志，2004，4）

〔用法用量〕 10~30ml 稀释后静滴，每日 1 次。

【专病单方】

1. 槐耳 用法：每取 15~25g，水煎，1 日 1 剂，分 3 次服。功用：解毒抗癌。主治：大肠癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 穿山甲 用法：每取 15g，配猪苓 6g，上药共用醋炙研成细末，1 次 6g，以酒送下。功用：化瘀祛湿，解毒抗癌。主治：大肠癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 露蜂房 用法：每取 100g，黄酒适量将露蜂房烧末，1 次 10~15g，黄酒调服。功用：解毒抗癌。主治：大肠癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 冬凌草 用法：每取 120g，泡茶饮用，或水煎，分 3 次服。功用：清热解毒。主治：大肠癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 马齿苋 用法：每取干品 60g，鲜品 150g，水煎服，1 日 1 剂。功用：清热解毒。主治：大肠癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 大黄粉 用法：每取 9g，盐水 300ml，共煎冷却，保留灌肠。功用：清热凉血。主治：大肠癌术后便血。（《中华肿瘤治疗大成》）

原发性肝癌

原发性肝癌是指肝细胞或肝内胆管细胞发生的恶性肿瘤，为我国常见恶性肿瘤之一。肝癌的发生在我国主要与病毒性肝炎、黄曲霉素和饮用水污染以及亚硝胺类化合物等因素有关。

本病相当于中医病名国家标准的肝癌，亦属于肝积、癥瘕、积聚、鼓胀、黄疸、痞气、癖黄等病症范畴。祖国医学认为脏腑气血亏虚、脾胃虚弱，或饮食失调，损伤脾胃，或情志久郁，或劳倦内伤，或六淫邪毒入侵，导致热毒内蕴、气滞血瘀，甚而肝肾受损；同时毒、瘀等病理产物又形成致病因素，并相互作用，互为因果，导致机体正气进一步的虚弱，毒瘀互结而成肝癌。其病位在肝，与脾、胆、胃、肾等脏腑密切相关；“瘀、毒、虚”乃肝癌的基本病机；肝癌是一种“因虚致病、本虚标实”的疾病。

【辨证用方】

肝癌首当辨虚实，其虚以脾虚、肝肾阴虚、气阴两虚为主，实以气滞、血瘀、热毒为主；次当辨危候，即晚期可见昏迷、吐血、便血、胸腹水等危重症。其治疗分清虚实，针对病变的不同阶段，或攻、或补、或攻补兼施；常用治则有健脾理气、化瘀软坚、清热解毒、补益肝肾等。

1. 气滞血瘀证

主症：右胁下痞块，两胁窜痛或胀痛，痛处不移，拒按，

神疲乏力，纳呆食少，大便溏结不调，舌淡或暗红，或边有瘀斑，苔薄白或薄黄，脉弦涩。

治法：疏肝理气，活血化瘀。

(1) 四逆散合大黄廑虫丸加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕柴胡 10g，枳壳 10g，赤芍 10g，大黄 10g，廑虫 5g，黄芩 10g，桃仁 10g，郁金 10g，莪术 10g，陈皮 10g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g，石见穿 30g，甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕疏肝理气，活血化瘀。主治肝癌。

〔加减应用〕胁腹胀痛甚者，加延胡索、川楝子、青木香；纳呆乏力甚者，去黄芩、大黄，加党参、黄芪、茯苓、炒麦芽；低热者，加鳖甲（先煎）、青蒿、地骨皮、银柴胡。

(2) 金甲白龙汤（辽宁中医杂志，1996，8）

〔组成与用法〕郁金 30g，八月札 30g，丹参 30g，女贞子 30g，鳖甲 35g，龙葵 35g，白术 25g，柴胡 20g，重楼 20g。水煎服。

〔功能主治〕疏肝理气，活血散结。主治肝癌。

〔加减应用〕肝脾不调者，加陈皮、清半夏、党参、茯苓；食少纳呆者，加炒麦芽、炒莱菔子、炒山楂、炒神曲；胀痛甚者，加合欢皮、枳壳、木香、延胡索、香附；刺痛者，加橘络、炒水蛭、红花、刘寄奴、穿山甲、王不留行。

〔临床报道〕治 128 例，临床治愈 5 例，显效 5 例，有效 79 例，治后中位生存期 24.9 个月。

(3) 消瘀养肝汤（中西医结合肝病杂志，1996，3）

〔组成与用法〕丹参 30g，白花蛇舌草 30g，龟甲 30g，鳖甲 30g，莪术 15g，三棱 15g，川芎 15g，当归 15g，香附 12g，青皮 12g，柴胡 8g，茯苓 25g，薏苡仁 30g，甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕活血消瘀，养肝敛阴。主治肝癌。

〔临床报道〕配合介入治疗 66 例，并设单纯介入治疗 60 例作对照组，结果在症状改善、肝功能、AFP、CT 检查、3

年生存率等方面均优于对照组。

2. 肝瘀脾虚证

主症：胁下痞块，胀痛或刺痛，纳呆食少，腹胀，食后尤甚，神疲乏力，大便溏泻，形体消瘦，舌质紫黯，或有瘀点、瘀斑，苔薄，脉沉细或涩。

治法：健脾理气，化瘀软坚。

(1) 肝复方（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 党参 12g，黄芪 20g，白术 12g，茯苓 15g，香附 10g，陈皮 10g，柴胡 10g，穿山甲 10g，桃仁 10g，丹参 12g，苏木 12g，生牡蛎 30g（先煎），沉香末 3g（冲服），全蝎 3g，鼠妇 6g，蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾理气，化瘀软坚。主治肝癌。

〔加减应用〕 纳呆乏力甚者，加炒麦芽、薏苡仁；便秘者，加大黄、厚朴；痛甚者，加延胡索、川楝子、制乳香、制没药。

(2) 扶正抗癌汤（实用中西医结合杂志，1996，9）

〔组成与用法〕 党参 10～15g，麦冬 10～15g，黄芪 20～30g，半枝莲 20～30g，黄芩 20～30g，白术 15～20g，夏枯草 15～20g，当归 6～9g，鳖甲 15～25g，莪术 6～12g，茜草 15～30g，大黄 10～20g，蚤休 10～20g，白花蛇舌草 30～45g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾散邪，化瘀软坚。主治肝癌。

〔加减应用〕 大便泻下不止者，去大黄，加煨肉豆蔻、煨木香、诃子、罂粟壳；身热发黄者，加龙胆草、炒山栀子、茵陈。

3. 肝郁脾虚证

主症：情志抑郁，胁痛腹胀，食少便溏，形体消瘦，神疲乏力，舌质淡胖，苔薄白或白腻，脉弦细。

治法：疏肝健脾，消肿散结。

(1) 逍遥散加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 当归 15g，白芍 15g，柴胡 15g，茯苓 15g，

白术 15g, 甘草 8g, 薄荷 10g, 生姜 15g, 三棱 15g, 莪术 10g, 蚤休 50g, 白花蛇舌草 50g。水煎服。

〔功能主治〕 养血疏肝健脾, 消肿散结。主治肝癌。

〔加减应用〕 腹水尿少者, 去三棱、莪术、茯苓、薄荷、生姜, 加大腹皮、陈皮、姜皮、泽泻、茯苓皮; 胁痛甚者, 加川楝子、延胡索。

(2) 疏肝理脾汤 (钱伯文经验方)

〔组成与用法〕 柴胡 10g, 枳壳 10g, 白术 10g, 陈皮 10g, 八月札 30g, 佛手片 10g, 茯苓 15g, 土茯苓 30g, 生、熟薏苡仁各 15g, 合欢皮 15g, 生黄芪 20g, 蒲公英 20g, 皮尾参 15g。水煎服。

〔功能主治〕 疏肝解郁, 运脾解毒。主治原发性肝癌、肝炎后肝硬化。

4. 湿热结毒证

主症: 胁下痞块, 身目发黄, 两胁胀痛, 口苦纳呆, 恶心, 胸闷腹胀, 大便不爽, 小便短赤, 舌红或绛, 苔黄腻, 脉弦滑。

治法: 清热利湿, 泻火解毒。

(1) 加茵陈蒿汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 茵陈 15g, 大黄 10g, 栀子 10g, 金钱草 30g, 虎杖 30g, 茯苓 15g, 泽泻 10g, 大腹皮 10g, 厚朴 10g, 半枝莲 15g, 蚤休 20g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿, 泻火解毒。

〔加减应用〕 大便干结者, 加芒硝 (冲服)、枳实; 腹胀甚者, 加木香; 高热者, 加生石膏 (先煎)、知母。

(2) 石燕漏芦方 (浙江中医学院学报, 1989, 5)

〔组成与用法〕 当归 9g, 丹参 9g, 红花 9g, 半枝莲 30g, 石燕 30g, 生瓦楞子 30g, 漏芦 15g, 薏苡仁 15g, 八月札 6g, 白芍 6g, 陈皮 6g。水煎服。

〔功能主治〕 化瘀解毒，疏肝养肝。主治肝癌。

〔加减应用〕 黄疸者，加茵陈、生栀子；大便不通者，加大黄；肝区疼痛者，加川楝子、延胡索；腹胀者，加枳实、厚朴、木香、砂仁；气虚乏力者，加党参、白术；阴虚、舌质红绛者，加沙参、天花粉、白茅根、芦根；腹水者，加车前子（布包）、黑丑、白丑、徐长卿；呕吐者，加法半夏；黑便者，加血余炭、仙鹤草、茜草、大黄炭、生地炭。

5. 脾虚湿困证

主症：腹大胀满，如囊裹水，上腹结块，身重纳呆，神疲乏力，大便溏薄或腹泻，小便短少，肢楚足肿，舌淡胖，舌边有齿痕，苔白腻，脉弦或滑或濡。

治法：健脾益气，利湿消肿。

(1) 加减四君五皮饮（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 党参 15g，白术 15g，茯苓皮 30g，大腹皮 15g，陈皮 10g，生姜皮 5g，黄芪 20g，薏苡仁 30g，半枝莲 30g，丹参 15g，制鳖甲（先煎）15g，半边莲 30g，木香 10g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气，利湿消肿。主治肝癌有腹水者。

〔加减应用〕 恶心欲呕者，加法半夏、竹茹；腹泻较甚者，加炮姜、苍术、炒扁豆；身目发黄者，加茵陈、金钱草；腹水较甚者，加泽泻、猪苓、车前草（布包）、牵牛子。

(2) 龙葵鳖甲方（黑龙江中医药，1987，2）

〔组成与用法〕 柴胡 10g，当归 10g，白芍 10g，赤芍 10g，郁金 10g，炙鳖甲 15g，夏枯草 15g，陈皮 10g，泽泻 30g，猪苓 15g，龙葵 30g，焦山楂 10g，神曲 10g，麦芽 10g，白花蛇舌草 30g，代赭石（先煎）15g，木香 10g，大腹皮 10g，三七粉（冲服）3g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾利水，化瘀解毒。主治肝癌。

6. 肝热血瘀证

主症：上腹肿块坚硬，疼痛拒按，或胸胁掣痛不适，烦热，口唇干，口苦喜饮，大便干结，溺黄或短赤，甚则肌肤甲错，舌苔白厚，舌质红或暗红，脉弦数或弦滑。

治法：清肝解毒，化瘀消癥。

(1) 莲花清肝汤（周岱翰经验方）

〔组成与用法〕半枝莲 30g，蚤休 30g，白花蛇舌草 30，蜈蚣 3 条，干蟾皮 3g，柴胡 12g，白芍 18g，延胡索 12g，三七 5g，人工牛黄（冲）1g。水煎服。

〔功能主治〕清肝解毒，化瘀消癥。主治肝癌。

〔加减应用〕疼痛甚者，酌加徐长卿、蒲黄、五灵脂；大便干结者，加知母、大黄。

(2) 加味西黄丸（孙桂芝经验方）

〔组成与用法〕麝香 3g，牛黄 3g，乳香 30g，没药 30g，熊胆 3g，三七粉 30g，人参 30g。共研为细末，黄米浆为丸，绿豆大，1 日 2 次。

〔功能主治〕行气豁痰，化瘀散结。主治肝癌。

(3) 肝益煎（《肿瘤良方大全》）

〔组成与用法〕夏枯草 15g，海藻 12g，海带 15g，白花蛇舌草 30g，王不留行 9g，八月札 15g，漏芦 15g，赤芍 9g，桃仁 9g，丹参 15g，炙山甲 12g，炙鳖甲（先煎）12g，莪术 12g，三棱 12g，当归 12g，铁树叶 15g，薏苡仁 30g，川楝子 9g，生香附 9g，木香 9g，白芍 9g，党参 15g，白术 12g，郁金 12g，茵陈 15g，车前子 9g。水煎服。

〔功能主治〕清热祛瘀，软坚化痰。主治肝癌。

〔临床报道〕治疗 40 例，半年、1 年、2 年生存率分别为 50%、32.5%、17.5%。

(4) 解毒化癥汤（林宗广经验方）

〔组成与用法〕茵陈 12g，山栀子、莪术、三棱、穿山甲、郁金、炒枳壳各 9g，生牡蛎（先煎）30g，半枝莲 30g，蚤休

30g, 白花蛇舌草 30g, 露蜂房 15g。水煎服。

〔功能主治〕 清热化湿解毒, 理气化瘀。主治肝癌。

7. 肝肾阴虚证

主症: 上腹肿块, 胁肋隐隐, 纳少消瘦, 低热盗汗, 头晕目眩, 大便干结, 舌红苔光, 脉弦细。

治法: 滋养肝肾, 化瘀软坚。

(1) 加减一贯煎 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 生地 10g, 当归 10g, 枸杞子 15g, 沙参 30g, 麦冬 10g, 川楝子 10g, 女贞子 30g, 赤芍 15g, 黄芪 20g, 鳖甲 (先煎) 12g, 全蝎 8g, 蚤休 20g。水煎服。

〔功能主治〕 滋养肝肾, 化瘀软坚。主治肝癌。

〔加减应用〕 低热、口干咽燥者, 加青蒿、银柴胡、天冬; 齿龈出血及鼻衄者, 加白及、白茅根、仙鹤草; 呕血、便血者, 加生大黄、云南白药 (冲服)、白及。

(2) 加减六味地黄饮 (黑龙江中医药, 1990, 4)

〔组成与用法〕 熟地 10g, 山药 15g, 山茱萸 10g, 丹皮 10g, 茯苓 10g, 泽泻 15g, 柴胡 5g, 白芍 10g, 栀子 10g, 酸枣仁 15g, 当归身 10g, 龟甲 (先煎) 15g, 丹参 15g, 白花蛇舌草 30g, 蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕 补益肝肾, 解毒化瘀。主治肝癌。

8. 气阴两虚证

主症: 上腹肿块, 胁肋隐隐灼痛, 头晕目眩, 或视物昏花, 口燥咽干, 神疲乏力, 纳少, 消瘦, 低热盗汗, 大便溏泻, 舌淡白, 苔少或无, 脉细数。

(1) 加减滋水清肝饮 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 生地 20g, 山药 30g, 山茱萸 20g, 丹皮 10g, 茯苓 15g, 泽泻 15g, 炒白芍 15g, 柴胡 10g, 栀子 10g, 川楝子 10g, 大枣 10g, 龟甲 (先煎) 10g, 丹参 20g, 当归 10g, 黄芪 30g, 白术 15g, 白花蛇舌草 30g, 蚤休 30g。水

煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，清热解毒。主治肝癌。

(2) 养肝抗癌方 (中医药信息, 1997, 2)

〔组成与用法〕 冬虫夏草 3g, 太子参 30g, 沙参 30g, 女贞子 30g, 当归 15g, 枸杞子 15g, 生地 15g, 山药 30g, 麦冬 15g, 茯苓 30g, 延胡索 30g, 鳖甲 (先煎) 15g, 苦参 15g, 黄芪 30g, 白术 15g, 半枝莲 30g, 龙葵 30g, 蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕 养肝阴，益肝血，健脾气，清热毒。主治肝癌。

(3) 三甲护肝汤 (甘肃中医, 1996, 1)

〔组成与用法〕 玳瑁 30g, 鳖甲、龟甲、太子参、石斛各 20g, 麦冬、丹参、茜草、白薇各 15g, 白花蛇舌草 30g, 水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，养阴扶正，软坚破积。主治肝癌。

〔加减应用〕 发热者，加地骨皮；黄疸者，加茵陈；腹水者，加猪苓。

【辨病用方】

肝癌的辨病治疗，一方面要注重扶正，以提高机体免疫功能，达到扶正抗癌的目的；一方面要注重祛邪，如清热解毒、活血化瘀、软坚散结、以毒攻毒等方法的合理运用，以求直接抗癌的效果。

(1) 加减肝复方 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 党参 12g, 黄芪 20g, 白术 12g, 茯苓 15g, 柴胡 10g, 穿山甲 (先煎) 10g, 桃仁 10g, 丹参 12g, 苏木 12g, 生牡蛎 (先煎) 30g, 鼠妇 6g, 蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾理气，化瘀解毒。主治肝癌。

〔加减应用〕 气滞血瘀者，加虻虫、莪术、三七粉 (冲服)、香附；肝郁脾虚者，加郁金、山药、陈皮、麦芽；肝胆

湿热者，加茵陈、蒲公英、黄芩；阴虚内热者，加牡丹皮、地骨皮、麦冬、鳖甲；肝肾阴虚者，加枸杞子、女贞子、旱莲草、菟丝子。

〔临床报道〕 用该方加减治疗Ⅱ、Ⅲ期原发性肝癌 164 例，治后 1、2、3、4、5 年生存率分别为 29.3%、14.5%、8.2%、5.2%、4.3%，瘤体稳定率 78.7%，AFP 下降率 28.3%。（湖南中医杂志，2002，4）

（2）益气健脾剂（于尔辛经验方）

〔组成与用法〕 太子参 30g，炙黄芪 30g，虎杖 30g，猪苓 15g，茯苓 15g，苍术 10g，白术 10g，香附 10g，生薏苡仁 20g，陈皮 6g，柴胡 6g。水煎服。

〔功能主治〕 益气健脾，调胃宽中。主治肝癌。

（3）疏肝祛瘀方（周岱翰经验方）

〔组成与用法〕 徐长卿、仙鹤草、半枝莲、蚤休各 30g，三七粉（冲）3g，人工牛黄 0.5g，山楂、白芍、廑虫、山梔子各 10g，大黄 5g，茵陈 12g，丹参 15g，蜈蚣 3 条。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒、疏肝祛瘀。主治肝癌。

（4）白术马兰汤（邱佳信经验方）

〔组成与用法〕 白术 12g，太子参 12g，珠儿参 12g，茯苓 30g，牡丹皮 12g，金银花 30g，岩柏 30g，马兰根 30g，夏枯草 12g，炙山甲 12g，炙鳖甲 12g，玫瑰花 9g，绿萼梅 9g，天龙 12g，地龙 12g，牡蛎 30g，八月札 15g，生南星（先煎）15g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾理气，清热解毒，软坚化痰。主治肝癌。

〔临床报道〕 治 123 例，治后 1 年生存率 32.5%。（中医药学报，1988，6）

（5）柴胡鳖甲参术汤（四川中医，1989，5）

〔组成与用法〕 柴胡 12g，鳖甲 15g，白芍 12g，清半夏 9g，廑虫 6g，黄芩 9g，桃仁 9g，党参 24g，炒白术 12g，茯

苓 15g, 砂仁 6g, 半枝莲 30g, 龙葵 30g, 鸡内金 30g, 焦山楂 15g, 焦神曲 15g, 焦麦芽 15g, 山核桃 12g, 甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕健脾疏肝, 解毒消癥。主治肝癌。

〔加减应用〕腹水尿少者, 去清半夏、麝虫、黄芩, 加泽泻、大腹皮、生姜皮、石韦; 黄疸者, 去麝虫、焦白术, 加茵陈、生栀子; 胁痛者, 加乌药、延胡索、川楝子。

(6) 抗癌 5 号药粉 (北京中医, 1990, 5)

〔组成与用法〕人参、鹿茸、紫河车、麝香、雄黄、藏红花、水牛角、羚羊角、冰片、鸡内金、水蛭、牛黄、炙马钱子、蟾酥、血竭、甘遂、祖师麻、鳖甲、川乌、穿山甲。以上药物, 按一定比例组方, 共研为细粉, 每日中午开水冲服 3g, 1 日 1 次。

〔功能主治〕解毒散结, 扶正祛邪。主治肝癌。

〔加减应用〕肝气郁滞者, 加用抗癌 1 号 (柴胡、白芍、当归、郁金、鳖甲、三棱、青皮、半枝莲) 以疏肝解郁、消痞散结; 血瘀气滞者, 加用抗癌 2 号 (生牡蛎、郁金、穿山甲、蜈蚣、麝虫、三棱、莪术、延胡索、赤芍、露蜂房) 以活血化瘀、行气消滞; 湿热蕴毒者, 加用抗癌 3 号 (茵陈、熟大黄、栀子、片姜黄、草河车、连翘、金钱草、蒲公英、商陆、土茯苓) 以解毒泻火、清肝利胆; 肝阴亏虚者, 加用抗癌 3 号 (太子参、北沙参、当归、赤芍、牵牛子、半边莲、青蒿、仙鹤草、牡丹皮、厚朴) 以养阴益气、活血清热。

(7) 益肝消癥汤 (中西医结合肝病杂志, 1995, 1)

〔组成与用法〕西洋参 9g, 鳖甲 24g, 石斛 15g, 枸杞子 15g, 白术 12g, 茯苓 24g, 半枝莲 30g, 龙胆草 24g, 延胡索 24g, 川楝子 15g, 柴胡 12g。水煎服。

〔功能主治〕益肝消癥, 化湿止痛。主治肝癌。

〔加减应用〕腹胀恶心、呕吐纳差者, 加半夏、陈皮、厚

朴；血细胞下降者，加当归、阿胶、鸡血藤；腹水、腹胀、尿少者，加车前草、芦根、白茅根。

〔临床报道〕该方配合介入治疗 80 例原发性肝癌，结果生存大于 2 年者 32 例，1~2 年者 22 例，3 个月~1 年 2 例，小于 3 个月 6 例。生活质量亦有明显改善。

(8) 消积软结片 (《常用抗肿瘤中草药》)

〔组成与用法〕莪术 30g，三棱 30g，白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g，铁树叶 30g，廔虫 15g，鳖甲 30g，党参 30g，当归 15g，白芍 15g，白术 10g，枳实 10g，薏苡仁 30g。以上药物，共研为极细末，加赋形剂压片，1 次 9g，1 日 3 次。

〔功能主治〕益气活血，解毒散结。主治肝癌。

〔临床报道〕治疗 54 例，总有效率 68.5%。

(9) 青龙丸 (中医杂志, 1996, 3)

〔组成与用法〕红参 10g，生黄芪 30g，党参 30g，生地 15g，枸杞子 24g，牡丹皮 15g，沙参 30g，代赭石 30g，鳖甲 30g，山萸肉 24g，当归 15g，丹参 24g，白术 15g，金银花 30g，穿山甲 15g，乳香 10g，没药 10g，三七 15g，琥珀 10g。以上药物，共研为细末，制为丸剂，1 次 8g，1 日 3 次，饭后半小时服。连续应用 2 个月。亦可汤剂内服，1 日 1 剂。

〔功能主治〕益气健脾，养阴补肾，活血散结。主治肝癌。

〔临床报道〕治疗 200 例，与介入组 70 例相比病灶疗效接近。对证候、体重、生活质量改善，骨髓功能、AFP 疗效等方面，中药组优于对照组。

(10) 肝回春丸 (中西医结合肝病杂志, 1996, 2)

〔组成与用法〕白术 12g，茵陈 30g，酒制大黄 10g，地黄 15g，桃仁 12g，制马钱子 5g，青皮 15g，莪术 24g，制南星 15g，水蛭 10g，廔虫 10g，干漆 10g。以上药物共研为细末，制为丸剂，1 次 8~10g，1 日 2 次，2 个月为 1 个疗程。连续应用 2~4 个疗程。亦可汤剂内服，1 日 1 剂。

〔功能主治〕 活血散积，理气化湿。主治肝癌。

〔临床报道〕 治疗 28 例，结果完全缓解（CR）2 例，部分缓解（PR）10 例，好转 7 例，无效 9 例。存活大于 3 个月、6 个月、1 年、1.5 年、2 年者分别为 26 例、21 例、15 例、9 例、5 例。

（11）消癥回生胶囊（中国中医药科技，2001，4）

〔组成与用法〕 黄芪，莪术，金钱草，白花蛇舌草，蟾蜍，三七，仙鹤草，半边莲，人参，桃仁，香附，冬虫夏草等。炼蜜为丸，1 次 5 粒，1 日 3 次。

〔功能主治〕 扶正祛邪，清热解毒，消癥软坚，活血化瘀。主治肝癌。

〔临床报道〕 治原发性肝癌 50 例，总有效率为 72.0%。

（12）补肝软坚方（北京中医，2004，2）

〔组成与用法〕 生牡蛎（先煎）60g，仙鹤草 30g，党参 30g，半边莲 30g，海藻 30g，陈葫芦 30g，泽兰 30g，灵芝 30g，桑寄生 30g，穿山甲 20g，天冬 20g，炙鳖甲 20g，石斛 20g，全蝎 6g，天龙 6g，三七粉（冲服）3g。水煎服。

〔功能主治〕 补益肝肾，化瘀软坚，解毒祛湿。主治肝癌。

〔加减应用〕 便溏者，牡蛎、鳖甲、石斛减量或减去，加炒白术、茯苓；转氨酶异常者，全蝎、天龙减量或不用，加茵陈、泽泻、郁金等。

〔临床报道〕 治疗肝癌 100 例，部分缓解 8 例，稳定 75 例，恶化 17 例，近期缓解率为 8%，瘤体稳定率为 83%。卡氏评分有效率为 71%；生存期有效率为 85%。

（13）加味异功散（四川中医，2000，11）

〔组成与用法〕 北芪 30g，太子参 30g，白术 15g，麦芽 15g，苍术 15g，茯苓 15g，甘草 6g，陈皮 10g，枳壳 12g，白茅根 12g。水煎服。

〔功能主治〕 益气健脾。主治晚期肝癌腹胀纳差者。

〔加减应用〕 黄疸口苦者，加茵陈、泽泻；尿少者，加泽泻、薏苡仁；上消化道出血者，加仙鹤草、紫草、云南白药；腹胀者，加乌药；腹水者，加大腹皮、泽泻；呕吐者，加制半夏；苔白腻者，加藿香、砂仁；苔黄者，加茵陈、龙胆草。

〔临床报道〕 治Ⅲ期原发性肝癌 28 例，稳定 15 例（63.6%），恶化 13 例（46.4%）。

（11）健脾消积口服液（中国中西医结合杂志，2003，3）

〔组成与用法〕 太子参，黄芪，白术，茯苓，陈皮，薏苡仁，白花蛇舌草，枳壳，甘草。共制成口服液，1 次 10ml，1 日 3 次。

〔功能主治〕 益气健脾，理气消积。主治中晚期肝癌。

〔临床报道〕 治Ⅱ、Ⅲ期原发性肝癌 40 例，部分缓解 2 例（5.0%），稳定 25 例（62.5%），恶化 13 例（32.5%）。明显改善生存质量，改善症状，提高机体免疫功能。

（15）化岩汤（江西中医药，2002，1）

〔组成与用法〕 黄芪 50g，丹参 20g，白芍 15g，蚤休 20g，蜚虫 10g，桃仁 10g，白花蛇舌草 30g，茯苓 10g，炙鳖甲 10g，党参 15g，白术 10g，枳壳 10g，莪术 10g，薏苡仁 30g。水煎服。

〔功能主治〕 补气活血，行气化痰，清热解毒。主治中晚期肝癌。

〔加减应用〕 肝区痛甚者，加延胡索；湿热重者，加大黄、茵陈；纳呆、腹胀者，加白豆蔻、谷芽；阴虚甚者，加麦冬、枸杞子。

〔临床报道〕 配合化疗治疗中晚期原发性肝癌 60 例，部分缓解 6 例，稳定 31 例，恶化 23 例。半年、1 年、2 年生存率分别为 45%、21.7%、6.7%，中位生存期 264 天。

（16）消肝积汤（陕西中医学院学报，2001，7）

〔组成与用法〕 海藻 10g，昆布 10g，海螵蛸 10g，瓦楞子

30g。水煎服。

〔功能主治〕 软坚散结。主治肝癌。

〔加减应用〕 肝阴不足者，加沙参、麦冬、鳖甲（先煎）；脾虚湿盛者，加茯苓、炒白术、薏苡仁；乏力明显者，加党参、黄芪、山药；血虚明显者，加阿胶、鸡血藤。

〔临床报道〕 配合服用大黄廑虫丸治疗肝癌 50 例，显效 5 例（10%），有效 35 例（70%），总有效率为 80%。

【对症用方】

肝癌的对症用方，主要针对主症、并发症以及手术后、介入后和放疗、热疗后综合征等的中医药治疗。

1. 肝癌疼痛

（1）三王止痛膏（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 大黄 50g，马钱子 15g，全蝎 30g，干蟾皮 30g，蚤休 60g，山慈菇 60g，姜黄 50g，麝香 1g，冰片 10g，红花 40g，桃仁 50g，当归 50g，血竭 30g，莪术 50g，蜈蚣 30g，桂枝 60g，制乳香、制没药各 30g，细辛 15g，各为细末和匀。取酌量药粉调入凡士林内，摊于纱布上，贴敷肿块处，隔日一换。

〔功能主治〕 化瘀软坚，解毒止痛。主治肝癌疼痛。

〔临床报道〕 用该膏贴敷治疗 12 例肝癌疼痛患者，止痛总有效率为 93.3%，止痛平均持续时间 16.6 小时。

（2）肝外 1 号方（段凤舞经验方）

〔组成与用法〕 雄黄 60g，明矾 60g，冰片 10g，青黛 60g，皮硝 60g，乳香 60g，没药 60g，血竭 30g。以上药物共研为细末，和匀，分成 30g 或 60g 的小包。用时，用米醋和猪胆汁各半（若对皮肤刺激过甚，用米醋比例小于猪胆汁），将药 1 包调成糊状，外敷患处。药干后再蘸以醋胆汁，使药面保持湿润。1 日 1 次，每次敷 8 小时左右。

〔功能主治〕 解毒，散瘀，止痛。主治肝癌疼痛。

(3) 推气散加味方 (浙江中医杂志, 1987, 3)

[组成与用法] 姜黄 30g, 枳壳 30g, 桂心 30g, 当归 30g, 红藤 30g, 厚朴 30g, 蜈蚣 30g, 郁金 30g, 柴胡 30g, 丹参 30g, 制半夏 18g, 生南星 18g, 大黄 18g, 白芍 18g, 炙甘草 18g。以上药物共研为细末, 1 次 12g, 1 日 3 次。

[功能主治] 理气化痰, 活血止痛。主治肝癌疼痛。

[加减应用] 痛甚者, 1 次 16g, 并用白参 6g、生姜 6g、白术 9g、茯苓 9g、桃仁 9g、大枣 9 枚。水煎, 送服。

(4) 镇痛散 (中医杂志, 1992, 7)

[组成与用法] 生南星 9g, 生附子 9g, 生川乌 9g, 白胶香 12g, 麝香 0.03g, 冰片 6g, 蚤休 30g, 黄药子 30g, 芦根 15g, 穿山甲 9g, 皂刺 12g。以上药物共研为细末, 制成散剂, 密封贮存。用时寻找患者疼痛最剧烈的部位或反应于体表的疼痛部位敷药, 若疼痛部位散在, 患者感觉模糊不清者, 选取痛处周围的穴位敷药。方法为以生理盐水清洁局部皮肤后, 取药末 5g, 以茶水调成糊状外敷。敷药厚度一般为 0.5cm, 最薄不少于 0.2cm, 敷药后盖纱布并用胶布固定。敷药时间一般为 6~8 小时, 12 小时后可重复使用。

[功能主治] 辛散镇痛, 消肿散结。主治各种癌痛。

[临床报道] 治疗各种癌痛 91 例, 其中肝癌 34 例, 结果显效 (用药后 20~40 分钟疼痛渐止、镇痛时间持续 16~28 小时以上) 46.15% (42 例), 有效 24.17% (22 例), 总有效率 94.51%。

(5) 速效止痛拔癌膏 (中医函授通讯, 1994, 1)

[组成与用法] 蜈蚣 3 条, 壁虎 2 条, 冰片 5g, 水蛭 5g, 全蝎 10g, 虻虫 10g, 生草乌 10g, 马钱子 1g, 黄药子 30g, 五倍子 15g。以上药物共研为细末, 用陈醋调成稀糊状, 外敷疼痛剧烈的对应体表部位及相应腧穴。敷药厚度 0.1~0.2cm, 上敷纱布、塑料薄膜各 1 层, 再用胶布固定。24 小时换药

1次。

〔功能主治〕 解毒止痛抗癌。主治各种癌痛。

〔临床报道〕 以该方治疗各种癌痛 156 例，并设度冷丁对照组 34 例进行对比，结果两组分别完全缓解（治疗后疼痛基本消失、镇痛时间大于 24 小时）104 例（66.7%）、11 例（32.4%），中度缓解 46 例、21 例，总有效率 96.2%、94.1%，两药疗效接近。

（6）消痞止痛膏（中西医结合肝病杂志，1999，4）

〔组成与用法〕 穿山甲、血竭、郁金、川乌、草乌、细辛、白芷、蟾酥。麻油制膏外敷。

〔功能主治〕 软坚化瘀，理气通络，消肿止痛。主治肝癌疼痛。

〔临床报道〕 治 159 例晚期肝癌疼痛，5 贴为 1 个疗程，1 个疗程后疼痛基本消失者 63 例（39.62%），好转 84 例（52.83%），无变化 8 例（5.03%），加剧者 4 例（2.51%）。

（7）止痛奇效汤（中国中医药科技，2002，4）

〔组成与用法〕 柴胡 10g，乌药 10g，半夏 15g，当归 15g，桃仁 15g，白芍 20g，延胡索 20g，川芎 20g，鳖甲 30g，黄芪 30g，廑虫 10g。水煎服。

〔功能主治〕 疏肝理气，活血化瘀，祛痰散结。主治肝癌疼痛。

〔临床报道〕 治肝癌疼痛 20 例，显效 10 例，有效 7 例。

（8）补气活血方（湖南中医药导报，2001，2）

〔组成与用法〕 红参 20g，白术 10g，黄芪 10g，当归 10g，柴胡 10g，延胡索 10g，枳壳 10g，厚朴 10g，蜈蚣 3 条，全蝎 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气活血，通络止痛。主治肝癌疼痛。

〔加减应用〕 气滞血瘀者，加郁金、川楝子、红花、桃仁、三棱、莪术、陈皮；脘腹胀满，腹大如鼓，纳差者，加薏苡

仁、陈皮；肝胆湿热者，加龙胆草、山梔、车前子、泽泻、茵陈；肝肾阴虚者，加沙参、麦冬、熟地、黄精、制首乌、鳖甲。

[临床报道] 治肝癌疼痛 218 例，控制 65 例，显效 35 例，好转 90 例，稳定 22 例，无效 6 例。

2. 肝癌腹水

(1) 解毒消水方（国医论坛，1994，6）

[组成与用法] 厚朴 60g，泽泻 12g，泽兰 15g，龙葵 15g，绞股蓝 30g，白花蛇舌草 30g，砂仁 6g。水煎服。

[功能主治] 解毒消水。主治肝癌腹水。

[加减应用] 如正虚者，并用扶正抗癌方（人参、蛤蚧、紫河车、冬虫夏草、三七、僵蚕、沉香、鹿茸。共为细末，1 次 1.5g，1 日 2 次口服）；兼有血瘀者，并用化瘀逐水散（甘遂、冰片、公丁香、血竭、乳香、没药、儿茶。共为细末，醋调为糊，外敷脐部，1 日换药 1 次，30 日为一个疗程）；如腹水量大，可适当配合抽吸腹水，并予支持疗法。

(2) 逐水散（山东中医杂志，1994，10）

[组成与用法] 琥珀 30g，炒甘遂 30g，沉香 10g。药物共研为细末，装胶囊，每粒 0.3g，1 次 2 粒，1 日 3 次。如无反应加至 1 次 5 粒，1 日 3 次。30 天为一个疗程。同时配合胸腔或腹腔内顺铂 DDP 灌注，适当抽液。

[功能主治] 逐水利尿通便。主治癌性胸腹水。

[加减应用] 腹腔积液者，加黑、白丑各 30g。

[临床报道] 以该方治疗癌性胸腹水 20 例，并设单纯化疗药灌注对照 18 例，总有效率分别 75%、44%。中位数生存期分别为 6 个月和 4.5 个月。

(3) 活血消水方（中医药信息，1997，1）

[组成与用法] 生水蛭 5g，蜈蚣 5 条，牵牛子 10g，甘遂 10g，枳实 30g，薏苡仁 20g。药物共研为细末，黄酒调成糊

状，以神阙穴位中心，平敷于腹上，厚 2mm，4 日换药 1 次，1 剂用 2 次，4 剂为 1 个疗程。同时配合支持疗法。

〔功能主治〕活血通利散水。主治癌性腹水。

〔加减应用〕可根据病情需要，同时配合内服汤药剂以增强疗效，如参苓白术散、五皮饮，真武汤、己椒苈黄汤、五苓散等。

〔临床报道〕以该方治疗癌性腹水 44 例，部分缓解 14 例，好转 10 例，稳定 11 例，无效 4 例，死亡 5 例。

(4) 消水Ⅱ号（中医杂志，1997，3）

〔组成与用法〕生黄芪 30g，牵牛子 9g，车前子 24g，猪苓 30g，桂枝 12g，大腹皮 15g，莪术 30g，桃仁 12g，生薏苡仁 45g。上药按一定比例配方，加工成外用软膏剂。用时于剑突至脐下 10cm、两侧至腹中线磨一薄层，在加敷料固定，1 日 1 次，连续应用 15 日。1 日 1 剂。

〔功能主治〕益气养阴，活血利水。主治癌性腹水。

〔临床报道〕治癌性腹水 47 例，结果显效（腹水消失、持续 1 个月以上）10 例，有效 28 例，无效 9 例，总有效率 80.8%。

(5) 育阴消水方（新中医，1990，3）

〔组成与用法〕水牛角 4.5g，陈皮 6g，肉桂 6g，知母 15g，黄芪 15g，生地 30g，车前子（布包）30g，仙鹤草 30g，白茅根 30g，丹皮 15g，木香 9g，大腹皮 9g。水煎服。

〔功能主治〕益气温阳利水。主治癌性腹水。

(6) 温阳消水方（浙江中医杂志，1984，9）

〔组成与用法〕制附子 9g，苏叶 9g，陈皮 9g，瓜蒌壳 9g，木瓜 9g，桔梗 4.5g，吴茱萸 4.5g，槟榔 15g，生姜 3 片。水煎服。

〔功能主治〕温阳利水。主治癌性腹水。

3. 肝癌常见并发症

(1) 消化道出血

三黄泻心汤加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 黄芩 10g, 黄连 10g, 大黄 5g, 法半夏 10g, 党参 10g, 地榆 15g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 凉血止血。主治肝癌合并消化道出血。

[加减应用] 虚寒出血者, 去黄芩、大黄, 加干姜 5g, 制附片 5g。

(2) 肝性脑病

① 安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹酌情选用。

[功能主治] 清热解毒、醒神开窍。

② 清开灵注射液: 静脉滴注, 1 次 20~40ml, 1 日 1 次, 用 10% 葡萄糖注射液 200ml 或用生理盐水 100ml 稀释使用。

4. 手术、介入、放疗热疗后

手术、介入、放疗后的中医药调理治疗时间一般 1 个月左右, 然后转入常规治疗。

(1) 手术后治疗 手术后多损伤气血, 治宜气血双补, 同时兼以健脾和胃、化瘀解毒。

① 八珍汤加减 (潘敏求经验方)

[组成与用法] 党参 10g, 白术 10g, 茯苓 10g, 当归 10g, 三七粉 (冲服) 6g, 白芍 10g, 熟地 10g, 法半夏 10g, 厚朴 10g, 砂仁 5g, 枸杞子 10g, 女贞子 10g, 白花蛇舌草 30g, 石见穿 30g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 益气补血, 健脾和胃, 化瘀解毒。用于肝癌术后气血不足者。

[加减应用] 虚烦失眠者, 加酸枣仁、远志; 胁肋疼痛者, 加延胡索、川楝子; 腹胀纳差者, 加炒谷芽、莱菔子。

② 肝癌术后方 (中西医结合肝病杂志, 1997, 2)

[组成与用法] 党参 10g, 黄芪 10g, 白芍 10g, 紫菀 10g,

枳壳 10g, 浙贝 10g, 白蒺藜 15g, 炒薏苡仁 15g, 制鳖甲 15g, 怀山药 20g, 白花蛇舌草 40g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾理气, 养血柔肝, 清热解毒。用于肝癌手术后。

〔加减应用〕 阴虚者, 加沙参、石斛、黄精; 湿热重者, 加黄芩、茵陈、山栀; 气滞者, 加苏梗、木香、青皮、郁金; 血瘀者, 加桃仁、赤芍; 白细胞减少者, 加黄精、枸杞子、当归。

〔临床报道〕 配合介入化疗治肝癌术后 30 例, 胁痛消失 27 例 (90%), 白细胞上升 28 例 (93.3%), 体重增加 25 例 (83.3%), 饮食增加 25 (86.6%)。

(2) 肝癌介入后治疗 肝癌介入治疗后损肝肾、伤脾胃, 治宜补益肝肾, 理气和胃, 化瘀解毒。

① 癌复康方加减 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 党参 10g, 白术 10g, 黄芪 30g, 茯苓 10g, 枸杞子 10g, 女贞子 10g, 菟丝子 10g, 枳壳 10g, 陈皮 10g, 法半夏 10g, 灵芝 10g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 补肝益肾、和胃理气、化瘀解毒。用于肝癌介入术后。

〔加减应用〕 恶心呕吐者, 加姜竹茹; 神疲乏力者, 去党参, 加人参 (蒸兑); 黄疸、尿赤者, 加茵陈、栀子、金钱草; 肝区疼痛者, 加延胡索、三七 (冲服)。

② 治肝癌介入化疗后并发症方 (福建中医药, 2001, 1)

〔组成与用法〕 党参 20g, 白术 10g, 茯苓 15g, 甘草 3g, 山药 15g, 半夏 10g, 山楂 15g, 莲子 20g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气化湿。治肝癌介入化疗后食欲不振呕吐者。

〔加减应用〕 呕甚者, 加旋覆花; 腹痛甚者, 加苏梗; 湿热内蕴者, 加茵陈、炒栀子、车前子、泽泻、白毛藤、白术、

山药、陈皮；黄疸者，加金钱草；腹水甚者，加大腹皮。

〔临床报道〕 治肝癌肝动脉插管化疗术后患者 80 例，治疗后症状改善总有效率为 65%，异常肝功能改善总发生率为 42%。

③ 加减参苓白术散（陕西中医，2003，7）

〔组成与用法〕 党参 30g，怀山药 18g，茯苓 18g，白术 15g，扁豆 15g，薏苡仁 15g，甘草 6g，陈皮 6g。水煎服。

〔功能主治〕 益气健脾祛湿。主治肝癌栓塞术后综合征。

〔加减应用〕 腹痛者，加延胡索、佛手、郁金、川楝子；呕吐并胃纳差者，加吴茱萸、麦芽、神曲；发热者，加石膏、柴胡。

〔临床报道〕 治肝癌栓塞术后综合征 43 例，其恶心、呕吐、发热、腹痛发生率及发生程度均较非中药组（20 例）低。

（3）放疗热疗后治疗 肝癌放疗、热疗后多伤阴损胃，治宜养阴和胃、疏肝理气、清热解毒。

沙参麦冬汤加减（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕 沙参 10g，麦冬 10g，怀山药 15g，竹茹 10g，法半夏 10g，砂仁 10g，枳壳 10g，陈皮 10g，青皮 10g，太子参 15g，黄芪 30g，茯苓 10g，白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 养阴和胃，疏肝理气，清热解毒。用于肝癌放疗热疗后肝胃不和。

〔加减应用〕 肝区疼痛者，加延胡索、川楝子；呕血或便血者，加地榆炭、仙鹤草、三七粉（冲服）；口干舌燥明显者，加麦冬、石斛；黄疸明显、尿赤者，加茵陈、栀子、金钱草。

【专病成药】

1. 肝复乐片（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 党参、鳖甲、重楼、黄芪、大黄、柴胡、桃仁、廑虫等 21 味。

〔功能主治〕健脾理气，化瘀软坚，清热解毒。主治以肝瘀脾虚为主症的原发性肝癌，症见上腹肿块，胁肋疼痛，神疲乏力，食少纳呆，脘腹胀满，心烦易怒，口苦咽干等。（辽宁中医学院学报，1999，1）

〔用法用量〕口服，1次6片，1日3次。治疗Ⅱ期原发性肝癌2个月为1个疗程，治疗Ⅲ期原发性肝癌1个月为1个疗程，治疗乙型肝炎肝硬化3个月为1个疗程，或遵医嘱。

〔禁忌〕孕妇忌服。

2. 参莲胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕苦参、山豆根、半枝莲、防己、三棱、莪术、丹参、补骨脂、苦杏仁、乌梅、白扁豆。

〔功能主治〕清热解毒，活血化瘀，软坚散结。用于由气血瘀滞、热毒内阻而致的中晚期肝癌。（中国中西医结合脾胃杂志，2000，3）

〔用法用量〕口服，1次6粒，1日3次。

3. 平消胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕郁金、仙鹤草、五灵脂、白矾、硝石、干漆、枳壳、马钱子粉。

〔功能主治〕活血化瘀，止痛散结，清热解毒，扶正祛邪。主治肝癌。（中西医结合肝病杂志，2001，1）

〔用法用量〕口服，1日3次，1次4~8粒。

4. 去甲斑蝥素片（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕斑蝥。

〔功能主治〕破血消癥，解毒定痛。主治晚期肝癌。（河北医药，2005，7）

〔用法用量〕口服，1次5~15mg，1日3次或遵医嘱。

〔不良反应〕超量使用或部分患者出现恶心、呕吐等症状，停药、减量或对症处理，可自行消失。

5. 消癥益肝片（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔**处方组成**〕 蟑螂提取物（总氮）。

〔**功能主治**〕 解毒化积，消肿止痛。主治肝癌。

〔**用法用量**〕 口服，1次6~8片，1日3次。

6. 安替可胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔**处方组成**〕 蟾皮等中药提取物。

〔**功能主治**〕 软坚散结，解毒定痛，养血活血。主治肝癌。

（中国现代医学杂志，2000，4）

〔**用法用量**〕 口服，1次2粒，1日3次，饭后服用；疗程6周，或遵医嘱。

〔**注意事项**〕 心脏病患者慎用；孕妇忌服；注意观察血象；注意掌握服用剂量。

7. 金龙胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔**处方组成**〕 鲜守宫、鲜金钱白花蛇等。

〔**功能主治**〕 扶正荡邪，解毒消肿，理气止痛，破瘀散结。具有增强免疫功能，促进新陈代谢，抑制多种肿瘤，改善体质等作用。主治肝癌。（中国肿瘤临床，2003，4）

〔**用法用量**〕 口服，1次2~4粒、1日3次，1~2个月为1个疗程。

8. 复方斑蝥胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔**处方组成**〕 斑蝥、刺五加、莪术、熊胆粉、人参、三棱、山茱萸、甘草、黄芪、半枝莲、女贞子。

〔**功能主治**〕 清热解毒，破血消癥，攻毒蚀疮。主治原发性肝癌及术后的巩固治疗。也可与化疗、放疗配合使用，增效减毒。（中国中西医结合外科杂志，2001，1）

〔**用法用量**〕 口服，1次3粒，1日2次。

〔**注意事项**〕 偶见消化道不适，糖尿病患者及糖代谢紊乱者慎用。

9. 慈丹胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔**处方组成**〕 莪术、山慈菇、鸦胆子、马钱子粉、蜂房等。

〔功能主治〕化瘀解毒，消肿散结，益气养血。主治原发性肝癌或手术、放、化疗后的辅助治疗。（上海中医药杂志，2005，3）

〔用法用量〕口服，1次5粒，1日4次，1个月为1个疗程，或遵医嘱。

〔注意事项〕偶见服药后恶心，孕妇禁服，本品含有马钱子、鸦胆子等，不可超量服用。

10. 新癢片（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕肿节风、三七、牛黄等。

〔功能与主治〕清热解毒，活血化瘀，消肿止痛。用于肝癌介入术后腹痛。（成都中医药大学学报，2002，4）；肝癌介入术后发热。（安徽中医学院学报，2002，3）

〔用法与用量〕口服，1次2~4片，1日3次，小儿酌减。外用，用冷开水调化，敷患处。

11. 金菌灵胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2002）

〔主要成分〕金针菇丝体（主含朴菇素、朴菇多糖等）。

〔功能主治〕调补气血，扶正固本。用于肝癌的辅助治疗。

〔用法用量〕口服，1次4粒，1日2次。

12. 回生口服液（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕益母草、红花、三棱、香附、人参、大黄、虻虫、鳖甲等。

〔功能主治〕消癥化瘀。能抑制肿瘤癌细胞的增殖和转移，提高机体免疫功能，保护骨髓造血细胞，且与放疗、化疗合用具有增效、减毒作用。用于原发性肝癌属气滞血瘀者。

〔用法用量〕口服，1次10ml，1日2次。

〔注意事项〕孕妇禁用。

13. 贞芪扶正冲剂（《国家基本医疗保险药品目录》2001）

〔处方组成〕黄芪、女贞子。

〔功能主治〕 补益气血，滋养肝肾。有提高人体免疫功能，保护骨髓和肾上腺皮质功能；用于各种疾病引起的虚损；配合手术、放射线、化学治疗，促进正常功能的恢复。

〔用法用量〕 口服，1次1袋，1日2次，开水冲服。

14. 参芪颗粒（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 人参、黄芪、当归、天麻、熟地黄、泽泻、决明子、鹿角、菟丝子、细辛、枸杞子等。

〔功能主治〕 补气养血，健脾益肾。适用于癌症应用放、化疗所致白细胞减少及因放、化疗引起的头晕头昏、倦怠乏力、消瘦、恶心呕吐等症。（中医药学报，2005，3）

〔用法用量〕 口服，1次2g，1日3次。

15. 槐耳颗粒（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔主要成分〕 槐耳菌质。

〔功能主治〕 适用于不宜手术和化疗原发性肝癌的辅助治疗药，有改善肝区疼痛、腹胀、乏力等症状的作用。

〔用法用量〕 口服。1次20g。1日3次。1个月为1个疗程，或遵医嘱。

〔不良反应〕 偶见恶心、呕吐。偶见白细胞下降，目前未有证实与使用本品有关。

16. 艾迪注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 含斑蝥、人参等。

〔功能主治〕 清热解毒，消癥散结。主治原发性肝癌。（肿瘤防治研究，2005，6）

〔用法用量〕 成人1次50~100ml，加入0.9%生理盐水或5%~10%葡萄糖注射液400~450ml中静脉滴注。1日1次；与放、化疗合用时，疗程与放、化疗同步；手术前后使用本品10天为1个疗程；介入治疗10天为1个疗程；单独使用15天为1个周期，间隔3天，2周期为1个疗程；晚期恶病质患者，连用30天为1个疗程，因病情而定。

【专病单方】

1. 三白草根 用法：每取 150～200g，配大蓟根 150～200g。水煎，上午服三白草煎液，下午服大蓟煎液。功用：清热解毒利湿。主治：肝癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 斑蝥 用法：每取 2 只，配鲜鸡蛋 1 个。将鸡蛋壳上开一个小孔，将斑蝥去头、足、翅后，放入蛋中，用纸封口，外包烂泥如皮蛋状，置火上或火内烘烤至干，去斑蝥，吃鸡蛋，1 日或隔日 1 次，连用 5 日，休息 5 天后再用。3 月为 1 个疗程。功用：攻毒蚀疮，破血散结。主治：肝癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 鼠妇干品 用法：每取 60g，水煎 2 次，共取汁 240ml，分 4 次服。功用：破血散结。主治：肝癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 守宫 用法：每取 2 只，守宫焙干研末，1 次 0.9～1.5g，1 日 2～3 次服。功用：散结止痛。主治肝癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 白及粉 用法：每取 1～3g。口服，1 日 2～3 次，温开水送服。功用：收敛止血。主治：肝癌并发消化道出血。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 三七粉 用法：每取 1～2g。口服，1 日 2～3 次，温开水送服。功用：化瘀止血。主治：肝癌并发消化道出血。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 云南白药 用法：每取 0.25～1g。口服，1 日 2～3 次，温开水送服。功用：化瘀止血。主治：肝癌并发消化道出血。（《中华肿瘤治疗大成》）

8. 生地 用法：每取 12g，配大黄粉 3g。煎服，1 日 2～3 次。功用：凉血止血。主治：肝癌并发消化道出血。（《中华肿瘤治疗大成》）

9. 生大黄 用法：每取 30g，配附子 30g，牡蛎 15g，浓

煎成 150~200ml, 1 日 1 次, 保留灌肠。主治: 肝癌并发肝肾综合征。(《中华肿瘤治疗大成》)

10. 大蒜 用法: 每取 120g, 配芒硝 60g, 捣烂, 外敷肋脊角和肾区。主治: 肝癌并发肝肾综合征。(《中华肿瘤治疗大成》)

胆 囊 癌

胆囊癌为胆系原发性恶性肿瘤中最常见的疾病, 胆囊癌的发病一般认为与胆囊结石引起的慢性感染所造成的长期刺激有关。

本病属于中医黄疸、胁痛、癥瘕、积聚、虚劳、痞块等范畴, 其主要病因病机为肝气郁结, 疏泄不利, 脾气虚弱, 水湿不化, 致痰湿互结, 湿热交蒸, 瘀毒内阻, 日久而形成。

【辨证用方】

胆囊癌病虽在胆囊, 病机则与肝、脾、胃关系密切, 故辨证治疗多按肝胆气郁、湿热中阻、气血两虚、痰凝血瘀等予以疏肝利胆, 健脾和胃, 清热利湿, 补益气血, 祛瘀散结为治法。

1. 肝气郁结证

主症: 右胁隐痛、钝痛及胃脘胀痛, 暖气, 恶心, 腹胀, 纳差, 或口干苦, 或目黄、身黄, 小便黄赤, 苔薄, 脉弦。

治法: 疏肝利胆, 化痰软坚。

(1) 加减大柴胡汤合大黄廑虫丸或鳖甲煎丸(《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕柴胡 10g, 枳实 10g, 川厚朴 10g, 法半夏 10g, 鸡内金 10g, 廑虫 10g, 赤芍 15g, 虎杖 15g, 车前子(布包) 15g, 瓜蒌皮 15g, 茵陈 30g, 半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕疏肝利胆, 化痰软坚。主治胆囊癌。

〔加减应用〕 胁痛甚者，加青皮、川楝子、郁金；气郁化火，症见胁肋掣痛、性急烦躁、口干口苦、溺黄便秘、舌红苔黄、脉弦细，加当归、何首乌、枸杞子、菊花；肝气横逆、脾运失常，症见胁痛肠鸣腹泻者，加白术、茯苓、泽泻、薏苡仁；恶心呕吐者，加陈皮、半夏、藿香、砂仁、生姜；便秘者，加瓜蒌、麻仁，润肠通便；发热者，加青蒿、败酱草、茵陈、半枝莲；食欲不振者，加山楂、麦芽、建曲、鸡内金健脾开胃；

(2) 逍遥散加味方（《中医肿瘤防治大全》）

〔组成与用法〕 柴胡 10g，甘草 10g，枳壳 10g，川芎 10g，白芍 30g，香附 15g，白术 15g，石打穿 20g，当归 20g，茯苓 20g。以上药物，水煎分 2 次空腹服下，1 日 1 剂。

〔功能主治〕 疏泄肝胆，理气解郁。主治胆囊癌。

〔加减应用〕 痛重于胀者，加郁金、延胡索、丹参、川楝子；恶心呕吐者，加姜半夏、竹茹；食欲不振者，加鸡内金、生山楂；脘腹胀满者，加佛手、香橡皮。

2. 痰瘀互结证

主症：右胁胀痛或刺痛，胸闷纳呆，恶心呕吐，腹胀乏力，胁肋下或见积块，或身目俱黄，苔白腻，舌有瘀斑，脉弦滑。

治法：健脾化痰，疏肝活血。

温胆汤合桃红四物汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 法半夏 10g，陈皮 10g，柴胡 10g，石菖蒲 10g，桃仁 10g，红花 10g，当归 10g，川芎 10g，郁金 10g，白花蛇舌草 30g，白术 15g，茯苓 15g，山楂 10g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾化痰，疏肝活血。主治胆囊癌。

〔加减应用〕 呕吐较甚者，加竹茹、黄连。

3. 肝胆湿热证

主症：右胁胀痛，或向右肩胛放射痛，胸闷且痛，恶心呕

吐，口苦，身目发黄，小便黄赤，大便不畅，苔黄腻，脉弦滑。

治法：清热化湿，利胆退黄。

(1) 加减茵陈蒿汤合五苓散（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕茵陈 30g，金钱草 30g，白花蛇舌草 30g，大黄 10g，栀子 10g，猪苓 10g，藿香 10g，白术 10g，泽泻 10g，虎杖 15g，茯苓 15g，车前子（布包）15g，柴胡 10g。水煎服。

〔功能主治〕清热化湿，利胆退黄。主治胆囊癌。

〔加减应用〕面黄晦暗、神倦少食者，加附子、炮姜温里助阳；发热明显者，加黄柏清下焦湿热；胸闷、呕恶者，加白蔻仁、生薏苡仁、半夏、厚朴。

(2) 加减龙胆泻肝汤合茵陈蒿汤（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕柴胡 10g，龙胆草 10g，黄芩 12g，金银花 10g，蒲公英 30g，茵陈 30g，山栀子 15g，大黄（后下）9g，白花蛇舌草 30g，薏苡仁 30g。水煎服。

〔功能主治〕清化湿热，利胆退黄。主治胆囊癌。

〔加减应用〕便秘甚者，加玄明粉通便；口干欲饮阴伤者，加生地、麦冬养阴生津；伴发热者，加清水豆卷、地骨皮退热；黄疸甚者，加虎杖退黄。

4. 肝胆实火证

主症：黄疸胁痛，高热烦躁，口苦口干，胃纳呆滞，腹部胀满，恶心呕吐，大便秘结，小便黄赤，苔黄糙，脉弦滑数。

治法：清肝解毒，凉血退黄。

龙胆泻肝汤合黄连解毒汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕茵陈 30g，赤芍 30g，黄芩 10g，栀子 10g，龙胆草 10g，黄柏 10g，泽泻 10g，当归 10g，丹皮 10g，柴胡 10g，车前子（布包）15g。水煎服。

〔功能主治〕清肝解毒，凉血退黄。主治胆囊癌。

[加减应用] 湿热煎熬，阻滞胆道，症见胁肋剧痛，连及肩背者，加金钱草、海金沙、郁金；大便干结较腹胀甚者，加大黄（后下）、芒硝（冲服）。

5. 脾虚湿阻证

主症：身目俱黄，其色较淡，右肋隐痛或胀痛绵绵，脘闷腹胀，纳差肢软，大便溏薄，苔白腻，舌淡体胖，脉沉细或濡细。

治法：健脾和胃，利湿退黄。

(1) 参苓白术散或茵陈五苓散加减（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 茵陈 30g，茯苓 15g，猪苓 15g，白术 15g，薏苡仁 15g，怀山药 15g，党参 10g，桂枝 10g，泽泻 10g，扁豆 10g，陈皮 10g，砂仁 5g。

[功能主治] 健脾和胃，利湿退黄。主治胆囊癌。

[加减应用] 恶心呕吐者，加姜半夏、竹茹降逆止呕；

(2) 加减茵陈术附汤（《临床中医肿瘤学》）

[组成与用法] 茵陈 30g，白术 12g，制附子 9g，干姜 5g，党参 15g，木香 10g，三棱 10g，莪术 10g，炮山甲 10g，白花蛇舌草 30g。1 日 1 剂，水煎服。

[功能主治] 益气健脾，温阳化湿。主治胆囊癌。

[加减应用] 腹痛者，加鸡血藤、七叶莲补虚止痛；纳食少者，加山楂、神曲健胃消食。

【辨病用方】

胆囊癌的辨病用药治疗，当注重湿热、瘀毒、虚三个方面。根据肿瘤病期早晚、患者体质强弱，选用或合用化瘀解毒、利湿退黄、健脾和胃等治疗方药。

(1) 利胆抗癌汤（《肿瘤学》）

[组成与用法] 虎杖 30g，金钱草 30g，茵陈 15g，木香 6g（后入），大黄（后下）9g，枳壳 15g，黄芩 6g，白花蛇舌草 30g，麦芽 15g。以上药物，水煎分 2 次空腹服下，1 日 1 剂。

〔功能主治〕 清热化湿，抗癌利胆。主治胆囊癌。

〔加减应用〕 小便黄赤如浓茶，涩痛不畅者，加泽泻、车前子、猪苓、茯苓；高热不退者，加连翘、金银花、蒲公英、玄参。

(2) 解毒抗癌汤（《肿瘤学》）

〔组成与用法〕 白花蛇舌草 30g，石见穿 30g，蒲公英 15g，金钱草 20g，山栀 10g，郁金 10g，枳壳 12g，柴胡 9g，延胡索 12g，白茅根 18g。以上药物，水煎分 2 次空腹服下，1 日 1 剂。

〔功能主治〕 清热解毒，行气止痛，活血抗癌。主治胆囊癌。

〔加减应用〕 热盛而黄疸明显者，加水牛角（先煎）、牛黄、生地、玄参；烦热口渴者，加芦根、生地、玉竹、石斛；大便干结者，加大黄、芒硝。

(3) 金钱草汤（《肿瘤的防治》）

〔组成与用法〕 金钱草 30g，水杨梅根 30g，小蓟 15g，海金沙 12g，茵陈 12g，鸡内金 12g，木香 9g，黄芩 9g，柴胡 6g，生甘草 6g。以上药物，水煎分 2 次空腹服下，1 日 1 剂。

〔功能主治〕 清热利湿，散结退黄。主治胆囊癌。

〔加减应用〕 身热不退者，加蒲公英、金银花、白花蛇舌草、连翘；黄疸较甚者，加虎杖、败酱草、滑石；上腹痛甚者，加郁金、延胡索、川楝子；积块较大者，加丹参、三棱、莪术、水蛭、赤芍；呕吐恶心者，加陈皮、清半夏、竹茹、代赭石、芦根。

(4) 白英龙胆汤（《段凤舞肿瘤积验方》）

〔组成与用法〕 白毛藤 30g，龙胆草 15g，夏枯草 15g，续随子 9g，穿山甲 9g，鸡内金 9g，昆布 9g，海藻 9g，海浮石 9g，通草 9g，阿魏 1.5g，斑蝥 0.05g。水煎服，1 日 1 剂。

〔功能主治〕 解毒化痰，活血散结。用于胆囊癌。

(5) 皂角乳没汤 (四川中医, 1989, 12)

[组成与用法] 金银花 15g, 赤芍 15g, 白芍 15g, 制乳香 6g, 制没药 6g, 青皮 5g, 陈皮 5g, 象贝母 12g, 天花粉 12g, 穿山甲 12g, 全当归 10g, 皂角刺 10g, 淡黄芩 10g, 柴胡 10g, 广郁金 10g, 生甘草 10g。水煎服。

[功能主治] 化痰祛瘀, 解毒散结。主治胆囊癌。

(6) 茵陈龙胆汤 (《中医肿瘤防治大全》)

[组成与用法] 茵陈 30g, 山梔 15g, 大黄 10g, 龙胆草 10g, 柴胡 10g, 泽泻 10g, 甘草 10g, 菝葜 20g。以上药物, 水煎分 2 次空腹服下, 1 日 1 剂。

[功能主治] 泻火解毒, 利湿退黄。主治胆囊癌。

[加减应用] 高热不退者, 加金银花、连翘、蒲公英、白花蛇舌草; 积块硬痛较剧者, 加三棱、莪术、延胡索、川楝子; 大便干结者, 加芒硝、厚朴; 小便黄甚者, 加金钱草、车前子、滑石; 口渴欲饮者, 加生地、玄参、麦冬。

(7) 胆囊癌方 (《抗肿瘤中草药精选原色图谱》)

[组成与用法] 蛇六谷 30g, 半枝莲 30g, 龙葵 30g, 川蓼子 15g, 柴胡 9g, 川楝子 15g, 党参 15g, 橘叶 15g, 陈皮 9g, 黄芩 15g, 半夏 15g, 代赭石 15g, 茯苓 15g。1 日 1 剂, 水煎服。

[功能主治] 疏肝和胃, 清热散结。主治胆囊癌。

[加减应用] 暖气者, 加佛手; 疼痛者, 加延胡索; 便秘者, 加望江南、鲜首乌。

【对症用方】

胆囊癌的对症用方, 除根据患者主要症状疼痛等进行选择外, 当区分是否手术或化疗等治疗。术后治疗以健脾补益气血为主, 化疗患者以健脾和胃、益肾养血为主。

1. 胆囊癌手术后专方

(1) 胆囊癌术后方 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕党参 15g, 白术 12g, 白芍 12g, 柴胡 9g, 薏苡仁 15g, 茯苓 10g, 砂仁 10g, 法半夏 9g, 陈皮 9g, 木香 6g, 炙甘草 5g, 石见穿 30g, 山慈菇 30g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益气, 解毒抗癌。用于胆囊癌手术后。

〔加减应用〕伴发热、口干、便秘、舌红紫无苔者, 加金银花、石斛、知母; 黄疸明显者, 加茵陈、大黄; 腹痛明显者, 加延胡索、丹参、乌药; 肝肾阴虚明显者, 加枸杞子、丹皮、菟丝子、黄精; 术后兼见气虚者, 加生黄芪。

(2) 大柴胡汤加减 (《临床中医肿瘤学》)

〔组成与用法〕柴胡 10g, 制半夏 10g, 炒黄芩 12g, 枳实 10g, 生大黄 (后下) 10g, 白花蛇舌草 30g, 蚤休 10g, 大叶金钱草 30g, 广郁金 10g, 广木香 10g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

〔功能主治〕疏肝利胆, 清化湿热。用于胆囊癌手术后。

〔加减应用〕腹胀者, 加厚朴、大腹皮以行气消胀; 低热者, 加地骨皮、银柴胡清退虚热。

(3) 加减大柴胡汤合大黄廑虫丸 (《肿瘤辨病专方治疗》)

〔组成与用法〕柴胡 10g, 制半夏 10g, 黄芩 10g, 广木香 10g, 枳实 10g, 广郁金 10g, 茵陈 30g, 廑虫 10g, 桃仁 10g, 水蛭 6g, 白花蛇舌草 30g, 虎杖 12g, 生大黄 (后下) 10g。水煎服。

〔功能主治〕疏肝软坚, 清化湿热。用于胆囊癌姑息手术后。

〔加减应用〕若胆道继发感染, 症见高热不退者, 加龙胆草、黄连、栀子。

2. 胆囊癌化疗后专方

(1) 癌复康方加减 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕黄芪 20g, 党参 20g, 白术 15g, 茯苓 15g, 砂仁 10g, 陈皮 12g, 法半夏 12g, 怀山药 20g, 炒麦芽 15g,

炒谷芽 15g, 女贞子 12g, 旱莲草 12g, 肉苁蓉 12g, 菟丝子 10g, 莪术 12g, 蚤休 20g, 白花蛇舌草 20g, 甘草 5g。水煎服

〔功能主治〕 健脾益肾。用于胆囊癌化疗后。

〔加减应用〕 头昏乏力者, 加红参或白参; 汗多者, 加煅牡蛎(先煎)、五味子。

3. 胆囊癌疼痛专方

雄黄南星膏(《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 雄黄 30g, 生南星(先煎) 20g, 大黄 30g, 天花粉 100g, 冰片 20g, 乳香 20g, 没药 20g, 黄柏 50g, 姜黄 50g, 皮硝 50g, 芙蓉叶 50g。共研细末, 加饴糖调成糊状, 摊于油纸上, 敷贴患处。

〔功能主治〕 清热散结, 消肿止痛。用于胆囊癌疼痛者。

【专病成药】

1. 平消胶囊(《国家基本医疗保险药品目录》2002)

〔处方组成〕 郁金、仙鹤草、五灵脂、白矾、硝石、干漆、枳壳、马钱子粉。

〔功能主治〕 活血化瘀, 止痛散结, 清热解毒, 扶正祛邪。用于胆囊癌。

〔用法用量〕 口服, 1次4~8粒, 1日3次。

2. 化癥回生片(《国家基本医疗保险药品目录》2002)

〔处方组成〕 益母草 12g, 红花 14g, 花椒(炭) 14g, 水蛭(制) 14g, 当归 28g, 苏木 14g, 三棱(醋炙) 14g, 两头尖 14g, 川芎 14g, 降香 14g, 香附(醋炙) 14g, 人参 42g, 高良姜 14g, 姜黄 8.4g, 没药(醋炙) 14g, 苦杏仁(炒) 21g, 大黄 56g, 麝香 1.4g, 小茴香(盐炒) 21g, 桃仁 21g, 五灵脂(醋炙) 1.4g, 虻虫 14g 等。

〔功能主治〕 消癥化瘀。可用于胆囊癌。

〔用法用量〕 口服, 1次2粒, 1日3次。

3. 复方胆通胶囊(《中华人民共和国国药标准》)

〔**处方组成**〕由疏胆通，穿心莲，溪黄草，大黄，茵陈等组成。

〔**功能主治**〕清热利湿，消炎利胆。对于胆囊癌有肋肋部疼痛，恶心呕吐等症有一定的效果。（黎月恒经验）

〔**用法用量**〕口服，1次2粒，1日3次。

4. 鳖甲煎丸（《中华人民共和国药典》2000）

〔**处方组成**〕鳖甲、射干、黄芩、柴胡、鼠妇、干姜、大黄、芍药、桂枝、葶苈子、石韦、厚朴、牡丹皮等组成。

〔**功能主治**〕软坚散结，行气活血。适用于胆囊癌右上腹包块，肋肋部疼痛。（潘敏求经验）

〔**用法用量**〕口服，1次3g，1日3次。

5. 慈丹胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔**处方组成**〕莪术、山慈菇、鸦胆子、马钱子粉、蜂房等。

〔**功能主治**〕化瘀解毒，消肿散结，益气养血。主治胆囊癌。（中国民间疗法，2004，2）

〔**用法用量**〕口服，1次5粒，1日4次，1个月为1个疗程，或遵医嘱

6. 华蟾素注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔**处方组成**〕中华大蟾蜍。

〔**功能主治**〕清热解毒，消肿止痛，活血化瘀，软坚散结。直接杀伤肿瘤细胞，抑制肿瘤细胞生长。主治中、晚期胆囊癌疼痛。

〔**用法用量**〕静滴，1次10~20ml加入5%葡萄糖注射液500ml稀释后缓慢滴注，1日或隔日1次。每个疗程4周，1次用药1周后休息1~2日或按医嘱使用。

7. 复方苦参注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔**处方组成**〕苦参等多味中草药。

〔**功能主治**〕抗癌镇痛，提高免疫功能。主治晚期胆囊癌及其引起的疼痛。

〔用法用量〕 静脉滴注：以本品 12~20ml 加入 200ml 生理盐水中滴入，1 日 1 次，或以本品 8~10ml 加入 100ml 生理盐水中滴入，1 日 2 次。

8. 西黄丸（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 麝香、牛黄、制乳香、制没药。

〔功能主治〕 解毒散结，消肿止痛。主治胆囊癌肝转移。
（浙江中西医结合杂志，2001，4）

〔用法用量〕 1 次 3g，1 日 2 次，温开水送服。

【专病单方】

1. 白花蛇舌草 用法：每取 50g，水煎服，1 日 1 剂，代茶频饮。功用：解毒抗癌。主治：胆囊癌。（《肿瘤辨病专方治疗》）

2. 小蓟全草 用法：每取 15g，水煎服。功用：凉血止血。主治：胆囊癌出血。（《中医药研究资料》）

3. 猕猴桃 用法：每取 90g，配藤黎根 90g，每日煎水，分 3 次服；或配藤黎根 60g，虎杖 30g，共煮 60ml，分 2 次内服。功用：清热利湿。主治：胆囊癌。（《中医肿瘤防治大全》）

4. 八月札 用法：每取 30g，配白花蛇舌草 30g、楸木 30g，水煎服。功用：清热利湿。主治：胆囊癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 炒山楂 用法：每取 6g，配炒麦芽 10g，水煎加红糖服。功用：消食化积。主治：胆囊癌消化不良。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 川楝子 用法：每取 15g，配延胡索 20g、白芍 20g，水煎服。功用：行气止痛。主治：胆囊癌疼痛。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 槟榔 用法：每取 10g（打碎），加炒莱菔子 10g、橘皮 3g，水煎服。功用：行气消胀。主治：胆囊癌腹胀。（《中华肿瘤治疗大成》）

胰 腺 癌

胰腺癌系指来源于胰腺导管上皮的恶性肿瘤。胰腺癌发病与吸烟、饮酒、糖尿病、胰腺炎、胆石症、饮食中高脂肪、高动物蛋白等有关，尤其与吸烟、饮酒关系密切。

本病相当于中医病名国家标准的胰癌，亦属于伏梁、腹痛、黄疸、积聚、癥瘕等范畴。中医认为，本病与肝脾胃关系密切，主要病因病机为七情内伤、外邪侵袭、饮食失宜，致肝脾损伤、脏腑失和、湿毒内蕴、气滞血瘀日久而形成本病。

【辨证用方】

本病之病因病机以气血痰湿互阻，湿热邪毒内攻，脾胃气阴两虚为特点，故其治疗则当行气活血、化痰散结以祛其邪，益气健脾、养阴和胃以补其虚。常用辨证与辨病相结合，再随症加减的方法。

1. 湿浊阻遏证

主症：胸脘痞闷，头重身困，恶心欲呕，纳呆，腹部隐痛，身目俱黄，黄色晦暗，口干不欲饮，大便溏薄，舌质淡，苔白腻，脉沉细或沉迟。

治法：健脾利湿，化浊解毒。

(1) 加减茵陈五苓散（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕茵陈 30g，猪苓 12g，茯苓 12g，白术 10g，泽泻 15g，桂枝 10g，菝葜 20g，陈皮 10g，法半夏 10g，石见穿 30g，山慈菇 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕利湿化浊解毒。主治胰腺癌。

〔加减应用〕脾阳不振，寒湿阻遏明显者，加制附片、干姜；湿邪郁而化热者，加藿香、黄芩、薏苡仁。

(2) 加减茵陈术附汤（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕茵陈 20g，苍术 10g，白术 10g，干姜 5g，

制附片 6g, 猪苓 15g, 厚朴 10g, 陈皮 10g, 泽泻 10g, 车前子(布包) 10g。水煎服。

〔功能主治〕 温阳利湿化浊。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 脘胁胀痛者, 加郁金、川楝子、延胡索。

(3) 加减二陈汤合平胃散(《临床中医肿瘤学》)

〔组成与用法〕 苍术 10g, 厚朴 10g, 陈皮 10g, 法半夏 15g, 胆南星 15g, 薏苡仁 30g, 猪苓 30g, 茯苓 30g, 泽泻 30g。水煎服。

〔功能主治〕 理气化湿。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 面浮足肿明显者, 加车前子、木瓜; 腹部肿块硬实疼痛者, 加三棱、莪术; 胀痛明显者, 加木香、青皮。

(4) 膈下逐瘀汤合涤痰汤化裁(《中华肿瘤防治大成》)

〔组成与用法〕 赤芍 30g, 延胡索 30g, 当归 15g, 五灵脂 15g, 茯苓 20g, 红花 15g, 枳壳 15g, 川芎 10g, 桃仁 10g, 法半夏 10g, 陈皮 10g。水煎服。

〔功能主治〕 活血软坚, 化痰散结。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 疼痛较重者, 加制乳香、制没药; 积块坚硬者, 加三棱、莪术、炮山甲; 纳呆腹胀者, 加鸡内金、大腹皮、白术、莱服子; 身目俱黄者, 加茵陈、栀子、大黄; 身热不退者, 加金银花、连翘、白花蛇舌草; 恶心呕吐者, 加竹茹、陈皮。

2. 气血瘀滞证

主症: 脘腹胀满, 恶心呕吐或呃逆, 上腹疼痛呈持续性, 痛处固定, 腹中痞块, 面目发黄而晦黯, 形体消瘦, 舌质青紫, 或有瘀斑, 苔薄, 脉弦细或涩。

治法: 行气化瘀, 软坚散结。

(1) 加减膈下逐瘀汤(《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 五灵脂(布包) 10g, 制香附 12g, 乌药 9g, 延胡索 30g, 红花 10g, 桃仁 10g, 生地 12g, 赤芍 15g,

枳壳 10g, 紫丹参 30g, 炮山甲 (先煎) 10g, 茵陈 20g, 八月札 10g, 浙贝母 15g, 菝葜 30g, 藤梨根 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 理气活血, 化瘀解毒。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 病程迁延, 而见纳差、乏力者, 去五灵脂, 加白术、茯苓、党参、陈皮; 瘀血内结较甚者, 加川楝子、三棱、莪术; 腹胀明显者, 加隔山消、沉香粉、大腹皮。

(2) 加减柴胡疏肝散 (《百病良方》)

〔组成与用法〕 莪术 15g, 甲珠 15g, 柴胡 15g, 水蛭 3g, 白芍 12g, 枳壳 12g, 半枝莲 30, 白术 24g, 黄药子 15g。水煎服。

〔功能主治〕 疏肝理气, 化瘀解毒。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 脘痞恶心者, 加藿香、法半夏、陈皮。

(3) 金铃子散合失笑散加味 (《中华肿瘤防治大全》)

〔组成与用法〕 延胡索 30g, 川楝子 10g, 五灵脂 20g, 蒲黄 20g, 八月札 20g。水煎服。

〔功能主治〕 行气活血, 软坚散结。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 上腹胀痛较甚者, 可加枳壳、厚朴; 疼痛较重者, 可加制乳香、制没药; 积块较硬者, 可加三棱、莪术; 大便不通者, 可加大黄、火麻仁; 食欲不振者, 可加鸡内金、炒山楂。

3. 肝郁蕴热证

主症: 脘胁胀满, 腹痛拒按, 身目发黄, 纳呆, 暖气恶心, 烦躁易怒, 发热, 小便黄赤, 大便干结, 舌质红而燥, 苔黄厚腻, 脉弦数或滑数。

治法: 疏肝解郁, 清热解毒。

(1) 加减柴胡疏肝散 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 柴胡 10g, 杭白芍 30g, 制香附 15g, 枳壳 10g, 川芎 6g, 白花蛇舌草 30g, 两面针 30g, 土茯苓 30g, 白

毛藤 30g, 垂盆草 30g, 虎杖 30g, 菝葜 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 疏肝理气, 清热解毒。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 兼瘀象者, 加延胡索、莪术; 黄疸明显, 疼痛牵引肩背, 或恶寒发热, 大便色淡灰白者, 加茵陈、金钱草、郁金、栀子。

(2) 加减茵陈蒿汤 (《百病良方》)

〔组成与用法〕 茵陈 30g, 栀子 12g, 大黄 6g, 柴胡 12g, 败酱草 30g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 虎杖 30g, 莪术 15g, 甲珠 15g。水煎服。

〔功能主治〕 疏肝利胆, 清热解毒。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 发热, 小便短赤者, 加生石膏、知母、车前草。

(3) 加减三仁汤合茵陈五苓散 (《临床中医肿瘤学》)

〔组成与用法〕 生薏苡仁 30g, 白蔻仁 10g, 杏仁 10g, 绵茵陈 30g, 山栀子 10g, 白术 15g, 猪苓 30g, 茯苓 30g, 泽泻 12g, 莪术 15g。水煎服。

〔功能主治〕 清热化湿。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 疼痛较甚者, 加延胡索、青皮; 腹胀较甚者, 加木香、大腹皮; 发热甚者, 加知母、黄柏; 黄疸较甚者, 加栀子、车前草。

4. 气血亏损证

主症: 腹胀隐痛, 扪及包块, 纳差、倦怠乏力, 全身消瘦, 面色萎黄, 舌质淡, 或有瘀点、瘀斑, 苔薄白, 脉沉细。

治法: 益气养血, 化瘀散结。

(1) 加减十全大补汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 生黄芪 15g, 潞党参 15g, 全当归 15g, 炒白术 12g, 大熟地 15g, 茯苓 15g, 猪苓 15g, 鸡血藤 30g, 炙鳖甲 (先煎) 9g, 枸杞子 12g, 浙贝母 15g, 炮山甲 (先煎)

10g, 蚤休 30g, 甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕补益气血, 化瘀软坚。主治胰腺癌。

〔加减应用〕兼脾虚湿困者, 加薏苡仁、砂仁、陈皮、法半夏; 积块日久、阴伤甚而见舌红无苔、脉细数者, 加生地、北沙参、石斛; 呕血, 便血者, 加槐花、地榆炭、大黄粉。

(2) 加减鳖甲煎丸合八珍散(《中西医临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕鳖甲 10g, 大黄 6g, 赤芍 10g, 丹皮 10g, 紫草 10g, 阿胶(烔兑) 10g, 桃仁 5g, 人参(蒸兑) 10g, 法半夏 10g, 当归 10g, 白术 10g, 茯苓 15g, 木香 10g, 龙葵 20g。水煎服。

〔功能主治〕益气养血, 化瘀解毒。主治胰腺癌。

〔加减应用〕心悸气短者, 加黄芪、酸枣仁、麦冬。

〔辨病用方〕

胰腺癌的辨病治疗, 当注重正虚、瘀毒、湿浊三个方面。根据肿瘤病期早晚、患者体质强弱, 选用或合用健脾和胃, 化瘀解毒, 利湿化浊等治疗方药。

1. 胰腺癌各期体质较实者用方

(1) 莪术大黄汤(潘敏求经验方)

〔组成与用法〕党参 10g, 白术 10g, 茯苓 15g, 木香 10g, 枳壳 10g, 鸡内金 10g, 炒山楂 10g, 夏枯草 15g, 莪术 10g, 大黄 5g, 蜈蚣 3 条。水煎服。

〔功能主治〕健脾理气, 化瘀解毒。主治胰腺癌。

〔加减应用〕腹痛甚者, 加延胡索、川楝子、白芍; 黄疸者, 加生大黄、山栀; 腹泻者, 加吴茱萸、黄连; 腹水者, 加大腹皮、冬瓜皮; 恶心呕吐者, 加姜半夏、姜竹茹。

(2) 冬凌白英汤(《段凤舞肿瘤积验方》)

〔组成与用法〕冬凌草 20g, 肿节风 20g, 白花蛇舌草 20g, 白英 20g, 茵陈 15g, 茯苓 12g, 白术 12g, 甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒利湿。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 积块坚硬者，加莪术、桃仁。

(3) 蟾皮菝葜汤（四川中医，1996，10）

〔组成与用法〕 柴胡 10g，枳壳 10g，郁金 10g，干蟾皮 10g，鸡内金 10g，八月札 30g，白术 30g，茯苓 30g，猪苓 30g，生薏苡仁 30g，菝葜 30g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g，生山楂 15g。水煎服。

〔功能主治〕 疏肝理气，健脾利湿，化瘀解毒。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 腹痛剧烈者，加徐长卿、延胡索、川楝子、白芍、甘草等理气散瘀，缓急止痛；伴发黄疸者，加生大黄、茵陈、山栀、田基黄等清热利湿退黄；伴发腹泻者，加诃子肉、罂粟壳、肉豆蔻、扁豆等健脾化湿，涩肠止泻；伴发腹水者，加大腹皮、半边莲、龙葵等解毒利尿；恶心呕吐者，加姜半夏、姜竹茹、代赭石、枇杷叶等和胃止呕。

〔临床报道〕 治疗 13 例，平均生存期 13 个月，1 例长达 34 个月。

(4) 树叶红藤汤（《抗癌良方》）

〔组成与用法〕 铁树叶 50g，红藤 50g，白花蛇舌草 150g，半枝莲 50～100g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒。主治胰腺癌。

(5) 三棱莪术汤（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕 三棱 15g，莪术 15g，半枝莲 15g，生薏苡仁 30g。水煎服。

〔功能主治〕 化瘀解毒。主治胰腺癌。

(6) 茵陈蒿汤合黄连解毒汤加减（《中华肿瘤防治大成》）

〔组成与用法〕 菝葜 30g，茵陈 30g，大黄 10g，黄连 10g，黄芩 10g，黄柏 10g，甘草 10g，黄药子 15g，栀子 15g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，利胆泄浊。主治胰腺癌。

(7) 柴胡龙胆汤（浙江中医杂志，1988，3）

〔组成与用法〕 柴胡 12g，龙胆草 6g，栀子 9g，黄芩 9g，黄连 3g，生地 15g，丹参 12g，大黄 9g，蒲公英 15g，白花蛇舌草 30g，土茯苓 30g，薏苡仁 30g，茯苓 12g，郁金 12g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，活血化瘀。主治胰腺癌。

〔临床报道〕 治疗中晚期 42 例，1、2、5 年生存率分别为 90.5%、50.0%、4.8%。

(8) 山甲楝子汤（《抗癌中药一千方》）

〔组成与用法〕 穿山甲 15g，川楝子 10g，香附 12g，郁金 10g，石见穿 30g，丹参 15g，青皮 12g，陈皮 12g，夏枯草 24g，红花 30g，龙葵 30g，广木香 10g，枸杞子 30g，八月札 12g。水煎服。

〔功能主治〕 行气活血，化瘀解毒。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 黄疸明显者，加茵陈、栀子、大黄；浮肿者，加茯苓、泽泻、猪苓、车前子、半枝莲。

(9) 青一方（《肿瘤辨病专方治疗》）

〔组成与用法〕 大青叶 30g，白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g，蒲公英 30g，桃仁 15g，红花 10g，丹参 30g，郁金 10g，白术 15g，茯苓 15g，薏苡仁 30g。1 日 1 剂，水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿解毒，行气活血化瘀。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 湿热者，加茵陈、虎杖、金钱草；血瘀者，加丹参、桃仁、红花等；脾虚者，加山药、白术、莪术、陈皮、鸡内金等。

(10) 茵陈天龙汤（《肿瘤辨病专方治疗》）

〔组成与用法〕 茵陈 30g，白花蛇舌草 30g，土茯苓 30g，茯苓 30g，蒲公英 30g，薏苡仁 30g，三棱 30g，莪术 9g，炒柴胡 6g，制大黄 6g，蜈蚣 3 条，丹参 24g，郁金 12g，焦山栀

12g, 焦山楂 12g, 神曲 12g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿, 活血消肿。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 同时吞服牛黄醒消丸(分2次吞服)3g。黄疸明显者, 栀子、茵陈剂量加大; 发热者, 加黄芩、大黄、知母; 中上腹疼痛明显, 加五灵脂、蒲黄、延胡索; 腹胀者, 加鸡内金、大腹皮、木香; 大便不成形, 加白扁豆、炒白术。

(11) 青黄金菊方(《中医成功治疗肿瘤100例》)

〔组成与用法〕 野菊花 30g, 紫草根 30g, 蒲公英 30g, 炒白芍 15g, 生薏苡仁 15g, 金银花 15g, 丹皮 12g, 生鸡内金 12g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒利湿。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 上腹部疼痛者, 加厚朴、木香、延胡索、三七(冲服); 黄疸者, 加茵陈、金钱草、半枝莲、郁金; 纳差者, 加生谷芽、生麦芽、神曲; 恶心者, 加姜半夏、陈皮。同时吞服青黄散(青黛 12g, 人工牛黄 12g, 紫金錠 6g, 野菊花 60g, 共研细末), 每天服3次, 1次服3g。

〔临床报道〕 治疗1例, 存活5年以上。

(12) 鳖甲灵芝散(四川中医, 1994, 12)

〔组成与用法〕 鳖甲 15g, 虻虫 15g, 浙贝母 15g, 玄参 15g, 莪术 12g, 三棱 12g, 鸡内金 12g, 皂角菌 12g, 灵芝菌 30g, 海藻 30g, 昆布 30g, 半枝莲 30g。共研细末, 早晚各服3g, 温开水送服。

〔功能主治〕 活血解毒散结。主治胰腺癌。

〔临床报道〕 治疗1例胰头癌, 胰头包块消失, 6年随访患者仍健在。

(13) 公英败酱汤(《中西医临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕 蒲公英 30g, 败酱草 30g, 田基黄 30g, 生黄芪 24g, 大腹皮 12g, 生薏苡仁 24g, 熟薏苡仁 24g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒利湿。主治胰腺癌。

2. 胰腺癌中晚期体质较虚者用方

(1) 牡蛎枯草汤（四川中医，1987，2）

〔组成与用法〕 生牡蛎（先煎）20g，夏枯草 20g，贝母 12g，玄参 15g，青皮 15g，党参 30g，炒白芥子 30g，何首乌 30g，赤芍 10g，当归 10g，胆星 10g，法半夏 10g，白芷 7g，乌药 7g，党参 10g，白术 12g，茯苓 15g，川楝子 9g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰软坚，健脾益气。主治胰腺癌。

〔加减应用〕 同时吞服小金丸。

(2) 健脾解毒汤（福州市第一人民医院方）

〔组成与用法〕 党参 9g，白芍 9g，茯苓 9g，木香 9g，丹参 9g，莪术 9g，麦冬 9g，白毛藤 30g，金银花 15g，当归 6g，白术 6g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，解毒活血。

(3) 加味六君子汤（中国中医研究院广安门医院方）

〔组成与用法〕 太子参 9g，焦白术 9g，茯苓 9g，草寇仁 9g，香附 9g，郁金 9g，延胡索 9g，五灵脂 9g，制半夏 9g，海螵蛸 9g，薏苡仁 30g，生黄芪 30g，当归 15g，瓜蒌 15g，炒柴胡 4.5g，木香 4.5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾理气，活血散结。主治胰腺癌。

(4) 茵陈四君汤（邱佳信经验方）

〔组成与用法〕 党参（太子参）30g，炒白术 30g，茯苓 30g，甘草 6g，猪苓 15g，车前子（布包）9g，丹皮 9g，金银花 15g，炙鳖甲 24g，廑虫 9g，八月札 12g，红藤 12g，瓜蒌皮 15g，茵陈 30g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾利水，清热退黄。主治胰腺癌。

〔临床报道〕 治疗胰腺癌伴黄疸，腹水者消失 1 例。（上海中医药杂志，1984，1）

(5) 铁树牡蛎汤 (上海中医学院附属曙光医院方)

[组成与用法] 煅牡蛎 (先煎) 30g, 夏枯草 30g, 白花蛇舌草 30g, 铁树叶 30g, 海藻 12g, 海带 12g, 漏芦 12g, 当归 12g, 赤芍 12g, 白芍 12g, 白术 12g, 丹参 15g, 党参 15g, 茯苓 15g, 川楝子 9g, 郁金 9g。水煎服。

[功能主治] 健脾和胃, 理气活血, 软坚消癥。主治胰腺癌。

[加减应用] 血瘀者, 加桃仁、穿山甲、王不留行; 癥积者, 加制鳖甲、望江南; 脾胃虚弱者, 加陈皮、木香、太子参、黄芪、薏苡仁等; 湿热者, 加茵陈、车前草、金钱草、虎杖。

[临床报道] 治疗晚期 17 例, 生存 2 年、3 年以上 4 例、2 例。

(6) 加减一贯煎合清凉甘露饮 (《中西医结合治疗肿瘤病》)

[组成与用法] 北沙参 30g, 生地黄 15g, 知母 15g, 地骨皮 20g, 麦冬 15g, 天花粉 30g, 白花蛇舌草 30g, 银柴胡 12g, 青蒿 20g, 甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 养阴生津, 清热散结。主治胰腺癌。

3. 胰腺癌肝转移方

加减大柴胡汤 (山西中医, 1985, 2)

[组成与用法] 柴胡 10g, 黄芩 10g, 清半夏 10g, 党参 10g, 丹参 10g, 广木香 10g, 金钱草 15g, 龟甲 (先煎) 10g, 枳壳 10g, 山慈菇 20g, 山甲珠 10g, 茵陈 15g, 栀子 10g, 炒山楂 10g, 炒麦芽 10g, 神曲 10g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 清热利湿, 活血解毒。主治胰腺癌肝转移。

4. 胰腺癌骨转移方

藤黄二乌散 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 藤黄 180g, 川乌 120g, 生草乌 120g, 白及 120g, 山慈菇 120g, 木芙蓉 120g, 归尾 120g, 制乳香

120g, 制没药 120g, 全蝎 150g, 冰片 20g。共研细末, 取适量, 用温开水调成糊状, 外敷。

【功能主治】 活血解毒止痛。主治胰腺癌骨转移。

【对症用方】

胰腺癌的对症用方, 主要根据患者主要症状 (如疼痛、黄疸、呕吐等), 是否手术或放疗、化疗等治疗。术后治疗以益气养血, 健脾理气为主, 放疗患者以健脾理气, 养阴清热为主, 化疗患者以健脾益气, 利湿和中为主。

1. 胰腺癌手术后专方

(1) 加減八珍汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】 当归 12g, 川芎 10g, 熟地 12g, 白芍 10g, 人参 (蒸兑) 10g, 白术 10g, 茯苓 12g, 陈皮 10g, 生姜 3 片, 大枣 2 枚, 柴胡 10g, 广木香 10g, 肿节风 20g, 半枝莲 15g, 炙甘草 5g。水煎服。

【功能主治】 益气养血, 健脾理气。用于胰腺癌手术后气血不足者。

【加减应用】 发热、寒战、小便黄赤、舌红苔黄腻、脉弦数或滑数者, 改熟地为生地, 加茵陈、金钱草、生石膏、郁金; 血瘀明显者, 去熟地, 加桃仁、丹参; 术后黄疸不退者, 加茵陈、田基黄; 腹胀疼痛者, 加隔山消、延胡索、郁金。

(2) 加味六君汤 (《中西医结合治疗肿瘤病》)

【组成与用法】 党参 30g, 茯苓 15g, 白术 12g, 陈皮 8g, 法半夏 12g, 山药 30g, 神曲 12g, 鸡内金 10g, 谷芽 30g, 麦芽 30g, 甘草 10g。水煎服。

【功能主治】 健脾和胃。用于胰腺癌手术后腹胀纳差者。

【加减应用】 湿热重者, 选加藿香、薏苡仁; 黄疸明显者, 选加绵茵陈、田基黄、金钱草; 瘀血甚者, 选加三棱、红花、三七粉 (冲服) 等; 呕血, 便血者, 选加白及、血余炭、槐花、地榆炭等。

(3) 柴胡疏肝散加减 (《中西医结合治疗肿瘤病》)

[组成与用法] 柴胡 12g, 白芍 15g, 枳实 12g, 川芎 10g, 香附 10g, 厚朴 10g, 佛手 10g, 莱菔子 15g, 虎杖 30g, 甘草 10g。水煎服。

[功能主治] 理气通便。用于胰腺癌手术后肠胀气者。

[加减应用] 黄疸明显者, 选加绵茵陈、田基黄、金钱草; 瘀血甚者, 选加三棱、红花、三七粉 (冲服) 等; 呕血, 便血者, 选加白及、血余炭、槐花、地榆炭等。

2. 胰腺癌放疗后专方

(1) 癌复康方加减 (潘敏求经验方)

[组成与用法] 白参 (蒸兑) 10g, 茯苓 10g, 白术 10g, 黄芪 10g, 陈皮 10g, 女贞子 10g, 旱莲草 10g, 枸杞 10g, 菟丝子 10g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾, 扶正固本。用于胰腺癌放疗后脾虚气弱者。

[加减应用] 恶心欲吐明显者, 加法半夏、姜竹茹、砂仁; 血象下降者, 加仙灵脾、锁阳、巴戟天; 心悸气短者, 加远志、炒酸枣仁、石菖蒲; 谷丙转氨酶高者, 加茵陈、蒲公英、虎杖。

(2) 一贯煎合益胃汤加减 (《中西医结合治疗肿瘤病》)

[组成与用法] 生地黄 15g, 当归 6g, 沙参 30g, 麦冬 15g, 玉竹 15g, 黄精 30g, 半枝莲 30g, 石膏 30g, 甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 益胃生津。用于胰腺癌放疗后口干发热者。

[加减应用] 脾阳不振者, 选加制附子、干姜等; 脾虚湿困者, 选加春砂仁、佩兰、陈皮、薏苡仁等; 腹胀明显者, 选加大腹皮、莱菔子等; 黄疸明显者, 选加绵茵陈、田基黄、金钱草等。

3. 胰腺癌化疗后专方

(1) 加減參苓白朮散 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 白参(蒸兑) 10g, 薏苡仁 20g, 莲子肉 10g, 砂仁 10g, 扁豆 10g, 茯苓 15g, 白朮 10g, 怀山药 15g, 黄芪 15g, 陈皮 10g, 法半夏 10g, 仙灵脾 10g, 广木香 10g, 石见穿 20g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气, 利湿和中。用于胰腺癌化疗后脾虚湿滞, 脘痞纳呆。

〔加減应用〕 血象下降明显者, 加枸杞子、女贞子、菟丝子、巴戟天; 恶心呕吐者, 加半夏、陈皮、竹茹、代赭石等; 食欲不振者, 加山楂、神曲、炒谷芽。

(2) 陈夏六君汤加味 (《中西医结合治疗肿瘤病》)

〔组成与用法〕 党参 30g, 茯苓 15g, 白朮 12g, 陈皮 8g, 法半夏 12g, 怀山药 30g, 神曲 12g, 鸡内金 10g, 谷芽 30g, 麦芽 30g, 甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾和胃。用于胰腺癌化疗后脾胃虚弱, 食欲不振。

〔加減应用〕 湿热重者, 选加藿香、薏苡仁等; 黄疸明显者, 选加绵茵陈、田基黄、金钱草等; 瘀血甚者, 加三棱、红花、三七粉(冲服)等; 呕血, 便血者, 选加白及、血余炭、槐花、地榆炭等。

4. 胰腺癌疼痛专方

(1) 加味四君汤 (李佩文经验方)

〔组成与用法〕 党参 15g, 茯苓 15g, 白朮 15g, 陈皮 10g, 香橼 10g, 佛手 10g, 绿萼梅 5g, 木香 10g, 乌药 10g, 川楝子 10g, 刘寄奴 8g, 萆澄茄 3g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾和中, 理气止痛。主治胰腺癌疼痛。

(2) 牛黄青黛散 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 人工牛黄 15g, 青黛 15g, 鸡内金 30g, 紫金锭 10g, 野菊花 60g, 草河车 30g, 三七 30g。上药共研细

末，1次2g，1日2次。

〔功能主治〕 清热解毒，化瘀止痛。主治胰腺癌疼痛。

(3) 冰片藤黄散（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 冰片 3g，藤黄 3g，麝香 0.03g，生南星 20g。用醋调成糊，外敷痛处，2天换药1次。

〔功能主治〕 通络止痛。主治胰腺癌疼痛。

(4) 复方马钱子散（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕 马钱子 1g，活蜗牛 1条，蜈蚣 1g，乳香 0.5g，全蝎 0.3g，蜂房 0.5g，上药为末，醋调成糊，敷于疼痛处，共1~2次。

〔功能主治〕 解毒化瘀止痛。主治胰腺癌疼痛。

(5) 三王止痛膏（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 大黄 50g，马钱子 15g，全蝎 30g，干蟾皮 30g，蚤休 60g，山慈菇 60g，姜黄 50g，麝香 1g，冰片 10g，红花 40g，桃仁 50g，当归 50g，血竭 30g，莪术 50g，蜈蚣 30g，桂枝 60g，制乳香、制没药各 30g，细辛 15g，各为细末和匀。取酌量药粉调入凡士林内，摊于纱布上，贴敷肿块处，隔日一换。

〔功能主治〕 化瘀软坚，解毒止痛。主治胰腺癌疼痛。

〔临床报道〕 治疗各种疼痛，止痛总有效率为 93.3%，止痛平均持续时间 16.6 小时。

【专病成药】

1. 肿节风注射液（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 肿节风水提取液。

〔功能主治〕 清热解毒，消肿散结。适应于胰腺癌。

〔用法用量〕 肌肉注射：4ml，1日2次；静脉滴注：10~16ml，1日1次。

2. 西黄丸（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 麝香、牛黄、制乳香、制没药。

[功能主治] 解毒散结，消肿止痛。主治胰腺癌肝转移。

(浙江中西医结合杂志，2001，4)

[用法用量] 1次3g，每天2次，温开水送服。

3. 慈丹胶囊 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

[处方组成] 莪术、山慈菇、鸦胆子、马钱子粉、蜂房等。

[功能主治] 化瘀解毒，消肿散结，益气养血。主治胰腺癌。(中国民间疗法，2004，2)

[用法用量] 口服，1次5粒，1日4次，1个月为1个疗程，或遵医嘱。

4. 金龙胶囊 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

[处方组成] 鲜守宫、鲜金钱白花蛇等。

[功能主治] 扶正荡邪，解毒消肿，理气止痛，破瘀散结。主治胰腺癌。(中国肿瘤临床，2004，19)

[用法用量] 1次2~4粒、口服，1日3次，1~2月为1个疗程。

5. 榄香烯乳注射液 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

[处方组成] 榄香烯，为中药莪术中提取到的抗癌活性物质。

[功能主治] 直接抑制肿瘤细胞的生长；能增强T淋巴细胞亚群的功能，有免疫保护作用；与放疗、化疗有协同作用；能为机体提供高能量营养；缓解癌痛；改善微循环；能通过血-脑脊液屏障。主治胰腺癌及癌性腹腔积液。

[用法用量] 静脉注射：1日1次，400~600mg/次，15天为1个疗程。腹腔注射1次500~800mg，用药1~3次为1个疗程。

6. 鸦胆子油乳注射液 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

[处方组成] 鸦胆子。

[功能主治] 清热燥湿，解毒消癥。有明显抗肿瘤作用，增强免疫功能，促进骨髓造血。用于胰腺癌。

〔用法用量〕 静滴，1次 10~30ml，加生理盐水 250ml 稀释后立即使用，1日 1次。

7. 亚砷酸注射液（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 三氧化二砷（ As_2O_3 ）。

〔功能主治〕 解毒去腐。适应于胰腺癌。

〔用法用量〕 成人 1次 5~10ml，用 5% 葡萄糖注射液或生理盐水 500ml 稀释后静脉滴注，1日 1次，4 周为 1 个疗程。

【专病单方】

1. 菝葜 用法：每取 60~120g，研成粉末，1次 3g，1日 3次。功用：清热解毒。主治：胰腺癌属邪毒内结、气血亏虚者。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 薏苡仁 用法：每取 120~150g，研成粉末，1次 3g，1日 3次。功用：利湿解毒。主治：胰腺癌属脾虚湿盛，或痰郁化热者。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 全蝎 用法：每取 100g，研成细末，装入空心胶囊，每粒 0.5g，1次 4g，1日 2次。功用：解毒抗癌。主治：胰腺癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 肿节风 用法：每取 15g，水煎服，1日 1剂。功用：清热解毒。主治：胰腺癌。（《中西医临床肿瘤学》）

5. 苦参 用法：每取 90g，配龙胆草 30g、炒栀子 15g、人参 20g，共研细末，用猪胆汁加入熟蜜为丸，如梧桐子大，1次 50丸，1日 3次，以大麦汤送服。功用：清热利湿。主治：胰腺癌属肝胆郁热者。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 过路黄 用法：每取 30g，配生大黄 9g、柴胡 9g、生半夏 30g、枸橘叶 30g，水煎服。功用：清利肝胆。主治：胰头癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

泌尿及男性生殖系肿瘤

肾 癌

肿瘤特色方药

上篇 专病方剂篇

肾癌是指发生于肾实质细胞的恶性肿瘤，包括肾细胞癌和肾腺癌。肾癌的发生与芳香族碳氢化合物、芳香胺、黄曲霉素、激素、放射线、病毒以及吸烟、酗酒、职业接触、某些遗传性疾病（如结节性硬化症、多发性神经纤维瘤）等因素有关。

本病相当于中医病名国家标准的肾癌，也属于血尿、癥积、腰痛等范畴。中医认为本病的病因病机为肾气不足，水湿不化，湿毒内生；或外受湿热毒邪，入里伤肾，内外合邪蓄结而成。

【辨证用方】

肾癌的辨证，首当辨明虚实，实证当辨湿热、毒蕴、气滞、血瘀之轻重，虚证当辨气、血、阴、阳之不同。血尿鲜红，腰痛剧烈，发热，苔腻，脉滑为实证；血尿淡红，腰痛绵绵，乏力神疲，面白无华，脉细为虚证。实证宜清热解毒、活血利湿；虚证宜健脾滋肾、益气养血。

1. 湿热瘀毒证

主症：血尿不止，腰痛较剧，腹部或腰部肿物日见增大，伴发热，口渴，纳少，恶心呕吐，舌质黯红，或有瘀斑瘀点，苔黄腻，脉滑数或弦滑。

治法：清热利湿，活血散结。

加减八正汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕车前子（布包）15g，瞿麦10g，大黄炭9g，篇蓄10g，滑石（布包）10g，栀子10g，女贞子10g，旱莲草20g，生牡蛎（先煎）30g，白花蛇舌草30g，夏枯草15g，石韦10g，甘草5g。水煎服。

〔功能主治〕清热泻火，利水通淋。主治肾癌。

〔加减应用〕纳呆者，加陈皮、砂仁、炒山楂、炒谷芽；恶心呕吐者，加法半夏、竹茹；尿血不止者，加生侧柏叶、小蓟、仙鹤草。

2. 肾亏湿毒证

主症：腰酸痛，四肢乏力，神疲，偶有低热，小便短赤或血尿，舌淡红，苔薄黄而腻，脉细滑或沉滑。

治法：益气滋肾，利湿解毒。

（1）加减左归汤（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕熟地12g，枸杞子10g，龟甲（先煎）10g，怀山药10g，女贞子15g，补骨脂10g，太子参20g，海金沙15g，瞿麦20g，土茯苓20g，半枝莲30g。水煎服。

〔功能主治〕滋阴补肾，利湿解毒。主治肾癌。

〔加减应用〕虚火甚者，可酌加大补阴丸送服；腰痛日久不愈，无明显阴阳偏虚者，可服用青娥丸以补肾。

（2）桑寄生山茱萸汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕生地30g，怀山药30g，山茱萸15g，茯苓30g，桑寄生30g，鳖甲（先煎）30g，三七粉（冲兑）6g，阿胶（烊化）12g，小蓟12g，半枝莲30g，白花蛇舌草30g。水煎服。

〔功能主治〕滋补肾阴，化瘀散结。主治肾癌。

〔加减应用〕头晕耳鸣者，加何首乌、菊花；腹部肿块胀痛者，加丹参、红花、大腹皮。

（3）加味六味地黄汤《临床中医肿瘤学》

〔组成与用法〕生地30g，怀山药30g，山茱萸10g，丹皮

10g, 泽泻 10g, 茯苓 20g, 鳖甲 (先煎) 30g, 冬虫夏草 2g, 三七粉 (冲服) 6g, 阿胶 (烔化) 10g, 半枝莲 20g, 白花蛇舌草 20g, 土贝母 15g, 甘草 3g。水煎服。

[功能主治] 滋阴补肾, 凉血解毒。主治肾癌。

[加减应用] 血尿频频者, 加大蓟、小蓟、仙鹤草; 疼痛甚者, 加延胡索、白芍。

(4) 熟地白龙汤 (《段凤舞肿瘤积验方》)

[组成与用法] 生地 6g, 熟地 6g, 山药 12g, 山茱萸 12g, 丹皮 10g, 茯苓 10g, 泽泻 10g, 骨碎补 10g, 女贞子 10g, 怀牛膝 10g, 篇蓄 10g, 阿胶 (烔化) 10g, 桂枝 7g, 猪苓 15g, 龙葵 15g, 白英 15g, 黄芪 30g, 枸杞子 30g。水煎服。

[功能主治] 滋阴补肾, 利水解毒。主治肾癌。

[加减应用] 低烧不退者, 加青蒿、鳖甲、五味子。

(5) 二地金沙汤 (《中医肿瘤学》)

[组成与用法] 生地 12g, 熟地 12g, 女贞子 15g, 枸杞子 10g, 补骨脂 10g, 生黄芪 30g, 白术 10g, 茯苓 10g, 太子参 20g, 海金沙 15g, 瞿麦 20g, 土茯苓 20g, 半枝莲 30g。水煎服。

[功能主治] 滋补肝肾, 清热利水。主治肾癌。

[加减应用] 小便不畅者, 加甘草梢、竹叶。

3. 脾肾阳虚证

主症: 腰部或腹部包块日渐增大, 腰痛, 腹胀, 血尿加重, 面色苍白无华, 消瘦, 纳少, 乏力口淡, 恶心呕吐, 舌质淡, 苔白, 脉沉细。

治法: 健脾益肾, 软坚散结。

(1) 肉桂附片汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 肉桂 6g, 制附片 (先煎) 10g, 熟地 15g, 山茱萸 15g, 茯苓 10g, 淫羊藿 30g, 三七粉 (兑服) 6g, 人参 (兑服) 10g, 丹参 30g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g。水

煎服。

〔功能主治〕 温肾壮阳，化瘀解毒。主治肾癌。

〔加减应用〕 乏力明显者，加黄芪；疼痛剧烈者，加郁金、乳香、延胡索。

(2) 加减右归饮（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 党参 20g，白术 20g，菟丝子 20g，熟地 20g，怀山药 20g，山茱萸 10g，枸杞 15g，杜仲 10g，土贝母 15g，制附子（先煎）6g，僵蚕 5g，鳖甲（先煎）30g，甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾，软坚散结。主治肾癌。

〔加减应用〕 乏力、嗜睡者，加黄芪；恶心呕吐者，加柿蒂、砂仁。

(3) 加味阳和汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 生黄芪 30g，炮附子（先煎）10g，薏苡仁 30g，败酱草 20g，白芍 20g，生甘草 20g，熟地 60g，鹿角霜 30g，白芥子 6g，炙麻黄 3g，肉桂 3g，炮姜 6g。水煎服。

〔功能主治〕 温补肾阳，清热利湿。主治肾癌。

〔加减应用〕 乏力膝软者，加杜仲、怀牛膝；小便夹有黯红色血块者，加三七粉（冲服）、大黄炭、蒲黄炭。

4. 气血双亏证

主症：乏力气短，心悸心烦，面色苍白无华，形体消瘦，肿块日见增大，疼痛，口干，低热，舌质有瘀点，苔白或苔黄白，脉沉细数或虚大而数。

治法：补气养血，化瘀解毒。

八珍汤加减（《中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 太子参 30g，黄芪 30g，茯苓 10g，猪苓 20g，生地 20g，当归 10g，赤芍 10g，白芍 10g，女贞子 20g，地骨皮 15g，干蟾皮 5g，僵蚕 10g，半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气补血，解毒散结。主治肾癌。

〔加减应用〕 兼肾阴虚者，加熟地、山茱萸、枸杞子、龟甲（先煎）；兼肾阳虚者，加菟丝子、鹿角胶（烊化）。

5. 气血瘀阻证

主症：腰痛加剧，多呈刺痛或钝痛，痛处固定，腰部或腹部肿块日渐增大，血尿或挟血块，面色晦黯，舌质紫黯，或见瘀斑瘀点，苔薄白，脉弦或涩或结代。

治法：理气活血，化瘀软坚。

（1）桃红四物汤加减（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕 桃仁 10g，红花 8g，当归 10g，生地 15g，赤芍 15g，丹参 30g，延胡索 15g，枳壳 12g，郁金 12g，川楝 12g，山慈菇 30g，莪术 10g，甲珠 12g，廬虫 6g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀，软坚散结。主治肾癌。

〔加减应用〕 疼痛剧烈者，加乳香、没药；出血量多者，加炒蒲黄（布包）、阿胶（烊化兑服）、三七粉（冲兑）。

（2）二蓟饮（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕 小蓟 60g，大蓟 60g，瞿麦 30g，石见穿 60g，白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g，赤芍 20g，炮山甲（先煎）15g，续断 30g，牛膝 30g，猪苓 15g。水煎服。

〔功能主治〕 清热凉血，化瘀散结。主治肾癌。

〔加减应用〕 疼痛剧烈者，加延胡索、郁金。

【辨病用方】

肾癌的辨病治疗，当辨明病期早晚，体质的强弱。肾癌早期，多属标实，以湿热蕴毒，气血瘀阻为主，治以祛邪为主。本病晚期，多属本虚标实，以气血双亏，肾虚毒蕴为主，当扶正祛邪同施，标本兼治。

1. 肾癌各期体质较实者用方

（1）龙蛇羊泉汤（《中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 白英 30g，龙葵 30g，蛇莓 30g，半枝莲 30g，瞿麦 20g，黄柏 15g，土茯苓 30g，延胡索 10g，大蓟

30g, 小蓟 30g, 仙鹤草 30g, 竹茹 10g, 竹叶 10g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿, 凉血散结。主治肾癌。

〔加减应用〕 纳差者, 加白术、麦芽、神曲; 尿血严重者, 加白茅根、生侧柏叶、茜草等。

(2) 八月札汤 (《中医成功治疗肿瘤 100 例》)

〔组成与用法〕 猪苓 30g, 薏苡仁 60g, 汉防己 12g, 八月札 20g, 石上柏 15g, 夏枯草 30g, 石见穿 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿解毒。主治肾癌。

〔加减应用〕 纳呆者, 加陈皮、砂仁、炒山楂; 恶心呕吐者, 加法半夏、竹茹; 尿血不止者, 加小蓟、仙鹤草。

(3) 猪苓白术汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 白术 30g, 黄精 30g, 牛膝 30g, 小蓟 30g, 菝葜 30g, 石见穿 30g, 全蝎 8g, 炮甲珠 15g。水煎服。

〔功能主治〕 化瘀祛湿。主治肾癌。

(4) 龟脂白石汤 (《实用抗癌药物手册》)

〔组成与用法〕 龟甲 15g, 补骨脂 9g, 白花蛇舌草 30g, 菝葜 30g, 石打穿 30g, 瞿麦 30g, 薜荔果 30g。水煎服。

〔功能主治〕 滋肾散结, 利湿解毒。主治肾癌。

(5) 猪苓防己汤 (《百病良方》)

〔组成与用法〕 猪苓 30g, 薏苡仁 60g, 汉防己 12g, 八月札 20g, 石上柏 15g, 夏枯草 30g, 石见穿 30g。水煎服。

〔功能主治〕 行水利湿, 分利湿热。主治肾癌。

〔加减应用〕 尿血明显者, 加小蓟、大蓟、仙鹤草。

(6) 小蓟白花汤 (《段凤舞肿瘤积验方》)

〔组成与用法〕 小蓟 30g, 瞿麦 30g, 菝葜 30g, 石见穿 30g, 白花蛇舌草 30g, 薜荔果 30g, 赤芍 15g, 炮山甲 (先煎) 15g, 补骨脂 10g, 续断 30g, 牛膝 30g。水煎服。

〔功能主治〕 补肾利水, 软坚散结。主治肾癌。

〔加减应用〕 腰膝酸软者, 加女贞子、旱莲草。

(7) 黄药葡萄汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 黄药子 9g, 半边莲 15g, 白茅根 15g, 薏苡仁 15g, 野葡萄根 30g。水煎服。

[功能主治] 解毒利湿。主治肾癌。

[加减应用] 疼痛者, 加海金沙、金钱草; 血尿者, 加血见愁、大蓟炭、生地炭。

(8) 二地金沙汤 (《中医肿瘤学》)

[组成与用法] 生地 12g, 熟地 12g, 女贞子 15g, 枸杞子 10g, 补骨脂 10g, 生黄芪 30g, 白术 10g, 云茯苓 10g, 太子参 20g, 海金沙 15g, 瞿麦 20g, 土茯苓 20g, 半枝莲 30g。水煎服。

[功能主治] 滋补肝肾, 清热利水。主治肾癌。

[加减应用] 小便不畅者, 加甘草梢、竹叶。

(9) 甲珠土鳖汤 (《百病良方》)

[组成与用法] 大黄 12g, 水蛭 3g, 莪术 15g, 虻虫 6g, 生地 30g, 红参 (嚼服) 10g, 黄芪 30g, 甲珠 15g, 赤芍 12g。水煎服。

[功能主治] 益气活血, 祛瘀生新。主治肾癌。

[加减应用] 疼痛剧烈者, 加延胡索、郁金、乳香、没药; 出血多者, 加炒蒲黄、阿胶 (烔化)、三七粉 (冲服)。

2. 肾癌中晚期体质较虚者用方

(1) 肾癌方 (实用医学杂志, 1995, 12)

[组成与用法] 黄芪 30g, 白术 15g, 鹿角霜 20g, 鳖甲 15g, 菟丝子 15g, 女贞子 15g, 莪术 12g, 三七粉 (冲兑) 3g, 赤芍 15g, 全蝎 8g, 大黄 6g, 生甘草 3g。水煎服。

[功能主治] 健脾补肾, 温阳化瘀。主治晚期肾癌。

[加减应用] 腰疼剧烈者, 加延胡索、乳香、虻虫; 血尿者, 去全蝎, 加仙鹤草、山楂炭; 肿块巨大硬实者, 加三棱、穿山甲; 腹水者, 去鳖甲, 加大腹皮、半边莲; 寒湿重者, 去

女贞子，加台乌药、益智仁。

〔临床报道〕治疗5例晚期肾癌患者，延长了生存期，改善了生活质量。

(2) 牡蛎山甲汤（四川中医，1989，5）

〔组成与用法〕牡蛎（先煎）15g，穿山甲（先煎）12g，全蝎6g，青皮6g，木香4.5g，五灵脂9g，桃仁9g，杏仁9g。水煎服。

〔功能主治〕活血化瘀，软坚散结。主治肾癌。

〔加减应用〕头晕耳鸣者，加何首乌、白蒺藜、菊花；腹部肿块胀痛者，加丹参、红花、川楝子、大腹皮。鳖甲煎丸另吞服。

3. 肾癌术后复发并腹水方

四君猪苓汤（黑龙江中医药，1993，5）

〔组成与用法〕党参12g，白术15g，猪苓20g，茯苓20g，大腹皮15g，八月札24g，土茯苓30g，白英30g，龙葵30g，猫人参60g，乌药9g，川椒目9g，陈葫芦30g，葫芦巴15g，泽泻30g，仙灵脾15g，车前子（包煎）30g，鸡内金12g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益气，解毒利水。主治肾癌术后复发并腹水。

〔加减应用〕口干，大便秘结者，加赤芍、半枝莲、瓜蒌仁；腰酸者，加桑寄生、菟丝子、怀山药、木馒头。

4. 肾癌侵犯结肠方

(1) 加味血府逐瘀汤（《实用中西医肿瘤治疗大全》）

〔组成与用法〕当归15g，赤芍15g，五灵脂15g，蒲黄15g，莪术15g，败酱草15g，延胡索15g，川芎9g，红花9g，柴胡9g，怀牛膝9g，三棱9g，郁金9g，香附9g，桔梗6g，甘草6g，生地24g，桃仁12g，大枣3枚。水煎服。

〔功能主治〕活血化瘀，理气解毒。主治肾癌侵犯结肠，

瘀毒内结者。

(2) 加减薏苡附子败酱汤 (《实用中西医肿瘤治疗大全》)

【组成与用法】 川附片 (先煎) 60g, 桂枝 9g, 杭芍药 9g, 砂仁 9g, 泽泻 9g, 炙甘草 9g, 生牡蛎 (先煎) 15g, 制鳖甲 (先煎) 15g, 败酱草 15g, 薏苡仁 15g, 炮姜 15g, 茯苓 15g。水煎服。

【功能主治】 软坚散结, 温肾解毒。主治肾癌侵犯结肠, 寒湿内积者。

【对症用方】

肾癌的对症用方, 主要根据患者主要症状 (如尿血、疼痛等) 进行选择, 并区分是否手术或放疗、化疗等进行相应选方用药。术后治疗以补益气血、养胃为主, 放疗病人以健脾益肾、养阴清热为主, 化疗病人以健脾益肾和胃为主。

1. 肾癌手术后专方

(1) 芪归六味饮 (《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】 熟地 24g, 怀山药 12g, 山茱萸 12g, 泽泻 9g, 牡丹皮 9g, 黄芪 20g, 当归 10g, 半枝莲 20g, 白花蛇舌草 20g。水煎服。

【功能主治】 益气补血, 清热解毒。用于肾癌术后肾虚腰痛。

【加减应用】 伴血尿者, 加血余炭、红鸡冠花炭、灯心炭、白茅根、瞿麦、阿胶 (烔化)、三七粉 (冲服); 下腹部不适者, 加川楝子、乌药、滑石、琥珀末 (冲服)、木香; 小便不畅者, 加甘草梢、竹叶、升麻。

(2) 加味阳和汤 (天津中医, 1988, 4)

【组成与用法】 生黄芪 30g, 炮附子 10g, 薏苡仁 30g, 白芍 20g, 生甘草 20g, 熟地 6g, 鹿角霜 30g, 白芥子 6g, 炙麻黄 3g, 肉桂 3g, 炮姜 6g。水煎服。

【功能主治】 温阳益气。治肾癌术后伤口久不愈合。

〔加减应用〕 疼痛剧烈者，加延胡索、五灵脂；尿血日久者，加白茅根、小蓟炭；腰酸肢冷者，加补骨脂、生杜仲、海螵蛸。

(3) 参芪菟丝汤（《实用中西医肿瘤治疗大全》）

〔组成与用法〕 生黄芪 30g，桑寄生 30g，党参 15g，怀山药 15g，菟丝子 15g，茺莢肉 15g，仙灵脾 15g，熟地 12g，泽泻 12g，白术 12g，枸杞子 30g，丹皮 15g。水煎服。

〔功能主治〕 补肾益气。主治肾癌术后蛋白尿。

〔临床报道〕 小便混浊者，加萆薢。

(4) 熟地芪苓汤（《中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 生、熟地各 12g，女贞子 15g，枸杞子 10g，补骨脂 10g，白术 10g，茯苓 10g，黄芪 30g，太子参 20g，海金沙 15g，瞿麦 20g，土茯苓 20g，半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕 滋肾益气，利湿解毒。主治肾癌术后，余毒未尽者。

〔加减应用〕 尿血多者，加阿胶、仙鹤草。

2. 肾癌放疗后专方

补肾生津汤（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕 黄精 10g，枸杞子 10g，鸡血藤 30g，北沙参 30g，麦冬 15g，天冬 15g，天花粉 15g，女贞子 15g，黄芪 15g，炒麦芽 10g，鸡内金 10g，五味子 6g，石韦 10g，夏枯草 15g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，补肾生津。主治肾癌放疗后，

〔加减应用〕 血尿明显者，加大蓟、小蓟、仙鹤草；湿热较盛者，加篇蓄、瞿麦。

3. 肾癌化疗后专方

(1) 癌复康方加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 白参（蒸兑）10g，茯苓 10g，白术 10g，

黄芪 30g, 陈皮 10g, 女贞子 10g, 旱莲草 20g, 枸杞 10g, 菟丝子 10g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾, 扶正固本。用于肿瘤化疗后。

[加减应用] 恶心欲吐明显者, 加法半夏、姜竹茹、砂仁; 血象下降者, 加仙灵脾、锁阳、巴戟天; 心悸气短者, 加远志、炒酸枣仁、石菖蒲; 谷丙转氨酶高者, 加茵陈、蒲公英、虎杖; 尿血者, 加仙鹤草、蒲黄炭。

(2) 参芪枸杞饮 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 黄芪 30g, 太子参 30g, 炒麦芽 30g, 炒谷芽 30g, 神曲 30g, 鸡血藤 30g, 女贞子 15g, 枸杞子 10g, 芦根 10g, 菟丝子 10g, 鸡内金 10g, 法半夏 10g, 白术 10g, 竹茹 10g, 陈皮 10g, 茯苓 15g, 半边莲 20g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

[功能主治] 健脾补肾, 益气养血。

[加减应用] 血尿明显者, 加小蓟、白茅根、茜草根、仙鹤草; 小便不利兼有灼热者, 加猪茯苓、瞿麦、海金沙; 口干明显者, 加麦冬、石斛。

4. 肾癌尿血方

(1) 加味小蓟饮子汤 (《癌的扶正培本治疗》)

[组成与用法] 生地 12g, 小蓟 15g, 滑石 15g, 蒲黄 10g, 藕节 30g, 竹叶 10g, 栀子 10g, 当归 9g, 甘草 3g, 猪苓 10g, 金银花 9g, 太子参 15g, 白术 12g。

[功能主治] 清热利湿, 凉血止血。主治肾癌尿血。

[加减应用] 下腹部不适者, 加川楝子、乌药。尿血多者, 加炒蒲黄、阿胶、三七粉 (冲服)。

(2) 伏龙肝饮 (《普济方》)

[组成与用法] 甘草 50g, 川芎 50g, 伏龙肝 50g, 黄芩 50g, 赤芍 50g。共为粗末, 用水 1L, 取药 25g, 煎至七分, 去渣, 温服。

〔功能主治〕 温阳摄血。主治肾癌尿血。

〔加减应用〕 乏力，头晕者，加黄芪、枸杞子。

5. 肾癌腰痛方

(1) 三王止痛膏（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 大黄 50g，马钱子 15g，全蝎 30g，干蟾皮 30g，蚤休 60g，山慈菇 60g，姜黄 50g，麝香 1g，冰片 10g，红花 40g，桃仁 50g，当归 50g，血竭 30g，莪术 50g，蜈蚣 30g，桂枝 60g，制乳香、制没药各 30g，细辛 15g，各为细末和匀。取酌量药粉调入凡士林内，摊于纱布上，贴敷肿块处，隔日一换。

〔功能主治〕 化瘀软坚，解毒止痛。主治肾癌腰痛。

〔临床报道〕 用该膏贴敷治疗各种癌性疼痛患者，止痛总有效率为 93.3%，止痛平均持续时间 16.6 小时。

(2) 南星冰黄散（江苏中医杂志，1986，10）

〔组成与用法〕 冰片 3g，藤黄 3g，麝香 0.3g，生南星 20g。共为细末，酒、醋各半调成糊状，涂布于腰区肿块处，干而易之。

〔功能主治〕 解毒化痰，通络止痛。主治肾癌腰痛。

(3) 茱萸椒桂贴（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 肉桂 30g，吴茱萸 90g，生姜 120g，葱头 30g，花椒 60g。共炒热，以布包裹，熨腰痛处，冷则再炒热。

〔功能主治〕 温经散寒，通络止痛。肾癌术后肾虚腰部冷痛者。

【专病成药】

1. 康逆胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 人参、灵芝、冬虫夏草、党参、刺五加、茯苓、三七、苦参。

〔功能主治〕 健脾补肾，益气活血，消肿解毒。用于脾肾

不足，瘀毒阻滞所致的癥瘕积聚，瘀结胀闷，肢体乏力，腰酸肢冷，萎黄消瘦，食欲不振；可作为肾癌的辅助用药，可提高生存质量，调节机体免疫功能，减轻放、化疗的不良反应。

【用法用量】 口服，1次6粒，1日2次。

【注意事项】 忌与藜芦、五灵脂同用。

2. 安康欣胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

【处方组成】 黄芪、人参、丹参、补骨脂、鸡血藤、半枝莲、淫羊藿等中草药组成。

【功能主治】 活血化瘀，软坚散结，清热解毒，扶正固本。可用于肾癌。

【用法用量】 1日3次，1次5粒，饭后温开水送服。

3. 贞芪扶正颗粒（《国家基本医疗保险目录》2004）

【处方组成】 黄芪、女贞子。

【功能主治】 补益气血，滋养肝肾。用于晚期肾癌；配合手术、放射线、化学治疗，促进正常功能的恢复。

【用法用量】 口服，1次1袋，1日2次。开水冲服。

【专病单方】

1. 旱莲草 用法：每取120g，水煎，1日1剂，分2次服。功用：滋阴清热。主治：肾癌。（《中医肿瘤学》）

2. 补骨脂 用法：每取15g，与猪腰1个洗净同煮，喝汤吃猪腰，每周1次。功用：滋阴补肾。主治：肾癌。（《中医肿瘤学》）

3. 菝葜 用法：每取60g，配槐豆40g水煎服，1日1剂，分3次服。功用：解毒利湿。主治：肾癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 半边莲 用法：每取120g，水煎，1日1剂，分2次服。功用：清热解毒。主治肾癌小便不利者。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 马鞭草 用法：每取60g，配瞿麦120g水煎，1日1

剂，分2次服。功用：清热利湿。主治：肾癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

膀胱癌

膀胱癌系指来源于膀胱壁上皮组织和间皮组织的恶性肿瘤。其发病与长期接触芳香族类物质、吸烟、体内色氨酸代谢异常、膀胱黏膜局部长期遭受刺激、某些药物、寄生虫病等因素有关。

本病相当于中医病名国家标准的膀胱癌，也属于尿血、血淋、癃闭等范畴，其主要病因病机是由于湿热久郁下焦，热毒瘀结膀胱，瘀毒蕴结，日久脾肾两虚，膀胱气化不利所致。

【辨证用方】

膀胱癌的辨证，首先应辨明虚实，凡病程较短，尿道艰涩灼热较甚多属实；病程较长，尿道无艰涩灼热感多属虚。尿色红赤或鲜红，或有紫黯血块者属实，有血块者属血瘀，尿色淡红者多为气血亏虚。其次应辨尿血的颜色，出血量少者，一般尿色微红；出血量多者，尿色较深；又见尿中夹有血丝、血块者，属于瘀血内停；火盛迫血，尿色鲜红；气血亏虚，气不摄血，尿色多淡红。治疗上当辨证选药。

1. 湿热下注证

主症：尿频，尿急，或尿痛，小便灼热，尿色鲜红，口干口苦，下肢可见浮肿，舌质红，苔黄腻，脉滑数或弦数。

治法：清热利湿，凉血软坚。

(1) 小蓟饮子加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕小蓟 30g，藕节炭 10g，淡竹叶 15g，滑石（包煎）15g，生地 15g，白茅根 30g，仙鹤草 15g，黄柏 10g，海金沙（布包）10g，蛇莓 20g，丹皮 10g，甘草 5g，茯苓 15g，猪苓 15g，蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿，凉血软坚。主治膀胱癌。

〔加减应用〕 血尿甚者，加血见愁、黑山栀、乌梅、水牛角（先煎）；小便刺痛者，改甘草为甘草梢，加瞿麦、篇蓄；小便不利者，加泽泻；健脾和胃者，加白术、陈皮、薏苡仁；双补气血者，加党参、黄芪、当归、白芍；温补肾阳者，加杜仲、怀山药、芡实；清热解毒者，加黄柏、蒲公英、金银花。巩固疗效用知柏地黄丸。

（2）八正散加减（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 篇蓄 30g，瞿麦 20g，车前子 15g，大蓟、小蓟各 30g，黄柏 10g，金钱草 20g，白茅根 30g，白术 15g，龙葵 30g，土茯苓 30g，蛇莓 20g，蒲黄 10g，炒五灵脂 10g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿，凉血解毒。主治膀胱癌。

〔加减应用〕 血尿不止者，加琥珀粉、杜仲炭、小茴香炭、仙鹤草。

2. 瘀毒蕴结证

主症：间歇性无痛性血尿，时见尿中血块，尿急，小便灼热，小腹胀满或下腹包块，舌质紫黯，或有瘀点、瘀斑，苔薄黄，脉涩或弦滑。

治法：活血化瘀，理气散结。

（1）失笑散加味（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 生蒲黄（布包）10g，五灵脂（布包）10g，三棱 10g，莪术 10g，白术 15g，黄柏 10g，牛膝 15g，益智仁 10g，土茯苓 30g，泽泻 15g，石见穿 30g，白英 30g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀，理气散结。主治膀胱癌。

〔加减应用〕 病久气血两虚、面色无华者，加黄芪、丹参、当归身。

（2）抵挡丸合五苓散加减（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕黄柏 10g，大黄（酒制）10g，水蛭 10g，穿山甲 10g，廑虫 10g，土茯苓 10g，猪苓、茯苓各 20g，龙葵 30g，仙鹤草 15g，黄芪 30g，女贞子 30g，三七粉（冲）4g，琥珀粉（冲）3g。水煎服。

〔功能主治〕解毒祛瘀，扶正通利。主治膀胱癌。

〔加减应用〕小便淋漓不尽者，加杜仲、菟丝子；小腹坠胀疼痛者，加蒲黄、炒五灵脂、川楝子、乌药；肺转移者，加鱼腥草、瓜蒌；直肠转移者，加半枝莲、穿山甲。

3. 脾肾两虚证

主症：无痛性血尿，小便困难，腰酸腿软，下腹坠胀或有包块，呕恶纳呆，头晕耳鸣，神疲消瘦，面色萎黄而黯，下肢浮肿，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。

治法：健脾益肾，软坚散结。

（1）四君地黄汤加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕白参（蒸兑）10g，白术 10g，茯苓 10g，生地 15g，山茱萸 15g，泽泻 15g，海金沙（布包）10g，仙鹤草 20g，黄芪 20g，女贞子 10g，旱莲草 20g，枸杞 10g，菟丝子 10g，蚤休 30g，生牡蛎（先煎）30g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益肾，软坚散结。主治膀胱癌。

〔加减应用〕气虚下陷而见少腹坠胀者，加升麻、黄芪、柴胡。

（2）补中益气丸合无比山药丸加减（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕黄芪 20g，党参 10g，白术 10g，当归 10g，升麻 6g，柴胡 10g，怀山药 15g，肉苁蓉 10g，熟地 12g，山茱萸 12g，赤石脂 10g，菟丝子 12g，蛇莓 10g，白花蛇舌草 30g。

〔功能主治〕健脾益肾，利湿化浊。主治膀胱癌。

4. 阴虚内热证

主症：小便短赤，腰骶酸痛，五心烦热，口干不欲饮，大

便干结，消瘦疲乏，舌质红，苔薄，脉细数。

治法：滋阴清热，化瘀解毒。

主方：知柏地黄丸加减（《中华肿瘤治疗大成》）

【组成与用法】知母 40g，黄柏 10g，熟地 12g，山茱萸 10g，怀山药 15g，丹皮 15g，茯苓 15g，泽泻 15g，三七粉（冲兑）6g，龟甲胶（烱化）10g，石韦 15g，王不留行 15g，薏苡仁 15g，石见穿 30g。水煎服。

【功能主治】滋阴清热，化瘀解毒。主治膀胱癌。

【加减应用】舌光无苔，阴伤甚者，加生地、北沙参、石斛。

【辨病用方】

膀胱癌的辨病治疗，当根据肿瘤病期早晚、病人体质强弱，早中期以清热利湿，化瘀解毒为主；晚期肾气虚衰，肾阴亏虚，湿热久蕴，宜滋阴清热、凉血止血。

1. 膀胱癌各期体质较实者用方

（1）牡蛎僵蚕汤（《实用中西医结合泌尿男科学》）

【组成与用法】生牡蛎（先煎）60g，昆布 15g，海藻 15g，土木鳖 5g，僵蚕 15g，炮山甲 10g，山慈菇 12g，半枝莲 30g。水煎服。

【功能主治】化痰散瘀，软坚散结，清热解毒。主治膀胱癌。

【加减应用】发热者，加炒柴胡、青蒿梗；小便黄热而痛甚者，加龙胆草、梔子；腹胀，尿涩不畅者，加乌药、益智仁；尿血者，加琥珀、蒲黄。

（2）导赤二蓟汤（《中西医临床肿瘤学》）

【组成与用法】当归 15g，赤芍 15g，生地 15g，滑石 15g，海金沙（布包）15g，半枝莲 30g，大蓟炭 30g，小蓟炭 30g，白茅根 30g，薏苡仁 30g，白花蛇舌草 30g，金银花 20g，知母 12g，黄柏 12g，炒木鳖子仁 12g，天花粉 12g，乌贼骨 24g。

水煎，1日1剂，分2次服。

〔功能主治〕 清热泻火，凉血止血。主治膀胱癌。

〔加减应用〕 尿血明显者，加三七粉（冲服）；有心烦失眠、口舌生疮糜烂者，加淡竹叶。

(3) 三藤二莲汤（《段凤舞肿瘤积验方》）

〔组成与用法〕 藤梨根 90g，忍冬藤 60g，仙鹤草 60g，白毛藤 30g，虎杖 30g，半枝莲 30g，半边莲 30g，凤尾草 15g，川楝子 15g，乌药 9g，苦参 6g，白芷 6g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿，理气止痛。主治膀胱癌。

(4) 牛角承气汤加减（中国中医药科技，1997，2）

〔组成与用法〕 水牛角（先煎）30g，龟甲（先煎）30g，桃仁 10g，丹皮 10g，厚朴 10g，薏苡仁 30g，泽泻 10g，枳壳 10g，甘草梢 10g。水煎服。

〔功能主治〕 凉血散瘀，清热解毒。

(5) 猪苓防己汤（《百病良方》）

〔组成与用法〕 猪苓 30g，防己 12g，大黄 6g，芦荟 6g，茯苓 50g，虎杖 30g，龙胆草 12g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾除湿，化瘀解毒。主治膀胱癌。

〔加减应用〕 烦热，口干苦者，加黄柏、知母。

(6) 金柏汤（《抗癌中草药制剂》）

〔组成与用法〕 蒲公英 30g，泽泻 9g，金钱草 30g，瞿麦 9g，篇蓄 9g，黄柏 9g，肥知母 9g，车前子（布包）9g，粉萆薢 12g，甘草 3g，川楝子 9g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿解毒。主治膀胱癌。

〔加减应用〕 虚证者，加菟丝子、莲须；腹胀，尿涩不畅者，加乌药、益智仁；病久体虚，面色不华者，加黄芪、丹参、当归。

(7) 白花寄生汤（《抗癌中药一千方》）

〔组成与用法〕沙苑子 15g，山慈菇 15g，桑寄生 30g，猪苓 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒。主治膀胱癌。

〔加减应用〕气短，乏力，头晕者，加党参、黄芪、茯苓、女贞子；大便干结者，加大黄（后下）；热盛者，加黄芩、黄连。

（8）龙蛇羊泉汤（肿瘤防治研究，1978，2）

〔组成与用法〕龙葵 30g，白毛藤 30g，土茯苓 30g，灯心草 30g，蛇莓 15g，海金沙 9g，威灵仙 9g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，通淋散结。用于各期膀胱癌。

〔加减应用〕尿血明显者，加小蓟、藕节；心火旺而心烦者，加黄连、竹叶。

（9）银花栀子汤《中草药验方选编》

〔组成与用法〕金银花 30g，藕节 15g，泽泻 6g，黄柏 12g，猪苓 9g，车前子（布包）9g，山慈菇 9g，萆薢 12g，甘草 9g，蒲公英 15g，紫花地丁 15g，生贯众 15g，栀子 9g。水煎服。

〔功能主治〕清热利湿解毒。用于各期膀胱癌。

〔加减应用〕尿血多者，加白茅根、大蓟炭、小蓟炭；尿中有紫色血块者，加桃仁；疼痛者，加制乳香、制没药；尿道刺痛者，加海金沙（布包）、竹叶。

（10）蜣蛇汤（《抗癌中草药制剂》）

〔组成与用法〕蜣螂虫 9g，白花蛇舌草 60g，河白草 30g，金茶匙 30g，半枝莲 60g，野葡萄藤 60g，水煎服。

〔功能主治〕清热利湿，破癥攻毒。主治各期膀胱癌见小便短赤，尿血鲜红。

〔加减应用〕尿血明显者，加蒲黄炭（布包）。

（11）三金石韦汤（中原医刊，1987，6）

〔组成与用法〕 金钱草 60g, 海金沙 30g, 鸡内金 20g, 石韦 12g, 冬葵子 12g, 滑石 25g, 瞿麦 20g, 篇蓄 20g, 赤芍 15g, 泽兰 12g, 甘草梢 10g。水煎服。

〔功能主治〕 清热泻火, 利水通淋。用于各期膀胱癌。

〔加减应用〕 发热者, 加黄芩、蒲公英; 便秘者, 加生大黄 (后下)。

(12) 仙鹤知母汤 (《中西医临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕 七叶一枝花 12g, 生地 12g, 仙鹤草 24g, 茯苓 12g, 天龙 2 条, 黄柏 9g, 丹皮 9g, 知母 12g, 萆薢 12g, 水煎服。

〔功能主治〕 清热泻火, 凉血解毒。主治膀胱癌体质较实者。

〔加减应用〕 腰痛明显者, 加续断、桑寄生、狗脊; 湿热未净, 尿黄热痛者, 加车前草、银花藤。

(13) 喜树篇蓄汤 (中国中医药信息杂志, 2003, 6)

〔组成与用法〕 喜树 12g, 丹参 30g, 法半夏 10g, 石韦 15g, 篇蓄 15g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 三七粉 (冲服) 6g, 琥珀 9g, 白英 15g, 白茅根 30g。水煎服。

〔功能主治〕 理气化痰, 清热解毒, 化瘀通淋。主治膀胱癌早期。

〔临床报道〕 治疗痰热瘀结型膀胱移行细胞乳头状癌 1 例, 尿血、疼痛消失, 随访 3 年, 病情稳定。

2. 膀胱癌中晚期体质较虚者用方

(1) 复方二蓟汤 (《抗癌中草药制剂》)

〔组成与用法〕 白参 (蒸兑) 10g, 黄芪 20g, 半枝莲 30g, 小蓟 30g, 蒲黄炭 (布包) 30g, 贯众炭 30g, 槐花炭 30g, 知母 12g, 黄柏 12g, 生地 12g, 车前子 (布包) 30g; 赤茯苓 12g, 猪苓 13g, 白花蛇舌草 30g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

[功能主治] 养阴清热，解毒凉血。主治膀胱癌。

[加减应用] 瘀血明显者，加田三七粉（冲兑），阿胶（烱化）；肝郁胁胀者，加白芍、柴胡。

(2) 加味五苓散（四川中医，1989，4）

[组成与用法] 猪苓 15g，茯苓 15g，白术 15g，生黄芪 15g，海金沙 18g，海藻 18g，桂枝 10g，生地榆 30g，生薏苡仁 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服，每剂煎汁 600ml，1 日 1 剂，40 天为 1 个疗程。

[功能主治] 清热利湿，通淋散结。主治晚期膀胱癌。

[加减应用] 血尿不止者，加琥珀、仙鹤草；小便混浊者，加萆薢、射干；小便淋漓不尽者，加杜仲、菟丝子；小腹坠胀疼痛者，加延胡索、香附、乌药；小便时痛不可忍者，加苍耳子，并加大海金沙用量；淋巴转移者，加黄药子、泽泻。

[临床报道] 治疗晚期膀胱癌 31 例，存活 5 年以上 3 例，存活 2 年以上 18 例。

(3) 黄芪莪术汤（中国中西医结合外科杂志，2004，8）

[组成与用法] 黄芪 20g，当归 10g，制鳖甲 10g，金荞麦 15g，野葡萄 30g，山慈菇 15g，三棱 15g，莪术 15g，白花蛇舌草 30g，女贞子 15g，生地 15g，露蜂房 10g，天龙 3 条。水煎服。

[功能主治] 益气养血，化瘀解毒。主治膀胱癌。

[加减应用] 纳差者，加炒白术、鸡内金、大枣、神曲、枳实、厚朴；肾虚乏力头晕者，加枸杞子、黄精、川芎、山茱萸、山药；湿热蕴结，尿频、尿急、尿血者，加黄柏、篇蓄、土茯苓、半枝莲；膀胱灌注化疗出血者，加白及、参三七、藕节炭、大蓟、小蓟、茜草。

[临床报道] 配合化疗灌注治疗 45 例，存活大于 5 年者 44 例，最长 2 例已存活 18 年。

(4) 山药猪苓汤（《百病良方》）

〔组成与用法〕 生地 30g, 怀山药 30g, 山茱萸 12g, 茯苓 30g, 猪苓 30g, 紫草 30g, 芦荟 6g, 小蓟 12g, 蒲黄炭 (布包) 12g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 水煎。

〔功能主治〕 滋阴补肾解毒。主治膀胱癌。

〔加减应用〕 心悸多汗者, 加麦冬、五味子、酸枣仁; 血虚者, 加鸡血藤。

(5) 蛇桑汤 (《中西医临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕 党参 15g, 黄芪 30g, 茯苓 30g, 女贞子 30g, 桑寄生 30g, 白花蛇舌草 30g, 水煎服。

〔功能主治〕 益气健脾, 补肾解毒。主治膀胱癌。

〔加减应用〕 形神委顿, 腰背酸痛者, 去党参, 加红参 (先蒸)、仙茅。

(6) 抗癌复生汤 (中医函授通讯, 1999, 4)

〔组成与用法〕 穿山甲 5g, 生牡蛎 (先煎) 50g, 石韦 20g, 薏苡仁 25g, 僵蚕 25g, 山慈菇 15g, 白及 50g, 蒲黄 15g, 旱莲草 30g, 三七粉 (冲服) 5g, 半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕 养阴益气, 清热利湿。主治膀胱癌。

〔加减应用〕 小便淋漓不尽者, 加杜仲、菟丝子、肉苁蓉; 小腹坠胀疼痛者, 加延胡索、乌药; 气血两虚者, 加党参、麦冬、五味子; 气虚者, 加党参、茯苓、陈皮、白术、炒扁豆; 血虚者, 加当归、阿胶、熟地; 淋巴转移者, 加黄药子、泽泻、夏枯草。

〔临床报道〕 治疗膀胱癌 60 例, 血尿、疼痛、小腹不适均消失。

【对症用方】

膀胱癌的对症用方, 除根据患者主要症状进行选择外, 当区分是否手术或放疗、化疗等治疗。术后治疗以健脾补益气血为主, 放疗病人以养阴清热解毒为主, 化疗病人以健脾和胃、益肾养血为主。

1. 膀胱癌手术前后用方

(1) 六君子汤加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 生黄芪 20g, 党参 12g, 茯苓 12g, 白术 10g, 甘草 3g, 沙参 10g, 太子参 15g, 枸杞子 12g, 麦芽 20g, 谷芽 20g, 神曲 12g, 大蓟 30g, 小蓟 30g, 猪苓 15g, 白英 20g, 菟丝子 10g, 白花蛇舌草 20g。水煎, 1日1剂, 分2次服。

[功能主治] 益气养血, 健脾理气。用于膀胱癌手术前后。

[加减应用] 头晕、乏力明显者, 去党参, 加西洋参(蒸兑)、鸡血藤。

(2) 黄芪解毒汤 (《临床中医肿瘤学》)

[组成与用法] 生黄芪 30g, 炙黄芪 30g, 白术 15g, 猪苓 15g, 茯苓 15g, 泽泻、海金沙各 18g, 仙鹤草 15g, 龙葵 30g, 白茅根 30g, 女贞子 30g, 旱莲草 15g。水煎服。

[功能主治] 扶正培本, 清热活血解毒。用于膀胱癌术前。

(3) 黄芪骨脂汤 (《临床中医肿瘤学》)

[组成与用法] 生黄芪 30g, 炙黄芪 30g, 旱莲草 20g, 补骨脂 20g, 当归 15g, 白术、川芎 10g, 莪术 10g, 地龙 10g, 冬葵子 10g, 猪苓 15g, 茯苓 15g。水煎服。

[功能主治] 补肾益气, 活血通淋。用于膀胱癌术后。

2. 治膀胱肿瘤术后形成窦道方

石膏珍珠粉膏 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 熟石膏 60g, 黄柏 30g, 炉甘石 30g, 苍术 30g, 地榆 30g, 防己 30g, 延胡索 30g, 郁金 30g, 木瓜 30g, 白及 30g, 珍珠粉 45g。共为细末, 水调为膏, 外敷患处。

[功能主治] 清热利湿, 生肌敛疮。主治膀胱癌。

3. 膀胱癌术后防复发方

生地鳖甲汤 (中医药学刊, 2001, 4)

[组成与用法] 生地 30g, 枸杞子 25g, 制鳖甲 25g, 金银

花 25g, 连翘 25g, 龟甲 25g, 茯苓 30g, 薏苡仁 30g, 甘草 10g, 半枝莲 40g, 白花蛇舌草 40g, 葛根 40g, 百合 25g, 白术 25g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴清热, 解毒利湿。主治膀胱癌。

〔临床报道〕 配合顺铂、阿霉素髂内动脉定期化疗治疗 20 例膀胱癌术后患者, 随访 6 个月~1.5 年均未见复发。

4. 膀胱癌化疗专方

癌复康方加减 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 白参 (蒸兑) 10g, 黄芪 20g, 茯苓 10g, 白术 10g, 女贞子 10g, 旱莲草 10g, 枸杞子 10g, 菟丝子 10g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾, 养阴解毒。配合化疗治膀胱癌。

〔加减应用〕 恶心欲吐明显者, 加法半夏、姜竹茹、砂仁; 血象下降者, 加仙灵脾、锁阳、巴戟天; 心悸气短者, 加远志、炒酸枣仁、石菖蒲; 谷丙转氨酶高者, 加茵陈、蒲公英、虎杖; 尿血者, 加仙鹤草、蒲黄炭。

5. 化疗后白细胞减少症治疗方

升白汤 (新中医, 2002, 10)

〔组成与用法〕 莲子 10g, 白芍 10g, 远志 10g, 酸枣仁 10g, 白术 30g, 芡实 30g, 怀山药 30g, 熟地 30g, 木香 6g, 甘草 6g, 党参 15g, 何首乌 15g, 阿胶 15g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾养心, 益肾填精。主治膀胱癌化疗后白细胞减少症。

〔临床报道〕 治疗化疗后白细胞减少症 120 例, 其中, 膀胱癌 6 例, 总有效率为 98.33%。

6. 膀胱癌放疗专方

沙参二冬汤 (黎月恒经验方)

〔组成与用法〕 麦冬 12g, 天冬 12g, 沙参 10g, 石斛 12g, 绞股蓝 18g, 茯苓 20g, 赤小豆 30g, 枸杞子 30g, 太子参

15g, 王不留行 12g, 石韦 10g, 丹皮 10g, 黄柏 10g, 大黄 9g, 白术 9g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 4g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

〔功能主治〕 养阴清热解毒。用于膀胱癌放疗时。

〔加减应用〕 口干咽燥喜饮者, 加知母、生地; 尿血明显者, 加藕节炭 (包)、蒲黄炭 (包)。

7. 膀胱癌小便不畅方

(1) 金砂五淋丸 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 海金沙、车前子、篇蓄、瞿麦、猪苓、茯苓、黄柏、大黄、黄芩、赤芍、当归、山楂、熟地组成。研末为丸, 每 20 丸 1g, 成人 1 次 10g, 1 日 3~4 次。

〔功能主治〕 清热利湿, 解毒凉血。适用于膀胱癌下焦湿热者。

(2) 加味桃仁承气汤 (《中草药验方选编》)

〔组成与用法〕 桃仁 9g, 芒硝 9g, 大黄 9g, 桂枝 7.5g, 甘草 15g, 栀子 12g, 当归 9g, 五灵脂 (布包) 9g, 水牛角 (先煎) 30g, 海金沙 (布包) 6g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

〔功能主治〕 清热峻下解毒。适用于膀胱癌瘀热内结者。

〔加减应用〕 小便一时不通, 胀闭难忍者, 加麝香少许吞服; 尿血明显者, 加三七粉 (冲服)、琥珀粉 (冲服)。

8. 膀胱癌尿血方

(1) 荷叶丸 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 由荷叶、藕节、大蓟炭、小蓟炭、知母、黄芩炭、地黄炭、棕榈炭、焦栀子、白茅根炭、玄参、白芍、当归、香墨组成。研末为丸, 1 次 10g, 1 日 3~4 次。

〔功能主治〕 清热利湿, 解毒凉血。用于膀胱癌偏于血热的尿血者。

(2) 黄芪小蓟饮 (《段凤舞肿瘤积验方》)

〔组成与用法〕 黑山栀 9g, 炒黄芩 4.5g, 小蓟炭 12g, 炒蒲黄 3g, 生地 12g, 淡竹叶 4.5g, 生甘草 3g, 当归 9g, 藕节炭 30g。水煎服。

〔功能主治〕 养阴清热, 凉血止血。主治膀胱癌尿血者。

9. 膀胱癌疼痛方

(1) 三王止痛膏 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 大黄 50g, 马钱子 15g, 全蝎 30g, 干蟾皮 30g, 蚤休 60g, 山慈菇 60g, 姜黄 50g, 麝香 1g, 冰片 10g, 红花 40g, 桃仁 50g, 当归 50g, 血竭 30g, 莪术 50g, 蜈蚣 30g, 桂枝 60g, 制乳、没各 30g, 细辛 15g, 各为细末和匀。取酌量药粉调入凡士林内, 摊于纱布上, 贴敷肿块处, 隔日一换。

〔功能主治〕 化瘀软坚, 解毒止痛。主治膀胱癌疼痛。

〔临床报道〕 用该膏贴敷治疗膀胱癌疼痛患者, 止痛总有效率为 93.3%, 止痛平均持续时间 16.6 小时。

(2) 慈菇黄药汤 (《肿瘤的诊治与防治》)

〔组成与用法〕 山慈菇 30g, 三七 30g, 重楼 30g, 延胡索 30g, 黄药子 30g, 川乌 30g, 冰片 9g。共为细末, 1 次 3g, 1 日 3 次。

〔功能主治〕 清热解毒, 活血止痛。适用于膀胱癌疼痛者。

【专病成药】

1. 肿节风注射液 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕 肿节风水提取液。

〔功能主治〕 清热解毒, 消肿散结。适应于膀胱癌。

〔用法用量〕 肌内注射: 4ml, 1 日 2 次; 静脉滴注: 10~16ml, 1 日 1 次。

2. 羟基喜树碱针 (《国家基本医疗保险目录》2004)

〔处方组成〕 植物喜树中提取得到的微量天然生物碱。

〔功能主治〕 有显著的抗癌活性, 对耐药肿瘤有治疗作用。

主治膀胱癌。(中华临床医学杂志, 2003, 64)

[用法用量] 静脉注射, 1日5mg, 用生理盐水20ml稀释后, 缓慢注射(或遵医嘱), 60天为1个疗程。

3. 斑蝥酸钠注射液(《中华人民共和国国药标准》)

[处方组成] 斑蝥酸钠。

[功能主治] 清热解毒、消肿止痛、活血化瘀、软坚散结。

主治中晚期膀胱癌。(中医杂志, 2004, 10)

[用法用量] 静脉滴注, 1日1次, 1次2~10ml, 用0.9%氯化钠或5%葡萄糖注射液500ml稀释后滴注。

【专病单方】

1. 干蜀葵 用法: 每取40g, 或鲜蜀葵全株100g。水煎, 1日1剂, 分3次服。功用: 清热利湿。主治: 膀胱癌。(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 地榆炭 用法: 每取100g, 配食醋500ml, 地榆炭放入食醋中, 煎至300ml, 1日1剂, 分次服完。功用: 凉血止血。主治: 膀胱癌尿血明显。(《中华肿瘤治疗大成》)

3. 露蜂房 用法: 每取200g, 烧末, 1次10g, 1日2次, 用酒调服。功用: 解毒散结。主治: 膀胱癌。(《中华肿瘤治疗大成》)

4. 冬凌草 用法: 取浓度为2:1的水提液200~300ml膀胱腔内热疗。功用: 清热解毒。主治: 膀胱移行细胞癌。(临床医学, 2005, 7)

5. 鲜斑叶兰全草 用法: 每取6株, 洗净生吃, 1日1剂。功用: 清热解毒。主治: 膀胱癌。(《中华肿瘤治疗大成》)

6. 猕猴桃鲜果 用法: 每取1000g, 洗净食用, 或加水3000ml, 煎至1500~2000ml, 代茶频饮。功用: 解毒通淋。主治: 膀胱癌放疗后尿频、尿痛者。(《中华肿瘤治疗大成》)

7. 猪苓 用法: 每取25~30g, 水煎500ml, 早、晚2次服。功用: 利水通淋。主治: 膀胱肿瘤术后复发。(中华外科杂

志, 1994, 7)

8. 土茯苓 用法: 每取 15g, 配茶树根 15g, 加水同煮, 去渣取汁, 加白糖当茶饮, 1 日 1 剂。清热解毒, 凉血止血。主治: 膀胱癌尿血。((《中华肿瘤治疗大成》))

9. 无花果 用法: 每取 30g, 水煎服, 1 日 1 剂。功用: 利尿通淋。主治: 各期膀胱癌。((《中华肿瘤治疗大成》))

10. 龙葵 用法: 每取 30g, 配白英 30g, 水煎服, 1 日 1 剂。功用: 清热解毒, 利尿通淋。主治: 膀胱癌。((《中华肿瘤治疗大成》))

前列腺癌

前列腺癌是男性生殖系的恶性肿瘤。本病好发于老年, 大约半数患者伴有前列腺增生, 与体内雄激素和雌激素之间的平衡紊乱有关, 推测雄激素可能促进前列腺癌的生长和发展。也与种族、生活习惯、高脂饮食、遗传因素、性生活及淋病、病毒、衣原体感染等有关。

本病属于中医癃闭、淋证、腰痛等范畴, 其主要病因病机为肾气亏损, 阴阳失调, 湿热痰浊气血瘀滞所致。

【辨证用方】

前列腺癌的辨证, 当分清虚实, 初起湿热蕴结, 以致膀胱气化失司者属实, 治宜清热利湿通淋, 活血化瘀, 佐以行气。病久脾肾两亏, 膀胱气化无权者属虚, 治宜培补脾肾。虚实夹杂者, 宜标本兼治。根据患者的不同临床表现, 或参以止血, 或佐以泄浊等以达到扶正祛邪的目的。

1. 湿热蕴结证

主症: 尿频、尿急、尿痛, 排尿困难, 小便短赤灼热, 腰背酸痛, 小腹胀满, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。

治法: 清利湿热, 通利小便。

八正散加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 海金沙（布包）15g，瞿麦 10g，滑石（布包）15g，山栀子 15g，车前子（布包）10g，篇蓄 10g，败酱草 15g，炮穿山甲（先煎）12g，白茅根 30g，土茯苓 30g，石韦 10g，白花蛇舌草 30g，莪术 10g，夏枯草 15g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清利湿热，通利小便。主治前列腺癌。

〔加减应用〕 兼心烦，口舌生疮糜烂者，改甘草为甘草梢 5g，加生地 16g，竹叶 10g；湿热久蕴下焦，致肾阴灼伤而见口干咽燥，潮热盗汗，手足心热，舌尖红者，加知母、生地、牛膝。

2. 瘀血凝滞证

主症：小便点滴而下，或时而通畅，时而闭塞不通，腹背疼痛，小腹胀满疼痛，舌质紫黯，或有瘀点，脉涩或细数。

治法：化瘀散结，通利下焦。

（1）膈下逐瘀汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 当归尾 15g，赤芍 15g，桃仁 10g，红花 10g，五灵脂（布包）10g，乌药 10g，王不留行 10g，延胡索 10g，炮山甲（先煎）10g，丹参 10g，败酱草 10g，瞿麦 10g，马鞭草 10g，泽泻 15g，石见穿 30g。水煎服。

〔功能主治〕 化瘀散结，清热解毒。主治前列腺癌。

〔加减应用〕 病久体虚者，改当归尾为全当归，加黄芪、白术、茯苓；小便一时不通，胀闭难忍，加麝香（吞服）0.05g。

（2）海藻琥珀汤（北京中医杂志，1988，5）

〔组成与用法〕 海藻 30g，夏枯草 30g，莪术 15g，皂角刺 10g，山慈菇 10g，牛膝 10g，乌药 10g，王不留行 10g，琥珀（冲服）1.5g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿，活血解毒。主治前列腺癌。

[加减应用] 尿血者，加三七粉（冲服）、仙鹤草、藕节炭。

3. 肾气亏虚证

主症：小便不通或点滴不爽，排出无力，双下肢浮肿，神疲怯弱，腰膝冷而疲软无力，面色苍白，畏寒肢冷，神气怯弱，舌质黯，苔白，脉沉细。

治法：温阳益气，补肾利尿。

(1) 济生肾气丸加减（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 肉桂 6g，制附片（先煎）10g，熟地 15g，丹皮 10g，茯苓 15g，泽泻 10g，山茱萸 10g，牛膝 15g，车前子（布包）15g，炮穿山甲（先煎）10g，刺猬皮 10g，夏枯草 30g，龙葵 15g。水煎服。

[功能主治] 温补肾阳，化瘀散结。主治前列腺癌。

[加减应用] 肾阴阳两虚者，加鹿角胶（烊化）、龟甲（先煎）、人参（蒸兑）、枸杞子。

(2) 真武汤加味（《临床中医肿瘤学》）

[组成与用法] 制附子（先煎）15g，白术 15g，茯苓 15g，白芍 10g，生姜 3g，龙葵 15g，白英 15g。水煎服。

[功能主治] 温补肾阳，渗利水湿。主治前列腺癌。

[加减应用] 尿血多者，加黄芪益气摄血；脾虚纳差者，加党参、白术；大便溏泻明显者，加党参、怀山药。

4. 气阴两虚证

主症：尿流变细，排出无力或点滴不通，面色无华，贫血消瘦，倦怠乏力，心悸怔忡，动则气促，头晕眼花，饮食减退，身疼腰痛，潮热盗汗，舌红，苔少或无苔，脉细数。

治法：益气健脾，养阴滋肾。

生脉散加味（《临床中医肿瘤学》）

[组成与用法] 太子参 15g，麦冬 12g，五味子 6g，制首乌 12g，枸杞子 12g，生黄芪 15g，炙鳖甲（先煎）9g，炙龟

甲（先煎）9g，白英10g，蛇莓10g。水煎服。

〔功能主治〕益气养阴，解毒散结。主治前列腺癌。

〔加减应用〕眩晕耳鸣者，加杭菊、女贞子；伴津亏便秘者，加玄参、决明子、肉苁蓉；血虚甚者，加熟地、阿胶。

【辨病用方】

前列腺癌辨病治疗，当注重湿热、虚、瘀毒三个方面。根据肿瘤病期早晚、病人体质强弱，选用或合用清热利湿通淋，健脾补肾，化瘀解毒等治疗方药；如形体壮实，虚象不明显，以攻邪为主，扶正为辅；如形体瘦弱，虚象明显，则以扶正为主，攻邪为辅。

1. 前列腺癌各期体质较实者用方

（1）桃仁红花煎加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕桃仁10g，红花10g，生地10g，赤芍10g，当归10g，川芎6g，制香附10g，丹参15g，青皮6g，穿山甲（先煎）10g，延胡索10g。水煎服。

〔功能主治〕活血解毒，祛痛散结。主治前列腺癌。

〔加减应用〕伴右胁疼痛者，加柴胡、郁金；口粘无味，咳吐白痰者，加半夏、桔梗；下肢肿甚者，加白术、泽泻。

（2）夏枯草汤（《中西医结合肿瘤学》）

〔组成与用法〕夏枯草30g，败酱草30g，金钱草30g，王不留行30g，龙葵30g，薏苡仁根60g。水煎服。

〔功能主治〕清热泻火，通淋散结。主治前列腺癌。

〔加减应用〕尿血者，加蒲黄炭、茅根炭。

（3）白花蛇舌草汤（《抗癌中药一千方》）

〔组成与用法〕川楝子15g，白花蛇舌草30g，半枝莲30g，萆薢30g，薏苡仁30g。水煎服。

〔功能主治〕清热利湿，健脾利水。主治前列腺癌。

〔加减应用〕尿痛者，加延胡索、桃仁。尿血者，加大蓟、小蓟、仙鹤草。

(4) 三棱莪术汤 (北京中医杂志, 1988, 5)

[组成与用法] 海藻 30g, 昆布 30g, 三棱 15g, 莪术 10g, 当归 15g, 赤芍 15g, 丹皮 30g, 赤茯苓 30g。水煎服。

[功能主治] 活血化瘀散结。主治前列腺癌。

[加减应用] 尿痛者, 加生地、甘草梢、竹叶; 会阴部痛甚者, 加制马钱子; 口舌生疮者, 合导赤散。

(5) 二瞿汤 (《肿瘤良方大全》)

[组成与用法] 瞿麦穗 30g, 白芍 30g, 瞿麦 (剉, 炒) 30g, 当归 (切, 焙) 加 30g, 天葵子 30g, 炙甘草 30g, 榆白皮 (剉) 30g, 栀子仁 30g, 石韦 (去毛) 30g, 火麻仁 30g; 上药共研粗末, 1 次 15g, 用水 220ml, 加入灯心草少许, 煎至 150ml, 去渣温服。

[功能主治] 清热解毒, 通利小便。主治前列腺癌。

[加减应用] 疼痛明显者, 加乳香、没药; 小便浑浊者, 加萆薢。

2. 前列腺癌中晚期体质较虚者用方

(1) 苁蓉山甲汤 (上海中医药杂志, 1988, 1)

[组成与用法] 生黄芪 15g, 党参 12g, 仙灵脾 12g, 肉苁蓉 6g, 枸杞 12g, 制首乌 12g, 穿山甲 15g, 牛膝 12g, 制大黄 6g, 炒黄柏 10g, 知母 10g, 土茯苓 15g, 蚤休 12g, 白花蛇舌草 15g, 杭白芍 12g, 炙甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾, 活血解毒。主治前列腺癌。

[加减应用] 尿血重者, 加小蓟、生地、阿胶; 小便不畅者, 加沉香、乌药; 小便疼痛者, 加延胡索、王不留行、莪术; 小便黄浊者, 加车前子、萆薢、瞿麦、金钱草。

(2) 益气养阴破瘀汤 (王沛经验方)

[组成与用法] 女贞子 30g, 覆盆子 30g, 知母 15g, 菟丝子 30g, 三棱 30g, 黄柏 10g, 莪术 20g, 夏枯草 30g, 穿山甲 10g, 露蜂房 15g, 全蝎 4g, 生黄芪 15g, 炙黄芪 15g, 龙葵

15g, 酒地龙 15g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴, 破瘀散结。主治前列腺癌。

[临床报道] 治疗 7 例, 显效 5 例, 2 例存活 13 年。

(3) 鹿角皂刺汤 (四川中医, 2004, 5)

[组成与用法] 熟地 30g, 土茯苓 30g, 鹿角胶 10g, 生黄芪 30g, 枸杞 20g, 川牛膝 25g, 穿山甲 10g, 制大黄 10g, 蚤休 15g, 制鳖甲 (先煎) 20g, 蜃虫 6g, 丹参 15g, 皂刺 10g, 海藻 10g, 蜈蚣 1 条, 山慈菇 15g。水煎服。

[功能主治] 补肾活血, 化痰散结。主治前列腺癌。

[加减应用] 血尿者, 加白茅根、阿胶; 骨转移疼痛者, 加续断、骨碎补、秦艽、忍冬藤、茜草; 肝转移者, 加八月札、夏枯草、郁金; 有尿路刺激征者, 加车前子、竹叶。

[临床报道] 治疗晚期前列腺癌 12 例, 平均生存 73 个月。

(4) 二地二甲汤 (江西中医药, 2002, 2)

[组成与用法] 生黄芪 30g, 生、熟地各 15g, 炒党参 15g, 全当归 10g, 炮山甲 (先煎) 15g, 土茯苓 30g, 山慈菇 15g, 蛇莓 15g, 天龙 3 条, 炙鳖甲 (先煎) 15g, 炙龟甲 (先煎) 15g, 生杭芍 15g, 甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 滋阴益肾、益气扶正、祛瘀除痰、解毒软坚。主治前列腺癌。

[加减应用] 兼湿热者, 加泽兰、泽泻、车前子; 兼肾阳虚者, 加肉桂、补骨脂; 伴血尿者, 加仙鹤草、茜草、三七粉 (冲); 伴疼痛者, 加乳香、延胡索、蜈蚣。

[临床报道] 该方能使体内雄性激素 (二氢睾酮) 降至最低水平, 提高患者生存质量。

2. 前列腺癌骨转移方

(1) 白鹿止痛汤 (潘敏求经验方)

[组成与用法] 熟地 30g, 鹿角胶 (烊化) 10g, 炮姜炭 5g, 桂枝 5g, 炙麻黄 5g, 白芥子 10g, 桂枝 10g, 枸杞子

10g, 菟丝子 10g, 炮山甲 (先煎) 15g, 山慈菇 15g, 蚤休 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 温阳散寒, 通络行滞。主治前列腺癌骨转移。

〔加减应用〕 痛甚, 固定不移者, 加制乳香、制没药、白花蛇舌草、莪术; 食纳减少者, 加炒谷芽、炒麦芽; 大便溏薄者, 加神曲、薏苡仁。

(2) 秦艽桑枝汤 (李佩文经验方)

〔组成与用法〕 桑寄生 20g, 秦艽 10g, 桑枝 30g, 木瓜 15g, 苏木 10g, 骨碎补 10g, 透骨草 10g, 海桐皮 10g, 千年健 10g, 茜草 10g, 狗脊 10g, 徐长卿 10g。水煎服。

〔功能主治〕 通络壮骨, 祛风止痛。主治前列腺癌骨转移。

〔加减应用〕 心烦失眠者, 加炒枣仁、夜交藤。

(3) 泉安方 (中国男科学杂志, 2004, 4)

〔组成与用法〕 熟地 12g, 鹿角霜 9g, 元参 9g, 牡蛎 (先煎) 9g, 象贝 9g, 穿山甲 (先煎) 9g, 半枝莲 15g, 白花蛇舌草 15g, 蜀羊泉 15g, 制附片 6g, 肉桂 10g, 炮姜 4.5g, 麻黄 6g, 白芥子 9g。水煎服。

〔功能主治〕 温肾补血, 软坚消积, 活血祛瘀, 散寒通滞。主治前列腺癌骨转移。

〔临床报道〕 治疗 18 例, 12 例疼痛指数下降 ≥ 2 度 (或 1 度到 0), 6 例服用止痛药剂量减少 50% 以上。

(4) 地鳖蜂房汤 (浙江中医药杂志, 1988, 8)

〔组成与用法〕 地鳖虫 10g, 白花蛇 10g, 当归 10g, 徐长卿 10g, 露蜂房 6g, 炙甘草 6g, 蜈蚣 3g, 党参 12g, 黄芪 12g, 熟地 15g, 鸡血藤 15g, 乳香 9g, 没药 9g。水煎服。

〔功能主治〕 益气活血, 解毒止痛。主治前列腺癌骨转移。

〔加减应用〕 尿血重者, 加小蓟、旱莲草。

【对症用方】

前列腺癌的对症用方, 主要根据患者尿血、小便不通等症

状进行选择，并区分是否手术或放疗、化疗等进行相应选方用药。术后治疗以健脾益气养血为主，放疗病人以养阴清热和胃为主，化疗病人以健脾益肾为主。

1. 前列腺癌手术后专方

六君子汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 白参（蒸兑）10g，白术 10，云茯苓 12g，甘草 5g，法半夏 10g，陈皮 9g，炒谷芽 15g，炒麦芽 15g，生黄芪 30g，当归 10g，枸杞子 15g，天葵子 10g，鸡血藤 30g，夏枯草 10g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾补肾，通淋散结。主治前列腺癌术后气血两虚者。

〔加减应用〕 腹胀，小便不通者，加猪苓、泽泻。

2. 前列腺癌化疗后专方

（1）二参女贞汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 西洋参（蒸兑）6g，薏苡仁 30g，绞股蓝 15g，白术 12g，茯苓 12g，太子参 15g，麦冬 10g，女贞子 10g，旱莲草 10g，海金沙 15g，金银花 10g，猪苓 15g，甘草 5g，白茅藤 20g，法半夏 10g，陈皮 10g，砂仁 6g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气，通淋散结。用于前列腺癌化疗后。

〔加减应用〕 恶心呕吐者，加竹茹、法半夏；头晕乏力者，加黄芪、薏苡仁。

（2）癌复康方加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 白参（蒸兑）10g，黄芪 20g，茯苓 10g，白术 10g，陈皮 10g，女贞子 10g，旱莲草 10g，枸杞子 10g，菟丝子 10g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾，扶正固本。用于肿瘤化疗后。

〔加减应用〕 恶心欲吐明显者，加法半夏、姜竹茹、砂仁；血象下降者，加仙灵脾、锁阳、巴戟天；心悸气短者，加远志、炒酸枣仁、石菖蒲；谷丙转氨酶高者，加茵陈、蒲公英、

虎杖；尿血者，加仙鹤草、蒲黄炭。

3. 前列腺癌放疗后专方

金钱枸杞饮（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕红藤 15g，生地 15g，丹皮 10g，沙参 10g，太子参 10g，枸杞子 15g，白芍 10g，麦冬 10g，金钱草 15g，金银花 12g，甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕益气养阴，通淋散结。配合放疗治前列腺癌。

〔加减应用〕大便黏液，里急后重者，加白头翁、当归、木香；小便频急者，加瞿麦、滑石（布包）。

4. 前列腺癌尿血专方

小蓟蒲黄汤（《段凤舞肿瘤积验方》）

〔组成与用法〕黑山栀 9g，炒黄芩 4.5g，小蓟炭 12g，炒蒲黄（布包）3g，生地 12g，淡竹叶 4.5g，生甘草 3g，当归 9g，藕节炭 30g。水煎服。

〔功能主治〕清热泻火，和血止血。主治前列腺癌尿血。

〔加减应用〕肝郁胁胀者，加白芍、柴胡。

5. 前列腺癌小便不通专方

（1）通草瞿麦汤《肿瘤良方大全》

〔组成与用法〕猪苓 6g，通草 6g，赤茯苓 4.5g，泽泻 3g，灯心草 1.5g，篇蓄 2.1g，瞿麦 2.1g。水煎温服。

〔功能主治〕清热利湿，通淋散结。主治前列腺癌小便不通。

〔加减应用〕小便不通者，加琥珀末 1.5g，车前末 3g。

（2）二苓汤（《肿瘤良方大全》）

〔组成与用法〕陈皮 3g，姜半夏 3g，赤茯苓 3g，猪苓 3g，泽泻 3g，炒白术 3g，黄芩 2.4g，升麻 0.9g，甘草 0.9g，炒栀子 3g。1日1剂。用水 400ml，煎至 200ml，不拘时服，待小便解而止。

〔功能主治〕健脾利湿，通淋散结。主治前列腺癌小便

不通。

【加减应用】血尿甚者，加三七、藕节炭。

【专病成药】

1. 新癆片（《中华人民共和国药典》）

【处方组成】由九节兰、牛黄、三七、珍珠粉、吡哌美辛等组成。

【功能主治】清热利湿，通淋散结。主治前列腺癌湿热壅盛者。（福建中医药，1988，2）

【用法用量】1次4片，1日3次，饭后服。

2. 艾迪注射液（《国家基本医疗保险目录》2004）

【处方组成】含斑蝥、人参等。

【功能主治】清热解毒、消癥散结。主治前列腺癌。（肿瘤防治杂志，2003，3）

【用法用量】每日以本注射液50~100ml加入生理盐水或5%葡萄糖注射液中静滴，1日1次，每15天为1个疗程。

3. 蟾酥注射液（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

【处方组成】含蟾酥水溶性提取物吡啶类总生物碱。

【功能主治】具有解毒消炎抗癌的作用，可用于前列腺癌、胃肠癌的治疗。

【用法用量】可用本品10~20ml加入5%葡萄糖注射液500ml中稀释后滴注，1日1次，30日为1个疗程。

【专病单方】

1. 九节茶 用法：每取60g。水煎，1日1剂，分次代茶频饮。功用：清热利湿。主治：前列腺癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 土茯苓 用法：每取60~120g。水煎，1日1剂，频饮。功用：清热利湿。主治：前列腺癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 马鞭草 用法：每取30~60g。水煎，1日1剂，频饮。功用：清热利湿。主治：前列腺癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 肿节风 用法：每取 60g。水煎，1 日 1 剂，代茶饮。功用：清热利湿。主治：前列腺癌。（福建中医药，1988，2）

5. 老鹳草茎叶 用法：每取 10g，加水 200ml 水煎，1 日分 3 次服。功用：清热利湿。主治：前列腺癌。（《中西医临床肿瘤学》）

6. 大葱白矾散 用法：每取大葱白 9cm，配白矾 15g，以上 2 味共捣烂如膏状贴肚脐上，每日换 1 次，贴至尿通为度，功用：软坚通尿。主治：前列腺癌小便不通、点滴难下。（《现代中医药应用与研究大系》）

7. 蚯蚓田螺散 用法：每取白颈蚯蚓 5 条、小田螺 5 个、毕澄茄 15g，以上三味共捣烂，伴米饭为丸，敷脐上，功用：温肾散寒、行气利水。主治：对前列腺癌尿闭、尿塞不通、少腹胀痛难忍者有效。（《现代中医药应用与研究大系》）

8. 甘遂 用法：每取 2g，研为细末，用醋调膏，纱布包裹，外敷脐部，以通为度。功用：清热利湿。主治：前列腺癌。（《前列腺病中医诊疗学》）

9. 皂角末 用法：每取 0.5g，吹鼻取嚏。功用：开肺举中，通利小便。主治：前列腺癌。（《前列腺病中医诊疗学》）

10. 冬虫夏草 用法：每取 15g，配仙灵脾 15g、仙茅 12g 水煎；1 日 1 剂，分 2 次服。功用：滋阴补肾。主治：前列腺癌。（《抗癌中药一千方》）

11. 野葡萄根 用法：每取 60g，配白花蛇舌草 30g、半边莲 30g、菝葜 60g 水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒。主治：前列腺癌。（《中西医结合肿瘤学》）

妇科肺癌

乳 腺 癌

乳腺癌指发生于乳腺小叶和导管上皮的恶性肿瘤。其发病与遗传、哺乳、月经初潮年龄早、高龄初产、未经产、闭经晚、身高、绝经后肥胖、高水平的电离辐射、良性乳腺疾病史等有关。

本病相当于中医病名国家标准的乳癌，也属于乳岩、乳石痈、乳石等范畴。中医认为其主要的病因病机为：七情太过，肝气郁结；肝郁脾虚，气滞痰凝；或年高体虚，冲任失调，日久致气滞血瘀，热毒内蕴，结积而成。其中与肝脾关系最为密切，即明·薛己《女科撮要》云：“乳岩属肝脾二脏郁怒，气血亏损。”

【辨证用方】

乳腺癌的辨证，重在辨痰、瘀、虚、实，以乳房肿块，质地坚硬或乳房肿块迅速增大、疼痛，间或红肿，甚则溃烂翻花者，多为瘀、热、实；以乳房肿块漫肿无边，边界不清或乳中结块，与胸壁粘连，推之不动者，多为痰、虚。因乳头属足厥阴肝经，乳房属足阳明胃经，故乳腺癌与肝脾关系最密切，治疗时多配伍疏肝健脾之品。

1. 肝郁气滞证

主症：乳房肿块初起，胀痛，牵引两胁作胀，情绪抑郁或急躁，心烦易怒，口苦咽干，头晕目眩，苔薄白或薄黄，脉弦滑。

治法：疏肝理气，化痰散结。

瓜蒌逍遥汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕瓜蒌 30g，当归 15g，白芍 15g，柴胡 10g，赤茯苓 12g，白术 12g，郁金 12g，香附 12g，橘叶 10g，鹿角胶 10g，生甘草 5g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 30g，八月札 10g，山慈菇 9g。水煎服。

〔功能主治〕疏肝解郁，解毒化痰。主治乳腺癌。

〔加减应用〕气虚加人参、黄芪；阴虚加天冬、麦冬、石斛；血虚加熟地、阿胶、三七；血瘀加三棱、莪术、皂角刺、穿山甲、王不留行；热毒加蚤休、半枝莲、白花蛇舌草、蒲公英；湿热内蕴加薏苡仁、白蔻仁；便秘加槟榔、火麻仁。

〔临床报道〕周家明等用该方治疗 117 例乳腺癌术后放、化疗者，3 年生存率为 97.4%。其中 66 例 5 年以上，生存率为 68.2%。（实用中医药杂志，1994，4）。配合 CMF 方案化疗，治疗 32 例乳腺癌，总缓解率为 68.7%。（中医药学刊，2003，6）

2. 肝郁化火证

主症：乳房肿块，质地坚硬，状似覆碗，推之不移，边缘不清，皮色紫黯，心烦易怒，便干尿赤，口苦咽干，舌红苔黄，脉弦数。

治法：清肝泄热，化瘀软坚。

主方：加减龙胆泻肝汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕龙胆草 15g，栀子 10g，黄芩 15g，泽泻 12g，当归 10g，柴胡 10g，生地 12g，郁金 10g，赤芍 10g，瓜蒌 10g，半枝莲 30g，龙葵 15g，牡蛎（先煎）30g，穿山甲（先煎）15g，制鳖甲（先煎）12g，贝母 10g，漏芦 12g，白花蛇舌草 30g，生甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕清肝解毒，化瘀软坚。主治乳腺癌。

〔加减应用〕乳房胀痛甚者，加王不留行、路路通、延胡索、广木香；皮肤紫黯者，加水蛭、虻虫、桃仁；气虚神疲

者，加黄芪、人参；纳呆乏力者，加白术、炒山楂、黄芪；大便结者，加大黄、枳实。

3. 冲任失调证

主症：乳房内单发肿块，月经前胀痛加剧，腰酸腿软，烦劳体倦，五心烦热，口干咽燥，苔少或薄黄，脉细数无力。

治法：调理冲任，补益肝肾。

(1) 加减青桅四物汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕青皮 10g，桅子 10g，当归 15g，白芍 10g，生地 15g，川芎 10g，香附 10g，女贞子 10g，山慈菇 15g，龟甲（先煎）10g，菟丝子 15g，郁金 10g，枸杞子 15g，半枝莲 15g，莪术 10g。水煎服。

〔功能主治〕调理冲任，补益肝肾。

〔加减应用〕肾虚甚者，加熟地、山茱萸、仙茅、杜仲；乏力头晕者，加党参、白术；潮热颧红、五心烦热者，加知母、黄柏；肿块胀痛者，加王不留行、路路通、野葡萄根。

(2) 滋阴补肾汤（《中西医结合临床外科手册》）

〔组成与用法〕女贞子 30g，旱莲草 10g，当归 10g，鹿角霜（冲兑）15g，山茱萸 10g，玄参 15g，川贝母 10g，鸡血藤 30g，丹参 15g，半枝莲 30g，丝瓜络 10g，瓜蒌 30g。水煎服。

〔功能主治〕滋阴补肾，养血活血。主治乳腺癌。

〔加减应用〕气虚乏力者，加黄芪、党参；津亏烦渴者，加石斛、天花粉、沙参、麦冬；肿块破溃流血者，加白芥子、王不留行、穿山甲、荆芥炭。

4. 热毒瘀结证

主症：乳房肿块迅速增大、疼痛，间或红肿，甚则溃烂翻花，恶臭，或发热，心烦口干，大便秘结，小便短赤，舌黯红，有瘀斑，舌苔黄腻，脉弦数。

治法：清热解毒，活血化瘀。

(1) 五味消毒饮合桃红四物汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕金银花 20g, 桃仁 10g, 红花 10g, 赤芍 15g, 野菊花 10g, 蒲公英 10g, 紫花地丁 10g, 紫背天葵 10g, 生地 15g, 白花蛇舌草 15g, 莪术 10g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒, 活血化瘀。主治乳腺癌。

〔加减应用〕流脓恶臭者, 加薏苡仁、仙鹤草; 便秘者, 加大黄、牛蒡子、枳实; 乳房痛甚者, 加郁金、延胡索; 肿块红肿热痛甚、溃烂者, 加山慈菇、连翘、夏枯草、半枝莲、土茯苓、猫爪草。

(2) 连翘金贝汤 (《肿瘤临证备要》)

〔组成与用法〕金钱草 30g, 土贝母 30g, 蒲公英 30g, 夏枯草 30g, 红藤 30g, 连翘 15g, 天花粉 20g, 草河车 30g, 野菊花 30g, 丹参 30g, 紫花地丁 20g, 干蟾皮 5g, 苦参 10g, 丹皮 10g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒, 消肿活血。主治乳腺癌。

〔加减应用〕便秘者, 加大黄、枳实; 流脓恶臭者, 加薏苡仁、半枝莲、白花蛇舌草。

5. 气血两虚证

主症: 乳中结块, 与胸壁粘连, 推之不动, 乳房遍生疙瘩, 头晕目眩, 气短乏力, 面白无华, 神疲消瘦, 纳呆, 舌质淡, 脉沉细无力。

治法: 益气养血, 佐解毒。

加减益气养荣汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕党参 15g, 白术 10g, 茯苓 10g, 炙甘草 6g, 陈皮 10g, 黄芪 30g, 当归 15g, 川芎 10g, 生地 15g, 白芍 15g, 丹参 15g, 白花蛇舌草 30g, 蚤休 30g, 香附 10g, 鹿角霜 (冲兑) 12g。水煎服。

〔功能主治〕补血健脾, 化瘀解毒。主治乳腺癌。

〔加减应用〕气虚甚者, 改党参为人参; 阴虚者, 加天冬、麦冬、沙参、鳖甲; 血水不净者, 加草河车、凤尾草、紫草、

蒲公英；出血不止者，加阿胶、地榆炭，甚则加三七粉；心烦失眠者，加茯神、酸枣仁、远志；肝气郁结者，加郁金、柴胡、青皮。

6. 脾虚痰湿证

主症：乳房肿块漫肿无边，边界不清，形体肥胖，多痰，胸脘痞闷，纳呆乏力，便溏，舌质淡胖，或伴有舌边有齿痕，苔白腻，脉滑。

治法：益气健脾，祛湿化痰。

参苓白术散加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 人参 10g，茯苓 12g，炒白术 10g，薏苡仁 12g，莲子肉 10g，砂仁 6g，桔梗 10g，炒扁豆 10g，山药 15g，蚤休 30g，石见穿 30g，甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气健脾，解毒渗湿。主治乳腺癌。

〔加减应用〕 乳房肿块漫肿无边，边界不清者，加海藻、昆布、贝母；偏热者，加蒲公英、夏枯草、野菊花、紫花地丁；偏寒者，加附片、炮姜；肿块痛甚者，加制乳香、制没药；食少者，加鸡内金、山楂、焦三仙；乏力自汗者，加黄芪、防风；湿浊甚者，加藿香、佩兰。

【辨病用方】

乳癌的辨病治疗，可根据不同病期选用不同治疗方法。乳癌初期邪气盛，正气未虚，多为实证，以祛邪为主，如清热解毒、活血化瘀、软坚散结、疏肝解郁、清气化痰等，佐以扶正；晚期邪盛正虚，以扶正为主，如益气养血、补益肝肾、健脾益肾、养血调肝、健脾和胃等，佐以祛邪。同时也要重视药物的局部治疗，分别选用解毒散结、化瘀消肿、生肌敛疮等药物。并根据现代药理研究结果，选用治疗乳腺癌有效的中药：如山慈菇、蒲公英、白花蛇舌草、半枝莲、夏枯草、草河车、郁金、白英、蛇莓、蜀羊泉。肺转移加沙参、麦冬、鱼腥草、川贝、土茯苓、百部等；肝转移加茵陈、龙葵、八月札、凌霄

花、炙鳖甲、炮山甲；骨转移加川断、牛膝、透骨草、鹿衔草、木瓜、威灵仙等。

1. 乳腺癌初期体质较实者用方

(1) 解毒化瘀汤（中原医刊，1984，5）

〔组成与用法〕 瓜蒌、半枝莲各 30g，白蒺藜 15g，青皮、陈皮各 12g，柴胡、当归、郁金、三棱、贝母、赤芍、莪术、丝瓜络各 9g。水煎服。

〔功能主治〕 疏肝解郁，化瘀散结。主治乳腺癌。

〔加减应用〕 乳房肿块红肿、疼痛者，加蒲公英、紫花地丁、夏枯草、金银花；阴虚甚者，加生地、玄参、天花粉、地骨皮；心烦、舌尖红者，加生地、木通、栀子、淡豆豉；大便结者，加大黄、芒硝、厚朴。

〔临床报道〕 配合化疗治疗 4 例乳腺癌。结果在治疗 40～55 天后乳房肿块消失，观察 14～28 个月均无异常。

(2) 牡蛎贝母汤（《肿瘤的诊治与防治》）

〔组成与用法〕 生牡蛎 30g，夏枯草 12g，海藻 12g，海带 12g，蜂房 10g，天花粉 10g，玄参 6g，川贝母 5g，蜈蚣 5g。水煎服。

〔功能主治〕 活血解毒，软坚散结。主治乳腺癌。

〔加减应用〕 肝气郁结者，加郁金、柴胡、青皮、丝瓜络；热甚者，加蒲公英、野菊花、紫花地丁；乳房胀痛甚者，加王不留行、川楝子、延胡索、五灵脂、丝瓜络。

(3) 化痰散结汤（《新编抗肿瘤药物手册》）

〔组成与用法〕 夏枯草 30g，海藻 30g，昆布 30g，橘络 9g，丝瓜络 9g，皂角 30g，银柴胡 9g，葛根 9g，青皮 9g，牡蛎 10g，鹿角胶（烊化）10g，制鳖甲（先煎）10g，土茯苓 10g，菟丝子 10g，蜈蚣 3 条，廑虫 3g，丹参 15g，当归 9g，三棱 9g，莪术 9g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰软坚，活血破坚。主治乳腺癌。

[加减应用] 流脓恶臭或发热者，加薏苡仁、蒲公英、野菊花、紫花地丁。

(4) 乳癌消肿方（《实用肿瘤学》）

[组成与用法] 铁树叶 15g，山慈菇 15g，凤尾草 9g，刘寄奴 9g，蜂房 9g，蜣螂 9g，鬼箭羽 9g，白毛藤 30g，猫爪草 30g，蛇蜕 3g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒，消肿散结。主治乳腺癌。

[加减应用] 肿块已破溃者，加生黄芪、土茯苓、太子参；阴虚甚者，加麦冬、天冬、生地、天花粉；热甚者，加蒲公英、夏枯草、野菊花；偏寒加桂枝、细辛、炮姜。

(5) 复方三甲汤（云南中医杂志，1993，5）

[组成与用法] 柴胡 20g，丹皮 20g，郁金 20g，三棱 20g，白术 20g，鳖甲（先煎）20g，生牡蛎（先煎）30g，甲珠 15g，全蝎 6g，红花 10g，白花蛇舌草 15g，甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 疏肝健脾，通络化瘀，软坚散结。主治乳腺癌。

[加减应用] 肝经湿热伴心烦易怒者，加山栀、夏枯草；乳房疼痛者，加川楝子、延胡索、橘核；阴虚者，加生地、枸杞子；气血虚弱者，加黄芪、当归；中阳虚弱者，加炮干姜、附片。

(6) 消核丹（江苏中医，2000，9）

[组成与用法] 白芥子 12g，王不留行 12g，七叶一枝花 12g，八角金盘 6g，薏苡仁 40g，全瓜蒌 12g，香附子 12g，仙灵脾 15g，仙鹤草 30g，炮山甲 9g，黄芪 30g，当归 12g。水煎服。

[功能主治] 疏肝理气，清热解毒，活血化瘀。主治乳腺癌。

[加减应用] 局部疼痛甚者，加延胡索、郁金；伴有淋巴结转移者，加天葵子、海藻、浙贝、昆布；骨转移者，加补骨

脂、透骨草；肺转移者，加南沙参、北沙参、云雾草；失眠者，加浮小麦、炙甘草、生龙骨、生牡蛎；乳头流水者，加金樱子、蒲公英、乌梅；胸胁闷胀不舒者，加伸筋草、威灵仙。

(7) 仙人山甲汤（《抗癌植物药及其验方》）

〔组成与用法〕 瓦松 100g，野菊花 100g，半枝莲 15g，黄柏 15g，金银花 15g，川楝子 15g，炙鳖甲（先煎）12g，仙人掌 12g，山楂 50g，穿山甲（先煎）6g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，消肿散结。主治乳腺癌。

〔加减应用〕 淋巴结转移者，加海藻、昆布、夏枯草、牡蛎、薏苡仁；口干甚者，加麦冬、沙参、天花粉；热甚者，加蒲公英、金银花、野菊花；瘀重者，加桃仁、泽兰、三棱、莪术、丹参；气阴两虚、短气自汗者，加黄芪、人参。

(8) 夏枯甲珠汤（《段凤舞肿瘤积验方》）

〔组成与用法〕 蒲公英 10g，紫花地丁 10g，远志 10g，官桂 10g，瓜蒌 60g，甲珠 6g，天花粉 6g，甘草 6g，夏枯草 15g，金银花 6g，当归 30g，桔梗 15g，黄芪 15g，白芷 15g，赤芍 6g，薤白 15g。文火水煎，1日1剂，分3次饭后服。

〔功能主治〕 清热化痰，扶正托毒。主治乳腺癌。

〔加减应用〕 伴有淋巴结转移者，加薏苡仁、海藻、牡蛎、玄参；肿瘤已破溃者，去蒲公英、紫花地丁，倍用黄芪；实证者，加枳实、青皮；寒证者，改官桂 18g；热证者，加黄芩、黄连、柴胡。

(9) 一枝箭方（《外科医学心境录》）

〔组成与用法〕 白及 4.5g，天花粉 3g，白芷 3g，牙皂 3g，金银花 5g，乳香 3g，半夏 3g，川贝母 3g，穿山甲 4g，当归 4g，甘草 1.5g。共为细末，生姜 2 片，水煎去渣，入黄酒一小杯，分 2 次服。

〔功能主治〕 活血解毒，化痰散结。主治乳腺癌。

(10) 蜈蝎散（《肿瘤的辨证论治》）

〔组成与用法〕 蜈蚣 10g, 全蝎 10g, 穿山甲 12g, 海马 10g。上药焙干研末, 1 次 1g, 1 日 2 次, 黄酒送下。

〔功能主治〕 活血解毒。主治乳腺癌。

(11) 紫金留行散 (《段凤舞肿瘤积验方》)

〔组成与用法〕 紫金锭 12g, 王不留行 30g, 猫眼草 30g, 金银花 30g, 冰片 0.6g。将王不留行、猫眼草、金银花制成浸膏干粉, 再加紫金锭、冰片, 研细和匀, 1 次 1.5~3g, 1 日 4 次。

〔功能主治〕 消肿散结, 活血解毒。主治乳腺癌。

(12) 木鳖子散 (《肿瘤的诊治与防治》)

〔组成与用法〕 木鳖子 15g (去壳切片, 烧存性), 炒五灵脂 15g, 白芷 15g, 雄黄 6g, 制乳香 3g, 制没药 3g, 冰片 1.5g。共为细末, 米饭捣烂为丸, 1 次 1.5~3g, 1 日 2 次。

〔功能主治〕 活血, 解毒, 散结。主治乳腺癌。

(13) 西黄解毒胶囊 (加味犀黄丸) (中国中医研究院广安门医院经验方)

〔组成与用法〕 人工牛黄 10g, 制乳香 15g, 制没药 15g, 海龙 15g, 黄芪 30g, 山慈菇 30g, 香橼 30g, 炒三仙 30g, 夏枯草 60g, 三七粉 60g, 首乌 60g, 薏苡仁 60g, 紫花地丁 60g, 莪术 60g, 仙灵脾 60g。共研细末, 水泛为丸, 1 次 3g, 1 日 2 次。

〔功能主治〕 活血解毒, 软坚散结。主治乳腺癌。

(14) 瓜蒌银蜂丸 (《癌瘤中医防治研究》)

〔组成与用法〕 瓜蒌 90g, 丹皮 60g, 金银花 60g, 露蜂房 60g, 蛇蜕 60g, 全蝎 60g。共研细末, 水泛为丸, 1 次 3g, 1 日 3 次。黄芪煎水送服或温开水送下。

〔功能主治〕 疏郁解毒, 软坚散结, 活血止痛。主治乳腺癌。

(15) 延中丸 (《肿瘤的诊治与防治》)

〔组成与用法〕白花蛇舌草 75g, 干蟾蜍 5 个, 鳖甲 150g, 黄精 60g, 丹参 60g, 三棱 60g, 莪术 60g, 僵蚕 60g, 青黛 60g。共为细末, 水泛为丸, 代赭石为衣。1 次 6g, 1 日 3 次。

〔功能主治〕清热解毒, 活血散结。主治乳腺癌。

(16) 制马钱子丸 (《肿瘤诊断与防治》)

〔组成与用法〕制马钱子 9g, 甘草 2.5g, 川芎 6g, 雄黄 3g, 炮山甲 9g, 当归 9g, 全蝎 6g, 蜈蚣 6g。油炸制马钱子至黄色, 与上药共为细末, 炼蜜为丸, 1 次 1.5g, 1 日 2 次。

〔功能主治〕活血解毒, 软坚散结。主治乳腺癌。

2. 乳腺癌中晚期体质较虚者用方

(1) 参芪莪术汤 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕莪术 10g, 黄芪 30g, 太子参 30g, 茯苓 12g, 白术 12g, 枸杞子 10g, 仙灵脾 10g, 菟丝子 12g, 青皮 10g, 漏芦 10g, 夏枯草 15g, 半枝莲 20g, 白花蛇舌草 30g, 生甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕益气养血, 解毒散结。

〔加减应用〕热甚者, 加金银花、红藤、连翘、紫花地丁、野菊花; 瘀血甚者, 加丹参、三棱、莪术、生牡蛎、虻虫。

(2) 乳安方 (上海中医药大学学报, 2002, 3)

〔组成与用法〕黄芪 30g, 太子参 30g, 茯苓 12g, 白术 12g, 鹿角片 9g, 灵芝 12g, 肉苁蓉 12g, 薏苡仁 15g, 白花蛇舌草 15g, 露蜂房 9g。水煎服。

〔功能主治〕扶正祛邪。主治乳腺癌。

〔加减应用〕肝郁气滞者, 加柴胡、郁金、香附、当归、白芍、八月札; 肝火旺盛者, 加丹皮、山栀; 肝肾亏虚、冲任失调者, 加女贞子、旱莲草、枸杞、生地黄、仙灵脾、首乌、当归、鸡血藤; 脾失健运、气血亏虚者, 加陈皮、法半夏、当归、白芍、熟地黄、远志、枣仁、炒谷芽、麦芽、苏梗。毒邪蕴结者, 加七叶一枝花、蛇六谷、鹿衔草、土茯苓、石见穿、

凤尾草、乳香、延胡索；放化疗所致骨髓抑制、白细胞下降者，加白芍、熟地、当归、黄精、阿胶、龟甲、何首乌；肺及胸膜转移、咯血、胸痛者，加生地、沙参、麦冬、野百合、猫爪草、山慈菇、藕节、仙鹤草、鱼腥草；肝转移、胁痛腹胀者，加茵陈、山梔、夏枯草、七叶一枝花、蜀羊泉、垂盆草；骨转移者，加独活、川断、杜仲、补骨脂、怀牛膝、延胡索；痛入骨髓者，加蜈蚣、壁虎、土茯苓。

〔临床报道〕配合化疗治疗乳腺癌术后患者 288 例，3 年、5 年生存率分别为 96.4%，90.5%。

(3) 乳康汤（湖南中医学院学报，1995，2）

〔组成与用法〕太子参 15g，白芍 12g，黄芪 12g，枸杞子 15g，天花粉 12g，丹参 12g，田三七 3g，半枝莲 15g，白花蛇舌草 15g，龙眼肉 30g。水煎服。

〔功能主治〕益气养阴，活血解毒。主治乳腺癌。

〔加减应用〕白细胞减少者，加补骨脂、女贞子；患侧上肢肿胀者，加薏苡仁、桑枝；伤口感染者，加蒲公英、鱼腥草等。

〔临床报道〕配合手术或防化疗治疗 36 例，有效率为 69.4%。

(4) 牡蛎橘叶汤（《活血化瘀疗法临床实践》）

〔组成与用法〕赤芍 9g，白芍 9g，生黄芪 30g，金银花 15g，半枝莲 30g，生首乌 12g，当归 6g，夏枯草 15g，煅牡蛎（先煎）24g，蒲公英 30g，甘草 6g，大生地 15g，金橘叶 9g。水煎服。

〔功能主治〕益气养阴，解毒散结。主治乳腺癌。

〔加减应用〕肝肾阴虚者，加女贞子、旱莲草、玄参、山茱萸；气虚乏力者，加黄芪、人参、白术；肿块未溃者，加白芥子、王不留行、穿山甲。

(5) 益气解毒汤（上海中医药杂志，1992，3）

〔组成与用法〕 党参、白术、海藻、黄药子各 12g，黄芪、夏枯草各 15g，首乌 10g，鹿衔草、半枝莲、白花蛇舌草各 30g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气，解毒散结。主治乳腺癌。

〔加减应用〕 在化疗期间，改用太子参、白术、黄精、首乌、补骨脂、仙灵脾、菟丝子各 12g，黄芪、鸡血藤 15g，半夏 9g，陈皮、砂仁壳各 6g 内服；放疗期间，改用太子参、石斛、芦根、知母、女贞子各 12g，黄芪、半枝莲各 15g，天冬、麦冬、五味子各 9g，蒲公英 30g，内服。

〔临床报道〕 治疗 76 例乳腺癌术后化疗或放疗者，连续服药 2 年左右，随访 2~8 年，65 例患者健康状况良好。

(6) 柴胡慈菇汤（浙江中医学院学报，1993，2）

〔组成与用法〕 柴胡 12g，香附 12g，郁金 12g，山慈菇 15g，菟丝子 15g，仙灵脾 15g，藤梨根 30g，猫爪草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 滋肾疏肝，解毒散结。主治乳腺癌。

〔加减应用〕 放、化疗期间，加和胃降逆之品；长夏，加健脾化湿之味；春季，加养血柔肝之药。

〔临床报道〕 治疗 50 例乳腺癌术后放、化疗者，连续服药 1 年以上，5 年、10 年的生存率分别为 66%、56%。

(7) 扶正升血调元汤（中国中西医结合杂志，1995，4）

〔组成与用法〕 女贞子 20g，党参、鸡血藤、白术、黄精各 15g，何首乌、骨碎补、麦芽各 10g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾。主治乳腺癌。

〔临床报道〕 配合放、化疗治疗 14 例Ⅲ~Ⅳ期乳腺癌患者，1、3、5 年的生存率分别为 85.7%、50%、35.7%。

3. 乳腺癌骨转移专方

(1) 白鹿止痛汤加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 熟地黄 20g，白芥子 10g，炮姜炭 5g，炙麻

黄 8g, 桂枝 10g, 鹿角胶 (烊化) 10g, 白花蛇舌草 30g, 夏枯草 15g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 通脉, 散寒化痰。主治乳腺癌骨转移疼痛者。

[加减应用] 疼痛甚者, 加乳香、没药; 痰瘀阻滞经络者, 加炮山甲、胆南星。

(2) 骨瘤方 (中国中西医结合杂志, 2003, 4)

[组成与用法] 黄柏 10g, 薏苡仁 30g, 丹参 20g, 牛膝 15g, 桑寄生 20g, 知母 10g, 生地 20g, 鹿角霜 20g, 桂枝 6g, 女贞子 15g, 旱莲草 15g。水煎服。

[功能主治] 补肝益肾, 化瘀解毒。主治乳腺癌骨转移疼痛。

[临床报道] 联合放疗治疗乳腺癌骨转移止痛有效率为 95.0%; 生存质量提高稳定率为 95.0%, 病灶骨代谢治疗后有效率为 52.5%。

(3) 羊泉慈菇汤 (《实用中医乳房病学》)

[组成与用法] 独活 9g, 生地 15g, 熟地 15g, 当归 15g, 山茱萸 9g, 川续断 12g, 杜仲 9g, 怀牛膝 15g, 蜀羊泉 30g, 山慈菇 15g, 肿节风 15g, 白花蛇舌草 30g, 桃仁 12g, 制香附 12g, 延胡索 12g。水煎服。

[功能主治] 补肾益精, 解毒。主治乳腺癌骨转移。

[加减应用] 血瘀重者, 加三棱、莪术; 痛入骨髓者, 加蜈蚣、僵蚕、土茯苓; 阴虚内热、消瘦者, 加鳖甲、地骨皮; 骨软无力者, 加鹿角片、巴戟天、黄精; 骨肿痛甚者, 加蚤休、石见穿、延胡索、寻骨风。

(4) 复方寻骨风汤 (辽宁中医杂志, 2001, 4)

[组成与用法] 寻骨风 15g, 威灵仙、地龙各 12g, 汉防己 10g, 川续断 12g, 廔虫 10g。水煎服。

[功能主治] 强筋壮骨, 化瘀通络。主治乳腺癌骨转移疼痛。

〔加减应用〕 气血亏虚型，加生黄芪，生白术，枸杞子；气滞湿阻型，加八月札，制半夏；瘀血阻滞型，加莪术、炮山甲。

〔临床报道〕 配合化疗治疗晚期乳腺癌骨转移疼痛患者 53 例，中药止痛疗效明显优于对照组，患者生存质量明显提高。

(5) 慈菇二胶汤（吉林中医药，1998，2）

〔组成与用法〕 当归 12g，鹿角胶（烊化）10g，龟甲胶（烊化）10g，石斛 15g，蜈蚣 2 条，鸡血藤 30g，肉苁蓉 10g，杜仲 10g，生地 10g，穿山甲 10g，枸杞子 10g，百合 10g，蜃虫 6g，生石膏 20g，黄芪 30g，白术 10g，瓜蒌 10g，陈皮 10g，山慈菇 20g。水煎服。

〔功能主治〕 滋补肝肾，调理阴阳，软坚散结，辅以解毒散热。主治乳腺癌骨转移疼痛者。

〔加减应用〕 配合口服自制骨瘤散。

〔临床报道〕 治疗 30 例，总有效率为 96.16%。

(6) 秦艽寄生汤（李佩文经验方）

〔组成与用法〕 桑寄生 20g，秦艽 10g，桑枝 30g，木瓜 15g，苏木 10g，骨碎补 10g，透骨草 10g，海桐皮 10g，千年健 10g，茜草 10g，狗脊 10g，徐长卿 10g。水煎服。

〔功能主治〕 通阳壮骨，祛风止痛。主治乳腺癌骨转移疼痛者。

〔加减应用〕 针对焦虑、神志不安症状者，加用安神、解郁、除烦、宁心之剂。

4. 乳腺癌肺及胸膜转移方

(1) 仙鹤蛇舌汤（《实用中医乳房病学》）

〔组成与用法〕 北沙参 15g，生地 15g，麦冬 12g，百合 12g，黄芩 10g，全瓜蒌 15g，藕节 5 枚，仙鹤草 30g，白花蛇舌草 30g，夏枯草 15g，徐长卿 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热生津，活血解毒。主治乳腺癌肺及胸膜

转移者。

〔加减应用〕 阴虚潮热者，加龟甲、地骨皮；气阴两虚、短气自汗者，加黄芪、人参；脾虚痰多腹胀甚者，加炒白术、鱼腥草；气滞血瘀胸痛、痰色褐者，加延胡索、三七粉。

(2) 复方十枣汤（江苏中医杂志，1987，11）

〔组成与用法〕 党参 12g，黄芪 12g，茯苓 12g，白术 9g，山药 9g，太子参 15g，北沙参 15g，麦冬 12g，百合 12g，龙葵 15g，胆南星 9g，守宫 3g，炒葶苈子 9g，白芥子 9g。水煎服。十枣丸 3g 吞服。

〔功能主治〕 益气养阴，化痰逐水。主治乳腺癌有胸腔积液者。

〔加减应用〕 乳房肿块明显伴胀痛者，加瓜蒌、夏枯草、八月札、山慈菇、制乳香；脾虚纳差者，加党参、鸡内金、山楂；胸腹胀痛甚者，加木香、王不留行、炒枳壳、香附、橘叶；情绪抑郁、烦躁易怒者，加郁金、栀子、淡豆豉。

5. 乳腺癌肝转移方

蚤休羊泉汤（《实用中医乳房病学》）

〔组成与用法〕 茵陈 12g，炒山栀 9g，全当归 12g，党参 12g，炒白术 12g，茯苓 12g，白花蛇舌草 30g，蚤休 30g，蜀羊泉 30g，徐长卿 30g，制香附 12g，延胡索 12g。水煎服。

〔功能主治〕 益气活血，清热解毒。主治乳腺癌肝转移者。

〔加减应用〕 血瘀重者，加桃仁、泽兰、三棱、莪术；阴虚胃热、口鼻牙龈出血者，加生地、川牛膝、芦根；脾虚腹胀尿少者，加大腹皮、车前子、牵牛子、鸡内金；大便干燥者，加大黄、枳实、全瓜蒌；肝肿胀满者，加鳖甲、炮山甲、生牡蛎、石见穿。

6. 乳腺癌外用方

(1) 二黄莪贝膏（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 山慈菇 30g，土贝母 30g，莪术 50g，生栀

子 30g, 马钱子 10g, 生香附 30g, 生南星 30g, 生半夏 40g, 雄黄 15g, 藤黄 15g, 醋膏适量。上药共研细末, 用醋膏调和成糊状, 将糊膏摊于核块上。醋膏制法: 用上好米醋 (陈久者佳), 文火煎至 1/4 为度, 冬季可凝结不散, 夏季可略加白醋少许。

【功能主治】解毒散结。主治乳腺癌及肿瘤转移性淋巴结肿大未破溃者。

(2) 芙蓉四黄膏 (《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】芙蓉叶 50g, 泽兰叶 50g, 黄柏 50g, 黄芩 50g, 黄连 50g, 大黄 50g, 冰片 6g。上药除冰片外研粉, 过重箩, 入冰片, 用凡士林调成 20% 软膏, 外敷于患处。

【功能主治】清热解毒, 祛湿。主治乳腺癌伴感染者。

(3) 三黄膏 (《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】①大黄 250g, 冰片 15g, 黑矾 120g, 青黛 60g, 生石膏 60g。②大黄 250g, 生石膏 180g, 青黛 60g, 冰片 30g, 木鳖子 30g, 黄柏 30g, 苍耳子 30g, 朴硝 30g。③大黄 250g, 生石膏 250g, 五倍子 60g, 明矾 30g, 马钱子 30g, 冰片 30g, 黄丹 30g, 皂刺粉 30g, 蟾蜍 60g。以上 3 方分别研细末, 各加桐油 500g, 调制成油膏, 根据肿块大小, 取适量油膏外搽肿处, 1 日 1~2 次, 3 方交替使用。

【功能主治】清热解毒。主治乳腺癌。

【对症用方】

乳腺癌的对症治疗主要是针对手术、放疗、化疗及其所出现的不良反应, 采用相应的中药治疗。

1. 乳腺癌化疗专方

(1) 癌复康加减 (潘敏求经验方)

【组成与用法】人参 10g, 黄芪 30g, 白术 10g, 茯苓 10g, 枸杞子 10g, 女贞子 10g, 菟丝子 10g, 广木香 10g, 仙灵脾 10g, 法半夏 10g, 砂仁 5g, 旱莲草 15g, 夏枯草 15g, 白花蛇

舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾, 和胃理气。用于乳腺癌化疗后脾虚肾亏, 气血不足者。

〔加减应用〕 恶心呕吐甚者, 加姜竹茹、代赭石; 气虚多汗者, 加山茱萸、煅牡蛎; 腹泻者, 加吴茱萸、黄连、神曲。便溏者, 加薏苡仁、扁豆、莲子; 纳呆者, 加山楂、鸡内金。

(2) 调肝补脾汤 (上海中医药杂志, 2004, 10)

〔组成与用法〕 生黄芪 30g, 太子参 20g, 白术 15g, 茯苓 12g, 苏梗 12g, 黄精 9g, 鹿角片 (烱兑) 5g, 生苡仁 12g, 灵芝 9g, 白花蛇舌草 12g, 龙葵 15g, 露蜂房 5g, 丹参 15g, 肉苁蓉 9g, 红枣 20g, 枣仁 15g, 珍珠母 30g, 仙灵脾 12g, 虎杖 15g, 杜仲 15g, 生甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾和胃, 调补肝肾。主治乳腺癌化疗后正虚瘀毒未尽者。

〔加减应用〕 随着四季气候变化、证候变化加减用药, 春季, 加金银花、连翘、菊花、板蓝根、苦丁茶等清热解毒; 夏季, 加藿香、佩兰、苍术、厚朴、荷叶等芳香化湿醒脾; 秋季, 加玄参、沙参、天冬、百合、枸杞子等养阴润肺; 冬季, 加菟丝子、蚕茧壳、熟地黄、阿胶 (烱冲)、何首乌等温补肝肾。治疗期间出现胃脘不适者, 加绿萼梅、谷芽、麦芽。

(3) 脾肾汤加减 (中国中西医结合杂志, 1997, 10)

〔组成与用法〕 党参、生黄芪各 30g, 熟地 20g, 当归、巴戟天、补骨脂各 15g, 白术、枸杞子、女贞子各 12g, 茯苓、紫河车、菟丝子各 10g, 甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾, 益气养阴。主治乳腺癌化疗后正气亏虚者。

〔临床报道〕 结合术前化疗治疗 30 例乳腺癌, 结果中药组在缓解病情方面的有效率明显高于对照组; 外周血白细胞的下降率明显低于对照组。

(4) 加味二仙汤 (中医杂志, 1995, 2)

〔组成与用法〕 生黄芪 15g, 党参 10g, 麦冬 10g, 白芍 15g, 当归 12g, 百合 10g, 丹参 10g, 仙茅 10g, 仙灵脾 10g, 陈皮 10g, 半夏 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 健脾补肾。主治乳腺癌化疗后气血不足者。

〔加减应用〕 血瘀征象明显者, 加川芎、茜草; 血虚者, 加鸡血藤、何首乌; 失眠者, 加五味子、远志、茯神。

(5) 首乌鹿藻汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 党参 12g, 黄芪 15g, 白术 12g, 何首乌 10g, 夏枯草 15g, 海藻 12g, 黄药子 12g, 鹿衔草 30g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气健脾, 清热解毒。用于乳腺癌术后正虚余毒未尽者。

〔加减应用〕 血瘀者, 加桃仁、泽兰、三棱、莪术、丹参; 气阴两虚、短气自汗者, 重用黄芪, 改党参为人参, 加五味子、防风、龙骨、牡蛎、麻黄根; 上肢肿胀、活动不利者, 加丝瓜络、王不留行、路路通、伸筋草、桑白皮、大腹皮。

2. 乳腺癌化疗期间及化疗后出现的骨髓抑制

(1) 八珍汤加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 人参 15g, 白术 10g, 茯苓 10g, 炙甘草 6g, 当归 15g, 川芎 10g, 生地 15g, 白芍 15g, 锁阳 10g, 巴戟天 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血, 补脾益肾。主治化疗引起的面色苍白、神疲乏力、头晕目眩、心烦失眠。

〔加减应用〕 血小板下降明显者, 加旱莲草、石斛、仙鹤草; 白细胞下降者, 加黄芪、枸杞子、女贞子、鸡血藤。

(2) 升血和中汤 (广西中医药, 2002, 4)

〔组成与用法〕 党参 20g, 黄芪 30g, 白术 20g, 陈皮 6g,

砂仁 10g, 半夏 6g, 茯苓 15g, 炙甘草 10g, 补骨脂 15g, 鸡血藤 30g, 山茱萸 12g, 阿胶 10g, 女贞子 12g, 枸杞子 12g, 淫羊藿 15g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血, 健脾和胃。主治乳腺癌化疗后气血不足者。

〔加减应用〕 呕吐严重者, 去阿胶, 加竹茹、代赭石; 心烦失眠者, 加百合、酸枣仁、夜交藤。

(3) 黄芪锁阳散 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 黄芪 4g, 白术 4g, 白茯苓 30g, 锁阳 4g, 枸杞子 4g, 甘草 2g, 败酱草 4g。上药共研细末, 分 3 次口服, 1 日 3 次。

〔功能主治〕 健脾益肾。主治乳腺癌化疗后气虚者。

〔加减应用〕 肾虚者, 加女贞子、旱莲草、菟丝子; 脾虚者, 加党参; 痰湿者, 加川贝母、全瓜蒌、白芥子、陈皮、半夏。

(4) 菟丝鸡血汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 太子参 12g, 黄芪 15g, 白术 12g, 黄精 12g, 首乌 12g, 鸡血藤 15g, 补骨脂 12g, 仙灵脾 12g, 菟丝子 12g, 法半夏 10g, 陈皮 6g, 砂仁 6g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾和胃, 补肾益精。主治乳腺癌化疗后脾肾两虚者。

〔加减应用〕 大便结者, 加生大黄、肉苁蓉; 口干舌红者, 加西洋参、石斛、天花粉、龟甲; 恶心、呕吐者, 加半夏、姜竹茹。

3. 乳腺癌放疗后出现放射性肺炎方

(1) 三参玉竹汤 (《实用中医乳房病学》)

〔组成与用法〕 黄芪 30g, 生地 30g, 玄参 15g, 南沙参 15g, 北沙参 15g, 麦冬 12g, 芦根 30g, 石斛 15g, 玉竹 10g, 金银花 15g, 白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 解毒清热。主治乳腺癌放疗

邪毒伤阴。

〔加减应用〕 胃阴不足、恶心呕吐者，加竹茹、代赭石；失眠、虚烦者，加百合、酸枣仁；血象偏低者，加黄精、制首乌。

(2) 公英二冬汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 太子参 12g，黄芪 15g，天冬 10g，麦冬 10g，石斛 12g，五味子 10g，芦根 15g，知母 12g，女贞子 12g，半枝莲 15g，蒲公英 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，清热解毒。主治乳腺癌放疗邪毒伤阴。

〔加减应用〕 恶心呕吐者，加半夏、砂仁、竹茹、陈皮；干咳、少痰者，加天花粉、玉竹、沙参、桑叶；白细胞下降者，加枸杞子、菟丝子、仙灵脾。

4. 乳腺癌术后上肢肿胀方

(1) 加减补阳还五汤（甘肃中医，2002，6）

〔组成与用法〕 黄芪 30g，当归 10g，川芎 10g，桃仁 10g，红花 10g，路路通 10g，泽泻 10g，陈皮 10g，木香 6g。水煎服。

〔功能主治〕 益气活血，利水通络。主治乳腺癌术后上肢肿胀。

〔加减应用〕 肢体疼痛明显者，加延胡索、全蝎；脾运不健者，加茯苓、白术；肝气不舒加柴胡、郁金。

〔临床报道〕 用该方治疗 19 例乳腺癌术后上肢肿胀患者，肢肿沉重感消失 12 例，缓解 7 例。

(2) 加减乳安方（上海中医药大学学报，2002，3）

〔组成与用法〕 黄芪 30g，太子参 30g，茯苓 12g，白术 12g，鹿角片（烊兑） 9g，灵芝 12g，肉苁蓉 12g，薏苡仁 15g，白花蛇舌草 15g，露蜂房 9g，桑枝 15g，鸡血藤 15g，丹参 15g，桃仁 9g，当归 9g，红花 9g，茯苓皮 15g。水煎服。

〔功能主治〕扶正祛邪，活血通络主治乳腺癌术后上肢肿胀。

(3) 消肿汤 (实用中医药杂志, 1999, 5)

〔组成与用法〕党参 15g, 秦艽 15g, 金银花 15g, 黄芪 30g, 大青叶 30g, 丹参 12g, 延胡索 12g, 茯苓 12g, 桃仁 9g, 汉防己 9g。水煎服。

〔功能主治〕益气养血，利水消肿，活血解毒。主治乳腺癌术后上肢肿胀。

〔临床报道〕治疗 68 例乳腺癌术后上肢肿胀患者，总有效率为 97.05%。

5. 治乳腺癌术后感染 (山西中医, 1996, 5)

(1) 化腐丹

〔组成与用法〕轻粉、红粉、煅石膏、广丹、火硝、没药、血竭、冰片，外敷。

〔功能主治〕祛除腐肉。用于乳腺癌患处溃疡脓腐较多者。

(2) 祛腐生肌散

〔组成与用法〕轻粉、朱砂、雄黄、黄柏、乳香、血竭、寒水石、冰片，外敷。

〔功能主治〕祛腐生肌。用于乳腺癌脓腐组织脱落，肉芽组织不红润者。

(3) 加减乳安方 (上海中医药大学学报, 2002, 3)

〔组成与用法〕黄芪 30g, 太子参 30g, 茯苓 12g, 白术 12g, 鹿角片 9g, 灵芝 12g, 肉苁蓉 12g, 薏苡仁 15g, 白花蛇舌草 15g, 露蜂房 9g, 当归 9g, 红花 6g, 桃仁 9g, 丹参 30g, 赤芍 9g, 白芍 9g。水煎服。

〔功能主治〕托里解毒，活血祛瘀。主治乳腺癌术后感染。

〔加减应用〕肩臂活动受限者，加鸡血藤、桑枝；创面溃烂者，加蒲公英、鹿衔草。

(4) 玉桂膏 (新中医, 2003, 3)

〔组成与用法〕肉桂、番木鳖、甘草、油茶树叶、当归、乳香、没药、蜂房、血余炭、冰片。将前9味药粉碎，过120目筛，麻油与黄蜡炉上融化后，将没药和冰片加入调匀，备用。将适量膏药摊于消毒敷料上，膏药表面覆盖单层生理盐水纱布，创面用酒精棉球消毒后，将药膏敷上，胶布固定，2天换药1次，6周为1个疗程。

〔功能主治〕活血祛瘀，清热解毒，祛腐生肌。主治乳腺癌术后感染。

〔临床报道〕用该方治疗21例乳腺癌术后出现皮瓣坏死患者，痊愈19例，好转2例。

(5) 桃红四物汤加减 (《实用中医乳房病学》)

〔组成与用法〕党参15g，黄芪30g，焦白术15g，茯苓15g，当归9g，红花6g，丹参30g，桃仁9g，赤芍9g，白芍9g，制首乌12g，砂仁3g，陈皮6g，姜半夏9g，制香附12g，白花蛇舌草30g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益气，活血解毒。主治乳腺癌术后感染。

〔加减应用〕心悸失眠者，加酸枣仁、远志、麦冬；头晕耳鸣者，加熟地；肩臂牵制受限者，加鸡血藤、桑枝；疮面感染者，加蒲公英；腐肉不脱者，改黄芪50g；疮面光红者，去党参改人参。

6. 乳腺癌肿块溃烂方

(1) 银花蛇舌汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕金银花25g，生黄芪25g，当归15g，白花蛇舌草30g，甘草7.5g，枸橘叶50片。以水、酒各半煎，1日1剂，1日2次。

〔功能主治〕清热解毒，养血活血。主治乳腺癌积久渐大，色赤出水，内溃深洞。

〔加减应用〕热毒盛者，加蒲公英、紫花地丁、夏枯草、野菊花；大便秘结者，加大黄、芒硝、枳壳；脾虚痰湿盛者，加

茯苓、白术、陈皮、半夏；肝气郁结者，加郁金、柴胡、青皮。

(2) 蜈蚣蝎黄丸（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 蒲公英 50g，全蝎 50g，大蜈蚣 1 条，血余炭 25g，雄黄 35g。上药共研细末，醋泛为丸，1 次 10g，白酒送服，1 日 2~3 次。

〔功能主治〕 清热解毒，活血止血。主治乳腺癌破溃腐烂者。

7. 乳腺癌所致胸痛方

(1) 三王止痛膏（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 大黄 50g，马钱子 15g，全蝎 30g，干蟾皮 30g，蚤休 60g，山慈菇 60g，姜黄 50g，麝香 1g，冰片 10g，红花 40g，桃仁 50g，当归 50g，血竭 30g，莪术 50g，蜈蚣 4 条，桂枝 60g，制乳、没各 30g，细辛 15g，各为细末和匀。取酌量药粉调入凡士林内，摊于纱布上，贴敷肿块处，隔日一换。

〔功能主治〕 化瘀软坚，解毒止痛。主治乳腺癌胸膜转移疼痛。

〔临床报道〕 用该膏贴敷治疗各种癌性疼痛患者，止痛总有效率为 93.3%，止痛平均持续时间 16.6 小时。

(2) 抗癌止痛散（《肿瘤的诊断与防治》）

〔组成与用法〕 山慈菇 30g，三七 30g，北重楼 30g，延胡索 30g，黄药子 30g，川乌 30g，冰片 9g。共为细末，1 次 3g，口服，1 日 3 次。

〔功能主治〕 解毒止痛。主治乳腺癌疼痛明显者。

【专病成药】

1. 复方红豆杉胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 红豆杉等。

〔功能主治〕 祛邪扶正，通络散结。主治气虚痰湿、气阴两虚、气滞血瘀而致的中、晚期乳腺癌。

[用量用法] 口服，1次2粒（每粒0.3g），1日3次。21天为1个疗程。

2. 复方斑蝥胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

[处方组成] 斑蝥、刺五加、莪术、熊胆粉、人参、三棱、山茱萸、甘草、黄芪、半枝莲、女贞子。

[功能主治] 破血消癥，攻毒蚀疮。主治乳腺癌及其术后的巩固治疗。也可与化疗、放疗配合使用，增效减毒。

[用法用量] 0.25g/粒，口服，1次2粒，1日3次。

3. 小金丸（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

[处方组成] 五灵脂、制草乌、地龙、木鳖、乳香、没药、当归身、麝香、墨炭等。

[功能主治] 散结消肿，化瘀止痛。主治乳腺癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

[用法用量] 每丸0.5g，1次2~5丸，1日2次。1个月为1个疗程。

4. 平消胶囊（《国家基本医疗保险目录》2004）

[处方组成] 郁金、仙鹤草、五灵脂、白矾、硝石、干漆、枳壳、马钱子粉。

[功能主治] 活血化瘀，止痛散结，清热解毒，扶正祛邪。主治乳腺癌。（现代肿瘤医学，2005，2）

[用法用量] 口服，1日3次，1次4~8粒。60天1个疗程。

5. 西黄丸（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

[处方组成] 麝香、牛黄、炙乳香、炙没药。

[功能主治] 解毒散结，消肿止痛。主治乳腺癌。（浙江中西医结合杂志，2001，4）

[用法用量] 1次3g，1日2次，温开水送服。

6. 艾迪注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

[处方组成] 人参、黄芪、刺五加、斑蝥

【功能主治】 清热解毒、消瘀散结。适用于乳腺癌及术后的巩固治疗。也可与化疗药物配合使用，减少化疗药物用量，增强疗效，减少毒副作用。（山东医药，2005，7）

【用法用量】 成人一次 50~100ml，加入 0.9% 氯化钠注射液或 5%~10% 葡萄糖注射液 400~500ml 中静脉滴注，1 日 1 次；与放、化疗合用时，疗程与放、化疗同步；手术前后使用本品 10 天为 1 个疗程；单独使用 15 天为 1 周期，间隔 3 天，2 周期为 1 个疗程；晚期恶病质病人，连用 30 天为 1 个疗程，或视病情而定。

7. 乳康片（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

【处方组成】 生牡蛎、夏枯草、生黄芪、丹参、玄参、没药、乳香、天冬、瓜蒌、鸡内金、白术、海藻、浙贝母、三棱、莪术等。

【功能主治】 疏肝解郁，软坚散结，活血理气。主治乳腺癌术后后遗症及各种乳痛症。（黑龙江医药，2005，1）

【用法用量】 口服，1 次 2~3 片（每片 0.3g），1 日 3 次，饭后服。20 天为 1 个疗程，间隔 5~7 天，继服第 2 个疗程，也可连续服用。

8. 乳疾灵颗粒（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

【处方组成】 海藻、鸡血藤、牡蛎、淫羊藿、丹参等。

【功能主治】 疏肝解郁，调理冲任，散结消痛。主治乳腺肿瘤。

【用法用量】 开水冲服，1 次 14~28g，1 日 3 次。

【专病单方】

1. 大蟾蜍 用法：①大蟾蜍 1 只，捣烂如泥外敷于患处，用纱布包扎 1 天。②干蟾皮 1.5g，麝香 1.5g，香油 10ml，干蟾皮、麝香研细末，香油调匀外敷患处。功用：清热解毒。主治：湿疹样乳腺癌及乳腺癌肿块未溃者。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 益母草 用法：每取 2500g，切碎，水煎浓液，频频外

洗患处。功用：清热解毒，活血消肿。主治：乳腺癌未破溃者。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 麻黄叶 用法：每取 30g，鲜品捣烂，外敷于患处，每 2 天 1 次。功用：收敛固涩。主治：乳腺癌皮肤破溃不收口者。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 蛇蛻 用法：每取适量与蜂房、全蝎等份共研细末，组成消癌散，1 次 3g，1 日 3 次。开水送服。1 个月为 1 个疗程。功用：活血解毒。主治：乳腺癌。（《肿瘤病防治》）

5. 刺蒺藜 用法：每取 1000g，带刺炒干，研细末，白开水调糊状不拘时服，每天 3 次。功用：行气活血。主治：乳腺癌疼痛。孕妇及气血虚弱者慎服。（《方龙潭家秘方》）

6. 胡芦巴 用法：①胡芦巴 200g，置于盐水中，炒干研末，1 次 15g，每天 1 次，黄酒送服。②胡芦巴 15g，加木瓜 15g，共研末，黄酒送服，1 日 1 次。功用：散寒止痛。主治：乳腺癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 了哥王 用法：每取 60g，研末，用冷开水或米酒调服，1 次 1.5g，1 日 2 次。功用：清热解毒，消肿止痛。主治：乳腺癌。注意：本品宜久煎（4 小时以上）以减低本品毒性。中毒现象为呕吐、头晕、腹泻等，可用米汤解之。孕妇忌服。（《湖南中草药单方验方选编》）

8. 千斤藤 用法：每取 15g 冲水当茶频饮；或 1kg 加水 4kg，煎成 1kg 药液，1 次 50ml 口服，1 日 3 次；或适量研末，炼蜜为丸如黑豆大小，1 次 7 丸，1 日 2 次。功用：清热解毒，祛风活络。主治：乳腺癌。（《抗癌植物药及其验方》）

9. 小蓟 用法：鲜小蓟草 120g，洗净打烂绞汁，用陈酒 60~90g 冲服，1 日 2 次。功用：清热解毒，凉血消肿。主治：乳腺癌。（《癌症秘方验方偏方大全》）

10. 白蔹 用法：鲜白蔹 15g，与红糖 9g 捣烂外敷患处。功用：清热解毒，消痈散结，生肌止痛。主治：乳腺癌初起。

(《癌症秘方验方偏方大全》)

11. 苦参 用法：①苦参 30g，捣烂外敷患处。②苦参 50g，白矾 20g，五倍子 50g，上药研极细末，按伤口大小取适量药粉外撒患处，或用蛋黄油调膏，敷患处，每日换药 1~2 次。功用：清热解毒，燥湿，利尿，杀虫。①方主治乳腺癌初起，②方主治乳腺癌晚期，溃破流脓血或疼痛，伤口不愈合者。(《中华肿瘤治疗大成》)

12. 王不留行 用法：每取 15g，水煎服，1 日 1 次。功用：活血通经，下乳消肿。主治：乳腺癌。(《中华肿瘤治疗大成》)

13. 天茄子 用法：取天茄子鲜叶晒干或烘干研粉高压消毒，将药粉撒在溃疡面上，覆盖消毒纱布，1 日 1~2 次。换药时用生理盐水冲洗患处，再撒药粉。功用：祛风止痛，散瘀消肿，祛腐敛疮。主治：乳腺癌溃疡。(《中药大词典》)

14. 槲寄生 用法：每取 30g，洗干净，切碎，水煎去渣，加红糖 10g 调味饮，1 日 3 次，代茶饮。功用：滋补肝肾。主治：乳腺癌肝肾虚者。(《中华肿瘤治疗大成》)

15. 仙人掌 用法：仙人掌鲜品捣烂，外敷。功用：清热解毒，行气活血。主治：乳腺癌。(《中医肿瘤学》)

16. 山慈菇 用法：山慈菇鳞茎 40~50g，研细末，1 次 0.5g，1 日 4 次，40~50g 为 1 个疗程。功用：清热解毒。主治乳腺癌。(《中华肿瘤治疗大成》)

17. 猪殃殃 用法：鲜猪殃殃 120g，捣汁和以猪油敷于癌症溃烂处，也可煎水内服。功用：清热解毒，利尿消肿。主治：乳腺癌。(《经验方》)

18. 薜荔果 用法：①薜荔果 3 个，切碎，加黄酒及水合煎，以陈酒送服。②薜荔果、鹿角尖等份，研细末，1 次 10g，黄砂糖拌和，陈酒送服。功用：活血解毒，祛湿消肿。主治：乳腺癌。(《肿瘤科中西药物手册》)

19. 全蝎 用法：每取 6 个，加胡桃 6 个，共研细末，分 6 等份，1 次 1 份，1 日 3 次，黄酒送服。功用：解毒消肿。主治：乳腺癌未破溃者。（《中华肿瘤治疗大成》）

20. 凤仙花 用法：凤仙花干品 5g 或鲜品 15g，以酒煎服，1 日 1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒。主治：乳腺癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

21. 黄鱼脊翅 用法：黄鱼脊翅 10~20 条，贴在石灰壁上，勿沾水，愈久愈好，火炙研末，1 次 5~10g，陈酒送服，1 日 2 次，30 天为 1 个疗程。功用：解毒消肿。主治：乳腺癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

22. 夏枯草 用法：每取 60~90g，煎水冲服牛黄 0.9g，1 日 2 次。功用：清热解毒，消肿散结。主治：乳腺癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

23. 猕猴桃根 用法：每取 75g，加水 1000ml，煎煮 3 小时以上，1 日 1 剂，10~15 日为 1 个疗程，休息 3~5 天再服，共 4 个疗程。功用：解毒消肿。主治：乳腺癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

24. 半枝莲 用法：每取 30g，配金刚刺 30g、白花蛇舌草 30g 水煎服。功用：清热解毒消肿。主治：乳腺癌红肿疼痛者。（《中华肿瘤治疗大成》）

25. 穿山甲 用法：①每取 30g，加皂角刺 30g，上药共研细末，外敷患处。功用：解毒消肿散结。主治：乳腺癌破溃者（《中华肿瘤治疗大成》）。②每取 250g，配土贝母 50g，香附 250g。共研细末，水泛为丸，1 次 3g，1 日 2 次。功用：清热解毒，消肿散结。主治：乳腺癌。（《中草药验方选编》）

26. 壁虎 用法：每取 2 条，浸于香油 100g 中 2 个月，用纱布蘸油外涂患处。功用：清热解毒。主治：乳腺癌破溃者。（《中华肿瘤治疗大成》）

27. 半边莲 用法：鲜半边莲 30g，鲜佛甲草 30g，捣烂

敷患处，1日1~2次。功用：清热解毒，祛湿。主治：乳腺癌破溃者。（《中华肿瘤治疗大成》）

28. 斑蝥 用法：每取鲜鸡蛋1个，鸡蛋一头开口，将斑蝥3只去头、翅、足，纳入蛋中，外用纸封好，蒸熟后去斑蝥吃鸡蛋，1日1次。功用：活血解毒。主治：乳腺癌未破溃者。（《中华肿瘤治疗大成》）

29. 五倍子 用法：每取60g，配乳香60g、没药60g、鸦胆子（去壳）20g，上药捣烂，米醋1250g，慢火熬成膏，摊于布上外敷，隔日换药1次。功用：清热解毒，活血化瘀。主治：乳腺癌初起。注意：孕妇忌用，已破溃者忌用。（《肿瘤临证备要》）

宫 颈 癌

宫颈癌又称子宫颈癌，系指发生于宫颈阴道部或移行带的鳞状上皮细胞及宫颈管内膜的柱状上皮细胞交界处的恶性肿瘤。其发病主要与性生活混乱和人乳头瘤病毒（HPV）感染有关，HPV感染是宫颈癌的主要危险因素。其他有关危险因素有：社会因素、婚育因素、性伴侣因素、慢性炎症、吸烟等。

本病相当于中医带下、五色带、崩漏等范畴，其主要病因病机是七情所伤，肝郁气滞，冲任损伤，肝、脾、肾诸脏虚损为本；湿热邪毒，瘀积阻滞，脏腑功能失调，冲任受损，积阻胞中为标。

【辨证用方】

宫颈癌的辨证，重在辨热、瘀、实、虚。以白带多，色黄如米泔，味臭，或有阴道出血，色鲜红等为主症者多为实证、热证；白带多，质地清稀或阴道流血色淡量多者多为虚证；阴道流血色黯，夹有血块者多为实证、瘀证。宫颈癌的治疗宜根据寒、热、瘀、实、虚证的不同，选择不同的治疗方法。由于

宫颈癌多有阴道出血，宜配合止血药物。

1. 肝郁气滞证

主症：阴道流血或夹有血块，伴胸胁胀满，少腹胀感或痛或全身窜痛，心烦易怒，口干口苦，不思饮食，情绪郁闷，白带稍多，月经失调，舌质正常或稍红，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝理气，解毒散结。

柴胡疏肝散加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕柴胡 10g，白芍 10g，当归 12g，郁金 12g，青皮 10g，香附 10g，白术 10g，半枝莲 30g，败酱草 20g，白花蛇舌草 30g，炒枳壳 10g，黄芩 10g，茯苓 10g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕疏肝理气，解毒散结。主治宫颈癌。

〔加减应用〕纳少、腹胀者，加炒麦芽、鸡内金；神疲乏力者，加黄芪、党参；少腹胀或痛者，加川楝子、醋延胡索。

2. 气滞血瘀证

主症：漏下黯红色血块，少腹积块，胀痛或刺痛，痛引腰背，带下不多，消瘦，舌质黯或瘀点、瘀斑，脉弦涩。

治法：活血化瘀。

加减少腹逐瘀汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕当归 12g，赤芍 10g，小茴香 3g，生地 15g，延胡索 10g，香附 12g，苦参 15g，莪术 10g，桃仁 10g，炮山甲（先煎）15g，蚤休 30g，夏枯草 15g，生牡蛎（先煎）30g，生蒲黄（布包）15g。水煎服。

〔功能主治〕活血化瘀，软坚散结。主治宫颈癌。

〔加减应用〕胀痛甚者，加乌药、川楝子、五灵脂；脾虚乏力者，加黄芪、党参；带下腥臭色黄者，加败酱草、鱼腥草；低热、口干不欲饮水者，加制鳖甲、青蒿。

3. 湿热内结证

主症：带下量多或较多，色黄，或黄赤兼下，或色如米

泔，腥臭，尿黄便干，腹痛下坠，口苦口干，舌质黯红或正常，苔黄或黄腻，脉弦数或弦滑。

治法：清热利湿，解毒。

(1) 加减黄柏解毒汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕黄柏 12g，败酱草 30g，土茯苓 30g，薏苡仁 30g，蒲公英 15g，半枝莲 15g，苍术 10g，白术 10g，茯苓 12g，车前草 15g，三棱 15g，莪术 15g，泽泻 10g，赤芍 12g，白花蛇舌草 15g，苦参 10g。水煎服。

〔功能主治〕清热利湿，解毒化瘀。主治宫颈癌。

〔加减应用〕便秘者，加大黄、厚朴；头晕、恶心欲呕者，加法半夏、姜竹茹；阴道流血，色鲜或黯者，加三七粉、丹皮。

(2) 蒲菊苓莲汤（《实用中西医结合妇产科证治》）

〔组成与用法〕蒲公英 30g，野菊花 15g，金银花 30g，土茯苓 30g，半枝莲 30g，薏苡仁 30g，茵陈 30g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，利湿消痈。主治宫颈癌。

〔加减应用〕便秘者，加大黄、厚朴、枳实；口干口苦、心烦失眠者，加栀子、淡豆豉、天花粉、黄连、黄芩；疼痛甚者，加郁金、川楝子、延胡索、五灵脂。

(3) 清宫解毒汤（《实用中医妇科学》）

〔组成与用法〕白花蛇舌草 30g，土茯苓 30g，半枝莲 15g，黄药子 15g，蒲公英 15g，丹参 15g，茵陈 15g，黄柏 9g，赤芍 9g。水煎服。

〔功能主治〕活血化瘀，清热解毒。主治宫颈癌。

〔加减应用〕结块难消者，加生牡蛎、莪术、三棱；阴道出血不止者，加仙鹤草、大蓟、小蓟、三七；小腹胀甚者，加延胡索、柴胡、郁金；便秘者，加川厚朴、大黄、枳实。

(4) 加味八正散（《中西医结合治疗癌症》）

〔组成与用法〕木通 10g，瞿麦 10g，滑石 15g，篇蓄 10g，

金银花 15g, 蚤休 10g, 蒲公英 30g, 山豆根 10g, 土茯苓 15g, 紫花地丁 15g, 败酱草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿, 解毒化浊。主治宫颈癌。

〔加减应用〕 阴道流血不止者, 加大蓟、小蓟、三七粉; 肝气郁结者, 加柴胡、郁金、川楝子、香附。

4. 痰湿下注证

主症: 白带量多, 形如痰状, 体重身倦, 头晕头重如裹, 胸闷腹胀, 或痰多乏力, 神疲纳少, 舌质淡或正常, 苔腻, 脉滑或濡缓。

治法: 健脾化湿。

主方: 加味二陈汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 法半夏 10g, 茯苓 10g, 陈皮 10g, 苍术 10g, 薏苡仁 30g, 白术 10g, 半枝莲 30g, 龙葵 30g, 泽泻 10g, 厚朴 10g, 莪术 10g, 虎杖 10g, 蚤休 15g, 泽兰 10g, 桃仁 10g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰祛湿, 化瘀解毒。主治宫颈癌。

〔加减应用〕 脾虚神疲甚者, 加黄芪、党参或人参; 恶心欲呕、腹胀甚者, 加生姜、木香。

5. 肝肾阴虚证

主症: 时有阴道流血, 量少, 色黯或鲜红, 腰酸背痛, 头晕耳鸣, 目眩口干, 手足心热, 夜寐不安, 易怒形瘦, 时有颧红, 便干尿黄, 舌质红, 苔少或有剥苔, 脉弦细或数。

治法: 滋补肝肾, 清热解毒。

(1) 加减二至丸合知柏地黄丸 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 生地 15g, 丹皮 10g, 知母 10g, 山茱萸 10g, 黄柏 6g, 茯苓 10g, 女贞子 10g, 山药 10g, 当归 10g, 赤芍 10g, 旱莲草 15g, 三棱 15g, 莪术 15g, 枸杞子 15g, 草河车 10g, 半枝莲 15g, 蚤休 15g, 白英 15g。水煎服。

〔功能主治〕 滋补肝肾, 清热解毒。主治宫颈癌。

[加减应用] 少腹痛或如针刺、口干欲频频少饮者，加鳖甲、乳香、没药；小便频数、疼痛者，加木通、篇蓄；胸闷心烦、怒者，加郁金、柴胡、龙胆草。

(2) 加减六味地黄汤（《中西医结合治疗癌症》）

[组成与用法] 熟地 10g，生地 10g，茯苓 10g，泽泻 10g，山茱萸 10g，龟甲（先煎）15g，女贞子 15g，地骨皮 10g，丹皮 10g，枸杞子 15g，菟丝子 10g，川断 15g，山药 10g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

[功能主治] 滋补肝肾，清热解毒。主治宫颈癌。

[加减应用] 腹痛甚者，加三棱、莪术、赤芍、延胡索、郁金、川楝子；气虚者，加黄芪、党参、白术。

(3) 仙蕊汤（《中医癌瘤证治学》）

[组成与用法] 生黄芪 30g，仙鹤草 30g，花蕊石 30g，当归 15g，党参 15g，大蓟 15g，小蓟 15g，龟甲 15g，贯众 15g，紫石英 15g，生牡蛎（先煎）20g，白术 12g，山豆根 10g。水煎服。

[功能主治] 滋阴软坚，益气养血，凉血止血。主治宫颈癌。

[加减应用] 直肠转移者，加川黄连、赤芍、槐花；膀胱转移者，加栀子、白茅根、夏枯草；肺转移者，加瓜蒌、贝母、杏仁；白细胞下降者，加鸡血藤、枸杞子。

6. 脾肾阳虚证

主症：时有少量阴道流血，色青紫，神疲乏力，腰酸膝冷，纳少，少腹坠胀，白带清稀而多，或有四肢困倦，畏冷，大便先干后溏，舌质胖、淡，苔白润，脉沉细或缓。

治法：温补脾肾。

(1) 附子理中汤合补中益气汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 黄芪 20g，党参 15g，白术 12g，陈皮 10g，制附子（先煎）10g，炮姜 10g，茯苓 12g，仙灵脾 12g，柴胡

6g, 吴茱萸 6g, 莪术 10g, 半枝莲 15g, 蚤休 15g, 当归 10g, 薏苡仁 12g, 甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕温补脾肾，化湿解毒。主治宫颈癌。

〔加减应用〕腰膝冷痛甚者，加狗脊、杜仲、川断；纳少、腹胀者，加神曲、鸡内金、砂仁。

(2) 珠补汤（《中医癌瘤证治学》）

〔组成与用法〕生黄芪 60g, 猪苓 60g, 料姜石 60g, 党参 20g, 白术 20g, 女贞子 30g, 珍珠母 30g, 补骨脂 30g, 夜交藤 30g, 骨碎补 15g, 仙灵脾 15g, 蜂房 10g, 蜈蚣 2 条。水煎服。

〔功能主治〕健脾补肾，软坚消肿。主治宫颈癌。

〔加减应用〕腹痛甚者，加三棱、莪术、赤芍、延胡索、郁金、川楝子。

【辨病用方】

宫颈癌的辨病治疗，当局部与整体同治。根据病期的早晚，体质强弱分别选用不同的内服药物。宫颈癌早期常无明显症状及特殊体征，最常出现的是不规则阴道流血、白带增多，辨证多为实证、热证、湿证，治疗以清热解毒、行气活血、利湿除胀等祛邪为主；晚期正气亏虚，邪气盛，治疗以健脾益肾、滋养肝肾、益气养血、调理冲任等扶正培本为主，佐以祛邪；局部治疗主要采用解毒祛瘀化湿为主。

1. 宫颈癌早期体质较实者用方

(1) 丹参散（《常见癌症中医治疗》）

〔组成与用法〕丹参 15g, 莪术 15g, 黄柏 10g, 赤芍 10g, 茯苓 10g, 墓头回 12g, 蒲公英 12g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 土茯苓 30g。水煎服。

〔功能主治〕清热利湿，化瘀解毒。主治宫颈浸润癌Ⅰ、Ⅱ期。

〔加减应用〕带下色白量多者，加苍术、生龙骨、生牡蛎、

海螵蛸；带下色赤者，加仙鹤草、小蓟炭、地榆炭；小腹胀痛甚者，加延胡索、金铃子；腹中结块者，加夏枯草、生牡蛎、海藻；乏力、面色无华者，加当归、党参、白术、鸡血藤。

(2) 复方石见穿煎（《全国中草药汇编》）

〔组成与用法〕鲜石见穿 30g，鲜六月雪 30g，鲜墓头回 30g，鲜香附 15g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒。主治宫颈癌。

〔加减应用〕湿热甚者，加苍术、薏苡仁、黄连、黄柏；阴道流血者，加仙鹤草、小蓟炭、地榆炭、侧柏叶；小腹胀痛甚者，加延胡索、金铃子、益母草。

(3) 大黄天龙汤（《肿瘤的辨证施治》）

〔组成与用法〕制大黄 6g，天龙 2 条，麝虫 3g，桃仁 6g，乳香 6g，没药 9g，当归 6g，莪术 9g。水煎服。

〔功能主治〕活血破瘀，解毒散结。主治宫颈癌。

〔加减应用〕湿热甚者，加半枝莲、白花蛇舌草、薏苡仁、山豆根、土茯苓；脾虚者，加山药、白术、黄芪、人参；阴道出血者，加仙鹤草、地榆炭、小蓟炭。

(4) 羊泉舌草汤（《肿瘤的防治》）

〔组成与用法〕蜀羊泉 30g，白花蛇舌草 30g，山豆根 10g，漏芦 15g，墓头回 10g，贯众 10g，合欢皮 15g，夜交藤 30g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，消肿散结。主治宫颈癌。

〔加减应用〕白带多者，加土茯苓、土贝母、海螵蛸；出血者，加旱莲草、乌贼骨、荆芥炭；湿热甚者，加半枝莲、薏苡仁、石见穿；脾虚者，加白术、陈皮、山药。

(5) 抗癌片（《中华妇科临床精华》）

〔组成与用法〕黄芪 45g，当归 15g，香附 12g，三棱 15g，莪术 15g，知母 15g，水蛭 30g，鸡内金 15g，山豆根 60g，桃仁 15g，党参 15g，炮穿山甲 15g，蚤休 60g。上药共研细末压

片，1次3~6g，1日2~4次。

〔功能主治〕 活血化瘀，益气抗癌。主治宫颈癌气滞血瘀型。

(6) 蝎尾壁虎散（《中草药单方验方新医疗法选编》）

〔组成与用法〕 蝎尾10条，壁虎6只，蜈蚣4条，百草霜9g，月石9g，白芷9g，血竭9g，硃砂9g，青黛6g，金银花30g。共研细末，混匀，1日3g。

〔功能主治〕 破瘀散结，化痰解毒。主治宫颈癌。

(7) 宫颈1号煎（《抗癌中草药制剂》）

〔组成与用法〕 白花蛇舌草60g，牡蛎30g，鱼腥草30g，白茅根30g，丹参15g，党参15g，当归9g，茜草9g，白术9g，赤芍9g，土茯苓9g，大枣5枚。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀，清热解毒，益气健脾。主治宫颈癌。

〔加减应用〕 腹刺痛者，加三棱、莪术、桃仁、炮山甲；腹胀痛甚者，加枳壳、厚朴、延胡索、五灵脂；带下腥臭色黄者，加败酱草、黄柏。

2. 宫颈癌中晚期体质较虚者用方

(1) 加味柴胡四物汤（《千家妙方》）

〔组成与用法〕 柴胡6g，川芎6g，当归6g，熟地6g，椿根皮6g，石见穿30g，白果6g。水煎服。

〔功能主治〕 化瘀解毒，扶正补虚。主治宫颈癌。

〔加减应用〕 带下黄臭者，加苦参、土茯苓、半枝莲、白毛藤；赤带，加仙鹤草、大蓟、小蓟、白茅根；腹痛甚者，加延胡索、五灵脂、郁金；腹中有肿块者，加海藻、昆布、三棱、莪术。

(2) 利湿解毒汤（《千家妙方》）

〔组成与用法〕 当归尾20g，赤芍12g，苍术12g，猪苓12g，土茯苓60g，制乳香10g，制没药10g，金银花15g，生

薏苡仁 30g, 槐花 15g, 冬瓜仁 30g, 青木香 12g, 全蝎 6g, 蜈蚣 2 条。水煎服。

[功能主治] 利湿解毒。主治宫颈癌Ⅲ期（菜花型）。

[加减应用] 出血过多加贯众炭、卷柏、莲蓬炭；小腹坠胀，里急后重加炒槟榔、白头翁。

(3) 加减六君汤（辽宁中医杂志，2003，11）

[组成与用法] 党参 20g, 茯苓 15g, 甘草 6g, 陈皮 6g, 白术 15g, 生半夏（先煎）6g, 香附 6g, 蜈蚣 3 条, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 田三七 6g。水煎服。

[功能主治] 健脾益气，清热解毒。主治宫颈癌晚期。

[加减应用] 湿热甚者，加白英、败酱草、益母草、蜂房；出血加蒲黄炭、仙鹤草、三七、侧柏叶；白带多者，加土茯苓、苦参、白槿花。

(4) 解毒凉血汤（《癌症的治疗与预防》）

[组成与用法] 石莲子 9g, 地骨皮 9g, 茯苓 9g, 麦冬 9g, 黄芩 9g, 车前子 15g, 柴胡 3g, 大蓟 18g, 小蓟 18g, 槐角 9g, 槐花 9g, 知母 9g, 黄柏 9g, 苍术 9g, 生地 15g, 玄参 12g, 白芍 15g, 金银花 15g, 连翘 9g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒，凉血止血。主治宫颈癌。

[加减应用] 头晕者，加白薇、菊花；心悸者，加龙骨、琥珀；失眠者，加夜交藤、酸枣仁、远志、珍珠母；失眠严重者，加生枣仁、熟枣仁；食欲不振者，加陈皮、半夏、焦三仙。

3. 宫颈癌局部用药

(1) 消癌丸（《癌症治验录》）

[组成与用法] 大枣 20 枚（去核，枣内加红砒 0.1g，用秸秆火烧存性，研粉），另以青黛 3g, 冰片 2g, 雄黄 3g, 炉甘石 6g, 枯矾 3g, 制乳香 3g, 制没药 3g, 麝香 1g。共为细末，炼蜜为丸，每丸 3g, 纳入阴道。每 3~4 日用 1 丸。

[功能主治] 消癌祛瘀，解毒化湿。主治宫颈鳞状上皮癌

I 期。

(2) 二砂血黄散 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 乳香 16.5g, 没药 15g, 儿茶 16.8g, 冰片 18.5g, 硼砂 18.5g, 白矾 9.5g, 蛇床子 7g, 钟乳石 22g, 雄黄 22g, 章丹 77g, 硼砂 2g, 血竭 12g, 麝香 2g, 蜂蜜 250g。将白矾水煮, 浓缩至滴水为珠, 晾干后研细末, 其他药研细末, 混合, 最后加麝香研匀, 以蜂蜜和生油调制成圆钉型丸, 每丸 2.6g, 1 次局部外用, 隔日 1 次, 15 次为 1 个疗程。

[功能主治] 活血解毒。主治宫颈原位癌。

(3) 抗宫颈癌 I 号方 (《癌症治验录》)

[组成与用法] 轻粉 6g, 藤黄 6g, 冰片 3g, 铅粉 10g, 硼砂 15g, 川楝子 15g。共研细末, 纳入蚕茧壳中, 上于宫颈糜烂处, 隔日冲洗换药 1 次。

[功能主治] 清热解毒。主治宫颈癌早期。

(4) 椿皮苍术汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 白英 30g, 椿根皮 30g, 阿魏 0.9g, 黄柏 9g, 苍术 15g, 金银花 15g, 乌梅 6g, 甘草 9g。水煎去渣, 分 3 天用, 每天冲洗阴道 3 次, 可用妇女阴道冲洗器吸入药液冲洗, 效果更好。

[功能主治] 清热利湿解毒。主治宫颈癌糜烂者。

(5) 蛇床地肤汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 苦参 60g, 蛇床子 30g, 野菊花 30g, 黄柏 15g, 白芷 15g, 地肤子 15g, 石菖蒲 15g。水煎取汁, 浸泡瘤体, 用纱布填塞, 1 日 1 剂。

[功能主治] 清热解毒利湿。主治宫颈癌。

(6) 三黄紫矾散 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 黄连 15g, 黄芩 15g, 黄柏 15g, 紫草 15g, 硼砂 30g, 枯矾 30g, 冰片 1.5g。将黄连、黄芩、黄柏、紫草、硼砂、枯矾等份别研细末, 过 120 目筛, 混合后加冰片研

匀，即可。以棉球蘸取少许，填塞于患处，隔日1次。

〔功能主治〕 清热利湿解毒。主治宫颈癌合并感染者。

(7) 松矾散 (《抗癌植物药及其验方》)

〔组成与用法〕 瓦松 30g，白矾 6g，红花 6g。水煎，熏洗外阴。

〔功能主治〕 清热解毒，消肿散结。主治宫颈癌。

(8) 阿魏乳竭散 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 三棱 50g，莪术 50g，炙鳖甲 50g，蓖麻子 (去皮) 75g，红花 50g，阿魏 20g，乳香 25g，没药 25g，血竭 25g，松香 25g，麻油 500ml。将三棱、莪术、鳖甲、蓖麻子、红花加入麻油，文火熬至诸药焦黑，去药渣再熬至滴水成珠后，再将阿魏、乳香、没药、血竭、松香共研细末后加入上液中，以槐枝搅匀，放入冷水浸泡12小时，外敷患处，每周1次，连用5~7周。

〔功能主治〕 活血解毒。主治中、晚期宫颈癌腹内结块者。

(9) 阴道洗液 (《中国百年百名中医临床家丛书·余桂清》)

〔组成与用法〕 苦参 20g，蛇床子 20g，黄柏 12g，花椒叶 15g，苍耳子 15g，蒲公英 15g，蝉蜕 10g，白鲜皮 20g，败酱草 15g。煎水约300~500ml，坐浴或反复冲洗，1日2次。

〔功能主治〕 清热利湿。主治宫颈癌阴道分泌物较多，伴有恶臭。

【对症用方】

宫颈癌的对症治疗，主要针对其主症 (如出血、疼痛等) 以及是否手术、化疗、放疗不良反应等分别选用不同方药，是辨证用药和辨病用药的补充。

1. 宫颈癌化疗期间及化疗后专方

(1) 癌复康加减 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 人参 10g，黄芪 30g，白术 10g，茯苓 10g，枸杞 10g，女贞子 10g，菟丝子 10g，广木香 10g，仙灵脾

10g, 法半夏 10g, 砂仁 5g, 旱莲草 15g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾, 和胃理气。主治宫颈癌化疗综合征。

〔加减应用〕 恶心呕吐甚者, 加姜竹茹、代赭石; 气虚多汗者, 加山茱萸、煅牡蛎; 腹泻者, 加吴茱萸、黄连、神曲。便溏者, 加薏苡仁、扁豆、莲子; 纳呆者, 加山楂、鸡内金。

(2) 加减黄芪补血汤 (《中国百年百名中医临床家丛书·余桂清》)

〔组成与用法〕 生黄芪 40g, 当归 10g, 白术 10g, 茯苓 10g, 鸡血藤 15g, 大枣 5 枚, 枸杞子 15g, 女贞子 15g, 何首乌 10g, 龙眼肉 10g, 阿胶 10g, 生甘草 6g, 焦三仙各 15g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾, 补气养血。主治宫颈癌化疗后骨髓抑制。

〔加减应用〕 气虚多汗者, 加防风; 腹泻者, 加神曲。

(3) 加减六君汤 (《中国百年百名中医临床家丛书·余桂清》)

〔组成与用法〕 太子参 10g, 白术 10g, 生薏苡仁 15g, 旋覆花 10g, 扁豆 10g, 法半夏 9g, 陈皮 10g, 竹茹 10g, 厚朴 10g, 鸡内金 10g, 生姜 5 片, 生甘草 6g, 焦三仙各 15g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾和胃, 降逆止呕。主治宫颈癌化疗后呕吐。

〔加减应用〕 恶心呕吐甚者, 加代赭石; 气虚多汗者, 加黄芪、防风。

2. 宫颈癌放疗后

茯苓二地汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 党参 15g, 熟地 10g, 生地 15g, 沙参 15g, 黄精 15g, 茯苓 12g, 金银花 20g, 土茯苓 15g, 白花蛇舌草

30g, 败酱草 15g, 白茅根 15g, 厚朴 10g, 赤芍 10g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾, 清热解毒。主治宫颈癌放疗热毒伤阴者。

〔加减应用〕 阴道流黄水、舌苔黄腻者, 加薏苡仁、蛇床子、车前子; 赤白带或阴道流出液体带血色者, 加云南白药、地榆炭、紫珠草; 纳呆, 恶心呕吐者, 加姜半夏、姜竹茹、陈皮、焦山楂、麦芽; 血象下降明显者, 加阿胶、鹿角胶、鸡血藤。

3. 宫颈癌放疗后放射性肠炎

(1) 黄连地榆汤 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 人参 10g, 黄芪 20g, 黄连 6g, 地榆 30g, 白头翁 30g, 乌梅 30g, 苦参 15g, 附子 10g, 槐花 15g, 半枝莲 20g, 败酱草 20g, 白花蛇舌草 20g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿。主治宫颈癌放疗后放射性肠炎。

〔加减应用〕 阴道流黄水者, 加薏苡仁、蛇床子; 血象下降者, 加阿胶、鹿角胶、鸡血藤; 阴道流血者, 加云南白药、地榆炭、紫珠草; 纳呆, 恶心呕吐者, 加姜半夏、姜竹茹、陈皮、麦芽、山楂。

(2) 秦槐地榆汤 (河南中医, 1994, 3)

〔组成与用法〕 秦艽 15g, 炒槐花 20g, 地榆炭 15g, 秦皮 10g, 苍术 15g, 黄连 10g, 荆芥炭 15g, 防风 10g, 槟榔 10g, 椿根皮 15g。水煎 200ml, 保留灌肠。

〔功能主治〕 清热解毒。主治宫颈癌放疗后放射性直肠炎。

〔加减应用〕 里急后重者, 加木香; 便血多者, 加大黄炭、三七粉。

〔临床报道〕 治疗 25 例宫颈癌放疗后直肠炎, 痊愈 17 例, 好转 6 例, 无效 2 例。

(3) 乌梅丸加减方 (医学理论与实践, 2004, 1)

〔组成与用法〕乌梅 30g，人参 10g，蜀椒 10g，黄连 6g，当归 15g，制附子（先煎）10g，桂枝 10g，山药 30g，白术 30g，干姜 10g，赤石脂 15g，槐花 10g。水煎服，7 天为 1 个疗程。

〔功能主治〕清热解毒，利湿。主治宫颈癌放疗后放射性肠炎。

〔加减应用〕恶心欲呕者，加半夏；里急后重者，加槟榔、枳壳；大便清稀、完谷不化者，加赤石脂；苔腻纳少者，加炒苡米、炒麦芽。

〔临床报道〕治疗宫颈癌放射性肠炎 50 例，总有效率 87%。

（4）加味白头翁汤（中级医刊，1996，2）

〔组成与用法〕党参 9g，黄芪 9g，白术 9g，山药 9g，茯苓 9g，白芍 9g，当归 9g，熟地 9g，黄连 6g，黄柏 6g，白头翁 12g，秦皮 9g，半枝莲 30g，升麻 3g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，健脾利湿。主治宫颈癌放疗后放射性肠炎。

〔加减应用〕腹胀、腹痛甚者，加厚朴、大腹皮、白芍；小便短少者，加车前子、泽泻。

（5）莪术芍药汤（实用中医药杂志，2000，6）

〔组成与用法〕莪术 10g，当归 10g，芍药 15g，黄连 10g，大黄 10g，黄芩 10g，半枝莲 15g，白花蛇舌草 15g，槟榔 6g，木香 6g，肉桂 2g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，行气利湿。主治宫颈癌放疗后放射性肠炎。

〔加减应用〕泻下赤多白少者，加白头翁、仙鹤草、生地榆；白多赤少者，加苍术、干姜；食滞者，加莱菔子、枳实；久泻滑脱者，加赤石脂、生黄芪。

〔临床报道〕治疗宫颈癌放射性肠炎 45 例，总有效率 93.3%。

4. 宫颈癌放疗后放射性膀胱炎

(1) 八正散加减 (黎月恒经验方)

〔组成与用法〕 车前子 (布包) 10g, 瞿麦 10g, 篇蓄 10g, 栀子 10g, 大黄 10g, 木通 10g, 竹叶 10g, 白茅根 15g, 半枝莲 20g, 败酱草 20g, 白花蛇舌草 20g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿。主治宫颈癌放疗后放射性膀胱炎。

〔加减应用〕 少腹痛、盆腔感染者, 加黄柏、蒲公英、鱼腥草; 腹痛腹泻者, 加白头翁、黄柏、黄连、白芍、木香。

(2) 小蓟饮子合导赤散 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 生地 15g, 木通 3g, 半边莲 15g, 猪苓 9g, 竹叶 9g, 生甘草 6g, 小蓟 12g, 滑石 9g, 蒲黄 9g, 山栀 9g, 当归 9g, 藕节 9g。水煎服。

〔功能主治〕 清热凉血, 利尿通淋。主治宫颈癌放疗后放射性膀胱炎。

〔加减应用〕 口干欲饮、舌红少津者, 加沙参、麦冬、天花粉; 纳呆、恶心呕吐者, 加姜半夏、姜竹茹、陈皮、麦芽、山楂。

5. 宫颈癌放疗后致外阴瘙痒

二黄地蛇汤 (中国中医急症, 2004, 4)

〔组成与用法〕 黄连 30g, 地肤子 30g, 紫草 15g, 黄柏 30g, 百部 30g, 蛇床子 30g, 防风 20g, 花椒 20g, 冰片 15g。上药除冰片外, 水煎 30 分钟, 取汁 2500~3000ml, 溶入冰片, 先熏后洗, 1 次坐浴 20~30 分钟, 1 日 2 次。

〔功能主治〕 清热解毒, 燥湿敛疮。主治宫颈癌放疗后致外阴瘙痒。

〔加减应用〕 皮肤破溃者去花椒, 加枯矾。

〔临床报道〕 治疗组治疗宫颈癌放疗后致外阴瘙痒 40 例, 总有效率 92.5%。

6. 宫颈癌手术后方

(1) 加减八珍汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 当归 15g, 白芍 10g, 熟地 15g, 川芎 10g, 党参 15g, 白术 10g, 茯苓 10g, 升麻 5g, 生黄芪 15g, 鸡内金 5g, 鸡血藤 30g, 白花舌蛇草 20g, 炙甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血, 活血解毒。主治宫颈癌术后气血不足。

(2) 肉桂茴香汤 (《癌症秘方验方偏方大全》)

〔组成与用法〕 肉桂 (后下) 3g, 全当归 10g, 乌药 10g, 青木香 10g, 茯苓 10g, 小茴香 10g, 制香附 10g。水煎服。

〔功能主治〕 温阳利水, 行气止痛。主治宫颈癌手术后小便不利者。

〔加减应用〕 少腹痛、灼热、盆腔感染者, 加黄柏、蒲公英、鱼腥草; 腹痛腹泻者, 加黄连、白头翁、白芍、木香。

7. 宫颈癌阴道流血方

(1) 白矾二炭丸 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 乳香炭 12g, 没药炭 12g, 白芍 18g, 黄蜡 30g, 白矾 30g。共研末, 蜜为丸如绿豆大, 1 次 6~15 粒, 1 日 3 次。

〔功能主治〕 活血止血。主治宫颈癌漏下不止者。

(2) 止血灵 (实用中医药杂志, 1997, 1)

〔组成与用法〕 炙黄芪 50g, 当归 20g, 白花蛇舌草 30g, 蒲公英 15g, 仙鹤草 50g, 白及 20g, 炒栀子 15g, 生地炭 15g, 藕节 15g, 茜草根 30g, 炒蒲黄 20g, 三七粉 (冲服) 10g, 甘草 10g。水煎服。出血量大者每 6 小时服 1 次。

〔功能主治〕 清热解毒, 凉血止血。主治宫颈癌阴道出血者。

〔加减应用〕 小腹冷痛者, 加艾叶炭、炮姜; 阴血虚弱者, 加旱莲草、阿胶; 血热者, 加黄芩炭; 腰酸痛甚者, 加杜仲炭、川断; 腹痛血色黑有块者, 加益母草、桃仁。

(3) 仙鹤人参汤 (《抗癌中草药大辞典》)

[组成与用法] 人参 6g, 阿胶 20g, 地榆炭 15g, 田三七 (冲) 3g, 白及 10g, 仙鹤草 30g。水煎服。

[功能主治] 益气养血止血。主治宫颈癌阴道出血者。

[加减应用] 湿热甚者, 加白英、败酱草、半枝莲、白花蛇舌草; 寒湿者, 加苍术、益母草、炮姜。

(4) 加减牛角地黄汤 (实用中医内科杂志, 2002, 1)

[组成与用法] 水牛角 30g, 仙鹤草 30g, 茜草根 15g, 生地 15g, 紫草根 15g, 侧柏炭 15g, 生地榆 15g, 炒白芍 10g, 炒山栀 10g, 制大黄 10g, 台乌药 10g, 生甘草 5g, 柴胡 6g, 炙升麻 6g, 黄芪 30g。水煎服。

[功能主治] 滋阴凉血, 益气固摄。用于宫颈癌放疗后大出血。

(5) 龙胆泻肝汤加减 (吉林中医药, 1998, 4)

[组成与用法] 龙胆草 5g, 炒山栀 10g, 车前草 15g, 生地 20g, 黄芩 10g, 泽泻 10g, 甘草 5g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 鄂根白皮 10g, 白头翁 10g, 贯众炭 10g, 地榆炭 20g 水煎服。

[功能主治] 清热利湿, 祛瘀生新。主治宫颈阴道流血者。

[加减应用] 体虚加党参、黄芪; 便秘加大黄; 尿频加琥珀。

[临床报道] 治疗 50 例, 痊愈 6 例, 显效 37 例, 无效 7 例。

8. 宫颈癌疼痛方

(1) 生鳖花椒散 (《全国部分名老中医验方》)

[组成与用法] 人参 18g, 生鳖甲 18g, 花椒 9g。磨细末, 每晚 6g, 开水送下, 24 天为 1 个疗程。

[功能主治] 益气, 散结, 止痛。主治宫颈癌疼痛者。

(2) 二子阿魏散 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕水红花子 60g，麝香 1.5g，阿魏 15g，急性子 15g，甘遂 9g，大黄 15g，巴豆 10 粒，白酒 500ml。各药捣碎，合在一起，外敷于疼痛处，疼痛止即停药。

〔功能主治〕散寒止痛。用于宫颈癌疼痛剧烈时。

(3) 乌头硝黄散 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕①生乌头 30g，研末醋调；②火硝 9g，黄丹 9g，白矾 9g，麝香 3g，胡椒 18g。共研末蜂蜜调糊。将两方均敷贴两足心，每料作 2 日用，1 日换 1 次，连用 3~4 料为 1 个疗程。

〔功能主治〕活血解毒止痛。主治晚期宫颈癌腹、腿剧疼者。

(4) 金莲汤 (《抗癌中草药大辞典》)

〔组成与用法〕金不换 30g，七叶莲 30g，牛蒡子 30g，白花蛇舌草 60g，白屈菜 10g，铁包金 90g，汉防己 15g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，活血止痛。主治宫颈癌疼痛者。

〔加减应用〕腹痛甚者，加五灵脂、蒲黄、乳香、没药；腰背痛甚者，加杜仲、桑寄生、续断；出血加地榆炭、仙鹤草、艾叶炭。

【专病成药】

1. 金龙胶囊 (《国家基本医疗保险药品目录》2001)

〔处方组成〕鲜活守宫、鲜活金钱白花蛇等。

〔功能主治〕扶正祛邪，解毒消肿，理气止痛，破瘀散结。主治子宫癌。(北京中医，2001，4)

〔用量用法〕口服，1 次 0.5~1.0g，每天 3 次，30~60 天为 1 个疗程。

2. 榄香烯乳注射液

〔处方组成〕中药莪术提取物榄香烯。

〔功能主治〕直接抑制肿瘤细胞生长；能增强 T 淋巴细胞

亚群的功能，有免疫保护作用；与放疗、化疗有协同作用；能为机体提供高能量营养；缓解癌痛；改善微循环；能通过血-脑脊液屏障。主治宫颈癌。（实用肿瘤学杂志，2003，4）

〔用量用法〕 静脉注射：1次 400~600mg，1日1次，15天为1个疗程。局部肿瘤注射：先用利多卡因等局麻药对瘤体多点注射（注意局麻药的浸润面应完全）3~5分钟后，视瘤体大小多点注入本品 50~70mg/次，或遵医嘱。用药次数遵医嘱。

3. 华蟾素注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 中华大蟾蜍。

〔功能主治〕 清热解毒，消肿止痛，活血化瘀，软坚散结。主治中、晚期肿瘤子宫颈癌。（中华实用中西医杂志，2005，5）

〔用量用法〕 静脉注射：1日或隔日1次，1次 10~20ml，用5%的葡萄糖注射液 500ml 稀释后缓慢滴注。4周一疗程，用药1周后休息1~2天或遵医嘱。

【专病单方】

1. 田螺 用法：每取10只，用水洗干净，除去螺盖，倒伏于清洁容器内一夜，即可得浅绿色水液，加冰片细末调成稀糊状使用。待阴道冲洗，拭去宫颈局部坏死组织后，将上药涂于坏死面，再用带线棉球塞于阴道内。1日1次，10日为1个疗程。功用：清热解毒。主治：宫颈癌放疗后组织坏死。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 猫眼草 用法：每取50g，干燥后研粉。外敷于患处，1~2天换1次。功用：清热解毒。主治：宫颈癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 血见愁 用法：每取50g，水煎，1日1次，分2次服。功用：清热解毒。主治：宫颈癌化疗者。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 鲜凤尾草 用法：每取150g，水煎，1日1次，分2

次服。可以长期服用。功用：清热解毒。主治：宫颈癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 新鲜脐带 用法：每取 1 个，将新鲜脐带两端扎紧，勿使流血，焙干研末。1 次 0.5g，吞服，1 日 3 次。功用：益气养血。主治：宫颈癌正气亏虚者。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 山豆根 用法：每取 6g，研末，与白砂糖混合调匀口服，1 日 1 次，10~15 天为 1 个疗程。功用：清热解毒。主治：宫颈癌。脾胃虚寒、纳呆、便溏及痰湿盛者忌用。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 千斤藤 用法：每取 15g 冲水当茶频饮；或 1kg 加水 4000ml，煎成 1000ml 药液，1 次 50ml 口服，1 日 3 次；或适量研末，炼蜜为丸如黑豆大小，1 次 7 丸，1 日 2 次。功用：清热解毒，祛风活络。主治：宫颈癌。（《抗癌植物药及其验方》）

8. 乌骨藤 用法：每取 120g，水煎 3 小时以上，分 3 次服，1 日 1 剂。功用：清热解毒，通络止痛。主治：宫颈癌。注意虚寒证忌用。（《肿瘤科中西药物手册》）

9. 薏荔果 用法：每取 30g，与猪脚 1~2 个加水煮至猪脚烂熟，吃肉喝汤。功用：解毒抗癌。主治：防止宫颈癌复发。（《中华肿瘤治疗大成》）

10. 石上柏 用法：每取 100g，加猪肉 100g，大枣 6 个，加水 1500~2000ml，煎 6 小时，煎至 250ml，1 日 1 剂，连服 1 个月。功用：解毒抗癌。主治：宫颈癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

11. 槐耳 用法：晒干后切成薄片，1 次 9~15g 加水 800ml，煎至 50ml 液体，1 日 3 次，饭前服。功用：补中益气，止血，化湿止痢。主治：宫颈癌。（《肿瘤科中西药物手册》）

12. 凤尾蕉叶 用法：每取 120g，加红枣 12 枚，水煎服，1 日 1 剂。功用：行气活血。主治：宫颈癌。（《中医临床参考》）

13. 山桃叶 用法：山桃叶捣烂，包裹后置于病灶局部，1 日 3~4 次。功用：清热祛湿。主治：宫颈癌。（《肿瘤科中西

药物手册》)

14. 苦楝皮 用法：每取 6~15g，水煎服。1 日 1 剂。功用：解毒，杀虫。主治：宫颈癌湿热较重者。《《肿瘤科中西药物手册》》)

15. 地胆草 用法：每取 6~9g，泡水服。功用：清热解毒，凉血利湿。主治：各种癌症。注意：体虚中寒者不宜用；孕妇慎服。《《肿瘤的诊断与防治》》)

16. 三棱 用法：三棱水煎浓缩成稠膏，1 次用米酒送服 4g，1 日 2 次。功用：破血行气，止痛化瘀。主治：腹腔、盆腔癌症。《《抗癌本草》》)

17. 南星 用法：鲜南星 50g，洗干净，每 6g 加 75% 酒精 0.5ml，捣碎，用纱布包好，在患处塞紧，阴道外口再塞一棉球，每天或隔天 1 次。功用：解毒抗癌。主治：宫颈癌。《《中华肿瘤治疗大成》》)

18. 苏铁叶 用法：每取 120g，加红枣 12 枚。水煎，1 日 1 剂。症状好转后加火炭母 120g，茅苏 60g，榔榆片 30g，蛇床子 12g，水煎，1 日 1 剂。功用：散瘀止血，理气止痛。主治：宫颈癌。《《抗癌中草药大辞典》》)

19. 半夏根 用法：鲜半夏根 50g，洗干净，每 6g 加 75% 酒精 0.5ml，捣碎，用纱布包好，在患处塞紧，阴道外口再塞一棉球，每天或隔天 1 次。功用：化痰散结。主治：宫颈癌。《《中华肿瘤治疗大成》》)

卵 巢 癌

卵巢癌系指发生于卵巢表面体腔上皮和其下方卵巢间质的恶性肿瘤。其发病与以下因素有关：环境因素、内分泌因素、遗传和家族因素，其他因素如放射线、病毒、化学因素、精神因素等。

本病相当于中医的癥瘕、肠覃、腹痛等范畴，其病因病机外为寒邪所侵或饮食所伤，内为脏腑气虚，致湿聚痰凝血瘀，日久而成积所致。

【辨证用方】

卵巢癌的辨证，以少腹部包块坚硬固定、刺痛或阴道流血晦黯为主症者，多为瘀证、实证；腹部肿块，胀痛，或阴道分泌物流腥臭色黄，多为热证、湿证、实证；少腹肿物或伴头晕目眩，腰膝酸痛，或伴下肢浮肿，神疲乏力，自汗盗汗，纳少，多为虚证。其治疗应根据瘀、热、湿、实与虚证的不同，选择相应的治疗方法。

1. 气滞血瘀证

主症：少腹部包块坚硬固定，腹胀，面色晦黯无华，形体消瘦，肌肤甲错，神疲乏力，或阴道流血晦黯，或少腹及腹部刺痛，舌有瘀斑及舌质黯紫，苔薄白或薄黄，脉细涩。

治法：行气破血，软坚消积。

(1) 加减蓬莪术丸（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕蓬莪术 15g，当归 10g，桂心 3g，赤芍 10g，桃仁 10g，广木香 10g，大黄（后下）10g，炙鳖甲（先煎）10g，三棱 10g，生牡蛎（先煎）30g，乌药 10g，益母草 15g，龙葵 30g。水煎服。

〔功能主治〕行气破血，软坚消积。主治卵巢癌。

〔加减应用〕腹胀甚者，加槟榔、大腹皮、枳实；肿块坚硬者，加虻虫、穿山甲、水蛭；小便少者，加车前子、猪苓、泽泻、木通；少腹痛者，加川楝子、延胡索；阴道流血者，少加三七粉、丹皮；纳少乏力者，加党参、黄芪；纳少腹胀者，加炒麦芽、炒莱菔子。

(2) 枳实虻虫汤（《百病良方》）

〔组成与用法〕枳实 12g，柴胡 12g，虻虫 9g，三甲珠 15g，黄药子 15g，莪术 15g，半边莲 30g，蚤休 30g，白花蛇

舌草 15g，川芎 6g，赤芍 9g，白芍 9g。水煎服。

〔功能主治〕 行气活血，消积散结。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 腹痛者，加乳香、没药、桃仁、延胡索、五灵脂；热甚者，加半枝莲、白英、蚤休；湿热者，加杏仁、薏苡仁、白蔻仁；腹胀甚者，加枳壳、枳实、陈皮、厚朴。

2. 湿热瘀毒证

主症：腹部肿块，胀痛，或有腹水，不规则阴道流血，或有分泌物流出，腥臭色黄，大便干燥，尿黄灼热，口干口苦不欲饮，舌质黯，苔黄腻，脉弦滑或滑数。

治法：清热利湿，解毒散结。

(1) 蛇莲鳖甲汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 半枝莲 30g，龙葵 30g，白花蛇舌草 30g，白英 30g，车前草 30g，土茯苓 30g，莪术 15g，益母草 15g，当归 10g，败酱草 30g，鳖甲（先煎）15g，三棱 10g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿，解毒散结。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 毒热甚者，加龙胆草、蒲公英；腹水者，加天葵、泽泻、猪苓；大便秘结者，加大黄、厚朴、桃仁。

(2) 地鳖蟾蜍汤（《癌的培本扶正治疗》）

〔组成与用法〕 廔虫 15g，干蟾蜍 5g，土茯苓 15g，猪苓 15g，党参 15g，白花蛇舌草 18g，薏苡仁 18g，半枝莲 18g，三棱 10g，白术 10g，莪术 12g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀，软坚化痰，清热解毒，益气固本。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 积块较大者，加鳖甲、生牡蛎；腹痛甚者，加延胡索、郁金；有腹水者，加车前子、天葵子；腰膝酸软者，加女贞子、枸杞子、当归。

3. 痰湿凝聚证

主症：胃脘胀满，时有恶心，面虚浮肿，体倦乏力，腹部

肿物及腹股沟肿块，舌淡润，苔白腻，脉滑。

治法：健脾化痰，软坚散结。

(1) 六君子汤合海藻玉壶汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 陈皮 10g，法半夏 10g，党参 15g，白术 10g，茯苓 12g，昆布 15g，海带 15g，陈皮 10g，连翘 10g，海藻 15g，独活 15g，当归 12g，蚤休 30g，白花蛇舌草 30g，当归 10g，青皮 10g，贝母 10g，川芎 6g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾化痰，软坚散结。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 四肢浮肿甚者，重用黄芪，加仙灵脾、大腹皮、车前子、泽泻、益母草；下肢寒、小便少者，加艾叶、胡芦巴；夹瘀血者，加莪术、山慈菇、龙葵。

(2) 健脾化浊煎（《中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 党参 15g，白术 10g，茯苓 15g，车前子 15g，山慈菇 12g，海藻 15g，夏枯草 10g，半夏 9g，泽泻 15g，枳壳 9g，薏苡仁 30g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾化浊，祛湿散结。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 兼热者，加黄柏、黄连、黄芩；便结者，加大黄、枳实；腹胀甚者，加厚朴、砂仁、陈皮；纳差者，加山楂、鸡内金。

4. 肝肾阴虚证

主症：少腹肿块，按之固定不移，或有刺痛或灼痛，腹胀，头晕目眩，手足心发热，口干欲饮，饮不多，稍口苦，大便干，小便稍黄，腰膝酸痛或胀痛，舌质红，边有瘀点或瘀斑，舌苔少或薄，脉细数。

治法：滋养肝肾，化瘀软坚。

六味地黄丸加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 生地 30g，丹皮 10g，龟甲（先煎） 10g，山茱萸 15g，女贞子 10g，旱莲草 15g，鳖甲（先煎） 15g，莪术 15g，三棱 10g，生牡蛎（先煎） 30g，当归 10g，蚤休 15g，

木香 10g, 青皮 10g。水煎服。

〔功能主治〕 滋养肝肾。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 腹水腹胀甚者, 加大腹皮、车前子、冬瓜皮、猪苓; 乏力神疲者, 加党参、黄芪。

5. 气血两虚证

主症: 少腹肿物隆起, 时有拘急疼痛, 下肢浮肿, 神疲乏力, 头晕目眩, 自汗盗汗, 纳少, 口干不欲饮水, 畏风怕冷, 舌质淡黯, 少苔, 脉沉细弱。

治法: 益气养血。

加减八珍汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 人参 6g, 白术 6g, 黄芪 18g, 枸杞子 10g, 益母草 10g, 黄精 10g, 女贞子 10g, 猪苓 10g, 杜仲 10g, 半边莲 15g, 白花蛇舌草 15g, 茯苓 15g, 熟地 15g, 当归 10g, 甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 益气补血, 解毒化瘀。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 下肢水肿甚者, 加泽泻、薏苡仁、车前子; 瘀血甚者, 加莪术、三棱、鳖甲。

【辨病用方】

卵巢癌的辨病治疗, 主要根据邪正盛衰而定。早期邪气盛, 正气未虚, 重在祛邪, 如活血解毒、清热利湿、化痰散结等; 后期多见邪盛而气血亏虚、气阴两虚, 重在扶正, 改善患者的生存质量, 如: 益气养血、益气养阴、健脾益肾、滋补肝肾, 佐以祛邪。

1. 活血止痛汤 (《肿瘤要略》)

〔组成与用法〕 山楂 30g, 益母草 15g, 当归 9g, 延胡索 9g, 紫草 9g, 川芎 6g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀, 消肿止痛。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 腹痛甚者, 加五灵脂、三棱、莪术; 腹胀者, 加枳壳、厚朴、砂仁、陈皮; 伴有腹水者, 加陈皮、大腹皮、

茯苓皮、桑白皮、生姜皮、车前子；湿热甚者，加夏枯草、薏苡仁、车前草。

2. 鳖甲白英汤（《肿瘤的诊断和防治》）

〔组成与用法〕 炙鳖甲 60g，龙葵 50g，白英 60g，半枝莲 60g，白花蛇舌草 60g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，软坚散结。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 腹痛加五灵脂、延胡索、川芎、当归、赤芍；腹胀加枳壳、厚朴、砂仁；肿块软而不坚者，加海藻、昆布、牡蛎、茯苓、夏枯草；肿块坚硬如石者，加莪术、三棱、鳖甲、穿山甲。

3. 桂姜四物汤（《癌症的治疗和预防》）

〔组成与用法〕 当归 12g，赤芍 12g，川芎 10g，熟地 15g，三棱 10g，莪术 10g，干蛤蟆 2 个，竹茹 10g，代赭石 30g，蜈蚣 3 条，蝉蜕 10g，急性子 15g，桂枝 15g，炮姜 15g，生姜 10 片，大枣 10 枚。水煎服。

〔功能主治〕 温中散寒，活血散结。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 气虚者，加黄芪、党参、白术、山药；痰湿者，加茯苓、白术、半夏、夏枯草。

4. 龙葵干蟾汤（《中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 龙葵 30g，干蟾皮 10g，当归 12g，三棱 10g，莪术 10g，川楝子 10g，乌药 10g，土茯苓 30g，生黄芪 30g，大腹皮 10g，穿山甲（先煎）15g，廔虫（先煎）9g。水煎服。

〔功能主治〕 行气，活血散结。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 肝气郁结者，加柴胡、郁金、香附；脾虚者，加白术、茯苓、人参；腹胀者，加枳壳、砂仁、陈皮。

5. 柴胡半枝莲汤（《百病良方》）

〔组成与用法〕 柴胡 12g，香附 12g，佛手 12g，当归 15g，益母草 15g，莪术 15g，泽兰 12g，白术 24g，薏苡仁 30g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕理气健脾，解毒化瘀。主治卵巢癌肝郁气滞型。

〔加减应用〕脾虚甚者，加黄芪、人参、山药；腹痛者，加延胡索、五灵脂、三棱、莪术；腹胀者，加枳壳、厚朴。

6. 蛇草橘核汤（《抗癌中草药制剂》）

〔组成与用法〕白花蛇舌草 30g，橘核 15g，昆布 15g，川楝子 10g，小茴香 9g，桃仁 15g，蜃虫 9g，三棱 10g，莪术 12g，党参 15g，茯苓 15g，薏苡仁 30g。水煎服。

〔功能主治〕解毒散结，化瘀消痞。主治卵巢癌。

〔加减应用〕肿块质软者，加海藻、夏枯草、半夏；肿块坚硬如石者，加鳖甲、川芎、赤芍。

7. 大黄黄柏膏（《抗癌本草》）

〔组成与用法〕大黄 6g，黄柏 3g，侧柏叶 6g，泽兰 3g，薄荷 1.5g。共研细末，煮糊加酒少许，外敷腹部，每晚睡前敷至第 2 日清晨。

〔功能主治〕清热解毒，凉血散瘀。主治卵巢癌。

8. 三白汤（《安徽单验方选集》）

〔组成与用法〕白英 30g，白茅根 15g，白花蛇舌草 15g，石橄榄 30g，紫草根 15g，南五味子根 30g，陈皮 15g，两面针 9g，半枝莲 15g，延胡索 6g，广木香 9g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，行气活血。主治卵巢癌。

〔加减应用〕腹胀甚者，加厚朴、香附、乌药、砂仁；腹痛甚者，加延胡索、当归、川芎、赤芍、蒲黄、五灵脂；腹水者，加大腹皮、薏苡仁、陈皮、桑白皮。

9. 木香顺气散加减（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕木香 10g，厚朴 10g，香附 15g，乌药 10g，陈皮 10g，砂仁 5g，肉桂 6g，党参 15g，白术 15g，茯苓 15g，甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，行气疏肝。主治卵巢癌腹胀甚者。

〔加减应用〕 腹痛甚者，加延胡索、川芎、赤芍、五灵脂；腹水者，加大腹皮、薏苡仁、桑白皮；气虚者，加黄芪。

10. 少腹逐瘀汤加减（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕 延胡索 20g，没药 10g，当归 10g，川芎 10g，赤芍 15g，蒲黄 10g，五灵脂 10g，小茴香 10g，川楝子 15g，郁金 15g，乳香 10g，乌药 10g。水煎服。

〔功能主治〕 活血逐瘀，散结止痛。主治卵巢癌腹痛甚者。

〔加减应用〕 气滞甚者，加木香、厚朴、香附、乌药、陈皮；阴虚者加麦冬、天冬、玄参、沙参；血瘀发热者，加半枝莲、白花蛇舌草。

11. 防己黄芪汤合五苓散（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕 黄芪 40g，汉防己 15g，白术 15g，甘草 10g，桂枝 10g，茯苓 30g，泽泻 15g，半边莲 30g，龙葵 20g，水红花子 30g，马鞭草 30g，大腹皮 15g，薏苡仁 50g。水煎服。

〔功能主治〕 益气通阳，化瘀利水。主治卵巢癌伴腹水者。

〔加减应用〕 腹痛甚者，加延胡索、川芎、赤芍、五灵脂；腹胀者，加厚朴、香附、乌药、砂仁、木香；阳虚者，加炮附片、炮姜。

12. 莲苓葶苈汤（《中西医肿瘤诊疗大全》）

〔组成与用法〕 猪苓 6g，茯苓 6g，半枝莲 30g，半边莲 30g，全蝎 10g，露蜂房 10g，炒葶苈子 10g，商陆 6g，大枣 10 枚。水煎服。

〔功能主治〕 化瘀利水。主治卵巢癌晚期水瘀互结者。

〔加减应用〕 脾虚者，加黄芪、陈皮、茯苓、白术；肾阳虚者，加炮姜、桂枝、炮附子；水肿者，加茯苓、猪苓、泽泻、益母草。

13. 附子五苓散方（《中西医肿瘤诊疗大全》）

〔组成与用法〕 党参 30g，茯苓 30g，猪苓 30g，白术 15g，桂枝 6g，炮附子（先煎）6g。水煎服。

〔功能主治〕 温补脾胃，化气行水。主治卵巢癌晚期脾阳虚水泛型。

〔加减应用〕 脾虚甚者，加黄芪、陈皮；肾阳虚甚者，去桂枝，加肉桂、补骨脂、菟丝子、炮姜；腰膝酸软者，加杜仲、桑寄生；水肿者，加益母草、陈皮、桑白皮、大腹皮；腹刺痛者，加三棱、莪术、鳖甲、廑虫。

14. 枳朴六君汤化裁（《中西医肿瘤诊疗大全》）

〔组成与用法〕 党参 30g，茯苓 30g，猪苓 30g，白术 15g，制半夏 12g，枳壳 10g，厚朴 10g，陈皮 10g，大腹皮 10g，泽泻 10g，甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾利水。主治卵巢癌气虚湿阻型。

15. 地鳖蟾蜍汤（潘明继经验方）

〔组成与用法〕 廑虫 15g，蟾蜍 15g，土茯苓 15g，猪苓 15g，党参 15g，白花蛇舌草 18g，半枝莲 18g，薏苡仁 18g，三棱 10g，莪术 10g，白术 12g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 解毒化浊，行瘀散结。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 腹胀甚者，加枳壳、厚朴、木香、川楝子；便结者，加大黄；心烦者，加生地、黄连、莲子心。

16. 当归化瘀汤（《癌症家庭防治大全》）

〔组成与用法〕 当归尾 10g，丹参 10g，五灵脂 10g，川断 10g，三棱 6g，莪术 6g，制乳香 6g，制没药 6g，桃仁 6g，赤芍 12g，炙鳖甲（先煎）2g，红花 6g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 气滞者，加枳壳、木香、陈皮、砂仁；阴虚者，加麦冬、天冬、玄参、生地、熟地、沙参；气虚者，加黄芪、人参、白术、茯苓；兼热者，加半枝莲、白花蛇舌草、败酱草；兼痰湿者，加半夏、陈皮、茯苓、夏枯草。

17. 桃仁血竭膏（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 延胡索 40g，乳香 20g，没药 20g，芫花

20g, 桃仁 20g, 血竭 20g。将上药浓煎取汁 100ml, 加冰片 3g 调匀后外敷与腹部。

〔功能主治〕 活血解毒抗癌。主治晚期卵巢癌疼痛并有腹水者。

18. 当归鹿角汤 (上海中医杂志, 1993, 12)

〔组成与用法〕 党参 9g, 白术 9g, 白芍 9g, 茯苓 9g, 当归 9g, 山药 10g, 制半夏 9g, 木香 9g, 鹿角霜 9g, 龙眼肉 9g, 枸杞子 9g, 陈皮 9g, 黄芪 12g。水煎服。

〔功能主治〕 益气和胃, 温补脾肾。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 纳呆者, 先用香砂六君子汤加苏梗、厚朴、神曲; 白细胞下降者, 加补骨脂、生地、熟地、鹿角片。

19. 阿胶二冬汤 (上海中医杂志, 1993, 12)

〔组成与用法〕 生地 9g, 白芍 9g, 天冬 9g, 麦冬 9g, 玄参 9g, 阿胶 9g, 当归 9g, 枸杞子 9g, 沙参 9g, 地骨皮 9g, 党参 9g, 天花粉 15g, 旱莲草 15g。水煎服。

〔功能主治〕 养阴生津, 清热安神。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 牙宣鼻衄, 小便赤热者, 加知母、白茅根、碧玉散; 腑气不通者, 加制大黄、瓜蒌仁; 口腔溃疡者, 加金银花、连翘。

20. 黄芪二冬汤 (上海中医杂志, 1993, 12)

〔组成与用法〕 黄芪 9g, 党参 9g, 白术 9g, 白芍 9g, 生地 9g, 天冬 9g, 麦冬 9g, 天花粉 9g, 枸杞子 9g, 丹皮 9g, 鹿角霜 9g, 五味子 5g, 木香 5g, 佛手 5g。水煎服。

〔功能主治〕 气阴双补。主治卵巢癌。

〔加减应用〕 血虚者, 加当归、女贞子、菟丝子、阿胶; 气虚甚者, 重用黄芪, 加山药、陈皮; 阴虚发热者, 加地骨皮、天花粉、鳖甲、银柴胡; 食欲不振者, 加鸡内金、山楂。

21. 夏枯铁树汤 (上海中医杂志, 1993, 12)

〔组成与用法〕 铁树叶 30g, 八月札 30g, 白花蛇舌草

30g, 半枝莲 30g, 夏枯草 15g, 莪术 9g, 露蜂房 9g, 白术 9g, 陈皮 6g。水煎服。

[功能主治] 扶正抗癌, 清热解毒, 软坚散结。主治卵巢癌。

[加减应用] 便血者, 加侧柏叶、槐花炭; 小便赤热者, 加赤茯苓、猪苓、生薏苡仁、碧玉散。

22. 蟾蜍二黄汤 (《中国民间敷药疗法》)

[组成与用法] 姜黄 0.6g, 活蟾蜍 1 只, 雄黄 3g。共捣烂如膏状, 外敷肿块疼痛处。1 日换 1 次, 发臭即弃之。

[功能主治] 行气破瘀, 通经止痛。主治卵巢癌疼痛者。

23. 凌霄二红汤 (《奇效良方》)

[组成与用法] 凌霄花 75g, 桃仁 3g, 硃砂 3g, 延胡索 3g, 红花 3g, 当归 3g, 官桂 (去皮) 3g, 红娘子 11 个, 血竭 60g, 紫河车 60g, 赤芍 60g, 山梔仁 60g, 地骨皮 60g, 五加皮 60g, 牡丹皮 60g, 甘草 60g。共为细末, 1 次 6g, 温酒送下。

[功能主治] 行气破瘀。主治卵巢癌。

[注意事项] 气血虚弱、孕妇忌服。

24. 当归益母丸 (《奇方类编》)

[组成与用法] 益母草 500g, 川芎 30g, 赤芍 30g, 当归身 30g, 木香 30g。共为细末, 炼蜜为丸, 1 次 9g, 1 日 2 次。

[功能主治] 行气破瘀, 活血调经。主治卵巢癌。

25. 桂枝茯苓丸加减 (《抗癌中草药大辞典》)

[组成与用法] 茯苓 40g, 桃仁 15g, 大黄 15g, 桂枝 9g, 白术 20g, 丹皮 20g, 阿胶 20g, 甘遂 5g。水煎服。

[功能主治] 活血, 养血。主治卵巢癌。

[加减应用] 气虚者, 加黄芪、人参、山药; 气滞者, 加陈皮、枳壳、砂仁、香附; 腹痛者, 加延胡索、五灵脂、赤芍、当归。

26. 龙葵蛇莓汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 白毛藤 37.5g, 龙葵 37.5g, 马鞭草 37.5g, 蛇莓 37.5g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒抗癌。主治卵巢癌或有水肿者。

27. 鸦胆慈菇丸 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 核桃仁 250g, 山慈菇 250g, 薏苡仁 100g, 鳖甲 (先煎) 30g (或莪术 30g), 海马 30g, 鸦胆子 9g。将核桃仁打粗末, 余药打细末, 搅拌均匀, 和蜜为丸, 每丸 9g, 早、晚各服 1 丸, 3 月为 1 个疗程。

〔功能主治〕 活血解毒抗癌。主治卵巢癌。

〔对症用方〕

卵巢癌的对症治疗主要针对手术、化疗、放疗所致不良反应, 辨证选用相应方药。

1. 党参二冬汤 (上海中医杂志, 1993, 12)

〔组成与用法〕 黄芪 9g, 党参 9g, 白术 9g, 白芍 9g, 生地 9g, 天冬 9g, 麦冬 9g, 天花粉 9g, 枸杞子 9g, 丹皮 9g, 鹿角霜 9g, 五味子 5g, 木香 5g, 佛手 5g。上药水煎浓缩成 500ml, 为 1 周用药量, 1 次 30ml, 1 日 2 次。

〔功能主治〕 气阴双补。主治卵巢癌放化疗中或放化疗后属气阴两虚者。

2. 育阴煎 (上海中医杂志, 1984, 8)

〔组成与用法〕 生地 9g, 白芍 9g, 天冬 9g, 麦冬 9g, 玄参 9g, 当归 9g, 丹皮 9g, 枸杞子 9g, 沙参 9g, 地骨皮 9g, 党参 9g, 天花粉 15g, 旱莲草 15g, 五味子 5g。上药水煎浓缩成 500ml, 为 1 周用药量, 1 次 30ml, 1 日 2 次。

〔功能主治〕 养阴生津, 清热安神。主治卵巢癌放化疗中或放化疗后属阴虚者。

3. 益气煎 (上海中医杂志, 1984, 8)

〔组成与用法〕 党参 9g, 白术 9g, 白芍 9g, 茯苓 9g, 当

归 9g, 生地 9g, 熟地 9g, 补骨脂 9g, 木香 9g, 鹿角霜 9g, 龙眼肉 9g, 枸杞子 9g, 陈皮 9g, 黄芪 12g。上药水煎浓缩成 500ml, 为 1 周用药量, 1 次 30ml, 1 日 2 次。

〔功能主治〕 益气和胃, 温补脾肾。主治卵巢癌放化疗中或放化疗后属气虚者。

〔加减应用〕 纳呆加服香砂六君子汤。

4. 清热消瘤煎 (上海中医杂志, 1984, 8)

〔组成与用法〕 铁树叶 30g, 八月札 30g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 露蜂房 9g, 白术 9g, 陈皮 6g。上药水煎浓缩成 500ml, 为 1 周用药量, 1 次 30ml, 1 日 2 次。

〔功能主治〕 扶正抗癌, 清热解毒, 软坚散结。主治卵巢癌放化疗后余毒未尽者。

〔临床报道〕 以上 4 方综合治疗妇科肿瘤 57 例, 其中卵巢癌 27 例, 存活 5~9 年 6 例, 4~5 年 4 例, 2~3 年 8 例, 1~2 年 7 例, 死亡 2 例。

5. 黄芪蟾蜍汤 (江苏中医, 1993, 12)

〔组成与用法〕 人参 6g, 生黄芪 30g, 全当归 10g, 茯苓 10g, 肉苁蓉 10g, 菟丝子 10g, 蛇莓 10g, 黄精 30g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 15g, 蟾蜍皮 10g, 阿胶 10g。水煎服。

〔功能主治〕 扶正祛邪, 活血化瘀。主治卵巢癌术后、放化疗后气血不足, 余毒未净者。

〔加减应用〕 咳嗽咯血者, 加川贝母、枇杷叶、白及; 疼痛者, 加罂粟壳。

〔临床报道〕 治疗卵巢癌术后、卵巢癌放化疗后 19 例, 生存 1~2 年 2 例 (Ⅳ期), 3 年 5 例 (Ⅳ期 1 例, Ⅲ期 4 例), 4 年 2 例 (Ⅱ期), 5 年 5 例 (Ⅱ期), 6 年以上 5 例 (Ⅰ期 4 例, Ⅱ期 1 例)。

6. 癌复康方加减 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 人参 10g, 黄芪 30g, 白术 10g, 茯苓 15g,

枸杞子 15g, 女贞子 10g, 旱莲草 30g, 鸡内金 10g, 砂仁 10g, 木香 10g, 仙灵脾 10g, 夏枯草 20g, 石见穿 30g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益气, 补肾养阴。主治卵巢癌术后、放化疗后脾肾亏虚者。

〔加减应用〕血虚者, 加当归、菟丝子、补骨脂; 贫血者, 加阿胶、龟胶、鹿角胶; 纳差者, 加山楂、鸡内金。

7. 黄芪龙葵汤 (河北省医学科学院方)

〔组成与用法〕绞股蓝 30g, 黄芪 30g, 当归 10g, 白花蛇舌草 40g, 龙葵 20g, 石见穿 30g, 丹参 20g, 三棱 10g, 莪术 10g, 水蛭 3g, 夏枯草 20g, 薏苡仁 30g, 木香 10g。水煎服。

〔功能主治〕益气活血, 解毒散结。主治卵巢癌术后正虚瘀毒未尽者。

〔加减应用〕腹水者, 加大腹皮、车前子。

8. 参桃红花饮 (河北省医学科学院方)

〔组成与用法〕党参 20g, 白术 10g, 半枝莲 20g, 白英 30g, 马鞭草 20g, 赤芍 15g, 桃仁 10g, 红花 10g, 廔虫 3g, 猫爪草 20g, 土茯苓 30g, 小茴香 5g。水煎服。

〔功能主治〕益气健脾, 清热化瘀。主治卵巢癌术后瘀毒未尽者。

〔加减应用〕血小板降低者, 加石韦、石斛。

【专病成药】

1. 桂枝茯苓胶囊 (《中华人民共和国药典》)

〔处方组成〕桂枝、茯苓、丹皮、桃仁、白芍。

〔功能主治〕活血化瘀, 软坚散结。主治宫颈癌术后尿潴留。(实用肿瘤学杂志, 2004, 2)

〔用量用法〕炼蜜为丸, 每丸重 10g, 1 次 1 丸, 1 日 3 次, 饭前温开水冲服, 如未见效, 可 1 次服 2 丸。

2. 鳖甲煎丸 (《中华人民共和国药典》)

[处方组成] 鳖甲、赤硝、柴胡、蜣螂虫、丹皮、芍药、廑虫、蜂房、阿胶、大黄、鼠妇、凌霄花、黄芩、射干、桂枝、干姜、桃仁、瞿麦、人参、半夏、葶苈子。

[功能主治] 活血化瘀，软坚散结。主治妇科肿瘤。(《临床中医肿瘤学》)

[用量用法] 炼蜜为丸。1次9g，1日2次，空腹温开水冲服。

[注意事项] 孕妇忌服。

3. 西黄丸 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

[处方组成] 麝香、牛黄、制乳香、制没药。

[功能主治] 解毒散结，消肿止痛。主治卵巢癌。(浙江中西医结合杂志，2001，4)

[用法用量] 1次3g，每天2次，温开水送服。

4. 复方斑蝥胶囊 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

[处方组成] 黄芪、刺五加、人参、斑蝥等十余味中药。

[功能主治] 清热解毒，消瘀散结。主治妇科肿瘤及术后的巩固治疗；也可与放疗、化疗配合使用，增效减毒。

[用量用法] 口服，1次3粒(每粒0.25g)，1日2次。

[注意事项] 偶见消化道不适；糖尿病患者及糖代谢紊乱者慎用。

5. 亚砷酸注射液 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

[处方组成] 三氧化二砷 (As_2O_3)。

[功能主治] 解毒去腐。适应于宫颈癌。

[用法用量] 成人1次5~10ml，用5%葡萄糖注射液或生理盐水500ml稀释后静脉滴注，1日1次。

6. 榄香烯乳注射液

[处方组成] 中药莪术提取物榄香烯。

[功能主治] 直接抑制肿瘤细胞生长；能增强T淋巴细胞

亚群的功能，有免疫保护作用；与放疗、化疗有协同作用；能为机体提供高能量营养；缓解癌痛；改善微循环；能通过血-脑脊液屏障。主治癌性胸腹腔积液及妇科肿瘤。

【用量用法】静脉注射：1次400~600mg，1日1次，15天为1个疗程。腹腔注射：尽量抽出腹水，先注射入5~10ml利多卡因注射液和5~10ml地塞米松，取本品500~800mg（或遵医嘱）用生理盐水稀释后，缓慢向腹腔内注射，滴注速度视患者的耐受能力而定。注药后让患者变换体位。用药1~3次为1个疗程。

【专病单方】

1. 鲜核桃树枝 用法：每取250g，加水500ml，煮30分钟后去渣，用汤煮鸡蛋2个，1次吃1个，1日2次。功用：清热利湿解毒。主治：输卵管卵巢癌各期。（《新编中医入门》）

2. 水蛭 用法：适量，晒干研细粉，每晚用黄酒冲服3g。功用：活血破瘀。主治：卵巢癌。注意：孕妇及体虚者忌服。（《抗癌本草》）

3. 三棱 用法：每取三棱浓缩成稠膏，1次用米酒送服4g，1日2次。功用：破血行气，止痛化瘀。主治：腹腔、盆腔癌症。（《抗癌本草》）

4. 柘木 用法：每取60~120g，水煎服。功用：清热凉血。主治：卵巢癌晚期。（《实用抗癌药物手册》）

5. 美登木 用法：每取30~60g，水煎服，1日1剂。另1日用竹茹15g，煎水代茶。功用：清热解毒，活血化瘀，消肿止痛。主治：各种癌症。注意：本品水煎服时消化道反应大，与竹茹同用可减轻反应。（《抗癌食药本草》）

6. 七叶莲 用法：每取10g，水煎服。功用：祛风止痛，舒筋活血。主治：癌性疼痛。注意：孕妇忌服。（《抗癌植物药及其验方》）

7. 朱砂莲 用法：取朱砂莲块根，刮粉，用白开水或白

酒吞服 0.5g 或 1g，1 日 1~2g。功用：清热解毒，活血止痛。

主治：癌性疼痛。（《肿瘤科中西药物手册》）

8. 槲寄生 用法：槲寄生茎、叶、花 15g，加水 300ml，煎后分 3 次服。功用：凉血止血，固肾明目。主治：各种癌症。（《肿瘤科中西药物手册》）

9. 菜豆 用法：每取 120g，加大蒜 15g、白糖 30g，水煎服。功用：清热抗癌，利尿消肿。主治：癌性胸腹水。（《肿瘤科中西药物手册》）

神经系统肿瘤

神经胶质瘤

神经胶质瘤简称胶质瘤，系指发生于神经外胚层的间质细胞和实质细胞的恶性肿瘤。本病的发生与脑胚胎组织发育异常、遗传、化学因素有关。

本病相当于中医病名国家标准的脑瘤，也属于真头痛、厥逆、头风、眩晕、呕吐等范畴。本病为嗜酒肥甘，饥饱劳倦，伤于脾胃，脾失健运，痰浊内阻，气机不畅或情志所伤，肝阳偏亢，阳化风动，气血上逆，气机郁滞，积结成块所致。

【辨证用方】

脑神经胶质瘤的辨证，重在辨虚实。以刺痛、钝痛、固定痛为主症者多为实证；以隐痛、空痛、昏痛、痛势悠悠、时作时止者多为虚证。治疗根据虚实的不同，采用不同的治疗方法，如益气养血，健脾和胃，填精益髓，清热解毒，活血化瘀，升清降浊，化痰通络等。由于手足三阳经络皆循行于头面，可根据头痛的部位，参照经络循行路线，适当加入引经药物。

1. 痰湿内阻证

主症：头痛头晕，恶心呕吐，视力障碍，半身不遂，谵妄神昏，喉中痰鸣，身重倦怠，舌淡胖，质淡红，苔白腻，脉弦滑。

治法：燥湿祛痰，开窍止痛。

(1) 涤痰蜈蝎汤（潘敏求经验方）

[组成与用法] 胆南星（先煎）10g，半夏（先煎）10g，竹茹10g，陈皮10g，茯苓皮15g，川芎10g，石菖蒲12g，钩藤15g，牛膝12g，僵蚕10g，全蝎粉（冲服）3g，蜈蚣3条，夏枯草20g，白花蛇舌草，蚤休30g。水煎服。

[功能主治] 祛痰通络，醒神开窍。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 头痛欲裂者，加细辛、蔓荆子；眩晕者，加天麻；身热、神昏者，另服安宫牛黄丸。

（2）麝香慈菇汤（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 法半夏10g，胆南星（先煎）10g，橘红15g，太子参15g，石菖蒲10g，竹茹8g，瓜蒌仁10g，制乳香10g，制没药10g，麝香（冲兑）0.03g，山豆根6g，山慈菇10g，穿心莲10g，丹参15g，白花蛇舌草30g，甘草5g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒，涤痰开窍。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 眩晕者，加天麻；呕吐、抽搐者，加蜈蚣、全蝎；颈项强痛，加葛根、杏仁、厚朴。

2. 气滞血瘀证

主症：头部刺痛，痛有定处，固定不移，面色晦黯，唇紫，指甲瘀斑，大便干，舌质黯有瘀点，苔薄白，脉涩而沉。

治法：活血化瘀，通窍止痛。

（1）加减血府逐瘀汤（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 当归12g，生地15g，丹参20g，川芎10g，桃仁10g，红花10g，枳壳10g，赤芍12g，牛膝10g，地龙10g，穿山甲（先煎）10g，钩藤15g，生石决明20g，水蛭3g，莪术10g，蚤休30g。水煎服。

[功能主治] 活血化瘀，通络止痛。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 头痛甚者，加全蝎、僵蚕；呕吐者，加姜半夏、旋覆花（布包）、代赭石（先煎）；视物不清者，加枸杞子、旱莲草；心悸怔忡者，加五味子、茯神、柏子仁。

（2）加减通窍活血汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 桃仁 12g, 红花 10g, 当归 9g, 蜈蚣 3 条, 赤芍 10g, 桔梗 5g, 川芎 15g, 川牛膝 10g, 全蝎 6g, 炒枳壳 5g, 三棱 10g, 莪术 10g, 守宫 5g, 麝香 (冲兑) 0.03g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀, 行气止痛, 攻坚散结。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 若头痛如针刺有定处者, 加炮山甲、五灵脂; 若头痛剧烈、复视、视物昏花、呕吐者, 加丹参、白蒺藜、法半夏。

3. 肝胆实热证

主证: 头痛头胀, 如锥如裂, 喷射呕吐, 面红耳赤, 口苦尿黄, 便干燥结, 唇黯色紫, 舌黯红或绛红, 苔黄或白, 脉弦数。

治法: 清胆泻肝, 解毒止痛。

(1) 加减龙胆泻肝汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 龙胆草 10g, 生地 15g, 川芎 15g, 赤芍 10g, 柴胡 12g, 黄芩 15g, 桃仁 10g, 泽泻 15g, 栀子 12g, 当归 10g, 夏枯草 20g, 野菊花 15g, 白花蛇舌草 30g, 车前子 (布包) 10g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清肝泻火, 解毒止痛。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 抽搐震颤者, 加全蝎末、蜈蚣、僵蚕、钩藤; 神志不清者, 加安宫牛黄丸。

(2) 加减黄连解毒汤 (黎月恒经验方)

〔组成与用法〕 黄连 9g, 黄芩 10g, 黄柏 10g, 炒栀子 10g, 大黄 10g, 生牡蛎 (先煎) 20g, 法半夏 10g, 夏枯草 20g, 全蝎 10g, 蜈蚣 3 条, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 祛风祛湿。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 神志不清者, 灌服安宫牛黄丸; 若实热痰阻者, 加礞石; 若高热不退, 重用生石膏, 加知母; 神昏, 躁动

不安者，加菖蒲、郁金。

4. 肝阳上亢证

主证：头痛头晕，喷射状呕吐，痛剧则吐频，视物模糊，喜怒无常，健忘失语，重则抽搐癫痫或偏瘫，口干颧红，大便干燥或秘结，舌红少苔，脉弦细而数。

治法：镇肝潜阳，息风止痛。

(1) 镇肝息风汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕牛膝 15g，代赭石（先煎）15g，生龙骨（先煎）12g，姜半夏 15g，生牡蛎（先煎）20g，当归 10g，白芍 15g，玄参 12g，麦冬 12g，决明子 10g，大黄（后下）10g，蚤休 30g，钩藤 12g，车前子（布包）10g，泽泻 15g，川芎 10g，全蝎 5g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕镇肝息风，解毒止痛。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕胁肋胀痛者，加柴胡、郁金；痰多者，加竹沥、胆南星；昏迷项强者，加安宫牛黄丸。

(2) 天麻钩藤饮加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕天麻 10g，钩藤 10g，生地 10g，白芍 10g，怀山药 10g，怀牛膝 15g，龟甲（先煎）10g，桑寄生 10g，黄连 6g，丹参 30g，升麻 6g，琥珀（先煎）10g，天然牛黄 3g，白花蛇舌草 30g，蚤休 30g，石菖蒲 10g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕镇肝潜阳，开窍醒神。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕高热抽搐者，加生石膏、蜈蚣；呕吐频繁者，加法半夏、黄连；视物不清者，加决明子；气虚者，重用生黄芪。

5. 肝肾阴虚证

主证：头痛头晕，耳鸣眩晕，视物不清，恶心呕吐，肢体麻木，失眠健忘，潮热颧红，四肢抽搐或震颤，口眼歪斜，大便干或秘结，小便短赤，舌质红，少苔，脉弦细而数。

治法：养血滋阴，柔肝止痛。

(1) 加减阿胶鸡子黄汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 阿胶 (烔兑) 10g, 白芍 15g, 石决明 15g, 钩藤 12g, 生地 12g, 红花 10g, 茯神 12g, 鸡子黄 2 枚, 生牡蛎 (先煎) 30g, 络石藤 10g, 全蝎 5g, 僵蚕 10g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴养肾, 祛风止痛。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 口干咽燥者, 加沙参、麦冬; 心中烦热者, 加栀子、竹叶; 痰热较甚者, 加胆南星、川贝。

(2) 镇肝息风汤合杞菊地黄汤加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 熟地 25g, 茯苓 15g, 枣皮 10g, 怀山药 15g, 枸杞子 10g, 杭菊 10g, 丹皮 10g, 泽泻 10g, 川牛膝 15g, 生牡蛎 (先煎) 15g, 生赭石 (先煎) 15g, 白芍 15g, 生龟甲 (先煎) 15g, 川楝子 5g, 菟丝子 10g, 白花蛇舌草 30g, 升麻 5g, 半枝莲 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 滋养肝肾, 息风止痛。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 瘀毒内盛者, 加三棱、莪术; 头痛连及项背者, 加葛根、川芎, 石膏; 抽搐者, 加全蝎、蜈蚣; 呕吐者, 加竹茹、法半夏。

〔辨病用方〕

神经胶质瘤的辨病治疗, 当注重气、痰、瘀三方面, 采用扶正固本的同时, 以理气祛痰、活血通经为主, 清热解毒为辅, 达到攻坚散结、消除或抑制肿瘤生长的目的。临床上根据病期早晚及体质的强弱选用不同的方药。

1. 脑胶质瘤各期体质较实者用方

(1) 芩蔚二玄汤 (江苏中医, 1957, 11)

〔组成与用法〕 车前子 (布包) 78g, 芩蔚子 18g, 茯苓 24g, 大黄 (后下) 9g, 玄参 18g, 玄明粉 (冲服) 9g, 桔梗 9g, 黄芩 9g, 防风 9g, 牛膝 18g, 郁金 10g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 祛湿止痛。主治脑神经胶质瘤。

〔**加减应用**〕 呕吐频繁，加竹茹、胆南星；头痛，加全蝎、蜈蚣。

(2) 二蛇二莲汤（上海中医药杂志，1981，3）

〔**组成与用法**〕 蛇六谷 30g，蛇果草 30g，半边莲 15g，半枝莲 15g，夏枯草 15g，天葵子 15g，蚤休 15g，贯众 15g，菝葜 15g。水煎服。

〔**功能主治**〕 清热解毒。主治脑神经胶质瘤。

〔**加减应用**〕 头晕、视物模糊者，加泽泻、充蔚子、青箱子。

(3) 蟾酥菖蒲汤（中医杂志，1988，1）

〔**组成与用法**〕 法半夏（先煎）10g，胆南星（先煎）10g，夏枯草 15g，石菖蒲 10g，僵蚕 10g，生牡蛎（先煎）15g，地龙 10g，蜈蚣 2 条，猪苓 12g，蟾酥（冲服）0.015g，麝虫 6g，天龙 1 条。水煎服。

〔**功能主治**〕 化痰开窍，通络止痛。主治脑神经胶质瘤。

〔**加减应用**〕 头痛剧烈，加川芎、全蝎粉；视物模糊者，加枸杞子、菊花、决明子、青箱子；咳痰不爽者，加海浮石、海蛤壳、瓦楞子、猫爪草；偏瘫者，加黄芪、赤芍、当归；畏寒冷者，加附子、肉桂、炮姜、小茴香、吴茱萸；阳痿不举者，加菟丝子、仙灵脾、仙茅；闭经者，加当归、川芎、王不留行、穿山甲；夜寐不安者，加灯心草、远志、朱砂；恶心呕吐者，加木香、竹茹、陈皮、九香虫、旋覆花；阴虚潮热者，加北沙参、石斛、龟甲、鳖甲、生地；脘闷纳呆者，加陈皮、焦楂曲、生薏苡仁、鸡内金；形羸体虚者，加黄芪、太子参、当归、生地、麦冬。

〔**临床报道**〕 治疗 20 例胶质瘤患者，中位生存期为 7.27 年。

(4) 脑瘤康平胶囊（山东省中医药研究院方）

〔**组成与用法**〕 炒枣仁 45g，百合 30g，土贝母 12g，白花

蛇舌草 15g, 丹参 18g, 赤芍 18g, 延胡索 15g, 川芎 12g, 细辛 45g, 蔓荆子 12g, 水蛭 6g, 生龙骨 30g, 泽泻 24g, 甘草 6g。制成胶囊, 1 次 7 粒 (含生药 3~5g), 1 日 3 次。

[功能主治] 活血化瘀, 渗湿利浊, 清热解毒, 软坚散结。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 手术后癫痫, 发作性抽搐, 加全蝎、蜈蚣、制南星、石菖蒲、白胡椒。

[临床报道] 张新华等治疗 42 例, 总有效率为 85.71%。(湖南中医药导报, 2003, 8)

(5) 蜂房夏藻汤 (湖北中医杂志, 1982, 1)

[组成与用法] 半枝莲 30g, 蒲公英 30g, 牡蛎 (先煎) 30g, 夏枯草 30g, 海藻 30g, 鲜核桃枝 30g, 败酱草 15g, 草河车 15g, 露蜂房 15g, 浙贝母 12g, 玄参 12g, 细辛 6g, 全蝎 6g, 白附子 (先煎) 25g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 通络止痛。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 气血亏虚者, 加太子参、黄芪、当归; 头痛连及项背者, 加葛根、柴胡; 痰湿明显者, 加法半夏、天竺黄。

(6) 丹参南星饮 (浙江中医学院学报, 1984, 3)

[组成与用法] 丹参 15g, 白芷 9g, 云雾草 9g, 炒葶苈子 9g, 钩藤 9g, 姜半夏 9g, 竹茹 9g, 僵蚕 9g, 蝉蜕 6g, 胆南星 (先煎) 6g, 藁本 6g, 甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 活血化瘀, 祛痰通络。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 随证选用全蝎、蜈蚣、蔓荆子、地龙、蕤仁、枸杞子、黄精、玉竹、当归、茯苓、潼白蒺藜、天葵子、密蒙花、石决明。

(7) 僵蚕全蝎汤 (中西医结合杂志, 1985, 2)

[组成与用法] 葶苈 60g, 天葵子 30g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 石决明 30g, 蚤休 15g, 白术 15g, 制半夏 9g,

三七 10g, 白僵蚕 10g, 天麻 10g, 全蝎 3g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 平肝息风。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 头痛者, 加川芎、白芷; 呕吐者, 加代赭石、竹茹。

(8) 全蝎茯苓汤 (湖南中医杂志, 1986, 6)

[组成与用法] 土茯苓 50g, 玄参 30g, 金银花 12g, 天麻 6g, 蔓荆子 10g, 防风 10g, 白芷 10g, 苍耳子 10g, 川芎 10g, 黑豆 10g, 僵蚕 10g, 全蝎 (研末冲服) 3g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 平肝息风。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 头痛剧烈者, 加藁本、白芷、蜈蚣、葛根;

(9) 蚤休地龙汤 (中西医结合杂志, 1987, 6)

[组成与用法] 白花蛇舌草 60g, 半枝莲 30g, 野葡萄根 30g, 沙氏鹿茸草 10g, 蚤休 10g, 僵蚕 10g, 地龙 10g, 蝉蜕 10g, 海藻 15g, 夏枯草 15g, 牡蛎 (先煎) 15g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 祛风通络。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 头痛、呕吐者, 加法半夏、白术、陈皮、车前子 (布包)、丹参。

(10) 柳叶穿石汤 (上海中医药杂志, 1981, 3)

[组成与用法] 白花蛇舌草 30g, 半边莲 30g, 半枝莲 30g, 贯众 30g, 石见穿 30g, 蚤休 30g, 菝葜 30g, 茶树根 30g, 柳树叶 30g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 祛风止痛。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 头痛如刺者, 加川芎、丹参、全蝎; 头晕蒙者, 加密蒙花、泽泻、黄芪。

(11) 昆布水蛭汤 (内蒙古中医药, 1991, 4)

[组成与用法] 制半夏 (先煎) 15g, 胆南星 (先煎) 15g, 橘红 15g, 大黄 10g, 水蛭 5g, 甲珠 10g, 白芥子 15g, 连翘 15g, 海藻 15g, 昆布 10g, 川芎 5g, 血竭 5g, 蜈蚣 3 条, 全蝎 5g, 红参 10g, 茯苓 10g, 白术 10g, 麝香 0.03g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾化痰，祛瘀通络，活血止痛。主治脑神经胶质瘤。

(12) 脑瘤平 (广州中医药大学学报, 2000, 6)

〔组成与用法〕 葛根 60g, 枸杞子 24g, 猪苓 30g, 土茯苓 30g, 半夏 (先煎) 12g, 胆南星 (先煎) 12g, 制乳香 9g, 细辛 3g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰通络，升阳开窍。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 若头昏头痛者，加钩藤、石决明；烦躁易怒者，加龙胆草、黄芩；咽干灼热者，加生地、鳖甲、麦冬、玄参、首乌。

(13) 脑瘤消 (山东中医药大学学报, 1997, 1)

〔组成与用法〕 金银花 15g, 连翘 15g, 蒲公英 15g, 紫花地丁 15g, 夏枯草 15g, 三棱 12g, 莪术 12g, 半枝莲 15g, 白花蛇舌草 15g, 瓜蒌 20g, 瓦楞子 15g, 礞石 20g, 水蛭 1.5g, 蜈蚣 3 条, 猪苓 40g, 牡蛎 (先煎) 15g。水煎服。

〔功能主治〕 行气破血，消积止痛。主治脑神经胶质瘤。

〔临床报道〕 治疗脑瘤 36 例，其中 18 例为脑神经胶质瘤放、化疗后复发者，结果临床治愈 9 例 (胶质瘤 6 例)，显效 15 例，稳定 11 例。

(14) 鱼脑珍珠汤 (《现代治癌验方精选》)

〔组成与用法〕 鱼脑石 15g, 广郁金 12g, 石菖蒲 10g, 天竺黄 10g, 石决明 12g, 珍珠母 24g, 煅磁石 (先煎) 3g, 赤芍 10g, 橘络 6g, 橘红 6g, 地龙 10g, 桃仁 10g, 钩藤 12g, 川牛膝 25g, 杭白芍 12g, 生代赭石 (先煎) 30g。水煎服。

〔功能主治〕 平肝息风，祛痰通络，降逆止呕。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 虚火上炎者，加生地、玄参；痰蒙心窍、神魂恍惚及伏热呕吐者，加服安宫牛黄丸或局方至宝丹；肝阳上亢、眼目昏糊者，加苦参、龙胆草、芦荟。

2. 脑胶质瘤中晚期体质较虚者用方

(1) 夏枯三棱汤（上海中医药杂志，1983，4）

〔组成与用法〕 丹参 15g，菊花 15g，夏枯草 15g，石菖蒲 15g，莪术 15g，半枝莲 15g，益母草 15g，茯苓 12g，三棱 10g，枸杞子 10g，党参 10g，山慈菇 9g，鹿角胶（蒸兑）9g，仙灵脾 9g。水煎服。

〔功能主治〕 平肝息风，化瘀止痛。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 脾气虚者，加黄芪、白术、薏苡仁；瘀毒甚者，加白花蛇舌草、牡蛎、浙贝母、僵蚕；肝阳上亢者，加钩藤、葛根、决明子。

(2) 天葵六谷汤（上海中医药杂志，1987，7）

〔组成与用法〕 ①生地 30g，蛇六谷 30g，天葵子 30g，熟地 24g，女贞子 15g，生南星 15g（先煎），白蒺藜 15g，夏枯草 12g，丹皮 6g。②生黄芪 30g，牡蛎（先煎）30g，生南星（先煎）30g，蛇六谷（先煎）30g，当归 9g，赤芍 12g，白芍 12g，露蜂房 12g，白芷 12g，补骨脂 12g，瓜蒌皮 15g，王不留行 15g，夏枯草 15g，海藻 15g，薜荔果 15g。二方交替，水煎服。

〔功能主治〕 益气养血，化痰通络，滋阴化痰，解毒散结。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 头痛昏蒙、视物模糊者，加白蒺藜、谷精草、夏枯草。

(3) 姜桂牡蛎汤（《癌症的治疗与预防》）

〔组成与用法〕 当归 10g，川芎 10g，白芷 10g，苍耳子 10g，蜈蚣 3 条，蝉衣 10g，百部 15g，土茯苓 40g，海藻 15g，牡蛎（先煎）15g，莪术 10g，党参 10g，苍术 10g，薏苡仁 10g，陈皮 10g，高良姜 15g，肉桂 15g，牵牛子 30g，槟榔 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血，温经祛寒，化瘀解毒。主治脑神

经胶质瘤。

[加减应用] 若形寒肢冷、头部冷痛者，加鹿角胶、炙麻黄、白芥子。

(4) 黄芪莪术汤（中国医学文摘·中医分册，1986，6）

[组成与用法] ①炙黄芪 30g，丹参 30g，莪术 20g，三棱 20g，天冬 15g，麦冬 15g，赤芍 10g，白芍 10g，全当归 10g，川芎 10g，五味子 5g，全蝎 5g。1 日 1 剂，水煎服。②全蝎 15g，三七粉 40g，蟾酥 0.2g，麝香 0.2g，虻虫 30g，壁虎 30g。共研末，1 次 1g，1 日 3 次。

[功能主治] 益气养血，活血化瘀，开窍止痛。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 若视物模糊，加桑椹子、夜明砂；痛连及项背者，加葛根、生石膏、知母。

(5) 莪术僵蚕汤（四川中医，1989，2）

[组成与用法] 僵蚕 10g，莪术 10g，三七粉（冲服）10g，鸡内金 10g，全蝎 3g，石决明（先煎）30g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g，谷精草 15g，夏枯草 15g，半夏（先煎）10g，天麻 15g，蚤休 15g，白术 15g，枸杞子 15g。水煎服。

[功能主治] 养肝益肾，祛痰除湿，活血通络。主治脑肿瘤，证属肝肾亏损，痰湿瘀毒凝滞者。

[加减应用] 头痛剧烈者，加川芎、白芷；视物模糊者，加菊花、青箱子。

(6) 全蝎钩藤汤（《现代治癌验方精选》）

[组成与用法] 全蝎 4.5g，蜈蚣 3 条，川芎 4.5g，丹参 20g，僵蚕 9g，地龙 9g，半夏（先煎）9g，钩藤 15g，白术 9g，天麻 9g，天葵子 15g，夏枯草 30g，贝母 9g，女贞子 15g，枸杞子 15g，云雾草 15g，分心草 15g。水煎服。

[功能主治] 祛风除痰，化瘀通络。主治脑神经胶质瘤。

[加减应用] 呕吐者，加姜竹茹；头痛甚者，加藁本、蔓

荆子、白芷、菊花；视力障碍者，加蕤仁、青葙子、密蒙花、石决明；便秘者，加番泻叶；多饮多尿者，加生地、天花粉、石斛、桑螵蛸、龟甲、远志。

(7) 桃红四物汤加减（《癌症的治疗与预防》）

〔组成与用法〕 当归 10g，川芎 10g，芥穗 10g，防风 3g，天麻 10g，枸杞子 15g，三棱 10g，莪术 10g，桃仁 10g，红花 10g，蝉蜕 10g，全蝎 10g，僵蚕 15g，蜈蚣 5 条。水煎服。

〔功能主治〕 养血祛风，活血化瘀。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 大便干燥者，加大黄、芒硝（冲）；饮食不振者，加刀豆、甘松；睡眠不安者，加合欢皮、白芍、琥珀；寒湿顽痰阻滞经络者，加南星、半夏、白芥子、橘络、干姜或苏合丸；寒湿化火、毒热内蕴、神昏者，加安宫牛黄丸或至宝丹或紫雪丹。

(8) 四物莪甲汤（《段凤舞肿瘤积验方》）

〔组成与用法〕 当归 12g，川芎 12g，赤芍 12g，桃仁 12g，红花 12g，虻虫 12g，生地 15g，莪术 15g，甲珠 15g。水煎服。

〔功能主治〕 补血活血，化瘀通络。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 头痛剧烈者，加蔓荆子、藁本、柴胡、白芷、葛根；耳鸣、眩晕、复视者，加杞菊地黄丸；耳聋者，加柴胡、黄芩、石菖蒲、远志；癫痫样发作者，加天麻、石决明、生龙骨（先煎）、生牡蛎（先煎）、全蝎、地龙、僵蚕；喷射性呕吐者，加夏枯草、车前草、半边莲、白花蛇舌草、大黄（后下）。

(9) 珍珠蜈蛇汤（《段凤舞肿瘤积验方》）

〔组成与用法〕 生代赭石（先煎）30g，珍珠母（先煎）30g，何首乌 15g，生地 15g，丹参 15g，白芍 15g，女贞子 15g，旱莲草 12g，竹茹 10g，天葵子 10g，牛膝 10g，紫草 10g，陈皮 5g，蛇蜕 3g，黄连 3g，蜈蚣 1 条。水煎服。

〔功能主治〕 镇肝息风，降逆止呕。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 痛缓，呕吐轻，大便调者，去生代赭石、竹茹、黄连，加龟甲、鳖甲、茺蔚子、石决明。

(10) 通络散结汤 (天津中医药, 2003, 12)

〔组成与用法〕 党参 15g, 白术 15g, 当归 10g, 川芎 10g, 天南星 (先煎) 10g, 半夏 (先煎) 10g, 煅牡蛎 (先煎) 15g, 夏枯草 15g, 僵蚕 10g, 地龙 10g, 虻虫 10g, 苍耳子 10g, 蛇六谷 10g, 苍术 10g, 三棱 10g, 瓜蒌 10g, 猪苓 15g, 红花 10g, 重楼 10g, 桃仁 10g, 菊花 10g, 女贞子 10g, 猫爪草 15g, 天花粉 10g, 甘草 6g, 大枣 7 枚, 干姜 3 片。水煎服。

〔功能主治〕 祛风化瘀，通络散结。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 加服祛风化瘀散 (全蝎 60g, 守宫 90g, 三七 60g, 蜈蚣 60g, 天麻 60g, 人工牛黄 60g, 白花蛇舌草 60g, 炮制后研细末, 1 次 5g, 1 日 3 次)。头痛头晕者, 加防风、石决明、延胡索; 视力模糊者, 加远志、石菖蒲; 低热烦躁者, 加蒲公英、半枝莲、柴胡; 胸闷、气急、恶心者, 加瓜蒌、葶苈子、旋覆花。

〔临床报道〕 治疗 92 例脑瘤, 总有效率达 96.74%。

【对症用方】

脑神经胶质瘤的对症用方, 要根据患者主要症状进行选择; 并区分是否手术或放疗、化疗等治疗。术后治疗以健脾益肾补益气血为主, 放疗病人以养阴清热、活血解毒为主, 化疗病人以健脾和胃、益肾填精为主。

1. 脑神经胶质瘤手术后专方

(1) 黄芪首乌汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 黄芪 15g, 璐党参 15g, 补骨脂 15g, 巴戟天 12g, 当归 15g, 熟地 12g, 何首乌 20g, 白芷 12g, 菊花 15g, 白僵蚕 10g, 全蝎末 (冲服) 3g, 白术 12g, 陈皮 10g,

半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g，鹿角胶（烊化）10g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益肾，清热解毒。主治脑胶质瘤手术后气血亏虚弱，症见头部隐隐作痛，面色苍白，乏力，纳差者。

〔加减应用〕术后口干咽燥、舌红少苔者，加参须、麦冬、玉竹；术后并发癫痫者，加丹参、川芎、地龙；视力障碍者，加枸杞子、木贼草。

（2）四君温胆汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕太子参 15g，白术 10g，陈皮 10g，法半夏 10g，茯苓皮 15g，砂仁 5g，黄芪 15g，胆南星（先煎）10g，枸杞子 10g，女贞子 12g，莪术 10g，钩藤 15g，僵蚕 10g，全蝎（冲服）3g，蜈蚣 3 条，夏枯草 20g，白花蛇舌草 30g，蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕健脾化痰，息风止痉。主治脑胶质瘤手术后引起癫痫抽搐者。

〔加减应用〕若急躁易怒、心烦失眠者，加龙胆草、青黛、芦荟；大便秘结者，加大黄。

2. 脑神经胶质瘤放疗专方

（1）参茱汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕当归 12g，生地 15g，丹参 15g，车前子（包煎）12g，泽泻 15g，山茱萸 15g，陈皮 10g，女贞子 12g，胡桃肉 10g，西洋参（蒸兑）10g，全蝎 5g，菊花 15g，红花 10g，蚤休 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕益气养阴，化瘀通络。主治脑胶质瘤放疗后引起人体气血亏虚，体力下降者。

〔加减应用〕头晕、视物模糊者，加夜明砂、枸杞子；纳差者，加麦芽、山楂；恶心呕吐者，加姜半夏、竹茹。

（2）息风通络汤（辽宁中医杂志，2003，10）

〔组成与用法〕半夏（先煎）10g，天麻 10g，僵蚕 10g，

桃仁 10g, 红花 10g, 丹参 20g, 夏枯草 15g, 当归 10g, 牛膝 10g, 大贝母 10g, 钩藤 10g, 郁金 10g, 地龙 5g, 白花蛇舌草 20g, 半枝莲 20g, 赤白芍 10g, 女贞子 10g, 蜂房 10g, 蜈蚣 3 条, 全蝎 5g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰祛瘀, 息风通络。主治脑神经胶质瘤。

〔加减应用〕 另用水蛭、全蝎、黄连、大黄、蜈蚣、川贝母研末冲服。降颅内压, 加泽泻、白术、猪苓; 痰盛者, 加白芥子、胆南星、海浮石。

〔临床报道〕 治疗 1 例脑额叶胶质瘤行 X 刀后出现半身不遂, 行走困难, 不能自理, 时抽搐。服药 2 月, 抽搐止, 可自由行走。

3. 脑神经胶质瘤化疗专方

癌复康方加减 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 人参 10g, 白术 10g, 茯苓 15g, 当归 10g, 陈皮 10g, 法半夏 12g, 砂仁 6g, 广木香 6g, 女贞子 10g, 旱莲草 15g, 枸杞子 10g, 菟丝子 10g, 仙灵脾 10g, 黄芪 15g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾和胃, 益肾生髓。主治脑胶质瘤手术后体质虚弱者, 或放、化疗后消化道反应及白细胞下降者。

〔加减应用〕 若气血不足明显者, 重用黄芪, 加川芎、白芍、熟地; 若头痛连及项背者, 加粉葛; 若前额头痛者, 加细辛、白芷。

4. 脑神经胶质瘤引起呕吐专方

小半夏汤合苓桂术甘汤加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 生姜 10g, 法半夏 10g, 茯苓 15g, 桂枝 10g, 白术 10g, 砂仁 5g, 白花蛇舌草 30g, 半边莲 30g, 陈皮 10g, 黄连 5g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 温化痰饮, 和胃降逆。主治脑胶质瘤引起呕吐, 呕吐多为清水痰涎, 头晕目眩者。

[加减应用] 视力障碍、头痛者，加白芷、川芎、泽泻；口干口苦者，加黄芩、栀子、生地。

5. 脑神经胶质瘤引起头痛专方

(1) 天麻藁本汤（李佩文经验方）

[组成与用法] 天麻 5g，藁本 10g，茯苓 15g，川芎 10g，蔓荆子 10g，水牛角（先煎）10g，白菊花 10g。水煎服。

[功能主治] 疏风清窍，升阳定痛。主治脑神经胶质瘤头痛者。

[加减应用] 头部放疗，热毒伤阴或引起肝阳上亢者，可加石决明、白芍、金银花；颅内高压者，加车前子、泽泻、牛膝；血压高者，加葛根、夏枯草、荷叶、浮萍；头热、目赤者，加谷精草、蝉蜕。

(2) 消风豁痰汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 黄芩 10g，羌活 10g，红花 10g，姜半夏 10g，陈皮 10g，白茯苓 15g，独活 10g，防风 10g，白芷 10g，粉葛 30g，全蝎 5g，蜈蚣 3 条，丹参 30g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 祛风化痰，清热解毒。主治脑神经胶质瘤引起颈项头痛者。

[加减应用] 痰毒内盛，引起神昏者，加石菖蒲、天竺黄；大便秘结者，加大黄。

(3) 羌防全蝎汤（《中华肿瘤治疗大成》）

[组成与用法] 防风 10g，羌活 10g，酒黄芩 10g，蜈蚣 3 条，全蝎 5g，甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 清热祛风通络。主治脑神经胶质瘤，症见眉棱骨痛，伴见昏闷，抽掣者。

[加减应用] 呕吐者，加法半夏、胆南星。

【专病成药】

1. 榄香烯乳注射液（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔**处方组成**〕 榄香烯，为中药莪术中提取到的抗癌活性物质。

〔**功能主治**〕 直接抑制肿瘤细胞的生长；能增强 T 淋巴细胞亚群的功能，有免疫保护作用；与放疗、化疗有协同作用；能为机体提供高能量营养；缓解癌痛；改善微循环；能通过血脑屏障血-脑脊液屏障。主治脑肿瘤。

〔**用法用量**〕 静脉注射：每日 1 日 1 次，400~600mg/次，15 天为一疗程 1 个疗程。

2. 安康欣胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔**处方组成**〕 黄芪、人参、丹参、补骨脂、鸡血藤、半枝莲、淫羊藿等中草药组成。

〔**功能主治**〕 活血化瘀、软坚散结、清热解毒、扶正固本。主治脑肿瘤。

〔**用法用量**〕 1 日 3 次，1 次 5 粒，饭后温开水送服。

【专病单方】

1. 蚯蚓 用法：每取 30 条，配冰片 1g，麝香 0.03g。上药共为 1 丸，每以 1 丸纳鼻中，1 日 1~2 次。功用：开窍止痛。主治：脑恶性胶质瘤头痛甚者。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 白附子 用法：每取 120g，配半夏 120g，天南星 120g。上药共研细末，用生姜自然汁浸蒸饼为丸，如绿豆大，1 日 40 丸，用生姜汤送下。功用：祛痰除湿。主治：脑肿瘤头痛，有痰湿征象者。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 雄黄 用法：每取 100g，配老姜 100g。将老姜剥去泥沙（不洗），除去叉枝，用小刀挖一小洞，捣空中心，四壁仅留 0.5cm 厚，填装入雄黄粉，以挖出的姜渣封口，置陈瓦上用木炭火焙 7~8 小时，至呈金黄色脆而不焦为度，离火放冷、研细，过 80 目筛，剩余姜渣可一并焙干后研细，拌入粉内即得。外用，取安庆膏药微火烘干，均匀散上雄黄散，可按瘤块、痛点、穴位三结合原则选贴敷部位，隔日换药 1 次。功

用：温肾祛痰。主治：脑胶质瘤头部疼痛者。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 金剪刀 用法：每取 120g，洗净，加食盐少许捣烂，敷于肿瘤相应部位，厚 0.5~1.0cm，24~36 小时换药 1 次。功用：清热解毒。主治：脑胶质瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 壁虎 用法：每取 1 条，鸡蛋 1 个。壁虎去内脏，焙干，研末，鸡蛋去黄，取壁虎末与蛋白搅匀蒸熟，再焙干研成粉末，将药末装入胶囊，每个胶囊 0.3g，1 次 3 粒，1 日 3 次。功用：清热解毒。主治：脑胶质瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

脑垂体肿瘤

脑垂体肿瘤是鞍区最多见的肿瘤。根据垂体腺瘤细胞的染色情况，分为嫌色性、嗜酸性、嗜碱性及兼有上述细胞特征的混合性垂体腺瘤；根据其临床表现并与上述相对应又分为非功能性腺瘤和功能性腺瘤（肢端肥大症和库欣病）。其发生与脑部损伤、射线、化学污染及病毒等因素有关。

本病相当于中医病名国家标准的脑瘤，亦属于头痛、虚劳、阳痿、乳泣、不孕、心悸等范畴，其病因病机多因禀赋不足、肾精亏虚、导致肝肾阴亏、肝阳上亢；或饮食不节，损伤脾胃，脾失健运，痰湿内生，气机不畅，脉络阻塞所致；或风痰上扰，蒙昧清窍所致。

【辨证用方】

脑垂体瘤的辨证，首先从病位辨，垂体肿瘤病位在脑，头为精明之府，神明之主，又内藏脑髓，脑为髓海，肝脾肾功能失调，以致风、火、痰、瘀内结于脑，久则形成脑瘤，故治疗上采用健脾疏肝，滋阴养肾，化痰解毒，祛风通络等；其二从主症辨，其主要表现为头痛、视力下降，主要因脑络痹阻或失

养，清窍不利所致，故采用滋阴养血，调神利窍，活血化瘀，缓急止痛等；其三从并发症辨，如肥胖、阳痿、闭经、糖尿病，根据辨证的不同，分别论治。

1. 痰湿内阻证

主症：形体肥胖，头痛，头晕眼花，视力模糊，健忘，乏力，步态不稳，舌质淡胖，苔白腻，脉弦滑。

治法：豁痰祛湿，软坚散结。

(1) 加减导痰汤（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕法半夏 10g，胆南星（先煎）6g，白芥子 10g，全蝎 5g，桃仁 10g，赤茯苓 15g，钩藤 20g，天麻 10g，橘红 10g，蜈蚣 3 条，泽泻 10g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕燥湿祛痰，行气开郁。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕嗜睡、肢体浮肿、苔白腻者，加防己、黄芪、桂枝；脘痞纳呆、大便溏者，加白术、薏苡仁、白蔻仁；肢端肥大者，加冬瓜皮、桑白皮、姜皮。

(2) 化痰清脑汤（《中医疑难杂症诊治》）

〔组成与用法〕钩藤 20g，土茯苓 15g，茯苓 15g，瓦楞子 15g，野菊花 10g，佩兰 10g，厚朴 10g，白蔻仁 10g，枳实 10g，生石膏（先煎）30g。水煎服。

〔功能主治〕祛痰除湿，利脑开窍。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕风痰者，加南星、竹沥；热痰者，加胆南星、黄芩；火痰者，加石膏、青黛。

(3) 加减半夏白术天麻汤（《神经系统肿瘤学》）

〔组成与用法〕黄芪 30g，法半夏 10g，天麻 10g，茯苓 15g，橘红 10g，白术 9g，白芥子 10g，炙麻黄 8g，蜈蚣 6g，白花蛇舌草 30g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕燥湿化痰，平肝止痛。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕痰郁化热显著者，加竹茹、枳实、黄芩；若

痰浊瘀血痹阻脑络、清阳被遏、头痛甚者，加全蝎、葛根。

2. 风痰上扰证

主症：突发头痛剧烈，视力障碍，恶心呕吐，大便秘结，耳聋耳闭，咳痰黏稠，舌质黯淡，苔黄腻，脉弦滑。

治法：涤痰开窍，祛风通络。

(1) 全蝎蜈蚣汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 黄芪 15g，胆南星（先煎）10g，法半夏 15g，枳实 10g，茯苓 10g，橘红 10g，蜈蚣 3 条，半枝莲 30g，全蝎 5g，僵蚕 10g，莪术 9g，人参 10g，竹茹 10g，甘草 5g。水煎服。

〔主治功能〕 涤痰开窍。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 若火热之势甚者，加黄芩、黄连；便秘者，加熟地、肉苁蓉；痰瘀痹阻脑络者，加炮山甲、虻虫、丹参、红花。

(2) 加减涤痰汤（四川中医，1989，4）

〔组成与用法〕 茯苓 15g，法半夏 10g，枳实 10g，竹茹 10g，石菖蒲 10g，陈皮 6g，红花 5g，虻虫 5g，炮山甲（先煎）5g，丹参 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 涤痰开窍，化瘀通络。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 热象明显者，加栀子、黄芩；津亏便秘者，加玄参、麦冬、熟大黄；风痰上扰、震颤者，加天麻、全蝎、僵蚕、杏仁。

(3) 丹参消风饮（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 丹参 30g，川芎 10g，羌活 10g，防风 10g，法半夏 10g，茯苓 15g，白僵蚕（炒）10g，藿香叶 10g，荆芥穗 10g，蝉蜕 4g，甘草 5g，厚朴 10g，陈皮 10g。水煎服。

〔主治功能〕 祛风化瘀，通络止痛。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 头颈项强痛者，加紫金藤、粉葛；恶心呕吐者，加黄芩、吴茱萸、竹茹；热毒甚者，加白花蛇舌草、半枝

莲、黄连。

3. 肝胃炽热证

主症：头胀痛，心烦易怒，失眠多梦，多食易饥，口渴喜冷饮，形体消瘦，女子闭经，舌红，苔黄，脉弦数。

治法：清肝泻胃，养阴生津。

(1) 加减玉女煎（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 人参 10g，黄芪 30g，丹参 15g，怀山药 15g，白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g，蚤休 30g，土茯苓 15g，生石膏（先煎）15g，熟地 15g，麦冬 10g，知母 10g，怀牛膝 10g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清胃泻火，养阴生津。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 头胀痛者，加黄连、栀子；肝火上炎者，加龙胆草、炒栀子；气虚津亏者，加黄芩、粉葛。

(2) 加减龙胆泻肝汤（《神经系统肿瘤学》）

〔组成与用法〕 太子参 15g，黄芪 15g，葛根 30g，龙胆草 6g，炒栀子 9g，黄芩 9g，泽泻 12g，白花蛇舌草 30g，车前子（布包）9g，当归 3g，生地 9g，柴胡 6g，生甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清肝泻火。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 肝火化风、肢体麻木、震颤者，加全蝎、蜈蚣、地龙、僵蚕；呕恶、视力障碍者，加羚羊角、法半夏、菊花。

4. 肝肾阴虚证

主症：头痛，头晕眼花，女子闭经，白带减少，男子阳痿，毛发稀少，健忘、失眠，视物模糊，口干欲饮，五心烦热，腰膝酸软，尿赤灼热，大便秘结，舌淡红，少苔，脉细数。

治法：滋补肝肾，活血止痛。

(1) 加减知柏地黄汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 熟地 24g，山茱萸 12g，怀山药 12g，泽泻

9g, 麦冬 10g, 防风 10g, 黄芪 15g, 龙葵 15g, 石上柏 15g, 丹皮 9g, 白茯苓 9g, 知母 6g, 黄柏 6g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 滋养肝肾, 解毒抗癌。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 潮热盗汗者, 加煅龙骨、煅牡蛎、地骨皮; 肢麻震颤者, 加全蝎、蜈蚣; 津伤便秘者, 加肉苁蓉、玄参、火麻仁。

(2) 加减左归丸 (《神经系统肿瘤学》)

〔组成与用法〕 太子参 15g, 天麻 10g, 熟地 15g, 怀山药 12g, 枸杞子 12g, 山茱萸 12g, 川牛膝 12g, 菟丝子 12g, 鹿角胶 (烊化) 12g, 龟胶 (烊化) 12g, 白花蛇舌草 30g, 蚤休 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴补肾。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 若五心烦热、舌红、脉弦细数者, 加炙鳖甲、知母、黄柏、丹皮; 若肢体麻木, 加全蝎、蜈蚣; 虚火上炎者, 去枸杞子、鹿角胶, 加女贞子、麦冬。

5. 痰瘀阻窍证

主症: 头痛经久不愈, 其痛如刺, 固定不移, 视物昏蒙, 呕恶痰涎, 舌紫或有瘀斑、瘀点, 苔薄白, 脉沉细。

主治: 活血化痰, 祛痰开窍。

(1) 加减通窍活血汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 麝香 (冲服) 0.03g, 赤芍 10g, 蜈蚣 3 条, 全蝎 5g, 天竺黄 10g, 川芎 10g, 桃仁 9g, 红花 9g, 老葱 3g, 红枣 5g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 活血通窍。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 气虚明显者, 加黄芪; 视物昏蒙者, 加枸杞子、菊花。

(2) 加减血府逐瘀汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 当归 9g, 生地 9g, 桃仁 12g, 红花 12g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 蜈蚣 3 条, 枳壳 6g, 赤芍 6g,

柴胡 6g, 桔梗 5g, 牛膝 9g, 川芎 5g, 甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 活血祛瘀, 行气止痛。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 血瘀经闭者, 去桔梗, 加香附、益母草、泽兰等; 若口渴多饮、乏力者, 加黄芪、麦冬。

6. 脾肾阳虚证

主症: 头晕闷痛, 视物模糊, 男子阳痿, 女子闭经, 嗜睡, 精神不振, 气短懒言, 形寒肢冷, 大便溏薄, 小便清长, 舌质胖大, 边有齿痕, 舌淡苔白, 脉沉细无力。

治法: 温补肾阳, 健脾益气。

金匮肾气丸加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 熟地 10g, 山药 10g, 泽泻 12g, 肉桂 6g, 茯苓 15g, 山茱萸 10g, 枸杞子 10g, 佩兰 10g, 仙灵脾 15g, 白术 12g, 党参 15g, 黄芪 15g, 全蝎 5g, 红花 10g, 蚤休 30g, 巴戟天 10g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 温补肾阳, 健脾化痰。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 面色晦黯无华、头面四肢浮肿、苔腻者, 加赤小豆、姜片、防己; 腹胀、纳呆者, 加陈皮、藿香。

【辨病用方】

脑垂体肿瘤的辨病治疗, 一是注意体质, 调整阴阳平衡, 做到“阴平阳秘, 精神乃治”, 如养心安神, 益气养血, 健脾益肾等; 二是针对并发症, 如肢端肥大症、女子继发性闭经、男子阳痿、消渴等, 应审症求因; 三是该类病人经手术或 γ 刀治疗后, 体质虚弱, 精神状况差, 故应重视扶正治疗, 消除手术等因素对人体的损害, 如扶正固本、补肾填髓等。

1. 脑垂体瘤体质较实用方

(1) 六谷牡蛎汤 (上海中医药大学附属龙华医院方)

〔组成与用法〕 蛇六谷 30g, 天葵子 30g, 生半夏 (先煎) 15g, 生南星 (先煎) 15g, 夏枯草 15g, 海藻 15g, 生牡蛎 (先煎) 30g, 僵蚕 12g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰软坚。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 痰毒瘀结者，加桃仁、白芷、炙蜈蚣、野菊花、七叶一枝花；脾肾阳虚者，加黄芪、生白术、杭白芍、淫羊藿、补骨脂、熟附片、菟丝子、肉苁蓉；肝肾阴虚者，加生地、熟地、山茱萸、枸杞子、女贞子、炙龟甲、炙鳖甲、白蒺藜；头痛明显者，加白芷、川芎、蔓荆子、藁本；呕吐者，加姜竹茹；大便秘结，加枳实、瓜蒌仁、火麻仁、生大黄；肢体抽搐者，加全蝎、制蜈蚣、天麻、钩藤；视力障碍者，加青箱子、密蒙花、石决明、枸杞子、石斛夜光丸。

(2) 五虫化痰饮 (中医杂志, 1988, 1)

〔组成与用法〕 半夏 (先煎) 10g, 天南星 (先煎) 10g, 夏枯草 15g, 石菖蒲 10g, 僵蚕 10g, 生牡蛎 (先煎) 15g, 地龙 3g, 蜈蚣 2 条, 猪苓 12g, 茯苓 12g, 蟾酥 0.01g, 廑虫 10g, 壁虎 2g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰祛瘀，通络散结。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 头痛剧烈者，加川芎、全蝎粉；视物模糊者，加枸杞子、菊花、决明子、青箱子；咳痰不爽者，加海浮石、海蛤壳、瓦楞子、猫爪草；偏瘫者，加黄芪、赤芍、当归；畏寒肢冷者，加附子、肉桂、炮姜、小茴香、吴茱萸；阳痿不举，加菟丝子、仙灵脾、仙茅；闭经者，加当归、川芎、王不留行、穿山甲；夜寐不安，加灯心草、远志、朱砂；恶心呕吐者，加木香、竹茹、陈皮、九香虫、旋覆花；阴虚潮热者，加北沙参、石斛、龟甲、鳖甲、生地；脘闷纳呆者，加陈皮、焦山楂、焦麦芽、焦神曲、生薏苡仁、鸡内金；形瘦体虚者，加黄芪、太子参、当归、生地、麦冬。

(3) 菖蒲星夏汤 (邱佳信经验方)

〔组成与用法〕 石菖蒲 15g, 远志 10g, 胆南星 (先煎) 10g, 姜半夏 10g, 生牡蛎 (先煎) 30g, 夏枯草 15g, 生地 10g, 蔻仁 10g, 紫草根 10g, 黄连 6g, 瓜蒌仁 10g, 火麻仁

15g。水煎服。

〔功能主治〕 芳香化浊，软坚化痰，清热解毒。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 加服安宫牛黄丸。

(4) 鱼脑磁石汤 (《抗癌中药一千方》)

〔组成与用法〕 鱼脑石 15g，广郁金 12g，石菖蒲 10g，天竺黄 10g，石决明 (先煎) 12g，珍珠母 24g，煅磁石 (先煎) 30g，赤苓 10g，橘络 6g，地龙 10g，桃仁 10g，钩藤 12g，川牛膝 25g，杭白芍 12g，生代赭石 (先煎) 30g。水煎服。

〔功能主治〕 平肝降逆，涤痰开窍。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 虚火上炎者，加生地、玄参；神志恍惚及发热呕吐者，加服安宫牛黄丸或至宝丹；肝阳上亢者，加苦参、龙胆草、芦荟。

(5) 脑瘤消 (山东中医药大学学报, 1997, 1)

〔组成与用法〕 金银花 15g，连翘 15g，蒲公英 15g，紫花地丁 15g，夏枯草 15g，三棱 12g，莪术 12g，半枝莲 15g，白花蛇舌草 15g，瓜蒌 20g，瓦楞子 15g，礞石 (先煎) 20g，水蛭 15g，蜈蚣 3 条，猪苓 40g，牡蛎 (先煎) 15g。水煎服。

〔功能主治〕 行气破血，消积止痛。主治脑垂体瘤。

(6) 慈菇公英汤 (天津中医, 1991, 4)

〔组成与用法〕 ① 山慈菇 10g，没药 10g，穿山甲 (先煎) 10g，天麻 10g，菊花 10g，半边莲 20g，茺蔚子 10g，蒲公英 20g，鱼腥草 20g。② 山慈菇 12g，半边莲 50g，鱼腥草 30g，茺蔚子 15g，海藻 15g，夏枯草 75g，青葙子 15g，菊花 20g，银花藤 20g，没药 10g，石斛 10g。二方交替水煎服。

〔功能主治〕 活血解毒，软坚散结。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 头痛呕吐者，加泽泻、竹茹、全蝎；发热者，加生石膏、条芩。

(7) 蜂房败酱汤 (《段凤舞肿瘤经验方》)

〔组成与用法〕 夏枯草 9g, 白芷 15g, 白鲜皮 15g, 白花蛇舌草 15g, 莪术 15g, 山豆根 9g, 赤茯苓 9g, 白茯苓 9g, 生薏苡仁 30g, 马齿苋 30g, 败酱草 30g, 露蜂房 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿, 解毒化瘀。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 视物模糊者, 加野菊花、枸杞子、桑椹子、杜仲; 头痛胀麻者, 加蜈蚣、全蝎、乌梢蛇、僵蚕、牛膝、泽泻、细辛、木瓜; 眩晕呕吐者, 加清半夏、陈皮、茯苓; 肢端肥大者, 加薄荷叶、山楂、赤小豆、草决明; 身麻不利者, 加赤芍、川芎、当归、地龙、黄芪。

(8) 木贼菊花汤 (《癌症疼痛中西医汇通》)

〔组成与用法〕 木贼 10g, 生牡蛎 (先煎) 15g, 甘菊 30g, 石决明 (先煎) 18g, 青黛 18g, 夜明砂 9g, 露蜂房 9g, 全蝎 9g, 蛇蜕 9g, 山豆根 9g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 通络止痛。主治脑垂体瘤, 症见头痛、视物昏蒙、眼胀。

〔加减应用〕 若偏头痛者, 加白蒺藜、柴胡; 前额痛, 加白芷、葛根。

(9) 蒺藜僵蚕汤 (上海中医杂志, 1989, 4)

〔组成与用法〕 黄连 6g, 川芎 6g, 黄芩 10g, 黄柏 10g, 栀子 10g, 当归 10g, 苍术 10g, 僵蚕 10g, 白蒺藜 10g, 生地 15g, 生芪 15g, 怀山药 15g, 玄参 15g, 薄荷叶 15g, 白芍 20g。水煎服。

〔功能主治〕 祛痰通络, 清热解毒。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 视物模糊者, 加青箱子、泽泻、密蒙花; 肢端肥大者, 加木瓜、防己、姜皮。

(10) 陈氏化瘤散 (成都中医学院学报, 1991, 3)

〔组成与用法〕 柴胡 20g, 赤芍 20g, 桃仁 20g, 浙贝 20g, 法半夏 30g, 茯苓 30g, 昆布 30g, 陈皮 30g, 海藻 30g, 半枝

莲 30g, 玄参 30g, 半边莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 夏枯草 50g, 生牡蛎 50g。共研细末, 1 日 3 次, 1 次 10~15g。

[功能主治] 祛痰化瘀, 解毒散结。主治脑垂体瘤。

[加减应用] 头痛明显, 加川芎、蔓荆子、藁本; 呕吐, 加竹茹; 大便秘结, 加枳实, 瓜蒌仁、火麻仁、生大黄。

(11) 大追风散加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 川乌 (先煎) 6g, 丹参 20g, 川芎 10g, 僵蚕 10g, 石膏 (先煎) 10g, 甘草 5g, 白附子 (先煎) 6g, 全蝎 5g, 羌活 10g, 地龙 10g, 胆南星 (先煎) 10g, 天麻 10g, 白芷 10g, 制乳香 10g, 制没药 10g, 草乌 (先煎) 5g。水煎服。

[功能主治] 消风化痰, 活血止痛。主治脑垂体瘤, 症见偏正头痛、头目眩晕、心烦、百节酸痛。

[加减应用] 瘀毒内结者, 去白附子、僵蚕、羌活, 加拳参、田三七、丹参。

(12) 白附散加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 白附子 9g, 炙麻黄 5g, 蜈蚣 5g, 川乌 5g, 胆南星 5g, 全蝎 4g, 干姜 3g, 朱砂 1.5g, 麝香 1g。上为末, 酒调, 1 次 2g, 1 日 3 次。

[功能主治] 祛风除痰, 开窍止痛。主治脑垂体瘤, 症见偏正头痛者。

[加减应用] 颈项强痛, 加葛根; 呕吐, 加黄连、法半夏。

(13) 加减苓桂术甘汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 太子参 10g, 茯苓 12g, 防风 10g, 法半夏 10g, 桂枝 9g, 白花蛇舌草 30g, 冬凌草 15g, 白术 6g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 温化痰饮, 健脾利湿。主治脑垂体瘤, 症见目眩心悸, 头痛头晕, 舌苔白滑, 脉弦滑。

[加减应用] 两侧太阳穴疼痛者，加川芎、白芷、僵蚕。

2. 脑垂体瘤晚期体质较虚用方

(1) 加减六味地黄汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 熟地黄 24g, 山茱萸 12g, 怀山药 12g, 茯苓 9g, 丹皮 9g, 黄芪 30g, 石斛 15g, 白花蛇舌草 30g, 拳参 30g, 麦冬 12g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 滋阴肝肾，主治脑垂体瘤引起高血压、血糖增高。

[加减应用] 头痛连及项背，加粉葛；头痛、头晕、烦躁、脉弱者，加天麻、白芍。

[临床报道] 用六味地黄汤加蕤仁肉、女贞子、旱莲草、白芍、丹参、三七末 (冲)，治愈 1 例复发性脑垂体瘤。(中国中西医结合外科杂志，1999，5)

(2) 脑垂体肿瘤方 (《癌症疼痛中西汇通》)

[组成与用法] 川芎 5g, 枸杞子 15g, 当归 9g, 鸡血藤 30g, 丹参 15g, 炙远志 9g, 红花 9g, 桃仁 9g, 淫羊藿 30g, 太子参 24g, 桔梗 9g, 贝母 9g, 半夏 9g, 炙蜈蚣 5 条, 豨莶草 15。水煎服。

[功能主治] 益血活血，通络化瘀。主治脑垂体瘤，症见头痛、头晕、视物模糊、夜晚尤甚。

[加减应用] 若气虚明显者，重用黄芪；血瘀明显者，加三七、血竭。

(3) 通络散结汤 (天津中医药，2003，12)

[组成与用法] 党参 15g, 白术 15g, 当归 10g, 川芎 10g, 天南星 (先煎) 10g, 半夏 10g, 煅牡蛎 (先煎) 15g, 夏枯草 15g, 僵蚕 10g, 地龙 10g, 虻虫 10g, 苍耳子 10g, 蛇六谷 10g, 苍术 10g, 三棱 10g, 瓜蒌 10g, 猪苓 15g, 红花 10g, 重楼 10g, 桃仁 10g, 菊花 10g, 女贞子 10g, 猫爪草 15g, 天花粉 10g, 甘草 6g, 大枣 7 枚, 干姜 3 片。水煎服。

〔功能主治〕祛风化瘀，通络散结。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕加服祛风化瘀散（全蝎 60g，守宫 90g，三七 60g，蜈蚣 60g，天麻 60g，人工牛黄 60g，白花蛇舌草 60g，炮制后研细末，1 次 5g，1 日 3 次）。头痛头晕，加防风、石决明、延胡索；视力模糊，加远志、石菖蒲；低热烦躁，加蒲公英、半枝莲、柴胡；胸闷气急、恶心，加瓜蒌、葶苈子、旋覆花。

（4）僵蚕石斛饮（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕石斛 15g，知母 15g，麦冬 12g，北沙参 12g，怀牛膝 10g，钩藤 12g，石决明（先煎）15g，大黄 9g，生地 12g，黄精 12g，枸杞子 12g，僵蚕 10g。水煎服。

〔功能主治〕滋阴养肾，清热祛风。主治脑垂体瘤，放疗后肺胃阴虚者。

〔加减应用〕眩晕呕吐者，加半夏、姜竹茹、砂仁；肢端肥大者，加防己、木瓜、姜皮；视物模糊者，加菊花、青箱子；夜寐不安，加远志、酸枣仁。

（5）钩藤地龙汤（《抗癌中药一千方》）

〔组成与用法〕全蝎 5g，蜈蚣 6g，丹参 20g，川芎 5g，僵蚕 9g，地龙 9g，半夏 9g，钩藤 15g，白术 9g，天麻 9g，天葵子 15g，夏枯草 30g，浙贝 9g，女贞子 15g，枸杞子 15g，云雾草 15g，灯心草 15g。水煎服。

〔功能主治〕祛风通络，平肝息风。主治脑垂体肿瘤。

〔加减应用〕呕吐者，加竹茹；头痛者，加藁本、蔓荆子、白芷；视力障碍者，加青箱子、密蒙花、石决明；便秘者，加熟大黄；多饮多尿者，加生地、天花粉、石斛、远志。

（6）枸杞桃仁汤（《抗癌中药一千方》）

〔组成与用法〕川芎 5g，枸杞子 15g，当归 9g，鸡内金 9g，丹参 15g，炙远志 9g，红花 9g，桃仁 9g，淫羊藿 30g，太子参 24g，桔梗 9g，浙贝 9g，半夏 9g，炙蜈蚣 5g，豨莶草

15g。水煎服。

〔功能主治〕 养血活血，益肾生髓。主治脑垂体瘤。

〔加减应用〕 头痛连及颈项，加粉葛；肝肾阴亏者，加天麻、枸杞子、菊花；便秘者，加熟大黄、火麻仁。

3. 脑垂体嫌色细胞瘤用方

(1) 莪术菖蒲汤（上海中医药杂志，1983，4）

〔组成与用法〕 丹参 15g，菊花 15g，夏枯草 15g，石菖蒲 15g，莪术 15g，半枝莲 15g，益母草 15g，茯苓 10g，三棱 10g，枸杞子 10g，党参 10g，山慈菇 9g，仙灵脾 9g，鹿角胶（烔化）9g。水煎服。

〔功能主治〕 活血祛瘀，解毒化浊。主治脑垂体嫌色细胞瘤。

〔加减应用〕 脾气虚者，加黄芪、白术、薏苡仁；平肝，选用钩藤、葛根、决明子；解毒散结，加白花蛇舌草、牡蛎、浙贝母、海藻、僵蚕。

〔临床报道〕 治疗 4 例，治愈 1 例，显效 2 例，好转 1 例。

(2) 清肝解毒饮（浙江中医学院学报，1984，3）

〔组成与用法〕 ①羚羊角粉（冲服）2g，僵蚕 9g，菊花 9g，当归 9g，益母草 9g，钩藤 9g，全蝎（冲服）4g，蜈蚣 4 条，枸杞子 20g，女贞子 15g。②藁本 10g，川芎 10g，蕤仁 10g，青箱子 10g，地龙 10g，夏枯草 30g，云雾草 10g，石楠叶 10g，黄精 10g，玉竹 10g。水煎服。

〔功能主治〕 活血通络，清肝解毒。主治脑垂体嫌色细胞瘤。

〔加减应用〕 同时吞服石斛夜光丸。

4. 脑垂体嗜酸性细胞瘤用方

丹参天麻饮（浙江中医学院学报，1984，3）

〔组成与用法〕 丹参 20g，桃仁 12g，红花 9g，白术 9g，制半夏 9g，天麻 9g，僵蚕 9g，白芷 9g，枸杞子 15g，云雾草

15g, 川芎 4.5g, 全蝎 4.5g。水煎服。

〔功能主治〕 息风通络, 活血散结。主治脑垂体嗜酸性细胞瘤。

〔加减应用〕 风痰壅滞者, 加蜈蚣、钩藤、地龙、青箱子; 盗汗烦躁者, 加菊花、糯稻根、石决明、天麻、蔓荆子、玉竹。

【对症用方】

脑垂体瘤的对症用方, 除要根据患者的主要症状和并发症进行选择外, 当区分是否手术、放疗或化疗等治疗。术后治疗以健脾益肾补益气血为主, 放疗病人以养阴清热解毒为主, 化疗病人以健脾和胃、益肾养血为主。

1. 脑垂体瘤手术后方

(1) 参芪饮 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 人参 15g, 黄芪 15g, 茯苓 10g, 白术 10g, 鸡血藤 30g, 枸杞子 12g, 女贞子 12g, 莪术 9g, 黄精 10g, 半枝莲 30g, 泽泻 10g, 全蝎 6g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养肾。主治脑垂体瘤手术后气阴两亏者。

〔加减应用〕 眼蒙、视力障碍者, 加密蒙花、菊花; 头痛者, 加白芷、川芎; 性功能低下者, 加仙灵脾、仙茅、巴戟天、锁阳; 女子闭经者, 加益母草、香附、红花。

(2) 加味圣愈汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 熟地黄 20g, 生地黄 15g, 陈皮 10g, 当归 (酒拌) 10g, 人参 5g, 黄芪 6g, 川芎 6g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 益气, 补血, 摄血。主治脑垂体瘤手术后或治疗后气血亏虚者。

〔加减应用〕 气虚明显者, 加重黄芪用量; 血瘀者, 加桃仁、红花。

(3) 养胃进食丸加味 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 苍术 10g, 神曲 10g, 白茯苓 10g, 厚朴 10g, 炒麦芽 10g, 白术 10g, 太子参 10g, 炒山楂 15g, 甘草

5g。水煎服。

〔功能主治〕 益气健脾，和胃化滞。主治脑垂体瘤术后，脾胃虚弱，心腹胀满，面色萎黄，肌肉消瘦，怠惰嗜卧，不思饮食。

〔加减应用〕 如胃脘部胀满者，加广木香；如血虚夹瘀者，加丹参、归尾；若血虚明显者，加当归、川芎。

(4) 冲和丸加味（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 人参 10g，石斛 10g，白术 8g，佛手 10g，广陈皮 10g，山楂肉 10g，远志 6g，白蔻仁 8g，香附 10g，山梔仁 10g。水煎服。

〔功能主治〕 养心扶脾，疏肝开胃。主治脑垂体瘤手术治疗后肝胃不和，夜寐不安者。

〔加减应用〕 若头痛者，加白芷、川芎。

(5) 天麻僵虫汤（辽宁中医杂志，2003，10）

〔组成与用法〕 菊花 10g，桑叶 10g，赤、白芍各 10g，制半夏 10g，枳壳 10g，香附 10g，桃仁 10g，僵蚕 3g，石决明（先煎）10g，地龙 10g，天麻 10g，全蝎 5g，贝母 10g，钩藤 15g，石斛 10g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 平肝潜阳，通络化痰。主治脑垂体瘤术后头晕头痛者。

〔加减应用〕 症状减轻改散剂。颅内高压者，加泽泻、白术、猪苓。

(6) 黄芪葛根汤（《当代名医临证精华·肿瘤专辑》）

〔组成与用法〕 生黄芪 15g，葛根 15g，天门冬 12g，天花粉 12g，炙僵蚕 10g，胆南星 10g，生牡蛎（先煎）25g，炙蜈蚣 2 条，炮山甲（先煎）10g，山慈菇 10g，露蜂房 10g，漏芦 12g，白花蛇舌草 25g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，化痰祛瘀。治疗肿瘤术后肝肾不足，气阴两虚，痰瘀上蒙，清阳不展。

〔加减应用〕视物模糊者，加泽泻、密蒙花。

2. 脑垂体瘤放疗专方

二冬四参汤（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕麦冬 12g，天冬 12g，沙参 10g，玄参 9g，生地 10g，泽泻 12g，玉竹 9g，金银花 15g，党参 12g，茯苓皮 12g，白术 10g，丹参 12g，夏枯草 15g，全蝎 5g，白花蛇舌草 20g，甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕益气养阴，清热解毒。主治脑垂体瘤放疗后气阴两虚者。

〔加减应用〕口干舌燥明显者，加石斛、知母；头晕面胀、舌质黯、苔厚腻者，加苍术、佩兰。

3. 主治脑垂体瘤引起头痛，眩晕专方

附子芎术汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕川芎 10g，附子 3g，白术 10g，桂心 5g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕温阳健脾，活血止痛。主治脑垂体瘤头痛、头晕。

〔加减应用〕形寒肢冷者，去桂心，加肉桂。

4. 脑垂体瘤引起肥胖、糖尿病

（1）竹叶黄芪汤（湖南省中医药研究院经验方）

〔组成与用法〕淡竹叶 10g，生地黄 10g，生芪 25g，蚤休 30g，白花蛇舌草 30g，麦冬 10g，当归 6g，川芎 6g，黄芩 10g，知母 10g，人参 10g，怀山药 20g，石膏（先煎）30g。水煎服。

〔功能主治〕益气养血，清热生津。主治脑垂体瘤引起血糖升高者，症见气血虚，胃火盛作渴。

〔加减应用〕气虚明显者，重用黄芪，加灵芝；颈项强痛者，加葛根。

（2）加减一阴煎加减（《中医肿瘤防治大全》）

〔组成与用法〕 生地 10g, 白芍 15g, 麦冬 10g, 熟地 10g, 石膏 (先煎) 15g, 拳参 15g, 冬凌草 15g, 知母 10g, 地骨皮 10g, 炙甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴清热。主治脑垂体瘤引起血糖升高, 烦渴不止, 潮热不退者。

〔加减应用〕 如躁烦热甚便秘者, 加胡黄连、火麻仁、郁李仁; 如小便热涩者, 加栀子、滑石; 如火浮于上者, 加泽泻、牛膝。

(3) 黄连三汁饮 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 黄连 (研末) 500g, 牛乳汁 500g, 白莲藕汁 500g, 生地黄汁 500g。调匀, 1 次 20g, 1 日 2 次。

〔功能主治〕 清热解毒, 养阴生精。主治脑垂体瘤引起血糖升高, 症见阴亏津伤者。

〔加减应用〕 热甚伤津者, 加知母、石膏。

(4) 人参石膏汤 (《中医肿瘤防治大全》)

〔组成与用法〕 人参 15g, 黄芪 15g, 石膏 (先煎) 30g, 知母 21g, 粉葛 30g, 怀山药 30g, 石斛 10g, 甘草 12g。水煎服。

〔功能主治〕 清热泻火, 益气生津。主治脑垂体瘤症见上焦烦渴, 火甚津伤者。

〔加减应用〕 气虚津伤者, 加天花粉, 改人参为西洋参。

5. 脑垂体瘤引起全身骨质疏松症

(1) 补益丸加味 (《中医肿瘤防治大全》)

〔组成与用法〕 白术 60g, 丹参 30g, 生地黄 45g, 龟甲 (酒浸炙) 30g, 锁阳 (酒浸) 30g, 当归身 (酒浸) 30g, 陈皮 30g, 怀牛膝 (酒浸) 30g, 干姜 20g, 炒黄柏 15g, 五味子 6g, 炙甘草 3g, 白芍 (酒浸) 30g, 菟丝子 (酒蒸熟, 研如糊, 晒干) 30g, 猪脑骨髓适量。研末, 1 次 5g, 1 日 3 次。

〔功能主治〕 益肾生髓。主治脑垂体瘤引起骨质疏松症。

症见腰膝酸软，经脉弛缓不能用者。

【加减应用】热毒内结者，加黄连、白花蛇舌草、半枝莲。

(2) 牛膝丸加味（《中医肿瘤防治大全》）

【组成与用法】牛膝（酒浸）10g，杜仲10g，白蒺藜10g，防风10g，菟丝子10g，肉苁蓉10g，官桂3g，甘草5g。水煎服。

【功能主治】益精缓中。主治脑垂体瘤引起的骨质疏松症，症见肝肾亏虚者。

【加减应用】头痛、头晕者，加川芎、陈皮、天麻；头痛甚者，加蜈蚣；若痰盛者，加天竺黄、白芥子。

【专病成药】

见“神经胶质瘤”。

【专病单方】

1. 麝香 用法：每取2g，置三圣散中，贴敷于肿瘤部位，3天换1次。功用：开窍镇痛。主治：脑垂体瘤引起头痛，呕吐为主症者。（上海中医学院经验方）

2. 蚯蚓 用法：每取20条，冰片1g，麝香0.025g上药共为小丸，1次0.5g，1日2次。功用：清热活血，通窍止痛。主治：脑垂体瘤引起的头痛较甚者。（《临床中医肿瘤学》）

3. 生乌头 用法：每取10g，配生南星10g，生白附子10g。共为细末，用葱白连根须7茎，生姜15g，切碎捣如泥，入药末拌均，用白布包好笼上蒸透，然后用手拍成薄饼状，敷贴在痛处，功用：化痰通络止痛。主治：脑垂体瘤头晕、头痛者。（《临床中医肿瘤学》）

4. 藤黄 用法：与樟脑、阿丁粉各等份，研细末，撒在胶膏上敷贴于疼痛处。1日1次。功用：化瘀开窍止痛。主治：脑垂体瘤头晕头痛者。（《癌症疼痛中西医汇通》）

5. 人中白 用法：每取15g，配蜈蚣10g，地龙15g，共研末，用羊胆汁和丸，1次0.2g，新汲水滴化开，滴入两鼻

中。功用：清热通络。主治：脑垂体瘤偏正头风者。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 五倍子 用法：每取 5g，配全蝎 5g、土狗 5g，共研为末，醋糊作如钱大的饼子，发时再用醋润透，贴太阳穴，1 日 1 次。功用：祛风通络。主治：脑垂体瘤引起两侧太阳穴疼痛者。若头冷痛者，加细辛。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 天南星 用法：每取 5g，配川芎 5g，上为细末，用葱白同捣烂作饼，贴于太阳穴痛处。功用：行气活血，祛痰通络。主治：脑垂体瘤引起头痛剧烈者。（《中华肿瘤治疗大成》）

8. 辰砂 用法：每取 50g，配川乌 50g，南星 100g，上为细末，用酒调涂痛处。1 日 2 次。功用：温阳化痰，镇惊安神。主治：脑垂体肿瘤引起偏正头痛，太阳穴痛，坐卧不安。（《中华肿瘤治疗大成》）

脊髓肿瘤

脊髓肿瘤又称椎管内肿瘤，是指发生在脊髓、脊膜、神经根、纤维组织、脂肪组织、血管及骨性结构的原发性肿瘤及继发性肿瘤，其发生与损伤、射线、化学污染、病毒等因素有关。

本病相当于中医病名的风痲、瘫痪、痿痹等范畴。中医认为其发病乃因外感毒邪侵犯肾经，侵袭督脉，毒邪凝滞，经脉受阻，气血运行不畅，瘀毒蕴结而成。其病位在脊髓，与肾、肝、脾有关，其病性有虚、实两端，实在痰、瘀、毒、湿，虚在气血阴阳亏损。

【辨证用方】

脊髓肿瘤的治疗，首辨邪正虚实。虚证当益气养血、健脾和胃、益气生津、填精益髓、补肾健脑等以扶正固本，调整机体内气血阴阳平衡，以抵御疾病、战胜疾病；实证予以清热解

毒、软坚散结、活血化瘀等以去除病邪，减轻病邪对正气的损伤，以利于保存正气和使正气恢复。

1. 气血亏虚、寒湿阻络证

主症：头后部及颈项胀痛，头重如裹，面色萎黄，身重倦怠，四肢酸楚，肢体麻木或感觉障碍，甚则截瘫，舌苔白腻，脉沉紧或濡细而数。

治法：益气养血，除湿通络。

(1) 身痛逐瘀汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕当归 12g，川芎 12g，生地 12g，桃仁 10g，红花 10g，羌活 10g，桂枝 10g，秦艽 12g，细辛 3g，杜仲 12g，桑寄生 15g，怀牛膝 12g，地龙 10g，白花蛇舌草 30g，蚤休 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕活血通络，清热解毒。主治脊髓肿瘤。

〔加减应用〕肢体痉挛或瘫痪者，加全蝎、蜈蚣；气血亏虚者，加黄芪、人参。

(2) 棱莪饮（《中华肿瘤防治大全》）

〔组成与用法〕三棱 12g，莪术 10g，槟榔 12g，广木香 15g，青皮 15g，当归 15g，五灵脂（包煎）15g，玄胡 15g，昆布 20g，海藻 20g，白术 18g，肿节风 30g，藤梨根 30g，半枝莲 30g，虎杖 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕理气活血，化瘀消积。主治脊髓肿瘤。

〔加减应用〕低热者，加青蒿、地骨皮、白薇、银柴胡；恶心呕吐者，加制半夏、竹茹；腰部疼痛者，加牛膝、杜仲、狗脊。

2. 气虚血瘀证

主症：胸胁及腰腹疼痛，肢体感觉异常，蚁走感，针刺感，以致痿软，精神萎靡，乏力，纳差，舌体胖大，舌质淡红，苔薄白，脉沉细缓无力。

治法：补气活血，通络止痛。

(1) 补阳还五汤加减 (潘敏求经验方)

[组成与用法] 黄芪 20g, 当归尾 10g, 赤芍 15g, 川芎 10g, 蜈蚣 3 条, 桃仁 10g, 红花 10g, 茯苓 12g, 白术 10g, 莪术 9g, 全蝎 5g, 僵蚕 10g, 鸡血藤 30g, 蚤休 30g, 甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 益气养血, 活血通络。主治脊髓肿瘤。

[加减应用] 腰膝痛软者, 加牛膝; 下肢感觉障碍者, 加木瓜、五加皮; 胸脘痞闷, 肢体浮肿者, 加防己、薏苡仁、砂仁。

(2) 养心汤加补阳还五汤加减 (《神经系统肿瘤学》)

[组成与用法] 郁李仁 15g, 生芪 15g, 当归 15g, 川芎 10g, 茯苓 10g, 茯神 10g, 远志 10g, 人参 12g, 半夏 10g, 肉桂 5g, 赤芍 8g, 桃仁 5g, 红花 3g, 地龙 8g, 五味子 10g, 炒枣仁 10g, 丹皮 10g, 全蝎 8g, 夜明砂 6g, 白菊花 8g, 黄药子 8g, 灵芝 8g, 穿心莲 10g。水煎服。

[功能主治] 养心健脾, 化瘀通络。主治脊髓肿瘤。

[加减应用] 气虚明显者, 重用黄芪; 热毒较重者, 加白花蛇舌草、拳参、半枝莲等。

3. 脾肾阳虚证

主症: 腰膝冷痛, 形寒肢冷, 头晕乏力, 气短懒言, 肢体痿痹, 筋脉挛急, 步履蹒跚、艰难, 甚则截瘫, 舌体淡胖, 苔白滑, 脉沉细。

治法: 温肾填精, 活血通络。

(1) 参茸固体丸合透痉解挛汤加减 (《神经系统肿瘤学》)

[组成与用法] 西洋参 10g, 鹿茸 10g, 黄芪 30g, 白术 10g, 当归 12g, 熟地 24g, 枸杞子 15g, 白芍 10g, 怀山药 12g, 牛膝 15g, 巴戟天 6g, 桂心 6g, 麝香 0.03g, 龟甲 40g, 鳖甲 40g, 琥珀 3g, 全蝎 10g, 炮山甲 (先煎) 15g, 羌活 10g, 独活 10g, 秦艽 30g, 川芎 6g, 天麻 6g。水煎服。

[功能主治] 益气养肾, 养血祛风。主治脊髓肿瘤。

〔加减应用〕若肢麻有蚁行感者，加蜈蚣、僵蚕；下利清谷，甚则五更泄泻者，合四神丸加减。

(2) 肾气丸合理中丸加减（《癌症疼痛中西医汇通》）

〔组成与用法〕熟地 20g，怀山药 10g，山茱萸 10g，泽泻 10g，茯苓 10g，牡丹皮 10g，桂枝 5g，附子（先煎）10g，干姜 10g，党参 15g，白术 10g，炙甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕温补脾肾。主治脊髓肿瘤。

〔加减应用〕若感觉障碍，有蚁行感，或凉感者，加全蝎、蜈蚣；气虚者，加黄芪；面浮肢肿者，加防己、黄芪。

4. 肝肾阴虚证

主症：下肢麻痹，感觉丧失，痿废不用，性欲障碍，小便失禁，腰膝酸软，五心烦热，潮热盗汗，舌质红少苔，脉沉细。

治法：滋阴降火，强壮筋骨。

镇肝熄风汤合加杞菊地黄汤加减（《神经系统肿瘤学》）

〔组成与用法〕熟地 24g，茯苓 15g，山茱萸 10g，怀山药 15g，枸杞子 10g，白菊花 10g，丹皮 12g，泽泻 10g，怀牛膝 20g，生龙骨（先煎）30g，生牡蛎（先煎）30g，生赭石（先煎）20g，白芍 15g，玄参 15g，生龟甲（先煎）30g，川楝子 12g，广木香 10g，台乌药 10g，玄胡 10g，天冬 15g，白花蛇舌草 15g，升麻 6g，薄荷 6g。水煎服。

〔功能主治〕滋肾柔肝，祛风通络。主治脊髓肿瘤下肢痿痹不用者。

〔加减应用〕腰膝痛软者，加牛膝；下肢感觉障碍者，加木瓜、蜈蚣、五加皮。

【辨病用方】

脊髓肿瘤的辨病治疗，主要是针对病情的虚实，分别采用补肾填精、益气养血、养阴生精、活血通络、清热解毒等。

1. 杜仲鹿角汤（山东中医杂志 1987，1）

〔组成与用法〕 鹿角胶 9g, 制乳香 9g, 制没药 9g, 当归 30g, 黄芪 30g, 金银花 30g, 杜仲 30g, 细辛 1.5g。水煎服。

〔功能主治〕 补肾生精, 活血通络。主治脊髓肿瘤。

〔加减应用〕 气血亏虚者, 加人参、熟地、川芎、阿胶; 腰膝酸软者, 加牛膝、狗脊、续断; 瘀毒内结者, 加拳参、全蝎、蜈蚣。

2. 加减桃红四物汤 (山东中医杂志 1987, 6)

〔组成与用法〕 黄芪 60g, 熟地 20g, 山药 20g, 当归 15g, 赤芍 15g, 地龙 9g, 桂枝 9g, 川芎 12g, 桃仁 12g, 红花 12g, 牛膝 12g, 玄胡 12g, 薏苡仁 30g, 鸡血藤 14g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血, 活血化瘀。主治脊髓肿瘤属肾虚夹湿夹瘀者。

〔加减应用〕 肾亏明显者, 加鹿角胶、巴戟天、锁阳; 下肢感觉障碍者, 加蜈蚣、僵蚕、全蝎。

3. 竺黄磁石汤 (《现代治癌验方精选》)

〔组成与用法〕 鱼脑石 15g, 广郁金 12g, 石菖蒲 10g, 天竺黄 10g, 石决明 12g, 珍珠母 24g, 煅磁石 (先煎) 30g, 赤芍 10g, 橘红 6g, 地龙 10g, 桃仁 10g, 钩藤 12g, 川牛膝 25g, 白芍 12g, 生代赭石 (先煎) 30g。水煎服。

〔功能主治〕 祛风化痰, 镇惊安神。主治多发脊髓肿瘤广泛转移。

〔加减应用〕 虚火上炎者, 加生地、玄参; 痰蒙心窍, 神志恍惚及伏热呕吐者, 加服安宫牛黄丸或局方至宝丹; 肝阳上亢、眼目昏糊者, 加苦参、龙胆草、龙葵。

4. 桃红四物地龙汤 (《现代治癌验方精选》)

〔组成与用法〕 当归 15g, 枳壳 15g, 赤芍 15g, 菊花 15g, 牛膝 15g, 桃仁 15g, 红花 12g, 桔梗 12g, 地龙 12g, 全蝎 6g, 柴胡 10g, 川芎 22g, 生地 25g, 白花蛇舌草 30g, 田三七 (冲服) 8g, 甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕行气活血，化瘀通络。主治脊髓肿瘤。

〔加减应用〕通络止痛，加麝香、老酒；益气扶正，加党参、川芎、黄芪；散瘀软坚，加海藻、细辛、廔虫。

5. 丹参二仁汤（《现代治癌验方精选》）

〔组成与用法〕怀山药 12g，生薏苡仁 24g，熟薏苡仁 24g，山茱萸 9g，桑寄生 24g，仙灵脾 9g，赤芍 9g，白芍 9g，川芎 9g，丹参 9g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益肾，活血养血。主治脊髓肿瘤脾肾两亏，症见全身乏力、腰部酸痛者。

〔加减应用〕配合牛黄醒消丸、六味地黄丸、小金片口服。

【对症用方】

脊髓肿瘤的对症治疗，主要针对主症及手术、放疗、化疗副反应治疗。

1. 脊髓肿瘤手术后专方

加味补阳还五汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕黄芪 20g，党参 15g，当归 15g，川芎 12g，赤芍 10g，牛膝 12g，红花 10g，桂枝 10g，陈皮 10g，地龙 10g，茯苓 10g，白术 10g，白花蛇舌草 30g，蚤休 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕益气健脾，化瘀解毒。主治脊髓肿瘤手术后气血不足，瘀毒未尽者。

〔加减应用〕术后多汗者，加浮小麦；呕吐者，加姜竹茹、姜半夏；肢麻者，加僵蚕、防风、桑寄生。

2. 脊髓肿瘤放疗专方

四物寄生汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕当归 12g，生地 15g，川芎 10g，茯苓 12g，枸杞子 12g，女贞子 12g，黄芪 15g，陈皮 10g，补骨脂 12g，淫羊藿 12g，巴戟天 10g，桑寄生 15g，鸡血藤 30g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 补血养血，滋阴益肾。主治脊髓肿瘤放疗后肾精亏虚者。

〔加减应用〕 口干咽痛者，加沙参、麦冬、石斛；失眠烦躁者，加酸枣仁、珍珠母、柏子仁；胃纳欠佳，食欲不振者，加谷芽、麦芽、鸡内金。

3. 脊髓肿瘤化疗专方

癌复康加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 人参 10g，黄芪 30g，白术 10g，茯苓 10g，枸杞子 10g，女贞子 10g，菟丝子 10g，广木香 10g，仙灵脾 10g，法半夏 10g，砂仁 5g，旱莲草 15g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾，和胃理气。主治脊髓肿瘤化疗后脾肾虚弱者。

〔加减应用〕 恶心呕吐甚者，加姜竹茹、代赭石；气虚多汗者，加山茱萸、煅牡蛎；腹泻者，加吴茱萸、黄连、神曲；便溏者，加薏苡仁、扁豆、莲子；纳呆者，加山楂、鸡内金。

4. 脊髓肿瘤引起肢体感觉障碍专方

(1) 南星蒺藜汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 生半夏（先煎）30g，天南星（先煎）30g，苍耳草 15g，白蒺藜 15g，生姜 5g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰通络。主治脊髓肿瘤引起的肢体及肌肤感觉障碍者。

〔加减应用〕 痰瘀阻滞经络者，加蜈蚣、全蝎、僵蚕；脾虚气弱者，加生黄芪、陈皮、茯苓；热毒明显者，加白花蛇舌草、半枝莲等。

(2) 加味补阳还五汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 当归 15g，黄芪 15g，川芎 15g，赤芍 15g，牛膝 12g，杜仲 12g，红花 9g，地龙 9g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血，活血通络。主治脊髓肿瘤引起肢

体麻木、腰膝疼痛者。

〔加减应用〕 气虚明显者，加重黄芪用量；瘀血阻滞者，加田三七、泽兰；肾亏明显者，加鹿角胶、菟丝子、枸杞子。

5. 脊髓肿瘤引起肌肉萎缩、上下肢活动障碍者专方

(1) 加味二妙散（《中医肿瘤防治大全》）

〔组成与用法〕 黄柏 10g，龟甲（先煎）10g，薏苡仁 30g，木瓜 15g，甘草 5g，蜈蚣 3 条，全蝎 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清热燥湿，通利筋脉。主治脊髓肿瘤引起四肢痿软、身体困重、麻木者。

〔加减应用〕 夹瘀之证，加桃仁、红花、丹参、赤芍；热甚伤阴者，加生地、麦冬。

(2) 地黄饮子加减（《中医肿瘤防治大全》）

〔组成与用法〕 熟地 15g，山茱萸 10g，巴戟天 10g，肉桂 6g，石斛 20g，肉苁蓉 12g，制附片（先煎）10g，石菖蒲 15g，远志 15g，麦冬 15g，五味子 6g，白茯苓 12g，大枣 10g，蜈蚣 3 条，全蝎 5g，鸡血藤 15g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴温肾，化痰通络。主治脊髓肿瘤引起四肢痿软不能用者。

〔加减应用〕 痰浊内阻者，加法半夏、陈皮；肢体麻木不能反应者，加怀牛膝、木瓜。

6. 脊髓肿瘤引起癌性疼痛专方

(1) 白鹿止痛汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 熟地黄 30g，鹿角胶（烊化）10g，白芥子 10g，桂枝 10g，炮姜炭 6g，炙麻黄 6g，全蝎 6g，蚤休 30g，甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 温阳益肾，散寒通滞。主治癌性疼痛。

〔临床报道〕 治疗晚期癌症疼痛 63 例，总有效率 76%。

(2) 癌痛消涂剂（中国中医药信息杂志，2001，8）

〔组成与用法〕 玄胡 60g，川芎 30g，萆薢 30g，丹参 30g，

蚤休 30g, 台乌药 30g, 细辛 50g, 干还魂草 20g。研末, 加 75%乙醇 400ml, 密闭浸泡 7 日, 取滤液, 加冰片外涂。1 日 3~4 次。

〔功能主治〕活血通络, 清热止痛。主治癌性疼痛。

(3) 抑癌止痛汤 (中国中医急症 1998, 251)

〔组成与用法〕三七 10g, 丹参 40g, 延胡索 30g, 蚤休 30g, 山慈菇 30g, 台乌药 15g, 黄药子 15g, 薏苡仁 60g。水煎服。

〔功能主治〕活血化瘀, 清热解毒。主治中晚期癌症疼痛。

〔临床报道〕治疗中晚期癌痛 81 例, 总有效率 81%。

(4) 癌痛散 (中国医药学报, 2001, 6)

〔组成与用法〕生川乌 20g, 生天南星 20g, 山慈菇 20g, 蜂房 20g, 徐长卿 20g, 生附子 15g, 乳香 15g, 没药 15g, 全蝎 15g, 蜈蚣 15g, 大黄 30g, 姜黄 30g, 石上柏 40g, 麝香 1g。研末, 加凉开水, 调敷痛处, 厚 1.5~2mm, 油纸覆盖, 胶布固定。1 日 1 次, 5 日为 1 个疗程。

〔功能主治〕祛寒, 通络, 活血止痛。主治癌性轻、中度疼痛。

〔临床报道〕治癌性轻、中度疼痛 139 例, 总有效率 82%。

【专病成药】

1. 消癌平注射液 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕乌骨藤。

〔功能主治〕清热解毒, 消瘤散结。主治脊髓肿瘤。

〔用法用量〕肌肉注射, 1 次 2~4ml, 1 日 2 次。30 天为 1 个疗程。

2. 榄香烯乳注射液 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕榄香烯, 为中药莪术中提取到的抗癌活性物质。

〔功能主治〕直接抑制肿瘤细胞的生长；能增强 T 淋巴细胞亚群的功能，有免疫保护作用；与放疗、化疗有协同作用；能为机体提供高能量营养；缓解癌痛；改善微循环；能通过血-脑脊液屏障。可用于脊髓肿瘤。

〔用法用量〕静脉注射：1 日 1 次，400～600mg/次，15 天为 1 个疗程。

【专病单方】

1. 制川乌 用法：每取 15g，配蜂蜜 30g。将上药加水 1000ml 文火煎 60～80 分钟，滤渣约剩 100ml。如法自煎，2 次药液混合，分上、下午 2 次服用。功用：散寒止痛。主治：脊髓肿瘤晚期癌性疼痛。（《癌症疼痛中西医汇通》）

2. 白芍 用法：每取 60～250g，配炙甘草 15～60g。将上药加水煎，分 2～3 次内服，1 日 1 剂。功用：缓急止痛。主治：癌症晚期疼痛。临床报道：治 40 例，有效率 83%。（新中医，1997，1）

3. 马钱子 用法：取马钱子于麻油中炸至膨胀焦黄后，滤净油冷却研末装入胶囊，每丸 200mg。1 次 200～400mg，1 日 1 次。功用：祛寒止痛。主治：晚期癌症癌性疼痛。临床报道：治疗 35 例，总有效率 89%。（辽宁中医杂志，1993，2）

4. 蜈蚣 用法：每取 3 条，配全蝎 5g，研末，开水冲服。1 次 3g，1 日 2 次。功用：祛风通络。主治：脊髓肿瘤引起肢体感觉障碍、麻木者。（《中医肿瘤防治大全》）

造血系统肿瘤

急性白血病

白血病是一类起源于造血（或淋巴）干细胞的恶性疾病。其发病与遗传、原子弹爆炸、职业性暴露于低剂量辐射、长期大量吸烟、职业性苯接触、病毒感染以及放、化疗治疗均有密切的关系。

本病相当于中医病名国家标准的恶核，亦属于中医热劳、急劳、血证、温病、积聚、痰核等范畴。中医认为本病的主要病因病机为正气不足，先天胎毒内伏，外感湿热毒邪，致热毒蕴结，伤营动血，内因劳倦、饥饱、房欲、七情所伤，耗气伤阴，骨髓受损，发为本病。

【辨证用方】

急性白血病的辨证治疗，应根据其不同阶段辨明虚实。虚证有气阴两虚、气血阴阳俱虚、阴竭阳微之不同，实证有毒、瘀、痰之分，分别采用不同治法。

1. 热邪炽盛证

主症：发病急骤，壮热，汗出不解，口渴欲饮，烦躁不安，头痛较甚，腰背酸痛，唇焦少津，尿黄便干，舌质红，苔黄，脉洪数。

治法：清热解毒。

白虎解毒汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕生石膏（先煎）30g，水牛角（先煎）30g，知母15g，竹叶10g，黄连5g，黄芩15g，黄柏10g，梔

子 10g, 连翘 15g, 大黄 10g, 陈皮 10g, 仙鹤草 30g, 白花蛇舌草 30g, 蚤休 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 泻火解毒, 清热生津。主治急性白血病。

〔加减应用〕 热势嚣张者, 加金银花、野菊花、紫花地丁; 胸闷呕恶, 苔厚腻者, 加佩兰、白蔻仁; 热入营血, 内窜心包, 扰乱神明, 神昏谵语者, 加服安宫牛黄丸, 或服至宝丹。

2. 热盛伤血证

主症: 壮热谵语, 胸中烦闷, 口渴, 便秘, 皮肤出现青紫斑点或斑块, 或伴有鼻衄、齿衄、便血、尿血, 舌质红或经绛, 苔黄, 脉弦数。

治法: 清热凉血, 化瘀解毒。

(1) 牛角凉血汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 水牛角 (先煎) 30g, 丹参 15g, 麦冬 15g, 白茅根 30g, 茜草炭 15g, 仙鹤草 30g, 黄连 3g, 青黛 (冲服) 3g, 白花蛇舌草 30g, 蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 凉血止血。主治急性白血病。

〔加减应用〕 高热烦躁者, 加生石膏 (先煎)、板蓝根、竹叶; 抽搐动风者, 加钩藤 (后下)、炙全蝎粉; 出血不止者, 加阿胶 (烊化)、三七粉 (冲服)、云南白药 (分吞); 齿衄、舌衄者, 加生蒲黄 (布包) 煎汤漱口; 兼见关节肿痛者, 加牛膝、木瓜。

(2) 加味犀角地黄汤 (郁仁存经验方)

〔组成与用法〕 水牛角 (冲服) 30g, 赤芍 12g, 生地 30g, 丹皮 12~15g, 龙葵 15g, 生石膏 (先煎) 30g, 玄参 15g, 茜草 15g, 黄芩 10g, 白花蛇舌草 30g, 大青叶 30g, 白茅根 30g, 栀子 10g, 半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒凉血。主治急性白血病。

3. 气阴两虚证

主症: 神疲乏力, 语音低微, 自汗微汗, 口渴, 食纳减

少，手足心热，反复低热，头晕少寐，皮肤紫癜或衄血，舌质淡或偏红，苔薄黄或花剥，脉细弱。

治法：益气养阴，活血解毒。

(1) 加味生脉饮（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕党参 15g，黄芪 15g，麦冬 15g，五味子 10g，生地 15g，熟地 15g，地骨皮 15g，丹参 15g，枸杞子 15g，玄参 12g，白花蛇舌草 20g，煅龙骨（先煎）30g，煅牡蛎（先煎）30g，半枝莲 20g，生甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕益气养阴。主治急性白血病。

〔加减应用〕头晕目眩、阴虚较甚者，加制龟甲（先煎）、制鳖甲（先煎）、紫河车；出血较多者，加阿胶（烊化）、旱莲草、紫草。

(2) 生脉二至汤（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕人参 10g，麦冬 10g，五味子 10g，女贞子 10g，旱莲草 10g，白花蛇舌草 20g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕益气养阴，佐以活血解毒。主治急性白血病。

〔加减应用〕临床运用时加入活血解毒之品，如川芎、丹参、当归、虎杖、金银花、连翘、半枝莲等；如有胁下肿块者，加三棱、莪术、地龙等；有颈项痰核者，加半夏、胆南星、浙贝母等；脾气虚弱，饮食不振，腹胀明显者，加茯苓、白术、陈皮、枳壳、砂仁、焦三仙等；自汗明显者，加浮小麦、麻黄根、煅龙骨、煅牡蛎等；潮热盗汗明显者，加青蒿、地骨皮、银柴胡等。

(3) 参芪杀白汤（郁仁存经验方）

〔组成与用法〕黄芪 15g，党参 15g，天冬 15g，沙参 15g，生地 15g，地骨皮 15g，黄芩 10g，生甘草 6g，白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕益气养阴，清热解毒。主治急性白血病。

4. 脾肾阳虚证

主症：气短乏力，形寒肢冷，消瘦纳呆，自汗，便溏，四肢浮肿，腰酸膝软，皮肤散在青紫斑点或斑块，舌质淡，边有齿痕，苔薄白而润，脉沉弱。

治法：温脾益肾。

加味右归丸（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕熟地 12g，制附片（先煎）10g，肉桂 5g，山药 12g，山茱萸 10g，菟丝子 12g，当归 12g，杜仲 12g，鹿角胶（烊化）10g，枸杞子 12g，党参 15g，白术 12g，蚤休 20g，臭牡丹 20g。水煎服。

〔功能主治〕温补脾肾。主治急性白血病。

〔加减应用〕阳痿者，加仙茅、巴戟天、补骨脂、肉苁蓉；久病，脾虚较甚，腹泻不止者，加红参（蒸兑）、干姜、茯苓、诃子。

【辨病用方】

急性白血病的辨病治疗，当注重虚、瘀、毒三个方面，且多为虚实夹杂。根据病变类型、病期早晚、患者体质强弱，选用或合用益气养血、化瘀解毒等治疗方药。常用抗癌中草药有白花蛇舌草、广豆根、半边莲、土茯苓、贝母、防己、雄黄、砒石、蟾酥等。

1. 急性白血病通用方

（1）益气养阴汤（上海中医药杂志，2003，4）

〔组成与用法〕生黄芪 15g，北沙参 15g，女贞子 10g，白术 10g，茯苓 10g，甘草 6g，天冬 10g，仙灵脾 10g，红藤 30g，莪术 10g，廔虫 6g，鹤虱 3g，枸杞子 10g，生地黄 20g，太子参 10g，黄柏 10g，砂仁 6g，党参 15g，当归 12g，旱莲草 20g，山萸肉 20g，怀山药 15g，丹皮 10g，泽泻 12g，青蒿 10g，地骨皮 10g。水煎服。

〔功能主治〕健脾补肾，益气养血，清热解毒。主治急性白血病。

〔**加减应用**〕骨髓有核细胞增生活跃时，同时口服梅花点舌丹。

〔**临床报道**〕治疗急性白血病 37 例，存活 10 年以上 5 例，5 年以上 7 例。

(2) 清白汤 (吉林中医药, 2002, 1)

〔**组成与用法**〕白花蛇舌草 12g, 大青叶 12g, 半枝莲 12g, 金银花 12g, 紫草 12g, 龙葵 10g, 生地 15g, 牡丹皮 10g, 赤芍 10g, 夏枯草 12g, 连翘 10g。水煎服。

〔**功能主治**〕清热凉血，化瘀散结。主治小儿急性白血病。

〔**加减应用**〕口腔溃疡、牙龈肿痛者，加黄连、玄参；出血严重，属于热毒迫血妄行者，加煅人中白、紫珠、大黄炭、白茅根或用鲜生地汁冲服；高热不退，加羚羊角（研末冲服）或健康幼童小便送服安宫牛黄丸；头痛、骨关节疼痛剧烈者，加全蝎、地龙；出现抽搐，加天麻、钩藤、石决明；肝脾及淋巴结肿大，加牡蛎、昆布、玄参；出现化疗不良反应、骨髓抑制，加人参、黄芪；恶心、呕吐者，加陈皮、竹茹、半夏。

〔**临床报道**〕配合化疗治疗 60 例急性白血病患者，总有效率为 96.67%。

(3) 解毒凉血方 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔**组成与用法**〕①露蜂房 15g (或龙葵 15g), 葵树子 30g, 当归 15g, 仙鹤草 30g, 猪殃殃 30g, 土大黄 15~30g, 黄精 15g, 丹参 15g, 白花蛇舌草 15g, 半枝莲 30g。②党参 180g, 焦白术 180g, 琥珀 30g, 蟾酥 9g, 牛黄 36g, 冰片 9g, 藤黄 30g, 麦芽 180g, 僵蚕 90g, 石菖蒲 90g, 猪殃殃 1000g。①方水煎服。②方制成丸剂，1 次 30 丸，1 日 3 次 (用上药浓缩泛丸如绿豆大，朱砂为衣)。

〔**功能主治**〕清热凉血，解毒抗癌。主治急性白血病。

〔**加减应用**〕神昏谵语者，加服安宫牛黄丸、紫雪丹，或服至宝丹；高热烦躁者，加生石膏（先煎）、板蓝根、竹叶；

出血者，加阿胶（烔化）、三七粉（冲服）、云南白药（分吞）；感染发热者，加蒲公英、紫花地丁、大青叶、金银花；高热者，另加生石膏（先煎）；脾气虚弱者，食欲不振，腹胀明显者，加茯苓皮、白术、陈皮、枳壳、砂仁、焦三仙等。

（4）黄芪凤尾汤（《抗癌中草药制剂》）

〔组成与用法〕 ①生马钱子 0.3~0.6g，生甘草 4.5g，蚤休 12g，凤尾草 30g，山豆根 9g，茜草 9g，射干 6g，当归 6g，黄芪 30g，紫草 30g，党参 15~30g，西黄粉 0.6g。水煎服。②仙鹤草 30g，鹿衔草 30g，岩珠 30g，金银花 30g，凤尾草 12g，生甘草 3g。水煎代茶随饮。

〔功能主治〕 益气生津，解毒凉血。主治急性白血病。

〔加减应用〕 热势嚣张者，加野菊花、紫花地丁、蒲公英；齿衄、舌衄者，加生蒲黄（布包）煎汤漱口；潮热盗汗明显者，加青蒿、地骨皮、银柴胡等。

（5）解毒散结方（《抗癌中草药制剂》）

〔组成与用法〕 夏枯草 12~18g，白花蛇舌草 20~30g，蚤休 9g，金银花 15~24g，土茯苓 30g，山慈菇 9g，生地 12~18g，半边莲 18~24g，紫草 12~18g，山豆根 12~18g。水煎服。

〔功能主治〕 养阴清热，解毒凉血。主治急性白血病。

〔加减应用〕 临床运用时加入活血解毒之品，如川芎、丹参、当归、虎杖、金银花、连翘、白花蛇舌草、半枝莲等。

（6）调血解毒方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 当归 20g，丹参 20g，赤芍 20g，川芎 10g，沙参 20g，麦冬 15g，板蓝根 50g，山豆根 30g，山慈菇 50g。水煎服，可同时配合化疗。

〔功能主治〕 养血活血，清热解毒。主治急性白血病。

〔加减应用〕 出血者，加三七、白茅根、白及；自汗明显者，加浮小麦、麻黄根、煅龙骨、煅牡蛎等；潮热盗汗明显

者，加青蒿、地骨皮、银柴胡等。

(7) 扶正祛邪方（浙江省中医院方）

〔组成与用法〕 ①绞股蓝、太子参各 20g，玉竹、五味子各 12g，山药、薏苡仁、白花蛇舌草、藤梨根各 30g。②生地、熟地各 12g，枸杞子、旱莲草、桑寄生各 20g，菟丝子、桑椹子、白花蛇舌草各 15g，藤梨根 30g。水煎服。

〔功能主治〕 ①方益气养阴祛邪；②方补益肝肾祛邪。主治急性白血病。

〔加减应用〕 气阴不足者用第一组方，属肝肾不足者用第二组方。并根据初发时的临床证型加减，初发时为湿毒内蕴型者，加紫花地丁、黄花地丁、贯众，丹皮、山梔、黄芩。属痰湿瘀阻型者，加陈皮、厚朴花、半夏、赤芍、白扁豆、茯苓、丹参。属正气虚弱型者，加当归、白芍、山萸肉、炙黄芪。另外，化疗中呕吐者，可加用刀豆壳、竹茹、代赭、旋覆花。便秘者，可加用全瓜蒌、火麻仁、柏子仁、郁李仁；纳呆者，加山楂、六曲、谷芽、麦芽。

〔临床报道〕 配合化疗治疗 28 例，3 年内持续缓解率为 71.4%。（浙江中医杂志，1998，2）

(8) 滋阴降火方（河南中医，2004，4）

〔组成与用法〕 沙参 30g，麦冬 20g，枸杞子 20g，山茱萸 30g，山药 20g，知母 30g，地骨皮 60g，山豆根 20g，猫爪草 30g，夏枯草 15g，桔梗 15g，黄连 15g，黄芩 30g，栀子 15g，穿山甲（先煎）30g，羚羊角粉（冲兑）3g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴降火，清骨髓实热。主治急性白血病。

〔加减应用〕 化疗后，加黄芪、当归、枸杞子、菟丝子、黄精、鸡血藤、炙甘草；出血者，加仙鹤草、旱莲草、生大黄。

〔临床报道〕 配合化疗治疗白血病 50 例，急性 33 例，慢性 17 例，完全缓解 35 例，明显好转 13 例，无效 2 例。

2. 急性粒细胞白血病用方

(1) 清热解毒方 (《抗癌中草药制剂》)

〔组成与用法〕 干蟾皮 12g, 半枝莲 30g, 板蓝根 30g, 土大黄 30g, 蚤休 15g, 射干 9g, 白英 30g, 紫草 15g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒。主治急性粒细胞白血病。

〔加减应用〕 气血虚衰者, 加黄精、黄芪、党参、熟地、当归; 出血者, 加旱莲草、丹皮、大蓟、小蓟、水牛角 (吞服); 感染发热者, 加蒲公英、紫花地丁、大青叶、金银花; 高热者, 另加生石膏 (先煎)。

(2) 养血祛湿方 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 柳树根 30g, 虎杖 30g, 党参 30g, 当归 30g, 熟地 30g, 薏苡仁 30g, 枸杞子 30g, 黄精 30g, 大枣 10 枚。水煎服。

〔功能主治〕 养血祛湿。主治急性粒细胞白血病。

〔加减应用〕 发热者, 加蒲公英、紫花地丁、大青叶、金银花; 高热者, 加生石膏 (先煎)。

(3) 益肾解毒方 (中西医结合杂志. 1985. 9)

〔组成与用法〕 熟地 30g, 茯苓 30g, 黄芪 30g, 白花蛇舌草 30g, 龙葵 30g, 山豆根 30g, 紫草 30g, 山药 15g, 山茱萸 10g, 肉苁蓉 10g, 巴戟天 10g, 补骨脂 10g, 人参 (或党参) 10g, 麦冬 10g, 五味子 10g, 当归 6g。水煎服。

〔功能主治〕 益肾活血, 养阴解毒。主治急性粒细胞白血病。

〔加减应用〕 发热者, 加金银花、板蓝根; 出血者, 加生地、丹皮、三七粉 (冲服)、云南白药 (分吞); 口腔溃疡者, 加生石膏 (先煎)、玄参、栀子。

(4) 健脾凉血方 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 党参 12g, 炙黄芪 12g, 熟地 (砂仁拌) 12g, 白芍 10g, 升麻 10g, 炒白术 10g, 茯苓 10g, 鹿角胶

(烔化) 10g, 红枣 10g, 柴胡 6g, 炮姜 6g, 炙甘草 3g, 龙眼肉 8g, 紫河车粉 (另吞) 6g, 仙鹤草 15g。水煎服。

[功能主治] 健脾益气, 养血凉血。主治急性粒细胞白血病。

[加减应用] 阳虚者, 加仙茅、巴戟天、补骨脂、肉苁蓉; 久病, 脾虚较甚, 腹泻不止者, 加红参 (蒸兑)、干姜、诃子。

3. 急性淋巴细胞白血病用方

(1) 清热凉血方 (《奇难杂症》)

[组成与用法] 羚羊骨 (先煎) 18g, 水牛角 (先煎) 30g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 山慈菇 30g, 玄参 15g, 紫草根 30g, 廔虫 12g, 青黛末 (冲兑) 2.5g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒凉血。主治急性淋巴细胞白血病。

[加减应用] 骨疼痛者, 加桑寄生、石上柏; 齿龈、皮下出血者, 加三七粉、白茅根、白及; 心悸头昏者, 加九节菖蒲、珍珠母、辰砂。

(2) 益气养血方 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 人参 (蒸兑) 10g, 黄芪 30g, 鹿茸 10g, 砂仁 10g, 白术 15g, 陈皮 15g, 半夏 15g, 茯苓 15g, 当归 15g, 白芍 15g, 甘草 15g。水煎服。

[功能主治] 益气养血。主治急性淋巴细胞白血病。

[加减应用] 补血者, 加何首乌; 破瘀滋阴者, 加龟甲 (先煎); 扶正常服胎盘粉, 1日2次。

(3) 加味黄连解毒汤 (河南中医, 2004, 1)

[组成与用法] 黄连 10g, 黄芩 10g, 大黄 6g, 金银花 20g, 栀子 10g, 白茅根 20g, 生地 20g, 地榆炭 20g, 女贞子 20g, 旱莲草 20g, 半枝莲 60g, 白花蛇舌草 30g, 地骨皮 60g。水煎服。

[功能主治] 养阴清热, 凉血止血。主治急性淋巴细胞白血病。

(4) 茵陈天冬汤 (北京中医杂志, 2003, 3)

[组成与用法] 天冬 20g, 紫草 10g, 柴胡 10g, 半枝莲 15g, 白芍 15g, 土茯苓 15g, 夏枯草 15g, 全蝎 3g, 生地 30g, 熟地 30g, 茵陈 30g。水煎服。

[功能主治] 滋阴清热解毒。主治急性淋巴细胞白血病。

[临床报道] 治愈急性淋巴细胞白血病 1 例。

4. 急性髓性白血病方

扶正祛邪方 (桂林医学院附属医院血液科方)

[组成与用法] 水牛角 (蒸兑) 10g, 生地 20g, 白芍 20g, 黄芩 15g, 栀子 15g, 地骨皮 15g, 连翘 15g, 白花蛇舌草 20g, 鳖甲 (先煎) 10g, 党参 10g, 丹参 15g, 阿胶 15g (烔化), 黄芪 20g, 黄精 20g, 紫河车 10g, 当归 10g。水煎服。

[功能主治] 益气养血, 滋阴补肾, 清热解毒, 凉血散邪。主治急性髓性白血病。

[加减应用] 化疗间隙期加用知柏地黄丸。

[临床报道] 配合化疗治疗 45 例老年急性髓性白血病, 完全缓解率为 60.9%。(浙江中西医结合杂志, 2004, 3)

5. 急性浆细胞白血病方

四君调血方 (江苏省中医院方)

[组成与用法] 炙甘草 5g, 白术 10g, 莪术 10g, 当归 10g, 黄芪 12g, 山茱萸 12g, 太子参 15g, 猪苓 15g, 茯苓 15g, 枸杞子 15g, 骨碎补 15g, 阿胶 (烔化) 15g, 虎杖 30g, 白花蛇舌草 30g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾, 化瘀解毒。主治急性浆细胞白血病。

[加减应用] 咳痰、发热者, 去滋腻之品, 加杏仁、桑白皮、连翘、黄芩、炙枇杷叶、金银花; 胸闷者, 加丹参、川芎; 后期骨痛者, 加廑虫、地龙、全蝎。

【对症用方】

急性白血病的对症用方，除根据患者主要症状进行选择外，当区分是否化疗，化疗患者以健脾和胃、益肾养血为主。

1. 急性白血病化疗后专方

(1) 癌复康方加减（潘敏求经验方）

【组成与用法】 炙黄芪 15g，党参 10g，当归 10g，熟地 10g，夏枯草 15g，补骨脂 10g，女贞子 10g，旱莲草 10g，仙茅 10g，仙灵脾 10g，菟丝子 30g，锁阳 10g，巴戟天 10g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

【功能主治】 健脾益肾，补气养血。主治白血病化疗后正虚邪毒未尽。

【加减应用】 饮食不振，腹胀明显者，加茯苓、白术、陈皮、枳壳、砂仁、焦三仙等；胸闷呕恶、苔厚腻者，加佩兰、白蔻仁。

(2) 健脾和胃方（黎月恒经验方）

【组成与用法】 党参 15g，白术 10g，茯苓 10g，陈皮 10g，清半夏 10g，砂仁 10g，旋覆花（布包）10g，代赭石（先煎）15g，焦山楂 10g，女贞子 10g，旱莲草 15g，蚤休 30g，大枣 15g，甘草 5g。水煎服。

【功能主治】 健脾降逆，消食止呕，益气凉血。主治白血病化疗后食欲不振。

【加减应用】 腹泻者，加神曲；气虚多汗者，加黄芪、煅牡蛎；口渴引饮、口苦苔黄者，加黄连、连翘；腹胀腹痛者，加厚朴、香附；头晕体乏者，加枸杞子、仙灵脾、黄芪；牙龈出血、皮肤瘀斑者，加阿胶（烔化）、仙鹤草。

(3) 芩莲龙胆饮（中国协和医科大学血液病医院方）

【组成与用法】 黄芩 12g，黄连 10g，龙胆草 10g，陈皮 15g，法半夏 12~15g，紫苏 12g，厚朴 15g，苍术 12g，白术 10g，砂仁 9g，竹茹 6g，茯苓 15g，薏苡仁 20g，焦三仙 30g。

水煎服。

〔功能主治〕 清热除湿化滞。主治骨髓移植后并发症。

〔加减应用〕 气虚者，加太子参；阴虚者，加生地、麦冬、知母、丹皮、女贞子。

〔临床报道〕 治疗大剂量化疗引起的消化道症状长期无好转 9 例，6 例治愈，2 例好转。（中国中西医结合杂志，1997，10）

（4）降逆止吐方（肿瘤研究与临床，2004，4）

〔组成与用法〕 旋覆花 15g（包煎），法半夏 12g，木香 12g，砂仁 12g，丁香 10g，柿蒂 10g，黄芪 12g，茯苓 10g，麦门冬 9g，生姜 6g，甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 降逆止呕。主治急性白血病化疗呕吐。

〔临床报道〕 湖北医科大学附属二医院中西医结合科张莹雯用此方治疗急性白血病化疗呕吐 30 例，完全控制率为 53.3%。

（5）加减补阳还五汤（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 黄芪 10g，党参 10g，当归 10g，地龙 10g，丹参 30g，鸡血藤 30g，赤芍 10g，白芍 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气活血通络。主治急性白血病化疗后出现手足麻木。

〔加减应用〕 阴虚甚者，加生地、熟地；阳虚甚者，加肉桂、附子。

2. 急性白血病发热方

（1）凉血方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 水牛角（蒸兑服）30g，羚羊角粉（冲服）3g，生地 30g，生石膏（先煎）60g，苍术 15g，金银花 50g，蒲公英 50g，黄连 10g，枳实 15g，全瓜蒌 30g，苏梗 10g，滑石 40g，生大黄（后下）10g，竹茹 10g。水煎服。并配服安宫牛黄丸，早、晚各 1 丸。

〔功能主治〕 清热凉血泻实。主治急性白血病高热。

[加减应用] 出血者，加生地、丹皮、藕节、三七粉、云南白药（分吞）、阿胶（烔化）；抽搐动风者，加钩藤（后下）、炙全蝎粉（冲服）；口腔溃疡者，加玄参、知母、栀子。

(2) 清热除湿汤（中国协和医科大学血液病医院方）

[组成与用法] 黄芩 12g，黄连 10g，栀子 10g，生石膏（先煎）30g，薄荷（后下）6g，柴胡 10g，丹皮 10g，半夏 12g，厚朴 15g，苍术 12g，藿香 12g，茯苓 15~20g，白蔻仁 12g。水煎服。

[功能主治] 清热除湿。主治白血病骨髓移植后发热。

[加减应用] 阴虚者，去黄连，减半量石膏，加生地、玄参、麦冬、知母、竹叶。

[临床报道] 治疗骨髓移植后发热 10 例（1 例肺部感染，9 例原因不明，多种抗生素效果不佳），全部治愈。（中国中西医结合杂志，1997，10）

3. 急性白血病出血方

(1) 牛角地黄汤（中西医结合实用临床急救，1998，6）

[组成与用法] 水牛角 50g，生地 30g，丹皮 15g，赤芍 15g，玄参 15g，侧柏叶 15g，紫草 15g，黄芩 10g，参三七粉 8g（分吞）。水煎服。

[功能主治] 清热解毒，凉血散瘀。主治急性早幼粒细胞白血病并弥漫性血管内凝血。

(2) 加减茜根散（中西医结合实用临床急救，1998，6）

[组成与用法] 茜草根 15g，黄芩 10g，知母 10g，黄柏 10g，侧柏叶 10g，生地 20g，阿胶 10g（烔化），女贞子 10g，旱莲草 10g。水煎服。

[功能主治] 滋阴降火，凉血安络。主治白血病鼻出血。

(3) 加减血府逐瘀汤（中西医结合实用临床急救，1998，6）

[组成与用法] 桃仁 10g，赤芍 10g，当归 10g，川芎 10g，生地 20g，枳壳 6g，桔梗 6g，丹皮 15g，参三七 6g，甘草 3g。

水煎服。

〔功能主治〕行气活血，化瘀止血。主治急性单核细胞白血病头痛、牙龈出血。

(4) 地骨山甲汤 (河南中医, 2004, 1)

〔组成与用法〕柴胡 30g, 黄芩 30g, 生石膏 40g, 桂枝 8g, 地骨皮 80g, 延胡索 20g, 郁金 20g, 山茱萸 30g, 枸杞子 30g, 炮山甲 30g, 半枝莲 60g, 白花蛇舌草 30g, 栀子 20g, 金银花 20g。水煎服。

〔功能主治〕滋阴清热。治疗白血病鼻出血, 牙龈出血, 口腔血泡, 尿血, 大面积紫癜。

4. 急性白血病合并感染方

(1) 口康含漱液 (湖南医科大学附属湘雅医院方)

〔组成与用法〕细辛 6g, 生石膏 30g, 石斛 30g, 山豆根 20g, 生地 20g 等八味中药煎煮制成。

〔功能主治〕滋阴清热, 泻火解毒。主治白血病合并口腔感染。

〔临床报道〕治疗化疗后口腔感染 56 例, 有效率为 100%。(海南医学, 1999, 3)

(2) 解毒宣肺方 (中国中医研究院西苑医院方)

〔组成与用法〕金银花 15g, 土大黄 10g, 白花蛇舌草 10g, 连翘 10g, 石膏 (先煎) 20g, 肥知母 15g, 杏仁 9g, 浙贝 9g, 桔梗 5g, 芦根 10g, 桑叶 10g, 黄芩 15g, 重楼 15g, 虎杖 15g, 柴胡 10g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒, 宣肺利气。主治急性白血病化疗后肺部感染。

【专病成药】

1. 白血康 (复方青黛片) (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

〔处方组成〕青黛、雄黄、太子参、丹参等。

〔功能主治〕清热解毒, 益气生血。用于急性早幼粒细胞

白血病的诱导缓解；慢性粒细胞白血病治疗等各类型的白血病的缓解后治疗。

〔用法用量〕开始剂量为 5 片/次，1 日 3 次，2 天后如无
明显消化道反应逐渐增至 12 片/次。至缓解后需续服 1 个月巩固
疗效。适用于急性非淋巴细胞白血病的治疗。

2. 西黄丸（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕麝香、牛黄、炙乳香、炙没药。

〔功能主治〕解毒散结，消肿止痛。主治急慢性白血病的
治疗。（中国中西医结合杂志，1998，10）

〔用法用量〕1 次 3g，1 日 2 次，温开水送服。

3. 梅花点舌丹（《中华人民共和国药典（2000 版）》）

〔处方组成〕乳香、没药、硼砂、熊胆、冰片、雄黄、葶
苈子、血竭、沉香、珍珠、牛黄、麝香、朱砂、制蟾蜍、白梅
花、生石决明等。

〔功能主治〕清热解毒，消肿散结。主治白血病骨髓有核
细胞增生活跃时。（陕西中医学院学报，1999，3）

〔用法用量〕含化，1 次 3 丸，舌下含化，徐徐咽之。

4. 亚砷酸注射液（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕三氧化二砷（ As_2O_3 ）。

〔功能主治〕解毒去腐。主治急性非淋巴细胞白血病，以
急性早幼粒细胞白血病疗效最显著。

〔用法用量〕成人 5~10ml/次，用 5% 葡萄糖注射液或生
理盐水 500ml 稀释后静脉滴注，1 日 1 次，4~6 个月为 1 个疗
程。

【专病单方】

1. 青黛 用法：每取 2~4g，分装胶囊，1 日 3 次，饭后
吞服。功用：解毒蚀疮。主治：急性白血病。（《中华肿瘤治疗大
成》）

2. 白花蛇舌草 用法：每取 30~60g，水煎服。功用：清

热解毒。主治：白血病。（《湖南中草药单方验方选编》）

3. 蟾酥 用法：每取 0.015~0.03g，装入胶囊内，每晚睡前服，10 天为 1 个疗程。功用：清热解毒。主治：急性粒细胞性白血病。（《抗癌中草药大辞典》）

4. 长春花 用法：每取 15g，水煎，1 日 1 剂。功用：清热解毒。主治：急性淋巴细胞性白血病。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 大黄 用法：每取 100g，水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒。主治：急性白血病。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 鲜生地 用法：每取 250g，配鲜茅根 250g，鲜蒲公英 50g。水煎，1 日 1 剂，当茶饮。功用：滋阴清热解毒。主治：白血病。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 凤尾草 用法：每取 30g，配虎杖 15g、鹿衔草 30g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒。主治：白血病。（《中华肿瘤治疗大成》）

慢性粒细胞白血病

慢性粒细胞白血病是一种发生在早期多能造血干细胞上的恶性骨髓增生性疾病，是第一个有染色体标志的白血病亚型，其发病与遗传因素有关。

本病相当于中医病名国家标准的恶核，亦属于虚劳、血证、积聚等范畴。中医认为本病的主要病因病机为先天禀赋异常，加之外感六淫邪毒，内伤于情志、饮食，导致精气内虚、血瘀痰聚毒结，久则气血耗损，肝肾亏虚，邪与营血搏结，脉络瘀阻成积而致本病。

【辨证用方】

慢性粒细胞性白血病的辨证应辨虚实。虚以肾虚、气阴两虚、阳气亏虚多见，实以血瘀、血热为主，是一种虚实夹杂，或本虚标实的疾病。治疗以扶正与祛邪相结合，扶正以补气、

养血、滋阴、壮阳，祛邪以清热、解毒、化瘀。

1. 瘀血内阻证

主症：腹部积块明显，疼痛不移，面黯消瘦，纳减乏力，时有寒热，女子或见月事不下，舌质紫暗或见瘀点，苔薄黄，脉细涩。

治法：活血祛瘀。

膈下逐瘀汤加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕桃仁 10g，红花 10g，当归 12g，川芎 10g，莪术 10g，赤芍 10g，法半夏 10g，砂仁 5g，陈皮 10g，香附 15g，乌药 10g，枳壳 10g，白术 10g，茯苓 10g，青黛（冲）6g，蚤休 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕化瘀软坚，清热解毒。主治慢性粒细胞白血病。

〔加减应用〕发热起伏者，加地骨皮、制鳖甲（先煎）；头昏乏力者，加党参、黄芪、阿胶（烊化）；积块大而坚硬作痛者，加服鳖甲煎丸（分吞）；颈项痰核者，加山慈菇、海藻、牡蛎（先煎）。

2. 痰热蕴结证

主症：发热，头痛，咽喉肿痛，咳嗽痰黄，鼻衄齿衄，颈项痰核，腹中结块，神疲乏力，大便不爽，苔黄腻，脉滑数。

治法：化痰清热。

海藻玉壶汤加味（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕海藻 15g，昆布 15g，姜半夏 10g，青皮 10g，陈皮 10g，山慈菇 15g，贝母 10g，胆南星 10g，黄芩 15g，桑白皮 15g，全瓜蒌 15g，制鳖甲（先煎）15g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕软坚散结，清热化痰。主治慢性粒细胞白血病。

〔加减应用〕痰瘀互结者，加三棱、莪术、生牡蛎（先

煎)；痰多胸满者，加厚朴、葶苈子(布包)；食纳差者，加砂仁、麦芽、谷芽；便秘者，加枳实、大黄(后下)。

3. 肝肾阴虚证

主症：低热绵绵，头晕眼花，五心烦热，疲乏盗汗，耳鸣耳聋，腰酸膝软，胸骨疼痛，肝脾肿大，面黑体瘦，舌红无苔，脉弦细数。

治法：滋补肝肾，凉血透热。

杞菊地黄汤加减(《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 菊花 12g，枸杞子 12g，山萸肉 10g，生地黄 12g，山茱萸 10g，山药 10g，丹皮 10g，知母 12g，茯苓 12g，泽泻 12g，牛膝 12g，女贞子 12g，半枝莲 20g，制鳖甲(先煎) 12g，制龟甲(先煎) 12g，茜草 15g，仙鹤草 30g。水煎服。

[功能主治] 补益肝肾，清热散瘀。主治慢性粒细胞白血病。

[加减应用] 低热不退者，加银柴胡、青蒿；高热者，加柴胡、石膏；久病阴损及阳者，加补骨脂、巴戟天、肉桂、制附片。(中医药研究，1998，5)

4. 气血亏虚证

主症：倦怠乏力，眩晕少寐，心悸气短，食纳减少，自汗或盗汗，或见衄血发热，面色萎黄，舌质淡，苔薄，脉细弱。

治法：益气养血。

归脾汤加味(《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 党参 15g，黄芪 15g，白术 10g，茯苓 10g，当归 12g，熟地 12g，炙远志 5g，酸枣仁 10g，木香 10g，青黛(冲服) 6g，半枝莲 20g，生姜 3 片，大枣 10 枚，炙甘草 5g。水煎服。

[功能主治] 补气益血，健脾养心。主治慢性粒细胞白血病。

【**加减应用**】梦多者，加夜交藤、合欢皮；血虚头昏者，加阿胶（烔化）、鹿角胶（烔化）、紫河车。

【辨病用方】

慢性粒细胞白血病的辨病治疗，当注重虚、瘀、痰、毒四个方面，且多为虚实夹杂。根据病期早晚、患者体质强弱，选用或合用益气养血、化瘀解毒等治疗方药。常根据分型加用抗癌中草药，如青黛、雄黄、砒石、半枝莲、紫草、鳖甲、黄药子、白花蛇舌草等。

1. 慢性粒细胞白血病通用方

（1）清肝化瘀汤（上海中医药大学附属曙光医院方）

【**组成与用法**】三棱 10g，莪术 10g，黄芩 12g，山梔 10g，龙胆草 6g，赤芍 10g，丹皮 12g，青蒿 12g，地骨皮 15g，白花蛇舌草 30g，白英 15g，狗舌草 30g 等。水煎服。

【**功能主治**】清肝化瘀，理气消积。主治慢性粒细胞白血病。

【**加减应用**】头晕乏力者，加太子参；食欲不振者，加木香、砂仁（后下）；口干欲饮者，加生地黄、麦冬、炙龟甲；盗汗者，加浮小麦、瘪桃干；失眠烦躁者，加酸枣仁、夜交藤、珍珠母。

【**临床报道**】治疗 38 例慢性粒细胞白血病，5 年生存率为 78.9%，中数生存期为 71.8 个月。（上海中医药杂志，2004，8）

（2）解毒化瘀汤（中国中医研究院西苑医院方）

【**组成与用法**】土茯苓 15g，山慈菇 12g，山豆根 10g，苦参 20g，野葡萄藤 15g，龙胆草 10g，三棱 12g，莪术 12g，水蛭 3g，鸡血藤 30g，穿山甲（先煎）5g。水煎服。

【**功能主治**】清热解毒，活血化瘀。主治慢性粒细胞白血病。

【**加减应用**】配合口服青黄散。

【**临床报道**】王展翔、周霭祥等治疗 80 例，其中获得 10

年以上缓解者 6 例。(白血病, 1998, 2)

(3) 阻变灵胶囊 (辽宁中医学院附属医院血液科方)

[组成与用法] 黄芪、雄黄、青黛、全蝎、蜈蚣、僵蚕、壁虎、皂荚、枯矾、莪术等为末装胶囊, 1 次 6g, 1 日 3 次。

[功能主治] 益气破血逐瘀, 涤痰清热解毒。主治急变期慢粒。

[加减应用] 加服六神丸、牛黄解毒丸、西黄丸。若为加速期加羟基脲、马利兰等。

[临床报道] 治疗急变期慢粒 60 例, 5 年以上存活率占 73.3%。(中国现代实用医学杂志, 2004, 3)

(4) 凉血解毒方 (陕西中医, 1999, 1)

[组成与用法] 青黛 (分 2 次随中药汤剂吞服)、生地黄、熟地黄、山萸肉、菟丝子、补骨脂、白术、紫草、生甘草、莪术各 10g, 生黄芪、白英、白花蛇舌草各 30g, 半枝莲、云茯苓、党参、地骨皮、丹皮各 20g。每煎 200ml, 翻渣再煎, 早晚各 1 次分服。

[功能主治] 凉血解毒, 培补脾肾。主治慢性粒细胞白血病。

(5) 青黄散 (周霭祥经验方)

[组成与用法] 青黛、雄黄按 9:1, 8:2, 7:3 (雄黄比例越大, 作用越强) 制成胶囊或片剂, 每胶囊或片剂含 0.3~0.5g。治疗剂量: 1 日 6~12g, 分 3 次饭后服; 维持剂量: 1 日 3~6g, 如无不良反应, 可增至 1 日 5~6g。每 2~3 个月用二巯丁二钠 1g 加入 5% 葡萄糖注射液 40ml 中缓慢静脉注射。

[功能主治] 清热解毒, 凉血散瘀。主治慢性粒细胞白血病。

(6) 芪参复方 (中国中西医结合杂志, 1984, 5)

[组成与用法] ①黄芪 15g, 板蓝根 15g, 山慈菇 15g, 半枝莲 15g, 当归 9g, 柴胡 9g, 白术 9g, 青黛 (冲) 9g, 红参

(蒸兑) 9g, 柏子仁 6g, 鳖甲 (先煎) 30g。②沙参 12g, 石斛 2g, 麦冬 9g, 谷芽 9g, 玉竹 9g, 鸡内金 30g, 生地 30g, 白花蛇舌草 15g, 三七粉 (冲) 5g, 红参 (蒸兑) 6g。水煎服。①方、②方交替使用。

[功能主治] 健脾益气, 清热解毒。主治慢性粒细胞性白血病。

[加减应用] 自汗明显者, 加浮小麦、麻黄根、煅龙骨、煅牡蛎等; 出血者, 加旱莲草、丹皮、大蓟、小蓟、水牛角 (吞服)。

(7) 夏枯二甲汤 (中国中西医结合杂志, 1989, 6)

[组成与用法] 白花蛇舌草 60g, 夏枯草 15g, 生牡蛎 (先煎) 30g, 鳖甲 (先煎) 12g, 板蓝根 20g, 鲜半枝莲 15g, 败酱草 12g。水煎服。

[功能主治] 解毒散结。主治慢性粒细胞白血病。

[加减应用] 恶心欲呕者, 加竹茹、姜半夏、砂仁; 胸腹胀痛者, 加广木香、香附、郁金; 大便秘结者, 加大黄 (后下); 气阴两虚、血热妄行者, 加黄芪、党参、生地、知母、仙鹤草、地骨皮、血余炭。

(8) 养阴解毒方 (辽宁中医杂志, 1982, 12)

[组成与用法] 白花蛇舌草 30g, 沙参 20g, 党参 20g, 黄精 40g, 半枝莲 20g, 马齿苋 50g, 白芍 15g, 丹参 20g, 黄药子 20g, 重楼 20g, 紫草 20g, 阿胶 (烱化) 15g。水煎服。

[功能主治] 养阴解毒。主治慢性粒细胞白血病。

[加减应用] 痰毒恶核较多者, 加三棱、莪术、生牡蛎。

(9) 酸甘化阴煎 (中国民间疗法, 1998, 4)

[组成与用法] 南、北沙参各 12g, 天、麦冬各 10g, 玉竹 10g, 酸枣仁 10g, 甘枸杞 10g, 山萸肉 10g, 五味子 5g, 制首乌 12g, 焦楂曲各 12g, 大枣 4 枚。水煎服。

[功能主治] 滋养肝肾。主治慢性粒细胞白血病。

〔**加减应用**〕高热者，加霜桑叶、菊花、金银花；出血者，加生熟地黄、丹皮；感染者，加金银花、野菊花、蒲公英，体温稳定期，加益智仁、仙灵脾、童葵藜等。

(10) 健脾解毒方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔**组成与用法**〕山药 24g，牛蒡子 6g，鸡内金 12g，玄参 12g，白术 9g，煅牡蛎（先煎）30g，鳖甲（先煎）30g，半枝莲 30g，毛慈菇 24g。水煎服。兼服化癥回生丹 6g，1 日 2 次。

〔**功能主治**〕健脾，软坚。主治慢性粒细胞白血病。

〔**加减应用**〕痰毒恶核较多者，加三棱、莪术、生牡蛎（先煎）；临床运用时，加入活血解毒之品，如川芎、丹参、当归、白花蛇舌草、半枝莲等。

(11) 慢粒方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔**组成与用法**〕猪殃殃 30g，土大黄 30g，金银花藤 30g，土茯苓 30g（也可用铁刺苓），黄精 15g，当归 12g，枸骨 30g，石菖蒲 12g，丹参 15g，狗舌草 30g，青黛（冲）6g。水煎服。治疗期间不宜食鸡。

〔**功能主治**〕活血，解毒。主治慢性粒细胞白血病。

〔**加减应用**〕潮热盗汗明显者，加青蒿、地骨皮、银柴胡等；血虚头昏者，加阿胶（烔化）、鹿角胶（烔化）、紫河车。

2. 慢性白血病加速急变期用方

(1) 清营汤合栀子豉汤（上海中医药杂志，2002，3）

〔**组成与用法**〕水牛角（先煎）15g，生地 15g，丹皮 10g，赤芍 10g，金银花 12g，连翘 12g，豆豉 12g，生山栀 15g，紫草 30g，蒲公英 30g，白术 15g，生黄芪 15g，茯苓 15g，生薏苡仁 30g，碧玉散（包）30g，焦山楂 10g，焦六曲 10g，炒谷芽、炒麦芽各 30g。水煎服。

〔**功能主治**〕清营泄热。主治慢性粒细胞白血病。

〔**临床报道**〕缓解慢粒 1 例。

(2) 益气养阴方（上海中医药大学附属曙光医院方）

〔组成与用法〕 太子参 15g, 天门冬 12g, 生地 12g, 青蒿 9g, 地骨皮 9g, 白花蛇舌草 30g, 龙葵 9g, 半枝莲 9g, 旱莲草 12g, 枸杞子 12g, 制鳖甲 (先煎) 15g, 山豆根 12g, 连翘 9g, 忍冬藤 9g, 鸡内金 9g, 炙甘草 9g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴。主治慢性粒细胞白血病。

〔临床报道〕 应用此方治疗慢粒 20 例, 总有效率为 90%。
(上海中医药杂志, 1997, 6)

(3) 解毒扶正方 (中医药研究, 1998, 5)

〔组成与用法〕 党参 30g, 西洋参 10g, 制鳖甲 (先煎) 30g, 枸杞子 30g, 砂仁拌熟地 30g, 蛤蚧 30g, 生牡蛎 (先煎) 30g, 海藻 30g, 海带 30g, 大贝母 10g, 水蛭 10g, 廑虫 10g, 制乳没 10g, 五灵脂 10g, 泽兰 15g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰消瘀, 扶助正气。主治慢性粒细胞白血病。

(4) 滋阴降火方 (河南中医, 2004, 4)

〔组成与用法〕 沙参 30g, 麦冬 20g, 枸杞 20g, 山茱萸 30g, 山药 20g, 知母 30g, 地骨皮 60g, 山豆根 20g, 猫爪草 30g, 夏枯草 15g, 桔梗 15g, 黄连 15g, 黄芩 30g, 栀子 15g, 穿山甲 (先煎) 30g, 羚羊角粉 (冲兑) 3g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴降火, 清骨髓实热。主治慢性粒细胞白血病。

〔加减应用〕 化疗后, 以黄芪、当归、枸杞子、菟丝子、黄精、鸡血藤、炙甘草、大枣为主; 出血者, 加仙鹤草、旱莲草、生大黄。

(5) 补肾解毒方 (《千家妙方》)

〔组成与用法〕 生地 18g, 熟地 18g, 枸杞子 15g, 杜仲 24g, 五味子 6g, 怀山药 21g, 山茱萸 18g, 生晒参 (蒸兑) 12g, 茯苓 12g, 蒲公英 18g, 紫花地丁 15g, 半枝莲 15g, 白花蛇舌草 30g, 青黛 (冲) 6g, 当归 12g, 雄黄 3g, 菟丝子 15g, 女贞子 15g, 甘草 6g。水煎服。

【功能主治】补肾解毒。主治慢性粒细胞白血病。

【加减应用】阳虚者，加仙茅、巴戟天、补骨脂、肉苁蓉。

【对症用方】

慢性粒细胞性白血病的对症用药，主要结合化疗及针对食欲不振、巨脾等相应症状和合并症采用相应的方药。

1. 慢性粒细胞白血病化疗后治疗专方

癌复康方加减（潘敏求经验方）

【组成与用法】党参 15g，黄芪 15g，白术 10g，茯苓 10g，砂仁 10g，法半夏 10g，陈皮 10g，女贞子 12g，枸杞子 10g，肉苁蓉 12g，夏枯草 15g，生牡蛎（先煎）30g，鸡血藤 20g，甘草 5g。水煎服。

【功能主治】益气养血。主治慢性粒细胞白血病化疗后脾虚气弱者。

【加减应用】饮食不振，腹胀明显者，加茯苓、白术、陈皮、枳壳、砂仁、焦三仙等；久病阴损及阳，症见畏寒、阳痿、小便清长、舌质淡、脉沉细无力者，加补骨脂、巴戟天、肉桂、制附片（先煎）。

2. 慢性粒细胞白血病食欲不振专方

苏叶三仙汤（中医杂志，1987，10）

【组成与用法】陈皮 9g，佛手片 9g，甘草 9g，姜竹茹 9g，焦神曲 12g，藿香 12g，谷芽 12g，炒麦芽 12g，苏叶梗 12g。以上 9 味药，以 1500ml 水煎浓缩成 500ml，1 日 3 次，1 次 30ml，温开水送下。

【功能主治】健脾和胃。主治慢性粒细胞白血病化疗后食欲不振者。

【加减应用】伍用靛玉红片 50mg，1 日 4 次。头昏乏力者，加党参、黄芪、阿胶（烔化）；腹胀，加广木香、沉香等。

3. 慢性粒细胞白血病脾肿大用方

（1）加味青蒿鳖甲汤（上海中医药大学附属曙光医院方）

〔组成与用法〕 青蒿（冲兑）12g，制鳖甲（先煎）15g，地骨皮12g，赤芍9g，丹皮9g，三棱9g，莪术9g，丹参12g，白英15g，白花蛇舌草30g，山慈菇9g，山栀子9g，枳壳9g，生大黄9g，生甘草9g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴清热，解毒散结。主治慢性粒细胞白血病脾肿大。

〔临床报道〕 配合益气养阴法治疗20例，用药15天开始脾脏缩小，40天左右可复常。（上海中医药杂志，1997，6）

（2）鳖甲牡蛎汤（实用中医内科杂志，1988，3）

〔组成与用法〕 鳖甲（先煎）50g，牡蛎（先煎）50g，夏枯草20g，海藻20g，胡黄连20g，鸡内金10g，丹参20g，白茅根50g，焦白术20g，白芍30g。水煎服。

〔功能主治〕 解毒活血，软坚散结。主治慢性粒细胞白血病脾肿大。

【专病成药】

1. 白血康（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 青黛、雄黄、太子参、丹参等。

〔功能主治〕 清热解毒，益气生血。主治慢性粒细胞白血病治疗等各类型的白血病的缓解后治疗。

〔用法用量〕 开始剂量为1次5片，1日3次，2天后如无明显消化道反应逐渐增至1次12片。至缓解后需续服1个月巩固疗效。

2. 亚砷酸注射液（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕 三氧化二砷（ As_2O_3 ）。

〔功能主治〕 解毒去腐。主治慢性粒细胞性白血病及慢粒急变期。

〔用法用量〕 成人1次5~10ml，用5%葡萄糖注射液或生理盐水500ml稀释后静脉滴注，1日1次，4~6个月为1个疗程。

3. 复方红豆杉胶囊 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔**处方组成**〕 红豆杉等。

〔**功能主治**〕 祛邪扶正，通络散结。主治白血病等中晚期患者治疗。

〔**用量用法**〕 口服。1次2粒(每粒0.3g)，1日3次。21天为1个疗程。

【专病单方】

1. 乳香 用法：每取60g，配没药60g、雄黄30g。乳香、没药去油，三药共研细末，和以米饭适量捣和为丸，如莱菔子大小，晒干。1次1~3g，1日1~3次，开水送服。功用：攻毒蚀疮，化瘀止痛。主治：白血病。(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 土大黄 用法：每取30~60g，配苦参15g，水煎服。功用：清热解毒。主治：白血病。(《中华肿瘤治疗大成》)

3. 山慈菇 用法：每取200g，配蜂蜜250g。将山慈菇研成细末，与蜂蜜炼制成膏，1次15~30g，1日2次，温开水送下。功用：解毒化痰。主治：白血病。(《中华肿瘤治疗大成》)

4. 雄黄 用法：取适量，制成粉，1次吞服0.5~1.5g，每天1~2次，粒细胞较高者可加大剂量，对慢性粒细胞白血病有效。(《实用肿瘤学》)

慢性淋巴细胞白血病

慢性淋巴细胞白血病是由于一种小淋巴细胞克隆性扩展，逐步积累而浸润骨髓、血液、淋巴结和其他器官，最终导致造血功能衰竭的一种恶性疾病。本病病因不明，其发病可能与遗传因素有关。

本病相当于中医病名国家标准的恶核，亦属于虚劳、积聚、痰核、血证、瘰疬等范畴，多因机体正气亏虚，情志、饮食所伤，外邪乘虚侵袭，导致肝脾受损，脏腑失和，气机阻

滞，瘀血内停，日久成积，或痰湿内停，久则痰凝毒结，发为痰核。

【辨证用方】

慢性淋巴细胞白血病的辨证应注意辨别虚实，实以痰湿、瘀血为主，虚以气血、肾阴亏虚为主。治疗分别予以化痰利湿，化瘀解毒，益气养血，滋阴补肾。

1. 痰湿蕴结证

主症：颈、项、腋下、鼠蹊等处，痰核瘰癧，甚则结聚成块，皮色不变，坚而不溃，持久难消，胸闷脘痞，食少乏力，大便时溏，舌质淡，苔白腻，脉滑。

治法：化痰利湿散结。

二陈汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕法半夏 10g，陈皮 10g，茯苓 10g，瓜蒌 15g，苍术 10g，厚朴 10g，薏苡仁 15g，昆布 15g，海藻 15g，玄参 10g，牡蛎（先煎）20g，黄药子 15g，夏枯草 15g，山慈菇 15g，蚤休 30g，半枝莲 30g。水煎服。

〔功能主治〕化痰除湿，软坚散结。主治慢性淋巴细胞白血病。

〔加减应用〕痰湿蕴而化热者，加胆南星、黄芩、竹茹。

2. 瘀血内结证

主症：胁下积块，坚硬疼痛，固定不移，颈项痰核，鼻衄或齿衄，胸闷胁痛，腹胀纳呆，形瘦乏力，舌质紫暗或有瘀点，苔薄黄，脉弦涩。

治法：活血化瘀，消积散结。

膈下逐瘀汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕桃仁 10g，红花 10g，丹皮 10g，赤芍 10g，当归 10g，川芎 6g，延胡索 12g，香附 15g，郁金 15g，莪术 10g，廑虫 10g，制鳖甲（先煎）15g，青黛（冲服）6g，海藻 15g，夏枯草 15g，白茅根 15g，仙鹤草 30g，蚤休 30g，猫爪

草 15g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀，消积散结。主治慢性淋巴细胞白血病。

〔加减应用〕 发热者，加金银花、蒲公英、石膏（先煎）、枳仁；痰核瘰癧者，加山慈菇、玄参、生牡蛎（先煎）；便血者，加茜草炭、地榆炭。

3. 气血亏虚证

主症：颈项痰核，经久未消，形瘦乏力，眩晕，心悸少寐，面色苍白，唇甲不华，食纳减少，舌质淡，苔白，脉细弱。

治法：益气养血。

归脾汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 党参 15g，黄芪 15g，白术 10g，陈皮 10g，当归 10g，酸枣仁 12g，远志 6g，木香 10g，海藻 15g，昆布 15g，夏枯草 15g，半枝莲 20g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血，软坚散结。

〔加减应用〕 便溏者，加砂仁、神曲、麦芽；形寒肢冷，腹中隐痛者，加干姜、桂枝；衄血便血者，加地榆炭、茜草炭。

4. 肾阴不足证

主症：胁下癥块或颈项痰核未消，五心烦热，潮热盗汗，少寐多梦，腰膝酸软，形瘦乏力，舌质淡红，苔薄白，脉细数。

治法：补肾养阴。

左归丸加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 熟地 12g，山茱萸 10g，菟丝子 12g，枸杞子 12g，牛膝 12g，龟甲胶（烊化）10g，鹿角胶（烊化）10g，制鳖甲（先煎）15g，丹皮 12g，地骨皮 15g，黄芪 15g，海藻 15g，夏枯草 15g，蚤休 20g。水煎服。

【功能主治】 补肾滋阴，软坚消积。主治慢性淋巴细胞白血血病。

【加减应用】 皮肤瘙痒者，加地肤子、白蒺藜；纳差者，加砂仁、麦芽；畏寒肢冷阳痿者，加制附片、肉桂、巴戟天、补骨脂；吐衄便血者，加仙鹤草、紫草、茜草炭、云南白药（分吞）；尿血者，加大蓟、小蓟、蒲黄炭（布包）。

【辨病用方】

慢性淋巴细胞白血病的辨病治疗，当注意虚实夹杂侧重不同，治疗以扶正、驱邪有先后之分；根据病期早晚、患者体质强弱，缓解期当益气养阴补血；加速急变期当散结、化瘀、解毒。

1. 慢性淋巴细胞白血病急性期用方

(1) 解毒活血汤（现代中西医结合杂志，2000，10）

【组成与用法】 青黛 10g，山豆根 10g，蚤休 15g，白花蛇舌草 30g，葛根 20g，山慈菇 10g，莪术 20g，丹参 20g，当归 10g，赤芍 10g，川芎 10g，甘草 3g。1 日 1 剂，浓煎 250ml，分 2 次服，连服 30 天为 1 个疗程。

【功能主治】 解毒活血。主治慢性淋巴细胞白血血病。

【加减应用】 血虚头昏者，加阿胶（烱化）、鹿角胶（烱化），紫河车；颈项痰核者，加山慈菇、海藻、牡蛎（先煎）。

(2) 补阴调血合方（《抗癌中草药制剂》）

【组成与用法】 ①猪殃殃 60g，羊蹄根 60g，旱莲草 60g，石仙桃 30g，红枣 30g，黄精 15g，丹参 15g，茜草 12g，地骨皮 12g，当归身 9g，白薇 9g，柴胡 9g，生地 9g，玄参 6g，六神丸 30 粒。②猪殃殃 30g，红枣 30g，薏苡仁 15g，黄精 15g，党参 12g，羊蹄根 9g，旱莲草 9g，当归身 9g，白术 9g，黄芪 9g，白薇 9g，炙甘草 3g，六神丸 15 粒。水煎服，先用①方治疗，获效后再用②方巩固。六神丸随汤药分 3 次吞服。

【功能主治】 补阴养血，退热凉血。主治慢性淋巴细胞白

血病。

〔加减应用〕 吐衄便血者，加仙鹤草、紫草、茜草炭、云南白药（分吞）；尿血者，加大蓟、小蓟、蒲黄炭（布包）。

（3）健脾解毒方（湖北中医杂志，2000，9）

〔组成与用法〕 炙甘草 5g，白术、莪术、当归各 10g，黄芪、山茱萸各 12g，太子参、猪苓、茯苓、枸杞子、骨碎补、阿胶各 15g，虎杖、白花舌蛇草各 30g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾，化瘀解毒。主治慢性淋巴细胞白血血病。

〔加减应用〕 合并咳嗽、咳痰或发热时，则去滋腻之品，加杏仁、桑白皮、黄芩、连翘、炙枇杷叶、金银花；胸闷时，加川芎、丹参；后期骨痛加廑虫、地龙、全蝎。

2. 慢性淋巴细胞白血血病缓解期用方

（1）扶正散结方（《抗癌中草药制剂》）

〔组成与用法〕 太子参 30g，山慈菇 30g，生地 15g，熟地 15g，天冬 9g，麦冬 9g，砂仁 9g，黄柏 9g，黑山栀 9g，紫河车 9g，甘草 9g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，清热散结。主治慢性淋巴细胞白血血病。

〔加减应用〕 失眠虚烦者，加酸枣仁、栀子；气虚自汗者，加西洋参（蒸兑）、五味子、黄芪。

（2）夏枯参芪汤（河北中医，1987，6）

〔组成与用法〕 党参 20g，黄芪 20g，当归 20g，制首乌 20g，生地 15g，白术 20g，甘草 15g，夏枯草 60g，地榆 12g，射干 12g，金银花 30g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g，野葡萄根 120g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴，清热解毒。主治慢性淋巴细胞白血血病。

〔加减应用〕 病在上，载药上行，加升麻；清热解毒，加

漏芦；补肾精，加鹿角霜、熟地；毒邪减，善后去漏芦。

(3) 平补缓消汤（国医论坛，2003，5）

〔组成与用法〕 白术 15g，人参 10g，茯苓 18g，甘草 3g，川芎 20g，归尾 12g，熟地 15g，赤芍 12g，白花蛇舌草 30g，半枝莲 30g，麦冬 15g，玄参 12g，五味子 9g，菟丝子 9g，山萸肉 9g。上药加水浸泡后浓煎至 200~300ml，1 日 2 次服用。至临床症状好转后上方制成丸剂，1 次 9g，1 日 3 次，长久服用。

〔功能主治〕 补气散瘀，消痰散结。主治慢性淋巴细胞白血血病。

〔加减应用〕 肺部感染者，加金银花、鱼腥草、川贝；脾大者，加鳖甲；扁桃体肿大者，加马勃、射干。

〔临床报道〕 治疗本病 6 例，存活 5 年以上 1 例，3 年以上 4 例，1 年以上 1 例。

【对症用方】

慢性淋巴细胞性白血病的对证治疗应针对放疗、化疗等不同治疗，选用相应的方药。

1. 慢性淋巴细胞白血血病放疗后专方

补肾养阴方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 党参 15g，白术 10g，茯苓 10g，陈皮 10g，枸杞子 12g，女贞子 12g，麦冬 15g，鸡血藤 30g，夏枯草 30g，马尾连 10g，白花蛇舌草 20g，沙参 10g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 滋肾养阴。主治慢性淋巴细胞白血血病放疗后气阴亏虚。

〔加减应用〕 恶心欲呕者，加竹茹、姜半夏、砂仁；胸腹胀痛者，加广木香、香附、郁金；大便秘结者，加大黄（后下）。

2. 慢性淋巴细胞白血血病化疗后专方

癌复康方加减（潘敏求经验方）

【组成与用法】党参 15g，白术 10g，茯苓 12g，陈皮 10g，黄芪 15g，枸杞子 12g，当归 10g，木香 10g，补骨脂 15g，肉苁蓉 12g，仙灵脾 15g，谷芽 15g，麦芽 15g，薏苡仁 20g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

【功能主治】健脾益气，补肾。主治慢性淋巴细胞白血病化疗后脾肾两虚。

【加减应用】失眠虚烦者，加酸枣仁、栀子；腹胀者，加莱菔子、香附、柴胡；气虚自汗者，加西洋参（蒸兑）、五味子、黄芪；潮热盗汗口干者，加地骨皮、银柴胡、鳖甲（先煎）、白芍、麦冬。

【专病成药】

见“慢性粒细胞性白血病。”

【专病单方】

1. 蒲葵子 用法：每取 50g，配红枣 6 枚，水煎服，20 天为 1 个疗程。功用：化瘀解毒。主治：白血病。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 淫羊藿 用法：每取 30g，配巴戟天 20g，鸡血藤 30g，白酒 1000ml，冰糖 60g。以上原料酒中浸泡 7 天后服用，1 次 15~30ml，若考虑药物有过热之忧，可煮银耳粥每天食用。功用：补肾养血。主治：白血病，慢淋放、化疗白细胞下降者。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 墓头回 用法：每取 15g，配羊蹄根 30g，水煎服。功用：清热解毒。主治：白血病。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 何首乌 用法：每取 15g，配白芷 9g，水煎，代茶饮。功用：养血解毒。主治：白血病，慢淋肾衰者。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 白花蛇舌草 用法：每取 60g，配狗舌草 30g，羊蹄根（牛舌草）30g，水煎服。功用：清热解毒。主治：白血病。（《中华肿瘤治疗大成》）

恶性淋巴瘤

恶性淋巴瘤是一类起源于淋巴网状系统的恶性肿瘤，分为非霍奇金淋巴瘤和霍奇金淋巴瘤两类。恶性淋巴瘤的发病与免疫功能低下、病毒感染、化学致癌物、放射线、染色体异常以及使用硫唑嘌呤、苯妥因钠等药物有关。

本病相当于中医病名国家标准的恶核，亦属于中医学的石疽、恶核、失荣、痰核、疵瘤、阴疽等范畴。中医认为本病的主要病因病机为脏腑虚弱、气机郁结、水湿运化失司，导致气滞血瘀，痰湿内生，痰、瘀、毒互结，气血阴阳受损而产生本病。

【辨证用方】

本病辨证应注意气、阴、阳之虚和痰、瘀、毒之实，分别予以不同的治法。

1. 寒痰凝结证

主症：初起颈项耳下肿核，不痛不痒，皮色不变，坚硬如石，不伴发热，或形寒畏冷，面色少华，舌质淡红，苔白，脉弦滑。

治法：祛寒散结。

消瘰汤加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕土贝母 10g，白芥子 10g，陈皮 10g，夏枯草 15g，山慈菇 15g，海藻 15g，皂角刺 10g，生南星（先煎）10g，生半夏（先煎）10g，玄参 10g，海藻 15g，生牡蛎（先煎）30g。水煎服。

〔功能主治〕化痰散结。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕神疲乏力者，加黄芪、党参；腰酸腿软者，加杜仲、牛膝；纳食不佳者，加砂仁、麦芽、鸡内金。

2. 气郁痰结证

主症：颈、腋下、鼠蹊部多处痰核累累，腹中结块，伴胸闷胁胀，腹痛不适，不思饮食，形体消瘦，舌质淡红，苔白或黄，脉弦滑。

治法：理气化痰散结。

逍遥散合二陈汤加减（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕柴胡 10g，川芎 6g，白术 10g，茯苓 10g，当归 10g，赤芍 10g，陈皮 10g，法半夏 10g，香附 15g，玄参 10g，生牡蛎（先煎）30g，山慈菇 15g，夏枯草 15g，廔虫 5g，白花蛇舌草 30g，蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕舒肝解郁，化痰散结。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕午后低热者，加青蒿、知母、银柴胡；两胁胀痛甚者，加川楝子、郁金、青皮；痰多者，加白芥子、南星、姜半夏；胁下积块明显者，加服大黄廔虫丸。

3. 血燥毒热证

主症：颈、项、腋下痰核，或见胁下积块，发热不退，口干舌燥，心烦不安，尿黄，大便干结，肌肤红斑，舌质红，苔黄，脉细数。

治法：养血清热。

四物汤合犀角地黄汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕生地 15g，当归 12g，白芍 12g，川芎 10g，水牛角（先煎）30g，丹皮 12g，赤芍 12g，生石膏（先煎）30g，紫草 10g，旱莲草 15g，女贞子 15g，廔虫 10g，桃仁 10g，大黄（后下）10g，白花蛇舌草 30g，蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕养血润燥，凉血解毒。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕皮肤瘙痒者，加荆芥、地肤子、苦参；腹痛便血者，加仙鹤草、茜草炭、地榆；神昏谵语者，加服安宫牛黄丸。

4. 气血亏虚证

主症：多处痰核未消，眩晕乏力，心悸少寐，神疲懒言，

面白无华，舌质淡，苔白，脉细弱。

治法：益气养血。

归脾汤加味（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕黄芪 15g，党参 15g，白术 10g，茯苓 10g，当归 12g，白芍 12g，熟地 10g，远志 6g，酸枣仁 15g，广木香 10g，夏枯草 15g，山慈菇 15g，海藻 15g，半枝莲 20g，蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕益气养血，软坚散结。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕食少便溏者，加山药、薏苡仁、神曲；盗汗者，加五味子、煅牡蛎（先煎）。

5. 肝肾阴虚证

主症：午后潮热，口干咽燥，腰酸腿软，头晕眼花，手足心热，夜间盗汗，多处淋巴结肿大，脉细弦或沉细略数，舌质红，薄白苔。

治法：滋补肝肾，解毒散结。

杞菊地黄汤加减（潘敏求经验方）。

〔组成与用法〕熟地 10g，山茱萸 10g，山药 12g，丹皮 12g，茯苓 12g，泽泻 12g，当归 10g，枸杞子 15g，菊花 15g，牛膝 12g，地骨皮 15g，夏枯草 15g，生牡蛎（先煎）20g，白花蛇舌草 30g，蚤休 20g，甘草 5g。

〔功能主治〕滋补肝肾，解毒散结。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕盗汗者，加黄芪、五味子；心悸失眠者，加酸枣仁、柏子仁、夜交藤；纳食减少者，加麦芽、陈皮；大便干结者，加肉苁蓉、火麻仁；久病阴损及阳，症见畏寒肢冷、阳痿、小便清长、舌质淡、脉沉细无力者，加制附片（先煎）、肉桂、补骨脂、巴戟天；口干咽燥者，加黄柏、知母。（中国肿瘤，1995，5）

【辨病用方】

本病辨病治疗，主要在辨证治疗基础上加入常用清热解毒

抗癌中草药，如海藻、昆布、夏枯草、山慈菇、露蜂房、广豆根、土茯苓、土贝母等。

1. 化痰解毒方（《抗癌良方》）

〔组成与用法〕 山豆根 30g，土茯苓 30g，连翘 30g，牛蒡根 15g，柴胡 9g，土贝母 12g，露蜂房 30g，板蓝根 30g，天花粉 15g，玄参 30g，鬼针草 30g，地锦草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 化痰解毒。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕 气滞者，加川楝子、香橼皮；痰多者，加白芥子、白僵蚕、胆南星、法半夏；虚热者，加胡黄连。

2. 活血散积方（《肿瘤的辨证施治》）

〔组成与用法〕 天葵子 12g，莪术（先煎）24g，水红花子 30g，蚤休 12g，煅牡蛎（先煎）30g，炙甘草 6g，煅瓦楞 30g，土茯苓 24g。水煎服。

〔功能主治〕 活血散结。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕 神疲乏力者，加黄芪、党参；两胁胀痛甚者，加川楝子、郁金、青皮。

3. 解毒散结方（《抗癌中草药制剂》）

〔组成与用法〕 望江南 30g，白花蛇舌草 30g，夏枯草 30g，海藻 30g，牡蛎（先煎）30g，野菊花 30g，白茅根 30g，丹参 30g，全瓜蒌 30g，昆布 15g，怀山药 15g，桃仁 9g，南沙参 12g，留行子 12g，露蜂房 12g，小金片 10 片，天龙片 15 片。水煎服。小金片分 2 次服，天龙片分 3 次，随汤药吞服。

〔功能主治〕 解毒散结。

〔加减应用〕 纳食减少者，加麦芽、陈皮；气虚乏力者，加生黄芪、党参。

4. 二皮参术方（中国中西医结合杂志，1982，1）

〔组成与用法〕 ①青皮 9g，陈皮 9g，象贝母 9g，茯苓 24g，姜半夏 12g，当归 12g，枸橘李 12g，全瓜蒌 12g，炙甘草 6g，水红花子 24g，黄药子 24g，苦桔梗 6g，天龙 6g，八

月札 12g, 厚朴 9g。②炒白术 24g, 炒党参 12g, 生黄芪 24g, 炒扁豆 12g, 天葵子 24g, 仙灵脾 12g, 香附 9g, 橘皮叶 9g, 天龙 6g, 夏枯草 12g, 枸橘李 24g, 青皮 12g, 柴胡 6g, 制南星 12g, 昆布 24g。水煎服。两方辨证选用。

〔功能主治〕 健脾理气, 化痰散结。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕 临床运用时并用归脾丸、六味地黄丸、小金丹及环磷酰胺等。加入活血解毒之品, 如川芎、丹参、当归、三棱、莪术、地龙等。

5. 消积方 (上海中医药杂志, 1984, 4)

〔组成与用法〕 生牡蛎 (先煎) 30g, 土贝母 9g, 玄参 9g, 夏枯草 15g, 海藻 15g, 山慈菇 9g, 首乌藤 30g。水煎服。另以艾绒包裹麝香 0.1g, 灸天井、光明、小海穴位, 每次取一穴。

〔功能主治〕 化痰散结。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕 热痰蕴结者, 加白花蛇舌草、蛇莓、蛇六谷 (先煎 1 小时)、竹沥、半夏; 寒痰凝结者, 加半夏、陈皮、茯苓、甘草、桂枝、煅牡蛎 (先煎)、白花蛇舌草、白芥子; 痰多者, 加陈胆星、小金丹; 痰湿凝结者, 加半夏、陈皮、茯苓、白花蛇舌草、天葵子; 气虚者, 加孩儿茶、白术、茯苓、甘草; 热不退者, 加鳖血拌柴胡、白薇; 寒痰内凝、阴虚证者, 加熟地、肉桂、甘草、麻黄、炮姜、鹿角胶 (烊化)、白芥子、半夏、陈皮。

〔临床报道〕 治疗 12 例, 生存 10 年以上 2 例。

6. 四物散结方 (北京中医, 1985, 5)

〔组成与用法〕 当归 10g, 川芎 10g, 赤芍 10g, 生地 10g, 玄参 15g, 山慈菇 15g, 黄药子 15g, 海藻 15g, 昆布 15g, 夏枯草 15g, 牡蛎 (先煎) 30g, 蚤休 30g。水煎服。

〔功能主治〕 养血散结。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕 神疲乏力者, 加黄芪、党参; 纳食不佳者,

加砂仁、麦芽、鸡内金。

[临床报道] 单纯中药治疗 7 例，肿块消失 3 例，基本消失 1 例，缩小 1/2 以上者 2 例，肿块保持不变 1 例。

7. 二贝汤（福建中医药，1987，2）

[组成与用法] 川贝母 10g，炒丹皮 10g，浙贝母 10g，丹参 10g，山慈菇 10g，炮甲珠 10g，海藻 10g，昆布 10g，郁金 10g，金银花 10g，忍冬藤 10g，小蓟 10g，桃仁 6g，杏仁 6g，皂角刺 6g，桔梗 5g，酒玄参 12g，夏枯草 15g。水煎服。另以三七末 3g，分 2 次冲服。

[功能主治] 化痰散结。主治恶性淋巴瘤。

[加减应用] 若加鹿角（生）20g，可使功效增强。临床运用时，常加白花蛇舌草、蚤休、半枝莲等解毒抗癌之品。

8. 散结通络方（河南中医药学刊，1996，4）

[组成与用法] 海藻 10g，昆布 10g，制没药 10g，制乳香 10g，贝母 10g，瓜蒌 10g，当归 10g，陈皮 10g，大青叶 10g，蒲公英 10g。水煎服。

[功能主治] 化痰散结通络，行气活血解毒。主治恶性淋巴瘤。

[加减应用] 气血两亏者，加党参、黄芪、阿胶、白芍；发热者，加夏枯草、白花蛇舌草、柴胡、黄芩；腹痛者，加白芍、厚朴、枳实；兼皮肤损害者，可加白鲜皮、苦参、金银花、土茯苓；发于头颈部者，可加入桔梗、升麻；发于喉部者，可加入桔梗、玄参、射干。

[临床报道] 用此方治疗 31 例恶性淋巴瘤患者，完全缓解 5 例，部分缓解 14 例，无效 12 例。

9. 增效消瘤汤（江苏中医，1998，3）

[组成与用法] 川芎 10g，赤芍 10g，三棱 10g，莪术 10g，红花 6g，三七 5g，枳实 10g，郁金 10g，陈皮 6g，鳖甲（先煎）30g，龟甲（先煎）30g，牡蛎（先煎）30g，海浮石 30g，

昆布 10g, 海藻 10g。水煎服。

[功能主治] 活血化瘀, 软坚散结。主治恶性淋巴瘤。

[加减应用] 神疲乏力、舌淡、脉弱者, 加党参、黄芪、白芍、阿胶; 纳少、呕吐、腹胀、苔腻、脉滑者, 加藿香、佩兰、姜夏、白术。

[临床报道] 配合化疗治疗 23 例, 总有效率为 73.9%。

10. 黄药枯草方 (中国中医药信息杂志, 2003, 1)

[组成与用法] 夏枯草 10g, 黄药子 10g, 山慈菇 12g, 浙贝母 10g, 连翘 15g, 莪术 10g, 炒王不留行 10g, 望江南 10g。水煎服。

[功能主治] 软坚散结、化痰祛瘀。用于恶性淋巴瘤化疗休息期间。

[加减应用] 气虚者, 加太子参、黄芪、白术; 血虚者, 加当归、熟地黄、阿胶、女贞子、白芍; 肝肾不足者, 加补骨脂、仙茅、淫羊藿、山萸肉。

11. 紫牛散 (辽宁中医杂志, 2003, 2)

[组成与用法] 牛黄、朱砂各 1g, 山慈菇、五倍子各 20g, 雄黄、乳香、没药、全蝎各 15g, 蜈蚣 10g, 珍珠 15g, 鹿角霜 20g, 鳖甲 20g。研末, 1 次 3g, 1 日 3 次口服。

[功能主治] 清血解毒, 祛风破瘀, 化痰散结。主治恶性淋巴瘤。

[临床报道] 伍用小剂量化疗, 治疗恶性淋巴瘤 105 例, 总有效率为 91.4%。

12. 参贝方 (湖南中医杂志, 1989, 3)

[组成与用法] 党参 25g, 土贝母 25g, 黄芪 30g, 白术 10g, 茯苓 10g, 柴胡 10g, 郁金 10g, 丹皮 10g, 赤芍 10g, 煅牡蛎 (先煎) 15g, 炙甘草 10g。水煎服。

[功能主治] 益气散结。主治恶性淋巴瘤。

[加减应用] 气滞者, 加川楝子、香橼皮; 神疲乏力者,

加黄芪、党参；腰酸腿软者，加杜仲、牛膝。

13. 扶正散结方（中国中西医结合杂志，1997，6）

〔组成与用法〕 生黄芪 30g，丹参 30g，黄药子 15g，生牡蛎（先煎）20g，浙贝母 20g，壁虎 12g，猫爪草 20g。水煎服。

〔功能主治〕 扶正固本，化痰行瘀，解毒散结。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕 瘀血者，加川芎、三棱 12g，莪术、郁金；痰湿明显者，加陈皮、半夏、海藻、昆布、猪苓；热毒较重者，加土茯苓、连翘、玄参、败酱草；气血虚者，加党参、当归、枸杞子、黄精。

〔临床报道〕 该方联合化疗治疗 55 例，1、3、5 年生存率分别为 85.7%、54.5%、29.5%，中位生存期 554 天。

14. 益气消积方（湖南中医杂志，1989，3）

〔组成与用法〕 党参 25g，土贝母 30g，黄芪 30g，白术 10g，茯苓 10g，郁金 10g，赤芍 10g，当归 10g，煅牡蛎（先煎）15g，海藻 15g，昆布 15g，荔枝 15g。水煎服。

〔功能主治〕 益气消积。主治恶性淋巴瘤。

〔加减应用〕 食少便溏者，加山药、薏苡仁、神曲；气虚多汗者，加防风，重用生黄芪。

【对症用方】

恶性淋巴瘤的对症用方，主要根据患者主要症状（如发热、盗汗、疼痛等）、并区分手术或放疗、化疗等不同治疗进行相应选方用药。

1. 恶性淋巴瘤手术后用方

香砂六君子汤加减（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕 太子参 15g，白术 10g，陈皮 10g，法半夏 10g，茯苓皮 15g，砂仁 5g，黄芪 15g，鸡内金 5g，广木香 10g，枳壳 10g，山楂 10g，枸杞子 10g，女贞子 12g，夏枯草

20g, 白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气健脾。主治恶性淋巴瘤手术后脾虚气滞者。

〔加减应用〕 大便干结者, 加瓜蒌仁、杏仁、麻子仁; 口腔溃疡者, 加儿茶、蒲公英, 去天花粉、沙参; 贫血者, 加阿胶 (烔化)。

2. 恶性淋巴瘤放疗后治疗专方

扶正散结方 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 党参 15g, 黄芪 15g, 沙参 15g, 麦冬 20g, 石斛 12g, 芦根 15g, 白茅根 15g, 天花粉 20g, 丹参 12g, 知母 12g, 夏枯草 15g, 茯苓 10g, 白术 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 解毒散结。主治恶性淋巴瘤放疗后气阴两虚者。

〔加减应用〕 恶心呕吐者, 加竹茹、代赭石 (先煎); 食纳减少者, 加谷芽、鸡内金、麦芽; 潮热盗汗者, 加煅牡蛎 (先煎)、五味子。

3. 恶性淋巴瘤化疗后专方

癌复康方加减 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 白参 10g, 白术 10g, 茯苓 15g, 当归 10g, 陈皮 10g, 法半夏 12g, 砂仁 6g, 广木香 6g, 女贞子 10g, 旱莲草 15g, 枸杞子 10g, 菟丝子 10g, 仙灵脾 10g, 黄芪 15g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益肾。主治淋巴瘤化疗后脾肾两亏、气血不足者。

〔加减应用〕 腹泻者, 加神曲、薏苡仁; 腹胀喜按者, 加枳壳、莱菔子、鸡内金; 胃脘不适, 反酸, 吐苦水, 嘈杂者, 加黄连; 气虚多汗者, 加防风, 重用生黄芪。

4. 恶性淋巴瘤伴盗汗专方

桂枝龙牡方 (浙江中医杂志, 1985, 1)

〔组成与用法〕桂枝 9g, 白芍 9g, 甘草 6g, 龙骨 (先煎) 18g, 牡蛎 (先煎) 18g, 生姜 2 片, 大枣 5 枚。水煎服。

〔功能主治〕调营敛汗。主治恶性淋巴瘤伴盗汗者。

〔加减应用〕失眠虚烦者, 加酸枣仁、栀子; 心烦失眠者, 加远志、酸枣仁、五味子、生地。

5. 恶性淋巴瘤高热方

清热解毒方 (辽宁中医杂志, 1986, 4)

〔组成与用法〕紫花地丁 30g, 金银花 30g, 连翘 30g, 板蓝根 30g, 大青叶 30g, 银柴胡 30g, 党参 30g, 黄芪 30g, 玄参 15g, 天花粉 15g, 野菊花 15g, 丹皮 15g, 白花蛇舌草 15g, 白英 15g, 石见穿 15g, 南沙参 15g, 北沙参 15g, 紫草根 15g, 鱼腥草 15g, 升麻 15g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒。主治恶性淋巴瘤高热者。

〔加减应用〕口腔溃疡者, 加儿茶、蒲公英, 去天花粉、沙参; 食少纳呆者, 加砂仁、神曲、鸡内金。

6. 腹膜后淋巴肉瘤伴腹痛方

益气活血方 (吉林中医药, 1988, 2)

〔组成与用法〕党参 25g, 黄芪 10g, 白术 10g, 炙甘草 10g, 当归 10g, 陈皮 10g, 神曲 10g, 川芎 10g, 栀子 10g, 桃仁 10g, 白芷 10g, 赤茯苓 10g, 滑石 10g, 升麻 5g, 柴胡 5g, 苍术 15g, 香附 15g, 丹参 15g。水煎服。

〔功能主治〕益气活血。主治腹膜后淋巴肉瘤伴腹痛者。

〔加减应用〕疼痛甚者, 加玄胡、全蝎; 食少便溏者, 加山药、薏苡仁、神曲; 食纳减少者, 加谷芽、鸡内金、麦芽。

【专病成药】

1. 小金丹 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕五灵脂、制草乌、地龙、木鳖、乳香、没药、当归身、麝香、墨炭等。

〔功能主治〕散结消肿, 化瘀止痛。主治恶性淋巴瘤。(深

圳中西医结合杂志, 2003, 12)

[用法用量] 每丸 0.5g, 1 次 2~5 丸, 1 日 2 次。1 个月为 1 个疗程。

2. 消核膏 (《实用中西医肿瘤内科治疗手册》)

[处方组成] 马钱子、玄参、木鳖子、巴豆、蜂房、苦杏仁、五倍子等。

[功能主治] 消肿解毒、化痰散结。主治恶性淋巴瘤中医辨证属痰凝化毒, 毒聚成块者。

[用法用量] 本药为硬膏剂, 每张重 3.125g、6.25g、9.375g。按肿块大小, 选用不同重量之膏药, 温化摊平贴敷, 3~5 日换药 1 次。

3. 复方斑蝥胶囊 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

[处方组成] 斑蝥、刺五加、莪术、熊胆粉、人参、三棱、山茱萸、甘草、黄芪、半枝莲、女贞子。

[功能主治] 破血消瘀, 攻毒蚀疮。主治恶性淋巴瘤。

[用法用量] 口服, 1 次 3 粒, 1 日 2 次。

4. 羟基喜树碱针 (《中华人民共和国国药标准》)

[处方组成] 植物喜树中提取得到的微量天然生物碱。

[功能主治] 有显著的抗癌活性, 对耐药肿瘤有治疗作用。主治难治性恶性淋巴瘤。(白血病·淋巴瘤, 2005, 2)

[用法用量] 静脉注射, 5mg/日, 用生理盐水 20ml 稀释后, 缓慢注射 (或遵医嘱), 60mg 为 1 个疗程。肝动脉给药, 用 5mg 加生理盐水 10ml 灌注, 1 日 1 次, 15~30 天为 1 个疗程。

【专病单方】

1. 天冬 用法: 每取 250g, 配白花蛇舌草 250g, 水煎当茶饮。功用: 清热解毒。主治: 恶性淋巴瘤。(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 白花蛇舌草 用法: 每取 90g, 配半枝莲 90g 水煎, 1

日1剂，分早、晚2次服。功用：清热解毒。主治：大网膜恶性淋巴瘤。（《抗癌本草》）

3. 玄参 用法：每取90g，配煅牡蛎90g、贝母90g。上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重9g，1次1丸，1日2次。功用：清热解毒。主治：恶性淋巴瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 半枝莲 用法：每取120g，配蒲公英30g，煎水当茶饮，1日1剂，病情减轻后剂量可减半。功用：清热解毒。主治：纵隔淋巴肉瘤邪热内蕴者。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 八角莲 用法：每取30~60g，黄酒60ml。水煎，1日1剂，分早、晚2次温服。功用：清热解毒。主治：恶性淋巴瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 了哥王根 用法：每取30g，久煎4小时去毒。1日1剂，分早、晚2次服。功用：清热解毒。主治：恶性淋巴瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 蒲公英 用法：每取50g，配半枝莲200g、半边莲50g、泽漆50g水煎，1日1剂，分3~4次服。功用：清热解毒。主治：恶性淋巴瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

8. 白花蛇舌草 用法：每取250g，配龙葵120g、猪殃殃60g，水煎服。功用：清热解毒。主治：恶性淋巴瘤。（《肿瘤防治》）

多发性骨髓瘤

多发性骨髓瘤是浆细胞（或称骨髓瘤细胞）异常增生的恶性肿瘤，多发性骨髓瘤的病因尚不清楚，可能与暴露于某些化学物质、电离辐射、病毒、家族易感性有关。

本病相当于中医学的骨疽、骨痹、骨蚀等范畴。中医认为本病的主要病因病机为脏腑虚弱，外感寒热毒邪，留驻于骨节，伤筋络，蚀骨髓，导致气滞血瘀、骨骼阻塞、骨骼筋脉失

于濡养而产生本病。本病主要与肝、肾、脾相关。

【辨证用方】

中医认为本病属本虚标实证，主要以血虚、阴阳两虚、肾虚等虚证为本；毒犯骨髓出现气滞血瘀、痰阻、血热、毒邪积聚等实证为标。治疗以补虚治本为主，补肾健脾、养血填精、活血化瘀、清热解毒、化痰散结、散寒祛邪为治疗方法，以此分型证治，以达祛邪扶正之目的。

1. 寒凝毒聚证

主症：周身骨痛，得温痛减，或见局部肿块，舌淡红，苔白，脉沉迟。

治法：散寒化瘀解毒。

白鹿止痛汤加味（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕熟地 15g，鹿角胶（烊化）10g，炮姜炭 5g，桂枝 10g，炙麻黄 10g，白芥子 10g，当归 10g，白芍 10g，陈皮 10g，虻虫 10g，穿山甲（先煎）15g，全蝎 6g，蜈蚣 2 条，生牡蛎（先煎）30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕温经散寒，祛瘀止痛。主治多发性骨髓瘤

〔加减应用〕头痛者，加细辛、川芎、白芷；肢体疼痛者，加牛膝、黄芪。

2. 热毒邪结证

主症：发热，全身骨痛或局部肿块，口干，尿黄，大便干结，舌红，苔黄干，脉数。

治法：清热解毒化瘀。

清瘟败毒饮加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕生地 15g，黄连 6g，黄芩 20g，生石膏（先煎）30g，丹皮 12g，知母 12g，竹叶 10g，赤芍 10g，金银花 15g，紫花地丁 15g，蒲公英 30g，蚤休 30g，白花蛇舌草 30g，石见穿 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕清热解毒，化瘀止痛。主治多发性骨髓瘤。

〔加减应用〕 若高热、神昏者，加水牛角、玄参；呕吐者，加竹茹、陈皮；抽搐者，加全蝎、僵蚕、白附子、钩藤。

3. 血虚精亏证

主症：全身疼痛或伴有肿块，头昏乏力，动则喘促，舌淡，苔薄白，脉虚弱无力。

治法：养血生精散结。

建中汤加味（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 黄芪 15g，党参 10g，白术 10g，茯苓 10g，法半夏 10g，当归 10g，熟地 10g，川芎 10g，麦冬 12g，附子 10g，桂枝 10g，昆布 12g，海藻 12g，夏枯草 30g，生牡蛎（先煎）20g。水煎服。

〔功能主治〕 补气益血，散结止痛。主治多发性骨髓瘤。

〔加减应用〕 心悸失眠者，加五味子、枣仁；纳少者，加砂仁、鸡内金、麦芽。

4. 脾肾两虚证

主症：全身骨痛，得温则舒，或局部肿块，腰膝酸软，全身浮肿，下肢重着，尿少，面色晦暗，舌质淡，苔薄，脉沉细。

治法：健脾益肾。

（1）实脾饮加味（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 茯苓 10g，白术 10g，木瓜 15g，广木香 15g，大腹皮 20g，厚朴 10g，香附 10g，附子 10g，肉桂 5g，干姜 5g，黄芪 15g，泽泻 15g，车前子（布包）10g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 温肾助阳，健脾利水。主治多发性骨髓瘤。

〔加减应用〕 腰痛者，加牛膝、杜仲；恶心呕吐者，加砂仁、法半夏、大黄；心悸者，加西洋参、麦冬、五味子。

（2）参芪附桂汤（《中医内科学》）

〔组成与用法〕 党参 30g，黄芪 30g，熟附子 12g，肉桂

6g, 白术 15g, 茯苓 20g, 陈皮 6g, 熟地 30g, 山萸肉 12g, 廋虫 6g, 徐长卿 30g, 牛膝 12g。水煎服。

〔功能主治〕 补脾温肾, 通络消肿。主治多发性骨髓瘤。

〔加减应用〕 苔腻不化、食欲不佳可加制苍术、扁豆、鸡内金; 大便秘结难下, 可加瓜蒌仁、炙大黄。

【辨病用方】

临床常用辨病治疗的抗癌中草药: 徐长卿、石见穿、半枝莲、露蜂房、紫杉茎皮、喜树根、败酱草根、蜈蚣、蛇莓等。根据西医理论骨髓瘤分泌大量的凝溶蛋白在肾小管沉积, 加之高 γ -球蛋白血症, 使血黏度增加, 此与中医理论“瘀证”相符, 故患者可见手足发麻, 视力障碍, 甚则昏厥征象, 因此在辨病治疗时还应注意运用大量活血化瘀的药物。

1. 多发性骨髓瘤缓解期用方

(1) 喜树鹤草方 (中西医结合杂志, 1987, 2)

〔组成与用法〕 仙鹤草 60~90g, 白花蛇舌草 15~30g, 半边莲 15~30g, 半枝莲 15~30g, 喜树根 10g, 败酱草根 10g, 蛇莓 10g, 白毛藤 10g, 大青叶 10g, 三棱 10g, 莪术 10g, 赤芍 10g, 红花 10g, 生薏苡仁 10~12g, 蛇六谷 (先煎 3 小时) 60g。水煎服。

〔功能主治〕 活血解毒。主治多发性骨髓瘤。

〔加减应用〕 阴虚阳亢、湿热内蕴者, 加黄芩、黄柏、知母、丹皮、生地、山栀子、玉竹; 恶心、呕吐、纳呆者, 加陈皮、姜半夏、竹茹、鸡内金、山楂; 气血两虚者, 加黄芪、党参、当归、生地、熟地、黄精。

(2) 补肾通络汤 (天津中医, 1989, 2)

〔组成与用法〕 党参 15~30g, 五味子 10g, 麦冬 15g, 何首乌 15g, 桑寄生 15g, 女贞子 15g, 牛膝 15~20g, 旱莲草 15~20g, 丹参 15~20g, 鸡血藤 15~20g, 杜仲 15g, 川续断 15g, 天麻 15g, 全蝎 6g, 蜈蚣 2 条, 白芍 15~25g, 甘草 6~

30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气补肾，活血通络。主治多发性骨髓瘤。

〔加减应用〕 肢体疼痛者，加牛膝、桂枝、黄芪；食欲不振者，加谷芽、麦芽、神曲。

(3) 祛湿通络方（《段凤舞肿瘤积验方》）

〔组成与用法〕 茅莓 30g，徐长卿 30g，生半夏（先煎）30g，虎杖 30g，丹参 30g，生地 15g，甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 祛湿通络。主治多发性骨髓瘤。

〔加减应用〕 胸腹满闷、恶心呕吐者，加土茯苓、茵陈、半枝莲、半边莲、薏苡仁；伤食者，加孩儿茶、山楂、麦芽、神曲；疲乏，气促者，加黄芪、党参、红枣、黄精；面色萎黄、唇舌淡红者，加鸡血藤、熟地、何首乌；口渴，津液亏损者，加生地、麦冬、天冬、沙参、天花粉；疼痛者，加延胡索、川楝子、云南白药（分冲）。

(4) 补通方（新疆中医药，1990，4）

〔组成与用法〕 黄芪 30g，西洋参 9g，白术 9g，生、熟地各 9g，麦冬 6g，厚朴 6g，枳实 9g，大黄（后下）6g，黄芩 6g，陈皮 9g，柴胡 9g，升麻 6g，炙甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 气阴双补为主，通腑泄热为辅。主治多发性骨髓瘤。

〔加减应用〕 热甚便秘者，酌加芒硝；口燥渴、咽干、善饮者，去厚朴，酌加葛根、芦根等；午后潮热、盗汗或长期低热者，去柴胡、厚朴，加银柴胡、秦艽、鳖甲等；兼食纳不振、恶心呕吐较重者，去生、熟地，减参芪用量，酌加半夏、竹茹、砂仁等，并需以伏龙肝煎水，澄清后再煎诸药；并发感染者，当根据不同部位酌加清热解毒的不同药物，如半枝莲、半边莲、野百合等。

〔临床报道〕 王光月配合化疗治疗 34 例患者，除 5 例因病程较长，肿瘤已广泛转移治疗无效外，其余患者均顺利完成了

4~6 个疗程的化疗。

(5) 补肾化瘀汤 (浙江中西医结合杂志, 1996, 1)

[组成与用法] 山慈菇 15g, 川断 15g, 狗脊 15g, 徐长卿 15g, 杜仲 12g, 威灵仙 12g, 补骨脂 12g, 川牛膝 12g, 鹿角胶 (烱兑) 12g, 熟地 12g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 三七 5g。水煎服。

[功能主治] 补肾化瘀解毒。主治多发性骨髓瘤。

[加减应用] 化疗期间纳呆, 加陈皮、炒谷芽、炒麦芽, 减熟地、鹿角胶。

[临床报道] 配合化疗治疗 21 例, 完全缓解 4 例, 部分缓解 16 例, 无效 1 例。

2. 多发性骨髓瘤复发期用方

(1) 阳和汤加减 (时珍国医国药, 2000, 6)

[组成与用法] 熟地 40g, 阿胶 (烱化) 15g, 鹿角胶 (烱化) 15g, 当归 15g, 党参 50g, 黄芪 60g, 白芥子 9g, 炙麻黄 5g, 路路通 10g, 炮姜 12g, 制附子 (先煎) 25g, 丹参 12g, 枸杞子 18g, 桑寄生 12g, 川断 12g, 延胡索 12g, 白花蛇舌草 30g, 半枝莲 30g, 半边莲 30g。水煎服。

[功能主治] 益气养血, 温阳补精。主治多发性骨髓瘤。

(2) 补肾活血通络方 (辽宁中医杂志, 1986, 1)

[组成与用法] 丹参 15g, 赤、白芍各 15g, 陈胆星 5g, 鸡矢藤 30g, 炒桑枝 12g, 制狗脊 15g, 炒川断 15g, 补骨脂 9g, 石斛 9g, 白英 15g, 桃仁 9g, 香谷芽 12g, 白花蛇舌草 30g, 徐长卿 15g。1 日 1 剂, 水煎服。

[功能主治] 清瘀热, 通络脉, 佐以养肝益肾。治多发性骨髓瘤证属瘀热阻络者, 症见骨痛抽掣、剧烈难忍、不能行动。

[加减应用] 若疼痛明显者, 加用蛇果草、制乳香、制没药, 延胡索、地龙以化瘀通络止痛; 若邪热盛伤及阴津者, 加

用连翘、石斛。

(3) 益肾解毒方 (中医药学报, 1998, 6)

〔组成与用法〕 太子参、猪苓、鸡血藤各 15g, 黄芪、薏苡仁各 20g, 生地黄 12g, 白术、补骨脂各 10g, 白花蛇舌草、仙鹤草各 30g, 桃仁、红花、炙甘草各 5g。水煎服。

〔功能主治〕 益肾健脾、解毒化瘀。主治多发性骨髓瘤。

〔加减应用〕 肝肾阴虚明显者, 去补骨脂, 加当归、枸杞子、黄精等; 气虚甚者, 重用黄芪; 恶心呕吐、纳呆者, 加焦山楂、炙鸡内金、佛手等; 热毒炽盛者, 加用黄芩、连翘、牡丹皮。

〔临床报道〕 江苏省中医院董筠应用本方配合化疗治疗多发性骨髓瘤 9 例, 骨痛减轻或消失 7 例。

【对症用方】

多发性骨髓瘤的对症用方应结合放疗、化疗的不同特点及不良反应选用相应的方药。

1. 多发性骨髓瘤放疗后治疗方

益气养阴方 (黎月恒经验方)

〔组成与用法〕 党参 12g, 茯苓 12g, 白术 10g, 当归 10g, 生地 10g, 麦冬 12g, 天冬 12g, 沙参 10g, 玄参 10g, 玉竹 10g, 金银花 15g, 山茱萸 10g, 肉苁蓉 10g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 20g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 健脾益肾, 清热解毒。主治多发性骨髓瘤。

〔加减应用〕 发热者, 加黄芩、青蒿; 食欲不振者, 加炒谷芽、炒麦芽、神曲; 口干、舌绛明显者, 加石斛、天花粉。

2. 多发性骨髓瘤化疗后治疗方

癌复康方加减 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 黄芪 15g, 党参 15g, 白术 12g, 茯苓 12g, 甘草 5g, 熟地 10g, 枸杞子 12g, 何首乌 12g, 黄精 10g, 女

贞子 15g, 沙参 10g, 麦冬 10g, 鸡血藤 20g, 芡实 12g, 怀山药 12g, 蚤休 30g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾, 益气养血。主治多发性骨髓瘤。

[加减应用] 恶心呕吐者, 加姜竹茹、代赭石 (先煎); 食欲不振者, 加神曲、麦芽、砂仁、鸡内金; 失眠者, 加酸枣仁、五味子; 贫血者, 加当归、紫河车。

3. 多发性骨髓瘤肾损害用方

蛇草枸杞汤 (天津中医学院第一附属医院血液科方)

[组成与用法] 黄芪 20g, 茯苓 10g, 白术 10g, 半夏 10g, 枸杞子 15g, 当归 10g, 败酱草 30g, 金银花 15g, 连翘 15g, 白花蛇舌草 30g, 丹参 15g。水煎服。

[功能主治] 健脾补肾, 化瘀解毒。主治多发性骨髓瘤肾损害。

[加减应用] 脾肾亏虚明显, 酌情加党参、女贞子、旱莲草、山药; 血虚证明显者, 加阿胶、何首乌; 热毒血癌证明显者, 加鸡血藤、蚤休、丹皮。

[临床报道] 配合化疗治疗多发性骨髓瘤肾损害 28 例, 总有效率为 89.28%。(中国中西医结合肾病杂志, 2002, 7)

4. 多发性骨髓瘤疼痛用方

(1) 白附南星汤 (中国中医药信息杂志, 2003, 8)

[组成与用法] 制附子 10g, 炙全蝎 2g, 制南星 15g, 虻虫 6g, 露蜂房 10g, 制僵蚕 10g, 制蜈蚣 3 条, 续断 20g, 制川乌 6g, 草乌 6g, 延胡索 15g, 九香虫 6g, 川楝子 12g, 巴戟天 10g, 金毛狗脊 20g, 当归 10g。水煎服。

[功能主治] 补肾强骨, 化痰逐瘀, 祛邪解毒。主治多发性骨髓瘤骨损腰痛。

[加减应用] 服马前子胶囊, 1 次 0.3g, 1 日 2 次。

(2) 血竭酊 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 松香 15g, 乳香 15g, 没药 15g, 血竭 5g,

冰片 3g，或加蟾酥 0.5g。共为末，酒泡或醋调备用，涂抹痛处。

〔功能主治〕 活血止痛。主治多发性骨髓瘤疼痛。

(3) 麝虫酊 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 三棱 12g，麝虫 12g，天南星 12g，王不留行 12g，川乌 12g，草乌 12g，樟脑 3g，红花 10g，桃仁 10g。共研细末，醋调外敷痛处。

〔功能主治〕 温经通络止痛。主治多发性骨髓瘤疼痛。

(4) 干蛤蟆散 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 干蛤蟆 6g，雄黄 3g，姜黄 0.6g。共研为末，加酒捣如泥，外敷痛处。

〔功能主治〕 通络止痛。主治多发性骨髓瘤。

(5) 三王止痛膏 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 大黄 50g，马钱子 15g，全蝎 30g，干蟾皮 30g，蚤休 60g，山慈菇 60g，姜黄 50g，麝香 1g，冰片 10g，红花 40g，桃仁 50g，当归 50g，血竭 30g，莪术 50g，蜈蚣 30g，桂枝 60g，制乳、没各 30g，细辛 15g，各为细末和匀。取酌量药粉调入凡士林内，摊于纱布上，贴敷肿块处，隔日一换。

〔功能主治〕 化瘀软坚，解毒止痛。主治多发性骨髓瘤疼痛。

〔临床报道〕 用该膏贴敷治疗各种疼痛，止痛总有效率为 93.3%，止痛平均持续时间 16.6 小时。

【专病成药】

1. 平消胶囊 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕 郁金、仙鹤草、五灵脂、白矾、硝石、干漆、枳壳、马钱子粉。

〔功能主治〕 活血化瘀，止痛散结，清热解毒，扶正祛邪。对肿瘤具有一定的缓解症状、缩小瘤体、抑制瘤体生长、提高

人体免疫力、延长患者生命的作用。主治骨肿瘤。

〔用法用量〕 口服，1日3次，1次4~8粒。60天为1个疗程。

2. 安多霖胶囊 (《国家基本医疗保险药品目录》2004)

〔处方组成〕 略。

〔功能与主治〕 益气补血，扶正解毒。主治气血两虚。适用于放、化疗引起的白细胞减少、免疫功能下降、食欲不振、神疲乏力、头晕气短等症。对肿瘤放射治疗中因辐射损伤造成的淋巴细胞微核率增高等有改善作用。可用于辐射损伤。

〔用法与用量〕 每粒0.32g，口服，1日3次，1次4粒。

【专病单方】

1. 紫杉茎皮 用法：每取紫杉茎皮1000g、黄酒2500ml，将紫杉茎皮放入黄酒中浸泡7天。口服，1次5~10ml，1日2次。功用：解毒抗癌。主治：多发性骨髓瘤。(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 白茅根 用法：每取30g，配地榆30g。均切碎，炒微黑色，共研细末和匀，1日15~24g，绢包水煎，空腹分早、晚2次温服。功用：凉血止血。主治：多发性骨髓瘤便血者。(《中华肿瘤治疗大成》)

3. 白花蛇舌草 用法：每取30g，加白糖30g水煎，1日1剂，分早、晚2次服。可常服。功用：清热解毒。主治：多发性骨髓瘤。(《中华肿瘤治疗大成》)

4. 花蕊石 用法：每取9g，配三七6g、血余炭3g。上药共研细末，白开水送服，分2次服。功用：化瘀止血。主治：多发性骨髓瘤有吐血、尿血、便血等出血症状者。(《中华肿瘤治疗大成》)

5. 仙鹤草 用法：每取60g，配白英25g、槟榔9g、甘草3g，水煎服。功用：凉血解毒。主治：多发性骨髓瘤。(《中华

肿瘤治疗大成》)

6. 半枝莲 用法：每取 200g，配山豆根 100g、露蜂房 30g、山慈菇 100g。上药共研细末，制成绿豆大丸剂，1 次服 15 丸，1 日 2~3 次，饭后服。功用：清热解毒化痰。主治：多发性骨髓瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

恶性骨肿瘤

骨肉瘤

骨肉瘤是一种高度恶性的骨肿瘤，起源于骨基质内，以产生骨样组织和不成熟的骨组织的恶性梭型细胞为特征的骨肿瘤，是常见的骨原发性恶性肿瘤，好发于四肢长骨。其发病年龄早，发展快，转移早，预后差。根据先前有无病损或放射治疗，骨肉瘤可分为原发性和继发性。儿童和青少年以原发为主，30岁以上继发性骨肉瘤相对多见。病因学研究显示，一些理化因素（如放射）、病毒及遗传因素（如染色体畸形、P₅₃、RB基因异常改变）等均与骨肉瘤的发生有密切关系。

本病相当于中医病名国家标准的骨瘤，亦属于中医骨疽、骨痹等范畴，中医认为其发病乃因先天禀赋不足、肾虚精亏、外感邪毒、内伤劳倦，导致骨髓空虚，毒邪留着、气血凝滞、经络受阻、伤筋蚀骨，日久结毒为瘤。

【辨证用方】

本病辨证应注意虚实。其虚以脾肾亏虚为主，其实多为寒凝、热蕴、瘀滞、湿聚、毒结。

1. 阴寒凝滞证

主症：患肢包块，皮色如常，不红不热，肢体酸楚疼痛，遇寒加重，得温痛减，小便清利，舌质淡，苔薄白，脉沉细弱。

治法：温经散寒。

白鹿止痛汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕熟地 30g，鹿角胶（烊化）10g，姜炭 5g，

炙麻黄 5g, 白芥子 10g, 桂枝 10g, 菟丝子 10g, 补骨脂 10g, 淫羊藿 10g, 蜈蚣 3 条, 全蝎粉 (吞服) 3g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 温阳散寒, 通络行滞。主治骨肉瘤疼痛。

〔加减应用〕 痛甚, 固定不移, 加制乳香、制没药、白花蛇舌草、莪术; 食纳减少者, 加谷芽、麦芽; 大便溏薄者, 加神曲、薏苡仁。

2. 毒瘀互结证

主症: 患肢包块, 肢体肿胀, 灼痛或刺痛, 皮色紫黯, 肢体行走或抬举不便, 发热, 口渴, 心烦, 大便干结, 舌质紫黯或有瘀斑, 苔黄, 脉弦涩。

治法: 化瘀解毒。

(1) 五神汤合复元活血汤加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 土茯苓 30g, 前仁 10g, 金银花 30g, 牛膝 10g, 紫花地丁 15g, 酒大黄 9g, 当归 10g, 红花 10g, 炮山甲 (先煎) 10g, 桃仁 10g, 蚤休 30g, 甘草 6g。

〔功能主治〕 清热解毒, 逐瘀通络。主治骨肉瘤。

〔加减应用〕 神昏谵语者, 加服安宫牛黄丸; 衄血便血者, 加仙鹤草、地榆炭。

(2) 清热地黄汤合黄连解毒方加减 (《临床中医肿瘤学》)

〔组成与用法〕 水牛角 (先煎) 30g, 生地 20g, 丹皮 12g, 赤芍 12g, 黄连 12g, 黄芩 15g, 栀子 15g, 徐长卿 30g, 白花蛇舌草 30g, 人工牛黄 1g。1 日 1 剂, 水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 凉血止痛。主治骨肉瘤。

〔加减应用〕 肿块疼痛剧烈者, 加乳香、没药、莪术; 大便秘结者, 加大黄、木香。

(3) 灵仙透骨汤 (《中医肿瘤学》)

〔组成与用法〕 忍冬藤 30g, 蒲公英 30g, 黄柏 15g, 肿节风 30g, 徐长卿 20g, 刘寄奴 15g, 黄芩 10g, 威灵仙 30g, 麝

虫 10g, 透骨草 30g, 天花粉 20g, 制乳香 5g, 制没药 5g, 当归 10g, 赤芍 10g, 龙葵 30g, 生甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 化瘀散结。主治骨肉瘤。

3. 脾虚湿毒证

主症: 患肢包块, 胀痛难忍, 皮色不红, 食纳减少, 倦怠乏力, 大便溏薄, 下肢浮肿, 舌体胖, 舌质淡, 苔白滑腻, 脉滑。

治法: 健脾祛湿。

六君子汤合四苓散加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 党参 15g, 白术 12g, 茯苓 12g, 陈皮 10g, 生半夏 (先煎半小时) 10g, 泽泻 15g, 猪苓 15g, 制乳香 10g, 制没药 10g, 地龙 10g, 防己 15g, 牛膝 10g, 车前草 20g, 山豆根 15g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾利湿, 解毒通络。主治骨肉瘤。

〔加减应用〕 脘腹胀满者, 加广木香、厚朴; 尿少者, 加大腹皮、木通。

4. 气血双亏证

主症: 患肢包块疼痛, 面色无华, 神疲乏力, 头晕目眩, 心悸少寐, 饮食减少, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。

治法: 益气养血。

八珍汤加味 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 当归 10g, 川芎 6g, 白芍 10g, 熟地 10g, 白参 (蒸兑) 10g, 白术 10g, 茯神 10g, 丹参 15g, 制乳香 6g, 制没药 6g, 山慈菇 30g, 甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血, 通络止痛。主治骨肉瘤。

〔加减应用〕 汗出气短, 畏风怕冷者, 加黄芪、防风、细辛; 大便溏薄者, 加神曲、薏苡仁。

5. 肾虚火郁证

主症: 患肢包块, 肿胀疼痛, 朝轻暮重, 皮色黯红, 行走

不稳，腰膝酸软，神疲乏力，头晕耳鸣，低热，口干，形体消瘦，舌质红，苔少，脉细数。

治法：滋肾解毒。

(1) 知柏地黄汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕生地 12g，山茱萸 10g，山药 10g，茯苓 12g，丹皮 12g，知母 12g，黄芩 10g，女贞子 12g，枸杞子 12g，当归 12g，牛膝 10g，银柴胡 10g，全蝎 3g，石膏（先煎）30g。水煎服。

〔功能主治〕滋阴补肾，降火解毒。主治骨肉瘤。

〔加减应用〕肢体麻木者，加桂枝、地龙；口渴者，加天花粉、竹叶。

(2) 四骨消瘤汤（《中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕生地 20g，山茱萸 15g，女贞子 30g，丹皮 10g，骨碎补 15g，补骨脂 15g，透骨草 20g，自然铜 10g，川续断 15g，当归 15g，黄柏 10g，知母 10g，肿节风 30g，核桃树枝 30g，寻骨风 15g。水煎服。

〔功能主治〕补肾壮骨，祛湿通络。主治骨肉瘤。

〔加减应用〕汗出气短，畏风怕冷者，加黄芪、防风、细辛；肢体麻木者，加桂枝、地龙。

〔辨病用方〕

本病的辨病治疗，当注重虚、瘀、毒，采用以补肾壮骨、活血化瘀、解毒散结为主，常加骨碎补、薏苡果等。

1. 壮骨消积方（新中医，1980，3）

〔组成与用法〕党参 15g，黄芪 30g，当归 15g，赤芍 12g，白术 12g，丹参 15g，王不留行 12g，广木香 10g，陈皮 10g，川续断 10g，狗脊 15g，桑寄生 15g，炙甘草 6g，煅牡蛎（先煎）15g，夏枯草 20g，海藻 20g，海带 20g，全蝎粉（吞服）4.5g，地龙粉（吞服）4.5g。水煎服。

〔功能主治〕益气活血，补肾散结。主治骨肉瘤。

〔**加减应用**〕肿块疼痛剧烈者，加乳香、没药、莪术；肢体麻木者，加桂枝、地龙。

2. 骨瘤方（湖北中医杂志，1980，6）

〔**组成与用法**〕黄芪 30g，生山楂 30g，茯苓皮 30g，薏苡仁 30g，白花蛇舌草 30g，当归 10g，乌梅 10g，天花粉 10g，狗脊 12g，续断 12g，黄药子 12g，山药 15g。水煎服。

〔**功能主治**〕益气养血，利湿壮骨。主治骨肉瘤。

〔**加减应用**〕食纳减少者，加谷芽、麦芽；尿少甚者，加大腹皮、木通。

3. 加味地黄汤（北京中日友好医院中医肿瘤科方）

〔**组成与用法**〕熟地 10g，山药 10g，山萸肉 10g，土茯苓 10g，泽泻 10g，丹皮 10g，菊花 10g，土鳖 5g，补骨脂 10g，透骨草 10g，骨碎补 10g，海金沙 15g，鳖甲 10g，蜈蚣 2 条，露蜂房 10g。水煎服。

〔**功能主治**〕补肾温阳，解毒祛湿通络。主治骨肉瘤。

〔**加减应用**〕位于上肢者，加桂枝、桑枝；位于腰骶者，加狗脊、杜仲；位于下肢者，加牛膝；肺转移者，加土贝母、瓜蒌、细辛。并同时口服骨瘤消胶囊（斑蝥、生黄芪、海金沙、白及等组成）

〔**临床报道**〕配合化疗治疗 22 例，1，2，3 年生存期分别为 89.6%，57.3%，37.3%。（中医药学刊，2004，10）

4. 归芍抗瘤方（北京中医杂志，1985，3）

〔**组成与用法**〕全当归 15g，赤芍 12g，白芍 12g，川楝子 5g，川郁金 9g，青皮 9g，陈皮 6g，半夏 9g，土茯苓 18g，川牛膝 10g，蒲公英 15g，板蓝根 25g，白花蛇舌草 18g，半枝莲 30g，连翘 18g，海藻 15g，昆布 15g，桂枝 30g，神曲 30g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。

〔**功能主治**〕理气活血，解毒散结。主治骨肉瘤。

〔**加减应用**〕清热解毒，加金银花、败酱草；健脾和胃，

加生薏苡仁、鸡内金；补气扶正，加焦白术、党参、黄芪；滋阴补肾，加生地、山药、玄参、沙参；活血祛瘀，加丹参。

5. 灭毒膏（《实用中医学》）

〔组成与用法〕 川椒 36g，菖蒲、生川乌、松香、萆薢、生南星、细辛各 36g，白芷 90g，甘松 72g，千金子、蓖麻子各 54g，生草乌、生半夏各 27g，乱发一团，蜈蚣 9 条，蛇蜕 10g，大葱 24 根，章丹 1000g，桐油 250g，香油 750g。用香油，桐油炸枯上药，去渣熬膏，离火兑入章丹，搅匀成膏，兑入麝香 9g，再搅匀成膏。外敷患处。

〔功能主治〕 化痰祛瘀，温经通络。主治骨肉瘤。

6. 木瓜补骨汤（《肿瘤临证备要》）

〔组成与用法〕 木瓜 10g，川乌 10g，草乌 10g，五灵脂 10g，地龙 10g，防己 10g，牛膝 15g，制木鳖子 15g，干蟾皮 15g，骨碎补 30g，补骨脂 30g，透骨草 30g，白屈菜 20g，乳香 6g，没药 6g，蜈蚣 6g。水煎服。

〔功能主治〕 温肾通络，化瘀解毒。主治骨肉瘤。

7. 乳没二乌汤（浙江中医学院方）

〔组成与用法〕 制乳香 6g，制没药 6g，三棱 9g，莪术 9g，川乌（先煎）6g，草乌（先煎）6g，紫草根 9g，地龙 9g，山豆根 12g，马钱子（研末吞服）0.3g。水煎服。

〔功能主治〕 化瘀解毒，通络止痛。主治骨肉瘤疼痛者。

8. 复方蛇六谷汤（《中西医结合肿瘤学》）

〔组成与用法〕 当归 9g，生地 30g，苍耳子 15g，桃仁 9g，丹参 9g，龙葵 9g，蟾蜍皮 9g，蛇莓 25g，猪殃殃 25g，半枝莲 15g，狗骨 15g，白花蛇舌草 15g，蛇六谷（先煎）15g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。

〔功能主治〕 活血解毒。主治骨肉瘤。

〔加减应用〕 失眠烦躁者，加酸枣仁、五味子；气虚乏力者，加党参、黄芪。

【对症用方】

1. 骨肉瘤截肢术后方

(1) 鹿衔铁树汤 (上海中医药杂志, 1982, 11)

〔组成与用法〕 黄芪 15g, 南沙参 15g, 北沙参 15g, 鹿衔草 30g, 白英 30g, 龙葵 12g, 土茯苓 30g, 露蜂房 15g, 木馒头 30g, 铁树叶 15g, 白花蛇舌草 30g, 凤尾草 30g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。连服 3 个月以上。

〔功能主治〕 益气养阴, 清热解毒。主治骨肉瘤。

〔加减应用〕 同时吞服小金丹 (分吞) 4 粒。低热盗汗、口干者, 加天花粉、地骨皮、煅牡蛎 (先煎); 食少纳差者, 加砂仁、麦芽、谷芽、鸡内金。

(2) 鹿衔蛇草汤 (《中西医结合肿瘤学》)

〔组成与用法〕 熟地 12g, 丹参 9g, 白花蛇舌草 30g, 女贞子 12g, 红花 9g, 鹿衔草 30g, 怀山药 12g, 泽兰 9g, 车前子 15g, 当归 12g, 鹿角粉 (冲服) 0.5g, 土茯苓 30g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴活血, 解毒利湿。

(3) 狗脊扶正汤 (中国中西医结合杂志, 1983, 5)

〔组成与用法〕 党参 10~12g, 黄芪 15~30g, 丹参 9~20g, 赤芍 12g, 金银花 12g, 连翘 12g, 茯苓 12g, 夏枯草 12~30g, 王不留行 12~24g, 昆布 9g, 海藻 9g, 乳香 9g, 没药 9g, 延胡索 9g (或川楝子 9g), 狗脊 15g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

〔功能主治〕 益气活血, 软坚散结。主治骨肉瘤术后局部皮下转移者。

〔加减应用〕 脾虚便溏者, 加炒白术、山药、薏苡仁; 饮食欠佳者, 加木香、陈皮、生姜; 腰腿及关节痛者, 加羌活、独活、姜黄、炒杜仲、川续断; 局部肿胀, 疼痛明显者, 加白花蛇舌草、生龙骨 (先煎)、生牡蛎 (先煎)、乌药、香附、桃

仁、红花。

(4) 复方板蓝根汤 (同济医学院同济医院方)

[组成与用法] 板蓝根 100g, 金银花 15g, 紫花地丁 20g, 白花蛇舌草 20g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒。主治骨肉瘤。

[加减应用] 根据患者体质情况逐渐提高板蓝根用量至最大量 180g, 并同时口服四君子汤或八珍汤。

[临床报道] 治疗骨肉瘤术后 16 例, 11 例存活 5 年以上。
(现代中西医结合杂志, 2003, 9)

2. 骨肉瘤放疗后专方

四参三白汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 麦冬 12g, 天冬 12g, 沙参 10g, 玄参 9g, 生地 10g, 玉竹 9g, 金银花 15g, 知母 10g, 白花蛇舌草 30g, 白英 20g, 党参 12g, 茯苓 12g, 白术 10g, 丹参 15g, 甘草 3g。水煎, 1 日 1 剂, 分 2 次服。

[功能主治] 益气养阴, 清热解毒。用于骨肉瘤放疗后。

[加减应用] 口燥咽干者, 加天花粉、芦根、石斛、乌梅; 食欲不振者, 加麦芽、谷芽、神曲; 发热者, 加黄芩、青蒿、连翘; 失眠烦躁者, 加酸枣仁、五味子; 便秘者, 加瓜蒌、大黄 (后下); 皮肤红肿者, 加紫花地丁、连翘; 如皮肤损伤较重, 应禁止涂油膏类药物, 可暴露病灶, 如伤口溃破, 久不愈合, 可用生肌散外敷。

3. 骨肉瘤化疗专方

(1) 竹叶石膏汤加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 竹叶心 10g, 生石膏 (先煎) 30g, 麦冬 20g, 人参 10g, 姜半夏 10g, 粳米 10g, 甘草 6g。水煎, 1 日 1 剂, 早、晚各服一半, 一般 5 剂为 1 个疗程。如服 2~3 剂后症状无明显缓解, 服满 5 剂则止。

[功能主治] 清胃止逆。用于骨肉瘤化疗时。

〔加减应用〕 呕恶严重者，加旋覆花（布包）、代赭石（先煎）、淡竹茹；胃热亢盛，口舌生疮为主者，重用生石膏（先煎），加知母、玄参、天花粉，口腔内搽锡类散等外用中成药；身发斑丘红疹，瘙痒难忍者，加鲜生地、赤芍、白芍、丹皮；气虚多汗，心悸怔忡者，加黄芪、当归、五味子、煅龙骨（先煎）、煅牡蛎（先煎）、灵磁石（先煎），或加服生脉散口服液；腹痛腹泻者，加木香、枳壳、白芍等，或加服黄连素片。

（2）加减橘皮竹茹汤（中国中西医结合杂志，1993，3）

〔组成与用法〕 橘皮 10g，竹茹 10g，姜半夏 10g，白豆蔻 10g，生黄芪 30g，太子参 30g，女贞子 15g，枸杞子 15g，菟丝子 15g，茵陈 15g。水煎服。

〔功能主治〕 止呕开胃，升血保肝。用于骨肉瘤顺铂化疗时。

〔加减应用〕 呕吐严重，加沉香粉 3g 冲服。

（3）参芪知母汤（中国中西医结合杂志，1993，3）

〔组成与用法〕 生石膏 30～60g，知母 15g，元参 15g，生地 15g，麦冬 15g，赤芍 15g，丹皮 15g，生黄芪 30g，太子参 30g，枸杞子 15g，女贞子 15g，旱莲草 10～15g，清半夏 10g，茵陈 15g。水煎服。

〔功能主治〕 清热凉血，升血保肝。用于骨肉瘤甲氨蝶呤、长春新碱化疗时。

〔加减应用〕 皮疹严重，加水牛角粉 15～30g 分次冲服。

〔临床报道〕 与化疗配合治疗手术后患者 32 例，能明显减轻化疗药物反应。

【专病成药】

1. 平消胶囊（《国家基本医疗保险药品目录》2004）

〔处方组成〕 郁金、仙鹤草、五灵脂、白矾、硝石、干漆、枳壳、马钱子粉。

〔功能主治〕 活血化瘀，止痛散结，清热解毒，扶正祛邪。

对肿瘤具有一定的缓解症状，有缩小瘤体、抑制瘤体生长、提高人体免疫力、延长患者生命的作用。主治骨肿瘤。

【用法用量】口服，1日3次，1次4~8粒。60天1个疗程。

2. 天蟾胶囊（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

【处方组成】夏天无、炙川乌、蟾酥、白芷、白芍、白屈菜、川芎、甘草等中药。

【功能主治】通络止痛。适用于各种癌症引起的疼痛。

【用法用量】1日3次，1次3粒，饭后服用。

【专病单方】

1. 蜈蚣 用法：每取1条，配全蝎1只，廋虫1只，僵蚕1只。上药焙黄共研细末，装入1个鸡蛋内搅匀，以纸糊口，放笼中蒸熟后再入水中煎煮1小时即成，每日服2个药鸡蛋。主治：胸壁骨肉瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 寻骨风 用法：每取30g，配白英30g、羊蹄根30g、补骨脂15g。水煎，1日1剂，分2次服。主治：骨肉瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 蜈蚣 用法：每取2~4条，配鸡蛋2个。经水炖熟制成，1日1剂，饮汤连食鸡蛋。主治：骨肉瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 天麻 用法：每取9g，配鸭蛋1个。天麻压极细末，鸭蛋放盐中浸泡7日后开一小孔，倒出适量（相当于9g天麻面的容积）蛋清，放器皿中，再把天麻面装入鸭蛋内（如鸭蛋不充盈，可把倒出的蛋清重新装入鸭蛋，至鸭蛋充盈为度）。用麦面和饼将鸭蛋封固，外用鸭面饼包裹，置火炭中煨热备用。早晨空腹服1个，1日1次，开水送下。主治：骨肉瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 乌骨藤 用法：每取30~45g，配白胡椒10粒。水煎，1日1剂，分2次服。主治：骨肉瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 六棱菊草 用法：每取 25g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。主治：骨肉瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 九节茶 用法：每取 10~25g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服或泡茶时饮用，同时外用鲜品适量捣烂外敷在患处，每日一换。主治：骨肉瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

尤文肉瘤

尤文肉瘤是一种来源于未分化的小圆细胞的恶性非成骨性原发骨恶性肿瘤。尤文肉瘤的发病与一些理化因素如放射性刺激、病毒感染、遗传及骨发育过程方向转位等有关。其中，遗传因素在其发生发展中起重要作用。

本病相当于中医病名国家标准的骨癌，亦属于中医石疽、骨瘤、骨痹等病症范畴，中医认为其发病乃因先天禀赋不足、肾气亏虚、外感寒湿或湿热邪毒所致毒邪留着、蕴阻骨骼，日久气血凝滞，经络受阻，结毒为瘤。

【辨证用方】

尤文肉瘤的辨证治疗应注重虚实，虚以肾虚、气血虚为主，治以益肾、补益气血；实以瘀血、痰浊、热毒为主，治以活血化瘀、化痰散结、清热解毒为法。

1. 痰结血瘀证

主症：局部肿块，按之较硬、疼痛，皮色青紫，胸闷，纳差，舌质淡红或有瘀斑，苔薄白或白腻，脉弦或涩。

治法：活血化痰散结。

海藻玉壶汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕海藻 15g，昆布 15g，青皮 10g，陈皮 10g，生半夏（先煎）10g，贝母 10g，连翘 10g，当归 10g，川芎 6g，黄药子 15g，炮山甲（先煎）10g，丹参 15g，蚤休 30g，半枝莲 30g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。

〔功能主治〕理气活血，化痰散结。

〔加减应用〕郁久化火而见烦热，加夏枯草、丹皮、玄参；大便溏薄者，加白术、茯苓。

2. 热毒壅盛证

主症：局部肿块，肿胀灼痛，皮色发红，发热汗出，口渴欲饮，小便黄，大便干结，舌质红，苔黄，脉弦数。

治法：清热解毒。

白虎加桂枝汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕生石膏（先煎）30g，知母15g，桂枝10g，忍冬藤30g，蒲公英20g，连翘15g，黄柏12g，玄参12g，白芍10g，竹叶10g，麦冬10g，桃仁10g，大黄（后下）10g，白花蛇舌草30g，山慈菇30g。水煎，1日1剂，分2次服

〔功能主治〕清热解毒，通经消肿。

〔加减应用〕衄血者，加白茅根；神昏谵语者，加服安宫牛黄丸。

3. 气血两虚证

主症：局部肿块，疼痛，面色无华，神疲懒言，纳差，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：益气养血。

八珍汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕党参15g，黄芪15g，白术10g，茯苓10g，陈皮10g，当归12g，白芍12g，川芎6g，熟地10g，海藻15g，黄药子15g，威灵仙15g，制乳香6g，制没药6g，半枝莲30g。水煎，1日1剂，分2次服

〔功能主治〕益气养血，软坚散结。

〔加减应用〕自汗者，重用黄芪，加防风；心悸少寐者，加远志、酸枣仁、茯神；大便溏薄者，加山药、薏苡仁。

4. 肾阳亏虚证

主症：局部肿块，肿胀疼痛，四肢不温，怯寒神疲，腰膝

冷痛，下肢浮肿，小便短少，面色灰黯，舌质淡胖，苔白，脉沉细或沉迟无力。

治法：滋肾壮阳。

济生肾气丸加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕肉桂 6g，制附片（先煎） 6g，山茱萸 10g，山药 12g，茯苓 12g，白术 12g，熟地 12g，白芍 12g，泽泻 12g，车前子（布包） 15g，牛膝 12g，蚤休 30g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服

〔功能主治〕温肾助阳，利尿消肿。

〔加减应用〕小便清长量多者，去泽泻、车前子，加补骨脂、菟丝子；心悸、唇绀、脉虚数者，加桂枝、炙甘草。

〔辨病用方〕

本病的辨病治疗，一方面要注重扶正补肾壮骨，一方面要注重祛邪，如清热解毒、活血化瘀、软坚散结、以毒攻毒以及祛湿通络等方法的合理运用，以求达到抗癌的效果。

1. 五合方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕①青蒿 10g，川断 10g，木瓜 10g，伸筋草 10g，秦艽 10g，当归 10g，川芎 10g，甘草 10g，白英 10g，银柴胡 10g，喜树菌 10g，桑枝 12g，天龙 12g，龟甲 12g，龙葵 12g，猪殃殃 12g，地骨皮 12g，夏枯草 12g，桂枝 6g，骨碎补 15g，半枝莲 15g，白花蛇舌草 15g。②方在①方加鸡血藤 12g、杜仲 12g、狗后腿骨 1 具（焙枯研粉，酒冲服）。③太子参 10g，川断 10g，伸筋草 10g，柴胡 10g，牛膝 10g，寻骨风 10g，甘草 10g，三七 3g，骨碎补 15g，当归 12g，杜仲 12g，川芎 12g，地骨皮 12g。④当归 12g，川断 12g，党参 15g，熟地 10g，茯苓 12g，杜仲 12g，鸡血藤 12g，枸杞子 12g，黄芪 15g，白芍 12g，三七 3g。⑤梨树叶 10kg、桃树叶 10kg、搜山虎 10kg、风肿消 2kg、透骨消 2kg、骨碎补 2kg、夏枯草 2kg、王不留行 2kg、三棵针 5kg，熬成浓膏，加麝香

1g、牛黄 10g、熊胆 5g、冰片 5g，制成膏药。

①方、②方、③方、④方水煎，1日1剂，分2次服，4方交替使用。每疗程约3个月，⑤方局部外敷。

〔功能主治〕祛湿壮骨，活血解毒。主治尤文肉瘤。

〔加减应用〕口干盗汗者，加天花粉、地骨皮、鳖甲（先煎）、煅牡蛎（先煎）；食欲不振者，加麦芽、谷芽、神曲、鸡内金。

2. 蛇虫方（《肿瘤良方大全》）

〔组成与用法〕白花蛇舌草 10g，虻虫 10g，当归 10g，徐长卿 10g，露蜂房 6g，蜈蚣 3g，党参 12g，黄芪 12g，熟地 15g，鸡血藤 15g，制乳香 9g，制没药 9g，炙甘草 6g。水煎，1日1剂，分2次温服。

〔功能主治〕活血理气，解毒通络。主治尤文肉瘤。

〔加减应用〕大便溏薄者，加白术、茯苓；小便清长量多者，加补骨脂、菟丝子；纳差者，加砂仁、麦芽、谷芽、鸡内金。

3. 补肾祛湿方（《肿瘤良方大全》）

〔组成与用法〕补骨脂 30g，骨碎补 15g，郁李仁 30g，透骨草 30g，猪苓 60g，生地 30g，桑寄生 15g，露蜂房 10g，全蝎 10g，乌梢蛇 10g，薏苡仁 30g。水煎，1日1剂，分2次温服。

〔功能主治〕补肾壮骨，解毒通络。主治尤文肉瘤病至晚期者。

〔加减应用〕腰腿及关节痛者，加羌活、独活、姜黄、炒杜仲、川续断。

【对症用方】

本病的对症用方，主要配合手术、放疗、化疗及针对其不良反应所采用的中医药治疗。

1. 尤文肉瘤手术后专方

术后扶正方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕太子参 15g，黄芪 10g，白术 10g，石斛 12g，茯苓 12g，陈皮 10g，生地 12g，赤芍 10g，当归 10g，白芍 12g，丹参 15g，鸡血藤 15g，白花蛇舌草 20g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。

〔功能主治〕益气养血，活血解毒。主治尤文肉瘤手术后气血不足证。

〔加减应用〕口干盗汗者，加天花粉、地骨皮、鳖甲（先煎）、煅牡蛎（先煎）；纳差者，加砂仁、麦芽、谷芽、鸡内金；发热者，加生石膏（先煎）、金银花、蒲公英。

2. 尤文肉瘤放疗后专方

益气养阴方（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕麦冬 12g，天冬 12g，沙参 10g，玄参 9g，生地 10g，白茅根 12g，玉竹 9g，金银花 9g，知母 10g，白花蛇舌草 30g，党参 12g，茯苓 12g，白术 10g，丹参 15g，威灵仙 15g。水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。

〔功能主治〕益气养阴解毒。主治尤文肉瘤放疗后气阴两虚，疮口久不愈合者。

〔加减应用〕口燥咽干甚者，加天花粉、芦根、石斛、乌梅；食欲不振者，加麦芽、谷芽、神曲、鸡内金；发热者，加黄芩、青蒿、连翘；失眠烦躁者，加酸枣仁、夜交藤；便秘者，加全瓜蒌、大黄（后下）；皮肤炎症者，加紫花地丁、连翘、大青叶、板蓝根；皮肤损伤较重者，应禁止涂抹油膏类药物，可暴露病灶；如伤口破溃，久不愈合，可用生肌散外敷。

3. 尤文肉瘤化疗后专方

（1）调中方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕黄芪 15g，白术 10g，神曲 10g，山楂 10g，陈皮 10g，姜半夏 10g，莱菔子 10g，鸡内金 15g，山药 15g，谷芽 15g，麦芽 15g，蚤休 20g，甘草 5g。水煎，1 日 1 剂，

分2次服。

〔功能主治〕 健脾和胃。主治尤文肉瘤化疗后脾胃虚弱不欲食者。

〔加减应用〕 恶心呕吐者，加姜竹茹、代赭石（先煎）；胃脘不适，反酸，吐苦水，嘈杂者，加黄连；便溏者，加薏苡仁。

(2) 清胃养阴方（中西医结合杂志，1988，12）

〔组成与用法〕 生石膏（先煎）30g，竹叶20g，知母10g，生甘草5g，粳米10g。水煎，1日1剂，分2次服。方中粳米不入药煎，煎粥食。一般5剂为1个疗程。

〔功能主治〕 清胃养阴。主治尤文肉瘤化疗后口舌生疮。

〔加减应用〕 呕吐重者，加旋覆花（布包）、代赭石（先煎）、竹茹；口舌生疮者，加玄参、天花粉，并重用生石膏（先煎）、知母，同时口腔内搽锡类散；身发斑丘红疹瘙痒难忍者，加鲜生地、赤芍、白芍、丹皮；气虚多汗，心悸怔忡者，加黄芪、当归、五味子或口服生脉饮；腹痛腹泻者，加木香、枳壳、白芍或加服黄连素片。

4. 尤文肉瘤疼痛方

(1) 白鹿止痛汤（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 熟地30g，鹿角胶（烊化）10g，姜炭5g，炙麻黄5g，白芥子10g，桂枝10g，菟丝子10g，补骨脂10g，淫羊藿10g，蜈蚣3条，全蝎粉（吞服）3g，甘草5g。水煎服。

〔功能主治〕 温阳散寒，通络行滞。主治尤文肉瘤疼痛。

〔加减应用〕 痛甚，固定不移，加制乳香、制没药、莪术；食纳减少者，加谷芽、麦芽；大便溏薄者，加神曲、薏苡仁。

(2) 三王止痛膏（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 大黄50g，马钱子15g，全蝎30g，干蟾皮30g，蚤休60g，山慈菇60g，姜黄50g，麝香1g，冰片10g，

红花 40g, 桃仁 50g, 当归 50g, 血竭 30g, 莪术 50g, 蜈蚣 30g, 桂枝 60g, 制乳、没 30g, 细辛 15g。各为细末和匀, 取酌量药粉调入凡士林内, 摊于纱布上, 贴敷肿块处, 隔日一换。

〔功能主治〕 化瘀软坚, 解毒止痛。主治尤文肉瘤疼痛。

〔临床报道〕 用该膏贴敷治疗各种疼痛, 止痛总有效率为 93.3%, 止痛平均持续时间 16.6 小时。

【专病成药】

见“骨肉瘤”。

【专病单方】

1. 白鲜皮 用法: 每取 50g (后下), 加白花蛇舌草 100g、寻骨草 25g、大枣 30g 水煎, 每日早晨 4~5 时服, 1 日 1 次。主治: 尤文肉瘤。《《中华肿瘤治疗大成》》

2. 鳖胆汁 用法: 将活鳖 (雌雄均可) 洗净, 投入砂锅或铝锅沸水中 (水应淹没鳖), 煮 5~10 分钟, 取出胆囊挤出胆汁, 鳖在 500g 以下, 胆汁为 1 次服用量, 在 500g 以上, 胆汁在为 2 次服用量, 1 日 1 次, 空腹服。主治: 尤文肉瘤。《《中华肿瘤治疗大成》》

3. 朱砂莲块根 用法: 每取不拘量。上药研粉, 用白开水或白酒吞服 0.5~1g, 1 日 1~2g。主治: 尤文肉瘤疼痛明显者。《《中华肿瘤治疗大成》》

4. 壁虎 用法: 每取 1 条, 鸡蛋 1 个。将壁虎放入去蛋清的鸡蛋壳内, 封口蒸熟, 烘干研粉; 或将壁虎焙干为末, 与鸡蛋黄搅匀蒸熟, 再烘干研粉。1 次 0.9g, 1 日 3 次。主治: 尤文肉瘤。《《中华肿瘤治疗大成》》

恶性皮肤及软组织肿瘤

皮肤癌

皮肤癌系指发生于表皮的恶性肿瘤，其中以鳞状细胞癌和基底细胞癌最为常见。本病的发生与慢性皮肤病（如光化性角化病、着色性干皮病）和物理化学刺激（如日光、紫外线、X射线、电离辐射、煤焦油等）等因素有关。

本病属于中医病名国家标准的皮肤癌，亦属于恶疮、翻花疮、石疔、癌疮等范畴，其病因病机为外感风、湿、热、毒，客于肌肤，内耗阴血，夺精灼液，气血亏虚，难荣于外，毒邪积聚，留置肌肤而成。

【辨证用方】

皮肤癌的辨证，宜根据患者全身情况及癌灶色泽、质地、渗液的不同情况，辨别湿、热、实、虚。以局部皮肤红、肿、热、痛为热证、实证；以皮肤表面糜烂，渗血绵绵不愈，疲乏无力者为湿证、虚证，其治疗宜根据不同，选择针对性的方法。

1. 湿热内蕴证

主症：患处为红斑样皮损或红色糜烂面，伴有渗液、渗血、恶臭、疼痛，口干口苦，小便短赤，大便秘结，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿，化浊解毒。

萆薢渗湿汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 萆薢 15g, 薏苡仁 20g, 黄柏 15g, 土茯苓 20g, 丹皮 12g, 泽泻 15g, 滑石 20g, 苍术 10g, 苦参 15g, 知母 15g, 茵陈 30g, 蒲公英 30g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清热利湿, 化瘀解毒。主治皮肤癌。

〔加减应用〕 溃疡流血不止者, 加仙鹤草、旱莲草、白茅根、蒲黄炭等, 并用云南白药外敷; 发热者, 加金银花、紫花地丁。

2. 热毒蕴结证

主症: 局部红肿热痛, 溃烂翻花, 伴恶臭、疼痛, 低热烦躁, 大便秘结, 小便短赤, 舌质红, 少苔, 脉洪数。

治法: 清热解毒, 活血止痛。

(1) 五味消毒饮加减。《《中华肿瘤治疗大全》》

〔组成与用法〕 金银花 15g, 野菊花 15g, 蒲公英 30g, 紫花地丁 12g, 天葵子 12g, 红花 10g, 桃仁 10g, 廔虫 10g, 穿山甲 12g, 川芎 10g, 大黄(后下) 6g, 车前子(布包) 15g, 蚤休 30g, 败酱草 20g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 活血化瘀。主治皮肤癌。

〔加减应用〕 溃疡肿痛剧烈者, 加延胡索、三七、乳香、没药。

(2) 散肿溃坚汤加减 《《临床中医肿瘤学》》

〔组成与用法〕 柴胡 10g, 升麻 6g, 半枝莲 30g, 知母 15g, 黄连 10g, 黄柏 10g, 天花粉 15g, 龙胆草 10g, 土茯苓 15g, 薏苡仁 30g, 干蟾皮 6g, 海藻 15g, 昆布 15g, 赤芍 15g, 白芍 15g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 化瘀软坚。主治皮肤癌。

〔加减应用〕 心烦、夜寐不安者, 加远志、夜交藤。

3. 血虚风燥证

主症: 局部呈斑丘状结节, 表面糜烂, 中心部萎缩, 呈癍

痕状或斑块状，糜烂面绵绵不愈，难以收口，痒痛，疲倦无力，面色苍白，头晕眼花，舌淡，苔白，脉沉缓无力。

治法：养血润燥，疏风解毒。

(1) 四物消风饮（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕生地 12g，当归 10g，荆芥 10g，防风 10g，赤芍 15g，川芎 10g，白鲜皮 10g，蝉蜕 10g，廔虫 10g，桃仁 10g，生黄芪 20g，山慈菇 15g，白花蛇舌草 30g，仙鹤草 30g，败酱草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕养血润燥，化瘀解毒。主治皮肤癌。

〔加减应用〕口干口渴者，加天花粉、芦根、麦冬；大便秘结者，加郁李仁、大黄（后下）。

(2) 桃红四物汤合消风散（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕当归 15g，丹参 30g，白僵蚕 10g，莪术 15g，赤芍 15g，白芍 15g，白芥子 10g，防风 10g，山慈菇 30g，桃仁 10g，红花 10g，何首乌 15g，黄芪 30g，甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕活血散结，疏风润燥。主治皮肤癌。

〔加减应用〕皮肤干燥或瘙痒者，加荆芥、地肤子、蝉衣、白鲜皮。

4. 脾胃虚弱证

主症：肿块局部出现鳞片状脱屑，反复结痂、脱屑，表面出现糜烂、渗血，绵绵不愈，面色萎黄，身倦乏力，纳差，大便溏薄，舌质红，苔薄白，脉细弱。

治法：健脾益气，除湿化浊。

(1) 除湿胃苓汤加减（《中华肿瘤治疗大全》）

〔组成与用法〕茯苓 12g，白术 10g，陈皮 10g，苍术 10g，厚朴 10g，猪苓 15g，泽泻 15g，防风 10g，山栀子 12g，滑石 20g，党参 15g，黄芪 20g，白花蛇舌草 30g，仙鹤草 30g，败酱草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气，化浊解毒。主治皮肤癌。

〔加减应用〕 肿块局部疼痛，舌质有瘀点者，加红花麝虫、三七粉（吞服）；夜寐不安者，加远志、酸枣仁、夜交藤。

（2）保元汤加减（王沛经验方）

〔组成与用法〕 生黄芪 20g，炙黄芪 20g，太子参 30g，当归 15g，肉桂 6g，猪苓 15g，茯苓 15g，何首乌 15g，川芎 10g，鸡血藤 30g，仙鹤草 30g，水红花子 15g，赤芍 30g，半枝莲 15g，甘草 15g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气，活血解毒。主治皮肤癌气虚血瘀者。

〔加减应用〕 若合并胸腹满闷者，可加黄芩、秦皮、苦参。

（3）八珍汤加减（《临床中医肿瘤学》）

〔组成与用法〕 黄芪 30g，党参 30g，当归 10g，熟地 30g，茯苓 20g，白术 15g，白花蛇舌草 30g，七叶一枝花 30g，金银花 20g，甘草 6g。水煎服。

〔功能主治〕 补益气血，扶正祛邪。主治皮肤癌。

〔加减应用〕 兼见腰酸肢冷、头晕耳鸣，酌加补骨脂、杜仲、川续断；兼五心烦热、口干咽燥、失眠多梦者，加女贞子、旱莲草、山萸肉；纳呆、脘腹痞闷者，酌加山药、薏苡仁、陈皮、半夏，或加服香砂养胃丸。

【辨病用方】

皮肤癌的辨病治疗，注重内服与外用同步。局部治疗以解毒燥湿，化瘀消肿，敛疮生肌为主；内服药物应根据病期早晚，体质强弱分别采取或祛邪，或扶正，或祛邪扶正同施等法。

1. 皮肤癌外用方

（1）改良硃砂散（沈阳医学院附属第一医院肿瘤科方）

〔组成与用法〕 硃砂 9g，轻粉 3g，雄黄 3g，冰片 0.15g，大黄 3g，西月石 3g。各药共研细末，用獾油或香油调和成糊

状，外用，1日1次。

〔功能主治〕祛腐生肌，主治皮肤癌。

〔加减应用〕同时内服五味消毒饮。

(2) 烟丹方 (中医杂志, 1982, 10)

〔组成与用法〕石胆 30g, 丹砂 30g, 雄黄 30g, 矾石 30g, 磁石 30g。煅制成末，外用。

〔功能主治〕祛腐生肌。主治皮肤癌。

〔加减应用〕内服黄芪、太子参、白术、白芍、赤芍、当归、陈皮、野菊花、蒲公英、白花蛇舌草、乳香、没药、丹皮等药扶正解毒，化瘀散结。

(3) 蟾酥软膏 (青岛医学院附属医院肿瘤科方)

〔组成与用法〕蟾酥 10g 溶于 30ml 生理盐水中，浸泡制成糊状，再加入 40g 磺胺软膏，调匀，每次适量，外敷患处。

〔功能主治〕解毒抗癌。适用于皮肤癌。

〔临床报道〕治疗皮肤癌 40 例，5 年治愈率为 22.5%。尤其是基底细胞癌效果好，有效率 73.6%。(肿瘤防治研究, 1980, 2)

(4) 信枣散 (苏州医学院学报, 1995, 4)

〔组成与用法〕大枣 10 枚，信石 0.2g。大枣去核将信石置于其中，烤干，研末，将红枣：信石粉末比例为 1：0.2，密封备用。用时与麻油调糊外敷。

〔功能主治〕祛腐生肌。主治颜面皮肤癌。

〔临床报道〕治疗颜面皮肤癌 40 例，总有效率达 80%。

(5) 茯苓拔毒散 (中国中西医结合杂志, 1986, 11)

〔组成与用法〕茯苓、雄黄、矾石各等份。共研末，混匀，外敷患处，也可以制成软膏调敷。

〔功能主治〕清热解毒，祛腐生新。主治溃疡型皮肤癌。

〔加减应用〕乏力神疲，加黄芪、党参。

(6) 化癌散 (《常见癌症中医治疗》)

〔组成与用法〕火硝 500g，皂矾 30g，黄丹 60g，雄黄 9g，朱砂 3g，冰片适量。先将黄丹、雄黄、朱砂共研细末，另取火硝、皂矾置锅内烈火练成药液，将药末加入药液中搅拌均匀，立即倾于干净平板上，冷却成冰晶块，研细末备用。同时，每 2g 药粉加冰片 1g，研细混匀，敷于患处，隔日换药。

〔功能主治〕解毒燥湿敛疮。主治皮肤癌。

〔加减应用〕可同时内服六君子汤加减。

(7) 皮癌净方（《抗癌中药一千方》）

〔组成与用法〕红砒 3g，指甲 1.5g，头发 1.5g，大枣（去核）1 枚，碱发白面 30g。共煅灰研末，撒于疮面或芝麻油调涂患处。

〔功能主治〕腐蚀祛毒。主治皮肤癌。

〔加减应用〕淋巴结肿大者，可用血竭、紫草、水蛭、穿山甲、虻虫、松香、麝香、蓖麻子，与上药制成药膏外敷患处。

(8) 白砒条及一效膏（辽宁中医学院附属医院方）

〔组成与用法〕①白砒条：白砒 10g，淀粉 50g。加水适量，揉团捻条状，待自然干燥备用。②一效膏：朱砂 50g，炙甘石 150g，冰片 50g，滑石粉 500g，淀粉 100g。麻油调糊状备用。局部常规消毒后，于肿瘤间隔 0.5～1.0cm 刺入白砒条，深达肿瘤基底部，在肿瘤周围形成环状，外敷一效膏。同时内服清热解毒汤。

〔功能主治〕消肿破结，解毒化癌。治皮肤恶性肿瘤

〔临床报道〕治皮肤恶性肿瘤 22 例，皆获治愈。（中医杂志，1986，2）

(9) 五虎丹及其复方剂型（萧梓荣经验方）

〔组成与用法〕五虎丹：水银、牙硝、明矾、青矾各 200g，食盐 100g。①五虎丹粉剂：五虎丹 0.5g，洋金花 1g，米饭 1.3g，共捣成糊，置于患处，外贴“神仙膏”。②五虎丹

饼剂：五虎丹 1.3g，洋金花 1g，米饭 1.3g，共捣成饼状，外敷。③五虎丹酊剂（又名拔毒酊）：五虎丹 1.5g，洋金花 1g，斑蝥 1g，红娘（去头足）1g，蟾酥 2g，共研细末，入米饭 3~5g 混合捣烂搓成钉状阴干备用。

〔功能主治〕 平胬吊毒祛腐。①用于未溃或溃破皮肤癌之肉芽坚硬而脆者。②治皮肤癌溃破，其肉芽坚硬而脆者。③用于溃破性皮肤癌。

〔加减应用〕 配合口服菊藻丸。

〔临床报道〕 治疗体表肿瘤病人 115 例，总有效率 79.1%。

(10) 三品一条枪（中医杂志，1994，1）

〔组成与用法〕 白砒 45g，明矾 60g，雄黄 7.2g，没药 3.6g，前两味药共研为末，与后两味药混匀，取适量，外敷，3~5 天 1 次。

〔功能主治〕 攻毒祛瘀，敛疮消肿。主治皮肤瘢痕癌。

〔加减应用〕 体质虚，癌灶边缘组织僵硬，色黯，脓少者，加服人参养荣汤或香贝养荣汤。

〔临床报道〕 治皮肤瘢痕癌 7 例，均治愈。随访 5 年以上者 4 例，均无复发。

(11) 苍耳草膏（甘肃中医学院学报，1999，3）

〔组成与用法〕 嫩苍耳草茎叶、冰片。将苍耳草洗净切细、熬膏，加适量研细冰片调匀，涂布于油纱上，覆盖病灶。

〔功能主治〕 攻毒祛瘀，化瘀消肿。主治皮肤癌。

〔临床报道〕 治疗 38 例皮肤癌，23 例治愈，15 例好转。

2. 皮肤癌早期体质较实者用方

(1) 清热解毒汤（中医杂志，1986，2）

〔组成与用法〕 生地 30g，赤芍 12g，马齿苋 30g，蒲公英 30g，忍冬藤 15g，连翘 15g，茯苓 30g，泽泻 12g，甘草 10g，水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒。主治皮肤癌。

(2) 开郁散加减 (王沛经验方)

〔组成与用法〕 柴胡 10g, 当归 10g, 白芍 30g, 茯苓 15g, 香附 10g, 郁金 15g, 天葵草 10g, 全蝎 3g, 白芥子 10g, 海藻 30g, 昆布 30g。水煎服。

〔功能主治〕 解郁化痰, 软坚散结。主治皮肤癌。

〔加减应用〕 若合并出血者, 加三七粉、白及, 并可外敷云南白药。

(3) 除湿解毒汤 (《常见癌症中药治疗》)

〔组成与用法〕 薏苡仁 30g, 白鲜皮 20g, 仙鹤草 20g, 大豆黄卷 10g, 土茯苓 10g, 山豆根、丹皮、连翘、紫花地丁、半枝莲、大蓟、小蓟各 5g。水煎服。

〔功能主治〕 清热凉血, 祛湿解毒。主治皮肤癌。

〔加减应用〕 糜烂瘙痒, 加苦参、地肤子。

(4) 菊藻丸 (萧梓荣经验方)

〔组成与用法〕 菊花 50g, 海藻 50g, 三棱 50g, 蚤休 50g, 制马钱子 50g, 金银花 75g, 漏芦 75g, 马蔺子 75g, 山慈菇 75g, 蜈蚣 25 条, 首乌 100g, 黄连 12.5g。炼蜜为丸, 口服, 1 次 2g, 1 日 3 次。

〔功能主治〕 清热解毒, 化瘀软坚。主治皮肤癌。

〔加减应用〕 若合并溃烂流血不止, 可用云南白药外敷。

(5) 三黄藁连汤 (上海市肿瘤医院方)

〔组成与用法〕 半枝莲 10g, 大黄 6g, 川芎 18g, 藁本 18g, 蔓荆子 18g, 菊花 18g, 金银花 18g, 黄芩 9g, 黄柏 9g, 红花 3g, 桃仁 3g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 活血止痛。主治皮肤癌。

〔加减应用〕 糜烂渗血者, 加三七粉、白及。

3. 皮肤癌中晚期体质较虚者用方

(1) 护肤解毒方 (中医杂志, 1982, 10)

〔组成与用法〕黄芪 30g，太子参 15g，白术 10g，百合 20g，赤芍 10g，当归 12g，野菊花 9g，蒲公英 25g，白花蛇舌草 30g，乳香 9g，没药 9g。水煎服。

〔功能主治〕益气活血，清热解毒。主治皮肤癌。

〔加减应用〕清热解毒，加金银花、连翘；除湿理气，加茯苓、厚朴、大腹皮；芳香健脾，加砂仁、陈皮。

(2) 活血化瘀汤方（《常见癌症中药治疗》）

〔组成与用法〕丹参 20g，白鲜皮 20g，当归 15g，赤芍 15g，莪术 15g，七叶一枝花 15g，桃仁、生首乌、僵蚕各 10g，山慈菇 30g，土茯苓 30g，蜈蚣 3 条，川芎 5g。水煎服。

〔功能主治〕活血化瘀，祛风解毒。主治皮肤癌。

〔对症用方〕

皮肤癌的对症治疗，主要根据患者主要临床表现进行选择，尤其要注意手术、放疗、化疗后的不良反应，重视祛邪，尽可能消除有害因素，如手术后的出血，放疗后、化疗后的毒性反应。

1. 皮肤癌手术后治疗专方

八珍汤加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕西洋参（蒸兑）10g，黄芪 15g，白术 10g，茯苓 10g，金银花 15g，知母 10g，生地 15g，当归 10g，鸡血藤 30g，黄芩 10g，丹皮 12g，枸杞子 12g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益气，活血解毒。主治皮肤癌手术后气血不足瘀毒未尽者。

〔加减应用〕气短汗出者，加浮小麦、煅龙骨（先煎）、煅牡蛎（先煎）；纳差者，加山药、神曲、麦芽；伤口处灼热者，加紫花地丁、连翘、蒲公英。

2. 皮肤癌放疗后治疗专方

沙参二冬汤（黎月恒经验方）

〔组成与用法〕麦冬 15g，天冬 15g，沙参 12g，石斛 12g，太子参 15g，白术 12g，茯苓 12g，旱莲草 15g，龟甲（先煎）15g，女贞子 15g，金银花 15g，紫花地丁 15，虻虫 10g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕养阴清热解毒。主治皮肤癌放疗后热毒伤阴者。

〔加减应用〕口干者，加芦根、玉竹、天花粉；五心烦热、盗汗者，加银柴胡、地骨皮、五味子；纳差者，加山药、神曲、麦芽。

3. 皮肤癌化疗后专方

癌复康方加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕白参（蒸兑）10g，黄芪 15g，白术 12g，茯苓 12g，枸杞子 12g，陈皮 10g，广木香 12g，女贞子 10g，菟丝子 10g，当归 12g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 30g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益肾，和胃理气。主治皮肤癌化疗后脾肾两亏、胃气不和者。

〔加减应用〕恶心呕吐者，加姜半夏、砂仁；肿块局部灼热者，加金银花、连翘；纳差者，加神曲、鸡内金。

4. 皮肤癌溃疡专方

生肌散（《癌症秘方验方偏方大全》）

〔组成与用法〕姜黄 45g，大海马 30g，黄柏 30g，丹皮 30g，炮山甲 30g，甘草 24g，雄黄 24g，生大黄 15g，全蝎 15g，冰片 4.5g，麝香 3g。外用。

〔功能主治〕清热燥湿，化腐生肌。主治皮肤癌肿块溃疡、溃烂难敛者。

〔加减应用〕若合并疼痛者，加白芷、郁金、延胡索。

5. 皮肤癌疼痛专方

（1）清热去痛膏（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕黄连 60g，黄柏 60g，黄芩 60g，郁金 60g，大黄 60g，栀子 60g，白芥子 60g，乌贼骨 60g，地龙 60g，白僵蚕 60g，密陀僧 60g，白及 60g，木鳖子仁 15g，朴硝 15g。外敷。

〔功能主治〕清热解毒，消肿止痛。主治皮肤癌致疼痛难忍者。

〔加减应用〕若寐不安者，加远志、合欢皮、灵芝。

(2) 砒矾散 (《癌症秘方验方偏方大全》)

〔组成与用法〕白砒 5g，明矾 6g，马钱子 3g，黄连素 1g，普鲁卡因 2g。研末外用。

〔功能主治〕软坚散结止痛。主治皮肤癌致疼痛难忍者。

〔加减应用〕若合并出血，加三七粉、白茅根、仙鹤草。

6. 皮肤癌渗液专方

(1) 燥湿散 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕龙葵 30g，景天 30g，黄连（去须）30g，天灵盖 30g，龙骨 15g，乳香 15g，木鳖子 15g，葵花 15g。外敷。

〔功能主治〕收敛燥湿。主治皮肤癌流脓水不止者。

〔加减应用〕若疼痛难忍，加川芎、延胡索、郁金。

(2) 泻火散加味 (《癌症秘方验方偏方大全》)

〔组成与用法〕生石膏 10g，藿香 15g，防风 15g，甘草 6g，炒栀子 20g，全蝎 2 条，全蜈蚣 3 条，僵蚕 1 条。水煎服。

〔功能主治〕清热泻火，燥湿收敛。主治皮肤渗液不止者。

〔加减应用〕若合并心烦失眠者，加灵芝、远志。

【专病单方】

1. 马钱子 用法：每取 10g，配紫草 50g、仙鹤草 30g 制成膏药，涂患处，1 日 3 次。功用：活血解毒。主治：皮肤癌。(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 斑蝥素片 用法：口服，1日0.5g，1日1次。功用：破血逐瘀，散结消肿，攻毒蚀疮。主治：皮肤癌湿热内蕴型及热毒蕴结型。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 野猪胆汁 用法：每取50g野猪胆汁捣葱白如泥，外敷患处。功用：清热解毒。主治：皮肤癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 山慈菇 用法：每取30g。捣烂涂敷患处。功用：化痰软坚。主治：皮肤癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 石见穿 用法：每取适量（鲜品为佳）捣烂或猪油调敷患处。功用：清热解毒散结。主治：皮肤癌溃破。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 生商陆根 用法：每取适量捣烂，加盐少许，外敷患处，同时阳和汤冲服犀黄丸。主治：足背皮肤癌，也可用于其他部位的皮肤癌。（秦伯未验方）

7. 天胡荽 用法：每取适量加水煎熬成膏，涂于患处。功用：清热解毒。主治：鳞状上皮癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

8. 全蝎 用法：每取7只黄泥封火煅烧后，研细，黄酒冲服，每周1次。同时取仙人掌，刮去皮刺，捣成泥状，敷患处。功用：解毒散结。主治：皮肤癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

9. 大蒜 用法：每取100g捣碎外敷患处，用纱布包之，2天换1次。主治皮肤癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

10. 补骨脂 用法：每取100g，将补骨脂浸泡于60度白酒250ml中15天，每天振摇2次，外涂患处，1日1次。主治：皮肤癌。（《中华肿瘤治疗大成》）

恶性黑色素瘤

恶性黑色素瘤系指一种来源于黑色素细胞的高度恶性肿瘤。其发病机制与紫外线照射、结构不良痣、遗传、外伤、内

分泌因素及免疫缺陷、免疫功能减退等因素有关。

本病属于中医黑疮、黑痣、恶疮、脱疽、历疽等范畴。主要病因病机为外邪侵入，毒积脉络，或毒积脏腑，真阴枯竭，阳气收束，最终导致气滞血瘀，日久成瘤。

【辨证用方】

恶性黑色素瘤首先辨明阴阳虚实。体表以无痛无痒，坚硬如核，长久难消，久则溃烂翻花者，为阴证；红肿痛痒，属阳证；虚证有气血阴阳之虚，实证有气滞、血瘀、痰结、湿聚毒火之辨，宜分而论之。

1. 痰湿凝聚证

主症：局部皮肤颜色或棕、或蓝、或黑、或白，发痒灼痛，或破溃，渗流黄汁，胸脘痞闷，舌淡红，苔白腻，脉滑濡。

治法：消痰散结，解毒止痛。

(1) 消核散加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕生牡蛎（先煎）30g，玄参10g，海藻10g，半夏10g，陈皮10g，当归10g，金银花15g，白术10g，苍术10g，苦参10g，知母10g，白英30g，白花蛇舌草30g。水煎服。

〔功能主治〕清热燥湿，化痰散结。主治恶性黑色素瘤。

〔加减应用〕纳呆，苔腻者，加薏苡仁、藿香；睡眠欠佳者，加柏子仁、夜交藤。

(2) 二陈汤加消瘿丸加减（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕半夏10g，茯苓15g，陈皮10g，甘草5g，玄参10g，生牡蛎20g，贝母10g，夏枯草15g，山慈菇10g，水煎服。

〔功能主治〕化痰散结。主治恶性黑色素瘤。

〔加减应用〕脾虚者，加茯苓、怀山药、白术、黄芪；肝郁者，加郁金、青皮、柴胡；血瘀者，加丹参、赤芍、桃仁、

三七、三棱、莪术等。

2. 气滞血瘀证

主症：局部皮肤颜色或灰、或蓝黑色，刺痛，或硬结，或溃破，渗血，胸胁胀满，心烦失眠，舌质黯红，有瘀斑，苔薄白，脉弦涩。

治法：行气活血，化瘀散结。

(1) 桃红四物汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕桃仁 10g，红花 10g，当归 10g，赤芍 15g，川芎 10g，三棱 10g，莪术 10g，蒲黄炭 10g，石见穿 30g，薏苡仁 15g，木通 10g，广木香 10g，柏子仁 10g，甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕健脾益气，化瘀散结。主治恶性黑色素瘤。

〔加减应用〕脘痞，舌苔厚腻，兼痰湿者，加法半夏、瓜蒌、佩兰；大便秘结者，加大黄（后下）、郁李仁。

(2) 身痛逐瘀汤（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕秦艽 6g，川芎 5g，桃仁 10g，红花 10g，甘草 6g，羌活 5g，当归 10g，五灵脂（炒）6g，香附 5g，牛膝 10g，地龙 6g。水煎服。

〔功能主治〕活血化瘀，理气止痛。主治恶性黑色素瘤。

〔加减应用〕气滞者，加香附、延胡索；气虚者，加党参、黄芪、太子参；血虚者，加当归、川芎、阿胶、赤芍、何首乌。

3. 热毒蕴结证

主症：局部皮肤黑红、灼痛，或破溃流水，形体羸弱，口干口渴，大便秘结，小便短赤，舌质红，苔黄，脉弦数。

治法：清热解毒，活血散结。

(1) 五味消毒饮加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕蒲公英 30g，金银花 15g，野菊花 15g，冬葵子 15g，紫花地丁 10g，黄芪 15g，白术 10g，山豆根 15g，

红花 10g, 赤芍 15g, 大黄 (后下) 6g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕活血化瘀, 软坚散结。主治恶性黑色素瘤。

〔加减应用〕肿块刺痛, 舌质瘀黯者, 加桃仁、延胡索; 热入营血至出血、瘀斑, 渴不欲饮, 舌绛无苔, 加水牛角、丹皮、紫草、生地; 热盛伤阴者, 加生地、玄参、天花粉。

(2) 加味菊藻丸 (萧梓荣经验方)

〔组成与用法〕菊花、海藻、三棱、莪术、党参、黄芪、金银花、山豆根、山慈菇、漏芦、黄连各 100g, 蚤休、马蔺子各 75g, 制马钱子、制蜈蚣各 50g, 紫草 25g, 熟大黄 15g。共研粉末为梧桐子丸, 每次 25~30 粒, 1 日 2~3 次。

〔功能主治〕清热解毒, 化瘀软坚。主治恶性黑色素瘤。

〔加减应用〕配合外用五虎丹糊剂。

4. 气血两虚证

主症: 局部皮肤颜色呈棕色或黑色, 溃破流水, 绵绵难愈, 精神疲惫, 四肢乏力, 面色无华, 舌质淡红, 苔薄白, 脉沉细无力。

治法: 补气养血, 解毒燥湿。

八珍汤加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕党参 15g, 茯苓 12g, 白术 10g, 当归 10g, 赤芍 15g, 熟地 10g, 川芎 10g, 山豆根 6g, 黄芪 20g, 苦参 10g, 苍术 10g, 白花蛇舌草 30g, 蒲公英 15g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕益气活血, 解毒燥湿。主治恶性黑色素瘤。

〔加减应用〕腰膝酸软者, 加杜仲、川断、菟丝子; 胃纳欠佳者, 加山药、白术、鸡内金。

【辨病用方】

恶性黑色素瘤的辨病治疗, 主张扶正祛邪并重, 局部与整体结合治疗; 但早期不主张局部外敷药物, 以免局部刺激致扩

散。内服汤剂应根据病期早晚、体质强弱分而论之。

1. 黑色素瘤早期体质较实者用方

(1) 贝母夏枯汤 (四川中医, 1983, 5)

[组成与用法] 当归 30g, 玄参 30g, 金银花 30g, 陈皮 30g, 紫荆皮 30g, 牡蛎 30g, 贝母 12g, 儿茶 15g, 夏枯草 6g, 黑木耳 30g, 黄药子 10g, 半枝莲 60g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 软坚散结。主治恶性黑色素瘤。

[加减应用] 肿块刺痛, 舌质瘀黯者, 加桃仁、延胡索。

(2) 蛇莓木耳汤 (四川中医, 1983, 5)

[组成与用法] 黑木耳 30g, 木贼 30g, 玄参 12g, 牡蛎 30g, 夏枯草 60g, 橘红 12g, 重楼 30g, 荆皮 30g, 半枝莲 30g, 蛇莓 60g, 白花蛇舌草 60g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒, 活血消肿。主治恶性黑色素瘤。

[加减应用] 若合并夜寐不安者, 加灵芝、远志、合欢皮。

(3) 石膏知母汤 (四川中医, 1993, 1)

[组成与用法] 生石膏 (先煎) 45g, 知母 12g, 玄参 12g, 黄芩 9g, 黄连 9g, 桔梗 9g, 厚朴 9g, 生地 15g, 芦根 15g, 瓜蒌 18g, 蒲公英 20g, 白花蛇舌草 30g, 生甘草 9g。水煎服。

[功能主治] 清热解毒。主治恶性黑色素瘤。

[加减应用] 口干口苦, 苔腻, 加胆南星。

(4) 皂角贝母汤 (广西中医药, 1987, 5)

[组成与用法] 皂角刺 10g, 土贝母 15g, 了歌王 (先煎) 10g, 三七粉 (吞服) 3g, 喜树 10g, 野百合 15g, 肿节风 10g, 半枝莲 15g, 蜈蚣 3 条, 全蝎粉 (吞服) 3g, 廋虫 9g。水煎服。

[功能主治] 活血解毒通络。主治恶性黑色素瘤。

(5) 除湿胃苓汤 (《中西医肿瘤诊治大全》)

[组成与用法] 炒苍术 10g, 厚朴 6g, 陈皮 10g, 猪苓 10g, 泽泻 10g, 白术 10g, 滑石 6g, 木通 6g, 肉桂 3g, 灯心

草 2.5g, 茵陈 9g, 生甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 健脾化湿。主治恶性黑色素瘤

[加减应用] 气虚明显, 加黄芪、党参、怀山药。

2. 黑色素瘤晚期体质较虚者用方

(1) 滋肾解毒汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

[组成与用法] 丹皮 10g, 山茱萸 10g, 茯苓 10g, 女贞子 12g, 枸杞子 12g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 30g, 生地 12g, 熟地 5g, 怀山药 10g。水煎服。

[功能主治] 益肾养肝解毒。治疗恶性黑色素瘤致肝肾阴虚者。

[加减应用] 合并失眠多梦者, 加酸枣仁、夜交藤。

(2) 蛇莓牡蛎汤 (四川中医, 1983, 5)

[组成与用法] 何首乌 30g, 狗脊 30g, 荆皮 30g, 木贼 30g, 重楼 30g, 玄参 15g, 牡蛎 20g, 蛇莓 60g, 半枝莲 60g, 白花蛇舌草 60g, 黑木耳 30g。水煎服。

[功能主治] 养阴清热, 解毒散结。主治恶性黑色素瘤。

[加减应用] 合并疼痛者, 加五灵脂、郁金、延胡索。

(3) 加味桃红四物汤 (《中西医结合肿瘤治疗大全》)

[组成与用法] 当归 15g, 黄芪 15g, 黄芩 9g, 生地 15g, 熟地 9g, 天冬 10g, 麦冬 10g, 天花粉 9g, 红花 6g, 桃仁 6g, 川芎 10g, 白芍 15g, 何首乌 20g, 甘草 6g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴, 活血润肤。主治恶性黑色素瘤。

(4) 扶正抑黑汤 (中医函授通讯, 1996, 3)

[组成与用法] 黄芪 50g, 人参 4g, 炒白术 15g, 茯苓 15g, 当归 10g, 白芍 30g, 生地 20g, 石斛 10g, 藤梨根 30g, 猫爪草 30g, 白花蛇舌草 30g, 夏枯草 10g, 七叶一枝花 20g, 石见穿 10g, 鳖甲 10g, 薏苡仁 30g。水煎服。

[功能主治] 滋阴清热, 益气养血, 化瘀解毒。主治恶性黑色素瘤。

3. 黑色素瘤外用方

五虎丹糊剂（湖北中医杂志，1982，4）

〔组成与用法〕 五虎丹结晶 1.2g（水银、白矾、牙硝各 180g，食盐 90g，按升丹法炼制，练成白色结晶），蟾酥、红娘、斑蝥（去头足）各 0.5g，洋金花 1g。涂于溃疡面以普通膏药覆盖之。

〔功能主治〕 燥湿化痰，软坚散结。主治恶性黑色素瘤。

【对症用方】

恶性黑色素瘤的对症治疗，要根据患者主要症状（出血、疼痛、溃烂等）进行选择用药。同时要重视手术、化疗后不良反应，重视扶正。

1. 恶性黑色素瘤出血不止者治疗方

鹤草止血散（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 仙鹤草 30g，血余炭 30g，血见愁 20g，白及 15g，三七粉（冲服）6g。水煎服。

〔功能主治〕 止血消肿。主治恶性黑色素瘤出血不止者。

〔加减应用〕 若合并疼痛者，加川芎、延胡索、郁金。

2. 恶性黑色素瘤疼痛难忍者治疗方

白屈止痛散（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 白屈菜 20g，防风 10g，防己 15g，延胡索 10g，白芷 20g，干蟾皮 15g。水煎服。

〔功能主治〕 活血止痛。主治恶性黑色素瘤致疼痛难忍者。

〔加减应用〕 若合并夜寐不安者，加远志、合欢皮、炒枣仁。

3. 手术后治疗专方

八珍汤加减（潘敏求经验方）

〔组成与用法〕 白参或西洋参（蒸兑）10g，黄芪 15g，白术 10g，茯苓 10g，金银花 15g，知母 10g，生地 15g，当归

10g, 鸡血藤 30g, 黄芩 10g, 丹皮 12g, 枸杞子 12g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气, 活血解毒。用于术后余毒未净。

〔加减应用〕 气短汗出者, 加浮小麦、煅龙骨(先煎)、煅牡蛎(先煎); 纳差者, 加山药、神曲、麦芽; 伤口处灼热者, 加紫花地丁、连翘、蒲公英。

4. 放疗后治疗专方

(1) 二竹参麦汤(黎月恒经验方)

〔组成与用法〕 沙参 15g, 麦冬 15g, 玉竹 15g, 桑白皮 15g, 天花粉 15g, 菊花 15g, 金银花 12g, 连翘 12g, 竹叶 10g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 10g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养阴, 清热解毒。主治放疗后发热。

〔加减应用〕 若呕吐恶心, 加竹茹、陈皮; 体虚乏力, 加白参(蒸兑)、黄芪。

(2) 黄精二冬汤(《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 丹参 15g, 怀山药 12g, 茯苓 10g, 生地 9g, 麦冬 12g, 沙参 10g, 石斛 10g, 天冬 12g, 黄精 12g, 太子参 12g, 枸杞子 12g, 白术 12g, 白花蛇舌草 30g, 白英 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 养阴清热, 化瘀散结。主治放疗后热毒伤阴。

〔加减应用〕 肿块局部发热者, 加黄芩、连翘; 食欲不振者, 加麦芽、谷芽、山楂、神曲; 失眠烦躁者, 加酸枣仁、五味子。

(3) 紫黄鸡汤(《中西医临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕 黄芪 15g, 全当归 12g, 白芍 12g, 紫丹参 15g, 乌药 9g, 鸡血藤 30g, 干地黄 30g, 黄芩 9g, 炙甘草 5g。

〔功能主治〕 益气养血, 滋阴清热。主治放疗后阴血亏虚。

〔加减应用〕 放疗后血细胞下降, 加女贞子、旱莲草。

(4) 养津汤 (《中西医临床肿瘤学》)

[组成与用法] 雪梨干 60g, 芦根 30g, 天花粉 15g, 麦冬 9g, 生地 9g, 桔梗 9g, 芥菜 15g, 杭菊花 12g。水煎服。

[功能主治] 养阴生津。

[加减应用] 乏力神疲, 加黄芪、党参。

5. 化疗后治疗专方

(1) 癌复康加减方 (潘敏求经验方)

[组成与用法] 白参 (蒸兑) 10g, 黄芪 30g, 白术 10g, 茯苓 10g, 陈皮 10g, 枸杞子 12g, 女贞子 15g, 旱莲草 15g, 菟丝子 12g, 鸡血藤 30g, 夏枯草 15g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 10g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾, 补气养血。

[加减应用] 若腰酸耳鸣, 加仙灵脾、石菖蒲; 恶心呕吐者, 加姜半夏、砂仁; 纳差者, 加鸡内金、山楂; 腹泻者, 加吴茱萸、黄连; 失眠者, 加酸枣仁; 潮热盗汗者, 加丹皮、山萸肉、煅牡蛎、五味子。

(2) 竹茹半夏汤加减 (《中西医临床肿瘤学》)

[组成与用法] 党参 20g, 姜半夏 10g, 枳实 10g, 陈皮 10g, 茯苓 15g, 姜竹茹 20g, 甘草 6g, 炙杷叶 15g, 苏叶 10g, 黄连 3g。水煎服。

[功能主治] 健脾理气, 和胃降逆。

[加减应用] 腹胀喜按者, 加砂仁、焦三仙; 气虚多汗者, 加黄芪、白术; 胃脘不适, 吞酸嘈杂、吐苦水者, 加黄连。

(3) 鸡血黄芪汤 (《中西医临床肿瘤学》)

[组成与用法] 补骨脂 10g, 淫羊藿 6g, 女贞子 15g, 山萸肉 10g, 黄芪 30g, 大枣 5 枚, 当归 12g, 丹参 15g, 鸡血藤 30g, 三七粉 (冲) 3g, 虎杖 10g, 胎盘粉 (冲服) 10g。

[功能主治] 健脾补肾, 养血活血。

[加减应用] 可同时内服如意金黄散。

软组织恶性肿瘤

软组织恶性肿瘤，又称为软组织肉瘤，系指起源于纤维、脂肪、平滑肌、横纹肌、间皮、滑膜、血管、淋巴管等间叶组织并且位于软组织部位（内脏器官除外）的恶性肿瘤。其发生与外伤、家族遗传、异物、化学刺激、病毒、创伤、放射线等因素有关。

本病属中医筋瘤、血瘤、肉瘤、气瘤、脂瘤等范畴。其病因病机为素体肾气亏虚，又感湿浊毒邪，以致气机郁滞，气、血、痰、毒壅滞于肌腠，结成瘤块所致。

【辨证用方】

软组织恶性肿瘤的辨证重在辨别湿、热、虚、瘀。若肿块增长迅速，表面出现红色或黯紫色，伴有疼痛者，多为热、瘀，为实证；若肿块常伴糜烂渗液，面色苍白，倦怠无力，多为湿证、虚证。

1. 痰湿凝聚证

主症：机体各部可有单发或多发性包块，面足虚浮，倦怠无力，胸胁满闷，恶心呕吐，大便稀溏，舌淡红苔白腻，脉滑或濡。

治法：消痰散结，健脾化湿。

海藻玉壶汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕海藻 15g，昆布 15g，海带 15g，半夏 10g，青皮 6g，陈皮 10g，土贝母 10g，制胆南星 9g，炒白术 15g，白芥子 10g，薏苡仁 20g，瓜蒌 10g，生牡蛎（先煎）30g，土茯苓 30g。水煎服。

〔功能主治〕健脾利湿，化痰散结。主治软组织恶性肿瘤痰湿凝聚证。

〔加减应用〕肿块较硬、刺痛者，加丹参、桃仁、蚤休；

痰热化火、舌红苔黄者，加黄芩、栀子；纳差，便溏者，加茯苓、山药、砂仁。痰热化火者，加五味消毒饮。

2. 热毒蕴结证

主症：瘤体速增，红色或黯紫色，发亮，烘热，或见瘤体破溃腐臭、渗液，全身发热，烦躁易怒，身痛口干，大便干结，小便黄赤，舌质红绛，舌苔黄腻，脉弦数或滑数。

治法：清热解毒，消肿散结。

(1) 清瘟败毒饮加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 生石膏（先煎）30g，生地 10g，水牛角（先煎）30g，黄连 6g，炒栀子 10g，黄芩 15g，知母 10g，赤芍 10g，玄参 10g，连翘 15g，夏枯草 15g，泽泻 15g，蚤休 30g，白花蛇舌草 30g，山慈菇 30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，化瘀软坚。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 纳差者，加茯苓、山药、鸡内金、麦芽；夜寐不安者，加酸枣仁、柏子仁。

(2) 软组织肉瘤实用方（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕 紫花地丁 30g，蒲公英 15g，野菊花 15g，夏枯草 15g，金银花 15g，半枝莲 15g，大青叶 10g，板蓝根 30g，白花蛇舌草 30g，穿山甲 15g，山慈菇 15g，蚤休 15g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，消肿散结。主治软组织肉瘤。

〔加减应用〕 夹湿热者，加龙胆草。肿块质地较硬者，加皂角刺。

(3) 仙方活命饮加减（《中西医肿瘤诊疗大全》）

〔组成与用法〕 金银花 12g，紫花地丁 30g，白芷 12g，当归尾 12g，天花粉 30g，穿山甲 12g，皂角刺 12g，白英 12g，半枝莲 10g，夏枯草 15g，草河车 10g，蒲公英 30g，黄芩 10g，黄连 3g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒，消肿散结。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕少气懒言者，加黄芪。

(4) 犀角汤（《古今名医临证金鉴·肿瘤卷》）

〔组成与用法〕水牛角、木香各 22.5g，连翘、栀子仁、射干、当归（切焙）、升麻、赤芍、玄参、枳壳（麸炒）、甘草各 30g，大黄（炒）60g，以上锉碎，每服用 9g，水一盞煎至六分，去渣，不拘时温服。

〔功能主治〕清热凉血，行气止痛。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕热毒气盛，肿硬疼痛，口干烦闷，加蒲公英、皂角刺。

(5) 沉香汤（《古今名医临证金鉴·肿瘤卷》）

〔组成与用法〕沉香、防风（去叉）、木香各 22.5g，麦门冬（去心）、当归（切焙）、枳壳（麸炒）、独活（去芦）、羚羊角屑、升麻、玄参、地骨皮、赤芍、甘草（生，锉）各 30g，大黄（锉，炒）60g。以上锉碎，每服 12g，水一盞半煎至七分，去渣，不拘时温服。

〔功能主治〕养血滋阴解痉。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕肿毒结硬、四肢拘急不得卧者，加石斛、生地。

3. 瘀血阻滞证

主症：面黯消瘦，四肢、肩背或腹膜部肿块，伴刺痛，痛有定处，有单发或多发性肿块，表面皮色正常或青紫，面色晦黯，口干口苦，舌质淡红或黯红有瘀斑，苔薄白，脉细数或涩。

治法：活血化瘀，软坚散结。

桃红四物汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕桃仁 10g，红花 10g，赤芍 15g，当归尾 10g，川芎 6g，制乳香 10g，制没药 10g，海藻 10g，昆布 10g，穿山甲（先煎）10g，皂角刺 10g，茯苓 12g。水煎服。

〔功能主治〕活血化瘀，软坚止痛。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 胸胁胀满、气促或腹胀者，加桑白皮、厚朴、大腹皮。

4. 肝肾阴虚证

主症：肿块增大，时破溃渗液，局部或全身疼痛，口干口苦，五心烦热，腰膝酸软，厌食，形体羸弱，舌质红赤或红绛，舌面光剥无苔或少苔，脉弦细或细数无力。

治法：滋补肝肾，解毒散结。

大补阴丸加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 生地 15g，龟甲（先煎）15g，知母 10g，黄柏 10g，石斛 10g，女贞子 10g，菟丝子 10g，黄芪 15g，枸杞子 10g，丹皮 10g，麦冬 15g，白花蛇舌草 30g，白英 30g。水煎服。

〔功能主治〕 滋阴潜阳，化瘀软坚。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 胸闷气促、有胸腔积液者，加葶苈子、木防己、白芥子；腹胀甚者，加大腹皮、莱菔子；失眠多梦者，加酸枣仁、远志。

5. 气血两虚证

主症：肿块溃烂，绵绵不愈，疼痛，面色苍白，心悸怔忡，倦怠无力，少气懒言，四肢倦怠，食纳日减，形体消瘦，舌淡红，苔薄白，脉沉细。

治法：补气养血，散结止痛。

（1）八珍汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 党参 15g，生黄芪 15g，白术 10g，茯苓 12g，熟地 15g，当归 12g，赤芍 15g，川芎 10g，枸杞子 10g，桃仁 10g，红花 10g，蚤休 30g，白花蛇舌草 30g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血，化瘀散结。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 自汗者，加防风、浮小麦、煅牡蛎；口干者，加麦冬、石斛、天花粉；食欲不振者，加山楂、神曲。

（2）香贝养荣汤（《古今名医临证金鉴·肿瘤卷》）

〔组成与用法〕 白术（土炒）6g，人参、茯苓、陈皮、熟地黄、川芎、当归、贝母（去心）、香附（酒炒）、白芍（酒炒）各3g，桔梗、甘草各1.5g，姜2片，枣2枚。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血，行瘀散结。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 胸膈痞闷者，加枳壳、木香；饮食不甘者，加厚朴、苍术；寒热往来者，加柴胡、地骨皮；脓溃作渴者，倍人参、当归、白术，加黄芪；脓多或清者，倍当归、川芎；肋下痛或痞者，加青皮、木香；肌肉生迟者，加白蔹、肉桂；痰多者，加半夏、橘红；口干者，加麦冬、五味子；发热者，加柴胡、黄芪；渴不止者，加知母、赤小豆；溃后反痛者，加熟附子、沉香；脓不止者，倍人参、当归，加黄芪；虚烦不眠者，倍人参、熟地，加远志、枣仁。

【辨病用方】

软组织恶性肿瘤的辨病治疗，注重毒、瘀、湿三方面，治以解毒、化瘀、祛湿为主，并根据病期早晚，体质强弱酌情选用益气、养血、温阳之品。

1. 软组织肿瘤各期体质较实者用方

（1）夏枯牡蛎方（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕 生牡蛎（先煎）30g，夏枯草30g，三棱9g，莪术9g，浙贝母30g。水煎服。

〔功能主治〕 清热化痰，化瘀软坚。主治软组织恶性肿瘤属痰瘀阻滞，热毒蕴结型。

〔加减应用〕 夜寐不安者，加灵芝、合欢皮、酸枣仁。

（2）桃红四物汤加减（《中西医临床肿瘤学》）

〔组成与用法〕 赤芍、葛根、当归、桃仁、苏木各10g，贝母、川芎、桂枝、大枣、红花、儿茶、血竭各6g，甘草、生姜各3g，王不留行30g。水煎服。

〔功能主治〕 活血化瘀，清热解毒。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 肿块坚硬、刺痛，加制乳香、制没药。

(3) 斑蝥祁蛇汤 (《中西医临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕 白花蛇舌草、白茅根、杏仁、海藻、牡蛎、薏苡仁、白芥子、延胡索、桂枝、香附、代赭石、肉桂各 10g, 百部、半枝莲、黄药子、二丑、槟榔、麦冬各 20g, 蛤蟆 2 个, 斑蝥 3 个, 制麻黄 6g, 蝉蜕 10g, 祁蛇 10g。水煎服。

〔功能主治〕 祛瘀攻毒。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 合并肝肾亏虚, 加服六味地黄丸; 并气虚, 加服补中益气丸。

2. 软组织肿瘤中晚期体质较虚者用方

(1) 三白消瘤汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 肿节风 15g, 白毛藤 20g, 白花蛇舌草 20g, 绞股蓝 15g, 天花粉 15g, 猪苓 15g, 茯苓 12g, 白术 10g, 太子参 15g, 甘草 3g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 活血化瘀。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 若合并出血者, 加三七粉、仙鹤草, 并可用云南白药外敷。

(2) 二甲海藻汤 (《中华肿瘤治疗大成》)

〔组成与用法〕 夏枯草 30g, 生牡蛎 30g, 白花蛇舌草 30g, 海藻 15g, 昆布 15g, 猪苓 15g, 山豆根 6g, 茯苓 15g, 泽泻 21g, 穿山甲 9g, 鳖甲 9g, 路路通 9g, 木瓜 9g, 橘核 9g, 荔枝 9g, 牛膝 12g, 石斛 12g, 党参 12g, 黄芪 12g, 白术 12g。水煎服。

〔功能主治〕 清热解毒, 益气化痰。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 气阴两虚者, 加生晒参 (另煎)、玄参、麦冬。

(3) 白金皂刺汤 (《中西医临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕 皂刺 15g, 桂枝 5g, 连翘 8g, 白蒺藜 10g, 胆南星 10g, 白金丸 10g, 紫花地丁 10g, 蒲公英 10g, 白芥子

10g, 炒当归 10g, 赤芍 10g, 生地 10g, 煅牡蛎 30g。水煎服。

〔功能主治〕 软坚化瘀, 清热解毒。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 乏力神疲者, 加人参、黄芪。

(4) 海藻昆布汤 (《中西医临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕 生黄芪 30g, 党参 15g, 白术 12g, 当归 15g, 金银花 30g, 连翘 30g, 蒲公英 30g, 赤芍 12g, 郁金 9g, 海藻 15g, 昆布 15g, 陈皮 9g, 法半夏 9g。水煎服。

〔功能主治〕 益气养血, 活血解毒, 化痰软坚。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 纳差者, 加鸡内金、炒山楂。

(5) 透骨银莲方 (《中西医临床肿瘤学》)

〔组成与用法〕 生黄芪 15g, 透骨草 30g, 银花藤 15g, 川牛膝 30g, 伸筋草 30g, 野白术 10g, 党参 10g, 紫草 18g。水煎服。独角莲 4.5g, 研末分 3 次吞服。

〔功能主治〕 益气托里, 清热解毒。主治软组织恶性肿瘤。

〔加减应用〕 肿物溃破, 用独角莲 30g 加轻粉 6g 共同研制成生肌散外敷, 1 日换药 1 次或隔 2~3 日换药 1 次。

【对症用方】

软组织恶性肿瘤的对症用方, 除根据患者主要症状选择合适的药物外, 还要重视属于手术后、放疗后、化疗后的治疗, 重视扶正祛邪, 尽早消除有害因素, 减轻手术、放疗、化疗后并发症及不良反应。

1. 软组织恶性肿瘤手术后专方

八珍汤加减 (潘敏求经验方)

〔组成与用法〕 白参或西洋参 (蒸兑) 10g, 黄芪 15g, 白术 10g, 茯苓 10g, 金银花 15g, 知母 10g, 生地 15g, 当归 10g, 鸡血藤 30g, 黄芩 10g, 丹皮 12g, 枸杞子 12g, 白花蛇舌草 30g, 甘草 5g。水煎服。

〔功能主治〕 健脾益气, 活血解毒。主治软组织恶性肿瘤。

[加减应用] 气短汗出者，加浮小麦、煅龙骨（先煎）、煅牡蛎（先煎）；纳差者，加山药、神曲、麦芽；伤口处灼热者，加紫花地丁、连翘、蒲公英。

2. 软组织恶性肿瘤放疗后专方

二竹参麦汤（黎月恒经验方）

[组成与用法] 沙参 15g，麦冬 15g，玉竹 15g，桑白皮 15g，天花粉 15g，菊花 15g，金银花 12g，连翘 12g，竹叶 10g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 30g，甘草 10g。水煎服。

[功能主治] 益气养阴，清热解毒。主治软组织恶性肿瘤。

[加减应用] 若呕吐恶心，加竹茹、陈皮；体虚乏力者，加白参（蒸兑）、黄芪。

3. 软组织恶性肿瘤化疗后专方

（1）癌复康加减方（潘敏求经验方）

[组成与用法] 白参（蒸兑）10g，黄芪 30g，白术 10g，茯苓 10g，陈皮 10g，枸杞子 12g，女贞子 15g，旱莲草 15g，菟丝子 12g，鸡血藤 30g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 30g，甘草 10g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾，补气养血。主治软组织恶性肿瘤。

[加减应用] 若腰酸乏力，加仙灵脾、杜仲；恶心呕吐者，加姜半夏、砂仁；纳差者，加鸡内金、山楂；腹泻者，加吴茱萸、黄连；失眠者，加酸枣仁；大便秘结者，选加大黄、麻仁；潮热盗汗者，加丹皮、山萸肉、煅牡蛎、五味子。

（2）扶正健脾汤（《中西医结合防治肿瘤》）

[组成与用法] 生黄芪 20g，党参 15g，白术 12g，茯苓 12g，甘草 3g，熟地 15g，枸杞子 12g，何首乌 12g，黄精 10g，女贞子 15g，沙参 10g，麦冬 10g，鸡血藤 24g，芡实 15g，怀山药 12g。水煎服。

[功能主治] 健脾益肾，养阴补血。主治软组织恶性肿瘤。

[加减应用] 恶心呕吐，选加姜半夏、竹茹；腹胀，加佛

手干、建耑；食欲不振者，加鸡内金、麦谷芽；口干舌燥者，加石斛、天冬；大便秘结者，选加大黄、麻仁；腹泻者，加罌粟壳、黄连；脾胃虚寒者，加干姜；失眠者，加枣仁、夜交藤；水肿者，加车前子、泽泻；贫血者，加当归、紫河车；发热者，选加石膏、青蒿；咳嗽者，加川贝、枇杷叶；便血者，选加地榆、血余炭。

4. 软组织恶性肿瘤致红肿、溃破者治疗方

儿茶梅竭膏（《中华肿瘤治疗大成》）

〔组成与用法〕麝香 0.15g，梅片 10g，红花 30g，儿茶 10g，乳香 20g，没药 20g，黄连 10g，黄柏 15g，白芷 15g，血竭 10g，独角莲 15g，自然铜 9g，黄芩 15g。共研细末，制成膏剂。外敷患处。

〔功能主治〕清热解毒，燥湿止血。主治软组织恶性肿瘤肿块红肿、溃破者。

〔加减应用〕若合并疼痛者，加郁金、川芎、延胡索。

【专病成药】

如意金黄散（《中华人民共和国卫生部药品标准》）

〔处方组成〕大黄、黄柏、姜黄、白芷、天花粉、生南星等。

〔功能主治〕清火散瘀、消肿止痛。对软组织肉瘤表现为肿块高起，灼热疼痛，皮色焮红，舌红苔黄，脉滑数，中医辨证属气血凝滞、火毒蕴结者较为适宜。（潘敏求经验方）

〔用法用量〕本药为散剂。每袋 15g。取适量以茶水、食醋调成糊状外敷。

【专病单方】

1. 浙贝母 用法：每取 30～60g，水煎服。功用：化痰软坚。主治：软组织恶性肿瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 寻骨风 用法：每取 30～60g，水煎服，1 日 1 剂，分 2 次服。功用：清热解毒。主治：软组织恶性肿瘤。（《中华肿瘤

治疗大成》)

3. 绞股蓝 用法：每取 30g，煎汤代茶，1 日 1 剂，常服。功用：益气养血。主治：软组织肉瘤虚证。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 龙葵 用法：每取 60~90g，水煎，1 日 1 剂，分 2 次服。功用：祛湿解毒。主治：纤维肉瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 独角莲 用法：每取 30g，配轻粉 6g。上药研末外敷，1 日换药 1 次，或隔日 1 次。功用：清热解毒。主治：滑膜肉瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 生何首乌 用法：每取 250g，配生蚤休 60g。将二药捣泥外敷，每日早、晚换药 1 次。功用：解毒益血。主治：脂肪瘤。（《中华肿瘤治疗大成》）

下篇

药 物 篇

清热解毒类药

一枝黄花

本品系菊科植物一枝黄花的全草。味辛、苦，性凉；归肝、胆经。清热解毒，疏风消肿。主治肝癌、甲状腺肿瘤、舌癌、喉癌；亦可用于感冒头痛、咽喉肿痛、黄疸、疮疡肿毒、皮肤瘙痒等。10~15g，水煎服。外用鲜品捣烂敷或水煎洗。本品有毒，服用过多，可引起狂乱；长期服用，引起胃肠出血。不宜久煎。

【临床应用】

1. 治舌癌 一枝黄花 15g，加水 500ml，煮沸，每日漱口。（《中华肿瘤治疗大成》）
2. 治食管癌 一枝黄花、大蓟根各 100g，玄参 150g，鲜青风藤 100g。水煎服，每日 1 剂。（《抗癌中草药大辞典》）
3. 治甲状腺肿瘤 一枝黄花 15g，韩信草、马兰各 12g，星宿菜 24g。水煎，分 3 次服，每日 1 剂，20 天为一疗程。肿物消退后仍续服 1~3 个疗程。（《福建药物志》）

【配伍经验】

本品配白花蛇舌草、半枝莲，治肝癌；配板蓝根、大青叶，治癌性发热。

【药理作用】

1. 抗癌作用 本品甲醇提取物对腹水型肉瘤 S₁₈₀ 有较强的抑制作用。（《中华肿瘤治疗大成》）
2. 促进免疫作用 本品有增强白细胞吞噬功能的作用。（《抗癌中草药大辞典》）

十大功劳

本品系小檗科灌木植物华南十大功劳的茎叶。同属植物阔叶十大功劳及狭叶十大功劳亦入药用。味苦，性寒；归肺、肝经。滋阴清热，解毒消肿。主治鼻咽癌、肺癌、乳腺癌、肝癌、恶性滋养细胞肿瘤；亦可用于咽喉肿痛、肺结核、肝炎、肠炎、痢疮肿毒。干品 15~30g，水煎服；鲜品 30~60g，外用捣烂或研末调敷。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 十大功劳 60g，鲜石榴皮 120g，夏枯草 45g，甘草 9g。水煎服，每日 1 剂，早晚 2 次分服。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治肝癌 十大功劳叶 30g，龙葵叶 30~60g，水煎服，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 治绒毛膜癌、恶性葡萄胎 十大功劳根 30g，龙葵 90g，白英 30g，白花蛇舌草 30g，菝葜根 30g。水煎服，每日 1 剂。（《千家妙方》）

【配伍经验】

本品配白英、仙鹤草，治宫颈癌；配旱莲草、仙鹤草、蚤休，治肺癌咯血；配天葵子，治鼻咽癌有颈淋巴结转移者；配菝葜、石榴叶，治肠癌泻利；配苦参，治皮肤癌。

【药理作用】

抗癌作用 华南十大功劳叶所含成分异汉防己碱有抗艾氏腹水癌作用。（《抗癌中药药理与应用》）阔叶十大功劳可抑制肿瘤活性，对人体鼻咽癌细胞毒作用很强。（中医药研究，2002，5）

了哥王

本品系瑞香科莪花属植物南岭莪花的根及根皮。味苦、辛，性寒，有毒；归肺经。清热解毒，消肿散结，祛湿化痰。主治恶性淋巴瘤、肺癌、宫颈癌、乳腺癌等；亦可用于癌性胸、腹水，及扁桃体炎、肺炎、风湿性关节炎等。10~20g，水煎服。本品有剧毒，内服时宜久煎至少3小时以上，方可降低其毒性。外用捣敷，研末调敷或煎水洗。孕妇忌用。

【临床应用】

1. 治肺癌 白花了哥王水剂 60ml，每日1次，2天为一疗程。（《新医药通讯》）

2. 治肝癌 了哥王根 15g，莪术 15g，甘草 10g。先将了哥王根加水煎3个半小时，再加入莪术、甘草煎煮30~50分钟，取汁。每日1~2剂，分2~3次饮服。（《抗癌中药》）

3. 治乳腺癌 了哥王根 30~60g，研末，用冷开水或米酒调服。（《湖南中草药单方验方选编》）

4. 治恶性淋巴瘤 了哥王根 30g，久煎4小时以去毒，然后内服，每日1剂。（《福建民间草药》）

5. 治皮肤癌 鲜了哥王 1500g，水煎，煎液浓缩至浸膏状，趁热加无水羊毛脂 100g 混匀，再加凡士林 200g，温热混匀，不断搅拌，制成了哥王软膏，时时涂用。（《中草药学》）

【配伍经验】

本品配夏枯草，治恶性淋巴瘤；配半边莲、陈葫芦，治癌性腹水。

【药理作用】

抗肿瘤作用 了哥王水煎剂对小鼠淋巴肉瘤-1号腹水型、小鼠子宫颈癌₇₁₄、小鼠肉瘤₁₈₀及淋巴细胞白血病有明显的抗癌活性。（《中华肿瘤治疗大成》）

土茯苓

本品系百合科多年生常绿藤本植物土茯苓的块茎。味甘、淡，性平；归肝、胃经。解毒消肿，除湿通络。主治泌尿系统及消化系统肿瘤；亦可用于热淋尿赤涩痛、火毒痈疖、梅毒等。15~60g，水煎服。外用研末调敷。忌茶。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 ①土茯苓、地骨皮各 30g，西河柳 15g，夏枯草 15g，炙甘草 6g。水煎，每日 1 剂，分 3 次服。（《肿瘤的辨证施治》）②土茯苓 30g，威灵仙 20g，山豆根 15g，夏枯草 20g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次温服。（《抗癌中药》）

2. 治鼻恶性肉芽瘤 土茯苓 15g，板蓝根 15g，山豆根 15g，牡丹皮 10g，羚羊角（另煎兑服）1.5g。水煎服，日 1 剂。另鼻咽部涂斑蝥油，鼻腔敷斑蝥膏。（中医杂志，1985，1）

3. 治乳腺癌 板蓝根 15g，土茯苓 15g，丹参 12g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 治肝癌 土茯苓 30~60g，茵陈、生鳖甲、半枝莲各 30g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次温服。（《抗癌中药》）

5. 治肠癌 土茯苓 30g，莼菜 60g，白花蛇舌草 60g，垂盆草 30g。水煎服。（《肿瘤的辨证施治》）

6. 治膀胱癌 ①土茯苓 15g，茶树根 15g。上药加水适量同煮，去渣取汁加白酒适量，每日 1 剂，分 2 次服；②土茯苓 30g，天葵子 15g，石韦 15g，过路黄 30g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

7. 治前列腺癌 土茯苓 60g。水煎，每日 1 剂，频饮。（《中华肿瘤治疗大成》）

8. 治急性白血病 土茯苓、大青叶、土大黄、白茅根各 30g。加水煎汁，每日 1~2 剂，分 3 次温服。（《抗癌中药》）

【配伍经验】

本品配土贝母，治消化道肿瘤；配龙葵，治泌尿系肿瘤；配莜蓼、怀牛膝、生贝母、威灵仙、露蜂房，治骨肿瘤或骨转移瘤所致的骨关节疼痛、拘挛；配忍冬藤、蒲公英、马齿苋，治肠癌；配苍耳子、白鲜皮，治皮肤癌。

【药理作用】

1. 抑瘤作用 土茯苓对 JTC-₂₆ 及肉瘤 S₁₈₀ 有抑制作用。（《抗癌中草药大辞典》）
2. 防癌作用 土茯苓对大鼠黄曲霉素（AFB）诱发肝癌有抑制作用。（中医药学报，1997，5）
3. 镇痛作用 土茯苓能明显提高小鼠的热板痛阈值，对冰乙酸引起的内脏躯体疼痛有明显的镇痛作用。（中国中药杂志，1997，5）

大蒜

本品系百合科多年生草本植物大蒜的鳞茎。味辛，性温；归脾、胃、肺经。解毒消肿，杀虫止痢。主治鼻咽癌、乳腺癌、宫颈癌、肺小细胞未分化癌、贲门鳞状细胞癌、胃腺癌等；亦可用于痈疔肿毒、癣疮及肺癆、泻痢、钩虫、蛲虫病。5~10g，水煎、煮食、生食均可。外用适量，捣敷。注意阴虚火旺者不宜服。本品外敷能引起皮肤发红、灼热、起疱，故不可外敷过久。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 将新鲜大蒜剥皮洗净，用干净水浸 2~3 日，日换水 2 次，晾干；用糖水熬制花椒、草蔻仁、肉桂、大茴香备用；将腌缸刷净晾干，盛熬制好的糖水，放入晾干的大蒜，置阴凉处，1 周后可食用。（癌症康复，2004，2）
2. 治食管癌 大蒜头 100g，醋 200ml。大蒜放入醋中煮

熟，食蒜饮醋，每日1次。（《中国民间偏方大全》）

3. 治肺癌 大蒜压榨出的液汁，每次10~30ml，口服，一日2次。（《常见病单味中药自疗法》）

4. 治肝癌 大蒜8枚，丁香10g，砂仁10g，高良姜10g，生姜5g。共捣如泥，将药泥贴于中脘、足三里穴位上，每日1~2次。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 治胃癌 ①大蒜豆：大蒜20g，炒黄豆40g，加水，文火煎至近稠为止。空腹服。②蒜酒：生大蒜250g去衣浸酒（名酒或高粱酒两瓶半）约1年，早晚空腹饮1小杯。③蒜茶：大蒜9~25g，去皮，捣如泥，和绿茶1~1.5g、红糖25g伴捣后加开水500ml浸泡5分钟，温饮。（癌症康复，2004，2）

6. 防肠癌 ①醋蒜：大蒜头浸米醋半月以上，每日2~3瓣。也适宜晚期肠癌包块，伴腹痛腹泻、血便者。（癌症康复，2004，2）②大蒜100g，西瓜1个。大蒜去皮，西瓜洗净，挖出一块三角形，放入大蒜，盖好瓜皮，盛盘中，隔水蒸熟，趁热饮汁。（《中华肿瘤治疗大成》）

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 本品对大鼠腹水肉瘤MTK-IV及小鼠艾氏腹水癌的癌细胞具有抗分裂作用。（《抗癌中药药理与应用》）

对大蒜素较为敏感的实验瘤株为小鼠网织细胞肉瘤ASR及S₁₈₀肉瘤，其次是肝癌腹水型，再次是子宫颈癌。（齐鲁医药情报，1991，4）

大蒜素在体外可有效诱导人肝癌BEL-7402细胞凋亡。[山东医药·内科（上半月），2002，19]

大蒜素可显著抑制卵巢癌细胞株H08910的生长，具有明显的时间及剂量效应，大剂量的大蒜素对H08910细胞呈直接杀伤作用，而小剂量则诱导细胞凋亡。（安徽中医学院学报，2001，6）

大蒜油具有显著性的杀伤和抑制人食管癌细胞生长的能

力，随浓度增加其抑杀肿瘤细胞的能力愈显著。（空军总医院学报，1994，2）

大蒜素可使人胃癌细胞系 MGC-803 和 SGC-7901 细胞周期阻滞于 M 期。（中国肿瘤临床，2004，4）

2. 防癌作用 大蒜素可有效抑制 4-硝基喹啉氧化物诱发的口腔癌前病变和口腔癌。（中华口腔医学杂志，1995，4）

3. 化疗协同作用 大蒜素与 M 期特异性抗癌药物联合使用，具有协同抗肿瘤作用。（中国肿瘤临床，2004，4）

大蒜素能增强顺铂、环磷酰胺、5-氟尿嘧啶、米托蒽醌等对小鼠肉瘤 S₁₈₀、人白血病 K₅₆₂ 的抑瘤作用。（肿瘤，1992，5）

4. 免疫作用 大蒜能提高 NK 细胞活性，改善 T 细胞功能及提高白细胞介素-2 水平。（湖南医科大学学报，1997，3）

山豆根

本品系豆科植物柔枝槐的根。味苦，性寒；归肺、胃经。清热解毒，消肿止痛。主治肺癌、咽喉癌、舌癌、肝癌、膀胱癌、食管癌、滋养细胞癌及白血病等多种癌症；亦可用于咽喉齿龈肿痛、黄疸及痈肿疮毒。内服 3～10g，煎服或磨汁服。外用：含漱或研末涂敷患处。不宜久煎，脾胃虚寒泄泻者禁服。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 山豆根 10g，山慈菇 15g，夏枯草 30g，白茅根 30g，苍耳子 9g，杏仁 6g。水煎服，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治慢性粒细胞白血病 山豆根末与白砂糖适量混匀备用，3～6g，每日一次，连服 6～15 天为一疗程。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 治舌癌 苦参 30g，山豆根 30g，龙葵 30g，白花蛇舌

草 10g，煎汤，入冰片少许，以汤漱口，每日数次。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 治喉癌 山豆根 15g，玄参 15g，大青叶 15g，开金锁 30g。水煎服，每日 1 剂。（《实用抗癌手册》）

5. 治扁桃体腺癌 山豆根、山慈菇各 120g，杏仁、孩儿茶各 150g，急性子 50g。共为细末，炼蜜为丸，每丸重 3g，含化，徐徐咽下，每日 6 粒。（《癌症秘方验方偏方大全》）

6. 治食管癌 山豆根、龙葵各 20g，全瓜蒌 15g，威灵仙 12g，葛根 12g，香橼 12g。水煎服，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

7. 治肺癌 用山豆根浸膏制成片剂，每片含生药 3g，口服 3 次，每次 3~5 片。（《癌症秘方验方偏方大全》）

8. 治肝癌 山豆根、炮山甲、鳖甲各 15g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次温服。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品配甘草可减低其毒性反应，但不宜与大黄配伍；配白花蛇舌草、黄芩、玄参、鱼腥草、夏枯草、苦参，治多种癌症。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用

（1）抑杀肿瘤细胞：本品水提取物对大鼠腹水瘤型吉田肉瘤及腹水型肝癌、小鼠子宫颈癌₁₄、人急性淋巴细胞性白血病、急性粒细胞白血病等的癌细胞有抑制作用。（《抗癌中草药大辞典》）

山豆根提取物对 Lewis 肺癌等小鼠移植瘤有 30%~60% 的抑制率，对癌细胞有直接杀伤作用；对小鼠 LA-795 肺腺癌细胞系在乏氧状态下的毒性为有氧状态下的 36 倍。（中国药理学报，1987，2）

（2）阻断癌前病变：山豆根对小鼠胃鳞状上皮的癌变过程

有阻断作用；对人食管癌细胞株（Eca-109）杀伤能力随药物作用时间的延长而增强。（中国药理学报，1987，2）

（3）影响癌细胞代谢：山豆根能抑制体外培养的人肝癌细胞的增殖，降低线粒体代谢活性；诱导小鼠肝细胞线粒体细胞色素 P_{150} ，提高环磷酰胺对艾氏腹水瘤的代谢激活，与环磷酰胺合用对艾氏腹水癌有协同抑制作用。（中国药理学报，1987，2）

（4）诱导癌细胞分化 可诱导 K_{562} 细胞向成熟方向分化，并具多向诱导分化作用，使人肝癌细胞系 SMMC-7721 细胞聚于 S 期，诱导其向正常肝细胞分化。（中国药理学报，1987，2）

2. 对免疫功能的影响 山豆根注射液能明显抑制小鼠巨噬细胞的吞噬功能，抑制小鼠血清溶血素的产生，降低特异性玫瑰花环形成细胞数和血清溶血素水平，降低体内淋巴细胞的转化率，从而表现出免疫抑制反应。（宜昌医学专科学校学报，1990，2）山豆根注射液与环磷酰胺合用具有协同免疫抑制作用。（宜昌医学专科学校学报，1992，2）

马蔺子

本品系鸢尾科多年生草本植物马蔺子的种子。味甘，性平。清热利湿，解毒止血。主治肝癌、宫颈癌、卵巢癌、直肠癌、淋巴肉瘤、白血病等；亦可用于癌性出血及吐血、衄血、崩下等，及喉痹肿痛。6~9g，水煎服。或入丸、散。

【临床应用】

1. 治喉癌 牛蒡子 1.8g，马蔺子 2.4g。上药制成散剂，空腹温水送服，每日 2 次，蜜糖水调服。（《抗肿瘤中药的临床应用》）

2. 治肝癌 马蔺子、郁金各 6g，酢浆草 9g，山豆根、糯

稻根各 12g，马鞭草、四季青各 15g。水煎，送服鳖甲煎丸 6g。《抗癌植物药及其验方》

3. 治子宫颈癌 炒马蔺子 18g，炒漏芦 9g，红糖 10g。将炒马蔺子捣碎，与漏芦加水 500ml，熬成 100ml，加入红糖。早晚空腹各服 1 次，每日 1 剂。《中华肿瘤治疗大成》

【配伍经验】

本品配八月札、藤梨根、山慈菇，治胃癌；配蚤休、白英，治宫颈癌；配肿节风、白花蛇舌草、苦参，治肠癌；配夏枯草、天葵子、生牡蛎，治恶性淋巴瘤。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 试验表明，马蔺子甲素对急性白血病和实体瘤有抑制作用；对小鼠子宫颈癌₁₁有明显疗效；对淋巴肉瘤、肝癌腹水型、艾氏腹水癌等也有抑制作用，是广谱抗癌药。《中华肿瘤治疗大成》

2. 免疫作用 本品能增强非特异性免疫吞噬功能，促进细胞免疫。《中华肿瘤治疗大成》

天葵

本品系毛茛科多年生草本植物天葵的块根。味甘、苦，性寒，有小毒。清热解毒，利水散结。主治肺癌、恶性淋巴瘤、食管癌、乳腺癌、前列腺癌。亦可用于泌尿系统肿瘤及癌性胸、腹水，痈肿疔疮、急性感染、淋巴结核等。15~30g，水煎服。因有小毒，不可过量。

【临床应用】

1. 治肺癌 天葵子、石豆蓝各 15g，野荞麦根、石莲各 30g。水煎服，日 1 剂。《实用抗癌手册》

2. 治肝癌、乳癌 天葵子 15g，白花蛇舌草 30g，半枝莲 15g，重楼 9g。水煎服。《抗癌中药药理与应用》

3. 治胃癌伴消化道出血 天葵子 500g, 黄药子 500g, 算盘子 500g。先将黄药子适当粉碎, 与天葵子、算盘子共同加水煎煮, 过滤, 滤液浓缩成浸膏状, 加入辅料后制粒, 干燥, 压片。每片重 0.5g, 每次 5~10 片, 每日 3 次。((《中华肿瘤治疗大成》))

4. 治乳腺癌 天葵根 15g, 象贝母 9g, 煅牡蛎 10g, 甘草 3g, 同煎服。((《浙江民间草药》))

5. 治膀胱癌 天葵、石韦各 15g, 过路黄、土茯苓各 30g。水煎服, 日 1 剂。((《实用抗癌手册》))

6. 治恶性淋巴瘤 天葵、黄药子、红木香、重楼各 15g, 蛇六谷 30g (先煎 2 小时)。水煎服, 日 1 剂。((《肿瘤的诊断与治疗》))

【配伍经验】

本品常配夏枯草, 治恶性淋巴瘤; 配浙贝母, 清热消肿散结, 治甲状腺瘤、甲状腺癌及腮腺肿瘤; 配苦参, 治皮肤癌; 配龙葵, 治癌性胸、腹水; 配土茯苓, 治膀胱癌。

【药理作用】

抗肿瘤作用 动物实验表明本品对多种移植性癌细胞有抑制作用, 对小鼠肉瘤₁₈₀、肺癌、淋巴瘤、肝癌、鼻咽癌、乳腺癌等多种癌症均有较好的疗效。((《抗癌中药药理与应用》))

木芙蓉

本品系锦葵科落叶灌木或小乔木植物木芙蓉的花及叶。味辛, 性凉。清热解毒, 消肿排脓, 凉血止血。主治胃癌、食管癌、肺癌、乳腺癌、皮肤癌; 亦可用于乳痈、肺痈、疔疮痈肿。10~15g, 水煎服。或研末入丸、散内服。外用适量。

【临床应用】

1. 治食管癌 木芙蓉花 120g, 研为细末, 每次 3g, 每日

2 次。(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 治肺癌 木芙蓉叶、铁树叶各 30g，泽漆 15g。水煎服，日 1 剂。(《中华肿瘤治疗大成》)

3. 治乳腺癌 ①木芙蓉叶、铁树叶各 30g，泽漆 15g。水煎服，每日 1 剂。②取木芙蓉叶烘干后研粉，调敷患处，每日 1~2 次。(《实用抗癌验方》)

4. 治宫颈癌 芙蓉叶、鲜蛇六谷各 30g，一见喜、阿魏、雄黄各 15g。按配方比例，将芙蓉叶和一见喜煎成浸膏，阿魏用水稀释后过 100 目筛，晒干，鲜蛇六谷榨汁过滤，低温烘干。然后将 4 味药混合，烘软，搓成细棒，雄黄为衣，制成栓剂。用时以栓剂插入宫颈管内，每日 1 次或隔日 1 次，60~90 次为一疗程。(浙江中医学院学报，1982，增刊)

【配伍经验】

本品常与蒲公英相配，治胃癌；配露蜂房，治乳腺癌；配山豆根、生半夏、生南星、壁虎，治食管癌。

【药理作用】

抗癌作用 胃癌细胞对本品敏感。(《抗癌中草药大辞典》)

牛黄

牛科动物黄牛或水牛胆囊、胆或肝管中的结石，为天然牛黄；用牛胆汁或猪胆汁经提取加工而成的为人工牛黄。味苦，性凉；归肝、心经。清热解毒，息风止痉，化痰开窍。主治粒细胞白血病、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、嗜酸性细胞肉芽肿等骨髓增生性疾病，肝癌、胃癌、食管癌、胰腺癌、脑肿瘤及鼻咽癌等肿瘤；亦可用于高热、小儿惊风、中风、昏迷；咽喉肿痛、口舌生疮、痈疽疔毒等。0.2~0.5g，入丸、散。外用适量。注意本品不入煎剂，多入丸、散服用。孕妇慎用。

【临床应用】

1. 治食管癌 人工牛黄 6g, 硃砂 3g, 板蓝根 30g, 猫眼草 30g, 制南星 9g, 威灵仙 60g。制成浸膏干粉, 每天服 4 次, 每次 1.5g。(安徽科技信息, 1976, 5)

2. 治贲门癌梗阻 人工牛黄 9g, 乳香、没药各 15g, 硼砂、三七各 30g, 麝香 1.5g。共研细末, 每日含化 4 次, 每次 1.5g。《《肿瘤药物治疗》》

3. 治肿瘤化疗后静脉炎 牛黄解毒片 20 粒, 去糖衣研末, 用 70%乙醇少许调成糊状, 外敷患处。治肿瘤化疗后静脉炎 84 例, 显效 62 例, 有效 22 例, 总有效率为 100%。(华西医学, 1998, 4)

【配伍经验】

本品配雄黄、冰片, 治皮肤癌。

【药理作用】

1. 抑瘤作用 本品对小白鼠肉瘤₃₇、肉瘤₁₈₀有明显的抑制作用。对艾氏腹水癌(实体型)也有一定的抑制癌细胞分裂的功能。《《抗癌中药药理与应用》》牛黄酸在体外作用 6 小时可诱导人急性早幼粒细胞白血病细胞 HL-60 细胞凋亡。(中国中西医结合杂志, 2001, 11)

2. 抗突变作用 牛黄酸可以有效地拮抗氧化剂氯化氨的致突变作用, 从而降低氯化氨诱发的小鼠胃癌的发生率。(中华新医学, 2004, 7)

3. 镇痛作用 中、低胆红素培植牛黄和天然牛黄均能显著降低醋酸所致小鼠的疼痛反应, 但对电、热物理因素所致小鼠疼痛反应无明显抑制作用。(中国药理与临床, 1994, 3)

4. 免疫作用 本品可显著提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬百分率和吞噬指数。《《抗癌中药药理与应用》》对小鼠非特异性免疫、体液免疫和细胞免疫均有显著的促进作用。(中国中药杂志, 1993, 5)

白花蛇舌草

白花蛇舌草为茜草科植物白花蛇舌草的带根全草。味苦、甘，性寒；归心、肝、脾经。清热解毒，活血化瘀，利水渗湿，消肿止痛。主治各种恶性肿瘤，尤其是消化道肿瘤及恶性淋巴瘤。内服：煎汤，30~60g；或捣汁。外用：适量，捣敷。孕妇慎服。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 白花蛇舌草 75~100g，煎水当茶饮，1日2次。（天津药学，1995，4）
2. 治舌癌 白花蛇舌草 20g，夏枯草 10g，茅苍术 5g，紫丹参 3g。水煎服。（《现代中医肿瘤学》）
3. 治食管癌 鲜白花蛇舌草、鲜半枝莲、鲜冬凌草各 500g。晒干，研磨为细末，加入蛋黄油 150g、枣花蜜 1350g，搅拌均匀做成药丸。每次 10g，饭前半小时口含化，或开水含服，每日 2 次。（中国民族民间医药杂志，2003，5）
4. 治肺癌 白花蛇舌草 30g，卷柏 60g。水煎，每日 1 剂，早晚分服。（《中华肿瘤治疗大成》）
5. 治胃癌 ①白花蛇舌草 90g，白茅根 60g，白糖适量。水煎服，每日 1 剂，分 2 次服。（《临床中医肿瘤学》）②白花蛇舌草 250g，龙葵根 200g，猪殃殃 100g（干品减量）。加水煎汁，代茶饮，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）
6. 治原发性肝癌 白花蛇舌草 75~150g，苏树叶 1 张（约 35~45cm），大枣 10~15 个。上药加水 800ml，浓煎至 250ml，睡前服用。（《中华肿瘤治疗大成》）
7. 治胰腺癌 白花蛇舌草、半枝莲各 60g，大黄 10~15g，加水煎汁，当茶饮，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）
8. 治胆囊癌 白花蛇舌草 50g，水煎，每日 1 剂，代茶频

饮。(《中华肿瘤治疗大成》)

9. 治直肠癌 ①白花蛇舌草、龙葵、忍冬藤各 60g, 半枝莲、紫花地丁各 15g, 水煎服。(《滇南本草新编》) ②白花蛇舌草、红藤、薏苡仁各 30~50g, 加水煎汁。每日 1 剂, 分 2~3 次服。(《防癌抗癌中药》)

10. 治膀胱癌 ①白花蛇舌草 60g, 石韦、龙葵各 20~30g, 加水煎汁, 每日 1 剂, 代茶饮。②白花蛇舌草、龙葵各 30g, 小蓟 20g, 每日 1 剂, 水煎服。(《防癌抗癌中药》)

11. 治白血病 本品配伍大青叶、水牛角、玄参, 治疗慢性粒细胞白血病。(浙江中医杂志, 1997, 6)

【配伍经验】

本品可用于各种癌症。常配半枝莲, 治肝癌; 配蚤休, 治肺癌; 配菝葜, 治肠癌; 配石见穿, 治胃癌; 配海藻、昆布, 治淋巴肉瘤; 配水蛭、土鳖虫, 治脑癌; 配土茯苓、土贝母, 治肾癌; 配败酱草, 治直肠癌。

【药理作用】

1. 抑瘤作用 体外对急性淋巴细胞型、单核细胞型、粒细胞型和慢性粒细胞型的肿瘤细胞均有较强的抑制作用, 对腹水性肝癌细胞、人肺癌细胞、肉瘤即艾氏腹水癌细胞有抑制作用。(《中药大辞典》) 本品能阻断小鼠前胃鳞状上皮增生发展为癌变, 抑瘤率为 47.02%。(河南中医药学刊, 1996, 4) 本品能诱导宫颈癌细胞凋亡。(福建中医学院学报, 2002, 4)

2. 免疫调节作用 能促进小鼠 B 细胞抗体的产生以及单核细胞的细胞因子产生, 并增强单核细胞对肿瘤细胞的吞噬功能。(中国中西医结合杂志, 2001, 5) 其免疫作用与剂量有关, 高剂量抑制小鼠脾抗原结合细胞数, 较低剂量则可增强体液免疫、细胞免疫功能。(中药材, 1996, 3)

石上柏

本品系卷柏科多年生蕨类植物深绿卷柏的全草。味甘，性平；归肺、大肠经。清热解毒，活血利湿。主治绒毛膜癌、恶性葡萄胎、喉癌、鼻咽癌、肺癌、消化道肿瘤、宫颈癌、乳腺癌等；与放、化疗合用有一定程度的协同作用；也用于上呼吸道感染、肺炎、乳腺炎及湿热黄疸、肝炎、肝硬化、胆囊炎等。15~60g，水煎服。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 石上柏 100g，生南星 50~100g，瓜蒌 15g，苍耳子 12g，沙参 15~20g。水煎沸 2 小时以上，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治喉癌 石上柏干品 30~50g（或鲜品 90~120g），加瘦肉 30~60g，每日 1 剂，煎 2 次分服，15~30 天为一疗程，药量可酌情增减。（华南肿瘤医院方）

3. 治食管癌 石上柏、威灵仙各 30g。加水煎煮 4 小时，煎 2 次汁，分 2~3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

4. 治肺癌 ①石上柏、野葡萄藤各 30g，甘草 10g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2 次服。（《防癌抗癌中药》）②石上柏 30g，土牛膝 30g，马鞭草 30g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 治肝癌 石上柏、石见穿、半枝莲各 30g，甘草 10g。加水 5 碗，煎至 1 碗半，分 2~3 次服，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品配莪术，治绒毛膜癌；配藤梨根，治胃癌；配菝葜，治肝癌；配石见穿，治肺癌。

【药理作用】

1. 抗癌作用 卷柏能延长实体型肿瘤小鼠的生存期，对

S_{180} 、 U_{14} 、 L_{160} 有抑制作用，并能增强机体代谢和网状内皮系统功能。（《中药药理毒理与临床》）石上柏醇提取液对蛋白激酶 C 有强烈的抑制作用。（中草药，1995，8）

2. 防癌作用 石上柏水提液有阻断 EB 病毒在细胞内抗原的表达作用，临床使抗体阳性者转阴，有可能降低一定比例的鼻咽癌发病率。（华夏医学，2001，6）

龙葵

本品系茄科茄属一年生草本植物龙葵的全草。味苦、微甘，性寒，有小毒；归肺、胃、膀胱经。清热解毒，利水散结。主治胃癌、肝癌、肺癌、乳腺癌、膀胱癌及癌性胸、腹水等；亦可用于疮痈肿毒，皮肤湿疹，水肿及小便不利。可鲜草捣烂外敷。10～30g，鲜草可用 60～120g，水煎服。

【临床应用】

1. 治肺癌 ①龙葵 30～50g，鱼腥草、山海螺、白英各 30g。每日 1 剂，加水煎汁，分 3 次服。（《防癌抗癌中药》）②鲜龙葵 500g 或干龙葵 200g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治胃癌 ①龙葵 30g，白毛藤 15g，黄药子 10g。水煎服。（《中国民间百草药方》）②龙葵 15g，白花蛇舌草 30g，白英 30g，黄毛耳草 15g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 治肝癌 龙葵 60g，十大功劳 30g，水煎服，每日 1 剂。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 治乳腺癌 龙葵、白英、蒲公英各 50g，蛇果草 25g。每日 1 剂，水煎服。（《抗癌中草药大辞典》）

5. 治恶性葡萄胎、绒毛膜上皮癌 ①鲜龙葵全草 60g（干

品 30g), 鲜半枝莲 120g (干品 60g), 紫草 15g, 每日 2 次煎服。(《抗癌中草药大辞典》) ②龙葵、藤梨根、半枝莲各 30g, 天花粉、紫草根各 20g。加水煎汁, 每日 1 剂, 分 2~3 次服。(《防癌抗癌中药》)

6. 治膀胱癌 ①龙葵 30g, 白英 30g。水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。②瞿麦 30g, 茜草 30g, 龙葵 30g, 野葡萄根 30g。水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。(《中华肿瘤治疗大成》)

7. 治癌性胸腹水 龙葵鲜品 100~150g, 或干品 30~60g。加水煎汁, 每日 1 剂, 分 2~3 次饮服。(《防癌抗癌中药》)

【配伍经验】

本品常配白英、蛇莓, 组成龙蛇羊泉汤, 为治多种恶性肿瘤的基本方; 配山慈菇, 治胃癌; 配猪苓, 治膀胱癌、前列腺癌; 配半枝莲, 治肠癌; 配半边莲, 治癌性胸、腹水。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 龙葵对宫颈癌、胃癌、肺癌、肝癌、膀胱癌等多种癌症有特殊疗效。(《抗癌中草药大辞典》)

(1) 中药复方龙葵合剂 (含龙葵、白花蛇舌草、龙胆草、丹参、当归、郁金等): 对人鼻咽癌细胞 CNB-2 的生长有显著的抑制作用, 且抑制率随浓度的增加而升高; 而对人胃癌细胞 MGC-803 只有轻度的抑制作用; 对小鼠肝癌及小鼠肉瘤 S₁₈₀ 均有明显的抑制作用, 其抑制率分别为 26.5%~56.2% 及 25.9%~56.9%。(癌症, 1996, 6)

(2) 龙葵猪苓水提物 (龙葵: 猪苓为 3: 2): 对小鼠肝癌 H₂₂ 的生长有抑制作用, 并有较好的剂量效应关系; 对小鼠 Lewis 肺癌有一定抑制作用, 但量效关系不理想。(中国中药杂志, 2004, 5)

2. 升白细胞作用 龙葵碱可用作造血系统的刺激剂。(《抗癌中药药理与应用》)

龙胆草

本品系龙胆科多年生草本植物龙胆和三花龙胆的根。味苦，性寒；归肝、胆、胃经。清热燥湿，清肝泻火。主治肝癌、胆癌、胰腺癌、鼻咽癌、胃癌、外阴癌；亦可用于湿热黄疸，阴肿阴痒、白带、湿疹等及肝胆热盛证。10~15g，水煎服。或入丸、散。外用适量。注意脾胃虚寒者不宜用。

【临床应用】

1. 治甲状腺癌属肝经郁结者 龙胆草（酒拌、炒焦）60g，柴胡 60g，海藻 60g，昆布 60g，小麦（醋煮、晒干）120g。上药共研末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服 20~30 丸，临卧白酒送下，噙化咽之尤好。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治胰腺癌 龙胆草 15g，茵陈 30g，黄连 6g，皂角刺 2g。每日 1 剂，水煎服，每日 1 剂。（《抗癌本草》）

【配伍经验】

本品常配栀子、黄芩，治肿瘤黄疸；配半枝莲、白花蛇舌草，治肝癌发黄；配金钱草、海金沙、郁金，治胆囊癌发黄；配大黄、莪术，治胰腺癌发黄；配黄柏、栀子、芦荟、当归等，治白血病；配黄柏，治妇科肿瘤湿热下注证。

【药理作用】

抗癌作用 本品甲醇提取物对小鼠宫颈癌 U₁₄、小鼠肉瘤₁₈₀（腹水型）有抑制作用。（《云南抗癌中草药》）龙胆草提取物有抑制癌细胞扩散的作用。（《防癌抗癌中药》）

白鲜皮

本品系芸香科多年生草本植物白鲜的根皮。味苦，性寒；归脾、胃经。清热解毒，除湿止痒。主治皮肤癌、恶性淋巴瘤

皮肤病变、肝癌、胃癌、肺癌、宫颈癌；亦可用于湿热疮疡，皮肤瘙痒、风湿痹痛等。10～15g，水煎服。外用 30～50g，煎汤外洗。

【临床应用】

1. 治阴茎癌 白鲜皮 9g，威灵仙 9g，土茯苓 60g，金银花 12g，苍耳子 15g。每日 1 剂，煎 2 次服。另用茶叶加食盐适量煎汁后，供局部冲洗。（江西瑞昌县人民医院方）

2. 治皮肤癌 白鲜皮、地肤子、蛇床子各 20g，苦参 15g。加水煎汁，代茶饮，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品配苍术、苦参、金银花，治皮肤癌湿热毒盛；配苦参、防风、地肤子，治皮肤瘙痒难忍；配茵陈，治湿热黄疸。

【药理作用】

抗癌作用 体外试验用豆芽法表明有细胞毒性，体内动物实验表明本品对小鼠肉瘤₁₈₀有一定抑制作用。（《中华肿瘤治疗大成》）本品中的花椒毒素对艾氏腹水癌细胞有杀灭作用。（《中药药理毒理与临床》）其注射液经胸、腹腔注射可促进胸腹水的吸收。（《抗癌中草药大辞典》）

冬凌草

本品唇形科香茶菜属多年生草本植物碎米桠的全草。味苦、甘，性凉。清热解毒，散瘀消肿。主治食管癌、肝癌、乳腺癌、肺癌、直肠癌等；与化学药物合用可增加疗效；也用于扁桃体炎、急慢性咽炎、慢性肝炎等。单用生药 30～60g，水煎服。

【临床应用】

1. 治喉癌 冬凌草、野荞麦根各 30g，山豆根 15～20g。加水煎汁。每日 1 剂，代茶饮。（《防癌抗癌中药》）

2. 治食管癌 干冬凌草茎叶制成每毫升含生药 1g 的糖浆。口服，每次 30ml，每日 3 次。另用山豆根、龙葵各 20g，全瓜蒌 15g，威灵仙、葛根、香橼各 15g，水煎服，每日 1 剂。（中西医结合杂志，1989，12）

3. 治贲门癌 1:1 浓度糖浆剂，每次 30ml，每日 3 次，饭后服，2~3 月为一疗程，疗程总量约在 10000g 生药；片剂，每片含生药 4g，每次 5~8 片，每日 3 次。（中国中西医结合外科杂志，1997，6）

4. 治肺癌 冬凌草、山海螺、鱼腥草各 30g（咳血或痰中带血者，加仙鹤草 30g），加水煎汁，每日 1 剂，分 3 次服。（《防癌抗癌中药》）

5. 治肝癌 冬凌草糖浆或片剂：冬凌草糖浆（1:1 浓度），每服 30ml，日 3 次；冬凌草片（每片相当于生药 5g），每次 5 片，日 3 次，2~3 个月为一疗程。（《临床中医肿瘤学》）

6. 治乳腺癌 冬凌草、天门冬各 30~50g，山慈菇 15g，白花蛇舌草 30g。加水煎汁，每日 1 剂，分 3 次服。（《防癌抗癌中药》）

7. 治胃癌 冬凌草 30~50g，石见穿 20~30g，藤梨根 50~80g，鲜石斛 30g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次服。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品配薏苡仁、白花蛇舌草、贝母、瓜蒌，治肺癌；配黄连、苦参、苍术，治肠癌；配蒲公英、鸡血藤、漏芦，治白血病。

【药理作用】

1. 抑杀肿瘤细胞 冬凌草对多种肿瘤细胞均有显著抑制或杀伤作用，冬凌草醇提取物的细胞毒作用最强。醇提取物对小鼠艾氏腹水癌皮下型（ESC）、子宫颈癌 V₁₄、瓦氏癌 W₂₅₆、肉瘤 S₁₈₀ 均有一定抑制作用。（肿瘤防治研究，1984，2）

冬凌草甲素对人体食管鳞癌细胞株 CaEs-17、S₁₈₀、艾氏腹水癌、肝癌、网织细胞肉瘤实体性，肺癌 SPCA-1 细胞、人白血病 L₁₂₁₀、人白血病 HL-60、人肝癌 BEL-7402 均有抑杀作用。(中国药学杂志，2003，11)

2. 诱导癌细胞凋亡 冬凌草甲素可诱导 HCT₈ 细胞凋亡，且凋亡率随浓度的增加而增加。(河南肿瘤学杂志，2004，3)

适宜浓度的冬凌草甲素 (34.3 μmol/L) 诱导人黑色素瘤 A₃₇₅-S₂ 细胞凋亡。(中草药，2004，4)

冬凌草甲素可显著地降低 V₉₃₇ 细胞端粒酶活性，抑制癌细胞的生长，诱导癌细胞发生凋亡，并呈明显的量效与时效关系。(中华新医学，2004，1)

3. 抗突变作用 冬凌草甲素对盐酸氮芥诱导肝原代细胞 VDS 有明显抑制作用，其抑制率达 73.8%，因而具有明显的抗 DNA 突变作用。(河南医科大学学报，2001，4)

4. 对免疫功能的影响 冬凌草乙素对细胞免疫有一定的兴奋作用。(《抗癌中药药理与应用》) 冬凌草多糖对体液免疫和细胞免疫均有增强作用。(中国病理生理杂志，2002，11)

半枝莲

本品系唇形科多年生植物半枝莲的全草。味辛、苦，性寒；归肝、胃、大肠经。清热解毒，利尿消肿。主治原发性肝癌等消化道肿瘤、肺癌及子宫颈癌、子宫体癌等妇科肿瘤；亦可用于疮疡肿毒、吐泻、衄血、血淋、黄疸、跌打损伤、蛇虫咬伤等。15~60g，水煎服。外用鲜品适量，捣烂外敷。注意血虚者不宜多服。孕妇慎用。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 ①半枝莲 50g，黄连 20g，白花蛇舌草、生黄芪各 100g。水煎服，每日 1 剂。(四川中医，1990，7) ②半枝

莲、独角莲各 50g。加水煎汁，每日 1 剂，分 3~5 次饮服。
③半枝莲、鲜老鹳草各 60g。加水煎汁，当茶饮服，每日 1 剂。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治食管癌 ①半枝莲、白花蛇舌草、威灵仙各 50g，水蛭 15g。水煎服，日 1 剂，30 天为一疗程。（新中医，1997，7）
②半枝莲、威灵仙、黄药子各 20~30g。加水煎汁，每日 1 剂，分 3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

3. 治贲门癌 半枝莲、乌梅各 100g，半枝莲加水 1000ml，煎成 750ml，过滤去渣。乌梅加水 1500ml，泡 24 小时，然后煮沸半小时，去渣浓缩至 50ml，倾入半枝莲煎液中即可。每天 3 次，每次 5ml。（《实用抗癌验方》）

4. 治肺癌 ①半枝莲、山海螺各 30g（鲜品各加倍）。加水煎汁，当茶饮服，每日 1 剂。②鲜半枝莲、白英各 30g（鲜品各加倍）。加水煎汁，代茶饮，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

5. 治纵隔淋巴肉瘤 半枝莲 120g（干品 30g），蒲公英 30g。加水煎汁，当茶饮服，每日 1 剂。病情减轻后，剂量可减半。（《防癌抗癌中药》）

6. 治胃癌 ①鲜半枝莲 80g（干品 30g），香茶菜 30g，加水煎汁，每日 1 剂，当茶饮服。②鲜半枝莲（干品 30g）、猫人参各 100g，加水煎汁。每日 1 剂，当茶饮服。③半枝莲、水杨梅、藤梨根各 30g，加水煎汁，代茶饮，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

7. 治肝癌 ①半枝莲、白花蛇舌草各 60g。水煎服。（《肿瘤的辨证施治》）②半枝莲 30g，半边莲 30g，玉簪根 9g，薏苡仁 30g。水煎服。（《中国民间偏方大全》）

8. 治绒毛膜上皮癌 半枝莲、白花蛇舌草各 60g，龙葵 30~60g，败酱草 15g。水煎服，日 1 剂。（武汉医学院第一附属医院方）

9. 治卵巢肿瘤 半枝莲 50g，龙葵、白英、白花蛇舌草、

鳖甲各 30g。水煎，每日 1 剂。腹痛加木香 6g，首乌 9g，元胡 9g；腹胀加大腹皮、厚朴、枳壳各 9g；腹水加车前子、泽泻各 12g。（《肿瘤的诊治与防治》）

10. 治膀胱癌 ①半枝莲、白茅根、龙葵各 30g。加水煎汁，当茶饮服，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）②半枝莲 30g，蜣螂 9g，白花蛇舌草 30g，野葡萄根 30g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

11. 治恶性葡萄胎 半枝莲 60g，龙葵 30g，紫草 15g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品常配白花蛇舌草治肝癌；配半边莲，治癌性胸、腹水；配全蝎，治癌性疼痛；配臭牡丹，治肺癌；配山慈菇，治胃癌；配莪术，治卵巢癌；配夏枯草，治淋巴瘤；配金果榄，治鼻咽癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用

（1）抑制癌细胞生长：其制剂对 W_{256} 、 S_{180} 、肝癌实体型 EAC、脑瘤 B_{22} 等多种动物肿瘤均有一定的抑制作用。本品热水提取物体外试验表明对 JTC₂₆ 有强烈的抑制作用；以细胞呼吸器法测定，本品对急性粒细胞型白血病细胞抑制率大于 75%。（《中华药海》）以半枝莲配黄芪、川芎等组成的复方半枝莲制剂能有效地抑制大鼠口腔癌变细胞的增殖。（中草药，2000，9）

（2）诱导癌细胞凋亡：通过促进细胞内储藏钙的释放和胞外钙离子的内流提高宫颈癌细胞内基础钙水平，从而诱导癌细胞的凋亡。（中药材，2003，10）

（3）抗突变作用 复方半枝莲水煎剂有防治乙基乙硝胺诱发大鼠肝癌的作用。（中国中西医结合消化杂志，2002，2）

2. 免疫作用 半枝莲多糖对机体细胞免疫有促进作用。

(南京中医学院学报, 1989, 2)

3. 化疗药物解毒作用 半枝莲具有抗丝裂霉素诱发遗传物质染色体损伤的作用。(癌变·畸变·突变, 1994, 6)

半边莲

本品系桔梗科多年生蔓生草本植物半边莲的全草。味辛，性寒；归心、小肠、肺经。清热解毒，利水消肿。主治肝癌、胃癌、肠癌、肾盂癌、膀胱癌；亦可用于癌性胸水、腹水、毒蛇咬伤、疔疮肿毒、肝硬化、水肿等。15~30g，或鲜草 30~60g，水煎服。外用鲜品捣敷。注意虚证水肿忌用。

【临床应用】

1. 治眼睑癌 半边莲、半枝莲、白花蛇舌草、仙鹤草各 90g，七叶莲、藤梨根各 45g，山豆根、白英、玄参各 30g。水煎服，每日 1 剂，分 2 次服用。(《抗癌中药一千方》)

2. 治喉癌 半边莲、当归各 15g，白花蛇舌草、黄芪各 30g。水煎服，每日 1 剂，分 2 次服。(《抗癌中草药大辞典》)

3. 治肺癌 ①半边莲、白英各 30g，瓜蒌 20g，加水煎汁，每日 1 剂，代茶饮；②半边莲、白英、野葡萄根各 30g (鲜品各 60g)。加水煎汁，每日 1 剂，代茶饮服。(《防癌抗癌中药》)

4. 治肝癌 ①鲜半边莲捣烂后制成泥罨剂，贴肝区。②半边莲、半枝莲、石见穿、石打穿各 30g，水煎服。(《抗癌中草药制剂》) ③半边莲、半枝莲、黄毛耳草、薏苡仁各 30g，天胡荽 60g。水煎，日 1 剂，煎 2 次分服。(江西医科大学二附院方) ④半边莲、甘露消毒丹(包)、黄芪各 30g。加水煎汁，每日 1 剂，分 3 次饮服。(《防癌抗癌中药》)

5. 治肾癌 半边莲 120g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。(《中华肿瘤治疗大成》)

6. 治膀胱癌 鲜半边莲 100g (干品 30g), 土茯苓、猪苓各 30g。加水煎汁, 每日 1 剂, 当茶饮。《防癌抗癌中药》

7. 治宫颈癌 半边莲、白头翁各 30g, 木馒头 20g。加水煎汁, 每日 1 剂, 分 3 次服。《防癌抗癌中药》

8. 治癌性腹水 半边莲、马鞭草、猫爪草各 30g, 车前草 20g。加水煎汁, 每日 1 剂, 分 2~3 次服。《中华肿瘤治疗大成》

9. 治恶性淋巴瘤 ①半边莲、半枝莲、蒲公英各 50g, 泽漆 10g。水煎服, 每日 1 剂。《实用抗癌验方》②半边莲、半枝莲各 30g, 山慈菇 15g。加水煎汁, 每日 1 剂, 当茶饮。《防癌抗癌中药》

【配伍经验】

本品常配半枝莲, 同具清热解毒, 利尿消肿之功, 治疗各种肿瘤, 尤其对各种有胸、腹水癌症者的效果较佳; 配龙葵、炒葶苈子治癌性胸水; 配茯苓皮、大腹皮, 治癌性腹水; 配莪术, 治卵巢癌; 配土贝母, 治膀胱癌。

【药理作用】

抗癌作用 本品对人白血病细胞株 (HL-60 和 K₅₆₂)、肉瘤 (S₃₇) 有抑制作用。临床应用研究证实, 本品对肝癌、肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤有较好的治疗效果。《防癌抗癌中药》有抑制鼠腹水癌细胞对氧的摄取作用。《抗癌中草药大辞典》

青黛

本品系菘蓝 (十字花科)、蓼蓝 (蓼科蓼属植物)、木蓝 (豆科木蓝属植物)、草大青等叶中的色素, 经加工制取, 干燥而成。味咸, 性寒; 归肝、胃、肺经。清热解毒, 凉血散肿。主治慢性粒细胞白血病及肺癌痰中带血; 放、化疗所致口腔溃疡、舌癌 (局部外涂); 亦可用于热盛出血, 肺热咳嗽; 疔腮

肿痛及热毒痈疮。1.5~3g，作散剂冲服或作丸服。外用适量干敷或调敷患处。不宜入汤剂煎服，注意脾胃虚寒者慎用。

【临床应用】

1. 治急性白血病 ①青黛 40g，天花粉 30g，芦荟 20g，牛黄 10g。研细末，制成丸，每日分 2 次服。（黑龙江中医学院附属医院方）②青黛适量，每次 3~6g，每日 3 次，冲服或装入胶囊内吞服（煎服无效）。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治慢性粒细胞白血症 ①青黛研粉，每次 0.9~2.5g 冲服，日 3 次；或制成片剂，每次 2~4，日 3 次。（《抗癌良方》）②将靛玉红制成片，每次 2~4 片，每日 3~4 次。（《中药新用》）

3. 治舌癌 青黛 9g，黄柏 30g，肉桂 3g，冰片 0.6g，上药各研末，再共研，瓷罐收储，用时，用少许敷患处。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 治食管癌 青黛 4.5g，蛤蚧 30g，柿霜 15g，硼砂 6g，硼砂 9g，白糖 60g。共研末，每次 0.9~1.5g，含化，每日 3 次。（《抗癌本草》）

5. 治胃癌 青黛 3g，硼砂 5g，沉香 6g，共为细末；再用白马尿 500ml，白萝卜 500ml 取汁，生姜 250ml 取汁，置于铜锅熬成膏。每次服 3 茶匙膏，加前药末 0.21g，白汤调下，每日 3 次。（《抗癌中草药大辞典》）

6. 治肝癌 青黛、牛黄各 12g，紫金锭 6g，野菊花 60g，共为细末。每次 3g，每日 3 次。（《癌症患者就医康复指南》）

7. 治化疗后口腔溃疡 青黛：冰片（4：1）以生理盐水 2~25ml 调成糊状，用无菌棉签蘸药直接涂于溃疡面，每日 3~6 次，5 天为一疗程。（实用中医药杂志，2003，7）

8. 治化疗药物外渗 青黛 18g，煅石膏 12g，滑石 12g，黄柏 9g，冰片 0.9g，共为细末，用麻油调敷局部肿胀疼痛处，每小时敷 1 次，连用 3 日为一疗程。（河南中医药学刊，2001，2）

【配伍经验】

本品配羌活，一寒一热，一升一降，散郁清火，开结通络，治肝经郁火，湿毒外蕴肌肤之皮肤癌；配姜汁汤，治胃癌疼痛。

【药理作用】

抗癌作用 其有效抗癌成分为靛玉红，靛玉红对动物移植性肿瘤有中等强度的抑制作用。其制剂对小鼠 W_{256} 肉瘤的抑制率在 47%~58%，并可延长腹水型 W_{256} 大鼠的生存时间 43% 左右；对 C57BL 系小鼠 Lewis 肺癌的抑制率为 43%；对小鼠乳腺癌亦有一定的抑制作用。临床上用本品制剂治慢性粒细胞白血病有确切疗效。（《常用中药成分与药理手册》）

苦参

本品系豆科多年生落叶亚灌木植物苦参的根。味苦，性寒；归心、肝、胃、大肠、膀胱经。清热解毒，祛风燥湿。主治肠癌、宫颈癌、肝癌、皮肤癌、软组织肿瘤及滋养叶细胞癌。亦可用于湿热所致的黄疸、泻利、带下、阴痒、疥癣、脓疮疮、皮肤瘙痒等。3~10g，水煎服。外用适量。本品苦寒，凡脾胃虚寒、食少便溏者忌用。反藜芦。

【临床应用】

1. 治舌癌 苦参、五倍子、山豆根、七叶一枝花各 30g，冰片少许。加水煎汁。待药汁温，代水含漱，每日数次。（《防癌抗癌中药》）

2. 治胃肠道肿瘤 苦参 15g，红藤 30g，大枣 10 枚。水煎服，日 1 剂，可随证加减。（《实用抗癌药物手册》）

3. 治膀胱癌 苦参、生地各 15g，金银花、大蓟、小蓟各 12g，泽泻、萆薢各 9g，黄柏 6g，琥珀屑（另吞）1.5g。（《肿瘤要略》）

4. 治宫颈癌 苦参 12g, 白毛藤 12g, 土茯苓 12g, 半枝莲 12g, 墓头回 12g。每日 1 剂, 煎 2 次分服。《抗癌中草药大辞典》)

5. 治恶性葡萄胎及绒癌 用脱氧苦参碱针剂, 静滴或局部注射。《免疫中药学》)

6. 治软组织肉瘤 苦参 15g, 蛇六谷、泽漆各 30g, 三棱、莪术各 10g。水煎服, 每日 1 剂。《抗肿瘤中药的临床应用》)

7. 治皮肤癌 苦参 15g, 地肤子、蛇床子、白鲜皮各 20g。加水煎汁, 代茶饮, 每日 1 剂。《防癌抗癌中药》)

8. 治白血病 苦参 12g, 青黛 (冲服) 6g, 生地黄、仙鹤草各 30g。加水煎汁, 代茶饮, 每日 1 剂。《防癌抗癌中药》)

【配伍经验】

本品常配黄连、紫草、败酱草、白花蛇舌草, 治肠癌, 症见腹胀痛, 大便时常带脓血和黏液者; 配半枝莲、墓头回、土茯苓、鸦胆子, 治子宫颈癌; 配白头翁、半枝莲、莪术, 治肠癌; 配地榆、槐角, 治肠癌便血; 配蒲公英、土茯苓, 治胃癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 本品对恶性葡萄胎、绒毛膜癌、子宫癌、艾氏腹水瘤和淋巴肉瘤细胞均有不同程度抑制作用, 苦参总碱、苦参碱、氧化苦参碱对肉瘤-180 有明显抑制作用; 苦参对人白血病细胞 K₅₆₂、人肝癌细胞 HepG₂ 和 SMMC-7721 有明显的抑制作用。《中华现代中西医杂志, 2003, 2》)

苦参碱对 Lewis 肺癌移植小鼠、S₁₈₀ 实体瘤移植小鼠、淋巴瘤、艾氏腹水瘤移植小鼠等均有明显抑制肿瘤生长, 延长小鼠寿命的作用。《中国中西医结合杂志, 1998, 5》)

2. 免疫调节作用 苦参碱、氧化苦参碱在 1/5 LD₅₀ 剂量下对小鼠免疫功能都有抑制作用。《中草药, 1987, 5》)

3. 镇静作用 苦参碱和氧化苦参碱能增强小鼠脑内 γ -氨

基丁酸和甘氨酸含量，抑制 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶活性，从而产生镇静作用。（中国药学杂志，1993，11）

鱼腥草

本品系三白草科多年生草本植物蕺菜的全草。味辛，性微寒；归肺经。清热解毒，排脓利尿。主治肺癌、绒毛膜癌、宫颈癌、胃癌等；亦可用于肺痈咳吐脓血及肺热咳嗽，热毒疮疡及热淋、小便涩痛等。15～30g，水煎服。外用适量。本品主要有效成分在挥发油内，故不宜久煎；本品有小毒，不宜过量。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 鱼腥草、七叶一枝花各 30g，苍耳子 15g，威灵仙、石见穿各 20g。每日 1 剂，加水煎汁，代茶饮。（《防癌抗癌中药》）

2. 治肺癌感染发热 鱼腥草 30g，赤小豆 90g。水煎，日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 治肠癌 鱼腥草 18g，山楂炭 6g。水煎蜂蜜调服。（《抗癌植物药及其验方》）

4. 治阑尾恶性肿瘤 鱼腥草、蒲公英、紫花地丁、白花蛇舌草各 30g。加水煎汁，分 3 次服，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

5. 治慢性淋巴细胞白血病 鱼腥草 100g，粳米 50g，煎服。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 治癌性胸腹水 鱼腥草、马鞭草、夏枯草各 30g，赤小豆 60g。加水煎汁，每日 1 剂。分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

【配伍经验】

配黄芩、大青叶，治肺癌感染发热；配红藤，治宫颈癌；

配蒲公英，治胃癌热毒壅盛；配牛蒡子，治喉癌。

【药理作用】

抗癌作用 本品有抗噬菌体作用，提示有抑癌作用。国外在本品全草中得到一种熔点为 140℃ 的针状结晶，已证明此结晶治疗胃癌有效。（《中华肿瘤治疗大成》）

蚤休

本品系百合科多年生草本植物蚤休及同属多种植物的根茎。味苦，性微寒，有小毒；归肝经。清热解毒，消肿止痛。主治热毒壅滞的肝癌、肺癌、脑肿瘤、乳腺癌、白血病、膀胱癌、恶性淋巴瘤等多种肿瘤；亦可用于热毒疔疔、蛇虫咬伤、白喉、腮腺炎、咽喉肿痛等。15～30g，水煎服。外用研粉，用醋、酒或水调敷患处。虚寒证、阴证外疡及孕妇禁服。

【临床应用】

1. 治脑肿瘤 ①蚤休、威灵仙各 30g，木瓜 9g，水煎服，同时吞服三七粉 3g，每日 1 剂。（《实用抗癌药物手册》）②苍耳子、蚤休各 12g，石菖蒲 6g，远志肉 4g。水煎，日 1 剂，分 3 次服。（《肿瘤的辨证施治》）

2. 治喉癌 蚤休 25g，野荞麦根 25g，龙葵 50g，蛇果草 25g，每日 1 剂，水煎，分早晚 2 次服。（《抗癌中药药理与应用》）

3. 治甲状腺癌 七叶一枝花 20g，生鳖甲（或炮山甲）（先煎）15～20g，黄药子 15g，夏枯草 20g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2～3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

4. 治食管癌 七叶一枝花 12g，炒大黄、木鳖子各 9g，马牙消 12g，半夏 30g。共为细末，炼蜜为丸 3g 重，每日徐徐含化 3～4 丸。（《常见肿瘤的防治》）

5. 治肺癌 七叶一枝花、紫草根各 60g，前胡 30g，人工牛黄 10g。前三味制成流浸膏，干燥研细，加入牛黄和匀，每

次服 2g，每日 3 次。（《肿瘤临证备要》）

6. 治晚期胃癌 ①七叶一枝花 20g，仙鹤草 30g，藤梨根 60g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

②蚤休 50~100g，煎水单服，一疗程不少于 20 天，服 7~8 个疗程。（新医学，1973，8）

7. 治肝癌 七叶一枝花 30g，石打穿 20g，生鳖甲（或炮山甲片）15~30g，茵陈 30g，加水煎汁，每日 1 剂，分 3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

8. 治宫颈癌 七叶一枝花 10g，白丁香花根 20g，白毛藤根 30g，金丝桃根 10g。每日 1 剂，水煎内服，每日 3 次。（《抗癌中草药大辞典》）

9. 治膀胱癌 七叶一枝花 30g，龙葵、小蓟、白花蛇舌草各 20g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

10. 治恶性淋巴瘤 蚤休 18~24g，猫爪草 15~30g，乌菰莓 30~60g。水煎，日 1 剂分服。（武汉医学院附属二院方）

【配伍经验】

本品常配臭牡丹，治肺癌；配山豆根、夏枯草，治食管癌；配石见穿、半枝莲、龙葵，治肝癌；配天葵子、夏枯草，治恶性淋巴瘤；配三七粉、全蝎，治癌痛出血。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 本品对鼠艾氏腹水癌及鼠肝癌细胞具有抑制作用；水煎剂腹腔注射对小鼠肉瘤的抑制率为 40%~50%；对实体型肝癌抑制率为 30%~40%。本品热水浸出物，体外实验对 JTC₂₆ 抑制率为 50%~70%；体内实验，本品所含皂苷 I 和 III 对白血病₃₈₈ 有细胞毒作用，能增进白细胞吞噬能力。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 镇痛作用 蚤休苷可使小鼠的自由活动减少，与戊巴比妥钠有显著协同作用。（《抗癌中草药大辞典》）

茵陈蒿

本品系菊科多年生草本植物茵陈蒿的幼苗。味苦，性微寒；归脾、胃、肝、胆经。清热利湿，利胆退黄。主治肝癌、胆管癌、胰腺癌及癌性胸、腹水；亦可用于肝炎、胆囊炎、湿热黄疸。15~30g，水煎服。

【临床应用】

1. 治胆管癌 茵陈 15g，芦根 20g，玉米须 25g。加水浓煎。每日 1 剂，代茶频饮。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治癌性发热 茵陈 30g，半枝莲 30g，白花蛇舌草 30g，大黄 10g，栀子 10g，配合大柴胡汤，水煎服。治 50 例，总效率为 90%。（湖南中医杂志，2004，3）

【配伍经验】

本品常配栀子、大黄，为疏肝利胆、清热除湿退黄之要药，在肝、胰、胆等肿瘤病中多同时应用；配白花蛇舌草，治肝癌；配金钱草，治胆囊癌；热甚加溪黄草、蒲公英、黄芩；湿重者，加石菖蒲、白蔻仁、滑石；气虚加黄芪、怀山药；阴虚加沙参、生地黄、玄参；夹瘀血者，加乳香、没药、桃仁；胁肋疼痛加川楝子、延胡索。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 茵陈蒿水煎剂对大鼠实验性食管肿瘤有抑制作用；（福建中医学院学报，2001，2）茵陈乙醇提取物在体外能抑制宫颈癌细胞的增殖；（中国药科大学学报，1992，8）对人胃癌细胞 BGC-823 具有杀伤作用。（中药材，1998，7）

2. 抗突变作用 茵陈蒿煎剂对 AFB₁ 诱发的小鼠骨髓多染红细胞微核率、染色体畸变率和姊妹染色单体交换率的增高有明显的拮抗作用，具有明显的剂量-反应性关系。（癌变·畸变·突变，1998，1）

3. 放、化疗减毒作用 对射线和氮芥损伤有良好的保护作用,对环磷酰胺表现出良好的减毒效果。(癌症,1998,2)

4. 免疫增强作用 茵陈蒿煎剂具有提高小鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能,促进免疫功能的作用;(中国实验方剂杂志,1998,4) 茵陈蒿能促进白细胞分裂,增加白细胞数目,提高T细胞免疫活性,参与机体免疫调节和诱生干扰素等作用。(中草药,1998,8)

鸦胆子

本品系本科常绿灌木或小乔木鸦胆子的成熟种子。味苦,性寒;归大肠、肝经。清热解毒,治痢腐疣。主治脑肿瘤及脑转移瘤、食管癌、贲门癌、肠癌、宫颈癌、皮肤癌等;亦可用于血痢、痢下脓血、里急后重及鸡眼、寻常疣、疟疾等。每次10~15粒,可装入胶囊或用桂圆肉包裹吞服。外用适量。注意本品极苦,不宜入汤剂;对胃肠及肝肾均有损害,不宜多用及久服;胃肠出血及肝肾病患者,应忌用或慎用。

【临床应用】

1. 治眼睑鳞状上皮癌 鸦胆子仁适量。第1、2、3、4、5周分别内服鸦胆子仁9、10、11、12、15粒,均每日3次,用桂圆肉包裹,饭后吞服。外搽鸦胆子仁凡士林膏,将鸦胆子仁捣碎,与凡士林混合,拌匀,外敷患处,每日1次。(广西中医药,1979,3)

2. 治食管癌 ①鸦胆子、水蛭各60g,桃仁120g,代赭石150g,禁用火烘,先将水蛭、桃仁、代赭石研成细面,再入鸦胆子捣烂,每次9~12g,搅入藕粉内服,每日3~4次,体虚者慎用。((《新编中医入门》) ②鸦胆子、鸡内金各等份,共研细末,装胶囊内,每粒0.5g。口服,每次2粒,每日2次,开水送服。((《实用单方验方大全》))

3. 治肺癌及脑转移 10% 鸦胆子油静脉乳剂 10~40ml, 加入 5% 葡萄糖注射液 500ml 静脉滴注, 每日 1 次; 或口服本品, 每次 20ml, 每日 2~3 次, 均 30 日为一疗程。(中国中西医结合杂志, 1985, 2)

4. 治胃癌 鸦胆子油乳 20~30ml 加生理盐水静脉滴注, 每日 1 次; 鸦胆子油乳口服液, 口服, 每次 20~25ml, 每日 3 次, 15 日为一疗程。有效者连续使用多疗程。(中成药, 1991, 9)

5. 治乳腺癌 鸦胆子 15~20 粒。用法: 装入胶囊, 开水吞服。每日 3 次。(《常见病单味中药自疗法》)

6. 治原发性肝癌 将鸦胆子油剂与碘化油混合乳化, 以该乳化剂进行 1~4 次肝动脉插管灌注, 临床结果显示对肝癌灶体有强烈的杀灭能力, 用药后临床症状明显缓解或消失。(临床医学影像杂志, 1994, 3)

7. 治大肠癌 ① 鸦胆子 20 粒 (去壳龙眼肉包裹吞服), 黄药子、马尾连各 15g, 水煎服。(《云南抗癌中草药》) ② 大黄 3g, 鸦胆子 15 粒, 蟾酥 0.015g, 共研为末, 分 3 次口服, 每日 1 剂。(《癌症秘方验方偏方大全》)

8. 治恶性胸腔积液 鸦胆子油乳剂, 联合顺铂腔内注入治 25 例, 每周用药 2 次, 缓解率为 86%, 优于单用顺铂。(肿瘤学杂志, 2004, 2)

9. 治癌性腹水 抽出腹水 1000~2000ml 后, 腹腔内注入鸦胆子乳 100~150ml, 每周 1 次, 治 40 例, 有效率为 65%。(浙江临床医生, 2002, 12)

【配伍经验】

本品配冰片, 治皮肤癌; 配水蛭、桃仁、代赭石, 治食管癌; 配大黄粉、蟾酥, 治大肠癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 鸦胆子油是细胞周期非特异性抗癌药,

对癌细胞 G_0 、 G_1 、S、 G_2 、M 期有杀伤和抑制作用，能明显抑制肿瘤细胞的 DNA 合成，可直接进入癌细胞，通过影响质膜系统和线粒体使之变性、坏死，易通过血脑屏障，对脑肿瘤及脑转移瘤有较好疗效。（黑龙江医学，2002，10）

鸦胆子的甲醇提取物注射给药，对艾氏腹水癌， W_{256} 癌肉瘤和 P_{388} 淋巴细胞性白血病有显著抑制作用。（《抗癌中药药理与应用》）

2. 免疫调节作用 对体液免疫和细胞免疫均有促进作用，可诱导干扰素的生成。（《抗癌中药药理与应用》）

拳参

本品系蓼科多年生草本植物拳参的根茎。味苦，性微寒，有小毒；归大肠、心经。清热解毒，凉血止血。主治头颈部癌、食管癌、肠癌、肝癌、乳腺癌、恶性淋巴瘤及白血病；亦可用于肠炎、痢疾、痈疮肿毒等。10~15g，水煎服。或研末作丸、散服。

【临床应用】

治头颈部恶性肿瘤 拳参、黄药子各 30g，泽漆 15g，夏枯草 12g。水煎服，每日 1 剂。（《实用抗癌药物手册》）

【配伍经验】

本品配蚤休，治肝癌；配菝葜，治肠癌；配败酱草、红藤，治宫颈癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 对小鼠 S_{180} 瘤株有抑制作用。（《抗癌中草药大辞典》）

2. 镇痛作用 拳参正丁醇提取物对醋酸诱发小鼠扭体反应，热板法和电刺激法诱发的疼痛有显著的抑制作用。（赣南医学院学报，2004，1）

黄芩

本品系唇形科多年生草本植物黄芩的根。味苦，性寒；归肺、胆、胃、大肠经。清热解毒，泻火凉血。主治肺癌、肠癌、白血病及其他肿瘤属热毒炽盛者。亦可用于高热烦渴、湿热泻利、湿热黄疸及肺热肺痛、疖肿疮疡等。3~10g，煎服或入丸、散。本品苦寒，脾胃虚寒，少食、便溏者慎用。

【临床应用】

1. 治大肠癌下血 黄芩 9g，加水 200ml，煎至六成，和渣一起温服。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治宫颈癌 ①黄芩 100g，黄连 100g，黄柏 100g。共研细末，先将子宫颈癌患处洗干净，然后外撒细末。（北京市中医院方）②黄芩、黄柏各 9g，山豆根 6g，水煎服。另局部用上海药研粉置棉球中紧贴病灶。（《抗癌植物药及其验方》）

3. 治黑色素瘤 黄芩、黄柏、栀子、马尾黄连各 15g，白花蛇舌草、半枝莲各 30g。水煎服。（《云南抗癌中草药》）

【配伍经验】

本品常配大黄、黄连，治消化道癌合并出血；配栀子、龙胆草，治肝癌；配辛夷、苍耳子，治鼻咽癌；配鱼腥草，治肺癌发热；配胆南星，治肺癌咳嗽痰稠；配金银花、牛蒡子、板蓝根，治放疗后咽喉肿痛。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 本品提取物对 JTC₂₅ 抑制率为 100%；其乙醇提取物对小鼠肉瘤 S₁₈₀ 抑制率为 37.7%；汉黄芩素药理和临床都证明有较强的抗癌活性作用，对白血病细胞有抑制作用。（《中华肿瘤治疗大成》）黄芩可明显抑制肝癌细胞 hepG₂ 及人肺腺癌细胞 AGZY-83 株细胞的生长增殖，诱导癌细胞形态改变，使

其停滞于细胞周期的静止期。(河北中医药学报, 2000, 3)

可通过降低血液凝固性, 抑制血小板聚集过程, 来抑制肿瘤转移, 亦可增强环磷酰胺的抗肿瘤效应。(国外医学·中医中药分册, 1991, 2)

2. 抗突变作用 黄芩可明显降低苯并芘诱发 TA_{98} 和 TA_{100} 的突变率。(国外医学·中医中药分册, 1991, 1) 明显抑制黄曲霉素 B_1 诱发 TA_{98} 的突变。(中药材, 1991, 3)

3. 免疫调节作用 黄芩能激活巨噬细胞, 促进 IL-1 产生, 增强 NK 细胞活性, 激活 T 淋巴细胞, 提高淋巴细胞转化率, 诱导 γ -干扰素形成, 从而发挥其对单核巨噬细胞、B 淋巴细胞等的调节作用, 亦可促进 IL-2 的产生, 促进细胞免疫。(河北中医药学报, 2000, 3)

4. 抗多药耐药作用 黄芩素在非细胞素剂量时能逆转卵巢癌细胞耐药细胞株 A2780/ADM 对 ADM 的耐药性。(肿瘤, 2004, 2)

5. 对放射损伤的保护作用 黄芩中酚性苷类对小鼠颌下放射性损伤有明显的细胞保护作用。(中药药理与临床, 2000, 1)

6. 对多种化疗药物的增效减毒作用 黄芩黄酮 A 与 MMC、ADM、5-Fu、卡铂羟基喜树碱合用具有相加或协同作用, 可降低端粒酶活性的表达。(肿瘤研究与临床, 2000, 3)

黄芩提取物对小鼠和大鼠的移植肿瘤能改善环磷酰胺和 5-氟尿嘧啶导致的骨髓抑制; 肺癌化疗者服用黄芩提取物后造血功能活跃, 骨髓红细胞系和粒细胞系有增强, 循环的红细胞系和粒细胞系前体细胞增多。(国外医学·中医中药分册, 2001, 1)

7. 镇静作用 黄芩苷能抑制小白鼠的自发活动, 作用强度与剂量有关, 黄芩煎剂可抑制小鼠阳性条件反射, 可用于神经兴奋性增高及失眠的高血压患者。((《抗癌中药药理与应用》))

黄连

本品系毛茛科多年生草本植物黄连、三角叶黄连或云连的根茎、根须及叶。味苦，性寒；归心、肝、胃、大肠经。清热燥湿，泻火解毒。主治唇癌、舌癌、消化道肿瘤及肿瘤并发感染，属热毒、湿热内盛者；亦可用于痈疮肿毒、疔毒内攻，耳、目肿痛诸症及肠胃湿热所致的腹泻、痢疾、呕吐等。2~10g，煎服。或1~2g研粉吞服。外用适量。凡属脾胃虚寒而无湿热实火者不宜服。

【临床应用】

1. 治舌体肿瘤 黄连 10g，半夏 10g，刀豆子 60g，赤小豆 60g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治外耳道或中耳癌 黄连 30g，明矾 15g，加猪胆汁 30g，阴干后再研为细粉，每取适量吹入耳内，每次 1~2 次。（《肿瘤的诊断与防治》）

3. 治耳部肿瘤 黄连（去须）30g，大黄 15g，龙骨 30g。上药共研末，每用少许，棉裹枣核大，塞耳中。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 治食管癌 黄连、半夏、白豆蔻、人参、茯苓、竹茹各 6g，水煎服。（《奇病广要》）

5. 治直肠癌出血 黄连 15g，生地黄 60g，王瓜 30g。王瓜烧存性，与生地黄、黄连共为粉末，蜜调为丸如梧桐子大，每次 10 丸，每日 3 次，米汤送服。（《中华肿瘤治疗大成》）

【配伍经验】

本品常配吴茱萸，治胃肠癌肝郁化热之胸胁胀痛、胃脘嘈杂；配木香，治肠癌泻利腹痛；配大黄，可用于胃癌、肝癌之吐血、便血；配肉桂，治肿瘤患者心肾不交之失眠；配黄芩、干姜、半夏，和胃降逆，开结散痞，用于消化道肿瘤湿热中阻

之呕吐、泄泻。

【药理作用】

1. 抗癌作用 黄连所含小檗碱对艾氏腹水癌细胞有抑制作用，其抑制癌细胞主要是抑制癌细胞的黄酶及核酸合成，抑制嘌呤核苷酸合成的中间体羟胺的利用。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 抗放射作用 小檗碱对小鼠遭受 ^{60}CoP -射线照射而致的死亡有某种保护作用。（《中华肿瘤治疗大成》）

紫草

本品系紫草科多年生植物紫草的根。味甘，性凉；归心、肝经。解毒凉血，活血透疹。主治绒毛膜上皮癌、胃癌、扁桃体腺癌、鼻咽癌、宫颈癌等多种肿瘤；亦可用于麻疹或斑疹不透，紫癜及疮疡、湿疹、阴痒、烫伤、火伤等。10~30g，水煎服。脾虚便溏者忌服。

【临床应用】

1. 治舌根腺癌 紫草 20g，天葵 10g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治肺癌 紫草根、昆布、山海螺各 30g，夏枯草 24g，蚤休、前胡各 15g。日 1 剂，分 3 次服。（《肿瘤的辨证施治》）

3. 治皮肤癌 紫草 50g，白蝎草 30g，马钱子 1g，蜈蚣 3 条，制成膏剂，涂在患处，每日 3 次。（安徽蚌埠市第二人民医院方）

4. 治大肠癌 紫草 15g，绿豆 30g，白糖适量。先将紫草加水煎汤，煮沸 10 分钟后滤去头汁，再加水适量煮沸 15 分钟后，滤出二汁。将头汁、二汁混合，放入绿豆同煎煮，俟煮至绿豆烂熟时，加入白糖调味，饮汤，吃绿豆。汤液分 2 次口服，绿豆当点心吃。每日 1 剂，常服。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 治肿瘤溃疡 3%紫草油棉纱油，在以生理盐水清洗后

轻擦患处，均匀涂擦，以无菌纱布封闭包扎，隔日换药一次。
(实用肿瘤学杂志，1992，2)

6. 治放射性皮炎 紫草 100g 研末过筛，用芝麻油 200ml 浸泡 1 周后搅匀备用，涂擦患处，每日 3 次，治 26 例，均在 7~23 天内痊愈。(医用放射技术杂志，2004，5)

【配伍经验】

本品配天葵，对头部肿瘤有较好疗效；配八月札、山慈菇、瓦楞子、蒲公英，治胃癌；配莪术、黄药子、天花粉，治宫颈癌；配仙鹤草，治阴道癌出血不止；配槐角，治大肠癌出血。

【药理作用】

1. 抗癌作用 紫草根对小鼠肉瘤₁₈₀、绒毛膜上皮癌及恶性葡萄胎有一定的疗效，对急性淋巴细胞性白血病有极轻度的抑制作用，可减少（鼠）自发性乳癌的发病率。（《抗癌中药药理与应用》）对人胃癌 BGC₈₂₃ 细胞和人食管癌 ECa₁₀₉ 细胞的生长有明显的抑制作用。（中西医结合杂志，1990，7）

紫草素具有明显的抑制人宫颈癌 Hela 细胞的生长作用，并呈明显的量效关系和时间依赖性；（中国药理学通报，2004，5）新疆紫草素能有效地诱导大肠癌细胞 CCL₂₂₉ 凋亡。（癌症，2001，12）

新疆紫草素对小鼠胶质瘤细胞 C6，人舌鳞癌细胞 Tca-8113 和 Hela 细胞的生长具有明显的抑制作用，但作用方式不同，对 C6 和 Tca-8113 主要以作用于细胞质为主，细胞以坏死为主；但对于 Hela 细胞则主要作用于细胞核，引起细胞凋亡。（泸州医学院学报，2003，2）

2. 放射增敏作用 紫草素加放射可增强鼠肝癌 H₂₂ 和 Lewis 肺癌的抑瘤率，延长带瘤的存活时间。（肿瘤防治研究，1991，2）

3. 免疫调节作用 紫草多糖可促进腹腔巨噬细胞吞噬功

能，增强脾脏中 T 淋巴细胞的计数和 B 淋巴细胞的功能，促进迟发性变态反应。（中国实验临床免疫学杂志，1995，5）紫草萘醌单体提取物能增强小鼠 NK 细胞活性。（中国免疫学杂志，1990，3）

槐角

本品系豆科落叶乔木植物槐树的果实。味苦、性微寒；归肝、大肠经。清热凉血。主治肝癌、直肠癌、结肠癌、胃癌等消化系统肿瘤；癌性出血及其他各种出血。10~15g，水煎服。或入丸、散剂。注意孕妇忌用。

【临床应用】

1. 治食管癌 槐角 100g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服用。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治贲门癌 槐角 100g，水煎服，日 1 剂，分 2 次服。（《抗癌良方》）

3. 治消化系统肿瘤 ①槐角糖浆（含槐角 1.25g/ml）每日 100ml 分 2 次服。②槐角蜜丸（每丸重 9g）每次 1 丸，每日 3 次。③槐角 30g，置热水瓶中，冲入开水浸泡，当茶饮。④槐角注射液肌注，每日 2 次，每次 1~2 支。（《抗癌全草》）

【配伍经验】

本品常配地榆炭，治肠癌出血；配白花蛇舌草、败酱草、仙鹤草，治宫颈癌；配夏枯草、海棠、紫草根、白花蛇舌草、半枝莲，治肛门癌；配田三七、大黄炭、仙鹤草，用于癌性溃疡出血。

【药理作用】

抗癌作用 体外筛选结果，对人子宫颈癌（JTC-26）有抑制作用，抑制率在 90% 以上。（《中药药理毒理与临床》）

蒲公英

本品系菊科多年生草本植物蒲公英及其多种同属植物的带根全草。味苦、甘，性寒；归胃、肝经。清热解毒、利湿散结。主治肝癌、胃癌、乳腺癌、肠癌等；亦可用于热毒痈肿疮疡、内痈及湿热黄疸及小便淋漓涩痛。10~30g，水煎服。外用适量。本品用量过大，可致胃肠道反应如恶心、呕吐、轻度腹泻等。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌颈部淋巴结转移 鲜蒲公英 30g，侧柏叶 30g，生地黄 30g。捣烂与蜜调匀，外敷颈部肿块。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治牙龈癌 蒲公英、夏枯草、白石英、白花蛇舌草各 30g，紫花地丁 15g。水煎，日 1 剂。（《肿瘤的诊治与防治》）

3. 治食管、贲门癌 蒲公英根 30g，加水煎，去渣，得汁服下。（《中国民间偏方大全》）

4. 治肺癌疼痛 鲜蒲公英 200g，捣碎取汁，将药水直接擦于痛处皮肤。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 治乳腺癌破溃腐烂者 蒲公英 50g，全蝎 50g，大蜈蚣 1 条，血余炭 25g，雄黄 35g。上药共研细末，醋泛为丸，如桐子大，每次服 10g，白酒送服，每日 2~3 次。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 治急性淋巴细胞性白血病 鲜蒲公英 50g，鲜茅根 250g，鲜生地黄 250g。将上药切碎、洗净。水煎，每日 1 剂，当茶饮。（《中华肿瘤治疗大成》）

【配伍经验】

本品常配连翘，治胃癌，既能使肿块缩小，又能减轻胃肠道症状；配紫花地丁、露蜂房，治乳癌；配夏枯草、牡蛎、天

葵子，治鼻咽癌颈部淋巴结转移。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 蒲公英的热水提取液有抗肿瘤作用，且与给药时间有一定的关系；（桂林医学，1999，15）蒲公英热水浸出物对小鼠肉瘤₁₈₀抑制率为43.5%；（《中华肿瘤治疗大成》）目前有人认为蒲公英可作为一种相对安全的抗肿瘤药物。（吉林中医药，1996，4）

2. 免疫作用 蒲公英干品制剂在体外能显著提高人淋巴细胞的转化率，能提高及改善小鼠细胞免疫和非特异性免疫功能的作用；并能使环磷酰胺所致免疫功能受损小鼠的免疫水平得到恢复和保护。（贵阳医学院学报，1997，2）

墓头回

本品系败酱科多年生草本植物异叶败酱及糙叶败酱（脚汗草）的根或全草。味辛、苦，性寒；归胃、大肠、肝经。清热解毒，祛瘀消肿，收涩止血。主治原发性肝癌、宫颈癌、白血病、胃癌等；亦可用于崩漏、赤白带下及热毒痈肿、胸腹痛。10~15g，水煎服。外用适量。注意本品性味苦寒，凡属脾胃虚寒者须慎用。

【临床应用】

1. 治胃癌 墓头回 30g，生姜 3 片，红糖 30g。水煎代茶。（《肿瘤要略》）

2. 治白血病 墓头回 15g，羊蹄根 30g。水煎服，日 1 剂。（《全国抗癌药物手册》）

3. 治宫颈癌 ①墓头回、半枝莲、苦参、土茯苓、白毛藤各 12g，日 1 剂，水煎分 2 次服；②鲜墓头回、鲜石见穿、鲜六月雪各 30g，鲜香附 15g。水煎服，日 1 剂。（《肿瘤要略》）③墓头回 12g，仙茅 30g，石见穿 30g，白英 30g，马齿苋

30g。水煎，每日1剂，分2次服。《中华肿瘤治疗大成》

【配伍经验】

本品常配八月札，治胃癌；配白毛藤，治宫颈癌。

【药理作用】

抗癌作用 体外抗癌试验表明，其热水提取物对艾氏腹水癌细胞有破坏作用；其提取物对艾氏腹水癌实体型有明显的防治作用；其有机酸部分对 S_{180} 亦有抑制作用，抑瘤率达62.5%。《中华肿瘤治疗大成》

藤梨根

本品系猕猴桃科猕猴桃属植物猕猴桃的根。味苦、涩，性凉。清热解毒，活血消肿。主治胃癌、肠癌、食管癌、肝癌；亦可用于跌打损伤、肝炎、关节炎、疮疖肿毒等。30~60g，水煎服。少数病人用药后可出现皮肤瘙痒、皮疹、呕吐、腹胀等副作用，停药后即能自愈。

【临床应用】

1. 治甲状腺癌 藤梨根 60~120g，黄药子 30~60g，野葡萄根 60~120g，紫草 60g，马钱子 3g，天龙 6g。水煎，每日1剂，分2次服。《中华肿瘤治疗大成》

2. 治胃癌 藤梨根配合虎杖，以乙醇提取法制成糖浆（每60ml含藤梨根60g，虎杖30g），每次20~30ml，每日3次，饭前服。《抗癌中药药理与应用》

3. 治小肠癌 藤梨根 50g，鸡蛋2个。藤梨根浓煎取汁，取渣，打入鸡蛋，煮熟即成。每日1次，可长期服食。《中华肿瘤治疗大成》

4. 治宫颈癌 藤梨根、猫人参各 60g，当归、杭白芍、黄芪各 30g。水煎服，每日1剂。《防癌抗癌中药》

5. 治卵巢癌 藤梨根 60g，当归、龙葵、土茯苓各 30g，

白术 15g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次服。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品常配八月札，治胃癌；配半枝莲、野葡萄根、凤尾草、蚤休，治肠道肿瘤。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 藤梨根对小鼠肉瘤（S₁₈₀）、子宫颈癌（U₁₄）有抑制作用；（《中华肿瘤治疗大成》）对胃癌细胞有明显杀伤作用；（河北中医，2004，4）对白血病的抑制率为 54.24%，对结肠低分化腺癌细胞的抑制率为 60.1%。（湖南中医药导报，1999，4）

2. 免疫作用 软枣猕猴桃根有增强细胞免疫，抑制体液免疫的作用。（中药材，2004，2）

活血化瘀类药

大黄

本品为唐古特大黄或药用大黄的根和根茎。味苦，性寒；归脾、胃、大肠、肝、心经。破血祛瘀，清热解毒，泻下攻积。主治消化系统肿瘤，如肝、食管、胃、肠之肿瘤及其引起的梗阻和癌性出血、白血病、黑色素瘤等。内服：煎汤，5~10g；生大黄抗癌及泻下力强，宜后下；酒制大黄泻下力较弱，活血作用较强，用于瘀血及不宜峻下者。大黄炭则多用于出血。脾虚便溏者慎用，妇女妊娠、月经期、哺乳期忌用。

【临床应用】

1. 治舌癌 大黄 22.5g，玄参 22.5g，升麻 22.5g，水牛角 22.5g，甘草 15g。共为细末，每次取 9g，加水 100ml 煎至 50ml，温服，日 3 次。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治耳部肿瘤 大黄 15g, 黄连 (去须) 30g, 龙骨 30g, 共为细末, 每用少许, 棉裹枣核大, 塞耳中。 (《中华肿瘤治疗大成》)

3. 治晚期癌性疼痛并发机械性肠梗阻 生大黄 10~15g, 碎成蚕豆大小, 放杯中, 以沸水 250ml, 加盖泡 20 分钟, 每次服 200ml, 杯中余药再加沸水 200ml, 30 分钟及 2 小时服用。治疗 22 例, 20 例在 4 小时内即排便排气, 腹胀痛改善。 (实用中医内科杂志, 1999, 2)

4. 治胃癌出血 大黄粉, 每次 3g, 每日 2~4 次。治疗 31 例胃癌合并出血, 达到止血效果 29 例, 平均止血时间是 49 小时, 大黄平均用量是 21g。服后约 5 小时, 排便、腹泻 6~7 次, 然后大便隐血试验转为阴性。 (《抗癌良方》)

5. 治结肠癌术后便血 大黄粉 9g, 盐水 140ml, 保留灌肠, 每日 1 次。 (《中华肿瘤治疗大成》)

6. 治肿瘤患者便秘 生大黄粉 3~5g, 以 50~60 度的酒调成糊状, 贴敷神阙穴, 外用胶布固定。每天于局部用白酒 5ml 加湿 1 次, 3 天换药 1 次, 5 次为一疗程。治疗 35 例, 总有效率为 92.11%。 (护理学杂志, 2001, 2)

7. 治肝癌化疗栓塞术后腹胀 生大黄 10g, 水煎至 100ml, 每次口服 50ml, 每日 2 次。治疗 40 例, 完全缓解 (26/40), 部分缓解 (12/40)。 (实用放射学杂志, 1999, 8)

【配伍经验】

本品配茵陈、栀子, 治肿瘤湿热黄疸; 配夏枯草、七叶一枝花、莪术、郁金、鳖甲, 治肝癌发黄; 配龙胆草、金钱草, 治胆囊癌发黄; 配枳实、厚朴, 治腹部肿瘤术后肠麻痹、肠粘连性便血; 大黄粉配白及、三七粉, 治肝癌合并消化道出血; 配失笑散, 治胃癌出血; 配槐花散, 治肠癌出血; 配蒲黄炭, 治泌尿系肿瘤尿血; 配仙鹤草, 治肺癌咯血; 配桂枝、苏木、全蝎, 治肿瘤血瘀疼痛; 配蜂蜜, 可减轻大黄所致便前腹痛的副作用。

【药理作用】

1. 抑制癌细胞生长 大黄酸及大黄素对小鼠黑色素瘤、乳腺癌、艾氏腹水癌、人肺癌 A-549 细胞有抑制作用；（《中华肿瘤治疗大成》）大黄多糖对人胃癌细胞系 5GC-7901、人肝癌细胞系 QGY-7703、人肺腺癌细胞系 SPC-A-1 有明显抑制作用，并能干扰肿瘤细胞 DNA 合成；（吉林中医药，1999，4）大黄酸对人口腔鳞癌 KBS 细胞系、人肝癌 BEL-7402 细胞系和人乳腺癌 M（F-）细胞系有一定的增殖抑制作用，并与 MMC 合用对 3 种肿瘤均有协同作用。（药学学报，2001，5）

2. 诱导癌细胞凋亡 大黄酸能诱导 KB 细胞凋亡，抑制 KB 细胞核苷转运和 DNA 合成。（药学学报，2001，5）

3. 抗肿瘤多药耐药 大黄素能增强 5-Fu、MMC、MTX 对人肝癌 BEL-7402 细胞的细胞毒作用，并能部分逆转人乳腺癌细胞 MCF-7/Adr 对阿霉素的抗药性。（药学学报，1999，3）

4. 抗肿瘤转移 大黄素能抑制肿瘤细胞转移相关性质。（癌症，2001，8）

5. 对免疫功能的影响 大黄蒽醌类衍生物大黄酸、大黄素和芦荟大黄素对正常小鼠免疫系统有不同程度的抑制作用。（中国药科大学学报，1989，4）大黄素对肿瘤坏死因子（TNF- α ）的分泌和 $[Ca^{2+}]$ 有双向调节作用。（中草药，2001，8）

三七

本品为五加科多年生草本植物三七的根。味甘、微苦，性温；归肝、胃经。化瘀止血，活血定痛。主治多种肿瘤及癌性出血、疼痛；亦治其他各种出血及跌打损伤。内服：煎汤，3~9g；研末，1~3g；或入丸、散。外用：适量，磨汁涂；或研末调服。孕妇慎用。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 三七粉、五倍子粉、枯矾粉各等份。共为细末，以凡士林纱条或植物油细纱条蘸药粉，塞入出血鼻孔内。（《防癌抗癌验方精编》）

2. 治食管癌 干蟾蜍 30g，田三七 30g，三棱 30g，五灵脂 30g。上药用微火焙干存性，研成细末，过筛即得。每次 1.5~3g，每日 3 次，用醋调和后，温开水冲服。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 治胃癌 党参 20g，白术 15g，炙甘草 5g，蒲公英 30g，仙鹤草 30g，三七粉 3g，（冲），水煎服。（《抗癌良方》）

4. 治肠癌 将三七、天龙、桂枝、地龙加工成片剂，每片生药 1.5g，每次 2~3 片，1 日 3 次。（上海中医学院方）

5. 治白血病 三七粉、黄药子各 9g，乌梅 6g，龙葵、薏苡仁各 60g，白花蛇舌草 75g，水煎服，每日 1 剂。（《抗癌良方》）

6. 治肿瘤化疗后出血 生山药 100g，桂圆肉 20g，炮姜炭 6g，三七粉 10g。将桂圆肉、炮姜炭先煮 30 分钟，去渣入山药，三七粉慢火煮成糊，加入红糖少许。于化疗第一天起，每日 3 餐服用，连续 30 日。对化疗后咳血、便血、呕血、衄血均有效。（天津中医学院学报，1997，4）

7. 治癌性疼痛 三七粉 1g，口服，每日 3 次，与速效救心丸合用，治疗 35 例，中度痛含服速效救心丸 10 粒，重度痛含服速效救心丸 15 粒，总有效率为 91.42%。（中国中医急症，1997，4）

【配伍经验】

本品配大黄炭，治各种肿瘤出血；配蒲黄炭、仙鹤草，治肺癌咯血；配蒲黄炭，治胃癌呕血；配炮姜、制附片，治胃癌脾胃虚寒呕血者；配白及粉，治食管癌吐血性分泌物者。

【药理作用】

1. 抑制癌细胞生长 三七中多糖对小鼠肉瘤-180 有极明显的抑制效果。三七水煎剂对人宫颈癌细胞-26 抑制率达 90% 以上。(《抗癌中草药大词典》)

2. 阻断癌前病变 三七对实验性大鼠慢性萎缩性胃炎癌前病变的形态学改变有明显的改善作用；能逆转腺上皮的不典型增生和肠上皮化生；(北京中医药大学学报, 1999, 6) 三七能降低胃癌前病变大鼠胃黏膜上皮细胞癌基因表达的异常增高而发挥治疗胃癌前病变的作用。(北京中医药大学学报, 2001, 6)

3. 诱导细胞凋亡 三七有促进甲基硝基亚硝基胍(MNNG) 转化的人胃黏膜上皮细胞凋亡的作用。(中华消化杂志, 2001, 12)

4. 化疗协同作用 三七能增加环磷酰胺抗肿瘤活性, 减轻其毒性反应, 提高环磷酰胺的抑瘤率。(中医研究, 1999, 5)

5. 对免疫功能的影响 三七总皂苷可使小鼠溶血空斑数增加, 亦可提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬指数。(中成药研究, 1986, 8)

6. 镇痛作用 腹腔注射三七总皂苷可减少小鼠醋酸扭体反应次数, 并能提高热反应阈。(中成药研究, 1982, 2)

川芎

本品系伞形科多年生草本植物川芎的根茎。味辛, 性温; 归肝、胆、心包经。活血行气, 祛风止痛。主治脑肿瘤及脑转移癌, 肝癌、骨癌等; 也治月经不调、痛经、产后腹痛及头痛、风湿背痛。内服: 煎汤, 3~10g; 研末, 每次 1~1.5g; 或入丸、散。外用: 适量, 研末撒; 或煎汤漱口。阴虚火旺, 多汗, 月经过多及出血性疾病者不宜应用。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌疼痛 两面针 30g, 徐长卿 15g, 川芎 15g, 蜂蜜 30g。前三味水煎后去渣兑蜂蜜服。《防癌抗癌良方》

2. 治食管癌 川芎嗪注射液 200mg, 静脉滴注, 第 1~5 天, 配合化疗方案, 治疗 50 例, 有效率 (CR+PR) 为 52%, 优于单纯化疗的 30%。(河南职工医学院学报, 2002, 4)

3. 治肺癌 川芎嗪注射液 5mg/kg, 静脉滴注, 每日 1 次, 配合手术治疗 56 例, 从手术前 4 天至术后 6 天应用, 结果川芎嗪注射液能明显改善患者的血液流变性, 提高手术成功率。(安徽医科大学学报, 2002, 2)

4. 治妇科肿瘤 川芎、当归、白芍、熟地黄、官桂、莪术各等量。研为末, 每服 15g, 水煎后服用。《济阴纲目·腹中结块》

5. 治白血病 ①川芎 15g, 板蓝根 15g, 铁扁担 15g, 猪殃殃 48g, 罂粟壳 6g。水煎服, 每日 1 剂, 或制成浸膏压片服用, 每日分 4 次服。《中国民间偏方大全》②川芎 6g, 生地黄、白芍各 15g, 当归 9g, 阿胶 9g, 何首乌 15g, 鸡血藤 30g。用水煎服, 每日 1 剂, 分 3 次服, 15 日一疗程。《中草药验方选编》

6. 治癌性疼痛 辛香止痛剂 (由川芎、薄荷、冰片、丁香等组成) 吸入剂, 治疗 50 例, 有效率为 72%。(中医研究, 1997, 10)

【配伍经验】

本品常与僵蚕为伍化痰散瘀; 配天麻解痉止痛, 通络降浊, 治脑肿瘤; 配黄芪益气活血, 治肝癌; 配当归养血活血, 治妇科肿瘤; 配附子温阳化瘀, 治胃肠肿瘤; 配生地黄化瘀润燥, 治宫颈癌; 配香附行气活血, 治盆腔肿瘤; 配细辛温经止痛, 治骨肿瘤; 配露蜂房搜风止痛, 治乳腺癌; 配桂枝温经通络, 治腹部肿瘤; 配地龙散结宣闭, 治脑膜瘤; 配连翘, 治咽喉肿瘤、甲状腺肿瘤。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用

(1) 川芎对白血病细胞有抑制作用：川芎内酯有较强的抗突变性。《抗癌中草药大词典》

(2) 诱导肺癌细胞凋亡：川芎嗪能抑制小鼠肺癌 H₄₆ 细胞增殖，且呈浓度相关性，可诱导其癌细胞凋亡；（肿瘤防治研究，2003，6）川芎嗪可抑制大肠癌 moser 细胞的增殖，并可诱导其凋亡。（肿瘤，2002，2）

(3) 诱导肝癌细胞分化：川芎嗪可抑制人肝癌细胞恶性表型 Bel-7402 细胞增殖，诱导肝癌细胞分化。（临床肝胆病杂志，2003，3）

(4) 抑制肿瘤内血管生成：川芎嗪可抑制小鼠 lewis 肺癌抑制瘤的生长和转移，并降低肿瘤微血管密度和血管内皮生长因子；（中草药，2004，3）对血管内皮细胞的生长有明显的抑制作用。（中国药理与临床，2004，2）

(5) 逆转肿瘤多药耐药：川芎嗪可促进肺癌细胞株和肺癌患者 PBMC 的 Th₂ 优势状态向 Th₁ 方向逆转。（上海免疫学杂志，2001，4）川芎嗪能部分逆转乳腺癌 MCF-7/ADR 的耐药性。（中国药师，2002，5）

(6) 抗肿瘤转移作用：川芎嗪有明显的抗 B16-F10 黑色素瘤肺转移的作用，并能促进小鼠脾 NK 细胞活性。（华西医科大学学报，1995，26）

(7) 化疗协同作用：低浓度的川芎嗪与 5 种化疗药（Vp-16、ADM、DDP、MMC、5-Fu）协同，可产生较强的抑制大肠癌 moser 细胞增殖作用。（肿瘤，2002，2）

2. 抗放射作用 川芎嗪能明显抑制纤维细胞的生长和繁殖，对于减少放射引起的纤维组织增生，减轻放射性肺纤维化、放射性皮肤纤维化、放射性肠粘连等均有意义。（中西医结合杂志，1987，9）

山楂

本品为蔷薇科落叶灌木或小乔木植物山楂或野山楂的果实。味酸、甘，性微温。归脾、胃、肝经。消积化滞、补脾健胃、活血化瘀。主治消化道肿瘤有腹胀食滞者，也治产后恶露不尽，瘀阻疼痛及高血压病、冠心病、高脂血症。内服：10～30g，煎汤；或入丸、散。

【临床应用】

1. 治大肠癌 大山楂（连核）10g，三七 2g，薏苡仁 50g，加水共煮成粥，加适量蜂蜜即可，每日早餐温熟食之，15 天为一疗程。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治卵巢癌 山楂 30g，益母草 15g，当归、延胡索、紫草各 9g，川芎 6g。水煎服，每日 1 剂。（《抗癌良方》）

3. 治肾癌 山楂 20g，白术 30g，黄精 30g，牛膝 30g，猪苓 30g。水煎，每日 1 次，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 治膀胱癌 山楂核、荔枝核、橄榄核各 100g，烧存性，研末，饭前用茴香汤送服 10g。调在粥内服也可。（《防癌饮食趣谈》）

【配伍经验】

本品配炒谷芽、炒麦芽，治各种癌症食欲不振、腹胀纳差；配八角莲，治肠癌；配莪术、郁金，治疗胆囊癌右胁胀痛或刺痛。

【药理作用】

1. 抑制癌细胞生长 山楂提取液有抑制艾氏腹水癌细胞的作用，山楂核水煎液对子宫颈癌 JTC-26 抑制率高达 70%；（《抗癌中草药大辞典》）对食管癌及喉癌细胞均有抑制作用，但以喉癌细胞更明显；对人正常细胞的生长无明显影响。（河南肿瘤学杂志，1994，3）

2. 抗突变作用 山楂的丙酮提取物对黄曲霉素 B₁ 的致突

变作用有显著抑制效果，可能对预防肝癌有意义。（癌症，1989，8）山楂提取液对体内合成甲基苄基亚硝胺诱癌有显著的阻断作用。（河南医科大学学报，1991，4）

3. 免疫作用 山楂能增强家兔体液免疫和细胞免疫功能，对血清溶菌酶含量、血液血清抗体滴度、血 T 淋巴细胞玫瑰花结形成率及 T 淋巴细胞转化率均有显著增强作用。（中草药，1992，11）

水蛭

本品系环节动物水蛭科的蚂蝗和水蛭等的全体。味咸、苦，有小毒；归肝经。破血逐瘀。主治食管癌、胃癌、直肠癌、肝癌、卵巢癌、宫颈癌等有瘀血者；也治闭经、跌打损伤等。内服：煎汤，3~6g，或焙干研末吞服，每次 0.3~0.5g。孕妇及月经期忌服，有出血倾向者慎服。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 水蛭干粉 1g，每日 3 次，同时口服汤剂：黄芪 20g，鸡血藤 20g，白术 10g，当归 10g，赤芍 10g，茯苓 6g，桃仁 6g，丹参 6g，红花 6g。水煎服，隔日 1 剂。3 个月为一疗程。配合放疗，治 119 例，中药组能明显减轻放疗不良反应。（中国中西医结合杂志，2003，10）

2. 治晚期食管癌 水蛭 6g，海藻 30g，分别用微火焙干，研细末，黄酒冲服。（吉林中医药，1998，6）

3. 治胃癌 水蛭 30g，天龙 10g，生半夏 10g，粉碎，装入胶囊，每粒 0.5g，每次 1 粒，每日 5~10 次，用下方汤剂冲服，20 天为一疗程。汤剂处方为：黄芪 20g，沙参 15g，白花蛇舌草 60g，生代赭石 30g，红枣 30g，王不留行 10g，甘草 6g。水煎服。（中国乡村医药杂志，2002，7）

4. 治直肠癌 水蛭 15g，海藻 30g。研粉，分成 10 包，

每次内服 1~2 包，每日 1 次。（《水蛭的临床应用》）

5. 治大肠癌 水蛭 3g，焙干，研为细末，开水吞服，每日 1 次。（《癌症家庭防治大全》）

6. 治卵巢肿瘤 水蛭 30g，生黄芪 45g，生三棱 15g，当归 15g，知母 15g，生桃仁 10g。上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服 6g，开水送服，早晚各 1 次。（《医学衷中参西录》）

7. 治子宫内膜癌 水蛭、鸡内金、穿山甲、蜈蚣、怀山药各等份，研末冲服，每次 12g，每日 3 次。（中医药研究，1996，6）

【配伍经验】

本品常配僵蚕、蜈蚣，治脑瘤；配海藻、黄药子、大黄、枳壳，治直肠癌，腹痛腹胀；配全蝎、土鳖虫，治晚期肝癌瘀毒内盛者；配莪术，治卵巢癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 水蛭素对小鼠肝癌细胞的生长有一定的抑制作用；（中草药，1984，3）水蛭提取液对小鼠白血病实体瘤的抑瘤率为 32.02%，并诱导肿瘤细胞凋亡，抑制 DNA 合成，延长荷瘤小鼠的生存期。（时珍国医国药，2001，10）

2. 抗肿瘤转移 水蛭素可能对人肺巨细胞癌 PGCL-3 细胞有抑制肿瘤的侵袭和转移能力的作用；（中草药，1999，5）水蛭对血小板聚集功能亢进的头颈部恶性肿瘤的转移可能有抑制作用。（广西医科大学学报，1997，4）

3. 免疫作用 水蛭对肿瘤细胞对网状内皮细胞功能有增强作用；（吉林中医药，1998，6）能增强荷瘤小鼠 NK 细胞活性，提高细胞免疫功能。（时珍国医国药，2001，10）

丹参

本品系唇形科多年生草本植物丹参的根。味苦，性微咸；

归心、心包、肝经。活血祛瘀，凉血养血。主治肝癌、食管癌、胃癌等；也治月经不调、血滞经闭、疮痈肿痛。内服：煎汤，10~30g，酒炒可增强活血之功。

【临床应用】

1. 治脑部肿瘤 丹参 30g，葛根 30g，生南星 12g，生牡蛎 30g，夏枯草 20g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

2. 治鼻咽癌 对应用 ^{60}Co 放射治疗鼻咽癌的患者，同时加用复方丹参注射液 2ml，每周 3 次肌肉注射，40 次为一疗程。与对照组比较，丹参组肿瘤消退快，不留或少留瘢痕组织。（《临床中药学》）

3. 治食管癌 ①复方丹参注射液配合电化疗和 COP 方案，治疗中晚期食管癌 50 例，部分缓解+完全缓解 42 例，占 84%。（实用肿瘤杂志，1998，5）

4. 治肝癌 ①丹参 30g，藤梨根 80g，石见穿 20g，一枝黄花 30g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）②丹参、黄芪、制鳖甲各 150g，水蛭、莪术各 100g。共研细末，拌匀备用。每日 3 次，每次 6g，温开水送服。本方亦可制成胶囊，每粒 0.5g，每日 3 次，每次服 4~6g。（《防癌抗癌中药》）

5. 治胃癌 丹参 30g，白花蛇舌草 30g，藤梨根 80g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次服。（《防癌抗癌中药》）

6. 治恶性淋巴瘤 丹参 30g，生鳖甲、炮山甲、山豆根各 15g，加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

7. 治晚期癌性疼痛 丹参注射液 20~40ml 加 10% 葡萄糖注射液 500ml 静脉滴注，每日 1 次，15 天为一疗程。（中国肿瘤临床与康复，1995，2）

8. 化疗协同作用 ①预防肿瘤放化疗所致的骨髓抑制：94 例恶性肿瘤进行以卡铂为主的放化疗同时静滴丹参 16ml 与

升白药比较，0度骨髓抑制丹参组为87.9%，升白药为29%。
(河南肿瘤学杂志，1994，2) ②增强化疗疗效：丹参注射液能增强环磷酰胺抗肿瘤活性，作用优于尿激酶。(西安医科大学学报，1991，2)

9. 放疗增敏作用 放疗同时配合静滴丹参注射液10ml，治食管癌128例，其完全缓解率及症状改善率明显优于单纯放疗组。(中国中西医结合杂志，1996，6)

【配伍经验】

本品配泽泻，擅长活血化瘀，利水消肿，治癌性腹水；配鳖甲，化瘀消痞，治肝癌合并肝硬化者；配泽兰，活血利水，治肾癌水肿；配白茅根，利尿止血，治膀胱癌尿血；配枳壳，治肿瘤患者胃肠瘀血见腹胀；配百合，活血润肺，治肺癌；配川芎，治脑瘤头痛者；配三七，通络止痛，治癌性疼痛；配牡丹皮，凉血泻热，治癌性血瘀发热；配香附，活血行气，治肿瘤心腹胀气。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用

(1) 丹参可以延长 Ehrlich 腹水癌小鼠的存活时间。(上海中医药杂志，1965，1)

(2) 紫丹参甲素，对小鼠 Lewis 肺癌、黑色素瘤₁₃₁₆和肉瘤₁₈₀有不同程度的抑制作用。(药学学报，1980，5)

(3) 丹参酮Ⅱ_A 对人肺腺癌细胞 SPC-A-1 有显著的抑制作用，其机理可能是与上调 p53、p52 表达，下调 CDAN2 的表达，抑制 DNA 合成有关。(中国肺癌杂志，2002，2)

(4) 丹参素在无血清培养液中能明显抑制人胃腺癌 NGCC 细胞株，并有较好的剂量依赖关系。(镇江医学院学报，1997，4)

(5) 丹参酮可诱导人肝癌细胞 (SMMC-7721) 某些表型的逆转，诱导癌细胞分化；(肿瘤，1997，5) 能抑制人肝癌细胞系 BEL-7402 的细胞生长，诱导癌细胞凋亡。(第三军医大学学

报, 2003, 9)

(6) 对宫颈癌细胞有诱导分化作用。(中华肿瘤杂志, 1995, 6)

2. 化疗增效减毒作用

(1) 丹参能增强喜树碱对艾氏腹水癌、肝癌、肉瘤 S₁₈₀ 和白血病 L₆₁₅ 的抗癌活性及环磷酰胺的抗癌活性有增效作用;(中华血液学杂志, 1981, 4; 中华肿瘤杂志, 1981, 3) 通过调整凝血-纤溶-血小板系统状态而增强肿瘤宿主的抗肿瘤能力并起到抗癌药物的增效作用。(中药通报, 1987, 2)

(2) 丹参对丝裂霉素诱发的小鼠遗传物质染色体损伤具有防护作用。(癌变·畸变·突变, 1994, 6)

(3) 丹参注射液可明显减轻顺铂对小鼠的听力损伤。(中国应用生理学杂志, 2004, 2)

3. 防肿瘤术后复发转移 丹参可抑制人肝癌细胞 SMMC-7720 的侵袭能力, 促进已黏附细胞的脱落, 防治裸鼠人肝癌切除术后转移复发。(中国中西医结合杂志, 1999, 5)

4. 免疫调节作用

(1) 丹参能促进 T 细胞功能转化, 诱生干扰素, 增强单核巨噬细胞吞噬功能。(《中西医结合肿瘤学》)

(2) 丹参注射液能明显增强人肿瘤浸润淋巴细胞 (TIL) 活性, 促进 TIL 对癌细胞的杀伤活性, 作用类似 IL-2。(浙江中医学院学报, 2002, 3)

(3) 丹参既能改善体液免疫功能, 又能调节蛋白代谢和免疫的功能。据此有人把丹参制剂应用于器官移植, 获得一定效果。(浙江中医杂志, 1980, 2)

全蝎

本品系钳蝎科昆虫东亚全蝎的干燥体。味辛, 性平, 有毒; 归肝经。解毒散结, 通络止痛, 息风止痉。主治脑瘤及脑

转移癌，晚期癌性疼痛。内服：煎汤，2.5~4.5g，或入丸、散，每次0.5~1g。蝎尾用量为全蝎的1/3。外用：适量，研末掺、熬膏或油浸涂敷。孕妇慎用。

【临床应用】

1. 治脑膜瘤 全蝎 100g，磁石 100g，蜈蚣 50g。上药共为细末，每次 7.5g，每日 2~3 次，白开水冲服。（《实用临床抗肿瘤中药》）

2. 治鼻腔及副鼻窦恶性肿瘤 全蝎 30g，蜈蚣 30g，研末冲服，每次 3g，每日 3 次。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 治上颌窦癌 全蝎、蜈蚣等量研末，每服 3g，每日 3 次，温开水送服。（热带医药杂志，2003，4）

4. 治喉癌 全蝎 30g，蜈蚣（去头足）5 条，白僵蚕 30g，鸡蛋 40 个。上药研末混匀分成 40 包，每包放入 1 个鸡蛋内摇匀，面糊封口，置碗内蒸熟吃，早晚各服 1 包。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 治食管癌 全蝎、蜈蚣各 30g，露蜂房、僵蚕、壁虎各 60g，制成散剂，每次服 5g，同时以煅代赭石、太子参各 20g，姜半夏 10g，煎汤送服。阴虚舌红者加石斛、麦门冬 12g；苔灰腻有痰者加天南星 10g，橘红 6g，每天服药 3 次。（热带医药杂志，2003，4）

6. 治肺癌 全蝎 200g，蜈蚣 160 条，白花蛇舌草、半枝莲、冬虫夏草、百部各 1200g，研末，炼蜜和为神农丸，每次 1 丸，日服 2 次。（热带医药杂志，2003，4）

7. 治胃癌 ①马钱子 10g，活蜗牛 5g，蜈蚣 15g，乳香 1g，露蜂房 5g，全蝎 3g。将马钱子用开水泡 24 小时后，再用清水换浸 7~10 天，去皮晒干，用麻油炒黄研末；将全蝎、蜈蚣、蜂房炒微黄研末，并将蜗牛捣烂，晒干研末，共与乳香末为糊泛丸，丸之大小以 20 丸为宜。每日用 3g，分 2 次吞服。（《千家药方》）②全蝎 20g，露蜂房 20g，山慈菇 25g，白僵蚕

25g, 蟾蜍 15g。捣碎, 置净器中, 用酒 450ml 浸之, 经 7 日后开取。每日 3 次, 每次空腹服 10~15ml。(热带医药杂志, 2003, 4)

8. 治乳腺癌 ①马钱子 0.1g, 露蜂房 0.5g, 活蜗牛 0.5g, 蜈蚣 1.5g, 全蝎 0.3g, 乳香 0.1g。以上药物为一日剂量, 用时共研细粉, 水泛为丸, 分 3 次口服。《《肿瘤良方大全》》

②全蝎 10g, 蜈蚣 1 条, 胡桃 1 个。将胡桃一开两半, 一半去仁, 将两药放内捆住, 放火上烧, 冒过青烟为度, 研末, 开水冲服, 每次 1.5g, 每日 3 次。《《癌症秘方验方偏方大全》》

9. 治皮肤癌 全蝎 7 只, 黄泥封煨, 研细, 黄酒冲服, 每周 1 次。同时取仙人掌刮去皮刺, 捣成泥状敷于患处, 覆以绷带包扎, 干则更换。《《实用抗癌良方》》

10. 治绒毛膜癌 全蝎 5 只, 露蜂房 6g, 白僵蚕 9g, 水煎服, 每日 1 剂。《《癌症秘方验方偏方大全》》

11. 治晚期癌性疼痛 活全蝎 1 只, 青瓦焙干研细末。将蝎粉撒在开水冲成的蛋花上, 趁热喝下, 每日 3 次, 饭前服, 治疗 42 例, 总有效率为 95%。(时珍国医国药, 2000, 5)

【配伍经验】

本品常配蜈蚣, 治颅内肿瘤; 配土鳖虫, 治肝癌疼痛。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用

(1) 全蝎提取液对网状细胞肉瘤 (SPS) 和乳腺癌 (MA-73)、宫颈癌细胞 (Hela)、胰腺癌 (LA-795)、结肠癌和人肝癌细胞、肉瘤 (S₁₈₀) 均有明显抑制作用。(现代中西医结合杂志, 2003, 1)

(2) 全蝎对 HL-60 细胞增殖有显著的抑制作用, 且有一定的量效关系。(中草药, 2003, 12)

2. 免疫作用

(1) 全蝎粉可促进小鼠巨噬细胞吞噬功能, 促进溶血素、

溶血斑形成，促进淋巴细胞转化。（安徽中医学院学报，1997，4）

（2）全蝎粉与蝎身煎剂（2g/kg）使小鼠网状内皮系统对碳粒的廓清作用和血清半数溶血指数值均明显降低，二者对非特异免疫和体液免疫功能有相似的抑制作用。（时珍国药研究，1995，2）

（3）蝎毒抗癌多肽（APBMV）及 APBMV 与 5-Fu 联用可显著提高 H₂₂ 带瘤小鼠 NK 细胞活性，提高淋巴细胞转化指数，APBMV 可显著提高 H₂₂ 带瘤小鼠外周血白细胞计数，当其与 5-Fu 联用后亦能明显减轻 5-Fu 所致的血细胞减少。（中国中西医结合外科杂志，2002，5）

3. 抗肿瘤转移作用 蝎毒能拮抗裸鼠大肠移植的肝转移，能阻止大肠癌细胞的恶性增殖及削弱其浸润生长的能力。（中国肛肠病杂志，1999，6）

4. 镇痛作用 全蝎蝎毒对小鼠内脏痛、皮肤痛及刺激大鼠三叉神经诱发皮层电位均有较强的抑制作用，蝎尾的作用比蝎身强 5 倍；蝎毒素Ⅲ镇痛作用为粗制蝎毒的 3 倍，大大强于安痛定，其镇痛作用赖于脑内 5-HT 的存在。（沈阳药学院学报，1993，2）

穿山甲

本品系脊椎动物鲛鲤科穿山甲（食蚁鲛鲤）的鳞片。味咸，性微寒；归肝、胃经。活血祛瘀通络，攻坚排脓，搜风通络，通经下乳。主治乳腺癌、食管癌、肝癌、皮肤癌、白血病、恶性淋巴瘤。内服：煎汤，6～10g，或研末吞服 3～5g，或入丸、散。孕妇及癌肿已溃者忌用。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 炮甲 3g，蜈蚣 3 条，地龙 3 条，土鳖虫 3g，田三七 3g，焙干共研细末，加适量米汤，每日分 3 次服。

(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 治食管癌 制马钱子 300g, 炒蟾蜍 300g, 穿山甲珠 200g, 炒五灵脂 200g, 怀山药粉适量。上药共研细末, 以怀山药粉调为糊状后, 再制成绿豆大小的丸剂。每次 3g, 每日 2 次, 饭后服。(《中华肿瘤治疗大成》)

3. 治乳腺癌 黄药子 30g, 穿山甲 12g, 王不留行 12g, 夏枯草 9g。水煎, 每日一次, 分 2 次口服。(《中华肿瘤治疗大成》)

4. 治肛门癌 穿山甲 15g, 猪苓 6g, 共以醋炙研末, 酒服每次 6g, 外用穿山甲末和麻油, 轻粉涂之。(《仁斋直指方·便毒便痢》)

5. 治大肠癌 穿山甲 40g, 龟甲 40g, 麝香 0.6g, 均研细末, 每次 4g, 用绿茶水送下, 每日 2 次。(《中华肿瘤治疗大成》)

6. 治白细胞减少症 用长安升白冲剂(穿山甲、白术、紫河车、枸杞子等)治疗肿瘤化疗所致白细胞减少。(陕西中医, 1994, 2)

【配伍经验】

本品配露蜂房、王不留行, 治乳腺癌; 配石见穿、臭牡丹, 治肺癌; 配山慈菇, 治胃癌; 配鳖甲、桃仁, 治肝癌; 配莪术, 治卵巢癌。

【药理作用】

抗肿瘤作用 穿山甲碱有抗白血病的作用; (《中药药理毒理与临床》) 穿山甲煎液可抑制 HL-60 细胞生长, 并诱导其凋亡。(浙江中西医结合杂志, 2001, 8) 银甲丸(穿山甲、金银花、蒲公英)有抗乳突状癌细胞的作用。(《抗癌中草药大辞典》)

莪术

本品系姜科多年生草本植物莪术、郁金的干燥根茎。味

辛、苦，性温；归肝、脾经。破血祛瘀，行气止痛。主治肝癌、宫颈癌、卵巢癌、淋巴肉瘤、黑色素瘤、白血病、胃癌、肠癌、子宫肌瘤等。内服：煎汤，3~10g，或入丸、散。外用：适量，煎汤洗，或研末调敷。孕妇及月经过多者忌用。

【临床应用】

1. 治肺癌 以三棱、莪术为主方（加王不留行、大黄廑虫丸）治疗 62 例原发性肺癌，总有效率 61.3%，生存期大于 1 年 4 例，大于 2 年 4 例，大于 3 年 2 例，以鳞型肺癌疗效较好，腺癌次之。（上海中医杂志，1982，7）

2. 治胃癌 应用榄香烯乳、氟尿嘧啶配合灸“神阙”治疗 36 例晚期胃癌，可以显著地提高治疗晚期胃癌的疗效，大幅度地降低其胃肠道副作用，减少血液学毒性，对延长患者生存期，提高患者生活质量有积极作用，更适合于年老体弱、骨髓功能不良及免疫功能低下者的治疗。（中国肿瘤临床，1997，7）

3. 治肝癌 ①莪术 15g，制鳖甲、茵陈、半枝莲各 30g。每日 1 剂，加水煎汁，分 3 次服。（《防癌抗癌中药》）②莪术、三棱各 9g，石见穿 30g，郁金 12g。每日 1 剂，加水煎汁，分 2~3 次服。（《防癌抗癌中药》）

4. 治宫颈癌 醋制莪术、醋制三棱各 15g，将 2 味药加水 300ml，煎成 200ml，去渣取汁。每日服 1 剂，早饭前、晚饭后各服 100ml。（《中国民间偏方大全》）

5. 治疗卵巢癌 莪术 15g，藤梨根、白英、白头翁各 30g。每日 1 剂，加水煎汁，分 2~3 次服。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品配**莱菔子**，消食化积，治胃肠癌、放疗性胃炎和肠炎及腹部手术后等所致腹胀、消化不良；配**猪苓**，治癌性胸水、腹水、心包积液及放化疗后体虚的恢复；配**山慈菇**，治胃癌；配**漏芦**，治乳腺癌；配**臭牡丹**，治肺癌；配**茵陈**、**白花蛇舌草**，治肝癌；配**金钱草**，治胆管癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用

(1) 温莪术注射液对小鼠肉瘤的抑瘤率达 52% 以上。体外实验，莪术油对腹水癌、L₆₁₅ 白血病细胞均有直接的破坏作用。莪术醇及莪术双酮对小鼠肉瘤₃₇、宫颈癌₁₄、艾氏腹水癌均有较高的抑制率，能使癌细胞变性坏死。（新医药杂志，1976，12）

(2) 莪术油对白血病细胞株 HL-60 和 K562 细胞的生长有抑制作用，且其与药物浓度和时间相关。（广州中医药大学学报，2004，2）

(3) 莪术油能有效抑制 Lewis 肺癌细胞增殖。（中国中医药科技，2003，6）

(4) 莪术油能抑制 HepA 肝癌细胞增殖核抗原（PCNA）阳性表达率，上调 RB 量的表达，其抑瘤作用与 5-Fu 相近。（中国自然医学杂志，2002，4）

2. 放化疗增效作用 临床上先用莪术油治疗癌症一段时间后再加用放疗或化疗，可提高单一药物的疗效，并可防止白细胞的下降，延长了放疗和化疗疗程；（《中药药理毒理与临床》）莪术油肝动脉灌注栓塞治疗原发性肝癌，疗效与化疗药相似，但生存时间和骨髓抑制明显优于化疗药。（首都医科大学学报，2001，4）

软坚散结类

土贝母

本品系葫芦科多年生攀援草本植物土贝母的鳞茎。味苦，性凉。化痰散结，解毒消肿。主治鼻咽癌、乳腺癌、淋巴肉瘤、白血病、胃癌；亦治疮疡、瘰疬、痰核。内服：煎汤，

10g，或入丸、散。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 土贝母 15~20g，山豆根 35g，土茯苓 20~30g，加水煎汁，每日 1 剂，代茶饮服。（《防癌抗癌中药》）

2. 治甲状腺癌 土贝母、山慈菇、昆布、海浮石各 100g。将四药研为细末，拌匀备用（亦可装入胶囊，每粒 0.5g）每日 2 次，每次 6g，温开水送下。（《防癌抗癌中药》）

3. 治乳腺癌 土贝母 15~20g。加水煎服，每日 1~2 剂。同时将土贝母研粉，以陈米醋调敷患处，每日数次。本法对于颈淋巴结核及破溃患者，或乳腺炎结块肿痛者亦有良好效果。（《防癌抗癌中药》）

4. 治恶性淋巴瘤 土贝母 20g，穿山甲片（先煎 10 分钟）15~20g，山豆根 15g，金银花 30g。加水煎汁，每日 1 剂，分 3 次温服。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品配夏枯草、天葵，治恶性淋巴瘤；配莪术、椿根皮、海螵蛸，治宫颈癌；配土茯苓，治肾癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用

（1）土贝母提取物中的皂苷甲对多种人癌细胞生长有抑制作用，其敏感性按下列次序递增：胃癌<宫颈癌<结肠癌<胰腺癌<神经母细胞癌<神经角质母细胞癌。对体外培养的胃癌细胞 GRC-1 及裸鼠移植性肾癌 RLC-310 的生长均有明显的抑制作用；（中国肿瘤临床，1994，6）对人宫颈癌 Hela 细胞的生长具有强抑制作用；（癌症，2002，4）土贝母水煎液对小鼠前胃鳞癌不但无抑制作用，而且还可能有促进作用。（中国中药杂志，1990，12）

（2）土贝母提取物能显著抑制体外培养的肝癌细胞增殖和降低线粒体的代谢活性。（世界华人消化杂志，2000，3）

(3) 土贝母提取物对人早幼粒白血病细胞 (HL-60) 有诱导分化作用。(第四军医大学学报, 1992, 4)

(4) 土贝母皂苷能诱导人鼻咽癌细胞株 CNE-2Z 细胞凋亡。(中国药理学通报, 2003, 2)

2. 免疫抑制作用 土贝母皂苷使小鼠脾脏空斑形成细胞显著增高, 胸腺重量显著减轻, 血清补体 C_3 含量显著增高, 土贝母皂苷甲和皂苷乙对大鼠变态反应性脊髓炎、特异性超敏反应有抑制作用。(中国药房, 1998, 1)

天南星

本品系天南星科多年生草本植物天南星、东北天南星或异叶天南星的干燥块茎。味苦、辛, 性温, 有毒; 归肺、脾、肝经。燥湿化痰, 消肿散结, 祛风止痉。主治宫颈癌、食管癌、肺癌、神经系统肿瘤及口腔肿瘤。内服: 煎汤, 3~9g, 或入丸、散。外用: 研末撒或调敷。阴虚燥痰及孕妇忌用。

【临床应用】

1. 治颅内肿瘤 生半夏 (先煎) 15g, 生南星 (先煎) 10g, 苍耳草 15g, 白蒺藜 15g, 生姜适量, 水煎服, 每日 1 剂, 分 2 次服。(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 治鼻咽癌 ①生天南星 10g, 乌头、附子各 5g, 木香 15g。水煎半小时以上, 每日 1 剂, 分 2 次服。(《实用抗癌验方》) ②生天南星复方治疗晚期鼻咽癌 4 例, 疗效均达显效以上。生南星对恶性淋巴瘤、肉瘤、皮肤鳞癌也有效。(辽宁中医杂志, 1993, 3)

3. 治肺癌 复方三针注射液 (生天南星、生附片、生川乌、木香、延胡索、三七), 肌肉注射, 每次 5ml, 每日 2~3 次; 或静脉注射, 每次 10~30ml, 加入 50% 葡萄糖注射液 40ml, 每日 1~2 次。(重庆医药, 1984, 5)

4. 治乳癌 生天南星，磨汁外搽。(中医外治杂志，1997，4)

5. 治宫颈癌 鲜天南星、鲜半夏各 10g，加 75% 乙醇 0.5ml，捣碎后用布包裹塞入宫颈病灶处，于阴道口处充填 1 块棉球，每天或隔天换药 1 次。同时每次服半夏肠溶片（每片含生药 1g）4~5 片，每日 2 次，或鲜天南星煎剂内服，每日 1 剂。观察 53 例，有效率为 84.9%。（上海第一医学院妇产科医院方）

6. 治肾癌疼痛 生天南星 20g，藤黄 3g，冰片 3g，麝香 0.3g。共研细末，以醋、酒调成糊外敷疼痛处。（《常用毒性中药临床应用指南》）

【配伍经验】

本品配半夏，燥湿化痰，治食管癌吞咽梗阻；配藤梨根、八月札，治胃癌；配蚤休、大青叶，治肺癌痰多；配夏枯草、牡蛎，治恶性淋巴瘤；配蜈蚣、全蝎，治神经胶质瘤头痛欲裂；配海浮石、苏子，治颅咽管肿瘤咳痰不爽。

【药理作用】

抗肿瘤作用 本品的水提取液体外对宫颈癌 Hela 细胞有抑制作用；对小鼠肉瘤₁₈₀、肝癌实体瘤、U₁₄等均有一定的抑制作用，并证明本品中的 D-甘露醇可能是抗癌的有效成分；（《中华肿瘤治疗大成》）有显著的抗 P₃₃₈（P₃₃₈ 鼠白血病细胞）和 DLD-1 人腺癌细胞的细胞毒作用。（时珍国医国药，2001，3）

白僵蚕

本品系蚕蛾科昆虫家蚕的幼虫在未吐丝前因感染白僵蚕菌而病死的僵化虫体。味咸、辛，性平；归肝、肺经。散结化痰，解毒止痛。主治乳腺癌、膀胱癌、恶性淋巴瘤、脑肿瘤、白血病、胃癌。内服：煎汤，4.5~9g，或入丸、散。外用：研末敷或调敷。

【临床应用】

1. 治脑肿瘤 白僵蚕 15g，鱼腥草 15g，葵树子 30g。共为细末，每次 6g，每日 2 次。（《实用抗癌药物手册》）

2. 治舌癌 僵蚕 3g，黄连（蜜炒）6g。为末掺之，涎出为妙。（《种德堂经验方》）

3. 治乳腺癌 僵蚕、穿山甲珠各 9g，金银花 30g，木鳖子（整个用）、大枫子（整个用）各 3g，用烧酒 50g，分 2 次用炭火煎之，顿服。（《抗癌中草药大辞典》）

4. 治胃癌 白僵蚕、山慈菇各 25g，露蜂房、全蝎各 20g，蟾蜍皮 15g。上五味，捣碎，置净器中，用酒 450ml 浸之，经 7 日后开取。空腹口服，每次 10～15ml，每日 3 次。（《药酒验方选》）

5. 治恶性淋巴瘤 白僵蚕研末，开水送服 1.5g，一日 2 次。（《千金要方·瘰癧》）

【配伍经验】

本品配蜈蚣、全蝎，治脑肿瘤；配苍术，治胃癌；配石见穿、木蝴蝶，治肺癌，咳嗽咽痛；配露蜂房、蒲公英，治乳腺癌；配水蛭，治宫颈癌。

【药理作用】

抗肿瘤作用 本品的醇提取物能抑制小鼠肉瘤₁₈₀的生长。体外实验，本品可抑制人肝癌细胞的呼吸。（《中华肿瘤治疗大成》）

半夏

本品系天南星科多年生草本植物半夏及掌叶半夏的地下块茎。味辛，性温，有毒；归脾、胃、肺经。燥湿化痰，消痞散结，降逆止呕。主治宫颈癌及其癌前病变、食管癌、鼻咽癌、皮肤癌等。内服：煎汤，3～9g，或入丸、散。外用：适量，

磨汁涂或研末以酒调敷患处。一切血证及阴虚燥咳、津伤口渴者忌用。

【临床应用】

1. 治脑瘤 生半夏（先煎）、生南星（先煎）各 15g，葛根 30g，干蜈蚣 2 条，炙甘草 9g。水煎，每日 1 剂，分 2~3 次服。（《防癌抗癌中药》）

2. 治鼻咽癌 ①生半夏（先煎）、山豆根各 15g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次饮；②生半夏、生川乌、生南星各 30g。加水久煎，每日 1 剂，分 2~3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

3. 治甲状腺瘤 全半夏 10g，水煎 15 分钟。肝郁气滞痰结者加郁金、柴胡、香附；脾虚痰湿中阻者，加茯苓、白术、扁豆；肝郁化热痰结者加川黄连、栀子、木通。隔日 1 次，连服 20 剂。（福建中医药，1992，2）

4. 治食管癌 ①生半夏（先煎）15g，旋覆花 12g，代赭石 30g，加水煎汁。每日 1 剂，分 3 次服。（《防癌抗癌中药》）②生半夏、醋制紫硃砂 50g，硼砂 25g，共研细粉。一般每次内服 2g，分数份放舌根部咽下，每日 1~2 次。用后漱口，以减少对口腔黏膜的刺激，但不可用水送服。用药 7~10 日，咽下困难减轻，或吐黏液减少为效，可继续用药，一般不得超过 30 日，用药 7~10 日无效者不再使用。（新中医，1998，2）

5. 治肺癌 ①生半夏（先煎）15g，鱼腥草 30g，云雾草 30g，水煎，每日 1 剂，分 2 次服。②生半夏、生南星、桃仁各 15g，杏仁 9g，薏苡仁 30g。加水久煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《防癌抗癌中药》）

6. 治宫颈癌 用掌叶半夏水溶性提取物制成片剂，每片相当于生药 10g，每日 2~3 次，每次 2~3 片，饭后服。同时用半夏栓剂和棒剂塞入宫颈管。治疗期均在 2 月以上。观察各期患者 247 例，总有效率 77.3%。（上海医学，1978，1）

【配伍经验】

本品配生南星，治食管癌；配益智仁，治食管癌泛吐涎痰者；配海浮石、瓜蒌，治肺癌痰多难咯；配胆南星，治肺癌咳痰黄稠；配黄药子，治甲状腺癌；配藤梨根，治胃癌；配白僵蚕、白芷，治脑瘤头痛；配射干、麦冬、天花粉，治放疗后咽干咽痛者。

【药理作用】

抗肿瘤作用 掌叶半夏的稀醇或水浸出液对动物实验性肿瘤 S₁₈₀、HCA 和 U₁₄ 和 HeLa 细胞均有明显的抑制作用。（《中华肿瘤治疗大成》）

牡蛎

本品系牡蛎科动物牡蛎和大连湾牡蛎或近江牡蛎等的贝壳。味咸，性微寒；归肝、肾经。软坚散结，平肝潜阳，敛汗固涩。主治肝癌、肺癌、乳腺癌、鼻咽癌、神经瘤、甲状腺瘤等各种实体瘤。内服：煎汤，适量，9～30g（先煎），或入丸、散。外用研末干撒、调敷或作扑粉。本品多服久服，易引起便秘和消化不良。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 生牡蛎、昆布、炮山甲、天冬各 20～30g，山慈菇 15g。水煎，分 2～3 次服，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

2. 治腮腺癌 牡蛎、海藻、白毛夏枯草、白花蛇舌草、板蓝根各 20～30g。水煎，分 2～3 次服。每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

3. 治甲状腺癌 生牡蛎 30g，山甲片、黄药子各 15g，莪术 15g，白花蛇舌草 20g。加水煎服，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

4. 治乳腺癌 牡蛎 30g，猫爪草 30g，蛇莓 30g，夏枯草

9g。每日1次，水煎，分2次服。《《中华肿瘤治疗大成》》

5. 治子宫颈癌 牡蛎 20g，山豆根、黄柏各 9g，黄芩 4.5g。水煎服，每日1剂。《《现代治癌验方精选》》

【配伍经验】

本品配海藻、昆布，擅长软坚散结、消癭瘤，治甲状腺瘤、甲状腺癌；配天葵、夏枯草，治鼻咽癌及颈部淋巴结转移、颈部恶性淋巴瘤；配半枝莲、制鳖甲，治肝癌；配王不留行、路路通，治乳腺癌，乳房胀痛。

【药理作用】

1. 抗癌作用 本品全体水提取物对小鼠肉瘤₁₈₀、克雷布斯-2有抑制作用；牡蛎肉的水提取物作瘤内注射，对 A-12、SV-40 病毒诱发的田鼠肿瘤有治疗作用；牡蛎肉中的一种鲍灵成分，对一些细胞株和动物有细胞毒作用和抑制其生长的作用。《《抗癌中草药大辞典》》

2. 免疫作用 能促进实验动物脾脏抗体生成细胞数增加。《《抗癌中草药大辞典》》

昆布

本品系褐藻类翅藻科植物昆布、裙带菜属植物裙带菜和海带科植物海带的叶状体。味咸，性微咸；归肝、胃、肾经。消痰软坚，利水消肿。主治甲状腺癌、恶性淋巴瘤、肺癌及淋巴转移癌。内服：煎汤，6~12g，或入丸、散。脾胃虚寒蕴湿者忌用。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 昆布、生牡蛎（先煎）、炮山甲、天冬各 20g，山慈菇 15g。水煎，每日1剂，分2~3次服。《《防癌抗癌中药》》

2. 治甲状腺癌 海藻 60g，昆布 60g，柴胡 60g，小麦

(醋煮、晒干) 120g, 龙胆草 (酒拌、炒焦) 60g。上药共为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大, 每服 20~30 丸, 临卧白酒送下, 噙化咽之尤好。《中华肿瘤治疗大成》

3. 治肺癌 昆布、海藻、半夏、全瓜蒌各 15g, 白花蛇舌草 30g。水煎, 代茶饮。每日 1 剂。《防癌抗癌中药》

4. 治恶性淋巴瘤 昆布、海藻、夏枯草、石见穿各 15~30g, 水煎, 分 3 次服, 每日 1 剂。《防癌抗癌中药》

【配伍经验】

本品常与海藻相配软坚散结, 治甲状腺癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 昆布的热水提取物小鼠肉瘤₁₈₀、白血病₁₂₁₀、Meth-A 瘤、 β -16 黑色素瘤、肉瘤₁₈₀ 均有显著抑制效果。(化学与药理学, 1981, 2) 此外, 还发现昆布对体内的人体 KB 癌细胞培养有明显的细胞毒作用, 可杀灭 50% 以上的癌细胞。(海洋药物, 1987, 2)

2. 免疫增强作用 昆布对机体免疫功能有明显的促进作用; (国外药理学·植物药分册, 1981, 1) 能对抗由环磷酰胺引起的白细胞下降及 $^{60}\text{Co}\gamma$ 射线辐射损伤, 并能明显增加半数溶血值, 增强体液免疫功能。(中国药科大学学报, 1988, 4)

海藻

本品系马尾藻科植物海蒿子 (大叶海藻) 和羊栖菜 (小叶海藻) 的全草。味咸, 性寒; 归肝、胃、肾经。软坚消痰散结, 利水消肿。主治甲状腺肿瘤、骨肿瘤、肺癌、乳腺癌、腮腺癌等。内服: 煎汤, 5~15g, 或入丸、散。外用: 适量, 研末敷或捣敷。脾胃虚寒者禁用。

【临床应用】

1. 治腮腺癌 海藻 30g, 牡蛎 (先煎) 30g, 黄药子 30g,

昆布 15g, 猫爪草 15g。水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。《中华肿瘤治疗大成》

2. 治甲状腺癌 ①海藻、昆布、黄药子、山慈菇各 20g。加水煎汁, 分 2 次服, 每日 1 剂。《防癌抗癌中药》②海藻 60g, 柴胡 60g, 昆布 60g, 小麦(醋煮、晒干) 120g, 龙胆草(酒拌、炒焦) 60g。上药共为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大, 每服 20~30 丸, 临卧白酒送下, 噙化咽之尤好。《中华肿瘤治疗大成》

3. 治食管癌 海藻 30g, 水蛭 6g, 分别用微火煨干, 研细后混合。口服每次 3g, 每日 2 次, 黄酒冲服。《抗癌良方》

4. 治肺癌 ①海藻 16g, 玳瑁 16g, 露蜂房 9g, 龟甲 16g, 鸦胆子 9g, 蟾酥 0.6~1.2g。上药共研细末, 每次 0.7~1.4g, 清晨及睡前各服 1 次。《中华肿瘤治疗大成》②海藻、黛蛤散各 30g, 王不留行、三棱、莪术各 12g, 或加大黄廋虫丸 2g(包煎), 水煎服。《现代治癌验方精选》

5. 治胃癌 海藻、昆布、香茶菜、蒲公英、白花蛇舌草各 30g。加水煎汁, 分 3 次服, 每日 1 剂。《防癌抗癌中药》

6. 治乳腺癌 海藻 30g, 山慈菇 9g, 蒲公英 30g, 水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。《中华肿瘤治疗大成》

7. 治肝癌 海藻、茵陈、半枝莲、白花蛇舌草各 20~30g, 藤梨根 60g。加水煎汁, 分 2~3 次服, 每日 1 剂。《防癌抗癌中药》

8. 治恶性淋巴肉瘤 海藻、蛇六谷、七叶一枝花各 30g, 夏枯草 20g。加水煎汁, 分 2~3 次服, 每日 1 剂。《防癌抗癌中药》

【配伍经验】

本品配昆布, 治多种肿瘤; 尤其是配黄药子, 治甲状腺肿瘤; 配八月札, 治胃癌; 配山豆根, 治食管癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 海藻及提取物对多种恶性肿瘤有较明显

的抑制作用，抑癌率达 55%。腹腔注射能使艾氏腹水癌 60%~80% 治愈；海藻多糖对大肠癌有明显抑制作用。海藻粗提取物海藻子对子宫癌 U₁₄、肉瘤₁₈₀ 及淋巴 1 号腹水癌有一定的抑制作用。近代临床应用研究证实，本品对甲状腺腺瘤、甲状腺癌、淋巴肉瘤及消化道肿瘤确有一定的治疗作用。（《抗癌中草药大辞典》）

2. 免疫作用 海藻酸钠可提高机体细胞免疫功能。（《中华肿瘤治疗大成》）

夏枯草

本品系唇形科多年生植物夏枯草的带花果穗或全草。味苦、辛，性寒；归肝、胆经。清肝火，散郁结，降血压。主治甲状腺癌、甲状腺瘤、肝癌、乳腺癌、喉癌等；也治肝火上炎之目赤肿痛、头痛、目眩等。内服：煎汤，6~15g，大剂量可用至 30g；熬膏或入丸、散。外用：适量，煎水洗或捣敷。脾胃虚弱者慎用。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 夏枯草 30g，水煎，冲服牛黄 0.3g，每日 1 剂。（《实用临床抗肿瘤中药》）

2. 治喉癌 夏枯草 30g，莢莢 25g，水煎，分 2 次服。（《实用临床抗肿瘤中药》）

3. 治晚期胃肠癌 夏枯草注射液 80ml，加入 5% 葡萄糖注射液或 0.9% 生理盐水 500ml 中静滴，每日 1 次，30 天为一疗程。（山西中医，2003，3）

4. 治肝癌 ①以夏枯草为主，配茵陈、白花蛇舌草、海藻、昆布、漏芦等，治疗原发性肝癌，有一定疗效。（辽宁中医杂志，1982，8）②经股动脉穿刺肝动脉介入法灌注夏枯草注射液 60ml，45~60 天内重复治疗一次。（上海中医药杂志，2003，8）

5. 治乳腺癌 夏枯草、天门冬等量。加水熬煮2次，将2次的滤液合并，慢火收成流浸膏。每次冲服量相当于生药各45g，日服3次。可同时配合其他中药内服。（《实用临床抗肿瘤中药》）

6. 治大肠癌 夏枯草 75g，黄精 250g，贝母 10g。水煎服，每日1剂。此方亦可作茶而时时饮之。（《实用抗癌验方》）

7. 治淋巴肉瘤 夏枯草、半枝莲、白花蛇舌草各等量，制成注射液，每次2ml肌注或肿瘤内注射。每日或隔日1次，连续2周。（《实用临床抗肿瘤中药》）

【配伍经验】

本品配僵蚕，清火散结、化痰软坚，治火热、痰瘀互结所致各种癌症；配牡蛎，一可清肝火，散郁热，二可敛阴潜阳，升降既济，除邪扶正，治颅内肿瘤、甲状腺癌；配连翘，散结消肿，治肺癌呛咳、吐黄痰、胸背胀痛；配露蜂房、蒲公英，治乳腺癌；配半枝莲、白花蛇舌草，治肝癌；配胆南星、金银花，治鼻咽癌；配山慈菇、威灵仙；治喉癌咽部梗阻；配猫爪草、蚤休，治肺癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用

(1) 夏枯草对小鼠肉瘤₁₈₀、小鼠子宫颈癌₁₄有抑制作用。煎剂能抑制 S₁₈₀ 及艾氏腹水癌的生长。（《抗癌中草药大辞典》）

(2) 夏枯草注射液能诱导人胃腺癌 SGC-7901 细胞凋亡。（上海医学检验杂志，2000，5）

(3) 夏枯草中所含熊果酸及其衍生物对 P₃₈₈L、L₁₂₁₀ 和人体肺肿瘤细胞均具有显著细胞毒性。（《中药现代研究与应用》）

2. 对免疫系统影响 ①可使肾上腺重量增加，而脾脏和胸腺重量减轻，其中胸腺萎缩极显著，表现为免疫抑制效应。（山西医药杂志，1983，2）②具有调节外周血 T 细胞亚群作用，能上调 T 细胞亚群值。（中国中西医结合消化杂志，2004，1）

3. 促进胸膜纤维化形成 能使兔胸膜脏层和壁层有明显的纤维化增厚及大量淋巴细胞黏附，进而促使胸膜粘连。（上海中医药大学学报，2001，2）

黄药子

本品系薯蓣科多年生宿根缠绕藤本植物黄独的块茎。味苦，性寒；归肝、肺经。散结消肿，清热解毒，凉血止血。主治甲状腺肿瘤、食管癌、胃癌、肠癌、胰腺癌、宫颈癌及横纹肌肉瘤等。尤其对甲状腺肿瘤有独特疗效。内服：煎汤，3～9g 或浸酒；研末 1～2g。外用：适量，鲜品捣敷；或研末调敷；或磨汁涂。脾胃虚弱及肝功能损害者慎用。

【临床应用】

1. 治甲状腺癌 ①黄药子、夏枯草、海藻、香蒲草根各 10g，山慈菇 9g。水煎服，每日 1 剂。（山东中医学院学报，1980，2）②黄药子 10g，藤梨根 60～120g，野葡萄根 60～120g，紫草 60g，马钱子 0.3g，天龙 6g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治食管癌 用 2% 的黄药子甘油经食管滴注。初步观察 6 例，其中 4 例有效，开道作用明显。（《抗癌食药本草》）

3. 治肺癌 黄药子 2000g，白酒 1500ml。入罐，外以石膏封口，放入水锅中，微火蒸煮 2 小时，置冷，连罐带药一起放入冷水中浸 7 天后，将药液从罐内倒入酒瓶中放阴凉地收藏备用，每次 30ml，日服 2 次，3 个月为一疗程。（中国民族民间医药杂志，1996，20）

4. 治胃癌 ①黄药子 50g，天葵子 500g，算盘子 500g。黄药子粉碎后，与天葵子、算盘子共同加水煎煮，浓缩成浸膏状，加入辅料制片，口服每次 5～10 片，每日 3 次。（《抗癌中药一千方》）②黄药子 300g，虻虫、蜈蚣、全蝎各 30g，白酒

1000ml。上药用白酒密封浸泡，埋在地下7日后，口服，每次10~30ml，每日1次。（《肿瘤学》）

5. 治宫颈癌 黄药子、旱莲草各15g，白花蛇舌草30g。水煎服，每日1次。（《肿瘤学》）

6. 治淋巴肉瘤 黄药子、天葵子、红木香、七叶一枝花各15g，蛇六谷30g（先煎2小时），服滤过的澄清部分。（《实用临床抗肿瘤中药》）

7. 治肾癌 黄药子9g，半边莲15g，白茅根15g，薏苡仁15g，野葡萄根30g。水煎每日1剂，分2次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

【配伍经验】

本品配当归，寒温并用，补散兼施，主治消化系统肿瘤并可减轻黄药子的中毒反应；配生牡蛎，治食管癌颈部淋巴结转移；配三棱、莪术、露蜂房、穿山甲，治甲状腺肿瘤，结块较硬及有结节者；配白花蛇舌草、制鳖甲、炮山甲珠，治肝癌。

【药理作用】

抗肿瘤作用

（1）动物实验对白血病₆₁₅、肉瘤₁₈₀、子宫癌₁₄有一定抑制作用。体外筛选对肿瘤细胞有抑制作用。（《抗癌中草药大辞典》）

（2）黄药子乙醇提取物（浸膏）对小鼠肝癌H₂₂、小鼠肉瘤S₁₈₀、小鼠腹水癌（EAC）有抑制作用，能延长小鼠生存天数。其所含的甲素、乙素、丙素及薯蓣皂苷等均具有抗肿瘤作用，尤其对甲状腺瘤有独特的疗效。（中草药，2002，2）

鳖甲

本品系鳖科动物中华鳖的背甲。味咸，性寒；归肝经。软坚散结，滋阴潜阳，益肾健胃。主治癌症患者阴虚内热、盗

汗、贫血、血小板减少等。内服：10~30g，水煎服。

【临床应用】

1. 治肺癌 鳖甲、蛤粉各 30g，同炒至色黄；熟地黄 45g，共为末。每服 6g，饭后清茶送下。（《中药大辞典》）

2. 治卵巢癌 鳖甲、半枝莲、龙葵、白英、白花蛇舌草各 50g，水煎服，分 3 次饮服，每日 1 剂。（《治癌中药处方 700 种》）

3. 治宫颈癌疼痛 生鳖甲 18g，人参 18g，花椒 9g。磨细末，每晚 6g，开水送下，24 天为一疗程。（《全国部分名老中医验方》）

4. 治慢性粒细胞白血病阴虚发热 制鳖甲 20g（先煎 1 小时），地骨皮 10g，银柴胡 5g，水煎，每日 1 剂。（《中华肿瘤治疗大成》）

【配伍经验】

本品配丹参，活血化瘀，软坚散结，治肝癌合并肝硬化；配青蒿，治疗各种癌症阴虚发热；配生地黄、龟甲、牡蛎，治白血病；配莪术、桃仁，治卵巢癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 鳖甲提取物对小鼠腹水肉瘤细胞 S_{180} 、肝癌细胞 H_{22} 、肺癌细胞 Lewis 有抑制作用；（中国公共卫生学报，1997，1）

2. 免疫调节作用

（1）鳖甲有增加血浆蛋白的作用，可用于肝病所致的贫血。（《中草药学》）能提高机体免疫力，延长抗体存在时间。（《中药药理毒理与临床》）

（2）鳖甲能提高 NK 细胞活性率及小鼠巨噬细胞的吞噬作用，从而具有免疫调节作用。（食品科学，2000，3）

3. 对 X 线照射的防护作用 鳖甲粗多糖可延缓 X 线照射小鼠的存活时间，提高存活率，显著提高受照射的白细胞数、脾细胞数和胸腺细胞数。（辐射防护，1998，1）

以毒攻毒类药

马钱子

本品系马钱科常绿乔木植物马钱及同科木质大藤本植物马钱（云南马钱）成熟种子。味苦，性寒，有毒；归肝、脾经。通络散结，消肿定痛。主治食管癌、胃癌、肠癌、肺癌、皮肤癌及白血病等，对再生障碍性贫血亦有一定疗效。内服 0.3～0.6g，做丸、散服。外用适量，研末吹喉或调涂。本品剧毒，生品忌内服。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 制马钱子 5～10g。研为细末，以蜂蜜适量调制成丸，每丸重 0.3g。每日服 1 次，每次 1 丸，米汤、甘草汤或温开水送服。（《防癌抗癌中药》）

2. 治食管癌 制马钱 300g，炒蟾蜍 300g，穿山甲珠 200g，炒灵脂 200g，山药粉适量，共研细末，以山药粉制成绿豆大小丸剂，口服，每次 1g，1 日 2 次，饭后服。（《抗癌中草药制剂》）

3. 治消化道癌 马钱子 30g，甘草 9g。先将马钱子用水泡去皮，晒干，切片，用香油炸至黄色，再与甘草共为细粉，以糯米面为衣，如梧桐子大。口服，每次 0.3～0.6g，每日 1 次，温开水送下。（《全国部分名老中医验方》）

4. 治子宫颈癌 生马钱子 500g，天花粉 500g，重楼 500g，甘草 300g。先将马钱子去皮，麻油炒至焦黄，与他药共研为细末制片。每片重 0.3g，每次 3 片，1 日 2 次。（《肿瘤良方大全》）

5. 治恶性淋巴瘤 生马钱子适量，醋磨后，调涂患处，每日 1 次。（《实用抗癌验方》）

6. 治癌性疼痛 ①马钱子于麻油中炸至膨胀焦黄后，滤净油冷却研末装胶囊，每粒 200mg。口服，每次 1 粒，每日 3 次，连用 3 日。若疼痛无解增为每次 2 粒，每日 3 次。（辽宁中医杂志，1993，2）②马钱子 1g，活蜗牛 1 只，乳香 1.5g，全蝎 2g。上药共研细末，敷于疼痛处，每日 1 换。（《中华肿瘤治疗大成》）

【配伍经验】

本品配蟾酥、冰片外用，治各种癌性疼痛；配熟地黄、白芥子、炙麻黄，治骨肿瘤。

【药理作用】

1. 抗癌作用 马钱子煎剂高浓度时能抑制淋巴细胞的有丝分裂，而低浓度时能促进细胞的有丝分裂。药理实验证明此品对小鼠肉瘤 S₁₈₀ 及白血病细胞均有抑制作用。（《抗癌中草药大辞典》）

2. 镇痛作用 小鼠热板实验证明，马钱子碱在一定剂量和时限内均有明显镇痛作用。（河南医科大学学报，1989，24）

白屈菜

本品系罂粟科多年生草本植物白屈菜的全草。味苦，性微寒，有小毒。消肿止痛，利水止咳。主治胃癌、食管癌、肝癌及肿瘤疼痛；亦可用于胃炎、胃溃疡、脘腹疼痛。肺热咳嗽、湿热水肿。10~15g，水煎服。本品有一定毒性，故用量不宜过大。

【临床应用】

1. 治食管癌 白屈菜、半枝莲各 10g，藤梨根 30g。加水煎至深黑色，去渣，浓缩，制成糖浆。每次服 10ml，每日 2 次。（《抗癌临证备要》）

2. 治肺癌 白屈菜、川贝母、芫荽各 20g，水煎服，每日

1 剂。《《实用抗癌验方》》

3. 治胃癌 ①夏天开花前采白屈菜全草，每次 10g，水煎服。《《实用抗癌验方》》 ②元枣根 90g，白屈菜 10g，刺五加 30g，核桃枝 15g，每日 1 剂，水煎，分 2 次口服。《《实用临床抗肿瘤中药》》

【配伍经验】

本品配半枝莲，治肝癌疼痛；配山慈菇、藤梨根，治胃癌；配半夏、山豆根，治食管癌；配瓜蒌壳，治肺癌胸痛；配龙葵、土茯苓，治肾癌；配半边莲，治癌性腹水。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 有效成分具有细胞毒活性，对艾氏腹水癌及淋巴肉瘤、L₁₂₁₀、P₅₈₆ 白血病及 Walker 癌肉瘤有抑制作用。（中国药学杂志，1994，3）

2. 镇痛作用 对福尔马林引起的疼痛反应有抑制作用，其镇痛作用系外周性，且不被纳洛酮所拮抗。（中草药，2003，9）

3. 护肝作用 对四氯化碳诱发的实验性肝细胞损害有保护作用。（药学进展，1993，1）

壁虎

本品系壁虎科动物无蹼壁虎或其他几种壁虎的全体。味咸，性寒，有小毒。散结止痛，祛风定惊。主治消化系统肿瘤，如食管癌、胃癌、肝癌，以及宫颈癌、肺癌、鼻咽癌、淋巴瘤及脑肿瘤等。内服：2～5g，水煎服；或每次 1～1.5g，研末吞服。外用：适量，研末调敷。血虚气弱者不宜服用。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 炙天龙（壁虎）末，口服，每次 5g，每日 2 次。（浙江中医杂志，1986，1）

2. 治食管癌 ①活壁虎 5 只，白酒 0.5kg，以锅盛酒将活壁虎泡入，浸泡 2~3 日。口服每次 10ml，每日 3 次，于饭前半小时服为好。（《抗癌中药药理与临床》）②守宫（壁虎）1 只，薏苡仁、奶母子、黄药子各 3 份，加入曲酒，以浸至药面为度，密封浸泡 2 周。每服 15~20ml，日 3 次。（《抗癌中草药大辞典》）③天龙 2 条（或 2~5g），急性子 3~4.5g，冬凌草 30g，甘草 9g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

3. 治纵隔恶性肿瘤 壁虎 5g，地龙 9g，僵蚕 6g，共研细末，炼蜜为丸，每丸 1.5g，口服，每次 1 丸，每日 2 次。（《肿瘤的诊治与防治》）

4. 治原发性肝癌 ①守宫（壁虎）适量，研末，每服 2g，日 3 次。（《抗癌中药药理与临床》）②壁虎、干蟾皮各 6g，石见穿 30g，藤梨根 60g，半枝莲 20g。加水煎汁。每日 1 剂，分 2~3 次服。（《防癌抗癌中药》）

5. 治胃癌 活壁虎 10 条，白酒 500ml。先将壁虎置白酒中浸泡，7 日后服药酒，每次 10~15ml，每日 3 次。（《中国民间单验方》）

6. 治乳腺癌 壁虎 1 个，纳入鸡蛋内，用纸封固，放在瓦上，用炭火煨存性，研末，加冰片少许，研末，放膏药上贴。（《常见病验方研究参考资料》）

7. 治急性淋巴细胞性白血病 守宫适量，焙干研末为粉，口服，每次 2~3g，每日 3 次，开水送服。（《中华肿瘤治疗大成》）

8. 治绒毛膜上皮癌 活壁虎 40 条，研粉，加蜈蚣粉 10g。口服，每次 2g，每日 2~3 次，10 日服完。（《实用抗癌验方》）

9. 治淋巴肉瘤 壁虎 1~2 条，制鳖甲、山慈菇、夏枯草、象贝母各 20g。加水煎汁，每日 1 剂，分 2~3 次服。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品配蟾酥、龙葵，治肝癌；配全蝎、蜈蚣，治脑瘤；配山豆根，治食管癌；配臭牡丹，治肺癌。

【药理作用】

抗肿瘤作用 鲜壁虎液具有抑制脑胶质瘤细胞增殖，诱导胶质瘤细胞凋亡的作用。（肿瘤防治研究，2003，6）体外实验证明，壁虎水溶液对人体肝癌细胞的呼吸有明显抑制作用。（《中华肿瘤治疗大成》）

肿节风

本品系金粟兰科草珊瑚属植物草珊瑚的全草。味苦、辛，性平，有小毒。清热解毒，散瘀祛风。主治胰腺癌、胃癌、直肠癌、肝癌、食管癌及急性白血病等。10～30g，水煎服。其制剂有肿节风注射液、肿节风片剂等。

【临床应用】

1. 治胰腺癌 肿节风 30g，大黄 30g，人参（嚼服）10g，黄芪 30g，水煎服。（《中华肿瘤治疗大成》）
2. 治大肠癌 肿节风、败酱草、白花蛇舌草各 30g，槐花 20g，蛇蜕 12g。上药晒干研细，调拌蜂蜜冲服，日 3 次。（《中国民间草药方》）
3. 治前列腺癌 九节茶 60g，煎水代茶饮。配新癢片（九节茶为主）每日 3 次，每次 4 片，饭后服。（福建中医药，1988，2）
4. 治宫颈癌 肿节风 30g，大黄 30g，人参（嚼服）10g，黄芪 30g。水煎服。（《百病良方》）

【配伍经验】

本品配连翘、蒲公英，治鼻咽癌；配大黄、莪术、半枝莲，治胰腺癌；配败酱草、白花蛇舌草、槐角，治大肠癌；配

皂角刺、土贝母、了哥王，治恶性黑色素瘤；配泽泻，治颅内肿瘤。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 肿节风对 SP、B₂₂、U₁₂、W₂₅₆、Tm₇₅₅ 及 U₂₇ 等瘤株都具有明显的抑制作用，对腹水型肝癌（H₂₂）细胞和荷瘤小鼠肝的耗氧能力亦有直接抑制作用。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 放化疗增敏作用 与化疗药合用增效率为 17.69%～39.80%；与放疗增效率为 17.69%～26.71%。（浙江中医杂志，1999，10）

3. 免疫调节作用 浸膏及其分离物（总黄酮）对动物的细胞吞噬功能等免疫指标有共同的促进作用；在动物机体免疫状态实验中，肿节风有和人参相似的作用，即小剂量使免疫功能增强，大剂量则免疫功能下降。（《抗癌中药》）

砒石

本品系砷矿中的砷华矿石的加工品。味辛，性大热，有大毒；归肺、肝经。蚀疮去腐，解毒杀虫，祛痰平喘。主治皮肤癌、子宫颈癌、唇癌、阴茎癌、乳腺癌等体表或有腔与体外通连之处的肿瘤及淋巴肉瘤、食管癌等；亦可用于各种顽癣。内服：每次 0.003～0.075g，入丸、散。外用：适量，研末撒，或制成膏、栓、酊等剂型。注意：①本品不宜作汤剂及酒剂服用；②不能持续服用，外用也不宜过多，以防局部吸收中毒；③孕妇忌用。

【临床应用】

1. 治唇癌 砒石适量纳入去核大枣内，置恒温干燥箱中烤至红枣略呈黑褐色，研为信枣散。外敷肿瘤溃疡处，使肿瘤组织坏死，结痂后脱落。（《抗癌治验本草》）

2. 治食管癌 ①白砒石 2mg, 山药粉 98g, 水泛为丸如绿豆大, 每次 4 粒, 1 日 3 次。《《癌症秘方验方偏方大全》》 ②白砒石 120mg, 草河车 1250g, 山豆根 2500g, 夏枯草 2500g, 白鲜皮 1000g, 败酱草 2500g, 炼蜜为丸, 每丸重 0.9g, 1 日 3 次, 每次 2 丸。《《实用临床抗肿瘤中药》》

3. 治中晚期肺癌 砒石 0.2g, 巴豆 (去壳研末) 7 枚, 大枣 (去核) 7 枚, 生葱 7 茎。将上药煎煮捣烂制成饼。纱布包敷两手心, 每次敷 5 昼夜, 间隔 5 日, 第 1 个月敷 3 次, 第 2 个月敷 2 次, 间隔 10 日, 以后每月或隔月 1 次。《《中华肿瘤治疗大成》》

4. 治宫颈癌 砒石、硃砂各 10g, 枯矾 20g, 碘仿 40g, 冰片适量。共研末, 过 120 目筛, 制散剂外用, 以带线棉球蘸取药粉, 上于癌灶处, 每日或隔日 1 次, 配合其他内服药用。《《抗癌中药的临床应用》》

5. 治白血病 ①三氧化二砷注射液 10ml 加入 5% 葡萄糖注射液 500ml 静滴, 每日 1 次, 连续应用 28 天为一疗程; (中国实用内科杂志, 2000, 1) ②安血宁注射液 [主要成分是三氧化二砷 (As_2O_3)], 每次 10ml 加入 5% 葡萄糖注射液 500ml 内静滴, 每日 1 次, 连用 30 天为一疗程。若未完全缓解, 再重复 1 个疗程。(河南中医, 2000, 5)

6. 治皮肤癌 ①白砒 5g, 明矾 6g, 马钱子 3g, 小檗碱 1g, 普鲁卡因 2g。将白砒、明矾混置于瓦罐内, 放在炉火上煅至青烟尽、白烟出、上下通红, 冷却 24 小时, 与马钱子、小檗碱、普鲁卡因共研细粉, 过 120 目筛, 装瓶备用。外敷, 每天 1 次或隔日 1 次。②白砒 10g, 淀粉 50g, 加水适量, 揉成面团, 捻成线条状, 待自然干燥备用。于肿瘤周围间隔 0.5~1cm 处刺入白砒条, 深达肿瘤基底部, 在肿物周围形成环状。外敷一软膏 (由朱砂、冰片各 50g, 炉甘石 150g, 滑石 500g, 淀粉 100g, 加麻油适量, 调成糊状制成), 每日换药 1

次，直至治愈。《《抗癌中药的临床应用》》

【配伍经验】

本品配明矾、马钱子、小檗碱、普鲁卡因组成砒矾散，治皮肤癌；配山药粉，治食管癌；配北枣去核，组成信枣散，治唇癌及宫颈癌。

【药理作用】

抗肿瘤作用 本品有细胞原生质毒，有杀灭活体细胞作用，亦能杀灭所接触的恶性肿瘤细胞，对小鼠肉瘤₁₈₀有抑制作用。《《中华肿瘤治疗大成》》

钩吻

本品系马钱科常绿藤本植物故曼藤的根、茎及叶。味苦、辛，性温，有大毒。破积拔毒，祛瘀止痛，杀虫止痒。主治肝癌、食管癌、胃癌等消化系统肿瘤及淋巴肉瘤、骨肉瘤、皮肤癌等；亦可用于风湿痹痛、疥疮肿毒等。内服：0.1~0.15g，干品研末，分三次服。外用适量。本品有剧毒，应严格控制剂量。

【临床应用】

1. 治食管癌、贲门癌 钩吻烧灰，口服，每次 0.1g，每日 2 次，冲开水服或入稀饭内服。《《实用抗癌验方》》

2. 治肺癌 钩吻 6g，夏枯草 20g，甘草 20g，金钱草 20g，上药共研末，装入中号胶囊，每粒 0.3g，每日 3 次，每次服 2 粒。《《肿瘤临证备要》》

3. 治肝癌 将钩吻制成干粉，口服，每次 50mg，每日 3 次，3 日后若无反应，增至每次 100~150mg，连服 1 至数月。《《中医肿瘤学》》

4. 治胃癌 ①钩吻 0.1g，水煎代茶饮。《《肿瘤临证备要》》
②钩吻 0.1g，白花蛇舌草 30g，煎汤代茶，每日多次饮用。《《抗癌治验本草》》

【配伍经验】

本品配夏枯草、白花蛇舌草，治肝癌；配金钱草，治胆管癌；配菝葜，治胃癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 钩吻总生物碱对动物移植性肿瘤小鼠肉瘤₁₈₀有抑制作用；（《中华肿瘤治疗大成》）钩吻碱有显著的抗肿瘤作用，钩吻碱注射液于体外对肺腺癌细胞 AGZY-83- α 和胃腺癌细胞 S_C-823 的增殖有抑制作用。（《实用临床抗肿瘤中药》）

2. 镇痛作用 钩吻素甲对小鼠有镇痛作用，对止癌痛亦有效。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 对免疫功能的影响 本品根茎乙醇粗提取物可使小鼠腹腔巨噬细胞对鸡红细胞的吞噬百分率及吞噬指数均有明显提高，并明显拮抗环磷酰胺的免疫抑制作用。（《实用临床抗肿瘤中药》）

急性子

本品系凤仙花科一年生草本植物凤仙花的种子。味微苦，性温，有小毒。活血通经，软坚散结。主治食管癌、贲门癌、胃癌；亦可用于骨鲠咽喉、经闭、难产等。3~4.5g，水煎服。孕妇忌用。

【临床应用】

1. 治食管癌 ①急性子 9g，蜣螂 6g，丹参 15g。水煎服，每日 1 剂。（《中国民间百草良方》）②急性子、黄药子、代赭石、半枝莲各 30g。水煎服，每日 1 剂。（《实用临床抗肿瘤中药》）

2. 治胃癌 ①急性子研末，每次 1.5g，日 3 次。②急性子 3g，蒲公英 30g，党参 15g，白术 15g，水煎，日 1 剂。（《抗癌中草药大辞典》）

【配伍经验】

本品配半夏、山豆根，治食管癌；配海浮石、煅花蕊石、

煅代赭石等，治胃癌；配伍莪术、赤芍、穿山甲等，治肝癌。

【药理作用】

抗肿瘤作用 体内实验，本品对小鼠移植性肿瘤 S₃₇ 有抑制活性的作用。药敏实验对胃淋巴肉瘤敏感。（《中华肿瘤治疗大成》）

斑蝥

本品系芫花青科昆虫南方大斑蝥或黄黑小斑蝥地虫体。味辛、性寒，有毒；归肝经。主治原发性肝癌、胃癌、食管癌、乳腺癌、肺癌、皮肤癌等。亦可用于痈疽、顽癣、瘰疬、狂犬咬伤、斑蝥等。内服 0.03～0.06g，做丸、散服用。外用适量，研末敷贴发泡，或酒醋浸涂。注意体弱及孕妇忌用。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 ①用斑蝥 1 只，去翅、足，以粟米 250g 同炒，米焦后弃米不用，入薄荷 200g 研为末，乌鸡蛋清调为丸，如绿豆大。空腹浓茶送服，每次 3 丸，每日 1 次。（《实用抗癌验方》）②斑蝥（去头、足、翅，糯米炒黄）3g，香油 30g，冰片 0.5g，麝香 0.15g，放入瓶中，盖严浸泡 1 个月即成，外用；若欲成膏，则以上药物，研细后加少量凡士林调膏即成，外用。（《实用抗癌验方》）

2. 治乳腺癌 新红皮鸡蛋 1 个，内纳斑蝥 3 只，外用纸封好，放笼屉里蒸熟后，去斑蝥吃鸡蛋，每日 1 个。（《肿瘤的诊断与防治》）

3. 治食管癌、贲门癌 斑蝥 30 个，三棱 12g，莪术 12g，大枣 15 枚。每个枣去核装 2 个斑蝥，再用白面包裹焙干，与三棱、莪术共为细末，分为 21 包。每日 1 包，每日 1 次。（《中华肿瘤治疗大成》）

4. 治胃癌 将鸡蛋凿一小口，将斑蝥 1 个（去翅）装入

鸡蛋内，用纸封口，煮熟或火煨熟，每日服1个，2日后如反应不大，将药量增加1倍，每日早晚各服1次。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 治肝癌 ①斑蝥1g，地鳖虫、丹参各9g，六一散30g。共研细末，拌匀，每日服3次，每次0.6g，温开水送下。（《防癌抗癌中药》）②斑蝥100g，陈皮100g，糯米100g。将糯米洗净，沥干，加入斑蝥，置锅内，微火炒至焦黄，拣去斑蝥；另将陈皮研末，混合均匀，首次剂量每次10~15g，每日3次；维持量每次5~6g，每日3次。饭后冲服。（《中华肿瘤治疗大成》）

6. 治总胆管癌 斑蝥0.06g，木通0.27g，车前子0.27g，滑石0.3g，上药共研细末，共制成10丸，每次2~3丸，每日3次。（新中医，1980，3）

7. 治胰腺癌 斑蝥0.06g，木通0.27g，车前子0.27g，滑石0.3g。常法制成丸子，共制10丸，每次2~3丸，每日3次。（《中华肿瘤治疗大成》）

8. 治早期膀胱癌 斑蝥15个，大黄25g，人参20g，猪苓25g。斑蝥用50度白酒浸泡1昼夜，加温至60℃10分钟，过滤去渣取酒150ml。另将大黄、人参、猪苓轧成细粉，将斑蝥酒与药粉混合搅拌，蛋清调之，团成绿豆粒大小，干燥后使用。每次5粒，每日3次。（《中华肿瘤治疗大成》）

【配伍经验】

本品配山豆根、乌梅、蜈蚣，治上段食管癌；配郁金、茵陈、大黄、栀子，治总胆管癌；配柴胡、金钱草，治胰腺癌。

【药理作用】

抗肿瘤作用 本品有较好的抗癌效用，其抗癌有效成分为斑蝥素，能抑制癌细胞的核酸及蛋白质的合成。其丙酮提取物能明显抑制Hela细胞和人体食管癌、贲门癌、胃癌、肝癌、肺癌、乳腺癌等细胞的代谢。斑蝥素对小鼠腹水型肝癌和网织细胞肉瘤ARS均有一定的抑制作用。（《中华肿瘤治疗大成》）

蜈蚣

本品系蜈蚣科昆虫少棘巨蜈蚣的干燥体。味辛，性温，有毒；归肝经。解毒散结，通络止痛，息风止痉。主治间叶组织与神经组织肿瘤，如软组织恶性肿瘤、骨肿瘤、脑肿瘤等，以及胃癌、食管癌、肝癌、宫颈癌、皮肤癌等；亦可用于急慢惊风、破伤风等痉挛抽搐之症及疮疡肿毒、顽固性头痛、风湿痹痛等症。1~3g，水煎服，或炒研细末，每次0.6~1g吞服。外用适量，研末或油浸涂敷患处。注意本品有毒，用量不可过大，孕妇忌服。

【临床应用】

1. 治脑瘤 蜈蚣、全蝎各100g。共研细末，每次3g，每日2~3次。（辽宁中医杂志，1978，3）

2. 治鼻咽癌 ①蜈蚣3条，炮山甲、土鳖虫、地龙、田三七各3g，共研细末，分3次温服。另用山苦瓜10g切碎，浸入75%乙醇25ml，搅匀，用消毒纱布过滤去渣，加甘油20ml，每日滴鼻3~6次。（《抗肿瘤中药的临床应用》）②蜈蚣、全蝎各等量为末，口服，每次3g，每日3次。（《肿瘤的诊断与治疗》）

3. 治颌窦癌、鼻腔癌、副鼻窦癌 蜈蚣、全蝎各等量，研细末，口服，每次3~5g，每日3次。（《抗癌良方》）

4. 治舌癌瘀热互结者 蜈蚣30g，马钱子30g，紫草30g，白蝎子草30g。将前两味药煨存性，研末，再与冰片混合，研细。将药粉少许吹入患处，每日1~2次。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 治喉癌 蜈蚣5条（去头足），全蝎、白僵蚕、土鳖虫各30g，鸡蛋40个。上药分别用瓦焙干研细末，混匀分为40包。服时每包放入1个鸡蛋内摇匀，面糊封口，置碗内蒸熟吃，早晚各服1枚。（四川中医，1985，9）

6. 治食管癌、胃癌 ①蜈蚣 1 条，硃砂、硼砂、干蟾皮各 1.0g，人工牛黄、玉枢散各 1.5g，冰片 0.3g，共为细末，每日 1 剂，分 3 次口服。（中医药学报，1995，2）②蜈蚣 1 条，降香炭 3g，硼砂、冰片各 2g，百草霜 6g，共研细末。用生鹅血趁热将药送下。（《中医诊疗特技经典》）③蜈蚣 4g，全蝎 2g，蛭螯 4g，烘干共研细末。将药粉与 2 个鸡蛋调匀，文火蒸熟后，1 次服完，每日 1 次。（成都中医学院学报，1983，2）④蜈蚣 3~5 条，蘸上白酒焙干，研细末，1 个鸡蛋里放 1.5g，用纸封口，煮熟，每日吃 2 个蛋。（《妙药奇方》）⑤蜈蚣 20 条，地龙、乌梢蛇、土鳖虫、三七、穿山甲各 50g，共研细末，炼蜜为丸，每丸重 5g。口服，每次 1 丸，每日 1 次。（《实用抗癌验方》）

7. 治原发性肝癌 ①蜈蚣 1~2 条，鸡蛋 1 个。用 75% 乙醇适量浸泡蜈蚣，加等量开水后煮干，再取出蜈蚣焙干，研末；另取鸡蛋 1 个，去壳将蛋黄蛋清放碗内，加入一半水加前药末 3~6g 搅拌，蒸熟。每日食蛋 2~3 个。（《湖南中草药单方验方选编》）②另用蜈蚣粉末 1g，冲服。配半枝莲、石上柏各 30~60g，水煎服，每日 1 剂。每日 3 次。（《抗癌食药本草》）③蜈蚣 3 条，金银花 100g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

8. 治乳腺癌 ①蜈蚣 1~2 条，焙干研细，和鸡蛋 2 枚炒食，连食 10 余日。（《抗癌中药大全》）②蜈蚣 1 条，核桃 1 个，全蝎 5g。将核桃一开两半，一半去仁，将全蝎、蜈蚣放入其中后捆住，放火上烧之，冒过青烟为度，研末，每次 1 剂，以开水冲服，每日 1 次。（《中华肿瘤治疗大成》）

9. 治恶性淋巴瘤、皮肤癌 蜈蚣 10 条，蜂蜜 180g，五倍子 140g，黑醋 1500g，研磨成膏，外敷，避免接触金属类用具。（《肿瘤的诊治与防治》）

【配伍经验】

本品配全蝎，擅长息风止痉，通络止痛，治颅内肿瘤及癌

性疼痛；配天麻、川芎、白僵蚕，治颅内肿瘤头晕头胀；配马钱子、雄黄，治皮肤癌；配紫草、桃仁、败酱草，治宫颈癌瘀热互结者；配连翘、金银花、天葵子，治鼻咽癌；配炮山甲、土鳖虫、田三七，治肝癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 蜈蚣水蛭注射液，对癌细胞有抑制作用，蜈蚣提取物对动物移植性肿瘤亦有作用。（《抗癌中药药理与应用》）

2. 镇痛作用 蜈蚣灌胃给药，扭体法实验测得，对小鼠的镇痛率为53%；热板法证实，给药后2小时痛阈提高率为50%，作用可维持4小时以上。（中国药理通讯，1992，9）

藤黄

本品系藤黄科植物藤黄树的树干割伤后流出的树脂干燥物。味酸、涩、辛，性温，有大毒；归脾、胃、大肠经。破血散瘀，消肿止痛，攻毒蚀疮。主治乳腺癌、子宫颈癌、恶性淋巴瘤、胰腺癌、肝癌、皮肤癌等。0.03~0.06g，入丸剂，不入煎剂。注意体质虚弱者忌服。

【临床应用】

1. 治乳腺癌 藤黄片剂，口服，每次1片（每片30mg），每日3次。（肿瘤防治研究，1986，2）

2. 治晚期胰腺癌疼痛 藤黄3g，冰片3g，麝香0.3g，生南星20g。用醋调成糊，外敷痛处，两天换药1次。（《中华肿瘤治疗大成》）

3. 治子宫颈癌 藤黄、大黄、轻粉、桃仁各30g，雄黄、白矾、官桂粉、冰片、五倍子各60g。共为细末，制成散剂，用带线棉球蘸取药粉，塞于阴道宫颈处。（《抗癌植物药及其验方》）

4. 治皮肤癌 藤黄软膏外敷癌肿块，2~3日换药1次。

藤黄片，口服，每次 60～90mg，每日 3 次。（实用癌症杂志，1986，3）

【配伍经验】

本品配龙脑、马钱子、鲜猪胆汁，治皮肤癌；配硼砂、冰片，治宫颈癌。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 本品提取液对人体肝癌细胞有抑制作用。其酸性树脂中的藤黄酸对大鼠乳癌₇₃₇、宫颈癌₁₄的癌细胞有直接杀伤作用。藤黄提取物腹腔注射对小鼠腹水型肝癌、艾氏腹水癌、肉瘤₁₈₀、肉瘤₃₇的抑制率为 35.6%～80.0%。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 放疗增敏作用 对小鼠肿瘤 MA₇₃₇ 用藤黄针剂合并放疗与单放疗两组进行比较，证明藤黄与放疗合用，有显著的增敏效果。（《抗癌中药药理与应用》）

蟾酥

本品别名蛤蟆蟾酥、蛤蟆浆、癞蛤蟆酥等，系蟾蜍科动物中华大蟾蜍和黑眶蟾蜍的耳后腺所分泌的白色浆液，经收集干燥而成。味甘、辛，性温，有毒；归心经。攻毒杀虫，破癥散结，消肿止痛。主治皮肤癌、肝癌、胃癌、食管癌、肠癌、肺癌、乳腺癌、宫颈癌、白血病、骨肉瘤等多种肿瘤；也治痈疽疮、咽喉肿痛、齿龈作痛；与放、化疗配合应用有保护血象的作用，同氟尿嘧啶有协同作用。内服 0.015～0.03g，入丸、散；外用适量，研末调敷或入膏药贴患处。本品有毒，可引起消化系统、神经系统反应及心律不齐，故严重胃溃疡、心血管疾病患者及孕妇忌用；外用不可入目；忌过量。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌头痛 蟾酥 5g，鹅不食草 20g，麝香 0.3g，

白芷 15g, 冰片 5g。先将鹅不食草、白芷研为细末, 再加入麝香、蟾酥、冰片混匀备用。用时取少许药末搽于鼻孔口, 并轻轻吸入鼻腔中, 稍时即打喷嚏, 使鼻窍通畅, 头脑清爽, 头痛随之解除。((《抗癌中药大辞典》))

2. 治食管癌 干蟾酥 30g, 田三七 30g, 三棱 30g, 五灵脂 30g。上药用微火焙干存性, 研末。每次 1.5~3g, 每日 3 次, 用醋调和后, 温开水冲服。((《中华肿瘤治疗大成》))

3. 治直肠癌 蟾酥、雄黄各 20g, 白及粉 15g, 研细末后加颠茄浸膏 5g, 甘油 75g, 调成糊状, 倾入已涂过润滑剂的鱼雷形栓模内, 冷凝后取出, 以蜡纸包好备用。患者仰卧, 取栓剂 1 颗轻轻塞入肛内约 10cm, 仰卧 30 分钟, 每日 2 次, 30 日为一疗程。(上海中医药杂志, 1988, 9)

4. 治皮肤癌 蟾酥 10g, 研细, 放入 30ml 生理盐水中, 浸泡 10~48 小时后, 蟾酥成糊状, 再加入外用的磺胺软膏拌匀, 制成含 10% 或 20% 的软膏备用。肿瘤周围以 75% 乙醇消毒后, 将软膏均匀地涂肿瘤上。(肿瘤防治研究, 1982, 2)

5. 治肝癌疼痛 蟾酥 10g, 冰片 10g, 麝香 3g。将上药溶入 60% 乙醇 50ml 内, 瓶装备用。用时将药液外搽局部, 每日 2~4 次。((《中华肿瘤治疗大成》))

【配伍经验】

本品配石见穿、半枝莲, 治肝癌; 配礞砂、硼砂、枯矾, 治食管癌; 配雄黄、枯矾、朱砂, 治皮肤癌; 配牛黄、雄黄、冰片, 治晚期癌症疼痛。

【药理作用】

抗肿瘤作用 蟾蜍皮提取物对小鼠肉瘤₁₈₀和兔 B、P 瘤都有抑制作用; 可延长肝癌小鼠的生存。蟾蜍醇和水的提取物对人胃癌细胞有抑制作用, 抑制人肝癌和白血病细胞的呼吸; 本品与环磷酰胺等抗肿瘤药合用, 能增强疗效。((《中华肿瘤治疗大成》))

露蜂房

本品系胡蜂科昆虫大黄蜂的巢。味甘，性平，有毒；归胃经。攻毒消肿，杀虫，祛风。主治胃癌（特别是溃疡型癌）、食管癌、肺癌、鼻咽癌、乳腺癌、骨肉瘤、肝癌、绒毛膜癌等；也可用于瘰疬痈疽、风疹疮癣、风湿痹痛、乳腺炎、淋巴腺炎，腮腺炎等。10~15g，水煎服，或1.5~3g，研末冲服。外用适量，研末调敷。气血虚弱者不宜服。

【临床应用】

1. 治耳癌 露蜂房、全蝎、蛇蜕各等量，研细末，温开水送服，每次3g，每日3次。（《实用抗癌验方》）

2. 治肺癌 露蜂房10g，生艾叶20g，大蒜20瓣，生甘草3g。水煎服，日1剂。（《肿瘤资料选编》）

3. 治胃癌 露蜂房1.5g，蜈蚣4.5g，全蝎0.9g（炒微黄研末），马钱子3g，用井水泡24小时，再换清水连续泡7~10小时，去皮晒干，用麻油炒黄，研为末；蜗牛0.5g捣烂，晒干研末，乳香0.3g研粉。诸药末混合均匀，共制成小丸粒，每3g约20粒。口服，每次10粒，每日2次。（《肿瘤的诊断与防治》）

4. 治乳腺癌 露蜂房、山慈菇各15g，雄黄6g，先分别研末，再和匀共研，口服，每次1.5g，每日2次（均装胶囊内服）。（《实用抗癌验方1000首》）

5. 治绒毛膜上皮癌 露蜂房6g，穿山甲珠、当归各9g，茯苓12g，丹参15g，山楂18g，水煎服，每日1剂。（《抗癌本草》）

6. 治大肠癌二便不通 露蜂房200g，烧为末，黄酒调服，每次10~15g，每日2次。（《中华肿瘤治疗大成》）

【配伍经验】

本品配鱼腥草，清肺散结，攻毒疗疮，治肺癌；配蒲公英

英、天葵子、王不留行，治乳腺癌；配半夏、生胆南星，治胃癌、食管癌；配胆南星，治鼻咽癌；配伍冰片，治耳廓肿瘤；配蛇蛻、全蝎，治涎腺肿瘤；配全蝎、炮穿山甲、石见穿，治肝癌。

【药理作用】

抗肿瘤作用 体外实验，能抑制人肝癌细胞，用美蓝法对胃癌细胞有抑制作用。（《有毒中草药大辞典》）

扶正培本类药

人参

本品系五加科多年生草本植物人参的根。味甘、微苦，性微寒；归脾、肺经。大补元气，补脾益肺，生津安神。主治各种肿瘤及肿瘤手术，放、化疗后正气虚弱者；亦用于大失血、大吐泻以及一切疾病因元气虚极所致体虚欲脱者。内服：5～10g，宜文火另煎，将参汁兑入其他药汤内饮服。或研末吞服，每次1～2g，每日2～3次。如挽救脱虚证，当用大剂量15～30g，煎汁分数次灌肠。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 人参3g，金银花30g，白花蛇舌草30g，夏枯草20g。水煎服，每日1剂。（广东省湛江市第二人民医院方）

2. 治食管癌 人参90g，当归60g，黄药子300g，丹参、五味子各30g，土大黄150g。共捣碎，浸泡于白酒2000ml内，2周后去渣备用。每日服15ml。（《肿瘤药物治疗》）

3. 治肺癌 人参10g，枸杞子10g，半枝莲20g，白花蛇舌草20g，甘草5g。水煎服，每日1剂。（潘敏求经验方）

4. 治肝癌及合并肝硬化 人参5g，藏红花（单煎）1g，柴胡30g，黄芩20g，生甘草3g。水煎服，每日1剂。（《常氏抗

癌验方》)

5. 治胃癌 人参香茶糖衣片 (含人参、香茶末、枳壳) 每次 5 片, 每日 3 次, 3 个月为一疗程。 (《抗癌中草药大辞典》)

6. 治宫颈癌 ①人参 18g, 生鳖甲 18g, 花椒 9g。共为细粉, 分为 6 包, 每晚服 1 包, 开水送下。 (《全国部分名老中医验方》) ②阴道出血: 人参 6g, 阿胶 20g, 地榆炭 15g, 田三七 (冲) 3g, 白及 10g, 仙鹤草 30g。水煎服。 (《抗癌中草药大辞典》)

【配伍经验】

本品常与**黄芪**配伍, 用于增强体质, 提高机体防癌、抗癌的能力, 改善机体虚弱状态; 配**木香**、**陈皮**, 补而不滞, 治肿瘤手术后脾虚食滞不消; 配**锁阳**, 温阳益气, 治化疗后白细胞减少; 配**附子**温阳救逆, 温阳化浊, 治肿瘤恶性积液。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用

(1) 抑制肿瘤细胞生长: 具有明显抑制人体早幼粒白血病 HL-60 瘤株的作用; (中草药, 1988, 3) 能阻抑胃癌细胞生长及增殖。 (白求恩医科大学学报, 1992, 1)

(2) 诱导肿瘤细胞凋亡: 人参皂苷能诱导人肝癌 SK-HEP-1 细胞、鼠神经胶质瘤 C₆B_U-1 细胞和人神经母细胞瘤 SK-N-BE (2)、人恶性黑色素瘤 A₃₇₅-S₂XIBAO、人前列腺癌 Cncap 细胞凋亡。 (药学进展, 2003, 5)

(3) 诱导肿瘤细胞分化: 人参能诱导 Morris 肝癌细胞、黑色素瘤 B₁₆ 细胞、畸胎瘤 F₉ 细胞、人早幼粒细胞白血病 HL-60 细胞分化。 (药学进展, 2003, 5)

(4) 抑制肿瘤血管生成: 人参皂苷 Rb₂、Rg₃ 等能破坏或抑制血管生成, 从而抑制肿瘤的生长和转移。人参皂苷 Rb₂ 能抑制 B₁₆-BL₆ 小鼠黑色素瘤细胞的血管生成, 降低小鼠黑色素瘤细胞、结肠癌细胞的肺转移; 并抑制肺癌模型肿瘤新生血

管的生长,抑制子宫内膜向基底膜侵袭。(药学进展,2003,5)

(5) 抗突变作用:人参皂苷可以抑制促癌剂 TPA 和过氧化氢诱发的 WB-F₃₄₄ 大鼠肝上皮细胞癌变;能抑制环加氧酶的活性,降低偶氮甲苯诱发的结肠癌发生;能抑制 3-甲基胆蒽的致癌活性,降低癌变的发生。(药学进展,2003,5)

2. 与化疗药物的协同作用 人参与环磷酰胺合用可发生明显的抗肿瘤协同作用。(中成药研究,1988,5)

3. 对免疫功能的影响 能调节细胞产生细胞因子和介导多种免疫效应。人参能明显提高对感染的抵抗力,能增强巨噬细胞的吞噬功能,对机体有明显的保护作用。(病理生理学报,1985,4)

4. 升白作用 人参能使肿瘤放化疗患者的白细胞回升。(肿瘤防治研究,1987,3)

女贞子

本品系木犀科常绿乔木植物女贞的成熟果实。味甘、苦,性凉;归肝、肾经。滋补肝肾,强腰膝,明耳目。主治肾癌、骨癌、脑瘤、白血病等;放、化疗所引起的白细胞减少症;肝肾阴虚内热者。10~15g,水煎服。脾胃虚寒泄泻、阳虚者忌用。

【临床应用】

1. 治肺癌 重楼、女贞子、白花蛇舌草、淡竹叶各 30g,核桃体 60g。水煎服,每日 1 剂。《抗癌良方》

2. 治胃癌 党参 15g,枸杞子 15g,女贞子 15g,白术 9g,菟丝子 9g,补骨脂 9g。水煎服,每日 1 剂,分 2 次服用。《抗癌中药一千方》

3. 治乳腺癌 女贞子 30g,海藻 30g,海带 30g,决明子 30g,水煎,每日 1 剂,分 2 次服。《中华肿瘤治疗大成》

4. 治膀胱癌 沙苑子、山慈菇各 15g，女贞子、桑寄生、猪苓、白花蛇舌草各 30g。水煎服，每日 1 剂。（解放军总医院方）

5. 治放疗、化疗所致白细胞减少症 ①女贞子 150g，龙葵 60g，水煎服。（首都医药，2002，12）②女贞子 1500g，黄芪 1500g，制成 1000ml，每次 10ml，每日 3 次。（中华新医学，2003，12）③女贞子 40g，水煎服，每日 3 次，1~2 个月为一疗程，白细胞下降上升率为 70%。（中药临床药理杂志，1990，2）

【配伍经验】

本品常配旱莲草，滋肾养阴，清热凉血，治放疗、化疗所致血小板减少；配仙灵脾、锁阳、鸡血藤，治放疗、化疗引起的白细胞下降；配旱莲草、枸杞子、菟丝子，治癌症晚期肝肾阴虚。

【药理作用】

1. 抑瘤作用 女贞子可抑制宫颈癌 U₁₄ 瘤株，抑制率为 49.2%；（《抗癌中草药大辞典》）对肝癌（H₂₂）实体型和小鼠 S₁₈₀ 肉瘤实体型有抑制作用，其抑制率为 37.5%~48.32%。但女贞子提取物对 H₂₂ 肝癌、S₁₈₀ 肉瘤腹水型无延长生命作用。（江苏药学与临床研究，2002，1）

2. 抗突变作用 女贞子对致突变剂环磷酰胺和乌拉坦诱发的突变效应和细胞染色体损伤均具有保护作用。（《抗癌中药药理与应用》）

3. 免疫调节作用 女贞子有增强细胞免疫及体液免疫的作用；（中西医结合杂志，1987，6）女贞子多糖对正常小鼠的特异性细胞免疫无显著影响，对环磷酰胺所致免疫抑制状态小鼠的细胞免疫有增强作用；（中药药理与临床，2001，2）女贞子多糖在一定浓度范围内能显著提高小鼠淋巴细胞分泌 IL-2 的能力，但高浓度（100μg/ml）无明显作用。（上海免疫学杂志，1999，6）

白术

本品系菊科多年生草本植物白术的根茎。味苦、甘，性温；归脾、胃经。健脾燥湿，利水安胎。主治消化道肿瘤、肺癌、子宫颈癌等及肿瘤手术；放、化疗后引起的消化道不良反应。内服：5~10g，水煎服。

【临床应用】

1. 治胃癌 ①白术 20g，单根木（锉片）15g，木香 10g，天龙 2 条。水煎服，每日 1 剂。（《常氏抗癌验方》）②白术、半夏、瓦楞子各 30g，木香、血竭各 9g，雄黄 6g，上药混合，共研极细末。分成 30 份，每次 1 份，每日 3 次，开水送服。治疗晚期胃癌 30 例，总有效率达 76.7%。（新中医，1997，1）

2. 治直肠癌 白术、瞿麦各 15g，党参、茯苓、甘草各 9g。水煎，日服 2 次。（《抗癌治验本草》）

3. 治宫颈癌 白术、白英、白花蛇舌草、藤梨根各 30g。加水煎汁，每日 1 剂，分 3 次服。（《防癌抗癌中药》）

4. 治肾癌 白术 30g，黄精 30g，牛膝 30g，山楂 20g，猪苓 30g。水煎，每日 1 次，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 治白血病 白术、黄芪、生地黄、绞股蓝、白茅根、大青叶各 30g，水煎，每日 1 剂，分 3 次服。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品常配黄芪、人参，健脾补虚，治各种晚期肿瘤及防治化疗后消化道反应；配天麻、半夏，治颅内肿瘤；配葶苈子，治肺癌胸水；配苍术，治肺癌痰多苔腻；配苦参、黄柏，治宫颈癌；配莪术、桃仁、制乳香、制没药，治宫颈癌少腹胀痛；配枳壳，治肿瘤气滞腹胀；配附子、干姜、川椒目，治胃癌呕吐肢冷。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 白术挥发油对小鼠移植性肝癌 H₂₂ 及小鼠肉瘤 S₁₈₀ 有显著的抑制作用，其抑制率分别为 51.6%、53.2%。(中国药物与临床，2002，4)

2. 免疫增强作用 白术可刺激小鼠抗体的产生，对淋转率和巨噬细胞吞噬率有明显促进作用；(滨州医学院学报，2003，5) 白术具有升高 IL-1 的作用，能拮抗环磷酰胺所致小鼠免疫损伤。(免疫学杂志，2003，11)

冬虫夏草

本品系麦角菌科植物冬虫夏草菌的子座及其寄主蝙蝠蛾科昆虫绿蝙蝠蛾幼虫的尸体。味甘，性温；归肾、肺经。益肾补肺，止血化痰。主治肺癌及其他癌肺转移者，乳腺癌、鼻咽癌、前列腺癌，及其他肿瘤体质虚弱者。内服：5~10g，水煎服；或研末冲服。或与鸡、鸭、猪肉等炖服。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 冬虫夏草 5g，仙鹤草 30g，白及 15g，雷公藤 10g。水煎服，每日 1 剂。(浙江中医药研究院方)

2. 治肺癌 ①冬虫夏草 5g，淫羊藿 15g，仙茅 12g，水煎服，每日 1 剂。(上海中医学院方) ②冬虫夏草 60g，人参 100g。研末吞服，每次 10g。(江西中医药，1998，4) ③冬虫夏草 5g，麦门冬 15g，石斛 15g，生地黄 15g。泡水当茶饮。(《中药新用》)

3. 治胃癌 冬虫夏草、白术、生黄芪、苏木、草河车，上药按一定比例组方，加工成冲剂，每袋相当于生药 30g，每次 1 袋，每日 3 次，温开水冲服。(《肿瘤病实用方》)

4. 治晚期骨肿瘤 冬虫夏草合剂，每次 10ml，每日 2 次。(《抗癌中草药大辞典》)

【配伍经验】

本品配黄芪、灵芝，能提高肿瘤患者免疫功能，主治肺癌、胃癌；配北沙参、川贝母、阿胶，治肺癌癆嗽痰血；配人参、胡桃肉、蛤蚧，治肺癌喘咳短气；配酸枣仁、远志，治肝癌术后虚烦失眠者；病后体虚不复，自汗畏寒，可与鸭、鸡、猪肉等一同炖服。

【药理作用】

1. 抑制肿瘤细胞生长 ①冬虫夏草可延长艾氏腹水癌小白鼠的生存期；（北京医学，1981，3）②对体外培养的人鼻咽癌细胞（KB细胞）及人宫颈癌细胞（Hela）、喉癌细胞均有直接抑制作用；冬虫夏草水醇提取物均可抑制小鼠 S₁₈₀ 肉瘤、小鼠 Lewis 肺癌、小鼠胃低分化腺癌 MKN-45、小鼠 MA-737 乳腺癌细胞生长。（时珍国医国药，2000，4）

2. 防治癌转移 冬虫夏草提取液与甲氨蝶呤并用能有效预防和治疗血性癌转移；（国外医学·中医中药分册，2003，1）冬虫夏草对小白鼠皮下移植性 Lewis 肺癌的原发灶生长和自发肺部转移均有明显的抑制作用。（中药通报，1987，2）

3. 阻断癌前病变 冬虫夏草对小白鼠前胃鳞状上皮增生无治疗作用，但可减少其癌变的发生率。（中华肿瘤杂志，1984，5）

4. 对免疫功能的影响 ①免疫器官的影响：可明显增加小鼠脾重，并拮抗泼尼松龙与环磷酰胺引起的脾重减轻；（中西医结合杂志，1985，1）对 γ 射线（4Gy）照射引起的脾脏重量下降，也有一定的保护作用；（中药通报，1998，4）还可使小鼠胸腺缩小，并加重泼尼松龙与环磷酰胺引起的胸腺萎缩作用。（同济医科大学学报，1988，5）②可明显提高腹腔巨噬细胞吞噬指数和吞噬百分率，并使肝、脾吞噬系数 α 值显著提高。（中草药，1982，13）③冬虫夏草菌能提高血清溶血素（IgM）水平。（中西医结合杂志，1985，1）

当归

本品系伞形科多年生草本植物当归的根块。味甘、辛，性温；归肝、心、脾经。补血活血，调经润肠。主治多种肿瘤及放化疗、手术所致的贫血、血小板减少等。5~15g，水煎服。热盛出血者禁用，湿盛中满及大便溏泄者慎服。

【临床应用】

1. 治乳腺癌 当归、甘草各 15g，大栝蒌（去皮，研为末）1 个，制没药、制乳香各 6g，共研粗末，每用 15g，酒熬，去渣，食后服。（《历代中医案论选萃》）

2. 治原发性肝癌 当归、瓦楞子各 20g，漏芦 12g，莪术 18g，半枝莲 60g。水煎服，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

3. 治直肠癌 当归、牛蒡子、大黄、赤小豆根、藤梨根，上药前 4 味各等份，为总量的 50%，取藤梨根占总量的 50%，共研细末，调匀冲服，每日 3 次，每次 6g。（《防癌抗癌中药》）

4. 治大肠癌便秘 当归 9g，枳壳 9g，杏仁泥 9g，肉苁蓉 9g，紫菀 30g。水煎，每日 1 剂，分 2 次与沉香 2.4g 磨成的汁同服。（《中华肿瘤治疗大成》）

5. 治宫颈癌 当归、杭白芍、黄芪各 30g，猫人参、藤梨根各 60g，水煎服，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

6. 治急性白血病 当归、鸡血藤各 30g，赤芍 15g，莪术 10g，参三七 5g。水煎，每日 1 剂，分 2~3 次服。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品常配黄芪，益气养血，治肿瘤患者体虚，尤其手术之后气血不足；配侧柏叶，治肿瘤化疗后脱发；配附子，温阳止痛，治各种肿瘤虚寒疼痛、盆腔肿瘤；配莪术，治宫颈癌；配石菖蒲，治胃肠肿瘤。

【药理作用】

1. 抗癌作用 当归多糖和当归内酯对实验小鼠移植性肿瘤均有肯定的抗癌作用。(科技开发动态, 2002, 12) 当归多糖对小鼠淋巴细胞性白血病细胞 (L_{1210})、人粒细胞白血病细胞 (KG-1)、人单核细胞白血病细胞 (V_{937})、人原始粒细胞白血病细胞 (K_{562}) 均有抑制作用。(兰州医学院学报, 1998, 1)

2. 抗突变作用 当归能明显抑制和抵御黄曲霉毒素 B_1 诱导所致突变作用。(癌症, 1989, 1)

3. 与化疗药物的协同作用 将当归与细胞毒类抗癌药(如环磷酰胺)合用, 有增效和协同作用, 能有效地拮抗后者对骨髓的抑制作用。(中医研究, 1999, 5)

4. 对免疫系统的影响 对正常动物或免疫功能低下动物如荷瘤动物的免疫功能(包括免疫效应细胞和免疫活性分子)有明显的诱导、增强及恢复作用。(科技开发动态, 2002, 12)

灵芝

本品系多孔菌科多孔菌属植物赤芝(红芝)、紫芝的担子果。味甘, 性平。滋补强壮, 止咳平喘。主治肺癌、食管癌、胃癌、鼻咽癌等虚证者; 前列腺癌及其他肿瘤体质虚弱者; 与放、化疗、手术结合应用, 增强疗效, 减轻不良反应。内服: 6~15g, 水煎服。兼外感初起者不宜服。

【临床应用】

1. 治食管癌 灵芝 50g, 猪心 250g, 猪肺 250g。以上原料共炖, 喝汤吃肉, 每月 2~3 次。(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 治肺癌 灵芝、紫草各 15g, 石见穿 50g。水煎服, 每日 1 剂。(《抗癌良方》)

3. 治胃癌 灵芝 15g, 向日葵籽心 30g, 水煎, 当茶饮, 可长期服用。(《中华肿瘤治疗大成》)

4. 治肝癌 黄芪 30g, 灵芝 30g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g。水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。(潘敏求经验方)

5. 治宫颈癌 灵芝 30g, 槐耳 15g。水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。《防癌抗癌验方精编》

6. 治中晚期癌症及放、化疗及术后患者 灵芝 15g, 黄芪 15g, 瘦猪肉 100g, 食盐适量, 同煮食。《中华肿瘤治疗大成》

【配伍经验】

本品配黄芪、人参, 以提高机体免疫功能, 增强自身防癌、抗癌能力; 配黄芪、黄精、鸡血藤, 治放、化疗后白细胞减少症; 配沙参、麦冬、大青叶, 治肺癌放疗后阴虚发热。

【药理作用】

1. 抑制肿瘤细胞生长 灵芝提取物对 H_{22} 、Lewis、Le、 S_{180} 肉瘤的抑制率分别为 47.8%、37.7%、36%、37% 和 59%。灵芝醇溶酸性组分对人肝癌 BEL-7402、宫颈癌 HeLa 细胞也有明显抑制作用。对人胃癌细胞 SGC-7901、人白血病细胞 HL-60 和小鼠白血病细胞 L_{1210} 均有较强的杀伤作用。(抗癌, 2003, 2)

2. 抑制肿瘤细胞转移 灵芝能抑制小鼠黑色素瘤细胞转移。(国外医学·中医中药分册, 2003, 4)

3. 免疫增强作用 灵芝能增强巨噬细胞吞噬率, 明显提高 T、B 淋巴细胞转化率, 增强 NK 细胞活性, 促进细胞毒 T 细胞的功能及 CD_4/CD_8 比值的升高。(时珍国医国药, 1999, 8) 灵芝多糖能拮抗环孢素 A、丝裂霉素、5-氟尿嘧啶、阿糖胞苷所致的免疫抑制。《中西医临床肿瘤学》

4. 其他作用 能升高白细胞; 改善肾上腺皮质功能, 使尿中 17-羟皮质类固醇含量增高, 增强中枢神经系统功能; 能抗放射, 对放射损伤有一定保护作用。《抗癌中草药大辞典》

补骨脂

本品系豆科 1 年生草本植物补骨脂的种子。味苦、辛，性大温；归肾、脾经。补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻。主治骨肉瘤、脑瘤、肾癌及骨转移癌；放、化疗后血红蛋白下降、白细胞减少者。6~12g，水煎服。

【临床应用】

1. 治阳虚型晚期肝癌 补骨脂 15g，白芍 30g，石见穿 20g，炙鳖甲 30g，猫人参 80g，水煎服，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

2. 治骨肉瘤 补骨脂、骨碎补、寻骨风各 30g，水煎服，每日 1 剂。（《抗癌植物药及其验方》）

3. 治急性白血病 补骨脂 20g，生地黄、白花蛇舌草、大青叶各 30g，紫草 20g，水煎服，每日 1 剂。（《防癌抗癌中药》）

【配伍经验】

本品常配骨碎补，治骨肉瘤；配仙灵脾、锁阳，治肿瘤放、化疗后白细胞减少症；配熟地、白芥子、炙麻黄，治骨瘤及骨转移癌疼痛；配杜仲、胡桃肉、人参、肉桂，治肺癌虚喘。

【药理作用】

1. 抑制癌细胞生长 补骨脂素对涎腺黏液表皮样癌、小鼠肉瘤、艾氏腹水癌、人宫颈癌等恶性肿瘤均有抑制作用；（中国中医药科技，1999，3）补骨脂无论在体内或体外均对乳腺癌 EMT₆ 有显著的生长抑制作用；（中国中药杂志，1998，5）补骨脂素对人白血病细胞株 K₅₆₂、人淋巴白血病细胞株 Raji 和人早幼粒细胞白血病细胞株 HL-60 均有抑制作用。（中国药理学报，1993，14）

2. 抑制癌细胞转移 补骨脂素可抑制涎腺黏液表皮样癌

转移细胞克隆 MC₃ 细胞转移率。(第四军医大学学报, 2000, 8)

3. 抗多药耐药作用 补骨脂素能逆转人乳腺癌 MCF-7/ADR 多药耐药性;(肿瘤, 2004, 3) 补骨脂素能使人白血病细胞株 (K₅₆₂ 细胞) 多药耐药株 Bcl-2 基因蛋白表达降低, 呈剂量依赖性。(中华实用中西医结合杂志, 2004, 14)

4. 放疗增敏作用 补骨脂素能增强 ⁶⁰Co 对 S₁₈₀ 细胞的敏感性, 其对多种辐射有增敏作用。(第四军医大学学报, 1998, 6)

5. 造血作用 补骨脂对造血系统粒系祖细胞的生长有促进作用。(中西医结合杂志, 1984, 9)

茯苓

本品系多孔菌科茯苓的菌核。味甘、淡, 性平; 归心、肾、脾经。利水渗湿, 健脾安神。主治消化道肿瘤有脾虚者, 或在化学药物治疗期间, 作健脾扶正之用。10~15g, 水煎服。阴虚而无湿热, 虚寒滑精, 气虚下陷者慎服。

【临床应用】

1. 治肝癌 茯苓、六神曲、麦芽各 9g, 车前子 30g, 茵陈 15g, 栀子 12g。水煎服, 每日 1 剂。(浙江中医学院学报, 1982, 增刊)

2. 治宫颈癌 茯苓 60g, 粳米 100g, 苡米 30g, 洗净, 同煮成饭, 早晚分服。(《防癌抗癌验方精选》)

3. 治白血病 茯苓、喜树根各 15g, 白花蛇舌草、马鞭草、葵树子各 9g, 水煎服。(《抗癌治验本草》)

4. 治溃疡性黑色素瘤 茯苓、雄黄、矾石各等份, 共研末, 麻油调敷患处, 同时内服金银花、连翘各 50g 的水煎液。(《抗癌植物药及其验方》)

【配伍经验】

本品配白参、黄芪、白术, 治各种肿瘤体弱气虚、神疲乏

力者；配沉香，治肝癌腹胀；茯苓皮配大腹皮，治癌性腹水；配姜竹茹、砂仁，治胃癌化疗后呕吐。

【药理作用】

1. 抑制肿瘤细胞增殖 茯苓多糖对小鼠体内 S_{180} 肉瘤细胞抑制率达 48%；能明显抑制小鼠腹水型肉瘤，抑制人慢性骨髓性白血病 K_{562} 细胞增殖，对 S_{180} 细胞膜磷脂酰肌醇 (P_i) 转换有明显抑制作用 ($P < 0.05$)。(中草药, 1999, 7)

2. 化疗药物协同作用 茯苓素能增强丝裂霉素、更生霉素、环磷酰胺、5-氟尿嘧啶的抑瘤率。对小鼠白血病 L_{1210} ，单独使用环磷酰胺的生命延长率为 70%，茯苓素与环磷酰胺合用为 168.1%。(中国抗生素杂志, 1990, 1)

3. 对免疫功能的影响 茯苓多糖能显著增加血清 IgG 含量，有促进细胞免疫和体液免疫的作用。(中药通报, 1987, 9)

茯苓多糖能诱导 T 细胞产生 IL-2，提高 IL-2 的活性，增强巨噬细胞活性，提高巨噬细胞吞噬率和吞噬指数，茯苓多糖对细胞免疫功能偏低者有很强的促进细胞免疫作用，调整 T 细胞亚群的比值，增强机体免疫功能，改善机体状况。(中草药, 1999, 7)

枸杞子

本品系茄科落叶灌木植物宁夏枸杞和枸杞的成熟果实。味甘，性平；归肝、肾、肺经。滋补肝肾，明目润肺。主治各种肿瘤体虚血亏及放、化疗后白细胞减少者。内服：10~15g，水煎服或泡酒服。脾虚便溏者不宜用。

【临床应用】

1. 治扁桃体癌术后 枸杞子 100g，松子 100g，肉糜 100~150g。肉糜加入黄酒、盐、调料，在锅中炒至半熟时加入枸杞子、松子再同炒，食用。(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 治肺癌化疗后白细胞下降 枸杞子 30g, 鸡血藤 30g, 菟丝子 20g, 大枣 4 枚。水煎, 每日 1 剂, 分 2 次服。难于口服者, 可用本方煎成 100ml, 保留灌肠 20 分钟, 每日 1 次。
(《肿瘤病实用方》)

3. 预防癌症 枸杞子 20g, 绿茶 1~3g, 以开水 200ml 冲泡 10 分钟, 饮服。每日 1 剂。(《防癌抗癌中药》)

【配伍经验】

本品常配菟丝子, 治晚期癌症及手术、放疗、化疗后体虚; 配锁阳、仙灵脾, 治白细胞减少症; 配女贞子、旱莲草, 治晚期肝癌或化疗后血小板减少; 配黄芪、鸡血藤, 治肿瘤放、化疗后贫血。

【药理作用】

1. 抑制癌细胞生长 枸杞子能抑制小鼠肉瘤 W₂₅₆ 的生长, 延长艾氏腹水癌荷瘤小鼠的生存期; (现代应用药学, 1995, 3) 对小鼠白血病的细胞代谢有明显的抑制作用; (现代检验·化学分册, 2002, 10) 枸杞子、叶对人胃腺癌 KATO-III 细胞, 果柄、叶对人宫颈癌 Hela 细胞均有抑制作用。(《中药研究与应用》)

2. 诱导癌细胞凋亡 枸杞多糖对培养的高转移人肺癌 PG 细胞增殖具有双向调节作用, 可诱导 PG 细胞凋亡。(宁夏医学院学报, 2002, 3)

3. 与放、化疗的协同作用 与放、化疗合用, 能产生明显的协同作用; (中国肿瘤临床, 1994, 12) 枸杞子与环磷酰胺合用并治疗对 W₂₅₆ 瘤体的抑制作用比单用后者强, 且可以缓解后者引起的白细胞减少。(宁夏医学院附属医院·内部资料)

4. 免疫调节作用 枸杞多糖能调节 T 细胞、B 细胞、淋巴细胞、NK 细胞和 IL-2 的活性, 促进 IL-2 的表达, 诱导 IL-6、TNF 的产生; (上海免疫学杂志, 1995, 2) 枸杞多糖能增强 LAK/IL-2 抗肿瘤活性, 减低用量及毒副反应。(中国药房, 2002, 1)

5. 升白作用 对环磷酰胺和 ^{60}Co 照射所致的白细胞下降有明显的升高作用。(中国药理与临床, 1993, 3)

香菇

本品系担子菌类伞科植物香菇的菌体。味甘, 性平。破血抗癌, 理气和中。主治消化道肿瘤、肺癌、白血病、子宫颈癌等及放疗、化疗、手术辅助治疗。10~30g, 水煎服。

【临床应用】

1. 治食管癌 香菇浸膏片, 相当于生药 9~12g, 口服。
(《肿瘤治验集要》)

2. 治晚期或复发胃癌 香菇多糖 1mg/次, 静滴, 每周 2 次, 配合化疗, 总有效率达 62.7%。(国药论坛杂志, 2003, 12)

3. 治原发性肝癌 香菇多糖 1mg, 静滴, 每周一次, 配合介入化疗治疗。(中国肿瘤临床, 1999, 5)

4. 治胸腔积液 香菇多糖 4~6mg 加入生理盐水 20ml 胸腔注入, 与胞必佳、顺铂联合治疗。(青海医学杂志, 2003, 10)

【配伍经验】

本品常用于食疗, 与鸡、鸭共炖, 以增强机体免疫力。

【药理作用】

抗肿瘤作用 香菇热水提取物对荷瘤小鼠肿瘤的抑制率为 80.7%, 并对小鼠肉瘤₁₈₀有显著的抑制作用。香菇多糖对小鼠肉瘤₁₈₀、子宫颈癌₁₄、肝癌腹水型转实体型有抑制作用。一般认为, 香菇多糖对癌细胞无直接毒性, 其抗肿瘤作用是通过宿主发挥出来的。研究表明, 香菇多糖的抗肿瘤作用有胸腺及 T 细胞的参与, 对吞噬细胞功能无刺激作用, 也不促进一般的细胞性或体液性免疫。(《中华肿瘤治疗大成》)

黄芪

本品系豆科多年生草本植物黄芪和内蒙黄芪的根。味甘，性微温；归脾、肺经。补气健脾，升阳固表，利尿消肿。主治肿瘤及肿瘤手术、放化疗后正气虚弱者。15~60g，水煎服。表实邪盛，气滞湿阻，食积内停，阴虚阳亢，痈疽初起，溃后热毒尚盛者，均不宜服。

【临床应用】

1. 治脑胶质瘤 黄芪 30g，当归 15g，半边莲 10g，白花蛇舌草 30g。水煎服，每日 1 剂。（《中西医结合肿瘤学》）
2. 治鼻咽癌 生黄芪、白花蛇舌草各 100g，黄连 20g，半枝莲 50g，水煎服。（《防癌抗癌验方精编》）
3. 治甲状腺肿瘤 黄芪 30g，白头翁 60g，海藻 15g，水蛭、大枣各 10g。水煎服，每日 1 剂。（四川中医，1988，2）
4. 治肺癌吐血 黄芪 30g，岩白菜全草 100g，鱼腥草 20g。水煎服，每日 1 剂。（《常氏抗癌验方》）

【配伍经验】

本品配人参，益气升阳，治肿瘤肺脾气虚；配当归，补气养血，治肿瘤放疗或化疗后气血亏虚；配大黄，治肿瘤气虚腑实证；配防风、白术，益气固表，治肿瘤体虚卫外不固证；重用黄芪，配红参、五味子，治肿瘤术后虚汗淋漓；配当归、鸡血藤，治慢性粒细胞白血病，衄血，面色萎黄。

【药理作用】

抗肿瘤作用 黄芪能增强机体免疫功能，促进抗体生成，还能保护肝脏，增加血细胞，提高肿瘤细胞逆转。黄芪可以增加病毒诱生干扰素的能力，并增强细胞对干扰素的敏感性，能促进淋巴等细胞转化，能加强免疫作用。对一些致癌性病毒的入侵和复制亦显示出阻碍作用。亦可发挥抗肿瘤作用。黄芪能

促进周围血中白细胞减少，对抗化学物质放射线或其他原因引起人类的白细胞减少，能显著提高单核巨噬细胞的吞噬能力。黄芪对细胞及体液免疫均有促进作用。通过此作用，尤其是通过单核巨噬细胞系统吞噬功能的显著增加，有可能发挥对肿瘤细胞的抑杀效应。黄芪的抗癌作用还与它所含的微量元素有关。（《抗癌中草药大辞典》）

猪苓

本品系多孔菌科真菌猪苓的菌核。味甘、淡，性平；归肾、膀胱经。利水渗湿。主治膀胱癌、肺癌、食管癌、胃癌、肝癌、白血病、子宫颈癌等；同化疗药物结合治疗各种癌症。10~30g，水煎服。无水湿者忌服。

【临床应用】

1. 治肺癌 猪苓多糖胶丸，口服，每次8丸（2g），每日3次，10日为一疗程。（白求恩医科大学学报，1984，1）
2. 治结肠癌 猪苓、大黄、肿节风各30g，莪术15g，干蟾皮6g，蜈蚣2条，水煎服，每日1剂。（《百病良方》）
3. 治膀胱癌 猪苓、白花蛇舌草、山慈菇、桑寄生各30g，沙苑子15g。水煎服，日1剂。（《癌症的中医治疗》）
4. 预防膀胱癌术后复发 猪苓60g，水煎服。（实用中西医结合杂志，2004，4）

【配伍经验】

本品配龙葵，利尿通淋解毒，治膀胱癌、肾癌及前列腺癌；配茯苓皮，治癌性腹水。

【药理作用】

1. 抑制癌细胞生长 猪苓能显著减少膀胱肿瘤发病率；（中华医学杂志，1987，11）猪苓多糖对小鼠 S_{180} 有明显的抑制作用；（新医药学杂志，1979，2）对 Lewis 肺癌的肺转移灶的发生

率有抑制趋势；(药学通报, 1985, 2) 对脂质体猪苓多糖能显著抑制黑色素瘤肝转移癌的生长。(胃肠病学和肝病杂志, 1999, 3)

2. 诱导癌细胞凋亡 猪苓多糖可引起膀胱癌细胞内钙离子水平的显著变化, 提示其可能有诱导细胞凋亡的作用。(中国临床药理学与治疗学, 2001, 3)

3. 抗辐射作用 猪苓多糖通过调节垂体-肾上腺系统的功能, 增加抗辐射损伤的能力。(中国药理通讯, 1983, 3)

4. 对免疫系统的影响 猪苓提取物或醇提水溶部分均能增强小鼠网状内皮系统吞噬功能, 能使荷瘤小鼠脾脏抗体形成细胞增多。所含的多糖类成分可提高小鼠细胞免疫及体液免疫, 降低化疗的副作用。(《中西医临床肿瘤学》)

本品能并明显增强小鼠脾细胞毒 T 细胞 (CTL) 对靶细胞的杀伤活性。(中国免疫学杂志, 1991, 3) 猪苓多糖能诱导 LAK 细胞活性。(实用医学进修杂志, 1994, 3)

猴菇菌

本品系多孔菌目齿菌科猴菇菌的培养物。味甘, 性平。补养脾胃, 强身抗癌。主治消化道癌, 尤其是癌症体弱者; 放、化疗期的辅助治疗。10~30g 或鲜品 30~100g, 水煎服。或与鸡共煮食。

【临床应用】

治胃癌 猴头菇 30g, 香附 9g, 水煎服。(《中华肿瘤治疗大成》)

【配伍经验】

本品常用于食疗, 配黄芪、枸杞子、怀山药等与瘦肉、鸡、鸭共炖, 以增强机体免疫力。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 猴菇菌对小鼠 S₁₈₀ 肉瘤和艾氏腹水瘤细胞有

抑制作用，对消化系统肿瘤有防治作用。（《抗癌中草药大辞典》）

2. 免疫增强作用 能提高淋巴细胞转化率，提升白细胞，产生干扰素，增强人体免疫功能。（《抗癌中草药大辞典》）

蜂乳

本品系蜜蜂科动物中华蜜蜂等的工蜂咽腺分泌的乳白色胶状物。味甘、酸，性平；归脾、肺、大肠经。滋补强身，益肝健脾。主治各种肿瘤及放疗、化疗、术后气血虚弱、营养不良、贫血等。0.3~0.6g，冲服。

【临床应用】

1. 治肺癌 蜂王浆，空腹服用，每次 15g，每日 1 次。（蜜蜂杂志，1991，8）

2. 治急性淋巴细胞性白血病 蜂王浆，空腹服用，每次 3.5g，每日早中晚各服一次。（《抗癌食物中药》）

【配伍经验】

本品常为佐使药，配南沙参、麦冬、百合，治肺癌干咳；配当归、肉苁蓉，治肠癌或化疗后肠燥便秘者；配黄芪、芍药、甘草，治胃癌中虚脘腹疼痛。

【药理作用】

抗肿瘤作用 蜂王浆具有强烈抑制白血病、淋巴癌、乳腺癌及多种腹水型癌等癌细胞生长的作用，能使艾氏腹水癌寿命延长，腹水出现较迟，癌细胞发育有退行性变化。能调节人体的细胞免疫和体液免疫的功能。（中国医学科学院情报研究室，1960，6）

薏苡仁

本品系禾本科多年生草本植物薏苡的成熟种仁。味甘、

淡，性微寒；归脾、胃、肺经。健脾利湿，清热除痹。主治消化道肿瘤、肺癌、宫颈癌、绒毛膜癌等。15～30g，水煎服。亦可作羹或与粳米煮粥、饭食用。津枯便秘者及孕妇慎用。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌手术、放化疗后体虚 生薏苡仁适量，煮粥常服。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治喉癌 ①生薏苡仁 30～60g，菝葜 30～60g，猪苓 30g，水煎服。②生薏苡仁 60g，刀豆子 60g，白茯苓 30g，淡竹叶 30g，水煎服。（《防癌抗癌验方精编》）

3. 治食管癌 薏苡仁 3 份，壁虎 1 份，黄药子 3 份。入白酒浸泡 2 周饮服。（湖北省武汉市第一医院方）

4. 治肺癌 薏苡仁 20g，金荞麦 30g，桃仁 12g，全蝎 6g，通关藤 15g。水煎服。（《抗肿瘤中药的临床应用》）

5. 治乳腺癌 ①薏苡仁 30g，全蝎 60g，白花蛇舌草 90g，生甘草 6g，水煎服。（《抗癌中草药大辞典》）②薏苡仁、延胡索各 15g，黄酒 2 盅煎至 1 盅，空腹服，出汗即验。（《外科大成·乳岩方》）

6. 治胃癌 薏苡仁 30g，紫藤根 30g，诃子 6g，菱角 20 个。水煎服，每日 1 剂。（广西中医药，1983，4）

7. 治肝癌 薏苡仁 30g，玉簪根 9g，半枝莲 30g，半边莲各 30g。水煎服，每日 1 剂。以此汤液外涂，尚可治唇癌。（南昌市第二人民医院方）

8. 治胆囊癌 薏苡仁、马鞭草、金钱草各 30g，射干 15g。水煎服，每日 1 剂。（《中医肿瘤的防治》）

9. 治大肠癌 生薏苡仁 60g，皂角刺 30g，大枣 7 枚，水煎，文火熬后，去皂角刺，每日早餐时食用。（《中华肿瘤治疗大成》）

10. 治前列腺癌 薏苡仁 30g，白花蛇舌草 30g，川楝子 15g，半枝莲 30g，萆薢 30g。水煎服。（《癌症家庭防治大全》）

11. 治肾癌 薏苡仁 5g, 猪苓、茯苓、滑石、泽泻、阿胶 (烔化) 各 3g。水煎服。《临床应用汉方处方解说》

12. 治恶性黑色素瘤 生薏苡仁 120g, 水煎, 分 2 次服。《防癌抗癌验方精编》

13. 治宫颈癌 ①薏苡仁 30g, 土茯苓 30g, 蜂蜜 20g, 前两味洗净晒干, 共研细末备用, 每次取 30g 细末, 开水冲服成糊, 趁热加入 20g 蜂蜜拌匀食用, 每日 2 次。《防癌抗癌验方精编》②薏苡仁 5g (磨碎), 全蝎 (打碎) 9g, 夏枯草 15g, 粳米 50g, 共入锅中, 煮成粥, 早晚分食。《中华肿瘤治疗大成》

【配伍经验】

本品配茯苓、白术、黄芪, 治各种肿瘤术后脾虚湿滞纳呆; 配败酱草、蒲黄炭、地榆炭, 治肠癌大便鲜血; 配胆南星、瓜蒌, 治肺癌胸痛咳吐脓痰者。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 薏苡仁对小鼠艾氏腹水癌有抑制作用, 能明显延长动物的生存时间。(日本外科学会杂志, 1960, 2) 对小鼠实体瘤和肝癌有明显抑瘤活性。此外, 薏苡仁还有抗肿瘤增效作用。(实用肿瘤学杂志, 1994, 3)

2. 免疫增强作用 薏苡仁能增强体液免疫, 使巨噬细胞产生并分泌白细胞介素-1, 并增强 NK 细胞活性或细胞毒性而发挥作用。《抗癌中药大辞典》

其他类药

八月札

本品为木通科植物木通、三叶木通、白木通的干燥或成熟果实。味甘、性寒; 归肝经。疏肝理气, 活血止痛, 除烦利尿, 抗癌。主治消化系统肿瘤、肝癌、乳腺癌; 亦用于肝胃气

痛，胃热纳呆，烦渴，赤白痢疾，腰痛，胁痛，疝气，痛经，子宫下垂，胸胁痛，肝胃痛，睾丸痛。15~30g，水煎服。

【临床应用】

1. 治肺癌 八月札 20g，人参 4g，粳米适量。熬粥服，每日 1 剂。《《抗癌本草》》

2. 治肝癌、胰腺癌 八月札 12g，郁金、香附、延胡索各 6g，水煎服。《《抗癌中草药大辞典》》

3. 治肝癌 八月札、石燕、马鞭草各 30g，水煎服，日 1 剂。《《中华肿瘤治疗大成》》

4. 治绒毛膜上皮癌 八月札、山稔根、白花蛇舌草各 60g。水煎服，每日 1 剂。《《青海常见肿瘤的防治》》

5. 治睾丸癌 八月札 30g，菝葜 30g，棉花根 30g，荔枝核 30g，延胡索 15g。每日 1 剂，水煎分次服。《《中西医结合常见肿瘤临床手册》》

【配伍经验】

本品常配藤梨根，治胃癌；配天葵子，治淋巴瘤。

【药理作用】

抗肿瘤作用 对 S₁₈₀、S₃₇ 均有抑制作用；对消化系统肿瘤和乳腺癌有较好的治疗作用。《《抗癌中草药大辞典》》

天花粉

本品系葫芦科多年生宿根草质藤本植物栝楼干燥块根。味苦、微甘，性寒；归肺、胃经。清热生津，解毒消肿。主治恶性葡萄胎、绒毛膜癌、食管癌、肺癌、胃癌、乳腺癌等；亦治肺热咳嗽，或燥咳痰稠、咳血；痈肿疮疡、热毒炽盛；消渴病以及中期妊娠引产。内服：10~15g，水煎服；或入丸、散。外用：研末，水或醋调敷。脾胃虚寒、大便滑泄者忌用。

【临床应用】

1. 治肿瘤手术或放、化疗后阴虚津伤 天花粉 15~20g, 鲜石斛 20g, 沙参 30g, 山豆根 15g, 黄芪 20g。加水煎汁, 每日 1 剂, 代茶饮服。《防癌抗癌中药》
2. 治肺癌 天花粉 20g, 金银花、鱼腥草各 30g。加水煎汁, 每日 1 剂, 分 2~3 次温服。《防癌抗癌中药》
3. 治胃癌、肝癌 天花粉 20g, 藤梨根 60g。加水煎汁, 每日 1 剂, 代茶饮服。《防癌抗癌中药》
4. 治肠癌 天花粉 15~20g, 猪苓 30g, 藤梨根 50~80g, 苍术 20~30g (出血加仙鹤草 30g, 白及 20~30g)。加水煎汁, 每日 1 剂, 分 2~3 次温服。《防癌抗癌中药》
5. 治宫颈癌、绒毛膜上皮癌 天花粉、紫草、红藤各 20g, 加水煎汁, 每日 1 剂, 分 2~3 次温服。《防癌抗癌中药》

【配伍经验】

本品配牡蛎、蜂房, 治乳腺癌; 配蚤休、石见穿, 治肺癌; 配生地黄、连翘, 协同放疗增效减毒。

【药理作用】

1. 抑制癌细胞生长 对实验性肝癌腹水型小鼠, 可减少腹水量, 延长存活期。对移植性肝癌实体瘤也有轻度抑制作用; (第二军医大学学报, 1980, 2) 天花粉蛋白对肺癌细胞株 (A₅₄₉)、大肠癌细胞株 (HT-29)、骨肉瘤细胞株 (HOS) 和人羊膜细胞株 (WISH) 的生长, 具有选择性抑制作用。(实用肿瘤杂志, 1991, 2)

天花粉蛋白对绒癌细胞有选择抑制作用, 但天花粉多糖对瘤体绒癌细胞增殖的直接抑制作用并不显著。(肿瘤, 1989, 3)

2. 诱导癌细胞凋亡 天花粉蛋白在体外能诱导 H₂₂ 肝癌细胞凋亡。(南通医学院学报, 2003, 4) 天花粉能抑制胃癌细胞 MKN-45 增殖和诱导细胞凋亡。(癌症, 2000, 12)

3. 免疫调节作用 天花粉蛋白同时具有免疫刺激和免疫

抑制两种作用。免疫刺激作用表现在天花粉对脾脏免疫细胞的形成和分化有促进作用；（福建中医药，1988，5）天花粉能明显增强艾氏腹水癌小鼠白细胞免疫吞噬能力；（肿瘤，1990，5）天花粉能明显提高小鼠 NK 细胞的杀伤活性。（贵州医药，2001，11）

仙鹤草

本品系蔷薇科多年生草本植物龙芽草的全草。味苦、涩，性平；归肺、肝、脾经。收敛止血，杀虫消肿。主治肺癌、胃癌、肠癌、肝癌、膀胱癌、白血病；癌症出血及各种出血；亦治肠炎痢疾、滴虫性疾病。10~60g，水煎服。外用适量。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 仙鹤草 30g，白及 15g，冬虫夏草 5g，雷公藤 10g。水煎服，日 1 剂。（《实用抗癌验方》）

2. 治食管癌 仙鹤草 30~50g，威灵仙、冬凌草、干地龙各 30g。每日 1 剂，加水煎汁，分 3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

3. 治肺癌 仙鹤草、蟾蜍、人参经提炼制成片剂，每片含复方药物 0.4g，每次 6 片，日 3 次，可连服数月至 1 年。（新中医，1986，4）

4. 治肝癌 仙鹤草 50g，败酱草 50g，人参 6g。每日 1 剂，加水煎汁，分 3 次服。（《防癌抗癌中药》）

5. 治胃癌 仙鹤草 30~50g，香茶菜、威灵仙、藤梨根各 30g。每日 1 剂，加水煎汁，分 3 次饮服。（《防癌抗癌中药》）

6. 治直肠癌 仙鹤草、败酱草各 50g。水煎每日分 3 次服。（《临床肿瘤学》）

7. 治宫颈癌 仙鹤草根芽 150g，水煎取浓汁，以棉缠紧如茧，浸药后，纳入阴道中，1 日 4 次。（《实用抗癌验方》）

8. 治膀胱癌 仙鹤草、土茯苓、白茅根、半枝莲、龙葵

各 30g。加水煎汁，每日 1 剂，代茶饮。（《防癌抗癌中药》）

9. 治黑色素瘤出血不止者 仙鹤草 30g，血余炭 30g，血见愁 20g，白及 15g，三七粉 6g。水煎，每日 1 剂，分 2 次服。（《中华肿瘤治疗大成》）

【配伍经验】

本品配生地黄、玄参、青黛，治白血病；配白及、蒲黄炭，治肺癌咯血；配三七粉、生大黄粉，治胃癌呕血；配槐角、地榆，治肠癌便血；配白茅根、小蓟、蒲黄炭，治膀胱癌尿血。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 仙鹤草对肝癌细胞株 HepG₂、肠腺癌细胞株 LS₁₈₀、SW₆₂₀ 及 Mgc₈₀₃、SPC-A-I 和 Hela 癌细胞及其裸鼠移植瘤、乳腺癌 MCF₇ 均有明显抑制作用。（中国药业，2004，6）

2. 免疫增强作用 仙鹤草水煎剂可增强荷瘤机体红细胞免疫黏附肿瘤细胞能力，提高血清中红细胞免疫促进因子活性和降低抑制作用因子活性。（云南中医学院学报，1998，4）对荷瘤小鼠白细胞介素-2 及自然杀伤细胞（NK）活性有显著增强作用。（中国中医药科技，1999，4）

沉香

本品系瑞香科常绿乔木植物沉香含有黑色树脂的木材。味辛、苦、性温；归脾、胃、肾经。行气止痛，降逆调中，温肾纳气。主治消化道肿瘤如肝癌、胃癌患者有气滞腹胀、大便秘结者，及胃寒呕吐、呃逆、虚喘者。2~3g，研末冲服，或原药磨汁服。注意本品辛温助热，阴虚火旺者慎用。

【临床应用】

1. 治贲门癌 沉香 50g，硼砂 80g，山慈菇 200g，田三七

20g, 冰片 30g。诸药共研极细末, 每日 10g, 分 4 次服, 10 天为一疗程。(浙江中医杂志, 1989, 6)

2. 治胃癌 沉香、紫苏、白豆蔻各 3g。共研为末, 每服 1.5~2.0g, 柿蒂汤送下。(《抗癌植物药及其验方》)

3. 治大肠癌便秘者 沉香磨汁(冲兑) 2.4g, 当归 9g, 枳壳 9g, 杏仁泥 9g, 肉苁蓉 9g, 紫菀 30g。后 5 味, 水煎, 每日 1 剂, 分 2 次和沉香汁兑服。(《中华肿瘤治疗大成》)

【配伍经验】

本品配枳壳、瓜蒌, 治胸腹肿瘤气滞胸闷腹胀; 配柿蒂、代赭石, 治贲门癌、胃癌呃逆连连。

【药理作用】

抗肿瘤作用 沉香对癌细胞增殖抑制率在 90% 以上。对人体子宫颈癌细胞培养株系 JTC-2b, 体外实验有抑制作用。(《抗癌中草药大辞典》)

泽漆

本品系大戟科越年生草本植物泽漆的全草。味辛、苦, 微寒; 归肺、小肠、大肠经。利水消肿, 消痰散结。主治淋巴肉瘤、肺癌、肝癌及癌性胸、腹水; 亦治水肿、肝硬化腹水、痢疾、结核。10~15g, 水煎服。本品苦寒有毒, 剂量过大则可致面色苍白、乏力、呕吐等。

【临床应用】

1. 治食管癌、肝癌 泽漆 100g, 壁虎 50 条, 干蟾皮 50g, 浸黄酒 1000ml 中, 每日搅动 2 次, 密封, 浸泡 5~7 天, 滤出药渣, 静置 2 天后, 每次 25~30ml, 饭前服, 日 3 次。(《抗癌中药药理与应用》)

2. 治贲门癌 泽漆 120g, 炒葶苈子 60g, 大黄 60g。上药各为细末, 混匀, 炼蜜为丸, 如梧桐子大小, 每服 2 丸, 每日

3 次。(《中华肿瘤治疗大成》)

3. 治乳腺癌 芙蓉叶、铁树叶各 30g，泽漆 15g。水煎服，日 1 剂。(《中华肿瘤治疗大成》)

4. 治恶性淋巴瘤 泽漆 50g，黄独 40g，天葵子、红木香各 25g，七叶一枝花 15g。水煎服，日 1 剂。(《抗癌中药药理与应用》)

【配伍经验】

本品配漏芦，治乳腺癌；配僵蚕、蜈蚣、全蝎，治脑瘤；配白花蛇舌草、蚤休，治肝癌；配山豆根，治贲门癌。

【药理作用】

抗肿瘤作用 泽漆对 S_{180} 、 S_{37} 、 L_{160} 有抑制作用。(《抗癌中草药大辞典》)

柴胡

本品系伞形科多年生草本植物（北柴胡）和狭叶柴胡（南柴胡）的根或全草。味苦、辛，性寒；归心包络、肝、三焦、胆经。疏肝理气，清热解郁。主治肝癌、胆癌、胃癌、肠癌、子宫颈癌；癌性发热；气虚下陷之脱肛、子宫脱垂等。6~10g，水煎服。注意本品性升发，故真阴亏损，肝阳上亢证患者忌用。

【临床应用】

1. 治甲状腺癌属肝经郁结者 柴胡 60g，海藻 60g，昆布 60g，小麦（醋煮、晒干）120g，龙胆草（酒拌、炒焦）60g。上药共为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服 20~30 丸，临卧白酒送下，噙化咽之尤好。(《中华肿瘤治疗大成》)

2. 治肝癌 柴胡 10g，菝葜 30g，丹参 24g，半枝莲 30g，甘草 6g。水煎服。(潘敏求经验方)

【配伍经验】

本品常配生石膏，治癌性高热；配牡丹皮、地骨皮、白

薇，治癌性低热；配**龙胆草**、**郁金**、**枳壳**，治肝癌胁痛；配**赤芍**、**茵陈**、**大黄**，治胆管癌发黄。

【药理作用】

1. 抗肿瘤作用 柴胡皂苷对小鼠艾氏腹水癌有抑制肿瘤生长作用，且能明显延长动物的生存时间。（国外医学·中医中药分册，1988，1）

2. 免疫增强作用 柴胡多糖能提高小鼠体液和细胞免疫功能，并使免疫抑制状态有一定程度的恢复。（中国药理学与毒理学杂志，1989，1）

菝葜

本品系百合科落叶灌木植物菝葜的根茎。味甘、酸，性平；归肝、肾经。解毒消肿，祛风利湿。主治食管癌、贲门癌、胃癌、肠癌、肝癌、胰腺癌、鼻咽癌、脑瘤；亦治风湿痹痛、跌打损伤、痢疾等。10～30g，水煎服。

【临床应用】

1. 治鼻咽癌 菝葜 30g，丹参 15g，天南星 9g。水煎服，每日 1 剂。（《中华肿瘤治疗大成》）

2. 治食管癌、胃癌、肠癌、肝癌 菝葜根干品 250～500g，以水 3～3.5kg，煎煮 3 小时，取药汁加肥肉 30～60g，再煮 1 小时，得药汁 500ml，于 1 小时内多次服用。（《老药新用途》）

3. 治肠癌 菝葜 60g，白花蛇舌草 60g，垂盆草 30g，土茯苓 30g。水煎服。（《肿瘤的辨证施治》）

4. 治绒毛膜上皮癌 菝葜根、白花蛇舌草、白英、十大功劳根各 30g，龙葵 90g，每日 1 剂，水煎分数次服。（《抗癌中草药大辞典》）

5. 治肾癌 菝葜 60g，槐豆 40g。水煎，每日 1 剂，分 2

次服。(《中华肿瘤治疗大成》)

6. 治皮肤癌 菝葜、半枝莲各 30g，蛇蛻、蝉蛻各 15g。菝葜加水先煎煮 2 小时再加入后药同煎，去渣取汤汁，分 3 次服，每日 1 剂，15 日为一疗程。(《本草从新》)

【配伍经验】

本品常与石见穿相配，治多种癌症。配臭牡丹，治肺癌；配丹参、胆南星，治鼻咽癌；配半枝莲、白花蛇舌草，治肝癌；配天龙、蜈蚣、蒲公英、瓦楞子，治胃癌；配瓜蒌、急性子、威灵仙，治食管癌；配莪术、五灵脂，治胰腺癌；配龙葵、野葡萄根，治肠癌。

【药理作用】

抗癌作用 对 S_{180} 、 S_{37} 、脑瘤₂₂ 有抑制作用。(《抗癌中草药大辞典》)

药名索引

一 画

一枝黄花 473

二 画

十大功劳 474

八月札 588

人参 568

了哥王 475

三 画

三七 520

土贝母 536

土茯苓 476

大黄 518

大蒜 477

山豆根 479

山楂 525

川芎 522

女贞子 570

马钱子 551

马蔺子 481

四 画

天花粉 589

天南星 538

天葵 482

木芙蓉 483

牛黄 484

丹参 527

水蛭 526

五 画

石上柏 488

龙胆草 491

龙葵 489

仙鹤草 591

白术 572

白花蛇舌草 486

白屈菜 552

白鲜皮 491

白僵蚕 539

冬虫夏草 573

冬凌草 492

半边莲 497

半枝莲 494

半夏 540

六 画

当归 575

全蝎 530

七 画

牡蛎 542

沉香 592

补骨脂 578

灵芝 576

八 画

青黛 498

苦参 500

昆布 543

肿节风 555

鱼腥草 502

泽漆 593

九 画

茵陈蒿 505

茯苓 579

枸杞子 580

砒石 556

鸦胆子 506

钩吻 558

香菇 582

急性子 559

穿山甲 533

蚤休 503

十 画

莪术 534

夏枯草 546

柴胡 594

拳参 508

海藻 544

十一 画

黄芩 509

黄芪 583

黄连 511

黄药子 548

菝葜 595

猪苓 584

十二 画

斑蝥 560

紫草 512

猴菇菌 585

十三画以上

墓头回 516

蒲公英 515

槐角 514

蜈蚣 562

蜂乳 586

薏苡仁 586

壁虎 553

藤黄 564

藤梨根 517

鳖甲 549

蟾酥 565

露蜂房 567

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "before_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTE3NjY1NDUuemlw",
    "filename_decoded": "11766545.zip",
    "filesize": 23033060,
    "md5": "2e67caa8a1472280a7e42da408dcb0fd",
    "header_md5": "e9bb7c77847ac6f6793264578f538cb4",
    "sha1": "8b51df8fd87e9819a17232d0ac941538251b3ab9",
    "sha256": "8a57a7fc40f5741aa584c108452608984883775bd6e4df020e8df7aeba494f58",
    "crc32": 4063072855,
    "zip_password": "wcpfxk&^TDwcpfxk",
    "uncompressed_size": 23427635,
    "pdg_dir_name": "",
    "pdg_main_pages_found": 599,
    "pdg_main_pages_max": 599,
    "total_pages": 614,
    "total_pixels": 11212800
  },
  "after_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTE3NjY1NDUuemlw",
    "filename_decoded": "11766545.zip",
    "filesize": 38667255,
    "md5": "26eb2610d91151f00583da1a7c28b173",
    "header_md5": "863c396a2810fab3f61905b9c09d972f",
    "sha1": "366725cb7fc22b9ebc62068e1141c4144c865739",
    "sha256": "636e91c9fb5eac4c23e5271aa8bd42bb0300f2f434f137c4043cbc5e76884be2",
    "crc32": 3979271169,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 39412608,
    "pdg_dir_name": "",
    "pdg_main_pages_found": 599,
    "pdg_main_pages_max": 599,
    "total_pages": 614,
    "total_pixels": 2297740992
  },
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```