

亲献中药外治偏单秘方

目 录

第 1 章

内科疾病外治方

痛风砂	——	卓守廷/1
三芯泥	——	王庆林/2
头痛酒	——	宋绪军/3
气管炎膏	——	王忠杰/5
清肺定喘散	——	杨福荣/6
肺内感染贴敷法	——	戴景春/7
风寒喘敷膏	——	郝进东/8
点穴法	——	郝进东/10
定喘膏	——	许 海/11
咳喘痰消膏	——	唐启盛/13
止咳平喘散	——	李善举/14
偏正头痛宁	——	张应兴/15
头风膏	——	赵韶光/16
头痛外敷方	——	王长武/17
冰麝散	——	李学广/18
芎辛芷痛散	——	李 华/19
纠咽膏	——	马纯礼/21
红星木方	——	阎 斌/22
复容膏	——	王祖伟/23

2 亲献中药外治偏单秘方

亲献中药外治偏单秘方		
芥茉外敷方	——	魏茂荣/25
竹管吸附方	——	曹广成/26
二术散	——	李文银/27
焦油口眼一次正	——	韩学忠/28
醒脑药帽	——	唐新华/29
脑囊虫外敷药贴	——	孙梦庚/30
治病酊	——	朱有存/32
朱倍散	——	张振波/34
眩心枕	——	张应兴/36
清脑降压防瘫防痴药枕	——	史文同/36
冰遂敷脐散	——	杜兆雄/38
药物灸	——	施发林/39
新白通汤	——	刘克勤/40
尿通散	——	陆雨竹/41
排毒泻浊液	——	朱崇义/42
活髓膏	——	马洪钧/43
鼻衄止血粉	——	米丰年/44
益寿降糖膏	——	刘文峰/45
温阳固涩行气膏	——	张云杰/47
中毒性肠麻痹中成药验方	——	洪天赦/48
通便排气露	——	王通泽/50
截痢散	——	赵家卫/51
补脾益肾神阙灸	——	孙光远/52
穴位药物敷贴法	——	胡发钰/54

亲献中药外治偏单秘方	
温肾止泻散	宋永贵/56
腹泻散	郑子新/57
肝病止痛散	邱兴明/58
蛋发饼	卢长润/59
消痞散	朱祥吉/60
麝香温脐散	陈现同/61
通腑软膏	侯 勇/62
外敷止痛灵	朱思纯/64
药浴方	额尔敦巴特尔/65
温膝膏	张素梅/66
淋浴消瘤汤	卢 明/67
鹤膝风外治方	马振远/68
止痛散	耿秀珍/69
止痛灵药水	张孔文/71
活络止痛散	李永成/71
风湿敷贴剂	白 碧/73
青囊散	伊智雄/74
麸醋热敷解痛方	宋会都/76
外用痹康灵	马春玲/77
二乌消痹膏	郭景周/78
姜樟灸	田中富/80
神农祛寒散	周国志/81
痹痛酊	殷海昌/82
抗痛灵托敷散	李献茂/83

亲献中药外治偏单秘方	
天麻针	宋永贵/84
川草乌灸	魏贤辉/86
麻沸膏	傅考芹/87
友益膏	孙为富/88
青州白丸子加减方	冀建宛/89
第2章	
儿科疾病外治方	
食盐外用方	利顺欣/91
雄矾糊	庞庆东/92
腮腺炎外敷方	沈永康/93
釜底抽薪散	熊正茂/94
仙人掌外敷方	米世进/95
子午效灵膏	李国柱/96
陈小粉膏	刘奇龄/98
防喘背心	余建社/99
止汗散	吕广秀/100
保肺贴	秦占甲/101
温脐消胀饼	林玉霖/103
消积化痞膏	樊成华/104
温肠散	龙 炜/105
丁萸散	赵娣桃/106
腹泻贴脐方	符贤才/107
大黄灌肠方	刘宝和/108

亲献中药外治偏单秘方

遗尿膏	阎洪才/111
三子散	吴国其/112
消水疝散	邹积群/113
利湿化瘀汤	武士建/114
雄杏散	林长泰/116
婴儿湿疹灵	石瑞刚/117
脐漏散	韩书林/118
脓疱灵	宋世良/119
松香青黛散	张延臣/120

第 3 章

妇科疾病外治方

七味散	程隆光/122
痛经散	潘玉华/123
暖宫散	杨宗孟/125
暖宫孕	张应兴/127
灯香敦	武士建/128
三炭宫血外用方	周 辉/128
大蒜溶液	毛瑞敏/130
清热燥湿汤	傅考芹/131
榆柏散	王金生/132
洁阴止痒液	刘文峰/133
地雄参洗剂	魏金荣/134
肤床阴而净	刘俊杰/135

亲献中药外治偏单秘方	
香椒粉	王淑华/136
药浴方	施发林/137
阴痒洗剂	马振远/138
地肤子汤	曾介绥/139
苦参百部汤	裴绍荣/140
回乳外贴方	徐光华/141
消肿散结液	钟秀美/142
第4章	
外科疾病外治方	
红白黄消散	郭林选/144
疔消	张应兴/145
泥鳅外敷方	蒋运祥/146
疖肿外敷方	黄祖明/147
痛疽疔疮外用方	王长春/148
垂盆草外敷法方	王楚才/149
蚤休涂剂	李时朴/150
肘臂显瘀艾灸法	李汉伟/151
搭背灵膏药	宋俊莲/153
香附膏	刘五龙/154
砒碌化腐散	辜甲林/155
消痛散	楼樟友/156
蜘蛛膏	赵光荣/157
自拟消肿药	郑丽丽/158

亲献中药外治偏单秘方	
自拟蛇药——	郑丽丽/159
枸杞膏——	蒋运祥/160
缘白丹毒散——	马振远/161
香辣丸——	曹尧武/162
芙蓉叶外敷方——	罗维娇/163
创伤散——	朱厚银/164
李俊子刀切药——	孙冠兰/165
血肿化瘀膏——	张远浔/166
三黄膏——	程宏超/167
硃砂单方——	黄开科/168
通便药条——	王启祥/169
大蒜芒硝糊剂——	詹德仁/171
稀签草外敷方——	林继禄/172
湿瘀散——	王兴周/174
双蚕散——	周耀明/176
归芍桃红乳没汤——	李 杰/177
定痛生肌散——	史敏儿/178
鞋底灰散——	李敬中/179
化腐生肌膏——	缪炳淙/180
白调药——	杨泰生/181
复方蛇总管液——	蓝世隆/183
治溃疡、窦道验方——	马舒茂/184
三辛栓——	谭德福/185
灵仙散——	汤振才/186

亲献中药外治偏单秘方	
乳痛速消散	周 萍/187
大蒜芒硝外敷方	韦昌岳/189
清热解毒膏	蔡正春/190
脓疮散	朱斯龙/192
大黄蜂蜜膏	吴继杭/193
血余炭黄柏液	刘恩竹/194
收鸡草外用方	廖之熊/195
烧伤油	李正国/196
地榆柏黄樟香散	于 龙/198
烧伤紫金膏	卫朝丰/199
烫伤灵	卢国珍/200
冰甲膏	孙 正/201
止烫散	李彭柱/202
白糖蚯蚓浸出液	符仁平/203
芦荟蚯蚓膏	金日男/204
地榆炭膏	樊长安/205
双白痔灵栓	塔 木/205
血栓痔验方	孔培申/207
复方苦参汤	李文银/207
三子二黄洗剂	叶祚栋/209
褥疮灵	李俊义/210
红辣椒治冻疮	马秋阁/211
当归四逆汤	杨林池/212
冻疮浸泡方	林信彦/213

亲献中药外治偏单秘方

第 5 章

骨伤科疾病外治方

颈痛灵膏	阎秀珍/216
十香散膏药	陈慈根/217
骨质增生膏	孙魁荣/219
抗骨增生热敷方	陈水成/220
腰痛外敷方	张中云/221
消刺液	贾振光/222
五虎温筋散	吴延义/223
樟脑膏	黎国发/224
骨质增生散	马用章/225
麝香二乌膏	王忠杰/226
芎灵煎	朱波刚/227
麝香复元方	王令喜/228
五鸡接骨膏	张鸿谋/230
接骨续筋膏	潘俊山/232
舒筋活络膏	卜 明/233
特效消肿接骨方	熊泽南/234
秘方接骨膏	赵春生/235
秘方独角莲膏	赵春生/236
祛瘀通络膏	赵春生/237
青黄散	种清治/238
药罐治痛方	王渊微/239

亲献中药外治偏单秘方		
通脉灵	——	马云龙/240
活血化瘀散	——	蔡和益/241
足痛熏洗方	——	王元英/243
肋软骨炎膏	——	金忠棋/244
通散酊	——	陈 健/245
舒筋活血镇痛散	——	许仁建/246
通滞散	——	朱大羲/247
消瘤方	——	肖厚杰/248
软组织损伤方	——	韩永辰/249
威川舒筋止痛方	——	陈莉秋/249
消瘀液	——	程 玲/251
消痛灵	——	安性仁/253
透骨草擦剂	——	常 庚/254
瘀痛散	——	余林涛/255
祖传秘方刀口药	——	李敬中/257
透骨红花三乌汤	——	黄松泉/257
创伤外用散	——	张殿明/258
损伤止痛散	——	廖洪平/259
大黄饼	——	徐建生/261
四香散	——	鲁继华/262
祛伤止痛散	——	庞肿常/263
活血散	——	苗丽华/264
活血舒筋散	——	徐正权/265
消肿膏	——	常立斌/266

亲献中药外治偏单秘方

将军跌打散——卜迎利/267

第 6 章

皮肤科疾病外治方

四黄青黛散——李 杰/269

子黄散——黄东胜/270

铁衣固疤散——宫本全/271

杏仁油——朱永海/272

带状疱疹秘方——国连彦/274

复方石花油——谭续绵/275

四份散合剂——苑桂英/276

地龙糖膏——金振祥/277

康皮十妙液——陈全寿/278

青柿浆——黄桂兴/279

疱疹灵液——邹凤阁/280

外治带状疱疹方——江顺先/282

青黛雄黄散——于霖沐/282

苦矾洗涤剂——王中立/283

扫银洗浴剂——刘文江/284

胎盘擦癣方——李树丛/286

消癣灵软膏——吉照春/287

皮癣灵——孙治安/288

顽癣秘方——万福利/289

消癣灵——刘国军/290

亲献中药外治偏单秘方		
外治牛皮癣秘方	——	蒋绍模/292
芦花酒	——	高田仓/292
除湿止痒药粉	——	卫朝丰/294
三白生肌散	——	卫朝丰/295
清湿杀虫方	——	黄书球/295
疥疮六味灵	——	兰才生/296
疥灵霜	——	马秋阁/297
鹅掌风验方	——	熊昌亮/298
湿疹散	——	符贤才/299
皮炎酊	——	常立昌/300
香黄膏	——	董文涛/300
艾叶洗剂	——	孙桂荣/302
神效湿毒灵	——	宋魁三/303
湿疹洗方	——	张珠凤/305
颖风无疾膏	——	卢 明/307
湿疹外敷方	——	杨明生/308
湿疹外洗煎剂	——	连业顺/309
肤敏灵	——	李 甫/310
青黄金胆液	——	宋小华/311
青连散	——	马 海/312
黄水疮软膏	——	姜延德/313
苦菜汤	——	梁志清/314
三黄酊	——	乔丽华/316
脱屑洗剂	——	刘玉梅/316

亲献中药外治偏单秘方	
肤康合掌散	杨新营/317
手足癣效灵洗剂	华占海/319
玉屏风散合参苓白术散	魏仙富/320
清白散	石纯信/322
苦参洗方	岑维璠/323
草乌八味散	贺巴依尔/324
脱敏洗药	孙 业/325
癣熏灵	潘书林/326
按叶白矾洗剂	符贤才/327
水银大风子丸	王守志/328
化癥止痒方	宋洪翼/329
金黄散	孙 正/331
速止痒	王树德/332
复方香木水洗剂	蒋成章/333
消疣液	谷玉琴/334
克疣灵	张慧君/335
祛癥灵	姚永利/336
疮见愁油	姚永利/337
粉刺灵	杨占山/337
痤疮灵洗剂	林玉霖/338
洁尔脸搽剂	文峥嵘/340
朱冰散	和成斌/341
硝银散	王立群/343
三黄二妙散	王立群/344

亲献中药外治偏单秘方

- 头虱酊——叶以健/345
- 生发酊——孙集庚/347
- 鸡眼平——罗永山/348
- 白芨膏——王同正/349
- 三子止痒熏洗方——刘彦/350

第7章

五官科疾病外治方

- 虎耳草滴耳液——张祖芬/352
- 吹耳散——孙振清/353
- 脓耳散——李贵海/354
- 百灵丹——史天阳/355
- 白月消息散——张应兴/356
- 麝梅散——曾庆林/357
- 鼻渊通——刘玉春/358
- 止血大蒜泥——易忠禄/359
- 象皮膜——徐国榕/361
- 辛麻熏鼻液——阎斌/362
- 木附青矾散——李学声/363
- 珍珠桃花散——徐昭英/365
- 倍连梅含漱液——李新妹/366
- 细辛敷脐方——彭平建/368
- 香冰茶——袁富森/370
- 乌泡子勒牙虫剂——胡圣才/371

亲献中药外治偏单秘方

巴荷牙痛宁	金振祥/372
火贴治痛法	张汉光/374
薄菊公英汤	安同明/376
人乳方	李素文/377
万应光明丹	张 明/378
消炎滴眼液	徐宗云/380
急结熏洗汤	张应兴/380
祛赤一点灵	张应兴/381
电眼消	张应兴/382

第 8 章

男科疾病外治方

温会熏洗方	刘显廷/383
三虎蒲鱼洗剂	田绍侠/384
阳起灵	徐存志/385
揉脐壮阳法	王克非/386
隔橘皮灸	袁少英/388
六神丸外用方	袁少英/389

第一章 内科疾病外治方

痛 风 砂

献方人小传 卓守廷，男，58岁，福建省寿宁县人。福建省寿宁县中医研究所负责人，中医师，中华全国中医学会会员，寿宁县农村卫生协会理事、副主任。本人自幼学医，从事中医工作40多年，痛风砂系祖传秘方，历经五代，历史悠久，治病范围较广，使用方便，通过热敷增进血液循环和抗病能力（通讯地址：福建寿宁县城关南门新村44号，邮编：355500）。

【方药组成】川芎 500g 羌活 240g 防风 240g 当归 180g 白芷 180g 川乌 60g 生姜 240g 细辛 60g 僵蚕 60g 麝香 10g 透骨草（鲜）2500g 净铁砂 50公斤 米醋 2500g

【制用方法】①搜集碎铁末，过2号筛，除去粗粒，用强风吹去细铁末及杂质，余下净铁末。②将川芎等12味中草药全部粉碎，过60目筛混匀待用。③煅淬过程，取净铁末10公斤，倒入铁锅内，武火加热，煅到铁砂被烧红（拨去表层即可看见）时，淬以（撒倒）米醋500g，即速加盖，待其吸收数分钟后，取出冷却（50公斤铁末分5锅煅淬）。冷却后拌入药末，搅拌均匀，包装即可，每包250g。先将粉剂放碗中，用浓米醋2匙（约20ml）拌匀，置手帕上扎成包，放棉被中约10~20分钟，药性发出热度时乘热敷患处，如热量大，可垫布隔热或移动，待热力消失取去。每包可

连续使用 4~5 次。伤风感冒，鼻塞声重敷肺俞；腰痛敷肾、腰俞；腹痛敷中脘；胃痛敷胃俞；关节炎、腿部风湿、膝软足酸敷阿是穴。

【适应病症】伤风感冒，腰痛，腹痛，胃痛，关节炎，腿痛。

【方 解】痛风砂的主要作用在于它的热力，煨后淬醋酸，使铁末的一部分变成氧化铁，用时再和醋酸起作用，就能生出热来。通过散发出来热力使中药成份起作用，能疏络通经，达到治病之目的。

【疗 效】治疗伤风感冒 675 例，有效率达 88%，治愈率达 78%，好转率 10%。无效率 12%；治手背部疼痛、麻木，甚至严重者失去痛觉多年患者 364 例，治愈率达 92%，无效率 8%。

【典型病例】刘××，男，78 岁。自诉上背部疼痛、麻木，失去知觉 2 年多，不能弯腰转侧，甚为痛苦，遂用上药 5 包，3 天后恢复知觉，连续使用 15 天诸症消失而告痊愈，至今未见复发。

三 芯 泥

献方人小传 王庆林，男，45 岁，山东栖霞金山乡人。现为山东烟台毓璜顶医院主治中医师（通讯地址：山东省烟台芝罘区毓璜顶东路 20 号，邮编：264000）。17 岁从师学习中医，3 年期满后，回原籍任赤脚医生。1979 年经考核被录用于毓璜顶医院从事中医推拿专业。撰写了数十篇学术论文，是《齐鲁推拿医术》主要编者之一，参加了中国医药暨传统手法专家亚运会义诊团的工作，简介已被《知名中青年医药师名录》、《杏林群芳谱》和《中国骨伤人材》等书收录。

【方药组成】香椿树芯 7 个 桃树芯 7 个 艾芯 7 个 胡椒 7

个 供香 7 节（每节约 1 寸） 葱根 3 个（根须连白约 1 寸）
姜 3 片 蜂蜡不拘多少 人参不拘多少

【制用方法】上药共捣为泥状，用黄裱纸或丝绢包好，留一个小孔，放鼻孔处（男左女右）对着鼻孔熏，汗出即可。

【功效】祛风寒，解表邪，行气解郁，助运化。

【适应病症】气郁复感风寒之症及一般风寒感冒。

【方解】因感受风寒之邪，故用香椿芯、桃树芯、葱根、生姜疗伤寒时气，解表通阳。寒气伤人，必由经络累及脏腑。选用艾芯、胡椒、生姜、蜂蜡温中散寒开胃，蜂蜡又能解郁除烦满；胡椒、生姜、香椿芯芳香行气，气行郁解。邪之所凑，其气必虚，故佐以人参健脾助运化。诸药共奏解表行气解郁助运化之功。

【临床应用】因生气志虑不伸而抑郁，复感风寒，闭遏阳气。证见发热惧寒，身痛身重，精神萎靡，心中烦闷嘈杂，不思饮食，脉沉迟等。老百姓称之为“夹气伤寒”。肺主气，鼻为肺窍。用药泥熏鼻发汗可直达病所，使病邪速解。发汗不可太过，微汗为宜。用上方一般一贴可愈，重者可隔一天再用一贴。

头 痛 酒

献方人小传 宋绪军，男，55 岁，黑龙江省青冈县人。现为黑龙江省青冈县中医院院长，副主任中医师（通讯地址：黑龙江省青冈县中医院，邮编：151600）。16 岁侍学从师，5 年后应诊，先后结业于黑龙江中医学院第一期中医师提高班，中国中医研究院研究生部代培研究生班。曾任县卫生局科员、绥化地区卫生学校青冈分校教务主任、县中医院院长兼任青冈县、绥化地区中医学会副理事长等职。1989 年被县选为拔尖人才。临证之际主张针药并用，内外合治，对疑难重证，能参古医理，穷源意流，深思

巧构，准确辨证，治法因机，屡起沉疴。发表省级论文 10 余篇，出版《伤寒论临床应用》、《金匱要略临床研究》两部著作。

【方药组成】红矾 10g 红干辣椒 7 个 白酒 500ml

【制用方法】红矾研细，椒碎同放酒内，慢火煎熬 10 分钟左右，白酒变粉红色时，用镊子夹棉花球蘸酒擦患者头顶部和两太阳穴。洗时可令患者头向后仰，用干净纱布把眼睛盖上以免药汁流入眼内。每次洗 7 分钟左右，一般每隔 7~8 分钟洗 1 次，每次洗 2~3 次，可持续 1 小时左右。病重者每隔 5~6 分钟洗 1 次，每日洗 4~5 次，以鼻尖汗出为有效。

【功效】温通经络，解毒止痛。

【适应病症】结核性、化脓性脑膜炎。

【方解】本方所治之病乃因温疫热毒之邪侵入脑府，留恋日久，正气受损，真阴消烁，引起虚风内动之候。治疗当以疏通经络，逐毒止痛，因其痛势颇烈，呕剧胃不受药，故另觅蹊径，选药外洗。病在脑府，投药途径以头顶、两太阳穴外洗为佳。方选辛酸剧毒之品，藉砒石化蚀肉、解热毒之力，渗入脑府逐毒排秽，劫痰热，佐以辣椒辛热之物，取其温中散寒、祛风发汗之功，冀其邪从皮肤而散，不致邪侵脑府为害无穷，更使甘辛酒液之慄悍之性以助药力，通血脉，达腠理，既迅速助药势达病所，又能聚药力共获逐邪之功。

【临床应用】本方所治头疼多因热疫病毒或情志怫郁，郁而化火，或脾胃受损，肝木乘土，虚风内起，上冲于脑所致。症见头痛如裂或闷痛、或刺痛、或胀痛、呕吐频繁、颈项强直、四肢抽搐、常伴有身热神昏、心烦闷躁、甚则瞳仁散大、苔黄腻、脉弦数。若不及时抢救，常致“阳盛阴涸”虚脱而逝。急用“头痛酒”外洗。若 2 小时后，头痛缓解，吐、热暂平，烦躁得缓，鼻尖微似汗，则为生机已得，转危为安。

【注意事项】使用该方 2 次后效果不彰，急采取其它相应治疗

措施。若纯属阴伤已极、久病太虚之体质，舌质红绛或无苔，脉细数者不宜用本方。在使用本方期间忌用小米饭 5 天，并严防药液沾唇入口。

气管炎膏

献方人小传 王忠杰，男，汉，现年 46 岁，毕业于四川医学院。现任甘肃庆阳地区净石沟煤矿职工医院（邮编：744201）主治医师。临床工作 28 年，擅长专治各类风湿性关节炎、骨质增生及坐骨神经痛。曾先后撰写了“中西医结合治疗风湿性关节炎”、“临终的护理”、“吸烟影响男子性功能”、“理沙疗法临床理论研究”、“县医院与初级卫生保健适宜形式的探讨”等论文，在杂志或全国学术会上发表。

【方药组成】白胡椒 50g 川椒 50g 生姜 50g 冬虫夏草 30g 蛤蚧 30g 蜂蜜 300g 核桃仁 100g 麻油 20g

【制用方法】将白胡椒、川椒、生姜、冬虫草、蛤蚧研细，过 120 目筛备用。核桃仁碾细末，麻油倒入铁锅内加热，再倒入蜂蜜加热，随后加上备好的其它药粉，搅均匀出锅，盛在容器中。用时涂在风湿膏或胶布上，贴两肺俞、两涌泉及天突、廉泉、定喘等穴。每 24 小时换药 1 次，7 次为 1 疗程。

【功效】宣肺平喘，止咳祛痰，润肺补肾。

【适应病症】主治支气管炎，支气管哮喘，新久咳嗽及呼吸困难。

【方解】全方功效为温中祛寒，以消除痰涎起到止咳、定喘的作用。

【注意事项】本膏无毒无副作用。个别对胶布有过敏者，在局部涂些肤轻松软膏，继续贴用。

【疗效】经 20 余年的临床使用，总有效率为 97.2%，治愈率为 64.3%。

清肺定喘散

献方人小传 杨福荣，男，44 岁，河北省兴隆县人。现为河北省兴隆县煤矿卫生所（邮编 067200）所长，中医师。成都中医学院刊授大学结业，北京振兴中医学院毕业，大专学历。从医近 30 年，用中医药治疗中医内、妇、外、儿、皮肤、骨伤等各科疑难杂症。发表论文 4 篇，其中“痹证的辨证治疗”和“镇惊定痫汤治疗外伤性癫痫症”两篇学术论文获全国疑难杂症诊治学术研讨会论文证书。“清肺定喘散冬病夏治穴位贴敷治疗慢性支气管炎”获全国第二届专科专病学术研讨会论文证书。其业绩已载入《中国当代名人志》、《疑难杂证求医指南》和《顽固杂病证治秘要》3 部书中。现为华夏中医研究者联合会会员，《医学理论与实践》杂志社通讯员。

【方药组成】白芥子 20g 元胡 20g 麻黄 20g 半夏 20g 莱菔子 10g 甘遂 10g 细辛 10g 五味子 10g

【制用方法】将上药共研极细粉，装瓶备用，上药为 1 人 3 次用药量，利用夏季伏天即头伏、二伏、三伏的第一天，用鲜姜汁调为糊状，摊在 6×6cm 橡胶布上行穴位贴敷。其贴敷穴位是：天突、膻中、肺俞、膈俞、大椎、定喘穴。每次贴 6~10 小时。若烧灼疼痛厉害可提前取下。连贴 3 年。

【功效】益气养肺，驱寒温阳，涤痰逐饮，降气化痰。

【适应病症】慢性支气管炎，哮喘，肺气肿。

【方解】“冬病夏治”、“内病外治”是中医药学一大特色，也是不治已病治未病的理论与实践相结合之结晶。通过用中药行

穴位贴敷，刺激相应穴位，益气养肺，驱寒温阳，涤痰逐饮，降气化痰，疏通经络，协调脏腑功能来调整阴阳之平衡以改善和增强机体的抗病和免疫能力，从而达到降低冬季发病率和缓解临床症状的目的。

【临床应用】通过 2 年对 60 例患者的跟踪观察，临床症状明显缓解，有效率达 90% 以上，该治疗方法是治疗慢性支气管炎一理想有效治疗方法。

【注意事项】用药期间，禁忌辛辣食物。外用药严禁内服。

肺内感染贴敷法

献方人小传 戴景春，1933 年 5 月生，吉林扶余人。1960 年毕业于大连医学院医疗系。于白城卫校从教，西学中班学习 1 年，调任白城市中医院（邮编 137000）任内科主任、内科副主任医师、长春中医学院兼职副教授。从事西医、中医、中西医结合临床、教学工作已 35 年，对治疗中风、肾病、肝胆病，肺心病，风湿病等颇有治疗经验，多采用活血化瘀治则，往往收到满意效果。曾在《实用中西医结合杂志》、《中国中医急症》、《神奇非药物疗法》、《第十四届国际自然医学学术会论文集》等书刊中发表论文 26 篇。

【方药组成】 梔子、苏子、杏仁等量 冰片 2~5g

【制用方法】将梔子、苏子、杏仁一起捣碎再加入研成粉的冰片混合后再加入红皮鸡蛋（去蛋黄）3~5 个外敷于实变体征明显有湿罗音或 X 线征象病变部位的相应表面的前后部位，敷至药液干燥为止，每日 2 次，直至痊愈。

【功效】降气消痰，化痈祛疡。

【适应病症】支气管肺炎，大叶性肺炎，支气管扩张合并感染，肺脓疡、脓胸。

【方 解】 栀子清热解郁，治热毒痈肿。苏子止咳平喘，降气消痰，治气壅痰滞，使肺气通顺。杏仁止咳平喘，诸药皆入肺经，藉冰片渗透之力，深入肺，旋运气机，润肺宣气，止咳平喘，降气消痰，清解毒热。

【临床应用】 肺内感染各病，多因肺失肃降而肺气不宣，脾运失调，水湿内停，肾虚不能纳气，血脉瘀阻而毒邪侵袭。症见咳嗽，痰多，气喘发热，肺实变，肺湿罗音长时间存留，X线炎性征象。贴敷3次大部分可见明显效果，否则需临床仔细检查和鉴别诊断是否诊断有误。

【注意事项】 治疗同时宜采取其它相应治疗措施，缩短疗程，取得满意效果。

【疗 效】 治疗支气管肺炎10例，肺内湿罗音较长时间不消失的儿童患者经3~10次全部治愈。支气管扩张合并感染2例经贴敷全部治愈。肺脓疡1例治愈，脓胸1例治愈。

【典型病例】 聂××，女，55岁，咳喘，咳黄色脓痰，痰量多，发热已半月。查体：T38.5℃，P110次/分，R30次/分，BP18/12KPa。神清，端坐呼吸，右肺底明显湿罗音，实验室检查：血常规：Hb120g/L，RBC4.13×10¹²/L，WBC12.5×10⁹/L，入院X线诊断右下肺支气管扩张合并感染，入院12日未愈，采用贴敷法2日后病情明显好转，1周后咳嗽、咳痰、气喘及肺湿罗音、发热各症均消失而出院。

风寒喘敷膏

献方人小传 郝进东，女，42岁，河北省安新县人。现为天津市第二医院内科中西医结合主治医师，并聘为天津市钟山医院专家咨询门诊副主任医师。（通讯地址为天津市第二医院，邮编

300141)。1969年下乡于内蒙武川县成为走乡串户的赤脚医生，广采民间良方，悬壶济世3年余。1972年入天津医学院对中西医理论进行了系统的学习。1986年师从著名中医儿科专家何世英4载有余。

【方药组成】方①：生大黄 2g 苍术 1.5g 芥末面 2g 桃杏仁各 2g 藏红花 3g 方②：白胡椒面 3g

【制用方法】将方①上药共研末（100目筛为佳），黄粉米（或秫米及迷子）30g，小火煨粘了，将药末倒入，调成糊状，以不流动为度，制成一分硬币厚，直径约5~6cm大的药饼，贴敷脐部（敷药前须先将脐部皮肤皱襞处垢物洗净），遂用绷带缠上；同时，将方②加酒调成糊状，制成五分硬币的厚度及大小，敷于脚心处须先用热水烫足，搓去角化上皮）。男取左侧脚心，女取右侧脚心。上述2方各贴敷6小时，一般为睡前敷药，次日晨起取下。如局部反应强烈，亦可敷1~2小时取下，1~2日进行1次，7次为1疗程。

【功效】温肺化痰定喘。

【适应病症】咳嗽气促，喉间有哮鸣声，咳痰清稀薄白，呈粉末状，形寒无汗，面色晦滞带青，四肢不温，口中不渴，或渴喜热饮，舌苔薄白或白腻，脉象浮滑或浮紧。

【方解】本方所治之风寒哮喘病儿，素体肺脾肾之气不足，且脾气虚弱，运化失司，易积湿蒸痰，上贮于肺，加之脾虚食滞，寒温失调，小儿又以感冒受寒为最多，寒痰阻隔，日久食积乳滞，挟痰伏于肠中。方中桃仁攻破血结，大量泄热化痰，苍术燥湿健脾，白芥子畅膈除痰，红花活血化痰，杏仁化痰平喘，诸药研末，炼膏取神阙穴是乃肺脾之阴经，皆与腹部冲任二经相连，任脉总督一身之阴，与肺脾肾三阴相关。肺主气，司开合；脾主运化痰湿，肾主纳气。方②白胡椒，辛解散寒，病久三阴阴寒内盛，足心乃脾肝肾三阴之居。

上述二方外敷，现代医学证明其中绝大部分药物有刺激穴位疏通经络，调节肺脾肾三脏器的功能，使局部温度增高，毛细血管扩张后，中药离子通过神阙穴及足心这两处的皮肤，穿过毛孔，不断地进入淋巴液、血液和肺脏。故推理，通过细胞免疫和体液免疫，稳定肥大细胞、嗜碱性粒细胞的颗粒，抑制 5-羟色胺与组织胺的释放，从而缓解毛细血管痉挛，恢复肺脏正常“宣发”与“肃降”功能。

【临床应用】药用后肠鸣音活跃，轻度腹泻，6 小时后始见脐部、足部皮肤发青，若见此反应为正常反应，发热者烧可退。

【注意事项】敷贴药物的部位（脐、足心），应注意保暖。如急用，可以蛋清调药。

点 穴 法

献方人小传 郝进东，同上。

【穴 位】镇静定喘穴

【穴位位置】双侧小拇指与无名指之间（俗称“手指缝”，手背部与手掌部赤白肉际之中点）。

【功 效】镇静降气定喘止痛。

【按摩方法】术者首先将自身大拇指指甲剪短，且稍短于甲床肉际处，并将甲床缘锉圆滑。施术时，术者运足气，定神，使用道劲柔韧之力按摩穴位，使患者感受到自手至肩部均有酸胀感，部分患者有热浪冲击感，有的可达咽喉及面颊部，甚或颈枕部。

【适应病症】哮喘发作，或喘息性支气管炎，慢性支气管炎，心绞痛。

【穴位释义】该穴位为非传统经络之穴位，但其紧靠近手少阴心经的走行部位，距离约 3mm，；其感传循行路线也几乎与手少阴

心经位置雷同。《灵枢·经脉》“心手少阴之脉，起于心中，出属心系。其直者络小肠。其支者：从心系，上挟咽，系目系。其直者：复从心系却上肺，下出腋下，下循臑内后廉，行太阴之后，下肘内，……，入掌内后廉，循小指之内，出其端”。《足臂十一脉灸经》与《阴阳十一脉灸经》所载手少阴心经的循行方向，均以上肢远端起始，向胸部走行。《灵枢·经脉》则谓手少阴心经始起于胸部，沿上肢屈侧尺侧缘向手小指走行，……。它的支脉：从心脏的系带部向上挟咽喉，而与眼球内连于脑的系带相连系。它的直行脉，从心与它脏相联系的系带上行至肺，……。由此可看出，心经的直行脉及其支脉均说明心经与肺息息相关，另外心经的支脉上也与脑的系带相连系。1976年国内祝氏等首次发现人类存在隐性循经感传线示人体体表普遍的人群95%以上存在14条和古典经脉线相吻合的、连续而均一的、能够重复而确切定位的、高度敏感的线，其宽度为1~3mm，其位置稳定不变，这提示笔者该穴位所在位置即属于手少阴心经循行所过之处。数十年来体会该穴位确有一定的镇静、定喘、止痛之功效，进而体会到“心为五脏六腑之大主，心动，则五脏六腑皆摇也”。

【临床应用】 支气管哮喘，喘息性支气管炎，慢性支气管炎，喉炎，心绞痛及一切憋气者。

【注意事项】 如按说明施用此按摩术5分钟后，无明显经络感应现象，如酸麻胀，且仅有轻微感觉而不上传者，哮喘持续状态者，急宜采取相应治疗措施。

定 喘 膏

献方人小传 许海，男，44岁，广东省韶关市人。现为广东省韶关发电厂职工医院主治中医师、院长助理（通讯地址为广东

省曲江县乌石镇韶关发电厂职工医院，邮编 512132)。1982 年毕业于广州中医学院医疗系。致力于中医内科及内病外治等临床工作，发表市级以上学术论文数篇。

【方药组成】桂皮、细辛、苏子各 10g 白芥子 15g 麝香 2g

【制用方法】上药共研为细末，用生姜汁调匀成糊状，分置于 7 块约 $6 \times 4\text{cm}^2$ 的伤湿止痛膏中央，贴于肺俞（双）、心俞（双）、膈俞（双）、及膻中穴，敷药前先用艾火灸上述穴位至皮肤微红。每年夏天的三伏天各贴 1 次，每次 3~5 小时，最好连续贴 3 年。

【功效】温阳散寒，化痰定喘。

【适应病症】虚寒性咳喘证。

【方解】本方所治之证乃由肺肾虚寒，气机升降失常，搏触内伏之痰，痰气交阻而发病。方选诸药均为辛温散寒之品，苏子、细辛、白芥子、生姜汁温肺化痰，桂皮温中补阳，麝香走窜内透。诸药敷贴于属足太阳经而近肺脏的肺俞、心俞、膈俞以及气之会穴膻中，可起到温阳散寒、顺调气机、化痰平喘的作用。

【临床应用】本方适用于虚寒咳喘，日久不愈，症见咳喘、气促，痰多色白，形寒肢冷，动则喘甚，气怯声低，舌淡苔白滑，脉细等。本方用伤湿膏敷贴，可增强散寒祛风之力，且有使用方便、粘着力强等优点。敷药前先用艾火灸穴位，可疏通经络，使药力直达病所。

【注意事项】本方孕妇忌用，实热咳喘不宜。第一次敷贴后可见皮肤灼痛、起水泡等，轻者不需处理，较重者可用消炎软膏涂敷。第二次以后皮肤反应较轻，可适当延长敷贴时间。另外，急性发作期用此法不一定即刻能止喘，需配合其他疗法处理。

【疗效】1983 年以来共治疗 23 例，病程均在 5 年以上，全部有效。连续敷贴 3 年者 12 例，显效（一年以上无复发或基本缓解）10 例；连续敷贴 2 年者 7 例，显效 4 例；敷贴 1 年者 4 例，显效 1 例。

【典型病例】李某，男，25岁。患支气管哮喘18年，多于受寒而发病。症见咳喘气急，痰多色白，不能平卧，动则喘甚，唇紫，舌淡苔白滑，证属虚寒哮喘。每年发病10余次，每次需静脉注射氨茶碱、地塞米松等才能缓解。用上法敷贴2年，至今3年未再发病。

咳喘痰消膏

献方人小传 唐启盛，男，38岁，山东省黄县人。现为黑龙江中医学院附属医院呼吸病房主治医师，正在攻读医学博士学位（通讯地址为哈尔滨市动力区和平路14号，邮编150040）。1977年考入黑龙江中医学院中医系学习，5年后毕业获学士学位，1987年在同校获硕士学位。主攻方向为呼吸系统疾病，长于用中西医结合理论，内治、外治法专治咳嗽、喘证、肺胀等疾病。在国际国家级等杂志发表论文10多篇，获省级科技成果奖2次。

【方药组成】白芥子 20g 炙麻黄 15g 细辛 15g 甘遂 15g 生半夏 15g 南星 15g 生元胡 15g 罂粟壳 15g 冰片少许

【制用方法】上药共为细末，用时加鲜姜汁调成糊状，将药膏5g左右放在医用胶布上固定在穴位上，24~48小时后取下，每隔5~10天贴1次，共5次左右即可。

【功效】止咳、祛痰、平喘。

【适应病症】慢性支气管炎，肺气肿，慢性肺心病，支气管扩张，支气管哮喘。

【方解】肺居胸中，司呼吸，主一身之气，外合皮毛。不论外感或内伤均可引起肺失宣发与肃降，或咳或喘或痰液贮留。本方选用的药物具有渗透力强、吸收快特点，通过局部药物渗透而发挥止咳祛痰平喘的作用。用穴选手太阴肺经中府，能宣通肺气；

天突、定喘穴为降气平喘之效穴，属近部取穴法；肺俞为肺之背俞之穴；气会膻中故取之；大椎、督俞而近肺脏有宣肺祛痰之效。通过上述俞募穴位的配伍，可调节肺、脾、肾的功能，有近期和远期疗效。

【临床应用】将药膏贴敷于下述穴位：天突、定喘、中府、肺俞、膻中、大椎、督俞。

【注意事项】①孕妇禁用。②敷药后如有发痒，发泡者应停用。

止咳平喘散

献方人小传 李善举，男，47岁，河南新安县仓头乡人。现为洛阳市第二中医院（邮编471003）中医主治医师、科主任。中华全国中西医结合学会会员，中国气功科学委员会气功师。从医25年，专长内伤杂病，善用吐泻导痰散，治疗各类顽固性癫痫疗效显著，堪称一绝，1992年被评为中西医结合学会优秀论文。近10余年又开展对中老年美容保健的研究，在挖掘古代宫廷秘方的基础上，结合现代科学实验又发明了长寿美容酒，服后能使人脸面皱纹减少，白发转黑，现已被国家专利局受理。

【方药组成】江米7粒 白胡椒7粒 梔子、桃仁、杏仁各0.7g

【制用方法】上药在砂锅片上焙干，捣碎，用鸡蛋清搅拌后敷脚心涌泉穴，男左、女右，外用纱布包扎。一次敷药2天，连敷3次，6天效极佳。

【功效】止咳平喘。

【适应病症】慢性气管炎咳嗽、喘息。

【方解】咳嗽、喘息一症，概括说来，皆为气机升降失其常度所致。一般可分为虚实两类，实证多由外感风寒痰浊所引起。

慢性气管炎，久病多虚，其本在于肺肾，为肺不降气，肾不纳气，精气内虚而形成，治以补肾纳气，止咳平喘，而涌泉穴为足少阴肾经井穴，敷以温中散寒的胡椒；佐以泻火除烦、凉血解毒归属肺、胃、三焦经的苦寒栀子；加之活血化瘀、止咳平喘的桃仁、杏仁，相辅相成，共奏止咳平喘之功效也。

【临床应用】本方主要应用于中老年气管炎，胸闷、咳嗽、气喘之虚症。证见咳吐白色粘痰，遇寒病情加重。咳吐痰色变黄也可酌加一些抗生素。若外感风寒引起的咳嗽、气喘应当别论。

【注意事项】本方外用药性平和，无任何副作用，亦可作为气管炎内外兼治的辅助疗法。

【典型病例】肖某，男，64岁，洛阳市郊区干部。患气管炎咳嗽、气喘，吐白色粘痰10余年，害怕见凉气，每遇秋冬季加重。胸片示：①慢性支气管炎。②轻度肺气肿。常服氨茶碱、喘息定、抗生素疗效不佳，经用上方外敷6次，诸症痊愈，至今随访2年病未复发。

偏正头痛宁

献方人小传 张应兴，男，40岁，山西应县人。现为应县东南角卫生所所长，主治中医师（通讯地址为山西省应县城内东街64号，邮编037600）。自1969年开始一直在东南角卫生所任职，同时兼任中华乡村医生进修学院校友会会员，中国农村卫生协会会员，光明函授大临床观察医师等职。曾于1984~1989年自修学习，获中药、西医、中医等4个毕业证书。1990年获《中医函授通讯》举办的全国中医知识竞赛荣誉证书。1993年由山西省卫生厅主持，聘为《中华效方汇海》之编委。通过自己的努力，不仅吸取了医学理论之精髓得以广泛运用，而且对临床各科多发、常见、

疑难疾病有独到见解。

【方药组成】蓖麻 2g 乳香 2g 麝香 0.2g

【制用方法】将 3 味药捣成饼，贴太阳穴。

【功效】祛风通络，活血止痛。

【适应病症】偏正头痛。

【方解】本方用于内伤病久之气血郁结的头痛。由于久痛入络，如锥如刺，经久不愈，启用太阳穴乃治头痛的主穴之一，加以麝香渗透之力直接起到郁发瘀除，散郁活血止痛的效果。

【临床应用】此方不仅用于偏正头痛，而且对于风寒湿引起的关节疼痛同样有效。还可用于口眼歪斜（面神经麻痹）以单味蓖麻仁捣烂（右斜贴左、左斜贴右）贴敷。另外单用蓖麻子仁捣烂成膏贴百会穴，可用于胃下垂及子宫下垂。

【注意事项】外感头痛不宜使用本方。无论新久头痛都不可内服，否则会由于其中的蓖麻碱与蓖麻毒素造成血压下降、休克、甚至呼吸停止而死亡。

头 风 膏

献方人小传 赵韶光，男，38 岁，河南省商水县人。现为河南省周口地区中医院中西医结合科主任（通讯地址：河南省周口地区中医院，邮编 466000）。1983 年毕业于河南中医学院中医系，1988 年任周口地区中医院中西医结合内科主任。临床主张师古创新，中医现代化。善治心律失常、顽固性高热、胃下垂及各种贫血。发表论文 10 余篇。目前正在探讨中药汤剂双重选药法。

【方药组成】白芷 10g 蜈蚣头 20 个 薄荷冰 1g 冰片 1g 樟脑 1g 生草乌 1g 生川乌 1g 乳香 0.5g 没药 0.5g 生马钱子 1g 丁香 1g 肉桂 1g 荆芥 2g 防风 2g 老鹳草 2g 积

雪草 2g 骨碎补 2g 山柰 3g 干姜 3g 猪脂 60g

【制用方法】先将白芷、蜈蚣头、薄荷冰、冰片、樟脑、乳香、没药共研细粉备用。将猪脂入铁锅内加热后下入余药，炸枯捞出，停火，油温降至 80℃ 时放入药粉，搅拌均匀，冷凝后备用。用时将患侧太阳、风池等穴处用温水清洗，擦干后将药膏涂于穴位。每日 2 次，连用 2 周。

【功效】活血、除风、止痛。

【适应病症】偏头风（血管神经性头痛）。

【方解】本方由伤湿止痛膏加减而得。入蜈蚣头引经除风，加重白芷散寒除风止头痛，功专偏头风。

【临床应用】偏头风痛甚且宜复发。本药多在 1 周内止痛。用药 2 周，意在减少复发，临床确有此效。

【注意事项】孕妇慎用。

【疗效】治疗 137 例，1 周内痛止 118 例，占 86%。1 年后随访 8 例复发，且症状较前减轻，用药仍有效。

【典型病例】王某某，女，32 岁，工人。阵发性左侧头部剧痛 9 年，每年发作 10 余次，每因劳累或受凉而诱发。3 天前因劳累再次发作，每日发作 4~8 次，头左侧刀割样剧痛，伴头晕眼花，恶心呕吐，每次持续 5~10 分钟。舌质暗，苔薄白，脉弦。经用本方 1 日后痛轻，4 日后痛止，共用药 15 日。1 年后随访未见复发。

头痛外敷方

献方人小传 王长武，男，46 岁，江苏泗阳县仓集镇人。现为中国人民解放军驻山东淄博周村 54871 部队医院气管炎皮肤病治疗（邮编 255300）中心主任。17 岁随父学医，1968 年入伍后在

部队当卫生员、军医、所长。“自拟汤治哮喘”及“浅谈牛皮癣的中医辨证疗法”获十城市论文评比1等奖，华夏中医联合会论文1等奖，济南军区科技进步奖。发表论文几十篇，出版了《肺部感染综合疗法》一书。

【方药组成】白附子 4g 川芎 7g 葱白 05g

【制用方法】将上3味药共捣烂如泥，贴两太阳穴，隔日1次，一般3次即可。

【适应病症】血管神经性头痛。

【方解】所谓“伤于风者，上先受之”、“高巅之上，惟风可到”，所以头痛以风邪为多见。白附子祛风止痛，川芎活血行气，葱白散寒行气，祛风止痛之效。鼻腔粘膜充血是头痛的病机之一，消除了血管性头痛和鼻炎头痛的鼻腔粘膜充血症状，从而使头痛缓解，并治愈。

【疗效】治疗113例血管神经性头痛患者，痊愈84例，好转18例，无效11例，总有效102例，占90.3%。此外，我们还用此法治疗鼻炎引起头痛9例，美尼尔氏综合征7例和三叉神经痛6例，亦获满意疗效。

冰 麝 散

献方人小传 李学广，男，44岁，河南省沈丘县陈寨卫生院（邮编466314）院长，主治医师，中华临床医学误诊误治研究会会员，中华预防医学会会员，周口地区科学技术协会会员。大专学历。曾在省级以上杂志发表论文11篇。

【方药组成】冰片、麝香各0.5g

【制用方法】上药共为细末装入瓶内备用。患者晚上休息时，将此药粉放入棉花球上，棉球如小手指大小，塞入耳内即可，早

起去掉，一般 3~7 次痊愈。

【功效】清热泻火，芳香开窍。

【适应病症】精神病幻听。

【方解】本方所治精神幻听是热邪上扰诸窍，暴怒伤肝，肝胆上逆，上壅于耳，清窍失灵，故耳鸣，耳聋，耳闻有声，甚则闭而失聪。用冰片、麝香入内开窍，清热泻火，火泻而头脑耳清，则耳鸣幻听耳聋症状自愈。

【临床应用】使用各类精神病患者，特别是精神分裂症，出现幻觉失眠，不论男女患者时间长短都有一定疗效。使用该方 7 天为 1 疗程，一般 1 疗程痊愈。

芎辛芷痛散

献方人小传 李华，男，38 岁，吉林东丰和平镇人。现为国营白云机械厂医院门诊部主任（通信地址为吉林省东丰县 2 号信箱医院，邮编 136315）。出身于中医世家，自幼从父学医，17 岁相继在镇里、部队等从事医疗工作，其间经高考后学习西医 3 年、中医 4 年。曾任吉林东丰和平镇医院业务副院长，国营白云机械厂医院医务科科长等职。临床主张中西医结合，对内科常见病家传而创新，对急危重病主张中西医针药（内外）合用。发表论文多篇，其中“论中西医结合整体观”、“中西医结合治疗陈旧性心肌梗塞 46 例”等为代表作。

【方药组成】川芎 10g 川羌 10g 细辛 6g 白芷 10g 元胡 10g 薄荷冰 3g 白面 20g 茶叶水少许

【制用方法】可用上药研成细末，用茶调成糊状，外敷颞部、前额部，不时用清茶润之。2 小时后头痛即减轻，敷 3 剂则头痛消失。

【功效】活血通络，祛风止痛。

【适应病症】偏头痛，神经衰弱性头痛，神经血管性头痛。

【方解】本方所治乃属外风侵袭，入客少阳经脉，或阳明胃实，挟肝胆之火，上冲头目所致。治疗当以活血通络，祛风止痛，方中川芎、元胡活血化瘀，行经通络；细辛、白芷、川羌祛风湿；藉薄荷冰芳香渗透之力，深入经脉内，活血祛风湿，筋脉得通，病邪外出则痛止。

【临床应用】偏头痛、神经衰弱性头痛、神经血管性头痛病因未完全明了，可能与调节血管运动有关的中枢神经部分功能失调有关，临床很难治愈。可用上药研成细末，茶调外敷头部，若肝胃火盛，可加大黄 10g、竺黄 10g，去细辛、川羌。药末越细其效越佳。

【注意事项】使用该方 3 次后，若效果不显，急宜采用其他方法。如用药后局部疼痛，有皮疹、水泡等不宜再用本方。

【疗效】共治疗偏头痛 46 例，痊愈 42 例，痊愈率 91.3%；好转 4 例，好转率 8.7%。神经衰弱性头痛 48 例，痊愈 32 例，痊愈率 66.67%；好转 11 例，好转率 22.92%；无效 5 例。神经血管性头痛 16 例，痊愈 4 例，痊愈 25%；好转 8 例，好转率 50%；无效 4 例。

【典型病例】王××，女，24 岁，于 1990 年 11 月 20 日初诊。自述 10 余年来，有周期性发作性偏头痛，发作期间需卧床休息 2～3 天。此次发作头痛如裂，两侧偏头跳痛，伴有恶心呕吐，较历次为重。经当地医院治疗无效乃转入我院。查：急性痛苦病容，精神不振，情绪忧郁，面色无华，闭目恶闻其声，体温 36.5℃，血压 110/70mmHg，心肺未见异常，肝脾未触及，舌紫红，苔薄白，脉浮数兼弦，二便如常。根据患者素患头痛，复受外邪，属风气客于诸阳，随经而上，侵袭头部经脉，留而不去，与正气相搏，气滞血瘀，致头跳痛如裂，给予祖传芎辛芷痛散外敷双侧太阳，2 小

时后头痛减轻，继用 3 剂外敷，头痛已愈。2 年后随访，未复发。

纠 喎 膏

献方人小传 马纯礼，男，53 岁，河北省卢龙县人。现为秦皇岛市博爱医院中医副主任医师（通讯地址：秦皇岛市海港区文化北路 13 号，邮编 066001 号）。1961～1967 年在北京中医学院中医专业学习。毕业后曾先后在唐山地区卫生学校、秦皇岛市第二医院及秦皇岛市博爱医院工作。除任教 10 年外，一直从事中医临床工作。治学严谨，善用经方。临症多内外兼治、针药并施。主编河北省中专教材《中医学基础》并发表学术论文多篇。

【方药组成】全蝎、马钱子、牙皂各等份

【制用方法】上药共研细末，用鲜姜汁调成膏药备用。每次用药前再加氢溴酸加兰他敏 1 支兑膏药内，用关节止痛膏或胶布将膏药贴敷于患侧面部穴位上。贴敷穴位：阳白、太阳、下关、颧髻、地仓、颊车。每次取 2～3 穴。睡前贴药，次晨取下，每日 1 次，治愈为止。

【功效】祛风通络。

【适应病症】面神经麻痹，口眼喎斜。

【方解】全蝎祛风通络，马钱子通痹散结止痛，牙皂祛风开窍。全方共奏祛风通络之效。加兰他敏为拟胆碱药，用于神经系统疾病所致的感觉运动障碍。

【临床应用】用关节止痛膏或胶布贴敷时，周围要贴紧，不要漏气，如用热水袋热敷效果更好。久治不愈者，可在原方中加等量黄芪。

【注意事项】贴眼部穴位时，注意药膏不要流入眼内。

【疗效】一般贴 7～15 日均可治愈。

【典型病例】张××，男，42岁。患者于2~3天前先觉左耳疼痛不适，继后觉进食不便食物填腔，左眼闭合不利，流泪、口角流涎。经用维生素B₁、强地松及神灯治疗5天疗效不显而来诊。查：左额纹消失。左眼不能闭合，左鼻唇沟变浅，鼓腮漏气。诊为面神经麻痹，经用上述方法治疗6天痊愈。

红 星 木 方

献方人小传 闫斌，男，50岁，朔州市朔城区滋润乡人。现为山西朔州市朔城区医院(038500)耳科中西医结合主治医师。曾多次离职学习耳鼻喉专科中医理论。于1994年在《中国中西医结合杂志》发表“吹干药粉治疗98例渗出性外道耳炎临床观察”。临证主张辨证辨病相结合，审证求因，手术治疗和用药相配合，扬长避短，收到予期疗效。

【方药组成】生南星 1g 番木鳖 1g 血竭 0.5g

【制用方法】按重量比例，临症配制。先将生南星和番木鳖用沸水浸泡，务使番木鳖内外浸透，软硬适中。血竭研成极细粉末。将泡好的番木鳖用大刀片切成两片，切面蘸已研好的血竭粉，敷于预先选好的穴位上，用医用胶布严密固定，以不显露出番木鳖为宜，隔12小时更换药片1次。

【功效】温经活络，祛风通痹。

【适应病症】各种中风致口眼歪斜和中耳乳突炎致面神经麻痹症。

【方解】本方所治之病为汗出当风，腠理开合失调，贼风邪气乘虚而入。病在面部，当行治面。中耳乳突炎长期溃脓不愈，腐骨烂肌，血络受侵，经络失养。局部外敷，温经活络，散邪通痹，又加医用胶布严密封闭，药气不得外越，药到病所，径入于

里。

【临床应用】各种贼风邪气，乘虚而入，导致血脉不畅，经络失去濡养的口眼歪斜症。现代医学认为本病为面神经瘫痪（贝尔氏面瘫）。笔者多次手术证实并非面神经断裂，仅为周围炎症刺激（肉芽肿、骨疡坏死型），实属局部血脉瘀阻，经络失去濡养。故局部用药显得神奇妙方。

【注意事项】炮制严格，浸润适中，血竭研为极细粉末。定时更换药片，否则有药力过时之弊。

【疗效】笔者从1987年10月～1994年2月运用此法治疗各类口眼歪斜症42例，疗效肯定，无毒副作用。尤其对中耳乳突炎面瘫手术后（肉芽肿、骨疡型，骨神经已腐烂者除外）更适宜。

【典型病例】任小花，女，19岁，朔城区大莲花村人。从4岁时，双耳流脓奇臭，家贫不得医。于1988年8月14日婚前，左侧面瘫，以头痛眩晕而就医。拍徐氏位片示双侧中耳乳突胆脂瘤。在胸片、血象化验和心电图正常下先行左中耳乳突根治术，术中证实骨桥处（面神经膝部）骨质已烂掉，神经裸露，术后隔日换碘仿纱条加红星木穴位贴敷，半月后，口眼歪斜治愈。后又行右侧中耳乳突根治术。

复 容 膏

献方人小传 王祖伟，男，55岁，浙江镇海人。现为上海市杨浦区肿瘤防治院中医科主任、主治医师（通讯地址：上海市平凉路335号，邮编200082）。少时好医，1961年入上海中医学院，承崇众师，博采众方，6载学成赴湘南各地行医10余年，后返申城从医至今。擅长内病外治，内外同治。临诊肿瘤推崇钱伯文老

师的中医辨证论治与辨病相结合之主张，曾多次在全国肿瘤学术会上发表论文数篇。

【方药组成】马钱子 5~6g 细辛 1g

【制用方法】先将细辛切碎入杯，加水 50ml，再投入马钱子，浸润至软后沿直径方向切成 1.5mm 薄片，晾干备用。应用时取约 7×9cm 医用膏布，将上药片排列于中央，留出周边空隙，然后敷贴于患侧面颊部（向左歪贴右，向右歪贴左），5~10 天调换 1 张，直至恢复正常，一般 1~2 张即可痊愈。

【功效】散肿止痛。

【适应病症】面神经瘫痪，肿瘤性疼痛。

【方解】马钱子苦寒大毒，细辛辛温发散，一凉一热，互相配合能增强行散镇痛，增加血液循环，营养筋脉的功效。

【临床应用】面瘫多因正气亏损，营卫俱虚，风、湿邪客于经络所致。主症见口角歪斜、流淌口水、流泪。现代医学认为系因面神经炎或血管性、损伤性、肿瘤性等引起面部肌肉运动障碍。属周围性面瘫尤为多见，及早予以复容膏敷贴则效验如神，中枢性面瘫或长久失治者，易面部肌肉萎缩疗效相形见绌。

【注意事项】夏日或少数易汗出者可能在敷贴患处有搔痒感，出现散在性疹子，取下药膏，数日即可自行消失，且仍可更换新药继续敷贴治疗。上药剧毒切忌内服，以免引起番木鳖碱中毒。

【疗效】治疗 162 例，痊愈（自觉症状消失，检查所见恢复正常）130 例，占 80.25%；显效（自觉症状和检查所见均基本恢复正常）16 例，占 9.88%；好转（口眼歪斜部分恢复）11 例，占 6.79%；无效（自觉症状和检查所见无明显改善或敷贴 5 张仍无好转）5 例，占 3.08%。总有效率达 96.92%。

【典型病例】杨某某，男，44 岁，管理员，湖南城步苗族自治县人。1979 年 9 月 15 日入该县中医院。诉突然左侧口角歪斜 3 天，食滞口颊，说话漏风，右侧眼睑闭合困难。无高血压病史。拟

诊周围性面神经瘫痪，遂予复容膏1张敷贴右侧面部，3天后即口角歪斜减轻，饮食滞留消失，7天诸恙悉解，恢复正常，11天出院。

芥菜外敷方

献方人小传 魏茂荣，男，50岁，山东淄博人。现为山东省淄博市鲁中中医院门诊部主任、主治医师（通讯地址：山东省淄博市张店南郊马庄山，邮编255067）。从1961年从事临床医疗工作至今。

【方药组成】芥菜20~30g

【制用方法】市售新鲜芥菜用温水调成糊状（可少加点醋或酒），摊在 $6\times 6\text{cm}^2$ 左右的纱布上，敷于患侧颊部（地仓、下关、颊车穴之间），然后以胶布固定（用伤湿止痛膏更佳），12~24小时取下即可。必要时间隔15天左右重复1次。为提高疗效，可配合挑刺。其方法为：以患侧口内颊部第二磨牙与咬合线交叉点为基点，间隔0.5cm，上、下、左、右各取1点，用消毒之三棱针将粘膜挑破，以出血为度。必要时间隔15天左右重复1次。

【功效】祛风寒，通经络。

【适应症】面神经麻痹。

【方解】白芥子辛温气锐，性善走散，能豁痰涎，利气机，通经络。本方主要用其散寒通络，疏通经气，行气活血，疏散停滞之瘀结，理顺不调之气血，改善局部血液循环，消除炎症。

【临床应用】面神经麻痹，俗称“歪嘴风”。中医认为“风为百病之长，风有内生外袭之别”。外袭者，脉络空虚，感受风寒，风自皮毛而入，袭于经络，阻滞气血，逐致喎僻。

【注意事项】本药外敷有刺激作用，可使局部皮肤发红、充血，

少数患者久敷能使皮肤起泡。一般对症处理即可痊愈（无须特殊治疗），不留疤痕。

竹管吸附方

献方人小传 曹广成，男，32岁，大专学历，主治医师。任山西省新绛县脑血管病医院院长（通讯地址：山西省新绛县城北大街64号，邮编043100）。先后出版《脑血管病防治必读》、《内科急症救治指导》等书籍，多次参加国内学术会议，曾先后在省级以上杂志发表论文多篇。研制的熄风醒脑丸治疗脑血栓，通过中国中医研究院、厦门国际中医培训交流中心等专家鉴定，认为该课题已达国内先进水平。其事迹中央、山西电视台及多家报刊曾给予报道。

【方药组成】僵蚕 10g 白芥子 10g 全虫 15g 蝉蜕 20g 蜈蚣 2条 荆芥 10g 白附子 10g 水蛭 10g 马钱子 5g 皂角刺 10g 川芎 20g 红花 20g 黄芪 30g 甘草 10g 麻黄 10g

【制用方法】上药同无数个竹管（竹管每个5cm长）同时放在药锅内水煎煮，煎煮的药开后30分钟，将药锅内竹管取出，分别吸浮在患侧面部翳风、颊车、地仓、瞳子髎、丝竹空、大迎、承浆、攒竹、四白穴位，45分钟后取掉吸浮在面部竹管，即可见效。

【功效】祛风解痉，活血通络。

【适应病症】面神经麻痹。

【方解】本病因风邪外袭，客阻脉络，气血瘀滞，筋脉失常所致。方中荆芥、白附子、麻黄、白芥子、皂角刺祛风邪；全虫、僵蚕、蝉蜕、蜈蚣、马钱子解痉；川芎、红花、水蛭活血；甘草缓急舒筋；黄芪益气补虚驱邪外出。

【临床应用】本方主要用于面神经麻痹。经 2 年半的临床观察治疗 106 例患者，无任何毒、副作用及不良反应。发病在 20 天以内者 80% 1 次可治愈，20~25% 的最多 2~3 次可治愈。

【注意事项】使用该方时应禁辛、辣食物。

二 术 散

献方人小传 李文银，男性，1949 年出生，汉族。系辽宁省大连市金洲区人。毕业于辽宁中医学院医疗专业，现就职大连市中心医院中医外科门诊。从事临床工作 20 余年（通讯地址：辽宁省大连市中心医院；邮政编码：116033）。善用外治法治疗多种常见病，如自拟溃疡膏治疗顽固性慢性皮肤溃疡，配制消肿止痛液治疗各种软组织急慢性扭挫伤，局部外敷中药治疗骨质增生症，硼砂放入睛明穴治疗急性腰扭伤等均收到显著疗效。撰写学术论文多篇，参加全国学术会议交流，有关杂志发表，并获省市优秀论文奖。

【方药组成】莪术 苍术 川乌 枯矾

【制用方法】上述 4 味药均等量，共研极细粉末混匀装入瓶中备用。应用时取配制好药物粉末约 0.5g 放入空心管（纸筒或细笔管均可）远端出口处，并置入患侧鼻腔内约 1.0cm 处，吹入即可，1 日 3 次。

【功效】温经通络，行气活血。

【主治病证】周围性面神经麻痹（面瘫）。

【方解】周围性面神经麻痹，中医称之为“喎僻”，多生于体弱气虚之时，风寒之邪乘机侵入体表皮毛，而使经络受阻，气血不和，筋脉失养，则肌肉弛缓不收所致。方中之川乌辛热，能温经散寒通络；莪术辛温，善行气活血，与川乌合用增强其温经

通络祛风之力；苍术健脾燥湿、增强筋脉功能；佐以枯矾既可协同苍术健脾，又可助川乌祛风，4药合用相辅相成达到治疗目的。手足三阳之经皆循行于头面，三百六十五络皆上注于面而走孔窍，选用鼻腔用药，粘膜吸收迅速，通过阳明经脉直达病所，从而收到显著疗效。其方法简便，不增加痛苦，易于接受。

【疗效】临床观察 81 例，均系门诊患者，年龄最大 73 岁，最小者 4 岁。治疗期限为 2 周，不辅助其它疗法。其中痊愈 59 例，占 72.84%；显效 18 例，占 22.22%；好转 3 例，占 3.71%。总有效率为 98.77%。

【典型病例】王××，男，57 岁，本市工人文化宫工作。初诊时间为 1987 年 2 月 4 日。自述患病前 2 天洗浴后入睡，晨起时自觉左侧面部麻胀不适，渐至发现口歪眼斜，吃饭时漏食，故来我门诊求治。诊断为面瘫。采用本法治疗 5 日后即痊愈。

焦油口眼一次正

献方人小传 韩学忠，男，44 岁，副主任医师。1974 年毕业于青岛医学院医疗专业。14 岁从医，1969 年～1979 年在原中国人民解放军 67 军任军医。1979 年至今在潍坊市人民医院内科从事肾内科专业。从医近 30 年，先后完成 He-Ne 激光针灸对慢性肾炎、肾病综合征研究，高压氧对早期肾衰研究；参与肾组织内微量元素测定研究和简易血液透析等研究。撰写专业论文 20 余篇，先后发表于国家及省级有关刊物，多次参加全国专业会议，论文在专业会议上大会交流。率先开展本市首例肾活检术及 CAPD 术、血液透析术等新技术新方法。开展胎肾、胎肝、胎心及胎儿胸腺、胎儿脑垂体输注及埋藏对慢性肾炎、尿毒症、支气管哮喘等研究，取得相应成绩。现着手于中药调控催乳素缓解狼疮肾研

究及当归补血汤加味对抗强的松所致药物性肝损的研究，研究已接近尾声。

【方药组成】灰焦油（系农村土坯火炕内层焦痂油垢部分，含土质）10g 独头蒜 1 枚

【制用方法】将磨成的糊膏均匀涂在纱布或纸片上，病人面瘫侧皮肤贴上 2 层温纱布，然后将药膏贴上。令患者平卧，微汗。医者立一旁观察，见前门牙中缝与鼻唇沟对齐后立即将药膏取下。不可过度牵拉。一般 1 次即见功效。

【功效】扩张患侧局部毛细血管，改善局部血液循环及神经血管营养供应，有利于面神经恢复正常功能。

【适应症】面神经麻痹（新近病人最好）。

【方解】面神经麻痹为面神经管内面神经非化脓性炎症。多因风寒所致面神经营养血管痉挛，致面神经缺血。引用本方可利用灰焦油特殊药能及大蒜局部渗透、刺激作用达到疏通血脉，活血化瘀，宣通气血即改善面神经血管的血液供应，而有利于面神经的功能恢复。

【临床应用】本方只限外用，不可内服，只限患侧。

【注意事项】应用前患侧需清洁，药膏不可直接与皮肤接触，以免灼伤。若不慎起水泡者，可用灭菌针头刺破，预防局部感染。

【疗效】新病人 1 次用药疗效达 100%，老病人 50% 左右。

醒脑药帽

献方人小传 唐新华，女，41 岁，主治中医师。研究中医外治已 20 余年，有独特的理论见解和丰富的临床经验。研制的中药药裤治疗妇科病获国家级优秀奖。现已发表论文 20 余篇（通讯地址：河南省汝南县三门闸医院，邮编 463008）。

【方药组成】荆芥 60g 防风 60g 羌活 60g 独活 60g 当归 60g 川芎 200g 桃仁 60g 红花 60g 赤芍 60g 丹参 60g 葛根 60g 菊花 200g 白芷 60g 丹皮 200g 薄荷 200g 细辛 60g 冰片 30g

【制用方法】上药除冰片外，均需低温干燥，碾为细粉，然后再将冰片研细入内，制成药帽。每个药帽含药粉 50g。药帽用薄棉织品制作，药粉入内固定。

【功效】祛风除湿，活血祛瘀，醒脑开窍。

【适应病证】①因感受风寒湿热诸邪而致的头痛、头重、头目不清等。②脑动脉硬化、脑血栓形成。③神经衰弱。

【方解】本方所治头部病证，乃因外感风寒湿热诸邪，内伤五脏而致痰瘀阻痹经络，清窍失宣，清阳不展。本方以辛香、辛温与辛凉药并用，辛香化湿，辛温走窜，辛凉开窍，使气机畅达，经络畅通，而病自愈。

【临床应用】应用本方时应根据四时季节变化而灵活应用。冬季用上方制成药帽，夏季制成药枕。

【注意事项】脑血栓形成伴有脑出血者，不宜戴此帽。

脑囊虫外敷药贴

献方人小传 孙梦庚，男，60岁。辽宁省桓仁县人。1953年从事西医医疗工作；1964年9月于辽宁中医学院调干班医疗系毕业。现任中医科主任、副主任医师。（通讯地址为辽宁宽甸满族自治县第一医院中医科，邮编 118200）。从医 40 余载，立足于西医辨病与中医辨证相结合，精心钻研医术，并回学院拜师进修 1 年。目前，对急、慢性肾小球肾炎、肾病综合征、早期尿毒症、糖尿病、胆肾结石症等疑难病证有一定研究与专长，治疗效果满意，治

愈率高，复发少，并撰写了论文。

【方药组成】砒石（信石、人言、红矾）10g 巴豆7个 斑蝥3个 珍珠1目（大） 轻粉3g 银珠15g 狼毒50g（或蜂蜜适量）

【制用方法】先将斑蝥去头、足、翅，巴豆去皮，焙干研末。信石、轻粉、银珠研细末，将新鲜狼毒捣成泥状，诸药调合捣匀而成糊状即可外敷，分敷于双太阳穴（外眼角斜上方）、印堂穴（在双眉中间）、神阙穴（肚脐上）。外敷约3、4小时许，察看皮肤以出米粒状丘疹为度，即可除去外敷药药贴而达到治疗效果。

【功效】攻毒杀虫，开窍定痫，散结止痛。

【适应病症】脑囊虫病性癫痫，顽固性头痛。

【方解】本方依据民间验方外敷药治疗顽固性头痛而衍化为治疗脑囊虫病性癫痫。该病是因脑部继发猪囊虫病，瘀阻气血，蒙闭脑窍，经络壅塞，神不守舍，遂为癫痫。治疗当攻毒杀虫，开窍定痫，散结止痛。方中砒石辛热，有大毒，渗透力强，与轻粉、银珠之攻毒杀虫之品相配后，以增强杀虫作用；巴豆开通闭塞力专而开窍；珍珠镇心安神而定痫；散结止痛，斑蝥破血散结，攻毒力强；狼毒杀虫，共奏散结止痛之功效。

【临床应用】脑囊虫病癫痫是因为脑部继发猪囊虫病而致。症见突然仆倒，昏不知人，口吐涎沫，口眼相引，四肢抽搐，或声类畜叫，移时苏醒。醒后如常人，但常有头痛。现代医学认为是脑器质性癫痫。表现为突然发生的短暂脑功能异常（如意识障碍，肢体抽搐），有反复发作的倾向。中医称为痫证，又名“癫痫”，俗称“羊痫风”。病人痛苦，反复发作，缠绵难愈。若给予本方药外贴1~2次可获痊愈。也是治疗痰浊头痛和瘀血头痛的好方法。

【注意事项】使用本方药外贴1次未愈者可半个月后再敷贴1次。禁忌小米饭、荞面、辛、辣、甜、牛、羊肉类1周以上。皮肤易敷起水泡、易感染者禁用。用完敷药后深埋土中。

【疗 效】共治疗 3 例皆治愈。

【典型病例】高××，男，34 岁，宽甸县西门外小学校教师。患有癫痫病多年，反复大发作，每月发作数次。经服苯妥英钠等抗癫痫药物无效，后经沈阳医科大学附属医院确诊为脑囊虫病。于 1969 年 4 月 22 日来中医科求诊。依据民间验方治疗顽固性头痛的外敷药贴，敷药 1 周以后癫痫发作次数明显减少，头痛减轻。故半月后又给外敷药贴 1 次，其后癫痫病停发至今再未发作而获痊愈。

治 痫 酊

献方人小传 朱有存，男，46 岁，山西晋城下村乡人。现为中国人民解放军八六五八九部队医院神经科主治医师，中国针灸学会会员辽宁省特种针法学会会员（通讯地址：辽宁省鞍山市八六五八九部队医院，邮编 114001）。17 岁拜名医为师。四年后应征入伍，在部队一直从事医疗卫生工作。毕业于空军军医学校。又先后 3 次入校学习药学、中医和特种针法。在治疗神经系统疾病方面造诣殊深，着意攻研癫痫病分型诊治，研制成 1~9 号治痫灵胶囊，还制成治痫酊穴位擦剂，治痫药枕和经络帽国家专利局已受理。发表学术论文 20 多篇。取得 1 项军队科技成果 3 等奖。治癫痫病的一些方法被香港现代出版社收入《中国当代知名中医特色医疗辞典》。

【方药组成】陈皮 20g 白附子 12g 鲜生姜 20g 白胡椒 20g 石菖蒲 20g 皂荚 15g 甘遂 3g 大戟 3g 芫花 3g 天竺黄 10g 公丁香 5g 天麻 10g 钩藤 30g 洋金花 1g 琥珀 15g 远志 15g 生桃仁 10g 红花 5g 丹参 20g 川芎 15g 安息香 1g 苏合香 0.2g 冰片 2g 沉香 5g 枳壳 20g 乙醇适量 制

成 2000ml

【制用方法】上药除冰片、安息香、苏合香、鲜生姜外，全部碎成粗粉，鲜生姜捣成泥状与粗粉混匀，置于有盖容器中，用 70% 乙醇按浸渍法操作，用冷浸法 3 次浸渍，收集浸出液。加入冰片、安息香、苏合香搅拌溶解后过滤、澄清即得。蘸药少许涂擦穴位。每天 1~3 次。主要穴位：申脉、照海、涌泉、长强、命门、大椎、鸠尾、上脘、腰奇等。

【功效】镇静安神，豁痰开窍，平肝熄风，止痉定痫；活血祛瘀，调补气血，调理脾胃，醒神健脑。

【适应病症】各种类型的癫痫病，小儿急慢惊风，抽搐，烦躁不安等。

【方解】未发作时以滋补肝肾、健脾化痰、活血祛瘀、行气、调补气血治本为重；发作期以化痰开窍，熄风定痫治标为先。故行痰、祛瘀为治则。行痰必先顺气，顺气必先调中；祛瘀必先行气，气行则血行。方中陈皮、白附子、鲜生姜、白胡椒理气健脾，调中和胃，温中散寒，开痰下食，消痰下气，共杜生痰之源；天麻、钩藤、洋金花清热、平肝潜阳、熄风止痉而能定痫；琥珀、远志镇心安神而能定惊。天竺黄清热化痰、凉心定惊；石菖蒲醒神健脑化痰开窍而降逆气；安息香、苏合香、冰片开窍醒神；甘遂、大戟、芫花泻痰开窍；皂荚能除老痰，通窍开闭；又伍以沉香、枳壳以期达到治痰先利气，气顺痰自消，痰消风自灭的目的；伍以川芎主要是行气活血，桃仁、红花、丹参活血祛瘀，以期达到祛瘀必先行气，气行则血行之目的；丁香重在调补肝肾。

【临床应用】癫痫病在发病形式上，具有突然性、短暂性、反复性三大特点。为防止癫痫病的发作，传统治法往往需长期规律用药，不但带来一些副作用，而且加重家庭经济负担。穴位涂药经济方便，安全无痛苦。是根据内病外治法原理，结合现代医药学药物离子透入理论，在祖传秘方、验方基础上，结合本人多年

反复临床实践自拟的有效外治方法。

【注意事项】选穴准确，涂药范围不宜过大，遇有皮肤过敏者停止使用。

【疗效】通过多年临床观察有效率 85.5%。

【典型病例】马××，女，46岁，病程33年。经检查确诊为癫痫病。半个月前因出现癫痫持续状态后左侧肢体轻瘫，行走受限，语言欠流利，平日痰多，二便尚调，舌苔白腻，脉象弦滑，此乃风痰惊痫。遂用治痫酊穴位涂擦，一周后发作减少，一个疗程后脉象沉伏，舌苔薄腻，说话吐字清楚，行动自如，没有发作，病情稳定出院。风痰深藏，药需缓消，故出院带药继续治疗，现已停药半年未再发作。

朱 倍 散

献方人小传 张振波，男，42岁，广东省台山市人。现为广东省江门市中心医院副主任医师（通讯地址为广东省江门市北街江门市中心医院中医科，邮编529071）。1975年毕业于广州中医学院。一直从事中医医疗、教学、科研工作，成绩卓著。曾参加北京全国首届特色医疗学术研讨会，获广东省学术优秀论文2等奖一篇，在《新中医》等省级以上杂志发表论文5篇，被载入《中国当代知名中医特色医疗辞典》。

【方药组成】朱砂 3g 五倍子 9g

【制用方法】上药研末（可按此比例研末备用），先将脐心洗干净，然后将朱倍散放入脐中，用大块（5×5cm以上）胶布粘紧密封即可（可用少许醋调匀，不用亦可）。

【功效】收敛止汗。

【适应病症】各种盗汗症。

【方解】贴脐疗法，是我国古代的一种治疗方法。祖国医学认为，脐为神阙穴，位于任脉之经，任脉为阴经脉气所汇聚，为诸阴之海，有充养和总调阴经脉气的功能，对诸阴经有主导和统率作用，能回阳、固脱、强壮、调节、溢蓄阴精，运肠胃之气、化寒湿积滞。朱倍散中朱砂微寒，入心经、善清心热，纳浮留之火而安神；五倍子酸咸而寒，性敛，入肺肾经，有燥湿，敛肺，涩肠之功。朱砂、五倍子研末敷脐，通过神阙穴调节心肺肾之阴气，泄阴火，固阴精，使心肾相交，心火自平，营卫调和，腠理固密，湿浊能敛，盗汗自止。

【临床应用】盗汗可见于各类不同性质疾病。笔者曾用于①气阴两伤，痰热内蕴的慢支肺气肿；②外感余热未清；③肺肾阴亏如系统性红斑性狼疮等病例。病因不同，但都能取效。

【注意事项】无不良副作用。一般1夜见效，可连续使用5~10天。

【疗效】已治愈10多例严重盗汗患者，其中4例是经用多种治汗法未效而用本法取效。

【典型病例】李××，女，53岁，住院号：156167。患者有慢性咳嗽史七、八年，气促4年，伴有心悸，活动后上述症状加甚，间歇性浮肿1年，入院诊断：慢性支气管炎，肺气肿并感染，肺源性心脏病，心肺功能不全Ⅲ级。于1976年9月，因咳嗽气促，心悸浮肿加重而入院。住院期间，盗汗日渐严重，每晚汗出湿透4件衣服。面色萎黄，心烦失眠，梦多。舌淡暗，苔微黄厚腻，脉弦缓。此属气阴两伤，痰热内蕴。用过阿托品治疗未效。中药先后用过化湿止汗及益气养阴固表止汗法，效果亦不理想。于11月7日用朱倍散，先将脐心洗干净，然后将药散放在脐中，用胶布密封。此法治疗1周，盗汗已愈，后按病后体虚调理。

眩 心 枕

献方人小传 张应兴，详见内科“偏正头痛宁”方。

【方药组成】菊花 100g 丹皮 250g 白芷 250g 川芎 250g

【制用方法】将上药装入布袋中，睡时枕头。

【功效】疏风明目，行气解表，清热止痛，活血散瘀。

【适应病症】眩晕，心悸。

【方解】眩晕，以头晕目花，突然坐起时则眩晕加重，耳鸣，心悸，体倦无力，睡眠不安等为主要特征。方中以菊花、丹皮散热明目，平降肝阳，并能清营血热毒，散瘀消滞使气血流畅；白芷、川芎对各种偏正头痛、眩晕其效明显。全方合用对虚证的心脾不足，不能上荣于脑，或实证的风阳上扰、痰阻、清阳不升引起的眩晕、心悸效果显著。

【临床应用】本方对无论病程长短的头痛、头晕、目眩、头胀以及温热病引起的瘀血等都有显著疗效。如头痛较剧者，加细辛 250g（另用小袋装入放药枕里，痛止时可拿去）；体胖下午面部有潮红者，丹皮、川芎可增加至 375g；胃气弱者，如感到白芷气味不适，可减去。

【注意事项】用药期间忌吃生葱、生蒜，尤忌情绪波动。

清脑降压防瘫防痴药枕

献方人小传 史文同，男，51岁，系河北省邢台市邢台县河曲村人。现为河北沙河市医院（邮政编码 054100）中医主治医师。临证用药主张尊古而不泥古，灵活辨证施治。近年来对脑血管病、

男性病颇有研究，疗效显著，曾发表论文多篇。其中 1992 年在《河北中医》发表“王氏气血理论初探”一文并获河北省优秀论文证书，1993 年在《辽宁中医》发表“男性不育治验”一篇，1994 年在《江苏中医杂志》发表“壮阳起痿灵治疗阳痿 265 例疗效观察”。

【方药组成】杭菊花 500g 荷叶 300g 草决明子 300g 白矾 300g 槐米 200g 青箱子 200g 山楂核 200g 川芎 200g 白芷 50g

【制用方法】以上药物均为干品，将草决明、白矾、山楂核、川芎、白芷打碎，荷叶剪碎，然后将诸药混合装入棉布制成的袋内即成。一般半年换一新药枕。睡时尽量使头部接触药枕。

【功效】清热解毒，活血通络，降脂。

【适应病症】高血压，脑血栓，老年性痴呆。

【方解】本方具有凉血清热解毒，活血化瘀通络作用，通过药物与头部持久接触和营养吸收，不仅利于消除炎症，降低胆固醇和甘油三脂，并可促进脑血管微循环，改善脑缺氧状况，促进脑细胞新陈代谢，以利于脑细胞得到新生和康复。

【临床应用】高血压、脑血栓、老年性痴呆近几年发病率较高，一旦患病治疗很难痊愈，且易复发。故遇患而治不如防患于未然。清脑降压防瘫防痴药枕通过头部皮肤毛孔持久作用于病处，扩血管，疏通微循环，改善脑组织的血液循环供应状况，降低血液粘度，使机体处于低凝状态。从而达到筋壮、气血畅，顽疾除。是目前一种防治结合治疗脑血管疾病非常理想有效方法。

【典型病例】郝××，女，45 岁，患高血压 5 年余，经常头晕头疼，四肢乏力，血压经常在 2/15KPa 以上，常服降压片、尼群地平片等多种降压药物均未效。经枕用清脑降压防瘫防痴药枕半年后，睡眠好头脑清，未吃任何降压药，血压经常维持在 16/10KPa 左右，追访 3 年血压正常未复发。

冰遂敷脐散

献方人小传 杜兆雄，男，39岁，安徽霍山县大别山中药职业技术学校（邮编237200）业务校长、副主任中医师，安徽中医学院肝脾病证研究所特约研究员。临床擅长以中医药治疗中晚期恶性肿瘤、乙肝、痛症、高低血压、心脏病、精神情志病，特别是于1986年提出的肿瘤临床的中医思路“十六字病机”和“二十四字治略”，被认为是中医治疗肿瘤认识上的一个飞跃、理论上的一大突破。根据这一理论指导创制的内外治结合、攻补兼施的“杜氏中医治癌系列疗法”，给不少中晚期肿瘤患者带来福音。

【方药组成】 制甘遂、冰片各6g

【制用方法】 将上述2药烘干研极细末备用。用时清洁脐部皮肤，擦干后以此药末填满脐孔，外贴麝香追风膏以固定之。

【功效】 通窍泻水。

【适应病症】 因心力衰竭而引起的下肢乃至全身浮肿，正气极虚而邪气炽盛的危重症。

【方解】 甘遂为苦甘寒而有毒之品，归肺、肾大肠诸经，为泻水逐饮之峻药；冰片辛苦微寒，归心、脾、肺经，功效重在开窍通闭。

【临床应用】 甘遂攻逐力峻，得冰片之助，可当泻水重任，但内服伤正，尤不适于正气虚衰之人，以之敷脐，可扬长避短。脐乃人体出生前摄取天然清气和水谷精微、排泄代谢产物之通道，皮内血管丰富，通透力强，以药敷之，能调达气机，使紊乱的升降出入功能恢复正常，水邪得去而正气不伤。

【典型病例】 某8旬老太，因心力衰竭而致危候，水肿由双下肢渐延至双上肢，及至全身，神疲气短，头不能抬，难以平卧，多

日未食，药物（不仅中药，连西药心血康、双克）入口即吐，静脉给药又怕输液增加心脏负担，不得已乃以甘遂、冰片各 6g 研末敷脐，静脉推注少量葡萄糖、肌苷以扶正，一昼夜后上半身肿消，下半身肿减，得安卧。次晨又以上药敷双足三里，至第三日，除脐部和大腿后侧尚存微肿外，余均正常，亦能进少量饮食，夜眠安稳。后以温通心阳、益气养血之品调理。

药 物 灸

献方人小传 施发林，男，38 岁，江西宜春市人。现为江西宜春市皮肤病防治医院医师（通讯地址为江西宜春市皮肤病防治医院，邮编 336000）。18 岁从部队学医，5 年后复员退伍分配在基层工作。曾任宜春市湖田卫生院业务院长。临床主张中西医结合，内外合治。对中风半身不遂、手足腰脊风湿等症，采取内服、药灸、按摩，疗效明显。多次参加全国举办学术交流会发表论文数篇。

【方药组成】秦艽 100g 姜黄 100g 桂枝 100g 桑枝 100g 当归 100g 川芎 100g 牛膝 100g 续断 100g 独活 100g 羌活 100g 乳香 100g 没药 100g 艾叶 150g

【制用方法】上药共研末，摊皮纸上，卷成灸条，点燃灸患侧上下肢各要穴（肩髃、肩贞、天宗、臂臑、曲池、外关、环跳、风市、足三里、绝骨）。

【功效】舒筋活络。

【适应病症】中风半身不遂、手足腰脊风湿证。

【方解】本方功能舒筋活络，中风病人多因气虚血滞，脉络痹阻，以致肢体偏废。选药熏灸，熏药途经上下肢，方中当归养血和血，川芎行气活血，赤芍和营化瘀，桂枝、桑枝辛甘温，温

经通脉，秦艽、姜黄辛散风邪，牛膝破血通经，续断补肝肾，壮筋骨，宣通血脉，独活、羌活祛风湿止痛，乳香没药二药并用消肿止痛，故可相须为用。

【临床应用】中风后遗症多见脑溢血、脑栓塞所见之偏瘫。症见手足举动不遂，上下左右行而不定，拘挛作痛，给予熏灸、按摩，短时间症状明显好转，减轻病人痛苦，早日恢复健康。

【注意事项】使用本方，是药物烧烟熏灸患部或特定部位，借助药力加热力的作用达到治疗疾病的方法，注意选择穴位，先熏灸，后按摩。冬天注意风寒，避免着凉，其它无不良反应。

新 白 通 汤

献方人小传 刘克勤，男，49岁，山东沂水县人。现为主治医师（通讯地址为山东省临沂地区人民医院，邮编276003）。生于中医世家，16岁侍学于父，后相继在干部疗养院、省煤矿疗养院、地区医院工作。对疑难杂症师古创新，临证知常达变，中西医结合，内外兼治急危重症。发表论文多篇，“双侧输尿管结石合并急性肾功能衰竭”一文1992年获全国优秀论文奖。

【方药组成】带根鲜葱白 200g

【制用方法】上药洗净，捣如泥，摊呈圆饼型厚约8mm，纱布包，放于热水袋上，待葱泥温度高于35℃时敷于脐下（下腹正中），宽布带固定，葱饼上可换热水袋加温。同时令病人听流水声，一次即可排出小便。

【功效】温通利尿。

【适应病症】尿潴留。

【方解】本方所治之病乃因寒凝、惊恐、气滞，或因病气虚，气化失常，开合失司，水道不通之尿闭腹胀，欲尿而不能。葱

白宣通上下，通达表里，调畅气机，通调水道，开闭塞而利小便，有“提壶揭盖”之功，“在下者引而竭之”之力。

【临床应用】因前列腺炎、腰椎间盘突出症、有机磷中毒恢复期、或突受惊吓、寒凉等所致尿潴留，不用导尿管即不能排出小便者。

【注意事项】①有并发症应同时治疗并发症；②膀胱无尿者不宜用此法；③暂无欲尿感，可先做好准备，有排尿欲时，再敷药。①用该方 1 小时后不能排尿者，急宜采取其它治疗措施。

尿 通 散

献方人小传 陆雨竹，男，48 岁，江西九江市人。中医主治医师（通讯地址：江西九江柴油机厂医院，邮编 332005）。出身中医世家，从事医疗工作 32 年，对常见病多采用综合治疗，撰写论文 12 篇，多次在全国学术研讨会上交流。

【方药组成】甘遂 30g 甘草 6g

【制用方法】上药共研细末用鸡蛋清调成糊状，外敷关元穴，药厚为 0.5cm 左右，上盖一消毒塑料薄膜，胶布固定，每日换药 1 次。

【功效】泻水遂饮。

【适应病症】尿潴留。

【方解】祖国医学对尿潴留认识较早，已积累了丰富的治疗经验，中药甘遂泻水遂饮，消肿散结，甘草补脾益气，缓急止痛，但甘草与甘遂同属十八反药，用于外敷则无副作用。因甘遂泻水颇峻，为防止太过，用甘草缓和药性，比例为 5：1，其机理是借助药物刺激穴位，通过神经反射作用，使药物分子进入血液循环达到病处。

【临床应用】尿潴留因多种病因不得排泻，潴留膀胱，往往要经过导尿，方可减轻痛苦，用本法外敷简单、经济、药源方便、疗效高，患者乐意治疗。

【注意事项】使用本法 3 次后，疗效不明显，应采取其它措施。

排毒泻浊液

献方人小传 朱崇义，男，40 岁，湖北仙桃市人。现为仙桃市中医院肾内科主治医师（通讯地址：湖北省仙桃市解放东路 67 号市中医院，邮编 433000）。大专学历，从医 20 年，善内科，专肾病。曾进修于湖北中医学院，湖北医科大学。善于中西医结合诊治内科疾病。对于肾病主张明确西医诊断，治疗以中药为主。中西结合，内外合治。发表及参加全国学术交流论文 20 余篇。

【方药组成】生大黄 20g 熟大黄 20g 牡蛎 60g 土茯苓 50g 车前仁 30g 黄芪 50g

【制用方法】上药以水 500ml，文火久煎（以 1 小时以上为宜）。去渣取汁 200ml，待温至 38℃，保留灌肠，以保留 2 小时以上方可收效，1 日 1~4 次，视病情而定。

【功效】排毒泻浊。

【适应病证】慢性肾衰（第 2 期与第 3 期）。

【方解】本方所治之病因乃为脾肾虚损气化失司，升清降浊失职，尿毒内停之尿毒症。方中以生大黄清热泻下，配以熟大黄，土茯苓泻浊解毒；车前仁利湿浊；黄芪升清益气固本；并佐以牡蛎收涩以防泻下太过伤正。另外牡蛎含钙量高，以补充慢性肾衰之低钙。本方为攻补兼施，标本同治，以排毒泻浊为主之外用灌肠基本方。

【临床应用】慢性肾衰尿素氮、血肌酐、血钾升高，通过保留

灌肠内毒素通过大肠吸附而随大便排出，灌肠后每日以大便 2~3 次为宜。对合并有出血倾向及高血压者应加槐花 30g、地榆 30g 以降血压止血，对尿毒症肠炎泄泻者不宜使用本方，以防泄泻无度而伤正。

【疗效】观察 48 例，慢性肾衰第 2 期 20 例，第 3 期 20 例，第 4 期 8 例，明显改善 27 例，好转 15 例，无效 6 例，总有效率为 87.5%。其中以第 2 期疗效最为满意，第 4 期疗效差，尤其是对无尿型尿毒症效果最差。

【典型病例】张×，男，27 岁，1992 年 2 月 8 日住院。患慢性肾炎 10 年，入院后查尿素氮 10.6mmol/L，二氧化碳结合力 19.1mmol/L，血肌酐 352umol/L，诊断慢性肾衰第 2 期。治疗按中医理论辨证内服汤药，西药对症处理。中药保留灌肠 1 日 1 次，3 周后复查尿素氮 2.7mmol/L，血肌酐 106umol/L，因血肌酐正常、尿毒氮正常而停止灌汤。内服药同前，2 周后复查，尿素氮 9.1mmol/L，血肌酐 256wmol/L，继续保留灌肠 1 日 1 次，2 周后复查尿素氮、血肌酐基本正常。

活 髓 膏

献方人小传 马洪钧，男，49 岁，辽宁省开原市人。现任辽宁省开原市中医院业务院长（通讯地址：辽宁省开原市胜利路，邮编 112300）。社会兼职：辽宁省古籍研究会常委、辽宁省古籍丛书编委、开原市中医学学会副会长。17 岁随父学医，19 岁毕业于开原县中医徒弟班，1978 年毕业于辽宁中医学院中医系，同年 10 月就职开原市中医院。临床善医痼疾顽症。尤其对治疗再生障碍性贫血、糖尿病、高脂血症、中风后遗症、男子不育症等有较好疗效，其临床特点多采用内治和外治相结合的办法，疗效较佳。几年来

发表高水平论文 10 余篇，并参加辽宁省卫生厅组织编辑《中医古籍临床必读》丛书，已由湖北科技出版社出版。

【方药组成】拉拉藤 500g 灵仙 200g 五加皮 200g 川芎 200g 红花 100g 桃仁 100g 赤芍 100g 当归 100g 麝香 2g

【制用方法】上药共为细末，先用米醋调合成颗粒状，然后加香油调成膏。装入瓶中封严，用时装药膏敷在胸骨处，厚度为 3~5mm，上盖生白布。每天敷不少于 4 个小时，7 天为 1 疗程。

【功效】活血通髓。

【适应病症】再生障碍性贫血。

【方解】本方拉拉藤有通髓之功；灵仙、五加皮、川芎、红花、桃仁、赤芍具有活血通经之效；当归亦养其血；麝香温通辛窜与米醋诸药合用增加渗透之力；香油具有润肤之能，全方具有活血通经活髓之功效。配合服用生血丸治疗再生障碍性贫血效果更佳。

鼻衄止血粉

献方人小传 米丰年，男，45 岁，黑龙江省哈尔滨市人。现为黑龙江省牡丹江医学院附属医院（邮编 157011）副院长、副教授。1968 年毕业于哈尔滨第三卫生学校，1976 年毕业于哈尔滨医科大学，1985 年~1986 年在日本国金泽医科大学研修。临床擅于应用中西医结合方法治疗血液系统疾病、糖尿病。发表论文 40 余篇，参加编辑出版《贫血》专著。

【方药组成】大黄

【制用方法】取上等大黄洗净研粉，分装于小瓶灭菌备用。治疗鼻衄患者首先用无菌脱脂棉清除鼻腔血液，最好能确定出血部位，以便有目的止血，若出血量较多，最好持枪式摄子用无菌脱

脂棉充分蘸取止血粉从鼻腔深部依次填塞，如不能 1 次止血，可应用前法反复填塞。这种填塞方法属非加压性填塞，对鼻粘膜无损伤。

【功效】 止血消炎。

【适应症】 血小板减少及其它原因引起的鼻衄。

【方解】 大黄具有明显止血，促进血液凝固，破积滞行瘀血等功能，此外还有杀菌作用。

【临床应用】 急性白血病、再生障碍性贫血、血小板减少等血液系统疾病患者，因血小板减少常出现鼻衄，这种鼻衄较正常人严重一般方法无效。而应用该法治疗 30 例，经 1 次填塞止血 16 例，2 次止血 5 例，3 次止血 9 例。所有病例均在 1 天内止血，次日取出填塞物，鼻腔粘膜均无损伤。

【典型病例】 患者巩某，女，23 岁。1993 年 1 月 27 日鼻出血不止住院治疗，经外周血、骨髓象检查诊断原发性血小板减少性紫癜，血小板 $10.0 \times 10^9/L$ ，由于鼻出血量多流入食道，同时还出现呕血。经前方法连续 3 次填塞血止。

益寿降糖膏

献方人小传 刘文峰，男，56 岁，副主任医师，现任天津中医学院第二附属医院内科部主任，天津中医学院疑难病研究中心糖尿病研究室主任。从医近 30 年，具有丰富的临床经验尤以治疗糖尿病、心脑血管病、呼吸系统疾病为其专长。新研制的“糖利平”、“降脂抗凝冲剂”等临床疗效显著。现承担局级“糖利平治疗Ⅱ型糖尿病的临床及实验研究”科研课题。撰写了“发热的热型与病因病机”、“漏症临证一得”、“糖尿病的病因病机”、“加味黄芪桂枝汤治疗糖尿病合并周围神经炎”等论文论著。

【方药组成】黄芪 60g 山药 30g 苍术 30g 苡仁 30g 玄参 30g 生熟地各 30g 生牡蛎 60g 黄精 30g 肉苁蓉 30g 菟丝子 30g 金樱子 30g 蚕砂 30g 萆薢 30g 菖蒲 30g 丹参 30g 生大黄 30g 僵蚕 30g 全虫 30g 白芥子 15g 五倍子 30g 丹皮 30g 地骨皮 30g 仙灵脾 30g 莱菔子 15g 水蛭 15g 肉桂 15g 小茴香 15g 黄连 15g 冰片 2g 蟾酥 2g 樟脑 1g 麝香 0.5g。

【制药方法】上方为 1 料，也为剂量比例。将前 28 种水煎提取成浸膏，再将后 4 种研成极细粉加入浸膏中搅拌均匀。将药膏涂于 2×2cm 的橡皮膏上，每贴药膏 1~2g，并用塑料薄膜敷盖于膏药表面备用。

【功效】益气养阴，固涩分清，除湿消瘀。

【适应病症】Ⅱ型糖尿病。

【方解】糖尿病以阴虚燥热为本，但随着病程的发展，阴阳气血俱虚，热盛伤津，清浊不分，挟痰湿挟瘀血又是其病机演变的必然规律。因此，益气养阴，固涩分清，除湿消瘀的治法颇合病机。方中有 6 组药物：1 组是黄芪、山药、苡仁等健脾补气；2 组是玄参、生熟地、牡蛎、丹皮等养阴清热；3 组是五倍子、菟丝子、金樱子、萆薢、菖蒲等固涩分清；4 组是苍术、苡仁、白芥子、蚕砂等除湿消痰；5 组是丹参、水蛭、生大黄、僵蚕、全虫等活血化瘀；6 组是小茴、肉桂、冰片、蟾酥等具浓烈芳香走窜之性，以率群药开结行滞，通经走络直达病所。综观全方，具有益气养阴，固涩分清，除湿消瘀之功。

【临床运用】本药用于外敷，且方中无章丹、蜜陀僧等含铅药品，因此作用全面，疗效可靠，使用安全。治疗Ⅱ型糖尿病，采用穴位贴敷法。常用穴位：涌泉、神阙、肾俞、三阴交。每次贴敷 2~3 穴，每穴 1 帖，每次贴敷时间 2~3 天。

【注意事项】本药无任何毒副作用，仅有极少数人贴后局部红

疹搔痒，更换穴位后即可消失。

【疗效】益寿降糖膏对Ⅱ型糖尿病的轻、中型疗效肯定。经观察30例，有效率达85%。对重症者，可配合西药降糖药使用，可明显减少西药剂量。因使用方便疗效可靠又无副作用，而深受糖尿病患者好评和欢迎。

【典型病例】朱××，女性，56岁，教员。因患糖尿病8年近期加重，于1993年3月来院专科门诊治疗。查血糖16.8mmol/L，尿糖（+++），给予优降糖、降糖灵及中药治疗，1月内自觉症状减轻，血糖降至9mmol/L，尿糖（++），停药口服降糖药，改用益寿降糖膏穴位贴敷，4周后复查，血糖降至7mmol/L，尿糖转阴。此后一直外敷药，半年后复查血糖仍在8mmol/L以下。

温阳固涩行气膏

献方人小传 张云杰，新疆米泉乌鲁木齐矿务局煤矿总医院东山门诊部（邮编830027）。

【处方组成】吴茱萸6g 丁香3g 白胡椒6g 五倍子6g 厚朴6g 枳实6g 青皮6g

【制用方法】7味药共为细末为粉，加200ml温开水调匀，文火熬成药膏，装瓶内备用。应用时将肚脐用温水洗干净，用酒精棉球消毒，然后将药膏摊在大纱布上如铜钱厚为度，敷在肚脐上，用胶布固定好，4小时内可生效。

【功效】温中散寒，疏肝破气行气，化湿散积，化滞消痞，降逆温肾阳。

【适应病症】长期腹泻、腹胀、肠鸣不通、久痢、便秘、腹疼痛的大人和小孩。

【方解】本方在治疗过程中，用白胡椒、厚朴温中散寒下

气；并用枳实、吴茱萸、青皮入肝、脾经，疏肝破气行气化痰；加之丁香、吴茱萸善能温肾助阳，降逆止呕。如久泻久痢不止、咯血、便血、肾虚遗精遗尿，可用五倍子入大肠经，宣肺温肠，止血解毒；如兼有湿重者可加马齿苋；兼有热重者可加黄连。

【临床应用】用过 20 天后腹胀疼痛消失或减轻，肠鸣腹泻腹气通，大便正常。

【注意事项】在用药其间忌用酒及刺激性食物，并注意性生活。肉类食品食物、蔬菜少用或不用最好。

【疗效】在治疗 15 例患者中，男 9 例，女 6 例；年龄最大的 60 岁，最小的 13 岁，平均 36 岁；病程最长的 30 年，最短 1 年；在治疗过程中用 1 次见效的 2 人，2 次见效 10 人，3 次见效的 3 人；时间最长的 30 天，最短的 6 天。

【典型病例】刘××，男，57 岁，工程师，现退休，患结肠炎 20 年之久，经多方大医院检查治疗效果不佳，1991 年来我院门诊就诊。经询问病史以及在各大医院所经检查诊断确诊为慢性结肠炎，给予敷脐治疗，15 天后腹泻腹胀疼痛肠鸣消失，大便正常，1992 年 7 月我们随访，一切均好。体重由原来 52 公斤增加至 76 公斤。

中毒性肠麻痹中成药验方

献方人小传 洪天赦，男，65 岁，福建省晋江人。现泉州市第一医院儿科中医副主任医师（通讯地址：福建省泉州市东街 134 号，邮编 36200）。早年随父学医，业居故里，先后在福建中医学院、北京中医学院进修。临症主张因证灵活施治，不拘传统，在前人的理论指导下敢于创新，对儿科急危重病及常见病，内外合治颇有心得。曾任福建省第一届中医儿科学术委员会委员，发表

论文多篇。

【药物组成】鲜艾叶心 7 支 公丁香末 10g 燕窝土 1 撮 风葱管(生) 7 支 生薄荷心 7 支 生姜 5 片 生香附子 7 粒 田螺 7 粒(去壳) 公羊屎 14 粒

【制用法】用以上诸药物混合在石臼中加工捣烂,即用鸡旦一枚去蛋黄,取其鸡蛋清,调诸药在锅中合煎成块,马上取起,不要过热,然后敷贴于脐部,用清洁纱布盖上,用绷带绕于脐腹部绑紧。

【适应病症】中毒性肠麻痹。

【功用】温阳健脾燥湿,驱风消肿,散寒理气,清热解毒利湿化浊。

【方解】方中丁香、艾叶、燕窝土具有温阳健脾燥湿之功;风葱、薄荷有驱风消肿通阳散寒之用;香附、生姜有温通理气散寒化浊之用;田螺、羊屎有清热解毒,利水消肿作用。

【临床应用】中毒性肠麻痹。体温下降,四肢逆冷,面色苍白,神志不清,呼吸呈叹息样,口吐咖啡色液体,二便不通,腹部膨胀,叩呈鼓响,肠鸣音消失,六脉沉细欲绝。若不及时治疗危在顷刻,以上中成药外敷 2 小时左右,矢气通则转危为安。

【典型病例】张文超,男,9 个月,晋江县金井乡山头村人,于 1974 年 11 月 10 日住院,住院号 128408。患儿于 3 日前始见发热,呕吐、腹泻,经住当地卫生院输液服药病况未见减轻,反而小便不通腹部膨胀,即来我院儿科。体检:面色苍白,神志不清,呼吸急促呈叹息样呼吸,二便不通,口吐出咖啡色液体,腹部膨胀,叩呈鼓响,肠鸣音消失。听诊:心音弱规则心跳 155 次/分,肺呼吸音粗有中等大小水泡音。大便检查:红血球+,脓球少,潜血+。西医诊断:①中毒性肺炎。②中毒性肠炎,引起中毒性肠麻痹。曾用胃肠减压,肛门放气,以及注射新斯的明、西地兰、甘露醇、红霉素等疗法,病情未见改善,即请中医会诊。患儿神志

不清，眼球凝视，呈双吸气呼吸，腹部膨胀，二便不通，口吐咖啡色液体，舌淡乏苔，六脉沉细欲绝，即给予以上中草药外涂，经2小时后得矢气，腹胀随之消退，神志转清，眼神即转活，呼吸也转正常，立即转危为安，继则对症调理，共住9日而出院。

通便排气露

献方人小传 王通泽，男，42岁，解放军第三七一医院主治医师（通讯地址：河南省新乡市文化路64号371医院外一科，邮编453000）。16岁至今一直从事医疗卫生工作，先后在贵州省独山卫校、河南医科大学医疗系、原武汉军区总医院外科提高班就读。现任主治医师，对胸心外科、普通外科有较好的临床经验。曾在全国各种医刊上发表论文30多篇。研究中西医结合防治腹腔手术后肠粘连、习惯性便秘10余年，研制的中药通便排气露于1990年投入临床应用，取得良好效果。

【方药组成】 大黄、番泻叶、香附、木香各10g

【制用方法】 各药合并提炼有效成份分装为10ml装的塑料胶囊备用。用于治疗粘连性肠梗阻和习惯性便秘者，一旦确诊即从肛门注入通便排气露1支，每4小时1次，直至症状消失，治疗习惯性便秘可常规用药3~5天。用于预防术后肠粘连时，于手术后8小时开始用药，每4小时1次，连用6次，或肛门排气后停药。

【功效】 行气开郁，通里攻下。

【适应证】 粘连性肠梗阻，习惯性便秘，预防术后肠粘连。

【方解】 本方偏寒，能清热燥湿，疏肝理气止痛，行气开郁，通里攻下。其作用机理是大黄、番泻叶中含的蒽醌，木香、香附中含的挥发油刺激直肠，反射性的引起胃肠道蠕动增快，并减

少肠道水份的吸收而导泻。有调整肠道应激状态，改善和保护机体内环境的稳定，促进细胞结构和功能恢复的作用。

【临床应用】粘连性肠梗阻是诸多因素引起的结果。其基础是早期肠麻痹、肠胀气、腹膜渗出的纤维蛋白将肠管相互粘着或与壁层腹膜粘着，肠道扭曲导致肠腑气机痞塞不通，运化障碍，传导失司而出现腹胀、腹痛、恶心呕吐、肛门闭气不排大便的梗阻症状。预防肠粘连是用其能增强肠运动的原理，减少肠管互相粘着和腹膜渗出。习惯性便秘是肠功能失调，结肠热极生火，水份吸收快使大便干结，欲便不畅，肛门疼痛。治则理气开塞，软化大便，通里攻下。

【注意事项】绞窄性肠梗阻、肠扭转者禁用。无毒副作用。

【疗效】经 500 例临床验证，用药后 1~30 分钟肛门开始排气或排便者占 92.6%，4 小时内排气排便者 100%。治疗粘连性肠梗阻消除症状 100%，复发率 7.5%，说明该药有改善症状而无法消除已经形成粘连的病变，症状复发时重新用药仍有效。

【典型病例】候某，男，84 岁。习惯性便秘 20 余年，加重 2 年，5~7 天大便 1 次，需他人帮助抠出。用通便排气露 1 次，能自行排大便，连用 3 天，大便次数规律为 1~2 次/日，无复发。

截 痢 散

献方人小传 赵家卫，男，31 岁，安徽省来安县人。现为安徽省来安县中医院中医师（邮编 239200）。18 岁中专毕业后即从事中医工作，中途脱产学习 3 年。临症主张师古而不泥古，中西合参，内治法、外治法并用。在省级以上杂志发表论文多篇。现为安徽省中医药学会会员。

【方药组成】马钱子 3g 公丁香 3g

【制用方法】上药共研细末，将药粉填纳脐孔中，外用橡皮膏贴之。每日换药 1 次。

【功效】消滞利肠。

【适应病证】痢疾、泄泻。

【方解】本方所治之病乃因外感邪气，内伤饮食，腑气失调，气血瘀滞所致的痢疾、泄泻。治疗当以消滞利肠，调畅气机。方用马钱子散外填脐孔，借温通香窜之公丁香渗透之力，直达肠腑以斡旋气机，消滞利肠。气机升降畅达，气血运行自如则病愈。外用橡皮膏紧合脐孔，不使药气外泄。

【临床应用】本方用于痢疾、泄泻的早、中期，一般 1~2 次即愈，慢性患者须 7~10 次即愈。

【注意事项】婴幼儿或皮肤对橡皮膏过敏者可用纱布绷带外扎。对于脱水、电解质紊乱、酸中毒严重者或中毒性菌痢须配合补液，纠正电解质紊乱，纠酸等抢救措施。

补脾益肾神阙灸

献方人小传 孙光远，男，59 岁，共产党员，河南禹州市人。现为广东省韶关市韶监医院（邮编 512145）副主任医师。1955 年 2 月中医学徒班毕业，同年 3 月参军习西医，后入广州中医学院就读，1963 年毕业。先后在广东省公安医院、河南省许昌地区中医院、广东省韶监医院任医师、主治医师、副主任医师。潜心研究运用脾胃、活血化瘀等学说。对内、妇、儿科疑难杂症有独到经验。勤笔耕耘撰“脾胃学说与临床应用”、“补中益气汤在妇科临床应用”，活血化瘀法在内、妇、儿科急腹症的临床应用，及胃肠肝胆、急慢性肾炎、老年病等论文在海内外杂志及学术会论文汇编等发表 50 余篇。1994 年 3 月有 2 篇论文获得首届医圣杯国际

中医药论文优秀奖。

【方药组成】黄芪 24g 人参 15g 当归 18g 茯苓、香附、白芍、熟地、巴戟、玄胡各 12g 干姜 15g 陈皮、肉桂、知柏、知母、乳香、三七各 6g 天麻、柴胡各 4g 砂仁 3g

【制用方法】上药烘干研末，入瓶备用。治疗时以 75% 酒精消毒神阙穴，取药粉 10g 左右，用蜂蜜调膏置于穴上（呈圆形约 2.5~3cm）。药膏以 8×8cm 大小胶布固定，3 日更换 1 次，在药之胶布上面放一金属片，于片上置 1cm 长艾条，点燃灸 4~5 壮。每天 1~2 次，1 月 1 疗程。

【功效】益气血、补脾肾、调阴阳、延年寿。

【适应证】气血亏虚、阴阳失调、诸腹疼痛、纳差倦怠、头晕目眩、内脏下陷、久泻脱肛、经水不调、崩漏带下、子宫寒冷等。如胃炎、慢性肠炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胃子宫下垂、慢性妇科炎症与防病保健。

【方解】本秘方内既有补中益气汤、十全大补汤，又有补肾阴阳、活血化瘀、理气等药。它调和后天脾胃与先天肾气，扶正祛邪。方中既存芪参桂姜之温性，又寓知柏地滋之属，补无燥，滋不腻。多年来临证施于多种疾病，屡获良效。防病保健常现其功。在药理机制方面，除治疗之外，就保健而言，从现代药理分析，上列药品，对于蛋白质与核酸生物合成功能障碍，脂肪代谢、内分泌机能降低，免疫功能的不足，均可使之增强。神阙穴，在中国医学经络学说中，为任脉经的要穴之一。任脉统领一身阴经，循行于胸腹正中，与心肺、脾胃、肝肾相连，故神阙穴有汇经气海之称，为脏腑之本。可使经气循行沟通五脏、六腑、四肢百骸、五官九窍、皮肤筋膜。故具健脾强肾，回阳救逆，调和胃肠，散气通滞，运气利水，活血调经，医治诸病。历代针灸临床家，皆将神阙穴视为健身要穴之一。众知胎儿时期，以脐带从母体获得养料，脐为气血运行出入之门，故用神阙穴特有的生理位置，以

药敷灸，通过其经穴皮肤、血管吸入药物甚为理想，对于不能口服给药患者更为适宜。以此调理先天、后天之药与具有自身调节阴阳气血、先后天功能之经穴，两者结合则更为有效的发挥其治疗保健作用。

【注意事项】补脾益肾散神阙灸法，适应于虚寒性，对实热病证、孕妇、脐部皮肤损伤、炎症者忌之。并禁食生冷油腻。

穴位药物敷贴法

献方人小传 胡发钰，男，42岁，湖北省石首南州村人。现湖北石首市人民医院业务院长兼中西长医结防治中心主任、副主任医师，石首市中医学学会副理事长，湖北省中医学院兼职教师，1992年被石首市政府授予“石首市科技拔尖人才”（通讯地址：湖北省石首市建设路20号，人民医院宿舍一号楼，邮编434400）。从事医疗工作24年，毕业于湖北中医学院，在中医治疗消化系统疾病方面，如肝炎、肝硬化、胆石症、穴位药物敷贴治疗胃肠疾病应用取得了一定成效。1981年以来，先后在《荆州卫生》、《湖北中医杂志》、《四川中医》、《广西医药》、《辽宁中医杂志》上发表论文数篇，其中“60例慢活肝生化指标异常的治疗”一文被《辽宁中医杂志》评为优秀论文一等奖，在全国性学术研讨会上宣读论文数篇，其中“中西医结辨证施治治疗泌尿系统的应用”一文被大会评为优秀论文，“慢活肝生化指标异常治疗应用”一文被收入全国肝病论文专集，“穴位药物敷贴治疗胃肠病的应用”现已向省申报科研成果和专利。

【药物组成】丁香 3g 干姜 30g 黄连 1g 元胡 3g 肉桂 3g 蔻仁 3g 白胡椒 3g 白芍 3g 莪术 3g 苍术 3g

【制用方法】药物共细末，瓶装好封藏备用。药物敷贴方法：

先将选用穴位用酒精局部消毒,然后用鲜生姜擦穴位皮肤呈红色,将备用药物适量放在穴位上,用膏药贴好固定,然后轻揉按各穴位5分钟,1日可按摩3次,症状重者可以按摩时间延长,次数增多,24小时更换一次药物。急性胃肠疾病愈后再应用1周,慢性胃肠病敷贴半月为1疗程,休息3天后再继续敷贴第2疗程。

【功效】温中散寒,理气活血,通络止痛。根据不同症状选用不同穴位,常用穴位足三里、神阙、上脘、中脘、下脘、胆俞、肝俞、胃俞、内关等。

【适应症】胃脘痛、反胃、暖气打呃、窜痛烧心、吐酸、呕吐、口粘、腹痛、腹泻、大便稀溏或水样便;急性肠炎,急性胃炎,慢性胃炎,胃溃疡,肠梗阻,结肠炎。

【注意事项】①如果局部有烧灼或疼痛,可以提前取下,或全身发痒症状加重即停止敷贴。②如贴后局部有发痒、发热、清凉舒适是药物的反应,继续使用。

【疗效】治疗有效率95%。

【典型病例】黄××,男,2岁,1989年8月12日。患儿7个月早产,出生以后又因用乳缺乏,人工喂养,消化不良,长期腹泻,每日少则2~3次,多则7~8次,西医诊断为重度脱水酸中毒,低血钾症,重度营养不良及多种维生素缺乏症,合并口腔霉菌感染。先后到医院住院治疗数次,补液、输血、抗生素等治疗,而病情仍无明显好转,逐前往诊治。其患儿每天腹泻7~8次,口渴尿少,烦躁不安,哭无泪,身无汗,形体极度消瘦,眼眶凹陷,舌红无苔,扪之无津,脉象细数,即使输液、输血亦无济于事,口服药困难,脉症尽参,脾胃之阴重伤,施穴位药物敷贴,足三里、中脘、神阙、脾俞、胆俞,选用穴位酒精消毒,用生姜擦皮肤呈红色,在穴位上放适量药物,膏药贴好固定,各穴位轻揉按五分钟,1日4次,即日腹泻减少3次,进少量米汤,治疗1周后诸症减,能进食,口渴,烦躁不安明显好转。继后中西药共治,外用

穴位药物敷贴、按摩，痊愈。

温肾止泻散

献方人小传 宋永贵，男，51岁，吉林省舒兰人。现任舒兰市新安乡卫生院主治中医师（通讯地址：吉林省舒兰市新安乡卫生院，邮编132625）。擅长内科、妇科，以中医为主，中西医结合，勇于实践。曾在《中医函授通讯》发表过“壮水之主与益火之源之运用”，在中华医药文化研讨会发表了“精气论在黄帝内经形成中的作用初探”等文章。

【方药组成】补骨脂 10g 肉豆蔻 10g 附子 15g 干姜 10g 肉桂 10g 吴茱萸 10g 白芷 5g 细辛 5g 皂角 3g 五倍子 10g

【制用方法】上药共为细面，制成温肾止泻散密封备用。用时取该散 1g 纳入脐内胶布固定，3~5 天换药 1 次。

【功效】温肾健脾，燥湿止泻。

【适应病证】五更泻、寒湿泻。

【方解】脾的阳气与肾中真阳密切相关，肾阳之火能助脾胃腐熟水谷。若肾阳虚衰不能温煦脾土，就会运化失常，而引起泄泻。补骨脂补肾阳；肉豆蔻、吴茱萸、附子、肉桂、干姜温中散寒；白芷、细辛、皂角温通香窜，使药物易于渗透深入肠内；再加五倍子固涩止泻，使肾中真阳复苏，运化正常而泻自止。

【临床应用】①五更泻是慢性疾病，用温肾止泻散病情好转后，可再将该散做成脐疗带，使药物长期与脐部接触以巩固疗效。②小儿腹泻可取温肾止泻散 0.5g，纳脐内，外敷热鸡蛋饼，以不烫坏皮肤为度，包好即可。

【注意事项】①禁忌生冷油腻食物。②属于热证不宜用本方。

【疗效】疗效确切未作统计处理。

【典型病例】陈某，男，47岁，黎明前腹痛泄泻4年，1年来不但黎明前腹泻，白天还便2~3次稀便，时有完谷不化，食后胀满不舒，腰膝酸痛，四肢发冷，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细。用温肾止泻散敷脐7次，大便正常，为巩固疗效，又嘱其用温肾止泻散做成脐疗带。未再复发。

腹 泻 散

献方人小传 郑子新，男，49岁，浙江湖州市人。现为湖州制药厂风湿病、骨伤门诊部主任医师（通讯地址：湖州菱湖东林弄24号302室，邮编313018），大专学历。从师于著名针灸学家承淡安先生高徒、苏州名医顾建岗先生。受卫生部中国当代高级医师、当代名医荣誉职称。中国名医疑难病研究所特聘研究员、专家。编入国内外医学辞典、名人传记、医案医话等12部医书，发表论文多篇，撰写《风湿必读》、《针灸集要》两书。临证30余年，遵古训，立新说，治病求本，发明8种秘验方，尿速通药厂开发生产。尤擅长于风湿病的类风关等证治。用外治脐内敷药治腹泻腹痛，效果良好。

【方药组成】肉桂末0.5g 白胡椒0.5g

【制用方法】上药和匀，放脐内，外用胶布固定，1天换药1次，一般2小时见效，1次可愈。

【功效】温阳健脾，和中止泻。

【适应病证】消化不良性腹泻，寒症腹痛。

【方解】本方治脾胃虚寒或寒食内积，中州阻滞，升降失调的腹泻腹痛。肉桂具有祛寒健脾，升阳消食，能促进多种消化液分泌，可调节肠内菌群。白胡椒行气散寒止痛，起清升浊降，渣液分道，脾运胃健，腑气通顺，腹泻腹痛自止。

【临床应用】无论大人小儿无菌性腹泻腹胀腹痛，饮食欠佳的单纯性肠胃功能不良症，均有良好效果。

【注意事项】如属细菌性或暴泻暴吐之急性肠胃炎无效。

【典型病例】金××，女，3岁，近2年纳呆，遂腹泻，1日6~7次，泻水样灰白色物，脐内用腹泻散，2小时后其母亲闻小儿腹鸣声，过半天腹泻停止，1次告愈。

肝病止痛散

献方人小传 邱兴明，男，50岁，河南中牟人。现为中牟县人民医院（邮编451450）副主任医师，副院长。行医30载，对甘温除热法有独到之处，对肝病、心悸、哮喘及妇科杂证辨证分析精确，用药严谨，在临床上常收到良好效果。曾在《中原医刊》发表过文章。

【方药组成】花椒 30g 大茴 30g 小茴 30g 乳香 30g 没药 30g 三棱 30g 文术 30g 降香 30g 漆炭 60g 白酒 750g 猪脬（膀胱）1个

【制用方法】上药共研后装入猪脬内加白酒 750g，扎口后即可放于两胁，2~3小时后右侧可换至左侧，敷用 3~5 天即可止痛见效。

【功效】活血化瘀，理气止痛。

【适应病证】适用于慢性肝炎、肝硬化引起的两胁痛。

【方解】本方适用于肝郁气滞的胁痛。肝主疏泄，肝血依赖气以行，肝气抑郁，血行不畅，久而气滞血瘀，脉络瘀阻两胁作痛。本方通过外敷使上药渗透到两胁及内脏从而起到疏肝理气活血化瘀止痛之效。

【临床应用】凡是慢性肝炎引起的两胁痛，包括现代医学所说

的甲肝、乙肝、肝硬化引起的肝区疼痛均可以用。

【注意事项】对酒精过敏者和漆过敏者忌用。

【疗效】通过近年来的应用，止痛效果明显。

【典型病例】李××，男，50岁，中牟县大孟乡人。1993年9月23日就诊。为乙肝合并甲肝，转氨酶198^u，肝区痛明显，经用西药2个月余两胁痛未见减轻。经用上药外敷，5天后疼痛消失。

蛋 发 饼

献方人小传 卢长润，男，32岁，湖北省保康县人。现为中国人民解放军80303部队直属通讯营卫生所军医（地址：云南省昆明市8303部队120分队，邮编650219）。受家庭影响幼年立志从医，17岁进县卫生学校学习中医，19岁入伍。先后求学于光明中医药大学、湖北中医学院、中华气功进修学院。临床上主张针灸按摩药物并施，自疗和药物相结合。发表论文20多篇，部分论文参加全国论文征选专家评定获奖。

【方药组成】头发30g 鸡蛋2个

【制用方法】先将头发敷贴肝区，再将鸡蛋煎成饼置于头发上，用敷料块和胶布固定。

【功效】清热解毒，软坚散结，养血通络。

【适应病症】肝炎，肝硬化，疮毒。

【方解】肝之为病病位在肝，肝主藏血，肝受邪血无所藏，血无所藏而致五脏六腑皆失所养。此方选用有情之物和血肉之品，具有显著的安脏腑养阴血之功，血行气不滞，肝之血气舒畅病之易消。肝区直接给药有利直中病灶，具有安全见效快之特点。

【临床应用】经实验室以及特殊仪器检查和临床体征确诊为慢

性肝炎、肝硬化均可使用。对无名肿痛也有显著疗效。对急性肝炎有治疗作用。每日2次。第2次可将上次的蛋饼重新加热即可。7天为1疗程，1疗程后间隔3~5天再次用药，用药后仰卧于床静养。

【注意事项】应选用常年不洗头带皮脂油的头发。用药初会有明显的疲乏感，保持静养和一定饮食调节即可消失。

消 痞 散

献方人小传 朱祥吉，男，42岁，河北省大名县人。现为河北省邯郸市中心医院中医科主治医师（通讯地址为：邯郸市中心医院中医科，邮编056001）。1969年高中毕业后经省地卫生部门统一考试合格入取跟师学徒3年，以优异成绩获出徒证书。一直从医于邯郸市中心医院中医科，在20余年的临床工作中，接受父亲传授的秘、验方和几十年的临床经验，临症应变施治，师古而创新，疗效显著，并善长治疗肝胆疾病。在省级以上杂志发表论文7篇，曾用父传授此秘方外敷配合辨证施治内服药物，治疗肝脾肿大，疗效可靠。

【方药组成】阿魏15g 血竭15g 穿山甲40g 红花15g 生桃仁15g 生杏仁15g 核桃仁30g 栀子60g 麝香少许 干醋适量

【制用方法】上药共轧为细面过细箩，分为2包，用温开水先将病区洗净，用鲜姜擦1遍，再用干醋适量调和药面（干醋即米醋），敷在肿块上面，再盖上消毒的布，用长绷带束缚好，48小时后揭去。

【功效】活血化瘀，消痞止痛。

【适应病证】肝脾肿大。

【方解】本方所治之病乃因肝郁气滞，脾失健运，湿邪入络等原因而致气血瘀滞形成痞块，故方选活血化瘀香窜之品，藉麝香渗透肌肤，直达病所，共起活血散结止痛消肿之功。

【临床应用】本病一般病程较长，体质虚弱，消化吸收功能均低下，故在用此方外敷的同时，辨证应用“养正则积自除”，着重培补脾胃，予扶助正气之中草药物内服，效果较好。

【注意事项】以上剂量为2次量，连续使用该方3次后效果不显者，则属无效。宜平卧休息，忌食辛辣物及生硬不易消化之食物。

麝香温脐散

献方人小传 陈现同，男，50岁，山东省济宁市郊区石桥乡辛闸村人。1968年毕业于山东中医药学校，现任山东省济宁市郊区石桥医院主治医师（通讯地址：山东济宁市任城区石桥医院，邮编272169）。自幼酷爱中医，先后拜张玉山等7位老师学习，得其真传，后求学于山东中医药学校。擅用外敷法治疗肝硬化腹水及面神经麻痹。科技日报、济宁日报、济宁电视台等曾报道多次。入选香港现代出版社出版的《中国当代知名中医特色医疗辞典》、青岛出版社出版的《诊籍续焰》、河南人民出版社出版的《疑难杂症名医辞典》书中。曾参加山东省首届验案交流会。

【方药组成】麝香 0.6g 阿魏 6g 硼砂 6g 白酒 500ml 猪膀胱 1具

【制用方法】上药共为细末与白酒同放在猪膀胱内，用细线扎好敷在脐部，固定3天即可见效。

【功效】温补脾肾，行水化瘀。

【适应病证】肝硬化腹水。

【方解】本方所治之病为脾肾阳虚，水气停留不化，瘀水互搏所致肝硬化腹水。治疗当以温补脾肾，行水化瘀。病在腹部，给药途径以脐眼为最佳。方选温通香窜之品，借麝香渗透之力，深入腹内，旋运气机，活血消肿，通经达络，使脾肾阳复苏而病愈。硼砂消肿解毒，阿魏消积散结，白酒温肾散水。猪膀胱其质软而韧，不伤皮肤，又能紧合脐孔不使药气外泄，径入于里。

【临床应用】肝炎失治引起的饮食不振，尿少便稀，腹大，脐心突起，腹筋暴露，叩有浊音，不能平卧，面色暗滞，形体消瘦，下肢浮肿，按之如泥。现代医学认为肝硬化腹水，若不及时治疗危及生命。急予麝香温脐散外敷，若肠鸣复得，则为生机已得，转危为安。

【注意事项】使用该方3次后若效果不佳，急宜采取其他措施。

【疗效】此方治疗15人，其中14人获痊愈，1人见效，疗效确切。

【典型病例】李某，男，40岁，1963年患急性肝炎（黄疸型），经中西治疗后，肝功能恢复正常。后常因酒食不节，夫妻不和时有反复。1966年春，感腹胀加重，伴有呕吐，在某医院诊为“肝硬化腹水”。现饮食不振，尿少便稀，腹大，脐心突起，腹筋暴露，叩有浊音，不能平卧，面色暗滞，形体消瘦，下肢浮肿按之如泥，舌质紫而有瘀点，脉沉涩。证属脾肾阳虚，水气停留不化，瘀水互搏所致。急用麝香温脐散敷在脐部，固定3天。连敷3次，临床症状消失。随访5年未再复发，并能从事家务劳动。

通腑软膏

献方人小传 侯勇，男，30岁，安徽合肥市人。现为安徽中医学院附属医院外一科主治医师（通讯地址为合肥市梅山路，邮

编 230031)。1985 年毕业于安徽中医学院中医系，留校后一直从事外科临床、教学及科研工作。擅长于对疮疡、急腹症等病的中西医结合治疗。先后发表论文有“拔罐法治疗有头疽 23 例”、“玉屏风散加减治疗多发性疖 35 例”、“青紫散外用治疗疮疡临床和抗炎实验”等，参加编写《中医传统试题库》。

【方药组成】炙甘遂 6g 生大黄 3g 冰片 1g

【制用方法】上药共研末，加凡士林适量赋形，敷于脐上，每日 2 次，外扎纱布。

【功效】通腑泄热。

【适应病证】腹部手术后或其它疾病属阳明腑实证，腹胀，大便不通。

【方解】本方为在《千金方》以甘遂末敷脐“消腹胀，通二便”的基础上加味而成。“六腑以通为用”，方以甘遂为主药，取其峻下之力，炙用可减其毒性，辅以大黄通腑泄热，借冰片渗透之性，共同作用于神阙穴，深入肠内，使腑气得通，诸症皆消。腹部术后即用，既防且治。

【临床应用】腹部手术后由于麻醉、手术操作和原发病的影响，临床多出现不同程度的痛、胀、吐、闭等阳明腑实证候。针对以上共性，根据中医“六腑以通为用”和脐疗的经络脏腑相关学说，对腹部手术患者术后即用通腑软膏敷脐。适用于不同的年龄，体质和病种，以促进术后胃肠功能恢复为目的，较之内服等方法俱有简、廉、便、验和安全的优点。临床上还可广泛应用于防治术后肠粘连、慢性便秘等症，或结合内服等其它方法则疗效更佳。

【注意事项】若纯属虚寒证者不宜用本方。对本方有过敏者慎用。

【疗效】通过对腹部手术后 68 例（以胃大部切除、胆系手术及肠切除术为主）进行前瞻性随机对照临床观察，表明用药组较未用药组平均肛门排气时间提前 26 小时，排便时间提前 32

小时，恢复进食时间提前 36 小时，胃肠减压时间及静脉输液量也相应减少。两组以上各项指标有显著差异 ($P < 0.01$)。

外敷止痛灵

献方人小传 朱思纯，男，汉族，1938 年出生于河北省丰润新军屯镇的一个中医世家。现任河北省丰南县中医院（邮编 063300）内科副主任，主治医师，县政协委员。自幼随父习医，尽得其传。1960 年，拜在中国中医研究院岳美中教授门下，获益匪浅。先后曾就学于河北中医业校、北京中医学院、中华中医进修大学。从 1979 年至 1994 年在省级、国家级、全国会议共发表 30 余篇文章。多年来对风湿病、骨质增生颇有研究。1982 年研制的专治风湿病的“痹痛灵”有效率 97% 以上，已收录在《中国中医秘方大全》。1992 年研制的专治颈腰椎病的“椎体康胶囊”，已获中国专利。1992 年获全国专利局银质奖，获银牌 1 枚，并获世界生命杯大奖赛优秀论文奖。1994 年 4 月卫生部长陈敏章和国家中医药管理局局长吕炳奎题词。1993 年 11 月 17 日在河北省石家庄通过省级鉴定，获二等科技进步奖。

【方药组成】乳香 10g 没药 10g 红花 6g 麻黄 6g 桂枝 10g 透骨草 20g 灵仙 10g 桑枝 10g 细辛 6g 小白花蛇 1 条（或乌蛇）

【制用方法】用两个小布袋，将上药 2 剂分装两袋，封好口，再用白酒滴 2 盅放在笼屉蒸 20 分钟，敷患处，交换用。

【功效】祛风除湿，活络止痛，温经散寒。

【适应病证】风湿痹痛。

【方解】乳香、没药、红花、小白花蛇活血祛瘀活络止痛，细辛、灵仙、桑枝、麻黄、桂枝、透骨草祛风除湿发散风寒，并

有抗炎止痛作用。

【临床应用】此方系祖传，先祖曾几代用此方治疗肩周炎、关节疼痛、坐骨神经痛，有药到病除之捷效。为了验证效果在临床曾应用 20 余年，治疗风湿痹痛 306 例，总有效率达 95.8%。

【疗效】如下表。

疗 效	病 程				占百分数(%)
	3 个月	1~2 年	3~5 年	10 年以上	
痊 愈	102	98	34	15	81.4
好 转	21	19	2	2	14.4
无 效	1	2	5	5	4.2

【典型病例】韩××，男，60 岁，丰南县大韩庄人。腰痛 2 年，近两月加重。患者系腰痛不介意，经常服止痛药维持，每夜间醒后难以翻身，晨起活动好转，但能坚持做一般工作，近两月加重不能活动，弯腰困难。曾到唐山××医院就诊，检查和化验，拍片均无异常。来我中医院风湿门诊。患者用车护送，2 人扶持到门诊。查：舌暗脉沉无力，上肢及其他无异常变化，腰椎无压痛，腰肌压痛明显，活动受限，两腿无明显变化。化验血沉 10mm/h，抗链“O”500^u 以上，类风湿因子阴性，拍片腰骶椎无异常。诊断为腰肌纤维织炎（腰肌劳损）。中医：寒湿性腰痛。治疗：温阳散寒止痛。方用外敷止痛灵。外敷 4 次痊愈，随访 3 年未复发。

药 浴 方

献方人小传 额尔敦巴特尔，男，70 岁，内蒙古扎鲁特旗人（蒙古族）。8 岁开始学中医，在 50 多年的治病过程中，主治内科、外科、儿科、妇科病，治愈了 2 万多病人，治愈率达到了 96%。1988

年被评为副主任医师。自己研制的中草药，对于治疗脏腑的几种内伤，效果很好（通讯地址：内蒙古哲里木盟扎鲁特旗阿日昆都冷种畜场，邮编 0291123）。

【方药组成】刺柏、冬青各 1kg 山川椰、麻黄各 2kg 野艾 3kg

【制用方法】把这些药放在 100kg 水中，用温火煮沸，蒸发其水约 50kg，然后药液倒在备用盒里。药渍再加水至 100kg，再煮蒸发其水约 70kg，用剩余的 30kg 药水洗浴。1 日 1 次，每次洗 10 分钟。药水的温度要求 50℃ 左右。

【适应病证】阴冷潮湿引起的腰酸腿痛。

温 膝 膏

献方人小传 张素梅，女，51 岁，河南濮阳海通乡人。于河南中医学院毕业，石油部一公司职工医院（洛阳关林）中医内科主治医师。近几年发表论文数篇，1993 年撰写的“无因性特发性下肢浮肿”和“指压眼球诊治肝之强弱的临床应用”分别由《中国医药荟萃》和《黄河医学》杂志发表。

【方药组成】皮胶 250g 生姜 250g 樟脑 9g

【制用方法】将生姜捣烂成糊状，调和樟脑，再与烊化的皮胶掺在一起拌匀，然后敷在肿大的膝关节上，外用塑料布包扎，4 个小时去掉，必肿消痛止。一般 1 次即可见效，无须敷第 2 次，多年来治愈 28 例鹤膝风患者，屡治屡效，近远期疗效皆满意。

【功效】温经散寒祛湿，活血通络止痛。

【适应病症】鹤膝风。

【方解】本方所治之病，乃因足三阴经空虚，风、寒、湿邪乘虚而入，阻于筋骨血脉之中，因循日久，致血虚寒凝痰滞，膝

关节肿大。治疗当以温经散寒，除风祛湿。方选温通香窜之品，籍樟脑香窜渗透之力，生姜辛温发散之用，皮胶粘腻之性，且生姜油又能促使膝关节周围血液循环，促使肿大的关节腔内的积液，一部分由毛窍外泄，一部分随水液代谢由小便排出。

【临床应用】鹤膝风又名鼓椎风，游膝风。由于足三阴经空虚，风寒湿邪乘虚而入所致。膝内隐痛寒胜也；筋急而挛风胜也；筋缓无力湿胜也。邪气阻于经络血脉，致膝肿大，初起如绵，皮色不变，亦无发热，属阴寒之症，疼痛日增，无论单侧双侧，俱宜温通宣散。

【注意事项】鹤膝风已溃者，禁用该方。若需再次敷该方者，必须间隔 1 周，否则损坏皮肤。

淋浴消瘤汤

献方人小传 卢明，字松嵩，25 岁，湖北荆州人。现任颖风居疑难病研究所所长（通讯地址为湖北省荆州城老南门外御河路 54 号，邮编 434100）。华夏中医高函院函授生。其父卢颖，著名中医肿瘤专家，应用自拟治癌专方颖风癌克星加减防治癌症，闻名遐迩。随父临床近 10 年，对乙型肝炎、肝硬化、腹水、萎缩性胃炎伴肠上皮增生、经久不愈的溃疡恶性化、各类肿痛增生等癌前病变有独特的治疗经验。

【方药组成】石菖蒲 50g 水菖蒲 100g 生南星 100g 生半夏 100g 黄药子 200g 狼毒 100g 桃树枝、桑树枝各适量

【制用方法】上药水煎沸 30 分钟，倒浴盆内，加醋、酒适量。趁热蒸、洗、泡全身约 20~30 分钟，使之全身汗出为度。每日 1~2 次。

【功效】行气活血，化痰软坚，祛风除湿。

【适应病证】多发性神经纤维瘤，全身淋巴结肿大及风湿痹痛。

【临床应用】本方治疗多发性神经纤维瘤 30 余例，据抽样随访统计，有效率达 75% 以上；治全身性淋巴肿块 7 例，有效率为 50%；无名肿块 3 例，有效率 70%；风湿痹痛 68 例，有效率 93%。

【注意事项】应用本方时先蒸后洗，注意不要烫伤。

【典型病例】秦某，男，43 岁。右下肢发现结节状肿块多处，皮质坚实，与周围组织分界明显，局部无红肿热痛，重按有酸胀感，不妨碍活动。约半年后左下肢对称部位亦发生类似肿块多处，背部，上肢同样有类似肿物。患者惊恐不安，急上医院诊治。病理切片诊断为多发性神经纤维瘤。因肿块遍布全身，数目多达 108 枚，手术治疗困难，授上方治疗，每日 2~3 次。治疗 28 天后复诊：肿块已有所缩小，肿块数已少了 15 枚。原方继续，嘱其蒸洗泡之前可服药液 200ml。出人意料，加内服后效果尤佳，仅不到 3 个月肿块即全部消除。

鹤膝风外治方

献方人小传 马振远，男，44 岁，山东省荷泽市人。现为荷泽市中医院主治医师、内科主任（通讯地址为山东省荷泽市曹州路北段 21 号，邮编 274000）。出生于七代中医世家，18 岁侍学于祖父，深得家传，对妇、内、外科疾病师古而有创新，常内外合治，增强疗效。发表学术论文 10 余篇。

【方药组成】川乌 10g 草乌 10g 肉桂 10g 红花 15g 白矾 15g 枯矾 15g 香油 50g 黄蜡 100g

【制用方法】将前六味共研细面，用香油调和，再将黄蜡化开与前药调和好，视膝关节肿块大小，制成饼状敷贴患处，外用布包扎固定，贴一周后再换。

【功效】温经散寒，活血通络。

【适应病证】鹤膝风（风湿性关节炎）。

【方解】风寒湿邪入侵痹阻于膝而为鹤膝风。症见膝关节肿痛，步履困难。方用川乌草温经散寒通痹止痛，肉桂、红花温经活血化瘀通络，矾石去冷湿风痹。诸药合用共奏温经散寒，活血通络，除痹之效。

【临床应用】鹤膝风多因风寒湿邪痹阻经络所致。症见膝部关节肿痛，屈伸不利，活动不便，步履困难。现代医学所谓风湿性关节炎、增生性膝关节炎。外用本方兼内服益气养血、除风湿、通经络之剂，每获良效。

【注意事项】若属湿热蕴结，红肿热痛者不宜应用本方。

【典型病例】赵氏，女，62岁，菏泽市北关人。1989年7月13日初诊。自诉15年前因劳累受寒，两膝关节肿大，疼痛。服药治疗时轻时重，近两年加剧，不能下床，腿软无力，动则疼痛。用上方贴敷6次，兼服中药大防风汤合四神丸加减而愈。随访近3年未见复发。

止 痛 散

献方人小传 耿秀珍，女，40岁，汉族，中共党员，医师。1987年毕业于内蒙古医学院中医系。工作单位：内蒙古中蒙医院（邮编010020）内科。擅长治疗呼吸系、消化系疾病及痛症等。1990年在重庆市中医研究所进修中医内科及中医急症1年。近些年发表论文“独活寄生汤加减治疗40例风湿性关节炎临床报导”、“120例肺心病舌底静脉曲张观察情况报告”、“灯笼海桑散治疗慢性咽炎60例疗效观察”、“二黄五味散治疗发烧70例临床分析”等。

洪洁，女，38岁，蒙族，中医师，1983年毕业于内蒙伊监

卫校。工作单位：内蒙中蒙医院内科。擅长治疗风湿病，心脑血管病及痛症等。近年来发表论文“中药配合针灸治疗前列腺肥大的临床研究”、“针灸治疗中风”等。

【方药组成】白胡椒 15g 生川乌 15g 细辛 15g 磁石 15g 僵蚕 15g

【制用方法】将上药捣碎，摊白布上用柳木笼蒸 1 小时，泡入 1 斤白酒内，密封 10 天后用。以酒反复摩擦病位，时间约 10~20 分钟，日 2 次，星起星落时用（即晚 8 时、晨 5 时）。

【适应病症】风寒湿痹痛，骨质增生，无名肿痛麻木，各种头痛等证。

【方解】方中白胡椒辛热，散寒止痛；细辛辛温，祛风散寒止痛，二药芳香气浓，性善走窜，为行痹止痛良药；川乌辛苦温有大毒，祛风散寒止痛，为治偏正头痛、跌打损伤之要药；僵蚕咸辛平，祛风止痛，解毒散结；磁石辛咸寒，潜阳安神，聪耳明目。《本经》云“主周痹风湿，关节中痛”。五药合用祛风寒，行痹止痛，化瘀滞，疗伤散结。

【临床应用】痹者，闭阻不通也。凡各种原因引起的气血运行不畅，形成筋骨、肌肉、关节等处疼痛、酸楚、重着、麻木及关节肿大屈伸不利等病变，本方均有特效。临床实践应用证实，在治疗风湿病、类风湿病、鹤膝风、颈椎、腰椎骨质增生、老年骨关节病、头痛、无名肿痛均取得满意疗效，1 个疗程为 10 天。

【注意事项】①本方虽为外用药，但个别患者有过敏现象，应立即停用，口服或外用抗过敏药物，无不良后果。②如疼痛肿胀属热性者可试用，一般不主张用。③禁忌内服。

止痛灵药水

献方人小传 张孔文，男，60岁，四川省人，四川省汉源县中医院副主任医师（邮编：625302）。1950年参军行医，1960年毕业于泸州医学院中专部，光明中医函授大学85级毕业。采制中草药760余种，创办中草药门诊部，拣药不收费，疗效显著。发表论文多篇，中药方面有：中药新效用、中药量和效、中药剧毒药浅识、中药虫类药的临床应用。

【方药组成】冰片 50g 芒硝 25g 薄荷油 5ml。

【制用方法】将前2种药装入瓶中，加入75%酒精500ml，再加入薄荷油，密闭。用时振荡，外擦痛处，1日多次。

【功效】止痛止痒消肿。

【适应病症】神经性疼痛。

【方解】高浓度冰片液有麻醉止痛作用，芒硝液有消炎消肿作用，薄荷油芳香通络，三药合用，舒筋活络，消肿止痛。

【临床应用】神经痛，瘀血痛，晚期癌症剧烈疼痛等。

【注意事项】急腹症手术前不宜用本方。

活络止痛散

献方人小传 李永成，男，47岁，四川省成都市人。大学学历。现为四川省乐山市第二中医院（邮编614000）副主任医师。出身于医学世家，从师于当地著名老中医，悬壶嘉州30余载。擅长于手法配合药物治疗骨伤科疾病。骨折治疗强调要重视功能康复，骨折后期除补肝益肾、强筋壮骨外，还注重调脾胃。对颈椎病、肩

周炎、梨状肌综合征、腰椎间盘突出症、骨质增生、寒湿痹痛、骨错缝等病的治疗效果显著。独创的“六步按摩法治疗梨状肌综合征”受到省内外专家好评，并在《江苏中医杂志》、《中国骨伤杂志》发表。被聘任为光明中医函授大学骨伤科学院成都分院乐山函授所副所长，《中国骨伤》、《医学理论与实践》杂志通讯员。10篇论文在国家、省、市级杂志发表并多次参加全国、省、市级学术会议。已经选入《中国当代中医名人志》、《当代中国骨伤人才》、《中国当代医界精英辞典》、《疑难杂病求医指南》等书中。《乐山报》1990年以“世上无难事”为题进行报道。

【方药组成】白附子 30g 羌活 30g 独活 30g 白芷 30g 干姜 30g 红花 30g 赤芍 30g 牛膝 30g 土鳖 24g 苡仁 30g 血竭 30g 乳香 24g 没药 24g 灵仙 20g 玄胡 30g 当归 30g

【制用方法】将上药共研细末，装瓶备用。临证时取药适量，加凡士林，用沸水调匀，乘热敷于患处。

【功效】散寒除湿，活血祛瘀，通络止痛。

【适应病证】寒湿痹痛。

【方解】方中红花、赤芍、当归祛瘀活血，血竭专入血分，为治血瘀肿痛之要药，能散血滞，解诸痛；羌活、独活、苡仁、白芷祛风胜湿，温经通络；加之附子、干姜大辛大热，更增强温经通络之力；乳香、没药、玄胡为伤科止痛要药；土鳖有良好的活血祛瘀，疗伤止痛之功；牛膝既能补肝肾、强筋骨，又能通经脉而利关节；威灵仙以走窜为能事，能消积湿停痰，祛血凝气滞，且止痛作用较强。综观全方，具有良好的活血祛瘀，散寒除湿，通络止痛之功。故每每临床，均收良效。

【典型病例】罗某某，男，47岁，工人。患者一年前骑自行车不慎跌倒，致右膝、踝关节软组织损伤，经治疗后好转。因患者系轮船工人，经常外出，故未坚持治疗，近日酸胀疼痛加剧，行

走、活动困难，以手法按摩后敷上药，3次痊愈。半年后随访，无不适感。

风湿敷贴剂

献方人小传 白碧，男，50岁，主任医师。现为国际自然疗法学会（香港）会员，中外合资锦州金海医疗保健品有限公司副总经理，锦州市中心医院金海门诊部主任（通讯地址为辽宁省锦州市解放路七段11—1号）。临床善治外科急腹症、结石症，针灸中药结合治疗内科杂证，如中风、痹证、水肿、消渴等，富有经验。首创中药滴肛疗法（不同于灌肠），论文发表在中国《中医杂志》1992年第2期。倡导自然疗法，主张身心并治。1992年8月曾出国去香港参加国际学术交流。发表国家及省级论文近20篇，多次参加国际、国内大型学术研讨会，并在大会发言。是《中医杂证治要》一书的编委、主要作者，其名字被《中国当代中医名人志》收录。

【方药组成】 透骨草 300g 秦艽 200g 海桐皮 200g

【制用方法】 上药混匀，装白布袋内，置锅内蒸之，见冒气后再蒸半小时，取出药袋待温后敷贴患处，30~60分钟即可见效，连敷1周，以后每2天1次，再敷7次，可愈。

【功效】 散风除湿，祛寒通络。

【适应病证】 风湿性关节炎，亦可用于风湿之红斑及软组织红肿等。

【方解】 上药均为治风湿之要药，且平和无毒。其中透骨草有渗透及消肿作用；海桐皮治上肢疼痛，因其苦而微寒治热痹尤宜，且偏于治风湿之皮肤红斑、红肿，秦艽偏治下肢风湿客于筋络之间，祛风燥湿，和血柔筋，故治痹痛挛急，又秦艽味辛苦

性平，无其他风药之燥，反而偏润，故没有伤阴之弊，反有解骨蒸劳热之功。三者合而为一，效果甚佳。其药理作用是通过神经系统间接影响脑垂体，使肾上腺皮质机能亢进，皮质激素分泌增加所致。本药作用与氯喹考的松相似，较水杨酸钠为强。

【临床应用】 风湿性关节炎是气血为病邪阻闭所引起的疾病。乃人体肌骨经络遭受风寒湿邪侵袭后致气血运行不畅而出现筋骨、肌肉、关节等处的疼痛、痠楚、重着、麻木和关节肿大、屈伸不利等症状，其病程缠绵，经常反复发作。余用此方、此法治疗该病 98 例，有效率占总数的 88%。

【典型病例】 鲍×，女，38 岁，营业员。患者左膝、踝关节痛，有时肘腕关节亦痛，1 年余。活动受限。化验检查：抗“O”：1000 单位，血沉亦快，脉沉弦、舌暗苔薄。诊断：风湿性关节炎（痹证）。经上风湿敷贴剂治疗，半个月后疼痛缓解，1 个月后复查，抗“O”：500 单位，血沉正常，临床治愈。

青 囊 散

献方人小传 伊智雄，男，47 岁，北京顺义县人。现任石家庄医学高等专科学校中医学教研室副主任，附属华山医院中医科副主任（通讯地址为：石家庄医学高等专科学校附属华山医院，邮编 050031）。出身世医之家，20 岁从师学医，继入大学深造，又先后从师河北名医李春茂（已故）等。临证求变通达，治疑难病主张医意创新。发表论文 20 余篇，论文范围有古籍方理应用，亦涉及现代科学及边缘科学的探讨。

【方药组成】 草红花、全当归、骨碎补、制乳没、软防风、宣木瓜、川椒、香白芷、透骨草、羌独活、生黄柏、川续断、怀牛膝、生马钱子、干茄根各 30g

【制用方法】上药共研粗末(10目左右),用大青盐100g略研,50~60度烧酒约60g与上药末拌匀后分为3份,用麻布袋盛装。用时,放蒸笼蒸半小时后使用。用后,置阴冷处。

【使用方法】上法所制三青囊,趁热敷于关节处,每次1个,轮番使用。若烫手,先用柳枝将其隔开皮肤,起薰蒸作用,可耐受时再热敷于皮肤上,变温凉后,再换1个,仍依上法使用。每次治疗时间不小于1小时,日2次,连续使用1周,即1个疗程后,即弃此囊。如需第2疗程,停药1周后,仍依上法制作、使用。使用时注意不要烫伤皮肤,若烫伤即停用。

【功效】温经通络,祛风除湿。

【适应病证】风寒湿痹所致关节痛证。

【方解】本方使用活血化瘀,温经通络,祛风胜湿之药组成,借盐酒浸穿之功,藉热力而透肌肤,直达病位经脉,抗邪以外出。方中干茄根,需用鲜茄根置灶房之檐下风干,得阳光之温煦,受灶火之薰蒸以除阴寒之气。《分类草药性》云:此药可“治风湿筋骨瘫痪”。马钱子,又名番木鳖,张锡纯认为:“其开通经络,透达关节之力,实远胜于他药”。马钱子有大毒,但外用则无碍,其外用活络止痛又胜于它药。一患者使本方时,马钱子因一时未能购得,余药使用1周,效不著,后设法购得后,再用,立效。其功不可没也。马钱子,强筋壮骨,祛风散寒,通经活络,散结消肿而止痛。无论外敷内用,用之得宜,皆效若桴鼓。

【临床应用】本方用于因风寒湿邪侵入经脉流注关节,卫阳被遏,气血郁滞,致关节疼痛活动失灵之证。本方一般使用1疗程即效。尤以使用后,关节部位汗出者佳。用后忌受风。本方可连续使用2~3个疗程,疗程间需间隔1周。时有应用1疗程结束时尚未痊愈,但数日后自愈。此药效深入病灶,继续发挥效力使然。此方若与内服药并用更佳。

【注意事项】此药小心保管,不得内服。亦防止它病滥用。使

用本方，偶有局部稍泛红疹者，无碍，继用可自愈。

【典型病例】纪某，女，64岁，退休工人。1988年11月6日初诊。患者间断发作性膝关节疼痛10余年，近3年呈进行性加重，尤以每晨起床时疼痛难以行动，需扶杖忍痛活动半小时左右方可缓解。在某省级医院查：类风湿因子阴性。X线所见：两膝关节软组织肿胀，骨关节骨质疏松，关节间隙狭窄。诊断：类风湿性关节炎；老年性骨关节退行性病变。患者在既往发作时曾使用阿斯匹林、保泰松、消炎痛等可缓解，近年常服尪痹冲剂，壮骨关节丸等，此次发作已近半年，上述药物皆效少。在各医院先后使用理疗、针灸、药物离子导入等治疗方法亦未效，辗转求治于余。刻诊：患者两膝疼痛不能行走，自述右膝尤甚，由两亲属搀扶来诊。两关节部肿胀，肤色无改变，稍有指凹。舌略红胖伴有齿痕，舌苔白厚略腻，脉沉弦略滑，此乃风寒湿邪郁久化热使然。拟方：大生地30g，晚蚕砂30g，汉防己15g，威灵仙15g，生苡仁20g，软防风10g，全当归10g，赤芍药10g，绵茵陈10g。上方加减7剂后，舌脉多安。予青囊散1料，嘱以用法。半月后其子来告，使用青囊散1周后，两膝关节疼痛大减，已可弃杖行走。停药后亦日胜一日。现两膝疼痛若失，活动自如。再讨青囊散1料以备用。患者次年秋季又发作时用备药再愈，至今未作。

麸醋热敷解痛方

献方人小传 宋会都，男，52岁，山东省莒县库山乡人。现任莒县中医院副院长，副主任中医师，中国中医药学会会员，日照市中医药学会副理事长（通讯地址为山东莒县中医院，邮编276500）。出生中医世家，16岁跟祖父中医带徒。1977年毕业于山东中医学院，从事中医药工作36年，曾任县医院中医科主任，

1987 年为莒县专业技术拔尖人材。对心脑血管病、出血性疾病、糖尿病等内科疑难病证有较丰富临床经验。主张内外并治。发表论文 32 篇，参编出版著作 5 册。“辨证施治为主治疗急性中风病临床研究”，1992 年获日照市科技成果进步奖。

【方药组成】麸皮 1000g 米醋 300ml（或酌情定量）

【制用方法】将米醋均匀拌入麸皮内，分 2 次放锅内炒热，用布包扎后，患处或选穴位局部热敷，两包交替使用，每次热敷 1 小时左右，每日 1~2 次。

【功效】温经散寒，活血止痛。

【适应病证】风寒痹痛，筋脉挛急，跌打损伤，瘀血肿痛，寒凝气滞，脘腹胀痛等症。

【方解】本方所治之病，主要由风寒湿邪侵袭，或跌打损伤，致筋脉挛急，经络气血痹阻，不通则痛。麸皮健脾祛湿，米醋活血透肌，二者拌匀炒热外敷，增强散寒行气，活血化瘀，消肿止痛之功，故能使病痛缓解或治愈。临床应用：该方属熨法，辨证要点在“寒”、“瘀”2 字。此与古方坎离砂功效相类似，但其治疗范围更广，而且简便廉验，最适用于农村患者。

【注意事项】使用中要注意预防烫伤，始用热度较高，可酌情隔垫软布。用后若醋量不足，可适当加入后再炒用。

【疗效】笔者几十年来应用本方治疗患者数千例，疗效满意。

外用痹康灵

献方人小传 马春玲，女，31 岁，1985 年毕业于山西中医学院。职称：主治医师。现就职太钢总医院（邮编 030003）。治学以严谨见长，诊病思路宽广，广开思源，明理创新，博采众学，多

科学交叉互补。识病以病理，诊病以多元。自创方有：肠惹安、降脂抗衰饮、老年便秘散、舒胆方、产后调脾汤、咽炎袋泡茶、积滞灵等，论文有“婴幼儿腹泻辨治经验”、“小儿急性支气管炎 150 例临床分析”、“益肾健脾降脂延缓衰老之探讨”、“加味逍遥散防治更年期综合征”等 10 余篇均发表，为“华夏优秀医论荟萃”副主编。

【方药组成】透骨草 20g 红花 20g 小茴香 20g 松节 15g 老鹳草 15g 艾叶 20g 伸筋草 20g 木瓜 15g 海风藤 15g 黄芪 50g

【制用方法】将上药共研粗末，用纱布或粗布包成 $0.2 \times 0.2\text{m}$ 方包，加热（蒸或近火）外敷患处，1 小时许复加热，1 日 3~5 次。

【功效】祛风、散寒、除湿、活血、通络、强壮。

【适应病证】痹证。

【方解】本品具有祛风散寒，除湿，活血通络作用（红花、松节、伸筋草等），对皮肤有通透性（透骨草、艾叶等），重用黄芪有强壮作用，治本以还柔韧之性。

【临床应用】应用本品局部关节、肌肉有热感，舒适，并随之扩散至周围均有舒热感。若配合穴位热敷，疗效更佳。

【注意事项】本品仅适用风寒湿痹，对风湿热痹、五脏痹证无效。

二乌消痹膏

献方人小传 郭景周，男，42 岁，河南省孟津县平乐村人。现为青海医学院（邮编 810001）中医第二临床教研室讲师。自幼随学于父，曾任全国骨伤科新技术推广应用学会理事。对颈肩腰腿痛病的防治有较深的研究。善于使用中医中药外用内服，治疗风

湿、类风湿性关节炎、骨关节结核，急慢性骨髓炎等。提倡中西医结合治疗骨折，疗效较好。多年来发表论文 20 篇。手法治疗急性慢性筋病亦是作者特长。

【方药组成】生川乌 15g 生草乌 15g 羌活 9g 独活 9g 川断 12g 白芷 9g 生乳香 9g 生没药 9g 黄柏 12g 地鳖虫 10g 川芎 15g 木香 9g 威灵仙 12g 骨碎补 12g 海桐皮 12g

【制用方法】上药共研极细末，蜂蜜调匀备用。使用时将药膏摊敷料块上，面积视肢体粗细，范围大小，灵活裁贴。

【功效】祛风散寒，活血温经，通络止痛。

【适应病证】软组织陈旧性损伤，风湿、类风湿性关节炎。

【方解】本方所治病证为肌肉韧带陈旧性损伤，肢体肿痛麻木，关节僵硬，风湿、类风湿性关节炎引起的关节肿痛强直等。由于气血凝滞，寒湿侵袭，冷痛甚剧，方中用川、草乌，羌、独活，灵仙，海桐皮祛散风寒，温经通络；以乳、没、地鳖、白芷、川芎、木香活血祛瘀行气止痛；佐川断、骨碎补疗伤壮骨；加用黄柏解毒清热，谨防诸药过燥，共达祛瘀散结止痛消肿，软化筋腱关节之效。

【临床应用】跌打扭挫很易造成肌肉韧带关节囊等软组织损伤，如未及时治疗可导致肢体肿硬冷痛麻木，关节僵硬，运动不灵活。寒湿侵袭引起的风湿、类风湿性关节炎见关节肿大、变形、自觉疼痛明显，运动障碍严重，甚至关节强直。用二乌消痹膏每 2~3 天敷换 1 次，直至肿消痛减，肢体关节恢复正常功能。

【注意事项】该方是在家传方基础上经作者加减所成，主要用于关节扭挫伤后期瘀血不散肿痛不消，寒冷潮湿引起的肢体关节冷肿疼痛。湿热引起的关节红肿热痛，为本方禁忌症。

姜 樟 灸

献方人小传 田中富，男，40岁，江西瑞昌人。现任江西瑞昌洋鸡山金矿职工医院（邮编：332200）院长。祖辈三代行医，本人始学于江西共大分校医务班，后经江西中医学院函授和专业学习及进修。对肝肾病的治疗有一定的创新，并发表过有关论文。

【方药组成】 生姜3片 樟脑1.0g

【制用方法】 新鲜生姜洗净切成均匀薄片，然后将樟脑粉撒在生姜片上。用火点燃樟脑，以钳或镊子挟住姜片的边沿。贴近皮肤平放在所灸部位，并时时移动姜片。待第1片樟脑燃尽后再接着换第2片、第3片，立可见效。

【功效】 温经散寒，活络止痛。

【适应病证】 风湿性关节炎，寒湿性腰痛，寒性胃脘痛，寒性腹痛。

【方解】 本方所治病症乃因风、寒、湿所致经络、气机闭阻而产生的痛症。治疗当以温经散寒，疏通气机。选生姜辛温、择樟脑芳香走窜之特性，合而为灸，恰中病机。

【临床应用】 本方仅适应于因风、寒、湿所致之关节痛、腰腿痛、胃脘痛和腹痛。临床以遇寒则痛，得热则舒为辨证要点。在治疗风湿性关节炎和腰腿痛时，先要在其关节的穴位处（如膝关节则在其膝眼穴）行针刺，腰腿痛则以阿是穴为主先行针刺。然后再在针刺的相应部位施以灸法。对于寒性胃脘痛和腹痛则无需针刺，其施灸部位分别以胃脘部和脐眼为主。临床具体运用姜樟灸时可视其病情和部位的大小增加或减少生姜的片数。

【注意事项】 在运用本灸法时既要將姜片贴近皮肤，又要避免因灸烫伤。同时必须严格掌握本灸法的病机和辨证要点，对于其

它的病因引起的以上痛症则不属本灸法的治疗范围。

【典型病例】梁××，男，45岁。双腿膝关节每遇风寒或阴雨天气则发疼痛，病情反复发作10余年。关节无红肿灼热，无畸形，血清抗“O”测定阳性。经施以姜樟灸治疗1次后当即疼痛消失，随访5年未复发。

神农祛寒散

献方人小传 周国志，男，40岁，四川省什邡县洛水镇人。现任成都军区士官大队什邡县中医院风湿专科门诊部特聘主治医师（通讯地址：四川省什邡县中心大街西段67号，邮编618400）。自幼随父习医，深得其父行医60余年的治疗痹症之真传。临床治疗痹症主张以温阳补肾，温筋散寒，活血通络为主，兼用外治。其整理研究的治疗痹症的祖传秘方神农定痛丸通过四川省药品检验所检验论证〔（89）川药检业字第049号〕。从1973年起《解放军报》、《中医药信息报》、《黑龙江报》、《四川经济报》、《德阳日报》、《前进报》、《呼伦贝尔报》和中央电视台及地方电视台对此进行了报导。1993年入《中国当代知名中医特色医疗辞典》。

【方药组成】生姜40g 生草乌50g 葱30g 白酒50ml 面粉10g

【制用方法】上药捣烂加白酒面粉调匀，加温至沸，待稍冷后摊入草纸上，敷贴患处后，再用纱布包扎固定，每天1~2次即可见效（每晚睡前敷贴最佳，早晨取之）。

【功效】散寒止痛。

【适应病证】风湿关节炎。

【方解】本方所治之症乃因风寒湿停滞关节肌表，腠理不通，邪无出处。本法重在温络散寒化瘀止痛。选用生姜、生草乌

重点散寒止痛，佐以白酒加温是促使生姜、生草乌更好的发挥药性，增强药效，并使药效保持长时间的恒温。葱可助药效的渗透之力，促进血液循环。加面粉是使药物有粘性和浓度。

【临床应用】对关节疼痛或肌表久痛按之有痛感部位，可先对痛处采取拔火罐后再敷贴神农祛寒散效果更佳。

【注意事项】若见实热红肿硬疔禁用本方。

【典型病例】肖佑兰，女，47岁。住址：什邡火车站。自述颈部疼痛1年多，经县人民医院拍片确诊为颈椎骨质增生，按之有痛感。1993年3月11日经采取拔火罐后再敷贴神农祛寒散。14天后愈，随访至今未发。

痹 痛 酊

献方人小传 殷海昌，男，43岁，湖北鄂州市人。现为中国人民解放军第二炮兵指挥学院医院（邮编430012）主治医师。毕业于云南中医学院中医系，就读于武汉市职工医学院基础理论提高班及同济医科大学协会医院内科提高班，并于解放军195医院皮肤科进修1年。擅长于中医内科、皮肤科，发表论文数十篇，编写出版医学论著及其它书籍4部，发表医学科普文章4篇。

【方药组成】桂枝30g 桑寄生30g 川牛膝25g 杜仲25g 鸡血藤50g 伸筋草15g 干地龙15g 当归30g 川芎15g 红花10g 千年健25g

【制用方法】将上述药物浸入75%乙醇1000ml中，浸泡10~15天，即可应用。每次应用时，加樟脑适量，溶于药酒中，用干纱布或药棉蘸药液外擦患处，涂擦后再用双手在患处轻轻按摩5~15分钟，1日3次。

【适应病证】本药对良性关节痛、风湿性关节炎、腰肌劳损、

末梢神经炎、血管闭塞性脉管炎，以及跌仆损伤皮肤未破溃者，都具有较好的效果。

【方解】痹痛者，多为风寒湿侵袭，致使经脉受阻，运行不畅所致。“通则不痛，痛则不通”，脉络不通，则腰膝关节痛痹。本方中当归、杜仲、千年健补血活血，强壮腰膝骨骼关节。鸡血藤配当归、川芎补血活血祛风。红花活血祛瘀。桂枝通行十二经脉而祛风止痛。秦艽、牛膝、伸筋草、地龙祛风邪燥寒湿止痛。合用有通经活络，活血化瘀，祛风止痛之功效。再加上樟脑之清凉，酒精之渗透作用，引药入肌肤，以及用药时的按摩，促进血液循环，加强药物渗透皮肤腠理，使脉络运行通畅而发挥药物效能。

【注意事项】冬天使用本品时可将药酊加温后应用。跌仆肿痛者在伤后 24 小时才能使用本品。骨折复位愈合后的恢复期，应用本品，可促进骨折部位功能的恢复。

抗痛灵托敷散

献方人小传 李献茂，男，51 岁，湖北江汉油田供应处医院（邮编 433122）主治医师，中华疼痛学会会员。1959 年开始攻读中医典籍，以师传生授进行学习，先后参加过全国软组织疼痛学术会国际颈肩腰腿痛学术会 5 次，撰写学术论文 43 篇，有 3 篇在国家级杂志上发表。在长期临床工作中，独创的抗痛灵载体穴位埋植疗法，荣获湖北省、荆州地区江汉油田科研成果奖。

【方药组成】生马钱子 60g 生栀子 27g 血竭 30g 生乳香 30g 没药 30g 红花 30g 元胡 30g 白芷 27g 生川乌 27g 草乌 27g 当归 27g 生大黄 30g 三七 30g 硃砂 10g 透骨草 80g 七叶一枝花 30g 冰片 10g 樟脑 10g 自然铜 30g

【制用方法】上药冰片、樟脑、硃砂除外，共碾细末过 180 目

筛，然后再加入冰片、硃砂、樟脑和匀装入瓶内密闭保存备用。每次 50~100g，如果病变部位大还可增加量，用醋 1~2 两或 45 度白酒也可，调成粘稠状，装入纱布袋中，放蒸笼中蒸半小时，然后取出趁热敷于患处，可反复蒸、敷，每次大约 1~2 小时，每天 2 次，可连续用 3~4 天。

【方 解】本方对因风寒或急性软组织损伤所引起气滞血瘀而致疼痛，具有温经通络，活血化瘀，消肿止痛的作用。方中樟脑、冰片、硃砂芳香走窜，渗透力较强，具有扩张外周血管改善局部血液循环，促使体内酸性代谢产物排泄，改善细胞缺血缺氧从而达到消肿止痛作用。

【疗 效】活血化瘀，消肿止痛，温经通络。

【适应病证】风湿性关节炎、肩周炎，类风湿性关节炎，颈椎病，腰椎间盘突出症，网球肘，梨状肌综合征。

【临床应用】该疗法对急性纤维织炎，软组织损伤，退行性关节炎，肩周炎，风湿性关节炎，坐骨神经痛疗效显著，经临床观察总有效率 97.8%。使用此疗法无痛，无副作用，具有简便廉等优点，适合广大城乡推广使用。

【注意事项】对皮肤有破损、高血压、心脏病、孕妇均不宜使用。

【典型病例】蔡××，男，71 岁，工人。于 1982 年 12 月 3 日因扛重物不慎，左侧腰部扭伤，当时病人疼痛难忍，行走困难，压痛，肿胀，经用抗痛灵托敷 1 次即愈，当时就可上班，病人感谢不尽，病家称此药为灵丹妙药。

天 麻 针

献方人小传 宋永贵。见本章“温肾止泻散下”。

【方药组成】50%天麻针 2ml 2%利多卡因 5ml

【用具】10ml 注射器 1 支，7 号腰椎穿刺注射针头 1 个。

【制用方法】嘱患者健侧卧位，患肢屈膝，环跳穴局部常规消毒，将上述药物吸入注射器内，针尖向外生殖器方向深刺 3 寸左右，得气后轻轻回吸注射器无血即可注药，每隔 1 日用药 1 次，连续注射 5 次为 1 疗程。

【功效】疏通经络，祛风止痛。

【适应病证】坐骨神经痛。

【方解】环跳穴为足少阳胆经穴，是足少阳、足太阳二脉之交会。足太阳经循行于背，与督脉并行，督脉总督诸阳，故有通经络，利腰腿之功效。天麻针有蠲痹止痛，通经活络之功效。利多卡因是安全范围较大的局部麻醉药，能减少注射的疼痛。环跳在上药的作用下，起到事半功倍的效果。

【临床应用】本方对原发性坐骨神经痛疗效十分显著，对继发性坐骨神经痛疗效较差。对风湿性腰腿痛也同样有明显疗效。

【注意事项】利多卡因过敏者禁用。

【疗效】对 40 例原发性坐骨神经痛临床观察结果，痊愈 21 例，占治疗总数的 60.4%；显效 15 例，占治疗总数的 31.3%；好转 4 例，占治疗总数的 8.3%。总有效率 100%。

【典型病例】梁某，男，30 岁，林业局工作。1989 年 11 月 2 日就诊。4 年前初春季节在雪地作业，劳累后感寒受湿，左腰至下肢持续性冷痛，行走困难，曾在吉林市中心医院等地均确诊为坐骨神经痛，用过多种中西药不愈，时轻时重。经两个疗程疼痛消失，行走如常，随访 2 年未复发。

川草乌灸

献方人小传 魏贤辉，男，1933年生，福建平潭人。1963年在《福建中医药》刊3篇论文。国际论文：“中国古代生物钟——八字”、“从伤寒论谈到现代中医”等5篇；全国获奖：“人体斑点诊疗纪要”、“回春丹治疗机理”、“中医地域学”、“身势语临床应用”、“行立坐卧——塑造自己的健康形象”、“子病兼治母”、“灯火燄淋巴结疗法”、“伤寒论左右中医之现状”；省级获奖：“医学语言学”、“塑造大众需求的医学艺术”。致力于民间医药研究。1989年中国中医研究院邀请为“中医药突破预测研究咨询专家”。住宅通讯：福建平潭县万顺庄25号，邮编：350400。

【方药组成】 川乌、草乌、桂枝按1:1:0.5用量

【制用方法】 上药共为细末。每次取15~20g，与适量蓖麻子仁捣为饼，固定在温灸器上（用10~12cm直径竹筒代替亦可），燃点艾绒温灸压痛点，或沿患侧坐骨神经分布区，每日1~2次，每次15~30分钟，或更长时间，有温热舒服感。

【功效】 通经活络。

【适应病证】 坐骨神经痛以及其他风湿疾病。

【方解】 坐骨神经痛为中医痹证，多因风寒湿邪侵袭，气血凝滞，痹阻经脉所致。川草乌辛而大热，祛寒开痹，力峻效宏；桂枝辛温，通阳散寒，通达营卫；蓖麻子定痛，协调诸药功效。本方即可散在表之风寒，除在里痼冷。温灸使辛热之药性借助热力作用于病变部位，使表寒、里冷、经络之风湿散除，促进经脉气血流通。止痛功效卓著。操作简单，易于掌握，无副作用。

【临床应用】 本药散同时纳入脐，滴少许酒，外贴魏氏万应膏药，3~5天换药1次，有很好协调作用。

【典型病例】林××，男，50岁。右臀连及大腿、小腿痛及踝关节，平时患腿麻痹难受。臀、腓等压痛明显。每日早晚温灸，每次20分钟，1星期痛止，2周痛消失，随访2年未复发。

麻 沸 膏

献方人小传 傅考芹，女，45岁，河北沧州人。现为河北省沧州卫生学校中医讲师、主治医师（通讯地址为河北省沧州卫校，邮编061001）。于1975年毕业于河北医学院，一直从事临床及教学工作，曾任沧州地区中医学会委员等职。临床主张应变而治，不囿传统，对妇、外常见病师古而创新；急危症重在明理识病，内外合治。发表论文10余篇，出版《乡村医生行医指南》。

【方药组成】草乌10g 川乌10g 乳香10g 没药10g 细辛10g 冰片3g

【制用方法】前5药共研细末，冰片研细兑入，以凡士林或蜂蜜调成膏状备用。视病灶大小，用本膏敷于患处，外盖纱布或塑料薄膜，胶布固定，每日换药1次，直至疼痛消失为止。

【功效】温经，活血，消肿，止痛。

【适应病证】各种疼痛。

【方解】疼痛是疾病创伤引起难受的感觉，是临床常见证，故方中以草乌、川乌、细辛散风祛寒，温经止痛为主药。辅以乳香、没药活血化瘀，通络消肿。佐以冰片通窍，清热止痛。众药合用，风寒得散，血行络通，邪气乃去，疼痛自舒。

【临床应用】本方集温经、通络、止痛之良药，故可广泛适用于各种疼痛，尤以软组织损伤肿痛、关节炎及骨质增生、腰椎间盘突出症疼痛疗效卓著。故取方名为“麻沸”。且温凉并用，不论寒热虚实疼痛，皆可采用。

【注意事项】外用药不可内服，病情较重者亦可同时配合内服药治疗。

【典型病例】杨××，女，40岁。因行路不慎跌倒，左髌关节损伤，瘀肿疼痛，功能障碍，站立行路受阻。X线检查，肌腱未断裂，骨质无明显错位折伤。急用麻沸膏治疗5天，瘀肿疼痛消失，活动行路自如。

友 益 膏

献方人小传 孙为富，男，50岁，安徽省怀远县人。现在安徽省怀远县河溜镇中心卫生院工作（邮编233421），主治医师。1967年毕业于安徽淮南医专医疗系。本人对骨伤科有所研究。“行气汤治疗骨折引起的腹胀”在安徽省第二次骨伤科学术交流大会上交流并编入会议论文集，“捏拿治疗颈椎病”在全国中医学会骨伤科学会第五届学术交流会上交流并编入该会议论文集。

【方药组成】透骨草 20g 生山甲 20g 防己 10g 王不留行 20g 细辛 20g 独活 20g 羌活 20g 生草乌 20g 生川乌 20g 五倍子 20g 肉桂 20g 枳实 20g 牛蒡子 20g 木瓜 20g 红花 20g 大戟 10g 泽兰 10g 麻黄 20g 地鳖虫 20g 防风 10g 归尾 30g 功劳叶 60g 威灵仙 20g 生地 10g 三棱 20g 莪术 20g 丹参 30g 桃仁 10g 牛膝 10g 茜草 20g 桂枝 20g 乳香 10g 没药 10g 冰片 20g 马钱子 20g 野辣菜子 30g 姜汁 50g 蜜 2000g。

【制用方法】以上药味共研成末，加姜汁和蜜调成糊状摊于厚纸上以2mm厚为适，敷于患处用绷带或胶布固定，每3天更换1次，5次为1疗程，不愈者继续敷贴。

【功效】化瘀散结，理气舒筋，祛风利湿，通络止痛。

【适应病证】慢性、陈旧性损伤及风湿引起的筋骨、肌肉、关节痛。

【方解】本方除用活血化瘀，祛风利湿等药外，并用疗效强的理气药。气为血帅，局部理气可促进化瘀散结。现代医学观点就是改善局部微循环，恢复组织变性。方内的野辣菜子（学名不详）是一辛辣之物，有较强的理气功效。用蜜做粘和剂除利用粘性外还利用理气功能及滋润皮肤。

【临床应用】药粉越细越好，稀稠度要适中，稠者药力不利发挥，稀了向四周溢出也不利于发挥药力。用药后注意观察发现过敏者立即停用。

【注意事项】本方药有剧毒，只能外用绝对不能入口。

【疗效】用药病人 32 人，痊愈 20 人，占总人数 62.5%；症状明显改善的 5 人，占总人数 25%；无效 4 人，占总人数 12.5%；总有效率 87.5%。

青州白丸子加减方

献方人小传 冀建宛，男，40 岁，河南省邓州市人。1983 年毕业于河南中医学院医疗系，现任河南省南阳张仲景医院（邮编 473000）肿瘤科主任，中医主治医师。多年来，他用中药治疗胃、肝、食道、肺癌以及脑瘤、淋巴瘤等多种肿瘤，取得了较好疗效，已发表省级以上论文 7 篇。

【方药组成】生南星、生半夏、生川乌、生草乌（均砸碎）各 30g 当归、细辛、黑胡椒各 15g 50 度以上白酒 2500ml

【制用方法】把前述药物和酒混装于塑料壶（桶）中，密封 15 日后启用。将棉花蘸取药酒适量，涂擦患部，每次 30~60 分钟，每日 3 次。

【功效】活血化瘀，散结止痛。

【适应病证】体表肿瘤，血栓性静脉炎，跌打肿痛，关节炎，皮肤疤痕等。

【方解】本方出自《太平惠民和剂局方》，原为内治方，笔者用其加减后外用，治疗多种疾病，简、便、廉、验。

【临床应用】本药酒也可快速制取，即将药物粉碎成粗末，按比例兑入白酒，密封 24 小时后应用。每次涂擦患部时间不可太少，否则效果不佳。也可用敷料酒浸后敷于患处，外用热水袋加温治疗。

【注意事项】皮肤破溃者禁用本药酒。

【疗效】10 年来，我院一直用该方外治前述疾病，均取得了满意疗效。

【典型病例】××，男，70 岁，门诊号 920278。患者于 1992 年 5 月 6 日以下肢疼痛 40 年，逐渐加重为主诉就诊。检查见左下肢股前部皮肤有大片瘀斑，触诊有 6×6cm 包块，中等硬度，压痛剧烈，股部肿胀，行走困难。患者曾分别于 1968 年、1980 年两次在河南省人民医院、医学院附属一院均诊为神经瘤，因手术难度较大而未治疗。给本药酒，从 1992 年 5 月初至 1993 年 1 月底，坚持涂擦患部，包块缩小至 2×1cm，疼痛明显减轻，股部瘀肿消退，行走恢复正常。

第二章 儿科疾病外治方

食盐外用方

献方人小传 利顺欣，女，27岁，中药师，现为张仲景国医大学教师（通讯地址为河南省南阳市张仲景国医大学教务处，邮编473061）。自幼喜爱医学，7岁上学，苦读10年，考入河南中医学院，却被录取于中药系。1987年7月毕业后分配到张仲景国医大学，曾从事中药科研工作4年，在药物剂型改革和新产品开发方面获得了不少有益经验。工作之余，对中药临床应用尤其中药外治很感兴趣，搜集了不少这方面的集料。

【方药组成】 食盐 50g

【制用方法】 将食盐置热锅中大火炒2分钟，取出，放凉。放入口中嚼（或与唾液拌匀），分别擦以下部位：额头、前胸口处、背后心处、两侧腋窝、两肘窝、两侧腹股沟、两膝窝、两足心。具体方法是边擦边搓，搓擦顺序依上列顺序，搓擦方向除额头向上、足心向前外，其它均向下。擦完后蒙被发汗。一般1次即可痊愈。

【功效】 发汗解表。

【适应病症】 小儿外感风寒初期。

【临床应用】 小儿外感风寒初期，常见恶寒，发热，兼或头痛。临床若能及时正确使用本法，常屡试屡效（有效率100%）。

【注意事项】 ①食盐在用前一定要炒。②搓擦的方向不能错。

③搓擦后一定要以被蒙头以助发汗。④以酒代盐可获得同样效果。

雄 矾 糊

献方人小传 庞庆东，男，43岁，山东省武城县人。现为胜利石油管理局第五医院门诊部主任（通讯地址：山东省滨州市胜利油田第五医院门诊部，邮编256606）。17岁跟父习医，1970年被胜利油田招为中医医师。临床20余年，擅长应用验方治病。雄矾糊外用治疗疔腮是其中之一，应用10多年效果显著。

【方药组成】雄黄 15g 明矾 12g 冰片 6g

【制用方法】上药共为细末，以75%酒精调成半固体糊状，洗净患处将调好的半固体糊敷于其上，然后外用纱布覆盖固定，连用2~3天肿痛即可消除。

【功效】清热解毒，消肿止痛。

【适应病症】疔腮（流行性腮腺炎）。

【方解】本方所治之病乃因外感温毒病邪后肠胃积热与肝胆郁火壅遏少阳经脉所致。方选雄黄解表燥湿。明矾解毒医疮。冰片辛散苦泻，宣表止痛，防腐消肿。3药合用则清热解毒，散郁止痛。

【临床应用】疔腮症状有轻重不一的发热，头痛，食欲不振，全身不适，恶心。一侧或先后两侧腮腺部位肿胀，边缘不清，按之柔韧感无波动感。伴有疼痛压痛，张口及吃东西时腮部疼痛加重，多伴有口干多饮，便秘或腹泻，小便短赤，舌苔厚腻，脉滑数。多见于学龄前及学龄儿童，发病多在冬春季，易于传染，现代医学多诊为流行性腮腺炎。

【注意事项】注意调和糊剂的干湿程度，以不易流脱又可粘着为度。如合并颌下淋巴结炎可根据大小用上糊剂适量外敷淋巴结

肿胀处，如体温较高， 39.0°C 以上可用清热解毒药内服。

【疗效】治疗 206 例，4~7 岁 124 例，8~10 岁 59 例，11 岁以上 23 例。应用 2~3 天肿痛消除 171 例，占 83.01%；症状好转 26 例，无效 9 例，总有效率 87.4%。

腮腺炎外敷方

献方人小传 沈永康，男，25 岁。现为海南省儋州市大城新风医院（邮编 571736）医师。8 岁跟医师当学徒，23 岁在乡里为民治病，1993 年 10 月到福州参加全国学术研讨会，发表过论文。

【方药组成】仙人掌 20g 明矾 2g

【制用方法】仙人掌去刺及皮，加明矾。捣成糊状外敷患者腮腺部位，外敷给 0.5cm 厚，1 日 1 次。

【适应症】流行性腮腺炎。

【方解】本方用于流行性腮腺炎。仙人掌、明矾清热解毒、活血消肿，起着治病作用。

【临床应用】流行性腮腺炎祖国医学认为邪毒壅阻少阳胆经而起。累及腮腺、睾丸、心脑等处发生炎症。用仙人掌、明矾，疏利少阳、厥阴经气。经络通利，气血流畅，瘟毒消散，炎症得到解除。

【注意事项】使用本方如用 2 天无效，可以加板兰根注射液注射。

【疗效】以局部消失为治疗标准，一般 3~5 天痊愈。

【典型病例】符××，4 岁，1993 年 4 月 5 日就诊。左耳下胀痛 1 天，局部浸痛，微痛咀嚼尤甚，伴有发热（体温 38°C ），用前法治疗 1 天后退热局部消肿减轻。3 天后，左耳肿痛消退，精神饮

食如常。

釜底抽薪散

献方人小传 熊正茂，男，湖南张家界桥头乡人，现为张家界中医院住院部外伤科主任（通讯地址为张家界市永定区天门路白鹤嘴84号，邮编427000）。19岁任乡村医生，3年后考入湘西自治州卫生学校，2年后分配张家界中医院工作，在外科临症主张内外合治。发表论文近10篇。

【方药组成】大黄 20g 胆星 15g 生地 25g 牡蛎 15g 吴萸 10g 胡黄连 10g

【制用方法】先将吴萸、牡蛎、胡黄连反复研成细末，再将胆星、大黄、生地共捣成糊状，然后将所有药物混在一起，加米醋适量调匀即可。

【适应病症】 疔腮。

【方解】本方所治之病乃因感受风热疫毒之邪，壅结上焦，循经流注面颊（为阳明经与少阳经循此经过），法当清热解毒，疏风散邪。道“经脉所过，主治所及”，取足少阳肾经井穴涌泉穴外敷，乃取法“上病下取，左病右取，右病左取”之意。方选大黄泻火解毒，胆星涤痰祛风，开闭攻结，生地、胡黄连凉血坚阴，牡蛎软坚散结，吴萸温散达邪更寄寓反佐，且诸药共利下行，并籍醋之酸涩收敛以药气循经传达，共奏清热解毒，疏风散邪，则面颊红肿焮痛诸症悉除。

【临床应用】疔腮常因外受风热疫毒之邪，壅取上焦，循经流注面颊而致。症见面颊部肿胀疼痛，恶寒发热，重则恶心呕吐，纳呆厌食。若不及时治疗则严重妨碍患者正常作息，生活上带来诸多痛苦，予“釜底抽薪散”外敷，取效捷径。

【注意事项】使用该方外敷4次后若效果不显，可采用其它相应治疗措施。若纯属瘰癧者不宜用本方。

【疗效】本组80例患者经治疗后，在1~2天内痊愈者47例，占59%，2~3天内痊愈者31例，占38%，3~4天内痊愈者2例，占3%，总有效率为100%。

【典型病例】许某某，男，7岁。本院亲属。于1989年6月17日来诊。诊前2天起病，畏寒、发热、头面红肿焮痛，食欲不振，两侧耳垂下肿胀并胀痛。检查：体温39℃，双侧耳垂下肿胀，颌下明显肿大，舌下腺肿大，心肺正常，周围血象无明显异常。中医诊断：疔腮。处方：釜底抽薪散。使用方法遵医嘱。

仙人掌外敷方

献方人小传 米世进，男，45岁，湖南省保靖县人。现为保靖县中医院（邮编416500）内科主治医师。18年毕业于吉首卫校中医一班，1979年晋升为中医师，1987年晋升为主治医师，擅于中医内科，“淋病治疗之我见”一文被湖南省中医学学会评为优秀论文。

【方药】鲜仙人掌

【制用方法】取鲜仙人掌1块，去刺，剖开，以剖开后的内质面贴敷于患处，仙人掌应稍大于患面，以绷带或膏布固定之，贴药1小时许取下。1天2次，第2次使用时须将剖面以刀稍削之再贴。第2天另觅鲜品，3日1疗程。

【功效】清热解毒消肿。

【适应病症】疔腮初中期。

【方解】本品味苦、涩，性寒。疔腮本感时气而发病，其病性乃为热毒。故以此药之苦寒制之。《内经》云：“寒者热之”。

此其理也。仙人掌有小毒，不宜作内服用。

【注意事项】重症疔腮有全身中毒症状者不宜单独使用，以免贻误病情。

【疗效】对于初中期之疔腮，经1个疗程治疗，疗效可达95%以上。

【典型病例】向××，5岁，女。双下颌肿胀2天，扁桃腺无红肿，吞咽如常，体温正常。以上法治之，2天后肿胀消失而痊愈。

子午效灵膏

献方人小传 李国柱，男，48岁，辽宁北票市人。现为铁道部十九局中心医院保健科主任（通信地址：辽宁省辽阳市卫国路，邮编111000）。对中医儿科、中医妇科有独到的治疗方法。近年来用自制的“新制咳喘膏”、“太乙壮身膏”、“子午效灵膏”以辨证论治和经络学说为理论指导，行内病外治，穴位贴敷治疗小儿支气管哮喘、小儿难治性咳嗽、小儿肺炎、小儿厌食等取得显著疗效。曾在《新中医》、《辽宁中医杂志》和《当代中药外治临床精要》等书中发表“新制咳喘膏临床分析”、“穴位贴敷治疗小儿咳嗽病128例”及“穴位贴敷并用治疗小儿厌食30例临床观察”等18篇论文。

【方药组成】皂角10g 白芥子20g 芦荟10g 白芷10g 细辛5g 川乌10g 草乌10g 甘遂10g 红花10g 杏仁10g 草决明10g 使君子10g 白胡椒5g 桃仁10g 山栀子20g 冰片2g。

【制用方法】上药共研细末，在密封干燥处保存。用前取鲜姜汁调成膏状，摊于3×3cm方型硬纸上，每块约3~5g，每次取5

~6 块，贴于穴位，胶布固定，每次贴 48~72 小时。取穴：1 次贴：身柱、心俞_双、天突、膻中穴。2 次贴：灵台、大杼_双、中脘、气海。3 次贴：膈俞_双、中府_双、丰隆_双。贴 3 次为 1 疗程，绝大部分即可治愈，如未愈者休息 3 天，再继续贴，方法同前。

【功效】温经散寒，清热解毒，理气化痰，止咳平喘。

【适应病症】小儿支气管哮喘，小儿难治性咳嗽，小儿肺炎，小儿厌食等。

【临床应用】小儿咳喘病，多因病邪客于肺络，阻塞肺经，影响了肺气的正常运行。肺失肃降，上逆则咳，肺失宣发，不宣则喘。故治疗小儿咳喘病的关键是祛邪，祛邪如同“拨刺”一样，刺去则诸症悉除，邪去则咳喘即愈。

【注意事项】贴药后局部热、痛、痒，起小水泡或出脓点，皮肤呈紫红色为正常现象。均为有效征象，一般不需处理，如水泡较大可用无菌针头刺破，让渗液流出即可，结痂愈合后再继续贴治。

【疗效】子午效灵膏穴位贴敷治疗小儿咳喘病 168 例，疗效见下表。

诊 断	总例数	治愈	显效	有效	无效
		例数 %	例数 %	例数 %	例数
上感咳嗽	21	21 100	0	0	0
小儿肺炎	31	31 100	0	0	0
支气管哮喘	35	29 83	38.5	25.7	12.8
难治性咳嗽	81	77 95	22.5	11.25	11.25
合 计	168	158 94	5 3	3 1.8	2 1.25

【典型病例】赵某，男，6 岁，1992 年 6 月 8 日就诊。以咳嗽少痰反复发作 2 年，加重 1 个月来诊，咳嗽呈阵发性顿咳，少痰，

夜间尤甚，伴恶心呕吐，经用多种消炎、止咳药物治疗无效，经用“子午效灵膏”贴天突、膻中、身柱、心俞双穴6小时。当晚咳止，继之诸症消失，随访至今未复发。

陈 小 粉 膏

献方人小传 刘奇龄，男，53岁，湖北省襄樊市人。1961年大专毕业，主治医师。任湖北省黄梅县龙感湖农场沙湖分场卫生所（邮编436503）所长。运用药物外敷治疗小儿支气管哮喘病、消化不良、肠炎及丝虫病、面神经麻痹、面肌痉挛、肩、腰、腿痛症、遗尿症、痔疮具有病程短，疗效好的满意效果。在多年的摸索中，用小儿奇应丸、安定和针灸治疗患破伤风的新生儿能迅速康复。发表了15篇论文，获得了当地政府的奖励，并著一书《巧食鸡蛋治妇幼杂病》即将出版。研制的陈小粉膏经专家评定获省农垦科技奖。被收录入《中国当代知名中医特色医疗辞典》。

【方 药】陈小麦（新的亦可） 醋

【制用方法】取陈小麦，加水，以淹没为度。浸泡，夏季3~4天，冬季6~7天。浸泡标准，以拇指和食指轻轻一按，粉与皮分离，即可捣烂（若做几十斤以上者，类似做豆腐一样用磨子磨），过滤，去渣，静置沉淀后，去上清液，将沉淀物晒干（即成小粉浆），放锅内小火炒。炒时会翻泡，要不断地搅动，待至焦黄色成块状时，取出隔纸放地上，冷却研成细末，过筛，装瓶备用。取粉加醋，调成软膏（每500g约需食醋240ml）。用普通纸将软膏涂上呈一圆形，膏的厚度约0.1cm，随用随调，但不可调稀，以免流动影响疗效。根据病情选取穴位贴敷，视年龄大小和皮肤敏感等情况决定贴敷时间，一般成人3~6次，儿童及少年2~5次，24小时换贴1次。未治愈者，可继续贴敷，治愈后复发者仍可以继

续使用。

支气管哮喘病贴敷穴位：天突、膻中、定喘、肺俞，为了贴敷方便，不必逐穴贴，我们常以处方大小的纸，将膏涂成一长圆形状，从天突一直贴到膻中，从定喘一直贴到肺俞。

【典型病例】万××，男，1岁。1978年10月因受凉，患支气管炎，咳喘，不发热，原经常用青霉素、链霉素注射，口服氨茶碱等，反复发作，后来试用陈小粉膏贴敷3次即愈，后又因感冒复发再用此膏而愈。随访至今未复发。

【注意事项】①一般贴敷6次无任何变化者为无效，应改为其他方法治疗。治疗期间勿用他药，但应首先控制感染后，再用此药，以免延误治疗时机。②贴敷此膏后，注意观察皮肤变化，防止破溃。因药物刺激而引起局部皮肤发红、发痒，停药后症状自行消失。治疗期间或治疗后，均应预防感冒。

【疗效】据有记载的32例分析，痊愈24例，显效5例，无效3例。

防 喘 背 心

献方人小传 余建社，男，40岁，安徽省黟县人。现为西武乡星火村中西医诊所医师（邮编245500）。1987年结业于上海中医学院函大中医专业，现任黟县卫协会常务理事、华夏医药研究会会员、中国医药荟萃丛书编委、中国引进报社秦皇岛记者站《求医药实用辞典》编委会特约记者、全国中药外治委员会会员。临床主张内外并治，以提高疗效。发表论文多篇。发明中药外治小儿疝气，经专家评为中国医疗新技术。论文“秘方疝气粉Ⅰ、Ⅱ号外治小儿疝气160例”入选《当代中医绝技荟萃》一书。

【方药组成】黄芪9g 白术6g 防风3g 陈皮3g 浙贝母

3g 椒目 3g 吴萸 3g

【制用方药】将上药共研成细末，先将药末铺撒在棉花内，再包以药棉纱布，缝严固定，让病人穿着背心，全天使用。亦可晚上穿，白天脱下。

【功效】补肺固卫，预防哮喘。

【适应病症】小儿哮喘缓解期。

【方解】本方以玉屏风散益气健脾，使“正气内存，邪不可干”，治其本。椒目、陈皮、浙贝具有良好止咳化痰平喘之功，治其标。吴萸有渗透之力，以增诸药之效，调其脏腑功能，去其生痰之因，故可标本同治。

【临床应用】小儿哮喘多由外邪诱发，多见肺气虚弱和素体多痰者，究其因多属“正气不足”，外邪易侵，正虚痰伏是本病的主要矛盾。防喘背心有扶正祛邪之功，经临床使用，能预防肺气虚弱，痰留肺络的哮喘证，即使发作，症状亦见减轻，发时处以汤药控制症状，缓解期以防喘背心预防发作，反复应用，自然有益。

【注意事项】哮喘发作期停止使用，辨证施治处以汤药治其标病，缓解期用防喘背心外治其本病。对少数缠绵难愈者，则内服外治结合，以标本兼施。

【典型病例】徐某，女，7岁。经常因寒温失调或感冒则哮喘发作，1月发作2~3次。经防喘背心外治后，从未发作，偶受凉感冒亦未见哮喘发作。

止 汗 散

献方人小传 吕广秀，男，31岁，浙江宁海人。现为上海解放军85医院儿科主治医师（通讯地址为上海华山路1220弄85医院儿科，邮编200052）。18岁就读于西安第四军医大学，已行医

10 年，积极开展中西医结合及科研活动。曾在《中华医学遗传学》、《实用儿科》、《放射免疫》等杂志，上海儿科年会及军内等杂志上发表文章，并多次参加全国性儿科领域学术会议。

【方药组成】五倍子粉 1.5g 龙骨粉 1g 牡蛎粉 1g

【制用方法】上药混匀，用米醋拌成丸状，固定在肚脐处，每晚 1 次，10 天为全疗程。

【功效】止汗固表。

【适应病症】小儿虚汗症。

【方解】本方所治之病乃因阳虚外卫不固（脾肾虚寒）所致，本方藉米醋之渗透力，药效深入腹内，使脾肾阳虚复苏，达外卫牢固。

【临床应用】小儿虚汗症，多系脾肾阳虚致外卫不固，表现在夜间入睡初出现大汗淋漓，时间久易受凉而患病。现代医学认为此症系身体虚弱，植物神经功能失调所致。故可用本方予调整。

【注意事项】应用 10 天后无效，则应作全面检查有无其他原因的虚汗症。

【疗效】临床应用 103 例，3 天有效为 43 例（43/103），6 天有效为 89 例（89/103），10 天有效为 102 例（102/103），1 例无效。随访半年未有复发。

【典型病例】曲薇，女，5 岁。1993 年 3 月出现每晚睡初大汗淋漓，头发湿如洗，用本方 3 天后出汗减少，7 天后不再发生出虚汗，至今 1 年未复发。

保 肺 贴

献方人小传 秦占甲，男，52 岁，辽宁省海城人。现居黑龙江省佳木斯市东风区建国路十委九组东新胡同门牌 2 号。25 岁毕

业于鞍山市卫校，先后在农村、部队、城市行医 30 年，曾做过乡村医生、医师及驻佳市部队 8 师医院疑难病科主任，现为佳市个体开业医。漫长的医龄，不断的实践，苦学获得渐进。近年来发表论文 4 篇，对儿科、内科、医药及护理学都有所突破。论文有“关于生后 28 日内的婴儿不用做青霉素过敏试验的报告”、“中西医结合治疗顽固性慢性支气管炎及哮喘病 54 例的探讨”及“常用过敏药品操作规程”等，被国家级刊物录用，向国内外发表。1992 年 11 月被中国民间疗法研究所授予助理研究员职称。在临床上善于中西医结合治疗疑难病症，更善于运用民间验方治疗西医西药所不能治愈之疾病。自拟保肺贴就是治疗小儿支气管肺炎后遗症最有效的例证，经多年临床试验，治愈率可达 99%。

【方药组成】白芥子（芥菜籽）25g 面粉 10g

【制用方法】将上药研成细面和面粉合在一起，用温开水调成泥状，敷于患儿背部左、右肺俞穴部，然后用白布贴在药泥表面包扎，等到皮肤显著发红为度，每日 1 次，每次 1~2 小时，时间不易过长。

【功效】温肺消肿，豁痰止咳，并有窜透皮毛之功效。

【适应病症】小儿支气管肺炎后遗症。

【方解】小儿支气管肺炎是儿科的常见病多发病，一般多经西医西药长时间静脉点滴各种大量抗菌素或抗病毒药，但由于病程长，病邪大量消耗肺气，造成后期机体无力恢复。借白芥子的窜透作用，经肺俞穴由表及里，循经入肺发挥其药气作用，攻其病邪，修复肺组织细胞损伤，达到迅速康复。

【临床应用】支气管肺炎的后期，化验血象正常，X 线检查肺纹理已不增强，体温正常，说明无炎症，但影响有两肺罗音或哮喘音的后遗症，这是西医西药无法治愈的，利用保肺贴药外敷，经 3~5 日即可治愈根除。

【注意事项】此方药敷贴，每次时间不可太长，时间太长要使

皮肤起泡，造成溃烂，所以需按规定时间和程度进行。

温脐消胀饼

献方人小传 林玉霖，男，35岁，福建省莆田市人。现任贵州省医疗技术协作中心疑难病研究室副主任，兼任北京市东华门医院疑难病专家门诊副主任，主治医师，福建莆田县万安堂中医药研究会副会长。1981年医学大专毕业，长期从事中西医结合治疗疑难病的研究，探索出“区域全息埋线法”配合中药应用及穴位注射等中西医综合疗法，对诸多疑难病症具有独特疗效，已发表学术论文（论著）6篇，参与的“小儿腹泻病源学调检”课题，于1990年荣获北京市科技进步1等奖，联系地址：福建省莆田县妇幼所，邮编：351100。

【方药组成】葱白7枚 生姜6g 鲜鸡蛋1个 精盐、黄豆油适量

【制用方法】把葱白、生姜用刀剁成细末，与生鸡蛋清、蛋黄一起置碗中充分搅拌均匀。用适量黄豆油与食盐一起放入砂锅中加热后，倒入蛋与葱、姜混合料，制成园形煎饼（直径约10cm）。然后用单层纱布包好煎饼，乘温（以不烫伤小儿皮肤为度）敷于肚脐眼，外盖厚纱布或毛巾包扎固定。若2~3小时后未见效，可把该饼加热后再敷1次。

【功效】温中散寒，理气消胀。

【适应病症】小儿腹泻后所出现的腹胀（肠胀气）。

【方解】小儿脾胃薄弱，无论感受外邪，或内伤乳食，均易导致脾胃运化功能失调而发生泄泻。发病之后易耗伤津液气血，出现气机升降失调，胃气上逆而致呕吐，肠气失降而致腹胀。治宜温脾理气，旋复气机。本方取葱白、生姜辛温之性，用于温中

散寒，辅油盐煎蛋之热气以祛寒凝、通脾阳、理气机。任脉系治疗胃肠疾患的主要经络之一，将药饼直接敷贴于任脉的要穴神阙（即脐眼）上，使药气更易透入肠内以复苏脾阳，斡旋气机。

【临床应用】主用于小儿腹泻后所出现的腹胀、呕吐。症见全腹胀气，欲便不畅，呕吐纳呆，烦躁不安。西医认为本病系腹泻引起酸碱及水电解质平衡紊乱，尤其是低血钾可引起肠蠕动减弱，甚至肠麻痹。现代医学研究表明，热敷腹部及脐眼能刺激兴奋支配胃肠运动的交感神经，有利于恢复肠蠕动功能。一般用药饼敷脐 2~3 小时可出现肠鸣及肛门排气，肠胀气渐消。

【注意事项】若用本法治疗 4 小时后未能见效，应细查是否有严重并发症，并采取其它相应措施。

【疗效】本人行医 10 余年，每遇本病症应用此法治疗多获显效。

消积化痞膏

献方人小传 樊成华，1949 年生，女，河南省南阳市公费医疗门诊部（邮编：473000）内科主治中医师。出生于中医世家，自幼学医，师从祖父樊禎臣（河南名医）、父亲樊伯玉（南阳地区名医）。18 岁开始行医，对疑难杂症有研究，擅长妇科病、风湿病、中风及心血管病等，治愈率平均在 90%。曾先后在国家 and 省级中医刊物及学术会议上发表学术论文多篇。南阳地区电台、新闻中心及晚报均有报导。曾多次参加国际张仲景学术研讨会，参加全国名医首届专科专病学术研讨会。被录入《求医问药实用辞典》、《到中国大陆求医购药指南》、《中国当代高级科技人才系列词典》、《中国医药荟萃丛书——疑难杂症求医指南》。

【方药组成】桃仁 7 个 杏仁 7 个 小枣 7 个 生栀子 7 枚

【制用方法】将桃仁、杏仁、栀子研碎，小枣去核煮烂，鸡蛋一个去黄用清混合调匀，并加入小麦面，捣成软膏，将膏摊于白平布上，贴腰眼上（男左女右），用绷带固定，24 小时后揭去，贴后无反应。

【功效】消积化痞。

【适应症】小儿痞积，腹中积块，消化不良等。

【方解】本方所治之病多因消化不良，腹中积滞日久痞块形成。治疗当以行滞、消积、清热、化瘀。病在腹中，给药以贴腰眼上为最佳。

【临床应用】小儿痞积常因饮食不当而致。腹部胀满，消化迟滞，面黄肌瘦，头发打缕。临床均可适用。

温 肠 散

献方人小传 龙炜，男，48 岁，广西壮族自治区北流县清湾镇人。现为广西壮族自治区北流县清湾镇卫生院（邮编 537426）院长，内科主治医师。从医 20 多年来，灵活运用中西医结合，内外治结合治疗常见病和一些危重症、疑难症，都积累了较丰富的经验，尤其对胃肠、肝胆疾病有较深入的研究。发表论文数篇，出版《乡村危重症抢救指南》。去年还被华夏出版社《光明中医之路》（杏林光明人）入编。

【方药组成】公丁香 2g 肉豆蔻 4g 肉桂 5g 白术 5g 诃子 5g

【制用方法】上药共研细末，用黄酒少许调成糊状，敷于止泻穴（止泻穴位于双足外踝尖垂直线足背黑白线交界处），再用纱布块敷盖，胶布固定。每日换药 1 次，轻者 1~2 次，重症者可用到 3~5 次。

【功效】 涩肠止泻。

【适应病症】 慢性腹泻，小儿消化不良。

【方解】 本方所治之症乃脾肾阳虚，温运失职，水谷不化以及中焦虚寒，脾虚气滞之症。药物内服治疗慢性腹泻，往往见效不佳，难以痊愈，医家颇棘手，而药物穴位外敷方法简便，见效快，效果好。方中公丁香、肉豆蔻、肉桂暖脾涩肠，温中散寒，诃子涩肠固脱，白术补脾。上述诸药均为芳香走窜和引经活络之品，药物之气通过皮毛孔窍，入于经络，入走脏腑，达到肠所而发挥其治疗作用。

【注意事项】 本方为成人量，小儿减半。若纯属实热证不宜使用本品。细菌感染者宜加适量抗生素治疗。药物过敏者慎用。

丁 萸 散

献方人小传 赵娣桃，女，53岁，山西大同人。现为河北中医学院基础部副教授（通讯地址：河北中医学院，邮编 050091）。1965年毕业于内蒙医学院中医系，分配到包头医学院第一附属医院中医科、中西医结合病房从事医疗工作。1971年后从事中医教学与临床工作。1983年11月调入河北中医学院，现为中基教研室副主任。本人教学联系实际，启发诱导，运用哲学的逻辑思维推理法激发学生学习中医的兴趣，发表过“中医的类比思维推理法”、“浅论教师在学校中的地位与作用”和医学论文、临床报导数十篇。参与编写高等中医药院校《中医心理学》试用教材及《情志疾病学》均已正式出版。对中医妇、儿、内科较专长。

【方药组成】 丁香、吴茱萸等量

【使用方法】 上药共研细末醋调，制成直径2cm~3cm，厚0.5cm~0.8cm的圆饼，分摊于布块上敷于神阙穴，外以绷带固

定。贴敷前，先用温水洗净皮肤，局部轻轻按摩，使毛细血管扩张以利于药物吸收。1~2日换药1次，一般3~5次治疗即可痊愈。

【功效】温肾健脾。

【适应病症】小儿脾肾阳虚泄泻。

【方解】小儿腹泻是儿科疾病的常见症状。其发病为时令气候，乳食所伤，贪食生冷或其他急慢性病致使脾胃损伤，累及于肾，脾运失常，胃失和降，消化异常的病态表现。本方用丁香温肾助阳，振奋脾阳，降逆止呕，吴茱萸温胃暖肝，散寒降浊，二药相伍温肾健脾，益气升清，气机升降复常，脾得健运，胃得通降，纳运正常，则诸症去矣。

内病外治，用神阙穴，因神阙为任脉之要穴，有“阴脉之海”之称，总司一身之阴经。从解剖特点看，脐部皮下脂肪极少，脐下又有腹壁下动脉、静脉及丰富的毛细血管，故药物易于吸收，加之丁香、吴茱萸味辛性温，行散力强，可使药物渗透到胃肠发挥治疗作用。

【临床应用】脾肾阳虚导致婴幼儿腹痛、腹胀及腹泻，手足不温，饮食呆滞，时时泛呕，口吐涎沫，上吐下泻等。

【使用注意】局部有感染或瘢痕者禁用，非里寒证者禁用。

【疗效】在数十年的医疗实践中，本人用此方法治疗婴幼儿腹泻确实取得满意疗效，尤其是周岁内的婴儿，弥补了口服药难的缺憾。

腹泻贴脐方

献方人小传 符贤才，男，56岁，现在任海南省儋州市大城新风医院（邮编571736）主治医师。16岁从父学中草药，相继在

乡村行医。曾 3 次参加全国学术研讨会，发表过 5 篇论文。

【方药组成】肉桂 5g 干姜 5g 丁香 5g

【制用方法】上药共研粉末，先用生理盐水把患儿脐部洗净，将药粉置于脐内，稍加压，以填平脐窝为度（约 0.5~0.7g），再用 0.4×0.4cm 胶布固定。

【适应症】婴儿秋冬季腹泻。

【方解】本方药是敷脐穴位而刺激、改善胃肠血液循环，促进胃液分泌及肠粘膜吸收。因婴儿皮肤通透性强，而肉桂、干姜、丁香能在脐穴发挥作用达到止泻作用。

【注意事项】治疗好后，再继续敷脐 1~2 日为巩固。

大黄灌肠方

献方人小传 刘宝和，男，54 岁，江西于都人。为湖南省湘潭市中心医院（邮编 411100）儿科主任。自医学院儿科系毕业后从事儿科临床已 32 载。临床经验丰富，特别是对中西医结合另有独钟。1982 年起担任儿科主任。1979 年、1985 年先后晋升为儿科主治医师、副主任医师兼湖南医科大学儿科副教授，同时兼湖南省优生优育协会理事，湘潭市医学会理事，市科委评委等。70 年代曾先后在上海医科大学、湖南中医学院西学中班进修半年。先后发表论文 10 余篇。课题“分子筛氧临床观察”、“单味大黄灌肠疗法治疗小儿急性肾炎临床研究”分别于 1984 年、1993 年通过专家技术鉴定。1993 年入录《中国当代高级医师大全》，并荣获“中国当代高级医师”荣誉称号。

【方药组成】单味生大黄

【制用方法】上药切碎，每 10g 或 20g（5 岁以下 10g，5 岁以上 20g）煎汁，待凉用于灌肠，1 日 2 次，连用 2 日或 7 日（视病

而定)。

【功效】利尿、消肿和消蛋白尿，降低血压，泄下降热。

【适应证】①小儿急性肾炎。②小儿高热。

【方解】①小儿急性肾炎为水湿内蕴，热毒未尽，血瘀气滞，属热毒、血毒、水毒错杂为患，以邪实为主。大黄自古为“通结灵丹”。《神农本草经》称为“主下瘀血、血闭、寒热……荡涤肠胃，推陈出新……”。中医认为“二便不通，先通小便”，而大黄可起到“通大便而利小便”之功。大黄入大肠经，而“肺与大肠相表里”、“肺朝百脉”，故药可由肠及肺，布于全身，发挥整体作用。②大黄熟用能泻心火、宣气消肿，而除结热之在上者。再者根据大黄之归经及“肺与大肠相表里”的理论，清利大肠则可肃肺热，此谓“釜底抽薪”之功。“肺”者指西医之呼吸系统与皮肤，故呼吸系统感染（尤其是上呼吸道感染）之高热用此法可达良效。③近代医学研究发现“直肠给药有50~70%吸收直接进入血循环，直肠给药与血药浓度相仿”。

【临床应用】①小儿急性肾炎之无尿、尿少、肾性水肿、肾性高血压及氮质血症等治疗棘手，尚无特效疗法。肾衰往往需透析疗法急救，而无论腹膜透析或血液透析在基层均难以普及。大黄可通过排便而排泄病理性毒物及气体，起到泻实、泻热、泻瘀、泻毒的作用，改善内脏微循环，从而有利于提高肾血流和肾小球滤过率，逆转肾内异常血流并重新分布，故尿量亦随之增多。近代发现大黄有效成分蒽醌类物质除利尿消肿、减少血容量、降低血压外，还有降低BUN、Cr，改善肾功能等多种药理作用。因水湿内蕴、热毒未尽，患儿多有恶心、呕吐、大便秘结，大黄灌肠治疗则正是对症下药，解决小儿临床用药困难。②大黄既有泄热降温之作用又有强有力拮抗组胺活性、降低毛细血管渗透之作用，从而减轻炎性反应，加强清热疗效。同时，近代医学研究大黄对葡萄球菌、肺炎双球菌等细菌及部分病毒有强大抑制作用，而它们

多为小儿呼吸道感染之常见致病原。

【疗效】①单味大黄汤灌肠疗法观察小儿急性肾炎 140 例，治疗组 72 例，对照组 68 例，结果经统计学处理总有效率治疗组为 97.22%，对照组为 85.29% ($P<0.05$)。本研究课题已通过省市专家组技术鉴定，认定本法有降低血压、消除水肿和蛋白尿的明显效果。②本法治疗小儿高热 186 例，其中上呼吸道感染 135 例，支气管肺炎 51 例。总有效率 92.5%。

【注意事项】本疗法经临床观察及推广应用均未发现毒副作用。但对有肾衰、心衰、电解质紊乱、酸中毒或肺炎并发症者需同时加相应治疗措施。若系虚寒证或有腹泻者不宜用本法。

【典型病例】黄××，男，8 岁。因下肢浮肿半月，加重伴尿少 4 天，头痛、呕吐 2 天入院。曾在外院用速尿、利血平并服中药无效。体检：嗜睡，舌质红，薄黄苔，脉滑数， $CH_{50}<36$ 单位， $C_30.22\text{mg/ml}$ ， $K^+5.3\text{mmol/L}$ 。诊断急性肾炎。治以单味大黄煎剂灌肠连用 10 天，后痊愈出院。出院随访 3 个月。血压、尿常规均正常。详情见附表：

附表

疗程	尿量	浮肿	尿蛋白(mg/dl)	Bp(kPa)	BUN	Cr
入院日	<80ml/24h	卅	100	18/14	22.84	395.15
4h	100ml			17/9.3		
24h	950ml	++		14/9.3		
48h	1450ml/24h	+		14/9.3		
72h	1500ml/24h	—	20	14/9	8.85	53.04

〔注〕：BUN 单位：mmol/L Cr 单位：μmol/L

遗 尿 膏

献方人小传 阎洪才，男，56岁，现为黑龙江省兰西县兰郊医院（邮编151500）院长，中医主治医师18年毕业于兰西县卫生学校，毕业后一直在兰郊医院从事中医儿科工作，并多次去省级医院进修。几十年来，刻苦钻研，勤耕不辍，理论实践多有建树。发表了“止泻三角膏治疗小儿腹泻500例临床观察”、“补肾祛瘀针法治疗颈椎病126例临床观察”等国家级论文5篇。

曹成芹、于仁峰、杜超（传略）。

【方药组成】覆盆子20g 山萸肉20g 杜仲20g 人参20g 麝香5g

【制用方法】上4味药入香油200g中，文火煎熬60分钟，去渣，剩净油150g，入黄丹40g，文火熬至滴水成珠为度，再将麝香搅入膏内，冷水中拔去火毒。将膏药摊在边长8cm的正方形牛皮纸上，每贴重约10g，入塑料袋中密封备用（用时将膏药烤化贴于脐部即可）。每贴贴敷3天，15天为1疗程。一般1个疗程即可痊愈。

【功效】补肾固摄，益气缩尿。

【适应病症】小儿遗尿症。

【方解】本方所治之小儿遗尿症，乃因肾气不足元气衰少，固摄无力所致。方中用覆盆子，山萸肉补肾固涩，杜仲补督脉壮肾阳，人参大补元气，诸药借麝香辛香走窜、渗透之力，从脐部深入肾脏膀胱，从而肾气强健，元气充盛，开合有常，遗尿自愈。

【临床应用】使用标准：长期遗尿，平时尿色清白；舌质淡；脉沉迟。

【注意事项】凡遗尿见有热象者（如舌红、苔黄、尿黄等）不

宜使用。

三 子 散

献方人小传 吴国其，男，39岁，现为广西中医学院副教授（通讯地址：南宁市明秀东路21号，广西中医学院23号信箱，邮编530001）。1982年12月毕业于广西中医学院中医专业，毕业后留校工作。擅长中医内、儿科，对中医治疗高脂血症、冠心病、骨质增生症、肿瘤等疑难病症有独到见解。在全国性和国际性学术会议上交流论文4篇，在省级以上杂志发表论文6篇，发表科普文章15篇，合编著作2本。

【方药组成】五倍子 10g 五味子 10g 覆盆子 10g 桑螵蛸 10g 益智仁 10g 补骨脂 10g 肉桂 5g

【制用方法】上药烘干研末，装瓶密封备用。每次用5~10g，加米酒调匀，敷于脐部，用塑料薄膜、纱布覆盖，胶布固定或绷带包扎固定。2天换药1次，3次为1个疗程。

【功效】温肾缩尿。

【适应病症】小儿遗尿症。

【方解】本方选用补骨脂、桑螵蛸、益智仁、覆盆子温肾培元；五倍子、五味子酸涩收敛缩尿；尤以肉桂温阳散寒，芳香引药入里，促进膀胱气化，使其开合有度，而遗尿自止。

【临床应用】遗尿，是指3岁以上小儿睡眠中小便自遗，醒后方觉的一种疾病。本方所治之遗尿，乃因肾阳不足，下元虚寒，不能温养膀胱，膀胱气化失职，不能制约水道所致。症见睡中遗尿，数日1次，或每夜遗尿，甚则一夜数次，常伴有小便清长或尿频，面色㿔白，舌质淡，苔薄白，脉细弱等症。小便常规检查无异常。

【注意事项】使用本方3个疗程后效果不显者，宜配合针灸或

中药内服治疗。膀胱有热者不宜使用本方。

【疗效】治疗 162 例，其中男 89 例，女 73 例。年龄 4～12 岁，病程 1 个月～7 年。治疗 2 个疗程，痊愈 141 例，遗尿消失；好转 17 例，遗尿次数减少；无效 4 例，症状无变化。

【典型病例】覃××，男，8 岁，1991 年 3 月 12 日就诊。经常遗尿 1 年余。症见夜间遗尿，白天尿频，面色晄白，舌质淡，苔薄白，脉沉弱。用上方治疗 2 个疗程后，遗尿消失，追访半年，未见复发。

消水疝散

献方人小传 邹积群，男，1957 年生，辽宁丹东人。现为辽宁省人民医院丹东分院门诊部男科副主任、主治医师（通讯地址：丹东市振兴区四经街市卫生局楼下，邮编 118000）。1986 年辽宁中医函授大学毕业。1988 年在北京中医学院附属东直门医院进修男性科，年底回院独立开诊。对男科临床，主张中西医结合，配合心理咨询、行为指导，综合治疗。近年发表论文 30 篇，已出版的《中医男科证治备要》中任副主编。并被选为东北地区和辽宁省的中医男科学会委员，辽宁省医学会功研究会理事。

【方药组成】吴茱萸 5g 公丁香 5g 肉桂 5g 冰片 1.5g（或用麝香 0.2g 疗效尤佳）

【制用方法】上药共研细末，过 120 目筛，瓶装备用。用中成药十香暖脐膏 1 帖加热化开，将上散剂约 2～3g 撒于膏体中心部位约直径 2～3cm 的圆形平面上，敷于患侧腹股沟约精索进入腹腔的部位（即腹股沟管的体表部位，一般敷药 8 小时取下休息 16 小时，次日继续敷用，如果局部无刺激症状，可适当延长敷药时间，每贴药可反复用 2～3 次。

【功效】温经通络，行气导水。

【适应病症】小儿水疝（小儿精索、睾丸鞘膜积液）。

【方解】水疝相当于现代医学的精索、睾丸鞘膜积液，现代医学多用手术方法治疗，小儿不易接受。中医认为：本病属水湿结于子肾所至，病因多责之于肾阳不足，气化不利；或脾气虚弱，运化失司；或肝气郁滞、疏泄失职等。本方吴茱萸辛苦温，归经肝脾肾，辛可行气通络，苦能燥湿，温可散寒行水是本方之主药，故为君；公丁香辛温善暖肾开窍，行水消疝以为臣；肉桂辛热，入膀胱肾经，专补元阳，除积冷，通血脉，去寒疝是为佐；冰片辛苦凉，通诸窍，引诸药入体内，又可抑制上药燥热之性而为使。若改冰片为麝香，则诸药渗透皮肤作用倍增。而十香暖脐膏即增加温经通脉的功能，又有固定及载体的作用。诸药合用，共奏温经络，通气血，行积水，消水疝之能。且小儿皮肤薄嫩，外用药易于吸收，用药部位接近病所，易于发挥作用，使用方便，无痛苦，方法简单易学，易于被患儿及家长接受。

【临床应用】主治小儿水疝，症见一侧睾丸肿大，如囊裹水，无红肿热痛者，相当于现代医学的精索或睾丸鞘膜积液。成人亦可使用，但疗效不及小儿。

【注意事项】①使用本药少数病人出现皮肤过敏现象。因此，用药后局部皮肤潮红，患儿自觉搔痒，应适时停止用药，移时再用，局部皮肤不完整者禁用。②注意十香暖脐膏的温度不可过高，以免烫伤患儿皮肤。③使用5贴仍未见效者，请改用其他疗法。

利湿化瘀汤

献方人小传 武士建，男，49岁，山西介休霍村人。现为介休市烧伤医院烧伤科主任（通讯地址为介休市烧伤医院原三佳医

院，邮编 031200)。22 岁中等卫校毕业，相继在乡、县厂矿、医院悬壶。临症主张应变而治，不囿传统。对儿科、妇科常见病很有研究，尤其是对治疗烧伤更为突出。发表学术论文数十篇，先后在全国第一至第三届烧伤湿性医疗学术会议上发表，有的被评为甲等论文。所写的“自制特效烧伤膏治疗烧伤 100 例临床报导”收入中国医药科技出版社出版的《当代中医外治精要》一书。

【方药组成】金银花 15~30g 苏叶 10~15g 赤小豆 10~15g 泽泻 10~15g 虎杖 15~20g 赤芍 10~15g 橘核 10~15g

【制用方法】上药水煎 2 次，去渣混合。分两次用药液薰洗或热敷患处。每次 30 分钟，每日早、晚各 1 次。每日 1 剂，7 日为 1 疗程。

【功效】清热利湿，理气化瘀。

【适应病症】小儿鞘膜积液。

【方解】本病多由肾虚，气化不利，水湿内停或由外伤、慢性感染引起。治疗当以清热利湿，理气化瘀为主。因小儿不易服药。所以采用中药外敷、外洗。给药部位，以双侧阴囊为佳。主选性平偏凉的赤小豆利水消肿，赤芍清热凉血散瘀消肿，配橘核理气止痛，疗效更佳。

【临床应用】药物加减，阴囊肿块大，下坠者加黄芪 15~30g、升麻 10g、陈皮 10g；有憋胀疼痛者加乳香 10g、没药 10g、公英 30g。

【注意事项】使用该方 1 疗程后，若效果不显，急宜采用手术治疗。

雄 杏 散

献方人小传 林长泰，男，58岁，福建省晋江市西滨人。现为晋江市中医院副主任医师（通讯地址：晋江市青阳新大街南路35号，邮编362200）。1963年毕业于上海中医学院，从事中医内科工作30余年，临床中尤其对痹症、胃脘痛、消渴的治疗颇有独到之处。曾任福建省南靖县中医院院长等职。发表论文10多篇，“调理脾胃治疗溃疡病出血”等3篇文章获全国基层医药学术论文评比3等奖。著作有《临床点滴》、《医海拾零》等。1991年福建省卫生厅授予优秀中医药工作者称号。

【方药组成】雄黄 5g 百部 10g 杏仁 15g

【制用方法】上药共研末，分成5份，每晚取1份，米醋调和，放在纱布中敷于肛门口，再用胶布固定，连用5晚。或米醋调和，捏成5粒圆锥形，每晚临睡前取1粒塞入肛门内，清晨大便时排出。

【功效】杀虫。

【适应病症】蛲虫。

【方解】蛲虫在胃弱肠虚的条件下，下乘大肠、肛门。轻者仅见蛲虫爬出肛门时引起之奇痒和夜卧不安。重者扰乱脾胃运化，引起食少、腹痛、恶心、呕吐。久病损伤气血，引起消瘦，面唇淡白，甚则夜惊、脱肛等。治疗以杀虫为主，方中诸药均属杀虫之品，雄黄杀虫燥湿、辟秽解毒；百部杀虫；杏仁根据《备要》记载能杀虫治疮，三药合用杀虫之力更强。

【临床应用】临床特征：肛门奇痒，夜间尤甚，睡眠不安，痒时可在肛门周围见到蠕动的细小白色小虫或清晨于病人未大便前，用肛门拭子抹肛门皱襞四周找到蛲虫卵。久病亦能引起腹部

隐痛、纳减、消瘦、烦躁不安、夜惊等。应用本方外敷治疗，达到虫死病愈。若脾胃症状较重或气血不足者，杀虫后可用香砂六君子汤调理脾胃，以善其后。

【注意事项】①研药的用具要洗干净；②若敷药时要对准肛门；③敷药时间为晚上睡前至早晨起床。

婴儿湿疹灵

献方人小传 石瑞刚，男，44岁，河北省玉田县散水头镇戴家屯人（邮编：064105）。职称为中医师，大学学历，在本村诊所行医。治疗男女不孕症师古而创新，有独特疗效。对脐疗法原理的研究、对许多疑难病治疗的研究、对中医学许多方面有自己独到的创见。自创双手持针同时进针行针、一穴多针的针刺疗法。已被选入《医疗人材信息》、《中国当代知名中医特色疗法辞典》、《中国当代中医名人志》等书之中。其论文曾被评为优秀论文。

【方药组成】苦参2份 冰片1份 鸡蛋黄油适量

【制用方法】将苦参碎成细末，越细越好。将冰片也研成细末。将鸡蛋煮熟去皮去清留黄，把蛋黄放到锅里熬出油。用其油调苦参冰片为糊状，外敷患处，要注意不断地保持局部的药量和湿度。

【适应病症】婴儿湿疹。

【方解】苦参苦寒，有清热燥湿，祛风杀虫之功，冰片有防腐止痒之功，鸡蛋黄油有护肤生肌之功，3药配合，不但能使婴儿湿疹患者很快止痒，还能促进皮损的愈合。

【典型病例】杨某，男，6个月。患婴儿湿疹月余，走几家医院不效。查体：患儿头部、躯体四肢均现大片水泡丘疹皮损，有几处已糜烂，阴茎根部烂1深沟，家属甚是焦急。余用上方治疗，患儿敷药后，由烦躁转为安静。3天后复诊，疗效甚好，皮损有很

大程度的消退，糜烂部位已大见好转。又过3天复诊，皮损、糜烂所剩无几。后继续敷药，很快痊愈。类似的病例屡见不鲜。

脐 漏 散

献方人小传 韩书林，男，48岁，河北省吴桥县韩庄人。现任吴桥县第二医院（邮编061801）中医科主任。18岁考入沧州地区中医带徒班，分配本县县医院中医科侍学于县医院几位名老中医，3年毕业后，在本县第二医院从事中医内科临床工作。临床中善于中西医结合及辨证与辨病相贯通。在内、妇、儿各科诊断治疗中，有开拓创新的精神及良好的业务水平，享誉四方。近年来，经多次参加全国专业学科学习，致力于肝病、糖尿病、风湿类风湿病的专门研究，取得了新的进展和效果，先后发表论文10余篇。

【方药组成】 车前子 50g 黄柏 15g

【制用方法】 上药轻炒后，共研细末，撒于脐眼上，待渗湿后再撒，直至脐眼处无湿性分泌物渗出为止，3~5天后自然脱落。

【功效】 燥湿解毒。

【适应病症】 小儿脐漏症。

【方解】 本方所治之病多因断脐处理欠妥或护理不当。脐部为水湿、尿液浸渍，感染邪毒而引起。因症发脐部，故以取近途治疗，车前子利湿解毒，黄柏燥湿清热，炒后倍加燥湿之功。现代医学研究，车前子、黄柏均有对真菌、表皮癣菌有抑制作用。局部用药直达病所。

【临床应用】 小儿脐漏症，尤以新生儿为常见，若脐漏日久不愈则转变成脓漏，甚则引起抽风而死亡。临床所见大多患儿均为脐痂脱落过早而护理不当。如发现患儿脐眼有渗溢淡黄色水液，擦之不绝，均为脐漏症，应急撒于脐漏散，而防止病情加重。

【注意事项】此方均以炒后研末，防止放入不洁之物内。用此方后，脐周出现红肿，并见患儿啼哭不止，应请医生诊查，不宜继续再用。

脓 疱 灵

献方人小传 宋世良，男，37岁，江苏太仓人。医学学士，主治医师（通讯地址：江苏省太仓市第一人民医院，邮编215400）。业务专长中西医结合治疗消化性溃疡及慢性胃炎，善用祖国医学的验单偏方治疗农村常见病及某些疑难杂症、顽症。2篇中西医结合论文在第二次国际胃肠病学会议上交流。发表论文10余篇。

【方药组成】黄连素片剂5~10片（每片0.1g）

【制用方法】每天先用黄连素溶液把患儿擦洗干净（溶液的配制：取市售黄连素5片，放入盛有10公斤温水的浴盆中，充分溶解搅匀），再取黄连素1~5片（根据病变多少而定），放入调羹，用温开水适量使其溶解，调成稀薄糊状，用消毒棉签蘸取药液均匀涂于患处，每天早、晚各1次，连续2~4天即可痊愈。

【功效】收敛杀菌。

【适应病症】小儿脓疱疮。

【方解】本方所治之病乃因肺经有热，脾经有湿，湿、热相搏，蕴蒸肌肤而发生。现代医学认为主要由葡萄球菌或与链球菌混合感染所致。治宜清热解毒、理湿收干。黄连素乃是中药黄连的天然提取物，其糊膏具有杀菌消炎，祛湿收敛之功效。

【临床应用】脓疱疮俗称“黄水疮”，是一种常见的化脓性皮肤病。皮损主要为浅在性脓疱及脓痂，有接触传染及自体接种特性，多于夏秋在儿童中流行。如用药不当，则久治不愈，痛苦不堪。应用黄连素糊膏后，可收到立竿见影之功效。

【注意事项】现配现用，厚薄均匀，不需加用其它药物。

【疗效】应用本方治疗 42 例脓疱疮患儿，有效率 100%。平均治愈天数 3.5 天。与同期外涂紫药水，静滴青霉素的另一组脓疱疮患儿（35 例）作对照，其有效率为 54.3%，平均治愈天数 6.5 天，经统计学处理二者均具有显著性差异（ $P < 0.01$ ）。

【典型病例】患儿杨军，男，6 岁，证见颜面散在脓疱及脓痂，体温 37.8°C ，应用紫药水外涂，青霉素每天 240 万^u 静滴 4 天，疗效不佳。脓疱增多漫延，遍布全身，体温升至 39°C 。改用本方外涂 1 次，次日脓疱便收敛干结，体温渐退，复用 2 次即痊愈。

松香青黛散

献方人小传 张廷臣，男，55 岁，山东东阿人。内蒙古满洲里市扎赉诺尔中医院院长，主治中医师（通讯地址：满洲里市扎赉诺尔矿区邮政街 25 号，邮编 021410）。从医 30 余年，对中医内、妇、儿科疾病的治疗积累了丰富的经验。主张“方不在多，法活则灵”。诸如：小青龙汤加减治咳喘病，以固冲汤与安冲汤为基本方治妇科崩漏症，活用独活寄生汤，巧用虫类药治疗风寒湿痹证等，灵活地运用古方取得了很高疗效。尤其是对水肿为主症的慢性肾炎的治疗有独到之处。撰写“谈治疗慢性肾炎”等论文 10 余篇。

【方药组成】松香 4g 青黛 5g 儿茶 3g 黄柏 3g 大黄 3g 龙骨 3g 枯矾 2g 冰片 2g

【制用方法】上药共为细末，香油调敷。

【功效】收湿止痒，祛瘀清热。

【适应病症】婴儿湿疮。

【方解】婴儿湿疮乃是内有胎火湿热，外受风湿热邪，蕴阻肌肤刺激而诱发。黄柏、青黛、冰片燥湿清热，龙骨、儿茶收

湿敛疮生肌，松香、枯矾祛风止痒，用大黄意在活血祛瘀生新。

【临床应用】 婴儿湿疮在临床中甚为多见，主要发生在头面，重者也可延及躯干和四肢。初为簇集的或散在的红斑和丘疹，在头皮或眉部，有黄色的鳞屑和结痂，剧烈瘙痒。若过分搔抓、摩擦、洗烫则糜烂、流水，损害逐渐扩大到颈部、躯干和四肢。自拟松香青黛散是外敷治疗湿疮的良方，有收湿止痒之功。

第三章 妇科疾病外治方

七 味 散

献方人小传 程隆光，男，65岁，四川荣县人。中国针灸专家讲师团副教授，青岛联合针灸医院院长（通讯地址：青岛市湛山大路54号，邮编266071）。15岁随父习医侍诊，悬壶家乡，后就学川南军区卫校、中央卫生部针灸疗法实验所。在海军青岛疗养院从事中医针灸临床40年，副主任医师。曾任海军中医学会理事、青岛市针灸学会副会长等职。以针灸为主配合中药医治内、外、妇、儿科常见病和疑难杂症，尤擅长神经、精神性疾病，对颅脑外伤后遗症、智能低下有较深入研究和临床处理经验。发表论文30余篇。

【方药组成】斑蝥 5g 廔虫 18g 水蛭 15g 虻虫 15g 血竭 9g 番木鳖 6g 麝香 0.5g

【制用方法】上药共研细末，贮存密闭瓶内。治疗时纳药末于关元穴（脐下3寸），腰阳关穴（腰骶椎关节）各0.2g，上覆生姜1片，橡皮膏胶布固定，经60~90分钟后，或局部皮肤有刺激感时取下，拭净该部药末。

【功效】活血逐瘀，通络定痛。

【适应病症】痛经，月经不调。

【方解】七味散原名七星丹，系家传秘方，用于治妇女痛

经、月经不调等症，对跌打损伤内服（药剂量组成不同）外敷有良效。取斑蝥、虻虫行气血暖胞宫，水蛭虻虫活血化瘀，血竭、番木鳖疏肝散结定痛，藉麝香通透之力，以生姜温散为引，用少量之药，经由任、督二脉之关元、腰阳关穴位，调和冲任，经行通畅而痛止。

【临床应用】妇女在行经前后及行经期间，因情志不畅、肝肾亏损或寒湿邪入络而客于胞宫，使经血凝滞故发腰腹痛等症。用七味散在腰阳关、关元穴贴敷，经1小时后痛即缓解，翌日再贴敷1次痛止，至下月行经前两日按上法敷贴1次即愈。治月经不调，连敷3个月，每月贴敷3次，行经前2日开始贴敷，隔日1次，可获良效。治跌打损伤，用童便调本方敷患部，能促进愈合，消肿止痛。

【注意事项】七味散敷贴穴位或患部的时间，均不要超过2小时，过久易使局部皮肤起泡破溃，以敷贴2小时内自觉局部刺痒或灼热为宜。知觉过敏或迟钝者慎用，糖尿病、高热及敷贴局部皮肤破损的患者忌用。

【疗效】临床统计本方治痛经175例，有效率90.14%，治愈率78.86%；治月经不调208例，显效率71.6%。

【典型病例】祁××，女，28岁，职员。行经时腹痛伴腰痛4年余，经行不畅，周期紊乱，近年加重，经期4~5天，经量少，色暗有块，用药疗效不显。当痛经时用本方贴敷腰阳关、关元穴1小时后疼痛逐渐缓解，第2天贴敷后症状消失。下月行经前贴后，再未发痛经。半年后随访，月经正常，自觉良好。

痛 经 散

献方人小传 潘玉华，女，46岁，主治医师，现承德医学院

附属医院中医妇科(邮编 067000)。自 20 岁始学中医,1976 年毕业于唐山煤炭医学院,担任承德医学院附院教学及临床工作,曾三次系统学习中、西医妇产科均达 1 年以上,对痛经、月经病、盆腔炎及不孕症等颇有专长。参加国际国内学术会议 10 余次,发表论文 30 余篇。任中西医结合学术委员会委员。合作出版《百家新论》第 2 集,并合作科研取得科研成果 6 项。

【方药组成】肉桂、元胡、细辛、小茴香各等分

【制用方法】上药共研细末,温水或黄酒调成糊状,并加二甲基亚砷数滴和匀,敷脐部加温,于经前 3 天,每日 1 次,治愈为止。

【功效】用于子宫虚寒,月经不调,经来腹痛,腰痠带下,久不受孕。

【方解】方中肉桂、小茴香、细辛温经散寒止痛,元胡理气活血止痛,二甲基亚砷能增加皮肤渗透作用。

【临床应用】妇女经前或经期小腹疼痛,得热痛减,经色紫暗,或夹紫血块,或冷汗昏厥,或畏寒肢冷,或呕吐便溏,带下清冷量多,舌苔薄白,脉沉或弦。中医认为气血运行不畅,而出现“不通则痛”的症状。现代医学认为多与精神因素引起植物神经功能失调,内分泌紊乱及物理刺激等原因导致子宫痉挛性收缩有关。故用温通药物,能抑制或缓解痉挛,达到“通则不痛”之效。

【注意事项】使用本方 2 次后效果不显者,应急宜采取其它治疗措施,若属热证者不宜用此方。

【疗效】以经行腹痛消失为显效,疼痛减轻为有效,腹痛不减为无效。结果:治疗 57 例,其中显效 35 例(用药 1 次 17 例,2 次 11 例,3 次 7 例),有效 17 例(用药 1 次 8 例,2 次 5 例,3 次 4 例),无效 5 例,总有效率为 96.1%。

【典型病例】李某,女,16 岁,学生。14 岁月经初潮,周期

尚准，经行第1天腹痛剧烈，甚则昏厥呕吐，冷汗淋漓，不能上课，经行不畅，色紫暗，每次均需服止痛剂或行针刺、理疗等方能缓解。自1992年3月经脐敷此药加温后疼痛明显减轻，连续治疗3个周期，每次贴敷5天，痛经痊愈，至今未发。

暖 宫 散

献方人小传 杨宗孟，女，67岁，江西省泰和县人。1951年毕业于江西医学院，1956年参加全国首届西学中研究班学习3年，毕业后执教于辽宁、黑龙江、长春中医学院。1963年随吉林省名老中医马志教授学习3年，尽得其传。曾任长春中医学院妇科主任、吉林省中医学会妇科分会主任委员等职（通讯地址为长春中医学院妇科特诊，邮编130021）。1990年获省优秀教师奖。曾先后研制新药女宝、化瘀止痛胶囊、长春毓麟丹等，其中女宝获第36届国际尤里卡等3项大奖。临床诊病多重调补脾肾，并善用外治法。发表论文40余篇，并参加《中医妇科学》等6本著作的编写，1990年被确认为国家级500名老中医之一。

【方药组成】 细辛 5g 川椒 10g

【制用方法】 上药共研末，每次2.5g，用生理盐水调成糊状，堵塞脐眼，用自制环形圈置于其上，暴露神阙穴，余用毛巾遮盖，用TDP治疗仪（俗称神灯）照射神阙穴30分钟，每天1次，连用10天为1疗程。

【功效】 扶阳益气，温补脾肾。

【适应病症】 肾阳虚性不孕症，输卵管轻度梗阻性不孕症。

【方解】 本方所治之病，是由于脾肾阳虚致子宫内阴阳二气不协调，影响孕卵着床而致的不孕症。川椒能温通督脉，细辛宣通阳痹，而且神阙穴能通全身之气血经络，加之灸疗的温热效

应，共奏扶阳益气，启迪命门之功。这种综合的调节作用能疏通经脉气机，温补心肾，直达胞宫脉络，俾火生胞暖阳回大地，则肾虚胞寒者毓麟有期。

【临床应用】经临床验证，该药可以提高体内雌激素水平，调节下丘脑-垂体-卵巢功能，临床常用于卵巢功能失调性不孕症，中医辨证为肾阳虚性不孕症。此外，还用于由炎症引起的输卵管轻度阻塞性不孕症。

【注意事项】该法在月经期间停用。

【疗效】1991年~1992年12月共收治37例，治愈率为32.4%，与G罗米酚组（治愈率26.9%）对照比较，疗效间无显著差异（ $P<0.01$ ）。

【典型病例】李某，女，26岁，工人，1993年9月9日就诊。病历号：2314。主诉：婚后4年未孕。病史：1989年5月结婚后曾口服避孕药一年，之后解除避孕，同居，至今未孕。丈夫精液常规检查：正常。月经 $14\frac{7}{30}$ 天，量中等，色正常，停药避孕药半年后月经不调 $\frac{4\sim5}{2\text{月}\sim5\text{月}}$ 天，量多，色黑，块少，经行腰骶酸痛，腿软无力。带下量多，色白，无味。食纳可，二便和，夜眠佳。查体：形体一般，神清倦怠，面色黄白少华，舌质暗淡，苔薄白，脉濡滑无力。妇科检查：外阴、阴道正常，宫颈光滑，宫体前倾位，稍小普硬，活动可，双附件阴性，分泌物白色、粘稠，中量。于经行12小时内行诊刮术，宫内膜病理回报：子宫内膜增生反应差，无排卵性月经。曾两次测定血清激素，显示雌、孕激素偏低，促卵泡素FSH以及促黄体生成素偏低。诊为月经不调，稀发，无排卵，原发性不孕症。中医辨证为脾肾气虚，气血不足，冲任亏虚，血海欠盈，致月经稀发、不孕。治法：温补脾肾，调经种子。灸疗神阙穴，日1次，每次30分钟，从月经干净后3天开始，连灸10天为1疗程，共2个疗程。于1993年12月3日因停经43天，

BBT 上升 22 天未下降，查尿妊娠试验阳性，诊为早孕。

暖 宫 孕

献方人小传 张应兴，详见内科“偏正头痛宁”方。

【方药组成】小茴香 60g 艾叶 10g 大茴香 15g 松香 15g 沉香 10g 熟附子 15g 广木香 15g 炙山甲 10g 乳香 10g 官桂 10g 肉桂 10g 炮姜 10g 桃仁 12g

【制用方法】上药研为粗末，装入布袋内，敷在小腹上。

【功效】温中回阳，散寒止痛，理气通经，温经活血，燥湿化痰。

【适应病症】不孕症，1~3 月来月经 1 次。

【方解】本方对于中下焦虚寒引起的月经错后，不孕症效果较好。其中大、小茴香、艾叶、炮姜、官、肉桂、附子用于脘腹冷痛，脾肾虚寒，肢冷脉数，经行腹痛等。沉香、广木香温中散寒、理气止痛；炙山甲、乳香、桃仁用于经闭不通，风湿作痛，甚或瘀血滞痛；松香外用增强燥湿止痛的效果。全方合用，同舟共济，促其早日孕育。

【临床应用】妇女结婚 3 年以上，男子无病而不孕者，多属先天性的和后天病理性的。其发病原因，后天性的多因虚寒、痰湿、郁热所致，而暖宫孕正适合于虚寒不孕，临床多见月经期摄食不慎，过食生冷，当风取凉，久坐湿地，风冷乘袭胞宫而致。症见腹冷时痛，经期错后，性欲减退等症。

【注意事项】本方 1 剂只能用 1 个月，月经后用。待下次月经时取下，月经干净后再投一剂。若月经过期不来，应立即取下。

灯 香 敦

献方人小传 武士建，见儿科“利湿化瘀汤”。

【方药组成】2寸长灯心草1根 香油2ml 大敦穴_双

【制用方法】将灯心草蘸香油点燃，烧双侧大敦穴各10下即止。如止而又崩，即在原处烧。若原处起泡，排泡烧之，血可立止。

【适应病症】崩漏。

【功效】止血。

【方解】由于崩漏发病缓急不同，出血的新久各异。因此，治疗尚须本着“急则治其标，缓则治其本的原则”。灵活掌握塞流即是止血。因而选大敦穴为主，应用灯心草有利水、通淋易燃的作用。配合香油燃烧刺激穴位有加强止血之功效。

【临床应用】大敦穴是足厥阴肝经井穴，在两足大拇趾外侧甲缝中，正中不上不下即是。此穴具有疏理肝气，调理气机的功能。对于肝郁引起的妇科病有独特疗效。

【注意事项】使用此法，只起立杆见影之效。还须根据病情辨证治疗以巩固效果。

三炭宫血外用方

献方人小传 周辉，男，1943年生，湖南益阳市人。现为益阳市人民医院中医内科副主任医师，省老年医学会会员、中西医结合研究会会员（通讯地址：湖南益阳市人民医院，邮编413001）。1968年毕业于湖南中医学院，曾任益阳疗养院长、老年

病研究室主任。擅长中医内科、老年病学，对疑难杂症颇有体会。发表论文 10 余篇。其中“三仁汤治疗伤寒副伤寒 37 例临床观察”收入《实用中西医结合临床手册》一书，“抗癆灵为主中西医结合治疗肺结核 107 例临床观察”收入中医中药出版社出版《当代最新中医验方集成》一书。1991 年被选入学苑出版社主编《中国当代中医名人志》。

【方药组成】西党参、川续断、川牛膝各 30~45g 贯众炭、荆芥炭、艾叶炭各 5g

【制用方法】上药研末，用纱布包成一药袋，将其用腹带固定于脐部，3~5 天即可见功。

【功效】健脾固冲，调经止血。

【适应病症】功能性子宫出血（脾肾虚损型）。

【方解】本方所治系指妇女年近五旬，脾肾不足，冲任失养之崩漏。治以健脾益肾、调摄冲任为本，益气止血为标。因脐属任脉，又是冲脉循行之处，任督脉相表里，冲任督“同源三岐”，三脉经气相通，联络五脏六腑，具有补脾益肾、益气固冲之功，故药物通过脐部可使药理作用直达病所。方中西党参补脾益气摄血，续断入肝肾通血脉，善疗妇人崩中漏血，川牛膝炒用活血调经、缩宫止血，贯众炭清热解毒，对子宫出血效力较好，使诸药温而不燥，荆芥炭、艾叶炭芳香渗透，引血归经。

【临床应用】妇女更年期子宫出血 70% 是属功能性的。其临床特点①平均绝经年龄在 49 ± 4 岁，症状持续 6 年以上；②子宫出血时间长、周期紊乱或一月数行，极易造成脾肾虚损，出现贫血；③初次月经较迟以 15~18 岁居多。经多年临床验证，脐疗优于口服，简便经济，药效持久，疗效神奇，无副作用，一般使用 3 个月经周期治愈，据临床统计有效率 90% 以上。

【注意事项】该方也适应脾肾不足的青少年功血，如合并感染者应同时予以抗炎治疗。

大蒜溶液

献方人小传 毛瑞敏，女，30岁。山东聊城地区中医医院（邮编 252000）妇科，中医师。

【方药组成】 食用大蒜去皮 200g 凉开水 200ml

【制用方法】 将食用新鲜大蒜 200g 去皮洗净，捣烂如泥，然后加入 200ml 凉开水，搅匀过滤取汁，装入干净容器内备用。用时，用消毒棉球蘸大蒜溶液涂擦阴道壁，或将大蒜溶液装入阴道冲洗器内来冲洗阴道。每日 1 次，5~7 天为 1 疗程。

【功效】 解毒，杀虫。

【适应病症】 滴虫性阴道炎，霉菌性阴道炎。

【方解】 大蒜出自《本草经集注》，辛，温。入脾、胃、肺经。解毒，杀虫，健脾。本品含蒜氨酸。蒜氨酸被蒜中存有的蒜酶分解后可产生蒜素。蒜素有明显的抗菌或杀菌作用，大蒜的挥发性物质、大蒜汁或大蒜浸出液同样有效。笔者在临床中取其解毒，杀虫的作用，用以治疗滴虫性、霉菌性阴道炎多例，疗效满意。并且物源丰富、价廉、方便。

【注意事项】 外阴、阴道有溃疡者慎用。或适当多加入凉开水减小浓度，以减轻大蒜对局部的刺激。

【典型病例】 李××，女，32岁，工人。于 1990 年 6 月 15 日就诊。自述患有滴虫性阴道炎 2 年。曾多次服用和阴道塞入灭滴灵治疗，以及多次用中药煎剂熏洗，用药期间阴痒症状减轻或消失，停药后阴痒又作，至今不能根除。妇科检查：外阴（一），阴道内有灰黄色泡沫样分泌物，阴道壁红，有散在的出血点，宫颈轻度糜烂，并取阴道分泌物送检。结果：有毛滴虫。诊断：滴虫性阴道炎。嘱用大蒜溶液装入阴道冲洗器中冲洗阴道。每日 1 次。

7 天后阴痒症状消失，待月经干净 3 天后继用 7 天。后来院妇科检查：外阴（—），阴道（—），并取阴道分泌物送检。结果：未找到毛滴虫及白色念珠菌菌丝及芽胞。愈后随访 1 年未复发。

清热燥湿汤

献方人小传 傅考芹，女，45 岁，河北沧州人。现为河北省沧州市卫生学校中医讲师、主治医师（通讯地址为河北省沧州卫校，邮编 061001）。于 1975 年毕业于河北医学院，一直从事临床及教学工作，曾任沧州地区中医学会委员等职。临床主张应变而治，不囿传统。对妇、外常见病师古而创新，急危症重在明理识病，内外合治。发表论文 10 余篇，出版《乡村医生行医指南》。

【方药组成】苦参 50g 地肤子 30g 白藓皮 30g 蛇床子 30g 百部 30g

【制用方法】上药以纱布包好，置入搪瓷盆内，加水煮 10 分钟，待温洗涤患处或坐浴。

【功效】清热燥湿，解毒杀虫。

【适应病症】外阴炎，阴道炎（滴虫性和霉菌性阴道炎）。

【方解】本症之发生乃湿热蕴结，循肝经下注，湿热生虫。故重用苦参以清热燥湿杀虫为主药，辅以地肤子、白藓皮以燥湿，佐以蛇床子、百部以杀虫。湿热得清，毒邪无以依附，邪祛则正安。

【临床应用】本症常以局部搔痒灼热为主，或见白色之假膜、皮疹、白带过多等。搔痒甚者加白矾 10g；有溃疡者加枯矾 10g。每晚采用本方洗涤坐浴，连用 3~7 天，苦楚难言之隐，洗之即愈。

【注意事项】注意器皿消毒，防止交叉感染。温度适中，防止烫伤。病情重者可兼用清热解毒剂内服。

【典型病例】陈××，45岁。患外阴炎和阴道炎，局部红肿灼热，剧痒痛，黄绿带下，臭味难闻，晚不得卧。用本方外洗5次，红肿痒痛俱消。

榆 柏 散

献方人小传 王金生，男，53岁，浙江杭州市人。现为杭州不孕不育专科医院副院长、副主任医师（通讯地址为杭州南星桥统一码头98号，邮编310008）。1967年毕业于浙江中医院中医大专班，为著名裘氏妇科嫡传弟子，对妇科疾病及机理的探讨有独特的见解，特长于妇科疑、难症及不孕症的治疗。现已有20余篇论文在省市、国家级书刊上发表，1992年5月整理出版了《裘氏妇科临证医案精萃》一书。创制了促孕宝、泌乳灵等妇科不孕症新方。采用疏理通络中药保留灌肠治疗输卵管阻塞，有效率达80%。

【方药组成】地榆 100g 黄柏 100g 追风箭 80g

【制用方法】上3味药分别焙干，研极细末，和匀，过筛后备用。

【功效】消湿热，祛湿毒，止带漏。

【适应病症】子宫颈重度糜烂，子宫颈癌致阴道出血。

【方解】地榆性沉而涩，凉血止血，泻火敛疮，入下焦；黄柏苦寒而清热解毒；追风箭苦涩凉，为止带治癌之良药。本方药虽三味，有清热祛湿解毒除漏之功。

【临床应用】因子宫颈重度糜烂、子宫颈癌致阴道出血，可暴露宫颈，直接将药末用喷粉器均匀地喷散在宫颈上，每日1次，10次为1疗程。

【注意事项】本方为纯中药制成的外敷散剂，经临床使用无毒

副反应。

【典型病例】段××，64岁。断经20年，近2月来阴道不规则出血，有时伴有黄水样分泌液，少腹作痛，腰酸头晕，面浮，经省妇保院诊断为子宫颈癌。苔微黄脉象细弦。除内服补气摄血凉血之中药外，外用榆柏散喷敷患处，30天后阴道出血渐止。

洁阴止痒液

献方人小传 刘文峰，详见内科“益寿降糖膏下”。

【方药组成】明矾 60g 苦参 60g 五倍子 60g 白藓皮 60g
川椒 30g 土茯苓 60g

【制用方法】上方为1剂，水煎2次，合滤液800ml备用。将所煎药液煮沸，趁热患处熏之，继而待温度适宜洗之，如阴痒者可坐浴。每次熏洗30分钟至60分钟。每剂药可用2~3天，每天熏洗2~3次，重复应用前均需加温煮沸。

【功效】清热解毒，除湿杀虫，洁阴止痒。

【适应病症】①淋菌性、霉菌真菌性、滴虫性阴道炎阴道瘙痒；②梅毒、宫颈糜烂宫颈炎；③皮肤湿疹、疥疮、体癣、脚气所致的搔痒等症。

【方解】本方集清热除湿杀虫止痒之上品为一体，对湿热下注所致之阴痒，病机合拍，故用之每获奇效。现代药理证实，其方中明矾、五倍子、苦参、川椒等对真菌滴虫均有一定的杀灭和抑制作用，这也为该方的适应病症提供了科学依据。

【临床应用】积多年的临床实践，该方是一安全有效的验方，凡属阴痒者，不论何因所致用之无不取效。对脚气病的应用，将本方加醋煎煮疗效更佳。

【注意事项】凡阴道、外阴及宫颈粘膜溃烂较甚者，可酌情减

少明矾与川椒用量，以避免对局部粘膜刺激引起的疼痛。

【疗效】治疗各类阴道炎 60 例，其中 1 周内治愈者（症状消失）45 例，2 周内治愈者 10 例，2 周内好转者（自觉症状明显减轻）5 例；治疗干湿脚气共 8 例，均用食醋煎药洗泡脚每晚 1 次，每次半小时，均用药 1 周，其中 6 例临床治愈，2 例好转；对下肢湿疹、疥疮用之也效，但未作详细资料统计。

【典型病例】冯××，女性，41 岁，工人。因患糖尿病 5 年近日加重而收住院治疗。入院后自述阴痒难忍自用洁尔阴无效，改用洁阴止痒液熏洗坐浴，1 剂未尽，自觉症状完全消失，后随访半年未再复发。

地雄参洗剂

献方人小传 魏金荣，男，43 岁，江苏丹徒人。现为江苏镇江钢厂中医主治医师（通讯地址为江苏镇江高资镇镇江钢厂，邮编 212114），中国疑难病研究所特约研究员。18 岁应征入伍从事医疗工作，先后毕业于解放军 116 医院护校和上海中医学院。曾任解放军 104 医院护士、军医，安徽省劳改局中心医院中医主治医师。有一定的理论与实践经验，临证主张辨证辨病相结合，走中西医结合医之路，善治疗内、妇科疑难杂症。现已在国家与省市级医刊发表“伤寒论对甘草运用刍议”、“头窍痹症辨治验案”、“经前咯血案”等论文 10 余篇，曾多次参加全国性学术交流会，并获首届齐鲁杯优秀论文奖。已载入《中国当代中医名人志》、《中国当代知名中医特色医疗辞典》、《求医问药实用辞典》、《疑难杂症求医南》、《中国民间名人录》、《全国治病特长名医选编》等书。

【方药组成】地肤子、土茯苓各 15g 苦参 12g 雄黄末 1g

【制用方法】将前 3 味药加水 1000ml，放入药罐中烘煎 30 分

钟，用纱布过滤去渣，加入雄黄末拌匀即可，每晚熏洗坐浴 30 分钟左右，3 日为 1 疗程。

【功效】清热解毒抗菌，祛风燥湿杀虫。

【适应病症】热淋，赤白带下，外阴瘙痒。

【方解】本方外治乃各种疾患所致的下焦湿热蕴结，气机不畅。地肤子能清利湿热，利小便，散恶疮，《本草原始》云：“去皮肤中积热，除皮肤外湿痒”。苦参、土茯苓、雄黄清热燥湿解毒，祛风杀虫通络，土茯苓有治梅毒之功。方中清热解毒药均有不同程度的抗菌抑菌作用，药物熏洗坐浴，有利于改善致病外来环节，促使腠理疏通，气血流畅，达到由表及里的作用。

【临床应用】急慢性尿道感染，阴道炎，宫颈炎，外阴部湿疹，瘙痒，脱肛，淋病，梅毒等下焦之疾患。

【注意事项】熏洗坐浴时注意不要烫伤外阴部。

肤床阴而净

献方人小传 刘俊杰，男，39 岁，黑龙江省海伦市人。出生于五代祖传中医世家，自幼随父学医。现任海伦市二轻医院副院长、主治医师。临床主张中西医结合，标本兼顾。从医 20 余年，系统地学习了中医经典著作及各家学说，1988 年在绥化地区卫校学习了西医理论。专于妇科，兼通内科、儿科、外科。1989 年与父编著了《简明西医诊断歌诀》。发表了区级论文 1 篇，获科技论文 3 等奖。省级论文两篇在省中西医结合学术会上宣读。国家级论文 4 篇，1993 年荣获“杏林专科特色名医”称号。

【方药组成】苦胆草 30g 川楝子 30g 地肤子 20g 蛇床子 20g 苦参 30g

【制用方法】将上药加水 1500ml，煎至 1000ml，临睡前用带

线无菌棉球蘸药液纳入阴道内，次日取出。15 天为 1 疗程。

【功效】清热燥湿，杀虫止痒。

【适应病症】滴虫性阴道炎。

【方解】方中苦胆草、蛇床子、苦参具有清热解毒、杀虫燥湿止痒之功。地肤子利水止痒，川楝子散寒杀虫止痛。故诸药配伍，清热燥湿杀虫止痒力强。

【临床应用】滴虫性阴道炎，临床以阴部瘙痒，白带增多为主要症状。属祖国医学“阴痒”、“带下”的范畴，系属脾虚生湿下注，湿郁蕴热生虫，虫蚀阴中而致。故临床以清热燥湿、杀虫止痒之苦胆草、蛇床子、苦参、地肤子、川楝子配伍应用而获良效。

【注意事项】用此药时避免性交。

香 椒 粉

献方人小传 王淑华，女，41 岁，现从医在大庆市第六医院中医科，主治医师。18 年前毕业于黑龙江省中医学院，始终从事中医临床工作，独擅男科、妇科。发表国家级交流论文 10 余篇，并曾获市级优秀论文和技术进步奖。

【方药组成】茴香粉、胡椒粉各 15g 葱白适量去皮带须

【制用方法】将 2 药放入葱内，捣成泥状，卯酉 2 时敷气冲穴，纱布覆盖，胶布固定，5 天为 1 疗程。

【功效】温中散寒，升中助阳。

【适应病症】阴道矢气证。

【方解】本方所治乃因中气不足，寒邪内陷而别走胞宫所致的阴吹证。茴香、胡椒及葱白温中而升中气，助阳而散寒。气冲穴既是足阳明胃经所行之处又是任脉起始之地，卯时即日出乃阴竭阳始盛之时，酉时日入阳衰阴方盛之时，胃为中焦，任主胞

宫，此时用胡椒、茴香、葱白敷气冲穴助阳气，升中气，散寒邪，而使胞宫之气得升，寒邪得散，阴吹自止。

【临床应用】多用于产后，病后及老年和孕妇脏腑功能低下所致的阴道矢气证。证见神疲乏力，面色青白无华，食少纳呆，肢冷便溏，阴道连续不断或间断的矢气。大多无性欲感。舌淡苔白脉沉缓或沉迟。

【注意事项】敷用 1 疗程后若效果不显或未治愈可重复 1 疗程。阴吹症状消失后可服用补中益气丸调治半月。

药 浴 方

献方人小传 施发林，详见内科“药物灸下”。

【方药组成】白藓皮 30g 蛇床子 30g 苦参 20g 鹤虱 20g
木瓜 15g 五倍子 18g 龙胆草 15g 生白矾 15g 川椒 15g 白芷 9g

【制用方法】水煎后，先薰后洗，1 日 2 次，每剂药用 3~4 天。

【功效】清热止痒。

【适应病症】外阴瘙痒症。

【方解】方中白藓皮、蛇床子、苦参清热祛湿毒，消炎止痒；五倍子收涩杀虫，鹤虱杀虫，以上药物乘热薰洗外阴，煎煮后的药物直接接触患处，所以药效力捷。

【临床应用】外阴瘙痒症属于祖国医学“阴蚀”的范畴。本病因长期用浓茶，饮酒或房事不节，积湿生热，以致湿热下注，瘙痒初起，日轻夜重，严重时昼夜无间歇，患者坐卧不宁，日久，皮肤、粘膜逐渐粗糙，常因奇痒难忍而影响工作、生活及睡眠。往往因搔抓后皮肤裂伤，染毒爆发，甚至溃烂成疮。急于薰洗，则为解决病人之苦。

【注意事项】临床使用过程中，往往一开始疗效较快，但使用1个阶段见效渐慢，如果中断治疗，有时前功尽弃，坚持使用，才能治愈。先熏后坐浴，未见不良反应。

阴痒洗剂

献方人小传 马振远，详见内科“鹤膝风外治方”下。

【方药组成】苦参 15g 黄柏 15g 防风 10g 蛇床子 30g 花椒 6g 艾叶 10g 白矾 6g

【制用方法】将上药布包，加清水 2000ml 浸泡 10 分钟，煮沸 20 分钟，倒盆内先熏后洗 30 分钟，每日 2 剂，早晚各洗 1 次，7 日为 1 疗程。

【功效】清热解毒，除风燥湿，杀虫止痒。

【适应病症】妇女阴痒（霉菌或滴虫性阴道炎、外阴炎）。

【方解】本方所治之病，乃湿热下注所致阴痒。治法当以清热解毒，除风燥湿，杀虫止痒为主。黄柏、苦参清热解毒；花椒、艾叶、蛇床子苦温燥湿杀虫止痒；古有“无风不作痒”故加白矾、防风除风胜湿止痒，用药外洗直接作用于局部。

【临床应用】妇女湿热下注所致阴痒现代医学认为多由霉菌或滴虫性阴道炎所致，内服药常不能直达病所，疗效较慢，外用熏洗直接作用于局部收效较快。

【注意事项】本方适应于湿热下注所致阴痒症。若熏洗 1 周仍不见效者，或属肝肾阴虚燥邪生风，则另用他法治疗。

地肤子汤

献方人小传 曾介绥，男，45岁，湖南新化县人。现为新化县中医院（邮编417600）党支部书记，中医内科主治医师。16岁侍学于祖父，3年后相继在乡里、县城悬壶。1990年获县劳动模范，省政协先进个人。临症主张应变而治，不囿经方。对妇、儿科常见病师古而创新，急危证重在明理识病，内外合治。术誉梅城。

【方药组成】地肤子 15g 蛇床子 15g 干苦参 10g 陈艾叶 10g 风化硝 15g

【制用方法】用上药前4味文火煎汤取液约500ml，纳入风化硝溶解于汤液中，待液温70℃时薰洗阴部。

【功效】祛风利湿，杀虫止痒。

【适应病症】外阴瘙痒证。

【方解】外阴瘙痒证乃因湿热下注，或洗涤不洁，坐卧湿地，以致感染滴虫，寄生阴道而成。方用地肤子、蛇床子、陈艾叶、祛风止痒，干苦参清热利湿，风化硝杀虫。药浴薰洗，直达病所。

【临床应用】外阴瘙痒证症见外阴部及阴道内瘙痒不堪，带下黄色，有的搔破继发丘疹，脓疱，红肿疼痛，溃烂成疮，阴道分泌物涂片检验，可见滴虫。用地肤子汤薰洗阴部，可立时止痒，5日便可根除。

【注意事项】药浴温度适当，不可烫伤皮肤。薰洗1日1次，以子时为效更大。

苦参百部汤

献方人小传 裴绍荣，女 50 岁，山东阳信河流乡人。现为烟台市中医院妇科主治医师（通讯地址：山东省烟台护校家属宿舍 18 号，邮编 264002）。本人 1976 年毕业于山东省中医药学校，毕业后一直从事妇科临床工作，擅长治疗不孕症、习惯性流产、月经不调、盆腔炎、阴道炎、外阴白斑等病有独到的见解。曾多次发表论文。

【方药组成】苦参 60g 百部 30g 土茯苓 60g 蛇床子 15g 海桐皮 15g 黄柏 10g 枯矾 10g 白头翁 30g

【制用方法】上药水煎 500~800ml，倒入干净器皿中，做外阴阴道熏洗或冲洗。每日早晚各一次，每次约 20 分钟。

【功效】祛湿杀虫止痒。

【适应病症】阴道炎。

【方解】本方所治之病，乃因湿盛所致白带过多症。治疗当以祛湿为主。因为病变在表层粘膜，所以取外治法。一般初得此病多为湿热，方中苦参、白头翁、黄柏、枯矾要重用，以清化湿热杀虫止痒。病久者多为寒湿，方中百部、土茯苓、蛇床子、海桐皮要重用，以温化寒湿杀虫止痒。

【临床应用】阴道炎常因外界污染所致。症见白带过多，其色黄秽气甚者多属湿热，白色腥气甚者多属寒湿。现代医学认为系阴道粘膜发炎，分泌物增多形成的一系列症状。所以予苦参百部汤洗之。一般 2~3 次见效。

【注意事项】症状消失后，仍继续用药 1 周以巩固疗效。

【疗效】352 例中，治愈 338 例，占 96%；显效 12 例，占 3.4%；无效 2 例，占 0.5%。

回乳外贴方

献方人小传 徐光华，男，48岁，陕西煤建公司总医院（邮编 727000）副主任医师。作者临证30余年，中西结合，对内科心脑血管病及疑难杂病经验丰富，对妇儿诸病收效亦丰，对心理疗法与体疗亦颇重视。嗜好总结，发表论文50余篇，参加国内外学术交流10多次，论著有《金匱要略新编》与《千金诊法释评》，计55万字，陕西科技出版社出版。被三家报纸报道，收入4部辞典，乳宝罩与腰带获国家专利。

【方药组成】 芒硝 50g 冰片 0.1g 乳香、没药各 0.2g

【制用方法】 上药外用纱布包，放乳上，固定。芒硝遇热软化，流水超越乳房外者擦之。日3次，乳回则止。

【功效】 消炎回乳。

【适应病症】 乳妇断乳；或乳腺炎辅助治疗。

【方解】 乳妇断乳，初乳流不止，或滞积乳中，渐则致气血运行不畅，郁而发热，甚则化腐为脓。于其初即用本方者，取芒硝咸寒，清热消肿；少佐冰片、乳香、没药消炎活血，则功效更大。且4味均外用常用药，芒硝又具软坚之功，故合用之。

【临床应用】 一般来说，外贴1天，回乳80%；2天乳断。无不良反应。

【疗效】 用于52例断乳妇女，仅1例失败。

【典型病例】 刘某，女，30岁，家住陕西铜川小河沟。小孩1岁半，欲断乳，用上方1剂，乳退大半，2剂全断。无任何不良反应。

消肿散结液

献方人小传 钟秀美，女，60岁，福建省安溪县人。现为福建省泉州市中医院妇科主任医师、副教授（通讯地址为福建省泉州市温陵路南段泉州市中医院，邮编362000）。先后毕业于晋江医士学校、福建中医学院。曾任泉州市中医学学会理事长、泉州市中医院副院长等职。从事医疗工作已近40年，擅长于中医妇科。在国内外发表学术论文30余篇。1989年被选为福建省中医妇科专业委员会副主任委员，1992年被定为福建省老中医专家学术经验继承工作指导老师。

【方药组成】朴硝50g 蒲公英30g 枳实、莪术各10g

【功效】清热解毒，行气消瘀，软坚散结。

【适应病症】妇科炎症包块，皮下血肿，手术切口瘢痕疙瘩。

【制用方法】将蒲公英、枳实、莪术加水500ml，煎取药液250ml；药渣再加水400ml，又煎取药液250ml，然后将两次药液混合，加入朴硝溶化。使用时将药液适当加热，以不烫伤皮肤为度。用2块6层厚的细纱布，大小可略大于病灶部位，交替蘸药液，乘热进行湿敷，每日2次，每次20分钟。

【方解】朴硝其味咸苦寒，具有软坚散结、消肿止痛和消炎的作用；蒲公英清热解毒，消痈散肿，具有较强的杀菌和抑制某些病毒的作用；枳实、莪术善于破血、行气、止痛。诸药藉助热湿敷之力，渗入皮肤，直达病所，软化炎症包块和瘢痕疙瘩，促使炎症渗出物和血肿吸收，从而达到病灶消失。

【临床应用】①妇科炎症包块，大多发生于经期产后，正气虚弱，瘀血未净，外感热毒之邪，与瘀血搏结，壅阻气机，结成包块，往往病情笃重，宜内治外治并用。除内服清热解毒，活血化

瘀，软坚散结之药外，应外用本方酌加败酱、三棱，进行局部热湿敷。②血肿，大多因跌扑闪挫损伤脉络，离经之血排无出路，积于肌肤腠理，久而不化则易化腐成脓，宜用本方作局部热湿敷，改善局部血液循环，促进瘀血吸收，以达到消肿止痛。③瘢痕疙瘩，大多因手术损伤好肉筋络，切口炎症，愈合后形成瘢痕疙瘩，可用本方作局部热湿敷，改善局部血液循环。软化瘢痕疙瘩，并促使其消退。

【注意事项】妇科炎症包块，在急性期应内治与外治并用，切勿粗心大意。外伤性血肿，应当在内出血已停止，瘀血已凝结成块，方可用本方热湿敷。

【典型病例】林某，29岁，因急性盆腔炎入院。经用中西药治疗10天，病情好转出院。近10多天来，经常少腹疼痛，腰酸，黄带增多，舌淡红，苔厚腻，脉沉弦。妇检：外阴（一）；阴道内黄色分泌物较多；宫颈轻度糜烂；子宫体稍增大、压痛；左侧触及肿块如孕2个月大，与子宫粘连，压痛，不活动。血检：白细胞 $8.1 \times 10^9/L$ ，中性细胞0.86，淋巴细胞0.14。B超提示：子宫 $6cm \times 5cm \times 6.4cm$ ，左侧见 $6.8cm \times 5.2cm$ 低回声区、部份液性暗区。诊为盆腔炎症包块。用朴硝50g、蒲公英30g、莪术、枳实各10g进行局部热湿敷，连用7天，肿块消失，诸症均除。

第四章 外科疾病外治方

红白黄消散

献方人小传 郭林选，男，36岁，甘肃省灵台县人。现为平凉市中医院（邮编 744000）内科中西医结合医师。从医 15 年，在中西医结合治疗疑难杂症方面有一定的研究。

【方药组成】红花 15g 白芥子 60g 大黄 30g 芒硝 60g

【制用方法】上药研末，食醋（山西陈醋为佳）搅拌，湿度为捏入手中成块，捣烂即散为度。炒热，以 45~60℃ 为宜，小孩应用时温度偏低。再用纱布包裹，外敷患处。凉时再入醋再炒再敷，可反复 5 次，或炒热外敷时外用热水袋加温或红外线照射。即“研末、醋拌、炒热、外敷”八字制作要领。

【功效】活血化瘀，软坚消肿，改善循环，炎症消散。

【适应症】输液后静脉炎，注射药物引起的臀部硬肿，血栓性静脉炎也有效。

【方解】方中白芥子辛温消散，除瘀消肿，改善血运，促使吸收；红花、大黄活血化瘀，软坚消肿；芒硝的主要成份是硫酸钠，促使水分外渗，使肿胀消散，拌醋加热有助于药物发挥作用，改善血运，肿胀吸收，炎症消除。全方共达消除炎症、肿胀消散、疼痛缓解之效。因药名与病变谐音，故命名为红白黄消散。

【临床应用】本类病症多是因为注射药物引起的非感染性炎

症，使药物吸收障碍，局部红肿硬痛，继续用药困难，尤其小儿静脉穿刺更是困难，故配此方。用药 1~3 剂，每剂药可用 1 天。轻症 1 天即恢复，重症需 3~7 天。

【注意事项】本方只限于非感染性炎症，严重的病变如血栓性静脉炎需配合应用蝮蛇抗栓酶、维脑路通。静脉滴钙引起的炎症性肿胀可配合 2% 普鲁卡因 2ml、654-2 5mg 局部封闭。有坏死趋向者无效，同时禁用。对于臀部硬肿感染时必须应用抗菌素，感染化脓时，无效同时禁用。

【疗效】曾统计 100 例患者，臀部硬肿 40 例，输液后静脉炎 40 例，血栓性静脉炎 12 例，滴钙后引起静脉炎者 8 例。显效 88 例，占 88%；有效 6 例，占 6%；总有效率 94%；无效 6 例，占 6%。其中无效的 6 例：臀部硬肿 3 例有感染，血栓性静脉炎 1 例，滴钙后引起者 2 例有坏死趋向，故无效。

【典型病例】柳××，女，62 岁，患右下肢大隐静脉血栓性静脉炎，曾住某中医院经静脉点滴维脑路通，蝮蛇抗栓酶治疗半月无效。来诊，入院时右下肢严重肿胀，较左下肢周径增粗 12cm，凹陷性浮肿，青紫。通液试验大隐静脉不通，诊断如上。即给予此方配合静脉点滴维脑路通、蝮蛇抗栓酶，3 天后肿胀消失，7 天恢复如常。

疗 消

献方人小传 张应兴，详见内科“偏正头痛宁”方。

【方药组成】野蜂房 2 个 黄连 10g 黄柏 10g 黄芩 10g。

【制用方法】将野蜂房烧至外皮黑褐色，里面黄褐色为度，研末，与三黄末混合，香油调敷患处。

【功效】攻毒散肿，消炎止痛。

【适应病症】疔疮。

【方解】疔疮是以唇、鼻部为多，肿块周围容易出现广泛的肿胀，局部除疼痛外，多伴有麻木感等为主要特征。方中野蜂房散肿清毒镇痛，其他三味药主用于热毒疮疡，合而对疔毒有良好的治疗作用。

【临床应用】疔疮的发病原因，多因面部受到各种创伤（如刺伤、割伤、擦伤）、火毒所致，治宜清火解毒为主。若敷上药不干脱，则不换药。一般在敷药2天之内出脓，第3天可结痂。

【注意事项】疔疮如不及时治疗，过食辛辣助火及荤腥发毒的食物后，出现病情加重，局部肿痛加剧，肿胀延及头面，并有高热、头痛、呕吐等症状，需配合抗生素治疗。

泥鳅外敷方

献方人小传 蒋运祥，男，52岁。安徽定远县人。现为定远县医院中医科主任（通讯地址：安徽定远县城南大街县医院宿舍楼，邮编233200）。大专学历，先学西医内、外科，后改中医，刻苦学习，勤于临证，注重实效，认真总结经验。发表中医、中西医结合文章96篇，获省市级优秀论文奖6次，聘为多家杂志通讯员。

【方药组成】鲜活泥鳅数条 白糖适量

【制用方法】将泥鳅略清洗，不去内脏，切成薄片，捣成泥状，加白糖适量，拌匀。视患处大小摊于不透水纸上，敷于患处，固定，每4~6小时换药1次。

【功效】解毒散结，活血消肿，提脓生肌。

【适应病症】疖、痈、疔、外伤血肿、烫伤、脓疮等。

【方解】泥鳅本为滋阴清热，祛湿解毒，补中益肾之药食

两用之品。笔者在临证中发现，泥鳅外用可治多种外科疾病，且药性温和柔润，无刺激性，不论已溃未溃，均可使用。

【临床应用】凡急性炎症者，使用鲜泥鳅药泥外敷后，有清凉舒适感，其红肿疼痛很快缓解。有疮面者则肉芽渐渐红活新鲜。对褥疮、臁疮或溃疡疮面者，将鲜活泥鳅切成薄片，烘脆研细，每取 10g，加枯凡 0.2g、冰片 0.1g，以麻油调敷为宜。

【注意事项】若作肉泥外用者，多为保留粘腻滑液，所用的泥鳅一般不宜多洗，不去内脏，切薄片后捣成肉泥。如果用量较大，可放在绞肉机上绞两遍。使用时以新鲜配制者为佳，且须 4~6 小时更换 1 次，既便于药效发挥，也不致使药泥发生腥臭味。

【典型病例】张某，男，35 岁。右膝外上方生一疖肿已 3 天，约 5×4cm 大小，红肿疼痛，T38.2℃。予泥鳅数条切薄片加白糖一匙，捣成肉泥外敷，4~6 小时更换 1 次，4 小时后疼痛减轻，1 天后红肿明显减退，再敷 2 天而愈。

疖肿外敷方

献方人小传 黄祖明，男，40 岁，山东青岛市人。现为青岛市肿瘤医院主治中医师（通讯地址为山东省青岛市肿瘤医院中西医结合科，邮编 266042）。1977 年从山东中医学院毕业，分配在青岛市肿瘤医院从事肿瘤内科的中西医结合工作。临症主张中西医结合、综合治理，对肿瘤的化疗与中医扶正治疗有一定研究，发表交流论文数篇。

【方药组成】白矾 12g 赤小豆 30g 生柏叶 30g

【制用方法】先将白矾、赤小豆加工成粉末，再将生柏叶捣成糊状，用生蛋清将诸药调成糊状。治疗时用竹器将药糊薄薄一层涂于患处，有脓头者，将脓头暴露，待患处药糊稍干，可再涂药，

反复数次。治疗时以 30 分钟为宜，每日可 2~3 次。

【功效】清热解毒，消散痈肿。

【适应病症】疔肿，蜂窝组织炎，急性乳腺炎，化脓性指头炎等。

【方解】痈疔疔肿多因热毒壅结、气血壅滞而成。热毒壅盛则红肿，气血郁滞壅塞不通则疼痛，治疗上当以清热解毒为主。方中白矾、赤小豆解毒消肿；生柏叶燥湿凉血，可直折热毒，消肿定痛；生蛋清粘腻，既可调和诸药，不使药性外泄，又可滋养患处肌肤。

【临床应用】痈疔疔肿以患处红肿热痛为主证。本方临床运用一般轻症治疗 2 次可愈，重证数次可愈。对于痈疔疔肿初起，效果更好。若疮疡已溃及阴疽患者忌用。

【注意事项】药物应随制随用。捣生柏叶以石臼为好。下次治疗前应将患处清洗干净。若全身症状明显者，应予以对症治疗。

痈疽疔疮外用方

献方人小传 王长春，男，59 岁，研究员。工作单位：射阳县海洋中药材种植场。（通讯地址：射阳县皮肤病防治所，邮编 224300）。医疗专长：中医中药、内、外科。学术经验：中医中药治疗肝炎、胆结石有一定临床经验。科研成果：“完成沿海滩涂抗菊花高产栽培”获江苏省科技成果 4 等奖。完成国家星火计划“中药材高效益粮药间套作种植技术项目”获盐城市科技成果 3 等奖。发表论文 126 篇。与他人合著 13 部专著。

【方药组成】生半夏 10g 生南星 10g 生草乌 15g 生川乌 15g 七叶一枝花 10g 蒲公英 20g

【制用方法】将上述 6 味药物（鲜品或干品，如用鲜品用量加

倍)，鲜品捣烂或干品研细粉，加白醋适量浸泡，用纱布过滤，其过滤液即为此药水。必须使药汁充分浸出，一般春天浸3天，冬天浸7天左右为宜。用新毛笔或鸡鹅毛，或药球蘸药水直接涂搽患处。或用陈干面粉用药液调均匀成糊状，外敷局部红肿疼痛处。

【功效】具有清热、解毒、消肿、止痛作用。

【适应病症】主治痈疽发背、疔疮肿痛、小腿红肿疼痛，妇女乳痈等症。

【方解】本方中生半夏、生南星、生草乌、生川乌均有毒，不经炮制不能入口，外用能解毒、消肿止痛。方中七叶一枝花能消肿止痛，蒲公英清热、解毒、消炎、止痛。

【注意事项】本方共6味药组成，除蒲公英清热、解毒外，其余5味药均为剧毒药，应用时严防入口，以防引起中毒。

【典型病例】吴××，女，28岁。哺乳期左右双乳乳孔闭塞，乳汁不通，迅速肿胀，摸之灼手，刺痛攻心，高热神昏。经涂本药液，约2小时，疼痛递减，高热渐退，神志慢慢清醒，未曾服其他药物，搽药3天后痊愈。

垂盆草外敷法方

献方人小传 王楚才，男，现年49岁，现浙江嵊县下王镇中心卫生院院长，出身于乡中医世家，中医喉科第五代传人。15岁随祖父王杏林学医，三十多年临床实践继承祖业喉症挑法，内外并治。临床上主张继古、中西医结合、攻克疑难杂症。对中医伤科、针灸治疗急危病人有独到一法。并在县、市、省、国家级学术杂志发表论文18篇。

【方药组成】垂盆草50g（鲜）

【制用方法】取鲜垂盆草（可根据痈疔大小而定），捡去杂草，

洗净泥沙，阴凉鲜草表面水干，然后将鲜草在碗中捣烂加少许食盐，捣均匀，放在植物叶上包扎敷患处。每日一换，半小时后患处疼痛明显减轻，一昼夜后有脓拔脓，无脓消肿止痛。注意：不宜用塑料薄膜包扎。

【功效】性凉、叶甘酸，清热解毒，消肿排脓，有脓拔脓，无脓消肿止痛。

【适应症】适应一切痈、疖、疔恶疮红肿热痛，恶疮危象，以及急性喉头肿痛，水火烫伤，毒蛇咬伤，无毒副作用。

【典型病例】钱杏玉，女，69岁，三界人。在颈后部发现结块，似鸡蛋白肿，灼热而痛，逐渐漫肿，坚实焮热疼痛，头痛项强，全身不适，张口困难，头也不能抬和旋转，经西药抗菌素治疗后色渐红，肿热高突，根脚如盘，结块坚硬疼痛剧烈，如鸡啄米，疼痛难忍，夜不合眼，前来本院求诊。脓成未溃，不宜开刀。君用垂盆草外敷一昼一夜，脓溃液白稠粘如破棉花，再次换药，脓尽而愈。故有“痈、疖、疔脓出就好”之说。

蚤休涂剂

献方人小传 李时朴，男，59岁，中医主任医师、副教授，省老中医药专家学术经验指导老师。工作单位：福建省龙岩地区第一医院（邮编364000）。通讯地址：福建省龙岩市东城北园新村一巷。具有29年中医临床实践，对瘀血证、肾病造诣较深，撰写“运用肾主骨理论，进行颈椎病探讨”、“中药治疗泌尿道结石96例临床观察”等30余篇论文，分别发表国内各类刊物或学术会议宣读和交流。在中医界享有较高威望和声誉。

【方药组成】蚤休、醋各适量

【制用方法】①取鲜蚤休根加醋磨汁。②取干蚤休根研粉调醋。

涂局部，1日3~4次。

【功效】清热解毒，消肿散瘀。

【适应病症】疖、疮疡。

【方解】蚤休又名七叶一枝花 (polyphylla, SMith)，属百合科，重楼属。主要成份甾体皂甙、蚤休甙、蚤休士宁甙。体外试验对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌抑制作用，并能增加白细胞的吞噬能力。具有消炎退肿功能。醋能改变局部循环障碍，活血散瘀。两者合用涂于病处，起着清热解毒、化瘀退肿的功效，清除炎症，疾病可愈。

【临床应用】①疖、疮阳证效果好。②炎症全身症状明显加用仙方活命饮水煎内服。③鲜品磨汁，其乳疖表面应粗糙便于药汁磨出。

【注意事项】本品苦微寒，有小毒，误服产生恶心、呕吐、头晕等症。可用洗胃和对症处理即可。

【疗效】治疗10例，以局部消肿止痛为标准，1日见效3例，2日见效6例，3日见效1例。一般5日痊愈。

【典型病例】曾××，男性，40岁。突然左小腿内侧发现红、肿、痛，小硬结约1.5cm×2cm，伴畏寒发热，全身不适，口干喜冷饮，大便干结，尿赤短少舌质红，苔薄黄，脉弦数。血检：白细胞1.1万/L，中性86%，淋巴14%。诊断：左小腿内侧疖肿。经蚤休涂剂外涂病处，翌日局部红肿始退，疼痛消除，3日病愈。

肘臂显瘀艾灸法

献方人小传 李汉伟，男，1956年生，广东吴川市人。吴川长岐中心卫生院医师（邮编524531）。1977年毕业于广西合浦卫生学校，1989年毕业于光明中医函授大学骨伤科专业。曾任广西

北海市三合口医院住院医师、副院长等职。临床主张应变而治，中西结合、内外合治，擅长骨伤、内、儿杂病，兼通针灸按摩，尤精于痹证。发表论文多篇。“刺络放血疗法的临床应用”1989年获广西合浦县医学系统五大会第四届年会论文2等奖，“试谈肾主腰脚”、“软坚治增汤辅以光疗按摩治疗增生性关节炎”1993年在北京获全国首届“光明杯”中医药优秀论文奖。

【施术方法】暴露患者肘至上臂的内侧面（男左女右，或左右同取），医者以手掌蘸清水频频轻轻拍打，使之肤红有瘀点充分呈现为度（非本疗法治疗疾病则不呈现），擦干水迹，然后用如苍耳子大小艾炷着肤灸，或隔姜灸明显的瘀点，每点灸2~4壮，灸后创面常规清洗涂上跌打万花油。隔1周后重复上法1次，3次为1疗程。

【功效】疏通经络，消肿止痛，化瘀散结，祛腐生新。

【适应病症】疡科多种病症。

【治疗机理】肘臂显瘀艾灸法，能准确地寻找病体瘀性反应点，从而提高艾灸的疗效。应用本法临床症状好转、消失，瘀点亦随之减少、逐渐消失。病体瘀性反应点的产生，是因机体阴阳失调，新陈代谢发生障碍，致使有害代谢物质通过经络“内属于脏腑，外络于肢节”（《灵枢·海论》篇）原理，隐藏在特定体表内，即“经气之所游行出入”的部位。因此，在经气出入部位，以之为输，根据“经络所通，主治所及”，通过艾灸刺激以激发其经气，引导直入病所，调节阴阳之偏，使体内气血畅通，已发生障碍的生理功能恢复正常，从而达到治愈疾病。故《外台秘要》十四卷载有：“火艾，特有其能，针、药、汤、散皆所不及者，艾为最要”。

【临床应用】眼睑边慢性溃疡、中耳炎、颈、背部疮毒、腋下疔、乳痈、臀腿部多发性疔肿、深部脓肿、睾丸炎、阴囊疮疡、足发背、足部疹癣恶毒感染等未溃、已溃或久治不愈疡科多种疾病。

【注意事项】①同灸疗的禁忌症。②瘀灸部皮肤溃疡、外伤禁

用，大血管处禁灸。③灸点创面未愈之前，不易食用生姜，以免创面皮肉高凸影响美容。

【治疗效果】笔者创立肘臂显瘀艾灸法，经17年临床治疗上述疡科多种病症，简便易行，疗效独特，无不良反应，极少复发者（复发往往为施术1次病者）。据不完全统计治疗300多例，均经中西医结合治疗无效，或此愈彼起，缠绵复发者，一般经本法治疗2~3次后逐渐痊愈，极个别病例需治疗4次以上。

搭背灵膏药

献方人小传 宋俊莲，女，50岁，天津人。1960年~1966年就业于天津中医学院，现为天津东丽医院中医科主任，副主任医师（通讯地址为天津东丽区立交桥东，邮编300300）。长期从事临床，广泛钻研内、妇、外科等疾病。对皮肤科疾病如脱发、牛皮癣、蜂窝组织炎等均有一定的治疗经验，曾撰写论文在全国性会议上发表并编入论文汇编。现从事中西医结合治疗脑血管疾病。

【方药组成】马蜂窝 酒制大黄各等分

【制药方法】取马蜂窝用砂锅稍焙研细过箩，大黄用黄酒闷后经砂锅焙干研细过箩。2味药末用蜂蜜调成糊状，放置在4~6寸的黑布上敷患处，每24小时换药1次。

【功效】祛腐生肌，消肿止痛。

【适应病症】搭背疮（蜂窝组织炎）。

【方解】膏粱厚味或嗜食辛辣之品，血分易积热逆于肉理，乃生痈肿。大黄性味苦寒，除攻积导滞通瘀作用外，临床上常用于热证肿疡。马蜂窝甘平有毒，《别录》：“疗蜂毒，毒肿”。《本草汇言》“驱风攻毒，散疗肿恶毒”。故二药同用可达凉血解毒，攻散痈肿恶毒之功效。

【临床应用】蜂窝组织炎。

【疗效】100%。

香 附 膏

献方人小传 刘五龙，男，44岁，湖北省石首市人。现为中国农工民主党石首市前进门诊部主任，市装卸卫生所所长（通讯地址为石首市装卸卫生所，邮编434400）。幼承家传，熟谙中医基础，弱冠之年又得名师指教，1985年毕业于湖北中医学院。先后发表了10多篇论文，悬壶20余年尤对中医骨伤科、中医外科有较丰富的临床经验。

【方剂组成】新鲜香附子100g 黑桐油50g

【制用方法】鲜香附子洗干净，去掉须根捣烂用黑桐油调成膏状备用。

【功效】清热解毒，消肿止痛。

【适应病症】腋痈、髂痈。

【方解】腋痈、髂痈多因热毒壅遏，气血瘀滞所致。用香附香而能窜，辛而能散的功能，配伍黑桐油，凉血散瘀，解毒消肿，上药合用，相得益彰，桐油质粘而腻，赋药成形，保护皮肤，护药不枯，更奏清热解毒，消肿止痛之功。

【临床应用】腋痈、髂痈常发生于腋穴和髂窝，红肿剧痛，活动受限，采用香附膏外敷（药膏大于肿痛处）即可以消肿止痛。

【注意事项】若能采用中西医结合，静滴青霉素则疗效更佳。

砒碌化腐散

献方人小传 辜甲林，男，47岁，四川遂宁市人。现任四川盐源县卫生局副局长（通讯地址为四川盐源县卫生局，邮编615700）。世代业医，幼承庭训，后多次在全国中医班、成都中医学院等处就学。曾任盐源县中医院院长、主治医师。从医30余年，发表论文70余篇。参与编写《内经》、《伤寒论》等四川中医函授教材多种，主编和协编《神针妙手奇方》、《叶天士临证指南医案发挥》、《中国传统医疗绝技大全》等医学专著数部。

【方药组成】红砒 3g 白砒 3g 雄乌骨鸡胫骨 1对 铜碌 1g 豆砂 3g

【制用方法】将红、白二砒研细调匀，装入鸡胫骨腔内，用黄泥包裹，文火煨至骨酥黄为度，取出制后砒粉，再加入铜碌、豆砂研细，瓷器贮备。用时均匀掺布疮面，盖以纱布，1日1换。或用桑皮纸裹药为捻，或赋形为条为栓，插入疮口或漏管，1~2日1换。

【功效】化腐平胬。

【适应病症】肿疡，痔瘻，赘疣，癌瘤等证脓成未溃，或胬肉突出，或疮口太小，或疮口僵硬，或腐肉不脱及手术后创口难愈者。

【方解】红白砒乃中医外科蚀腐攻毒之峻药。现代研究其主要成分是三氧化三砷，具有细胞原浆毒。本方辅以清热解毒之铜碌、豆砂，经炮制加工，则性和而效宏，能促使肿瘤细胞的坏死和脱落，促进组织的再生和修复。

【临床应用】本方为世代相传之外科经验方之一。临床中，外疮疡胬肉突出，将药末均匀掺布其上，能使胬肉平复收缩；凡瘰

疔痿漏，即用药条插入，可化漏蚀坚；凡疮口太小，脓腐难去，可用桑皮纸裹药为捻，插入疮口，能攻溃拔核，使之开大；若肿疡脓已成而不穿溃，亦可用少许水调点放毒顶，代刀破头；凡赘疣痔疮，可将药涂于表面，使之焦枯脱落。

【注意事项】本方峻烈，用量要小。掺布或插条时，切不可伤及周围健康组织，待腐脱胬平，即应改用其它提脓生肌之品。凡对砒过敏者禁用。凡用药后患部疼痛加剧，说明用量过大，或伤及健康组织，应立即清洗后，重新换药。

【典型病例】杨××，女，56岁，干部。因患胆结石症行胆切除术后，创口感染，形成痿管逾半年，复经手术仍不效。用本方治疗月余，痿管消除，再以提脓生肌散治疗数次，创口愈合。随访15年无恙。

消 痈 散

献方人小传 楼樟友，男，49岁，浙江金华人。现在金华市中心医院（邮编321000）中医科主治医师。16岁跟名老中医张兆智学医，出师后入伍，在军队从事中医、中西医结合工作20余年。擅长中医内、妇科疾病的诊治，主张临床辨证和辨病相结合。曾在国家级、省级医学杂志发表和在全国性学术会议上交流论文10篇。

【方药组成】红茴香（一名三木蟹）。

【制用方法】根皮研细末，瓶贮备用，剂量视痈肿范围大小而定。

【功效】行血祛瘀，消肿解毒。

【适应病证】一切痈疽，无名肿毒。

【方解】本方所治之病乃因外感邪热、膏粱厚味、湿热火

毒内侵肌肤，致使营卫不和，气血凝滞，经络壅遏，不通而成痈。该药局部调敷，消肿作用甚捷。

【临床应用】各部位肌肤大小痈疽，红肿灼热、疼痛、溃脓之前，及时用消痈散水调成糊状外敷，上置一层湿纱布以防干裂。

【注意事项】该药用于局部皮肤可起疱疹，一般可不予处理，应用2次即可。溃疡者禁用，发热、疼痛明显者，应卧床休息。

蜘蛛膏

献方人小传 赵光荣，男，31岁，湖南桑植人。现为湖南桑植县人民医院内科主任（通讯地址同上，邮编416900）。16岁就读于湖南吉首大学医学系，4年后相继在煤矿及桑植县城工作。曾任湖南湘西自治州分水岭煤矿职工医院院长。1992年获内科主治医师资格。从事中西医结合临床多年，发表论文20余篇，对消化病内镜诊疗中的中西医结合用药有独特见解。

【药物组成】蜘蛛蛹

【制用方法】蜘蛛产卵于壁，织茧覆盖。隔茧捣烂卵，整块取下，贴于患处。1~2次即见功。

【适应病症】瘰疬疮疡，无明肿毒。

【功效】消肿解毒。

【方解】本方所治之病乃因毒气入皮肤，久之则入内脏。蜘蛛卵为蜘蛛之精华，具祛风消肿解毒之功，其茧性柔粘，紧合皮肤，不使药气外泄。

自拟消肿药

献方人小传 郑丽丽，女，33岁，浙江省洞头县北岙镇人。现为洞头县人民医院护士（通讯地址：浙江省洞头县人民医院，邮编325700）。12岁时就在爷爷身边学习民间草药及疮疡治疗。1985年出嫁后侍学于婆婆（婆婆是本县最有名的祖传草药师，行医已有47年，专治疗、疖、痈、脓疱疮、蛇串疮、蛇头疖等多种疾病），去年“自拟疔药治疗疔疮66例”等2篇论文被收录于《实用医学论文集锦》一书中。

【方药组成】土珠草 红泥膏 盐

【制用方法】取土珠草洗净鲜用或晒干备用。取山红泥倒入容器中，加入足够的水制成悬浊液，然后将该悬浊液倒入另外一个容器中（该法主要是去掉原山泥中的各种杂质），并加入1%的食盐搅拌后进行沉淀，沉淀后倒去上层的大部分清水，留下少许的清水复盖泥面以保持红泥的湿度（要经常换水以保持红泥水的鲜活状态），便制成了红泥膏。用时，取适量土珠草捣烂后挖取同等体积的红泥膏充分拌和后敷于患处，外盖海州常山叶包扎，每4~8小时换药1次。

【功效】消肿散结。

【适应病症】无名肿毒。

【方解】无名肿毒是指没有固定部位，无季节发病特性，是由于各种致病因素的作用，形成了局部气血凝滞，经络阻塞，营卫不和。治疗以清热解毒，活血散瘀为主。给药途径以局部用药为最佳。方选清热解毒，和营调卫使经络疏通，血脉调和，从而达到肿消毒散的目的。该药制备简单，使用方便，药源丰富，花钱少，疗程短，疗效佳，无副作用，患者易于接受。

【临床应用】无名肿毒。

【注意事项】本方适用于没有成脓的肿毒。敷时禁吃糯米、酒、海鲜等。

【疗效】本方药临床应用已 30 余年，就诊病人达万人以上，有效率为 95% 左右，明显优于西药治疗，用药后 8~12 小时起效，2~4 天痊愈。

【典型病例】患者，男，68 岁。右肩胛部肿痛 10 几天，曾去当地诊所注射青霉素未能消退，因牵引颈痛而来就诊。查患者体温正常，身体较胖，精神状况佳，右肩胛部可见隆起直径约 8cm 的肿毒，表面光滑，不移动，质中，略红痛。按上法治疗，肿毒逐渐缩小，4 天痊愈。

【土珠草简介】土珠草（方言），其珠生于草心，叶以珠为中心呈放射状贴地生长，色淡绿，长约 4~12cm，产于山边或田边，全草入药，春天采集，鲜用或晒干备用。在江苏新医学院编著、上海科学技术出版社 1986 年 6 月出版的《中药大辞典》上、下册和浙江温州地区卫生局《浙南本草新编》编写组 1975 年 6 月编印的《浙南本草新编》中查无此草。

白拟蛇药

献方人小传 郑丽丽，详见上方。

【方药组成】半边莲 白酒 雄黄

【制用方法】取半边莲鲜全草 100kg 切碎，雄黄 1kg，倒入白酒若干，其量以刚浸没鲜草为宜。然后拌匀压实贮藏备用（1 个月后即可取用）。用时取适量蛇药捣烂，敷患处，外盖塑料薄膜包扎，每 8~12 小时换药 1 次。一般 2~8 天痊愈。

【功效】抗炎，消肿，活血止痛。

【适应病症】蛇头疔，甲沟炎，急性化脓性腱鞘炎等。

【方 解】本方所治之病是因手部损伤和感染引起局部气血凝滞，经络阻塞，营卫不和，出现皮下组织发炎肿痛。治疗从清热解毒，控制感染，消肿止痛，行瘀活血，提脓祛腐入手。给药途径以局部用药为最佳。方选消肿解毒，托毒透脓，从而达到消肿止痛而痊愈。该药包扎方便，价廉效果佳，易为患者所接受。

【注意事项】蛇头疔已发生骨髓炎和指骨坏死的用该药效果不佳，应采取其它治疗措施。敷时，禁吃海鲜、糯米、猪油、酒、山芋等。

【疗 效】本方用于治疗蛇头疔、甲沟炎至今已有 40 多年，就诊病人达数万人次，有效率为 96%，用药后 6~12 小时起效，2~8 天痊愈。

【典型病例】患者，女，30 岁，因右食指被虾刺刺伤后，出现肿痛，皮肤变得苍白 8 天。查：体温正常，手指疼痛剧，脓已形成。按上法治疗，敷药 12 小时后疼痛减轻，7 天痊愈。

枸 杞 膏

献方人小传 蒋运祥，详见外科“泥鳅外敷方”。

【方药组成】枸杞子 50g 凡士林 50g

【制用方法】一般化脓性感染者，将枸杞放在瓦片上以小火慢慢烘烤令脆，研细末，或将其放在烘干箱烘脆。凡士林加热熔化后兑入枸杞粉拌匀成软膏，视患处大小，将软膏摊于不透水纸上厚 0.5cm，敷贴，包扎固定，1 天换 2~3 次。或将枸杞加水酒各半，煮烂，作成饼状外敷。对慢性炎症溃疡或烫伤，如前制备枸杞粉，加麻油调膏或制成油纱条备用。

【功 效】清热解毒，活血消肿，提脓生肌。

【适应病症】疔，痈，疔，烫伤，冻伤，褥疮，臁疮。

【临床应用】笔者在临证中发现，枸杞子可治疗多种外科疾病，不论已溃未溃，均可使用。且药性温和柔润，无刺激性及毒副作用。据有肿痛患者反映，敷药后立感舒适，很快止痛消肿，有疮面则肉芽渐渐新鲜红活。对流脓多者应将敷药中间留一小孔，以利引流。

【注意事项】制备枸杞子粉时，应用文火，常翻动，勿令焦糊炭化，研制应极细。

【典型病例】潘某，女，43岁。颈后生对口疮，直径约5cm，周围高肿，疼痛，畏寒发热，全身不适。予前法外敷，4~6小时换药1次，2小时后痛减，敷药3次后肿痛大减，脓水流出甚多，拔出欲脱脓栓，嘱再敷药时中间留一小孔，以便流脓，连用3天，红肿消退，疮口渐平，7天而愈。

缘白丹毒散

献方人小传 马振远，见内科“鹤膝风外治方”。

【方药组成】生石膏30g 青黛10g 冰片3g

【制用方法】将前2味先研细末，后加入冰片再研细即可。视患处面积大小，取药粉适量用香油调涂患处，若破溃流水，撒干面即可。

【功效】清热解毒，泻火止痛。

【适应病症】丹毒、缠腰丹（带状疱疹）。

【方解】丹毒、缠腰丹多为肝胆湿热，火毒郁于血分，发于肌肤而成。方用石膏、青黛清肝凉血，泻火解毒；冰片清热止痛，去腐止痒。

【临床应用】丹毒、缠腰丹症见皮肤红肿、烧灼疼痛、局部泡

疹。使用本方常兼内服清肝泻火解毒之剂，内外合治增强疗效。

【注意事项】若起大疱疹，不红肿疼痛，不宜使用本方。

香 辣 丸

献方会小传 曹尧武，男，42岁，湖南资兴市七里乡人。现为湖南资兴市中医院中医副主任医师（通讯地址为湖南省资兴市中医院，邮编423401）。中医内、外、妇、儿科均有特色，尤以治疗急慢性肾炎、肝炎、肝硬化腹水、脑血栓形成、烧伤、慢性下肢溃疡见长。先后在省级以上刊物、学术会议上发表学术论文8篇。获得县级一等科研成果奖1项。

【方药组成】葱头15g 胡椒或生半夏10g 可以根据情况在该方的配伍基础上增减药量

【制用方法】上药混合捣烂成团，然后取豌豆大小药团塞入患部对侧的鼻孔（下鼻道）内。即患处在左塞右鼻孔，患处在右塞左鼻孔。待其香辣气由浓变淡后再更换药丸，直到痛止肿消。

【功效】行气化瘀消肿。

【适应症】乳房部蜂窝组织炎（中医称乳发）。

【方解】本方所治之病为湿热火毒外侵皮肉，阻于乳房肝胃二经致使气血瘀滞不通而成。足阳明胃经与手阳明大肠经为同名经相传，鼻孔与手阳明大肠经的人中、迎香相连属。故用香辣丸塞入鼻孔内，其芳香走窜之气沿经循行，通气血而疏经脉，使乳房部位瘀滞之气血得以消散，经脉通而邪毒除。

【临床应用】乳房部蜂窝组织炎多见于哺乳期妇女，常表现为乳房区红肿热痛，还伴有畏寒发热，骨节酸楚等症状。处理不及时或不恰当则可以形成瘻管。一般用香辣丸治疗1宿便可见效，2宿可以痊愈。

【注意事项】使用该方1宿后仍不见效，则可改用其它方法治疗。若用生半夏则忌入口，以免中毒。

【疗效】病程3天以内患者17例全部治愈。

【典型病例】1993年冬，某农妇，哺乳期，左乳头下漫肿约2×3cm，灼热潮红疼痛，伴夜间恶寒发热，已2天。予以香辣丸塞右鼻孔治疗1宿，次日告愈。

芙蓉叶外敷方

献方人小传 罗维娇，女，55岁，福建省南平市中医院（邮编353000）妇产科主任，主任医师。1964年毕业于福建中医学院。从事中医临床工作30年，擅长治疗妇科疑难杂症，尤其对妇科热证、血证及不孕、不育症颇有研究。多篇论文在全国性学术会议上交流，有3篇论文在省级刊物上发表，其中“中药治疗妊娠肾盂积水”在全国中医特色诊病专方专药论文大赛中评为优秀论文一等奖，并编入《当代中医必效奇方》一书中由中国古籍出版社出版。

杨丽萍 陈文（传略）。

【方药组成】鲜芙蓉叶30～60g

【制用方法】取新鲜芙蓉叶洗净晾干，捣烂后调上一勺蜂蜜，外敷乳房硬结处，每天换药1次。适用于乳痈初期，脓肿未溃破之前，贴上一、二次即可奏效。若病情较重，伴全身症状，可配合内服中药，内外合治，提高疗效。

【适应症】急性乳腺炎。

【方解】木芙蓉为锦葵科植物，别名地芙蓉、三变化等，性平味微辛，无毒，具有清热解毒，散瘀止血，消肿排脓之功效。据药理研究，芙蓉叶、花、根对金黄色葡萄球菌有抑制作用，对

绿脓杆菌、大肠杆菌、变形杆菌也有抑制作用。

【典型病例】李××，女，24岁，住院号28807，1990年2月20日入院。产后18天，因调摄不慎，外感风寒，双侧乳房硬结红肿作痛，按之痛甚，乳汁不通，伴见恶寒、发热、头痛、周身酸痛、口干渴喜饮、舌质红、苔薄黄、脉弦数。体检：体温39.8℃，双侧乳房硬结红肿灼热，乳汁不畅。血常规检查：血细胞总数130000/mm³，中性81%，淋巴19%。局部外敷芙蓉叶，并同时煎服中药1剂：银花15g、蒲公英30g、防风9g、瓜蒌15g、穿山甲10g、天花粉12g、赤芍15g、浙贝9g、乳没各9g、甘草3g。次日患者体温降至38℃，乳房局部红肿硬结略退，第3天硬结红肿消失，体温正常。血常规复查：白细胞总数6900/mm³，中性72%，淋巴28%，住院5天痊愈出院。

创 伤 散

献方人小传 朱厚银，男，50岁，四川省纳溪县人。现为四川省内江市妇幼保健所门诊部副主任（通讯地址为四川省内江市妇幼保健所，邮编641000）。1967年大专毕业，先后从事西医内外科、中医科，曾两次获市引进新技术进步奖。“蒜黄糊剂治疗炎性包块”在《四川中医》发表，“炎痒定搽剂临床应用”在全国首届内病外治研讨会交流。

【方药组成】铁线草

【制用方法】去掉枯老根茎和枯叶，取鲜嫩尖部晒干研细过筛备用。同时将药粉直接撒在创面，可立即止血止痛，每天换药1次，创口多则7天，少则4天即可生肌愈合。

【功效】凉血止血，生肌止痛。

【适应病症】创伤出血。

【临床应用】本人在孩提时已在自己身上用此法治外伤，几十年所治病例已达数百人，凡伤口在 5cm 以内且张力不大者均可应用，皮肤较大面积创伤无法缝合者更为适用。以鲜者疗效更佳，即用鲜铁线草适量咬烂后敷于伤口，不管春夏秋冬，伤口未作特殊处理，从未感染。

【典型病例】李×，男，18 岁，于 1992 年 7 月×日左手拇指关节掌面被玻璃割伤，深及筋骨，部份韧带损伤，笔者以鲜铁线草咀烂后敷于患指，以干净敷料包扎，1 周即愈，患部未留任何疤痕。

李傻子刀切药

献方人小传 孙冠兰，男，54 岁，山东宁津人。现为山东省宁津县中医院（邮编 853400）主治中医师。16 岁拜当地名中医为师，从事中医临床近 40 年。兼任山东中医药学会会员、县医学会理事、德州地区名中医师、宁津县专业技术拔尖人才。精研业务，擅长脾胃病，热性病，肝胆病等。临证强调辨证论治，遵古不泥古，主张博采众长，融于一炉，用药不多，贵在精。发表论文 70 余篇，参加编写《中医男科临证研究》等 5 本书。“略论脾火”荣获全国首届医圣杯学术成果奖。

【方药组成】生石灰（陈久者佳）120g 生大黄 30g

【制用方法】上药同炒至石灰呈粉红色，大黄焦褐色，研细末备用。用时根据外伤疮口大小将适量药粉撒于患处，复盖消毒纱布，胶布固定，或用干净白布裹敷。一般伤口 1 次即愈，伤口较大 2~3 次即可。

【功效】止血，愈合伤口，防腐止痛。

【适用病证】一切外伤出血证。

【方 解】方中陈石灰有解毒防腐和收敛止血作用，常用治创伤性出血证及烧伤烫伤等证。大黄外用有散瘀活血，解毒消肿等作用。二药合用，具有解毒防腐，止血消肿等作用，治外伤性出血证，作用于局部，能收敛止血，保护创面，防止感染，促进愈合。

【临床应用】用治一切外伤性出血，尤其适用于外伤急救。给予外敷，能尽快止血，止痛，消肿，愈合创口，疗效确切。

【注意事项】上药研细末后应密封保存，防止受潮变质，影响疗效。

【疗 效】李傻子刀切药为我县李氏祖传四世秘方，为外治创伤性出血证之良方，声誉方圆几十里。笔者临床用治各种外伤性出血证数百例，均取得显著疗效，未发现1例无效者或感染者。

血肿化瘀膏

献方人小传 张远浔，男，31岁，湖北省黄梅县人。现为江西省九江市国棉一厂职工医院骨伤科医师（通讯地址为江西省九江市国棉一厂职工医院），高中毕业后即拜师学习中医骨伤科，从事临床工作12年。临床主张以手法治疗为主，辅以药物，内外合治，且偏重于外治，所谓“外治之理亦内治之理”。

【方药组成】土鳖虫 30g 田三七 30g 五灵脂 15g 姜黄 15g 川芎 10g 白芷 6g 醋、凡士林适量

【制用方法】上药共研细末，加醋、凡士林调成糊状，按血肿大小外敷患处。

【功 效】消肿逐瘀。

【适应病症】头颅血肿。

【方 解】本膏用于头颅血肿，活血消肿作用好，逐瘀快，

止痛佳，疗效迅速。方中土鳖虫破血逐瘀，三七化瘀止血，活血定痛，五灵脂活血止痛，化瘀止血，姜黄破血行气，4药合用，活血化瘀，消肿止痛作用增强，川芎活血行气，为头部之引经药，白芷止头痛，用于此方，功同麝香。

【临床应用】头部多因暴力外伤，产生头颅血肿，不易消散。临床上多采用注射器抽血，加压包扎，但疗效并不理想。而本膏用于头颅血肿，则能收到立竿见影的效果。

【注意事项】应用本膏时，须将血肿之处头发剃掉，否则将会影响疗效。

三 黄 膏

献方人小传 程宏超，男，29岁，医师。在河南省兰考县人民医院骨科工作（通讯地址：河南省兰考县人民医院骨科，邮政编码：475300）。擅长用中西医结合治疗骨伤科疾病。曾发表过国家级论文7篇，省市级论文数十篇，现正在努力钻研中药在骨伤科中的临床应用，其中“三黄膏”外疗创伤感染，疗效显著。

【方药组成】大黄100g 黄柏100g 黄连100g 凡士林300g

【制用方法】将大黄、黄连、黄柏各100g混合加水600ml，泡12~14小时，文火煎沸半小时过滤，再加水600ml，文火煎沸15~20分钟过滤，将两次滤液煎熬浓缩至300ml左右与凡士林300g混合均匀煎熬片刻即制成三黄膏。按伤口表面大小将三黄膏摊于无菌敷料纱布上面贴于伤口上，如伤口表面脓液稀薄较多，每日换药1次。如伤口脓痂少许，肉芽生长良好，可每3~5日换药1次。

【功效】清热解毒，泻火燥湿，祛腐排脓生肌。

【适应症】各种化脓性伤口。

【方解】大黄有活血化瘀，泻火解毒之功能，并对金黄色葡萄球菌、链球菌、志贺氏痢疾杆菌、结核杆菌等有抗菌作用，对常见皮肤真菌有抑制作用；黄连、黄柏有清热燥湿功能，并能扩张末梢血管，改善微循环。二者均含有黄连素，具有广谱抗真菌作用，用于各种化脓性炎症，三者与凡士林混合制成膏剂，外敷伤口，既有抗感染作用，又能改善局部微循环，增加局部抗抵力，促进创伤组织修复。

【临床应用】应用本膏之前应先用双氧水、生理盐水清洁伤口，周围皮肤用碘酒、酒精消毒，然后外敷本膏，也可根据伤口脓液形态、色泽、气味等，有条件的可做菌培及药敏试验，局部伤口及全身加用相应的抗菌素。根据中医内外兼治的原则，配合口服活血化瘀、清热解毒、补气血、燥湿化痰、透里排脓之中药，效果会更好，也可用于植皮后覆盖创面。

【注意事项】三黄膏制作时一定要煎沸足够时间，外敷纱布一定要无菌，一定要冷却后再应用，避免烫伤，以稍热最好。

【典型病例】徐韩氏，女，68岁，住院号：5043。因车祸致左小腿中下段开放性骨折，局部皮肤、肌肉广泛挫伤，部分皮肤缺损约有18cm的伤口，骨质粉碎外露。急行清缝止血包扎，跟骨牵引术。次日换药，伤口周围皮肤颜色变紫黑，组织坏死、液化，脓液外溢，给以全身应用青、链霉素及口服活血化瘀中药，加强营养，局部应用双氧水、盐水清洁，常规皮肤消毒，三黄膏换药。坏死组织逐渐脱离，28天创面愈合，未行植皮术。

硃砂单方

献方人小传 黄开科，男，52岁，现为云南省元谋县人民医院五官科（邮编 651300）医生。1961年跟师当中医学徒，曾在基

层卫生所工作 20 多年，善于走访民间单验方，在省红会医院进修过西医眼科；参加过全省盲目流行病调查，参加过全国残疾人抽样调查，负责眼科方面鉴定工作，学徒期得到我县名老眼科中医吴世周真传。

【药物组成】 硃砂适量

【临床应用】 治口疮：首先观察疮是否成热，成熟脓点色白周围硬结软，可用镊子夹破脓点，取硃砂米粒大，直接放入脓点。即刻溶化，这时用小镊夹持脓根，左右慢慢摆动使其与健康组织脱离，清除脓根，包封即愈。治瘻管：临证中最长见，最难治愈。可用硃砂研粉用白棉纸做成药捻，根据瘻管深浅放入反复多次，腐蚀瘻管，以利新肉再生，由里向外长新肉，达到根治目的。通泪道：利用硃砂刺激作用可直接在泪点上用米粒大小的硃砂擦一下，使其热泪外溢，轻的可灌疏，过后相当舒适。

【方 解】 硃砂，古书云硃砂有烂肉之功，临床应用是柱状晶体白硃砂，只烂腐肉，病变组织拔脓根，不损伤正常组织。本品刺激性大，一般应用令患者睡着，预防疼痛性休克。

通 便 药 条

献方人小传 王启祥，男，55 岁。现为江苏铜山县徐庄乡医院业务院长，副主任中医师（通讯地址：江苏省铜山县徐庄乡医院，邮编 221122）。1958 年徐州中医专科学校毕业。从医 33 年，致力于中医内、外、妇、儿各科常见病、多发病的研究和治疗，积累了大量宝贵经验，充分发挥了中医内外合治的独特功效。创制外治法百余种，在方圆百余里众乡亲中，很有威望。

【方药组成】 牙皂、细辛等份 猪胆汁少许 蜂蜜适量

【制用方法】 将牙皂、细辛等份研极细末，蜂蜜炼至滴水成珠

状，与上药末搅拌，入胆汁少许，调匀，搓成药条状，封藏，备用。待临床上选准病例，将通便药条一枚，入患者肛门内一寸许，即可。

【功效】开窍通便。

【适应病症】急性肠梗阻（蛔虫性肠梗阻、动力性肠梗阻、粘连性肠梗阻，以及早期肠扭转，肠套迭）。

【方解】本方所治“痢、呕、胀、闭”四症俱全的急性肠梗阻患者，四药协同，以达通关开窍，通便破坚，气机畅通，豁然而解。

【临床应用】急性肠梗阻，属祖国医学“关格”、“肠结”的范围，不论男女老幼，只要具备以上典型症状，皆可选用。方法简单，价格低廉，尤其对无条件手术的地区和单位，更有意义，也可作术前准备，数分钟内，即可见效，更不能耽误病机。

【注意事项】使用本方法时，一定将通便药条（3×10cm 大小），插入肛门内一寸处，稍有便意要令患者强忍几分钟，直到不能再忍时，再行排便。若效果不明显，可再来一次，再不见效，可转手术治疗。

【疗效】共治疗 17 例。除一例绞窄性肠梗阻外，全部在 3~5 分钟内，排出大便和矢气而痊愈。

【典型病例】牛××，男，60 岁，铜山县徐庄乡黄集村人。因腹痛，腹胀，呕吐，大便闭结 2 天来院治疗。经西医检查，X 线摄片等，确诊为急性肠梗阻。经输液、灌肠等对症治疗，未见好转，即通知住院手术治疗，作术前准备。将通便药条一枚，插入肛门一寸许，2 分钟，患者要求排便，待病人忍不住时，豁然排出粪便和矢气，患者以上症状全部消失，痊愈而回家，免于手术治疗。

大蒜芒硝糊剂

献方人小传 詹德仁，男，64岁，福建莆田人。中西医结合外科主任医师。现任福建莆田县医院（福建医学院莆田教学医院）医务科科长，兼任中国中西医结合急腹症研究会福建分会委员（通讯地址为福建莆田市内桃巷1号，邮编351100）。1956年福建医学院5年制外科专业毕业。1971年开始从事中西医结合治疗外科急腹症工作，先后共撰写论文60多篇，参加全国、华东区及省学术交流的有20多篇，在省级或以上的杂志、有关刊物发表的有10多篇。“中西医结合治疗阑尾周围脓肿的初评”被收载于《现代临床医学研究与实践》第二辑中。

【方药组成】大蒜（去皮）250g 芒硝 60g

【制用方法】称取大蒜（去皮）250g、芒硝 60g，两者混合捣烂成糊状，用纱布包好，捏成比右下腹部肿块范围稍大的园状饼。另在病人腹部肿块的皮肤涂上薄层凡士林（减轻药物对皮肤的刺激），再将包好的大蒜芒硝糊剂放在肿块上面，前3天，每天敷3~4次，每次敷贴30~50分钟，3天后每日敷2次，一般使用4~7天即可收效。大蒜芒硝糊剂每天更换1剂。

【功效】消炎止痛，软坚化结。

【适应病症】阑尾周围脓肿，腹腔炎症性肿块，腹腔脓肿。

【方解】本方主要作用是通过敷贴，使局部组织血管扩张，增加局部血液循环和加大渗透作用，达到消炎止痛，软坚化结。

【临床应用】住院病人确诊为阑尾周围脓肿的病例，常规内服阑尾炎合剂二号和外敷大蒜芒硝糊剂。大蒜以采集收藏1个月左右为佳，新采集的大蒜水份过多，使用时在包好糊剂的周围用棉花或纱布围住，以防蒜汁外流。

【注意事项】敷贴时间 1 次不能过久，病人皮肤对药物的耐受性不一，故在敷贴糊剂时应嘱咐病人如果局部皮肤有烧灼感时应即移开糊剂观察，发现局部皮肤潮红时，可在下一次敷药时间缩短 10~20 分钟，皮肤仍是潮红，可暂时停用。如果见有小水疱时，则应停止敷用。

【疗效】中西医结合非手术疗法治疗阑尾周围脓肿 384 例（本文在华东地区第六届中西医结合学术交流大会上宣讲），其中治愈 289 例，好转 90 例，无效 5 例，有效率达 98.70%。

稀荳蔻外敷方

献方人小传 林继禄，男，58 岁，福建晋江人。现为福建省同安县医院副院长，中西医结合副主任医师（通讯地址为福建省同安县医院，邮编 361100）。1960 年毕业于南京第一医学院医疗系，相继在南京第二医学院、南京鼓楼医院、福建同安县医院工作。1976 年于福建医科大学西学中二年制毕业。应用中西两法诊疗疾病，有独立开展医疗科研的能力，多次被评为省、市、县卫生部门先进工作者，1991 年获同安县“专业技术拔尖人才”称号。撰写论文有“土茯苓治疗钩端螺旋体病疗效观察”、“乌附剂的临床应用”、“鱼腥草治疗肝癌胸腹水临床观察”等。

【方药组成】鲜黄花稀荳蔻

【制用方法】鲜草取叶洗净加饭粒及食盐少许捣烂，外敷患处，每日敷 1 次。

【功效】清热利湿，活血祛瘀，消肿解毒止痛。

【适应病症】阑尾周围脓肿。

【方解】稀荳蔻性味苦寒，常用治疗风湿痹痛，高血压病，伤暑，腹痛吐泻，湿疹，暑疖，跌打损伤，咽喉肿痛，痢疾，肝

炎，痛经等疾患。临床上对各种疔疮，痈疽肿毒颇有良效。本地民间经验，凡属腹部可见之疮痈，皆单用此草药，未成即消，已成即溃。阑尾周围脓肿，中医辨证为湿热挟瘀之肠痛，是属外科急性疾患。病因可由饮食积聚或暴急奔走，跌打损伤，担负重物，或暴怒忧思或寒温失调等种种因素，而导致肠胃受损，运化失职，糟粕积滞，蕴湿化热，气血不和，留为败瘀，积于肠道而成。其病机不外乎血瘀气阻。但有寒瘀、热壅之分，而以湿热挟瘀者发病较为迅速而多见。在酿脓期，热胜肉腐，而化为脓，则高热持续，疼痛加剧；脓成以后，则有明显肿块。外治不论脓成未成，均宜清热解毒，消肿止痛，而本草有此功效。

【注意事项】本草应用 3 次者，效果不显，要结合中药内服。

【疗效】治疗数十例，确有疗效。

【典型病例】黄××，男，20 岁，未婚，福建同安人。因下腹部疼痛 1 周，右下腹发现一包块 3 天，而于 1993 年 6 月 2 日来同安县医院门诊。患者一周前参加强体力劳动，后感下腹部阵发性疼痛，病后 2 天局限于右下腹痛，第 4 天发现右下腹一包块，疼痛呈持续性，不吐，大便溏薄，小便短赤，伴有低热。在当地服中药，疗效不显。体检：体温：37.5℃ 脉搏 88 次/分 急性病容，心肺无异常发现，肝脾肋下未触及，右下腹阑尾处可触及鹅蛋大包块，压痛明显，不移动。舌质红，苔白厚，脉弦。血象：白血球 $11.5 \times 10^9/L$ ，中性 80%，淋巴 20%。诊断：阑尾周围脓肿。给用鲜黄花豨莶草捣烂，加饭粒食盐少许敷于肿块处，外加纱布覆盖固定，每日换 1 次，2 天后疼痛大减，体温降至正常，第 5 天包块消失，1 周痊愈能参加劳动。

湿 瘀 散

献方人小传 王兴周，男，42岁，四川泸州人。现为四川省军区后勤医院外科主治医师（通讯地址为四川成都市前卫街36号，邮编610021）。毕业于第四军区大学医疗系，曾在兰州军医总医院、成都体育学院骨伤医院、成都军区总医院（中国儿麻康复研究中心）学习深造。临症主张辨证而治，对骨科师古而创新，善长中西医结合，内外兼治。出版、发表论著、论文30余部、篇。曾多次登上国家、国际学术研究的讲台，获全军科研成果奖一项，荣登《杏林名医效方精要》及《全国专科特长名医选》，荣获“杏林专科特色名医”称号。

【方药组成】 苍术 200g 黄柏 200g 苏木、忍冬藤、川牛膝各 100g

【制用方法】 将上药共研细末，以 0.05% 呋喃西林与 75% 酒精成 5:1 调成糊状摊于薄型塑料纸上，敷贴于患处，范围稍大，绷带包扎。2 日 1 次，2~5 次即可见功效。

【功效】 化瘀除湿解毒，散寒止痛。

【适应病症】 输液性静脉炎，血栓性脉管炎，痛风性关节炎，无名肿毒。

【方解】 黄柏含多种生物碱，主要为小檗碱，次为掌叶防己碱、木兰碱、黄柏碱、药根碱、蝙蝠葛碱等。具清热消炎，去瘀除湿，解毒散结作用。苍术含挥发油，油中主含苍术酮、茅术醇、 β -桉叶醇、并含苍术炔、苍术炔醇、乙酰苍术炔醇、 β -芹子烯及榄香醇等。具泄湿、除风寒作用。苏木主含苏木素、苏木酚及挥发油（油中含水芹烯、罗勒烯）、鞣酸等。具有祛瘀消肿，行血理气止痛作用。忍冬藤含异绿原酸、绿原酸、木犀草素及 7-葡萄

糖甙、肌醇、挥发油、皂甙及鞣酸等。具清热解毒，疗肿毒疮痈作用。川牛膝主含蜕皮甾酮、红甾酮、杯苋甾酮等。具破瘀散恶血作用。以上药合用，具有明显的化瘀除湿解毒，散寒止痛，溶解血栓，扩张外周血管，促进炎性渗出的吸收，改善微循环的作用，从而达到解湿热、消肿、止痛、溶栓。因而疗效明显，比以往单纯用内服药治疗，疗程短，疗效好。

【临床应用】血栓闭塞性脉管炎及静脉补液性静脉炎，中医称为“脉痹”。方中的川牛膝、苏木活血化瘀，配黄柏、忍冬藤清热通络。各药合用具有明显的溶化血栓，扩张外周血管，改善微循环，疏通血脉的作用。湿热性皮肤、肌肉及关节红、肿、烧痛，痛风性关节炎，前者属于阳证初起，脓未形成，局部红肿坚硬，灼热疼痛者，后者为尿酸在血液及组织积聚，沉积在关节面、关节囊、韧带及软骨下骨皮质和骨髓，受害关节处皮肤红、肿、热，发亮及疼痛。黄柏、忍冬藤清火解毒，散瘀消肿，配伍川牛膝、苏木合用，共奏行气活血，清火解毒，消肿止痛之功。

【注意事项】治疗“脉痹”时配合化瘀扩血管药内服；治疗痛风性关节炎时配合排尿酸药及止痛药内服，同时忌用高嘌呤类食物，如肝、肾、胃等内脏、沙丁鱼、菠菜、啤酒等。治疗肿毒时配合抗炎解毒药内服。

【疗效】治疗 40 例中，临床治愈 34 例，好转 5 例，无效 1 例，有效率达 97.5%。临床治愈：临床主要症状和体征消失，恢复工作；好转：临床主要症状明显减轻，生活自理；无效：临床症状和体征无改善。

【典型病例】金某，男，74 岁，住成都横丁字街，干部。1992 年 4 月 14 日因左足背靠踝关节前侧疼痛不止 3 日，拄拐杖跛行来我门诊求诊。查体见左足皮肤发凉，左足背见条索状的静脉样突出物，触压痛，稍有滚动。追问病史时，既往曾诊断为“血栓闭塞性脉管炎”。经采用上述药物外敷治疗，2 日后感疼痛明显减轻，

外敷 2 次后疼痛基本消失，外敷 3 次后无疼痛感。随访 2 年未见复发。

李某，男，54 岁，住成都走马街，工人。1992 年 7 月 11 日因左足第一跖趾关节红、肿、烧痛，经查血尿酸增高而诊断为痛风性关节炎。经采用上述药物外敷治疗配合内服药，1 日后疼痛明显减轻，2 日后疼痛基本消失，继续外敷 2 次后停止治疗。随访 1 年半未见复发。

双 蚕 散

献方人小传 周耀明，男，扬州市人。中医副主任医师，中医学学会蚌埠分会顾问（通讯地址为安徽省蚌埠市小蚌埠地区医院，邮编：233020）。生于中医世家，幼承家学，深得其传。1960 年入南京中医学院深造后，在蚌埠市第二人民医院工作，1970 年下放到郊区工作至今。30 余年来，潜心研究，不断探索，积累了丰富的临床经验，并结合农村实际，创制了大量简便廉验的单方、验方。掌握多科医术，尤精内、儿、妇科。特别在治疗疑难杂症方面，博采众长，大胆创新，注重疗效，深受患者信赖。在治癌方面，主张中西医结合，“留人治病”，攻补兼施，以攻杀癌，以补留人，取得显著疗效，曾发表论文 10 余篇。多次出席国家、省、市级学术研讨会，也数次受到各级党政部门嘉奖，其行医事迹已被几家辞典载入。历任蚌埠市小蚌埠地区医院院长兼书记。

【方药组成】僵蚕 30g 制蛭螬 15g 牡丹皮 15g 梅片 1g

【制用方法】将蛭螬洗净烘干，与其他 3 味药共研极细末，酒或醋调成糊状，贴敷患处，1 日更换 2 次，以愈为度。若舌下囊肿，可以药粉上患处即可。

【适应病症】舌下囊肿，颈部淋巴结结核，外伤性滑膜炎和滑

囊炎及腱鞘炎等血气不疏，经络不通，结瘀成块之症。

【方 解】药味为辛咸微寒，通络克坚。蛭螭又名地蚕、应条、土蚕，可行瘀、破血、散结、止痛。僵蚕能祛风热、化痰止血、可灭瘢痕。牡丹皮生用凉血清热、活血化瘀，合上药最消瘀块。冰片消肿止痛，香窜善走，引药直达病所。本方有祛风止血不留瘀，祛风化瘀不出血之优点。

【临床应用】本方具有止血、破血、散血之妙，临床上凡遇血气不疏，经络不通，血结不散，结瘀成块之病症，皆可施以本方。临床上治舌下囊肿，以该散剂直接上于囊肿处，1日2次，醋或酒调敷患侧肿胀下颌部，1日1次，一般10~15天可消净，个别复发病例再用该方仍有效。对颈部淋巴结结核，外伤性滑膜炎和滑囊炎或腱鞘炎，皮下脂肪瘤，疗效肯定，见效较捷。

【注意事项】使用该方3天后若效果不显，可易冰片加麝香0.3g，可增加其渗透力，效果更佳。孕妇禁用。

归芍桃红乳没汤

献方人小传 李杰，男，36岁，回族，安徽省太和县人民医院（邮编236604）中医外科医师。18岁高中毕业后随父学医。1978年考入中医学徒班，曾在地区卫校学习中医理论2年，获省中医学徒出师证书和省中医师证书。十几年来临床工作，对中医理论虽无很深的造诣，但一直应用内外兼治，特别对中医外科的痈疽疮疖及乳腺疾病有独特见解。在明理识药的同时内外合治，深受广大患者的称赞。

【方药组成】归尾30g 赤芍20g 桃仁20g 红花20g 生乳香30g 生没药20g 生大黄50g 皂丁20g 芒硝50g 葱白50g 镇江米醋500ml 酒100ml

【制成方法】上药放入瓷盆内加水 200ml,煎熬 25 分钟后加镇江米醋煎沸为止,再加入白酒即可。待温热不觉烫为度,用毛巾浸此药水对包块局部热湿敷(如热水不温时可重复加温),每次半小时,日敷 2 次,反复应用。

【功效】解毒,活血化瘀,行气散结止痛。

【适应症】腹腔内单纯性炎性包块,肌注引起的硬结。

【方解】包块引起的总病机不外气滞血瘀,湿阻热壅,不通则痛。故本方应用归、芍、桃、红、大黄一派活血散瘀之品。重用消痈肿之食醋,配以行药势杀百毒的白酒,软坚之芒硝使其作用更为猛烈,皂丁葱白合用则闭窍通,瘀结散。诸药合用而达毒解、结散、肿消痛止。

【临床应用】使用归芍桃红乳没汤 15 年来,疗效显著,使很多患者免受手术之苦。临床上凡西医诊为阑尾包块,附件炎包块,腹膜炎而致包块,皮下肌肉注射所致的硬结,一般用此 1 周,即可消散。应用本方患者兼有全身症状时,须结合临床对症处理。

【注意事项】已化脓者忌用。

定痛生肌散

献方人小传 史敏儿,女,46 岁,浙江兰溪市人。现为兰溪市人民医院,中医外痔科主治医师(通讯地址为浙江兰溪市人民医院,邮编 321100)。20 年毕业于金华卫校中医专业,毕业后随本市名医胡品瑜先生(已故)学习中医外痔科专业,任浙江兰溪市中医学会常务理事。撰写论文近 20 篇,参加全国及省级肛肠学会交流。对中医痔科、外科有一定独立见解,对痔科、外痔常见病师古而有所创新,急危症,重病明理辨症,内外合治。在当地

群众中有一定声望。

【方药组成】炉甘石 30g 滴乳石 15g 飞滑石 60g 琥珀 15g 朱砂 6g 冰片 3g 珍珠粉 30g。

【制用方法】将上药各研极细末，后入冰片研细和匀，过 200 目筛，装瓶备用。

【功效】祛腐定痛生肌。

【适应病症】各种溃疡久不收口者。

【方解】本方所治之症因各种因素致伤口不能愈合、疼痛。给药途径以用喷粉器将药粉均匀喷撒在疮口（或者用干棉球沾上药粉扑散在疮面上）。方选炉甘石、滑石燥湿收敛，珍珠之粉生肌收口，朱砂、琥珀化腐定痛生肌，冰片防腐杀菌，共奏定痛祛腐生新长肉。

【临床应用】溃疡一症，较难收口生肌，不管外伤，烫伤，术后创面之新旧，均可用此药敷，促进创面愈合，达到治愈。

【注意事项】使用该方如腐肉多，切不可用。若腐肉已化，新肉难以生阶段最佳。

鞋底灰散

献方人小传 李敬中，男，1956年生，安徽省蒙城县人。县中医协会常务委员，金牛寺医院院长，中医主治医师。1985级光明中医函授大学毕业，对中风、癫痫及精神病治疗有独到之处。从医20年，发表学术论文20余篇。1993年10月参加在北京召开的全国首届“光明杯”中医药优秀论文表彰交流大会，受到中医泰斗吕炳奎的亲切会见并合影留念。论文“中风不语症非轻，针药并用见奇功”一文获首届“光明杯”优秀论文奖，事迹被华夏出版社编入《光明中医之路》一书。（通讯地址：安徽省蒙城县金牛寺

医院，邮编 233526）。

【方药组成】鞋底灰适量 香油适量

【制用方法】取壮年男子脚淌汗穿烂的布鞋底烧灰存性。拌入香油，视疮面大小涂上。干则更换，直至痊愈，屡试屡验，其效神速。

【功效】凉血，祛湿，解毒生肌。

【适应病症】下肢溃疡（臁疮）。

【方解】本方所治之病乃因久病不愈，疮下陷，边缘形如缸口，疮面肉色灰白或暗红，流灰黑或带绿色脓水。鞋底灰乃汗渍而成，具有渗湿杀菌作用。麻油能解百毒，使疮面干燥而臁疮自愈。

【注意事项】用药期间忌食辛辣酒类及牛肉。

化腐生肌膏

献方人小传 缪炳淙，男，汉族，生于1939年4月，四川省泸州市的溪县护国镇（原大里乡）瓦窑村人。现为纳溪县造纸厂卫生所所长，主治中医师，纳溪县第十届人大代表。13岁随父缪万兴学医，19岁即开业行医至今已临床36年，学术上不主张偏于一家学派和学说，主张把各家学派和学说融化为一炉，中西医结合，取长补短，师古创新。著述收录《中国当代中医名人志》、《中国医药荟萃丛书·疑难杂症求医指南》等。（通讯地址：四川省泸州市纳溪县造纸厂卫生所，邮政编码：646300）。

【方药组成】血竭 30g 轻粉 15g 儿茶（去油）30g 乳香（去油）15g 没药（去油）15g 铅粉 60g 樟脑 60g 松香 120g 白蜡 60g 黄蜡 60g 龙骨 30g 上冰片 10g 银珠 30g（一封）虎油 60g（现在虎为珍稀动物，豹子油亦难，无药源可不用）

猪板油 1500g（熬煎去渣净重）。

【歌 诀】缪氏家传虎油膏，乳没轻铅竭茶熬；二蜡硃龙松脑片，二油熬膏生肌妙。

【制用方法】先将血竭、轻粉、铅粉、龙骨、银硃、樟脑、上冰片分研合匀；儿茶、乳香、没药分别去油，松香分研合匀；先将猪油、白蜡、黄蜡入锅熔化烧开，铲入容器内，微微倾入合成药粉，用柳棒不断搅拌至冷勿停，以免沉淀。待初冷时将容器置入冷水中以退热，熔器内切勿进水，在数小时后冷却，收贮备用。

【功 效】提脓拔毒，化腐生肌，止血镇痛。

【适应病症】刀砍斧伤，创伤，痈、疽、疮、疔、疮已化脓等症。

【方 解】本方所治之症，皆为外科刀砍斧伤、创伤出血或已感染化脓及各种痈、疽、疮、疔、疖肿化脓后使用。方中轻粉、铅粉、龙骨、银硃、樟脑、冰片、松香、黄、白蜡提脓拔毒，化腐肉，生新肉以敛皮；血竭、儿茶、乳、没止血止痛、活血散瘀；猪油润燥护肤，诸药合用，共奏化腐、提脓、拔毒、止血、镇痛、生肌、护肤润燥、敛皮收口之功。

【临床应用】将刀砍斧伤、创伤、痈、疽、疮、疔、疖的溃疡面用高锰酸钾溶液洗净拭干，用纱布垫涂上油膏覆盖创面，胶布固定，1日换药1次，以愈为度。如伤口久不长肉芽，可配合雪花丹使用，功效尤捷。

白 调 药

献方人小传 杨泰生，男，60岁，浙江省湖州市人。现为湖州市中医院中医外科副主任医师（通讯地址：湖州市南街82号，邮编313000）。幼承其父中医外科名家杨泳仙庭训，1950年正式

执医，从事中医外科临床 40 余年，在前人基础上改进或创制了多种中药外敷药。目前临床应用的敷药（膏、散、酊、锭等各种型）达 70 余种。发表“以痰立法治疗疮疡”等论文 30 余篇。任浙江省中医学会外科分会委员，1990 年被湖州市卫生局列为市名老中医。

【方药组成】樟脑 10g 炉甘石粉 23g 煅石膏粉 23g 菜油 250g

【制用方法】上药均取市售品。先称取樟脑放在陶质盖钵内，再将菜油放在铁锅中加热至沸，乘热将菜油迅速倾入有樟脑之盖钵内，立即盖紧勿使樟脑泄气，候冷，称取炉甘石粉和煅石膏粉先后放入有樟脑菜油的盖钵中，边放边搅拌成厚糊状备用。应用时疮面先用双氧水冲洗，然后将白调药均匀涂于消毒纱布上，约 2mm 厚，盖于疮面，用绷带包扎，隔日 1 换，至完全愈合。

【功效】生肌敛疮，燥湿止痒。

【适应病症】下肢慢性溃疡。

【方解】樟脑除湿杀虫，止痒镇痛力宏，如直接和合于外敷药应用于溃疡，会产生疼痛。本方贵在将樟脑溶解于加热之菜油，敷于溃疡就不致产生痛感，与生肌敛疮收湿炉甘石、煅石膏合用，疗效卓著。

【临床应用】适用于下肢慢性溃疡腐肉虽脱，起白色厚边，疮面肉色泛白，经久难愈，四周皮肤暗黑或伴有湿疹者。

【注意事项】须敷药至疮面完全结皮愈合，不要在将愈合前停药，以致疮面结痂而成假愈合。敷药期间宜经常抬高患肢，促使早愈合。

复方蛇总管液

献方人小传 蓝世隆，男，56岁，广西桂平县人。骨科副主任医师，中国名医研究所研究员（通讯地址：广西桂平县中医院，邮编537200）。1965年广西医科大学毕业分配到广西桂平县中医院骨科，从事中西医结合治疗骨折工作28年，在全国省级医药杂志发表论文18篇，其中获全国中医药优秀论文1、2、3等奖各1篇，荣获县科技成果1、2等奖各1次、2等奖2次，地区科研成果2等奖1次，卫生厅级科研题“慢性骨髓炎辨证分型综合治疗的研究”1993年通过鉴定，达国内先进水平。1993年获国家特殊津贴。

【方药组成】大叶蛇总管 1000g 九里香 1000g 假茉莉 1000g 地榆 1000g 疏忽蓼 1000g

【制用方法】将5味鲜药洗干净，切碎放置锅内，加水没过药面煎煮2次，每次煮沸1.5小时。合并滤液，并浓缩至1500ml，放凉，静置24小时。取上清液煮沸加入防腐剂，加蒸馏水至2000ml搅拌均匀，过滤，罐封，105℃热压灭菌30分钟。使用时先将药液浸湿消毒纱布，盖在伤口上。每日换药1次，至伤口愈合。

【功效】本药具有清热解毒，抗菌消炎，去腐生新等作用。

【适应症】创面感染。

【疗效】我院治疗伤口感染3840例，其中属软组织损伤的伤口感染2500例，开放性骨折伤口感染1200例，骨髓炎瘘道口感染100例，褥疮40例。创面最小5cm，最大280cm。伤口愈合最快7天，最慢78天，平均伤口愈合时间28天。在3840例中，随访2600例，治愈2500例，治愈率占98%。该药经广西区药品检验所检验，50%的药液浓度对金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、绿脓杆菌及枯草杆菌有较强的抑制作用。

【典型病例】陈某，男，62岁，被拖拉机压伤，左足肿痛流脓不能行走15天。经当地某医院用抗生素及局部外敷换药治疗，效果不佳。于1991年10月30日到我院求医。面色苍白，痛苦病容，被迫卧床，在足背侧可见20cm×10cm创面，骨质外露，伤口积满黄绿色粘稠脓性分泌物，腥臭味难闻。体温39℃，白细胞 $14.2 \times 10^9/L$ ，中性0.77，X光示：2、3、4、5跖骨骨折。诊断为左跖骨开放性骨折合并伤口感染。入院后，局部用生理盐水清洗。同时除去坏死组织，外敷复方蛇总液，每日换药1次，用五味消毒饮加減，每日1剂内服，治疗6天，伤口愈合，能站立行走。

治溃疡、窦道验方

献方人小传 马舒茂，男，34岁，山西临猗人。主治医师，霍州矿务局中心医院外科工作（通讯地址：山西省霍州矿务局中心医院外科，邮编031412）。1981年大同医专毕业。曾任霍州矿务局中心医院手术室副主任。近年来发表论文3篇。医疗专长有：熟练的显微外科技术、创伤疾病的诊断和治疗、麻醉及心肺脑复苏术。

【方药组成】珍珠 3g 冰片 6g 牛黄 1.5g

【制用方法】取珍珠放入豆腐中蒸1小时取出晾干，上药共研末，用福尔马林、高锰酸钾熏蒸12小时后即可使用。

【适应病症】久不愈合的溃疡或窦道形成。

【功效】生肌收

【临床应用】先用1%新洁尔灭及生理盐水清洗溃疡或窦道，然后用庆大霉素或氯霉素浸湿纱布条放入窦道中引流。每日换药2次。数日后即可引流干净，然后再将以上中药撒入伤口内，隔日1次，一般4天后即可见新鲜肉芽组织生长，然后待其自然恢复。

【注意事项】若经引流后伤口腐肉难脱，分泌物引流不尽。再用朱砂 15g、硼砂 15g、麻雀屎 6g 研末。用福尔马林、高锰酸钾熏蒸消毒后，撒于伤口内，每天 1 次，直至无脓水，腐肉脱净，再上生肌收口药即可。

【疗效】用本方法使用 17 人，均治愈。

【典型病例】王××，男，22 岁，因跳墙时铁板尖扎伤左脚底，急诊手术清创，术后 10 天出院。出院后第 7 天发现伤口处有一个小眼，以后渐增大，形成窦道，并有脓性分泌物流出。经多方医治 8 个月未见好转。检查局部见窦道外口组织坚硬发白，用止血钳探及窦道底深达跟骨，口小内大，查全身无异常，不发烧，然后用以上方药处理，20 天后长好。

三 辛 栓

献方人小传 谭德福，男，44 岁，湖北五峰人。现在宜昌医学高等专科学校中医系任教（通讯地址为湖北省宜昌市夷陵路 159 号，邮编 443003）。西医离职学习中医，大学本科毕业，曾侍学家父 8 载。发表论文 50 余篇，出版《中国实用刺血疗法》等著作。

【方药组成】生半夏 15g 斑蝥 3g 葱白适量

【制用方法】将生半夏、斑蝥共研细末，瓶装密封备用。用时取药末 1g，与鲜葱白 1~2 根捣烂如泥，捏成枣核状栓子，塞入患乳对侧的鼻孔中（若病在双侧，则左右交替塞），经 20 分钟左右，待鼻腔内有灼热感时取出，每日 1~2 次。

【功效】通乳散结。

【适应病症】乳痈。

【方解】本方中生半夏辛温，消肿散结止痛；斑蝥辛寒，

攻毒逐瘀散结；葱白辛温，通阳解毒下乳。3药皆辛，有走窜之力，共奏通乳散结之功。其药效的发挥，一方面与鼻粘膜对药物的吸收有关；另一方面，足阳明胃经起于鼻旁，其直行者经乳下行，故与经气的转输有密切联系。

【临床应用】乳痈早期，肿胀触痛，乳汁不畅，或见硬结明显而尚未化脓者，用本方1~2次，即可见效。一般4~6次可愈。

【注意事项】应用本栓，待鼻腔有灼热感时即应取出，否则鼻腔粘膜出现水疱、疼痛，但不影响疗效，且一般不需特殊处理。方中斑蝥有剧毒，故不宜内服。孕妇忌用。若乳痈出现结块渐软，按之有波动感时，不宜用本方。

【疗效】治疗乳痈18例，病程都在3天以内，检查无成脓征象。经2~6次三辛栓塞鼻治疗后，全部肿块消失。

【典型病例】沈某，女，24岁，1983年6月5日初诊。初产后7天，右乳肿胀触痛，皮色微红，乳汁不畅，伴有发热、口渴，舌苔薄黄，脉浮数。治用三辛栓塞左鼻腔内，早、晚各1次，次日右乳肿痛消失，乳汁流畅。

灵 仙 散

献方人小传 汤振才，男，43岁，江西省余干县禾山乡人。现为该乡医师（通讯地址为江西省余干县余干镇后街弯巷7号，邮编335100）。1962年肄业于小学五年级，1983年于江西中医学院函授毕业。在本乡从事医疗工作，擅长于中西医内、儿科。曾发表论文被首届全国内病外治学术研会录用为大会交流文章。现为中国民间中医医药研究开发协会会员。

【方药组成】鲜威灵仙根

【制用方法】将威灵仙平地面砍去泥土外的藤蔓。连兜挖起长

在泥土里的根须，去泥土，用冷水洗干净，切下根须约 50g，用旧棉纱布包裹，以针线悬吊于内衣，使药囊贴近乳房肿痛处即可。

【功效】祛风解毒，通络散结止痛。

【适应症】乳房红肿（急性乳腺炎）。

【方解】本方所治之证乃为阳明郁热化火成毒或肝郁气滞，乳汁不通，郁久成毒或感受时邪火毒致乳络郁闭不泄，邪毒内蕴发为肿痛。威灵仙，鲜者祛风清热解毒且走窜力强，善通经络而止痛，故用之能疏通壅塞之乳络，驱邪外出，肿痛速愈。

【临床应用】急性乳腺炎多于哺乳期间乳汁瘀积继发细菌感染而引起急性乳房硬胀疼痛。如不及时控制，局部很快坏死化脓和发生全身中毒症状。故临床一经诊断，应迅速将药囊吊贴于患部，常能消肿止痛于顷刻。如同时吸尽乳汁则取效更捷。本方最适用该病早期，如乳房已趋坏死化脓，其治疗则另当别论。

【注意事项】本方所选为毛茛科多年生攀援性灌木威灵仙的新鲜根须，刺激性很强，易使皮肤发红起泡。

【疗效】笔者数年来，经治急性乳腺炎（初期）近 200 余例，有效率 100%。

【典型病例】余××，女，25 岁，农民，于 1993 年 3 月 4 日因左侧乳房肿痛伴畏寒 4 小时而就诊。检查：左侧乳房外下方距乳头 2cm 处发生鸡蛋大硬块，疼痛拒按，T38.8℃，怕冷，心肺（一）、大小便如常。诊断：急性乳腺炎（早期）。处理：取新鲜威灵仙根约 50g 用旧棉纱布包裹悬贴于乳房肿痛上，10 分钟后，患者自觉疼痛消失，畏寒减轻，续用 1 天后诸症若失。

乳痛速消散

献方人小传 周萍，女，28 岁，上海市人。1989 年毕业于河

南中医学院，获学士学位。现为中国第一拖拉机工程机械公司职工医院（洛阳 471003）中医师。数年中悉心研究妇科及内科疾病的治疗，对一些妇科病注重内外合治，临床获得良效。已在正式期刊及学术交流会上发表论文 6 篇。

朱宝莲，女，52 岁，副主任医师。

【方药组成】黄芩、黄连、黄柏、生大黄各等份 麝香、冰片少许

【制用方法】将大黄、黄芩、黄连、黄柏烘干粉碎过 100 目筛备用。临用时加少许麝香、冰片，倒入盛有适量蜂蜜的器皿中，用木棒搅成稠糊状即可使用。将药膏均匀地涂在双层纱布上，外敷患处，另用一层软塑料纸覆盖其上，胶布固定即可。每日换药 1 次。

【功效】清热解毒，活血消肿止痛。

【适应病症】急性乳腺炎初期。

【方解】本方选用大黄、黄芩、黄连、黄柏清热解毒，消肿止痛，藉麝香、冰片渗透之力，更增加清热活血消肿止痛之功效，直达病所，使肿消、痛止，乳汁通畅痊愈。

【临床应用】急性乳腺炎常因乳汁积滞所致。初期症见乳房红肿热痛，或有发热恶寒，头痛骨楚，口渴欲饮，呕吐便秘等症。急予乳痈速消散外敷，若 2~3 日内寒退热清，肿消痛减者，可连续敷用直至病愈。

【注意事项】使用该方 2 日后若效果不显，宜配合其它治疗措施。

【疗效】治疗患者 128 例，其中 108 例治愈，13 例病情减轻，7 例无效，总有效率达 94.5%。

【典型病例】吴女，28 岁，一拖装配分厂工人。因乳头破裂疼痛，不能使乳汁吸尽而致乳房红肿热痛 3 天，发热 38.6℃，头痛骨楚，经用乳痈速消散 2 天后，肿消痛减，继用 3 日而痊愈。

大蒜芒硝外敷方

献方人小传 韦昌岳，男，45岁，广西横县板路乡人。广西横县板路乡竹瓦卫生所主治医师（通讯地址：广西横县板路乡竹瓦卫生所，邮编530300）。光明中医函授大学1986年毕业于，善治农村常见病、多发病。包括中医内科、外科、妇科、产科、儿科、针灸科，对疑、难、奇、杂等症亦有独特的诊疗方法，中西医诊疗技术比较全面。曾撰写中医论文7篇，发表在光明中医等杂志上，“新生儿窒息抢救医案”曾获1993年首届“光明杯”优秀论文奖。

【方药组成】冰片5g 芒硝100g 大蒜100g 田七粉药物牙膏1支。

【制用方法】先将芒硝、大蒜槌烂成泥再加入冰片调匀。患者右下腹阑尾部位或左上腹胰腺部位，涂上层厚0.1cm的田七药物牙膏，面积稍宽些，然后用纱布或清洁布块包裹药物压成饼状敷在疼痛部位上，每次敷药2小时左右，一般敷药1次即见效。

【功效】清热解毒，消痈散结止痛。

【适应病症】急性阑尾炎，急性胰腺炎。

【方解】冰片性微寒辛苦，功能通诸窍、散郁火、止痛退翳。芒硝性味咸苦大寒。具有泻热导滞，润燥软坚，解毒的功效。大蒜生品性温味辛，入脾、胃、肺、大肠经。功效：行滞气、暖脾胃、化肉食、消滞积、通诸窍、除风邪、解暑气、辟秽浊、解百毒、杀百虫。现代医学认为具有抗菌作用。田七药物牙膏除保护皮肤，预防因大蒜汁造成起泡外，同时还有增强解毒止痛的功效。

【临床应用】急性阑尾炎、急性胰腺炎的属脏腑的内痈卒腹痛。

以腹痛急剧发作，腹胀，呕吐，便秘等为主要特征。阑尾炎痛在右下腹，胰腺炎痛在左上腹。敷药后患者即感到腹部盛水，待口中觉有冰片、蒜味感时，为药达其所，随之腹痛即得到缓解。

【注意事项】同时必须相应服用内服药物。

清热解毒膏

献方人小传 蔡正春，男，54岁，江苏省溧阳市人。现为江苏省溧阳市杨庄医院（邮编213313）外科主治医师。1962年7月毕业于溧阳市卫生学校，从事内科临床12年，外科临床20年，1986年健康报振兴中医学院函授毕业。长期以来，治疗体表囊肿性疾病，痔疮，疝痛等以不开刀为特长。在医学杂志上发表中医、西医、中西医结合论文20篇。中华临床疾病误诊误治研究会会员，中华医学会会员。

【方药组成】冰片50g 铁锈50g 阿魏150g 黄柏200g 大黄200g 地榆200g 五倍子200g 蜜糖适量

【制用方法】生黄柏、生大黄、五倍子、冰片共研极细末，阿魏剪细用酒清溶解后与药粉末混合再与蜜糖调成膏状或糊状备用。铁锈：取土内锈钉，火煅醋淬，锈刮下，再煅几次研细末另备用。用时，将膏状或糊状摊在纱布敷料上再撒上适量铁锈细末然后敷贴于患部，外用胶布固定。视病情轻重，日换1~3次。多年来未出现不良反应。

【功效】清热解毒，凉血逐瘀。

【适应病症】急性乳腺炎，急性脓性指头炎，丹毒，急慢性阑尾炎。

【方解】上述病种共同特点均为急性细菌感染性外科疾病。中医认为多与风毒、火毒、湿毒、痰毒有关，故毒邪是外科

疾病的主要病因。冰片，开窍醒神，清热止痛。黄柏，清热燥湿，泻火解毒，退热除蒸。大黄，泻火通便，凉血解毒，逐瘀通经。五倍子，散热收敛降火。地榆，凉血解毒敛疮。以上诸药现代研究对细菌均有抑制或杀灭作用。阿魏，消积滞作用。铁锈用于初起疖肿的红热肿痛。蜜糖，《本草纲目》记载，入药功能有五，清热也，解毒也，止痛也，补中也，润燥也。上诸药混合外敷起到清热解毒，凉血逐瘀，抑菌或灭菌作用，达到治疗目的。

【临床应用】急性乳腺炎，中医称为乳痈，多见初产妇。局部红热肿痛伴全身不适，畏寒，发热，头痛等。要以胃热、火毒，肝郁，积乳结辨证施治。但病者起病 1~2 天，用本方外敷 30 分钟止痛，日换 2~3 次，3~5 天症状体征消失治愈。急性化脓性指头炎，中医称“疔疮”或“蛇头疔”。指端肿胀如蛇头，剧烈跳痛或刺痛，触痛，不及时治疗，指骨内压增高，易并发指骨骨髓炎。以清热解毒止痛治疗，用本方日换 2 次敷 2~4 天治愈。丹毒，为皮肤网状淋巴管炎，发生下肢，中医叫“流火”或“腿游风”，易反复发作，以清火解毒利湿治疗。用本法日换 2~3 次敷 5~7 天症状体征消失而愈。急慢性阑尾炎，是外科急腹症中的最常见的一种疾病，中医学称为“肠痈”。右下腹压痛，反跳痛，发热、低热或体温正常，舌苔黄腻，质红或红绛。根据气滞、血瘀、热毒轻重急缓不同，用本法外敷右下腹及阑尾穴，日换 2~3 次，必要时再加上适量的西药，5~7 天症状体征消失而愈。

【注意事项】对于急性阑尾炎，经用本法密切观察 6~12 小时症状体征不减，而加剧，改其他或转手术治疗，以防化脓穿孔并发弥漫性腹膜炎。

【疗效】本人自 1970 年以来，用本药外敷治疗急性乳腺炎 102 例，起病 1~4 天，日换 2~3 次，3~5 次治愈（症状体征消失，随访 7 天无复发）100 例，其他 2 例（1 例就诊太晚切开引流，1 例治疗 2 天未来复诊）。急性脓性指头炎 320 例，用本药日

换2次，2~4次治愈250例，5次治愈67例（均症状体征消失），其他3例因就医太迟，用本药2天痛好转，肿胀不消切开引流。丹毒（流火）62例，用本药外敷日换2~3次，4~7天症状体征消失而愈。阑尾炎，急性8例，慢性急性发作14例，用本药右下腹及阑尾穴外敷日换2~3次，配合适量西药，6~10天症状体征消失而愈18例，其他4例未坚持用药，自己要求手术。对早期病人疗效佳。

【典型病例】吴某，女，25岁，工人。1984年产后2个月，突然右侧乳房疼痛，继而局部红肿热痛，伴畏寒，发热，头痛已2天。血化验：WBC 15×10^9 /L。诊断为急性乳腺炎，经用本药，日换2~3次，4天症状体征消失，血化验正常而愈。

廉 疮 散

献方人小传 朱斯龙，男，61岁，江西丰城市人。现为南昌市草药科研所所长，南昌市农工中草药第一门诊部特约中医师（通讯地址为南昌市环湖路56号6栋西3楼，邮编330006）。幼得家传，参加工作后，业余从事草药研究和治疗40余年，临证主张西医辨病，中医辨证，抓住健脾、补肾、活血、解毒四大关键，用中草药治疗肿瘤及肝病有独特疗效。

【方药组成】博落迴100g 冰片5g

【制用方法】将博落迴闷成炭，研细末加入冰片即成。

【适应病症】廉疮（俗称老烂脚）及一切化脓性感染。

【方 解】博落迴，江西民间称土霸王，为罂粟科植物，药用其根。此药辛温有大毒。功能，消肿、解毒、杀虫。

【临床应用】廉疮多因经久站立或担负重物，以致脉络失调，影响下肢气血的运行，或因湿热下注，皮肤受损，湿疹、虫咬等

诱发。用此药时，宜先用茶叶水，适量放少许盐，清洗创面，然后用小磨油拌药末至糊状，敷上即成，日换药 2 次。

【疗效】我用此方治疗疔疮 68 例，病程最短者 3 个月，最长者 14 年，皆获治愈。

【注意事项】此方只准外用，忌内服。

【典型病例】李某某，女，58 岁，家庭妇女。患疔疮 14 年经久不愈，经用疔疮散治疗，100 天痊愈。

单某某，男，53 岁，南昌市某局局长。患疔疮 3 个月，经多方治疗无效，用疔疮散治疗 1 月，痊愈。

大黄蜂蜜膏

献方人小传 吴继杭，男，57 岁，江苏省铜山县大庙镇人。现为徐庄卫生院中医主治医师（通讯地址：铜山县徐庄卫生院，邮编 221121。或铜山县大庙官庄村，邮编 2211217）。1962 年毕业于徐州中医专科学校，曾在公社医院、地区医院任中医师、中医主治医师。1986 年曾因写作中医论文、临床报导获县卫生局 2 等奖。临床对儿科、妇科专长。

【方药组成】炒大黄、热蜂蜜 1：1 成膏

【制用方法】将大黄炒干研极细末和蜂蜜搅拌均匀成糊状，装瓶备用。其用法：将烧烫伤部位经严格消毒后，涂本膏，1 日 2 次。

【功效】活血化瘀，消炎止痛，去腐生肌。

【适应病症】适用于各种烧烫伤病人。

【方解】本人认为大黄是一味“出将入相”的良药，故有“黄良”之称。其作用①抗菌、抗病毒，增强免疫功能。对流感、葡萄球菌、链球菌、伤寒杆菌、肺炎球菌、痢疾杆菌等有不同程度的抑制作用。②调和气血、疏通经络。蜂蜜有润肺、润肠、滋

养、缓疼、解毒作用。因此，二味合用可消炎、止疼、解毒、去腐、生肌，对烧烫伤有特效作用，愈后不留有疤痕。

【临床应用】对于因烧烫引起的红肿、起泡、疼痛皆可应用。

【注意事项】对于烧烫后感染化脓者慎用。

血余炭黄柏液

献方人小传 刘思竹，男，34岁，山东海阳县人。现在山东省潍坊市86464部队医院（邮编261051）主治医师、所长。18岁入伍，20岁从医，目前已临床工作11年，擅长普外及骨科和烧伤，发表论文3篇。

【方药组成】人发500g 黄柏35g 酒精（75%）500ml

【制用方法】人发500g，铁锅1个，锅盖1个。将头发加碱水洗去油腻，再用水洗净晒干，放入锅中，盖上锅盖，锅盖上放一张白纸，用石块压上后将锅放在大火或电炉上烧烤，直至变为焦黄色后即可取下锅打开锅盖，待发冷却后，研细成粉，备用。黄柏液为黄柏35g放入75%酒精500ml中浸泡1周，过滤后即成。

烧烫伤部位用外用盐水简单冲洗，再用消毒棉擦干，将大水泡放水，切勿剪去泡皮。然后用五官科喷喉器在烧烫伤处喷黄柏液少许，立即撒上血余炭粉，再喷再撒反复数次，直至形成粉痂后，每2~3小时喷黄柏液少许1次，晚上睡觉可不喷液。第2天后，每天喷上液3~4次即可。

【功效】血余炭性平、味苦。有止血化瘀、生肌收敛之功效；黄柏性寒、味苦。具有泻火解毒，清湿热之功效；酒精也有一定的收敛和杀菌作用。

【适应病症】各种烧烫伤。

【方解】本方中血余炭其主要成份有碳素、胱氨酸、脂类

和部分金属离子，它能缩短出、凝血时间和血浆钙化时间，还有利尿作用。黄柏中含有鞣质成份，它可与组织表面或渗出物中的蛋白质结合成鞣酸蛋白结合物，此药液与创面接触后能很快形成一层痂膜，以减轻炎性渗出。

【临床应用】本药方适用各种烧烫伤病人，各种伤情，任何年龄均可。病情严重及大面积烧烫伤者应同时抗感染、抗休克。本方来源丰富，价格低廉，使用方便，结痂迅速，尤其适用于基层医疗单位、偏远地区和家庭病房。

【注意事项】对头面部烧烫伤，应注意在保护好眼睛的基础上方可使用。

【疗效】止痛时间最短 10 小时，最长 18 小时，治疗天数最短 6 天，最长 20 天。

【典型病例】吕某，男，27 岁，工人。被锅炉喷出的大火烧面、颈、胸及左手、左上肢，面积为 13% 的 I°~II° 烧伤，经用本药，病人病情稳定，体温正常，6 天后自觉伤处发痒，8 天开始脱痂，12 天痊愈出院。

收鸡草外用方

献方人小传 廖之熊，男，55 岁，广西岑溪县南渡人。现为梧州福利医院内科副主任医师（地址：广西梧州市富民二路太和里 63—1 号，邮编 543002），兼任梧州市中国民间疗法研究会理事长。1966 年毕业于广西医科大学。长期从事康复医学及民间疗法的研究，主张中西医结合。著有“偏瘫的功能康复治疗”、“人体腧穴体表形态的初步观察”（《中国针灸》1984 年第 5 期发表）、“戒毒烟配合克痛宁作戒毒治疗”等 80 多篇文章，研制成“治虚汗洗剂”、“双黄万应药条”、“小儿保健香囊”、“妇腹康贴腹药

袋”、“斑秃生发精”、“戒毒烟和戒毒胶囊”等，以上有些已为有关厂家制为产品供临床应用及在市场销售，有些则有待开发。

【方药组成】鲜收鸡草 250g

【制用方法】煎水温洗患处，每天 2~3 次。另用鲜收鸡草放瓦上煨炭（存性），研末，加少许冰片，调茶油外敷。若创面有渗出可直接撒布于创面。

【功效】消炎止痛，促进渗液吸收及创面愈合。

【适应病症】主治 I°、II°烧烫伤，对 III°烧伤，在中西医结合疗法基础上用本方有促进治愈作用。

【方解】收鸡草，又名铺地蜈蚣 *Lycopodium Cernum* L. 有消炎、祛湿收敛、舒筋络、活血止血之功，民间常用于治疗湿疹、痢疾、跌打损伤及化痰止咳，水煎外洗亦治盗汗。对烧烫伤的渗出、发炎、创面难愈合者，疗效肯定。使用安全，无毒副作用。

烧 伤 油

献方人小传 李正国，男，54 岁，四川重庆人，副主任医师，重庆市万盛区中医院学术委员会主任（通讯地址：重庆市万盛区中医院，邮编 630800）。1965 年毕业于成都中医学院医学系，有 30 年临床经验，对中西医内科均较熟悉，对中医外科也有一定的专长。能用中西两套方法治病，擅长儿科杂病、肝肾疾病及疑难重病。出席过全国及国际学术会议多次，在全国各类刊物杂志发表论文数十篇。自己主研的“皮炎霜”课题目前已通过专家鉴定。

陈思文，女，47 岁，四川重庆人，副主任医师。有 30 多年临床经验，善长于妇科杂病和儿科疾病，疗效独特，在当地有很高威信。

【方药组成】大黄 10g 黄柏 10g 黄连 10g 地榆 10g 寒水石 10g 冰片 5g 麝香 1g 珍珠 3g

【制用方法】将大黄、黄柏、黄连、地榆分别烤焦，研成极细粉末。寒水石、珍珠研细，加上冰片和麝香共同拌匀，配 60% 香油调和成糊状，外搽患处，每日 3~4 次。

【功效】清热解毒，凉血止痛，去腐生肌。

【适应病症】各种烧伤，烫伤，灼伤等。

【方解】本方所治烧烫灼伤，乃是肌体遭受各种强烈热毒物质（如火、热、电、射线、强酸碱等）刺激，使皮肤受损，肌肉腐烂，脏腑内伤，气血失调而导致的病理改变。方用黄连、黄柏清热解毒；大黄、地榆凉血泻火；冰片、麝香祛腐消肿；珍珠收敛生肌；再加寒水石协助清泻大热，并藉麝香、冰片渗透之力将药液渗入肌内，以此达到消灭火毒，祛腐止痛的作用。使体内热清毒除，腐去烂掉，而病自愈。

【临床应用】本药液适用于各种强烈热毒物引起的 I°或浅 II°烧、烫、灼伤，局部出现发热、肿胀、水疱、疼痛、甚或溃烂、渗液、流脓、坏死。但无全身反应，或全身反应轻微者。

【注意事项】①本方药末越细越好，越细越容易渗入肌肤，增强疗效。②使用药油时，手脚要轻，要用柔软的工具如鹅毛、棉花等蘸药液搽创面，以免机械刺激患处，引起疼痛。③若患者有全身反应或局部症状较重者，则需加中西药物内服或静滴协助治疗。

【疗效】本药油经临床治疗各种烧烫灼伤 100 例，采用高等医药院校现版教材作为诊断和治疗标准。分类是 I°或浅 II°烧烫伤，治疗时间为 1~50 天，全部外搽治疗，结果治愈 95 例，显效 5 例，总有效率 100%，经治愈者创面未留任何痕迹。

地榆柏黄樟香散

献方人小传 于龙，男，50岁，内蒙古兴安盟科右中旗人。现为科右中旗人民医院中医科主治中医师（通讯地址：内蒙古自治区兴安盟科右中旗人民医院中医科，邮编 029400）。1963年拜当代明医祖传三代传人主任中医师杨春生为师，跟师学医拜读，五年满徒毕业独立行医。1983年～1986年在内蒙古自治区卫生厅主办的中医师函授班深造，系统学习中医理论，三年考试合格毕业。自从事临床至今博览群书，广集众方，去伪存真吸取精华，理论指导实践，厚古重今，不泥于古，有所创新，临床诊治疾病，历来主张辨证施治、内外结合。30多年的临床实践对危重疑难病症不断总结整理升华，先后发表国家级论文5篇，分别收入《前列腺疾病临床荟萃》、《全国骨伤科论文集》二书。

【方药组成】地榆 20g 黄柏 15g 黄芩 15g 大黄 15g 乳香 15g 没药 15g 樟脑 10g 冰片 10g

【制用方法】上药共研细末，以香油调成糊状，外用涂抹伤面1～2次即可。

【功效】收敛渗液，止血止痛，托疮生肌。

【适应病症】各类轻重度火烧，水烫，沥青烫伤，电灼伤。

【方解】本方所治各类烧、烫、灼伤，其部位都有大、小不同程度的皮肤损伤，伤口渗出液较多，出血，疼痛，治疗当以地榆、黄芩、大黄收敛止血，乳香、没药、冰片止痛，樟脑、黄柏防腐托疮生肌。

【疗效】本方治愈率100%。

【典型病例】袁××，男，25岁，农民。发动拖拉机时因用引火之物不慎将身旁40多斤的柴油桶弄着火而造成双手、头面、胸

腹部大面积烧伤，有的部位烧伤重度达3、4度之多。用地榆柏黄樟香散施治20天，烧伤各部愈合良好，无斑痕。

烧伤紫金膏

献方人小传 卫朝丰，男，50岁，山西万荣人。现为西安市第二医院环西门诊部外科主治医师（通讯地址：西安市环城西路北段甲字114号，邮编710082）。自幼接受祖训，立志学医。1975年有幸上长治医学院深造。采用中西医结合非手术疗法治疗肠梗阻，疗效显著。有关论文曾在全国学术研讨会上交流。

【方药组成】紫草、生地、当归、白芷、大黄、地榆炭、五倍子、枸杞木、鬃炭（或血余炭）、蜂蜡各30g 冰片5g 金霉素软膏30g 麻油100g

【制用方法】先将鬃炭（或血余炭）前九味药研为粉末，再将麻油倒入锅内烧开后离火。乘热放入蜂蜡溶化，接着一边用桑枝或竹片搅拌（此为中医传统习惯，意在忌铁器），一边放入金霉素软膏及研好的药粉，待搅匀后再放入冰片继续搅拌，使冰片完全溶化为止。待稍凉后装瓶备用。用时直接涂抹患处或制成药物纱条敷患处，包扎或不包扎。

【功效】凉血活血，润肤生肌，抗渗收敛，抗菌消炎。

【适应病症】各种烧伤。

【方解】烧伤是人体皮肤或管腔（如呼吸道、食道）组织受到各种热力或化学物质（强酸或强碱）的侵袭所引起的一种损伤。其主要的病理特点是组织坏死、大量体液渗出、水肿、感染等。针对烧伤的这些病理特点，如何设法增强组织活力，减少渗出，减轻水肿，控制感染，就成为烧伤的治疗原则。本方正是遵照这些原则按图索骥的。方中的紫草、生地、当归、白芷、大黄、

地榆炭、冰片具有凉血活血，润肤生肌的功效，五倍子、枸杞木、鬃炭（或血余炭）具有抗渗收敛之功，地榆炭亦有此功，蜂蜡、麻油专能润肤生肌，金霉素软膏既能抗菌消炎，又能润肤生肌。诸药合用，炼制成膏，使药性温和，易于接受，且无任何毒副作用。

【临床应用】本方应用于Ⅰ°、Ⅱ°烧伤效果良好。除上述功效外，尚有保护损伤创面，致使外界细菌难以侵入人体的功能，从而起到减少感染甚至抵抗感染的作用。感染既制，就给肌肉的生长创造了良好的环境。另本方亦可试用于Ⅲ°烧伤。

【注意事项】①对起泡创面，一定要先剪除泡皮、沾掉渗液后再敷药，这样，创面感染机会将大大减少，因而愈合就比较迅速。②本方对管腔组织（如呼吸道、食道）的烧伤不适用。

烫 伤 灵

献方人小传 卢国珍，男性，56岁，1962年毕业于江苏省淮阴医学专科学校，一直在淮阴县新渡医院（邮编2233023）工作。本人已被录入《中国名医辞典》和《中国医药荟萃》书中。近5年在省以上医药刊物上发表50余篇文章，在美国发表3篇文章，“口服藿香正气水致过敏性休克”一文已编入中华医学学会的《基层医学论文佳作选析》一书中。近2年来参加全国性医学论文研讨会8次、国际性1次。

【方药组成】黄连200g 生大黄200g 银花300g 地榆200g 冰片15g 麻油1500ml

【制用方法】将上药烘干（冰片、麻油除外），共研细粉，过120目筛，加冰片麻油搅拌，瓶装备用。伤口用生理盐水洗净，外涂烫伤灵3~5次，如有水疱，可用注射针抽去水后涂药。

【功效】清热解毒，去腐生肌，敛疮止痛。

【适应病症】烧烫伤。

【方 解】烫伤灵用外敷法治疗烧烫伤，直达病所，即速生效。比口服和注射治疗均收效快，故治疗效果满意。方中大黄又有活血化瘀的功效，能改善伤口血液循环，使脉络畅通，促进炎症吸收和恢复，使病早愈。

【注意事项】用本方治疗期间，如患者感染严重，伴有全身中毒症状，可配合抗生素治疗，纠正水与电解质平衡。

冰 甲 膏

献方人小传 孙正，女，56岁，祖籍河北定兴县。现为天津化工厂医院（汉沽区，邮编300490）中医科副主任医师，毕业于天津中医学院，1962年分配到天化医院。随曹晏如老中医临床10余年（现已故），师承曹老对内、外、妇、儿等科疾病辨证施药。对前辈经验及家传秘方能大胆应用于临床，并通过应用总结经验，去粗取精，兹将手中3个外用方献出，广慈天下患者。

【方药组成】人甲 15g 冰片 1g 蜂蜡 30g 香油 30g

【制用方法】先烧热香油入甲炸，滤去渣质，入蜂蜡、冰片，置容器中待冷成膏。

【功 效】消炎止痛，防腐生肌。

【适应病症】各种灼伤、水火烫伤。

【方 解】冰片芳香防腐消炎止痛，人甲含有多种氨基酸促生肌长肉，蜂蜡成膏使伤面与外界隔离，减少感染保护伤面，滋润肌肤。

【临床应用】Ⅰ～Ⅱ°烫伤效果佳，用药即可减少痛苦，减少渗出。Ⅲ°烫伤原方中加象皮，因目前保护野生动物，缺少货源。今后可试用其它动物皮，人发等有待研究。

【注意事项】化学灼伤必须清洁创面，待残留化学物质干净后再用药。本药无毒副作用，伤面可直接涂药，也可用纱布浸膏敷伤面，不必包扎，以免揭敷料因粘连引起痛苦。关节部分可自行活动，减少关节僵硬后遗症及瘢痕。

止 烫 散

献方人小传 李彭柱，男，43岁，天津市汉沽区人。现为汉沽盐场五分场门诊部医生（通讯地址为天津汉盐宿舍金谷里28楼10号，邮编300480）。18岁从父学医，注重实践，坚持内科疾病从脾胃肾论治，23年义务为患者按摩15000次。1993年开办中医按摩诊所，事迹简介入编《光明中医之路》。“按摩治愈闭塞型脉管炎5例”论文获全国首届“光明杯”优秀奖，“综合手法健脾和肝补肾治疗老年性关节炎”被1994洛阳国际学术研讨会录用。

【方药组成】大黄 3g 生石膏 3g 儿茶 3g

【制用方法】上药共研细末，香油适量调成糊状，外敷伤处，稍干再敷，即可见效。

【功效】止痛清热敛伤。

【适应病症】皮肤水烫伤。

【方解】本方所治水烫伤乃因损伤皮肤代谢失调，局部神经灼痛。治疗当以凉血止痛，清热敛伤，活血长皮。烫伤在皮表，给药途径以局部外敷为主。方选大黄、石膏清热活血，儿茶收湿敛疮止痛，三者之力直透肌肉，缓解疼痛。取其香油粘化药粉挥发药力，柔润皮肤，防止细菌渗透侵袭，起到促进皮肤生长功能。

【临床应用】水烫伤是因皮肤破坏形成溃疡面，症见灼痛钻心与局部热感，甚者痛不欲睡。应用此药效果特佳，能解决患者烫

后痛苦，外敷 2~5 天皮肤发生变化，肉芽排列生长。

【注意事项】使用此药无须纱布敷盖，配制药粉要精细，可避免瘢痕形成，勿与其它药混用。

【疗效】经临床 25 例验证有效率 100%，治愈率 100%。

【典型病例】高×，女，7 岁，1989 年 3 月 10 日就诊。因玩耍将满锅开水碰洒在左前臂上，顿见皮破红肿，痛哭憾人，用自制止烫散当时见特效，患女眠夜一宿，每日如此，药痂由外向内慢慢脱落痊愈。

白糖蚯蚓浸出液

献方人小传 符仁平，男，30 岁，现任海南省儋州市王五塘花医疗站（邮编 571700）医师。本人从小跟随父学中草药。对外科、儿科、妇科等杂症外治积累很多秘方及单方。曾 2 次到北京参加全国学术研讨会，发表过 3 篇论文。

【方药组成】蚯蚓 25g 白糖 10g

【制用方法】将蚯蚓若干条，洗净剪 2~3cm 小段，以清水洗冲，晾干放入盘中，将白糖与蚯蚓拌均匀，浸 10 分钟白糖溶化，蚯蚓变褐黑色、黄色，将浸液过滤备用。

【功效】保护创伤面。

【适应病症】烧伤。

【方解】本方蚯蚓含有多种化学成份，有抗菌作用，白糖蚯蚓浸出液，涂于创伤面后，很快形成一层痂膜保护创伤面，并有效保护创伤面，防止液渗出。

【临床应用】将创伤面以 1%新洁尔灭溶液冲洗，剪除创伤面的水泡，将浸出液均匀涂在创伤面上，暴露 2 小时后，创伤面形成黄色痂膜，如关节活动处出现裂痕，应再涂 1 次。一般涂 1 次

即可。

【注意事项】如创伤太严重，有高烧，应使用抗生素防感染。

芦荟蚯蚓膏

献方人小传 金日男，男，32岁，吉林和龙县人。现为中国人民解放军第223医院整形烧伤科主治医师（通讯地址为吉林延吉223医院整形烧伤科，邮编133000）。1987年毕业于白求恩医科大学医疗系，1992年在上海第二军医大学长海医院进修整形烧伤专业1年。参加临床工作以来，发表了数篇论文。

【方药组成】芦荟粉10g（芦荟干燥粉末） 蚯蚓10g 白糖30g 水500ml

【制用方法】将白糖和水装入容器内，加热至100℃，加入蚯蚓自然溶化，再加芦荟粉搅拌，冷却即可使用。于烧伤、烫伤处，每日涂2次。

【功效】消肿止痛，去腐生肌。

【适应病症】小面积浅度烧伤，烫伤。

【方解】本方能加速血液循环，改善体液，解除体内有毒物质，直接能杀菌，同时增强全身的抗菌能力，增强细胞的再生能力。

【临床应用】浅Ⅱ°烧伤创面愈合时间为3~12天，深Ⅱ°愈合时间为16~24天，残余创面上皮生长明显。应用过程中发现坏死组织脱落，肿胀消退迅速。未发现1例创面感染，涂药后创伤疼痛明显减轻。

地榆炭膏

献方人小传 樊长安，50岁，吉林省白城人。现任山河农场职工医院内科主任、主治医师，有30年中西医临床经验。有10余篇省地级和国家级论文。

张丽，护士，中专毕业，20年外科护理经验。

【方药组成】地榆炭根据伤的面积大小决定剂量 普鲁卡因适量

【制用方法】地榆研细末，用香油或豆油调成糊状，加普鲁卡因适量，涂在患处裸露，如有水泡可剪去，再涂上药10余天即可痊愈。

【适应病症】小面积烧烫伤。

【方 解】地榆炭消炎解毒抗感染，普鲁卡因止痛。

【注意事项】全部裸露不包扎，如有感染的地方可清创后再涂上药。

双白痔灵栓

献方人小传 塔木，男，56岁，内蒙古哲里木盟科左后旗人蒙古族。现为内蒙古呼伦贝尔蒙医学校（全国唯一的蒙医中等专业学校）附属医院主任医师（通讯地址为内蒙古海拉尔市河东学府路，邮编021008）。1963年毕业于内蒙古医学院中蒙医系。曾任呼伦贝尔布鲁氏杆菌病研究所副研究员，蒙医主任医师，呼伦贝尔蒙医学会理事、秘书长、副理事长等。有丰富的临床经验，临证主张应变而治，不囿传统。对地方病、糖尿病、乙型肝炎、心

血管等疾病师古而创新，有独特理论见解，急危症重在明理识病内外合治。多次参加过区内外学术活动和应邀到外省市出地方病专家门诊。发表论文近 50 篇，出版了《蒙医内科学》、《蒙医骨科》等中专教材。

【方药组成】白糖 25g 白矾 25g

【制用方法】上药共研末，在专制铁器内用软火烤化，待 3~5 分钟自然凝固后制做成 30 个小圆柱状（类似于感冒胶囊）栓剂即可。每日 2 次，每次 1 个，置入肛管内病处。轻者 1 个疗程，重者 2 个疗程（1 个疗程为 5~10 天）。

【功效】清血热、消肿、化瘀、止血。

【适应病症】内、外混合痔，习惯性便秘。

【方解】本方所治之病乃因久滞下阻，气血运行功能紊乱，湿热内积，浊气瘀血及血热偏盛而肠内津液损耗，肠道与肛管干燥，致下阻便秘或腹泻过度。治疗当以改善气血运行，清利血热，润燥通肠，止血。因病处在肠道之下直肠和肛管处，受药不足，故选择局部用药给药途径的肛门栓入最佳。方选白糖、白矾清热、解毒，防腐烂止血，利用渗透之力，深入痔核内，化瘀血，促进气血运行，下清气血功能改善而愈。白糖白矾和而收敛使痔核表面形成包膜，减少，刺激压迫静脉团。

【临床应用】内外痔常因便秘或泄泻过重、久坐久立而致。症见肛门内异物感，发痒，灼痛，分泌粘液，发生疮疹，流血，重者脱肛。用双白痔灵栓局部外敷，5~10 天即见效，病程长、病情重用 10~15 天。

【注意事项】使用该方 2 个疗程后效果不显，宜采用其他相应治疗措施辅助，效果更好。若纯属湿寒症引起的痔不宜用本方。此方无毒副作用。

血栓痔验方

献方人小传 孔培申，男，39岁，1979年毕业于河南中医学院医疗系，现为河南省中牟县人民医院（邮编451450）中医外科主治医师。业医16年余，对常见病、多发病的诊疗积有较为丰富的临床经验；擅长中医外科和肛肠外科，曾在省、国家级期刊及学术会上发表和交流论文数篇，参编《当代中药外治临床精要》一书。

【方药组成】苦参30g 黄柏30g 荆芥30g 防风30g 大黄、地榆各30g 红花20g 川草乌、当归尾、附子、川芎、木通各15g 透骨草10g 乳没各12g。

【制 法】以上药物加水淹没药3~5cm，水煎，煮沸5分钟左右，待温约37~38℃不烫伤皮肤为度。

【用 法】先熏后洗，或坐浴，或用毛巾热敷肛门，每晚熏洗10~20分钟，1周内可痊愈。1副药可用2次，第2次用时温热即可敷患处。

注：此方对扭挫伤（无骨折）者肿痛熏洗亦有特效。多年来近100例患者，屡治屡效。

【适应病症】痔疮。

复方苦参汤

献方人小传 李文银，详见内科“二术散”方。

【方药组成】苦参75g 元柏25g 赤芍20g 丹皮20g 生地榆25g 甘草15g

【制用方法】上述诸药一同煎熬2次，共取其水煎液800ml，分

4次直肠给药，每日1次，每次200ml，保留灌肠，连续4次为1疗程。

【功效】清热利湿解毒，凉血止血。

【适应病症】肛隐窝炎，便血，内痔、混合痔炎性期，肛门直肠脓肿初期。

【方解】上述诸药均为苦寒性，具有清热凉血解毒功效。方中苦参直入大肠经，以清热利湿为其特长，又有凉血解毒祛风杀虫的作用，是治疗肠瘟湿热病之主药。配伍元柏、赤芍、丹皮、生地榆药物，使其清热解毒功效显著，凉血之中有活血之功，则不会发生血瘀，活血之中有凉血特长，血不会妄行。甘草可通十二经脉兼有清热解毒止痛作用，调和诸药，共同达到消肿止血止痛目的。

【疗效】灌肠疗法，是中医外治法一种。因其直肠给药，药物直达病所，吸收快，作用迅速，急慢性疾患均可使用，男女老幼都可接受治疗，因此在临床治疗肛门周围疾患中收到了显著疗效。笔者先后选用西药口服止血药，静脉点滴抗生素疗法与本药法对照治疗各30例，结论是本疗法简便经济，疗程短，效果快，平均1个疗程可痊愈，而西药组均需1周至10天痊愈。

【典型病例】苏××，男性，24岁，系山东民工，初诊时间为1993年4月17日。因其肛门下坠样疼痛、大便时带有少量新鲜血3天，肛肠检查直肠肛窦部粘膜红赤水肿，并伴有多处糜烂面，诊断肛窦炎（急性）。给保留灌肠2次痊愈，并嘱咐其少食辛辣之品。

毛××，男性，39岁，系大连玻璃厂工人，初诊日期为1993年5月12日。自述无明显诱因及不适感，大便时带血约1周，便后呈新鲜血点滴而出，量不多，几滴而已。肛肠检查，距肛缘6.0cm处内痔，其粘膜糜烂水肿，触之渗血，给予中药灌肠，令其保留2小时以上，连续3次，症状消失。肛肠复查时痔核明显缩小，粘膜红润，为痊愈状。

三子二黄洗剂

献方人小传 叶祚栋，男，38岁，湖南省澧县人。现为湖南省澧县中医院副主任中医师，中国蛇协会员，湖南省肛肠学会及省中医药科研管理专业委员会会员（通讯地址为湖南省澧县城关镇人民西路113号，邮编415500）。1979年毕业于湖南中医学院医疗系，从事中医临床工作20年，临证注意辨证论治，擅长中医痔瘕科及蛇伤的治疗，主张中西医结合，内外合治，依其病情的不同，除内服中、西药及手术外，尤为重视局部熏洗坐浴，取得了满意的疗效。曾发表“槐花二柏汤治疗内痔出血”等论文10余篇，参加全国及省级学术交流会4次，其医疗特点被收载在《疑难杂症求医指南》一书中。

【方药组成】五倍子 30g 地肤子 30g 蛇床子 30g 大黄 50g 黄柏 30g 苦参 50g 乌梅 30g 芒硝 50g

【制用方法】以上诸药加水2500ml合煎，煎至2000ml，去渣，乘热熏洗坐浴局部10~20分钟，每日2次。

【功效】清热解毒，消肿止痛，收敛止血。

【适应病症】各期混合痔，内痔出血。炎性外痔，血栓性外痔早期，痔栓脱出嵌顿，肛裂，肛门湿疹及痔瘕术后。

【方解】本方所治之病，是由于脏腑虚弱，饮食不节，燥热内生，下迫大肠，以及久坐、妊娠、产后，久泻久痢，负重远行等，致血行不畅，血液瘀滞，热与血相搏，则气血纵横，筋脉交错，结滞不散为病。病在肛门，用药途经以局部熏洗坐浴为最佳疗法。方选五倍子、乌梅涩肠止血，具有很强的收敛作用；地肤子，蛇床子能祛风除湿，具有收敛，抑制渗出，吸收等作用；大黄、黄柏、苦参、芒硝能清热解毒燥湿，消肿止痛，具有加速局

部炎症吸收的功能。诸药合煎熏洗坐浴会阴部，通过热与药物的作用，促进局部血液循环，使气血流畅，达到消肿止痛，收敛止血的目的。

【临床应用】运用本方以肛门局部红肿、疼痛、瘙痒及痔瘘术后为辨证要点。若红肿明显加虎杖 30g，芒硝加至 100g；疼痛甚则加罂粟壳 30g；瘙痒明显则加川椒 30g、土茯苓 30g。

【注意事项】使用该方 3 天后若疗效欠佳，则应采取手术等治疗措施。运用本方时，应注重辨别寒热虚实，采用相应方药内服，应变而论治。治疗期间忌食煎炒，辛辣刺激之物，不宜饮酒。

【疗效】本方药熏洗坐浴，容易吸收，使用方便，奏效迅速，安全可靠。本组治疗 394 例，其中治愈 355 例，好转 39 例；有效率为 100%。

褥 疮 灵

献方人小传 李俊义，男，57 岁，河北省顺平县人。原为山西阳泉第三人民医院结核科、中医科主任，现被聘在昔阳县界都医院工作（通讯地址为山西阳泉三院，邮编 045000 或山西昔阳界都医院，邮编 045313）。从事中西医结合工作 30 余年，曾获中国中西医结合学会荣誉证书。发表论文 10 余篇，刊登在《实用中西医结合杂志》、《中国名医名药大观》、《求医问药实用辞典》、《中国当代名知中医特色医疗辞典》。有的被评为国家级优秀论文，并被聘任为实用中西医结合杂志社的特邀编辑。

【药物组成】黄芪 15g 丹参 6g 桃仁 9g 川芎 6g 红花 6g
75%酒精 200ml

【制作方法】将上药浸泡在酒精中 48 小时后用棉球沾药液由内向外涂擦患部数次，然后用纱布覆盖，每日 1 次。轻者 1~2 次，

重者 3~4 次见效。

【适应病症】适用于治疗各期褥疮。

【方解】本方针对久病或重病气血虚损，又因局部受压导致气血运行障碍肤失所养，久而破溃成疮而创立。方中黄芪益气固表、托疮生肌，丹参有养血和血功兼四物之力，二药合用使气血双补，配以桃仁、川芎、红花、酒精能起到活血祛瘀，消毒防腐，并借酒精渗透之力，药力深入肌肤。故本方不仅有益气养血，祛瘀生新之功，而且能促使局部气血运行而加速褥疮痊愈。

【临床应用】使用于治疗各期褥疮，症见局部红润，皮肤破损与溃烂者。如局部感染严重伴有体温和血象升高，为控制感染，在应用褥疮灵药液后，在患部涂少量红霉素软膏即可，

【注意事项】在治疗过程中，为防患处受压，要加防护垫。如气圈垫等。

【疗效】轻者 5 天，重者 10 天，治疗得当即可痊愈。

【典型病例】患者董玉良，女，69 岁，系山西昔阳县北界都村，职业农民，住院号 0295。于 1993 年 8 月 27 日，因患肺心病伴心律失常住院，在治疗过程中发现骶尾部皮肤红润其范围 3~4cm 伴有中心部皮肤破损，即用褥疮灵液治疗 5 日后局部破损处愈合，共住院 22 天，病情好转出院。

红辣椒治冻疮

献方人小传 马秋阁，河北医学院附属医院皮肤科。

【药物组成】红辣椒 5 个 水约 3000ml

【制作方法】将红辣椒用刀剖开，加入水中煮沸约 20 分钟，后用热水洗，热敷病变处（也可将辣椒贴在病变处）。约 1 小时，后将病处包扎保暖，隔 3~5 天再作 1 次。

【功效】散寒、舒筋活血化瘀。

【适应病症】冻疮（未破的红斑结节）。

【临床应用】经多年应用效果非常满意，2次痊愈，不再复发。

【典型病例】孙××，女，15岁，每年入冬时双手背外侧起红斑、结节。经用上方2次痊愈，后无再发。

当归四逆汤

献方人小传 杨林池，男，49岁。1969年毕业于辽宁中医学院。大学学历，副主任医师（通讯地址为辽宁省丹东市港湾街3号，邮编118000）。曾在省级以上杂志发表论文4篇。主持的科研课题分别获市级优秀成果奖和优秀成果1等奖。擅经典方剂的临床新用。对中药外治和中医脾胃病也有较深的研究和独特见解。

【药物组成】当归 25g 桂枝 25g 白芍 15g 细辛 15g 甘草 10g 木通 15g

【制作方法】上药水煎20分钟左右，倒入盆内，候温，把患病之手足浸泡在药液中并轻轻揉擦冻疮部。如耳鼻等面部冻疮，可用毛巾浸药液外敷。每次洗或敷约15分钟，每日睡前1次，7日为1疗程。

【功效】温经散寒，养血通脉。

【适应病症】冻疮。

【方解】冻疮患者多素体血虚，阳气不足。感受外寒，以致气血运行不畅，不能温养四末而致病。方中桂枝、细辛温经散寒，当归白芍养血和营，甘草补中益气，木通入经通脉。诸药合用温经和血通络，气血得通，红肿痛痒消退。

【临床应用】本方出自《伤寒论》351条，“手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之”。疮是人体感受低温、寒冷所致的一种常

见皮肤病。常春暖自愈，冬寒复发。其病机与当归四逆汤所主治的素体血虚，复因寒邪凝滞的血虚寒厥证相同。故临证应用，疗效确切。应用本方，病期越短，疗效越快。最好冬季来临，病尚未发或刚复发时应用，可明显缩短疗程。

【注意事项】本方外用无毒副作用，但浸泡时水温不宜过高，以皮肤能耐受为度，避免烫伤。每剂洗完后可再加热，连用2~3次。

【疗效】共治冻疮患者36例。其中男19例，女17例。年龄最大64岁，最小13岁。手冻疮21例，足冻疮12例，耳部冻疮2例，鼻部冻疮1例，经过1~2疗程的治疗，全部有效。其中治愈（冻疮水肿红斑消退，痛痒感消失，观察1年以上未见复发）33例。好转（冻疮水肿红斑减轻或虽治愈但第2年冬有轻度复发）3例。

【典型病例】赵××，女，24岁，工人。双手患冻疮5年余，每年冬季复发。曾用多种方法治疗，疗效不显。检查可见十指和手背弥漫性水肿，表面有多处紫红斑。用此方2剂后水肿即见消退，红斑痛痒明显减轻。共治疗7日，双手皮肤恢复正常。观察3年，未见复发。

冻疮浸泡方

献方人小传 林信彦，男，48岁，上海南汇宣桥医院（邮编201314）。1970年上海中医学院本科毕业，1987年考取主治医师。曾在甘肃、河南、浙江工作20年。中西结合，用药精选求实。博学多识，勤于编撰。近年发表“五脏咳源流与实用性”、“蚂蚁的食用与药用”、“蜂胶内服和外用”等。冬春开设冻疮专科，广收古今文献，博采南北土方。在浸泡、涂药、照射三步疗法中，尤以

浸泡为关键。

【药物组成】基本方：生甘草 30g，芫花 20g，杜衡 20g。加减举例：手足汗多：去杜衡，加洋金花 20g。痒剧：加花椒（后下）5g，或樟脑粉（浸时下）3g。水肿、水泡：加甘遂 10~20g。溃烂初起：生甘草加倍。感染：加呋喃西林 3~5g，或单独应用 0.1% 洗必泰溶液。久不收口：加明矾（或枯矾）5~15g，或纯蜂膝 10g。

【制作方法】①饮片：辨证选药配方，甘草先煎半小时，余药依常规。可以选用新鲜文旦皮（或鲜橘皮）、尖辣椒、茄子梗或生姜适量，切碎入煎，作为“药引”。头、二煎连渣混和后，调节至 2000ml 左右。煎成后可加新鲜生蜂蜜、黄酒适量。②加工成单味粗粉，辨证调配，便于携带、邮寄。用时沸水冲泡，先熏后浸。③浓汁：煎好单味或分型小复方，辨证调配，还可加入适用的中西药粉末，便于现用。④旧液再用：旧液带渣煮沸，既可消毒，又可煎取更多的有效成分，先熏后浸，每剂可用 3~5 次。⑤浸法，控制液温 36~42℃（温墩水），最高 45℃。浸泡 20~30 分钟左右，每天 1~3 次。观察温度，配备 1 支 0~100℃ 量程的红柱温度计。维持温度用小火断续加热法，或浸泡容器里置更加容器中夹层逐步加少量沸水等方法。

【功效】化瘀逐水，扶正护肤，散寒止痒。

【适应病症】各型冻疮的各个阶段。

【方解】冻疮病机，重在瘀阻。红肿、水泡及溃烂初起，皆属瘀阻引起无菌性炎症反应，应化瘀治本。感染之后，方加抗菌药物治标，仍须化瘀治本。改善局部微循环，畅通气血，推陈出新，便是最佳扶正护肤法。甘草芫花浸泡法治冻伤，书刊屡有推荐，原方用量嫌小，未强调控制温度。“十八反”外用无妨，或有相反相激之妙。杜衡又名土细辛，辛温，散风寒，化痰瘀，兼止痒，功近细辛而价廉。感染旧用黄连，时价昂贵，依近年冻伤研究成果，选用呋喃西林，价廉效宏。加用生蜂蜜、黄酒，护肤

行血，优质优价。尚有几种“豪华型”治疗，从略。

【临床应用】冻疮为体表轻浅小恙，亦须整体着眼。外病可以内治，单用中药或西药内服治愈者报道不少。尚有内病不治而外症难愈者，为如冠心病可用硝苯啉；易感风寒的慢支患者可加酮替芬；血压偏低者，酌选人参、黄芪、肉桂、桂枝、附子、甘草等组方内服。本专科浸泡用“电热恒温水箱”，涂药品种较多，常选貂油制剂；照射用红外灯泡或“神灯”。个别患者须包扎，涂用复方康纳乐霜或蓝油烃。一般病人，门诊只治疗1、2次，辨证，配方，悉心指导并详答询问。实地看看试试，一教就能学会。自用药液可带。再用健身养护，不可忽略。冬病夏治能断根。

【注意事项】浸用温度，务必控制，与药物相辅相成，过高过低皆不适宜。本法优点：辨证施治，针对性强，疗效可靠。未见毒副作用。缺点：可繁可简，可贵可廉，总的来说还是比较繁琐，成本稍高。

【疗效】一般3天之内，硬块可消，溃烂可收。

第五章 骨伤科疾病外治方

颈 痛 灵 膏

献方人小传 阎秀珍，女，44岁，副主任医师。1975年毕业于昌潍医学院医疗系，工作单位：山东省潍坊市人民医院（邮编261041）。出生中医世家。14岁从医，擅长中医针药汤剂，后改学西医。先从事外科麻醉，后改心内科。撰写论文20余篇，率先开展针麻止痛门诊等。多次参加全国、全省学术研讨会，有关论文在国家、省级专业刊物发表10余篇。现着手于冠心病中药治疗过程中心电图变化及冠心病舌诊与心电图变化研究。

【方药组成】穿山甲 12g 白芥子 12g 生姜 200g

【制用方法】上3药共为研末，加鸡蛋清少许，调成药膏状，敷于颈椎疼痛处。

【功效】活血化瘀，宣通气血，通络。

【适应病症】颈椎病。

【方解】该方利用其穿山甲主痹证，散血通络，祛风功效和白芥子消痈癖，驱痰气及生姜散风寒，消瘀结，增强血液循环作用，达到活血化瘀，通经活络，宣通气血之功能并改善局部血液循环，增加颈椎病受压之血管、神经的营养状况，起到止痛或治疗目的。

【临床应用】颈椎病系中老年常见病、多发病。系机体老化退

行病变的一部分，影响人们日常生活起居，目前尚无切实有效方法。

【注意事项】应用前洗净局部皮肤，该方有一定的刺激作用，个别有皮肤过敏现象。

【疗效】本方1次即见功效，为巩固治疗效果可连用5次。45岁以下病人有效率90%，总有效率75~85%左右。

十香散膏药

献方人小传 陈慈根，男，47岁，浙江安吉县人。现为浙江安吉县孝丰卫生院（邮编313301）外科中医师。出身于三代中医（外科）世家，注重临床，勤于实践，擅长中医皮外科，专于中医外治法。曾多次选送到浙江省卫生部门举办的医学进修班学习深造，撰写学术论文数篇，分别刊登《当代中药外治临床精要》及《湖州医学》，多次出席市、地和全国学术会议上交流。

【方药组成】肉桂、生川草乌、生南星各90g 山柰、公丁香各50g 制乳香、制没药、北细辛各30g 冰片15g

【制用方法】上药各研成细末，过80目筛，称准用量，混合研匀，密闭备用。用时将五香膏（浙江杭州产）加温软化后，再搅入十香散少许于膏药中心，稍加粘和，乘热贴于颈部及上肢压痛点，4天更换1次，4次为1疗程。如逢炎热天气，五香膏（因受热后药肉太粘）易止痛消炎膏（浙江兰溪日化厂生产）与十香散等份调成糊状，将膏药摊在大小不等的纱布上，贴于颈部及上肢压痛点，2天更换1次，8次为1疗程。

【功效】温经散寒，行气和络，活血止痛。

【适应病症】颈椎病。

【方解】本方选温经散寒，行气和络，活血止痛的十香散，

配以芳香走窜、祛风化湿、活血行瘀之功的五香膏（系麝香、穿山甲，生川乌等配制）或止痛消炎膏（系独活、生天南星、生草乌、皂荚、冰片、水杨酸甲脂等配制），二膏均对药物的吸收与发挥有促进作用，从而达到疏通经络，血随气行，瘀随气转的目的。由于改善了血液循环及组织营养，临床治疗效果颇为显著。

【临床应用】颈椎病属中医“痹证”范畴，本病大都为颈椎退行性改变，复加陈旧性筋骨劳伤，或感风寒湿邪，导致颈椎及周围组织的气血运行不畅，脉络瘀滞，经气不利而变生诸症。主要症状为单侧或双侧的颈肩疼痛、头痛、头晕、耳鸣、恶心、手指麻木、活动不灵、精细动作困难。主要体征为颈部活动受限、不能向左右转侧回顾及前后俯仰，压头试验、臂丛神经牵拉试验阳性等患者，皆可使用本方。尤其适用于老年虚弱之体，攻补难施之时，或不肯服药之人，以及耐药性的病例。

【注意事项】除炎热天气外，一般取十香散合五香膏为主，使用本方2疗程后若疗效欠佳或见皮肤过敏者，宜改用它法治疗。孕妇禁用。

【疗效】1982年~1992年，笔者应用十香散膏药外敷治疗颈椎病204例（本组患者均是门诊病人，其中男153例，女51例；年龄最小32岁，最大79岁；病程最短6个月，最长12年。本组病例经颈椎X线片检查显示：有颈性生理前凸消失和后突，椎体间隙变窄，椎体后缘及钩椎关节骨质增生，项韧带钙化等表现。经治疗后，治愈107例（临床症状及体征全部消失，能恢复正常工作）占52.5%；显效65例（临床症状大部分消失，颈部活动无明显限制，能恢复正常工作，但逢天气变化或劳累后颈部偶有轻微疼痛）占31.9%；有效25例（症状部分改善，功能部分恢复，但有轻度颈臂酸楚），占12.2%；无效7例（一般连续治疗2个疗程症状体征无明显改善）占3.4%。总有效率为96.6%。获效患者其治疗次数多数在3~7次以内，少数患者治疗次数需8~

15次。全部病例均为膏药外敷，无皮肤过敏而能坚持治疗者，治疗期间停用其他药物。

骨质增生膏

献方人小传 孙魁荣，男，34岁，吉林省大安市人。现为吉林省卫生协会会员（通讯地址为吉林前郭县油田公安消防支队特勤队，邮编：131100）。14岁侍于业，3年后在乡下为医，后继在吉林省松原市扶余东贤诊所从医。1993年获全国首届“光明杯”中医药优秀论文奖。

【方药组成】细辛 冰片 姜汁

【制用方法】细辛研末，放入少许冰片，姜汁调合，摊在风湿止痛膏上按增生面摊药，敷于患处。

【功效】通经止痛，活血化毒。

【适应病症】骨质增生病症。

【方解】本方所治之病乃因伤后久不愈的增生病症，通经活络，化瘀解毒。方选温通香窜之品，藉冰片渗透之力，细辛祛风，散寒止痛，姜汁发表解毒之效，对骨质增生有奇效。此方药可深入肌里经络，透化增生的骨刺骨芽之毒。

【临床应用】各关节部位增生，椎体肥大引起的功能障碍有奇功之效。

【注意事项】有伤口或溃疡的忌用。

【疗效】15例，痊愈2例，6例功能障碍接近消失，7例也有明显减轻。

【典型病症】刘××，松原市机关干部。颈椎4～5节增生，第7椎增肥，敷用本方药2个来月，骨质增生基本消失，恢复正常功能。徐××，大安市，某机关干部。颈椎5、6、7节增生2年之

久，敷本方药1个多月，病情基本痊愈，X片增生骨小梁微量，显像已经不清。

抗骨增生热敷方

献方人小传 陈水成，男，55岁，福建省厦门市人。现为厦门市鼓浪屿干部疗养院医务处副主任医师（通讯地址为厦门市鼓浪屿中华路2号201室，邮编361002）。1967年毕业于福建省中医学院本科班。曾任福建省华安县高东公社卫生院负责人，于华安县医院中医骨伤科和厦门市中医院骨伤科工作。现为中国人才研究会骨伤人才分会理事、中国医药荟萃丛书编委，中华医道编委，中医学会福建省骨伤专业委员会委员，福建省林如高学术研究会委员。对损伤重在辨证施治，内外兼治。发表论文70多篇，被载入《中华当代名家大辞典》、《中国当代医界精英辞典》等10余本书。本方参加1994年美国国际东方医学学术大会交流。

【方药组成】伸筋草15g 透骨草15g 五加皮10g 海桐皮10g 刘寄奴10g 红花10g 苏木6g 川断6g 黄柏6g 牛膝6g。

【制用方法】将上药装入纱布袋内，每次2包。每包加入白酒10~15ml后，置入空罐内盖好，放入水中炖热后，先取1包热敷患处，凉后再换1包热敷40分钟，1月为1疗程。

【功效】使增生之骨质软化，以达控制至消失。

【适应病症】颈椎综合征、肥大性脊柱炎、椎间盘突出症、骨刺等骨质退化致疼痛，活动不利，四肢麻木，疼痛难行等热敷即可见效。

【注意事项】皮肤病或溃破者勿热敷。

【疗效】治疗1590例，有效率达92.5%。

【典型病例】林××，男，58岁。颈4~5椎骨质唇样增生，转侧活动不利，酸麻反射至上肢，疼痛。经热敷后症状逐渐消失，1月后痊愈，又巩固1月，已5年未见复发。

腰痛外敷方

献方人小传 张中云，男，汉族，大学毕业，双学历。儿科副主任医师。山东烟台招远市人。1969年2月入伍，北京卫戍区军人。1973年8月医科大学毕业。1983年8月获山东师范大学外文系英语专业毕业文凭。先后在国内医学刊物上发表专业论文及译文30余篇。1988年8月调入山东招远市宋家医院至今（邮编265405）。

【方药组成】乳香 30g 没药 30g 白芍 20g 细辛 3g 白芥子 3g 桃仁 10g 杏仁 10g 威灵仙 20g 骨碎补 12g 韭子 3g 川乌 6g

【制用方法】上药共为细末，分3剂，1日1剂。用鸡蛋清调成糊状，用消毒纱布外扎。24小时换1剂，2剂见效，可用12天。

【功效】活血化瘀，通经活络。

【适应病症】腰椎骨质增生症，腰肌纤维炎。

【方解】本方对风、寒、湿所致腰痛及肾虚、血瘀所致腰痛有效。

【临床应用】敷药后由于局部血液循环得到改善，腰肌痉挛、强直得到缓解，疼痛消失。

【注意事项】个别患者敷药后局部皮肤有少许皮疹及轻度痒感，无其它不良反应，无需特殊处理。

消 刺 液

献方人小传 贾振光，女，46岁，山东青州市人。现为山东省青州荣军康复医院内科主治医师（通讯地址为山东青州荣军康复医院，邮编262500），系医疗专业本科毕业生，曾在乡镇医院临床工作10年，注意收集民间偏方为广大农村患者解除病痛。曾用该方治愈跟骨骨刺32例。

【方药组成】洋金花全草（干100g或鲜150g左右）

【制用方法】上药加水，烧开后熬10~20分钟，乘热先熏后洗患足，每日1~2次，每次约30分钟，10天为1疗程。1疗程不愈可休息3~5天再进行下一疗程，直至痊愈。

【功效】祛风除湿，疏通经络，舒筋活血，消肿止痛。

【适应病症】跟骨骨刺。

【方解】本方所治之病属痹证范畴，是因感受风寒湿热之邪而诱发，其主要病机是气血痹阻不通，筋脉失于濡养所致。用洋金花熏洗，依其热力和药物的作用，使腠理疏通，气血流畅，改善局部营养，达到舒筋活络，祛风除湿，消肿止痛等目的。

【临床应用】现代医学认为，跟骨骨刺压迫血管神经导致血运障碍，刺激周围软组织，引起变性粘连痉挛，出现疼痛麻木。口服药物疗效甚微，理疗效果较好，但广大农村尚不普及，应用洋金花熏洗，药源广，易操作，疗效高，一般1~3个疗程即愈。

【注意事项】使用本法应注意调整患部与盛药器皿之距离，以免烫伤患部；熏洗时为使药液蒸汽消散减慢，可用一清洁布罩住患足和盛药液的器皿；并注意保暖，避风寒，熏洗完毕立即揩干。该药有毒勿入口。

五虎温筋散

献方人小传 吴延义，男，32岁，安徽怀宁人。现为安徽省怀宁县江镇医院医师（邮编246142）。出生中医世家，自幼爱好中医中药及武术，自18岁从事中医骨伤科临床工作，在骨伤科治疗方面，不囿传统，师古而创新，对临床疾患，明理识病，内外合治，医疗事迹曾入录《当代中国骨伤人才》、《疑难杂症求医指南》、《中华名家大辞典》、《中原名医名方荟萃》。在国家级杂志上发表论文10余篇，1993年参加首届“生命力杯”世界传统医学优秀论文大奖赛，通过专家评定，其论文获优秀论文成果奖，并有美国中医中药研究院的邀请去美参加学术交流，全文翻成英文版，向世界发行。

【方药组成】川乌头 25g 天南星 15g 生半夏 15g 油肉桂 25g 公丁香 10g

【制用方法】将上药混匀研成均匀的细末，备用。使用时根据肩部压痛点的范围，用适量的药末，和热糯米饭拌匀后，外敷局部，每日1次，每次24小时，10天为1疗程，一般1疗程得到满意效果。

【功效】温筋散寒，祛风止痛。

【适应病症】肩关节周围炎。

【方解】本方所治之病乃因肩部外伤而引起；或劳动过度，使肩部肌肉劳损；或因年老体弱，筋肉不健，失于气血濡养，受风、寒、湿三气的侵袭，而气血瘀滞，疼痛，关节活动不利；根据“治风先治血，血行风自灭”的原则，所以方以温经散寒，而偏走血分，故能温营血，散寒凝，通血脉而止痛。

【临床应用】以肩关节疼痛，肿胀，活动明显受限，而逐渐加

重，肩部广泛性压痛；后期肌肉萎缩，甚至关节强直。现代医学认为关节囊及关节周围软组织呈慢性炎症反应，致使关节周围广泛粘连，限制正常活动，故用五虎温筋散外敷而得到奇效。

【注意事项】此方辛温，有大毒，不宜内服，在确诊后方可外用；如皮肤发痒，可停2天再敷。

樟 脑 膏

献方人小传 黎国发，男，40岁，中医主治医师。工作单位：武汉市第二精神病医院（武汉市武东医院，邮编：430084）中医科。学习中医并从事中医教学及临床工作近20年，临床长于针灸、中西医结合精神科专业。著有上述专业方面的论文数篇，多次参加国家和地区级学术会交流。

【方药组成】樟脑粉 医用橡皮膏

【制用方法】将橡皮膏按疼痛的部位裁为适当大小，铺平，樟脑粉适量，以薄薄均匀铺于橡皮膏上为宜。用手指将樟脑粉在橡皮膏上轻轻涂匀后（注意橡皮膏的四边不要涂药），点燃其中，再将火吹向四周，烧匀后吹灭，待温而不烫时立即敷贴于患部（痛处），整平即可。操作时勿将橡皮膏烧焦。

【功效】据临床观察及文献记载，我们认为樟脑膏具有活血化瘀，祛湿散寒，通络止痛的功效。

【适应病症】腰肌劳损，跌打损伤，风湿病，肩周炎，颈、腰椎病，坐骨神经痛，胸腹痛等各种原因引起的急、慢性痛证。

【注意事项】头面毛发处及皮肤破溃处不宜用，孕妇忌用。

骨质增生散

献方人小传 马用章，男，53岁，现为四川省德昌县中医院（邮编 615500）内科副主任医师。1964年毕业于四川医学院医疗系，分配至德昌县工作。1971年参加成都中医学院举办的西医离职学习中医班1年，此后回县从事中西医教学和临床工作，长于内、儿科。在诊治疑难重病中师古而不泥古，疗效较好，后写了一些文章。

【方药组成】生川乌、生草乌、北细辛各 25g 生半夏、一只蒿、乳香、没药各 20g 生大黄 60g 血竭、樟脑、冰片各 10g

【制用方法】上药共研细末，均分 5 包，每包约 50g，视病灶大小，取 1~2 包药，加麸醋调成膏，装入小纱布口袋内，缝合袋口火上烤热，置于患处，盖上一小块塑料薄膜防药液外渗，外扎布绷带，用热水袋适当保温，进行温热敷。

【功效】活血化瘀，消肿，麻醉止痛。

【适应病症】增生性腰颈椎病，增生性骨关节炎，软组织损伤。

【方解】本方所治之病症是由骨质增生、软组织变性或瘀血水肿致气血凝滞疼痛，治宜活血化瘀消肿麻醉止痛，选用骨质增生散外治。方中生川乌、生草乌、生南星、生半夏、一只蒿麻醉止痛；青盐消肿定痛；生大黄泻热活血消肿止痛；乳香、没药活血止痛；樟脑、冰片、北细辛辛散行气止痛，全方共奏活血化瘀清热止痛消肿之功。

【临床应用】凡久坐久站、行走或长期从事某种工作，或软组织损伤致四肢关节刺痛、酸胀隐痛麻木或压痛肿胀瘀血、或颈椎骨质增生致心律失常者，经 X 光片确诊为骨质增生或闭合性软组织损伤者，均可用本方外治。偏寒者热敷，偏热者宜冷敷，早晚

各敷1次，每次1小时，10次为1疗程，若因药物浓度过高刺激皮肤局部疼痛，影响治疗者，可在此敷药内适当加入米糠以降低药物浓度，可减轻或消除疼痛。颈椎骨质增生者可辅以颈牵引疗法疗效更好。

【注意事项】①局部有溃疡、水泡及开放性软组织损伤者不宜用本法治疗；②药物致局部水泡者，暂停治疗，待水泡痊愈后，缩短每次治疗时间，继续治疗。③1次量外敷药可连续用3~4次，每次治疗后将药装入塑料袋内扎紧保存备用，药物干涸时可加醋揉散后继续用，直到无药味时为止。④禁忌口服，若误用中毒者可用阿托品解救。

麝香二乌膏

献方人小传 王忠杰，见内科“气管炎膏”下。

【方药组成】麝香 5g 生草乌 6g 生川乌 6g 琥珀 6.5g 乳香 6g 没药 6g 当归 6g 山甲 6g 慈姑 5g 川断 6g 熟地 8g 红花 5g 马钱子 6g 血竭 5g 生大黄 6g 广丹 5g 槟榔 9g 赤芍 9g 白芷 5g 枳壳 9g 桂枝 6g 木瓜 6g 麻油适量

【制用方法】广丹除外，麝香、血竭研成细粉混匀备用。余药均入麻油内熬枯去渣，至滴水成珠时，方下广丹即成药膏，再加上备用的麝香和血竭，搅拌均匀后，摊在胶布中心（将胶布剪成5×5cm的方块）。再盖上和胶布等大的干净塑料纸，使胶布和塑料纸边缘充分粘合，不能透气，防止药膏干枯，用时去掉塑料纸，将胶布贴于患处（经穴用药时，要掺骨碎补、枸杞子各5g，研细备用）。

【功效】软坚止疼，消除骨质增生。

【适应病症】骨质增生，增生性脊柱炎。

【方解】本方具有疏通气血，温经散寒，软坚散结，通络止疼，补充微量元素，抑制骨刺增生，破坏骨刺的内生环境。该方加上骨碎补，枸杞子，贴在神阙穴上，具有补益肝肾，强壮筋骨的作用。因为增生病，多因外伤、肝肾两虚，外感风寒湿邪等原因而发病，使该部经脉气血闭阻不通，邪气注于筋骨，留滞关节、肌肉而成。

【注意事项】本膏无毒性反应。个别患者对胶布过敏者，在贴胶布处有轻度发痒，或者皮肤有潮红，可涂些肤轻松软膏，继续贴用。

【疗效】据上千例患者使用，总有效率为 96.7%，好转率为 89.4%，治愈率为 56%。

芎 灵 煎

献方人小传 朱波刚，男，31岁，主治中医师。现在安徽蚌埠第二人民医院中医科从事临床工作（通讯地址：安徽蚌埠市第二人民医院中医科，邮编 233000），擅长中药内服外用结合治疗临床常见病、多发病以及一些疑难杂症，尤对骨伤科、皮肤科等疾病有较丰富的临床经验。发表省级以上论文 9 篇。

【方药组成】透骨草、伸筋草、川芎、威灵仙、川草乌、独活、年健、当归、桂枝、清风藤、薄荷各 30g

【制用方法】将上药加水 300ml 煎煮，待煮沸后再用文火煎 15~20 分钟，然后将药汁过滤至脚盆内，将患足先薰待药液温和时再浸泡 30 分钟，每日 2 次，7 剂药为 1 疗程。

【功效】温经散寒，活血祛瘀，通络止痛，软化骨刺。

【适应病症】跟骨骨刺，跟部滑囊炎，跟部神经痛，踝关节扭伤等。

【方解】方中取威灵仙、透骨草、伸筋草、清风藤、年健、独活祛风散寒，温经通络止痛；川芎、当归、清风藤活血祛瘀；川草乌、薄荷局部麻醉镇痛消炎；桂枝、薄荷根据现代药理证实，还有促进局部皮肤血行、扩张皮肤血管、增强药物吸收的作用，从而提高该方的治疗效果。

【临床应用】如患跟骨骨刺，待药液煮沸后再加入 1 斤米醋与药同煎，威灵仙、川芎必须加倍用量，可增强疗效。其它疾病，则薄荷、川草乌加倍用量，其效更佳。

【注意事项】本方无任何毒副作用，应避免烫伤，如 7 剂药治疗后无效者可改用其它方法治疗。

【典型病症】刘××，女，47 岁，蚌船厂工人。1986 年 3 月 17 日就诊。患双足跟骨骨刺半年余，因畏于手术前来我科，经用上方 18 剂外用薰洗，症状体征消失，拍片也未见明显异常，随访 3 年未见复发。

麝香复元方

献方人小传 王令喜，男，48 岁，山东省聊城市人。聊城地区卫生协会理事。现为聊城市王令喜中医门诊部主治医师（通讯地址：山东省聊城市东昌西路 140 号，邮编 252000）。1961 年初中毕业后，看到家乡缺医少药，立志学医以治病救人，以医药大师李时珍为榜样，寻求古训博采众方，走上自学成才之路。经多年刻苦学习，取得了大专文凭。经几十年的精心研究，先后攻克了骨质增生、椎间盘病变、股骨头无菌缺血性坏死、骨髓炎和类风湿性关节炎，取得了治愈率 90% 以上的疗效。近年来在省和国家级刊物发表了 16 篇论文，其中发表在《山东中医杂志》的“外贴膏药治疗颈椎增生 276 例”获得省优秀论文 2 等奖。

【方药组成】益母草露 120g 白芨、杜仲、川断各 20g 地龙、土元、凤仙花、鹿角胶各 10g 川乌、灵仙各 6g 麝香 0.2g 梅片 1g

【制用方法】上药除麝香、梅片、益母草露，共为细末，放砂锅内掺匀，熬到滴水成珠为宜，将药膏摊到布上，把研好的麝香、梅片均匀地撒在膏药上，敷贴患处。每 3 天换 1 次，6 次为 1 个疗程，2~3 个疗程痊愈。

【功效】补肾纳气，消痛散寒，化瘀通络，续筋接环。

【适应病症】椎间盘突出、脱出、膨出、膨隆及所致椎管狭窄者。

【方解】椎间盘病变的病因，一是外伤劳损所致瘀血阻滞；二是韧带钙化所致保护椎间盘的功能减弱；三是骨质增生物长期挤压磨擦椎间盘所致椎纤维环破裂；四是肾虚对椎间盘失其温养濡润所致椎间盘萎缩。以上诸因迫使椎纤维环断裂、椎核膨胀造成椎间盘突出、脱出、膨出或膨隆。外敷法能使药力直达病所，其药力持久而效速。因此选用杜仲、灵仙、麝香、白芨等组方，补肾纳气治其本，消痛散寒、化瘀通络治其标，续筋接环祛其根。

【临床应用】椎间盘病变的辨证要点是①疼痛的部位：一般在腰胯腿的后外侧，严重者影响到脚趾。椎间盘突出、脱出病痛为单侧，膨出或膨隆则影响双侧。②疼痛的性质：一般是酸麻沉痛，严重者，时有触电似的刺痛。③疼痛特点：当站立行走时疼痛加重，直腿抬高时呈阳性并且疼痛剧烈，咳嗽打喷嚏时，有触电似的酸麻沉痛感，从腰部向腿部放射，但当骑自行车时疼痛明显缓解。④X 光片示相邻两椎体间隙变窄或前后左右不等宽，椎间孔或棘突歪斜不正。CT 显示椎间盘向左后或右后突出、脱出或向四周膨出。

【注意事项】局部拔出红点白点不必害怕，既不是烫伤，也不是过敏感染，红点是拔出的瘀血，白点是拔出的椎间盘病变的白

色胶质，红白点由多到少，最后到无即愈。

【疗 效】腰椎椎间盘病变 1966 例，其中椎间盘突出 910 例，脱出 456 例，膨出 516 例，并发椎管狭窄者 110 例。痊愈 1790 例，显效 176 例，治愈率 91%，有效率 100%。

五鸡接骨膏

献方人小传 张鸿谋，男，54 岁，甘肃武山人。现为武山县医院副院长（邮编：741300），1966 年兰州医学院医疗系毕业，副主任医师。1991 年获国家特殊津贴。临床主张应用中西两法内外合参，应变而治。发表论文 30 篇，其中“硝菴甘草通结汤对肠梗阻的治疗作用及机制探讨”获全国优秀论文。出版《活人金丹针灸秘要》。特长中西医结合治疗急腹症、骨折、肝炎及针灸。曾 3 次应邀到莫斯科、列宁格勒和韩国汉城、孺城讲学，为祖国传统医学走向世界作了应尽的努力。

【方药组成】小鸡 1 只（孵出不过 1 月，骨黑者最佳） 五加皮末 12g

【制用方法】将小鸡连毛带肉与五加皮末共捣为糊状，外敷患处，每 2~3 日换药 1 次。

【功 效】活血化瘀，接骨续筋，固本培元。

【适应病症】各型闭合性稳定性骨折。

【方 解】本方治疗骨折之所以有效，是因为它能作用于早期的活血化瘀，又能作用于中期的接骨续筋，还能作用于晚期的固本培元。五加皮辛温、入肝肾二经，肾得其养则妄水去而骨壮，肝得其养则邪风去而筋强。鸡属木，骨黑者属水，甘温，入肝肾二经，有补虚暖胃，强筋骨，续断伤，活血化瘀的作用，这样就将骨折愈合过程的 3 个阶段有机的连续在一起，将骨折的修复程

序向前移了一步,使活血化瘀为和血生新、接骨续筋创造了条件,也为固本培元创造了条件。因而加速了骨折的愈合,缩短了临床愈合期。

【临床应用】外敷五鸡接骨膏后,受伤局部可产生以下四种反应:①局部发凉,约持续15~30分钟,这可能是五加皮含挥发油的缘故。②继凉之后产生疼痛,约持续10~20分钟,可能是局部发凉而致短暂性血管收缩、痉挛而产生疼痛。③继疼痛之后产生局部发烧,约持续2~3小时,可能是由于五鸡接骨膏的活血化瘀作用而引起局部血容量的改变,使血流加快,血容量增加。④继发烧之后产生局部发痒感,可能是由于五加皮具有强壮运动神经的作用,而引起反应性神经兴奋的结果。

【注意事项】开放性或不稳定性骨折禁用。

【疗效】通过对25例不同骨折的治疗,股骨骨折11例,平均临床愈合期为40天;锁骨骨折2例,平均临床愈合期为26天;肱骨骨折8例,平均临床愈合期为26天;胫腓骨骨折4例,平均临床愈合期为29天;蹠骨骨折3例,平均临床愈合期为29天;尺桡骨骨折2例,平均临床愈合期为29天;手指骨折4例,平均临床愈合期为21天。各型骨折总的平均临床愈合期为31天。又进行动物试验,家兔29只,以左前肢尺桡骨人工骨折。试验组15只,平均临床愈合期为18天;对照组14只,平均临床愈合期为30.8天。经统计学处理,求得两均数相差的标准误为1.76%, $P < 0.05$,说明五鸡接骨膏治疗骨折的治疗组与对照组的临床愈合期有显著差异。通常以两均数之相差小于标准误的2倍为不显著,在2倍与3倍之间者为相差显著,大于3倍为非常显著。计算结果两均数之相差为其标准误的7.236倍,大于3倍,说明五鸡接骨膏治疗骨折的治疗组与对照组的临床愈合期有非常显著的差异。

【典型病症】邓××,男,30岁,武山粮管所干部。1988年

4月24日，因夜行不慎，由多丈高处摔下，左肩着地，经X线拍片检查，诊为左侧锁骨中段骨折。急行手法复位，“8”字绷带外固定后（伤处暴露），次日开始外敷“五鸡接骨膏”，每2日换药1次，共换7次后，解除外固定开始局部热敷，每日2次。1988年5月24日拍片复查，已有大量骨痂形成通过骨折线，骨折愈合。26日开始上班，恢复正常工作，患处无舒感。

接骨续筋膏

献方人小传 潘俊山，男，27岁，中医师，中国民间中医医药研究开发协会会员。现为射阳县潘俊山中医内科诊所所长（通讯地址为江苏射阳县特庸盘洋七组，邮编224313）。对中医内科、伤科有独特的治疗方法。临证主张内外合治。发表论文数篇。

【方药组成】骨碎补 18g 续断 18g 制乳香 12g 制没药 12g 元胡 12g 五灵脂 12g 肉桂 12g 麝香 2g

【制用方法】上药麝香除外，余药入0.75kg香油中浸2天，文火煎45分钟去渣加麝香2g（研为细末）后，入黄丹380g收膏，将膏药入冷水中拔去火毒后，摊于棉布上，每块布摊膏约0.25cm厚、直径为15cm的圆形。用时，将膏药加热软化后上贴患处，7天换1次。

【功效】接骨续筋。

【适应病症】骨折筋伤。

【方解】骨碎补苦温性主走泄，能活血止血，接骨续筋，消肿止痛；续断辛温性涩，能行瘀血，生新血，消肿痛，续筋伤，疗骨折；乳香、没药、元胡、五灵脂为“手拈散”能行气活血止痛；肉桂温阳能增加血液循环；麝香有渗透之力能引上药深入筋骨，直达病处，能促使骨折愈合筋伤恢复，故能接骨续筋。

【临床应用】骨折者，先将骨折复位，再把膏药加热软化外贴患处，而后按伤科规定行外固定。筋伤者，先进行推拿疗法后，再外贴膏药。

【注意事项】骨折者进行用药固定后，还需骨科透视，如骨折已复位，固定正确即可，否则重新处理；使用该药 14 天后不显效者，急宜采取其他相应措施；皮肤损伤、过敏者勿用。

【疗效】经治 53 人，治愈 50 人，好转 3 人，有效率 100%，一般 3~30 天临床治愈。

舒筋活络膏

献方人小传 卜明，男，30 岁，大专学历。现在陕西省安康地区中医院从事骨伤科临床工作（通讯地址为陕西省安康市巴山东路 47 号，邮编 725000）。善于采用中西医结合的方法治疗外伤所致手足指（趾）坏死及骨折延迟愈合。曾在《中国骨伤》杂志发表论文 2 篇，《当代中药外治临床精要》一书载入论文 1 篇，并有多篇学术论文在全国及省级参加学术交流。

【方药组成】三七 100g 当归 100g 丹参 30g 土元 30g 莪术 30g 生半夏 60g 生南星 60g 白附子 60g 僵蚕 60g 生黄芪 30g 骨碎补 30g 伸筋草 30g 木香 30g。

【制用方法】上药为散，每用取适量与医用凡士林搅和，微微加热，摊于绷带上（视患处大小决定摊药面积），厚约 3~4mm，外敷于患处，再在其上置一塑料薄膜，包扎好，外用热水袋热敷，2~3 天换药 1 次。

【功效】活血祛瘀，化痰通络，佐以补益气血。

【适应病症】骨折后期患处疼痛及关节活动不利。

【方解】骨折损伤后期，由于气滞血瘀，经络阻塞，气血、

津液运行不畅，生瘀生痰，形成一种病理产物，痰瘀交阻，又加重了经络阻塞，从而导致了恶性循环。筋骨失去了气血的温煦濡养，津液不能滋润滑利关节，故病人常出现患处疼痛及关节屈伸活动不利的情况。使用上方，外敷于患处，通过皮肤持续吸收，化除瘀痰，经络畅通，从而取效。方中三七、当归、丹参、土元、莪术活血祛瘀通络；生半夏、生南星、白附子、僵蚕化除痰湿；当归、黄芪补益气血；骨碎补、伸筋草通络舒筋；木香疏散肌肤郁气，合而为用，达到治疗目的。

【临床应用】临床体会，使用上药时最好用凡士林搅和，而不用蜂蜜或蛋清，因为后者容易干燥，影响药效。对关节活动不利者，可于换药后，指导其进行关节屈伸功能锻炼，这样取效更捷。

【注意事项】①方中生半夏、南星有毒，故切勿内服。②孕妇忌用本方。③对关节活动不利者，功能锻炼时要持续用力，勿骤使猛劲。④少数患者用药后皮肤出现丘疹、搔痒，不用担心，此系药物刺激过敏所致，可停止换药 2~3 次，然后继续用药，患处皮肤可逐渐适应。

【疗效】临床治疗患者 200 例，效果良好。骨折后期伤处疼痛者，使用上方 2~3 次后疼痛即可缓解。

特效消肿接骨方

献方人小传 熊泽南，男，59 岁，中医副主任医师。南昌市红十字会工作，中华全国中医学会会员。生于中医世家，发表“丹凤汤治肝病临床报告”等论文，编纂《华氏中藏经图注》、《医林备要》、《临疹杂记》祖传医学著作 3 书。擅治疑难杂病（通讯处南昌市卫生局，邮编 330008）。

【方药组成】鲜骨碎补（用量视患者肿痛部位范围而定）

【制用方法】将鲜骨碎补捣碎敷患处，用纱布固定，24 小时换药 1 次。鲜骨碎补采来后，用细沙子埋藏，保持新鲜。此药可内服，无毒性及任何副作用。

【功效】性味苦温，补骨坚骨，破瘀生新。

【适应病症】骨折。

【疗效】对骨折患者，促进骨折愈合，经敷药 69 例，有效率 100%；对跌打损伤肿痛者敷药 124 例，有特效。

【典型病症】裘友山，男，32 岁，农民。从树上摔下，被石块硌伤腰部，腰部肿胀，疼痛，腰不能伸，敷药 7 天，痊愈。献方者本人，1989 年 5 月 3 日车祸右臂 3 处骨折，经开刀手术复位，肿胀不消，敷药 10 天，肿胀消失，又敷药 30 天骨折愈合。

秘方接骨膏

献方人小传 赵春生，男，45 岁，内蒙古哲里木盟开鲁县人。现为内蒙古哲里木盟开鲁县小街基中心卫生院骨科副主任医师（通讯地址内蒙古哲里木盟开鲁县小街基中心卫生院，邮编 028417）。18 岁侍学于伯父，继承中医骨伤、骨病经验，5 年后在乡里行医。1983～1984 年先后在北京市同仁医院骨科、北京市积水潭医院中医骨科进修深造，对于手法整骨不断创新和改造，经手法整复、外敷、内服中药治愈各类骨折 400 余例，发表国家级论文 2 篇。

【方药组成】红粘谷米粉 150g 骨碎补粉 50g 老贯筋粉 40g 大黄粉 20g 制乳香粉 20g 制没药粉 20g

【制用方法】将红粘谷米放入泥盆内，用文火加温随时搅拌，制成发黄、米粒相互粘结成团块状，取出研成细粉，注意不要制

成碳化状。取红糖 300g，水 300ml 同时放入锅内，文火溶化熬开后放入以上药粉炼为膏剂，装入瓶内放在阴冷处备用，应用时米醋调和外敷。配合相应小夹板或石膏外固定，每周更换秘方接骨膏 1 次，一般的骨折 3 周治愈。

【功效】消瘀接骨。

【适应病症】本方所治各类骨折及骨关节软组织损伤。

【方解】本方外敷治疗各类创伤所致各类软组织及关节损伤、骨折。红粘谷米粉外敷具有消肿止痛，续筋接骨；老贯筋活血化瘀；配入制大黄粉、制乳香粉、制没药粉炼为膏剂外敷，具有消肿化瘀促进骨痂形成加速骨折愈合。

【临床应用】因外伤所致各类软组织损伤，关节损伤，各类骨折均可外敷。

【注意事项】炮制红粘谷时，火候要掌握好，不要制成碳化状，配制好的秘方接骨膏装入瓶内放阴冷处。如为骨折患者，应先行整复后外敷秘方接骨膏，绷带缠好，选用适当的外固定。

秘方独角莲膏

献方人小传 赵春生，详见上方。

【方药组成】鲜独角莲根 150g 鲜蒲公英 150g 仙人掌 150g 鲜地丁 100g 制乳香粉 30g 制没药粉 30g 鹿角霜粉 50g 地龙粉 30g 附子粉 10g 生鸡蛋白适量。

【制用方法】先把仙人掌刺挖除后，将以上药用药缸捣成泥状，用鸡蛋白调合成稀泥膏状，敷于患处用绷带包扎，隔日更换 1 次，2~3 周基本治愈。

【功效】清热解毒，祛瘀定痛，通里温经。

【适应病症】急性骨髓炎。

【方 解】本方所治之病乃因余毒、湿热毒邪深窜入骨；或外伤瘀血化热凝滞于骨；风寒湿邪阻于脉络留于筋骨。治则清热透里祛瘀解毒，方选秘方独角莲膏外敷，鲜独角莲根捣泥外敷，解毒消肿，主治疔毒恶疮；鲜蒲公英、鲜地丁、仙人掌捣泥外敷具有清热解毒作用；制乳没活血定痛；鹿角霜、附子温经透里；生鸡蛋白调合保护皮肤。

【临床应用】患处皮温增高，软组织肿胀，持续剧痛，拒按，活动加重，X线片在起病2周内无明显异常，2周后可见骨皮质有虫蛀样破坏，并有骨膜增生。

【注意事项】先将仙人掌刺连基底部挖除后制用，外敷后将剩余秘方独角莲膏装入瓶内放阴冷处。

祛瘀通络膏

献方人小传 赵春生，详见上方。

【方药组成】柴胡 30g 瓜蒌 20g 当归 20g 红花 10g 甘草 10g 炮穿山甲 10g 酒浸大黄 50g 酒浸桃仁 20g 鸡血藤 30g 骨碎 30g 五加皮 20g

【制用方法】将上药共为细末，以酒、蜂蜜调和成膏状涂敷患处，敷料包扎，每2日更换1次，4~6周基本治愈。

【功效】祛瘀通络。

【适应病症】肋软骨炎。

【方 解】本方所治之病乃因气虚血瘀，寒湿侵袭或跌仆闪挫，致使瘀血停着不通，不通则痛，痛处不移则渐成瘀块。方选活血膏外敷，活血祛瘀，通络健骨。方中当归、红花、桃仁活血祛瘀，桃仁又善祛有形之瘀；酒制大黄荡涤瘀血；炮穿山甲通络健骨；柴胡疏达肝气；瓜蒌根清除瘀热；甘草缓急和中；骨碎补、

五加皮、鸡血藤补血强筋壮骨。

【临床应用】肋软骨疼痛，皮肤颜色正常，局部隆起拒按，X线片示肋软骨增粗，骨膜肥厚，但须排除其他肋软骨疾病。

【注意事项】外敷活血膏剩余装入瓶内放阴冷处。

青 黄 散

献方人小传 种清治，男，41岁，陕西省高陵县人。现任陕西中医学院骨伤教研室副主任医师（通讯地址：陕西省咸阳市陕西中医学院骨伤教研室，邮编712083）。16岁侍学从医，先后在二军大进修3年。学业成就后曾在青海、甘肃从事骨伤科，先后任55师机关卫生所门诊部主任、84801部队医院外科主任，于1980年在陕西中医学院任教，1987年参加天津医院举办全国高级骨科医生进修班，任党部支书记、班长等职，1992年陕西中医学院骨伤教研室副主任医师。临床对骨伤有独到之处，对治疗软组织伤病有专长。先后参加全国各种学术交流会发表各种论文20多篇，出版中医《骨伤手册》一书，“种清治手法……膝顶按摩治疗腰腿痛疗效及探讨”课题，通过专家鉴定。

【方药组成】青黛25g 大黄30g 黄柏25g 黄芩18g 栀子20g

【制用方法】上药共研细末，将醋微加热，调药为糊状，贴于患处。

【功效】活血化瘀，消肿止痛。

【适应痛症】各类退行性关节病及软组织损伤，颈椎病。

【方解】本病以热症为主要表现，瘀肿胀痛，痛较甚。本方具有活血化瘀，消肿止痛之功效。因三黄有强力渗透之力加之青黛对软组织更有渗透作用，合用后可改善局部症状，缓解疼痛

对治疗此病有较好之作用。

【临床应用】软组织损伤及退行性关节病是以热症为主要症状，瘀肿疼痛为主要表现的局限性病变，特别退变病者多有关节广泛增生、骨赘、碎片脱落，稍有活动障碍，而导致关节肿胀。服用青黛散具有活血化瘀，消肿止痛之功效，经外敷加西药后症状缓解更加明显，使患者关节得以康复，肿胀得以消退。

【注意事项】①使用 3 次以上症状即可消失，肿痛明显消退。②若局部感染，软组织红肿，应用青黄散后效果更加明显，但应用时可用蛋清调糊外用。③软组织病变使用中，不应用任何内服中药及西药。

【疗效】软组织损伤，治愈率 98.7%。骨赘治愈率 78.2%。

药罐治痛方

献方人小传 王渊微，男，60 岁，河北井陉人，邯郸市邮电局卫生所所长，中西医副主任医。（通讯地址：邯郸市中华路报社胡同东头四楼 1 单元，邮编 056001）。医学大专毕业。从医 40 余年，参加全国医学会 5 次，发表论文 7 篇。擅长中医内外科，以辨证论治，内外结合，收效甚捷。参加全国中药外治专业委员会，有论文载入《当代中药临床外治精要》一书中。

【方药组成】血竭、细辛、川芎、川乌、草乌、肉桂、当归、红花、乳没各 10g 樟脑、薄荷各 5g

【制用方法】将上方 12 味中药碾粉浸入 60% 酒精 500ml 中，1 周后去渣取酒液，装入 500ml 输液瓶中密封备用。患者取卧位或坐位，暴露患病部位，以痛点为中心，用此涂剂由里向外涂擦，超出所用的火罐周围 1cm，再以相应大小的火罐，用闪火法拔罐，置留 20 分钟取下，如果 1 次未愈，以后每日拔罐 1 次，3 次为 1 疗

程，休息 2 日再进行第 2 个疗程。

【功效】一年四季，患者全身各部位，由于各种原因引起的疼痛，只要此涂剂加火罐治疗就有效。要治愈原发病须配合其他疗法。

【适应病症】受内外邪引起全身肌肉、关节疼痛，神经痛，扭伤，叉气，肩周炎，颈椎病，胃脘痛，心绞痛，骨质增生等。

【方解】此涂剂是以温经散寒，活血化瘀为主，溶于辛温走窜之酒中，樟脑、薄荷、肉桂有透达皮肤之功效。用此疗法能使毛孔畅开，药液进入病所或通过输穴、经络达到病所，使风寒湿瘀排出皮外，达到止痛的作用。

【注意事项】拔药罐时间成人不超过 20 分钟，小儿递减。如果起罐后患部起水泡，先用棉球涂擦后再用消毒针头刺破水泡流出液体，再涂上紫药水即可。休克性疼痛勿用此疗法。

【疗效】治愈：第一次起药罐后，局部疼痛完全消失，患处功能活动恢复正常者 286 例，占 45.4%；显效：第一次起药罐后，局部疼痛明显减轻，患处功能基本恢复者 188 例，占 29.8%；好转：第一次起药罐后，局部疼痛部分减轻，患者功能活动有一定改善者 156 例，占 24.8%；无效：拔药罐前后病情无变化者。

通 脉 灵

献方人小传 马云龙，男，53 岁，北京人。先后毕业于北京医科大学医疗系，中国医学科学院与中国中医研究院首届中西医结合班。现北京中医药大学专家门诊部中西医副主任医师、民办北京儿童康复研究所所长。从医 32 年来探讨中西医结合，主攻小

儿脑瘫。《健康报》多次报导，联合国儿童基金会曾访问。“简明中医辨证论治盘”获中国发明专利。“中医综合治疗小儿脑性瘫痪”获世界传统医学优秀论文大奖金奖（美国中医药学研究院与中国文化研究会传统医学专业委员会合办），并纳入《世界传统医学大系》一书。

【方药组成】每1000ml含生药量：川乌20g 草乌20g 麻黄15g 细辛5g 洋金花5g 川芎20g 红花20g 郁金15g 自然铜60g 菖蒲20g 丁香5g 生军15g 伸筋草50g 乳香30g 没药30g 芫荽10g 猫爪草50g 三棱20g 莪术15g 川椒10g 威灵仙20g 三七10g 土鳖20g 当归20g 生黄芪20g

【制用方法】75%酒精浸泡10日，过滤去渣。涂擦患部，并加按摩。

【功效】疏经通络，活血化瘀。

【适应病症】寒凝气滞，气血亏损，跌打损伤，诸劳内伤所致各种骨关节病，肌肉损伤，小儿脑瘫，成人中风后遗症。

【方解】“气为血帅”，气行则血行，气滞则血瘀，气滞血瘀者经络痹阻，“不通则痛”，脏腑继而失调，诸病丛生。治当以益气温阳，活血化瘀，疏通经络。

【临床应用】①局部涂擦配合按摩用于各种外伤内损所致肌肉与骨关节病。②循经涂擦配合点穴用于小儿脑瘫，成人中风后遗症。

【注意事项】皮肤破损者忌用。

活血化瘀散

献方人小传 蔡和益，男，42岁；湖北省大悟县人，现任东汽中心医院正骨科主治医（通讯地址为湖北省十堰市东汽中心医院，邮编442008）。1973年中专毕业后跟当地正骨名师陈礼华学

医，并先后到武汉协和医院、安徽省干部疗养院、北京康复研究中心等地进修学习共3年多。临床主张应变而治，不囿传统，对中医骨伤科常见病师古而创新，钻研按摩，药物内外兼治。近年来数篇论文获奖，并已在《中国骨伤科杂志》、《大众中医药杂志》等刊上发表过3篇论文。

【方药组成】桃仁、生川乌、生草乌、玄胡各500g 栀子、地龙、乳香、没药各250g

【制用方法】上药研末备用，用陈醋、医用凡士林调成糊状，外敷患处，2天后再敷，痊愈为止。

【功效】活血化瘀，行气止痛。

【适应病症】全身各部位软组织损伤。

【方解】本方所治之症均为局部软组织因外来暴力猛烈撞击，重物挫压，不慎跌仆，强力扭转等引起的急性软组织损伤。治疗当以活血化瘀，行气止痛。因上药毒副作用较大，不宜口服，而直接外敷患处见效快，疗效好。方选上述活血化瘀，行气止痛药物，使瘀血祛而新血生，血行通畅而肿胀消，取之中医不通则痛，通则不痛之原理。

【临床应用】急性软组织损伤症见疼痛剧烈，局部迅速肿胀，青紫。在2~3天内瘀聚凝结，功能障碍。若不及时治疗轻者转为慢性，迁延日久；重者引起炎症或功能障碍，影响生活和工作，给予活血化瘀散外敷，一般在1周内即可痊愈。

【注意事项】使用该散外敷，对局部皮肤有刺激性，少数患者敷药后如有皮肤发痒则应停止外敷。

【疗效统计】临床已应用10多年，已统计1000例。痊愈率98.5%，皮肤过敏停敷者1.5%，其中1次20.3%，2次48.8%，3次23.3%，4次6.1%。

【典型病例】陈××，男，20岁，工人。1993年5月10日就诊。左踝因从约2米高处摔下后内翻位着地，当即可行走，2小时

后左踝肿胀，次日晨起床时左踝不能着地行走，扶来就医。查见：左外踝前下方青紫肿胀，压痛明显，叩击痛（一），左踝关节内翻时外踝前下方剧痛，踝关节外翻，屈伸功能（被动）正常。经X光片检查未见骨折。经手法复位后外敷活血化瘀散，2天后复查，肿胀明显消退，疼痛减轻，继续外敷活血化瘀散，伤后第5天就诊，肿胀消退（局部仍轻度青紫），局部压痛（一），功能正常，临床痊愈而结束治疗。

足痛熏洗方

献方人小传 王元英，女，现年33岁，武汉市人。系五年制本科毕业生，于1984年毕业于武汉市医师进修学院中医系，获学士学位。分配到武昌铁路中心医院工作，1988年调入湖北省财贸医院。从事中医临床工作迄今近10年，对中医之痹证、痛证有所研究，并在医疗临床实践中取得了明显的疗效。

【方药组成】艾叶 30g 红花 10g 川椒 6g 伸筋草 30g 川断 20g 海桐皮 30g

【制用方法】上药加陈醋 500ml，与水同煎至沸，将足悬于药汤上，外敷纱布熏，俟水温降至适度再入其内浸泡半小时。

【功效】舒筋，活血，止痛。

【适应病症】足跖筋膜炎，下肢骨折恢复期。

【方解】足跖筋膜炎多由于久立，远距离步行或因鞋跟过高导致足部疲劳，跖筋膜发炎疼痛。而内服药物功效难达四末，外治则不然。本方立意在于假药物之辛香走窜，通达经脉，渗透筋膜，直达病所，以促进血液循环，促进骨折创面的愈合，终奏舒筋活血止痛功效。

【临床应用】筋膜炎患者行走稍长即感足跖疼痛，甚至于跛行，

直接影响工作学习。而骨折患者则更是苦不堪言，以药熏洗后即肿胀消失，疼痛缓解。

【注意事项】掌握水温，谨防烫伤。

肋软骨炎膏

献方人小传 金忠棋，男，32岁，浙江省浦江县人。1988年毕业于浙江中医学院。现工作于浙江医科大学附属第二医院伤骨科，主治医师。从事伤骨科常见病治疗，对颈肩腰腿痛关节痛有自己独特治疗。

【方药组成】制乳没 10g 生炮甲片 10g 生南星 10g 生半夏 10g 生大黄 10g 生川草乌各 6g 七叶一枝花 12g 冰片 5g 延胡 10g 木香 10g

【制用方法】把上药物分别研成细粉，用密闭容器贮存。使用时用蜂蜜、凡士林、烧酒少量，调成稠膏放在密闭容器中备用，使用时把药膏取适量置于橡皮膏中央，然后贴于患处，四周用手压实不让透气。药物容易渗出，可在胶布上再贴一层胶布，3~5天换1次。

【功效】理气止痛，活血化瘀，消痰结。

【适应病症】肋软骨炎（非化脓性）。

【方解】生炮山甲软坚散结当引药；生南星、生半夏温化寒痰消痞散结；生大黄逐瘀通络；生川草乌祛风除湿，温经止痛；七叶一枝花清热解毒消肿止痛，使本组药不至于过温而刺激皮肤；延胡活血行气止痛；冰片清热止痛防腐；制乳没活血祛瘀止痛；同时防腐，善于率领群药开结行滞；木香行气止痛。

【临床应用】无明显诱因的肋软骨部肿大，隆起或无肿胀情况下的间隙性疼痛，严重时深呼吸、咳嗽或活动患侧上肢疼痛加剧，

受累肋软骨处压痛明显，无红肿，皮温正常。

【注意事项】如发现有皮疹应停用。

【疗效】经信访统计总有效率达 91%。

通 散 酊

献方人小传 陈健，男，53岁，浙江平阳县人。1960～1966年求学于浙江中医学院。现为浙江医科大学第二临床医学院中医教研室副主任，附属第二医院骨伤科主任、副教授，中华疼痛研究会软组织专业委员会理事，中华全国中医学会浙江省骨伤委员会理事等职。临床擅长骨关节软组织损伤和软组织疼痛（颈肩腰腿痛等病）的治疗和研究。主张软组织疼痛和软组织炎症的内外兼治和整体疗法。发表论文 30 篇，出版《中医骨伤针灸推拿治疗软组织损伤》、《中医学》等书。近期开展类风湿性关节炎的白介素-2 受体的研究工作。

【方药组成】生草乌 15g 生大黄 15g 生山栀 15g 川桂枝 15g 硃砂根 15g 冰片 10g 75%酒精 1000ml。

【制用方法】上药（除冰片外）共研粉，浸于 75%酒精内 2 周后滤去药渣，加入冰片 10g，加水稀释酒精浓度为 60%时即可使用。

【功效】温经通络，消肿止痛，祛风散湿。

【适应病症】伤后关节软组织肿痛，或疼痛或痠痛，关节活动不利，或陈伤劳损，风寒湿滞，颈肩腰腿痛等症。

【方解】方中生大黄、生山栀、硃砂根以散瘀消肿止痛；生川乌、川桂枝以温经通络止痛；冰片“治肢节疼痛”（《会约医德》），《医林纂要》曰：“冰片、辛香之气，固无不达……性走而不守，亦能生肌止痛”，故冰片为引经药渗透药物作用，通过药物

加使用时按揉局部，使局部血液循环得到改善，粘连分解，关节滑利，以达到祛风散寒，消肿止痛，改善功能活动的作用。

【注意事项】开放性损伤或伤口感染者不宜使用。

舒筋活血镇痛散

献方人小传 许仁建，男，57岁，福建闽侯上街人。现职于福建福鼎医院内科副主任医师兼内分泌专科，中国引进报社特约记者（通讯地址：福建福鼎城关玉池里21号，邮编：355200）。60年代初医大毕业，从事临床工作至今，热心于中西医结合的诊疗研究，善取诸家之长，广采民方。撰写的医学论文，多次参加国际、全国和省内外学术交流，有的为期刊选登，有的被编入专著译成英文，向国内外发行。其业绩1993年为中国科协科技人才中心编入《中华当代名家大辞典》。

【方药组成】乳香、没药、生川乌、生草乌、红花各15g 桃仁、归尾、白芥子各8g

【制用方法】乳香与没药要先去油后才可同上述各药共研末为散剂。

【功效】通经活络，消瘀止痛。

【适应病症】在排除了骨折、脱臼的情况下的急性关节、腰部扭伤及外伤性皮下瘀血、血肿等引起的疼痛和活动障碍。

【临床应用】本散剂集多家治伤方剂，采用“优选法”，取其精华，经20多年临床应用于上述病症近百余例次，均获奇效。

【注意事项】①药量须随病变范围的大小按比例增减。②须加适量面粉和炖热的红酒调成面团样柔软为膏，外敷患处。③外敷后须静卧12小时后取下。④对于陈旧性的伤痛，须外洗（伤）或拔火罐，还要内服有关伤药后外敷本散剂，其效亦佳。

通 滞 散

献方人小传 朱大義，男，40岁，湖北省当阳市胡场乡卫生院中医科中医师（通讯地址为湖北省当阳市胡场卫生院，邮编：444112）。于1974年毕业于宜昌地区卫校中医班。主要从事于基层临床，20年来对前列腺炎、前列腺增生、肝炎的治疗上有一定的临床经验，撰写的“化滞逐瘀汤治疗前列腺增生症”一文收载《前列腺临床荟萃》一书。

【方药组成】千金子 20g 桃仁 15g 红花 15g 土鳖虫 15g 栀子 15g 泽兰 20g 大黄 75g 乳香 15g 细辛 15g 樟脑粉 20g

【制用方法】上药分开研细末，用鸡蛋清或白醋调成糊状，敷于伤痛局部，敷药面积大于伤处，再以纱布固定，在2天之内局部肿消疼减者取掉，如1次效果不好可更换第2次即可。对于骨折的病人，每周更换1次即可，也可根据病情略加延长时间。

【功效】活血散瘀，消肿定疼。

【适应病症】跌打损伤，局部肿痛。

【方解】本方治疗因各种原因所致之气血瘀阻症，根据祖国医学理论之“痛者不通，通者不痛”的道理、内病外治之理，本方均以活血通瘀为主导，再用传统的蛋清调和诸药使其药物粘连增加其药物通毛孔密封吸收的作用。

【疗效】因用之每每显效，未用数据统计。

【注意事项】对于樟脑粉过敏患者不宜连续应用，在临床上有极少数患者用药后有轻微瘙痒症状，不必惊恐。

消 瘤 方

献方人小传 肖厚杰，男，55岁。四川梁平县云龙镇人。现为云南省开远市开业医师。（通讯地址：云南省开远市西城肖氏中西诊所。邮编 661000）。中专毕业后随父学中医；继后随军医学习西医。参加国家中西医多次考试考核，成绩优异。行医 32 载；职称医师。治疗疑难杂症颇有长处，在当地享有重誉。

【药物组成】当归 50g 川芎 50g 桃仁 50g 红花 50g 栀子 50g 大黄 50g 三七 50g 川甲 50g 水蛭 50g 雄黄 150g 雪上一支蒿 50g

【制用方法】共研筛后储瓶备用；并视病大小，药粉匀撒在铺好纱布的药棉上，（药棉厚点）包扎固定，倒粮食酒浸湿纱布药棉每日 4~5 次。一般敷药 1~2 次可收桴鼓之效。

【功效】通经活血，散瘀消肿止痛。

【适应病症】对多种瘤有效。

【方解】当归、川芎活血行血；桃仁破瘀散血；栀子、大黄清热凉血解毒散瘀；川甲通经活络；三七、水蛭活血祛瘀生新；雪上一支蒿活血止痛；雄黄（含三氧化砷）以毒攻毒。

【临床应用】除对多种瘤有效；尤对跌打损伤、外科疮毒有奇效。

【注意事项】此方有毒，不宜内服。

【典型病例】叶女，27 岁，农民。劳作不慎，跌伤右胫骨外侧长 20×15cm 之包块；二月后不断长大疼痛。刻诊：包块肿大，不红而痛。按之坚硬不移。经县人民医院确诊为软骨病，要求手术切除。慕名求治于余。外敷上料 1 剂，一月后瘤体消失。10 年后随访，欣喜迎告，顽疾未患。

软组织损伤方

献方人小传 韩永辰，男，55岁，山西大同人。出生于中医世家，自幼随其祖父学医，20岁开始在云城行医。现任山西中医学会儿科分会委员，大同市中医学会理事，大同市中医研究所主治医师（通讯地址为大同市中医研究所，邮编037004）。从医近35年，具有丰富的临床经验，尤擅长儿科，主张小儿用药清灵，药味简洁，内外合治。

【方药组成】北五加皮 30g 白芍 10g 葱须 20g

【用法】煎汤熏洗，每日2~3次。

【功效】消肿，活血止痛。

【适应症】急性软组织损伤。

【方解】方中以北五加皮为君，取其消肿活血之功，加强局部血液循环；白芍配葱须辛温通阳，活血止痛。

【临床应用】本药用中火煎半小时，熏洗以不烫伤皮肤为度，一般1天见效，2~3天痊愈。

【注意事项】本法只适用于闭合性急性软组织损伤，对合并骨折，开放性损伤禁用。

【疗效】所治有记录的37例，全部于3天内治愈。

威川舒筋止痛方

献方人小传 陈莉秋，女，39岁，北京人。现为安徽省蚌埠市铁路中心医院、友谊医院中医科主治医师（通讯地址为安徽省蚌埠市友谊医院中医科，邮编233000）。1979年毕业于安徽中医

学院中医系。曾任安徽省固镇县中医学会理事，现任蚌埠友谊医院新医科主任。主张大胆创新，祖国医学和现代新技术兼容并蓄，常博鉴各家医籍，以收集思广益之效。临证应变而治，内外合治。发表论文近 10 篇。

【方药组成】威灵仙 30g 生川草乌各 10g 乌梢蛇 10g 丹参 15g 红花 15g 元胡 15g 伸筋草 20g 杜仲 20g 乳香 15g 土鳖虫 15g 栀子 20g 川楝子 15g

【制用方法】将药共研末，用适量黄酒调之成稠糊状，再根据患部大小缝制一个小纱布袋，然后将药纳入袋中封口，袋的外层敷上一层塑料薄膜防止药液外溢沾污衣衫。将药袋敷在患部，外扎纱布固定。每日可敷 4 小时，1 日 1 次。一般急性病 2 次可见效，慢性病 4~5 次可显效，5 次 1 疗程，必要时用 2~3 疗程。

【功效】温通经络，活血化瘀理气，透骨强筋，祛风消肿止痛。

【适应病症】踝关节扭伤，足后跟骨刺，风湿性关节炎，腰颈骨质增生症。

【方解】本方所治之病乃因外伤或久病而致，瘀血凝于络脉，气血受遏，不通则痛。往往应用内服药效果慢，放此药外敷于患处，穴位收效甚佳。本方重在活血化瘀止痛，寒热攻补兼施，舒畅经络，流通气血，镇痛祛邪，既可互相监制，又可互相促进，气血兼顾以化瘀为主，理气为辅，寓行气于活血之中。足后跟骨刺乃为中老年退行性疾患，不可专事攻伐，必寓补于攻，方为得宜。威灵仙、伸筋草祛风通络，善止痹痛，且消骨刺，生川草乌祛风湿散寒止痛；元胡、乳香活血止痛生肌；丹参、红花活血化瘀，有促进血管扩张组织修复功能；土鳖虫破血逐瘀，续筋接骨，疗伤止痛；乌梢蛇透骨通络祛风治骨节疼痛；栀子消肿通络；杜仲能补肝肾而强筋骨；川楝子理气止痛；用黄酒目的在于加速血

行，使药力易于达到病所，增强祛瘀功能。

【临床应用】症见发病迅速肢体疼痛不能行走，痛有定处，挫闪所致积瘀疼痛，扭伤肿胀，腰背痹痛，步行时即感足跟疼痛，不能履地，休息后痛缓，行走时又痛，但步行久之疼痛反减轻。腰膝痛甚加牛膝；气候变化重者加秦艽；腰酸脚软加川断。

【注意事项】一般跌仆重者，先予 X 线检查后再斟酌用药。使用该方 3 次后若效果欠佳应采取其他治疗措施。若皮肤破溃、有皮疹者禁用，待皮损痊愈后再敷用。在应用过程中敷用时间过长偶可出现皮疹，停药后即愈。孕妇禁用。

【疗效】笔者应用此方，治疗患者 146 例，其中 3 次治愈 58 例占 39.7%；5~10 次治愈 67 例，占 45.9%；显效 19 例，占 13%；无效 2 例，占 1.4%。

消 瘀 液

献方人小传 程玲，女，46 岁，河北石家庄人，现为中国人民解放军第 145 中心医院理疗科主治医师（通讯地址：山东莱阳市驻军第 145 中心医院，邮编：265200）。1966 年高中毕业，入伍从事理疗工作，1983 年于济南医学高等专科学校医疗专业毕业，继续从事理疗工作至今达 26 年。有丰富的医学基础知识及临床工作经验，多次参加全国及全军理疗专业会议，撰写 20 篇临床经验论文，有的在会议上交流，有的被正式刊物发表，其中“消瘀液”被评为优秀论文。

【方药组成】红花、透骨草各 100g 或 150g

【制用方法】上药用冷水 3000ml 浸泡，铝锅煮沸后，文火煎 20 分钟，离火弃渣即可。使用方法：先将患处置于药液上方，热气熏蒸待温后用纱布沾药淋洗，不烫时浸泡患处至凉，取出擦干

皮肤。不宜浸泡处，如腰背部，可用毛巾浸药液，轻拧至不滴水，乘热敷于患处，上盖塑料布，外加热水袋或红外线照射以维持温度。每日 2~3 次。

【功效】活血化瘀，舒筋通络，消肿止痛。

【适应病症】各种跌打损伤。如扭、挫伤、骨折后肿胀瘀血疼痛，骨折愈合不良。

【方解】跌打损伤后创伤瘀血，肿胀疼痛。治疗应以活血化瘀、消肿止痛。本方之红花功于活血通经，去瘀止痛，配以透骨草之舒筋活络止痛之效，借热力熏蒸渗透肌肤，以祛瘀通络，舒筋活血，消肿止痛。

【临床应用】扭挫伤后，皮肤无破溃者 24 小时后施行。轻症 1~2 次见效。骨折后肿胀瘀血数日渐消，石膏固定者拆除后即可使用。

【注意事项】①勿烫伤。②该药为外用熏洗药，可反复地加热使用。药液浓缩，可加水适量。连续使用 1 周左右更换新药。异味变质不可再用。

【疗效】经治疗数百例效果颇佳，已将资料较全的 265 例总结于济南军区理疗专业会议交流，获优秀论文奖。

【典型病例】于×，女，20 岁，右踝扭伤 2 天。右踝及足背足趾均青紫、肿胀，疼痛不能行走。经该法治疗 2 次后，青紫消退，次日基本消肿，连续用药 3 天后行走跑跳正常。

史×，男，56 岁，左胫腓骨骨折，行内固定术后 45 天，整个左小腿肿胀。X 光拍片示骨折处无骨痂生成，经上法治疗 1 周后肿胀基本消退，12 天时拍片示有骨痂生长。

消 痛 灵

献方人小传 安性仁，男，53岁，贵州省贵定县人，现为贵阳市云岩区医院内科副主任医师（通讯地址为贵州省贵阳市云岩区医院，邮编550003）。1962年毕业于贵阳医学院医疗系，从医已30余年。能亲自采集应用中草药百余方，曾任云岩区医院副院长。先后在全国及省市等有关杂志及学术会议上发表论文10余篇，其“乌头碱类中毒所致心律失常”获区科技进步奖。

【方药组成】七叶莲 25g 五花血屯 25g 八爪金龙 15g 白龙须 10g 四块瓦 10g 黑骨藤 15g

【制用方法】取以上药物干品加粮食酒500ml浸泡1周即成。同时取其浸液适量沿其痛点或/及循径取穴进行按压，每穴1次可按压1至数分钟，每日1~2次。

【功效】通经活络，活血化瘀，消炎止痛。

【适应病症】神经性疼痛，风湿痹症，扭伤。

【方解】本方所治之病症，多因六淫致病，经络受阻，有的则兼因七情致病，气郁内结所致。“痛则不通，通则不痛”，“久痛入络”。方中重用通经活络要药五花血屯，兼以镇痛要药七叶莲，辅以驱风胜湿的其它数种药物而达通经活络，祛瘀散结，消炎止痛之功效。

【临床应用】本方可治疗各种顽固性神经血管性头痛，偏头痛，枕大神经痛，肋间神经痛及坐骨神经痛等各种神经性疼痛。虽可治疗各种痹证及扭伤。以上诸症系常见而顽固，而且前中西各家治法较多，但有的疗效欠佳，有的起效较慢，有的副作用较大，以上足令病家甚感痛苦，此方此法治疗以上诸症镇痛迅速，疗效可靠，使用方便，未发现明显副作用，颇受欢迎。

【注意事项】凡皮肤过于娇嫩者，按压之力勿过猛。对病程长者，为巩固疗效也可睡前加服此药 10~20ml。但孕妇、肝炎忌服。严重胃炎及高血压慎用。

【疗效】本人曾经治神经性头痛、风湿性关节炎及各种扭伤各 20 余例，肋间神经痛 5 例，坐骨神经痛 10 例，风湿热 5 例，共计 80 余例，总有效率达 95% 以上。

【典型病例】患者刘某，62 岁，为我院住院病人，住院号 2885。因左侧额顶头痛 2 月，近 1 周头痛发作加剧屡经治疗不愈，夜不能眠，抱头呻吟不止，左颧发红肿痛，结膜充血。到我处诊为偏头痛，当即取消痛灵适量按压左太阳穴及前额、顶部，经 3 分钟后头痛自称锐减，日 1~2 次，计 3 日而愈，追踪 2 月未发。患家称之为神方也。

透骨草擦剂

献方人小传 常庚，男，23 岁，北京市人。现为河北张家口市第二中学体育教师（通讯地址为河北张家口市清水桥南街 16 号楼 302 号，邮编 075000）。本人热爱祖国医学，业余时间随父学习中医理论，在外伤病方面应用于体育保健取得了较为满意的效果。

【方药组成】透骨草 30g 麻黄 30g

【制用方法】上药装于布袋内，加水适量，煮沸 20 分钟，剩药液 500ml 备用。

【功效】活血散瘀，消肿止痛。

【适应病症】跌打损伤。

【临床应用】扭伤，拉伤为运动后常见病症，用透骨草擦剂及时涂于患处，可使受伤局部迅速恢复，一般涂 1~2 次可使肿胀、疼痛缓解或消失。

瘀 痛 散

献方人小传 余林涛，男，40岁，陕西省淳化县人。现为宁夏回族自治区银川市第一人民医院中医骨伤科主治医师（邮编750001）。1974年开始随父学医，先后在银川市中医院、银川市卫生局西医学习中医班、中国中医研究院、总参医院、宣武医院、宁夏卫生学校、解放军第五医院、光明中医函授学院（骨伤科专业）等校学习、进修，大专学历，曾有9篇论文在全国性学术会议上获2等奖和优秀论文奖，1985年至今共发表论文和科普文章80余篇。《宁夏日报》、《中国人才报》、《光明中医之路》、《走向世界的中华医药事业》均介绍过他的医疗事迹。现兼任：全国农村医院管理协作组创伤骨科学术委员会委员，中医骨伤科杂志社通讯员，西北五省联络站负责人，银川市骨伤按摩学会理事。

【方药组成】玄胡 30g 地鳖虫 5g 三棱 15g 莪术 5g 白芷 15g 血竭 10g 黄柏 30g 五倍子 15g 黄芩 10g 大黄 15g 木香 25g 半边莲 15g 芙蓉叶 25g 当归 30g 羌活 15g 独活 15g 王不留行 15g 赤芍 10g 生南星 30。

【制用方法】先将上药用白酒浸泡1周，后焙干，研细末，主要用于外敷，按照损伤部位大小用山西产老陈醋调好后，摊于油纸或纱布上，贴于患处。24小时换药1次或2天换药1次均可。

【功效】消炎清热，活血散瘀，止痛软坚，解除粘连。

【适应病症】跌打损伤闪挫所致的局部血肿、红肿热痛、瘀斑青紫以及跌打损伤所致的骨折、骨折后筋伤久不愈合、术后关节僵硬、韧带粘连。对良性血管瘤、肿瘤、腱鞘囊肿也有较好的疗效。

【方解】方中黄柏苦寒，清热解毒，退烧；配以黄芩、大

黄以增强凉血、消肿、活血功能；玄胡、地鳖虫、血竭、五倍子更具有活血散瘀，通利关节，又能生肌敛疮促进伤口愈合功能；白芷、赤芍、制黄柏、黄芩、大黄过凉又能阻止因外伤所致的血凝；为防止因损伤而致外邪的风寒乘虚而入，故用羌活、独活以祛风散寒，解除酸胀；“气行则血行，气滞则血滞”，用木香行气止痛；当归补养气血，扶损防止因损伤所致的气血虚亏；王不留行、三棱、莪术以促进损伤后的血肿，硬块的破散，生南星以软化粘连，芙蓉叶、半边莲以退血瘀所致的软组织烧痛，促进组织恢复原状。上药合用，互济互促，再以白酒以助药性，提高活血化瘀之功，陈醋调合诸药，以达到“破血运，破结气，除癥块坚积，散瘀解毒消炎，消损伤积血”之目的。

【临床应用】本方主要用于因跌打损伤闪挫所致的软组织损伤，骨折（无论是对位良好或暂不能复位的），骨折后筋伤久不愈合，关节损伤严重、僵硬，局部粘连等临床常见各症。①若软组织挫伤严重，局部烧痛，可加莱菔子、栀子；②若损伤后造成骨折，可加三七粉、自然铜；③若损伤后，出现血肿、硬块，可加乳香、没药、红花、桃仁，促进血块、硬块破散。④若软组织损伤并关节囊肿伤，并有波动感，可加防风、泽泻，花粉以促进渗出液被吸收。⑤若因损伤造成关节僵硬、韧带粘连及手术后出现的各种后遗症，可加地龙、豆根、川乌、草乌、威灵仙软化粘连，促进组织恢复原形。

【注意事项】若有对陈醋过敏的患者，可改用白开水或少量蜂蜜调和。

【疗效】本方自应用于临床中对 1000 名患者的治疗观察，总有效率在 95.86%。对肱骨髁间粉碎性骨折，肋骨后肢骨折，胫腓骨中下段骨折，股骨粗隆间骨折，膝关节外侧韧带损伤，半月板损伤，腕部、桡侧韧带扭、挫伤，踝关节外侧韧带扭挫伤，腰部扭、挫伤的临床观察，总有效率达 100%。

祖传秘方刀口药

献方人小传 李敬中，详见外科“鞋底灰散”下。

【方药组成】 未生毛小老鼠 7 只 生石灰 30g

【制用方法】 取生石灰和未生长的小老鼠一起共捣成泥，悬于通风处阴干，研末装瓶备用。用时将药面撒在创面上包扎即可。

【功效】 凉血止血，生肌消肿止痛。

【适应病症】 用于治跌打损伤、刀伤、枪伤等创伤出血症无不神效。

【方解】 生石灰具有消毒防腐；未生毛小老鼠因气血未损，具有生肌、活血、续筋接骨的作用。二药为伍，共奏止血、活血生肌的作用，达到治愈外伤出血的目的。

透骨红花三乌汤

献方人小传 黄松泉，男，47岁，云南省昆明市人。现在昆明市虹山延寿中药店及昆明市工农药店坐堂医师，（家庭住址：昆明市光华街140号，邮编：650021）。其祖父黄延寿，晚清名医，长期在昆明市文明新街寿仙方大药房行医，出自名中医世家，专长中医外科，在临床中应用祖父的透骨红花三乌汤治疗骨伤痛证取得满意疗效。

【方药组成】 透骨草 15g 红花 15g 桃仁 15g 川乌 15g 草乌 15g 台乌 15g 乳香 10g 没药 10g 冰片 5~10g（后下）

【制用方法】 上药水煎，后下冰片，外用热敷。

【功效】 行气止痛，温经活络，活血化瘀。

【适应病症】软组织挫伤，骨关节炎，肩周炎，骨伤痛证。

【方 解】透骨草、川乌、草乌温经通络；台乌、乳香、没药、行气止痛；桃仁、红花、活血化瘀；冰片，清热止痛。以上各药合成方药，治疗活血化瘀，行气止痛，促使血液循环行，达到通则不痛的目的。

【临床应用】肩周炎，骨伤痛症，软组织挫伤。

【注意事项】本方属大辛、大热之品，有毒，故只能外用，不能口服。

创伤外用散

献方人小传 张殿明，男，54岁，河北丰润人。现为河北省矾山磷矿职工医院医疗组组长，副主任医师（通讯地址河北省涿鹿县河北省矾山磷矿，邮编075641）。1961年毕业于唐山医专。曾任河北铜矿职工医院中医科副主任，1983年调往矾山磷矿至今。对骨伤、针灸、按摩，有一定造诣，尤其是用中药治疗骨折延迟愈合、针灸治疗中风后遗症，结核性脑膜炎后遗症、按摩治疗慢性结肠炎、胃下垂、频发性劳力型心绞痛，腰椎间盘突出等及中药治疗慢性盆腔炎均有显著疗效。博采众长，不断创新，深受当地群众好评。

【方药组成】栀子 30g 大黄 30g 冰片 150g 芒硝 60g

【制用方法】上药共为细末，备用。用时将上述药末用75%酒精，或醋，或鸡蛋清调成糊状，贴敷患处，外以塑料袋覆盖，包扎固定，干后揭下。如肿胀未完全消退，还可继续敷用。

【功效】清热解毒，活血化瘀，消肿止痛。

【适应症】一切跌打损伤，扭挫伤所致的瘀血肿胀，引起的疼痛、功能障碍。

【方解】 栀子清热解毒，凉血止血活血化瘀；大黄清热解毒，消积导滞活血化瘀，止血消瘀；冰片散热止痛；芒硝泻热除积，散瘀通脉，四药组合共奏凉血止血，活血化瘀通脉止痛，功能恢复。

【临床应用】 跌打损伤所致局部软组织损伤、小血管破裂，血不循经而造成内出血。软组织损伤后，局部发生营养不良性水肿，一些代谢产物堆积使之瘀而生热，因而出现红肿热痛，功能障碍。用本方外敷以改善局部血液循环障碍，建立新的循环体系，受伤组织得及早修复，功能复原。

【注意事项】 有伤口、流血者忌用。妊娠忌用。

【疗效】 从 1963 年开始应用至今已有千余人，无不应手取效。未作临床统计。

【典型病例】 王××，女，52 岁，1993 年 10 月末因去果园买苹果，下坎时不慎被石头撞伤右小腿，当即肿胀疼痛，被人扶至门诊。右小腿胫前中下 $\frac{1}{3}$ 处有 $4 \times 6\text{cm}$ 大瘀血肿胀区，压痛明显。经拍片除外骨折后敷用创伤外用散，次日肿胀消退大半，夜能入寐，经敷用上药 2 次痊愈。

损伤止痛散

献方人小传 廖洪平，男，49 岁，中医主治医师，系四川省万源市中医院副院长（通讯地址：四川省万源市河街南路 5 号，邮编：636350）。曾任四川康复医学研究分会会员，四川医学信息学分会会员，四川医学分会会员，中国名医疑难病研究所特约研究员，《古今外治灵验单方全书》的副主编。擅长于中医内、骨科。发表和出版论著达 30 余篇，其中 2 篇，获得全国评选的 1 等和 3 等奖。“胸痛微机诊疗系统”荣获县级科研成果 1 等奖。

【方药组成】栀子仁 30g 乳香、没药各 25g 透骨消 50g 红背三七 60g 川椒 10g 白酒（适量） 食盐 15g

【制用方法】上药除白酒、食盐外，其余共研末。食盐放入白酒内溶化后，再倒入药粉内搅拌成糊状，加热敷患处，外扎纱布固定。8 小时换药 1 次。

【功效】活血化瘀，消肿止痛。

【适应病症】软组织损伤。

【方解】本方主治外伤引起局部红肿，疼痛拒按，不能伸屈，活动困难，皮色红紫，瘀血凝滞所致。故治宜活血通络，散瘀止痛。方选味苦活血通经之品，乳没外敷专治跌打损伤，瘀血作痛；栀子仁、透骨消、红背三七治以瘀积肿痛；椒、盐、酒则活血通络，散瘀止痛。诸药热敷患处，故有活血化瘀，消肿止痛之功。纱布固定，使药气不外泄，径入于里，更增强疗效。

【临床应用】常见关节韧带受伤，局部肿痛，皮色红紫，不能伸屈。骨膜劳损症见疼痛拒按，无明显红肿，活动困难，现代医学均属于软组织损伤一类。用损伤止痛散外用 2 次见效，5 次治愈。若连用 2 次，或 2 次以上者，症状未改变为无效。

【注意事项】外用药，不可内服。骨折、孕妇及患处脓肿和皮肤病者禁用。局部皮肤如有过敏者，停用该方。

【疗效】通过 10 年来病例收集，216 例的临床验证，见效及治愈 187 例，无效 29 例。

【典型病例】张××，男，45 岁，搬运工人。1980 年 5 月 12 日就诊。不慎压伤左侧小腿部，疼痛拒按，无明显红肿，活动困难，X 光片无骨折。祖国医学认为骨膜劳损，现代医学属于局部软组织损伤。用损伤止痛散热敷 2 次后见效，投上方再用 3 次，疼痛消失，活动自如，照常上班。

陈××，男，28 岁，工人。1983 年 8 月 5 日就诊。膝关节因突然扭挫过重，X 光片无骨折，局部肿痛，皮色红紫，不能伸屈，

关节韧带受伤。仍属于现代医学软组织损伤一类。用损伤止痛散热敷 2 次见效，再敷 3 次后，肿痛消失，皮色渐退，行动如常。

大 黄 饼

献方人小传 徐建生，男，44 岁，福建德化三班乡人。现为德化县中医院中医师（通讯地址为福建省德化县中医院，邮编 362500）。自学成才，参加中医自学考试取得了大专学历，行医 20 余载，重视辨证论治，内服外用兼施。

【方药组成】大黄 30g 桃仁 10g 红花 10g 乳香 10g 没药 10g 生栀子 10g 生韭菜 20g

【制用方法】上药杵粗末和地瓜粉和白酒一起调和均匀，放入锅中煎饼，待稍凉后外敷关节扭伤处，轻症 1 日敷 1 次即愈，重者每日敷 1 次，连用 3~7 天，即见效。

【功效】理气活血祛瘀，消肿止痛。

【适应病症】关节扭伤。

【方解】关节扭伤导致气血瘀滞，不通则痛，关节屈伸不利；治疗以理气活血祛瘀而起消肿止痛之功，恢复关节运动机能。方中以大黄为主药，取其清热泻火、解毒，活血祛瘀之功；辅以乳香、没药、桃仁、红花、韭菜、生栀子活血逐瘀通经，消肿止痛；更入酒能行药破结之用，促使关节扭伤迅速痊愈。

【临床应用】关节扭伤多见于活动时动作不协调或意外跌倒，尤以下肢的踝关节扭伤最为常见。症见关节周围肿胀，疼痛，皮肤青紫，关节屈伸不利，用大黄饼外敷，疗效确切。方中若没有韭菜可用朴硝 10g 代用，效同。

【注意事项】经 X 线拍片后若属于关节脱位或骨折者应采取相应治疗措施。此外大黄饼煎好之后不要立刻外敷，而应待稍凉

一下，当不会烫伤皮肤时才能外敷。

【疗效】1988年～1991年门诊68例关节扭伤者，其中男43例，女25例。踝关节扭伤49例，膝关节扭伤8例，腕关节扭伤6例，肘关节扭伤5例；年龄8～64岁，平均年龄38岁。疗效标准为：经大黄饼外敷3～5天肿消痛止，关节屈伸自如为显效；经7～10天治疗后肿消痛止，关节活动不受限制为有效；经治疗15天后症状改善轻微为无效。结果显效36例，有效24例，无效8例，总有效率为88%。说明用大黄饼外敷治疗关节扭伤效佳，值得推广应用。

【典型病例】许××，男，23岁，1990年3月6日就诊。昨晚打排球时不慎右足踝关扭伤，右踝关节肿痛，皮肤青紫，不能着地行走，经用大黄饼外敷右踝关节1日后肿痛明显减轻，能着地慢行，用3次后即痊愈。

四 香 散

献方人小传 鲁继华，男，52岁，浙江省平湖城关人。现为平湖市中医院副院长、伤骨科主治医师（通讯地址为浙江省平湖中医院伤骨专科，邮编314200）。幼年师承当地名医，后几经进修深造骨伤专业，精通正骨医术。数年来，进行骨伤科急症病的探索和研究，重视骨折3期中药治疗，对陈旧性损伤、骨折后遗症、关节功能障碍，内外合治具有独特的疗效。先后发表了“中药治疗梨状肌综合征96例疗效观察”等论文，曾录名于《当代中医骨伤人才》一书，1993年被吸收为中国人才研究会骨伤分会会员。

【方药组成】甘松、山柰、良姜、白芷等量

【制用方法】上药共研细末，密闭贮存备用。用适量加入伤湿止痛膏内调匀，贴于患处。

【功效】活血化瘀，散寒止痛。

【适应病症】跌打损伤，风寒湿痹。

【临床应用】跌打损伤；或血瘀气滞，阻塞不通，为肿为痛；或筋断骨折之瘀血肿痛；或风寒湿阻痹经络不通而作痛。当以外敷本药，疗效显著。

【注意事项】使用本方皮肤破损者忌用；连续不超过2次；不能内服。

祛伤止痛散

献方人小传 庞肿常，广东省海康人民医院中西医结合骨伤科。

【方药组成】绿豆 50g 鱼腥草 30g 生大黄 10g 泽兰 10g 生草乌 4g 冰片 2g 生栀子 15g 桃仁 10g 红花 10g

【制用方法】以上9味药，晒干分别研细末，过筛备用。按损伤部位大小取药粉适量，混匀，加蜂糖及适量面粉调成糊状，敷于患处，然后用纱布绷带包扎，每日换药1次，3天为1疗程。

【适应病症】软组织损伤。

【方解】绿豆（药性论）“能消散恶血，治水肿皮肤”，配生草乌加强局部渗透力，增强解痛，加速局部血肿消散，而绿豆又能有效地抑制生草乌辛热有毒之性；鱼腥草有清热解毒，扩张血管之效；生大黄活血，化瘀止血清热解毒；泽兰活血祛瘀消肿；冰片开窍醒神，清热止痛加强诸药渗透力，增强镇痛作用；生栀子清热凉血解毒；桃仁、红花破血祛瘀通经止痛。直接敷于患处，集中药力，直达病所。无副作用。有效地解除新鲜软组织损伤，便于推广应用。

【注意事项】局部伤口较深及缝合者、皮肤过敏、湿疹、伤部

近面目部、伤口近二阴部禁用。

【疗 效】582 例中 1~2 疗程痊愈 480 例，占 90.2%，1~3 疗程痊愈 35 例，占 9.8%。治愈率 100%。

活 血 散

献方人小传 苗丽华，女，45 岁，主治医师。在大庆市六院中医科工作（通讯地址同工作单位）擅长中医内、外、妇科。曾多次参加全国及国际学术会议，并在《中西医结合杂志》增刊发表过文章。

【方药组成】三七 50g 水蛭 10g 川军 100g 冰片 0.5g

【制用方法】将上药共研细末混匀，用时取适量药末用黄酒调敷患处。

【功 效】活血化瘀，清热止痛。

【适应病症】外用于跌打损伤、挫伤、挤压伤等所致局部软组织瘀血肿胀热痛等症。

【方 解】该方选用活血化瘀药为主药，使患处瘀散、血行、肿消、痛止。方中三七、水蛭有祛瘀血不伤新血功效，三七还有活血止血作用，加用大黄、冰片增强清热、散瘀、止痛作用。

【临床应用】对局部肿胀无明显热象者可去冰片；对局部肿胀冷痛者可去大黄、冰片，加麻黄末或白芥子末适量。

【注意事项】患处皮肤有破、溃等不宜用，血液病患者及出凝血时检验异常者慎用。

活血舒筋散

献方人小传 徐正权，男，50岁，江苏高邮人。现为高邮市人民医院骨伤科主治医师（通讯地址为江苏省高邮府前街116号北楼208室，邮编225600）。1956年跟随当地名老中医师学习3年，后入伍到部队接受西医基础理论培训3年，多次进修内、外、骨科等。1973年～1974年跟随省著名中医骨科主任医师许炬才进修骨伤科。擅长中西医结合治疗骨折、脱位与软组织损伤和疑难杂症，内服外敷，辨证施治。善于手术切开复位内固定，骨病、矫形、人工关节置换，腰突症等手术都能熟练施行，并不断创新。在国内国际骨伤科学术会议上和期刊著作上发表论文60余篇，参与《骨科正误》和《中华医道》两书的编书工作。被评为市科技优秀工作者。

【方药组成】生川乌、生草乌、生南星、生半夏、生山栀、生大黄、路路通各240g 苏木360g 赤芍、地鳖虫、蒲黄、三七各120g 生乳香、没药、血竭各90g 丁香15g 麝香1g

【制用方法】上药共研细末，过百目筛，装入瓶内备用。使用时根据损伤部位范围大小，取适量药粉，用黄酒或米醋调成糊状，然后平摊于消毒敷料上，厚约2～3mm，敷盖于患处，外加塑料薄膜覆盖，3～5天即可显效，必要时可连续换药几次，直至痊愈。

【功效】舒筋活血，消肿止痛，祛风湿。

【适应病症】跌仆损伤，筋骨疼痛，风寒湿痹。

【方解】本方以古方四生散为主方，佐以舒筋活血、消肿镇痛之品，效果很好。方用生川、草乌、生南星、生半夏祛风散寒、通络止痛；赤芍、蒲黄、生乳没活血化瘀、镇痛舒筋；生山栀、生大黄有清热泻火、凉血止血、消炎退肿、调整血流分布的

作用；路路通、苏木有改善血液循环，促进消肿止痛的效果；地鳖虫、三七、血竭有破血散瘀、消肿镇痛之功；丁香、麝香走窜、渗透力强，深入组织内，促进愈合。

【临床应用】主要用于各种外力作用于人体而引起软组织损伤，骨折和关节脱位，伤后皮下瘀血，肌肉组织挫伤或断裂，肌肉痉挛，反应性炎症，组织水肿，瘀阻筋脉，不通则痛，或急性损伤失治日久，缠绵不愈等证。

【注意事项】使用本方外敷后，个别患者在敷药过程中，可出现患处潮红、搔痒、皮疹、渗液等反应，此为药物过敏，暂停敷药后可自行消失。若药疹较重，渗液较多，可给予抗过敏治疗，或外涂去炎松——尿霜效果更佳。

【疗效】本方经 30 多年临床使用，疗效确切，有效率达 100%。

消 肿 膏

献方人小传 常立斌，男，43 岁，辽宁海城县人。现为鞍山钢铁公司鞍钢铁西医院中医结合主治医师（通讯地址辽宁省鞍山市铁西区共和 638 栋 8 号，邮编 114011）。23 岁先后在鞍山卫校、辽宁中医学院学习，1984 年相继在西安中医研究院、北京中医研究院西苑医院拜师于贾堃、方药中、王占玺、房定亚。临证主张经、验方同用，汇通互补。对男性病和不育不孕有一定建树，对内外合治也有专长。曾发表论文多篇。

【方药组成】山栀子 3250g 黄柏 3250g 白垩（俗称白土子），3250g 冰片 750g 75%酒精 2000ml 蜂蜜 1800ml

【制用方法】将山栀子、黄柏、白垩干燥压成药粉，过 80 目筛。并将冰片溶解在 75%酒精中，待溶解连同蜂蜜混合药粉内搅

拌均匀，即可应用。用时纳药膏于消毒纱布上，敷于患处，后用纱布外扎固定，两日换药 1 次。

【功效】 消肿止痛。

【适应病症】 外科各种扭、挫、跌打损伤等。

【方解】 本方用于治疗跌打损伤所致的皮肤病。肌肉青紫或红肿疼痛。因损伤后能使瘀血内留，血行不畅，滞内为患，故法当活血化瘀，消肿止痛。方中取其山栀子、白芷、酒精消肿通络，止血敛疮；取黄柏清热解毒燥湿；更加冰片芳香走窜能直达病所，又能消肿定痛。全方合用，有清热解毒，活血通络，消肿止痛之功。

【临床应用】 外伤性扭、挫、跌打损伤等，往往证见患处红肿青紫，焮热疼痛，势如针刺，活动受限。选用消肿膏外敷，则肿消疼止。尤其适用于四肢关节附近的肌肉、肌腱等部位的损伤。

【注意事项】 如患处溃烂禁用。

将军跌打散

献方人小传 卜迎利，男，41 岁，辽宁省开原市人。1977 年毕业于辽宁中医学院，现任开原市中医院骨伤科主任。

【方药组成】 大黄 100g 桃仁 50g 黄酒 500ml

【制用方法】 上 2 药研末，用黄酒浸泡 1 周待用，外涂患处，日数次。

【功效】 宣气血而止疼痛，导瘀血而消壅肿。

【适应病症】 跌打损伤，局部瘀血肿胀疼痛。

【方解】 本方所治之病乃因外伤皮肉筋骨而引起经络阻塞、气血凝滞，而致瘀血肿胀疼痛，治当以宣气导血为主，取大黄浸酒后而入太阳，增加宣通闭结之灵，与桃仁同用则祛瘀血而

生新，用其攻而不守，以通为用。

【临床应用】用于跌仆、坠堕、撞击、闪挫、扭捩、压扎、负重、刀刃、劳损而致局部瘀血、肿胀、疼痛、功能受限。急用将军跌打散外涂患处，筋痛立止，肿即消，病痊愈。有速战、速决大将之度。

【注意事项】使用该方前必须排出血管、神经损伤，如有应手术治疗。

第六章 皮肤科疾病外治方

四黄青黛散

献方人小传 李杰，详见外科“归芍桃红乳没汤”下。

【药物组成】黄连 30 克 黄柏 30g 大黄 50g 雄黄 20g 白矾 20g 青黛 30g 冰片 6g 马齿苋汁适量

【制作方法】将黄连、黄柏、大黄、雄黄、白矾、青黛分别研细，加冰片，和匀再研极细，置广口瓶中密封备用。临证时，罹患之大小，取鲜马齿苋适量捣汁，取汁调粉为糊状，箍围整个患处。每用每调（如无鲜马齿苋可用地龙粪 500g，加冷开水 2000ml 浸泡 5 分钟，搅拌澄清，用其水调药）。

【功效】清热解毒，收湿止痛。

【适应病症】蛇串疮（带状疱疹），热疮（单纯性疱疹），疔腮（流行性腮腺炎）。

【方解】四黄合用清热泻火，燥湿解毒；青黛、冰片、白矾既能解毒又止疼痛；加鲜马齿苋不但能清其热毒又有收湿止痛之功效，现临床研究又是抗病毒之要药。诸药合用而达湿燥、热清、火泻、毒解而痛止。

【临床应用】蛇串疮又名缠腰火丹、蜘蛛疮等，相当于西医的带状疱疹，此病临床疼如火燎，有时彻夜不能入睡，且患者年龄越大，症状越重。其病因多有肝郁生火，或脾失健运，蕴湿化热，

湿热搏结，感毒而致。现代医学乃病毒感染所致。临床上应用此方多年，疗效满意，箍围上药 20 分钟后疼痛渐止，3 日水泡吸收，5 日皮损结痂脱落。临床上也常用于热疮及疔腮，效果也很满意。

【注意事项】表皮已破者慎用。

【典型病例】尚子健，男，71 岁，农民，住太和县关集区赵集乡尚寨村。于 1990 年 9 月 24 日患病，在当地医院诊“带状疱疹”，给口服阿斯匹林、去痛片、吗林呱等，后用普鲁卡因局封，未见好转。后来我院诊疗。望左侧腰肋部呈带状分布绿豆大小的水泡累累如串珠，皮色暗红，触之有灼手感。急服龙胆泻肝汤加减 2 剂，外用四黄青黛散，2 日后复诊诸症减轻，疼痛已止，本方外用 5 日治愈。随访无复发。

子 黄 散

献方人小传 黄东胜，男，32 岁，河南太康县人。现任太康县血栓病院外科医师（通讯地址为太康县血栓病院，邮编 475400）。中专毕业，曾就学于河南医科大学及中医学院，擅长中医痔瘕及疮疡治疗，尤善于中药外治法，以药简而病愈，达事半功倍。发表论文 20 余篇。

【药物组成】马钱子 5g 五倍子 9g 雄黄 6g 生大黄 10g

【制作方法】将 4 味药共研细末，过 120 目筛，以食醋调成糊状，外涂于皮损处及疼痛部位，每日 2~5 次。

【功效】解毒泻火，清热利湿。

【适应病症】带状疱疹。

【方解】带状疱疹主要由于心肝火邪炽盛，脾经湿热内蕴，致使火邪湿热凝结肌肤而成。治宜解毒泻火，清利湿热。方选马钱子散结消肿、攻毒止痛；五倍子解毒消肿、收湿敛疮；雄黄解

毒燥湿；大黄清热泻火、解毒。取食醋调和，还具有渗透、解毒、收敛作用。现代药理研究证明马钱子、五倍子、雄黄、大黄有明显的抑菌及抗病毒作用，且马钱子对感觉神经末梢有麻痹作用。

【注意事项】药物随配随用。有大疱者抽吸液体后再行外用。

【疗效】应用本方经治 164 例，以患处干燥结痂，痛痒消失时间判断疗效。1~3 天内者为显效，4~7 天内为有效，7 天以上者为无效。结果显效 130 例，有效 32 例，无效 2 例，总有效率为 98.8%。

铁衣固疱散

献方人小传 宫本全，男，36 岁，辽宁丹东市人。现为丹东市振兴区第三卫生院主治医师（通讯地址：丹东市振兴区振三街 48 号，邮编：118000），中国民间中医医药研究开发协会中医新技术专业委员会会员。自 17 岁起即从师学医，1986 年毕业于辽宁中医学院函大。临床擅长运用经络切诊及以经络切诊所诊察出的阳性反应点为主的穴位注射法，所著“经络切诊及穴位注射的临床应用”一文，被载入《中国中医新技术集萃》一书。

【方药组成】铁衣 40g 青黛 20g 冰片 6g

【制作方法】①将置于空气中无油污的铁氧化后生成的铁锈除下即为铁衣，将其研细过 100 目筛，置烘箱内干热灭菌备用。②将冰片置乳钵内研细，加入青黛研匀，过 100 目筛，再与铁衣和匀即可。用时以乳香油调涂患处。③乳香油制法：将 50g 香油置于勺内，乳香 20g 捣为粗末放入香油中，置火上边加热边搅动，待乳香被炸至尚未枯时，用细金属网滤去乳香即成乳香油。将乳香弃去不用。乳香油有祛瘀定痛、收敛生肌之功，可配合各种散剂外治疮疡之证。

【功效】 清热凉血解毒，祛瘀止痛收敛。

【适应病症】 带状疱疹（串疮）。

【方解】 本方重用铁衣配青黛清热凉血解毒，冰片清热止痛，乳香祛瘀收敛，更能增加冰片止痛之功。方病相合，可谓药中肯綮。

【临床应用】 本方系民间秘方加味而成，专治带状疱疹，亦治单纯疱疹（热疮）。在面部者涂药后不必包扎，其在躯干者涂药后用双层凡士林纱布敷盖，再用干敷料敷盖后胶布固定，每日换药1~2次，敷药后很快痛止疮敛，1周左右可愈。

【注意事项】 本方无毒副作用，轻症仅用本方即可，重症需配合内治。对重症遗留神经痛者配合穴位注射效果极佳（注射方法从略）。

杏 仁 油

献方人小传 朱永海，男，49岁，河北唐山人。现为河北省地矿局第二地质大队卫生所所长（通讯地址为唐山市路北区光明西里丙区101楼10门，邮编063004）。1970年在河北医学院学习3年，毕业分配地质队到现在。发表论文3篇，1993年9月入选《当代中药外治临床精要》。1993年10月研制的实用新型“环柄式盯盯钩”已获国家专利。

【方药组成】 土法：杏仁3~5枚，锈铁1块；精制法：杏仁油100g 氧化铁2g

【制作方法】 土法：将杏仁用火烧焦后往生锈的铁器上擦出杏仁油，再将杏仁油涂于患处，隔日1次，暴露治疗。如腰、胸部为避免污染衣被可用纱布包扎。

精制法：将杏仁在锅内炒焦，用榨油机将杏仁油榨出。取100g

榨好的杏仁油加氧化铁 2g，拌匀备用。取少许（适量）涂于患处，隔日 1 次，一般 3~5 次即愈。

【功效】清热解毒，祛腐生新。

【适应病症】带状疱疹，黄水疮，对各种癣症也有一定的治疗作用。

【方解】杏仁是传统的镇咳类中草药，具有止咳平喘的作用。杏仁味苦，微寒。苦寒则降火杀菌。杏仁油有润泽皮肤，易透入组织，防止皮肤干燥脆弱，增强皮肤弹性，软化病痂，除去鳞屑；氧化铁有营养肌肤，促进患处新陈代谢更新的作用。两者合用确见奇效。

【临床应用】我们使用的杏仁油都是自己土法制作（精制法适合药厂生产），用火将杏仁烧成黑色，即能挤出油为度，烧重了油干成炭，烧轻了挤不出油，所以烧的程度以能挤出油为度。氧化铁就是生了锈的铁，如生锈的菜刀或其它锈铁片，将烧好的杏仁马上往锈铁上擦，将擦出的油再向患处涂。有病痂的要用双氧水洗净，能去掉的痂尽量去掉，不能去掉的也不要勉强，防止出血，然后再用生理盐水冲洗干净，用无菌干棉球将患处蘸干，再涂上杏仁油，隔日 1 次，一般暴露疗法好的快，怕衣物磨擦的地方可包扎。

【注意事项】因含氰氢酸，病变范围较大者，注意用量防止中毒。勿内服。

【疗效】治疗带状疱疹 30 例均为门诊病人，男 17 例，女 13 例；年龄 1~15 岁 6 例；16~30 岁 19 例；31~60 岁 5 例。部位：胸部 10 例；腰部 12 例；四肢 6 例；颈部 2 例。治疗黄水疮 20 例均为门诊病人，男 10 例，女 10 例，年龄 1~15 岁 16 例，16 岁以上 4 例；下颌及口角部 15 例，头部 3 例，四肢和躯干 2 例。经 3 次治愈的 18 例，4 次治疗的 16 例，5 次治愈的 16 例，总效率为 100%。

【典型病例】朱××，女，16岁，河北丰润县人。1991年11月10日就诊。患者因左腕部皮肤群聚皮疹和水泡，伴疼痛奇痒。曾诊断为过敏性皮炎，经用抗过敏药物治疗无效，于11月10日右腕部也发生同样皮损，诊断为带状疱疹。杏仁油外敷，隔日1次，连用3次，疱疹变干，结痂脱落而痊愈。

张××，男，6岁，河北抚宁县人。1990年4月17日就诊。下颌部等脓疱糜烂，结痂，流黄水，患者因痒搔抓，头部口角两侧均有新的感染，诊断为黄水疮。经用杏仁油涂擦2次见效，4次干燥结痂脱落而愈。

带状疱疹秘方

献方人小传 国连彦，女，51岁，河北省隆尧县人。现为河北省邢台市第三医院中医主治医师（邮编054000），中专毕业，从事中医临床34年。为《中医药研究》杂志通讯员，在省级以上杂志发表论文4篇。“七宝汤泡洗法治愈手脱皮408例疗效观察”在《当代中药外治临床精要》一书中收录。“清眩饮治眩晕”在《当代中医必效奇方秘术》一书中发表。临床治法灵活变通，师古而不泥古，有方而不执方。在中医内、外、妇、儿、皮肤及中药外治方面有较深的造诣。

【方药组成】煅龙骨 60g 煅牡蛎 60g 乳香 15g 没药 15g

【制作方法】将上药碾成细粉，香油调涂患处，2小时后疼痛减轻，2~3天后结痂止痛。

【功效】活血止痛，收敛生肌。

【适应病症】带状疱疹。

【方解】本方所治之病，乃肝胆火盛、湿热蕴结于肌肤之间，外受毒邪，气机升降失调所致。患部皮肤红晕、灼热疼痛呈

带状或串珠状疱疹，破溃或糜烂，甚或疼剧。本方取龙骨、牡蛎平肝抑火、渗湿敛疮；合乳香、没药消肿定痛，活血散瘀，去腐生新；麻油甘凉解毒、生肌为辅药，帮助皮肤吸收药物。

【临床应用】本方治疗局部斑丘疹、疱疹或大疱疹型带状疱疹较好。对仅有神经疼者效果较差，须加服龙胆泻肝汤合当归、川芎、乳香、没药清泻肝胆湿热，活血止痛。个别重症患者可服此方。

【注意事项】为防污染衣物，敷药后可用纱布或塑料薄膜包扎。药粉随落随敷，不分时候。

复方石花油

献方人小传 谭续绵，男，37岁，1980年3月毕业于湖南省邵阳地区卫生学校。现为湖南省新邵县（八号信箱）职工医院中医师。10余年来，在中西医结合、内外并治的道路上，勤于探索，勇于实践，克服了“名医不治癣，治癣就丢脸”的偏见。积累了一定的中医外科证治经验。“脱肛证治举隅”曾参加第二届全国中西医结合大肠肛门病学术研讨会会议交流，对皮肤病和肛门疾患具有独特疗效。

【药物组成】石花 20g 枯矾 15g 文合 15g 蜈蚣 2条 冰片 2g

【制作方法】石花、文合、蜈蚣先炒至黄，与枯矾、冰片共研细末，麻油调成糊状，瓶装备用。用5%的白矾水溶剂洗净患处，用鸭翅毛搽药于患处。每日2~3次，2日后5%白矾水洗净患处如上搽药。

【功效】祛湿止痒，愈疡生肌。

【适应病症】带状疱疹，钱币状湿疹及以局部糜烂、渗出为主

要症状兼见疼痛或瘙痒等皮肤疾患。

【方 解】风癣瘙痒疮口不敛，皆风湿之邪聚于皮肤所致。本方取恋深山岩石湿气而生之石花，祛湿止痒；辅以枯矾、文合、蜈蚣、冰片共奏祛风除湿，杀虫止痒，生肌愈疡之功。

【临床应用】本制剂对具以上适应证且反复发作者，用药即日症状减轻，1~2周即可痊愈，并具有消除或减轻带状疱疹的后遗神经痛和湿疹类皮肤病的复发作用。

【注意事项】搽洗用药必须用鸭翅毛。如搽药后疼痛，即为枯矾煅制欠妥。用药2天，症状不减轻，即不属本方所宜。

四份散合剂

献方人小传 苑桂英，女，43岁，系辽宁省兴城市人。现任锦州市合成纤维厂职工医院主治医师、职工医院院长职务。毕业于中国医科大学医疗系，多年临床工作积累了丰富经验。曾在各医学杂志发表过文章。擅用中西药结合于临床，受到院内外的好评（通讯地址：锦州市解放路6段6号，邮政编码121000）

【药物组成】雄黄10g 明矾10g 琥珀3g 吗啉胍100毫克

【制作方法】均研成细粉面，医用甘油33ml，蒸馏水100ml，上述药物调成稀糊状，涂抹患处，每日3次。

【适应病症】带状疱疹，卡他性口腔炎。

【功效】雄黄、明矾、琥珀解毒蕴结肌肤止疼；吗啉胍抗病毒，因为带状疱疹是滤过性病毒传染、甘油滋润皮肤，使药液在患处停留时间长，起到治疗作用。

【临床应用】我院数次应用均收到满意的疗效，一般7天左右均可痊愈。本药自用临床未发现任何不良反应。

地龙糖膏

献方人小传 金振祥，男，47岁，北京市人，现为河北省放射卫生研究所开发办公室主任、放射损伤研究室副主任（通讯地址：石家庄市机场路4号 邮编050071）。1963年入伍，1991年转业。曾任军医、主治医师、卫生所所长等职。先后拜名老中医10人为师。曾获科技成果奖、优秀论文奖等。对穴位注射疗法、穴位敷贴疗法、穴位按摩、内外合治等研究日久，有独到见解和疗效。

卢振吉，男，37岁，石家庄市人。现为河北省放射卫生研究所技师。河北医学院夜大学医疗专业毕业，从事科研工作多年。曾获国家、省科技成果奖。

【药物组成】地龙 300g 地榆 85g 大黄 75g 白糖 100g

【制作方法】活地龙（白环颈者佳）放在流水中冲泡30分钟捞出加白糖研成糊状，装瓶备用。地榆、大黄分别研成细末过筛，装瓶高压灭菌消毒备用。外用地龙糖膏：地龙液100g，地榆粉15g，大黄粉15g，掺和混匀装瓶，放在冰箱内备用。按常规消毒皮肤后，涂一层外用地龙糖膏，外层再涂鸡蛋清一层，每日2次。下次换药时，应将上次药液用温盐水除去后，再敷新药。口服地龙糖膏：地龙液250g，地榆粉60g，大黄粉40g，蜂蜜适量，掺和混匀装瓶，放在冰箱内备用。每次30g，每日3次口服，连服7日为1疗程。

【功效】清热解毒，抗菌消炎，收敛止痛，抗敏止痒。

【适应病症】带状疱疹、烧烫伤。

【方解】地龙为血肉之品，加糖后则易于液化和被机体吸收。地龙具有清热定惊，止喘通络，提高痛阈；结合地榆抗菌消

炎，止痛收敛，防溃烂之效，加速了创面愈合；辅以大黄抗病毒、抗过敏、止痒之功效，三药效力专著。

【临床应用】带状疱疹，发病初期局部先有疼痛，感觉异常，数日内出现疱疹，基底发红，呈簇状分布，可发生在任何部位，多见于成年人，老年人。多由于病毒潜伏脊髓后根神经节或脑神经感觉神经节，当机体抵抗力下降，或在某些诱因激发下，病毒大量繁殖，播散而发病。目前多采用白细胞干扰素等免疫制剂及抗病毒制剂治疗，但成本高且效果不够理想。采用地龙糖膏，内治外治并用，疗程短见效快。病程长者，可分热盛、湿盛、气滞血瘀等证型论治。

【注意事项】①地龙液最好现配现用。②在冰箱内贮存 5 天为限。

康皮十妙液

献方人小传 陈全寿，男，33 岁，系福建永定坎市医院住院部中医师。家父陈少珍，福建名老中医。承父业 17 载，侧重内、外、妇科。在《高粘血症》、《华夏优秀医论荟萃》、《临床荟萃》第 8 卷第 19 期、《浙江中医杂志》第 28 卷第 12 期、《福建中医药》第 22 卷第 6 期等国家级和省级刊物发表论文 9 篇。

【药物组成】冰片 3g 白矾 3g 硼砂 3g 雄黄 3g 炉甘石 5g 青黛 10g 生大黄 10g 山栀子 10g（打碎） 金银花 10g 生甘草 10g

【制作方法】取干净 250ml 输液瓶 1 个，加入冷开水 50ml，将冰片、白矾、硼砂、雄黄、炉甘石（研末）、青黛倒入瓶中，瓶塞盖紧，频繁振摇 10 分钟。另将大黄、栀子、银花、甘草加入宽口干净盛有 150cc 冷开水玻璃瓶中，拧紧瓶盖，剧力握摇 5 分钟，上

午与下午各 1 次。7 天后把宽口瓶药液注入上述输液瓶内，10 味药液混合，酌加摇匀即成。带状疱疹及皮肤病，以棉签蘸十妙液涂搽患区，日 3 次，10 天为 1 疗程。临床应用于阳性痈疡多效。

【功效】 解毒消肿，泻火止痛，化腐排脓，生肌敛疮。

【适应病症】 带状疱疹，急慢性湿疹，稻田皮炎，疔疮恶肿，疥癣等。

【方解】 带状疱疹（俗称：蜘蛛疮）系由病毒引起，而另列适应病症则病因各异。十妙液中内含拔毒散（雄黄、白矾），外治风湿诸疮红肿痛痒及疥癣等；四宝丹（硼砂、雄黄、冰片、甘草）、冰硼散（主药：冰片、硼砂），虽治鹅口疮、咽喉牙口肿痛，但皮肤给药显效亦著，盖取其解毒止痛，消肿防腐之功；古方金银花酒（银花、甘草、酒）专治奇痒恶毒，去酒效不衰减；青黛、大黄、栀子、炉甘石清热解毒，泻火祛瘀，收湿生肌。诸药合用，协同发挥，故外治带状疱疹等皮肤病，效佳面广。

【注意事项】 本品外搽，不作内服，无毒副反应，但孕妇慎用，禁辛辣及刺激性食物。

【疗效】 本组 80 例带状疱疹经上法治疗，一般在第 1 疗程即可见效，坚持 2 疗程者每愈。其中痊愈 72 例（90%），无效 8 例（10%）。其它皮肤病疗程疗效类似，唯疥癣疗程宜加。

【典型病例】 卢××，男，28 岁。1983 年 6 月 17 日突发左侧腰腹横带状红斑，继而出现多数成群的绿豆大小水疱，局部疼痛灼热，全身不适。诊为：带状疱疹。十妙液涂搽 18 天痊愈。

青 柿 浆

献方人小传 黄桂兴，男，1954 年出生于浙江省嵊县。中医大专学历，现为浙江省绍兴市人民医院主治中医师（邮编

312000)。1978年~1990年间任教于浙江省绍兴卫生学校中医教研组，尔后调至医院从事临床工作。具有扎实的中医基础知识和丰富的临床经验。临证擅长中医药及针灸治病，对胃肠、咽喉、小儿咳嗽、三叉神经痛及顽痹等病的治疗具有独特的疗效。发表有价值论文5篇，分别入载《中华自然疗法汇粹》、《顽固杂病证治秘要》、《疑难杂症求医指南》、《全国治病特长名医选编》等书中。

【药物组成】未成熟青柿数枚。

【制作方法】将未成熟柿子捣烂成浆外搽患部（也可将捣烂之柿浆贮冰箱中存放备用）。隔2小时搽1次，连搽3天即愈。

【功效】清热解毒，敛疮疗疹。

【适应病症】病毒性带状疱疹。

【方解】带状疱疹是由肝胆火盛或脾湿郁久，湿热内蕴，外受毒邪而发的疾病。青柿浆味苦涩，性平，捣浆外搽，具有清热解毒，敛疮疗疹之功效，治疗带状疱疹其效卓著。

【临床应用】病毒性带状疱疹。证见患部皮肤有带索状刺痛，继则皮肤发红，出现密集成簇、绿豆大小的发亮小水疱，各簇之间皮肤正常，排列成带状，严重时可有出血、坏死。用青柿浆搽患部皮肤、水疱之上，12~24小时疼痛明显减轻，1天后疱疹随之逐渐消退干涸，治愈后不会产生后遗症。

【注意事项】使用该药48小时后疼痛没有缓解、疱疹未见干涸者，可采用其它有效之法，以免延误病情。

【疗效】共治32列，除2例无效外，其余30例24小时内疼痛明显减退，3天后疱疹基本干涸，总有效率为93.7%。

疱疹灵液

献方人小传 邹凤阁，男，53岁，现任鞍钢曙光医院中西医

结合皮肤病治疗中心主任、皮肤科主任，副主任医师（通讯地址为辽宁省鞍山市立山区太平村鞍钢曙光医院皮肤科，邮编114033）。从医33年总结出一套中西医结合独特配方，研制出一些行之有效的外用药，在皮肤科难治病的治疗上有新的突破。临床主张中西医结合、针药结合、土洋结合、内外兼治。发表论文近20篇，“穴位冷针治疗荨麻疹”科研成果已通过专家鉴定，达到国内先进水平。电子皮肤针等两项实用新型发明正在办理专利，主要业绩已载入《疑难杂症求医指南》一书。

【药物组成】地龙（鲜）100g 冰片2g 雄黄2g 青黛3g
白糖适量

【制作方法】将鲜地龙洗净放少许盐，置于罐头瓶中1小时左右，待其腹中污泥吐出后，再洗净切成小段加冰片、白糖（覆盖其上一层约0.5cm厚即可），24小时后再加入生理盐水120ml，过滤除渣，将研细的雄黄、青黛粉和入混匀备用。

【功效】清热利湿，解毒止痛。

【适应病症】带状疱疹、单纯疱疹。

【方解】本方所治之病，多因情志不遂，内有蕴热，外感时毒，以至热毒互结于肺胃或脾肺二经而发病。治疗当以清热、利湿、解毒、止痛为原则，病主要在皮肤局部，当以局部强化用药为主。方中重用地龙，以发挥其清热解毒、止痛之功效；伍用冰片、雄黄、青黛增强了抗菌、止痛、止痒的作用，青黛并有抗病毒的作用；先加冰片对鲜地龙同时有防腐作用；加适量白糖对疱疹破溃后形成的溃疡有促进愈合的作用。

【临床应用】带状疱疹、单纯疱疹均为病毒所致。症见皮肤出现红斑、水疱，簇集成群，互不融合，排列成带状，沿神经分布，伴疼痛，多为单侧；或发生于口鼻周围、二阴等处的群集性小疱，无论破与未破均可外用，发疱前期涂用可消疱止痛，疱疹已破外用可解毒、止痛止痒，促进溃疡愈合，一般可缩短病程1周。

【注意事项】方中地龙宜选新鲜粗壮者为佳，如重症泛发型带状疱疹应用时配合其他综合治疗措施。

【疗效】临床观察 60 例，治愈率 97%，有效率为 100%。

外治带状疱疹方

献方人小传 江顺先，男，57 岁，河北省滦南县人。现为唐山市气功科学研究会开滦矿务局气功科学研究会副理事长兼秘书长，中国中医药学会会员，河北省中医药学会会员，唐山市中医学会、唐山市气功科学研究会会员。1993 年 6 月参加全国疑难杂症诊治学术研讨会，会上发表“中药治愈带状疱疹”的学术论文。擅长治疗痹证、不孕症、带状疱疹等疑难病症。

【药物组成】雄黄 6g 大黄 9g

【制作方法】以上 2 味药共为细末，醋调敷患处。

【功效】清热消肿止痛。

【适应病症】带状疱疹。

青黛雄黄散

献方人小传 于霖沐，男，58 岁，山东荣成崖头镇人。现为山东省烟台护士学校高级讲师、副主任医师（通讯地址护校家属宿舍 18 号，邮编 264002）。本人 1961 年毕业于黑龙江省中医学院医疗系，毕业后一直从事临床、科研及教学工作。在临床治疗擅长内科、神经内科、皮肤病及某些疑难病，从理论到治疗有创新。曾多次撰书及发表文章。

【药物组成】青黛 30g 蜈蚣 1 条 雄黄 10g

【制作方法】上药共研末，醋调糊状敷于患处，外用塑料纸盖好以免水份蒸发，再用绷带扎好。24 小时换 1 次。

【功效】清热解毒。

【适应病症】带状疱疹。

【方解】本方所治之病，因毒侵局部肌表。治当解毒为主，因毒在表层，近取之用药外敷。方中青黛清热解毒为君，蜈蚣、雄黄辛温解毒为佐，醋散瘀解毒，穿透力强，可引诸药直捣病灶为使。

【临床应用】带状疱疹常因肝火妄动所致。症见单侧、带状、沿神经系统方向分布，并有针刺样或烧灼样疼痛及炎性小水疱为特点。现代医学认为系因水痘——带状疱疹病毒所引起的带状疱疹。应予青黛雄黄散外敷。一般 1 天见效。

【注意事项】用药前用针将水疱刺破，再用火罐拔后外敷此药效果非凡。

苦矾洗涤剂

献方人小传 王中立，男，56 岁，四川省奉节县永安镇人。现任奉节县计划生育技术指导站门诊部（邮编 634600）中医内科主治医师。历任指导站医师和主治医师，中华医学会奉节县分会会员。出身中医世家，从医 35 年。长期致力于中医内、外、妇、儿科的临床诊治和研究工作，特别擅长用中药苦矾洗涤剂、拔核丹治疗妇科病（阴道滴虫、霉菌），各种真菌癣，淋巴结核等有特效。

【方药组成】苦参 50g 明矾 30g 花椒 10g

【制用方法】上药碾碎水煎外洗（每次加温水 250ml）。煎 20 分钟，连煎 3 次一齐混合，1 日洗泡 2 次，每次 5～10 分钟，早晚

各1次。

【功效】解毒、燥湿、清热、收敛、止血、止痒及各种细菌、毒菌、原虫的杀虫作用。

【适应病症】皮肤湿疹、毒菌腿癣、头癣、手癣、皮肤结核、麻风、疥疮、牛皮癣、阴道滴虫、外阴白斑。

【方解】苦参的药理作用，能对多种皮肤真菌，有抑制作用，故以苦参为君药；以明矾的解毒、燥湿、驱虫、止痒、收敛、止血作用为臣药；以花椒除风杀虫之力，而达到对皮肤解毒，及各种细菌、病毒、原虫的抑制杀灭作用，故以为佐使药。

【临床应用】苦参含苦参素、金雀花碱，对多种皮肤真菌有杀虫抑制作用；白矾含硫酸钠钾能燥湿、杀虫，对阴蚀恶疮、瘰疬、癣疥有显著疗效，治外阴白斑尤为有效。李时珍曰：“取其酸涩而收也，治阴部疮疡，取其收而燥湿，治喉痹痈疽中蛊，蛇虫伤螫，取其解毒也”；花椒含挥发性精油及生姜精味油，《本草概要》：“温中止泻，燥湿杀虫”，外用治毒菌脚癣、湿疹疗效良好。

【注意事项】煎水外泡洗时，均应按方量配兑，不能随意加减（系祖传四代秘良方也），忌滴入眼内，忌内服。

【疗效】总有效率100%，治愈率99%，好转及再复发的1%。

扫银洗浴剂

献方人小传 刘文江，男，30岁，山东省邹平县人。现为淄博市焦化煤气公司副主任医师（淄博市焦化煤气公司门诊部地址：淄博市张店区人民东路18号，邮编：225500）。18岁从事医学皮肤科工作，毕业于潍坊医学院，曾在青岛市附院进修学习。在十几年工作中，治愈过数千例银屑病、皮肤瘙痒症患者，受到当地

新闻界报道和患者好评。本人主张临证立法，施方用药，灵活多变内外合治方法，发表“银屑病外洗浴”论文 3 篇。

【方剂组成】大枫子（碎）、苦参、地肤子、蛇床子各 80g 大胡麻 80g（碎） 狼毒 75g 艾叶 80g 木槿皮 90g 苦杏仁 60g

【方 法】上药用纱布包好加水 5 公斤，泡 1 小时左右，在铁锅煎煮 30 分钟，温度在 40℃左右时，药浴患部，每日 1 次，1 次药浴 30 分钟~1 小时，一般 10 次见效。

【功 效】祛风湿润肤，杀虫解毒止痒，疏通血脉。

【适 应 症】银屑病，皮肤瘙痒症。

【方 解】本方所治之病受风、湿、寒、热之邪，内侵皮肤，本方地肤子、蛇床子祛风止痒；大枫子祛风燥湿，攻毒杀虫；狼毒杀虫破血通脉；艾叶温通经脉；苦参杀虫止痒，清热燥湿；大胡麻软坚润肤；木槿皮杀虫止痒；苦杏仁润肤软坚，渗透力强，此方经过煎煮后，其有效成份溶解于水中，通过温和药力的化学渗透作用，改善局部血液循环，有利于浸润吸收，使皮肤对外界刺激的敏感性降低，耐受性增强，免疫力提高，且方法简便，效果显著。

【临床应用】银屑病是一种角化过度 and 瘙痒明显的皮肤病。此方止痒和软化皮肤作用显著，一般轻者洗浴 5 次后瘙痒减轻，皮疹有白色落屑失去，10 次瘙痒即止，皮肤粗糙而厚者 50 次即愈。

【注意事项】口、眼、会阴部、急性炎症皮损、抓破出血者禁用。儿童减半。

【疗 效】结果：痊愈为皮损瘙痒全部或 90% 消失，有效为皮损瘙痒消失 50~90%，无效为皮损消退不足 50%，无明显改变者。在十几年临床经验和上千例病历统计，总有效率 95%，治愈率 88.13%，此方正在验证研究阶段。

【病 例】陈××，男，15 岁。患银屑病半年，开始为小的点状皮损，外罩白色鳞屑，其后逐渐融合成片，皮损增厚，近半

年来，全身皮肤融合在一起，不断有白色鳞屑脱落而下。见风瘙痒加重，出汗时全身瘙痒减轻，痒时感觉有游走感，脉浮紧，舌苔黄厚，大便秘结，小便黄。诊断：银屑病（血热型）。使用扫银洗浴剂，同时内服扫银汤加减，并每日晚上药浴 30 分钟～1 小时，30 剂后诸证减，50 剂后，全身皮损、瘙痒消失，鳞屑脱落等症状消失，脉缓、舌苔黄白，继药浴 20 剂痊愈。每年冬天坚持使用此方半月。随访 3 年未复发。

胎盘擦癣方

献方人小传 李树丛，男，37 岁，大专学历，河北省迁西县人。现为河北省唐海县医院外科医师（通讯地址为河北省唐海县医院，邮编 063200）。从 16 岁起在伯父指导下开始学习中医，18 岁跟随伯父行医。1978 年考入唐山卫校学习西医，毕业后分配到唐海县医院从事外科工作。1985 年考入北京中医学院，毕业后一直从事外科工作，经常用中西医结合的方法治疗一些疑难病症，先后发表论文 10 余篇，对内、妇、儿科也有一定研究，发明的“小儿肺炎灵”对病毒性肺炎疗效显著，且无任何毒副作用，已申报国家专利。

【方药组成】新娩出健康人胎盘 1 个 以男孩胎盘为佳

【制用方法】病人洗净患处，用力将胎盘切成数块，然后用带血胎盘趁热反复涂擦患处皮肤 15～20 遍，如 1 次未愈，隔 7～10 天再用同法治疗，一般 1～3 次痊愈。

【适应病症】牛皮癣。

【方解】现代医学认为，牛皮癣与免疫、代谢及内分泌障碍有关，而胎盘中含有多种免疫蛋白及激素，故而局部涂用对牛皮癣有治疗作用。

【临床应用】反复发作、经久不愈的牛皮癣，皮损明显，病变皮肤增厚、搔痒、脱屑。

【注意事项】所用胎盘，千万不要用水漂洗，趁热带血使用，在治疗期间，忌食鱼腥辛辣等激性食物，不能饮酒，忌房事。

【疗效】有效率 90%，治愈率 85%。

【典型病例】刘某某，男，37 岁。双下肢及腰背部多处牛皮癣 10 余年，曾先后去唐山、北京等地治疗，无效。采用本法治疗 2 次痊愈，至今 5 年无复发。

消癬灵软膏

献方人小传 吉照春，43 岁，陕西高陵人。现为西安康春皮肤病疑难病综合研究所所长（通讯地址：陕西省高陵县城东方红街生产资料公司大门东，邮编 710200）。曾在西安医科大学学习，并担任中国名医疑难病研究所特约研究员。多次在国家级及省级医疗刊物上发表论文。1982 年荣获高陵医学科成果银质奖，他研制的银屑防制口服液（治愈率 95%，能预防银屑病复发）和治疗高血压动脉硬化特效药海波特神先后被载入《求医问药实用辞典》和香港亚州出版社向国内外发行的《到中国大陆求医购药指南》、《西安百科全书》等 10 本书中，1992 年秋季该药又参加了西北地区国际技术贸易洽谈会。

【方药组成】硫磺 5g 雄黄 5g 铜绿 1g 京红粉 10g 生南星 10g 石蜡油 20g 凡士林 100g

【制用方法】上药共研极细末，再加入凡士林、石蜡油搅拌均匀。用法是每日 3 次，外涂患处。

【功效】杀虫止痒，祛腐生肌，活血润燥。

【适应病症】银屑病（牛皮癣），神经性皮炎。

【方解】银屑病是表皮细胞有丝分裂紊乱,表皮角化不全,和肿瘤发病机理非常相似。从中医观点来看,细胞分裂增殖属阳,所需物质属阴,阳盛则热,热盛生毒。方中硫磺使表皮细胞角化正常;雄黄以毒攻毒,杀虫止痒;京红粉祛腐生肌;生南星杀菌抗肿瘤抑制表皮增生,石蜡油凡士林增强药物渗透以达到治愈银屑病目的。

【临床应用】银屑病临床分为进行期、静止期、退行期,本药对三个期均可外用。如果配合银屑防治口服液疗效更佳,还可以预防银屑病复发,本药对神经性皮炎也有疗效。

【注意事项】本方对红皮症型牛皮癣禁用。

【疗效】本方治疗银屑病治愈率为80%,有效率为95%。治疗神经性皮炎治愈率65%,有效率89%。

【典型病例】李树兰,女,30岁,陕西高陵县人。患银屑病3年,用许多药疗效欠佳,经用消癣灵软膏20天治愈,观察2年未见复发。

皮 癣 灵

献方人小传 孙治安,男,31岁,中医师(通讯地址:河南安阳市中医药学校附院,邮编455000)。临证师古思新,古方新用,中西医结合,不断探索针灸及偏、单、验方在皮肤病中的临床运用,先后发表了“酒精闪火灸治疗带状疱疹85例”、“仲景皮肤病诊治初探”、“补阳还五汤治疗脱疽一得”等4篇论文。

【方药组成】川槿皮 2000g 蛇床子 1500g 苦参 750g 白藓皮 1500g 水杨酸 350g 明矾 1250g 苯甲酸 350g 黄柏 750g 百部 750g

【功效】燥湿敛汗,杀虫止痒。

【制用方法】先将川槿皮、蛇床子、苦参、白藓皮、明矾、黄柏、百部粉碎，然后加入水杨酸、苯甲酸，混合均匀，分装备用（每袋 30g）。使用时，将一袋药加入盛有 1500ml 水的盆中，煮沸 10 分钟，然后待温浸泡患处 30 分钟，每日 1 次，1 周为 1 疗程。

【适应病症】各种类型的手足癣，尤对水泡型手足癣疗效为佳。

【方解】川槿皮、蛇床子、苦参、百部、白藓皮燥湿杀虫；明矾、黄柏收涩敛汗；水杨酸、苯甲酸杀菌和松解角质，诸药合用，具有燥湿敛汗，杀虫止痒之功效，作用持久，渗透力强之特点。

【临床运用】以自觉瘙痒，局部鳞屑迭起，或潮湿糜烂，或深在性水疱此起彼伏等皮损表现为使用要点。

【典型病例】魏××，女，28 岁，1991 年 5 月 27 日首诊。自述患足癣 5 年，每至春末夏初复发，瘙痒难忍，甚则搔破感染，影响工作。诊见左足 3、4 趾间表皮剥蚀，基底潮红湿润，掌跖部前 1/3 部分布有半透明的深在性水疱及水疱破裂后出现的蜂窝状损害，右足第 4 趾间布有浸渍发白的鳞屑。诊断为混合感染型足癣。用皮癣灵浸泡 2 周而愈。

顽癣秘方

献方人小传 万福利，男，56 岁。1962 年毕业于河北中医学院。现为河北省沧州化肥厂医院（邮编 061000）中医副主任医师。1982 年与他人合作编写《新编子午流注针法》一书。多篇文章在省级以上杂志刊登，并多次参加全国各类中医学术交流会议。临床擅长治疗中医内、妇、儿等科疑难病症。

【方药】生半夏、白芨、白蔹、斑茅（去足翅）各等分

【功能】清热消肿，破血去瘀，生肌杀虫。

【主治】各种顽癣，牛皮癣，体癣，手足癣。

【方解】癣是一种常见外科疾病。尤其牛皮癣更为难治。其发病原因与自身免疫、内分泌障碍、新陈代谢、感染有密切关系。方中生半夏有散结消肿之功；斑蝥有攻毒祛瘀破血之功，但皮肤有刺激作用，也能促进肌肉再生作用；白蔹与白芨具有清热解毒，补肺生肌止痛的作用，对皮肤表面的各种杆菌和葡萄球菌有杀灭作用。因方药组合严谨，收效甚佳。治疗牛皮癣 10 例，其它顽癣 10 例，均收到满意疗效。

【制用方法】上药共为细末，贮瓶备用。先将患处用肥皂水洗净（溃者不宜用），再用凉开水洗一次擦干，取 75% 酒精棉球涂一次，用贮备药末和陈醋调好，初次稀薄涂在患处表面（每次涂 1~2 次），日 2 次，连用 1~2 天，而后渐增加药量（厚浓度以不灼痛或剧痛为佳）。一般用 2~3 天后皮肤出现红肿、起泡、溃烂、流黄水（停止用药），待结痂后，患处不再瘙痒无红色丘疹，即为痊愈。如有红色丘疹或瘙痒者，为不彻底，再继续涂药，直至根除为止。轻者 2~3 日即止痒，重者，每日涂 3~4 次，不出月余，即可痊愈告终。

【注意事项】使用本方一定要涂药由少、薄、稀到渐次加量，不然反应剧烈灼痛。1974 年在南皮县后罗寨材村，赵××，患牛皮癣十几年，开本方外用，嘱其一定要按上述使用方法涂药。但患者恨病用药，一开始涂之量大，结果剧疼难忍，起泡、流黄水，两昼夜痛哭不眠，但 10 天后结痂而愈。本方只适用于四肢、胸背部。忌用面部、阴部、肛门周围。

消 癣 灵

献方人小传 刘国军，男，31 岁，河南方城人。现为河南省

南阳中医药学校附院中医外科肛肠科医师（通讯地址为南阳市卧龙路131号，邮编473061）。大专毕业，擅长中药外治。对结肠炎等病有独特疗法，在省地及国家级学术会议上交流论文数篇。

【方药组成】黑附子 50g 黑黄柏 50g 补骨脂 50g 代赭石 50g 陈醋 500g

【制用方法】上药各包分研混匀后，醋调外敷或外涂患处，每日1~2次，3~4天显效或痊愈。

【功效】清热燥湿，祛风散瘀，杀虫止痒。

【适应病症】各种顽癣、牛皮癣。

【方解】本方所治病损在皮肤肌腠之间，热毒风燥，毒邪稽留血分，营血瘀阻，经久难愈。法当清热燥湿，祛风散瘀，杀虫止痒，清营活血。黑附子、黑黄柏清热散瘀，加速新陈代谢，且有强烈的吸附还原能力，使皮肤细菌和真菌失活；代赭石除含有大量的铁离子外，还含有其他多种微量元素，既增加了皮肤的通透性，又补充了局部微量元素之不足；补骨脂入骨，能促进皮肤色素新生。诸药配伍，寒热辛苦并用，共奏皮肤之开合。得木化之醋，入骨透营治风，引药力入肌腠深处发挥作用，相得益彰。

【临床应用】本病外由风湿热，内合肝郁脾急所致肌肤营血亏损失养，营血失和，久患不愈，毒虫乘机侵入肌肤而成。症见初起为大小不等的红点，迅速在表面形成斑疹片状，斑疹渐高于皮肤，皮肤变硬，斑片上并覆有白色皮屑，边缘处发红色，刮去皮屑，下面有出血点，并有黄水渗出，多痒少痛，有的溃烂化脓，也有因虫入而剧痒更甚。多在冬季加剧，夏季减轻，反复发作。现代医学认为是由于皮肤细菌和真菌混合感染所引起，是目前常见的传染性皮肤病。对于局限性癣症，不必内服药，用消癣灵外敷或外涂即可痊愈；对于播散型癣症，在用消癣灵外敷或外涂的同时可配合内服药对症治疗即可痊愈。

【注意事项】使用该方外敷或外涂时，易引起大冷大热等不良

反应，症状出现应停止用药，待症状消除后再用。

外治牛皮癣秘方

献方人小传 蒋绍模，男，33岁，主治医师，副院长。现在湖南省东安县人民医院工作。从事内科工作14年，擅长消化内科和消化道内镜检查术，对中医也有一技之长——外治皮肤病。在国内医学杂志发表论文3篇，在省级以上学术会交流论文10余篇。

【方药组成】砒霜 60g 枯矾 30g 斑蝥 15g 粮白醋 1000ml

【制用方法】将前3种药浸泡于醋内，密封7天即可使用。用药棉浸湿外涂患处，每日1~2次，7天为1疗程，一般1疗程见效，2疗程无效则为无效不适再用。若复发可重复使用。

【适应症】牛皮癣。

【疗效】作者曾经治103人次，有效率为98%，治愈率73%。

【注意事项】组方药物的砒霜、斑蝥均有毒，切忌内服。若患处皮肤有溃烂也不能使用，用药时只能以药棉涂擦，不要直接用手涂擦。

芦花酒

献方人小传 高田仓，男，42岁，山西省昔阳县界都乡里安阳沟村人。现为界都乡卫生院院长（通讯地址为山西省昔阳县界都乡卫生院，邮编045313）。16岁学医，并在省、地、市级医院多次进修学习，相继在界都乡卫生院任外科医师。临床对皮肤病

师古而创新。发表论文多篇，1993 年参加了第三届全国中西医结合中青年皮肤性病学术交流会。

【方药组成】土槿皮 30g 荆芥 3g 防风 3g 苦参 10g 白藓皮 10g 花椒 3g 槟榔 15g 蜈蚣 3 条 甘松 3g 全蝎 3 条 苍术 3g 麻黄 3g 浮萍草 3g 白芷 3g 苍耳子 5g 蜜蜂 3 只 斑蝥 3 只 蛇蜕 3g 瓦松 3g 蛇床子 3g 鹤虱 3g 蝉蜕 3g 百部 3g 土蜂房 5g 白酒 1500ml

【制用方法】上药共研粗末，用白酒浸泡 1 个月，去渣取酒备用。外搽 1 日 2 次，10 天即可见效。

【功效】散风活血，杀虫止痒。

【适应病症】牛皮癣。

【方解】本方所治之病乃因湿蕴阻肌肤而致营血不足，又因血虚受风，邪阻肌肤，肤所失养，湿蕴化热，气血阻滞肌肤。初起皮肤发红、痒，久而皮肤增厚如牛皮，脱屑。用此酒治疗使邪外出，兼清内热，祛瘀止痒，软坚生新，再借酒之渗透之力，使药直达病位，促进局部病灶痊愈。

【临床应用】牛皮癣，皮肤燥裂，厚皮坚硬者，此酒外用 10 天，能脱死皮而后渐愈。

【疗效】近年来笔者治疗牛皮癣 126 例取得了较好的疗效。10 天为 1 疗程，一般 3~5 个疗程痊愈。用药 1 个疗程见效者 63 例，2 个疗程见效者 58 例，3 个疗程见效者 5 例。一年后复发者 9 例。

【典型病例】康××，男，58 岁，农民。于 1990 年 1 月 11 日初诊。主诉：3 年前开始四肢伸侧及颈侧剧痒，无明显的皮肤损害，经搔抓后局部出现圆型或扁平丘疹，密集成群，呈淡褐色，有少量鳞屑以后成片，皮肤肥厚，皮沟加深，皮嵴隆起，经多次求医，内服外搽均无效果。局部干燥，肥厚脱屑，舌苔薄，脉濡细，为血虚风燥型。用芦花酒局部外搽，1 日 2 次。治疗 1 个疗程，大面

积肥厚的皮肤脱落，继续治疗第2个疗程，肥厚皮肤全部脱落，呈粉红色皮肤。随访3年余没有复发。

除湿止痒药粉

献方人小传 卫朝丰，见外科“烧伤紫金膏”方下。

【方药组成】 炉甘石、赤石脂、熟石膏、滑石粉、枯矾各30g
冰片5g

【制用方法】 ①将上药共研粉末，装瓶备用。此即为除湿止痒药粉，可直接扑撒患处。②将研好的药粉和入适量医用凡士林内调匀（一般为1：20）即为除湿止痒药膏，可直接涂患处或搽擦患处。

【功效】 抗渗收敛，除湿止痒。

【适应病症】 主治皮肤、手足指（趾）缝潮湿、糜烂、奇痒难忍、流水流脓者。现代医学称为湿疹、手癣、脚癣。

【方解】 本方是在三石散（炉甘石、赤石脂、熟石膏各等分见《中医方药手册》——山西省中医研究所、山西医学院编）基础上加味并改制而成。原方即有抗渗收敛，除湿止痒之功，加入枯矾、冰片功效更著，且有止痛作用，加滑石粉，可收清热除湿之效，尤宜于热毒湿邪浸淫皮肤腠理之间的病症。用凡士林调和成膏，增加了药物与皮肤的亲和力，且药性稍偏滑润，所以更适宜于渗出不明显的皮肤燥痒症。

【临床应用】 皮肤、手足指（趾）缝潮湿瘙痒，或流水流脓，多因湿热之邪滞留于皮肤腠理之间，外泄受阻所致。本方具有抗渗收敛，清热除湿止痒之功。无渗出则疮易敛，湿热除而痒自止，故可奏效。

【注意事项】 忌食辛辣、鱼腥等刺激性食物。

三白生肌散

献方人小传 卫朝丰，见外科“烧伤紫金膏”方下。

【方药组成】 乌贼骨 12g（去硬壳） 轻粉 6g 冰片 2g

【制用方法】 将上药共研粉末，装瓶备用。用时取药粉适量撒患处，也可制成药纱条填塞伤口内，外用无菌纱布覆盖，胶布固定。

【功效】 敛疮生肌。

【适应病症】 适用于疮疡流水较多，腐肉不去，新肉不长及口舌生疮。

【方解】 凡疮疡流水较多，久不收口者，多由湿邪滞留，经脉受阻。本方药性偏燥，功能除湿收敛，攻毒开窍，疏通经脉，祛腐生新。所以用于各种疮疡脓尽而新肉不长的病证效果满意。

【临床应用】 本方若再加入硼砂 12g（研面）名四白生肌散，除与三白生肌散有相似的功效外，并用治口舌生疮有良效。

【注意事项】 本方各药的加工一定要精细，除清除杂质外，一定要研得很细很细。古今医书多用“研极细末”表明作工要求，我则觉仍不尽妥，故常喜欢以“研粉末”或“研面”表明之。再者本方宜在脓净之后开始应用，以防残余脓腔形成。

清湿杀虫方

献方人小传 黄书球，男，59岁，广西玉林市人。1956年3月参军务医于海南军区187医院，广州军区军医学校毕业，广西

中医学院西学中 1 年，上海二军大进修胃镜、消化系 1 年半，总后勤部活血化瘀学习班 3 个月。1980 年晋升主治医师、内科副主任，立过功，受过奖。1984 年转业玉林市医院（邮编 537000）内科主治医师，医务科副科长，专长胃镜检查，消化性溃疡、急慢性肝炎等常见病、疑难病的中西医结合的治疗。刊登国家级论文 3 篇、省级 5 篇，为玉林市 3、4 届政协委员。

【方药组成】苦参 50g 蛇床子 50g 蒲公英 50g 白鲜皮 50g 防风 50g

【制用方法】上药每日 1 剂，水煎分首煎及复煎 2 次浸泡，趁热浸泡效果好，温度以能忍耐为宜，每次浸泡 15~20 分钟，7 天为 1 个疗程。

【功效】清热利湿，杀虫解毒。

【适应病症】手癣，足癣，急性湿疹，慢性湿疹。

【方解】对多种表皮癣菌起广谱抑制作用，改善血运及组织营养状态，促进慢性炎症吸收，皮损消失。

【临床应用】真菌菌属种类繁多，临床对症用各种癣水、癣药膏治疗手癣往往效果不好，数月或数年不愈，本方对多种表皮癣菌起到广谱抑制作用，故效果显著。

【注意事项】使用本方不宜把煎剂放冷后浸泡，治疗期间避免吃鱼、虾腥味。

疥疮六味灵

献方人小传 兰才生，男，30 岁，江西大余县人。现为广东省电白县中医院中医师（通讯地址为广东省电白县中医院，邮编 525400）。1989 年于江西中医学院五年制中医专业本科毕业。毕业后一直从事临床一线工作，平素喜结良友，收集验方。临证不局

限于辨病而侧重于辨证施治，内外兼治。急危重症主张中西结合，取长补短。发表省级及参加全国性学术交流论文 4 篇。

【方药组成】樟脑 10g 玄明粉 10g 冰片 10g 硫黄 6g 苦参 6g 蛇床子 10g

【制用方法】①上药共研细末，用棉布包扎好，放入瓷碗中，碗中加木油少许，将瓷碗放入盛有清水锅中炖沸即可备用。②用新鲜苦楝树皮 1 公斤左右，加水 1 桶倒入锅中煮沸取水，待水温适当时用之洗澡，洗完澡后用上药包蘸木油涂擦患处即可，隔日 1 次，按上述方法连用 3 次，一般患处即能结痂而愈。

【适应病症】各种疥疮。

【方解】本方所治之病乃因感染疥虫或风湿热郁于肌肤蕴毒而成。治疗当以祛风清热，燥湿解毒，杀虫止痒。病在肌肤，给药途径以外用为佳。方选芳香辛散解毒之品，借冰片渗透之力，使药力直达病所。此斩关夺门之势，使邪除病愈。用木油取其解毒，又能将六药有效成份涂敷全身各部位，有利于肌肤吸收，保持药效。

【临床应用】干、湿、虫、砂、脓 5 种疥疮，涂擦一次即能止痒。

【注意事项】先用新鲜苦楝树皮煎水洗澡后，乘药包温热时涂擦效果更佳，但应注意烫伤皮肤。

疥 灵 霜

献方人小传 马秋阁，女，57 岁，河北定州市人。副主任医师、副教授，现于河北医学院附属三院皮肤科工作（邮编 050051）。1964 年毕业于河北医学院医疗系，留校后分配附属三院皮肤科至今，担任临床医疗、教学、科研工作。曾脱产参加中央

卫生部举办的皮肤科师资班学习及中医班学习，在医疗工作中主张中西医结合治疗疾病，尤其对银屑病、皮炎湿疹、病毒性疾病、结缔组织疾病等，均收到良好的效果。参著《青少年违纪心理预防》一书及写论文 20 余篇，在全国及省级刊物上发表，尤其对面部疾患如青年痤疮、面部毛囊炎病等有较深的研究。

【方药组成】硫磺 300g 蛇床子、土茯苓、百部、黄柏、花椒、苦参等量 水质雪花膏 3000g

【制用方法】将上药共研细末过筛 180g，配水质雪花膏混合均匀，分装备用，每日早晚 2 次外用。

【功效】杀虫、除湿、止痒。

【适应症】疥疮。

【方解】硫磺、蛇床子、川椒、百部都具有杀虫作用，配合应用更能增强杀虫功效，辅以黄柏、土茯苓、苦参以除湿止痒。

【临床应用】经临床应用多年，治疗数千例患者，痊愈率达 100%。

【注意事项】隔离治疗，内衣、被罩、褥单等物消毒（用开水煮 15 分钟）。

【典型病例】王××，男，全身起皮疹剧烈瘙痒 10 多天，经诊断为疥疮，应用此药 7 天（即一个疗程）痊愈，再无复发。

鹅掌风验方

献方人小传 熊昌亮，男，48 岁，湖北省武汉市蔡甸区永安镇严湾村人。现在武汉市桐湖农场职工医院工作（通讯地址武汉市桐湖农场职工医院，邮编 430105）。18 岁在严湾村医务室任乡村医生，1979 年调永安卫生院工作。跟随肖秀荣老中医学医，1987 年调到桐湖农场职工医院工作。

【方药组成】百部根 50g 冰片粉 5g 鹅蹼 1 对 芝麻油 50ml

【制用方法】鹅蹼 1 对放在黑瓦上，小火慢慢焙黄碾成粉末，与冰片粉、芝麻油搅拌成糊状。百部根 50g 加水 1000ml，水煎开到 700ml，水温冷到 30 度左右。手掌溃烂面放入水中浸泡，时间 10~15 分钟，然后用棉球擦干。将配制药物涂在溃烂面上，每日 3 次。

【功效】灭菌除风止痒，润泽皮肤。

【适应病症】鹅掌风。

【药物分析】百部根能灭菌除风，冰片吸收水份，芝麻油润泽皮肤，鹅蹼药理作用待于探讨。

【注意事项】在治疗期间忌服牛肉、公鸡。

【疗效】治疗 5 例，痊愈 3 例，显效 1 例，有效 1 例。

【典型病例】患者许道坦，男，25 岁。两掌心溃烂 2 年，恶痒，有少许分泌物。曾在武汉市 3 家大医院治疗，诊断鹅掌风，疗效不好。用上方法治疗，3 天无分泌物，痒感觉减轻，5 天溃烂面缩小，15 天痊愈，到现在 10 余年未发。

湿 疹 散

献方人小传 符贤才，详见内科“腹泻贴脐方”。

【方药组成】黄柏 30g 冰片 20g 青黛粉 20g 苍术 5g 白矾 10g 石膏 10g

【制用方法】将黄柏、苍术洗净泥土及杂质，烤干后共研细粉，白矾、石膏用火烧透后研成粉末。将冰片、青黛制成粉末，把上面各药混后均匀过筛后装瓶备用。

【功效】清热、利湿、收敛、止痒、散火。

【适应症】湿疹。

【方 解】黄柏、苍术清热、利湿、止痒；冰片、青黛解毒、消肿、散郁火、凉血；白矾收敛、杀虫、清热；石膏清热。六药合用具有收敛、消炎、止痒、杀虫利湿之功，又有散火之效。急性湿疹以清热利湿为主，慢性湿疹以清热利湿祛风养血为主。

【临床应用】对于急性广泛性湿疹渗出液多者，用醋调敷患处；慢性湿疹或渗出液少者用麻油调敷患处。每日上药1次。1次用药不可过多或过厚。对传染性及外伤的湿疹也有其特效。

【注意事项】治疗期间禁用辛辣刺激食物，瘙痒时不要用热水烫洗，涂药不要过厚。

皮 炎 酊

献方人小传 常立昌，男，56岁，张家口地区卫生学校（邮编07500），中医教研室讲师，地区中医学会副理事长。

蒋淑坤，（传略）。

【方药组成】麻黄 30g 地肤子 30g 蛇床子 30g 荆芥 20g

【制用方法】以上诸药混合加入75%酒精500ml，浸泡7日后备用。每日擦洗患处2次，7日为1疗程。一般经治1个疗程后，诸症均可消失，一般用药1次后可立即止痒，无任何副作用。

【适应病症】皮炎，奇痒。

香 黄 膏

献方人小传 董文涛，男，32岁，吉林省梅河口市人。现为梅河口市个体卫生协会分会长，并兼任华夏医药研究会会员、中

国慧莲功研究总会会员（通讯地址为吉林省梅河口市山城镇文涛中医诊所，邮编 135022）。自幼侍学于外祖父、舅父，深得严教。毕业于北京光明中医药大学。现独立开诊。在临床上采用“平剂重投法”治疗各科疑难病症，疗效独特。创研的治疗肝腹水方药肝腹消及治疗癫痫的镇痫宁效尤显著。近年来，有 10 余篇论文参加全国学术研讨会，其中 5 篇已被收入专辑出版。

【方药组成】 黄连 15g 香油（芝麻油）20ml

【制用方法】 黄连研细过筛，同香油放入瓷器内调拌均匀备用。将患处脓水用消毒棉拭干，取此油膏涂患处即可，不必包扎。日 2~3 次。

【功效】 清热燥湿，抗菌消炎。

【适应病症】 湿疹，脓疱疮。

【方解】 本方所治之病乃民间习称“黄水疮”症。该病溃破流水，迁延不愈，儿童尤甚。方中以黄连一味，伍以香油，虽似平平，却效专力宏。黄连素以清热燥湿、抗菌消炎而为疮痈火毒之首选药物。现代药理研究也证实该药具有广谱抗菌消炎作用。且香油甘凉，解毒生肌，善治疮肿溃疡。二药合制，其作用远胜现代治疗该疾的诸抗生素类药物。

【临床应用】 湿疹、脓疱疮均是常见的皮肤炎症，中医认为其发病机理是风热内蕴，外感风邪，风湿热邪相搏，浸淫肌肤而成。应用香黄膏外涂，治愈迅速，且安全可靠，绝无致敏及毒副之弊。

【注意事项】 重症患者在外用本品的同时可加内服清热解毒剂。

【疗效】 凡属上述病症者，一般用药 3~7 日即愈，部分重症加服清热解毒剂而愈。

艾叶洗剂

献方人小传 孙桂荣，女，45岁，湖北省天门市石油三机厂职工医院主治医师（邮编431734）。1967年由襄阳卫校毕业分配到现单位从事外科、皮肤科工作至今。在这些年内，抢救了许多外科急危重病人。总结的“氟板搽剂治疗带状疱疹”一文，发表在1977年《中西医结合杂志》上，总结的“烫伤一号治疗烧、烫伤”一文在中华医学会首届外科厂、矿学术会议上交流。

【方药组成】艾叶100g 雄黄50g 防风75g

【制药方法】将上药共放入砂罐内，加水1500~2000ml，煎熬20分钟取下，凉至适当温度。用药水擦洗患处，擦后切勿洗澡，1剂1日洗2次，尤以午休及晚上睡觉前擦洗为佳。

【功能】解毒祛风。

【适应病症】皮肤瘙痒症，慢性湿疹，神经性皮炎。

【方解】本方所治之病是冬季常见多发病，乃因气候改变，寒冷干燥，忽冷忽热而致皮肤萎缩，皮脂腺及汗腺分泌功能减退，或因某些内部脏器的疾病所引起，当以祛风除湿解毒为上策。方中的艾叶具有清热除湿祛风作用，雄黄具有杀虫、解毒作用，防风具有发汗解表、祛风除湿的功效。

【临床应用】皮肤瘙痒症是一种较常见的只有皮肤瘙痒而无原发损害的皮肤病，有局限性和全身性两种。局限性可局限一个部位如肛门、外阴、大腿等部位。全身性可有时这处痒，有时那处痒，瘙痒常呈阵发性，于夜间比较严重可出现广泛的条状或点状抓痕、血痂、色素沉着或苔藓化，浅表淋巴结可肿大。用艾叶洗剂擦洗之，可除湿、祛风、解毒、止痒，达到治疗的目的。

【注意事项】有溃烂及水疱者慎用。如有原发疾病必须同时治

疗。

【疗效】从1990年用此方治疗34例皮肤瘙痒症，其作用优于单独使用西药抗过敏的药物及激素类软膏外用。

神效湿毒灵

献方人小传 宋魁三，男，58岁，内蒙林西人，现为承德医学院附院（邮编067000）家床科主任、副主任医师。出身于中医世家，早年曾从师于中研院刘志明、路志正教授门下，从医40余载，博览群书，德高术精，经验丰富，注重实效，很有独特精神，擅治尿毒症、冠心病、糖尿病、胆囊炎胆结石等疑难病症及太极经络按摩。发表论文甚多，其中“奇草绝药任我用习研神术济世人”被《走向世界的中华医药事业》一书收录，“养阴健脾益肾清热活瘀汤”治肾炎尿毒症一文被《中医百家新论》收录。近年来悉心潜研，攻克了胃结石病，填补了中医内科领域空白。2次获省级劳模，1992年又被评选为河北省医德医风建设先进个人，白求恩式医务工作者。

【方药组成】黄连10g 黄柏10g 青黛10g 血竭10g 儿茶10g 蛇床子20g 冰片20g 麝香1.5g

【制用方法】先将黄连、黄柏、蛇床子、儿茶、血竭共研极细末，再放入青黛同研，最后放入冰片、麝香再研匀，储瓶密封备用。用时视湿毒疮疡面积大小，取适量，以鸡蛋油调成糊状，先以生理盐水清洗患处，将能去之痂尽量去掉，再以脱脂棉擦干，将药涂上，可不必包扎，干燥后可再涂，日3、4次。无论任何湿毒疮疡，将药涂用一般5~7天即可痊愈。鸡蛋油制法：把煮熟之鲜蛋，取蛋黄，用小铁勺以中等火量煎炒，使蛋黄由浅黄变深黄→黄褐→黑色微冒烟即有蛋油熬出，每个蛋黄约可出蛋油2ml左

右。

【功效】祛湿止痒，消肿止痛，清热解毒，愈溃生肌。

【适应病症】一切湿热毒邪所致的疡疹疮毒经久不愈之疾患，如慢性湿疹、结节性痒疹、神经性皮炎破溃不愈、天疱疮、黄水疮、秃疮、湿性牛皮癣等顽疾。

【方解】黄连、黄柏均为苦寒质燥，清热燥湿之品，为广谱杀菌药，对真菌有较强的抑制作用，内服外用均可，临床用途广泛；青黛能泻肝火清肺热解热毒愈疮病湿毒，亦是一味可内外用之广谱杀菌药，其与上二味相配用，可谓相辅相成，效著力强；蛇床子辛苦温燥，既善祛湿杀虫，又善祛风。风湿除，虫被灭，痒可自止，故对湿疹疮疖疗效甚佳。其性温，尤宜于风湿邪所致者，对于郁久化热或湿热所致者，配以上三味，可谓严谨；血竭、儿茶均有祛腐生肌敛疮收湿愈溃之功。其活血消肿散瘀杀菌虫之效为世所公认；麝香具开通走串之性，又兼活血散结之功，可开经络之壅滞，消肿止痛促使伤处组织与功能复元，冰片最助麝香之功能的发挥。诸药相配，共奏清热解毒，消肿止痛止痒，祛腐生肌愈溃之功。蛋黄油其性温和有止痛痒敛疮愈溃之效，再以此调诸药，更使全药充分发挥作用。

【临床应用】湿毒诸症，多因风寒湿虫毒邪外侵肌肤，或因体虚复受外邪，导致脾肾两虚，湿毒之邪久羁不解，郁久化热影响食眠，内侵脏腑，使脏腑机能失调，免疫机能低下，故湿毒疮溃久不愈合，缠绵不愈。造成患者精神机体极大痛苦，临床遇此等疾患即投以神效湿毒灵，并详嘱用法，无不药到病除。

【注意事项】①必须详嘱用药方法；②对求治者，还应予以辨证施治考虑全面，除外治其疾有必要者亦需内调其脏腑机能，以求其本，切望同道临证时参酌。

【疗效】治疗顽固性湿疹共 58 例（其中皮肤科介绍来诊者 17 例）均治愈；结节性疮疹 12 全部治愈；神经性皮炎 14 例全

部治愈；外伤创口久不愈合者 4 例全部治愈；天疱疮 3 例（均经皮肤科确诊，2 例多次住院治疗，1 例曾在北京皮肤病研究所及石家庄专科医院治疗过）均治愈；湿性牛皮癣 5 例均治愈；头癣 5 例均治愈；其余黄水疮、葡形疹治愈不计其数，可以说，凡用此药者，均 100% 治愈。

【典型病例】患者宫武，男，28 岁，承德市被服厂维修工人。就诊日期 1993 年 7 月 12 日。因两手背及手指起疱疹，干裂流黄水结痂已近 2 年，奇痒。诊断为顽固性湿疹。曾在北京、上海、石家庄等多方求治，耗资数千无。在我院皮肤科住院几次，均无显效。因疹疮满布两手，羞于外露，虽盛夏亦带手套，交女友 2 人均因此疾而未成，十分痛苦。述因 1990 年 4 月去池塘捞水草后，初起小丘疹，奇痒，搔抓流黄水，渐发展成现症，伴食眠差，便干结数日一行，情绪烦躁。查见双手背及手指黄痂干裂皮损，少间增厚粗糙之皮肤，舌质红，苔黄腻，脉弦滑，此属风寒湿毒外侵，郁久化热，为湿毒疹。投以神效湿毒灵 1 份外用，内服防风通圣丸，1 次 1 袋，日服 3 次。1993 年 7 月 17 日 2 诊，皮疹大消，嘱继续用药。1993 年 7 月 20 日 3 诊，皮疹消尽。病人十分感激，他说：“我终于甩掉带了两年多的手套”。于 1994 年 1 月结婚，随访至今未发。

湿 疹 洗 方

献方人小传 张珠凤，女，51 岁，北京市人。现任北京市宣武中医医院老中医经验继承研究室副主任，副主任医师（通讯地址为北京市宣武区万明路 8 号，邮编 100050）。1964 年中医大专毕业，并师承全国名老中医药专家刘春圃老先生。从事中医临床工作 30 年，对多种内科疑难病症及神经、精神系统方面疾病开展

中医中药研究治疗，取得一定疗效，临床注重调整人体气机的升降、开合、顺逆转枢。并在《北京市老中医经验汇编》、《北京中医》、《中国医药学报》、《百病临床指南》发表文章多篇。

【方药组成】败酱草 50 克 苦参 15g 蛇床子 30g 川柏 10g
明矾 6g 马尾连 10g

【制用方法】上药放于清洁布袋内，加水适量，煮沸 20 分钟约剩药液 500~1000ml，即可用之熏洗患处。每日 3 次，用前需将药液煮沸。

【功效】解毒燥湿止痒。

【适应病症】外阴湿疹（肿痒热痛），外痔肿痛。

【方解】本症乃因脏腑失调或肝胆郁火，脾湿不化，湿毒蕴蓄，冲任失调，循经脉而病发外阴。本方的设立在于清热燥湿，解毒止痒，其药物多入于肝、大肠、膀胱、肾等经。尾连、败酱消痈疮散疔肿而止痛；苦参、蛇床一寒一温均为苦性，苦参尤善疗下部、止瘙痒，蛇床子功专解表杀虫燥湿止痒，治阴部湿疹、湿疣、湿疮尤佳；川柏、明矾之功效在于消疮疡、祛湿毒。合之本方力极专。病发于肌肤，外用熏洗妙在直接，免伤脾胃。

【临床应用】外阴湿疹之患者症见湿疹泛发，甚或漫及股内，搔之破溃，痛痒难忍，日久不愈，可用本方洗之。若外痔肿痛，肛门湿痒者亦可用本方，或女子带下黄浊气秽者可用其熏洗坐浴。

【注意事项】①应忌食辛辣之物。②气虚下陷子宫脱垂者不宜用之。

【疗效】本方治疗 32 例患者，均在 1 周内获效。

【典型病例】赵××，女，36 岁，干部，1990 年 8 月初诊。患者于 1 月前因家事恼怒，数日后外阴发痒，继之丘疹点点，2 周来继发成片兼有小水疮出现，搔之破溃，渐浸至腹股沟处痒痛、热灼难忍、大便燥、小便黄赤、心烦躁急。曾在×院皮肤科诊为湿疹

经治未效，随用本方熏洗之，每日3次，2天后顿觉舒适，疼痛减轻。连用1周后，渗液消失，湿疹渐退仅留瘙痒脱屑，继用1周，皮肤微痒，皮色略暗，3周后复查，症状消失，临床治愈。

颍风无疾膏

献方人小传 卢明，详见内科“淋浴消瘤汤”。

【方药组成】大黄50g 马钱子30g 乳香20g 没药20g 天花粉30g 南星30g 半夏30g 蜈蚣20条 斑蝥5g 轻粉10g 广丹50g 青黛20g 冰片15g

【制用方法】植物油500g武火煎沸，入大黄、马钱子、天花粉、南星、半夏、蜈蚣、斑蝥炸至焦黑松脆，去渣，下乳香、没药、桃树枝搅拌烊化至糊状，以滴入凉水中能成形，但质要极软。最后入轻粉、广丹、青黛、冰片拌匀摊于布、皮、纸上备用。用时贴患处。

【功效】行滞化瘀，消肿止痛，清毒泻火，祛腐生肌。

【适应症】顽癣恶疮，久不愈合的溃疡漏管及有恶变趋势者。

【方解】恶疮溃疡，病久毒深，破坏组织，阻碍气血，引起瘀积肿胀，瘀则不通，不通则痛。方中蜈蚣、斑蝥、马钱子以毒攻毒；天花粉、青黛、大黄清热泻火；乳香、没药、南星、半夏化瘀散积而止痛；广丹、轻粉、冰片祛腐生肌，促进创面愈合修复。

【临床应用】本方治疗各类顽固性体癣、赘疣、恶疮、无名肿块，不论已溃未溃皆有奇效。尤其是经久不愈的溃疡、漏瘘等有增生恶变者效果亦佳。作者曾在家父的指导下应用此膏治疗多例体表癌瘤，取得满意疗效。

【注意事项】本方应用时如有发痒起泡或溃烂组织脱落属正常现象，无须停药。

【疗效】据随访核实，资料完整的病例统计，凡经接受并坚持治疗者，有效治愈率达95%以上。

【典型病例】徐某，男，48岁。素来嗜酒好烟，少于劳作，因成湿热之体。春旺夏长湿热之际，右肩胛处生一大疔，溃烂秽浊，经久不愈。历时2年有余，溃处肉芽增生，痛苦不堪言。求治，授颖风无疾膏外贴。3日拔脓血甚多，5日拔祛腐烂根蒂，患处露一指头大小溃洞，可见胛骨。该方治疗月余始愈。

湿疹外敷方

献方人小传 杨明生，男，43岁，系山西省高平市人。现为长治市晋东南卫校皮肤科讲师。大学本科毕业，曾在西安医科大学皮肤病高级师资班和北京医科大学主治医师班学习2年。临床主张学用结合，学习前人经验，贵在师古而创新，将各地先进经验用于临床。为解除基层广大皮肤病患者的痛苦，曾利用业余时间在大行山上的晋城市和长治市创办2个皮肤专科门诊部。发表论文多篇，受到当地政府和上级领导的好评。1992年被选入天津人民出版社出版的《疑难杂证指南》一书。

【方药组成】马齿苋60g 黄柏20g 地榆15g 苦参15g 苍术15g

【制用方法】上药共加水1200ml，煎3遍混合备用，用口罩或4~8层的纱布垫于患处湿敷，每日2次，用时适当加温。每次15分钟。

【功效】收敛、消炎、止痒。

【适应病症】急性湿疹。

【方解】本方主治急性期湿疹，发生原因可能与各种因素引起的变态反应及神经功能障碍有关，好发于四肢、面、耳部，常对称和广泛发生。祖国医学认为因风湿热滞于肌肤所致。因此称为“湿疮”。马齿苋主要有清热、凉血之功效；黄柏清热燥湿；地榆苦寒凉血解毒有收敛作用；苦参清热燥湿止痒；苍术燥湿散风互相配合，效果明显。

【临床应用】湿疹临床分型较多，急性湿疹最为常见。本方对湿疹红斑、丘疹、有少量流水渗出的急性期疗效最好，湿敷 3~5 日可愈。渗出多面积大，如配合抗过敏药效果更好。用上方 3 剂不用其它药，2 周痊愈。

【注意事项】使用该方 1 周效果不显，可采取其它相应治疗措施。其它亚急性和慢性湿疹需配合有关药物治疗。

【典型病例】朱××，男，39 岁，双下肢发痒红斑、丘疹，有抓破渗出，用上方 2 剂痊愈，2 年随访未见复发。

湿疹外洗煎剂

献方人小传 连业顺，男，42 岁，山东莱城市黄山乡人。现为济南军区第 405 医院主治医师（通讯地址为山东蓬莱第 405 医院，邮编 265600）。1965 年从医，70 年入伍，先后毕业于上海第二军医大学军医系及广州第一军医大学中医系，临床对呼吸内科、妇科及皮肤病的中西医结合治疗有创新。

【方药组成】艾叶 15g 苦参 60g 明矾 50g 芒硝 60g 川椒 15g 荆芥 15g

【制用方法】上药水煎，先熏后洗患处，每天 2 次，每次 15~20 分钟，日用药 1 剂。

【功效】清热祛湿，祛风止痒。

【适应病症】肛周湿疹，急慢性湿疹，神经性皮炎，皮肤瘙痒症。

【方 解】本病多因湿热客于肌肤而成，重用苦参、明矾、芒硝燥湿泻火、收敛防腐与辛温之艾叶、川椒、荆芥合用，共奏清热祛湿，祛风止痒之功。

【临床应用】肛周湿疹，证见肛门部奇痒难忍，夜不能眠，肛门周围皮肤粗糙，肤色灰白，少许鳞屑，若不及时治疗则继续蔓延。

【注意事项】皮肤合并感染者，不宜应用。

【疗 效】3~4 剂痒减，6~7 剂则痊愈。

肤 敏 灵

献方人小传 李甫，男，71 岁，浙江省平阳县人。现为浙江省平阳县中草药外治疗法研究所（邮编 325400）所长，副主任医师，平阳县卫生工作者协会名誉会长，曾任平阳县第二人民医院院长，杭州市医学科技服务部特邀医师、中华医学会会员。1988 年选用中草药研制成功李氏一擦灵系列药品治疗骨质增生、脉管炎、闭合性骨折、骨裂、脊柱压缩性骨折、外伤性截瘫等疑难疾病有独特的疗效。尤其对骨折病员带来福音。只要用药水在骨折断端周围组织反复涂擦，即可免受内外牵引固定和长其卧床之苦。愈合快疗程短，功能恢复好，是传统疗法无可与之比拟的，是骨伤科治疗史上一大革新。由于李氏一擦灵对疑难病具有高效速效、省费等特点，深受广大群众的好评，同时也引起舆论界的关注。自 1988 年以来《浙江日报》、《温州日报》、《医药动态报》等 10 家报刊、电视台、电台先后报导了李氏一擦灵治疗疑难病有特效的信息，发表论文 6 篇。

【方药组成】桂枝 9g 麻黄 9g 白芍 10g 半夏 9g 细辛 6g 黄芩 9g 五味子 6g 甘草 6g 苦参 9g 红花 6g 干姜 5g 赤芍 9g

【制用方法】上药粉碎混和，浸泡于 70%乙醇液 1000ml 中，充分搅拌，密封瓶口，放置 15 天，过滤收集药液约 800ml，加入薄荷脑 16g（比例 2%计算）溶解后装瓶备用。

【功效】温阳祛风，活血化瘀，解肌透表。

【适应病症】荨麻疹，过敏性皮炎，瘙痒症。

【方解】本方取自小青龙汤加味清热解毒、活血化瘀之品化裁而成。主要作用：解表，驱除在表的风寒。为治喘咳、过敏性哮喘的良方。

【临床应用】移用本方外治给药，对过敏性皮肤病及原因不明的瘙痒症疗效确切。大多病例一擦即效，多次给药可愈。

青黄金胆液

献方人小传 宋小华，男，25 岁，山东枣庄人。出身中医世家，自幼喜读医书，熟读《药性赋》、《汤头歌诀》、《频湖脉学》等，平时刻苦钻研发奋学习，毕业于高等教育自学考试中医专业。后在天津针灸进修学院高级专修班进修推拿专业，擅用中药外治法，博采众方，研制一系列外用药应用临床疗效颇显。现在安徽铜陵冶金矿山实业总公司职工医院中医科（通讯地址：安徽省铜陵市冶金矿山实业总公司职工医院，邮编：244032）。为中国民间中医药研究开发协会中药外治专业委员会会员、铜陵市气功科学研究会会员。在市、省、国家级杂志上及学术会议上交流、发表论文 4 篇。

【方药组成】大黄 20g 黄连 15g 青黛 6g 五倍子 4g 枯矾

6g

【制用方法】上药共研细末，另用金银花 50g 煎汁 300ml 与猪胆汁 10ml 调成。

【功效】消炎解毒，收湿止痒。

【适应病症】丹毒，疖肿，毛囊炎，药物性皮炎，湿疹等。

【方解】本方所用大黄、黄连、青黛有清热解毒，消肿止痛之功，五倍子性味酸涩善收敛而渗湿。加青黛燥湿止痒，与金银花汁、猪胆汁调增解热毒之效。

青 连 散

献方人小传 马海，男，38 岁，山西省应县人。现任山西省朔州市小峪煤矿医院家病科主任、中医师，中国针灸学会会员（通讯地址：山西省怀仁县朔州市小峪煤矿医院，邮编 038301）。1981 年毕业于山西省中医学校，1992 年取得了成人中医自学考试专科毕业证书。临床上擅治消化系统、妇女及小儿诸疾，对外科疮疡的中医药治疗有独特的疗效。曾在国家、省级医学刊物发表论文 5 篇。本方为民间老中医所传，经多次更换药物，验之于临床 10 余年，确有显著疗效。

【方药组成】青黛 10g 黄连 10g 枯矾 6g 西瓜皮碳 15g

【制用方法】共为细末，过 120 目筛，装瓶消毒备用。用时先用 0.01% 新洁尔灭局部清洗。渗出少者，取药面少许，香油调涂；渗出多者用药面外撒约 0.5mm 厚，每日 2 次。

【功效】清热解毒，燥湿止痒。

【适应病症】黄水疮。

【方解】本病症多见于儿童，好发于颜面部位。其机理为脾胃湿热过盛，凝滞不散，复感风邪，搏结肌肤而成，故痒、痛、

流水并作，缠绵不愈。方用青黛、黄连清热解毒，枯矾、西瓜皮碳燥湿收敛止痒，同时局部外用，吸收增强，药简力专，故收效迅速。

【临床应用】黄水疮，现代医学又称脓疱疮，是由金黄色葡萄球菌、链球菌或二者混合感染所致。发病早期，应用本方，皆可痊愈，该药无毒副作用，愈后不留疤痕，可放胆使用。

【注意事项】本病皮损仅局限于口唇、鼻周或耳前后者，单用本方即可。若病程长，皮损延及四肢或全身者可合用抗菌素全身治疗。

【疗效】本方疗效确切，经治 100 余例，均在 3~5 日内痊愈。

黄水疮软膏

献方人小传 姜廷德，男，42 岁，1976 年 8 月毕业于山东省中医药学校中药专业。毕业后至今在山东省垦利县人民医院（邮编 257500）从事中药专业工作 19 年。现任药剂科副主任、主管中药师。十几年来对部分皮肤病有研究，利用中西医结合治疗取得了一定成果。发表论文 5 篇。

王建民，（传略）。

【药物组成】黄芩、黄柏、双花、苦参各 5g 野菊花 3g 犀黄丸 6g 白矾、冰片、青黛各 1g 樟丹 0.5g 呋喃西林粉 10g 红霉素软膏 2 万^u 凡士林适量

【制用方法】先把黄芩、黄柏、双花、苦参、野菊花晒干压碎过筛，犀黄丸、白矾、冰片用乳钵研细，以上药物细粉加呋喃西林、青黛、樟丹再共同过筛，使之均匀，加红霉素软膏，再加适量凡士林调成稀膏状即可。用消毒棉棒蘸取软膏涂抹患处，1 天 2

次。治疗期间停用其他药物。

【功效】清热解毒除湿。

【适应病症】黄水疮。

【疗效】40例患者全部治愈，经随访均无复发。一般用药后立即止痒，48小时后脓水起干结痂，继日痂皮脱落，仅留淡红色斑，5天后不留痕迹。

【典型病例】患者李莉，女，1周岁，周身发痒，起脓水疱4天。体温37.8℃，全身皮肤布满红斑，丘疹及脓水疱，疱壁薄而松弛，易破裂，流出黄水脓水，用软膏涂抹2次即愈。

【临床应用】黄水疮多属脾胃湿热或心火炽盛复感风热湿毒搏结于肌肤所致，治宜清热解毒除湿。黄水疮软膏就是根据这一原则配制而成的。制成膏剂局部涂抹，可直达病所，见效迅速，2~3天即可痊愈，克服了疮痒此起彼伏、缠绵难愈之弊。尚具有收敛止痒消炎之特效，不但立即解除患者的痛苦，而且不因搔抓而引黄水疮蔓延和到处传播。

苦 菜 汤

献方人小传 梁志清，男，52岁，河北省张家口市人。现为张家口医学院中医系古典医籍教研室主任、副教授（通讯地址为河北省张家口市长清路14号，邮编075029）。1964年毕业后从事中西医结合临床工作，1972年调张家口医学院从事中医教学及中西医结合临床。现任实用中西医结合杂志国际学术交流中心学术委员会委员、河北省中医学会仲景学说学术委员会委员。发表论文20余篇，临床主张中西医结合，吸取各家之长，对仲景学说，消化系疾病、皮肤病的中西医结合诊治体会较深。

【方药组成】苦巨菜（干者50g 鲜者100g） 硼砂30g 防

风 30g 蛇床子 50 克

【制用方法】先用温水将苦巨菜、防风、蛇床子 3 药浸泡 20~30 分钟，然后煮沸 15 分钟，去除药渣，取药液 2000ml，趁热将硼砂冲化，即可坐浴。先熏，待能耐受时用纱布蘸药液反复轻轻擦洗，然后坐浴，每晚睡前 1 次，每次半小时，5 次为 1 疗程，每剂药可煎取 2 次药液，坐浴 2 次，每次均需冲化 30g 硼砂。

【功效】清热解毒，活血消肿，燥湿止痒。

【适应病症】肛门湿粘，肛门湿痒，痔核脱出，妇女外阴瘙痒。

【方解】方中苦巨菜清热燥湿，活血消肿，硼砂清热解毒，消肿防腐，二药合用燥湿消肿作用颇佳。据笔者体会，一般用这两味药煎液擦洗 1~2 次就可使肛门分泌物明显减少，肿大脱出之痔核明显缩小，肛门瘙痒也会随分泌物之减少而减轻。再辅以防风、蛇床子祛风胜湿止痒，可使本方燥湿止痒之效大增。

【临床应用】本方所治之肛门湿痒乃因湿热下注阻于肛门周围皮肤，或因痔疮、肛漏、息肉等粘液分泌刺激而引起肛门湿粘及肛门湿痒。早期一般多是肛门分泌物过多，多感肛门湿粘不适，瘙痒较轻或无瘙痒感，或单纯痔核脱出肛门，出现肛门异物感。此时只用苦巨菜、硼砂两药煎汤擦洗即可痊愈。若病久痒甚，则需加入防风、蛇床子。本方对妇女滴虫性、霉菌性阴道炎引起的外阴瘙痒、白带过多也有良好的疗效。

【注意事项】方中硼砂只可用煎液趁热冲化，万不可将硼砂同它药一起煎煮，以免失效。本方对蛲虫引起之肛门瘙痒无效。因痔疮、肛漏引起者，使用本方一用就好，过几天又犯，反反复复不能根治者，则需治疗原发病。本方只可外用，不能内服。

三 黄 酊

献方人小传 乔丽华，女，42岁，辽宁人。现为中国人民解放军第220医院主治医师（通讯地址：内蒙古赤峰市解放军第220医院，邮编024006）。1975年毕业于辽宁中医学院中医医药系，至今从事皮肤科临床工作。曾在各类杂志发表文章40余篇。

【方药组成】 黄连 30g 黄芩 30g 黄柏 30g

【制用方法】 将上药用75%酒精浸1周，过滤涂患处，1日2次。

【功效】 清湿热、止痒。

【适应病症】 股癣。

【方解】 方中黄连、黄芩、黄柏清湿热、止痒，并有较强的杀菌和抑制霉菌作用，酒精配制更增功效。

【临床应用】 股癣为真菌感染所致，皮损为双股内侧皮肤片状红斑，脱少量鳞屑，皮损边界清楚，应用三黄酊外涂以清湿热，止痒，达到抑菌杀菌之功效。

【注意事项】 皮损糜烂者禁用。

脱屑洗剂

献方人小传 刘玉梅，女，54岁，江苏无锡人。现任上海同仁医院（邮编200050）皮肤科主任、副主任医师，上海市科普作家协会会员、上海女医生联宜会会员，1964年毕业于南京医学院。通过30年临床探索，采用中西医结合方法治疗牛皮癣（银屑病）、痤疮、伴发哮喘异位性皮炎、白癜风及各种皮肤病中疑难杂症，被

称为牛皮癣的克星。近 8000 例各种类型银屑病治愈率 78%，总有效率 95%。治疗牛皮癣已形成系列产品，由中药配制片、丸、冲剂、糖浆。外洗有脱屑洗剂、外用有脱屑软膏，均有特效，全国及省级专业杂志上论文 47 篇，报刊杂志科普文章 57 篇，其中优秀论文 5 篇，评论文 1 篇，曾是青海省医学科普杂志《健康向导》编委，是长宁区技术专业拔尖人才，享受国家特殊津贴。

【方药组成】黄柏 50g 黄芩 25g 苦参 25g

【制用方法】上药煮煎成溶液，浓缩为 250ml，另加防腐剂即可。

【功效】消炎、止痒、脱脂、脱屑、杀菌、抑止霉菌生长。

【适应病症】头部银屑病，毛囊炎，脂溢性皮炎，单纯头皮糠疹，头癣。

【方解】黄柏、黄芩对金黄色葡萄球菌、甲乙溶血性链球菌和各种球菌、杆菌有抗菌作用，对白色癣菌、念珠菌有抑制作用；苦参有抗大肠杆菌、杀灭滴虫、抗真菌作用。

【临床用法】将脱屑洗剂溶液 5ml 倒入备有一盆温热水中，将头部浸泡 1~3 分钟后，用洗头膏洗，然后用清水洗净。

【注意事项】按上浓度使用，千万不能自己加大强度，禁忌外擦和内服。

肤康合掌散

献方人小传 杨新营，男，33 岁，大专学历，河南省汝州市人。现为漯河肉联厂职工医院中医师（通讯地址为漯河市人民东路 100 号，邮编 462000）。全国中医医药研究学会漯河分会会员。中国民间中医药开发协会会员，临证十几年勤求古训，博采众长，做为基层医务工作者，在中医内、妇、男科和中药外治方面颇有

见长。先后在国家、省级专业杂志发表论文 5 篇，并参与《名家新秀效方》等 2 书的编写。

【方药组成】硫磺 20g 铁锈 20g 枯矾 10g 轻粉 2g 冰片 2g 葱涕 15ml

【制用方法】硫磺、铁锈、枯矾、轻粉分别研成细末，混合拌均后，以葱涕调为浆糊样，薄敷于碗内，口朝下，用艾叶燃熏至干，取下加入冰片重研成极细末，密封备用。每次取 1g 放手掌心，加 2 滴香油，合掌揉搓至不见药形可闻药味时，用双手摩擦患处，1 日 2 次。

【功效】清热解毒，燥湿杀虫止痒。

【适应病症】慢性湿疹，疥疮。

【方解】方用硫磺、轻粉、枯矾解毒燥湿杀虫；冰片、铁锈清热解毒；妙在葱、艾不仅性温燥湿，更取透窜之性，率诸药深达病所（位），增强疗效。

【临床应用】禀性不耐之人，常易或内有湿热感风成疹或久居湿地，染疥成疮。治宜解毒燥湿，杀虫止痒，肤康合掌散正为合拍，但制备时一定用艾叶燃熏药糊干透则效佳。

【注意事项】用药前，先洗澡及衣服；用药期间忌用水洗患处；忌食辛辣刺激海腥食物。

【疗效】该方是多年来治疗疥疮效方，近年试用于治疗慢性湿疹数例，竟获效卓然。

【典型病例】柴某某，男，38 岁，1985 年 9 月就诊。患者半年前，不明原因，全身出现散在丘疹，瘙痒，抓破时流水，结痂，时轻时重。在省级医院诊为慢性湿疹。多方治疗，效果不佳，经用上法治疗 7 天而愈。半年后随访未复发。

手足癣效灵洗剂

献方人小传 华占海，男，52岁，甘肃榆中县人。现任榆中县中医院中医副主任医师，党支部书记，县政协委员，兰州市中医学学会常务理事。擅长内科、妇科。在学术上能博采众长，勇于创新。交流、发表论文10余篇，7篇被评为优秀论文，1篇收载《中国农村中医药优秀论文荟萃》。入录《知名中青年中医药师名录》和《中国当代知名中医特色医疗辞典》（通讯地址：甘肃榆中县中医院，邮编730100）。

【方药组成】白藓皮、苦参、蛇床子、地肤子、防风、葱白各15g 黄精30g 明矾8g

【制用方法】上药共放入瓦盆内（忌用铁器），用食醋1公斤，浸泡1昼夜即可使用。用时每日将患部浸入药液中1~2小时，10天为1疗程。

【功效】祛风除湿，杀虫止痒。

【适应病症】手足癣叠起白皮，皮肤粗糙变厚，皱纹宽深皲裂，燥痒作痛者。

【方解】风毒湿邪凝聚皮肤，气血不能来潮，皮肤失养，故局部粗糙起皮，皲裂痒痛。《医学源流》云：“外科之法最重外治”，选用蛇床子、地肤子、苦参、白藓皮祛风除湿，杀虫止痒，以抗癣菌；葱白辛温通阳，开发毛窍，放邪处出；防风散经络中留湿；食醋、明矾收敛解毒；并重用黄精甘平滋润，既抑制癣菌，又润养肌肤。诸药相伍，使风散湿除，皮肤得养，癣必自愈。

【临床应用】手足癣位于四肢之末，单用内服药难速奏效，外治法有其独到之处。前人有“诸痒属虚，属风”之说，故临床应用本方时，除用祛风之品外，滋养润肤之黄精必不可少，意在标

本同治，扶正祛邪。辨证要点，以手指、手掌或脚丫、足底部皮肤粗厚起皮，皲裂痒痛，形如鹅掌者为特征。

【注意事项】①对糜烂型患者不宜使用。②治疗期间患部不宜用洗衣粉或碱类擦洗。③冬季使用时，浸泡液宜加温至接近皮肤温度，不可过凉。

玉屏风散合参苓白术散

献方人小传 魏仙富，男，57岁，浙江省黄岩市人。现在山西省太原白癜风医院（通讯地址为山西省太原市宁化府东巷16号，邮编0310001）。1957年卫生中专毕业，开始从医皮肤病40年，现任山西省太原白癜风医院院长、副主任医师，对皮肤病师古而创新，急危症重在明理识病，内外合治，发表论文20多篇如“中医治疗白癜风2016例临床观察与研究”、“如意消斑丸治疗白癜风临床观察”、“中医治疗牛皮癣102例临床疗效观察”、“牛皮癣继发红皮症治验”等。治白癜风药物如意消斑丸、白癜精搽剂、消斑注射液，通过科委专家鉴定达到国内先进水平，获得1992年科技进步奖。

【方药组成】黄柏 8g 防风 8g 大黄 6g 黄连 5g 龙胆草 5g 甘草 5g 黄芪 12g 黄芩 10g 白术 10g 萆薢 20g 蛇床子 12g 白藓皮 12g

【制用方法】上药共研末，用醋调成糊状搽患处，每日2次，或水煎服。

【功效】清热燥湿。

【适应病症】慢性湿疹。

【方解】本方玉屏风散，受“肺主皮毛”影响，外邪从皮毛循经内传舍肺，日久肺亏，则其宣降、通调之功必损，水液代谢

紊乱，更有助湿邪，加重本病，故以玉屏风散补肺荣皮毛。合参苓白术散化燥，意有脾健湿行，湿无从生，实乃求生之道。古人云：脾为生痰之源，肺为贮痰之器，在治疗许多皮肤病中，酌情添加健脾补肺之品，对提高疗效有所裨益。

【临床应用】慢性湿疹，病程较久，缠绵不愈，符合湿邪致病特点。初诊，湿邪之象明显，宗急标缓本原则，选三黄为主内与外治疗宜用清热燥湿；二、三诊，湿性重浊药后其势有下趋之征，加利尿之品，使湿从小便解；四诊，外症已解，因症纳呆，身重乏力，嗜睡多梦较著，遂改投健脾利湿，荡余邪之品，扶正祛邪，标本兼顾。

【注意事项】使用该方 3 次后若效果不显、急宜采取其它相应治疗措施。

【疗效】有效率 98%，治愈率 91%。

【典型病例】苏某，女，47 岁，农民。1990 年 3 月 27 日初诊。皮肤瘙痒、挠破流黄水，甚则化脓，经某医院诊为湿疹。以抗炎、抗过敏治疗维持一时，药停痒搔如故，反复反作，迁延难愈，已有年余，因症状加重，前来我院诊治。证见周身奇痒、四肢、胸腹部及前后二阴可见多形皮损、暗红色斑块、丘疹、脓疱糜烂等并在、瘙痒继发性加剧，尤以夜间入睡为甚，口粘苦、纳呆、头身重、乏力、舌苔黄腻。宜清利湿热。内与外治疗，处方：黄柏 8g、防风 8g、大黄 6g、黄连 5g、龙胆草 5g、甘草 5g、黄芪 12g、黄芩 10g、白术 10g、萆薢 20g，5 剂。4 月 2 日 2 诊：瘙痒减轻，脓疮变凹，渗出黄水减少，舌苔薄黄，脉滑，照本方加蛇床子 12g、白藓皮 12g，再进 5 剂，内与外治疗。4 月 6 日 3 诊：用药后上半身已不痒，腰腹下肢仍时痒，脓疱及渗出已消，全身可见数处暗红色斑，纳呆，乏力，白带多，舌苔薄白脉细缓。上方去龙胆草、蛇床子，加车前子 10g、泽泻 10g、生地 15g，续进 3 剂。4 月 8 日 4 诊：停药 1 周，已未再痒，亦无糜烂及渗出。但纳差、身重、乏

力、嗜睡多梦，白带仍多，舌脉如前，改为健脾为主，利湿为标本同治，用二妙散加味：苍术 15g、茯苓 15g、白术 8g、防风 8g、地肤子 6g、苡米 20g、淮山药 12g、扁豆 10g、黄柏 12g、黄芪 16g、太子参 16g、陈皮 10g、丹皮 10g、生地 10g。3 剂后未再诊，延访至今未痒，纳谷转香。嘱其常服参苓白术散，少食甜、粘、油腻等食物，以善其后。

清 白 散

献方人小传 石纯信，男，50 岁，河北省昌黎县人。现为唐山市卫校附属医院内科主治医师（通讯地址：唐山市卫校附属医院，邮编 036000）。早年在部队从医，转业地方医院与老中医杜乃左学习多年。之后从事中西医结合及老年病疑难病的研究。曾先后在国家省级刊物发表论文 10 余篇，科研成果 5 项，均获国家及省级金奖。

【方药组成】 黄连 5g 冰片 2g 章丹 2g 白芷 2g 青粉 3g

【制用方法】 将上药共为细面，装瓶备用；或取适量凡士林与药面合在一广口瓶内加温做成清白膏备用。要根据病变大小，取适量药粉加适量香油调成糊状（不要过稀），敷在患处，1 日 1 次；或取适量清白膏敷于患处，1 日 1 次。

【功效】 利湿、消炎、止痒、止痛。

【适应病症】 适应于各型湿疹。

【临床应用】 湿疹是个症候群，皮损多种，形态各异，病因复杂，表现不一。身体各部位都可发病。病变扩散快，治愈难。用清白散外敷，能止痒、止痛、利湿、消炎，用药 3 天可收口结痂，痊愈，作者用本方治病多年，均有效。

【注意事项】 清白散中含有汞制剂，对汞过敏者禁用。

苦参洗方

献方人小传 岑维璠，男，45岁，广西合浦县人。现为广西合浦县中医院中医内科主治医师（通讯地址：广西合浦县廉州镇定海路5号，邮编536100）。出身中医世家，七年制中医学徒出师。临床致力于肾脏病、胆道疾病及妇科病的研究，主张肾病从脾治，尤其治疗肾小球肾炎更有独到之处，用药广而不滥，选方简而不繁。发表论文近30篇，编著出版《古今外治灵验单方全书》（副主编），获“齐鲁杯”优秀论文奖，全国中医特色诊疗专方专药论文大赛1等奖。

【方药组成】苦参 60g 黄柏 30g 蛇床子 30g 五倍子 20g 青蒿 30g 银花 30g 冰片 3g（烱化） 白矾 10g（烱化）

【制用方法】上药用清水 1500ml 煎 20 分钟，取药液 800～1000ml，兑入冰片、白矾溶化后先熏后洗或湿敷，每日 1 剂，分 2～3 次外洗。

【功效】清热解毒，收湿止痒。

【适应病症】湿疹、包皮龟头炎、外阴瘙痒。

【方解】本方苦参、黄柏、银花、青蒿清热燥湿、祛风止痒；五倍子、明矾、冰片、蛇床子收湿止痒，防腐杀虫。诸药配伍外洗，使肌肤湿热得清，红肿皮损消散，收湿杀虫而止痒。

【临床应用】对湿疹皮损渗出糜烂比较严重的患者，用苦参洗方熏洗后再湿敷，收效较好。用于治疗龟头包皮龟头炎，本方冰片用量减为 1g，避免刺激，一般局部浸洗 20～30 分钟。外阴瘙痒则先熏后洗，坐浴 20 分钟。

【注意事项】使用该方忌烫洗。在治疗中同时注意忌口，腥辣之物及有刺激性的食物均属禁忌，否则会影响疗效。

【疗效】本方治疗湿疹 30 例，治愈率为 76%，显效 24%，总有效率 100%。包皮龟头炎 50 例，治愈 48 例，有效 2 例，平均治愈时间为 7.8 天，总有效率 100%。外阴瘙痒 56 例全部治愈。

【典型病例】李××，男，23 岁。1 星期前下肢起红色小丘疹，搔痒难忍，曾服苯海拉明、维生素及肌注钙剂等均未获效。近日来下腹部及两足小丘疹满布、灼热，搔抓后皮疹糜烂渗水，融合成片，尤以腹股沟为甚。经用上方 4 剂，煎汤熏洗及湿敷后，疹消痒止而愈。追访 1 年未见复发。

草乌八味散

献方人小传 贺巴依尔，男，50 岁，内蒙古自治区阿拉善人。任内蒙古自治区阿拉善盟蒙医药研究所（邮编 750306）蒙医主治医师，1963 年参加工作，通过 30 多年临床经验，应用中蒙西医针灸各种理疗治常见病多发病疑难杂病方面均取得了一定成绩。在国际中医学术研讨会上，发表论文 2 篇，国内学术会上发表论文有 10 多篇。1987 年出版的《贺巴依尔验方》一书在中国科技成果大全上被选入。入选《中国当代中医名人志》、《中国民族民间秘方大全》、《中国医药荟萃疑难杂症求医指南》等。

【方药组成】草乌 6g 雄黄 12g 硫黄 12g 黄连 12g 黄柏 12g 巴豆 6g 乳香 12g 没药 12g

【制用方法】以上 8 味药研成细末后，放入瓶内加 25ml 醋，浸泡 24 小时搽于患处。每天 2 次。

【适应病症】头癣、手足癣，神经性皮炎，牛皮癣，各种湿疹等皮肤病。

脱敏洗药

献方人小传 孙业，男，57岁，吉林长春市人。现为吉林省中医中药研究院副主任医师（通讯地址为长春市工农大路17号，邮编130021），曾任该院临床医院骨伤科主任、全国骨伤外固定学会省分会理事等职。1964年8月毕业于白求恩医大医学系本科，1978~1980年脱产学中医2年，1980~1990年师从著名骨伤专家胡黎生教授学习中医整骨技术，历10年寒暑，颇得真传，技艺日精。曾先后主持完成省部级科研成果2项，其中1项获部乙级奖。发表学术论文40余篇。

【方药组成】白芷 50g 紫草 25g 牡丹皮 25g 桑白皮 10g
桂枝 10g 甘草 10g

【制用方法】将上药置洗脸盆内，加清水2000ml浸泡1小时，加热煮沸5分钟，取下待温，泡洗患部，每日1剂，浸透3~4次，每次半小时。

【功效】解毒散湿，通经化瘀。

【适应症】接触性皮炎。

【方解】白芷健脾宣肺，祛风胜湿，清解毒热，为本方主药；紫草、丹皮凉血活血，清热解毒为辅；桑白皮、桂枝散风湿，化瘀血，调营卫，共为佐药；甘草为使，泄邪热，通行十二经而解百药毒。全方共奏解毒散湿，通经化瘀之功。

【临床应用】接触性皮炎系因触及某种化学物质，毒邪侵入机体阻滞经络而引起的一类过敏性皮肤病。临床常以皮肤奇痒，起丘疹水泡为初发症状。若不及时治疗，还可化脓，漫延扩大，经久不愈。应用本方可迅速控制病情，消除症状，导邪经皮而出，疗程短，见效快，疗效巩固，简、便、廉。

【注意事项】若并发毒血症等全身症状时，则应首先使用强力抗菌素静点或清热解毒中药汤剂内服，迅速控制全身感染后，再外用本洗药。用本方期间宜食清淡，忌食辛辣腥厚之品。

【典型病例】申××，女，20岁，朝鲜族，图们市某发廊美发师。因接触美发水（名不详）双手奇痒、肿痛、皮肤起疱疹，经服扑尔敏、息斯敏等未奏效，已3天，于1993年9月10日求余诊治。余检查病人，全身状态佳，体温正常，双手十指肿胀，屈伸受限，自掌横纹以下皮肤弥漫暗红丘疹，间有水泡脓疱，少数已溃破，诊为双手接触性皮炎。予上方水煎，泡洗，每日1剂，4剂后复诊，肿胀消退，疱疹消失，指间关节功能恢复正常，皮肤已脱屑，治愈停药。随诊1个月未复发。

癣 熏 灵

献方人小传 潘书林，男，45岁，黑龙江省哈尔滨人，现为哈尔滨铁路局中心医院主治医师，中国中医学会会员、哈尔滨市八卦掌武术协会秘书（通讯地址为南岗区颐园街15号哈铁中心医院，邮编150001）。自幼随父学医，19岁从事医疗，1977年毕业于黑龙江中医学院医疗系，1981年返校复训18个月，曾陆续进修中医内、外、按摩等科目，曾受明医指点求古训，采众长。发表国家及省市级论文数10篇，多次参加全国或东北三省内、外、妇科学术研讨会。1992年12月，在香港出版《中国当代知名中医特色医疗辞典》中入录并获荣誉证书。

【方药组成】苍术、黄柏、苦参、防风各15g 大枫子、白藓皮各50g 松香、鹤虱草各20g 五倍子25g

【制用方法】上药共碾粗末，用较厚草纸卷药末成纸卷，燃烟熏皮损处。每日1~2次，每次15~30分钟。温度以病人能耐受

为宜。

【功效】除湿祛风，杀虫止痒。

【适应病症】神经性皮炎，慢性湿疹，皮肤瘙痒症。

【方解】方中苍术燥湿；黄柏、苦参、防风清热祛湿毒、消炎止痒；大枫子杀虫解风毒止痒而润肤；鹤虱草杀虫；白藓皮杀虫止痒祛湿；五倍子收敛杀虫；松香收涩止痒。

【临床应用】熏药的药烟并无任何毒性，对人体亦无任何损害。但是由于药味组成中多是杀虫药，故药烟必含刺激性臭味，对呼吸道粘膜、球结膜有一定刺激，个别人可以引起轻微头痛。停止烟熏后即消。

【注意事项】对有严重高血压病、孕妇和体弱患者慎用或禁用。对急性炎症皮损一般禁用。

【典型病例】于×，阴囊湿疹、股癣6年。阴囊皮肤粗糙变厚，两侧股部内上侧各有手掌大小皮损粗糙变厚，瘙痒明显，以多种疗法未效，用癣熏灵后，3、4天自述痒感减半，14天搔痒基本消失，阴囊及股内侧皮肤变薄脱屑并恢复一定的弹性而出皱折，4周股癣痊愈，远期观察未发。

桉叶白矾洗剂

献方人小传 符贤才，详见内科“腹泻贴脐方”。

【方药组成】老桉叶 100g 白矾 500g

【制用方法】将2味药放进锅内加水4500ml，煮沸10分钟左右，即可用。将手足、甲沟感染部位，溃疡部位浸洗15分钟，3天为1个疗程。

【功效】在水田操作较长时间，指（趾）间其邻近的皮肤脱落，呈溃疡现象，露出红色糜烂面，剧烈瘙痒及疼痛。止痛消

痒。

【适应症】稻田皮炎。

【方 解】白矾性味涩、酸寒，外用收敛、杀虫、止痒；桉叶味苦，清热解毒止痒，两药同用，有收敛抗菌作用。

【注意事项】涂药时停止下水田操作，涂药痊愈后，需要下水田操作，操作前手足擦 20% 松香凡士林，收工后扑干燥粉剂。

【疗 效】一般 3~4 天痊愈。

【典型病例】符××，36 岁，1993 年 6 月 28 日来诊。农历 6 月下水田作业，起始 6 天，就出现手（趾）间皮肤红肿、灼痛、瘙痒、甲沟化脓性感染，外用双氧膏，擦碘酒无效。口服扑尔敏、强的松、四环素无效。病程日渐加重，甲沟感染化脓，手指皮肤大多剥脱，伸展活动困难，手背、足背溃疡严重，举步十分困难，晚上难睡，停止其他药，用上面药涂法，次日病程好转，手（趾）出现结痂，手指已能伸展，继续用第 2 次按上次涂法，四天活动自如，继续休息 2 天。涂药好转后才停药。下水田时用凡士林涂皮肤保护。

水银大风子丸

献方人小传 王守志，男，40 岁，四川奉节县吐祥镇范家乡人。现为奉节县人民医院中医内科主治医师（通讯地址：四川奉节县人民医院二门诊中医科，邮编 634600）。初、高中时随父学医，现为奉节县政协委员，自然科学学会会员，中华医学内科学会中医分会会员。发表国家级论文 10 余篇，合著出版《顽固杂病证治秘要》、《全国治病专长名医选篇》及《全国疑难杂症求医指南》。临证主张辨证施治，治病求本，对祖传秘方很有创新，对中医内

科、外科及疑难杂病辨理识病，收效甚显。

【方药组成】水银 10g 大风子 40g 陈醋 6g

【制药方法】先将大风子去壳取仁，将大风子仁研烂加入水银，陈醋和匀，用小块纱布 2 层将药放入纱布中心，用线捆成一球形物，每日擦患处 10~15 次，当日见效，8 日可痊愈。

【功效】解毒祛风，止痒拔毒，杀虫。

【适应病症】神经性皮炎。

【方解】本方所治之病，是由于久居潮湿、薰蒸皮肤、湿热阻滞经络、或过食辛辣肥厚之品，内生热毒，阻滞经络而产生皮肤搔痒，发展成癣疥毒热，选用水银大风子丸祛风燥湿，攻毒杀虫，止痒而痊愈。

【临床运用】神经性皮炎是一种顽固性的由真菌感染的慢性皮肤病，证见患处呈对称形，遇热奇痒难忍，可见患处边缘起痒疹边界不甚清晰，无很好的药物治疗，给患者带来不少痛苦，用水银大风子丸外擦，当日见效。

【注意事项】使用上方如 1 剂未见彻底者，可使用 2 剂必定痊愈，用药期间不宜饮酒，上药忌内服以防中毒。

化癢止痒方

献方人小传 宋洪巽，男，57 岁，山东省东阿县人。现为海南省中医院第二门诊部主任，副主任中医师（通讯地址为海南省海口市中山路 4 号，邮编 570003）。1964 年毕业于山东中医学院医疗系本科。曾任海南中医院第一副院长。临床主张辨病与辨证结合，以辨病为主，辨证加减。擅长内科及皮肤科，在省级以上杂志及学术会议发表、交流论文 10 篇。

【方药组成】藁本 30g 白芷 30g 白藓皮 30g 地肤子 30g

大黄 15g 刺猬皮 15g 紫草 15g

【制用方法】上药用水 1500ml，浸泡 30 分钟，煮沸 10 分钟，待温，以多层纱布或小毛巾浸药液湿热敷患处，待冷则更换纱布，以保持适当温度。每日 1 次，每次 30 分钟，每剂可用 4 天，用前煮沸。

【功效】祛风止痒，清热除湿，活血化瘀。

【适应病症】神经性皮炎。

【方解】神经性皮炎初起为风湿热之邪侵袭肌肤，日久则致血瘀阻滞。前人认为无风不作痒，笔者认为皮肤增厚乃气血瘀滞所致。因而治疗应根据其病因病机，以祛风止痒，清热除湿，活血化瘀为治则。方中藁本、白芷辛温，祛风胜湿，湿邪留滞非辛温不能散；白藓皮、地肤子苦寒，祛风湿清湿热，热邪非苦寒而不得清，二药祛皮肤中热气尤佳；大黄、刺猬皮、紫草活血化瘀。诸药合用使病因去，瘀滞除，气血畅通。病灶恢复正常。

【临床应用】神经性皮炎多局限于颈项部、四肢伸侧、外阴及尾骶部。一般病变 1~2 处或 3~4 处，均可应用本方治疗。若抓后湿润者加苍术 30g；若病程较长皮肤干燥肥厚者加鸡血藤 30g，以养血活血通络。神经性皮炎严重者可播散全身，称弥漫性神经性皮炎，则不便应用本方，可内服祛风活血汤（笔者自拟），疗效亦佳。

【注意事项】使用本方湿热敷时，要注意温度不宜太高，用前要先用手试探一下敷料的温度使之适宜，避免烫伤。冷却时要及时更换，温度低于皮肤时不利于皮肤血管扩张和组织的松弛，药物不易渗透于内发挥作用。敷料不能拧得太干，要使之含有足够的药液。

【疗效】近 3 年来应用本方共治 32 例，男性 19 例，女性 13 例；年龄 12~54 岁；病程最短 3 个月，最长 7 年，平均近 3 年；疗程最短 24 天（6 剂），最长 2 个月，平均 36 天（9 剂）。疗效标

准：瘙痒缓解，皮损恢复正常。治愈后极少复发。本组 32 例全部治愈。

金 黄 散

献方人小传 孙正，天津化工医院中医科，详见外科“冰甲膏”方。

【方 组】黄芩、黄连、黄柏、五倍子各 30g 枯矾 3g 冰片 1g

【制用方法】芩、连、柏、五倍子共研细末过筛（800~1000 目），枯矾、冰片入钵研细，混入药粉中搅拌均匀，用时加植物油调成糊状，涂于患处。

【功 效】清热、解毒、燥湿、敛疮。

【适应病症】皮肤溃烂流黄水，疱疹，婴儿湿疹

【方 解】三黄具有清热解毒燥湿之功，五倍子、枯矾燥湿、敛疮，冰片芳香防腐去浊秽。

【临床应用】黄水疮，单纯疱疹，湿疹。

【注意事项】婴幼儿如渗出不多可去枯矾，减少疼痛症。因枯矾刺激性较强，亦可用青黛粉替用。涂金黄散前先用花椒、盐水清洗疮面。涂金黄散后每次再涂不必洗去原药可连续再涂直至结痂脱落。

【疗 效】用于黄水疮效果最佳，屡用屡效。治婴儿湿疹时应改变哺养乳品，减少油脂，调理小儿脾胃助消化。

【典型病例】邵××，男，2 岁，1969 年初夏就诊。患儿头身及四肢多处溃烂流黄水，烦躁不安，哭闹拒乳，其母因怀抱其二臂也染黄水疮奇痒痛难忍。曾外用氧化锌粉，内注青霉素均未能控制疮面扩散。嘱用金黄散 1 周后其母抱患儿复诊：患儿及其母

黄水疮 80%疮面结痂，嘱其续用上药。

【禁忌】治疗期忌食辛辣、晕腥之食品。本散剂无毒副作用，多年临床应用未出现过敏反应。用药后忌用水洗，结痂后需自行脱落。

速 止 痒

献方人小传 王树德，男，55岁，河北省张家口人。现张家口博爱医院（邮编 075000）中医科主任，主治医师，门诊主任，张家口市中医学会推拿骨伤分会秘书长。毕业后跟随名老中医临床治疗，从医30余年，对中医内、妇、儿各科，皮肤科疾病均有研究。特别是对老、青、少年人的咳喘病及小儿百日咳的治疗有突出疗效，并且还擅长治疗消化与泌尿系统疾病。多年丰富临床经验撰写了论文收录在论文选编中，有的还集录在由天津人民出版社出版的《中国医药荟萃丛书》中。

【方药组成】僵蚕 4g 地肤子 15g 蛇床子 15g 百部 10g

【制用方法】将上4味中药用60°白酒或75%的酒精500ml浸泡。白酒浸泡5天，酒精浸泡3天后，除去药渣，留药液备用。

【功效】杀菌、消炎、止痒。

【适应病症】荨麻疹，过敏性皮炎，接触性皮炎。

【方解】本方治病原理是疏通皮肤气机脉络，活血散风，杀菌消炎止痒，用白酒或酒精浸泡是为了将药物中的有效成份全部浸出，治疗更为速效。

【临床应用】治疗以上病种每日抹擦3次，病程短1天可愈，重者5天可愈，用药5天不愈者可配服中草药临证处置。临床观察1000余例总有效率90%以上。

【注意事项】有酒精、僵蚕过敏者禁用。

复方香木水洗剂

献方人小传 蒋成章，男，45岁，湖南衡阳县人。现为湖南省人民医院皮肤科主治医师（通讯地址为长沙市东茅街，邮编410002）。1972年3月入衡阳医学院医学系医疗专业，1975年10月毕业被分配在湖南省人民医院麻醉科、外科工作2~3年。1978年从事皮肤科临床工作。曾任中华医学会湖南省第三届皮肤科学会委员。现任中国中西医结合研究会湖南省皮肤科学会委员。先后多次筹备举办省内外学习班及学术会议，1986年7月亲自筹备举办湖南衡山全国性皮肤美容专题研讨会，中西医结合治疗淋病报告会。为推动国内的皮肤美容医学及中西医结合防治性病作出较大的贡献。本人发表论文近20篇。

【方药组成】木贼草 30g 香附 30g 地肤子 30g 板兰根 30g 苦参 20g 黄柏 20g 白矾 10g 马齿苋 30g

【制用方法】加水1500~2000ml，水煎后去渣，浓缩至500ml左右，可先熏后洗，每天用温药水浸泡患处1~2次，每次15~20分钟。可选用纱布蘸药稍用力擦洗，以不擦破为度，药液每2天更换1次。注意局部干燥，避免性生活半月，内裤每天更换且煮沸消毒，一般用药处洗1周后疣体脱落，再继续用药1周。以防止复发，巩固疗效。

【功效】清热、解毒、收湿、止痒、祛疣。

【适应病症】尖锐湿疣，寻常疣及女阴或肛周瘙痒等皮肤病。

【方解】本方用中药外洗治疗皮肤病，是利用诸多药物清热解毒，收湿止痒，祛疣之功效。方法简明，疗程短，见效快。

【临床应用】尖锐湿疣属于第6型人类乳头瘤病毒，该病常为性直接接触传染。主要发生男女外生殖器及肛周等处，中医认为

疣体的形成因热邪煎熬成块而致，治以清热为主，祛湿、止痒、及抗病毒等作用，消疣体之功效。在目前激光、手术治疗费用偏高的情况下，采用此法，既简单，又价廉，且效果好，无明显副作用。

【疗效】治愈：皮损完全消退；好转：皮损部分消退；无效：治疗前后皮损无变化。本方治愈 27 例（77.1%），好转 5 例（14.2%），无效 3 例（8.7%），总有效率为 91.3%。

【注意事项】注意局部皮肤干燥，外洗时，注意不要过于用力擦洗，以局部不擦出血为度。

【典型病例】患者，刘××，男，28 岁，汽车个体司机。1 $\frac{1}{2}$ 年前，龟头冠状沟出现绿豆大小红色丘疹，未予注意，后渐增大，形成多黄豆大小的赘生物。诊断尖锐湿疣。曾在外院用冷冻治疗 1 次，未愈，后改用本方药水外用 8 天后，赘生物结痂、脱落、痊愈。后用药洗 1 周，随访 1 年无复发。

【附方】外治尖锐湿疣偏单秘方：鸦胆子仁 10g。浸入 75% 酒精，呈糊状，浸泡 1 周，然后将药物涂于患处，纱布覆盖，大便后换药。

消 疣 液

献方人小传 谷玉琴，女，34 岁，辽宁省大连市人。现为大连市中西医结合第二人民医院皮肤科主治医师（通讯地址为大连市西岗区宏济街 29 号，邮编 116011）。19 岁就读于中国医科大学医学系，获医学学士学位。曾进修于上海华山医院皮肤科、中国医学科学院皮肤病研究所。临床主张中西医结合治疗皮肤病，尤其注重外治。曾在《中华皮肤科杂志》、《中国中西医结合杂志》发表文章。

【方药组成】板兰根 生苡米仁 红花等量 氢氧化钠结晶

【制用方法】将板兰根、生苡米仁、红花等量研成细末，过180目筛，装入瓶皿备用，取氢氧化钠结晶配制成50%氢氧化钠溶液，缓缓倒入瓶内，配制成糊状药液（配制比例：1份药末1份50%氢氧化钠）。

【功效】清热利湿，解毒化浊。

【适应症】尖锐湿疣。

【方解】本方所治之病乃湿热下注皮肤粘膜，蕴之成毒而生此疣，给药途径以外用除疣最佳。方选板兰根、红花清热解毒；生苡米仁利水渗湿；而氢氧化钠具有腐蚀肌肤之功效，合用可致疣体腐蚀而结痂脱落。

【临床应用】尖锐湿疣为性病之一种，症见生殖器呈乳头瘤样、菜花样，乳头间有肉腐糜烂的小肿物，祖国医学认为是由于湿热毒邪内蕴，致使湿热下注皮肤粘膜，蕴久成毒而生此疣。现代医学认为由于病毒传染而生本病，应用消疣液可清热解毒、利水渗湿、抗病毒腐化，达到100%疗效。

【注意事项】①本药适应现用现配。②在涂抹中要将正常皮肤保存完好（涂上凡士林以防腐蚀）。③每周涂2次，2~3周可痊愈。

克 疣 灵

献方人小传 张慧君，女，51岁，河南省武陟县小董乡南官庄人。现为河南省焦作市第二人民医院小儿科副主任。从医32年，主搞内科、小儿科。曾有6篇文章在国家级及省级杂志上刊登，曾著书《胎教指南》，及参予《小儿急危重病的抢救》一书的有关章节的编写。获市级科技成果2等奖，具有丰富的临床经验。

【药方组成】新鲜芝麻花数十朵

【用法】取新鲜芝麻花根部的白水，直接擦在扁平疣上，1日1~2次，连用2~3天即可愈。最好把扁平疣最早出现的且最大的用针刺破涂擦效果更好，有的1次即可愈。没有发现毒副作用及感染。观察病例31例，总有效率100%。摘取新鲜芝麻花数十枚，取1枚揉烂在身上刺痕上反复涂擦1日1~2次。连用4~6天，当时看不见什么效果，20~30天以后往往在不觉中发现刺痕消失。临床应用20例总有效率达100%。

【适应症】传染性扁平疣，刺痕。

祛 癍 灵

献方人小传 姚永利，男，1954年5月生，河南温县人。1989年北京光明中医函授大学毕业。现就职于陕西临潼中国标准缝纫机公司（邮编710612）。自幼受家父影响，喜爱中医，先后在皮肤病专家吴绍熙教授、米太初教授及陈尚根先生指导下进行临床医治白癜风的研究。撰写的“白癜风的防与治”、“白癜风皮肤病的治疗”等专文在《卫生报》、《陕西农民报》、《现代生活》、《陕西日报》、《现代保健报》、《家庭之友》等报刊杂志发表。《白癜风的起因与研究》论文获首届全国中医药“光明杯”优秀论文奖，中医药管理局长吕炳奎亲笔题词鼓励，合影留念。

【方药组成】全当归、红花、乌梢蛇各12g 蜜陀僧、花椒各2g 斑蝥5只

【制用方法】瓶装白酒500g（60%度左右）浸泡7天，药瓶盖紧，每天需上下摇荡几次，日擦数次，直擦到痊愈。如果条件许可的话，擦药后晒太阳5~10分或照紫外线1~2分钟，以患部出现微红痒为度。经过这样治疗，白斑块的边缘至中心，皮肤表面色素逐渐恢复正常。

【功效】活血通络，祛风利湿，增长血色素。

【适应病症】扩散、对称白癫风皮损。

【注意事项】外用药水，有毒，用时谨慎。

【疗效】(统计 50 例)痊愈 6 例，显效 16 例，有效 23 例，无效 5 例，有效率 90%。一般用药 10 天~20 天见效，如用药 1 月未见效者，需更换处方。

疮 见 愁 油

献方人小传 姚永利，同上。

【药方】熟鸡蛋黄 1 个

【制用方法】取鸡蛋 1 个，煮熟去皮取蛋黄放在铜勺内，放火上干烧，待蛋黄化开出油即可，由小瓶装备用。用棉签取蛋黄油，涂在患处薄薄一层即可，6 小时或 12 小时后即可揭去痂然后重新涂上蛋黄油，3 天一般都可治愈。如果新的皮肤仍有红色还可继续使用 1~2 天必愈。

【适应症】主治黄水疮（羊胡疮）。

【疗效】临床应用 25 例，均在 3~5 天内痊愈，有效率 100%。

粉 刺 灵

献方人小传 杨占山，男，72 岁，吉林省梨树县第一人民医院（邮编 136500）副主任医师。

【方药组成】白芨 25g 黄柏 50g 精制硫磺粉 100g 大黄 100g 冰片 5g

【配用方法】共为极细面，以瓶收储备用。

【用药方法】取药面少许（面积大小），用温水调糊状，现用现调，每晚睡前用手蘸药，搓擦患处，第2天清晨洗脸，7天痊愈。

【功效】清热、解毒、杀虫。

【适应病症】粉刺（痤疮，美丽青春痘）。

【方解】大黄、黄柏清热解毒；硫磺杀虫；白芨性粘，使药粉吸着皮肤，便于吸收，以达疗效。

【临床应用】发于青春期的青年男女，多由肺热及血热，郁滞肌肤；过食膏粱厚味，致脾胃积热上蕴皮肤，形成疮疖；化学药物的刺激（胭脂），腠理不密，亦发此病。

【注意事项】①诊断不明勿用；②其它皮肤病忌用。

痤疮灵洗剂

献方人小传 林玉霖，见儿科“温脐消胀饼”方。

【方药组成】鲜马齿苋 30g（干品 15g） 金银花、山豆根、黄柏、茵陈、丹参、苦参各 15g 栀子、川芎、白芷、苍术各 10g 细辛 5g

【制用方法】将上药加清水 1000ml，浓煎为 400ml，乘热用纱布或棉球蘸药液擦洗患处，每次擦洗 15～20 分钟，每日 2 次，连续用药 7～14 天，获效后可继续用药直至痊愈。每剂中药可使用 2～3 天，每次擦洗前应把药液加热或煮开。注：本方也可改为汤剂（去细辛）煎服同样有效。

【功效】清热解毒，活血通络，祛湿消疹。

【适应病症】痤疮，青年扁平疣，皮肤疖肿。

【方解】痤疮、扁平疣及皮肤疖肿皆由风热湿毒客于皮肤，阻塞经络，气血壅滞所致。治宜清热解毒，活血祛瘀除湿。本方

以马齿苋、金银花、山豆根清火解毒；加茵陈、栀子、黄柏、苍术清热利湿；配川芎、丹参养血润肤，活血软坚，疏通体表经络，同时可防止清热泻火之药燥寒过度耗损阴津而伤及肌肤；佐以苦参、白芷祛湿止痒；细辛性辛温，达表走肌肤，引诸药直达病灶。合而用之，组成清热解毒，活血化瘀，祛湿消疹之剂，故作为疮疗疖肿及疣疹的外用洗剂，能达到显效迅速，除根达源。药理研究表明。本方中的马齿苋、金银花、山豆根、茵陈、栀子、黄柏、苍术、丹参、川芎等单味煎剂均具有高、中效的抗痤疮丙酸杆菌活性及广谱的抑菌作用。其中丹参、川芎的有效成份还具有调节机体免疫机能的功效。此外，丹参酮还被证实具有抗雄性激素和类似糖皮质激素的抗炎作用。上述诸药功效与西医对痤疮采用抗菌消炎、抗雄性激素以抑制皮脂腺分泌的治则颇为吻合。

【临床应用】痤疮和扁平疣多见于青年，好发于面部。痤疮的主要表现为粉刺、丘疹、结节、脓疮及囊肿型皮损。本洗剂为各型痤疮，扁平疣及皮肤疖肿的通用方，对局部红肿较重，炎症明显者，应加用地丁、蒲公英各 20g；对结节、囊肿难以消退者加用浙贝母、海藻、桃仁、红花各 15g；扁平疣患者最好能配合每日早晨空腹食用醋蛋 1 个，连用 14 天（醋蛋的制法为将鲜鸭蛋泡入食用米醋中，7 天后捞出煮食）。

【注意事项】忌食辛辣油腻及甘甜过度食物。若应用本方治疗 14 天后效果不明显，宜改用其它疗法。对伴发严重细菌感染者应同时加用抗生素治疗。

【疗效】作者总结北京市东华门医院疑难病专家门诊 1993 年 5～6 月份应用本方治疗的痤疮患者 35 例，结果治愈 21 例，显效 8 例，好转 4 例，无效 2 例，总有效率为 94.29%。同期应用本法治疗扁平疣 9 例均获痊愈。该论文发表于《中国医学论坛报》1994 年 2 期（总第 395 期）。

【典型病例】马某，女，22 岁，北京无线电通讯局职工。同时

患扁平疣及痤疮 7 年，曾跑遍京城所有大医院的皮肤科求医无效，因面部长满扁平疣疹及痤疮结节而影响美观，内心非常痛苦，曾动过轻生之念头。后于 1993 年 6 月应用本方剂外洗 7 天后，疣疹结节开始脱落，皮损变小，20 天后痊愈。

洁尔脸搽剂

献方人小传 文峥嵘，男，27 岁，海南琼海市人。医学院毕业，现系中华唯象中医学研究所民间疗法研究室主任，琼海市工农门诊部医生（通讯地址：海南省琼海市纪纲街 114—2 号邮编 571400）。博采众家之长，临床独树一帜，擅治疑难病，尤其对痛症及皮肤病有独特疗法，国外华侨及港澳同胞均有求治者。已发表论文 10 多篇，参编《奇难杂症妙验单方》和《中医百家新论》等书。其医术及业绩已被编入《现代中医特色医术荟萃》和《走向世界的中华医药事业》、《全国治病特长名医选编》等大型专著。《海南日报》、《琼海市报》、海南电台、琼海电台等新闻单位曾多次作过医德医术方面的报道。

【方药组成】芦荟 30g 苦参 15g 当归 15g 泽兰 15g 七叶一枝花 15g 防风 15g 黑白丑 15g 白术 15g 珍珠 15g 皂角刺 15g 丹参 15g

【制用方法】上药切碎或捣烂，置瓶中用酒精 500ml 浸泡 15 天，而后将药液过滤装瓶，使用时用棉球蘸药液外搽面部患处。日搽 3~4 次。

【功效】清热燥湿，解毒消肿，活血化瘀，化瘀散结，祛斑除痤疮润肤。

【适应病症】青春期粉刺，顽固性痤疮。

【方解】本方所治之病乃因肺胃郁热或心肝火旺，上蒸颜

面，毒邪凝滞而致；或过食肥厚辛辣，导致脾胃蕴积热毒，上攻于头面；或气血瘀滞，脉络阻塞而发。治疗当以斡旋气机，调理阴阳，复其升降有序。方中诸药共奏清热解毒散痈除疮养颜润肤之效。酒精有消毒作用，善通血脉，调营卫，载药势行于颜面，用之浸药，能使有效成分充分释出，增强药效，且本方使用方便，无副作用，随时可进行治疗。

【临床应用】不少男女青年，颜面部长有粉刺、痤疮，现代医学认为，此系由于性激素分泌失调引起。虽对身体健康不大碍事，但影响美容，确实增添了不少烦恼。根据笔者临床经验，除用本方外搽外，若配用督脉灵台穴刺血拔罐，可增强疗效，缩短疗程。

【注意事项】使用本方2周后，若效果不显，宜采用其他疗法。若纯属化妆品过敏所致的颜面丘疹，本方疗效欠佳。

朱 冰 散

献方人小传 和成斌，男，50岁，陕西铜川人（通讯地址为陕西省铜川市人民医院中医科，邮编727000）。中医主治医师，从事中医内科临床30年，现任中华全国中医学会陕西理事，铜川市中医学会副会长，市人民医院中医科主任。近年来曾在《陕西中医》等省市级刊物发表学术论文6篇。参加全国、省市级学术会并交流论文20余篇，专长中医内科，能较熟练的诊治心、肝、肾等系统的疑难病，善于收集、验证、推广、使用单验方。

【方药组成】黄烧纸100张 锦油纸100张（质软易浸入油之食品包装纸） 朱砂20g 冰片30g

【制用方法】①备薄铁片约手掌大小一块（如煤铲等），放火上加温后，将朱砂粉分3次先后均匀的撒在铁片上，接着徐徐少量多次撒加冰片于朱砂末上（铁片温度以撒加冰片末后即冒出气

为宜),然后将备好散开的黄烧纸放在加温后药物冒出的白气上熏蒸上下两面,药尽100张纸熏完即成。②取用药熏过的黄烧纸及同样大小的锦油纸各一张,合卷毛笔杆粗细的圆桶状,放入封闭的塑料袋中,以不漏气为好。④使用时取圆桶纸1~2支,点燃一端后熄灭火焰,用冒出的烟气熏疣部位30~40分钟,1日1次。

【功效】清热除湿,疏风通络,软坚祛疣。

【适应病症】扁平疣,青年痤疮。

【方解】明·薛己《外科枢要》谓:“疣属肝胆,少阳经风热血燥或怒动肝火,或肝客淫气所致”。本文所治之病乃因脾虚生湿,湿蓄生热,或肝郁之时感受风热湿邪,湿热互结,气郁血络不通,瘀结日久生疣为患。病生肌表,选药外熏。方选冰片清凉香窜,并用上味油,易透入肌肤,共助软坚祛疣之力。

【临床应用】扁平疣俗称扁瘡,多发于青少年,临床可见如米粒或小黄豆大小,疣体呈浅褐色或正常肤色,似圆或椭圆形,密集或散见以颜面、前胸、后背、手背等部位。多因久治不愈影响美观,若用朱冰散外熏,首次即效,半月内可痊愈。

【注意事项】使用本法治疗后,见有面部个别深褐色疣体不能消退者,可取中药鸦胆子1~2粒,取掉外表粗皮,将其仁稍加压后轻轻涂擦疣部3~4日即可消退,不留瘢痕。

【疗效】入选200例,均用过其他疗法无效,用本法治疗全部治愈,无毒副作用。

【典型病例】汪某,女,27岁,患扁平疣约4年,以颜面为著,疣体呈深褐色,因影响婚事,曾内服中西药及用过多种化妆品,先后行电灼、冷冻等疗法无效,使用朱冰散卷外熏后40天疣丘逐渐消退,至今未复发。

硝 银 散

献方人小传 王立群，男，48岁，山西晋城市人。毕业于南京中医学院医疗系。现为江苏连云港市妇女儿童医院副院长，主治医师（通讯地址：江苏省连云港市妇女儿童医院，邮编222001）。从事多年中医临床工作，对内、外、妇科的常见病主张应变而治，师古而创新。自1987年开设男性病专科临床诊治以来，明理识病，内外合治积累了较丰富的临床经验，发表论文10余篇。

【方药组成】火硝 20g 白矾 25g 水银 30g 轻粉 3g 冰片 3g

【制用方法】将上方中前3味共研细末，放于铁盆内，再用瓷碗盖上，用盐水泥封固，放在火边焙干。如有裂缝再糊1次，以无缝为好。然后用文火烧1小时，再用武火烧5分钟。俟药上升碗上，耳听无音，冷后将碗取下，将碗上的灵药用刀刮下，再把轻粉、冰片各3g研细加入，用香油调涂患处，每日1次。

【功效】解毒、驱霉、消疮。

【适应病症】梅毒。

【方解】因肝脉绕阴器、肾开窍于阴，当不洁交媾时，毒气乘肝肾之虚而入于里，初病多局限在阴部外表，邪毒浸渍发为疮毒。治疗当以清血解毒，促进正气恢复。方选炼制而成的汞化物外涂，把毒性极强之药外用，深入肌肤，以毒攻毒，解毒杀虫而病除。

【临床应用】梅毒的病因为感受霉疮毒气，多由不洁性交时阴器直接传染而得。现代医学认为梅毒的致病体是梅毒螺旋体，当进入机体后即在侵入处的组织中繁殖，引起局部反应。因此及时

选用硝银散外涂患处治疗，对阻止毒气侵入营血脏腑有益无害。

【注意事项】使用本方时，如毒气已伤气血脏腑，在选用外治同时，必须整体治疗，以消除血液中之毒素，促进正气的恢复。

三黄二妙散

献方人小传 王立群，见上方。

【方药组成】黄连、黄芩、大黄、苍术、白芷各等份 生香油
适量

【制用方法】将上 5 味药焙干、研细、筛后装瓶备用。用时取花椒适量，加水煎后，用其煎液洗除脓痂，然后取药粉用生香油调匀涂患处，1 日 1 次，到痊愈为止。

【适应病症】脓疱疮。

【方 解】本方所治之病，好发于夏秋之季，多见于儿童。乃因湿热相搏，壅于肌肤，则为痈肿疮毒。治疗当以清热燥湿，泻火解毒，用三黄泻火解毒；二妙燥湿排脓；选方外涂患处，直达肌肤，使湿邪去、热毒解，诸症可愈。

【临床应用】脓疱疮，俗称黄水疮，具有强烈的接触传染性。在夏秋之季，当外界气温湿度适于细菌繁殖，致病菌即乘机致病。好发于人体露出部分，如面、手、下肢及臀部等处。选用本方外用，安全效佳。

【注意事项】如患者病损广泛或伴有发热及淋巴结肿大者，在选用本方外用之时，需配合全身治疗。

【疗 效】一般 3~5 次即愈。

头虱酊

献方人小传 叶以健，男，49岁，广东新会市人。现为新会市会城医院中医科负责人，主治医师（通讯地址为广东新会市会城医院，邮码529100）。1966年毕业于广州中医学院中医学徒班。曾在北街中心医院、睦州医院工作过，在新会市卫生学校当过专职教师，培养中医、西医进修中医人材数百人。曾多次参加国际、海峡两岸（港、澳、台）、全国、省市中医药学术研讨会，发表论文10余篇，获1等奖3次，2等奖1次。对脊髓灰质炎的临床分析与治疗，成绩显著，见解独到，并参加国际中医药学术研讨交流。对儿科临床经验为专长。

【方药组成】 百部 100g 五色梅种子 50g

【制用方法】 上药切片盛于瓶中，加95%医用酒精浸没诸药为度，加盖密封1星期后，其浸出液为药备用。用量约20~40ml不等，视其头发多少而灵活掌握，用棉花舔吸涂抹于头发，湿透为度，再用毛巾裹头12小时后才清洗梳理头发。10岁以上药液不必稀释，9岁以下 $\frac{1}{3}$ 水稀释（酒精浓度约70%）后才用，头虱及虱卵1次即可杀灭。

【功效】 毒杀虱及虱卵。

【适应病症】 所有头虱。

【方解】 本方所治之病为头虱。头虱颇为难治。本方百部药用功能很多，独取其毒杀虱类之长，配以五色梅种子芳香辟秽，使其毒杀虱类的功能明显增强。95%医用酒精除了起到提取百部硷（百部）、马缨丹烯A、B（五色梅）的有效成份外，高浓度酒精本身能凝固蛋白质，故使虱、特别是虱卵的蛋白凝固而破杀。所

以 3 者结合就能起到铲草除根一次成功。而对人体影响极少。

【临床应用】头虱，凡有头发的人都有机会感染。女多于男，儿童常见。幼儿及学龄儿童，交头接耳嬉戏，感染头虱机会多，由一人传及全班学童患头虱的情况屡见不鲜，而用农药驱杀头虱致使人虱共毒者也时有发生。头虱吸血，致人贫血，传布疾病，引起皮肤搔痒，影响睡眠，重者致使皮肤感染、脱发，影响儿童发育。农村边远地区为常见病，高度发达的大都市，亦时有发现。此方治疗效果良好，安全系数高。

【注意事项】①因为此药含酒精 95%，用药时要远离火源。②酒精过敏者不能用。③涂抹药液时用布带把毛发以外的五官隔离开，防止药液流下刺激五官（特别是眼睛）。④用药不宜多，毛发全部湿润为度。药后有寒颤感（酒精挥发带走热量所致），稍后渐而消除。⑤酒精挥发后，头发硬朗，似涂浆糊，用水清洗梳理后，即复如常。

【疗效】治疗头虱 94 例，男 25 例，女 69 例；最大年龄 72 岁，最少 2 岁，平均 8.3 岁；分试验与对照两组，试验组用上述头虱酊剂原方，治疗 56 例，全部 1 次用药痊愈。对照组用百部 100g 煎水洗头，治疗 38 例，11 例 1 次用药痊愈，20 例 2 次用药痊愈，7 例未愈 ($X^2=55.836 P<0.005$)。在 x^2 检验两个样本率的比较中，有明显差异，说明试验组的头虱酊有非常显著的优越性。

【典型病例】冯结莹，女，4 岁，新会市幼儿园学生。因在幼儿园班感染头虱，搔痒不能眠，抓破头皮致轻度慢性感染，耳后淋巴结肿大，多方面治疗，未见理想。有某医院疑为淋巴肉瘤，准备作进一步活组织病理切片检查。后来此就诊，问及病史，家长亦有头发皮肤搔痒情况，当即发现头虱而确诊。用上述药液 20ml 加水 7ml 小孩用，家长 40ml 不加水，医嘱用法及注意事项，1 次用药而愈。其肿大淋巴结 1 个月后消失。

生 发 酊

献方人小传 孙集庚，男，52岁，山东省淄博市人。现为山东省淄博市劳动局技校保健站主治医师（通讯地址为山东省淄博市劳动局技工学校，邮编255202）。1962年毕业于淄博卫校，毕业后改习中医。至今已从事中医临床30余年，是省市中医学会会员。擅长中医妇科、男科，发表论文10余篇。近年来潜心研究中药外治皮肤病，收到良好疗效。

【方药组成】当归 30g 红花 20g 鲜侧柏叶 50g 生姜 30g

【制用方法】将当归捣碎，生姜切丝，鲜侧柏叶剪碎与红花共入瓶中，再加入75%酒精500ml，封口，1周后启封使用，用时摇匀，以药棉蘸取药液稍微用力反复涂擦患处，每日2次，早晚涂用，直至生出新发。

【功效】养血生发。

【适应病症】斑秃。

【方解】本方所治之病，多因肝肾亏虚，阴血不足。血为气母，血虚气亦虚，腠理不固，毛孔开张，风邪乘虚而入，风盛血燥，发失所养，则发脱落。病在肌腠，选药外用，药液经毛孔直达皮下，较之内服方便效捷。方中当归、红花养血活血。鲜侧柏叶、生姜祛风凉血；酒精能扩张血管，增强血运，改善毛发营养并能促进药液吸收，诸药合用共奏养血润燥，祛风生发之效。

【临床应用】斑秃一证多因血虚受风、毛发失养所致，现代医学认为与植物神经功能失调有关。证见头部突然发生的局限性斑状脱发，无任何自觉症状，严重者可成全秃、普秃。该病虽不甚痛苦，但因影响容貌，可给患者造成精神负担。外用生发酊涂擦，可激发毛囊再生功能，使病损早愈。

【注意事项】使用生发酊外涂 1 周后可见细软毳毛长出,此时,只可轻轻涂药,勿再用力涂擦。

【疗效】用生发酊外涂治疗斑秃 23 例,涂药 1 周病损处有新发长出者为显效,共 7 例,涂药半个月病损处有新发长出者为有效,共 13 例,涂药 1 月以上病损无改变者为无效,共 1 例,总有效率为 95%。

【典型病例】任×,男,57 岁,1987 年 10 月 23 日就诊。自诉于晨间梳洗时发现头部有斑状脱发 3 处,局部无痛痒,诊其舌苔薄白两脉沉细。查皮损呈圆形或椭圆形,大者约 3cm,小者如 5 分硬币大,局部皮肤光亮无毛发,边缘清楚,周围毛发正常,诊为斑秃。给予生发液 500ml,嘱每日 3 次局部涂擦。1 周后见有细软新发长出,改为每日 2 次继续用药 20 天,斑秃消失,新发较之周围头发色黑且粗。

鸡 眼 平

献方人小传 罗永山,男,36 岁,主治医师、院长,在撰山子金矿职工医院工作(通讯地址为内蒙古赤峰市敖汉旗撰山子金矿职工医院,邮编 024331)。本人对面瘫、肩周炎、崩漏、流产、肝胃病的治疗不但采取了传统的治疗方法和民间秘方,在实践中又有所创新,有独到之处,疗效显著,在当地远近闻名。曾在国家及省级书刊发表文章 11 篇。其中 2 篇被评为国家级优秀论文,有 3 篇分别获得优秀论文市级 1、2、3 等奖。本人的名字被载入《知名中青年中医药师名录》一书。

【方药组成】酒精(笔者用 75%的) 100ml 申姜 30g

【制用方法】将申姜泡于酒精内 7 天,取其药液每天涂患处 10 余次,每次反复涂擦 2 分钟左右。每天用利刀削去鸡眼表面粗糙

角质层。

【功效】通利血脉，活血祛瘀。

【适应病症】鸡眼。

【方解】本方所治之病乃因外伤或摩擦等为诱因，而致气血凝滞郁于肌肤而发。方中酒精性热，通利血脉；生姜性温，能破除瘀血，二药相溶通利血脉，活血祛瘀。

【临床及应用】本病发于手掌、足底或趾间，约米粒大至黄豆大小，角化性增厚，中央有角质增生核。呈浅黄色、灰黄色或灰褐色。圆锥之基底扁平，表面粗糙，略突出于皮面呈圆形似鸡眼状而得名，其尖端深入皮内，削去表面则呈丝状角质物。有明显挤压疼痛。用鸡眼平治疗，一般1周左右时间可愈，无任何不良反应。

【注意事项】刀削角质层不要太深，以不出血为度。

【疗效】经临床24例验证，疗效好。治愈时间最短6天，最长18天。

【典型病例】陈×，男，32岁。1989年8月4日诊。自述走路时右足跟疼痛2个月。查：右足跟偏左处有黄豆大硬结浅黄色，表面粗糙，稍隆起皮肤，呈圆形似鸡眼状。按之疼痛。诊为鸡眼。用以上治法7天，最后1次刀削鸡眼尖端脱落。随访2年，未复发。

白 芨 膏

献方人小传 王同正，男，57岁，河北行唐人。现任行唐县计委门诊部主治医师（河北行唐县城内西街，邮编050600）。14岁参军从医。临证多采用中西结合，用药少而精，处理儿科疑难病有时1~2味药而出奇制胜，已发表论文20多篇。与人合作翻译

出版了《最新实用抗微生物治疗手册》、《现代临床用药必备》、《最新实用护理手册》等3部专著。

【方药组成】白芨 30g 五倍子 15g 凡士林 50g

【制 法】先将白芨煮透后烘干，分别将五倍子、白芨研极细末，上药用白凡士林混合均匀储瓶备用。

【功 效】收敛生肌，解毒消肿。

【适应症】乳头破裂，手足破裂。

【方 解】五倍子、白芨均有收敛生肌、解毒消肿之功，加入凡士林能促进乳头裂口生长愈合。

【临床应用】乳头破裂多由于哺乳期乳头不卫生，加之分娩后脾气虚弱，造成乳头感染、裂解。本病内服药效果不著。上药物有较强的粘合力，外用直接作用于乳头，能使乳头裂口迅速愈合。

【注 意】小儿吮乳前先将药膏用干净热毛巾轻轻揩净；另外小儿的吃奶次数要酌情减少，其间可用奶粉及米糊补充，以利裂口愈合。

【疗 效】共治疗乳头破裂 32 例（1 个月为 1 疗程），1 疗程临床治愈 18 例，好转 8 例，无效 6 例，有效率为 81%。

三子止痒熏洗方

献方人小传 刘彦，男，32岁，黑龙江省海伦市二轻医院临床医生。高中毕业后随五代祖传中医世家、副主任医师刘显廷（姑父）学医，1991年10月29日参加全国成人高等自学成才中医专业考试即将毕业。临床主张中西医结合，标本兼顾，获得良效。对内病外治的治疗取得明显效果，发表了论文10余篇，1993年撰写“中西医结合治疗面神经炎25例”刊登《中国实用中西医结合杂志》。

【方药组成】防风 20g 荆芥 20g 蛇床子 30g 鹤虱子 30g
地肤子 30g 大戟 15g 艾叶 20g 苦参 20g

【制用方法】将上药加适量水煮沸后倾入容器内，容器以能适应患部体位熏洗为宜。趁热将病损部放于盛药容器上，使蒸气直达患处，周围的空隙，以布单包绕严密。俟水变温（接近体温时）即以药水浸洗患处。每日 2 次，每次 15～20 分钟，3～7 天痊愈。

【功效】祛风止痒，杀虫。

【适应症】阴囊、肛门、女阴瘙痒症，滴虫性阴道炎。

【方解】方中防风、荆芥祛风止痒；蛇床子、鹤虱子、地肤子、苦参杀虫止痒，收敛吸湿；大戟消肿散结；艾叶散寒止痛。诸药配伍熏洗可使热气内注，透达经络。药效在热力的引导下，渗透组织深层，滋润皮肤，促进血液循环，使药物利于透入皮肤而治病，故配伍祛风止痒杀虫的药物疗效满意。

【临床应用】本方所治之病是属祖国医学“痒症”、“阴痒”范畴，由湿热蕴于肌肤，或血虚肝旺生风生燥，肌肤失养或肝胆湿热下注或感染滴虫毒邪，兼湿热内蕴所致。

【注意事项】使用本方治疗疥疮患者需加硫黄，熏洗容器必须选用砂锅或搪瓷器皿。如熏洗 3 次不见效者，应选用其它方法治疗。

第七章 五官科疾病外治方

虎耳草滴耳液

献方人小传 张祖芬，男，52岁，福建省永太县人。现为永太县中医院（邮编 350700）主治中医师，兼任永太县中医学学会理事长。60年代初高中毕业后，跟永太名老中医郑永成、林云章学医5年，相继在永太在关、梧桐、葛岭卫生院、莆田地区医学研究所、永太县中医院工作，连续医龄33年。主治中医内科、妇、儿各科疾病，以中医心脑血管疾病为专长。近年对中医男科，以慢性前列腺炎为主攻研究课题。有10余篇论文在省、国家和国际性学术会议上交流发表。治学严谨，经验丰富，深受广大患者赞誉。

【方药组成】鲜虎耳草 5~10 叶 冰汽 0.3~0.5g 鲜母乳 0.5~1ml

【制用方法】鲜虎耳草洗净晾干，合鲜母乳捣烂取汁，装入滴眼瓶内，加冰汽溶化后滴入耳内，日滴 3~6 次，连用 7 日。1 岁以下婴幼儿日滴 2~3 次。

【功效】清热解毒，消痈止痛。

【适应病症】急、慢性中耳炎。

【方解】《本草纲目》：虎耳草“气味微苦，辛、寒，有小毒……，又治聾耳，捣烂滴之”。冰汽性能、功效，《本草纲目》：

“气味微寒，辛苦……疗喉痹，通诸窍，散郁火”。虎耳草为本方主药，辅以冰汽少许，共为清热解毒，消痈止痛之效。

【临床应用】急、慢性中耳炎，耳底疼痛，耳内流脓、流水，或溃烂发臭。

【注意事项】连滴 7 日，效果不显，宜配合其他中西药治疗。因用母乳配制，宜当日用完。

【疗效】治疗 50 例，男 30 例，女 20 例。1~6 个月 10 例；7~12 个月 15 例；2~10 岁 13 例；11~20 岁 6 例；21~30 岁 3 例；31~40 岁 2 例；41~50 岁 1 例。治愈 47 例，无效 3 例。重者用药 1 天，长者用药 7 天，一般用药 2~3 天。

【典型病例】张×，女，2 岁，1992 年 3 月 2 日就诊。患者发热、咳嗽，鼻塞流涕 1 周，服中西药后好转。第 8 日起耳底剧烈疼痛，啼哭不安，耳中流脓水，时时发臭。用虎耳草滴耳液，日滴 2~3 次，连用 3 天，未见耳内流脓水，无发臭。病情转愈，观察 1 年，未见复发。

吹 耳 散

献方人小传 孙振清，男，49 岁，辽宁省丹东市人。现为丹东市中西医结合医院专家门诊部内科主任（通讯地址：丹东市振兴区振八街 1 号楼中西医结合医院专家门诊，邮编 118000）。1964 年毕业于安东医专。后又学习中医 2 年，一直从事内科临床工作，以消化系为专长，并擅长中西医结合的临床治疗。发表、交流论文 10 余篇。该方系自研方，临床应用疗效满意。

【方药组成】五倍子 15g 黄连 15g 枯矾 10g

【制用方法】上药共研极细末，混合装瓶备用。用时以纸卷成细管或用细塑料管摄入适量药粉吹入耳道深部。每日 2 次。

【功效】消炎杀菌、收敛。

【适应病症】化脓性中耳炎。

【方解】化脓性中耳炎属中医“聾耳”范畴，常为风邪热毒袭耳，或肝胆湿热上扰耳窍所致。而方中五倍子收湿解毒、消肿敛疮；黄连泻火解毒、清热燥湿；枯矾收敛燥湿解毒。

【临床应用】吹药前宜先用棉棒沾双氧水或生理盐水将耳道内的分泌物清除，然后再向耳内吹药。

【注意事项】本方研制成粉末过筛时应越细越好；装瓶贮藏应防潮；剂量不必拘于此量，按 3 : 3 : 2 的比例亦可。

脓耳散

献方人小传 李贵海，男，47岁，副主任医师，现任青岛市中医药学会专家门诊部院长，华夏医药研究会常务理事（通讯地址：青岛市四流南路12号，邮编266042）。毕业于青岛医学院，从医27年，长年致力于中医内、外、妇、针灸的研究。擅长治疗老年脑病、不孕不育症、外科杂病等。曾在国际、国家级刊物及学术大会发表论文26篇。曾参加编写《高粘血症》一书。

【方药组成】四川黄连 10g 冰片 5g 枯矾 20g 龙骨 20g 鱼脑石 20枚

【制药方法】上药共研细末，装瓶备用，治疗时先将耳内脓液用双氧水洗净，再用消毒棉签将耳道拭干净，用纸筒（呈喇叭状）将药末装入，由他人轻轻将药末吹入耳内。然后用消毒棉球轻轻堵塞外耳道，以防药末脱出。每晚睡前用药1次，一般药末与脓液干结后可自行脱落掉出。用药6~10次即愈。

【方解】本病是由细菌入侵耳内，引起中耳粘膜和鼓膜化脓性病变，相当祖国医学的“脓耳”、“聾耳”范畴。治疗以清热

解毒，消炎杀菌，故采用耳窍局部用药，方药用黄连、冰片、枯矾等五味药具有清热解毒消炎杀菌之功效，故能奏效。

【临床应用】本方适用化脓性中耳炎，症见剧烈耳痛，呈刺痛、钻痛、跳痛，耳内流脓汁，脓汁有特殊的腥臭味，听力减退，伴全身不适，寒战，发热，食欲不振等。

【注意事项】使用该方，药物制作研末必须研成粉状细末，吹入耳内要让其药末与脓汁干结后自行脱落掉出，若药末在耳内长期不脱出，可用双氧水反复浸泡冲出，不可用金属利器掏出，以防损伤局部粘膜引起炎症。

【疗效】笔者 1968 年至今 27 年，长年使用本偏方治疗化脓性中耳炎，共治愈 103 例，其治愈率达 100%，一般疗程为 10 天~15 天即痊愈。特殊病患者反复发作可继续治疗。

百 灵 丹

献方人小传 史天阳，男，26 岁，河北省磁县人。现为慈恤诊所主治医师（通讯地址：河北省磁县台城乡西城基慈恤诊所，邮编 056500）。16 岁自学中医，18 岁参加河北医学院邯郸分校的中医函授，次年入县人民医院进修实习，经多师垂教。在内部刊物上发表论文数篇。对内、外、妇、儿科常见病常能处之泰然，得心应手，尤擅长内科杂病及某些疑难病症的治疗。

【方药组成】鲜猪苦胆 1 具 枯矾适量 冰片、珍珠少许

【制用方法】将枯矾研末填满猪苦胆内（注意胆汁不可扔掉），用尼绒绳将苦胆口系紧悬挂于阴凉通风处，房檐下最佳，切记不可挂在室内。经 1 载后摘下取出内容物敲开，再按 10：1 的比例加冰片、珍珠研成极细末即成本品，装入瓶内密封切勿漏气。

【功效】清热解毒，消肿止痛，敛疮生肌。

【适应病症】中耳炎，口腔溃疡，扁桃腺炎（单双喉蛾），咽喉肿痛，舌炎舌痛，黄水疮等。用时将鹅管装本品少许吹撒局部即可。

【方解】方中苦胆大苦大寒，可清热毒而退壅肿，散火结而消炎痛，复感受天地阴寒之气使其清凉之作用更进一层；配枯矾敛疮生肌，燥湿防腐，为皮肤疮家不可缺少之圣药。加之冰片辛香走窜，清热止痛而增强上药之诸功效，使本方药少而力专，一试而功见。加珍珠辅群药解毒防腐，收口生肌更是妙不可言。

【临床应用】本品应放置阴凉干燥处，受潮结块则效力减弱，故当入瓶内以密封之，治中耳炎时应先将耳道经双氧水清洗，棉签擦净后再吹入本品。扁桃腺炎吹入时药粉必须附着在肿大的腺体上，否则无效。口腔溃疡，舌炎舌痛撒布局部即可。黄水疮可用麻油调敷。

【注意事项】本品无任何副作用，只有少数患者在吹入咽喉时因本药气味的特异刺激而出现恶心或呕吐现象，单用不妨。若吹入即恶心呕吐，再吹如是者，可改用他法。

【疗效】疗效确切，除极少数外，基本上屡用屡效。

白月消息散

献方人小传 张应兴。详见内科“偏正头痛宁”方。

【方药组成】白矾 6g 月石少许

【制用方法】研末，吹息肉上，可化水流出而愈。

【功效】燥湿止痒，清热解毒。

【适应病症】鼻生息肉。

【方解】鼻生息肉也叫鼻痔。是以鼻孔内可见到灰白色或粉红色的半透明新生物，表面光滑，触之无感觉不易出血。巨大

息肉可使鼻梁变宽，外形臃大饱满而如蛙形，鼻塞涕多，嗅觉减退，头昏、头胀等为特征。用本方可使毒解、肉消、痒止，随之各种症状（如头昏、胀、鼻塞等）消除，最后使息肉平而病愈。

【临床应用】白月消息散有良好的解毒消炎，收敛止痛等功能。因白矾难溶于水，而易沉淀，又因本病生于鼻腔之内，故用散剂吹入正合此意。一般用本方治疗鼻息肉用至4剂可愈。

【注意事项】本病与肺经风湿热邪或胃经湿热凝滞有关，故宜忌吃膩胃荤腥或易生湿生痰、生热之类的发物。

麝 梅 散

献方人小传 曾庆林，男，51岁，广东南雄县人。现为广东南雄县人民医院（512400）门诊部主任、五官科主治医师。1962年卫生学校毕业后，一直从事临床工作。并先后2次在广州医学院西学中班学习和进修耳鼻喉科，积累了丰富的临床经验。1985年以来，在县、省发表过论文。“鼻咽癌误诊误治病例报告及早期诊断的建议”在全国基层医院论文选杂志上发表，1993年论文“中西医结合治疗急性会厌炎37例临床总结”参加全国耳鼻喉科（厦门市）诊疗新进展研讨会上交流。

【方药组成】麝香 0.3g 梅片粉 3g

【制作方法】上药分别研末，混合均匀，置于密封的小瓶内（青霉素瓶用完后洗净烤干）备用。用时取一个5寸长的吸管，插入药瓶内装入药末约3~5mm（半粒米大），对准前鼻孔吹入，每侧鼻孔吹1次，每日1~2次。

【功效】消炎、通窍。

【适应病症】慢性鼻窦炎，慢性鼻炎。

【注意事项】孕妇及婴幼儿禁用。吹粉时患者闭眼，勿大力吹

入眼内。

【疗效】经治11例全部治愈。一般3~5天症状改善,7天为1疗程,休息3天,可重复第2疗程。一般2个疗程可愈,最多3个疗程。吹入粉后5分钟,患者连续喷嚏,流脓性分泌物,10分钟后自然停止,无其它明显副作用。

【典型病例】高×,女,36岁。鼻塞伴流脓性鼻涕、头痛3年余。曾在本院及五官科就诊,X光摄片示“上颌窦炎”(双),并住院治疗,经用青霉素、中药、上颌窦穿刺冲洗并注入庆大霉素4万^u,效果不明显,最后作上颌窦根治术,术后症状好转,2个月后又复发。后经作者使用麝梅散吹鼻,日2次,1个星期后鼻塞头痛减轻,2个疗程后症状消失,X光摄片:上颌窦(双)正常。至今已10年无复发。

鼻 渊 通

献方人小传 刘玉春,男,40岁,出身于中医世家,自幼随父学医。曾参加中医函授学院学习,熟谙中医基础理论,治学严谨,精通中医各科,尤长于内科、儿科。常选经方投治,多1~2剂建功。曾撰写了数篇论文,先后参加了全国中药炮制学术会议和第一届中药内病外治学术研讨会。现在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中医院(邮编161041)任中医师。

【方药组成】猪胆1个 冰片15g 麝香0.2g

【制用方法】将冰片、麝香二药装入猪胆内,阴干后,去掉胆皮,研为极细末,装入小瓶封闭备用。用时将脱脂棉捻成细条,蘸药末少许,放入患侧鼻孔内,或将药末吹入鼻孔内。

【功效】清热通窍。

【适应病症】慢性鼻炎,慢性副鼻窦炎。

【方解】本方所治之病，乃因感受风湿热邪或感寒日久化热，造成湿热上蒸，郁阻鼻窍。经络不通，气机不畅，故治以清热开窍，调畅气机。方中冰片辛散苦泄，芳香走窜，既开窍散瘀又清热止痛；麝香辛散温通，为开窍要药，能通诸窍之不利，开经络之壅遏，又长于活血散结；猪胆苦寒，苦能胜湿，寒能清热，3药相合，既清热祛湿又开窍通络，俾鼻窍通，气机畅而病自除。

【临床应用】慢性鼻炎、慢性副鼻窦炎是鼻部常见的慢性病，大都是急性感染时期未彻底治愈转变而成。其临床表现为：前者鼻塞不通，嗅觉迟钝，鼻涕粘稠；后者鼻塞流涕，日久不愈，鼻涕稠厚呈黄脓色，有腥臭气味，甚至嗅觉减退，不闻香臭，前额胀痛。中医称为“鼻塞”、“鼻渊”，为湿热上升，熏蒸清窍所致。故用鼻渊通嚏鼻，使分泌物增多，湿热外泄。若能取嚏效果更佳。

【注意事项】本药芳香走窜，活血散瘀，故孕妇禁用。

【疗效】本方治疗慢性鼻炎 53 例，全部治愈；治疗慢性副鼻窦炎 74 例，痊愈 69 例，显效 5 例。

止血大蒜泥

献方人小传 易忠禄，男，41岁，四川万县龙古乡人。现为内蒙古赤峰市城郊乡西南地村卫生所主治中医师（通讯地址：内蒙古赤峰市城郊乡西南地村，邮编 024006）。12岁侍学于当地冉凤伍、路润医生，4年后出徒。1969年应征入伍，次年推荐入军医校学习，1973年7月毕业。后入辽宁中医学院函授，北京中医学院进修，先后毕业和结业。对疑难杂证有深入的学习和研究，强调综合治疗，内服外用并重。尤其专长中医脑病治疗。已发表“鹿茸益智散治疗小儿大脑发育不全”、“浅谈中风急性期治疗”等论文 18 篇。根据多年临床心得，编著有《中医脑病新论》一书。

(待出版)。

【方药组成】大蒜 60g 大黄粉 20g

【制用方法】上药共捣如泥。将足底用猪油搽过，贴于足心，厚约 1cm，纱布包扎。血止后去之。鼻衄：左鼻孔出血贴右足，右鼻孔出血贴左足。两鼻孔出血、咯血、吐血双足心俱贴。

【功效】解毒止血。

【适应病症】鼻衄、咯血、吐血。

【方解】鼻衄、咯血、吐血多由肺胃郁毒积热损伤脉络所致。方中大蒜行滞气，暖脾胃，消瘕积，解毒杀虫。《本草纲目》谓：止衄血。大黄泻热解毒，行瘀导滞，善治吐血、衄血。贴于足心，一是借大蒜对皮肤的刺激，通过肾经（涌泉穴）使药力较快直达病所，发挥解毒止血作用。二能引热邪下行，火降血宁，出血自止。

【临床应用】①蒜泥越捣细越好。②令患者注意闻到蒜味，使其心静神宁，有助止血。③血止后，根据病因采取相应措施，以防复发。

【注意事项】因大蒜对皮肤有刺激，为防止发生水泡，故需先用猪油或其他动物油涂擦。

【疗效】治鼻衄 20 例，10~30 分钟，全部血止。咳血 5 例，30 分钟~1 小时血止。吐血 3 例，30 分钟血止。

【典型病例】周某，63 岁，农民，1977 年 7 月 6 日诊。市医院确诊晚期肺癌，劝其出院，家人已备后事。诊日凌晨，剧烈咳嗽并大咯血。诊见：形消瘦立，呛咳，鼻口血污，咯血快满洗脸盆。声音低微，额部汗出，烦躁不安，脉细弱。急以紫皮大蒜半小碗（约 120g）、大黄粉 20g，共捣细如泥，贴于双足心，手绢包扎。并令患者注意闻蒜味，20 分钟后，咯血渐少，1 小时完全停止。去蒜泥，以人参、阿胶西瓜汁等调治 2 月，渐获痊愈，13 年后随访未见复发。

象 皮 膜

献方人小传 徐国榕，女，60岁，广东省中山市人。安徽中医学院副教授，安徽中医学院附属医院（邮编 230031）副主任医师。1955年毕业于北京医科大学口腔医学院。1958～1961年在长春中医学院西医离职学习中医班学习，毕业后，曾在长春中医学院及安徽中医学院从事中西结合的临床、教学及科研工作。曾任耳鼻咽喉科教研室主任，附院中医喉科主任等职。现为全国中医耳鼻喉科学会理事，安徽中西医结合学会副秘书长及常务理事。发表论文 10 数篇，出版了《中医口腔病症学》及《口腔科常用中药指南》两书，结合临床需要，改革中药剂型提出多种泡袋剂、膜剂、含片及气雾剂之内服及外用配方。

【方药组成】 象皮

【制用方法】 取象皮适量，用清水浸泡，刷洗、切碎，然后煎煮、浓缩、过滤，加入成膜剂及甘油，倒在涂有液体石蜡的玻璃板上，厚约 0.5mm，干燥后即成膜。用时剪取比病变面积略宽出 1～1.5mm 的药膜，贴敷患处。

【功效】 敛疮生肌。

【适应病症】 鼻中隔粘膜糜烂，口腔粘膜溃疡，单纯性鼓膜小或中等大穿孔。

【方解】 此药膜含多种氨基酸。有消炎、滋养、保护创面、促进上皮生长等作用，可缩短愈合时间。

【临床应用】 凡粘膜或皮肤之创面及溃疡皆适用。但对因全身性疾病引起者，尚须结合全身用药，方能彻底治愈，防止复发。

【注意事项】 ①本品无毒、无痛、无副作用。②用于鼻腔者应在出血停止后贴敷。鼻腔有分泌物时影响药膜之附着。③用于口

腔者，因口内有唾液，药膜溶解快，溶后可再贴，每日可贴 3~5 次。贴于口唇及口腔上半部之药膜较贴于下半部者药膜溶解慢，维持药效时间长。贴后应尽量减少唇舌的运动，勿饮水，以饭后或睡前贴用为宜。④用于修补鼓膜穿孔者，因夏季耳道内温度高、湿度大，药膜易软化，故最好避开夏季使用。

【疗效】①鼻中隔糜烂贴 1~2 次可愈。②鼓膜穿孔修补 1~2 次可愈。③口腔粘膜溃疡治愈率 87.5%。

辛麻熏鼻液

献方人小传 阎斌，见内科“红星木方”下。

【方药组成】生麻黄 3g 辛荑 3g 苍耳子 3g 川芎 1.5g 葱白 1 节 风寒型加白芷 3g 风热型加薄荷 1.5g

【制用方法】上药用凉水浸泡 30 分钟后，煮沸，蒸气吸入。

【功效】祛邪活络，肃鼻润肺。

【适应病】急慢性鼻炎。

【方解】本方所治之病多为民间俗称伤风感冒和久病不医之鼻塞。肺为娇脏，开窍于鼻，与皮毛相表里。挟寒挟热，鼻先受之，下传于肺。肺失清宣，上犯于鼻。水样清涕，直到脓浊臭味和不同程度鼻塞为临床就医主诉。方中药物蒸气熏冲鼻腔，上达清窍，下润肺脏，辨证加减。白芷，温阳散邪，通窍肃肺；薄荷辛凉解表，疏风散热，通窍利肺；佐以血中气药川芎，药到病所，循经而入。

【临床应用】各种急慢性鼻炎。笔者自 1987 年以来，治疗 500 例。用药前均详细做前后鼻镜检查（除外各种占位性肿物病例）见鼻粘膜充血水肿，状如葡萄。伴流清涕，打喷嚏，鼻内作痒，脓浊下注和不同程度阻塞。现代医学认为由于鼻病毒入侵，细菌感

染致鼻粘膜充血、水肿，导致鼻通气不良。笔者通过多年临证感受，外邪入侵，鼻窍先受，下传于肺，肺气失宣，上犯于鼻。治宜祛邪活络，通窍宣肺。

【注意事项】熏剂煮沸，不得火候太过，使蒸气适中，便于收集（多用废 X 胶片卷桶或其它硬质纸片等）熏蒸鼻腔，早晚各 1 次，每次 10～15 分钟。

【疗效】急性鼻炎，经 1～3 剂均可治愈；慢性鼻炎，经 5～10 剂，也能收到消肿止痒而通畅。

【典型病例】句玲玲，女，12 岁，某小学学生。于 1993 年 8 月 2 日，以双侧鼻阻塞，白天轻，夜间重，流清涕，打喷嚏，鼻内灼热感就医。前鼻镜检查：双侧鼻粘膜充血，水浸样改变，无脓涕、异物。西医认为急性鼻炎，给予辛麻熏鼻液加薄荷 1.5g，3 剂治愈。

木附青矾散

献方人小传 李学声，男，58 岁，江苏铜山县人。现为铜山县柳新医院副主任中医师。1962 年大专毕业，对内、妇、儿科诸多疑难病的治疗，尤有独到，且长于中医外治。现任中医科主任，中国疑难病研究所特约研究员。经多年苦心钻研，自创天灸膏穴位贴治慢支和哮喘，健童散敷脐治疗小儿腹泻，军石散外涂治疗烫火伤等，均取得显著效果，有效率达 95% 以上。在省级以上医学杂志发表论文 40 篇，省以上学术交流 20 余篇，有 20 篇获省、市、县级优秀论文奖，有 500 余篇卫生科普文章被报刊电台录用。现已载入《求医问药实用辞典》、《疑难杂症求医指南》、《中国当代知名中医特色医疗辞典》、《中国当代医药卫生学家词典》、《中国当代高级科技人员名典》等书。通讯地址：江苏徐州市北郊柳

新医院，邮政编码 221142。

【方药组成】木附子 35g 飞青黛 20g 猪胆矾（猪苦胆装和枯矾粉阴干）25g 瑞龙脑 10g 白秋霜 10g

【制用方法】上药分别研成细粉后，按比例兑在一起，掺合均匀，贮瓶密封备用，或分装成 2~5g 小瓶，便于病人携带。用时用纸筒或竹管将药粉吹搽患处，轻者日吹搽 2~3 次；甚者日吹搽 5~6 次。一般轻者 1~2 日显效，3~5 日痊愈；甚者 1~2 周内可获康复。

【功效】清热解毒，消肿止痛，化腐生肌，渗湿敛疮。

【适应病症】急慢性口腔炎，咽喉口齿生疮，及皮肤、粘膜溃疡。

【方解】该方配伍严谨，用药精良，方中木附子消炎收敛；飞青黛清热解毒；猪胆矾清热养阴，燥湿止血；瑞龙脑通诸窍，散郁火，消肿止痛；白秋霜降火消瘀，化腐生肌。共奏清热解毒，消肿止痛，化腐生肌，渗湿敛疮之效益。木附青矾散中所含鞣酸较高，有强烈凝固蛋白质作用，对蛋白质有沉淀作用，皮肤、粘膜溃疡接触鞣酸后，其组织蛋白质即被凝固，造成一层被膜而呈收敛作用；同时小血管也被压迫收缩，血液凝结而收止血功效；腺细胞的蛋白质被凝固，引起分泌抑制，产生粘膜干燥；神经末梢蛋白质的沉淀，可呈微弱的局部麻醉现象，使疼痛减轻或消失。因此，木附青矾散在治疗中，对口腔溃疡，以及皮肤、粘膜的溃疡有较强的清热解毒、消炎止痛、收敛止血作用，能迅速促使溃疡面干燥，伤口愈合，疗效显著，以达早日康复。

【临床应用】木附青矾散，乃吾家三代祖传秘方，为治口疮之要药。吾业医 30 余载，用该方治愈多种口疮数千例，疗效卓著，治愈率 85% 以上，有效率 100%。经临床观察，对溃疡性或糜烂性口腔炎有较好疗效，止痛作用明显，加速炎症消除，促进口腔粘膜剥脱、糜烂和溃疡的愈合。特别对物理因素所引起的粘膜损

害效果良好，而对细菌性或其他复杂因素所致的粘膜损害，亦能发挥辅助治疗作用。通过临床实践，拓宽应用，该方除对多种口腔溃疡有特效外，对内、外、妇、儿、五官等科的多种皮肤、粘膜溃疡或湿疹，亦有较好疗效。

【注意事项】该方对口腔粘膜病变等疗效卓著，对细菌性或其他复杂因素所致的粘膜损害，以及久病寒盛的患者，需进行辨证论治，根据病情，适当配合内服药物，才能取得显著的疗效。治疗期间忌烟酒及辛辣厚味之品。

珍珠桃花散

献方人小传 徐昭英，男，48岁，山东省金乡县胡集镇人。现在金乡县胡集卫生院中医科（通讯地址为山东省金乡县胡集卫生院，邮编272211）。祖上四世业医皆为鲁西南喉科名家。18岁初学于父，4年后在胡集湾里村行医。1979年山东省中医药人员选拔录用为中医医师。曾任金乡县中医协会理事等职务。精于内、外、妇、儿，尤以喉科是其专长。临证主张注重整体观念，反对见症治症。强调辨病与辨证并重，对喉疾病师古而创新，反对执死方以应万变，内外并治。发表论文10篇，其中有2篇被评为优秀论文。

【方药组成】珍珠 1g 朱砂 3g 月石 20g 人中白 0.5g 天竺黄 0.5g 冰片 0.5g（后下）

【制用方法】上药共碾极细粉末，过100目筛后装入小玻璃瓶内，密封备用，用时吹撒或涂敷患处，一般不辅以内服药。吹敷的次数要视口疮大小数目，病情程度而定，每天3~4次，3天为1疗程，若病情危重，可频频吹药，使药物直接浸渍溃疡，保持局部的有效浓度，加速治愈。

【功效】清热解毒，消肿止痛，敛疮防腐，祛腐生肌。

【适应病症】复发性口腔溃疡，急性感染性口腔炎，创伤性口腔溃疡。

【方解】本方所治之病乃因心火上炎之口舌生疮，治疗当以清热解毒，泻心火，消肿止痛，祛腐生肌，收敛疮口，选用吹药，施以局部治疗，使药直达病所，以加速治愈的目的。方中以珍珠清热解毒，外用有燥湿收敛之功；月石清热解毒，外用亦有良好的祛腐生肌，消肿止痛的作用；人中白清热解毒，消瘀化腐；冰片清热止痛，祛腐生肌；配以朱砂清心除烦，天竺镇静止痛，能迅速缓解或减轻口疮的病痛。诸药合用，具有清热解毒消肿止痛，清心除烦，敛疮防腐，祛腐生肌之功效，促进溃疡愈合，缩短病情，且药性平和，刺激性小，安全无副作用。

【临床应用】口腔炎是口腔粘膜与软组织的一种疾病，大多数与全身疾病和机体状况有密切关系，中医很早就指出，湿热熏蒸则口舌生糜点，热毒蕴结则口生疮疹，火热上灼或虚火上炎则成溃疡。治疗当以清热解毒，消肿止痛，防腐祛腐生肌。选药吹敷，使药物直接浸渍病所，能迅速缓解或减轻口疮的病痛，促进溃疡愈合，缩短病程，且药性温和，刺激性小，安全无副作用。但应注意其局部特征，了解与口腔疾病有关的全身疾病。

【疗效】共治疗口腔疾病 384 例；其中治愈 209 例，显效 174 例，无效 1 例，总有效率为 99.48%。

倍连梅含漱液

献方人小传 李新妹，女，35 岁，河南省新乡市人。现为新乡市人民医院（邮编 453000）中医科主治医师。钻研结石病、糖尿病的临床研究，曾撰写发表论文 7 篇，编写《中医秘单验方妙

用大典》及《当代中国名医高效验方 1000 首》。

【方药组成】五倍子 12g 黄连 12g 乌梅 12g。

【制用方法】上药加水 500ml，煎至 250ml，含漱 5～10 分钟，每日 4～6 次。

【功效】泻火解毒，敛阴生津。

【适应病症】舌痛，舌红，舌大片剥脱或舌苔鲜红无苔。

【方解】中医理论认为：舌为心之苗，又为脾之外候，舌苔是胃气上蒸而生。正常人舌面仅有一层薄苔，干湿适中，不热不燥是胃气正常的表现。《形象外诊简摩·舌质舌苔辨》曰：“苔乃胃气之所熏蒸五脏皆禀气于胃……”。舌苔的有无消长变化，是正邪斗争互为消长的外在表现。若舌苔突然退去，不再复生，是胃阴枯竭、胃气大伤而致。西医理论认为：舌苔剥脱是丝状苔癣侵袭舌面而致，治疗较为困难。本方所治乃心胃阴虚火旺而致舌痛苔脱之症，方中黄连苦寒泻火解毒，治口舌生疮等内热火毒之症。据现代药理研究，黄连含多种生物碱，有抗抑微生物生长繁殖作用；五倍子酸咸寒，性善收敛肺胃之阴气而解毒；乌梅味酸善收敛生津，治虚热烦渴，据药理研究：乌梅有抗菌和抑菌作用。三药合用，共奏泻火解毒，敛阴生津之功，使心火消、胃阴生故病除。

【临床运用】本方除对舌痛治疗外，对西医认为的口腔炎，口腔溃疡均可运用。对于阴虚火旺症状明显者，可配合内服知柏或六味地黄汤（丸），效果更佳。

【疗效】21 例患者中，其中男性 6 例，女性 15 例；年龄最大的 52 岁，最小的 30 岁；患病最长的 3 年，最短的 30 天；治疗时间最长的 6 个月，最短的 20 天。21 例中治愈（舌痛消失，舌面生出正常薄苔）14 例，占总数的 67%；好转（舌痛消失或缓解，舌苔隐约可见或生出薄苔）6 例，占总数的 28%；无效（诸症不减）1 例，占总数的 5%。总有效率 95%。

【典型病例】张××，女，53岁，住81路。患者于1991年冬因舌痛不能弯曲，饮食困难为主诉就诊。自述从1991年7月开始只是舌痛，伴烧灼感，伴口干渴，大便不利，经土单方治疗上症不减。遂转省某医院，经检查疑舌癌，动员其住院观察。患者不愿住院故又转回新乡，欲口服中药治疗。诊见患者黄瘦，痛苦面容，观其舌体瘦小而红，舌面鲜红无苔，且有粗糙的裂纹。查血象：中性62%，淋巴38%，余未见异常。问其个人生活嗜好，言其性情易急躁，嗜辛辣。患者平素心肝火旺，灼伤肝阴，耗竭胃津以致患者口干舌痛。诊断：舌痛（舌炎）。治则：清热敛阴。方药：五倍子12g 黄连12g 乌梅12g 另配合麦味地黄丸每次1丸，每日3次。用药1周，舌痛消失，仍有口干，继续守方治疗1个月，舌面生出薄白苔，口干症状大为好转，大便也转为正常。病告痊愈。

细辛敷脐方

献方人小传 彭平建，男，30岁，湖南沅陵县人。现为湖南省怀化地区第一人民医院药剂科/药物研制中心药师（通讯地址怀化市锦溪南路19号，邮编41800）。毕业于湖南中医学院中药专业。1987年毕业分配到湖南怀化地区第一人民医院。研究开发生产30余种中药制剂于临床医疗，潜心创作，在中药理论研究，中药研制诸方面造诣颇深，成绩斐然。先后在《中国中药杂志》等20余家刊物上发表有学术价值的专业论文50余篇，省级以上学术会发表论文20余篇，多篇论文获国家级优秀论文1、2、3等奖、优秀奖，其中“生姜的药理研究和临床运用”（《中国中药杂志》1992年6期）一文被美国《医学索引》（Index Medicus，IM）收录并被译成外文在国外刊物上发表，“从《本草纲目》丹砂附方论

朱砂挂衣”(《长春中医学院学报》1992年3期)获全国医药学术论文大选赛优秀论文1等奖并被编入书中,“蜈蚣超剂量治疗Bells面瘫及毒性讨论”一文入编《中国青年中医药优秀论文荟萃》一书,“治疗感冒的中成药选择”(《中国医院药学杂志》1991年11期)入编1992年《中国药学年鉴》。与人合著《蒙汗药、毒药及解法》已付梓正在出版,为《中国药房》等多家报刊优秀特约通讯员,发表科普及文学作品百余件。入编《中国当代知名中医特色医疗辞典》、《中国当代中医药新秀大全》、《中国当代医界精英辞典》、《中国大陆名医大典》、《杏林群芳谱》、《杏林新秀》。

【方药组成】北细辛 3~5g (重用可至 9~15g)

【制用方法】北细辛文火干燥,稍冷后研成细末,分成5小袋,每袋0.6~1g,使用时用米醋或加冷开水调成糊状填充于脐上,上覆盖消毒纱布,外用胶布固定,每天1次,每次1包,一般3~4天痊愈。

【功效】散寒止痛。

【适应病症】口舌生疮。

【方解】细辛善开通结气,宣散郁滞,能上透巅顶,旁达百骸,散风邪,祛寒凝,无处不到,宣络脉。通百节无微不至而用于心胃火炎,口舌疮痛者。而细辛敷脐,既有药物的刺激作用,又有药物本身的治疗作用。脐在胚胎发育过程中,为腹壁最后闭合处,和全身皮肤结构比较,表皮角质层最薄,屏障功能最弱,药物易于穿透、弥散而被吸收。脐名神阙穴,属任脉,又为冲任循行之地,冲乃经脉之海,任督两脉相表里,故任脉、督脉、冲脉“同源而三岐”,三脉经气相通,内联十二经脉,五脏六腑,四肢百骸。从而通过经脉之循行,输布于全身,从而发挥治疗作用。

【临床应用】口舌生疮(口舌疮痛),系心胃火上炎所致。症见满口及舌面疮疡,食不甘,夜不寐,以进食有刺激性食物疼痛更甚且涎水剧增,给生活工作带来诸多不便。而细辛能散寒止痛,

而神阙穴（脐中）具有温通元阳，回厥固脱，运肠胃之气机，化寒湿积滞之功效。细辛脐疗法，可通过脐在腹壁正中，内系中焦而使药物发生效能，胃肠先承受之。从而使上炎之心胃火得到遏止，从而使口舌疮痛症状得到缓解，而达治愈之目的。

香 冰 茶

献方人小传 袁富森，生于1939年，辽宁省海城市人。针灸主治医师（内聘副主任医师）、中华医学会会员、中国针灸学会会员，现任海城市正骨医院针灸科主任，兼任鞍山市针灸学会理事。出身中医世家，从事中医针灸临床30年，总结出“综合疗法医治腰椎间盘突出症”获中医药国际学术论文证书；“综合疗法医治颈椎病”发表在《光明中医杂志》；“子午流注及临床”获辽宁省优秀论文，先后撰写12篇论文，其中省级优秀论文4篇，市级优秀论文5篇，县级优秀论文2篇。从1980年起至今治疗上述疾病达万余例，总有效率达97%，治愈率92%。近年应用针灸配合中药治疗静脉炎取得非常良好疗效。

【方药组成】孩儿茶 30g 白矾 20g 冰片 10g 麝香 0.1g

【制用方法】①将明矾置瓦上火煨至水分挥发尽，凉后取其膨胀状如海绵之白色块状物即为白枯矾；②上述各药，先研孩儿茶至粉末时，次研白枯矾，再研冰片，最后入麝香共研细末，放入玻璃器内密封，切勿透气。③视口舌溃疡面大小而定用药量多少，用药匙挑药粉均匀外敷，务必将疮面完全敷盖。日敷2~3次即可。如果属于维生素B₂缺乏者，可内服维生素B₂，同时外用本品可收良好效果。

【功效】清热解毒，去腐生肌。

【适应病症】口舌生疮，小创面外伤止血。

【方 解】心火上炎则口舌糜烂生疮，方中孩儿茶清热生津，收敛止血；冰片散郁火、消肿止痛；麝香去风毒止痛消肿，与冰片芳香走窜之功相合，令邪从外泄；加之枯矾生肌燥湿，令腐损之肌速去而生新肌。

【临床应用】香冰茶治疗口腔溃疡千余例，资料完整的 318 例。均系门诊治疗，其中男 108 例，女 210 例；年龄最小者 5 个月，最大者 76 岁；治疗 1 天而愈者 103 例；2 天而愈者 163 例；3 天治愈者 52 例，治愈率 100%。

【典型病例】白××，女，50 岁，本院护士长。1990 年 4 月 28 日初诊。自述口舌糜烂 7 天。查其舌尖部可见 0.1×0.2cm 圆型外红里黄色溃疡面，舌左前侧 0.2×0.3cm 园型外红里黄色溃疡面，左下唇内 0.2×0.4cm 园型溃疡面各 1 处，饮食时均痛，舌质红，舌苔薄黄，脉弦数。诊为口腔溃疡。遂取香冰茶均匀撒于各疮面，嘱其日用 3 次。2 诊，4 月 29 日，各溃疡面已成白色，亦无痛感，再用药 1 日而愈，到今无复发。

乌泡子勒牙虫剂

献方人小传 胡圣才，男，江西萍乡市人。1961 年于武汉医学院毕业，1987 年晋升副主任医师，现任江西萍乡市湘东中医院办公室主任（邮编 337016）。在 30 多年的临床工作中曾书写论文“胃病十防”、“督导治疗 72 例肺结核体会”等多篇，曾到武汉、珠海等地进行学术交流。

【药物组成】乌泡子勒，多年生攀援性藤本。枝和叶柄披毛，并有小勾刺。叶互生，掌状复叶，每一总叶柄有 3 片小叶，顶上的 1 片大，阔卵形，边缘具不规则锯齿，表面光滑或有疏毛，背面密披白色绒毛，小花数朵，顶生，成圆锥花序，或单生叶腋，花

序柄有疏刺，花瓣 5 片，红色，果实小球形，蕊成红褐色。常生长沟旁，草丛等潮湿地方。药用部分叶，性微寒，味苦。功用清热解毒，益阴强精，消肿止痛。

【制用方法】药物制取：取新鲜鸟泡子嫩叶 30~60g，不用洗，也不加水即放干净罐内捣细，用纱布包裹沥汁放干净碗中备用。操作步骤：①让患者仰坐在靠椅上，然后医生将已备好的药液，用注射器抽取少许缓缓滴 1~2 滴于患者两眼球上，嘱患者闭眼 5~10 分钟。②将针线穿好，把白线穿入针眼后，再将白线缠绕在针身上。③翻开患者眼睑，用已转好的针线，用针背一头深入眼内、外角等处，往返挑取眼内分泌物放入到碗或杯子装好的蒸馏水或冷开水内。每次可多点药、挑虫几次，虫尽即止。有的需多次挑虫才能将牙虫除尽。

【适应病症】牙虫病。

【方 解】牙虫藏牙内，无法直接点药、挑虫。鸟泡子勒药液不杀牙虫，但因有芳香、渗透之功，滴入眼内，对眼全无损害，还可渗入牙缝、牙龈等处，可能牙虫嗜香，闻香味即上行入眼内分泌物中，故可以眼内全部挑出牙虫。

【疗 效】曾治疗 152 例，收到满意效果。

巴荷牙痛宁

献方人小传 金振祥，详见皮肤科“地龙糖膏”。

贾效琪，男，56 岁，河北省南和县人，现为河北省放射卫生研究所副主任医师。曾主持《河北验方选》征集调查编辑工作，主持《河北地方药品标准》的编辑工作，一直从事科技成果管理评议鉴定工作。

【方药组成】巴豆 1 个 蓖麻子 1 个 薄荷脑 1g

【制用方法】①将巴豆、蓖麻子去壳，然后与薄荷脑掺和共研细末，装瓶备用。②分层撒在脱脂棉上，边撒边缠于火柴棒上，作成 1.5cm 长的棉签。③将作好的棉签，插入患牙痛侧的外耳道内，10 分钟后取出。若过 30 分钟疼痛未减者可作成直径 1cm 的药饼，从颊车、听会、印堂、涌泉中，选 2 穴敷贴即可，10 分钟后将药饼除去。

【功效】活血化瘀，消肿止痛。

【适应病症】风火牙痛，肾虚牙痛，过敏性牙痛，牙周炎。

【方解】巴豆与蓖麻子合用增强了逐水消肿，去痰蚀疮镇痛的功效。巴豆味辛性热，可使局部血液循环加快。薄荷协助促进透入皮肤，引起局部长时间充血，刺激感受器，调整神经血管功能。

【临床应用】口齿者，脏腑之门户，呼吸之机关，纳滋味以充胃肠，通津液以润经脉。故口为脾之应候，齿作骨之荣华，髓之所养，肾之所主，肾开窍于耳。手阳明支脉入于齿，足阳明经脉入于颊，手少阳、足少阳、手太阳三经脉交汇于听宫。牙齿是后天之本的门户，是饮食的第一道关口，与心脾肾等脏器有关。牙龈脓肿形成应进行破脓清创术后再敷本方。牙髓炎做开髓术后用本方。三叉神经所致牙痛，应与病因同治。

【注意事项】①现配现用佳。②贴穴或放入外耳道均不得超过 10 分钟，若刺激过量易引起水泡。

【疗效】本组共治疗牙痛者 298 例。年龄 7~68 岁，男 206 例，女 92 例。治愈率 76%（226 例），好转率 14%（42 例），无效率 10%（30 例）。

【典型病例】李××，男，35 岁，工人。1989 年 10 月 5 日去朋友家参加螃蟹宴，饱腹而归，下午 4 时许，全身皮肤刺痒，满口牙痛。经检齿龈及口腔粘膜稍有充血，上肢皮肤有少量红色疹块，越抓越痒。经查血、尿、便常规检验正常，胸部透视正常。初

诊：过敏性牙痛，荨麻疹。给予抗过敏药及止痛类药对症处理。但经一夜的时间症状不减，不能入睡，天明时来求治。采用将巴荷牙痛宁置于双外耳道内，10分钟后取出，牙痛减轻。并配合快速针刺合谷、内关、颊车、听宫1次。11时再用巴荷牙痛宁双外耳道上药一次，症状明显转轻。时至晚20时上述症状皆除而愈。今后禁食螃蟹。

火贴治痛法

献方人小传 张汉光，男，1944年11月生，汉族，江苏如皋市人。出身于中医世家，1979年10月经江苏省中医选拔考试，录用为中医师（通讯地址为江苏省如皋市白蒲中心卫生院，邮编226511）。1991年到南京中医学院参加针灸学习班，得邱茂良等教授的教诲，考试合格，并得结业证书。1992年“药饼灸疗简介”被《江苏中医》杂志采用，同年“阿魏处贴治百日咳”被《时珍国药研究》杂志刊登。1992年12月被收入由香港出版社出版的《中国当代知名中医特色医疗辞典》一书中。

【方药组成】樟脑 1g

【制用方法】每取樟脑 1g，压于伤湿解业膏中心，在痛处和相关穴位处做一记号，将膏药托术者右手指，樟脑用火点燃，迅速对准记号处贴上，往往手到病除。

【功效】温通经络，散瘀止痛。

【适应病证】牙痛，三叉神经痛，头痛，脊椎疼痛，肋间疼痛，肩臂关节、手指关节疼痛，膝踝关节以及至足趾关节疼痛，急性腰扭伤以及外伤引起的后遗疼痛。

【方解】本方所治之病，属风寒瘀阻郁积者为重点，痛点不在脏腑（指五脏、六腑、奇恒之腑）而在经络，不在深处，而

在较浅处，如在坐骨神经处的疼痛，非治无功，实属难达病所（有清瘦、臀部肉少者，试贴效亦著）。

【临床适用】如属风热疼痛，可加冰片 0.5g；如属风寒或是瘀阻疼痛，可单用樟脑外贴即可；贴后痛未大减，可用手摸一摸，如仍有樟脑硬块未有消散，术者可用医用塑料手套戴在左手上，右手用一血管钳挟一 95% 酒精棉球（注意酒精棉球干潮适度）点燃扑打未消药块，每点燃 1 次，用左手扑灭 1 次（因为樟脑隔布仍能燃烧），扑灭时术者有意轻按片时，这样既有保温防烫作用，又能不使樟脑扩散在空气中，逼气化之药直透病所。在火贴之前，最好将患者痛处安排朝上，因火性炎上，术者意在逼药气内透，为不烫伤皮肤而设。可以针灸协助进行。查《本草纲目》樟脑条，气味辛热，无毒（实际有毒）。通关窍，利滞气……。可见其效，加上火贴，清利关节，温散滞气的作用会更速更强，况其芳香辛窜之品，李时珍认为樟脑属“纯阳之品”。《内经》云：“寒者热之，热者寒之”。加上点火速贴患处，使纯阳之品迅速气化，自有通则不痛之效。故笔者 20 余年以来，用此作为秘方，救治诸痛甚众，往往手到痛止。实属简便廉者，今公诸于同道，可当即试其效验。

【注意事项】①以不烫伤皮肤为宗旨，如已烫伤，用烫伤油或紫药水涂之（熟练操作者绝不会烫伤皮肤）。②疼痛要查明原因，连贴数次不见功者，可更换他法以治之。

【典型病例】倪×，男，59 岁，白蒲中心卫生院外科主治医师。1993 年 5 月 11 日求诊。患急性腰扭伤 3 天，不能步履，不能站立，查其痛点在腰骶椎交点上，当即采用樟脑火贴疗法，取樟脑 1g，如上法，患者俯卧位，做上記号，置樟脑于伤湿止痛膏中央点燃，迅速贴于痛点，当即痛止，嘱其膏药贴至感痒揭去，并注意休息，1 周内不干重活，愈后至今未见复发。

丁××，女，45 岁，白蒲镇中药房药师。1989 年 11 月 5 日患三叉神经痛，属下支（牙科诊断）。已有 5 天不能进食，遇冷遇

热皆痛，食则痛剧，痛如针刺，如电击。用上法，先定痛点——阿是，配穴太阳（同侧）、下关、颊车，侧卧位，痛点朝天，手到痛止，至今未见复发现象。

薄菊公英汤

献方人小传 安同明，男，37岁，现为山西省平定县城关镇医院中医师。中国超声医学工程学会会员，中国民间中医药研究开发协会会员（通讯地址为山西省平定县东关三官庙38号，邮编045200）。自幼受父亲影响，偏爱祖国医学，20岁学医，先后随当地名医治疗一些农村常见病。专长放射、B超。心电图。1989年6月光明中医函授大毕业后，随父应用中医及火罐疗法治疗腰腿痛病疗效甚佳，有号“安外治”。临证审因论治，内外合治，中西相参。参加省及全国性学说会议有论文。

【方药组成】薄荷5g 菊花10g 蒲公英10g

【制用方法】上药共置于茶杯中，热沸水冲至离杯边约1~2cm处，用大于杯口的一张方块纸对折，中剪一约2×3cm大的孔，展开盖于杯口，用胶皮圈缩纸于杯外边，借纸孔处散发的药力和热力作用，头前倾患眼着于孔旁熏之，双眼疾患可轮熏，距离随热气由远而近，每日2次，每次熏10~15分钟，每剂熏后滤药液于小杯内冷洗患眼，一般2~3次见效。

【功效】疏风清热，解毒散邪。

【适应病症】风火眼和红眼病。

【方解】本方所治之病多因风热邪毒外侵，客于内热阳盛之人，内外合邪上攻于目。治疗发病起初本方首选，因病发于目，本法可使药性直接作用于病处，方选辛凉解表之品，加之蒲公英清热解毒，促使腠理疏通，气血流畅，发挥本方之功，达到祛风、

消肿、止痛止痒的目的。

【临床应用】风火眼和红眼病均多发于夏秋季节。风火眼不引起大流行，而红眼病则传染快，易造成大流行；二病证初期均见白睛红赤、痛痒并作、怕日羞明而无全身兼证。此期使用本方治疗往往病情得以控制和好转。若病重，甚伴全身症状者需配合内治法，内外合治方可奏效。

【注意事项】使用该方在病初起证轻可单用本法，若病重宜配合内治法治之。本方在红眼病流行季节有预防作用。

人 乳 方

献方人小传 李素文，女，50岁，广西桂平市人。现为广西柳州市民族中医院中医眼科主治医师（通讯地址为：广西柳州市广雅路北二巷八号，邮编545001）。16岁从事医疗工作，师随广西名老眼科中医何廷杰老师学习多年。1982年到广西中医学院临床进修1年，师随周基帮副主任医师、郑启明教授。对内、外、妇、儿科疾病并发眼病有独特见解，对糖尿病伴发的眼病治疗有特色。察理辨病，内外合治，临证法古而不泥古，对内、外、妇、儿科病并发眼病的诊治多有创新。曾在广西中医药、广西名老中医刊物上发表文章。入编《中国中医秘方大全》。曾2次参加全国防治消渴病学术交流会。

【方药组成】新鲜人乳

【制用方法】就地取材，嘱患者现取现用。

【适应病症】天行赤眼，电光性眼炎，眼部外伤瘀肿及跌扑外伤瘀肿，胬肉攀睛，美容。

【方解】本方所治之病乃因时行疫毒侵犯于目，风热上受，首先犯肺，肺主气轮，故气轮发病，目睛红赤。肺主气之升降，气

机不利，气血滞涩，故患者白睛红赤肿痛。取新鲜乳汁频频滴眼屡见奇效。乳汁《本草纲目》称之为仙人酒、生人血。乳乃阴血所化。气味：甘、咸、平、无毒。功能补五脏……疗目赤痛、多泪、点眼止泪。悦皮肤、润毛发……。盖心主血，肝藏血，肝受血则能视。乳汁色白入肺。故可清肺调气，开通气机，复其升降，逐邪外出。治天行赤眼、电光性眼炎、胬肉、眼部沙涩肿痛流泪。选人乳滴眼，直达患处最为理想。且人乳甘、咸、平，无毒，功可补五脏，且疗目赤肿痛，止泪。夫五脏外应五轮，今五脏受益，五轮复得阴血滋润，故有活血散瘀明目之功。

【临床应用】①天行赤眼：症见白睛红赤浮壅，伴有较重的片状溢血。②电光性眼炎：症见双眼剧痛，怕光流泪，双眼难睁。③眼部外伤：症见胞睑瘀紫肿胀疼痛。④胬肉侵睛：症见眦内赤脉如缕，内外眦角三角形肉膜增厚，横贯白睛，攀侵黑睛。现代科学研究表明，人乳含有丰富的蛋白质、多种维生素、微量元素，及各种丰富的营养成分及抗体。应用人乳滴眼可提高眼的抗病能力，有活血散瘀及促进眼部炎症吸收及改善眼部血液循环的作用。

【注意事项】使用本方要新鲜人乳，用该方2天无效或眼部伴发高热，急宜采取相应治疗措施。

【疗效】1988年柳州市发生8.31特大洪水后，伴发天行赤眼，曾在《柳州日报》上介绍使用该方获显效。

万应光明丹

献方人小传 张明，男，44岁，浙江平湖人。现为平湖市第二人民医院（邮编3142017）中医眼科主治医师。擅长眼科，对眼底病的治疗有较深入的探讨，具有较丰富的临床经验。发表论文20余篇，并有多篇获优秀论文奖。

【方药组成】炉甘石 30g 石燕、石蟹各 18g 珊瑚、玛瑙各 15g 硼砂、朱砂、珍珠各 12g 西牛黄、麝香、冰片各 6g

【制用方法】将炉甘石用炭火煅至通红，取起即淬入下药液（黄连、黄柏、羌活、黄芩、栀子、防风、木贼、蝉衣、菊花、白芷、薄荷、细辛、当归、川芎、荆芥、赤芍、生大黄、连翘各 6g，水煎，取浓汁，供淬煅炉甘石）浸 2 个时后，将炉甘石捞起再煅，再淬，如此共段淬九次。将珊瑚、玛瑙、石燕、石蟹各置钵内用木炭火煅红，取起淬入上好白醋内，如此连续煅淬至碎为度，各研细末，水飞晒干。硼砂，结晶者用火煅存性。朱砂研细，水飞过，晒干。珍珠置豆腐内煮 2 小时后，取起研细末。上药按法炮制后各研极细末，至无声为度。将西牛黄、麝香、冰片各研极细末，备用。先将甘石、珊瑚、玛瑙、石燕、石蟹末合研至匀，次下硼砂、朱砂末，再下珍珠、西牛黄末合匀再研，后下麝香、冰片末，充分研匀，至无声为度，过 200 目极细筛，用瓷罐收贮，勿令气泄。用点眼器挑药如米粒大，点撒于内眦部结膜处，闭眼 30 分钟，于午饭后、晚上临睡前各点眼一次。早晨空腹勿点。

【功效】清热解毒，明目，退翳除障。

【适应病症】新元翳膜，内障眼病。

【方解】炉甘石、石燕、石蟹、硼砂、珊瑚、玛瑙、珍珠具有退翳除障、明目功效；麝香有通窍开闭，活血散结之功；西牛黄清热解毒，开窍；冰片退翳，明目；朱砂解毒，退翳，明目。浸泡液中 18 味药物具有清热祛风，解毒明目作用。全方具有清热解毒，明目，退翳除障之功效。

【临床应用】常用于病毒性或细菌性角膜炎，角膜浅层溃疡，老年性白内障初期。

【注意事项】本药未对眼有一点刺激，须闭目半小时后即觉舒适。点药后也可用手轻揉眼睑，以促药物消散吸收。严重的角膜深层溃疡勿用本药。

【疗效】据临床观察，角膜炎治愈率达78%。老年性白内障初期有一定疗效，常可提高视力或延缓白内障发展。

消炎滴眼液

献方人小传 徐宗云，女，50岁，系辽宁省海城县人。现为锦州合成纤维厂职工医院主治医师，本人毕业于锦州医学院，行医33年，具备一定的临床经验。（通讯地址：锦州市凌河区解放路6段6号，邮政编码121000）。

【方药组成】新鲜蚯蚓10条（选5~6cm长左右） 白糖适量

【制用方法】将蚯蚓洗净放入带盖缸内，取1:1000的新洁尔灭溶液浸泡30分钟后取出蚯蚓，重新再用0.9%的生理盐水冲洗，放入备好的消毒缸内，加入适量的白糖，盖好缸盖，待化水后，用其水点眼，每日3~5次。

【功效】清热消炎。

【适应病症】急性结膜炎。

【临床应用】我院眼科自1988年7月~10月份全市流行急性结膜炎，因眼药水脱销，故采用此方法，治疗200余例，最短仅1~2天，最长5~7天基本痊愈。追踪观察，未发现1例并发症，还可以用于创面感染性溃疡，同样能获卓效。

急结熏洗汤

献方人小传 张应兴，详见内科“偏正头痛宁”方。

【方药组成】秦皮9g 川柏9g 川椒9g 薄荷6g 荆芥6g 防风6g

【制用方法】上药共煎，熏洗患眼，每次熏 20～30 分钟，每剂煎 2 次用之。

【功效】清热祛风，明目止痛，消炎祛翳。

【适应病症】急性结膜炎。

【方解】此方清肝泄热的作用强，故适于风热上攻于目的疾患，对于目赤肿痛效果明显。

【临床应用】本方主用于肝胆蕴热，化火上攻于目。对于急性结膜炎主症为痒痛，流泪，畏光，眼睑、结膜高度肿胀，有粘液性或水样分泌的，严重者角膜上皮可见点状浸润等都有显著的治疗作用。

【注意事项】此方只能外用。在用药期间不可食辛辣食物，如葱、蒜、酒等。

【疗效】治疗本病 115 例，其中用药 3 天痊愈者 112 例，5 天痊愈者 2 例，7 天痊愈者 1 例。

祛赤一点灵

献方人小传 张应兴，详见内科“偏正头痛宁”方。

【方药组成】新鲜蚯蚓 3～5 条（洗净）

【制用方法】将蚯蚓放碗内，加少许白糖，上面用碗扣，待其化水后，用其水点眼，每日 3～5 次。

【功效】降低眼压，清热消肿，退翳祛屎。

【适应病症】急性结膜炎（肺经风热型目赤）。

【方解】蚯蚓性寒降泄，并有通络消肿的作用。由于火炎于上，故见目赤眼肿。另据药理研究，本药有降压解热的作用，因而对于急性结膜炎（肺经风热型目赤）特别有效。

【临床应用】本方简便易用，适于眼压升高或风热引起的目赤

肿痛，其解热消炎作用较著。对于用其他方法而难以治疗的急性结膜炎，而用此方应手而效。

【注意事项】本方性偏寒凉，故临床用于由各种热性病引起的眼疾。胃呆纳少者不宜多用。忌食辛辣食物。

电 眼 消

献方人小传 张应兴，详见内科“偏正头痛宁”。

【方药组成】熟地片

【制用方法】熟地片贴眼。将熟地洗净切片，每片约 2cm 厚，4 片即够。患者平卧或头后仰，将熟地片贴在眼上，约 2 分钟一次，轮流重复使用。

【功效】滋阴明目。

【适应病症】电光性眼炎。

【方解】本品味甘、性微温，入心、肝、肾经，口服补血滋阴，外用消炎止痛。

【临床应用】本品通常只内服，不外用。据现代报道，此药成分中含有地黄素、甘露醇、维生素 A 类物质。另据其药理还有降低血糖的作用，因而外用直接对于由光度致伤的眼赤目肿、流泪不止等症有显著疗效。

【注意事项】本品内服由于性滋腻，易于助湿碍胃，而外用无妨。但对于眼疾一般需忌食辛辣食物。

第八章 男科疾病外治方

温会熏洗方

献方人小传 刘显廷，男，57岁，黑龙江省海伦市人。出生于五代中医世家，自幼从父学医，1959年中医出徒。现任海伦市二轻医院院长，副主任医师，海伦市中医学学会副理事长，海伦市人大代表，政协委员。1991、1992年被评为市级优秀代表，1991年被评为市级先进政协委员，1992年被评为地级先进政协委员。1989年曾获国家特殊津贴。临床主张中西医结合，标本兼顾，对危重病用药灵活，视症守方，颇获效验。发表了论文30余篇，编著《诊断歌诀》由黑龙江人民出版社出版、《简明西医诊断歌诀》由黑龙江科技出版社出版，发行全国。2本书的出版，受到了省地医学会的高度评价。

【方药组成】 吴茱萸 100g 公丁香 50g 高良姜 50g 薄荷 50g 小茴香 100g 川椒 50g 皂角 50g 冰片 1g 肉桂 50g

【功效】 散寒止痛，温经通络。

【制用方法】 将上药加适量水煮沸后倾入容器内熏洗会阴部，使蒸气直达前列腺周围，俟水变温（接近体温时），再以药水浸洗会阴部口，每日2次，每次20~30分钟，10天为1个疗程。

【适应病症】 前列腺炎。

【方解】 肉桂、公丁香温通经脉、助肾阳；小茴香、吴茱

萸散寒行气化湿止痛；皂角消肿开窍；川椒、高良姜温中散寒，行气止痛；薄荷芳香通经，起引导作用；加冰片熏洗散寒止痛。此方熏洗会阴穴能温通经络，药效在热力的引导下，促进血液循环，促使炎性分泌物排出，以减轻前列腺炎症充血水肿而达到治疗之目的。

【注意事项】将上药煮沸后再加入冰片，每次 1g。

三虎蒲鱼洗剂

献方人小传 田绍侠，男，31岁，山东高密县人。现为总政白石桥门诊部中医师（通讯地址为北京市海淀区白石桥路42号门诊部，邮编100081）。自小承家教而习医药，为第五代中医传人，毕业于北京中医学院。临床主要从事中医男科、针刀药疗法的研治。独创蹊径在肛管粘膜下注射中药制剂，配合坐浴治疗急慢性前列腺炎及前列腺肥大，治愈率高。先后在国内国际会议上发表论文数十篇，其名就被载入《中国当代中医名人志》、《中国当代知名中医特色医疗辞典》及《疑难杂证求医购药指南》等书。

【方药组成】三棱 15g 虎杖 20g 蒲公英 15g 鱼腥草 15g 穿山甲 18 萆薢 20g 泽兰 15g 败酱草 15g 槐花 20g 菖蒲 20g 夏枯草 15g 冰片 4g

【制用方法】将上药置于洗浴盆内，加水 2500ml，加热 40 分钟，浓缩至 2000ml，先行熏蒸后行洗浴，尤以前后阴为主，日行 2 次，15 次 1 疗程。

【功效】清热解毒，活血软坚。

【适应病症】慢性前列腺炎，前列腺增生。

【方解】该病中医认为，湿热浊瘀内聚，使之精舍滞塞肥大而硬。现代医学认为主要是纤维组织增生，炎性细胞浸润，腺

小管阻塞。故在用药上均体现了“利”、“通”、“消”、“散”，共奏消炎通塞，软化腺体之功。

【临床应用】慢性前列腺炎及前列腺增生为男科常见多发病，临床以会阴部坠胀痛，尿频，尿急、尿痛、尿淋白浊为主要表现。该病属于中医“悬痈”、“精浊”、“淋病”等病证，鉴于本病治疗西医多采用抗菌素疗法，而进入前列腺的浓度，往往达不到有效的治疗浓度，而用该方治疗，通过局部皮肤及肛管粘膜下直接吸收，可改善局部微循环，促进炎性病灶消退，从而促使了增生性病灶的软化与吸收。

【注意事项】治疗期间节制房事，禁食辛辣刺激食物。

阳 起 灵

献方人小传 徐存志，男，52岁，浙江乐清市北白象镇人。现为乐清市北白象镇卫生院中医主治医师（通讯地址为浙江乐清市北白象镇东大街165号，邮编325603）。1957年起一直从事临床工作，学习中医《伤寒论》、《金匱要略》等古典著作，现代医学知识，走中西医结合道路，理论联系实际，探索常见病、多发病的防治规律。发表论文近10篇，擅长于内、儿科。主张内病外治，外病内治，近年来，还积极研究治疗男性病的新方法。

【方药组成】淫羊藿 15g 酒苁蓉 15g 丹参 15g 酒阳起石 30g 黄芪 30g

【制用方法】取净阳起石煅后拌黄酒（比例20%），肉苁蓉拌黄酒（比例30%）水蒸，上药各晒干备用，加入淫羊藿、丹参、黄芪文火水煎30分钟，乘热熏蒸阴囊、阴茎、龟头10分钟，待药液降至40℃，将龟头阴囊浸泡10~20分钟，每晚1次，15天为1疗程。

【功效】温肾壮阳，活血强筋。

【适应病症】阳痿。

【方解】阳事不举，先贤所谓：命门大火为主，“火衰者十居七八”，故治疗当以温肾壮阳，活血强筋，阳事复举。因病位在下，故从下取之，选药汤浴，捷径到达，给药阴囊阴阙为最佳，方选酒阳起石、酒苁蓉、淫羊藿，温肾壮阳之品；辅以丹参活血强筋，使肾阳得火而病愈；用黄芪益气助阳，使药效久而不衰，诸药配伍，相得益彰。

【临床应用】阳痿因命门火衰而致，症见阳痿不举或勃起不坚，腰腿发软，气力倦怠，精薄清冷、身寒喜热、脉沉细无力、舌苔薄白。现代医学认为，阳痿可分为精神性和器质性疾病，阴茎勃起的发生是由于被兴奋的勃起中枢（脊髓骶段有勃起与射精中枢）发出神经冲动将勃起神经传向生殖器，引起阴茎海绵体充血，男性功能障碍，绝大多数是由于精神心理因素所造成，故用阳起灵，若1~2个疗程阴茎能举，则阳痿治疗效果较满意。

【注意事项】传统方法将阳痿分为原发性与继发性两种，对于继发性主要是精神疗法和性教育。至于原发性，通过身体全面检查，必要时采取外科治疗，包括阴茎假体植入、阴茎血管重建手术。

揉脐壮阳法

献方人小传 王克非，男，36岁，黑龙江省佳木斯市人。1982年毕业于黑龙江中医学院医疗系，毕业后于佳木斯市中医院内科从事临床工作，1987年晋升主治中医师，1990年担任病区责任主治医师工作至今，积累了一定的临床经验。对医药保健品的研制有兴趣，曾组方研制保健饮品“山杞茶”通过省级科研成果专家

鉴定，美容保健品“乌发固发帽”、“除皱养容膜”等已申请国家专利。撰写“中药灌肠治疗氮质潴留疗效观察”、“糖尿病灰黑苔辨治心得”等数篇论文。

【方药组成】淫羊藿 52g 蛇床子 36g 蜈蚣 15g 冰片 9g

【制用方法】上药共研细末，用时取适量药物，捣葱汁将药搅匀，至药粉湿润即可，再将药物纳入脐中，然后用双手拇指交替揉按脐中，睡前与晨起各做1次，每次揉按10~20分钟，月余始效。

【功效】温肾壮阳。

【适应病症】用于阳痿不举或举而不坚，滑精早泄等性功能低下者。亦用于宫寒带下、腹冷腹痛。

【方解】脐中即神阙，属任脉经穴。本方重用补肾壮阳、祛风除湿之力药。淫羊藿、蛇床子，纳入脐中，补助元阳，通经活络，以疗肾阳不足，腹中冷疾；辅以蜈蚣、冰片通窍散结，增强渗透之力；按摩神阙，疏通任脉，任肾相通，使气机调畅、气血调和。

【临床应用】阳气不足，表现为虚寒之证。如果病状较重，可配合应用其它补阳之品。治疗性机能低下，不可急于求成，对于性生活的要求，应顺其自然。

【注意事项】使用本方如时有恶心、腹部不适者暂停，脐中破溃者忌用。

【疗效】数年前一友人，对我说起腹冷、阴举不坚之事，欲求一方以治之。我便以此方为之治愈。其后屡用此方，皆效。唯其程度不同而已。

隔橘皮灸

献方人小传 袁少英，男，29岁，现任广东珠海市中医院男科主治医师（通讯地址：广东珠海市吉大景乐路市中医院男科，邮编519015）。长于针灸、药物并用治疗男科杂病，不育症，性病等。发表论文10多篇于《上海中医药杂志》等杂志上。

【方药组成】新鲜橘皮若干块 艾炷适量

【制用方法】橘皮剪成如5分硬币大小，并刺一些小孔，置患处，艾炷置橘皮上作灸法，每次10~15次，每天1~2次，1疗程10天。

【功效】行气化痰，散结止痛。

【适应病症】慢性附睾炎、精索炎。

【方解】慢性附睾炎、精索炎多由于湿热下注厥阴，或寒凝肝脉，日久致气血痰聚于少腹阴器而成。取橘皮行气化痰，散结消肿之功，再配艾灸散结止痛之效，并引药内行，二者共奏消肿散结之功。

【临床应用】现代医学认为精索炎、附睾炎多因于细菌感染，或性生活过度，或嗜酒，辛辣肥厚之品而成。若治疗不当，易致慢性感染，局部可见硬结形成，疼痛，日久影响性生活。触诊附睾增厚肿大、质硬、压痛，精管增粗、压痛、疼痛放射至少腹、腹股沟等。治疗时橘皮可置于附睾或精索处。

【注意事项】急性期不能应用本法，由于会阴部皮肤细嫩，艾炷灸时橘皮液体渗出易烫伤皮肤，故治疗时应注意保护患处。

六神丸外用方

献方人小传 袁少英，同上。

【方药组成】六神丸（中成药）

【制用方法】取六神丸若干研成细末，以适量灭菌用水调成粘稠状，涂于尖锐湿疣的顶部及底部。

【适应病症】尖锐湿疣。

【方解】尖锐湿疣属中医臊（瘙）瘕范畴，是外受风热之邪，内因肝虚血燥，致气血凝滞，湿热下注皮肤粘膜，蕴久成毒而生。六神丸功能清热解毒，散结消肿。故外涂疣上能收到较好疗效。

【临床应用】现代医学认为尖锐湿疣是由于多种人类乳头瘤病毒感染所致，多因于不洁性生活、间接接触传染所引起。可见会阴部及生殖器上有淡红丘疹，渐增大成乳头状、菜花状、条索状的疣状赘生物，触之易出血，5%的醋酸溶液涂布患处呈白色反应。以六神丸外涂之，8小时后用清水洗去，3天后可见疣体逐渐发白，变黑而脱落，未见脱落者，可继续使用本法，平均为3.5次均可治愈。

【注意事项】使用后局部可有少许破溃面，可作一般对症处理，因本病属病毒感染，应同时使用抗病毒药物如转移因子、胸腺素等，以防复发。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 亲献中药外治偏单秘方

作者 = 全国中药外治专业委员会

页数 = 3 8 9

S S 号 = 1 0 7 8 8 3 3 7

出版日期 = 1 9 9 4 年 1 1 月第 1 版