

细说中医【妇科篇】

来源细说中医，[岐黄中医网](#)整理，本资料仅供学习交流

◆胎產諸證——驗方筆記.....	4
◆惡阻——驗方筆記.....	6
◆乳房纖維瘤——驗方筆記.....	8
◆乳腺炎——驗方筆記.....	9
◆女子不孕——驗方筆記.....	10
◆外陰搔癢——驗方筆記.....	12
◆白帶——驗方筆記.....	14
◆更年期症候群——驗方筆記.....	16
◆經前症候群——驗方筆記.....	17
◆痛經——驗方筆記.....	18
◆月經失調——驗方筆記.....	20
◆人工流產與生化湯'素食'避風'.....	23
◆什麼叫“血母痛”？.....	24
◆精液倒流出體外.....	24
◆七公分的巧克力囊腫.....	24
◆淺紅色白帶.....	25
◆每次行房都不會溼.....	25
◆性冷感有救嗎.....	26
◆蜜月期的調經.....	27
◆心臟病的準媽媽.....	27
◆水痘.....	27
◆閉經.....	28
◆高齡產婦的注意事項.....	28
◆Rh 陰性的孕婦.....	29
◆孕婦的理想體重.....	29
◆早產.....	29
◆妊娠胃酸逆流的火燒心.....	30
◆胎盤早期剝離.....	30
◆過期妊娠.....	31
◆胎動記錄.....	31
◆羊膜穿刺.....	32
◆妊娠蛀牙與牙齦炎.....	32
◆子宮外孕.....	33
◆胎位不正.....	33
◆剖腹產.....	34
◆妊娠抽筋.....	34
◆妊娠感冒.....	35
◆妊娠的腰背酸痛.....	36
◆妊娠毒血症.....	37
◆前置胎盤.....	38
◆妊娠的白帶.....	38

◆妊娠的貧血.....	39
◆流產.....	40
◆妊娠的皮膚癢.....	40
◆妊娠的水腫.....	41
◆妊娠的便秘、痔瘡與脹氣.....	42
◆妊娠靜脈曲張.....	43
◆妊娠分期的飲食注意.....	44
◆產兆---生產的前兆.....	44
◆安胎.....	45
◆產程---生產的過程.....	46
◆妊娠糖尿病.....	46
◆驗孕.....	48
◆妊娠出血.....	49
◆害喜.....	50
◆陰道沖洗生男法.....	51
◆糖尿病的準媽媽.....	51
◆同房時間生男法.....	52
◆肝炎的準媽媽.....	52
◆精蟲分離術生男法.....	52
◆飲食控制生男法.....	53
◆子宮內膜異位.....	53
◆多囊性卵巢囊腫.....	54
◆習慣性流產.....	54
◆受孕前的西藥禁忌.....	55
◆懷孕前需要做的優生檢查.....	55
◆女性不孕原因分類.....	56
◆量基礎體溫的意義.....	57
◆黃體素的重要性.....	58
◆子宮內膜太薄.....	59
◆冷底體質的自己判定.....	59
◆增加受孕機率.....	60
◆最佳受孕日.....	61
◆【育兒生活雜誌】2003.1 白帶的內服外治法.....	62
◆孕婦不宜的中藥蒐集.....	63
◆下體腫痛突出三四寸.....	64
◆吾家有女初長成---初潮前後的調理.....	65
◆行政院新聞局所屬【光華雜誌】採訪稿----米酒與米酒水.....	66
◆卵巢長水泡開刀後的注意事項.....	67
◆經前症候群.....	68
◆少女痛經.....	68
◆白帶.....	69
◆包翠英的錯誤治療----子宮肌腺瘤.....	69
◆四物湯、中將湯與生化湯的差別.....	70
◆經前胸漲.....	71

◆錯誤的減肥黃金期.....	72
◆【自由時報】採陽補陰媚力四射採訪稿.....	72
◆更年期乳房纖維囊腫.....	73
◆無排卵兼卵巢水瘤.....	74
◆產後失血所致不明原因關節炎.....	74
◆產後外感咽喉痛.....	75
◆經期保養的藥膳與茶飲.....	75
◆低血壓.....	76
◆不孕症.....	76
◆嚴重掉髮與斑禿.....	77
◆瘦弱的脾虛白帶.....	78
◆初經第三次可促進長高嗎.....	79
◆【民生報】生薑洗髮乳的 SPA 與坐月子採訪稿.....	79
◆子宮頸閉鎖不全.....	80
◆輸卵管不通.....	80
◆子宮頸癌【carcinoma of the cervix】.....	81
◆產後頻尿.....	82
◆請問枸杞、紅棗、黃耆湯對胎兒之影響.....	83
◆經期胸痛以及經期補養藥膳.....	83
◆經前症候群.....	84
◆產後尿失禁.....	85
◆害喜胃痛的藥茶.....	86
◆坐月子豐胸法.....	86
◆中醫的安全流產方法.....	87
◆經間出血.....	88
◆平胸又痛經.....	89
◆孕婦專用的枇杷膏.....	90
◆TVBS【大搜索線】資料稿---皇室的求子方法.....	90
◆TVBS【大搜索線】資料稿---不孕的民俗自救法-換花換肚換蹄.....	92
◆TVBS【大搜索線】資料稿---如何受孕及生男祕方.....	93
◆流產後急問.....	95
◆妊娠可以喝花茶嗎.....	96
◆【東森新聞台】轉載少女濫交 陰氣早洩.....	98
◆【東森新聞台】轉載--咪咪變小了 / 藥膳 - 雪奶哈士蟆.....	98
◆【東森新聞台】轉載--建設優質乳房的方法.....	99
◆如何用中藥墮胎 - 給男孩的信.....	100
◆青春期痛經的養護與藥膳.....	105
◆慢性盆腔炎的房事疼痛.....	106
◆更年期的養護藥膳.....	107
◆婦女養生至寶-雪蛤藥膳.....	108
◆懷孕能否吃四物湯.....	109
◆藥物豐胸可能性的探討.....	109
◆我的濕氣很重嗎.....	110
◆性交疼痛與受孕困難.....	111

◆生男生的祕方.....	112
◆白帶.....	113
◆惡阻(妊娠惡阻).....	113
◆痛經.....	114
◆有求子祕方嗎?.....	114
◆孕婦須避開神農淡煙.....	115
◆孕婦與雪蓮、淮山、黃體素.....	117
◆青春期初經的保養.....	117
◆嬰兒對母乳中藥物吸收的問題.....	118
◆痛經食療方.....	119
◆有中醫要我小心血崩.....	121
◆乳房發育.....	122
◆讓咪咪升級的中藥飲食建議.....	123
◆氣喘又產後憂鬱症的調理.....	125
◆產後感冒.....	126
◆怎樣生出皮膚好的嬰兒 - 孕婦和準爸爸都必看.....	129
◆泌乳素過高.....	129
◆月經不定期.....	129
◆中將湯的適應症.....	130
◆席漢氏症.....	132
◆多囊性卵巢囊腫.....	132
◆懷孕前的藥酒.....	133
◆子宮肌瘤切除後的調養.....	135
◆類似更年期的疑惑.....	136
◆乳頭內陷.....	136
◆墮胎後的補養.....	137
◆玫瑰花與痛經.....	137
◆崩漏誤用歸脾湯.....	138
◆幼少女白帶.....	139
◆懷孕不宜服黃蓮.....	141
◆懷孕不宜服杜仲.....	141
◆產後腰痛.....	142
◆月內風的頭痛.....	143
◆黑豆酒與坐月子.....	143
◆安胎藥十三味的宜忌.....	144
◆生化湯及產後調理.....	146
◆坐月子的建議.....	147

◆胎產諸證——驗方筆記

安胎--益氣攝血用人參、黃耆，血寒用艾葉炭，血熱用地榆，形瘦血熱用黃芩，形盛氣實用香砂，血虛火旺腹痛用白芍，體肥痰盛嘔逆用陳皮，血虛有火用竹茹、絲瓜絡、桑葉。腹痛

下墜便乾用白朮，氣虛下陷用柴胡、升麻。【黃河醫話375】

妊娠咳嗽：妊娠中期出現乾咳、日久不止、漸至五心煩熱、胎動不安，黨參、麥冬各10，水煎當飲料。【臨證用藥經驗34】

妊娠腰痛：補骨脂9、桑寄生12~15、續斷10，水煎服，服時先吃胡桃肉1~2枚。【臨證用藥經驗232】

死胎--死胎不下，孕婦可見舌青口臭。【北方醫話639】

產後出血--艾灸隱白、大敦。【鄧鐵濤耕耘集5】

產後發熱--荊芥穗9、紅糖30，頓服。【黃河醫話101】

產後癰閉--外用方：巴豆50去皮、黃連2.5為末，蔥白三寸三個，艾葉一壯，巴豆、黃連同搗成泥，作成小餅，搗蔥汁塗於肚臍，再置上小餅，餅上艾灸，即有尿意。【北方醫話535】

妊娠癰閉--大便三日未行，小便點滴全無，身微熱，口乾不欲飲，神疲體弱，少腹脹痛，舌淡胖有齒痕，苔中心微黃，脈弦滑。補中益氣湯加枳殼、桔梗、大黃少許。【長江醫話307】

胎漏：血虛、漏下不止、血色不鮮、腰痠體乏、曾經流產，桑寄生16、續斷12、當歸身、白芍、白朮、黨參各10、阿膠10、仙鶴草15、蘇梗9、南瓜蒂1枚劈四開。【臨證用藥經驗251】

氣虛胎漏：傅青主助氣補漏湯，黨參15~30、炒白芍10~15、黃芩、生地均用酒炒黑各9、續斷6、益母草、甘草各3、鹽水炒杜仲12。【臨證用藥經驗252】

腎虛胎漏：腰疼、下紅、頭昏耳鳴、舌淡、脈弱，桑寄生、續斷、菟絲子、阿膠、黃耆、白朮、黃芩、龍骨、牡蠣。胎漏紫紅、陰虛內熱較甚者，去龍骨、牡蠣，加生地12、鹽水炒黃柏8。如感腹脹而墜、氣機鬱滯不舒者，加蘇梗10、柴胡7。【臨證用藥經驗254】

傷胎：跌撲或閃腰導致漏下、腰腹疼墜、胎漏鮮紅、下腹部尚無陣發性收縮，續斷酒炒12、墨旱蓮、蜀羊泉各10、仙鶴草12~15、當歸8、黃耆15、白朮10、炒黃芩6，此是因傷胎漏經驗方，如無重要兼症，藥味不宜加減。【臨證用藥經驗251】

習慣性流產：杜仲240，以糯米30，煎湯浸透杜仲，取出炒乾，去絲，續斷80、酒溼焙乾、白朮80、米泔水炒，同研細、山藥適量，煮糊為丸，每服5~7、日三次。【臨證用藥經驗253】

子腫：妊娠28周後，足踝水腫，迅速上升至下肢、外陰及下腹部，同時尿少、體重較快增加。脾虛子腫、生薑帶皮5~8、蜜炙白朮、茯苓皮、冬瓜皮、大腹皮、白芍、當歸各9、陳皮7、黃耆20。腎虛加肉從容、桑寄生各10。胎熱加黃芩6。腹脹甚者減白朮加薑皮3~5。【臨證用藥經驗255】

子腫：氣滯、子腫由腳漸及腿、膚色不變、頭暈脹痛、胸悶脅痛、食欲不振、苔較厚，天仙藤10、桑寄生10、陳皮、薑皮、烏藥鹽水炒各6、蘇梗、木瓜各9、黃耆15、漢防己6。【臨證用藥經驗256】

子暈：頭目眩暈、顴紅面熱、或心煩胸悶、血壓升高、脈多弦滑、舌苔黃黏，羚羊角骨12、桑寄生12~15、乾地黃、生白芍、枸杞子、杜仲、鉤藤、天麻各9。暈止接服六味丸。【臨證用藥經驗257】

腎虛子暈：茺蔚子、沙苑子、杜仲、桑椹子、夏枯草各9、熟地、山藥、蓮子各12、龍眼肉5、荷蒂4個。【臨證用藥經驗260】

陰虛子暈：楮實子9~12、酸棗皮、玄參、茯苓、冬朮各10、陳皮、肉從容各8、淫羊藿9~12，水浸15分鐘後、文火煎服。【臨證用藥經驗260】

惡露不下：惡露不下或甚少、色紫黯、小腹疼痛拒按、痛處有結塊、舌邊略紫、苔微黃、脈沈澀，煨花蕊石【煨紅投醋中反覆四次後、研細】3g分兩次服、失笑散10布包、當歸12、川芎、桃仁、香附各9、炮薑、炙甘草各3，黃酒、水各半煎。【臨證用藥經驗263】

惡露不下：下腹部脹痛均甚、劇者伴有寒熱、心胸煩躁、舌邊紫、苔黃、脈弦、指下流動不利，沒藥炒去油、紅花、延胡索各7、當歸尾、桃仁、白芍酒炒、香附、澤蘭、川芎各9、柴胡、烏藥各5、蔥白一根。【臨證用藥經驗265】

產後便秘：松子仁、熟地各12、當歸身、甜杏仁、瓜蒌仁、柏子仁各10、蘇梗、蘇子各6、熟蜂蜜15和服，2劑後便軟再隔日一劑、共用四劑自無遺患。【臨證用藥經驗267】

產後乳漲：氣滯、乳房脹痛發硬、漲硬甚疼痛輕、甚至腋下、胃脘亦感漲滿影響食慾、炮山甲、酒洗當歸各9、八月扎、娑羅子各11、柴胡、青皮、白通草、路路通各7，水煎加白酒少許，另乳房熱敷。【臨證用藥經驗271】

產後乳漲：血滯、疼痛甚、發漲只限乳房、並不漲及胸脅，王不留行、全當歸、酒炒白芍各9、橘絡、橘葉各5、炮山甲末6、分二次和服。【臨證用藥經驗272】

產後乳漲：乳房局部發熱，他處不熱，漏蘆根、天花粉、當歸、炮山甲各9、柴胡、桔梗、路路通各7、通草、甘草、橘皮各5、蒲公英15。【臨證用藥經驗273】

◆惡阻——驗方筆記

症狀：妊娠早期出現噁心嘔吐、頭暈、厭食、甚至食入則吐。

原因：懷孕初期黃體素升高。內治：

惡阻--王孟英法：桑葉30、竹茹12、絲瓜絡12。若又虛煩難眠可加生棗仁25、生薑3片。【孫魯川醫案159】惡阻：痰鬱、柿蒂10、丁香5後下、生薑3、白芍、茯苓各10、蘇梗、陳皮各8。

【臨證用藥經驗247】陰虛惡阻：木瓜9、石斛10、熟地10~12、桑椹10、竹茹8、牡蠣15、生薑汁8滴。【臨證用藥經驗248】外治：

蒸藥法

材料：鮮芫荽【香菜】5錢、鮮紫蘇1錢、鮮藿香【左手香】1錢、陳皮2錢、砂仁2錢。

用法：將全部藥材放入茶壺內加水煮開，孕婦對準茶壺嘴吸取散發出來的蒸氣。

此可以寬胸定逆、悅脾醒胃，再略進食物，即可慢慢恢復。敷臍法

材料：制半夏5錢、砂仁1錢、白豆蔻1錢、生薑5兩。

用法：生薑榨汁備用，將半夏、砂仁、白豆蔻研成末，取適量調入薑汁成糊狀，敷在肚臍上，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，1日換藥1次。注意

- 1、 惡阻又稱害喜，孕婦多少都會有的症狀，如果病情嚴重導致營養吸收不足，會影響胎兒發育，所以也不能輕易忽略。
- 2、 懷孕前的脾胃功能差，在懷孕期就特別容易發生害喜，所以準備懷孕之前的脾胃調養也是很重，特別是不能只用飲食控制來減肥，這樣搞壞腸胃是很得不償失的。
- 3、 害喜的飲食習慣需要做調整，可以少量多餐，也可以多進流質食物，睡前多少吃一些也可以減少醒來時的低血糖。
- 4、 第1胎如果惡阻嚴重，就要檢討一下平時的飲食習慣，或是妊娠前檢討一下脾胃功能，以防微杜漸。若是嚴重惡阻者，非但藥入即吐，甚至入廚房、開冰箱就頻頻欲嘔，如此長期厭食，形體消瘦，臥床不起，可用蒸藥法。
- 5、 輕微的害喜可以選用紫蘇梅作為零食，紫蘇有疏肝理氣的作用，所以紫蘇梅可以簡單解決害喜的不舒服。

◆乳房纖維瘤——驗方筆記

症狀：乳房腫塊、腫塊柔軟、呈橢圓形、觸摸光滑、界限分明。

原因：與荷爾蒙不平衡有關。內治：

乳癖：夏枯草、娑羅子、橘葉、橘核、柴胡、丹參、當歸、昆布、海藻、赤茯苓、香附。四周可消。【臨證用藥經驗88】乳癖：消癖飲：海藻、昆布、黃藥子、天師栗、橘葉、橘核、海浮石、浙貝、當歸、赤芍。質硬加炮山甲、王不留行。腫痛明顯加紫花地丁、蒲公英。【杏林小品156】乳癖：柴胡6、當歸9、香附9、橘葉皮各6、羌獨活各9、構橘李15、蒲公英30、漏蘆9、制半夏9、瓜蒌仁9、生紫苑5、小金丹十粒，早晚各服一粒，逍遙丸每早服9g，外用饅頭上加皮硝少許，貼乳部，每夜換一次。【黃一峰醫案醫話集110】外治：

敷藥法1—腫瘤在乳房內側

材料：生半夏3錢、浙貝3錢、生南星3錢、僵蠶3錢、白芷3錢、細辛3錢、生川烏3錢、生草烏3錢、白蘞3錢、樟腦3錢、雞蛋1個、紹興酒適量。

用法：全部藥材研成末，用蛋清、紹興酒各半調入適量藥粉成糊狀，敷患處，1日換藥1次。
敷藥法2—腫瘤在乳房外側

材料：血竭7錢、乳香1兩、沒藥1兩、白芷1兩、蜈蚣2條、浙貝7錢、金銀花7錢、絲瓜絡5錢、雞蛋1個、紹興酒適量。

用法：全部藥材研成末，用蛋清、紹興酒各半調入適量藥粉成糊狀，敷患處，1日換藥1次。
乳癖：乳房纖維瘤或乳腺增生，消癖散，山慈姑10g、玫瑰花5g、白芷10g、檀香5g，加冰片少許，共研細末，每次用5g，裝入細布袋敷患處，每天換藥一次。【何少山醫論醫案經驗集263】
注意

- 1、 乳房纖維瘤屬於良性腫瘤，轉變為惡性機會幾乎沒有，所以不用緊張，如果沒有牽扯疼痛也可以忽略不管。
- 2、 透過乳房攝影和超音波可以準確診斷，而經前的乳房脹痛，不是屬於乳房纖維瘤的症狀，那是經前症候群的胸漲。
- 3、 中醫認為氣滯血瘀於胸部所以才發生纖維瘤，都只有氣滯的時候是初起症狀，這時需要注意生活起居，尤其是情緒問題，只要調理好情緒，形成實質性腫瘤的機率會大大降低。
- 4、 如果乳頭出血、乳頭凹陷、或是乳房皮膚局部出現皺褶，這時需要趕緊求醫診治，不可以遷延時日，因為有可能是惡性腫瘤的先兆。
- 5、 乳房分泌物可以能因為哺乳或是乳頭刺激，而藥物引起或是腫瘤引起的也會，不過暫時性的屬於百分之99都是良性的，可以放心。附一：

乳癰：男性乳房發育異常症，冰片6g、蟬衣10g、蜈蚣10g、全蠍50g、五味子50g、穿山甲30g、麝香2g，共研細末，溫水調勻，外敷患處。【趙昌其臨床經驗與學術研究165】

◆乳腺炎——驗方筆記

症狀：乳房紅、腫、熱、痛，身體發燒。

原因：哺乳期輸乳腺阻塞或乳汁分泌不暢的感染。內治：

乳癰：乳房洪腫灼熱、搏動性疼痛，瓜蒌皮15、蒲公英、金銀花、紫花地丁各18、王不留行9。【臨證用藥經驗58】

乳癰：初起結硬脹痛、掀熱、全身可壯熱惡寒，蒲公英20、銀花、紫地丁各15、連翹、炒牛蒡子、鹿角霜各9、青皮6。【臨證用藥經驗123】

乳癰：乳腺炎未成膿者二三日可消，陳皮30、連翹、柴胡各9、銀花15、鹿角霜9、甘草6，煎湯熱服，覆被取汗。【臨證用藥經驗96】

急性乳腺炎：生半夏5、大白蔥二根，搗爛，捏成長圓團，塞於患處對側鼻孔。兩乳皆病則兩鼻孔輪流塞，每次半小時，日二三次。【臨證用藥經驗99】

乳汁不通：通草12、豬脊髓50、豬蹄200、炮川山甲7、王不留行10。【臨證用藥經驗209】

外治：

敷藥法1

材料：新鮮桑葉2兩。

用法：將桑葉搗爛外敷乳房，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，1日換藥1次。敷藥法2

材料：白芨3錢、白蘞5錢、芙蓉葉7錢、赤小豆8錢。

用法：全部藥材研成末，取適量調凡士林外敷患處，紗布蓋住，以透氣膠帶固定、1日換藥1次。乳癰：蔥白一把、雞蛋清適量，將蔥白搗爛，再入蛋清調勻，烘熱外敷。【成大權得心

應手祕方選】286。

乳癰：產後乳房一側或兩側局部紅腫熱痛初起者，桃仁30g、青黛15g、朴硝30g、蜂蜜適量，前三藥搗爛再與蜂蜜搗成稀膏狀，攤於紗布上，洗淨患處，再將藥膏貼於患處，1～2日一換。

【路志正醫林集腋204】

乳頭風：鹿角燒灰、熟蜜調勻塗於患處。【跛鰲齋醫草235】

旋乳頭瘡：乳頭根生瘡，乳子多有此症，用茄子花蕊，燒灰，研細末，香油調擦，一老嫗相傳此方，輒效。【王修善臨證筆記167】

注意

- 1、乳汁排出不暢是導致乳腺炎的原因，所以要保證每個乳房分葉都能順利排出，這可以改變嬰兒吸吮的習慣來完成。
- 2、由乳房周圍往乳頭方向按摩，輕輕按摩或是熱敷，都可以促進乳汁分泌，如果乳房內有膿瘍發生，這時不可以熱敷，嚴重者甚至要開刀做引流。
- 3、單側乳腺發炎時也是可以用正常乳房繼續哺乳，而患側乳房可以人工排乳，以利乳汁暢流。
- 4、任何的治療乳腺炎前提一定要排出乳汁，不然都是無效的，不要畏懼疼痛就不敢按壓乳房。
- 5、初次哺乳需多多請教有經驗的婦女，不然過程痛苦很難熬過來，也容易發生乳腺炎，放棄哺乳對母嬰都是一大損失。

◆女子不孕——驗方筆記

症狀：無法受孕

原因：嚴重貧血、焦慮、子宮異常、甲狀腺功能紊亂、卵巢衰竭、骨盆腔炎、輸卵管阻塞、子宮肌瘤。內治：

不孕--求嗣方：當歸、川芎、香附、澤蘭、紅花、丹參、牛膝、艾葉、川斷、益母草、月季花、赤砂糖。月經先期加赤芍、丹皮，後期加鹿角、巴戟，經行腹痛加元胡、木香，腰痠加秦艽、杜仲。婦人久不孕，審無病患，檢驗正常，必因氣血所淤滯，可以此方以探動靜。經行時服用一劑後，腹中覺有氣燥動，大便微利，日行一、二次，自覺舒適，可繼續再服二劑，即不覺燥動，這表示氣血流暢，可有生育之望。假使先進一劑，腹中不覺燥動，而大便也不得通暢，再進始有燥動感覺，表示氣血鬱結，胞絡之氣不調暢，則生育較慢。若服此方毫無動靜，連續試服六個月之久，也無上述反應，則生育多無希望。服藥反應雖與妊娠無直接關係，但由此可測知氣血之盛衰，任脈之通調與否。【近代中醫流派經驗選集、陳筱寶242】

外治：

貼藥法1----體弱腰痛

材料：菟絲子4錢、五加皮5錢、川芎3錢、木香5錢、杜仲3錢、桑寄生3錢。

用法：將全部藥材研成末，取適量加水調成糊狀，外敷命門穴、關元穴，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，睡前貼上，醒後除去即可。貼藥法2----煩躁難眠

材料：菟絲子4錢、五加皮5錢、川芎3錢、木香5錢、合歡皮3錢、菊花2錢。

用法：將全部藥材研成末，取適量加水調成糊狀，外敷三陰交、期門穴，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，睡前貼上，醒後除去即可。貼藥法3---肥胖

材料：菟絲子4錢、五加皮5錢、川芎3錢、木香5錢、菖蒲5錢、車前子3錢。

用法：將全部藥材研成末，取適量加水調成糊狀，外敷委中穴、關元穴，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，睡前貼上，醒後除去即可。敷臍法—四肢冰冷

材料：川椒5錢、附子3錢、食鹽5錢、生薑片5片、艾條1隻。

用法：川椒與附子研成末備用，取適量食鹽放入肚臍中，再蓋上生薑片，點燃艾條以適當距離溫灸肚臍，使肚臍產生熱感即停灸，1次15分鐘。取出食鹽換上中藥粉末，再操作1次，1次15分鐘，1日1次。注意

1、 受孕懷胎是極其自然的事，可是晚婚之後的急於求成，在在違背水到渠成的原理。只要遵循體內律動來受孕，感覺排卵期陽氣內動的性慾衝動來同房，這樣的成功率會增高很多。

2、 只要西醫檢查一切正常，那剩下就是夫妻房事的協調，並且要相信有愛情才会有結晶，感情的融洽則更容易開花結果，孕育是愛情的延續，是過程而不是手段，不要為了生育而夫妻反目，夫妻常生氣不利於胚胎著床。

3、 同房日期的安排，盡量以身體情慾激動來探知排卵時刻，不必於計較排卵期外的禁慾，因為禁慾後精蟲數雖增加，但是活動力卻減少。有研究顯示每週同房4次以上，受孕機會反而會提高。

4、 測量基礎體溫最主要是為了辨認內分泌功能是否正常，不必作為同房的依據，以免產

生精神壓力，有規律的性生活最好。

5、適當的睡眠、運動和興趣可以緩解壓力，可以使內分泌更趨於穩定，但是不可以過度運動而消耗大量體力。附一：

子宮脫垂：金櫻子10、酸棗皮9、五味子6、黃耆30、黨參10、白朮10、茯苓12，第三煎多加水，乘熱薰洗。【臨證用藥經驗219】

子宮下墜：黨參二錢、黃耆一兩、升麻二錢、五倍子錢半、烏梅四枚、小茴香一錢，水一碗煎取半碗，空心溫服，連服三次，奇效如神。肛門下墜、胃下垂亦可。【吉甫醫話48】

輸卵管阻塞：少腹部條索狀硬結不消、按壓則痛，柴胡、白芍各10、枳實、甘草各8、熟附片9、敗醬草15，經期前12日服至經淨。【杏林小品20】

胎盤殘留：益母草15、當歸12、桃仁、紅花各8、炮薑、炙甘草各5、香附、失笑散各9、蟬蛻4。【臨證用藥經驗227】

◆外陰搔癢——驗方筆記

症狀：外陰搔癢難忍

原因：潮濕、感染、過敏、情緒外治：

藥浴法

材料：五倍子7錢、蛇床子2錢、黃柏3錢、冰片5分。

用法：將五倍子、蛇床子、黃柏加入1大鍋水中，大火滾沸10分鐘，濾取藥汁倒入臉盆，加水調成適溫後，浸浴下身15分鐘，1日1次。敷藥法

材料：青黛4錢、石膏3錢、滑石2錢、黃柏7錢，苦參2兩。

用法：將青黛、石膏、滑石、黃柏研成末，加入凡士林適量調成糊狀備用，外敷藥膏之前先用1鍋子熬煮苦參20分鐘，濾取藥汁洗外陰，再塗上藥膏，1日1次。陰癢--外洗方：蛇床子18、艾葉9、蒼朮、黃柏、苦參各15。先薰後洗，一日二三次，洗後用甘石散藥棉外撲。甘石散

：爐甘石水飛、鍛石決明、熟石膏、鍛龍骨各30、松花粉60、枯礬15、冰片6，可收水止癢，治溼熱胞疹、皮膚發癢。外洗方是臨床多年摸索的驗方，重點在於艾葉與苦參【單蒼桂外科經驗集60】

陰癢：陰部搔癢、皮肥厚、肉硬結，苦參、蛇床子各20、墓頭回、野菊花、地膚子各15，煎湯先薰後坐浴。【臨證用藥經驗245】

陰癢：黃帶、質黏氣腥臭、小腹墜漲、陰內甚癢，白朮、蒼朮、車前子、土茯苓、炒黃柏、茵陳、山梔、墓頭回、扁蓄灰。【臨證用藥經驗206】

注意

- 1、 外陰搔癢引起原因有很多，如果能自我排除和生活上注意，那治療上就事半功倍。
- 2、 棉質內褲或是只穿裙子，這樣保持下身通風，可以減少潮濕悶熱的環境而刺激皮膚。
- 3、 解手時擦拭外陰，應由上往下，不要由肛門往前擦拭，以減少感染機會。
- 4、 下身不要使用芳香劑或是香水，內褲清洗也要用溫和清潔劑，都是要避免外陰的皮膚刺激。
- 5、 飲食上少吃過熱或過冷的食物，如刺激、辛辣、油炸的食物，以及冰涼的冷飲。
- 6、 中醫的狐惑症是西醫的白塞氏症，是屬免疫性的問題，順便提出僅供參考。
- 7、 老年外陰瘙癢需特別注意，少數是外陰白斑，是罹癌前兆。附一：

狐惑--多屬溼熱，可用龍膽瀉肝湯，偏於狐，可用升陽益胃湯，以補脾升陽除溼，偏於惑，可用參苓白朮散，以健脾益氣滲溼。外敷方：苦參50、雄黃25、蛇床子35、黃柏25、蒲公英35、木鱉子10、大楓子10，水煎，先薰後洗。【北方醫話345】

狐惑--黏膜潰瘍外敷，青果焙焦研末，加青黛、冰片、硼砂。【長江醫話471】

狐惑--多屬溼熱，可用龍膽瀉肝湯，偏於狐，可用升陽益胃湯，以補脾升陽除溼，偏於惑，可用參苓白朮散，以健脾益氣滲溼。外敷方：苦參50、雄黃25、蛇床子35、黃柏25、蒲公英35、木鱉子10、大楓子10，水煎，先薰後洗。【北方醫話345】

狐惑--黏膜潰瘍外敷，青果焙焦研末，加青黛、冰片、硼砂。【長江醫話471】

陰吹：中氣下陷，補中益氣湯加枳殼。腎氣不固，酸棗皮、山藥、芡實、蓮子各15、金櫻子10、蓮花鬚7、沉香5。【臨證用藥經驗277】

吊陰痛：陰戶左右兩側筋肉由下上吊至乳上、摯痛陣作、身或發熱，川棟子湯：川棟子、豬苓、檳榔、澤瀉、麻黃、木瓜、白朮、烏藥、乳香、元胡、大小茴香、薑、蔥，水煎，對火取暖服。【杏林小品157】

陰中痛：分娩後起病、感覺陰戶內痛、陰唇並不向上抽掣、反而有下墜之感、坐立均不適、非子宮脫垂，當歸、熟地、白芍、淮小麥、黑棗、炙甘草。【杏林小品158】

◆白帶——驗方筆記

症狀：有色異味的陰道分泌物。

原因：感染或是抵抗力下降導致的陰道內共生菌群紊亂而異常增生。內治：

帶下；帶下之物，亦人身陰液之屬，久淋不已，陰液虧虛，任、帶之脈，關係肝腎，肝腎兩虧影響下焦。【趙榮醫療經驗124】

白帶：脾溼，腰腿酸軟、下腹隱痛、白帶量多而清稀，異功散加白果、酸棗皮、鹿角霜、車前子各10。【臨證用藥經驗105】

寒濕帶下：白帶清冷、量多、終日淋漓不斷、便溏尿頻、面色黃暗、腰痠如折、小腹喜暖有冷感，中年之後患之、炒艾葉、鹿角片各10、菟絲子、沙苑子各10、肉桂、附子各6、續斷、山藥各10，腰痠冷除後改丸劑。【臨證用藥經驗234】

白帶：帶下黃白、低熱、口乾、頭昏、腰痠、小腹墜漲，補中益氣湯加炒黃柏5~8、續斷12~15。【臨證用藥經驗196】

白帶：溼熱帶下之熱重於溼，椿白皮、白芍各10、炒黃柏、柴胡各8、北沙參、生甘草、白茯苓、山藥適量。椿白皮初用生藥三日、繼用存性之炭、則溼熱自去。【臨證用藥經驗241】

黃帶：溼熱下注，烏賊骨10、鳳尾草15、墓頭回、土茯苓、卑解各12、蒼朮、炒黃柏各9。【臨證用藥經驗130】

赤帶：子宮內膜炎、初起惡寒發熱、血性帶下夾雜膿液、血是血、帶是帶，兩不相混、有穢臭味、下腹痛而拒按，連子紅雞冠花微炒15、蜀羊泉、金銀花、鳳尾草、魚腥草各12、白芍、生地各10、丹皮、黃柏炭各6、柴胡、車前子各8。【臨證用藥經驗240】

赤帶：似血非血，血與帶相混、白芍、當歸身各9、青蒿、柴胡各7、茯苓、白朮、甘草各6、

炒丹皮、梔子炭各7、貫眾小火微炒10。【臨證用藥經驗242】

溼毒帶下：帶下黏稠如涕、如膿夾血、臭穢異常、外陰瘙癢、腰痠膝軟，土茯苓20~30、墓頭回10~12、熟地、山藥各12、酸棗皮、白茯苓各10、丹皮、澤瀉各6。【臨證用藥經驗239】

帶下：

白帶：脾虛溼陷兼熱：完帶湯加墓頭回12。完帶湯加鳳尾草、炒白芷、炒艾葉。

黃帶：帶如米泔、或黃綠如膿、或夾血液，止帶方加墓頭回10~15。止帶方減豬苓、赤芍加鳳尾草。

帶下黏稠腥臭、尿赤而痛，側柏零皮丸。證238。【跛鰲齋醫草8】

止帶方：車前子、澤瀉、茯苓、茵陳、山梔子、黃柏、丹皮、白芍、牛膝。帶下：逍遙散去薑、薄，加車前子。

白帶：加黨參、陳皮、荊芥炭、貫眾炭。

黃帶：加黃柏、魚腥草、墓頭回。

陰癢：加酒炒龍膽草。

赤帶：加蜀羊泉、烏賊骨、茜草根、白芍重用。

腰痠痛：加續斷、狗脊、卑解、山藥。【跛鰲齋醫草76】外治：

藥浴法1

材料：新鮮馬齒莧6兩或是乾品3兩。

用法：將馬齒莧加水1鍋，滾後再煮5分鐘，濾出藥汁，倒入乾淨面盆再加水調到適當溫度。下身浸泡水中5分鐘，1日1次，連續20天，經期停用。藥浴法2

材料：蛇床子5錢、黃柏5錢、冰片5分。

用法：將五倍子、蛇床子、黃柏加入1大鍋水中，大火滾沸10分鐘，濾取藥汁倒入臉盆，加水調成適溫後，浸浴下身15分鐘，1日1次。敷臍法—帶下清稀量多

材料：硫磺5錢、丁香3錢、冰片5分、蒜頭2瓣、杏仁10粒。

用法：將硫磺、丁香研成末，再加入冰片、蒜頭、杏仁搗爛研磨成膏狀，取適量敷在肚臍上，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，1日換藥1次。滴蟲性陰道炎：黏性白帶量多、陰道內和外陰部刺癢難堪，雞冠花120，煮沸10分鐘坐浴。【臨證用藥經驗241】。

帶下搔癢：卑解30g、苦參30g、艾葉10g，煎水日洗外陰二次。【醫案珍藏錄29】注意

1、白帶引起的搔癢不適，是分泌物對外陰的刺激，可以用1盆溫水浸泡下半身。這樣把陰道內大量繁殖的菌群稀釋下來，搔癢可在短時間內減輕，陰道清潔用品不可多用，過度清潔會把好菌也消滅光了。

2、貼身衣物儘量寬鬆保持下半身舒爽，不可穿牛仔褲或是短熱褲，飲食上少吃辛辣、油炸以及菸酒，涼性食物也會造成分泌量增加，尤其脾胃虛弱者最為明顯。

3、滴蟲引起的是黃綠色帶有泡沫，有尿頻、尿痛或是間歇性出現血尿，需連續3個月在白帶中找不到滴蟲，這樣才算是治癒。

4、內診會讓婦女求醫卻步，可是這是診治最好的辦法，不過一定要做陰道分泌物的檢查，看是哪種問題導致的，不要只內診卻不檢驗分泌物。附一：

陰道炎：帶下增多、外陰部刺痛、墓頭回12~15、酒炒龍膽草8、車前草、鳳尾草、澤瀉、卑解各10、生地、白芍各9、蒼朮、黃柏各8、甘草6，三煎薰洗。【臨證用藥經驗238】

滴蟲性陰道炎：黏性白帶量多、陰道內和外陰部刺癢難堪，雞冠花15、苦參、卑解、蒼朮、黃柏各9、魚腥草、敗醬草、紫花地丁各12、陳皮、白朮各8、甘草5，煎湯內服，外用雞冠花120，煮沸10分鐘坐浴。【臨證用藥經驗241】

滴蟲帶下：陰癢、常法無效時，可用消毒紗布裹蔥白數根、擠汁，徐徐滴入陰道內，連用七晚可效。【杏林小品210】

◆更年期症候群——驗方筆記

症狀：月經紊亂、顏面潮紅、烘熱盜汗、煩躁易怒、焦慮憂鬱、頭昏耳鳴、心悸失眠、腰酸腿軟、倦感乏力、陰道或尿道上皮細胞萎縮而乾澀。

原因：育齡期體能的過度消耗，如多產、多育、房事勞損、月經過多、或是罹患消耗性疾病如甲狀腺機能亢進、糖尿病等等。外治：

敷臍法1---更年期症狀嚴重者

材料：菟絲子3錢 枸杞子3錢 熟地2錢 淮山3錢、米酒適量。

用法：將藥材研成末，取適量調米酒成糊狀敷於肚臍，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，1日換藥1次。敷臍法2---更年期症狀輕微者

材料：菟絲子3錢、桂枝3錢、黨參3錢、鎖陽5錢、米酒適量。

用法：將藥材研成末，取適量調米酒成糊狀敷於肚臍，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，1日換藥1次。注意

- 1、 有人平安渡過更年期，有人卻是病情嚴重，出現更年期症狀是因為年輕時體能過度消耗，不管是生兒育女或是工作、疾病的消耗，只要是體能消耗都會導致更年期症候群的發生。
- 2、 如果有更年期症候群的潛在因素，那麼就需要在症狀還未出現前，平時就要加強保養，有疾病問題就要趕快解決，而生兒育女過多、過累的，就需要好好調理身體。
- 3、 更年期的進補不可以過於燥熱，否則會加重病情，平和安穩的藥方才能長期服用，最好是用藥膳形式，因為有動物性蛋白才能慢慢的轉化為身體的一部份，這樣才能養生抗衰老，素食者可飲用安素補充營養。
- 4、 失眠和大量經血是最危險的潛在因子，因為失眠導致無法完全休息，這樣身體長期處於亢奮狀態，而大量經血會透支身體的營養，所以這兩樣都會趕快解決，不要以為習慣了就忽略問題的嚴重性，不然更年期時會很痛苦，也會衍伸更多的病症。
- 5、 更年期症狀發生後不要以為自己可以熬過去，一定要借重藥物調理，這不是心理問題，所以去做心理諮商是無用的。

◆經前症候群——驗方筆記

症狀：經期前有頭痛、煩躁、失眠、胸漲、腹痛、腹瀉、下肢水腫。

原因：內分泌失調。

外治：

敷臍法1---水腫、腹瀉嚴重者

材料：茯苓3錢、桂枝3錢、黨參3錢、鎖陽5錢、米酒適量。

用法：將藥材研成末，取適量調米酒成糊狀敷於肚臍，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，1日換藥1次，可在行經前2日開始敷臍。敷臍法2---頭痛、煩躁嚴重者

材料：白芷3錢、生牡蠣4錢、生龍骨4錢、桂枝3錢、鎖陽3錢、米酒適量。

用法：將藥材研成末，取適量調米酒成糊狀敷於肚臍，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，1日換藥1次，可在行經前2日開始敷臍。注意

- 1、 測量基礎體溫可以分析內分泌功能，出現排卵後體溫升幅不高，或者是上升日數過短，這是黃體功能不全，這是自我檢測內分泌最簡單的方法。
- 2、 經前症候群常發生在長時間體力透支後，或是作息日夜顛倒無法調適者，所以要盡量避免，或是趕快休息來恢復體力。
- 3、 除了經期養護之外，要有質優量足的飲食和充份的睡眠，如此就能擁有健全的內分泌了。
- 4、 經前症候群症狀發生原因就是水腫，水腫在頭部就會頭痛、失眠、煩躁不安，水腫在腸胃道就會食欲不振、腹痛、腹瀉，水腫在胸部就發生胸漲，水腫在腳部就是下肢水腫，所以避免經期吃冰和平常注意良好飲食習慣的養成，這些都是避免水腫惡化的方法。
- 5、 有經前症候群或是痛經都可以沖泡玫瑰花茶來改善，有噁心、腹痛、腹瀉者可以沖泡白豆蔻茶。附一：

經行發狂：桂枝茯苓丸，桂枝、赤苓、丹皮、桃仁、赤芍、龍骨、牡蠣、柴胡、黃芩。【杏林小品158】

◆痛經——驗方筆記

症狀：行經前後或是行經期，少腹部劇烈疼痛，甚至腰背酸痛不能起身，伴有頭暈、嘔吐、心悸、精神疲倦。

原因：原發性痛經、精神壓力、內分泌不平衡、子宮頸狹窄、肌瘤、肌腺病、子宮發育不良

或位置不良。內治：

痛經--少腹逐瘀湯，在臨經或先一二日服之，至經淨為止，如此續服三五週，常使多年痛經痊癒。歸尾三錢、川芎二錢、赤芍三錢、桂枝錢半、乾薑二錢、小茴香一錢、元胡三錢、沒藥二錢、生蒲黃三錢、炒五靈脂三錢。【近代中醫流派集、范文甫85】痛經：寒濕凝滯、經前及經期小腹痛、腹內覺冷、拒按、經量少、色黯不鮮、舌邊紫、舌白、脈沈而緊，艾葉、香附各10、桂枝、赤芍、桃仁、丹皮各8、川芎、當歸、澤蘭各9、蒼朮、牛膝各10，於月經前九日開始服3~5劑。【臨證用藥經驗242】外治：

敷藥法—痛時小腹喜按

材料：香附10兩、白芷5錢、紅花3錢、黑醋5兩。

用法：將全部藥材炒熱，邊炒邊加入黑醋，再用布包趁熱熨敷腹部20分鐘，藥材冷後可再炒熱使用數次。有痛經史者，於行經前1日外敷。敷臍法1--輕微疼痛

材料：乳香5錢、沒藥5錢、米酒適量。

用法：將藥材研成末，取適量調米酒成糊狀敷於肚臍，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，1日換藥1次，可在行經前2日開始敷臍。敷臍法2--嚴重經痛

材料：肉桂5錢、細辛3錢、烏藥5錢、玄胡索3錢、紅花2錢、乳香5錢、沒藥5錢、冰片1錢、米酒少許。

用法：全部藥材研成末，取適量調米酒成糊狀敷於肚臍，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，1日換藥1次，可在行經前2日開始敷臍。虛寒痛經：烏藥、砂仁、延胡、香附、甘草，各等分，炒熱布包熨患部三十分鐘。【中醫臨床家—黃宗勛239】痛經：吳茱萸15g、冰片15g、艾葉20g、香附20g、細辛10g，研細末，裝袋，佩於臍下胞宮位置。【孟維禮中醫世家經驗輯要160】痛經：大蔥9個、生薑200g、共搗爛，食鹽500g 研細，同放入鍋中炒熱，布包熨痛處。【山野遺方267】注意

- 1、 青春期痛經，多屬原發無器質性病變的功能性痛經，體質上是陽虛寒凝的不通而痛，也有瘦弱的血少導致的停滯不通，在婚後或是產後可能會不藥而愈。
- 2、 繼發性痛經是器質性病變所引起，如子宮內膜異位、盆腔炎、子宮肌瘤等等。注意行經時不可以喝冰水和保暖小腹，經期結束要好好調養，八珍湯、四物湯或是補血飲料都可以用。
- 3、 經期前的熱水坐浴可以預防痛經發生，經期熱敷下腹部也可以減緩疼痛。
- 4、 痛經會造成經期前的精神壓力，惡性循環會讓痛經程度加重，經過詳細解說的放鬆心情，大部分也可以得到減輕。
- 5、 止痛西藥有耐受性，可用於劇烈疼痛無法忍受者，但是常用藥效會遞減，使用數個月之後須更改藥物。但是以生活調理為主，盡量不依賴藥物，若痛不可忍使用藥物也並無不妥，不必害怕藥物而讓痛苦持續著。

◆月經失調——驗方筆記

症狀：經期提前或是延後、經間出血、閉經。

原因：營養不良、厭食、肥胖、緊張、內分泌失調、卵巢腫瘤。內治：

調經--醋元胡、醋山楂、苦參、續斷、肉豆蔻（赤石脂炒）、懷牛膝各9、官桂、甘草、公丁香、鬱金各6、當歸18、沙參12。蜜丸。治痛經、不定期、經閉、肝鬱氣滯、帶症、宮頸炎、陰道炎、輸卵管炎。此為日本中將湯方。【來春茂醫話276】

月經不調：先期，經行腹痛、胸漲，丹梔逍遙散加丹參10、香附8。後期，小腹脹痛、血有凝塊，逍遙散去柴胡加丹參10、桂枝8、吳茱萸6。【臨證用藥經驗74】

血滯閉經：當歸、炒白芍、制白朮各9、柴胡、丹皮各7、瞿麥穗、生卷柏各12、香附、烏藥各5。【臨證用藥經驗205】

血滯閉經：三陵15、黃耆25、香附、川芎各8、蒲黃、五靈脂、赤芍各7、肉桂5、小茴香1。【臨證用藥經驗234】
淤血閉經：舌邊紫暗、下腹痛而拒按、胸脅滿悶，肝鬱氣滯血澀，香附、烏藥各10、川芎、當歸各9、桃仁、丹參、三陵各9、艾葉、桂枝各6。【臨證用藥經驗233】

淤血閉經：氣滯血瘀，景岳通瘀煎，歸尾、生山楂、紅花、香附、烏藥、木香、川芎、牛膝、桃仁，煎成對酒少許。【臨證用藥經驗234】

寒凝閉經：寒溼凝滯，少腹冷痛、四肢不溫、面色偏黃或偏青、便溏、帶下，川芎、牛膝、當歸、三陵、黃耆、桂枝、蒼朮、白朮、半夏、茯苓、澤蘭、艾葉。【臨證用藥經驗234】

少女閉經：體多偏肥、性多溫順、青春活力較差、脈象浮取中取滑而兼弦，但沈按不甚應指，補骨脂、菟絲子、仙靈脾、油桂、熟地、當歸、川芎、赤芍。【臨證用藥經驗232】

崩漏--黑蒲黃散：蒲黃炒黑、棕皮炒黃、川芎、丹皮、香附醋炒、白芍、阿膠、當歸、地榆炒炭、熟地、荊芥、血餘。初用歸脾湯無效，後採此方多驗。【近代中醫流派經驗選集、陳筱寶241】

崩漏--虛中夾實，經水淋漓，色淡質稀夾有血塊，可用將軍斬關湯，熟軍炭一錢、生熟地各三錢、蒲黃炒阿膠三錢、茯神三錢、焦穀牙三錢、仙鶴草六錢、黃耆錢半、炒當歸三錢、白

朮錢半、巴戟天三錢，煎水服，另用藏紅花三分、三七末三分，紅茶汁送服。【北方醫話487】
崩漏--失笑散；蒲黃、五靈脂炒成炭藥，用量各20，加於應用方中，如四物湯。【北方醫話743】

崩漏--肺脾氣虛不統血，補中益氣湯加歸脾湯，柴胡、白芍醋炒，並以米醋六兩為引。【黃河醫話316】

崩漏--膠艾四物湯加米醋煮地榆炭，冷服。【南方醫話406】

崩漏--歸脾湯證加雞冠花、白茅根，因脈細數、陰虛生熱迫血妄行，白茅根去虛熱，熱去血自不出。【黃河醫話364】

崩漏--蘇子、白芥子、萊菔子各10，炒微黃、鹽水淬，研細末，開水沖頓服，渣再頓服。大多可一劑見效，若二劑仍不止，即應視為無效，須做進一步檢查。【南方醫話407】

漏下：經量多、期長，酸棗皮、白芍各12、熟地、當歸、蜀羊泉、大薊、小薊各10。【臨證用藥經驗108】

漏下：烏賊骨10、蜀羊泉、仙鶴草各12、大薊、小薊各15、生地榆、茜草各9、艾葉炭6、炙黃耆20。【臨證用藥經驗130】

漏下：經量多、腹無淤痛、頭昏、心慌、自汗、下肢出現紫斑，龍眼肉、仙鶴草各15、蜀羊泉12、炙黃耆30、煨龍骨、牡蠣各18、紅棗。【臨證用藥經驗】

漏下：固沖湯，白朮、黃耆、龍骨、牡蠣、酸棗皮、白芍、烏賊骨、茜草、棕邊炭、菟絲子12。【臨證用藥經驗200】

漏下：已婚者，炒茜草根、蜀羊泉各10、柴胡、川棟子各8、白芍、當歸各9、黃芩炭8、烏賊骨9、炒失笑散、香附各6。【臨證用藥經驗225】

漏下：更年期者，月經後漏下、綿綿不斷、腰痠痛、陰部墜、喜暖避寒，艾葉炭9、熟地、酸棗皮、山藥各10、枸杞子、菟絲子、鹿角霜、杜仲、當歸各10、肉桂、附子各8。【臨證用藥經驗243】

營虛內熱漏下：量少、血色深紅、時煩、少寐、口乾不欲飲、舌質紅、脈虛數，熟地、當歸、白芍各10、炒丹皮、炒黃柏各6、蜀羊泉、蘇梗各10、文火煎服，調服醋浸炒紅花、研細末、每服4~5，日2~3次。【臨證用藥經驗236】

產後漏下：大小薊各15、炙黃耆30、茜草根、旱蓮草、烏賊骨、白芍各10、白朮、炒蒲黃、炙甘草各8，殘淤停留、小腹時痛而墜，加炒五靈脂5，煎成加紅糖少許。【臨證用藥經驗210】
外治：

敷藥法1---經期提前

材料：香附7錢、白芍4錢、雞血藤5錢、川牛膝3錢、益母草5錢、五味子4錢。

用法：將全部藥材研成末，取適量調水成糊狀，外敷命門穴、三陰交，紗布蓋住，以透氣膠

帶固定，睡前貼上，醒後除去即可。敷藥法2----經期延後

材料：香附7錢、白芍4錢、雞血藤5錢、川牛膝3錢、桂枝3錢、艾葉5錢、鬱金2錢。

用法：將全部藥材研成末，取適量調水成糊狀，外敷足三里、期門穴，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，睡前貼上，醒後除去即可。敷藥法1----閉經

材料：紅參5錢、鹿茸2錢、川芎3錢、澤蘭3錢、當歸2錢、香附5錢、桃仁3錢。

用法：將藥材研成末，取適量加水調成糊狀，敷在肚臍上，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，1日換藥1次。敷藥法2----經間出血

材料：生地5錢、丹皮3錢、黃柏3錢、地骨皮5錢。

用法：將藥材研成末，取適量加水調成糊狀，敷在肚臍上，紗布蓋住，以透氣膠帶固定，1日換藥1次。月經後期：硫磺10g、胡椒30g，研細末，調香油適量，敷臍部，蓋以油紙，紗布裹之，每月1換。【山野遺方257】

注意

- 1、 經期避免喝冰水已經是國民常識了，經期結束後喝補血的四物湯也有廣告大力宣揚，但是也有人誤喝強力收縮子宮的生化湯，真是過猶不及。
- 2、 經期提前或是延後需準確日期為憑，不要以月初幾日而下次來是幾日來算，應該確實算出26天或是30天的日數，否則容易有誤差。
- 3、 也有人因為工作忙碌忘記經後進補而懊惱不已，其實要用平常心對待，錯過這次還有下次，沒有補一下也不會有所損失，只是掌握這個小機會調理體質，是用心愛自己的表現。
- 4、 經間出血是指排卵期因動情素減低所產生的出血，出血通常少量的持續2～3天，也有持續到下次月經來臨。有人以為自己1個月來2次月經，其實是經間出血。
- 5、 若正常行經婦女超過3個月月經沒來，則可稱為閉經，青年婦女以神經性厭食為主要原因，快速降低體重會造成腦下垂體損害，並形成永久性無月經。
- 6、 如果泌乳激素上升，會導致月經不來數月，嚴重者會有乳汁分泌，這樣情形同時會伴有嚴重的其他症狀，這些症狀雖然與婦科不相關，可是在中醫卻是重要的參考資料，臨診應詳細說明。

◆人工流產與生化湯'素食'避風'

228做完人工流產後 感到腰酸膝無力(情形相當嚴重) 且小腹有刺痛現象 參考貴版訊息說手術完應服用生化湯 並按照坐月子保健 可是今天(3.1)複診時 幫我實行手術的醫生卻說我不能服用生化湯 且他開避免發炎的藥(2天份)給我 囑我3天後再回去複診 請問 我可以照貴版的生化湯藥方自行去抓藥煎服嗎? 休養期間是否完全不能走動?還是如西醫所說生活可一切正常進行?是否要避風?另 我是吃素的(奶蛋不忌)請問這段時間飲食要如何才能將身體狀況調整好?

謝謝您回覆;生化湯原本也有使用禁忌和依症加減的必要,當作一般常規處方是在一般情況下,所以在此前提下,如果您的西醫師也修習過中醫,也對生化湯有相當掌握,那也可以遵照該位醫師的建議而不用生化湯,又因為您有小腹刺痛現象,又未說明人工流產方式,又因為要使用西藥消炎,那麼是否為器械搔刮吸引,那就必須遵照該位醫師建議停用生化湯,而多用抗生素,因為 RU486藥物流產者安全性大於器械,那就比較不用考慮到手術後遺症。關於休養期間的問題,不宜走動是個基本概念,最主要還是減輕身體負荷,盡量讓身體內分泌恢復完全,所以不宜走動並非只有這一項,就好像坐月子不可以哭泣,那是避免眼睛的消耗,可是有人坐月子卻不眠不休的看書或是看電視,這也是不可以的,但是無所事事也是不好,生活頓失重心難免胡思亂想,所以過猶不及都不好。避風也是概念問題,古代的操勞是戶外居多,風吹日晒當然更消耗體力,而現在還要加上避免傳染傷風感冒,所以避風又有減少出入公共場所,以及避免家庭成員由外攜帶病菌入內,所以也應該遵照 SARS 的防範措施,多洗手。產後或是小產後的身體調整是重要的,因為大破壞之後需要大建設,而大建設就需要肉類補充,對於素食者那就想不出其他好方法解決了,因為肉類食物有不可取代的必要性與重要性,所以中醫稱之為血肉友情之品,唯有肉類才能高效率的及時補充和化合,如果宗教上的素食,在原始佛經上並未堅持須素食,因為素食是不殺生的延伸,不殺生的含意有數種,一為親自使之死亡,二為因自己使之死亡,所以當生活上有必要又不拘於素食,所以高原上的西藏,果蔬不足以養生活命,那就無法實施素食,可是這樣並未減少僧侶信眾的向善之心,所以必要時期的肉食並未違反佛的基本訓誨。您好 以您上次回信表示若是器械刮搔手術 術後不能服用生化湯【因為要西醫評估】那麼 請問手術後一星期可否服用四物湯?【惡露乾淨或是減少很多之後就可以】或者需服用其他湯藥【八珍湯燉煮雞腿也可,有配方】另麻油麵線之類食物現在就可食嗎?【可以】或者也是要等一個星期後才能服用?【不用,麻油不要加太多就好】平日較不繁重的家務 如煮飯洗碗 是否能做?【建議洗碗可以,煮飯那就慢一點囉】或者完全不能操勞?【輕鬆的可以,散步也可以】

謝謝您的答覆

◆什麼叫“血母痛”？

百忙中打擾您了！

今天幫朋友上網查資料，因為她快要生產了，我就幫她看月子外送餐，有個很大的疑惑，什麼叫“血母痛”？查了中港台三地的中醫網站都沒有叫血母痛的中藥材或藥方，為什麼只有坐月子料理裡才有這東西呢？到底這血母痛是什麼？謝謝您的回覆！妳好這我也是第一次聽到，大概是業者自創名詞，或許也有我所不知道的也說不定，不過依字面推敲，應該是講產後淤血導致的疼痛，產後以腰痛為主，但是並不侷限於淤血，也有失血過多的因虛作痛，或是麻醉後腰部極度扭轉而不自知所導致的腰肌扭傷，這是我所知道的，希望有幫助。祝安康陳俊哲敬上

◆精液倒流出體外

我跟我的先生,性行為後精液會自動流出陰道,這樣會影響懷孕嗎?妳好原本精液就是會流出體外,受孕要的是其中的精蟲而已,當然流太快出來會沒讓精蟲有時間通過子宮頸游入子宮,所以射精之後女方可以仰臥,然後屁股用小枕頭稍微墊高五分鐘左右,這樣的時間該可以夠足量的精蟲游泳了,再來就可以去清潔處理善後,流再多精液出來也沒關係了。墊高枕頭時可以加上自我的暗示,也算是催眠的變形吧,就是女生自己有歡迎接納精蟲進來的意思,快樂一點,不要太嚴肅,畢竟要有愛情才会有結晶,而且是最棒的結晶,這樣對受孕有幫助,也會優質化下一代。同時可以收縮陰道幫助子宮內壓,以幫助精蟲的游動,收縮方法如同凱格爾運動,就是先吸氣,然後收縮肛門,停住幾秒鐘,之後再呼氣和放鬆肛門,這樣連帶陰道也會收縮。祝安康陳俊哲敬上

◆七公分的巧克力囊腫

七公分的巧克力囊腫您好：我今年36歲，已婚孕有一女。我在八年前患有子宮內膜異位症，

而且並發「巧克力囊腫」(位於右側卵巢)，當時接受「腹腔鏡手術」取出囊腫，但三年之後腫瘤又復發。結婚生產後，囊腫曾經一度自動消失。不過，生完小孩一年半之後，右側卵巢又長出腫瘤，現在的腫瘤長7公分、寬5公分。請問陳醫師，現在如果服中藥能治癒我的子宮內膜異位症，並且使我的腫瘤消失嗎？依您的臨床經驗，長7公分、寬5公分腫瘤有因服用中藥而治癒的可能嗎？謝謝！最後敬祝一切平安順利回答：妳好這麼大的囊腫以我的經驗中是無法用中藥消除的，因為實質的東西已經長成了，大概小於三公分的才有保守治療的機會。所以唯一處理方式大概就是手術，當然手術的必要性是應該和西醫婦產科研究來判定。不過可以建議是因為囊腫是屬於內分泌問題所引起的，在手術後必須持續的由中醫治療，這樣才能糾正體質上的問題，而且能夠保證不再復發。這是中醫能夠也是有把握的部份。關於子宮內膜異位，來信並不詳盡清楚，所以無法回答，不過應該如同巧克力囊腫一樣，是可以一併處理的。祝安康陳俊哲敬上

◆淺紅色白帶

淺紅色白帶問：您好近一年間，除了經期時間外我的白帶常常是呈現淺暗紅色的狀態，有時陰唇也會感到刺痛，不知是何原故？

要如何治療呢答：妳好白帶中夾有淺紅色分泌物推測應該是有出血狀態，也有可能是陰道內壁或是子宮頸的發炎所導致，所以請先依網站中的白帶外治法處理，同時請至婦產科求治，以求萬全。陰唇刺痛也是發炎的分泌物所刺激，所以病症是同一原因，請務必儘快治好。祝安康陳俊哲敬上

◆每次行房都不會溼

每次行房都不會"濕"怎麼辦問：與先生結婚三年每次行房都不會"濕"怎麼辦.....答：這有三方面；一、心理性的，教育壓力下的產物，嘿咻時放不開，拘謹的問題。二、生理性的，女性身體適應性愛較慢，成熟度也有的較慢，除了均衡飲食和適當運動外，自我探索也是一種了解自己的方式，所以建議以自慰來嘗試了解自己的敏感帶。三、病理性的，由病引起，

可是來信中看不出有何問題。請購買我寫的【網路性教易】【用力嘿咻來瘦身】這兩本書有提到不少相關內容，請參

閱

◆性冷感有救嗎

性冷感有救嗎謝謝有這網站可查詢，不然真不知要如何解決這私密又難以啟齒的問題。

請問我的情形很嚴重嗎 會有不孕症的可能嗎【性冷感不會造成不孕】

可以治療好嗎 大概要多久才會有感覺ㄋ【可以治好，時間不一定】

請問有哪裡有可治療女性這方面的中醫【我不認識北部中醫師所以無法推薦，不過問題應該妳可以自己解決。】

或是可否請陳醫師幫幫我，這對我很重要，請幫幫我謝謝。

年齡：30，身高 160公分，體重 49公斤我從未有過高潮的感覺，總是興趣缺缺，在做愛做的事時都沒有感覺，心情很沮喪。3-4年前有過好一段暴食症情形，催吐嚴重，當時非常憂鬱到想自殺。目前身體狀況偶會頭暈、呼吸困難與胸悶，常掉髮，嘴唇常脫皮，食慾不佳、胃會脹氣。臉頰與額頭鼻子常長痘痘，冬天手腳冰冷。下半身尤其是小腿腳踝會浮腫，口乾舌躁。腰腎會酸。因不太想吃，一天大概一晚飯，不愛吃肉，不太吃零食，偏甜食。【回答】因為不知道是暴食的飲食失調之後才發生性冷感，不過我認為嚴重飲食失調後遺症也可以加重，而性快感的發生與中醫所謂腎氣的內分泌生殖有關，所以應當是脾腎都病了，而是因為脾病導致腎發生問題，或是脾腎同時都發病這些都有可能。不過現階段還是以調整腸胃優先。因為腸胃功能受損之後，消化吸收的營養物質很難供應人體能量來源，而囤積為人體的外在，所以瘦身的第一步就是調整腸胃道功能，這樣優質的消化系統不會導致越吃越胖，而是越能把吃的東西轉成能量使用而不囤積身體，加上能量可以後送到腎臟的內分泌生殖系統，所以您該做的第一步就是好好的養成正常飲食習慣，規律的輕量運動，然後注意一下經期調養，經期泡玫瑰花茶，經期後吃八珍湯，這樣應該就可以慢慢改慢，如果經期症候群減輕了，內分泌逐步恢復，那性快感缺乏的問題就會慢慢好轉。最後建議購買我的著作【網路性教易】【用力嘿咻來瘦身】【超薦瘦身術】，其中包括了妳的所有問題，請仔細閱讀，可以補充這次回答所不足的。網站另有篇【性冷感】專題，請參閱。

◆蜜月期的調經

蜜月期的調經一般給予五至七日女性荷爾蒙加上黃體素，停藥後三天左右月經會來；若要延後須在預定月經來臨日期前三天，吃五至十日的黃體素。聯考完畢即可停藥，不過少數的人需要以針劑催經，否則時間上難以配合。

◆心臟病的準媽媽

心臟病的準媽媽1、懷孕的心肺功能負擔加重，所以原本就罹患心臟病在受孕前就要接受評估，但是也並非所有心臟病都不能懷孕的。2、如果平時已經無法輕微的活動，在醫師嚴格限制下需完全臥床休息，那麼懷孕對母子都是有極大危險。

◆水痘

水痘1、懷孕初期感染水痘會導致新生兒異常，如果是接近分娩時感染，那麼會引起新生

兒死亡率升高。2、建議婚前健康檢查血液中的水痘抗體，如果是陰性那麼可以注射水痘疫苗，以免懷孕時受到感染。3、懷孕時懷疑接觸到水痘患者受到傳染，可以注射免疫球蛋白以減輕和預防水痘症狀。

◆閉經

閉經繼發性閉經常見是子宮腔沾黏、卵巢早衰、多囊性卵巢囊腫。多囊性卵巢囊腫已有專題介紹。※子宮腔沾黏多因用力過猛的刮搔子宮的流產手術，導致子宮頸和子宮內膜受損，引起子宮壁沾黏而閉經。※卵巢早衰原因不明。多發於20～30歲，症見面部潮紅、周身煩躁、出汗，陰道內滋潤下降、性交疼痛、不孕。治療以少量的荷爾蒙。

◆高齡產婦的注意事項

高齡產婦的注意事項以最新研究發現，高齡產婦與一般產婦的妊娠風險並無差異，而該注意的是胎兒染色體異常問題，而這可以藉助羊膜穿刺檢查來確定。羊膜穿刺是在妊娠十六到十八週時檢查，在超音波導引下，用細針經由媽媽肚皮及子宮壁，進入羊膜腔抽取羊水約20CC做染色體分析。

◆Rh 陰性的孕婦

Rh 陰性的孕婦危險性：

當 Rh 陰性的婦女與 Rh 陽性男性結婚後，胎兒如果是陽性的話，母體會產生 Rh 抗體，當懷第二胎時母體的抗體會侵入胎兒血液中，使得胎兒黃疸、貧血、水腫。對策：第一胎如果是陽性的時候，在生產後七十二小時內醫院會對產婦注射 Rh 抗體，這樣母體就不會產生抗體，第二胎就不會受到影響。

◆孕婦的理想體重

孕婦的理想體重1、並沒有絕對的理想體重，每個人體重增加的速度也都不一樣，只要注意每周增加超過一公斤時，要小心妊娠毒血症或是懷疑腎臟有問題。2、剛懷孕時因為害喜孕吐的關係，所以體重反而會下降，不過最初三個月大約可以增加一兩公斤，然後每周增加半公斤。大概懷孕前體重較輕者可以增加多一些，而懷孕前體重過重者則增加要少一點。

◆早產

早產1、定義：妊娠未滿37周即發生陣痛而分娩。2、原因：早產的大部分是不明確的，只有少部份可以探知原因如子宮頸或陰道感染、子宮頸閉鎖不全、子宮畸形如雙子宮、羊水過多。3、症狀：子宮收縮伴隨腹部疼痛，而且是逐漸加強加重。需馬上到醫院生產。4、早產兒處置：因為不足月生產，所以肺臟發育不成熟，必須注射腎上腺類固醇等藥物使肺部成熟。

◆妊娠胃酸逆流的火燒心

妊娠胃酸逆流的火燒心一、時間：

懷孕中後期二、症狀：

胸口灼熱或是疼痛，胃酸往上衝向咽喉，有酸味感覺，半夜出現較多。三、原因：

胎兒往上頂把一部份的胃頂到胸部，胃酸往上逆流。四、對策：

1、改變睡姿，頭部墊高或是腳部墊高。

2、吃點少鹽的酸梅可以當下改善胃酸逆流症狀。五、預防：

1、睡前不要再吃東西。

2、少量多餐的進食。

3、難以消化的食物少吃。

◆胎盤早期剝離

胎盤早期剝離1、正常胎盤是在分娩後自行排出體外，如果妊娠末期胎盤出現剝離，也會以陰道出血的症狀發生。2、胎盤早期剝離的症狀：妊娠末期出血、腹痛、腹壁僵硬、胎心音消失。此時的腹痛是撕裂般的強烈，不是一般的肚子疼痛。3、處置：需進行剖腹手術，如果出血不止，經過搶救還是無法好轉需進行子宮切除手術。4、胎盤早期剝離的原因不明，經常與妊娠毒血症同時發生，也需注意血壓變化以防萬一。

◆過期妊娠

過期妊娠1、定義：超過預產期兩週未分娩。不過前提是孕婦的月經原本是規則的，不然難以計算確實的預產期，所以經期不規則者須在初懷孕時就用超音波估計週數。2、風險：過期妊娠時因為胎盤開始老化，無法供應血液、營養、氧氣，導致胎兒體重下降或是遽增，並且有胎死腹中或是產後腦部病變。3、對策：因為胎盤會隨著時間的增加而加速老化，所以醫師需通過檢查來確定是否有老化或是老化的程度，以決定是繼續觀察或是進行剖腹產。

◆胎動記錄

胎動記錄1、最早記錄：早期輕微胎動可用超音波測知，初產婦可能要到妊娠二十週左右才有胎動，在28週後可以開始記錄，作為參考資料。2、次數：胎動次數隨著妊娠週數增加而增加，但在預產期前一、二週胎動會略為減少，如果胎動突然減少那就要馬上找醫師診治排除問題。3、如何記錄：在一天的固定時間內，記錄十次胎動所需的時間，如果小於120分鐘那就正常。或是記錄一小時內的胎動次數，只要不少於三次即屬正常。

◆羊膜穿刺

羊膜穿刺適應範圍：年紀超過三十五歲的產婦，不管是否第一次生產者。在懷孕十六到二十週之間作羊膜穿刺檢查。功用：診斷胎兒是否為唐氏症。注意事項：產檢時先以母血篩選唐氏症的可能，通過抽血測知 AFP 和 β -HCG，然後由電腦來計算機率，結論以百分比顯示如 1/300、1/270，這就是發生的機率，如果是 1/270 這就屬於高危險群需要做進一步檢查，就是羊膜穿刺，穿刺抽出羊水來檢測。而如果懷孕年紀是 34 歲以上就直接懷疑是高危險群就一定要做羊膜穿刺。

◆妊娠蛀牙與牙齦炎

妊娠蛀牙與牙齦炎一、時間：

懷孕的任何時期。二、症狀：

蛀牙、牙齒酸軟、牙齦出血。三、原因：

懷孕後飲食習慣和內分泌改變，所以牙齦容易受食物殘渣影響而發炎。四、對策：

1、牙齒的急性期以減輕症狀為主，等到生產後再做徹底治療。五、預防：

1、懷孕期間更需要注意口腔衛生。

2、因為牙齦容易刷牙後出血，所以有的孕婦會減少刷牙次數，加上因為孕吐或是少量多餐，使得口腔衛生不容易做到確實，是這樣原因才使孕婦蛀牙比率升高，才有生一個小孩掉一顆牙齒的俗諺。

◆子宮外孕

子宮外孕一、時間：

懷孕早期二、症狀：

陰道點狀出血，少量、暗褐色、骨盆腔壓痛，當下腹劇痛或是休克是提示子宮外孕的受精卵增大在輸卵管破裂。三、原因：

受孕的精卵在子宮腔之外的地方著床，以輸卵管最多見。四、對策：

使用腹腔鏡將外孕胚胎部位摘除或是藥物注射使胚胎萎縮。五、預防：

有過盆腔發炎、結紮、內膜易位輸卵管手術者容易發生子宮外孕，這類產婦需多加注意，在懷孕一週後使用陰道超音波、或是懷孕六週後用一般超音波觀察不到受孕囊，這就要特別注意。

◆胎位不正

胎位不正一、時間：

懷孕七個月二、症狀：

胎兒不是正常的頭朝下。三、原因：

不明四、對策：

1、做膝胸臥位運動：雙手趴在床上，膝蓋彎曲跪姿，兩腿分開，大腿和床成九十度姿勢，每次五分鐘，每天早晚兩次，運動時間可以慢慢增加到十五分鐘。當胎位回正後，兩三天內可用束腹帶托住。

2、胎位不正有程度上的差異，嚴重者可要剖腹生產。五、預防：

七月的胎位不正有很大比例會慢慢轉回來，因為此時胎兒身體小於子宮，胎兒可以在子宮內游動而轉正，所以孕婦得知胎位不正時也不會多加緊張。

◆剖腹產

剖腹產1、方式：全麻或是半麻，在小腹下方橫切。2、必要性：有以下原因則需進行剖腹產，以不超過三次以上的剖腹產為最安全。

骨盆腔狹窄、前置胎盤、胎盤早期剝離、妊娠毒血症、前胎剖腹產、子宮手術史、超高齡產婦、巨嬰、胎位不正、臍帶脫垂、胎兒缺氧、產程過久。3、風險：出血量大、傷口及附件感染、麻藥過敏。4、注意事項：剖腹產後二天內最為疼痛可以施打止痛藥物。放屁排氣後才可以進食，進食也要漸進的，先以流質食物，需多吃高纖蔬果以防便秘。術後24小時拔除導尿管、點滴，即可下床走動，越早下床恢復會越好，可使腸胃蠕動。

◆妊娠抽筋

妊娠抽筋一、時間：

懷孕的中後期二、症狀：

通常睡覺時或是清晨醒來會小腿抽筋。三、原因：

原因不明，後期胎兒骨骼發育快速，致使鈣的攝取不足，而鈣質攝取過量也會。夜間睡姿固定過久。久坐、久站的血液循環不良。四、對策：

1、小腿抽筋時，坐好然後雙腿伸直，腳尖慢慢往軀體方向彎曲，然後用手慢慢按摩痙攣的

小腿肚。

2、可以用熱敷緩解。五、預防：

1、喝牛奶或是乳製品，也可以服用鈣片。避免喝可樂等碳酸飲料。

2、也要避免攝取過多乳製品和含有磷的蛋黃、肉類、米飯、麵粉製品。

3、避免過久的站立或是坐姿。

4、適量的運動。

5、吻仔魚和排骨湯可以補充適量的鈣質。

◆妊娠感冒

妊娠感冒一、時間：

懷孕的任何時期。二、症狀：

發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水。三、原因：

感冒病毒傳染。四、對策：

1、多休息、多喝開水。

2、如果罹患較嚴重的流行性感冒，需請醫師診治，若有需要醫師會開孕婦可用的抗生素，以防止惡化為肺炎。而且必須做風疹的鑑別診斷，因為風疹症狀與感冒類似，而風疹病毒在懷孕早期容易對胚胎心臟有影響。當自覺胎動減少更要醫師診治。

3、不可以自行購買治療感冒的成藥。五、預防：

1、抵抗力下降容易罹患感冒，所以盡量多休息避免體力勞動。

2、懷孕三個月後可以施打流感疫苗。

3、感冒流行期盡量不要出入密閉的公共場所，如有必要請戴口罩，如公車、電影院。

◆妊娠的腰背酸痛

妊娠的腰背酸痛一、時間：

懷孕三個月以後二、症狀：

從輕微的腰痠到嚴重的背痛都有。三、原因：多見於經產婦和腹肌鬆弛的孕婦，也有是因為內分泌改變導致韌帶鬆弛。四、對策：

1、局部疼痛的腰背部可以熱敷，用熱水袋溫敷，促進肌肉放鬆。如果疼痛劇烈可以冰敷。

2、局部按摩，使用溫和精油按摩也可以，最妥當的就只用橄欖油、乳液都可以。

3、睡覺時拿枕頭墊著，找出舒服的位置。五、預防：

1、多休息。固定姿勢不可過久，如久坐。坐姿也要維持挺立，並用小靠枕支撐腰部。

2、提重物要屈膝、蹲下，不可以直接彎腰取物。

3、不要穿高跟鞋導致重心移位。

4、彈簧床不要過軟，不然影響支撐。

5、使用束腹帶。

◆妊娠毒血症

妊娠毒血症一、時間：

懷孕五個月以後。二、症狀：

沒有明顯症狀，頂多周身水腫按壓凹陷不起，只有經由檢查得知高血壓>140/90和蛋白尿，毒血症嚴重者轉變為【產前子癇症】會有頭痛、視力模糊、上腹痛甚至痙攣、昏迷等症狀或是死亡。

觀察胎動情形以及尿量。三、原因：

不明。四、對策：

- 1、絕對的臥床休息，不可起身做任何事情，也不可以運動。
- 2、嚴重時要緊急送醫，入院監測治療如有需要可能要提早分娩。
- 3、多休息、減少勞累工作。
- 4、產檢時間間隔可以縮短，以利監控。

五、預防：

以下是高危險群，懷孕後需特別注意

- 1、40歲以上的高齡產婦。
- 2、糖尿病病史
- 3、高血壓
- 4、過胖的孕婦
- 5、懷了雙胞胎

◆前置胎盤

前置胎盤1、正常胎盤是附著在子宮的後壁和頂端，如果胎盤附在子宮頸附近則稱為前置胎盤，當越接近生產時，胎盤會剝離發生出血現象。2、前置胎盤症狀：妊娠末期發生無痛性出血、腹壁柔軟、胎心音清晰，以超音波檢查可確診。【胎盤早期剝離的症狀是腹壁僵硬、胎心音消失】3、處置方式：如果出血不嚴重需臥床休息以延長妊娠時日，使胎兒更成熟再分娩。如果有大量出血發生則需進行剖腹產。4、懷孕中期診斷出前置胎盤時，也有可能因為持續的子宮變化而胎盤位置變為正常。5、前置胎盤的出血的量與頻率會逐漸增加，反覆的止血和出血，這是需要注意的，不然會造成大量出血的休克。6、出現前置胎盤的診斷需避免房事，以免病情惡化。

◆妊娠的白帶

妊娠的白帶正常的白帶是清稀，沒有味道，也不會搔癢。一、時間：

任何時間二、症狀：

念珠球菌感染：乳酪狀白帶、腥味、刺激外陰會有搔癢、破皮，燒灼感、頻尿。這是懷孕時最常見的白帶。

滴蟲感染：惡臭水狀白帶、外陰瘙癢疼痛。少見。

披衣菌感染：膿樣白帶。少見。三、原因：

念珠球菌原本就是體內共生黴菌，當懷孕時抵抗力下降或是內分泌改變，這就會慢慢繁殖增生。四、對策：

以念珠球菌的治療為主

1、可以塞劑或是外用軟膏治療。

2、寬鬆的衣褲保持陰部通風乾燥。五、預防：

1、飲食的平衡也會導致陰道內酸鹼質改變，所以均衡飲食也是預防之道。

- 2、如果白帶夾有血絲，那可能是子宮頸發炎，須請醫師診治。
- 3、如果大量而又稀薄的分泌物，或是持續不斷的滴出，那有可能是羊水破了，請儘速就醫。

◆妊娠的貧血

妊娠的貧血一、時間：

懷孕中期二、症狀：

面色萎黃、皮膚毛髮乾燥、水腫、心悸、疲勞、眩暈、呼吸短促、昏倒。檢查血色素低於10克以下，紅血球三、原因：

因為血液總量增加但是紅血球製作不及，食物中鐵質攝取不足，或是原本有地中海型貧血，也有是因為痔瘡出血、消化性潰瘍所致。四、對策：

- 1、如果有原因起起的就針對疾病治療。
 - 2、多吃動物性肉類、豬肝和深色蔬菜如菠菜、胡蘿蔔。
 - 3、醫師開立含鐵質藥物，為求不傷胃，需在飯後或是加開水一起服用。不過也有報告提示服用鐵劑要在懷孕兩個月以後，以減少畸胎機率。五、預防：
- 1、懷孕前應檢查是否有貧血以免懷孕後加重。
 - 2、貧血經常與妊娠毒血症同時存在，所以妊娠毒血症高危險群者也要注意貧血。
 - 3、不要久站或是突然起立，也要避免空腹過久，這樣比較不會有眩暈感。

◆流產

流產※一、時間：懷孕前三個月1、自然流產：懷孕三個月內，染色體因素胚胎發育不良，無法順利著床。2、先兆流產：胚胎尚有生命現象，則需保胎安胎，絕對臥床休息。如果是黃體機能不全可以補充黃體素。3、不可避免性流產：子宮有規則陣痛，子宮頸口已經張開，則胚胎屬無法保留。4、過期流產：承上，如果胚胎以死亡，稱作過期流產。5、完全流產：經陣痛子宮自行排出胚胎則稱為完全流產，若是排不乾淨，則稱為不完全流產。6、習慣性流產：連續三次或是三次以上流產，則稱為習慣性流產。流產並不是絕對的壞，也並不是完全不可避免，只要詳細檢查，配合醫囑，流產的壓力不要過大，保住胎兒的機會還是很大的。

※二、時間：懷孕的最後三個月症狀：出血、腹痛、陣痛、破水、腰痠、腹部下墜感。對策：入院安胎。

◆妊娠的皮膚癢

妊娠的皮膚癢皮膚癢是每位孕婦多少會發生的問題，輕重程度不一，發病原因也各自不同，不過不要以為肯定會發生的，不舒服嚴重時還是要請醫師診治。※妊娠皮膚病

一、時間：

懷孕六、七月發生。二、症狀：

皮膚搔癢，沒有丘疹或是水泡。三、原因：

懷孕時內分泌改變。分娩後自然會痊癒。※粟粒疹一、時間：

懷孕中後期二、症狀：

皮膚癢、皮膚上出現疹子，多出現在胸部下方、大腿內側。三、原因：

長時間身體某部位的潮溼與摩擦。四、對策：

容易長疹子的地方在洗澡擦乾後，可以撒上爽身粉。嚴重搔癢時用冰敷可以減輕一下。五、

預防：

- 1、流汗後盡快擦乾，穿著吸汗的棉質衣服，尺寸要盡量寬鬆。
- 2、不要使用刺激性太強的消毒藥皂來防治感染。
- 3、盡量不要使用化妝品、香水。
- 4、也有可能是對食物過敏，注意一下飲食，尤其是吃海產時一定要保證是品質的新鮮。
- 5、夏秋之際蚊蟲多，蚊蟲叮咬也是皮膚搔癢的原因之一。

◆妊娠的水腫

妊娠的水腫一、時間：

懷孕七個月後明顯。二、症狀：

下肢水腫，如果臉部、上肢水腫且按之凹陷則須注意。三、原因：

水腫也是懷孕時常見的症狀，大部分是正常的生理現象，因為要供應羊水、血液給胎兒，所以母親增加蓄水量這是正常的。但是也有水腫是妊娠毒血症的徵兆，所以也不能輕視，此症會合併蛋白尿、高血壓、抽筋。四、對策：

1、每天固定時間把腳用枕頭墊高十五分鐘，以減輕下肢水腫。

2、特殊水腫要請醫師診治排除危險問題發生。五、預防：

1、懷孕四個月後就不要仰睡，以向左側睡最好，向右亦可，因為這樣子宮就不會壓迫送四肢血液回心臟的靜脈。

2、鹽分的攝取要適量，不可以採取淡鹽飲食，不然影響食慾導致營養吸收不良。

3、生活工作不要過於緊張勞累，要有充分休息和睡眠，餐後和下午的休息時間都要排出來，至少三十分鐘以上。

4、體重控制要得當，每週增加不可超過600G，妊娠增體重也不要過多過快，不然影響心臟

功能。

5、不要站立過久。

◆妊娠的便秘、痔瘡與脹氣

妊娠的便秘、痔瘡與脹氣時間：懷孕後期症狀：

便秘是排便困難。

內痔、混合痔會排便時肛門無疼痛出血，血色鮮紅，血量過大時會引起貧血。痔瘡嚴重時孕婦行走咳嗽腹壓增高時，痔瘡脫出而疼痛。原因：

荷爾蒙改變和子宮胎兒重量壓迫腸子，使腸道蠕動緩慢，糞便內水分重吸收而變硬，使排便產生困難，肛門周圍靜脈曲張而發生痔瘡。對策：

1、每天飲用八大杯水，清晨醒來喝一杯溫水以刺激排便反射。

2、食用高纖蔬菜和水果。

3、每天輕微散步運動。

4、早晚兩次提肛運動，每次至少三十下。

5、便後用溫水清洗肛門，養成固定時間排便的習慣。預防：

1、不要喝含有刺激性的茶葉和咖啡。

2、辛辣食物避免食用，如辣椒、蔥、薑、蒜、酒、胡椒，不過少量添加調味可以，不要過量就好。

3、不要站立過久。

4、市售緩瀉劑、通便劑、灌腸藥物都不可使用，即使要用也要在醫師指示下暫時使用。脹氣的形成原因與便秘是相同的，所以相同對策可以來預防，不須另外服藥。

◆妊娠靜脈曲張

妊娠靜脈曲張一、時間：

懷孕後期二、症狀：

靜脈曲張在下肢時可見皮膚淺層紫色筋脈或是蜘蛛網，嚴重時有沈重感或是局部疼痛，外表可見到結節狀的血管瘤。如果局部紅腫、疼痛、發熱則需請醫師診治，不可以自行揉按或是任何治療。三、原因：

因為懷孕腹壓上升，靜脈回流壓力增加。四、對策：

1、輕微者可穿著彈性襪以改善血流循環，穿著彈性襪前可以將腳抬高、墊高幾分鐘，讓腫脹的腳消退後再穿上。

2、洗溫水澡或是下肢浸泡溫水中，可以暫時改善腿部的腫脹和疼痛。水溫不可過高，否則血管擴張會引起血管

3、下肢竟慢靜脈曲張程度上與水腫有連帶關係，所以需與水腫治療合併注意。

4、工作站立或是久坐時，請不定時的起立、走動等等的改變身體的姿勢。五、預防：

1、懷孕次數會加重靜脈曲張的嚴重性，所以嚴重者產後可與專門外科醫師討論，評估問題輕重。

2、適量的運動是預防靜脈曲張的好方法。

3、每天把腳抬高數次，當可以平臥時可以用枕頭墊高腳部。

4、不要翹二郎腿，因為這樣會導致血液循環不良。

◆妊娠分期的飲食注意

妊娠分期的飲食注意1、不能吃的：

酒、煙。尤其懷孕初期酒精會對胎兒產生中毒症候群，而抽煙導致早產或是體重不足。

糖果、油炸、肥肉、汽水這些垃圾食物也不宜吃，濃茶、咖啡、辣椒都要少吃。2、一定要遵守的：

均衡飲食，不可以偏食也不可以過量，不要聽說什麼東西好就一直吃某樣東西。蛋白質供應胎兒的身體結構組成，而蔬菜是微量元素的最佳來源，而且可以防止便秘。每天飲水量也足夠的八大杯。食物來源肉類、乳類、蛋類、肝臟、海鮮、雞蛋、堅果、新鮮蔬菜、水果、乳類。3、懷孕早期：前三個月

此時胚胎發育較慢，孕婦的營養只要高於平時一些就可以，因為孕吐的關係，可以少量多餐，然後多吃點新鮮的水果。4、懷孕中期：四到七個月

此時胎兒發育較快，營養需求量大，所以除了飲食的量要足夠，還要特別加強蛋白質、鐵和鈣質的補充。5、懷孕晚期：八個月以後

此時胎兒生長更快，量要比中期更多，但是應該以蛋白質為主，而限制脂肪、糖類的攝取以免胎兒體重過大。6、素食者：

必須補充維他命 B 12，尤其是吃全素連蛋都不吃的。7、維他命丸的補充：

可以補充孕婦專用的維他命，其中會含有葉酸、鋅、鐵、鎂、A、B、C、E。

◆產兆—生產的前兆

產兆---生產的前兆預產期前後兩週生產均屬正常。以下是四種產兆，可單獨出現或是同時都有。1、腹部下墜：

預產期前兩三週發生，因為胎頭進入骨盆腔，所以原本胎兒壓迫胃部心臟的呼吸急促感消失，感覺肚子會小一點。初產婦腹部下墜較早發生。2、陣痛：

先是腰痠，然後是規律子宮收縮的腹痛，隨著產程進展，陣痛頻率越頻繁，時間間隔越短，疼痛也越強烈。剛開始可能是間隔二十或是三十分鐘，如果間隔五分鐘之內那就應該在產房了。

初產婦的假性陣痛可以繼續觀察，而經產婦的假性陣痛則需小心，因為經常是假性陣痛之後馬上就是令人措手不及的陣痛。假性陣痛是子宮收縮不規則、頻率不加快、疼痛也不增強，最後甚至疼痛消失。3、見紅：

陰道少量出血且夾雜在黏稠分泌物之中。這表示就快要生了。

如果出血量大要考慮胎盤早期剝離或是前置胎盤，需立刻到醫院診治。4、破水：

胎膜破裂流出羊水，是不自主、不自覺的，不像小便是可以控制的。通常是陣痛後破水，如果未陣痛就破水稱之早期破水，需立刻到醫院，不然容易引起羊膜發炎。早期破水後需在24小時內催生分娩，以免發生危險。懷孕末期時如果腹部用力或是咳嗽，有時會壓迫膀胱使尿液流出，而誤認為是破水，分辨方法是破水是持續不斷的流出，而尿液只是暫時性的而已。

◆安胎

安胎1、早期支持妊娠的是黃體素，黃體素先由卵巢分泌，在妊娠八週胎盤形成後，才由胎盤取代卵巢分泌黃體素。所以懷孕早期有的孕婦卵巢分泌黃體素不足，可以施打HCG來刺激卵巢分泌黃體素。2、早期的出血安胎有一部份是染色體異常，所以會出現胚胎萎縮或是心跳消失，極力的安胎用處不大，盡人事聽天命。3、晚期的安胎要先分辨引起胎動不安的原因，如果嚴重者經常是要絕對的臥床休息，這方法就全天的躺在床上，包括睡覺、吃飯、大小便。絕對不可以起身活動。最重要是心情放輕鬆，這樣子宮收縮的力道也會減輕。

◆產程——生產的過程

產程——生產的過程產程指開始規則陣痛到胎兒娩出、胎盤娩出。1、第一產程(擴張期)：子宮頸開口期規則陣痛開始，一直到子宮頸完全張開為止【十公分或五指幅】，初產婦約8～10小時。此時會有破水現象。此時產婦不宜過度用力，因為子宮頸開口不大，尚不足以讓胎兒通過，所以要盡量放鬆，不痛時盡量休息或是睡覺，不用馬上躺到床上準備生產，可以隨意走動或是坐椅子上。當醫師允許可以開始用力時才可以用力。子宮收縮時可以做腹式深呼吸，吐氣時腹部往內縮。有尿液就要去解小便。有飢餓感時可以進食容易消化的食物，不要餓肚子生小孩，當然也不可以大吃大喝。2、第二產程(排出期)：胎兒娩出期從子宮頸口完全的擴張至胎兒完全的出生為止，初產婦約60～80分鐘。

幾乎每分鐘都在痛，陣痛最強的時期。當陣痛間隔時，深吸一口氣然後閉氣，在陣痛來襲時再盡量向下用力使胎兒儘速生出。用力方式如果解大便一樣。胎頭即將露出時，醫師做會陰切開，娩出後再縫合。不做會陰切開則胎頭通過會陰也會造成撕裂傷，這樣傷口不平整，逐層縫合困難。3、第三產程(胎盤期)：胎盤娩出期從胎兒出生後至胎盤娩出為止，約10～30分鐘。

娩出胎盤也會疼痛，不過程度較輕許多。胎盤娩出後一小時最容易發生產後出血，需特別注意。尤其是要注意冬天天氣冷，產婦虛弱的睡著後大出血。

胎盤娩出前不可以用手碰觸下腹部，不然會引起子宮口的收縮，這樣會阻礙胎盤娩出。

◆妊娠糖尿病

妊娠糖尿病一、時間：

懷孕中後期。二、症狀：多由產檢時篩選出來。懷孕時尿糖檢測陽性時會再進一步做血糖測試，因為糖尿病對胎兒危害較大，所以有必要做相對應的檢驗。如何診斷妊娠糖尿病：在懷孕二十四到二十八週之間，喝五十公克糖水，一小時後驗血糖（此項檢查事前不須空腹），若血糖數值超過標準，則須進一步做一百公克耐糖測試。一百公克耐糖測試須事前空腹，喝一百公克糖水前先抽一次血，喝下後一、二、三小時再各抽一次血，四次血糖數值中若有兩項或兩項以上超過標準，則可診斷為妊娠糖尿病。三、原因：

妊娠的內分泌改變。產後六週內大多會恢復正常，所以如有妊娠糖尿病，不要忘了產後再接受檢查。四、對策：

1、妊娠糖尿病經由飲食和運動可以得到控制，澱粉類的碳水化合物需要減量，而脂肪和蛋白質食物則維持原來標準。較嚴重者可以施打胰島素來控制。並在預產期一個月前入院監控，而且最好是醫學中心。

2、熱量控制不宜過低，不然會加速飢餓感，以少量多餐為宜。

3、體重控制在每月1.5kg，妊娠體重增加不超過9kg。

4、經醫師檢查如果胎兒與胎盤都正常，那就沒有必要在三十六週就提前娩出，儘量到足月再分娩。五、預防：A、有以下事項需特別注意妊娠糖尿病：

1、檢驗過一次尿糖是陽性。

2、有糖尿病的家族史。

3、肥胖的孕婦。

4、有巨嬰生產史。嬰兒大於4.5kg

5、以往有羊水過多和原因不明的死胎或是畸胎史。

6、妊娠糖尿病史。B、依賴型糖尿病的婦女仍可以在醫師監控下懷孕與生產。

◆各種超音波的差異

各種的超音波差異前言：

超音波對孕婦是很好的檢查工具，沒有侵入性又可以探知很多事情，因為超音波如同講話一樣的是機械震動的波動，所以對胎兒來說是安全的。不過雖然好用，可是並不能保證超音波觀察下沒問題就是完全沒有問題，儀器還是需要醫師的細心觀察和診斷的，不過至少在超音波能力範圍內是正常的，那也不錯了。以下來分析現在各式各樣的超音波，看看有絕對需要自費到那麼高級的先進儀器嗎？一、超音波

一般婦產科產檢是腹部超音波，可以在不同時期觀察到胎兒生長發育的變化，如果有懷疑的異常再做進一步檢查，這是初級篩選。常規要在懷孕七週時做超音波檢查。二、高層次的2D超音波

當一般超音波有所懷疑就安排使用高層次超音波檢查。例如：常規檢查懷疑畸形胎、羊水量

異常、妊娠糖尿病、胎兒生長遲滯、高齡孕婦未作羊膜穿刺、懷疑服用藥物、母血篩選數值異常。三、3D 超音波

可以立體成像，看到胎兒的微笑、吮指，也更精密的觀察胎兒外觀，例如畸形、胼指。但是需要足夠的羊水才能立體觀察，而月份太大，胎兒擠成一團那也是看不到。四、4D 超音波

可以立體成像的同時又是動態性的。侷限性如3D 超音波。五、都卜勒超音波

也就是彩色超音波，可以觀察胎兒臍帶、胎盤、心臟的血液流動，尤其是臍繞頸，不過臍繞頸是很常見，也不是只要繞頸就是要很緊張，大部分還是可以自然產，要看醫師的評估。六、陰道超音波

陰道超音波可以比腹部超音波早一週觀察到胚囊，可是一般正常下不會使用，如果腹部超音波觀察不到胚囊發育才有需要用超音波更進距離的觀察。

◆驗孕

驗孕*嘿咻六天後驗孕受孕是要在卵子排出的24小時內，然後碰到72小時內進入陰道游到輸卵管的精子。所以排卵前一、二天或是當天嘿咻才有機會受孕。然後受精卵還要旅行三天才會到子宮內著床，固定下來之後才會分泌絨毛激素，所以精蟲存活時間三天加上旅行時間三天，那就是同房之後有懷孕大約六天才能知道有無懷孕。所以也不用嘿咻後急著驗孕，只少等六天吧，當然時間越久濃度越高也就越準確，因為有的人就是剛開始分泌少所以測不到。*怎麼驗市售驗孕劑就有很好的準確率，誤差率1%。到藥局買一隻就是了，一手交錢一手交貨後記得不要害羞趕快跑掉，注意看一下有效期限，不然白忙一場花錢當冤大頭。市售驗孕劑價格差別很大，大概只要通過審核可以上市的就ok了，不用買最貴的，有時候急著想要懷孕連續買好多盒也是很花錢的。另外也不要找中醫把脈看有沒有懷孕，因為把脈的誤差率很高，這點驗孕劑比較受信賴。驗孕劑要用早上醒來的第一泡尿，而且是尿的中段，這樣才有高的濃度。如果沒有早上測量，那麼也不要再喝大量開水之後，這樣的尿液中荷爾蒙的濃度是不夠的。驗孕後是陰性如果月經過期十天，該來還是沒來，那就要再驗孕一次，如果還是陰性那就到婦產科請醫師診治。*其他方法抽血也可以得到體內的內分泌變化，不過要到醫院才辦得到，這是可以達到百分之百的準確率。*注意事項驗孕陽性之後，還要在懷孕的第六週去照超音波，確定好位置以免子宮外孕或是葡萄胎等等。在可能懷孕的懷疑中，不要吃可疑藥物---中西藥都有可能導致畸胎，也不要照射X光。

◆妊娠出血

妊娠出血一、時間：

懷孕三個月內二、症狀：

陰道點狀出血，為流產的前兆。子宮外孕與葡萄胎的出血會合併腹痛。三、原因：

胚胎發育異常的早期流產、內分泌失調、子宮外孕、葡萄胎。四、對策：

- 1、胚胎發育異常的早期流產為自然流產，是為自然淘汰。
 - 2、觀察胚胎發育情形如胚胎在子宮內，而施予黃體素安胎。
 - 3、子宮外孕則使用腹腔鏡將外孕胚胎部位摘除或是藥物注射使胚胎萎縮。
 - 4、葡萄胎可經由超音波顯示或H C G濃度升高，須行真空吸引刮除術。
- 五、預防：
- 1、需找出出血原因並做針對性治療，不可盲目保胎。
 - 2、20歲以下、40歲以上懷孕或是連續兩次自然流產者需注意葡萄胎的可能性大增。※胞漏

妊娠，經水壅之以養胎，畜之以為乳，其衝任氣虛不能約制，故月水時下，名為胞漏，血盡子死。亦有孕婦血盛，月信常來而胎不動，名為激經，俗稱狗兒胎，若以胎漏治之，則胎必墮。又有壯盛孕婦，按月去血點滴，若無腰痠痛胎動，不須服藥。如孕婦虛羸，腰常酸痛，并胎動而按月下血點滴，或下血不止，此非血有餘，乃胞漏也。蓋氣虛則提攝不固，血弱則灌溉不周，婦人腎以繫胞，而腰為腎之府，腰痛則墮不可不防。凡妊娠三月後，尺脈或澀，或微弱，胎必不固，惟脈洪盛者，胎不墮。以上是說明常見妊娠出血的情形，中醫治療此症的重點，在於腰部疼痛的好轉與否，病情的輕重，是與腰痛的有無輕重，呈相對應關係，而別無他症，只有出血少許的情形，雖然不是很嚴重，可以不必服藥，不過為慎重起見，也要絕對臥床休息數日，唯恐病情出現轉折，而懷孕之初，若有腰痠現象，又素來體質甚差，就應該密切觀察，或安胎以免措手不及。若是因為提重物抱小孩等等的外力，使腰肌韌帶損傷者，不是腎虛腰痛，應該鑑別出來。

◆害喜

害喜時間：

懷孕的第二個月中期開始，持續一、二個月，最慢第四個月結束。症狀：

害喜的孕吐可以是正常現象，也可以是嚴重的症狀，有的人毫無感覺，有的人卻是嘔吐連連。

孕吐的特徵就是嘔吐後感覺舒適，而且食慾良好，更不會因嘔吐而消瘦。對策：

即使不斷嘔吐還是要多少吃一些，因為不可能完全吐光光，還是多少會吸收，少量多餐的吃。

當對氣味敏感時，廚房室內要多打開窗戶讓空氣流通，一打開冰箱時不要靠太近，或是烹調時戴上口罩。預防：

平時胃腸功能不好的孕吐就會嚴重點，而懷孕的心理壓力也會增大孕吐的症狀，這兩點是可以預防的。中醫祕訣：惡阻，即惡食也。

此因婦人本虛，平居之時，喜怒不節，當風取冷，中脘素有痰飲，受妊經血既閉，飲食相搏，氣不宣通，遂至心下憤悶，頭昏眼花，四肢沈重，聞食氣即吐，喜食酸物，多臥少起，甚則吐逆。所以平時注意脾胃攝納最重要，有一位小姐，國中之後吃冰則短氣，呼吸不暢，平時四肢冰冷，這是以上所說痰飲比較嚴重的，又兼有陽氣虛，所以婚後妊娠，惡阻幾乎維持整個懷孕過程，幸好產後調理得當，體質轉佳，竟然吃冰而宿疾不作，已經十年不識冰的滋味，然而放開負擔後，毫無忌憚的吃冰，現在第二胎又見惡阻，所以還是謹慎一點比較好。所以第一胎如果惡阻嚴重，就要檢討一下平時的飲食習慣，或是妊娠前檢討一下脾胃功能，以防微杜漸。若是嚴重惡阻者，非但藥入即吐，甚至入廚房，開冰箱，就頻頻欲嘔，如此長期厭食，形體消瘦，臥床不起，可用藥物蒸汽法。鮮芫荽【香菜】一把 鮮紫蘇一錢 鮮藿香【左手香】一錢 陳皮二錢 砂仁二錢 裝入茶壺，加水滾開，以壺口蒸汽對鼻孔吸入，如此可以寬胸定逆，悅脾醒胃，再略進食物，即可慢慢恢復。害喜胃痛的藥茶 陳醫師: ^_^...您好!我現已懷孕二個月,因常害喜,胃很不舒服,吃或不吃,都會胃痛,而且還會吐到頭暈,肌肉酸痛,非常痛苦,從網站上得知陳醫師解說害喜的情況非常詳細而且粉親切,想請問陳醫師"胃痛"是正常的嗎?還是我自己本身的胃有問題,須要檢查呢?麻煩您告訴我一些可減輕症狀的方法,謝謝您!懷疑自己有胃病的媽媽/*-*\

ps.懷孕前並沒有胃病,也不會胃痛.您好這就是害喜丫

不是妳的腸胃有問題

試試看泡點中藥喝喝陳皮一錢

砂仁一錢

紫蘇 二錢如果喝不下去，持續的聞藥味也可以。

試四天，如果沒改善再寫信來問。祝安康陳俊哲敬上

◆陰道沖洗生男法

陰道沖洗生男法在危險期或是同房前十五分鐘，使用溫的5%重碳酸鈉溶液灌洗陰道內，如此陰道內成為弱鹼性，這樣可以Y精蟲活力上升。重碳酸那就是小蘇打，藥房有賣。將乾淨的陰道沖洗器加入200g的溫水和一小匙的小蘇打，溶解後沖入陰道內即可。

◆糖尿病的準媽媽

糖尿病的準媽媽1、原本就是依賴型糖尿病人跟妊娠糖尿病是不同的。依賴型糖尿病還是可以在醫師監控下懷孕生子。2、依賴型【一型】在受孕前需做一系列的評估，尤其是心血管、腎臟、血色素。3、懷孕過程需緊密的與醫師聯繫，完全在醫師監控下才能安全的生下健康嬰兒。4、懷孕過程有任何併發症都需要住院觀察，以免惡化。5、血糖過低時會有頭暈發生，所以隨時都要備有糖果。

◆同房時間生男法

同房時間生男法控制生男的Y精蟲活動力強但是存活時間短，所以越靠近排卵日同房就越有利於Y精蟲進入卵。而精蟲總數量越多則生男機會越高。所以排卵前五天不同房，到越靠近排卵日同房越能生男孩。排卵的徵兆每人不同，有的是陰道分泌物增加，或是卵巢有排卵的輕微疼痛，也有人是性慾增強。不過月經週期越準確者越容易找出排卵日，排卵日是行經前的倒數14天，所以週期越準確就越能測知排卵日。

◆肝炎的準媽媽

肝炎的準媽媽1、B型肝炎患者懷孕並不受影響，但是需檢查e抗原，e抗原是陽性的時候才有較強傳染力，如果陰性的那傳染力更弱。2、B型肝炎帶原者會在分娩時通過分泌物使新生兒感染，這也就是垂直感染，並不會在懷孕期間就傳染給胎兒。3、如果孕婦是e抗原陽性，新生兒在生出後24小時需注射一劑B型肝炎免疫球蛋白，之後再按時接受三劑B型肝炎疫苗注射，這樣就可以預防新生兒受到感染。4、婚前健康檢查如果發現沒有B型肝炎，也沒有抗體，那麼可以注射三劑B型肝炎疫苗，這樣就可以避免自身和胎兒受到感染。

◆精蟲分離術生男法

精蟲分離術方法：取出精液後用化學藥品【如特殊蛋白質】或是高速離心機，得到X精子或是Y精子，再依人工受精完成受孕。原理：Y精子與卵結合生男孩，X精子與卵結合生女孩。所以個別分離出X或Y就可以達到生男生女的胎兒性別控制。注意事項：

1、因技術操作有效率有不同差異，並非百分之百有效，所以要有一定程度的心理準備。2、分離過程是否會對遺傳物質有所損傷，因為無法做到長期追蹤，所以利用這個方法只為了性別選擇，那麼絕大多數的醫師都是不贊成的，除非是有遺傳性疾病的懷疑，那才非做不可。如血友病。

◆飲食控制生男法

飲食控制生男法 Y 精蟲在鹼性環境中活動力較強，比較容易先馳得點的與卵子結合，所以想要生男孩通過飲食使體質產生變化。控制飲食並非長年都如此，而是行經到排卵的期間控制飲食，而夫妻攝取相反性質的食物，則功效加倍。想生男孩則丈夫多吃米飯、麵包、麵食、魚、肉、蛋等酸性食物。想生女孩則妻子要多吃水果、蔬菜等鹼性食物。這裡不詳細記載各種酸性類食物或是鹼性類食物，因為原則上就是如上所述，縱使有一點點細微差別，大概主要方向對了就可以。當然基本五大類的飲食都要顧到，只是突出的多吃一些。如果丈夫原本素食，那攝取肉食的時間要增長才能改變體質。

◆子宮內膜異位

子宮內膜異位一、症狀：以痛經和不孕最多，經量增多、週期紊亂、經期延長、性交疼痛、急性腹痛、排便困難、血便。子宮內膜組織不長在子宮，可以在卵巢、輸卵管、子宮外壁、骨盆腔、甚至肺、腦。所以依據不同部位而有不同症狀出現。二、原因：原因不明，但是異位的子宮內膜組織與正常者相同，所以也隨著月經週期而有變化。而現今各種不同產生學說都有一定的證據，互相間也有所補充。異位內膜以卵巢內最多見，產生的囊腫隨病程逐漸擴大，手術摘除時容易破裂而流出巧克力樣黏稠的陳舊血，所以也稱為巧克力囊腫。三、治療：以不孕為主的治療效果與病程輕重有關，也有輕微者經過一兩次妊娠後而減輕，其他荷爾蒙製劑治療或是內視鏡手術處理，均需醫師評估。

◆多囊性卵巢囊腫

多囊性卵巢囊腫一、症狀：月經週期不規則或是不正常出血、皮膚粗糙、青春痘、多毛、肥胖、雙側卵巢腫大、甚至閉經、不孕。二、原因：檢查可以測知 LH/FSH 比值（黃體刺激素比濾泡刺激素）上升，E1/E2比上升、泌乳激數增加、胰島素增加。三、治療：治療上如果肥胖突出，則著手減少體重在一定程度上可以達到受孕的機會。有過研究患者實施低胰島素飲食法，可在短期內獲得良好效果。此症的治療目的有三：一是妊娠，可以施打排卵藥物，不過建議前提是不可過於頻繁，而且體能體質要養好才進行。二是調經，因為月經不規則或是閉經，可以給予荷爾蒙治療即可。三是除毛，因為多毛影響觀瞻，可與雌激素與黃體素類避孕藥物，降低雄激素後多毛現象可以改善。四、保養：因為與丘腦-垂體-卵巢三者之間互為影響，所以情緒會左右病情進展，而初潮後的經期關注也是預防此症的關鍵。

◆習慣性流產

習慣性流產習慣性流產指的是連續三次以上，懷孕週數20週以前的自然流產。臺大醫院從1987年到1993年的統計，共393個案例，其中因為染色體異常佔了3%，內分泌異常佔20%，子宮異常佔8%，子宮頸閉鎖不全佔2%，免疫因素佔12%，原因不明者佔55%。※一、染色體異常染色體異常造成胎兒死亡，所以胚胎流產。染色體異常者無法可治，只能反覆受孕期待生出正常者。※二、內分泌異常甲狀腺機能亢進、低下、糖尿病、高泌乳素症，但最常見為黃體素不足或是不全者，只要量基礎體溫，再黃體期檢測血清中的黃體素，即可確診，只要妊娠前後施予荷爾蒙治療即可改善。※三、子宮體異常先天性子宮體異常如雙子宮、雙角子宮、中隔子宮，此異常子宮胚胎不易著床。當流產後的詳細檢查可以通過超音波、陰道內視鏡發現異常，可以手術處理。後天性子宮異常如子宮沾黏和子宮頸閉鎖不全。子宮沾黏源自於人工流產損傷內膜、感染、產後受傷，沾黏可以手術後治入樂普避孕器，再以雌激素治療。子宮頸閉鎖不全多出現在妊娠中期，因為胎兒過重擠壓出子宮頸口，然後破水而流產，可以妊娠後手術治療。手術子宮肌瘤也會導致習慣性流產，可以手術或是藥物使肌瘤縮小後再受孕即可。※四、免疫問題全身性紅斑性狼瘡或是原發性血小板過少者，會使流產比例上升。

◆受孕前的西藥禁忌

受孕前的西藥禁忌一、孕婦用藥等級分類以美國 P D R，U S P D I 為根據，孕婦用藥危險分為以下等級。在藥物治療手冊的藥物介紹中會註明各種等級。

以孕字後面註明 A、B、C、D、X。所以 A B 等即是可以使用，而 C 級需要注意，D X 則有必要才會勉強使用。孕（A）：依據有對照組的實驗顯示，並無危險性。孕（B）：人體實驗顯示無危險性。孕（C）：無法排除無危險性。孕（D）：證據顯示具有危險性。孕（X）：孕婦禁忌使用。台北市網路新都市民健康網的西藥查詢系統 <http://www.healthcity.net.tw/healthcare/drugs.asp>#二、以作用來區分的用藥禁忌1、引起子宮收縮導致流產的藥物種類

麥角劑、奎寧、催產素。2、強力瀉下藥物，刺激腸蠕動也會興奮子宮收縮

蓖麻油、硫酸鎂、硫酸鈉。3、能夠通過胎盤影響胎兒的發育或是畸形的藥物

毛果芸香鹼、胰島素、可的松、抗癌藥、荷爾蒙製劑。三、按語孕婦用藥在西醫學上有很好的實驗與臨床支持，所以只要醫師權衡好使用時機，那麼就可以放心，因為有些藥物只有懷孕的前三個月對胚胎器官形成有影響。另外有的藥物也無法通過胎盤達到胎兒，而且有些妊娠的問題會產生生命危險，所以及時治療反而是對胎兒有保護作用。像有的孕婦即使被蚊子咬了也不敢抹綠油精，這真是矯枉過正了。

◆懷孕前需要做的優生檢查

懷孕前需要做的優生檢查優生健檢或是孕前健康檢查，也稱做優生健檢，項目包括：個人基本資料（健康史、家族史）、一般身體檢查、傳染性疾病如梅毒、肝炎、愛滋病、德國麻

疹等；血型 RH 因子分析及地中海型貧血篩檢。尤其是家族中有遺傳性疾病者或是智能發展不足、精神異常、或是習慣性流產等等那就更必須要詳細作好優生健檢。檢查項目如下：一、個人基本資料：

職業史、長期使用之特殊藥物、吸菸史、飲酒史、家族成員有遺傳疾病或異常個案史。

因為有的遺傳性疾病並無法當下檢驗出來，中年發病的也很多，所以通過家族史的詢問可以更準確的朝某些方向檢查。二、一般健康檢查：

身高、體重、血壓之測量、視力、色盲、聽力之鑑定、內外科身體檢查，胸部 X 光檢查、血液、尿液、糞便、血清生化、血清免疫、心電圖、超音波(腸胃道及婦科)、精液、甲狀腺功能檢查。X 光檢查對胎兒有一定程度的損傷，所以排出肺結核就要先做好，不能等懷孕了才來照 X 光。精液檢查可以排除例如精索區張引起的精蟲品質下降，這就可以事先解決了。如果有甲狀腺機能亢進就要先控制好病情，不然懷孕時會加重病情，而且某些抗甲狀腺藥物會導致胎兒發生先天性甲狀腺機能低下，所以有這類病史要事先注意。三、遺傳性疾病檢查：

細胞生化酵素、染色體檢驗和基因檢驗。四、傳染性疾病檢查：

結核病、梅毒、淋病、肝炎、疱疹、德國麻疹、愛滋病。五、精神疾病檢查：

臨床精神科檢查、心理測驗、腦波檢查、遺傳性精神疾病檢查。六、懷孕前六個月要做的：德國麻疹和水痘病毒抗體檢驗後，要在孕前三個月注射，而後續追蹤檢查要預留時間，所以建議懷孕前六個月。

◆女性不孕原因分類

不孕原因分類婚後性生活正常，未避孕，同居兩年以上，而未妊娠，稱為不孕症。因為根據資料統計，正常夫婦同居兩年以上妊娠的比率是90%，所以時限以兩年為宜。※一、內分泌因素：佔女性不孕40%1、多囊性卵巢囊腫

閉經、多毛、肥胖、不排卵、單相基礎體溫。2、高泌乳素血症

未生育但是有乳汁分泌，常見原因是腦下垂體前葉的腫瘤，症狀有無月經、經量減少。3、黃體功能不全

基礎體溫高溫相低於14天，黃體素不足使受精卵不易著床。4、無排卵性子宮出血

行經正常但是不排卵，見於高孕酮血症、黃素化未破裂卵泡綜合徵。以上四種佔內分泌因素80%※二、輸卵管因素：佔女性不孕30%1、輸卵管炎

導致原因是感染化膿、結核性結節、淋菌。輸卵管發炎腫脹後，輸卵管無法抓取卵子，受精卵也無法在輸卵管結合。2、輸卵管發育不良

輸卵管過於纖細，導致精子、卵、或是受精卵通過不良。※三、子宮內膜異位症：約佔女性不孕10%異位的子宮內膜因為不同位置而有不同表現，有時會導致子宮、卵巢沾黏。或是內膜存在於卵巢而破壞卵巢功能，使之不排卵。※四、卵巢因素因為基因異常，所以卵巢發育不良或是不發育，是為絕對不孕，如Turner綜合徵。卵巢發炎也會導致不排卵或是沾黏後妨礙排卵。甲狀腺疾病也會影響卵巢功能。※五、子宮因素先天性無子宮、子宮發育不良、畸形、子宮內膜炎、子宮肌瘤、子宮內沾黏等等都是不孕的原因。另外子宮位置異常如子宮嚴重前屈，往往伴有子宮發育不良。重度子宮後傾後屈，使子宮頸口向上，難與射入後穹隆的精液接觸，進而影響精子進入子宮頸口。※六、子宮頸因素子宮頸先天發育異常、息肉、慢性發炎、子宮頸黏液異常等等都是不孕的可能原因。※七、外陰--陰道因素處女膜閉鎖、陰道閉鎖、先天性無陰道、等等都是不孕的原因。滴蟲引起的外陰陰道炎，滴蟲和大量白細胞會吞噬精子。※八、免疫因素女性對精子產生免疫反應，產生抗精子抗體。

◆量基礎體溫的意義

量基礎體溫的意義一、何謂基礎體溫基礎體溫就是人體完全沒有額外的活動，只有維持身體最基本代謝、呼吸、心跳等等活動的體溫，由此可以知道身體細微的變化。女性因為排卵後的第二天，卵巢形成黃體而分泌黃體素，這會使體溫上升攝氏0.2~0.6度左右。如果沒有受孕，黃體會萎縮，體溫會降下來而進入下一次月經週期。二、如何量基礎體溫先要到藥房買一支特殊的基礎體溫計，它的刻度較密可以觀察到細微體溫差異，一般以攝氏36.7度(刻度24)為高低溫的分界。把基礎體溫計放在床邊隨手可以拿到的地方，當清晨一醒來就把它放入口中，測量三分鐘左右。基礎體溫計包裝盒內有統計圖可以填寫記錄，而如果有同房、感冒發燒、前一天熬夜晚睡、月經來臨等等也需標記註明。三、基礎體溫要量多久基礎體溫是為了判定身體內部是否有問題，而不是戰戰兢兢的為了捕捉受孕時機，所以建議正常測量三次左右就可以。如果用基礎體溫來捉排卵期，那麼有可能會是經年累月的量，像慾望城市中的夏綠蒂，為了生育量了六個月，這就不必要了，因為排卵對女生來說還是有跡可循的，自己的身體還是會有暗示的跡象，所以不要戰戰兢兢的在早上醒來的美好時光中呆呆的含著溫度計，而是應該耳鬢磨絲的講講悄悄話，或是慵懶的撒撒嬌，培養點生活情趣，這樣才是對的方法，不然愛愛如同按表操課，跟隨著記錄走，這樣不考慮心情慾望的變化，是會把原本做

愛做的事弄成僵硬無比。基礎體溫容易受外界影響，所以不要為了偶爾的異常，而懷疑自己的內分泌有問題，生小孩要放輕鬆這是不變的道理。四、基礎體溫的研判1、單相

只有低溫期，需做詳細檢查，以排除不排卵的原因。2、雙相

雙相是有高溫期和低溫期。高溫期正常平均有14天。但是如果高溫期少於12天，那是顯示黃體不足，需要積極治療。

◆黃體素的重要性

黃體素的重要性一、什麼是黃體素卵巢上有濾泡【也就是卵泡】，當濾泡排出卵之後，濾泡的剩餘組織就轉變為黃體，然後開始分泌大量的黃體素【又稱 PRG】，也叫做助孕素。二、黃體素有什麼功用黃體素是負責子宮為懷孕所作的準備工作，讓子宮內膜增厚，等待受精卵的著床。而且可以減少子宮收縮的頻率，以避免著床的受精卵被排出去。另外黃體素所促成乳房小葉和乳房小泡的發育，然後等待泌乳激素刺激後就可以分泌乳汁。三、黃體素不足黃體機能不足導致黃體素不足，這時基礎體溫的高溫期過短，子宮內膜快速剝落成月經，然後又被快速排出，或者是受精卵在薄弱的子宮內膜勉強著床，但是內膜無法供應良好的營養給受精卵，那麼根基不穩下會產生早期流產的現象。一般都是懷孕四五週之後出現點狀出血，然後安胎，最後以大出血流產作收，這種會反覆發生而為習慣性流產，不過只要妥善處理，這種習慣性流產是最容易治療的一群。所以人工生殖就要女方自行肌肉注射黃體素，每天2cc。或是安胎時也是開黃體素。

◆子宮內膜太薄

中醫師說我子宮內膜太薄以及身體虛寒，告訴我這是不孕的體質，且要我連續吃中藥調養一到二個月，我想請問：

1)吃中藥調養就能讓子宮內膜變厚嗎？

2)子宮內膜太薄，在不孕的症狀中算嚴重嗎？回答：

中醫師憑什麼說妳【子宮內膜太薄】呢？這在西醫檢查中是可以精準確實的量出零點幾公分的數據，所以不能憑把脈就說太薄，不然妳應該可以反問他說那到底是多薄呢？沒有所謂不孕體質這種診斷，請千千萬萬要放心，因為即使西醫也只能就多少證據說多少話，例如幼小子宮那是絕對不孕，而卵巢部份切除也只能說難以受孕而已，所以哪有對著還沒準備懷孕或是完全沒有婦科器質性病變的女生就鐵口直斷說是【不孕體質】呢。子宮虛弱也是江湖說法，中醫有胞宮虛寒的診斷，那是要一系列症狀才能那樣講。中醫講的胞宮就是西醫所說的主管女性內分泌的卵巢和垂體功能。大陸的婦科中醫師也是要有一系列的檢查才敢下不孕可能的診斷。胞宮的功能好壞其實大家可以自己測試，不要聽人瞎扯，那就是基礎體溫測量，也就是表現在黃體素的多寡，因為黃體素就叫做助孕素。基礎體溫至少有雙向，而且高溫期有14天左右，那麼就要先恭喜妳，第一關通過了，內膜也不薄喔。

◆冷底體質的自己判定

酗酒男人的精子游動時也是醉醺醺的亂晃。精子與卵子都是人的一個縮影，所以好的體質才會有好的卵子和精子。有很多女生都會被中醫師判定為【冷底】或是【子宮冷】，而這樣的判定對懷孕真的有那麼重要嗎？而且真的有絕對的關連性嗎？其實人只要吃的好、睡得著，基本上沒什麼大病痛，我們不認為是需要給她這樣一個體質判定，這樣會造成心理壓力，而民眾的自我認知也覺得好像有這麼一回事，那會造成潛意識的自我催眠，這是很不好的一個恐嚇性說法。人卻有不同的體質，這跟每個人有不同的脾氣一樣，只是說這樣的體質有大到影響身體運轉嗎？而且有大到影響受孕嗎？通常說【冷底】只是手腳冰冷而已，或是經期腰痠的厲害或是經痛的兇猛一點，而西醫內分泌都是正常的，大多的【子宮冷】在中醫的辨證論治也沒有到達腎虛、胞宮虛寒的階段，所以請心細如髮的女生們千千萬萬不要緊張的放在心上。※腎氣虛的判定簡明中醫辭典記載：腎虧是腎虛、腎氣虛的俗稱，腎藏精，腎虛以腎精不足為主要症狀，一般症狀有精神疲乏，頭昏，耳鳴，健忘，腰痠，遺精，陽痿等，臨床表現可偏於腎陰虛，或腎陽虛。虧的意思是不足，以腎來說可以是功能作用的不足，就是腎陽虛。如果是基礎物質的不足就是腎陰虛。一般來說，功能作用的不足，也會導致基礎物質的減少，陰陽兩者可以互相轉化。腎功能的減退，男女皆有，並不獨厚於男性，只是男性受到以訛傳訛的錯誤觀念，或是與身俱來的自然壓力，所導致的腎虧症候群。女性的腎氣虛症

候有很多，例如頭髮早白、頭昏目眩、耳鳴、眼花、盜汗、不眠、筋骨萎弱、腰膝酸軟、月經減少、白帶清稀、同房次日晨起腰痛如折、或是僵硬等等。腎氣虛的原因很多舉例如下：

- 1、老化。
- 2、過度使用身體，如工作、壓力、飲食無度。
- 3、疾病，如糖尿、結核等消耗性疾病。
- 4、產後調理不當。

◆增加受孕機率

一、適當的房室頻率精子成熟後可以存活28天左右，房室過少的死精比例太高，也影響受孕，房室過多則精蟲數量過少也不利受孕。所以建議計畫當月受孕者，可以經期結束後同房一二次，然後等待排卵期的到來再伺機行事。這樣可以維持一定的房室頻率和良好的精蟲品質。

二、高潮決勝負子宮頸的分泌物會隨著高潮快感的增加而增加。子宮頸的開口只允許兩隻精蟲並排進入，另外子宮頸開口會分泌子宮頸液，而且是泌泌不斷的由子宮往陰道流動，所以精子是逆流而上的，平常子宮頸液是黏稠的，當高潮興奮度越高，子宮頸液也就越多也越稀薄，這樣子精蟲就更容易鑽進子宮中，繼續向輸卵管的目標區前進。所以基本上房事越能有高潮，受孕機率也會更高。不過這是加分要件，不是絕對的要件，沒有高潮的排卵期也是可以受孕，只是如果能夠享有高潮那對受孕是有加分的好處。所以快樂的愛愛才會產生愛情結晶。

三、射精後女生屁股墊個枕頭吧射精後精液會積存在陰道底部的凹陷處，這裡可以稱為貯精池，然後興奮的子宮頸會變長，子宮頸如同大象鼻子伸入貯精池中，這樣精液中的精蟲就更容易進入子宮內。炒飯後女生屁股墊個枕頭維持個五分鐘，這樣子精液就不會快速的流出陰道。

四、至少男生可以裸睡陰囊和卵巢是同功器官，卵巢長在體內，而陰囊長在外面，陰囊表面是有絨褶的，這都是為了要散熱，睪丸的溫度要比身體溫度低很多才會產生精蟲，裸睡和穿平口褲可以讓陰囊的溫度下降，這就可以創造更有活力的精蟲。

五、太胖會是造人的阻礙過胖的體型有時也是不易受孕的原因，那是因為脂肪量過多時，女生體內的男性荷爾蒙相對會比女性荷爾蒙高，排卵的能力會受到影響。高出太多的體重會使月經逐漸稀發，甚至閉經，基礎體溫也出現單相，這樣子的體型有的在減下體重後，月經和排卵都會自然的恢復了，所以如果體重超出太多又有難以受孕的問題，那麼就先排除是否有內分泌的問題所導致肥胖，就要先去醫治原有的病，如果只是吃的多的單純性肥胖，那就好好的下定決心來減肥吧。

六、戒菸酒吧酗酒的精蟲會是醉醺醺的找不到路到輸卵管。而抽煙的婦女也是會使受孕機率下降，所以戒煙酒雖然不是絕對的幫助受孕，可是卻是幫助受孕機率的好方法，況且會對生出來的胎兒品質有加分的作用，所以想要有個健康寶寶戒煙酒是需要的。

◆最佳受孕日

一、中醫的陽氣內動就是性慾較高的時候天地生物，必有絪縕之時，萬物化生，必有樂育之時。貓犬至微，將受妊也，其雌必狂忽而奔跳，以絪縕樂育之氣，觸之不能自止耳，此天然之節候，生化之真機也。凡婦人一月經行一度，必有一日絪縕之候，於一時辰間，氣蒸而熱，昏而悶，有欲交接，不可忍之狀，此的候也，順而施之則成胎矣。這裡指出了“的候”，就是排卵期，是最容易受孕之時，如果是清晨測量基礎體溫，以捕捉最佳受孕時機，都是已經在昨晚就該辦事了，實質幫助不大，中醫所說絪縕之時，就是陰血充足，陽氣內動，充滿性慾需求的自我感覺，這就是最佳的受孕時候，這個時候並不是絕對在晚上，可以在任何時間出現，雖然精蟲卵子都有一段體外存活時間以受孕，但是陽氣內動時最佳，這是大自然的一種設計，以企求能夠最有效的傳宗接代，真是神奇。二、羊齒狀結晶的黏稠分泌物身體的另一個徵兆可以觀察排卵期到了。在月經中期，卵巢分泌雌激素增多，陰道分泌物會增加，顏色清澈透明、質地稀薄如蛋清樣，不過有的人量多有的人量少，並沒有絕對的，應該是以自己的相對分泌量來作比較。洗淨手指後以食指中指進入陰道，退出後併攏的手指緩慢張開後會有【牽絲】的黏稠。顯微鏡下觀察是呈“羊齒狀結晶”，便可知是排卵期，如有房事就容易受孕。唾液也有相同的變化，所以市面上有簡易的儀器可供自行購買觀察。三、最好的受孕月份最適合坐月子的季節是五月和六月，這時候不冷又不熱，所以受孕月份以八九月最佳，這樣害喜的時候就可以避開吃不下飯的大熱天，而嬰兒的斷奶期又可以避開腸胃炎多的夏天，到了流行性感冒多的冬天嬰兒已經六七個月，這時候抵抗力也較強了。不過如果沒有哪麼剛好在這幾個月內受孕，也不要緊張，好好培養好父母雙方的體力，這樣子就會有好的媽咪和BB，也就會順順利利的了。四、最好的受孕年紀根據統計是有年齡上的最好建議，可是每個人都有很大的差異性，其實只要卵巢機能不老化，老蚌還是可以生出美麗的珍珠。就在西醫上的建議做一下檢查，那麼就可以安心的懷孕了。在自己能做的就是避免卵巢的提前老化，以及好好呵護卵巢等等的內分泌機能的健全。內分泌機能有無衰退跟整體身體機能息息相關，有強健的身體就有完善的內分泌，所以該經常運動的就不要忘記運動，正常的飲食和作息以符合自然的生態，每個月的月事調養都注意了，加上愉快的心情和適當的工作荷負，以上這樣就是呵護內分泌的最佳方法，講起來雖然簡單，可是要養成生活習慣卻是最艱難的。所以不要考慮年紀的壓力，想想怎樣讓身體更健康，夫妻感情如何更好，那麼愛情的結晶就會歡歡喜喜的來報到了。五、不要受孕的時機1、喝酒、酗酒不要受孕。

2、大病後不宜受孕。

3、生病的時候不要受孕。

◆【育兒生活雜誌】2003.1 白帶的內服外治法

※白帶的緊急處理白帶引起的搔癢不適，是潮溼悶熱而又痛苦萬分，其實不管是怎樣的細菌類型，可以先用一盆溫水浸泡下半身十分鐘。如此可以把陰道內大量繁殖的菌群稀釋出來，這樣分泌物就不再對皮膚產生刺激，搔癢的程度可在短時間內減輕。※白帶的來源白帶可以分為幾種類型的細菌感染，不過治療之前要先做分泌物檢測，可是婦產科醫師大多省略這步，只用廣效抗生素來亂槍打鳥一番。白帶除了少數是外來感染，有一大部分是自身陰道內菌群的紊亂，導致本來與人體共生的細菌發生不正常繁殖，所以有時候也要反求諸己的養成好的生活習慣，尤其是熬夜對身體是最大的傷害。一、生理性白帶白帶的正常與不正常最簡單的辨認就是在量的多寡，正常的生理性白帶只是溼潤而已，病理性白帶可是會因為姿勢改變而一陣一陣的流出來，而且還有外陰搔癢和氣味、顏色的改變。正常的白帶會出現多一點在排卵期，那是無味、透明又黏稠的，口服避孕藥也會使陰道分泌物增加，這些都是不必治療的。而更年期後的荷爾蒙下降，不能維持正常的陰道酸度，所以也容易產生陰道炎而出現白帶。青春期卻因為內分泌旺盛或是紊亂，白帶發生也與週期起伏有關，這時加強注意貼身衣物的材質和通風性即可。二、病理性白帶病理性白帶症狀可見於異常白帶的量與氣味，以及伴隨的搔癢、灼熱感、性交痛和盆腔痛。引起白帶的原因有三十種以上，不過百分之九十集中以下四類。

1、輸卵管積水、輸卵管癌。

2、急性子宮內膜炎、子宮積膿。

3、急慢性子宮頸炎、子宮頸息肉、子宮頸癌。

4、細菌性、黴菌性、滴蟲性陰道炎，淋病。常見的病理性白帶是黴菌與滴蟲，黴菌感染可以發現白帶是如同豆腐渣狀或是乳酪狀；滴蟲引起的白帶這是較特殊的，滴蟲可以經由性行為傳染，也可以因為使用公共衛生設施，所以也普遍而常見。滴蟲引起的白帶是黃綠色、帶有泡沫，症狀有尿頻、尿痛或是間歇性出現血尿，內診時可在陰道內壁和子宮頸上發現出血點。治療上有口服加外用塞劑，注意的是要連續三個月白帶中找不到滴蟲，這樣才算是治癒。※中醫對白帶的治療中醫對白帶可更細分為虛與實，實症白帶是顏色深如黃、綠、赤，分泌物黏稠，氣味穢臭。虛寒白帶顏色是淡而清稀，氣味腥。所以治療方向實症需清熱解毒，虛症則需補脾與腎。一、實症白帶實症白帶可見於感染性的所以用清熱解毒方子，如五味消毒飲，方子組成是蒲公英、金銀花、野菊花、紫花地丁、天葵子等等。實證感染初期使用清熱解毒的藥物大多有效，可是這樣的狀況下抗生素也是有效，可是為什麼說十女九帶呢？那是急性轉成慢性了，會轉成慢性是沒有在第一時間內完全清除感染源，另一方面是體質不好讓陰道內原本的菌群出現不平衡的紊亂，所以體質會是提供一個滋生的環境空間，當想要根治

處理時就要面對體質的根本問題。二、虛症白帶虛症白帶有時會與實症白帶同時出現，中醫稱之為虛實夾雜，有實症白帶的症候也有虛弱體質的一面。另一方面還有純虛白帶，是沒有感染現象，白帶沒有臭味，可是卻綿綿不絕，量多而質地稀薄，同時會有房事後腰痠如折、小腹冷感、夜尿頻繁等症狀，這是屬於腎虛證。若是精神困乏、食少、四肢不溫、易腹瀉，則屬於脾虛證。虛證白帶嚴重者中醫稱為【白崩】，可見陰道分泌物清稀如水、量又大、也無臭味，同時會有頭昏欲倒、精神恍惚、心悸心慌等虛弱狀態，甚至終日昏睡而查無器質性病變腎虛白帶可用內補丸，組成是鹿茸、菟絲子、黃耆、肉桂、附子等等。脾虛白帶可用完帶湯，藥物組成是白朮、山藥、人參、柴胡、車前子等等。以上是純虛證所用的方子，而虛實夾雜就要判定虛實的輕重緩急，然後在清熱與補虛之間作好攻補兼施的取捨，其間分寸就需要臨床醫師的功力了。※外治法一、簡易外治法如果不是很嚴重可以單用馬齒莧二兩濃煎坐浴即可，若是只找到鮮品一次可用到四兩。方法是用一個家裡最大的鍋子，放入藥材加滿水，然後煮沸之後轉小火再熬十五分鐘，濾取藥汁倒入新的面盆中，加水調溫，只比體溫高三四度就可以，浸泡下身五分鐘到十分鐘，一天一次即可。馬齒莧在中藥房裡不多見，青草行較多，偶爾傳統菜市場也有賣新鮮的，一斤低於五十元可以用四次，台語俗名稱為豬母乳，不過要註明紅莖的才有用，另一種白莖的是可以當蔬菜炒來吃。二、標準外治法苦參一兩 蛇床子一兩 黃柏五錢 蒼朮五錢 意苡仁五錢 煎湯坐浴方法如同簡易外治法。※叮嚀與呼籲虛證白帶與虛實夾雜的越來越多見，除了是產後調理不當的體質衰弱，也包括社會聲色刺激下的過早初體驗，因為少女早熟發育，但是整體內在並未完全成熟，所以過早初體驗會導致腎氣外洩；另外瘦身的全民運動下亦使消化吸收過少，而戕害了脾胃後天營養精微的補給，所以少女的虛證白帶也逐漸增加。炎症性的白帶是要注意個人衛生，如貼身衣物單獨個別洗滌，或是盡量少穿密不通風的連身褲襪、或是厚實的牛仔褲，還有腳指甲也要勤於修剪，不然容易藏污納垢引起不必要的感染。若是白帶出現血絲，或是經一般治療毫無改善，或是稍有好轉而無法痊癒，那麼就要進一步的詳細檢查，這樣能儘早的發現儘早治療。

◆孕婦不宜的中藥蒐集

活血化瘀藥---受孕初期影響胚胎的分化，常見受孕停經時以為閉經而用活血藥物催經，導致出生幼兒的先天性心臟病如中隔缺損。川芎、紅花、桃仁、丹參、沒藥、乳香、延胡索、鬱金、薑黃、莪朮、三稜、虎杖、益母草、山楂、雞血藤、牛膝、水蛭、五靈脂、穿山甲、蟻蟲、降香、澤蘭、月季花、凌霄花、自然銅、王不留行、劉寄奴、蘇木、乾漆。瀉下藥物-----瀉下藥物使腸蠕動加快，也會影響盆腔子宮不正常收縮，所以懷孕後不可以吃瀉藥，以免胎動不安。大黃、芒硝、番瀉葉、蘆薈。

火麻仁、郁李仁。

甘遂、大戟、芫花、巴豆、牽牛子、商陸、千金子。驅蟲藥---有毒使君子、苦楝皮。涌吐藥---導致胃氣上逆，故不宜。瓜蒂、常山、膽礬、藜蘆。其他---各藥物筆者認為不宜於孕婦，使用的原因不一不再詳述。麝香、冰片、蘇合香。陽起石。玫瑰花。香附，雞內金。黃藥子。全蠍、蜈蚣。壁虎。地龍。鹿茸，淫羊藿。骨碎補、薏仁、另外當然有毒中藥也包括在內，詳細藥物請看另一篇文章。

◆下體腫痛突出三四寸

孔氏醫案---議某氏婦奇症並治驗
某氏，凌晨叩門，為其女求治，意甚倉皇。予為並者何以不來？曰：不能移動。為何病？病自幾時？曰：下體腫痛才三日耳，而重特甚。問其詳？曰：言之殊慚，亦不得不言。此女素本無病，適人未久，三日前，自其夫家來歸，亦甚歡愉，及晚，稍覺腹中熱疼，次日，陰股已腫，陰中有物外撐，痛乃甚。小便不利，通宵無片刻安。至昨日，陰中之物突出三四寸，赤紅粗大，上帶鋒刺，觸之疼澈心扉，不惟小便不能涓滴，並肛門撐阻，大便亦不能下。而其物且方長未艾。目下惟支股臥榻上，哭求速死，不知尚可治否？予曰：但痛亦不至死，小便不通，胡可久也。吾為立二方，一以飲，一以洗，或尚可瘳，然效與不效，明日必來回信。親朋駭曰：此為何病？君敢慨立二方。予曰：病名予所不識，然其理可意斷也。經曰：諸痛瘡瘍，暴病暴腫，皆屬於火。劉寧真曰：五志過極皆為火。此必五志之火鬱於內，而少年新婚，又有以觸之，故其火不炎而上焚，反吸而下就。夫火性極速，其發也暴，故三日而病至此極也。且病之似此者三：曰陰挺，曰陰菌，曰陰痔。其為病多屬產後虛勞，中氣陷下之故，而總不聞其腫疼，亦必不至於阻便。今新婚未產，何至于虛？平日不病，氣必不陷，不作火治，此外尚有他途乎？予但為之清火，保無舛錯。曰：風濕中無此症乎？曰：風之為性也動，必不驟結于一處；淫之著人也遲，必不猝發于一朝；惟心包之火，可下注于膀胱，而肝家之雷火，腎家之龍火，地近壤接，聲應氣求，勢必翕然歸一，併起危害，斯其所以沸騰氣血，鼓蕩肌肉，以至腫勁而突出也。茲用丹皮、連翹清心包之火，佐之龍膽，臣之以知、柏，涼之以地黃，和之以芍藥，而又用車前子、牛膝導引直下，火勢即不清，能不衰減乎？洗法特屬末事，無足道也。次早，前嫗至，訊之，突出之物果消歸烏有，痛亦頓止，惟陰股尚餘微腫。問藥可再服否？予曰：分量過重，減半服之可也。及服半劑，病遂痊癒。註：孔氏醫案：出處是清乾隆年間山東孔甫涵所著【醫鑒草】亦名之為【孔氏醫案】。按語：這個病歷距今兩三百年，以現在的眼光來看是最簡單不過的了，不就是發炎嗎？大劑量的抗生素投下去就是了，還要這樣分析老半天真是奇怪，可是西醫這樣的觀念也是從第一次是就大戰之後才慢慢懂的，而中醫能夠處理好這樣的病，而且不用看到病人就可以醫治成功，這樣的成就是驚人的。現在的中醫可以根據西醫的角度，而使用大劑量清熱解毒的中藥，這樣也可以治好這一例病人，可是這是從西醫轉換到中醫。就好像老年糖尿病在急速水腫時發生急性耳聾，此時利尿消腫就解除耳聾，可是這是從西醫直接跳到中

醫，如果能夠更詳細的去辨證，這樣的耳聾是怎樣產生的？中醫是不可能從腳部水腫猜想得到內耳水腫？而水腫是怎樣產生，是陽虛水腫嗎？還是脾虛水腫？當然針對性更好的話療效會更鞏固，不過我還是無法想出如果單用中醫辯證那療效會同樣出來嗎？這樣的問題經常出現，大概是我的功力不足以做恰當的融合。所以現代的中醫應該能夠辨病與辯證同時進行，不然也要在辨病與辯證時做最好的取捨。然而現代中醫療效有時反而不如古代，究其原因應該是基礎不紮實，新進學生常汲汲於祕方驗方，或者是根據想要研讀的病種來攻讀，例如僵直性脊椎炎。我會這樣說，因為我當年也是這樣子過來的，如果能夠讓我重新來過，我應該會在第一年裡，把所有經典、本草、方劑好好的心無旁騖的記住。這個醫案詳細訴說疾病的前因後果，而且敘述治療方向，同時也提出反問，當然最後還有療效追蹤報告。這樣才是一個完整到可以指導新進的中醫醫案，有的醫案只有短短一兩行，真是有看沒有懂得機會多，不過會看不懂是自己的基礎太爛了。

◆吾家有女初長成——初潮前後的調理

初潮的特徵因為氣血不足或是氣血未定所以會出現紊亂的現象，其實如果事前可以有良好的防範，這樣的問題是可以減輕到最少的。初潮需要是能量累積到一定程度，而這一階段的到來中醫無法測量實際內分泌荷爾蒙，不過觀察整體人生的現象，我們命之為【天葵】，就是生殖能力的到來，所以月經也可以稱為天葵，不過廣義的天葵也可以包括男生的。女孩子受內分泌影響比男生大，而這個影響體現在月經的週期與量上，當內分泌越正常這週期與經量也就越順暢，所以內分泌好壞就由此可以觀察出來。我自己有個特殊體會是書上所沒有的，那就是觀察初潮來臨前，女孩子都會在那之前一段時間內急劇的長高，當快速生長期出現後即將來臨的就是初潮了，這時候生命就要進入下一個階段了。所以在快速長高期可以做適當的營養補充，這樣生長足夠所需，提供腎氣的更充盈，不過是不可以直接補腎，是要通過脾胃營養的吸收，由脾胃把精華物質往後送到代表生殖系統的腎來貯藏來運用。所以轉骨方可以說有也可以說沒有，如果營養吸收順利而飲食生活又正常的話，那麼是不需要額外的藥物吸收來幫助成長。也可以說有轉骨方，那是因為這階段還是有她特殊需求，在某些方面可以提供好一點的、契合深層需要的，所以也可以說轉骨方理論是成立的。這篇文章是為了有著一位在美國十一歲女兒的台灣媽媽寫的，雖然初潮未到，可是要求鉅細靡遺的寫清楚，然後帶著處方在寒假交給女兒也叮嚀女兒。所以以下分幾個階段來注意一下。※一、快速長高期在快速長高期之前是不需要額外給予藥物或是特殊營養飲食，正常就好。除非腸胃道有消化系統的問題，那就要請中醫師診治排除問題，這樣才能好好的吸收以免營養不足而影響發育。我們發現國小寒暑假是快速長高期最明顯發生的時期，那是因為功課壓力減少，而且可以吃吃喝喝，大部分時間可以想睡就睡，睡眠時間增加很多，這樣的生活作息雖然慵懶，可是卻最能夠給小孩子休息和營養的方式，所以放假給小孩子睡懶覺是必要的罪惡，也不要責怪或

是塞一大堆假期活動，好好把握這段時間吧。這時可以用藥膳形式來烹調，而且是全家都可以吃，可以把藥膳端上桌，當作午餐或是晚餐，這樣融入飲食中的最好了。食材建議以排骨為主，熬煮久一點會更好。寒假時常吃會更好。轉骨方黃耆 二錢 當歸 二錢 參鬚 二錢 芡實 三錢 紅棗 五粒 絡石藤 三錢 【如無絡石藤可以夜交藤、忍冬藤代替都可以】可以與排骨一起燉煮，也可以用水五碗熬煮成二碗，然後加入煮成排骨湯，可以加鹽調味。※二、經期當初潮來臨時如果沒有特殊異常情形，例如月經淋瀝不盡、點點滴滴拖一二十天、或是經量較多幾乎隨時有。沒有特殊情形可以用以下方子；經期來臨時-----玫瑰飲玫瑰花五分之一杯，用熱開水沖泡，悶三十秒之後倒出湯汁即可飲用，可以反覆回沖數次。當作茶水飲用，一天可以泡數次，如果經痛嚴重者可以增加玫瑰花的量達到三分之一。經期結束後三四天----加味八珍湯經期乾淨後用下方吃三四天的通用燉補方，食材是燉雞鴨鵝均可。建議一天吃一次，每次燉煮一隻去皮雞腿。當歸二錢 川芎二錢 白芍三錢 熟地二錢 黃耆三錢 淮山三錢 茯苓三錢 黨參 三錢 枸杞三錢 黑棗六錢 肉桂一錢 桂枝三錢 桂枝與肉桂要用布包

◆行政院新聞局所屬【光華雜誌】採訪稿----米酒與米酒水

※產後禁止飲水與米酒水的問題有不少讀者來信詢問，筆者翻閱所有的中西婦科書籍約四十本，都沒有提到禁止飲水的說法，筆者推敲，禁水如果是為了能夠馬上達到產後減肥瘦身，那麼大可不必，產後的目的是體質調整，這是真的終身大事，不可以輕率，必須嚴陣以待，而禁水是否有害，筆者不得而知。現在盛行使用米酒水烹調或是替代飲水，其實這是很危險的，因為米酒水仍然含有1%的酒精，而且依據法律規定酒精含量高過0.5%就是酒，以1%的酒精大量喝下來也是會造成肝臟負擔。民間坐月子中心對米酒水的使用量，每一產婦約用60000~650000CC，合算起來有600 C C 的酒精，或是1200 C C 的高粱，通常一瓶高粱300 C C，也就是產婦一個月內喝掉四瓶高粱，或是37.6瓶的罐裝台灣啤酒。這對大部分不常喝酒的女生是很大的負擔，加上產後百脈空虛，燥熱的酒精更容易煉熬津液，而且酒精有累積性，雖然產婦會發生一定比例的急性胰腺炎，可是由於調理失當自行攝取過多酒精，這樣自取的急性胰腺炎是很不智的。以其他古老民族經驗為例，回教齋月白天是必須禁水的，而老幼病殘和孕產婦是例外的。所以由此可知回教地區產婦也是不禁水的。傳統上台灣民間坐月子時有的是不直接喝開水，而是喝荔枝殼煮開水來飲用，而且產後忌食生冷，不可以喝冰水，這是在中醫界和民眾之間都是一致無疑義的。不過只喝米酒水就矯枉過正了。※米酒水與米酒的問題紅標米酒的酒精來自兩個部份，一半是米酒酒精，一半是精製酒精。精製酒精是由台糖公司煉製蔗糖的剩餘產物【糖蜜】所製成的酒精，所以還含有一定比例的糖量，也因此烹調時有獨特的甘甜風味，這就是純米酒釀造的米酒頭或是稻香酒所無法取代紅標米酒的原因。紅標米酒所使用的米酒酒精因為成本考量，所以蒸餾過程並不採取分段擷取，所以醛、胺和有機酸的含量較高，所以直接飲用後有頭痛和宿醉的現象，長期飲用紅標米酒對肝臟的

破壞程度是比一般酒類高。不過有壞物質的沸點低，在烹調過程就會散失，所以作為烹調使用紅標米酒是稱職又無害的，而且米酒在魚、肉的去腥過程更是無可取代。用紅標米酒烹調是台灣獨特的經驗，這種經驗是有區域性的集體記憶，就好像煮三杯雞一定要用紫莖九層塔，這種通過嗅覺味覺的化學反應是深層的銘記。就好像破殼而出的小鴨子，牠第一眼看到會動的東西就認定是媽媽一樣。在台灣的出生嬰兒都會透過母親的乳汁吸吮到生命中第一口米酒，所以當往後再度舉筷選擇時，紅標米酒的料理是深度催眠下的溫馨制約。※產後減肥懷孕期間所增加的體重，有一部份是脂肪，一部份是水份。水份因為水液代謝不正常，才導致的水份累積在體內，一般水分的代謝是經由肺脾腎三個臟腑的綜合運作，而妊娠肥胖是為了養胎，也有一部份是因為胎氣阻礙，使代謝受阻，產後胎氣的原因消失之後，加上產後調理恢復得當，體內五臟六腑運行順暢，產後一個月後，只要進食維持體能消耗的熱量，加上一定的運動，身材的恢復，半年內是絕對可以達到的，如果哺喂母乳那麼瘦身效果會更快。通常坐月子全程使用米酒水的目的是要瘦身和防止妊娠紋，瘦身的問題在上段文章已經說明，而妊娠紋的產生是孕婦和胎兒的體重增加太快，導致肚皮的真皮膠原蛋白纖維斷裂，而且巨嬰寶寶後遺症多，所以控制體重增加速度是對媽媽對小孩都是重要的。

◆卵巢長水泡開刀後的注意事項

問：請問

我姐姐剛剛開完卵巢水泡的刀,開完刀後,因為她人在美國,她問醫生,為什麼會形成的原因,醫生一直說不明原因,請問,要用什麼中藥來補身體會比較好呢?答：卵巢長水泡確實原因不明，現在醫學界猜的方向大致是環境荷爾蒙所引起的，可是又不是每個人都會發生，我想是體內不平衡導致身體對環境荷爾蒙的敏感性增加，那麼接受器就容易誤認環境荷爾蒙是人體的荷爾蒙而產生刺激作用。環境荷爾蒙是會模擬人體荷爾蒙，這點很難去避免，因為是大環境的關係，除非遷移。自己可以做的就是飲食上注意，例如注意塑膠材質的盛食器具，盡量用瓷器鐵器不鏽鋼，不要用塑膠袋保麗龍裝熱湯食物，食物不可接觸到印刷染料。最後就是避免不良的油炸食物，想吃就自己炸，外面的就盡量少吃，因為鹽酥雞的油都很久才換，炸到起泡了還在用，速食店的油是超高溫去炸，所以同樣也是破壞油的穩定性，雖然速食店的炸出來還蠻好看的不黑。術後的中藥補身是沒有特性方子，除分體質症狀上有異常的地方，不然妳可以去抓加味八珍湯煮藥膳來吃就可以了。

◆經前症候群

1、春江水暖鴨先知，而有經前症候群的女生也是可以預知好朋友的到臨，可是怎麼會這樣呢？這是因為內分泌失調導致了水腫，又因為水腫的部位不同而有不一樣的症狀。例如水腫在胸部就會胸漲，水腫在顱內就會有頭痛，水腫在腸胃道就會腹脹、腹瀉，所以體重會增加好幾公斤也不為過。而情緒上也會有影響，出現煩躁、鬱悶、失眠、注意力不集中。2、此症關係到複雜的內分泌，不過也可以自己做個簡單的測定，那就是量基礎體溫，會出現排卵後體溫升幅不高，或者是上升日數過短，這些都有可能是黃體功能不全。經前症候群常發生在長時間體力透支後，或是作息日夜顛倒無法調適者，中醫認為有陰血不足的體質，而行經陰血下行導致身體上暫時的相對不足，陰血無法涵養肝氣，肝氣橫逆四竅所以此症多變化。3、因為此症與生活飲食息息相關，所以不只是不要過度熬夜和剝奪睡眠，另一方面也不可以控制飲食的減肥，不然當消耗量大於攝食量，加上經期的透支，此症是內分泌的些微表現，爾後會慢慢加重產生別的新的問題，這對身體是有長遠的影響的，所以盡量把這樣的小病治好，以免事態擴大到不可收拾。4、年輕女子的保養除了經期的養護之外，大概就是剩下質優量足的飲食和充足的睡眠了，能夠完成這三樣就有完善的內分泌，這就有水噹噹的大美女喔。宣鬱寧心小米粥是可以通治經前症候群的藥膳，在經前症候群出現之前服食來預防，或是每日一次的吃，可以治病兼保養。參考藥膳分類相關文章。

◆少女痛經

1、少女痛經通常是檢查都正常，可是每次又都痛的要命，不過大都會在婚後或是第一次生產後明顯好轉，還有就是初潮越早者痛經就越厲害。所以雖然原因不明，但是可以推測是子宮發育不良、子宮頸狹窄經血不易通過、也有可能是卵巢發育尚未完成。既然發育不足那就是要注重保養之道，經期來時泡玫瑰花茶來理氣止痛，經期結束後用八珍加味來補養身子。2、經期排出經血是跟子宮肌肉收縮有關，所以體力不足時痛經會加重，天氣寒冷、緊張壓力、過度疲勞等等都會是加重痛經的因子，所以考試前後的熬夜經常會誘發痛經。這樣的原發性痛經是有別於繼發性痛經，繼發性就是感染等等的病理產物引起的，例如逆行性感染到輸卵管時，不過會先有腥黃黏稠的白帶出現，但這通常是有性行為之後才會得的。3、青春期中雖然是氣血旺盛可是中醫認為根基不足，過早的性愛會導致陽氣的過早使用不能再周密固外，這時陰氣外洩會使整體機能下降，所以後天行為盜用先天基礎，發育會受損，未來的身體健康也會受損，不止是痛經會加重而已。原發性痛經因會生產而解除，這是因為胎頭撐開

狹窄的子宮頸，而不是單純的性生活所致。4、痛經時的西藥止痛藥會有耐受性，所以要四五個月輪換一種藥物，也可以用避孕藥抑制排卵減少經血的產生，但是過早干擾內分泌總是不好。可以平時注意適當的運動使氣血循環良好，均衡的營養也會使機能發育完整，痛經時動物性脂肪會加重疼痛程度，所以速食要少吃，可以多吃豆製品來減輕疼痛。臨時疼痛加劇時可喝生薑紅糖湯，或是熱水袋外敷小腹，或是屈膝臥位。有痛經史者可以經前吃豬肚胡椒湯或是外敷香附散。

◆白帶

1、白帶引起的搔癢不適，真是難言之隱又痛苦萬分，其實不管是怎樣的細菌類型，可以先用一盆溫水浸泡下半身。如此可以把陰道內大量繁殖的菌群稀釋下來，這樣分泌物就不再對皮膚產生刺激，搔癢的程度可在短時間內減輕。如果時間允許可以再加馬齒莧一兩濃煎效果更好，若是只有鮮品可用到二兩。2、白帶可以分為幾種類型的細菌感染，不過治療之前要先做分泌物檢測，可是婦產科醫師大多省略這步，只用廣效抗生素來亂槍打鳥一番。白帶除了少數是外來感染，有一大部分是自身陰道內菌群的紊亂，導致本來與人體共生的細菌發生不正常繁殖，所以有時候也要反求諸己的養成好的生活習慣，尤其是熬夜對身體是最大的傷害。3、正常的白帶會出現在排卵期，是無味、透明又黏稠的，口服避孕藥也會使陰道分泌物增加，這些都是不必治療的。而更年期後的荷爾蒙下降，不能維持正常的陰道酸度，所以容易產生陰道炎而出現白帶。青春期卻因為內分泌旺盛或是紊亂，白帶發生也與週期起伏有關，這是加強注意貼身衣物的材質和通風性即可。4、白帶如果夾有血絲那就要慎重的徹底檢查，另外有一種滴蟲引起的白帶這是較特殊的，滴蟲可以經由性行為傳染，也可以因為使用公共衛生設施，所以普遍而常見。滴蟲引起的白帶是黃綠色、帶有泡沫，症狀有尿頻、尿痛或是間歇性出現血尿。內診時可在陰道內壁和子宮頸上發現出血點。治療上有口服加外用塞劑，注意的是要連續三個月白帶中找不到滴蟲，這樣才算是治癒。

◆包翠英的錯誤治療——子宮肌腺瘤

包翠英瘦身成功，想不到事隔不到2年，卻因為減肥所導致的副作用，使得她經血逆流，罹

患子宮腺肌瘤，為了保住子宮，包翠英注射男性賀爾蒙，讓她的體重直線上升到70公斤。【摘自東森新聞】導讀：

子宮腺肌瘤是子宮肌腺病的異位的子宮內膜集中於子宮肌壁的某一處，引起周圍肌細胞的高度增生，形成一個球狀體，稱為子宮肌腺瘤。肌腺病屬於子宮內膜異位的一種，內膜異位是進入子宮肌壁層，當侵入越多則痛經程度越明顯，肌腺病的痛經是所有痛經中最嚴重的。肌腺瘤經常形成球狀，均勻性的增大，質地堅硬，觸按有疼痛感，所以超音波可以明顯看出差異，尤其是對照經期前後。並不是劇烈痛經都要懷疑這個病，因為它是逐漸加重的，所以年輕女孩子不會出現，當三四十歲後開始逐漸加重的痛經就要懷疑此症。當此病處於增生期時就對內分泌荷爾蒙不敏感，也有人認為異位的內膜是不成熟的所以對荷爾蒙敏感度低。因為多數患者均有子女，所以大多採取手術切除子宮。除非已經產生惡性病變，則卵巢是要保留的。採取假孕和假絕經療法是造成閉經而緩解內膜增生所產生的劇烈痛經，但是藥物去除症狀則又隨之而來，所以常規治療是不採用激素藥物的，除非年輕患者又有生育要求，則可以藥物治療六到十二個月，然後在短時間之內受孕，那就可以在生育後再行手術處理。因為肌腺瘤增生後的不可逆，所以以手術為主。肌腺病的發生原因不明，內膜會植入肌壁層大多懷疑生產或是流產過程手術對子宮壁的創傷，或是卵巢功能失調，使得雌激素過度刺激使內膜向內增生。所以報導經血逆流的成因是不對的，而藥物治療對本病只是暫時緩解而已，並沒有積極的治療目的，除非已經接近更年期了，在等待自然的絕經而忍過一刀。因為肌腺病的輕重不一，中醫處置疼痛可以部份緩解而值得期待。

◆四物湯、中將湯與生化湯的差別

我想請問四物湯、中將湯與生化湯這三種的藥材與差別？應用在什麼時候？在哪些時候不適合飲用哪一種湯？謝謝！妳好四物湯是補血的方子，應用於貧血體質。

中將湯是活血化淤的方子，應用於劇烈痛經時。

生化湯是促進產後的子宮收縮，應用於產後惡露未盡時。通常四物湯是可以用於月經結束之後，有的人在經期來時喝生化湯，那是不對的，那有強力收縮子宮會有危險的可能，所以不可以亂吃。中將湯效果強大，應該由醫師處方，不可以自行服用。經遲的原因有很多，請接受醫師診治。祝安康陳俊哲敬上

◆經前胸漲

我個人對這個網站很喜歡，除了讚賞，真的無從挑惕，可以說幾乎都能得到解答而得以安心，沒病還可以養身，真的是謝謝你們！

年齡：25，身高 163公分，體重 52公斤月經來前，都會有明顯乳房脹痛之困擾，有時是前兩天開始，嚴重時則是前十天就開始

痛了，請問這是跟生活作習有關，還是另有原因？約會提早一到兩天，每次都固定五天，來前會乳房脹痛，量略多但還算正常，第一天會

腹痛腰酸，第二天有些許無力，再來就正常了妳好經前乳漲是因為經血下行，上半部陰血不足，不足以涵養肝臟之氣，所以才橫阻胸前。

妳可以自己體會一下，是不是身體狀況越差，而胸漲的更厲害。

所以一方面妳要長期調理，一方面胸漲時對症處理。這是所有這類問題者的通例，請認

真遵守。經前期乳漲者的茶飲

玫瑰佛手飲

玫瑰花三錢 佛手片 二錢 陳皮 一錢 泡熱開水喝，能喝多少就喝多少，不限量。經前

喝，月經來時也要喝。經期結束八珍湯加味連吃五天。通用燉補方燉雞鴨鵝均可 或是雞腿一隻也可以燉煮當歸二錢 川芎二錢 白芍三錢 熟地二錢 黃耆三錢 淮山三錢 茯苓三錢 黨參 三錢 枸杞三錢 黑棗六錢 肉桂一錢 桂枝三錢 桂枝與肉桂要用布包 祝安康陳俊哲敬上

◆錯誤的減肥黃金期

ASK 我經常是用小紅之名，行亂吃之實，前天還去吃到飽的吃到吐，真是過癮。小紅結束了，我也要來實施我的魔鬼體驗營了，在瘦身黃金期好好的把體重壓下來。ANS 有的事是積非成是，不對的事情給大家說一千遍也不會變成真的，所謂約定成俗的東西並不是真理。生理期結束後的減肥是一種對身體掠奪式的破壞。如果想要長期培養成健康的減肥狀態，唯一的前提就是不可以對身體有傷害。生理期不用消耗體力嗎？這樣說不就很明白了，這段期間更加縮減飲食的話，就是不足的更加不足，這樣當然體重下降的更明顯，但是這是不正常的投機取巧的瘦。況且小紅來時所吃的也會長胖，並不是馬上吃就會馬上胖，所以不管任何時候亂吃都會胖，不要以為小紅來了就有免胖通行證。

◆【自由時報】採陽補陰媚力四射採訪稿

傳統的說法經常鄙視房中術，尤其是其中的採補方法，其實更遠古的年代，房中術是一門優生保健超前時代的醫學，指導著使我們民族綿延不絕，並不是完全為縱慾的富貴人家所服務，那是有心人士的誤用。中醫講究中庸之道，體現在陰陽調和的原則上，所以在表裡寒熱虛實上莫不要求恰如其分，不偏不倚謂之正道。在人體功能上就有【孤陽不生，孤陰不長】的觀點，藉由陰陽調和使氣血運轉得到平衡。在影響內分泌和生殖系統上，唐代孫思邈真人即稱【男不可無女，女不可以無男】這是消極方面的論點，在積極上更可以通過房事讓男性採得陰氣以壯其陽，同時女性也是可以因為振奮陰氣而強壯身體，這是中醫獨特的房事養生。圓滿的房事對女性青春美麗有重大影響，這是一種採陽補陰的內在調和，另外一種形態的採陽補陰那就是擴及生活形態上了。我們身體活動就是陽氣的表現，把身體調整到易於接收陽氣的狀態，那麼對身體的健康、青春美麗的維護更是有幫助。*生活習慣也可補陽外界陽氣的來源可以是呼吸中的氧氣，也可以是高質量的食物，更可以是激發身體穴位的S P A和按摩，而不斷輕微活動的微熱體質更容易接收外界陽氣，所以說從生活習慣中來補陽那是源源不絕的資源。所以建議一早起來梳洗過後建議做適度的暖身操，讓身體的活力上升到可以吸收外界的溫度來產生熱量，這也就是外界的陽氣，這樣可以使得一整天都充滿活力。不然虛弱狀態的身體馬上強力的使用，這樣會使人體機能更快磨損，所以早上要熱熱車子，更何況是人呢。因此虛弱狀態的老人家晨間輕微的運動，就有吸收早晨天地精華的意涵以接續衰弱的陽氣。對於上班族女生而言，除了適度暖身操之外，還建議【深度補陽腹式呼吸法】，方法是先緩慢吸氣，然後閉氣三秒鐘之後緩慢呼出，如此反覆三到五分鐘，這樣視為一次，而一天建議做兩次。讓身體因深度的完全呼吸氣體交換，增加氧氣利用率與二氧化碳的排出量，這有點類似身體活氧的概念。因此做這個動作時，最好能在通風良好氧氣充足的地方，下午的

辦公室空調下空氣品質不佳，二氧化碳濃度太高，做這樣動作反而會越做越累。此外，很多上班族女性經常一落座就是大半天，不僅會讓身材越來越朝葫蘆型邁進，長期氣淤下半部，也是造成許多婦女疾病的來源。所以我們下半身的陽氣就要保持在活動狀態，不必一定要有固定時段，只要不讓身體固定靜態太久都可以，因此在工作環境中，隨時創造活動機會，伸伸懶腰、走動到茶水間、爬爬樓梯少依賴電梯，這都可以隨時提升陽氣而保持活力，有好的活力才有優質的工作效率。梳頭髮也可以補陽，因為提皮是人體穴位集中的大聚落，而且頭皮穴位特性與其他相比的話，明顯的是較表淺可以輕易刺激到。因此隨時梳頭髮有助於振奮陽氣又梳理陽氣，所以不必採陽就有助陽的效果。這點尤其在清晨起來的第一次梳髮，連蘇東坡醒來都是要梳一百下頭髮，也難怪大文豪的心思是如此敏捷，原來是有個清靈又活力十足的頭腦。在洗澡時也可以補陽氣您知道嗎，建議在淋浴時，用蓮蓬頭溫水沖激頸後的【大椎穴】，位於頸後在低頭時會突起的部位，這樣溫水是刺激到總管背後陽氣的督脈，督脈輻射掌管背後所有陽氣，也是維持人體功能的重要系統。

◆更年期乳房纖維囊腫

您好

請問~纖維囊腫(乳房腫瘤)有十餘年了現更年期後才有隱隱作痛的問題(在無月經來後每月都有幾天會)之前只有摸到有硬塊並不痛,我有看過您的回答關於[乳房腫瘤的防治]那一篇,可以請您建議藥方嗎.目前使用的方子：十六味流氣飲，血府逐瘀湯，黃連解毒湯，龍膽瀉肝湯。回答：穩定的乳房腫瘤如果西醫檢查是安全的，那就比較放心，關於不舒服的症狀是為更年期後才出現的，那就要依更年期的特色來處理，來信中的方子都是一般針對乳房腫瘤而開的，並未照顧到更年期的關鍵因素，所以可想而知是無效又會導致更年期症狀加重。建議使用的更年期藥膳方子，因為處理好更年期，腫瘤所造成的氣滯血淤會降低到最少程度。如有問題請再來信祝安康陳俊哲敬上

◆無排卵兼卵巢水瘤

您好：

我是無排卵性月經,結婚後接受一連串的西醫療程後以試管嬰兒懷孕,現在小孩四歲,想在懷第二胎,還是無排卵性月經,經西醫打排卵針卻發現以前的排卵針對我有效,這一次卻沒有效,還有我有卵巢二側有水瘤,經吃避孕藥一邊消失,一邊卻無消失,醫生推斷可能不是水瘤,可能類似是血,目前休息,沒有再繼續治療,請問中醫是否可以吃藥就消除這樣的卵巢瘤,中醫是否有排卵藥,或者是只要對身體調養好,自然就會排卵,請解疑,謝謝您好因為要活血化淤的同時又要補身體,所以建議長期泡玫瑰花茶,不定時不定量的泡著喝。另外調理需要針對性處理,因為沒有確實脈診,所以建議依通常狀況來調理,請於月經結束後吃八珍湯燉東西吃。八珍湯方子請在搜尋。祝安康陳俊哲敬上

◆產後失血所致不明原因關節炎

醫生您好懷孕四個多月前都一直處於嘔吐及食欲不振的情況之下,五個多月後即因為宮縮而以最高劑量的安胎藥及完全臥床的方式安胎至32週,最後因子癲癇症,全身水腫,壓迫到腎臟及肋骨不得不提早開刀,開完刀後因大出血而輸了3000cc的血液,醫師說,也許幸好她還算年輕所以能幸運的保住子宮。產完一個星期出院後,也許因長期臥床之故,一直發現雙腳無力且腳很痛,至醫院檢查,醫師診斷為"不明原因的關節炎",因而需再臥床休養。而目前她的老二除了由於住保溫箱曾脫水至1700g而於現在已回升至2000g外,其吸吮能力及其他身體狀況應屬健康,已預計於近日內出院。我想請教的是----1.我好友的關節炎在慢慢復原的情況中是否需要任何的調養及注意?

2.產後的她除了生化湯外是否還需其他的補品進行調理?

3.她的小孩是否需要任何的調理?

4.她是否最好需要帶至中醫師處進行調理? 您好關於不明原因的關節炎可能是妊娠過程消耗太多體力,大概只要產後調理得當就可以恢復,不過生兩個的照顧實在是很艱鉅,希望她有好的解決辦法。在中醫是屬於身體無法柔以養筋,人體的基礎物質不足,所以調理應可以恢復。這個病在產後發生一定要在產後完全得到解決。產後調理的方法在裡寫的很詳盡,照那個做就可以。其中雪蛤請一定要用。雖然時間已經過了坐月子期間,可是因為狀況特殊,應該是可以調養到半年以上都有效,都可以有效的幫助內分泌的重建。小孩子的調理應該是注意後來是否有外界感染,如有感冒的話裡有外洗的藥浴方子可以用。等到小孩可以進食副

食品或是吃稀飯的時候網站裡也有小兒藥粥。現在的調理中醫應該是最恰當的。如有問題請再來信祝安康陳俊哲敬上

◆產後外感咽喉痛

醫師您好:

在此先感謝您抽空為我答覆問題!我的問題是這樣的:我在去年10月時生產,在坐月子時感冒沒好,之後就一直感冒纏身,怎麼也看不好,我試了好多醫生了,感冒就是無法根治;一直到現在,我常常會在半夜感到喉嚨痛,但白天則不會覺得,是不是就像老一輩的人所說的,月子如果沒做好,以後身體就會常出毛病呢?我想問說是否有什麼方法可以改善我現在的體質,讓我不會再那麼容易就覺得喉嚨痛呢?您好可能是因為產後補身又恰逢感冒,所以補助外邪才纏綿這麼久。原則上感冒就是不可以吃補藥,有感冒就是要吃感冒藥,即使是昏昏沈沈的爬不起來,也不可以誤認是虛弱來吃人參高麗參之類的。產後外感還是要把感冒治好了之後才可以再進補。所以建議泡茶方子如下麥門冬二錢 五味子一錢 沙參 二錢 羅漢果半個 石菖蒲五分祝安康陳俊哲敬上

◆經期保養的藥膳與茶飲

醫師您好之前有進入過您的網站閱讀幾篇有關中將湯的問題,但有一點我不甚了解您說可在經後服用,但不知您所謂的經後是指月經完全乾淨後還是指月經期第幾天,這是我想要請教您的一點回答;

因為妳沒有痛經的現象,所以不建議妳喝中將湯。還有我今年26歲,自開始有生理期後白帶就比較多 雖然沒什麼異常,但有時總覺得不太舒適回答;有點像脾虛白帶,就是不可以吃冰冷的東西,飯後要散步,多吃幾次四神湯的藥膳。我的生理期週期很長,大約28-45天一次,近半年來月經量時多時少,少的時候只要用護墊就可以了,多的時候就有很多血塊,月經色成暗紅色顏色很深,看過西醫也沒什麼問題。請問我這情形中醫有辦法幫我調理嗎? 回

答：建議月經前十幾天泡玫瑰花茶喝，量約杯子的五分之一，可回沖，不定量也不定時。喝到月經結束。月經結束後可以吃八珍湯燉食，燉排骨適量。連吃五天。當歸二錢 川芎二錢 白芍三錢 熟地二錢 黃耆三錢 淮山三錢 茯苓三錢 黨參 三錢 枸杞三錢 黑棗六錢 肉桂一錢 桂枝三錢 桂枝與肉桂要用布包

◆低血壓

非常感謝你，還有我想請問你癲癇病人30歲了，可以吃什麼藥膳食補果汁，保肝 保腎，因為必須長期吃藥，怕把身體搞壞，最近西醫出了一種藥，但這一種藥會使人過動，精神不穩定？-----Ans:沒有什麼要特別注意的，大概就是不要太勞累，這點相當重要，還有就是不要便秘太久。我對我的生理期感到很困擾，一直很不穩定，有時候有來，又有時候隔三個月才來，或好幾個月，來的時候只有2、3天，而且白帶黃黃的，我發現自從不順開始，我有時候坐著或站著會昏眩，-----Ans:建議平常泡玫瑰花茶或是熬中藥茶飲如當歸二錢 枸杞二錢黃耆二錢 黑棗 五粒 代替茶水溫溫的喝有一次有一個推銷健康食品的人幫我把脈說我子宮腫脹，又有一次我媽帶我去看中醫，醫生說沒有腫脹，我不知道要信誰，而且我不喜歡看西醫婦科-----Ans:推銷的人亂說，不要相信。哪有一眼就可以看穿人體腫瘤，虎爛。在我兩年前做學校健康檢查時，發現有低血壓而我媽也有，不知道有沒有遺傳，現在比較嚴重了，有時候喝咖啡會心悸，還有在通風不良的地方會呼吸不順。-----Ans:多做輕微運動，每天晚飯後散步20分鐘。這樣就可以改善，增進心肺功能。量部會很多，有時候我媽煮有關麻油的東西，我吃有時候會來，有時口乾舌燥經期症狀，剛來時會脹脹的，但會痛，但我還可以忍受。-----Ans:經期泡玫瑰花喝，經淨後麻油太熱，可以吃八珍湯燉排骨吃，湯方在裡。

◆不孕症

個人於去年11月結婚,至今尚未懷孕,四個月前經期尚稱規則,但近3.4個月約為40_50天為一週期,於今年7.8月期間有到中醫師診所求診,醫生說"子宮寒,受經卵無法著床,即使著床也不就流失"醫師建議我所有"涼.寒.冷性水果蔬菜都不可再攝取,於是我水果只攝取(蘋果.葡萄.櫻桃),蔬菜只有對於"白菜.蘿蔔"禁口.且我服用"調理"藥方(口服&水煮藥材),服用一個多月期間食

慾大振,體重增了3公斤,讓我對於此藥物產生懷疑,而無再服此藥物,請問1.水果是不是只可吃此三種??2.冷的蔬菜為何???or 有相關資料可查???冷的蔬菜水果資料何處尋?3.服藥期間食慾大振,正常否?? 為何會如此?4.如何以其它方式克服"子宮寒冷"問題?多服用"四物湯"可改善嗎?可否由男生方面改善??5.排卵不規則如何改善??謝謝您花這麼多時間閱讀此信....

期待解答回答;【子宮寒,受經卵無法著床,即使著床也不就流失"】我反對這樣武斷的說法,一方面沒有中醫學理上的根據,另一方面覺得只有恫嚇的意味來提高自己的存在價值。子宮虛寒的診斷從來文是看不出來,不過42公斤減三公斤的39確實太瘦了,子宮虛寒跟吃的東西關連不大。所以忌食某幾種水果如西瓜就可以了,不用忌諱到只剩吃這三樣,這樣反而營養素會缺乏。反而注意不要久坐冷氣房內,久坐則要多走動,飯後要散步行走反而可以促進血液循環,對子宮的加溫有幫助,所以這是整體的維護會比只注意飲食會更有用,多樣化的飲食才會對你的身體有幫助。促進食慾如果醫師認為有必要,幫助進食而增加體重也是治療的一部份,這需要事先的溝通。排卵週期的規則治療需要實際臨床,所以很難線上幫忙。祝安康陳俊哲敬上

◆嚴重掉髮與斑禿

請教您有關女性的雄性禿與圓形禿問題.

我從小學開始就有所謂的鬼剃頭.在後腦部會禿一塊一塊圓圓的.隔很久的時間會長頭髮回來.但這塊好了就又会有一塊新的地方.小時看過皮膚科擦過藥.不過也不記得是藥有效還是自己長出來的.一段時間後也就沒在擦藥了.現在我已30歲了.後腦部的圓形禿問題還是在.不過更嚴重了.現在是有3.4個地方.禿的地方幾乎感覺不出有長頭髮出來.額頭的髮際也越來越高.額頭兩邊的頭髮也掉的蠻厲害.已經像男生的前額禿狀.非常明顯.外觀上很不美觀.本身頭髮屬於少又細的.現在掉髮情況蠻嚴重的.頭皮都看的很明顯.最近看過皮膚科.但醫生只是建議我擦生髮水.並無其他的治療建議.想請教陳醫師.女性雄性禿在中醫上.是否有較為有效直接的治療方式.我該如何來治療與保養我的頭髮問題呢

.另這種皮膚病跟內分泌.遺傳方面是否有關係呢.抽血檢查能對我的問題有幫助嗎.麻煩您了...謝謝您好中醫治療女性掉髮都是使用神應養真丹,這是一種養血生髮的方子.不過還是要臨床診治才能更切合問題所在.所以中醫大致上就是要求排除耗血傷血的徵兆,例如熬夜或是吃太辣,或是注意經期保養,您或許可以從經期的調理著手.調理方法在婦科中.況且妳應該不是雄性禿,雄性禿是內分泌的問題這就比較棘手.斑禿俗稱鬼剃頭跟身體血液有關,也跟精神緊張有關係,所以放鬆心情也有幫助的.祝安康陳俊哲敬上

◆瘦弱的脾虛白帶

站長您好

我從小就瘦，體重一直無法上升，國中時突然長高十幾公分，但是長高不長肉，但是也不常生病。

曾經看過中醫，醫生說我貧血，子宮太冷，導致不易受孕，會心悸、卵巢發炎，腸胃的吸收也不好，所以營養也無法吸收，不容易變胖。

請問如果我不想喝大補湯的話，我可以用飲食方面來做改善嗎？我的症狀看來好像很多，但是我真的有那麼嚴重嗎？回答這是脾虛白帶，所以還是建立較好的脾胃就好起來，飲食注意事項請參考【消化系】消化潰瘍的錯誤飲食習慣，請注意實行。有個藥膳方子，偶爾就吃。
炒白朮 一兩

炒淮山 一兩

黨參 三錢

白芍 五錢

甘草 一錢

陳皮 一錢

柴胡 一錢

荊芥穗 一錢

枸杞子 三錢

紅棗 五粒煮豬腸子適量 再調味經期泡玫瑰花茶

玫瑰花 三錢

佛手片 一錢【醫生說我貧血，子宮太冷，導致不易受孕，會心悸、卵巢發炎】，這句話是白爛妳的，不要當一回事。

不過把身體養好，健健康康，人會更漂亮。

◆初經第三次可促進長高嗎

您好目前我已是國三學生，初經第三次，但體重一直增加，身高都沒再長高，不知如何？回答建議大量的運動，每天至少慢走20分鐘快走5分鐘，要有心跳加快和流汗的程度。建議月經後以藥膳調理三五天，這樣內分泌好點就可以長高高。9.通用燉補方

燉雞鴨鵝均可

當歸三錢 川穹二錢 白芍三錢 熟地三錢 黃耆三錢 淮山三錢 茯苓三錢

黨參三錢 枸杞三錢 黑棗六錢 肉桂三錢 桂枝三錢

桂枝與肉桂要用布包

◆【民生報】生薑洗髮乳的 SPA 與坐月子採訪稿

生薑洗髮乳是近來流行的頭皮 SPA 的一環，生薑洗髮乳是搭配薄荷頭皮調理素的美髮水使用，生薑的熱性反差出薄荷的涼性，如此就有如同三溫暖的功效。這是每日可以做的頭皮調理。另外業者還推出護髮三溫暖，薄荷洗髮乳搭配辣椒護髮乳，也是利用溫度感覺的反差，另以辣椒護髮乳代替護髮機的蒸髮，護髮乳直接拍在頭髮上。【安樂詩】云：髮是血之餘，一日一次梳，通血脈，散風溼。這是因為人體的經絡常是深埋皮膚底下，所以要用針灸或是重力刺激才能激發作用，唯有頭皮部位的穴位是最淺層的，而且所有的經絡最後就是匯集到頭部，頭皮穴位密度又居於全身之冠，例如頭頂最高的穴位叫做百會，就是所有經絡匯集地就是囉。因為穴位位置非常表淺，穴位數量又多。所以使用生薑配方的洗髮乳對於頭皮下的穴位刺激的有正面幫助的。坐月子時中醫認為產後百脈空虛，又加上中國北方氣候多乾燥原本就不常洗髮，所以就有產後不洗頭髮的倡議。但是南方島國溫度高又多潮溼，所以產後不洗髮很不舒服，加上現今洗澡沐浴相當方便，又有吹風機的幫助，這樣風寒入侵體內的機會應該是沒有的，所以基本上我們是贊同產後適當的洗髮，而如果用溫水搭配生薑這種溫性藥

材為主的洗髮乳，應該是適宜產後用的。

◆子宮頸閉鎖不全

陳醫師

我想請問子宮閉鎖不全，在中醫療法上是否有方子可以治療，或者有何方子可以使我於每次月經完後第二天起能予服用保養，以強化子宮，因為兩次子宮閉鎖不全五個月羊水破掉流了。回答您的問題應該正名為子宮頸閉鎖不全，原因有先天性和繼發性。繼發性為外力對子宮頸的撕裂傷，例如器械性的人工流產等等。治療上我在教科書查到的是在妊娠16周左右進行子宮頸縫合，縫合手術有很多種可供醫師選擇最有利者。所以連續兩次早期破水，是否沒有事前跟醫師溝通好，或是尋求進一步處理，希望您與您信任的醫師多溝通。這裡中醫提供的方法雖然有，可是並無絕對的把握，所以建議懷孕前以中醫調理好身體，妊娠前也跟西醫溝通好。建議鍛鍊體質，每天至少步行20分鐘，然後快步5分鐘，會對子宮肌肉收縮力有較好的幫助。有問題請再問祝安康陳俊哲敬上

◆輸卵管不通

請問輸卵管不通，服用中藥可以導通嗎？您好因為輸卵管不通暢的原因有不少種，而形成的輕重大小也有別，所以在中醫來說有一定困難度。但如果以懷孕為首要目的的話，人工生殖可以繞過輸卵管而達到目的。但是如果還兼加有卵巢功能的問題，那麼中醫就比西醫來的有幫助，至少是協同的幫助，有中醫的介入可以提高人工生殖的成功率。祝安康陳俊哲敬上

◆子宮頸癌【carcinoma of the cervix】

※致病原因子宮頸癌號稱為具傳染源的傳染性癌症，實驗證明因性關係傳染的人類乳突狀病毒是主要元兇，所以逐漸開放的性觀念連結出患病的發生率上升與年紀層面的下降，當子宮頸癌躍升為婦女癌症首位就不足為奇了。因為男性感染此類病毒之後，幾乎不會有症狀，一段時間後病毒會消失，但是傳染給女性後，若是免疫能力下降或是子宮頸損傷，導致病毒可以感染到最底層的具有分裂能力的細胞，這就有轉變成癌前期細胞的機會，再慢慢變成癌細胞。※高危險群過早的性行為刺激導致不成熟的子宮頸柱狀一鱗狀細胞受到傷害，而多育婦女生產過程的子宮頸損傷，或是長期子宮頸發炎的糜爛狀態，也都是病毒入侵的管道。所以初體驗過早，過早生第一胎，性伴侶過多，都是高危險群。而人類乳突狀病毒的垂直感染給胎兒也是不可忽視的原因，所以家族史亦須注意。※為何要做抹片檢查子宮頸癌的前身為細胞變性期稱為子宮頸細胞異型增生（CIN），CIN 和零期癌鮮少有症狀出現，但卻是極少數可以治癒的癌症階段，而 CIN 到正式癌變又需要數年時間醞釀，所以簡易的抹片檢查就彌足珍貴，尤其是以上所說的高危險群。多數中早期子宮頸癌只有性行為後的血絲狀陰道分泌物，又因為無疼痛感，所以極易被忽略，晚期之後才有增多的腥臭味白帶、停經後出血、下腹疼痛，但是多已經嚴重又棘手了，而事實上最嚴重的浸潤型子宮頸癌被診斷出來之前，她們的共同特徵就是幾乎五年內都沒有做過抹片檢查，可見抹片確實重要。因為抹片的失誤率是二到三成，所以建議第一次檢查之後隔一個月要再做一次，這樣可以把失誤降到一成以下，然後每年再做一次即可，我們建議把檢查日期定在生日之前，當作給自己最好的禮物。※什麼是抹片檢查子宮頸抹片（Pap smear）檢查結果分為五級。

第一級：正常。表示沒有不正常的細胞。

第二級：有變形的細胞。其來源可能是發炎或細胞變形所引起。

第三級：有不正常或結構不良的細胞出現。雖仍不能說是癌症細胞，但已有嫌疑

第四級：有極可疑的細胞，癌症的診斷應無問題。

第五級：已經有決定性的癌細胞抹片檢查如同內診，用抹片棒輕輕沾取出子宮頸部及陰道底部的分泌物，再以顯微鏡觀察其中脫落的上皮細胞，所以簡單方便又不痛，最好在月經剛完時較為準確，受檢前一日最好不要同房和做陰道灌洗，以免影響抹片品質。抹片後是有人輕微出血，一般一兩天內會自動停止，內診也可以自費用拋棄式鴨嘴，所以也不用煩惱感染。通常第二期是發炎狀態會要求重新再檢，並不是什麼大不了的事，也不用擔心害怕，報告是第三期以上再搭配陰道鏡，這是類似用數十倍放大鏡觀察細胞細微構造，若有懷疑可以做切片那更精准了。子宮頸癌的特色是早期發現可以絕對的治癒，不像其他高轉移率的癌症，而網路的匿名性更催化社會的性開放，所以這是最低限度的保護自己喔。健保局規定三十歲以上婦女每年可免費做抹片檢查，就是繳掛號費不蓋健保卡，而低年齡的高危險群可以蓋卡的健保方式檢查，況且自費的話大約是三百元左右，再不放心的話打查號台問醫師公會哪有女性的婦產科醫師，這樣子總該可以了吧，好好保護自己疼愛自己。※治療方式常見的早期癌前期細胞變化，只需做局部電燒擴清病灶的治療，門診處理也不會有疼痛感，可以完全治癒且保留生育能力。零期可選擇子宮頸雷射錐狀切除(可保留生育能力)，高齡者可考慮子宮全

切除：一期至二期上以手術為主(子宮根除手術)；二期下及三四以放射治療為主(俗稱電療)；復發性或是晚期時無法用手術或放療處理時，才採取化學療法來控制和緩解病情。※五年存活率零期即原位癌：近乎100%。一期：80-85%。二期：60-65%。三期：25-35%。四期：8-14%。※子宮頸癌分期 A.零期子宮頸癌又稱為原位癌，癌細胞仍侷限於上皮內，尚未突破基底膜。 B.第一期，癌症只侷限在子宮頸，由其侵犯程度的深淺，又分為第一期上(Ia)與第一期下(Ib)。第一期上表示癌細胞已穿透基底膜而到了間質細胞，只有表淺的浸潤，其侵犯深度應不超過5mm，水平侵犯範圍應不超過7mm。如超過此範圍稱為一期下。 C.第二期，癌症超過子宮頸但未達盆腔，是向下侵襲到了陰道，但仍未到達陰道的下1/3，此稱為第二期上。若往旁邊向兩側的子宮組織侵犯，歸為第二期下。 D.第三期，癌細胞往下侵襲到了陰道的下三分之一（此稱為第三期上）或侵犯到了骨盆壁（此稱為第三期下）。 E.第四期，癌症已超出生殖道。如侵犯到膀胱或直腸黏膜則歸為第四期上，如有骨盆腔外的遠端轉移，則歸為第四期下。

◆產後頻尿

陳醫師您好，

自從生完老二後，沒有一天晚上能夠一覺到天亮沒有起床上廁所。儘管我盡量晚上少喝水也是一樣。一個晚上起來如廁二次事稀鬆平常，的確也有尿可解，不知如何改善。

有時，明明才上完，卻有很強想再上的感覺，真不知如何是好。白天就比較好。您好建議購買胡桃肉一斤，用食鹽炒熟，每次吃三粒，不定時食用。另外可以練習改良的凱革爾運動

平躺床上或是坐著，深深的吸一口氣，然後閉住，再提肛，縮住肛門，這樣持續幾秒再呼氣和放鬆肛門肌肉。多次練習之後，再練習收縮陰道，動作如同收縮肛門。隨時隨地可以練習。祝安康陳俊哲敬上

◆請問枸杞.紅棗.黃耆湯對胎兒之影響

陳醫師您好:

本人於懷孕初期【前三個月】每天都飲用枸杞、紅棗及黃耆所泡之

茶飲，不知對胎兒是否會造成不良之影響？也曾經因為喉嚨疼痛滴

過五六滴的蜂膠，我目前已懷孕35週了，若有不良影響，好似一切

都太遲了，但我還是希望陳醫師能撥冗回答，感激不盡。.....心憂如焚的媽媽
您好對胎兒有影響的除了活血化淤藥之外就是一些毒劇藥，妳的茶飲方

子不會對分化中的細胞有影響，頂多就是感冒時喝的話會纏綿難愈

，或者是改變體質方向而出現一些妳自己身體上的不適,這種方子對

胎兒應該可以放心的，但是也不鼓勵喝,因為對妳確實體質不明確，

如果有問題可以再問，憂心的媽媽也會有不快樂的B B喔。

也請您訂閱我的電子報，謝謝。祝安康陳俊哲敬上

◆經期胸痛以及經期補養藥膳

症狀：經期時胸部鬱抑不通，會有想敲打它，讓它疏通的慾望。

- > 位置在胸部上方的排骨裡面,
- > 離胸部排骨中央向右約五公分處.我本身體質是怕冷怕熱,
- > 易累, 易拉肚子, 冷底又厚火.
- > 每月經期第一天我都吃麻油雞.

> 這次經期前兩週有吃四天的歸脾湯.

> 這次經期吃飯都只配黃豆芽菜.

> 經期的伴隨症狀:

>

> *另外有一問題請教: 經期時我可以喝中將湯嗎?

> 那時候喝才對?您好經期請沖泡玫瑰花四錢

月經期不可以吃補的藥膳，麻油雞把淤血補助，難怪妳會越來越痛。中將湯妳不適合，那是有淤血痛經才恰當。經期乾淨後用下方吃三四天

通用燉補方

燉雞鴨鵝均可

當歸三錢 川穹二錢 白芍三錢 熟地三錢 黃耆三錢 淮山三錢 茯苓三錢

洋參【或是黨參】三錢 枸杞三錢 黑棗六錢 肉桂一錢 桂枝三錢

桂枝與肉桂要用布包

有高血壓者用黨參去肉桂祝安康陳俊哲敬上

◆經前症候群

年紀：33

發病時間：每次經前10~15天

症狀：我有較嚴重的經前症候群症狀有:情緒低落,易怒,胸部漲痛,疲倦,失眠...等等,每月到這時 候就一直有快不想活了的想法

之前曾經於月經結束後喝四物湯但每服必拉肚子妳好加減宣鬱寧心小米粥材料：金針花[乾

貨]四錢、五味子五分、枸杞二錢、合歡皮三錢、當歸一錢，熟地二錢，白芍二錢、白朮二錢、小米一杯。

做法：1.將以上藥材置入布袋內，以五碗水煮開十五分鐘，倒出湯汁。2.小米洗淨後，倒入湯汁煮粥食用。服用法：每日一次，空腹服食。月經期則去除當歸熟地白芍月經期再加上玫瑰花茶，以玫瑰花二錢沖泡開水，不定時飲用。祝安康陳俊哲敬上

◆產後尿失禁

您好

我有一個很惱人的問題想請教...

自從我生完老二以後就常有漏尿的情形,

走在路上不自覺的就會有一點點漏下來

真的很煩惱,我才卅出頭...

不看西醫可以嗎?

有什麼方法可以調養嗎?

救救我吧！

非常感謝您！妳好可以採用類似凱格爾運動的鍛鍊方法。吸氣後，收縮肛門不放，持續幾秒鐘，然後在放鬆肌肉吐出空氣，休息十幾秒之後再做一次，如此每天有空就做，可以增加運動局部肌肉收縮，而使功能恢復正常。祝安康陳俊哲敬上

◆害喜胃痛的藥茶

陳醫師: ^_^...您好!我現已懷孕二個月,因常害喜,胃很不舒服,吃或不吃,都會胃痛,而且還會吐到頭暈,肌肉酸痛,非常痛苦,從網站上得知陳醫師解說害喜的情況非常詳細而且粉親切,想請問陳醫師"胃痛"是正常的嗎?還是我自己本身的胃有問題,須要檢查呢?麻煩您告訴我一些可減輕症狀的方法,謝謝您!懷疑自己有胃病的媽媽/*-*\ps.懷孕前並沒有胃病,也不會胃痛.您好這就是害喜丫

不是妳的腸胃有問題

試試看泡點中藥喝喝陳皮一錢

砂仁一錢

紫蘇 二錢如果喝不下去,持續的聞藥味也可以。

試四天, 如果沒改善再寫信來問。祝安康陳俊哲敬上

◆坐月子豐胸法

陳醫師您好.....

我目前懷孕36週..我有問題想請教您...

1.我本身有慢性過敏性鼻炎..是否可以在坐月子的期間服用什麼藥方來改善過敏性鼻炎??亦或是若月子坐的好即可改善此狀況呢??2.我的胸部從青春期就發育不好.很希望可以藉由這次坐月子的調理可以讓胸部變大一點.是否服用您在網站文章中提到的藥膳就能夠改善呢??或者可以再服用什麼藥方做加強呢??>>>>>回答妳好1:坐月子之後一個月,請至我網站內的自療妙方中找鼻炎的外用方子。2:請依照坐月子的方法,如果天氣過熱吃不下太補的藥膳,可以下方作成甜點,注意不可以是冰的。坐月子期間,哈士蟆至少要服用半斤以上。藥膳---雪奶哈士蟆哈士蟆三錢溫水一碗浸泡三小時,再放入電鍋中燉一夜,次日取出加入牛

奶300CC 枸杞子二錢一起煮開五分鐘，待冷倒入剖半去子的木瓜中，即可食用。牛奶也可以用椰子奶代替。空腹時用效果好。祝安康陳俊哲敬上

◆中醫的安全流產方法

陳醫師您好想請教在懷孕7週內中醫是否有

安全的流產方式

若採西醫口服的流產方式

可能的風險為何

而是否需如坐月子般保養請問需休息多久?是否可吃補品>>>>>>>>>回答

您好請用【坐月子】或是【流產】進入我網站搜尋相關文章。中醫沒有安全流產方式 RU486 是怕胚胎著床於輸卵管，所以服藥前要用超音波確定胚胎是在子宮。

所以有的自行服藥，結果胚胎著床不在子宮，出現腹腔出血而危及生命。

服 RU486同時還要加服前列腺素，以使子宮收縮無力者順利排出胚胎。

服藥後還要接收超音波檢查，如果還有殘餘組織，有的還有需要進行刮宮，以清除乾淨。

所以請至信譽良好的婦產科。小產的坐月子如同一般生產，切記切記。>>>>>>>>>>來信
陳醫師您好謝謝您的耐心與及時回應

現在醫師請我服6錠黃色藥片

分四次每次隔12小時服一次

前二次各服二錠

後兩次各服一錠

第三天回醫院服藥打針

之後會出血2-3星期

請問生化湯或坐月子的食物從何時開始吃另請教平時有上健身房的習慣

若這段期間是否完全不能運動(西醫如此說)

簡單的踩步機或背背包是否如人家生產過後的婦女,以後會腰酸背痛另我也不能洗澡嗎??>>>>>>>>>回答打針完隔一天就可以開吃喝生化湯,請依我網站上的方子自己抓藥,不可以讓藥房自行添加藥物。連續吃五六包,出血情形轉成淡淡血絲狀就可以轉吃十全大補湯燉東西吃。一個月內只可以散步,主要是避免體力的消耗,因為內分泌重建要有大量的能量,而且是一個很好的改變體質的機會,不可以錯過。產後腰背酸痛,通常是因為懷孕時重心改變,而沒有注意好姿勢所導致的,或是產後抱小孩施力不當,很少因為坐月子運動造成的。當然可以洗澡,只要注意頭髮要趕快吹乾,不可以只包著大毛巾讓它慢慢乾。>>>>>>>>.來信謝謝您的指導

由於是第一次上婦產科就遇上這種事,對於孩子是很愧疚的,看您回答其他疑問時,我覺得不只醫人還醫心,很感佩,真的謝謝現代有這種認真熱忱的好醫生>>>>>>>>>回答妳好誰都不願意這樣的事情發生,也不要自責,妳可以跟小BABY約好下次一定要再來喔,因為這是沒辦法的事,下次來一定會好好招待的。我是盡力而為,能把所學的提供給有需要的朋友就是一種快樂。謝謝妳的鼓勵。妳一定要依照我的方法好好作好月子。切記切記。祝安康陳俊哲敬上

◆經間出血

經間出血 intermenstrual bleeding 定義: 兩次正常量的月經期之間的少量出血, 又稱為中期出血、或是經間出血、或是排卵期出血。因為出血發生是在基礎體溫週期的曲線扭轉時, 所以接近排卵期, 出血約二到三天, 最多不超過四到五天, 顏色紫暗, 偶爾淡紅, 經量少於一般正常量, 如果經量如同正常量就不是經間出血了。是因為女性荷爾蒙的波動而出血, 出血一般會自動停止, 經常會週期性發生, 所以有時會自認為兩個禮拜就來一次。伴隨症狀有腰痠, 雙乳做漲或乳頭發癢, 一側或兩側的少腹漲痛, 帶下增多, 質黏如蛋清。此症如上的與其他類似病症做鑑別診斷, 如月經先期, 月經過少, 經漏, 赤白帶下。中醫認為月經乾淨之後, 血海呈現空虛狀態, 再慢慢蓄積經氣。在兩次月經之間, 是由虛至盛的轉折, 此時陰精充實而飽滿, 功能加強到處於準備受孕狀態, 此時陽氣一發動就出現難以忍受的動情期, 中醫稱為綢繆。如果此時陰陽調節正常, 表現出動情難忍而欲交接之勢, 這是自然的繁衍動力,

也是自我感覺最準確的排卵時刻。而若是腎陰不足，受此陽氣衝擊，則陰絡易受傷而溢出血，此乃經間出血。治法大致是滋陰止血，採用兩地湯合二至丸，其他再隨症加減，或是某證突出以某證為主要標的物。2001.5.25.

◆平胸又痛經

發病時間：青春吧月經來很痛,但是胸部就是不長大

症狀：月經來時腹部很痛,腰酸背痛,雙腳無力,很疲倦,冒冷汗

曾經接受的治療過程：吃止痛藥,到婦產科檢查也只說生完小孩就好,有去看過中醫說我"冷底"

現在服用的藥物：沒有,不過現在痛時就喝黑糖水止痛

希望能有調經又豐胸的藥膳,謝謝您得指導您好月經疼痛請於月經來臨前，稍有徵候就開始沖泡玫瑰花，可以理氣止痛，喝到經期結束為止。月經結束後連續六天開始服用豐胸藥膳，組成請見網站內相關文章。有疑問可以再來信。祝安康陳俊哲 敬上【附上類似問題】建設優質乳房的方法

> 我要問ㄉ是這個是吃豐胸ㄉ嗎??

> 是不是一定要在月經完後第六天才能吃??

> 平常不能吃嗎??

> 是不是煮一次要一次吃完??

> 謝謝您好是月經乾淨之後連吃六天，不是乾淨後的第六天開始吃。

平常想吃也可以，只是乾淨後連續六天效果最好。

煮一次就要吃完，所以食材的量不要太大太多，例如雞腿一根，或是小一點的魚一條。陳俊哲 敬上

◆孕婦專用的枇杷膏

請問孕婦懷孕中咳嗽可否服用枇杷膏

謝謝答：一般川貝枇杷膏組成

川貝、枇杷葉、沙參、茯苓、瓜婁仁、遠志、蓮子、款冬花、桔梗、半夏、乾薑、薄荷腦、杏仁油、草莓香料、波羅香料、麥芽糖、蔗糖

、蜂蜜。生達藥廠出品的【肺益清】川貝枇杷膏組成

枇杷葉、大梨子、大棗、蓮子、貝母、藕節、蜂蜜、薄荷腦、草莓香料、水蜜桃香料、乙醇、去水醋酸鈉。

此藥品註明兒童枇杷膏以及孕婦可用。本品組成較上方平穩，又有知名的股票上市藥廠背書，是一種方便的選擇。

◆TVBS【大搜索線】資料稿—皇室的求子方法

此篇是為 TVBS【大搜索線】節目的【求子大捕帖】書面資料外用貼穴位強壯療法

慈禧光緒醫方選議 184

毓麟固本膏

組成：杜仲 熟地 附子 牛膝 故紙 大茴香 蛇床子 鹿角 龍骨 等等

功效：種子之功 百勝百效

用法：貼左右腎俞穴各一張 丹田穴一張 用汗巾博住 勿令走動 半月一換

光緒三十三年脈案載：遺精之病將二十年，每月必發十數次。清季皇家人丁欠旺，故光緒帝用此藥記載頗多。求子於陰道內給藥

外臺祕要 卷三十三 唐 王燾

療無子，令子宮暖，內置丸方。

麝香兩分 皂莢十分，蜀椒六分，密丸，以棉裹納產宮中，留少棉線出，一日一換，無間晝夜皆納，無所忌。求子藥枕法

驗方新編卷九 清 鮑相璈

丁公仙枕方

清康熙山西總兵 丁其泰，七十無嗣，得此方，不二年精力強壯，至八十一歲，得二十一子。

以槐木薄板做枕，上面留一百二十八孔，內置藥物如下，川椒、桔梗、柏子仁、薑黃、吳茱萸、白朮、薄荷、肉桂、川芎、智仁、枳實、當歸、川烏、千年健、五加皮、羌活、防風、辛夷、白芷、附子、白芍、蒿本、細辛、牙皂、甘草、菊花、杜仲、烏藥、半夏、從容、每味一兩、研細末、納絹袋入枕中。鐵定生男的終極必勝方法

續名醫類案卷二十三求子篇 褚氏遺書

建平孝王，妃姬侍皆麗無子，擇良家未笄女子入御，又無子。問褚澄曰：求男有道乎？澄曰：合男女必當其年，男雖十六而精通，必三十而娶。女雖十四而天葵至，必二十而嫁。皆欲陰陽完實候交合，則交而孕，孕而育，育而為子，堅壯強壽。今未笄之女天葵始至，以近男色陰氣早洩，未完而傷，未實而動，是爾交而不孕，孕而不育，育而子脆不壽。此王之所以無子也，然婦人有所產皆女者，有所產皆男者，大王誠能求多男婦人，媒至官府，有男之道也。王曰善，未再期生六男。何首烏求嗣法

本草綱目 李時珍

何首烏本無名，相傳某何姓人，見藤夜交便採，食而有功，因以採人為名。

明嘉靖年間，邵應節道士以七寶美髯丹上進，世宗服餌有效，連生皇嗣，此方以何首烏為主，此藥遂大行天下。

◆TVBS【大搜索線】資料稿---不孕的民俗自救法-換花換肚換蹄

此篇是為 TVBS【大搜索線】節目的【求子大補帖】書面資料因為普通名詞雖然常聽過，可是不清楚源由和意義，大概情形如下。換花---由娘家媽媽實施----對象是不孕

結婚時新娘子頭上戴有兩朵春仔花，娘家媽媽再拿兩朵新的春仔花重新插上，然後舊的春仔花丟入溪中，娘家媽媽要口中要念【新花插上頭，舊花放水流】。換肚----由娘家媽媽實施-----對象是前胎生女生

由娘家媽媽用豬肚兩粒圓圓的黑棗，調味燉煮熟，然後裝入茶壺中，在房內象徵性吃下一些，即完成換肚儀式。黑棗表示睪丸，茶壺嘴代表男性生殖器，豬肚一定要跟肉商指定是公豬的豬肚才可以。娘家媽媽自行煮好，默默放在房內，不可以告訴女兒，女兒自己象徵性吃一些即可。換蹄-----由娘家媽媽實施-----對象是流產一次或是連續流產的女生

娘家媽媽煮豬腳給女兒吃，豬腳要包含有豬蹄，自行放在女兒房內，然後娘家媽媽口中要念【後蹄換前蹄，攔生阮女兒的】後一句台語發音意思是再生是我女兒的，不可以再流掉了。擇日師

結婚擇日不當沖煞，所以要重新來一次，看好時辰，男生再次出門到女方家帶女方過來，安床時間，祭拜祖先時間祭拜，這樣就完成了，不用跨火爐或是踩破瓦片。婚禮踩破瓦片是要生男生，不要弄瓦。煎綠色鴨蛋長期吃。鴨舌黃炒鴨蛋吃。七個雞蛋蛋黃加入一瓶米酒，然後搖晃均勻，靜置一個月即可飲用，男女睡前各一小杯。可以增進女生胞宮虛寒的溫暖，以利著床，也可以增加男性精蟲活力。

【隨筆散記,婦科,其他】◆TVBS【大搜索線】資料稿---媽祖廟的求子燈花

此篇是為 TVBS【大搜索線】節目的【求子大補帖】書面資料嘉義朴子配天宮【求子燈花】【代表意義】

白牡丹花為男生 紅牡丹花為女生【時間】

農曆正月到二月底的御賜燈花節【儀式】

正殿前有牡丹花二棵，可在花前祈求媽祖賜予紅花或是白花。先燃香默禱，報上善男信女雙方姓名地址，心中默想擇一祈求紅花或是白花。然後要擲杯，須有連續三個聖杯【陰陽相反】

就是媽祖同意，然後工作人員可依信徒指定花朵幫忙摘下。然後將花裝入盒中【紅白花各不同的盒子】，再把牡丹花過正殿金爐爐火三圈。當然事後添一下油香，隨意奉獻。牡丹要放在夫妻的房內，用花瓶插好，花枝若過長可彎曲之，不可剪斷，也不可以讓小孩亂玩，有灰塵就用溼抹布擦拭。有喜之後就要再回廟裡上香報告，媽祖會庇佑母子均安。如半年後未受孕，可以再來上香報告祈求一番。在小孩滿月時要用油飯和麻油雞酒回來拜拜，報告事情圓滿達成，再把牡丹花移到家中神明位旁，如家中沒有供奉神明，可以將牡丹繳回媽祖廟。也可以等到十六歲小孩成人了再繳回，因為媽祖的階段性任務已經完成了，再來靠自己了。朴子街上還有人持續恭奉祈求的燈花五十年以上。元宵節前後是祈求【求子燈花】的最高潮，每天有五十幾對夫妻前來，而回來還願報告成功者則是終年絡繹不絕，媽祖供桌上經常有麻油雞酒，這不只是神威顯赫，更是身為女性的媽祖，感同身受溫柔的慈悲心腸。【注意事項】因為妊娠變數很多，媽祖也有設想幾個方法協助，但是技術性方法就要有了解流程的工作人員幫忙。例如我表妹前天專程求白花，求老半天媽祖都沒有同意，工作人員就建議換求紅花如何，結果很神奇的馬上有連續三杯。工作人員問他們之前的受孕過程，她是去年懷孕到七個月因為不明原因胎死腹中，所以建議再求加強庇佑，方式依困難度而有不同，例如可以求得殿後四季蘭樹葉回去泡茶、或是供桌上三杯敬茶的中杯茶、或是夫妻到正殿後的四季蘭下，男生站左邊，女生站右邊，牡丹放樹中間旁，一起抱著一兩秒鐘，這樣就完成儀式。正殿後的四季蘭有不少傳說，因為配天宮正殿媽祖是在朴樹上直接雕刻成形，所以根部能植基於地下，因為四季蘭在殿後而與媽祖直接相通，所以媽祖也藉由無情的草木做有情的事情。隨時都有信徒以身體或是患處摩擦四季蘭，以祈求媽祖庇佑。廟方則收集掉落樹葉以供民眾索取，四季蘭是一株高過廟宇挺拔的珠蘭，在因緣際會裡傳遞著媽祖的愛心，在香火鼎盛煙霧繚繞裡釋放淡淡的清香。【源由】

配天宮求子燈花源自於西元1865年，清朝嘉慶君的御賜燈花，為嘉勉扶養台灣史上最高位的官員王得祿的大嫂，所以恩賜她於元宵節來北京深宮內院觀賞御花園的燈花，但是因為台灣北京兩地舟途勞累，皇帝就恩准王得祿在家中比照皇家規模佈置燈花，後來有敢於無法年年傳承就轉移到配天宮讓所有百姓都能欣賞，早先是孕婦於正殿燈花下祈求順產，媽祖順著民意經由燈花解決傳遞香火的終身大事。配天宮

地址：嘉義縣朴子市開元路118號

電話：05-3792350

◆TVBS【大搜索線】資料稿——如何受孕及生男祕方

此篇是為 TVBS【大搜索線】節目的【求子大捕帖】書面資料睡覺方位注意事項

醫心方卷二十八 日本 丹波康賴 撰於西元982年 輯錄唐朝以前醫學文獻

交交所向時日吉利益損順時效此大吉。

春首向東，夏首向南，秋首向西，東首向北。交接瞬間注意事項

醫心方卷二十八

交接泄精之時，候女快來，須與一時同泄，泄之必盡，先令女正面仰臥，端心一意，閉目內想，受精氣。生男祕訣在於交接瞬間

馮氏錦囊秘錄 清 康熙 馮兆張著

方脈陽萎篇

媾精成胎之法，男子必前數日，調補精力強健，希戒七情攪亂真氣，臨事預使女人動情，已則心靜神恬，若無其事，惟為收攝固注丹田，俟女人候至，然後任其百脈齊到，自然得子。此是陰先至則成男。佩戴法轉換性別。

千金要方 卷二 唐孫思邈

取雄黃一兩絳囊盛帶之，要女者帶雌黃轉女為男法

婦人良方 卷十 宋 陳自明

陽施陰化，所以有妊。遇三陰所會，多生女子。但妊娠三月，名為胎始。

血脈不流，象形而變。時男時女未定，故令於妊娠未滿三月間服藥方術，轉令生男也。

其法以斧置妊婦床下，繫刃向下，勿令人知。恐不信者，令待雞抱卵時，依此置窠下，一窠盡出雄雞。

又取雄雞尾尖上長毛三莖，潛安婦人臥席下，勿令知之，驗。

又取夫髮及手足甲，潛安臥席下，勿令知之。便宜好用的生精食物。

馮氏錦囊

嗣育門

經云，精不足，補之以味，濃郁之味，不能生精，惟恬淡者，能補精爾。

世物惟五穀得味之正，最能生精，如煮粥飲中有厚汁滾做一團者，此米之精液所聚也，食之最能生精，稱之粥油。排卵期的掌握

馮氏錦囊

嗣育門

天生各物必有氤氲之時，萬物化生必有育樂之候，貓犬至微，將受妊時，其牡者必狂忽而奔跳，以因孕育樂之氣觸之不能自止，此天然之節候，生化之真機也。

凡婦人一月經行一度，必有一日氤氲之候，於一時辰間，氣蒸而熱，昏而悶，有欲交接不可忍之狀，此的候也。順此施之則成胎矣。這個方法比西醫量基礎體溫測排卵期效果更好。孕育男女胎的原因

馮氏錦囊

嗣育門

以經血各由百脈齊到者，別勝負爾。精之百脈齊到，勝乎血則成男。血之百脈齊到，勝乎精則成女。百脈齊到者，暢遂之極，而無一毫勉強是也。百脈齊到應該就是男女高潮射精的前後瞬間。

◆流產後急問

您好!我有一些問題想求救.....SOS!!!

我最後一次 MC 是2/1來的

我在3/24流產，由於人在國外

(出血+腹痛.....像月經)

直到才回國求診(西醫)

他用超音波+驗尿檢查

說已經流產但未完全排乾淨

等7-10天後再回來檢查

這期間我吃了4帖生化湯(3/29-4/1)

4/3我再回診

醫生又開了2天份子宮收縮藥+止痛藥(共6次)請問:

1. 我的血已經快沒了....只剩一點還要吃西醫開的藥嗎?(我有把這些情形完全清楚的告知醫生他還是堅持要再吃他的藥)

回答;

再找第二個醫師以超音波檢查是否還有殘留

這樣可以決定藥量和藥物強度2. 懷孕後到現在都會腰痠, 正常嗎?需要特別調養嗎?

回答;

當然需要調養, 一樣要坐月子

還有不知道請再問喔第二次來信; 謝謝您的回覆!!!

非常感激!

醫生開藥之前已經有照超音波&驗尿了

so.....我想我應該把他的藥吃了吧?!

吃了子宮收縮藥是否還會再出血?也會比現在多一些吧?陳俊哲的話好難得這位朋友有回第二次信, 有時候一個月內回了一百封也不超過十封

回應回來的, 呵呵, 也不是要討什麼, 只是回信蠻辛苦的, 怕讀者沒收到

, 有個回音總是令人放心, 畢竟每一封都是殷切盼望得到回應的, 所以即

使這樣子少人回覆, 我還是堅持每封必回。

◆妊娠可以喝花茶嗎

您好!!

我是一位剛證實懷有身孕的女性(5週)，因平日有喝花茶的習慣，(如玫瑰花--Rosebuds、甜菊葉--Stevia、桂花--Sweet-Osmanthus)不知這類食品對孕婦與胎兒會不會有不良的影響，因此來訊相問，請醫師們代為解惑!!!您好玫瑰花妊娠不可喝。其他可以。【藥用】

玫瑰的花蕾，如果花苞開放，芳香味的量就會減少。【性味歸經】

甘、微苦，溫。歸肝、脾經。【功效】

疏肝理氣，和血散瘀。1：用於肝胃不合的脇肋疼痛，胸腹脹痛及乳房脹痛等症，本品氣味清香，

善能疏肝理氣而解鬱，主要適用於肝氣鬱結、胸悶脹痛及肝胃不和、脘腹脹

痛、噯氣則舒等症，可配合佛手片同用；對於經前乳房脹痛可配青皮、

川楝子等同用。2：用於月經不調，跌仆傷痛等症本品又入血分，具有和血散瘀作用，治療

月經不調，可配合當歸、川芎、澤蘭葉等藥同用。治療損傷瘀血，可配合雞

血藤，赤芍，延胡索。【應用】

1：玫瑰花雖然歸類於理氣藥，但是也可以歸類於活血化瘀藥，而且是作用最輕微的活血化瘀藥，這一點非常重要，因為在婦科疾病，或是一些出血症狀的疾病，有許多特殊狀況，是只能用馴良的玫瑰花，其他活血藥一概不能用，可為小兵立大功，好像肺結核腎病末期時，使用冬蟲夏草一樣。

2：在婦女月經期的子宮收縮不舒服時，然而並非很不舒服，不必大動干戈的用藥，可以泡一杯玫瑰花茶，有極輕微的疏肝理氣的作用，這樣就可以減輕不舒服。【本草正義】

玫瑰花香氣最濃，清而不濁，和而不猛，柔肝醒胃，流氣活血，宣通室滯而絕無辛溫剛燥之弊，氣分藥之中最有捷效而最為馴良者，芳香之品殆無其匹。【用量與用法】

一錢至錢半，煎服時要後下，就是其他藥煎好之後，過濾好藥汁，再加入玫瑰花，蓋上蓋子燜一下就可以喝了，因為如果同其他藥物一起煎熬，含有的玫瑰精油會很快揮發完畢，而失去效用。【使用注意】

因為也有活血化癥的作用，所以孕婦不可以當作花果茶喝。

◆【東森新聞台】轉載少女濫交 陰氣早洩

一位署名網友「小公主」留言表示，自己同時有6個男友，且每隔一天或兩天就會做愛一次，有時還玩2人以上，甚至同時6人的性遊戲，以及還會找來

同班女學生一起玩8女6男的性遊戲……。中醫認為雖然男子16歲而精通，女子14歲而經行，但必待三十二而後嫁娶。因為未笄之女，天葵始至，若近男色，陰氣早洩，未完而傷，未實而動，是以交而不孕，孕而不育，育而子脆不壽。可見陰氣之難成，而養之欲其固也。做愛過程需要內分泌的調度、以及大腦皮層的興奮，都是極度消耗體力，所以中醫認為基礎物質的過度消耗，達到人體無法自然調節補充時，輸出大於輸入，那就是虧損。以中醫的腎來說，包括西醫所說的生殖系統與內分泌系統。腎的功能作用不足就是腎陽虛，基礎物質的不足就是腎陰虛。尤其未完全成熟的少男少女，更容易損及與生俱來的腎陰，因為腎水不足導致腎陽的命門火衰，腎的陰陽不足就是腎虧狀態。腎功能的減退，男女皆有，並不獨厚於男性，也不局限於性功能的表現。一般症狀有華髮早白、精神疲乏、頭昏眼花、耳鳴健忘、盜汗失眠、四肢冰冷、筋骨萎弱、腰膝酸軟，甚至同房次日晨起腰痛如折。在男性還有遺精，陽痿，早洩。女性出現經量減少、白帶清稀、甚至性冷感。總的來說時間過早或是刺激過強的性愛，只會讓病理性衰老提早出現，血氣方剛則操之過急。筆者在網站回答諮詢問題，就有很多一夜七次的壯男老公或是每天手淫四五次學生，其下場就如上述，更有一個是家中獨子的國三男生，四年來每天自慰五六次，現在就有耳鳴、頭昏、腰痠軟、甚至陽萎無法勃起，真是何必當初。

◆【東森新聞台】轉載--咪咪變小了 / 藥膳 - 雪奶哈士蟆

報載某位知名性感女星，因為罹患甲狀腺機能亢進導致豐滿的胸部由 C 降至 B，甲狀腺機能亢進發病的時候會消瘦，這是大家都知道的，可是症狀得到控制之後，體重恢復了，怎麼咪咪沒恢復呢。因為乳房大小與乳房上荷爾蒙接受器的敏感度高低有關，而甲狀腺內也有女

性荷爾蒙的接受器，所以甲狀腺機能亢進與乳房大小的連動就不只是因為體脂肪減少而已。發生甲狀腺機能亢進的原因有很多種說法，總的來說應該是外在壓力超過內在體質能夠承受的範圍，而這個抗壓性不足的體質就是陰血不足。容易緊張、晨昏顛倒的工作壓力、以及追求完美主義者，都是甲狀腺機能亢進的誘因，所以充足的睡眠是最好的養陰藥，月經結束之後調理的內分泌重建也是養陰的好時機，加上妥善而針對性的治療和善加管理自己的生活，因病縮減的胸部是可以恢復的。容易導致胸部變小的還有產後憂鬱症，通常產後月子調理得當，是可以輕鬆擁有大一號的成長，可是如果產後體力消耗過大、或是小孩難帶、或是調理失當，都會讓這項重大的內分泌重建失敗，短時間內不足超量的陰血，導致心陰不足而發生精神抑制。甲狀腺機能亢進與產後憂鬱症雖然都是內分泌問題，但是都與生活管理息息相關，好好注意一下，這樣可以減少好多問題的發生，也是保養咪咪的好方法，畢竟胸部的發育根據也是在內分泌。藥膳---雪奶哈士蟆哈士蟆二錢溫水一碗浸泡三小時，再放入電鍋中燉一夜，次日取出加入牛

奶300CC 枸杞子二錢一起煮開五分鐘，待冷倒入剖半去子的木瓜中，即可

食用。牛奶也可以用椰子奶代替。空腹時用效果好。

◆【東森新聞台】轉載--建設優質乳房的方法

女性乳房發育與女性荷爾蒙有關，但不是絕對相關，最重要是與乳房上的荷爾蒙接受器敏感度高低有關。中醫認為乳頭屬肝，乳房屬胃，清王孟英在歸硯錄提到【男子之氣沖於外腎，女子之氣沖於乳房】，近代又有人提出乳房與子宮相表裏。以上就是大略性的牽涉到乳房發育與消化、內分泌、生殖系統的相連動。青春期的發育----女子二七天葵至，任脈通，太陰脈盛，這是第一次的乳房發育，界定為初潮至二十歲。第一：遺傳因素所影響。母親或是姐妹的初潮如果來的晚，那麼發育較慢是有跡可循的，不用太緊張。第二：來潮之後的月經週期和經量是否正常。唯有正常的經期表現，才能證明女性荷爾蒙和內分泌的運轉良好，這樣能保證第二性徵的乳房能順利發育成功。第三：適度的嬰兒肥。足夠的體脂肪才能帶動乳房組織的發育，所以青春期刻意的減重，反而不利於乳房發育的黃金時機，尤其是快速長高而身高又很高，如果無法提供足夠的營養，那就長高不長肉也不長胸部。適度的運動也是讓氣血流暢的必要條件。第四：過早性愛易導致陰氣早洩。因為未笄之女，天葵始至，若近男色，陰氣早洩，未完而傷，未實而動，陰氣不足整體發育就差，尤其是與內分泌有關的乳房。第五：中藥調理

經期時以四錢玫瑰花泡茶，可以疏肝理氣減輕經痛，又可以流暢氣機。

經淨後六天的調養藥膳，輕微的補充經期損耗的體能和協助內分泌的重建，以黨參二錢 黃耆二錢 茯苓二錢 當歸二錢 白芍三錢 川穹一錢 熟地三錢 燉雞腿一隻或是排骨適量，輪流吃六天。有個女學生來信問到說，因為減重導致胸部減小以及閉經，如何依上法於月經乾淨後吃藥膳呢？這時要先調理減肥所損傷的脾胃吸收和內分泌，讓月經順利恢復，所以豐胸計畫就要延後了。育齡期的發育 這一期界定為二十歲到三十五歲。第一：首重良好的睡眠。睡眠是最好的養陰藥，陰血充足才能支撐沖任二脈，這樣月事才會依時而下，保證有良好的內分泌。熬夜如同熬煉陰血，

大大不利於女性養生。第二：經期伴隨症狀如腹瀉，水腫，這些都是成長過程有缺失，導致消化系統薄弱，在經期肝血下行時，加重脾胃消化的虛弱，這些都無法提供足夠的氣血來讓乳房圓滿充實。第三：產後是第二次青春期，產後調理得當，可以讓乳房再次的發育，反過來說亦如此。尤其是產後憂鬱症，產後百脈空虛因此更加的嚴重，乳房因內分泌重建失敗、氣血受損而縮小，因為子宮與乳房相表裏。產後調理另有專文請至網站查閱。第四：中藥調理

經期還是如前所述的泡玫瑰花茶。

月經乾淨後的六日藥膳如下，黨參三錢 黃耆三錢 茯苓三錢 當歸三錢 白芍三錢 熟地四錢 川穹二錢 枸杞子三錢 肉桂一錢 桂枝二錢 黑棗五錢

燉煮法如前。每位太平公主都有辛酸的成長歷程，每位女性都希望擁有美麗的曲線，其

實這都不難，確實的遵守以上要求，不假外力，不妄服藥物，B 或是 C 是輕而易舉的。這篇是在華梵大學授課內容部份摘要，分享給有需要的讀者。

◆如何用中藥墮胎 - 給男孩的信

您好!

我是一位學生, 因為女友ㄉ月經沒來,做ㄉ檢查之後,知道她懷孕了,但是

我們年齡太小, 因此想請教您如何吃中藥墮胎能讓身體傷害減到最低,之

後又該如何保養?謝謝您!您好您問到如何將傷害減到最低, 還問之後的照顧, 可以深深感覺到你是有情

意又負責的男人，現在這已經是很少見的囉。

就我所知道的情形，中藥墮胎成效是很差的，副作用又很大，所以希望您

轉至婦產科。現在 RU486 功效相當的好，副作用也幾乎都沒有，不過要

在醫師監控下才可以避免因為子宮外孕或是清除不完全的生命危險。

費用在 5000 元左右或是更低，希望您儘量籌措，不要做出讓至親的人終身

遺憾的事。請你一定要用心的好好愛護妳的女友，用盡所有最大的能力照顧你所愛和

愛你的人，這才是男人應該做的事。

我們男人就是要一輩子揚眉吐氣的活著，不要有內疚，不要有悔恨。往後

的成就算什麼，心裡從來沒有任何的悔恨，才是生命自若的最大成就。

女孩賭上一生的幸福放開所有來接納你，因為你是她所最重要的擁有，現

在你的決定關係到她終身的幸福和當下生命的安危，希望你要慎重考慮。如果你敢把事情告訴雙方家長，我會敬佩你是有氣魄的男人，雖然你的年

紀不大，我仍然會認為你比其他大男人更像個男人，因為你敢接受降臨的

責罵和難堪，然而這一切的一切算什麼，還比不上女孩在失去孕育的小生

命過程裡的掙扎和痛苦，以及有可能失誤的生命危險。如果有家人的協助

，你們會平平安安的渡過這一關，女孩才可以得到最好的照顧，你也才有

機會抓住往後的幸福。

我是個陌生人，你的來信讓我有機會跟你聊聊這一些，不管如何希望你再

次來信告訴我你們的決定。因為我有女兒，以後你也是會有子女，感同身

受的假定你是女孩的父親吧，你希望子女怎麼做的，那應該就是你現在應

該會做的，勇敢的做下決定吧。

附上兩篇重要的文章，請一定要好好的讀。陳俊哲 敬上人工流產調理的重要性懷孕生產都有被祝福的喜悅，但是人工流產的痛苦常是產婦獨吞，得不到奧援。其實不管任何原因的人工流產，之後的調理重要性尤高於正常產後，因為受孕後人體有許多系統就會開始啟動，處於非常狀態，主要的是內分泌。這些系統如同工廠一樣，會排好生產線的步驟行程，如此井然有序地完成懷孕的整個過程，乃至於生產之後。現在人工流產把這一系列工作從中打斷，

所以人工流產手術後的養生休息和調理就特別重要於一般。現在反而受到大家忽視，會衍生出不少後遺症，這是相當遺憾的。在人工流產術後無特殊症狀，應該服用生化湯，也必須坐月子，把內分泌等等系統恢復好，這對下一胎的孕育以及身體健康有相當大的幫助。常見產後調理得當，改變成非常好的體質，這是一種難能可貴的體質改造運動，得天獨厚給女生的，應該珍惜。【生化湯及產後調理】※生化湯簡介生化湯是我們產後必服的常規處方，其原方組成：當歸八錢 川芎三錢

桃仁十四粒 炮薑五分 炙甘草五分。此方來自明＜景岳全書＞

＜婦人規古方＞的錢氏生化湯，在清＜傳青主女科＞中更是詳細記載，其中的用藥方法以及產後禁忌，因為行之有效，自此以後的婦科專著，皆一致推崇，遂使此方深入民間，維護非常重要的產後問題，因為在此之前所習用的方劑，並不周延，此方遂成法定方。江西省中醫院婦科沙冰主任：臨床上產後無特殊原因者，可以原方使用，不可以無的放矢隨意加減。此方經前輩醫生多年使用認為比較穩當，並無副作用，所以無特殊兼症，應以全方原量為宜。北京中醫院婦科主任劉奉五先生，記載北方常規使用的生化湯，稱為產後官方。組成：當歸三錢 川芎一錢 桃仁五分 炮薑五分 炙草五分 紅花一錢

澤蘭一錢 益母草一錢 山楂二錢。此方是前方加減而來，當歸份量減輕，活血藥味增加，組方輕靈，如果體質柔弱，也是另外一種對證的選擇。也有中醫持不同意見，是以生化湯主述淤血症狀既多又重，來推斷不適合現代。但是因為原方是要求黃酒童便各半煎，所以去瘀力量很大，現在一般均用水煎，運用上又甚為合拍，應無疑慮。生化湯屬於預防性治療，但是產後變化極大，雖說順產較多，但是有逆症的話又較其他疾病棘手，所以有必要依常規處方，藉前人穩定的經驗，使變症降到最低。大陸生化湯的煎劑處方可以報銷，就是公費醫療有給付，由中醫師把關，安全性較高。台灣生化湯均是自行到藥房抓藥，老一輩又相信高價的效果好，不知對證下藥的重要性，藥房樂得投其所好大肆加藥，此有可議之處。※產後調理中醫對於產後病的理論基礎，在於臨產用力，產傷出血，產後元氣受損，百脈空虛，又產後淤血易停滯於胞宮，所以就有多虛多瘀的基本狀態。中醫對於產後的診斷除四診八綱外尚有三審：一審，小腹痛與不痛，以辨其有無惡露停留。

二審，大便通與不通，以驗其津液之盛衰。

三審，乳汁行與不行，和飲食的多與少，以察胃氣之強弱。讀者必須對三審有個感性的認識，對產婦做密切觀察。在正常情況下，即使不服生化湯，惡露也應在三至四週內乾淨。生化湯組方嚴謹，切合病機，有養血活血化瘀的作用，可以通治產後常見的輕微不適，又可以幫助子宮復舊，所以臨床上是每日一劑煎服至惡露乾淨為止，之後才可以進補一些人蔘、黃耆等等大補氣血的中藥，因為太早進補會導致淤血內停，不可不慎。至於老一輩所要求的坐月子禁忌，像是不可以勞動，運動，哭泣等等，這些是應該再遵守下去的寶貴經驗。對照前面的理論和經驗談，都是有根有據的，常見中老年婦女退化性關節炎應與困苦年代的產後勞動有關，而未來可見的關節酸痛應與過早的減肥運動有關，嗟乎，嗚呼。※人工流產調理的重要性懷孕生產都有被祝福的喜悅，但是人工流產的痛苦常是產婦獨吞，得不到奧援。其實不管任何原因的人工流產，之後的調理重要性尤高於正常產後，因為受孕後人體有許多系統就會開始啟動，處於非常狀態，主要的是內分泌。這些系統如同工廠一樣，會排好生產線的步驟行程，如此井然有序地完成懷孕的整個過程，乃至於生產之後。現在人工流產把這一系列工作從中打斷，所以人工流產手術後的養生休息和調理就特別重要於一般。現在反而受到大家忽視，會衍生出不少後遺症，這是相當遺憾的。在人工流產術後無特殊症狀，應該服用生化

湯，也必須坐月子，把內分泌等等系統恢復好，這對下一胎的孕育以及身體健康有相當大的幫助。常見產後調理得當，改變成非常好的體質，這是一種難能可貴的體質改造運動，得天獨厚給女生的，應該珍惜。同樣的道理，人工受孕失敗之後也應該重視，給予休息復舊的調理，和手術時間的間隔，尤其像打排卵針。不肥的豬是榨不出油的，所以中西醫理論和治療上，其實有很多地方是可以相輔相成的，中醫也應有功成不必在我的胸襟。因為各地民情風俗不一樣，所以坐月子的方式也就大大的不同，尤其台灣是

五湖四海各省方式都有，筆者僅就所學習到的，和嘉義海邊地方的習慣用法

，記錄如下：※坐月子的藥膳

坐月子的重要性已經在生化湯文章中說明清楚，這裡是接下去的一些步驟

，因為地域的不同，而有不同的坐月子的方法，這裡是提供筆者心目中的好

方法。第一階段，生產之後，惡露排淨之前，約七天至十天。

每天一劑生化湯。

藥材：只能用到黑杜仲粉。

食材：可以用豬腰子，土雞，哈士蟆，紅蟳，血蛤，鱸魚。【滴雞湯】

滴雞湯這是傳統的好方法，已經很少人會用了，筆者訪問我的岳母，記錄如下：

土雞一隻，最好是放山雞，把雞隻洗淨，去內臟，不可剖開，只留屁股附近一個洞，再以剁骨的刀子，拍碎全身骨骼，讓其中骨髓可以熬出。

用老式大同電鍋，一般電子鍋沒有外鍋不能用，外鍋加水，內鍋放入一個大碗公，雞屁股的洞朝下，讓熬出的雞汁可以流到碗底。

得到的雞汁，上面有一層浮油，可以舀出煮菜，這樣就是純純的雞汁。

一般中午之後滴雞湯，晚上就可以喝，隔天才可以吃雞肉。 【哈士蟆】

哈士蟆是中國林蛙的輸卵管，蛙類只有輸卵管，沒有卵巢，此藥材含有多量的激素，以中藥而言，血肉有情的藥材，屬於甘平的不多，大部分都偏溫燥，所以不適用於產後的填補，對於突然失去的氣血，和內分泌系統的重建，哈士蟆的功效恰好都有針對性，所以此藥在溫州名醫沙驥夫先生家中使用，

而今再傳於筆者，筆者經用後卓有成效。

使用方法：

哈士蟆二錢，溫開水三碗浸泡三小時，加冰糖一錢，用大同電鍋燉煮六小時

，半空腹服，每天兩次，惡露乾淨後，可以加入高麗參二錢。

哈士蟆二錢泡開之後，可以膨脹到一大碗，如果是膺品，膨脹比例只有一倍而已，此藥等級甚多，以大且油潤沒有雜質黑點為上，黑點可能是卵，不堪用，此藥曾有廠家作成健康食品，名為雪蛤。第二階段：惡露乾淨後三十天。

這一階段可以使用人參，筆者是用二十良的高麗參，例如滴雞湯可以在碗公內，放入五錢高麗參。

豬心燉高麗參。

豬腰子炒麻油，開刀者麻油的量不可太多，只能作為提味的。

麻油雞。

可以用八珍湯加味燉食物，食物可以如下，輪流煮來吃，如土雞，土龍，

鰻魚。

八珍湯加味：當歸二錢 川芎二錢 白芍三錢 熟地二錢 黃耆三錢 淮山三錢 茯苓三錢 黨參三錢 枸杞三錢 黑棗六錢 桂枝三錢 桂枝要用布包

腰酸痛者加杜仲三錢 川斷三錢 ※產後口渴

民間用的是荔枝殼，常常產後就上藥房買一斤，分數次熬湯喝，效果絕佳。

但是筆者以為生產過程本來就會消耗體力，流出大量的汗，導致口渴，只要補充含電解質的水分，就可以了，不必再多吃藥。※產後禁止飲水

有不少讀者來信詢問，筆者翻閱所有的中西婦科書籍約四十本，都沒有提到禁止飲水的說法，筆者推敲，禁水如果是為了能夠馬上達到產後減肥瘦身，那麼大可不必，產後的目的是體質調整，這是真的終身大事，不可以輕率，必須嚴陣以待，而禁水是否有害，筆者不得而知。※產後減肥

懷孕期間所增加的體重，有一部份是脂肪，一部份是水份。水份因為水液代謝不正常，才導致的水份累積在體內，一般水分的代謝是經由肺脾腎三個臟腑的綜合運作，而妊娠肥胖是為了養胎，也有一部份是因為胎氣阻礙，使代謝受阻，產後胎氣的原因消失之後，加上產後調理恢復得當，體內五臟六腑運行順暢，產後一個月後，只要進食維持體能消耗的熱量，加上一定的運動，身材的恢復，半年內是絕對可以達到的，如果哺喂母乳效果會更快。※產後注意事項

第一：不可以悲傷哭泣。

第二：一週之後才可以洗頭髮，期間可以用乾式噴霧狀的洗髮用品，清潔頭髮。

第三：十天後再洗澡，期間可以擦澡。

第四：坐月子期間可以輕鬆走動，不可以激烈運動想要減肥。

第五：藥膳調理各地不一，但是補過頭了，會有口渴，臉熱，失眠的現象，就要停止。

◆青春痛經的養護與藥膳

青春痛經是少女成長過程的夢魘，週期性的少腹疼痛絞痛，伴隨噁心嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈、四肢乏力、甚至冷汗淋漓、四肢逆冷、暈厥虛脫。幸而如此的原發性痛經，都會在婚後或第一次足月生產之後有顯著的好轉。繼發性痛經是器質性病變所引起，如子宮內膜異位、盆腔炎、子宮肌瘤等等。青春痛經，多屬原發無器質性病變的功能性痛經，體質上有陽虛寒凝的不通而痛，也有瘦弱的血少導致的滯而不通。所以在生活作息上須多注意，例如秋冬之際與月經來潮時均需忌食冰冷和刺激性飲食，夏天則注意經期少腹的保暖，加上適度的運動也是可以積極促進血行，精神的放鬆也有助於氣滯的流暢。元代《格致餘論》提出簡易辨別分法「將行而痛者，氣之滯也。來后做痛者，氣血俱虛也」，一般痛時喜按少腹者，屬虛，拒按屬實。豬肚胡椒湯材料：豬肚一個 胡椒八錢

做法：豬肚一個，洗淨，入胡椒八錢，裝入肚內，燉爛食。

功效：溫養虛弱體質的痛經。生薑紅糖湯材料：生薑五錢 紅糖五錢

做法：生薑紅糖五碗水煎成二碗，頻頻服用。

功效：痛經時，喜溫喜按，臨時取用，可以止痛，白糖也可。.

◆慢性盆腔炎的房事疼痛

姓名：

年紀： 22

身高：159

體重：44

工作行業：

所在地：

發病時間：每次性行為後

症狀：左右下腹痛,腹部脹氣,痛時食慾不佳.有時嚴重時會發燒.噁心(看西醫說是慢性骨盆腔或卵巢發炎,但治好後,一有性行為又會痛,非常困擾)

曾經接受的治療過程:抗生素 消炎藥.陰道塞劑--

現在服用的藥物：同上,有時會服用加味四物湯(中藥店抓的),有時會改善

以往病史：月經來時腹痛劇烈,有服用四物湯時則較改善,從發育時就有輕微白帶現象因為一有性行為則會發炎,非常困擾,也因此心理壓力很大.對未來婚姻也

有所恐懼,而且斷斷續續看西醫也有一年多的時間,但並沒太大的改善,所

以希望能問問中醫方面,看看是否有改善的方法或藥方,急需您的診斷與意

見,謝謝!!您好依來信描述，應該與慢性盆腔炎的診斷相去不遠。

或是因為急性期抗生素的應用不足、或是因為體能不足導致恢復力欠缺，

這些都是演變呈現在炎症的慢性化。

中醫治療此類的炎症疾患，不只是如抗生素般的清熱解毒，還須攻補兼施

，所以偶爾的四物湯也可生效。您的問題不只是需要清熱解毒，尚須扶正

以驅邪，可能還有器質性的炎症包塊產生，所以性行為時牽動包塊產生疼

痛，而要用到活血化瘀、理氣止痛。

這一系列的治療模式並非一成不變，需要更多的資料證據，所以無法提供

一個簡便的方法，只能建議積極求醫。

◆更年期的養護藥膳

月經紊亂、顏面潮紅、烘熱盜汗、煩躁易怒、焦慮憂鬱、頭昏耳鳴、心悸失眠、腰酸腿軟、倦感乏力、陰道或尿道上皮細胞萎縮而乾澀，這是更年期的常見症狀，可是為什麼有的婦女一點症狀都沒有呢。中醫認為[年四十而陰氣自半]，是說明人體基礎物質的陰液，會隨著年紀增加而減少。而卵巢功能的逐漸退化，是因為[七七任脈虛、太衝脈衰少、天癸竭、地道不通、故形壞而無子也]。七七四十九是一個人生轉換的分界點，稱之為更年期。輕重不一的更年期症候群，是因為陰陽比例的失衡，導致臟腑氣血的不相協調。典型的證候是陰虛肝旺，腎水不足無法涵養肝木，肝陽上亢而致病。腎水不足的腎陰虛潛伏遠因，是育齡期體能的過度消耗，如多產、多育、房事勞損、月經過多、數脫於血，或是罹患消耗性疾病如甲狀腺機能亢進、糖尿病等等，所以有如此者當注意。西醫又有[準更年期]的說法，證實其荷爾蒙水平皆正常，但是存在於女性生殖器官、心臟、血管、骨骼、腦部的動情激素接受器卻早已喪失功能，所以有必要在未出現症狀之前，就做積極的準備。中醫溫補派大家張景岳先生指出：善補陰者，必於陽中求陰，則陰得陽升，而泉源不竭。西醫也證實男性荷爾蒙有助於更年期婦女性慾的改善，雄激素幫助雌激素來促進陰道黏液的分泌，以及增進陰道、大陰唇的敏感度。所以更年期的消極養護在於滋陰潛陽的症狀消除，更積極的是於陰中求陽，使得陰平陽秘精神乃治。藥膳---滋陰潛陽湯

藥材：杭菊二錢 枸杞子三錢 熟地二錢 淮山三錢

做法：以上藥材以三碗水慢火熬成一碗，用此藥汁燉煮魚湯，任何魚類皆

可。長期服食。

對象：有更年期症狀者。藥膳---平調陰陽湯

藥材：菟絲子二錢 枸杞子三錢 熟地二錢 淮山三錢

做法：以上藥材以水三碗慢火熬成一碗，用此藥汁燉煮魚湯，任何魚類皆

可。長期服食。

對象：無更年期症狀但有潛在遠因者。

◆婦女養生至寶-雪蛤藥膳

中國林蛙生長於東北高山之中，經歷霜雪所以又稱為雪蛤。哈士蟆是中國林蛙的輸卵管，蛙類只有輸卵管，沒有卵巢，所以藥名稱為哈蟆油，此藥材特殊之處在於含有大量的荷爾蒙。以中藥而言，滋補藥材需要是動物性種類，才能有效的轉化為人體的一部份，所以稱之為血肉有情之品。因為養生為目的的補養，需要是長期緩慢的逐漸吸收，才能慢慢轉化成功，所以藥性的選擇就不宜過於強烈，甘平的最好，但是藥力又不能太過薄弱如燕窩、冬蟲夏草。哈士蟆屬於甘平藥力又夠強大，至於其他有名的大都偏於溫燥，如鹿茸、鹿鞭等等，溫性藥物可用於一時功能的提振，不適用於長期的吸收轉化。雪蛤含有適宜女性的多種荷爾蒙，是平和的強壯藥物，如有特殊問題可以雪蛤為主，加些引導性藥材，如功效良好的雪蛤強心湯。哈士蟆二錢泡開之後，可以膨脹到一大碗，如果是膺品，膨脹比例只有一倍而已，此藥等級甚多，以大且油潤沒有雜質黑點為上，黑點可能是卵，不堪用，此藥曾有廠家作成健康食品，名為雪蛤。此藥也是有名的甜點冰品，在宴客席上見過，只是餐廳使用的等級甚差，差價約20倍。藥膳---冰糖蓮子雪蛤湯使用方法：哈士蟆二錢，溫開水三碗浸泡三小時，加冰糖一錢蓮子三錢

用電鍋燉煮六小時。

適應症：此方平和，適用於更年期與育齡婦女，無特殊兼加症狀的冬季普遍性保養。

使用時機：從秋冬天氣轉涼到初春轉熱，每日兩次，早晚餐前空腹服。藥膳---雪蛤益心湯使用方法：哈士蟆二錢，溫開水三碗浸泡三小時，加龍眼乾三錢

枸杞子二錢 電鍋燉煮六小時。

適應症：更年期婦女的心悸與自律神經失調。

使用時機：從秋冬天氣轉涼到初春轉熱，每日兩次，早晚餐前空腹服。

◆懷孕能否吃四物湯

您好:我現已懷孕三個月,因常害喜,血壓低,亦有貧血,是故,婆婆認為可以四物湯來補身,但我現在常覺得舌頭發黃,火氣亦較大,偶爾排便亦呈現黑色

自己認為應該不要亂吃這些補品才是,不知道吃四物對於懷孕的人來說,究竟適不適合?而我身體所呈現的狀況亦是屬於懷孕的,人應有的正常現象嗎?麻煩您告訴我正確的方法,謝謝!您好:一般中藥房所抓的四物湯都是加味的,妳可以算一下不只四味,所以非常補

,即使是單純四物湯以孕婦來說當歸川芎會導致胎動喔因為活血力量太強,即要使用的話,當歸也要炒過,川芎要減量

用藥絕對不可以用到口乾舌燥,不然會妊娠高血壓妳的體質會改變的,如果懷孕期間不要感冒又吃得下的話,體質自己會改善的

因為妊娠會發動不一樣的內分泌,不用害怕體質虛,害喜的不舒服在我網站內的婦科妊娠不適有提到解決方法希望以上有用,如有問題歡迎再來信懷孕很重要ㄟ恭喜也保重自己

◆藥物豐胸可能性的探討

很冒昧打擾您我想請問您一件事,就是

現在坊間在賣的 XX 通乳丸大奶寶或是其他豐胸藥品(中藥),是任何人都可以服用的嗎?吃了會不會有副作用呀!?(例如長痘痘.....)效果如何呢?有人建議我去使用那些廣告藥品,但我害怕用了會有副作用,所以才會想打這封信詢問您,希望您給我一點意見,謝謝!您好先簡略回答好嗎,我有篇文章在網站請查閱,坊間通乳丸都不可以用,詳情容後再稟,閱後再來信陳俊哲敬上
陳醫師您好:您發表的那篇"乳房發育"我已經看過了.....我一直覺得我是因為青春期缺乏妥善調理照顧.導致現在發育不良.因為媽媽和妹妹都有傲人的身材.這就不可能是遺傳的問題導致了!因為以前生過重病.服用一段日子的西藥.導致體質變差.常常容易生病扁桃腺發炎...又火氣大.常容易長痘痘....鼻子過敏現象也從青春期開始就沒斷過根.....您發表的文章中.很多藥材是屬於補藥.對我來說.吃了不是很容易上火嗎?我一直就很想利用中藥來調養自己的身體.可是覺得自己的身體那麼糟了.還會有救嗎?現在還有辦法彌補以前的缺憾嗎? 廣告還很誇張的說:可以讓你重新回復到青春期容易吸收脂肪的體質(指胸部)...對呀!胸部絕大部份是由脂肪堆積而成的.不是嗎?那再讓那裡累積脂肪有那麼困難嗎?現在有很多藝人服用雌激素.刺激乳腺發育.胸部進而升級...聽說那和市面上在賣的中藥通乳丸有異曲同工之妙...吃了是會成長.不過一段時間又會消下去了.真得是如此嗎?而且我又已經26歲了.會不會來不及了? 謝謝~您好:希望您以身體健康為前提去尋求治療,或許身體健康之後,還有胸部在發育的機會,因為在成熟期還有一次機會,所以再次發育絕非不可能的事市售通乳丸,純粹事針對產後哺乳過程的乳腺發炎,所以全部都是消炎藥,對於豐胸的目的更是有害處,其他含女性激素成份的外用藥膏,只能暫時讓胸部不下垂,並無增大功能因為您的體質特殊,所以沒有簡便方法,一定要有中醫師針對性的處方治療

所以我可以給妳肯定的信心,卻無法給予治療建議, 很抱歉

◆我的濕氣很重嗎

陳醫師您好: 本人目前正服用中藥調理身體, 但身體常會有一些不同的反應, 好像是因為吃中藥後有很飲食上的禁忌, 而我疏忽了, 最近幾天我的左手肘關節及左腳跟很酸痛, 我跟醫師反應, 她說跟她的藥沒有關係, 醫師說我的身體濕氣很重, 氣很虛, 循環很差所反應出來的, 她說是我飲食生活的問題, 但她並沒有告訴我該注意那些事, 我為此感到很困擾, 到底我該如何在平日的飲食和生活起居上保養我的身體呢??我目前服的藥功效在化子宮肌瘤可能還有調理血路的吧! 我不知道~ 至於我的身體濕氣很重, 氣很虛, 循環很差到底該如何在平常的時候 保養身體, 這是我今天想要向您請教的地方!!我看到您一篇關於龍眼肉的介紹, 依我目前的狀況適合服用嗎??

『內有痰火, 及濕滯停飲者忌服。』這是什麼意思呢???盼陳醫師能夠回覆我的問題, 謝謝您!!!! 您好因為沒有填寫我製作ㄉ表格, 所以條理不是清楚, 如果可以的話請補填吧

依來信所述,關節酸痛應該與服藥無關,也不是生活飲食沒有注意所致,應該尋求病因來解決問題,而該中醫所言是勿推托之詞關節酸痛應屬暫時性的問題,所以可以合併於主要治療處方裡面,中醫所謂溼氣重,乃是消化代謝中的水分容易滯留,而代謝差就會影響正常的吸收,而出現一些氣虛症狀,所以這是有連動的,詳情可參考我網站內的中醫脾胃論關於保養方面可以在參考胃潰瘍的飲食注意,規律而正常的飲食就可以了,

其他藥物就應該遵照醫師處方,不必再自行找藥吃如果可以請填表過來吧

◆性交疼痛與受孕困難

醫師您好:我做過人工流產,但想再懷孕,目前我月經是蠻正常的,但我有性交疼痛的問題,因此做愛次數很少,所以二年來,無懷孕(1) 中醫師說我子宮壁受精卵難著床,我還有救嗎?(2)另有中醫說我肝陰血熱,說若懷孕會生出過動兒,小孩子會臭頭,流目油不止是真的嗎? 基本資料【請複製至郵件內文依序填寫】【一週內必回】姓名: 已婚

年紀: 女

身高: 160

體重: 48

工作行業: 無

所在地:

發病時間:

症狀:

曾經接受的治療過程: 無

現在服用的藥物: 感冒藥

以往病史: 尋麻疹 ,躁鬱症

飲水多寡和頻率: 多,隨時喝

吃飯多寡與變化以及伴隨症狀：正常

睡覺時間與做夢情形：淺睡,偶有惡夢

大便的頻率和通暢與否：二天一次

小便頻率多寡顏色和夜尿次數：白天多尿,夜尿少,黃色

女性讀者的月經週期天數頻率變化：28天

月經經量的多寡：

經期的伴隨症狀：痛

有沒有訂閱電子報:

對我的網站或電子報的建議:僅儘速指點您好因為無姓名不過因為來信甚為關切,所以仍然勉力回答【子宮壁受精卵難著床】這是無賴的診斷,無確實證據的胡言亂語【肝陰血熱,說若懷孕會生出過動兒,小孩子會臭頭,流目油不止是真的 嗎? 】這是胡亂指控,不必聽也罷多找一些好醫生吧,不管是中醫還是西醫,應該找出性交疼痛的原因,才是正確治療之道,性交疼痛一般是導致於盆腔內附件沾黏或是子宮頸是否有問題

,這在西醫來說是可以正確診斷勿

◆生男生的祕方

您好：請問醫師．我爸爸媽媽一共生了四個女兒一個兒子

我妹妹結婚後生了二個女兒我也生了二個女兒

前陣子在網站上看到一帖江西唐氏保證生男的藥方是：黃岐 2分 黨參 2分 沉香 2分 天竺 2分 芍藥 2分 粉草 2分 胡桃 2分 川芎 2分 枳寔 2分 枳殼 2分 以上十味研細末用開水沖服一次請問真的嗎？此藥方有害嗎？男用還是女用？真的有生男藥方嗎？

煩請解疑,謝謝您好:關於生男生女的祕方，多數無效，很抱歉，無法提供好方法。因為即使有些思考方向，考慮到試驗失敗的後果，那也只能隱忍不談了。

這個方子以我們來看，是有一定的偏溫，所以也不是可以長期吃而無副作用的。

◆白帶

新鮮馬齒莧三兩或是乾品一兩，加水一鍋，滾後再煮五分鐘，濾出藥汁，加入乾淨面盆，再加水調到適當溫度。下半身浸泡水中五分鐘，每日一次。連續20天。經期停用。

如果20天後還沒好，請再來信諮商。

◆惡阻(妊娠惡阻)

若是嚴重惡阻者，非但藥入即吐，甚至入廚房，開

冰箱，就頻頻欲嘔，如此長期厭食，形體消瘦，臥

床不起，可用藥物蒸汽法。 鮮芫荽【香菜】 一把 鮮紫蘇 一錢

鮮藿香【左手香】一錢 陳皮 二錢 砂仁 二錢 裝入茶壺，加水滾開，以壺口蒸汽對鼻孔吸入，如

此可以寬胸定逆，悅脾醒胃，再略進食物，即可慢

慢恢復。

◆痛經

內服方一生薑紅糖五錢

焦山楂四錢

水煎服出處:中醫婦科外敷方二香附十兩

白芷五錢

紅花三錢

黑醋五兩拌勻炒熱布包，敷痛處二十分鐘後，再炒熱外敷。

有痛經史者，於行經前一日外敷。

◆有求子祕方嗎？

問一：

您好我在您的站上找了好一會，發現好像沒有關於不孕的文章耶，因為我有很多朋友都有這樣的問題，但是都被西醫們搞的痛苦不堪，能不能幫一下他們，謝謝功德無量。答一：我只寫過多囊性卵巢囊腫，因為不孕症範圍很廣，所以如果你能寫清楚一點，我會比較方便回答，例如參考我網站的詢問必答檔。問二：我知道原因很多!!因為以西醫也是這樣!!不過是不是可以有一些比較廣泛的藥方呢？不是常常有那種所謂"生子祕方"嗎?!!因為不知道現在的人因為壓力大而引起的不孕要怎樣治療呢?!!答二：精神壓力大會引起不孕嗎？答案是否定的。只能是一個附屬條件，而不是主要條件，而且壓力每個人都有，為什麼就單單某些人會發病。而且一般而言與精神壓力有關的問題，都是身體體質先轉壞，才會導致生理無法承擔心理壓力。如果體能狀態正常的，在精神狀態通常也是正常的，除非單一壓力是非常巨大的，巨大到身心暫時無法承擔而總體性的潰退，不過這樣的發病結果，是會出現精神科範疇的疾病，而不是內科或是婦科的問題，所以精神壓力會導致不孕的理由，是應該持保留看法的。再說中醫對不孕症的治療，隨著西醫知識的累積，使中醫獲得更大的作戰陣地和火線，所以擁有西醫知識的中醫，其治療有效率硬是高於前輩，這是不爭的事實。所以中醫在治療男性不育、女性不孕方面，是要求完全而詳細的檢查報告，即使是梅毒血清檢查也不放過，而治療的針

對性更是細膩又複雜，所以詢問廣泛的祕方，我們只能說一句話，有這個可能嗎？所以治療不孕症，首先如果能排除一方的問題，事情就減少一半了，尤其是在台灣，男方不肯接受檢查的比例很高，顏面自尊竟大於撫育子女的期望，真是奇怪。況且男性只要產生優良的精子就可以了，構造也比較簡單，所以診治比較容易成功，比率也就高出很多。而女性方面，除了結構複雜之外，還需負擔孕育胚胎的責任，所以任何一個環節出問題，就會導致妊娠的失敗，所以不止西醫要詳查原因，中醫也是同樣重視。而且中醫經過西醫的洗禮之後，也相對應的在每一個環節問題上尋求解決之道，這是進步負責的態度，所以中醫早已不是粗糙地尋求祕方來通治所有人的一個病，況尤其不孕症只是一個症狀而已，其中包括的疾病種類是超出一般民眾所能想像的，所以我的師母在講授中醫婦科不孕症的時候，幾乎是在總結之前所以教導的所有婦科範疇，以及反芻實習臨床所遇見的所有婦科疾病，所以也就沒有廣譜的求子妙方。

◆孕婦須避開神農淡煙

菸酒公賣局的豐原廠，推出【神農100淡煙】外包裝名稱是

【Sinox 100】，首先宣稱是全球首見的中藥配方香煙，

不過筆者在大陸的中醫藥雜誌上看過有藥廠研發出藥煙介紹，所以

此說不對，只能說是菸廠第一個開發含中藥配方的香煙。藥廠開發藥煙是有治療目的，而不是像菸廠開發出來的是以煙草為

主成份。大陸開發此藥煙過程是一波三折，因為此劑型是以往所沒

有，加上跟菸廠利益衝突，所以限制頗多。大陸香煙也是政府公賣

，不過是以省為單位，每一個省之間香煙的流通須課以高額關稅，

以保護省產煙農和菸廠，所以省之間有香煙走私，因為藥品無此限

制可以全國流通，而且怕被誤用，所以就備受關注。神農100淡煙加上中藥配方，如貝母、陳皮、枇杷葉、丹參，前

三味藥是常用的止咳化痰藥，除了陳皮有揮發油的香味之外，貝母

可以說是味道極苦，所以配方組成為掩飾香煙副作用的目的極為明

顯，藉由香煙配方功能的掩護，達到自我安慰的目的，所以何不加上何首烏、冬蟲夏草、靈芝等等熱門中藥，宣稱可以延年益壽、增加免疫力、烏髮潤膚、壯陽補身，這樣把國粹發揚光大，又可以大大的賺錢。丹參這味藥號稱功同四物，並非一味藥可以抵上一包四物湯，反而是有相反作用的。四物湯是溫性藥物組成，可是在熱性病時需要涼藥來活血時，丹參就能取代四物派上場了，所以是藥性相反的功同四物，不是在四物湯的適應症裡可以用丹參取代。丹參有很好的活血化淤功能，雖然在排行榜上不是很前面，可是在使用量上可是超過他藥的，因為在藥性功用上是確實而有效的，也有詳盡的藥理實驗報告，在此不贅述。神農淡煙因為是吸入性的，所以應該也會有藥物的全身作用，筆者以為須以藥廠製藥為標準，來作人體實驗和藥理病理實驗。如果以上次某教授服用六味丸導致吐血，而幾位肝病和藥理專家就直言是丹皮有抗凝血作用所致，以此標準的話，丹參活血作用百倍於丹皮，如果有人抽此煙時剛好宿疾發作，例如痔瘡出血、胃出血、月經血崩、妊娠出血，是否都可以總歸戶於此，而向國家求取賠償呢？尤其莫名其妙的胎動不安所導致的流產，流產原因通常都是說不出所以然的，中醫對孕婦絕對是禁止使用，即使是藥性比較緩和的活血藥，又如果孕婦吸到二手煙的話，那又該怎麼辦。神農氏在中醫認知裡，應該是對藥物有豐富經驗的氏族，他們總結經驗寫下來，就成為中醫經典《神農本草經》。有豐富醫藥經驗者應該特別注重養生護生，而香煙對健康的危害是確定的，現在官方冒名的作為，實在是有愧於神農。

◆孕婦與雪蓮、淮山、黃體素

問一：

想請教一下雪蓮孕婦不能食用，那山藥可否食用，大部份的人認為好的東西就可以食用，因此比較不會考慮到孕婦可否食用，若不適用會對胎兒有什麼影響嗎？另可服用珍珠粉美白嗎？中醫師介紹吃膠囊裝的胎盤素請問有何益處嗎？感謝你撥空回答本人的疑問,謝謝!答一：

孕婦不可以服用雪蓮，懷山藥可以，雪蓮山藥已有專文介紹，妊娠服用珍珠粉沒有用，如果想要嬰兒皮膚好也已經有專文介紹，胎盤素不可服用。慎之慎之。妊娠期有一定的規範已有專文請查閱，您實在太懶了，怎麼不先看一下我的網站。問二：

對不起，今天第一次才上你的網站，但看過裡面的介紹並未提到此項，所以就直接寫 mail 給你，下次我會仔細看過再詢問你，在此仍感謝你的回信。

另有一點不太清楚，我所說的胎盤素就是你文中所提到的活血化淤藥嗎？若已服用會對胎兒有什麼影響嗎？甚至已出生的孩童埋下危險基因嗎？答二：

一般活血化淤藥出現副作用在台灣很少見，最多的是自行打胎不成的，或是醫師誤判妊娠為閉經，例如紅花桃仁或是大量的當歸，這些都是活血通經藥。一般活血化淤藥對胚胎分化有影響，如先天性心臟病或是流產。胎盤素如果是中藥的紫河車，那是補腎藥不是活血藥，如果懷孕時吃過的話可能沒關係，只是如果男胎的話，怕會比較娘娘腔而已，女性荷爾蒙較多一些，就好像例如西醫安胎針的黃體素也一樣。有的胎盤素是採自牛羊胎盤，唯恐感染狂牛症賈庫症，所以小心為妙。

◆青春期初經的保養

姓名：

年紀： 13歲

身高：159公分

體重：42公斤

工作行業：學生

所在地：南非

以往病史：無

吃飯多寡與變化以及伴隨症狀：中午下課較沒胃口，早、晚餐胃口尚可

睡覺時間與做夢情形：晚十時就寢，很少做夢

大便的頻率和通暢與否：每日一至二次且通暢

小便頻率多寡顏色和夜尿次數：正常，很少夜尿

女性讀者的月經週期天數頻率變化：28-30天〈目前是第三次來〉

月經經量的多寡：少量

經期的伴隨症狀：無目前正是初經階段，能否告知一些保養方法，食補或藥補方式，手上有

白鳳丸、四物湯、中將湯等中藥，但不知是否適合這年齡服用？本人因

久居國外，獲得資訊不易，懇請回覆是盼。回答：您好青春期的保養，通常就是注意不可以刻意降低飲食的質量，和養成適當規律的睡眠和運動。來信提到的藥物白鳳丸不是很適宜。中將湯是有劇烈痛經才管事，沒有相對應症狀，反而是藥過病所，會過度鼓動氣血而耗損氣血。四物湯可以使用，在月經結束之後才使用四天或五天，這樣效果最好，也不會干擾太多，不過要真的是四物湯，數數仿單是真的是四個藥物組成。

◆嬰兒對母乳中藥物吸收的問題

你好

我住在香港，今年三十四歲，懷孕到了廿六周，關於餵母乳適合否，想請

教一下。

本人的情況如下：

1. 體質虛寒，計劃生育後要待一年多才能受孕。
2. 血型是 O，Rh 是負值(-)，而大部分人是正值(+)，若胎兒是正的話，會有抗體產生，對嬰兒和母體有損。醫院安排卅周注射預防抗體，並於產後立即再注射一次。醫生說注射對嬰兒及母親無礙。問題如下：

1. 以上的情況下，餵母乳還是奶粉對嬰兒比較好？還是一并餵用？
2. 如果餵母乳比較好，產後服用參茸，人奶對嬰兒會否太燥？
3. 產後進補，母親的吸收，會否因餵母乳而受影響，則是給嬰兒吸收去了？

謝謝你！您好產後以中藥調養身體，通常使用的都是溫和的藥物，所以經由嬰兒經由母乳吸收到的中藥成份，並不會早成嬰兒的負擔。

來信提及人參和鹿茸，人參可以使用於產後進補，只是鹿茸太過溫燥，請多考慮。

胎兒會經由母乳吸收，所以建議使用平和的補藥，並且建議不要添加過多的酒。

其他的相關坐月子事宜，請參閱我的網站。

◆痛經食療方

＜陳修園 醫學從眾錄 卷八＞豬肚胡椒湯：治婦人經寒，往來時有痛。豬肚一個，洗淨，入胡椒八錢，裝入肚內，燉爛食。＜中醫婦科 朱承漢＞治療痛經簡便方：生薑紅糖各五錢 焦山楂四錢 水煎服以我的看法，痛經偏寒者多見，只是程度上的差異，其他淤血造成的

，或是發炎引起的，當各有其他相關病史和主症，所以普通在用這兩

個食療方是可以的。第一個方子是用在平時，養兵千日抵抗於一時。第二個方子是疼痛來

臨時阻擋一下，如果不是那麼痛，用一下自己的小方法會有收穫的，

如果沒有山楂也沒關係，老薑或是冰糖也可以，因為問題不大才，這

樣用簡單的方法嘛。我們男生學婦科最奇怪了，不過以前婦科名老中醫又大多是男性，在

大陸曾經限制只能女生學婦科，不知過多久才又開放限制的。有在台灣念中醫的朋友說，看婦科最簡單了，只要把痛經看好就可以

。他這樣說好像把痛經講的很簡單，其實痛經只是一個表象，實際如

果碰過棘手的，那是既複雜又困難。師母沙冰主任常說，婦科病好像一張在手背上的紙，輕飄飄的，可以

易如反掌的拿到，也會一陣輕風把她吹走。師母在省中醫院婦科門診，有一個下午不對其他成人開放，是配合中

小學生沒有上課的時段，那一個下午全部都是小女生的內分泌還不健

全的功能性子宮出血，這是影響一輩子的大事，每個人都是厚厚的一

疊病歷，師母艱辛的呵護這些剛綻放的蓓蕾，小女生臉皮薄，那時候

我是不跟診的。有一些糊塗講不清楚的病人，師母會叫他們把每一次經期的所有月經

用紙都帶來，當時南昌都沒有衛生棉，都是衛生紙，一天一包，裝成

一大包，在門診攤開檢視，真是氣勢驚人。也佩服師母追根究底的精

神，有時候病人不聽醫囑，師母當場說起病人，越說越快，當變成溫

州口音時，就知道生氣了。有些小女生愛吃冰，師母要她們先寫切結書，畫押簽名，保證怎

樣的。師母付出所有精神在病人身上，在醫院裡面。難怪在南昌碰到

的女性同志，不知道沙主任的還真少。

◆有中醫要我小心血崩

請問一下哦..就是最近天氣愈來愈冷了..而我本身的體質蠻容易中獎

<感冒>不知道有什麼方法可以讓我的身子暖和一點，最近每天晚上

睡前，我都會泡腳和手，不過再天氣真的很冷的時候，女孩子若 MC

來的話，很容易會痛，不知有什麼辦法可以讓自己的身體好一點還有

．之前在花蓮讀書時，去看了一位中醫師．那時我問他，為什麼我容

易被蚊子叮他沒回答我，把把我的脈只說我血熱，如果說我血熱的話

，那照理說我天氣冷時，應該不用擔心說四肢冰冷的，最後呀．那位

醫生竟然還說，要我小心血崩，我聽了到現在還怕怕的．他講得好恐

怖哦.... 回答：有的中醫師確實喜歡當算命的來預測事情，雖然高明的中醫是可以預

測疾病轉歸和病人體質歸屬，但是像血崩這種要天時、地利、人和等

等各種機緣加在一起，才有可能出現的事情，怎麼可以隨便說呢。如

果這種事都說得準，那麼六合彩的明牌預測就不是難事了，所以不要

把危言聳聽掛在心上。可能這位中醫師連血崩是什麼原因造成的、或

是常見的情形是什麼，都不知道，就敢莫名其妙地預測年輕女孩子以

後會有血崩，真是哈哈，我的牙齒哪裡去了。如果不放心可以在找一位中醫師把脈，不過傳統上台灣的中醫教育在

把脈上大多並不深研，可能也不管事的。體質的問題可以參考我的文章【冬日自製養生藥酒】，應該有幫助。再說月經疼痛大多數是胞宮虛寒，無力收縮，所以才會這樣，除非無

力收縮過久，經血在子宮內形成大的血塊，當通過狹窄的子宮頸就會

疼痛，但是這樣的疼痛，在血塊通過後疼痛就會消失，也有人竟然血

塊大到如子宮內樣大小，我們都稱之為紅豆餅大小，這種血塊最是痛

不欲生，簡直跟生小孩一樣，您的問題應該沒那麼嚴重，建議在月經

期沖泡玫瑰花，詳情見於中藥介紹的玫瑰花。

◆乳房發育

未婚

年紀: 16 女

身高: 170

體重: 48-50kg 醫師:

很抱歉，因為我並沒有甚麼病，只是想問問看，有沒有甚麼方法能夠讓胸部長大呢？很多人都說是體質的關係，無論你怎麼嘗試都沒有用，這是真的嗎？如今已是高中學生，大都很在意自己的身材，而本身真的是可謂太平公主，總覺得好像連 A 都沒有... 到現在也沒服用過有關這方面的藥，在看過朋友們失敗的例子，自己也沒有膽子去嘗試，請問..還有甚麼方法嗎？回答：妳沒有服用任何藥物是正確的，妳的問題中醫認為是跟沖任二脈與肝經的充盈程度有關，所以先注意一下月經週期經期、經量的正常與否，以及是否有併發症狀。然後再考慮到遺傳因素，母親在青春期的有無特殊變化，以及姐妹的發育情形，但是只能提供參考，不是絕對的。再來是檢查脾胃以及其他病史，脾胃的好壞關係吸收之後氣血的品質。還有生活習慣中的睡眠狀態，因為睡眠是最重要的養陰方法。所以您的問題可以說是一種排除療法，排除可能的問題，創造良好的環境。再針對性在月經週期的消耗和復舊裡，補充適量氣血，以供應充沛的氣血，以及保證良好的臟腑機能，不被月經的運轉有所消耗。建議在飲食習慣上增加體重，應該可以讓身材更勻稱，再來就是月經乾淨後燉煮八珍湯，以補充經期消耗的體能和促進內分泌的重建，雖不敢保證絕對可用，但卻是在合理範圍內的最好建議了。不過要在沒有任何不舒服的情形下，才可以服用，畢竟有問題就應該要找醫生了。八珍湯加味燉食物，食物可以如下，輪流煮來吃，如土雞腿，豬排骨。一天一餐連續三到六天，可以間隔一天吃一次，不用太緊張，畢竟是要慢慢累積的工作。八珍湯加味：當歸三錢 川穹二錢 白芍四錢 熟地二錢 黃耆三錢 黨參二錢 茯苓二錢 枸杞三錢 黑棗五粒 蓮子三錢您給我的及簡單資料裡，只有身高體重，所以只能大概知道，您有比較少的脂肪比例，所以上圍有所不足是可以預見的。市面上政府核准的通乳中藥，完全都是針對產後乳腺發炎所導致的乳腺阻塞，所以稱之為通乳丸也沒錯，只是消費者會錯意了，想看看我們的衛生署敢核准促進青春期乳腺發育的藥物嗎？如果真的核准了，不是滑天下之大稽，不然就是準備得諾貝爾獎，所以很多人把藥房裡的通乳丸每一種買了，可是都不敢服用。西醫研究乳房發育，雖然關係到內分泌，而且不只與單一的女性荷爾蒙有關，而是與多種女性荷爾蒙的協調性有相連動，所以無法製造出豐胸藥物，市面上外用的豐胸藥物，大多含多種女性荷爾蒙，雖然使用會有短暫的效果，可是容易導致內分泌的紊亂，或是分泌器官的疲乏不可不慎。就我所知道的高齡特種營業女性，她們有的會長期連續的施打女性賀爾蒙針劑，但也只能暫時抵抗地心引力和

保持不乾癟而已。所以就已知的豐胸祕方或是食療，筆者以為沒有學理上的根據和反覆實踐的證據，輕易推薦是有危險的，讀者來信詢問的情形是很著急的，不過還是小心謹慎的好。

◆讓咪咪升級的中藥飲食建議

【回答---乳房發育】未婚

年紀: 16 女

身高: 170

體重: 48-50kg 醫師:

很抱歉，因為我並沒有甚麼病，只是想問問看，有沒有甚麼方法能夠

讓胸部長大呢？很多人都說是體質的關係，無論你怎麼嘗試都沒有用

，這是真的嗎？如今已是高中學生，大都很在意自己的身材，而本身

真的是可謂太平公主，總覺得好像連 A 都沒有... 到現在也沒服用過

有關這方面的藥，在看過朋友們失敗的例子，自己也沒有膽子去嘗試

，請問..還有甚麼方法嗎？回答：妳沒有服用任何藥物是正確的，妳的問題中醫認為是跟沖任二脈與肝

經的充盈程度有關，所以先注意一下月經週期經期、經量的正常與否

，以及是否有併發症狀。然後再考慮到遺傳因素，母親在青春期的有

無特殊變化，以及姐妹的發育情形，但是只能提供參考，不是絕對的

。再來是檢查脾胃以及其他病史，脾胃的好壞關係吸收之後氣血的品質

。還有生活習慣中的睡眠狀態，因為睡眠是最重要的養陰方法。所以您的問題可以說是一種排除療法，排除可能的問題，創造良好的

環境。再針對性在月經週期的消耗和復舊裡，補充適量氣血，以供應充沛的

氣血，以及保證良好的臟腑機能，不被月經的運轉有所消耗。建議在飲食習慣上增加體重，應該可以讓身材更勻稱，再來就是月經

乾淨後燉煮八珍湯，以補充經期消耗的體能和促進內分泌的重建，雖

不敢保證絕對可用，但卻是在合理範圍內的最好建議了。不過要在沒

有任何不舒服的情形下，才可以服用，畢竟有問題就應該要找醫生了

。八珍湯加味燉食物，食物可以如下，輪流煮來吃，如土雞腿，豬排骨

。一天一餐連續三到六天，可以間隔一天吃一次，不用太緊張，畢竟

是要慢慢累積的工作。八珍湯加味：當歸三錢 川穹二錢 白芍四錢 熟地二錢 黃耆三錢

黨參二錢 茯苓二錢 枸杞三錢 黑棗五粒 蓮子三錢您給我的及簡單資料裡，只有身高體重，所以只能大概知道，您有比

較少的脂肪比例，所以上圍有所不足是可以預見的。市面上政府核准的通乳中藥，全部都是針對產後乳腺發炎所導致的乳

腺阻塞，所以稱之為通乳丸也沒錯，只是消費者會錯意了，想看看我

們的衛生署敢核准促進青春期乳腺發育的藥物嗎？如果真的核准了，

不是滑天下之大稽，不然就是準備得諾貝爾獎，所以很多人把藥房裡

的通乳丸每一種買了，可是都不敢服用。西醫研究乳房發育，雖然關係到內分泌，而且不只與單一的女性荷爾

蒙有關，而是與多種女性荷爾蒙的協調性有相連動，所以無法製造出

豐胸藥物，市面上外用的豐胸藥物，大多含多種女性荷爾蒙，雖然使

用會有短暫的效果，可是容易導致內分泌的紊亂，或是分泌器官的疲

乏不可不慎。就我所知道的高齡特種營業女性，她們有的會長期連續的施打女性賀

爾蒙針劑，但也只能暫時抵抗地心引力和保持不乾癟而已。所以就已知的豐胸祕方或是食療，筆者以為沒有學理上的根據和反覆

實踐的證據，輕易推薦是有危險的，讀者來信詢問的情形是很著急的

，不過還是小心謹慎的好。

◆氣喘又產後憂鬱症的調理

醫師您好～

欣見您的網站，對您精辟及誠心的見解很是佩服。

現有一事想請教醫師，希望您能撥空回信，感激不盡！

我目前已懷孕十週，小時候得過氣喘病，長大後未曾再犯只是每到季節變換及梅雨季節氣管即變的很是難過，出現的症狀是呼吸不順暢，舌頭發麻，兩眼無力，全身虛弱，此一過敏性氣喘病症已困擾我多年之久，有時感到很無奈聽人說，女人在做月子時是一改變體質之大好時機，又有人建議我泡藥酒在做月子時飲用，不知是否有此一說？

如果有效可否請醫師建議我該抓什麼藥方來泡藥酒，或者您知道有更好的方法，請不吝賜教，感激不盡！一個被過敏性氣管折磨中的人基本資料【請複製至郵件內文依序填寫】

姓名：

年紀：33歲

身高：164

體重：56

工作行業：電腦資訊工作

發病時間：天氣變換/氣候潮濕/直接吹風

症狀：呼吸不順/舌頭發麻/全身虛弱/二眼無力

曾經接受的治療過程：無

其他病史：前一胎有較嚴重之產後憂鬱症

飲水多寡和頻率：每天約1500cc

吃飯多寡與變化以及伴隨症狀：每餐一碗飯（肉與菜都吃）

睡覺時間與做夢情形：夜10:30入睡 晨6:30起床（少夢）

大便的頻率和通暢與否：二天一次（還算順暢）

小便頻率多寡顏色和夜尿次數：小便正常

女性讀者的月經週期頻率變化：31天（月經量5日）

月經經量的多寡：中等

經期的伴隨症狀：經痛/拉肚子/容易感冒答：第一胎出現產後憂鬱症，足見身體並不是很好，因為肝腎陰不足，在生產前後身體無法負荷，才導致心陰肝陰不足的精神狀態。所以現在首要之務，不在產後而在於產前，產前最注意感冒的預防，否則妊娠咳嗽必定非常難以脫身，保持快樂的心情最為重要，飲食均衡運動適量，如果感冒必定要趕快治好。確實產後調理得當可以減輕一些慢性病，有一例是吃冰就心悸而喘產後治癒，好像寫過這個例子。網站內還有一篇坐月子請參考，務必確實遵守，如果有與婆婆或是媽媽不同之處【上次】，務必再來信討論。產後藥酒因為你比較有針對性，所以無法於書信中寫明，而且冬季生產藥效可以好一點，製作藥酒可以服用整個產後的冬季和初春，季節的關係補得進去，不過還是要很針對性的，這一方面體質的重建很有幫助，好好把握。

◆產後感冒

※產後外感景岳全書：產後有外感發熱者，蓋臨盆之際多有露體用力，無暇他顧

，此時或遇寒邪則乘虛而入，感之最易，若見頭痛、身熱、憎寒發熱

、或腰背拘急，脈見緊數，即產後外感症也。一：風寒

症狀：發熱、惡寒、鼻塞、流清涕、頭痛及全身酸痛，舌質淡，苔薄

白，脈浮。

治則：活血去風、散寒解表為主。

處方：荊防四物湯

荊芥 防風 當歸 白芍 川芎 地黃 蘇葉二：風熱

症狀：發熱、頭痛及全身疼痛、咳嗽咽痛、口渴、舌質紅，苔白乾或微黃，脈象浮數。

治則：辛涼解表 疏清風熱。

處方：銀翹散

銀花 荊芥 牛蒡子 竹葉 薄荷 桔梗 豆豉 蘆根三：暑熱症狀：身熱多汗、口渴心煩、體倦少氣、舌紅少津、脈虛數。

治則：是為感染暑熱，氣津兩傷。治以清暑益氣、養陰生津。

處方：清暑益氣湯

洋參 石斛 麥冬 黃連 竹葉 荷梗 知母 甘草 粳米 西瓜翠衣注意：

產後病有虛有實，有寒有熱，應根據其特點，進行辯證施治。在用藥上也必須照顧到氣血，開鬱勿過於耗散，消食必兼扶脾，熱多不宜過用寒涼，寒多不宜過用辛燥。

如果產前正屬炎熱酷夏，加上飲冷傷胃，外濕引動內濕，暑熱傷津，就容易發病。感染暑熱平常不易辨別，產婦或家屬也無暑熱概念，如果見到體倦氣弱而頻頻進補，將是一大災難，不可不慎。

一般治療必須辯證論治，提供以上治療方法，只是提示大概方向。因

為病人體微不一，兼加症狀也不一樣，不可按表操課貽誤病機。※產後外感頭痛單養賢曰：產後頭痛、身熱、惡寒，雖是感冒風寒，只宜服生化湯一

二服，慎不可用柴胡、麻黃等藥，以表虛其汗，劑中川芎、乾薑其味辛溫，亦能散邪退熱，如頭痛不解，加連鬚蔥白三枚。

按：頭痛有三陰三陽之分，屬風寒外感者居多，若產後頭痛，雖有風寒，而本之血虛者，其病源也。。惟大劑芎、歸養血，血行則風自滅，若立齋以補中湯倍川芎，此是治氣虛頭痛為宜。注意：如果產後不久的外感，須注意惡露是否減少，因為會導致宿血留滯。也須考慮感染導致的發熱，不只是感冒而已。如果醫院空調過冷會消耗產婦體力

，也可稱為陽氣的減弱。如果是初產婦用力過多過久，大汗淋漓也會

導致氣虛，而易為外邪所侵，所以要注意產後保暖。※產後外感氣喘產後秘書：氣喘論：凡產後若因風寒外感，邪氣入肺而喘急者，必氣

粗胸脹，或多咳嗽，自與氣短似喘，上下不接者不同。治當疏散中兼補為主，宜金水六君煎，或六君子湯。若單以寒邪入肺，氣實氣壅而本無虛者宜六安煎、或二陳湯加蘇葉之類主之。

按語：產後感冒常見釀成不少的後遺症，因為在這個生命交替的時刻，母親付出龐大的心血和體能，在十月懷胎期間的盼望和臨產的壓力恐懼，在考驗母體所能承受衝擊的極限，所以無不念茲在茲的立下一大堆的禁忌，可是過猶不及，也導致了不一樣的後遺症，這是因為時代上生活設施的差異，所以只要了解中醫對產婦特殊體質的要求，在不違反這個原則下的都可以權宜一下。

產後的體質恢復是一個重大關卡，一些因為產程的不順當，以及產前的維護不佳，導致抵抗力異於一般，在輕微的感冒病毒侵襲下，就一再反覆的感冒，最後在坐月子這一虛弱體質的大門，也衍生出一系列可能預測到的問題。最為普遍常見的是氣喘，因為氣血空虛抵抗力下降，導致反覆地重感冒，使虛弱的氣道，對環境異常的高反應性，其實這時刻雖然棘手，可是認清病因病機即可對症下藥，不必如民間傳言的，生孩子引起的，要再生一次小孩做坐月子才會好。

◆怎樣生出皮膚好的嬰兒 - 孕婦和準爸爸都必看

您好:

常聽說懷孕期間吃珍珠粉及燕窩的話小孩的皮膚會好,這是真有其事嗎?

若可行的話,服食方法為何?謝謝解答您好希望嬰兒皮膚好,那是所有媽媽的願望,不過因為皮膚的顏色深淺或是好壞,是和遺傳有相當大的關係,有時候是強求不來的。服食中藥或是飲食禁忌是很難有作用。不過可以給您一個建議,就是妊娠期間的同房如果用保險套,可以使外來的異體蛋白質,不會太刺激到外胚層分化出來的皮膚,應該就會有比較好的皮膚。網站內還有其他懷孕前後須注意的文章請查閱。

◆泌乳素過高

您好;

請問中醫對泌乳素(prolactin)過高,而造成不孕的現象如何改善,需用哪些方劑作治療?您好如果是您本人罹患此病 希望多找一些書來看

這並不是簡單一個方劑就可以治療的此病可因:腫瘤、藥物、原發性甲狀腺功能低下,特發性原因如手術、創傷、精神抑鬱等精神因素引起。因為常合併閉經或是泌乳為主訴,所以常稱為閉經泌乳綜合症。所以不止是需要西醫詳細檢查,中醫的治療過程也是非常繁複,並沒有想像中的簡單。所以請多充實自己對此症的認知。

◆月經不定期

陳醫師您好:在您的網站上看您答覆的幾封信件,覺得你的覆信方式和態度我很喜歡,因此鼓

起勇氣寫信給你.我今年二十四歲,160cm,48kg,自從月經來潮開始,每個月我都要煩惱一次,因為我的經期十分紊亂,早先是月月提早,之後也曾發生延續一個月的情形,以前看過中西醫,中醫師曾開"腎氣丸"給我服用,不論什麼藥吃了幾個月後便失

效了.我夜來夢長,食少慮多,體形消瘦是否和上述情形有關呢?這樣的情形能不能徹底解決,還是我仍然要依賴一次又一次的調經呢?勞煩您寶貴的時間看完這封信,謝謝您.如果能讓我的情形有所改善,實在感激不盡.答:因為婦科之中的月經先後不定期證,而且是發生自初潮者,一般不是屬於器質性病變,而是屬於結構性體質的問題,這是相當不容易用幾包藥或是一兩個月經期療程可以簡單治好,而且不是能夠在郵件往來中可以有什麼好建議的.而且月經先後不定期有時會有一些潛在的問題,有時候又都通通沒事,所以很難說是有什麼嚴重性.夜來夢長,食少慮多,體形消瘦是否和上述情形有關呢? 這個關連性是有的,可是誰是主要病因又很難講清楚,不過儘量排除不正常的心理生理狀態,對健康的體質是有幫助的.還有治療這個病不是每個月調月經,而是連續治療幾個月.治療這個病不止病人要有耐性,醫生更要有耐性.最後,只能建議找一位高手,相信他而且賴著他,一直到把你的病看好為止.很抱歉沒什麼好建議。

◆中將湯的適應症

您好:

請問一般西藥房買得到的"中將湯",其作用為何?

如何飲用(時間或方式)才適當? 謝謝!回答:

在中將湯的說明書中只有簡單寫三種籠統的適應症1.經期異常

2.經痛

3.女性更年期障礙所以就成份推演其可能的最佳適應症以及推測相應症狀1.經期異常-----
-----不論經行先期、後期、不定期,經色

淡黑,微有淤塊,舌質偏淡,即可尤其是經行後期最為適宜。2.經痛-----適用於
經前或經行腹痛,得熱稍減,不

適於經淨後隱痛綿綿,做痛按壓痛減者,此方於此療效卓著。3.女性更年期障礙-----唇口
乾燥手心煩熱-----內有抑鬱不達之陽氣外有浮散之熱----肇因於久虛而化熱者飲用法-----此
方主要用於經痛是在痛經發作時依說明書之

用法用量即可---此藥須經醫師指示使用詳細說明如下

此方組成

芍藥---緩急止痛

當歸---養血活血

川芎---活血養血

生地---涼血清熱

桃仁---活血化淤

肉桂---溫經散寒

川連---清熱解毒躁溼

丹皮---輕熱涼血化淤

甘草---緩急

生薑---和中

香附---理氣止痛

丁子---溫中健脾

人蔘---益氣補脾

蒼朮---燥溼化濁

茯苓---健脾滲溼

陳皮---行氣化濕此方有溫經湯，膈下逐淤湯，清熱調血湯，以及平胃散，四個方子的組方含意。然而以溫經湯為基調。此方在大量溫經散寒藥中配伍清熱寒涼藥，是因常有本虛標實，本寒而標熱，寒熱虛實錯雜，所以才組相輔相成之方，但若是單純症候，反而受到牽制，所以仍以醫師處方為宜。

◆席漢氏症

您好，

拜讀您的網頁，十分感謝您的知識。只是不知如何稱呼您！我姓劉，女性，27歲。有以下問題想請您回答，真是麻煩您了！您所提之因損傷出血而腦下垂體萎縮之席漢氏綜合症是否症狀會大量盜汗及自汗？是否就是更年期之來臨？對我來說（27歲）是否是會早衰（我母親38歲便停經，所以我懷疑這是否會遺傳）？請問這種病症如何測出及治療？我目前的卵巢有囊腫（排不出卵）並且有泌乳激素過高。子宮因沾黏而放避孕器（但骨盆腔似乎時刻都會隱隱作痛）。目前困擾我的是盜汗。我連睡個覺都會整個頭溼噠噠。沒有醫生知道如何處理。因此想向您求救！謝謝！感激不盡。您好。席漢氏症的原因是生產後的大量出血，導致對氧氣敏感的腦下垂體萎縮而發病，因為以前醫療不方便而輸血不及，所以現在五十以上年紀才考慮此病，依你的年紀應該沒有這個問題。多囊性卵巢囊腫，我在其他婦科文章略有提及，請把我的婦科文章全部下再來看好嗎。也請看一下，開放諮詢那一檔。盜汗的問題，應該找中醫治療，西醫沒辦法的，不過這只是表象，應該還有更深沈的問題。不過您的問題不簡單，所以應可以找中醫積極治療，不過不要灰心，並非絕症。還好還好。

◆多囊性卵巢囊腫

問：本人今年虛歲三十，結婚已年餘一直未受孕，之前也曾去西醫檢查過，大致上並無問題，只是本身的體溫偏低，且基礎體溫高低差並不明顯，曾吃過排卵藥兩三次，仍是沒成功。後來去一家傳統中醫把脈，說我是多囊性卵巢，但問西醫又說沒有這種名詞，為什麼中西醫差這麼多？又如果我想懷孕應該看西醫或中醫好呢？我從事服務業，上班很輕鬆，因為離家近三餐飲食正常，工作也沒什麼壓力，但自從上班一兩年後每次 MC 來第一天都會痛，我不曾吃過任何止痛藥【以前 MC 來不太會痛就算會痛也只一兩次而已】，我作習並未改變太大，上

班也幾乎不穿高跟鞋，公司制服窄裙，有時上班無聊下午會泡茶喝，唯一缺點上班後比較少運動，結婚後跟婚前改變不大，可是近幾個月每刺 MC 來前幾天總會覺的肚子冷冷的【我不是很愛吹冷氣，冷氣房內我一定穿長袖外套

】有幾次會覺得好像有什麼東西從肚子流掉似，為什麼會這樣子？答：西醫確有多囊性卵巢綜合症的名詞，因為病因無法確定，所以是以一組症狀和組織形態變異來命名。病人血中雄

激素水平升高，反饋抑制 FSH 的分泌，同時垂體對 GnRH 的反應敏感性增加，致 LH 的濃度較高，使 LH/FSH 比值升高，卵泡發育，但不成熟，不排卵。症狀如下：月經不規則

無排卵

繼發閉經

不孕

多毛

肥胖

雙側卵巢增大二至五倍呈多囊性病變中醫沒有這個名詞，純粹是西方醫學研究的成果，在 1935 年就已經由 Stein 與 Leventhal 提出，所以西醫告訴你沒有這個病，那我就想不出有什麼原因，而這個綜合徵的確定是要很嚴謹的，中醫只經由跡近於單相的基礎體溫就下診斷，那也太輕率了，因為有少數婦女有排卵，但是未形成黃體，孕激素不增加，所以基礎體溫呈現單相型。而西醫檢查正常的話，為何會開排卵藥呢？所以也有不無可議之處。現在的建議是自己再做兩次詳細的基礎體溫，如果是單相【高低溫差不大】，就建議進一步由西醫詳細檢查，看結果是怎樣再做定奪。另外中醫部份請到我的網站把婦科全部文章下載，細細閱讀一下，看看有沒有疏落那些因素。也可以在【懷孕前的準備】那一篇重點看一下。即使是多囊性卵巢也不是絕對就沒有希望，請不要給自己太多心理負擔。中醫認為這是一種退化過程，而退化有嚴重的，也有剛開始而已，退化過程一開始西醫往往認為已經定型，而施予固定性治療【施打排卵藥物】。中醫認為的退化，也就是提前老化、衰老，這也剛好完全可以納進中醫一直追求抗老化、抗衰老的經驗法則，再從中汲取方法來治療多囊性卵巢囊腫，其中收效的遲速，關鍵就在於老化的程度和患者是否有妥善的養生攝生之道來配合。中醫是不排斥強迫取分的排卵藥和人工生育技術，而且是應該與西醫相配合，但前提是卵巢內應該有相當接近成熟的卵子，這時施打排卵藥才有成功的機會，所以中醫此時扮演的角色，是通過抗衰老的方法，來提升卵子的成熟度，同時也可以為受精卵的著床創造好條件。

◆懷孕前的藥酒

請問

在前幾期(健康天地)中.您曾提及十全大補湯加味.大量鹿茸為引.來作為藥酒.效果很好.我與內人正準備懷孕.所以想請教您.這十全大補湯加味.藥方子為何.該如何泡製.如何飲用.如果懷孕之後.是否可以繼續飲用又因本人第一胎為女孩.現在如果懷孕就是第二胎了.內人一直希

望能夠生男孩他自己壓力頗大.站在中醫的角度.有沒有可以盡人事方法.可以幫忙(本人對於男孩女孩一向是抱著聽天命的立場)承蒙賜教 不勝感激您好如果你們都沒有特殊病史，可以依以下處方浸泡藥酒，我冬天都如此，算是

養生的一種

可不是生男的處方喔。每晚喝泡老人茶的茶杯一杯八珍湯加味：

當歸二錢 川穹二錢 白芍四錢 熟地二錢 黃耆三錢 高麗參二錢 茯苓二錢

枸杞三錢 黑棗五粒 蓮子三錢以上處方五倍量,浸六瓶稻香酒,浸七天後,再加一瓶米酒頭.製法如下※製法一冷浸法一、將藥材切碎炮炙後，置於適當容器中，加入定量白酒，密閉浸漬。

二、人參鹿茸等高貴藥材，須研成粗粉，以利成份析出。

三、白酒種類可依酒力而定，一般常用稻香酒、米酒頭、高粱酒。

四、每日搖晃一次，一週後每週搖晃一次，共浸漬三十天。酒精濃度越高，時間可縮短。

五、取上清液。

六、壓榨藥渣，榨出液與上清液合併，四層紗布濾清。

七、加入適量的糖，或是蜂蜜，攪拌溶解，後密封。

八、靜置十四天以上，取上清液裝瓶即得。

九、下層混濁物是不容於乙醇的蛋白質、黏液質、樹膠等成份，去除這些雜質，使藥酒不易感染細菌，不易變質，有利於貯存。

十、加糖可消除酒的烈性，不宿醉，存久也不會變酸，存放的越久越醇化。關於生男孩方法，請於最接近排卵初期時受孕，感覺排卵期如下。中醫對內分泌的認識，是從生理變化著手，例如月經期的不正常，就必須調

經，經由調整經期，以達到導正各項女性賀爾蒙的指標，所以為求能夠正常

的受孕，首先要有正常的月經期，男精壯，而女經調，有子之道也。中醫對

於能夠受孕的機理有以下的認識：腎氣旺盛，精血充沛，陰陽和洽，任通沖

盛，月經按期而潮。※受孕的的最佳時機天地生物，必有絪縕之時，萬物化生，必有樂育之時。貓犬至微，將受妊也

，其雌必狂忽而奔跳，以絪縕樂育之氣，觸之不能自止耳，此天然之節候，

生化之真機也。凡婦人一月經行一度，必有一日絪縕之候，於一時辰間，氣

蒸而熱，昏而悶，有欲交接，不可忍之狀，此的候也，順而施之則成胎矣。

這裡指出了“的候“，就是排卵期，是最容易受孕之時，如果是清晨測量基

礎體溫，以捕捉最佳受孕時機，都是已經在昨晚就該辦事了，實質幫助不大

，中醫所說綢繆之時，就是陰血充足，陽氣內動，充滿性慾需求的自我感覺

，這就是最佳的受孕時候，這個時候並不是絕對在晚上，可以在任何時間出

現，雖然精蟲卵子都有一段體外存活時間以受孕，但是陽氣內動時最佳，這

是大自然的一種設計，以企求能夠最有效的傳宗接代，真是神奇其他注意事項請查閱我網站的全部婦科資料

◆子宮肌瘤切除後的調養

問：

因子宮肌瘤而必須手術切除達25% ，請問婦女在此項手術後應如何調養以避免可能的後遺症？先行謝謝，候覆。答：這個分為三階段來說一：是感染

因為經由陰道手術，容易感染蜂窩組織炎，會有發燒盆腔下腹疼痛，以及血水惡臭等現象，這必須服用較多的抗生素，如果是經腹腔，也是須服用定量的抗生素，並作好仔細觀察。二：是手術良好的恢復

一般停用抗生素後，可先試用市售的四物雞精或是十全雞精，如果無不適，才再用中藥燉食材，如八珍湯，方子看【對坐月子的建議】，不必用高麗參，用黨參即可。三：是避免子宮肌瘤的復發

這裡就必須有針對性的治療，於此無中醫四診資料，所以無法提供建議，請赴中醫門診治療。

◆類似更年期的疑惑

問：媽今年五十，正處更年期。媽媽性格是老愛杞人憂天，小事化大，老往壞處想，現在她覺自己一身是病，認為自己無藥可治。西醫中醫的藥她都吃過了，就不見起色。全家人都認為媽這樣吃法不可能有效，可是媽已不相信家人的話，只相信醫生。可到後來醫生的話她也不信了因為醫生說媽其實並沒什麼大礙，媽卻始終認為她一定有病，否則為何會感不適老爸和我三姐妹都試過讓各種方法去安慰她，結果都白費心機了。我媽說她的口常乾，舌頭喉常痛，肚子常感饑餓，內分泌酸性的過多，血內的脂肪多出了一倍可我媽不吃油性食物。我老媽為身子快失去正常的生活了。勞煩回答，謝謝。答：這個病歷我們覺得很替病人及其家屬同情，因為確實有病，但是西醫檢查並不能與症狀相對等，而且試遍中西醫都不見效，然而實際問題卻又不是很嚴重。我們總不可以看到五十歲的女人，就懷疑是更年期，應該說是空巢期，依這麼少的資料只能判定是中醫裡的胃陰虛，陰液不足，虛火內灼而飢擾，津不上承而口乾咽躁，若津不濡下，腸失滋潤而便結。若胃體失養，氣機升降失司則嘔吐呃逆。這種病理現象診斷簡單，治療需要時間，虛火又須補又須清，攻補兼施互相牽制，又補陰液，不是一兩天就可以的，畢竟弄壞的時間也不是一兩天，越心急，肝木越容易剋脾土。不要吃辣的、油炸的，而油脂類的反而要攝取，才能補充陰液，以平衡陰陽，血脂高是內在代謝失調，並不完全是飲食所致，拒食油脂食物，是倒果為因的做法，反而加重身體的失衡，只要不過量就好，不可以完全不吃，要吃動物性脂肪才有用。在身心失衡的病症裡，有一種相當特殊的情形，容易被忽視，就是輕症的席漢氏綜合症，這是起因於產後大出血，導致腦下垂體萎縮，而出現一系列症狀，當症狀輕微而不典型，就容易被忽視，而且這個病症屬於婦科內分泌的範圍，一般醫師不熟悉，也不會想到是這個原因。通常疑神疑鬼的病人，皮膚白黃而沒有光澤，加上眉毛稀疏，就應該問一下，是否數十年前醫藥還不進步時，有沒有輸血不夠的產後大出血。

◆乳頭內陷

問：您好，請問女孩子的乳頭為什麼會平平扁扁的，沒有突起的一粒？有時藉由吸吮會暫時性的突起，但不久又會縮回去。請問是什麼原因？有沒有方法矯正或改進？謝謝！答：內陷乳頭 CRATER NIPPLE 其原因可能是先天性的，但較多原因是束胸不當所致。其危害在

於造成哺乳困難，乳汁淤積，甚至繼發感染引起乳腺炎。為預防乳頭內陷，青春期的婦女不宜束胸，因為此期活動量大，乳房容易損傷，如血腫或脂肪壞死。因此青春期的婦女應特別注意胸罩的合適性。

妊娠期一旦發生乳頭扁平、內陷、內翻者，應該給予糾正。每天用手輕輕向外牽拉，或用吸乳器抽吸乳頭。

◆墮胎後的補養

請問：

墮胎之後需要吃那些食物？或注意事項？麻煩告訴我，謝謝。答：墮胎後調理的重要性，請參考【生化湯及產後調理】，因為墮胎是與生產一樣，是須做整體重建的工作，所以等同於坐月子，在食物方面，與坐月子一樣，忌食辛辣、油炸、燒酒、冷飲、多食營養食物即可。注意事項，首先是臥床休息，所以公務人員有小產【三月內】假有 14 天，流產【七月內】假有 28 天，經期頻率以及月經量，如果有異常，須接受治療。

◆玫瑰花與痛經

【藥用】

玫瑰的花蕾，如果花苞開放，芳香味的量就會減少。【性味歸經】

甘、微苦，溫。歸肝、脾經。【功效】

疏肝理氣，和血散瘀。1：用於肝胃不合的脇肋疼痛，胸腹脹痛及乳房脹痛等症，本品氣味

清香，善能疏肝理氣而解鬱，主要適用於肝氣鬱結、胸悶脹痛及肝胃不和、脘腹脹痛、噯氣則舒等症，可配合佛手片同用；對於經前乳房脹痛可配青皮、川棟子等同用。2：用於月經不調，跌仆傷痛等症本品又入血分，具有和血散瘀作用，治療月經不調，可配合當歸、川芎、澤蘭葉等藥同用。治療損傷瘀血，可配合雞血藤，赤芍，延胡索。【應用】

1：玫瑰花雖然歸類於理氣藥，但是也可以歸類於活血化瘀藥，而且是作用最最輕微的活血化瘀藥，這一點非常重要，因為在婦科疾病，或是一些出血症狀的疾病，有許多特殊狀況，是只能用馴良的玫瑰花，其他活血藥一概不能用，可為小兵立大功，好像肺結核腎病末期時，使用冬蟲夏草一樣。2：在婦女月經期的子宮收縮不舒服時，然而並非很不舒服，不必大動干戈的用藥，可以泡一杯玫瑰花茶，有極輕微的疏肝理氣的作用，這樣就可以減輕不舒服。【本草正義】

玫瑰花香氣最濃，清而不濁，和而不猛，柔肝醒胃，流氣活血，宣通窒滯而絕無辛溫剛燥之弊，氣分藥之中最有捷效而最為馴良者，芳香之品殆無其匹。【用量與用法】

一錢至錢半，煎服時要後下，就是其他藥煎好之後，過濾好藥汁，再加入玫瑰花，蓋上蓋子燜一下就可以喝了，因為如果同其他藥物一起煎熬，含有的玫瑰精油會很快揮發完畢，而失去效用。【使用注意】

因為也有活血化瘀的作用，所以孕婦不可以當作花果茶喝。

◆崩漏誤用歸脾湯

問：我是一位缺鐵性患者（在長庚做的檢查），雖然沒有進一步追蹤原因，但是由於 MC 過多，醫師與我都猜這是問題徵結所在。醫師開 FeSpan，但是由於鐵劑傷害胃，我決定往中醫求援。我在報章雜誌上看過一位中醫師發表有關"缺鐵性"文章，他依患者表象將患者分三類，我發現我就是他所謂的其中之一（謂心脾兩虛）症狀有：心悸、失眠、毛髮乾脫、指甲脆裂，他建議這種人可服用歸脾湯，所以我就直接跑到中藥行買一罐順天堂的歸脾湯，並開始服用（約一週）。由於未經醫師指示，所以我只早晚服用，並依服用法中成人的最低劑量（即每次四顆）。現在我想請教：生理期間要暫停服用歸脾湯嗎？註：我的 MC 現象是很有規律，不亂來也不痛但量很多（第2-3天），第三

天後量變少了，但卻拖拖拉拉無法快速結束，從 MC 來至完全乾淨約需二週。答：您現在的問題可能已經本末倒置，因為 MC 導致缺血缺鐵，應該積極得治療崩漏證，而不是去治療失血過多的缺血缺鐵。好像一個臉盆破掉了在漏水，你不去補那個破洞，而去添加更多的

水，如果有一天裂更大的洞的時候，怎麼辦？臉盆能換一個，人能換嗎？而開鐵劑給你的醫師，難道沒有把你轉到婦科看嗎？自己卯起來看是不對的，隔行隔科如隔山。而且你現在也應該有缺鐵性胃炎，而不是鐵劑導致胃的不適。中藥處方歸脾湯，雖然似乎與你的症狀完全符合，但是在崩漏證來說，也有可能已經在倒著用，如果是心脾兩虛，但是心火偏盛的心經熱證，會導致淋離不斷點滴的，較鮮紅的出血，那麼溫藥處方的歸脾湯，已經是幫倒忙了。所以崩漏證找正規醫師治療就可以了，台灣醫療資源過剩，你不會找不到醫師看的。

◆幼少女白帶

例一

黃濱餘外甥女，七歲，下白，兒不自知，其母疑焉，夜臥時以帛墊其身，始識其病，請予治，予曰：女子二七任脈通，始有赤白帶下之病，任脈未通，帶脈未成，何以得此？是必脾經有溼，兼稟母氣而然。用陳皮、白朮、茯苓、山藥、薏仁、扁豆、芡實、白芍、甘草，九味為末服之止，其女出閣，逾年一產而脫，體氣早虧之過。

【怡堂散記】 清 許豫和例二

鄰村方氏女，年才四歲，其母抱負來舍求治，予曰：何疾？曰：帶下。問疾何時起：曰：女夜遺溺，常以帛墊臥，舊春晨起曬帛，乍見白物，以為偶然，後頻下不已，漸覺面黃肌瘦，飲食減少，今經一載，時發時止，附近求醫，皆言未見之證。予曰：此先天稟弱，脾虛夾溼故也，但童真未充，早泄誠非所宜，令夜服地黃丸，早服參苓白朮散，匝月而效。半載後疾復發，仍令守原方服愈。嗣後不聞消息。及閱【怡堂散記】載一七歲幼女，患此證雖已治痊，後出室懷孕，一產即脫，亦天之由也。方氏女孩得無類此。

【杏軒醫案】 清 程杏軒按：夜服地黃丸，以補先天之陰。早服參苓白朮散，以健後天之陽，使腎陰得充，脾陽得運。例三

女，十歲，清稀白帶甚多，別無不適，唯不耐寒冷，夏日需擁厚被而眠，尚未初潮。治如前法，亦愈。【述古】

女子，二七天葵至，任脈通，任脈為病，女子帶下。【內經 素問】

婦人帶下，與男子夢遺同。【元 朱丹溪】

白帶出於胞宮，精之餘也。【明 景岳全書】

故俗諺，十女九帶，誠不必藥。【民初 張山雷】

帶者，奇經八脈之一。腰臍間回身一周，如束帶焉。帶脈總束諸脈，使不妄行，如人束帶而前垂也。八脈俱屬腎經，人身帶脈，統攝一身無形之水，腎氣虧損，帶脈漏下，治法總以補腎為主，白帶多是脾虛，脾傷則濕土之氣下陷，是脾精不守，不能輸為榮血，而下白滑之物矣。【清 錦囊祕錄】

帶下，女子生而即有，津津常潤，本非病也。故扁鵲自稱帶下醫，即今所謂女科是矣。【清 王孟英】按語：幼少女白帶之症，雖然不是什麼大病，但是為求預防重於治療，防止體質持續的惡化，避免陰陽的不正常傾斜，所以有必要對這個問題提出來，請讀者重視。正常白帶的出現，是內分泌女性荷爾蒙的傑作，所以是天葵至，青春期開始以後才會有的。朱丹溪認為：帶下與夢遺相同。是把正常白帶的屬性位階，提升到和男精相同，所以張景岳才接著說：精之餘也。內分泌運作正常，有餘的精氣，就把體內津液化為白帶，當然正常來說，量是不能太多。就如王孟英所說的：津津常潤。然而在以下情形是屬正常的，如母體雌激素通過胎盤，傳給胎兒的新生兒白帶。排卵期、懷孕期、和避孕藥造成雌激素水平升高，白帶也會增加，或是性興奮時，均屬正常。剛進入青春期時的少女，因為內分泌不穩定，月經來潮前，新陳代謝特別旺盛，所以陰道上層細胞脫落會較多，白帶的量也會比正常多。然而尚未進入青春期中，內分泌尚未發揮作用，是不該也不會有白帶的，雖然實際並不多見，詳細的西醫檢查也正常，但是中醫認為，白帶的重要程度不輸於精氣血，若有所缺失，對正在成長中的小孩，是有負面的影響。況且這個症狀不會單獨出現，有的是出現肢體極度畏冷的腎陽虛，或是有面黃肌瘦，飲食減少的脾經症候，所以並不能等閒視之。中醫的病理觀點很不容易解釋，即使老師帶徒弟，大多是心領神會，出之口筆於墨的機會並不多，但是為求讀者能夠有個感性的認識，筆者會花較多篇幅儘可能地解釋。像中醫所謂的陽，是指外在功能表現而言。陰是指內在物質而言。想要有所表現，就要有充分的物質基礎作為支援，而想要有充分的基礎物質，也需要外在功能去活動、去吸收，才能獲得的，所以維持人體的運作，就是陰、陽而已。然後再由此細分，各個臟腑主管的陰陽的個別的特殊功能，就是有共性，也有特性。

中醫治療方面，有一大部分是因為陰陽的不足，當然不足的補足就是了，還不簡單。可是如果不足的假設是肝陰不足，不足到一定程度，陰陽會分離，肝陽脫離肝陰的羈縻而上升，出現肝陽上亢，肝陽上亢出現的熱象，又會消耗肝陰，所以肝陰會持續不足，肝陽就持續上亢，這個過程就會出現頭暈、目眩等等高血壓的症候群，再這樣下去，就是中風。我舉一次摔倒的經驗，坐在椅子上，側身伸手拿東西，這時椅子對側兩隻腳懸空，重心移動，如果一定要拿到東西而拿不到，重心過中心線就摔倒了，肝陰肝陽決離的過程，好像側身的過程，如果決離到了極限，也就爆了。然而有許多的病症，並無法如此簡單地可以區分出他們的界限。例如甲狀腺機能亢進，也是肝陰肝陽的決離，肝陰肝血越是不足，身體機能的運轉也就越快，這是肝陽肝風的上升，所以這個病的治療方法就是補足肝陰，兼以平息肝陽而已。但是有的補了肝陰，肝陽可以降下來，有的卻沒辦法，可能是越過中心線摔倒了，成為另一個嶄新的境界，而中醫很難清楚的界限出來，或許是中醫的偵防手段，只限生命的外在現象，而無法達到精神意志的內在狀態。常看日本鬼怪漫畫，他們總是會清楚提到結界的地方。還好中醫有許多可以事先預防踏入結界的經驗和方法。白帶在童稚時出現，是因為先天稟賦不足，這個稟賦就是腎陰腎陽，而在發育過程，因為脾經消化精微不足，或不能充分地化入身體的組織，成為身體的一部份，會因為腎陰腎陽的不足無法固澀精氣，而下走為白帶。前面兩位清朝醫生，並沒有進一步的積極治療，所以其成長之後，妊娠子嗣終成大患。當然吃藥的成效，要到十多年後才看得見，這種處方不容易開，然而作為父母的，卻有必要細心觀察子女的一點一滴。

◆懷孕不宜服黃蓮

問：你好：

我現在已懷孕 8 個多月，請問如果吃黃蓮，是否可以減少產後嬰兒胎毒及黃膽的產生，初生兒餵食黃蓮水是否有排胎毒的效果，飲用量每日需多少【女嬰】，感謝你們的辛勞。答：胎黃或稱胎疸，有生理性與病理性之分。

生理性者，在出生後二至三天出現黃疸，十至十四天左右自行消退，食欲良好，二便正常。

病理性者，在出生二十四小時內出現黃疸，二至三週後仍不消退，甚至繼續加深，症狀較重，精神食欲不振，此新生兒黃疸，是血液內膽紅素濃度升高，鞏膜，黏膜及皮膚發黃。如先天或後天性溶血疾病，或肝內外膽道阻塞，或先天性膽道閉鎖。所以如果有新生兒黃疸出現，是必須進一步研究的。〈保赤新書〉：小兒初生，唇紅，眼屎膠黏，舌尖紅絳，此為胎熱，可以黃連汁喂兒，使清熱降火。此法頗驗，但無此症狀，當不可服。

〈幼科類萃〉：古法拭口多用黃連，不知黃連大苦大寒，小兒以胃氣為主，安得初生即以苦劣之氣相犯。這是有道理的。胎兒稟父母之氣而生，現在已經妊娠八月，建議少食辛辣油炸，睡眠充足，即可減輕胎熱，這是治本方法。所以建議不要吃黃連，或是珍珠粉等等。

◆懷孕不宜服杜仲

問：很感謝你對上次有關十三味問題的回覆在，此表達誠心的謝意。現又有另一個問題想請教你，我太太因體質得關係，多年來經常以豬腰子或里肌肉炒薑絲，再加杜仲湯煮熟後服用，不知杜仲對懷孕是否適合？有無副作用？謝謝你！ 答：您好您這樣關心太太，我當然會努力解答疑問。杜仲在懷孕前三個月內請勿服用，雖然是中醫傳統安胎良藥，但是有活血作用，

會導致胎動不安。安胎必須特別炮製，必須鹽水炒黑，炒黑到折斷裡面沒有絲，裡面沒有膠質成份才有固腎安胎，但是不能炒成炭，那就沒有用了。而且熬湯也不能用太大量，不可以超過五錢。

◆產後腰痛

問：我生過一個小孩，自此後常感到腰背酸痛，尤其腰砥深部，尤其是一早起床時。我沒減過肥，但常常抱我那個胖兒子。想請問您我該如何保養或鍛鍊，才能使子宮恢復原位？需要看醫生嗎？是否需暫緩懷二胎？答：因為中醫以辯證為主，須大量線索來判斷，或脈診來定病性，今只有晨起腰痛為主證，故以此推導，若有出入敬請見諒。一：晨起為陰交於陽之時，自身陽虛不能溫煦肢體，賴活動後，外在陽氣【溫】加熱才痛減，或熱飲入胃才痛緩，如早上開車，有的須熱車一陣子，跑起來才順暢，而此是腎陽虛，依此推導當有其他症狀：如畏寒、肢冷、夜尿頻、面色白、下肢浮腫、帶清稀。西醫講盆腔淤血，中醫的意思是腎陽虛血行不暢，這在中醫觀念裡，也是一

種淤血的成因，此是裡證，尚有表證如下。二：可能是麻醉作用不知痛，生產時過度扭曲身體，局部牽扯損傷，又有空調冷氣入侵，風寒入表，此雖以骨痛為主，但仍屬表不屬裡，問題較簡單。三：腰砥深部的腰痛，也不能忽視是否有盆腔感染的可能性，這一部份就要借重西醫檢查。四：又如果是抱小孩引起，當時輕時重的痛，晨起痛應是全身僵硬呈放射狀，且不以腰砥為主，這一種治療更簡單。關於鍛鍊問題，能夠增加肌肉緊張度，量力而為都可以，保養的話，是少飲冷，少吹冷氣，注意少腹保暖【尤其經期】，抱小孩姿勢要正確。子宮復不復位，不是問題重點，重點在於若是腎陽虛，那就有牽涉到卵巢的內分泌，是子宮的內在環境的動力來源，看醫生的問題，西醫幫助不大，中醫良莠不齊，不然藥物幫助改善會更快。是否暫緩妊娠計畫，問題更大了，當然準備妥當最好，婦科問題，常有諸症皆同，而有泰山鴻毛之別，妳的問題應該不大。不過還是請與你的【家庭中醫師】詳細研究吧，因為婦科問題實在不能大意。

◆月內風的頭痛

你好：有問題想請問，自從生了老大後，每次月事要來時都非常難過，頭痛，噁心，有點像中暑，每次都要借由刮痧情況才會好轉，而且刮了之後月事就來了，生產是採剖腹產物【胎位不正】，生產前色暗量多，6 日可結束生產後色

紅量多，但需 10 日才可結束，前四五日量都好少，好像下不來，生產後有感冒，頭痛是空痛，非月事期也常頭痛【路走久一點或天氣稍熱就會有此現象】這次的月事更讓我全身痠痛全身無力，這種現象都是生產前不曾有的，

曾看過中醫吃過中藥粉，都沒有改善，請問是否在日常生活該注意什麼，或該燉煮什麼中藥或藥膳可改善，運動有效嗎【體重比生產前還重5公斤】，謝謝醫生幫我解答!!答：因為大部分讀者並未能明白，中醫必須掌握的資料要非常多，才能給予建議，所以筆者收到大批非常簡短的問題，卻苦無下筆之處，真是抱歉。以上是經再次通信才得到的，雖然並不完整，仍勉力作答，如果有不足的地方請見諒。此證可能是陰虛陽浮。

可能因為月子期間，外感風寒，調理不當，導致身體最重要的重建工作，遭到阻礙，所幸外邪並未造成太大傷害，沒有留下任何呼吸系統的症狀，詳情需閱讀【生化湯及產後調理】。因為肝血不足，陰虛陽浮，上犯清竅，所以頭痛是空痛，而不是一般的刺痛，或是壓痛，而且體力勞動後，氣血過度消耗，所以頭痛也會誘發。尤其月經要來不來之時，肝血欲下行，因不足使體內自我調節不過來，所以出現陰愈虛，陽愈浮，頭痛噁心，這次的全身酸痛乏力，只是同樣的症情，再次的加重。經期延長，然而量仍未減少，這是可喜的現象，證明陰液並未嚴重耗損。刮痧可以刺激深部的交感神經，而振奮陽氣，加速氣血流轉，但是對病理的本質並無多大改善，所以可以暫時取效，並不能減輕下次月事的不舒服。此病詳細劃分，可以牽涉在奇經的充任督三脈，遵葉天士的觀點，當用血肉有情之品，在〈臨症指南〉之中提到：夫精血皆有形，以草木無情之品為補益，聲氣必不相應，需血肉有情栽培身內之精血。所以擬定藥膳長期培養烏骨雞1隻 洋參五錢 黃耆六錢 當歸三錢 枸杞六錢 黑棗一兩 乾薑一錢加水調味，文火燉爛，月經乾淨之後，十天內服用三次。月經中期之後，去烏骨雞易豬尾椎骨，燉上方。生活上只要忌食冰冷、油炸，注意下半身保暖，待冷氣房工作，須保暖小腹，少穿高跟鞋，不可熬夜。運動方面散步即可，會加速心跳的皆不宜。

◆黑豆酒與坐月子

請問：

喝黑豆酒有何益處？又婦女在坐月子期間能喝嗎？煩請解答，感激不盡！答：

＜中藥大辭典＞：黑豆的功用主治：活血，利水，去風，解毒。治水腫脹滿，毒腳氣，黃疸，浮腫，風痺筋攣，產後風痙，口噤，癰腫瘡毒，解藥毒。＜綱目＞：治腎病，利水，下氣。治諸風熱，活血。＜食療本草＞：主中風腳弱，產後諸疾。＜普濟方＞：黑豆酒：辟風邪，養血，去惡露，行乳脈。＜千金要方＞＜聖濟總錄＞均有收錄黑豆酒：主治產後中風，浮腫。由以上典籍記載判斷，在坐月子期間是可以飲用黑豆酒。因為活血的作用，對於惡露的去除有幫助，尤其剖腹生產者。甚至有人認為這個作用在中風後遺症的恢復有價值，因為產後多虛多瘀，黑豆酒是可以照顧到淤血停滯胞宮的問題，由以上主治功能可以看出並無法照顧到產後多虛的地方。因為作用並不強烈，所以坐月子期間的前半段少量飲用是可以的。中藥並不是每一種黑色的都能入腎補腎，黑色屬腎，只是五行上一個粗淺分類，更須深究典籍和臨床上的實踐。

◆安胎藥十三味的宜忌

問：

你好

我太太今年三十一歲，剛懷孕三周，但因親友說她身體較偏性寒，故建議我太太服用【十三味】，想請教貴報的專家，【十三味】含有那些藥材？那些情況才須服用？那些情況不可服用？服用後可能有那些副作用須要注意？

謝謝你！答：

【十三味】的正名是【保產無憂散】，出自＜傳青主女科，產後篇，補編＞主治：此方保胎，每月三，五服，臨產熱服，催生如神。組成：

當歸一錢五分酒洗

川貝一錢

黃耆八分

菟絲子一錢四分

厚朴七分薑汁炒

炒艾葉七分

炒黑荊芥穗八分

枳殼六分麸炒

川芎一錢五分

羌活五分

甘草五分

白芍一錢兩分酒炒

生薑兩片張山雷 <沈氏女科輯要箋正>

此方雜亂無章，但向來為催生妙劑，誠不能說明其所以然之理，自程鐘齡以擦法一講，語雖似奇，其實不過行氣滯，通血脈。彌月之時，得此潤澤流利之品，達生自捷，但終是催生妙劑，必非安胎良方。<中醫婦科學>五版教材

本方俗稱【保產十三太保方】近來用於糾正胎位，效果較好。古人譽為安胎妙劑，方中芎，歸，芍養血活血，黃耆補氣舉胎，更以羌活，荊芥升舉元氣，蘼艾暖宮，川貝利肺氣，菟絲子益精固胎，厚朴，枳殼寬胸理氣，懷胎六七月服之，能使胎氣安和，臨產服之，亦可催生，本方一日一劑，或隔日一劑，十劑為一療程，藥後往往有不同程度的胎動增加。江西省中醫院婦科主任 沙冰：

此方用原方劑量治療氣虛又肝氣鬱滯之早期胎動不安胎漏。有人以此治療胎位不正<轉胎>，但是劑量須加倍。按：

經由以上可以知道，此方主要作用在於安胎，而且是胎兒月份較大，有阻礙氣血流通時，可以酌情使用，現在懷孕三週，還不適用此方，而且沒有胎動不安的情形，也不可以隨便服藥，畢竟方中當歸川芎有活血作用，不利某些氣血虛弱，衝任不固者，況且現在應該養胎，不是安胎，中醫是有按月養胎的方法，然而正常情況下並不需要。

孕婦身體偏寒，在懷孕過程體質自然會有改變，只要不吃冰品，冷飲，自能在飲食上充分吸收，完成整個懷孕過程。沙冰主任指出，懷孕過程孕婦杜絕冰品，可以產下消化系統健壯的嬰兒，證諸吾女，受惠良多。

◆生化湯及產後調理

※生化湯簡介生化湯是我們產後必服的常規處方，其原方組成：當歸八錢 川芎三錢

桃仁十四粒 炮薑五分 炙甘草五分。此方來自明＜景岳全書＞＜婦人規古方＞的錢氏生化湯，在清＜傅青主女科＞中更是詳細記載，其中的用藥方法以及產後禁忌，因為行之有效，自此以後的婦科專著，皆一致推崇，遂使此方深入民間，維護非常重要的產後問題，因為在此之前所習用的方劑，並不周延，此方遂成定法定方。江西省中醫院婦科沙冰主任：臨床上產後無特殊原因者，可以原方使用，不可以無的放矢隨意加減。此方經前輩醫生多年使用認為比較穩當，並無副作用，所以無特殊兼症，應以全方原量為宜。北京中醫院婦科主任劉奉五先生，記載北方常規使用的生化湯，稱為產後官方。組成：當歸三錢 川芎一錢 桃仁五分 炮薑五分 炙草五分

紅花一錢 澤蘭一錢 益母草一錢 山楂二錢。此方是前方加減而來，當歸份量減輕，活血藥味增加，組方輕靈，如果體質柔弱，也是另外一種對證的選擇。也有中醫持不同意見，是以生化湯主述淤血症狀既多又重，來推斷不適合現代。但是因為原方是要求黃酒童便各半煎，所以去瘀力量很大，現在一般均用水煎，運用上又甚為合拍，應無疑慮。生化湯屬於預防性治療，但是產後變化極大，雖說順產較多，但是有逆症的話又較其他疾病棘手，所以有必要依常規處方，藉前人穩定的經驗，使變症降到最低。大陸生化湯的煎劑處方可以報銷，就是公費醫療有給付，由中醫師把關，安全性較高。台灣生化湯均是自行到藥房抓藥，老一輩又相信高價的效果好，不知對證下藥的重要性，藥房樂得投其所好大肆加藥，此有可議之處。※產後調理中醫對於產後病的理論基礎，在於臨產用力，產傷出血，產後元氣受損，百脈空虛，又產後淤血易停滯於胞宮，所以就有多虛多瘀的基本狀態。中醫對於產後的診斷除四診八綱外尚有三審：一審，小腹痛與不痛，以辨其有無惡露停留。

二審，大便通與不通，以驗其津液之盛衰。

三審，乳汁行與不行，和飲食的多與少，以察胃氣之強弱。讀者必須對三審有個感性的認識，對產婦做密切觀察。在正常情況下，即使不服生化湯，惡露也應在三至四週內乾淨。生化湯組方嚴謹，切合病機，有養血活血化瘀的作用，可以通治產後常見的輕微不適，又可以幫助子宮復舊，所以臨床上是每日一劑煎服至惡露乾淨為止，之後才可以進補一些人蔘、黃耆等等大補氣血的中藥，因為太早進補會導致淤血內停，不可不慎。至於老一輩所要求的坐月子禁忌，像是不可以勞動，運動，哭泣等等，這些是應該再遵守下去的寶貴經驗。對照前面的理論和經驗談，都是有根有據的，常見中老年婦女退化性關節炎應與困苦年代的產後勞動有關，而未來可見的關節酸痛應與過早的減肥運動有關，嗟乎，嗚呼。※人工流產調理的重要性懷孕生產都有被祝福的喜悅，但是人工流產的痛苦常是產婦獨吞，得不到奧援。其實不管任何原因的人工流產，之後的調理重要性尤高於正常產後，因為受孕後人體有許多系統就會開始啟動，處於非常狀態，主要的是內分泌。這些系統如同工廠一樣，會排好生產線的步驟行程，如此井然有序地完成懷孕的整個過程，乃至於生產之後。現在人工流產把這一系列工作從中打斷，所以人工流產手術後的養生休息和調理就特別重要於一般。現在反而受到大家忽視，會衍生出不少後遺症，這是相當遺憾的。在人工流產術後無特殊症狀，應該服用生化湯，也必須坐月子，把內分泌等等系統恢復好，這對下一胎的孕育以及身體健康有相當大的

幫助。常見產後調理得當，改變成非常好的體質，這是一種難能可貴的體質改造運動，得天獨厚給女生的，應該珍惜。同樣的道理，人工受孕失敗之後也應該重視，給予休息復舊的調理，和手術時間的間隔，尤其像打排卵針。不肥的豬是榨不出油的，所以中西醫理論和治療上，其實有很多地方是可以相輔相成的，中醫也應有功成不必在我的胸襟。

◆坐月子的建議

因為各地民情風俗不一樣，所以坐月子的方式也就大大的不同，尤其台灣是五湖四海各省方式都有，筆者僅就所學習到的，和嘉義海邊地方的習慣用法，記錄如下：※坐月子的藥膳

坐月子的的重要性已經在生化湯文章中說明清楚，這裡是接下去的是一些步驟，因為地域的不同，而有不同的坐月子的方法，這裡是提供筆者心目中的好方法。第一階段，生產之後，惡露排淨之前，約七天至十天。

每天一劑生化湯。

藥材：只能用到黑杜仲粉。

食材：可以用豬腰子，土雞，哈士蟆，紅蟳，血蛤，鱸魚。

注意事項：不可以用酒烹調。【滴雞湯】滴雞湯這是傳統的好方法，已經很少人會用了，筆者訪問我的岳母，記錄如下：土雞一隻，最好是放山雞，把雞隻洗淨，去內臟，不可剖開，只留屁股附近一個洞，再以剝骨的刀子，拍碎全身骨骼，讓其中骨髓可以熬出。用老式大同電鍋，一般電子鍋沒有外鍋不能用，外鍋加水，內鍋放入一個大碗公，雞屁股的洞朝下，讓熬出的雞汁可以流到碗底。得到的雞汁，上面有一層浮油，可以舀出煮菜，這樣就是純純的雞汁。一般中午之後滴雞湯，晚上就可以喝，隔天才可以吃雞肉。【哈士蟆】哈士蟆是中國林蛙的輸卵管，蛙類只有輸卵管，沒有卵巢，此藥材含有多量的激素，以中藥而言，血肉有情的藥材，屬於甘平的不多，大部分都偏溫燥，所以不適用於產後的填補，對於突然失去的氣血，和內分泌系統的重建，哈士蟆的功效恰好都有針對性，所以此藥在溫州名醫沙驥夫先生家中使用，而今再傳於筆者，筆者經用後卓有成效。使用方法：

哈士蟆二錢，溫開水三碗浸泡三小時，加冰糖一錢，用大同電鍋燉煮六小時，半空腹服，每天兩次，惡露乾淨後，可以加入高麗參二錢。哈士蟆二錢泡開之後，可以膨脹到一大碗，如果是膺品，膨脹比例只有一倍而已，此藥等級甚多，以大且油潤沒有雜質黑點為上，黑點可能是卵，不堪用，此藥曾有廠家作成健康食品，名為雪蛤。第二階段：惡露乾淨後三十天。

這一階段可以使用人參，筆者是用二十良的高麗參或是北韓切蔘，例如滴雞湯可以在碗公內，

放入五錢高麗參。豬心燉高麗參。豬腰子炒麻油，開刀者麻油的量不可太多，只能作為提味的。麻油雞。可以用八珍湯加味燉食物，食物可以如下，輪流煮來吃，如土雞，土龍，鰻魚。八珍湯加味：

當歸三錢 川穹二錢 白芍四錢 熟地二錢 黃耆三錢 高麗參二錢 茯苓二錢

枸杞三錢 黑棗五粒 蓮子三錢

腰酸痛者加杜仲三錢 川斷三錢 ※產後口渴

民間用的是荔枝殼，常常產後就上藥房買一斤，分數次熬湯喝，效果絕佳。但是筆者以為生產過程本來就會消耗體力，流出大量的汗，導致口渴，只要補充含電解質的水分，就可以了，不必再多吃藥。※產後禁止飲水與米酒水的問題有不少讀者來信詢問，筆者翻閱所有的中西婦科書籍約四十本，都沒有提到禁止飲水的說法，筆者推敲，禁水如果是為了能夠馬上達到產後減肥瘦身，那麼大可不必，產後的目的是體質調整，這是真的終身大事，不可以輕率，必須嚴陣以待，而禁水是否有害，筆者不得而知。現在盛行使用米酒水烹調或是替代飲水，其實這是很危險的，因為米酒水仍然含有1%的酒精，而且依據法律規定酒精含量高過0.5%就是酒，以1%的酒精大量喝下來也是會造成肝臟負擔。民間坐月子中心對米酒水的使用量，每一產婦約用60000~650000CC，合算起來有600 C C 的酒精，或是1200 C C 的高粱，通常一瓶高粱300 C C，也就是產婦一個月內喝掉四瓶高粱，或是37.6瓶的罐裝台灣啤酒。這對大部分不常喝酒的女生是很大的負擔，加上產後百脈空虛，燥熱的酒精更容易煉熬津液，而且酒精有累積性，雖然產婦會發生一定比例的急性胰腺炎，可是由於調理失當自行攝取過多酒精，這樣自取的急性胰腺炎是很不智的。以其他古老民族經驗為例，回教齋月白天是必須禁水的，而老幼病殘和孕產婦是例外的。所以由此可知回教地區產婦也是不禁水的。傳統上台灣民間坐月子時有的是不直接喝開水，而是喝荔枝殼煮開水來飲用，而且產後忌食生冷，不可以喝冰水，這是在中醫界和民眾之間都是一致無疑義的。不過只喝米酒水就矯枉過正了。※米酒水與米酒的問題紅標米酒的酒精來自兩個部份，一半是米酒酒精，一半是精製酒精。精製酒精是由台糖公司煉製蔗糖的剩餘產物【糖蜜】所製成的酒精，所以還含有一定比例的糖量，也因此烹調時有獨特的甘甜風味，這就是純米酒釀造的米酒頭或是稻香酒所無法取代紅標米酒的原因。紅標米酒所使用的米酒酒精因為成本考量，所以蒸餾過程並不採取分段擷取，所以醛、胺和有機酸的含量較高，所以直接飲用後有頭痛和宿醉的現象，長期飲用紅標米酒對肝臟的破壞程度是比一般酒類高。不過有壞物質的沸點低，在烹調過程就會散失，所以作為烹調使用紅標米酒是稱職又無害的，而且米酒在魚、肉的去腥過程更是無可取代。用紅標米酒烹調是台灣獨特的經驗，這種經驗是有區域性的集體記憶，就好像煮三杯雞一定要用紫荳九層塔，這種通過嗅覺味覺的化學反應是深層的銘記。就好像破殼而出的小鴨子，牠第一眼看到會動的東西就認定是媽媽一樣。在台灣的新生嬰兒都會透過母親的乳汁吮吸到生命中第一口米酒，所以當往後再度舉箸選擇時，紅標米酒的料理會是深度催眠下的制約。※產後減肥懷孕期間所增加的體重，有一部份是脂肪，一部份是水份。水份因為水液代謝不正常，才導致的水份累積在體內，一般水分的代謝是經由肺脾腎三個臟腑的綜合運作，而妊娠肥胖是為了養胎，也有一部份是因為胎氣阻礙，使代謝受阻，產後胎氣的原因消失之後，加上產後調理恢復得當，體內五臟六腑運行順暢，產後一個月後，只要進食維持體能消耗的熱量，加上一定的運動，身材的恢復，半年內是絕對可以達到的，如果哺喂母乳那麼瘦身效果會更快。通常坐月子全程使用米酒水的目的是要瘦身和防止妊娠紋，瘦身的問題在上段文章已經說明，而妊娠紋的產生是孕婦和胎兒的體重增加太快，導致肚皮的真皮膠原蛋白纖維斷裂，而且巨嬰寶寶後遺症多，所以控制體重增加速度是對媽媽對小孩都是重要的。※產後注

意事項

第一：不可以悲傷哭泣。

第二：一週之後才可以洗頭髮，期間可以用乾式噴霧狀的洗髮用品，清潔頭髮。

第三：十天後再洗澡，期間可以擦澡。

第四：坐月子期間可以輕鬆走動，不可以激烈運動想要減肥。

第五：藥膳調理各地不一，但是補過頭了，會有口渴，臉熱，失眠的現象，就要停止。後記：

因為我的兒子提前二週，健健康康地報到，所以這三篇文章，到現在產後十一天，比較有空才完成，這三篇文章，也可以說是一份自身體驗的報告。當然這其中的經驗，是我的師母江西省中醫院婦科沙冰主任的叮嚀。

(以上資料來自細說中醫，由岐黃中醫網整理，僅供學習交流)