肿瘤治验录

ZHONGLIU ZHIYANLU

李昌达 著

李根 整理

西南交通大学出版社

◎ 特邀编审 / 张国俊
◎ 特邀编辑 / 陈云虹
◎ 责任编辑 / 万 方
◎ 责任校对 / 韩松云
◎ 封面设计 / JIANG LIE

李嘉诚《肿瘤治验录》摘句一览

- 《黄帝内经》说："邪之所凑，其气必虚"，此气包括了五脏六腑之气，气虚必然导致血虚，虚之甚者，邪即乘之，癌证亦然，故扶正祛邪为治癌之大法
- 中医的"辨证论治"就是从病人的实际，疾病的实际出发，实事求是地对具体问题具体分析，具体解决
- 医生诊治力求处方用药息息与病机相合
- 此类病主要依靠病家密切配合、坚持服药
- 癌证早逝，往往是治不及时，或治疗失当，或杂药乱投，或半途而废，或频频易医
- 感冒乃一切疾病的罪魁祸首，它可以诱发一切未彻底治愈之病，可以加重一切病
- 人，往往在崎岖小路十分小心，摔跤多在平坦大道，病者亦然

ISBN 7-81104-087-5
9 787811 040876 >

ISBN 7-81104-087-5
定价:28.00元

肿瘤治验录

李昌达 著 李 根 整理

西南交通大学出版社
·成 都·

图书在版编目（CIP）数据

肿瘤治验录 / 李昌达著. —成都：西南交通大学出版社，2006.5
ISBN 7-81104-087-5

Ⅰ. 肿… Ⅱ. 李… Ⅲ. 肿瘤—中医治疗法
Ⅳ. R273

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 055162 号

肿瘤治验录

李昌达 著 李 根 整理

*

特邀编审 麦倜曾
特邀编辑 徐云虹
责任编辑 万 方
责任校对 韩松云
封面设计 何东琳设计工作室
西南交通大学出版社出版发行
(成都二环路北一段 111 号 邮政编码：610031 发行部电话：028-87600564)
http: //press.swjtu.edu.cn
E-mail: cbsxx@swjtu.edu.cn
成都蜀通印务有限责任公司印刷

*

成品尺寸：140 mm×203 mm 印张：5.562 5
字数：135 千字 印数：1—5 000 册
2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 7-81104-087-5/R・001
定价：28.00 元

图书如有印装问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话：028-87600562

著者简介

李昌达，男，四川省平武县人，1926年生，四川大学法律系毕业。曾任九三学社中央委员会第七、八届委员；九三学社四川省委员会第一、二届常委、秘书长，第三届顾问；中国人民政治协商会议四川省委员会第五、六、七届委员；四川省外向型经济文化丛书编委，兼中医中药卷主编（另两位主编是成都中医学院名誉院长、教授凌一揆，四川省中医药研究院研究员、主任医师陆干甫同志）；四川巴蜀文化研究会常务理事。现任四川巴蜀文化研究会学术顾问。

中医系家传，十二岁即开始学习中医。1979年落实政策调回成都之前在名山县中医医院从事中医临床工作，1978年列为名老中医。调回成都之后，曾与李克光、王静安、赵棟华等同志创办成都市老中医经验讲习班，任班主任并为学员授课。1987年至1993年被四川省中医药研究院名老中医门诊部、成都市第二人民医院老年门诊部、农工民主党四川省委主办的金河门诊部聘为特约医师。1994年离休后至2002年在家中为病员服务。

1978年至今在《新中医》、《成都中医学院学报》、《四川中医》、《重庆中医药杂志》等发表文章20余篇，已出版专著《疑难杂病治验录》和《疑难杂病治验录续编》，约70余万字。

肿瘤治验录

ZHONGLIU ZHIYANLU

前 言

本书分上篇和下篇，上篇为良性肿瘤计30例，下篇为恶性肿瘤计24例，共54例。

癌证来求治者不少，绝大多数都是晚期，都是经过多方、多种治疗。通常的情况是：手术—化疗—放疗—复发—转移—找中医吃中药，此时已是难以措手、难以救治。而病者的心态、病者家属的心态也是很复杂的，往往是“方寸已乱”、“病急乱投医”、“试一试”，今天这里明天那里，本来还有延续生存期的一点希望也因之丧失。有的病者亲属则是希望减轻一点痛苦、多延续一点生存时间，“死马当成活马医”。持积极态度与医生密切合作者甚少，而合作之中往往受到很多干扰，能排除干扰、坚持进行治疗者则更少。由此可知，书中收治的24例殊非易事。

我认为癌证最终是会突破的，从许多中医治疗癌证的资料看，事实上已经突破。中医的理论、中医的“辨证论治”就是中医突破和攻克癌证的锐利武器。“辨证论治”就是从病人的实际、疾病的实际出发，实事求是地对具体问题具体分析、具体解决，这是十分科学的。有人主张配制一种中药成药治疗所有癌证，我认为这是不科学的、办不到的，也是行不通的。凡成药都只是有共性而无个性和差异性。同是肺癌，在不同的患

者身上都有它的差异性，38 码的鞋子不是一切人都可以穿，当然也偶有例外，也仅仅是例外而已。前贤早已指出："执成方以治病非医也。"如果要求从这方面突破是永远也突破不了的。

癌瘤的病因是复杂的，要之有三：一是外感六淫之邪留连不去；二是七情内伤；三是饮食劳倦。我以为饮食劳倦十分重要，应予足够重视。"百病从口入"，很多病是"吃"出来的，不洁之物、霉变之物、将腐之物，凡此种种不一而足。以为去其霉变腐烂之处即可食用，殊知毒素已侵入其相邻之处，只不过尚未表面化而已。特别要提出的是"偏嗜"，偏嗜辛辣、香燥、厚味，偏嗜烟酒，偏嗜油炸、腌卤、烧烤及烟熏火燎之物(2005 年 3 月《成都日报》的副刊健康·科学登载了"世界卫生组织公布全球十大垃圾食品"全面而具体，真是好得很)。凡此种种，未有不令阴阳失调、气血失调、五脏六腑功能失调而导致癌瘤者。饮食如此，劳倦如何?! 有因工作过劳而积劳成疾者，亦有因贪玩好耍而"积劳"成疾者。如有人嗜赌成性连续数日不下牌桌者，耗伤气血、亏损元气莫此为甚，其不"积劳"成疾焉可得乎?!

以上三者皆可导致阴阳失调、气血失调、五脏六腑功能失调，从而在薄弱环节处形成痰瘀积滞，再夹其湿热毒气，积之既久而肿瘤(癌毒)生焉。

肿瘤之为病，其来也渐，其愈也慢，一蹴而就者未之有也！操刀一割，快则快矣，然只能去其有形之包块(肿瘤)而不能也无法割除其致癌因素。故医者要悉心帮助患者对此有正确认识，从而增强信心，与医生密切配合，共同战胜这一顽疾。

当前癌证已位居我国各类死因的第一位。20 世纪 70 年代我国每年死于癌证的人数为 70 万，90 年代为 117 万，21 世纪初则上升为 150 万。有关方面提出如不加以控制，在今后 20

年中癌证死亡人数还将上升一倍，其中八种癌证死亡又占我国癌证总死亡的80%以上。它们是：肺癌，肝癌，胃癌，食道癌，结、直肠癌，乳腺癌，宫颈癌和鼻咽癌。卫生部2003年12月颁发的《中国癌证预防与控制规则纲要》(2004—2010年)已将其列为重点防治对象。1998年与哲学家、我们的老省委书记杨超同志谈及癌证时，他当时就提出要“积累这方面的资料，总结这方面的经验，在全国乃至全世界的医务工作者共同努力下突破这一威胁人类生命健康的恶证”，并指出：“中医在这方面有其独特优势。”今年春节我去看望已经94岁高龄的杨老时谈起拟在今年出版已于2001年写成的《肿瘤治验录》时，杨老深表赞成，并说：“就在成都出版好了，北京太远不便校对。”现在由于西南交通大学教授、国家级专家、全国政协委员、九三学社中央委员高庆同志的帮助，得到西南交通大学出版社的支持，特别是出版社老领导麦倜曾教授、责任编辑万方和出版社其他有关同志的支持，本书终于面世，在此一并表示感谢，志之以示不忘。

根据一些虽未谋面、但已有所联系的同道的意见又补充了“肿瘤习用药”附于书后，其中有不少的验方、秘方，辨证正确，运用得当可收殊效。若用以济世善莫大焉，若用以敛财恶莫大焉！

余年八旬，老矣！夫复何求？一得之愚供参考而已，不当之处尚乞读者教正。

作者于成都

2005年夏

目 录

上篇 良性肿瘤

一、脑血管瘤…… 3
二、舌血管瘤…… 4
三、颈淋巴团块…… 7
四、颈部包块(一)
——甲状腺肿大…… 8
五、颈部包块(二) …… 10
六、颈部包块(三)
——颈部淋巴结核 …… 12
七、瘰疬(颈淋巴结核) …… 15
八、结喉两侧包块 …… 17
九、面颌左侧包块 …… 19
十、右耳后区及左腕关节包块 …… 21
十一、胸部包块 …… 22
十二、乳房包块 …… 23
十三、胃部包块 …… 26
十四、脐上包块(腹主动脉瘤) …… 28
十五、腹部包块(脾肿大)水肿 …… 30
十六、直肠肿瘤 …… 33

十七、阴部包块 …… 34
十八、胸部包块、双乳房包块、酒皶鼻 …… 36
十九、外阴包块 …… 38
二十、卵巢肿瘤 …… 40
二十一、全身性皮下包块(皮肤神经包) …… 42
二十二、全身性大小关节长包块 …… 44
二十三、卵巢囊肿合并子宫内膜异位症 …… 45
二十四、卵巢囊肿(一) …… 48
二十五、卵巢囊肿(二) …… 50
二十六、卵巢囊肿(三) …… 51
二十七、子宫肌瘤 …… 54
二十八、右乳根肿瘤 …… 56
二十九、颈淋巴肿块手术二次后成漏管 …… 58
三十、双侧乳房包块手术后复发及
双侧腋窝深部淋巴瘤 …… 62

下篇 恶性肿瘤(癌证)

一、鼻咽癌转移为肺癌晚期 …… 67
二、食道癌 …… 71
三、肺癌、肝癌 …… 74
四、肺癌(一) …… 78
五、肺癌(二) …… 81
六、肝癌手术后复发 …… 84
七、乳癌 …… 90
八、乳腺癌手术后复发 …… 92
九、乳腺癌手术后复发转移 …… 95

十、乳房浸润性导管癌手术后预防复发…… 100
十一、颈淋巴癌手术后复发…… 104
十二、胃癌手术后复发…… 106
十三、结肠癌手术后复发…… 108
十四、直肠癌晚期…… 110
十五、肾癌手术后预防复发及前列腺重度肥大…… 114
十六、直肠癌手术后预防复发(一)…… 118
十七、直肠癌手术后预防复发(二)…… 119
十八、结肠癌手术后预防复发…… 121
十九、子宫癌晚期广泛转移…… 125
二十、膀胱癌手术后预防复发转移…… 128
二十一、肺癌晚期纵膈淋巴转移、骨转移…… 131
二十二、乳腺癌手术后预防复发…… 133
二十三、不遵医嘱卵巢癌手术后复发…… 136
二十四、牙龈白斑…… 138
肿瘤习用药…… 141

上　篇

良性肿瘤

一、脑血管瘤

肖××　女　47岁　四川省名山县　干部

1991年9月24日初诊：

自诉与亲属代述：今年1月1日，感到周身不舒服，服药不见好转，一直治疗，时好时歹；到1月3日中午服药(中药)后，下午5点突然头剧烈疼痛，二目无神，痛昏倒地，立即送医院抢救；醒后急呼头顶痛，口吐白沫子，呕吐数次，当即住院，打针吃药，当夜病人一直处于昏迷状态，经输液、打针3天，未确诊为何病；后用腰椎穿刺诊为蛛网膜下腔出血，对症治疗，渐有好转；殊知治疗中又患肺炎、高烧，住院一个月，于2月4日出院；医院建议到成都医院进一步检查治疗，因此来成都。3月19日经某医院CT会诊，CT号为18640号，诊断为脑动脉瘤系前交通支；4月15日X光检查X线片号为16841号，诊断为左前交通动脉瘤，大小约0.3厘米×0.5厘米。不能手术，因此前来求治。

检查：诊脉平弱，舌质淡白，现在仍然头痛，必须吃止痛片，否则剧痛，呕吐，昏晕，甚则倒仆，若感冒则头痛更剧，大便正常，食欲尚可，月经已停2年，面色蜡黄，形体消瘦，心烦易怒，目前医院医生除开有止痛片外，还开有维生素B_1、维生素C和太阳神，服后食欲有所增加但神疲无力，嗜睡懒言，视物不清，手指及脚趾麻木，感觉失调。

辨证：气血两虚，瘀血阻络。

治法：益气活血，祛瘀通络，此症非汤剂所宜，当用丸剂徐徐图功。

处方丸剂：

黄芪　红参　当归　丹参　乳香　没药　水蛭　土鳖虫　地龙　牛膝　山楂　赤芍　川芎　生地　土茯苓　建曲

鸡血藤膏　共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服一丸，温开水送服，若感冒咳嗽即停服，愈后续服。

1992年1月30日二诊：上丸方连服2剂，并日服3次，现在头痛只偶尔出现，瞬间即逝，且服丸药以来从未感冒过，只大便干燥。

处方：

上丸方中加：麦冬　大云　元参　守宫　干蟾皮　蟑螂　三棱　莪术　菟丝子　枸杞子

9月29日三诊：上丸方连服2剂，头痛已止，形体已丰，面色红润，大便正常，已不干燥，眠食俱佳，经医院脑血管造影：右CAS未见异常。停药。

1995年10月来蓉开会，登门看望，其神采奕奕与当年憔悴情形判若两人矣。1999年春节，专程来蓉表示感谢。

二、舌血管瘤

戴××　女　19岁　上海市　大学生

1989年2月18日初诊：

其父母代述：17岁突然在一个早上发现舌头肿大，语言发生障碍，微有胀痛，当即去医院诊治，服消炎药，打青霉素即

消退，但反复发作；今年1月复发时，较以前几次严重，除服药外，打了18支青霉素均未控制住，又打了另一种针药，方有好转。现住成都一家大医院，诊断为血管瘤，医院坚持手术，要割去大部分舌头。本人不愿，因她学的是旅游专业，割去舌头的三分之二就成了废人，因此特来求治，务请设法救治。

检查：诊脉细数102次/分，舌苔黄厚而腻，不渴饮亦不思食，舌中心长一包块如拇指头大，语言障碍，压痛、进食困难，月经每月超前约一周，一般五日即净，现正月经第四天，大便正常，一日一行，平素嗜食辣椒及煎炒、油炸、香燥之物。早上口苦、口腻。

辨证：湿热蕴毒。

治法：清热除湿解毒，佐以活血化瘀。

处方：龙胆泻肝汤加减。

细生地20克　生栀子10克　丹皮15克　柴胡10克　龙胆草10克　土茯苓30克　黄芩30克　赤芍20克　生石膏30克　福泽泻18克　黄连10克　银花30克　连翘30克　生甘草5克

2剂，水煎服。

2月21日二诊：服上方3剂(服2剂后觉效佳，又自行再服1剂)，舌上肿块大消，说话较前灵活，自觉服药后大小便通畅、舒服，进食亦不像过去困难，黄厚腻苔大退，因此坚决出院，于今日已办出院手续，口苦消失，口腻大减，已知饥。

处方：

生地30克　淡竹叶10克　黄连10克　露蜂房10克　连翘30克　生栀子10克　丹参30克　白花蛇舌草30克　木通15克　生甘草5克　灯芯一扎

8剂，水煎服。

3月3日三诊：舌上肿瘤消去大半，黄腻苔退净，脉数78

次/分，眠食俱佳，二便正常，因将返校，改用丸剂，嘱其勿食辛辣香燥之物。

处方：

全当归 丹参 黄芪 北沙参 莲子芯 丹皮 山药 半枝莲 露蜂房 乳香 没药 山慈姑 川黄连 生地 枣皮 茯苓 鸡血藤膏 泽泻 土茯苓 建曲 白花蛇舌草 生甘草

共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸。

7月18日四诊：学校放暑假，因此来成都就诊，言服上丸约2剂后，舌上肿瘤已消，且未再发，虑其复发，要求再开丸药处方，并说：舌头左边似比右边微微高一点，因此感到担心，诊其脉，尺部稍有不足，在上丸剂中加菟丝子、枸杞子、女贞子、桑椹子、覆盆子、沙苑子。

1990年1月24日又来成都，言舌上肿瘤消后未有反复，因月经不调，为之处方。

1992年3月23日遇其父，询其病况，言大学毕业后，随其爱人已分配在湖北工作，舌上血管瘤消失后，情况良好，没有反复。1998年暑天与其父遇于街头，询之，一切俱佳。

按：患者脉数每分钟达102次，舌苔黄厚而腻，口苦、口腻，其为湿热可知。通过问诊，知其嗜食辛辣、煎炒、油炸、香燥之物，长期偏嗜，必然蕴毒、伤气、伤血、心主血，舌为心之苗，湿热毒气结于舌上，故先用龙胆泻肝汤加减清热除湿解毒，佐以赤芍、丹皮、生地、丹参等活血化瘀。初步获效之后，继用导赤散加味清血分之热，解血分之毒，肿瘤消去大半之后，因将返校，乃改用丸剂，益气养血、活血化瘀、除湿解毒、散结消瘤。方中白花蛇舌草，清热解毒、消炎止痛、活血散瘀，既能抑制肿瘤细胞的生长，又能增强机体的免疫功能；半枝莲清热解毒，除湿消肿；山慈姑化痰散结，解毒消肿；露蜂房驱风攻毒，散恶疽恶毒，根在脏腑者；土茯苓解毒、祛湿热、消肿毒。诸药用于益气养血，

活血化瘀，调补肝肾等味之中，共奏清热解毒除湿，益气活血消瘀之功，使邪去而正不伤也。

三、颈淋巴团块

李××　女　46岁　崇州市　教师

1994年8月5日初诊：

自诉：颈部生一包块，已10余年，最初很小，逐渐长大，近两年来，迅速长大，医院诊断为“颈右侧淋巴团块，约8厘米×7.5厘米，疼痛”。医院建议手术，我一亲戚也曾患过这个病，手术割除过后又复发了，发了又割，最后病故，因此我决定不做手术。过去也吃中药，效果不大，自己不知如何是好，这时候有同志介绍我来找您，今天我们一同来了。

检查：诊脉浮弦，苔黄而粗，口苦甚，吃任何东西都是苦的，口干喜饮，饮不解渴，大便不干燥，但解便不畅，许久方能解出，44岁月经即断，颈右侧根部生一包块，质硬，大小如医院检查，疼痛拒按。形体尚壮。过去眠食俱佳，现不思饮食，无食欲，睡眠亦较过去差，最近感冒，自称服药已愈。

辨证：痰气凝结，但外感未尽，邪在少阳、阳明。

治法：消痰散结，表里同治。

处方：小柴胡汤合白虎汤加减。

柴胡15克　黄芩15克　龙胆草10克　黄芪30克　石膏30克　花粉30克　夏枯草20克　昆布30克　海藻30克　玄参15克　生牡蛎30克　浙贝母15克　大甘草10克(4剂)

8月12日二诊，粗黄苔大退，口苦大减，包块较前稍软，稍有减小。

处方：

上处方加全虫 10 克　大蜈蚣 3 条(4 剂)

8 月 19 日三诊：颈右侧包块消去大半，口苦止，渴饮愈，黄苔退净，眠食转佳。

8 月 27 日四诊：颈右侧包块变为两个，一个有小指头大，一个略比小指头大一点，疼痛在二诊时即消失，效不更方，原方去白虎汤，小柴胡汤减其制，再服 4 剂，包块完全消失即停服，若 4 剂后尚有根蒂，加白芥子 10 克、皂角刺 10 克、瓦楞子 30 克，服至消无芥蒂为止。

1994 年 10 月带信来称："加白芥子、瓦楞子、皂角刺等药服 2 剂后，就完全好了。"并表示谢意。

按：颈淋巴团块乃西医病名，中医治病关键在于辨证，而不在病名如何，据其形症与瘰疬极为相似，当属痰气凝结，故消痰散结为正治之法，但外邪未尽，邪在少阳、阳明，因用小柴胡汤和解少阳，白虎汤以清阳明，加消瘰丸、昆布、海藻、夏枯草消痰散结；二诊时加全虫、蜈蚣；四诊时更加白芥子等药。都是加强消痰散结的作用，因其形体尚壮，故能如此用药，若其体虚，则不宜如此攻伐也。

四、颈部包块(一)

——甲状腺肿大

游××　女　41 岁　成都市　居民

1981 年 12 月 7 日初诊：

自诉：颈部左侧长一包块，初如拇指大，逐渐长大已三

年。最近一月以来，颈部不能转动，转动则痛甚，乃去华西医大附院检查，诊断为甲状腺肿大，建议手术治疗，本人不愿，因来求治。

检查：诊脉弦弱，左尺为甚，结代，舌质淡白无华，血压80/60毫米汞柱，颈部左侧包块大如桃，质坚硬、拒按，颈部不能左右顾，转动则痛甚，眠差、梦多、易惊醒，无故自惊，舌边齿痕密布。疲倦易累。

辨证：气血两亏，痰气凝结。

治法：补气益血，活血通络，消痰散结。

处方：

昆布30克　海藻30克　甘草10克　黄芪50克　当归12克　赤芍10克　生地20克　夏枯草30克　没药10克　葛根20克　蜈蚣3条　炒五灵脂10克　全蝎6克　生牡蛎30克

4剂，水煎服。

1983年2月7日二诊：上方连服4剂后，感到有效，又服4剂，又因药味不全，多处找药，故迟至今日方来二诊，现在颈部包块已软，痛已止；颈部已能自由转动，精神较前为好，余症如故。

处方：

黄芪50克　路党参30克　昆布30克　海藻30克　柴胡12克　夏枯草30克　白芍20克　当归12克　香附10克　川贝母10克　生牡蛎30克　甘草10克　生龙骨30克

10剂，水煎服。

6月6日三诊：上方连服10剂后，包块已大大缩小如黄豆大，精神、睡眠、饮食等大见好转，自认为病愈，因停药，现在颈部包块又长大了，且疼痛又作，眠差、梦多、大便干燥异常，因又来求治。

诊脉沉、弦、弱，舌质淡白无华，舌边尚有齿印。

处方：

黄芪　路党参　玄参　牡蛎　柴胡　川贝母　白芍　当归　生地　五灵脂　丹参　昆布　海藻　肉苁蓉　香附　生大黄　连翘　炒麦芽　全蝎　蜈蚣　甘草　没药

共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸。

此方连服3剂，诸症悉愈，包块消失，习惯性便秘亦愈；1985年3月因患咳嗽久不愈，前来就诊，言包块愈后未再复发。

按：此类疾患，中医皆归之于痰，但病者气血两亏，故用补气益血、通络止痛、消痰散结之法。方中黄氏、党参、当归、丹参、白芍、生地补气益血；当归、丹参、没药、五灵脂、蜈蚣、全蝎活血，通络，止痛；痰凝气结多由肝气不舒，故用柴胡、白芍、当归、香附疏肝理气，养血柔肝；用玄参、牡蛎、贝母、昆布、海藻、夏枯草、连翘消痰散结，海藻配甘草则消痰之力更强；用玄参、生地、肉苁蓉润肠通便，以药切病机，故奏全功。

五、颈部包块(二)

陈××　女　16岁　成都市　学生

1991年1月27日初诊：

其母代述：在一个星期之内，颈部右部突然出现包块，而且迅速长大，开始只有桂圆那样大，几天功夫长得像个桃子，已去过几个医院检查，未能确诊，都建议中医治疗。

检查：诊脉浮数，舌红，苔黄，颈部包块约6厘米×6厘

米，触之痛，咽痛，头面浮肿，肢肿按之起凹，头面为甚。

辨证：气瘿、外感风热。

治法：解表兼以消瘿、消肿(风水)。

处方：银翘马勃散合越婢汤加减。

银花30克　连翘30克　射干10克　马勃10克　麻黄10克　石膏30克　柴胡15克　夏枯草20克　海藻30克　昆布30克　赤药10克　大青叶15克　大枣10克　甘草6克(5剂)

2月10日二诊：咽痛止，颈部包块消失，全身浮肿亦消。

处方：

柴胡10克　黄芩10克　法夏10克　泡参12克　香附10克　赤芍10克　海藻15克　昆布15克　夏枯草15克　大枣10克　甘草5克(4剂)

1992年10月，其母因病前来就诊，言颈部包块消失未再复发，也未再肿。

按：任何疾患兼有表证者，当先解表或表里同治，往往可收事半功倍之效。此症包块数日之内迅速长大，乃表证促进之故。故治疗此病，解表是重要一着，咽痛、脉浮而数是为外感风热之邪；全身浮肿，头面为甚、脉浮是为风水；包块在颈之右侧，属少阳；触之痛，但质软，故诊为气瘿，气瘿不痛而触之痛者，乃表证作祟。故用银翘马勃散合越婢汤解表清里、消肿、治咽痛；以柴胡、赤芍、香附疏肝、活血、理气；昆布、海藻、夏枯草消瘿；甘草、大枣和中，使清热而不伤脾胃；海藻配甘草，其消瘿之力更强，切不可因其相反而弃之不用也。

六、颈部包块(三)
——颈部淋巴结核

雷××　48岁　成都市　干部

1982年3月19日初诊：

自诉：三年前发现颈部右侧长一包块，如核桃大小，痛，拒按，因在本市医院治疗，确诊为颈淋巴结核，服药并注射青链霉素后，缩小如胡豆大，停药，则复发如故，现已反复数次，治疗已达三年之久，因人介绍，特来求治。

检查：诊脉弦数，舌淡无苔，颈部右侧包块大如鸡蛋，质坚硬，可推移，光滑无结节，疼痛拒按，大声说话痛，呼吸亦痛；鼻孔经常发炎，右鼻孔为甚；唇与口腔粘膜经常发炎糜烂，大便数日一行，但不干燥，小便正常，眠食尚可。

辨证：肝郁不舒，痰气凝结。

治法：疏肝解郁，消痰散结。

处方：逍遥散加减。

柴胡10克　白芍15克　香附15克　浙贝母10克　昆布30克　海藻30克　连翘20克　夏枯草30克　生地15克　全蝎5克　蜈蚣3条　生牡蛎30克　焦栀子10克　生甘草6克

4剂，水煎服。

3月24日二诊：服上方4剂，痛止，质稍变软，唇疮已愈，但下唇左侧又生一疮。

处方：

上方加玄参20克　丹皮12克（4剂）

3月29日：服上方4剂后，唇疮已愈，愈后未再发，颈部包块痛止未再作，按之亦不痛，大便已行但不畅，须努挣许久，脉弦弱，舌质淡无苔。

处方：

柴胡10克　赤芍15克　香附10克　夏枯草30克　黄芪30克　昆布30克　海藻30克　生牡蛎30克　玄参20克　浙贝母15克　生甘草6克（6剂）

因本人出差，中断治疗，介绍重庆老友用药酒为之治疗。

1983年3月4日三诊：

自诉：因老师开会、出差，介绍我以重庆某老师之药酒治疗，在药酒未制好时，连服上方18剂量，包块已缩小如食指头大。此时药酒制好，接服药酒现已一年余，效果不显著，右侧包块过去按都不痛，现在出现按压痛，而左侧又生一块；口腔糜烂和鼻孔炎症本已痊愈，现又有发作之势，鼻孔干燥异常。诊脉沉弦弱，舌淡胖无苔，舌边齿痕密布；大便溏，数日一行，须努挣许久方解一点。

处方：

黄芪60克　党参30克　柴胡20克　白芍30克　当归15克　丹参30克　海藻30克　昆布30克　玄参20克　僵蚕10克　香附10克　青皮10克　生牡蛎30克　夏枯草30克　浙贝母15克　甘草10克

6剂，水煎服。

3月11日四诊：服上方后，自觉短气和解大便有明显好转。精神亦有好转，其余诸症无明显感觉。精思久之，改用丸剂。

处方：

黄芪　晒参　玄参　大青盐　花粉　海藻　连翘　海蛤粉　当归　硝石　枳壳　浙贝母　白薇　甘草　昆布　熟大黄　三棱　莪术　山药　生牡蛎　桔梗　柴胡　白芍　佛手片

上24味共研细末，以夏枯草膏250克加炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸，白开水送服。

1983年9月29日五诊：服上丸2剂右侧包块消失，左侧已缩小如拇指头大，口鼻炎症未发，大便通畅，精神壮旺，眠食俱佳，脉平、舌淡，齿印大消。

处方：按上丸方再进1剂，病愈。

1991年6月随访，愈后未复发。

按：包块生于颈部两侧，乃少阳经循行部位，且脉弦数，故用逍遥散加减，疏肝解郁，且以引经；昆布、海藻、连翘、夏枯草、焦栀子、玄参、浙贝母、生牡蛎清热散结，软坚消痰；全蝎、蜈蚣合用为止痉散，不但止痛有卓效，且对瘰疬、淋巴结核亦有卓越疗效。服后取得明显效果。因去北京、西安等地开会，接连出差，担心贻误治疗，因推荐重庆善治肿瘤之老友为之诊治；老友之秘方药酒对治肿瘤素享盛名，其不效者，乃病者本人素不饮酒，不能适应，而药酒中多为克伐之剂、无益气补血之味以驾驭之。此时又转而求治于余，其脉弦弱，舌质胖、舌边齿印密布，气短、易累乃气虚之像，舌质淡白无华乃血虚之像，气主煦之，血主濡之，二便方能通畅，今气虚不煦或煦之不足，推送无力，血虚不足以濡，故大便虽溏而努挣难出，服汤剂6剂后，只短气，解大便、精神有所好转，而包块为之巍然不动，知汤剂已不能成功，改用丸剂徐徐消之。丸剂中用参芪以驾驭其他诸药，所以有节制之师，则可立于不败之地，祛邪而不伤正也。方中大青盐，又名戎盐，功能“助水脏，益精气，除五脏症结，心腹积聚”，且能“入肾，软坚散结”(《日华子本草》)，故重用达150克之多；硝石功能“破积散坚，解毒消肿”(《本草纲目》)；白薇能“杀痨瘵之虫”(《本草新编》)，“治肺结核潮热”(《常用中草药》)，又治“瘰疬”(《贵州草药》)；连翘功能“清热解毒，散结消肿”，“治瘰疬结核不消”(《杨氏家藏方》)；大黄“破症瘕积聚”(《本经》)，“宣通一切气，调血脉”；牡蛎、贝母、玄参为消瘰丸；昆布、

海藻、海哈粉均有清热消痰、软坚散结之功，为消散瘿瘤、瘰疬、结核之要药；夏枯草功能清肝、散结，“行肝气、开肝郁、散瘰疬、周身结核”(《滇南本草》)，以之熬膏加炼蜜和诸药为丸，其力愈大，其效愈速，以数年之顽疾，3 剂而消无芥蒂矣。

七、瘰疬(颈淋巴结核)

张××　女　33 岁　成都市　大学副教授

1996 年 6 月 5 日初诊：

自诉：颈项两侧耳后忽生肿瘤数个，因痛才发觉，当即去医院检查，全家人都害怕是癌，但医院初步诊断为颈淋巴结核，又说要确认必须作活检，经治两月效不佳，且疼痛加剧，包块不断长大；又去另一家医院，诊为慢性颈淋巴结炎，打针、吃药一个多月仍无效，因熟人介绍，前来求治。

检查：诊脉，右脉沉弦弱，时有歇止，左脉浮弦，舌苔薄白，耳后颈部两侧各有包块数枚，按之痛加剧，不按则痛不甚，大者如拇指头，小者如小指头；颈后以大椎穴为中心周围一片剧痒，面积约一巴掌大小，因不时搔抓，抓痕累累，且有血痕；精神不振，累甚，讲课中，时时气不接续，短气，哈欠连连；饮食一般，吃饭不香，口苦、口干喜饮，饮不解渴；大便稀溏，间日一行，不易解出；月经基本对月，量少、色黯，有瘀块。

辨证：瘰疬位于少阳部位，乃由肝气郁结，气滞伤脾，脾失健运，痰热内生，结于颈项而成此症；今病者精神不振，气

短不续，哈欠连连，倦怠累甚，右脉沉弱，时有歇止，月经量少色黯，大便溏而不易解出，是为气血两虚；左脉浮弦，舌苔薄白，进食不香，口苦，口干喜饮，饮不解渴，乃夹有外感，邪入少阳、阳明。

治法：第一步解表清里，兼化痰散结；第二步补气养血，化痰散结。

处方：小柴胡汤合白虎汤加减。

黄芪60克　柴胡20克　黄芩20克　法夏15克　石膏30克　花粉30克　昆布20克　海藻20克　全蝎10克　蜈蚣3条　茯苓15克　甘草10克

粳米1撮，3剂，水煎服。

6月10日二诊：口苦止，口干喜饮大减，“时冷时热的现象这几个月来自得病就有，现在没有了，感到舒服了，精神好得多了”；颈项两侧瘰疬缩小，大椎穴周围一片剧痒大减；薄白苔退，脉沉弦弱。

处方：

上方黄芪加为100克，加党参30克，减柴胡、黄芩为5克，去石膏、花粉，加猫爪草20克，石斛30克(3剂)

6月14日三诊：口干喜饮消失，大椎穴周围剧痒消失，精神、食欲均较前有明显好转，颈两侧瘰疬小的各二枚已消失，大的已缩小为胡豆大、豌豆大、质硬、平时已不痛，按之方痛。

处方：

黄芪100克　防风15克　白术30克　柴胡15克　白芍15克　茯苓15克　昆布20克　海藻20克　全蝎10克　蜈蚣3条　夏枯草20克　猫爪草20克　建曲15克　甘草15克

3剂，服完后接服下列丸剂：

黄芪　防风　白术　红参　归身　川芎　青皮　陈皮　柴

胡　白芍　连翘　皂角刺　守宫　猫爪草　花粉　夏枯草　桔梗　建曲　海浮石　昆布　海藻　独活　炒谷芽　生牡蛎

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，温开水送服。七日后在中午加服1丸。

8月22日陪其母前来就诊，称：项上瘰疬，已消无芥蒂矣；而丸药尚未服完，嘱其服完为好。她说："在医院前后检查治疗三个多月花了5千多元没医好，而服中药汤剂9剂，丸药1剂还未吃完就好了，总共才花了400多元，所以我陪我母亲到您这里来治。她的病也是好几年了，花的钱不少哩！"询其精神、月经、饮食、二便等情况，她表示"比过去好多了，特别是大便，不但业已成形，且毫不费力就解了，通畅舒适是前所未有，月经的量较前增加，经色转红……食欲明显好转。"

八、结喉两侧包块

曾××　男　61岁　四川省梁平人

1993年4月4日初诊：

自诉：下颏两边长了两个包块，老伴发现时只有鸽子蛋大小，不痛不痒，故未医治，近半年多来，长得很快，老伴多次催我来成都治疗，经人介绍，前来求治。

检查：诊脉浮数，苔黄厚腻，口干不喜饮，咳，痰少而稠，口苦、清涕、鼻塞(途中感冒)；结喉两侧各长一包块，右侧约鸡蛋大，左侧略小，质软，按之不痛；除有重坠感之外，无其他不适，高兴时重坠感亦不觉；大便正常，小便淋漓不尽，须努挣许久，大便亦然；头昏，周身微觉不适。

辨证：气瘿兼有外感。

治法：当先解表。

处方：麻杏石甘汤加味。

麻黄6克　杏仁10克　石膏30克　黄芩10克　柴胡10克　前胡10克　桔梗10克　枳壳10克　浙贝母12克　夏枯草18克　甘草3克　苍术10克

2剂，水煎服。

4月8日二诊：服上方2剂后清涕、鼻塞、头昏、口苦、周身不适俱消失，咳亦减，气瘿消去约三分之一；诊脉弦数、黄厚腻苔大退，脉尚有浮象；治以舒肝理气、解郁消瘿为主。

处方：海藻玉壶汤加减。

海藻18克　昆布18克　夏枯草18克　浙贝母18克　川芎10克　青皮10克　海螵蛸18克　海浮石15克　连翘30克　花粉18克　生黄芪30克　香白芷10克

2剂，水煎服。

4月11日三诊：黄苔退净，咳止，气瘿消去三分之二强，但脉尚浮，小便淋漓不尽有所改善。

处方：玉屏风散合海藻玉壶汤加减。

黄芪60克　防风18克　白术30克　柴胡10克　香附10克　白芍12克　当归10克　海藻30克　夏枯草30克　浙贝母15克　甘草10克

4剂，水煎服。

4月18日四诊：气瘿已消，小便淋漓基本消失，眠食俱佳，要求善后之策，以玉屏风散合逍遥散加全瓜蒌，嘱其多服数剂。

按：初诊时在麻杏石甘汤中加入柴胡、前胡，既有解表降气止咳作用，亦有舒肝解郁之功；夏枯草清肝、消肿、散结；浙贝母消痰止咳散结，服2剂气瘿即消去三分之一。为以后用

海藻玉壶汤奠定基础，表证已解，而脉尚浮，乃表虚之故，因用玉屏散合海藻玉壶汤加减以固表实卫消瘿，4 剂而气瘿消散，小便淋漓亦大有改善，此黄芪益气之功也。最后用玉屏风合逍遥散善后以益气固卫、疏肝解郁、加瓜蒌消痰。

九、面颌左侧包块

蔡××　女　39 岁　成都市　医务工作者

1990 年 3 月 18 日初诊：

自诉：面颌左侧紧挨颈部长一包块有大拇指头大，不痛，未长大，也无感觉，已 10 余年，未予注意。今年春节后，忽然疼痛如抽掣，并且长大，赶快去医院检查，经活检，排除癌，建议做手术；有友人建议我吃药化，我想先吃一段时间的药，化不了再考虑手术。

检查：诊脉浮弦弱，舌淡、头昏、咽痛，面颌左侧紧挨颈部长一包块如核桃，质略硬，按之微痛，抽掣样痛，只偶有出现，一二天不过出现一二次或二三次而已，且很短暂，瞬间即逝；眠、食尚佳，时有心烦不舒，有郁闷感，大便干燥异常，状如羊矢，月经正常。

辨证：气瘿、兼有外感。

治法：疏肝解郁，益气消瘿，当先解表。

处方：银翘散合银翘马勃散加减：

银花 30 克　连翘 25 克　射干 10 克　马勃 10 克　荆芥 10 克　薄荷 10 克　桔梗 10 克　大力子 10 克　玄参 10 克　甘草 5 克

2 剂，水煎服。

3月21日二诊：咽痛止，包块抽掣样痛消失，按之质变软，已不拒按，余症如故。

处方：

柴胡15克　白芍30克　香附10克　青皮10克　黄芪30克　海藻30克　昆布30克　夏枯草18克　枳壳10克　生地30克　元参30克　黄药子10克　甘草10克

4剂，水煎服。

3月25日三诊：心情较前舒畅，大便较前易解，已不像羊矢了，但仍然干燥；包块好像消了一点，总之已经不痛了，按它已软了。

处方：

黄芪30克　太子参30克　白蒺藜30克　海藻30克　昆布30克　海哈壳30克　杭白芍30克　柴胡12克　青皮10克　制香附10克　肉苁蓉30克　生地30克　玄参30克　甘草10克

5剂，水煎服。

4月1日四诊：气瘿已消，大便已调，心情更觉舒畅，但病者顾虑复发，乃以丸药善后。

处方：

黄芪　北沙参　太子参　柴胡　白芍　天麦冬　生熟地　佛手　当归　白蒺藜　肉苁蓉　香附　海藻　海哈粉　天花粉　枸杞子　合欢皮　建曲

共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸。因其经常介绍病人前来就诊，知其愈后未有反复。

按：病者情志抑郁，肝失条达，遂使肝旺气滞，结为气瘿，气瘿之为病，质软不痛，出现质略硬，抽掣痛者，以其有外感也，外感愈即随之而愈，方中诸药皆疏肝解郁，益气消瘿之品。药符病机，故奏捷效。

十、右耳后区及左腕关节包块

郑××　男　59岁　成都市　干部

1996年7月29日初诊：

自诉：右手腕关节，生了三个包块已七八年，中间一个大约有半个胡豆大，上下两个各有豌豆大小，七八年来，没有痛过，也就没有注意；两月前忽然出现疼痛，同时右耳根后出现一个包块有食指头大，也因出现疼痛才引起注意，当即去医院检查。医院认为要确诊即须做活检，建议手术治疗。本人不愿，前来求治。

检查：诊脉弦弱，舌质淡无苔，右腕关节列缺穴前包块三个，大小如病者所述，按之痛，不按亦痛，右耳根后包块一个如拇指头大，质均较硬；平时疲倦易累，大便数日一行，并不干燥；饮食一般，睡眠尚可，但不深不熟，梦多；曾患冠心病、心绞痛，经用中药丸药治疗后至今已两年又七个月，心绞痛未再发作。

辨证：气血两虚，痰瘀互结。

治法：补气益血，消痰祛瘀，软坚散结。

处方：

黄芪60克　当归15克　川芎10克　赤芍15克　全蝎10克　蜈蚣3条　昆布20克　海藻20克　柴胡15克　姜黄10克　夏枯草20克　浙贝母15克　甘草10克　（3剂）

9月3日二诊：上处方服6剂右耳根后包块消失，左腕列缺穴处三个包块，小的两个已经消失，大的一个已缩小如绿豆大，服药2剂后疼痛即消；因连连出差开会延至今日方再复诊，诊脉气分仍嫌不足，左脉且有浮象，询之，果曾感冒，已服西药并打针。

处方：

按上方加独活10克　防风10克　黄芩10克　黄芪改用90克　（4剂）

9月10日三诊：右腕包块消失。

十一、胸部包块

赵××　男　37岁　绵阳市　干部

1990年7月27日初诊：

自诉：左胸皮下长一条状硬块，因痛才发现，当地医院未查出属于何种肿瘤，因介绍到成都的医院检查，也未查出，医院要做活检，本人不愿，因人介绍，前来求治。

检查：诊脉浮弦，苔薄白，左胸皮下长一条状硬块，长约一小指，宽如指，按之痛，不按时，阵发性痛，其痛如刺，发现已二月余，发现时尚无现在这样大；头痛、头重、周身酸楚，自觉精力不济，口无味，不思食。

辨证：气血瘀滞，外感风寒。

治法：行瘀活血，当先解表。

处方：荆防败毒散2剂，水煎服。

7月28日二诊：服上处方2剂后外感诸症悉愈，疼痛减轻，因又服2剂方来就诊，诊脉弦，舌无苔，刺痛减轻。

处方：

归尾15克　川芎10克　赤芍15克　桃仁10克　红花10克　生地15克　牛膝10克　柴胡15克　桔梗10克　枳壳10克　郁金15克　甘草5克

5 剂，水煎服。

1992 年 8 月 6 日因带其亲戚前来就诊，方知服上方 15 剂后，包块方才消失。至今年余，未有反复。所用之方即血府逐瘀汤加郁金是也。

十二、乳房包块

杨××　女　38 岁　成都市　工厂职工

1988 年 5 月 15 日初诊：

自诉：双乳房长满了包块，已在两个医院检查，第一个医院说是乳腺小叶增生，串珠状；第二个医院检查后，告知要活检才能确诊。两家医院共同的意见是做手术，但有熟人告诉我，手术做了，以后又要发，她就是这样的，因此介绍来请您治疗。

检查：诊脉浮弦，苔黄，口苦、口渴但不甚喜饮；双乳包块如串珠，充满乳房，质坚硬，疼痛，最大者如小鸡蛋，次者如核桃大小，小者如鸽蛋、如葡萄，胀痛拒按，经来之前胀痛加剧；月经每月提前五六天，有时七八天，色紫暗，瘀块大而多，经来第二、第三天量特多，以后逐渐减少，最后两天色淡、质清如水，完全干净少则七八天，多则十一二天，经来小腹胀痛。大便不畅，偏干燥，嗜食辛辣厚味，平时烦躁，经来特别烦躁，易感冒，易疲倦，饮食尚可，但最近感冒后吃不得，食即欲呕，喝水亦呕。

辨证：气血两虚，冲任失调，痰瘀互结，感冒后邪入少阳，阳明。

治法：补气血，调冲任，活血化瘀，疏肝理气，消痰散

结，当先解表，和少阳，清阳明为治。

处方一：玉屏风散合小柴胡汤、白虎汤加减。

黄芪60克 防风15克 白术30克 柴胡15克 黄芩15克 姜半夏20克 竹茹10克 石膏30克 花粉30克 砂仁10克 甘草6克 （3剂）

处方二：玉屏风散合逍遥散加减。

黄芪60克 防风15克 白术30克 柴胡15克 白芍20克 当归10克 生熟地各15克 枣皮10克 香附10克 郁金15克 川楝子10克 橘叶6克 丝瓜络10克 （3剂）

5月22日二诊：服处方一，3剂后口苦、口干不喜饮、呕等俱愈，大便较前为畅；服处方二后双侧乳房不那么胀痛，感到舒服。但月经快来了，可能就在5月25日前后，已往在这时候，乳房又胀又痛，这次好多了。

处方：

黄芪60克 防风15克 白术30克 当归15克 川芎6克 赤芍10克 生地20克 桃仁10克 红花10克 香附10克 青皮10克 元胡10克 橘叶6克 （4剂）

5月29日三诊：月经在5月25日早晨至，乌黑瘀块大大减少，经前乳房胀痛大大减轻，小腹痛也大为减轻，只感到隐隐作痛。但又感冒，项背强痛不能转侧、头痛、经来已五天，来势凶的两天已经过去了，但此次量尚多，已往在经期感冒了，不但量多，而且拖的时间很长，诊脉浮弦数、苔黄、口苦、口干喜饮，大便正常、头重、头痛，一身尽痛。

处方：

羌活胜湿汤加石膏、花粉、黄芩、羌独活各10克 藁本10克 防风10克 川芎10克 蔓荆子10克 黄芩15克 石膏30克 花粉30克 黄芪60克 白术30克 建曲15克 甘草6克

3剂，服完后接服下丸剂：

黄芪　防风　白术　太子参　当归　乳香　没药　丹参　鹿角尖　海藻　甲珠　牡蛎　黄药子　连翘　香附　青皮　山楂核　橘核　皂角刺　山药　生鳖甲　郁金　浙贝母　橘络　土鳖虫　枸杞子　菟丝子　枣皮　生熟地　当归　白芍　柴胡　女贞子30克　鸡内金30克　建曲30克

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每次服1丸，日服3次，温开水送服。

7月10日四诊：上次月经是6月20日至，较之过去只提前了五天，经期四天，比过去至少缩短了五天，过去经来疲倦异常，必须请假休息，此次仍然坚持上班，经来之前乳房胀痛已无感觉，乌黑色瘀块大大减少，一月多未感冒。

处方：坚持服丸药，不另处方。

10月23日五诊：丸药还可服三天，特再来配制，自服丸药以来一是没有感冒过，二是精神很好，三是乳房包块大为缩小，四是痛经(小腹痛、乳房胀痛)消失，五是经期缩短，一般五天就干净了，六是月经提前只有四五天了；现在睡眠、饮食都比过去好了。要求仍服丸药，认为效果好、服用方便、价廉。诊脉弦弱，舌质淡，舌边有齿印。

处方：

在前丸方中加鸡血藤膏，以红参易太子参，再服1剂。

1989年10月29日六诊：丸药连服3剂，月经已调，乳中包块消失，面色红润，形体已健。要求再服丸药善后，乃以八珍益母汤如黄芪为丸服之。

按：妇女患此症者为数不少，手术之后往往复发，因手术只能摘除有形之包块，不可能摘除长包块之病因；祖国医学则可标本兼治，扶正与祛邪兼施，不但病要痊愈，而且身体要长好。气血两虚的病人往往容易感冒，而表证不解，则难于治里，

故治表证为第一要着，而治此类病人之表证，仍须用扶正祛邪之法，故汤剂和丸剂之中皆用玉屏风散，即是为此。对于此类疾病，只宜徐徐图功，不宜投以猛药厚味，即不宜汤剂；丸者缓也，且丸药有综合施治之优点，覆盖面广，既有重点，又照顾到全面，由小的量变进入大的量变，由小的质变发展到大的质变，大环境改变了，局部小环境也必然改变。一方面用参、芪、归、术等补益气血，调理冲任；另一方面用柴胡、香附、青皮等疏肝理气；用土鳖虫、甲珠等活血化瘀；用生鳖甲、浙贝母、海藻、生牡蛎、皂角刺等消痰散结。连服四剂方奏全功。

十三、胃部包块

张××　女　36岁　成都市　职工

1992年2月23日初诊：

自诉：胃痛已数年，现在发现胃上长一包块，去单位职工医院检查，医生摸了一下，又做B超，在剑突下有一椭圆形包块，约5.6厘米×4.3厘米大小，疑是胃癌，提出要开刀，我惧怕开刀，我单位有一个人开了刀不久又复发；因友人介绍，前来求治。

检查：诊脉沉弦涩，舌质红，无苔，剑突下略偏左有一包块，约鸡蛋大小，质硬，平卧即可见，胃痛即在此处，拒按，按之痛加剧，常服吗丁啉。月经正常，大便干燥异常，一个星期可望解一次大便；睡眠尚可，饮食不敢多吃，晚上这一餐不敢吃；性淡漠、性反感。

辨证：气虚血瘀，肝郁不舒。

治法：补气养血，活血祛瘀，舒肝解郁，增液行舟。

处方：四逆散合增液汤加味。

柴胡12克　白芍30克　丹皮15克　生地30克　元参30克　麦冬30克　赤芍15克　丹参30克　莪术10克　木香10克　郁金15克　大云30克

4剂，水煎服。

3月8日二诊：胃痛已止，但原痛处如有物压；大便已不干燥，但仍数日一行；舌质红稍减。

处方：

上处方加黄芪60克，白术15克，枳实、建曲各10克

4剂，水煎服。

3月15日三诊：本周解大便二次，从未有的通畅痛快，胃隐痛又作，短暂。

处方：

黄芪60克　太子参30克　全当归18克　丹参30克　三棱10克　生大黄9克　莪术10克　土鳖虫10克　海藻15克　肉苁蓉30克　炒五灵脂10克　没药10克

4剂，水煎服。

3月29日四诊：上处方服4剂后，感到效果很好，因又服4剂，大便通畅，胃隐痛已止，两周来未再作痛，自觉包块已大大缩小；但出现气不接续，抽长气(过去有过已消失)，一时性头眩晕，如荡秋千，但几秒即过去；诊脉弦弱，舌质正常。

处方：

上处方中减三棱、莪术、生大黄各为6克，加升麻、柴胡各10克。

4剂，水煎服，嘱其不可过剂。

以后即在此方的基础上加减出入，当黄芪加到90克、党参60克时一时性眩晕即消失；小腹出现下坠感时加升麻、柴

胡各 15 克。4 月 19 日七诊包块明显变软缩小，因去大黄，加昆布、海藻各 30 克，菟丝子、枸杞子各 15 克。治疗过程中感冒一次，停药治感冒，月经期停药三次。6 月 7 日包块已摸不着，6 月 14 日经该单位职工医院复查包块消失，用八珍汤加黄芪 90 克、菟丝子 20 克、枸杞子 20 克、桑椹子 15 克、仙灵脾 15 克善后，嘱其多服几剂。

按：本病以用丸剂攻补兼施，扶正祛邪为最佳方案，但病者对服丸药颇感困难，故只好用汤剂消息之。方中黄芪、党参、白术补气；当归、丹参、白芍、生地、枸杞子补血；三棱、莪术、土鳖虫、五灵脂、没药活血化瘀、消症瘕（中医对一切包块统称症瘕）；昆布、海藻、瓦楞子软坚散结；郁金、木香、枳实理气止痛；生地、元参、麦冬、肉苁蓉益阴润肠通便，治疗中出现气不接续；一时性眩晕乃病家将服 4 剂之方连服 8 剂破气破血太过之故，因加黄芪、党参用量，减三棱、莪术、生大黄用量；病去十之六七，即加入菟丝子、枸杞子等补肾之药，意在解决肾虚；包块消失后，即以八珍汤加黄芪气血双补，加菟丝子等以补肾。大便已不干燥，但仍数日一行，乃气虚推送乏力之故；曾治十数人，大便稀溏，而数日一行，皆重用黄芪、党参而愈。

十四、脐上包块（腹主动脉瘤）

杨××　男　68 岁　重庆市　画家

1985 年 8 月 18 日初诊：

自诉：脐上长一包块，去年在重庆及北京两处医院检查，

均诊为腹主动脉瘤，约3厘米×3厘米大小，很硬。中央一位领导要我在301医院做手术，我老伴不愿意，我也不愿意，因作罢。关心的同志朋友很多，各种建议都有，最后决定用中药治疗，有几位同志都建议请您治疗，因来求治。

检查：诊脉弦、平、弱，舌淡无苔，有裂纹，脐上包块拒按、质坚，痛，时剧时缓。两手颤抖，影响作画、写字。畏冷，每至秋季即开始服鹿茸粉，每次5分，每周2次，直到第二年春季始停服。大便长期不成形，但也不稀。饮食一般，睡眠也一般，有时失眠，嗜烟及酒，形瘦。

辨证：脾肾阳虚、气虚血瘀。

治法：健脾温肾，活血化瘀。

处方：

人参　鹿茸　当归　丹参　乳香　没药　鸡血藤膏　熟地　山药　枸杞子　菟丝子　黄芪　玉竹　土鳖虫　覆盆子　白术　茯苓　鸡内金　麦冬　水蛭　焦山楂　荆三棱　莪术　建曲　北五味子

共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸。若感冒即停服，感冒愈后续服。并嘱其少抽烟、少饮酒，最好戒掉烟酒。

11月18日二诊：服上丸剂后，精神大有好转，眠食俱佳，大便已成形。过去多吃一口饭，就要拉肚子，现在这个现象消失了。过去体重只有98斤，现在是103斤了。两手颤抖明显减轻，包块疼痛基本停止，只偶有隐痛，但时间很短，已非持续性的。诊脉弦平，舌上有裂纹。

处方：

上丸方中加百合、甲珠，荆三棱、莪术加量用，加佛手片、黄精，焦山楂改为生山楂。

仍制丸剂如前法服。

1986年5月11日来信称："丸药服1剂后，效果很好，因又配制1剂，已快服完。我于5月9日去医院复查，包块已经消失，血管硬化现象也有好转，血管的弹性比过去好。手抖的情况大为好转；过去口干但不喜欢喝水，现在口已不干了。特作画一幅寄上以表微忱。这种情况，是否继续服药，请您费心斟酌……"

处方：

将上丸方中之乳香、没药、土鳖虫、水蛭、甲珠等撤去，减三棱、莪术，加制首乌、山萸肉。

制丸药再服1剂。

十五、腹部包块(脾肿大)水肿

李××　男　48岁　成都市　工厂职工

1988年8月7日初诊：

自诉：1985年体检，脾肿大8厘米，因为不痛，不以为意，1986年5月开始痛，即进行治疗，先在医院打针吃药，后又在市上的医院治疗，最后又吃中药百余剂，疼痛反日益加重，腿也肿了，又去医院检查，肿块增至12厘米。查尿结果不是肾脏炎；建议中药治疗，因人介绍，特来求治。

检查：诊脉沉弦，舌淡、苔薄黄，腹部稍偏左包块、质硬，疼痛拒按，两腿膝以下肿，按之没指。平时饮食稍有不慎即拉稀，自感整个身体沉重异常，两腿尤其沉重，懒于行动，嗜卧；饮食一般，大便稀溏，日行二三次，小便短少。

辨证：气滞血瘀而成症瘕，脾肾阳虚而为水肿。

治法：健脾温阳行水，益气祛瘀消症。

处方：汉防已黄芪汤合真武汤加减。

黄芪60克　汉防已18克　白术30克　茯苓30克　泽泻30克　山药30克　泡参30克　制附片15克　大腹皮15克　白芍15克　生姜皮10克　（5剂）

8月21日二诊：两腿肿大消，右脉沉弱，左脉沉弦结代；此病其来也渐，初战告捷，当以丸药消息之。

处方一：

汤剂按上方加白扁豆30克，继进5剂，5剂服完，接服丸剂。

处方二：丸剂。

黄芪　太子参　当归　土鳖虫　丹参　炮山甲　山药　鸡内金　白术　炙鳖虫　乳香　白扁豆　没药　菟丝子　黄精　枸杞子　水蛭　牡蛎　白芍　茯苓　苡仁　建曲　枳实　砂仁

共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸。

10月30日三诊：服处方一后腿肿基本消完，接服丸药后，两腿肿已消完，包块已不痛，并明显缩小，起码表面看不见了。大便溏泻已止，已成形了。诊脉沉弱细，舌淡无苔，舌边有齿印。丸药业已服完半月，包块仍拒按，质坚硬。

处方：

按上丸方加黄芪、太子参的用量，加三棱、莪术，制蜜丸服，服法如上。

1989年1月4日四诊：病者于12月28日去医院复查，包块缩小为4.6厘米×3.8厘米，平时已不痛，但仍然拒按，质坚硬。

处方：

按10月30日三诊时处方如海藻、昆布、覆盆子、菟丝子、枸杞子，仍制蜜丸服，可连服2剂。

1989年5月18日五诊：

自诉：遵嘱服丸药2剂之后，自觉包块消失，摸不到了，不放心又去医院复查，果然全消失了。身体也长好了，特别吃得，现在多吃一点也无所谓了。是否还需服药巩固，答以不必再行服药，注意饮食起居即可。

按：脾与肾在生理上的关系主要表现在先天和后天精气的化生、储备和利用及水液的代谢上；脾主运化水谷之精气为后天之本，而脾的运化功能必得肾阳的温煦蒸化，脾运化之精气又补充肾脏元气(即先天精气)使不匮乏，先后天相互资生，相依为用，共同决定着人体的生机；在水液代谢上，脾主运化水液，肾主气化排出水液，脾之所以能运化，有赖于肾气的推动和温煦；肾之所以能气化，也有赖于后天精气的补充，如果脾不运化，肾脏也无水液可气化，肾气在进行气化时要耗伤后天所资之精气，同样脾运化时要耗伤肾气，互相耗伤又互相资生、互相资助、互相补充；今脾脏肿大，运化失职，不能正常运转，在本脏则出现长期溏泻、多吃一口就拉稀、大便日行二三次等现象。同时影响肾脏的温煦、气化和排出水液，于是出现了下肢浮肿，按之如泥而没指；而脾所以肿大，乃瘀所致，血之所以瘀，乃由气虚，何以知之为气虚，一是右脉沉弱、舌边有齿印，一是身体沉重异常，两腿尤甚(此乃脾气虚不能运化水湿)，气以运血，气虚则滞，滞则血瘀，包块由是而生而大而质坚硬，包块与水肿似为两个病，实则有其内在联系，阳虚是气虚之进一步发展，故诊为脾肾阳虚而为水肿，气滞血瘀而成症瘕。治之之法先用防己黄芪汤合真武汤加减以健脾温阳行水；初战告捷之后，乃汤丸并进，以丸剂益气健脾，活血化瘀，消症行水，以汤剂健脾温阳行水，重点放在脾脏；脾脏矛盾解决，则可补充肾之精气，肾对脾之运化的推动和温煦即恢复正常，脾亦能正常接受肾之推动和温煦，脾肾二脏功能恢

复，病即痊愈。丸剂中以参苓白术散加黄芪、黄精、枳实等健脾除湿；以活络效灵丹加土鳖虫、水蛭、甲珠、牡蛎、海藻、昆布等活血化瘀、软坚散结消症；以菟丝子、覆盆子、枸杞子温肾阳、补肾阴；以当归、白芍、丹参、枸杞子养肝护肝。如此组合，使邪去而正不伤，实践表明，患者随着疾病的逐渐好转以至痊愈，“身体也长好了”。

包块(症瘕)消到最后，往往坚硬如石，难以消除，此时应更增强补与消的力量，去其根蒂，则永不反复，若半途而废，则养痈贻患矣。此种情况，往往在于病家是否能够坚持。

十六、直肠肿瘤

徐××　男　77岁　四川省　建筑设计大师

1992年7月3日初诊：

自诉：因大便异常，痔疮经常出血，做痔疮治疗后，大便异常(变薄、变细)情况未见改变，因去医院检查，发现直肠长一肿瘤，直径约占整个直肠的三分之二，经三次活检，未发现癌细胞，但亦不能确诊为何种性质肿瘤，医院准备再作一次活检。特征求您的意见。

检查：诊脉浮缓微有涩象，舌上有少量黄苔；曾感冒，服药后，目前已无感冒症状。体丰，眠食俱佳，过去有小便淋漓、甘油三酯高的情况，经服1990年12月28日所开的丸药后已趋正常，肿瘤部位除大便异常外，无其他感觉；建议仍服丸药，不必再作检查，患者表示同意。

辨证：气虚血瘀而成症瘕，兼有外感。

治法：补气活血，软坚消症，表里同治。

处方：玉屏风散加味。

黄芪　防风　白术　当归　丹参　土鳖虫　水蛭　三棱　莪术　制马钱子　制鸦胆子　海藻　昆布

共研为末，炼蜜为丸，每丸重9克，每次服半丸，日服2次，服完后去医院复查。1992年12月2日上午病者电话告知："上周星期五去医院复查，直肠肿瘤消失，再三表示感谢。"但丸药尚有约1/4，嘱其服完，以荡余邪。

按：玉屏风散可提高人体免疫功能，防御感冒，没有感冒祛瘀消症之药方可发挥作用，否则，不但无益，反而有害。余曾治一些肝炎病人，在介绍病情时，常说："我在某医院检查出肝炎，就在那里治疗，开始服药有效，后来不但无效，反而愈医愈严重……"这类病人往夹有感冒。脉之，果然感冒，经解表，病情顿减；肝炎如此，其他病亦莫不如此。今病者并无感冒症状，但两手脉皆为表证之脉，故只用玉屏风散，若有症状，则又宜对症加药。

十七、阴部包块

郭××　男　49岁　成都市　画家

1991年7月28日初诊：

自诉：一年多以前，阴囊中长疙瘩，或二三个，或三四个不等，胀痛，时长时消，不吃药也会自行消失，消失后数日又长，如此循环反复不已；后又在前阴下部，即前后二阴之间长一包块，来势甚猛，初起只有大拇指大，随即长如核桃大，桃

子大、既胀且痛，不几天逐渐缩小消失，消失后又长，如此循环反复，消长不已。后又在前阴上部长一包块，其消长情况与前后之包块同，可以长到拳头大。三处包块，此起彼消，近两年来，使我没安宁过一天，中、西医药吃过不少，均不见效，几个医院都主张手术，但不做手术也自然消失，而都不能确诊为何病，因人介绍，特来求治。

检查：诊脉浮弦数，舌质红，无苔，双目红赤，流泪，痛，有异物感，痒甚、汗多；无故心跳，阵发性心动过速；早泄、阳痿。检查阴部，前后二阴之间有包块如核桃大，不痛亦不坚硬，光滑，无结节，盖此时前阴之上和阴囊之中的包块已先后消失，正前后二阴间之包块当值也。

辨证：气瘕、天行赤眼(红眼病)。

治法：先表后里，先治天行赤眼，用疏风解表、消热活血之法。

处方：

银花30克　连翘30克　荆芥10克　薄荷6克　蒲公英30克　生地15克　赤芍10克　红花10克　生甘草3克　(4剂)

8月11日二诊：天行赤眼已愈，舌质红转正常，脉浮弦数，苔黄，转治瘕气，兼清余热。

处方：

黄芪30克　石膏30克　麦冬10克　法夏10克　竹叶6克　柴胡15克　白芍15克　香附10克　青皮10克　枳壳10克　薄荷10克　甘草3克　(4剂)

8月30日三诊：黄苔退净，饮食转佳，舌质淡，脉弦弱，结代；前后二阴间之包块消失，前阴之上和阴囊中包块应出现而未出现；但腰右侧生一包块已长如大拇指头大，有继续增大之势，胀痛；二便正常。

处方：

柴胡15克　白芍30克　当归10克　丹参30克　白术10克　茯苓10克　香附10克　青皮10克　橘核10克　枳壳10克　黄芪30克　甘草5克　（4剂）

9月8日四诊：腰部包块消失，其他三处之包块消失后未再出现；转治早泄、阳痿。

随访年余，病未再发。

按：瘕属气，生长部位三处都在阴部，而肝之脉绕阴器，故从肝经论治，用逍遥散疏肝理气，肝肾同源，故腰部包块只加一味橘核以助逍遥散成功；用黄芪者以其脉弦弱结代，结代脉属气血不足，故又用丹参协归、芍以补血养血活血，同时制约了香附、青皮、橘核、枳壳等香燥伤阴之弊。

十八、胸部包块、双乳房包块、酒皶鼻

白××　女　28岁　四川省　干部

2000年5月23日初诊：

自诉：右乳上方的胸部生一包块，最初有指头大，不痛，感到痛时已有拇指头大，当即去医院检查，说活检方能确诊。两个乳房都生有包块多个，诊断为乳腺小叶增生，如串珠状，平时胀痛很轻，月经将至则胀痛加剧。再就是鼻头愈来愈红，说是酒皶鼻，可是我又不吃酒，我又是女的，这样的鼻子实在太烦了。

检查：诊脉弦数，舌质红，舌尖尤红；右乳上胸部包块大如核桃，从发现到现在近三年，已服中药若干剂，又服数种中成药，效不佳；因惧怕手术后复发，故未做手术；大声说话和

笑俱痛，出大气亦痛，触之则痛加剧；又乳房包块多个，如串珠状，经将来则胀痛加剧，经来则胀痛减，经净则胀痛微，胸部包块则不因月经而消长，月经每月要提前二三日，多则四五日，经期五六日或七八日，经色先黯后红，第二天和第三天量多，此后淋漓不净者久之，“真正干净，要拖七八天”，当前月经将至，乳房胀痛加剧，且烦躁甚，“总想发气，骂人”。鼻头红赤，上布红疹，颏下亦布满红疹。大便不干燥，二日一行，眠食尚可，形瘦面苍晦暗。

辨证：肝郁血热，气虚血滞。

治法：舒肝解郁，益气清热，活血化瘀，散结消症。

处方：逍遥散加减。

柴胡15克　赤白芍各15克　枳实10克　郁金15克　川楝子10克　八月札15克　青皮10克　全当归15克　鸡血藤30克　丹参30克　凌霄花10克　太子参30克　黄芪90克　建曲15克　大甘草10克

3剂，水煎服。

5月20日二诊：乳房胀痛止；此次月经五日即净，没有拖拉情况；酒皶鼻及颏下红疹本消，因停药三天后又作。胸部包块及双乳房增生如故，大便在服药期间每日俱解，不干不稀，诊脉弦平弱，舌尖尚红。

处方：

栀子15克　丹皮15克　柴胡15克　生地20克　紫草30克　银花30克　连翘30克　黄芪100克　紫花地丁30克　黄芩15克　黄连10克　凌霄花10克　怀山药30克　建曲15克　大甘草10克

4剂，煎服。服完后接服下面丸剂。

黄芪　太子参　柴胡　赤白芍　枳壳　凌霄花　香附　川楝子　青皮　浙贝母　海藻　生牡蛎　鼠妇　八月札　制蜂螂

枇杷叶　黄芩　桑白皮　黄连　野菊花　黄柏　玫瑰花　栀子　紫花地丁　银花　蒲公英　郁金　怀山药　乳香　没药　建曲　炒谷麦芽　瓜壳

计药33味，共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日服3次，每次服1丸，饭后20分钟用温开水送服。

11月7日三诊：右乳上方胸部包块消失，乳房小叶增生之胀痛消失，串珠状之包块基本消失，尚有豌豆大，二三枚自认为不碍事；酒皶鼻已恢复正常，患者对此颇为高兴，认为大出她的意料，“简直没有想到有这样快”。大便已正常，每日俱解。

处方：按上丸方再进1剂以资巩固。

十九、外阴包块

吴××　女　53岁　成都市　职工

1997年10月8日初诊：

自诉：9月20日晚上忽然发现外阴长一包块有鸽蛋大，三天后迅速长大约有土鸡蛋大小，吓坏了，赶快去一家大医院检查，认为是炎症引起，给予抗炎治疗效果不佳。10月6日又去医院检查：外阴右侧摸及一约4厘米×3厘米之肿块，压痛、触痛明显；阴道：畅；宫颈：光滑，宫体萎缩。双附件(一)诊断：右侧前庭大腺囊肿。建议手术或激光治疗。本人不愿，因来求治。

检查：诊脉沉弱而弦，舌苔黄厚而粗，口干喜饮，大便正常，日行一次，隔衣摸之，外阴右侧包块大小如病者自诉，触

之痛，质不硬，走路快了及上坡下坎都感到痛，有下坠感。

辨证：气虚血热，痰瘀互结。

治法：益气清热，消痰化瘀。

处方：

黄芪60克　当归15克　川芎10克　赤芍15克　水蛭10克　银花30克　石膏30克　花粉30克　半枝莲30克　昆布30克　海藻30克　鱼腥草30克　皂角刺15克　土茯苓30克　败酱草30克　白术30克　紫花地丁30克　建曲15克　甘草6克

3剂，水煎服。

10月14日二诊：诊脉平弱带弦象，黄厚粗苔大退，口干大减，饮食有所增加，包块未继续长大，口苦。大便在服第一剂时曾拉稀3次，但只有一天，第二天就正常了，“我想这是排毒吧”！

处方：

黄芪60克　白术30克　石膏30克　花粉30克　柴胡15克　黄芩15克　木通15克　泽泻15克　银花30克　连翘30克　红花30克　败酱草30克　皂角刺15克　水蛭10克　海藻30克　甘草10克

3剂，水煎服。

10月20日三诊：口苦、口干喜饮俱消失，黄苔退净，大便正常，包块大为缩小，病者喜形于色，诊脉沉弱。

处方：

黄芪100克　太子参60克　白术30克　当归15克　丹参30克　红藤30克　水蛭10克　银花30克　连翘30克　皂角刺15克　海藻30克　浙贝母15克　土茯苓30克　白芥子10克　败酱草30克　建曲15克　甘草10克

3剂，水煎服。

12月27日因重感冒前来就诊称："服上处方3剂后包块消失，全家人都高兴，想不到祖国医学如此奇效，才治了三次，吃了9副药就好了，花钱还不到二百元，还没有我两次的检查费多……"

按：方中海藻与甘草相反，在治疗此类包块(肿痛)中我常常二药并用，并无任何不良反应。2000年10月其女前来就诊，询之，言其母包块愈后未复发。

二十、卵巢肿瘤

蒋××　女　32岁　成都市万年场人

2000年3月18日初诊：

自诉：今年1月12日在一家大医院检查：双侧卵巢占位性病变，右侧卵巢内见多个回声暗区，大者约3.4厘米×3.4厘米×2.8厘米，左侧卵巢查见2.6厘米×2.4厘米×2.1厘米，腰腹胀痛，月经将至则胀痛更加严重。由于这个病，致结婚九年未孕，也正因为怀不起才去检查。

检查：诊脉沉弱而弦，两尺弱甚，舌质淡；月经每月提前约7天左右，经期7～8天，有时10天甚至10多天方净，经色黯，瘀块多，经来之前一周，腰腹胀痛，来之前一二日胀痛更甚，月经来了，特别是瘀块出来了，胀痛明显减轻，随即消失；大便干燥，吃辣椒则干燥异常，非吃排毒养颜胶囊不可；形瘦面苍，心烦易怒，月经前后烦躁更甚，甚至骂人毁物。

辨证：气阴两虚，痰瘀互结。

治法：益气养阴，消痰化瘀。

处方：汤丸并进。汤剂：

中芪100克　当归15克　川芎10克　赤白芍各15克　生地30克　桃仁10克　红花10克　黄芩15克　黄连10克　柴胡15克　枳壳15克　木香10克　月季花10克　益母草30克　太子参50克　元参30克　大云30克　建曲15克　甘草6克

4剂，水煎服。

3月21日二诊：心烦易怒减，大便已正常，每日俱解；服此药开始，即停服排毒养颜胶囊，现在还有两次的汤药未服。

处方：两次汤药服完后接服下面的丸药。

中芪　红参　当归　川芎　红花　赤白芍　熟地　枸杞子　柴胡　八月札　生牡蛎　莪术　黄芩　黄连　黄药子　制鳖甲　丹皮　皂角刺　海藻　夏枯草　天葵子　栀子　三棱　阿胶　益母草　半枝莲　大云　芦荟　防风　月季花　土鳖虫　建曲　水蛭　桃仁　仙鹤草　白芥子　浙贝母　白花蛇舌草　仙灵脾

上药39味共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日服3次，每次服1丸，饭后20分钟用温开水送服，若感冒、咳嗽即停服，愈后续服，忌辛辣、香燥等燥火伤阴之物。

8月19日三诊：8月16日去医院检查：右侧卵巢见1.6厘米×1.3厘米的回声暗区，左侧卵巢(一)。诊脉弦平，两手尺脉已起，舌渐红润；过去极易感冒，服药的三个多月中未感冒过；烦躁易怒明显好转，大便很正常，通畅易解；月经仍提前3～5天，经色转正红，瘀块大为减少；腰腹胀痛已微，丸药现还可服一周，为了不致中断，故前来开第二剂丸药。

处方：

中芪　红参　柴河车　当归　川芎　柴胡　熟地　赤白芍　枸杞子　栀子　丹皮　黄芩　八月札　黄连　三棱　莪术　海

藻 夏枯草 阿胶 黄药子 芦荟 大云 天葵子 土元 半枝莲 建曲 浙贝母 南星 生牡蛎 制鳖甲 鸡内金 白花蛇舌草

制蜜丸与服法均与前相同。

11月25日四诊：11月17日去医院检查：双侧卵巢肿瘤俱消失，月经已对月，经期5～6天，瘀块消失，痛经消失，面部褐色斑亦消，转治不孕。

二十一、全身性皮下包块(皮肤神经包)

李××　男　23岁　四川省名山县农民

1974年9月2日初诊：

自诉：病已3年多，发病之初全身扯痛，随即在皮肤下面生疙瘩，大的有胡豆大，小的有豌豆大，遍布全身，表面看不见，要用手摸才能感觉到，稍用力则全身扯痛，以致不能参加劳动。体重也由120多斤下降到90多斤；历经几个医院未能确诊为何病，后经雅安地区医院诊断为皮肤神经包，建议到成都四川医学院确诊。经川医确诊，仍为皮肤神经包，医生说此病极为少见，他临床30多年中也只发现2例，此为其中1例。经中、西医治疗3年多，均无效果，经亲友介绍，前来求治，并表示已失去信心，去年就劝我来，现在才来，说实话也很勉强，却不过情才来的。

检查：诊脉沉弱而涩，舌质淡红不润，形瘦体衰，面色不华，用指触之，果如患者所诉，按其一核，他处亦牵扯引而痛，能食而瘦，二便正常。

辨证：痰核结于皮里膜外。

治法：补气活血，散结消痰。

处方：

黄芪30克　党参15克　当归15克　川芎10克　桂枝15克赤芍15克　乳香10克　没药10克　地龙10克　僵蚕10克全蝎6克　蜈蚣3条　生地15克　白芥子10克　炮山甲10克　制马钱子10克

上药共研细末，每服6克，每日早晚各服1次，白开水送服，感冒、咳嗽即停服。

12月21日二诊：自诉“还有4包药未服完，皮肤神经包就消失了，但仍然把4包药服完，病好了，心理很高兴，因长期治病，负债不少，就修玉溪河去了，最近有时又感到扯痛，这与发病之初的情况一样，心里很害怕，故来诊治。”诊脉沉弱，尚有涩象，舌正无苔。

处方：

按原方加黄芪为60克，党参为30克再进1剂，服法同前。

随访5年，病未复发。

按：本病乃因肺、脾、肾三脏功能失调，致津液不能正敷布运行，聚而为痰，结而成核，痰随气行，窜于皮下，故出现皮下痰核。痰核瘀滞经络，经络不通，则生疼痛，经络相通，故按其一核，他处亦牵扯引而痛。在正常生理情况下，水谷之精气，得脾之健运；肺之调节，肾阳之煦蒸；三焦之气化，化而为气、为血、为津液以营养全身。今三脏功能失调，肺气虚，津液输布无权；脾气虚，运化失职；肾气虚，不能蒸化水液，则变而为痰，故能食而日益消瘦，体重日益下降。是以方中重用参、芪以补三脏之气，气足则血行，气虚则血滞，气滞则血瘀，故补气同时，又当活血行瘀，因而用桂枝、乳香、没药、当归、赤芍以当之；痰核瘀滞经络，故用炮山甲、制马钱

子、地龙活络散结，开通经络；用蜈蚣、全蝎解毒散结，通络止痛；僵蚕化痰散结；白芥子搜逐皮里膜外之痰；诸药合用，共奏补气活血、散结消痰之功。

二十二、全身性大小关节长包块

周××　女　七岁　四川省名山县农民

1976年10月16日初诊：

其母代诉：四肢关节生包块，不红亦不痛，开始生在四肢肘、膝等大关节处，渐而腕、踝关节亦生，近年来指、趾关节亦生，总之全身大小关节处都生，行动愈来愈不灵活，身体愈来愈消瘦。现在翻门槛、上下台阶都很吃力，且随时跌倒，跌倒了，必须有人拉才能起来，从起病到现在至少也有三年了，因没有喊痛，就未引起注意，现在严重了才去医院检查，但原因不明。

检查：诊脉濡，无苔，舌质淡；膝关节肿块，有患儿的拳头大小，生于关节两侧，肘关节肿块略小，指、趾关节肿块有胡豆、鸽蛋大小，按之质软，都生在关节上，大腿根的肿块特大，严重妨碍其走路；患儿消瘦甚，精神倦怠；懒言懒动，面色萎黄，纳差，便溏。

辨证：气虚不运，痰流关节。

治法：益气散结消痰。

处方：

黄芪20克　海藻15克　昆布15克　玄参15克　浙贝母10克　陈皮10克　法夏10克　茯苓10克　生牡蛎20克

制南星10克　建曲10克　甘草10克

2剂，水煎服。

10月21日二诊：病人肿块缩小，纳食渐佳；于上方中加白芥子6克、僵蚕10克、炒谷麦芽各10克。连续服8剂。

11月10日三诊：患儿关节肿块消去大半，饮食增加，形体渐充。

处方：

按上处方加党参10克　（4剂）

11月20日四诊：病儿除左足趾肿块缩小外，其他关节处肿块俱已消完。

处方一：

按上处方再服4剂。

处方二：

人参健脾丸2盒，每日早晚各服1丸。

按：本例与前例，病理基本相同，所不同者，前例是痰结皮下，本例是痰流关节。前人说："怪病多生于痰"、"痰之为物，随气升降，内外表里，上下左右无所不至，故方用陈皮理气，而以黄芪驾驭之，则理气之力更强。其他诸药皆消痰散结之品，前后共服药18剂而愈。脾为生痰之源，故愈后以人参健脾丸善后。"

二十三、卵巢囊肿合并子宫内膜异位症

王　×　女　32岁　成都市　工厂职工

1995年10月30日初诊：

自诉：经常腹痛腰胀，月经紊乱，因去医院检查，诊断为卵巢巧克力囊肿合并子宫内膜异位症，医院主张手术，本人不愿，因同事介绍，特来求治。

检查：诊脉弦浮，舌质淡白，舌边齿印甚多；月经退后4天左右，经色黯红，有瘀块，4～6天方净，经来小腹坠胀痛、腰痛，经常腹痛，痛则腰亦胀痛，月经来时坠胀痛加剧，曾经痛昏厥数次，经行不畅，此病已达6年之久，疲倦异常；懒言懒动，动则累甚，烦躁易怒，目干、咽干、喜闭目、喜静卧，平时极易感冒，月经来时，凡此种种，更加严重，甚至毁物骂人；卵巢囊肿在右侧大小约4.6厘米×5厘米×5.8厘米；眠差、梦多，合目即梦，乱梦，醒后不复记忆，不易入睡，往往在半夜3点即醒，醒后常在早上6点迷糊入睡；面色晦滞、形瘦，体重74斤，身高1.58米，其标准体重应为103斤。嗜食辛辣厚味，每餐必备，否则不能下咽。夜尿多，晚上起来小便3～4次，大便干结难解，常引起肛裂及痔疮出血。

辨证：气阴两亏。舌质淡白，舌边齿印，月经退后，疲倦异常，懒言懒动，动则累甚，烦躁易怒，目干、咽干、喜闭目、喜静卧，平时极易感冒，凡此种种皆气阴两虚之象；气虚则血瘀故月经中有瘀块，气虚提挈无力故腰腹坠胀痛，气虚运血无力故经行不畅，气阴两虚，卵巢功能减退，故生囊肿，五脏六腑皆赖气血煦之濡之，今气阴(血)两亏，心、肝失养，故眠差、梦多，肾司二便，肾失养则夜尿频多而大便干结难解，致数日一行，经来，气血下行，故种种症状加重。

治法：益气养阴，疏肝理气，叮咛病者薄滋味配合治疗。

处方：

黄芪60克　泡参20克　当归15克　丹参30克　鸡血藤30克　柴胡15克　白芍15克　木香10克　元胡15克　枳壳10克　杜仲30克　川断30克　大甘草10克　(3剂)

11月3日二诊：服上方后，小腹坠胀痛大减，腰痛亦减，精神有所好转；但夜多小便，最少要小便3～4次，因此休息不好，影响第二天工作；月经将至的征兆要持续两个星期，每次月经来后小腹冷痛坠胀难受。

处方：

黄芪90克　当归15克　丹参30克　鸡血藤30克　柴胡20克　升麻20克　白芍15克　小茴香10克　木香10克　杜仲30克　川断30克　金樱子20克　炙甘草10克　（3剂）

11月10日三诊：11月4日月经至，此次经来是多年来最轻松的一次，小腹冷痛，腰、腹坠胀痛俱大为减轻，过去要卧床休息，此次没有，而且坚持上班，精神明显好转，经色较前为红，经期5天；睡眠较前为好，睡得深一些了；小便次数减少很多，每天晚上只小便一次了。此后即以此方为基础，或加党参、太子参，或加益母草、月季花、对月草；若感冒，即按感冒辨证施治，感冒愈后，即以玉屏风散加入调经方中。至1996年1月8日诸症或消失、或减轻，特别是感冒大大减少，乃用丸剂治其卵巢囊肿，同时治失眠、慢性咽炎，进一步调其月经。

处方：

黄芪　防风　白术　光慈姑　人参　当归　丹参　黄药子　乳香　没药　昆布　生鳖甲　海藻　白芷　杜仲　半枝莲　川续断　橘核　阿胶　鸡血藤膏　赤芍　白芍　木香　炒枣仁　莪术　血竭　儿茶　菟丝子　前仁　建曲　射干　败酱草　覆盆子　沙苑子　五味子　女贞子　桑椹子　仙灵脾

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日服3次，每次服1丸，温开水送服。

上丸方连服2剂，于1996年11月24日去医院检查，卵巢囊肿消失，眠食俱佳，月经对月，经色正红，4日即净，形体已健，精力充沛，前后判若两人矣；慢性咽炎大为好转，咽

部异物感，在服完第一剂丸药后即已消失，查其咽部，原来丛生之淋巴滤泡已消去大半，晚上已不起来小便，一觉睡至天亮，特带其丈夫、孩子前来就诊。

二十四、卵巢囊肿(一)

朱 × 女 24岁 成都市 教师

1991年10月13日初诊：

自诉：经来小腹痛，腰胀痛，自腰至腿胀麻痛，经期延长，十日乃至十二三日方净，瘀块较多，1989年结婚，尚未孕，诸治不愈，乃于今年8月27日去计生所检查，确诊为卵巢囊肿为4厘米×4厘米大，因本单位同志介绍，特来求治。

检查：诊脉浮弦，舌质淡；患过敏性鼻炎，流清涕乃至清水，喷嚏不断，平时极易感冒；感冒了则流清水，喷嚏连连，此病至少也在五年以上；又患慢性咽炎，咽痛经常出现，感冒则更痛，咽壁淋巴滤泡密集，咽部常出现异物感。

辨证：症瘕，痛经属气滞血瘀，并夹外感。

治法：表里同治。

处方：苍耳散合府逐瘀汤加减。

苍耳18克 辛夷10克 薄荷10克 白芷10克 归尾10克 赤芍10克 桃仁10克 红花10克 三棱6克 莪术6克 海藻12克 昆布12克

4剂，水煎服。

10月20日二诊：清涕、喷嚏明显减少，余症如故。

处方：

黄芪30克　防风18克　白术24克　归尾10克　赤芍10克　桃红10克　红花10克　三棱9克　莪术9克　海藻18克　昆布18克　甘草6克　（4剂）

此后即以此方为基础方出入加减：

如流清涕、喷嚏、鼻塞，即加苍耳、辛夷；

如头痛，更加薄荷、白芷；

咽痛加银翘马勃散；

黄芪由30克渐加至60克；三棱、莪术由6克渐加至10克，更加山慈姑。

1991年12月9日去计生所复查，囊肿缩小为3.7厘米×3.2厘米，经期也由十余日缩短为6～7日，小腹痛、腰胀痛明显减轻；但久立、久走、久坐腰仍痛；过敏性鼻炎的症状基本消失，反复感冒的情况大为改善，“很难得感冒了”。乃用丸剂，益气固卫、补肾健脾、活血祛瘀、软坚消症。

处方：

黄芪　党参　当归　丹参　乳香　没药　海藻　莪术　水蛭　土鳖虫　防风　白术　茯苓　山药　枳实　鸡内金　白芍　木香　续断　桑寄生　橘核　枸杞子　狗脊　菟丝子　三棱　山慈姑　甘草　射干

共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸。

1992年4月13日体检，囊肿消失，卵巢右侧增大亦消失，过敏性鼻炎已愈，咽壁淋巴滤泡萎缩，咽部异物感不复存在，经来腰、腿、腹痛俱愈，且已怀孕。

按：本病属中医症瘕范围，但患者兼有数种慢性病，特别是反复感冒，对治疗备受干扰，故先用苍耳散合血府逐瘀汤表里同治，继用玉屏风散之益气固表于血府逐瘀汤之中，数剂后，感冒即被控制，乃改用丸剂益气固卫、补肾健脾、活血祛瘀、软坚消症；方中参、芪、术、山药、茯苓益气健脾（胃）；

桑寄生、川续断、狗脊、菟丝子、枸杞子等补肾；当归、丹归、白芍补血；配乳香、没药、三棱、莪术、水蛭、土鳖虫、鸡内金活血祛瘀；昆布、海藻、山慈姑软坚消症；射干配山慈姑可消咽部淋巴滤泡，玉屏风散有益气固卫防御感冒之功；活血祛瘀药中若不配以行气之品则祛瘀之功不显，故用木香、橘核、枳实等以佐之；海藻有反甘草之说，实则二药配伍其力益大，其功更著。1962 年治一刘姓患九子烂痒达 8 年之久的病人，大剂量使用海藻、甘草收到理想效果，尽信书不如无书也。此丸药竟治愈数年之久的过敏性鼻炎，实属意外收获，故知此法可治多种慢性病也。

二十五、卵巢囊肿(二)

吴××　女　44 岁　乐山市　干部

1991 年 3 月 17 日初诊：

自诉：1990 年月 12 月 1 日和 1991 年 3 月 11 日先后在两个医院检查，确诊为卵巢囊肿，去年 12 月检查时才 3.5 厘米×3.7 厘米，今年 3 月检查时则为 4.5 厘米×3.7 厘米，医院建议手术摘除。我一个熟人也是这个病，手术后不到 1 年又复发了，因此不愿手术，特来求治。

检查：诊脉沉数，苔黄，口渴喜欢冷饮；左小腹扪及包块，有波动感，形肥；眠食俱佳；月经基本对月，无月经症候；二便正常。

辨证：气滞血瘀挟痰湿凝结小腹，当前为热聚阳明。

治法：活血理气，软坚消症，清热生津。

处方：汤、丸并进。

汤剂：

北沙参30克　生石膏30克　天花粉30克　生山药30克　生甘草5克

水煎服，服至口不渴饮为止。

丸剂：

黄芪　北沙参　当归　赤芍　丹参　三棱　莪术　昆布　海藻　槟榔　黄药子　乌药　山慈姑　桃仁　丹皮　夏枯草　建曲　菟丝子　茯苓　枸杞子　鸡血藤膏　甘草

共为细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸。

6月16日二诊：6月11日药服完即去医院复查，左侧卵巢囊缩小为3厘米×2厘米，包块已不易扪及，但按之疼痛，渴喜冷饮已愈，但平素口干。

处方：

上丸方中加乳香、没药、地鳖虫、石斛、花粉各30克。

9月22日三诊：丸药服完后，又去医院复查，超声号91085872。左侧卵巢可见2.6厘米×1.7厘米大小的低回声区。

处方：

上丸方中加黄芪为90克，去北沙参加红参50克、甲珠20克。

12月22日四诊：服上丸药后再去医院复查，左侧囊肿消失。

二十六、卵巢囊肿(三)

危　×　女　36岁　成都市　医务工作者

1993年9月26日初诊：

自诉：去年2月妇科检查两侧卵巢巧克力囊肿，5月在医院手术摘除；不久发现子宫后壁囊肿，触摸即痛；今年9月24日妇科检查，左侧附件查见5.7厘米×4.8厘米液性暗区，边界欠清，其内有少许强光点，右侧附件(一)，诊断为巧克力囊肿。

检查：诊脉沉弱，舌质淡无华，舌边齿印甚多且深；形体瘦弱，体重72斤，面色苍白，口臭，长期便溏，从不成形；月经每月提前10天或7天，经水呈浅咖啡色，质清如水，无瘀块，10余日方净；平时腰痛，久坐、久走、久立则痛胀加剧，必须躺下休息，休息后痛胀即缓；疲倦易累，由于对外服务，工作繁重，常常不能支持全天工作；又极易感冒，患慢性鼻炎、慢性盆腔炎、慢性腹泻等多种疾病。食欲不振，眠差梦多，心烦易怒。

辨证：气血两亏，痰瘀互结。

治法：补气益血，消痰化瘀，由于患者体质极其虚弱，又患多种疾病，工作又颇繁忙，按时门诊有相当困难，当以攻补兼施之法，以丸剂消息之。

处方：

黄芪　防风　白术　苍耳　辛夷　薄荷　白芷　鹅不食草　当归　丹参　黄精　鸡血藤膏　山药　莲米　芡实　茯苓　党参　白芍　砂仁　干蟾　三棱　莪术　菟丝子　黄药子　猪苓　白芥子　覆盆子　川续断　狗脊　桑寄生　土鳖虫　建曲　鸡内金　炒谷麦芽

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，温开水送服。

1994年9月26日：上丸方连服2剂，服药中常因感冒停服，自觉有以下明显好转：① 精神比过去好多了，支持全天

工作，已不是太困难了；② 感冒减少多了，即使感冒了，吃药就可很快痊愈；③ 月经只提前 3 天左右，5 天左右即完全干净，不像过去淋漓不绝需拖十来天；④ 饭量比以前增加了；⑤ 睡眠有所好转，过去眼睛一闭梦就来了，恍恍惚惚，睡不熟，更睡不深，现在这个情况有改变，虽然还睡不那么深，但是好多了；⑥ 这一年体重增加了 12 斤，人家都说我比过去长好些了，我自己觉得起码样子不那么难看了；⑦ 腰痛好多了；⑧ 大便多数时候是软便，成形，如果多吃一口或多吃一点肉，特别是肥肉，还是要拉稀。9 月 24 日又去医院检查，囊肿未缩小亦未长大，诊脉平弱，舌淡有红润之象，形体稍丰，仍用丸药消息之。

处方：

黄芪　防风　白术　太子参　苍耳　辛夷　当归　丹参　山药　莲米　砂仁　鸡血藤膏　甲珠　三棱　莪术　土鳖虫　水蛭　干漆　蟑蛴　猪苓　泽泻　香附　青皮　山慈姑　白芥子　川续断　羌活　橘核　桑寄生　建曲　焦山楂　菟丝子　覆盆子　沙苑子　千蟾　芡实　枸杞子　鸡内金

共为细末，蜜丸，服法同前。

1995 年 3 月 30 日三诊：上丸药连服二剂，由于没有感冒，两剂丸药很顺利地服完，最后一剂每天服 3 丸，服完后于 3 月 27 日去原来医院妇产科作了详细检查，囊肿全部消失，身体也长好了，体重已有 98 斤，“我这身体长不上 100 斤，就这样我很满意了，今天来是请老师转治他病”。

按：脾胃为气血生化之源，患者长期腹泻，纳食不佳，消化吸收不好，故饮食不为肌肤，形成气血两亏局面，气虚则血瘀，脾虚则饮停为痰而成痰瘀互结之证。治疗此症，当首先调理脾胃，使之多进饮食，化生气血，气血壮旺，一则可提高抗病能力，减少感冒，减少甚至消除两面作战，专力对付囊肿；

一则气血壮旺，整个体质有了改善，抗病则有了较为坚强的基础，消除囊肿较易成功，故首剂丸药重在健脾胃，而脾胃又主肾气之温煦，故健脾胃同时补肾气，调气血，固卫防感。辅之以祛瘀消痰，两剂后，预期目标基本达到。则益气血、调脾胃、补肾气、消症瘕同时并举，又服2剂，囊肿消失，身体健壮。如不分两步走而欲毕其功于一役，或一味攻伐，则失之矣。

此病治疗成功还有病家坚持治疗，积极配合。其所以能坚持治疗积极配合，一是患者已手术一次，术后不久即复发；二是患者是医务工作者，深知治病之道，否则也难以收功。

二十七、子宫肌瘤

钟××　女　51岁　成都市　教师

1994年5月15日初诊：

自诉：5月14日单位体检，查出子宫肌瘤约13厘米×11厘米×10厘米，回声极不均匀，内呈强弱不等的回声。还有高血压200/90毫米汞柱，因朋友介绍，前来求治。

检查：诊脉左脉沉弦结代，时时歇止；舌质淡白无华，上有瘀点；腰痛、肌肉痛已10余年，医院诊为风湿；胃痛拒按已15年，医院诊为消化性溃疡；疲倦易累，心悸，讲话多了，气就接不上来。去年3月绝经，到今年已一年，一年之中又来过两次，今年3月一次，4月底又一次；饮食一般，睡眠尚可，形肥，面苍，两颊瘀斑，二便正常。

辨证：气虚血瘀。

治法：补气活血，化瘀消症，当以丸剂徐徐图功。

处方：

黄芪　防风　白术　晒参　当归　丹参　鸡血藤膏　乳香　没药　水蛭　虻虫　三棱　莪术　土鳖虫　干漆　甲珠　白芍　木香　山慈姑　檀香　砂仁　玉竹　鸡内金　昆布　海藻　黄精　浙贝母　蟾蜍　蜣螂　天麻　怀牛膝　生牡蛎　制大黄　天麻　山楂

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，温开水送服。

1995年2月7日二诊：2月5日去医院复查，子宫肌瘤明显缩小，约7厘米×6厘米×4厘米；此外：① 腰痛大减，肌肉痛过去不敢触摸，现在触摸已不痛，但气候变化尚痛；② 服丸药以来没有感冒过，因此连服两剂丸药都很顺利；③ 心跳、心累消失，疲倦易累大减；④ 高血压未再发过；⑤ 胃痛消失。食欲较前为好，眠佳，二便正常，诊脉沉弱，舌质转红润，舌上瘀点变淡，两颊黧黑瘀斑大消。

处方：

在前丸方中加羌活、独活、乌梢蛇、鹿角片各30克，熟地50克，枸杞子50克，制蜜丸，服法同前。

7月21日三诊：肌肉痛、腰痛俱消失，胃痛消失后未再出现；月经自去年4月底来后，未再来过；子宫肌瘤，过去自己可以摸到，这付丸药吃后，已经摸不到了；现在精神很好，讲课已不觉累。大便正常，眠食俱佳，体重增加了4斤。

处方：

黄芪　防风　白术　晒参　当归　丹参　乳香　没药　三棱　莪术　水蛭　生山楂　甲珠　干蟾　天龙　鸡内金　天麻　虻虫　土鳖虫　鹿角尖　菟丝子　覆盆子　枸杞子

1996年1月16日其女前来就诊，言其母经医院复查，肌瘤已消。“啥子病都好了，所以叫我也来医”。

按：邪之所凑，其气必虚，子宫长肌瘤，乃肾气虚衰；子宫功能减退，气以运血，气虚血行缓慢，极易瘀滞，故子宫长肌瘤，面部长瘀斑，舌上出现瘀点，因而治以补气活血，祛瘀消痰之法，此种病非汤剂所宜，故用丸剂缓图之。

二十八、右乳根肿瘤

鲁 × 女 18岁 成都市 中学生

1994年7月19日初诊：

其母代述：两月前因胸痛，发现右乳根部长一包块，有乒乓球那样大；即去医院检查，医院提出要住院活检，方能确诊，确诊后手术治疗；患者惧怕，家中亦不愿手术。“听说割了以后还要复发”，朋友介绍，特来求治。

检查：包块如核桃大，质硬不移，边缘清楚，按之痛加剧；诊脉弦弱，舌质淡白；平时疲倦易累，学习刻苦努力，近半年来，看书稍久一点即觉头昏；喜卧，喜闭目，眠差，梦多；月经基本对月，经期3～4日，经色淡红，经来腰痛；饮食一般，大便正常，性格内向，已服消核片、乳癖消、小金丹等，药效不佳。

辨证：气虚血弱，痰瘀互结。

治法：益气养血，软坚散结，化瘀消痰。

处方：四君子汤合逍遥散加减。

党参30克 白术10克 茯苓10克 柴胡10克 白芍15克 当归10克 昆布20克 海藻20克 全瓜蒌30克 生牡蛎30克 浙贝母15克 鸡内金10克 甘草6克 （3剂）

7月24日二诊：服上处方3剂后包块变软；月经于7月21日至今天已第四天，今天晚上或明天即可干净。过去月经来，特别感到疲倦，这次觉得好些；睡眠、饮食都比以前好一些。

处方：

上方加黄芪50克　夏枯草15克　（3剂）

7月27日三诊：精神、饮食、睡眠都明显好转；痛稍减，似有缩小。

处方：按上处方继进三剂后，接服下列丸剂。

黄芪　党参　当归　丹参　乳香　没药　柴胡　赤白芍　香附　青皮　橘络　丝瓜络　昆布　海藻　守宫　猫爪草　蟑螂　甲珠　白芷　天花粉　重楼　鹿角尖　建曲　山慈姑　全瓜蒌

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，温开水送服，若感冒咳嗽即停服，愈后续服，忌辛辣香燥等。

1994年11月27日四诊：右乳根部包块缩小为食指头大，周边已软；诊脉弦弱；月经、二便具正常，仍以丸剂消息之。

黄芪　党参　全瓜蒌　乳香　没药　柴胡　赤白芍　丹参　鸡血藤膏　川贝母　生牡蛎　夏枯草　猫爪草　甲珠　蟑螂　守宫　山豆根　重楼　瓦楞子　僵蚕　橘络　元参　蜈蚣　干蟾　建曲

共为细末，蜜丸，服法同前。

1995年4月10日五诊：右乳根部包块已缩小很多，为小指头大；二便正常，眠食俱佳，但舌边齿印尚在。

处方：

在上丸方中加香附、青皮、山慈姑，党参改用晒参。

1996年8月3日六诊：右乳根部包块缩小如豌豆后，未再缩小，亦未再长大，但上处方已连续服了3剂；诊脉平弱，舌淡，舌边齿印如故，但眠食俱佳，精神饱满，参加高考已被

录取，拟停药，晓以除恶不尽尤恐复发。

处方一：

于上丸方中加皂角菌、灵芝、木耳。

处方二：

乳香、没药、鸦胆子、制南星、浙贝母、五倍子各等量，共研极细末，醋调敷患处48小时换药一次。

11月1日七诊：内服丸药，外敷药后右乳根包块继续缩小，包块中间出现一杠，势将一分为二，按之已不痛。

处方一：

丸药中黄芪、晒参加重剂量。

处方二：

外敷药继续外敷，48小时换药一次。

1998年5月其母前来就诊，询之，言丸药连服2剂，外敷药亦连用2剂，至今未再听见她说过。

二十九、颈淋巴肿块手术二次后成漏管

徐 X 女 35岁 在美国工作

2003年7月12日初诊：

病者自述：主要是颈部肿块，左右都有，已在美国做过多次检查。左耳后的肿块为淋巴结肿大，另一侧两个肿块诊断为甲状腺肿大。同年9月在美国做了左耳后淋巴结肿块手术，后复发，时有分泌物流出。同年12月又做第二次手术后成了漏管，医院医生认为即使再次手术切去漏管，以后仍然要长。在这种情况下不远万里回国求医，经亲戚介绍特来求治。

检查：患处贴膏药，时有脓液流出，其质清稀，有腥臭味。诊脉沉弱，两尺不应指，舌质淡，舌边齿印甚多；面色萎黄、形瘦、目突出、眼眶黑；月经每月约推后10～20天，7～10天方净，有时淋漓达十余日之久，最后数日有瘀块，经色发黑有异味；食欲不好，但回国后转佳，疲劳易累，经常感冒，感冒就鼻塞不通；睡眠很不好，不易入睡且易惊醒，每晚都服安眠药；曾患忧郁症，现已愈；大便较软，但二日一行；时时烦躁，无故生气。

辨证：据其形症乃气血两亏、脾肾俱虚，正气(精、神、气、血)不足，邪势鸱张，故脓液质清腥臭、脉沉弱而两尺不应指、舌质淡白而舌边齿印甚多、疲倦易累、面色萎黄；五脏六腑时刻皆需气血供应，供应不足则烦躁自生，甚者可发展至骂人毁物状若疯癫，或者悲伤欲哭，若有神灵作祟；正气既亏卫外不固，故感冒频繁且缠绵难愈；导致月经推后、经期淋漓不净达十余日之久，经色黑而有异味；血不养心则失眠，血不养肝则多梦。安眠药乃治标之剂，非治本之药也，时常服用损害健康，西药大抵如此不足怪也。有人服用一种强烈安眠药，服后周身如瘫不能动弹而失眠如故。疾病有如帝国主义，专欺弱者，正气日亏，邪势日炽，种种症象(如目睛微突、眼眶晦暗如戴墨镜……)足以说明。

治法：扶正祛邪、宁心安神。

处方：圣愈汤合酸枣仁汤加味。

黄芪100克　太子参30克　当归15克　川芎10克　赤白芍各15克　丹参30克　炒枣仁30克　茯苓15克　知母15克　制首乌20克　黄精20克　炙甘草10克

2剂，水煎服，连煎四次，将四次药汁混合后分四次服，日服3次。

7月16日二诊：疲劳易累大减，睡眠明显好转，黑眼眶

右侧基本消失，左侧变浅；大便仍二日一行，但时间缩短，较前易解；脉、舌如故而左尺(脉)已应指。从小患荨麻疹，遇风即发，色红成团成片，痒甚。

处方：

在上处方中加入紫草30克、丹皮15克、全虫10克、大蜈蚣3条、防风15克、白术30克，2剂。

服完2剂后荨麻疹当消失，可接服下列丸剂。

处方：

黄芪 防风 白术 人参 当归 川芎 赤白芍 海藻 昆布 连翘 黄药子 土贝母 猴枣 夏枯草 益母草 月季花 合欢花 炒枣仁 知母 茯苓 灵芝 守宫 隔山撬 全虫 大蜈蚣 蝉蜕 紫草 丹皮 丹参 乳香 没药 花粉 儿茶 乌贼骨 建曲 焦山楂

共为细末，每日服三次，每次服6克，饭后用温开水送服。另外，每日用淡盐开水俟温清洁疮面后用消毒纱布覆盖。

2003年11月22日：其表妹敬某来叙症开药：① 身体、面色都比过去好多了；② 感冒明显减少；③ 甲状腺包块已摸不到了；④ 荨麻疹消失后未再发。过去遇冷遇热都要发，现在没有发了。余病尚无明显好转，但漏管流出的黄水要稠些了。

处方：

在7月16日丸方中加血竭、海蛤粉、猫爪草，服法同前。

若感冒、咳嗽即停服，及时治疗感冒、咳嗽，不可轻忽，愈后续服。忌辛辣、香燥、油炸、烧烤、腌卤及烟熏火燎食物。

另用化管生肌散掺入漏管中，必排出脓液若干，自内排脓生肌收口。

2004年7月26日上午11点30分自纽约打来长话：病者漏管有牙签粗细，深约1.5厘米，药不能到达深部。我建议他路途遥远、花费甚大就在纽约找医院想办法，对方说：找医院

就是开刀割，现在的漏管就是手术后出现的，因此不敢再割；又建议在美国找中医外科或疡科，他(病者丈夫)说：在美国的中医外科、疡科还不知道是否有，也没有看见过，务请先生设法。我想用传统的方法做捻子插入管中，但现在已没有那些材料了，我说你可找细玻璃管消毒后将药粉吹入漏管深部，只要药达深部必有脓液排出，随即自内而外生肌长肉，最后收口。

8月6日上午8点30分自纽约打来长话：将药第一次渗入深部后果如先生所说排出很多脓液，第二次就不行了，主要是伤口痛甚，不敢稍有触动，如何办？我说这是腐肉已化、新肉正生，很嫩，故触之痛甚。服药好了，服药同样可以收到自内排脓生肌收口的效果，之所以内外用药是因为可以快一些痊愈以减轻病者痛苦。你们回国一趟不那么容易，且在美国工作挣钱也并非易事，坚持服药好了。但须注意每日必须清洁疮口之后用消毒纱布覆盖。

2005年2月22日上午11点50分自纽约打来长话称："颈部漏管已封口一月余未见异常，因去纽约医院用核磁共振检查，原漏管右侧有一小包块如小指头大，左边颈部皮肤表面有颗粒数个；月经由推迟10～20天缩短为七八天，经期也缩短为五六天；荨麻疹已愈，睡眠好转，但入睡尚难；大便不干但不畅。总之比过去好多了，首先是漏管好了，体重增加了。请老师再开一疗程的药由我表妹来取。我的先生服药已有明显好转，我们全家感谢您。"

2005年5月4日晚上9点15分由纽约打来电话称：① 颈部漏管愈后已3个多月，未有反复，经医院检查，确实好了；② 漏管周围的小包块和甲状腺肿大，都消失了；③ 月经只推后五六天了，经期也缩短为4天，淋漓不净、拖拉的现象也没有了，要求转治她的忧郁症和失眠症。

按：坏症最难医，病医烂了最难收拾。有人认为中医将被

西医取代，认为当前中医的西医化、高等中医院校中医经典由必修变成了选修、英文由选修变成了必修、西医课大量涌入中医课堂……种种迹象似乎都表明中医将被取代，不是吗？用了几千年行之有效的古方现在要小白鼠点了头才算数，凡此种种不一而足。但，我认为西医取代不了中医，为什么？因为中医能够医治西医所医不了的病，此例即是。而且此例是在西医很发达的国家医不了的，甚至医成了坏症。在拙著《疑难杂病治验录》及《续篇》(分别在1986年和1997年由四川科技出版社和北京学苑出版社出版)中所列病案基本上都是经过医院甚至是大医院治过的。实践表明西医取代不了中医。中西医结合创造祖国新医学是一个不断探索的过程，在探索过程中难免会走一些弯路，这是正常的情况。中西医各有优势也各有不足之处，团结、合作、互补，笔者以为是可行的。

三十、双侧乳房包块手术后复发及双侧腋窝深部淋巴瘤

韩××　女　43岁　成都市　干部

2001年3月17日初诊：

自述并出示检查报告。月经来潮之前双乳房胀痛，右乳胀痛更甚，因去川医检查，双乳均有包块，右乳房包块较左乳房为大，触之痛，遵医生建议将右乳房包块切除。已做手术三次，现又复发，左乳包块比豌豆大，比胡豆小。超声检查报告：左侧乳腺距乳头4厘米查见大小约4厘米×2厘米×5厘米的弱回声结节，边界欠清楚，形态欠规则。双侧腋窝查见长

大的淋巴结回声，结构未见明显异常。左侧腋窝最大，大小约17厘米×7厘米，右侧腋窝最大尺寸约15厘米×8厘米，内见点片状血瘀信号。病者称："有拳头大小"，医生仍建议手术。因有前车之鉴，不愿再动手术，故来求治。

检查：诊脉弦细而弱、时有歇止，舌无苔但粗，舌边齿印甚多；月经每月提前7～10天，5天干净，经色先黑后红，有瘀块。经来除乳房胀痛外，还有小腹胀痛、腰痛微胀等；平时易感冒，睡眠特别不好，不易入睡，睡后易惊醒，醒后难以入睡，多梦纷纭，基本上一夜都是梦；大便正常，软便、不通畅、不易解出，有时便秘；尿少尿频，解不尽而时时欲解，不痛，夜多小便。

辨证：脉弱、时有歇止(结代脉之属)，舌边齿印甚多，此气虚也；气虚，推送无力故大便不通畅、不易解出；气虚则血瘀，故月经有瘀块；气虚则气滞，故乳房、小腹、腰等处胀痛；气属阳，血属阴，阴无阳则不化，故经色黑；气血相依，阳生阴长，故气虚血亦虚，血不养心则失眠，血不养肝则多梦；尿少、尿频、解不尽而时时欲解亦属气虚不摄、推送无力之故。乳房肿瘤、腋窝深部肿瘤皆由气虚所致之痰瘀互结之证，《内经》云"百病皆生于气也"，信然。

治法：补气活血、行瘀消痰。

处方：

玉屏风散　桃红四物汤加红参　益母草　夏枯草　全瓜蒌　浙贝母　海藻　蟑螂(制)　守宫　猫爪草　五子衍宗丸　建曲

以上诸药共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克。每日早晚各服1丸，3日后无异常在中午加服1丸。

上方连服2剂后于2002年2月20日去原所在医院检查："医生对腋窝深部淋巴结肿大和乳中钙化点消失殆尽感到十分惊讶！"现在痛已减轻很多，大小便、夜多小便及睡眠等俱有明

显好转。但月经来时小腹坠胀痛，腰胀痛。诊脉弦弱，舌淡。

处方：

在前方中加升麻、柴胡、枳壳、木香，仍制蜜丸服之。

2002年4月17日三诊：月经来时小腹坠胀痛、腰胀痛俱消失，饮食、睡眠、夜多小便等均有明显好转。“精神好了，可以支持工作了”，面色由萎黄、晦暗渐转白皙红润，自我感觉腋窝深部淋巴瘤缩小，胸部的支撑感大大减轻；但左腋窝淋巴瘤尚隐痛，月经提前3～5天。

处方：

在上处方中更加香附、青皮、水蛭、土鳖虫，并加重参、芪用量，制蜜丸再进1剂。

2002年8月3日四诊：丸药服完后遵嘱于今日去医院复查：双侧腋窝深部淋巴瘤消失，双乳房中包块亦消失。

按：气以运血，气足则血行，故重用人参、黄芪、白术、桃红四物汤养血活血行滞，加香附、青皮、枳壳、木香行气，补气活血、行气消滞则经来小腹胀痛、腰痛微胀可解、经水中瘀块可消；淋巴瘤、乳房中包块乃因气虚、水液代谢功能失常导致痰瘀互结而为肿瘤，故在用桃红四物汤活血行瘀的同时又用夏枯草、全瓜蒌、浙贝母、海藻等消痰之品；蟑螂为治乳中包块之圣药，民间有单用此物研末装于鸡蛋中(鸡蛋顶端敲一小空，将蟑螂末纳入空中，以纸浸湿封其口，于饭上蒸熟后去壳食之)治乳癌及乳中包块者；守宫、猫爪草治淋巴瘤有殊效；病者平时极易感冒，故用玉屏风散更以升麻、柴胡配伍其中，既可补气升阳预防外感，又可解除小腹及腰坠胀之苦。重要的是以参、芪驾驭诸药，益以五子衍宗丸补其肾气，共奏扶正祛邪之功。

下　篇

恶性肿瘤（癌证）

一、鼻咽癌转移为肺癌晚期

温××　女　62岁　重庆永川　工厂干部

1987年10月30日初诊：

自诉：我于1984年7月确诊为低分化鳞状上皮鼻咽癌，经放疗控制住了病情。1986年8月在成都一家大医院检查，发现转移至左上肺尖，立即在该院进行化疗至1987年3月，此转移灶已长至4.5厘米×4.5厘米×5厘米大小，3月下旬在该院手术切除后，继续化疗，至7月一个疗程结束，发现又已转移至右中肺约1厘米×1.5厘米大小。由于化疗反应极重，不能承受，改服中药治疗，经亲戚介绍，于今日前来求治。

检查：诊脉沉数102次/分，舌质嫩红，舌边齿印甚多；口干无津液，夜间干甚，必须时时以水润之，叙症时已频频饮水若干次；时时恶心欲吐、厌食；说话气不接续，自感气往下坠；头发已全部脱光，带假发；形瘦，面色苍白，心烦甚易怒；动则累甚，坐则舒，卧则更舒；大便不调，时干时稀，但以干燥时居多。原体重120多斤，现在只有98斤；不咳，亦无胸痛等症状；现在大便干结难解，二三日或四五日一行。

辨证：气阴两亏，邪毒内结，乃正虚邪实之证。

治法：益气养阴、生津止渴、软坚化痰，解毒散结，汤、丸并进。

处方一：汤剂

西洋参10克　北沙参30克　麦冬30克　石斛30克　黄芪60克　生地30克　丹皮15克　紫草15克　丹参30克　黄精30克　猪苓20克　枸杞子20克　女贞子20克　建曲15克　砂仁6克　甘草10克　（可连服10剂）

处方二：

西洋参　黄芪　麦冬　海马　菌灵芝　石斛　生地　花粉　制马钱子　硝石　矾石　郁金　干蟾皮　蜣螂　麝香　冰片　人工牛黄　守宫　当归　丹参　五灵脂　枳壳　干漆　川贝母　皂角刺　皂角菌　枸杞子　山药　女贞子　水蛭　全虫　蜈蚣　桑椹子　菟丝子　鸡内金　建曲　炒谷芽　地鳖虫　仙鹤草

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，温开水送服。

1988年1月17日来信称："服药后，觉得精神、饮食、睡眠都较好，也无什么不良反应，有的同志看见我都说气色在有好转，不像个病人……只是12月下旬我照例又拍了一次X光片，发现左上肺手术切除的部位又有了一肿块影，大小也与手术前相似，不过颜色较浅，医生认为这是转移灶，还认为发展较快，建议化疗。我已婉言谢绝，一来我对化疗极不适应，视为畏途，二来我现在自我感觉良好，相信丸药对我的病及身体均有好处，只因气候寒冷出门不便，故写信将情况简述如下，恳请再为我处方。前不久查了一次血常规，白细胞已由原来的2 800升为4 000多，血色素由6克多升为9克。近来感觉有时有些带不住小便，腿软，蹲下以后，必须撑着脚背才能站得起来，而且不能盖得太厚、穿得太多，否则耳朵、鼻子、口腔就容易出现炎症……"

处方：

按前丸方加天冬、北五味子、白花蛇舌草、生地。

另用：玳瑁、露蜂房、龟版、海藻、鸦胆子、蟾酥，共研细末，每次服1～1.5克，日服2次，温开水送服。

1989年4月27日面诊：自诉，服丸药近两年，两年来自我感觉一直很好。但今年春节以来，开始是颈痛连脑，疑是癌转移，后来头痛颈痛减轻，腰椎又痛，腰减轻后左腿又痛，两年来除服丸药外，未服任何西药、中药；腰椎、颈椎都照了片，没有什么问题(出示检查报告单及照片)，EGM部右侧贲门有包块，手术之前就有，现在有所增长；4月15日照片，气管旁有新的阴影，是重庆第三人民医院照的，X光照片号79705；偶有咳嗽，现在我又来成都，仍然去川医检查，结论相同，医院建议化疗，我认为疗效并不好，而且副作用特别大，婉言推谢了；至于腰痛，医院认为不是癌转移，但晚期癌症，都有这类现象；中耳炎时时发作，先痛，随时流脓，流后痛即减轻；脱发近来也很利害，本来已脱的头发已长起来。但饮食、二便俱正常，只有解大便很吃力，大便并不干燥，都是稀便或软便，只是无力解出来；说话很费力，接不上气，气往下坠，精力很感不够，但体重略有增加，过去由120多斤下降到98斤，现在有100斤，有一次达到102斤；不喜油荤，喜吃蔬菜，鼻子偶有出血现象，点滴即止。诊脉沉弦弱结代，舌红无苔而嫩，气阴两亏之象。

处方：

黄芪　西洋参　玉竹　山药　干漆　五灵脂　硝石　矾石　石斛　花粉　丹皮　牛角粉　全虫　蜈蚣　蟾酥　人工牛黄　野灵芝　乳香　没药　守宫粉　川贝母　夏枯草　龙葵　当归　丹参　莲米　百合　苡仁　甲珠　莪术　白木耳　黄药子　海藻　菟丝子　女贞子　地鳖虫　蜂房　海马　鸡内金　建曲　冰片　白花蛇舌草　枸杞子

仍为蜜丸，服法同前。另外可服犀黄丸。

汤剂：中耳炎发作时服，愈后停服。

黄芪60克　柴胡15克　赤芍15克　赤茯苓15克　升麻10克　生地15克　菊花15克　蔓荆子15克　浙贝母10克　木通10克　桑白皮10克　黄柏10克　夏枯草20克　麦冬10克　甘草5克

1989年8月17日面诊：

自诉：这四个月以来，自我感觉一直很好，精神比过去好多了，说话费力的现象大大减轻，大便也较前易解，多数时间是软便，当地医院认为我还活着是个奇迹，气往下坠的情况基本上没有了，丸药每天吃3次，每次1丸，有时我吃4次，没有不舒服的感觉，医院检查，癌仍在进展，但很缓慢，医生说：晚期癌症像这样缓慢进展的，极为罕见。犀黄丸找到两盒，都按照说明吃了。此次到成都是因为左腿一股筋痛从左侧臀部一直痛到脚，当地医院检查是坐骨神经痛，不是癌转移。8月15日去川医检查，结果为：① L_3—S_1 椎体前缘骨质增生，但未见明显骨质破坏现象；② 双侧髋骨无确切破坏。同时也检查了癌症的变化情况，照片号302418，结果为：a. 右前上纵隔、右肺门淋巴结、双肺NPC转移；b. 右下叶空洞影多为阻塞性炎坏死空化而成；c. 对比1989年4月23日检查结节状高密度影有所增加，大小有所增大，左上肺且有新的结节状高密度影出现，提示NPC转移癌仍在缓慢进展。

诊脉沉弱弦，舌质嫩红，口干喜饮，时时心烦微咳，鼻孔中偶有出血的情况有所减少，两手脉仍时有歇止，过去容易感冒，感冒就发高烧，高达40°C，现在这种情况明显减少。

处方：

在前丸方中加仙鹤草、白芨、广三七、防风、白术、紫草、生地。服法同前。

1990年8月某日其姐丈徐××同志告知，病者因腿剧痛

不能忍，俟其家中人外出时自杀。此病例自 1987 年 10 月 30 日至 1990 年 8 月，共存活 33 个月。

二、食道癌

李××　男　63 岁　绵阳地区干部

1979 年 11 月 5 日初诊：

自诉：食道吞咽困难，胸部疼痛，经省上两家大医院检查为食道癌，为菜花状，鳞癌，病灶 15 厘米，同时患有冠心病、慢性气管炎、肺气肿、咳嗽、哮喘、两腿皆肿。

检查：诊脉浮数 115 次/分，苔黄厚腻；心绞痛时作，夜间为甚，常在睡中痛醒；血压很不稳定，救心丸、降压片经常随身携带；目前吃流质，胸部梗得痛，很难受，咳嗽、黄痰、痰不易出。现服西药，服后大便干燥异常，努责难出；又服强的松、安茶碱控制哮喘；两腿肿，按之凹陷没指；心烦易怒，面色晦滞。

辨证：痰湿凝滞，瘀毒内结。

治法：化痰散结润燥，清热解毒除湿

处方一，旋复代赭汤加减。

旋复花 15 克　代赭石 60 克　石膏 30 克　玄参 30 克　生麦芽 30 克　川楝子 6 克　天冬 30 克　龟版 30 克　生龙骨 30 克　生牡蛎 30 克　猪苓 30 克　海藻 30 克

处方二，活络效灵丹加味。

当归、丹参、乳香、没药、桃仁、地鳖虫、黄连各 20 克，共研细末分为 27 包，每日早晚各服一包。

1980年2月23日二诊：服上方汤剂12剂及散剂后，脚肿消失，大便通畅，黄痰已无，吞咽梗塞、胸痛、心绞痛等均有所好转，痰亦大大减少；半流质已可吞下，但背部扯得痛（吞咽时常引背痛）。因于1980年1月9日去北京，经两个医院检查，结果与成都两家医院检查结果相同。在北京一家医院住院治疗，并经院方同意，继续服用您的两个处方，在这家医院做化疗一个疗程，建议出院继续中医中药治疗。该院出院介绍："食管癌症状消失，X光食管造影，原食管中断充盈，狭窄消失；心电图：窦性心律，正常心电图，肺功能较为明显混合性减退，肺气肿，肝肾功正常，血色素11.7，白血球5 900，淋巴13，胸部右侧皮下有一硬结，质坚，逐渐长大，当防转移。"现在半流质已可吞下，但吞咽不顺，有堵塞感，吞咽时牵扯引背痛，诊脉弦数87次/分，黄厚腻苔已退，治当扶正消癌，攻补兼施，方用丸剂消息之：

黄芪　红参　茵灵芝　木耳　射干　当归　丹参　淮山药　乳香　没药　川贝母　黄精　菟丝子　枸杞子　熟地　建曲　鸡血藤膏　女贞子　百合

根据具体病情加用了下列药物：

干蟾　守宫　蟑螂　蜣螂　制马钱子　山慈姑　山豆根　地鳖虫　鼠妇　紫硇砂结晶粉　全蝎　莪术　干漆　郁金　龙葵　黄药子　重楼　僵蚕

上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸。

7月21日三诊：由于找药困难，耽延了时间，因此配制了两剂，现在还有半个月的药，服后自觉精神很好，食道癌的前述症状俱已消失，无任何不良反应，心绞痛未再出现，也不感冒了，哮喘也未发作，只平时痰多。诊脉结代，78次/分，舌有薄腻苔。

处方：

上丸方中加法夏、茯苓，去黄药子，加北五味子，制蜜丸服法同前。

此后即在本处方基础上出入进退。

在治疗过程中曾哮喘发作，反复感冒，牙龈肿痛，黄疸(急性黄疸型肝炎)，均用汤剂陆续治愈，同时根据情况丸药时服时停。

1983年12月27日在医院复查："自我感觉良好，无任何不适之感，病灶消失，食道正常。但有粗糙面，而吞咽无任何梗阻感。"

1984年11月20日去医院复查，照片号104543，未发现异常，仅鼻孔干燥，诊断为慢性干燥性鼻炎，时北京肿瘤专家黄教授在该院讲学，向病者建议："不做化疗，坚持中药治疗。"

1985年9月26日在医院复查：做痰涂片检查："无癌细胞"；27日透视检查食道，照片号180529，"食道中段憩室约2厘米×3厘米大小，除憩室外，未见食道异常改变征象，原有粗糙面消失"。血沉12 mm/h，白细胞6 400，血色素12.5淋巴细胞40%。因停药，转治肺气肿。

1989年8月死于心肌梗塞，逝世前写信给作者："心脏病频发，恐不久将去马克思处报到，我的这个病例，值得老兄总结，以造福人民也。"

按：本病初用旋复代赭汤加减、降逆、化痰、除湿、润燥、清热、解毒，使大便通畅，黄色稠痰消失，吞咽梗塞减轻，用活络放灵丹加味，活血去瘀解毒，心绞痛减轻，此时半流质已可吞下，在北京住院40天中，院方同意继续服用两个处方，出院时建议继续中医治疗，这使病人增强了信心，特别是1984年黄克维教授来成都讲学，复查时明确建议："不做化

疗，坚持中药治疗”，减少了许多干扰，难能可贵，对治愈此病起了重大作用。

丸药重在扶正祛邪，扶正有参、芪、归、地、术、白木耳、丹参、山药、黄精、菟丝子、枸杞子、女贞子、百合、鸡血藤膏、建曲等，后又加北五味子、苡仁、楮实子；祛邪药中用射干、山豆根、山慈姑、重楼、黄药子、僵蚕、龙葵，清热解毒，软坚散结；用当归、丹参、鸡血藤膏、乳香、没药、制马钱子、水蛭、蟑螂、蜣螂、莪术、干漆、鼠妇、土鳖虫、全蝎、守宫等活血行瘀，消肿止痛；射干配守宫、蜣螂、水蛭、山慈姑、硇砂、贝母、郁金对食道癌、贲门癌等颇具殊功。诸药合用功能补气养血，活血行瘀，软坚散结，消肿止痛，化症消癌、祛邪而正不伤，故病者体重不但没有下降，反而有所增加。

三、肺癌、肝癌

高××　男　62岁　四川省　高干

1993年7月2日初诊：

6月30日其上级何老打电话给我，7月1日其子前来介绍病情：“今年5月援外回来，咳嗽不止，服药不愈，继而咳血，胸痛，乃去医院检查。内科检查之后，转至肿瘤科检查，确诊为晚期肺癌，肺上两个包块约6厘米，已转移到肝，肝上四个包块约8厘米，胸水，医院准备抽水，现在本人只知道是包块，尚不知是癌，望老师多关照云云，并将检查报告的复印件给我看。今日9时本人前来就诊：称已做放疗，下一步将做化

疗；白血球 2 800；医院决定抽水；胸痛，胸部感窒到塞；剧咳痰中带血，有时全是血痰，咽中感到血腥气。”

检查：诊脉沉弦弱结代，时时歇止，舌质淡白；咳剧，泡子痰，量多，痰中带血，色鲜；气短、胸闷、胸痛，胸部窒塞，极感不舒。饮食尚可，大便稀溏，不易解出，必须努责许久；口干甚，时时饮水不欲咽，饮食很勉强。因不断咳嗽，影响睡眠，精神委靡，面色苍白，语音低弱，时时感到气不接续。

辨证：气阴两亏，正虚邪实。

治法：益气养阴，扶正祛邪，建议停止放疗和化疗，暂缓抽水，汤、丸并进。

处方：

黄芪 60 克　晒参 15 克　北沙参 30 克　麦冬 10 克　五味子 10 克　龙葵 30 克　桑白皮 15 克　葶苈子 15 克　白英 30 克　白芨 30 克　三七粉 12 克　半边莲 30 克　(3 剂)

丸剂：

射香　蟾酥　冰片　人工牛黄　晒参　防风　白术　川贝母　水蛭　甲珠　鳖甲　制蜂房　黄芪　当归　丹参　全虫　鼠妇　蜣螂　蜈蚣　干漆　天龙　柿霜　南北沙参　乳香　没药　五灵脂　冬虫夏草　枳壳　硝石　矾石　广三七　仙鹤草　龙葵　百合　鸡内金　制马钱子　郁金　建曲　虻虫

共为细末，炼蜜为丸，每丸重 10 克，每日早晚各服 1 丸，3 日后无不良反应，可在中午加服 1 丸，均在饭后半小时内用温开水送服。

7 月 11 日二诊：咳大减，痰亦大减，白细胞上升至 3 200；脉浮弱，舌淡白，痰中带血大减，便溏。

处方：

黄芪 60 克　晒参 15 克　南、北沙参各 15 克　山药 30 克

麦冬10克 五味子10克 龙葵30克 白英30克 苡仁30克 茯苓20克 全瓜蒌30克 石见穿20克 桃仁10克 川贝母10克 大枣10克 桑白皮20克 葶力子15克 白花蛇舌草30克 仙鹤草30克 半边莲30克 （4剂）

7月18日三诊：医院检查胸水消去大半，决定不抽水；泡子痰只偶尔咳出，咳亦大大减轻，晚上人睡后已基本不咳，痰中带血消失。

处方：

上方再进4剂，同时开始服丸药。

7月25日四诊：咳止，胸痛消失，白细胞升为4 800，眠食俱佳，精神明显好转，大便虽溏，但可畅快解出；其老伴说："现在想说话了，说话的声音也大了。"但呃逆频频，其声响亮；脉浮、舌淡，此乃冲气夹胃气上逆，治当降逆镇冲。方用旋复代赭汤加减：

旋复花10克 代赭石30克 法夏20克 晒参15克 鱼腥草30克 柿蒂30克 山药30克 建曲15克 甘草6克 （3剂）

8月1日五诊：呃逆基本止，只偶有出现；大便仍溏，但已畅通；脉浮，苔薄黄，口渴喜冷饮，头微有昏胀感。

处方：

黄芪60克 防风15克 白术60克 旋复花10克 石膏30克 花粉30克 柿蒂20克 代赭石60克 沈参30克 桑叶10克 菊花10克 蔓荆子15克 （3剂）

8月4日六诊：呃逆止，但咳尚时有出现，薄黄苔退净，渴饮止，仍便溏但通畅，右脉平弱，左脉有浮象。

处方：

黄芪60克 防风15克 白术60克 龙葵30克 白英30克 桑皮15克 葶苈子10克 桑叶10克 丹参30克 桃仁

10克　鱼腥草30克　甘草6克　大枣10克　(4剂)

8月11日七诊：医院检查：胸水基本消失。咳已微，舌淡，脉尚有浮象，仍按六诊时处方继进4剂，并以此方为基础，据病情予以进退加减，8月25日医院检查，包块缩小，尚有胸水。

9月1日医院检查肺上包块缩小为1.2厘米，血色素升至12，白细胞4 800，舌质渐红润，精神明显好转，可一直走上四楼就诊，中途不再休息；咳只偶尔出现，胸水消失，大便溏，日行2～3次，诊脉沉弱而弦。

处方：

黄芪60　防风18克　白术60克　莲米30克　茯苓15克　晒参10克　麦冬10克　北五味子10克　龙葵30克　白英30克　苡仁30克　白花蛇舌草30克　川贝母10克

研末分冲。

丸药由于病者自觉效佳，早已改为日服3次，每次1丸，并以丸药为主。

10月13日九诊：医院于昨日检查，肺上包块消失，肝上四个包块约8厘米，现缩小为3.7厘米，为片状，已非块状，白血球上升为5 800。大便日行一次软便，已非溏便；自觉精力较前为旺，已接连两周回单位处理公务各一次，体重增加2斤。

由于病者要去非洲某国上一个大项目，因此要求医院放疗、化疗一齐上，他认为有丸药支持，有汤药对临时出现的问题及时解决，再上化疗、放疗，癌症即可迅速痊愈，虽然医者重申前言，再三劝止，又通过其妻、儿子劝止亦未奏效。10月22日感冒剧咳，按“知犯何逆，随症治之”的原则进行治疗，24日咳大减，11月6日二便出血，辨证施治后11月12日小便出血止，大便出血大减，再次提出停止放疗、化疗，以疗程未完为由，未予接受。

11月28日全身浮种，黄疸，医院当即进行检查：核医学科骨显报告单结论(L4左8肋及右肩胛骨骨转移)。12月1日请我去医院会诊：小便出血止后未作，但大便昨日出血甚剧，病者仰卧床上，二目深陷，面色、肤色深黄晦暗，目光失神，嘴唇翕动，其妻知其想说话，乃将耳朵凑近嘴唇；移时，其妻说："他想出院，他很后悔没听李老师的话"。随即滚出泪珠两颗，全身浮肿，两腿为甚，按之没指，此时丸药、汤药均不能下咽，放疗、化疗也已停止，唯输液而已，知其无救，勉处一方，用鼻饲，12月3日本人去北京开会，返回成都时，丧事已办理完毕。丸药尚余180余丸，嘱其亲属，可与我救治他人。

四、肺癌(一)

郑××　女　55岁　四川省资中县农民

1991年5月5日初诊：

子女代述：因感冒咳嗽，咳血、胸痛，治疗月余不但无效，反加重，因去医院检查，诊断为：① 慢性气管炎肺气肿；② 肺癌待进一步诊断，因来成都某医院检查，确诊为肺癌，当即住院治疗，医院决定手术，本人坚持不愿手术，她说："不愿临死还要挨一刀"，好容易动员她来老师这里来吃中药。

检查：诊脉浮数而弦，舌苔黄厚，口干喜饮，口苦甚，每天早晚咳，以早上咳为剧，必咳出数口乃至数十口黄稠浓痰，其中数口带有血丝或鲜血，咳为阵阵呛咳，胸痛，胸闷，气促，病自今年春节开始，因反复感冒迁延至今；饮食尚可，但很勉强，喜饮极凉之水；大便一日一行，定时解便，稍稍偏

干。肺上包块约4.5厘米×7厘米大小(X片号：358971号)，在右肺上叶属中央型肺癌。形瘦，面苍。

辨证：时邪犯肺，化热传入少阳、阳明。

治法：疏风清热，生津止渴，化痰散结。

处方：小柴胡汤合白虎汤加减。

柴前胡各15克　黄芩15克　沙参15克　石膏30克　花粉30克　浙贝母15克　岩白菜15克　山药30克　鱼腥草30克　仙鹤草30克　重楼30克　银花30克　广三七10克

研细粉分3次用药汤送服，3剂。

5月9日二诊：黄厚苔退，渴饮止，口苦消失，纳食已香，咳大减，黄痰转白，痰量大减，痰中尚带血丝，胸痛大减；大便日行2次，不干不稀；饭量增加，但气不接续，胸闷。诊脉：右脉沉而结代，左脉尚有浮象，舌质淡白，舌边出现齿印，气阴两虚，外邪未净，治以益气养阴，清热润肺，解毒散结，逐邪外出之法。

处方：

黄芪60克　防风15克　白术30克　北沙参20克　麦冬20克　荆芥15克　鱼腥草30克　岩白菜20克　重楼30克　前胡15克　浙贝母15克　全瓜蒌30克　半枝莲30克　龙葵30克　仙鹤草30克　百合30克　白花蛇舌草30克　建曲15克　甘草10克

3付，并将高某所遗之丸药给予3丸，每日早晚饭后半小时内各服半丸，温开水送服。

5月13日三诊：气渐接续，微咳嗽，服丸药后，无任何不良反应且有舒适之感。由于病情好转，子女以炖鸡补之，今日起床即面浮肢肿，按之起凹，诊脉浮数，苔薄黄，此属风水，以越婢加术汤合汉防已黄芪汤3剂予之，另给丸药(即上所给之丸药)3丸，服法同前。

5月18日四诊：服上方3剂后肿大消，但未全消，又服2剂，诊脉沉弱，黄苔退争，浮肿全消，精神渐振，身软无力大减，仍微咳，乃停服汤药，将高某所遗之丸药全数与之，共183丸，每日早晚各服1丸，饭后半小时内用温开水送服，服半月后，中午加服1丸，若感胃咳嗽加剧即停服，愈后续服，并嘱其切不可知服补品，尤不可吃炖鸡，其子称：5月9日二诊时已出院，住在他那里。

7月1日五诊：感冒、清涕、喷嚏、咽痛、咽痒、咳嗽加重，诊脉浮数，舌质偏红，痰色白，块状，但未咳血，只胸痛隐隐，治以疏风清热，化痰止咳，解毒散结之法。

处方：苍耳散合银翘马勃散加减。

苍耳30克　辛夷10克　薄荷10克　白芷15克　银花30克　连翘30克　射干10克　马勃10克　鱼腥草30克　浙贝母15克　重楼20克　前胡15克　岩白菜20克　桔梗10克　甘草6克

5剂，水煎服。

7月4日六诊：除咳嗽、咳吐泡沫痰及腿肿又作外，他症悉愈。

处方：

射干10克　蝉衣10克　山慈姑10克　鱼腥草30克　黄芪60克　百合30克　北沙参20克　麦冬15克　山药30克　防风15克　白术30克　龙葵30克　桑白皮15克　葶苈子10克　大枣10克　（3剂）

服完3剂继续服丸药，日服3次，每次1丸，饭后半小时内服。

8月23日七诊：丸药服完后去原诊断医院复查，X片号62334号，癌块消失，称为奇迹乃以扶正祛邪之方巩固疗效。

处方：

黄芪　防风　白术　晒参　麦冬　百合　山药　法夏　浙贝母　玉竹　岩白菜　白花蛇舌草　龙葵　重楼　白英　僵蚕　守宫　蜣螂　鱼腥草　水蛭　干蟾皮　当归　丹参　白芍枸杞子　菟丝子　瓜蒌　白前　女贞子　沙苑子　黄精　苡仁紫河车　建曲　隔山撬　苦荞头　谷芽

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，日服3次，每次1丸，饭后半小时内温开水送服。

1996年3月13日八诊：形体已丰，体重增加5斤，眠食俱佳，子女要求再配制丸药1剂，要求加重剂量，并将丸药配制好后即送回资中老家，因将上丸加重剂量，并加桑叶、黑芝麻。

按：此例与高某病例相比，一生(当然要看远期效果，此点已向其子女交待清楚)；一死，给人以不少启发。

此后病人一直坚持服丸药至2000年5月方停药，整整达5年之久。2003年随访尚健在，在家为其子带孩子。

五、肺癌(二)

贺××　男　68岁　北京市　高干

1992年12月23日晤谈，根据约定，当日上午由刘某偕病者秘书来京西宾馆接我直接去医院。病者称：体检时发现肺左上叶有一肿瘤如指头大小，后确诊为肺癌，已制订手术方案。关心的同志都主张不动手术，不做放疗、化疗，用中药治疗，他指着刘说，他也是一个。并说："先生对他夫人的乳腺癌的治疗效果很好，建议我请先生诊治，我自己也感到身体不

好，承受不起手术、放疗、化疗，所以请您来听听您的意见。”

我谈了我的看法之后说：“对癌证必要时不排除手术，但不主张化疗和放疗，如果癌块小则不必考虑手术。此事贺老可多考虑考虑，我开会还有五六天，如果考虑决定由中医治疗，那时再联系好了。”其间主管医师介绍了情况，出示了病历记录。

12月30日初诊：根据昨晚联系约定，第二天早上8点30分时刘偕其秘书来接，两人表示贺老决定请李老为之诊治。

诊脉沉弦弱，两尺弱甚，舌淡，舌边有齿印。饮食较好，睡眠差、入睡难，须服安定，易惊醒，醒后不易入睡；大便为软便，但不易解出，要蹲许久。对肺癌毫无感觉，不是体检查出根本就不知道，就是现在也无任何感觉，也不咳嗽。但近年来较易感冒，常常是反复感冒，要缠绵很久方能痊愈。在医院里好些，大约一两个星期未感冒了。面色不华，有晦暗之色，眼眶灰暗。

辨证：脉沉弦而弱，沉弱沉为在里，称为气虚，弦脉应肝，肝气郁而不舒方见此脉象，可知病者精神上有负担。两尺弱甚乃肾之阴阳俱虚，舌边齿印乃气虚之征，大便虽为软便但不易解出乃气虚推送乏力之故。肺癌盘踞体内无时无刻不耗伤气血，正气既伤，卫外不固，抗病能力下降，故感冒频频缠绵难愈。气血既伤，不能养心故失眠，不能养肝故多梦。入睡既难又易惊醒，虽日服安定亦难奏功。肺癌尚小(约1.5厘米×2.0厘米)侵犯面不大，造成的破坏亦不大。其来也渐，故病者尚无任何感觉，若形成气候当不是目前局面。故及时治疗实为明智之举也。

治法：扶正祛邪、活血行瘀、消痰散结。汤剂不宜，当用丸剂徐徐图功。

处方：

中芪　防风　白术　西洋参　麦冬　五味子　当归　川芎　生地　赤白芍　百合　土鳖虫　水蛭　甲珠　川贝母　天竹黄　蟾皮　鱼腥草　瓜壳　守宫　玉竹　半枝莲　白花蛇舌草　猫爪草　龙葵　白英　重楼　鱼鳔胶　制首乌　灵芝　黄精　枸杞子　沙苑子　海龙　莪术　苡仁　八月札　金石斛　焦山楂建曲

共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，饭后用温开水送服。7日后无不良反应，可在中午加服1丸。若感冒、咳嗽即停服，必须及时地、认真地、积极地治愈感冒、咳嗽愈后续服丸药。可连服2剂(1剂约三个月左右)后去医院检查，并告诉检查结果以便对丸药做必要的调整。此丸药由刘委托书法家、友人陈某在成都制作。

1994年4月20日病者秘书自北京打来电话称："贺老遵医嘱服丸药2剂后去医院复查，肺上肿瘤消失，身体也长好了。贺老说要感谢您，问您需要什么?"我说只要病好了，身体康复了，大家都高兴，感谢就不必了，我什么都不需要。秘书说："贺老是书法家，字写得很好，送您一幅字如何?"我说这个我就很欢迎。不久即收到贺老的墨宝"心底无私天地宽"条幅。

赘言：此事当时是成都书法家陈某(现任四川省政协委员)受其友——全国书协负责人之一的刘某委托，来找我询问去北京开会的行期，事实上刘已知道九三学社中央将在12月下旬在北京召开会议。我告知陈后陈即转告刘，故刚到北京京西宾馆刘就与我联系上了。

2005年2月25日《晚霞报》第3版在《贺老夫妇的激情岁月》中提及患肺癌的事："1991年在体检时确诊为肺癌，要做手术。这时他已经67岁了，心力交瘁，他向中央辞去了职务。因心脏不好，左肺又曾经做过手术，对于自己能否经受得住肺

部大手术，心存怀疑。医院看出他的疑虑，只好建议他进行保守疗法。不料，后来一次体检时他肺部的阴影没有了，这种奇迹连大夫都感到吃惊……”同样令人惊讶的是只字未提一年多中医的治疗。

六、肝癌手术后复发

雷××　男　67岁　四川省　离休干部

1986年11月18日初诊：

自诉及亲属代述：“因患肝癌住院治疗，今年5月手术切除后，一直吃不得，主要是厌食，全靠输液，过去是天天输，现在是隔天输1次。全身皮肤痒，夜间特别痒，咳嗽，素来有慢性气管炎，口苦得不得了，喝白开水都是苦的。现在肝上又发现包块，发现时只有小指头大，最近检查已有食指头大，长得很快，肝区痛，有轻度腹水。最近感冒(经常感冒)，声音哑了，说不出话了，他(病员)的老领导介绍请您用中药治疗，并且给您打了电话，所以今天接您到医院诊治。”

检查：诊脉浮弦而数106次/分，结代，时时歇止；舌质淡白，上罩黄苔；形体枯瘦，面色肤色黧黑，面有黧黑斑，两颊及额特别显著；二目频频流泪；口苦甚，口干不甚喜饮；咽痒即咳，痰不易出，音哑；肝区痛，拒按，夜间疼痛加剧，以致严重影响睡眠。过去嗜酒与烟达40年之久，患此病后已戒掉，时时烦躁易怒，低烧，体温37.5°C～38.5°C，输液后低烧即退，继而又作。夜多小便，大便溏，数日一行，现已3天，不解大便，亦无便意，时时恶心欲呕，早上漱口亦呕。

黄芪 防风 白术 西洋参 麦冬 五味子 干漆 五灵脂 郁金 矾石 硝石 仙鹤草 鼠妇 蟑螂 蟾酥 人工牛黄 血竭 儿茶 甲珠 水蛭 地鳖虫 枸杞子 女贞子 生地 百合 冬花 鸡内金 建曲

共为细末，炼蜜为丸，每丸重6克，每日早晚各服1丸，饭后半小时内用温开水送服。

12月9日四诊：汤剂已服完6剂，丸剂已服一周，现在精神明显好转，已能在医院花园散步，有时也回家走要；肝区痛明显减轻；饮食基本上恢复正常，少吃多餐，每天吃5顿；虚汗问题已解决了，体温正常，口干尚喜饮，皮肤仍瘙痒；现在每周打一次干扰素，一次转移因子。咳止；脉弦数84次/分，舌质红，眠差，便秘，往往在服西药之后出现。

处方：

北沙参30克 麦冬30克 元参30克 丹皮15克 合欢花10克 生地30克 紫草15克 炒枣仁20克 知母10克 茯苓10克 川芎5克 炙甘草6克

4剂，水煎服，丸药续服。

12月15日五诊：睡眠好转，中午都要睡一觉；饮食已达到病前水平；皮肤痒减轻，下肢痒加重，“这已是许多年的老毛病了”。大便已不干燥，每天都解；但舌质仍嫩红，脉弦数，口仍干，仍以益气养阴为法。

处方：

太子参30克 玉竹30克 生地30克 丹皮20克 炒枣仁20克 知母10克 茯苓10克 川芎5克 女贞子20克 枸杞子20克 鸡内金10克 甘草6克

5剂，水煎服，丸药续服。

12月24日六诊：精神饮食俱佳，遇着天气好还出去走一走(逛街)；睡眠虽然好多了，但还不巩固；口干好多了，舌质

嫩红转正常；流泪，遇风更甚；皮肤痒甚，影响睡眠。丸药已服完，脉弦数84～90次/分。

处方：丸剂。

黄芪　西洋参　枳壳　干漆　五灵脂　郁金　硝石　矾石　仙鹤草　僵蚕　枸杞子　鼠妇　五味子　蜂螂　蟾酥　麦冬　人工牛黄　血竭　儿茶　甲珠　水蛭　地鳖虫　女贞子　生地　百合　冬花　鸡内金　水红花子　建曲　山楂　玉竹　制马钱子　生甘草　大云

制蜜丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸。

处方：汤剂。

太子参30克　黄芪30克　当归10克　丹参30克　柴胡15克　白芍30克　菊花10克　生地15克　茯苓10克　栀子10克　夏枯草20克　炒枣仁20克　建曲15克　甘草5克　(6剂)

处方：洗剂。

麻黄10克　蝉衣10克　红花10克　苦参30克　黄柏30克　白矾30克　芒硝30克　花椒10克　(3剂)

煎洗痒处，全身痒全身洗。

1987年1月6日七诊：眠食俱佳，烦躁消失，肝区痛止；用洗剂后，皮肤瘙痒好转；仍流泪，右眼更甚；脉弦数78次/分，舌质由嫩红转正常，舌边现紫色。

汤剂继进6剂。

洗剂再用3剂。

丸剂续服。

1月16日八诊：医院作了一次检查，昨日方告结束，认为情况很好，稳定；气胸(原有气胸)经照片已吸收；查肝功正常，B超检查肝癌未继续长大；流泪乃泪点移动，但已减轻；皮肤痒也明显减轻；晚上小便由原来的四次，减少了两次；体

重增加两斤；诊脉弦数 78 次/分，舌淡，舌边齿印，仍现紫色。

处方：停服汤剂，续用洗剂，坚持服丸药，每日 3 次，每次 1 丸，温开水送服。

2 月 20 日九诊：汤剂已停 4 周多，坚持丸药，日服 3 次，每次 1 丸，精神颇好，眠食俱佳，身痒已止；夜尿又减少一次；饮食方面油荤多点即感消化不好，第二天必然拉稀；诊脉弦，左脉有浮象，舌淡，舌上有裂纹，舌边齿印变浅，紫色消失，流的眼泪是冷的，经本医院及另一家医院会诊为慢性泪囊炎。

处方：

黄芪　西洋参　玉竹　灵芝　当归　丹参　血竭　广三七　甲珠　生鳖甲　枳壳　干漆　全虫　蜈蚣　五灵脂　硝石　矾石　僵蚕　半边莲　山药　防风　白术　柴胡　绞股蓝　枸杞子　菟丝子　北五味子　天麦冬　生熟地　鸡血藤膏　蟾酥冰片　人工牛黄　建曲　苡仁　白英　茯苓　女贞子　百合　冬花　白花蛇舌草　制马钱子　炒谷麦芽　覆盆子

制蜜丸，每丸重 10 克，每日早晚各服 1 丸，饭后半小时内用温开水送服，若感冒咳嗽即停服，愈后续服，7 日后若无任何不良反应可在中午加服 1 丸。

6 月 19 日十诊：今日病者偕夫人来我办公室，3 个多月未见面，居然容光焕发，神采奕奕，与过去判若两人，自称体重由 89 斤增加到 115 斤，“若能恢复到原来的 130 多斤就更好了”，身痒完全消失了，流泪好了两个月，现在又流起来了，但已不凶，白细胞由原来的 2 300 升到了 5 000。医院提出要化疗，我想征求您的意见，我这病是靠您的治疗才有今天这个样子；另外我的丸药只剩下几天了，要请您再开处方，其夫人白某趁病者入厕时告知：此次检查，其他都好，原有的肿块

3.4 厘米×3 厘米未继续长大，但另外在右叶肝区内出现了两个，一个直径 1.8 厘米，一个直径 1.4 厘米，都是圆形的。

处方：

在九诊处方中加虎杖　贯众　板蓝根　鼠妇　蜣螂　蟑螂　水蛭　蛇虫

制蜜丸，每丸重 10 克，每日 3 服，服法同前。

1987 年 7 月 30 日其子将两个医院检查会诊的结果送来如下：

1. 胆囊大小属正常，胆囊内未见肿块图像。

2. 在左内下肝区内紧靠胆囊的左侧壁有一个 3.4 厘米×3 厘米低回声像实质性肿块，此肿块之形态及回声特点与手术前第 1 次检查所发现的肝肿块相同，另外在右肝区内还有两个低回声近似无回声像肿块其大小分别为直径 1.8 厘米、直径 1.4 厘米，都是圆形的。

3. 肝脏整体内回声仍然强弱不均。

4. 胰腺：大小属正常，胰腺部位未见肿块。

1987 年 10 月 3 日十一诊：病者夫人来我办公室邀诊并说他精神本来很好，眠食俱佳，体重未增加亦未减少，除下午腹胀而外，无其他问题，所以丸药没有配制。现在组织上给他买了专治肝癌的针药，打了几针后，就明显感到有问题，但本人认为这是组织上对他的关心，必须坚持打完，现在还剩下 4 针。“我看实在不行了，坚决停下来，化疗也停了，但癌块迅速长大，呕不能食，喝水亦吐。医院已抽水 2 次。”随即拉开病人的衣服，右胁包块大如拳，剧痛，夜间痛不成眠，病势至此，已难挽救，勉处一方而去，其夫人送我下楼，问我如何，答以好好护理，准备后事。其媳送我回去时，我说何时逝世，请打个电话给我，后电话告知病者于 1988 年 3 月 14 日逝世。

据称服中药汤剂后，心里难受，呕吐好些，腹水有所缓解，兹将此方记录如后，供同道参考：

黄芪100克　防风20克　白术50克　柴胡20克　黄芩20克　胆草10克　半边莲30克　龙葵30克　水红花子30克　炒谷芽20克

4剂，实际服了10剂。

七、乳　癌

雷××　女　36岁　成都市　干部

1981年11月5日初诊：

自诉：乳房长一包块，胀痛，因在9月2日去医院检查，9月3日照片，9月10日看片，不能确诊；9月18日又去另一家医院照片4张，10月2日答复："不像乳癌，可能是小叶增生"；又去原来的那家医院，认为可以排除乳癌嫌疑，建议按小叶增生用中药治疗，服中药18剂无效；10月23日改由另一位中医老师治疗，服药25剂，并另用药磨水外搽仍无效，因人介绍特来求治。

检查：诊脉沉细而弦，舌质淡，不华；左乳中包块一个大如核桃，今年8月23日因疼痛发现，按之痛，说话、笑、呼吸俱痛，质硬，经来之前胀痛加重，躬腰则坠胀痛；月经基本对月，色红，3日即净，量少，有瘀块；大便干燥；嗜食辛辣香燥厚味，近半年来特别容易感冒，平时疲倦易累，烦躁易怒；除服中药而外，还服过小金丹10盒。

辨证：气血两虚，肝脾两伤，痰瘀互结。

治法：益气养血，调肝和脾，化瘀消痰。

处方：括蒌逍遥散合活络效灵丹加减制蜜丸徐消之。

黄芪　党参　当归　丹参　乳香　没药　瓜蒌　柴胡　白芍　香附　青皮　枳壳　甲珠　川贝母　牡蛎　鸡血藤膏　昆布海藻　地鳖虫　水蛭　三棱　莪术　重楼　山慈姑　鹿角尖　建曲　鸡内金　白术

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，饭后半小时内用温开水送服，7日后可在中午加服1丸，若感冒，咳嗽即停服，愈后续服，忌辛辣、香燥等物。

1982年1月4日二诊：病人称："自服丸药后，有几点明显的收获：① 没有感冒过；② 胀痛已不明显，躬腰也不坠胀痛了，月经来之前的胀痛感觉已微，可以大笑、大声说话，走路可以走快些了；③ 包块已软，有缩小；④ 月经量有所增加，瘀块已消失；⑤ 饭量增加，体重增加8斤；⑥ 精神比过去好，也比过去累得了，但大便仍干燥。"诊脉弦弱，舌正无苔。

处方：

黄芪　党参　当归　丹参　柴胡　生地　枸杞子　赤白芍　甲珠　牡蛎　莪术　鸡血藤膏　三棱　香附　青皮　地鳖虫　水蛭　蟑螂　黄精　鳖甲　鹿角尖　建曲　鸡内金

制蜜丸服，服法同前。

3月19日三诊：左乳房包块缩小如食指头大，"能食能睡，精神很好，月经、二便俱已正常，可以说一切正常"，诊脉弦平，右脉时有歇止。

处方：按上丸方再进1剂。

5月5日四诊：左乳房中包块已缩小三分之二，"现在只有小指头大，用手捏不痛。其他一切正常，体重又增加5斤，形体已丰，面色红润。""此方效果很好"。

处方：上方加灵芝、皂角菌，制蜜丸续服，服法同前。

此药丸连续服用，直到1984年3月14日，包块已缩小如豌豆大小但未消失，眠食俱佳，精神健旺，其他症状消失后再出现，劝其除恶务尽，继续坚持服药，病者未能接受自行停药。

1986年9月乳房包块忽然在十余天中长大如桃，疼痛甚剧，因仍去原来的医院检查，确诊为乳腺癌。因做手术，医院对包块中癌细胞只占20%感到惊异，细问病员，方知长时间服中药丸药，要求将处方给他们研究。病员来找我，我将处方交与她，并要求将研究结果告知我。后病员告知，医院组织人员研究后认为处方中没有杀灭癌细胞的药。吁嗟呼！何浅之乎视祖国医学也。我告知病员手术只能切除有形之包块，不能切除致癌之因素(原因)，需继续服药，防止复发。病员认为医院给她做的是根治术，无须再吃中药。同年12月底，复发并广泛转移，住院治疗，并邀诊涕泣不已，但已无救。

八、乳腺癌手术后复发

孔××　女　46岁　医务工作者

1987年10月8日初诊：

自诉：1983年冬发现右乳房包块，因去医院检查，诊为乳癌，经放疗效不佳；乃于第二年5月手术，做乳癌根治术，术后上化疗八个疗程；1987年1月复发，做第2次手术，手术后继续化疗；同年5月再次复发作第3次手术，手术后继续化疗直至现在；每一次都是根治手术，都是在手术后做化疗，但复发时间越来越短；从第2次手术及化疗后，身体愈来愈

坏，说话气不接续，抽长气，极度疲乏，懒言懒动；失眠，甚至通宵不寐，梦多，合目即梦；进食即吐，喝水都吐，但口干渴，又必须喝水，食欲大减，成天不吃亦不知饥；腹泻稀水，每天1～3次，吃的青叶子菜，屙出来还是青叶子菜，所有西药健胃药都用过了，皆无效。不少同志介绍我来找您，我也认为这类病必须请中医调治才行，现在我认为要解决两个问题，一是防复发；二是要健胃能吃，不拉肚子。

检查：诊脉沉细弦弱伏，右脉为甚，时时脉伏不起，舌质淡白无华，舌体胖嫩，舌上有少量黄苔，舌边齿痕密布；形容憔悴，面色青黄晦暗，头发枯槁，脱发已完全秃顶，现戴假发；失眠，甚至通宵不寐，人睡极难又易惊醒，稍有声响，那怕落1片树叶都要惊醒，梦多，合目即梦，即使在白天，随便在那里一靠，眼睛一闭，梦就来了，醒后不复记忆；慢性腹泻已26年，手术和化疗后，更加严重，手术前腹泻只1日一次，有时还堆得起，现在1日二三次，全是稀汤汤和不消化食物，一点精神都没有，懒言懒动，坐着就想睡下，时时烦躁，想发脾气："自感问题严重"。

辨证：精、气、神、血俱亏。

治法：首当健脾益气，使之多进饮食，且能消化吸收，从而开辟气血生化之源；继用扶正祛邪之法，调补气血、五脏，徐徐图功，若操之过急，则欲速不达矣；同时建议坚决停止化疗、放疗及其他西药。

处方：参苓白术散加味。

黄芪60克　党参30克　山药30克　白术20克　莲肉30克　芡实30克　茯苓15克　半夏曲15克　陈皮6克　砂仁6克　建曲10克　甘草10克　(5剂)

10月15日二诊：气已接续，精神渐振，大便渐稠，余症如故。

处方：上方加陈皮、砂仁为10克，加建曲为15克，更加炒谷芽为15克，6剂。6剂服完后接服下列丸剂：

黄芪　晒参　白术　山药　莲肉　芡实　茯苓　白扁豆　砂仁　陈皮　半夏曲　木香　黄连　肉桂　炒枣仁　合欢　隔山撬　苦荞头　鸡血藤膏　炒谷麦芽　建曲

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，温开水送服。

1990年2月12日三诊：服上丸方3剂后，精神已振，腹泻已止，软便，基本成形，食欲和消化明显好转，大便中已无不消化之物；睡眠较前为好，仍有梦，但已不是合目即梦；口干基本消失；脱发已被制止；面色渐白皙，晦暗之色消失，形体渐充，体重由83斤增为95斤；未再作化疗，西药也停服了。

处方：按上丸方再服1剂，日服3次，每次1丸。

4月20日四诊：病者精神颇佳，神采奕奕，心情舒畅，形体已充，体重增为102斤，眠食俱佳；大便已成形，软便，一日一行，每天早上起床即解，畅通；新发满头，但还不能梳理成型，故戴帽；诊脉平弱，但已有神，舌淡红，舌边尚有齿痕，但很浅，舌质渐红润，治当扶正消癌，预防复发。

处方：上丸方中加蟑螂粉、干蟾粉、干漆、甲珠、三棱、莪术、柴胡，服法同前，可连服3～4剂。

1995年3月4日五诊：丸药连服4剂后，已完全与健康人一样，每半年去医院复查一次，一切都正常，无任何复发转移迹象，连主治我病的医生都感到诧异，我才说，我在吃中药。1993年4月停服丸药后一直都很好，仍然每半年去复查一次，都无异常现象；1992年下半年开学我就上班了；但今年以来，睡眠又不好了，梦也有了，特别是噩梦多；大便虽然一天一次，很按时，也正常，但逐渐变稀；自服丸药后基本上

没有感冒过，而且未生过冻疮，去冬今春却生冻疮了，现在两颧的冻疮还未好。由于做手术和化疗，月经就停了，1990 年月经复来，而且还很正常。1994 年我已 50 岁了，月经才未再来。诊脉沉弱，结代，舌淡，舌边齿痕；两颧冻疮，时时叹气，疲倦易累，每晚腿脚抽筋至少一次，仍用丸剂消息之。

处方：

黄芪　防风　白术　红参　莲肉　山药　芡实　苡仁　茯苓　丹参　琥珀　当归头　川芎　炒枣仁　合欢花　甲珠　三棱　莪术　夜交藤　石莲子　蟑螂　干蟾　菟丝子　覆盆子　守宫　龟胶　鹿角胶　制首乌　建曲　赤芍　白芍　鸡内金　木瓜　牛膝　女贞子　五味子

共为末，蜜丸，每丸重 10 克，每日早晚各服 1 丸，温开水送服。

6 月 15 日六诊：服丸剂后诸症俱已消失，嘱其再服 2、3 剂以资巩固。

由于她常常给我介绍病人来，自 1996 年 7 月止，知道她仍正常上班，身体健康。2002 年 8 月，在商场相遇，神采奕奕，视之若 40 许人，与语，感谢之情溢于言表。自 1987 年至今已 15 年矣。

九、乳腺癌手术后复发转移

王　×　女　34 岁　中央驻蓉单位工程师

1991 年 1 月 14 日初诊：

自诉，亲属代述及医院检查：1990 年 5 月因左乳房发现

包块，去医院检查，确诊为浸润性乳腺导管癌，本人无任何感觉，包块约3厘米×4厘米，数日即迅速长大。5月18日在川医做乳癌根治术，6月11日切除两侧卵巢，6月18日起做化疗，8月23日结束。9月3日起做放疗，10月17日结束。11月5日起又作化疗至今年1月7日结束。现腋窝淋巴转移，医院决定休息一周后再作放疗，白细胞4 500。

检查：诊脉弦数106次/分，舌质嫩红；左胸腋包块比豌豆略大质硬如石，不痛；除口干外，病者无任何自觉症状，能吃能睡，大便正常；细细寻按其脉，两手脉均时有歇止，大便虽一日一行但溏而不爽。

辨证：正虚邪实，正虚乃脏气已虚，肝肾阴虚，邪实、复发转移，昭然可见；手术可去其包块，但不能去长癌之原因，然，暂杀其鸱张之势，亦有可取之处；但化疗、放疗轮番克伐，癌细胞未必能全歼无遗，而正气亦因之亏损，正如识者所说："消灭了敌人，也毁掉了自己。"作为中医岂可蹈此覆辙。

治法：扶正祛邪为根本之良策，但不停止化疗放疗无以谈扶正，正气愈虚则邪势愈炽，因建议病家停止化疗、放疗。

处方：调神攻坚汤加减。

黄芪60克　党参30克　白术30克　柴胡15克　黄芩15克　苏子30克　瓜蒌30克　夏枯草30克　陈皮30克　白芍30克　花粉30克　生牡蛎30克　石斛30克　丹皮30克　女贞子30克　川椒5克　王不留行90克　大枣20克　山药30克　建曲15克　甘草10克　海藻30克

4剂，日服1剂。

1月19日二诊：口干无津似有好转，它症如故；包块未长大但也未缩小，舌质嫩红如故。

处方：

上方加生地15克，枸杞子15克，紫草15克，水牛角30

克，黄芪加至90克，党参加至60克。

继进6剂。

1月26日三诊：歇止脉消失，但有二至略弱，舌质嫩红大有好转。仍舌干无津，口干喜饮减，大便溏，但较前已容易解出，无其他不适之感。

处方：以太子参60克易党参，继进6剂，同时服下丸剂。

黄芪　西洋参　枳壳　炒干漆　郁金　五灵脂　砒石　仙合草　硝石　全瓜蒌　甲珠　蜂螂　柴胡　猫爪草　苡仁　莲米　全虫　蜈蚣　干蟾皮　海藻　鸡内金　制马钱子　薄荷冰　建曲　炒谷麦芽　大甘草

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，温开水送服。

此方即贾坤同志所制之平消丹加味，关于加味的问题，曾向他请教过，他完全赞同我的看法，认为“完全可以根据病人的具体情况予以加减，不然就不是辩证唯物主义了。”

2月9日四诊：丸药于2月4日开始服，已服5天无任何不良反应，大便已经成形，饮食增加，“吃饭香了，想吃了，过去虽然能吃，但一天不吃也不觉得饿。”

处方：丸剂每天服3次，每次服1丸。

汤剂按1月26日方再进10剂

3月2日五诊：感冒、鼻塞、流涕、打喷嚏、咽痒、咳嗽、脉浮数、苔黄、口苦、口干喜饮、便溏。

按感冒辨证施治

3月30日六诊：感冒咳嗽已愈，左胸腋包块已缩小如绿豆大，坚硬如石。

处方：按1月26日方加防风15克再服10剂，丸药照服。

4月28日七诊：除服丸药外，汤剂服了20剂，左胸腋包块缩小如胡椒大坚硬异常，调整汤剂。

处方：

黄芪90克 防风15克 白术30克 太子参60克 柴胡15克 黄芩15克 苏子30克 夏枯草30克 牡蛎30克 瓜蒌30克 陈皮30克 王不留行90克 白芍30克 川椒5克 山药30克 海藻30克 石斛30克 浙贝母30克 山慈姑15克 甘草20克

10剂，并用下方敷包块处。

外用方：

乳香10克 没药10克 皂角刺10克。

鸦胆子(去壳)6克共研细末，醋调敷包块处。

5月11日包块消失，续服汤剂15剂。

5月25日八诊：5月21日去医院复查，一切正常；诊脉沉弦细而弱，歇止消失，舌质嫩红消失后未再出现，口干消失，眠食俱佳，大便通畅但仍稀溏，程度上已不若过去那样稀。

处方：在4月28日处方中加莲米30克，芡实30克，15剂一个月服完，丸药照常服。

7月20日九诊：汤剂共服20剂，左腋窝在7月17日晚上发现包块有指头大，因痛才发现，但第二日就不痛了，触之质软。在前处方中加昆布30克，僵蚕10克，连翘30克，法夏15克，制南星10克 (4剂)

7月27日十诊：左腋窝包块消失，丸药即将服完，由于气候太热，要求停服汤药，此时已服汤药65剂。

丸剂处方：

黄芪 山药 苡仁 芡实 防风 白术 茯苓 干漆 硝石 矾石 郁金 五灵脂 蜈蚣 全虫 蟑螂 制马钱子 干蟾 甲珠 蜂房 全当归 丹参 昆布 海藻 白芍 白芥子 猫爪草 香附 瓜蒌 僵蚕 水蛭 虻虫 白扁豆 制首乌 牡蛎 川贝母 建曲 鸡内金

共为末，如上法制蜜丸，每丸重10克。

1992年3月22日去医院复查，所有脏腑皆未见异常。

5月11日十二诊：左腋窝又发现指头大一包块，粘连、触之较第2个包块更为柔软。

处方：

按4月28日汤剂处方加昆布30克，制南星15克，白芥子10克，服10～20剂。

6月13日左腋窝包块消失。

7月23日十三诊：左腋窝包块消失后未再出现；诊脉沉弱，舌正无苔，自我感觉良好，精力充沛，眠食俱佳，二便正常，未再感冒过。

处方一：丸剂。

在前丸方中加菟丝子、女贞子、枸杞子、覆盆子、紫河车。

处方二：汤剂。

按5月11日十二诊处方每月服10剂。

此后即以此二方为基本方，根据具体情况出入加减。每半年去医院复查一次，皆无异常，体重由92斤增为116斤，达到标准体重。

1994年1月31日医院复查时，查出脂肪肝，因治脂肪肝，5月17日去医院复查，脂肪肝不复存在，肝、胆、胰均未见异常。病者称："人家都说我红光满面，不像病人……"我告以此病要看远期效果，建议继续服丸药。

1999年8月已整整8年零7个月，病者身体健康，精力充沛，眠食俱佳，并已于1994年初恢复工作，目前仍服丸剂中。

按：此病例能存活达8年半之久，根据目前情况还可能存活相当时间，其主要因素一是病员单位对治疗全力支持，对药

费全部报销，有此经济力量支持，病员与医生皆可放心治疗，放胆用药；二是病人积极、听话，因而配合密切；三是医生诊治力求处方用药息息与病机相合。2000年随访，体健如故。

《黄帝内经》说："邪之所凑，其气必虚"，此气包括了五脏六腑之气，气虚必然导致血虚，虚之甚者，邪即乘之，癌证亦然，故扶正祛邪为治癌之大法。

癌证早逝，往往是治不及时，或治疗失当，或杂药乱投，或半途而废，或频频易医，如此等等不一而足。癌证如此，它病亦往往如此，以致无救，悲哉！

十、乳房浸润性导管癌手术后预防复发

付××　女　35岁　北京市　干部

1992年10月6日初诊：

自诉：因乳房摸着有包块，捏起疼痛，即去医院检查，确诊为浸润性导管癌，当即于今年7月12日做了手术。手术后休息一月，即做化疗，做化疗很痛苦，但不做就要复发转移。早闻先生医术，因托成都朋友和先生联系，知先生10月初来北京开会，今特来求治。

检查：诊脉沉弱而弦、时时歇止，舌质淡白不荣、胖嫩，舌边齿印密布；已化疗8次，失眠、多梦、常噩梦，脱发甚剧，神疲、累甚、懒言懒动、嗜卧、卧则舒，烦躁易怒，胸闷不舒，时时叹气，"深吸一口气就舒服"，气短，气不续接；月经在手术后来过一次，大约在7月21日，两天多就干净了，经色淡红，质清，至今已两个多月未再来，亦无不适之感；

“胃口不开，不思饮食，食即呕，喝白开水亦呕”，二便正常。白细胞 2 800，血色素 6.5 克。

辨证：气血大亏。

治法：扶正抗癌，汤丸并进。

处方一：汤剂。

黄芪 60 克　晒参 15 克　石莲子 15 克　白术 15 克　柴胡 10 克　白芍 10 克　炒枣仁 25 克　当归 15 克　丹参 30 克　枳实 10 克　炙甘草 10 克　可连续服 10～20 剂。

处方二：丸剂。

黄芪　晒参　海马　灵芝　山药　当归　丹参　川芎　白芍　熟地　佛手　柴胡　蟑螂　蟾皮　山慈姑　山豆根　鸡血藤膏　莪术　甲珠　女贞子　沙苑子　枸杞子　芡实　枣皮　夏枯草　菟丝子　鸡内金　建曲　香附　浙贝母　炒枣仁　合欢花

共为细末，炼蜜为丸，每丸重 10 克，每日早晚各服 1 丸，温开水送服。

11 月 8 日晚电话联系：汤剂已服完 20 剂，丸剂服后很好，自行在中午加服 1 丸，每日共服 3 丸，现在精神很好，眠食俱佳，特别能吃；您听我说话的声音多洪亮；噩梦早已消失，一般的梦也难得做；去医院复查一次，一切正常；但医院要求做化疗，且非做不可，经与爱人商量，还是得去，请先生开一个避免化疗副反应的方子。

处方：

黄芪 90 克　人参 15 克(白参、西洋参均可)　归身 15 克　柴胡 10 克　白芍 15 克　熟地 20 克　姜半夏 20 克　竹茹 10 克　石莲子 20 克　龟胶 10 克　鹿角胶 10 克　枳实 10 克　石斛 30 克　天花粉 30 克　女贞子 20 克　甘草 10 克

化、放疗的副反应消失后，可继续服原来的汤剂处方。

12月24日面诊：诊脉沉弱，时时歇止的脉象大为改善，舌质淡白，舌边齿印未消失，但精神很好；曾停服汤剂，每晚服安定2片，睡眠仍不佳，一个晚上起来数次，或小便、或喝水，总之睡卧不安。因又服10月6日的汤剂处方，现在又好睡了，此次化疗后，梦特别多，入睡很难，又易惊醒，落1片树叶也会把我惊醒；上次化疗后出现耳鸣，不以为意，此次化疗后耳鸣加重，医院检查说是神经性耳鸣，似乎无药可治；月经来过一次，一天即干净了。由于失眠，第二天头又胀又痛。仍从益气养血安神为治。

处方：

黄芪100克　白人参15克　当归15克　丹参30克　柴胡10克　白芍20克　炒枣仁30克　知母10克　茯苓10克　川芎6克　响铃草15克　焦三仙10克　炙甘草10克　（3剂）

12月29日面诊：睡眠转佳，耳鸣及头胀痛，心烦不安等俱大减，建议按此方再服20剂，并建议暂停化疗、放疗三个月。

1993年1月5日面诊：又服汤剂5剂、耳鸣已止，眠食俱佳，精神大振，“人家说我脸色都好看多了；我发觉我只要做一个疗程的化疗，睡眠就不好了，也吃不得了，精神越来越差；先生的汤药丸药对我都很有效，我现在决心吃中药，不做化疗了；与我同时做化疗的一个女同志，在做化疗中复发转移了；早就有人告诉我做不得化疗，化疗杀伤白细胞很厉害，我决定不去做了，请先生仍然给我开丸药，丸药不但效果好，而且服用方便……”诊脉沉弱，仍时有歇止；食欲较佳，但大便溏薄，据此仍以扶正抗癌为法。

丸药处方：

黄芪　防风　白术　人参　怀山药　海马　苡仁　当归

丹参　茵灵芝　柴胡　白芍　川芎　茯苓　炒枣仁　甲珠　佛手　青皮　僵蚕　半枝莲　海藻　昆布　元参　黄精　全瓜蒌　三棱　莪术　守宫　蟑螂　鸡血藤膏　熟地　枸杞子　山慈姑　浙贝母　沙苑子　乳香　白扁豆　没药　白花蛇舌草　建曲　鸡内金

制蜜丸，服法同前。

1993年6月7日其成都友人前来叙症求方，言病者精神颇佳，体重增加，红光满面，到处旅游，随处都把药丸带上，眠食都好，二便正常，月经也恢复正常；化疗早已停止，经她自己两次对比，认为化疗太伤身体，决心不再做化疗，认为吃丸药就好，此次特别打来长话，委托我们来请老师处方。因根据1月5日丸药处方，略加调整与之。

12月23日面诊：(余去京开会)诊脉弦弱，舌淡，体形已健，面色红润(未化妆)，声音清脆响亮，体重增加9斤，睡眠饮食俱佳，二便正常，已经上班工作，常因工作怄气，月经正常，丸药已经服完。要求再开处方，仍以原处方为基础，加合欢花、郁金等，制蜜丸服，服法同前，可连服2～3剂。

1996年12月16日随访，病者体健如故，神采奕奕，精力充沛，月经正常，眠食俱佳，二便正常，上次丸药处方已连续服了3剂，定期去医院检查，情况良好，一切正常，打算这1剂丸药服完后停一下再吃。因告知病者，此病主要看远期效果，在满5年以后，可1年服1剂，不可半途停药。1999年农历八月中秋，其友来我处，询之健在，身体颇好，再次叮嘱不可中途停药。2004年春节前夕，其友来我处，询其近况，体健如故。

十一、颈淋巴癌手术后复发

余××　女　57岁　四川省名山县干部

1994年7月26日初诊：

自诉及亲属代述：右颈部长包块，疼痛，1980年在成都一家医院诊断为淋巴癌，当即在该院做了手术，手术很成功，术后又做化疗8个疗程。1992年做阑尾手术；1993年右颈包块复发，经原来做手术的医院检查确诊为淋巴癌复发；又去华西医大检查结果相同，两家医院都建议手术，本人不愿，因来求治。

检查：诊脉弦数有力，112次/分，舌质偏红而干；右颈部包块大者如核桃大，小者两个如鸽蛋大，质硬如石，疼痛，按之痛甚，服西药止痛可以管个把小时；胃痛，吃香砂养胃丸痛即止，过一段时间痛又作即又吃，已近20年；大便时干时稀，吃豆制品如豆腐、豆豉、红豆腐等都要拉稀；肩周炎在25年前经您治愈，最近又发作了，手不能上举、后反，因此梳头穿衣都很困难，最初怀疑是癌转移，经检查排除了；饮食愈来愈不好，不想吃，口苦、早上特别苦、咽干甚，时时饮水润之，但不想吞下，视其咽部，气子(淋巴滤泡)密集，咽部异物感明显，长期以来嗜食辛辣厚味。

辨证：气阴两亏，邪势鸱张，痰瘀互结，病在少阳。

治法：益气养阴，消痰化瘀，清肝利胆，汤、丸并进。

处方：小柴胡汤合海藻玉壶汤加减。

柴胡20克　黄芩20克　半夏曲15克　北沙参30克　夏枯草30克　生牡蛎30克　浙贝母15克　猫爪草30克　山慈姑10克　海藻15克　昆布15克　石斛30克　丹皮15克　山药30克　生地20克　建曲15克　大甘草10克

4剂，水煎服，服完后接服丸剂。

处方：丸剂。

黄芪　晒参　玉竹　石斛　花粉　黄精　枸杞子　当归　丹参　乳香　没药　三棱　莪术　昆布　海藻　柴胡　赤芍　白芍　僵蚕　全蝎　蜈蚣　守宫　干蟾　建曲　黄芩　夏枯草　猫爪草　浙贝母　制南星　生麦芽

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，饭后半小时内用温开水送服，忌辛辣香燥油炸等物。

11月23日二诊：服汤剂4剂后口苦消失，纳食已香，舌质红转正常，咽干大减；服丸药后，精神较前为好，包块疼痛大减，若做其他的事，则可忘记疼痛，但仍拒按，肩周炎痛亦有好转；大便仍然不调，时干时稀；胃痛减轻，诊脉弦弱，78次/分，“自觉包块已缩小许多”，大者已缩小如鸽蛋大，小者两个如胡豆大，质仍坚硬。

处方：

黄芪　晒参　当归　丹参　乳香　没药　三棱　莪术　昆布　海藻　川贝　羌活　防风　姜黄　柴胡　赤白芍　木香　九香虫　僵蚕　全蝎　蜈蚣　守宫　蟾皮　白术　玉竹　石斛　黄精　枸杞子　夏枯草　猫爪草　生麦芽　水蛭　建曲　焦山楂　射干

制密丸：服法同前。

1995年11月16日三诊：上丸药连服3剂，右颈部包块消失，肩周炎亦愈。咽痛异物感亦减轻，清神较前更佳。睡眠、饮食均好，体重增加9斤，基本达到标准体重；大便已不稀，相反变干燥了；胃痛消失，消化方面有很大改善。

处方：

上丸方中去乳没、全蝎、蜈蚣、羌活、防风、姜黄，加山慈姑、浮石、桔梗。

制蜜丸，服法同前，可连服3剂。

2000年5月介绍另一病人前来求治，询其近况，言其到处玩耍，身体很好云云。2005年春节我女儿自名山回来，询其近况曰：身体健康，生活愉快。

十二、胃癌手术后复发

文××　男　36岁　劳改农场犯人

1973年9月13日初诊：

该场医生代述：1970年患胃癌，胃已大部分切除，假释回家；1973年因再犯，判刑劳改；今年7月下旬因胃剧痛和喷射性剧烈呕吐，经医院检查确诊为胃癌复发，有4.5厘米×5.1厘米包块一个，尚未发现转移，但大小肠皆发现有斑点，因治疗不效，建议中医治疗。

检查：诊脉沉数而实，苔薄腻、口苦，喷射性呕吐，喝白水俱吐，胃剧痛，除注射杜冷丁外且服止痛片，一次达4片之多，又服颠茄合剂等药，因不能食；大小便正常，形体壮实，面色青黄，两手抚胃，作愁苦状。

辨证：气滞血瘀结为症瘕，致胃气上逆。

治法：降胃镇冲，化瘀消症，经与场医协商由我用药止呕吐，场医用药暂时止痛。

处方：大剂旋复代赭汤。

旋复花30克　代赭石250克　法夏30克　泡参30克　甘草10克　大枣10枚　生姜20克

2剂，水煎服。

9月16日二诊：喷射性呕吐止，剧痛稍有减轻。

处方：

白芍60克　赤芍60克　木香30克　百合60克　台乌20克　丹参30克　檀香10克　砂仁10克　生蒲黄25克　生甘草30克　炒五灵脂25克

3剂，水煎服，场医停用止痛药。

9月23日三诊：痛与呕吐俱止，考虑到患者具体情况，改用散剂：

制马钱子　地鳖虫　守宫　地龙　水蛭　蒲黄　五灵脂　没药　甲珠　黄芪　莪术　当归

共研细末，每次服3克，早晚各服一次，7日后若无不适反应，中午加服一次，27天服完。

10月25日四诊：场医介绍病情说："痛与呕吐俱未再出现，包块有所缩小，但质硬。"

处方：

上方加生牡蛎、浙贝母、僵蚕、海藻，服法同上。

12月2日五诊：包块继续缩小如拇指大，质仍硬。

处方：

按四诊处方加昆布、皂角刺、干漆。

嘱场医可连服2～3剂。

此后未再来诊，因诊务太忙，亦无暇追访；1979年9月落实政策将回成都时，于9月23日追访，场医说："按你的嘱咐，最后一次的处方接连吃了3剂，此后他未再要求看病，现在他在看守菜园，做些锄草的轻活之类"。经场领导同意，见到本人，他说："组织上照顾做轻活，守菜园，吃得睡得，没哪里痛，肚子按起也不痛。"问到包块，他说："因为不痛了，也就没有注意了。"不便再问，只好离去。

十三、结肠癌手术后复发

冯××　女　45岁　辽宁省抚顺市　职工

1994年2月15日初诊：

自诉及亲属代述：1992年3月职工体检发现结肠癌，于3月27日做手术，术后放疗，因反应太大不能承受乃停止；在当地服中药、练气功，10月初复查，情况较好，无复发转移，大便虽已改道，但还比较正常。1993年3月检查，也无问题；11月初检查已复发转移，包块约4.5厘米×5.8厘米，在右小腹疼痛。因姐姐在成都工作，打电话叫我来成都求老师治疗，她和姐夫的病都是您治好的。

检查：诊脉平弱而弦，不任重取；右小腹包块约鸭蛋大小，扪之即得，质硬，疼痛拒按。面色晦暗、形瘦、体重较前减轻14斤，饮食尚可，眠差梦多，疲乏，动则累甚，其姐密告："当地医院说，存活期不过3个月左右，吃好点，安排后事。""现在已经过去将近两个月，催她们立即就来，还是拖了这么久，不知尚可救治否；现在连她本人还不知道。"

辨证：正虚邪实。

治法：扶正祛邪。

处方：

黄芪　防风　白术　晒参　麦冬　当归　丹参　乳香　没药　血竭　儿茶　水蛭　蟾皮　干漆　蜣螂　守宫　大黄　地鳖虫　全蝎　蜈蚣　鸡内金　玉竹　黄精　灵芝　虻虫　枸杞子　菟丝子　枳壳　建曲

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸。温开水送服。

5月24日二诊，服上丸方后，精神明显好转；疼痛基本

消失，偶有出现多在过劳之后，稍稍休息其痛即止；眠食俱佳，大便正常；癌块在平卧放松肌肉之后，自己即触摸到，约有鸭蛋大小；诊脉沉弱，舌质淡白。

处方：

上丸方加三棱、莪术、隔山撬、猫爪草、紫河车、仙灵脾，制蜜丸服，服法同前。

10月7日三诊：服丸药中有十余天拉的大便为纤维状黑色的东西，之后仍为正常的黄色粪便；自觉包块缩小如鸡蛋大小，疼痛消失，精神面貌明显好转。

处方：

在丸方中加甲珠、鸦胆子制蜜再进。

12月29日因感冒引起呕吐、腹痛，包块痛，大便秘结，剧烈咳嗽，病人思想包袱异常沉重，认为患病之初就是大便秘结不通，恶心呕吐，现在出现乃是病情恶化，涕泣不已，因晓之曰，此乃感冒所致，一切未彻底治愈之病感冒皆可诱发，皆可加重，治感冒即可使病情还原，因用药治感冒咳嗽。1995年1月30日感冒咳嗽愈，恶心呕吐、大便秘结、腹痛，包块痛亦随之消失，继续服用丸药。

1995年10月20日：按1994年10月7日三诊时的丸药处方已服完3剂、包块缩小不多，但身体较前为佳，一年来体重增加5斤，精神状态较前好转很多；但脉仍沉弱，舌质淡白，舌边齿印仍未消失，当加强扶正之力。

丸剂中黄芪、人参、灵芝均加重用，同时用药外敷包块。

外敷方：

雪上一枝蒿　冰片　乳香　没药　血竭　儿茶　大黄　鸦胆子　五倍子　甲珠　留行子　制南星

共为细末，醋调和糊状，外敷包块处，48小时换药1次。

1996年2月10日其女来成都接她回抚顺，因来我处，嘱

她坚持服丸药并外敷药，端午节前夕其姐来我处，看情况颇好，除服丸药，敷药之外，又练气功；以后未再联系，据称在当地治疗。1997 年 1 月 28 日其姐来我处要求配制丸药，言在当地治疗以来，包块长大，全身性转移，现在周身都有包块、剧痛，病势至此，已属不救，勉拟一方予之，但已存活三十四个月矣(1994 年 2 月 15 日至 1997 年 1 月 28 日)。

十四、直肠癌晚期

舒××　女　79 岁　成都市　居民

1989 年 6 月 20 日初诊(现在住医院治疗已七个多月)：

其女代述：医院已确诊为直肠癌，病灶如菜花状，肛门分泌物极多，一天用两斤纸都不够，大便出血，不大便也出血，解小便大便也要出血。医院早就告诉我们了，1984 年就因大便解不出住院检查即已发现，确诊为直肠癌，医院建议手术，本人坚持不愿意，认为已是七十多岁的人了，就是死也不愿挨一刀。严重了就住院，好转了又出去；这次已经是第三次住院了。我们希望不高，只希望减轻一点痛苦。

检查：诊脉沉弱而数，频频歇止，重按即无，舌苔粗黄而干；口渴甚，喜冷饮，每日可吃 3～4 斤重西瓜一个，认为喝水不解渴，吃西瓜好一些，“很想吃冰糕，但我女不准给我吃”，不思饮食，只想喝水，喝水多，小便也多，每解小便，大便即出血，色鲜，肛门时时流出脓血，臭秽难闻，形体枯瘦，面色蜡黄，语音低弱，气短不续。主管医师介绍说：这已是第三次住院，初来时肿块只有 3 厘米，手指可以伸入，现在

肿块发展迅速，病人坚持不做手术，只好每天给她输液，所以我们同意请中医治疗，希望能把出血及分泌物减少一点，如果能止住，当然更好。

辨证：正气大亏，邪势鸱张。

治法：扶正祛邪。

处方一：人参白虎汤加味。

西洋参10克　石膏30克　花粉30克　石斛30克　仙鹤草30克　槐花30克　地榆30克　鳖甲20克　白花蛇舌草30克　建曲10克　生甘草10克　鸦胆子10粒(去壳装胶囊用药汤送服)，6剂水煎服，日服3次，同时服下散剂。

处方二：

硝石、制马钱子、矾石、郁金、甘草共研细粉，每次服1克，装胶囊吞服，日服3次。

7月3日二诊：主管医师及病员之女介绍：肛门上的分泌物(脓血淋漓)和血减去大半，过去肛门成天是湿漉漉的，现在干了；原来不晓得饿，现在知道饿了，可以吃点东西了，但选择性很大，精神也好些了。诊脉沉弱，仍时有歇止，粗黄厚苔退净；口渴大减，虽然口干，但已不若过去之渴饮，已不再闹着要吃冰糕，这几天吃西瓜也减少了，大便在本周内已解两次，杂有脓血，小便次数减少，因此大便出血的机会亦减少，偶有一两次，虽解小便，大便亦不出血。

处方：

西洋参15克　石斛30克　花粉30克　黄芪60克　仙合草30克　百合30克　槐花30克　半枝莲30克　石莲子30克　鳖甲15克　白花蛇舌草60克　建曲15克　(6剂)

鸦胆子20粒去壳装胶囊日服3次，服法同前，散剂继续服。

7月30日三诊：病家及主管医师介绍：大便出血已止，

小便时大便也不出血了，肛门的分泌物基本消失，但时流极臭之黄水；已可坐起，并下床行走，但头昏昏然，走路不稳，飘飘然的；大便不通，必须用番泻叶泡水喝方能解出；不思食，口干，睡眠不好，需吃安定，诊脉沉数 84 次/分，舌质淡白，气阴两虚之象。

处方一：

西洋参　硝石　矾石　制马钱子　郁金　赤链蛇粉　生甘草　研粉装胶囊，每次服 1.5 克，日服 2 次，温开水送服。

处方二：

黄芪 60 克　西洋参 15 克　石斛 30 克　石莲子 20 克　百合 30 克　槐角 30 克　地榆 30 克　半枝莲 20 克　白英 20 克　建曲 15 克　甘草 6 克　白花蛇舌草 30 克　无花果 30 克　（6 剂）

8 月 24 日四诊：病人业已出院，“精神、头昏、走路不稳等明显好转，已思食，食量较前增加许多，已能与保姆上街买菜，但要上一次街回来就感到特别累；吃药很难，好一点就不愿吃药了，一再劝她，才吃一点，我们上班去了，中午的药往往就没有吃；大便不干燥，但解不出，必须吃泻药才能解。”诊脉平弱 72 次/分，舌淡无苔，处方一尚未服完，昨日上街回来，心里不好受，恶心呕吐。

处方：

黄芪 90 克　晒参 20 克　当归 15 克　白芍 20 克　姜半夏 15 克　竹茹 10 克　石莲子 20 克　建曲 10 克　白英 30 克　土茯苓 30 克　半枝莲 30 克　白花蛇舌草 30 克　焦山楂 10 克　甘草 60 克　（6 剂）

10 月 3 日五诊：饮食、睡眠恢复正常，纳食已香，恶心呕吐已止，精神较前更佳，脸色出现红润，头昏大减，大便已可解出，稀便；但吃汤药十分艰难，自己停药一个月，最近十

余日又必须喝番泻叶水方可解出大便；诊脉沉弱时有歇止，舌质较前红润，病家要求只服散剂或丸剂，停服汤剂。

处方：

黄芪　防风　白术　西洋参　硝石　矾石　郁金　制马钱子　水蛭　干蟾　蜣螂　鸦胆子　猪苓　大云　龙葵　广三七　儿茶　冰片　硇砂　紫河车　土茯苓　五倍子　白花蛇舌草　败酱草　半枝莲　当归　白芍　熟地　山药　黄精　芦荟　乳香　没药　血竭　鸡内金　枳壳　建曲　玉竹　赤链蛇粉

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚服1丸，饭后半小时内温开水送服，若感冒咳嗽即停服，愈后续服，忌辛辣、香燥、酒等物。

1990年8月17日六诊：病者之女介绍情况：去年8月2日出院，这一年多来一直吃老师的药，情况都比较好，特别吃丸药后精神、饮食、睡眠、大便等都有明显改善；但吃到今年春节前就不吃了，答应过了春节再吃；春节期间，由于饮食不慎拉肚子，开了西药服后泻止，但又出现大便中带血，又劝她继续服丸药，服了一个星期大便正常了又不吃了。5月20日去医院复查：肠道较前松动，病灶有缩小，菜花状萎缩。回来后坚决不再吃丸药，认为"苦得钻心"。拖到七月中旬大便二十多天不解，因去医院做了手术，肛门改道，改道后至今大便仍然不通，并恶心呕吐。诊脉沉弱，重按方得，频频歇止，舌苔黄厚，口干无津，喜饮，大便不干燥，但解不出，仍用补气通便清热生津之法，以解燃眉之急。

处方：

黄芪150克　晒参20克　石膏30克　花粉30克　石斛30克　山药60克　姜半夏20克　竹茹10克　(4剂)

8月20日其女打电话告知大便已通，稀便、黄厚苔大退，因病者不愿服药，未再邀诊。

1991年春节刚过，病者之女前来致谢，告知其母因感冒并发症，高烧不退，在医院逝世，存活16个月。

十五、肾癌手术后预防复发及前列腺重度肥大

张××　男　68岁　成都市　大学教授

1994年3月17日初诊：

自诉：今年3月在医院确诊为左侧肾癌后就立即在该院做了左肾肾癌根治性切除术，手术顺利成功，术后恢复亦好，休息两周后就上化疗。对化疗反应太大，不能支持，但医生认为不做化疗，就会复发。因一癌症患者同我情况极为类似，不过他是肠癌，也是因化疗反应太大，在老师处吃中药丸药，至今两年，情况甚好，介绍我来求治。另外，很早以前大致是1990年体检时，就查出前列腺轻度肥大，我校医生检查是Ⅰ度，现在成了重度(Ⅲ度)，我担心会不会成前列腺癌。

检查：诊脉浮弦，口苦咽干，食欲不振，不想吃饭；小便不爽，滴沥不净，常常打湿内裤；早上刷牙即呕；舌质淡白，形瘦，面苍晦滞，喉中异物感，吞不下，吐不出，又自疑为喉癌，经医院检查为慢性咽炎，视其咽部淋巴滤泡数个，大者如大豆、豌豆，小者如绿豆。久坐、久走、久立则腰酸软而痛，自感两腿乏力，疲倦易累；长期大便偏稀，稍有多食即腹泻；脱发，顶渐秃；50年代患肺结核，现已钙化。

辨证：癌势已杀，正气亦虚，复感外邪，至今口苦咽干，不欲饮食。邪在少阳。

治法：扶正抗癌，预防复发，首当解表。

处方：玉屏风散合小柴胡汤加味。

黄芪60克　防风15克　白术30克　茯苓15克　山药30克　柴胡15克　黄芩15克　姜半夏15克　建曲15克　大枣10克　甘草60克　生姜9克　(3剂)

3月23日二诊：外感诸症已解，纳食已香，改用丸剂扶正抗癌，预防复发。

处方：

黄芪　防风　白术　晒参　天麦冬　黄精　山药　莲米　苡仁　生熟地　当归　丹参　枣皮　丹皮　野灵芝　三棱　莪术　秋石　天龙　紫河车　甲珠　猪苓　水蛭　白英　干蟾皮　射干　蟾蜍　建曲　焦山楂　炒谷麦芽　菟丝子　枸杞子　楮实子　覆盆子　女贞子　沙苑子　桑椹子　无花果　南瓜子　黑故子　苦荞头　隔山撬　山慈姑

共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，温开水送服，3日后可在中午加服1丸。

1995年3月16日三诊，咽部异物感消失，眠食俱佳，体重增加6斤，现为103斤，面部晦滞之气基本消失；大便已成形，但不敢过食，否则大便变稀；过去极易感冒，现在明显减少，即使感冒了，吃点药很快就好了，不像过去反复感冒，缠绵难愈；精神较前为佳，久坐，久走，久立仍有腰痛现象，但比过去好多了；咽部淋巴滤泡明显缩小，但未消失，若感冒，咽部即有不适之感。

今年2月7日在医院复查：左肾区未见异常回声；右肾4.5厘米×10.5厘米大小正常，实质回声均匀，结合部未见积液及结石，前列腺前后径3.6厘米，左右径5.6厘米，回声欠均匀，中叶未突入膀胱。意见：前列腺长大。同年3月10日医院CT检查，CT号58530号：① 右肺上叶及左肺前段陈旧

性结核已纤维钙化；② 纵隔、心影未见异常；③ 肺气肿。

处方：

按1994年3月23日丸药方倍用南瓜子、蜣螂、加土鳖虫，制蜜丸续服。

1996年1月26日四诊：1995年11月25日去医院复查：肝、胆、胰、肾俱未见异常，但：① 前列腺持续长大(重度)；② 双肺慢支炎，轻度肺气肿；③ 慢性浅表性胃炎；④ 十二指肠球部溃疡；⑤ 血红蛋白100(正常值120)。诊脉浮弦，舌淡，咳吐白色泡沫痰，咽痒即咳，大便日行一次，软便，色黑如柏油样，胃时有隐痛，但眠食俱佳；暂时停服丸剂，解表为急。

处方：

黄芪60克　防风15克　白术30克　射干10克　蝉衣10克　葶苈子10克　建曲15克　大枣12克　甘草6克

3剂，愈后续服丸剂。

1996年5月21日五诊：今年3月21日在医院复查：① 左肾缺如，其肾窝内未见结节及肿块回声；② 右肾肾盂及实质未见回声；③ 前列腺肥大(增生Ⅲ度)大约为6.0厘米×4.0厘米，未见明显结节回声；④ 盆腔内未见结节回声。诊脉平弱，舌淡，近半月内遗精两次有梦，便溏，能食，精神颇佳，面色红润，但体重减轻1斤为102斤。

处方：

黄芪60克　防风15克　白术60克　莲心10克　芡实30克　龙骨30克　牡蛎30克　琥珀10克　山药30克　金樱子15克　建曲15克　甘草6克　(4剂)

丸药不停。但丸药即将服完，今将丸药调整如下：

中芪　防风　白术　白人参　当归　丹参　熟地　山药　山萸肉　紫河车　蜣螂　水蛭　土鳖虫　南瓜子　蟾皮　元驹　三棱　莪术　皂角茵　桃仁　天龙　秋石　茯苓　仙灵脾　枸

杞子　甲珠　建曲　皂角刺　菟丝子　沙苑子　灵芝　覆盆子　留行子　女贞子　鸡内金　白花蛇舌草　制蜜丸，服法同前。

1996年10月6日六诊：丸药在即将服完时，于9月5日去医院复查，遇着在该医院初诊时的医生也就是力主我做化疗的那位医生，先作B超检查：① 肝脏大小形态正常，实质回声均匀，肝内无团块；② 胆囊大小形态正常，内无光团，肝内外胆管未见扩张；③ 胰腺、脾脏未见异常；④ 右肾大小未见异常，集合系统不分离，未见异常。总结提示：肝、胆、胰、脾、右肾俱未见异常。但这位医生当我答复他是吃中药时，他说："不行！必须用CT检查。"因此9月11日又去该院做CT检查，CT号2914号，CT会诊报告：① 左侧肾ca切除术后，现上腹未见转移性病灶和肿的淋巴结，仅见右肾有约0.1 cm小囊肿，胸12至腰3椎体轻度骨殖增生；② 前列腺轻度增大(Ⅰ度)。医生看了CT会诊报告单后很沉默了一阵才说："好吧，那就继续吃中药吧！"由于单位主管人的态度是："吃西药一万两万都报销，吃中药一分也不报。"因此病者在经济上的顾虑很大，勉拟一方如下：

黄芪　防风　白术　人参　当归　丹参　熟地　山药　山萸肉　元驹　茯苓　猪苓　蟾皮　水蛭　守宫　土鳖虫　三棱　莪术　灵芝　菟丝子　枸杞子　沙苑子　女贞子　秋石　覆盆子　皂角刺　南瓜子　蜣螂　留行子　仙灵脾　鸡内金　肉苁蓉　甲珠　桃仁　建曲　白花蛇舌草

仍制蜜丸，服法同前，可连服2～3剂。

丸药服至1998年3月已整整5年，去医院复查一切正常，未见复发转移，前列腺肥大消失。嘱其自1999年起每年服丸药1剂。2001年3月他介绍一病人来我处就诊，方知他在市内一大学教英语。

十六、直肠癌手术后预防复发(一)

郝××　女　69岁　北京市　教授

1987年7月10日初诊：

自诉：由于大便时出血渐趋频繁，且带黏液，去医院检查，先诊断为痢疾，服药无效；几经检查确诊为直肠癌，于今年3月9日做了手术。因化疗反应太大，故至今未做治疗。

检查：诊脉沉弱结代，舌质偏红，眠食尚可，大便成形，有时干燥，形体瘦弱，面色晦滞，语音低弱，疲倦易累，时时心烦不舒。

辨证：气血两亏，肝脾失调。

治法：益气养血，调理肝脾，解毒抗癌，以丸剂为宜。

处方：

西洋参　北沙参　生地　麦冬　五味子　白木耳　丹皮　柴胡　全当归　杭白芍　丹参　黄芪　桑椹子　菟丝子　郁金　枳壳　菌灵芝　无花果　硝石　矾石　半枝莲　土茯苓　干蟾　海马　合欢花　枸杞子　山药　枣皮　鸦胆子　女贞子　茯苓　泽泻　旱莲草　沙苑子　建曲　鸡内金　制马钱子　制首乌　干漆　白花蛇舌草

上药共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，温开水送服。

1992年12月31日二诊："上丸方已服四年半，每年2～3剂，从未间断，国内出差，国外讲学都带在身上，服后很感舒适，精神颇好，眠食俱佳，大便畅通，不干不稀，极少感冒，4年来只感冒过一二次，而且吃点药就好了，不像过去缠绵不愈。由于处方在保姆洗衣时弄坏了，因此请再予良方。"诊脉平弱，舌正无苔。

处方：

上丸方去硝石、矾石，重用参、芪，加防风、白术、玉竹、黄精，仍制蜜丸长服。

1995年12月24日晚8时打电话来(时余到北京开会)宾馆我住的房间，称："服药已整整六年半了，每次复查都是正常的，无任何复发转移情况，是否还需继续服药?"答以：此病重在远期效果，建议每年服1～2剂。

1996年12月16日余在北京香山饭店开会，中午同桌吃饭，问其情况良好，"可说是一切正常，我已76岁，还觉精力充沛，每次复查，都是正常的。"仍然建议每年服1～2剂，勿因情况良好而掉以轻心。满十年后，可每年服1剂。2001年全国政协的春节联欢晚会和同年农历正月十五中南海的联欢晚会在电视播出时见到她亦在座，形体尚健。自1987年7月至今已13年多了。

十七、直肠癌手术后预防复发(二)

沈××　男　56岁　北京市　干部

1987年12月31日初诊：

自诉：今年5月查出直肠癌，于5月31日做手术，手术很成功，为高分化初期直肠癌，周围无糜烂现象，术后除血小板降低外，其他情况良好。现在大便已经改道，医院安排，手术后休息两个月前去做化疗，防止复发、转移；有的亲友劝阻我不能化疗，有的又说应做化疗，我去试做了一次，反应太大，不能承受。此次您来北京开会，特来求治。

检查：诊脉，两手脉沉弱结代，时时歇止，舌淡，大便日行2～3次，有时干燥，但多数时候为溏便；时有腹胀、口腻、揽镜自照，此时即出现黄腻苔，疲倦乏力，气短懒言，食欲不振，面色苍白。

辨证：邪势已杀，正气亦亏，脾胃虚弱，湿热积滞。

治法：补益气血，健脾和胃，理气化湿，清热解毒，扶正抗癌，以丸剂为宜。

处方：

晒参　黄芪　鸡血藤膏　山药　苡仁　莲米　蟾皮　白花蛇舌草　蜣螂　芡实　黄精　丹参　半枝莲　白术　枳实　厚朴　龙葵　败酱草　鸦胆子　重楼　白英　守宫　白头翁　土茯苓　建曲　炒谷麦芽　苦荞头　隔山撬　当归　菟丝子　沙苑子　女贞子　海马　制首乌

制蜜丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，温开水送服；若感冒咳嗽即停服，愈后续服；忌辛辣、香燥、烟酒等刺激性食物。

1988年5月4日收到4月19日来函称："吃了您为我开的(丸药)处方，我总的感觉很好。大便日趋规律正常，只偶尔还有溏便，精神好多了，体重也增加了，食欲很好，口腻和有时出现黄苔的现象也没有出现过了。现在药已近吃完(还有三天量)下一段如何办？请赐告。"

处方：

人参　黄芪　防风　白术　鸡血藤膏　莲米　苡仁　淮山药　黄精　白花蛇舌草　水蛭　干蟾　蜣螂　当归　半枝莲　龙葵　莪术　重楼　海马　鸦胆子　守宫　建曲　枸杞子　首乌　菌灵芝　白英　硝石　鸡内金　女贞子　沙苑子　玉竹　白扁豆　土茯苓　苦荞头　菟丝子　制蜜丸，服法同前。

1989年1月7日面诊：上方连服2剂，精神、精力明显好转，体重增加，形体已健，面色红润，眠食俱佳，并已由

1988年1月的全休改上半天班，大便日行2次，不干不稀，舌正无苔。按期去医院复查，均未见异常。

处方：

上方加百合、无花果。

同年9月查肝功，做了B超、胸部透视、查了血、并做了CEA检查，10月做第二次CEA检查，11月下旬做第三次CEA检查均正常。

1990年3月14日面诊：服上丸第2剂，大便已不稀，但也不干燥，一日一次通畅易解，每日早上起床后即解已成规律；眠食俱佳，精神健旺，形体已健，已在机关担任较前更为繁重的工作。本人信心十足，表示与医生密切配合，战胜顽疾，此后即以上方为基础，根据具体情况对症加减用药，但总不离扶正抗癌，防止复发这一原则。

1991年退休后又去一家公司任总经理，我每年去北京开会或面诊或电话联系，嘱其若无其他情况出现，即服原方，不可中断。

1996年12月和1997年11月我去北京开会，他打来电话称："每年复查2次，均正常，现已整整10年，是否还需服药?"答以此种病主要看远期效果，建议他每年服2剂，满10年后，每年服1剂，并在上丸方中去水蛭、硝石二味。

十八、结肠癌手术后预防复发

邵××　男　68岁　成都市　教授

1995年8月23日初诊：

自诉：1992年发现严重贫血，住省医院，经血液科检查患有慢性胃炎、浅表性胃炎，经治疗贫血好转后出院。1994年大便出血3十，做肠镜检查，降结肠处长一包块，确诊为癌。同年4月开刀以后，采取综合性治疗，由于身体太差，决定不做化疗，先服天仙丸半年多，又继续服平消丸半年，又吃蓖麻子蒸鸡蛋，又做气功，10月检查，无复发转移迹象。今年7月又去医院肿瘤科复查，白血球竟高达10.6万，癌胚抗原75正常，血清脂质结合唾液酸测定(LSA)结果为24 mg%，服青霉素后白血球降到6.3万，又发现心动脉硬化，心肌有梗塞现象，体重减轻，明显消瘦，感到问题愈来愈多，愈来愈严重，此时我们医院领导及一位同事介绍特来请老师用中药治疗。

检查：诊脉浮弦，苔黄，口苦，口干不喜饮，不思食，虽整天不进食，亦不知饥；特别感到疲乏，感到累，喜静卧、静坐、闭目、心烦，懒言懒动；消瘦，睡眠很不好，不易入睡，又易惊醒，梦多；腹部刀口处隐隐作痛，大便正常。

辨证：气血既亏，又伤外感，宜有此种种证象也。

治法：扶正祛邪，解表为先。

处方：玉屏风散合小柴胡汤，苍术白虎汤加减。

黄芪60克　防风15克　白术30克　柴胡15克　黄芩15克　苍术15克　石膏20克　知母15克　丹参20克　生山楂15克　建曲15克　甘草6克

2剂，水煎服。

8月26日二诊：服上方第一剂2次后曾拉稀2次，拉后感到舒服，此后也未再拉；口苦已减轻很多，诊脉尚有浮象，黄苔大退。

处方：

在上方中加胆草10克，白术增为50克，再进3剂。

8月31日三诊：诸症消失，改用丸剂防止癌症复发转移。

丸剂处方：

中芪　防风　白术　晒参　莲米　怀山药　苡仁　当归　丹参　乳香　没药　血竭　儿茶　硝石　矾石　天龙　干蟾　三棱　莪术　白英　龙葵　红花　黄连　土茯苓　黄精　玉竹　百合　枳实　建曲　半枝莲　枸杞子　女贞子　菟丝子　鸡内金　鸭胆子

共为细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸，饭后20分钟内用温开水送服。

1996年1月2日四诊：服丸剂后自觉有明显改变：①过去常常感冒，这段时间未感冒了；②开刀的伤口痛现在不痛了；③精神比过去好多了，想动、想说话了；④体重由开刀后的102斤增为120斤；⑤烦躁基本上没有了，眠食俱佳。

处方：

按上丸方加花蛇舌草、蜣螂再进1剂。

5月11日五诊："从手术到现在已经整整两年零一个月，今年3月7日去省医院复查，完全正常，身体日健，朋友们都说我脸色红润，不像病人，自己也很高兴。五一节前夕，在友人家吃饭，喝了很少一点酒，又多吃了一口饭，回家即觉不适，辗转不能入睡，五一早上起床即眩晕呕吐，当即送人我校职工医院，检查病症为：血压220/98毫米汞柱，早搏、腹泻、咽痒、咳嗽，经医院治疗，诸症已愈，血压150/75毫米汞柱。医院给的药是心痛定、心律平，现在丸药已经服完，精神仍很好，食欲甚佳，大便也不稀了，眩晕呕吐未再出现。"诊脉浮弦，苔黄，口干喜饮，口苦，大便正常，日行1次或2次。经医院检查结肠癌部位及相关脏器，均未见异常。出现以上病况乃由内伤饮食，外感风寒所致，现在外感已经化热，出现少阳、阳明证状，当按此施治。

处方：

黄芪60克 防风15克 白术30克 柴胡20克 黄芩15克 石膏30克 花粉30克 怀山药30克 代赭石30克 怀牛膝30克 焦山楂15克 甘草6克

3剂，水煎服，服完后，接服下列丸剂。

丸剂方：

黄芪 防风 白术 晒参 麦冬 五味子 灵芝 无花果 山药 苡仁 玄驹 当归 鸦胆子 丹参 蜣螂 守宫 蟾粉 绞股蓝 甲珠 白花蛇舌草 代赭石 天麻 勾藤 龟版 夏枯花 青箱子 枸杞子 女贞子 山楂 怀牛膝 茺蔚子 建曲 决明子 沙苑子

制蜜丸，每丸重10克，每日服3次，每次服1丸，温开水送服，饭前饭后俱可服。

1997年11月6日六诊：今年6月在省医院全面复查，除尿酸偏高外其他都正常，血压正常，早搏消失，癌变处无任何复发转移迹象，形体已健，面色红润，眠食俱佳。由于很注意饮食起居，1996年5月上旬的情况未再出现，自我感觉良好，因此停药已4个月。因嘱患者，此类病主要看远期效果，应坚持服药，5年之后，可每年服丸药1剂，不可中途停药，因将前丸方略加调整，继续服用。

2001年3月10日七诊：丸药已坚持服了5年又6个月，自称：① 曾感冒过一次随便吃了点感冒药就好了；② 我已73岁，但精神很好，精力充沛，拟将自己从事的专业加以总结，算是对人民做出一点贡献；③ 体重增至128斤后未再增加；④ 眠食俱佳，大便已调，不干不稀，一日一次定时解便；⑤ 血压稳定，心痛定等西药早就停服了。现在除服您开的丸药外，其他药一概未服。现在遵嘱从今年开始，每年服丸药1剂。

处方：

在前丸方基础上增强了扶正的药物，并加用了海马。

按：此类病主要依靠病家密切配合，坚持服药。2003年4月校外同学聚会、晤面，健康状况颇佳正从事著作。

十九、子宫癌晚期广泛转移

江××　女　51岁　成都市　职工

1997年5月5日初诊：

亲属代述：子宫癌已广泛转移，主要转移至肺、肝、脊椎4～5椎，剧痛，医院医生认为尚可存活20天左右。左腿痛已8个月，建议找中医治疗，因来求治。

检查：诊脉沉弦弱、结代、舌质红绛，不思饮食、口渴甚，喜饮，饮不解渴；大便不干燥，但很难解出。子宫癌是1995年5月全体职工体检时查出，6月做手术，手术后做过化疗，因体弱不能承受乃止，服过平消丸。今年3月因剧痛，住院检查，治疗，已全身性转移，医院已无药救治，乃于今日出院，即来老师处求治，只求减轻一点痛苦，延续一点时间，作子女的尽点孝心而已。左腿痛，医院诊断为坐骨神经痛，其痛的特点是上午轻、下午重，晚上尤重，痛不成眠，甚至号叫。自觉是一般筋由左侧臀部直痛至脚，痛甚出汗，形体瘦削，面容憔悴，诊病期间呻吟不止。

辨证：气阴两亏，邪势鸱张，病势至此，勉尽人事而已。

治法：益气养阴，活络止痛。

处方：活络效灵丹加味。

黄芪60克　晒参10克　当归15克　丹参30克　生地30克　栀子10克　丹皮15克　牛角丝30克　牛膝15克　蜈蚣3条　全蝎10克　白芍15克　木瓜15克　苡仁30克　乳没各10克　建曲15克　甘草10克

3剂，水煎服。

5月7日其女来我处称：药已服完1剂，第2剂已服2次，痛已减，出汗大减，但腹泻。还有1剂未服，嘱其在第3剂中加山药、芡实、浮小麦各30克。

5月8日二诊：服上方3剂后，痛大减，汗止，左腿痛大消，但拉肚子，甚至日行10余次乃至20次，拉的全是泡沫黏液，但拉后精神反而好转，且感觉舒适。诊脉沉弱弦细，原来脉搏频频歇止，现十余次方歇止一次。腹泻时有腹痛现象，此属肝脾不和，治当调和肝脾，方用四逆散合痛泻要方加减：

黄芪60克　防风15克　白术30克　柴胡15克　白芍15克　枳实10克　木香10克　陈皮10克　晒参10克　建曲15克　炒谷芽15克　甘草10克

2剂，水煎服，腹痛腹泻止后，接服下列丸剂：

黄芪　晒参　白术　怀山药　苡仁　当归　丹参　乳香　没药　蜈蚣　全蝎　鼠妇　守宫　无花果　百合　紫草　丹皮　建曲　炒谷芽　干蟾皮　麝香　牛黄　冰片　制马钱子　水红花子

共为细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日早晚各服1丸，7日后若无不良反应，可在中午加服1丸，饭后20分钟内用温开水送服，服药期间若出现其他情况可及时联系。

5月28日三诊：自服丸药半个月以来，精神明显好转，腿痛及周身痛大为减轻，晚上可以睡3～4个小时了；饮食也较前好了，渴饮也减轻了，累也减轻了，腹痛腹泻早已痊愈，现在的问题是大便干燥，解便困难，同时一个月的丸药只剩下

一半了。诊脉弦细弱，歇止脉如故，舌质尚红，左腿有坠胀感，小便灼热。

处方：

黄芪60克　太子参30克　生地30克　栀子15克　丹皮15克　紫草30克　元参30克　大云30克　汉防己30克　猪苓30克　枳壳20克　香通30克　血通20克　白芍15克木香15克　建曲15克　炒谷芽15克　甘草10克　黄柏15克

3剂，水煎服，丸药照常服。

6月5日四诊：大便已不干燥，易解，小便灼热，本已消失，但近日又作，腿肿坠胀本消，现又作，足背肿，按之凹陷。细询之，乃因昨日吃炖肘子，用的是麻辣烫的调料，醋也放得重，当天吃了，半夜就感觉不对，即来诊治。诊脉沉弦弱，舌质红又作。

处方：

黄芪60克　太子参30克　生地30克　紫草30克　猪苓30克　白茅根60克　牛膝15克　白芍20克　香附10克　大腹皮30克　全蝎10克　蜈蚣3条　青皮10克　茯苓皮30克　枳壳10克　木瓜15克　苡仁30克　建曲15克　甘草10克　水红花子30克

3剂，水煎服。

丸剂方：

在上丸剂方中加半枝莲、半边莲、白花蛇舌草，制蜜丸同前，服法亦同，40天服完，并嘱其忌辛辣、香燥、油炸、酒、醋等。

7月15日五诊：精神、面色俱有明显好转，大便正常，饮食增加，舌质红渐趋正常，盗汗(已十多年了)减退，但左腿痛反复较大，痛剧时，肿又作，丸药只剩下几天了，要求再配制一付，认为丸药效果好，且服用方便，并要求多配制一点。

处方：

在前丸方基础上加银花藤、赤链蛇，制蜜丸如前，服法亦同前。

8月19日六诊：重感冒，头痛身痛，一身尽痛，咳，苔黄，渴饮，诊脉沉紧而弱。询其家人，方知因气候炎热，躺在床上看报时睡着了着凉而起，因用人参败毒散加黄芪、石膏、花粉。服一剂诸症大减，但又感冒，喷嚏连连，清涕不断，口苦，乃以玉屏风散合苍耳散、小柴胡汤，服后小愈，但又连续感冒，此时丸药已停服近10日，宿疾加重，有诸症蜂起之势，建议送医院输液，以增强抗病能力，殊知在检查当中又重复感冒，9月10日其婿何某前来开药，言已处于昏迷状态，但始终无疼痛之苦，同月24日在医院逝世，共存活170天，当其送医院时，认为还未逝世是个奇迹。

按：人皆以感冒为轻浅之疾而予以忽视，殊知，感冒乃一切疾病的罪魁祸首，它可以诱发一切未彻底治愈之病；可以加重一切病，可以加速患者的死亡，可不惧哉！

人，往往在崎岖小道十分小心，摔跤多在平坦大道，病者亦然，在危重时最听医嘱，最认真服药，生活上亦最小心谨慎，随着病情好转，往往就不那么谨慎了。江某之病已是不治之症，但其始终认真服药，注意护理，慎于微末，就增长了存活的时间。

二十、膀胱癌手术后预防复发转移

孙××　男　53岁　成都市　工厂干部

1997年7月4日初诊：

自诉：去年因小便反复出血，去省医院检查，确诊为膀胱癌，同年10月17日在该医院做了手术，切除后做卡介苗膀胱灌注，开始每周做一次，后每月做一次，已做13次。同时检查出前列腺中度肿大，医院开了延生护宝液，现已服完数瓶。一病友告诉我，此病手术之后用中药防止复发效果很好，他介绍我来找老师，另外我的一个亲戚也介绍我来找您。因此前来求治。

检查：诊脉浮、舌质偏红，舌边齿印甚多，且有紫络，舌有裂纹，黄苔；口渴喜饮，尿多；饮食尚可，大便日行1至3次；胸、背、四肢发疹，色红，痒甚，已四年；疲乏无力，喜静恶动，大便溏而不爽，一次解不尽，且努责方出，小便亦然，自感解便(大、小便)无力。

辨证：气阴两亏，湿毒内踞，又兼表证，入里化热，故有此种种症象。

治法：扶正祛邪，当先解表清里，循序渐进，庶可奏功。

处方：玉屏风散合白虎汤加味。

黄芪90克　防风15克　白术30克　石膏30克　花粉30克　芥穗15克　蝉衣10克　土茯苓30克　苡仁30克　全蝎10克　蜈蚣3条　紫草30克　赤芍15克　丹皮15克　山药30克　前仁10克　建曲15克　甘草6克

3剂，水煎服。

8月1日二诊：服上方3剂效果很好，因在附近药店又配3剂，现在：① 黄苔退完，渴饮大减；②“特别周身痒，痒得难以入睡，现在竟然痊愈，这个病过去一直医，花了不少钱，从未好过一天，这次六付药就好了，大大出乎意外；”③ 精神有较明显的好转，不那么疲乏，也想说话了；④ 解大、小便不那么吃力了，不鼓劲挣了。诊脉平、弱、弦，两尺沉弱甚，重按即无，舌质淡，舌上有裂纹五条；大便仍溏，日行2至3

次；眠食甚佳，小便次数减少，但尿黄增加。

处方：

黄芪100克 防风15克 白术30克 太子参30克 茯苓15克 怀山药30克 莲米30克 苡仁30克 白英20克 土茯苓30克 龙葵20克 绞股蓝20克 苍术15克 南瓜子30克 黄柏15克 白扁豆30克 花粉30克 白花蛇舌草20克 建曲15克 甘草6克

4剂，水煎服，服完后接服下列丸剂。

丸剂方：

黄芪 防风 白术 晒参 山药 莲米 苡仁 猪苓 蜣螂 水蛭 蟾皮 守宫 重楼 灵芝 蚯虫 白英 龙葵 土茯苓 枸杞子 菟丝子 女贞子 沙苑子 甲珠 海金砂 芡实 扁豆 黄柏 前仁 覆盆子 南瓜子 当归 丹参 三七 建曲 焦山楂 冬葵子

共为细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日3次，每次服1丸，饭后20分钟用温开水送服，若感冒、咳嗽即停服，愈后续服，忌辛辣、香燥、酒等。

1998年11月3日三诊：丸药已连服3剂，不但无任何不适之感，且明显的感到：① 感冒大大地减少了，过去一个月要感冒两三次，现在服丸药的一年多时间中，只感冒过两次，到医务室要点药吃，很快就好了，不像过去反复感冒，缠绵不愈；② 精神、饮食、睡眠都比过去好；③ 大便已是成形的软便，一天一次，早上起床即解；④ 身痒愈后未再出现。诊脉平弱，但已有神，两尺仍沉弱，但较前为好。

处方：

黄芪 防风 白术 晒参 茯苓 怀山药 莲米 苡仁 熟地 枣皮 泽泻 冬葵子 丹皮 猪苓 海马 元驹 枸杞子 菟丝子 女贞子 灵芝 干蟾 蜣螂 水蛭 土茯苓 甲

珠　虻虫　蝼蛄　白英　砂仁　半枝莲　守宫　三七　建曲　龙葵　焦山楂　皂角菌

仍制蜜丸，服法同前。

2000年11月11日四诊：上丸方已连服3剂，过去每三个月复查一次，1999年以后，每半年复查一次，每次都是正常的，无复发、转移迹象，此次是11月9日复查，仍然是无复发转移迹象，前列腺轻度增生。

处方：

在前丸剂方中加当归、丹参、鸡血藤膏、银耳、黄精等，制丸剂续服。

按：自1997年7月至2000年11月已整整3年又4个月，嘱其坚持服药满5年后，每年服丸药1剂。万不可中途停药。此后他一直在我大儿李根处治疗，直到现在2005年2月，仍在满5年后第6年开始每年服丸药1剂。

二十一、肺癌晚期纵膈淋巴转移、骨转移

周××　男　59　广元市　干部

1999年9月16日初诊：

亲属代述：今年7月23日因咳嗽、咳血、胸痛等治疗不愈，去医院检查，经胸部透视、CT检查，CT号2290号，诊为左上中实型肺癌(纵膈型)纵膈淋巴转移，因来成都川医检查，诊为左肺上叶中分化鳞癌2厘米×2厘米，纵膈淋巴转移、骨转移，做化疗一个疗程，现声音已嘶哑，其他症状均未减轻；经同病房病友介绍，特来求治。并表示：此病已是晚

期，但求减轻一点痛苦，他现在重要的是痛得厉害，晚上痛得睡不着觉。又吃不得，明显消瘦。其子密告：医院认为存活期最多只有三个月了，望能延长一点生存时间。

检查：诊脉浮弦数，苔黄，咽痒、咳、痰多，痰色白呈块状其中有黑点，咳血，有时是痰中带血，有时为鲜血，多在上午出现；口微腻，声音嘶哑，不能出声；大便初硬后溏，量少，不思饮食，口虽干而不思饮。

辨证：气阴两亏，表证为急。

治法：解表宣肺。

处方：

桑叶10克　杏仁10克　射干15克　蝉衣10克　浙贝母15克　胆草15克　苡仁30克　黄芩15克　白芨30克　百合30克　藕节30克　桔梗10克　前胡15克　芥穗15克　防风15克　全蝎10克　蜈蚣3条　诃子15克　建曲15克　甘草6克

4剂，水煎服。

9月25日二诊：服上方4剂后胸痛稍有减轻，咳吐鲜血消失，痰中带血减，口苦减，咳的次数减少，黄痰减少，大便如故，不易解出，声音嘶哑稍有减轻，咽痒减，诊脉弦弱，左脉尚见浮象，黄苔渐退。

处方：

射干15克　蝉衣10克　芥穗15克　防风15克　白术30克　百合30克　白芨50克　藕节50克　黄芪100克　黄芩15克　胆星15克　鱼腥草30克　桑叶10克　枇杷叶15克　全蝎10克　蜈蚣3条　苡仁30克　冬瓜子20克　建曲15克　甘草6克　川贝母15克(细末，分4次药汤冲服)

3剂，水煎服，服完后，接服下列丸剂。

黄芪　防风　白术　晒参　怀山药　苡仁　百合　当归　丹参　乳香　没药　川贝　胆星　瓜壳　猫爪草　守宫　全蝎　蜈蚣　干蟾　制马钱子　虻虫　三七　龙葵　海马　鱼腥草　牛黄　冰片　血竭　儿茶　绞股蓝　灵芝　银耳　莲米　白芨　薄荷冰　苍耳　建曲　焦山楂　桔梗　白花蛇舌草　白英　半枝莲　炒谷麦芽　千张纸

共为细末，制蜜丸，每丸重9克，每日服3次，每次服1丸，饭后20分钟用温开水送服，若感冒，咳嗽加重即停服，感冒愈后续服，忌辛辣、香燥、酒、油炸等。

2000年3月7日三诊：丸剂连服2剂后诸症俱减，精神好转，眠食转佳，大便不干不稀，1月一次，已易解出；因老伴脑溢血突然去世，悲伤太过，守灵之中又患感冒，致诸症加重，第2付丸剂已停服月余，因根据病情治疗感冒(已在当地医院打针输液)，3月28日感冒愈，接服丸药，因丸药只剩10天用量了，故再开第3付丸药如下：

在前丸药基础上加：麝香　蟾酥　干漆　岩白菜　抗癌转移粉　去干蟾。

2000年6月16日晚上8点45分，其女打来长话，告知其父因感冒发高烧，在当地医院治疗中又重复感冒，于14日晚上去世，共存活9个月。

二十二、乳腺癌手术后预防复发

张××　女　49岁　深圳市　公司经理

1998年4月16日初诊：

自诉：左乳房乳腺癌，1997 年 10 月 23 日在陆军总医院手术，术后做放疗 32 天，现在做化疗已 5 次，人感到疲乏无力，精神不振；睡眠越来越不好，梦特别多，眼睛一闭就是梦；头发也掉光了，现在戴的假发；白血球只有 3 000 了。手脚也肿了，人一天天消瘦；一位朋友介绍，特来求治。

检查：诊脉浮数而弦，舌质嫩红；咳，干咳时居多；咽痛，吞咽俱痛；手脚肿，按之凹陷，以左侧上下肢较重；口苦、口干、饮不解渴，自带矿泉水二瓶，诊病中频频饮之；大便干结，不易解出。

辨证：气阴两伤，又兼表证。

治法：益气养阴，当先解表。

处方：银翘散合白虎汤加减。

银花 30 克　连翘 30 克　芥穗 15 克　薄荷 10 克　射干 15 克　马勃 15 克　柴胡 15 克　黄芩 15 克　石膏 30 克　花粉 30 克　元参 30 克　黄芪 60 克　杏仁 10 克　桔梗 10 克　大力子 10 克　建曲 15 克　甘草 6 克

2 剂，水煎服。

4 月 19 日二诊：口苦消失，渴饮大减；咽痛止；大便已不干燥易解；右侧上下肢肿消，左侧尚肿；饮食好转“晓得饿了”；咳亦减；诊脉右脉弦弱，左脉尚有浮象，舌质尚红；咽部觉痒，痒即咳。

处方：

射干 15 克　蝉衣 10 克　杏仁 10 克　黄芩 15 克　生地 30 克　紫草 30 克　丹皮 15 克　百合 30 克　桔梗 10 克　前胡 15 克　麦冬 20 克　鱼腥草 30 克　石枣子 30 克　五味子 6 克　建曲 15 克　甘草 5 克

3 剂，水煎服，服完后接服下列丸剂。

中芪　晒参　柴胡　白芍　青皮　郁金　守宫　蟑螂　干

蟾　鼠妇　甲珠　山慈姑　当归　川芎　熟地　枸杞子　桃仁　赤白芍　红花　灵芝　银耳　姜黄　海龙　黑芝麻　建曲　焦山楂　皂角菌　地鳖虫

共为细末，炼蜜为丸，每丸重9克，每日服3次，每次服1丸，饭后用温开水送服。

1999年4月21日下午6点50分病员自深圳打电话称服丸药后：① 精神明显好转，感冒减少；② 饮食好，吃饭香，大便正常，已不干燥，容易解出；③ 服丸药后每半年复查一次，现已复查两次，无复发转移现象，但早上脸肿、四肢肿，深圳医院医生认为乃手术后淋巴管的回流不好所致，要求再服丸药1剂。

处方：

在前方基础上加：橘叶、丹参、瓜蒌、桑椹子、女贞子、沙苑子，制蜜丸续服，服法同前。

2000年3月18日夜8点30分病员自深圳打来电话称：① 1999年10月复查，情况很好，无复发、无转移；② 精神、睡眠都好、饮食增加，体重增加5斤，现已恢复工作；③ 大便多数是每天一次，有时隔日一次，必须多吃水果蔬菜，方可不干燥，请在丸药中考虑一下。

处方：

黄芪　晒参　灵芝　柴胡　枳壳　赤白芍　守宫　蟑螂　蟾皮　甲珠　瓜壳　玫瑰花　浙贝母　海藻　大云　芦荟　皂角菌　银耳　当归　川芎　熟地　枸杞子　元驹　鼠妇　黑豆　建曲　桑椹子　白英　龙葵　焦山楂　橘叶　山豆根　女贞子　沙苑子　绞股蓝

制蜜丸同上，服法亦同。

2001年2月6日面诊：诊脉弦，舌淡形体已丰，新发满头，面色红润，眠食俱佳，大便通畅，每日定时解便。左胁

冷、左胁刺痛感(过去未说)俱已消失。左腿肿消失，左手肿已减轻，上丸药已服2剂，前后共服5剂，自1998年到现在已整整3年，表示定遵医嘱服够5年，5年后每年服1剂。因在前方基础上加夏枯草、猫爪草、苦荞头，制蜜丸续服。以后每年由其女、或子来做丸药1剂至2004年止已七个年头，据其子、女称，其母身体颇健仍在上班。

二十三、不遵医嘱卵巢癌手术后复发

侯××　女　30岁　成都市　高校干部

1993年10月7日初诊：

自诉：今年4月28日因卵巢肿瘤6厘米×7厘米在省医院手术切除后，已做化疗5次，自感承受不了，一是呕吐，不论吃什么都呕，喝白开水都呕；二是吃不进东西，主要是无食欲；三是头发全掉光，现在是戴假发；四是疲乏无力，话都不想说，亲属密告：手术时已经扩散，两边卵巢只剩下一边的二分之一了。目前本人尚不知道。

检查：脉沉弱，舌淡，舌边齿印密布；呕不能食，食即呕，喝水亦呕；不思饮食，面色青黄，精神疲惫，懒言懒动；眠差梦多，合目即梦“是半睡半醒的状态”；大便数日一行，并不特别干燥，且不易解出。

辨证：气血两虚，胃气上逆。

治法：益气养血，降逆止呕。

处方：圣愈汤加小半夏如茯苓汤加减。

黄芪60克　党参30克　当归15克　丹参30克　鸡血藤

30克　清半夏30克　茯苓15克　竹茹10克　甘草6克　生姜3大片(约10克)

3剂，水煎服。

10月17日二诊：呕吐止，已可进食；因服药中感冒，故3剂药吃了10天。诊脉沉弱，舌淡，舌边齿印如故，但精神略见好转，大便正常，微偏干燥，二三日一行。

处方：

黄芪60克　防风15克　白术30克　晒参10克　白英30克　生地30克　当归15克　白芍15克　莪术10克　桃仁10克　红花10克　半枝莲30克　海藻30克　白花蛇舌草30克　绞股蓝30克　建曲15克　焦山楂15克　甘草6克

4剂，水煎服。

10月24日三诊：诊脉沉弱，舌淡，舌边齿印渐浅，精神明显好转，饮食增加；白血球由3 000升至4 600，但服药后感觉腹胀，大便日行一次，或间日一行，不干不稀。

处方：在上方中加枳壳15克，炒莱菔子20克，再进4剂后接服下列丸剂：

黄芪　晒参　白术　黄精　怀山药　当归　丹参　鸡血藤　青　甲珠　水蛭　虻虫　蟑蛴　炙鳖甲　干蟾皮　守宫　鼠妇　蜣螂　浙贝母　生牡蛎　山慈姑　重楼　熟地　枸杞子　赤白芍　制首乌　建曲　焦山楂　菌灵芝　黑芝麻　无花果

共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日服3次，每次服1丸，饭后20分钟用温开水送服；若感冒、咳嗽停服，愈后续服；忌辛辣、香燥、油炸等。

1994年6月16日四诊：服丸药2剂后脱发已生，现在是新发满头，体重增加十余斤，形体已丰，一改面黄肌瘦之状；第1剂丸药服完，月经即至，梦已稀疏；学校的文艺晚会，每次都积极参加；自服丸药以来未感冒过，已在医院复查两次，情况都很好，要求再服丸药。

处方：

在前丸药方中加半枝莲、白花蛇舌草、猫爪草、海龙制蜜丸如前法，服法亦同。

同年10月丸剂服完，自认为已经痊愈，不愿再服丸药，虽一再晓以利害，亦未接受建议，就此自行停药。

2000年10月8日忽来我处称："原做手术处有包块如鸡蛋大小，疼痛拒按……"诊脉沉弦而涩，有结代象，舌质淡，舌头大，舌边齿印甚多；扪其包块质硬，大小如患者所说，诊为卵巢癌复发，建议去医院复查；10月9日四川省人民医院亦确诊为卵巢癌复发；10月10日又来我处，为之开丸药1剂，嘱其坚持服药5年，必要时可再次手术，手术后仍须坚持服丸药5年，5年后可每年服1剂，再服5年当不致复发。殊知丸药服完后，未继续服药，听信游医之言，致失病机，于2002年冬死亡。

二十四、牙龈白斑

郭××　女　55岁　北京市铁路系统教师

1997年11月9日初诊：

自述：口腔右侧上牙龈白斑已2年，大小3个，无任何不适之感，发现后即去医院检查未得确切结论，未用药，亦未作其他处理，密切观察而已。1997年9月发现白斑长大，又去几家医院检查，其中一家医院确诊为癌前病变。上化疗因副作用太大，呕吐、不思食、脱发等而停止。因先生正在北京开会，我侄儿介绍特来求治。

检查：右侧上牙龈白斑3个，触之硬，不痛，中间一个略小，3个均高出牙龈表面。诊脉沉弱而弦，两尺弱甚几不应指，舌质淡白不荣，面色不华，眠差、梦多，饮食尚可，大便干燥，每天必须大量吃蔬菜水果特别是香蕉方能解出。平素喜吃油炸、香燥、烧烤等食物。47岁时绝经。

辨证：病者形瘦，面色不华，舌质淡白不荣，脉沉弱，大便干燥乃气阴两虚之象；两尺弱甚，几不应指是为肾气虚衰，肾主骨，齿为骨之余，故白斑生于牙龈；脉弦应肝，弦而弱是为肝阴不足，肝阴不足乃肾阴不足以养肝也。造成如此局面其罪魁祸首乃由平素喜食(实为偏嗜)油炸、香燥、烧烤等食物所致，其不燥火伤阴岂可得乎？阴损及阳，气(属阳)阴两伤，肾气虚极，故病变在薄弱环节发生。幸发现较早尚未癌变，医院确诊为癌前病变固其宜也。

治法：益气养阴以扶正，滋肾养肝以消斑。但必须戒辛辣、香燥、油炸、腌卤、烧烤及烟熏火燎之物，并注意饮食有节、起居有时，不偏嗜、不过劳、不熬夜。

处方：非汤剂所宜，应以丸剂徐徐图功。

知柏地黄丸合五子衍宗丸、参麦散、四物汤加黄芪(重用)灵芝、银耳、蟾皮、守宫、鼠妇、土茯苓、芦荟、黑芝麻、元参、柴胡、枳壳、白英、龙葵、白花蛇舌草、建曲、鸡内金等，诸药共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每日早晚各服1丸，淡盐开水送服。

1998年5月18日其侄儿来电话告知其姑母的白斑已消，是否还需要服药？建议可再服1剂以资巩固。并嘱其对辛辣、香燥、油炸等食物今后亦不可食。

按：方中用知柏地黄丸合参麦散、四物汤加黄芪、灵芝、银耳、以益气养阴(血)；病标在上(牙龈白斑)病本在下(肾气虚衰)，故用知柏地黄丸合五子衍宗丸、黄芪、灵芝、银耳以

滋肾固肾；肾主水，肺为水之上源，故用参麦散（必须用生晒参或西洋参）养肺金以滋肾水，滋肾水以养肝的同时用四物汤合银耳、枸杞子、女贞子、桑椹子（五子衍宗丸中有此）养肝阴、益肝血，合黄芪、人参有补气活血之功；黄芪、人参、生地、桑椹子、元参、芦荟、枳壳合用有补气降气、补肾润肠之功，使大便不干燥通畅易解；因其脉弦弱，有肝郁不舒之象，故四物汤合柴胡、枳壳益肝阴、舒肝郁；病标在上，余药皆抗癌消斑之品，诸药合用共奏扶正消斑之功。

肿瘤习用药

一、清热解毒药

【重楼】又名七叶一枝花、蚤休，以根茎入药，苦、微寒，有小毒；功能清热解毒、消肿止痛、散瘀定惊、平喘止咳。用于：① 治疗各种癌症，如肺、肝、乳腺癌、脑瘤、恶性淋巴瘤、白血病等，并止癌痛，常与半枝莲、山豆根、夏枯草等同用；② 热疖、疔疮、肿毒，与蒲公英、银花、连翘同用；③ 咽喉肿痛与藏青果、土牛膝同用；④ 小儿高烧、惊风、抽搐与钩藤、蝉衣同用；⑤ 晚期胃癌，可单用本品 50～100 克煎服，每日二至三次，十天为一疗程，最多可服七至八个疗程，无不良反应。常用量是 10～15 克。

【山豆根】又名广豆根、苦豆根，苦寒，清热解毒、消肿利咽。用于：① 治疗食管、喉、肺、肝、舌等癌症常与鱼腥草、白花蛇舌草、大青叶、重楼等配伍运用，能消乳癌；② 咽喉与齿龈肿痛与元参、桔梗、板蓝根、重楼等同用。用量 6～10 克。

【马勃】辛平，清热解毒、利咽止血。用于：① 喉癌、舌癌、鼻咽癌、肺癌；② 咽喉肿痛、痄腮、发颐、肺热咳嗽，与射干、银花、板蓝根、大力子、大青叶同用。

【土茯苓】甘淡平，解毒消肿、祛湿通络。用于：① 泌尿系统、消化系统肿瘤，肝癌等；② 关节酸痛、筋骨拘挛、风湿关节炎；③ 湿热疮毒常与白鲜皮、地肤子、苦参、苍术、黄柏同用。为治疗梅毒之主药。用量 30～60 克。

【大力子】即牛蒡子。辛、苦、寒。清热解毒、散风利咽。用于：① 与其他抗肿瘤药物配用治喉、肺、食管等癌症及恶性淋巴瘤等；② 咽喉肿痛配桔梗、山豆根、马勃等；③ 治疗流行性腮腺炎；④ 捣烂治疮肿及翻花疮。

【白英】又名蜀羊泉、排风藤、白毛藤。微苦、寒、有小毒，功能清热解毒、祛风利湿。用于：① 治疗各种癌症，以胃肠道癌及肝癌、膀胱癌、乳腺癌、宫颈癌等为主，与龙葵、蛇莓配合即龙蛇羊泉汤，为治疗各种癌症的基本方之一；② 用于湿热黄疸、湿热带下、宫颈糜烂。用量 15～30 克。本品性味苦寒，久服易伤肾气，宜配以大枣。

【白花蛇舌草】甘淡、微苦、凉，清热解毒、消痈活血、利水通淋。用于：① 各种癌症如消化道癌、肝癌、淋巴肉瘤、子宫颈癌、喉癌；② 各种感染，如上呼吸道感染、尿路感染、急性阑尾炎、急性肝炎；③ 疮疖痈肿、肠炎痢疾、毒蛇咬伤。用量 30～60 克。本品能显著增强机体免疫能力、增强防御机能，能直接抑制癌细胞生长、且无明显的毒副作用，故广泛应用于各种癌症。

【龙葵】又名天茄子、七姊妹。苦、微甘寒、有小毒，清热解毒、利水散结。用于：① 治疗各种癌症，如肺、胃、肝、膀胱癌及滋养叶细胞瘤等，对癌性胸腹水有一定疗效；② 水肿及小便不利与泽泻、木通、车前子等配伍运用；③ 疮痈肿毒、皮肤湿疹用鲜草捣烂外敷。用量 15～30 克，如过量可引起头痛、腹痛、呕吐、腹泻、瞳孔散大、甚至昏迷。

【半枝莲】辛、苦、寒，清热解毒、利水消肿。用于：① 治疗各种癌症；② 热毒疮肿、虫蛇咬伤；③ 肝硬化腹水、肾炎水肿。用量 30～60 克。

【蛇莓】又名蛇泡草、三匹风、三爪龙。甘、酸、寒、有小毒，清热解毒、散结消肿、凉血通经。用于：① 治疗多种

癌症，常与白英、龙葵合用治癌症之实热证；② 颈淋巴结核、疔疮肿毒、蛇虫咬伤；③ 咽喉肿毒、风热咳嗽、烫火伤、痢疾、肠炎。用量 15～30 克。

【漏卢】苦寒、有小毒，清热解毒、排脓通乳。用于：① 乳房肿痛，乳汁不下，乳癌初起；② 治瘰疬结核与夏枯草、猫爪草合用；③ 治痈疖初起与连翘、大黄、生甘草合用。

【蒲公英】又名黄花地丁。苦、甘、寒，清热解毒、凉血散结。用于：① 肝、肺、胃、乳腺癌等各种癌症；② 乳腺炎及各种急性感染，疔疮、疖肿、肠痈、肺痈、乳痈；③ 肝炎、急性黄疸型肝炎、胆囊炎等肝胆瘀热。用量 15～30 克。

【青黛】咸、寒，清热凉血解毒。用于：① 慢性粒细胞白血病，青黄散缓解率达 100%；② 热盛出血；③ 肺热咳嗽、慢支配以蛤粉称黛蛤散；④ 治黄疸，黛矾散，日三服；⑤ 治口疮、咽痛、舌癌配以黄柏、冰片。外用适量。

【鸦胆子】又名鸦蛋子。苦、寒，清热解毒、杀虫止痢。用于：① 治胃、结肠、直肠癌、肝癌等；② 治阿米巴痢疾，本品去壳取仁装胶囊服；③ 治皮肤赘疣、鸡眼，用本品去壳取仁捣烂涂敷。用量 10～15 粒装胶囊吞服。

【野菊花】全株入药。苦、辛、凉，清热解毒、凉血消肿。用于：① 各种癌症伴热毒壅盛者；② 治瘰疬疖肿；③ 治流感与大黄、贯众合用甚效。用量 10～15 克。鲜品捣烂外敷。

【天名精】又名野烟，果实名鹤虱。辛、甘、寒，清热解毒、破血止血，全草入药。用于：① 各种癌症患者有热毒瘀阻者，及肠癌、乳腺癌、鼻咽癌、喉癌等；② 无名肿毒、恶疮、毒蛇咬伤，用鲜草捣汁一小杯饮服，药渣敷患处，日数次。用量 10～15 克。

【大蓟】甘、苦、凉，解毒消肿、凉血止血。全草、根入药。用于：① 淋巴肉瘤、肺、肝、肠、膀胱、甲状腺等癌症，

特别是有热毒症候及出血倾向者；② 用本品、龙葵、臭牡丹称龙蓟合剂，再随不同癌症及辨证配伍，对治疗恶性淋巴瘤、肺癌、肠癌、甲状腺癌有一定疗效；③ 痈肿、疖疮、血热、出血诸症及高血压；④ 用鲜品合猪肉炖服治肠系膜淋巴肉瘤。

【小蓟】甘、苦、凉，清热解毒、消瘀止血。用于：① 治胃、肠、肝、膀胱、子宫颈癌等功效与大蓟相似；② 对癌症患者出血及感染者常用；③ 有用本品治疗白血病的报道。

【鱼腥草】辛、微寒、有腥气、小毒，清热解毒、利水消肿。用于：① 治肝癌、肠癌、绒毛膜上皮癌；② 外用治体表恶性肿瘤，对于晚期癌症患者并发感染有清热解毒、镇痛消肿等作用，对改善症状有较好效果；③ 治癌性胸腹水与半边莲、葶苈子、赤小豆等利水药合用；④ 治肺痈、痈肿疮毒、恶疮、泌尿系统感染，肺痈配以冬瓜子、桃仁、鲜芦根、桔梗、生苡仁、金荞麦等。用量 20～30 克。有效成分在挥发油内，故不宜久煎。

【栀子】苦、寒，清热解毒、泻火除烦、凉血止血，用于：① 治肝癌、胰头癌、胆管癌及癌症患者合并感染，或因血热而有出血者；② 疮疡肿毒配银花、连翘、黄柏、蒲公英等；③ 黄疸、肝炎、胆道感染配茵陈、大黄、黄芩、过路黄；④ 口舌糜烂、小便涩痛配以生地、竹叶、黄连、黄柏；⑤ 吐血、衄血配以白茅根、大小蓟、侧柏叶、丹皮等。用量 6～9 克。

【紫草】苦、寒、清热解毒、凉血活血，用于：① 治绒毛膜上皮癌、白血病、肺、肝、胃、宫颈等癌症；② 疮毒痈肿；③ 小儿斑疹不透；④ 紫癜、流感等。用量 10～30 克。

【牛黄】苦、凉，清热解毒、化痰开窍、息风镇痉。用于：① 治疗白血病及各种恶性肿瘤，与麝香、乳香、没药等配制成犀黄丸治乳腺癌、瘰疬、恶疮；② 治疗小儿高烧、神昏、惊厥、抽搐等；③ 治疗牙疳、咽喉肿痛、口舌生疮、痈肿毒

疮等。用量：每次服 0.15～0.5 克，冲服，多入丸散。

【熊胆】苦、寒，清心平肝、解毒杀虫，用于：① 有高热、惊搐及黄疸之肿瘤患者；② 食道癌、胃癌、肝癌与山豆根、山慈姑、千金子霜、红芽大戟等配伍；③ 目赤翳障、痔疮用以点服或涂患处。用量 0.15～0.3 克，多人丸散剂。

【白鲜皮】苦、寒，清热解毒、祛风化湿，用于：① 治皮肤癌、肝癌、胆管癌、胃癌、恶性淋巴癌、皮肤病变，亦用于膀胱、直肠、宫颈等癌症有下焦湿热见症者；② 治黄疸、风热疮毒、风湿痹痛、皮肤瘙痒。用量 10～15 克，水煎内服，外用 30 克，煎洗患处。

【虎杖】又名花斑竹。苦、酸、凉，清热利湿、解毒活血。用于：① 治肝、胰腺、胆管、卵巢等癌症，癌性胸腹水；② 化疗、放疗所致之白细胞减少症；③ 黄疸、湿热、淋浊带下、症瘕积聚、痔漏下血、恶疮、风湿痹痛；④ 常用于肝、胰腺、胆管等癌症伴有黄疸者。本品有抗病毒作用，还能提升白细胞。用量 15～30 克，或入丸剂。

【射干】又名乌扇、开喉箭。苦、寒、有小毒，清热解毒、祛痰利咽。用于：① 治疗呼吸道肿瘤、鼻咽癌、喉癌、支气管肺癌，亦可用于肝癌；② 咽痛喉痹，水浆不入，咳逆上气，喉中痰鸣者，为治喉痹咽痛之要药；③ 治疮毒肿痛初起，除内服外可用鲜根茎捣烂外敷患处；④ 治瘰疬结核。用量 6～9 克，水煎服。单方治鼻咽癌。

【臭牡丹】又名矮桐子、臭梧桐。夏季采叶及嫩茎，秋后采根入药。苦、寒(苦、平)，清热解毒、祛风除湿、消食理气。用于：① 治各种恶性肿瘤及肿瘤患者放疗后的治疗。可单用，亦可与龙葵、小蓟合用；② 风湿痛、骨节酸痛，高血压病有降压作用；③ 食积饱胀、小儿疳疾、脾虚水肿。用量 10～30 克。

【胡黄连】苦、寒，清热燥湿、退蒸消疳。用于：① 治白

血病、大肠癌、肛管癌；② 湿热下痢；③ 小儿疳疾；④ 骨蒸劳热；⑤ 痔疮肿痛配猪胆汁、冰片外敷。用量 6～10 克。

【穿心莲】又名一见喜、斩蛇箭，苦、寒，清热解毒、消肿止痛。用于：① 治恶性葡萄胎及绒毛膜上皮癌，亦可用于白血病；② 咽喉炎、呼吸道感染；③ 急性肠炎、菌痢；④ 疖肿疮毒、虫蛇咬伤，水煎内服。外用：鲜草捣烂酒调涂敷患处；⑤ 肿瘤患者合并感染具有热证表现者。用法及用量：口服水煎剂，每剂 30 克，每日 1 剂；穿心莲片（每片含生药 1 克）每日服 3 次，每次服 5 片。治疗肿瘤时可用至 10～15 片，连服数月。本品能增强人体白细胞吞噬金黄色葡萄球菌的能力，能增强肿瘤患者机体免疫功能。

二、活血化瘀药

【三棱】辛、苦、平，破血行气、消积止痛。用于：① 老癖症瘕、积聚结块，腹内包块、气滞体胀常与莪术同用；② 血滞经闭、腹腔肿瘤及卵巢癌、肝癌等；③ 各种癌症之气滞血瘀者。用量 10～15 克，水煎服。

【莪术】苦、辛、温，行气破血、祛瘀消积。用于：① 腹内包块、血瘀腹痛；② 血滞经闭、食滞腹胀；③ 治子宫颈癌、肝癌、胆管癌、胃癌、肺癌、肠癌、卵巢癌、淋巴癌、白血病等。

三棱、莪术皆有行气破血之功，但三棱破血化血之力优于莪术，而破气理气之力则莪术优于三棱。二药配伍则可加强消坚破积作用。体虚者应配以参、芪、术，包块积久过坚者非数剂所能愈，必以补药佐之，冀其徐徐消除方可邪去而正不伤。用量 10～20 克，水煎服。

【王不留行】又名留行子。苦、平，活血消肿、下乳通经。用于：① 治乳腺癌、肝癌、肺癌、乳腺良性肿块；② 乳痈肿痛常与蒲公英、瓜蒌、夏枯草合用；③ 产后通乳及子宫恢复，

闭经、痛经；④ 本品行而不住，有活血消肿止痛作用，用于各种肿瘤有血瘀疼痛者，尤常用于乳腺癌及乳腺增生。用量5～15克。

【泽兰】苦、辛、微温，活血祛瘀、通经利尿。用于：① 腹中症块、痈肿疼痛，通九窍、利关节、破宿血、通月经、消症瘕、散水肿，治血滞经闭、痛经、产后腹痛，为治妇科肿瘤要药；② 肝癌、胃癌具有血瘀症候者；③ 卵巢癌、输卵管癌、癌性胸腹水、鼻咽癌等。用量10～15克，入煎剂或丸、散。

【急性子】即凤仙花子、指甲花子。微苦、温、有小毒，降气行瘀、散结消肿。用于：① 治食道、贲门、胃癌等。治食道癌、贲门癌噎嗝不下时，以本品与灵芝、威灵仙、制木鳖子伍用，本品具有明显的食道开通作用，广泛用于食道癌；② 治鱼骨鲠喉、经闭；③ 梗名透骨草，治骨瘤疼痛。凡服本品者注意不可着齿，以其损齿也。用量6～10克。

【土鳖虫】又名䗪虫。咸、寒、有小毒，活血散瘀、通经止痛。用于：① 血瘀经闭、症瘕积聚、腹中痞块；② 肝癌、宫颈癌、骨肉瘤；③ 骨折外伤、瘀血疼痛。本品破瘀攻坚之力较强，治疗肿瘤时应与扶正药同用。用量3～6克入煎剂，以入丸、散剂为佳。

【水蛭】咸、苦、平、有小毒，破血祛瘀、消症散结。用于：① 治食道癌、胃癌、直肠癌、肝癌、卵巢癌、宫颈癌有血瘀见症者；② 闭经、症瘕、积聚、跌打损伤、瘀血作痛。用量1.5～3克，水煎2～3小时或焙干研末，每次服0.3～0.6克，日服2次，白开水送服。以入丸、散剂为佳。

【蜣螂】又名推屎扒、推车虫、屎壳郎。咸、寒、有毒，破瘀解毒、消肿止痛。用于：① 治食道癌、贲门癌、胃癌，亦用于鼻咽癌、膀胱癌；② 血痢、症瘕、反胃、噎嗝；③ 前

列腺肥大。本品能通关止痛，故常用以治疗食道癌噎塞不通、呕吐痰涎、胸膈疼痛者。本品性猛有毒，孕妇忌服，脾虚者亦非所宜。用量1.5～3克入煎剂，以入丸、散剂为宜。外用治恶疮研粉撒患处。

【蟑螂】俗名偷油婆。咸、寒、有小毒，破瘀、化积、消肿解毒。用于：① 治乳腺癌及其他癌症；② 治症瘕积聚、小儿疳疾、疔疮、喉蛾、痈肿、蛇虫咬伤；③ 治臌胀：本品1个(焙干、研)萝卜子1撮(约6克)捣碎，好酒吞。用量1～3个，以入丸、散剂为佳。

【鼠妇】俗名地虱婆。酸、凉、无毒，破血利水、解毒止痛。用于：① 治肝癌、疟母；② 经闭、症瘕；③ 小便不通：本品5克、泽泻9克、灯芯3克，水煎服；④ 治闭经：本品、赤芍、桃仁、红花、丹参，水煎服；⑤ 血淋：本品焙干研末服；⑥ 子宫功能性出血：本品焙干研末服，童便送服。用量3～6克煎服，入丸、散剂为佳。外用研末。

【乳香】辛、苦、温，活血止痛、消肿生肌。用于：① 各种癌瘤及良性肿瘤，古方治乳癌乳痈瘰疬之犀黄丸、醒消丸、乳香丸等均为主药之一；② 痈疽、恶疮、肿毒及跌打损伤、癌性疼痛等常与没药伍用。用量6～9克入煎剂，多用于丸散剂中。

【没药】苦、平，散血祛瘀、消肿定痛。用于：① 治各种肿瘤与乳香同，且常与乳香同用；② 治跌损、金疮、筋骨心腹诸痛；③ 症瘕、经闭、痈疽、肿痛、痔漏、目障；④ 本品研末，以热酒调服能堕胎，故孕妇忌用。用量6～9克入煎剂，多入丸、散剂。

【威灵仙】辛、微苦、温，消痰散热、通络止痛、祛风除湿。用于：① 治食道癌、贲门癌、胃癌、骨瘤、骨肉瘤入煎剂；② 治噎嗝反胃(食道癌、贲门癌、胃癌等多有此症状)，

用本品、大青盐捣如泥，加浆水1杯搅匀后去渣，调入狗宝，日服2次，愈后即须调补；③ 症瘕积聚、痰核瘰疬；④ 风湿痹痛、肢体麻木；⑤ 鱼骨鲠喉用本品30克，醋适量，水煎取汁缓咽。用量10～15克煎服。浸酒或入丸、散剂。

【茜草】苦、凉，凉血止血、活血祛瘀。用于：① 治食道癌、胃癌、肠癌、肝癌、鼻咽癌、白血病等及有因血热而具有出血倾向者；② 因放疗引起的血小板减少症与虎杖、女贞子、旱莲草、石韦、大枣同用；③ 吐血、衄血、便血伴血热者与生地、白茅根、小蓟、地榆等同用；④ 血瘀经闭；⑤ 跌打损伤。用量10～15克入煎剂，或入丸、散剂。鲜品茎、叶捣绒敷痈肿。

三、软坚散结药

【夏枯草】苦、辛、寒，清肝明目、散结消肿。用于：① 治乳腺癌、甲状腺癌、肝癌、纵膈肿瘤、淋巴肉瘤，常与牡蛎、海藻、土贝母等同用；② 治瘰疬结核、痰火郁结常与浙贝母、昆布、猫爪草等同用；③ 本品与白花蛇舌草、半枝莲等量用，可治多种恶性肿瘤；④ 治肝阳上亢头痛胀、目赤等，常配以黄芩、决明子、菊花等。用量10～15克。本品在少量或初期应用时可能有充血及血压上升，长期或大量应用时有降血压作用。

【黄药子】苦、辛、寒、有小毒，化痰散结、解毒消肿。用于：① 治食道癌、胃癌、肠癌、甲状腺癌、肺癌、宫颈癌等。酒浸制剂称黄药子酒，古代及民间用以治瘿瘤；② 治甲状腺瘤及甲状腺肿大；③ 凉血止血，用于热盛所致之出血；④ 无名肿毒、疮疖痈肿。用量15～30克。本品有毒，用量过大时可引起口、舌、喉部烧灼痛，并有流涎、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、瞳孔缩小等反应，严重时可出现昏迷、呼吸困难和心脏麻痹而死亡。长期服用能引起肝功的严重损害。中毒时内服鸡蛋清、绿豆汤解毒，并可洗胃、导泻、输液。

【蒲葵子】甘、涩、平，软坚散结、消瘀止痛。用于：① 主治各种癌症；② 治绒毛膜上皮癌，本品捣烂与鸡炖服；③ 治食道癌、白血病，本品、红枣水煎服，对幼稚型白细胞增生有明显抑制作用；④ 治脑肿瘤、鼻咽癌、食道癌、绒毛膜上皮癌及恶性葡萄胎、肺癌转移等常与半枝莲、白花蛇舌草同用；⑤ 治症瘕结气、肚腹痞块。用量 30～60 克，或与猪肉炖服。

【半夏】辛温有毒，燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结。主要用于：① 子宫颈癌，及其癌前病变、食道癌、胃癌、鼻咽癌、皮肤癌等；② 咳嗽痰多；③ 呕吐反胃、恶心痞闷，胃寒呕吐常与荜拨、良姜、丁香等配用；胃热呕吐与竹茹、黄连等伍用；④ 瘰疬痰核。用量 6～15 克，或入丸散。

【天花粉】即瓜蒌根。甘、微苦、微寒。清热生津、消肿排脓。用于：① 治疗绒毛膜上皮癌及恶性葡萄胎、食道癌、喉癌等；② 对放疗时的副反应有治理作用；③ 痈肿疮疡、肺热咳嗽、燥咳；④ 消渴病；⑤ 中期妊娠引产。用量 10～15 克，入煎剂或丸、散。

【栝蒌】即瓜蒌、瓜壳。甘、寒，清热化痰、宽胸散结、排脓消肿、润燥滑肠，反乌头。用于：① 治乳腺癌、肺癌、胃癌、胰腺癌、淋巴肉瘤等；② 治食道癌、大肠癌之有痰热便燥者；③ 乳痈、乳中结核，肺痈咳吐黄痰；④ 胸痹胁痛、心前区痛。用量 15～30 克。

【山慈姑】亦名山茨菰。甘、微辛、寒、有小毒，化痰散结、解毒消肿。用于：① 治乳腺癌、何杰金氏病、白血病、胃癌、食道癌、肺癌等，其中以乳腺癌效果较好；② 急性痛风性关节炎；③ 疮痈肿毒、瘰疬结核、蛇咬伤。本品原植物品种较为复杂，混名亦多，本人习用者，一为百合科多年生草本植物山慈姑(亦即山茨菰)的鳞茎；一为兰科多年生草本植物杜鹃兰的假球茎称毛茨菰。

【昆布】咸、寒，化痰利水、软坚散结。用于：① 治甲状腺癌、食道癌、子宫体癌、恶性淋巴瘤、肺癌及淋巴结转移癌；② 治瘰疬、瘿瘤、噎嗝、水肿、睾丸肿痛等。用量 10～30 克。

【海藻】苦、咸、寒，软坚散结、消瘿破症。主要用于瘰疬、痰核、瘿瘤，以及各种癌症。本品与昆布有反甘草之说，证之临床实践此说不确。20 世纪 60 年代后期曾治一刘姓九子烂痒，脓水淋漓，久治不愈，神形俱惫。西医诊为淋巴结核溃烂。我以海藻玉壶汤合消瘰丸加减重用海藻、昆布各达 60 克，生甘草 30 克，先用汤剂数剂后脓水即尽，继以之为丸服 2 剂而愈。此后又用多人皆获良效。用量 15～30 克，水煎服。亦可入丸、散剂。

【牡蛎】咸、涩、微寒，软坚散结、平肝潜阳、敛汗固涩。用于：① 各种实体癌瘤；② 瘰疬结核、痞块症瘕；③ 遗精、崩漏、带下、虚汗；④ 虚劳烦热、心悸失眠；⑤ 阴虚阳亢、头晕目眩。用量 30～60 克，水煎服。

【蛤壳】又名文蛤、海蛤壳、蛤蜊壳。咸、寒，软坚化痰、清热利水；肉咸冷，止渴除烦。用于：① 治乳腺癌、肺癌、甲状腺癌、淋巴肉瘤等；② 痰湿壅肺，痰稠难出者用蛤粉，有黄痰加青黛名蛤黛散；③ 胃痛反酸，蛤粉煅与香附等份为末，每次服 9 克，日服 3 次；④ 瘰疬结核、瘿瘤。用量 10～15 克，水煎服。亦入丸、散剂。

【僵蚕】辛、平、咸，化痰散结、息风镇痉、抗癌消肿。用于：① 治白血病、恶性淋巴瘤、肺癌、喉癌、肝癌、脑癌等；② 发热抽搐、头痛头风；③ 消瘰疬结核、症结等。用量 6～10 克，亦入丸、散剂。

【皂角刺】辛、温，祛痰杀虫、消肿排脓。用于：① 治乳腺癌、宫颈癌、肺癌、肠癌与其他抗癌中药伍用；② 痈肿疮

疡未成能消，已成促溃；③ 加米醋熬浓汁外搽治顽癣。用量6～9克，水煎服。

【前胡】苦、辛、微寒，祛痰止咳、清热疏风。用于：肺癌、肺转移癌及肿瘤患者之咳痰不爽、痰稠喘满等症。用量10～15克，水煎。

【硇砂】咸、苦、辛、温、有毒，软坚散结、消积祛痰、破瘀去翳、消肿利水。有白硇砂、紫硇砂两种，本人习用紫硇砂。用于：① 症瘕积聚、噎嗝反胃；② 痈疽疔毒；③ 鼻息肉、鼻咽癌、食道癌、贲门癌等肿物阻塞用以通道开噎、消积祛瘀；④ 痰饮咳嗽、喘逆、呼吸困难(可用于慢性支气管炎、肺气肿等呼吸道疾患)；⑤ 外用治目翳、胬肉、鼻息肉、面痣、赘疣等。常配以冰片共为极细末，用牙签沾水蘸药点于鼻息肉上，移时即化为水，大多一次即愈。用量0.3～0.9克入丸、散，须用醋蒸，醋干为度。外用适量。

【土贝母】苦、凉，散结解毒、消痈肿、化痰敛疮。用于：① 治鼻咽癌、乳腺癌、淋巴肉瘤、白血病、胃癌、大肠癌等；② 瘰疬、痰核、疮疡、肿毒初起；③ 乳痈初起与白芷、花粉各9克，乳香5克共为末，白酒调敷；④ 治乳癌用本品15克加入阳和汤中煎服以散为度，若乳癌已破用本品与核桃隔(又名分心木)、银花、连翘各等份用水、酒煎服；⑤ 刀、斧伤出血用本品研末敷之可止血收口。

【穿山甲】咸、微寒，祛痰散结、通经下乳、消肿排脓。用于：① 乳腺癌、食道癌、肝癌、皮肤癌、白血病及恶性淋巴瘤等；② 乳痈、痈疽恶疮；③ 经闭、乳汁不通；④ 白细胞减少症。用量6～12克入煎剂，以入丸、散剂为佳。本品善通经络、消瘀散结，痈疽肿毒初起者可使内消，已成者则拔毒提脓，又有生肌敛疮之功，尤对粘膜部位之溃疡有效。

【乌药】辛、温，理气散结、温中止痛。用于：① 治胃

癌、大肠癌、胰腺癌、肝癌等具有虚寒见症者，常与降真香、郁金、百合等伍用；② 胃寒气滞、脘腹疼痛、或呃逆，常与香附、丁香、砂仁等伍用；③ 寒湿疝痛、痛引少腹等。用量10～15克，水煎服。气血虚而内热者勿用。

四、消肿止痛药

【制马钱子】又名马前子、番木鳖。苦、寒、有大毒。消肿散结、通络止痛。用于：① 多种癌症；② 痈疽肿毒、咽喉痹痛；③ 风湿疼痛、跌打伤痛；④ 骨折；⑤ 面神经麻痹、重症肌无力；⑥ 小儿麻痹后遗证。用量及用法：(入丸剂不入煎剂)成人最大剂量内服一日量不超过0.5克。必须炮制后方能入药。

制法：用等量之甘草同在沙锅内用清水煮5小时，去甘草再用清水漂3日，每日换水1次，漂足3日捞出，刮去皮切片，用油砂炒至深黄色即可。

【全蝎】咸、辛、平、有毒，消肿散结、息风解痉、镇静止痛。用于：① 晚期癌症疼痛、脑瘤、脑转移癌，常与蜈蚣、僵蚕配伍；② 高热惊痫、抽搐、破伤风以及头痛、骨痛等。用量6～9克，水煎服。如研末吞服，每次0.5～1克。

【蜈蚣】辛、温、有毒，解毒散结、通络止痛、息风止痉。用于：① 脑瘤、脑转移癌、骨癌或晚期癌症剧痛者与全蝎、僵蚕同用；② 惊风癫痫、痉挛、头痛、关节肿痛；③ 瘰疬疮疡、虫蛇咬伤常与雄黄配伍，研末外敷；④ 治癌证，食道癌、肺癌、胃癌、乳腺癌、唇癌、子宫颈癌及皮肤癌等，用本品晒干(不可焙干)研末服；⑤ 治颌下淋巴腺炎，取本品干者2条水煎分三次服，每日1剂，一般3～4天即可治愈。对急性与早期效果好，对慢性或晚期化脓性能控制其扩散面，并有消除疼痛与肿胀的作用；⑥ 治疗骨髓炎，本品烘干研末以0.5克装入胶囊，每次服1克(两个胶囊)，每日服3次，小儿减半。

同时用凡士林纱条拌药粉入瘘管内，每日1次。

【守宫】又名壁虎、天龙。咸、寒、有小毒。息风镇惊、散结止痛。用于：① 各种恶性肿瘤，对食道癌有开道通关作用，使噎塞症状好转；② 瘰疬结核、癫痫惊风、关节疼痛等症；③ 脑血管瘤；④ 治食道癌：活天龙浸酒（名开关酒）饮之，无酒量者可加适量白开水；⑤ 治瘰疬：用本品研末装胶囊，每日服3次，每次服3粒，黄酒送服。已溃者用本干粉掺于创口上，外以普通膏药贴之。

【蟾酥】甘、辛、温、有毒，解毒开窍、消肿止痛、强心。用于：① 治肺癌、肝癌、乳腺癌及消化道癌；② 疔毒痈肿、咽喉疼痛；③ 心力衰竭，本品装胶囊，饭后用冷开水送服；④ 治疗骨关节结核及慢性骨髓炎漏孔（漏管），本品装胶囊饭后服用，连服至漏孔闭锁后再巩固1～2个月。除口服外还可用0.1%蟾酥液每日或隔日滴入漏孔中。用量：内服0.5～1克，只入丸、散剂。

【蟾皮】辛、凉、微毒，清热解毒、利水消胀。用于：① 治食道癌、肝癌、乳腺癌、白血病、淋巴瘤等；② 胃癌用本品、儿茶、元胡共研细末装胶囊，每次服1克，每日服1次，至3周为1疗程。对各型胃癌均有不同程度的疗效，对溃疡癌变的疗效最好。胃癌患者服后能止血、止痛、促进食欲，并有缩小癌块消除腹水的效果。

【苍耳子、草】辛、苦、温、有小毒，祛风除湿、通窍止痛、解毒杀虫。用于：① 治鼻咽癌，常与重楼、贯众等伍用；② 治慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎、头痛、风湿痛、疥疮及皮肤化脓性感染等。本品上通脑顶、下行足膝、外达皮肤，但散气耗血，虚人慎用。用量：苍耳子3～9克，苍耳草9～15克，煎服。

【白芷】辛、温，发表祛风、活血止痛。用于：① 治乳腺

癌常与重楼、土贝母伍用；② 痈肿疼痛；③ 眉棱骨痛、偏头痛常与川芎等伍用。用量 3～10 克，水煎服，亦可入丸、散。

【蜂房】又名露蜂房。甘、平、有毒，攻毒消肿、止血杀虫、祛风利尿、止痉通痹、强心、化痰、兴阳。用于：① 治胃癌特别是溃疡型癌、食道癌配以蛇蜕、血余、陈棕炭等；② 治鼻咽癌、乳腺癌、肺癌、骨肉瘤等；③ 痈疽瘰疬、风疹疮癣；④ 乳腺炎、淋巴腺炎、骨结核；⑤ 风湿、类风湿关节僵肿、肿痛；⑥ 阳痿、遗尿、崩漏、浊带；⑦ 风、虫牙痛、头疼、百日咳等。用法用量：10～15 克入煎剂，或烧存性研末，每次服 0.6～1.5 克。

五、利湿逐水药

【竹叶】甘、淡、寒，清热除烦、利尿通淋。用于：① 治唇癌、舌癌、齿龈癌及胃癌、肝癌、膀胱癌等；② 小便淋痛、湿热黄疸；③ 热病烦渴、口舌生疮。切勿因药性平和而等闲视之也。用量 10～15 克，煎服。

【苡仁】甘、淡、微寒，健脾利湿、清热排脓。用于：① 治肺癌、胃癌、肠癌、宫颈癌等。日本曾有报道一中药验方：苡仁、藤瘤(即豆科植物紫藤)、诃子、菱实各 10 克，煎服。1 日 3 次，每日 1 剂，治癌症有效；② 肺痈配桃仁、冬瓜仁、芦根；肠痈配败酱草、牡丹皮；③ 湿热内蕴、发热便溏、纳少苔腻与白蔻仁、杏仁、滑石、法夏等同用；④ 皮肤病及湿疹。用量 15～30 克，煎服。亦入丸、散剂。

【茯苓】甘、淡、平，利湿消肿、健脾和中、宁心安神。用于：① 肿瘤患者有脾虚症或在化疗期间作健脾益气扶正之用；② 水肿小便不利、脾虚湿盛、腹泻便溏、痰饮停滞、食欲不振；③ 惊悸失眠。用量 10～15 克。

【猪苓】甘、淡、平，利水渗湿、消肿抗癌。用于：① 治泌尿系统癌症如膀胱癌；② 水湿停留、水肿尿少、胸水腹水；

③ 能提高患者免疫功能。用量 15～30 克。

【汉防己】苦、辛、寒，利水消肿、祛风止痛。用于：① 肺癌、肝癌及癌性胸水、腹水；② 水肿小便不利；③ 关节痹痛、痈疮肿毒。用量 10～15 克。

【木通】苦、寒，泻火利水、通脉下乳。用于：① 舌癌、膀胱癌、乳腺癌、肝癌腹水等；② 心火上炎、口舌生疮、小便淋痛；③ 乳汁不通、闭经与王不留行、红花、牛膝同用。用量 10～15 克，有用至 30 克者。木通果实预知子即八月札，甘、寒，理气散结、疏肝健胃，常用于治疗肝癌和胃癌。

【石韦】苦、微寒，利水通淋、祛痰止咳，上清肺热，下利膀胱。用于：① 肺癌咳嗽痰多胸痛，膀胱肿瘤的尿血，放疗和化疗所引起的血象下降及膀胱炎；② 尿路感染，小便淋沥涩痛；③ 肺热喘咳。用量 15～30 克，水煎服。

【半边莲】辛、平，清热解毒、利水消肿。用于：① 治肺、肝、胃、卵巢、肾盂、膀胱等癌症及癌性胸腹水；② 肝硬化、肾炎水肿、黄疸、痢疾；③ 痈疮肿毒、跌打损伤等；④ 治蛇伤特效。取鲜品 120 克熬水内服，每日 2 次，渣捣绒敷伤口周围，不把伤口封住(即留出伤口不敷药)，移时即流黄水，流尽即愈。此方 1969 年得自蛇医，秘不传人。

【泽泻】甘、淡、寒，利尿渗湿。用于：① 治肺、膀胱、肾、肾盂等癌症、白血病、癌性胸腹水、癌症患者的水肿；② 肾炎水肿、高血压病、高血脂症；③ 淋病、泻痢、小便不利。用量 10～15 克。

【车前子】甘、寒，利水清热、止咳祛痰、明目止泻。用于：① 治肺、肝、肾、肾盂、膀胱等癌症及癌性胸腹水、癌证患者的水肿等；② 治小便不通、黄疸、泻泄、咳嗽、目赤肿痛、小便淋浊等。用量 10～15 克，布包煎。车前草 15～30 克，水煎服。

【马鞭草】苦、微寒，利水消肿、破血通经、清热解毒、截疟杀虫。用于：① 治肝、卵巢、子宫体癌，恶性淋巴瘤、白血病、癌性胸腹水等；② 黄疸、疟疾、症瘕、月水不通、血淋；③ 痈肿疮毒、肝硬化腹水以及白喉等。用量 15～30 克，孕妇忌用。

【金钱草】又名过路黄。苦、酸、凉，利尿排石、清热利湿。用于：① 治肝癌、胆管癌及胰头癌所致之黄疸，常配伍虎杖、茵陈、半边莲、姜黄等；② 黄疸型肝炎配伍茵陈、板蓝根、虎杖等；③ 胆结石、肾结石、膀胱结石配伍冬葵子、海金砂、芒硝、玉米须、鱼脑石等。用量 15～30 克，水煎服。有用至 210 克者。

【海金砂】即左转藤之孢子。甘、寒，利尿通淋、清热解毒。用于：① 治膀胱癌、肾盂癌、肾癌等，常与白英、龙葵、蛇莓、土茯苓等伍用；② 泌尿系统结石、血尿与金钱草、石韦、车前草等伍用。用量 6～12 克(包煎)。

【桑白皮】甘、寒，泻肺平喘、利水消肿。用于：① 治肺癌、肺癌胸膜转移、癌转移、腹水、胃癌、体表恶性肿瘤初起等；② 治肺热咳嗽、肺热吐血、水肿、高血压；③ 治癌性胸水：本品 15 克，葶苈子 15 克，车前草 30 克，半边莲 30 克，龙葵 20 克，泽漆 15 克，大枣 5 个，地骨皮 30 克，水煎服。

【茵陈】苦、辛、凉，清热利湿、利胆解毒。用于：① 治肝胆系统恶性肿瘤及胰腺癌、癌性胸腹水，亦用于治胃癌、腹腔肿瘤；② 肝炎、湿热黄疸、小便不利、疮疥湿疹。用量 15～30 克，水煎服。外用煎水洗患处。

六、其　他

【臭椿根皮】苦、涩、寒，燥湿清热、涩肠止血。用于：① 宫颈癌、大肠癌、白血病、恶性淋巴瘤；② 痢疾、肠炎、便血、尿血、子宫出血、带下量过多。用量用法：10～15 克，

水煎服。外用煎汤熏洗，亦可入丸、散剂。

【儿茶】苦、涩、微寒，清热化痰、敛疮止血、涩肠止泻。用于：① 唇癌、舌癌、喉癌、扁桃体癌、乳腺癌、宫颈癌等局部外用，直肠癌内服或局部外用；② 小儿痰热咳嗽、消化不良；③ 湿毒恶疮研末敷患处及恶疮久不收口者。用量 1～3 克入丸、散剂。外用于癌肿，配乳香、没药、血竭、麝香、冰片、蟾酥、硼砂、青黛、黄柏等共为细末，局部撒布或涂敷。

【槐树】豆科落叶乔木，槐树的果实、花蕾、叶、根均入药。苦、寒，清热凉血。用于：① 治直肠癌、结肠癌、肛管癌、胃癌、肝癌、白血病，尤多用于大肠癌患者的粘液脓血便；② 多种出血：尿血、便血、吐血、咳血、痔疮出血、崩漏等。用法用量：槐米（花蕾）10～15 克入煎剂、丸、散剂，炒用止血；槐角（即成熟之果实又名槐实、槐豆）10～15 克入煎剂或丸、散剂；槐花功同槐米，性平、味苦，有凉血止血作用。槐角性寒，久服败胃。

【石菖蒲】辛、苦、温，芳香开窍、化痰祛湿、健胃杀虫。用于：① 治胃癌、肝癌、脑癌，或其他癌症的脑转移以及肿瘤患者有高热神昏、痰湿蒙窍等均可用，配郁金、远志、牛黄、竹茹、莲子芯、半夏等；② 胃中湿浊阻滞所致食欲不振、嗳腐吞酸；③ 风湿痹痛、喘咳；④ 疥癣：煎汤熏洗。用量 10～15 克。有用至 30 克者。

【仙鹤草】苦、涩、平，收敛止血、截疟杀虫、解毒止痢、益气。用于：① 治多种癌证及癌性出血，多用于肺、胃、肠、肝、膀胱、宫颈等癌症，白血病等。可与其他抗癌中草药伍用；② 肺咯血、肠出血、胃溃疡出血、子宫出血、齿出血、痔血、肝脓疡等；③ 白细胞及血小板减少症；④ 盗汗、阴道滴虫、食物中毒；⑤ 感冒、流感、黄疸型肝炎、贫血、跌打内伤等；⑥ 疔疮痈肿初起、疟疾、绦虫病、脑积水；⑦ 治脓

疱疮：水煎浓汁洗患处。用法用量：6～15克煎服，捣汁或入散剂。外用适量，鲜品捣敷或煎浓汁及熬膏涂局部。

【诃子】苦、酸、涩、温，利咽敛肺、涩肠止泻。用于：① 治鼻咽癌、喉癌、肺癌、大肠癌等。治鼻咽癌可与苍耳、黄芩等伍用；喉癌与桔梗、山豆根、板蓝根、射干、玄参、山慈姑等伍用；肺癌与桔梗、重楼、鱼腥草、夏枯草、山豆根等伍用；大肠癌与白头翁、马尾连、败酱草、地榆、木香等伍用。② 食道癌、胃癌与蜣螂、苡仁、芡实等伍用，煎汤服，日服3次；③ 久咳失音配青果、麦冬、桔梗、川贝母、瓜壳、元参等煎服，日服3次；④ 久泻久痢、脱肛与炮姜、升麻、白头翁、秦皮、老鹳草同用；⑤ 胃及十二指肠溃疡与甘草、白芨等伍用。用法用量：5～9克水煎服。外邪及毒热未解者忌用，恐其恋邪。本品生用清肺，煨用涩肠，治癌证多生用，对久痢、久泻、癌性便血可煨用。

【五倍子】苦、酸、涩、平、无毒，消肿散毒、敛肺涩肠、止血杀虫。用于：① 治乳腺、宫颈、直肠、肛管等癌及皮肤癌等局部应用，与山豆根、山慈姑、全蝎为伍制丸内服可治多种癌症；② 肛管、直肠、宫颈癌等浸润转移至会阴、肛门等处，用本品、蛇床子、苦参、黄柏及清热解毒药煎水坐浴浸洗，能消肿止痛；③ 口舌生疮，疼痛难忍可用本品与冰糖各5克、冰片1克共研为细末，掺于患处疼痛立止；④ 金疮出血，本品生研为末，干布患处，稍按之血立止；⑤ 崩漏、便血与地榆、槐米同用。用法用量：内服研末，每次1～3克。亦可入丸、散剂中。

【乌梅】酸、涩、温；白梅(青梅以盐腌晒干而成，因其果肉外有析出之盐末覆其上故称白梅)酸、咸、平，消肿软坚、敛疮蚀肉、杀虫安蛔、敛肺涩肠。用于：① 食道癌、胃癌、大肠癌、宫颈癌、膀胱癌、皮肤癌、阴茎癌等，上消化道癌常

配以急性子、降香、木鳖子、半夏、硇砂等；② 乌梅、卤水，沙锅(不可用金属锅)煮沸后再以小火持续煮 20 分钟，放置 24 小时，过滤，每日服 4～6 次，治食道癌、宫颈癌、阴颈癌、皮肤癌等，同时外涂于体表肿瘤。服药期间忌酒、烟、酸辣、香燥、油炸、红糖等；③ 消渴、久痢、久咳肺虚；④ 外用治疗溃疡面之恶肉死肌及胬肉、胼胝等。用量 3～10 克，煎服。可入丸、散剂。

【山楂】酸、甘、微温，活血化瘀、消食健胃。用于：① 治食道癌、胃癌、肝癌以及老年性癌症患者；② 症瘕痞块、食积、肉积、泻痢；③ 本品能降低血中胆固醇，软化血管、扩张冠状动脉和增强心肌收缩作用，是降血脂及防治心血管病之佳品。用量 10～15 克，水煎服或入丸、散剂。

【白芨】苦、辛、微寒，凉血止血、补肺润肤、消毒敛疮，反乌头。用于：① 治肺癌咳血、食道癌、胃癌出血、宫颈癌、乳腺癌创面溃疡外用以粉掺之；② 以白芨粉与阿拉伯明胶调成糊状含咽治食道癌患者食道、气管瘘有效；③ 治疗上消化道溃疡或癌性溃疡可用本品细末冲服，每次服 3 克，日服 3 次；④ 肺结核痰中带血、硅肺(旧称矽肺)、支气管扩张、支气管炎咯血常与仙鹤草、藕节炭、大小蓟、阿胶等伍用；⑤ 消化道出血常与乌贼骨、三七粉等量研末吞服，每次服 3～5克，每日服 3～4 次；⑥ 皮肤皲裂、肛裂及外伤出血，研末掺之，或用甘油调涂患处。用法用量：10～15 克入煎剂，或入丸、散剂。外用研末。

【蝉蜕】甘、凉，疏风清热、透疹、退翳、止痉解毒。用于：① 治喉癌、鼻咽癌、甲状腺癌、肺癌等，亦用于脑癌头痛抽搐者。治喉癌配山豆根、桔梗、大力子、板蓝根、元参、金果榄、薄荷等；治鼻咽癌配重楼、苍耳、野菊花等；治甲状腺癌与蜈蚣、全蝎、僵蚕、穿山甲、夜明砂各等份研为细末，

建曲糊丸，每日服2次，每次服5克，空腹黄酒送下。胃弱及不饮酒者可在饭后用温开水送服。用法用量：6～9克，水煎服。或入丸、散剂。

【白矾】又称明矾、矾石，煅至枯干称枯矾。酸、涩、寒，燥湿杀虫、止血敛汗。用于：① 治皮肤癌、乳腺癌及体表癌肿之已破溃成恶疮者，以及膀胱癌、宫颈癌等，其水溶液作洗漱药或坐浴剂。治疗粘膜部位之炎性疾患如放疗或化疗引起的口腔炎、咽炎、阴道炎，或入熏洗坐浴中治疗肛管癌破溃成翻花疮；② 治疗瘘疮、诸溃疡、阴蚀、瘙痒、顽癣、衄血及金刃出血。为无砒枯痔液及枯痔散中的主药之一，用于治疗内痔；③ 如圣金刀散：松香210克，生矾、枯矾各45克，各研极细末和匀，撒于患处治刀伤、针后血流不止及金疮大脉已伤者其效极佳。

【斑蝥】辛、寒、有毒，破血逐瘀、攻毒蚀疮。用于：① 治食道癌、贲门癌配麝香、儿茶、三七等；② 治肝癌配半枝莲、败酱草、川楝子、丹参等；③ 斑蝥丸(《太平圣惠方》)治瘰疬、瘘生于项上、结肿有脓。本品10枚(糯米炒令米黄)、珍珠粉15克、刺猬皮(炙)45克、雄黄0.3克为细末，每服1.7克，空腹酒调下，日服二次；④ 斑蝥通经丸(《济阴纲目》方)：治经候闭塞及干血气，本品十枚(糯米炒令米黄)、桃仁49枚(炒)、大黄15克共为细末，酒糊为丸如桐子大，空腹酒下5丸，甚者10丸。如血枯经闭者用四物汤下。

据现代科学研究，本品① 抗肿瘤；② 抗肝损伤；③ 增强肌体免疫功能及发挥抗肿瘤作用；④ 可促进骨髓有核细胞DNA的合成。

【硝石】又名火硝、焰硝。苦、咸、寒、有毒，破坚散结、活血化瘀、解毒消肿。用于：① 治食道癌：硝石、硼砂、礞石、沉香、冰片，共研极细末，含咽，每隔30分钟至1小时

1次，待粘液吐尽可改为3小时1次，连服2天。食道癌全梗阻患者症状可得到改善；② 治胆结石、泌尿系统结石；③ 重舌(舌下生一小舌)：竹沥浸本品点之；④ 治内伤黄疸、女劳疸、黑疸与皂矾(烧)等量共研细末，大麦粥汁和服，日服3次，每次1克。

【雪上一枝蒿】苦、辛、温、有大毒，消炎止痛、祛风除湿。主要用于：① 止痛(晚期肿瘤疼痛、风湿痛、神经痛、牙痛、跌打损伤痛、术后疼痛、骨折、扭伤)；② 疮痒肿毒、毒蛇咬伤。内服研末，装胶囊服，每日1次，每次如米粒大1粒晚上临睡时服，服后即睡；外用：酒磨敷患处。切忌不可过量，服后24小时内忌食生冷、牛羊肉、豆类。本品大毒，极宜慎用！用量可参考《全国中草药汇编》。

七、扶正药

【人参】生晒参：甘、微苦、平；红参：甘、微苦、温。功能大补元气、补肺健脾、生津安神。① 能调节中枢神经系统的兴奋和抑制过程，改善兴奋过程，也增强抑制过程，呈双向调节作用；② 抗疲劳；③ 增强机体对有害因素的抵抗力，增强机体的特异性抵抗力，增强机体的非特异性抵抗力；④ 调整内分泌功能：兴奋垂体—肾上腺皮质系统，增强肾上腺皮质功能，提高机体对疾病的抵抗力，促进性腺作用；⑤ 调节代谢功能：降低血糖、调节胆固醇代谢、抑制高胆固醇血症的发生；改善消化吸收功能，增强食欲，促进核糖核酸及蛋白质的合成，使骨髓等处红细胞生成素的含量升高。还有明显的抗利尿作用、抗过敏作用；⑥ 增强机体免疫力，促进白细胞的生成，防治因化疗、放疗所引起的白细胞减少；能使淋巴细胞类增加，促进淋巴母细胞转化，增强网状内皮系统功能，提高免疫球蛋白生成，提高晚期肿瘤患者的细胞免疫功能。主要用于：① 肿瘤患者正气虚亏及各种癌、瘤手术后康

复期、放疗、化疗及治疗期间正气亏虚、白细胞减少时均可应用；② 重病、久病及大失血后虚脱、冷汗淋漓、肢冷、脉细弱而数，用人参 10～15 克煎服称独参汤，加附子回阳固脱称参附汤。1991 年春一港商来我处言夫人血崩，现卧床宾馆不敢稍动，否则流血加剧。时正在开会，会议由我主持无法分身，细审病情知无感冒，嘱其用红参 30 克浓煎内服。下午约两点过来电话告知，出血已微，嘱其再服 1～2 次，血即止。盖补气可以摄血也；③ 肺气亏虚、气短而喘、声低息促、行动乏力、动则气喘与核桃肉、蛤蚧同用；④ 脾气亏虚、体倦乏力、食欲不振、久泻滑脱与白茯苓、山药同用；⑤ 气血双亏、心悸自汗、失眠怔忡与当归、熟枣仁、桂圆肉同用。用法用量：3～10 克单煎服；研末服：每日 2～3 次，每次 0.5～1 克，装胶囊。有感冒及感冒咳嗽者忌用；有热象者慎用，或与生石膏之类的清热药同用。反藜芦，畏五灵脂。

【西洋参】为五加科植物西洋参的根，主产于美国、加拿大、法国，我国有引种称“种洋参”或“种参”，以第一代为佳，二代次之，三代更次之，三代以下不堪用也。味甘、微苦、性凉。功能益肺阴、清虚火、补肺降火、养胃生津、止渴。治肺胃津亏、烦渴少气、肺痿久嗽、虚热烦倦、咽干口渴。肿瘤患者气虚而有热象者用，放疗、化疗时用，余同人参。用量用法：3～6 克，水煎服，研末每次服 1～2 克，感冒及咳嗽忌用。

【黄芪】即黄耆。甘、微温，补气健脾、升阳固表、托里生肌、利尿消肿。用于：① 提高肿瘤患者的免疫功能、提高网状内皮系统的吞噬功能、增加血浆中 CAMP 的含量、提高末梢血中白细胞总数、提高淋巴细胞转化率，对正常人淋巴细胞有明显的促分裂效应，增强 T 细胞的脂酶活性，有利于恶性肿瘤患者的细胞免疫，是一种免疫促进剂；② 能加强心脏收缩、扩张血管、降低血压、改善血液循环、有明显的利尿作用；③ 对肾

炎有阻抑作用、能消灭蛋白尿；④ 肿瘤患者手术后恢复期及放疗、化疗期间以及癌症患者体虚气亏时用为扶正培本、健脾益气之主药；⑤ 脾虚气亏、倦怠乏力、全身酸软、脾虚腹泻、水肿、脱肛及中气下陷所引起的种种症状，用以升阳举陷；⑥ 表虚自汗、动则汗出(手术后常有此现象)与浮小麦、煅牡蛎同用以固表止汗；⑦ 表虚恶风汗出与防风、白术同用名玉屏风散，大儿李根在玉屏风散内加入灵芝一味，其效更佳。常用以预防感冒；⑧ 气血双亏、疮溃不收、贫血，与养血补血药同用；⑨ 肾炎水肿及蛋白尿。用法用量：生用或炙用，15～30 克，水煎服或入丸、散剂。用以降压用量应在 30 克以上。

【太子参】功能与人参同而力弱，不受红参、党参之温补者用之。用量 15～30 克，亦入丸、散剂。

【党参】功与人参同而力弱，且性温，有热者不宜。用量与太子参同。

【五味子】酸、温，敛肺固肾、止汗生津、宁心安神。用于肿瘤患者体虚多汗、口干脉弱，特别是肺肿瘤手术切除后的患者、或肺虚喘咳患者、或放疗或化疗后出现气阴两虚时与人参、麦冬组成生脉散以益气养阴。亦可用作肿瘤患者之康复强壮剂。对于肝炎患者或化疗后引起的血清谷丙转氨酶增高，五味子粉冲服有降酶作用。本品有敛肺而生肾水、益气生津、补虚明目、涩精强阴之功。用量 6～9 克水煎服。并入丸、散剂。

【枸杞子】甘、平，滋肾补血、养肝明目。用于肿瘤患者血虚阴亏、头昏眼花等症。贫血、血色素低或因放疗、化疗引起的白细胞减少等与大枣伍用，煎汤代茶饮。本品常用于白细胞减少症、糖尿病、视力模糊及肾虚腰酸等症。其根皮为地骨皮，甘、淡、寒，有清热凉血退虚热之功，常用于肺癌有阴虚血热者。常用量：枸杞子 10～20 克，地骨皮 15～30 克。

【菟丝子】辛、甘、温，滋补肝肾、益精明目。用于：① 白

细胞减少症，防治放疗、化疗所致之白细胞减少，可与枸杞子、女贞子、枣皮(山萸肉)、鸡血藤伍用；② 肾虚腰膝酸软、遗尿、尿频、耳鸣等与金樱子、枸杞子、益智仁等伍用；③ 视力减退、头晕眼花与沙苑子、枸杞子、女贞子伍用。本品为平补阴阳之品，补而不腻不燥，肾阳虚或肾阴虚均可应用。常用量 10～15 克。

【玉竹】甘、平、微寒，养阴润燥、生津止渴。主要用于：① 各种癌证患者因放疗后出现阴亏津涸症候、化疗后气阴两虚者；② 治各种癌证、恶性淋巴瘤等阴液匮乏者；③ 能促进淋巴细胞转化、增强网状内皮系统吞噬功能、增强和调动机体免疫能力而抑制肿瘤；④ 有强心和轻度降低血压及抑菌作用；⑤ 热病伤阴、咳嗽、烦渴、口干、纳差、舌质光红无苔等肺、胃阴伤之症。常用量 10～20 克。

【百合】甘、平，润肺止咳、清热安神。用于：① 肺癌咳嗽、痰中带血、舌红少苔、脉细数等肺阴不足之症；② 治恶性淋巴瘤、白血病及肿瘤患者心烦失眠；③ 肺热肺燥、热病后余热未清、虚烦不寐等。常用量 15～30 克，水煎服或煮粥食。同盐捣如泥外敷治疮肿。亦入丸、散剂。

【冬虫夏草】甘、平(一说甘、温)，补肺益肾、化痰、止咳。用于：① 肺癌、肺转移癌、晚期恶性肿瘤；② 肾虚阳痿遗精、腰膝酸痛、久病虚弱、久咳虚喘、劳嗽痰血、自汗、盗汗，秘精益气，专补命门；③ 治慢性肾功能衰竭，可使蛋白尿转阴。治疗心率失常，预防习惯性感冒；④ 配黄芪治贫血、病后虚弱；配枸杞子治肾虚腰痛；配黄芪、胡桃肉治肺肾两虚、喘咳短气；配海狗肾、鲍鱼治阳痿、遗精；治肺结核本品与精肉或鸭肉同煮食；⑤ 免疫功能低下者，本品水煎服，或研末吞服；⑥ 治哮喘，本品研末服，日服 2 次。

【仙灵脾】即淫羊藿的全草。辛、温，补肾壮阳、强筋壮骨。用于：① 促进淋巴母细胞的转化作用，提高 T 细胞比值，

增强白细胞及巨噬细胞的吞噬活性，因而提高肿瘤患者的免疫功能；② 肾虚阳痿、遗精早泄、肢冷怕凉、腰腿酸软；③ 骨节酸痛、肢麻拘挛；④ 防治化疗引起的髓抑制和免疫抑制；⑤ 本品之提取物有雄性激素样作用，能促进精液分泌，并有抗病毒及抑菌作用。常用量 8～10 克，水煎服。

【补骨脂】即破故纸。辛、苦、温，补肾壮阳、暖脾止泻。用于：① 治骨肉瘤、脑瘤、肾癌及骨转移癌。对于因放疗、化疗后血象下降，白细胞减少有提升作用；② 脾虚肾亏之五更泻泄配肉蔻、五味子、吴茱萸名四神丸，服之甚效；③ 白癜风：酒精浸泡，局部涂搽。常用量 6～10 克。

【山茱萸】即枣皮。酸涩、微温，补肝肾、涩精气、强阴助阳、安五脏、通九窍、敛汗。用于：① 肿瘤患者肝肾不足之头晕、耳鸣、目眩、腰酸等，常与熟地、枸杞子合用；② 放疗、化疗后白细胞减少症配女贞子、鸡血藤同用；③ 转移性肝癌时的盗汗、虚汗不止与煅龙骨、煅牡蛎、浮小麦等同用。常用量 10～15 克，敛汗可用至 30 克。

【女贞子】甘、苦、凉，滋补肝肾、明目乌发。用于：① 放疗、化疗引起的白细胞减少有提升和保护作用；② 可试用于肾癌、骨癌、脑癌、白血病；③ 肝肾阴虚所致之头晕、耳鸣、腰膝酸软、目眩眼花、须发早白等。本品性凉，有润肠缓泻作用。用量 15～30 克，脾虚便溏者慎用。

【龟版】甘、咸、寒，滋阴益肾、退蒸。用于：① 肿瘤患者阴虚血少伴有痞块者；② 阴虚内热、或阴虚阳亢、或热病伤阴等与生地、鳖甲、生牡蛎同用；③ 龟版胶用于阴血亏少、贫血、崩漏、或血小板减少、白细胞减少等症。常用量 15～30 克。

【鳖甲】咸、平，滋阴潜阳、软坚散结。用于① 癌症患者有阴虚低热者；② 症瘕、疟母、肝脾肿大；③ 阴虚内热、盗汗贫血、血小板减少等症。常用量 10～15 克，水煎服。

【鸡血藤】又名大血藤、过江龙。甘、平、微温，补血活血、舒筋通络。用于：① 放疗、化疗后引起的白细胞减少症；② 贫血及再生障碍性贫血；③ 治风湿痹痛，平素气血虚弱而患有慢性风湿的老人和妇女最适用；④ 治老人手脚萎弱、麻木瘫痪、眩晕，由血脉瘀滞、类中风(包括脑血管意外)引起者，可在病情稳定期用本品调补气血、行滞活络；⑤ 肿瘤患者在放疗、化疗中引起的白细胞减少，收效迅速而持久，用后3至4天即见白细胞开始回升。可用本品30克，黄芪15克，大枣5个，水煎服；⑥ 月经不调、经闭腹痛，由血虚引起者常配四物汤同服。常用量15～60克。

【灵芝】滋补强壮、止咳平喘。用于：① 抗癌。破壁灵芝孢子粉、灵芝孢子油单用或与其他抗癌药配伍运用；② 高血压、冠心病、高血脂症。对降低甘油三酯有较好疗效；③ 肿瘤患者手术或放疗后气虚体弱，食欲不振；④ 治疗各种原因引起的白细胞减少症；⑤ 对白细胞免疫及体液免疫均有增强作用。还能改善肾上腺皮质功能，使尿中17—羟皮质类固醇含量增高。对变态反应有显著抑制作用，增强中枢神经系统功能；⑥ 对神经衰弱、失眠、消化不良、虚劳、气喘、咳嗽、耳聋等有一定疗效；⑦ 治慢性肝炎、慢性气管炎、过敏性哮喘及鼻炎；⑧ 本品配鸡血藤、石菖蒲、田七治动脉硬化、高血压、脑血管意外等；⑨ 本品15克南、北沙参各10克百合15克治慢性支气管炎；⑩ 配五倍子、党参、白术治胃溃疡；⑪ 配山萸肉、柏子仁、远志治神经衰弱；⑫ 配甘草、生姜、大枣治各种菌类中毒；⑬ 灵芝、山萸肉、柏子仁、泽泻、党参、麦冬、远志、五味子、木香研末蜜丸，每日早晚服治心悸、失眠、虚咳气喘、神经衰弱。常用量6～15克，水煎服。入丸、散剂。

【银耳】甘、平，补肺益气、养阴润燥。用于：① 治肺

癌、胃癌、肝癌、白血病等，特别适用于癌证患者身体虚弱及放疗、化疗后气阴两伤者与西洋参伍用，补气生津；② 虚劳咳嗽、痰中带血、肺燥、肺痿。常用量 5～10 克，加冰糖炖服。

【紫河车】甘、咸、温，大补气血、益精填髓。用于：① 晚期癌证患者气虚血亏、正气大伤者；癌证患者贫血、恶病质；放疗、化疗所致之贫血及白细胞减少症；② 各种劳损、虚弱，尤其气虚、血虚、咳喘；③ 肺结核、神经衰弱、支气管哮喘、老年慢性气管炎，但要长期服用方有效。一般单用为主，每日服 2～3 次，每次服 3～5 克。对贫血患者用本品 1.5 克、太子参(或党参)细末 3 克冲服，每日服 3 次，效佳，用人参更妙。老弱可用河车大造丸：紫河车、大云、生熟地、天冬、黄柏、五味子、锁阳、当归、枸杞子、杜仲，可加人参，研末蜜丸，早晚各服 9 克，空腹白开水下。

【鱼鳔胶】甘、平，补肾益精、滋养筋脉、止血散瘀、消肿、抗癌。用于：① 治恶性肿瘤：本品研细末，每日服 3 次，每次服 6 克，温开水送服；② 治男子精少不育：本品合菟丝子、人参、麦冬、大云、枣皮、怀山药、熟地、桑椹子、鹿茸、龟胶、枸杞子、当归、北五味子、紫河车、柏子仁，共为细末，炼蜜为丸。每次服 15 克，每日服 2 次；③ 治再生障碍性贫血：本品合桂枝、党参、白术、当归、麦冬、熟地、茯苓、枸杞子、丹参、炙甘草、陈皮、三棱、半夏、贝母，水煎服；④ 腰腿痛日久不愈：本品合牛膝、当归、杜仲、川续断、木瓜，共为细末，炼蜜为丸，每丸重 10 克。每日服 3 次，每次服 1 丸，黄酒送服。亦可作散剂，每次服 6 克。

制法：用蛤粉拌炒，每 5 克用蛤粉 1.25 克，先将蛤粉放铁锅内炒热，再将鱼鳔倒入，文火拌炒至松泡为度，取出，筛去蛤粉即成。用法：入丸、散剂，不入煎剂。