

百病独特疗法丛书

百病熏洗疗法

主编 黄亦琦
编者 李凤仙 李艳彦
黄亦琦 王秀根



0105438

山西科学技术出版社

00362401

百病熏洗疗法

主编 黄亦琦

*

山西科学技术出版社出版 (太原并州北路69号)

山西省新华书店发行 太原千峰科技印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/32 印张:12 字数:252千字

1997年2月第1版 1997年2月太原第1次印刷

印数:1—5000册

*

ISBN 7-5377-1302-2

R·518 定价:13.00元



0105438

107104

内容提要

本书系统介绍了熏洗疗法的发展概况、作用机理、各科治疗和具体操作方法等；对熏洗常用中草药、古今熏洗名方进行了归纳整理；重点介绍了皮肤、外、骨伤、妇、五官、内、儿、男、性病科 186 种疾病的熏洗特效方法。所录处方药味精练、疗效显著，每一处方内容包括组成、用法和主治等。

本书内容丰富，简明实用。既可供广大中医药工作者参考使用，也可用于患者自疗和家庭保健。

10496800

前 言

熏洗疗法是一种古老而有效的治疗方法,具有疗效显著、操作简便、经济实用、适用面广、安全可靠之特点,因而深受历代医家的普遍重视而广为采用,也是广大患者喜爱和乐于接受的治疗方法之一。

随着人们对中医外治法的普遍重视和研究的不断深入,熏洗疗法的应用范围更为广泛,涌现出了很多新技术、新成果。为了使熏洗疗法更好地得到推广应用,我们对该法作了较全面地阐述和系统地整理。本书将 69 味熏洗常用中草药分为清热解毒药、活血化瘀药、燥湿杀虫药、祛风通络药、生肌收口药、解毒散风药、麻醉止痛药七类加以介绍,对每味药在熏洗治疗中的适应症进行了总结。并特别介绍了熏洗经典方和各科有代表性的验方共 92 首。

我们结合多年在山西省中医药研究院从事中医外治临床工作的经验体会,广泛收集和整理了古代医学书籍和现代期刊杂志中熏洗治疗各科疾病行之有效的秘验单方并加以精选,所选处方药味精练而实用,且经临床一再验证确有良效者方予录用。

本书重点介绍了皮肤科、外科、骨伤科、妇科、五官科、内科、儿科、男科和性病科计 9 科 186 种疾病的熏洗治疗方法。

大多数病后列有数方,可供临床辨证选择之用;每方按组成、用法、主治排列,临床十分实用。

由于作者水平、时间所限,书中难免存在错误和不足之处,望读者不吝指正。

编者

目 录

第一章 熏洗疗法概论	1
一、熏洗疗法发展概况	1
二、熏洗疗法的作用机理与特点	3
三、熏洗疗法的分类方法	5
四、熏洗疗法的操作过程	9
第二章 熏洗常用中草药	13
一、清热解毒药.....	13
二、活血化瘀药.....	16
三、燥湿杀虫药.....	18
四、祛风通络药.....	22
五、生肌收口药.....	24
六、解表散风药.....	26
七、麻醉止痛药.....	29
第三章 古今熏洗名方	32
一、皮肤科病证方.....	32
二、外科病证方.....	42
三、肛肠科病证方.....	50
四、妇科病证方.....	52
五、五官科病证方.....	55

六、骨科病证方·····	57
七、内科病证方·····	58
八、儿科病证方·····	59
第四章 皮肤科疾病 ·····	61
一、斑秃、全秃·····	62
二、脂溢性脱发·····	63
三、白发、黄发·····	65
四、皮脂溢出·····	66
五、脂溢性皮炎·····	70
六、颜面春季皮炎·····	72
七、类固醇激素皮炎·····	73
八、急性湿疹·····	74
九、慢性湿疹·····	76
十、酒糟鼻·····	78
十一、痤疮·····	78
十二、扁平疣·····	81
十三、寻常疣·····	83
十四、黄褐斑·····	84
十五、黑变病·····	86
十六、掌跖脓疱病·····	87
十七、银屑病·····	89
十八、神经性皮炎·····	92
十九、皮肤瘙痒症·····	94
二十、痒疹·····	96
二十一、荨麻疹·····	97
二十二、丘疹性荨麻疹·····	101

二十三、手、足、甲癣	103
二十四、体癣、股癣	108
二十五、头癣	110
二十六、手足皲裂症	112
二十七、汗疱疹	114
二十八、硬皮病	115
二十九、疥疮	118
三十、连续性肢端皮炎	121
三十一、结节性红斑	122
三十二、脓疱病	123
三十三、多汗症、臭汗症	126
三十四、皮肤淀粉样变	128
三十五、夏季皮炎	129
三十六、痒子(红痒)	130
三十七、剥脱性角质松懈	132
三十八、肉刺(逆剥)	133
三十九、鸡眼、胼胝	133
四十、粘膜白斑	134
第五章 外科疾病	136
一、疖肿	137
二、痈	139
三、丹毒	141
四、急性蜂窝组织炎	143
五、急性乳腺炎	144
六、急性淋巴管炎	146
七、急性淋巴结炎	147

八、化脓性指头炎	149
九、甲沟炎	150
十、血栓性静脉炎	151
十一、血栓性闭塞性脉管炎(脱疽)	153
十二、下肢慢性溃疡	156
十三、烧伤	157
十四、象皮肿	159
十五、冻疮	160
十六、褥疮	163
十七、痔	164
十八、肛裂	168
十九、肛门直肠周围脓肿	169
二十、脱肛(直肠脱垂)	170
第六章 骨伤科疾病	174
一、骨折	175
二、脱臼	177
三、软组织损伤	178
四、颈椎病	181
五、网球肘	182
六、腱鞘炎	183
七、急性化脓性腱鞘炎	185
八、腰肌劳损	186
九、踝关节扭伤	186
十、跌打损伤	188
十一、外伤血肿	189
十二、外伤疼痛	191

十三、化脓性骨髓炎	192
十四、足跟骨刺	193
第七章 妇科疾病	196
一、阴道炎	197
二、宫颈炎	203
三、盆腔炎	204
四、宫颈糜烂	205
五、女阴湿疹	207
六、阴痒	207
七、阴疮	218
八、带下病	219
九、经行风疹	224
十、经后尿感	225
十一、崩漏	225
十二、闭经	226
十三、妊娠肿胀	227
十四、妊娠皮肤瘙痒	227
十五、难产	228
十六、产后胞衣不下	228
十七、产后玉门不闭	229
十八、产后缺乳	229
十九、产后身痛	230
二十、乳痈	231
二十一、乳头皲裂	232
二十二、阴痛	232
二十三、阴吹	234

二十四、阴肿	235
二十五、阴道挛缩	236
二十六、会阴侧切硬结	237
二十七、不孕症	238
二十八、子宫脱垂(阴挺)	239
二十九、外阴白斑	245
第八章 五官科疾病	249
一、角膜炎	250
二、急性结膜炎	252
三、睑缘炎	253
四、麦粒肿	257
五、沙眼	258
六、翼状胬肉	260
七、老年性白内障	261
八、外耳道炎及外耳道疳	262
九、耳部湿疹	263
十、急性鼻炎	264
十一、慢性鼻炎	265
十二、鼻前庭炎和鼻疖	267
十三、鼻息肉	268
十四、急性咽炎	269
十五、慢性咽炎	270
十六、口疮(阿费他口炎)	271
十七、剥脱性唇炎	272
十八、急性根端周围炎	273
十九、牙周炎	274

二十、口臭	276
第九章 内科疾病	278
一、感冒	278
二、外感高热	280
三、支气管哮喘	281
四、腹痛	282
五、便秘	282
六、呕吐	284
七、泄泻	284
八、痢疾	286
九、黄疸	287
十、腹胀	288
十一、水肿	288
十二、淋证	290
十三、癃闭	291
十四、关格	293
十五、痛风	294
十六、尿血	295
十七、紫癜	296
十八、头痛	296
十九、眩晕	299
二十、失眠	300
二十一、高血压病	300
二十二、中风	302
二十三、面神经麻痹	303
二十四、麻木	304

二十五、红斑性肢痛病	305
二十六、雷诺氏病	306
二十七、癲狂	307
二十八、厥证	308
二十九、痹证	308
三十、盗汗	311
第十章 儿科疾病	313
一、小儿感冒	314
二、麻疹	315
三、惊风	318
四、小儿腹泻	319
五、流涎	321
六、小儿汗证	321
七、小儿蛲虫证	322
八、小儿麻痹证	323
九、水痘	325
十、小儿湿疹	327
十一、小儿风疹	329
十二、小儿丹毒	330
十三、鹅口疮	331
十四、口吻疮	331
十五、尿布皮炎	332
十六、胎黄	333
十七、小儿疝气	334
十八、小儿鞘膜积液	335
第十一章 男科疾病	338

一、阴茎头包皮炎	338
二、阳强	341
三、睾丸炎	342
四、阴囊湿疹	344
五、阴囊鞘膜积液	247
六、前列腺炎	348
七、前列腺肥大	349
八、阳痿	350
九、遗精	351
十、早泄	353
十一、疝气	354
第十二章 性传播疾病	356
一、阴虱	357
二、生殖器疱疹	359
三、软下疳	360
四、尖锐湿疣	361
五、淋病	364
六、梅毒	366
参考文献	368

第一章 熏洗疗法概论

熏洗疗法是用药物煎汤，趁热在皮肤或患部进行熏蒸、淋洗和浸浴的一种治疗方法。它属中医外治法之一，是祖国医学的重要组成部分。熏洗疗法在中医外治法中占有很重要的地位，受到历代医家普遍重视并广泛使用。

熏洗疗法借助药力和热力的综合作用，促进腠理疏通、气血流畅，改善局部营养和全身机能，具有清热解毒，消肿止痛，祛风止痒，拔毒祛腐等作用。该法不但能治疗皮肤科、外伤科疾患，而且对很多内、妇、儿、五官等科疾病也有很好的疗效。

一、熏洗疗法发展概况

熏洗疗法在我国有着悠久的历史，早在《内经》中已有用热汤洗浴、熨熨和浴法治病的记载。此外，《礼记》中也有“头有疮则沐，身有疡则浴”的说法。马王堆出土的《五十二病方》亦有用雷丸水煎洗浴治“婴儿病痢”的记载。

熏洗疗法到了东汉时期有了很大的发展，临床上已广泛应用。如张仲景在《金匱要略》中就有用苦参汤熏洗治疗狐惑病蚀于下部的记载。到了唐代熏洗疗法在临床上的应用更加

广泛,如孙思邈的《千金要方》、《千金翼方》和王焘的《外台秘要》,都有熏洗疗法的记载,尤其对妇科、儿科和眼科疾病应用最广。金元时代,齐德之在《外科精义》中进一步总结了前人应用熏洗疗法的经验,介绍了“汤渍疮肿法”,阐述了熏洗疗法的种类、操作方法和作用原理。

到了明代,熏洗疗法又有了更进一步的发展,引起医家的普遍重视。如陈实功的《外科正宗》、王肯堂的《证治准绳》、张介宾的《景岳全书》、申斗垣的《外科启玄》等著作,对熏洗疗法的使用方法、作用原理和临床治疗疾病的种类均有较详细的记载,已逐渐成为一种比较完整的治疗方法。

至清代熏洗疗法逐渐成熟。嘉庆年间问世的《急救广生集》,系作者程鹏集清以前历代外治疗法之大成,博收约取,汇萃精要而成。该书共10卷,收病证约400余种,载方1500余首。特别是清末吴师机,精心研究前贤外治经验,并结合自己丰富的临床经验,对外治法进行了系统地整理和理论探索,历时数10载,终于著成举世闻名的《理渝骈文》一书,被后世尊为“外治之宗”。该书收录外治方法近100种,载方1500余首,治病范围遍及内、外、妇、儿、皮肤、五官各科,并提出了“外治之理,即内治之理”的观点,对外治法的临床实践有着重要的指导意义。

1949年以后,由于社会的发展,科技的进步,使熏洗疗法这一传统分支学科有了更进一步的发展。60年代尚德俊教授编著的《熏洗疗法》一书,首次对熏洗疗法进行了较全面的整理和论述。随着中医外治法研究的不断深入与普及,应用熏洗疗法的研究成果不断涌现,对熏洗疗法进行较全面整理和论述的专著陆续问世。这些对提高熏洗疗法的疗效及对该法的

推广应用,起到了积极的促进作用。

二、熏洗疗法的作用机理与特点

(一)作用机理

熏洗疗法是借药物、温度和机械的作用来治疗疾病。其作用机理可分为直接作用和间接作用。

1. 直接作用:直接作用是指药物经熏洗,透过皮肤孔隙、腧穴等部位,深入腠理、脏腑各部位,直接吸收,输布全身,以发挥其药效的作用。药物直接接触病灶,能起到清热解毒,消肿止痛,祛风止痒,拔毒祛腐等作用。用于治疗体表的疹、癣、疥等皮肤病和疮疡肿毒、软组织损伤等外伤科疾病,其效果显著,奏效迅捷。

现代药理学认为直接作用可使中药化学成分刺激皮肤感受器,发挥某些化学作用。也可使药物渗透、吸收和经络传布,使药物归经,达到“以气调气”的作用,实际上可起到与内服药同样的效果。

2. 间接作用:间接作用是指在熏洗过程中,通过温热、按摩等刺激,对经络系统进行调节,从而起到通经活络,祛邪扶正,协调阴阳的作用。

大量的临床观察和实验研究表明,当利用药汤趁热在皮肤或患部熏洗时,由于温热刺激,引起皮肤和患部的血管扩张,加速局部和周身的血液和淋巴循环,除了促进药物发挥直接治疗作用外,还能使新陈代谢旺盛,改善局部组织营养和全

身机能,同时又能刺激皮肤的末梢感受器,通过神经系统,形成新的反射,从而破坏了原有的病理反射,达到治愈疾病的目的。

(二)熏洗疗法的特点

1. 适应面广,疗效独特:目前临床应用熏洗疗法可治疗数百种疾病,往往应用内服药物和其它疗法疗效不满意时,使用该法有独特的治疗功效。故《理渝骈文》认为外治可“与内治并行,而能补内治之不及”。特别是皮肤科、外伤科、妇科、眼科的应用最为普遍。随着熏洗疗法的不断普及和推广,其治疗范围将更加广泛。

2. 直达病所,奏效迅捷:熏洗施于局部组织内的药物浓度显著高于血液浓度,故发挥作用充分,局部疗效明显优于内治,往往能直达病所,奏效迅捷。尤其是对皮肤科、外科等外部疾患,能起到内服药物难以取得的理想疗效,如皮肤瘙痒症、神经性皮炎、脂溢性皮炎、手足癣、湿疹、疖痈、痔、软组织损伤、阴道炎等疾病,用熏洗疗法均有显著疗效。熏洗疗法一般治疗1~3次即可获显效或痊愈,即使重症,只要坚持用药亦可取得良效。

3. 安全可靠,副作用小:由于熏洗疗法是一种施于体表的外治法,可随时观察其适应和耐受情况而决定药物加减去留。内服之药,用药稍有不慎易生它变,而本法即使用药稍有不妥,也易于处理。正如《理渝骈文》所说:外治法治而不效,亦可造成坏症,犹另易它药可收效,倘若内服不当则有贻误病机之弊。另外,熏洗疗法往往采用患病局部、相邻病位以及关系密切部位施药,在局部形成较高的药物浓度,而血中药物浓度甚

微。因熏洗疗法兼有药力作用和热力刺激，很多疾病所需药量远小于内服药量。故一般说来熏洗疗法是比较安全可靠的，很少发生毒副作用，因而患者乐于接受。

4. 操作简便，易于推广：熏洗疗法操作技术简便，不需要特殊的医疗设备，不论在城市、农村、工矿、山区都可以推广应用。本法一讲就懂，一看便会，不论是否医务工作者，只要掌握了常用药物和熏洗方剂的治疗作用及应用范围，就可用于临床治疗。本法医者可用以治人，病者亦可用以治己。

5. 取材容易，经济实用：熏洗多采用简单的器具，如火炉、砂锅、浴盆、毛巾等等；用药多是临床常用的中草药，药源广而价廉。一些常用药物可以就地采集，方便省钱，如夏季取新鲜蒲公英、马齿苋煎汤熏洗，可治疗皮科、外科、妇科的多种感染性疾病。

三、熏洗疗法的分类

（一）熏洗法

熏洗法是用药物煎汤趁热先在患处熏蒸，待温后再淋洗和浸浴。本法因有药力和热力的协同作用，能促使腠理疏通，气血流畅，改善局部营养和全身机能，具有解毒消肿，止痛，止痒，祛风等功效。

1. 全身熏洗法：将药物剂量加倍煎汤，倒入浴盆里，进行全身沐浴。或把煎好的药液倒入大水缸或大木桶内，里边放一小木凳，小木凳要高出水面9厘米左右，患者蹲坐在小木凳

上,用布单或毯子从上面将木桶(或水缸)及患者盖住,勿使热气外泄,仅露头部在外面,这样借药物蒸气徐徐熏蒸。待药液不烫手时,可取出小凳,患者再浸于药液内进行沐浴,以出汗为度。熏洗完毕后,速用干毛巾拭去身上的药水或汗液,用浴巾盖住身躯安静卧床休息,如能稍睡片刻更好,待汗消以后再换穿衣服。全身熏洗法主要用于全身性皮肤病等疾患。

2. 局部熏洗法:局部熏洗法根据熏洗法的部位不同,又分为手熏洗法、足熏洗法、眼熏洗法、坐浴法四种。

(1)手熏洗法:可用洗脸盆或小木盆,把煎好的药液趁热倒入盆中,将患手架于盆上,以布单或毛巾将手及盆口盖严密,勿使热气外泄,进行熏蒸。待药液不烫手后,再把患手或腕部(或前臂)浸于药液中进行洗浴。

(2)足熏洗法:把煎好的药液倒入木桶内,桶内放置一小木凳,小木凳略高出水面,患者坐下,将患足放在桶内小木凳上,用布单将腿及桶口盖严实,进行熏蒸,待药液不烫手时,取出桶内小木凳,再把患足及小腿浸于药液中进行浸泡。

(3)眼熏洗法:将煎好的药液趁热倒入搪瓷脸盆中(脸盆放置于桌面上),患者向前低头,微微弯腰,使患病局部倾向药汤盆前,两眼紧闭。同时用布单将头部及脸盆围盖严密(如觉憋气,可稍留一条缝),勿使热气外泄,以借药物蒸气熏洗。待药汤不烫手后,揭去布单,用消毒棉花或纱布蘸药汤频频淋洗患眼,或将药液倒入洗眼杯进行洗眼。在进行洗眼前,患者应先低头把杯口紧扣患眼之上,随即紧持洗眼杯随即抬头,药汤即与眼部接触,借助上下眼睑开合活动及眼球转动,使药液直接进入眼内。如患眼分泌物过多,应不断更新药液,做多次洗浴。

(4)坐浴法:可用搪瓷脸盆或椭圆形坐浴盆,把煎好的药液趁热倒入盆中,于盆上放置带孔横木架,使患者暴露臀部坐在木架上进行熏洗。待药汤不烫手时,拿掉盆上的横木架,将肛门、会阴部及臀部浸于盆中泡洗。也可用坐浴椅,先把盆放在椅子下进行熏洗,后将盆移至椅子上再坐浴浸泡。坐浴法主要用于肛门及会阴部的疾患。

(二)洗浴法

洗浴法:是用药物煎汤洗浴,以治疗疾病的方法。具体又分为沐浴、浸洗、淋洗三法。

1. 沐浴法:用药物煎汤,然后取药液加入沐浴用的热水中,趁热遍洗头部和周身,称之为沐浴法(相当于药浴法)。一般每日洗1~2次。张仲景在《金匱要略》中明确记述了沐浴法,开了沐浴疗法之先河。吴师机在《理渝骈文》中就有沐浴方10余首。本法是借浴水的温热之力及药物本身的功效,使周身血脉疏通,毛窍开放,从而起到发汗退热,祛风除湿,温经散寒,疏通经络,调和气血,消肿止痛,祛瘀生新等作用。

2. 浸洗法:将药物煎汤,去渣取液,然后将患处或特定部位在此药液中浸洗,以达到治疗效果的方法,称为浸洗法。一般每天浸洗1~2次,每次浸洗30~60分钟。使用本法可使药液较长时间地作用于患部皮肤,并趁药液的荡涤之力而发挥清热解毒,祛风,杀虫止痒,软化角质,祛腐生肌等效力。由于浸泡时间较长,药物还可通过皮毛、腧穴,由表入里,循经内传,以调节人体气血阴阳,扶正祛邪。

3. 淋洗法:将药物煎汤去渣,趁热把药水装入带细眼的小喷壶内,不断地淋洗患处的方法称为淋洗法。一般每日淋洗2

次,每次可重复 2~3 遍。本法的作用机理是利用喷洒时药液的刺激和冲洗作用,促使局部经络疏通,气血流畅,并能祛除秽物,达到解毒消肿,散瘀止痛,洁净疮口的目的。

(三)热罨法

热罨法是用一定温度的热水袋或湿热布敷于病变部位,以治疗疾病的方法。本法借助湿热之力,作用于局部皮毛、经穴,以疏通经络,调畅气血,解毒消肿,散结止痛,从而达到治疗目的。由于患病部位不同,治疗应用时有以下几种方法:

1. 将煎好的药汤趁热倒入盆内,用消毒纱布七八层或干净软布数层蘸药汤趁热摊放患处,另用一块消毒纱布不断地蘸药汤淋漓患处,使摊敷在患处的纱布层得以保持一定的湿热度,持续淋漓热罨。

2. 将煎好的药汤趁热倒在盆内,用消毒纱布或软布蘸药汤后,稍微拧一下,再折叠数层,趁热敷在患处,两手轻轻旋按片刻,稍凉再换,如此持续操作。

3. 手足部疾患换药时,已包扎好敷料者,可以不解去敷料,将患部直接浸入药汤内,每次约 1 小时左右取出,让其自干,每日可浸三四次。

4. 将药物研成粗末装入布袋内,扎紧袋口,放入搪瓷盆内加水煎汤,趁热熏洗,并取出药袋趁热在患处进行湿热敷,这样熏洗与热罨连续交替应用。

热罨法主要用于软组织损伤,以及骨折临床愈合后肢体功能障碍者,也适用于疖、痈等急性化脓性感染性疾病还未溃破者,但用时应注意消毒灭菌。

四、熏洗疗法的操作方法

(一)熏洗疗法常用的器具

1. 浴盆：全身熏洗用。
2. 木桶：大木桶用于全身熏洗，小木桶用于四肢手足熏洗。
3. 水缸：没有浴盆、木桶时，可以家用的水缸代替。
4. 脸盆：即日常用的搪瓷脸盆，作为头面部、四肢、手足部熏洗用，也可坐浴用。
5. 小喷壶：淋洗患处用。
6. 洗眼杯：眼部疾病洗浴时用。
7. 电炉或火炉：加热煎煮药物用。
8. 砂锅或搪瓷锅：盛置药汤用。
9. 小木凳或木架：熏洗时放置患肢用。
10. 纱布垫：热敷患部用。
11. 毛巾或软布：用于蘸药汤溻渍淋洗患部，或熏洗后擦干身体。
12. 毛巾被或毯子：在熏洗时，围着浴盆，不使药物蒸气外泄。
13. 消毒换药设备：消毒纱布、干棉球、碘酒、酒精、红汞、龙胆紫、消毒镊子、换药碗以及常用的中药膏、散等，待伤口熏洗完毕后换药用。

(二)熏洗前的准备

1. 熏洗前应先向患者说明熏洗疗法的优点、操作方法及注意事项,使患者对熏洗疗法有正确的认识,以便充分调动患者的积极性,并与医务人员密切配合,坚持治疗。

2. 熏洗前将所用的器械、物品准备齐全。在冬季熏洗时,应注意保暖,如房间无暖气设备时,应事先生好火炉取暖。将药物用纱布包扎好,放入砂锅或脸盆内,加水煮沸 20~30 分钟,或煎好药汤后过滤去渣。药汤的多少应视熏洗的部位而定,局部熏洗所用药汤量较少,全身熏洗药汤量就要多些。

3. 熏洗部位有伤口时,应事先做好换药的准备工作。患者的两手和患部,在熏洗前应先用温开水洗干净,然后进行熏洗。洗浴前应嘱患者排除大小便,以免在洗浴过程中排便。

(三)操作程序

1. 将煎好的药汤倒入浴盆或木桶内,先进行熏蒸,待药汤不烫人时,再浸洗患部。若熏洗伤口,应先取下伤口处的敷料,按换药方法擦净伤口,再进行熏洗。

2. 根据患者的病情和发病部位的不同,可采用熏洗、洗浴和热奄等不同方法进行熏洗。熏洗伤口时,浴盆及其它用具均须无菌,并注意保持无菌操作,不要用手接触敷料和伤口。

3. 熏洗完毕后,用干毛巾擦干患部或全身,如为全身沐浴则应换穿干净衣服,盖好被子卧床休息 30 分钟。如有外伤,熏洗完毕后,应用消毒纱布擦干患处,根据伤口情况进行换药。

4. 最后清理用物,将浴盆、木盆、纱布垫等洗净擦干或晾干,放置整齐,以备下次应用。

(四)治疗的时间与疗程

临床上应用熏洗疗法,一般每日2次,每次1~2小时为宜;以15~30天为1个疗程。如进行全身熏洗时,每日可用2剂药煎汤洗浴,洗浴的时间可适当延长,以全身发汗,并有舒适感为度。

(五)熏洗时注意事项

1. 冬季熏洗时,应注意保暖,夏季要避风。全身熏洗后皮肤毛细血管扩张,血液循环旺盛,全身微热出汗,必须待汗止并穿好衣服后再外出,以免感受风寒,引起感冒等病证。

2. 药汤温度要适宜,不可太热,以免烫伤皮肤,也不可太冷而影响疗效,甚至产生不良刺激。要根据年龄、病情、部位具体而定,一般以不烫手或能耐受而定。如果熏洗时间较久,药汤变凉时,须再加热。只有持续温热熏洗,才能收到良好的治疗效果。

3. 夏季要当日煎汤当日使用,煎汤不可过夜,以免发霉变质,影响治疗效果和发生不良反应。

4. 在全身熏洗过程中,如患者感到头晕不适,应停止洗浴,卧床休息。

5. 应随时注意病情变化,如熏洗无效或病情反而加重者,则应停止熏洗,改用其它方法治疗。有效则应坚持用药,切忌用用停停,影响疗效。

6. 临证选方用药熏洗,亦要辨证论治,才能收效显著。此外还要根据施治部位用药,如头面部不宜选用刺激性太强的药物,以免发泡而损伤皮肤。

(六)熏洗疗法的禁忌症

1. 急性传染病、重症心脏病、高血压病、脑动脉硬化症、肾脏病等，均忌用洗浴。
2. 妇女妊娠及月经期间，均不宜进行洗浴或坐浴。
3. 饱食、饥饿，以及过度疲劳时，均不宜洗浴。

第二章 熏洗常用中草药

一、清热解毒药

清热解毒药具有清热解毒，消肿止痛，消炎杀菌，祛腐生肌等作用。临床(熏洗)应用于一切急性化脓性感染性疾病，初期红肿热痛或破溃有坏死组织及脓性分泌物者。

(一)黄芩

黄芩性味苦寒，归肺、胃、胆、大肠经；含黄芩甙或汉黄芩素等成分。具有清热燥湿，泻火解毒，凉血止血，除热安胎之功效。适用于：急性化脓性感染性疾病，如疖、痈、蜂窝组织炎、丹毒等；目赤肿痛等眼疾。用量为9~15克。

(二)黄连

黄连性味苦寒，归心、肝、胃、大肠经；含有小檗碱、甲基黄连碱等成分。具有清热燥湿，泻火解毒之功效。适用于：一切急性化脓性感染性疾病；急性结膜炎、目赤肿痛等眼疾。用量为9~15克。

(三)黄柏

黄柏性味苦寒，归肾、膀胱、大肠经；含有小檗碱、黄柏碱等成分。具有清热燥湿，泻火解毒，退热除蒸之功效。适用于：一切急性化脓性感染性疾病；湿疹、脓疱疮、皮肤溃疡等皮肤病；外阴阴道炎、带下病等。用量为15~30克。

(四)金银花

金银花性味甘寒，归肺、心、胃经；含有环己六醇、黄酮类等成分。具有清热解毒，疏散风热之功效。适用于：疖、痈、蜂窝组织炎、丹毒、脓疱疮等一切急性化脓性感染性疾病（煎汤洗涤疮面，能促进疮口早日生肌收口愈合）；湿疹、皮炎、癣等皮肤病；急性结膜炎、目赤肿痛等。用量为15~30克。

(五)连翘

连翘性味苦、微寒，归肺、心、胆经；含有三萜皂甙、生物碱等成分。具有清热解毒，消痈散结，疏散风热之功效。适用于：一切急性化脓性感染性疾病的初期或溃破流脓者。用量为15克。

(六)紫花地丁

紫花地丁性味苦辛、寒，归心、肝经；含甙类、黄酮类等成分。具有清热解毒，消痈散结之功效。适用于：疔疮痈肿及一切急性化脓性感染性疾病。用量为30克。

(七)蒲公英

蒲公英性味苦甘、寒，归肝、胃经；含有蒲公英素、蒲公英甾醇、蒲公英苦素等。具有清热解毒，消痈散结，利湿通淋之功效。适用于：一切急性化脓性感染性疾病和皮肤癣病（对葡萄球菌和皮肤癣菌有明显的抑制作用）；急性结膜炎、目赤肿痛等各种急性眼炎。用量为 30 克。

（八）马齿苋

马齿苋性味酸寒，归大肠、肝经；含有去甲肾上腺素、多巴胺等成分。具有清热解毒，凉血止痢作用。适用于：一切急性化脓性感染性疾病，如疖、痈、蜂窝组织炎、化脓性指头炎、丹毒等（有显著的抗菌作用）；脓疱疮、毛囊炎、湿疹、皮肤瘙痒症、癣等皮肤病；痔疮、肛瘘、急性附睾睾丸炎、蛇虫咬伤等。用量为 30～60 克。

（九）秦皮

秦皮性味苦涩、寒，归大肠、肝、胆经；含有秦皮素、秦皮甙等成分。具有清热燥湿，解毒，止痢，止带，明目之功效。适用于：急性结膜炎、睑缘炎、目赤肿痛生翳、羞明流泪等眼疾，为眼科要药。用量为 9～15 克。

（十）大黄

大黄性味苦寒，归脾、胃、大肠、肝、心经；含有蒽醌甙、大黄酚、大黄素、大黄酸等成分。具有清热泻火，解毒，泻下攻积，止血，活血化瘀之功效。适用于：烫伤、下肢溃疡、口腔炎、口腔溃疡、毛囊炎、结节性红斑、瘢痕疙瘩、静脉炎等。用量为 3～12 克。

(十一)芒硝

芒硝性味咸苦、寒，归胃、大肠经；含有硫酸钠、各种矿物质等成分。具有泻下，软坚，清热之功效。适用于：乳腺炎、疮疡；咽喉炎、口角炎等。用量为 10~15 克。

二、活血化瘀药

活血化瘀药具有活血散瘀，消肿止痛作用。临床(熏洗)应用于骨折及软组织损伤，局部瘀血肿痛，关节肿痛及肢体活动功能障碍等疾病。

(一)红花

红花性味辛温，归心、肝经；含有红花甙、新红花甙等成分。具有活血通经，祛瘀止痛之功效。适用于：骨折及软组织损伤，局部瘀血肿痛，关节肿痛，肢体活动障碍等。用量为 10~15 克。

(二)苏木

苏木性味甘咸、平，归心、肝经；含有苏木素、苏木酚、挥发油等成分。具有活血疗伤，祛瘀通经之功效。适用于：骨折及软组织损伤，局部瘀血肿痛；痈肿疮疡；痔及肛瘘发炎期肿胀疼痛等。用量为 15~30 克。

(三)姜黄

姜黄性味辛苦、温，归肝、脾经；含有姜黄素、挥发油等成分。具有活血行气、通经止痛之功效。适用于：软组织损伤、瘀血肿痛、风湿性关节炎等。用量为 9~15 克。

(四)赤芍

赤芍性味苦、微寒，归肝经；含有芍药甙、牡丹酚、苯甲酸等成分。具有祛瘀止痛，清热凉血之功效。适用于：骨折及软组织损伤，局部瘀血肿痛；急性化脓性感染性疾病，局部红肿热痛等。用量为 15~30 克。

(五)当归

当归性味甘辛、温，归肝、心、脾经；含有挥发油、阿魏酸等成分。具有活血，补血，调经，止痛，润肠之功效。适用于：骨折及软组织损伤，局部瘀血肿痛；疖、痈、蜂窝组织炎、化脓性指头炎等；痔及肛瘘发炎期红肿疼痛等。用量为 15~30 克。

(六)丹皮

丹皮性味苦辛、微寒，归心、肝、肾经；含有牡丹酚、芍药甙、苯甲酸等成分。具有活血散瘀，清热凉血之功效。适用于：急性化脓性感染性疾病，痈肿疮疡，目赤肿痛；软组织损伤，局部瘀血肿痛等。用量为 9~15 克。

(七)乳香

乳香性味辛苦、温，归肝、心、脾经；含有挥发油、树脂、树脂酸等成分。具有活血行气止痛，消肿生肌之功效。为外科、伤科活血止痛之要药。适用于：骨折及软组织损伤，局部瘀血肿

痛,关节疼痛,肢体活动功能障碍;痈肿疮疡久不收口等。用量为9~15克。

(八)没药

没药性味苦辛、平,归心、肝、脾经;含有挥发油、树脂、树胶等成分。具有活血止痛,消肿生肌之功效。适应证与乳香相同,常互为配伍使用。用量为9~15克。

(九)酒

酒性味辛甘、热,归心、肝、肺、胃经;其主要成分为乙醇。具有通血脉,行药力,除寒,杀虫之功效。本品为外治方中常用之引药。适用于:跌仆扭挫等瘀血肿痛者;痈疽初起欲消散者,或痈疽疮势已成欲腐溃者;痹证疼痛等。外用适量。

三、燥湿杀虫药

燥湿杀虫药具有清热燥湿,杀虫止痒作用。临床(熏洗)应用于阴道炎、阴道和皮肤瘙痒症、皮癣、神经性皮炎、湿疹、急性化脓性皮肤病等疾病。

(一)蛇床子

蛇床子性味辛苦、温,有小毒,归肾经;含有蛇床子素、二氢化山芹醇等成分。具有燥湿杀虫,散寒祛风,温肾壮阳之功效。适用于:滴虫性和霉菌性阴道炎、阴道瘙痒症、宫颈糜烂;湿疹、手足癣、皮肤瘙痒症、肛门及阴囊瘙痒症等。用量为30

~60 克。

(二)苦参

苦参性味苦寒，归心、肝、胃、大肠、膀胱经；含有苦参碱、臭豆碱及黄酮类等成分。具有清热燥湿，杀虫利尿之功效。适用于：外阴阴道炎、滴虫性和霉菌性阴道炎；湿疹、皮癣、皮肤瘙痒症；痔疮、脱肛、肛门直肠周围脓肿等。用量为 15~30 克。

(三)地肤子

地肤子性味苦寒，归膀胱经；含有三萜皂甙、维生素 A 等成分。具有清热燥湿，止痒利尿之功效。适用于：皮肤湿热疮疡（有消炎收敛作用）、脓疱疮、毛囊炎、湿疹、荨麻疹、接触性皮炎等；外阴阴道炎、阴道瘙痒症、宫颈糜烂等。用量为 30~60 克。

(四)白鲜皮

白鲜皮性味苦寒，归脾、胃经；含有白鲜碱、胆碱等成分。具有清热解毒，除湿祛风之功效。适用于：急性化脓性皮肤病，如疖、毛囊炎、脓疱疮等；寻常疣、扁平疣、脂溢性皮炎、神经性皮炎、湿疹、接触性皮炎；外阴阴道炎、女阴瘙痒症、宫颈糜烂等。用量为 15~30 克。

(五)大风子

大风子性味辛热，有毒，归肝、脾、肾经；含有大风子油酸和次大风子油酸等成分。具有祛风燥湿，攻毒杀虫之功效。适用于：梅毒、疥癣、麻风等。用量为 15~30 克。

(六)雄黄

雄黄性味辛温，有毒，归肝、大肠经；含有硫化砷等成分。具有解毒，杀虫之功效。适用于：皮肤癣病、疥疮、麻风（对皮肤霉菌有抑制作用）；疖、痈红肿痛痒或已溃烂者；蛇虫咬伤等，用量为9克。

(七)枯矾

枯矾性味酸寒，归肺、肝、脾、胃、大肠经；含有硫酸钾铝等成分。具有解毒杀虫，燥湿止痒，清热止血之功效。适用于：各种阴道炎、外阴瘙痒症、宫颈糜烂，痈肿疮疡、痔疮、肛瘘、脱肛、毛囊炎、脓疱疮、湿疹、手足癣、疥疮、扁平疣、手足多汗症；蛇虫咬伤等。用量为9~15克。

(八)露蜂房

露蜂房性味甘平，有毒，归胃经；含有蜂蜡及树脂等成分。具有攻毒杀虫，祛风止痛之功效。适用于：痈疽、瘰癧、风湿痹痛；瘙痒性皮肤病、风疹、癣病等。用量为9~15克。

(九)花椒

花椒性味辛热，有小毒，归脾、胃、肾经；含有柠檬烯、桔醇等挥发油成分。具有杀虫，止痒，温中止痛之功效。适用于：皮肤湿疹瘙痒、癣病、阴道炎等；痔疮及肛瘘发炎期，伴红肿疼痛者；软组织损伤，骨折局部瘀血肿痛者；冻疮等。用量为9~15克。

(十)艾叶

艾叶性味苦辛、温，归肝、脾、肾经；含有桉油素、樟脑、龙脑等挥发油及鞣质等成分。具有解毒杀虫，温经止痛之功效。适用于：皮肤瘙痒症、癣病；痔疮、肛瘘发炎期、慢性溃疡伤口久不愈合者；外感风寒、疫毒之邪等。用量为15~30克。

(十一)硼砂

硼砂性味甘咸、凉，归肺、胃经；含有四硼酸钠等成分。具有外用清热解毒，内服清肺化痰之功效。适用于：霉菌性阴道炎、阴道瘙痒症、咽喉炎、毒蛇咬伤等。用量为1.5~3克。

(十二)狼毒

狼毒性味辛平，有大毒，归肺、心经；含有狼毒甙、蒽甙等成分，具有杀虫，消积，除湿止痒之功效。适用于：神经性皮炎、银屑病、疥癣；淋巴结核、骨结核、痔瘘等。用量为0.9~1.5克。

(十三)土槿皮

土槿皮性味辛温，有毒，归肺、脾经；含有二萜酸、土槿皮酸等成分。具有清热，杀虫，止痒之功效。适用于：疥疮、体癣、脚癣；带下、痔疮、痢疾等。用量为3~9克。

(十四)百部

百部性味甘苦、微温，归肺经；含有百部碱等成分。具有灭虱杀虫，润肺止咳之功效。适用于：体虱、头虱、阴虱；慢性湿

疹、神经性皮炎、皮肤瘙痒症；百日咳、肺结核、蛲虫病、蛔虫病等。用量为3~9克。

(十五)大蒜

大蒜性味辛、温，归脾、胃、大肠经；含有大蒜素等挥发油成分。具有解毒杀虫，消肿，止痢之功效。适用于：钩虫病、蛲虫病；痢疾、肺结核、急性阑尾炎等。用量为5~20克。

(十六)醋

醋性味酸苦，温，归肝、胃经；含有乙酸、灰分、劳发酸等成分。具有散瘀，止血，解毒，杀虫之功效。适用于：手足癣、体癣、阴部瘙痒症；痢、疽、疮肿；软组织损伤、外伤血肿和疼痛、骨质增生等。外用适量。

四、祛风通络药

祛风通络药具有祛风除湿，通络止痛等功效。临床(熏洗)应用于风湿性和类风湿性关节炎、关节肿痛、肢体活动障碍、各种软组织损伤、皮肤瘙痒、湿疹等疾病。

(一)透骨草

透骨草性味辛甘、温，有小毒；含有皂甙、脂肪油、挥发油等成分。具有祛风湿，活血止痛作用。适用于：风湿性关节炎、大骨节病、关节肿痛等；软组织损伤、瘀血肿痛、骨折愈合后肢体功能障碍、血栓闭塞性脉管炎早期未溃破者；痢肿、痔疮等。

用量为 15~60 克。

(二)威灵仙

威灵仙性味辛咸、温，归膀胱经；含有白头翁素、白头翁醇、皂甙等成分。具有祛风除湿，散寒止痛之功效。适用于：风湿性、类风湿性关节炎，坐骨神经痛，软组织损伤等；对龟头包皮炎有良效。用量为 15~30 克。

(三)五加皮

五加皮性味辛苦、温，归肝、肾经；含有挥发油、鞣质、棕榈酸等成分。具有祛风湿，强筋骨，利尿之功效。适用于：风湿性和类风湿性关节炎，软组织损伤；各种外阴阴道炎、阴道瘙痒症等。用量为 9~15 克。

(四)海桐皮

海桐皮性味苦辛、平，归肝经；含有刺桐灵碱、有机酸、氨基酸等成分。具有祛风除湿，通络止痛，杀虫止痒之功效。适用于：软组织损伤、关节疼痛、癣病等。用量为 9~15 克。

(五)桑枝

桑枝性味苦、平，归肝经；含有桑素、桑色素、桑色烯等成分。具有祛风通络，利关节之功效。适用于：风湿性关节炎、手足麻木、中风；脚气浮肿、皮肤瘙痒等。用量为 9~30 克。

(六)鸡血藤

鸡血藤性味苦甘、温，归肝经；含有鸡血藤醇、铁质等成

分。具有舒筋活络，补血行血，调经之功效。适用于：肢体麻木、肢节疼痛；肌肤甲错、银屑病、皮肤瘙痒症；月经不调、痛经等。用量为 9~15 克。

(七)路路通

路路通性味辛苦、平，归肝、胃、膀胱经；含有桂皮酸、左旋龙胆、树脂及挥发油等成分。具有祛风通络，利水，下乳之功效。适用于：风湿性关节炎、痈肿；荨麻疹、湿疹、手足癣；月经不调、胃痛、乳汁少等。用量为 5~10 克。

(八)寻骨风

寻骨风性味辛苦、平，归肝经；含有生物碱、挥发油、内脂等成分。具有祛风湿，通络，止痛之功效。适用于：风湿痹痛、肢体麻木、筋脉拘挛、跌打损伤疼痛；疖肿、疟疾、癌痛等。用量为 15~30 克。

(九)松节

松节性味苦温，归肝、肾经；含有挥发油等成分。具有祛风湿，活络止痛之功效。适用于：风寒湿痹、跌打损伤疼痛。用量为 10~20 克。

五、生肌收口药

生肌收口药具有祛腐生肌，收敛疮口的作用。临床(熏洗)应用于一切慢性溃疡，疮口经久不愈合者(能促进肉芽组

织及上皮组织增生而使伤口愈合)。

(一)白藜

白藜性味苦辛、微寒，归心、胃经。具有生肌止痛，清热解毒，消痈散结之功效。适用于：痈肿疮疡(一切慢性溃疡和疮疡后期，用之能促进肉芽组织增生而使疮口愈合)；烧伤、冻疮等。用量为 30 克。

(二)白芨

白芨性味苦甘涩、微寒，归肺、肝、胃经；含有挥发油、粘液质、淀粉等成分。具有收敛止血，消肿生肌之功效。适用于：痈肿疮疡(能促使慢性溃疡和疮疡后期的肉芽组织及上皮组织增生而使疮口愈合)；手足皲裂症、烧伤、湿疹、癣病等。用量为 15~30 克。

(三)石决明

石决明性味咸寒，归肝经；含有碳酸钙、有机物等成分。具有生肌收口，清肝明目之功效。适用于：一切慢性溃疡和疮疡后期(煎汤外洗，能促进肉芽组织及上皮组织增生而使疮口愈合)。用量为 30 克。

(四)象皮

象皮性味甘咸、温，归膀胱、脾经；具有生肌，敛疮，止血之功效。本品功专收敛，促进疮面愈合。适用于：疮疡久不收口、跌打损伤等。用量 10~30 克。

(五)赤石脂

赤石脂性味甘涩、温，归大肠、胃经；含有硅酸铝、钙镁氧化物等成分。具有敛疮生肌，收敛止血，涩肠止泻之功效。适用于：疮痈溃后久不收口；虚寒性腹泻、脱肛；月经过多、功能性子宫出血等。用量为 9~24 克。

(六)儿茶

儿茶性味苦涩、凉，归心、肺经；含有儿茶鞣酸、鞣质、粘液质、树脂等成分。具有敛疮，止血，生肌之功效。适用于：疮疡疮口不敛；外伤出血、湿疹、脚癣、泻痢便血。用量为 1.5~8 克。

(七)龙骨

龙骨性味甘涩、平，归心、肝、肾经；含有碳酸钙、磷酸钙等成分。具有收敛固涩，重镇安神，平肝潜阳之功效。适用于：疮疡疮口不敛、湿疹；遗精、多汗、头晕、失眠多梦等。用量为 15~30 克。

六、解表散风药

解表散风药具有疏通腠理，发散表邪的作用。临床（熏洗）应用于风、寒、湿、热之邪侵袭肺卫之证；疮肿初期；软组织损伤、关节疼痛、肢体功能障碍以及皮肤病等。

(一)桂枝

桂枝性味辛甘、温，归心、肺、膀胱经；含有桂皮醛、桂皮油、鞣质等成分。具有发汗解表，温经通阳之功效。适用于：关节疼痛、软组织损伤、肢体活动功能障碍者；风寒感冒、风湿病等。用量为9~15克。

(二)防风

防风性味辛甘、微温，归膀胱、肝、脾经；含有挥发油、甘露醇、酚性物质等成分。具有发表散风，胜湿止痛，止痉，止泻之功效。适用于：荨麻疹、皮肤瘙痒症；暴发火眼、目赤肿痛、疮肿；关节疼痛、四肢挛急、肢体活动功能障碍者等。用量为9~15克。

(三)荆芥

荆芥性味辛、微温，归肺、肝经；含有多挥发油等成分。具有发表散风，透疹消疮，止血之功效。适用于：疖、痈、疮肿等；皮癣、神经性皮炎等；痔疮、肛瘘、肛周脓肿等。用量为9~15克。

(四)羌活

羌活性味辛苦、温，归膀胱、肾经；含有挥发油、有机酸、生物碱等成分。具有散寒解表，祛风湿，止痛之功效。适用于：风湿性与类风湿性关节炎、各种神经痛、软组织损伤等。用量为9~15克。

(五)白芷

白芷性味辛温，归肺、胃经；含有白芷素、白芷醚、白芷毒素及挥发油等成分。具有祛风解表，排脓，消肿止痛，燥湿止带之功效。适用于：一切疮疡肿痛，如痈、化脓性指头炎、痔瘡；慢性溃疡、软组织损伤、毒蛇咬伤等。用量为9~15克。

(六)菊花

菊花性味辛甘苦、微寒，归肝、肺经；含有菊甙、腺嘌呤、黄酮类等成分。具有疏风清热，解毒，明目之功效。适用于：急性结膜炎、麦粒肿、睑缘炎等眼科疾病；一切急性化脓性感染疾病，如疖、痈、化脓性指头炎、脓疱疮等（有消炎杀菌作用）。

(七)麻黄

麻黄性味辛微苦、温，归肺、膀胱经；含有麻黄碱、挥发油等成分。具有发汗解表，宣肺平喘，利水消肿之功效。适用于：感冒、鼻窦炎、急性支气管炎；荨麻疹、硬皮病、脉管炎等。用量为2~10克。

(八)细辛

细辛性味辛温，有小毒；归肺、肾、心经；含有挥发油、棕榈酸、树脂等成分。具有祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮之功效。适用于：风寒头痛、鼻窦炎、牙痛、风寒湿痹、气管炎、口疮糜烂等。用量为1~3克。

(九)苍耳子

苍耳子性味辛苦、温，有小毒，归肺经；含有苍耳甙、脂肪油、生物碱等成分。具有散风除湿，通窍止痛之功效。适用于：风寒头痛、鼻窦炎、牙痛；荨麻疹、皮肤瘙痒症、腮腺炎；风寒湿痹、腰肌劳损、坐骨神经痛、下肢溃疡等。用量为3~10克。

(十) 生姜

生姜性味辛温，归肺、脾、胃经；含有姜烯、姜辣素等挥发油成分。具有发汗解表，温肺止咳，温中止呕之功效。适用于：风寒感冒、咳嗽、胃寒呕吐泄泻、鱼蟹中毒等。用量为3~10克。

(十一) 葱白

葱白性味辛、温，归肺、胃经；含有大蒜辣素、苹果酸等成分。具有发汗解表，散寒通阳之功效。适用于：风寒感冒、腹泻、乳腺炎、痈肿、小便不通等。用量为3~10克。

七、麻醉止痛药

麻醉止痛药具有麻醉止痛，解毒消肿作用。临床(熏洗)应用于软组织损伤、骨折、局部瘀血肿痛，风湿性和类风湿性关节炎；一切化脓性感染性疾病，红肿疼痛剧烈者(未溃或已溃均可应用)等。

(一) 川乌

川乌性味辛苦、温，有毒，归心、肝、肾、脾经；含有乌头碱

等成分。具有散寒止痛，祛风除湿之功效。临床(熏洗)以生用为佳。适用于：风湿性和类风湿性关节炎、关节肿痛、各种神经痛；软组织损伤、骨折、局部瘀血肿痛等。用量为 15 克。

(二)草乌

草乌性味辛苦、热，有毒，归心、肝、肾、脾经；含有乌头碱等成分。具有祛风除湿，温经止痛之功效(乌头碱可麻醉局部皮肤粘膜的感觉神经末梢，使知觉丧失)。临床(熏洗)以生用为佳。其毒性比川乌大，疗效亦强于川乌。适应证与川乌同。用量为 9~15 克。

(三)三棱

三棱性味苦辛、平，归肝、脾经；含有挥发油、淀粉等成分。具有破血行气，消积止痛之功效。适用于：癥瘕痞痞、硬皮病、肉芽肿、静脉炎；痛经、闭经、产后瘀血腹痛等。用量为 3~9 克。

(四)莪术

莪术性味辛苦、温，归肝、脾经。含有挥发油、树脂、粘液质等成分。具有破血逐瘀，消积止痛之功效。适用于：癥瘕痞痞、硬皮病、肿瘤、结节性静脉炎；痛经、闭经、饮食积滞、脘腹胀痛等。用量为 3~9 克。

(五)天南星

天南星性味苦辛、温，归肺、肝、脾经；含有三萜皂甙、安息香酸等成分。外用消肿止痛，内服具有祛风解痉，燥湿化痰之

功效。适用于：软组织损伤局部瘀血肿痛；蛇虫咬伤、跌打损伤、淋巴结核、半身不遂、口眼喎斜、癫痫、破伤风等。用量为 9～15 克。

(六)半夏

半夏性味辛温，有毒，归脾、胃、肺经；含有挥发油、皂甙、氨基酸等成分。外用消肿止痛，内服具有消痞散结，降逆止呕，燥湿化痰之功效。适用于软组织损伤、痈疽、淋巴结核；咳嗽痰多、呕吐等。用量为 9～15 克。

第三章 古今熏洗名方

一、皮肤科病证方

(一)洗头风汤(《中医皮肤病学简编》)

〔组成〕 苦参 30 克 野菊花 30 克 白鲜皮 30 克 硫黄 15 克

〔功能与主治〕 散风除热,解毒止痒;用于脂溢性皮炎等。

〔用法〕 用水 3 升,将上药煮沸后取滤过液,洗浴患处,1 日 2 次。

(二)去头皮屑洗剂(《外科学》)

〔组成〕 水杨酸 2 克 硫黄 3 克 酒精适量 甘油 5 克 蒸馏水加至 1 升

〔功能与主治〕 去头皮屑,抑制皮脂分泌;用于白屑风等。

〔用法〕 混合后外搽。

(三)脂溢洗方(《朱仁康临床经验集》)

〔组成〕 苍耳子 30 克 明矾 9 克 王不留行 30 克 苦参 15 克

〔功能与主治〕 收敛止痒;用于头皮脂溢性皮炎等。

〔用法〕 煎水半盆,用小毛巾蘸液,反复洗头皮,每次 15 分钟,1 天洗 2 次,隔 3 天洗 1 天,洗前剪短头发。

(四)生发合剂(《中医外科外治法》)

〔组成〕 生姜汁 50 毫升 旱莲草 250 克(鲜用为佳)
生半夏 20 克 芥菜子 20 克 川椒 30 粒 榧子 10 个 蔓荆子 10 克 生川乌 20 克 醋 200 毫升

〔功能与主治〕 疏通气血,促进头发生长;用于油风脱发等。

〔用法〕 先将生姜汁倒入醋内,后将芥、夏、旱、椒、榧、乌捣烂掺入,再将蔓荆子置于瓦上以文火焙干,研末后一并掺入即可。装有色瓶内,密封备用。使用时用双手由轻到重摩擦局部,待头皮发热后再将外用生发合剂摇匀,涂擦局部,每日 10 次,待头发长出为止。

(五)令发不落方(《古今名方》)

〔组成〕 榧子 3 个 核桃 2 个 侧柏叶 30 克

〔功能与主治〕 凉血,滋肾,润燥;本方用之有助于“令发不落”。今有人以鲜侧柏叶浸泡于 60% 酒精中数天后,用之涂擦斑秃处,有治疗和预防作用。

〔用法〕 共捣烂,泡在雪水中,蘸水梳头。

(六)四黄汤(《古今名方》)

〔组成〕 黄连须 黄芩 黄柏 大黄各 9 克 龙胆草 6 克 枯矾 12 克

〔功能与主治〕 养阴泻火；用于头皮油脂外溢、头发易脱等。

〔用法〕 煎水洗头，隔日 1 次。

(七)痤疮洗剂(《中医外科临床手册》)

〔组成〕 沉降硫黄 6 克 樟脑酯 10 克 西黄芪胶 1 克 石灰水加至 100 毫升

〔功能与主治〕 清热燥湿；用于痤疮等。

〔用法〕 混合后外擦患处，每日 3~4 次，擦前用热水肥皂洗患部。

(八)颠倒散洗剂(《外科学》)

〔组成〕 硫黄 生大黄各 7.5 克 石灰水 100 毫升

〔功能与主治〕 活血祛瘀；用于粉刺、酒糟鼻、白屑风等。

〔用法〕 将硫黄、大黄研极细末后，加入石灰水(将石灰与水搅拌，待澄清后，取中间清水)混合即成。外擦患处，每日 3~4 次。

(九)毛疮洗方(《朱仁康临床经验集》)

〔组成〕 苍耳子 60 克 雄黄 15 克 明矾 30 克

〔功能与主治〕 清热解毒，杀虫；用于发际疮、毛囊炎等。

〔用法〕 煎水半盆，用小毛巾蘸药液反复洗患处，每次洗

15 分钟,1 日 4~5 次,洗前剪短头发。

(十)百部洗方(《赵炳南临床经验集》)

[组成] 百部 120 克 苦参 120 克 蛇床子 60 克 雄黄 15 克 狼毒 75 克

[功能与主治] 疏风止痒,祛湿杀虫;用于皮肤瘙痒症、荨麻疹、神经性皮炎等。

[用法] 上药共碾粗末,装纱布袋内,用水 2.5~3 升煮沸 30 分钟。以软毛巾潮洗,或潮洗后再加热水浸浴。有抓破创面者慎用。

(十一)止痒洗剂 1 号(《中医外科外治法》)

[组成] 苦参 120 克 蛇床子 60 克 百部 120 克 威灵仙 60 克 川椒 30 克 苏叶 60 克

[功能与主治] 疏风止痒;用于皮肤瘙痒症、阴囊湿疹、荨麻疹、慢性湿疹等。

[用法] 上药共研粗末,装纱布袋内,用水 2.5~3 升,煮沸即可。用时先熏后洗,待温后软毛巾潮洗。每剂药可反复用 3~4 天。

(十二)痒症洗方(《文琢之中医外科经验论集》)

[组成] 苦参 60 克 千里光 60 克 蛇床子 30 克 地肤子 30 克 苍耳子 30 克 白芷 9 克

[功能与主治] 消风清热,解毒止痒;用于一切瘙痒之症等。

[用法] 煎汤熏洗患处。

(十三)止痒洗方2号(《朱仁康临床经验集》)

〔组成〕 透骨草 30 克 红花 15 克 苦参 30 克 雄黄 15 克 明矾 15 克

〔功能与主治〕 软坚,止痒;用于皮肤淀粉样病变、神经性皮炎等。

〔用法〕 煎水半盆,待温时用软毛巾反复洗患处,每日 3~4 次,每次 15 分钟。

(十四)楂黄汤(《中医外科外治法》)

〔组成〕 生山楂 40 克 生大黄 30 克 红肿热甚者加芒硝 20 克,有水疱或糜烂渗液者加明矾 15 克,有化脓感染者加蒲公英 30 克。

〔功能与主治〕 清热,燥湿,止痒痛;用于漆性皮炎等。

〔用法〕 上药水煎,湿敷或外洗患处,每日 1 剂,1 剂洗 2~3 次,每次约 15 分钟,轻者 1 剂,重者需 2~3 剂。

(十五)马齿苋洗方(《赵炳南临床经验集》)

〔组成〕 马齿苋 60 克(鲜者 250 克)

〔功能与主治〕 清热解毒,除湿止痒;用于急性湿疹、过敏性皮炎、接触性皮炎、丹毒、脓疱疮等。

〔用法〕 洗净后用水 2 升,煎煮 20 分钟(鲜药煮 10 分钟),取药液用纱布六七层蘸之湿敷患处,每天 2~3 次,每次 20~40 分钟。

(十六)疣洗方(《朱仁康临床经验集》)

〔组成〕 马齿苋 60 克 露蜂房 9 克 陈皮 15 克 苍术 15 克 细辛 9 克 蛇床子 9 克 白芷 9 克 苦参 15 克

〔功能与主治〕 软坚祛疣；用于扁平疣等。

〔用法〕 煎液半盆，待温时用小毛巾反复擦洗 15 分钟，每日 4~5 次，洗时加温。

（十七）寻常疣洗剂（《中医外科外治法》）

〔组成〕 木贼 30 克 香附 30 克

〔功能与主治〕 祛风消疣；用于寻常疣等。

〔用法〕 加水 500 毫升左右，水煎，日洗 2~3 次，1 剂药可洗 3 天，一般 2~3 剂见效。

（十八）止痒洗剂 3 号（《中医外科外治法》）

〔组成〕 马齿苋 120 克 蒲公英 120 克 白矾 12 克 黄柏 60 克 白鲜皮 15 克 地肤子 30 克

〔功能与主治〕 清热解毒，除湿止痒；用于脓疱疮、多发性疖肿、急性湿疹、接触性皮炎等。

〔用法〕 共为粗末，装纱布袋内，加水 2.5 升，煮沸即可，用消毒纱布蘸药汤洗患处，或反复淋洗，每次洗 30 分钟左右，1 日 2~3 次。

（十九）黄水疮洗方（《华佗神医秘传》）

〔组成〕 雄黄 15 克 防风 15 克 荆芥 9 克 苦参 9 克

〔功能与主治〕 祛风止痒；用于黄水疮等。

〔用法〕 水煎，取药液洗疮。

(二十)洗诸痒疮方(《外科大成》)

〔组成〕 枯矾 60 克 花椒 120 克 野菊花 250 克 牙硝 500 克

〔功能与主治〕 解毒止痒；用于浸淫疮、血风疮、癩、癬、脓疱疮等。

〔用法〕 上药和匀，分为 7 份，每份用水 1 升，煎沸 1~3 分钟，温洗或温渍，每日 2 次。

(二十一)二矾汤(《外科正宗》)

〔组成〕 白矾 皂矾各 120 克 儿茶 15 克 柏叶 250 克

〔功能与主治〕 杀虫止痒；用于鹅掌风等。

〔用法〕 水煎浸泡。

(二十二)鹅掌风洗药(《中医外科外治法》)

〔组成〕 鸦胆子 20 克(打碎) 生百部 30 克 白酒 醋各 250 毫升。

〔功能与主治〕 润燥，杀菌；用于鹅掌风、灰指甲等。

〔用法〕 以上药量为 1 只患手用量，将药及酒、醋共放入大口瓶内，密闭，浸泡 10 天后备用。同时将患手插入瓶中浸泡(浸泡过程中注意尽量减少药液的挥发)，每次浸泡 30~60 分钟，每日浸泡 2~3 次，约 11~12 天药液泡完即愈。泡到第 6~7 天时患手皮肤将变得红嫩而薄，此是将愈之兆，不须顾虑，当继续浸泡至愈。

(二十三)紫草洗方(《赵炳南临床经验集》)

〔组成〕 紫草 30 克 茜草 15 克 白芷 15 克 赤芍 15 克 苏木 15 克 南红花 15 克 厚朴 15 克 丝瓜络 15 克 木通 15 克

〔功能与主治〕 行气活血，化瘀消斑；用于肝斑、中毒性黑皮病、面部继发性色素沉着、下肢结节性红斑、硬结性红斑、下肢静脉曲张等。

〔用法〕 加水 2~2.5 升，煮沸 15~20 分钟，取药液潮洗湿敷。

(二十四)沐浴方(《古今名方》)

〔组成〕 谷精草 茵陈 石决明 桑枝 白菊花各 36 克 木瓜 桑叶 青皮各 45 克

〔功能与主治〕 清热利湿解毒；用本方沐浴可防治皮肤病，保护皮肤健康。近代实验证明谷精草对绿脓杆菌有抗菌作用，对皮肤真菌有抑制作用。

〔用法〕 共为粗末，盛布袋内，熬水浴之。

(二十五)干葛洗方(《赵炳南临床经验集》)

〔组成〕 干葛 120 克 明矾 15 克

〔功能与主治〕 去湿，收敛，止汗；用于手足多汗症及腋部多汗症等。

〔用法〕 以水 1~1.5 升，煮沸 15~20 分钟，待温后浸泡手足。

(二十六)明矾洗剂(《中医外科外治法》)

〔组成〕 明矾 10 克 白芨 15 克 马勃 6 克

〔功能与主治〕 润肤，敛皮；用于手足皲裂等。

〔用法〕 上药水煎 3 次，每次加水 600 毫升，煎取 300 毫升，3 次药液和匀于一小盆内。用前将药液加温，洗净患处，再浸入药液，早晚各浸泡 20 分钟，每剂可浸泡 3 天，3 剂为 1 个疗程，一般 1~2 个疗程可愈。同时将上药同样比例研细末，用凡士林调成 20% 含量软膏，浸后涂于患处，效果更佳。

(二十七)鹅掌风熏洗方(《中医外科诊疗学》)

〔组成〕 防风 6 克 土槿皮 9 克 生川乌 4.5 克 生草乌 4.5 克 羌活 4.5 克 独活 4.5 克 豨莶草 9 克 白鲜皮 9 克 浮萍 4.5 克 丹皮 9 克 僵蚕 6 克 猪牙皂 4.5 克

〔功能与主治〕 杀虫止痒；用于手足癣等。

〔用法〕 上药用醋 1 升，清水 2 碗，先浸 1 夜，瓦罐内煎液熏洗，每日早晚 2 次，最好在三伏天连续熏洗。

(二十八)脚癣洗方(《中医外科外治法》)

〔组成〕 苏木 蒲公英 钩藤各 30 克 防风 防己 川椒 黄芩 白矾各 15 克

〔功能与主治〕 清热解毒，祛风除湿，止痒；用于湿烂型脚癣等。

〔用法〕 将上药置洗脸盆中，加水 2.5 升。煮沸后待温，浸洗患足。每日 1 剂，早晚各浸洗 1 次，每次浸洗 30~60 分钟，浸洗后擦干即可。浸洗 3 日为 1 个疗程。

(二十九)复方苦参醋浸药(《中医外科外治法》)

〔组成〕 苦参 大枫子 蛇床子 地肤子 防风各 30 克 枯矾 川椒 川芎各 20 克 红花 15 克

〔功能与主治〕 燥湿,祛风,杀虫;用于脚癣等。

〔用法〕 将上药放入盆内,倒入市售食醋 1.5 升左右(以能淹没患脚为度),加盖密闭浸泡 24 小时后,滤出药渣即可使用。置患脚于药液内浸泡,每日 1~2 次,每次约 30 分钟,每剂药可连续使用 2 次,5 天为 1 个疗程。一般 5~10 天获效。

(三十)黄精首乌醋(《中医外科外治法》)

〔组成〕 生黄精 生何首乌各 50 克 陈醋 300 毫升。

〔功能与主治〕 润燥,杀虫,止痒;用于足癣等。

〔用法〕 将二药研细,加入陈醋,连同容器置入 60℃~80℃ 热水中,加温 6~8 小时后取出备用。每日用淡盐水洗脚,早、中、晚各用棉球蘸药涂擦患处 1 次。15 天为 1 个疗程,未愈者可进入第 2~3 疗程。

(三十一)雄黄洗剂(《中医皮肤病学简编》)

〔组成〕 雄黄 9 克 百部 15 克 苦参 15 克 川椒 9 克 月石 9 克

〔功能与主治〕 止痒杀疥;用于疥疮等。

〔用法〕 水煎去渣后外洗。

二、外科病证方

(一) 漏肿升麻汤(《外科精义》)

〔组成〕 升麻 芒硝 黄芩 漏芦 栀子仁 接骨草各等份

〔功能与主治〕 清热解毒，散风消肿；用于阳证痈毒初起，焮热肿痛等。

〔用法〕 上药 60 克，水 3 大碗，煎沸 2 分钟，用药棉湿渍患处。

(二) 熏洗汤(《中医外科诊疗学》)

〔组成〕 银花 9 克 羌活 独活 川乌 草乌 防风 苍术 薄荷 苏叶各 6 克 桑叶 桃叶 槐叶 樟叶各 1 握

〔功能与主治〕 消毒止痛；用于红肿疼痛的阳性疮疡等。

〔用法〕 上药共煎，趁热先熏后洗。未成脓者，熏洗之后，将药渣捣涂患处；已成脓者，再加猪蹄汤。

(三) 升麻调肿汤(《外科精义》)

〔组成〕 升麻 黄芪 防风 川芎 生地 细辛各等份

〔功能与主治〕 温经疏风，通络消肿；用于疮疽初起，肿而散漫，苍白属阴证之候等。

〔用法〕 以药 60 克，水 3 大碗，煎沸 2 分钟，待温淋患处及其周围。

(四)葱归溲肿汤(《医宗金鉴》)

〔组成〕 独活 白芷 当归 甘草各9克 葱头7个

〔功能与主治〕 疏导腠理,通调血脉;用于痈疽疮疡,初肿及将溃之时等。

〔用法〕 以水3大碗,煎沸2分钟,以药棉蘸汤淋洗患处,以局部热痒为度。

(五)集香散(《证治准绳》)

〔组成〕 白芷 茅香 香附 藿香 防风各9克 木香 甘草各3克

〔功能与主治〕 祛风除秽;用于痈疽溃烂臭秽者等。

〔用法〕 用水3碗,煎药沸3~5分钟,淋洗患处。

(六)猪蹄汤方(《刘涓子鬼遗方》)

〔组成〕 猪蹄1具 川芎 炙甘草 大黄 黄芩各60克 芍药90克 当归30克

〔功能与主治〕 祛腐止痛,疏通气血;用于痈疮溃后脓腐不脱,疼痛不止,疮口难敛者等。

〔用法〕 先以水5大碗,煮猪蹄软为度,去油及蹄,取清汁入药,煮沸2分钟,温洗疮上,每日3次。

(七)银花甘草汤(《外科十法》)

〔组成〕 金银花60克 甘草6克

〔功能与主治〕 清火解毒;用于疮疡热毒、烧伤等。

〔用法〕 煎汤,外用洗涤疮面。

(八) 神硝散(《医医大全》)

〔组成〕 蛇床子 60 克 朴硝 30 克

〔功能与主治〕 止痒, 消肿, 祛腐; 用于痈疽溃烂臭秽等。

〔用法〕 水煎熏洗。

(九) 解毒洗药(《熏洗疗法》)

〔组成〕 蒲公英 30 克 苦参 黄柏 连翘 木鳖子各 12 克 金银花 白芷 赤芍 丹皮 生甘草各 10 克

〔功能与主治〕 清热解毒, 活血消肿, 祛腐排脓; 用于一切急性化脓性感染性疾病, 红肿热痛或破溃流脓甚多者, 如疖、痈、丹毒、急性蜂窝组织炎等。

〔用法〕 将上药共为粗末, 用纱布包扎好, 加水煎煮后, 过滤去渣, 趁热熏洗或湿敷患处, 每日 2 次, 每次 1~2 小时。

(十) 溃瘍洗药(《熏洗疗法》)

〔组成〕 金银花 当归各 30 克 白芷 30 克 苦参 24 克 黄柏 24 克 乳香 12 克 没药 12 克 煅石决明 24 克 赤芍 15 克 连翘 15 克 大黄 15 克 甘草 15 克

〔功能与主治〕 消毒排脓, 祛腐生肌, 收敛伤口; 用于一切溃瘍脓性分泌物较少者, 或慢性溃瘍, 疮口经久不愈合者等。

〔用法〕 将上药共为粗末, 用纱布包扎好, 加水煎煮后, 过滤去渣, 趁热熏洗或湿敷患处, 每日 2 次, 每次 1~2 小时。

(十一) 金银花液(《精选八百外治验方》)

〔组成〕 金银花 30 克 生地 15 克 乌梅肉 30 克 当归 15 克 黄柏 9 克 五倍子 9 克

〔功能与主治〕 清热解毒，活血消肿，生肌收敛；用于各种疮疡溃破后久不收口、缠腰火丹、脱疽溃破期。

〔用法〕 将上诸药用 45% 酒精 500 毫升，浸泡 24 小时，加水煎至 300 毫升，经过高压消毒备用，使用时用纱布浸泡金银花液，湿敷患处，每日换药 2~3 次。

（十二）解毒洗方（《中医外科外治法》）

〔组成〕 蒲公英 30 克 苦参 黄柏 连翘 木鳖子各 12 克 金银花 白芷 赤芍 丹皮 生甘草各 9 克

〔功能与主治〕 清热，解毒，止痛；用于溃疡局部红肿疼痛，脓液多者等。

〔用法〕 上药煎汤，温洗患处，每日 1~2 次。

（十三）芫花洗方（《赵炳南临床经验集》）

〔组成〕 芫花 15 克 川椒 15 克 黄柏 30 克

〔功能与主治〕 清热解毒，杀虫止痒；用于多发性疖肿等。

〔用法〕 共碾粗末，装纱布袋内，用水 2.5~3 升煮沸 30 分钟，用软毛巾蘸汤湿洗，或湿洗后加热水浸浴。芫花有毒，勿入口、目。

（十四）复方藤黄液（《中医外科外治法》）

〔组成〕 藤黄 10 克 马钱子 6 克 龙胆 6 克 新鲜猪胆汁 100 克

〔功能与主治〕 清热,解毒,散结,消肿;用于疖肿等。

〔用法〕 马钱子用沙拌炒软,去毛,研成粉末,然后将龙胆、藤黄分别研成粉末,将上药掺在猪胆汁中备用。用时以棉签蘸药汁涂在疖上。涂药范围要比红肿范围大0.5厘米,每日涂2~3次;涂后需保留24小时以上,保持时间短,则效果较差;重复涂药时,前次药液不要洗掉。本药有毒,只能外涂,禁忌入口。

(十五)复方马齿苋洗方(《赵炳南临床经验集》)

〔组成〕 马齿苋200克 蒲公英200克 如意草200克
白矾20克

〔功能与主治〕 清热解毒,除湿止痒;用于多发性疖肿、脓疱疮等。

〔用法〕 上药共碾细末,装纱布袋内,加水2.5~3升,煮沸30分钟。用时以软毛巾蘸汤清洗,或清洗后加热水浸浴。

(十六)三黄洗剂(《外科学》)

〔组成〕 大黄 黄柏 黄芩 苦参各等份

〔功能与主治〕 清热,止痒,收湿;用于急性皮肤病、疖痈等有红肿瘙痒渗液者。

〔用法〕 共研细末,上药末10~15克加入蒸馏水100毫升,临时摇匀,以棉花蘸药汁擦患处,1日4~5次。

(十七)椒艾洗药(《中医外科心得集》)

〔组成〕 川椒10克 艾叶30克 桂枝15克 防风15克 透骨草30克 槐枝10节 蒜瓣半挂 当归30克 苏

木 30 克 红花 15 克 桑枝 30 克 生川乌 10 克

〔功能与主治〕 温经散寒，活血祛风；用于脱疽初期属寒凝经脉闭阻者等。

〔用法〕 以大盆煎汤，熏洗患处，每次半小时，每日 1~2 次，每剂药可连用 3 日。

（十八）乳痈洗方（《疮疡外用本草》）

〔组成〕 刘寄奴 9 克 蒲公英 30 克 红花 9 克

〔功能与主治〕 散瘀止痛，解毒消肿；用于乳痈初期。

〔用法〕 用水 1 升煎上药，煮沸 2~3 分钟，趁热洗溃，1 次 20 分钟，1 日 2 次。

（十九）虎杖灼涂液（《中医外科外治法》）

〔组成〕 虎杖适量

〔功能与主治〕 清热，解毒，收敛；用于烧伤等。

〔用法〕 将虎杖研成粗末，用 6 倍量的乙醇冷浸 3 天，滤出液经减压浓缩得虎杖浸膏。再加 4 倍量的热水充分搅拌，趁热过滤，滤液浓缩到原浸膏重量的 1.5 倍，放置 24 小时以上过滤，滤液用碳酸氢钠调节 pH 到 5~6，加 0.2% 的呋喃西林装瓶，高压消毒。将滤液涂于烧伤创面，每日 1 次，最好采用暴露疗法，用于 I 度烧伤较为理想。

（二十）黄连洗药（《千金翼方》）

〔组成〕 黄连 黄柏各 10 克 黄芩 白芍 白蔹 甘草各 12 克

〔功能与主治〕 消毒杀菌，祛腐排脓；用于小面积灼伤而

有继发感染者等。

〔用法〕加水煎汤，过滤去渣，待微温时淋洗伤口。

（二十一）回阳止痛洗药（《熏洗疗法》）

〔组成〕透骨草 30 克 当归 赤芍 川椒 苏木各 15 克 生南星 生半夏 生草乌 川牛膝 白芷 海桐皮各 10 克

〔功能与主治〕回阳止痛，活血通络；用于一切肢体怕冷、发凉、疼痛者，如血栓闭塞性脉管炎、肢端动脉痉挛等。

〔用法〕上药煎汤，温洗患处，每日 1~2 次。

（二十二）温经散寒洗剂（《张八卦外科新编》）

〔组成〕附子 干姜 桂枝 当归 花椒 赤芍 细辛 麻黄 红花各 30 克 毛皮树根 120 克

〔功能与主治〕温经散寒，活血止痛；用于脉管炎、风寒痹痛等。

〔用法〕放大锅内，加水 10 碗，煎至 5 碗，去渣洗患处。

（二十三）甘草芫花水（《疮疡外用本草》）

〔组成〕甘草 芫花各 15 克

〔功能与主治〕消肿止痛；用于冻疮等。

〔用法〕用水 1 升，煎上药后，未溃者趁热先渍，已溃者于洗后用黄连水纱条换药。

（二十四）桃红洗剂（《中医皮肤病学简编》）

〔组成〕桃仁 桂枝各 90 克 红花 30 克 川芎 30 克

〔功能与主治〕 活血消肿；用于冻疮等。

〔用法〕 水煎取液，熏洗患部。

（二十五）浅静脉炎洗剂（《中医外科心得集》）

〔组成〕 苏木 30 克 红花 15 克 银花 30 克 蒲公英 30 克 芒硝 15 克 当归 30 克 葱须 30 克 桑枝 30 克 明乳香 30 克 明没药 30 克

〔功能与主治〕 活血化瘀，清热消肿；用于浅静脉炎初期，红肿热痛者等。

〔用法〕 煎汤先熏后洗，每日 1 次，每次 30 分钟。

（二十六）深静脉炎洗剂（《中医外科心得集》）

〔组成〕 桑枝 30 克 芒硝 30 克 苦参 30 克 红花 15 克 苏木 30 克 当归 30 克 透骨草 30 克

〔功能与主治〕 活血通脉，消肿止痛；用于深静脉炎，肿胀甚者等。

〔用法〕 大盆煎汤，先熏后洗，再浸泡或湿敷患处，每日 1 次，每次 30 分钟。若红肿甚者加蒲公英、地丁；若紫暗发凉者，去苦参，加桂枝、艾叶。

（二十七）五倍子枯矾煎剂（《中医外科外治法》）

〔组成〕 五倍子 枯矾各 10 克

〔功能与主治〕 散结消肿；用于水疝（鞘膜积液）等。

〔用法〕 上药加水 300 毫升，煎半小时，凉至微温，以不烫皮肤为宜，将阴囊放入药液内浸洗，并用纱布湿敷患处，每日 2~3 次，每次约 20~30 分钟。用药前先洗净患部，如下次

用药仍需将药液加温，1剂用1天。

三、肛肠科病证方

(一)五倍子汤(《疡科选粹》)

〔组成〕 朴硝 桑寄生 莲房 荆芥 五倍子各 30 克

〔功能与主治〕 消肿止痛，收敛止血；用于痔疮脱肛等。

〔用法〕 煎汤熏洗患处。

(二)花椒洗药(《熏洗疗法》)

〔组成〕 花椒 10～15 克

〔功能与主治〕 消炎止痛，清洁伤口；用于痔、肛门瘻手术后等。

〔用法〕 用纱布将花椒包扎好，加水煎汤，趁热熏洗坐浴。每次换药时常规应用。

(三)硝矾洗药(《熏洗疗法》)

〔组成〕 朴硝 12 克 月石 明矾各 10 克

〔功能与主治〕 消炎，止痒，收敛；用于内外痔发炎、血栓外痔、肛瘻发炎期，以及皮肤癣病、手足多汗症等。

〔用法〕 用开水冲化后，趁热浸洗患处或坐浴。

(四)痔瘻洗剂 3 号(《中医外科外治法》)

〔组成〕 芒硝 30 克 红花 30 克 苏木 30 克 蒲公英

30 克 苦参 30 克 槐花 30 克 防风 15 克 蛇床子 30 克

〔功能与主治〕 活血通络, 清热燥湿; 用于内痔、外痔、肛窦炎等。

〔用法〕 共为粗末, 装入纱布袋内, 加水 2.5 升, 煮开后先熏洗, 后坐浴, 每次 30 分钟, 每日 1 次, 每剂可连用 3~5 天。

(五) 痔瘕洗剂 1 号(《中医外科外治法》)

〔组成〕 朴硝 30 克 莲房 30 克 五倍子 30 克 地榆 30 克 槐角 30 克 防风 30 克

〔功能与主治〕 消肿止痛, 收敛止血; 用于内痔脱出、出血、脱肛等。

〔用法〕 共为粗末, 装入纱布袋内, 加水 2.5~3 升, 煮沸即可, 用时先熏洗, 后坐浴, 每次 30 分钟, 每日 1~2 次, 每剂可用 2~3 天。

(六) 痔瘕洗剂 2 号(《中医外科外治法》)

〔组成〕 芒硝 30 克 苦参 30 克 黄柏 30 克 地肤子 30 克 地榆 30 克 槐角 30 克 蛇床子 30 克 银花 30 克 蒲公英 30 克

〔功能与主治〕 清热解毒, 止痒止血; 用于内痔嵌顿、外痔发炎、瘰疮肿痛、肛窦炎等肛门部红肿热痛, 渗液有脓水者。

〔用法〕 共为粗末, 装入纱布袋内, 加水 2.5 升, 煎开即可。用时先熏洗, 后坐浴, 每日 1 次, 每次 30 分钟。

(七) 防风洗药(《熏洗疗法》)

〔组成〕 防风 生枳壳 马齿苋各 30 克 黄芩 苦参 五倍子各 15 克

〔功能与主治〕 解毒消肿，消炎止痛；用于内痔嵌顿、内外痔发炎、血栓外痔等。

〔用法〕 加水煎汤，过滤去渣，趁热熏洗坐浴。

（八）艾叶洗药（《熏洗疗法》）

〔组成〕 艾叶 60 克

〔功能与主治〕 消炎止痛，生肌敛口；用于一切慢性瘰管、溃疡、肛门瘻手术后等。

〔用法〕 用纱布将艾叶包好，加水煎汤，趁热熏洗坐浴，每次换药时常规应用。

四、妇科病证方

（一）苦参汤（《疡科心得集》）

〔组成〕 苦参 60 克 蛇床子 30 克 白芷 15 克 银花 30 克 菊花 60 克 黄柏 15 克 地肤子 15 克 大菖蒲 9 克

〔功能与主治〕 祛风除湿，杀虫止痒；用于阴痒、阴蚀、松皮癣、麻风等。

〔用法〕 水煎去渣，临用时亦可加猪胆汁 4～5 滴，一般洗 2～3 次即可。

（二）治阴痒方（《集简方》）

〔组成〕 蛇床子 30 克 白矾 6 克

〔功能与主治〕 收湿止痒；用于女阴瘙痒、肛门瘙痒及阴囊湿疹等。

〔用法〕 煎汤频洗。

（三）漏痒汤（《外科正宗》）

〔组成〕 蛇床子 鹤虱各 30 克 威灵仙 苦参各 15 克
狼毒 当归各 10 克

〔功能与主治〕 祛风，杀虫，止痒；用于妇女阴痒难忍及阴内外生疮，如女阴瘙痒病、滴虫性阴道炎等。

〔用法〕 加水煎汤，过滤去渣，趁热熏洗坐浴，和人猪胆汁同洗更好，每日 2 次。

（四）止痒洗方（《古今名方》）

〔组成〕 藜芦草 苦参各 30 克 地肤子 15 克 明矾 9 克

〔功能与主治〕 燥湿止痒；用于阴囊、肛门、女阴瘙痒症等。

〔用法〕 煎水洗患处，每次洗 10～15 分钟。

（五）阴痒外洗方（《古今名方》）

〔组成〕 蛇床子 30 克 野菊花 30 克 苦参片 12 克

〔功能与主治〕 燥湿，杀虫，止痒；用于妇女阴痒等。

〔用法〕 水煎外洗患部。

（六）止痒洗剂 2 号（《中医外科外治法》）

〔组成〕 苦参 30 克 蛇床子 30 克 雄黄 9 克 川椒 9 克 老葱头 5 个 枯矾 9 克 地肤子 30 克

〔功能与主治〕 燥湿，杀虫，止痒；用于阴囊湿疹、会阴部瘙痒、湿疹等。

〔用法〕 上药共为粗末，装纱布袋内，加水 2.5 升，煮开即可。用时先熏后洗，待温后坐浴，每次 30 分钟左右，每剂药可用 3~4 次，每天 1~2 次，有抓破流津者慎用。

（七）复方蛇床子洗药（《熏洗疗法》）

〔组成〕 蛇床子 苦参 艾叶各 30 克 黄柏 金银花 地肤子各 12 克 川椒 白矾各 9 克

〔功能与主治〕 清热燥湿，杀虫止痒；用于外阴阴道炎、滴虫性阴道炎、女阴急性溃疡、阴囊湿疹等。

〔用法〕 加水煎汤，过滤去渣，趁热熏洗坐浴，每日 2 次。

（八）复方白鲜皮洗药（《熏洗疗法》）

〔组成〕 白鲜皮 蛇床子 苦参 椿根皮 枯矾各 30 克 黄柏 15 克

〔功能与主治〕 清热燥湿，杀虫止痒；用于宫颈糜烂等。

〔用法〕 加水煎汤，过滤去渣，趁热熏洗坐浴，每日 2 次。

（九）蛇床子洗方（《医宗金鉴》）

〔组成〕 威灵仙 蛇床子 当归尾 苦参各 15 克 绵砂壳 9 克 大黄 15 克 老葱头 7 个

〔功能与主治〕 散风祛湿，杀虫止痒；用于阴囊湿疹、阴囊瘙痒症、女阴溃疡等。

〔用法〕 上药加水5碗，煎沸1～3分钟，倾入盆内，先熏，待温浸洗，有抓破出津水者慎用。

五、五官科病证方

（一）疏风散湿汤（《审视瑶函》）

〔组成〕 黄连 赤芍 防风各6克 铜绿（后入） 川椒 归尾各3克 轻粉0.3克（另研） 羌活 五倍子各1克 荆芥2克 胆矾 明矾各15克

〔功能与主治〕 祛风，解毒，燥湿；用于睑缘炎、急性结膜炎、沙眼急性发作等。

〔用法〕 加水煎汤，过滤去渣，外加铜绿泡化，后入轻粉搅匀，潮洗患眼。

（二）秦皮汤（《千金要方》）

〔组成〕 秦皮30克 黄柏 决明了各15克 黄芩 黄连 栀子各10克

〔功能与主治〕 清热，解毒，明目；用于眼部急性炎症、急性结膜炎、睑缘炎等。

〔用法〕 加水煎汤，过滤去渣，趁热熏洗患眼。

（三）桑菊饮（《温病条辨》）

〔组成〕 冬桑叶 白菊花 苦杏仁 连翘各6克 桔梗 薄荷各2克 生甘草3克 鲜芦根30厘米

〔功能与主治〕 清热,解毒,明目;用于沙眼急性发作等。

〔用法〕 加水煎汤,过滤去渣,趁热熏洗患眼,每日3次。

(四)复方龙胆草熏洗剂(《眼科外用中药与临床》)

〔组成〕 龙胆草 秦皮 红花 生地各等份

〔功能与主治〕 利湿解毒;用于浅层或深层前部巩膜炎等。

〔用法〕 上药水煎,过滤去渣,熏洗及热敷患眼,每日3次,每次半小时。

(五)桑花驱风汤(《中医眼科学讲义》)

〔组成〕 桑叶 菊花 金银花各15克 黄连 防风 归尾 赤芍各10克

〔功能与主治〕 祛风解毒;用于麦粒肿、急性结膜炎、角膜溃疡、沙眼急性发作等。

〔用法〕 加水煎汤,过滤去渣,趁热熏洗患眼。

(六)唇风洗药(《中医外科外治法》)

〔组成〕 白鲜皮15克 蛇床子10克 苦参30克 土槿皮10克 地肤子30克

〔功能与主治〕 清热,祛风,利湿;用于慢性唇炎等。

〔用法〕 上药置砂锅煮沸约10分钟,离火后,去除药渣待温,将患唇浸泡于药液内,每次浸泡15分钟;或用消毒纱布浸透药液,湿于唇部,戴上口罩,可以自由活动。每天用药时间宜长,如果仅用1次则无效,1日1剂。

六、骨科病证方

(一)舒筋活血洗药(《伤科常见疾病治疗法》)

〔组成〕伸筋草 海桐皮 大秦艽 大当归 山钩钩 大独活各10克 川红花 兔儿酸 乳香 没药各6克

〔功能与主治〕舒筋活血止痛;用于骨折愈合后;无明显肿胀,关节及肢体活动功能障碍者等。

〔用法〕加水煎汤,过滤去渣,趁热熏洗溃患部。

(二)活血洗药(《熏洗疗法》)

〔组成〕丹参12克 五加皮 透骨草 川椒 川牛膝 木瓜 艾叶 白芷 红花各9克 肉桂4.5克

〔功能与主治〕舒筋活血,散风止痛;用于软组织损伤或骨折愈合后,关节及肢体活动功能障碍,以及风湿性关节炎等。

〔用法〕加水煎汤,过滤去渣,趁热熏洗溃患部。

(三)消肿止疼汤(《中医验方汇选》)

〔组成〕当归尾9克 赤芍9克 红茜草9克 透骨草9克

〔功能与主治〕活血,止痛,消肿;用于急性软组织损伤等。

〔用法〕用大砂锅煎熬,水开后改文火,炖2小时即妥。

用时先喝2碗,其余药汤趁热烫洗患处。

七、内科病证方

(一)茱萸浴汤(《医部全录》)

〔组成〕 吴茱萸 杜仲 蛇床子 五味子 丁皮各50克 木香 丁香各25克

〔功能与主治〕 温经散寒;用于下焦虚冷,脐腹疼痛等。

〔用法〕 上药共为细末,每取药末25克,装入纱布袋中,以水3大碗煎数沸,趁热熏下部,通身淋浴,早晚2次熏洗。

(二)五枝透骨汤(《中医外科外治法》)

〔组成〕 鲜桃枝 鲜柳枝 鲜桑枝 鲜槐枝各50克 桂枝20克 透骨草30克

〔功能与主治〕 祛风,止痛,除寒湿;用于痹证。

〔用法〕 先煎5枝20分钟,再入透骨草煎10分钟,即可熏洗患处,每次约1小时,每日1~2次,每剂可熏洗2~4次。

(三)桑菊祛风汤(《理瀹骈文》)

〔组成〕 冬桑叶30克 黄菊花15克 黑山栀10克 独活60克 天麻60克 薄荷30克

〔功能与主治〕 祛风,泄热,止痛;用于风热头痛等。

〔用法〕 上药水煎,待温,取药液洗头,反复擦洗,每日早、晚各1次。

(四)祛风活血汤(《熏洗疗法》)

〔组成〕 荆芥穗 9 克 白芷 9 克 川芎 9 克 白僵蚕 9 克 当归 9 克 全蝎 9 克

〔功能与主治〕 祛风化痰，解痉止痛；用于面神经麻痹等。

〔用法〕 煎汤趁热熏洗；本方可同时水煎服。

(五)茜草桐叶煎(《理瀉骈文》)

〔组成〕 茜草 30 克 梧桐叶 30 克

〔功能与主治〕 清热解毒，凉血止血；用于热痢等。

〔用法〕 加水 1 升，煎汤浸足。

八、儿科病证方

(一)清热液(《小儿外治疗法》)

〔组成〕 银花 板蓝根各 10 克 黄芩 20 克

〔功能与主治〕 疏风清热，解毒；用于小儿外感发热等。

〔用法〕 各药用适量水煎 2 次，混合各药液过滤去沉淀物，再浓缩至 100 毫升，每次用 30~50 毫升药液先熏洗后灌肠，每日 2 次，热甚者可加安乃近 1~2 毫升同灌。

(二)蝉衣消肿汤(《中医外科外治法》)

〔组成〕 蝉衣 15 克

〔功能与主治〕 散风消肿；用于婴幼儿阴茎肿大等。

〔用法〕 上药煎汤熏洗患处，1～2 次即消。

（三）蜂房煎（《理瀹骈文》）

〔组成〕 露蜂房 30 克

〔功能与主治〕 祛风止痉；用于小儿外感高热引起的手足抽搐等。

〔用法〕 加水 1 升，煎沸，洗浴。

第四章 皮肤科疾病

皮肤犹如藩篱一样被覆体表,一旦患病,最宜外治。熏洗疗法是治疗皮肤病的一种主要方法,此法可使药物直接作用于病灶处,使药物直达病所,发挥其治疗作用,其疗效往往比内服药好,如配合内服药效果更佳。

皮肤病种类繁多,治则有别。对于急性渗出性皮肤病,如急性湿疹、脚气、接触性皮炎、脓疱疮、脂溢性湿疹等,表现为红斑、丘疹及水疱糜烂、渗出、结痂者,应以清热燥湿,收敛止痒为治;应用时,药液应偏温,不宜过热,以免刺激创面,主要以湿敷为主,最好用4~8层无菌纱布蘸药汁湿敷创面,每5分钟换1次。对慢性肥厚性皮肤病,如慢性湿疹、神经性皮炎、结节性痒疹、银屑病、皮肤淀粉样变等皮肤粗糙肥厚者,治以活血通络,软坚润肤,祛风止痒,以促进血液循环,改善氧化过程,增强代谢机能,软化上皮;在应用过程中,以熏为主,洗时药液以偏热为好。对急性炎症性皮肤病,如毛囊炎、痤疮、丹毒、疖,应清热解毒,凉血消肿为治,可起到局部消炎杀菌,消肿止痛作用。对寄生虫类皮肤病,如体虱、头虱、疥疮等皮肤病,应以燥湿杀虫治之,除熏洗皮肤外,还要烫煮衣被。对浅部真菌性皮肤病,如手足癣、头癣、体癣、股癣等,常在燥湿清热药中加入一定的抑制真菌药物和食醋。

一、斑秃和全秃

斑秃又名圆形脱发，系突然发生于头部的无炎症性局限性脱发，可发生于任何年龄。一般无自觉症状，常无意中发现，头发呈斑片状脱落，脱发区呈圆形、椭圆形、不规则形，表面光滑，界限清楚。本病有自愈倾向，多数可再生新发，个别患者此愈彼脱，迁延1年或数年以上。

斑秃如发展到全部头发脱落叫全秃；有时腋毛、阴毛、眉毛等均脱落，叫普秃，此时恢复起来比较缓慢。

方(一)

〔组成〕 炙首乌 30 克 金樱子 30 克 侧柏叶 10 克
桑叶 6 克 60 度白酒 500 毫升

〔用法〕 以上中药研粗末，浸入白酒中1周后，过滤去渣，以药酒擦洗脱发局部，每日3~5次，连用1个月。

〔主治〕 斑秃、全秃、脱眉。

方(二)

〔组成〕 桑叶 麻叶各适量

〔用法〕 用米泔水煮汁，洗之，每日1次。

〔主治〕 脱眉、脱发。

方(三)

〔组成〕 艾叶 菊花 藜本 蔓荆子 防风 薄荷 荆

芥穗 麝香 甘松各 6 克

〔用法〕 加水煎数滚，取药汁，先以热气熏，候汤稍温，用布蘸洗，日二三次。洗后避风，忌鱼腥、发物。

〔主治〕 斑秃。

方(四)

〔组成〕 甘菊花 60 克 蔓荆子 柏叶 川芎 桑白皮 白芷 细辛 旱莲草各 30 克

〔用法〕 上药共研粗末，每次用药 60 克煎汤熏洗。

〔主治〕 斑秃及一切脱发。

方(五)

〔组成〕 桑白皮 300 克

〔用法〕 煎取汁，擦洗患处，1 日 2~3 次。

〔主治〕 斑秃。

二、脂溢性脱发

又称早秃或男性秃发，一般认为遗传是一个比较肯定的致病因素，此外雄性激素增加或对雄性激素敏感性增高也是一个重要因素。多见于成年男性，主要表现为头部油腻光亮如同擦油一样，头发呈均匀性脱落，毛发稀疏，不能覆盖头皮，严重者头顶头发完全脱落呈秃顶状。

方(一)

〔组成〕 苍耳子 苦参 王不留行 明矾各适量

〔用法〕 水煎，除渣取液，洗头，隔日1次。

〔主治〕 适用于皮脂分泌旺盛，头发油腻如涂油膏的脱发。

方(二)

〔组成〕 透骨草120克 皂角 王不留行各60克

〔用法〕 加适量水煮取汁，洗头部，洗后保留药物在头皮上，不要用水冲洗，隔日1次。

〔主治〕 头发油腻，头皮瘙痒，头发脱落。

方(三)

〔组成〕 桑白皮30克 五倍子15克 青箱子60克

〔用法〕 水煎取汁外洗，每日1次。

〔主治〕 头油大，头皮痒，脱眉，脱发。

方(四)

〔组成〕 桑叶10克 细辛6克 侧柏叶15克 桑白皮15克 桑椹15克

〔用法〕 水煎外洗，隔日1次。

〔主治〕 脂溢性脱发，头发枯燥无光，稀疏不生，或伴头皮痒，脱皮屑。

方(五)

〔组成〕 透骨草120克 侧柏叶120克 皂角60克 白矾9克

〔用法〕 用水适量，煎煮后待温洗头。

〔主治〕 脂溢性脱发及头部皮脂分泌旺盛。

三、白发、黄发

白发生于老年是衰老的一种表现；青少年白发可能与遗传有一定关系，但忧愁、焦虑、紧张等往往为重要诱因；某些皮肤病也常出现白发，如斑秃、白癜风等。

方（一）

〔组成〕 白僵蚕 零陵香 百药煎 白芨 青黛 白芷
滑石 甘松各等份

〔用法〕 研细末，水煎取汁外洗。

〔主治〕 白发、黄发、头发枯焦。

方（二）

〔组成〕 黑桑椹 60 克

〔用法〕 水渍之，涂发，洗发。

〔主治〕 白发、黄发、枯发。

方（三）

〔组成〕 酸石榴 五倍子 芝麻叶各等份

〔用法〕 研粗末，浸入铁器水中，取汁外洗。

〔主治〕 白发、黄发。

方(四)

- 〔组成〕 乌梅适量
〔用法〕 生油渍乌梅,常用敷头。
〔主治〕 须发花白。

方(五)

- 〔组成〕 木槿叶适量
〔用法〕 捣木槿叶,以热汤和药汁洗头。
〔主治〕 白发。

四、皮脂溢出

本病系皮脂腺功能紊乱,皮脂分泌过多而致;雄性激素水平增高可能是本病的主要原因,因此多见于青年人。该病在临床又分为油性和干性两种,油性皮脂溢出主要表现颜面、头皮、鼻沟异常油腻,如涂油脂,毛囊口扩张,用手能挤出乳白色线状软脂。干性皮脂溢出主要为头屑多,头皮布满细碎麸皮状白屑,常有痒感。

方(一)

- 〔组成〕 透骨草 120 克 皂角 60 克 王不留行 50 克
〔用法〕 加适量水煎煮,去渣过滤待温外洗,5~7 天 1 次。
〔主治〕 油性皮脂溢出(头皮、面部如涂油膏)。

方(二)

〔组成〕 厚朴 30 克 桑叶 30 克

〔用法〕 水煎取汁，外洗，5～7 天 1 次。

〔主治〕 油性皮脂溢出(头面部油腻大)。

方(三)

〔组成〕 瓦楞子适量

〔用法〕 晒干，烧灰，水淋取药汁，外洗患处，每天 1 次。

〔主治〕 油性皮脂溢出(头面部皮脂分泌旺盛如涂油状)。

方(四)

〔组成〕 皂角 荆芥 黑牵牛 白芷 威灵仙 侧柏叶
诃子各等份

〔用法〕 水煎取汁，熏洗头部，隔日 1 次。

〔主治〕 头油大，头发垢腻、脱落。

方(五)

〔组成〕 滑石 100 克 五倍子 30 克 地骨皮 20 克 王
不留行 白芷 细辛 防风 羌活 独活各 15 克

〔用法〕 水煎取汁洗头，隔日 1 次，洗前先用洗发膏洗净
头上污垢，再用药水淋洗。

〔主治〕 头发油腻，脱皮屑，头皮瘙痒。

方(六)

〔组成〕 当归 白芷 牵牛子 防风 荆芥穗 地骨皮
滑石 王不留行各等份

〔用法〕 上药为粗末，装布袋中，水煎取汁，洗头，每日1次。

〔主治〕 头垢大，毛发枯燥，柔软无泽。

方(七)

〔组成〕 生柏叶适量

〔用法〕 水煎取汁，洗头。

〔主治〕 干性皮脂溢出(头屑多，头皮痒)。

方(八)

〔组成〕 杏仁 乌麻子各等份

〔用法〕 将上二药捣为泥状，加水搅拌，过滤取汁，以汁洗头。

〔主治〕 头屑多，头皮痒，头发枯燥。

方(九)

〔组成〕 蔓荆子 大麻仁 防风 桑寄生 秦艽 白芷
芒硝各等份

〔用法〕 水煎取汁，洗头。

〔主治〕 头皮痒，起白屑，头发枯黄脱落。

方(十)

〔组成〕 大麻仁 秦艽 皂荚各等份

〔用法〕 上三味研末，米泔水浸渍一宿，去渣，洗头。

〔主治〕 头皮起白屑瘙痒。

方(十一)

〔组成〕 侧柏叶 120 克 苏叶 120 克 蒺藜秧 240 克

〔用法〕 研粗末，装纱布袋内，加水煮沸 30 分钟，外洗。

〔主治〕 头皮瘙痒，脱屑，脱发。

方(十二)

〔组成〕 苍耳子 地肤子 威灵仙 艾叶 吴茱萸各 15 克

〔用法〕 加水煮沸 15~30 分钟，滤汁，待温湿洗或湿敷头部，每日 1~2 次。

〔主治〕 干性皮脂溢出(头生白屑，瘙痒)。

方(十三)

〔组成〕 桑叶 侧柏叶 细辛 蛇床子 地骨皮各 20 克

〔用法〕 研粗粉，装布袋，加水煎煮 30 分钟，待温洗头，隔日 1 次。

〔主治〕 干性皮脂溢出(头皮白屑多，头皮痒，头发脱落)。

方(十四)

〔组成〕 桑叶 10 克 细辛 10 克 五倍子 10 克 蛇床子 30 克 硼砂 10 克 白矾 10 克

〔用法〕 水煎外洗，每日 1 次。

〔主治〕 干性皮脂溢出(头皮瘙痒,脱白屑搔抓如雪花飞扬)。

五、脂溢性皮炎

脂溢性皮炎为发生于皮脂溢出部位的一种慢性皮炎。目前普遍认为,主要病因是由于皮脂分泌过多,皮肤表面化学成分的改变,造成皮肤表面正常菌群失调,大量卵圆形糠疹芽孢菌繁殖所致。本病常发生于头面部,严重者可以发展至颈、胸、背、腋、股等多皮脂处。头面部脂溢性皮炎表现为:灰白色糠秕状油腻性鳞屑,基底潮红,严重者有渗出糜烂结痂。躯干部常表现为:圆形、椭圆形黄红斑片,表面有细碎薄屑,有的中心倾向正常皮色,呈环状。

方(一)

〔组成〕 透骨草 60 克 龙葵 30 克

〔用法〕 水煎外洗,或湿敷,每日 1 次。

〔主治〕 头部脂溢性皮炎(头油大,脱油腻性皮屑,瘙痒,头皮潮红有轻度渗出)。

方(二)

〔组成〕 苍耳子 30 克 苦参 30 克 白鲜皮 15 克 明矾 9 克

〔用法〕 水煎外洗或湿敷。

〔主治〕 各处脂溢性皮炎均可应用。

方(三)

〔组成〕 祁艾 菊花 桑本 蔓荆子 防风 薄荷 荆芥 藿香 甘松各等份

〔用法〕 水煎取汁，待温洗敷，每日1次。

〔主治〕 脂溢性皮炎合并有感染，渗液多。

方(四)

〔组成〕 马齿苋30克 黄柏30克 银花30克 生地榆30克 枯矾15克

〔用法〕 水煎取汁，局部湿敷，每日2~3次。

〔主治〕 脂溢性皮炎(潮红斑，或合并有感染，局部糜烂，渗出，结黄腻痂皮)。

方(五)

〔组成〕 蛇床子30克 五倍子30克 苦参30克 透骨草30克 龙胆草30克 川椒15克 黄柏15克

〔用法〕 水煎取汁，洗敷头部。

〔主治〕 头面皮色潮红，渗出结痂，油腻性皮屑及瘙痒(即渗出性脂溢性皮炎)。

方(六)

〔组成〕 石榴皮15克 大黄20克 黄芩15克 黄连20克 黄柏30克

〔用法〕 水煎取汁，湿敷，每日1~3次。

〔主治〕 脂溢性皮炎(湿热重，潮红斑，渗出多)。

方(七)

〔组成〕 苦参 90 克 野菊花 15 克 白鲜皮 15 克

〔用法〕 煎汤趁热湿渍患部。

〔主治〕 脂溢性皮炎。

六、颜面春季皮炎

颜面春季皮炎是春季和夏初发生于面部的一种非特异性皮炎。发病原因与春季花粉、光线、粉尘有关。多见于女性,也可发生于男性面部。患者常于每年春季发作。主要表现为,颜面潮红斑,或淡红斑,表面有糠状皮屑,严重者有轻度肿胀,自觉灼热、干燥、瘙痒。

方(一)

〔组成〕 蚕沙 30 克 车前子 10 克(布包)

〔用法〕 水煎取汁,局部洗敷,每日 1~2 次。

〔主治〕 颜面春季皮炎(以干燥脱皮屑为重)。

方(二)

〔组成〕 桑叶 10 克 菊花 10 克

〔用法〕 水煎取汁,局部洗敷,每日 1~2 次。

〔主治〕 颜面春季皮炎,以红斑灼热为重。

七、类固醇激素皮炎

该病主要原因是长期反复滥用激素类药膏，如肤轻松软膏、皮炎平霜、氯氟舒松霜等，造成皮肤继发性炎症反应。主要表现为面部皮肤变薄，毛细血管扩张，潮红斑，轻度肿胀，糠状皮屑，自觉干燥、灼热、瘙痒、涩痛。

方(一)

〔组成〕 蚕沙 15 克 白僵蚕 10 克 车前子 15 克(布包)

〔用法〕 水煎取汁，待凉湿敷，每次 15 分钟，每日 1~2 次。

〔主治〕 类固醇激素皮炎。

方(二)

〔组成〕 细辛 6 克 桑叶 6 克 蚕沙 15 克 车前子 10 克(布包)

〔用法〕 水煎取汁，待凉湿敷，每日 1~2 次，每次 10~15 分钟。

〔主治〕 类固醇激素皮炎。

方(三)

〔组成〕 木蝴蝶 6 克 霜桑叶 6 克

〔用法〕 水煎取汁，外洗

〔主治〕 类固醇激素皮炎。

八、急性湿疹

湿疹是由多种原因引起的一种过敏性炎症性疾患。急性湿疹是湿疹的一种表现形式，主要表现为急性炎症经过，皮损呈多形性，开始为弥漫性潮红，以后发展为丘疹、水疱、糜烂、渗液、结痂，常数种皮损同时存在。经过急剧，炎症明显。

方(一)

〔组成〕 黄柏 30 克 生地榆 30 克

〔用法〕 水煎 15～20 分钟后取汁，待温局部湿敷（用净纱布 6～7 层蘸药水湿敷）。

〔主治〕 急性湿疹（糜烂严重，渗出多）。

方(二)

〔组成〕 马齿苋 60 克

〔用法〕 用水 2 升煎煮 20 分钟，过滤去渣，待温局部湿敷，每天 2～3 次，每次 20～40 分钟。

〔主治〕 急性湿疹（渗出多者）。

方(三)

〔组成〕 龙胆草 30 克 龙葵 30 克 黄柏 30 克 野菊花 15 克 五倍子 30 克

〔用法〕 水煎 30 分钟，取汁待温，用干净纱布 4～8 层厚蘸药汁，湿敷于患处，每 5 分钟蘸 1 次，共 30～40 分钟。每日 2～3 次。

〔主治〕 急性湿疹合并有感染者。

方(四)

〔组成〕 生大黄 50 克 芒硝 50 克 苦参 30 克 蛇床子 30 克

〔用法〕 先煎大黄、苦参、蛇床子 30 分钟，取药液 500 毫升，再入芒硝洗患处，每日 2 次。

〔主治〕 急性湿疹。

方(五)

〔组成〕 大黄 黄柏 黄芩 地肤子 苍耳子 七茯苓 白鲜皮 苦参 鱼腥草 防风各 15 克 黄连 10 克 白矾 30 克

〔用法〕 加水 3 升，煎至 1 升，取汤趁热洗患处，每日 1 剂，分 2 次洗。

〔主治〕 急性湿疹。

方(六)

〔组成〕 苦参 30 克 苍术 15 克 黄柏 15 克 白鲜皮 15 克

〔用法〕 煎汤熏洗患处。

〔主治〕 急性湿疹。

九、慢性湿疹

常由急性湿疹长期不愈反复发作转变而来。多局限于某一部位，呈慢性炎症改变，患部皮肤粗糙肥厚，表面有鳞屑，颜色为褐红色，伴有色素沉着，边界清楚，抓破有浆液渗出。发生于手足部位，易发生皲裂。

方(一)

〔组成〕 蛇床子 30 克 苦参 30 克 地肤子 30 克 苍耳子 30 克 石菖蒲 30 克

〔用法〕 水煎取汁洗患处，每日 1 次。

〔主治〕 慢性湿疹(皮损粗糙肥厚者)。

方(二)

〔组成〕 紫背浮萍 土大黄 苍耳子 蛇床子 地肤子 花椒各等份

〔用法〕 水煎取汁外洗。

〔主治〕 阴囊慢性湿疹。

方(三)

〔组成〕 威灵仙 15 克 蛇床子 15 克 当归尾 15 克 缩砂壳 9 克 土大黄 15 克 老葱头 7 个 苦参 15 克

〔用法〕 将上药研碎装纱布袋内，置水中煮取汁，浸泡坐浴。

〔主治〕 外阴湿疹。

方(四)

〔组成〕 苍耳子 15 克 地肤子 15 克 土槿皮 15 克
蛇床子 15 克 苦参 15 克 百部 15 克 枯矾 6 克

〔用法〕 上药共研成粗末，装布袋置水中煮取汁，局部熏洗，每日 2 次，每次 15～30 分钟。

〔主治〕 慢性湿疹。

方(五)

〔组成〕 煅龙骨 透骨草 黄柏 花椒 苍术 地骨皮
羌活各 9 克

〔用法〕 水煎取汁，先熏后洗。

〔主治〕 慢性湿疹。

方(六)

〔组成〕 五倍子 蛇床子 紫草 土槿皮 白鲜皮 石榴皮 黄柏 赤石脂 生甘草各适量

〔用法〕 上药加水 3 升煎煮，取汁 2 升，趁热先熏，待药液不烫时坐浴，每日早晚各 1 次，轻者连续熏洗 1 周，重者连续熏洗 1～2 个月。

〔主治〕 顽固性肛门湿疹。

十、酒糟鼻

本病发病原因未明，目前倾向于在皮脂溢出的基础上有螨虫感染。患者常在进食辛辣食品、饮酒、暴晒、寒冷刺激、情绪激动时加剧。主要为鼻梁、双颊、下颊红斑，炎性丘疹，毛细血管扩张，严重者鼻尖皮脂腺肥大，结缔组织增生，使鼻尖肥大，形成鼻赘。

方(一)

〔组成〕 芫花 6 克 黄柏 15 克 川椒 10 克 苦参 15 克 土大黄 15 克 百部 15 克

〔用法〕 水煎取汁，待冷局部湿敷，每日 1~2 次。

〔主治〕 酒糟鼻。

方(二)

〔组成〕 马齿苋 30~60 克

〔用法〕 水煎取汁，湿敷或外洗患处，每日 1~2 次。

〔主治〕 酒糟鼻。

十一、痤疮

痤疮是一种毛囊皮脂腺结构的慢性炎症性疾病，可能与体内雄性激素分泌量增多有关，雄性激素可使皮脂腺分泌旺

盛，瘀积于毛囊内形成脂栓，影响皮脂分泌不易排出，造成粉刺，加之厌氧棒状杆菌大量繁殖，刺激毛囊引起炎症，形成痤疮。主要发生于颜面、胸背等处，表现为黑头粉刺、炎性丘疹，继发脓疱或结节。

方(一)

〔组成〕 土茯苓 30 克 虎杖 30 克 大黄 15 克 野菊花 15 克 银花 15 克

〔用法〕 水煎外洗，每日 1~3 次，每次 15~30 分钟。

〔主治〕 青年痤疮(呈脓疱状，皮脂分泌旺盛)。

方(二)

〔组成〕 大黄 黄柏 黄芩 苦参 蒲公英 紫花地丁 各 15 克

〔用法〕 水煎取汁，局部洗敷，每日 1~3 次。

〔主治〕 青年痤疮。

方(三)

〔组成〕 蚤休 15 克 黄药子 15 克 炒皂刺 30 克 土贝母 20 克 炮山甲 10 克 当归尾 15 克 乳香 没药各 10 克

〔用法〕 水煎取汁，待温，局部洗敷，每日 2~5 次。

〔主治〕 囊肿性痤疮。

方(四)

〔组成〕 白僵蚕 白附子 白芷 藁本各 30 克

〔用法〕 上药共研细末，每次少许水调洗面。

〔主治〕 青年痤疮。

方(五)

〔组成〕 射干 30 克 土大黄 15 克 苦参 10 克 野菊花 15 克

〔用法〕 水煎用药汁外洗，每日 3 次，分早中晚各 1 次。

〔主治〕 青年痤疮。

方(六)

〔组成〕 枇杷适量

〔用法〕 水煎取汁，洗面，每日 2~3 次。

〔主治〕 青年痤疮。

方(七)

〔组成〕 野菊花 240 克 朴硝 480 克 花椒 120 克 枯矾 120 克

〔用法〕 上药分作 7 份，每次 1 份，加适量水煮沸后倾入容器内（一般可用搪瓷面盆），趁热将病损部位放于盛药器之上，使蒸气直达患处，周围的空隙以布单包绕严密。待水变温时，浸洗患处，每日 1~2 次，每次 20 分钟。

〔主治〕 痤疮。

十二、扁平疣

扁平疣是一种病毒性良性赘生物，多发于青少年。常对称性发生于颜面、手背、前臂等部位。皮疹呈米粒大到黄豆大小，圆形或椭圆形的扁平状，无炎性丘疹，表面光滑，质地较硬，呈淡褐色或正常皮色。一般无任何感觉，偶尔有痒感。大多数骤然发生，逐渐增多。

方(一)

〔组成〕 马齿苋 60 克 露蜂房 白芷 蛇床子 细辛 各 9 克 陈皮 苍术 苦参各 15 克

〔用法〕 水煎取汁，反复擦洗 15 分钟，每日 4~5 次。

〔主治〕 扁平疣。

方(二)

〔组成〕 金毛狗脊 30 克 地肤子 30 克

〔用法〕 水煎取汁，反复擦洗患处，每日 2~3 次，每次 15~30 分钟。

〔主治〕 扁平疣。

方(三)

〔组成〕 白鲜皮 白矾各 30 克

〔用法〕 上药加水至 250 毫升后，煮沸 3~5 分钟，待温擦洗病处，每日 1 次，每次 15 分钟。

〔主治〕 扁平疣。

方(四)

〔组成〕 马齿苋(鲜)62克 苦参 陈皮各31克 蛇床子24克 苍术 露蜂房 白芷各18克 细辛12克

〔用法〕 上药加水浓煎后,趁热擦洗患处,以不擦破皮为度,每日1次。

〔主治〕 扁平疣。

方(五)

〔组成〕 当归 生地 赤芍 紫草 昆布 海浮石各15克 丹皮6克 鸡血藤 马齿苋 板蓝根各30克

〔用法〕 煎汤取汁,擦洗患处,每次20分钟,共用15~20天。重症患者可内服本方头煎。

〔主治〕 扁平疣。

方(六)

〔组成〕 苍术9克 细辛6克 陈皮12克 白芷12克 板蓝根30克 贯众30克

〔用法〕 上药水煎500毫升,趁热擦洗患处,每日3次,每次洗至皮损发红或局部感灼痛为度,每日用药1剂,一般4~6剂可愈。

〔主治〕 扁平疣。

十三、寻常疣

寻常疣是由人类乳头瘤病毒引起的病毒性赘生物。常发生于颜面部、手足等末梢处。呈圆形、椭圆形、多角形灰褐色或黄色突起，表面粗糙不平，有许多角化性小棘，质地坚硬，无自觉症状，常自家接种，由1个发展为多个或数十个。

方(一)

〔组成〕 木贼 香附各 30 克

〔用法〕 水煎取汁，浸泡患处，并反复擦洗。

〔主治〕 寻常疣。

方(二)

〔组成〕 金毛狗脊 地肤子各 30 克

〔用法〕 水煎取汁，泡洗患处。

〔主治〕 寻常疣。

方(三)

〔组成〕 马齿苋 30 克 苍术 露蜂房 白芷 陈皮各 15 克 细辛 10 克 蛇床子 苦参各 12 克

〔用法〕 加水 1.5~3 升，煎沸取药汁，浸泡洗涤患处，每天 1~2 次，每次 15~30 分钟。

〔主治〕 寻常疣。

方(四)

〔组成〕 马齿苋 60 克 露蜂房 白芷 蛇床子 细辛
各 9 克 陈皮 苍术 苦参各 15 克

〔用法〕 水煎取汁,反复擦洗患处 15 分钟,每日 3~5 次。

〔主治〕 寻常疣。

方(五)

〔组成〕 苍耳子 30~60 克

〔用法〕 水煎熏洗患处,每日 2 次。

〔主治〕 寻常疣和扁平疣。

方(六)

〔组成〕 蛇床子 60 克 地肤子 60 克 白鲜皮 60 克
明矾 60 克

〔用法〕 加水浓煎,趁热洗患处,每次擦洗 30 分钟,每日 2~3 次。

〔主治〕 寻常疣。

十四、黄褐斑

黄褐斑的发生与女性激素代谢失调有关,常在月经不调、痛经、口服避孕药、妊娠、精神创伤和日光暴晒情况下发生,以中青年女性多见。对称发生于双颊、前额、眉弓、眼周、颧、鼻、

鼻唇沟、下颏等处，呈黄褐色、咖啡色、淡黑色，形状不一，边界常清楚，无自觉症状。

方(一)

〔组成〕 白藜 白术 白牵牛 白附子 白芷 白芍药 白僵蚕各等份

〔用法〕 上药共研细末，每次用15克，煎汤外洗。

〔主治〕 黄褐斑。

方(二)

〔组成〕 当归10~15克 生地15~20克 川芎 赤芍各10~12克 梔子仁 红花各6~10克 血竭3克 白扁豆 白僵蚕各10~20克 白附子 白芷各10克 鹿角胶 阿胶 龟版胶各6克

〔用法〕 上药水煎取汁，洗局部，每日2~3次，洗毕后再用温水洗净。也可以用上药水煎内服，边服边洗效更佳。

〔主治〕 黄褐斑。

方(三)

〔组成〕 紫背浮萍120克 防风15克

〔用法〕 上药浓煎，趁热熏洗患处，每日3~5次。

〔主治〕 黄褐斑。

方(四)

〔组成〕 白僵蚕 黑牵牛 细辛各等份

〔用法〕 上为细末，每次用15克煎汤熏洗面部。

〔主治〕 面部色素斑。

方(五)

〔组成〕 桃花 杏花 当归各等份

〔用法〕 上药水浸煎煮取汁外洗。

〔主治〕 面部色素斑。

十五、黑变病

是一种原因尚未明了的黑色素沉着性疾病，一般倾向长期与汽油、机油、沥青、柴油、化学物品接触有关，但许多患者并无明显的接触史。本病多见于中年女性，易发生于暴露处，如面颈部、耳前后、双手背、前臂，少数可发生于躯干。损害初起时常有红斑和瘙痒，以后逐渐出现灰褐色的色素沉着，边界不太清楚，病程缓慢，一般不影响身体健康。

方(一)

〔组成〕 紫草 30 克 茜草 白芷 赤芍 苏木 南红花 次厚朴 丝瓜络 木通各 15 克

〔用法〕 加水煮沸 15～20 分钟，局部湿洗湿敷，每日 2～3 次，每次 15～30 分钟。

〔主治〕 黑变病及继发性色素沉着斑。

方(二)

〔组成〕 蒺藜 白芷 苦参 零陵香各等份。

〔用法〕 研粗末，水煎取汁外洗，每天3次。

〔主治〕 黑变病。

方(三)

〔组成〕 茯苓 白石脂各等份

〔用法〕 上二药研末，水煎取汁外洗，每日3次。

〔主治〕 黑变病、雀斑。

方(四)

〔组成〕 露蜂房适量

〔用法〕 水煎取汁，加入适量胡粉洗涂，每日2次。

〔主治〕 黑变病及其它色素沉着斑。

方(五)

〔组成〕 当归15克 红花6克 桃仁6克 丹参15克
制乳香 制没药各10克 血竭6克 赤芍9克 冬瓜仁
15克

〔用法〕 水煎取汁，趁热洗敷，每日2~3次，每次15~
30分钟。

〔主治〕 黑变病、黄褐斑、雀斑。

十六、掌跖脓疱病

掌跖脓疱病又称掌跖脓疱性银屑病，是银屑病之一。目前病因尚未明了。主要发生于手掌大小鱼际，扩延于掌心、指掌

面、足跖或跖侧缘。初起为红斑，在红斑上出现针帽至粟粒大小无菌深在性小脓疱，疱壁厚不易破裂，逐渐干涸形成黄褐色痂皮，脱落痂皮后又出现新脓疱。常伴有沟状舌，指、趾甲混浊、增厚、变形、分离。部分病人可在身体某部有银屑病损害。

方(一)

〔组成〕 露蜂房 50 克 细辛 15 克 川槿皮 15 克

〔用法〕 水煎取汁，浸泡手足，每日 2 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 掌跖脓疱病。

方(二)

〔组成〕 淫羊藿 鹤虱各 10 克 蛇床子 刺猬皮 石榴皮各 15 克

〔用法〕 加水适量，浓煎取汁，湿敷或浸泡患处，每日 2～3 次，每次 15 分钟。

〔主治〕 掌跖脓疱病。

方(三)

〔组成〕 苍耳子 地肤子 威灵仙 艾叶 吴茱萸各 15 克

〔用法〕 加水煮沸 15～30 分钟，待温汤洗，每天 3～5 次。

〔主治〕 掌跖脓疱病。

方(四)

〔组成〕 枯矾 50 克 朴硝 100 克 五倍子 30 克 黄柏

30 克 川椒 20 克

〔用法〕 水煎取汁，浸泡手足。

〔主治〕 掌跖脓疱病。

十七、银屑病

银屑病是一种原因尚未完全明了的慢性炎症性皮肤病，成人发病率较高。损害分布全身皮肤，初起为散在红色小丘疹，以后逐渐扩大成大小不等的斑片，边界清楚，表面覆以银白色鳞屑，刮去鳞屑后出现点状出血。皮疹色鲜红，逐渐增多和扩大的叫进行期；损害不增加，久不消退的叫静止期。本病病程长，易复发，大部分病例冬季加重，少数在夏季加重。

方（一）

〔组成〕 蛇床子 生大黄 大枫子 白鲜皮 鹤虱草各 15 克 苦参 30 克 黄柏 生杏仁 枯矾 朴硝 蝉衣 露蜂房各 9 克 丹皮 12 克

〔用法〕 上药煎煮取汁，趁热熏洗患处，每日 1~2 次。

〔主治〕 银屑病静止期（皮屑厚而炎症轻）。

方（二）

〔组成〕 篇蓄 30 克 艾叶 15 克 蛇床子 30 克 五倍子 15 克 路路通 10 克

〔用法〕 上药研粗末，装布袋内，加水煎煮，取汁，外洗敷，每日 1 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 银屑病静止期(炎症轻、鳞屑多、叠层堆积)。

方(三)

〔组成〕 金钱草 45 克 篇蓄 30 克 楮桃叶 60 克

〔用法〕 加水煮沸 15 分钟,滤汁,待温洗敷,每日 1~2 次,每次 15~30 分钟。

〔主治〕 银屑病进行期(皮疹潮红,炎症明显,并不断增多,面积扩大)。

方(四)

〔组成〕 侧柏叶 120 克 苏叶 120 克 蒺藜秧 240 克

〔用法〕 加水煎煮 30 分钟,取汁过滤,待温洗浴,每日 1~2 次,每次 15~30 分钟。

〔主治〕 银屑病静止期(皮疹基底暗红或淡红,皮屑厚,堆积呈蛎壳状)。

方(五)

〔组成〕 枯矾 120 克 朴硝 500 克 野菊花 250 克 川椒 120 克

〔用法〕 水煎取汁,过滤待温洗浴,每日 1 次,每次 15 分钟。

〔主治〕 银屑病进行期、静止期均可应用。

方(六)

〔组成〕 侧柏叶 楮桃叶各 100 克 细辛 30 克 露蜂房 60 克

〔用法〕 加水煎煮 30 分钟，取汁泡浴，每日 1 次，每次 30～40 分钟。

〔主治〕 各期银屑病。

方(七)

〔组成〕 大枫子 30 克 地肤子 30 克 蓖麻子 30 克
祁艾 30 克 苏子 15 克 苦杏仁 15 克 银杏 12 克 苦参 12 克

〔用法〕 共研粗末，用纱布包扎放锅内煮 30 分钟，取汤，先熏后洗，每日早晚各 1 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 各期银屑病。

方(八)

〔组成〕 苦参 蛇床子 地肤子 白鲜皮 土大黄 土茯苓各等量

〔用法〕 共研成粉末，过 80 目筛，取药粉 20 克加入开水 1 盆，煮沸，待温后洗敷局部病变。每日 1 次，每次 10～30 分钟。

〔主治〕 寻常性银屑病。

方(九)

〔组成〕 鲜艾叶适量

〔用法〕 加水煎煮洗患处，每日 1～2 次。

〔主治〕 寻常性银屑病，脓疱型银屑病。

方(十)

〔组成〕 石榴皮 30~60 克

〔用法〕 加水半脸盆煎液洗患处，每天或隔 2~3 天 1 次，洗至痊愈为止。

〔主治〕 银屑病。

方(十一)

〔组成〕 秦艽 60 克

〔用法〕 煎汤趁热焗洗患处。

〔主治〕 银屑病。

十八、神经性皮炎

神经性皮炎是一种有剧烈瘙痒的慢性皮炎。皮肤损害呈苔藓样硬化改变，病程缓慢。患者常伴有其它神经官能症的症状，如失眠、焦虑、心悸、头痛、疲惫等。起病初期，仅有局部瘙痒，以后皮肤逐渐增厚，皮纹加深，皮嵴隆起，形成苔藓样改变，表面有抓痕及鳞屑。损害好发于颈部、肘部、骶部及胫前部。

方(一)

〔组成〕 透骨草 艾叶各 6 克 防风 羌活 独活各 4 克 苍耳子 紫花地丁 马齿苋各 3 克

〔用法〕 共煎取汁，洗敷患处，每日 2~3 次，每次 20 分钟。

〔主治〕 神经性皮炎(肥厚不太重，因搔抓皮损潮红)。

方(二)

〔组成〕 苍耳子 川椒 苦参 蛇床子 土槿皮 苍术
百部各 30 克 斑蝥 0.5 克

〔用法〕 上药加水 1.5~2 升,煮沸 20 分钟,取汁(不得少于 1000 毫升)局部擦洗,每日 2~3 次,每次 30 分钟。

〔主治〕 神经性皮炎(皮损肥厚呈皮革样改变)。

方(三)

〔组成〕 路路通 苍术各 60 克 百部 艾叶 枯矾各 15 克

〔用法〕 加水 1~1.5 升水,煮沸 20 分钟,滤汁,局部清洗,每日 2 次。

〔主治〕 神经性皮炎(呈肥厚样变)。

方(四)

〔组成〕 百部 120 克 苦参 120 克 蛇床子 60 克 雄黄 5 克 狼毒 15 克

〔用法〕 共研粗末,装纱布袋内,用水煮沸 30 分钟,用毛巾清洗,或洗后再加热水浸浴。有抓破疮面者慎用。

〔主治〕 泛发性神经性皮炎。

方(五)

〔组成〕 苍术 9 克 黄柏 9 克 苦参 9 克 防风 大枫子 白鲜皮各 30 克 松香 鹤虱草各 12 克 五倍子 15 克

〔用法〕 共研粗末,用纱布包扎好,放入锅内煎沸 30 分

钟，取汤先熏后洗。

〔主治〕 神经性皮炎。

方(六)

〔组成〕 蛇床子 苦参 牛蒡子 防风 芥穗 泽兰
赤芍 川椒 白鲜皮 鹤虱 生川乌 皂角各 15 克 丹皮
9 克 大枫子 24 克

〔用法〕 将上药研为粗末，用纱布包扎好，加水煎煮后，
过滤去渣，趁热熏洗或潮洗患处，每日 2 次，每次 1~2 小时。

〔主治〕 神经性皮炎。

十九、皮肤瘙痒症

皮肤瘙痒症是一种自觉瘙痒而无原发损害的皮肤病。与神经精神因素、皮肤干燥、糖尿病、肝病、肾病等多种原因有关，老年人皮肤老化、干燥、萎缩最易发生瘙痒，因此皮肤瘙痒症多见于老年人，而且冬重夏轻。瘙痒可以是全身性的，也可以是局部性的，外阴瘙痒和肛门瘙痒是一种局部皮肤瘙痒症。皮肤瘙痒症常呈阵发性发作，尤以夜间为重。久之因不断搔抓，皮肤可以增厚、粗糙，呈苔藓样改变。

方(一)

〔组成〕 百部 苦参各 120 克 雄黄 15 克 狼毒 75 克

〔用法〕 共研粗末，装纱布袋内，加水 2.5~3 升煎煮 30 分钟，用毛巾潮洗，有抓破者慎用。

〔主治〕 皮肤瘙痒症(皮肤粗糙肥厚如皮革状)。

方(二)

〔组成〕 楮桃叶 250 克

〔用法〕 加水煮沸 30 分钟后,局部潮洗。

〔主治〕 皮肤瘙痒症(皮肤干燥老化欠润泽)。

方(三)

〔组成〕 苍耳草 艾叶各 50 克 露蜂房 白鲜皮 苦参 地肤子 川槿皮各 30 克 川椒 白矾各 20 克

〔用法〕 上药加水煎煮,过滤,趁热外洗,每天 1~2 次,每次 15~20 分钟。

〔主治〕 皮肤瘙痒症(瘙痒程度重,影响工作生活)。

方(四)

〔组成〕 路路通 苍术各 60 克 百部 艾叶 枯矾各 15 克

〔用法〕 上药加水 1~1.5 升,煮沸 20 分钟,滤汁,先熏后洗,每日 2~3 次,每次 30 分钟。

〔主治〕 皮肤瘙痒症。

方(五)

〔组成〕 防风 30 克 荆芥 20 克 地肤子 40 克 蛇床子 60 克 川乌 10 克 草乌 10 克 浮萍 100 克 生地 30 克

〔用法〕 上药加适量水煎煮,去渣滤液倾入浴盆中,洗浴 15~20 分钟,每日 1~2 次。

〔主治〕 皮肤瘙痒症。

方(六)

〔组成〕 藜苳草 苦参各 30 克 地肤子 15 克 明矾 9 克

〔用法〕 上药加水适量煎沸，取汁熏洗患处，每日 1 次，每次 10～15 分钟。

〔主治〕 肛门瘙痒症、外阴瘙痒症。

方(七)

〔组成〕 茵陈 苦参 蛇床子各等份。

〔用法〕 加水煎煮 30 分钟，取汁待温，坐浴。

〔主治〕 肛门瘙痒症、外阴瘙痒症。

二十、痒疹

痒疹是一组炎症性瘙痒性皮肤病，分单纯性和结节性两种，诱发原因很多，如虫咬、食物过敏、扁桃体炎、龋齿、气候变化、肠寄生虫、妊娠等。单纯性痒疹皮损为米粒至绿豆大小风团性丘疹或丘疱疹，色潮红或淡红，好发于四肢伸侧、胸背、腰部，也可泛发全身。因搔抓皮肤可变粗变厚，呈苔藓样改变。结节性痒疹损害初起为散在小红斑丘疹，不相融合，而后逐渐变硬呈半球状结节，表面光滑，被覆不易剥离之灰白色鳞屑，病程缓慢可迁延多年。

方(一)

〔组成〕 路路通 苍术各 60 克 百部 艾叶 枯矾各 15 克

〔用法〕 加水 1~1.5 升,煮沸 20 分钟,滤汁外洗,每日 2 次。

〔主治〕 结节性痒疹(皮疹粗糙肥厚)。

方(二)

〔组成〕 苍耳子 土槿皮 蛇床子 苦参 蚕沙各 30 克 当归 红花 细辛 金毛狗脊各 15 克

〔用法〕 加水适量水煎取汁,倾入盆中,用毛巾蘸药汁擦洗;每日 1~2 次,每次 30 分钟。

〔主治〕 结节性痒疹(皮肤粗糙肥厚)。

方(三)

〔组成〕 桃叶 浮萍 僵蚕 薄荷 苦参 地肤子各 15 克

〔用法〕 上药加水适量,煎煮取汁,局部外洗,每日 2~3 次,每次 15~30 分钟。

〔主治〕 单纯性痒疹或急性痒疹(皮疹呈红色风团或小丘疹,或丘疱疹)。

方(四)

〔组成〕 百部 30 克 苍耳子 30 克 篇蓄 30 克 桑叶 15 克 蝉衣 15 克

〔用法〕 上药加水煎煮 30 分钟，洗浴，每日 1 次，每次 20 分钟。

〔主治〕 急性痒疹（皮疹呈淡红色，发作急，瘙痒甚）。

二十一、荨麻疹

荨麻疹是一种常见的过敏性皮肤病。基本损害为风团，呈扁平状浮肿性斑块，颜色淡红，边缘可有红晕，水肿较重则呈白色。常骤然发生，迅速消退，瘙痒剧烈，愈后不留任何痕迹。引起本病的原因众多，如花粉、药物、粉尘、鱼虾、阳光、寒冷、精神兴奋紧张、虫咬、感染等。荨麻疹的病因不同，表现形式也不同，可分为寻常性荨麻疹、血管性水肿、人工荨麻疹、日光性荨麻疹、寒冷性荨麻疹、胆碱能性荨麻疹。

方（一）

〔组成〕 苦参 50 克 地肤子 艾叶 防风 荆芥 白鲜皮 百部各 25 克 蝉衣 20 克 、

〔用法〕 每日 1 剂，1 日 3~4 次水煎外洗。3 日为 1 个疗程。

〔主治〕 荨麻疹（凡属风热之毒而致者均可使用，如风团来势迅速，消退快，皮疹呈红色，边缘有红晕，受热加重等）。

方（二）

〔组成〕 百部 30 克 樟脑 6 克

〔用法〕 用干净纱布将二药包好，再用白酒（49 度~60

度均可)适量将药浸泡6小时。用药包蘸酒反复擦洗患处,每日1~2次。皮肤有破损者慎用。

〔主治〕 荨麻疹(反复发作不愈,下午及晚间加重者)。

方(三)

〔组成〕 紫背浮萍 蚕沙各100克

〔用法〕 上药加适量水煎至沸后约10分钟,取汁3~5升,待温后用干净毛巾蘸汁,从头部向下肢擦洗,每日1~2次,每次10~15分钟。

〔主治〕 荨麻疹,急慢性均可应用。

方(四)

〔组成〕 夜交藤200克 苍耳子 白蒺藜各100克 白鲜皮 蛇床子各50克 蝉蜕20克

〔用法〕 上药加水5升,煎煮20分钟后,趁热先熏蒸患处,待温后,用毛巾或干净旧布浸药液外洗患处。每剂可洗3~5次,一般熏洗2小时后风团消退。

〔主治〕 各型荨麻疹。

方(五)

〔组成〕 地肤子20克 白芷5克 防风15克 川椒15克 透骨草15克 赤芍15克 一枝蒿15克 独活15克 荆芥15克

〔用法〕 上药加水1.5升,煎沸30分钟,洗患处,每日1次,每次30分钟。

〔主治〕 各型荨麻疹。

方(六)

〔组成〕 楮桃叶 500 克

〔用法〕 上药加水 5 升，煮沸 30 分钟后焯洗或浸浴。

〔主治〕 慢性荨麻疹。

方(七)

〔组成〕 蛇床子 60 克 防风 60 克 生痰藜 60 克

〔用法〕 煎汤趁热洗浴。

〔主治〕 荨麻疹。

方(八)

〔组成〕 丹参 60 克 苦参 60 克 蛇床子 60 克

〔用法〕 煎汤趁热熏洗。

〔主治〕 荨麻疹。

方(九)

〔组成〕 川椒 50 克 生龙骨 50 克 艾叶 30 克 蝉衣 50 克 苦参 50 克 白鲜皮 50 克 藿香 50 克 乌梢蛇 50 克 白矾 20 克 米醋 100 毫升 大蒜(捣烂)2 头 60 度白酒 100 毫升。

〔用法〕 将上药(米醋、大蒜、白酒除外)用 10 倍水煎好后，加入醋、蒜、酒，立即倒入洗衣盆内。洗衣盆上搭上板，患者充分暴露身体，坐在木板上，迅速用筒式塑料布将全身(露出头面)与洗衣盆遮严，勿令泄气，此时利用热气熏洗全身。当药液温度降低至无蒸气时，将塑料布取下，搓洗全身，重点搓洗

患处，待药液凉后，上床盖被发汗，汗后避风，每晚1次，4天为1个疗程。

〔主治〕 急慢性荨麻疹。

二十二、丘疹性荨麻疹

丘疹性荨麻疹，为一种急性过敏性皮肤病，常见于儿童，夏秋季多见，多与昆虫叮咬、胃肠功能障碍、肠道寄生虫、食物过敏等有关。基本损害为花生米大小椭圆形浮肿性红斑，形状好像纺锤形，周边有伪足，中心可有水疱，多见于四肢远端、腹部、臀部等处，瘙痒剧烈。

方(一)

〔组成〕 银花 蒲公英 蝉衣 丹皮 薄荷 黄芩各15克

〔用法〕 上药加水煮沸15分钟，待温外洗，每日2次，每次15～30分钟。

〔主治〕 丘疹性荨麻疹(以红斑为主)。

方(二)

〔组成〕 大黄 黄柏 黄芩 苦参 生地榆各20克

〔用法〕 上药加水煎煮30分钟，取汁待温局部湿洗。每日2～3次，每次15～30分钟。

〔主治〕 丘疹性荨麻疹(伴有水疱及疱破渗出者)。

方(三)

〔组成〕 马齿苋 30 克 黄柏 30 克 枯矾 30 克 滑石 15 克 炉甘石 30 克

〔用法〕 上药共研粗末，装纱布袋内煎煮 30 分钟，取汁，待温局部洗敷。

〔主治〕 丘疹性荨麻疹（水疱大，水疱多，抓破后局部糜烂渗出者）。

方(四)

〔组成〕 虎杖 40 克 败酱草 30 克 银花 30 克 生地榆 20 克 大黄 30 克 青黛 10 克

〔用法〕 上药加水煎煮取汁，局部湿洗，每日 2~3 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 丘疹性荨麻疹（伴有感染、局部潮红、糜烂、脓性分泌物）。

方(五)

〔组成〕 龙胆草 100 克

〔用法〕 上药加水煎煮 30 分钟，湿洗患处，每日 2~3 次，每次 20 分钟。

〔主治〕 丘疹性荨麻疹各期均可应用。

二十三、手、足、甲癣

该病是真菌侵犯手、足表皮和趾指甲而引起的浅表真菌病。夏季多见。

足癣也称“脚气”，轻度足癣常仅限于第3～5趾间，趾缝间皮肤浸渍腐白，刮除白皮，露出潮红湿润面，为间擦型足癣；若脚缘，足底发生水疱，初为澄清液，此后成为混浊黄白水疱，然后干枯，变成皮屑，为水疱型足癣；若足底、足跟皮肤粗糙肥厚皲裂无汗，冬季加重，为角化过度型足癣。瘙痒是脚癣的主要症状。

手癣往往是由足癣传染而来，开始仅限于一侧手，损害与足癣相似，也有间擦型、水疱型、角化过度型不同。

手足癣可以引起指、趾甲癣，开始波及指（趾）甲数目较少，以后逐渐增多，且指（趾）甲增厚、变形，混浊无光泽，表面凹凸不平。

方（一）

〔组成〕 浮萍 僵蚕各12克 防风 荆芥 生川乌 生草乌 威灵仙 牙皂 白鲜皮 羌活 独活 黄精各9克 鲜凤仙花1株

〔用法〕 食醋1升，浸上药24小时后，用小火煮沸，滤汁浸泡手足，每日1次，每次30分钟，浸后拭干，不要用水冲洗。

〔主治〕 水疱型手足癣。

方(二)

〔组成〕 黄精 120 克

〔用法〕 加水适量，煮沸待温，湿敷患处，每日 3～5 次，每次 20～30 分钟。

〔主治〕 间擦型手足癣（手足癣以指趾间浸渍腐白或糜烂渗出为重）。

方(三)

〔组成〕 石榴皮 30 克 五倍子 威灵仙各 15 克 陈皮 10 克

〔用法〕 加水煎煮 30 分钟，取汁过滤待温，湿洗患处。

〔主治〕 间擦型手足癣（皮疹以浸渍腐白为主）。

方(四)

〔组成〕 苍耳草（全草）31 克 蛇床子 露蜂房 苦参 白矾 黄柏各 15 克

〔用法〕 上药放瓦罐或瓷器内，加入水约 1 升，煎至 800 毫升，弃渣，再加入温水 4～5 倍，洗患处，每天 1 次。

〔主治〕 水疱、糜烂型手足癣。

方(五)

〔组成〕 苦参 菊花各 60 克 蛇床子 银花各 30 克 菖蒲 黄柏 地肤子 白芷各 20 克 射干 胡黄连 白鲜皮各 15 克

〔用法〕 上药煎汁，熏洗患处，每日 1～2 次，每次 30 分

钟。

〔主治〕 手足癣(以糜烂、水疱为重,或合并有感染者)。

方(六)

〔组成〕 苍术 黄柏各 15 克 苦参 白鲜皮 马齿苋
车前子(布包)各 30 克

〔用法〕 上药加水煎煮 30 分钟,取汁外洗,每日 2~3 次。

〔主治〕 水疱型手足癣合并感染(局部糜烂、渗出、红肿热痛,伴淋巴管发炎者)。

方(七)

〔组成〕 萝卜(鲜)1 千克

〔用法〕 将萝卜切成小块,加水适量煎煮 30 分钟,去渣取汁,待温洗患处,每日 2~3 次,15 天为 1 个疗程。

〔主治〕 各型手足癣。

方(八)

〔组成〕 醋 1.5 升 食盐 30 克 白矾 60 克 阿斯匹林
10 克 石碳酸 20 毫升

〔用法〕 加水煎煮,洗患处,每日 2 次,每次 30~40 分钟。

〔主治〕 水疱型、间擦型、糜烂型手足癣。

方(九)

〔组成〕 白矾 皂矾各 12.5 克 儿茶 15 克 侧柏叶

250 克

〔用法〕 加水适量煮沸，先熏后洗，每日 2~3 次。

〔主治〕 角化过度型手足癣。

方(十)

〔组成〕 荆芥 18 克 防风 18 克 红花 18 克 地骨皮 18 克 皂角 30 克 大枫子 30 克 明矾 18 克

〔用法〕 上药用米醋 1.5 升，浸泡 3~5 天后。用药醋浸泡手足，每晚 1 次，连泡 2 周为 1 个疗程。

〔主治〕 角化过度型手足癣(局部干燥角化肥厚皲裂)。

方(十一)

〔组成〕 斑蝥 0.9 克 蜈蚣 3 条 白信 6 克 樟脑 白芷 土槿皮 大黄 马钱子各 9 克

〔用法〕 将上药共研细末，用米醋 1 升，浸泡 24 小时后，将患手患足浸入药液，先浸手后浸足，初次每日洗 5~10 分钟，2~3 日逐渐延长至 1~2 小时。

〔主治〕 角化过度型手足癣。

方(十二)

〔组成〕 白矾 五倍子 地肤子 蛇床子 苦参各 30 克 大枫子 川椒 黄柏各 25 克

〔用法〕 上方共研粗末，用食醋 1 升浸泡 5 天即可使用。用时先将药液振匀，然后将患手患足浸入药液，每日浸泡 2 次，每次浸泡 15 分钟，浸泡完毕用温水洗净药液。

〔主治〕 角化过度型手足癣。

方(十三)

〔组成〕 大枫子肉(研碎)9克 花椒9克 明矾12克
皂莢15克 石膏(研碎)9克 五加皮9克 土槿皮15克

〔用法〕 加鲜凤仙花5朵,米醋250~500毫升,将药与醋放在砂锅内先浸一夜,次日煮沸后将药汁倒入搪瓷盆内待温,将患手浸入,第一天浸洗4小时左右,第二天浸洗2小时左右。从开始浸泡日起,7天内不能使用碱水洗,有裂口暂缓使用。

〔主治〕 角化过度型手癣、甲癣及角化过度型足癣。

方(十四)

〔组成〕 地骨皮30克 白矾15克

〔用法〕 将上二药同时放盆内,加沸水2升,盖严焖10分钟后熏洗,约30分钟,每日1次。

〔主治〕 角化过度型手足癣。

方(十五)

〔组成〕 枯矾 白矾各30克 地骨皮60克 猪牙皂
侧柏叶 花椒 雄黄各15克 冰醋酸10毫升(或米醋50毫升)。

〔用法〕 先将猪牙皂、地骨皮、侧柏叶、花椒加水1升,煎至600毫升,滤液取渣再煎至400毫升,将两滤液混合后加热,投入枯矾、白矾、雄黄、冰醋酸搅溶,待温浸泡病甲20~30分钟,然后用刀削除肥厚病甲至甲床,外用纱布包裹,胶布固定。每周2~3次,至新甲正常生长。

〔主治〕 甲癣。

方(十六)

〔组成〕 土槿皮 大枫子肉 花椒 百部 皂刺 黄精
生川乌 生姜 明矾 五加皮各15克 米醋750毫升

〔用法〕 用醋浸泡药1周,再用药醋浸泡患甲。

〔主治〕 甲癣。

方(十七)

〔组成〕 生大蒜10瓣 食醋30~60毫升

〔用法〕 将生大蒜捣烂,用醋浸泡2小时后将指甲伸到醋蒜液中浸洗,每日浸洗3~5次,每次10~15分钟。

〔主治〕 甲癣。

二十四、体癣、股癣

体癣是由真菌侵犯人体平滑皮肤引起的疾病,如面、颈、躯干、四肢等。可因病人直接接触或通过用具、带菌衣服传染;也可本身原有手足癣,自身传播而来;或接触有癣病的猫、狗、牛等传染而来。体癣开始发病时是小片淡红色斑丘疹,以后向四周扩展,中心部炎症消退,边缘不断向周围扩展,形成环形损害。损害可有1个至数个,大小不等,也可相互融合。有明显瘙痒症状,夏季多见。

股癣是发生于股内侧,或臀沟附近的体癣,向股下方或臀部呈环形发展,边界清楚,痒感明显。

方(一)

〔组成〕 土大黄 50 克

〔用法〕 加水煎煮 30 分钟，局部熏洗，每日 2 次，每次 15～30 分钟。

〔主治〕 体癣、股癣。

方(二)

〔组成〕 紫槿皮 60 克 百部 30 克 蛇床子 15 克 防风 15 克 露蜂房 10 克 苦参 30 克

〔用法〕 上药加水煎煮 30 分钟，取汁待温，局部洗敷，或坐浴，每次 30 分钟，每日 1～2 次。

〔主治〕 体癣、股癣。

方(三)

〔组成〕 硫黄 30 克 明矾 大蒜各 10 克 炉甘石 氧化锌各 6 克

〔用法〕 将硫黄、明矾、大蒜三味研细末，加后二味于前药中，置搪瓷盆内加适量食醋调匀，煮沸 10 分钟，待冷后擦洗患处。每日 2 次。

〔主治〕 体癣。

方(四)

〔组成〕 生大黄 15 克 丁香 9 克 食醋 90 毫升

〔用法〕 药浸泡在醋中 5～7 天后，取汁过滤，外擦洗。

〔主治〕 体癣、股癣。

方(五)

〔组成〕 桃树皮 枣枝各 50 克 五加皮 30 克

〔用法〕 上药加水 1.5~2.5 升,煮沸 30 分钟,熏洗患处,每日 1 剂,早晚各 1 次,7 天为 1 个疗程。

〔主治〕 体癣、股癣。

方(六)

〔组成〕 桃枝 50 克 鲜山楂 30 克 核桃枝 50 克

〔用法〕 上药加水 250 毫升,煎煮 30 分钟,趁热先熏患部,然后再洗患部,每日 1 剂,分 2 次外洗。

〔主治〕 体癣、股癣。

二十五、头癣

头癣是发生在头部的一种浅部真菌病,有传染性,患者大多是儿童。头癣有黄癣、白癣、黑点癣三种。

黄癣俗称“秃疮”,最初在毛囊口周围形成黄色痂皮,逐渐长大,形成直径 3~5 毫米大小的碟形黄痂,中心稍凹陷,边缘隆起,痂紧附头皮,剥离后,下面是潮红湿润面。黄痂互相融合成大片灰白色黄痂,有鼠臭味,毛发干枯无光泽,最后脱落,黄痂也随之脱落形成萎缩性瘢痕。头发永久不生。

白癣的特点是头皮有圆形或椭圆形白色鳞屑斑片,片中头发折断脱落,呈干枯稀疏状。毛发外包绕灰白色套状物,称为菌鞘,有轻度瘙痒。到青春期多自愈,头发重新长出。

· 黑点癣为紫色毛癣菌和断发菌所致，皮疹为散在脱屑性斑片，病区毛发一出头皮即被折断，断发在毛囊口呈黑点状，故称黑点癣。

方(一)

〔组成〕 五倍子 30 克

〔用法〕 水煎取汁，加入米醋 120 毫升，混匀，洗患处，每天 3~4 次。

〔主治〕 各类头癣。

方(二)

〔组成〕 蛇床子 60 克

〔用法〕 水煎取汁洗头。

〔主治〕 头癣。

方(三)

〔组成〕 黄柏 梔子 硫黄 苦楝子 大枫子仁各 15 克

〔用法〕 上药加水煎煮 30 分钟，取汁溻洗头部。

〔主治〕 各种头癣。

方(四)

〔组成〕 川槿皮 露蜂房 百部 龙胆草 苦参各 30 克

〔用法〕 将上药浸入食醋中，食醋以淹没药物为度，浸泡一昼夜，加水为食醋 2 倍，煎煮 30 分钟，取汁用毛巾蘸药潮洗

患处，每日3次。

〔主治〕 头癣。

二十六、手足皸裂症

本病是冬季多发病，患者多为劳动人民，由于长期受机械摩擦、化学刺激，使皮肤干燥角化，弹性减低而发生皸裂。初起手足皮肤微觉变厚变硬，自觉发紧，以后皮肤粗糙增厚，沿纹理发生裂口，可伴有出血、疼痛难忍。

方(一)

〔组成〕 地骨皮 白矾各30克 白芨20克 黄柏20克 黄精30克 升麻20克 甘草15克

〔用法〕 上药加水煎汁，趁热浸泡手足，每次45分钟，每日1次，浸泡后用钝刀刮除厚皮。

〔主治〕 手足皸裂症。

方(二)

〔组成〕 苍术35克 白芨 地骨皮各30克 红花 甘草各12克

〔用法〕 上药加水2升煎后，取汁倒入盆中，待药温热时泡洗手足，每次20~30分钟，每日2次，2日更换药液。

〔主治〕 手足皸裂症。

方(三)

〔组成〕 荆芥 防风各9克 艾叶 明矾 苦参 蛇床子 土槿皮各15克 秦皮6克 丹参9克

〔用法〕 加水煎液，待温，将患手患足入药液中熏洗，每次30分钟，每日2~3次。

〔主治〕 手足皲裂症。

方(四)

〔组成〕 地骨皮 白矾各等份

〔用法〕 水煎取汁，浸泡患处。

〔主治〕 手足皲裂症。

方(五)

〔组成〕 陈皮30克 葱白15克

〔用法〕 水煎泡洗，每日2次，每次30分钟。

〔主治〕 手足皲裂症。

方(六)

〔组成〕 桃树根 柿树根各50克

〔用法〕 将上药加水约2.5升，文火煎熬50分钟，趁热先熏，待温擦洗患处，每日2~3次。

〔主治〕 手足皲裂症。

方(七)

〔组成〕 明矾10克 白芨15克 马勃6克

〔用法〕 加水600毫升，煎3次取汁300毫升，三汁混合，用时加温，将手足浸入药汁中，早晚各浸20分钟，每剂药

可浸洗 3 天。

〔主治〕 手足皲裂症。

二十七、汗疱疹

汗疱疹是发生于手掌的水疱疾患，多见于青年人，一般于春末夏初发病，夏季加剧，损害发展可分 3 个阶段。第一阶段手掌潮红，肿胀多汗，瘙痒；第二阶段手掌出现深在性小水疱，约米粒大小，呈球丘状，略高出皮面，成群发生于掌、手指，水疱初起疱液清澈，而后变为混浊，最后干枯形成皮屑；第三阶段脱皮屑，伴以角化干燥皲裂，鳞屑呈剥脱状，暴露柔软的表皮，因皮肤薄而嫩，时常感觉疼痛。

方(一)

〔组成〕 葛根 枯矾各等份

〔用法〕 加水适量，煮沸 10~15 分钟，滤汁，浸泡双手，每次 20 分钟，每日 2 次。

〔主治〕 汗疱疹(出汗多，肿胀，水疱期)。

方(二)

〔组成〕 王不留行 30 克 明矾 9 克

〔用法〕 上药煎水取汁，浸泡患手，每日 1 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 汗疱疹(出汗多，潮红肿胀，水疱期)。

方(三)

〔组成〕 苍术 地骨皮 陈皮 露蜂房各 15 克 蛇床子 20 克 车前子 30 克(布包)

〔用法〕 上药加水煎煮 30 分钟,取汁浸泡双手,每日 1 次,每次 20 分钟。

〔主治〕 汗疱疹(干燥角化脱皮屑期)。

二十八、硬皮病

硬皮病是以局限性和弥漫性皮肤内脏器官结缔组织纤维化或硬化,最后发生萎缩为特点的疾病。本病多见于女性。

局限性硬皮病,多发于头皮、前臂、股和胸部,呈斑块状、带状损害,表现为局部皮肤硬肿、微红,表面有蜡样光,以后中心部分硬化凹陷,皮肤色素加深或减退。边界较清楚不规则,多年后损害明显萎缩,但仍保持一定硬度。损害通常是单个,也可多个。

系统性硬皮病又称全身性硬皮病,除了广泛的皮肤硬化外,伴有内脏多系统受累。起病前多有雷诺氏现象,以后出现关节疼痛、消瘦、血沉加快,皮肤硬化首先发生于面部四肢,并向躯干、内脏发展。初起皮肤淡红色肿胀,逐渐扩大变硬,局部有麻木感,数月后进入硬化期,皮肤呈皮革样,显著增厚,不能捏起,毳毛脱落,有蜡样光泽。面部呈呆板状,缺乏表情,鼻尖唇薄,手指僵硬活动受限。侵犯内脏可造成肾脏损害、心肌纤维化和食道硬化的吞咽困难。病程漫长,可达 10~20 年。

方(一)

〔组成〕 白附子 黄丹 羌活 独活 蛇床子 轻粉
花粉 山梔 枯矾 川乌 草乌 木通 甘松各6克 白鲜
皮7.5克 狼毒 红花 地骨皮 透骨草 生半夏 木贼
艾叶各9克 花椒15克 皂角60克 料姜石120克

〔用法〕 上药共研细末,用药末加水煎煮,病在四肢末梢者,把煎好的药汁倒入盆内,待温时泡洗患处;皮损发生于头面、腰背、腹部及四肢近端等处不便浸泡者,将药粉用开水拌湿,装入布袋内(大小以皮损大小而定),置于患处,布袋上加1个热水袋。每日1~2次,每次30~60分钟,每剂连用3~7天,1个月为1个疗程。

〔主治〕 局限性硬皮病。

方(二)

〔组成〕 当归 肉桂各60克 干姜 红花 山花椒各
30克 樟脑 细辛各15克

〔用法〕 将上药加入到95%的酒精1升中,浸泡1周后,以手蘸药汁揉擦按摩洗浸患处,至发热为度,每日2~3次。

〔主治〕 硬皮病。

方(三)

〔组成〕 透骨草12克 石菖蒲 川乌 草乌各10克
艾叶 红花 伸筋草 桂枝各15克

〔用法〕 上药加水适量,煎沸取汁,趁热熏洗患处,并加

以适当按摩，每天2次，每次15～20分钟。

〔主治〕 硬皮病初期(皮损发红肿胀)。

方(四)

〔组成〕 大黄 桂枝 川芎 细辛 苏木 红花各等份。

〔用法〕 上方药量当视病变部位的大小而定，然后加适量水煎煮，浸泡患处，每次20～30分钟，保持药温，每天或隔天1次。

〔主治〕 硬皮病。

方(五)

〔组成〕 川楝子60克 花椒30克

〔用法〕 上药炒后布包，趁热熨患处，每日2次，10次为1个疗程。

〔主治〕 硬皮病。

方(六)

〔组成〕 伸筋草60克 透骨草30克 艾叶30克 刘寄奴15克 自然铜30克

〔用法〕 取水2.5～5升，煎20分钟后浸浴。而后局部用虎骨油涂擦，并加以按摩。

〔主治〕 硬皮病。

方(七)

〔组成〕 透骨草30克 桂枝15克 红花10克。

〔用法〕 上药加水适量煎汤，以软毛巾蘸药潮洗患处，每次 30 分钟。

〔主治〕 硬皮病。

方(八)

〔组成〕 制草乌 15 克 川椒 10 克 桂枝 10 克 艾叶 10 克

〔用法〕 上药加水适量，煎煮取汁，用质地细软毛巾蘸药汁潮洗患处，每次 30 分钟。

〔主治〕 硬皮病。

二十九、疥疮

疥疮是疥虫寄生于表皮内引起的皮肤病。本病是在密切接触条件下传染的，如母亲传给婴儿，夫妻互传，也可间接传染，如使用患者用过的带幼虫的衣服、被褥、毛巾等而传染。本病好发部位是手指间、腕部内侧、腋部、脐周、乳下、下腹、外生殖器附近、股部等。皮疹主要是瘙痒性丘疹，典型损害是“隧道”，常见于指缝或腕屈侧，呈淡红色或灰色，为稍隆起于皮肤表面的弯曲线条形损害。隧道末端常有水疱或脓疱，有诊断意义。疥疮有阵发性剧烈的瘙痒，夜间痒甚。患病时间较久的可继发湿疹样损害和化脓感染。

方(一)

〔组成〕 藜芦 大枫子 蛇床子 硫黄各 20~30 克

川椒 8~10 克。

〔用法〕 上药加水 4 升，煎 2 次，至药液 3 升左右，以桶盛之，先用清水、肥皂洗澡，后将药液擦洗患处，每次 20 分钟，每日 1 次，一般连洗 2~4 天即可见效。若有感染而成脓者，去川椒加鱼腥草、蒲公英各 20~30 克；若有结节者，加皂刺、刺蒺藜各 20~30 克。

〔主治〕 疥疮。

方(二)

〔组成〕 苦参 花椒各 40 克 蛇床子 30 克 硫黄 15 克 白鲜皮 20 克 地肤子 15 克 黄柏 20 克 龙胆草 15 克 密陀僧 10 克 大枫子 10 克 滑石 10 克 韭叶适量

〔用法〕 加水适量，煎煮取汁，先用肥皂水洗净肌肤，然后用药汁洗涤全身皮肤，洗时将疥头擦破，药液进入疥心效果更佳。

〔主治〕 成人及小儿疥疮均可应用。

方(三)

〔组成〕 花椒 10 克 地肤子 30 克

〔用法〕 加水适量，煮沸，趁温热洗之，每天 1 次。

〔主治〕 疥疮。

方(四)

〔组成〕 金钱草 30 克 食盐少许

〔用法〕 加水煮沸，待温外洗，每日 1 次。

〔主治〕 疥疮。

方(五)

〔组成〕 硫黄 60 克 艾叶 24 克 苦杏仁 30 克

〔用法〕 加水适量，煎煮 30 分钟，趁热外洗，每日 1 次，每次 20 分钟，连用 3 天以后，把内衣裤及被套、床单、枕巾用开水烫洗 1 次。

〔主治〕 疥疮。

方(六)

〔组成〕 鹤虱 百部 蛇床子 苦楝子 大枫子各 30 克

〔用法〕 上药加水约半脸盆，煮沸 30 分钟，去渣，取药汁，趁热先熏，待温后洗全身，自颈到足，无处不到，每日 1 次，每次 30 分钟，3 天为 1 个疗程。每洗 3 天后把内衣、床单、被套烫煮 1 次，一般 3 个疗程可治愈。若疥疮化脓感染，上药加银花、蒲公英、蚤休各 30 克，用法同前。

〔主治〕 疥疮、脓疮。

方(七)

〔组成〕 青蒿 30 克 苦参 30 克 白矾 20 克

〔用法〕 上方加适量水煎汁，先熏后洗，待药汁温度适宜时，用消毒药棉蘸汁擦疥疮局部，每日 3~4 次。

〔主治〕 疥疮。

方(八)

〔组成〕 黄柏 百部 大枫子 蛇床子 苦参 花椒

土槿皮各 30 克 薄荷 15 克

〔用法〕 上药加水 3~5 升,煮 5 分钟;或用沸水浸泡(大枫子、花椒打碎)30 分钟。用药液洗浴患处或全身,每次 30 分钟,每日 1 次,7 日为 1 个疗程。

〔主治〕 疥疮。

三十、连续性肢端皮炎

连续性肢端皮炎又叫固定性肢端皮炎。病因目前尚不清楚,常在受外伤后发病,多见于中年人,皮疹多发于四肢末端,指趾两侧,尤其是手指常见,常在刺伤、扎伤后诱发。最初表现为化脓性甲沟炎,而后不断扩大,出现丘疱疹、水疱、脓疱,日久干枯脱皮,呈剥脱性鳞屑,落而又生;下面为红色糜烂面或有光泽的红斑,并不断向根部发展,日久可波及到它侧。上述皮疹此起彼伏,反复不愈可影响到指(趾)甲,引起指(趾)甲变形,失去光泽。

方(一)

〔组成〕 大蒜瓣适量

〔用法〕 水煎取汁,浸洗患处,每天 1~2 次。

〔主治〕 连续性肢端皮炎以脓疱、水疱为主。

方(二)

〔组成〕 马齿苋 大青叶各 30 克 蒲公英 15 克

〔用法〕 加水煎煮取汁,湿敷患处,每天 15~30 分钟。

〔主治〕 连续性肢端皮炎以脓疱、水疱为主。

方(三)

〔组成〕 路路通 苍术各 60 克 百部 艾叶 枯矾各 15 克

〔用法〕 加水煎煮取汁，焯洗患部，每日 2 次。

〔主治〕 连续性肢端皮炎以脱皮为主。

方(四)

〔组成〕 露蜂房 蛇床子 生地榆各 30 克

〔用法〕 上药加水浓煎取汁，局部洗敷，每日 2~3 次，每次 15~30 分钟。

〔主治〕 连续性肢端皮炎。

三十一、结节性红斑

结节性红斑是血管急性炎症所引起的皮肤结节性损害。可能与病灶感染、风湿病、结核菌感染及药物过敏等有关。多见于春秋季节，好发于青年女性。损害主要侵犯下肢伸侧，为对称性鲜红色结节性损害，压痛明显，不溃破；旧的皮疹消退，新的皮疹又陆续出现；多数伴有关节疼痛。在妇女经期或者过度疲劳，常易诱发或加重。全身症状可有低热、不适、血沉加快。

方(一)

〔组成〕 紫草 30 克 茜草 15 克 白芷 15 克 赤芍 15 克 苏木 15 克 南红花 15 克 次厚朴 15 克 丝瓜络 15 克 木通 15 克

〔用法〕 加水 2~2.5 升，煮沸 15~20 分钟，湿洗患处，每日 2~3 次。

〔主治〕 结节性红斑（皮疹鲜红色）。

方（二）

〔组成〕 当归 丹参 乳香 没药 木鳖子各 15 克 三棱 莪术各 25 克 桃仁 红花各 30 克

〔用法〕 上药加水煎煮，取汁，湿洗患处，每日 1~2 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 结节性红斑（皮疹呈硬结状，压痛明显）。

方（三）

〔组成〕 桂枝 桑枝 细辛各 9 克 当归 赤芍 红花各 15 克 生姜 1 枚。

〔用法〕 上药加水煎煮，取汁，湿洗患处，每日 2~3 次。

〔主治〕 结节性红斑（皮疹暗红怕冷，遇风寒加重者）。

三十二、脓疱病

脓疱病又称黄水疮，是由金黄色葡萄球菌合并溶血性链球菌感染引起的。儿童发病较多，传染性较大，夏秋发病率较高。损害常发生于颜面、四肢暴露部位，其它部位亦可发生。初

起为小红斑片，迅速形成浅表水疱，接着变成脓疱，大小不等，一般约黄豆大或更大些。疱壁松弛，易破裂，呈糜烂面，有脓性分泌物，形成黄痂。皮损可向周围扩大或因自家接种面向周围及远处播散，自觉瘙痒，可伴有淋巴结肿大压痛和发热。

方(一)

〔组成〕 苦参 30 克 马齿苋 30 克

〔用法〕 水煎取汁，洗患处，每日 2 次。

〔主治〕 黄水疮。

方(二)

〔组成〕 蒲公英 马齿苋 野菊花各适量

〔用法〕 上药加水煎煮取药液，湿敷患处，每日 3~4 次。

〔主治〕 脓疱疮。

方(三)

〔组成〕 蛇床子 苦参各 30 克 苍术 黄柏 川椒各 15 克 轻粉 0.5 克 蝉蜕 10 克

〔用法〕 将上药(非红疹期去蝉衣)水煎 3 次，趁热取药汁分早、中、晚 3 次熏洗患处，每次 10 分钟左右。一般 3~5 天可愈。

〔主治〕 脓疱疮。

方(四)

〔组成〕 白头翁 30 克 蚤休 30 克 白鲜皮 30 克

〔用法〕 将上药煎汤，分 2 次外洗，将脓液、脓痂清除干

净。

〔主治〕 脓疱疮。

方(五)

〔组成〕 五倍子 枯矾各 25 克 马齿苋 50 克

〔用法〕 将上药加水 1 升，文火煎煮 30 分钟，弃药渣取药液，至 37℃ 备用，用消毒过的软布蘸药液涂擦事先消毒过的病损处，每次 30 分钟，1 日 2~3 次，一般疗程 3 天。

〔主治〕 脓疱疮。

方(六)

〔组成〕 黄芩 黄柏 大黄 银花 连翘 苦参 艾叶各 10 克 蛇床子 15 克 马齿苋 20 克

〔用法〕 将上药水煎取汁，待温后轻擦洗患处，1 日 1 剂。

〔主治〕 脓疱疮。

方(七)

〔组成〕 鲜马齿苋 鲜野菊花 鲜丝瓜叶 鲜紫花地丁 鲜蒲公英各适量

〔用法〕 上药加水煎汤洗浴全身，每日 1 次。

〔主治〕 脓疱疮。

方(八)

〔组成〕 鲜石榴皮 绿豆各适量

〔用法〕 上二药水煎取浓汁，洗患处，每日 2~3 次。

〔主治〕 脓疱疮。

方(九)

〔组成〕 鱼腥草 15 克 黄柏 白鲜皮各 9 克

〔用法〕 将上药加水适量，煎取药液，反复冲洗患处，每日 3~4 次。

〔主治〕 脓疱疮。

方(十)

〔组成〕 败酱草 蒲公英各适量

〔用法〕 上二药煎取浓汁，反复洗敷患处，每日 3~4 次。

〔主治〕 脓疱疮。

方(十一)

〔组成〕 鲜地黄全草数株

〔用法〕 上药煎煮取浓液，洗敷患处，每日 2~3 次，每次 15~30 分钟。

〔主治〕 脓疱疮。

三十三、多汗症、臭汗症

多汗症系汗腺分泌旺盛使皮肤出汗过多，一般局限性多汗为多见。多汗症大多与精神紧张、情绪激动、焦虑、恐惧、恼怒等因素有关，部分多汗症与遗传有一定关系。患者多见于青年男性，一般以手掌、足跖、腋下、外阴、颜面等处最为常见，轻

者汗出溱溱不断，重者汗如滚珠不停流淌，在情绪激动、紧张情况下尤为严重。患者手足湿冷，掌跖皮肤浸渍腐白，腋下及阴部多汗，同时伴有臭汗症。

方(一)

〔组成〕 干葛 120 克 明矾 15 克

〔用法〕 加水 1~1.5 升，煮沸 15~20 分钟外洗。

〔主治〕 多汗症。

方(二)

〔组成〕 麻黄根 60 克 煅龙骨 煅牡蛎各 30 克 赤石脂 30 克

〔用法〕 水煎取药汁，浸泡手足，或湿敷患处，每日 2~3 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 多汗症。

方(三)

〔组成〕 五倍子 60 克 枯矾 煅石膏各 20 克

〔用法〕 上药加水煮沸 30 分钟，局部泡洗。

〔主治〕 多汗症。

方(四)

〔组成〕 香白芷 60 克 厚朴 30 克

〔用法〕 水煎取汁，外洗患处。

〔主治〕 臭汗症。

方(五)

〔组成〕 木香 沉香 丁香 茴香各 30 克

〔用法〕 上药研粗粉装入布袋内，加水煮 30 分钟，倒入浴盆内，盆中心放一方凳，蹲坐凳上，用大塑料布将浴盆及全身包裹，露出头面，熏之。药液待温，入药液中沐浴，并用装药粉的布袋潮腋、股、外阴等多汗处。每日 1 次。

〔主治〕 臭汗症。

三十四、皮肤淀粉样变

皮肤淀粉样变是由于淀粉蛋白质沉积于皮肤所致，可为原发性，有家族史。好发于小腿伸侧、上背部，对称分布，皮损为褐黄色角化性半圆形丘疹，密集而孤立，互不融合，质地坚实，排列成念珠状，瘙痒剧烈，迁延难愈。

方(一)

〔组成〕 苍术 30 克 黄柏 30 克 白鲜皮 30 克 川椒 30 克

〔用法〕 上药加水煎煮外洗，每日 2~3 次。

〔主治〕 皮肤淀粉样变。

方(二)

〔组成〕 苦参 60 克 蛇床子 30 克 白芷 15 克 银花 30 克 菊花 60 克 黄柏 15 克 地肤子 15 克 大菖蒲 9 克

〔用法〕 上药加水煮沸，去渣外洗患处，每日1~2次。

〔主治〕 皮肤淀粉样变。

方(三)

〔组成〕 路路通 苍术各60克 百部 艾叶 枯矾各5克

〔用法〕 加水煎煮，去渣取汁，局部湿洗，每日2次，每次20~30分钟。

〔主治〕 皮肤淀粉样变。

方(四)

〔组成〕 苍耳子 地肤子 威灵仙 艾叶 吴茱萸各15克

〔用法〕 上药加水煎沸，弃渣取汁，趁热外洗患处，每日1~2次。

〔主治〕 皮肤淀粉样变。

三十五、夏季皮炎

夏季皮炎原因不太明了，可能与感受暑热之气和汗液刺激有关。多见于成年人，其次是儿童。皮疹好发于四肢伸侧面，严重者可以发展到全身皮肤。初起皮肤轻度发红，继而出现米粒大小密集小丘疹，抓破不流水，结血痂，自觉灼热瘙痒剧烈，伴心烦、胸闷、纳呆、小便黄赤。病变通常发生于炎热夏季，入秋渐愈。

方(一)

〔组成〕 蝉衣 薄荷 藿香 香白芷各 15 克

〔用法〕 加水煎煮，沸后 15 分钟，取药汁，待温外洗，每日 2 次。

〔主治〕 夏季皮炎。

方(二)

〔组成〕 大黄 黄柏 黄芩 苦参各 15 克

〔用法〕 加水煎煮，待温取药汁外洗患处，每日 1~2 次。

〔主治〕 夏季皮炎。

方(三)

〔组成〕 蛇床子 地肤子 苦参 花椒 白矾各 20 克

〔用法〕 上药煎汁，先熏后洗，每日 1 剂，可熏洗 2~3 次，每次 20 分钟。

〔主治〕 夏季皮炎。

方(四)

〔组成〕 艾叶 路路通各 30 克 蚕沙 60 克

〔用法〕 上药共煎汁，以纱布蘸药汁湿敷痒处，每日 2 次，可连续应用，次数不限。

〔主治〕 夏季皮炎。

三十六、痱子(红痱)

痱子系外界气温过高时，出汗过多，汗液排泄不良所致。

一般见于夏季,或高温环境工作者。发病急骤,初起为小红斑,继则发生针头大小密集性丘疹和小疱,周围有红晕,好发于头面、颈项、胸背、肘窝、腋窝、腰围、臀部等处,自觉灼热、刺痒。可继发擦烂红斑、湿疹样皮炎或假性疖病。

方(一)

〔组成〕 马齿苋适量。

〔用法〕 煎汤取汁,待温后,局部湿洗,每日2次,每次15~30分钟。

〔主治〕 痱子。

方(二)

〔组成〕 明矾20克

〔用法〕 用温水1升溶化明矾,外洗,每日1~2次。

〔主治〕 痱子。

方(三)

〔组成〕 西瓜皮150~200克

〔用法〕 煎水外洗。

〔主治〕 痱子。

方(四)

〔组成〕 马齿苋 地肤子各60克 薄荷叶 陈皮各30克

〔用法〕 煎汤外洗患处,洗后配撒痱子粉。

〔主治〕 痱子。

方(五)

〔组成〕 藿香 20 克 佩兰 20 克 野菊花 20 克 枇杷叶 60 克 滑石 30 克

〔用法〕 上药加水煎至 2 升，加清水 1 倍洗浴。每日 1 次，3~6 天为 1 个疗程。

〔主治〕 痱子初起暑湿盛者。

三十七、剥脱性角质松懈

剥脱性角质松懈是一种表浅的掌跖部角质剥脱性皮肤病，原因尚不明了。通常发生于掌跖部，初起呈针头大小白色干疱，然后自然破裂，呈薄纸样鳞屑，不断向周围剥离，严重者累及整个掌跖、指趾。剥除皮屑，其下面的皮肤无炎症反应，为正常皮肤，初剥脱后皮肤较细嫩，摩擦时有轻度疼痛。本病易发生于春夏季节，往往合并局部多汗。

方(一)

〔组成〕 陈皮 金毛狗脊各 30 克 五倍子 苍耳子 金钱草各 15 克

〔用法〕 上药加水适量，煎煮取汁，浸泡患处，每次 15 分钟，每日 1~2 次。

〔主治〕 剥脱性角质松懈。

方(二)

〔组成〕 炒白术 12 克 炒山药 15 克 薏仁 9 克 甘草 6 克 白鲜皮 6 克 苦参 6 克 地肤子 6 克 苍术 6 克 厚朴 6 克 陈皮 6 克 防风 6 克

〔用法〕 水煎浓汁，外洗局部，边浸边洗。每日 2 次，每次 15～30 分钟。

〔主治〕 剥脱性角质松懈。

三十八、肉刺(逆剥)

肉刺俗称逆剥，主要发生于手部指甲皱襞近端，好发于儿童和妇女。常因过度摩擦，致使皮肤粗糙。爪甲上缘皮肤呈三角形撕裂，上翘倒卷，强力拉牵有疼痛和出血现象。

处方

〔组成〕 细辛 15 克 艾叶 30 克

〔用法〕 上药加水煎煮取汁，待温浸泡，每日 1～2 次，每次 15 分钟。

〔主治〕 肉刺(逆剥)。

三十九、鸡眼、胼胝

鸡眼及胼胝均由鞋窄紧或鞋过硬，足部受挤压、摩擦，使局部血液运行不畅，皮肤过度角化而形成。鸡眼损害为针头至黄豆大小淡黄色小圆锥状皮疹，境界明显，质地坚硬，根埋肉

里，顶起硬凸，表面光滑透明，状如鸡眼，压迫疼痛。胼胝为境界不清的淡黄色或蜡黄色扁平状局限性角化肥厚性损害，边界角化稍薄，中心角化肥厚突出，稍透明，质地硬，无自觉症状，鸡眼和胼胝主要发生于足部，但手部长受机械刺激摩擦也常发生损害。

处方

〔组成〕 葱白 3 根 红花 10 克 苏木 15 克 金毛狗脊 30 克 陈皮 30 克 细辛 15 克 香附 20 克

〔用法〕 上药加水煎煮，取浓汁，浸泡手足，泡软硬皮后，用钝刀刮除硬皮，每晚 1 次，每次 30～60 分钟。

〔主治〕 鸡眼、胼胝。

四十、粘膜白斑

粘膜白斑是发生于粘膜处以白色角化为主要特征的一种疾病。该病原因尚不清楚，多发生于中年人，白斑可发生在口腔粘膜、唇粘膜、舌粘膜、龟头、女阴、肛门等粘膜处。损害呈局限性，浸润肥厚，角化过度性白色斑片，有时斑上有灰白色膜状粘附物，日久可发生皸裂和糜烂。

方(一)

〔组成〕 蛇床子 15 克 苦参 15 克 蚤休 30 克 鹤虱 30 克 地肤子 15 克 苍耳子 15 克 紫花地丁 30 克

〔用法〕 水煎取汁，外洗，每日 2～3 次。

〔主治〕 粘膜白斑。

方(二)

〔组成〕 土槿皮 30 克 白鲜皮 30 克 花椒 12 克 马齿苋 30 克 蒲公英 30 克 皂角 30 克 黄柏 15 克

〔用法〕 加水煎煮,取汁,熏洗局部,每日 2~3 次。

〔主治〕 粘膜白斑。

方(三)

〔组成〕 淫羊藿 鹿含草各 30 克

〔用法〕 加水煎煮,取药汁熏洗。

〔主治〕 粘膜白斑。

方(四)

〔组成〕 地肤子 30 克 蛇床子 白鲜皮 苦参 蒲公英各 15 克 枯矾 西月石各 6 克

〔用法〕 上药加水浓煎,取汁,先熏后洗,每日 1 次。

〔主治〕 粘膜白斑。

第五章 外科疾病

熏洗疗法治疗外科疾病包括外科与肛肠科两大内容。外科古代称为“疡科”，是以研究外症为主的疾病医学，所谓的外症是指疾病在人体表的症候，外症大都需要给予局部处理，因而外治为疡科的重要治疗方法。《医学源流》曰：“外科之法最重外治。”在诸多的外治法中，熏洗疗法又是最重要的一种疗法。正如《医宗金鉴·外科心法要诀》曰：“涤洗之法，乃疡科之要药也。”

外科疾病的熏洗疗法主要治疗急慢性炎症疾患，如丹毒、急性蜂窝组织炎、痈、疖、化脓性指头炎、甲沟炎、脉管炎、深浅静脉炎等。在应用时又根据其炎症初期、成脓期和溃脓期采用不同的中药熏洗。在炎症初期，红肿热痛者，应发散风邪，清热解毒，改善局部血液循环促进炎症吸收；成脓期，局部肿胀突起，用手指按压有波动感时，应托表透脓，加速脓栓形成，使坏死组织和感染局部形成脓肿，易于排脓消肿；溃脓期，脓流不畅，中心腐肉不尽，疮面暗红，疮口不敛，应双补气血，清解余毒，以清除腐败之物，利于创面生肌收口。凡疮形肿而不高，微红微热者，以行气疏风，活血散瘀，消肿止痛为治，如深浅静脉炎、脉管炎等。

肛肠科熏洗法主要治疗内外痔、脱肛、肛周脓肿等疾患。

肛门直肠是消化道末端，大肠湿热下注，大便燥结压迫最易造成疾患，多以清热燥湿，活血化瘀，软坚散结为治。应用时可先熏后坐浴，水温宜偏热，可使肛肠周围血液循环增强，静脉丛回流加快，达到消痔、消炎、消肿的目的。

一、疖肿

疖是葡萄球菌侵入毛囊所引起的毛囊深部急性化脓性炎症，本病与机体抵抗力降低有密切关系，糖尿病、营养不良、慢性肾炎及免疫功能低下者易发生本病。临床以鲜红色毛囊性丘疹，顶端有脓栓，触之坚硬，局部灼热疼痛为特点。好发于头面、颈、臀部，症状严重者有全身症状，如：发热恶寒，周身不适等。

方(一)

〔组成〕 升麻 芒硝 黄芩 漏芦 栀子仁 接骨草各等份

〔用法〕 上药60克，水3大碗，煎沸5分钟，用药棉溻渍红肿处，每日2~3次，每次15~30分钟。

〔主治〕 疖。

方(二)

〔组成〕 芫花15克 川椒15克 黄柏30克

〔用法〕 共研粗末，装纱布袋内，加水煎沸30分钟，局部溻洗，每日2~3次。

〔主治〕 疖。

方(三)

〔组成〕 马齿苋 120 克 蒲公英 120 克 如意草 120 克
白矾 12 克

〔用法〕 共研粗末，装纱布袋内，加水煎煮 30 分钟，局部
冲洗，每日 2~3 次。

〔主治〕 多发性疖肿。

方(四)

〔组成〕 龙胆草 30 克 蒲公英 30 克 龙葵 5 克 鲜仙
人掌 50 克(去刺)

〔用法〕 上药加水浓煎取汁，局部冲洗。每日 2 次，每次
15 分钟。

〔主治〕 多发性疖肿。

方(五)

〔组成〕 黄连 20 克 生大黄 桑枝各 30 克 当归 20
克 白矾 15 克

〔用法〕 将上药放入脸盆中，加水 1.5~2 升，置旺火上
煮沸，煎 5~10 分钟下火待温，用毛巾或纱布包药渣熏蒸患
处，或把患处置药液中浸泡，每日 3~4 次，每次 30 分钟。痒明
显者加川椒 30 克；化脓者加漏芦、白芷各 20 克。

〔主治〕 手足疗疮(疖肿)。

方(六)

〔组成〕 野菊花和茎叶各适量

〔用法〕 煎汤洗涤，并以药棉或纱布浸药汤湿敷，1 日数回。

〔主治〕 疖肿。

方(七)

〔组成〕 苍耳子 60 克 白矾 60 克

〔用法〕 煎汤趁热湿洗患处，每日 2 次。

〔主治〕 疖肿。

二、痈

痈是由数个邻近毛囊或皮脂腺化脓感染所致的皮肤深层化脓性疾病。多见身体虚弱、贫血及糖尿病患者。以颈后发际处及腰背部多发。初起皮肤呈急性弥漫性暗红色浸润，肿硬发亮，边界不清，迅速发展扩大，表面可见多个脓栓，状如蜂房；自觉局部灼热疼痛，伴有全身发热寒战，食欲不振，周身不适，附近淋巴结肿大压痛。

方(一)

〔组成〕 地肤子 莱菔子各 30 克

〔用法〕 文火煎煮，取汁洗患处，每日 2 次，每次 10～15 分钟。

〔主治〕 痈初期(局部红肿热痛)。

方(二)

〔组成〕 升麻 芒硝 黄芩 漏芦 栀子仁 接骨草各等份。

〔用法〕 上药加水煎煮取汁，局部湿洗。每次 15～30 分钟，每日 2 次。

〔主治〕 痈初期(焮红热痛)。

方(三)

〔组成〕 五倍子 黄柏 诃子 青果 明矾各适量

〔用法〕 上药加水适量，煎煮取汁，待温洗患处，每日 1 次，分 3 次洗，每次 15～30 分钟。

〔主治〕 痈已化脓。

方(四)

〔组成〕 当归 独活 白芷 甘草各 12 克 葱头 7 个

〔用法〕 将上药共研粗末，装布袋内，加水煎煮，去渣取汁，趁热熏洗患处，每日 1 次，每次 1～2 小时。

〔主治〕 痈红肿期和化脓期均可应用。

方(五)

〔组成〕 蛇床子 苦参各 30 克 苍术 黄柏 花椒各 15 克 轻粉 0.15 克

〔用法〕 上药前五味加水煎煮 3 次，将混合液煮沸对入轻粉溶化，趁热熏洗患处，每日早、中、晚各 1 次，每次 10 分钟左右。

〔主治〕 痈已化脓溃破者。

方(六)

〔组成〕 菊花 30 克 薄荷叶 30 克

〔用法〕 煎汤趁热焗洗患处。

〔主治〕 痈。

三、丹毒

丹毒是由溶血性链球菌引起的皮肤及皮下组织的急性炎症。好发于颜面及小腿。细菌多由皮肤粘膜破伤入侵，足癣和鼻炎常是引起小腿丹毒和颜面丹毒的主要诱因。本病发病急，常有恶寒发热、头痛、周身不适等先驱症状，接着局部皮肤出现水肿性红斑，境界清楚，并向四周扩大，触之灼热疼痛，有时表面可发生水疱和血疱，附近淋巴结可肿大压痛。丹毒反复发作可形成慢性丹毒，易继发局部象皮肿。

方(一)

〔组成〕 芒硝 250 克

〔用法〕 上药加水 1 升，煎煮至 500 毫升，趁热局部热敷，以不烫皮肤为度，每日 3~4 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 急性丹毒(红肿热痛，表面无水疱、脓疱者)。

方(二)

〔组成〕 鲜仙人掌(去刺)200 克

〔用法〕 将仙人掌捣烂如泥，用沸水冲入搅匀，先熏后湿敷局部，每日2次，每次30分钟。

〔主治〕 急性丹毒（红肿热痛，表面无水疱脓疮者）。

方（三）

〔组成〕 鲜苍耳草根与叶适量

〔用法〕 上药煎汤，熏洗红肿处，每日3次，每次15～30分钟。

〔主治〕 急性丹毒。

方（四）

〔组成〕 苦参 黄柏 地肤子 大黄 白矾 蛇床子 花椒 甘草各30克 白芷24克 雄黄18克

〔用法〕 水煎取汁，先熏后淋洗，每日1～2次，每次30分钟。

〔主治〕 急性丹毒（浮肿甚或表面起水疱者）。

方（五）

〔组成〕 海桐皮 姜黄 汉防己 当归尾 红花 苍术 黄柏 晚蚕沙各12克

〔用法〕 煎汤趁热熏洗患处，稍凉后用毛巾蘸药汁外敷，每日2次。

〔主治〕 慢性丹毒。

方（六）

〔组成〕 鲜侧柏叶 鲜樟树叶 鲜松针各60克 生姜

30 克

〔用法〕 上药切碎煎汤，每晚趁热熏洗患处，每日 1 次，7～10 次为 1 个疗程。

〔主治〕 慢性丹毒（继发局部象皮肿者）。

方（七）

〔组成〕 黄柏 30 克 黄芩 30 克

〔用法〕 煎汤焗洗患处。

〔主治〕 丹毒。

四、急性蜂窝组织炎

急性蜂窝组织炎是皮下组织的一种急性化脓性炎症，多由皮肤创伤、细菌侵入而致，致病菌一般为溶血性链球菌。常发生在面部、背部和四肢，初起时局部轻微红肿，逐渐加剧，红肿以中心部最为显著，边缘界限不清，并有凹陷性水肿，甚者红斑上出现水疱，可发生广泛性皮下组织坏死而溃烂，或形成脓肿，并伴有发热恶寒，头痛，周身不适等全身症状。

方（一）

〔组成〕 独活 白芷 当归 甘草各 9 克 葱头 7 个

〔用法〕 以水 3 大碗，煮沸，局部焗洗，每日 1～3 次。

〔主治〕 急性蜂窝组织炎未溃期。

方（二）

〔组成〕 银花 9 克 羌活 独活 川乌 草乌 防风 苍术 薄荷 苏叶各 6 克 桑叶 桃叶 槐叶 樟叶各 1 握。

〔用法〕 上药共煎煮，趁热先熏后洗。

〔主治〕 急性蜂窝组织炎未成脓者。

方(三)

〔组成〕 猪蹄 1 具 川芎 炙甘草 大黄 黄芩各 60 克 芍药 90 克 当归 30 克

〔用法〕 以水 5 大碗，煮猪蹄软为度，去油及蹄，取汁入药煮沸 2 分钟，温洗疮面。

〔主治〕 急性蜂窝组织炎成脓或已溃脓者。

方(四)

〔组成〕 蒲公英 30 克 苦参 黄柏 连翘 木鳖子各 12 克 银花 白芷 赤芍 丹皮 甘草各 10 克

〔用法〕 将上药共研粗末，用纱布包，加水煎煮后，过滤去渣，趁热熏洗或溻渍患处，每日 1~2 次。每次 1 小时，如有疮口，熏洗后，再常规换药。

〔主治〕 急性蜂窝组织炎化脓未化脓均可。

五、急性乳腺炎

急性乳腺炎是乳房部急性化脓性病变。多见于初产妇女，好发于产后 3~4 周，初起乳房肿痛发胀，肤色微红，乳汁分泌

不畅，乳房内出现界限不明性肿块，伴有恶寒发热，头痛不适，进一步发展，乳房逐渐肿大，焮红灼热，憋胀疼痛，全身壮热不退，肿块有波动感，进而溃破，脓汁排出，全身症状逐渐减轻，并逐渐痊愈。

方(一)

〔组成〕 葱白 90~150 克

〔用法〕 葱白切段后加入适量热水，先熏后洗患侧乳房，每日 3~5 次，2 天为 1 个疗程。

〔主治〕 急性乳腺炎初期。

方(二)

〔组成〕 刘寄奴 30 克 蒲公英 30 克 红花 9 克

〔用法〕 用水 1 升煎上药，开沸 2~3 分钟，趁热洗溃，1 次 20 分钟，1 日 2 次。

〔主治〕 急性乳腺炎初期。

方(三)

〔组成〕 芒硝 20 克

〔用法〕 上药溶于 100 毫升开水中，以纱布蘸药汁敷患处，每日 2 次，每次 20~30 分钟。

〔主治〕 急性乳腺炎初期。

方(四)

〔组成〕 乳香 15 克 白矾 花椒各 6 克 葱白数根

〔用法〕 水煎外洗，每日数次。

〔主治〕 急性乳腺炎。

方(五)

〔组成〕 王不留行 桃枝 茱萸根皮各 15 克 蛇床子
蔓荆子 苦竹叶 蒺藜子各 100 克 大枫子 30 克

〔用法〕 加水 3 升，煮取 1 升，频频洗之。

〔主治〕 急性乳腺炎，或继发乳汁不通者。

六、急性淋巴管炎

急性淋巴管炎多由皮肤破伤，细菌侵入而引起，致病菌多为溶血性链球菌和葡萄球菌。常发生于四肢，在手足的创伤处，有红肿热痛，感染沿着淋巴管径路蔓延，在肢体上可看到一条红线向上达腋窝或腹股沟，沿红线径路触之发硬、疼痛，局部淋巴结肿大、压痛，严重者病人常伴有全身症状：发热恶寒，头痛，全身不适等。

方(一)

〔组成〕 野菊花根叶花适量 蒲公英适量

〔用法〕 加水煎煮取汁，局部湿洗，每日 2~3 次，每次 15~30 分钟。

〔主治〕 急性淋巴管炎。

方(二)

〔组成〕 蒲公英 30 克 苦参 黄柏 连翘 木鳖子各

12 克 银花 白芷 赤芍 丹皮 甘草各 10 克

〔用法〕 将上药共为粗末，用纱布包好，加水煎煮后，过滤去渣，趁热熏洗或溻洗患处，每日 1~2 次，每次 1 小时。

〔主治〕 急性淋巴管炎。

方(三)

〔组成〕 朴硝 月石 胆矾各 10 克

〔用法〕 上药用开水冲化后，趁热浸洗患处，每日 2~3 次。

〔主治〕 急性淋巴管炎。

方(四)

〔组成〕 芒硝 60 克 大黄 紫花地丁 一枝蒿各 30 克
麻黄 10 克

〔用法〕 上方加水煎汤，冷洗或湿敷患处，每日 2~3 次。

〔主治〕 急性淋巴管炎。

七、急性淋巴结炎

急性淋巴结炎是由于机体存在感染病灶的细菌侵入淋巴管到达局部淋巴结而致的淋巴结急性炎症，感染菌常为溶血性链球菌和葡萄球菌。在机体可找到原发感染病灶，常同时伴有急性淋巴管炎。初起淋巴结肿大压痛，而后多个淋巴结粘连形成炎性硬块，红肿热痛，并可形成脓肿，头面部感染，颌下及耳后淋巴结肿大；下肢、肛门、会阴部感染，常发生在腹股沟淋

巴结肿大。淋巴结炎严重时可伴有全身症状，发热恶寒，头痛等。

方(一)

〔组成〕 银花9克 羌活 独活 川乌 草乌 防风 苍术 薄荷 苏叶各6克 桑叶 桃叶 槐叶 樟叶各1握。

〔用法〕 上药共入水煎取液，趁热先熏后洗，未成脓者，熏洗之后，将药渣捣涂患处。

〔主治〕 急性淋巴结炎。

方(二)

〔组成〕 升麻 芒硝 黄芩 漏芦 梔子仁 接骨草各等份。

〔用法〕 以药60克，水3大碗，煎沸2分钟，用药棉溻洗患处。

〔主治〕 急性淋巴结炎。

方(三)

〔组成〕 朴硝 月石 明矾各10克

〔用法〕 上药用开水冲，溶化后趁热浸洗患处。

〔主治〕 急性淋巴结炎。

八、化脓性指头炎

化脓性指头炎多由于手指刺伤或擦伤，细菌侵入而致，临床上表现为手指发红肿胀，灼热，剧烈跳痛，而后化脓溃破。化脓性指头炎严重时，疼痛剧烈影响睡眠，并有发热，寒战，头痛，恶心等全身反应。

方(一)

〔组成〕 马齿苋 蒲公英各 60 克

〔用法〕 上药煎汤，浸泡手指，每日 2~3 次，每次 15~30 分钟。

〔主治〕 化脓性指头炎(初期未化脓者)。

方(二)

〔组成〕 金银花 苦参 黄柏 紫花地丁 蒲公英 大枫子各 30 克 连翘 丹皮 泽兰各 24 克 川军 黑豆各 15 克 荆芥 防风 白鲜皮 生杏仁 甘草各 10 克

〔用法〕 上药共为粗末，用纱布包好，加水煎煮后，过滤去渣，趁热熏洗或焗洗患处，每日 1~2 次，每次 1 小时。

〔主治〕 化脓性指头炎(初期)。

方(三)

〔组成〕 黄连 65 克

〔用法〕 黄连加水 2 升，煮沸 3 次，每次 15 分钟，冷却后

备用,不去渣,不加防腐剂。用时将药液置于瓷杯内,浸泡患指,药液以浸没全部病灶为度,浸洗3小时后擦干,外敷黄连纱条,消毒纱布包扎,1日1次。

〔主治〕 化脓性指头炎。

方(四)

〔组成〕 蒲公英15克 野菊花15克

〔用法〕 将上药加水2升,煎汁约1升,每日用此药液湿敷患处3~4次,每次半小时,疗程3~15天。

〔主治〕 化脓性指头炎。

方(五)

〔组成〕 雄黄 煅寒水石各15克 白矾60克

〔用法〕 共研为细末,每次用30克煎汤洗疮口,尔后换药。

〔主治〕 化脓性指头炎(已溃)。

九、甲沟炎

甲沟炎是爪甲周围急性化脓性炎症,常由于拔肉刺,或修剪指趾甲引起甲周围轻度损伤,细菌侵入而致。临床表现为甲周围肿胀,潮红,灼热疼痛,尔后化脓。

方(一)

〔组成〕 大黄 黄柏 黄芩各15克

〔用法〕 上药加水煎煮沸，取汁，潮洗患处，每日3次，每次15分钟。

〔主治〕 甲沟炎。

方(二)

〔组成〕 大黄 黄芩 白薇各30克 芒硝15克

〔用法〕 加水煎汤，趁热潮洗患处。

〔主治〕 甲沟炎。

方(三)

〔组成〕 紫花地丁 一枝蒿 芒硝各30克 赤芍 白芷各15克 麻黄10克

〔用法〕 上药加水煎汤，趁热渍洗，可敷患处。

〔主治〕 甲沟炎。

十、血栓性静脉炎

凡能引起静脉壁炎症及坏死的因素，均为发生静脉炎的原因，如静脉输液、注射硬化剂、砷剂及外伤或邻近组织炎性作用，是常见原因。本病多发生于下肢静脉，病变的静脉有自发痛及压痛、下肢弥漫性潮红肿胀等急性炎症表现，并伴有全身症状，如发热，头痛，食欲欠佳，周身不适。

方(一)

〔组成〕 苏木30克 红花15克 银花30克 蒲公英

30 克 芒硝 15 克 葱胡 30 克 桑枝 30 克 明乳香 30 克
明没药 30 克

〔用法〕 上药煎汤，先熏后洗，每次 30 分钟，每日 2 次。

〔主治〕 静脉炎（初起红肿热痛者）。

方（二）

〔组成〕 大黄 刘寄奴 防风 桂枝 威灵仙 透骨草
乳香 没药各等量。

〔用法〕 上药加水适量煎取汁，待温外洗，每日 2 次，每
次 30 分钟。

〔主治〕 静脉炎（静脉呈条索状物久不消退）。

方（三）

〔组成〕 透骨草 延胡索 归尾 片姜黄 川椒 海桐
皮 威灵仙 川牛膝 乳香 没药 羌活 白芷 苏木 五
加皮 红花 土茯苓各 9 克

〔用法〕 上药煎煮取药汁，趁热熏洗患肢，每日 1~2 次，
每次 30~60 分钟。

〔主治〕 血栓性深静脉炎。

方（四）

〔组成〕 苏木 30 克 制草乌 制川乌 川椒 秦艽
芒硝 威灵仙各 15 克 荆芥 防风 红花 松节各 9 克

〔用法〕 上药加水煎煮取汁，先熏后洗，每日 2 次，每次
30~60 分钟。

〔主治〕 血栓性深静脉炎。

方(五)

〔组成〕 桑枝 苡硝 苦参 苏木 当归 透骨草各 30 克 红花 15 克

〔用法〕 上药煎汤，先熏后洗，再浸泡或湿敷患处，每日 1 次，每次 30 分钟。若红肿甚者加蒲公英、地丁；若紫暗发凉者加桂枝、艾叶。

〔主治〕 深静脉炎(肿胀明显)。

方(六)

〔组成〕 大黄 25 克 黄柏 30 克 苦参 30 克 连翘 30 克 红花 30 克 蒲公英 40 克 板蓝根 25 克 泽泻 30 克 木通 25 克 麻黄 30 克

〔用法〕 水煎取药液，局部外洗，每日 1~2 次。若已溃者，每次换药前先局部外洗，后行换药。

〔主治〕 各型静脉炎。

十一、血栓闭塞性脉管炎(脱疽)

本病是一种慢性进行性动静脉同时受累的血管疾病。主要侵犯四肢血管，尤以下肢多见，多发生于男性。小动脉痉挛和闭塞是造成局部缺血的原因，一般认为与吸烟、受寒冷刺激、感染、外伤、精神刺激有关。初起患处表现为一时性或持续性苍白、发绀、灼热、刺痛，患肢下垂时皮色变红，上举时皮色苍白，足趾麻木，小腿肌肉痉挛性疼痛，足背动脉及胫后动脉

搏动减弱或消失，病情进一步发展可出现跛行，休息痛和夜间痛剧，进而发生溃疡坏疽，一般为干性坏疽，合并感染可形成湿性坏疽，疼痛是主要症状，常剧痛难忍。

方(一)

〔组成〕 干姜 附子 桂枝 当归 甘草各 15 克

〔用法〕 上药水煎取汁，先熏后洗，每天 2 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 脉管炎初期(患肢青紫、冰冷疼痛)。

方(二)

〔组成〕 无花果叶适量

〔用法〕 加水煮沸，取汁先熏后洗，每日 2 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 脉管炎初期(冰冷疼痛)。

方(三)

〔组成〕 川椒 10 克 艾叶 30 克 桂枝 15 克 透骨草 30 克 槐枝 10 节 蒜瓣半挂 当归 30 克 苏木 30 克 红花 15 克 桑枝 30 克 生川乌 10 克

〔用法〕 上药煎汤，熏洗患处，每次 30 分钟，每日 1~2 次，每剂可用 3 日。

〔主治〕 脉管炎初期。

方(四)

〔组成〕 附子 干姜 桂枝 当归 花椒 赤芍 细辛

麻黄 红花各 30 克 毛皮树根 120 克

〔用法〕 放大锅内，加水 10 碗，煎至 5 碗去渣，熏洗患肢，每日 1~2 次，每次半小时。

〔主治〕 脉管炎（未发生坏疽、溃疡者）。

方（五）

〔组成〕 桂枝 附子 伸筋草 苦参各 15 克

〔用法〕 上药用水煎后趁热浸洗患肢，每日 2 次，10 日为 1 个疗程。

〔主治〕 脉管炎（未溃疡未坏疽者）。

方（六）

〔组成〕 毛皮树根适量

〔用法〕 上药煎煮取汁，洗敷患肢，每日 1 次。有坏疽溃疡者洗泡局部后换药。

〔主治〕 脉管炎出现坏疽或感染后溃疡者，或未出现坏疽者均可应用。

方（七）

〔组成〕 透骨草 30 克 鸡血藤 30 克 干姜 30 克

〔用法〕 上药煎汤熏洗患肢。

〔主治〕 血栓闭塞性脉管炎。

方（八）

〔组成〕 鲜松针 1 束

〔用法〕 煎浓汤熏洗患处。

〔主治〕 血栓闭塞性脉管炎。

十二、下肢慢性溃疡

下肢慢性溃疡又名臁疮，是发生于小腿下1/3胫骨两旁的慢性溃疡。本病多由经久站立或负担重物，致下肢循环不畅，血液回流受阻，或因外伤、虫咬伤后感染而致。初起胫前起丘疱疹，迅速化为脓疱，焮红漫肿，基底炎性浸润，以后炎症不断向深部发展，中心坏死溃烂，形成黑褐色污秽痂皮，若日久不愈形成溃疡，疮口凹陷，肉色灰白或黯红，周围皮肤发硬紫黑，不易收口，严重者可腐烂至胫骨。

方(一)

〔组成〕 黄荆叶适量

〔用法〕 加水煎煮取汁，外洗患处，每日2次。

〔主治〕 下肢慢性溃疡。

方(二)

〔组成〕 黄柏60克 豆腐2块

〔用法〕 上二药加水同煎煮，取豆腐冷却后贴敷患处，每日2次。

〔主治〕 下肢慢性溃疡。

方(三)

〔组成〕 蒲公英30克 苦参 黄柏 连翘 木鳖子各

12 克 金银花 白芷 赤芍 丹皮 生甘草各 9 克

〔用法〕 上药煎汤，温洗患处，每日 2 次。

〔主治〕 用于溃疡局部红肿疼痛、脓汁多者。

方(四)

〔组成〕 鲜凤仙花连根叶 500 克

〔用法〕 将凤仙花根叶煎汤，待药汤温度降至患者能忍受时，轻轻擦洗患处 15～20 分钟，1 日 1 次，疗程为 25～35 天。

〔主治〕 下肢慢性溃疡。

方(五)

〔组成〕 鲜枸杞根 250 克

〔用法〕 上药洗净加水 3 升，煎熬至 2 升。倾入桶内，趁热熏蒸疮面，药汁降温后，反复清洗疮面，每次熏洗半小时左右，冬季适当缩短。1 日 1 次，冬季隔日 1 次。疗程为 15～30 天。熏洗后有短暂麻痛不适，活动十几分钟自癒。

〔主治〕 下肢溃疡。

十三、烧伤

烧伤是因热力，如火焰、灼热气体、液体或固体作用人体而引起的损伤。由于热力程度、作用时间、侵袭范围和深浅不同，引起局部及全身症状各异，烧伤面积小而浅者只需外治。严重烧伤者必须内外并治。I 度烧伤局部潮红肿胀疼痛，愈后

不留疤痕；Ⅱ度烧伤局部红斑上有大量水疱，疼痛剧烈，肿胀明显，愈后无疤痕，有色素沉着。Ⅲ度烧伤损伤已深达真层，表层坏死，愈后多留有疤痕。

方(一)

〔组成〕 薄荷 荆芥 苦参各等份。

〔用法〕 水煎待温湿洗患处。

〔主治〕 Ⅰ度烧伤。

方(二)

〔组成〕 金银花 60 克 甘草 6 克

〔用法〕 水煎洗涤创面。

〔主治〕 烧伤(创面渗出多者)。

方(三)

〔组成〕 虎杖 地榆 夏枯草 白芨各 1 千克 黄连 500 克 冰片 50 克

〔用法〕 将洗净的虎杖、地榆、夏枯草、黄连加适量蒸馏水浸泡 12 小时，另外将白芨同样浸泡 12 小时，浸泡后将诸药合并加适量水煎煮 3 次，每次 30 分钟，合并 3 次药液，浓缩至 2 升，趁热加入苯甲酸钠 18 克，冷却后加入冰片 50 克，混匀分装。用时将烧伤创面消毒，再涂以烧伤液；若陈旧性创面，除去死皮，消毒后再涂药。一般以暴露疗法为主，每日涂药 2~3 次。亦可包扎，先将无菌纱布浸透药液，平铺于创面上，加无菌纱布包扎，3~5 天后换药。

〔主治〕 Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度烧伤均可应用。

十四、象皮肿

象皮肿是由血丝虫病或丹毒反复发作，阻塞淋巴管，皮肤及皮下大量纤维组织增生所引起。临床表现患肢粗肿，皮肤肥厚，形成大皱纹，肢体沉重，行动笨拙。

方(一)

〔组成〕 透骨草 元胡 归尾 姜黄 川椒 海桐皮
威灵仙 川牛膝 乳香 没药 羌活 白芷 苏木 五加皮
红花 土茯苓各 10 克

〔用法〕 将上药共研粗末，用纱布包扎好，加水煎煮后，过滤去渣，趁热熏洗或溻洗患处，每日 1~2 次，每次 1 小时。

〔主治〕 象皮肿。

方(二)

〔组成〕 当归尾 红花 桃仁 苏木 蛇床子 路路通
苍耳子各 30 克

〔用法〕 上药共研粗粉，装布袋内，加水煎煮，趁热先熏，待凉后外洗，并用装药的布袋敷于患处，每次熏洗敷 1 小时，每日 1~2 次。

〔主治〕 象皮肿。

方(三)

〔组成〕 透骨草 60 克 鲜樟树叶 松枝各 30 克 生姜

15 克

〔用法〕 煎汤熏洗患处。每晚 1 次，每次 15 分钟。

〔主治〕 阴囊阴茎象皮肿。

十五、冻疮

冻疮是局部受寒冷刺激，引起局部血管痉挛、缺氧、瘀血所致的病变。多见于冬季，好发于青少年。冻疮好发部位为手、足和耳壳，这些部位在受寒后出现一个或数个紫红色水肿性斑块，自觉瘙痒、发木、胀痛，稍重者可以破溃，形成糜烂、溃疡，愈后留有瘢痕。损害可以连年出现，迁延至春暖才能消除。

方(一)

〔组成〕 艾叶 冬瓜皮 桂皮各 10 克

〔用法〕 水煎热泡患处，每日 1~2 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 冻疮未溃破者。

方(二)

〔组成〕 当归 红花 川乌 草乌各 9 克 透骨草 12 克

〔用法〕 加水适量，煎沸取药汁，先熏后浸泡，每日 1 次。

〔主治〕 冻疮未溃烂者。

方(三)

〔组成〕 尖辣椒 30 克 冬麦苗 60 克

〔用法〕 切碎混合，加水 2~3 升，煮沸 15 分钟后，去渣，趁热用布蘸药汁外洗患处，每天 1 次。

〔主治〕 冻疮未溃烂者。

方(四)

〔组成〕 蜀椒 川芎 白芷 防风 生姜各 6 克

〔用法〕 水煎取浓汁，浸洗患处，每日 1 次。

〔主治〕 冻疮未溃烂者。

方(五)

〔组成〕 黑胡椒 5~9 克(或干辣椒)

〔用法〕 将黑胡椒研成粉末，加水适量煎汤，每日早晚擦洗患处。

〔主治〕 冻疮未溃烂者。

方(六)

〔组成〕 芫花 15 克 甘草 15 克

〔用法〕 将上药水煎成 200 毫升，趁热浸洗患处，每次 20 分钟，1 日 2 次，洗后药液不必倒掉，下次继续加温可应用 2~3 天。疗程为 3~6 天。

〔主治〕 冻疮(各期)。

方(七)

〔组成〕 白萝卜 1 个(切片) 生姜 2 枚(切片) 花椒 15 克 胡椒 15 克 茄子秆 辣椒秆各适量。

〔用法〕 将上药加水适量，煎煮 30 分钟，趁热熏洗患处，

每日1~2次,每次30分钟。

〔主治〕 冻疮未溃烂者。

方(八)

〔组成〕 当归15克 赤芍15克 细辛9克 通草9克
大枣10枚。

〔用法〕 上药共用水煎半脸盆,先以热气熏洗患处,用布盖手足上,勿使热气外泄,使持久熏蒸,待汤稍凉时浸洗患处约30分钟,每天1~2次,药汤可再煮沸,如法连用4~5次。

〔主治〕 冻疮溃烂,疼痛奇痒。

方(九)

〔组成〕 芒硝适量 黄柏适量

〔用法〕 冻疮未溃破者,芒硝用量大于黄柏1倍;已溃破者,黄柏用量大于芒硝1倍;两药共为细末,用时以冰水或雪水调敷患处。局部症状轻微者,可按未溃破者用药比例,将黄柏水煎化芒硝外洗患处,1日1次,未溃者4~7天1疗程,已溃破者8~11天1疗程。

〔主治〕 冻疮溃烂者和未溃烂者均可应用。

方(十)

〔组成〕 羊角辣椒5个 生姜7片

〔用法〕 上药水煎外洗,水温以60℃为宜,洗浴患部约10分钟左右。

〔主治〕 冻疮。

方(十一)

- 〔组成〕 紫草 30 克
〔用法〕 水煎外洗，每日 2 次。
〔主治〕 冻疮。

方(十二)

- 〔组成〕 川椒 川芎 白芷 防风 生姜各 10 克
〔用法〕 煎汤趁热洗患处。
〔主治〕 冻疮。

十六、褥疮

褥疮为一种压迫性溃疡。本病多见于昏迷、外伤、偏瘫、截瘫病人，由于该病患者长期卧床不起，局部受压迫及摩擦，循环不佳，组织缺血坏死而致。多见于臀部、脊背、骶骨、枕部等突出易受压部。初起为微红破损，或呈小片红斑，继而溃破，迅速形成黑色腐肉，脓汁稀薄而臭，日久溃疡渐深而可达骨骼，四周形成空壳。常伴有发热疲惫，食欲不振等。

处方

- 〔组成〕 无花果树叶
〔用法〕 取上药适量煎煮，待皮肤可耐受时用药液浸洗患处。1 日 2 次，7 天为 1 疗程。
〔主治〕 褥疮。

十七、痔

痔是直肠末端粘膜下和肛管皮肤下静脉丛扩张、屈曲所形成的柔软静脉团。本病的发生，常因久坐久站、负重远行、久痢久泻、大便秘结、妊娠造成腹腔压力增高，致痔静脉回流受阻，或局部炎症与损伤而形成。临床根据症状不同分为内痔、外痔、混合痔。内痔发生在齿线以上，以出血、脱出为主要表现；外痔发生于齿线以下，以疼痛、坠胀、异物感为主要表现，混合痔有内外痔的特征。痔疮在一般情况下无全身症状，如发炎时可有便血、脱出、剧疼等表现。

方(一)

〔组成〕 无花果树叶 50 克

〔用法〕 上药水煎，待温度适宜，浸泡患处。1 日 2 次，7 天为 1 个疗程。

〔主治〕 痔疮。

方(二)

〔组成〕 藜芦 大黄 黄连各 25 克 川楝子 14 枚 桃仁 4 枚 巴豆 14 枚 蓖麻 4 枚 猪苓 1 千克

〔用法〕 上药同煎去渣，洗敷患处，每日 1 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 痔疮。

方(三)

〔组成〕 朴硝 30 克 莲房 30 克 五倍子 30 克 地榆 30 克 槐角 30 克 防风 30 克

〔用法〕 共为粗末，装入纱布袋内，加水 2.5~3 升，煮沸即可，先熏，再洗，后坐浴，每次 30 分钟。

〔主治〕 内痔脱出，出血，脱肛等。

方(四)

〔组成〕 芒硝 30 克 苦参 30 克 黄柏 30 克 地肤子 30 克 地榆 30 克 槐角 30 克 蛇床子 30 克 银花 30 克 蒲公英 30 克

〔用法〕 上药共研粗末，装入纱布袋内，加水 2.5 升煎煮，先熏，再洗，后坐浴，每日 1 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 内痔嵌顿，外痔发炎肿痛，肛窦炎等肛门红肿热痛，有渗液者。

方(五)

〔组成〕 芒硝 30 克 红花 30 克 苏木 30 克 蒲公英 30 克 苦参 30 克 槐花 30 克 防风 15 克 蛇床子 30 克

〔用法〕 共为粗末，装纱布袋内，加水 2.5 升，煮沸，先熏，再洗，后坐浴，每次 30 分钟，每日 1 次，每剂可用 3~15 天。

〔主治〕 内外痔、肛窦炎等。

方(六)

〔组成〕 苦参 菊花各 60 克 蛇床子 金银花各 30 克
白芷 黄柏 地肤子各 15 克 大菖蒲 9 克

〔用法〕 上药共煎煮，取药汁，加猪胆汁 4～5 枚，坐浴，
每日 1～2 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 内痔、外痔、混合痔。

方(七)

〔组成〕 瓦松 马齿苋 甘草各 15 克 川文蛤 川椒
苍术 防风 葱白 枳壳 侧柏叶各 9 克 焰硝 30 克

〔用法〕 上药加水 5 碗，煎煮取汁，先熏后洗，每日 3 次，
每次 30 分钟。

〔主治〕 内痔、外痔、混合痔。

方(八)

〔组成〕 五倍子 枯矾各 12 克 冰片 1.5 克

〔用法〕 前二味药加入适量的水，浸泡 30 分钟，煮沸 20
分钟，入冰片倒入盆中，先熏后洗，待温度适宜时坐浴。每日 1
剂，熏洗 2 次。

〔主治〕 痔疮。

方(九)

〔组成〕 丹皮 赤芍 川芎各 30 克 黄芩 黄柏 甘
草各 20 克

〔用法〕 上药煎沸，先熏洗后坐浴，1 日 2～3 次

〔主治〕 炎性外痔、血栓痔、嵌顿性内痔。

方(十)

〔组成〕 鸡冠花 凤眼草各 30 克

〔用法〕 上药为粗末,每次用粗末 15 克,水半碗,煎 3~5 沸,热洗患处,每日 2 次,每次 30 分钟。

〔主治〕 内痔、外痔。

方(十一)

〔组成〕 鱼腥草 野菊花 虎杖 泽兰 败酱草各 15 克 五味子 10 克

〔用法〕 以上诸药加水 1.5 升,置容器内煮沸 15 分钟后再文火煎 15 分钟,去渣,用药液洗患处。

〔主治〕 血栓外痔,炎性内痔,内痔嵌顿,乳头炎,早期肛裂,肛周脓肿。

方(十二)

〔组成〕 马齿苋 60 克 夏枯草 60 克

〔用法〕 煎汤熏洗。

〔主治〕 痔疮。

方(十三)

〔组成〕 莲房(或荷叶)60 克 黄柏 9 克

〔用法〕 煎汤熏洗。

〔主治〕 痔疮。

十八、肛裂

肛裂是肛管的皮肤全层裂开并形成慢性感染性溃疡。多由外伤、感染、慢性刺激、先天肛管狭窄、大便秘结、解剖学特点所造成的肛管撕裂溃疡。常见于20~30岁之间。溃疡多为单发，沿肛管放射状呈菱形。排便时疼痛，周期性出血是主要症状，并伴有便秘，肛门瘙痒，少腹胀痛，食欲不振，失眠多梦等症。

方(一)

〔组成〕 瓦松 马齿苋 五倍子 川椒 防风 苍术 枳壳 侧柏叶 葱白 朴硝各等份

〔用法〕 上药加水适量，煎沸去渣，将药汁倒入盆内，趁热熏蒸患处，待温时，坐浴洗之。每日熏洗2~3次。

〔主治〕 肛裂。

方(二)

〔组成〕 花椒6克 杭菊花6克 桑叶12克 苦参30克 陈艾30克 金银花30克 蛇床子30克 蒲公英18克 黄芩15克

〔用法〕 上药加水煎煮30~50分钟，将药液倒入盆内，趁热熏洗肛裂处，隔日1次。

〔主治〕 肛裂。

方(三)

〔组成〕 五倍子 30 克 明矾 20 克 大黄 20 克 黄柏 15 克 赤芍 12 克 红花 12 克 白芷 12 克 乳香 12 克 没药 12 克 川椒 15 克

〔用法〕 上药水煎，将药液倒入盆内，先熏洗患处，待温后再进行坐浴。

〔主治〕 陈旧性肛裂。

十九、肛门直肠周围脓肿

肛门直肠周围脓肿是指肛门直肠周围的组织急性化脓性炎症。大多由葡萄球菌、大肠杆菌和结核杆菌感染所致。临床表现为肛门周围红肿、灼热、疼痛；如已化脓则压痛明显，有波动感，伴有全身症状，如：发热，恶寒，头痛等全身反应。

方(一)

〔组成〕 荆芥 蛤蟆草 马齿苋 透骨草 苏木各 15 克 防风 银花 连翘 苦参 槐角各 12 克 生川乌 生草乌各 10 克

〔用法〕 加水煎汤，过滤去渣，趁热熏洗或坐浴。

〔主治〕 肛门直肠周围脓肿化脓期及非化脓期均可应用。化脓切开者先坐浴后换药。

方(二)

〔组成〕 蒲公英 30 克 苦参 黄柏 连翘 木鳖子各 12 克 金银花 白芷 赤芍 丹皮 甘草各 10 克

〔用法〕 将上药共研粗末，用纱布包好，置砂锅内，加水煎煮后，过滤去渣，趁热熏洗或溻渍患处，每日 1~2 次，每次 1 小时，如有疮口，先熏后洗，再常规换药。

〔主治〕 肛周脓肿（红肿热痛或破溃流脓均可应用）。

方（三）

〔组成〕 马齿苋 瓦松 甘草各 15 克 川文蛤 川椒 苍术 防风 葱白 枳壳 侧柏叶各 10 克 芒硝 30 克

〔用法〕 加水煎汤，趁热熏洗或坐浴。

〔主治〕 肛门直肠周围脓肿。

方（四）

〔组成〕 朴硝 月石 明矾各 10 克

〔用法〕 上药用开水冲化后，趁热熏洗或坐浴。

〔主治〕 肛门直肠周围脓肿。

二十、脱肛（直肠脱垂）

直肠脱垂系指直肠甚至乙状结肠下端，经肛管脱出于肛门外。其主要原因是长期腹泻、习惯性便秘等引起腹腔内压增强，使支持直肠的组织结构变得松弛无力。可发病于任何年龄，多见于老人及儿童，早期大便时直肠粘膜脱出，便后能自行回纳。若长期反复脱出，日久失治，可发生直肠或部分乙状

结肠脱出，重者甚至咳嗽、下蹲或行走时亦可脱出，有时不易回复。患者常有大便不净、下腹坠痛、腰背酸胀、腹股沟沉坠感觉。直肠粘膜经常暴露于外，容易发生充血、水肿、溃疡、出血。

方(一)

〔组成〕 石榴皮 80 克 枯矾 15 克 五倍子 30 克

〔用法〕 上药加水煎沸 30 分钟，取汁先熏后洗，早、晚各 1 次。

〔主治〕 直肠脱垂。

方(二)

〔组成〕 荆芥 皂角各等份。

〔用法〕 上药煎汤洗患处。

〔主治〕 小儿脱肛、子宫脱垂。

方(三)

〔组成〕 朴硝 30 克 莲房 30 克 五倍子 30 克 地榆 30 克 槐角 30 克 防风 30 克

〔用法〕 共研粗末，装入纱布袋内，加水 2.5~3 升，煮沸，先熏后洗，再坐浴。每次 30 分钟，每日 1~2 次。

〔主治〕 直肠脱垂。

方(四)

〔组成〕 老枣树皮 6 克 石榴皮 6 克 明矾 4.5 克

〔用法〕 将上药加水 500 毫升煎至 300 毫升，用脱脂棉蘸药液轻轻擦洗脱出部位，每日 2~3 次，疗程 10~25 天。

〔主治〕 直肠脱垂。

方(五)

〔组成〕 五倍子 36 克 地榆 30 克 土黄连 30 克

〔用法〕 上药水煎,待药液温时坐浴,1 日 1 次,每次 20 分钟,疗程 15~30 天。

〔主治〕 直肠脱垂。

方(六)

〔组成〕 苦参 菊花各 60 克 蛇床子 金银花各 30 克
白芷 黄柏 地肤子各 15 克 大菖蒲 9 克 石榴皮 明矾 五倍子各 30 克

〔用法〕 上药加水煎煮 30 分钟,取药汁趁热熏洗肛门,每日坐浴 2 次,每次 30 分钟。

〔主治〕 直肠脱垂,伴有水肿充血或溃烂者。

方(七)

〔组成〕 朴硝 桑寄生 莲房 荆芥 五倍子各 30 克

〔用法〕 煎汤熏洗患处。

〔主治〕 直肠脱垂、痔疮。

方(八)

〔组成〕 石榴皮 60 克

〔用法〕 煎汤熏洗。

〔主治〕 直肠脱垂。

方(九)

〔组成〕 枳壳 30 克 防风 30 克 枯矾 6 克

〔用法〕 煎汤熏洗。

〔主治〕 直肠脱垂。

方(十)

〔组成〕 芒硝 30 克 甘草 10 克

〔用法〕 上药一起水煎，待温，坐浴，每日早晚各 1 次。

〔主治〕 小儿脱肛。

第六章 骨伤科疾病

骨伤科疾病主要包括骨折和软组织损伤两大部分。熏洗疗法一般用于治疗骨折损伤后期并发关节僵硬、外伤性骨化或损伤性关节炎等症。在临床上,骨折病人在临床愈合解除外固定时,关节均有不同程度的僵硬而使关节功能活动受到一定的影响。中药熏洗具有行气散瘀,温经通络的作用,此时采用熏洗疗法,配合手法按摩、功能锻炼,能够加快关节功能的恢复。所以,熏洗疗法是骨折损伤后期一种重要的康复治疗方法。

熏洗疗法通过药物的直接治疗作用和水蒸气及水的温热效应,可以增强局部组织的血液循环,促进肌肉、肌腱、骨组织的修复,药力从皮到肉,从筋到骨,层层渗透,温通关节,松弛局部肌肉、肌腱及韧带的紧张、挛缩以及僵硬。如能进行全身洗浴,可使僵硬的关节在水中进行主动或被动的功能锻炼,借助于水中的浮力,逐步扩大僵硬关节的活动范围,疗效更佳。

白酒和食醋在骨折熏洗方剂中起着重要的作用。酒行气走窜于全身,活血通络;食醋软坚散结化骨,消肿止痛。白酒和食醋可引诸药直达病所,往往在药物煎煮后,对入药液中,然后进行熏洗泡浴患处。

软组织损伤主要是指人体各关节、筋络、肌肉遭受外来暴

力撞击、强力扭转、牵拉压迫或跌打闪挫等原因引起的无骨折、脱位或皮肉破裂的损伤。临床上可分为急性损伤和慢性损伤，急性损伤多由突然受到外界暴力所引起的损伤，包括挫伤和扭伤；慢性损伤是由于急性损伤没有及时治疗或治疗不当迁延而来，或人体长期处在一种特定位置上使某些软组织长期受牵拉而导致受损。软组织损伤的主要症状是疼痛、瘀血、肿胀和功能活动障碍。急性损伤疼痛较剧，局部肿胀，多呈红色、青紫色；慢性损伤疼痛多与活动牵拉有关，或仅有轻微酸痛。

熏洗疗法治疗软组织损伤，可促进损伤局部肌肉组织的血液循环以及血肿、渗液的吸收，有利于消肿止痛；对于慢性损伤，药物的作用和水的热作用可以松懈肌肉、筋腱的粘连，增加局部组织的血液循环，促进无菌性炎症的吸收，达到舒筋活络、散寒祛风止痛的治疗效果。

治疗急性软组织损伤时要注意药液的温度。损伤初期局部的组织病理变化表现为皮下出血、浆液渗出。故在受伤 48 小时之内，须将药液冷却至皮温以下，来浸泡或敷于患处，使局部的毛细血管收缩，减少局部的出血量和渗出。48 小时后，可用热的药液浸洗或外敷，促进血肿和渗液的吸收。

一、骨折

骨折指由于外力作用破坏了骨的完整性和连续性，以局部肿胀、畸形、异常活动及功能障碍为临床特点。

方(一)

〔组成〕 矿泉水

〔用法〕 选取水温在 40°C ~ 41°C 间的矿泉浴池,每次洗浴15分钟,1日1次,10~15次为1个疗程。

〔主治〕 骨折后期。

方(二)

〔组成〕 透骨草 500 克

〔用法〕 上药与白酒少许共炒至略带黄色,加水煎煮6~8小时,再与45%酒精配制药酒500毫升,每次用50毫升,淋洗伤口,1日2~3次。

〔主治〕 骨折初期。

方(三)

〔组成〕 伸筋草 9 克 秦艽 9 克 钩藤 9 克 络石藤 10 克 独活 9 克 红花 6 克 海桐皮 9 克 当归 9 克 乳香 9 克 没药 9 克

〔用法〕 上述药物水煎熏洗患处,每次20~40分钟,1日2次。

〔主治〕 骨折后期。

方(四)

〔组成〕 透骨草 伸筋草各 30 克 泽兰 刘寄奴各 15 克

〔用法〕 上药加水煎煮数沸,将药液倒入盆内,趁热熏洗

患处。每日3次，每次熏洗15～30分钟。每剂用5～6次。

方(五)

〔组成〕 生川乌 生草乌 当归各15克 川芎 海藻各15克 倒吊松树根 葱白各50克

〔用法〕 上药加水煎煮数沸，将药液倒入盆内。熏洗时加白酒50克，趁热熏洗患处。每日2次，每次30分钟。

〔主治〕 骨折、脱臼、伤筋后期。

方(六)

〔组成〕 牛膝 苏木 独活 牙皂 白芥子 麻黄 威灵仙 海桐皮各20克

〔用法〕 加盐10克，加水适量，煮沸后再加食醋15毫升。先熏洗患处，待温后将患处药液中浸泡。每日2次，每次20分钟。

〔主治〕 骨折后并发关节僵硬。

二、脱臼

脱臼即关节错位，多因行走、搬物不慎或跌打扭伤致脱，或活动失当、活动幅度过大等致关节脱臼。

方(一)

〔组成〕 当归尾 透骨草各30克 赤芍 地骨皮 五加皮 海桐皮 南红花各15克 杉木皮90克

〔用法〕 上药加水适量煎煮，趁热熏洗患处。每次15～30分钟，每日2～3次。

〔主治〕 陈旧性脱臼、骨折、畸形愈合正复前用之。

方(二)

〔组成〕 海桐皮30克 当归 防风各12克 红花 川椒 地龙 秦艽 川断 桂枝 羌活 牛膝各9克 乳香 没药各6克 五加皮15克

〔用法〕 上药共研粗末布包，加清水适量煎数沸，将药液倒入盆内，趁热先熏后洗患处，每日1～2次。

〔主治〕 陈旧性脱臼后遗症，软组织损伤。

方(三)

〔组成〕 当归 白芷 木瓜 怀牛膝 五加皮 透骨草 红花 艾叶 花椒各9克 白矾12克 元胡 青皮 乳香 没药各9克

〔用法〕 上药加水煮沸10分钟，去渣，将药液倒入盆内，边熏边洗。每日洗3～4次。

〔主治〕 关节脱臼复位，跌打损伤后肿胀。

三、软组织损伤

软组织损伤包括关节挫伤、扭伤，多发生在四肢关节部。多由于行路、运动时不慎或外力直接打击引起的关节周围软组织、关节囊和韧带的损伤。临床表现为受伤后关节处疼痛、

肿胀,并有皮下出血斑,关节活动障碍。

方(一)

〔组成〕 鲜大蓟 100 克 生栀子 100 克

〔用法〕 将上药加水 1 升煎煮,去渣,加入黄酒 100 克,趁热熏洗患处。

〔主治〕 软组织损伤。

方(二)

〔组成〕 刘寄奴 苏木 益母草 红花 丹参 赤芍 防风 独活 花椒 透骨草 五加皮 姜黄各 10 克

〔用法〕 上药共研粗末,用纱布包扎好,加水 1.5 升煎煮,去渣,趁热熏洗或湿渍患处,每日 2 次,每次 1~2 小时。

〔主治〕 软组织损伤初期,局部瘀血肿胀疼痛者。

方(三)

〔组成〕 川乌 草乌 苍术 独活 桂枝 防风 艾叶 花椒 刘寄奴 红花 透骨草各 10 克

〔用法〕 上药共研粗末,用纱布包扎好,加水 2 升煎煮,趁热熏洗,或用药包熨揉患处,熨揉时最好用火加热药液,边熏边熨,以加强温经散寒,活血通络的作用。

〔主治〕 软组织损伤范围较大,局部肿硬发凉,关节活动功能障碍,以及骨折愈合迟缓者。

方(四)

〔组成〕 菊花 蒲公英 紫花地丁 穿心莲各 15 克

芒硝 10 克 羌活 独活 细辛各 9 克 乳香 没药各 6 克

〔用法〕 上药加水适量，煎数沸，去渣，将药液倒入盆内。待温浸洗患处，每日洗数次。

〔主治〕 软组织急性炎症。

方(五)

〔组成〕 桃仁 乳香 没药各 10~16 克 红花 10 克
羌活 独活各 15 克 防己 苏木各 30 克

〔用法〕 上药加水煎煮 5~10 分钟，去渣，将药液倒入盆内，趁热先熏后洗患部。每次熏洗 20~30 分钟，每日 1~2 次，每剂用 2~4 次。

〔主治〕 急、慢性软组织扭挫伤，关节肿痛。

方(六)

〔组成〕 麻黄 伸筋草 红花 桑枝各 12 克 肉桂 9 克
(腕关节以下加桂枝，踝关节以下加牛膝，局部瘀肿加血竭，疼痛剧烈加乳香、没药)。

〔用法〕 加水煎煮，去渣，将药液倒入盆内，待温浸泡患处。每日 2 次，6 次为 1 个疗程，1 剂用 4 次。

〔主治〕 急性软组织损伤。

方(七)

〔组成〕 透骨草 30 克 防风 30 克 羌活 30 克

〔用法〕 上药煎汤去渣，熏洗患处。

〔主治〕 软组织损伤。

四、颈椎病

颈椎病又称颈椎综合征,是由于颈部长期的劳损,椎间盘组织或骨与关节发生退行性病变,影响邻近的神经、脊髓、椎动脉而导致的以颈项及肩背疼痛、麻木、活动受限等症状为特点的综合征。

方(一)

〔组成〕 伸筋草 五加皮 乳香 没药各 20 克 秦艽 当归 红花 土鳖虫 路路通 桑叶 桂枝 骨碎补 川乌 草乌各 9 克

〔用法〕 上药加水煎煮 20 分钟,取药液温洗患部,每日 1 次,每次 20 分钟,7 次为 1 个疗程。

〔主治〕 各型颈椎病。

方(二)

〔组成〕 独活 秦艽 防风 艾叶 透骨草 刘寄奴 苏木 赤芍 红花 甲珠 威灵仙 乌梅 木瓜各 9 克

〔用法〕 上药水煎,趁热熏洗患处,每次 30~40 分钟,每天 2~3 次,10 天为 1 个疗程。

〔主治〕 气滞血瘀型颈椎病。

方(三)

〔组成〕 艾叶 红花 赤芍 桑枝 木瓜 防风 五加

皮各 10 克 鸡血藤 川牛膝各 15 克 透骨草 30 克

〔用法〕 上药加水 3 升煎煮，先熏洗后热敷。每次 30 分钟，每日 2~3 次。

〔主治〕 外伤，肩关节固定时间过长及过度劳损等原因引起的肩周炎。

五、网球肘

网球肘又名肱骨外上髁炎。其病因多因肘关节长期活动过度所致，症状为肘关节疼痛，持物无力，压痛点在肱骨外上髁、桡骨小头以及腕伸肌的肌间沟。

方(一)

〔组成〕 海风藤 石楠藤 宽筋藤 鸡血藤 五方藤 十大功劳各 15 克 桑枝 12 克 苍耳子 艾叶各 10 克

〔用法〕 上药加水煎数沸，将药液倒入盆内。熏洗前在药汤中加入适量酿醋，趁热熏洗患处。若病程长，病情顽固，可另将本方水煎内服。

〔主治〕 网球肘。

方(二)

〔组成〕 生川乌 生草乌 生半夏各 15 克 川椒 苏木 生南星 细辛 桂枝各 12 克

〔用法〕 水煎熏洗，熏洗前先用手法在患处进行分筋、理筋，使局部粘连的劳损肌腱得以松懈。每次熏洗 15 分钟，浸泡

15 分钟。每剂药用 4 次。

〔主治〕 网球肘。

六、腱鞘炎

腱鞘炎是一种腱鞘损伤性疾病，主要发生在手腕和手指等活动多的部位，动作反复，或过度用力，或局部受挤压，或感受风寒等均可诱发。临床表现为局部皮肤轻度潮红肿胀，疼痛，关节活动受限，有明显压痛点，活动时病变部有摩擦感。

方(一)

〔组成〕 桃仁 乳香 没药各 10~16 克 红花 7~13 克 独活 羌活各 13~25 克 防己 25~32 克 苏木 32 克

〔用法〕 诸药水煎后熏洗患部，每日 1~2 次。

〔主治〕 腱鞘炎受风寒疼甚者。

方(二)

〔组成〕 川乌 草乌 艾叶 薄荷各 20 克 川芎 续断 当归 伸筋草 威灵仙 青风藤各 30 克 桂枝 25 克 姜黄 30 克

〔用法〕 上药加水 3.5 升，煎煮 15~20 分钟，用药液先熏后洗患处，每次 30 分钟，每日 2 次。

〔主治〕 腱鞘炎。

方(三)

〔组成〕 透骨草 海风藤 麻黄 细辛 白芥子 炮姜
桂枝 红花各 20 克

〔用法〕 上药研粗末装布袋内，加水煎煮 20 分钟，用热气先熏后洗，再用布袋置于患处热敷。

〔主治〕 腱鞘炎。

方(四)

〔组成〕 桂枝 紫苏叶各 15 克 伸筋草 20 克 麻黄
红花各 8 克 透骨草 鲜桑枝各 30 克

〔用法〕 上药加水 5 升，煎至 2.5~3 升，将药液倒入盆内。趁热熏蒸患处，待温时再浸洗患处，每次熏洗 30 分钟，每日 2 次。

〔主治〕 伸腕肌腱鞘炎(伤筋)，肿胀疼痛，不能活动，肿处有斜条状隆起。

方(五)

〔组成〕 伸筋草 豨莶草 海桐皮 续断 当归 川椒
各 30 克

〔用法〕 将上药加水文火熬煎。冷却至 50℃ 左右，把患指或腕部浸泡于药液内。浸泡数分钟后将患指或腕部反复屈伸活动数分钟，再浸泡，再活动。如此交替进行 30~60 分钟。若药液温度降低时可加热。每天 2~3 次，5 天为 1 个疗程。

〔主治〕 桡骨茎突腱鞘炎。

七、急性化脓性腱鞘炎

急性化脓性腱鞘炎多由刺伤后,细菌侵入腱鞘而发病,为急性化脓性炎症。临床表现局部红肿热痛,沿腱鞘有剧烈压痛,活动受限,尔后化脓。

方(一)

〔组成〕 马齿苋 60 克 黄芩 30 克

〔用法〕 水煎取汁,趁热浸洗。

〔主治〕 化脓性腱鞘炎初期红肿热痛者。

方(二)

〔组成〕 雄黄 煅寒水石各 15 克 白矾 60 克

〔用法〕 共研为细末,每次用 30 克,煎汤洗疮口。

〔主治〕 化脓性腱鞘炎未化脓者。

方(三)

〔组成〕 白蔹 黄芩 赤芍 丹参各 30 克

〔用法〕 上药煎煮取汁,焗洗患处。

〔主治〕 化脓性腱鞘炎已溃脓者。

八、腰肌劳损

腰肌劳损又称功能性腰痛，指腰部的累积性肌纤维、筋膜及韧带等软组织损伤，以发病缓慢、腰部酸痛为特点，属中医学“痿证”、“痹证”等范畴。

方(一)

〔组成〕 艾绒 120 克 川椒 3 克 透骨草 30 克

〔用法〕 上药水煎 2.5 升，趁热熏洗患处，每次 20～40 分钟，1 日 2 次，10 日为 1 个疗程。

〔主治〕 腰肌劳损。

方(二)

〔组成〕 当归 50 克 红花 30 克 乳香 20 克 没药 20 克 牛膝 15 克 醋 20 毫升

〔用法〕 将上述药物浸入醋内 4 小时，再加热至沸 5～10 分钟，用纱布浸药汁，趁热熏洗腰眼穴，冷则再换，1 次 4～6 小时，1 日 1～2 次，7～10 日为 1 个疗程。

〔主治〕 腰肌劳损。

九、踝关节扭伤

踝关节扭伤指踝关节过度内、外翻导致以踝部肿胀、剧痛

及功能受限为特点的踝部软组织损伤。属中医学“筋伤”、“崴脚”范畴。

方(一)

〔组成〕 紫花地丁 土大黄 蒲公英 大青叶 红花各
适量

〔用法〕 上药水煎，外洗患部，每次 30 分钟，每日 3 次。

〔主治〕 踝关节扭伤。

方(二)

〔组成〕 伸筋草 30 克 寻骨风 30 克 透骨草 30 克
路路通 30 克 甘松 30 克

〔用法〕 煎水外洗患处。有血肿者加三棱、莪术各 30 克。

〔主治〕 踝关节扭伤。

方(三)

〔组成〕 松木锯末 500 克 陈醋 500 克

〔用法〕 上药加水 400 毫升煮沸后，将患足置于药盆上，
进行熏蒸，每次 20~40 分钟，每日 2 次，5~7 日为 1 个疗程。

〔主治〕 气滞型踝关节扭伤。

方(四)

〔组成〕 伸筋草 透骨草各 15 克 五加皮 三棱 莪
术 秦艽 海桐皮各 12 克 牛膝 木瓜 红花 苏木各 9
克

〔用法〕 上述药物加水煎沸，先熏后洗患处，每次 20~

40 分钟,1 日 2 次,5~7 天为 1 个疗程。

〔主治〕 血瘀型踝关节扭伤。

十、跌打损伤

跌打损伤泛指一切体表筋膜损伤之症,包括扭挫伤及软组织损伤,是伤科最常见的疾病之一。

方(一)

〔组成〕 凤仙花(急性子)15~60 克 辣蓼 30~60 克

〔用法〕 上药加水煎煮 5~10 分钟,将药液倒入盆内,趁热先熏后洗患处,每日 1~2 次。

〔主治〕 各种损伤疼痛、风湿痛。

方(二)

〔组成〕 海桐皮 透骨草 乳香 没药各 6 克 当归 5 克 川椒 9 克 川芎 红花各 3 克 威灵仙 白芷 甘草 防风各 3 克

〔用法〕 上药加水煎煮数沸,将药液倒入盆内,趁热熏洗患处,每日 2~3 次。

〔主治〕 一切跌打损伤(筋翻骨错而疼痛不止者)。

方(三)

〔组成〕 桂枝 透骨草 羌活 赤芍各 20 克 三棱 莪术各 30 克 红花 10 克 苍术 20 克 威灵仙 30 克 艾叶

石菖蒲各 20 克 番木鳖 5 克

〔用法〕 上药加水 3~4 升,煮沸后,先以热气熏蒸患处,再以毛巾浸药水热敷患处。每次 1 小时,每日 2~3 次,每剂药可洗 3 次。

〔主治〕 跌打损伤后期,局部粘连,关节僵硬,屈伸不利者。

十一、外伤血肿

外伤血肿一般指高处跌下、硬物撞击或挤压等引起皮下组织及小血管受到破坏而形成以肿胀、疼痛为特点的组织内出血。属中医学“瘀血”、“蓄血”等范畴。

方(一)

〔组成〕 桃仁 红花 五倍子 黑豆各 20 克 赤芍 15 克 甘草 15 克 白酒 30 克

〔用法〕 加水 3 升,煎至一半,加入白酒趁热熏患处,待温后用毛巾浸药液洗患处,在药液余热未尽时停止熏洗,用毛巾擦干患处,1 次熏洗 30 分钟,1 剂药可用 4 次。

〔主治〕 扭伤、碰伤、砸伤等造成局部红肿热痛者。

方(二)

〔组成〕 宽筋藤 30 克 伸筋草 30 克 银花藤 30 克 王不留行 30 克 刘寄奴 30 克 钩藤 20 克 防风 15 克 荆芥 12 克 黄柏 12 克

〔用法〕 上述药物水煎熏洗患处，每次 20～30 分钟，1 日 3 次。

〔主治〕 外伤性局部瘀血肿痛。

方(三)

〔组成〕 鲜大蓟 120 克 栀子 120 克 黄酒 120 克

〔用法〕 将前两药加水 1 升，煎开后再对入黄酒，稍煎 1 分钟，过滤熏洗患处，每次 20 分钟，1 日 1～2 次。

〔主治〕 瘀血型外伤血肿。

方(四)

〔组成〕 桃仁 红花 三棱 莪术 乌药 桂枝 当归 尾 泽兰 生川乌 生草乌各 9 克 羌活 独活 牛膝各 15 克

〔用法〕 上药加陈醋 45 毫升、水适量煎煮数沸，将药液倒入盆中，趁热熏洗患处。每剂熏洗 2 次。

〔主治〕 久伤蓄瘀作痛。

方(五)

〔组成〕 鲜韭菜根 240 克

〔用法〕 加水 3 升，煎至 2.5 升，用药液趁热熏洗患处，每日 2 次，每次 30 分钟，1 剂用 2 次。

〔主治〕 外伤血肿。

十二、外伤疼痛

外伤疼痛是指因外力伤害而引起的疼痛。主要依据外伤史和疼痛症状而确诊。

方(一)

〔组成〕 黄栀子 60 克 血竭 15 克

〔用法〕 上药加水 300 毫升,煎沸去渣,趁热将药水装在带细眼的新喷壶内,不断淋洗患处(下接搪瓷盆)。如药水已凉需再加热。每日淋洗 2 次,每次 4 遍。每剂药用 2 天。

〔主治〕 外伤疼痛。

方(二)

〔组成〕 鲜大蓟 120 克 黄栀子 120 克 黄酒 120 毫升


〔用法〕 先将前两药加水煎煮,煎开后再对入黄酒,煎煮 1 分钟,过滤,待温用新毛巾 2 条轮换蘸取药汁湿敷患处,每日 3~5 次,7 H 为 1 个疗程。

〔主治〕 跌仆摔伤,局部血肿作痛者。

方(三)

〔组成〕 艾叶 土细辛 川桂枝 甘松 山奈 制川乌 制草乌 伸筋草 海桐皮各 10 克 红花 9 克 川椒目 30 克 茜草 15 克

〔用法〕 上药加水煎沸,先以热气熏患处,待水稍凉后外



洗患处。1日2次,7日为1个疗程。

〔主治〕 外伤肿痛。

十三、化脓性骨髓炎

化脓性骨髓炎是金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等化脓性细菌感染所引起的骨膜、骨质和骨髓化脓性炎症,多发生在四肢长管状骨,以血源性骨髓炎为严重和常见。属中医学的“附骨疽”范畴。

方(一)

〔组成〕 黄连 65 克

〔用法〕 上药加水 2 升,煮沸 15 分钟,待温将病灶全部浸入药液浸洗 1~3 小时,1 日 1 次。

〔主治〕 指(趾)骨骨髓炎。

方(二)

〔组成〕 食盐温泉或硫黄温泉。

〔用法〕 选择上述温泉洗浴,根据不同病情进行短浴或长浴。

〔主治〕 慢性骨髓炎。

方(三)

〔组成〕 黄连 900 克 黄柏 1.2 千克 大黄 1.8 千克
甘草 450 克

〔用法〕 将上述药物加适量水煎制成浓度为3%的无菌液，每取3升，灌注冲洗引流，7~15天为1个疗程。

〔主治〕 骨髓炎窦道。

方(四)

〔组成〕 透骨草 艾叶 红花 防风 桂皮 羌活 苍耳草 露蜂房各10克

〔用法〕 上药加水煎煮，取药液对局部患处先熏后洗，每次20~40分钟，每日1~2次，7~10日为1个疗程。局部有伤口时应避开伤口。

〔主治〕 血虚寒凝型骨髓炎。

方(五)

〔组成〕 独活 白芷 当归 生甘草各9克 艾叶 15克 生葱根7根 猪前蹄1只。

〔用法〕 上药加水同煎，趁热熏洗。

〔主治〕 化脓性骨髓炎。

十四、足跟骨刺

足跟骨刺指以足跟疼痛，痛点明显为特点的足跟骨质增生性病变。该病由慢性劳损引起，多见于中年以上的女性。

方(一)

〔组成〕 米醋1千克

〔用法〕 将米醋适当加热后熏洗患足，每次1小时，1日1次，15～20次为1个疗程。

〔主治〕 足跟骨刺。

方(二)

〔组成〕 麻黄 制川乌 制草乌 制乳香 制没药 地龙 赤芍各10克 红藤30克 元胡10克 桂枝 丹参各15克

〔用法〕 加水3升，浓煎至1.5升。先以一半药液洗足，同时用药渣擦洗患部，再将余药分次倒入浸洗患足。每日2次，每剂用2日，10日为1个疗程。

〔主治〕 足跟痛。

方(三)

〔组成〕 炮山甲30克 炙鳖甲40克 威灵仙50克 陈米醋1升

〔用法〕 将前三药与陈米醋在砂锅内煎熬半小时后离火，熏洗患足。将患足跟部浸泡在药液内30～45分钟，每日1～2次。1剂可用7天。

〔主治〕 足跟骨刺。

方(四)

〔组成〕 夏枯草50克 食醋1升

〔用法〕 将夏枯草浸入食醋内2～4小时，然后煮沸15分钟，熏洗浸泡患处20分钟。1日2～3次，1剂用2日。

〔主治〕 足跟骨刺。

方(五)

〔组成〕 附子 15 克 细辛 10 克 白酒适量

〔用法〕 附子加水 1.5 升武火煮沸 20 分钟,再加细辛,沸后,最后加入白酒 50 毫升。先熏后洗,浸泡 10 分钟,每日 2 次,每剂用 3 日。第二次加白酒 10 毫升即可。连用 9 日为 1 个疗程。

〔主治〕 骨刺、外伤或风寒湿邪侵袭而致的足跟痛。

方(六)

〔组成〕 威灵仙 60 克 乌梅 石菖蒲各 30 克 艾叶 羌活 独活 蜀羊泉各 20 克 红花 15 克

〔用法〕 上药用食醋 500 毫升浸泡片刻,再加清水 2.5 升煎煮。趁热以布盖脚熏之,至药液不烫手时,再将足跟浸泡 30 分钟,拭干后以拇指用力按摩患处 1 分钟。每天 1 次,每剂可连用 8 次。

〔主治〕 跟骨骨刺。

第七章 妇科疾病

熏洗疗法治疗妇科疾病具有作用迅速,简、便、廉、验等特点,深受历代医家的推崇和重视。

在古代,应用熏洗疗法治疗妇科疾病非常广泛,如“疗阴下生疮,地榆、黄柏各八两洗疮”;“疗阴痒痛不可忍,取狼牙、蛇床子煮作汤洗”;“疗妇人产后、脏中风、阴重,当归汤洗浴”等。并且有许多治疗妇科疾病的著名方剂,如苦参汤、治阴痒方、漏痒汤、阴痒外洗方、复方蛇床子洗药等,疗效确切。

本法的作用机理是借助药力和热力的综合作用,促进腠理疏通,气血流畅,改善局部营养和全身机能,达到解毒、消肿、止痛、止痒、祛风等目的,因此对多种妇科疾病确有显著而独特的疗效。如滴虫性和霉菌性阴道炎、阴痒症等女性生殖系统炎症,常用蛇床子、苦参、黄柏、硼砂、枯矾等具有清热燥湿,杀虫止痒,祛腐生肌功效的中药熏洗外治。采用该法治疗由于药物能直达病所,故奏效迅捷,有内服药所不及的优点。历代医家在这面积累了许多丰富而宝贵的经验,产生了不少疗效卓著的熏洗名方。此外熏洗疗法尚有提高机体免疫功能,调整血液和各系统组织器官功能的作用,因此对妇科的神经、体液和内分泌等方面的疾病也有较好的疗效。

一、阴道炎

阴道炎是由于阴道正常状态被各种原因破坏,而使细菌生长繁殖的疾病。临床以阴道分泌物增多为特点。常见阴道炎有滴虫性、霉菌性、老年性阴道炎等。

方(一)

〔组成〕 苦参 60 克 蛇床子 黄柏各 30 克 苍术 薏苡仁各 15 克

〔用法〕 上药加水适量煎煮,待温取汁洗涤外阴及阴道,每日 2~3 次,7 天为 1 个疗程。

〔主治〕 各种阴道炎。

方(二)

〔组成〕 苍术 百部 蛇床子 黄柏 苦参 连翘各 15 克 荆芥 10 克 枯矾 5 克 土槿皮 15 克

〔用法〕 上药加水适量浓煎成 250 毫升,待温冲洗阴道,1 日 2 次,6 天为 1 个疗程。

〔主治〕 阴道炎。

方(三)

〔组成〕 虎杖 100 克

〔用法〕 上药加水 1.5 升,煎取 1 升,过滤,待温,坐浴 10~15 分钟,每天 1 次,7 天为 1 个疗程。

〔主治〕 霉菌性阴道炎。

方(四)

〔组成〕 蛤蟆草 100 克 艾叶 100 克 硼砂 150 克 小苏打 20 克

〔用法〕 煎汤,先熏后洗,1 日 2 次,10 天为 1 个疗程。

〔主治〕 霉菌性阴道炎。

方(五)

〔组成〕 银花藤 100 克 蛇床子 100 克 大黄 25 克 乌梅 25 克 诃子 25 克 甘草 25 克

〔用法〕 上药用纱布包好(防止药渣刺激皮肤),1 剂煎 2~3 小盆,每次 1 小盆坐浴,浸洗阴道内,1 日 1 次,7 天为 1 个疗程,一般可连用 2 个疗程。

〔主治〕 滴虫性阴道炎。

方(六)

〔组成〕 苍耳草 60 克 狼毒草 20 克 苦楝皮 30 克 蒲公英 60 克

〔用法〕 上药加水煎汤,先熏后洗,1 日 2 次,10 天为 1 疗程。

〔主治〕 滴虫性阴道炎。

方(七)

〔组成〕 五倍子 乌梅各 30 克

〔用法〕 水煎,熏洗患处。

〔主治〕 滴虫性阴道炎。

方(八)

〔组成〕 蛇床子 鹤虱各 30 克 威灵仙 苦参各 15 克
狼毒 当归各 10 克

〔用法〕 加水煎汤,过滤去渣,趁热熏洗坐浴,和人猪胆汁同洗更好,每日 2 次。

〔主治〕 滴虫性阴道炎。

方(九)

〔组成〕 蛇床子 苦参 艾叶各 30 克 黄柏 金银花
地肤子各 15 克 川椒 白矾各 10 克

〔用法〕 加水煎汤,过滤去渣,趁热熏洗坐浴,每日 2 次。

〔主治〕 滴虫性阴道炎。

方(十)

〔组成〕 生大蒜适量

〔用法〕 捣碎煎汤,过滤去渣,趁热熏蒸,待温浸洗阴道。

〔主治〕 滴虫性阴道炎。

方(十一)

〔组成〕 野菊花 紫花地丁 半枝莲 蛇床子 苦参
丝瓜叶各 30 克

〔用法〕 上药加水适量煎汤,先熏后洗,1 日 2 次,10 次为 1 个疗程。

〔主治〕 阴道炎(尤其对老年性阴道炎效果最佳)。

方(十二)

〔组成〕 蛇床子 五倍子 黄柏 苦参 川椒 白鲜皮 百部 地肤子 大胡麻各 15 克 雄黄 20 克 土茯苓 12 克 白矾 冰片各 10 克

〔用法〕 先将白矾、冰片溶化，余药用布包水煎，煎液与溶化液对匀，先以热气熏阴部，待温度适宜时坐浴 15~20 分钟，同时用冲洗器取药液冲洗阴道，或用棉签蘸药液抹洗阴道，早晚各 1 次，2 日 1 剂，每次熏洗前煮沸药液，6 日为 1 个疗程。

〔主治〕 一般性阴道炎、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎及急、慢性宫颈炎。

方(十三)

〔组成〕 苦参 30 克 白鲜皮 30 克 黄柏 15 克

〔用法〕 将上药布包水煎 30 分钟，取汁，待药液温度降至 40℃ 左右时，坐浴，1 日 2 次，1 周为 1 个疗程。

〔主治〕 各种阴道炎。

方(十四)

〔组成〕 苦参 生百部 蛇床子 土槿皮 土茯苓 白鲜皮 虎杖根 鹤虱各 30 克 地肤子 川花椒 龙胆草 川黄柏 明矾各 15 克 石榴皮 苍术各 10 克

〔用法〕 上药加冷水 3 升，煮沸 20 分钟，用干净纱布滤去药渣，将药液倒入盆中，坐浴 20 分钟。每日 1 剂，早晚各 1 次，10 天为 1 个疗程，1 个疗程后复查。

〔主治〕 滴虫性、霉菌性、细菌性、老年性阴道炎。

方(十五)

〔组成〕 蛇床子 15 克 地肤子 苦参 百部 五倍子
明矾各 9 克

〔用法〕 上药先以适量水浸泡 30 分钟,再加水 1 升煮沸 30 分钟,过滤去渣,趁热熏洗阴部,每日 1 剂,10 天为 1 个疗程。滴虫性阴道炎患者,应在用药后的连续两次月经后第 2~3 天,分别再用药 5 天。治疗期间勤换内裤,禁房事。

〔主治〕 滴虫性、细菌性、霉菌性阴道炎。

方(十六)

〔组成〕 百部 蛇床子各 20 克 明矾 银花 苦楝根
皮各 15 克 川椒 10 克

〔用法〕 煎汤局部熏洗,日行 2 次,每日 1 剂,并配合口服药(山药 30 克,白术、苦参、车前子各 10 克,萆薢 12 克,黄柏、白果仁各 9 克,芡实 24 克,每日 1 剂,两煎,早晚分服,连用 5 天)。

〔主治〕 滴虫性阴道炎。

方(十七)

〔组成〕 苦参 蛇床子 黄柏 百部各 30 克

〔用法〕 上药放入盆内,加水至 1.5 升,浸泡半小时,煮沸 15 分钟,过滤后熏洗阴道半小时,浸洗时必须让药液进入阴道,每日 2 次,每 2 次 1 剂,7 天为 1 个疗程。

〔主治〕 各种阴道炎。

方(十八)

〔组成〕 蛇床子 15 克 地肤子 15 克 苦参 12 克 黄柏 10 克 土茯苓 15 克 川椒 6 克

〔用法〕 上药布包水煎，趁热熏洗阴部。

〔主治〕 阴道炎。

方(十九)

〔组成〕 艾叶 红糖各适量

〔用法〕 水煎服，同时用艾叶煎汤熏洗。

〔主治〕 阴道炎。

方(二十)

〔组成〕 蛇床子 苦参根 艾叶 明矾各适量

〔用法〕 上药按 3:3:3:2 的比例研成细末，用纱布袋包装，每包 30 克，开水冲溶后，趁热先熏阴部，水温后洗阴部，坐浴 15 分钟。

〔主治〕 阴道炎。

方(二十一)

〔组成〕 蛇床子 30 克 苦参 15 克 明矾 9 克 花椒 9 克 黄柏 9 克

〔用法〕 上药浸入水中 30 分钟，再加热煮沸 1 小时，过滤去渣，趁热熏洗。每日 1 剂，每剂洗 2 次，10 天为 1 个疗程，于第 8 天和第 14 天各复查 1 次。

〔主治〕 滴虫性、霉菌性、细菌性阴道炎。

二、宫颈炎

宫颈炎是生育年龄妇女的常见病。可分为宫颈息肉、宫颈肥大、宫颈腺囊肿、宫颈糜烂或宫颈炎。除白带增多外，一般无自觉症状，白带呈黄白色、脓样或伴有血丝，或有接触性出血。下腹和腰骶部亦可出现疼痛，且多在月经期、排便及性交时加重。

方(一)

〔组成〕 鲜仙人掌 100 克 食盐少许

〔用法〕 先将仙人掌全草剥碎，加少许食盐煎汤，先熏后洗，10 日为 1 个疗程，经期停用。另取仙人掌肉质茎块或连同果实鲜品 80 克，加烹调佐料入钵水煎后内服。如能加瘦肉 60～90 克同炖，则更为理想。

〔主治〕 宫颈炎。

方(二)

〔组成〕 苦楝根 百部根 射干各 50 克

〔用法〕 煎汤趁热熏洗患处。

〔主治〕 宫颈阿米巴病。

方(三)

〔组成〕 野菊花 紫花地丁 半枝莲 丝瓜叶各 30 克

〔用法〕 将上药同煎，熏洗阴部，每日 1 次，7 日为 1 个

疗程。

〔主治〕 偏湿热型的宫颈炎。

方(四)

〔组成〕 鱼腥草 90 克 甘草 15 克

〔用法〕 上药煎水，待温冲洗阴道，1 日 1 次，10 次为 1 个疗程。

〔主治〕 热毒郁结型的宫颈炎。

三、盆腔炎

盆腔炎是子宫、输卵管、卵巢、盆腔腹膜及盆腔结缔组织炎症的统称，为常见妇女病之一。主要表现为发热或低热，下腹部疼痛，白带多，月经失调及不孕，盆腔检查附件增厚或有炎症，常发生于经行前后或产后。

方(一)

〔组成〕 地骨皮 蛇床子 苦参各 30 克

〔用法〕 水煎，温洗阴部。

〔主治〕 盆腔炎。

方(二)

〔组成〕 蛇床子 30 克 花椒 9 克 白矾 9 克

〔用法〕 水煎温洗阴道，每剂煎汤分 5 次洗。

〔主治〕 盆腔炎。

方(三)

〔组成〕 紫花地丁 15 克 蒲公英 15 克 蝉衣 9 克

〔用法〕 煎水熏洗外阴部,每日 1 次。

〔主治〕 盆腔炎。

方(四)

〔组成〕 甘草 黄柏各 100 克

〔用法〕 水煎取汤,趁热先熏,待药液温度降至 40℃ 左右坐浴,每日 1 次。

〔主治〕 盆腔炎。

四、宫颈糜烂

宫颈糜烂指宫颈外口处的宫颈阴道部分糜烂。机理为局部表面的鳞状上皮因炎症而丧失,很快被颈管的柱状上皮所覆盖,使这部位的组织呈颗粒状的红色区。临床以白带增多,接触性出血为主要特点。

方(一)

〔组成〕 虎杖 千里光 银花藤 野菊花 蒲公英(去花)各 250 克 艾叶 60 克

〔用法〕 上药水煎后,每次取 1/4 加温水 1 倍,冲洗阴道,每日 2 次,10 次为 1 个疗程。

〔主治〕 轻度宫颈糜烂。

方(二)

〔组成〕 白鲜皮 蛇床子 苦参 椿根皮 枯矾各 30 克 黄柏 15 克

〔用法〕 加水煎汤，过滤去渣，趁热熏洗坐浴，每日 2 次。

〔主治〕 宫颈糜烂。

方(三)

〔组成〕 刘寄奴 60 克 败酱草 30 克 山慈菇 30 克 白花蛇舌草 100 克 黄柏 30 克 苦参 30 克 金银花 30 克 蒲公英 60 克

〔用法〕 加水煎取 1 升，温度降至 20℃～25℃时冲洗宫颈。

〔主治〕 宫颈糜烂及宫颈炎。

方(四)

〔组成〕 苦参 20 克 大黄 20 克 银花藤 20 克 薄荷 20 克 荆芥 12 克 蛇床子 15 克 地肤子 12 克 芒硝 12 克 蒲公英 15 克

〔用法〕 上药用布包水煎，取液 1 升，温度降至 20℃～25℃时，冲洗宫颈，每日 2 次。

〔主治〕 宫颈糜烂。

五、女阴湿疹

女阴湿疹指外阴皮疹，滋水淋漓，常伴瘙痒，甚则痒痛难忍，溃破出血，烦躁不安。

方(一)

〔组成〕 鹤虱 15 克 苦参 30 克 威灵仙 15 克 归尾 15 克 蛇床子 30 克 狼毒 15 克

〔用法〕 煎水坐浴。

〔主治〕 外阴湿疹。

方(二)

〔组成〕 蛇床子 30 克 花椒 12 克 白矾 30 克

〔用法〕 煎水坐浴。

〔主治〕 外阴湿疹。

六、阴痒

阴痒指妇女外阴部或阴道内瘙痒。其特点是痒痛难忍，或时出黄水，坐卧不安，亦称“阴疮”。是滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、老年性阴道炎、幼女性阴道炎、外阴白斑等患者经常并发的一个症状。本病多因湿热蕴积或血虚生风化燥所致。

方(一)

〔组成〕 蛇床子 白鲜皮 黄柏 苦参各 50 克 荆芥 防风 龙胆草各 20 克 薄荷 苍耳子 蒺藜 地肤子 草薢各 10 克

〔用法〕 上方水煎，熏洗外阴，每日 2 次，每次先熏后洗，每次 30 分钟，洗后须换内裤，15 天为 1 个疗程。另煎 300 毫升，每次服 10~50 毫升，1 日 3 次。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(二)

〔组成〕 苦参 30 克 黄柏 15 克 白鲜皮 30 克 蛇床子 30 克 地肤子 30 克 白矾 30 克 芒硝 30 克

〔用法〕 上药水煎，熏蒸外阴后坐浴 10~15 分钟，每晚睡前 1 次，连用 1 周。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(三)

〔组成〕 苦参 蛇床子 地肤子 黄柏各 30 克 白芷 川椒各 10 克

〔用法〕 上药加水煎沸，取煎液趁热熏洗半小时，药凉存放，下次用时再行煮沸，每日 2 次。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(四)

〔组成〕 徐长卿 50 克

〔用法〕 煎水 500 毫升，待温时浸洗，每日 2 次，早晚各 1 次。

〔主治〕 阴痒或霉菌性阴道炎。

方(五)

〔组成〕 蛇床子 苦参 艾叶 明矾各适量

〔用法〕 上药按 3 : 3 : 3 : 2 的比例投药，研成粗末，装入纱布或石棉纸内，每包 30 克，每次 1 包，以沸水冲 1 包，先熏后洗，每次 15 分钟，每日 1 次。同时更换内裤，月经期停用，分泌物多的配合中药内服。

〔主治〕 由滴虫性、霉菌性、白色病损性、老年性阴道炎及非异物性阴道炎所致阴痒。

方(六)

〔组成〕 苦参 30 克 金银花 蛇床子 地肤子各 10 克
甘草 6 克

〔用法〕 上药水煎，作局部熏洗，每晚 1 次，严重者每日 2 次，3 天为 1 个疗程。对渗出者，加用 3% 硼酸水外洗及氧化锌软膏外搽。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(七)

〔组成〕 苦参 60 克 黄柏 白矾 蛇床子各 30 克 川椒 15 克

〔用法〕 每日 1 剂，每日 2~3 次，煎水熏洗外阴部。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(八)

〔组成〕 鸦胆子 30 克 土槿皮 30 克 狼毒 25 克 枯矾 20 克 川椒 10 克 白鲜皮 40 克 百部 25 克 苦参 40 克

〔用法〕 将上药加水 3 升，煮沸 30 分钟，待药液温热时浸洗阴部，每次 10～20 分钟，每日 2 次，一般用药 4～9 剂即愈。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(九)

〔组成〕 狼牙草 24 克 川椒 9 克 生艾叶 15 克 黄连 21 克 乌梅 24 克 蛇床子 30 克 桃仁 15 克

〔用法〕 共研末，分为 3 份，每份用净水 500 毫升，煎半小时，熏洗。

〔主治〕 滴虫性阴道炎所致阴痒。

方(十)

〔组成〕 蛇床子 50 克 苦参 50 克 川椒 50 克 艾叶 15 克 猪苦胆 1 个(刺破取汁)

〔用法〕 水煎趁热先熏，温后坐浴，经期禁用。

〔主治〕 滴虫性阴道炎所致阴痒。

方(十一)

〔组成〕 茵陈 30 克 苦参 30 克 黄芩 12 克 黄柏 6 克 川椒 6 克 艾叶 30 克 甘草 3 克 维生素 B₁ 维生素

B₂ 维生素 B₆ 各适量

〔用法〕 上方酌情加用荆芥、防风各 10 克，水煎熏洗外阴，早晚各 1 次。同时常规口服维生素 B₁、维生素 B₂、维生素 B₆。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(十二)

〔组成〕 蜀椒 15 克 蒲公英 15 克 艾叶 15 克

〔用法〕 上药煎液置盆中进行洗浴，1 日 2~3 次，1 贴煎剂供 2 次使用。

〔主治〕 湿郁下焦之阴痒。

方(十三)

〔组成〕 蛇床子 百部 木槿皮 川椒 枯矾各等份。

〔用法〕 上药加水浓煎，熏洗阴部，每日早晚各 1 次。

〔主治〕 久病阴痒带多症，3 剂即愈。

方(十四)

〔组成〕 苦参 20 克 大黄 20 克 白芷 20 克 青蒿 20 克 艾叶 20 克 黄连 10 克 桉树叶 30 克

〔用法〕 将上药同清水 1.5 升放入砂罐内，加盖煮沸 15 分钟后，将药液过滤，装入小型保温瓶内，瓶口对准患处熏 15 分钟左右，待温取药液缓缓冲洗患处，用消毒布擦干，每日早晚各 1 次。

〔主治〕 湿热风毒所致的阴痒痛。

方(十五)

〔组成〕 蛇床子 苦参 川椒 明矾 百部各 10~15 克

〔用法〕 阴道伴有破溃者去川椒。上药煎汤熏洗每日 1 剂,1 剂用 2 次,10 次为 1 个疗程。

〔主治〕 女阴痒瘡。

方(十六)

〔组成〕 豨薟草 苦参各 30 克 地肤子 15 克 明矾 9 克

〔用法〕 煎水半盆,待温时反复洗患处,每次洗 10~15 分钟,每日洗 2 次,用时加温。

〔主治〕 女阴痒瘡,也可用于阴囊肛门痒瘡。

方(十七)

〔组成〕 蛇床子 21 克 苦参 21 克 明矾 21 克

〔用法〕 上药水煎,熏洗患处。注意:皮肤抓破,湿疹流水者慎用。

〔主治〕 外阴及其周围痒瘡,剧烈难忍,甚则坐卧不安,尤以睡中温暖时更甚。

方(十八)

〔组成〕 苦参 30 克 蛇床子 30 克 千里光 30 克 龙胆草 10 克 明矾 2 克

〔用法〕 上药水煎,熏洗患处。

〔主治〕 外阴湿疹、滴虫性阴道炎所致阴痒。

方(十九)

〔组成〕 蛇床子 9 克 黄柏 6 克 吴茱萸 3 克

〔用法〕 上药布包，温水浸泡 15 分钟，煎数沸，倾入盆中，趁热熏洗坐浴，早晚各 1 次，每次 5～10 分钟。

〔主治〕 外阴炎、外阴湿疹、急性女阴溃疡、单纯性阴道炎及其它阴道疾病引起的阴痒阴肿。

方(二十)

〔组成〕 蛇床子 15 克 花椒 9 克 木槿皮 15 克 紫荆皮 15 克

〔用法〕 上药布包，温水浸泡 15 分钟，煎数沸，倾入盆中，趁热熏洗坐浴，早晚各 1 次，每次 5～10 分钟。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(二十一)

〔组成〕 蛇床子 地肤子 苦参各 20～30 克 花椒 黄柏各 12 克 苍术 防风各 12～15 克。

〔用法〕 用纱布包扎，加水 2 升，煎至约 1.5 升，等温度适中时，先熏后洗，每日 2 次。

〔主治〕 滴虫性、霉菌性阴道炎所致的阴痒。

方(二十二)

〔组成〕 当归 白鲜皮各 12 克 贝母 牛膝各 10 克 苦参 15 克 连翘 蒲公英各 20 克 蝉蜕 6 克

〔用法〕 上药每日1剂，头煎内服，二煎加枯矾6克熏洗。

〔主治〕 湿热型女阴瘙痒。

方(二十三)

〔组成〕 苦参30克

〔用法〕 水煎后待温频洗，每日3~5次。

〔主治〕 风热湿邪下注所致阴痒。

方(二十四)

〔组成〕 蛇床子30克 野菊花15克 苦参片12克

〔用法〕 上药水煎外洗患部，每日2次，1剂可洗2日。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(二十五)

〔组成〕 蛇床子30克 黄柏12克 枳壳10克 紫草30克 苦参30克 明矾10克 椒目20粒。

〔用法〕 上药水煎，外洗阴部，每日2次。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(二十六)

〔组成〕 雄黄 薏苡仁 蒲公英各30克 蛇床子 黄柏各20克 苍术15克

〔用法〕 上药水煎，外洗阴部，另配内服龙胆泻肝丸，每次5克，每日2次。

〔主治〕 前阴瘙痒，入暮则甚，小便短赤。

方(二十七)

〔组成〕 蛇床子 30 克 花椒 10 克 白矾 15 克

〔用法〕 煎汤，趁热先熏后洗，每日洗 2~3 次。

〔主治〕 女阴瘙痒，阴部生疮痛痒者。注意：忌食辛辣油腻之品。

方(二十八)

〔组成〕 鹤虱草 30 克 苦参 15 克 威灵仙 5 克 归尾 30 克 狼牙 10 克 蛇床子 15 克

〔用法〕 上药煎汤，熏洗阴部，临用时加猪胆 2 个更佳。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(二十九)

〔组成〕 黄柏 15 克 蛇床子 20 克 金银花 20 克 苦参 蜀椒各 10 克 白鲜皮 10 克 食盐 3 克 明矾 10 克

〔用法〕 每日 1 剂，水煎后熏洗阴部，每日 2 次，5 日为 1 个疗程。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(三十)

〔组成〕 鹤虱草 50 克 苦参 威灵仙 归尾 蛇床子 狼毒各 25 克 公猪胆 2~3 个

〔用法〕 用水 10 碗煎数沸，滤清贮盆内，趁热先熏后洗。临洗入公猪胆汁同洗效更妙，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

〔主治〕 女阴瘙痒未溃者。

方(三十一)

〔组成〕 蛇床子 30 克 苦参 15 克 白头翁 15 克 仙鹤草 15 克 乌梅 10 克

〔用法〕 上药水煎，待温外洗。注意：经期禁用，治疗期间禁房事。

〔主治〕 滴虫性阴道炎所致阴痒。

方(三十二)

〔组成〕 川椒 30 克 决明子 30 克

〔用法〕 上药布包，水煎，先熏洗，后坐浴。

〔主治〕 一切外阴瘙痒症。

方(三十三)

〔组成〕 鹤虱 30 克 蛇床子 30 克 生百部 15 克

〔用法〕 将上药水煎，趁热熏洗阴部，每日 1 次，每次 20 分钟。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(三十四)

〔组成〕 芒硝 蛇床子 生黄柏 川椒 苦参各 15 克

〔用法〕 上药水煎，熏洗阴部，每日一二次，每次 20 分钟。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(三十五)

〔组成〕 丝瓜络 蒜瓣各 60 克

〔用法〕 上药加水 1 升煎煮，先熏后坐浴，每日 2～3 次，每次 20 分钟。

〔主治〕 女阴瘙痒。

方(三十六)

〔组成〕 苦参 30 克 黄柏 30 克 大青叶 25 克 红花 6 克

〔用法〕 水煎，取煎液趁热熏洗，每日 2 次。

〔主治〕 带下、外阴瘙痒等。

方(三十七)

〔组成〕 花椒 吴茱萸 蛇床子各 30 克 藜芦 15 克
陈茶 1 撮 烧盐 60 克

〔用法〕 上药水煎，趁热熏。

〔主治〕 妇人阴痒不可忍，非以热汤泡洗不能已者。

方(三十八)

〔组成〕 蛇床子 白鲜皮 黄柏各 50 克 荆芥 防风
苦参 龙胆草各 15 克 薄荷 1 克(后下)

〔用法〕 带下多而黄者黄柏加倍，有滴虫者苦参加倍，霉菌感染者龙胆草加倍。上方水煎熏洗，每日 2 次。如阴道内瘙痒可熏洗阴道，10～15 天为 1 个疗程。

〔主治〕 各种阴痒。

方(三十九)

〔组成〕 苦参 白鲜皮 蛇床子各 30 克 冰片 3 克
防风 15 克 荆芥 10 克 花椒 20 克 透骨草 35 克

〔用法〕 将上述药物除冰片外，煎取药液，再入冰片 1.5 克，趁热熏外阴 10～20 分钟，待药液凉后，徐徐洗涤患处，每日 1 剂，早晚各 1 次。

〔主治〕 女阴瘙痒。

七、阴疮

阴疮指妇人阴户生疮，局部红肿热痛，积结成块，或化脓腐烂，脓水淋漓，甚则溃瘍如虫蚀者。亦名“阴蚀”、“阴虱”等。包括西医所指外阴炎、外阴肿瘤、脓肿、溃瘍、阴虱等。本病以外阴局部红肿热痛或兼脓水淋漓为特征。

方(一)

〔组成〕 蛇床子 9 克 黄柏 6 克 淡吴萸 3 克

〔用法〕 诸药布包，温水浸泡 15 分钟后煮数沸，倾入盆中，趁热熏洗坐浴，早晚各 1 次，每次 5～10 分钟，洗后拭干外阴部。内阴部待其自然吸收，随证增减方中寒温药量。

〔主治〕 毒热型阴蚀、寒凝型阴蚀。

方(二)

〔组成〕 苦参 15 克 蛇床子 15 克 白鲜皮 15 克 土茯苓 15 克 黄柏 15 克 川椒 6 克

〔用法〕 诸药水煎熏洗外阴部，每日 1～2 次。

〔主治〕 各型阴蚀。

方(三)

〔组成〕 鹤虱 30 克 苦参 15 克 狼毒 15 克 蛇床子 15 克 归尾 15 克 威灵仙 15 克

〔用法〕 诸药水煎,滤渣,熏洗外阴部。

〔主治〕 外阴部溃烂,脓血淋漓,或痛或痒,多伴有赤白带下。

方(四)

〔组成〕 羊蹄适量

〔用法〕 煎汤滤渣,熏洗外阴部。

〔主治〕 妇人阴蚀疼痛。

八、带下病

带下病指带下量明显增多,色、质、气味异常,伴全身或局部症状者。正常带下为润泽于阴户的一种无色、质粘、无臭的阴液,其量不多。如果带下五色夹杂,如脓似血,奇臭难闻,当警惕癌变,应结合必要的检查明确诊断。

方(一)

〔组成〕 苦参 60 克 蛇床子 黄柏各 30 克 苍术 薏苡仁各 15 克

〔用法〕 上药加水煎煮 1 小时后滤渣,洗涤外阴周围及

阴道，每日2~3次，7日为1个疗程，连用3个疗程。

〔主治〕 阴道炎所致带下。

方(二)

〔组成〕 狼毒 90 克

〔用法〕 上药加适量水煎至 500 毫升，冲洗阴道，每日 1~2 次，7 日为 1 个疗程。

〔主治〕 宫颈炎所致的带下病。

方(三)

〔组成〕 蛇床子 白鲜皮 黄柏各 50 克 荆芥 防风 苦参 龙胆草各 15 克 薄荷 10 克(后下)

〔用法〕 上药水煎去渣，熏洗外阴，每日 2 次，10~15 日为 1 个疗程。

〔主治〕 滴虫或霉菌所致的湿热带下病。

方(四)

〔组成〕 野菊花 蛇床子各 30 克 生百部 15 克 苦参 20 克 枯矾末 12 克

〔用法〕 上药用纱布包好后入煎 30~40 分钟，取煎液趁热熏洗阴部，每天 3~4 次，每次 15~30 分钟，每剂可用 2 天，治疗期间忌食鱼腥、油腻，勿用公共浴池洗澡，节制性生活。

〔主治〕 湿毒带下。

方(五)

〔组成〕 蛇床子 30 克 地肤子 30 克 黄柏 15 克

〔用法〕 水煎去渣，待温坐浴。

〔主治〕 黄带。

方(六)

〔组成〕 蒲公英 30 克 蛇床子 15 克 藿香 30 克

〔用法〕 加适量水 200 毫升，待温取滤液冲洗，每日 1 次，7 日为 1 个疗程。

〔主治〕 黄带。

方(七)

〔组成〕 防风 10 克 苦参 10 克 黄柏 10 克 地肤子 15 克 白矾 6 克 狼毒 10 克

〔用法〕 同前。

〔主治〕 黄带。

方(八)

〔组成〕 藿香 30 克 拉拉藤 30 克

〔用法〕 同前。

〔主治〕 五色带。

方(九)

〔组成〕 细辛 10 克 蛇床子 30 克

〔用法〕 同前。

〔主治〕 五色带。

方(十)

〔组成〕 羌活 20 克 升麻 20 克 知母 20 克 白矾 20 克 白头翁 30 克

〔用法〕 上药水煎，待温冲洗坐浴，1 天 1 次，10 天为 1 个疗程。

〔主治〕 湿热下注所致的带下病。

方(十一)

〔组成〕 苦参 30 克 蛇床子 30 克 白鲜皮 20 克 狼牙草 20 克

〔用法〕 水煎去渣，待温坐浴，每日 1 次，并用手指裹纱布蘸药液尽可能擦洗阴道深部。

〔主治〕 滴虫病所致的带下。

方(十二)

〔组成〕 黄柏 30 克 马鞭草 30 克 白鲜皮 30 克 苦参 30 克 红花 10 克

〔用法〕 上药水煎冷却后坐浴，每日 1~2 次。

〔主治〕 霉菌病所致带下。

方(十三)

〔组成〕 黄柏 20 克 蛇床子 15 克 白矾 10 克 生半夏 生南星 花椒各 10 克 椿根皮 30 克

〔用法〕 煎汤，待温坐浴，1 日 2 次，15 天为 1 疗程。

〔主治〕 妇人带下。

方(十四)

〔组成〕 蛇床子 30 克 白鲜皮 15 克 黄柏 9 克 土茯苓 30 克 枯矾 9 克 苦参 9 克 百部 15 克

〔用法〕 水煎熏洗阴部，每日 3 次。

〔主治〕 湿热带下。

方(十五)

〔组成〕 生山药 生薏苡仁 土茯苓 椿根皮 蒲公英 各 30 克 芡实 银花 白花蛇舌草各 20 克 黄柏 白果 柴胡各 10 克 车前子 15 克(包煎)

〔用法〕 上药加适量水煎至 1 升，熏洗或坐浴，早晚各 1 次。

〔主治〕 黄带。对白带、赤带、青带亦有良效。

方(十六)

〔组成〕 吴茱萸 杜仲 蛇床子 五味子各 30 克 木香 丁香各 15 克

〔用法〕 上药用纱布包好，加水 1 升煮沸熏洗小腹患部，先熏后洗，并可坐浴，早晚 2 次。

〔主治〕 下元虚冷腹痛，带下五色。

方(十七)

〔组成〕 蛇床子 防风 透骨草 苦参 川椒 蒺藜 黄柏 银花 连翘 槐花各 10~16 克

〔用法〕 水煎熏洗坐浴，每日 2 次，10 天为 1 个疗程。

〔主治〕 带下病。

方(十八)

〔组成〕 鸦胆子 15 克或蛇床子 50 克

〔用法〕 用蛇床子或鸦胆子研碎后，加水 500 毫升煎煮，趁热熏洗阴部，每日 1 次。

〔主治〕 妇人白带增多，属湿热者。

九、经行风疹

经行风疹指每值临经时或行经期间，周身皮肤突起红疹，或起风团，瘙痒异常，经净渐退者。

方(一)

〔组成〕 西河柳适量

〔用法〕 水煎熏洗。

〔主治〕 经行风疹。

方(二)

〔组成〕 苦参 30 克 地肤子 30 克

〔用法〕 水煎熏洗。

〔主治〕 经行风疹。

十、经后尿感

经后尿感指经后出现小便频数，淋漓不畅，尿色黄赤混浊，小腹拘急，或伴腰痛，带多色黄或有秽臭。

处方

〔组成〕 银花 30 克 甘草梢 3 克

〔用法〕 水煎坐浴。

〔主治〕 经后尿感。

十一、崩漏

崩漏是指经血非时暴下不止或淋漓不尽，前者称崩中，后者称漏下。诊断依据为阴道出血，月经没有规律，出血量多，势急或淋漓不断；出血情况有骤然大下，继而淋漓，有淋漓连月不休，或停经数日又暴下或淋漓；其血色或鲜红或黯淡，血质或稠粘或清稀，或有血块，或有臭气，原因不同，证型各异。

处方

〔组成〕 吴茱萸(汤泡) 杜仲(炒) 蛇床子 五味子 丁皮各 50 克 木香 丁香各 25 克

〔用法〕 上药共为粗末，每次取药末 25 克，用纱布袋盛，以水 3 大碗煎数沸，趁热熏下部，待温用手淋洗，早晚各 1 次。

〔主治〕 下焦虚冷，脐腹疼痛，带下五色，崩中漏下。

十二、闭经

闭经是指女子年逾 18 周岁月经尚未初潮，或已行经而又中断达 3 个月以上者。妊娠期、哺乳期暂时性的停经，经绝期的绝经，或有些少女初潮后一段时间内有停经现象者，均属生理现象，不作闭经论。有些妇女由于生活环境的突然改变，偶尔一两次月经不潮，并无其它不适者，亦不作闭经论。

方(一)

〔组成〕 生地 当归 赤芍 桃仁 五灵脂 大黄 丹皮 茜草 木通各 15 克

〔用法〕 上药加水 1.5 升煎煮，待温取汤淋浴小腹，每日 1 次，每次 30 分钟，7 天为 1 个疗程。

〔主治〕 热结血闭的实证闭经。

方(二)

〔组成〕 益母草 125 克

〔用法〕 上方加水 1 升，煎煮取液，先温洗小腹，再取蚕沙适量炒热，布包熨小腹。

〔主治〕 闭经。

十三、妊娠肿胀

妊娠肿胀指妊娠期出现头面部、四肢或全身浮肿者。在妊娠期发现有肿胀现象不能忽视，需积极治疗，以防渐趋严重，发展成子痫。

方(一)

〔组成〕 甘松 100~300 克(重者可酌加剂量)

〔用法〕 加水适量，煮沸数分钟，去渣，待药液温度至 40℃ 左右时，擦洗患处，每天 1~2 次，每剂可洗 2~3 次。

〔主治〕 妊娠肿胀。

方(二)

〔组成〕 甘松 100 克

〔用法〕 加水 3 升，煎水浸泡双足，每日 2 次。

〔主治〕 妊娠肿胀。

十四、妊娠皮肤瘙痒

妊娠皮肤瘙痒指妊娠期间出现皮肤瘙痒，分娩后，皮肤瘙痒可自行消失。

处方

〔组成〕 地肤子 12 克 野菊花 12 克(包)

〔用法〕 煎汤外洗。

〔主治〕 妊娠皮肤瘙痒。

十五、难产

难产是指妊娠足月到分娩时，胎儿不能顺利娩出的疾病。

处方

〔组成〕 蛇蜕适量

〔用法〕 水泡，浴产门。

〔主治〕 难产。

十六、产后胞衣不下

产后胞衣不下是指胎儿娩出后，胎盘经过较长时间不能娩出者。类似现代医学的胎盘滞留。诊断依据为胎儿娩出后半小时，胎盘仍然没有娩出。

处方

〔组成〕 川芎 当归各 60 克

〔用法〕 加水 1 升，煎洗外阴。

〔主治〕 胞衣不下。

十七、产后玉门不闭

产后玉门不闭是指妇女产后阴户不能闭合的疾病。多由于胎前失于调养，产后气血大虚，不能收摄而致。又称“产门不闭”。

方(一)

〔组成〕 甘草适量

〔用法〕 煎汤，趁热先熏阴部，待温（不烫皮肤时）洗之。

〔主治〕 产后玉门不闭。

方(二)

〔组成〕 野紫苏适量

〔用法〕 煎汤先熏后洗。

〔主治〕 产后玉门不闭。

十八、产后缺乳

产妇在哺乳期，乳汁甚少或全无，称为“缺乳”。缺乳多发生在产后第二三天至半个月內，也可发生在整个哺乳期。

方(一)

〔组成〕 京三棱 1.5 千克

〔用法〕 水2碗,煎汁1碗,洗乳房至乳汁出为度,极妙。

〔主治〕 乳汁不下。

方(二)

〔组成〕 热水或葱汤或橘皮

〔用法〕 局部用热水或用葱汤熏洗乳房,或用橘皮煎水热敷乳房。

〔主治〕 乳汁不下。

方(三)

〔组成〕 麦芽120克

〔用法〕 以水500毫升,煎汤洗乳房,并用木梳梳千遍。

〔主治〕 乳络不通,乳汁不行。

十九、产后身痛

产后身痛指妇女产褥期间出现肢体关节酸痛、麻木、重着者,或称“产后关节痛”、“产后痛风”。临床特点是产后肢体酸痛、麻木、重着,局部无红、肿、灼热,临证时应与风湿热相区别。

方(一)

〔组成〕 老茅草叶 石菖蒲 陈艾各适量

〔用法〕 水煎外洗。

〔主治〕 产后风湿痛。

方(二)

〔组成〕 还阳参适量

〔用法〕 水煎外洗。

〔主治〕 产后腰痛。

二十、乳痈

乳房患痈肿脓疡,称为乳痈。往往发生于产后小满月内,尤以初产妇(特别是农村的妇女)多见。

方(一)

〔组成〕 葱白 150~250 克

〔用法〕 葱白切细后加入适量热水,先熏后洗患侧乳房,每日 3~5 次,2 天为 1 个疗程。

〔主治〕 乳腺炎初期(乳痈)。

方(二)

〔组成〕 葱白 500 克 麦芽 50 克

〔用法〕 葱白捣烂取汁,用好酒分 2 次冲服,外用麦芽 50 克煎汤频频温洗。

〔主治〕 乳腺炎(乳痈)。

方(三)

〔组成〕 刘寄奴 蒲公英各 30 克 红花 9 克

〔用法〕 上药水煎，熏洗患乳，每日1~2次，每次20分钟。

〔主治〕 乳痛初起。

二十一、乳头皲裂

乳头皲裂是由多种原因引起的乳头部位皮肤干燥皲裂。本病主要是发生于乳头部位的皮肤干燥皲裂。发病缓慢，初起时，皮肤发干发紧，弹性减低，可出现多处浅在裂纹，随病情发展，皮肤粗糙，裂纹深达真皮及皮下组织。

处方

〔组成〕 白芷 15克 蒲公英 苦参 硼砂 生甘草 各9克

〔用法〕 上药加水煎汤，趁温热用无菌纱布蘸药擦洗患部，每次15~20分钟，如药液变凉，可再加温，每日洗2次，每剂药用1天。

〔主治〕 乳头皲裂，可防治继发性乳腺炎。

二十二、阴痛

阴痛指女子阴中或阴户作痛，或阴器时时抽掣疼痛，甚至牵引少腹，上连两乳，或阴道干涩作痛，或外阴红肿疼痛，但又非阴疮者。

方(一)

〔组成〕 泽兰叶 120 克 枯矾适量

〔用法〕 先用泽兰叶煎汤熏洗二三次，再加枯矾，煎水洗之，即安。

〔主治〕 产后阴户翻出疼痛。

方(二)

〔组成〕 羌活 防风各 30 克

〔用法〕 煎汤熏洗即效。

〔主治〕 产后阴户肿痛。

方(三)

〔组成〕 蛇床子 60~90 克

〔用法〕 煎水频洗即愈。

〔主治〕 产后阴户肿痛。

方(四)

〔组成〕 当归 150 克 独活 150 克 白芷 150 克 地榆 150 克 败酱草 100 克 矾石 100 克

〔用法〕 将诸药捣碎，水煎去渣，温洗患处，每日 3 次。

〔主治〕 产后中风，阴肿痛。

方(五)

〔组成〕 黄连 45 克 牛膝 30 克 甘草 30 克

〔用法〕 上药分为 4 等份，熬水洗阴道，每日早晚各洗 1

次。

〔主治〕 房事阴疼症。

方(六)

〔组成〕 荆芥 25 克 防风 25 克 蒲公英 25 克 蛇床子 10 克

〔用法〕 上药水煎，每日早晚各熏洗阴户 1 次。

〔主治〕 证属肝肾亏损，风邪内侵之房事阴疼症。

方(七)

〔组成〕 小麦 甘草各等份。

〔用法〕 上二味煎汤擦洗外阴部，每日早晚各 1 次。

〔主治〕 房事损伤所致的房事阴疼症。

二十三、阴吹

阴吹指妇人阴道里时时出气，或气出有声，状如矢气者。本病多见于 40 岁以上，经产体弱之妇，而室女体健者，较为少见。

方(一)

〔组成〕 苦参 土茯苓 百部各 10 克 花椒 20 克 苦楝根皮 地肤子各 30 克

〔用法〕 煎水熏洗坐浴，每天睡前 1 次。灭滴灵 0.2 克，每天 3 次口服，连用 10 天。

〔主治〕 室女阴吹。

方(二)

〔组成〕 苦参 黄柏 白鲜皮 桂枝 黄芪各 30 克

〔用法〕 将上药水煎取汁坐浴，每日洗 2 次，7 天为 1 个疗程。

〔主治〕 阴吹。

二十四、阴肿

阴肿指女子阴中或阴户肿胀，或红肿疼痛，但又非阴疮者。诊断依据为：女子外阴或阴道肿胀，兼有疼痛不适。

方(一)

〔组成〕 五倍子 蒲公英 生侧柏叶 川椒 苦参 朴硝 苍术 地榆 防风 黄柏 赤芍 生甘草各适量

〔用法〕 上药水煎，坐浴，每日 1~2 次。

〔主治〕 外阴红肿热痛。

方(二)

〔组成〕 艾叶 小茴香 桂枝 细辛 升麻各适量

〔用法〕 上药煎水，先熏后洗，每日 1~2 次。

〔主治〕 外阴肿胀，而无明显疼痛者。

方(三)

〔组成〕 艾叶 防风 大戟各适量

〔用法〕 水煎趁热熏洗阴部。

〔主治〕 气虚下陷之阴肿。

方(四)

〔组成〕 秃疮花 蒲公英 艾叶 全葱各适量

〔用法〕 煎水洗阴部。

〔主治〕 妇女阴肿。

方(五)

〔组成〕 甘菊苗适量

〔用法〕 捣烂煎汤，先熏后洗。

〔主治〕 妇女阴肿。

二十五、阴道挛缩

妇人阴道挛缩，抽掣不适称为“阴道挛缩”，临床上常可见到。

处方

〔组成〕 当归 15 克 赤芍 15 克 首乌 15 克

〔用法〕 水煎频洗阴部。

〔主治〕 气血不足的阴道挛缩病。

二十六、会阴侧切硬结

本病指女子分娩时，会阴侧切形成的硬结。此病临床上常可见到，往往给患者带来痛苦和不适。

方(一)

〔组成〕 蛇床子 野菊花 生黄柏 苦参 鹤虱 马齿苋 生甘草各适量

〔用法〕 上药水煎去渣，取汁趁热熏蒸局部，待稍凉后外洗。

〔主治〕 会阴侧切术后硬结。

方(二)

〔组成〕 苍术 30 克 黄柏 9 克 大青叶 30 克

〔用法〕 每日 1 剂，水煎 2 升，熏洗阴部，1 日 2 次。

〔主治〕 会阴切口感染，局部红肿有脓液。

方(三)

〔组成〕 马齿苋 芒硝 瓦松各 15 克 川椒 白藜 苍术 防风 枳壳 侧柏叶 黄柏 苦参 木槿皮各 9 克

〔用法〕 将上药置于纱布袋中，扎紧袋口，加水 5 升，水煎后取出纱布袋，趁热熏患处，待温浸洗，每次 20 分钟，每日 2~3 次，每日 1 剂。坐浴时间在刀口拆线后即可。

〔主治〕 会阴刀口愈合不良、老年性阴道炎、外阴炎、外

阴溃疡。

二十七、不孕症

不孕症指育龄期妇女，夫妻同居 2 年以上，男方生殖功能正常，未避孕而不怀孕；或曾有过妊娠，又间隔 2 年以上，未避孕而不受孕者。

方(一)

〔组成〕 蒲公英 15～30 克 黄柏 15 克 苦参 15 克

〔用法〕 上药放盆内，对冷水半盆，煎煮半小时，趁热熏洗外阴，待不烫手时，右手食指缠纱布或薄细布蘸药水洗外阴、阴道，每晚熏洗 1 次。次日药渣中再对水至半盆，熬开后继续如上法使用。1 剂药可连用 3 天。

〔主治〕 霉菌性、滴虫性、细菌性阴道炎所致不孕症。注意：治疗期间忌食辛辣之物。

方(二)

〔组成〕 苦参 地肤子 蒲公英 龙胆草各 30 克

〔用法〕 将上药加适量水煎取药液 500 毫升，再加开水 1 升，在排卵期每晚熏洗阴道 1 次，每剂煎 3 次，每 3 剂为 1 个疗程。用药后自觉阴道清洁，分泌物透明，无不适感。

〔主治〕 不孕症。

二十八、子宫脱垂(阴挺)

子宫脱垂指妇人阴中有物下坠,甚则挺出阴户之外者。主要指西医妇产科的子宫脱垂、阴道前后壁膨出。诊断标准为妇女子宫从正常位置沿阴道下降,子宫颈外口达坐骨棘水平以下,甚至子宫全部脱出于阴道口外。

方(一)

〔组成〕 生枳壳 60 克 乌梅 30 克

〔用法〕 上药水煎,熏洗坐浴。

〔主治〕 子宫脱垂无溃烂者。

方(二)

〔组成〕 金银花 紫花地丁 蒲公英 苦参 黄连 黄柏 蛇床子 枯矾各 10 克

〔用法〕 上药水煎,熏洗坐浴。

〔主治〕 子宫脱垂并发感染,湿热下注者。

方(三)

〔组成〕 生核桃皮 50 克

〔用法〕 将上药煎水 2 升,温洗,每次 20 分钟,早晚各 1 次,1 周为 1 个疗程。Ⅰ、Ⅱ度脱垂者,除以上方法,可配补中益气汤水煎内服,并加土炒生核桃皮 6 克,研细冲服,每日 2 次,1 周为 1 个疗程。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(四)

〔组成〕 麻黄 6 克 炒枳壳 12 克 透骨草 9 克 小茴香 6 克

〔用法〕 上药布包,温水浸泡 15 分钟,煎煮数沸,趁热先熏后洗,然后将子宫脱垂部分,轻轻还纳,卧床休息。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(五)

〔组成〕 枳壳适量

〔用法〕 煎汤先熏后洗阴部,每日 2 次。

〔主治〕 子宫脱垂,无溃疡者。

方(六)

〔组成〕 乌梅 五倍子 石榴皮各适量

〔用法〕 煎汤先熏后洗阴部,每日 2 次。

〔主治〕 子宫脱垂无溃疡者。

方(七)

〔组成〕 苦参 蛇床子 黄柏 白芷 枯矾各适量

〔用法〕 煎汤先熏后洗,每日 1~2 次。

〔主治〕 湿热型子宫下垂。

方(八)

〔组成〕 蛇床子 15 克 真乌梅 9 个

〔用法〕 水煎先熏后洗，每日 1～2 次，又以猪油调藜芦末敷之，内服逍遥散自消。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(九)

〔组成〕 大蒜适量

〔用法〕 煎汤熏洗之，以愈为度。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(十)

〔组成〕 苦参 15 克 黄柏 10 克 蛇床子 30 克 黄连 3 克 白芷 10 克 枯矾 15 克

〔用法〕 煎汤熏洗外阴部。

〔主治〕 子宫脱垂，兼湿热下注者。

方(十一)

〔组成〕 韭菜 250 克

〔用法〕 煎汤熏洗外阴部。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(十二)

〔组成〕 千金藤根适量

〔用法〕 煎汤熏蒸，每天 1 次，另取金樱子 60 克，水煎服。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(十三)

〔组成〕 丹参 15 克 五倍子 诃子肉各 9 克

〔用法〕 煎汤熏洗外阴部。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(十四)

〔组成〕 五倍子 白矾各适量

〔用法〕 煎汤熏洗外阴部。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(十五)

〔组成〕 五倍子 9 克 诃子 9 克

〔用法〕 煎汤熏洗外阴部。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(十六)

〔组成〕 升麻 枳壳 当归 蛇床子 乳香 没药 赤芍 赤小豆各 40 克 五倍子 15 克

〔用法〕 煎汤熏洗外阴部。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(十七)

〔组成〕 金银花 蒲公英 紫花地丁 蛇床子各 30 克
黄连 6 克 苦参 15 克 黄柏 枯矾各 10 克

〔用法〕 水煎熏洗外阴部。

〔主治〕 子宫脱垂，伴有黄水淋漓，湿热下注者。

方(十八)

〔组成〕 芒硝 35 克 枯矾 35 克 黄柏 10 克 黄芩 10 克

〔用法〕 上药放入砂锅内，加清水 2 升，煮沸 30~40 分钟，捞去药渣，将药汁倒入盆中，趁热熏洗患处，每日 2 次。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(十九)

〔组成〕 嫩苦参 30 克 生枳壳 30 克 石榴皮 30 克

〔用法〕 以清水 3 升，将上药浓煎取汁，先熏后坐浴温洗，每晚 1 次。用时取蓖麻子仁 3 粒，捣烂做小饼，敷于百会穴。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(二十)

〔组成〕 生枳壳 15 克 益母草 15 克 蛇床子 9 克 川黄柏 15 克 金银花 15 克 紫草根 9 克

〔用法〕 用清水 3 升，将上药浓煎去渣，药水倒入盆中，先熏后坐浴，每晚 1 次，连续 1~2 周。

〔主治〕 子宫脱垂带下量多者。

方(二十一)

〔组成〕 白胡椒 附片 白芍 元桂 党参各 20 克
五倍子 椿根白皮各 100 克

〔用法〕 上药煎汤熏洗，1日2次，10日为1个疗程。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(二十二)

〔组成〕 蛇床子 20克 大蒜 30克 白鲜皮 20克 紫背浮萍 30克

〔用法〕 将上药水煎后，外洗阴部，1日1次，7日为1个疗程。

〔主治〕 湿热性子宫脱垂。

方(二十三)

〔组成〕 蛇床子 45克 益母草 30克 乌梅 30克

〔用法〕 加水浓煎，熏洗后温浸局部，能使子宫逐渐缩小，易于纳入。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(二十四)

〔组成〕 五倍子 椿根白皮各 100克

〔用法〕 水煎熏洗阴部，1日2次。

〔主治〕 子宫脱垂。

方(二十五)

〔组成〕 益母草 枳壳各 30克

〔用法〕 上药加水适量煎煮，取汁，先熏后洗，早晚各1次，每次5~10分钟。阴户溃破者外敷五味子粉。7天为1个疗程。

〔主治〕 阴挺脱垂。

方(二十六)

〔组成〕 荆芥 枳壳 诃子 文蛤各 60 克

〔用法〕 上药煎汤熏洗。

〔主治〕 子宫脱垂。

二十九、外阴白斑

外阴白斑又称女阴白色病变,是外阴皮肤或粘膜的生长和营养紊乱而引起的外阴局限性或弥漫性白色病变。病变多见于大阴唇内侧、小阴唇、阴蒂等部位,也可波及于阴道。不同类型有不同的局部症状,主要为外阴皮肤变白或呈灰白色,弹力减退,局部皮肤变粗糙或干裂,或薄脆,或增厚,外阴或萎缩或阴道变窄,多伴有阴痒,或伴有溃烂肿痛,或伴有不同的全身症状,如失眠,尿痛,尿频等。

方(一)

〔组成〕 苦参 30 克 蛇床子 30 克 仙灵脾 30 克 威灵仙 30 克 白鲜皮 30 克

〔用法〕 上药加水 2 升,水煎 15 分钟后熏洗患处,每日 1~2 次。

〔主治〕 肝经湿热所致的外阴白斑。

方(二)

〔组成〕 仙灵脾 15 克 蛇床子 15 克 苦参 15 克 野菊花 15 克 川椒 12 克 白芷 12 克

〔用法〕 上药加水适量煎汤，早晚各熏洗 1 次。

〔主治〕 肝经湿热所致的外阴白斑。

方(三)

〔组成〕 苦参 黄柏 蛇床子 白鲜皮 蝉衣 露蜂房 花椒 荆芥各 12 克

〔用法〕 上药用洁净纱布包好，温开水泡 15 分钟，煎数沸，倾入盆中，趁热熏洗，早晚各 1 次，每次 5~10 分钟，洗后拭干外阴部，糜烂明显者忌用，经期停用。

〔主治〕 外阴白斑。

方(四)

〔组成〕 鸡血藤 30 克 鹤虱 20 克 蝉蜕 15 克 苦参 30 克 蛇床子 30 克 枯矾 25 克 威灵仙 20 克 狼毒 9 克 鹿衔草 20 克 皂刺 12 克 仙灵脾 30 克

〔用法〕 上药水煎，熏洗患处，2 日 1 剂，每日熏洗 2 次。

〔主治〕 外阴白色病变。

方(五)

〔组成〕 补骨脂 蛇床子 明矾各 30 克 白鲜皮 川椒各 25 克

〔用法〕 上药加水 2 升，煎至 1 升，用药液熏洗患处，每日 1~2 次。

〔主治〕 脾肾虚之外阴局部白色病变或弥漫性萎缩的白

色病变。

方(六)

〔组成〕 苦参 60 克 白鲜皮 30 克 蛇床子 30 克 艾叶 30 克 千里光 120 克 生白矾 15 克

〔用法〕 先将前五味药煮开，后入生白矾，煮成 3 升药水，去渣后趁热熏洗外阴部，每日早晚各 1 次，每剂用 2 日。

〔主治〕 风毒湿热下注阴户所致外阴白斑。

方(七)

〔组成〕 银花 五倍子 红花各 30 克 黄连 15 克

〔用法〕 每剂加水适量，煎煮 2 次，合并 2 次煎液，分早晚各用一半，先熏后洗患处，或用毛巾蘸药汁趁热敷患处，每日 2 次，每次 10～15 分钟。

〔主治〕 外阴白斑及各种外阴病。

方(八)

〔组成〕 鹿衔草 60 克 地骨皮 20 克 苦参 30 克 生百部 15 克 川椒 15 克 蛇床子 30 克 白头翁 30 克 土茯苓 30 克

〔用法〕 上药煎煮，取药汁熏洗患处，每日 2 次，每次 20 分钟，连用 3～6 日。

〔主治〕 外阴白斑。

方(九)

〔组成〕 生南星 黄连 生半夏 姜黄各 15 克 金银

花 红花 五倍子各 30 克

〔用法〕 水煎上药，趁热先熏后洗患处，每日 2 次，每次 20 分钟。

〔主治〕 外阴白斑。

第八章 五官科疾病

五官科包括眼科、耳鼻喉科、口腔科三大部分。五官位于人体之巅，暴露于外，最易感受外邪而患病。

眼科的熏洗法主要治疗外障眼病，如急性结膜炎、睑缘炎、麦粒肿、角膜炎等。表现为眼痛，局部焮热，流泪，多眵等，属有余之实证，治宜祛风清热，解毒消肿，应用时，应先以热气熏眼部，待药液温后再冲洗局部。

耳部疾患熏洗法主要治疗外耳疾患，如耳部湿疹、外耳道炎及耳道疔肿等。以泻肝清热，燥湿消肿为治。应用时，除熏洗外，还可用药汁冲洗外耳道。

鼻部熏洗法主要治疗外鼻、鼻前庭和鼻腔疾患，如酒糟鼻、鼻前庭炎、鼻疖、急慢性鼻炎等。鼻为肺之窍，肺脏疾患，鼻部首当其冲，在用药熏洗时，常以清热宣肺为治。

咽喉熏洗法主要治疗急慢性咽炎、急慢性喉炎、扁桃体炎等。治宜疏风清热，养阴利咽。应用时，先用蒸气雾化咽部，待凉时含漱。

口腔科熏洗法对口腔粘膜疾患和牙周组织疾病效果较好。如复发性口疮、唇炎、牙龈炎、根端周围炎等。应用时，张口趁热气先雾化病灶处，待温后频频含漱。

一、角膜炎

角膜炎是由病毒、细菌侵袭，或受外伤，或化学性物理性刺激而导致的角膜炎症。临床以畏光流泪，视力模糊，疼痛为主要症状；眼科检查常可见到眼睑痉挛，睫状体充血，角膜上有灰白色点状、斑片状浸润，严重者可形成角膜溃疡、虹膜发炎、前房积脓等。

方(一)

〔组成〕 桑叶 菊花 银花 防风 归尾 赤芍 黄连
各适量

〔用法〕 上药煎汤，趁热先熏后洗。

〔主治〕 肝经风热型角膜炎。

方(二)

〔组成〕 杨梅枝皮 60~120 克

〔用法〕 水煎去滓，放面盆内熏患眼，1 日 1 次。

〔主治〕 眼生星翳(角膜炎)。

方(三)

〔组成〕 炉甘石 青矾 朴硝各等份。

〔用法〕 上药为末，每用 0.75 克，沸汤化开，温洗，每日 3 次。

〔主治〕 角膜炎及诸般翳膜。

方(四)

〔组成〕 青盐 4 克 硼砂 6 克 铜绿 6 克 白矾 6 克
乌梅 3 个 川椒 7 个 杏仁 7 个 花椒 7 个

〔用法〕 上药共放一处，加水 150 毫升，泡 7 日，浸洗，每日 1 次。

〔主治〕 肝胆热毒型角膜炎。

方(五)

〔组成〕 白矾 9 克 川椒 3 克 艾叶 6 克 青盐 3 克

〔用法〕 将诸药放砂锅内，对水 500 毫升，煎至 200 毫升，过滤，去尽沉淀，用消毒棉花蘸药水洗眼。每日可反复数次连用数日。

〔主治〕 单纯疱疹性角膜炎、角膜溃疡。

方(六)

〔组成〕 银花 野菊花 蒲公英 天葵子 赤芍 当归
各 15 克 紫花地丁 天花粉各 20 克 白芷 防风 贝母
炮山甲 乳香 没药(麸炒) 全蝎 薄荷各 10 克 蜈蚣 2
条

〔用法〕 上药加水煎煮，将煎好的药液倒入小盅内，趁热气熏蒸患眼，待药之热气尽后再口服。

〔主治〕 匍行性角膜溃疡。

二、急性结膜炎

急性结膜炎是由细菌、病毒侵袭，或化学性物理性刺激而引起的眼结膜急性炎症。临床上以眼部痒，异物感，灼热疼痛为主要症状。眼科检查可见：睑结膜、球结膜充血，乳头增生，滤泡形成，结膜分泌物增多，球结膜下出血。

方(一)

〔组成〕 金银花 生石膏各 30 克。连翘 杭菊 黄芩 黄柏 夏枯草 当归 赤芍 丹皮 生甘草各 15 克。

〔用法〕 上药用水浸泡 20 分钟左右，煮沸后 10 分钟，将白纸卷成接近锥状，大口放在药锅上，患侧眼睁开贴近纸的小口端，利用药物蒸发的热气熏蒸，每次 20~30 分钟，每日 2~3 次，待药放温后口服。

〔主治〕 急性结膜炎。

方(二)

〔组成〕 桑叶 菊花 金银花各 15 克 防风 归尾 赤芍各 9 克

〔用法〕 上药加水煎汤，过滤去渣，趁热熏洗患眼。

〔主治〕 急性结膜炎。

方(三)

〔组成〕 黄柏 30 克 菊花 15 克

〔用法〕 上药加开水 500 毫升浸泡 2 小时，用纱布过滤，以此药汁外敷或洗眼，每次约 10 分钟，每日 2 次，连用 1~2 天或病愈停用。

〔主治〕 急性结膜炎。

方(四)

〔组成〕 千里光 60 克

〔用法〕 煎汤熏洗患眼，每日 1 次。

〔主治〕 急性结膜炎(风火眼痛)。

方(五)

〔组成〕 玉竹 赤芍 当归 黄连各等份。

〔用法〕 煎汤熏洗患眼，每日 2 次。

〔主治〕 急性结膜炎(赤眼涩痛)。

方(六)

〔组成〕 秦皮 30 克 黄柏 决明子各 15 克 黄芩 黄连 栀子各 9 克

〔用法〕 加水煎汤，过滤去渣，趁热熏洗患眼，每日 2 次。

〔主治〕 急性结膜炎。

方(七)

〔组成〕 桑叶 野菊花 蒲公英各 15 克

〔用法〕 上药加水 1.5 升煎煮，过滤去渣，待温熏洗患眼。

〔主治〕 急性结膜炎。

方(八)

〔组成〕 大青叶 薄荷各 15 克

〔用法〕 水煎取汁洗眼。

〔主治〕 急性结膜炎。

方(九)

〔组成〕 蒲公英 60 克

〔用法〕 煎汤熏洗患眼。

〔主治〕 急性结膜炎。

方(十)

〔组成〕 白菊花 9 克 金银花 9 克 蝉蜕 9 克 薄荷 3 克

〔用法〕 上药煎汤，熏洗患眼。

〔主治〕 急性结膜炎。

三、睑缘炎

睑缘炎由细菌感染，或化学性物理性刺激而引起的眼睑缘、睫毛及腺组织的急性或慢性炎症。并有鳞屑性睑缘炎、溃疡性睑缘炎及眦部睑缘炎之分。临床以眼睑痒痛为主要症状，少数伴有畏光流泪，视力疲劳等症状。鳞屑性睑缘炎除上述症状外，睑缘、睫毛根有鳞屑附着，睑缘潮红充血，无溃疡及秃睫现象。溃疡性睑缘炎的眼睑潮湿糜烂，有脓痂，除去脓痂后显

露溃疡面，溃疡愈后常有睑外翻，秃睫及睫毛紊乱现象。眦部睑缘炎主要表现为以外眦角潮红、糜烂为主的炎症。

方(一)

〔组成〕 一柱香适量。

〔用法〕 煎汤洗患处，每日2~3次。

〔主治〕 睑缘炎。

方(二)

〔组成〕 青黛 黄连各适量

〔用法〕 煎汤外洗，每日2次。

〔主治〕 睑缘炎。

方(三)

〔组成〕 薄荷适量

〔用法〕 以生姜汁浸薄荷一宿，晒干为末，每用3克，沸汤泡洗。

〔主治〕 睑缘炎。

方(四)

〔组成〕 大黑枣(去核)20个 明矾末1.5克

〔用法〕 明矾末和黑枣肉捣成膏，湿纸包，火内煨，取出去纸，将枣膏煎汤，去渣，用汤洗眼。

〔主治〕 睑缘炎。

方(五)

〔组成〕 红铜末 6 克

〔用法〕 逐日煎汤频洗半月。

〔主治〕 睑缘炎。

方(六)

〔组成〕 野菊花(或菊花)30 克

〔用法〕 水煎后熏洗患眼。

〔主治〕 睑缘炎。

方(七)

〔组成〕 秦皮 30 克 黄柏 决明子各 15 克 黄芩 黄连 栀子各 9 克

〔用法〕 加水煎汤,过滤去渣,趁热熏洗患眼。

〔主治〕 睑缘炎。

方(八)

〔组成〕 菊花 15 克 白矾 2 克

〔用法〕 上药加适量的水,煎后熏洗患眼,每日 3 次。

〔主治〕 睑缘炎。

方(九)

〔组成〕 黄芩 12 克 艾叶 12 克

〔用法〕 煎汤熏洗患眼。

〔主治〕 睑缘炎。

四、麦粒肿

麦粒肿是眼睑腺体组织急性化脓性炎症。临床以睑缘局限性红肿热痛，摸之有硬结和压痛，顶尖有脓栓为主要特征，个别人有全身症状，如轻度的发热，口渴，便秘，尿赤等。

方(一)

〔组成〕 黄连 防风 归尾 赤芍各9克 桑叶 菊花 金银花各15克。

〔用法〕 加水煎汤，过滤去渣，趁热熏洗患眼。

〔主治〕 麦粒肿。

方(二)

〔组成〕 桑叶 菊花 金银花各15克 黄连 防风 归尾 赤芍各9克。

〔用法〕 上药加水煎煮后，过滤去渣，熏洗患眼，每次15～20分钟，每天2～3次。

〔主治〕 麦粒肿。

方(三)

〔组成〕 蒲公英30克 苦参 黄柏 连翘 木鳖子各12克 金银花 白芷 赤芍 丹皮 生甘草各9克。

〔用法〕 诸药共研为末，用纱布包好，加水煎煮后，过滤去渣，熏洗患眼，每次15～20分钟。

〔主治〕 麦粒肿。

方(四)

〔组成〕 蒲公英 15 克 金银花 15 克 白芷 10 克 赤芍 10 克

〔用法〕 上药加水适量煎煮，过滤取汁趁热先熏患眼，待药稍凉后再洗眼，每日 2 次。

〔主治〕 麦粒肿。

五、沙眼

沙眼是一种慢性传染性结膜炎，常发生于双眼。其主要特点是：结膜浸润肥厚，血管模糊，滤泡增生，乳头肥大，瘢痕形成和角膜血管翳的出现。轻度沙眼一般无自觉症状，重者可有刺痒，灼热，异物感，视力疲劳，并有少量眼眵及流泪。诸症以傍晚较重，若合并睑内翻、倒睫时，则表现眼睑痉挛，羞明，流泪，疼痛，视力减退等。

方(一)

〔组成〕 明矾 胆矾 黄连各 3 克 木贼 6 克

〔用法〕 上药水煎熏洗，每晚 1 次，1 剂可熏洗 1 周，下次需要熏洗再加热，如患者感觉刺激强烈，可酌加适量开水再用。

〔主治〕 浸润进行期沙眼。

方(二)

〔组成〕 桑叶 10 克 元胡粉 5 克。

〔用法〕 将上药煮沸 5 分钟后，去渣，澄清过滤，取汁洗患眼，每日 2 次。

〔主治〕 浸润进行期沙眼。

方(三)

〔组成〕 桑叶 菊花 金银花各 15 克 黄连 防风 归尾 赤芍各 9 克

〔用法〕 加水煎汤，过滤去渣，趁热熏洗患眼。

〔主治〕 沙眼急性发作。

方(四)

〔组成〕 大黄 连翘 菊花 黄芩 黄连 密蒙花 木贼草各 10 克

〔用法〕 上药加水煎煮 30 分钟，趁热气先熏眼，稍凉后用软毛巾蘸药汁润洗，每次 30 分钟，每日 2 次。

〔主治〕 各期沙眼。

方(五)

〔组成〕 秦皮 30 克 黄柏 决明子各 15 克 桑叶 6 克 白菊花 20 克 防风 6 克 牛蒡子 板蓝根各 10 克

〔用法〕 上药加水煎煮，先熏后润洗，每次 20~30 分钟，每日 2 次。

〔主治〕 浸润进行期沙眼。

方(六)

〔组成〕 鲜石榴叶 90 克 鲜竹叶 60 克 鲜木贼草 60 克

〔用法〕 上药浓煎，使热气熏蒸患眼，待温后再用棉花蘸洗患眼，每天 2 次。

〔主治〕 沙眼。

方(七)

〔组成〕 桑叶 30 克 菊花 30 克

〔用法〕 煎汤熏洗患眼。

〔主治〕 沙眼。

六、翼状胬肉

翼状胬肉是一种慢性炎症和组织增生的产物，多见于鼻侧睑裂部，形似飞虫的翅膀由球结膜侵袭到角膜上，故又名“胬肉攀睛”。常见于农村及野外工作的体力劳动者。进行性的翼状胬肉充血、肥厚，且其头部隆起，前方角膜上显灰色混浊浸润；静止性者则胬肉较薄，不充血，成为灰白色薄膜，头部前方的角膜清亮。

方(一)

〔组成〕 蝉衣 15 克

〔用法〕 将蝉衣洗净置于保温杯内，注入开水，浸泡 10

分钟，将药汁分作两份，一份当茶水饮用，一份趁热冲洗患处。每日3~5次，连用30~50次。

〔主治〕 翼状胬肉。

方(二)

〔组成〕 蝉蜕 蛇蜕各6克 桑叶 野菊花各12克
冰片3克

〔用法〕 将诸药入500毫升水中，轻煎之，去渣取药液200毫升，趁热先熏后洗，药液可于1日间3~4次反复温热熏洗，药物日易1剂，5日为1个疗程。

〔主治〕 胬肉攀睛。

七、老年性白内障

白内障是由于多种因素造成晶状体变性混浊的一种常见病，其中以老年性白内障最为常见。本病为进行性双眼病，它分为皮质性白内障与核心性白内障。皮质性白内障，混浊首先出现于前皮质，随后逐渐混浊，由局部分布于全面。核心性白内障，最初核心硬化程度增强，折光性增强，变为近视，以后由胎核开始混浊，逐渐布满整个成年核，随着混浊程度的增加，视力逐渐下降。

处方

〔组成〕 蒲公英30克 菊花 木贼草 生地 龙胆草
各15克

〔用法〕 上药加水煎煮，取汁，先熏后潮洗患眼。同时可以针刺太阳、攒竹、鱼腰、阳白，留针 15 分钟。

〔主治〕 早期白内障。

八、外耳道炎及外耳道疖

外耳道炎是外耳道皮肤及皮下组织弥漫性炎症。外耳道疖是外耳道外段软骨的毛囊或皮脂腺感染。常因挖耳外伤或洗澡、理发、游泳等，污水进入耳道引起。耳痛为主要症状，咀嚼时疼痛加剧，严重者可使患者不能入眠，常伴有全身发热不适等症状。局部可见外耳道弥漫潮红，牵拉耳廓或压迫耳屏有显著压痛。若为疖肿则外耳道有局限性的红肿丘疹，顶尖有脓泡，疖肿穿破流出稠厚脓液。病情重者炎症可波及周围组织，使颞部或耳后皮肤红肿，以及耳廓附近淋巴结肿大。

方(一)

〔组成〕 银花 15 克 紫花地丁 12 克 连翘 12 克 川楝子 9 克 夏枯草 赤茯苓各 15 克 丹皮 12 克

〔用法〕 水煎取汁，趁热熏洗患处，重者也可内服。

〔主治〕 外耳道炎、外耳道疖肿。

方(二)

〔组成〕 苦参 30 克 蛇床子 30 克 苍术 15 克 黄柏 15 克 川椒 15 克 轻粉 0.5 克

〔用法〕 水煎 3 次，趁热熏洗患处，每次 10 分钟，每日 3

次。

〔主治〕 外耳道炎、外耳道疖肿。

方(三)

〔组成〕 鲜野菊花叶 30 克(或黄连适量)

〔用法〕 上药任选一种,煎成浓汁澄清,冲洗外耳道,每天 3~4 次,7~10 天为 1 个疗程。

〔主治〕 风热邪毒型耳疖。

方(四)

〔组成〕 野菊花 银花 白芷 皂刺 紫花地丁 制乳香 制没药各 10 克 贝母 6 克

〔用法〕 上方加水煎煮取汁,局部清洗,每日 3~5 次,严重者可用头煎分 2 次内服。

〔主治〕 外耳道炎、外耳道疖。

九、耳部湿疹

湿疹是由内外激发因子引起的一种迟发性变态反应,患者可能具有特异的体质。耳部湿疹是一种特定部位湿疹,多发生在耳后皱襞处,表现为红斑,渗液,有皲裂和结痂,常两侧对称。外耳道湿疹常由中耳炎引起继发性传染性湿疹,可见耳廓和外耳道皮肤红斑,丘疹,水疱,糜烂,渗出结痂。日久呈慢性湿疹改变,可见皮肤粗糙、脱屑、皲裂等。

方(一)

〔组成〕 苦参 60 克 蛇床子 百部 益母草各 30 克

〔用法〕 上药加水煎煮，取汁洗患处，每天 2 次。

〔主治〕 外耳部湿疹。

方(二)

〔组成〕 黄柏 30 克 枯矾 15 克

〔用法〕 上二药加水煎煮取药汁，潮洗患处，或冲洗外耳道。

〔主治〕 耳部湿疹。

方(三)

〔组成〕 五倍子 20 克 苦参 蛇床子 黄柏各 10 克

〔用法〕 上药水煎，待温，用软布蘸药水潮洗。外耳道有湿疹也可用药汁冲洗。

〔主治〕 外耳湿疹、外耳道湿疹。

十、急性鼻炎

急性鼻炎俗称“伤风”，主要由病毒感染(上呼吸道感染)引起。感冒时常伴有急性鼻炎症状。急性鼻炎初期鼻腔内灼热发干，分泌物少，进而出现鼻堵塞，喷嚏，大量水样鼻涕，嗅觉下降，伴发热恶寒，头痛，全身不适，渐渐鼻涕由清变为粘稠或脓性。

方(一)

〔组成〕 银花 连翘各 15 克 桔梗 薄荷 竹叶各 6 克 荆芥 牛蒡子各 9 克 淡豆豉 细辛各 3 克 大青叶 15 克

〔用法〕 上药煎汤，取汁，用热气熏鼻，待温后内服。每日熏 3~4 次，内服 2 次。

〔主治〕 风热型急性鼻炎。

方(二)

〔组成〕 细辛 3 克 辛夷 6 克 荆芥 9 克 防风 9 克 麻黄 6 克 薄荷 6 克

〔用法〕 上药加水煮沸 10 分钟，用热气熏鼻腔，待温将药汁分作两份，一份内服，一份潮洗鼻部，每日 2 次。

〔主治〕 风寒型急性鼻炎。

方(三)

〔组成〕 麻黄 辛夷 细辛 桔梗 苍耳子各 6 克

〔用法〕 上药加水煎煮 10 分钟，先熏后洗鼻部，每日 3~4 次。

〔主治〕 急性鼻炎或兼风寒感冒。

十一、慢性鼻炎

慢性鼻炎以鼻腔粘膜长期慢性充血和肿胀为特征，多由

急性鼻炎反复发作不愈，鼻腔粘膜受分泌物刺激所致。主要症状是鼻塞，为双侧交替或间歇性发生，伴有嗅觉减退，头晕，鼻涕多，分泌物常倒流向咽部，患者常觉咽部不适。若分泌物过多亦可向前流，刺激鼻前庭及上唇皮肤发生糜烂。

方(一)

〔组成〕 辛夷 升麻 白芷 防风 藁本 细辛 木通 各6克

〔用法〕 上药加水煎煮10分钟，趁热先熏后潮洗鼻部，每日3次，每次20~30分钟。

〔主治〕 慢性鼻炎。

方(二)

〔组成〕 苍耳子 射干 露蜂房 藿香各10克 辛夷 12克

〔用法〕 加水煎煮，趁热熏洗鼻部，每日2次，每次20分钟。

〔主治〕 慢性鼻炎。

方(三)

〔组成〕 皂角刺3克 蔓荆子10克 石榴皮10克 苍术10克

〔用法〕 将上药煎煮后，以汤药蒸气熏鼻腔，每日3次，每次10~25分钟，7~14天为1个疗程。

〔主治〕 慢性鼻炎。

十二、鼻前庭炎和鼻疖

鼻前庭炎系鼻前庭部弥漫性炎症。常由于手指挖鼻或鼻腔内经常有分泌物刺激所引起。主要表现为鼻前庭部红肿，刺痒灼痛，表皮有浅在糜烂或破裂，或被覆以脓痂皮，严重者鼻前孔被堵塞影响呼吸。

鼻疖系鼻前庭部毛囊局限性炎症。用手挖伤皮肤或拔鼻毛，葡萄球菌侵入毛囊和汗腺是常见致病原因，主要表现为鼻前庭或鼻尖发红，肿胀，疼痛，开始局部呈现丘疹，几天后隆起，顶尖可见脓头。重者有头痛，寒战，发热等全身症状。

方(一)

〔组成〕 黄连 黄芩 栀子各 10 克 黄柏 6 克 蒲公英 紫花地丁各 20 克

〔用法〕 上药煎煮，取汁趁热熏洗患部。

〔主治〕 鼻前庭炎、鼻疖。

方(二)

〔组成〕 明矾 3 克 甘草 10 克

〔用法〕 上药加水适量，煎煮取汁，以棉棒蘸药液反复擦洗患处，也可淋洗，每日 3~5 次。

〔主治〕 鼻前庭炎、鼻疖。

方(三)

〔组成〕 川椒 10 克 食盐 5 克

〔用法〕 煎汤洗患处。

〔主治〕 鼻前庭炎、鼻疖。

方(四)

〔组成〕 银花 野菊花 蒲公英 紫花地丁 天葵 黄芩 黄连各 6 克

〔用法〕 上药加水适量，煎沸取汁，先熏后洗，每日 3~5 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 鼻前庭炎、鼻疖。

十三、鼻息肉

鼻息肉系鼻腔内赘生物，呈进行性增生，临床上以渐进性鼻塞，嗅觉障碍等为特点。检查可见息肉柔软苍白，凸出于鼻腔内或鼻孔前。

方(一)

〔组成〕 苍术 白芷 乌梅 五味子各适量。

〔用法〕 药物置药壶内煎煮，鼻孔凑近壶嘴，以雾气熏吸，每日 1 次，10 天为 1 个疗程。

〔主治〕 鼻息肉。

方(二)

〔组成〕 米醋适量

〔用法〕 煎汤熏洗，每日1次。

〔主治〕 鼻息肉。

方(三)

〔组成〕 枫树根 120 克

〔用法〕 上药加水煎煮熏鼻，每日1次。

〔主治〕 鼻息肉。

十四、急性咽炎

急性咽炎是上呼吸道急性炎症的一部分，起病较急，初觉咽部干燥，咽痛不适，重者痛剧，吞咽困难，咽痛可放射到耳部，分泌物多，有刺激性咳嗽，可伴有全身症状，发热恶寒，头痛，周身酸困，食欲不振。局部检查可见咽部充血，悬雍垂、软腭水肿；咽后壁淋巴滤泡水肿，颈部淋巴结肿大压痛。

方(一)

〔组成〕 荆芥 防风 薄荷 桔梗 牛蒡子 银花各9克

〔用法〕 将药装入药壶内，加盖，加水煮沸，使热气从壶嘴出，患者张口对准壶嘴吸气，每日3~5次。

〔主治〕 急性咽炎。

方(二)

〔组成〕 麦冬 玄参 胖大海各10克，木蝴蝶3克，

〔用法〕 上药加水煎煮，以热气熏咽部，待凉后含漱，每日3次。

〔主治〕急性咽炎。

十五、慢性咽炎

慢性咽炎为咽部慢性弥漫性炎症改变。急性咽炎反复发作，吸烟饮酒等长期不良刺激是造成慢性咽炎的原因。临床上以咽部干燥，发痒不适，分泌物增多粘稠为特点，常伴有反射性咳嗽，有异物感。咽部检查，有慢性充血，呈暗红或肥厚，咽后壁淋巴滤泡水肿隆起，后期粘膜干燥。

方(一)

〔组成〕 生地 麦冬 玄参 黄芩 桑白皮 枇杷叶各9克 贝母 桔梗各6克 射干 杭菊花各9克

〔用法〕 上药共放入药壶内，加水适量煎沸后，加盖，使气从壶嘴而出，患者张大口，对向壶嘴，使气熏蒸咽部，每日3~5次。

〔主治〕 慢性咽炎。

方(二)

〔组成〕 木蝴蝶3克 胖大海3枚 金银花 菊花 桔梗 麦冬 沙参 元参各6克

〔用法〕 上药置药壶内，先用冷水浸泡30分钟，加盖煎煮，待有热气自壶嘴溢出时，张口吞吸热气，每次30分钟，每

日3次,药汁置温后可内服或含漱。

〔主治〕 慢性咽炎。

十六、口疮(阿弗他口炎)

复发性口疮又称阿弗他口炎,是一种经常反复发作的口腔粘膜溃疡。本病的病因尚不清楚,常发生在月经前后,神经衰弱或某些慢性疾病中也常伴发,因此本病的发生可能是全身性疾病所引起的机体内在变化在口腔粘膜上的一种反映。溃疡可发生在口腔粘膜的任何部位,以唇舌侧缘、舌尖、舌腹、颊粘膜多见。初起粘膜灼热,然后出现红斑,继而红斑上出现水疱,水疱破裂后形成溃疡面,呈椭圆形,基底部周边绕以红晕,表面呈淡黄或灰白色凹陷面,自觉局部灼痛,影响进食,反复发作,每次复发间隔时间长短不一,短者每月1~2次,长者1年或更长一些时间发作1次。

方(一)

〔组成〕 银花12克 连翘 白茅根各20克 生地金牛15克

〔用法〕 上药水煎,嗽口,每日6次,每次含3~5分钟,重者可延长含漱时间,增加含漱次数,1~7天为1个疗程。

〔主治〕 阿弗他口炎(口疮)。

方(二)

〔组成〕 金莲花10克

〔用法〕 上药加水煎煮，先以热气熏口腔，后漱口，每日5~6次，每次熏20分钟，凉后加热再熏。

〔主治〕 阿弗他口炎。

方(三)

〔组成〕 金灯笼10克 黄连6克 青黛3克 麦冬9克 元参9克 藏青果15克

〔用法〕 上药置药壶内，加水加盖，浸泡半小时后煎煮，待热气从壶口喷出时，张口凑向壶口，以热气熏蒸口腔，约15~30分钟，待药温后，漱口，每次口含3~5分钟后，再咽下去，每日2次。

〔主治〕 阿弗他口炎。

十七、剥脱性唇炎

剥脱性唇炎是一种唇粘膜的慢性浅表性炎症。原因尚不清楚，可能与长期日光照射，或某些刺激有关，如唇膏、口红、刺激性食物、牙膏等。多见于青年女性及儿童，病变主要先从下唇中部开始，逐渐扩展到整个下唇，而后可发展至上唇。初起轻度红肿，继而干燥脱屑，屑脱后露出潮红面，复结痂皮，反复发作，自觉灼热疼痛不适。

方(一)

〔组成〕 白鲜皮15克 蛇床子10克 川槿皮10克 地肤子30克 苦参30克

〔用法〕 上药加水煎汤，以纱布块浸药液，湿敷唇上，每次 20～30 分钟，每日 3 次。

〔主治〕 剥脱性唇炎(紧唇)属湿热证者。

方(二)

〔组成〕 鲜大青叶适量

〔用法〕 上药洗净，捣烂取汁，以药汁浸洗唇部，每天 2～3 次。

〔主治〕 剥脱性唇炎。

方(三)

〔组成〕 车前子 10 克(布包) 生地榆 五倍子 蛇床子各 15 克 木蝴蝶 3 克

〔用法〕 上药加水煎煮，浓缩，以数层厚敷料蘸药汁，湿唇部，每日 4～5 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 剥脱性唇炎。

十八、急性根端周围炎

急性根端周围炎常由于外伤、感染、化学刺激等损伤根端周围组织，使抵抗力下降(细菌感染)而致。初期患者可感到牙齿升高、松动，有轻度的自发性、持续性疼痛。进一步发展成急性根端周围炎时，患者牙齿松动，升高感觉明显，持续性的疼痛或剧烈跳痛，影响进食。往往伴有全身症状，发热，头痛，周身不适，情绪不安，焦躁。检查可见牙龈及牙龈周围软组织红

肿,有压痛,相应区域的淋巴结也常肿大压痛。

方(一)

〔组成〕 生石膏 30 克 金银花 15 克 连翘 15 克 黄芩 15 克

〔用法〕 上药水煎取汁漱口,每日 2~3 次,每次含漱 15~30 分钟。

〔主治〕 急性根端周围炎。

方(二)

〔组成〕 细辛 15 克

〔用法〕 上药浓煎取汁,趁热含漱,含漱时要保持时间良久,每口含 5~10 分钟,每次半个小时左右,每日数次,禁止下咽。

〔主治〕 急慢性根端周围炎。

方(三)

〔组成〕 金莲花 菊花 银花 蒲公英 竹叶各 10 克 细辛 3 克

〔用法〕 上药加水煎煮取汁,频频漱口,每日数次。

〔主治〕 急性根端周围炎。

十九、牙周病

牙周病是发生在牙周支持组织的慢性进行性疾病。目前

许多研究资料认为牙周病的发生与内分泌功能紊乱,营养功能障碍,以及物质代谢障碍等全身因素和局部牙垢多,经常嵌塞食物,牙周组织外伤和微生物的破坏有关。初期牙龈充血,变成红色或紫红色,牙龈增生、肥大或萎缩,刷牙时易出血,有轻度痒感,牙龈增生,可使龈沟加深,形成假性牙周袋,有的红肿明显,并可使之形成脓肿。病情继续发展,则因牙槽骨吸收而使牙龈与牙体逐渐分离,在牙体和牙龈之间形成真性牙周袋,内有积液,挤压牙龈时,脓液即由龈缘溢出,患者感觉口臭,唾液发粘,有咸味。由于牙槽骨吸收,牙根包埋在牙槽骨的部分减少,因而牙齿逐渐松动、移位,牙间隙增宽;后期,牙齿松动严重者,可以脱落,影响咀嚼功能。

方(一)

- 〔组成〕 骨碎补 10 克 食盐少许
〔用法〕 上药水煎取汁弃渣,含漱,每日数次。
〔主治〕 牙周病,牙齿松动。

方(二)

- 〔组成〕 菊花叶 1 把
〔用法〕 捣烂,绞汁、用汁含漱,良久吐出,每日数次。
〔主治〕 牙周病(牙龈肿痛)。

方(三)

- 〔组成〕 白芷 知母各 9 克 生石膏 12 克
〔用法〕 上药水煎取汁,频频含漱,每日 4~5 次。
〔主治〕 齿龈炎(内有积热)。

方(四)

〔组成〕 玄参 生地 牛膝 生石膏各 15 克

〔用法〕 上药水煎取汁，漱口，每日数次。

〔主治〕 牙龈炎(虚火上炎)。

二十、口臭

口臭是指口内出气臭秽。是某些口腔疾病(如口腔溃疡、口疮、龋齿)、鼻咽喉疾病(如鼻窦炎、扁桃体炎)和其它疾病(如肺脓疡、胃火、食滞)的一个症状。临床表现为口中出气腐臭或腥臭，牙龈红肿，口干欲饮等症状。

方(一)

〔组成〕 枯矾 0.3 克 田螺 6 克 薄荷 12 克 菖蒲 12 克

〔用法〕 上药水煎或用沸水浸泡，然后漱洗口腔。每日 3 次，至症状消失。

〔主治〕 脾胃火盛型(口腔溃疡)口臭。

方(二)

〔组成〕 白矾 30 克

〔用法〕 白矾用开水泡开，温时洗泡双足 20 分钟，1 日 1~3 次。

〔主治〕 脾胃火盛型口臭。

方(三)

〔组成〕 野蔷薇 12 克 石榴皮 12 克 白茅根 10 克
大青叶 12 克

〔用法〕 上药水煎后取药液漱口，每日 3 次，直至症状消失。

〔主治〕 肺实热型口臭。

第九章 内科疾病

熏洗疗法治疗内科疾病虽不如治疗外科疾病和皮肤病那样应用广泛,但对不少内科疾病也有显著疗效。尤其对老幼虚弱之体,攻补难施之时,或不肯服药之人,不能服药之症,熏洗疗法与内服有殊途同归,异曲同工之妙。

数千年来,古今医家在采用熏洗疗法治疗内科疾病的实践中,积累了十分丰富的经验,创制出了许多卓有实效的中药熏洗方剂,如《金匮要略》就有用百合煎汤洗浴治疗百合病的记载。百合病是属于神经官能症一类的疾病,可见熏洗疗法是适用于某些内科疾病治疗的。清代的吴师机很注重运用外治法治疗内科疾病,在运用熏洗疗法治疗内科疾病时,据其方式不同,提出了洗、沐、浴、浸、渍、浇、熏八法,均属全身或局部的熏洗疗法。后世医家在继承前人经验的基础上,不断改进、创新,在实践中创制出了许多熏洗方剂来治疗内科疾病,并且配合内服药使用疗效更加突出。

一、感冒

感冒为机体感染了冠状病毒、流感病毒、副流感病毒、腺

病毒等多种病毒而发病。其诊断要点为：起病较急，局部症状有喷嚏，鼻塞，流涕，咽部干痒作痛，声音嘶哑或咳嗽，全身症状较轻，可有低热，乏力，纳减，全身酸痛等症状。

方(一)

- 〔组成〕 紫苏适量
〔用法〕 煎浓汤熏头面及腿弯部。
〔主治〕 感冒无汗。

方(二)

- 〔组成〕 生姜 葱白 核桃 细茶 黑豆适量
〔用法〕 将上药煎汤熏洗头面部。
〔主治〕 感冒。

方(三)

- 〔组成〕 紫苏 60 克 鸡蛋 2 个
〔用法〕 上药加水煎煮，取药液洗泡双脚，鸡蛋吃下。
〔主治〕 感冒伴咳嗽，下肢作冷者。

方(四)

- 〔组成〕 苏叶 木瓜 槟榔 防风 白矾各 30 克 草乌 10 克
〔用法〕 上药煎汤，趁热浸洗双足，每日 1 次。
〔主治〕 风寒头痛。

方(五)

〔组成〕 浮萍 鲜生姜 葱白各 15~30 克 白酒少许

〔用法〕 上药共捣烂，煎汤半盆，入白酒少许，备用。待药温适宜，嘱患者洗浴（周身洗透，尤其胸腹部要多洗几遍），每次洗 5~10 分钟。洗后用柔软毛巾将水擦干，避风，覆被安卧，待其微汗出即可。每日洗 1 次。

〔主治〕 风寒感冒（男女老幼皆宜）。

二、外感高热

外感高热以体温骤升达 39℃ 以上，伴烦渴，脉数等为临床特征，是正气抗邪的表现，多由感染疫毒之气，或被六淫之邪侵袭所致。

方（一）

〔组成〕 荆芥 薄荷各 30 克

〔用法〕 加水煎汤，浸洗全身，1 日 1 次。

〔主治〕 风热外感之高热。

方（二）

〔组成〕 葱白 10 克 胡麻叶 15 克 白芷 10 克 藁本 10 克 蛇床子 15 克

〔用法〕 加水煎煮，取药汁不冷不热时洗浴全身，每日 1 次。

〔主治〕 卫分外感高热。

三、支气管哮喘

支气管哮喘是因支气管痉挛,粘膜水肿,分泌物增多而引起支气管阻塞的疾病,其特点为阵发性呼吸困难,哮喘,咳嗽和咯痰。

方(一)

〔组成〕 鱼腥草 60 克 紫苏子 30 克 五味子 20 克
地龙 30 克 沉香 10 克(后下) 鸡蛋 2 个

〔用法〕 上药同蛋共煮 30 分钟,去渣,待温以汤浸洗双足,每晚 1 次,10 次为 1 个疗程。

〔主治〕 各型哮喘的辅助治疗。

方(二)

〔组成〕 鲜白凤仙花 1 大株

〔用法〕 将凤仙花连根、茎、叶及果实全部捣烂榨汁,将药汁倒入砂锅内煎熬,待温,以棉球蘸汁揉擦患者背部(自第一胸椎至第十二胸椎),先正中,后左右旁开各 1.5 寸处,频频擦之,以擦至皮肤微红为度,每隔 2 日擦 1 次。

〔主治〕 支气管哮喘。

四、腹痛

腹痛指胃脘以下，耻骨毛际以上部位发生疼痛的疾病。引起腹痛的常见病因有情志刺激、饮食不节、寒温失调、虫积等，大致包括现代医学的急慢性胰腺炎、急慢性腹膜炎、肠炎、各类肠痉挛、胃肠神经官能症等。

方(一)

〔组成〕 小蓟 60 克 益母草 30 克 牛膝 15 克 车前子 10 克 血余炭 3 克

〔用法〕 上药加水 1 升，煎汤取液浸洗下腹部。

〔主治〕 血淋腹痛。

方(二)

〔组成〕 吴茱萸 杜仲 蛇床子 五味子 陈皮各 50 克 木香 丁香各 25 克

〔用法〕 上药共研细末，每取药末 25 克，用生绢袋盛，以水 3 大碗煎数沸，趁热熏下部，通身淋浴，早晚 2 次熏洗。

〔主治〕 下焦虚冷，脐腹疼痛。

五、便秘

便秘指大便秘结不通。排便时间延长，或欲大便而艰涩不

畅的一种疾病。多由大肠传导功能失常，粪便在肠道停留过久，水分被吸收，造成粪便干燥、坚硬。一般说来排便后8小时内所进食物的残渣在40小时内未能排出，即是便秘。

方(一)

〔组成〕 竹叶1捆 绿矾1把(或用萝卜叶或青菜叶适量)

〔用法〕 竹叶洗净，放锅内，加水3~5升，烈火把水烧开20~30分钟，趁热把汤带竹叶一起倒入桶内，撒绿矾1把，如法熏洗，每日1次。

〔主治〕 热秘。

方(二)

〔组成〕 芒硝 大黄 甘遂 牵牛子各等份

〔用法〕 上药加水适量煎汤，剂量依据浴盆而定，待药液40℃时洗浴全身。亦可煎取药液500毫升，洗浴前，把药液对入温水中洗浴，每日2次。(注意：洗浴时，重点冲洗脐部。洗浴时间可根据药液水温而定，水凉停洗)。

方(三)

〔组成〕 槐花30~50克

〔用法〕 上药煎汤淋洗肛门。通常用2~3次即通。

〔主治〕 老人虚秘。

六、呕吐

呕吐是由于胃失和降，气逆于上，饮食和痰涎等胃内容物经口而出的疾病。呕吐相当于现代医学的急性胃炎、神经性呕吐、胰腺炎等。

方(一)

〔组成〕 附子 30 克 吴茱萸 15 克 生姜 15 克

〔用法〕 上药加清水适量煎沸，药液倒入盆内，待温浸洗双足，并浸泡 15～30 分钟。

〔主治〕 寒性呕吐。

方(二)

〔组成〕 胡椒 20 克 绿豆 1 把 黄连 120 克 干姜 120 克

〔用法〕 上药加水适量煎煮 20 分钟，煎取药液 3 升，对入凉水至 40℃ 左右，沐浴胸腹部，冷后加温再洗，并浸双足。每次 30～60 分钟，每日 1～2 次。

〔主治〕 暴饮暴食引起的呕吐。

七、泄泻

凡排便次数增多，粪质稀薄或带脓血都称为泄泻。反复发

生或迁延数月至数年者，称为慢性腹泻。本病一年四季均可发生，但以夏秋两季为多见。

方(一)

〔组成〕 胡椒 20 克 绿豆 1 把 黄连 120 克 干姜 120 克

〔用法〕 上药加水煎煮 20 分钟，煎取药液 3 升，对入凉水至 40℃ 左右，擦洗胸腹部，冷后加温再洗，并浸双足，每次 30～60 分钟，每日 1～2 次。

〔主治〕 暴饮暴食引起的腹泻。

方(二)

〔组成〕 无花果叶 60 克

〔用法〕 将无花果叶洗净，加水 2 升，煎至 500 毫升，待温洗脚，早晚各 1 次，每次 30 分钟，15 天为 1 个疗程，疗程间隔 5 天。

〔主治〕 湿热腹泻。

方(三)

〔组成〕 蝴蝶草(牛耳草)适量

〔用法〕 用凉水洗净，加水 500 毫升，煮沸 5～10 分钟，放温洗脚，每日 1 次，连洗 2～3 天。

〔主治〕 肠炎腹泻。

方(四)

〔组成〕 葛根 50 克 白扁豆 100 克 车前草 150 克

〔用法〕 上药加水 2 升,水煎 20~30 分钟,取药液入盆,对温开水以超过足踝为度,水温保持 30℃左右,浸泡脚部 30~60 分钟,每日 2~3 次。

〔主治〕 湿热泄泻。

方(五)

〔组成〕 生姜 30 克 葱白 30 克

〔用法〕 生姜捣烂,葱白切断,加水 3 升,煮沸 30~40 分钟,趁热用食指蘸药液在患者的拇指及小指根部的掌面向外擦洗 12 次,再向内关、手臂方向擦洗 12 次。每日 1~2 次,连用 3 日或病愈为止。

〔主治〕 水泻。

八、痢疾

痢疾以腹痛,里急后重,下痢赤白脓血为主症,多发于夏秋季节。本病相当于现代医学的多种疾病,如急慢性细菌性痢疾、急慢性阿米巴肠病、慢性非特异性溃疡性结肠炎等。

方(一)

〔组成〕 乌梅 500 克

〔用法〕 上药用清水煎汤,将药汁倒入盆内,趁热熏肛门,温度降至 40℃~50℃时,用药汁浸浴肛门,每日 1 次,连用 3~5 天即见效。

〔主治〕 噤口痢、休息痢

方(二)

〔组成〕 黄芪 防风 枳壳各 50 克

〔用法〕 上药加水煎汤，过滤去渣，倾入盆内，趁热先熏肛门，待温度降至 45℃～50℃时，用药汁浸浴肛门，每日 1 次，连用 3～5 天即见效。

〔主治〕 虚寒痢、寒湿痢。

方(三)

〔组成〕 马兜铃藤 谷精草 荆三棱(用乌头炒过)各等份。

〔用法〕 水煎，先熏后洗。

〔主治〕 肠风漏血。

九、黄疸

黄疸以身黄、目黄、小便黄为主症，多因时气疫毒、湿热、寒湿之邪侵袭，或酒食不节，劳倦内伤，以致肝胆脾胃功能失调，寒湿阻遏，湿热蕴蒸以及气机郁滞，胆失疏泄，胆汁渗于肌肤而发为黄疸。

处方

〔组成〕 松蒿 30 克

〔用法〕 上药以沸水冲，趁热熏洗全身，同时于睡前服用本药液。

〔主治〕 黄疸病。

十、臌胀

臌胀以腹部膨满隆起，甚则腹壁青筋显露，肤色黄，下肢肿为临床特征。多由黄疸积聚失治，或感染血吸虫，使气血瘀滞，水液停滯而成。

方(一)

〔组成〕 荷叶 酒各适量

〔用法〕 上药加水煎，取液洗腹部，每日2次。

〔主治〕 腹水胀满。

方(二)

〔组成〕 蒺藜 200 克

〔用法〕 加水煎煮，取液洗脐腹，每日2~4次。

〔主治〕 腹水胀满。

十一、水肿

水肿指水液泛滥肌肤，引起眼睑、头面、四肢、腹、背甚至全身浮肿的疾病。包括现代医学的急慢性肾炎、充血性心衰、肝硬化、内分泌失调及营养障碍等疾病所出现的水肿。

方(一)

〔组成〕 赤小豆 750 克

〔用法〕 文火煎煮赤小豆，待赤小豆熟透后，取出药液，温度适中后浸洗足膝。

〔主治〕 水肿面浮者。

方(二)

〔组成〕 麻黄 羌活 苍术 紫苏梗 荆芥 防风 牛蒡子 忍冬藤 柳枝 葱白各适量

〔用法〕 加水煎煮上述药物，弃渣取液，令其降至 40℃ 时洗浴，汗出即可，每日 1 次。

〔主治〕 风水泛滥型水肿。

方(三)

〔组成〕 蒺藜 90 克

〔用法〕 日日煎汤洗之。

〔主治〕 通身浮肿。

方(四)

〔组成〕 巴豆汁 240 克

〔用法〕 煎汤熏洗。

〔主治〕 寒湿下坠，下肢浮肿。

十二、淋证

淋证以小便频数、急涩、淋漓不尽，小腹拘急，痛引脐中为特征。据临床表现又可分为热淋、血淋、气淋、石淋、膏淋等。

方(一)

〔组成〕 地榆 250 克

〔用法〕 地榆加水 5 升，浸泡 30 分钟，上锅煎煮 20 分钟，去渣，趁热洗浴腰腹部，每日 1 次。

〔主治〕 砂石淋。

方(二)

〔组成〕 瓦松 60 克

〔用法〕 将瓦松加水上锅煎煮，取药液 1 升，入盆，熏洗少腹及阴器，每日 1 次。

〔主治〕 热淋。

方(三)

〔组成〕 麻根 血余炭 车前子 地骨皮各适量

〔用法〕 上药煎汤，去渣，至温后洗小腹部。

〔主治〕 血淋。

方(四)

〔组成〕 胡椒适量

〔用法〕 将胡椒加水煎煮，取药液 1 升，洗浴腰腹部。

〔主治〕 冷淋(寒战后溲)。

十三、癃闭

癃闭指小便点滴难出，甚则闭塞不通为主症的一种疾患。相当于西医学之各种原因引起的尿潴留及无尿症，如神经性尿闭、前列腺疾病、尿路肿瘤、尿道狭窄、尿路损伤，以及肾功能衰竭尿毒症期等。

方(一)

〔组成〕 皂角子 6 克 葱头 2 个 王不留行 0.5 克 麝香 0.15 克

〔用法〕 先将前三味药加清水适量煎煮，倒入小盆内，加入麝香溶化。趁热放在生殖器下面熏之，数分钟即可通。

〔主治〕 温病后小便突然不通，面浮肿胀。

方(二)

〔组成〕 生黄芪 200 克 宣木瓜 30 克 葱白 10 根

〔用法〕 上药加清水 2 升，煎至 1.5 升，连渣倒入痰盂内，嘱患者趁热(以能忍受为度)坐在痰盂上熏蒸下阴(生殖器)。每次熏 15 分钟即可，6 小时后再如法熏 1 次。

〔主治〕 癃闭。

方(三)

〔组成〕 瓜蒌 葱白各 30 克 冰片 1.5 克

〔用法〕 上药加清水 2 升煎至 1.5 升，连渣倒入痰盂内，加入冰片溶化，嘱患者坐在痰盂上趁热熏阴器，先熏后坐浴 10～20 分钟。

〔主治〕 癰闭。凡肺热令壅新致者用之均效。

方(四)

〔组成〕 高良姜 四季葱白 紫苏(茎叶)各等份

〔用法〕 上药加清水适量煎沸 3～5 分钟，连渣倒入痰盂中，置于密室内，嘱患者坐在痰盂上趁热熏小腹、外阴、肛门，待温时用消毒棉球蘸药水洗之，以手抚于脐下，拭干，仰坐棉被上垂脚，自舒其气，或用葱熨脐下，其效更著。

〔主治〕 胞精、小便不通。

方(五)

〔组成〕 臭梧桐子 皂角各 120 克

〔用法〕 将上药加水煎煮 60 分钟，加麝香 1.5 克冲入瓷瓶中。将尿道口对准瓷瓶口熏蒸。病人会自觉有股热气入小腹，欲尿时，即尿药液中，蒸气熏时，热度以病人能忍受为度，时间可 30～40 分钟。

〔主治〕 肝气郁滞之癰闭。

方(六)

〔组成〕 皂角 90 克 葱头 90 克 王不留行 90 克

〔用法〕 上药加水，煎汤 1 盆，待水温 40℃ 时，令患者坐浴盆中。熏洗小腹下体，久之，热气内达，壅滞自开，可每次坐

浴 30~40 分钟,药液冷后可加热再洗。

〔主治〕 膀胱肌麻痹所致的尿潴留。

方(七)

〔组成〕 黄酒 1 升

〔用法〕 将黄酒倒入盆内,浸洗双足,每次 40~60 分钟。

〔主治〕 湿热壅结,小便不通。

方(八)

〔组成〕 桃枝 柳枝 木通 花椒 明矾各 30 克 葱白 灯芯草各 1 把。

〔用法〕 上药加水 5 升,煎汤,围被,趁热熏洗腹部,冷后再热,每日 2~3 次,每次 40~60 分钟。

〔主治〕 尿路阻塞所致的尿闭。

十四、关格

关指小便不通,格指呕吐不止,二者合称关格。大多由于脾阳亏损,肾阳衰微,阳不化水,水浊逗留,浊邪壅塞三焦,气机不得升降所致。类似于西医泌尿系统疾病引起的慢性肾功能减退,多种疾病晚期引起的急性肾功能衰竭。

处方

〔组成〕 川椒 红花 苍术 防风 羌活 独活 麻黄 桂枝 细辛 艾叶各 25 克

〔用法〕 上药加水煮沸 15 分钟，倒入水桶中，待温时将双脚浸入水中，然后逐渐加热水，直至水桶加满为止。共浸泡 40 分钟，使周身出汗。每日 1 次，10~20 天为 1 个疗程。

〔主治〕 湿浊上泛型关格。

十五、痛风

痛风是嘌呤代谢障碍性疾病，血清尿酸水平升高，尿酸盐以结晶形式沉积于组织，表现有急慢性关节炎、关节畸形、痛风石、肾结石和肾脏病变。临床经历无症状期、急性关节炎期和慢性关节炎期。本病 95% 是男性，中年发病；女性多在绝经后发病，症状轻。

方(一)

〔组成〕 樟木屑 37.5 千克

〔用法〕 将上药置大桶内，以急流水 50 升煮沸泡之，桶外置一凳子，令人坐凳上，放足在桶内，以草苫围桶外，勿令汤气入眼，每日洗足 1 次，每次 1 小时，7~10 次为 1 个疗程。

〔主治〕 痛风有关节疼痛者。

方(二)

〔组成〕 当归 20 克 川芎 60 克 牛膝 60 克 红花 30 克 苏木 100 克 川断 狗脊 防风 独活 羌活各 100 克 乌梢蛇 60 克 鸡血藤 150 克 制乳香 制没药各 20 克 血竭 儿茶各 60 克

〔用法〕 上药水煎液倒入温度适宜的洗澡水中,洗浴全身,1日1次,15~30天为1个疗程。

〔主治〕 痛风有关节疼痛者。

方(三)

〔组成〕 马钱子 生半夏 艾叶各20克 红花1.5克
王不留行40克 大黄 海桐皮各30克 葱须3根

〔用法〕 上药煎汤2升,置于桶内,以热气熏蒸患部,待药液变温后,浸洗患处,每日2次,7天为1个疗程。

〔主治〕 痛风有关节疼痛者。

十六、尿血

尿血指小便中混有血液,甚至血块的疾病。随出血量多少的不同,而使小便呈淡红色、鲜红色,或茶褐色。临床上以排尿不痛或痛不明显者称尿血;尿血而兼小便滴沥涩痛者称为血淋。正常人的离心尿沉淀中(镜检)每高倍视野 ≥ 3 个红细胞时,即称为血尿。

处方

〔组成〕 蒲黄150克 旱莲草600克 车前子草150克

〔用法〕 上药加水煎煮15~20分钟,倒入大盆中,待水温40℃左右时,焯洗少腹部,每日1次。

〔主治〕 热伤血络所致尿血。

十七、紫癜

紫癜是以血液溢出肌肤之间，皮肤呈现暗紫斑点或斑块为临床特征，常伴有鼻衄、齿衄、尿血、便血等，属血证范畴。

方(一)

〔组成〕 生地 丹皮 白芍 黄芩 黄柏各 20 克 山梔 15 克 甘草 9 克 犀角 5 克

〔用法〕 上药煎煮 20 分钟后，以药液浸洗肌肤。每日 1 剂，7 剂为 1 个疗程。

〔主治〕 热盛迫血型紫癜(皮肤过敏者慎用)。

方(二)

〔组成〕 桃枝 60 克

〔用法〕 上药加水适量，文火煎煮 50 分钟，先熏后洗，每日 1 剂，早晚各 1 次。

〔主治〕 皮肤结节性紫癜。

十八、头痛

头痛指外感、内伤或杂病以头痛为主症者，是临床上常见的自觉症状，可见于现代医学内、外、神经、精神等各科疾病中。内科常遇到的头痛多见于感染性发热性疾病、高血压、颅

内疾病、神经官能症等。

方(一)

〔组成〕 川芎 15 克 晚蚕沙 30 克 僵蚕 20~30 克
香白芷 15 克

〔用法〕 将上药共入砂锅内,加水 1 升,煎至 600 毫升,用厚纸将砂锅口糊封,并视疼痛部位大小,在纸盖中心开 1 孔,令患者痛位对准纸孔,满头痛者,头部对准砂锅口(两目紧闭或用毛巾包之),上面覆盖 1 块大方毛巾罩住头部,以热气熏蒸。每日 1 剂,每剂 2 次,每次熏 10~15 分钟,并用温凉适度的药液洗痛处,7 日为 1 个疗程。

〔主治〕 风热头痛。

方(二)

〔组成〕 吴茱萸 120 克

〔用法〕 将上药加水 5 升,煮取 3 升,趁热熏洗头部,每日早晚各 1 次。

〔主治〕 寒凝头痛

方(三)

〔组成〕 葶苈子适量

〔用法〕 煎汤沐浴头部。

〔主治〕 太阳头痛伴大热。

方(四)

〔组成〕 紫苏 川芎 花椒 葱白 细茶各适量

〔用法〕 上药煎汤熏洗头部。

〔主治〕 风寒或寒湿头痛。

方(五)

〔组成〕 霜桑叶适量

〔用法〕 煎汤熏头部。

〔主治〕 肝风头痛。

方(六)

〔组成〕 冬桑叶 30 克 黄菊花 15 克 黑山栀 10 克
独活 天麻各 60 克 薄荷 30 克

〔用法〕 上药煎水，待温，取药液洗头，反复擦洗，每日早、晚各 1 次。

〔主治〕 风热头痛。

方(七)

〔组成〕 川芎 当归各 30 克 荆芥 60 克 白芷 细辛
各 10 克

〔用法〕 上药加清水适量煮沸，趁热熏蒸头面部，待药温适度时再洗头部。每日 1 剂。每日熏洗 2~3 次。

〔主治〕 血虚头痛兼外感。

方(八)

〔组成〕 川芎 10 克 防风 白芷 僵蚕 菊花 藁本
羌活各 15 克 晚蚕沙 20 克 蔓荆子 12 克 冰片 10 克
(另包)

〔用法〕 上药除冰片外共研为粗末，加清水 5 碗，武火煮沸 10 分钟即可。弃渣取液，将药液装入小口容器，并用牛皮纸密封。熏时将纸开一孔投入冰片 3 克，熏蒸痛处，如前额痛，先将毛巾打湿包住眼部，防止刺激，同时头上盖住毛巾以防药气泄露。温度降低可加热再熏，熏后将纸口密封，待用。每次熏 10～15 分钟，每日 3 次，每日 1 剂。

〔主治〕 头痛。

十九、眩晕

眩晕是目眩与头晕的总称。目眩即眼花或眼前发黑，视物模糊；头晕即感觉自身或外界景物旋转，站立不稳，多属肝经病变，可由风、痰、火、虚等原因引起。

方(一)

〔组成〕 夏枯草 30 克 钩藤 20 克 桑叶 15 克 菊花 20 克

〔用法〕 以上各药共煎汤洗脚，每日 1～2 次，每次 10～15 分钟，10～15 日为 1 个疗程。

〔主治〕 眩晕。

方(二)

〔组成〕 桑枝 15 克 桑叶 15 克 茺蔚子 15 克

〔用法〕 上药加水 1 升，煎至 600 毫升，凉至 40℃～50℃时泡脚 30～40 分钟，洗脚后即就寝，每日 1 次。

〔主治〕 眩晕。

二十、失眠

失眠指经常不能获得正常睡眠的一种疾病，其病情轻重不一，轻者有人寐困难，寐而易醒，醒后不能再寐，亦有时寐时醒等，严重则整夜不能入眠。形成失眠的原因很多，思虑劳倦，内伤心脾，阳不交阴，心肾不交，阴虚火旺，肝阳扰动，心胆气虚以及胃中不和等因素，均可影响心神而导致失眠。

处方

〔组成〕 热水 1 盆

〔用法〕 令患者睡前热水洗足 10 分钟，每日数次。

〔主治〕 各型失眠。

二十一、高血压病

高血压病是指体循环血压高于 18.7/12 千帕(140/90 毫米汞柱)，即以血压增高为主要表现的一种疾病。其病因与年龄、职业、环境、家族遗传、食盐、体重等有关。

方(一)

〔组成〕 钩藤 20 克 冰片少许

〔用法〕 将钩藤剪碎，布包冰片少许，放入盆内加温水洗

脚,每次 30~45 分钟,早晚各 1 次,10 日为 1 个疗程。

〔主治〕 高血压病。

方(二)

〔组成〕 茺蔚子 10~15 克 桑树皮 10~15 克 桑叶 10~15 克

〔用法〕 上药煎汤 1.5 升,凉至不烫脚时,倒入盆中,把双脚放入盆内浸洗半小时,一般洗后 30 分钟开始降压,1 小时作用最强,维持 4~6 小时,浸洗 1~2 次,血压即可恢复正常。

〔主治〕 高血压病。

方(三)

〔组成〕 磁石 石决明 党参 黄芪 当归 桑枝 枳壳 乌药 蔓荆子 白蒺藜 白芍 炒杜仲 牛膝各 6 克 独活 18 克

〔用法〕 水煎取汁,浸洗双脚,每日 1 次,每次 1 小时,10 日为 1 个疗程。

〔主治〕 高血压病。

方(四)

〔组成〕 吴茱萸 桃仁 丹参 夏枯草 川牛膝各 10~15 克

〔用法〕 上药水煎,药液倒入脚盆内,将双脚浸泡在药液中 30 分钟。每日浸洗 1~2 小时,洗后卧床休息 1~2 次,每剂可用 2 次。

〔主治〕 高血压病。

二十二、中风

中风是以卒然昏仆，不省人事，伴口眼喎斜，半身不遂，言语不利或不经昏仆而仅以喎僻不遂为主症的一种疾病。本病起病急骤，症见多端，变化迅速。

方(一)

〔组成〕 伸筋草 透骨草 红花各 3 克

〔用法〕 上药共置于搪瓷脸盆中，加清水 2 升，煮沸 10 分钟后取出，药液温度以 $50^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ 为宜，浸洗 15~20 分钟，汤液温度降低后需加温，手足拘挛者先浸洗手部，后浸洗足部。1 日 3 次，浸洗时，手指、足趾要在汤液中进行自主屈伸运动，1 个月为 1 个疗程。

〔主治〕 中风后手足拘挛。

方(二)

〔组成〕 黄芪 30~50 克 赤芍 当归尾 干地龙 川芎 桃仁 红花各 9 克 丹参 15 克 僵蚕 9 克 蜈蚣 3 条

〔用法〕 上药加水煎煮，药液一半口服，另一半倒入盆内。趁热用毛巾蘸药液擦洗患处，每次 30 分钟。每日早晚各 1 次，10 日为 1 个疗程。

〔主治〕 中风后遗症。

二十三、面神经麻痹

面神经麻痹是颞骨内面神经管内段的面神经之急性非化脓性炎症，造成病侧面部肌肉瘫痪和口眼歪斜的一种急性周围神经疾病。

方(一)

〔组成〕 巴豆(去壳)4~8粒 50度白酒250毫升

〔用法〕 巴豆入白酒中煮沸，趁热熏健侧近心处约20分钟，1日1次，10次为1个疗程。

〔主治〕 面神经麻痹。

方(二)

〔组成〕 薄荷 艾叶 荆芥 前胡各15克

〔用法〕 上药加清水1.5升煎煮后，将药液倒入盆内，将头面部对准盆口，并用布遮盖头面部及盆，趁热熏患侧头面部10分钟左右，至自动汗出为度。待药水稍温，再用毛巾蘸药水洗患侧头面部3分钟。每晚睡前熏洗1次。

〔主治〕 周围性面神经麻痹。

方(三)

〔组成〕 鲜榔树皮60~160克

〔用法〕 上药加清水煮沸后，倒入盆中，趁热熏洗患侧面颊，每次熏洗40~60分钟，冷则加热再熏洗之，每日2次。3

次无效停用。

〔主治〕 面神经麻痹。

二十四、麻木

麻木是指由于经脉阻滞不利或经脉、肌肤失荣而引起的以人体四肢、肌肤异常感觉为特征的疾病。“麻”是指四肢肌肤有如虫行的感觉，“木”是指皮肤无痛痒知觉，按之不知，掐之不觉。

方(一)

〔组成〕 桑枝 60 克

〔用法〕 水煎，先熏后洗，煎洗过的药液，下次煮沸后仍可用，可连用 6 次。

〔主治〕 手足麻木。

方(二)

〔组成〕 薄荷 艾叶 荆芥 前胡各 15 克

〔用法〕 将上四味药加水 1.5 升煎煮，煮沸后头面部用布遮盖。让热气熏蒸患侧而部 10 分钟左右，汗出为止。待药水降温后，再用药水洗患侧头而部 3 分钟，每日临睡时熏洗 1 次。

〔主治〕 面神经麻痹之麻木。

方(三)

〔组成〕 鲜姜 60 克 葱 120 克 醋 120 克

〔用法〕 水煎，先熏后洗，每日早晚各 1 次。

〔主治〕 手足麻木。

方(四)

〔组成〕 霜降后桑叶适量

〔用法〕 煎汤频洗。

〔主治〕 手足麻木，不知痛痒。

二十五、红斑性肢痛病

红斑性肢痛病为一少见的阵发性血管扩张性疾病。多发生于手足，尤以两足多见。以灼痛，潮红，发热，皮温升高为特征。本病多发生于中年以上人群，男女均可发生。

方(一)

〔组成〕 盐 200 克

〔用法〕 用 1 桶热水将盐化开，用热盐水洗脚。每晚 1 次，每次 20 分钟，3 日为 1 个疗程。

〔主治〕 红斑性肢痛病。

方(二)

〔组成〕 茜草 大黄 大青叶各 30 克 红花 乳香 没药各 18 克

〔用法〕 上药煎汤，待凉后浸洗患肢 30 分钟，每日 2~4

次,5 日为 1 个疗程。

〔主治〕 红斑性肢痛病。

方(三)

〔组成〕 豨薟草 30 克 桂枝 12 克 当归尾 12 克 大黄 15 克 艾叶 12 克 防风 12 克 苍术 12 克 生姜皮 15 克

〔用法〕 上药煎汁,待温浸洗患部,每次半小时,每日 1 次,5 次为 1 个疗程。

〔主治〕 红斑性肢痛病(气滞血瘀现象明显者)。

二十六、雷诺氏病

雷诺氏病是血管神经功能紊乱所引起的肢端小动脉痉挛性疾病。以阵发性四肢肢端(主要是手指)对称的间歇发作与紫绀为其临床特点,常为情绪激动或受寒所诱发。

方(一)

〔组成〕 川乌 草乌 细辛 三棱各 25 克 透骨草 肉桂 红花 苏术 桃仁各 50 克

〔用法〕 上药加水煎汤,先熏后洗,每次 20 分钟。每日 1 剂,1 次 1 剂,10~15 日为 1 个疗程。

〔主治〕 雷诺氏病。

方(二)

〔组成〕 红花 川椒 艾叶各适量

〔用法〕 上药水煎，趁热熏洗患肢，稍凉后浸洗患肢，每次 30～40 分钟，每日 2～3 次，10～15 日为 1 个疗程。

〔主治〕 雷诺氏病。

方(三)

〔组成〕 甘遂 30 克 甘草 30 克

〔用法〕 上药加水 600 毫升，煮沸后去渣熏洗。

〔主治〕 雷诺氏病。

二十七 癲狂

癲与狂都是精神失常的疾患。癲证以沉默痴呆，语无伦次，静而多喜为特征；狂证以喧扰不宁，躁妄打骂，动而多怒为特征。本病多见于青壮年。

处方

〔组成〕 艾叶 150 克 菖蒲 150 克 白芷 60 克 酸枣仁 50 克 大枣 60 克

〔用法〕 上药煎煮 1 桶，在避风保暖之处洗浴全身，有条件者可浸泡于浴池中，每 3～4 天 1 次。

〔主治〕 癲证。

二十八、厥证

厥证是以突然昏倒，不醒人事，四肢厥冷为主要表现的一种疾病。轻者昏厥时间较短，移时自醒，清醒后无偏瘫、失语、口眼喎斜等后遗症，严重则会一厥不醒而导致死亡。

处方

〔组成〕 醋 人参 黄芪 白术 附子各适量

〔用法〕 速取醋入壶，置旺火炉上，另取 1 根竹管一端插入壶嘴，一端对准患者口鼻，令药气熏之，并速配大剂人参、黄芪、白术、附子人于醋中煎熏，直至神志苏醒。

〔主治〕 血厥。

二十九、痹证

痹证是由于风、寒、湿、热等外邪侵袭人体，闭阻经络，气血运行不畅所导致的，以肌肉、筋骨、关节发生酸痛，麻木，重着，屈伸不利，甚或关节肿大灼热等为主要临床表现的疾病。相当于现代医学的风湿性和类风湿性关节炎。

方(一)

〔组成〕 桑枝 500 克 海桐皮 60 克 豨薟草 100 克
海风藤 200 克 络石藤 200 克 忍冬藤 60 克 鸡血藤 60 克

〔用法〕 以上诸药共研细末，纱布包扎好，加水煎煮，过滤去渣，趁热洗浴患肢。每日1次，每次约1小时，7~10日为1个疗程。

〔主治〕 热痹。

方(二)

〔组成〕 桃枝 50克 辣椒 5个

〔用法〕 上药加水适量，文火煎熬30分钟，先熏后洗。每日1~2次，每日1剂。

〔主治〕 寒痹。

方(三)

〔组成〕 生姜 30克 葱 艾叶 苏叶各 50克 乌药 20克 水菖蒲 120克

〔用法〕 上药加水2升，煎煮去渣，趁热熏洗患部。

〔主治〕 风寒湿痹。

方(四)

〔组成〕 当归 五加皮各 20克 川芎 桃仁 红花 巴戟天各 15克 黄芪 30克 制附子 12克 细辛 7克(剧痛者加制二乌，麻木重者加肉桂、连翘)

〔用法〕 煎汤熏洗。

〔主治〕 风寒湿痹。

方(五)

〔组成〕 川乌 草乌各 10克 白术 10克 当归 10克

鸡血藤 10 克 独活 6 克 牛膝 10 克 木瓜 12 克 川芎 12 克 郁金 6 克 生香附 10 克 细辛 3 克

〔用法〕 将上药放入 3 升水中煎煮 30~40 分钟，用煎好的药趁热熏患部后将药汁倒出。用干净毛巾蘸药汁热敷患部，如此反复 2~3 次，每日早晚各 1 次，5~10 天为 1 个疗程。注意：发热病人及患热证皮肤发痒者不宜使用，热敷前，尤其是直接热敷者，医生要用手试药液温度，避免烫伤皮肤。

〔主治〕 痹证。

方(六)

〔组成〕 鲜三百草 1 千克 鲜皂角刺 250 克

〔用法〕 上药加水煎煮，直接熏洗患部。

〔主治〕 痹证。

方(七)

〔组成〕 防风 鸡血藤 蜀椒各 30 克 透骨草 苍术各 20 克 细辛 10 克 食盐 150 克

〔用法〕 上药用纱布包好后加水 3 升煎煮，沸后再煎 20 分钟，用药液先熏后洗。

〔主治〕 风寒湿痹。

方(八)

〔组成〕 黄柏 20 克 苦参 浮萍 地肤子 蛇床子各 10 克

〔用法〕 上药水煎后，将药液倒入盆内。用毛巾蘸药液擦洗患处，每次擦洗 5~10 分钟，每日洗 3 次。

〔主治〕 风湿热痹。

方(九)

〔组成〕 干姜 60 克 干辣椒 30 克 乌头 20 克 木瓜 25 克

〔用法〕 上药水煎，趁热熏蒸患处，待温浸洗。每日早晚各 1 次，每剂可用 2 天。

〔主治〕 痛痹。

三十、盗汗

盗汗属于汗证中的一种，汗证包括自汗、盗汗，是由于阴阳失调，腠理不固而致津液外泄失常的疾病。不因外界环境因素影响，而白昼时时汗出，动辄益甚者称为自汗；寐中汗出，醒来自止者称为盗汗。

方(一)

〔组成〕 麦冬 30 克 五味子 50 克 黄柏 40 克 艾叶 30 克

〔用法〕 上药煎煮 1 桶，在避风保暖处洗浴全身，有条件者可浸泡于浴池，3~4 天 1 次。

〔主治〕 各型盗汗。

方(二)

〔组成〕 生黄芪 30 克 知母 10 克 生牡蛎 30 克 麻

黄根 15 克 生地 30 克 茯苓 20 克 黄芩 10 克

〔用法〕 将上药盛入脸盆，加适量洁净水煎煮，煎至 3 升，去渣取汁，趁热熏蒸涌泉、神阙，待药液温度适中后用纱布蘸药液擦洗肺俞、心俞、神阙，每日擦洗 10 分钟，1 日 1 次。

〔主治〕 阴虚盗汗。

第十章 儿科疾病

熏洗疗法在治疗儿科疾病方面有其独到之处。由于小儿年龄小,不配合治疗,内服药物比较困难,故熏洗疗法不失为一种适应其特点的较好疗法。

古代即有“浴儿法”,即新生儿脱离母体后,用药物煎成的水来洗浴新生儿,既有清洁皮肤的作用,又有消火败毒之功,可防止以后皮肤病及疮疖的发生。又如用生姜煎汤洗浴,再配合适当的内治法,对防治小儿多种疾病有显著疗效,也可用于治疗风寒咳嗽、肺炎、腹泻、痢疾等。对于小儿麻痹后遗症,可在姜汤浴后按摩患肢,促进患肢的恢复。凡小儿停乳、停食、神疲嗜睡等,运用姜汤浴可改善症状或使症状消失。

古代常用熏洗疗法预防和治疗小儿疾病,如《产孕集》:“儿生三日,浴之,俗谓之洗三。”《千金要方》卷五的浴儿法则更为具体,用桃枝、槐枝、桑枝、梅枝、柳枝煎成洗浴的水,洗浴儿体,可以起到防病治病的目的。临床运用时可在洗浴水中加少许猪胆汁,不仅可以除污去秽,而且能够滋润皮肤,更能起到清热解毒,预防疮疡的作用。

因小儿体质柔弱,腠理不密,在熏洗时要防风、防寒,不可在水中久坐,洗浴时间要适当,浴后注意保暖。

一、小儿感冒

感冒俗称伤风，是小儿时期最常见的外感疾病。临床以发热恶寒，头痛，鼻塞流涕，打喷嚏，咳嗽为主要症状。小儿感冒，发病较急，传变较快。

方(一)

〔组成〕 荆芥 薄荷各 30 克

〔用法〕 加水煎汤，洗浴全身，每日 1 次。

〔主治〕 小儿风热外感之高热。

方(二)

〔组成〕 雷丸 丹参 石膏各 60 克 大黄 120 克 苦参 90 克 黄芩 30 克

〔用法〕 加水煎煮，取药汁不冷不热时，洗浴全身，每日 1 次。

〔主治〕 小儿外感高热。

方(三)

〔组成〕 柴胡 荆芥 紫苏 薄荷各 20~50 克

〔用法〕 上药以热开水 2 升，冲泡 20 分钟或煎煮 5 分钟，去渣，待温，以毛巾蘸药液反复擦洗全身，每次洗 15~20 分钟。

〔主治〕 小儿外感高热不退。

方(四)

〔组成〕 藿香 菖蒲 扁豆各 15 克 滑石 荷叶各 20 克 银花 30 克 竹叶 10 克 薄荷 15 克

〔用法〕 上药共煎汤 2 次，混合，水温 $40^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 时，洗浴全身，每日 1~2 次，每次 10~20 分钟。每日换药 1 剂，3 天为 1 个疗程。

〔主治〕 小儿暑湿感冒。

方(五)

〔组成〕 苏叶 防风 荆芥 薄荷各 10 克 柴胡 15 克 板蓝根 菊花 桑叶各 30 克 重楼 40 克

〔用法〕 煎汤外洗，2~3 小时 1 次。

〔主治〕 小儿外感高热及痄子疮毒。

二、麻疹

麻疹是由外感麻毒引起的呼吸道传染病，临床以发热，咳嗽，鼻塞流涕，泪水汪汪，满身遍布红疹为特征。虽一年四季都可发生，但多流行于冬春季节，传染性很强，好发于儿童，尤以 6 个月以上，5 岁以下的幼儿多见。

方(一)

〔组成〕 荆芥 苦参各 15 克 黄柏 薄荷 苍耳子各 10 克 防风 蝉蜕各 6 克

〔用法〕 上药加水适量煎汤外洗，每日1~2次，每剂2天。对重症患儿，另用甘松粉扑之。

〔主治〕 麻疹。

方(二)

〔组成〕 假天竺(即阴凉潮湿之处的苔藓) 嫩柳枝各250克 星星草120克 蝉蜕200个

〔用法〕 上药加水6升，煎煮15分钟，放置温度适宜时，淋浴全身，令微汗出，注意避风，每日1次，2~3次为1个疗程。

〔主治〕 小儿麻疹重症之遍体黑疹。

方(三)

〔组成〕 紫背浮萍30克 臭牡丹30克 西河柳10克 芫荽30克 烧酒100毫升

〔用法〕 将四味草药水煎，倾入面盆内，加烧酒，趁热抹洗患儿全身，但眼、口、鼻不可触及药液。

〔主治〕 麻疹肺炎。麻疹突然隐没，用此法抹洗，常能使疹复出，症状减轻。

方(四)

〔组成〕 西河柳叶 樱桃核各适量

〔用法〕 煎汤洗之。

〔主治〕 麻疹透发不畅，或因风而闭者。

方(五)

〔组成〕 芫荽 1 把

〔用法〕 将芫荽煎水 500 毫升，待温热时擦洗四肢或未出部分，擦洗时要保持一定室温，不可着凉，洗后盖被保暖。

〔主治〕 麻疹透发不畅。

方(六)

〔组成〕 西河柳 1 把

〔用法〕 将西河柳煎水约 500 毫升，待温热时，擦洗四肢及周身。

〔主治〕 麻疹透发不畅。

方(七)

〔组成〕 紫背浮萍 紫苏叶各 15 克 芫荽子 10 克 升麻 60 克

〔用法〕 上药加水 1 升，煮沸 10 分钟，入黄酒 60 毫升，熏洗患儿面部及四肢。

〔主治〕 麻疹未透。

方(八)

〔组成〕 麻黄 15 克 浮萍 15 克 芫荽 15 克 黄酒 60 毫升

〔用法〕 加水适量煮沸，使水蒸气布满室内，再用热毛巾蘸药液，热敷头面或胸背。

〔主治〕 麻疹透发不利。

方(九)

〔组成〕 浮萍 15 克 西河柳 30 克 苏叶 15 克 芫荽 15 克

〔用法〕 加水煎煮，以毛巾蘸药液擦周身。

〔主治〕 麻疹透发不利。

三、惊风

惊风是小儿时期常见的一种以抽搐伴神昏为特征的疾病。任何季节都可发生，一般以 1~5 岁的小儿为多见，年龄越小，发病率越高，其病情往往比较凶险，变化迅速，威胁小儿生命。

方(一)

〔组成〕 露蜂房 30 克

〔用法〕 上药加水 1 升煎煮，待温洗浴，或用燕窝泥亦可。

〔主治〕 惊风。

方(二)

〔组成〕 薄荷油 1~2 滴。

〔用法〕 用温水半面盆，加入薄荷油 1~2 滴，搅匀，给患儿擦洗周身。薄荷油不可多用，否则小儿洗后会寒战。或用鲜荷叶 10~20 片，浸泡于热水中数分钟，等水温适中时，擦洗患儿。

〔主治〕 夏天小儿高热惊厥。

四、小儿腹泻

小儿腹泻指大便次数增多，粪质稀薄或如水样的疾病，尤以2岁以下的婴幼儿多见，年龄愈小，发病率愈高。

方(一)

〔组成〕 胡椒10克 艾叶15克 透骨草10克

〔用法〕 上药加水连煮3次，去渣混合，待温洗双足，每次洗30～60分钟，洗后药汁勿倒，下次加温再用，1日3次，连用数天。

〔主治〕 小儿寒湿泻。

方(二)

〔组成〕 葛根50克 白扁豆100克 车前草150克

〔用法〕 上药加水2升，煎煮20～30分钟，将药液倒入盆内，然后对温开水，以超过足踝为度，水温保持30℃左右，浸泡脚部30～60分钟，每日2～3次。

〔主治〕 小儿湿热泻。

方(三)

〔组成〕 茜草30～60克

〔用法〕 上药加水连煮3次，去渣混合，待温频洗双足，每次30～60分钟，1日2～3次，连洗3～4天。

〔主治〕 小儿湿热泻。

方(四)

〔组成〕 鬼针草 5 株

〔用法〕 上药加水浸泡 15 分钟，煎取浓汁，连渣倒入桶内，熏洗患儿双脚，每次 5 分钟，间隔 2 分钟，连续熏洗 3~4 次，每日进行 4 次。1~5 岁熏洗足心，5~15 岁熏洗部位提高到脚面，腹泻严重者熏洗部位可再适当提高。

〔主治〕 小儿单纯性腹泻。

方(五)

〔组成〕 金丝草 30 克

〔用法〕 将金丝草洗净，加水 500 毫升，煮沸 5~10 分钟，放温后洗脚，冷后可加温再洗，每日 2~3 次，连用 2~3 天。

〔主治〕 婴儿腹泻(湿热证)

方(六)

〔组成〕 白胡椒 9 克 艾叶 15 克 透骨草 9 克

〔用法〕 上药共煎煮 3~4 沸，待温热后洗患儿双足，每日 3 次，每剂药可洗 3 次，一般连洗 2~3 天。

〔主治〕 婴儿腹泻(寒证)。

方(七)

〔组成〕 鲜蓼草 250~300 克

〔用法〕 将上药洗净切碎，放入砂锅内加清水适量煎煮 30 分钟，将药液倒入盆内，稍温后，把患儿双脚放入盆内浸

泡，并用药液洗小腿。每日浸洗1次，每次浸洗20分钟。

〔主治〕 小儿泄泻(湿热型)。

五、流涎

流涎指儿童口涎不自觉地由口内流溢出来的疾病，以3岁以下的幼儿最多见。由于长期流口水，致使口周潮红、糜烂，尤其是两侧口角为著，俗称“流口水”。

方(一)

〔组成〕 白矾 60克

〔用法〕 将白矾研极细末，溶于温水中，频洗双足，1日2~3次，每次30~60分钟，连洗3~4天。

〔主治〕 小儿流涎(脾胃湿热型)。

方(二)

〔组成〕 肉桂 吴茱萸各适量或任选一种

〔用法〕 上药加水煎沸，将药液倒入盆内，待温，每晚临睡前浸泡双足1次。每次浸泡30分钟。

〔主治〕 小儿口角流涎，由脾胃虚寒所致者尤宜。

六、小儿汗证

汗证指不正常出汗的一种疾病，即在安静状态下或无故

而全身或局部出汗过多，甚则大汗淋漓。小儿腠理疏薄，在日常生活中，若因天气炎热，或衣着过厚，或喂奶过急，或活动剧烈，都可引起汗出，如无其它疾苦，这些都是常态。

方(一)

〔组成〕 甘蔗叶适量

〔用法〕 煎汤外洗，每日1~2次，连洗2~3日。

〔主治〕 小儿汗证。

方(二)

〔组成〕 伸筋草 麦秆各适量

〔用法〕 煎汤外洗。

〔主治〕 小儿盗汗。

七、小儿蛲虫证

小儿蛲虫证是一种常见的小儿肠道寄生虫病。蛲虫体小色白，细小如线头，故俗称“线虫”。临床以饮食异常，精神烦躁，睡眠不安，肛门会阴部瘙痒，大便排出蛲虫为特征。本病在幼托机构常引起反复感染，相互传播。

方(一)

〔组成〕 鹤虱 15克 苦参 15克 百部 15克 花椒 6克

〔用法〕 水煎，临睡前浸洗肛门、前阴，连洗3天。

〔主治〕 小儿蛲虫病。

方(二)

〔组成〕 百部 15 克 苦参 15 克

〔用法〕 每晚煎汤熏洗肛门,再将六神丸 1 粒塞入肛门,连续使用 1 周。

〔主治〕 小儿蛲虫病。

方(三)

〔组成〕 百部根 20 克 苦参 20 克 榧子 10 克 石榴皮 10 克 槟榔 10 克

〔用法〕 上药加水适量,煎汤熏洗肛门,每日 1 次。

〔主治〕 小儿蛲虫病。

方(四)

〔组成〕 百部 30 克 苦楝皮 60 克 苦参 10 克

〔用法〕 上药加水浓煎取汁,晚上熏洗肛门,连用 5~7 天。

〔主治〕 蛲虫病。

八、小儿麻痹

小儿麻痹,又称“婴儿瘫”。多发生于 1~5 岁的婴幼儿。常流行于夏秋季节,初起有较强的传染性。属中医“痿证”的范畴。现代医学认为本病由于脊髓灰质炎病毒侵犯小儿的神经

系统所致。

方(一)

〔组成〕 木瓜 透骨草 麻黄 当归 地肤子各 12 克
制甲珠 桂枝各 9 克 红花 12 克 露蜂房 1 只 川牛膝
12 克

〔用法〕 上药加水煎沸后，加入烧酒、黄酒各 60 毫升，继续煮沸后，趁热熏洗患肢，每剂可洗 3 次。必须使药力热透，方会生效。

〔主治〕 小儿麻痹（待热退后，方可用之）。

方(二)

〔组成〕 当归 19 克 赤芍 川牛膝各 15 克 木瓜 桂枝 红花各 12 克 甲珠 19 克 透骨草 15 克 地肤子 12 克 麻黄 10 克 露蜂房 1 个

〔用法〕 将上药煎汤，然后加入烧酒、黄酒各 60 毫升，再煮沸，倒入盆中趁热洗患处，每日早晚各 1 次。

〔主治〕 小儿麻痹后遗症。

方(三)

〔组成〕 川断 防风 羌活 独活 当归各 9 克 杜仲 黄芪各 21 克 五加皮 15 克 木瓜 赤芍各 10 克

〔用法〕 上药加水煎沸 5 分钟，待温浸泡擦洗患肢 30 分钟，每日 2 次。

〔主治〕 小儿麻痹后遗症中期。

方(四)

〔组成〕 寻骨风根 威灵仙各 30 克 半边莲 240 克

〔用法〕 上药加水煎沸后，倒入杉木水桶内，并放一小木凳于桶中。嘱患者脱去裤袜，坐于水桶口，将足踏在小木凳上，并用厚毛巾将水桶口围起，勿使热气外出。趁热熏蒸患处至药水不烫时，取出小木凳将患儿患足浸入水中泡洗。每日早晚各 1 次。

〔主治〕 小儿下肢麻痹症。

方(五)

〔组成〕 当归 赤芍 木瓜 桑枝各 15 克 制附子 9 克 穿山甲 6 克 桂枝 9 克 蜈蚣 1 条 桑寄生 土牛膝 川芎各 10 克

〔用法〕 上药加清水煎沸 5 分钟，加入黄酒、白酒各 25～35 毫升，煎沸，趁热熏蒸患处 10 分钟，熏时用布覆盖。待温后用清洁纱布蘸药水反复在瘫痪患部浸泡擦洗 30 分钟。每日熏洗 2～3 次。

〔主治〕 小儿麻痹后遗症(瘫痪期轻、中期)。

九、水痘

水痘以发热及皮肤分批出现丘疹、疱疹、结痂为其特征，其形态如豆，色泽明净如水疱，是由外感时行邪毒引起的急性传染病。一年四季都有发生，多见于冬春两季。儿童时期任何

年龄均可发病，而以1~4岁多见。一般预后良好，愈后不留瘢痕。

方(一)

〔组成〕 荆芥 防风 甘草 薄荷 蝉衣 大青叶各15克

〔用法〕 上药用沸水浸泡，待温外洗皮肤。

〔主治〕 水痘。

方(二)

〔组成〕 苦参30克 浮萍15克 芒硝30克

〔用法〕 煎汤外洗，每日2次。

〔主治〕 水痘。

方(三)

〔组成〕 银花 连翘 六一散 车前子各10克 紫花地丁 黄花地丁各15克

〔用法〕 上药共煎汤100毫升，兑入温水中外洗患部（最好用烧开后放温的水），每日1~2次，3天为1个疗程。

〔主治〕 水痘。

方(四)

〔组成〕 银花 连翘 蒲公英 野菊花 生薏仁 车前草各20克 土茯苓30克 黄柏15克 甘草10克

〔用法〕 上药加清水半面盆煎沸，倒入盆内。用干净毛巾蘸药水擦洗患儿全身，每日洗3次。一般连用3~5次即愈。

〔主治〕 水痘(根盘色红,晶莹饱满)。

十、小儿湿疹

小儿湿疹是发生于婴儿头面部的急性或亚急性湿疹状皮肤病,大多有遗传过敏史,喂养失当、消化不良、环境因素等都可能成为发病诱因,临床以湿疹样皮损为特征。

方(一)

〔组成〕 蛇床子 9 克 银花 9 克 野菊花 9 克 生甘草 6 克

〔用法〕 水煎外洗或湿敷局部,每天 2~3 次,每次约 10 分钟。

〔主治〕 婴儿湿疹。

方(二)

〔组成〕 苦参 60 克 蛇床子 30 克 百部 30 克 益母草 30 克

〔用法〕 水煎外洗,每剂可煎洗 2~3 次。

〔主治〕 小儿湿疹。

方(三)

〔组成〕 生山楂 60 克 生大黄 60 克 苦参 60 克 蝉蜕 30 克 芒硝 60 克

〔用法〕 用水 2 升,先煎煮前四味药,待煮沸 10~15 分

钟后，将芒硝加入，再煮1~2沸离火，滤出药液，置于阴凉处，待药液冷却后，用药棉蘸洗（药棉随洗随换，以免污染药液），每日可洗5~6次，注意保暖。

〔主治〕 小儿湿疹。

方(四)

〔组成〕 地肤子10克 蛇床子10克 苦参10克 白矾5克 川椒10克 黄连5克 黄柏10克 防风10克

〔用法〕 水煎外洗，1日2次。

〔主治〕 小儿湿疹。

方(五)

〔组成〕 蛇床子9克 银花9克 野菊花9克 生甘草6克

〔用法〕 煎水外洗或湿敷局部，每天2~3次，每次约10分钟。

〔主治〕 婴儿湿疹。

方(六)

〔组成〕 生大黄10克 川黄连10克 黄柏10克 苦参10克 苍耳子10克

〔用法〕 取上药煎后过滤，用药液熏洗患处，每日3次，每次数分钟，渗液多者加枯矾6克。

〔主治〕 小儿湿疹。

方(七)

〔组成〕 银花 30 克 防风 蝉衣各 15 克

〔用法〕 上药煎汤外洗，每日 1~2 次。

〔主治〕 小儿慢性湿疹。

方(八)

〔组成〕 土茯苓 苦参各 15 克 苍术 黄柏各 10 克

〔用法〕 上药煎汤洗患处。

〔主治〕 小儿急性湿疹。

十一、小儿风疹

小儿风疹为感染风疹病毒所致，多见于冬春两季。有风疹病员接触史，低热或中度发热，有轻度上呼吸道症状。发热 1~2 天出现麻疹样皮疹，但较稀疏，持续 1~4 天消退，疹退后无色素沉着斑，耳后及枕后淋巴结肿大，一般情况良好，多无并发症。

方(一)

〔组成〕 苍耳草 24 克 苦参 24 克 川椒 6 克 紫草 10 克

〔用法〕 水煎外洗瘙痒部，1 日数次。

〔主治〕 小儿风疹。

方(二)

〔组成〕 地肤子 16 克 白蒺藜 16 克 浮萍 15 克

川椒 3 克

〔用法〕 水煎外洗，1 日数次。

〔主治〕 小儿风疹。

方(三)

〔组成〕 荆芥穗 24 克 艾叶 10 克 防风 10 克 花椒 6 克

〔用法〕 水煎外洗，1 日数次。亦可用荆芥穗揉碎炒热，用布袋装好擦患处，1 日数次。

〔主治〕 小儿风疹。

十二、小儿丹毒

小儿丹毒又名赤游风、赤游丹，是婴幼儿的一种常见皮肤病。临床表现为局部皮肤突然发赤，焮红肿胀，色如丹涂脂染，先发一处，渐及全身，游走不定，或伴见发热恶寒等全身性症状。

处方

〔组成〕 防风 荆芥穗 黄柏 苦参各 30 克 蚤休 大青叶各 20 克

〔用法〕 上药加水煮沸 5 分钟，将药液倒入盆内，待温用毛巾蘸药水擦洗患处。每日早晚各 1 次。每次洗 15～30 分钟。

〔主治〕 小儿丹毒，反复发作。

十三、鹅口疮

鹅口疮为小儿口腔、舌上满布白屑，状如鹅口的疾病。婴儿口腔粘膜嫩薄，不耐邪热熏灼，故易于发生鹅口疮。尤以早产儿及久病、久泻、体质羸弱的乳儿更为常见。

方(一)

〔组成〕 板蓝根 10 克

〔用法〕 上药煎浓汁，用棉球蘸药液反复擦洗患处，1 日 5~6 次，10 次为 1 个疗程。

〔主治〕 鹅口疮。

方(二)

〔组成〕 板蓝根 20 克 薄荷 5 克

〔用法〕 上药煎汁，取一半洗擦患处，每日 5~6 次，另一半分 2~3 次内服。

〔主治〕 鹅口疮。

十四、口吻疮

口吻疮相当于现代医学的口角疮、核黄素缺乏性口角炎，常因脾胃湿热，上攻口唇或先天遗毒所致。

处方

〔组成〕 苦参 百部 黄柏 五倍子 蛇床子各 15 克
皮硝 10 克

〔用法〕 上药加水适量煎汤外洗或湿敷患处。

〔主治〕 小儿口吻疮。

十五、尿布皮炎

尿布皮炎是发生于尿布遮盖部位的局限性皮炎，主要是因尿液分解产物的刺激，湿尿布的浸渍等原因所致。临床以尿布覆盖部位一致的红斑为皮损特征。

方(一)

〔组成〕 草薢 20 克 车前子 苦参 黄柏各 15 克

〔用法〕 上药加水 2 升，煎取 1 升，每天 3~4 次外洗，7 天为 1 个疗程。

〔主治〕 小儿尿布皮炎。

方(二)

〔组成〕 川黄连 6 克

〔用法〕 水煎外洗患处。

〔主治〕 小儿尿布皮炎。

方(三)

〔组成〕 黄芩 15 克 黄连 15 克 黄柏 15 克 大黄 15 克 雄黄 6 克 枯矾 9 克

〔用法〕 上药加温水 1.5 升浸泡 30 分钟后，浓煎至 100 毫升左右。使用前先用温开水将患处洗净，再用棉球蘸此液擦患处，每日擦 3 次。

〔主治〕 小儿尿布皮炎。

十六、胎黄

胎黄以婴儿出生后全身皮肤、巩膜发黄为特征。凡婴儿出生后 2~3 天出现黄疸，足月儿于出生 10~14 天后自行消退，禀赋虚弱的早产儿持续时间较长，一般情况良好，食欲尚可，二便正常，且无其它临床症状者，此为生理性胎黄；若于生后 24 小时内即出现黄疸，2~3 周后仍不消退，甚至继续加深，或黄疸退而复现，或于生后 1 周甚至数周后出现黄疸，临床症状较重，精神萎靡，食欲不振者，此为病理性胎黄。

方(一)

〔组成〕 大黄 硝石 黄柏 山梔各 10 克

〔用法〕 上药共煎汤 1 升，擦洗患儿全身，每日 2 次，3 天为 1 个疗程。

〔主治〕 新生儿黄疸。

方(二)

〔组成〕 黄柏 30 克

〔用法〕 上药煎水去渣，水温适宜时，让患儿浸浴，反复擦洗10分钟，每日1~2次。

〔主治〕 胎黄。

十七、小儿疝气

小儿疝气多因先天不足、禀赋虚弱或因久咳、久哭而使小肠下降到阴囊内所致。临床以举丸、阴囊肿胀疼痛及小腹牵掣疼痛，甚则痛剧难忍为特征。

方(一)

〔组成〕 生香附 木瓜 苏叶 橘叶各10克

〔用法〕 上药加水煎煮，待温，用干净毛巾浸药液，先洗患部10分钟左右，再浸透稍拧干热敷患处，冷则去之。每日早晚各1次。

〔主治〕 小儿疝气。

方(二)

〔组成〕 茶叶10克 橘叶20克 老生姜25克 淡豆豉30克 白术 食盐各15克

〔用法〕 将上药加水煮沸后，趁热熏洗20~30分钟。先熏后洗，冷则加热，每日早晚各1次。

〔主治〕 小儿虚寒性疝气。

方(三)

〔组成〕 川厚朴 透骨草 艾叶各9克 槐树枝7厘米
葱白7个。

〔用法〕 上药加水煎沸后，趁热先熏后洗患处30分钟，
每日1次。

〔主治〕 疝气。

十八、小儿鞘膜积液

小儿鞘膜积液多因厥阴肝经之脉不得舒畅，复受寒湿或
湿热郁结所致。临床症状为阴囊的一侧或两侧肿大如水晶，不
红不热，下控睾丸，上引小腹，或瘙痒流水，苔薄白而腻，脉沉
弦；寒湿之邪，久郁化热，亦可见阴囊红肿，小便短赤等。

方(一)

〔组成〕 五倍子 枯矾各10~15克

〔用法〕 上药共研粗末，加清水300~400毫升煎煮，去
渣存汁，待微温（以不烫伤皮肤为宜），把阴囊全部浸泡在药液
中，每次浸泡20~30分钟。每日1剂，每日浸泡2~3次。下
次用时将药液加温即可（用药前先用温开水洗净外阴部）。

〔主治〕 小儿原发性和继发性睾丸鞘膜积液、精索鞘膜
积液、交通性鞘膜积液等。

方(二)

〔组成〕 金银花 蝉蜕各30克 紫苏叶15克

〔用法〕 上药加水煎2次，去渣，两汁混合倒入碗内，待

温，先熏后浸患部(阴囊)，每次浸泡 30 分钟，每日浸洗 2~3 次，每日 1 剂。

〔主治〕 小儿鞘膜积液。

方(三)

〔组成〕 肉桂 6 克 煅龙骨 五倍子 枯矾各 15 克

〔用法〕 先将上药捣碎，加清水约 700 毫升，煮沸后 30 分钟，将药液倒入碗内，待温与皮肤温度相近时，把阴囊全部浸入药液内浸洗 30 分钟，每 2 日 1 剂，连用 8 剂。每日浸洗 2 次。

〔主治〕 小儿睾丸鞘膜积液。

方(四)

〔组成〕 蛇床子 白矾各 12 克 川黄连 3 克

〔用法〕 上药煎汤熏洗患处，每日 2 次。本法可同时配合内服药，如车前子、六一散各 12 克，赤苓、猪苓、泽泻、薏苡仁、金银花各 9 克、木通 3 克，煎汤分 2 次内服。

〔主治〕 阴茎包皮水肿。

方(五)

〔组成〕 青木香 梔子各 15 克

〔用法〕 上药共煎去渣，洗拭患处，每日 2~3 次

〔主治〕 过敏性阴茎包皮水肿。

方(六)

〔组成〕 蛇床子 10 克 雄黄 4 克 枯白矾各 4 克

〔用法〕 将药放在罐内加水适量，置火上煎煮后，趁热将小儿阴囊置罐口上方熏之。

〔主治〕 小儿阴茎及阴囊浮肿，光亮如玻璃状，甚至小便不通。

方(七)

〔组成〕 荔枝草(即蛤蟆草)150 克

〔用法〕 上药加水煎沸，趁热先熏后洗患处(阴茎阴囊)，每日1次。

〔主治〕 小儿阴茎包皮水肿，兼治阴痒、湿疹。

第十一章 男科疾病

男科疾病包括男性生殖器疾病、性功能障碍等。由于男性生殖系统的解剖部位及生理功能的特点,熏洗对男科疾病,特别是对阴茎头包皮炎、阴囊湿疹、睾丸炎等前阴疾病有着独特的疗效,其主要原因是药物可以直接作用于病灶部位,从而获得桴鼓之效。还可通过坐浴,改善局部血液循环,消除局部的炎症;或采用药液浸泡双足(除药力的作用外,通过经络的传导及穴位的刺激也能发挥治疗作用)对阳痿、遗精、早泄等性功能障碍疾病也能起到良好的治疗作用。

一、阴茎头包皮炎

阴茎头包皮炎是阴茎龟头及包皮同时感染的疾病。多由包皮过长、局部不洁、污垢刺激所致。属中医外痈范畴,病机多由湿热之毒蕴结下焦而发。急性感染时,局部潮湿、红肿、疼痛、奇痒,甚至发生溃疡,乳白色臭味分泌物;慢性期由于感染造成包皮阴茎头部粘连,包皮不能上翻,可造成尿道外口狭窄。

方(一)

〔组成〕 黄柏 15 克

〔用法〕 上药加水适量煎汤，待温后将包皮上翻浸洗，每次 15 分钟，1 日 2~3 次。洗后用青黛吹口散（煨石膏、煨人中白、青黛、薄荷、黄柏、黄连、煨月石、冰片）外敷，或扑以青黛散（青黛、石膏、滑石、黄柏）。

〔主治〕 用于急性阴茎头包皮龟头炎。

方(二)

〔组成〕 生地榆 黄柏各 30 克 蛇床子 苦参各 10 克

〔用法〕 上药水煎，浸洗患处。每日 2~3 次，每次 10 分钟，然后外扑青黛散，或外敷青黛膏。

〔主治〕 阴茎头包皮龟头炎。

方(三)

〔组成〕 七叶一枝花 生甘草各 60 克

〔用法〕 每天 1 剂，煎水 3 碗，分 2 次趁热洗患处。

〔主治〕 阴茎头脓肿。

方(四)

〔组成〕 银花 蒲公英各 30 克 野菊花 15 克 黄柏 茯苓各 12 克。

〔用法〕 每日 1 剂，水煎。取药液约 500 毫升，待温度适宜，浸洗包皮阴茎头肿胀部分约 15 分钟，每日 2~3 次。

〔主治〕 阴茎头包皮龟头炎。

方(五)

〔组成〕 威灵仙 蛇床子各 30 克

〔用法〕 将上药水煎熏洗患处。如有溃瘍流脓者，应翻起包皮熏洗。每日 1~3 次。

〔主法〕 阴茎头包皮灸。

方(六)

〔组成〕 龙胆草 金银花 黄柏各 15 克

〔用法〕 上药加水煎煮，待温后局部洗敷，每日 2 次。

〔主治〕 阴茎头包皮灸有脓性分泌物者。

方(七)

〔组成〕 紫花地丁 20 克 大黄 20 克 五倍子 15 克
煅龙骨 10 克

〔用法〕 上药加水煎煮 30 分钟，取药汁局部潮洗，每次 20~30 分钟，每日 2 次。

〔主治〕 阴茎头包皮灸伴有溃瘍面者。

方(八)

〔组成〕 蛇床子 30 克 雄黄 5 克 枯矾 5 克

〔用法〕 水煎熏洗患处。

〔主治〕 阴茎头包皮灸。

方(九)

〔组成〕 韭菜根 60 克 防风 30 克

〔用法〕 上药煎汤，熏洗患处。

〔主治〕 阴茎头包皮炎。

二、阳强

阳强指无性欲或无性刺激的情况下，阴茎异常勃起，可长达数小时，甚至数日，伴有疼痛的疾病。本病多由肾水亏虚，虚火上炎或败精阻络所致。

方(一)

〔组成〕 玄明粉 60 克

〔用法〕 玄明粉冲水浸洗阴茎，每日 4~6 次。

〔主治〕 痰火郁滞之阳强。

方(二)

〔组成〕 皮硝 40 克

〔用法〕 上药加水煎煮后，趁热熏洗会阴部，一般 1 次见效。如不效可再行熏洗。

〔主治〕 阳强。

方(三)

〔组成〕 肉桂 30 克 透骨草 40 克 白芷 20 克

〔用法〕 上方加水煎煮，去渣取汁，将两足浸泡于药汁中 15 分钟，每日 1 次。

〔主治〕 虚火妄动之阳强。

方(四)

〔组成〕 大黄 黄柏各等量

〔用法〕 取上药煎液，涂擦阴茎，每日2次。

〔主治〕 阳强。

三、睾丸炎

睾丸炎以单侧或双侧睾丸肿大、疼痛，阴囊皮肤红肿为主症，可伴有发热。病毒性睾丸炎多为流行性腮腺炎的一个并发症，细菌性睾丸炎则常继发于附睾感染。

方(一)

〔组成〕 鱼腥草 60 克

〔用法〕 上药水煎后趁热淋洗阴囊，每日1~2次。

〔主治〕 急性睾丸炎。

方(二)

〔组成〕 鲜马齿苋 100 克

〔用法〕 取马齿苋煎液，一半内服，一半外洗患处。

〔主治〕 急性附睾睾丸炎。

方(三)

〔组成〕 紫苏叶 适量

〔用法〕 水煎熏洗睾丸。

〔主治〕 睾丸红肿疼痛。

方(四)

〔组成〕 丹参 30 克 赤芍 30 克 夏枯草 15 克 川椒 9 克 桂枝 9 克

〔用法〕 上药水煎后熏洗阴囊，每日 1 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 慢性睾丸炎。

方(五)

〔组成〕 白芷 30 克 萆薢 蛇床子 苏木各 15 克 甘草 10 克

〔用法〕 上药水煎后，将药液置于盆中熏洗坐浴。每天 2 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 慢性睾丸炎。

方(六)

〔组成〕 马齿苋 威灵仙各 60 克

〔用法〕 上药水煎熏洗患处。

〔主治〕 睾丸炎、附睾炎。

方(七)

〔组成〕 七叶一枝花 60 克 红花 10 克 制乳香 制没药各 15 克

〔用法〕 上药水煎后熏洗患处，每日 2 次。

〔主治〕 湿热型睾丸炎、附睾炎。

方(八)

〔组成〕 紫花地丁 30 克 蒲公英 30 克 地肤子 30 克

〔用法〕 上药煎汤熏洗患处。

〔主治〕 急性附睾睾丸炎。

四、阴囊湿疹

阴囊湿疹是一种常见的瘙痒性皮肤病。属中医肾囊风范畴，临床以阴囊作痒或起粟疹、水疱，搔破湿烂，脓水浸淫为特征。其病机多由肾气内虚，风邪外袭，或肝经湿热下注所致。

方(一)

〔组成〕 芒硝 30 克 食盐 3 克

〔用法〕 上药入盆中，加水煮沸，熏洗患部，每日 2～3 次。

〔主治〕 阴囊湿疹。

方(二)

〔组成〕 艾叶 30 克 千里光 30 克

〔用法〕 加水浓煎后，温洗患处 10～15 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

〔主治〕 阴囊湿疹。

方(三)

〔组成〕 丝瓜络 60 克

〔用法〕 水煎取液，待温坐浴，每日 1～2 次。

〔主治〕 阴囊湿疹。

方(四)

〔组成〕 蛇床子 土大黄 归尾 威灵仙 苦参各 9 克
老葱头 6 克

〔用法〕 水煎取液待温坐浴，每日 2 次，每次 20～30 分钟。

〔主治〕 阴囊湿疹。

方(五)

〔组成〕 苦参 蛇床子 地肤子 白鲜皮各 25 克 百部 川椒 当归各 20 克。

〔用法〕 上药煎沸后熏洗患处。每日 2 次，每次 15～20 分钟。

〔主治〕 阴囊湿疹。

方(六)

〔组成〕 冰硼散 2 克

〔用法〕 加水 1 升煮沸，先熏蒸阴囊，再浸泡 15 分钟左右，最后反复擦洗 5 分钟。

〔主治〕 阴囊湿疹。

方(七)

〔组成〕 苦参 100 克 明矾 10 克 雄黄 3 克

〔用法〕 上药水煎后，局部熏洗。每天2次。

〔主治〕 阴囊湿疹。

方(八)

〔组成〕 地榆400克 黄柏400克

〔用法〕 上药煎汤去渣，熏洗患处。

〔主治〕 阴囊湿疹。

方(九)

〔组成〕 槐皮 苦参 黄柏 香薷各等份

〔用法〕 上药煎汤去渣，外洗患处。

〔主治〕 阴囊湿疹。

方(十)

〔组成〕 地骨皮60克 吴茱萸30克

〔用法〕 上药水煎取液，熏洗患处，每日熏洗1次。

〔主治〕 阴囊湿疹。

方(十一)

〔组成〕 新荷叶1张 连须葱头7个。

〔用法〕 将上两药煎汤，先熏后洗患处。

〔主治〕 阴囊湿疹。

方(十二)

〔组成〕 老葱 川椒各适量

〔用法〕 先以葱椒煎汤熏洗，再以五倍子、腊茶研末，少

加铅粉涂擦。

五、阴囊鞘膜积液

阴囊鞘膜积液是指睾丸鞘膜囊内积聚的浆液多于正常量而形成的囊肿。包括睾丸鞘膜积液、精索鞘膜积液等。临床以阴囊逐渐肿大形成肿物，表面光滑有波动感为特点。一般无任何感觉，较大时有坠胀感。常为一侧发病，个别时也可双侧发病，肿物透光试验阳性。

方(一)

〔组成〕 蝉蜕 30 克

〔用法〕 上药煎汤熏洗肿处。

〔主治〕 阴囊水肿。

方(二)

〔组成〕 大黄 30 克 芒硝 60 克

〔用法〕 上药置一干净盆中，加开水适量，将药物浸渍搅和 5 分钟后，先熏后洗，也可坐浴。1 日 2 次。

〔主治〕 阴囊鞘膜积液。

方(三)

〔组成〕 川椒 艾叶 苏叶 生葱 小茴香各 10 克
牡蛎 30 克 地龙 15 克 醋 250 毫升

〔用法〕 上药水煎取液，熏洗阴囊，每日洗 2 次。

〔主治〕 阴囊鞘膜积液。

方(四)

〔组成〕 车前子 30 克 荔枝核 15 克

〔用法〕 上药水煎,熏洗阴囊。

〔主治〕 睾丸鞘膜积液。

方(五)

〔组成〕 艾叶 30 克 草薢 15 克 丹参 15 克 防风 5 克 蜈蚣 2 条

〔用法〕 水煎外洗,每次 30 分钟,每日 2 次。

〔主治〕 精索鞘膜积液。

六、前列腺炎

前列腺炎是男性成人因泌尿道多种细菌感染而致的一种常见疾病。属中医淋证、精浊等范畴。以阴部不适、疼痛、尿频、灼热感、小便挟精、遗精为特征。多由湿热毒邪侵袭精室、精道,疳肿、乳蛾热毒入于营血,或饮酒过量、性交不洁所致。

方(一)

〔组成〕 龙胆草 黑山栀 黄芩 草薢 黄柏 生地 土茯苓 车前草各 12 克

〔用法〕 水煎后熏洗会阴部,每日 2 次。

〔主治〕 前列腺炎。

方(二)

〔组成〕 红花 9 克 银花 15 克 蒲公英 车前草各 30 克 革薺 18 克

〔用法〕 上药水煎，趁热熏洗。每次 30 分钟，每日 1 次。

〔主治〕 前列腺炎。

方(三)

〔组成〕 白芷 革薺各 30 克 甘草 5 克

〔用法〕 上药煎汤倾盆，水凉加温，每次坐浴半小时，每日 1 次，1 个月为 1 个疗程。

〔主治〕 前列腺炎。

方(四)

〔组成〕 野菊花 苦参 马齿苋 败酱草各 30 克 元胡 15 克 当归 12 克 槟榔 10 克

〔用法〕 煎液 1.2~1.5 升，每晚坐浴半小时。

〔主治〕 前列腺炎。

七、前列腺肥大

前列腺肥大是以排尿费力，尿流变细，排尿次数增多，甚者可出现完全性尿潴留或充盈性尿失禁为主症的一种疾病。多发生于老年男性 50~70 岁之间。属中医“淋证”、“癃闭”范畴。

方(一)

〔组成〕 艾叶 赤芍 泽兰 苦参 蒲公英各 30 克
桂枝 红花各 20 克

〔用法〕 上药煎汤，先熏洗，后坐浴。每日 1 次。

〔主治〕 前列腺肥大。

方(二)

〔组成〕 大黄 芒硝 益母草 天花粉 车前草 泽兰
艾叶各 12 克 白芷 桂枝各 10 克 生葱 30 克

〔用法〕 水煎后熏洗前后阴，每日 2 次。

〔主治〕 前列腺肥大。

方(三)

〔组成〕 大黄 毛冬青 忍冬藤各 30 克 红花 10 克
吴茱萸 15 克

〔用法〕 上药水煎 1.5 升，待温坐浴。每日 1 次，每次 20
~30 分钟。

〔主治〕 前列腺肥大。

八、阳痿

阳痿是男性阴茎痿弱不用，不能勃起，或勃起不坚，不能完成正常房事的一种疾病。多因情志不遂，肝胆湿热，肾气亏虚等致使宗筋弛纵所引起。

方(一)

〔组成〕 五倍子 20 克

〔用法〕 上药加水煎煮，将药液倒入盆中，趁热熏洗龟头。待药温降至 40℃ 左右时，再浸泡龟头 5~10 分钟，每晚熏洗 1 次，15~20 天为 1 个疗程。

〔主治〕 阳痿、早泄

方(二)

〔组成〕 菟丝子 蛇床子 韭菜子 棉花子 仙茅 仙灵脾 巴戟天 阳起石 补骨脂 大小茴香各 10 克

〔用法〕 上药水煎，熏洗会阴及阴茎、阴囊，每日 2 次。

〔主治〕 阳痿。

方(三)

〔组成〕 苦参 蛇床子各 50 克 黄柏 龙胆草 荆芥 海风藤各 20 克 百部 白鲜皮 夜交藤各 15 克

〔用法〕 上药煎汤，先熏后洗阴茎。也可配合口服汤药进行治疗。

〔主治〕 阳痿伴阴囊发痒和湿疹。

九、遗精

遗精是以不因性生活而精液遗泄为主症的一种疾病。多因肾精封藏不固，或相火旺盛，湿热下扰精室所致。其中有梦

而遗精的名为“梦遗”；无梦而遗精，甚至清醒时精液流出的名为“滑精”。现代医学的神经衰弱、前列腺炎、精囊炎等引起的遗精症可参考本病治疗。

方(一)

〔组成〕 清洁水适量

〔用法〕 取清洁水适量，加热至 $50^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ，倒入盆内。患者赤足在热水中浸洗，每次 $8\sim 10$ 分钟，每晚睡前浸洗 1 次。睡前保持心境平静，不要看刺激性欲的电视、小说。

〔主治〕 各类型遗精，特别适用于神经衰弱引起的遗精。

方(二)

〔组成〕 仙鹤草 30 克 黄芩 丹皮各 9 克

〔用法〕 上药水煎后，熏洗会阴部，每晚睡前熏洗 1 次。

〔主治〕 遗精。

方(三)

〔组成〕 黄连 肉桂各 6 克 知母 黄柏 五倍子 菟丝子各 12 克 仙鹤草 煨牡蛎 煨龙骨各 30 克

〔用法〕 上药水煎，趁热熏洗会阴部及阴茎、阴囊，每日 2 次。临睡前取药液浸洗两足。

〔主治〕 遗精。

十、早泄

早泄是指性交时，阴茎勃起后未插入阴道或插入阴道后，在性高潮未到以前即行射精，难以完成正常性交的一种疾病。

方(一)

〔组成〕 五倍子 20 克

〔用法〕 将五倍子用文火煎熬半小时，再加适量开水，趁热熏洗阴部数分钟，待药温适度后浸泡龟头。每晚 1 次，15～20 天为 1 个疗程。

〔主治〕 早泄。

方(二)

〔组成〕 蛇床子 10 克 地骨皮 10 克 石榴皮 10 克

〔用法〕 上药煎汤后熏洗阴部，并于性交前洗泡阴部。

〔主治〕 早泄。

方(三)

〔组成〕 仙鹤草 30 克 黄芩 9 克 丹皮 9 克

〔用法〕 将上药煎汤熏洗双足。每晚 1 次，每次 20～30 分钟。

〔主治〕 早泄。

十一、疝气

疝气是指睾丸、阴囊肿胀疼痛，或牵引小腹疼痛为主症的一种疾病。常见的有狐疝和血疝。凡腹腔内容物行立则外出小腹滑入阴囊，卧则复入小腹，如狐之出入者称为狐疝，相当于西医的腹股沟疝。血疝是指血液瘀积于阴囊，导致阴囊肿大的疾病，多为阴囊直接暴力或手术止血不慎所致，西医称为阴囊瘀血。

方(一)

〔组成〕 马鞭草 120 克

〔用法〕 用水 1.5 升，煎汤熏洗患处。

〔主治〕 血疝。

方(二)

〔组成〕 雄黄 3 克 白矾 60 克 甘草 30 克

〔用法〕 上药加水 1.5 升，煎汤外洗患处。

〔主治〕 疝气。

方(三)

〔组成〕 花椒 30 克 葱胡 7 个 全瓜蒌 1 个 陈醋 250 毫升

〔用法〕 上药加水煎煮，以纱布蘸药液浸洗患处，每日 2 次。

〔主治〕 疝气。

方(四)

〔组成〕 白矾 30 克 雄黄 15 克 生黄柏 20 克 橘叶 10 克 葱白 10 根

〔用法〕 上药加水煎煮，熏洗阴囊。

〔主治〕 疝气。

方(五)

〔组成〕 落得打 红花 生半夏 骨碎补各 9 克 甘草 6 克 葱须 15 克

〔用法〕 上药加水 2 碗煎滚，加醋 30 毫升，再煎滚。然后熏洗、坐浴患处。每日 3~4 次，每次 20 分钟。

〔主治〕 阴囊血肿。

第十二章 性传播疾病

性病是一组传染病,主要通过性接触传染。随着国际交往日益频繁,旅游事业迅速发展,性病患者明显增多。性病的传播,对人类健康危害极大,它的传染性极强,并能引起各种并发症和后遗症。如梅毒可并发眼、鼻、神经、骨、脑、心脏、血管等多脏器损害;淋病可引起盆腔炎、关节炎、心内膜炎、脑膜炎、菌血症等;艾滋病被人形容为“超级癌症”,是一种致死率极高的严重疾病。制止性病的蔓延,除了加强宣传和监测工作外,积极治疗已患之病,杜绝发病根源同样是相当重要的。

性病主要发生在皮肤粘膜部位,特别是生殖器、肛门、口腔等部位。除了中西药内服治疗外,以中药熏洗外治,内外结合也相当重要。

临床多采用先熏后坐浴的方法,对阴道内疾患还可采用纱布蘸药汁填塞的方法。主要治疗淋病、梅毒、尖锐湿疣、生殖器疱疹、非淋病性尿道炎、阴虱等疾患,并根据致病的病原体不同,临床症状不同,可分别采用清热解毒,软坚散结,燥湿杀虫等施治。

一、阴虱

阴虱是虱病的一种。是由寄生于人体的虱寄生虫叮咬皮肤引起的一种瘙痒性皮肤病。主要由性接触直接传播，或由内裤、床垫、厕所座板间接传播，男女均可发病。主要表现为阴毛部位及其附近瘙痒，有红斑、丘疹、血痂。在内裤和阴毛上可发现虫卵和虱体。

方(一)

〔组成〕 百部 苍术各 30 克 槟榔 15 克

〔用法〕 以水煎汤熏洗患处，3~4 次可愈。

〔主治〕 阴虱。

方(二)

〔组成〕 蜀椒 30 克

〔用法〕 上药水煎熏洗患部。

〔主治〕 阴虱。

方(三)

〔组成〕 百部 蛇床子 黄柏各 200 克

〔用法〕 将上药洗净，加水 3 升，文火煎 1 小时，过滤取汁，再浓缩至 500 毫升，装瓶备用。治疗前应剃掉阴毛并焚烧，将内衣衬裤煮沸，同时将药液均匀地涂搽患处，每日 3 次，涂药后局部不得清洗。

〔主治〕 阴虱。

方(四)

〔组成〕 百部 50 克 雄黄 30 克 龙胆草 蛇床子 土茯苓 苦参各 40 克 露蜂房 20 克

〔用法〕 加水 4 升,煎成 1.5 升,待温慢慢清洗阴部、肛门,每次不少于 30 分钟。洗后擦干,局部擦龙胆紫,之后更换内衣裤,清除阴虱巢穴,剃净阴毛,治疗 1 周。

〔主治〕 阴虱。

方(五)

〔组成〕 蛇床子 大枫子各 30 克 川椒 藜芦各 15 克 硫黄 60 克

〔用法〕 上药煎液,浸洗患部,每日 1~2 次,连用 3 天。

〔主治〕 阴虱。

方(六)

〔组成〕 百部 滑石 苦参各 100 克 蛇床子 川楝子各 50 克 紫草 10 克

〔用法〕 上药煎液坐浴,每日 3 次,每次半小时。

〔主治〕 阴虱。

方(七)

〔组成〕 苦杏仁 百部 明矾 鹤虱各 30 克

〔用法〕 上药加水煎煮取汁,待温坐浴,洗前剃除阴毛,洗后更换内裤。

〔主治〕 阴虱。

二、生殖器疱疹

生殖器疱疹主要由单纯疱疹病毒感染所致，属性病范畴，性接触是主要传染途径，男女均可发病。好发于男性的龟头、冠状沟、阴囊、尿道口、阴茎，女性的外阴、宫颈、大腿或臀部、肛门等。一般在性接触3~7天内发病，局部灼热，继之在红斑基础上出现群集小水疱，疱液渐变脓性，易破溃，形成糜烂或浅表性溃疡。腹股沟淋巴结肿大压痛。

方(一)

〔组成〕 苦参30克 黄柏20克 地榆20克 青黛6克(布包) 红花10克 板蓝根20克 鱼腥草30克。

〔用法〕 每日1剂，水煎分3次内服，药渣水煎外洗，经15~20天治疗可愈。

〔主治〕 生殖器疱疹。

方(二)

〔组成〕 贯众 紫草 生地榆各30克

〔用法〕 上药加水煎煮取汁，坐浴，每日1~2次，每次30分钟。

〔主治〕 生殖器疱疹。

方(三)

〔组成〕 黄芩 黄连 马齿苋各 30 克 枯矾 15 克 蛇床子 20 克

〔用法〕 上药加水煎煮取汁，浓缩，用软布蘸药汁敷患处，每次 30 分钟，每日 2 次。

〔主治〕 生殖器疱疹。

方(四)

〔组成〕 龙葵草 银花 炉甘石各 20 克 黄柏 15 克 五倍子 苦参各 10 克

〔用法〕 上药加水浓煎取汁，洗敷患处，每日 2~3 次，每次 15~20 分钟。

〔主治〕 生殖器疱疹。

三、软下疳

软下疳是由克雷嗜血杆菌引起的一种性传播性疾病。性接触是主要传播途径。好发于男性阴茎、包皮、龟头、冠状沟，女性为大阴唇、阴唇系带、肛周、肛门。性交后 2~5 天发病，初起为红色炎症性丘疹，迅速变成脓疱，脓疱溃破后形成边界清楚但不整齐的溃疡面，质地柔软、疼痛。溃疡可单发也可多发；单侧腹股沟淋巴结肿大压痛。

方(一)

〔组成〕 益母草 黄柏末 胡燕窠内土适量。

〔用法〕 先用益母草水煎洗患处，再将后二药研细末，敷

患处。

〔主治〕 软下疳。

方(二)

〔组成〕 绿豆 2 升 茶叶少许

〔用法〕 将绿豆煮极烂，茶叶研细末，趁热倾倒入多年的马桶内，熏洗之，待出汗。

〔主治〕 软下疳。

四、尖锐湿疣

尖锐湿疣又称生殖器疣，是由人类乳头瘤病毒感染所引起的一种性病。主要是通过有传染性的性伴侣接触而发生，在性活跃的人群中发病率高。男性常发生于冠状沟、龟头、系带、尿道口，有时见阴茎体及周围皮肤、肛门损害，常见于男性同性恋者；女性常见于阴蒂、阴唇、肛周、阴道及宫颈。皮疹为乳头样、菜花样有蒂增生物，初起散在或集簇状发生，以后不断增大融合成大团块，尖锐湿疣易发生癌变，应积极防治。

方(一)

〔组成〕 板蓝根 30 克 木贼 30 克 大青叶 15 克 连翘 12 克 蒲公英 30 克

〔用法〕 上药加水 3 升，文火煎煮 20 分钟，去渣。用药液坐浴，并用纱布或软毛巾蘸药液填塞阴道内，每 2~3 分钟更换 1 次，连用 30 分钟，每日 1~2 次，每剂中药可连续用 3~4

天。

〔主治〕 外阴尖锐湿疣。

方(二)

〔组成〕 板蓝根 大青叶 蒲公英 黄柏 苦参 30 克
紫草 木贼 红花 桃仁 枯矾各 20 克。

〔用法〕 上药加水煎煮 2 升，趁热熏患处，待温度适合时用纱布蘸药水擦洗局部，每日 1 次，每次约 20 分钟，每剂药可连用 3 天。每次用药前先加热。

〔主治〕 男女阴部尖锐湿疣。

方(三)

〔组成〕 人中白 霜梧桐叶 瓦松 红花 生黄柏 蛇床子 荆芥 防风 赤芍各 30 克

〔用法〕 上药水煎取汁，熏洗患处，每日早晚各 1 次，每剂用 2 日。

〔主治〕 肛门尖锐湿疣。

方(四)

〔组成〕 生薏仁 30 克 板蓝根 30 克 香附 30 克 红花 10 克

〔用法〕 上药水煎，每日 1 剂，每次先熏后洗，每日 2 次，洗时稍用力揉搓疣体，但不可搓破。

〔主治〕 尖锐湿疣。

方(五)

〔组成〕 贯众 15 克 大青叶 20 克 蛇床子 20 克 白矾 10 克 桃仁 10 克 大黄 10 克 海藻 30 克 甘草 10 克

〔用法〕 上药煎水，于外阴部先熏后洗，1 日 2 次，每次 10～15 分钟，每剂可用 3 天，7 天为 1 个疗程。

〔主治〕 外阴尖锐湿疣。

方(六)

〔组成〕 白矾 30 克 马齿苋 2 大棵

〔用法〕 上药水煎先熏后洗，洗后擦干，外抹滑石、薏苡仁粉。

〔主治〕 尖锐湿疣。

方(七)

〔组成〕 狼毒 蒲公英 地肤子 藤梨根各 30 克 透骨草 20 克 黄柏 15 克 明矾 冰片各 10 克

〔用法〕 水煎取汁，每日 1 次。

〔主治〕 尖锐湿疣。

方(八)

〔组成〕 金钱草 60 克 板蓝根 40 克 大青叶 40 克 红花 20 克 赤芍 20 克 桃仁 10 克 败酱草 30 克 三棱 15 克 莪术 15 克

〔用法〕 上药煎汤熏洗患处，连续用 21 次。

〔主治〕 尖锐湿疣。

方(九)

〔组成〕 马齿苋 45 克 板蓝根 30 克 白芷 10 克
贼草 15 克 细辛 12 克 桃仁 10 克 露蜂房 10 克 生甘草
10 克。

〔用法〕 将上药加水煎至 2 升，先熏后洗患处，每次熏洗
15～20 分钟，每天 1 次，5 次为 1 个疗程。

〔主治〕 尖锐湿疣。

五、淋病

淋病是由淋病双球菌引起的泌尿生殖器系统化脓性感染。人是淋球菌的唯一天然宿主，因而淋病患者是其传染源。成人的淋病几乎全部通过性交而传染，但是污染的衣裤、被褥、寝具、浴盆和手在传染中也起一定作用。淋病患者大多数为性生活比较活跃的中青年男女。男性淋病症状比较明显，早期出现尿频，尿急，尿痛，尿道流脓；女性出现小便不适，阴道脓性白带。

方(一)

〔组成〕 黄连 黄柏 明矾 土茯苓 苦参各 30 克

〔用法〕 水煎外洗，每日 3 次，每次 15 分钟，或用软布蘸药塞入阴道内，10 分钟后取出。

〔主治〕 淋病。

方(二)

〔组成〕 生大黄粉 10 克 鱼腥草 60 克 黄柏 12 克

明矾 5 克 乌梅 3 个

〔用法〕 上药煎汤外洗生殖器，每日 2 次，每次 30 分钟。

〔主治〕 淋病。

方(三)

〔组成〕 苦参 50 克 蛇床子 30 克 地肤子 30 克 山豆根 30 克 黄连 20 克 苏叶 15 克

〔用法〕 煎水取汁，每日 1 剂反复外洗外阴，每日 2~3 次。

〔注治〕 淋病。

方(四)

〔组成〕 土茯苓 50 克 双花 50 克 白鲜皮 15 克 威灵仙 15 克 苦参 20 克 甘草 15 克

〔用法〕 取上药煎液冲洗阴道、尿道口，每日 2 次。

〔主治〕 淋病。

方(五)

〔组成〕 败酱草 100 克

〔用法〕 上药加水 2 升，煎半小时，去渣，待凉，分 2 次冲洗前阴，每日 1 剂。

〔主治〕 淋病。

方(六)

〔组成〕 银花 蒲公英各 20 克。

〔用法〕 水煎，洗涤阴部，1 日数次。

〔主治〕 淋病。

方(七)

〔组成〕 土茯苓 30 克 紫草 15 克 蒲公英 15 克 金莲花 15 克 蛇床子 10 克 川椒 10 克

〔用法〕 上药水煎，外用浸洗患处。

〔主治〕 淋病。

方(八)

〔组成〕 苦参 30 克 生大黄 15 克 黄柏 12 克

〔用法〕 上药水煎取汁，冲洗外阴，每日数次。忌房事，戒烟酒，饮食宜清淡。

〔主治〕 淋病。

六、梅毒

梅毒是由苍白螺旋体所引起的一种慢性性传播疾病。主要通过性交传染，也可通过胎盘传染给下一代，少数可以通过性接触以外的途径受传染，如接触患者日常用品，或接吻、哺乳、输血等。梅毒几乎可侵犯全身各器官，并产生多种多样症状和体征。

方(一)

〔组成〕 莲房 瓦松 川椒 蒜瓣 陈皮 朴硝 槐枝 甘草 绿豆各等份。

〔用法〕 上药共煎煮取汁，先熏后潮洗患处，每日1次，每次30分钟。

〔主治〕 早期梅毒。

方(二)

〔组成〕 煅石膏100克 硃砂10克 大青盐2千克 包心白菜5千克。

〔用法〕 包心白菜去根洗净，切成3厘米厚的菜片，将青盐末分层撒在菜体上，加盖密封1周，压榨取汁，再将硃砂与石膏粉加入搅匀即得，冷藏保存。每日2~3次外洗。

〔主治〕 梅毒

参考文献

1. 吴师机. 理瀉辨文. 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 1984
2. 尚德俊. 熏洗疗法. 第1版. 济南: 山东人民出版社, 1964
3. 赵尚华等. 中医外科外治法. 第1版. 太原: 山西科学教育出版社, 1989
4. 雷载权主编. 中药学. 第1版. 上海: 上海科技出版社, 1995
5. 王广津等. 疮疡外用本草. 北京: 人民卫生出版社, 1982
6. 徐宜厚. 中医皮肤科诊疗学. 第1版. 武汉: 湖北科技出版社, 1989
7. 北京中医医院编. 赵炳南临床经验集. 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 1975
8. 边天羽等. 中西医结合皮肤病学. 第1版. 天津: 天津科技出版社, 1986
9. 顾伯康. 中医外科学. 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 1994
10. 赵尚华等. 中医外科方剂学. 第1版. 太原: 山西科技出版社, 1992
11. 曲祖贻. 中医简易外治法. 第2版. 北京: 人民卫生出版社, 1981
12. 刘道清. 中国民间疗法. 第1版. 郑州: 中原农民出版社, 1987
13. 范思行. 家庭熏洗治病小窍门. 第1版. 北京: 中国医药科技出版社, 1993
14. 王金权等. 女病外治良方妙法. 第1版. 北京: 中国中医药

- 出版社,1993
15. 戴德英等. 中医妇科临床手册. 第1版. 上海:上海科技出版社,1990
 16. 贾一江等. 当代中药外治临床大全. 第1版. 北京:中国中医药出版社,1991
 17. 李超. 中医外治法类编. 第1版. 武汉:湖北科技出版社,1977
 18. 李乃庚. 小儿外治疗法. 第1版. 天津:天津科技出版社,1989
 19. 上海中医学院曙光医院. 中医儿科临床手册. 上海:上海科技出版社,1980
 20. 王竑等. 男病外治良方妙法. 第1版. 北京:中国中医药出版社,1993
 21. 黄亦琦. 论熏洗疗法及其临床应用. 中医外治杂志. 1996;5(5):3