

江苏省中医中药学术研究会
委员会筹备委员会资料室 編

中醫秘方驗方彙編

第一集

江苏人民出版社出版

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

再版的話

本會出版的「中醫祕方驗方彙編第一集」，自發行以來，獲得全國各地讀者的歡迎，第一版二萬零一百冊，業已售罄，紛紛來信要求再版。由於我們在前次彙編時，缺乏經驗，加上時間倉促，書中錯訛之處甚多，根據各地讀者提出的寶貴意見，我們已與獻方者取得了聯繫，再版時均作了適當修正。

我國寶貴的醫學遺產，不僅見於醫學文獻上的記述，尚有許多流傳在民間的治病救人的祕方、驗方，都有它很大的實用價值。本會迄目前為止已將收到祕方、驗方四千余張，其中有的是從未公開者，我們將繼續整理出版。

本書主要供作醫務人員臨床上的研究參考，希望各地醫療機構，以積極慎重態度，進行試用。方中劇毒藥品，如砒石、斑蝥等藥，試用時務須謹慎。方中劑量切勿擅自加減，以防不測。非醫務人員使用上述藥品時應與中醫師研究后再行試用。在試用時如有顯著療效，請隨時告訴本會，以便進一步交流推廣。

江蘇省中醫中藥學術研究委員會籌備委員會資料室

一九五六年九月

定做各類PDF電子書，提供各個種類各個年代的電子圖書，全是掃描制作的PDF格式，清晰度高也方便閱讀和攜帶和轉換編輯。當您想看的書是幾十年前出版的市面上購買不到可以聯繫我，當您想看的書市面上價格過高的時候也可以聯繫我先試讀，QQ45472743 微信s38772614，您的移動書庫 低價 高效 專業。

目錄

內科門

咳嗽、哮喘類

枝氣管喘息方	一
喘息咳嗽方	一
氣喘方	一
哮喘方	一
保肺膏方	一
燥咳方	二
流行感冒方	二
咳嗽方	二
咳嗽方	二
痰咳方	三
咳嗽方	三
肺露方	三
痰飲方	三
定喘丸方	三
哮喘方	三
老嗽方	四
哮喘方	四
哮喘方	四

肺癆類

肺癆方	四
肺癆方	五
肺結核驗方	五
肺癆方	五
肺出血方	五
肺癆方	五
保肺丸方	五
咯血方	六
肺病血痰方	六
肺結核方	六
治肺病方	六
治肺病方	六
百部膏方	六
結核病方	七
肺癆方	七
肺癆方	七
肺癆方	七
肺癆方	七
治肺癆方	七
風痺類	七
慢性關節炎方	七

關節痛風散方

八

關節炎方

八

頭痛方

八

頭痛方

八

治瘰方

八

筋骨痛方

九

頭痛方

九

頭痛方

九

頭痛作响方

九

頭痛方

九

頭痛腦痛

九

治中風方

九

鶴膝風方

一〇

鶴膝風方

一〇

代參膏方

一〇

歪嘴方

一〇

口眼歪斜方

一〇

瘰癧方

一〇

中風驗方

一一

偏正頭痛藥

一一

瘰癧類

瘰癧方

一一

間日瘰癧方

一二

瘰癧外用方

一二

瘰癧方

一二

瘰癧方

一二

瘰癧方

一二

瘰癧方

一二

瘰癧外治方

一二

治大瘰癧方

一三

止瘰癧散方

一三

瘰癧方

一三

瘰癧方

一三

瘰癧方

一三

久瘰癧全消丸方

一三

氣滯類

消化道潰瘍方

一四

胃痛方

一五

肝胃氣痛

一五

經驗胃痛方

一五

胃痛吐酸方

一五

胃痛方

一五

胃痛祖傳祕方

一五

胃氣痛方

一六

胃痛方

一六

腹痛外敷方

一六

心口疼方

一六

呃逆方

一六

痛病方	一七
走馬丸方	一七
急性胃腸炎	一七
胃腸炎方	一七
消化驗方	一七
五兒丸方	一八
慢性腸炎方	一八
消化性潰瘍方	一八
梅核氣病方	一八
梅核氣方	一八
胃氣痛方	一九
胃神經痛方	一九
胃寒氣痛方	一九
黃疸方	二〇
肝癰方	二〇
疝氣方	二〇
胆脹不眠方	二〇
黃病丸方	二〇
肝膿腫方	二〇
胆黃方	二一
復方海螵蛸方	二一
噎膈方	二一
膈氣方	二一
胃氣痛驗方	二一

肝臟硬變腹水	二二
止嘔吐方	二二
積聚類	
水腫方	二二
單腹脹方	二二
腹水方	二二
水臌脹單方	二二
腹水方	二三
水腫方	二三
外治方	二三
水臌脹方	二三
臌脹丸方	二三
水腫病驗方	二四
水腫病驗方	二四
寬中丸方	二四
大溫中丸方	二四
紅顏丸方	二五
水不溢丸方	二五
單腹脹方	二五
血臌脹方	二五
水腫病驗方	二五
單腹脹方	二六
臌脹方	二六
治氣臌脹方	二六

治臌脹方	二六
水腫方	二七
水腫方	二七
治脹病方	二七
河白脹方	二七
河白脹方	二七
水臌方	二七
臌脹方	二八
血蠱方	二八
臌脹效方	二八
腫脹驗方	二八
腎臟炎水腫方	二八
鵝尿體方	二八
腫脹方	二九
臌脹病驗方	二九
治疫瘧方	二九
疫瘧絳礬丸方	二九
伐木丸方	三〇
疫瘧煮黃丸方	三〇
時疫類	
經驗霍亂方	三〇
類似麻風初期方	三〇
大麻風祕方	三一
大头瘟方	三一

霍亂方	三一
真塘西沙藥方	三一
治麻風方	三一
楊亭諸氏風丸方	三一
腦膜炎方	三一
愈風膏方	三一
腦膜炎外用方	三一
腦膜炎內服方	三一
腦脊髓膜炎外用方	三一
腦脊髓膜炎內服方	三一
腦膜炎祕方	三一
霍亂祕方	三一
大麻風祕方	三一
蝦蟇脹祕方	三一
痢疾類	
痢疾效方	三四
紅白痢疾方	三四
痢疾方	三四
紅白痢疾方	三四
慢性痢疾方	三四
多年痢疾方	三四
初痢方	三五
痢疾方	三五
白头翁飲方	三五

黃連方	三五
痢疾方	三五
瀉痢方	三六
紅白痢方	三六
紅白痢方	三六
痢疾丹方	三六
治痢方	三六
痢疾方	三六
痢疾方	三七
痢血方	三七
水瀉方	三七
水瀉方	三七
濟生烏梅方	三七
慢性腸出血方	三七
便血方	三八
便血方	三八
便血方	三八
失血類	
鼻衄方	三八
鼻衄方	三八
止血散方	三八
止吐血鼻血方	三九
吐血方	三九
嘔血方	三九
百草霜丸方	三九

治鼻衄方	三九
鼻衄方	三九
鼻衄急救法	四〇
吐血驗方	四〇
吐血病驗方	四〇
腸血單方	四〇
便血方	四〇
尿血方	四〇
尿血方	四〇
尿血方	四一
尿血方	四一
胃出血方	四一
胃出血方	四一
胃出血方	四一
虫病類	
殺鉤虫蛔虫方	四一
傷力黃方	四二
雷丸方	四二
燒虫方	四二
驅蠅虫方	四二
燒虫方	四二
姜片虫方	四三
血吸虫病方	四三
黃病方	四三

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我，我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

黃疸方	四三
鐵商丸方	四三
去黃驗方	四四
黃病方	四四
萎黃病方	四四
黃病方	四四
癰癤類	四四
癰癤方	四五
羊癰瘋方	四五
羊癰瘋方	四五
瘋癲方	四五
癲病方	四五
陽狂疾病方	四六
癡癲方	四六
痢厥方	四六
羊癰瘋方	四六
肝陽類	四六
肝陽方	四六
高血壓方	四七
齋菜湯方	四七
肝陽方	四七
高血壓方	四七
高血壓方	四七

防眩湯方	四七
破傷風、狂犬病類	四八
破傷風方	四八
破傷風方	四八
破傷風驗方	四八
破傷風方	四八
破傷風驗方	四九
破傷風方	四九
已戍丹	四九
狂犬病方	五〇
五金丹方	五〇
瘋狗咬方	五〇
狂犬咬方	五〇
狂犬病方	五一
瘋犬咬方	五一
泌尿病類	五一
淋病方	五一
尿閉外治方	五一
金錢草方	五一
通小便方	五一
小便癰閉方	五一
雜病類	五一
夜不寐方	五一
風疹塊方	五一

定做各類PDF電子書，提供各個種類各個年代的電子圖書，全是掃描制作的PDF格式，清晰度高也方便閱讀和轉換編輯。當您想看的書是幾十年前出版的市面上購買不到可以联系我，當您想看的書市面上價格過高的時候也可以联系我我先試讀，QQ45472743微信s38772614，您的移動書庫 低价 高效 专业。

外科門

瘡瘍類

治結核性腦膜炎方.....	五二
神經衰弱方.....	五三
失眠方.....	五三
遺精方.....	五三
陽痿方.....	五三
遺尿方.....	五三
遺精方.....	五三
遺精方.....	五三
滑精方.....	五四
消渴症方.....	五四
十棗湯.....	五四
盲腸炎方.....	五四
紅腫方.....	五四
盲腸炎方.....	五四
脚氣驗方.....	五四
熱癰方.....	五五
斷背丸方.....	五五
流痰方.....	五五
桂麝散方.....	五五
青龍散方.....	五五
祖傳伸筋丸方.....	五六

中國安福消炎膏.....	五六
壁虎散方.....	五六
陽和膏.....	五六
九龍下海散方.....	五六
青龍丸方.....	五六
平腎散方.....	五七
提毒方.....	五七
預防癰瘡方.....	五七
如意膏方.....	五七
海浮散方.....	五八
癰疽經驗方.....	五八
流注瘰癧方.....	五八
生化丹.....	五八
背部癰疽方.....	五八
冰珠散方.....	五九
搭背方.....	五九
發背方.....	五九
發背方.....	五九
發背方.....	五九
对口瘡方.....	五九
对口疽方.....	五九
善攻頭方.....	六〇
千槌膏方.....	六〇
治蟻頭方.....	六〇
治蟻頭方.....	六〇

定做各類PDF電子書，提供各個種類各個年代的電子圖書，全是掃描制作的PDF格式，清晰度高也方便閱讀和轉換編輯。當您想看的書是幾十年前出版的市面上購買不到可以聯系我，當您想看的書市面上價格過高的時候也可以聯系我先試讀，QQ45472743微信s38772614，您的移動書庫 低价 高效 专业。

乳疽方	六二
奶癰消散方	六一
乳癰外治方	六一
乳癰方	六一
魚口毒方	六一
臙瘡方	六一
石珍散方	六二
对口疽發背方	六二
脫壳癰癰方	六二
發背膏方	六二
發背方	六二
灵应必消散方	六二
臙瘡方	六二
妙灵丹方	六三
九一丹方	六三
金僧散方	六三
推車散方	六三
生肌長肉方	六三
棉瘡下疳方	六三
消癰瘡方	六四
对口疽方	六四
四味散方	六四
对口瘡方	六四
止血棉花方	六四

老爛脚方	六四
盲腸炎方	六四
癰疽方	六五
疔瘡類	
疔瘡方	六五
消腫提毒方	六五
疔藥方	六六
瘡疔方	六六
立馬取疔丹方	六六
拔疔膏方	六六
消疔散方	六七
敷疔方	六七
疔瘡初起奇效方	六七
唇疔特效方	六七
疔毒方	六七
皮膚病類	
下腿潰瘍(臙瘡)藥膏	六七
剃鬚頭方	六八
剃鬚頭方	六八
禿瘡效方	六八
牛皮癬方	六八
黑藥膏方	六九
繡球風方	六九
五倍散	六九

黃連膏方	六九
三炷丹方	六九
剃刀瘋方	六九
癩子方	六九
黃水瘡方	七〇
黃水瘡方	七〇
七星丸方	七〇
腳丫濕痒方	七〇
水龍骨散方	七〇
白癩風方	七一
白癩風方	七一
赤遊丹	七一
青保丹方	七一
外用殺八脚蟲方	七一
鵝掌瘋方	七一
鵝掌瘋方	七一
鵝掌瘋外用方	七二
油灰指甲方	七二
風熱瘰癧洗方	七二
風熱瘰癧洗方	七二
白癩風方	七二
黃水瘡方	七二
石黃散方	七三
肥瘡散方	七三

流火方	七三
纏腰火丹方	七三
黃水瘡方	七三
鬍鬚頭方	七三
鵝掌瘋方	七三
小兒赤游丹方	七四
胎毒方	七四
紫草膏方	七四
面上粉刺方	七四
漆瘡方	七四
腫腿瘡驗方	七四
腫瘡方	七五
腫瘡方	七五
腫腿瘡方	七五
腫瘡方	七五
爛腳方	七六
老爛腳方	七六
下腿潰瘍外用方	七六
下腿潰瘍外用方	七六
凍瘡方	七六
凍瘡方	七六
凍傷破潰方	七六
凍瘡方	七七
蟾酥散方	七七

定做各類PDF電子書，提供各個種類各個年代的電子圖書，全是掃描制作的PDF格式，清晰度高也方便閱讀和攜帶和轉換編輯。當您想看的書是幾十年前出版的市面上購買不到可以聯系我，當您想看的書市面上價格過高的時候也可以聯系我先試讀，QQ45472743 微信s38772614，您的移動書庫 低价 高效 专业。

王露散方.....七七

瘰癧、癌腫類

瘰癧方.....七七

瘰癧方.....七七

瘰癧方.....七七

瘰癧消散方.....七七

乳癰方.....七八

乳癰方.....七八

化癰丹方.....七八

豎肉方.....七八

蜀羊地榆散方.....七八

男子乳房結核方.....七九

癰腫方.....七九

癰症方.....七九

消癰丸方.....七九

頸淋巴腺結核方.....七九

乳癰方.....八〇

瘰癧方.....八〇

治癰方.....八〇

乳癰方.....八〇

醉龍丸方.....八〇

瘰癧丸方.....八一

瘰癧內服方.....八一

獨立丸方.....八一

瘰癧未破外用方.....八一

瘰癧方.....八一

瘰癧潰破外用方.....八一

瘰癧漏管外治方.....八一

瘰癧膏方.....八一

瘰癧瘡驗方.....八一

瘰癧方.....八一

治癰方.....八一

乳癰方.....八一

瘰癧瘡驗方.....八一

治癰方.....八一

痔瘡類

痔瘡洗方.....八三

痔瘡方.....八三

脫肛方.....八四

痔瘡方.....八四

痔瘡方.....八四

小兒脫肛方.....八四

大功散方.....八四

枯痔散方.....八五

文蛤散方.....八五

脫肛方.....八五

外痔方.....八五

痔瘡方.....八五

漏管方.....八五

痔漏方.....八六

偷糞鼠方.....八六

白虎八宝丹方.....八六

退管方.....八六

痔出血方.....八六

治痔方.....八六

痔瘡方.....八七

痔瘡藥縫方.....八七

湯火傷類

湯火傷方.....八七

火燙外用方.....八七

水火燙藥膏方.....八七

水火燙效方.....八七

火燙方.....八八

水火燙傷方.....八八

燙火傷方.....八八

火燙藥方.....八八

火燙藥方.....八八

葵花油方.....八九

蛇咬傷方.....八九

蛇虫咬傷類

呂氏蛇咬方.....八九

蛇咬方.....八九

蛇咬方.....八九

蛇咬方.....八九

蛇咬方.....八九

蛇咬方.....八九

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

蛇咬方.....九〇

跌打損傷類

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

跌打損傷方.....九〇

刀伤止血方

九三

五官病門

眼病类

雀眼方

九四

夜盲症方

九四

蟹珠眼方

九四

雀盲眼方

九四

七針丹方

九四

目生白星方

九五

目中贅肉外治方

九五

風火紅眼方

九五

眼科神效方

九五

青光眼方

九五

耳病类

黃龍散方

九六

黃瓜霜方

九六

礞砂散方

九六

耳聾方

九六

耳癢方

九六

耳炎方

九六

白降丹方

九七

耳应丹方

九七

鼻病类

鼻淵方

九七

鼻淵方

九七

鼻淵祕方

九七

腦漏方

九七

腦漏外用方

九八

治鼻瘰肉方

九八

鼻瘰肉方

九八

鼻淵方

九八

鼻竇炎方

九八

化鼻濾方

九八

鼻淵方

九九

嗜鼻散方

九九

咽喉病类

抑木丹方

九九

獨勝散

九九

乳蛾內服方

〇〇

咽喉腫痛方

〇〇

骨梗咽喉方

〇〇

魚骨梗喉方

〇〇

魚骨梗方

〇〇

纏喉急症方

〇〇

喉風方

〇〇

爛嘴唇方

〇一

口腔炎方	一〇一
喉科方	一〇一
治喉蛾方	一〇一
喉風丹	一〇一
喉科祕藥方	一〇一
吹喉回生丹	一〇二
軟化魚卡方	一〇二
喉症祕方	一〇二
喉症方	一〇三
錫類散方	一〇三
喉疳方	一〇三
喉風方	一〇三
喉科閉塞方	一〇三
陰虧喉痹方	一〇四
喉科吹藥方	一〇四
啞喉風方	一〇四
複方珠黃散方	一〇四
黃吹藥方	一〇四
吹喉方	一〇四
齒病類	
牙齒痛藥水方	一〇五
牙痛方	一〇五
風火牙痛方	一〇五
治牙痛驗方	一〇五

牙痛方	一〇六
牙痛出血方	一〇六
離骨丹方	一〇六
牙痛方	一〇六
治牙癢方	一〇六
走馬疳方	一〇七
珍珠散方	一〇七
擦牙散方	一〇七
牙痛方	一〇七
齩齒方	一〇七
走馬牙疳方	一〇七
牙痛方	一〇八
牙疳方	一〇八
骨槽風方	一〇八
骨槽風方	一〇八
婦科門	
調經類	
婦女痛經方	一〇九
痛經方	一〇九
月經困難方	一一〇
室女經閉方	一一〇
月經過多方	一一〇
痛經方	一一〇

定做各類PDF電子書，提供各個種類各個年代的電子圖書，全是掃描制作的PDF格式，清晰度高也方便閱讀和轉換編輯。當您想看的書是幾十年前出版的市面上購買不到可以联系我，當您想看的書市面上價格過高的時候也可以联系我先試讀，QQ45472743微信s38772614，您的移動書庫 低价 高效 专业。

痛經方	一一一
調經方	一一一
婦科驗方	一一一
妊娠期疾病類	
妊娠惡阻方	一一一
胎動不安方	一一一
安胎散方	一一二
牛鼻保胎丸方	一一二
臨產不痛方	一一二
惡阻方	一一二
催生方	一一二
產后疾病類	
產后驗方	一一二
兒枕痛方	一一三
胞衣不下方	一一三
產后咳嗽方	一一三
產后中風方	一一三
產后破傷風方	一一三
產后暈厥方	一一四
產后中風方	一一四
開牙關方	一一四
產后中風方	一一四
崩帶類	
血崩方	一一四

血崩方	一一四
血崩方	一一五
白帶方	一一五
白帶丸	一一五
白帶單方	一一五
老年崩漏方	一一五
治腸癰兼治血崩血瘤方	一一五
婦女雜病類	
痞塊方	一一六
子宮頸下垂方	一一六
驗胎方	一一六
乳房皸裂方	一一六
吹乳方	一一六
貫仲散方	一一七
治陰癢方	一一七
治乳頭干裂方	一一七
兒科門	
驚風類	
慢驚方	一一八
小兒驚風方	一一八
小兒驚風方	一一八
小兒慢驚方	一一八
麻疹類	

定做各類PDF電子書，提供各個種類各個年代的電子圖書，全是掃描制作的PDF格式，清晰度高也方便閱讀和轉換編輯。當您想看的書是幾十年前出版的市面上購買不到可以联系我，當您想看的書市面上價格過高的時候也可以联系我我先試讀，QQ45472743微信s38772614，您的移動書庫 低价 高效 专业。

麻疹方.....一八

麻疹薰浴方.....一九

痧子难透方.....一九

麻疹方.....一九

百日咳类

百日咳方.....一九

芫花膏方.....一九

百日咳方.....二〇

百日咳方.....二〇

百日咳方.....二〇

百日咳方.....二〇

二冬膏方.....二〇

大蒜浸出液方.....二一

百日咳方.....二一

小兒咳嗽方.....二一

驚驚液膠囊方.....二一

百日咳方.....二二

疳積类

小兒疳積方.....二二

小兒疳積方.....二二

疳症方.....二二

疳熱方.....二二

百效粉祕方.....二三

鷄肝散方.....二三

初生兒腹脹方.....二三

水腫草方.....二四

水腫方.....二四

小兒黃瘦方.....二四

小兒食積泄瀉方.....二四

小兒雜病类

小兒夜啼遺尿方.....二五

治遺溺法.....二五

大渴大飲多尿方.....二五

金蟾散方.....二五

小兒口腔病方.....二五

金翼丹方.....二五

走馬牙疳方.....二六

雪口方.....二六

小兒气管炎方.....二六

小兒水瀉外用方.....二六

姜雄丹方.....二七

小便不利方.....二七

喉風方.....二七

种痘化膿方.....二七

小兒口內炎方.....二七

小兒吐奶方.....二七

新生兒口頰腫硬方.....二八

小兒鵝口瘡方	一二八
結胸外敷方	一二八
螳螂子方	一二八
小兒口炎方	一二八
二蛟散方	一二八

針灸門

內科病類

胸悶脘痛方	一二九
偏頭痛方	一二九
耳鳴或耳聾方	一二九
頭昏目花方	一二九
滿腹脹痛方	一二九
胃氣痛方	一二九
氣急咳嗽方	一二九
神經錯亂方	一二九
癱瘓方	一二九
傷寒方	一二九
遺精病方	一二九
敵眼病方	一二九
遺尿病方	一二九
反胃吐食方	一二九
牙痛方	一二九

外科類

兩目紅腫作痛方	一三〇
喉腫爛方	一三〇
疔方	一三一

風濕病類

半身不遂方	一三一
初中風針灸方	一三一
頭痛方	一三一
口眼歪斜方	一三一
脅肋刺痛方	一三一
背部痠痛方	一三一
痿痹方	一三一
坐骨痠痛方	一三一
兩手痠痛方	一三一
膝痠痛方	一三一
手彎痠痛方	一三一
神經衰弱方	一三一
歷節痛風方	一三一
四肢麻木方	一三一
腰痛方	一三一
手足痠攣方	一三一
痛經方	一三一
產后破傷風方	一三一
胞衣不下方	一三一

婦科病類

內科門

咳嗽、哮喘类

枝气管喘息方

康日寧

主治 枝气管喘息

处方 皂角(燒焦)，不拘多少。

制法 研極細末

用法 每服三——五分，立時有效。

〔註〕 本方原註云：「不易根除」。

喘息咳嗽方

刘棣

主治 癰癪性咳嗽喘息、慢性枝气管炎。

处方 蔓陀罗花

制法 干叶可制喘息烟草

用法 作烟卷吸入

〔註〕 本品多吸能中毒，用时須注意，勿多吸，見

效即止。

气喘方

魏直哉

主治 气喘

处方 百合(不拘多少)

制法 水煎

用法 每年于冬季連吃百合四十余日，可以保持一

年不發，連服二、三个冬季可治愈。

哮喘方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 哮喘

处方 小冬瓜(未脫花蒂的童子冬瓜) 冰糖

制法 將小冬瓜剖開，不去皮子，填入冰糖，用竹

簾放鍋中，將冬瓜放在竹簾上隔水蒸，取

水。

用法 飲冬瓜水，多至三、四个即愈。

保肺膏方

主治 不論老幼新旧哮喘，每年秋末开始，連貼三

冬，可以除根。

处方 虎茸二兩 上肉桂四錢 防風三兩

生綿黃芪三兩 党參三兩 炮姜六錢

酒炒黃芪六兩 苏叶四錢 母丁香六錢

明附片二兩 白朮三兩

制法

肉桂、丁香，研末。余藥用清水四升浸一宿，次日入鍋中煎，至水干之后，再將藥傾入茶油四斤同煎。該藥枯，用絹篩去淨渣，再煎至滴水成珠后入黃丹一斤四兩，然后將肉桂、丁香末加入和勻。收膏攤布上，須五六錢重。

用法

貼背部第三節兩旁約距一寸左右肺俞穴

燥咳方

駱筱峯

主治

燥咳少痰，咽喉干者

处方

大甜梨一只 川貝母末一錢 冰糖末三錢

制法

梨去核，將貝母末納入，封口，紙裹，煨熟。

用法

內服

流行感冒方

周維僧

主治

暑令感冒傷暑，身熱頭昏，口渴心煩，甚則氣喘者。

处方

藿香三錢 香茹二錢 知母三錢 青蒿三錢

制法

天花粉三錢 山梔二錢 滑石三錢 竹叶三錢
水煎服

咳嗽方

李耕云

主治

久嗽

处方

蜂蜜四兩 核桃仁四兩 鮮姜四兩 冰糖四兩
香油四兩

制法

將核桃仁、姜切為細塊，與蜜、糖、油同入砂鍋內煎熬一小時許（文火），待見赭石色時即可，冷卻后放于磁器內。

用法

每日以開水沖服三次。每次核桃大一勺（據說以高粱米之米湯服之更見效）。

〔註〕

核桃仁即胡桃肉。用法：剝去核壳取仁。香油即胡麻油之原名。

咳嗽方

凌几味

主治

咳嗽，吐痰不爽，脅肋疼痛。

处方

生山梔三錢 白芥子三錢 赤芍三錢 歸鬚三錢

制法

煎湯飲服

用法

日服一劑，每劑分為二次飲服。

〔註〕

本方似有退熱、消炎、祛痰、通絡之功，或

可施用于肋膜炎病例。

痰咳方

馬書

主治 咳嗽、吐痰、上气、喘隔。

处方 桑皮三錢 杏仁三錢

制法 煎剂

用法 內服

咳嗽方

柴寿昌

主治 咳嗽

处方 野萵苣(連根帶叶)一、二枝

用法 煎湯服，日服二次。

〔註〕 野萵苣之枝、花、叶均类萵苣，惟頗瘦長，

老时三、四尺高，入冬枯死。

肺露方

常熟縣第三屆中医進修班

主治 咳嗽

处方 白芨五錢 杏仁霜五錢 款冬花五錢 百部三錢

川貝二錢 苡仁六錢 橘紅一錢五分

小豬肺(漂淨一天)一具

制法 放花露甑蒸出露來

用法 服量隨意

痰飲方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 痰飲

处方 于朮四兩(分四份)：一份用甘遂二錢水煎炒，

一份用大戟二錢水煎炒，一份用白芥子二錢

水煎炒，一份用沉香二錢水煎炒。

制法 共研末，面糊为丸。

用法 开水下，每服一錢至一錢半。

定哮喘丸

馬培之傳 馬澤人獻

主治 喘息

处方 白朮二錢五分 白礬五錢 白硫三分

制法 共为末，紅棗肉为丸，如棗豆大。

用法 食后冷茶送下，六、七丸，小兒減半。

〔註〕 本方治寒喘有效，但方內有劇毒藥，用时慎

之。

哮喘方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 哮喘

处方 五谷虫(即蠹蛆。須用清水漂淨)

制法 炙黃，研末，用黑棗搗和为丸。

用法 早、中、夜服之，約二条虫一次。廿日至一月可痊愈。

老嗽方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 多年咳嗽不已

处方 鷺鷥蛋

制法 煮熟

用法 內服二、三枚

哮喘方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 哮喘

处方 青皮(去穢)一枚 巴豆(去壳)一粒

制法 燉紅研

用法 內服

哮喘方

王勵吾

主治 哮喘

处方 川烏六錢

木鱉子八錢

赤芍八錢

桑枝五錢

柳枝五錢

連翹八錢

白朮六錢

草烏六錢

桑枝五錢

槐枝五錢

當歸八錢

官桂八錢

白薇八錢

烏藥六錢

桃枝五錢

白芷八錢

茯苓六錢

牙皂五錢

桃枝五錢

制法

麻油三斤，浸藥一宿，熬焦去渣，入飛黃丹一斤，如麥色急以桃柳棍二根攪至滴水成珠，入乳香、沒藥細末，各四錢，收膏攤成膏藥。

用法

將膏藥貼肺俞穴，背脊第三節，二旁各离一寸五分，貼三伏九九，同时配合內服藥有效。

肺癆类

肺癆方

張劬

主治 肺癆

处方

大海龍一條

當門子一分

北沙參三錢

乳香三錢

延胡索三錢

沉香三錢五分

白芥子二錢

大海馬一對

蛤蚧尾一對

大茴香二錢

戈制半夏一錢

桑仁三錢

白豆蔻三錢

當歸三錢

大海姐二錢

冬虫夏草三錢

小茴香三錢

款冬花三錢

參三七三錢

川貝母三錢

白朮三錢

制法

上藥共研細末。用老雌雞一只，去毛漂淨。

將藥物加老酒八兩和勻，灌入雞內，蒸透為度。

用法 初喝其膏汁，最后食雞肉。

〔註〕 當門子即麝香。本方香燥藥較多，用于肺癆病，請醫師指導為妥。

肺癆方

王秉元 暉 榛

主治 肺結核病

处方 桑白皮 生白芍 川貝母 麥冬 大生地

生白朮 生甘草 光杏仁 陳阿膠 天冬

白芷 肥知母 淮紅花 大熟地各一錢

制法 上藥用雞蛋三個同煎，煮熟后剝去蛋壳，刺眼數十個，再入藥煮好。

用法 先吃蛋，后吃藥，每日一劑。

肺結核驗方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 肺結核、肺空洞

处方 白芨 百部 生牡蠣 山甲片（炮） 紫菜

（合作社買）各四兩 痰多加川貝四兩

制法 共研細末，水泛為丸。

用法 每日三次，每次一錢。服藥期間，不可間斷。一料為一個療程。

肺癆方

駱筱峯

主治 肺結核

处方 人乳汁每次一茶杯 鮮首烏每次四、五兩

用法 人乳汁每日服二、三次。鮮首烏煎湯代茶或

蒸食。

肺出血方

盛仲岩

主治 咳嗽吐血、肺結核有空洞形成者

处方 鮮百合一個 白芨三錢

制法 白芨研末煎湯。將百合搗爛，將白芨湯沖。

用法 連服十天，停五天再服。如無鮮百合，可用

干百合一兩煎湯，以白芨三錢研末，用百合湯沖服。

肺癆方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 肺結核

处方 水蛭（三、四寸大）

制法 劈開取肉，漂淨，用陳菜油浸之。

用法 生吃。每日吃五只，療程為一個月。

保肺丸方

張澤生

主治 肺結核咳嗽

处方 白芨 百部 百合 榧子肉等分

制法 諸藥共研細末，加罌粟壳十分之二，或以可待因片代之，为丸，如蘇豆大。

用法 每服七粒或十四粒

咯血方

周慕庭

主治 久咳蒸燒，咯血，手足心燒，口干渴飲，并

治鼻衄、牙齦出血。

处方 白茅根一兩 仙鶴草三錢

制法 煎汁服

用法 血止后單用白茅根，每日一兩，連服十天。

肺病血痰方

周憲璋

主治 肺結核、痰中帶血

处方 白芨二錢 肥猪肉(即脂肪)三兩

制法 煨汁

用法 服湯

肺結核方

曹鳴高

主治 肺結核

处方 萼菜(即蕺菜，產江浙苏杭一帶)

制法 煮羹

用法 內服

治肺病方

徐秉如

主治 肺病

处方 白桃花(干的)四錢

制法 水六百西西煮开后十分鐘，过濾后分早午晚

三次服。如無桃花，用桃樹枝三兩亦可，有同样效用(便溏者慎重用之)。

治肺病方

徐秉如

主治 肺病

处方 胎盤(男的一个)

制法 把上面一層皮去掉，將胎盤切碎。用水二千

西西，微火煮之。

用法 早晚各服一次

百部膏方

王慎軒

主治 肺結核咳嗽、慢性气管炎及咳嗽多年不止者

处方 百部三斤

制法 洗淨切碎，水煎二次。去滓熬干，入飴糖十

斤，熬至不激紙为度。

用法 早晨及夜間臨臥時各用沸水冲服五錢

結核病方

曹鳴高

主治 結核病

处方 活烏龜

制法 用黃泥塗固，罈糠火中炙灰，去泥研細末。

用法 末服或丸服。每日三次，每次五分，治程約

三月。

肺癰方

沙星垣

主治 肺癰發熱不退

处方 黃芩一兩

制法 水煎

用法 內服

肺癰方

漣水縣衛生科

主治 肺癰（肺膿腫）

处方 三棱白果 麻油

用法 將三棱白果放在麻油中，浸至二年，每患者

服七、八枚即愈。浸至三、四年，只服三、

四枚即愈。

肺癰方

駱筱峯

主治 肺癰

处方 陈芥菜油

用法 日服數小匙，白湯下。

肺癰方

駱筱峯

主治 肺癰

处方 黃豆（水浸磨汁）

用法 冷飲，每服一碗。

〔註〕 此方宜有熱象者。

治肺癰方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 肺癰

处方 魚腥草（干者用五錢，鮮者用一兩五錢）

制法 煎水与鷄子清燉

用法 內服

風痺类

慢性關節炎方

魏直哉

主治 慢性關節炎

处方 肉桂三錢 山奈三錢 六軸子三錢 細辛六分

用法 煎服
白芨三錢 白芷二錢 甘松三錢 杏仁三錢

〔註〕 此方应用时需慎重，酌量病情。

關節痛風散方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 週身關節疼痛，皮膚發冷不熱，熱者無效，

對鶴膝風有特效。

处方 無烟煤（白煤）不拘量

制法 浸尿中三日後取出洗淨，晒干研末。

用法 每日二次，每次一湯匙。飯後以赤砂糖、好

陳酒送服。不嗜酒有頭暈感覺。

關節炎方

鄭子良

主治 風濕性關節炎，四肢拘急不能伸屈，關節疼

痛。

处方 蒼耳子二兩（或一兩五錢）

制法 水煎

用法 內服取汁

頭痛方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 偏頭痛不論左右

处方 桑叶三錢 決明子一錢五分 川芎八分

杞子三錢 石決明八錢 白蒺藜三錢

杭菊三錢 白芍一錢五分 龍胆草三分

制法 煎劑內服

用法 輔助劑：另用棉球蘸藥汁，再蘸元寸香（麝

香）少許塞鼻孔，全頭痛塞兩鼻孔。

頭痛方

李日東

主治 頭痛，或頭額角骨枕處偏于一邊疼痛，頭皮

內層，觸之亦痛，無腫瘤，時發時止或受涼

後發作。

处方 萆撥五錢至一兩

制法 研成細末，瓶裝塞緊。

用法 每日五、六次，每次取少許嗅鼻，左痛嗅右

鼻孔，右痛嗅左鼻孔，不痛後減少次數。一

月後停止。

〔註〕 原註稱：「用此方嗅鼻，獲效後並不復發」

云。

治癭方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 癭症（濕熱體質）

处方 陳京墨三錢

制法 开水磨汁

用法 內服，服后吐痰。

筋骨痛方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 寒湿筋骨痛

处方 川草烏 華撥

制法 研末，調水作餅

用法 溫貼痛處，加艾絨置袜底中能健步。

頭痛方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 風熱頭痛

处方 大黃 朴硝等分

制法 為末。用井底泥捏成餅。

用法 貼兩太陽穴

頭痛方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 偏正頭痛屬熱

处方 黃芩(研)一錢 生軍(研)三分

制法 和白酒釀一碗

用法 燉熱服之

頭痛作响方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 頭痛作响

处方 茶子

制法 研細末

用法 吹鼻中

頭痛方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 頭痛

处方 蛇退 葱头七个 豆豉四錢

制法 蛇退炙焦研細，葱、豉煎湯。

用法 蛇退每服一錢，以葱豉湯服三、四次。

〔註〕 原註称：「不論頭痛远近，皆可服之。」

頭痛腦痛

馬培之傳 馬澤人獻

主治 頭痛腦痛

处方 川芎一兩 細辛五分 蔓荊子二錢 沙參一兩

制法 水兩碗，加入藥內，煎成八分。

用法 內服，加黃酒半碗調勻，早晨服之。

治中風方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 半身不遂

处方 生黃芪四兩 桃仁一錢 紅花一錢

赤芍一錢二分 當歸一錢五分 地龍一錢

川芎一錢二分

制法 煎剂
用法 内服

鹤膝風方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 鹤膝風

处方 东壁土 葱

制法 搗爛，加高粱酒作餅。

用法 將餅貼于患处，冷則易之，屬用數次即癒。

此方治筋骨痛，亦有良效。

鶴膝風方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 鹤膝風

处方 过山龍根(土葛草根)

用法 鮮者搗敷之

代參膏方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 防治中風

处方 黃芪二斤 枸杞十二兩 天麻十二兩

枇杷叶六兩 防風三兩 玉竹二斤

天冬八兩 桂圓肉八兩

制法 照膏方一般制法

〔註〕原註稱：「此方出自內府（內府指清室），

常服永無中風之患。」

歪嘴方

仪征縣衛生科

主治 歪嘴（顏面神經麻痺）

处方 巴豆（去壳）三、五粒

制法 搗爛去油备用

用法 嘴向左斜，將搗爛之巴豆放于左手心內，右

斜則置于右手心內。以一只碗，裝入開水，

碗底复于手心內之巴豆上。用鏡子照臉，見

口正后即移去鏡子与巴豆。

口眼歪斜方

王勵吾

主治 口眼歪斜（俗称邪風吹歪口）

处方 白芷一錢 硃砂（飛）一錢 羊麻仁（去油）二兩

黃鱗血不拘多少

制法 上藥研末，和鱗血如膏，攤于布上。

用法 貼于面部，歪左貼右，歪右貼左，數日可复

正常。

痺病方

曹鳴高

主治 關節疼痛發冷

处方 葱头一斤 生姜一斤

制法

同打爛絞汁。用上等醋煮滾，后將葱姜汁和入，攪和成膏樣，攤在厚布上。

用法

貼于關節痠痛之處，有熱感，祛寒濕，通利血脈。

中風驗方

宋振祖

主治

中風、口喎歪斜、半身不遂

处方

当归三錢 制白附子三錢 炙僵蚕三錢

全蠍三錢

制法

將上藥四味研成細末

用法

每日三次，每次一錢，服時用陳酒送下。

〔註〕

此方中全蠍是劇毒藥，內服不宜過多，用時慎之。

偏正頭痛藥

叶玉峯

主治

顏面神經痛，三叉神經痛，痛在左边或右边，以及前額、眉稜骨痛等。凡頭痛之屬於神經性者，皆有效，往往一、二服即止痛。

用法

止后不必再服，多服。

处方

香白芷二兩五錢 川芎一兩 生甘草一兩

制法

川烏頭一兩（炒成焦黃色）

用法

四味各研細末，過篩，去粗渣，取細粉，按

用法

每服一錢，溫開水送服，一日服一、二回，頭痛時服。

〔註〕

據介紹者稱：「本方原出于談堃翁試效方，余曾如法泡制，各以贈送試用。對半邊頭痛，大多一、二服即止痛，效果很好，因鼻

付寶炎蓄膿症（普通叫做腦漏）而引起之前

額眉稜痛，服后虽亦能見效，但旋即復發，

此須治其鼻病也。」

瘡疾方

曹進

主治

間日瘡

用法

常山一、二錢 葛根一錢 甘草八分

制法

發作前半至一小時煎服

〔註〕

本人原註稱：「功效好」，「小兒用之尤宜」，

但常山容易有嘔吐的付作用，最好加二片生

姜同煎。

瘡疾類

間日瘧疾方

錢恆之

主治 間日瘧疾

處方 雄黃 雌黃 硫黃等分

制法 共研細末

用法 將藥放在膏藥內，在未發作前二小時，貼在

背部第三背椎。

〔註〕 本方系苏州顧允若先生傳出，据云：「有百

分之九十有效」。

瘧疾外用方

葛兆良

主治 瘧疾

處方 威灵仙（研細末）五錢 鮮生姜兩大片 葱白頭兩枚

制法 共同打爛

用法 在瘧疾未發之前一小時敷脈搏外，用布包

好。

瘧疾方

田秀峯

主治 間日瘧、三日瘧、溫瘧

處方 甜茶三錢 甘草七分 僵蚕三錢 烏梅二枚

制法 煎湯

用法 煎湯

用法 內服。服后可能要吐，吐后即好。

瘧疾方

陳繼祖

主治 瘧疾

處方 川常山 草果 甜茶叶 廣霍香 花椒

制法 烏梅各三錢

用法 水煎，露一宿。

用法 瘧發前約二小時服之，孕婦忌服。

瘧疾方

駱筱峯

主治 瘧疾

處方 阿魏 硃砂等分

制法 研為末，糊丸如黑豆大（約三分重）。

用法 發作前二小時，用白湯吞服一丸。

瘧疾方

劉宝生

主治 瘧疾

處方 生地二錢 熟地二錢 甘草二錢 檳榔二錢

制法 甜茶二錢 文冰（冰糖）五錢 黑棗四个

用法 煎湯，用水一碗，文火煎。

用法 發病前二小時服，服后蒙被臥，出汗再服二

煎。

瘰癧外治方

陈德远

主治 間日瘰癧与三日瘰癧

处方 明雄黃二分 阿魏二分

制法 研細末

用法 于瘰癧發前二小时，將藥置于臍中正，用小膏藥貼蓋。

治大瘰癧方

馬培之傳 馬澤人猷

主治 瘰癧

处方 制首烏二錢 甘草一錢 烏梅三个 青皮一錢

檳榔二錢 紅棗五枚 甜茶二錢 常山一錢

制法 煎剂

用法 內服

止瘰癧散方

主治 一切瘰癧

处方 雄黃 川白芷等分

制法 研細末

用法 藥末二分，絲棉包裹塞入鼻孔內，男左女右。

瘰癧方

王祖礼

主治 瘰癧

处方 枸杞头(枸杞)根

制法 切成小片，酒浸七天瀝出。

用法 發作前一時服二十滴到三十滴，發作時再服一次，連用兩、三次。

瘰癧方

李宝珍

主治 惡性瘰癧

处方 焦山查三錢 甜茶三錢 炒枳壳三錢 檳榔三錢

粉草五分

制法 煎后露一宿

用法 早晨空心服下

瘰癧方

陈鳴璆

主治 日瘰或間日瘰

处方 生大蒜一枚

制法 搗爛，以紗布包裹，紮于機動脈上，男左女

右。待包紮處皮膚起泡，瘰即止。

久瘰全消丸方

王励吾

主治 日久瘡疾，并治瘡母。

威灵仙一兩 金毛狗脊(去毛炙酥)八錢

蓬莪述(醋炙)二兩 穿山甲五錢 炒麥芽一兩

黃丹五錢 生何首烏二兩 鱉甲(酒炙)四兩

青蒿子五錢。 如小兒，加黃鷄肫皮(炙)五錢

淮山藥一兩 鉛糖一兩

制法 合研細末，加水一小碗，面糊丸菰豆大。

用法 每半飢时，姜湯送下二、三錢。此方輕者半

料可愈。

气 滯 类

消化道潰瘍方

叶玉峯

主治 胃及十二指腸潰瘍、胃痛、消化不良、舌有

厚苔、大便祕結、口腔炎、口腔粘膜小潰瘍，口中熱痛，小便少，色濃。

处方 决明子(一名馬蹄决明子，或称草决明，是

一种麥粒大、褐黃色、菱形的种子，中藥店有备。)

注意：不是青箱子(青箱子是極細的种子，

用法

亦名草决明)及石决明(石决明是一种貝壳)，切勿搞錯。

胃及十二指腸潰瘍，每日約三、四錢，煎濃湯，三、四回分服。如果同时有大便干結，二、三天排便一次者，可加重至四、五錢，煎飲其湯，經常服，以愈为度，或用「决明子」炒燥，磨細粉，每日一錢，三回分服。研粉服效果大，剂量可減輕，再食后服三分已足。口腔炎等，則用其煎剂之濃湯，待凉后含嗽，每日三、五回，含数分鐘，唾弃之，嚥下一些亦不妨。

〔註〕

据介紹者称：「本方用之最多效果最著，为最王道和平安全可靠之藥。对口腔炎、口舌瘡(口內粘膜之小潰瘍)，每日一兩煎濃湯一碗，濾过去渣，待冷却后頻頻含漱，二日即可見效。胃及十二指腸潰瘍，其作用机轉可以此类推。本品有健胃整腸作用，大便習慣性祕結和消化不良者，都可用，每日剂量为四、五錢，大便正常而有消化性潰瘍的患者，每日三錢煎服，磨粉每回服二、三分，一日三回已足，如大便稀溏、下痢者禁用。」

胃痛方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 胃痛

處方 阿魏

制法 阿魏如黃豆大，豆腐衣包。

用法 內服，吃兩粒。

肝胃氣痛

主治 肝胃氣痛

處方 上沉香一錢 海螵蛸四兩 坎炆二十條

制法 共研細末，入瓶收貯，不可洩氣。

用法 每服三分，溫水調下。

經驗胃痛方

陸明道

主治 神經性胃痛

處方 延胡索三錢 廣木香一錢五分 高良姜五分

制法 附三錢 上宮桂末五分

用法 用水煎

服用時，先吞官桂末，次以煎劑沖服。如大

便秘結者，方中可酌加大黃、枳實。

〔註〕 此方以延胡索為主要藥物，對止痛可能有

胃痛吐酸方

朱竟榮 夏蔭林

主治 胃痛吐酸

處方 蚌壳四只

制法 置陰陽瓦上煨之研末

用法 每服〇・七克（三分），紅糖拌服，開水送

下。連服有效，久服后有大便干結現象。

〔註〕 此方可能有其鈣質的止酸作用。

胃痛方

盛仲岩

主治 新老胃病，吐酸水，或痛劇而吐血。

處方 瓦楞子五錢 白螺蛸壳五錢

制法 先用天落水煮沸取出，煨后研極細末。

用法 陳皮煎湯送服，每次五分，可頓服，或分三

次服，連服五天。

〔註〕 此方所治似消化性潰瘍之類疾病。

胃痛祖傳秘方

楊英華

主治 胃部疼痛、飽悶作脹

處方 陳香櫟一只 春砂仁二十七粒 白芷蔻七粒

制法 先將陳香櫟切開留蓋，中間挖空，將上藥納

入蓋內，外包七、八層草紙，再塗以河泥，放在灶堂內煨干，去泥紙后研細。

用法 每日吞服二次，每次七至八分，用陳酒沖服。

〔註〕 本方對神經性胃痛可能有效

胃氣痛方

駱筱峯

主治 胃氣痛

處方 紅花一兩 枳殼(炒)一兩五錢 五靈脂一兩

廣木香三錢 公丁香三錢 巴豆霜(去油)三錢

胡椒三錢 明雄黃三錢

用法 共為細末，瓶貯，勿洩氣。

制法 每服三厘至五厘，放病人手心(男左女右)

舔服。

胃痛方

呂駿聲

主治 胃痛喜按，喜熱敷，起病突然者。

處方 穿山甲(土炒)二錢 五靈脂(醋炒)二錢半

高良姜(香油炒)二錢半 砂仁(打)二錢 枳榔二錢

廣木香二錢半 延胡索三錢 川楝子三錢

制乳沒^{三錢}_{二錢半} 落水沉香二錢 舶茴香二錢

制法 右藥共為末，加番木鱉(切片)二錢。用藥拌炒

焦，去番木鱉不用。磁器收貯待用。

腹痛外敷方

仲立亭

主治 諸種腹痛(蛔虫痛、食積痛、月經痛等)

處方 生香附末四錢 皂莢(打碎)兩挺 食鹽三兩

制法 上藥共入鉄鍋內，炒熱出香，另加酸醋一兩。

兩。

用法 乘熱包布中，按痛處，緩熨之。冷可再炒，

并加醋四兩，噴過再用。

〔註〕 原註云：「施用屢驗」。

心口疼方

馬書

主治 心口疼

處方 五靈脂 木香 元胡各一錢

制法 為末

用法 黃酒下

呃逆方

徐筱江

主治 呃逆

處方 皂角(牙皂)一條

制法 去子研細末

用法 用少許吸入鼻中，以打噴嚏為止。三、五次后，其呃即止。

痛病方

陈 煦

主治 癘病

处方 雄猪胆一枚 雄鵝胆一枚 雄羊胆一枚

雄黄一兩

制法 雄黄研細末，分放在三个胆中，不要去胆

汁。把鵝胆放進羊胆，羊胆放進猪胆，紮好胆口，掛在僻陰地方，經二十一天取下。

用法 冲热开水吃，吃后嘔吐痰涎，即能見效。但在葫蘆开花，石滾翻身，蘆柴莠毛花的时候

还会再發，發时再吃此藥，就会好了。这一料藥能治几个人到十个人。

走馬丸方

郁煥其

主治 心腹痛如刀割，堅滿拒按，大便不通，气

急，口噤，停尸，猝死，大腹水脹，身面浮腫，气急中滿。

处方 原巴豆(去壳) 杏仁各六十粒 炒狼毒(另研一兩)

制法 合杵一千鎰，棗和丸，棗豆大。

用法 每服一錢為極量，輕者遞減。

〔註〕 本方与九痛丸近似(見魯樓医案)。

急性胃腸炎

張錫純 徐少儒等

主治 急性胃腸炎、腹痛吐瀉

处方 粉甘草三錢 蛛砂一錢 冰片五分 薄荷冰三分

制法 為細末

用法 每服一錢，小兒酌減，开水冲服。

胃腸炎方

任百川

主治 急性腸胃炎脫水

处方 第一方：烏梅一錢 原金斛三錢

第二方：烏梅一錢 原金斛三錢 細辛三分

制法 煎剂

用法 第一方：适应于急性胃腸炎，頻頻嘔吐者。

第二方：适应于急性胃腸炎，脫水时肢冷、脈沉細者。每隔五至十分鐘冷飲一調羹。

〔註〕 据交流者个人經驗，曾屢用有效，惟第二方禁用于妊娠妇女。

消化驗方

刘 棣

主治 腸胃消化不良，痢疾慢性便秘食伤

处方 望江南二錢

制法 煎剂

用法 当茶用

五兒丸方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 一切慢性泄瀉（屬寒熱最宜）

处方 五倍子一錢 兒茶五分

制法 二味共研細末

用法 以上二藥為一次量，小兒減半。

〔註〕 原註云：「二藥與溫中補氣藥同」。

慢性腸炎方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 消化不良，食谷即瀉，大便檢查無變化。

处方 參芽三錢 枳殼八分 黨參三錢 白朮三錢

生地三錢 扁豆一錢五分 炮姜八分 黃芪三錢

陳皮一錢五分

制法 煎剂

用法 內服用

消化性潰瘍方（胃寶）

徐筱江

主治 胃和十二指腸潰瘍

处方 茶叶 白糖等量

制法 一次可各取四至十兩，加水同煮數沸，沉淀

去渣，貯于有蓋瓷器中，經六至十二日後，

色如陳酒，結面如羅皮，即可服。如未結

面，只要經七至十四天就可服。

用法 每日食前早晚各服一次，每次一調羹，蒸熱

后服。

梅核氣病方

劉濟農

主治 梅核氣病

处方 煨月石二兩 紫苑一兩 桔梗七錢 川貝母一兩

制法 上藥研末，蜜為丸，如彈子大。

用法 臨臥時嚥化一丸

〔註〕 服后如有心跳加速反應，服炙甘草湯即解。

梅核氣方

成煥亮

主治 咽中貼貼如有炙癢，而日久不愈的梅核氣

症。

处方 芥菜二三斤

制法 洗淨搗取汁，再加蜜少許，文火熬成膏。

用法 每天半茶匙，開水和服。

〔註〕 原註稱：「服至一月后即奏效」云。此方簡

單易行。

胃氣痛方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 胃氣痛

處方 香附六錢 丁香一兩 巴霜一兩 木香一兩

延胡六錢 枳壳一兩 枯礬六錢 烏梅一兩

紅花六錢 義朮一兩 沉香六錢 青皮一兩

靈脂一兩 雄黃六錢

用法 各藥共研細末，燒酒泛丸。

用法 每服一分五厘，開水送下。

胃神經痛方

胡方澧

主治 胃神經痛

處方 桂枝二分 杭芍(炒)四分 當歸四分 吳萸二分

細辛五厘 川連(炒)一分五厘 炙甘草一分五厘

姜二片 棗二個

制法 水煎。胸滿者加瓜蒌四分 枳實三分。作嘔者

加半夏 陳皮各三分。 飲水即吐者加丁香

砂仁各一分 竹茹二分。嘔吐清涎者加蒼朮三分。

痛不休息加廣木香二分。 痛充頭腦者加川芎

二分。 痛澈背不安者加姜仁四分。 痛引腰腹者

加元胡三分 故脂四分。 痛如飢不安者加茯苓

用法 內服

胃寒氣痛(神經性胃痛)方

叶玉峯

主治 心下胃脘部痛，每因著寒或氣惱而發作，痛

時俯屈前身或以手捫之則痛稍可，這是神經性胃病，通常稱為胃寒，胃氣痛可用本方(如因胃潰瘍之胃痛，本方無效)。

處方 香附子(醋浸，炒，研細粉)一兩

高良姜(酒浸，炒，研細粉)一兩

制法 二味研和，瓷瓶密封，勿令泄氣。

用法 胃痛時服一錢，熱米湯調服，隔一小時再服

一次，以痛止為度，痛止后每日二至三回，

食后服。

(註)

据介紹者稱：「此方效果很好，用于神經性胃痛，不但能當時止痛，解除症狀后，連服五、七日往往可減少發作，或竟全治。胃痛者最好先經醫師診斷確屬神經性胃痛時，效果方著。」

四分 白朮三分。 大便干燥者加黃芩一分五厘
熱地黃二分。 小便短赤者加澤瀉三分 炒山梔
一分五厘

黃疸方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 黃疸

處方 甜瓜蒂(連梗)少許

制法 炙研

用法 搐鼻

肝癰方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 肝癰

處方 桃仁三錢 延胡三錢 杏仁三錢 參三七五分

蘇子梗各三錢 瓜子肉四錢 澤蘭三錢 五靈脂三錢

藕節五錢

制法 煎劑

用法 內服

疝氣方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 疝氣痛、寒熱

處方 車前子三錢

制法 瓦上焙焦，陳酒煮。

用法 內服。隨量飲，蓋被出汗。

胆脹不眠方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 胆脹不眠

處方 郁李仁八錢 天竺黃二錢

制法 煎劑

用法 內服

黃病丸方(即黃病至寶丹) 董雪帆

主治 一般性黃疸，兼治瘧痢、瘋癲、痰症及婦人

經閉、腹癰發黃等症。

處方 藿香 神面 紫蘇叶 遠志 蒼朮 制半夏

山梔 砂仁 木香 茯神 青木香 石菖蒲

川郁金 白礬各一兩

制法 以上各藥研末。用大腹皮一兩熬濃湯和上藥

末，泛丸如桐子大。丸成后，分为二份，一

半用硃砂為衣，一半用黃柏末為衣。

用法 早服黃丸(即黃柏衣的丸)，晚服紅丸(即

硃砂為衣的丸)。早晚各服二錢五分，開水

送下。

肝膿腫方

陳鳴鑒

主治 寒熱，右肋下腫脹壓痛，曾有痢疾病史。

處方 降檀香各三錢 全瓜蒌四錢 白芥子四錢

薤白頭三錢 柴胡一錢 小青皮三錢

川朴一錢

青木香三錢

苏梗子各三錢

制法

水煎

用法

內服，二、三天即見效，膈下膿腫亦效。

胆黃方

王慎軒

主治

消化不良，黃胆腸胃炎，胸悶嘔吐，腹痛泄瀉，痢疾，角膜炎，口腔炎，付鼻竇炎，咽喉炎，子宮內膜炎，癰腫，疔毒等一切炎症。

处方

猪胆膏十二兩

黃柏六兩

杜霍香叶十二兩

制法

各研細末，和勻再研，水泛為丸，如菉豆大。

用法

每次服五分至一錢，日服三次。空腹時開水送下。

复方海螵蛸方

苏州市中医診所

主治

一、胃病胃酸過多，二、月經病、白帶。

处方

海螵蛸一斤

細砂仁一兩

制法

共研細末

用法

散劑吞服，每次一公分至一公分半。

噎膈方

王勵吾

主治

老人飲食噎塞不通，凡由氣塞胃寒以致食

处方

噎、痰多、吐飯、吐痰者俱宜服。

鷄嗉子二个（不去內物，外用濕紙數層包裹，泥封固，炭火煨一時，約內中焦熟去泥，紙灰不用）

廣木香一錢 公丁香一錢 真沉香一錢

制法

共研細末，棗肉為丸，梧子大。

用法

一日三次，食后七丸嚥化津嚥下。

膈氣方

周憲璋

主治

膈氣（嚥下困難，食后即吐）

处方

老鷹潭（即老鷹嘴吐出來的東西）

制法

炙灰，加陳酒少許。

用法

沖服

胃氣痛驗方

陳丹華

主治

胃氣痛

处方

薤白頭二錢

五靈脂三錢

澤蘭叶三錢

全瓜蒌四錢

玄胡索二錢

炒川芎一錢

法半夏一錢半

沉香柚一錢（后下）

白芷冠一錢

陳枳壳一錢半

藿香一錢半

制法

水煎

用法

內服

肝臟硬變腹水

漣水縣衛生科

主治 肝臟硬變腹水

處方 甘遂 白茅根 生姜汁 細面粉各二兩

制法 公豬腰一付焙和上藥，共研細末。

用法 每次服一湯匙。服此藥后大瀉或嘔瀉若干次，水消而病愈。

〔註〕 據漣水縣衛生科介紹：「本方確有功效，但是藥性太烈，體弱及心臟病者不宜用。」

止嘔吐方

吳匯川

主治 嘔吐

處方 用晒衣裳之竹竿，以陈旧者為佳，把節鋸去，成二寸長的圓筒，將枸杞頭葉藏入筒內煎服。

積聚類

。水腫方

王佐民

主治 腹水、全身水腫。

處方 烏柏樹根皮（俗名柅子樹）

制法 焙干研細末

用法 以蜜調和，用開水吞服二錢。老人小孩減半。禁鹽一百二十天。

〔註〕 原註：「腫脹退后，用開鹽法：鮮鱒魚二兩

食鹽三兩，以黃泥包裹，炭火煨煨一週時，去泥，將魚鹽研細做菜，即用此鹽調味，食

完后再服生鹽即不發。」

。單腹脹方

朱克謙

主治 單腹脹

處方 莖木（即松木）

制法 焙成老黃色，研末用。

用法 每次一錢，紅糖對開水調服即消。

。腹水方

李宝光

主治 腎臟性腹水

處方 大葫蘆蒂七個 元醋三斤 黃酒一盅（沖）

制法 將葫蘆蒂浸醋內，取出用木炭火烤干，再浸再烤約一天，以醋完為度，為細面。

用法 用瓠子皮湯沖，每日早晨空口服，黃酒送服。病一年半以上服一料，二年以上服二

料，三年以上服三料，病愈后再服大量金櫃腎氣丸或六味地黃丸。

。水臌脹單方

吳匯川 周伺虞

主治 腹部膨隆、水氣腫脹
处方 人家歷年使用之面瓢，藥名敗瓢。愈年久愈好，瓢面上紫黑色者。（徐州以北較多）

制法 敗瓢（敲碎）三錢 葶藶子（搗三錢，攔在小鋼鐘

鍋內，放兩小碗水，煎成一小碗。

用法 敗瓢湯服下，須側臥，隔兩小時再服二道，

次早消去多半。病輕一服消尽，病重兩、三

次痊愈，屢試屢驗。

腹水方

馬云翔

主治 腹水、湿性肋膜炎

处方 甘遂

制法 研細末

用法 每日量五分至八分。开水送服。

〔註〕 交流者称：「本方治腹水、湿性肋膜炎有著

效。伴以沉香等量吞服，可避免嘔吐，惟服

后短期內有百分之九十五要腹痛，体弱者禁

用。」

。水腫方

苗蔭華

主治 水腫

处方 陈蚕豆（至少三年）

用法 煎湯喝水

。外治方

主治 水腫、水臌

处方 鳳尾草根一大握

制法 洗去泥，打爛，与雞蛋同研和如膏，入麝香

少許。

用法 敷臍上，一日一換，小便即多，水退甚速。

。水臌脹方

印会河

主治 新久腫脹（虛極羸瘦、血吸虫病晚期及孕婦

不宜用）

处方 紫蝴蝶花十份（露尾）生薑一份

制法 共搗爛取汁

用法 每次生飲汁半飯碗（約四兩許）。虛者酌

減，腫退不淨者，數日后再服一次。

臌脹丸方

王玉玲

主治 水腫脹

处方 巴豆(去心皮去油)八兩 杏仁(去皮尖)六兩

制法 共研細末。用藥量三分之一的面粉和丸，每

一丸約五厘重。

用法 每次用量一至二丸，最多不得超過三丸。用

量須視體質之弱強，病情之輕重而定，每日

只能服一次，開水送下。

〔註〕 巴豆藥性甚猛，用時慎之。

水腫病驗方

陳福林

主治 水腫病

处方 野大蒜(石蒜)約中小碗

制法 搗爛

用法 敷臍下及膝下。敷后一小時，時急流出水

液。三、四日內，水腫皆消。消后用青魚

一個 橘子肉三、四枚煮爛吃服。

水腫病驗方

卜潤家

主治 水腫病

处方 甘遂三錢 白朮三錢

制法 共研末

用法 每日服二次，每次五分至一錢。最危險之水

腫，大過三料即痊愈。

寬中丸方

郁煥其

主治 腹如大鼓，大如抱甕，飢不能食，呼吸氣

急，欲寐不得，大便塞結不通，小便滴点而

下，勢頗凶惡。

处方 商陸 芫花 生軍 甘遂 大戟

蓬朮(上醋炒) 元明粉 巴霜上藥等分

制法 共研，糊丸菉豆大。

用法 量病輕重以為多少，但一次不得超過一錢五

分。

〔註〕 此藥性甚猛，用時慎之。

大溫中丸方

郁煥其

主治 脾虛濕熱，腹臌腫滿，氣脹、水臌、氣化不

行，飲食減少等症。

处方 川朴 蒼朮 白芍各五兩 白朮 廣皮

云苓各三兩 粉甘草 苦參各二兩 青皮六兩

香附十六兩 鐵砂(醋炒)十六兩 山查五錢

制法 共研糊丸

用法 每服一錢，一日二次，白湯下。

紅顏丸方

郁煥其

主治 为元氣大虛，慢性臟脹之緩劑。

处方 扁豆一兩 归身五錢 三棱二錢 建蓮一兩

芡实五錢 蓮朮二錢 白茯苓二錢 白朮二錢

紅花一錢 糯米二合半

制法 研末，每藥粉一兩加制礬一錢。艾糖湯泛

丸，菉豆大。

用法 每日一錢，日服二次，白湯下。

水不溢丸方

郁煥其

主治 鼓脹大勢已除，余邪未清，用此調理以肅清之。

处方 鷄金 姜皮 地枯萆各一兩 芫花 大戟

甘遂 商陸 苓皮 沉香面 黑丑 香元

石葦 青皮各六錢 土狗四錢 巴豆霜一錢

制法 共研，醋水泛丸，菉豆大。

用法 每服一錢，每日二次。

單腹脹方

金慶椿

主治 單腹脹

处方 輕粉一兩 淨硫黃四錢 巴豆霜四錢

制法 共為細末

用法 用藥棉少許蓋于臍部，將以上藥面敷上。先用紙蓋上藥粉，用綳帶束好，經過三小時

后，大便發現瀉下。

〔註〕 原註：「大便四、五次后將藥面除去，防止瀉太猛，發生虛脫。如年歲太高，或身体削

弱过甚者，敷以上藥粉时，大便一通后即去掉，以防虛脫。」

血蠱脹方（排榜丸）

張治安

主治 血蠱脹病

处方 桃仁泥二兩 瓦楞子二兩 大蒜二兩

制法 先將前二藥研成碎末，然后合大蒜，搗爛為丸，如豌豆大。

用法 每服七粒，連服三星期。

〔註〕 原註云：「服藥期間，須補充营养，三星期后即用四君子湯服一、二劑」。

水腫病驗方

朱克謙

主治 水腫病

处方 大麥芽二錢

制法 炕黃。水煎熬濃汁，濾去渣。

用法 服之小便如注，腫消。

單腹脹方

邱魁馨

主治 單腹脹（腹水）

处方 三生蘿下（詳制法）

制法

用地里鮮白蘿下一个，臨時取出，挖一小孔，將巴豆仁一粒去壳，放置小孔內，再行栽植，俟結子時取子再栽，第二次又將蘿下取出，放巴豆仁兩粒，如前栽種，取子再栽，再依法放入巴豆仁三粒，再候結子時，用子與蘿下陰干，再以黑白丑末各四錢和勻。

用法

每服二錢。小兒減半，食服時用大腹皮五加皮各三錢，煎湯送下。

〔註〕 本人原註稱：「很有效果」云。

臌脹方

金治明

主治

腹水

处方

神柚 麥芽 甘遂 木香 芫花各三錢

制法

共研細末，用醋和白面共約一兩，調成如飴狀的漿糊，然後入碗中與藥末拌勻，做成豆

用法 粒丸。每服五錢，須用三服，每日早晨用白開水送下。

〔註〕

原註：「服后，十八天內禁忌吃油、鹽、醬、醋、面、腥等東西，只吃小米飯和稀粥，紅糖當菜吃（如不忌口，三天即要因中毒而死），並且一輩子不吃驢馬肉、蕎麥面、榆樹皮和無鱗魚等，不然仍會復發。」

治氣臌脹方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 氣脹及因食物后成脹者

处方

三白西瓜一枚 連壳砂仁五百粒

獨瓢大蒜頭四十九个

制法

取三白西瓜（皮白、瓢白、子白）去子肉，至白皮為度，切開蓋，入連壳砂仁和獨瓢大蒜頭。如放不足，酌加數量。將蓋以竹絲扞好，外用槌濃黃泥塗寸余厚，用定做風爐（爐口須湊西瓜式）文火一晝時，四周烘透不可洩氣，滿晝時去外泥用之。

用法

每服二錢，早晚服。

治臌脹方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 腋脹

处方 沉香三錢 鷄內金一具 砂仁三錢 陳香櫞五錢

制法 共研細末

用法 每服一錢五分

。水腫方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 水腫

处方 梧桐花一至三錢

制法 煎劑

用法 內服

。水腫方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 水腫

处方 豬肺一具 蝦蟆(蟾蜍)一个

制法 將豬肺洗淨，入蝦蟆，用綫紮住，懸于砂鍋

用法 內煮之，尽化為水。

作三、四次飲之。飲尽則泄水而愈。

治脹病方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 脹病

处方 巴豆霜(去淨油)一錢半 归尾三錢 姜半夏三錢

地鼈虫三錢 日石一錢半 血竭三錢

制法 生晒，共研細末，白酒釀汁為丸，如菜豆

大。

用法 每服三十五丸，輕者減半。

河白脹(水腫)方 馬培之傳 馬澤人獻

主治 河白脹(腎臟炎)

处方 灶土(炒熟加入)一升 川椒一兩 吳茱萸五錢

艾叶一兩 蒼朮一兩

制法 研末，俟灶土稍退熱氣，將藥末置灶土上，

置腳爐內，去蓋薰之，外以被圍之。

〔註〕原註稱：「成人濕囊脹大亦效」。

。河白脹方 馬培之傳 馬澤人獻

主治 河白脹(水腫)

处方 次白糖 唾液

制法 次白糖用唾液調敷

用法 男用唾液調敷陰囊上，女用唾液調敷乳上，

腫即退去。

。水腫方 馬培之傳 馬澤人獻

主治 水腫

处方 豬肚一具 大蒜头三斤

制法 共煎濃湯

用法 將煎之濃湯置新木桶內，患者坐上，至水冷即臥，一日一次，三日即止，水从小便出。

臌脹方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 痞積，氣臌脹滿，痰迷心竅的实证
处方 五灵脂一斤 香附(去毛水浸)一斤

黑白丑(研末)各二兩

制法 一半微炒熟，一半生用，和勻，醋和为丸。
用法 每服八分至一錢，姜湯下。此方在睡先服一次，次早再服一次，其效甚良。

血蠱方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 血蠱

处方 大冬瓜 赤小豆

制法 取大冬瓜一个，去子瓢，納入赤小豆一斤，

架上燒之，待瓜內有水即停。

用法 將瓜內水取出与病者服之。

臌脹效方

宝山縣川沙聯合診所

主治 臌脹

处方 沉香屑三錢 川椒目三錢 黑丑三錢

炮山甲三錢 紅牙大戟三錢 五倍子六錢

甜葶藶三錢 麝虫三錢 粉甘遂三錢

粉葛根三錢 西茵陳三錢 芫花三錢

制法 研細末，蜜丸。

用法 每服一錢

腫脹驗方

陈丹華

主治 腫脹(陽水較有效)

处方 黑白丑各五錢 萊菔子一兩 砂仁一兩

制法 用陈葫蘆一枚，將上三味納入，再入陈酒一

大杯，隔湯燉一柱香，取葫蘆中藥炒研为末，再以葫蘆炙炭，共研和。

用法 每服二錢

腎臟炎水腫方

仪征縣衛生科

主治 腎臟炎水腫

处方 藍胡蝶花(連根)三錢

制法 水煎

用法 內服

雞屎醃方

桂履中

主治 臌脹

处方 鷄糞白干八合，無灰好酒三碗

制法 共煎至干一半許，用布濾出其汁，五更熱

飲，次日再服一次。

〔註〕 介紹者本人實驗有效。

腫脹方

張天和

主治 水腫脹

处方 醃魚（俗名黑魚）（一斤以內的）一尾

制法 煎湯

用法 淡服二次，腫即消。

臌脹病驗方

周 鈞

主治 臌脹病（單腹脹、腹水）

处方 黑沉香八分 公丁香一錢 上肉桂一錢共研細

末，加鷄屎（硬的）十兩 陳酒二斤

制法 文火煎成十兩左右，濾過去渣。

用法 內服。或分二次服。內服后二、三小時開始

大便泄瀉。

治疫瘡方

王叔相

主治 疫瘡

处方 皂莢（煨煉三次）二兩 蚕豆粉一斤 土鱉子四兩

制法

皂莢燒煉，須用砂鍋（忌金屬，如銀鋪用者

）。第一次約一小時許，細研，候礬紅如炭火樣，冷后再如此煉三次。研極細末，米湯蜂蜜為丸，每七粒重三分。

用法

每服七粒，早中晚食前各服一次，用鵝食水送下（鵝食水即用盆一只，內放谷食經過鵝食后煮沸）。

疫瘡絳礬丸方

駱筱峯

主治

治疫瘡二、三月，堅硬，大为掌，或下及臍旁，面色黃黑，肌瘦，神疲，腹痛夜盲，間有發熱盜汗，在女子則經停，小兒形如疳疾，但以瘡形為主，余症不必悉具。

处方

絳礬（皂礬之煨赤者，未煨不可用）四兩

桃仁（不去皮另研）四兩 土鱉虫（去足炒）四兩

大黃（另研末蜜煮三兩 當歸六兩 茯苓六兩

大棗（另煮取肉用）十二兩

制法

共為細末，用棗肉，酌加濃米湯，和丸如梧桐子大。

用法

每服十九至十五丸，日服二次，開水送下，

以愈为度。除忌一切葷腥發物外，終身忌服蕎麥面。

伐木丸方

郁煥其

主治

心腹中滿或黃腫如土色

处方

蒼朮二斤 酒麴四兩 皂礬一斤

制法

共研末，醋糊丸，如梧子大。

用法

每日服一錢五分

〔註〕

此系張三丰方，見本草綱目，治鉤虫有效。

疫瘧煮黃丸方

駱筱峯

主治

傳染性疫瘧，寒熱如瘧，脅下結塊，體倦，

处方

膚黃食少，及兼發牙疳、鼻衄、痢疾等症。

制法

錦紋大黃二十兩 生桃仁（連皮另研如泥）四兩

用法

先將大黃研為細末，用米醋一兩，蜂蜜十二兩。酌加井華水同煮三小時（不住手攪），

取起候冷，和入桃仁泥丸，如菉豆大。

用法

每服十九至二十九（量體質強弱），日服二次，用藿香叶二錢煎湯送下。

〔註〕

本人原註稱：「連服三、四日，寒熱即見減輕，七、八日可退盡。如不退，細察症狀，惡寒重者，改用桂枝五分，柴胡一錢，煎湯

下。發熱重發者改用青蒿公二錢，丹皮二錢，煎湯下，寒熱即退，約十余日，重症既去，痞亦漸消，如未消盡續服。」

時疫類

經驗霍亂方

馬云翔

主治

霍亂

处方

生大黃五分 黃連八分 黃芩一錢五分

鮮金斛六錢 桂枝六分 芍藥二錢

茯苓三錢

豬苓三錢 枳實一錢

制法

用水煎湯

用法

冷服，同時伴服西瓜汁及汽水。

〔註〕

本方根據交流者稱：「效果甚速」。其同學

任百川之經驗，方中加入烏梅、細辛更效，

同時針刺委中穴部，流出靜脈血，可止腓腸

肌之痙攣。

类似麻風初期方

陸愼其

主治

面部和腿部皮膚紅圈，麻痺，行走不能自

主。

处方

蒼耳草

制法

秋季收集鮮者十斤，用銅鍋煮熬三、四次，去渣，文火煎濃，加白糖二斤收膏。

用法

每次服一茶匙，早晚各一次。

大麻風祕方

謝令安

主治

大癲風病

处方

倭硫磺四兩 皂角一升

制法

以皂角鋪滿鍋底，置硫磺于其上，用好醋浸之，以淹沒為度，文火緩煮，待乾去皂角，取硫黃。

用法

每日用淡干湯下三分

大头瘟方

陈寿民

主治

大头瘟

处方

蚯蚓五、六条 洋糖三至四兩

制法

先以洋糖置大盤內，然後將蚯蚓放在大盤內，約隔十二小時，俟蚯蚓死后，而糖化水，即以該水滿面塗之，約敷二日即可愈。

霍乱方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

不論陰陽，上吐下瀉，筋脈抽攣等。

处方

上桂心八錢 母丁香一兩二錢 麝香四錢

制法

上藥研細末

用法

每用三分納入臍中，外用膏藥封貼。

〔註〕

孕婦忌用。

眞塘西痧藥方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

痧症

处方

茅蒼朮三兩(米泔水浸軟，切片，焙干為末)

麻黃(焙)三兩六錢 丁香六錢 蟾酥(酒浸化)九錢

明天麻(焙)三兩六錢 麝香四錢 和上藥研細，

大黃(晒)六兩 雄黃(水飛)三兩六錢

甘草(炒為末)二兩五錢 硃砂(飛)三兩六錢

制法

上藥各研極細末和勻，或丸或散，丸則以水

滴和為丸，硃砂為衣。

治麻風方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

麻風

处方

好生漆十斤 大蟹四十只

制法

將蟹浸漆內，埋土中，七日取出搗濃炙存性。明雄黃四十兩，陳酒十斤，雄黃絹包入酒內，懸煮一時，取出晒干研末，漆蟹八

成，雄黃二成。

用法 服一錢，陳酒送下，體虛者減之。

楊亭諸氏風丸方

諸滿生

主治

(一)大麻風，(二)關節疼痛(可能包括慢性風濕性關節炎及風濕樣關節炎、梅毒性關節炎)。

處方

水銀四兩 銀硝(火硝)四兩 生礬四兩
輕粉二兩

制法

水銀放入搪盆內，研磨半小時，再與銀硝等放入銅杓內，加水八分滿，置炭火上煮，約一小時許，成乳白色一塊，取出置地上出火氣，研細備用。另以米飯約半飯碗，在研鉢中研爛，加上已制好的上述藥末及百草霜二錢搗和，做成如半粒米大之丸藥。

用法

每天早晨服三粒，小兒減半。

腦膜炎方

泗陽縣衛生科

主治

腦膜炎

處方

癩蝦蟆血

用法

滴入患者耳內(那邊疼痛滴那邊)，每半小時一次。

愈風膏方

鎮江市中醫師協會

主治

大麻風、毛髮脫落，遍體如蛇皮，時落有腥臭氣味白屑。

處方

蒼耳(全草)

制法

須在蒼耳子結實時，連根採用，洗去泥，略打晒，用水煎濃，去渣熬成膏。

用法

內服，一日三次，每次一匙，開水送下。

腦膜炎外用方

曹鳴高

主治

流行性腦膜炎

處方

絳礬(即以皂礬煨紅)二錢

制法

研細末

用法

吹入鼻孔，少頃，鼻流清涕或血水。連吹數次，可轉危為安。

腦膜炎內服方

曹鳴高

主治

流行性腦膜炎

處方

麝香二厘 老石菖蒲三厘 紅鹽璫砂一分

制法

管仲二分 明雄黃五厘

用法

共研細末 輕者一服，重者兩服，小兒減半。

腦脊髓膜炎外用方

溧水縣衛生科

主治 腦脊髓膜炎

处方 蝦皂礬六錢 瓦松二兩 冰片五分 老月石三錢

制法 共為細末，收貯瓶內。凡腦炎頭痛甚者，用

上藥吹鼻內，當即流出黃涕，立能定痛，病可大減。

腦脊髓膜炎內服方

溧水縣衛生科

主治 腦脊髓膜炎

处方 龍胆草 生山梔 池菊花 天竹黃 黃芩

石決明

制法 煎劑（便祕加錦紋大黃，泡水沖服）

用法 藥量視病情輕重酌情增減

腦膜炎祕方

沈維乔

主治 腦膜炎

处方 先以胆礬煅成赤色（絳礬）細末，吹鼻数次，再內服后方。

真殭蚕二錢 蟬蛻三錢 山梔二錢 生大黃二錢
連翹三錢 赤芍二錢 蘇叶二錢 萊菔子三錢

薄荷一錢（后入）

用法 河水煎服

霍亂祕方

王老復

主治 上吐下瀉

处方 樟木皮四兩（刮去外皮用里皮）

用法 同食鹽一兩沖服

大麻風祕方

張良歧

主治 大麻風

处方 冬天松毛尖花三斤 陳酒六斤

制法 將右味花酒，同入瓶，隔水蒸煮。

用法 每日吃兩次，每次二兩。

蝦蟆脹祕方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 蝦蟆脹（耳下腺炎）

处方 石灰醋

制法 燉熱

用法 調敷患處，甚效。

痢疾類

痢疾效方

王進信

主治 痢疾

处方

干姜一兩四錢

砂仁(去壳)三錢

華撥六錢

上川連二兩四錢

丁香三錢

廣皮三錢

黃芩(酒炒)二兩一錢

荊芥一錢

麥芽(炒)三錢

車前子六錢

川貝母六錢

制法

研末，用鮮荷葉汁搗為丸(勿用蜜)，每料

作二百丸。

用法

每日早晚空心吞服二次，每次一丸，忌服

牛、羊、魚、肉。

紅白痢疾方

惲 榛

主治

紅白痢疾

处方

干麻菜(亦名長命菜，又名馬齒莧)

制法

熬湯

用法 治紅痢加入白糖，治白痢加入紅糖。

痢疾方(白头翁湯)

張宗震 胡淑身

主治

赤白下痢，里急后重，心煩口渴，或發熱者。

处方

白头翁三錢

川黃連

川黃柏

北秦皮各二錢

制法 水煎
用法 內服

紅白痢疾方

惲 榛

主治

紅白痢疾

处方

白朮 車前子各一錢五分

用法

炒煎服之

慢性痢疾方

江韻樵

主治

慢性阿米巴痢疾

处方

地耳菜(又名地塌菜，色灰白，狀如小木

耳，雨后田野間都有之)

制法

洗后晒干

用法

用晒干之地耳菜二兩，加白糖二兩，水半

碗，蒸三次，每日服三次，共分十次，服完

即愈。

多年痢疾方(又名休息痢)

趙雨亭

主治

慢性痢疾

处方

鱧魚

制法

去腸切段，瓦上焙干成炭，研末。

用法

每服三錢，加紅糖拌食，用酒送下，服數次

愈。

初痢方

輝 榛

主治 痢疾初起

处方 木耳一兩

制法 煮木耳，去水，置碗內，調醬乳腐汁，加山

胡椒少許。

用法 用以佐餐。

痢疾方

江伯瑾 景宜

主治 痢疾

处方 蒼朮(米泔浸，陳土焦炒)三錢

川烏(去皮，鹽包燉透)一兩五錢

杏仁(去皮尖，去油)二兩 生大黃(炒)一兩

羌活(炒)二兩 熟大黃(炒)一兩

生甘草(炒)一兩五錢

制法 共為細末

用法 每服四分，小兒減半，孕婦忌服。赤痢用灯

芯三寸煎濃湯調服，白痢用生薑三片，煎濃

湯調服，赤白痢灯芯、生薑同煎調服，水瀉

米瀉調服。

〔註〕 原方註云：「極重者五、六服即愈」。

白头翁飲方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 阿米巴痢疾

处方 白头翁一五至三〇公分(四錢八分至九錢六分)

制法 水兩碗，煎五分鐘即成。

用法 分兩、三次服。飯前服。在服藥前可先進鹽

菜瀉劑。

黃連方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 細菌痢

处方 黃連

制法 將黃連洗淨炒干(微轉深色為度)，另加二

成白薤仁，研細末，裝膠囊內。

用法 成人一次六分至一錢(二——三克)。一日

三次至四次。小兒一歲以內六厘至二分(〇

·二——〇·六克)。二歲至三歲一分至二

分(〇·三——〇·六)四歲至八歲一分六

厘至三分二厘(〇·五——一·〇克)。八

歲以上一分六厘至五分(〇·五——一·五

克)。

痢疾方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 下痢

处方 鮮藕汁四兩 泡姜三錢

制法 煎劑

用法 內服

瀉痢方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 瀉痢

处方 青棠核四个

制法 炙研末

用法 開水送下，一二次即效。

紅白痢方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 紅白痢

处方 梧桐花 根皮

制法 煎劑

用法 內服

〔註〕 又方：用梧桐叶煎湯洗足。

紅白痢方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 紅白痢

处方 白芍三兩 當歸三兩 萊菔子三兩 甘草三兩

枳壳三兩 枳榔三兩 車前子三兩

制法 各藥共研細末，水泛為丸。

用法 每服三錢

痢疾丹方

張澤生

主治 赤白痢、水瀉

处方 火麻仁（去皮油）七十二粒 大黃一兩

羌活（炒）四兩 草烏（面煨）一兩 芎朮四兩

制法 共研為細末

用法 用生薑紅糖湯調服，每次三錢。

治痢方

方效良

主治 下痢

处方 當歸五錢 白芍（酒炒）四錢 炙甘草三錢五分

草薢仁一錢五分 扁豆衣二錢五分 苡仁五錢

萊菔子三錢 車前子二錢五分 枳壳三錢

用法 煎劑 枳榔一錢 苦參六分

制法 煎劑

用法 內服

痢疾方

南京市龍潭勝群牙科診所

主治 痢疾

处方 馬兜鈴三錢 黃連一錢五分 大黃三錢

黄芩三錢 澤瀉二錢 巴豆(去油)二錢

制法 面糊为丸，黃豆大。

用法 成人服三粒，最多四粒。在一周内不可連服二次。

痢疾方 鄭紹霖

主治 痢疾腹痛，里急后重，赤白兼行無度，心煩干嘔。

处方 萆薢粉(地粟)調猪胆汁，晒干再調，約十余次，漸成黑色。川黃連末四錢 苦參子肉八錢 木香末三錢合搗

制法 再用猪胆汁为丸，菴豆大。

用法 成人每服十粒，一日三次，开水吞下。

痢血方 李殿斌

主治 痢血(俗名休息痢)經久不愈者

处方 地皮菜一斤 白糖一斤

制法 拌勻，九蒸九晒，以磁罐裝貯。

用法 每早晚空心服，一湯匙。

〔註〕 地皮菜無根，色綠，形似小木耳，出于郊外

荒地上或坟塚上，夏秋易于尋找，下雨久陰后，荒地多有之，屬于湿生。

水瀉方 刘德富

主治 水瀉不止

处方 火腿骨头

制法 炙炭研細

用法 每次三錢，連服二次可痊愈。

水瀉方 叶心銘

主治 腸炎，水瀉，甚至目眶陷凹渴飲憔悴。

处方 車前子(炙研三錢至四錢)

用法 一次开水吞服。胃納呆滯的分二、三次服下亦可。

濟生烏梅方 王勵吾

主治 大便下血

处方 烏梅肉五錢 黃連炭五錢 赤石脂二兩

人參一兩

制法 共为細末，醋糊为丸，梧子大。

用法 每服四、五十丸，空心，开水加醋少許吞服。

慢性腸出血方 楊春方

主治 慢性腸出血

处方 檳榔白皮六兩

制法 去粗皮，用酒浸之。

用法 每服一杯，日服三次，食前服。

便血方

孟樹江

主治 腸風下血

处方 猪大腸一具 木耳一至二兩 鴉胆子仁七粒

制法 將腸收拾干淨，納入木耳，兩端紮好，少加鹽煨熟。

用法 頻頻食之，晚間服。鴉胆子（龍眼肉包吞），連服一星期，便血即漸止。

〔註〕 据余克昌醫師經驗，豬腸內塞蓮肉既美味又效著。豬腸用近肛門一段為佳。

便血方

駱筱峯

主治 大便秘

处方 千柿餅二枚 地榆炭一兩

制法 柿餅瓦上焙成炭，研細末，地榆炭煎湯。

用法 每服柿餅約二枚，加砂糖少許，拌勻，用地榆炭湯送下。

失血类

鼻衄方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 熱性出血久而不能止

处方 鮮茅針蕊

制法 打爛

用法 敷脚底，左右交叉敷。

鼻衄方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 鼻衄

处方 胎髮四（二味）不拘量 龍骨 冰片各少許

用法 塞鼻即愈

〔註〕 劑量制法未註明，可酌量用。

止血散方

繆益堂

主治 鼻衄、出血不止

处方 真龍骨

制法 煨研細末

用法 塞鼻

止吐血鼻血方

張澤生

主治

吐血、鼻衄

处方

白茅花（連杆）五錢 干藕節十枚

制法

將茱萸花置于瓷罐底，取豆腐放在茱萸花上面，加清水三大碗，急火燒后，繼以文煨，至汁如墨色，約存三茶杯。

用法

每次服一茶杯

吐血方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

吐血

处方

鮮山牛屎草（天名精）

制法

和紅棗煎湯

用法

內服（多服能斷根）

〔註〕

原註稱：「取開白花的一種有效，開紅花者無效。」

嘔血方

楊宇祥

主治

嘔血

处方

蚕豆花露二斤 藕汁八兩 降香末二錢

制法

調和燉溫（一日量）

用法

內服

〔註〕

對血管爆裂，驟然嘔吐血盈盞者服之，可能有效。

百草霜丸方

王勵吾

主治

吐血、鼻血

处方

百草霜三兩 連翹一兩 陳棕炭二兩

制法

灯心炭一兩 姜黃一兩 桑叶二兩 三七一兩

用法

細末，糯米粥糊丸，菰豆大。每服一錢，開水送下。

治鼻衄方

鄒云翔

主治

傷寒鼻出血，腎臟病尿毒症狀，鼻出血或無故鼻受風熱出血。

处方

黑山梔末

制法

黑山梔研極細，篩去粗末待用。

用法

鼻出血時，吸少許，血自止。

〔註〕

本方介紹者稱：「在上列症狀時，本人用之果試果驗。」

鼻衄方

主治

鼻衄及其他出血症

处方

黑山梔三錢

用法 每日朝晨空心煎服，連服七天即愈。

鼻衄急救法 常熟縣第三屆中醫進修班

主治 鼻衄

处方 用弓弦絲繞額后，下至髮際，繞三周，紮緊，經一小時放开，即不出血，特效。

吐血驗方

沈子習

主治 吐血

处方 鋪地草一兩（地錦草）

制法 焙干為末

用法 開水服下

吐血病驗方

周向虞

主治 吐血及血崩下血

处方 土產竹節三七（取鮮的）二、三兩

制法 打碎水煎

用法 內服，吐血可立止。

腸血單方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 腸紅

处方 烏豇豆

制法 煮熟
用法 內服

便血方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 便血

处方 地榆四錢 白薇二錢 枳殼一錢五分 桑皮三錢

淮山藥三錢 當歸二錢 牡丹皮二錢

蒲黃（炒黑）二錢 白芍三錢 西瓜子壳一兩

制法 煎劑

用法 內服

尿血方

范濟霖

主治 尿血症

处方 大小薊各三錢 川雅連八分 六一散（包）二錢

川黃柏四錢

制法 水煎

用法 內服一劑

尿血方

馬書

主治 小便下血

处方 烏梅三個

制法 水煎

用法 內服。常喝。

尿血方（來自民間）

李日东

主治 尿血（血淋）

处方 百年青根

制法 搗爛榨汁

用法 每次服藥二十公撮。輕者每日一次，重症者每日二次，服至不尿血為止。

尿血方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 尿血

处方 龜板六錢

白芍一錢五分

烏梅三個

牡蠣六錢

歸身二錢

生地炭四錢

烏賊骨三錢

潼蒺藜三錢

旱蓮草三錢

制法 煎劑

用法 內服，二日即愈。

胃出血方

趙實生

主治 胃出血、鼻出血

处方 鮮生地二兩 生大黃八分

制法 將鮮生地搗汁去渣，和入大黃末。

用法 不煎內服，可連服二、三劑。

〔註〕 此方組成頗佳，精簡扼要，膩而不滯。

胃出血方

張培生

主治 胃出血

处方 五邊万年青叶五、六片

製法 洗淨搗汁

用法 加冷開水服

〔註〕 綱目拾遺所載：「合紅麥煎服」，与此方小異。

胃出血方

石昌志

主治 胃出血

处方 （一）生軍三錢

廣郁金錢半

炮姜炭三錢

當歸錢半

（二）琥珀末五分

用法 將（一）項藥，煎湯送服；（二）項琥珀藥末，可服三劑。

虫病类

殺鉤虫蛔虫方

吳匯川

主治 無論男女老幼，腹內有蛔虫、鉤虫，時有腹

痛。

处方

使君子三錢 鶴虱草三錢 川棟肉三錢

花楸榔三錢 綠色貫眾三錢 粉甘草一錢五分

制法

水煎。用兩小碗冷水煎至半碗。

用法

夜晚臨臥服下，次早服二道藥，服后再睡二小时。連服二、三剂，即將蛔虫藥死，虫由大便而出。

伤力黃方

周叔陽

主治

伤勞黃疸

处方

皂莩二兩 鹹砂(煨)二兩 茵陈二兩

樞子肉二兩 黑棗一斤

制法

上藥共研細末，再黑棗浸一宿，洗淨煮爛(去皮核)，和藥末为丸，如梧子大。

用法

每日三次，每次三錢，飯后服。如消化不良，腹漲滿痛，可去黑棗換漿糊調藥为丸。

〔註〕

原註称：「此方在民間已相当流行，效果較为确实」云。根据其藥物的組成，可能为鈎虫病。

虫病。

雷丸方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 鈎虫病

处方

雷丸

制法

研細末

用法

每日三次，每次二十克。

〔註〕

本方根据北京中華新醫學報报道，經實驗對治療蟻虫病有特效，對鈎虫是否有效尚待實驗証明。

蟻虫方(民間單方)

倪君安

主治

蟻虫病

处方

鮮棟樹根

制法

打爛絞汁

用法

每日每次飲服一〇至二〇西西，連服數天。

〔註〕

鮮棟樹根皮對驅除蛔虫有特效，服后無不良反應。

驅蟻虫方

李耕云

主治

蟻虫

处方

檳榔四兩

制法

煎湯

用法

服前吃白糖少許，飯一天。

蟻虫方

陶君仁

主治 蟻虫病

处方 蛇床子三錢 棟樹根三錢 生草一錢

制法 右藥研末，以蜜煎搓成条子。

用法 塞肛門內，听其自化。

〔註〕 本方在常熟市联合医院試用有效。

姜片虫方

龔子欣

主治 姜片虫

处方 桤榔三錢 大黃三錢 黑白丑各五分

制法 晒干研細末

用法 上藥分成二包，第一次服一包，与赤砂糖酌量同服，第二天再服一包，如上法。

血吸虫病方

張國栋

主治 痢疾型血吸虫病，有腹臌飽悶情形者。

处方 西路党参三錢 焦白朮二錢 土炒淮山藥三錢

桑白皮二錢 扁豆炭三錢 廣木香一錢（煨后下）

生地炭三錢 当归（炒）二錢 白芥子三錢

陈棕炭三錢 川棟子二錢 制香附三錢

制法 水煎
用法 內服

黃病方

高學之

主治 黃疸

处方 茵陈一兩 桤榔三錢 皂礬（煨）六錢

廣木香五錢 黑丑二錢 桑白皮六錢 大黃五錢

針砂二錢 陈皮八錢

制法 共研細末，加做点心之酵头半斤，黑棗三斤（去核），和上藥末打糊为丸，如桐子大。

以上共十五天量（成人）。

用法 每日三服，开水送下。

黃疸方

陸明岐

主治 黃疸

处方 苦参二兩 白朮二兩 生牡蠣二兩

制法 上藥共研細末，用猪尿脬煮爛搗和为丸，如桐子大。

用法 每服二錢，用茵陈煎湯送下。

鉄商丸方

常熟縣第三屆中医進修班

主治 一切黃疸
处方 針砂（煨）四兩

制香附六兩 厚朴一兩

皂礬一兩(面包火煨) 蒼朮二兩 甘草一兩

制法 共研細末，加入大麥面(炒香)四兩成丸。
用法 每次劑量五分，日服三次。

禁忌 在三个月內不吃油膩、酒，特別忌小麥。
〔註〕 此方似適用于鉤虫病貧血，俗稱黃病、桑叶黃等。

去黃驗方

趙雨亭

主治 黃疸

处方 苦丁香(瓜蒂)

制法 研末

用法 搐鼻內。搐鼻后出黃水，水尽即止，三日再搐一次即愈。

黃病方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 黃病(本病可能屬鉤虫病)

处方 陈皮三兩 蒼朮四兩 厚朴三兩 甘草二兩

木香一兩 當歸三兩 怀牛膝三兩 川斷三兩

砂仁二兩 皂礬一斤

制法 面一斤，包皂礬煨研細末，紅棗為丸。
用法 每服一錢，開水下。

萎黃病方

李孝儒

主治 萎黃病

处方 皂礬一兩五錢 發面饅饅十二兩

制法 將饅饅切片同皂礬入鍋內水煎，待礬汁悉浸

入饅饅內取出晒干搓碎。

用法 分數次開水沖服，過月余黃色即退。如病

重，可再服一料。

黃病方

康安啓

主治 黃病头晕眼花，皮膚及眼結膜發黃，心跳腹

脹，四肢無力，以致浮腫貧血。

处方 針砂八錢 犂頭末八錢(治匠店買) 香尖嘴三錢

武夷茶三錢(上二味茶叶店買) 皂礬一兩

生大黃三錢 廣木香二錢

制法 先將上藥為末拌和，放于藥鍋內炒脆研末，用黑棗六兩煮熟去皮核，打爛和丸，如豌豆大。

用法 每日早晚各服一次，每次二〇至三〇粒。大便作瀉，可停數日再服。約三十天即可恢復健康。

〔註〕 此方所稱黃病，可能亦為鈎虫病。

癩癩類

癩癩方

呂駿聲 黎象青

主治 癩癩

處方 馬宝

制法 研成細末

用法 每日一次，每次服三分至五分。忌服刺激性

食物。

〔註〕 原註云：「經多次試用，確屬有效。」

羊癩癩方

胡蓮舫

主治 羊癩癩（痰癩）

處方 鮮青菜一斤 川玉金五錢 明白礬八錢

制法 先將青菜打破，砂鍋內熬數十滾，去核，入

石臼內搗爛，再加川玉金熬至無味，過濾去

渣，再以白礬研末加入攪勻。

用法 每服三錢，早晚各一次，開水送下。

羊癩癩方

沈紹九

主治 羊癩癩

處方 全蠍七個 鵝鴿糞五錢 硃砂三錢 魚鱗三錢

蜈蚣二條 巴豆霜二錢

制法 共研細末，小米面打糊為丸，如菉豆大。

用法 每服三至四粒，生薑湯送下。

羊癩癩方

祁燕然

主治 羊癩

處方 黃瓜藤分量不拘

制法 煎短，取水約三磅煎。

用法 分五至六次服

〔註〕 原註云：「屢用有效」。

瘋癩方

王書生

主治 瘋癩

處方 豬肚一只 金叶紙（漆工貼金用紙）十紙

制法 金紙放豬肚內煮熟，成濃厚液汁。

用法 連肚連湯，患者服尽。

癩癩方

朱雨震

主治 神經錯亂（文癡）

處方 生明礬四兩 冰糖四兩

制法 水一碗半，煎至半碗。

用法 內服后約一、二小时即大吐。輕者一服，重者二服。

陽狂疾病方

王玉玲

主治 陽狂疾病

处方 甘遂二錢 辰砂二錢

制法 共研細末。用雄豬心一个，剖开勿洗，納藥

末入內，紮緊，用面裹煨（炭火上）枯。

用法 取末，一次開水送服。服后数小时即大瀉，

二至三日始止，倦怠入睡，醒后即神清病除。

〔註〕

本方藥力甚猛，須体实病实者方宜，惟剂量亦須斟酌。

癡癲方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 癡癲

处方 西黃一分半 白石一分半 巴霜（去油）一分半

辰砂（水飛）五厘

制法 米糊为丸六十粒，辰砂为衣。

用法 開水送下，每用三九，多至六九。大便出痰而愈。

癰厥方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 癰厥痰鳴肢搐日發數十次

处方 南沙參三錢 丹參三錢 鈎鈎四錢 生地四錢

茯神三錢 远志一錢 麥冬三錢 白芍一錢五分

竹茹一錢 天竺黃三錢 橘紅一錢五分

石決明五錢 川貝一錢五分

制法 煎剂

用法 內服

羊癇瘋方

李思威

主治 羊癇瘋

鮮石菖蒲五錢

用法 將鮮石菖蒲燉湯服。日服一次或二次，連服

四月，不可間斷，再吃鮮青橄欖，每天四兩或半斤，連吃十五斤，多至三十斤即愈，不復發。

肝陽类

肝陽方

樊心如

主治

头晕，眼花，耳鳴，脅肋时痛（亦可治高血压。痰多虛寒者忌服）。

处方

磁石四錢

粉丹皮錢半

大小胡麻各二錢

左牡蠣四錢

霜桑叶二錢

大白芍三錢

馬蹄决明三錢

明天麻一錢

稽豆花二錢

用法

煎服。一般服二、三剂。

高血压方

盛仲岩

主治

高血压头晕失眠症

处方

蚕豆花（取花的黑色处，四周紅的不用）

制法

生打絞汁

用法

每次取汁二兩生服。連服五天即效。

薺菜湯方

連水縣衛生科

主治

降低出血时高血压症，並能止血。

处方

薺菜

制法

煎湯

用法

內服

肝陽方

叶心銘

主治

肝陽眩暈

处方

淡菜（系一种貝类之肉，南貨舖、海味店有售）

制法

磨粉或作湯羹服，或与陈皮等分糊丸。

用法

丸剂用量五分至一錢。一日二、三回。

高血压方

江陸靜

主治

高血压

处方

臭梧桐叶（学名海州常山）

制法

鮮叶七片，煎湯。

用法

每天一次，連服七天，間歇一星期再服，宜續用数月。

高血压方

沙星垣

主治

血压升高，中風癱瘓。

处方

馬兜鈴三錢

制法

水煎服

用法

煎服十至二十天为一疗程，可繼續二、三疗程。

〔註〕

中風或高血压的臨床症狀比較複雜，如血压已經下降，可配合隨症療法。

防眩湯方

包伯鴻

主治

腦貧血，眩暈不能起立，开目則諸物旋轉（

妇人產后最多）。

处方

党参三钱 半夏三钱 当归一兩 白芍一兩

熟地一兩 白朮一兩 川芎五錢 山茱肉五錢

天麻三錢 陈皮一錢

制法

水煎

用法 內服。輕者二、三劑，重者五、六劑。

破伤風、狂犬病类

破伤風方

主治

破伤風

陸明岐

处方

魚鱗膠一兩 驢蹄心(驢蹄脚子)二兩

初產肉鼠(未生毛的，如黑的不可用)五只

制法

上藥共燉為末，米酒冲服。

用法

每服三至四錢，日服二次。服后多矢氣。

破伤風方

刘志仁

主治

預防破伤風(外傷能止疼止血)

处方

(一)生南星三錢 生半夏三錢 生川烏二錢

甘松三錢 白芷三錢

制法

(二)竹節白附子二錢 白芷三錢 黃明膠二兩
將方(一)共研細末，將方(二)陳酒溶

化，然后合和成糊狀，置日中晒干，貯于磁

孟中待用，愈陳愈好。

用法 每次一錢至一錢半，黃酒送下。

〔註〕

原註云：「此藥服后，汗出溱溱，周身自覺

有麻痺遊走狀，即表示破伤風症狀消失。非

破伤風驗方

李保金

主治

破伤風

处方

天麻二錢 雄黃二錢 蜈蚣四条 魚鱗一錢

僵蚕一錢 野鴿菜一錢

制法

共研細末，分作兩份，一份飯糊為丸，梧子

大，硃砂為衣，另一份加巴豆霜五分，飯糊

為丸，梧子大。

用法

每服二十九丸硃砂衣的，再加巴豆霜丸藥二

粒，白开水送下。如便秘，以通度，如無便

秘症，不用巴豆霜丸，用硃砂衣丸藥，以發

汗为好。

破伤風方

主治

破伤風

处方

防風三錢 姜制南星三錢 白芷三錢 羌活三錢

生白附子三錢 明天麻三錢 魚鱗膠一兩
補助藥：左盤龍（即錦囊）二兩，瓦上炙干，
用陳酒和水煮（煮時用絹包），沸即送服破
傷風藥。

制法

方藥在瓦上焙微黃，研細末。

用法

用陳酒四兩與藥末和勻，隔湯蒸服。服后臥
床休息，蓋被出汗自愈。能飲酒者，以酒服
微醉為度，燒酒陳酒均可。每服二至三錢藥
末，十六歲以下兒童減半。

〔註〕

原註云：「鵠羹治破傷風，李時珍本草綱目
載明。」並稱：「與一上破傷風藥同服，可稱
特效。」

破傷風驗方

羅玉岷

主治

破傷風

处方

沉香 明雄黃 西牛黃 廣木香 老天麻
金蠟尾 公丁香 巴豆霜 上硃砂以上各二分

八碼金五十張

制法

共研極細末，用醋糊為丸，硃砂為衣，椒目
大。

用法

每服二分

〔註〕

原註云：「治小兒痰熱、食熱，每服二分。
人弱可服二次，瀉一、二次，以稀粥補之。
如痰熱用葛蒲、灯草、金器煎湯。」

破傷風方

朱月橋

主治

因創傷突然手足抽搐，兩目上視，昏睡神
迷，項背強直，高热無汗。

处方

生荊芥三錢 炒黑荊芥三錢

用法

煎水服之。如牙關緊閉，可將牙齒撬開灌
之。此方亦治產后驚風，但須加重便一杯和
服。

已戍丹

董儀瑞

主治

毒蛇、瘋犬咬傷

处方

奎津一分 大紅馬腦一分 大紅礞砂一分
麝香一分 上西黃一分 上腰黃二分

大梅片一分 白硝二分

制法

共研細末，勻裝十小瓶，用蠟封口，再用火
漆加封，勿洩氣。

用法

把藥点入靠近鼻梁的眼角，点后閉目仰面。
輕者点三次，重者溫開水服一小瓶，可連点
二至三次。

狂犬病方

朱雨臣 胡淑身 王子源

主治

狂犬病，精神極度恐懼，狂躁抽搐，咽困難，聲門和咽部劇痛而痙攣，全身震顫抽搐者。

处方

斑蝥(去足翅)七个 帶皮苦杏仁十四粒
蘇雄黃一錢 豆硃砂一錢

制法

共研細末

用法

開水送下。孕婦忌服。忌食狗肉。

〔註〕

此方斑蝥有劇毒，能刺激腎臟，引起血尿等危險，用量需經醫師研究。

五金丹方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

瘋犬、毒蛇咬

处方

麝香一錢 梅片一錢 火硝三分 明雄黃一錢
九制甘石一錢

制法

上藥共研極細

用法

點眼大角七次，男左女右。隔日再點七次，隔一星期又點七次，雖重症亦愈。

瘋狗咬方

吳匯川

主治

瘋狗咬傷

处方

斑蝥七个 糯米一兩

制法

同炒。斑蝥炒至深黃色后取出，去頭尾翅足，研成細末。

用法

用高粱酒一小碗，煎斑蝥至半小碗，空腹服下，側臥二小時。先服黃連二錢五分，煎一小杯，如感腹痛，立即服下黃連水。

〔註〕

斑蝥系劇毒藥物，身弱有腎臟病者用時應斟酌。

狂犬咬方

溧水縣衛生科

主治

狂犬咬傷

处方

銀花四錢 錦紋大黃四錢 甘草一錢(另泡水沖服)
地龍虫四錢 白蜜丹(和藥水服下) 桃仁一錢

制法

將上藥煎成水，並將另泡之大黃水和白蜜沖入藥內，徐徐服下，待三、四小時后，大便必下黑糞，再服一劑，以大便之顏色正常為毒已盡。

狂犬病方

溧水縣衛生科

主治

狂犬病

处方

生大黃三錢 桃仁(去皮尖)七个 地龍虫(炒)七个

制法

上三味研末，加白蜜三錢，用酒一盃，煎至七分，連渣服之。不能飲者，用水与酒对和煎之。小兒減半，孕婦忌。預防与治療均有确效。

用法

服此藥后，如祇扁稀水便，即認為無毒，不需再服。如屙紅黑色粘液，便即認為毒未除尽，須繼續服，直至轉为稀水样便为止。

瘋犬咬方

王鍾石

主治

瘋犬咬

处方

大黃五錢 黑白丑（以年齡計，每歲一粒）

黃柏五錢 皂礬三錢 桃仁二錢 地鼈虫五錢

制法

上藥研末，以白米湯調冲。

用法

內服，服后大便排出瘀血便，俟見排出黃糞为止。

泌尿病类

淋病方

張忠恕

主治

急性慢性淋病

处方

貓兒眼睛草（学名澤漆）紅棗三斤 白糖一斤 水十大碗，煮貓眼睛草，爛如泥，濾去渣，約八碗，加紅棗煮四碗，再加糖四兩和服。每晨一碗，四日服完。

制法

用法

尿閉外治方

李日东

主治

小便癰閉

处方

生姜一片 艾叶一至二錢

用法

將姜片放于臍下丹田穴（臍下三寸处），上放一团燃点着的艾絨，燃尽即換。最多燃三枚，即可產生尿意。

金錢草方

常熟縣第三屆中医進修班

主治

膀胱結石

处方

金錢草一兩五錢

制法

煎湯

用法

分五杯服

〔註〕

金錢草别名遍地金錢，其叶对生，形圓像鏡，生郊野湿地。能治玉莖腫痛、熱淋（見綱目拾遺）。本方原註云：「五三年五月号中医雜誌第廿一頁蕭逢春报道膀胱結石使用中藥治愈一例的初步报告中，金錢草可化腎

藏結石。」（該草目前廣州市荳欄上街廿四
号百如堂藥号有賣）

通小便方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 小便不通

处方 甘遂（研末）四錢 甘草一錢

制法 甘遂末清水調敷臍下一寸三分后，用甘草煎湯服之。

小便癰閉方

吳匯川 吳德輔

主治 小便癰閉，消渴（糖尿病）。

处方 玉蜀黍鬚一兩

制法 煎剂

用法 內服。消渴症宜連用多日。

雜病类

夜不寐方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 失眠

处方 生熟地各五錢

沙刺蒺藜各五錢

生熟甘草各三分

龍齒龍骨各一錢

黑菖蒲各三錢 赤白茯神各三錢

川釵石斛各三錢 加鮮百合一枚

天麥門冬各二錢 生熟白芍各二錢

后入川連、桂心各一分

制法 河井水各半煎服

用法 內服

〔註〕 原註：「此方系蔣紫真先生方，治夜不寐良法。」

風疹塊方

曹鳴高

主治 風疹塊

处方 紫荆樹根不拘多少

制法 浸酒或煎服

用法 口服

治結核性腦膜炎方

俾榛

主治 結核性腦膜炎

处方 凌霄花二錢 白茅根四錢 大黃一錢 赤芍四錢

蒲公英四錢 通草一錢 甘草二錢

羌活子六錢 夏枯草二錢 桑葉（酒炒）三錢

馬鞭草四錢

用法 乳兒患者，母子同服，斷奶小兒減半。

神經衰弱方 常熟縣第三屆中醫進修班

主治 神經衰弱

处方 鮮胎盤一具

制法 漂淨，文火煨切碎，飯鍋上蒸，晒干研細為

丸，或裝膠囊。

用法 每服〇·五（一分六厘）至一克（三分二厘

），一日三次。

失眠方

龔子欣

主治 失眠

处方 豬胆汁拌川連一錢 豬胆汁拌山梔五錢

制法 晒干研細末為丸

用法 每日清晨及臨睡時各服一錢

遺精方

姚頌岳

主治 夢遺（無夢者無效）

处方 黃柏一兩 真梅片四分 硃砂（飛）一錢五分

制法 黃柏硃砂先研，然后再入梅片研和，飯糊丸

如菉豆大。

用法 每早晚各服一錢五分，開水過口。

〔註〕 本方原註：「接服二料，效驗約十分之八。」

陽痿方

劉云鵬

主治 陽痿而顏面蒼白，手足畏冷，少精神，好靜

少語。

处方 硫黃錫

制法 每日取硫黃（不超過二克（六分四厘））拌于

飯中餵母雞，食三星期後殺之。

用法 白湯煮食，約五只上下。

〔註〕 原註稱：「三至五月可愈」。

葛清華

遺尿方

主治 遺尿

处方 鮮雄雞肝一具 官桂末等分

制法 同打爛為丸

用法 成人量每服一錢，每日三次，開水送下。

遺精方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 遺精

处方 刺蝟皮

制法 炙研細末

用法 白粥湯調下二、三錢

遺精方

張澤生

主治 遺精

处方 五倍子(炙)三錢 煨龍骨三錢

制法 研末。唾液調糊為丸，如桂元核大。

用法 納于臍中，外以布紮。三日一換，久用有效。

滑精方

儀征縣衛生科

主治 遺精、滑精

处方 五味子(炒)四九粒

用法 臨臥前用鹽開水頓服

消渴症方

吳德輔

主治 糖尿病

处方 生豬胰子二兩

制法 胰子切成小塊，冷開水洗淨。

用法 每日吞服十余小塊，陳酒空心送服。一月可愈。

十棗湯

苏州市中医診所

主治 胸膜炎(滲出性)

处方 甘遂 芫花各一分半 大戟一分半

制法 用十棗湯煎

用法 空腹服

〔註〕 實驗者稱：「治愈率約百分之五十」。

盲腸炎方

劉定宇

主治 盲腸炎

处方 秦當歸一兩 生白芍二兩

用法 水煎服。服后第二天即止痛。

紅藤方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 慢性闌尾炎與流注

处方 紅藤二兩

制法 煎劑

用法 內服有效

盲腸炎方

劉定宇

主治 盲腸炎

处方 鷄血藤四錢

制法 黃酒煎服

脚氣驗方

陳丹華

主治 脚氣

处方 黑附片三錢 太子參三錢 炙黃芪三錢

赤小豆一兩 二妙丸三錢 川桂枝一錢半

生熟苡仁各三錢

制法 水煎

用法 內服

外科門

瘡瘍類

熱癰方

俚
榛

主治

熱癰

处方

芭蕉根汁一茶盅

用法

如患熱癰，連生不斷，飲之可消熱毒而愈。

斷背丸方

蘇州市中醫診所

主治

流痰（骨及關節結核），已形成冷膿腫及瘻管時功效尤為顯著。

处方

尅蛇龜

制法

用鉛絲將龜紮好，外用鮮荷葉包裹，再塗泥土，用炭火煨存性（約二小時）。煨時切不可流氣。取出放陰涼處一夜，去泥土，研成極細末，用軋片機械軋成○。五克片劑。

用法 每日三次，每次一片至二片。

流痰方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

流痰（寒性膿瘍）

处方

藤黃末

用法

搽膏藥上貼之。堅硬不紅之陰症，用上藥貼之，紅者用生軍磨汁，調藤黃末敷之。

桂麝散方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

消一切陰疽流注

处方

麻黃五錢

豬牙皂三錢

生半夏八錢

生南星八錢

細辛五錢

麝香六分

肉桂一兩

冰片四分

丁香一兩

制法

共研細末，瓶貯候用。

用法

此方同八將散合用，貼鶴膝風有效。

青龍散方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

無名腫毒，紅腫不出膿。

处方

月石五錢

冰片三分

青黛五分

制法

共研末

用法

外用。治耳內腫痛，用此藥吹之。

祖傳伸筋丸方

王定安

主治 癰疽流注及各種堅硬不消外症

處方 蜈蚣(炒)二兩 斑蝥(炒)五錢 上血珀六錢

炙乳沒各一兩五錢 炙甲片一兩五錢

紅花(炒)二兩 伸筋草(炒)三兩

制法 共研細末，糯米飯打爛為丸，如菽豆大。

用法 每日早晨空腹吞服六至七粒

〔註〕 斑蝥內服分量宜小，據交流者稱：「多服有引起惡心之反應。」

中國安福消炎膏

凌几味

主治 紅腫、熱痛等炎症

處方 生山梔五錢 白芥子五錢 當歸尾五錢

元明粉七錢

制法 上藥共研細末

用法 以雞蛋清調敷患處

〔註〕 據交流者稱：「用于肋膜炎病例，有止痛消炎之功。」

壁虎散方

楊少仙

主治 乳癰症初起二、三日，乳房局部生核，硬而

疼痛。

處方 活壁虎一只 雞蛋一枚

制法 將壁虎納入雞蛋內，用紙封固，放在瓦上用

炭火煨存性，研為細末，加冰片少許。

用法 以散少許放在膏藥上，點于患部，經一、二

日發痒，其核即消。外部潰爛內部化膿者禁用。

陽和膏

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 乳疹與一切陰性瘡瘍

處方 鬼箭羽一兩五錢 海風藤一兩五錢 防風一兩

當歸一兩 桑白皮一兩 九香虫一兩 肉桂一兩

制法 上藥研末

用法 臨用時拌和藥鍋內。使用時不可用火烘。

九龍下海散方

徐湘泉

主治 一切癰腫外瘍，開刀后排膿提毒。

處方 斑蝥一兩二錢 麝香三錢 犀黃一錢五分

冰片八分 前胡八分 元參八分

血竭三錢 乳香一錢五分 沒藥一錢五分

制法 將斑蝥去頭、翅、足，和糯米數十粒同炒，

炒至米色發黃為度。按稱准分量與其他各藥共研細末，貯于密塞瓶內。

用法 以少量藥末放置膏藥內，貼于瘡口。

〔註〕 本方据交流者稱：「排膿作用甚強」。

青龍丸方

李玉樹

主治 一切未成熟之癰疽、瘡瘍

處方 土木鱉四錢（淘米水浸三日，去皮切片，麻油炒）

姜黃一錢 穿山甲二錢

制法 用米飯一兩，打和為丸，如桐子大。

用法 大人每服一錢，小兒三分。每日二次，食后

服，以皂角針煎湯送下。

平腎散方

曹青儒

主治 腎肉外突

處方 烏梅（去核）一枚 輕粉少許

制法 以少量輕粉納入烏梅

用法 將梅肉放在腎肉上，然后蓋以膏藥。

〔註〕 此方內有輕粉，對治腎有效。

提毒方

朱蘭仙

主治 潰后之癰疽及其他腫瘍

處方 天仙子

制法 去壳，研細末至無聲為度。

用法 將藥末干摻于傷口上，蓋以膏藥。

〔註〕 天仙子廣東產者良，据交流者云：「本地產的品種不同，可能無效。」

預防癰瘡方

俾 樑

主治 預防伏日生癰瘡

處方 使君子仁

用法 伏日小兒啖食使君子仁數粒。服量按年歲而定。至七歲則服七生七熟，年幼者遞減，長

者不加。如三伏服三次，則夏無瘡癰，秋不瀉痢。

如意膏方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 瘡瘍潰爛、疔與發背

處方 黃柏一斤 川椒四兩 大楓子四兩

西丁（硫黃）一斤 枯礬四兩 水銀四兩

腦砂四兩 蛇床子四兩 木鱉子四兩 輕粉四兩

烟膠一斤 苦參一斤

制法 先將水銀、大楓子油研和，再加腦砂、輕粉

共同研細，再加上藥研細末。

用法 以藥末摻入藥鍋內，拌和貼患處，數日即愈。

海浮散方

朱宗瑾

主治 手足大小瘡瘍，久不生肌收口者。

处方 乳香（形如乳頭者佳）明沒藥各等分

制法 新瓦上煨，去油存性，研末愈細愈佳。

用法 先將患處洗淨，摻上藥末，另用絲棉紙玉紅膏攤貼蓋上，屢用有效。

癰疽經驗方

王定安

主治 癰疽堅腐不化

处方 蜈蚣十條 斑蝥三十只 巴豆肉三粒 雄黃四錢

制法 蜈蚣、斑蝥微炒，巴豆压去油微炒，同研極細末。

用法 將藥末放于膏藥內蓋貼之

〔註〕 据交流者称：「此方能迅速去腐而不痛。根盤堅硬者，可使軟化潰膿。」

流注擦藥方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 流注

处方 杜紅昇六錢 腰黃四錢 硼酸粉二錢 犀黃一錢

麝香一錢

冰片少許

制法 研細末

用法 摻藥綫上用

生化丹

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 用于外科已化膿

处方 生半夏七錢 銀珠三錢

製法 研細末

用法 撒于瘡口

背部癰疽方

丁芳靜

主治 搭手發背

处方 松香四兩 黃升一錢五分 冰片一錢

制法 先將松香研細，放銅鍋內熬至融化為度，但不可熬得太老。融化后，隨將黃升、冰片投入。另用火酒先放瓶內，其量約把藥汁沉沒為度。以制成之藥，傾入火酒內密封，隔三天后將溶液取出，放布膏藥，即刻貼瘡上。

膏藥下剪一條縫，以便膿液引流。每三天換膏藥一張，約三張可痊愈。

介紹者附註：「制取藥液時動作要迅速，否則即凝固不適用，所剩藥液，須蓋好密封，

〔註〕

則即凝固不適用，所剩藥液，須蓋好密封，

防止風干失效。L

冰珠散方

朱宗璵

主治 搭背

处方

辰砂(水飛)五分 大梅片五分 生半夏三錢 大貝母三錢

制法 共研細末

用法

不論瘡口大小。先以甘草、銀花二味煎湯，洗淨瘡口，再用藥末搽上，外用油紙刺孔蓋貼。四周紅腫處塗桐油，雞毛蘸掃，一天三、四次。

搭背方

王少甫

主治

搭背紅腫未潰，燒灼疼痛。

处方

赤石脂

制法

研細末

用法

用冷開水調成糊狀，敷于患處四周。輪流數次，可止疼、防潰。

發背方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

發背去腐肉

处方

大黃蟬 冰片

制法

用大黃蟬焙干研末，加冰片。

用法

敷患處，蓋上膏藥，第二天腐肉即去。

發背方

祁燕然

主治

發背

处方

五倍子 貝母 白蜜各等分

制法

上藥研極細末，用白蜜調勻即成。

用法

破潰流有白色小粒，很多小孔，將藥放于紗布貼上三至八次即愈。重者用蒲公英四錢紫花地丁 金銀花各三錢煎湯服。

对口瘡方

譚醒華

主治

对口瘡已潰未潰均可

处方

茄蒂一錢 頭梅(冰片)一分 黃烟屑一分

制法

將茄蒂燒存性(即不太焦黑而保存其性質者)，共研極細。

用法

塗擦瘡面，或散布上貼瘡口。

对口疽方

謝百川

主治

對口疽(其他外症禁用)

处方

番瓜蒂 鯽魚一尾

制法

將番瓜蒂切碎，放魚腹中縫好，掛在樹上日

晒夜露，八十一天取下，放瓦上焙干，研細末用。

用法 將上藥用雞蛋清調勻，敷于瘡的周圍，連續塗之。

善攻头方（又名蟾頭头）

沈志芳

主治 善攻头

处方 食鹽 鉛粉等分

制法 將食鹽炒焦，与鉛粉同搗，入膏藥內攤于布上。

用法

先將患处周圍頭髮剃光。膏藥須比瘡口大三分之一，貼于患处，三日換一次。又法：將該藥制成半寸長之細藥条，俟干燥堅硬后，將藥条塞入瘡口內，膏藥蓋貼，一日換一次。

千槌膏方

朱云傑

主治 蟾頭头

处方 土木鱉十粒

沒藥四錢

蓖麻子（去壳淨肉）一兩四錢 乳香四兩

巴豆（去壳）十粒

东丹二兩五兩（后入）

苦杏仁三錢

松香七兩

制法

先用蓖麻子、巴豆二味千槌打細，然后同諸藥共研細末，入鍋溶化，最后將东丹收膏，貯于瓦罐內。臨用时用熱开水溶化，放入鍋內煎煮，一料膏藥約放菜油二兩。

用法

〔註〕

先將患处頭髮剪光，然后以此膏貼之。煎煮膏藥時，宜用文火。如膏太硬，可加菜油，太軟可加东丹。

治蟾頭头方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

蟾頭头

处方

降藥

制法

研細末

用法

以降藥塞瘡口中，上蓋膏藥，隔三日揭去膏藥，抹去膿液再蓋膏藥，不必塞降藥。保持清潔，數日即愈。

治蟾頭头方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

蟾頭头

处方

紅汞水百分之二

用法

先用針筒將膿血抽出，再以等量紅汞水注入。依然不須換藥，三、四日即愈。

乳痈方

范濟霖

主治 乳痈

處方 夏枯草三錢 蒲公英五錢 鹿角霜(搗碎)一錢五分

用法 陳佛手二錢 制乳沒各一錢五分 王不留行三錢

煎服三劑

奶癰消散方

張元浩

主治 奶癰

處方 蒲公英四錢 白芨三錢 沒藥三錢 地丁草四錢

木瓜三錢 甘草一錢 銀花四錢 乳香三錢

澤蘭四錢

制法 煎湯服

乳癰外治方

叶步成

主治 惡寒發熱，乳房腫硬，表面紅而疼痛，乳汁

不下。

處方 芫花 紫花地丁(皆取根皮)等分

制法 取新鮮多汁者搗爛，加水做成錠子。

用法 將錠子塞鼻中(或左或右，不能全塞)。鼻

腔內發覺刺痛時即拔去，以免破潰。隔一小

時后再塞，約二十四小時見效。孕婦禁用，

新產不忘。

乳癰方

許茂祥

主治 化膿性乳腺炎

處方 蒲公英(鮮者尤佳)二兩，劑量加倍亦可。

制法 水煎蒲公英，去渣，黃酒兌入口服。

用法 內服。藥渣外敷患處。

魚口毒方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 魚口毒

處方 威靈仙五錢 大貝母五錢 知母五錢

制法 研末酒調

用法 每天內服五錢。早中晚飯前服，三天服完。

臙瘡方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 臙瘡(下腿潰瘍)

處方 松香三兩 白占三兩

制法 上二味煮透，取出放冷水內搓洗數十下，再

養再洗，如此九次，倒地待冷取起，每兩加

輕粉三錢 銀珠一錢 白蜜少許，煉老成珠，

加菜油少許，燉熱攪勻。

用法 看瘡大小作餅，置瘡上，以布紮好。周時取

下。

石珍散方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 一切瘡瘍破潰作痛熾赤者

处方 熟石膏一兩 青黛三錢 黃柏三錢

制法 共為細末

用法 香油調敷

对口疽發背方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 对口疽發背

处方 巴豆肉

制法 炒枯研末

用法 摻于膏藥上貼之。一日一換。

脫壳囊癰方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 羣丸發炎破潰

处方 紫蘇

制法 研末

用法 逐漸摻之而收口

發背膏方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 發背

处方 白蜜

制法 烏金紙攤貼

發背方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 發背

处方 狗大牙

制法 炒黑為末

用法 葱湯煎，洗瘡口，以末摻上。

靈應必消散方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 一切痰核、無名腫毒

处方 川草烏五錢 蟾酥一錢 白芷五錢 麝香四分

制法 花板一錢 山奈三錢 貝母三錢 大黃三錢

用法 共研細末

未成塊者，將此藥摻于膏藥上貼之。本方加
入干姜末四錢，治小兒頸上寒痰核最妙。

臙瘡方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 臙瘡（下腿潰瘍）

处方 將本地棟樹子裝滿一罇，用篾絲架封口。另
用空罇埋在土中，將裝有棟樹子的罇合上，
再在罇外四圍用礬糠火煨，即有棟子油漏

下。

用法 將油擦患處

妙灵丹方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 一切潰爛拔毒提膿

用法 黃昇八錢 沒藥一錢五分 青黛二錢

白歛一錢 輕粉一錢

寒水石二錢 制乳香二錢五分 冰片三分

枯礬一錢 海蝶蛸一錢

制法 細末

用法 外用

九一丹方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 提膿拔毒

用法 乳香二錢 升藥一錢五分

冰片三分 制石膏三錢

雄黃一錢 硼砂五錢 川貝一錢

制法 共研細末

用法 外用

金僧散方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 結毒，多骨疽，破爛日久不斂，或多骨不

出，毒不清。

用法 蜜陀僧一兩 冰片一分

制法 共研極細末

用法 桐油調塗瘡口，干摻亦可。

推車散方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 專治多骨

用法 推車虫

制法 炙研細末，每一錢入干姜末五分。

用法 吹孔內。內有骨，次日不痛骨自出。

生肌長肉方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 生肌長肉

用法 曰屋上屋花（鮮用）

制法 炙研。干者烘脆研用。

用法 摻布用

棉瘡下疳方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 棉瘡下疳

用法 田螺厖

制法 炙存性，研細末。

用法 麻油調塗。水多膿多者干摻之。

消癰瘡方

叶心銘

主治 夏秋間癰瘡

处方 芭蕉干

制法 切成餅塊，置入压榨器（榨甘蔗用的亦可）

內，榨取大量液汁。

用法 小的癰瘡，可以毛筆或鷄毛蘸藥塗擦。炎症

劇烈者用本藥浸，紗布作冷瘡用。

对口疽方

陈丹華

主治 对口疽

处方 鼯鼠头（即黃鼠狼头）

制法 掛在屋簷下風干研末

用法 麻油調敷

四味散方

湯源深

主治 癰疽，發背，疔瘡，呼膿拔毒，生肌收口。

处方 太乙粉（煨）二斤 銅綠一兩六錢 大梅片一錢五分

輕粉一錢六分

制法 右味研極細末

用法 外敷

对口瘡方

李殿斌

主治 对口疽

处方 金头蜈蚣（去身研末）四个 瘦猪肉二兩

制法 將蜈蚣头、瘦猪肉搥爛如泥

用法 將藥敷于瘡口，以搥爛豬肉敷之，一日換

二、三次。無論初起或已潰，能消能完口。

止血棉花方

湯源深

主治 止血

处方 水楊樹（打汁）一大碗 京墨（將上汁磨濃） 醋四兩

制法 上墨汁同醋拌和，用棉花衣把上汁蘸乾，再

放太陽中晒極干用。

老爛脚方

宝山縣衛生工作者协会

主治 老爛脚

处方 蘆甘石一兩 石膏（煨）一兩 滑石一兩

樟冰一錢

制法 研細末

用法 熟豬油調敷

盲腸炎方

王書生

主治 盲腸炎（腸癰）

处方

第一方：紅藤（又名老佛藤）二兩 黃酒二茶杯
第二方：紫花地丁一兩 黃酒二杯

以上二方藥与酒各煎成一杯，分別服之，痛即止。再服后方即可除根。

第三方：僵蚕二錢 金蟬蛻二錢 蜈蚣一錢

川軍一錢 老蜘蛛五錢

以上五味为末

用法

如前日用一方，次日服二方，必可全好；再服第三方可根除。

癰疽方

王書生

主治 搭手發背之潰爛者

处方

陳菜油半斤 黃臘四兩 老松香一兩
桃丹一錢半

制法

先以菜油放銅鍋內煎沸，次用黃蠟熔化，再將松香放入，視起白色烟时，立即摻入桃丹。

用法

嫩油紙攤貼

疔瘡類

疔瘡方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

各种疔瘡

处方

松香四兩 杏仁七粒 草麻仁五錢 荔枝核三錢
东丹三錢 蓮肉七粒

制法

研細末，用生姜汁、青葱汁打和成膏。

附制松香法：松香用白嫩者。放鍋內制，提至清白脆嫩易研。

用法

無論已潰、未潰，攤布貼之。

消腫提毒方

張和林

主治

疔瘡初起

处方

草麻子肉四十九粒 巴豆肉一貫半 麝香一分
犀黃一分 紅升三分

制法

草麻子肉、巴豆肉研搗后，同麝香、犀黃、紅升合併研細，打和成膏。分裝十小瓶，密塞勿洩氣。

用法

疔瘡初起时，稍破表皮貼之。

〔註〕

本方適用於疔瘡初起，已經化膿者無效。

疔藥方

沈志芳

主治 面部及手指疔瘡，有提毒作用。

处方 壁釘不拘多少 陈黃升少許 梅片少許

制法 先用壁釘在瓦上炙灰，研極細末，加入黃升

共研和勻，最后加入冰片研和，入瓶勿洩氣。

用法 以藥末放入膏藥內，貼在瘡口上。

〔註〕 壁釘是牆头上的小螺螄，四、五月間潮濕氣候時甚多。

瘡疔方

陸慎其

主治 膿瘍初起（未老先白头）、指头疔、人中疔，均有效。

处方 蒼耳草蠹虫（俗名野茄科。此虫生于草節中）

制法 浸于油中备用

用法 每用取一條，置瘡头上，小膏藥蓋护，次日將膏藥揭下，膿头自出。四圍紅腫，亦可消散。再換一、二次即愈。

〔註〕 抗战前上海中國医学院伤科教授朱寿鵬先生亦曾傳此方，盛稱治瘡癰有效云。

立馬眼疔丹方

王定安

主治 顏面疔瘡

处方 守宮（即壁虎）七條 斑蝥十五只 全虫一錢

蜈蚣七條 人指甲少許 耳膜少許 青龍衣一條

黃升藥三錢 灵磁石七錢 犀黃四分 甲片四錢

制法 用新鮮守宮为佳。炙黃耳膜，人指甲焙黃，

青龍衣炙黑存性，同上藥共研極細末。犀黃最后放入。

用法 將瘡口挑破后，即以藥条蘸上藥插入，或干

瘡瘡口上。

〔註〕 原註称：「此藥必須研細至無声为度，用

時可能有少許疼痛，但流出黃水后疼痛即止。」

拔疔膏方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 疔瘡

处方 銀珠（水飛）一錢 蓖麻肉二錢 嫩松香五錢

輕粉五分 黃丹（水飛）一錢

制法 共搗如膏

用法 初起時作餅貼之

消疔散方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 疔瘡

處方 礞砂一厘 牆壁釘一兩 牛黃一分 冰片一錢

制法 研末

用法 摻膏藥上貼之

敷疔方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 疔瘡

處方 牆壁釘(活的)三十个 康熙銅錢兩個

制法 略加食鹽同搗爛研末

用法 塗敷用

疔瘡初起奇效方

沙亦恕

主治 疔瘡初起

處方 百草霜一錢五分 耳塞(即人耳垢)三分

土驚虫三个 人乳(搗時配加)

制法 共搗(稀濕為度)

用法 敷患處

唇疔特效方

沙亦恕

主治 唇疔

處方 鉛粉二錢 黑胭脂二錢(以上二藥各地漆店均有出售)

制法 共研細末

用法 用麻油調敷患處

〔註〕 据沙亦恕先生称：「此方流傳一百余年，療

效良好。」

疔毒方

連水縣衛生科

主治 疔毒紫黑危急症

處方 內服：蒼耳草叶(搗汁) 壹便。冷服一盅，一

日三次。

外用：蒼耳草根莖叶一束(燒灰存性為末)。以醋

和泔豉熬拌如泥。先將疔中心及周圍刺破拭

淨，敷之不過十次，根拔出即愈。

皮膚病類

下腿潰瘍(臙瘡)藥膏

叶玉峯

主治 臙瘡俗名爛腿，近代醫學稱為「下腿潰瘍」，

好發于下腿脛之前緣，潰爛流膿，或出血，

放惡臭。婦女患此者，旧時稱為「裙邊瘡」，

每因月經來潮而增劇，其瘡面往往呈紫色，

处方

瘡口之边沿高起，如堤样，累月經年，很难收口生新皮，此为难治之症。

用法

(一)蜂蜜適量(未經提煉之新鮮蜂蜜，效力更佳)
(二)动物生血(猪、羊、鷄鴨之血均可)適量
(一)用蜂蜜厚塗紗布上，貼患处，外以綁帶紮縛之，每日換藥一次。

(二)用动物血厚塗局部，包紮之，每日早晚各換一次。

說明：(一)(二)兩方，可交換用之，或先用(一)方數天后改用(二)方，或先用(二)方數天后改用(一)方。兩者交換均可。或覺某方用之效果較好，則專用某方亦可。

〔註〕

据介紹者称：「曾介紹試用者約計七、八例，(二)方对促進內芽生長效果较好。(一)方对周圍高凸有平复之效，有朱姓一妇人，患此已三年，曾試殖皮術，十愈六、七，嗣因月經出血過多而失效，后以(二)方二十天，中央清潔，再改用(一)方，約經三十余天而痊愈。」

鬚鬚头方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 鬚鬚头

处方 升藥底 大楓子油

制法 昇藥底研末，以大楓子油調。

用法 塗患处

鬚鬚头方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 鬚鬚头

处方 紫草

制法 紫草浸入麻油一晝夜，然后放飯鍋上蒸熟。

用法 用麻油搽患处

禿瘡效方

駱筱峯

主治 禿瘡

处方 鮮桑椹子

制法 搗爛

用法 剃头后塗上，当时甚痒，二、三次愈。

牛皮癬方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 牛皮癬、胎毒

处方 蛤粉二兩

生熟石膏各二兩

黃連五錢

制法 老銅綠五錢 輕粉五錢 黃柏一兩 大黃一兩
研細末，麻油或凡士林調。
用法 外敷患處。

黑藥膏方

王少甫

主治 繡球風、疥瘡、鬚鬚頭（黃癬頭）
处方 柏油（即木榴油）四兩 菜子油一兩 樟腦三錢
制法 上藥混合攪拌
用法 先將患處洗淨，用此膏塗擦。

繡球風方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 繡球風及牛皮癬
处方 花龍骨一兩 白芷一兩 烟膠一兩 黃丹二錢
輕粉四錢 煅石膏三兩
制法 共研細末，酌加冰片。
用法 麻油調塗患處

五倍散

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 皮膚熱痒的帶狀泡疹
处方 五倍子
制法 研細末
用法 用醋調敷患處

黃連膏方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 婦女乳頭破碎與皮膚風毒痒疹
处方 川連三錢 黃柏五錢 姜黃五錢 归尾二兩
生地一兩
制法 上藥以十二兩菜油浸一晝夜，次日晨用火煎
枯，濾過去渣，再以黃占四兩溶化收膏。
用法 調塗患處

三靈丹方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 濕疹、黃水瘡
处方 川連二錢 黃丹八分 輕粉三分 梅片五分
三興硃一錢
制法 共研細末
用法 和菜油調塗

剃刀瘋方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 头部慢性濕疹
处方 花椒
制法 研末浸菜油
用法 擦患處。一日數次，不可用水沖洗。

痱子方

惲 榛

主治 夏日小兒感受暑熱發生瘡子（亦稱瘡子、痂子）

處方 絲瓜叶

用法 搗爛取汁，搽上即消。

黃水瘡方

凌几味

主治 黃水瘡、天泡瘡

處方 青黛二錢 黃芩四兩

制法 將黃芩煨灰后以青黛拌和

用法 用時以麻油或菜油調敷患處

〔註〕 本方使用便利，据交流者經驗，效果良好。

黃水瘡方

封志鈞

主治 小兒黃水瘡

處方 白臘二兩 黃臘二兩 輕粉一錢半 血竭二錢

枯礬六錢 乳香三錢 沒藥三錢 銅綠二錢

蜈蚣一對 雄黃四錢

制法 除黃白臘外，其余八味共研細末。先取二臘

文火熬汁十分鐘，加入藥末再熬十五分鐘，

取出裝瓶。放置地上二夜，以去火性。

用法 先用明礬水洗淨瘡口，再塗藥膏，經過一星

期可痊愈。

七星丸方

郁有文

主治 疥瘡

處方 白信 巴豆 斑蝥 大楓子 葶麻子

水銀各一兩

制法 共研細末，用麻油調和，做成丸子。

用法 晚上睡在床上時，將該丸在胸口輕輕擦

之。連擦五、七日。

〔註〕 此方內有劇毒藥品，宜慎用。擦擦時特別注

意不可擦破皮膚。

腳丫濕痒方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 腳丫濕痒

處方 蜜陀僧

制法 水磨

用法 搽患處有效

水龍骨散方

主治 腳丫濕氣生臭味，痒則刺骨難忍。

處方 旧船底上石灰 梅片（即冰片）少許

制法 將石灰火煨研細，再加入梅片研和。

用法 先將腳丫洗淨，拭干后搽上。

〔註〕 脚趾溼气，大概是香港脚之类。

白癬風方

王海春

主治 皮膚起白癬痕

处方 紅葦花（該草生長于草田及河岸边，高梗大

叶，端开粉紅色花成串）二斤

制法 熬汁去渣，加蜜收膏。

用法 每日早晚各服三錢，連服二料，同时外用白

茄子擦白癬。

〔註〕 原註称：「經二至三月后，皮膚即能正常，

並能使癬不再滋蔓」云。

白癬風方

刘光祖

主治 白癬風

处方 当归一錢五分

高丽參三錢

丹參五錢

川芎四分

棉芪三錢

小胡麻三錢

白芍三錢

土炒干朮一錢三分

蟬退一錢五分

熟地三錢

甘草五分

白蒺藜一錢

用法 煎湯服

赤遊丹

常熟縣第三屆中医進修班

主治 赤遊丹

处方 沒实子

制法 用开水磨細

用法 敷患处極效

青保丹方

常熟縣第三屆中医進修班

主治 紅腫遊火丹毒

处方 天花粉三斤

大黃一斤

姜黃半斤

黃柏半斤

白芨四兩

陳皮四兩

青黛四兩

白芷六兩

甘草二兩

制法 研末

用法 以菊花汁調敷患处

外用殺八脚蟲方

陸明歧

主治 殺八脚蟲

处方 百部草一兩

火酒二兩

用法 浸廿四小時后即可搽患处

鵝掌瘋方

楊英華

主治 鵝掌瘋

处方 豬尿泡一个

花椒三錢

醋酸適量

制法 豬尿泡去掉尿液，加入醋酸、花椒。

用法 將手套入豬尿泡內，上面以綫紮緊，數小時

后取出。

〔註〕 有裂紋者，用此藥可能發生刺痛。

鵝掌瘋方

帥海洲

主治 鵝掌瘋

处方 杉木片

制法 取杉木片晒干，火燒出烟。

用法 將手塗上元醋，置烟上烘之。乾后再塗，反

复五、六次。烘后用布包好，不可入水。每日一次。共八天。

鵝掌瘋外用方

主治 鵝掌瘋

处方 野芥菜子三錢 肉桂五分 东丹（水飛）一錢半

飛面二錢 春砂仁五分

制法 共研細末

用法 以白酒釀、燒酒和勻調

油灰指甲方

惲 榛

主治 油灰指甲

处方 白鳳仙花

制法 連根叶搗爛敷之

風熱瘰癧洗方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 風熱瘰癧

处方 大黃蒲二个 雄豬胆五枚

制法 煎水

用法 洗滌用

風熱瘰癧洗方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 風熱瘰癧

处方 苦參四兩 大黃蒲二个 雄豬胆五枚

用法 煎水洗之

〔註〕 原註称：「貼膏藥后的過敏疹，經洗三、五

次，效果良好。」

白癧風方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 白癧風

处方 白芷二錢 雄黃一錢

制法 上藥為末，以白茄子蒂煎藥。

用法 擦擦用

黃水瘡方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 黃水瘡

处方

雞蛋黃五枚

制法

置銅杓內熬膏

用法

用布蘸擦患處

石黃散方

馬培之傳

馬澤人獻

主治

濕瘡浸淫出水，破爛痒痛。

处方

熟石膏一兩 黃柏三錢 輕粉三錢

制法

為細末，用香油調。

用法

敷患處。如有水者，干摻之。

肥瘡散方

馬培之傳

馬澤人獻

主治

大人、小兒頭肥瘡浸水作痒

处方

松香一兩 黃丹三錢 枯礬三錢 黃柏三錢

制法

為末

用法

香油調敷

流火方

馬培之傳

馬澤人獻

主治

流火（脚上發紫塊）

处方

煤炭（患處大小分量酌用）

制法

研末，溫醋調。

用法

外用

纏腰火丹方

馬培之傳

馬澤人獻

主治

纏腰火丹

处方

黃鱉血

用法

塗布用

黃水瘡方

馬培之傳

馬澤人獻

主治

黃水瘡

处方

甘草七錢 硼砂三錢

制法

研極細末，用菜油調如面漿式，再用冷開水

用法

沖成敷藥。

用法

敷于瘡上

鬚鬚頭方

馬培之傳

馬澤人獻

主治

鬚鬚頭

处方

生礬三錢 黃豆（炙存性，研末）二兩

制法

用生礬泡水，將頭洗淨，再將黃豆末和灶上

用法

烟塵灰二錢拌勻。

用法

菜油調塗之

鵝掌瘋方

楊志強

主治

鵝掌瘋

处方

升藥脚三錢 全蠟十日 輕粉一錢 蜈蚣五條
土槿皮五錢 榆面五錢

制法

共研細末，加冰片少許，以適量之醋調成粥狀。

用法

將調成之藥塗兩手，以布包好，七天后去掉。兩手在兩星期內不得入水。

小兒赤游丹方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

小兒赤遊丹

处方

鵝蛋三枚

制法

煮熟去白，將蛋黃入鍋內熬至成油。

用法

塗擦用

胎毒方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

胎毒，脫皮見肉者有效，並治大人陰癬。

处方

黑魚一條

制法

煎湯

用法

洗用

紫草膏方

叶心銘

主治

濕疹、水泡疹、淺在性潰瘍（下腿潰瘍）、火傷、凍傷

处方

紫草根（切片） 黃臘 麻油（豬油亦可）

制法

約以油脂十兩入紫草二、三兩。先將油脂文火煮沸，徐徐加入紫草根，油脂即呈美麗紅色，紫草根漸呈焦黑，用紗布過濾即成。

用法

塗敷患處用

面上粉刺方

鎮江市中醫師協會

主治

肺經風熱、面上生粉刺

处方

紫背浮萍三錢 鮮蒼耳草五錢（如沒有鮮草，改用子亦可）

制法

上藥煎水

用法

每日早上用以洗面一次，連洗十余次即愈。

漆瘡方

鄒良材

主治

漆瘡（俗名漆咬）

处方

石壁

制法

水磨

用法

敷搽用

〔註〕

本方在常熟市第五聯合診所試用有效。

廉腿瘡方

陸硯濃

主治

廉腿瘡

处方

鉛粉五錢 制乳香五錢 輕粉五錢 制沒藥五錢

制法

共為細末。用香油四兩入鍋熬，將此四味藥末入油內，再加潮腦三錢同搗。

用法

外敷

臙瘡方（複方臙甘石豚脂劑）

王佐民

主治

亞急性、慢性及結核性潰瘍，多年久不收口之頑固性潰瘍，臙瘡及頸部結核性潰瘍。

处方

臙甘石一兩 銅綠五分 輕粉五分
龍骨二錢五分 冰片二分 白芷一錢五分

制法

白臘一兩 黃臘一兩 松香三錢 豚脂二兩
先將豚脂煉好去渣，加入黃臘、白臘、松香，調和均勻，融化即離火，再加入已研細之藥末，最后加入冰片，混和攪勻，即裝入罐內密閉。

用法

先以過錳酸鉀液或開水洗去潰瘍膿液。揩干，即將此膏照瘡口大小薄攤于油紙或紗布上，貼患處，外以消毒紗布包紮，或用膠帶細之，一日或間日一換。禁忌：（一）急性膿瘍。（二）激烈運動。（三）食刺激性食物。

臙瘡方

朱宗瑄

主治

多年臙瘡，發于小腿上下，似癬非癬，痛痒不堪，破流脂水。

处方

黃柏末一錢 大黃末三錢 黃連末五分
烟膏五錢 大梅片五分

制法

共為細末，桐油調。

用法

先將瘡面洗淨，然后敷上，能止痒收水。

臙腿瘡方

巩雨亭

主治

臙腿瘡

处方

大蔥白七棵

制法

搗爛。蜂蜜一酒盅。

用法

調敷三次

臙瘡方

主治

臙瘡

处方

制甘石三錢 百部一錢半 水飛滑石三錢
黃柏一錢半 水飛青黛一錢半 枯礬五分
冰片一分 蜈蚣一條

制法

上味共研細末

用法 菜油調敷

爛脚方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 老爛脚

处方 桐油脚

制法 將桐油脚燉熱，至出青烟止。加豆腐拌。

用法 塗敷

老爛脚方

陸元德

主治 老爛脚

处方 煨龍骨五錢 黃白占三錢(另研) 枯礬三分

蛤粉散二錢 廣丹一錢五分 銅青一錢

制法 上藥共研細末，用菜油四兩煎。先加黃白

占，后入余藥成膏。

用法 塗敷患處

下腿潰瘍外用方

樊汝梅

主治 下腿潰瘍

处方 鷄脛骨

制法 煨存性，研末。

用法 麻油調搽

下腿潰瘍外用方

陸明歧

主治 下腿潰瘍

处方 地鼈蛇(蝮蛇)

制法 放菜油熬枯

用法 取油搽之

凍瘡方

主治 凍瘡預防用

处方 大蒜瓣

制法 將大蒜搗爛如泥

用法 敷在每年患凍瘡處，外以布包裹。敷一小

時。不能過厚。在夏季二、三次。

〔註〕 大蒜瓣即大蒜種子。

凍瘡方

張文睿

主治 凍瘡

处方 透骨草五錢 冬瓜皮五錢

制法 水煎

用法 用湯洗患處

凍傷破潰方

主治 凍瘡潰破淋漓，或有膿液排出。

处方 野鴨脚一對

制法

瓦上焙灰研末

用法

用麻油或花生油調搽（未潰破者無效）

〔註〕

原註称：「如破口不大，最長不超过一星期即愈」云。

冻瘡方

張文睿

主治

冻瘡

处方

蜜柑皮

制法

火上烤成焦塊，研細末。

用法

將藥末調凡士林油塗在患部，用綢帶裹好。

蟾酥散方

馬培之傳

馬澤人獻

主治

外瘍陰陽兩症初起不紅不腫

处方

蟾酥一錢

沒藥二錢

藤黃二錢

蠟尾四錢

蜈蚣二錢

甲片二錢

雄黃二錢

川烏二錢

乳香二錢

草烏二錢

麝香五分

制法

共研細末，貯瓶待用。

用法

將藥末撒于比瘡大的膏藥上，貼患處。

玉露散方

馬培之傳

馬澤人獻

主治

專治一切化膿性炎腫疾患

处方

芙蓉（叶或花）

制法

干燥研末

用法

白蜜調敷或搽敷于患部，干即換。

〔註〕

原註称：「为特殊消腫解毒藥」。

瘰癧、癌腫类

瘰癧方

馬培之傳

馬澤人獻

主治

瘰癧

处方

蟾蜍兩枚

制法

去腸雜，同豬肉煮食之。

痰癧方

馬培之傳

馬澤人獻

主治

痰癧

处方

玉簪花根

制法

搗爛

用法

外敷患處

瘰癧方

馬培之傳

馬澤人獻

主治

瘰癧

处方

核桃肉一斤

斑蝥二錢

蜈蚣二錢

銀花二斤

制法

將斑蝥、蜈蚣入核桃壳內，炙枯存性，共研

末。

用法 每服二錢至三錢，陈酒下。

痰塊消散方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 痰癰成串，不論已潰未潰。

处方

紫背天葵六錢六分

黃芩(酒炒)五錢

黑元參六錢六分

瞿麥穗六錢六分

昆布(晒干，酒炒)五錢

真川連五錢

薄荷五錢

平番貝母(去心)五錢

桂枝五錢

生麥芽五錢

海參(洗淨)六錢六分

連翹二錢六分

山梔仁(去淨壳、酒炒)

制法

各藥各研細末，煉蜜為丸，如桐子大。

用法

每日早餐后一時，陈酒送下三錢。

乳癌方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

乳癌

处方

白芭蕉扇十把

制法

取其柄炙灰

用法

陈酒燉溫過服。每次服柄一根，服必見效。

乳癌方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

乳癌

处方

醋炙龜板

制法

研末，棗肉為丸。

用法

每服三錢，開水下。

乳癌方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

乳癌

处方

蟹壳

制法

焙為末

用法

日口服之。每服一錢，不可間斷。乳癌未潰

者用之。

化瘤丹方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

腫瘤

处方

白薇二錢五分

黃連二錢五分

生軍二錢五分

黃芩二錢五分

川芎二錢五分

明礬二錢五分

當歸二錢五分

吳茱一錢二分

制法

共研細末

用法

雞蛋黃調敷攤紙上，作膏貼之。

豎肉方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

贅疣

处方

鴉胆子(淨肉)

制法

研濃照瘰之大小敷上(先將瘰頭剝破見血)，外以膏蓋之，三日後連根拔出，脫痂而愈，並無疤痕。

蜀羊地榆散方

王慎軒 刘 棣

主治

初起原發性癌症。

处方

蜀羊泉 地榆各等分

制法

蜀羊泉切碎研末，地榆切碎炒微黑色，共研末和勻。

用法

每日五錢至八錢。絹包水煎。空腹時分二次溫服。

男子乳房結核方

王健行

主治

乳癰

处方

蓮房炭 牡蠣(煨)各等分

制法

研細末，黃酒燉。

用法

內服。每次二錢，每日二次，連服一星期。

癌腫方

張惠安

主治

各種癌腫

处方

鳳眼草(研細包) 趙鞠丸 逍遙散各五錢

制法

水煎

用法 每日一劑

瘰癧方

佚名

主治

瘰癧(子宮癌)

处方

紅莧菜四兩 小紫四兩

制法

共打極爛如泥

用法

用紗布兜在陰戶上(托在陰戶外面，周時一換)。

消癰丸方

王勵吾

主治

癰癰未潰或初潰者

处方

元參(蒸)四兩 牡蠣(煨醋浸)四兩 貝母(去心，產四川者良)四兩

制法

共研細末，煉蜜為丸，梧子大。

用法

每服三錢。每日一回。如配合逍遙散二錢同服尤佳。

頸淋巴腺結核方

張德澄

主治

頸淋巴腺結核(瘰癧)不論已潰未潰

处方

壁虎(天龍)

制法

瓦上炙灰

用法

每夜用黃酒吞服一條，數十次有效。

乳癌方

龔子欣

主治 乳癌（已破者）

处方 已破者用：土貝母五錢 胡桃隔 銀花 連翹 各三錢。酒水煎服。潰爛已久者用：雄鼠糞 經霜土楝子（不用川楝） 露蜂房各三錢

制法 煨存性。各取淨末和勻。每服三錢，酒下。二日一服即止痛收口。

瘰癧方（內消散）

漣水縣衛生科

主治 瘰癧

处方 硃砂一錢 血竭一錢 斑蝥（生用，去翅足）三分

制法 共為細末

用法 每日服一次。燒酒調和，空心服一分。未破者三、四周即消，已潰者內服此藥，外用金

頭蜈蚣一條，焙研極細，用麻油一小杯，浸三日，擦患處，其瘡腫潰加重，過二、三月腫消漸愈。

治癰方

張仲陶

主治 癰症

处方 草薢

制法 用酒醋煮三日，以酥為度。研細末。

用法 用麻油調敷患處，不拘已破未破皆治。

乳癌方

劉登羸

主治 婦人乳癌，堅硬如石。

处方 五倍子末二兩 昆布末五錢 乳香末二兩 沒藥末二兩 鴉蛋子（去壳，另研如泥）

制法 共和一處，入鎮江醋二斤八兩，慢火熬成軟膏

狀，量患處大小攤在紗布上敷之。

用法 每日早晚二次。每日二次，每次五錢，內服逍遙丸。

醉龍丸方

叶天心

主治 瘰癧疔瘡。初起时有消散之功。

处方 大斑蝥（去头、足、翅）一味

制法 用糯米同炒，去米用。研末，与白米飯和為丸，如菜子大。

用法 每日吞服一次，每次一九。

〔註〕 孕婦忌服。此方為劇毒藥，服用時不可過

量，否則，有引起腹瀉及小便出血之不良后果。

瘰癧丸方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

瘰癧無論初起、已潰、未潰均可有效。只須吃一料，即可見效或治愈。如已潰流黃水，服一料即可不流黃水，再服一料即愈。

處方

(一)海藻三兩 昆布三兩 牛膝三兩

制法

研細末，用甘草三兩煎湯泛丸。

用法

每服三錢，一日二次，開水送下。

處方

(二)玉簪花叶

制法

玉簪花叶浸鎮江醋(即好醋)內

用法

貼瘰癧患處，無論已潰未潰均有效。

處方

(三)貓头

制法

貓头放瓦上焙，研細末，加冰片少許。

用法

用麻油調敷患處，無論已潰未潰，均甚有效，屢試屢效。

〔註〕

此方出自南通朱良春編「民間醫藥刊」，已屢試有效。

瘰癧內服方

陸慎其

主治

頸部瘰癧

處方

野楊梅一斤 蒼耳草一斤

制法

將上藥切碎，同浸泡酒中，約一星期后用。

用法

每日二次，每次一杯(約一兩)。連服一月，可逐漸消退。

〔註〕

野楊梅即復盆子，蒼耳草又名野茄棵。

獨立丸方

周民康

主治

瘰癧及螻蛄毒，已潰未潰均可應用。

處方

斑蝥(炙)百分之十 生甘草百分之九十

制法

共研細末。勻和后以漿糊成丸，如菉豆大。

用法

每日早餐后吞服一粒，開水送下。

〔註〕

斑蝥系劇毒藥，孕婦及肝臟、腎臟疾患者忌服，多服可使小便不通。

瘰癧未破外用方

王映和

主治

初期瘰癧

處方

鮮芋苗子(要香梗半)少許

制法

加紅糖拌，槌如泥。

用法

敷于患處，四至六次。

瘰癧方(民間單方)

楊英華

主治

已潰爛之瘰癧

處方

蜈蚣一條 鷄蛋一枚

制法

以鷄蛋打一個洞，將蜈蚣放入蛋內，煮熟后

煎油。

用法 外塗

〔註〕 此系民間單方，治久潰不愈之頸淋巴結核有效。

瘰癧潰破外用方

主治 潰瘍性瘰癧（俗稱患核）

处方 黃柏末

用法 用麻油調稀，敷于患處。一日一次，須經

二、三月。其用量要隨瘡口大小而定。另外可內服夏枯草膏，每日晚各服一湯匙，溫開水下。

〔註〕 原註云：「試驗有百分之七十有效」。

瘰癧漏管外治方

陳德遠

主治 瘰癧漏管

处方 白壁虎尾（炙）三條 乳香（炙）一錢 沒藥（炙）一錢

黃昇一錢

制法 上藥共研極細末，用漿糊做成藥條。

用法 用藥條塞入瘡管，經三日取出，管即流出。

瘰癧膏方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 淋巴腺結核症（未潰者可用）

处方 豆腐泔水量不拘多少

制法 盛鍋內以文武火交換煎之。煎至漸稠，如漿

糊時則純以緩火煎，煎至象牙色即停火勿煎。

用法 敷貼患處。用清潔消毒紗布塗厚厚一層，再

貼紗布。用后感覺患處甚痒，初貼甚緊。逾

一、二日藥性減退，自行脫落，繼續再換，連續使用一星期。

〔註〕

此方系一中學校長錢人龍介紹，渠母患頸淋巴結核有十九年歷史，最近數年，發作較劇，乃進行治療，注射鏈黴素廿克，服異菸吡片稍效。勸其繼續注射，而其老母苦于注射疼痛，拒絕治療，后得友人介紹，用此方連續一月余即效，其瘰已消，無芥蒂。

瘰癧瘡驗方

施蘭田

主治 瘰癧

处方 大螺螄二、三個 紅礬少許

制法

將螺螄口蓋揭開，將紅礬裝于螺螄內，埋在地下一尺深左右，七、八天取出（夏天可少

埋几天。

用法 將螺螄取出，以水塗抹于結核处，經久自愈。

療癰方

王恩甫

主治 癰癰

处方 鱉甲一兩

制法 研細末

用法 敷在患处，三、四次痊愈。

治瘰方

惲 榛

主治 瘰

处方 昆布四錢 海藻四錢 知母三錢 川貝母三錢

桔梗三錢 廣木香一錢

制法 共研細末，晒干和面中，制成餅十枚。

用法 每日食二枚

乳癖方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 乳部硬塊不痛者

处方 生香附一兩 肉桂一錢 麝香二分 樟腦五分

制法 香附研細末，和入膏藥內，再加肉桂、麝香、樟腦。

用法 貼患处，久則自消。

療癰瘡驗方

徐鐘琪

主治 癰癰

处方 海藻一錢 土貝母一錢 白芥子五錢

紅娘子五个

制法 研細蜜丸，桐子大。

用法 開水服二十粒，每日二次。患处用藥丸，以

開水泡开敷貼。

治瘰方

惲 榛

主治 瘰

处方 昆布 海藻 海帶 海蛤 海螵蛸各五錢

制法 共研為細末，熬湯。

用法 每日早晚服一杯

痔瘡類

痔瘡洗方

駱筱峯

主治 痔瘡

处方 苦參一兩 皮硝五錢 槐花一兩 枳壳五錢

黃柏五錢 元松二兩 蒼朮五錢

豬蹄甲四、五十枚

制法 先將豬蹄甲熬成濃汁，后入余藥煎湯。

用法 乘熱先薰后洗

痔瘡方

惲 榛

主治 痔瘡

处方 河中螺螄

制法 以明礬点其肉，即化為水。

用法 以此水塗患處，數次即愈。

脫肛方

馬 書

主治 脫肛

处方 蟬退

制法 研細末，拌菜油。

用法 抹肛門上

痔瘡方

惲 榛

主治 痔瘡

处方 豬腹部肥肉半斤 馬齒莧草一掬

制法 加鹽，用碗蒸熟。

用法 全部食之。食一、二次。

痔瘡方

高志明

主治 痔瘡（大便不暢，便時疼痛並時下血）

处方 秦朮三錢 制蒼朮三錢 當歸三錢

川草（酒炒）二錢 羌活二錢 皂角子（煨）三錢

桃仁三錢 防風三錢 澤瀉（炒）三錢 枳櫚三錢

黃芩（炒）三錢 黃柏（炒）二錢 郁李仁二錢

制法 煎劑

用法 內服

小兒脫肛方（民間單方）

沈友民

主治 小兒脫肛

处方 鰾頭

制法 將鰾頭懸掛風干，瓦煨，研極細末，再加入

冰片少許。

用法 臨用時以麻油或菜油調勻敷之，每日一次。

〔註〕 鰾頭煨灰，用麻油調敷，確是民間治療小兒

脫肛之有效單方。

大功散方

沈郁文

主治 痔瘡流注

处方 花龍骨三錢 滑石（飛）五錢 制甘石二錢

冰片少許

制法 共研細末，后入冰片。

用法 將藥摻于瘡口

〔註〕 本方有收歛燥濕之功，用時可以麻油調敷。

枯痔散方

沈郁文

主治 痔瘡

处方 甘草一斤 飛礬四兩 白信一兩

制法 先將甘草煮沸去渣，然后放入白信、飛礬，

煮干為止，研末存性使用。

〔註〕 本方使用方法，交流者未註明，僅云結合手

術治療，效果最大。

文蛤散方

沈郁文

主治 痔瘡

处方 五倍子三兩 蝦蟆草 輕粉一兩 冰片約量

制法 將蝦蟆草晒干后嵌入五倍子內，煨存性后加

入輕粉、冰片，混合貯用。

用法 用菜油調敷

脫肛方

翁壽春

主治 專治因下痢之脫肛

处方 明礬（米粒大）七粒 鷄蛋一個

制法 先將鷄蛋之一端鑿一孔，然后將明礬七粒由

孔納入。煮飯時放飯鍋內煮熟。

用法 每晨空腹食此蛋一個，連服七天即好。

外痔方

呂駿声

主治 外痔

处方 馬齒莧大量 木鱉子

用法 （一）先用馬齒莧煎湯薰洗。（二）以生馬

齒莧搗汁磨木鱉子，塗于患處。每日一次，

一星期為限。

痔瘡方

夏高亭

主治 痔瘡脫肛

处方 蝸牛（桑叶上寄生的） 冰片細末

制法 將蝸牛放在瓦上焙成灰研末，加好的冰片。

用法 敷在瘡上

〔註〕 此方系無錫群眾流傳。

漏管方

魏青云

主治 膿漏管（外科多時不收功）

处方 棉子仁（棉花子仁）

制法 炒熟去壳研末

用法 每日早晚二次，每次服四錢，溫開水送下，連服月余可見效。

痔漏方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 痔漏

处方 海桐皮八錢 蕎麥粉二兩 刺蝟皮六錢

苦參一兩 核桃仁五錢

制法 共為末

用法 砂糖調服。分次服，開水下

偷糞鼠方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 偷糞鼠

处方 煙辣尿

用法 搽之。有孔即用紙撚蘸塞之。

白虎八宝丹方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 拔管

处方 磁器碗粉（放銀罐內燒紅，醋煨五次，細末）五錢

白芷三錢 乳沒各一錢 白薇三錢 降藥二錢

白芨三錢 梅片二分

制法 共研細末

用法 用藥綫或放膏藥上貼之

退管方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 消管

处方 自死龜壳

制法 炙研末

用法 用時摻冰片少許

痔出血方

鄒云翔

主治 無論內痔、外痔、遠血、近血，出血或多或少，或在婦女產后胎前痔瘡出血各病。

处方 人中白

制法 人中白在水中漂過至少二日以上，放在瓦上

用法 用生炭火煨之，二小時為度，研細末。

分五錢一包，用赤糖三錢、黃酒半杯調和，空心服之。一日一包，共吃三天，吃完藥量

共一兩五錢。

〔註〕介紹者若干年來遇痔出血屢試屢驗。

治痔方

吳基厚

主治 痔瘡

处方 癩因草（其叶如麻菜，故名）

制法

煎湯

用法

置干淨便桶中，乘熱坐桶上薰之。有效。

痔瘡方

南京磚瓦厂

主治

外痔及有漏管者

处方

桐油半斤

用法

桐油半斤用瓦罐煮開，用布一層蓋上，患者坐上薰，直等油冷停止，可根治外痔。如外痔有漏管者，用海帶四兩水煮化，患者將臀部浸在水內，下面微加溫，保持不冷四小時，可根治。

痔瘡藥縫方

宝山縣衛生工作者協會

主治

痔瘡漏管科用（藥綫）

处方

芫花一兩 壁錢一錢 白絲綫一介

制法

右藥同白絲綫放入罐內，用河水一大碗煎。將干去藥，把綫陰干用。

湯火傷方

湯火傷方

程淑文

主治

湯火傷

处方

美人木（即婦人泡水桶頭用的鏤花子）三、五片

制法

開水泡出粘液

用法

用雞毛汁蘸塗患處

火燙外用方

王繁生

主治

火燙

处方

地榆木六錢 龍衣炭一錢

制法

共研細末

用法

麻油或菜油調敷

水火燙藥膏方

沈志芳

主治

水火燙傷

处方

麻油一斤 地榆炭末二兩 頂老黃臘四兩

制法

先以麻油在鍋內煮至黑色，加入黃臘溶化，再煎數沸，冷卻后入地榆炭末，搗和成膏。

用法

燙傷處先以干淨棉花（用脫脂棉）吸去水分，用該藥膏刮于雙層棉紙上或紗布上，貼于創面，每日更換一次。

〔註〕

須用頂老黃臘，否則刺激創面，發生疼痛。

水火燙效方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

水火燙傷

处方 生地榆末 冰片

用法 用麻油調敷患處。火燙加大黃末。效好。
〔註〕 民間一般常用治燙傷，甚效。

火燙方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 火燙

处方 黑猪毛一握

制法 煨末

用法 用油調敷

水火燙傷方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 水火燙傷

制法 取茶杯一只，放入菜油半杯，將生石灰一塊

浸于油中。石灰須与油平，俟石灰水泡泛完
后，再放入冷开水齐杯口。待石灰如面漿
式，即可使用。

用法 塗于患處，效果良好。

燙火傷方

黃足信

主治 燙火傷

处方 寒水石(研末) 秋石(研末)各五錢 三黃散五錢

大黃末二錢 甘草末一錢

制法 調茶油

用法 塗患處。臨時先用粗紙几重浸入尿敷上，不
生泡。

火燙藥方

曹鳴高

主治 火燙

处方 南瓜

制法 將南瓜置于甕中封好，俟其自然腐爛化水。

越陳越好。

用法 塗于燙傷之處，甚效。

火燙藥方

曹鳴高

主治 火燙

处方 陳年石灰

制法 不計多少。用鷄蛋白調打成膏。

用法 塗于燙傷之處

火藥燙方

曹鳴高

主治 火燙

处方 肉鼠油

制法 將初生尚未出毛之小鼠浸入菜油內。陳久者

良。

用法 塗于燙傷之處

葵花油方

薛青萍 嚴良修

主治 湯火灼傷

處方 葵花(鮮)四兩 食油一斤

制法 以向日葵花盤周圍之黃花，放在麻油或豆油

內，浸一年后用。

用法 不論湯燙或火灼傷，用此油塗之迅速轉好。

蛇虫咬傷類

蛇咬傷方

惲 榛

主治 蛇咬傷

處方 好醋 五灵脂五錢 雄黃二錢五分

用法 凡蛇被咬傷者，即時飲好醋一、二盃，以繩

紮傷處二頭。若神昏，酒調五灵脂、雄黃末二錢灌之。少時咬處出黃水，水尽則腫消，以雄黃末摻之，口合而愈。

呂氏蛇咬方

郭守樸

主治 一切毒蛇咬

處方 全蠍三条 甲片三枚 蜈蚣三条 硃砂適量

制法 上藥生研，勿見火，共為細末。

用法 上藥為一劑量，開水送服。

〔註〕 此方內有劇毒藥，謹慎用之。有心臟、腎臟

疾病及體弱多病者忌服。

蛇咬方

唐克訓

主治 毒蛇咬

處方 葛二藤(土名，很像山芋藤根塊狀)

用法 在咬傷處塗擦，或浸酒內服。

蛇咬方

范伯仁

主治 蛇咬

處方 雅連七分 黃芩二錢五分 半枝連三錢

生錦紋二錢 甘草七分 全虫七分

大連喬三錢 黑梔三錢 蜈蚣二条

香白芷三錢 銀花三錢 腰黃七分

用法 先以腰黃冲服，后服煎劑。

〔註〕 方中半枝連系常用于蛇咬患者。早期应用，

可能有效。

蠍螫方

惲 榛

主治 蠍螫

处方 大蝸牛一个

用法 搗爛塗之

蛇狗毒方

黃治功

主治 蛇狗毒

处方 火赤練蛇一條

制法 炙炭，加雄黃、冰片，研細末。

用法 用麻油調塗患處

蛇咬效方

王鐘石

主治 蛇咬

处方 活壁虎一只

制法 用黃烟塞入壁虎口內，移時殭死，同面粉包裏煨灰。

用法 研末內服。十六歲以下每服四分。

〔註〕 倘若加倍服食而中毒或其他現象如寒冷痙攣，急用普通肉桂（成人五分，小人三分），煎湯吃下，立即解和。

〔註〕 倘若加倍服食而中毒或其他現象如寒冷痙攣，急用普通肉桂（成人五分，小人三分），煎湯吃下，立即解和。

煎湯吃下，立即解和。

煎湯吃下，立即解和。

毒蛇咬方

溧水縣衛生科

主治 毒蛇咬傷

处方 竹（木）杆內烟油，用冷開水洗出。

用法 飲一、二碗。若受毒重者，其味必甜而不辨，以多飲為佳。傷口甚痛者，以該油洗擦之。

之。

蜈蚣咬方

王書生

主治 蜈蚣咬

处方 公鷄冠血

制法 以針刺破鷄冠取鮮血

用法 塗搽患處能極速止痛

跌打損傷方

傷方

楊伯英

主治 傷發痛

处方 地龍廿只左右

制法 先以開水泡死，再以豆腐衣包裹。

用法 一次服。黃酒過下，能多吃些愈妙。

傷膏藥方

宋矩春

主治 跌打損傷

处方

当归五錢 三棱五錢 血竭四錢 川芎三錢

義虎三錢 生乳香三錢 人髮一团 生山甲六錢

生沒藥四錢 地龍五錢 蜈蚣五条

木鱉子仁六錢 大黃六錢 桑寄生四錢

千年健六錢 木瓜五錢 桂枝六錢 防風五錢

用法 如法熬膏，外加麝香和勻攤膏藥。

用法 貼伤处

跌打損伤丸藥方

宋矩春

主治 跌打損伤

处方 骨碎补五錢 破故紙五錢 甘草三錢 杜仲六錢

当归六錢 參三七一兩二錢 川牛膝八錢

川断一兩 乳香五錢 羌活五錢 防風八錢

沒藥四錢 麻黃八錢 澤蘭六錢 血竭三錢

紅花五錢

制法 共研細末

用法 用的劑量須視病人的年齡、體質、病的輕重

臨時酌定。每天吃一至二次。

接骨外用藥

張元浩

主治 接骨

处方 珠粉一分 血竭一錢 乳香(煨)一錢 麝香一分

龍骨二錢 兒茶一錢 硃砂(水飛)一錢 虎骨二錢

散紅花一錢 冰片三分 月石五分

制法 共研細末。瓷瓶收貯，勿令洩氣。

用法 用陳小粉研細末，炒至微黃，待冷加酸醋調

勻。根據伤部大小攤布上，加入上藥末，貼

患处外用，夾板固定。一星期換一次，約用

四、五次左右，骨折处自然愈合。

吊伤散方

宋振球

主治 新旧跌打損伤

处方 生川 草烏各一兩 山奈一兩 生大黃一兩

陳皮五錢 生梔子二兩 樟冰片五錢 血竭五錢

紅花一兩 王不留行五錢

乳香 沒藥(去油)各一兩

制法 上藥各研細末，再共研和。

用法 略加麩面少許，同百分之五十酒精混和敷患

处。隔日換藥一次，十天後隔兩日一換。

外伤止血方

李日东

主治 外伤出血

处方 烏賊魚骨不拘多少

制法 研細過篩，裝瓶密塞。

用法 將藥末罨在出血處，用布紮緊。

敷藥方

宋矩春

主治 跌打損傷

處方 川斷八錢 乳香五錢 生山梔五錢 骨碎補三錢

沒藥五錢 土鱉虫六錢 參三七五錢 麻黃四錢

自然銅五錢 木鱉子六錢 香附六錢

澤蘭叶五錢

制法 共研細末，醋和飛面調敷。或用酒或用雞蛋

白調敷。方內自然銅醋煨淬三次。

止出血方

主治 皮膚損傷，血流不止。

處方 生石灰 鮮韭菜根等分

制法 共搗稠粘，貼牆上陰干。研極細末。

用法 將藥摻出血處，包紮後即止血，並可止痛。

胸肋骨傷痛方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 胸肋骨傷痛

處方 帶皮猪毛（不能以水洗）

制法 煨存性研末

用法 每服二錢，一日一次，陳酒送服，兩日即愈。

金瘡方（鉄扇散）

袁竹平

主治 刀、石、木棍破傷，出血不止。

處方 象皮四錢 龍骨四錢

石灰（越陳越好，百年更佳）四兩

寸白香（即松香之黑色者）四兩 松香四兩

制法 先將寸白香、松香一同溶化，傾入水中，取

出晒干。象皮切成薄片，用鉄篩煨成黃色，

共研細末，瓷瓶收貯。

用法 將藥摻上創口包紮

傷科方

周憲璋

主治 跌傷及壓傷局部疼痛

處方 鵝腸長草（紫綫）

制法 打爛取汁，約一小酒盅。

用法 加陳酒少許沖服。草渣塗敷患處。

跌傷休克方

陳廣余

主治 跌傷休克

處方 降香木 檀香 沉香

制法

燃燒

用法

病人置于不通風的密室，使香味竄入鼻孔，可使苏醒。

內傷丸方

苏州市中医診所

主治

一切損傷之症，跌打損傷。能去瘀生新，通經活絡，強壯定痛。

处方

參制雪上一支高(苏州民間藥草)二 廣木香二
參三七二 当归膏(用水煎汁去渣熬成膏)一九
麝香二 續斷膏(用水煎汁去渣熬成膏)一九

制法

參制「雪上一支高」是用百分之二參燒湯制，后切片晒干，磨成粉(極細)和參三七、廣木香、麝香(亦一一分开磨成細粉)加入当归膏与續斷膏熬成的膏滋(佔原來生藥百分之四十为度)內調和至粘性即可，待干成丸藥。

用法

成人每次一錢五分至三錢二分，每日三錢至一兩。兒童減半。

猪蹄湯方

叶心銘

主治

小兒常習脫胎

处方

猪蹄

制法

制成適味羹汁，令小兒时时吃之。

〔註〕

吳縣淞南診所曾試用多例有效。

關節脫臼方

程民生

主治

關節脫臼、骺落

处方

澤瀉四錢 丹皮三錢 絲瓜絡二錢 川芎三錢
紅花二錢 伸筋艸二錢 宣木瓜三錢
如外傷在上部，加：桂枝二錢。
中部加：杜仲二錢。下部加：沉香一錢。
研末內服五錢，煎服亦可。

用法

刀傷止血方

王書生

主治

刀傷止血

处方

車前艸(俗名野甜菜)

制法

洗淨晒干研末

用法

敷患处

五官病門

眼病類

雀盲方

馬書

主治 雀盲眼（夜盲症）

处方 羊肝四兩 蒼朮一錢

制法 蒼朮為末，入羊肝內。

用法 蒸熟吃

夜盲症方

徐景耆

主治 夜盲症

处方 夏枯草三錢

制法 煎劑

用法 每日以三錢煎水當茶飲

〔註〕 据交流者称：「本方服后，一星期后見效者

百分之七十。」

蟹珠眼方

金壇縣趙伯

主治 腫孔凸出、白瞽浮起

处方 紫蘇叶二錢 石燕（并）四錢 荆防風各錢半

冬桑叶三錢 白菊花二錢 蟬衣一錢

用法 煎湯內服，可以逐漸收縮。

雀盲眼方（决明夜灵散）

金壇縣衛生科

主治 目力夜盲

处方 夜明砂二錢 石决明（煨）二錢

制法 共研細末，和豬肝一兩（以竹刀切成二片），

麻縛，勿犯鉄器，以米泔水煮。臨臥連肝和

藥汁服下，連服二、三剂效。

七針丹方

溧水縣衛生科

主治 眼赤發炎、云翳等症

处方 烏梅六個 潮腦一錢 胆礬一錢 川連一錢

銅綠一錢五分 明礬一錢 川椒一錢 青鹽一錢

杏仁一錢 綉花針七支

制法 用洗淨空瓶一只，入井水一斤，並將上开各

藥入瓶內浸泡，同时，將上述綉花針用綫穿

連，懸泡水內七天，待針溶化水內（針不化者該藥水無效）后，去藥渣，濾過听用。凡患眼病者，用該藥水日日洗之。

目生白星方

惲 榛

主治

目生白星

处方

丁香 細辛等分

制法

研極細末

用法

用棉花蘸藥塞鼻孔。右眼有白星塞左鼻孔，左眼有白星塞右鼻孔，不到一时即落。

目中贅肉外治方

楊伯英

主治

目中贅肉

处方

冬丹（黃丹） 輕粉等分

用法

灌葱。臨睡塞入耳內，早晨去之（右眼塞左耳，左眼塞右耳）。

風火紅眼方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

風火紅眼

处方

川連三分 明礬少許

制法

入紅棗內煎湯。

用法

冷后塗搨用

眼科神效方

趙 伯

主治

腎虧陰虛、双目失明（只要瞳孔未破）

处方

童子鷄一只 京川貝三錢 枸杞子五錢

黃花菜（黃瓜菜、萱草花之別名）一兩

制法

每次童子鷄一只加以上藥品入鍋，以炭火煨爛。

用法

鷄藥均可同吃，午飯時亦可當飯菜，一天分二次服完，服二三十次双目能恢復原有之光明。

青光眼方

趙 伯

主治

青光眼

处方

海狗腎一个 豬肝四兩

制法

用水一斤先將海狗腎煎湯，入夜時即用炭火煨二小時，待至天明再行煨沸煮爛，再入陳酒、醬油、鹽。連湯分三次服，每天一次。

用法

在每天晚飯時將海狗腎連皮再加半斤水，豬肝切小片滲入煮沸連湯均可服下。

定做各類PDF電子書，提供各個種類各個年代的電子圖書，全是掃描制作的PDF格式，清晰度高也方便閱讀和轉換編輯。當您想看的書是幾十年前出版的市面上購買不到可以联系我，當您想看的書市面上價格過高的時候也可以联系我先試讀，QQ45472743 微信s38772614，您的移動書庫 低价 高效 专业。

耳病类

黃龍散方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

中耳炎已化膿流膿者

处方

黃丹(水飛)三錢 枯白礬三錢

海螵蛸(米泔水浸)三錢 杜宇香(即麝香)少許

干胭脂少許

制法

共研細末

用法

吹入耳內

黃瓜霜方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

中耳炎未化膿者

处方

老黃瓜 明礬

制法

將老黃瓜子挖出，填入明礬末，掛通風處，

經一年或到冬天取出即成。

用法

和成百分之十的水溶液滴入耳內。日二、三次即愈。

礞砂散方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

耳痔、耳菌、耳癰、鼻痔、瘰癧肉

处方

礞砂三錢 輕粉三錢 雄黃三錢 冰片五厘

制法

水調濃度

用法

蘸点痔上

〔註〕

火毒疔瘡忌用。

耳聾方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

耳聾

处方

穿山甲一片

制法

炙枯研末存性

用法

用真磁石(豆大一塊)同甲片入棉花內包好

塞耳內，另用生鉄一塊含口內，即時耳內覺

响声者，氣通耳自聰矣。

耳膿方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

害耳流膿

处方

棟樹果 枯礬 冰片 胭脂

制法

棟樹果炙存性。共研末。

用法

吹之

耳炎方

王勵吾

主治

耳內出血、膿水、腫痛

处方

指甲二錢 冰片二分

制法

細末瓶貯

用法 吹耳用

白降丹方

陈明善 諸滿生

主治 外耳道瘻肉（耳菌）

处方 白降丹。外科通用藥，中藥店有制成品。

制法 研細后，用水調搽一点于瘻肉上，一般六、

七日（一日塗一次）即好。一部分經腐蝕后脫去，一部份枯萎。塗后如耳道壁破碎流水多，可停藥一、二天再用。

耳应丹方

吳一良

主治 慢性中耳炎和外听道炎，膿水淋漓者均效。

处方 烏賊骨二兩 蘆甘石三兩 寒水石二兩

枯礬一兩 魚腦石一兩 青黛或硃砂二錢

西月石一兩 大梅二錢

制法 共研細末，密貯用。

用法 膿水多者，日換三次。換藥時，必須將膿水卷干。

鼻 病 类

鼻淵方

李日东

主治 鼻漏涕或如膿狀，有腥臭，以及偏头痛，

眉稜骨痛。

辛夷（豬胆汁拌炒）三錢

处方 煎服

用法 早晚各服一次。輕症二至三星期，重症四至

六星期。

鼻淵方

丁 君

主治 鼻淵

处方 芙蓉叶

制法 碾成黑棗大

用法 火燻嗅烟

鼻淵祕方

謝今安

主治 治鼻淵流濁涕

处方 大羊印子一對

制法 去膜切片，用醬油、酒拌，放碗內隔湯煮

爛。

用法 用陳酒過下，微醉。中午服。

腦漏方

周民康

主治 腦漏（即鼻竇炎）

处方 漆絲棉百分之二 白鴉鴉翎百分之二

制法 焙干炙灰存性

用法 吹入鼻腔內

〔註〕 此方出于「驗方選易集」。用时加些梅片，較为有效。

腦漏外用方

朱文江

主治 腦漏

处方 白芷五分 鵝不食草五分 川芎五分

辛夷花（去絨毛去壳）一錢 細辛五分

制法 共研末，放瓶內。

用法 时时嗅之，並用鹽水洗鼻。

治鼻瘻肉方

鍾明然

主治 鼻瘻肉併發頭痛

处方 天麻一兩

制法 敲碎

用法 分三次泡服。一次不效，可續服一次。

〔註〕 本方天麻使用劑量較高，用时斟酌之。

鼻瘻肉方

丁景襄

主治 鼻瘻肉（俗称鼻花）

处方 麝香〇·五至一分 銅綠三至四分 枯礬五至八分

胆礬五至六分 冰片四至五分

制法 共研成極細末

用法 每次用少許。裹入棉花球中塞入鼻孔。每天一次，連用二星期。

〔註〕 原註称：「在不知不覺中瘻肉隨噴嚏脫出。十有九效，無刺激，無痛苦」云。

鼻淵方

石昌志

主治 鼻流清涕，稍有感冒即發。

处方 辛夷二朵

用法 薰烟，每日一次。

鼻竇炎方

馬云翔

主治 鼻塞不通，晝夜流膿汁。

处方 生南星一錢 生半夏一錢 牙皂一錢 細辛八分

辛夷二錢

制法 共研極細末

用法 每日以少許吹入鼻孔，一日三至五次。

〔註〕 据馬云翔醫師在臨床上应用，患長期付鼻竇炎之二例患者，均獲得痊愈。

化鼻瘻方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 鼻瘻

处方 狗头面梁骨連腦

制法 炙存性为末

用法 每日五分，加入礪砂五分，共研細末点之。

鼻淵方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 鼻淵

处方 漆店內漆布不拘多少 鴿子毛(炙灰瓶貯)

用法 噴鼻，代鼻烟聞之。久之自覺有臭味，再和

入好痧藥少許，嗅之，吐出形如硬骨一塊，病即愈矣。

噴鼻散方

沙海卿

主治 治腦漏(即鼻淵)

处方 魚腦石(黃魚腦內，兩粒，如石白骨) 京梅片八分

制法 研極細末

用法 噴鼻

咽喉病类

抑木丹方

曹青儒

主治 喉头局部糜爛，吞嚥疼痛。

处方 鹽硝三錢 石膏(煨)九錢 粉甘草一錢

腰黃五分 梅片五分

制法 先將粉甘草晒燥研極細，以絹篩篩出，再將

鹽硝、煨石膏分开在瓷鉢內研細，后加粉甘草、腰黃和勻，最后加入冰片研和。貯于瓷瓶。

用法 吹入局部糜爛处

〔註〕 本方有滋潤止痛之功，可能解决患者暫時之痛苦。

独勝散(民間單方)

張人傑

主治 喉头痰涎壅塞，呼吸困難，呈室息現象。

处方 鮮土牛膝根(即臭花娘子根)不拘多少

皂角末少許

制法 將土牛膝根洗淨，在石鉢內搗爛，加入皂角末少許，搗勻用榨床取汁，以新淨白布絞取汁。

用法 取汁飲服

〔註〕 此方民間習用于「喉風」病例。患者以小兒

为多，其狀近似喉头白喉，經服大量吐痰后，症狀消失。如無鮮土牛膝，可用干者与

皂角煮汁，亦有同样效果。

乳蛾內服方 常熟縣第三屆中醫進修班

主治 乳蛾（西醫稱扁桃腺炎）

處方 薄荷一錢 霜桑叶二錢 殭蚕三錢

光杏仁三錢 生甘草一錢五分 白桔梗一錢

大連芥二錢 赤芍二錢 馬勃八分

象貝母三錢 淨蟬衣一錢 牛蒡子二錢

活蘆根尺許

制法 不須久煎，煮三沸即可服。

用法 服時不必一次下，可以少量多服法，間三小

時啜五、六茶匙。

加減法 若乳蛾紅腫，熱甚，口渴，可加生

石膏。若見白点白腐，可加京元參，甚效。

若腫勢有膿，可用刺法排去膿，外吹金不

換。

〔註〕 本方見曹穎甫「經方實驗錄」。介紹者姜佐

景稱：「歷年來应用于臨床確有效果。」

咽喉腫痛方

主治 咽喉腫痛

處方 參冬 桔梗 山豆根各三錢

馬書

制法 煎湯

用法 內服

骨梗咽喉方

俾榛

主治 誤吞魚骨梗于咽喉

處方 活鴨嗆涎

用法 用河中活鴨倒掛，以磁碗接下垂涎，令患者

仰臥頻灌，其骨尽化。

魚骨梗喉方 常熟縣第三屆中醫進修班

主治 小兒魚骨梗喉

處方 飴糖

用法 服之即效

魚骨梗方

成煥堯

主治 魚骨梗于喉中

處方 威灵仙 紅糖各等分

制法 煎服

纏喉急症方

葛蔚堂

主治 纏喉，水藥不下，牙关緊閉，不省人事。

處方 明雄黃（水飛） 藜蘆（生） 枯礬（煨研）

牙皂（炙黃） 上藥等分

制法 共研細末，瓷瓶收貯。

用法 每用豆大一粒，吹入鼻內，取嚏吐痰即愈。

喉風方

駱筱峯

主治 喉風

处方 猪牙皂

制法 研細末

用法 以醋調入喉四、五匙，痰涎吐出則痛止。

〔註〕 慎用子白喉病例。

爛嘴唇方

袁鳴一

主治 嘴唇腐爛

处方 紅糖 明礬

制法 打成糊

用法 塗抹患处

口腔炎方

杜程远

主治 口腔炎（口瘡）

处方 五倍子

制法 研細面

用法 塗口內患处

喉科方

蔣俊源

主治 普通咽喉口腔炎症

处方 白陶土一兩 熟石膏一兩

三黃湯（黃芩、黃柏、黃連。水飛，炭火烘制）

青黛六錢 兒茶六錢 薄荷六錢 冰片適量

制法 上五种混合粉每兩加百寿大梅三分到五分

用法 吹料

治喉蛾方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 喉蛾

处方 以兩手大拇指揉病者虎口穴，患处之疹即漸

止。

喉風丹

馬培之傳 馬澤人獻

主治 喉風

处方 鮮土牛膝根（臭花娘子根）

制法 搗汁

用法 含于口內，不可嚥下。輕者含汁一、二次，

重者三、四次即愈。

〔註〕 上藥汁含后作嚥，吐出痰涎即舒。

喉科秘藥方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

喉痹、喉風等症

黃連(焙) 黃芩(焙) 黃柏(焙) 梔子(焙)

黃芪 薄荷 防風 荊芥 元參 連翹

細辛 白芷 川芎 羌活 獨活 山奈

檳榔 厚朴 苦參 甘草 木通 半夏

草烏 川烏 蒼朮 麻黃 赤芍 升麻

大黃 僵蚕 牛膝 桔梗 射干 干葛

皂刺 車前 桑皮 茄皮 牛蒡子 地骨皮

麥冬 山豆根 杏仁 生地 歸尾 花粉

南星 參三七 銀花 川槿皮

上藥各一兩，另加鮮車前草 紫背天葵草

骨牌草 金星草 五爪龍草 地丁草各一兩

土牛膝草四兩。新缸一只，清水浸之，日晒

夜露四十九日，取起濾去渣，銅鍋煎之，柳

槐攪之，煎調如糊，再加后藥：雄黃五錢

青礞石五分(童便煨七次) 乳沒(炙) 龍骨(煨)

熊胆(焙) 元明粉 血竭 石燕(醋煨七次)

海螵蛸(紙包煨) 蘆甘石(童便煨七次)

青黛上藥各五分 枯礬一錢 兒茶一錢 輕粉三分

黃丹三分 月石(水飛)七分 桑枝炭三錢。以上

為細末，入前膏內，和勻作餅，如指大，晒

制法

用法

吹用 露七晝夜，放地上，以瓦盆蓋之，一日翻一次，七日取起，置透風處，陰乾，貯入瓷瓶內，三月后方用之。用時為細末，每二分加后藥七味：梅片四分 珍珠四分 珊瑚四分 牛黃四分 麝香二分 輕粉二厘 硼砂二分 為末和勻收貯。

吹喉回生丹

馬培之傳 馬澤人獻

主治

喉間垂危急症，不拘單雙乳蛾。

處方

硼砂一兩 牙硝二錢 冰片六分 麝香四分

制法

共研細末，瓷瓶收貯，不令洩氣。

用法

吹患處

軟化魚卡方

宋振祖

主治

魚骨卡喉

處方

橄欖核(又名青果核)

制法

將核放在瓦上炙成炭，研成細末。

用法

將粉吹于魚卡部，約二、三次，魚卡自然消失。

喉症秘方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 一切喉症

处方 鲜土牛膝根(即臭花娘子根)三斤(捣汁)

白礬二錢(研細沖入汁內)

制法 置烈日中晒干瓶貯

用法 研末吹用

喉症方(喉科異功散)

馬培之傳 馬澤人獻

主治 喉症腫痛

处方 斑蝥(去翅足米炒)四兩 元參六分 血竭六分

麝香六分 全虫六分 冰片三分

制法 各細末和勻入膏藥中

用法 貼于喉外痛處，遇時起泡，挑破即松。

錫類散方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 喉痧、喉蛾、牙疳等病

处方 珍珠二分 青黛六分 冰片三厘

象牙屑(煨)二分 泥壁上噓窩三十个 西黃五厘

人指甲五厘

制法 各藥共研細末貯瓶

用法 吹用

喉疳方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 喉疳

处方 扫盒三分 硃砂一錢

青菜核(橄欖核)三分(炙研淨末)

制法 共研末

用法 吹上其腐即退

喉風方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 喉風

处方 黃瓜一枚

制法 切蓋去子，用明礬灌入一兩。陰干。

用法 用时以明礬五分少許煎湯飲，吐出痰涎即愈。如破皮，連瓜皮用之。

〔註〕 又方：以皮硝五錢、明礬五錢照法取霜，治風

火喉症。

喉科閉塞方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 治風火上攻，咽喉閉塞，牙关緊急。

处方 皂角針一錢 青黛一錢 細辛一錢

殭蚕一錢 山豆根一錢 元參五分

制法 各藥共研細末

用法 吹鼻用

陰虧喉痹方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 陰虧喉痹症

处方 鮮側柏叶半斤

制法 搗汁，入蜜糖一飯匙。

用法 內服

喉科吹藥方

魏青云

主治 扁桃腺發炎、小兒口疳、口內炎等一切口腔

疾患

处方 明雄黃四錢 海螵蛸六錢 生熟石膏各八錢

元明粉六錢 黃瓜霜六錢 爐甘石(飛)六錢

梅片一錢五分 另加牛黃 珍珠

制法 共研細末

用法 吹喉用

啞喉風方

主治 啞喉風(一名啞障風，新名聲門水腫)

处方 蜂蜜一兩 梅片三分

制法 兩藥調勻

用法 頻頻吞服自愈

複方珠黃散方

魚瑞舟

主治 一切喉症

处方 犀黃五分 人中白(水飛)一錢 凍珠五分

明腰黃(水飛)一錢 滴乳石一錢 硃砂(飛)一錢

真西月石一錢 麝香二分 老式大梅片三分

老式鉄口兒茶八分

制法 共研細末

用法 吹喉用

〔註〕 本方在常熟市聯合醫院試用有效。

黃吹藥方

范灝洲

主治 咽喉紅腫

处方 寒水石二錢 腰黃一錢 黃柏六分

硃砂一錢五分 西月石五錢四分 薄荷一錢

兒茶一錢 冰片四分

制法 研細粉

用法 吹喉用

〔註〕 本方在常熟市第五聯合診所試用有效。

吹喉方

陳丹華

主治 一切喉症

处方

明礬十斤 巴豆一百粒

制法

用楊樹挖一洞，不使穿，代鍋子用。炭火煨明礬、巴豆，至明礬熔化去巴豆。候冷凝用瓦罐裝盛，埋地下退火毒。一年后研細用，越陈越良。

用法

吹喉。吐去涎痰即愈。

齒病類

牙齒痛藥水方

叶玉峯

主治

齲齒（俗名蛀牙齒）。齒質剝蝕穿穴，露出齒髓神經，往往遇冷或熱物，咸或甜味，即發齒痛，俗稱虫蛀牙痛。

处方

甘松 華撥 白芷 防風 細辛各五錢

制法

以上五味剉碎，為粗末，放入大口瓶中，加高粱酒半斤，浸七日（时时振盪之）過濾，去渣澄清，分裝入二錢或半兩小瓶內。

用法

凡遇蛀牙痛，随时用脫脂棉花蘸藥液，塞入蛀孔中，或含一口，使藥液浸漬于蛀牙处，其痛即止。

〔註〕

据介紹者称：「本方余曾如法浸制贈人，效

牙痛方

果十分可靠。凡蛀牙齒痛，早期用此藥液，不僅止痛，并有防腐滅菌之效。此藥液應用範圍，以齒痛之齒齦不發炎腫时为適應（如因浸入細菌而引起齒根化膿、齒齦炎腫者，須請齒科医生拔去）。」

惲 榛

主治

風火牙痛

处方

石膏（煨） 白胡椒

制法

研細為末

用法

敷牙上

風火牙痛方

馬 書

主治

風火牙痛

处方

元參 丹皮 薄荷 生地各一錢

制法

煎劑

用法

內服

治牙痛驗方

金 寶 义

主治

牙痛

处方

甘草一錢 生地一錢 黃芩一錢 荆芥一錢
石膏一錢 防風一錢（以上主藥） 兩边牙痛，

加：川芎 白朮 白芍。右边牙痛加：柴胡
黑山梔 龍胆草。左边牙痛加：大黃 黃芩
桔梗（枳殼）各一錢

制法

煎劑

用法

內服

牙痛方

張治安

主治

風火牙痛

处方

蜂房一个 食鹽酌量 冰片一分

制法

將蜂房孔放滿食鹽，澆少許豆油在蜂房上，

用火燒成末，加冰片。

用法

將上藥研末配好，痛時擦之。

牙痛出血方

成煥堯

主治

一切牙齦出血不止，或病后牙齦出血腐爛。

处方

鮮生地三錢 丹皮二錢 生山梔二錢
鮮柏叶二錢

制法

煎藥

用法

服用

離骨丹方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

拔牙用

处方

急性子（即鳳仙花子）二錢 白砒一分

制法

共研細末

用法

每用少許點之

〔註〕

方內白砒是劇毒藥品，用時不宜過多或誤吞腹內。

牙痛方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

風火牙痛

处方

枯薄荷叶廿片 潮腦一錢

制法

先將薄荷鋪粗碗內，將潮腦搽上，以白紙糊

好碗口，燉糠火盆中，見熱氣一出，即取

起。潮腦已隔紙昇碗蓋紙上，俟冷定刷下待

用。

用法

不論老少，以此擦牙，其痛即止。

治牙癰方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

牙癰

处方

梅片二分半 血竭一分五厘 硃砂五分

熟石膏二錢五分 川連五分 人中白五分

三七五分 西黃二分半

制法

研極細末

用法

搽敷用

走馬疳方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 走馬疳

处方 青竹一段

制法 去一边節留一边節，置食鹽于內塞緊，放炭火上炙之。須臾竹枯，便取下為末，酌加冰片研之。

用法 敷用

珍珠散方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 牙疳、牙齦紅腫等症

处方 硼砂一錢 雄精一錢 川連一錢 兒茶一錢

冰片五分 薄荷一錢 人中白一錢 黃柏一錢

大破珠五分

制法 共為細末

用法 以刀点破吹藥

擦牙散方

王勵吾

主治 虫牙、火牙、常痛

处方 生大黃五錢 青鹽一兩 熟大黃五錢

生石膏五錢 熟石膏五錢 沒石子兩個

制法 共研極細末

用法 每日擦牙，止痛固齒。

牙痛方

周憲璋

主治 風火牙痛

处方 蜂房（黃蜂窩） 白礬三粒（如赤豆大）

制法 同煎水

用法 漱口，含片刻即吐出。續用數次。

齩齒方

張良岐

主治 齩齒（蛀牙）

处方 五倍子五錢

制法 以清水煎湯备用

用法 漱口一刻，忍住澀味，約十五分鐘吐出，以溫開水過口漱淨。日三次，連用二月。

走馬牙疳方（民間單方）

張震華

主治 走馬牙疳

处方 小青蛙

制法 將銅板二枚夾住小青蛙，外用青布包好，綫紮緊，放置衣袋內，俟其干后瓦煨成炭，研細，加入冰片少許。

用法 將藥末吹在患處

〔註〕小青蛙俗名唸佛青，多数生于桑叶上，少数生在麥田內。

牙痛方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 牙痛

处方 向日葵蕊

用法 燒烟薰之，即可不發。

牙疳方

王承山

主治 潰瘍性口腔炎

处方 青栗核（煨存性）十枚 生石膏三錢 上梅片二分

制法 研成細末

用法 搽口腔，一日數回。

骨槽風方

居憲林

主治 骨槽風、牙关不能開張

处方 樟腦五分 艾叶一握

制法 將樟腦放在艾叶上燃燒，使樟腦慢慢熔化成

液，滴入碗內，俟冷用。

用法 將上藥研末，加入冰片一分，吹入口內腫處。

骨槽風方

顧靜泉

主治 骨槽風久不收口

处方 桂元肉二枚 銀珠少許

制法 用桂元肉含口內一夜，次晨取出搗爛，少加

銀珠。

用法 放于瘡口上，用膏藥貼好。隔日更換一次，

六、七次即愈。如瘡內有多骨，須拔出后再用。

婦科門

調經類

婦女痛經方

叶玉峯

主治

婦女月經來潮時，腹痛腰痛，乳房脹痛，頭痛，經常不暢利，經水少，或週期落后，經血色黑或淡，持續期延長。經行不暢，時痛更甚，暢下時則痛減。此為月經困難的痛經，本方有卓效（子宮位置不正，前屈后屈者，不能生效。如果月經過多者忌用）。

處方

番紅花（一名西藏紅花，入藥時系用其花蕊）
廿至卅條 香附一至二錢

按：番紅花系鳶尾科，產于西藏等處，價較貴。如無番紅花，可改用紅花（紅花是菊科，一名「紅藍花」，用量為一錢）同有

制法

效（中藥店有紅花，或稱「散紅花」，系用其花瓣）。
香附研成細末，每包一錢，一日約須二包。番紅花廿至三十條置杯中，沖入沸開水半杯，加蓋密封廿至卅分鐘。

用法

以此黃紅色之藥湯送服香附末一錢。月經來潮初，感腹痛時即服一回，隔三、四小時再服一回（紅番花可泡二次，如用散紅花，同祥用開水泡漬之）。

〔註〕

介紹者稱：「月經痛（俗稱「痛經」）的原因不一。本方除子宮位置不正（前屈后屈或傾屈等）及子宮內膜炎、月經過多等之外，凡子宮發育不全、內膜肥厚、神經質（古稱肝氣、氣郁、血滯等）等都有效，尤其是月經時伴有頭痛、乳部痛等，都有效。如果鑑別診斷正確，可獲預期的效果。本方不但治痛經，並能治神經性胃痛，古稱「肝氣」、「郁悶」痛等。此為余廿年來經驗之藥。但月經過多者忌用。」

痛經方

陸慎其

主治 痛經，並治室女經閉（俗名干血癆），形瘦

腹痛，下午潮熱亦有效。

处方 全當歸四兩 川牛膝一兩半 沒藥（炒）二兩

芫薢子（炒）三兩

制法 上藥研細末，蜜丸。

用法 每日早晚各服三錢（空腹開水送下）

〔註〕 本方原註稱：「對痛經療效較好，室女經閉較差。」

月經困難方

鄒錫民

主治 月經困難、腹痛

处方 砂仁末一錢（后下） 當歸三錢 香附五錢

赤芍三錢 木香二錢 牛膝三錢 川棟子四錢

延胡四錢 芫薢子四錢 蘇木二錢

生卷柏三錢 馬鞭草三錢 劉寄奴三錢

制法 水煎劑

用法 內服

〔註〕 體虛者分量須斟酌應用。

室女經閉方

駱筱峯

主治 室女經閉

处方 白鴿一只（去毛和內臟） 上血竭一兩（研細）

制法 將血竭末裝入鴿腹內，針縫縫口。黃酒、清

水各半煮熟。

用法 連湯服用

月經過多方

鄒錫民

主治 月經過多及崩漏

处方 當歸炭三錢 粉丹皮四錢 牡蠣（煨）五錢

白芍炭三錢 花粉四錢 龍骨五錢

血余炭三錢 荊芥炭三錢 陳棕炭五錢

旱蓮草三錢 烏賊骨（炙）三錢

制法 煎湯

用法 內服

痛經方

張文睿

主治 經行腹痛

处方 丁香六錢 紅花四錢 山稜六錢 義朮六錢

吳萸三錢 五靈脂四錢 肉桂四錢 沉香三錢

川芎四錢 牛膝六錢 延胡索六錢 香附四錢

小茴四錢 艾炭六錢 制乳香四錢 制沒藥四錢

大黃一兩

制法 共為細末，加入當歸膏五兩，搗和為丸，每

粒重一錢五分。

用法 經前每日服一丸，陈酒化服。重者兩丸。

痛經方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 痛經

处方 川芎一錢 丹參三錢 当归三錢 白芍二錢

白芷一錢 青皮一錢五分 烏藥一錢五分

制法 煎剂

用法 內服

調經方

凌國春

主治 婦人經水或前或后或多或少

处方 当归一錢二分 熟地一錢二分 香附一錢二分

白芍(酒炒)一錢 大腹皮一錢 紫荊皮一錢

肉苁蓉一錢 川芎七分 条芩七分

粉草五分

制法 加棗三枚、姜三片水煎

用法 待經至之日服起。一日一剂，四剂而止。

妇科驗方

鄒錫民

主治 專对一般精神不振、月經过少

处方 党参二錢 女貞子三錢 黄芪二錢 青皮二錢

何首烏三錢 廣皮二錢 川断三錢 枳壳三錢

杜仲三錢 香附五錢 狗脊三錢 当归三錢

白芍三錢

制法 水煎

用法 內服

妊娠期疾病类

妊娠惡阻方

褚肱三

主治 妊娠惡阻

处方 苏叶四分 橘皮一錢八分 黃連六分

茯苓五錢 吳萸三分 龍齒五錢

綠萼梅一錢八分 竹茹一錢八分

制法 煎剂

用法 內服三、四剂

胎动不安方

楊鶴汀

主治 胎动不安

处方 黄芩 白朮各三錢

制法 煎剂

用法 內服

安胎散方

主治 安胎

处方

砂仁八分

枳壳(炒)一錢五分

廣木香八分

桔梗一錢五分

白朮(炒)三錢

當歸三錢

杜仲三錢

茯苓三錢

黃芩二錢五分

廣皮二錢五分

升麻一錢

苧麻根五錢

荷葉蒂三個

制法

煎劑

用法

內服

牛鼻保胎丸方

主治 安胎預防流產

处方

牛鼻保胎丸：黨參 黃芪各二兩 川斷 山藥

各三兩 于朮 阿膠各一兩 砂仁 黃芩各七錢

當歸 白朮各一兩半 甘草五錢 杜仲 荷葉

各一兩二錢 蜚蠊一兩 黃牛鼻一具 大熟地四兩

制法

蜜丸

用法 懷孕后三月、五月、七月連續服用。每次三

錢，每日一次，開水吞服。

臨產不痛方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 臨產不痛

处方 茉莉花

制法

泡湯

用法 代茶用(產前一月用)

惡阻方

常熟市第五聯合診所

主治 妊娠惡阻嘔吐

处方 姜制半夏三錢

蘇葉四分

茯苓四錢

干姜四分

黃連四分

厚朴三分

制法

水煎

用法

內服

催生方

殷潮章

主治 適用於臨產子宮已開，而陣縮微弱時。

处方 白蔻仁二粒 急性子(即鳳仙花子)二錢

用法 將急性子煎湯送服薤球

〔註〕原註稱：「百分之百有效」。

產后疾病類

產后驗方

鄒錫民

主治

產后惡露不下，腹痛拒按而堅硬，小便不暢通者，發病二、三天內。

处方

归尾四錢 赤芍三錢 牛膝四錢 乳香二錢

沒藥二錢 延胡四錢 川棟子四錢 小茴香七分

木香二錢 桃仁五錢 紅花三錢 元明粉三錢

敗醬草三錢 澤蘭草三錢 失笑散四錢

血珀一錢（開水先服）

制法

煎剂

用法

內服

〔註〕 用時須注意分量，体虛者尤宜斟酌使用。

兒枕痛方

王明道

主治

兒枕痛（產后腹痛）

处方

制香附五錢 山查炭五錢

制法

濃煎

用法

頓服

〔註〕 戴效歧同志經驗：生焦山查同服更效。

胞衣不下方

主治

產后胞衣不下

处方

乳香一錢半 血竭一錢半 沒藥一錢半

制法

三味共研細末

用法 一次開水調服

產后咳嗽方

馬書

主治

產后咳嗽

处方

紅花 桑白皮各一錢

制法

煎剂

用法

內服

產后中風方

馬書

主治

產后中風

处方

荊芥穗三錢

制法

炒黑為末

用法

童便下

產后破傷風方

張宗震

主治

產后風，神昏口噤，四肢強直，角弓反張及

处方

產后血暈。

制法

荊芥（炒）三錢 西當歸三錢 川獨活三錢

用法

黑豆（炒）一錢 童便一酒盅（沖）

主治

如失血過多，氣分虛弱而無瘀積內停者，加

处方

生黃芪一兩。

制法

水煎前藥，濾去渣，沖入童便。

用法 口噤者搗口灌之，或用鼻飼法亦可。

產后暈厥方

周世鵬

主治 產后出血過多，神昏厥暈。

處方 西血珀四分

用法 童便沖服

產后中風方

周世鵬

主治 產后血虛感風，肝腸上亢，頭眩而痛，兩目

上泛，項強抽搐者。

處方 全蠍尾二條

制法 研粉

用法 開水沖服

〔註〕 全蠍是劇毒藥，用時須慎重。

開牙关方

錢蘊石

主治 產后破傷風，頸項強急，牙关緊閉。

處方 蠍尾三分 蜈蚣二條

制法 二味炙脆研細末

用法 以藥棉包裹兩個，塞入兩面牙关。

產后中風方

張良岐

主治 產后感受風寒發熱，心中煩躁及瘧疾、譫

語。

處方

荊芥（青布包）一兩 烏魚（不過一斤）一條

制法

烏魚去腸、雜、鱗、甲，不洗，將荊芥包入魚腹，加姜葱少許，不加油鹽，蒸熟，吃魚肉和湯。輕者一次，重者二、三次。

崩帶類

血崩方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

血崩

處方

鯊魚卵（腹中的）

制法

浸鹽酒內約二十天左右，取出煮熟吃。

用法

每次三、四枚，日服三次。

血崩方

馬書

主治

血崩

處方

棕炭 烏梅炭各三分

制法

研細末

用法

黃酒送下

血崩方

猪脰三

主治 妇女血崩，產后或小產后子宫大出血，腹腰
墜痛色紫者。

处方

震灵丹一錢至二錢 太子参 野于朮 黄芪

烏賊骨 貫仲炭 地榆炭 龍骨 牡蠣各等分
如有噁心嘔吐，加用旋复花 代赭石。

制法

震灵丹以硃砂为衣，水泛为丸。方藥水煎。

用法

震灵丹吞服，方剂水煎空心服。

〔註〕

謝觀中國医学大辞典註明：「震灵丹」南嶽
魏夫人方对妇女崩症用之有效。

白帶方

鄒錫民

主治 頑固白帶，病人疲乏，胃口不佳，消瘦等
症。

处方

向日葵莖(干枯)

制法

切片煎服

用法

每日三、四錢，加紅糖。

白帶丸

張文睿

主治

白帶

处方

蒼朮 白朮 茯苓 高良姜各三錢

椿根皮一兩五錢 白芍五錢 黃柏六錢

补骨脂三錢 續斷三錢 山藥三錢 巴戟天三錢

牡蠣 龍骨各一兩 陈皮五錢 五味子三錢

制法 研末煉蜜为丸，每丸重一錢五分。

用法 每天一丸，重者二丸。用豆漿送服，或淡鹽

湯近下。

白帶單方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

白帶

处方

鮮胡桃叶七瓣 紅棗九粒

制法

煎剂

用法

內服

老年崩漏方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

老年經水不断及血崩

处方

黃芪八錢 龍眼肉廿粒 紅棗廿个

制法

(此方剂量須重些)煎剂

用法

代茶用

治腸癰兼治血崩血瘤方

吳匯川

主治

腸癰兼治血崩血瘤

处方

薏仁(炒)二錢五分 敗醬草二錢五分 制香附二錢

制法 煎剂
用法 内服

妇女杂病类

痞块方(阿魏化坚膏)

萧正虎

主治 女人腹内血凝痞块，形瘦膚黃，狀如怀孕。

处方 臭梧桐皮(新鮮的)約十斤 阿魏五兩

制法 加水煎熬成粘液样时去渣，用文火煎至約二

碗时加入阿魏，仍以文火緩緩煎熬成膏。

用法 將藥膏塗布上，貼腹部。

〔註〕 原註称：「貼二、三天即下血塊。如腹内还

有硬塊，再貼一次，即可痊愈。血塊下后，

須注意营养」云。

子宫頸下垂方

主治 子宫頸下垂

处方 桔梗 廣皮各一錢五分 党参三錢 升麻二錢五分

黃芪 白朮(炒) 当归(炒) 川續斷 杜仲

桑寄生 薏米 南沙参各三錢

外用 薰洗方：烏梅三錢 五倍子五錢

制法 方藥水煎
用法 煎藥內服。薰洗方煎湯外用。

驗胎方

凌國春

主治 月經不行已經三月，不知是孕是病。

处方 川芎末一錢

制法 濃煎艾叶湯，空心調服川芎末。

用法 服后覺腹内微動則有胎，不动者則是經滯。

乳房皸裂方

錢中選

主治 妇人乳头像裂縫疼痛

处方 白芷(研粉)一錢 鷄蛋油

制法 將鷄蛋煮熟去白，放黃銅勺內煎熬，枯焦时

即出油。

用法 塗擦用

吹乳方(一醉消)

李思威

主治 乳母奶部脹痛

处方 山茹茹一兩 血余炭五錢 兩头尖(炒黃)一兩

制法 研細和勻

用法 每服一錢，熱酒送服，以醉為度。溫復取

汗。

貫仲散方

王慎軒

主治

慢性子宮內膜炎，帶下甚多，黃或赤白，腥穢如膿血者，兼治慢性腸炎，大便溏泄。

处方

貫仲

制法

洗淨，打碎斬小，炒黑成炭，研細末。

用法

每服一錢至二錢，空腹時用粥湯送下，日服二次。

治陰癢方

錢蘊石

主治

陰痒

处方

雄黃二錢 鷄肝一具

制法

將雄黃研細，塗鷄肝上。

用法

納入陰戶內，一日換二次。

治乳頭干裂方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

乳頭干裂（有孩子吃乳）

处方

鷄蛋 鹿角霜

制法

雞蛋取黃熬油，冷卻后加鹿角霜。

用法

調搽患處

兒科門

驚風類

慢驚方

王少甫

主治 小兒慢驚風，日漸消瘦，如皮包骨，面色蒼白，潮熱渴飲。

處方

蚯蚓（即地龍）數尾 白糖三兩

制法

混合搗爛如泥

用法

將頭頂前頭部頭髮剃光，把藥敷上，經過二十四小時，洗去再敷，數日即可逐漸好轉。

〔註〕

蚯蚓內服，有鎮痙作用。本方外用更為穩妥。

小兒驚風方

吳基厚

主治

小兒驚風、顫門高腫

處方

豬肝 海螵（較釘螺螵大，有充食品用）各等分

制法 上兩物打爛

用法 將打爛藥物包在顫門部，干時即換，至顫門平為度。

小兒驚風方

吳基厚

主治

小兒驚風、顫門高腫

處方

鷄蛋白 菜油

制法

調和

用法

塗敷顫門部

小兒慢驚方

周憲璋

主治

小兒慢驚風，脾土虛甚，泄瀉引成虛弱者。

處方

穿牛鼻子繩（越久越好）

制法

約三、四寸長，不洗煎湯。

用法

餵服

麻疹類

麻疹方

高行素

主治

麻疹初期

處方

浮干 萍五錢 萊豆皮一兩 蘆葦根（鮮者佳）二兩

制法 水煎服

〔註〕 本方中乾浮萍五錢，宜斟酌用之。

麻疹薰浴方

丁少庵

主治 小兒麻疹出不透而色黯不鮮，高热汗少，咳

喘鼻煽，有併發肺炎的象征者。

处方 观音柳二把 或鮮芫荽几撮

用法 將藥先煎水，煎后傾入浴盆中，用大孔篩子

一張，放置薰浴盆上，在無風的房間內發薰之。

痧子難透方

馬培之傳 馬澤人獻

主治 痧子難透

处方 烏芝麻一斤

制法 煎湯

用法 薰洗（前胸后背最要緊）

麻疹方

季博文

主治 小兒麻疹

处方 杏仁泥二錢

苦連翹一錢半

淨蟬衣一錢

牛蒡子一錢半

霜桑叶一錢半

嫩薄荷一錢

濟銀花二錢

陳菊花一錢半

大貝母二錢

茅根二錢

用法 內服。以上剂量是兩歲四歲量，一歲內減

半。

百日咳類

百日咳方（經濟有效百日咳方）

江韻樵

主治 百日咳

处方 雞肫皮（即鷄內金）三錢 京貝母一錢五分

制法 先將雞肫皮慢火炒焦，然后共研細末。

用法 將上藥分九次服。用麥芽糖蘸服，一日三

次。

〔註〕 原註稱：「無併發症者，有百分之八十的功

效。如再與車前草（每次三顆）煎湯當茶，

則更效。」

芫花膏方

朱泰生

主治 百日咳

处方 芫花一兩 冰糖或白糖一斤

制法 先將芫花浸于水中洗淨，然后加水煎二、三

次，去渣熬濃，用糖收膏。

用法

每日三次，每次半茶匙，開水和服。服後咽喉部有辛辣刺激感時，即可止嗽。療程約半月。

〔註〕

芫花亦為劇毒藥，用時慎之，不可過分多吃。

百日咳方

李佳珍

主治

百日咳痙攣期症

处方

車前草（全草）二至三棵（一至二週歲用量）

制法

加水煎汁

用法

分數次服

〔註〕

原註稱：「連服一星期可痊愈」。據近人研究報告：車前子亦為止咳藥物，並列入止咳藥中，因此本方可以研究試用。

百日咳方

鄒良材

主治

百日咳

处方

葶藶子三錢 紅棗廿四枚

制法

先用葶藶煎汁，放入紅棗內再煎。

用法

七歲以上的可一天服完。連服三次，方能見效。

〔註〕 原註稱：「試用有效」。

百日咳方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

百日咳

处方

石膏一錢 麻黃三分 杏仁一錢 甘草二分

桑皮八分

制法

煎劑

用法

內服。適用于四歲小兒。

百日咳方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

百日咳

处方

生扁柏三錢 紅棗十個

制法

水煎

用法

內服。三、四服即愈。

百日咳方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治

百日咳

处方

柏子仁四十八粒

制法

肉絲湯內煮煎

用法

內服。三至四服。

二冬膏方

泗陽縣衛生院

主治 百日咳

处方 天門冬五錢 麥門冬五錢 百部根三錢

瓜蒌仁二錢 橘紅二錢

制法 煎二次，劑量不減。

用法 內服。一至三歲分三頓服，四至六歲分二頓服，七至十一歲做一頓服。

大蒜浸出液方

主治 百日咳、蟯虫、鉤虫

处方 大蒜

以大蒜切片，加開水浸十分鐘，濾過後加小苏打。

用法

治百日咳：十歲每日用大蒜一兩三錢（四〇克），加水五〇茶匙（二五〇西西）。五歲每日用大蒜八錢（二十五克），加水五〇茶匙（二五〇西西）。一歲每日用大蒜四錢八分（十五克），加水五〇茶匙（二五〇西西）。

治蟯虫：將大蒜浸出液，灌腸。

治鉤虫：將大蒜切成細粒。每日三次，每次三分二厘（一克）。食前服，開水送下，隔

日服鹽瀉類瀉劑。連服四日為一巡，約服三至五巡。

百日咳方

馮佑之 金照文

主治 百日咳

处方 百部二錢五分 鮮沙參五錢八分 天竺黃三錢五分

竹瀝半夏三錢五分 京川貝一錢八分

制法 煎劑

用法 每日一劑。三至五日有效。

小兒咳嗽方

項瑜菁

主治 小兒百日咳及慢性氣管炎

处方 建蘭叶（要蘭叶厚板。鮮叶）三錢至六錢

慈孝竹一兩

制法 二味洗清煎湯

用法 頻頻飲服。連服五至十天（或少許少許給服之，以免嘔吐）。

鷺鷥液膠囊方

蘇州市中醫診所

主治 小兒百日咳

鷺鷥液

制法 將鷺鷥液濾清，以相等的乳糖吸收，放烘箱

內（攝氏八十度）烘干，研和即成，然后加
千分之一安息香酸鈉防腐。每公分鷺鷥液一
克。

用法 每天二克。裝膠囊服，按年齡增減。

百日咳方

徐秉如

主治 百日咳

处方 枇杷叶（滌淨去毛，用鍋炒干）三錢

制法 加開水四百西西，煮開五分鐘，過濾渣滓。

二小時服一次，十二時服完。

疳積類

小兒疳積方

楊鶴汀

主治 小兒疳積病

处方 大鷄蛋一個

制法 取出蛋黃，納入十分之三的溏鷄屎，用白面

封孔燒熟。

用法 乘熱時吃下，無臭氣。每日一枚，連服數
日。

小兒疳積方

王佐民

主治 小兒疳積

处方 密陀僧（研細）五錢 黃蠟二兩

制法 調和制丸，如豌豆大。

用法 每天以豬肝一兩，該丸二、三粒，放入碗或

碟內，蒸于飯上。熟後令患兒食肝和汁水，

約食十多次至數十次疳疾即愈。

〔註〕 密陀僧內服有毒，用時慎之。

疳症方

陸愼其

主治 小兒疳症，營養不良，毛髮黃悴，形瘦腹脹

泄痢。

处方 蒼耳草蠹虫（蒼耳草一名野胎棵，學名羊耳

來，春生夏長，秋開白花，立秋前，干節中

生小青虫）。

制法 浸食油中

用法 每日用三條，包在豆腐皮中服之。

〔註〕 本人原註稱：「服七至十天後，症狀好轉，
能恢復健康。」

疳熱方

程希仲

主治

小兒疳熱，肌瘦神倦，頭髮脫落，唇口咽紅，完谷不化，便瀉，頭部靜脈曲張。

處方

活蟾蜍一只 鹹豬肉一小塊

制法

將蟾蜍剝皮去內臟，油炒后再用咸肉一小塊煨湯。

用法

每日一只，分三餐服下。全治程以三十只為度。

〔註〕

原註稱：「經實用多次，效果良好，但腹大有水者無效。」

百效粉秘方

許履和

主治

小兒疳積。小兒斷乳后服用此方，可以預防疳積。

處方

(一) 皂礬一斤 面粉一斤

(二) 炙五穀虫(漂清)四兩 使君子肉(炒香)四兩

白朮(炒)二兩 茯苓二兩 滑石(另飛)二兩

制法

方(一)：用好酸醋調成餅，放鉄鍋內炭火上煨煉，任其自行焚燬，成為粉末，以色如鼻烟為度，收貯待用。

方(二)：共研細末待用。

用法

皂礬粉二兩加入五穀虫等粉末二兩和勻，每服

主治

小兒疳疾，消瘦，頭髮脫落，頭髮無光澤，大便溏薄，腹脹作惡，眼目上生云翳，有不規則虛熱。

處方

石燕子一兩 雄鷄肝一具 原蠟醋二兩

制法

石燕炭火內煨透，取出入醋內，滲透后再取出陰干，研細末。

用法

每用取雄鷄肝一具，竹片切開，將藥粉投入肝內(每次二至三錢)，用沸水燉熟，和白糖少許，每日一至二次。

〔註〕

疳疾範圍極廣，本方根據主治中所稱，似近于腸寄生虫一类疾病。原註稱：「本人屢用，有百分之九十五的效果。」

初生兒腹脹方

丁少庵

主治

初生兒腹脹便秘，煩啼不安而無其他症狀者。

處方

元明粉一錢 蜂蜜三錢

鷄肝散方

嚴安效

一分至二分，一日三次。最好以此藥和入面粉中用豆油冷開水做咸薄餅，燻熟后服用，或將藥和入菜或粥內服用。

制法

將上二藥用沸水沖化和勻

用法

內服

〔註〕

該方組成，簡單扼要，应用于初生兒腹脹便秘，尙稱適合，但初生兒的服用劑量須加斟酌。

水腫草方

主治

水腫

处方

大田螺七个 車前草 小青菜各七棵

制法

將田螺連壳打爛

用法

敷臍下一寸三分处，如杯口大一塊，另用車前草、小青菜煎湯代茶飲之，小便增多腫即消失。

〔註〕

本方簡單易行，在農村中可以就地取材。

水腫方

主治

水腫

处方

蚕豆外衣(炒焦)半斤 鮮冬瓜皮半斤

制法

分次煎

用法

內服

〔註〕

原註云：「用于五歲至十五歲小孩最有效」。

小兒黃瘦方

馬培之傳 馬澤人獻

主治

小兒黃瘦

处方

使君子肉二十六个 榧子肉八个 檳榔一錢五分

淮山藥 三錢 黑白丑一錢五分 苡米 三錢 各半

制法

上藥各炒黃為度，研末入雞蛋內。

用法

燉熟食之

小兒食積泄瀉方

周憲璋

主治

小兒食積泄瀉

处方

鷄內金(即鷄胗皮)灰一錢

五香飯炭三錢(藥舖有售)

制法

用赤砂糖拌勻

用法

調水服

小兒雜病類

小兒夜啼遺尿方

仲立亭 常熟縣第三屆中醫進修班

主治

小兒夜啼遺尿

处方

甘草头二錢 小麥粉一兩 大棗五枚

制法

先以甘草头与大棗煎成濃液，用以調麥面，

用法 成漿糊狀。小麥粉不熟者煮。
臨臥量服

治遺溺法

馬毓德

主治 小兒夜間遺尿

方法 (不用藥物)用小盞大圓形木球一枚，另用

一尺寬、四尺多長的布一方，將木球纏以布，縛于小兒腰部，並令木球緊貼脊柱，挾小兒使側臥。

〔註〕原註稱：「小兒遺尿都在仰臥時，如此可以在發生遺尿時間觸醒小兒，經半月養成習慣

后，即不致遺尿。」(六歲以上小孩難以見效)

大渴大飲多尿方

常熟縣第三屆中醫進修班

主治 大渴大飲多尿，體溫不高脈細苔膩。

处方 杜仲三分 附子三分 肉桂二分 巴戟天二錢

補骨脂一錢

制法 煎劑

用法 內服。如服后口渴加白芍。

〔註〕原註稱：「小孩服之見效」。

金蟾散方

丁少庵

主治 小兒營養不良

处方 活蟾蜍一只 砂仁

制法 將活蟾蜍置清水內二十四小時，再以砂仁杵碎灌入蟾蜍口腔，裝滿為度，外用泥土封固，火煨透，去泥，搗研細末。

用法 每服三至五分，一日三次，開水送下。

〔註〕砂仁有健胃祛風作用，似疳症而兼有消化不良者宜之。蟾蜍有微毒，用時劑量不宜過多。

小兒口腔病方

楊鶴汀

主治 小兒口腔病

处方 鉛糖 柿餅等分

制法 將柿餅切碎納置飴糖內，隨時應用。

用法 內服或塗抹用

金棗丹方

朱宗暄

主治 專治小兒口內白腐流涎(俗稱白口瘡)

处方 紅棗 明雄黃 梅片

制法

紅棗去核，以明雄黃（如核大）包入棗內，瓦上火煨存性，研末加梅片量五分之一，瓶裝勿洩氣。

用法

先用米泔水拭去白腐（稍重出血亦不妨），然後將此藥搽患處，流涎任出，慎勿嚥下。

走馬牙疳方

朱炎龍

主治

大熱口渴。牙齦紅腫，潰爛流血，惡臭，甚至穿顙落齒，脈洪大，大便干燥。

处方

（一）雲茯苓二錢 生石膏末四錢 黑山梔二錢
牛蒡子三錢 黃連五分 銀柴胡二錢半
桔梗一錢八分 生軍三錢 丹皮二錢
生甘草一錢半

（二）皂礬（煨）一錢半 五倍子（焙焦）一錢半

雄黃五分 梅片二分 熟地黃一錢半

制法

方（一）加水煎，方（二）共研細末。

用法

方（一）內服二劑即可收效。方（二）吹患處，每日三至四次。

〔註〕

原註稱：「痢疾及猩紅熱后所起的牙齦潰爛，治之均能奏效云。」

雪口方（鵝口瘡方）

馬培之傳 馬澤人獻

主治

小兒雪口

处方

天竺叶

制法

將天竺叶入冷開水內，取出打汁。

用法

以紗布繞指蘸汁，擦患處。

小兒氣管炎方

魏青云

主治

小兒氣管炎

处方

前胡一錢五分 瓜蒌皮三錢 桔梗一錢五分

川白前二錢 杏仁泥一錢五分 川大貝一錢五分

薄橘紅一錢 雲茯苓三錢

制法

煎劑

用法

內服

小兒水瀉外用方

范春如

主治

小兒水瀉、發熱等症

处方

白芥子四分 桃杏仁各七粒 生山梔七粒

制法

打爛。用鷄蛋清、面粉調和作二餅。

用法

將餅貼臍上

姜雄丹方

薛青萍

主治 走馬牙疳

处方 生姜三分之一 雄黃三分之一 冰片少許

制法 鮮生姜上挖孔，把真雄黃末納入，仍用生姜

皮蓋好，並用干面糊縫，放在瓦上焙灰存性，置陰暗處三星期后和上等梅片研末，瓶貯候用。

用法 搽患處

〔註〕 小兒牙疳虽牙齦黑腐脫落，前藥搽患處即停

止潰臭，肌肉呈現紅活。

小便不利方

朱月橋

主治 小便不利，涓滴即無。

处方 淡豆豉一錢 木香七分

制法 上二藥研為細末，加麝香一分和勻，葱汁干

面，調成一餅。

用法 將餅敷肚臍上小便自通

喉風方

朱月橋

主治 小兒驟然胸喘不止，痰涎上湧，声如拽鋸，甚則面色發青，旦夕有生命危險。

处方 鼻涕虫（蛭蟪）三条 明礬末一錢 烏梅三个

制法 先將鼻涕虫放在碗內，加礬末一撮，洒在虫

身上，不久鼻涕虫成水，將鼻涕虫遺体鉗去，用烏梅三个熬成濃汁收膏。

用法 每料分二次和水服之

〔註〕 蛭蟪与蝸牛同类異种。

种痘化膿方

溧水縣衛生科

主治 种牛痘局部引起化膿

处方 黃牛糞不拘多少

制法 煨存性，為細末。

用法 搽發炎部

小兒口內炎方

錢中選

主治 小兒口舌腐碎，不能吮乳，流涎，痛哭不安。

处方 五倍子一錢（括去皮，刷淨垢，溫開水泡，晒干）

生蒲黃三錢 生中白（漂水飛）三錢

制甘石（水飛）三錢 硃砂一錢 梅片五分

用法 撒布用

小兒吐奶方

項瑜青

主治 小兒吐奶

处方 姜汁

制法 用姜打汁

用法 每用一、二滴加入白开水服

新生兒口頰腫硬方

吳基厚

主治 新生兒頰里腫硬（俗名螳螂子）

处方 川柏 生大黃 鮮生地各一錢

制法 用陳酒浸透，同打爛。

用法 包敷兩足心。如干硬時，可交換包敷，至愈為度。

小兒鵝口瘡方

吳基厚

主治 新生兒有馬牙或鵝口瘡

处方 栗子壳內軟衣

制法 煎水，待冷瀉清。

用法 用紗布浸藥拭口內

結胸外敷方

朱月橋

主治 凡高熱氣粗，舌尖黃厚，口渴，中脘拒按。

处方 大鯽魚一條 麝香一分

制法 將魚肉剔下鎚濃，加麝香調勻。

用法 敷胸口八小時

〔註〕介紹此方者稱：「本人屢經治愈結胸重症」。

螳螂子方

張良歧

主治 小兒螳螂子（土名肉老鼠），不能吮乳。

处方 初生兒一至三日可擦 冰硼散

又方 生地二錢 吳茱萸五分 草麻子七粒（去壳）

制法 方藥搗爛如泥

用法 敷兩足心，一夜即效。

小兒口炎方

主治 初生小兒口內兩邊發硬，不能吮乳。

处方 薄荷叶四分 元明粉六分 青黛（飛）二分

冰片五厘

制法 右方研為細末

用法 搽患處，三次即愈。

二蛟散方

顧云鰲

主治 小兒周身性水腫，無汗。

处方 芒硝三兩 糯米一市斤

制法 先將糯米炒至半熟，再將芒硝加入共研炒，

待米炒黃為止，共研極細末。

用法 每日三次，每次二匙。食前服，服時加白糖少許，用開水調服。

針灸門

內科病类

胸悶皖痛方

程培蓮

主治

胸悶皖痛，作脹，飲食不能多進。

处方

上皖 中皖 下皖 气海 大腸俞 足三里 等穴

偏头痛方

程培蓮

主治

偏头痛

处方

肝俞 大腸俞 合谷 列缺 絲竹空 風池 等穴

耳鳴或耳聾方

程培蓮

主治

耳鳴或耳聾

处方

关元 耳門 風池等穴

头昏目花方

程培蓮

主治

头昏目花

处方

关元 足三里 内庭 風池 絲竹空等穴

滿腹脹痛方

程培蓮

主治

滿腹脹痛

处方

气海 关元 气穴 大腸俞等穴

胃气痛方

程培蓮

主治

胃气痛

处方

中皖 胃俞 足三里等穴

气急咳嗽方

程培蓮

主治

气急咳嗽

处方

肺俞 丹田 尺澤等穴

神經錯乱方

程培蓮

主治

神經錯乱

处方

中皖 丹田 心俞 曲澤 内关等穴

瘧疾方

程培蓮

主治 瘧疾

处方 膏肓 曲池 絕骨等穴

用法 針曲池，先补后瀉；針絕骨，先瀉后补。

伤寒方

程培蓮

主治 伤寒

处方 伤寒無汗，先补合谷，后瀉复溜。伤寒多汗，先瀉合谷，后补复溜。

遺精病方

程培蓮

主治 遺精病

处方 关元 中極等穴

臌脹病方

程培蓮

主治 臌脹病

处方 水分 小腸俞 三陰交等穴

遺尿病方

程培蓮

主治 遺尿病

处方 中極穴

反胃吐食方

鎮江市中医协会

主治 反胃吐食，朝食暮吐，暮食早吐，并治干嘔

不患。

处方 公孙 内关 胃俞 間使 脾俞 中脘

隔俞 气海 足三里等穴

另方 甘蔗汁七錢 生姜汁一錢。和勻。每日

早、中、晚三次溫服。

外科类

牙痛方

程培蓮

主治 牙根及牙齒脹痛

处方 大腸俞 合谷 内庭 列缺等穴

兩目紅腫作痛方

程培蓮

主治 兩目紅腫作痛

处方 肝俞 大腸俞 合谷 風池 睛明等穴

喉腫爛方

程培蓮

主治 喉頭紅腫、腐爛，湯水難嚥

处方 曲池 合谷 足三里 頻車 少商等穴

疗方

程培蓮

主治 疔瘡

处方 大椎 内关等穴

風湿病类

半身不遂方

程培蓮

主治 半身不遂或全身不遂

处方 关元 气穴 膀胱俞 陽陵泉 曲池 合谷

肩井 肩髃等穴

用法 半身不遂針半边，全身不遂針全身。

初中風針灸方

程培蓮

主治 初中風时，病者神昏，不省人事，痰涎壅

滯，湯水不進。

处方 中脘 气海 大腸俞 足三里 合谷 肩井

風池 風府等穴

說明 如果病者神清口开，言語不清，加針金津等

穴

头痛方

程培蓮

主治 全部头痛，病勢甚重，坐立不安。

处方 肝俞 丹田 膀胱俞 合谷 絲竹空 列缺

風池等穴

口眼歪斜方

程培蓮

主治 口眼歪斜，或偏左，或偏右。

处方 关元 膀胱俞 合谷 迎香 地倉 絲竹空

攢竹 頰車等穴

說明 偏右針左，偏左針右。

脅肋刺痛方

程培蓮

主治 脅肋刺痛

处方 大腸俞 足三里 風池等穴

背部痠痛方

程培蓮

主治 背部痠痛

处方 大椎 肺俞 膈俞等穴

癱瘓方

程培蓮

主治 兩足癱瘓或四肢癱瘓

处方 关元 气穴 膀胱俞 白环俞 肾俞

陽陵泉 崑崙 太衝 委中等穴

坐骨痠痛方

程培蓮

主治 腿部坐骨痠痛，曲而不直。

处方 关元 冲門 膀胱俞 环跳 陽陵泉 陽关

等穴

兩手痠痛方

程培蓮

主治 兩手痠痛，不能高举，伸屈不利。

处方 肩髃 曲池 肩貞 列缺等穴

說明 如果只有一边痠痛，只需針灸一边。

膝痠痛方

程培蓮

主治 兩膝痠痛腫脹

处方 膀胱俞 白环俞 膝眼 陽陵泉 足三里等

穴

手弯痠痛方

程培蓮

主治 手弯痠痛

处方 曲池 手三里 合谷 尺澤等穴

神經衰弱方

程培蓮

主治 神經衰弱

处方 气海 足三里 列缺等穴

歷節痛風方

程培蓮

主治 歷節痛風

处方 膀胱俞 陽陵泉 肩髃 曲池 合谷等穴

四肢麻木方

程培蓮

主治 四肢麻木，曲而不直。

处方 二間 神門 三陰交 太白等穴

腰痛方

程培蓮

主治 腰痛直強，不能轉側。

处方 关元 腎俞 环跳 陽陵泉 委中等穴

手足痠攣方

程培蓮

主治 手足痠攣，形如雞爪。

处方 肩中 肩髃 曲池 外关 神門 承山

委中 刺湧泉等穴

婦科病類

痛經方

程培蓮

主治 婦人經痛，或過期與縮短。兩乳脹痛。

處方 關元 中極 大赫 膀胱俞 三陰交等穴

產后破傷風方

程培蓮

主治 小產后惡露未清，牙關緊閉，角弓反張。

處方 關元 氣穴 三陰交 合谷 頻車等穴

胞衣不下方

程培蓮

主治 產后胞衣不下

處方 合谷 三陰等穴

附：中國重量與公分制對照表

制容量與家用器具約量對照表

(一) 中國重量與公分制對照表：

一市斤等於五〇〇克

一市兩等於三一・二五克

一市錢等於三・一二五克

一市分等於〇・三一二五克

一克等於三・二(市)分

(二) 公制容量與家用器具約量對照表：

一公升約等於一〇〇〇毫升

一茶匙約等於五毫升

一湯匙約等於一五毫升

一茶杯約等於一五〇毫升

一飯碗約等於四〇〇毫升

一滴約等於二〇分之一至一〇分之一毫升

為了進一步統計秘方、驗方的療效，以便總結推廣起見，特附錄「臨床試用本書秘方、驗方記錄表」于后，希望各醫院、診所及個人在試用本書各方后，無論成功与否均填報，寄交江蘇省衛生廳內江蘇省中醫中藥學術研究委員會籌委會。並為繼續進行交流秘方驗方起見，附錄「貢獻秘方驗方內容格式」于后，亦希填寄本會。

附錄一：臨床試用本書秘方、 驗方記錄表

病人姓名 年齡 性別 職業 籍貫
起病時間與地點：
患病及治療經過情況：
現在病狀（愈詳細愈好）：
試用何方：
試用經過（包括時間、次數和劑量）：
效果如何（包括全愈、良好或某種症狀減退）：
試用單位及姓名

記錄日期

附錄二：貢獻秘方、驗方內容 格式

秘方驗方名稱：
主治（適應症）：
處方藥草名稱及用量：
藥草的制法和用法：
使用時注意事項（使用時的禁忌等）：
實用病例（附填表（一））：
獻方者意見：
獻方者現住地址及姓名：

[General Information]

书名=中医秘方验方汇编 （第一集）

作者=江苏省中医中药学术研究委员会筹备委员会资料室编

页数=134

SS号=10444427

DX号=

出版日期=1956年03月第1版

出版社=江苏人民出版社

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

书名
前言
目录
内科门

咳嗽、哮喘类

枝气管喘息方

喘息咳嗽方

气喘方

哮喘方

保肺膏方

燥咳方

流行感冒方

咳嗽方

咳嗽方

痰咳方

咳嗽方

肺露方

痰饮方

定哮喘方

哮喘方

老嗽方

哮喘方

哮喘方

肺癆类

肺癆方

肺癆方

肺结核方

肺癆方

肺出血方

肺癆方

保肺丸方

咯血方

定做各类PDF电子书，提供各种种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

肺病血痰方

肺结核方

治肺病方

治肺病方

百部膏方

结核病方

肺痈方

肺痈方

肺痈方

肺痈方

治肺痈方

风痺类

慢性关节炎方

关节痛风散方

关节炎方

头痛方

头痛方

治痿方

筋骨痛方

头痛方

头痛方

头痛作响方

头痛方

头痛脑痛

治中风方

鹤膝风方

鹤膝风方

代参膏方

歪嘴主

口眼歪斜方

痺病方

中风验方

定做各类PDF电子书，提供各种种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

偏正头痛药

疟疾类

疟疾方

间日疟疾方

疟疾外用方

疟疾方

疟疾方

疟疾方

疟疾方

疟疾外治方

治大疟方

止疟散方

疟疾方

疟疾方

疟疾方

久疟全消丸方

气滞类

消化道溃疡方

胃痛方

肝胃气痛

经验胃痛方

胃痛吐酸方

胃痛方

胃痛祖传秘方

胃气痛方

胃痛方

腹痛外熨方

心口疼方

呃逆方

？病方

走马丸方

急性胃肠炎

定做各类PDF电子书，提供各种种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我
我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

胃肠炎方
消化验方
五儿丸方
慢性肠炎方
消化性溃疡方
梅核气病方
梅核气方
胃气痛方
胃神经痛方
胃寒气痛方
黄疸方
肝痛方
疝气方
胆胀不眠方
黄病丸方
肝脓肿方
胆黄方
复方海螵蛸方
噎膈方
膈气方
胃气痛验方
肝脏硬变腹水
止呕吐方

积聚类

水肿方
单腹胀方
腹水方
水臌胀单方
腹水方
水肿方
外治方
水臌胀方

臌胀丸方
水肿病验方
水肿病验方
宽中丸方
大温中丸方
红颜丸方
水不溢丸方
单腹胀方
血虫胀方
水肿病验方
单腹胀方
臌胀方
治气臌胀方
治臌胀方
水肿方
水肿方
治胀病方
河白胀方
河白胀方
水臌方
臌胀方
血虫方
臌胀产方
肿胀验方
肾脏炎水肿方
鸡屎醴方
肿胀方
臌胀病验方
治疫瘡方
疫瘡绛矾丸方
伐木丸方
疫瘡煮黄丸方

定做各类PDF电子书，提供各种种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我
我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

时疫类

经验霍乱方
类似麻风初期方
大麻风秘方
大头瘟方
霍乱方
真塘西沙药方
治麻风方
杨亭诸氏风丸方
脑膜炎方
愈风膏方
脑膜炎外用方
脑膜炎内服方
脑脊髓膜炎外用方
脑脊髓膜炎内服方
脑膜炎秘方
霍乱秘方
大麻风秘方
蝦蟆胀秘方

痢疾类

痢疾效方
红白痢疾方
痢疾方
红白痢疾方
慢性痢疾方
多年痢疾方
初痢方
痢疾方
白头翁饮方
黄连方
痢疾方
泻痢方

红白痢方
红白痢方
痢疾丹方
治痢方
痢疾方
痢疾方
痢血方
水泻方
水泻方
济生乌梅方
慢性肠出血方
便血方
便血方

失血类

鼻衄方
鼻衄方
止血散方
止吐血鼻血方
吐血方
呕血方
百草霜丸方
治鼻衄方
鼻衄方
鼻衄急救法
吐血验方
吐血病验方
肠血单方
便血方
尿血方
尿血方
尿血方
尿血方

胃出血方

胃出血方

胃出血方

虫病类

杀钩虫蛔虫方

伤力黄方

雷丸方

蛲虫方

驱？虫方

蛲虫方

姜片虫方

血吸虫病方

黄病方

黄疸方

铁商丸方

去黄验方

黄病方

萎黄病方

黄病方

癫痫类

癫痫方

羊痫疯方

羊痫疯方

羊痫方

疯癫方

癫病方

阳狂疾病方

痴癫方

痫厥方

羊痫疯方

肝肠类

肝阳方

高血压方
荠菜汤方
肝阳方
高血压方
高血压方
防眩汤方
破伤风、狂犬病类
破伤风方
破伤风方
破伤风验方
破伤风方
破伤风验方
破伤风方
已戌丹
狂犬病方
五金丹方
疯狗咬方
狂犬咬方
狂犬病方
疯犬咬方
泌尿病类
淋病方
尿闭外治方
金钱草方
通小便方
小便癃闭方
杂病类
夜不寐方
风疹块方
治结核性脑膜炎方
神经衰弱方
失眠方

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我
我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

遗精方
阳痿方
遗尿方
遗精方
遗精方
滑精方
消渴症方
十枣汤
盲肠炎方
红藤方
盲肠炎方
脚气验方

外科门

疮疡类

热疔方
断背丸方
流痰方
桂麝香散方
青龙散方
祖传伸筋丸方
中国安福消炎膏
壁虎散方
阳和膏
九龙下海散方
青龙丸方
平餐散方
提毒方
预防疖疮方
如意膏方
海浮散方
痈疽经验方
流注掺药方

生化丹
背部痈疽方
冰珠散方
搭背方
发背方
发背方
对口疮方
对口疽方
善攻头方
千槌膏方
治蟥？头方
治蟥？头方
乳疽方
奶痈消散方
乳痈外治方
乳痈方
鱼口毒方
臃疮方
石珍散方
对口疽发背方
脱壳囊痈方
发背膏方
发背方
灵应必消散方
臃疮方
妙灵丹方
九一丹方
金僧散方
推车散方
生肌长肉方
棉疮下疳方
消疔疮方

定做各类PDF电子书，提供各种种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我
我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

对口疽方

四味散方

对口疮方

止血棉花方

老烂脚方

盲肠炎方

痈疽方

疔疮类

疔疮方

消肿提毒方

疔药方

疮疔方

立马取疔丹方

拔疔膏方

消疔散方

敷疔方

疔疮初起奇效方

唇疔特效方

疔毒方

皮肤病类

下腿溃疡(臃疮)药膏

鬍鬚头方

鬍鬚头方

秃疮效方

牛皮癬方

黑药膏方

绣球风方

五倍散

黄连膏方

三灵丹方

剃刀疯方

痲子方

黄水疮方
黄水疮方
七星丸方
脚丫湿痒方
水龙骨散方
白癜风方
白癜风方
赤游丹
青保丹方
外用杀八脚虫方
鹅掌疯方
鹅掌疯方
鹅掌疯外用方
油灰指甲方
风热痤疮洗方
风热痤疮洗方
白癜风方
黄水疮方
石黄散方
肥疮散方
流火方
缠腰火丹方
黄水疮方
鬍鬚头方
鹅掌疯方
小儿赤游丹方
胎毒方
紫草膏方
面上粉刺方
漆疮方
膝腿疮验方
膝疮方

定做各类PDF电子书，提供各种种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

臃疮方
臃腿疮方
臃疮方
烂脚方
老烂脚方
下腿溃疡外用方
下腿溃疡外用方
冻疮方
冻疮方
冻伤破溃方
冻疮方
蟾酥散方
玉露散方

瘰癧、癌肿类

瘰癧方
痰癧方
瘰癧方
痰块消散方
乳癌方
乳癌方
乳癌方
化瘤丹方
豎肉方
蜀羊地榆散方
男子乳房结核方
癌肿方
癌症方
消瘰丸方
颈淋巴腺结核方
乳癌方
瘰癧方
治癧方

乳癌方
醉龙丸方
瘰癧丸方
瘰癧内服方
独立丸方
瘰癧未破外用方
瘰癧方
瘰癧溃破外用方
瘰癧漏管外治方
瘰癧膏方
瘰癧疮验方
瘰癧方
治瘰方
乳癖方
瘰癧疮验方
治瘰方

痔疮类

痔疮洗方
痔疮方
脱肛方
痔疮方
痔疮方
小儿脱肛方
大功散方
桔痔散方
文蛤散方
脱肛方
外痔方
痔疮方
漏管方
痔漏方
偷粪鼠方

白虎八宝丹方

退管方

痔出血方

治痔方

痔疮方

痔疮药线方

烫火伤类

汤火伤方

火烫外用方

水火烫药膏方

水火烫效方

火烫方

水火烫伤方

汤火伤方

火烫药方

火烫药方

火烫药方

葵花油方

蛇虫咬伤类

蛇咬伤方

吕氏蛇咬方

蛇咬方

蛇咬方

蝎螫方

蛇狗毒方

蛇咬效方

毒蛇咬方

蜈蚣咬方

跌打损伤类

伤方

伤膏药方

跌打损伤丸药方

定做各类PDF电子书，提供各种种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我
我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

接骨外用药
吊伤散方
外伤止血方
敷药方
止出血方
胸肋骨伤痛方
金疮方
伤科方
跌伤休克方
内伤丸方
猪蹄汤方
关节脱臼方
刀伤止血方

五官病门

眼病类

雀眼方
夜盲症方
蟹珠眼方
雀盲眼力
七针丹方
目生白星方
目中赘肉外治方
风火红眼方
眼科神效方
青光眼方

耳病类

黄龙散方
黄瓜霜方
礞砂散方
耳聋方
耳脓方
耳炎方

白降丹方

耳应丹方

鼻病类

鼻渊方

鼻渊方

鼻渊季方

脑漏方

脑漏外用方

治鼻息肉方

鼻息肉方

鼻渊方

鼻窦炎方

化鼻息方

鼻渊方

？鼻散方

咽喉病类

抑木丹方

独胜散

乳蛾内服方

咽喉肿痛方

骨梗咽喉方

鱼骨梗喉方

鱼骨梗方

缠喉急症方

喉风方

烂嘴唇方

口腔炎方

喉科方

治喉蛾方

喉风丹

喉科秘药方

吹喉回生丹

软化鱼卡方
喉症秘方
喉症方
锡类散方
喉疳方
喉风方
喉科闭塞方
阴？喉痹方
喉科吹药方
哑喉风方
复方珠黄散方
黄吹药方
吹喉方

齿病类

牙齿痛药水方
牙痛方
风火牙痛方
治牙痛验方
牙痛方
牙痛出血方
离骨丹方
牙痛方
治牙癌方
走马疳方
珍珠散方
擦牙散方
牙痛方
龋齿方
走马牙疳方
牙痛方
牙疳方
骨槽风方

骨槽风方

妇科门

调经类

妇女痛经方

痛经方

月经困难方

室女经闭方

月经过多方

痛经方

痛经方

调经方

妇科验方

妊娠期疾病类

妊娠恶阻方

胎动不安方

安胎散方

牛鼻保胎丸方

临产不痛方

恶阻方

催生方

产后疾病类

产后验方

儿枕痛方

胞衣不下方

产后咳嗽方

产后中风方

产后破伤风方

产后晕厥方

产后中风方

开牙关方

产后中风方

崩带类

定做各类PDF电子书，提供各个种类各个年代的电子图书，全是扫描制作的PDF格式，清晰度高也方便阅读和携带和转换编辑。当您想看的书是几十年前出版的市面上购买不到可以联系我，当您想看的书市面上价格过高的时候也可以联系我我先试读，QQ45472743微信s38772614，您的移动书库 低价 高效 专业。

血崩方
血崩方
血崩方
白帶方
白帶丸
白帶单方
老年崩漏方
治肠痢兼治血崩血瘤方

妇女杂病类

痞块方
子宫颈下垂方
验胎方
乳房皴裂方
吹乳方
贯仲散方
治阴疔方
治乳头干裂方

儿科门

惊风类

慢惊方
小儿惊风方
小儿惊风方
小儿慢惊方

麻疹类

麻疹方
麻疹薰浴方
痧子难透方
麻疹方

百日咳类

百日咳方
芫花膏方
百日咳方

百日咳方
百日咳方
百日咳方
百日咳方
二冬膏方
大蒜浸出液方
百日咳方
小儿咳嗽方
惊鸣液胶囊方
百日咳方

疳积类

小儿疳积方
小儿疳积方
疳症方
疳热方
百效粉秘方
鸡肝散方
初生儿腹胀方
水肿草方
水肿方
小儿黄瘦方
小儿食积泄泻方

小儿杂病类

小儿夜啼遗尿方
治遗溺法
大渴大饮多尿方
金蟾散方
小儿口腔病方
金枣丹方
走马牙疳方
雪口方
小儿气管炎方

小儿水泻外用方
姜雄丹方
小便不利方
喉风方
种痘化脓方
小儿口内炎方
小儿吐奶方
新生儿口颊肿硬方
小儿鹅口疮方
结胸外敷方
螳螂子方
小儿口炎方
二蛟散方

针灸门

内科病类

胸闷脘痛方
偏头痛方
耳鸣或耳聋方
头昏目花方
满腹胀痛方
胃气痛方
气急咳嗽方
神经错乱方
疟疾方
伤寒方
遗精病方
臌胀病方
遗尿病方
反胃吐食方

外科类

牙痛方
两目红肿作痛方

喉肿烂方

疔方

风湿病类

半身不遂方

初中风针灸方

头痛方

口眼歪斜方

肾肋刺痛方

背部酸痛方

痿痹方

坐骨酸痛方

两手酸痛方

膝酸痛方

手弯酸痛方

神经衰弱方

历节痛风方

四肢麻木方

腰痛方

手足痉挛方

妇科病类

痛经方

产后破伤风方

胞衣不下方