

中医膏方治病百问

陈家英 周吉燕 编著

上海中医学院出版社

目 录

序 前言

概 论

1. 何谓膏方?.....(1)
2. 膏方应用的发展源流如何?.....(1)
3. 膏方有哪些功效?.....(3)
4. 应用膏方有哪些优点?.....(4)
5. 膏方的药物配伍有什么特点?.....(5)
6. 膏方的药物用量应如何掌握?.....(6)
7. 膏方选用辅料(赋形剂)的原则如何?.....(7)
8. 怎样自制膏剂?.....(8)
9. 膏剂在一年中什么时间服用较好?.....(10)
10. 膏剂如何服法?.....(10)
11. 服用膏剂应注意哪些问题?.....(11)

各 论

内科

一、呼吸系统疾病

1. 感冒怎样选用膏方防治?.....(13)
2. 何谓咽炎? 什么膏方可治?.....(14)
3. 扁桃腺有什么作用? 扁桃腺炎用什么膏方
治疗?.....(15)
4. 如何分别选用膏方来治疗新咳、久咳?.....(16)

5. 慢性鼻窦炎选用何种膏方治疗?.....(17)
6. 支气管哮喘有哪些表现? 怎样用膏方防治?.....(18)
7. 什么叫支气管扩张咯血? 用什么膏方治疗?.....(19)
8. 肺结核用什么膏方治疗?.....(20)
9. 肺炎有哪些症状? 可用膏方治疗吗?.....(20)
10. 什么叫肺气肿? 如何用膏方防治?.....(21)
11. 什么叫肺心病? 选用什么膏方治疗?.....(22)

二、消化系统疾病

1. 消化不良的含义是什么? 用什么膏方治疗?.....(23)
2. 慢性胃炎是怎样一种病? 选用何种膏方
治疗?.....(24)
3. 胃、十二指肠溃疡病是怎么发生的? 可选用什么
膏方?.....(25)
4. 慢性肠炎该选用什么膏方治疗?.....(26)
5. 痢疾用什么膏方治疗?.....(27)
6. 胆囊炎用什么膏方治疗?.....(27)
7. 胆石症为什么会引起胆绞痛? 用什么膏方
防治?.....(28)
8. 急性病毒性肝炎是怎样传播的? 如何用膏方
防治?.....(29)
9. 慢性活动性肝炎选用什么膏方治疗?.....(31)
10. 肝炎恢复期肝区疼痛可用膏方治疗吗?.....(32)
11. 肝硬化是怎么发生的? 有什么膏方可以
治疗?.....(33)
12. 肝硬化腹水选用什么膏方治疗?.....(33)
13. 习惯性便秘是怎么回事? 选用什么膏方治

- 疗?.....(34)
14. 脱肛的病因、症状有哪些?用什么膏方治疗?.....(35)
15. 阑尾炎用什么膏方治疗?.....(36)
16. 怎样预防蛔虫病?用什么膏方治疗?.....(36)
17. 怎样预防蛲虫病?用什么膏方治疗?.....(37)
18. 乙型肝炎表面抗原(HBsAg)阳性者如何用
膏方保健?.....(38)

三、心血管、血液系统疾病

1. 高血压是怎样发生的?选用什么膏方治疗?.....(39)
2. 动脉硬化是怎么回事?用什么膏方防治?.....(40)
3. 什么是高脂血症?可用膏方治疗吗?.....(41)
4. 心力衰竭有哪些早期表现?膏方可治吗?.....(42)
5. 什么叫冠心病?用什么膏方治疗?.....(44)
6. 早搏是怎么回事?用什么膏方治疗?.....(45)
- 7 阵发性心动过速是怎么回事?选用什么膏方治
疗?.....(46)
8. 什么是病态窦房结综合征?用什么膏方治
疗?.....(47)
9. 脑血栓形成在发病前有哪些先驱症状?用什么
膏方可以预防?.....(48)
10. 低血压是怎么回事?用什么膏方治疗?.....(48)
11. 缺铁性贫血有哪些症状?用什么膏方治疗?.....(49)
12. 血小板减少性紫癜选用什么膏方治疗?.....(50)
13. 什么叫过敏性紫癜?用什么膏方治疗?.....(51)
14. 什么叫再生障碍性贫血?用什么膏方治疗?.....(52)
15. 脑溢血是怎么回事?怎样选用膏方配合治

疗?..... (53)

四、泌尿、生殖系统疾病

1. 血尿用什么膏方治疗?..... (54)
2. 尿路感染有哪些症状?用什么膏方治疗? (55)
3. 尿路结石用什么膏方治疗?..... (56)
4. 肾结核病有哪些症状?用什么膏方治疗? (56)
5. 夜尿多用什么膏方治疗?..... (57)
6. 遗尿有什么膏方可治?..... (58)
7. 慢性肾炎有哪些基本特点? 用什么膏方治
疗?..... (58)
8. 什么叫肾病综合征? 用什么膏方治疗?..... (59)
9. 什么叫慢性前列腺炎? 用什么膏方治疗?..... (60)
10. 遗精或滑精用什么膏方治疗?..... (60)
11. 阳痿选用什么膏方治疗?..... (61)
12. 男子不育(精子异常)用什么膏方治疗?..... (62)

五、神经、内分泌系统疾病

1. 什么叫“甲亢”?用什么膏方治疗? (63)
2. 甲状腺肿大用什么膏方治疗?..... (63)
3. 糖尿病有什么特点?用什么膏方治疗? (64)
4. 什么叫尿崩症?用什么膏方治疗? (65)
5. 神经性头痛是怎样引起的? 用什么膏方治
疗?..... (65)
6. 三叉神经痛有哪些症状? 用什么膏方治疗?..... (66)
7. 面瘫是怎么回事?用什么膏方治疗? (67)
8. 坐骨神经痛用什么膏方治疗?..... (67)
9. 何谓美尼尔氏综合征?用什么膏方治疗? (68)

10. 什么叫癫痫?如何选用膏方治疗? (68)

六、骨、关节系统疾病

1. 什么叫肩周炎?用什么膏方治疗? (69)
2. 什么叫颈椎病?如何选用膏方治疗? (70)
3. 什么叫骨质疏松症?用什么膏方防治? (71)
4. 什么叫腰肌劳损?如何预防? 什么膏方可治本病?..... (72)
5. 脚后跟为什么会痛?怎样选用膏方治疗? (73)
6. 什么叫肋软骨炎? 用什么膏方治疗?..... (74)
7. 风湿性关节炎有哪些表现?用什么膏方治疗?..... (74)

妇产科

1. 月经过少有哪些原因引起?用什么膏方治疗?..... (76)
2. 什么叫痛经?用什么膏方治疗? (76)
3. 什么叫“经前期紧张症”?用什么膏方治疗? (77)
4. 什么叫“功血”?可用膏方治疗吗? (77)
5. 何谓闭经?用什么膏方调治? (78)
6. 白带过多用什么膏方治疗?..... (79)
7. 白带过少用什么膏方治疗?..... (80)
8. 习惯性流产用什么膏方调治?..... (80)
9. 不孕症有什么膏方可治?..... (81)
10. 何谓“儿枕痛”?用什么膏方可治? (82)
11. 盆腔炎有哪些症状?用什么膏方治疗? (82)
12. 什么叫急性乳腺炎?用什么膏方治疗? (84)
13. 乳腺小叶增生是什么病?用什么膏方治疗? (84)

14. 什么叫更年期综合征?用什么膏方治疗? (85)
15. 子宫脱垂用什么膏方治疗?..... (86)

儿科

1. 水痘是什么病?选用什么膏方治疗? (86)
2. 流行性腮腺炎是什么病?用什么膏方治疗? (88)
3. 小儿多汗用什么膏方治疗?..... (89)
4. 小儿久泻用什么膏方治疗?..... (89)
5. 小儿疳积(奶痂)用什么膏方治疗?..... (90)
6. 百日咳有什么特点? 用什么膏方治疗?..... (91)
7. 什么叫小儿“疰夏”?用什么膏方治疗? (91)
8. 哮喘患儿在缓解期用什么膏方扶正固本?..... (92)

五官科

1. 口疮是怎么回事?用什么膏方治疗? (93)
2. 口臭怎么办?能用膏方治疗吗? (93)
3. 声音沙哑选用什么膏方治疗?..... (94)
4. 慢性喉炎的病因和主要症状如何?用何膏方治疗?..... (95)
5. 牙龈出血用什么膏方治疗?..... (96)
6. 耳鸣是怎么回事?什么膏方可以治疗本病? (96)
7. 鼻出血选用什么膏方治疗?..... (97)
8. 过敏性鼻炎有何特点?用什么膏方治疗? (98)

老年科

1. 老年人慢性腰腿痛选用什么膏方治疗?..... (99)
2. 防治老年人视力减退宜用什么膏方?..... (99)
3. 老年人为什么容易耳聋?用什么膏方防治?..... (100)
4. 老年慢性支气管炎用什么膏方治疗? (100)

5. 什么叫骨质增生症?用什么膏方治疗?.....(101)
6. 老年人前列腺增生症用什么膏方治疗?(102)
7. 老年人尿失禁是怎么回事?用什么膏方调
治?(103)
8. 什么叫老年忧郁症?用什么膏方治疗?.....(103)
9. 男性也有更年期综合征吗?用什么膏方治
疗?(104)
10. 为什么老年人肿瘤发病率较高? 用什么膏方预
防?(105)
11. 老年人服用什么膏方可以延年益寿?(105)
12. 中年人用什么膏方抗衰老?(106)

皮肤科

1. 脂溢性脱发有什么特点?用什么膏方治疗?.....(107)
2. 须发早白用什么膏方治疗?(108)
3. 慢性荨麻疹用什么膏方治疗?(108)
4. 什么叫带状疱疹?用什么膏方治疗?.....(109)
5. 皮肤搔痒症是怎样产生的? 用什么膏方治
疗?(109)
6. 面部色素沉着是怎么回事? 用什么膏方治
疗?(110)
7. 什么叫白癜风?怎样用膏方治疗?.....(111)
8. 痤疮是怎么回事?用什么膏方治疗?.....(112)

肿瘤科

1. 鼻咽癌有哪些早期信号?用什么膏方治疗?.....(113)
2. 食道癌的发生与哪些因素有关?用什么膏方治
疗?(114)

3. 如何认识肺癌的早期症状? 用什么膏方治疗? (115)
4. 胃癌早期有哪些症状? 用什么膏方治疗? (115)
5. 如何早期发现肝癌? 用什么膏方治疗? (116)
6. 结肠癌有哪些早期症状? 用什么膏方治疗? (117)
7. 中年妇女为什么易患乳腺癌? 用什么膏方治疗? (117)
8. 宫颈癌有哪些早期症状? 用什么膏方治疗? (118)

其他

1. 失眠的含义是什么? 用什么膏方治疗? (119)
2. 某些体弱的人经常有几分低热, 怎样用膏方调治? (120)
3. 什么叫“梅核气”? 用什么膏方治疗? (121)
4. 怎样才算肥胖? 什么膏方可以减肥? (122)
5. 什么叫微量元素不足? 什么膏方可预防本病发生? (123)
6. 痔疮有几种? 有哪些主要症状? 可用膏方治疗吗? (124)

概 论

1. 何谓膏方？

什么叫膏方？先要明确“膏”的含义。“膏”，《正韵》释为“泽”；《博雅》释为“润泽”。说明“膏”，含有滋润、补养之意。关于膏方，近代名医秦伯未先生说：“膏方者，盖煎熬药汁成脂液而所以营养五脏六腑之枯燥虚弱者也，故俗亦称膏滋药”。又说：“膏方非单纯补剂，乃包含救偏却病之义”。（《膏方大全》）。中医膏方是中医药学中汤、丸、散、膏、丹五大主要剂型之一。膏方有内服、外用之别，本书主要讨论内服膏剂。外用膏剂，一般称为膏药，不作为本书论述范围。

内服膏剂是由汤药（煎剂）浓缩演变发展而来。膏方是根据患者体质不同与病情的需要，选择单味或多种药物组成方剂，并将中药饮片经多次煎熬、去渣，将药汁经微火浓缩，再加入某些辅料收膏，形成一种比较稠厚的糊状物，用以长期内服，达到滋补或治病的目的。根据所加辅料不同，内服膏剂又有素膏滋与荤膏滋的不同，前者指在清膏中加入砂糖或蜂蜜；后者是指在素膏滋中加入荤胶，如阿胶或龟板胶或鹿角胶等。

2. 膏方应用的发展源流如何？

膏方应用，源远流长。早在长沙马王堆西汉古墓出土的《五十二病方》中即有膏方应用的记载，我国最早的一部中医

典籍《黄帝内经》所载的十三方中，亦有膏剂的应用。东汉著名医学家张仲景《伤寒杂病论》载有不少膏方的制法与用途，如“大乌头煎”取“乌头大者五枚，以水三升，煮取一升，去滓，内蜜二升，煎令水气尽，取二升”，显然就是以川乌为主药制成的膏剂。“甘草粉蜜汤”中，“先煮甘草取汁去滓，内粉蜜搅令和，煎如薄粥……”。“皂荚丸”后有“饮以枣膏，安其正也”之说，用大枣制成枣膏内服，以免皂荚涤痰损伤病人正气，可谓后世膏剂用于补养的起端。唐宋时代，医家们把外敷药膏称为“膏”，而将内服膏剂称为“煎”，如《千金要方》、《千金翼方》中“苏子煎”、“射干煎”、“杏仁煎”、“填骨煎”及“地黄煎”、“枸杞煎”、“薯蓣煎”等各种膏剂众多，不仅用于攻病痼疾，而且开后世补虚康复、养生抗衰老之先河。宋代《太平圣惠方》、《太平惠民和剂局方》在前人基础上收录了更多的膏方。金元时期，随着学术争鸣的兴起，扩大了膏方治病的范围，如治偏正头疼、年深不愈的清空膏（《东垣试效方》），治消渴的地黄膏（《世医得效方》）、藕汁膏（《丹溪心法》），治咳嗽喘满的蛤蚧膏及治“不得睡”的酸枣仁煎（《御药院方》）等等。明清以降，膏方广泛应用于内、外、妇、儿各科，并且用于治疗疑难重症。其中许多膏方沿用至今，如《本草纲目》中的益母草膏；《寿世保元》中的清空膏、人参膏、茯苓膏、琼玉膏、保婴五疳膏；《类证治裁》用人参、芦根、姜汁、龙眼肉等等制成膈噎膏，用以治疗噎膈证。《医宗金鉴》、《清太医院配方》、《慈禧光绪医方选议》等许多反映明清时期医家诊疗经验的医籍也载有不少膏方，值得我们研究探讨。

新中国成立以来，随着中医事业的蓬勃发展，膏方的应用也日趋广泛。我们深信，在不久的将来，膏方的推广和研

究必将出现一个新的局面。

3. 膏方有哪些功效？

膏方的功效主要有以下几方面：

(1) 补虚扶弱 虚弱是指机体对外界的适应能力，免疫功能及抗病能力较健康水平低下，不一定具有临床检验指标的异常。凡是气血不足、五脏亏损、素体虚弱者或因外科手术、妇女产后以及大病、重病、慢性消耗性疾病等恢复期出现各种虚弱症状，都可以用膏方调养。膏剂药性缓和持久，又便于久服或贮藏，对各种虚证有独特功效。著名老中医蒲辅周说得好：久服汤剂，胃气难任荡涤，以膏、丸缓图，庶不伤胃气。特别是冬令时期，人体肌肤致密，对滋补营养性物质更能藏而不泄，如能抓紧这段时间，选用适当膏方进补，有投资少、收效大的优点。经常服用膏剂，必能增强体质，使虚弱者恢复健康。

(2) 防病治病 膏方不仅用于虚证，也能治疗实证。如外邪侵袭或自身脏腑功能失调，导致湿热、痰浊、瘀血等蕴积体内，引起各种病证，也可通过内服膏剂治疗。众所周知，市售枇杷膏治痰热咳嗽，益母草膏治妇女月经不调，夏枯草膏治甲状腺肿均有一定效果。

古今善用膏方的名医大家临证拟处膏方时，都细辨虚实，往往调补与祛邪并施以达到调整机体阴阳、脏腑、气血之偏盛偏衰的作用。许多膏方、补益与祛邪药物的比例，很难分出孰轻孰重，也有以祛邪为主的膏方。唐代《外台秘要》“芫花煎”，“治三十年欬”，即以峻逐水湿的芫花配温热辛散之干姜，加蜜制成为内服膏剂；金·李东垣所制治疗年深不愈之头痛

的“清空膏”由羌活、防风、柴胡、川芎、甘草、黄连、黄芩组成，其中多属散风泻火之品；又如明代《寿世保元》中“如神宁嗽膏”由天门冬、杏仁、贝母、百部、百合、款冬、紫苑组成，显然，该方也以祛邪为主。说明膏剂和汤、丸、散剂型一样，在邪盛、正不太虚的情况下侧重祛邪，同样可“使邪去正自复”，达到“不补之中有真补存焉”的目的。《清代名医医案精华》中陈莲舫医案精华“痰浊门”中一案“肋旁掣痛……屡屡咯痰，大便艰涩，痰邪湿邪，随风走窜”除予汤剂煎服外，同时予膏方配合治疗，方中除首乌、党参等益气养血之品外，尚有竹沥半夏、宣木瓜、生于术、牡蛎、菊花、天仙藤等化痰、祛湿、息风、通络之品，扶正与祛邪力量相当，难分轻重。近代名医秦伯未先生善用膏方治疗杂病，临证常以膏剂代煎剂。读其膏方医案不难看出，多数膏方邪正兼顾，攻补兼施，且每获良效，深得病家信赖。推而广之，读者如能针对病症选择适当方药，自制膏剂内服，同样可达到防病治病的目的。

(3) 抗衰延年 中、老年时期是体质由盛转衰的时期，中年工作负担较重，如果不加注意，就容易出现体虚或未老先衰的各种病症，如失眠、心悸、头晕目眩、神疲乏力、腰酸腿软、耳鸣、记忆力衰退等。严重的可积劳成疾甚至早夭。所以中年人及早注意健康投资，经常自制膏方内服以增强体质，防止早衰是非常必要的。老年人气血衰退，脏腑功能低下，如能重视调养，长服膏方以益气养血，防病治病，必能延缓衰老、益寿延年。

4. 应用膏方有哪些优点？

中药膏剂，作为一种剂型，千百年来为临床所沿用，经

久不衰，是由于它确实存在不少优点。首先，膏剂和汤剂一样，符合中医学辨证施治、灵活机动的特点。应用膏方时，可从整体情况出发，根据病情不同或体质的差异灵活处方。由于古代医家为满足封建贵族士大夫阶层延年益寿，长生不老的欲望，片面追求药贵价昂，脉案书写华丽，因此，膏方只能为少数人服务，并使膏方的应用渐渐倾向于滋补方面。实际上，膏方作为一种剂型，与其他汤、丸、散一样，不但补虚，同样能治病。实践证明，膏方不但能治慢性久病，也能用于某些急症的治疗，如急性扁桃腺炎、阑尾炎等。无论是男子遗精、阳痿，女子经、带、胎、产，还是小儿久泻、多汗，老年慢性支气管炎等病，可谓男女老幼，膏方皆宜。膏方可弥补汤剂的某些不足之处。如汤剂一天一剂，医生开了七剂或十四剂，患者每天须花相当时间和精力煎药。天天如此，对患病体弱者包括其家属来说，无疑是一种负担。如果病情需要较长时间的服药，就更麻烦了，病人可能因此中断治疗。膏方便于服用和贮藏，中药在制成膏剂后，体积缩小，由于充分利用了药物功效，经济花费相应减少。此外，对患病的小儿，如果制成带甜味的膏剂，喂服就会方便容易得多。随着当前中医药日益被广泛应用并正走向世界的需要，如何更好地发挥中医中药之长，避其之短，我们认为中药剂型改革是一个亟待解决的关键问题，膏剂的推广应用，无疑是一条很好的途径。

5. 膏方的药物配伍有什么特点？

膏方的选药，视病情及兼夹证的需要而定，以少而精为佳。有用一种药物的单味膏方，如用青果或蒲公英治急性咽

炎，苍耳草治痢疾，腹水草治肝硬化腹水，金银花治胆囊炎，金樱子治夜尿症，地锦草治尿路感染等，均单独使用一种药且用量较大(用到500克甚至1000克以上)，针对某一病证，求其药力精专，取效较快。但多数膏方是取两味及两味以上药物或两个及两个以上成方组成的复方，如治低血压的“参术膏”，取党参、白术二药同用，可增强健脾益气作用；治肺结核的“养肺膏”，取百部与饴糖二药。饴糖可助百部润肺止咳抗癆，又能矫味；又如治缺铁性贫血的十全大补膏，即以补血、和血的四物汤配伍益气健脾的四君子汤，再加黄芪、肉桂，益气生血以更好地达到补血目的；治痛经的“益母草膏”由四物汤配以四君子汤、失笑散三方并加其他一些理气药组成，能更好地实现活血理气、调经止痛功效。此外，服用膏方，在用药配伍方面尚须注意下列两点：患者如果脾胃功能不佳，食欲不振、腹胀、便溏应先请医生帮助调理，待脾胃功能好转后再服膏方；症状轻微者，则可自行在膏方中加入白术、陈皮、木香、砂仁等药以防止膏剂药物有碍于脾胃功能。患者若不喜甘甜之味或不宜进糖太多者(如糖尿病)，处方时，可减去糖或蜂蜜，也可于收膏时根据体质相宜加入胡桃肉粉，莲肉粉或黑芝麻粉，使膏剂香甜可口。

6. 膏方的药物用量应如何掌握？

膏方药物用量与汤剂处方用量原则相近，可参考中药学讲义和历代医家的医案所用剂量。开列膏方药物，用量须视中药质量而定。质轻者，如花、叶类中药(如桑叶，菊花等)用量宜少些；质重或不易煎出有效成分的矿物、贝壳类中药(如磁石、牡蛎等)用量宜大。假如服膏方前，患者已服过若

干帖中药汤剂并取得一定疗效，在病情基本稳定，病证性质也较明确的情况下，进一步改为膏方则更具针对性。开列膏方可根据汤剂处方按比例增加，一般每剂汤药大约在100克左右，膏方可按有效处方增大若干倍，如五、六倍，十倍或十五倍等，酌情而定。一次膏方的总剂量一般在1000克左右，加糖或炼蜜1000克至2000克，熬成膏剂1500克至2500克左右，可服用一个半月至二月余。一剂膏方的药量多少需结合年龄、体质、气候、病情等情况而定，如年幼、体弱者，药量宜小，所制膏剂相应宜少；又如天气偏暖，可用上述半料制膏，服完后如需要可再制，避免因天气热发霉变质；病情轻、病程短者，则可先制少量膏滋内服，病愈则不必再服，所谓“中病即止”；反之，若病情顽固，病程较长者，可适当多制一些，服完后病未痊愈者，可再制，直至痊愈。

7. 膏方选用辅料(赋形剂)的原则如何?

制作膏剂需用辅料，了解它们的特点和性能，才能正确选用，否则，会影响药效的发挥。例如，素膏滋常选用各种糖类作辅料，其中红糖性温，具有祛寒、散瘀、生血作用，适宜于寒证或气滞血虚之证；蔗糖性凉，有清心润肺作用，适宜于制备治疗心肺热证的膏剂；冰糖性凉，具有清热、润燥、养肺作用，适宜于制备清肺热、滋阴润燥类膏剂；饴糖，又称麦芽糖，具有健脾、和胃、缓急之功效，适宜于中气不足，胃虚、胃痛等病证；蜂蜜性温，功用广泛。明代著名医药学家李时珍说：“蜂蜜入药之功有五：清热也，补中也，解毒也，润燥也，止痛也。生则性凉，故能清热；熟则性温，故能补中；甘而和平，故能解毒；柔而濡泽，故能润燥；缓

可以去急，故能止心腹肌肉疮疡之痛；和可以致中，故能调和百药而与甘草同功。”可见蜂蜜除大便不实以及忌糖病症（如糖尿病）不宜外，大多数膏方均可选用。

膏滋选用的辅料，如阿胶、鹿角胶、龟板胶也有区别：如阿胶性甘平，有补血、止血、滋阴润肺之功，适宜于制备治疗血虚、各种出血病证的膏剂；鹿角胶，性温，有补肝肾作用，适宜于制备治疗肾阳不足而见肢冷畏寒，阳痿、遗精、腰酸的膏剂；龟板胶、鳖甲胶，性平，能滋阴潜阳，适宜于制备治疗肾阴不足，见骨蒸虚热，盗汗或阴虚阳亢动风的膏剂。

8. 怎样自制膏剂？

各中药店所售种种膏滋均系药厂成批生产。其膏方的制定只能大概地针对某些虚弱体质或病症，不一定适合每个人的情况，这就是有些人在自购膏滋药内服后不能取得预期效果，甚至服后还有不适感的原因。为了能得到适合自己服用的膏剂，读者不妨自己在家中制作膏剂，这里介绍一下如何自制膏剂的方法。

(1) 浸药 按膏方配好中药后，将药和匀，放在容器内加水浸泡，水须浸没药物并高出10至15厘米左右，浸一夜或12小时以上使药浸透。

(2) 熬制清膏 将药放入煎药锅内（砂锅或搪瓷锅，其次可用铝锅，不要用铁锅），加热煎熬，每次煎熬以保持连续沸腾（文火）3小时为度，滤出药汁，再加水煎煮，滤汁，如此反复煎熬3次，最后1次将药渣压榨一下，使药液尽量取出。将3次取得的药液混合在一起，再用纱布过滤，并静置，待

其沉淀，取其清液，放入砂锅或铝锅内(预留下一部分药液，以备烱糖时用)，再加热煎熬，不断撇去浮沫，浓缩成薄粥汤状。取少许滴在能吸水的纸上，以不渗纸为度，此即清膏。

(3) 准备辅料

① 化糖：如果辅料用糖，可将砂糖或冰糖放在锅内，用小火加热炒之，并用锅铲不断搅拌，免得糖焦枯粘着锅底，待糖全部融化成老黄色，加入预留的药汁，将糖化薄。

② 炼蜜：如果辅料为蜂蜜，即将蜂蜜置锅内加热，使之完全熔化，并使其中水分大部蒸发，泛起大泡，呈老红色后，酌加十分之一的冷水，再继续加热煮沸，随后乘热倒出，以纱布过滤，除去其中杂质，即成炼蜜。

③ 烱胶：如果用驴皮胶、龟板胶、鹿角胶之类，可先将胶放在碗中，加适量开水，放在锅中隔水炖烱。如病情需要活血或通经者，可于放胶的碗中加入适量黄酒，隔水炖烱。如用作止血剂，不可加酒。

此外，滋补性膏剂中，如加些核桃肉(去衣，炒香，研碎)、黑芝麻(去掉杂质，淘去泥沙，炒干至微香，研碎)，可使膏滋药味道更佳。

(4) 收膏：将制好的辅料(即糖或炼蜜或烱胶)与清膏混和。一般清膏加蜜或糖为1:1或1:2，烱胶酌减。再用文火煎熬，浓缩收膏。

(5) 贮藏：制成的膏剂如及时服用，可将带盖的器皿洗净擦干，最好是烘干，再将煎成的膏剂盛入容器，待稍冷后，上盖纱布过一夜(以免过早加盖，蒸汽水滴入膏剂)，第二天再加盖。如暂时不服，需要久藏，则容器必须密封。

9. 膏剂在一年中什么时间服用较好？

中医学认为，人禀天地之气而生，人体与天地之气息息息相关，随着一年四季气候不同，人体生理也有不同变化，其变化规律与自然界春生、夏长、秋收、冬藏基本相符。所以，古今许多医家认为每年冬至到开春之前这段时期，根据各人气血阴阳不同的虚损情况，选择适当膏方，进行调补最为适宜。因为这段时期人体内阳气、阴精均藏而不泄，营养物质能被充分吸收、利用和储存，从而能最大限度地发挥其改善体质，防病治病的作用。这就是人们强调“冬令进补”的原因。但是，中医治病的原则之一是“虚则补之，实则泻之”，所以，对于体虚或体有实邪的患者，一年四季都可以选择适宜的膏方自制膏剂内服，达到补虚或祛邪的目的。况且，虚弱病证也并非只限于冬季，许多严重疾患、外科手术、妇女产后所出现的气血不足，脏腑亏损以及因虚所致眩晕、耳鸣、心悸、多汗、失眠、腰酸、食欲不振等病证，就不一定只发生于冬季，其他季节也可发生，所以说用膏方补虚或治病，一年四季皆可。

10. 膏剂如何服法？

膏方制成膏剂后，大多采用冲服法，也有用含化法者。冲服一般一天2次，每次1匙、或9克、或15克，放在杯中，加入适量白开水搅匀，饮服。如病情需要，可用少量温热黄酒冲入服用，以助活血温通；有些膏剂可以含化，如青果膏等，可将大约一匙膏剂含在口中，让药汁在口中慢慢溶化、咽下，使药在口腔咽喉部停留时间较久，以便药物在局部更

好地发挥作用。服用膏剂的时间应结合病情、病人体质、季节气候等酌情而定。如体虚进补，一般应在饭前空腹服，以有利于消化吸收；病在下，宜饭前半小时服，使药力迅速下达；病在上，饭后半小时服，使药力留连于上；补益心脾、镇静安神类及治遗尿的膏剂则应在睡前 20 分钟时服。此外，尚须根据膏方性质的平和或峻猛、病情轻重、体质强弱、年龄、性别等酌情而定。性质平和用量大些，无妨；峻猛之剂，用量宜小，或从小量逐步增加。病情轻，慢性病，剂量不必太大；病情重，急性病，用量可适当增大。体质强、青壮年、男性，用量应大于体质弱、老人、小儿、女性等。

11. 服用膏剂应注意哪些问题？

滋补性膏剂在下列两种情况下应暂停服用：一是感冒以后出现恶寒、发热，咳嗽多痰的情况下，此时若服用滋补膏，容易留邪为患，所谓“关门留寇”。待感冒治愈后可继续服用。如果感冒轻症，可在治感冒药中加入补益之品，攻补兼施也可；另一种情况是脾胃素虚，食欲不振者，补膏应慎用，因为滋补膏药物的药性大多气厚味腻，服后更易导致脾胃气滞。故宜改为小量缓调，或在膏方中加入健脾助运之品；如果脾胃功能欠佳而见食欲不振、腹胀、大便溏薄情况较重，应先调理好脾胃功能，再服补膏。

服用膏剂治病须注意体质与药性是否协调，如体质偏于阳虚有寒，应避免服用阴寒伤阳类药物组成的膏剂。如体质偏于阴津不足，助火伤阴类药物组成的膏剂则不宜。一切咳血，咯血、吐血、便血、尿血等出血病症，均不宜服用辛热刚燥之膏剂；妊娠妇女忌服破气活血类药物组成的膏剂。

此外，服膏剂期间，还应注意某些食物与某些药物的性能相抵触而影响疗效的一些情况。如服药忌口问题，服用含有人参的膏剂，应忌食萝卜，免饮茶叶，忌猪、羊血等。另外，如服发汗解表、止咳化痰、清热凉血类膏剂的同时，应忌食生冷油腻，以免妨碍药力运行或助湿、生痰、生热；服安神、清肝明目、止血、利湿类膏剂应忌酒、葱、姜、蒜、辣椒等辛温燥热食品；服用祛风湿、温经通阳、止泻涩精类膏剂的同时，应避免冷饮、梨、香蕉、竹笋、螃蟹等寒性食品。

总之，各种膏方用途各异，每一膏方均有一定的适应证，运用得当，疗效显著；反之，则不能获得疗效，甚至产生不良反应。如属证情复杂，数病并发，须用膏方治疗时，应当在医生指导下进行。

各 论

内 科

一、呼吸系统疾病

1. 感冒怎样选用膏方防治？

感冒，俗称伤风，是一种最普通的常见病，几乎人人都体验过。一些年老体弱者经常反复感冒或感冒后迁延不愈，变得弱不禁风。若不及时治疗，还会产生并发症，如肺炎、心肌炎、关节炎等。感冒是由多种病毒引起，不同季节引起感冒的病毒也不同。目前应用的各种抗生素，只对细菌有效，对病毒却没有杀灭作用，而中草药对感冒病毒有较好的抑制杀灭作用，若能及时正确地选购一些中草药自制膏剂内服，对感冒能起一定防治作用。

如感冒初起，头痛，身体痛，怕冷，发热，鼻塞，咳嗽，苔白，脉浮，可用“苏麻膏”（选自《全国中药成药处方集》）。

处方、制法及服法：苏叶 50 克，麻黄 18 克，枳壳 20 克，甘草 20 克，生石膏 30 克，杏仁 18 克，桔梗 18 克，制半夏 18 克，款冬花 10 克，葛根 12 克，前胡 30 克，桑白皮 20 克，陈皮 10 克，浙贝母 10 克，百合 20 克。上药加水煎煮 2 次，每次滤汁，去渣，合并药汁，加热浓缩为清膏，每 100 克清膏加炼蜜 200 克，文火收膏。每服 30 克，一日 2 次，开水冲服。

如感冒以发热为主，并见口干，咽痛，咳嗽，痰黄，舌红，苔黄，脉数等，则采用“银翘膏”(选自《中国膏药学》)。

处方、制法及服法：金银花 15 克，连翘 9 克，甘草 6 克，荆芥穗 6 克，桔梗 6 克，淡豆豉 3 克，薄荷 9 克，牛蒡子 6 克，淡竹叶 3 克。将上药加水煎煮成汁，滤去药渣，文火浓缩，加冰糖适量收膏。每服 9 克，一日 2 次，白开水送下。本膏方也可用于预防流行性感胃。

有些人诉说经常反复感冒，要改变这种状况，除平时加强锻炼以增强体质外，还可常服下列药物制成的膏剂：生、炙黄芪各 200 克，红枣 400 克，清水煮，取汁去渣，加炼蜜适量，文火收膏。每服 1 匙，一日 2 次，白开水送下。

2. 何谓咽炎？什么膏方可治？

咽部是人体呼吸和进食的要道，咽部粘膜容易接触各种细菌和病毒。当人体抵抗力减弱时，这些微生物就会乘虚而入，侵入咽部粘膜或淋巴组织(扁桃腺等)发生急性炎症，这就是急性咽炎。病人除感觉咽痛外，还可有全身不适，发热，头痛等症状。有一种溶血性链球菌引起的急性咽炎，使人体产生变态反应，如风湿热，风湿性心脏病，急性肾小球肾炎等，严重危害健康。这种急性咽炎的特点是：突然发热，体温多在 38.5°C 以上，怕冷，一般无寒战，可有头痛，咽部剧痛，颈淋巴结肿大压痛，咽后壁、上腭充血或有黄白色渗出物。除应及时应用抗菌素外，若同时服用中药膏剂，能减轻患者痛苦，防止变态反应性疾病或其他并发症发生，促进早日康复。急性咽炎可采用“青果膏”(选自《全国中药成药处方集》)或“蒲公英膏”(选自《中药制剂汇编》)。

处方、制法及服法：鲜青果 500 克，熬汁去渣，文火加热，浓缩为清膏，每清膏 100 克加炼蜜 200 克收膏，每次服 30 克，1 日 3 次，白开水冲服；或用蒲公英 500 克，切碎，加水煎煮 3 次，过滤去渣，合并滤液，浓缩即得。每次服 30 克，1 日 3 次，白开水冲服。

急性咽炎反复发作，久治不愈，将发展为慢性咽炎。慢性咽炎可用“养阴清肺膏”（选自《中药制剂手册》）。

处方、制法及服法：生地黄 300 克，浙贝母、牡丹皮、白芍各 120 克，玄参 240 克，麦门冬 180 克，甘草 60 克，薄荷 75 克。上药切碎，置于锅内加清水煎煮，水量蒸发减少时适当续水，煎约 3 小时；将药汁滤出静置，续入清水再煎，如此 3 次；最后一次压榨残渣，榨出药汁后与前药汁合并，过滤，静置；取清汁用文火熬，不停搅动，防止烧焦，炼为稠膏，以不渗纸为度；每清膏 30 克加炼蜜 30 克，和匀，收膏。每服 15 克，一日 2 次，白开水冲服。

3. 扁桃腺有什么作用？扁桃腺炎用什么膏方治疗？

扁桃腺位于咽部两侧壁，是一种淋巴组织团块。据研究，扁桃腺内含有各种免疫球蛋白，如 IgG、IgM、IgA、IgD 等，证明扁桃腺能产生抗体；扁桃腺还能分泌干扰素，有抑制病毒生长和保存维生素 C 的作用，所以，扁桃腺已被公认为具有免疫功能的器官。免疫功能，通俗地说，是指人体抵抗病菌，识别和清除各种物理、化学等有害因子，维持体内环境稳定，保护人体完整性的能力。鉴于此，有些学者认为扁桃体不宜切除。尤其是儿童，切除扁桃腺，就如同解除了上呼吸道第一道防线的武装。但扁桃腺处于上呼吸道（所谓咽炎

要道),经常容易发炎,若不及时治疗,很容易诱发全身性疾病,如肾炎、关节炎、风湿性心脏病、荨麻疹等,对健康危害甚大。尤其是青少年,感冒并发扁桃腺炎是很常见的。如见感冒,发热恶寒,头胀,咳嗽,咽痛,扁桃腺发红肿大,可采用“羚翘解毒膏”(选自《丸散膏丹成药验方》)。

处方、制法及服法:银花、连翘、葛根、大青叶、花粉各60克,玄参、薄荷各50克,焦山栀30克,赤芍24克,马勃、浙贝母、桑叶、枳壳、黄芩、炙僵蚕、知母、黄柏各18克,生石膏120克。以上药物加水煎煮,滤汁去渣,文火煎熬,将药汁收为清膏。每清膏250克,加炼蜜500克收膏,每膏750克,加羚羊角粉0.3克,冰片2.5克,搅匀贮藏。每次服30克,1日2次,白开水冲服。小儿酌减。

4. 如何分别选用膏方来治疗新咳、久咳?

咳嗽须分新咳、久咳。新咳指咳嗽时间不长、常由外感风寒引起,伴怕冷、发热,头痛、身痛,鼻塞流涕等症状;久咳,指咳嗽日久,迁延数月或数年,反复发作,时轻时重。有些久咳可由新咳久治不愈转化而来。

如果新咳并见恶寒、怕冷,痰色白、质清稀,口不干,多属风寒咳嗽,可选用“葛根膏”(选自《中国膏药学》)。

处方、制法及服法:苏叶6克,枳壳9克,前胡6克,半夏6克,广皮6克,桔梗6克,云苓12克,葛根12克,木香3克,甘草6克,党参6克。上药加水煎汁,滤去渣,在药汁中加红糖适量,熬成膏状。1日3次,每次9克,白开水送服。

久咳痰多,痰色白者,用“冬花膏”(选自《中国膏药学》)。

处方、制法及服法：冬花 6 克，川贝 6 克，橘红 6 克，党参 6 克，远志 6 克，麻黄 5 克，前胡 6 克，杏仁 3 克，五味子 3 克，马兜铃 5 克。上药加水煎煮，滤汁去渣，加适量红糖，文火收膏。每次服 6 克，1 日 3 次。

若久咳，痰黄稠粘，口干者，可用“二母膏”(选自《中国膏药学》)。

处方、制法及服法：麦冬、天冬、知母、川贝母 各 120 克(川贝研粉另入)。将前 3 味药煎 3 次，合并过滤取汁，文火加热浓缩，再加入川贝粉和匀，并加冰糖或白蜜收膏。每次服 10 克，1 日 3 次，白开水化服。

久咳、呛咳，痰少或痰中带血，或有口干鼻燥，声音嘶哑，可采用“橘饼膏”(又名润肺膏)(选自《中国膏药学》)。

处方、制法及服法：橘饼 120 克，沙参、麦冬、天冬、花粉、枇杷叶(去毛)、甜杏仁、核桃(研末)、冰糖各 250 克，川贝 60 克(研细后调入)。上药煮取浓汁，去渣，再加入川贝末、冰糖末、核桃末，加白蜜 3 000 克和匀收膏。成人每日服 15 克，一日 2 次，白开水冲服。小儿酌减。痰多、大便稀溏者不宜。

5. 慢性鼻窦炎选用何种膏方治疗？

鼻窦炎，简称“鼻炎”。中医称之为“鼻渊”或“脑漏”。中医古籍早有记载：“胆移热于脑则辛颞鼻渊，鼻渊者，浊涕下不止也。”(《黄帝内经·素问·气厥论》)可见它的主要症状是“辛颞”(即鼻根部有酸辣胀痛感)，且“浊涕下不止”。鼻炎发作时，鼻腔粘膜水肿，常分泌黄稠或清稀鼻涕，多兼有鼻塞，头痛，眼眶痛等症状。日久鼻甲变得肥大，影向颜面美观。

患鼻窦炎的人容易感冒，而感冒又会使鼻炎发作或加重。对于这种病，上海名老中医张赞臣先生积六十余年临床经验，诊治方面有独到心得。他采用内治与外治相结合的办法，内服“辛前甘桔汤”，外用“鼻渊散”。鼻炎是慢性病，需要较长时间服药治疗，为方便起见，可将内服方药制成膏剂。

处方、制法及服法：辛夷花 6 克，青防风 6 克，嫩前胡 9 克，天花粉 9 克，薏苡仁 12 克，白桔梗 4.5 克，生甘草 3 克。上方配 10 剂，混合在一起，加水煎煮 2 次，滤汁去渣，合并药液，加适量冰糖或白蜜，文火收膏。每服 1 匙，1 日 3 次。患者可根据病情酌情加减，如气虚经常感冒者，于上方加炙黄芪 6 克，炒白术 6 克；鼻塞重，加苍耳子 6 克，细辛 3 克，藿香 9 克；头痛加白芷 6 克，藁本 6 克等。

张老家传之“鼻渊散”，配制方法如下：辛夷花 30 克，薄荷叶 6 克，飞滑石 9 克，风化月石 9 克，大梅片 0.9 克。上药共研细末，过细筛后，贮于瓷瓶中密封，备用。用时取少量吹入鼻内，1 日 2 至 3 次。

6. 支气管哮喘有哪些表现？怎样用膏方防治？

支气管哮喘病人发作时，常突然感到胸闷、咳嗽、气急，咳出白沫样痰或痰粘不易咳出，喉部有哮鸣音。有些患者可出现呼吸困难，病人不能平卧，常被迫坐起，张口抬肩，大口喘气，表情痛苦。严重者，可见口唇指甲青紫，手足冰冷，出汗，伴有心悸，头晕等。待咳出浓痰后，病情稍缓解。

支气管哮喘以秋冬季节发作较多，也有好发于夏季者。上海华山医院曾从临床研究得出：在好发季节到来之前，给患者服用温补肾阳的方药，有提高肾上腺皮质功能，改善呼吸

道过敏状态的作用，可预防和减少哮喘的发作。上海中山医院姜春华教授治疗本病经验丰富，拟定“截喘方”，支气管哮喘发作期间，可按本方选药，自制膏剂内服。

处方。制法及服法：佛耳草、老鹳草、开金锁、碧桃干各 45 克，合欢皮、防风、全瓜蒌(打碎)、旋复花(包)各 9 克。上药加水煎煮滤汁，加适量冰糖，浓缩成膏。每次服 1 匙，1 日 3 次。本方有宣肺平喘、止咳化痰，解除支气管痉挛的显著功效。

当哮喘缓解后，应予扶正固本类中药制成膏剂常服，可提高患者内分泌功能与免疫功能，使哮喘发作减少或减轻。可用下列经验方：熟地黄 100 克、淮山药、山萸肉、泽泻、茯苓、丹皮各 50 克，熟附块 30 克，桂枝 40 克，五味子 60 克，海蛤粉 80 克。上药煎煮 3 次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩为清膏，再加适量炼蜜，文火收膏。每次服 1 匙，1 日 3 次，白开水冲服。一料服完，可再制续服。

7. 什么叫支气管扩张咯血？用什么膏方治疗？

人们在咳嗽咯痰时，发现痰中带有血丝、血块，或咯出的竟是满口鲜血，一定会感到紧张。医学上把从呼吸道咳出鲜血的现象，称为“咯血”，较常见的就是“支气管扩张咯血”。这种病往往有慢性咳嗽史，有经常咳出脓性痰，反复咯血现象。咯血常骤然而发，少则痰中带血，多则成碗成盆。如果是少量咯血，或出现咯血前兆症状，如咳嗽增剧，痰色由白转黄或带血腥味，咽部发痒，胸部有灼热感等，可采用中药制成膏剂内服，如“秋梨膏”(选自《全国中药成药处方集》)。

处方、制法及服法：秋梨 500 克，萝卜汁、藕汁各 50 克，

鲜姜 25 克，贝母 50 克，麦冬 50 克，生地 25 克，茅根 50 克，白糖 1 000 克。上药熬出清膏，每清膏 50 克，加炼蜜 100 克，和匀，收膏。每次服 15 克，1 日 2 至 3 次，开水冲服。如果咯血较多，上方可酌加仙鹤草 200 克至 300 克，疗效更为可靠。对于大咯血，药物不能控制的患者，须考虑手术治疗。

8. 肺结核用什么膏方治疗？

肺结核，中医也称肺癆，是一种有传染性的慢性虚弱性疾患。患者常有慢性咳嗽，身体渐渐消瘦，咳血，下午或傍晚发低热，盗汗，疲乏无力等症状。若不及时治疗和控制，结核病可以传播到肝、肾、肠等其他脏器。不少中草药对结核菌有抑制或杀灭作用，如：百部、白芨、黄连、大蒜、獭肝、十大功劳叶、穿心莲等。“养肺膏”（选自《实用中成药手册》）对肺结核慢性咳嗽有良好效果。

处方、制法及服法：百部 400 克，饴糖 1 000 克。先将百部加水煎煮 2 次，第一次 3 小时，第二次 2 小时，过滤药汁，合并药液，加入饴糖，文火加热浓缩成膏。每次服 15 克，1 日 3 次，白开水冲服，饭前服用。据报道，百部对各种细菌及结核杆菌均有抑制作用。本膏方对长期应用西药抗癆药效果不显的病例，疗效比较显著。

9. 肺炎有哪些症状？可用膏方治疗吗？

肺炎的分类方法很多，一般分为大叶性肺炎和支气管肺炎，前者多发于青壮年，后者多发于小儿和老人。大叶性肺炎，起病往往急骤，常有寒战高热，头痛，厌食，全身无力，胸痛，气急，呼吸浅而快，面色潮红或发绀。初起干咳，以

后吐铁锈色痰或吐脓痰。支气管肺炎常继发于感冒、气管炎之后，或并发于某些急性传染病，如麻疹之后。主要表现为发热，可高可低，体质特别弱的小儿，不但不发热，还有低于常温的。同时有咳嗽、气急、鼻煽，口唇、鼻尖发绀，烦躁不安或精神萎靡不振等症。支气管肺炎也可见于老人，其临床表现往往不典型。有的患者出现恶心、呕吐、腹胀、腹泻等消化系统症状，严重者可见黄疸、紫癜、呼吸衰竭、休克等。实验室检查以及X线检查不难作出诊断。肺炎是比较严重的疾病，一般需住院治疗。中毒性休克型肺炎需及时抢救，否则，会造成严重后果甚至死亡。

肺炎患者如临床中毒症状严重，出现高热，白细胞增高，肺部X线检查证实炎症在扩散，除应用抗菌素治疗外，在中医辨证的基础上，可采用清热败毒汤(选自《老年医学知识》)制成膏剂内服配合治疗，可提高疗效，加速痊愈。

处方、制法及服法：银花、连翘、牛蒡子、蒲公英、紫花地丁、鱼腥草、板兰根各100克，加水煎煮2次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩，加入适量炼蜜，文火收膏。每次服1匙，1天3次，白开水送服。

10. 什么叫肺气肿？怎样用膏方防治？

肺气肿与某些慢性阻塞性肺部疾患有关，是指长期慢性支气管炎、哮喘病等引起的肺泡过度充气扩大，肺组织弹性丧失，小肺泡破裂，融合成大肺泡的一种病变。因为这种病变不能逆转，所以需及时防治肺气肿，才能防止其发展为慢性肺原性心脏病(简称肺心病)。早期肺气肿并无明显的症状，随着病情的发展，就会出现动则气短、气急，以后发展到平

静时也觉得呼吸困难，不能平卧，口唇发紫，最后发展成为慢性肺原性心脏病，甚至呼吸衰竭而危及生命。医生检查时常见病人胸部呈桶状，呼吸运动减弱，肋间隙变宽。肺部叩诊呈过清音，肺下界降低，心浊音界缩小或不易叩出。听诊时发现肺部呼吸音降低，心音遥远，肺动脉瓣区第二音亢进（由肺动脉高压所致）。凡有多年慢性咳嗽、咳痰病史，肺功能减退，经用支气管扩张药物治疗无明显改变，肺气肿的诊断即可成立。

肺气肿的防治，除戒烟，防治感冒、咳嗽，适当加强锻炼外，可注射核酪或胎盘组织液或丙种球蛋白，以提高机体免疫功能。同时选用中药六味地黄丸（选自《小儿药证直诀》）加减制成膏剂，达到滋肾补肺，防治肺气肿的作用。

处方、制法及服法：熟地、山萸肉、山药、丹皮各 10 克，沙参、麦冬各 12 克，冬虫夏草、白前各 8 克。若咳嗽剧者，加马兜铃 6 克，百部 10 克。上药配 10 剂，合在一起加水煎煮 3 次，滤汁，去渣，加热浓缩为清膏，加入适量炼蜜，文火收膏。每次服一匙，1 日 3 次，白开水送服。

11. 什么叫肺心病？选用什么膏方治疗？

肺心病是肺原性心脏病的简称。它的病因大多与慢性支气管炎及由它引起的阻塞性肺气肿有关；其次，慢性支气管哮喘、肺结核、支气管扩张、矽肺等肺部疾病，也是产生肺心病的重要因素。肺心病如果同时合并有冠心病和高血压病等，病情容易加重并可能出现心衰。肺心病的形成，短则需数年，长则可达数十年。在这段时间里，经常有效地控制肺心病的各种原发病，如感冒，慢性支气管炎，肺气肿等各种呼吸道

疾病，肺心病的发病率可大幅度下降。肺心病早期的主要表现有：活动后感觉心悸、呼吸困难，疲乏无力。感冒后咳嗽、咳痰加剧，气短日益加重。体检时有明显肺气肿体征，右心室增大但可因肺气肿而不易叩出，剑突下可见心脏收缩期搏动。部分病例可见颈静脉充盈。其后期主要表现为呼吸衰竭为主或以心力衰竭为主。常见呼吸困难，由于缺氧而见鼻尖、口唇、耳垂、指(趾)端青紫，有的可出现精神、神经症状，心衰，消化道出血甚至休克等。以心力衰竭表现为主者，可有心悸、心率加快，呼吸困难及紫绀，颈静脉怒张，肝脏肿大压痛，肝颈静脉回流征阳性，下肢浮肿明显。有的可出现腹水，三尖瓣区可听到收缩期杂音，严重者可出现舒张期奔马律。

对肺心病，慢性心衰患者，可按“振心汤”(选自《老年医学知识》)配方制成膏剂内服以温振心阳。

处方、制法及服法：党参 12 克，茯苓 20 克，白术 12 克。白芍 8 克，生姜 8 克，桂枝 6 克，熟附子 10 克，甘草 6 克。上方配 10 至 15 剂合在一起，加水煎熬 3 次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩，加适量砂糖，文火收膏。每服一匙，1 天 2 至 3 次，白开水送服。

二、消化系统疾病

1. 消化不良的含义是什么？用什么膏方治疗？

脾与胃是主管饮食消化吸收，维持人体生命活动的重要脏腑。当脾胃功能失调时，就会出现消化不良病症。消化不

良的一般表现有：腹中虽饥，但口中无味，不欲纳食；虽知味能食，但食后脘腹胀闷，饮食难化；或不欲纳食，也不知饥，大便不调，或秘或溏。大多兼有精神疲乏，肢体无力等症状。可用“资生健脾膏”（选自《慈禧光绪医方选议》）。

处方、制法及服法：党参、茯苓各 60 克，炒于术、炒柏子仁各 45 克，砂仁（研）、木香、山药、紫姜朴各 30 克，陈皮、炒枳实各 36 克，炒三仙（即山楂、麦芽、六曲）120 克，炙草 15 克。上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，文火加热浓缩，加入适量炼蜜为膏。每次服 12 克，1 日 2 次，白开水冲服。

2. 慢性胃炎是怎样一种病？选用何种膏方治疗？

慢性胃炎一般分为慢性浅表性胃炎和慢性萎缩性胃炎。一般所说的“胃窦炎”，是指胃窦部有慢性浅表性或萎缩性炎症，这是我国最常见的一种胃炎。慢性胃炎的发病原因是多方面的，如长期饮食不规律，常服止痛药，长期饮酒、吸烟，常食辛辣、过冷、过热、过硬的食物。也有由于肝、胆、胰疾病导致十二指肠液返流入胃，刺激损伤胃粘膜等，都可引起慢性胃炎的发生。慢性胃炎的病人经常感到胃脘胀闷，疼痛，嗳气，恶心，食欲减退或纳食不化，进食后食物在胃内潴留时间长。慢性胃炎容易继发胃溃疡、胃息肉、胃癌等，所以要及时治疗。可选用脘痞疼痛膏方（选自《秦伯未先生膏方选集》）。

处方、制法及服法：人参须 30 克（另煎汁、冲入收膏），清黄芪、潞党参、炒白术、瓜蒌仁、云茯苓、白蒺藜、沉香曲、炒泽泻各 90 克，土炒当归、仙半夏各 60 克，老薤白（酒炒）、广陈皮、枳实炭、香橼皮各 45 克，白蔻仁（杵）24 克，淡

干姜、清炙草各 12 克。上药浓煎 2 次，滤汁，去渣，加驴皮胶 180 克(陈酒烱化)，煎熬，再入白纹冰糖 180 克，并冲入参须汁，文火收膏，以滴水为度。每日早晚空腹开水冲服 1 大匙。

3. 胃、十二指肠溃疡病是怎么发生的?可选用什么膏方?

胃溃疡、十二指肠溃疡，统称“消化性溃疡”，属中医“胃脘痛”范围，是很常见的疾病。多由饮食生冷无度，饥饱不均或过度劳累，忧思少寐，损脾伤胃而致。严重者久病入络，可出现呕血、黑便等并发症。胃溃疡多表现为中脘或中脘偏左疼痛，多于食后发作，痛处拒按，时止时发，并伴有呕吐；十二指肠溃疡多表现为胃脘正中偏右胀痛或刺痛，多在食后二小时后发作。十二指肠溃疡饥饿时易痛，甚至半夜痛醒者，但摄取少量食物后疼痛即缓解。中医认为脾胃是“后天之本”，因为人体所需的饮食营养都来源于脾胃。消化道溃疡患者往往不能像正常人那样进食，加上经常慢性出血，日久可出现贫血，头晕，疲乏无力，面色无华等气血两虚证候。慢性消化性溃疡多属“脾胃虚寒”，除胃脘隐痛外，还常伴有泛吐清水或酸水，纳食无味，四肢不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱等症。如属此类情况，可采用“建中膏”(选自《中草药制剂技术》)。有温补脾胃，缓急止痛的功效。

处方、制法及服法：党参、白芍各 250 克，桂枝、炙甘草各 160 克，高良姜 80 克，大枣 70 克。饴糖 150 克。将前 6 味药加水煎煮 3 次，每次 1 至 2 小时，过滤，去渣，合并滤液，加热浓缩至 750 毫升左右，加入饴糖搅匀，加热浓煎收膏。每次服 1 匙，1 日 2 次，白开水冲服。如能坚持服食，

可使溃疡愈合。据研究，饴糖含麦芽糖、蛋白质等营养成分，入胃后有帮助形成溃疡面保护膜的作用。

4. 慢性肠炎该选用什么膏方治疗？

慢性肠炎，通常是指慢性结肠炎。除了细菌性痢疾、阿米巴痢疾、肠结核等引起的所谓特异性肠炎外，还有一些原因不明的结肠炎症，检查可见肠粘膜上有溃疡，通常称之为“非特异性溃疡性结肠炎”。另外有一些慢性结肠炎，虽然有腹痛、腹泻，偶有脓血便的共同特点，但多次检查没有发现病原体，经多次肠镜检查，也未见肠粘膜有糜烂或溃疡，这类慢性肠炎患者也不少。俗话说：“好汉就怕三泡稀”，这种病人大便经常稀溏，或带粘冻，每日三、五、六次不等，病情顽固，经年累月不愈。日久可致贫血，浮肿，营养不良，消瘦等，对身体健康影响很大，不可等闲视之。

慢性肠炎患者病情较轻者，可用“莲肉粳米膏”（选自《家庭食疗手册》）。

处方、制法及服法：莲子肉、粳米各 ~~100~~ 克，茯苓90克。上药共研细末，用水熬透，加砂糖适量、调匀，微火加热成膏。每次服5至6匙，每日2至3次，白开水冲服。此外也有内服“金樱子膏”（见本书“遗精”条下）获效者。

泄泻日久，久治不愈，可用“六君子汤”合“四神丸”加减方制成膏剂（选自《临证会要》）内服。

处方、制法及服法：炒党参、炒白术、茯苓、白扁豆各150克，半夏、陈皮、甘草、炙罂粟壳、煨诃子、肉豆蔻、干姜、补骨脂各100克，禹余粮300克。上药加水煎煮3次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩为清膏，再加适量红糖，文火

收膏。每次服 15 克，一日 3 次，饭前白开水送下。

5. 痢疾用什么膏方治疗？

痢疾，为感染痢疾杆菌所引起，故又称“菌痢”。痢疾杆菌对环境的污染非常广泛，曾有人进行过检测，菌痢患者一克粪便中，可含一亿多个痢疾杆菌。菌痢病人接触过的家俱、食具、被褥、衣服、书籍、门把手、水龙头等，均可检出痢疾杆菌。夏季气温高时，痢疾杆菌在剩饭等食物上能进行数百，数万倍的繁殖。了解这些情况，可提醒我们防止菌痢“病从口入”。菌痢患者的主要表现是腹痛，发热，腹泻，里急后重，粪便带粘液或脓血，左下腹有压痛。严重中毒性菌痢可以出现高热、抽风、昏迷、休克等凶险之象。急性菌痢须隔离治疗，慢性菌痢患者可自制膏剂内服治疗，可用“苍耳草膏”（选自《医方摘元》）。

处方、制法及服法：取苍耳草 500 克或 1 000 克，洗净，切碎，加水煮透，去渣，加适量炼蜜，用武火熬成膏。每次服 2 匙，1 日 3 次，白开水冲服。据研究，苍耳草有良好的解毒杀菌，清热止痢作用。

也可选用“椿皮膏”（选自《全国中药成药处方集》）。

处方、制法及服法：椿皮 250 克，酸梨 500 克，鲜姜 9 克，红糖 120 克。将椿皮加水熬至 500 毫升，去渣取汁，再将姜、梨捣汁去渣，将汁对和在一起，煎煮至沸，加红糖适量收膏。每日早晚各服 1 匙，开水冲服。

6. 胆囊炎用什么膏方治疗？

胆囊贮存胆汁，它能定期而有规律地将胆汁排入肠内，帮

助食物消化(主要是脂肪类食物的消化)。急性胆囊炎发病常较突然,最初可有上腹疼痛,或者是右上腹部痛,可向右侧肩背部放散,常同时伴有恶心、呕吐,有时患者可有发热,胆囊区压痛等。如不及时治疗,可发展为慢性胆囊炎或胆石症等。胆囊炎经解痉止痛、抗感染等治疗后,疼痛缓解。为了促使胆囊炎炎症彻底消退,患者可自制膏剂服一个时期,可用“忍冬膏”(选自《抗衰老膏方集锦》)。

处方、制法及服法:金银花 1 000克至 2 000克,于四月份采取鲜花,捣汁熬膏,每次服 1 匙,1 日 2 次,白开水冲服。

或用经验方:金钱草 100 克,败酱草 50 克,茵陈 50 克。加水煎煮,滤汁,去渣,将药汁加热浓缩,再加适量炼蜜收膏,每次服 1 匙,1 日 2 次。也能获效。

7.胆石症为什么会引起胆绞痛?用什么膏方防治?

胆石症与胆囊炎多同时存在,胆结石可刺激胆囊壁引发炎症,胆囊炎又可促使胆结石形成。胆石从胆囊移动至胆总管或胆总管内,发生嵌顿时,使胆囊或总胆管的平滑肌不断发生扩张,痉挛,以图将胆石排出,就会发生胆绞痛。疼痛大多发生在饱餐或进食高脂肪饮食后数小时内。疼痛开始于右上腹,呈持续性钝痛,以后逐渐加重,让人难以忍受。有些患者疼得坐立不安,弯腰、打滚、呻吟或哭叫不止,疼痛可向右肩胛,右背放射。患者常痛得面色苍白,大汗淋漓,恶心,呕吐。绞痛呈阵发性、时发时止。当胆石退入胆囊或进入十二指肠时,疼痛可以完全消失。

治疗胆石症可取胆道排石汤(选自《中西医结合治疗急腹

症》天津南开医院编)利胆排石，行气止痛。

处方、制法及服法：金钱草 60 克，茵陈、郁金、枳壳、木香、生大黄各 9 克。上方可配 5 至 6 剂，将药合在一起，加水煎煮 3 次，滤汁，去渣，合并药汁，加热浓缩，加入适量炼蜜，文火收膏。每次服 1 匙，一日 3 次，用白开水送服。以一个月为一疗程，必要时可连续第二个疗程。

对于肝内胆管结石泥沙型者，可按下列经验方(选自《中药方剂学》山东中医学院编)有化湿利胆作用。

处方、制法及服法：金钱草 30 克，苍术、厚朴、栀子、郁金、茵陈、陈皮各 9 克，甘草 6 克。上方配 8 至 10 剂，合在一起，加水煎煮 3 次，滤汁，去渣，合并药汁，加热浓缩为清膏。每服 1 匙，1 天 3 次，白开水送服。

8. 急性病毒性肝炎是怎样传播的？如何用膏方防治？

病毒性肝炎，又称传染性肝炎，是由肝炎病毒引起的急性传染病。目前，一般认为肝炎病毒有三种：甲型肝炎病毒、乙型肝炎病毒和非甲非乙型肝炎病毒。肝炎病毒通过不同的途径进入人体，在肝脏里生长繁殖，破坏肝组织的正常结构，影响肝脏的生理功能，并出现一系列临床症状。不同的肝炎病毒可以使人得不同类型的病毒性肝炎。三种肝炎之间没有交叉免疫，即同一个人，得过甲型肝炎以后，仍可以再得乙型肝炎或非甲非乙型肝炎。这三种肝炎症状基本相似，但传播的方式不同：甲型肝炎病毒主要通过消化道传播，如日常生活的接触，与肝炎患者共用餐具，进食被肝炎病毒污染了的食物等，都可能被传染，如果水源被病人的大便污染，就会引起甲型肝炎的流行；乙型肝炎病毒多存在于血液中，所

以乙型肝炎主要是由于输入了含有乙型肝炎病毒的全血、血浆、血清或生物制品等，或者使用被这种血液所污染的注射器、针头、采血器等，通过这些途径将病毒传给健康人；非甲非乙型肝炎主要是通过输血，皮肤伤口传播，通过饮食也能传播。目前，人们对这种病毒还未完全搞清楚。这种肝炎不同于甲型肝炎，也不同于乙型肝炎，其临床症状很像轻型乙型肝炎，大部分病人可以痊愈，但三分之一的病人可以转为慢性肝炎。

预防传染性肝炎，主要是及时隔离病人，注意饮食卫生和水源卫生，养成良好的卫生习惯；严格检查给血者，肝炎患者不能输血给别人。肝炎流行期间，可用茵陈15克煎水服，每日一剂，连服三至五天，有一定的预防作用。

肝炎的治疗，目前临床上一般分急性肝炎和慢性肝炎。急性肝炎又分为黄疸型与无黄疸型。以急性黄疸型肝炎来说，病毒进入人体后一般要经过10至40天的潜伏期才开始发病。最初，表现为发冷发热，全身乏力，食欲不振或头痛，腹胀，肝区痛，恶心，呕吐，厌油腻，逐渐出现巩膜、皮肤黄染，小便深黄如浓茶。可按茵陈泻肝汤(选自《临证会要》)加减制成膏剂内服，健运脾胃，清宣湿热，疏肝利胆。

处方、制法及服法：茵陈30克，炒槐角10克(研)，炒梔仁10克，龙胆草10克，焦山楂15克，川厚朴10克，炒建曲10克，炒麦芽10克，炒黄芩10克，红柴胡10克，广陈皮10克，白茯苓10克。上药配10至15剂，将药合在一起，加水煎煮3次，滤汁，去渣，合并药汁，加热浓缩为清膏。每服1匙，1日3次，白开水送服。

无黄疸型肝炎，一般早期无明显自觉症状，但日久，始

觉肝脏肿大压痛，同时伴有脘腹胀闷，食减，神疲乏力，但无黄疸出现。可按下列经验方(选自《临证会要》)选药制成膏剂内服以疏肝、理气、活血、消瘀、解毒。

处方、制法及服法：丹参 15 克，旋复花 10 克(包煎)，五灵脂 10 克，炒蒲黄 10 克，紫花地丁 24 克，蒲公英 24 克，夏枯草 30 克，当归尾 10 克，赤白芍各 10 克，川厚朴 10 克，延胡索 10 克，生甘草 10 克。上方配 15 剂，合在一起，加水煎煮 3 次，滤汁，去渣，合并药液，加热浓缩，加适量炼蜜，文火收膏。每次服 1 匙，1 日 3 次，白开水送服。此为一个疗程，如服后有效，可以续服三个疗程。

9. 慢性活动性肝炎选用什么膏方治疗？

急性病毒性肝炎患者在患病期间，由于隐性发病，休息不当，嗜酒，营养不良等因素影响，约 10~15% 患者可发展为慢性肝炎，也称“慢性活动性肝炎”。这些病人常有肝区刺痛，腹胀，嗳气，食欲减退，全身乏力，肝脏肿大压痛，肝功能异常等，有些患者还伴有低热，体重减轻，轻度出血倾向，黄疸等症状。本病属中医“胁痛”、“肝胀”等范畴。还有些患者虽无症状，但验血发现乙型肝炎表面抗原（简称“HBsAg”）阳性，这种人被称为乙型肝炎病毒健康携带者。这些健康携带者虽不发病，但还是有传染给别人的可能。临床实践证明，中草药对降低谷丙转氨酶、改善症状和体征，控制病情发展有一定效果。慢性肝炎可选用“丹参膏”(选自《验方》)加味。

处方、制法及服法：丹参 500 克，黄芪 250 克，炙甘草 50 克，平地木 100 克，半枝莲 100 克。上药共煎 3 次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩，加适量炼蜜，文火收膏。每次

服 20 克，1 日 2 次。据研究：丹参有活血化瘀的功效、能扩张肝脏血管，增加肝血流量，有利于肝细胞组织恢复与生长。其余药物对乙肝血清抗原转阴性有一定作用。

10. 肝炎恢复期肝区疼痛可用膏方治疗吗？

患肝炎后，有些患者常感右上腹肋缘处疼痛——肝痛。特别是体力活动后更加明显，这是肝炎后常见症状之一。患者常为此而忧心忡忡，怀疑是否为肝炎复发。我们认为，如果经医生排除了胆囊疾患、肝肿瘤等，肝炎在恢复过程中或已痊愈的情况下，也会有疼痛的感觉。其原因为：①人体一个肝脏约有 2 500 亿个肝细胞，肝脏的表面包有半透明膜，包膜上分布着丰富的感觉神经末梢。当肝脏发生急性炎症时，肝细胞会发生不同程度的肿胀，使肝包膜因膨胀受到压迫，影响到包膜上的感觉神经末梢，产生痛感；②在肝炎过程中，除肝细胞发炎外，肝包膜也可能发炎，这就有可能使肝包膜与邻近的脏器组织，如胃、肠、胆、胰、腹膜等发生粘连。所以，肝炎病情虽已稳定，炎症也已消退，但粘连仍然存在。当肝脏处于恢复阶段，由肿大逐渐缩小时，粘连的部分可拉得更紧。当体力活动或腹胀、便秘时，就会产生不同程度的牵扯性疼痛。可见，这实际上是肝炎的一种“后遗症”。对于这种肝痛不用担忧，一方面注意生活上的调摄和静养，同时自制中药膏剂内服一个阶段，可以达到疏肝理气止痛的功效。可用加减“柴胡疏肝散”（选自《景岳全书》）。

处方、制法及服法：柴胡 80 克，赤白芍各 100 克，炒枳壳 100 克，制香附 100 克，川楝子 100 克，延胡索 80 克，广郁金 80 克，虎杖 100 克。上药加水煎煮，共煎 3 次，过滤，

合并药液，加热浓缩为清膏，再加适量的炼蜜调匀，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送服。

11. 肝硬化是怎么发生的？有什么膏方可以治疗？

慢性肝炎，如果不及时注意生活调摄和药物治疗，任其发展，其中一部分可以发展为肝硬化。众所周知，肝脏是人体内重要的解毒器官，外界一切有害因子，不仅仅病毒，如酗酒、毒物，营养不良等都会造成肝细胞损伤，坏死。肝细胞被破坏后可以再生，但同时肝内结缔组织、纤维组织也会增生。如此肝细胞不断被破坏，纤维组织不断增生，几经反复，最后即成肝硬化。肝硬化患者常有神情衰弱、容易疲乏，食欲减退，大便不正常等主诉，体征有肝脾肿大，蜘蛛痣，以及浮肿、腹水等。选用中药制成膏剂长服，有滋阴养血，保护肝细胞不受损伤，防止肝脏继续硬化的作用。可用“一贯煎膏”（选自《重庆市中药成方制剂标准》）。

处方、制法及服法：北沙参、麦冬、当归身各90克，生地黄300克，枸杞子150克，川楝子45克。上药切碎，加水煎煮3次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩为清膏，再加入与清膏等量的炼蜜，和匀，文火收膏即得。每次服1匙，1日3次，白开水冲服。久服此膏，对早期肝硬化，慢性肝炎等颇有效验。

12. 肝硬化腹水选用什么膏方治疗？

当病人体内血浆白蛋白低于2.5克/100毫升或血浆胶体渗透压低于300毫米水柱时，腹水或浮肿就会产生。肝硬化病人，由于肝细胞受到严重损害，使肝脏合成白蛋白的功能

减退，从而使血浆蛋白含量降低，血浆胶体渗透压也随之降低。此外，肝病患者多有食欲不振，故蛋白等营养物质常摄入不足，加上消化吸收功能不佳，更使血浆白蛋白含量减少，胶体渗透压降低。在这种状态下，血浆蛋白和水分一起就不断漏入腹腔。所以，对肝硬化腹水病人来说，一般情况下，应多补充些蛋白质，特别是动物蛋白。但每天吃盐的量不宜超过3克，最好进无盐饮食。每天进水量也不宜太多，应避免吃粗糙食物及刺激性调味品，吃东西要细嚼慢咽。选用中草药制成膏剂内服，有帮助消肿利水，改善肝功能的作用，可用“腹水草膏”（选自《中国膏药学》）。

处方、制法及服法：腹水草300克或500克，煎煮，滤汁，去渣，加冰糖适量，熬成糊状收膏。每次空腹服15克，1日2次，白开水送下。

13. 习惯性便秘是怎么回事？选用什么膏方治疗？

便秘是常见病症之一。特别是老年人，由于年老体弱，活动量减少，胃肠蠕动功能减弱。有些人三、五天甚至一星期以上排便一次，或者须服用泻药才能解出大便。大便的形状往往又干又硬，象栗子或羊屎一样，这就是习惯性便秘。便秘如不及时防治，可引起其他疾病，如痔疮，疝气，肛裂，甚至可引起结肠癌，直肠癌等。因此，及时治疗便秘，对于保持健康，延年益寿，具有十分重要的意义。中药制成膏剂内服对便秘有很好疗效。可选用“藕蜜膏”（选自《家庭食疗手册》），或“润肠膏”（选自《证治准绳》）。

处方、制法及服法：①藕蜜膏：藕汁、蜂蜜各500克，生地黄汁100克。以上3味药和匀，文火熬成膏。每服半匙或

一匙，口中含化后徐徐咽下，不时服饮；②润肠膏：火麻仁、桃仁、当归、生地各100克，甘草50克。先将火麻仁、桃仁捣成泥，然后与他药一起加水煎煮3次，滤汁，去渣，合并药汁，加热浓缩，再加入适量炼蜜，文火收膏。每次服15克，1日3次，饭前白开水送服。

此外，老人津亏便干，也可用锁阳500克，加水煎煮3次，滤出药汁，合并药液，加适量炼蜜收膏。每次服二、三匙，1日2至3次，白开水送服。

14. 脱肛的病因、症状有哪些？用什么膏方治疗？

脱肛又称肛门直肠脱垂。关于脱肛，古代医籍早有记载，如明代《医学入门》曰：“脱肛诸因劳倦，房欲过度，孕育用力，久泻久痢，小儿呼叫耗气，皆有此症。”可见小儿先天不足，老年气血衰退，妇女多次分娩，慢性腹泻，便秘，慢性咳嗽等，都会造成骨盆肌肉松弛，导致脱肛。脱肛早期常有粘膜自肛门脱出，便后自行缩回，以后渐渐不能自然回复，须用手上托方能复位。伴有粘液自肛门流出，排便次数增多，并有下坠感和排便不尽感。以后在咳嗽、喷嚏，走路，久站或稍一用力即可脱出，脱出后局部有发胀感。中医学认为脱肛病症多与气虚体弱有关，治宜补气升提，可用加减“补中益气膏”（选自《临证会要》）。

处方、制法及服法：黄芪、党参各150克，当归、白术、升麻、柴胡、炙甘草、枳白皮、陈皮、罂粟壳各100克。上药加水煎煮3次，滤汁去渣，将药汁合在一起，适当浓缩，加炼蜜适量，文火收膏。每次服1匙，1日3次，空腹时白开水送下。视病情需要，可连服二、三料。此外，可采用外敷熏洗

法配合治疗：取苦参、石榴皮各 20 克，五倍子 30 克，枯矾、皮硝各 10 克，加水煮沸，熏洗局部，1 日 2 次，每次 15 分钟。配合内服膏剂，疗效更著。

15. 阑尾炎用什么膏方治疗？

阑尾是人体腹腔内一段很细小的肠子，一般长约 5 ~ 7 厘米，直径 0.5 厘米左右。一般位于右下腹部，长在大小肠交界处的下方，一端开口于盲肠，另一端是封闭的。肠道的食物碎屑、粪石、蛔虫等容易进入阑尾引起发炎。急性阑尾炎的症状主要是右下腹疼痛，还可伴有恶心、呕吐、发热等症状，一般需考虑手术治疗。但有部分阑尾炎患者不愿手术，希望内科保守治疗。经注射抗生素等药后也可因炎症的暂时消退而好转，但过一段时间又会发作。每因劳累、受凉或饮食不当等，引起复发。慢性阑尾炎反复发作会影响消化功能，有碍日常生活与工作。患者可选用行气活血，通里攻下的中药制成膏剂内服，对提高机体抗病能力，促进阑尾炎症吸收有一定疗效。可选用“红藤膏”。

处方、制法及服法：红藤 60 克，制大黄 15 克，京赤芍 15 克，牡丹皮 15 克，生甘草 15 克。上药加清水煎煮 2 次，滤汁去渣，合并药汁，加适量炼蜜，文火收膏。每次服 1 匙，1 日 3 次，白开水送服。

16. 怎样预防蛔虫病？用什么膏方治疗？

蛔虫寄生在人体的小肠里，一条雌虫每天产卵可达 20 万个，随大便排出体外。如果粪便管理不好，经风吹、雨淋，田间施肥，很容易散布到泥土、水中和蔬菜上。所以人们吃了

帶有虫卵的蔬菜、瓜果以及由蒼蠅污染了的食物，就有可能染上蛔虫病。一旦患有蛔虫病，可使人营养不良，腹痛，乏力等，影响小儿生长发育。蛔虫还有“钻孔”的习性，当人体发热或吃了有刺激性的食物后，它就在肠道里乱钻。有时从口腔、鼻孔钻出来，有时钻到阑尾或胆道，有时扭结成团，引起蛔虫性肠梗阻，甚至钻破肠子，发生肠穿孔。预防蛔虫病最重要的是养成良好的卫生习惯。饭前便后要洗手，不吃生水，生菜及不洁瓜果，不要随地大小便，作好粪便管理，不用新鲜的人粪施肥。治蛔虫病，可选用下列经验方（选自《常见病中医证治》）。

处方、制法及服法：槟榔、雷丸各 10 克，使君子、苦楝根皮，茵陈各 15 克，木香、枳实各 8 克。上药配 3 剂，合并在一起，加水煎煮 3 次，滤出药汁，去渣，合并药液，加热浓缩，加适量炼蜜，文火收膏。此膏分 3 天服完，每日 3 至 4 次，白开水送服，小儿酌减。此外，可取单味苦楝根皮 50 克，加水煎煮，滤出药汁，加热浓缩，加入适量炼蜜收膏，将膏分 3 天，每天分数次服完，有驱蛔虫效果。

17. 怎样预防蛲虫病？用什么膏方治疗？

蛲虫病又叫“寸白虫”，象白线头一样不到半寸长，寄居于人体的结肠和盲肠内。患者多为儿童，成人也可被感染。雌蛲虫成熟后到处爬行，大多在夜间趁人睡觉时从结肠下行爬出肛门，停留于肛门周围的皱褶间和会阴处产卵，在十几分钟内可产卵一万个以上，引起肛门周围和会阴部奇痒难忍，影响睡眠，令人精神不安。有的患者还会出现食欲不振、腹痛、消化不良等症状。预防蛲虫病，主要是注意个人卫生，如常

剪指甲，儿童不要穿开裆裤，饭前便后洗手，勤洗澡，勤换衣服，教育小孩不吸吮手指等。治蛲虫病可选用下列经验方（选自《常见病中医证治》），制成膏剂内服以杀虫止痒。

处方、制法及服法：鹤虱、槟榔各 10 克，苦楝皮、茵陈各 15 克，使君子、大黄、芜荑各 9 克。上药配 4 至 6 剂，合在一起，加水煎煮 3 次，滤汁，去渣，合并药液，加热浓缩，加入适量炼蜜，文火收膏。每服 1 匙，1 日 3 次，白开水冲服。此外，可用生百部 30 克，加水 500 毫升，煎汤浓缩至 150 毫升，睡前保守灌肠，如此连续五天有一定疗效。

18. 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性者如何用膏方保健？

乙型肝炎表面抗原最初阶段，被称为澳大利亚抗原，简称“澳抗”。后来进一步研究发现，这种抗原和乙型肝炎的发病密切相关，故将这种抗原称之为乙型肝炎表面抗原。正常人应为阴性（1:32 以下），1:64 以上为阳性。“澳抗”阳性，一般有两种可能：“澳抗”阳性者，同时有肝炎症状、体征和肝功能异常，可确诊为病毒性乙型肝炎，这种人需要休息和治疗；“澳抗”阳性者，经半年医学观察，未发现肝炎表现，肝功能正常，医学上称这种人为澳抗携带者，或称无症状澳抗携带者。澳抗携带者处于一种潜在性感染状态，一旦抵抗力下降，病毒即有可能损伤肝脏而发生肝炎。研究资料表明，澳抗携带者每年以 3~5% 的比例转化为慢性肝炎，甚至导致肝硬化和发生肝癌。所以澳抗阳性者应注意自身保健，在目前无特殊疗法情况下，应定期复查肝功能，注意生活规律，增加营养，不饮酒、不暴食、不盛怒。平时如能经常选择一些

扶正祛邪，益气养血的中药制成膏剂内服，对增强自身免疫力，促使澳抗转阴方面有一定的作用。可按经验方(选自《袖珍中医处方》)加减选药。

处方、制法及服法：蒲公英 18 克，土茯苓 12 克，秦皮 6 克，白花蛇舌草 15 克，广郁金 9 克，制大黄 6 克，太子参 15 克，白芍 12 克，生黄芪 15 克，炒枳壳 9 克，炒谷芽 9 克，上方配 5~10 剂，合在一起，加水煎煮 3 次，滤汁，去渣，合并药液，加热浓缩，加入适量炼蜜，文火收膏，1 日 3 次，每次 1 匙，白开水送服。

三、心血管、血液系统疾病

1. 高血压是怎样发生的?选用什么膏方治疗?

世界卫生组织(WHO)将收缩压大于或等于 21.3kPa(160 毫米汞柱)，舒张压大于或等于 12.7kPa(95 毫米汞柱)，规定为高血压的诊断标准。高血压病是中老年人最常见的内科疾病之一，其病因还不十分明了，故为一种较难治愈的慢性病。学者们提出了种种学说，如遗传学说、肾素学说、内分泌障碍学说等。近年来，心身医学研究认为不良的心理社会因素是引起高血压病的重要病因，尤其是长期存在压抑性心理矛盾冲突，急剧遭受强烈精神创伤，都可引起高血压病。这方面例子很多，如：有位五十余岁的银行职员，平素身体健康，五年前，唯一的亲生儿子因工伤死亡，患者从此悲痛抑郁，不久得了顽固的高血压病，血压常在 21.3~25.3kPa (160~190 毫米汞柱)/13.3~16kPa (100~120 毫米汞柱)，虽经药物治

疗，但效果不佳。高血压患者除血压升高外，平时常感头晕，头胀痛，心烦易怒，失眠多梦，耳鸣等。有的患者，收缩压可高达26.7kPa(200毫米汞柱)，舒张压可高达17.3kPa(130毫米汞柱)以上，其最大的危害是晚期可发生脑血管意外。

高血压病人的血压降到什么水平，应根据各人的年龄、病情而定。年纪较轻而又无并发症的患者，则尽可能把血压降到正常水平，但对那些年老的患者，特别是血压在26.7/14.7kPa(200/110毫米汞柱)以上的严重高血压患者，经治疗后，血压维持在21.3~22.7/13.3kPa(160~170/100毫米汞柱)左右已属理想。反之，如果硬要把血压降到正常水平，则会引起机体各重要脏器缺血，从而导致严重后果。对高血压这种慢性病，也可通过中药膏剂的长期服用，达到治疗目的，且无副作用。可采用“降压膏”(选自《中药制剂汇编》)。

处方、制法及服法：槐角 250 克，冬青、夏枯草 各 150 克，熟地 40 克，桑枝 125 克，臭牡丹 100 克，白糖 250 克。上药洗净，切碎，和匀，反复煎煮 3 次，分别过滤，合并药液，加入白糖收膏。每次服 1 匙，1 日 3 次，白开水冲服。

也可用“夏枯草膏”(选自《摄生众妙方》)。

处方、制法及服法：夏枯草 1 000 克，加水煎煮 2 次，滤汁去渣，合并药汁，加热浓缩为清膏，再加炼蜜适量，调匀，文火收膏。每次服 15 克，1 日 2 次，白开水送服。据研究，夏枯草有良好的降压作用，对老年高血压病效果较好。

2. 动脉硬化是怎么回事？用什么膏方防治？

动脉硬化，中年以后，尤其是老年人较为多见。人们平时说的“动脉硬化”与“动脉粥样硬化”不完全是一回事。“动脉

硬化”范围更广，包括动脉粥样硬化。人体内的动脉分大、中、小三等，小动脉硬化多由高血压引起，长期的高血压可使全身的小动脉内膜变厚，眼科医生用一种特殊的镜子（眼底镜），可通过病人的瞳孔以观察眼球内小动脉硬化的程度。有人误认为：如果眼球内的小动脉硬化了，就是标志着全身的动脉也都硬化了。这种误解是由于概念不清引起。“动脉粥样硬化”与小动脉粥样硬化不同，粥样硬化最常发生于大、中动脉，如：主动脉、心脏上的冠状动脉和肾动脉等。这是由于动脉内膜中的脂质，如胆固醇过分堆积，造成局部隆起，呈白色或淡黄色斑块，形如粥状，形成动脉粥样硬化斑块。这种斑块发生在大动脉，问题还不太大，如果发生于中动脉，如：冠状动脉，当其程度严重时，可致管腔狭窄，血流不畅，甚至完全堵塞，使心脏局部肌肉缺血、缺氧，从而出现心绞痛或心肌梗塞的症状，此即所谓“冠状动脉粥样硬化性心脏病”，简称“冠心病”。据研究，何首乌能减轻或阻止胆固醇沉积，芝麻含有丰富的维生素E、B₁、亚油酸等，有改善血液循环，调节胆固醇的代谢，降低高血压等作用，被称为抗老益寿的高级食品，防治动脉硬化，不妨采用“首芝膏”（经验方）。

处方、制法及服法：制首乌 500 克，芝麻（炒、研粉）300 克，蜂蜜 1 000 克。将首乌反复煎煮，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩至 500~600 毫升，加入芝麻粉和炼蜜，拌匀，文火收膏。每服 1 匙，1 日 2 至 3 次。如能长期坚持服用，其减缓动脉硬化、益寿延年之功效，自不待言。

3. 什么是高脂血症？可用膏方治疗吗？

人体血液中有多种脂质成份，如胆固醇、甘油三酯、磷

脂等，简称“血脂”。医生比较注意的是胆固醇和甘油三酯。对人体来说，上述各种脂质成份既不可缺少，又不宜太多。否则就会给人体带来一定危害。根据专家研究得知：健康成人血中胆固醇含量应在160~180毫克/100毫升范围中，高于220毫克/100毫升者为过高，健康成人血中甘油三酯含量一般在80毫克/100毫升左右，高于160毫克/100毫升者为过高。如果一个人重复两次检查血脂胆固醇含量高于220毫克/100毫升，可诊断为高胆固醇血症；若甘油三酯含量高于160毫克/100毫升者，可诊断为高甘油三酯血症。如果两项指标都高于上述界限者，可诊断为混合型高脂血症。一般说，血脂含量有随年龄而增高的趋势，故高脂血症以中、老年人较为多见，是导致冠心病的主要因素之一。高脂血症的形成与饮食不当、缺少运动关系密切，有些人还与遗传因素有关。高脂血症常见症状有：头晕、头痛，脑力、体力衰退，食欲不振，消化不良，大便不正常等。治疗高脂血症可采用经验方（选自《袖珍中医处方》）。自制膏剂内服。

处方、制法及服法：桑寄生15克，泽泻18克，制首乌12克，生山楂12克，茵陈30克，生麦芽12克，槐米18克，羌藟子9克。上方配7至10帖，将药混合在一起，加水煎煮3次，每次2小时，滤汁去渣，合并药汁，加热浓缩，加入适量炼蜜，文火收膏。每次服1匙，1日2次，白开水送下。

4. 心力衰竭有哪些早期表现？膏方可治吗？

心脏的主要作用是推动血液在血管中运行，把氧和养料带到全身各组织器官，又从那里把废物带走。当心脏功能不全，如心肌损害，心瓣膜关闭不全，节律发生改变等，使心

脏收缩力量减弱，心脏在单位时间内射出的血量减少，引起组织缺氧，同时使大量带有废物的血液阻滞在组织器官中，这样就会出现呼吸困难、心悸、气促、面唇发绀、水肿等症状，这就是心力衰竭，也称心功能不全。

心力衰竭能否早期识别、及时予以纠正，是延长心脏病患者寿命的关键。心力衰竭的早期一般表现为：轻度活动后容易疲劳，夜间突然感觉胸闷而憋醒，登楼或跑步后呼吸困难较前加重，不明原因的咳嗽，或有食欲下降、神疲乏力、浮肿、尿量减少等，都是心功能不全的表现。心衰早期，平时可没有什么症状，因为这时心脏尚有“代偿”功能，通过心跳次数增加，心脏扩大或心肌肥厚等方式来应付全身的供血任务。一旦由于劳累、感染等因素使心脏负担超过其代偿能力时，就会出现心悸、气促及面唇发绀等现象。病情继续发展，使心脏功能越来越差，即使在安静时也可出现心功能不全症状。

急性心力衰竭，需及时去医院抢救，否则有生命危险。慢性心力衰竭早期，应注意适当休息，设法减轻心脏负担。同时，可选用中药膏剂内服起到强心、健脾、温肾作用，可按经验方(选自《袖珍中医处方》)选药。

处方、制法及服法：生黄芪 15 克，葶苈子 15 克，熟附片 9 克，党参 12 克，丹参 12 克，益母草 15 克，炙甘草 4.5 克，麦冬 12 克，五味子 3 克，茯苓 12 克。上方配 5 至 10 剂，将药合在一起，加水煎熬 3 次、滤汁、去渣，合并药汁，加热浓缩，加适量炼蜜，文火收膏。每服 1 匙，1 日 3 次，白开水送服。

5. 什么叫冠心病?用什么膏方治疗?

冠心病是由于供应心肌血液的冠状动脉发生了粥样硬化,使冠状动脉血管腔变窄,心肌供血不足而造成。高脂血症、高血压、吸烟是导致冠心病发生和发展的三大危险因素。冠心病早期,常有胸闷、气短、心悸等自觉症状,在过度劳累、情绪波动、饱餐等因素影响下,心脏对血氧的需求增加时,容易诱发“心绞痛”。心绞痛主要表现为心前区(指胸骨下段或偏左)疼痛,疼痛开始较轻,经数分钟后达到高峰,持续3~4分钟,一般不超过15分钟,还可放射到颈部、喉头或左上肢等处。心电图检查多有异常表现。如果冠状动脉严重硬化,其管腔高度狭窄,一旦冠状动脉发生痉挛或管腔内狭窄处有血栓形成,使血管完全闭塞不通,导致心肌发生严重缺血与坏死,这就是“心肌梗塞”。心绞痛、心肌梗塞都是冠心病的典型表现,可危及生命。为了防止冠心病的发生与发展,除保持良好的生活方式和饮食习惯,积极地开展体育活动外,用中药膏剂长期调治能改善胸闷,胸痛等症状,可用枸杞膏(选自《中国膏药学》)。

处方、制法及服法:枸杞45克,炒赤小豆90克,炒酸枣仁30克,槐花24克,当归30克,丹参9克,人参9克。前六味药用水750毫升、煎煮药汁,滤汁去渣,加热浓缩,加红糖适量收膏。人参研粉,每服膏剂9克,掺入适量搅匀。1日2次。白开水送服。

此外,也可选用“葛根膏”(选自《验方》):葛根500克,加水煎煮3次,滤出药汁,去渣,合并药液,加热浓缩,加适量炼蜜收膏。每服15克,1日2次,白开水冲服。据研究,

用葛根治冠心病之心绞痛，可使发作次数、程度及持续时间明显减少或减轻。“丹参膏”（详见“慢性活动性肝炎”条）对防治冠心病也有一定疗效。

6. 早搏是怎么回事？用什么膏方治疗？

要问早搏是怎么回事，先要弄清心跳是怎样产生的。人的心脏的右心房靠近上腔静脉入口处有个窦房结，其中有许多发放冲动的“起搏”细胞，由它发放冲动，然后激动心脏各个部位所有的心肌细胞，使之按一定的频率发生收缩，这就是心跳。由于某些原因，心室或心房内某一区域兴奋性过高，使整个心室或心房在正常节律中突然提前兴奋和收缩，这就是过早搏动，简称“早搏”。根据早搏起源的部位，依次可分为房性、房室交界处与室性早搏三种，通过心电图检查就可把它们明确区分开来。

早搏有功能性的，如正常人在过劳、紧张、大量吸烟、饮酒等情况下也会发生。早搏有时是器质性病变的信号，如心肌炎、冠心病等心脏疾患以及发热、贫血、甲状腺机能亢进等其他疾病。早搏的原因是复杂的，中医认为早搏多由气血、阴阳、心肾平衡失调所致。早搏，尤其是功能性的早搏，用中药制成膏剂调治有一定疗效，可选用经验方（选自《大众医学》）。

处方、制法及服法：苦参 40 克，茵陈 30 克，黄芪 30 克，生山楂 30 克，桑寄生 30 克，制半夏 24 克，丹参 30 克，黄连 12 克，葛根 30 克，炒枣仁 30 克，川芎 24 克。上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩，再加适量炼蜜收膏。每次服 1 匙，1 天 2 次，白开水冲服。此为一周量，三

周为一疗程。

7. 阵发性心动过速是怎么回事?选用什么膏方治疗?

你可能遇到过这样的情况,某人平时工作、生活好好的,但说不定什么时候,他的心脏会突然跳得很快,每分钟100多次甚至200次左右,他立刻感到心脏猛烈跳动,精神不安,疲乏无力,胸闷,头晕,恶心呕吐,面色苍白,甚至晕厥。这种情况持续几分钟、几小时或几天,然后心跳又突然恢复正常,一切症状也随之逐渐消失,他又能和往常一样谈笑自如,这就是一次阵发性心动过速的典型发作过程。正常成人的心跳由窦房结发出冲动,每分钟60~100次。如果超过100次,就叫做心动过速。如果在心脏窦房结以外部位如心房或心室的某一处产生比窦房结更为活跃的区域,即异位兴奋灶,它取代了窦房结指挥心跳的“职能”,突然以每分钟160~250次的频率发放冲动,即产生了阵发性心动过速。随异位兴奋灶部位不同,有房性、房室结性、室性心动过速三种。前二种又称室上性心动过速,也是最常见的二种。这部分人一半以上心脏没有其他疾病,只是反复发作,另一部分则与心脏疾患同时存在。室性心动过速较少见,绝大多数发生在比较严重的心脏病患者中,需及时救治。对一般的阵发性心动过速,除针对病因治疗外,也可选用养阴安神类中药制成膏剂内服,可用经验方(选自《中药方剂临床手册》)。

处方、制法及服法:珍珠母300克,沙参、麦冬、茯苓、丹参、夜交藤、远志各90克,五味子60克,莲心100克。上药加水煎煮3次,滤汁去渣。将药液合并,加热浓缩,再加适量炼蜜,文火收膏。每次服1匙,1日3次。白开水送下。

8. 什么是病态窦房结综合征?用什么膏方治疗?

心脏右心房后上方的窦房结,虽然只有约15毫米长,5~7毫米宽,1.5~2毫米厚,但它能指挥整个心脏的活动。窦房结的细胞具有自律性,但也受神经支配,如交感神经兴奋时,起搏频率加速,于是心跳加快;当迷走神经兴奋时,心跳就减慢。窦房结十分娇嫩,由于心脏本身疾病,如心包炎、心肌炎、心内膜炎、冠状动脉狭窄,或全身性疾病,如红斑狼疮等都会损害窦房结。如果窦房结得了病,它指挥心跳的功能即失灵,心跳就会减慢或紊乱,有些患者的心跳可以慢到每分钟30次左右,这会造成心脏供血不足,从而出现头昏或晕厥,并可有逐渐加重的心力衰竭或心绞痛等表现,这就是“病态窦房结综合征”。中医学认为“病态窦房结综合征”多属心肾阳虚,可选用温补心肾类中药制成膏剂长期内服,缓图药效。可选用经验方(选自《袖珍中医处方》)。

处方及制法、服法:党参12克,桂枝9克,熟附片9克,杞子10克,麦冬10克,丹参12克,炙甘草6克,广郁金10克,川芎9克。上方配10剂,将药合在一起,加水煎煮3次,滤汁去渣。合并药液,加热浓缩,再加适量炼蜜,文火收膏。每次服15克,1日3次,白开水送下。

或用下方(适宜于心肾虚寒明显者):生熟地各50克,淮山药50克,山萸肉30克,龙眼肉50克,仙灵脾30克,仙茅30克,女贞子30克,巴戟天30克,党参50克,附块20克。上药加水煎煮3次,每次2小时,滤出药汁,去渣,合并药液,浓缩,加适量炼蜜,文火炼制收膏。每次服1匙,1日2次,温开水冲服。

9. 脑血栓形成在发病前有哪些先驱症状?用什么膏方可以预防?

脑血栓形成,属中医“中风”、“偏枯”。多数发生在60岁以后,男性多于女性。通常在安静状态下发病,有些人在睡觉时还很好,清晨起床发现一侧肢体瘫痪了。这是由于脑动脉硬化的老年人,夜间睡眠时,脑血流缓慢,血液中血小板与纤维蛋白容易沉积而引起脑血管栓塞。本病在发生前常有短暂性脑缺血的各种表现,如:有的头昏,眼花,走路不稳;有的手臂无力上举或下肢起立行走时不能支撑而跌倒;有的表现为口舌发麻,舌咽困难,口角歪斜等;有的表现为复视或突然失明或耳鸣、听力减退;有的突然发生单瘫或偏瘫。这些不同的先驱症状随脑组织缺血的部位而异。近年来,脑血栓形成发病率较高。不少患者发病后留下半身不遂、失语甚至痴呆等严重后遗症,给病员及其家庭带来极大的不幸。如能及时发现上述先驱症状,并选择有效的膏方久服,可以预防脑血栓形成的发生。可选用经验方(选自《袖珍中医处方》)。

处方、制法及服法:生黄芪150克,川芎、葛根、当归、片姜黄、红花各90克,赤芍120克,鸡血藤180克,地龙120克。上药加水煎煮3次,滤汁去渣,将3次滤出的药汁混合,加热浓缩,加适量白糖,文火收膏。每次服15克,1日2次,白开水冲服。

10. 低血压是怎么回事?用什么膏方治疗?

自从80多年前里拉和罗西设计出水银测压计以后,各国

的医生们经过大量的实践，认为正常成人血压是在 12/8kPa (90/60 毫米汞柱) 以上。但也有些人低于上述数值，特别是在一些 20 至 40 岁的女性中更为多见，约占 2%。这些人往往形体较瘦长，体质较孱弱，一般无明显不适，常在体格检查时被查出血压较正常值低。部分人可因轻微头痛、头昏、恶心、心悸、乏力、寐差多梦、腰酸膝软等不适，去医院就诊经量血压后得知血压偏低。有时在他们的家族成员中发现与其情况相似的低血压病员。医学上把这种情况称为“体质性低血压”。一般对人没有什么危害性，发现了也不必忧虑、紧张。人体血压与心脏收缩力及血管紧张度有关。所以，体质性低血压患者注意经常参加一些体育锻炼和体力劳动，增加营养，血压偏低的情况会有所改善，用中药熬制膏剂内服，也很有帮助。可选用“参术膏”(选自《证治准绳》)。

处方、制法及服法：党参、白术各 500 克、加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩，加适量炼蜜收膏。每次服 1 匙，饭后白开水冲服，1 日 3 次。

也可用经验方(选自《临证会要》)。

处方、制法及服法：黄芪、熟地、南沙参、北沙参、党参、白术、泽泻、玉竹各 90 克，茯苓、当归、川芎、陈皮、甘草、谷芽、白芍各 60 克，桂枝 30 克，太子参 90 克。上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩为清膏，再加入适量炼蜜，文火收膏。每次服 15 克，1 日 2 次，白开水送服。

11. 缺铁性贫血有哪些症状？用什么膏方治疗？

铁是人体必需的元素之一，因为它是人体组成血红蛋白

的主要成份。人体一旦缺铁，就会使血红蛋白合成受阻，影响红细胞的发育与成熟，导致贫血。缺铁性贫血早期有疲乏、头晕、眼花、耳鸣、心跳、气急、食欲减退、腹胀等症状。严重时患者面色苍白，全身微肿，逐步体力衰退，还会发生各种并发症。治疗方面，除补充铁质外，选用中药制成膏剂内服，效果良好。可用经验方(选自《袖珍中医处方》)。

处方、制法及服法：熟地 120 克，当归 100 克，川芎 60 克，白芍 100 克，红枣 250 克。上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并 3 次药汁，加热浓缩，再加适量炼蜜，文火收膏。每次服 1 匙，1 日 3 次。白开水送服。

如贫血严重，可用“十全大补膏”(选自《江苏省药品标准》)。

处方、制法及服法：党参、炙黄芪、炒白术、炒白芍、茯苓各 250 克，熟地黄、当归各 400 克，川芎、肉桂、蜜炙甘草各 125 克。以上 10 味药，加水煎煮 3 次，第一次 3 小时，第二、三次分别 2 小时，滤出药汁，澄清，混合药汁，浓缩得清膏。取砂糖 250 克，加水、文火加热化烊，滤过，然后与上述清膏 500 克混合，和匀即得。每次服 15 克，1 日 2 次，用开水化服。感冒未愈或食积时暂停服用。

12. 血小板减少性紫癜选用什么膏方治疗？

血小板减少可与患者体内存有某种破坏血小板的抗体有关，或因再生障碍性贫血、白血病、感染细菌或病毒、脾功能亢进、某些化学或物理因素的作用等引起。这种病的主要症状是：皮肤出现出血点，压之不褪色；平时口腔、牙龈容易出血，皮肤不小心划破后出血很久才能止住。化验血可知

血小板计数显著减少。选用中药自制膏剂久服对控制出血，减少血小板破坏，促使血小板生长有益。

如伴有形寒怕冷、面色苍白、小便清白、大便不实、舌淡、脉虚弱等阳虚证候者宜用“养血归脾膏”(选自《江苏省药品标准》)。

处方、制法及服法：当归、党参、炒白术、茯苓、黄芪、炒枣仁、龙眼肉、生姜各 250 克，木香、远志、甘草、大枣各 125 克。上药加水煎煮 3 次，过滤去渣，合并药液，浓缩成膏，每 30 克清膏加砂糖 60 克和匀，文火收膏。每次服 1 匙，1 日 3 次，白开水送下。

如伴有低热、口干咽痛、盗汗等阴虚证候者宜用“紫草膏”(选自《方脉正宗》)。

处方、制法及服法：紫草、细生地各 150 克，茯苓、麦冬各 120 克，白果肉 120 克，上药共煎 3 次，滤汁去渣，合并药液，浓缩成膏，加适量炼蜜收膏。每服 5～6 匙，1 日 3 次，白开水冲服。

13. 什么叫过敏性紫癜？用什么膏方治疗？

过敏性紫癜是一种过敏性毛细血管出血性疾病，多见于青少年及儿童。开始时，多见疲乏无力，头痛，低热，上呼吸道感染等，而后皮肤出现紫癜。紫癜好发于背部、臀部、下肢等部位，分布对称，呈现针尖大小或指甲大小的紫红色斑。有些可以突出皮肤表面，压之不褪色，三至五天后消退，留下淡黄色斑。反复成批出现，可拖延数周或数月。严重者可有有关节酸痛、肿胀、腹痛伴恶心、呕吐、便血或水肿、血尿、管型尿、蛋白尿、血压升高等症状。严重者可危及生命。实

实验室检查，血小板数目，出血、凝血时间，血块收缩时间等化验均正常，免疫球蛋白测定，IgA 明显增高。本病应与血小板减少性紫癜区别，后者紫癜分布不对称，血小板数目减少，常在每立方毫米三万以下，出血、凝血时间延长，并不难区别。过敏性紫癜容易发生于过敏体质的人，当这些人接触到某些过敏原时，如链球菌、病毒、某些食物（如牛奶、蛋、鱼、虾等）、药物（如青霉素、链霉素、氯霉素、阿司匹林等）时，体内就会发生过敏反应，毛细血管发生中毒性扩张，血管壁脆性和渗透性增加，血液外渗到皮肤、粘膜、关节腔和内脏等处。

本病治疗，应找出过敏原并避免接触，应用抗过敏药物等。中药对本病有良好的抗过敏止血功效，可按经验方（选自《袖珍中医处方》）选用中药制成膏剂缓调取效。

处方、制法及服法：生地 15 克，仙鹤草 30 克，生蒲黄 12 克（包煎），玄参 12 克，乌梅 4.5 克，甘草 3 克。血尿者，可加大蓟、小蓟各 15 克。上方配 3～5 剂，合在一起，加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩，加适量白糖，文火收膏。每次服 1 匙，1 日 3 次，白开水送服。

14. 什么叫再生障碍性贫血？用什么膏方治疗？

再生障碍性贫血，简称“再障”。是一种由于骨髓缺乏造血能力而产生的一种严重进行性贫血症。男性较女性为多。本病病因约有半数尚未弄清。一部分与药物如氯霉素、保泰松、抗癌药等有关；有的与接触某些染料、砷、汞等有关。本病有急有缓，以起病缓慢者多见。患者常表现为进行性贫血、无力、困倦、头晕、眼花、心悸、气短、面色苍白或蜡黄，皮

肤可见紫癜、牙龈出血、鼻衄，严重者可见呕血、咯血、便血、尿血及颅内出血，且出血难以制止，可危及生命。由于机体对细菌抵抗力降低，故常有皮肤感染、上呼吸道感染、肺炎、败血症等发生，感染不易被控制。本病的治疗，首先应去除可疑病因，适当休息，加强营养，增加蛋白质饮食，积极预防感染，有出血现象者应及时止血。对于慢性再障，采取中西医结合治疗能获一定疗效。除给予西药、反复输入小量新鲜血液等治疗外，同时可按经验方（选自《袖珍中医处方》）选配中药制成膏剂长服，可以减轻症状，稳定病情。

处方、制法及服法：生地、熟地、枸杞子、白术各120克，炙黄芪180克，党参150克，当归100克，陈皮90克，鹿角粉90克。上药除鹿角粉外，加水煎煮3次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩，再加入鹿角粉，和匀，加入适量炼蜜，文火收膏。每次服1匙，1日3次，白开水送下。如有出血，上方加入血见愁、仙鹤草各150克。

15. 脑溢血是怎么回事？怎样选用膏方配合治疗？

脑溢血是大脑实质内有大块出血，俗称“中风”或“卒中”。这种病多发于40岁以上的中、老年人中，对中年之后，经常眩晕、肢麻、甚至眩晕欲仆者，谓之中风先兆症状，应及时诊治，以免发生中风。中风的发生与高血压、动脉粥样硬化有关。长期的血压增高，使动脉内膜发生改变，如损伤、脂类沉积等，促进或加重动脉粥样硬化。所以动脉硬化与高血压往往同时存在。血压高进一步加重血管硬化和纤维组织增生，而使血管壁增厚、僵硬、变脆，失去弹性。脑溢血多发生于白天，常与激动、外伤、跌仆或重体力劳动以致血压突

然升高有关。病人常表现为突发剧烈头痛、呕吐、眩晕、并迅速出现偏瘫、意识障碍、面部潮红、呼吸深大、口角歪斜、两侧瞳孔不等大，重者昏迷甚至死亡。治疗本病时，须辨别轻重，对于不经昏迷，或仅有短暂的神志不清，而出现口眼歪斜，言语不利，半身不遂者为中风轻症；突然昏迷，或反复发作，出现偏枯，失语，口眼歪斜者，为中风重症，应当迅速送医院救治。对于中风轻症，可用加减天麻钩藤饮（选自《杂病症治新义》）。制成清膏内服，配合其他治疗。

处方、制法及服法：天麻、黄芩、玄参、菊花各 10 克，石决明 20 克，夏枯草、地龙各 15 克，白芍、牛膝、天竺黄各 12 克，甘草 3 克。如有头痛、烦躁，加僵蚕 10 克，钩藤 30 克，以平熄肝风；舌强不语者，加菖蒲 15 克，以化痰开窍；肢体抽搐者，加全蝎 9 克，蜈蚣 2 条，以通络熄风。上药配 10 剂，合在一起，加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏。每次服 15 克，1 日 3 次，白开水送服。

四、泌尿、生殖系统疾病

1. 血尿用什么膏方治疗？

正常尿液用常规检查方法找不到红细胞，或偶尔有 2~3 个红细胞。如果尿内红细胞增多，就叫血尿。眼睛看得出血色的尿，叫做肉眼血尿；在显微镜下才能查出红细胞来的，叫做镜下血尿。血尿的治疗与其他病一样，应针对不同的病因，比如：缺乏维生素，应补充维生素；炎症，应作抗炎治疗。结石，应使它排出；肿瘤，则须手术治疗……。如果出

血量多或长期慢性血尿患者，除寻找病因，对因治疗外，可选用有止血功效的中药制膏服用，可用经验方(选自《临证会要》)。

处方、制法及服法：小蓟根、丹皮、焦山栀、炒蒲黄、白芍、茜草根、炒黄柏、木通、嫩白薇，篇蓄各10克，生地炭15克，白茅根30克。上方配5剂或10剂(视病情需要)，把药合在一起，加水煎煮2次，第1次3小时，第2次2小时，滤汁去渣，合并2次煎液，加热浓缩，再加适量炼蜜，文火收膏。每服1匙，1日3次，饭前，白开水送服。

2. 尿路感染有哪些症状？用什么膏方治疗？

尿路感染是指细菌侵犯了尿路系统，尿液中存在细菌的一种病。它可分为：上尿路感染，即肾盂肾炎；下尿路感染，主要为膀胱炎、尿道炎。这两种感染可以相互影响，最终都可成为全尿路感染。尿路感染急性期可有发热、寒战、头痛，全身疲乏以及尿频、尿急、尿痛（称“尿路刺激症状”）、血尿、菌尿或脓尿。病程超过六个月者，称慢性尿路感染。可表现为间歇发热或长期发热，腰酸乏力、消瘦等，尿路刺激症状可有可无。尿路感染可选用有抗感染作用的中草药制膏内服，如“地锦草膏”(选自《中药大辞典》)。

处方、制法及服法：地锦草1000克，加水煎煮，滤汁去渣，文火浓缩为膏状。每次服9克，1日2次，白开水冲服。据研究，地锦草对多种致病性球菌及杆菌有明显的抑菌作用。

另外，也可用尿路感染方(选自《方剂学》，上海中医学院编)。

处方、制法及服法：篇蓄、车前草、蒲公英各 200 克。上药加水煎煮 2 次，合并 2 次药汁，加热浓缩为清膏，加适量白糖，文火收膏。每次服 1 匙，1 日 2 次，白开水冲服。

3. 尿路结石用什么膏方治疗？

肾、输尿管、膀胱结石，统称尿路结石。中医学称之为“石淋”、“砂淋”。尿路结石患者常有腰酸、腰痛、脐腹左侧或右侧痛、小腹痛，还向小腹部放射，称为“肾绞痛”。有些尿路结石患者还会伴有尿路感染，出现发热、尿频、尿急、血尿等症。“胡桃仁膏”（选自《中药大辞典》）有溶石、排石作用。

处方、制法及服法：胡桃仁 500 克，用食油炸酥，加适量糖，混合研磨成膏状，贮存，于一周内分次服完，连续服药至结石排出，症状消失为止。据研究，胡桃仁有溶石作用，对泌尿系统各部之结石一般在服药后数天，即能一次或多次排石。

尿路结石用上方若无效，可用经验方（选自《袖珍中医处方》）。

处方、制法及服法：金钱草 60 克，海金砂 15 克（包煎），冬葵子 15 克，广地龙 10 克，生鸡金 12 克，滑石 30 克（包煎），王不留行 15 克，车前子 30 克（包煎）。上方配五剂或十剂，制成膏剂。每次服 1 匙，1 日 3 次，用白开水送服。

4. 肾结核病有哪些症状？用什么膏方治疗？

中医称肾结核为“肾癆”，多发于 20~40 岁的男性。早期常无明显症状，只是在尿中可以找到少量红细胞和脓细胞。

很多患有肾结核的病人可以隐症多年，但随着病情发展，除出现低热、盗汗、食欲减退、贫血等全身症状外，还可出现尿频、尿急、尿痛、血尿、腰痛等症状。治疗方面除抗结核治疗外，选择有抗癆作用的中药制成膏剂久服，可帮助抗癆，改善全身状况。如用张梦侬经验方(选自《临证会要》)。

处方、制法及服法：百部根 150 克，白薇、潼蒺藜、补骨脂、泽泻、山萸肉、天冬、丹皮、覆盆子、茯苓各 90 克，熟地 150 克，山药 250 克，加水煎煮取浓汁，去渣，再加炼蜜 1 500 克，熬至滴水成珠。每次服 15 克，1 日 2 次，饭前，白开水送服。

5. 夜尿多用什么膏方治疗？

夜尿多，是指有些人，尤其是老年妇女在晚上睡眠期间，至少要起床小便三至四次以上。老年妇女夜尿多不一定是病，一般是生理功能衰退的表现，因而不必过分忧虑。可以去医院检查一下尿液，首先排除器质性病变，如果确属功能性的，注意在睡前尽量少饮水，避免膀胱胀满。平时注意营养，适当锻炼身体，以增强体质。如能自制中药膏剂内服也可减轻或消除夜尿多症状，可用“金樱子膏”(选自《丸散膏丹集成》)

处方、制法及服法：金樱子 1 000 克。加水煎煮 3 次，去渣，滤汁，合并药汁，加适量炼蜜，和匀，文火炼制成膏。每服 1 匙，1 日 2 次，白开水送服。

症情较重者，可用下面经验方(选自《袖珍中医处方》)

处方、制法及服法：熟地、淮山药各 15 克，煨益智、补骨脂、淮牛膝、覆盆子、桑螵蛸各 12 克，台乌药 10 克。上药

配10剂，合在一起，加水煎煮3次，滤汁去渣，合并三次煎液，加热浓缩，加入适量炼蜜，文火收膏。每次服1匙，1日3次，饭前，白开水送服。或购市售“十全大补膏”内服。

6. 遗尿有什么膏方可治？

遗尿是指3岁以后，夜间还有无意识的排尿。遗尿可分原发性与继发性两种。原发性遗尿是儿童从未建立过对排尿的控制；而继发性遗尿是儿童期曾经一度能自行控制排尿，以后又发生遗尿。继发性遗尿通常由器质性疾病引起，应及时去医院的有关专科就诊。对于原发性遗尿病人，可以采取针灸治疗，并用中药制成膏剂内服配合治疗。可用经验方（选自《临证会要》）

处方、制法及服法：肉桂7.5克，熟地75克，山萸肉50克，怀山药75克，建泽泻、粉丹皮、白茯苓、熟附片、菟丝子、补骨脂、桑螵蛸、益智仁各50克，覆盆子75克，煅龙牡粉各75克。上药加水煎煮2次，第一次3小时，第二次2小时，滤汁、澄清、去渣，合并药汁，加适量蜂蜜拌和，文火炼制成膏。儿童每服1匙，1日2次。成人每服2匙，1日2次，每次空腹，白开水送下。

7. 慢性肾炎有哪些基本特点？用什么膏方治疗？

肾脏，俗称“腰子”，是形成尿液、调节体内水分的重要器官。日常生活中，一般所讲的“腰子病”，实际上大多指的是肾小球肾炎。这种炎症不象肾盂肾炎那样，由病菌直接引起，而是人体对包括细菌在内的某些致病因素的免疫反应所致。不同类型的肾炎以及同一类型肾炎的不同阶段，可有各

种不同表现，而蛋白尿、血尿、水肿、高血压和不同程度的肾功能损伤等，则是它们的共同表现。尤其是蛋白尿，为肾炎基本特点。内服中药膏剂可以改善肾功能和全身状况，可采用“白扁豆膏”（选自《临证会要》）。

处方、制法及服法：白扁豆500克，红饭豆（即赤豆）250克、焦白术、白茯苓、熟附片、泽泻、麻黄、桂枝、炒白芍、炒黄柏、车前子、木通、陈皮各60克，炒知母、炒地肤子、炒麦芽、甘草、细辛、干姜各30克，干廔虫（土鳖）、干蜈蚣（土狗）各36个。共炒，以白扁豆焦枯为度，研极细末，每100克药粉加200克炼蜜拌和成膏。每次服1匙，饭前空腹服，少量白开水送下。

8. 什么叫肾病综合征？用什么膏方治疗？

肾病综合征，是由肾脏病变而出现的一类综合症候群。多数由慢性肾小球肾炎演变而来，也有因其他疾病引起的。本病的诊断主要有四大特点：①高蛋白尿（每日 >3.5 克），②低蛋白血症（血浆白蛋白 <3 克%），③高脂血症（如血中胆固醇可高达400~600毫克%或更高），④浮肿（初期以下肢为主，继则出现全身水肿）。其次，患者往往有消瘦，全身乏力，食欲不振，大便不实，面色晄白，恶心呕吐等症状。患者抵抗力很差，很容易发生感染。本病的治疗，目前多用激素或免疫抑制剂。中药制成膏剂久服可以起到扶正祛邪，提高机体抵抗能力，增加食欲，改善全身状况的作用。可用下面经验方（选自《验方》）。

处方、制法及服法：炙黄芪15克，炒党参15克，炒白术9克，炙升麻4.5克，软柴胡4.5克，当归身9克，陈皮

9 克，淡干姜 6 克，炙甘草 9 克，粉萆薢 9 克，台乌药 9 克，益智仁 9 克，石菖蒲 6 克。上方配 10 剂，合在一起，加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并三次药汁，加热浓缩，再加适量炼蜜和匀，文火收膏。每次服 1 匙，1 日 2 次，白开水送服。

9. 什么叫慢性前列腺炎？用什么膏方治疗？

慢性前列腺炎是一种常见的“男子病”。前列腺形如栗子大小，重不过 20 克左右，位于男子盆腔中，包绕在后尿道周围。前列腺炎在青、壮年男子中发病率很高，得了此病所产生的症状是很痛苦的，如：下身不适，尿道口经常有白色混浊液滴出，肛门与会阴部隐痛，排尿有灼痛感等。病情严重者还有腰酸、腰痛、头昏、眼花、失眠以及阳痿、早泄等，少数可影响到性功能。对于慢性前列腺炎的治疗，医生和病人常常无可奈何。除按摩、理疗及某些药物等综合治疗外，如选用清热解毒、活血化瘀的中药制成膏剂内服，有一定疗效。用经验方（选自《袖珍中医处方》）。

处方、制法及服法：细生地 15 克，忍冬藤 30 克，石苇 15 克，木通 9 克，皂角刺 5 克，台乌药 10 克，滑石 9 克（包煎），甘草梢 6 克，王不留行 15 克。上药配 5 剂或 10 剂，混合在一起，加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并 3 次药液，加热浓缩，再加适量白糖，文火收膏。每次服一匙，1 日 3 次，饭前白开水送服。

10. 遗精或滑精用什么膏方治疗？

男子进入青春期，有 80% 的人会出现遗精，这是性成熟的一种标志。各人的遗精次数可以不同，有的人一周 1~2 次，

有的人一、二个月一次，这都属于正常范围。倘若遗精现象过于频繁，如一、二天一次或几次，这就不正常了。有梦而遗精的叫“梦遗”，无梦而遗精甚至清醒时精液自出的，称为“滑精”。遗精、滑精实际上是一种病，只是程度轻重不同。过多的遗精，常并见头昏、精神不振，腰腿酸软，失眠等症。可用中药制膏内服，如“樱蜜膏”（选自《全国中药成药处方集》）。

处方、制法及服法：金樱子、何首乌各500克。上2味药煎熬成汁，每100毫升加蜜200克，文火收膏。每次服15克，白开水送服。也可用“水陆二仙膏”（见“尿失禁”条）治疗。

如滑精严重，可用下方（选自《临证会要》）。

处方、制法及服法：五倍子500克，煅牡蛎180克，茯苓、萆薢各120克，莲心、金樱子、五味子、益智仁、煅龙骨各60克。上药加水煎煮3次，滤汁去渣，合并3次药汁，加热浓缩为清膏。再加入适量炼蜜，文火收膏。每次服1匙，1日3次，饭前，白开水送服。

11. 阳痿选用什么膏方治疗？

人类为了繁衍后代，须求偶婚配。所以性功能是本能，性神经衰弱或某些慢性虚弱性疾病引起阳事不举或举而不坚的病证，即阳痿。阳痿一般分器质性和精神性两种。器质性阳痿较少，也不易治愈；精神性阳痿往往占阳痿患者中90%以上，主要是由于大脑皮层对勃起中枢过分抑制引起。此类患者大多可以治好。中医学认为阳痿大多由肾虚、命门火衰所致，正如明代著名医家张介宾所说“火衰者十居七八”。患者除阳痿外，多同时兼见面色晄白，头晕目眩，精神萎靡，

腰膝酸软，形寒肢冷，舌质淡白，脉多沉细。可选用温肾助阳类中药制成膏剂内服，如“狗肾膏”（选自《丸散膏丹大全》）。

处方、制法及服法：狗肾 500 克，洗净切碎，加水煎煮，浓煎成膏，冰糖熬汁，加入收膏。每次服 6 克。黄酒燉服。也可自购市售“参鹿补膏”（《实用中成药手册》）内服。

12. 男子不育(精子异常)用什么膏方治疗？

据统计，不育夫妇中由于男性精子异常而不育者，占30%左右。其中包括少精、精子活力差、死精、无精等。中医学认为男子不育多属肾阳虚衰，多数患者常兼见面色晄白、怕冷、手足发凉、腰膝酸软，或见大便稀溏、小便清长等症。可选用益肾温阳类中药制成膏剂内服，如用经验方（选自《大众医学》）

处方、制法及服法：淫羊藿、韭子、炮附子各30克，石斛18克，菟丝子、肉苁蓉各35克，覆盆子、桑寄生各18克，怀牛膝15克，蚕蛾30克，鹿角胶90克。加减法：无精子症，上方淫羊藿改为100克，蚕蛾改为60克；死精子症，上方蚕蛾剂量改为60克，并加阳起石30克。上方除鹿角胶外，余药加水煎煮3次，滤汁去渣，合并滤液，浓缩为清膏，将鹿角胶加酒隔水炖烊，冲入清膏和匀，再加适量炼蜜收膏。每次服9克，1日2次，白开水冲服，治妇女不孕症的“河车膏”，对男子体虚不育者，也有效。

五、神经、内分泌系统疾病

1. 什么叫“甲亢”？用什么膏方治疗？

“甲亢”的全名是“甲状腺功能亢进症”。本病是由于人体甲状腺分泌了过多的甲状腺激素，并出现甲状腺肿大、心动过速、神经过敏、食欲旺盛、但体重反而减轻，眼球突出、烦热、汗多等症状的一种内分泌疾病，中医将它列入瘰瘤类疾病。中医中药治疗“甲亢”由来已久。古代医家认为“瘰”是由于忧思郁怒，肝郁气滞引起痰、湿凝聚而成。近年来进一步研究得知，本病发病主要原因是气阴不足。故治疗时，应针对本病气阴不足与痰湿凝聚，治拟益气养阴，佐以理气化痰。坚持服药半年至一年，常能取得良好效果。可用经验方（选自《大众医学》）。

处方、制法及服法：党参 150 克，黄芪 450 克，首乌 120 克，白芍 120 克，夏枯草 200 克，制香附 100 克。上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并 3 次煎液，加热浓缩为清膏，再加适量冰糖，文火收膏。每服 15 克，1 日 2 次，白开水冲服。

2. 甲状腺肿大用什么膏方治疗？

甲状腺肿大，又称“大脖子”病，是由饮食中含碘不足或心情抑郁、气滞痰凝而成。此病好发于青年，女多于男。其主要症状是颈部一侧或两侧呈弥漫性肿大，或肿势由轻到重，边缘不清，皮色如常，无疼痛，按之质软。少数过于肿大者，

可呈下垂状或向四周发展。病情严重者可出现压迫症状，使呼吸不利，发音嘶哑等。平时除增加含碘食品，保持心情舒畅外，可选用软坚散结、化痰散瘰类中药制成膏剂内服。可用“夏枯草膏”（选自《医宗金鉴》）。

处方、制法及服法：夏枯草 500 克，京元参、昆布各 100 克，象贝母、桔梗、甘草、当归、白芍、川芎、红花、香附各 50 克，陈皮、乌药、僵蚕各 30 克。上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并 3 次药液，加热浓缩为清膏，每 100 克清膏加炼蜜 200 克和匀，文火收膏。每服 10 克，1 日 2 次，白开水冲服。也可以单用夏枯草与蜂蜜制成膏剂久服。

3. 糖尿病有什么特点？用什么膏方治疗？

糖尿病是一种以糖代谢紊乱为主的常见的慢性内分泌和新陈代谢疾病。如果治疗得当，患者可以转危为安；如果不及及时治疗，病情就会恶化，甚至死亡。糖尿病有三多一少的特点，即多饮、多食、多尿和体重减轻的症候。尿糖检查呈阳性，但在部分老年糖尿病患者中，三多一少症状可不明显，尿糖检查也可为阴性。老年人如果有疲乏无力、白内障、周围神经炎、久治不愈的疮疡等症，应及时检查血糖、葡萄糖耐量试验等项目，以免漏诊。中药制成膏剂内服可稳定病情，控制病情发展，可用“参麦膏”（选自《中医常用效方》）。

处方、制法及服法：党参 90 克，天麦冬 270 克，细生地 360 克，山萸肉、枸杞子各 180 克。上药加水，煎煮三次，滤汁去渣，浓缩成清膏。每服 9 克，1 日 3 次，白开水冲服。据有关药理研究证实：本方之党参、生地、天麦冬、山萸肉、枸杞子均有降低血糖作用，可长期服用。如配合饮食控制，

适当锻炼身体，对防治老年糖尿病有相辅相成之效果。

4. 什么叫尿崩症？用什么膏方治疗？

尿崩症有中枢性和肾性两种。中枢性尿崩症与颅内肿瘤或脑部感染等有关，由下丘脑——垂体后叶病变，造成抗利尿激素分泌和释放减少所致。肾性尿崩症与遗传有关，由于肾脏病变使肾小管对抗利尿激素不敏感而引起。尿崩症的发病以儿童和青年居多，其他年龄也可发生。其主要症状是多尿，一昼夜可以多达4~6升以上，甚至达10~12升。每天饮水甚频，总是与尿量相当。如限制喝水，尿量往往仍多，会引起严重失水，患者感到非常口渴，并有头痛，疲乏，浑身痛，体重减轻，便秘及心动过速等症。如再不予饮水，会引起精神失常，循环障碍，甚至休克。实验室检查，尿液比重低，一般在1.006以下。对于本病，中医学认为多与“肾虚”有关，归在“小便不禁”范畴。可选用温肾涩精类中药制成膏剂调治。可用经验方（选自《袖珍中医处方》）。

处方、制法及服法：细生地12克，大熟地12克，生龙骨30克，煅牡蛎30克，山萸肉12克，桑螵蛸12克，炒黄柏10克，仙灵脾12克，鹿角片12克，甘草6克。上方配10剂，混合在一起，加水煎煮3次，滤汁去渣，合并3次药液，浓缩后加适量炼蜜，和匀，文火收膏。每服15克，1日2次，白开水送服。

5. 神经性头痛是怎样引起的？用什么膏方治疗？

日常生活中，不良的情绪，如紧张、焦虑等可以引起头痛。著名研究头痛的专家马丁博士说：“这种头痛常与人们互

相间的矛盾、不如意、羞怯和内心恐惧心情有关。”据研究，紧张、激动的情绪，可使头部某些动脉血管发生痉挛，这些发生痉挛的血管平滑肌不可能长时间收缩，当它疲劳后放松、扩张时，即引起头痛。此外，肌肉收缩时可使供应肌肉的血流减少，局部发生缺血，也会导致头痛。头部一侧或两侧交替发生疼痛，就是偏头痛。对于头痛，除进行适当的运动以解除身心紧张，预防或减少头痛发作外，也可服用中药制成的膏剂，如“菊花茶调膏”（选自《医方集解》）有一定疗效。

处方、制法及服法：川芎60克，薄荷50克，菊花60克，荆芥、羌活、防风、白芷、僵蚕、甘草各30克，细辛20克。上药加水煎煮2次（薄荷须另煎，水沸后几分钟即可，滤出药汁），过滤药汁、去渣，合并二次煎液（薄荷煎液也合入），加热浓缩为清膏，再加适量炼蜜和匀，文火收膏。每服1匙，1日2次，白开水冲服。

6. 三叉神经痛有哪些症状？用什么膏方治疗？

三叉神经痛多见于中、老年人，疼痛发生于一侧面部的颊部三叉神经分布区，病人说话、进食、洗脸、刷牙等牵动局部皮肤时也会引起疼痛发作。疼痛呈阵发性、电击样、刀刺样、火灼样剧烈疼痛，有的睡中痛醒，病人十分痛苦。用下方（选自《袖珍中医处方》）制成膏剂内服，有效。

处方、制法及服法：羌活10克，细辛3克，川芎9克，天麻10克，白芷9克，僵蚕10克，制川乌6克，制草乌6克。上方根据病情需要，配10剂或15剂，混合在一起，制成膏剂。每服9克，1日2至3次，白开水冲服。有散寒通络，活血行气止痛作用。

7. 面瘫是怎么回事？用什么膏方治疗？

人的喜怒哀乐是通过面部表情肌的活动来表现的。表情肌受面神经的支配，如果面部神经损伤或表情肌本身有了病变，就会造成面肌瘫痪，简称面瘫。病人常因受凉或突然被风吹而发病，面瘫患者不但无法表现其喜怒哀乐，同时还有口眼歪斜、瘫侧面部麻木，眼睑不能闭合，口角下垂，不自觉地流口水等。对面瘫的治疗应及时，治疗越早，疗效愈好，治愈的可能性愈大。治疗方法最好采用针药并施，即在针灸治疗的同时，抓紧时机选用中药制成膏剂内服，可用经验方（选自《临证会要》）。

处方、制法及服法：明天麻、香白芷、炒白术、台乌药、紫苏、宣木瓜、细青皮、炙甘草各 10 克，党参 15 克、沉香 1.5 克、生姜三片。上方配 10 剂，合在一起，加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并 3 次药液，加热浓缩为清膏，再加适量炼蜜，和匀，文火收膏。每服 1 匙，1 日 3 次，白开水冲服。

8. 坐骨神经痛用什么膏方治疗？

坐骨神经痛是一种常见的疾病，属中医“痹证”范围。本病常给患者的生活与工作带来不便。坐骨神经是支配下肢的主要神经干，是人体内最大的一支周围神经。坐骨神经痛多由腰部扭伤或举重引起椎间盘突出，压迫该侧腰骶神经根引起。不少患者常感疼痛从腰部向大腿后侧的腘窝、小腿外侧向远端放射，呈烧灼样或刀刺样，持续或阵发性疼痛。服用中药膏剂对本病有效，可用经验方（选自《袖珍中医处方》）。

处方、制法及服法：桑寄生 30 克，独活 9 克，鸡血藤 15

克，川牛膝12克，制川乌9克，细辛3克，桂枝9克，甘草4.5克。上方配10剂，将药混合在一起，加水煎煮3次，滤汁去渣，合并3次药汁，加热浓缩，再加适量炼蜜和匀，文火收膏。每服1匙，1日2次，白开水送服。如伴麻木，上方加蜈蚣二至三条；疼痛剧烈，加三七粉40克，调入膏中。

9. 何谓美尼尔氏综合征？用什么膏方治疗？

美尼尔氏综合征由内耳前庭感受器的功能障碍所致，表现为急性阵发性眩晕。发作时，患者感觉房子或周围景物旋转，目不能睁，站立不稳，并伴有恶心呕吐、面色苍白、出冷汗、耳鸣、耳聋等症状，持续数分钟、数小时或数天，缓解期长短不等，病情反复，可迁延多年。可选用平肝化痰止眩的中药制成膏剂调治，如用加味“半夏白术天麻汤”（选自《袖珍中医处方》）作为膏方。

处方、制法及服法：制半夏50克，白术100克，天麻50克，泽泻120克，陈皮50克，生牡蛎200克，钩藤75克。先将牡蛎单独煎煮3小时，共2次，滤出药汁，合并在一起，将钩藤单独加水煎煮20分钟2次，滤出药汁且合并在一起，余药加水煎煮2次，取汁，将药汁合并，牡蛎、钩藤之药汁也并入，沉淀，取上面清汁加热炼制成清膏，再加入适量白糖，文火收膏。每服1匙，1日2次，白开水冲服。

10. 什么叫癫痫？如何选用膏方治疗？

癫痫俗称“羊癫风”。一般认为是由脑细胞异常放电所致。病人表现为突然神志丧失，跌倒在地，痰涌气促，喉间作响，有的发出类似猪、羊的叫声。同时，全身肌肉痉挛，呼吸暂

停，历时几秒至几十秒，紧接着出现了强直性抽搐，口吐白沫，有的大小便失禁，持续二、三分钟。此后神志渐渐恢复，呼吸渐趋平稳，面色也恢复正常，患者发作后常感头痛、头昏、全身酸痛乏力，对发作情况毫无记忆。癫痫发作轻者，可表现为患者突然停止活动，中断谈话，双目凝视，手中的东西可能掉地，这种短暂的神志丧失，仅几秒钟即止，患者清醒后，对发作情形不能记忆。

本病在发作期，可按下列经验方(选自《临证会要》)选配中药制成膏剂内服，以平肝、熄风、滋阴潜阳、祛痰利窍、镇静安神。

处方、制法及服法：丹参、茯苓、远志、龙齿、石菖蒲、陈皮、白术、枳实、木香、朴硝、青礞石、黄芩、法半夏各30克，制大黄、甘草、胡黄连、胆星各15克，沉香10克，煅磁石60克。上药加水煎煮3次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩，加入适量炼蜜，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送服。抽搐较甚者，上方加全蝎10克，钩藤30克。平时癫痫不发作时，可长服二陈丸和河车大造丸，以健脾化痰、益气养血、扶正固本，有助于减少、减轻本病的发作。

六、骨、关节系统疾病

1. 什么叫肩周炎？用什么膏方治疗？

中、老年人中常发生肩关节不能抬起，肩臂疼痛，胳膊不能上举，甚至影响梳头、穿衣等日常生活的病症，即肩周炎。本病病程长，甚至数年不愈。这种病多见于四五十岁的

人，所以俗称“五十肩”或“漏肩风”。有人认为其发病与内分泌紊乱有关。人到中年以后，气血渐衰，筋骨老化，关节囊、肌腱等软组织容易发生慢性炎症和粘连，加之风、寒、湿邪侵袭，使肩关节发生退行性病变。由于肩部疼痛剧烈，病人多尽量避免作肩臂部活动，所以肩关节就越来越僵硬，肩部肌肉也会明显地萎缩，给生活和工作带来困难。关于肩周炎的治疗，除针刺、推拿、理疗等方法外，对于肩部疼痛较剧者，可按下列经验方(选自《家庭医药指南》)配药自制膏剂内服，有助于减轻症状，加速痊愈。

处方、制法及服法：桑枝、威灵仙、豨莶草、黄芪各30克，赤芍、秦艽各15克，甘草5克。上方配10剂，将药合在一起，加水煎煮3次，滤出药汁，去渣，合并3次药汁，加热浓缩为清膏。每服1匙，1日3次，饭后白开水送服。

2. 什么叫颈椎病？如何选用膏方治疗？

颈椎病是指由于颈椎椎间盘变性，颈椎骨质增生而引起一系列颈椎综合症状的病，多发生于长期伏案工作的人。由于长期单一的低头伏案姿势，颈椎负担过大，故颈椎间盘、韧带和关节囊等软组织逐渐发生损伤变性，损伤的软组织变得松弛，引起颈椎不稳定，导致骨质增生，形成骨刺。一些中、老年人常诉说颈部发僵，颈部活动时有弹响声，或颈肩部疼痛，有的还放射到头枕部或上肢；少数患者自觉眩晕，甚或猝倒；有的面部一侧发热，出汗异常；严重者可出现双下肢痉挛，行走艰难等症状。临床上，颈椎病分五型，即颈肩型、神经根型、脊髓型、椎动脉型及交感神经型。病情严重或症状持续时间太久者，需作进一步检查，如脊髓造影、CT扫

描等。如检查发现有脊髓受压，需考虑手术治疗。一般治疗除针刺、牵引、理疗等方法外，内服中药膏剂可以缓解症状，缩短病程。可按白芍木瓜汤(选自《养生寿老集》)加减选用中药制成膏剂内服有较好疗效。

处方、制法及服法：白芍30克，木瓜、甘草各12克，鸡血藤、威灵仙、鹿衔草各15克，葛根12克，仙灵脾10克。上方配10剂，合在一起，加水煎煮3次，滤汁，去渣，合并3次药液，加热浓缩，加适量炼蜜，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送服。

3. 什么叫骨质疏松症？用什么膏方防治？

骨质疏松症是老年人的常见病。绝经后的妇女更为多见。骨质疏松指的是单位体积内骨组织量减少，但成分正常，与钙化发生障碍的骨质软化症不同。本病主要症状是背痛，多见于胸段和下腰段，X线片上可见有脱钙现象。一般情况下无明显临床症状，但骨的脆性增高，患者容易发生骨折。其发病与缺少蛋白质、钙的摄入，或与代谢障碍，体力活动少，营养不良以及绝经早等因素有关。中医学认为本病多属肾虚。骨质疏松症的预防，一方面须注意饮食调养，多吃含蛋白质和钙的食品，如豆制品、牛奶、瘦肉、鸡蛋、骨头汤、鱼类等，也可经常进食大豆粉、黑芝麻粉、山药、胡桃仁、百合等；另一方面，选用中药制成膏剂常服以健脾补肾，对治疗骨质疏松症有一定疗效。可按经验方(选自《临证会要》)选配中药。

处方、制法及服法：制首乌120克，川牛膝90克，菟丝子、炒杜仲、潼蒺藜、桑椹子、补骨脂、益智仁、巴戟天、

全当归、白茯苓、续断、白术、狗脊、鹿角霜各60克。上药加水后煎煮3次，滤汁，去渣，合并药液，加热浓缩，加入适量炼蜜，文火收膏。每服1匙，1日3次，饭后白开水送服。

4. 什么叫腰肌劳损？如何预防？什么膏方可治本病？

由于长期劳累引起的慢性腰痛，称为“腰肌劳损”。这种腰痛常因腰部感受寒湿，或长期从事固定姿式（如弯腰、久坐、久站等）的工作，腰背肌肉、韧带、关节囊等软组织长期处于紧张状态以致发生退行性变化，失去弹性而引起腰痛。

预防腰肌劳损不外下列几方面：避免力所不及的负重劳动，抬举重物时要注意掌握正确的姿势；从事弯腰动作者，应加强腰部肌群的弹性练习，经常做腰部前后俯仰和转体侧弯等体操动作；训练后要避免腰部受凉，不要坐在风口或阴凉的地方。

腰肌劳损发生后应进行积极治疗，如针灸、推拿、理疗、局部封闭等。也可选用活血化瘀类中药制成膏剂内服，有祛瘀止痛作用。可选用“加减身痛逐瘀汤”（选自《常见病中医证治》）。

处方、制法及服法：当归、赤芍、川芎、桃仁、元胡各120克，穿山甲、土鳖虫各60克，没药60克，牛膝100克，甘草50克，三七粉30克。上药除三七外，加水煎煮3次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩，加入适量炼蜜，拌入三七粉，和匀，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送下。

5. 脚后跟为什么会痛？怎样选用膏方治疗？

足跟部由足跟脂肪垫、跟腱、跟骨滑囊和足骨等组成，这些部位的任何部分发生病变都可引起足跟痛。足跟部是身体承受力最大的部位，容易遭受劳损性伤害。中、老年人的足跟痛多与跖筋膜炎有关。跖筋膜在足底，呈扁平状，附着在跟骨前缘。跖筋膜劳损、水肿、增厚并发生慢性炎症，引起跟骨附着处增生，即骨刺。每当走路多、劳累后即疼痛，休息后好转。跟骨前缘有压痛。其次，由于鞋不合脚引起“跟骨后滑囊炎”，或经常跑步而又不做准备活动的人易发“跟腱周围炎”，或由外伤或慢性炎症形成“触痛性跟骨垫”，也会引起足跟痛。较少见的是由跟骨本身病变如结核、肿瘤、类风湿等所致者。

跟骨痛患者首先应找出病因。如果发现是跟骨骨刺，不必紧张，除采用理疗、局部封闭等疗法外，内服中药膏剂有一定疗效。中医学认为脚后跟痛多属肾虚，可用补肾活血类中药制成膏剂，如“加味济生肾气汤”（选自《家庭保健300问》）。

处方、制法及服法：川牛膝9克，车前子9克，生地24克，山药12克，山萸肉12克，茯苓9克，丹皮9克，泽泻9克，桂枝6克，元胡9克，生薏米20克。上药配10剂，将药合在一起，加水煎煮3次，滤出药汁，去渣，合并3次药汁，加热浓缩，加入适量炼蜜，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送服。

此外，可用茄子根适量，水煎外洗，有一定疗效。

6. 什么叫肋软骨炎？用什么膏方治疗？

肋软骨炎在医学上又称“泰齐氏病”或泰齐氏综合征。好发于女性，尤其是青年女性。原因尚不清楚，一般认为是创伤或机械性应力所致。部分学者认为与病毒感染有关，也有无任何原因而发病的。不少患者常因突然感到胸肋部疼痛而就诊。疼痛可为多发，也可见一侧发病的，单发者多见于第二肋软骨。发病时，肋软骨肿胀、疼痛，可以摸到硬性肿块，局部皮肤温度较高，病程长短不一。一般以对症治疗为主，如热敷、服止痛药，也可用中药制成膏剂内服以减轻疼痛，使肿块缩小以至消失。可用经验方(选自《外科手册》)。

处方、制法及服法：柴胡、黄芩、姜半夏、川楝子、延胡索、炒枳壳，广郁金、川芎、香附、赤芍、白芍、甘草各9克。上药配6剂至8剂，合在一起，加水浸一夜，煎煮3次，滤汁去渣，合并3次药液，加热浓缩为清膏。每服9克，1日3次，白开水冲服。

7. 风湿性关节炎有哪些表现？用什么膏方治疗？

风湿性关节炎是一种较为顽固的疾病。其病因目前还不十分清楚。一般认为其发病与链球菌感染有关，多数病人在发病前一个月内，常有过扁桃体炎、咽喉炎等溶血性链球菌感染病史。本病在寒冷、潮湿地区发病率较高，好发于儿童及青少年，女性较多。

其症状特点是：多数病人在膝、踝、肘、腕等关节有肿胀、疼痛，痛有游走性，与天气变化有关。有的患者出现发热、皮肤环形红斑；也有的皮下出现黄豆大的结节；严重者

出现关节挛缩僵硬，生活不能自理。本病极易与类风湿关节炎混淆，后者多表现为左右对称发生，主要侵犯指、趾等小关节，且常见关节变形肿胀。中医将风湿性关节炎归入“痹证”范畴。《内经》云：“风寒湿三气杂至，合而为痹。”偏于风者，以走窜疼痛为特点，故称行痹；偏于寒者，疼痛较剧烈，故称痛痹；偏于湿者，病情顽固缠绵，称其着痹。关节红、肿、热、痛者为热痹。本病在临床治疗时常分风寒湿痹和风湿热痹两大类，中药对风湿性关节炎有较好疗效。

如为风寒湿痹，可按蠲痹汤(选自《医学心悟》)加减配方自制膏剂内服。

处方、制法及服法：羌、独活各10克，秦艽、当归各12克，川芎、桂枝各8克，海风藤15克，没药、甘草各5克。上药配10至15剂，合在一起，加水煎煮3次，滤汁去渣，合并药汁，加热浓缩为清膏。每服1匙，1天3次，白开水送下。

如为风湿热痹，可按白虎加桂枝汤(《选自《金匱要略》)加减配方自制膏剂内服。

处方、制法及服法：生石膏30克，知母、黄柏、丹皮、赤芍各9克，忍冬藤25克，苍术12克，秦艽、威灵仙各15克，桂枝3克。上药配8至10剂，合在一起，加水煎煮3次，滤汁去渣，合并药汁，加热浓缩，加入适量炼蜜，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送下。

妇 产 科

1. 月经过少有哪些原因引起？用什么膏方治疗？

月经周期基本正常，月经总量少于50毫升，或行经时间缩短，少于2天者，为“月经过少”。月经过少常见于下列几种情况：①素体虚弱或久病伤阴或大失血之后，气血不足，使血海空虚，②情志抑郁或多怒，使气滞血瘀而血行不畅致经行量少，③坐卧湿地，饮食生冷，使寒凝于体内而气血运行不畅，也会使月经量过少。经量过少可用“养血当归膏”（选自《中药成方集》）以补血调经。

处方、制法及服法：当归500克，党参、白芍、熟地、黄芪、茯苓各120克，川芎、炙甘草各60克，阿胶500克。上药除阿胶外，余药加水浸一夜，然后煎煮3次，滤汁去渣，合并3次煎液，加热浓缩为清膏。将阿胶加酒适量，隔水燉烊，和入上述清膏，调匀，加适量蔗糖，文火收膏。每服9克，1日3次，白开水送服。

2. 什么叫痛经？用什么膏方治疗？

大多数女子月经来潮时没有明显的不适，仅有少数人可因盆腔充血、子宫收缩而感到小腹有胀坠感，以及轻微的腰酸，这些都属于正常的月经期反应。如果在经期前后或月经期间发生明显的小腹部疼痛，腹痛剧烈时，面色苍白、手足冰冷、冒冷汗、恶心呕吐，甚至昏厥。一般要到经量增多后，

腹痛才能缓解，这就是痛经。常靠吃止痛片是不解决问题的。除经期注意保暖，避免剧烈运动外，经前一周，如能服用“益母膏”（选自《实用中成药手册》）有调经止痛作用。

处方、制法及服法：益母草 100 克，当归、白芍、党参、川芎、白术、茯苓、丹参、熟地黄、香附、红花、甘草、桃仁、蒲黄、五灵脂、木香各 50 克。加水煎煮 3 次，滤汁，去渣，合并滤液，澄清，去沉淀物，将药液加热炼制成清膏，每加红糖适量收膏。每服 1 匙，1 日 3 次。白开水冲服。

3. 什么叫“经前期紧张症”？用什么膏方治疗？

不少女同志每逢月经来潮前一周左右，心情忧郁、烦躁、想发脾气、注意力不集中，并伴有乏力、疲倦、失眠等不适症状，这在医学上称为“经前期紧张症”。有些人还有手足或颜面浮肿、腹胀、腹痛、乳房胀痛等。这种经前身体不适及情绪变化与体内的雌激素量增高并影响神经内分泌有关。可于经前一周熬制“归芍膏”（选自《中国膏药学》）内服，可起到减轻或消除这一病症的作用。

处方、制法及服法：当归 60 克，白芍 60 克，柴胡 50 克，白术 60 克，茯苓 60 克，甘草 90 克，薄荷 60 克。如心烦、口苦、小便颜色偏黄者，可于上方加丹皮、山栀各 60 克。上药加水煎煮，滤汁去渣，加热药汁，使浓缩为清膏，再加冰糖适量收膏。每服 9 克，1 日服 2 次，温开水调服。

4. 什么叫“功血”？可用膏方治疗吗？

月经是子宫内膜在卵巢性激素作用下发生的周期性子宫出血。正常情况下，下丘脑—垂体—卵巢三者相互影响、相

互制约，以维持动态平衡。这是月经周期调节的主要环节，这几个环节又受大脑皮层控制。如果从大脑皮层到卵巢，任何一个环节发生障碍，都会破坏平衡，导致卵巢功能紊乱，从而影响子宫内膜，引起功能性子宫出血。本病多发生于青年女性，故又称“青春期功血”。其主要症状是月经周期紊乱，经期长短不一，有的大量出血，有的不规则出血。如此反反复复，日久可引起贫血以及各种其他症状，如：头昏、耳鸣、记忆力减退、疲乏、心悸、气短、食欲不振等。本病可选用“女经膏”（选自《江苏省药品标准》），以滋阴清热、养血调经。

处方、制法及服法：炙鳖甲 100 克，地骨皮、大白芍、制香附、川续断、当归、青蒿、茯苓、黄芩、丹参、焦白术、南沙参、陈阿胶各 60 克，炙甘草 20 克，益母草、杜仲各 40 克，熟地黄、雪梨清膏各 80 克，川芎 30 克。上药除阿胶、梨清膏外，余药加水煎煮 3 次，每次 2 小时以上，滤汁去渣，合并 3 次药液，加热浓缩，再将阿胶熔化后加入，最后加入梨清膏和炼蜜 1300 克，浓煎收膏。每服 10 克，1 日 2 次，白开水冲服。

5. 何谓闭经？用什么膏方调治？

正常育龄妇女，如果没有怀孕，都应按一定的周期来月经。可是，有些超过 18 岁的姑娘，月经从未来过，这就叫原发性闭经；也有一些妇女，过去有过正常月经，后来停止不来了，如果停经在三个月以上者，就称为继发性闭经。闭经的发生也因内分泌系统的某些疾病所致。可用养血活血调经类中药制成膏剂内服，如“鸡血藤膏”（《选自《中国膏药学》》）。

处方、制法及服法：鸡血藤 500 克或 1000 克，切片，加

清水浸一宿，煎煮 3 次，滤汁去渣，合并 3 次药液，加热浓缩，加阿胶 120 克或 200 克烱化冲入，文火收膏。每服 15 克，1 日 2 次，白开水冲服（能饮酒者用酒化服，其效尤著）。

或用“益母草膏”（选自《上海市药品标准》）。用益母草 500 克或 1 000 克，加水煎煮 2 次，滤汁去渣，合并两次药液，加热浓缩，加适量红糖（或赤砂糖），文火收膏。每服 1 匙，日服 2 次，白开水送服。

6. 白带过多用什么膏方治疗？

白带是女性的正常生理现象，它有润滑阴道壁、防御“外邪”入侵的作用。白带异常可以表现在量的增多，或同时有色、质以及气味方面的改变。白带过多，如果经检查排除了感染、肿瘤等，又找不到其他明显原因时，可采取中药制成膏剂内服治疗。

如果腰酸，带下较多，色微黄而粘稠，舌苔黄腻，脉濡，多属湿热下注，可用下列经验方（选自《大众医学》）制膏内服。

处方、制法及服法：苍白术各 42 克，黄柏 42 克，茯苓 63 克，甘草 21 克，椿根皮 84 克，川断 63 克，杜仲 63 克。上药加水浸泡一夜，煎煮 3 次，滤汁去渣，合并 3 次药液，加热浓缩，加适量砂糖，和匀，文火收膏。每服 9 克，1 日 2 次，白开水送服。

如果头昏、腰酸、气短乏力、带下如水，或有面目轻度浮肿、苔薄、脉虚者，为脾虚湿胜，可用下列经验方（选自《大众医学》）制膏内服。

处方、制法及服法：党参、白术、菟丝饼、茯苓、川断、杜仲各 63 克，山药、椿根皮各 84 克，炙甘草 21 克（制法、服

法同上)。

7. 白带过少用什么膏方治疗？

白带过少，一般认为由内分泌功能不足引起，如卵巢功能衰退，性激素水平低下等。中医学认为带下过少多属肝肾亏损、精血不足、胞脉失养、津液不能濡养阴道所致。临床上常见于先天肾精不足或后天孕产太多(包括人工流产)，哺乳时间过长或长期患慢性消耗性疾病或内分泌疾病，如糖尿病，甲状腺功能低下等患者。中药对本病有一定疗效，可选用滋肾益精、养血润燥类中药制膏，于月经干净后开始内服。可用经验方(选自《大众医学》)。

处方、制法及服法：何首乌 200 克，女贞子 200 克，枸杞子 140 克，旱莲草 200 克，山萸肉 80 克，大麦冬 80 克，菟丝子 100 克，巴戟天(或淫羊藿) 100 克，陈皮 15 克。上药加水浸一夜，煎煮 3 次，第一次 3 小时，第二、三次分别 2 小时，滤汁，去渣，合并 3 次煎液，加热炼制浓缩为清膏，再加适量炼蜜，文火收膏。每服 1 匙，1 日 3 次，白开水送服。

8. 习惯性流产用什么膏方调治？

连续数次流产为习惯性流产，中医谓之“滑胎”，并认为本病多与素体亏虚，不能养胎有关。一般来说，怀孕三个月前后发生腹痛、腰痛、阴道出血，如能及时采取适当治疗措施和休息，其胎尚可保住；如腹中剧烈阵痛，阴道出血多者，则其胎难保。有习惯性流产的患者，如果在怀孕前后常服补气养血、益肾固胎类中药制成的膏剂，有一定效果。可用“乌鸡白凤膏”(选自《临证会要》)。

处方、制法及服法：红参 30 克(另煎取汁，然后加入药汁中)，龟板胶、鹿角胶各 60 克(另加酒炖烱后加入药汁中)，党参、当归、杜仲、生地、熟地、天冬、麦冬、黄芪、续断、白术、茯苓、白芍、狗脊、潼蒺藜、补骨脂各 60 克，炒黄芩、生甘草、砂仁、川芎各 30 克，龙眼肉 240 克。上药除红参、龟板胶、鹿角胶，另熬、另化外，余药共熬浓汁，去渣，取药汁候用。再加白毛乌骨鸡(俗名白凤鸡)一只，宰后，去净毛、脚爪、皮、内脏，将鸡洗净，熬取浓汁候用；再用冰糖 2 500 克，入锅内熔化，熬至滴水成珠时，即将药汁、鸡汁、红参、龟、鹿二胶汁同时加入冰糖锅内，熬至滴水不散，收膏。用干净容器贮存，密封，埋入 3 尺深土中，去火气，七日后取出。每次 1 匙，1 日 3 次，开水化服。

9. 不孕症有什么膏方可治？

临床上一般以婚后二年未受孕者，称之为不孕症。中医认为不孕者，必见月经不调，经期或前或后，或数月一至，或一月数至，经量或多或少，经色或淡或紫，或经行腹痛，或经期前后腹痛，多由气血失调或胞宫虚寒所致。一般认为，治不孕症，首先应当调理好月经，可用“一草膏”(选自《中国膏药学》)养血调经。

处方、制法及服法：益母草 1 000 克，当归、川芎各 72 克，熟地 100 克，白芍 50 克，红糖 500 克，蜂蜜 200 克。若有形寒怕冷，经来腰腹冷痛者，加炒艾叶 50 克，炒小茴香 50 克，川桂枝 40 克，炒吴萸 100 克。先将药煎汁，再加红糖、蜂蜜收膏。每服 10 克，1 日 2 次。黄酒或白开水送服均可。

身体虚弱较甚者，用“河车膏”(选自《清太医院配方》)。

处方、制法及服法：党参、生地、枸杞、当归各100克，紫河车一具。用水煎煮三次，滤汁去渣，合并三次药液，加热浓缩，再加入适量炼蜜，文火收膏。每服3匙，每天清晨用黄酒冲服。

如果属于卵巢功能不足引起的不孕，可用下列经验方（选自《验方》）。

处方、制法及服法：党参15克，白术12克，茯苓12克，芍药9克，川芎6克，炙草6克，当归15克，熟地8克，菟丝子15克，杜仲12克，鹿角霜12克，川椒5克。上药配10剂，合在一起，加水浸一夜，煎煮3次，滤汁去渣，合并3次药液，加热浓缩为清膏。加入适量炼蜜，文火收膏。每服9克，1日3次，白开水冲服。

10. 何谓“儿枕痛”？用什么膏方可治？

产妇在分娩以后，小腹阵阵作痛，即产后腹痛，又称“儿枕痛”。多由气血虚弱或气血凝滞、运行不畅所致。可用“泽兰膏”（选自《中国膏药学》）活血行气止痛。

处方、制法及服法：泽兰30克，当归90克，川芎30克，桃仁泥15克，益母草90克，香附45克，红花30克，炙草30克，姜炭15克。上方加水煎煮3次，滤汁去渣，合并3次煎液，加热浓缩，加适量炼蜜，文火收膏。每服1匙，1日2次，温开水送服。

11. 盆腔炎有哪些症状？用什么膏方治疗？

盆腔炎是盆腔内各种器官和组织发炎的总称，分急性和慢性两类，急性盆腔炎多发生于分娩、流产、刮宫或盆腔手

术后，由于病菌直接由生殖器或间接经过血液和淋巴循环进入宫腔、输卵管、卵巢、盆腔，使盆腔感染所致。病人常表现为：高烧、寒战、恶心、呕吐，下腹部持续剧烈疼痛；白带增多，呈脓性，气秽。急性期若不彻底治愈，可转为慢性盆腔炎。慢性盆腔炎患者常有低热、疲乏无力或五心烦热，腰骶部酸疼，下腹胀疼，有时可摸到包块。患者常感不耐久立、久坐；有的月经紊乱，经量增多伴有痛经，白带增多且有臭气；有的因慢性盆腔炎引起卵巢功能紊乱，导致不孕。

本病的治疗，在急性期应及时用抗生素彻底治愈以防炎症向盆腔蔓延。中医学认为急性盆腔炎多属湿热下注所致，宜清热利湿、凉血解毒、祛瘀止痛。可按银翘红酱解毒汤(选自《妇产科学》上海中医学院编)选药制成膏剂内服。

处方、制法及服法：银花、连翘、红藤、败酱各15克、丹皮、山梔、赤芍、桃仁、薏苡仁、玄胡索各9克，川楝子、乳香、没药各6克。上方配5剂，合在一起，加水煎煮3次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩，加适量白糖，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送服。此为一个疗程，如不愈，可继续一至二个疗程。

慢性盆腔炎，多属气血不足，下焦湿热，可用地骨皮饮(选自《常见病中医证治》)加减。

处方、制法及服法：当归、丹皮、白芍各12克，生地、地骨皮、益母草各15克，川芎6克，知母、银柴胡、台乌药各10克，甘草3克，菟丝子、续断、石莲肉各12克。上方配5至10剂、将药合在一起，制法、服法同上。

12. 什么叫急性乳腺炎？用什么膏方治疗？

急性乳腺炎是乳房出现硬结，红、肿、热、痛的一种疾患。多由产后乳汁分泌过盛，一时不能排空，郁积腐败化脓而致。患者常同时有发热、寒战等症状。中医学称之为“乳痈”，认为与肝气郁结，胃热壅滞，复感外邪，经络阻滞以致乳汁不通，气血失调，遂成痈肿。可用瓜蒌牛蒡汤（选自《中医治疗学》）加减，有清胃解毒，通络消肿作用。

处方、制法及服法：全瓜蒌、牛蒡子、金银花、紫花地丁各12克，蒲公英30克，黄芩、炒栀子、连翘各10克，通草、丝瓜络、生甘草各5克。上方配5至10剂，合在一起，加水煎煮2次，滤汁、去渣，合并药液，加热浓缩，加适量白糖，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送服。如果脓肿已成，加皂角刺、穿山甲各12克，以托毒透脓，增强治疗效果。

13. 乳腺小叶增生是什么病？用什么膏方治疗？

乳腺小叶增生是中、青年妇女较常见的一种良性乳腺疾病，与卵巢功能失调有关。由于雌激素分泌过多，使乳腺管扩张成囊状，囊壁的上皮细胞增生旺盛，形成了一个或多个囊肿。从外表触摸，就象是一些小肿块。本病可用“二冬膏”（选自《张氏医通》），有一定疗效。

处方、制法及服法：天冬、麦冬各等分或各500克。加水煎煮3次，滤汁，去渣，合并3次药液，加热浓缩，再加入适量炼蜜，文火收膏。每服15克，1日2次，白开水冲服。据研究，天冬治疗乳房良性肿瘤，尤其是乳腺小叶增生，不论肿块大小，奏效迅速，大多可获治愈。

本病也可选用“蜂房膏”(选自《中国膏药学》)。有清肝散结、活血软坚作用。

处方、制法及服法：露蜂房、醋炒柴胡、广郁金、党参、茯苓、栀子、黄柏各6克，当归、杭白芍、枸杞子、焦白术、夏枯草各9克，川断、女贞子、金银花、生地各12克，天冬、蚤休、桑寄生各15克，生苡仁、玄参、生牡蛎各18克，山慈菇3克。上药加水煎煮3次，滤汁去渣。合并3次药汁，加热浓缩，再加红糖适量，文火收膏。每服15克，1日3次，白开水冲服。

14. 什么叫更年期综合征？用什么膏方治疗？

多数妇女绝经期年龄为45岁至55岁之间。女性更年期是指妇女绝经前后的一段时期。在这段时期内，性腺功能开始衰退直到完全消失，其持续时间长短因人而异，一般为8~12年。主要是卵巢功能减退、消失、逐渐萎缩，不再排卵，月经也就不再来了。由于卵巢功能改变，使内分泌系统的功能暂时失去平衡，往往可引起一系列自觉症状，如：月经失调、潮热、心悸、多汗、畏寒、头痛、头昏、情绪不稳定、抑郁、烦躁易怒以及失眠、性功能减退、记忆力下降、思想不集中等，这就是更年期综合征。对于本症的治疗，可采用浙江名老中医何任教授治疗更年期综合征的经验方（选自《大众医学》）。

处方、制法及服法：炙甘草120克、淮小麦400克，大枣100枚，百合300克，干地黄200克。上药加水煎煮2次，第一次3小时，第二次2小时，滤汁去渣，澄出药汁，加热浓缩为清膏，再加适量炼蜜和匀，文火收膏。每服1匙，1日

2至3次，白开水送下。本膏有补养心肾、安神和中作用，不仅适宜于女性更年期综合征，男性更年期综合征服之也有效。

15. 子宫脱垂用什么膏方治疗？

子宫脱垂是由于支持和固定子宫的组织松弛引起。其主要症状是：子宫从正常位置沿阴道下降至坐骨棘水平以下，甚至脱出阴道口外。根据其脱出的程度一般分为三度：Ⅰ度，子宫颈下降至坐骨棘水平以下，但不超出阴道口者；Ⅱ度，子宫颈及部分子宫体脱出于阴道口外者；Ⅲ度，整个子宫脱出于阴道口外者。子宫脱垂患者还常伴有下腹、外阴、阴道向下坠胀的感觉，腰酸背痛，于久立或体力劳动后病情加重。治疗可采取针灸、药物并施，中药膏剂内服对Ⅰ度、Ⅱ度子宫脱垂有效，可选用“枳壳膏”（选自《中药大辞典》）。

处方、制法及服法：枳壳 500 克，炙升麻、白术各150克。上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并 3 次煎汁，加热浓缩为清膏，再加适量砂糖，文火收膏。每服30克，1日 3 次，白开水送服。气虚明显者，也可服用“补中益气膏”（见“脱肛”条）。

儿 科

1. 水痘是什么病？选用什么膏方治疗？

水痘是由病毒引起的传染病，任何年龄皆可发病，但以1~6岁的小儿最为多见。四季皆可发病，以冬春两季较常见。主要是通过呼吸道传染，病毒存在于病孩的口鼻分泌物和痘

疹内，当病儿咳嗽、喷嚏时，飞沫散布于空气中，其他小孩吸入，就可能染上。病毒侵入人体后，一般要经过二、三个星期才发病，开始时患儿可出现低热、烦躁、胃口不佳、全身不适等症状。一、二天后出现皮疹，以躯干和头部为多，四肢比较少。初起为米粒大小红色丘疹，一天后发展成绿豆大小光亮的小水疱，周围有红晕，以后干燥结痂脱落。出疹多者，同一部位可见不同期的皮损，即斑疹、丘疹、疱疹及痂盖并见。小儿出水痘一般没有什么危险，痊愈后有终生免疫力，但如果出痘期间，护理不周，就有可能发生脓疱疮、眼结膜炎、肺炎、肾炎、脑炎等并发症。所以小儿出水痘时，护理工作十分重要，病孩在发热期应注意休息，多饮开水，吃易消化的食物，注意皮肤清洁，防止疱疹化脓。同时选用中药制成膏剂内服，有疏风解毒，清热除湿，减轻病情，促使早日康复的作用。

在出痘初期，出现发热、头痛、鼻塞、流涕、咳嗽，疹色红润、疱浆清亮，舌苔微黄、脉浮数等症状时，可用银翘散(选自《常见病中医证治》)加减。

处方、制法及服法：金银花、土茯苓各12克，连翘、紫草各9克，牛蒡子、薄荷、桔梗、竹叶各5克，甘草3克，上药配3至5剂，合在一起，加水煎煮2次，滤出药汁，去渣，合并滤液，加热浓缩，加适量白糖，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送服。

如果出痘后，见高热烦渴、面红唇赤，疱疹稠密、痘疹混浊或有舌溃烂、便秘、尿赤，舌苔黄燥、脉数等症状者，可用加味消毒饮(选自同上)。

处方、制法及服法：金银花、生石膏、薏苡仁各18克，

连翘、板兰根各12克，牛蒡子、赤芍、丹皮、知母、紫草各8克，木通、竹叶各4克。上药配5至6剂，合在一起，加水煎煮2次，滤汁、去渣，合并药汁，加热浓缩，加适量白糖，文火收渣。每服1匙，1日3次，白开水送服。

2. 流行性腮腺炎是什么病？用什么膏方治疗？

流行性腮腺炎是由病毒通过飞沫传染而引起的急性传染病，中医称“痄腮”。好发于冬、春季节。常见于儿童，也可见于成人。发病初期象感冒，如畏寒、发热、头痛、胃口不好，全身不适等，经过一、二天后即出现腮腺肿大，先一侧，然后两侧都肿，约2~3日肿胀达最高峰，肿胀以耳垂为中心，边缘不清楚，有触痛，张嘴或进食时更痛。肿块持续4~5日，以后逐渐减退。患病期间，病人应卧床休息，保持口腔清洁，进流汁或软食为宜，避免吃刺激性食物。整个病程约10~14日。患腮腺炎一般没有生命危险。部分病人会出现并发症，如腮腺炎病毒脑膜脑炎、睾丸炎、卵巢炎，心、肝、胰等脏也可能受到不同程度损害。为减轻症状，预防并发症，轻症患者，可用板兰根、蒲公英各30克煎汤代茶饮服；重症患者，可按普济消毒饮（选自《卫生宝鉴》）选用中药制成膏剂内服以清热解毒，疏风散邪。

处方、制法及服法：板兰根60克，黄芩50克，黄连20克，连翘50克，升麻15克，柴胡30克，牛蒡子50克，玄参50克，马勃25克，僵蚕30克，薄荷15克，桔梗30克，陈皮30克，甘草15克。上药除薄荷外，加水煎煮2次，滤汁，去渣，合并2次药液，将薄荷另煎煮沸后5分钟滤出药汁，和入上面的药液，调匀，加热浓缩，加适量白糖，文火收膏。每服

1 匙，1 日 3 次，白开水送服。

3. 小儿多汗用什么膏方治疗？

小儿汗出过多，大多与体质虚弱有关。白天，小儿清醒时，稍一活动，就全身出汗或以头面部为甚，谓之自汗；夜晚入睡后即汗出，醒后汗止，出汗以上半身明显，谓之盗汗。中医学认为：“汗为心之液”、“汗血同源”。故汗多日久，势必会影响小儿的生长发育，应及时予以调治。

如为自汗，同时伴有精神不振、形瘦、面白或萎黄，平时恶风寒、易感冒者，宜补气敛汗。用经验方（选自《大众医学》）。

处方、制法及服法：黄芪60克，白芍40克，党参60克，白术60克，茯苓90克，浮小麦90克，煅牡蛎150克，碧桃干90克。上药煎煮2次，每次2小时，滤汁去渣，加热浓缩为清膏，加适量炼蜜收膏。每服1匙，1日2次，白开水送服。

如为盗汗，同时伴有手足心热、口渴喜冷饮、大便干燥等症，宜滋阴敛汗。用经验方（选自《大众医学》）。

处方、制法及服法：沙参、麦冬、生地、石斛、五味子、白芍各60克，糯稻根、碧桃干各90克。（制法、服法同上）。

4. 小儿久泻用什么膏方治疗？

腹泻本身是机体的自卫反应之一，通过腹泻可以排出细菌和毒素，这对人体是有利的。但是长期腹泻，对人体则是有害的，必须及时治疗。小儿患了腹泻，有些家长赶紧给服抗菌素，想把腹泻治好，结果适得其反，腹泻反而加重或迁延不愈。小儿久泻有多种原因，但大多与喂养不当，饮食失

调有关。患儿常表现为大便稀溏，每日数次，同时常见食欲不振、腹胀、有时呕吐，甚至大便滑泻不禁，面色苍白、形体消瘦、怕冷等症。此时，除了调整饮食、注意保暖外，可用下列健脾温阳、涩肠止泻类中药剂制成膏剂内服调治。可用经验方(选自《临证会要》)。

处方、制法及服法：炒党参、茯苓、焦白术、炙甘草、诃子炭各30克，法半夏、炮姜炭各15克，橘红18克，赤石脂、禹余粮各45克。上药加水煎煮3次，滤汁去渣，合并药液，加热浓缩，再加炼蜜适量，文火收膏。每服6克，1日2次，白开水冲服。

5. 小儿疳积(奶痨)用什么膏方治疗?

临床治疗时，我们常见有些小儿面色萎黄、毛发焦枯或稀疏、食欲不振、形体瘦弱、皮肤干燥、五心发热、腹部膨满，或者大便酸臭难闻、舌红、口干、喜饮。有些患儿因积生虫，有喜食泥土或生米等异嗜。

如以消化不良为主，可用“肥儿健脾膏”(选自《实用中成药手册》)。

处方、制法及服法：党参、山药、芡实、茯苓、扁豆、莲子、苡仁、五谷虫、鸡内金各60克。上药煎煮3次，滤汁去渣，加热浓缩为清膏，加适量炼蜜、和匀，文火收膏。每服6克，1日3次，饭前，白开水送服。

如以虫积为主，可以用经验方(选自《临证会要》)。

处方、制法及服法：胡黄连、白芨、鹤虱、槟榔、榧子肉、炒建曲、炒麦芽、雷丸(打)、焦山楂、白术各60克，川椒炭9克，厚朴、枳实各36克，苦楝根皮90克。上药加水煎

煮2次，每次2小时，滤汁去渣，合并药汁，加热浓缩为清膏，再加适量炼蜜，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送服。

6. 百日咳有什么特点？用什么膏方治疗？

百日咳，俗称“顿咳”。它是婴幼儿、一般是5岁以下儿童常见的一种呼吸道传染病，由百日咳杆菌侵入呼吸道引起。本病的主要特征是阵发性痉挛性咳嗽，病程可迁延2~4个月(约一百天左右)，所以叫做百日咳。百日咳之咳嗽有日轻夜重的特点，痉咳发作时，每阵连咳十几声甚至数十声，接着吸一口气，产生一种鸡啼样回声，咳时面红耳赤。咳嗽暂停后，常呕出痰水及食物。小儿百日咳也可用中药膏剂治疗，如“天冬百部膏”(选自《临证会要》)有清热泻火，降逆止咳作用。

处方、制法及服法：天冬、百部、紫菀、冬花、枳壳、知母、杏仁、桑叶、前胡、甘草各30克，桔梗18克，鲜芦根180克，竹茹45克。上药加水煎煮3次，滤汁去渣，合并3次煎液，加热浓缩为清膏，再加适量冰糖，和匀，文火收膏。每服1匙，1日2次，白开水送下。

7. 什么叫小儿“疳夏”？用什么膏方治疗？

有些婴幼儿(多见于6个月~3岁)每到夏天经常发热不退，有时还伴有脘腹胀闷、食欲减退、疲乏无力、手足心热、烦渴欲饮水等现象，去医院检查并无明显异常。到了秋凉后，体温会自然下降。这是由于小儿中枢神经系统发育尚未完善，体温调节功能不健全，排汗功能差，体热不易散发所致。小

儿疰夏多与暑邪太盛或内有食积相关。可用下列中药制膏内服)选自《临证会要》，以清暑消食。

处方、制法及服法：香薷、淡豆豉、苏叶、建曲、枳壳、谷麦芽、青蒿、连翘、陈皮各30克，厚朴、胡黄连各18克，焦山楂45克、上药加水煎煮2次，滤汁去渣，合并2次药液，加热浓缩，再加适量炼蜜，和匀，文火收膏。每服6克，1日2次，白开水送服。

8. 哮喘患儿在缓解期用什么膏方扶正固本？

哮喘患儿大多体质虚弱，痰饮内伏。治疗本病，急性期以控制哮喘发作为主，不宜骤进补药；在缓解期如能以中药膏剂久服缓调，可增强免疫力，改变过敏体质，达到减少哮喘发作或减轻发作程度的作用。可用“五味子膏”(选自《柳选四家医案·环溪草堂医案》)。

处方、制法及服法：五味子30克，紫石英(煨)45克，橘皮30克，半夏30克，茯苓30克，苡仁30克，蛤壳45克，胡桃肉100克，杜仲30克，熟地30克。除胡桃肉炒微焦研粉外，余药加清水煎煮3次，滤汁去渣，合并3次药液，加热浓缩为清膏，和入胡桃肉粉，加适量炼蜜和匀，文火收膏。每服6克，1日2次，白开水送服。

五 官 科

1 口疮是怎么回事？用什么膏方治疗？

口疮，即溃疡性口腔炎。中医学称之为“口糜”，是一种常见病。常在口腔粘膜或舌面、牙龈上出现一些大小不等、数目不一的溃疡面，或形成黄白、灰白色的假膜，覆盖在疮面上。得了这种病，有的满口溃烂，疼痛难忍，流口水，进食困难。如果是小儿，还会日夜吵闹，甚至发高热，便秘等，弄得全家不安。有的人反复发作，经年不愈，十分痛苦。中医经络学说认为：“舌为心之苗”，故凡舌面上有溃疡，常是心火旺的表现；牙龈属胃，牙龈红肿、溃烂、是胃火盛的表现；口腔内颊部、唇、上腭发生溃疡，多属脾热上熏引起。总之，与火热上浮有关，火浮又常与下焦肝肾阴亏有关，所以在治疗口疮时，需清热泻火，也要考虑滋补肝肾之阴。治疗口疮，可用“地黄膏”（选自《证治准绳》）。

处方、制法及服法：生地黄、焦山栀、绿豆、麦冬各100克，生甘草40克。上药加水煎煮3次，滤汁去渣，合并3次药液，加热浓缩为清膏，每50克清膏加入炼蜜100克，和匀，文火收膏。每服15克，一日3次，白开水冲服，局部可用冰硼散或锡类散敷，有助于止痛和消退炎症。

2. 口臭怎么办？能用膏方治疗吗？

口臭是一种令人讨厌的症状，患者很痛苦，也容易造成

别人不愉快。口臭原因很多，80~90%是由于不注意口腔卫生，不按时刷牙或刷牙方法不当所致；其次，有的与咽部、口齿、鼻腔炎症有关；有的与抽烟、饮酒、多食葱、韭类食品有关；有的与某些疾病，如糖尿病、肺结核、胃肠道炎症等有关。有了口臭怎么办？首先，生活中要注意以下几方面：养成饭后漱口，每天早、晚各刷牙一次的习惯，保持口腔卫生，进餐不宜过饱以免消化不良，睡前不吃零食。如因吸烟、饮酒引起的口臭，最好下决心戒除烟酒，平时保持大便通畅。如系全身系统疾病引起，应请有关专科医生诊治。中医学认为口臭一般多属胃火，可按清胃汤(选自《医宗金鉴》)选用中药制成膏剂内服。

处方、制法及服法：石膏 120 克，黄芩、生地各 60 克，丹皮 90 克，黄连、升麻各 30 克。上药加水煎煮 3 次，滤出药汁，去渣，合并 3 次药汁，加热浓缩为清膏，每服 1 匙，1 日 3 次，饭后白开水送下。

此外，也可用藿香、佩兰各 10 克，金银花 5 克，生甘草 5 克，以开水冲泡代茶饮，取其芳香化浊，清火解毒而除口臭。

3. 声音沙哑选用什么膏方治疗？

声音不扬，甚至嘶哑不能出声，称为失音。有人对某市四所重点中学的 420 名授课老师进行了调查分析，其结果是：嗓音不好者有 274 人，占普查人数之 65.2%。故有人称嗓音沙哑是教师职业病。多由发音过度，发音方法不当，护嗓不够引起。除教师外，演员或老年人，气阴两虚、咽喉失养者或慢性气管炎、体弱者均易患此证。失音的治疗，用清咽润喉

类中药制成膏剂，通过含咽，效果良好。可用“青果膏”（选自《北京市中药成方选集》）。

处方、制法及服法：鲜青果 500 克，胖大海、天花粉、麦冬、诃子肉各 100 克，挂金灯 40 克，山豆根 20 克。上药切碎，加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并 3 次药液，加热浓缩为清膏，每 50 克清膏加炼蜜 100 克，和匀，文火收膏。每服 1 匙（或口中含化，慢慢咽下），1 日 3 至 5 次，白开水调服。

4. 慢性喉炎的病因和主要症状如何？用何膏方治疗？

喉部，上接呼吸道的咽部，下连呼吸道的气管，呼吸道病变容易引起慢性喉炎。此外，不恰当发声（常与患者所从事的职业有关），烟、酒过度，空气中有害气体等因素都可以成为慢性喉炎的病因。中医认为本病多属肺虚、气阴不足。其主要症状有：声音嘶哑，喉部干痒不适或有异物感，咽喉部分泌物增多以及恶心，咳嗽等。慢性喉炎也可用膏剂治疗，如“地冬膏”（选自《中国膏药学》）。

处方、制法及服法：生地 30 克，麦冬 18 克，白芍 12 克，贝母 12 克，丹皮 12 克，薄荷 7.5 克，玄参 24 克，甘草 6 克。上方配 5 剂，混和在一起，加水煎煮 3 次，滤取药汁浓煎为清膏，加适量炼蜜和匀，文火收膏。每服 15 克，1 日 2 次，白开水调服。

也可用“枇杷膏”（选自《南京验方》）。

处方、制法及服法：鲜枇杷 1 000 克，去核，加少量水熬汁，滤去渣，收成清膏。每 500 克清膏加冰糖 1 000 克，和匀，文火收膏。每服 15 克，1 日 3 次，白开水冲服。咽部与喉部很近，常相互影响，炎症并发而成咽喉炎。治咽炎的“青

果膏”也可用于喉炎。咽喉部疾患，自制膏剂含服，其效尤佳。

5. 牙龈出血用什么膏方治疗？

牙龈出血是成年人的常见病、多发病。患有牙龈出血的人，轻者在刷牙、咀嚼食物时流血，重者在安静状态下也会流血不止。长期出血会导致贫血，影响健康。况且，由于血液是细菌最好的培养基，牙龈出血的人，其口腔中细菌比健康人多得多，所以常有口臭等症状。口腔下连消化道，上与耳、鼻、眼相通，当人体抵抗力降低时，口腔中细菌乘机侵入，也会使上述部位受到细菌感染。牙龈出血常由牙龈炎、牙周病引起，或与维生素C缺乏、血液病、肝病、肾病后期等有关。除针对病因治疗外，也可用中药自制膏剂以减轻或制止牙龈出血，可用“仙鹤草膏”（选自《中药成方配本》）。

处方、制法及服法：鲜仙鹤草1500克（如无鲜者，用干者750克也可），红枣60克，上二药加水煎煮，滤汁去渣，加炼蜜250克，和匀，浓缩收膏。每服1匙，1日3次，白开水冲服。据药理研究证实：仙鹤草有促进血液凝固的作用。

6 耳鸣是怎么回事？什么膏方可以治疗本病？

耳鸣，男女老少都可以发生。绝大多数耳鸣只有病人自己能感觉到，别人无法听到，仪器也无法记录下来。耳鸣的表现很复杂，轻者只在晚上，睡前或安静环境中才感觉到，如风声突然而起，一过即逝；重者，整天响个不停，音调有高有低，或象蝉鸣，或象马达隆隆，或象钟表的滴答声，或象雨

声夹杂尖细的风笛。吵得人心烦意乱，夜不成眠。医学文献中有报道，有的病人因不堪忍受耳鸣之苦而自杀，可见耳鸣苦人之深。耳鸣大多由听觉神经系统病变，如噪音损伤、耳神经中毒、老年内耳退行性变、耳内迷路积水等引起。或因全身性疾病，如贫血、高血压病、内分泌紊乱等，影响内耳的血液供应而引起耳鸣。耳鸣也是中、老年体虚，神经衰弱的常见症状之一。耳鸣虽为常见病症，却相当难治。除针对病因治疗外，长期内服膏滋剂有一定效果。近代名医秦伯未先生治耳鸣膏方(选自《秦伯未先生膏方选集》)可资参考。

处方、制法及服法：上党参90克，云苓神、炒枣仁、柏子仁、潼蒺藜、白蒺藜、甜杏仁、黑料豆、炒熟地(砂仁24克拌)、桑椹子、女贞子、淮牛膝、炒杜仲、川断肉、黑芝麻各各90克，大麦冬、制首乌、当归身、甘枸杞、炙鸡金各60克，野于术(即白术)、竹沥、半夏、炒池菊花、大白芍各45克，苍龙齿、生石决、煅磁石各120克。上药浓煎2次，滤汁去渣，加驴皮胶120克，龟板胶120克(上胶陈酒烊化)，煎熬，再入冰糖500克，文火收膏，以滴水为度。每服1匙，1天3次白开水冲下。本膏方有滋肾平肝，健脾益气化湿作用。制成膏剂久服，不但能治耳鸣等症，且面体受益。

7. 鼻出血选用什么膏方治疗？

鼻出血，中医学称为“鼻衄”，一般认为是由外伤或内伤等原因，使阳络损伤所致。有些人常在洗脸、低头或轻微触碰鼻部时发生，有些人在睡梦中不知不觉地从鼻孔里流出血来，但出血量一般都不是很多。有些儿童鼻出血有反复发作的情况。在鼻出血时，可以因地制宜地采取一些简便止血方法，

如采取平卧位，将冷毛巾敷于额部，用消毒干棉球塞入鼻腔加以压迫止血；用蘸有麻黄素或肾上腺素溶液的消毒棉球塞入出血的鼻腔内，效果良好。如果出血不止，出现面色苍白，出冷汗等情况，应立即找医生处理。对于一般鼻出血，出血量不太多，可用“清肺抑火膏”（选自《寿世保元》）。

处方、制法及服法：黄芩75克，栀子、桔梗、天花粉各36克，知母、苦参各27克，黄柏、前胡各18克，大黄56克。上药酌予碎断，置锅内加水煎4小时，共煎3次，滤汁去渣，合并3次药液，加热浓缩为清膏，每100克清膏加炼蜜200克，和匀，文火收膏，每服15克，1日2次，白开水送服。

此外，上海著名老中医张赞臣治鼻衄的经验方——“丹芍茅花汤”值得介绍。该汤剂改为膏方如下：粉丹皮、生白芍，淡黄芩各63克，白茅花、蚕豆花、仙鹤草、旱莲草各84克。熬制膏剂，一周内服完。为治鼻衄良方。如果出血量多，可加藕节炭、侧柏叶、鲜生地等。

8. 过敏性鼻炎有何特点？用什么膏方治疗？

过敏性鼻炎是一种变态反应性疾病，因对某些物质过敏而引起。如在某些植物开花季节，这些患者就容易发病，这叫季节性过敏性鼻炎；有些人每与某些物质（如皮毛、染料等）接触后即发病，这叫常年性过敏性鼻炎。过敏性鼻炎患者发作时常连续十几个甚至数十个地打喷嚏，鼻痒，日久可致嗅觉失灵。治疗除找出病因，消除病因外，可选用经验方（选自《袖珍中医处方》）。

处方、制法及服法：防风、路路通各90克、乌梅、五味子、蝉衣各45克，甘草30克。上药熬浓汁，加适量炼蜜收膏。

每服1匙，1日2次，饭后，白开水送服。

老年科

1. 老年人慢性腰腿痛选用什么膏方治疗？

老年人常见腰痛、腿痛或关节痛，其中大多数原因难以确定，常与骨质增生，骨刺形成，腰肌劳损或关节炎等有关。但大多是在年老体弱，脾、肾亏虚，气血不足基础上，加之风、寒、湿邪侵袭而成，属中医“痹证”范畴。初病易治，久病难医，故应及时医治，除采用针灸、理疗外。可按“痹效汤”（出自《家庭医药指南》）选用中药制成膏剂内服。

处方、制法及服法：炒杜仲、威灵仙、桑寄生、熟地、牛膝、炙黄芪、泽兰各15克，羌活、木瓜、狗脊、巴戟天各12克，淫羊藿5克。上方配10剂，合在一起，加水煎煮3次，滤汁去渣，合并药汁，加热浓缩，加适量炼蜜，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送下。

2. 防治老年人视力减退宜用什么膏方？

老年人视力减退可由多种原因引起，但与老年体衰或营养不良关系较密切。老年人视力减退多与白内障有关。年纪越大，发病率越高，这是一种老年退行性病变。如能及早服药进行预防，可使之延缓发生或减轻症状，可选用疏风清热、清肝明目类中药制成膏剂内服，如“明目延龄膏”（选用《慈禧

光绪医方选论》)。

处方、制法及服法：霜桑叶、菊花各150克。共以水煎煮两次，滤汁去渣，合并药液并加热浓缩为清膏，加适量炼蜜收膏。每服9克，白开水冲服。

也可用“桑椹子膏”(选自《证治准绳》)以滋补肝肾，聪耳明目。用鲜桑椹子1000克，榨出汁，其渣放锅内加水煮透，滤液去渣，加入原汁，和匀，浓缩，加适量炼蜜，文火收膏。每服9克，1日2次，白开水冲服。

3. 老年人为什么容易耳聋？用什么膏方防治？

耳聋是老年人的常见现象。人到60岁以后，不论男女听力都将发生不同程度的下降，俗称“耳背”。随着年龄的增长，听觉器官和全身其他器官一样，也会衰老——耳蜗萎缩退化，使听觉发生障碍，称为“老年性耳聋”。中医认为肾精亏虚，不能充养清窍可引起耳聋。所谓“耳为肾之窍”、“精脱者，耳聋”。在未聋之前或初聋阶段及时注意体育锻炼和饮食起居，并选用补肾益气类中药制成膏剂长服、对防治耳聋有一定作用。可用“益气聪明膏”(选自《江苏省药品标准》)以益气升阳，聪明耳目。

处方、制法及服法：党参、黄芪、炙草各200克，升麻、葛根各120克，炒黄柏、白芍各40克、蔓荆子60克。上药共煎3次，合并煎液，静置沉淀，滤出清液，加热浓缩为清膏。每服15克，1日2次，白开水冲服。

4. 老年慢性支气管炎用什么膏方治疗？

慢性支气管炎是危害老年人健康的常见病、多发病。50

岁以上的人，患病率达13%。慢性支气管炎的真正病因还不十分清楚，可能与上呼吸道感染，呼吸道长期受理化因素，如吸烟、空气污染、寒冷、吸入灰尘等有关。主要症状是咳嗽、咯痰、胸闷。如由细菌引起继发感染，就会发烧，咳脓性痰，或伴有喘息，甚至呼吸困难，日久便形成肺气肿，进一步发展，会引起肺原性心脏病，出现肝大、浮肿、心力衰竭甚至昏迷等症状。老年慢性支气管炎须及时治疗。可用“金水膏”(选自《备急千金要方》)润肺化痰。

处方、制法及服法：细生地180克，麦冬、山药各120克，天冬、紫菀、玉竹各90克，款冬花、白芍、百合各60克，茜草、知母、陈皮、川贝母各30克。川贝母，去心，另研极细末，备用。余药共研粗末，水煎3次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩成膏，再加适量炼蜜，文火收膏。冷却后，将贝母粉渐渐调入，拌匀。每服15克，1日3次，口中含化或白开水冲服。

如见黄色脓性痰，可用“竹沥膏”(选自《江苏省药品标准》)。

处方、制法及服法：鲜瓜蒌500克，朱砂15克，天竺黄、枳壳、桔梗、胆星、川贝、川连各90克，九节菖蒲21克，鲜竹沥250克。上药用水共煎3次，滤汁去渣合并3次药液，澄清过滤，加热浓缩收膏。每服10克，1日3次，白开水冲服。

5. 什么叫骨质增生症？用什么膏方治疗？

通常人们说的骨质增生，多指一种衰老现象，就象人老了头发要白、牙齿要掉一样。这种增生是一种普遍现象，40岁

以上的人大多都有，只是发生的部位，增生的程度不同，有的有症状，有的尚无明显感觉而已。中医认为骨质增生与肝肾之气衰退，精血不足，筋骨失养有关。故治疗宜补肝肾、强筋骨、活血利气止痛，可用“骨质增生膏”(选自《中医方剂临床手册》)。

处方、制法及服法：熟地 9 克，肉苁蓉 9 克，鹿含草 12 克，淫羊藿 9 克，骨碎补 9 克，鸡血藤 15 克，莱菔子 9 克。上方配 15 剂，混合后，加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，每 50 克清膏加 100 克炼蜜，和匀，文火收膏。每服 15 克，1 日 2 次，白开水送服。

6. 老年人前列腺增生症用什么膏方治疗？

前列腺增生症，多是在慢性前列腺炎的基础上发展起来的一种增生性病变。前列腺位于膀胱出口处，后尿道的周围。当腺体增生时，体积变大，就会压迫尿道，使排尿不畅，甚至受阻。本病初起时，小便次数增多，常不被人注意。病变继续加重后，就会出现排尿时间延长，排尿费力，有时用尽气力，也排不出几滴尿液，病人坐卧不安，十分痛苦。并常见饮食乏味，倦怠无力等症。由于尿液残留在膀胱里，还容易并发炎症、结石、血尿甚至引起威胁生命的尿毒症。本病的治疗，有的用激素，有的须采用手术治疗。对于一般病情，可及早采用中药制成膏剂内服，有一定防治作用。可选用加减滋肾通关丸方(选自《兰宝秘藏》)。

处方、制法及服法：黄柏 150 克，知母 150 克，肉桂 7.5 克，车前子、草各 100 克，木通 30 克，王不留行 100 克，滑石 100 克(包煎)，甘草梢 30 克。上药加水煎煮 2 次，滤汁去渣，

合并2次煎液，加热浓缩、再加适量炼蜜和匀，文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送服。

7. 老年人尿失禁是怎么回事？用什么膏方调治？

人的身体时刻进行着新陈代谢活动，代谢产生的废物通过小便在膀胱中贮存，到达一定的量时，就会产生排尿感。如果这时条件不允许解小便，健康者能有意识地控制自己不解小便；尿失禁患者丧失这种功能，因为他们的尿液不能在膀胱里贮存，而是有一点就漏一点，不分昼夜地不断漏尿，病人十分痛苦。引起尿失禁的原因很多，此病在中老年妇女中多见。一方面年龄大了，内分泌功能下降，控制排尿的尿道张力差，或因控制膀胱的神经失灵，所以在情绪稍一紧张或咳嗽，打喷嚏等腹内压力增加时，尿液便不由自主地从尿道流出。严重的尿失禁可行手术治疗。对于轻症或刚出现尿失禁苗头，可用中药膏剂调治，如“水陆二仙膏”（选自《证治准绳》）有固肾、涩精、止遗的作用。

处方、制法及服法：金樱子、芡实各500克。将金樱子洗净，蒸熟、汤淋取汁，入锅内，文火熬成膏；芡实研为粉末，放入膏中，和匀，收贮。每服15克，用淡盐汤送服，1日2次。常服本膏，不仅治疗尿失禁，还有补肾抗衰老之功。

8. 什么叫老年忧郁症？用什么膏方治疗？

人到老年，由于生理上的变化，也会引起精神情绪方面的变化。有些老年人表现为一反常态，终日抑郁不乐，少言寡语或情绪忧伤、焦虑、易发脾气。同时，常伴有食欲降低、失眠，对工作、娱乐、日常活动失去兴趣，注意力难以集中

或思维困难，行动上表现得坐立不安或动作迟钝，说话费力。少数严重者想到死或有自杀行为。这就是老年忧郁症。可选用健脾温肾，凉血滋阴类中药制成膏剂内服，如“扶元益阴膏”（选自《慈禧光绪医方选议》）。

处方、制法及服法：党参、炒白术、云茯苓、炒当归、地骨皮各30克，酒炒白芍24克，粉丹皮、制香附各18克，砂仁12克，银柴胡9克，薄荷6克，鹿角胶（溶化）15克。上药加水煎煮3次，滤汁去渣，加热浓缩，加入溶化好的鹿角胶，再加入适量炼蜜和匀，文火收膏。每服9克，1日2次，白开水冲服。

9. 男性也有更年期综合征吗？用什么膏方治疗？

所谓更年期是指由中年向老年过渡的时期，也即人生开始衰老的转折点。妇女更年期多在45岁到55岁之间，男性更年期综合征症状出现稍晚，一般在50岁以后。随着年龄的增长，性腺功能衰退，内分泌系统的相互平衡遭到破坏，于是丘脑下部、垂体、肾上腺功能也相继减退，因而产生多种临床表现和代谢紊乱，引起更年期的各类症状。主要表现为情绪不稳定，体力减弱，心血管系统、神经系统功能失调等方面。出现如：阳痿、性欲减退，疲乏无力、兴趣下降、记忆力差、思想不易集中、激动易怒、心情忧郁、失眠甚至头晕、头痛、心悸、肢体麻木或发冷、发热、感觉异常等。这类患者除了应注意生活有规律，工作有劳有逸，避免过分激动，保持情绪稳定外，也可选用中药制成膏剂内服，可按右归丸（选自《景岳全书》）加减。

处方、制法及服法：大熟地、山药、枸杞、菟丝子、杜仲、

当归各 150 克，山茱萸、肉桂各 60，柴胡、栀子各 100 克，鹿角胶 120 克。上药除鹿角胶外，加水浓煎 3 次，滤汁，去渣，合并药汁，将鹿角胶加陈酒烱化后加入上面药汁，和匀，煎熬，再加入炼蜜 500 克，文火收膏，以滴水为度。每服 1 匙，1 日 3 次，白开水送下。妇女更年期综合征的膏方也可试用（见有关项目）。

10. 为什么老年人肿瘤发病率较高？用什么膏方预防？

据调查，60 岁以上的老年人每 100 人中就有 12 人患癌肿，老年人癌肿发生率为其他年龄人群的 100 倍。为什么老年人肿瘤发病率较高？这与多种因素有关。如免疫功能降低，即是其中重要因素之一。一般地说：人体免疫功能随年龄增长而下降，老年人容易发生免疫功能缺陷，因而容易患肿瘤。中、老年人平时如能选择一些具有防癌抗癌的中药制成膏剂长服，无疑对防止癌症发生有好处。可用“茯苓膏”（选自《抗衰老方集锦》）。

处方、制法及服法：白茯苓 500 克，白蜜 1 000 克。将茯苓去掉黑皮，研成细末，用水漂去浮者，取下沉者，滤去水，晒干，复为细末，再漂再晒，反复 3 次，再为细末，拌白蜜，和匀，熬膏。每服 9 克，1 日 2 次，白开水送服。据现代药理研究报告，茯苓含有茯苓多糖，能增强人体免疫功能，有一定防癌抗癌作用。或购市售“人参滋补膏”内服。

11. 老年人服用什么膏方可以延年益寿？

健康长寿，人人向往。“老年”是生命的后期阶段。自身的细胞、组织和器官的逐渐老化，各种生理功能日趋衰退、

衰老是不以人类意志为转移的客观规律。然而设法推迟衰老的到来，延缓衰老的进展，不断延长寿命是完全可能的。中医学认为，人的衰老主要是与“肾气衰”有关。从现代实验得知，肾亏或肾气早衰常表现为内分泌功能、免疫功能等方面的衰退。所以老年人如果常服一些补肾益精类中药来增强人体内分泌功能和免疫功能，保持新陈代谢的活力，就可以达到延年益寿的效果。老年人可按“八仙长寿丸”（选自《寿世保元》）的配方制成膏剂内服。

处方、制法及服法：熟地、山药、山萸肉、云茯苓、粉丹皮、福泽泻、大麦冬、五味子各60克。加水煎煮3次，滤汁去渣，合并3次煎液，加热浓缩为清膏，再入适量炼蜜和匀，文火收膏。每服10克，1日2次，白开水冲服。本方有滋肾养肺、固气益寿作用。或购市售“洞天长春膏”内服。

12 . 中年人用什么膏方抗衰老？

中年，指年龄四、五十岁的人。中年阶段是体质状态由盛趋衰的转折时期，生理功能逐渐下降，随着气血衰减，肝肾渐弱，某些老化的征象开始显露。古人对此早有认识，强调指出“人年四十，阴气自半”，意思是指人到中年，体内阴精气血衰减，几乎只有原先气血旺盛时的一半，此时尤需注意保养阴精，修复元气，延缓衰老，以使青春长驻。如果中年开始出现衰弱症候，如头晕、心悸、失眠、健忘、腰腿酸软、精力衰退，容易疲乏等表现，尤应及早调治，长服中药膏剂是一个好办法。可用“健身长青膏”（选自《上海市药品标准》）。

处方、制法及服法：红参15克，云茯苓、炒白芍、桑椹

子、炙黄芪、炒白术、陈皮各60克，熟地黄、制首乌、酒炒当归、枸杞子、制女贞子各90克，川芎、炙甘草各30克，制半夏45克。先将红参加水煎煮2次，每次3小时，参汁滤清，再将参渣与其余药一起水煎3次，药汁滤清，与参汁和匀，加热浓缩为清膏。每100克清膏加100克炼蜜和匀，文火收膏，每服15克，1日2次，白开水冲服。或购市售“双龙补膏”内服。

皮 肤 科

1. 脂溢性脱发有什么特点？用什么膏方治疗？

脂溢性脱发常发生于年轻人，以男性为多。其特点是：头皮常油腻发亮，头屑增多，头皮瘙痒，头发变得纤细，容易脱落。患这种脱发的女子常同时伴有头发和皮肤油腻，面部痤疮及多毛症。中医学认为，脱发多与肾亏、血虚及风燥有关，故可选用养血、益肾、祛风润燥之品制成膏剂内服。可用经验方（选自《中医处方手册》）。

处方、制法及服法：熟地150克，制首乌120克，生侧柏叶150克，当归100克，菟丝子120克，白芷60克，桑椹子120克，黑芝麻180克，苦参60克，羌活60克。上药将黑芝麻炒微香后研粉，余药加水共煎3次，滤汁去渣，合并3次药汁，将药汁加热浓缩，加入适量炼蜜和芝麻粉，和匀，文火收膏。每服3匙，1日2次，白开水冲服。

2. 须发早白用什么膏方治疗？

只要注意观察一下就发现：有的人头发油光闪亮，润泽美观；有的人头发枯槁干燥，毫无生气或者年龄不大，却已白发丛生，两鬓如霜。这些人除须发早白外，一般还兼有头晕眼花，四肢酸麻，腰膝无力，耳鸣重听，夜尿频数等气血不足、肝肾亏虚症状。如果选用益气养血、滋补肝肾类中药制成膏剂长服，对于减缓或纠正须发早白有一定作用。可用“乌发膏”（选自《积善堂经验方》）。

处方、制法及服法：制首乌、云茯苓各 500 克，当归、枸杞、菟丝子、牛膝、黑芝麻各 120 克，补骨脂 60 克。上药共研粗末，加水煎熬 3 次，滤汁去渣，合并 3 次煎液，加热浓缩为清膏，再加适量炼蜜和匀，文火收膏。每服 15 克，1 日 3 次，白开水冲服。一料服完，可再制，直到见效为止。

3. 慢性荨麻疹用什么膏方治疗？

荨麻疹是一种很常见的过敏性疾病。发作时，皮肤可出现大小不等、数目不一、形态各异的风团样“疹块”，瘙痒难忍。不少人遇到冷风一吹，即引起发作。急性荨麻疹，一般经数日或一周即痊愈，慢性荨麻疹可反复发作，经久不愈。对该病的治疗，除找出致敏原因并设法排除它而外，同时，在发作期或缓解期选用中药制成膏剂内服，可以减少或减轻本病发作，甚至能治愈。可用“抗过敏膏”（选自《实用中成药手册》）。

处方、制法及服法：乌梅、白鲜皮各 150 克，防风、柴胡、生甘草、五味子、苦杏仁各 90 克。上药加水煎煮 3 次，

滤汁去渣，合并3次煎液，加热浓缩为清膏，每100克清膏加炼蜜200克，和匀，文火收膏。每服15克，1日2次，白开水冲服。

4. 什么叫带状疱疹？用什么膏方治疗？

带状疱疹，中医又称为“蛇丹”或“蛇串疮”，民间也有称“缠腰火丹”的。本病好发于春、秋季，是由病毒引起的一种急性水疱性皮肤病。疼痛为本病的主要症状，严重者可长达半年。发病前，局部皮肤刺痛或烧灼感，同时伴有疲乏无力，胃口不佳，甚至低热等。一、二天后患部如绿豆或黄豆大小的水疱累累如串珠排列成带状，基底发红，疱群之间皮肤正常，疱液初为透明，约五、六天后转为浑浊，最后结痂，一般二周左右可自愈。本病常见于老年人。中医学认为，本病与肝火妄动、湿热内蕴有关，可用泻肝清热、凉血利湿的龙胆泻肝汤加减(选自《中医外科临床手册》)制成膏剂内服，可减轻症状，加速痊愈。

处方、制法及服法：龙胆草15克，柴胡10克，黄芩30克，生山楂30克，鲜生地40克，粉丹皮15克，京赤芍30克，泽泻30克，木通10克，车前子30克，紫草40克，生甘草10克。上药加水煎煮2次，滤汁去渣，合并2次煎液，加热浓缩为清膏，加适量白糖和匀，文火收膏。每服6克，1日2次，白开水冲服。

5. 皮肤搔痒症是怎样产生的？用什么膏方治疗？

不少人经常有皮肤痒感，甚至奇痒难忍。尤其是一些老年人，由于皮肤干燥，角质层水分减少，使其对外界刺激敏

感性增高而患此症者较多。有的可因局部摩擦、温热潮湿、汗液浸渍或细菌感染或药物过敏等原因引起。有的与进食某些食物或接触一些肥皂，染料，丝、棉织品，羽毛等织物有关。有的与患某些疾病有关，如肝胆疾病、肾功能不全、糖尿病、甲状腺病、白血病、低蛋白血症、痛风、肠寄生虫病、神经衰弱甚或恶性肿瘤都可出现皮肤搔痒。中医学认为本病与湿热、血虚、风邪走窜皮肤等因素有关，古人有“治风先治血，血行风自灭”之说，所以可采用养血祛风、清化湿热之品制成膏剂内服并局部用药外洗获效。可用经验方(选自《验方》)。

处方、制法及服法：当归尾、赤芍、茺蔚子、防风、苍术、地肤子、白鲜皮各9克，苦参，乌梅，炒黄柏、甘草各6克。上药配10剂，合在一起，加水浸一夜，煎煮3次，滤汁去渣，合并3次药液，加热浓缩为清膏。每服9克，1日3次，白开水冲服。此外，可用下方煎汤外洗患处：炒黄柏、制苍术、苦参各20克，蛇床子、地肤子各30克。每天1剂，一周为一疗程。

6. 面部色素沉着是怎么回事？用什么膏方治疗？

色素沉着主要表现为面部黄褐色斑片，常对称性分布于面部颊部、鼻梁、前额等处，形似蝴蝶，故有“蝴蝶斑”之称，它有损于面部美观。

妇女妊娠期易见，是由于内分泌因素所致，多属生理范围。有些未婚女青年或未妊娠的妇女也会出现面部色素沉着，是什么原因呢？有的与遗传、内分泌、日光照射等因素有关，因皮肤黑色素沉着而形成。有些与体内某些慢性病，如慢性肝病、甲亢、营养不良等有关。中医学认为面部色素沉着多

属肾虚，所谓“肾色上泛”。所以，采用益肾补虚类中药制成膏剂内服有一定作用。如“茯苓膏”（选自《中国膏药学》）。

处方、制法及服法：白茯苓、党参、炒白术、炙黄芪各60克，川芎、肉桂、甘草各30克，当归，白芍各48克，熟地120克。上药加水煎煮3次，滤汁去渣，合并3次煎液，澄清，将上面清液加热浓缩为清膏，再加冰糖240克收膏。每服9克，1日2次，白开水冲服。一料服完，可再制再服，直至病愈。

7. 什么叫白癜风？怎样用膏方治疗？

白癜风，又名白驳风，是一种色素缺乏的皮肤病，表现为大小不等、形态不一的白斑。无自觉症状，亦不影响劳动工作。常发生于头皮、颈部、手指、胸、腰、四肢等部位。发生于面部者，有人连头发、眉毛，眼睫毛都同时变白，虽不痛不痒，但影响外貌，给患者带来苦恼，多急于求治。可按经验方（选自《家庭中医顾问》）选用中药制成膏剂内服，配合外搽进行治疗。

处方、制法及服法：黑豆、制首乌、地榆、石决明各150克，紫草、红花、郁金、丹皮、白蒺藜各100克。将药混合，加水煎熬3次，滤汁，去渣，合并药汁，加热浓缩，加入适量炼蜜、文火收膏。每服1匙，1日3次，白开水送服。

此外，介绍局部外搽的两种方法：

1. 白蒺藜20克，补骨脂30克，浸泡于95%酒精100毫升中，一周后取其浸出液，涂搽患处，每日1~2次。

2. 乌梅30至50克，浸泡于95%酒精100毫升中，1至2周后，过滤取浸出液备用，使用时，蘸药液搽患处，每次

5分钟，每日3～4次。

8. 痤疮是怎么回事？用什么膏方治疗？

不少青年人脸上长了许多疙瘩，十分苦恼，这在医学上称为“寻常性痤疮”，又叫“青春疙瘩”，中医称之为“肺风粉刺”。发病原因多由于皮脂腺分泌过盛，加之局部感染所诱发。面部及胸背部生出大小不等的黑头丘疹，挤压时有白色粉浆出来，愈后留下黑斑，严重者出现结节、疤痕。中医认为本病多由过食辛辣、油腻，或肺有伏热，或思欲过度，五志化火以致肺胃热盛，上熏颜面，复加风热外侵，热毒郁于面部所致。治疗痤疮可采用内服和外治相结合的办法。内服可选用黄芩清肺饮(选自《常见病中医证治》)加减，制成膏剂内服以宣肺、清热、解毒。

处方、制法及服法：黄芩、生地、土茯苓、连翘各15克，当归、川芎、防风、赤芍、红花、栀子、丹皮、薄荷各10克。上方配5至6剂，将药合在一起，加水煎煮2次，滤出药汁，去渣，合并药汁，加热浓缩，加适量白糖，文火收膏。每服1匙，1日3次，饮后白开水送服。

对于皮脂腺分泌过多者，可用芦荟、地榆、虎杖、山楂、荷叶各10克，加水煎熬取药汁，每晚洗面或用纱布6层蘸药汁湿敷于面部持续半小时，一周为一疗程。

肿 瘤 科

1. 鼻咽癌有哪些早期信号?用什么膏方治疗?

鼻咽癌是指发生在鼻与咽部之间的癌肿,好发于30岁到50岁的人。鼻咽部出现肿瘤,开始阶段一般没有明显症状,很容易被忽略。这种癌发展却很快,若得不到及时治疗,不到两年就可能夺去生命。所以注意鼻咽癌的早期报警信号,早期发现,及时采取有效治疗措施,可以提高生存率。

鼻涕带血是鼻咽癌第一个最明显的信号。由于鼻咽癌最早出现的是鼻腔粘膜粗糙、斑状隆起,肿起结节、斑块,继而破溃出血,所以常在鼻涕中带有极少量血丝,特别是早晨起床后第一次擤鼻涕。有的人习惯吸鼻吐“痰”,如果是“痰”中带血,实际是鼻涕带血,即应引起注意,应及时去医院检查。鼻塞、耳鸣是鼻咽癌的第二个信号,这种鼻塞与感冒鼻子不通气不同,常表现为一侧而且进行性加重,由于肿物继续增大,压迫邻近的耳咽管,故而出现耳鸣,如果癌肿继续增大,向纵深发展,侵犯颅底,可出现头痛、复视、面部麻木、张口困难、说话不清楚,向下蔓延至颈部则淋巴结肿大,这些都是鼻咽癌已经转移的晚期信号。

鼻咽癌的治疗,主要是放射治疗或手术切除。同时,可用中药制成膏剂内服达到化瘀散结、抗癌、消肿的作用,可按经验方(选自《袖珍中医处方》)配药制膏。

处方、制法及服法：北沙参 15 克，天冬、麦冬各 12 克，玄参、白花蛇舌草、石上柏各 30 克，菝葜 18 克，山豆根、苦丁茶、鹅不食草各 9 克。上方配 10 剂，合在一起，加水煎煮 3 次，滤出药汁，去渣，合并 3 次药汁，加热浓缩，加入适量炼蜜，文火收膏。每服 1 匙，1 日 3 次，白开水送服。

2. 食道癌的发生与哪些因素有关；用什么膏方治疗？

一个人如果出现进行性吞咽困难，首先应该想到是否患了食道癌。中医学称本病为“噎膈”。因为本病的特征就是咽食不畅，有堵塞感，发展下去即咽下困难，甚至进水都困难或食物反流，有些患者常伴有胸骨后疼痛。进行 X 线检查，可以确诊，及早手术治疗，可以提高生存率。

本病发生的原因尚未完全明确，但不少资料表明与生活习惯、地理自然环境等因素有关。食道癌高发区居民普遍爱吃泡酸菜或霉变食品。酸菜发酵过程中产生的化学物质、霉菌及其毒素容易致癌。又据研究，食道癌高发区的土壤和水质含有大量亚硝酸盐和仲胺，以致这些地区的粮食、作物、蔬菜和饮水中也含有大量的亚硝酸盐和仲胺化合物，当人进食了这些化合物之后，在体内很快发生化学变化，生成致癌力极强的亚硝胺。其次，食道炎症，包括长期饮酒、食道憩室发炎、食管烧伤、进食太快、太烫等也会增加食道癌的发病机会。对已病患者及时采取手术治疗，是挽救生命的有效措施。同时，选用启膈散（选自《医学心悟》）加味、制成膏剂内服可起到扶正祛邪，养阴启膈，抗癌消肿的作用。

处方、制法及服法：沙参、丹参、茯苓、川贝、郁金、荷叶蒂、杵头糠各 100 克，石见穿 300 克，急性子、干蟾皮、桃

仁各 120 克。上药加水煎煮 3 次，滤汁，去渣，合并药液加热浓缩，加适量炼蜜，文火收膏。每服 1 匙，1 日 3 次。含化咽下。

3. 如何认识肺癌的早期症状？用什么膏方治疗？

肺癌是最常见的恶性肿瘤之一，其发病率仅次于胃癌。认识肺癌的早期症状以便及早发现，及时治疗。中年以上并有长期吸烟史的人，平素并无慢性支气管炎病史，突然出现不明原因的咳嗽、且久治不愈，或咳痰不多、但痰中带血或突然咯血，应想到肺癌的可能。有部分患者可有不同程度的胸痛、胸闷、气急等症，应尽早去医院作 X 线检查或痰查癌细胞等。中药膏剂可配合手术、放疗、化疗，达到扶助正气，减少治疗反应，减轻患者痛苦，延长寿命的作用。肺癌可用“猕猴桃膏”（选自《中国膏药学》）。

处方、制法及服法：斑蝥 0.15 克，猕猴桃 30 克，黄药子 60 克，草河车 120 克，山豆根 120 克，夏枯草 120 克，白鲜皮 120 克，败酱草 120 克，九节茶 9 克。上药加水煎煮、滤汁去渣，加红糖适量收膏。每服 6 克，1 日 3 次，白开水冲服。

4. 胃癌早期有哪些症状？用什么膏方治疗？

胃癌的早期症状并不是十分特异的，有时被人们当作“胃炎”、“胃溃疡”、“消化不良”而没有受到及时重视。胃癌早期可有上腹不适，闷胀或胃脘部隐痛，时轻时重，或有恶心，部分患者有呕出咖啡样液体或排出柏油样黑便等症状。应提高对早期胃癌的警惕性，及时去医院作有关检查。早期胃癌也

可服用中药膏剂配合治疗。可用“葵花膏”(选自《中国膏药学》)。

处方、制法及服法：葵花杆心 30 克，猕猴桃 30 克，蛇莓 30 克。上药加水煎煮，取汁去渣，加糖适量收膏。每服 7 克，1 日 3 次，服时加服“猕猴桃膏”(见上条肺癌) 6 克。

5. 如何早期发现肝癌?用什么膏方治疗?

肝癌十分隐蔽，肝脏中的肝癌直径小于 5 厘米时，可能不具任何症状；直径超过 5 厘米时，虽有明显症状可以确诊，但因肿块太大，已失去了根治的可能。且肝癌发展迅速，从确诊到死亡，至多是半年左右。因此提高对本病的警惕，争取早期诊断特别重要。

肝癌患者早期常有下列症状表现：食欲不振，脘腹饱胀，甚至恶心、呕吐。不少患者自己可在上腹摸到肿块，但不疼痛，发展下去则很快出现贫血、消瘦、发热、黄疸、流鼻血、牙龈出血、巩膜黄染、腹水、锁骨上淋巴结肿大等。为早期发现肝癌，对可疑者可进行下列检查：及早检查病人血中胎儿甲种球蛋白，大约有 80% 的肝癌患者此项化验结果为阳性；同时，进行肝脏同位素扫描，可以查出直径 2 厘米的肝癌，75~90% 的肝癌病人通过这种方法得到诊断；此外，B 型超声波常显示肝脏组织不均匀，并能显示占位性病变；也可进行 CT (电子计算机 X 线横断) 扫描。后一种方法可以发现直径 1 厘米左右的微小肝癌，在诊断肝癌中有特殊地位。

肝癌早期，宜手术切除。有转移者可采用化疗、放疗加中草药治疗。中药可选经验方(选自《袖珍中医处方》)制成膏剂内服，有活血化瘀，清热解毒，软坚散结，抑制癌细胞生

长的作用。

处方、制法及服法：丹参 15 克，炙鳖甲 12 克，露蜂房、失笑散(包煎)各 9 克，郁金 9 克，半边莲 18 克，白花蛇舌草 30 克。若肝区疼痛，加川楝子、延胡索各 12 克。上药配 10 剂、将药合在一起，加水煎煮 3 次，滤汁，去渣，合并药汁，加热浓缩为清膏。每服 1 匙，1 天 3 次，白开水送服。

6. 结肠癌有哪些早期症状?用什么膏方治疗?

结肠癌的早期症状也并非十分特异，主要有腹痛、腹胀、大便次数与性状改变。腹痛多在沿结肠部位或下腹部，疼痛随行走、劳动可以加重。随病情发展，疼痛可由间歇性转为持续性痛；腹胀在排便后稍缓解；大便可由原先每天或两天一次变为一日四至五次，质地变稀，可带脓血。也有部分患者表现为便秘与腹泻交替出现，腹部有时可触摸到沿结肠部位的肿块。也有自始至终毫无症状的患者，这就增加了早期诊断的困难。此外，原先患有结肠腺瘤、慢性溃疡性结肠炎或血吸虫病者，发生结肠癌的可能性也较大，应随时注意作相应检查，以免失去治愈的时机。中药膏剂可以配合治疗，可用“九节茶膏”(选自《中国膏药学》)。

处方、制法及服法：喜树 10 克，黄独 15 克，九节茶 15 克，白花蛇舌草 40 克，黄芪 9 克，党参 6 克，甘草 9 克。上药加水煎煮，滤汁去渣，加糖适量收膏。每服 10 克，1 日 3 次，白开水冲服。

7. 中年妇女为什么易患乳腺癌?用什么膏方治疗?

乳腺癌多发生于 40 岁至 60 岁之间的妇女，尤以 45~49

岁的中年妇女发病率最高。特别是那些未婚中年女性或婚后一直不育者，人工断乳者，哺乳期超过两年者。据研究，中年期以后进入更年期阶段易患乳腺癌，这是由于卵巢功能逐渐减退，相反地引起垂体前叶功能增强而促使肾上腺皮质产生雌激素，它能刺激乳腺发育，也是诱发癌症的因素之一。因此，也有人认为雌酮、雌二醇增加会成为致癌物质。中年妇女应经常自己检查乳腺，如发现乳腺内有肿块，应及时去医院检查。如肿块增大迅速、皮肤呈橘皮样改变，有的呈塌陷形，有的已破溃感染、有恶臭、腋下淋巴结肿大，这些都属于乳腺癌晚期症状。

乳腺癌的治疗，在手术、化疗、放疗等综合治疗的同时，选用中药制成膏剂内服有化痰散结，解毒抗癌的作用。可用蜂房膏(选自《中国膏药学》)。

处方、制法及服法：露蜂房、醋炒柴胡、郁金、党参、茯苓、栀子、黄柏各6克，当归、杭芍、枸杞子、焦白术、夏枯草各9克，川断，女贞子、金银花、生地各12克，天冬、蚤休、桑寄生15克、生苡仁、玄参、生牡蛎各18克，山慈菇3克。将上药加水煎熬，滤液，去渣，加红糖适量收膏。每服15克，1日3次，白开水冲服。

8. 宫颈癌有哪些早期症状?用什么膏方治疗?

据统计研究,如40~49岁年龄组的妇女患宫颈癌的可能性较多,早婚,多产,性生活过频者,丈夫包茎、包皮过长者,女方易患本病。宫颈癌早期,多数有非月经期阴道出血现象,或经绝期又出现阴道流血,这是癌肿侵犯血管的结果,是宫颈癌的主要症状之一。其次,白带增多,开始时为稀薄分

分泌物或为脓性，随着病情发展，癌肿破溃合并感染等，使白带量增多，变成米汤样或呈脓性，或混有血液，臭味大。当癌肿侵犯到宫旁组织时，患者常感到阴道及下腹部有胀痛、隐痛，晚期可引起腰痛，下肢放散痛，若侵及膀胱者可出现尿频、尿急、尿痛等。中年妇女凡非月经期出现阴道不规则流血，不论量多量少或白带增多有血迹时，都应速去医院检查，以免延误病情。平时注意改善精神状态，保持心情舒畅，积极治疗慢性宫颈炎、宫颈糜烂、息肉、白斑等癌前病变，提倡晚婚、少生，丈夫包皮过长者应及时手术治疗，有助于预防宫颈癌的发生。

宫颈癌的治疗，除手术、放疗、化疗外，应配合中药抗癌治疗，可用青蒿膏(选自《中国膏药学》)。

处方、制法及服法：青蒿 6 克，鳖甲 15 克，地骨皮 9 克，秦艽 6 克，黄芩 6 克，麦冬 12 克，百合 20 克，百部 6 克，马钱子 0.3 克，鱼腥草 40 克，半枝莲 40 克，斑蝥 0.03 克，黄芪 9 克，党参 6 克，将鳖甲砸碎，研成末与其他药物加水煎熬成汁，滤渣，加糖适量收膏。每服 15 克，1 日 3 次，白开水送下。

其 他

1. 失眠的含义是什么？用什么膏方治疗？

“失眠”一词，大家都比较熟悉，但它的确切含义，至今还没有一个为大家所满意的公认的定义。失眠的表现各异，如

入睡困难，易醒，早醒，通宵不眠或睡眠不深、睡中多梦等。伙随失眠而产生不适感觉，如：疲乏、提不起精神、白天昏昏欲睡等，甚至烦躁、焦虑、紧张不安，茶饭不香，记忆力下降，工作效率降低等。失眠时间较久，服用中药膏剂可以获效，可用“不寐膏”（选自《陈莲舫医案精华》）。

处方、制法及服法：制首乌、生地、淡苡蓉、抱茯神、紫丹参、龙眼肉、白木耳各15克，枸杞子、潼蒺藜、酸枣仁、川杜仲、白蒺藜、橘络，潞党参、制半夏、麦冬各9克，佛手花、西洋参、红参各6克，建曲12克，沉香屑3克，莲子30克，阿胶、龟板胶各60克。上药加水共煎3次，滤汁去渣，合并煎液，加热浓缩，加入参水煎，浓缩为清膏，将阿胶、龟板胶烊化冲入，和匀，文火收膏。每服1匙，1日2次，白开水冲服。

如为失眠轻症，也可用合欢花、柏子仁各150克，煎2次，滤汁去渣，合并2次煎液，加适量红糖收膏。每服1匙。1日2次，白开水冲服。

2. 某些体弱的人经常有几分低热，怎样用膏方调治？

有的人由于各种原因，如长期过劳或饮食失调或患有某些慢性消耗性疾病，出现消瘦、疲乏、无力，经常自觉有几分低热，特别是在下午或傍晚时分，更觉面部升火、五心烦热等不适。有的还可出现咳嗽、痰中带血、夜间盗汗、心烦口苦、腰酸、耳鸣等各种症状。在这类患者中，有的可以通过检查得知患了某些慢性病，如结核病或溃疡病，有的虽经各种检查仍原因不明。经多方治疗，低热不退，这是怎么回事呢？中医学认为，人体应保持阴阳平衡，在某些原因作用下，使人体阴精消耗过度，于是阴阳失衡，阴不能制阳，那么“虚

阳”就容易浮越，所以面部升火、颧红、低热等症状就会出现。这种情况的本质属虚，故不能用治“实火”的苦寒清热类药，只能用“滋阴”的方法来清热。可按“清骨散”（选自《证治准绳》）制成膏剂内服。

处方、制法及服法：地骨皮、鳖甲（将其砸碎）各9克，青蒿、胡黄连、银柴胡、知母、秦艽、炙甘草各6克。上方配10剂，将药混合在一起，加水煎煮3次，滤汁去渣，合并3次煎液，加热浓缩，再加适量炼蜜和匀，文火收膏。每服9克，1日2次，白开水送服。如体虚较甚者，上方加黄芪15克。

3. 什么叫“梅核气”？用什么膏方治疗？

梅核气是指某些患者自觉咽喉部有物梗塞，却又吐之不出、咽之不下的感觉，俗称“梅核气”。患者病情常随精神情绪的变化而时轻时重、时有时无。情绪良好，梗塞感减轻或消失，情绪不佳时则症状更为明显。这些患者若进行咽部、食道X线钡剂透视时，咽喉部并无真正的肿物发现，能正常进食、饮水。患者往往情绪抑郁，常为患有此症而精神上很紧张。如果在排除了慢性咽炎、喉炎、扁挑体炎、食道炎、食道憩室、肿瘤以及一些内分泌紊乱，如：甲状腺机能低下或性腺机能减退等病变后，患者应解除精神负担，尽可能地保持心情舒畅。同时，可用中药制成膏剂内服有一定疗效。可选用半夏厚朴汤（选自《金匱要略》）加减。

处方、制法及服法：半夏9克，厚朴9克，茯苓15克，生姜6克，苏叶梗各15克，广玉金12克，佛手片9克，青陈皮各6克。上药配10剂，合在一起，加水浸一夜，煎煮3

次，滤汁去渣，合并3次药液，加热浓缩为清膏，加适量炼蜜，文火收膏。每服9克，1日3次，白开水送服。

4. 怎样才算肥胖？什么膏方可以减肥？

正常的体重和身高有一定的比例关系，标准体重的测量可参考下列公式：身长(厘米) - 105 = 体重(公斤)。如果超过标准体重20%者就算肥胖。肥胖有单纯性肥胖和疾病引起的肥胖之分。单纯性肥胖多由营养过度，摄入的热量超过身体消耗的热量而引起。疾病引起的肥胖，如甲状腺机能减退、消化功能亢进、遗传因素等引起。肥胖除有损形体美观，行动笨拙外，还增加心肺负担，有易患糖尿病，肝胆病、高脂血症、动脉硬化、冠心病、中风等病的倾向。

疾病引起的肥胖，须针对病因予以治疗。单纯性肥胖除控制饮食、少吃糖类食物、减少热量摄入外，还应进行一定的体育锻炼，以增加能量消耗。服用中药膏剂也可减肥，可用经验方(选自《大众医学》)。

处方、制法及服法：水牛角30克，黄芪、防己、白术、川芎、制首乌各15克，生山楂、丹参、茵陈、仙灵脾各10克，生大黄9克。上药配5剂或10剂，水牛角另煎3次，每次3小时，滤出药汁，再将药渣与其他药一起加水煎煮2次，每次3小时，滤汁去渣，合并2次煎液，并将水牛角煎液并入，加热浓缩为清膏。每服9克，1日2次，白开水冲服。

如果肥胖而体质壮实，常感胸膈满闷，大便秘结，目赤睛痛者，可内服中药成药“防风通圣散”(选自《宣明论方》)也有减肥作用。

5. 什么叫微量元素不足?什么膏方可预防本病发生?

现代医学知识告诉我们,人体除了需要碳、氢、氧、氮、钾、钙、镁、磷等十一种元素外,还需要铁、铜、碘、氟、锌、钼、砷、钴、硒、锰、钒、锡、镍、硅、铬等十五种微量元素。如果人体内微量元素缺乏,轻则影响健康,使人容易衰老,重则导致各种病症。预防微量元素不足可采取两种方法:一是服用人工制剂,但如服用不当,不能达到治疗效果,若服用过量还会中毒;另一种是采取食疗或内服中药膏剂的方法,实践证明这样较好。食疗法,如牛奶中有微量元素锌;杏干、葡萄干中含有丰富的铜和铁;动物食品、海产品中含有铁、锌、碘、铬等;而锰则必须从植物食品中得到补充。平时,应避免偏食,提倡主、副食,动、植物食品混合进食,不要只进精制食品,例如糙米被加工为精白米要损失55%的铁和86%的锰以及很大量的锌。许多中药含有丰富的微量元素,如黄芪中含硒;天麻中含钼、铬、钴、铜等,已知人体所必须的金属有18种,而其中有16种为中药“当归”所含有。有人研究认为,用含有某种微量元素的中药治病,可以调整体内因微量元素变化而引起的紊乱。为预防和调整人体内微量元素失常,对平时表现为气血不足,体质虚弱,头昏眼花者,可按圣愈汤(选自《兰室秘藏》)选用中药制成膏剂内服。

处方、制法及服法:黄芪、当归、白芍各120克,党参、熟地(或生地)各100克,川芎80克。上药加水煎煮3次,滤出药汁,去渣,合并3次药汁,加热浓缩,加入适量炼蜜,文火收膏。每服1匙,1日3次,白开水送下。

6. 痔疮有几种?有哪些主要症状?可用膏方治疗?

痔是直肠下端粘膜下和肛管皮下的曲张静脉团。本病多与饮食不节,经常饮酒,嗜食辛辣,长期便秘或因久坐久立、妊娠分娩等原因,使湿热下注肛门而引起。痔按解剖部位进行分类,在直肠粘膜和肛门皮肤交界处,形成一环状交错不齐的线,医学上把它称作为齿状线。位于肛门齿状线以上,表面覆以粘膜的痔核,称内痔;位于肛门齿状线以下,表面覆以皮肤的痔核,称外痔;内、外痔同时存在的,则称为混合痔。中医学上统称痔疮。本病主要症状是间歇性大便时滴血。因内痔表面粘膜被干燥粪便擦伤,或粘膜糜烂,血管破裂引起。长期出血可造成贫血,影响健康。痔块可随排便脱出,初时大便后可自行缩回,以后须用手纸将痔块托回肛门内。若痔核日久或年老体弱、气虚不能升提时,内痔脱出不及时复位,则容易发炎、肿胀、变紫,使病人疼痛剧烈,坐卧不安,称之为内痔嵌顿。外痔虽不太容易出血,但容易发炎,引起红肿疼痛。

痔疮的治疗,除局部熏洗以外,可按槐角丸(选自《太平惠民和剂局方》)加减制成膏剂内服拟清热散湿、凉血止血。

处方、制法及服法:槐角炭,地榆炭、黄芩各15克,金银花、蒲公英各30克,仙鹤草、当归各12克,生地、防风各10克、甘草6克。上方配8至10剂,合在一起,加水煎煮2次,滤汁去渣,合并药液,加热浓缩为清膏。每次服1匙,1日3次,白开水送服。

外治方面,每晚临睡前进行一次坐浴,可以改善肛门局部

循环，消炎止痛，各种痔疮都可使用。方法是：用盆盛温水（以不烫为度）半盆，或在水中加少许高锰酸钾，然后坐浴，每次约 15 分钟。若痔疮发炎，可用芒硝 30 克，明矾、五倍子各 15 克，黄柏 10 克，加水煎成药液，先熏后洗。如痔疮经常出血、脱出或发炎、肿痛，应考虑进行手术根治。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 中医膏方治病百问

作者=

页数= 1 2 5

S S 号=

D X 号=

出版日期=

出版社=

- 1 . 何谓膏方？
- 2 . 膏方应用的发展源流如何？
- 3 . 膏方有哪些功效？
- 4 . 应用膏方有哪些优点？
- 5 . 膏方的药物配伍有什么特点？
- 6 . 膏方的药物用量应如何掌握？
- 7 . 膏方选用辅料（赋形剂）的原则如何？
- 8 . 怎样自制膏剂？
- 9 . 膏剂在一年中什么时间服用较好？
- 1 0 . 膏剂如何服法？
- 1 1 . 服用膏剂应注意哪些问题？

各论

内科

一、呼吸系统疾病

- 1 . 感冒怎样选用膏方防治？
- 2 . 何谓咽炎？什么膏方可治？
- 3 . 扁桃腺有什么作用？扁桃腺炎用什么膏方治
- 疗？
- 4 . 如何分别选用膏方来治疗新咳、久咳？
- 5 . 慢性鼻窦炎选用何种膏方治疗？
- 6 . 支气管哮喘有哪些表现？怎样用膏方防治？
- 7 . 什么叫支气管扩张咯血？用什么膏方治疗？
- 8 . 肺结核用什么膏方治疗？
- 9 . 肺炎有哪些症状？可用膏方治疗吗？
- 1 0 . 什么叫肺气肿？如何用膏方防治？
- 1 1 . 什么叫肺心病？选用什么膏方治疗？

二、消化系统疾病

- 1 . 消化不良的含义是什么？用什么膏方治疗？
- 2 . 慢性胃炎是怎样一种病？选用何种膏方治疗
- ？
- 3 . 胃、十二指肠溃疡病是怎么发生的？可选用
- 什么膏方？
- 4 . 慢性肠炎该选用什么膏方治疗？
- 5 . 痢疾用什么膏方治疗？
- 6 . 胆囊炎用什么膏方治疗？
- 7 . 胆石症为什么会引起胆绞痛？用什么膏方防
- 治？
- 8 . 急性病毒性肺炎是怎样传播的？如何用膏方
- 防治？
- 9 . 慢性活动性肝炎选用什么膏方治疗？

- 疗？
- 疗？
- 疗？
- 如何用膏方保健？
- 1 0 . 肝炎恢复期肝区疼痛可用膏方治疗吗？
- 1 1 . 肝硬化是怎么发生的？有什么膏方可以治
- 1 2 . 肝硬化腹水选用什么膏方治疗？
- 1 3 . 习惯性便秘是怎么回事？选用什么膏方治
- 1 4 . 脱肛的病因、症状有哪些？用什么膏方治
- 1 5 . 阑尾炎用什么膏方治疗？
- 1 6 . 怎样预防蛔虫病？用什么膏方治疗？
- 1 7 . 怎样预防蛲虫病？用什么膏方治疗？
- 1 8 . 乙型肝炎表面抗原（H B s A g ）阳性者

三、心血管、血液系统疾病

- 1 . 高血压是怎样发生的？选用什么膏方治疗？
- 2 . 动脉硬化是怎么回事？用什么膏方防治？
- 3 . 什么是高脂血症？可用膏方治疗吗？
- 4 . 心力衰竭有哪些早期表现？膏方可治吗？
- 5 . 什么叫冠心病？用什么膏方治疗？
- 6 . 早搏是怎么回事？用什么膏方治疗？
- 7 . 阵发性心动过速是怎么回事？选用什么膏方
- 8 . 什么是病态窦房结综合征？用什么膏方治疗
- 9 . 脑血栓形成在发病前有哪些先驱症状？用什
- 么膏方可以预防？
- 1 0 . 低血压是怎么回事？用什么膏方治疗？
- 1 1 . 缺铁性贫血有哪些症状？用什么膏方治疗
- 1 2 . 血小板减少性紫癜选用什么膏方治疗？
- 1 3 . 什么叫过敏性紫癜？用什么膏方治疗？
- 1 4 . 什么叫再生障碍性贫血？用什么膏方治疗
- 1 5 . 脑溢血是怎么回事？怎样选用膏方配合治

四、泌尿、生殖系统疾病

- 1 . 血尿用什么膏方治疗？
- 2 . 尿路感染有哪些症状？用什么膏方治疗？
- 3 . 尿路结石用什么膏方治疗？
- 4 . 肾结核病有哪些症状？用什么膏方治疗？
- 5 . 夜尿多用什么膏方治疗？
- 6 . 遗尿有什么膏方可治？
- 7 . 慢性肾炎有哪些基本特点？用什么膏方治疗
- ？

- 8 . 什么叫肾病综合征？用什么膏方治疗？
- 9 . 什么叫慢性前列腺炎？用什么膏方治疗？
- 1 0 . 遗精或滑精用什么膏方治疗？
- 1 1 . 阳痿选用什么膏方治疗？
- 1 2 . 男子不育（精子异常）用什么膏方治疗？

五、神经、内分泌系统疾病

- 1 . 什么叫“甲亢”？用什么膏方治疗？
- 2 . 甲状腺肿大用什么膏方治疗？
- 3 . 糖尿病有什么特点？用什么膏方治疗？
- 4 . 什么叫尿崩症？用什么膏方治疗？
- 5 . 神经性头痛是怎样引起的？用什么膏方治疗？

？

- 6 . 三叉神经痛有哪些症状？用什么膏方治疗？
- 7 . 面瘫是怎么回事？用什么膏方治疗？
- 8 . 坐骨神经痛用什么膏方治疗？
- 9 . 何谓美尼尔氏综合征？用什么膏方治疗？
- 1 0 . 什么叫癫痫？如何选用膏方治疗？

六、骨、关节系统疾病

- 1 . 什么叫肩周炎？用什么膏方治疗？
- 2 . 什么叫颈椎病？如何选用膏方治疗？
- 3 . 什么叫骨质疏松症？用什么膏方防治？
- 4 . 什么叫腰肌劳损？如何预防？什么膏方可治
- 5 . 脚后跟为什么会痛？怎样选用膏方治疗？
- 6 . 什么叫肋软骨炎？用什么膏方治疗？
- 7 . 风湿性关节炎有哪些表现？用什么膏方治疗

？

本病？
妇产科

- 1 . 月经过少有哪些原因引起？用什么膏方治疗？
- 2 . 什么叫痛经？用什么膏方治疗？
- 3 . 什么叫“经前期紧张症”？用什么膏方治疗？
- 4 . 什么叫“功血”？可用膏方治疗吗？
- 5 . 何谓闭经？用什么膏方调治？
- 6 . 白带过多用什么膏方治疗？
- 7 . 白带过少用什么膏方治疗？
- 8 . 习惯性流产用什么膏方调治？
- 9 . 不孕症有什么膏方可治？
- 1 0 . 何谓“儿枕痛”？用什么膏方可治？
- 1 1 . 盆腔炎有哪些症状？用什么膏方治疗
- 1 2 . 什么叫急性乳腺炎？用什么膏方治疗？
- 1 3 . 乳腺小叶增生是什么病？用什么膏方治疗？
- 1 4 . 什么叫更年期综合征？用什么膏方治疗？
- 1 5 . 子宫脱垂用什么膏方治疗？

儿科

- 1 . 水痘是什么病？选用什么膏方治疗？
- 2 . 流行性腮腺炎是什么病？用什么膏方治疗？
- 3 . 小儿多汗用什么膏方治疗？
- 4 . 小儿久泻用什么膏方治疗？
- 5 . 小儿疳积（奶痂）用什么膏方治疗？
- 6 . 百日咳有什么特点？用什么膏方治疗？
- 7 . 什么叫小儿“疰夏”？用什么膏方治疗？
- 8 . 哮喘患儿在缓解期用什么膏方扶正固本？

五官科

- 1 . 口疮是怎么回事？用什么膏方治疗？
- 2 . 口臭怎么办？能用膏方治疗吗？
- 3 . 声音沙哑选用什么膏方治疗？
- 4 . 慢性喉炎的病因和主要症状如何？用何膏方治疗？
- 5 . 牙龈出血用什么膏方治疗？
- 6 . 耳鸣是怎么回事？什么膏方可以治疗本病？
- 7 . 鼻出血选用什么膏方治疗？
- 8 . 过敏性鼻炎有何特点？用什么膏方治疗？

老年科

- 1 . 老年人慢性腰腿痛选用什么膏方治疗？
- 2 . 防治老年人视力减退宜用什么膏方？
- 3 . 老年人为什么容易耳聋？用什么膏方防治？
- 4 . 老年慢性支气管炎用什么膏方治疗？
- 5 . 什么叫骨质增生症？用什么膏方治疗？
- 6 . 老年人前列腺增生症用什么膏方治疗？
- 7 . 老年人尿失禁是怎么回事？用什么膏方调治？
- 8 . 什么叫老年忧郁症？用什么膏方治疗？
- 9 . 男性也有更年期综合征吗？用什么膏方治疗？
- 1 0 . 为什么老年人肿瘤发病率较高？用什么膏方预防？
- 1 1 . 老年人服用什么膏方可以延年益寿？
- 1 2 . 中年人用什么膏方抗衰老？

皮肤科

- 1 . 脂溢性脱发有什么特点？用什么膏方治疗？
- 2 . 须发早白用什么膏方治疗？
- 3 . 慢性荨麻疹用什么膏方治疗？
- 4 . 什么叫带状疱疹？用什么膏方治疗？
- 5 . 皮肤搔痒症是怎样产生的？用什么膏方治疗？
- 6 . 面部色素沉着是怎么回事？用什么膏方治疗？
- 7 . 什么叫白癜风？怎样用膏方治疗？
- 8 . 痤疮是怎么回事？用什么膏方治疗？

肿瘤科

- 1 . 鼻咽癌有哪些早期信号？用什么膏方治疗？
- 2 . 食道癌的发生与哪些因素有关？用什么膏方治疗？
- 3 . 如何认识肺癌的早期症状？用什么膏方治疗？
- 4 . 胃癌早期有哪些症状？用什么膏方治疗？

- 5 . 如何早期发现肝癌？用什么膏方治疗？
- 6 . 结肠癌有哪些早期症状？用什么膏方治疗？
- 7 . 中年妇女为什么易患乳腺癌？用什么膏方治疗？
- 8 . 宫颈癌有哪些早期症状？用什么膏方治疗？

其他

- 1 . 失眠的含义是什么？用什么膏方治疗？
- 2 . 某些体弱的人经常有几分低热，怎样用膏方调治？
- 3 . 什么叫“梅核气”？用什么膏方治疗？
- 4 . 怎样才算肥胖？什么膏方可以减肥？
- 5 . 什么叫微量元素不足？什么膏方可预防本病发生？
- 6 . 痔疮有几种？有哪些主要症状？可用膏方治疗吗？