

嶺南草花志



嶺南草藥志

广东省中医药研究所 合編
华南植物研究所

上海科学技术出版社

內 容 提 要

广东省中医药研究所在采风运动中对嶺南草藥驗方的研究頗多收
获,并与华南植物研究所协作,根据科学分析,結合临床实践,进行調
查、訪問、整理編繪,輯成本书,特别是有关除四害、消灭疾病的草藥,被
罗載为詳尽。

本书共收載药驗88味,都是具有显著疗效,久經流傳采用,或医疗
学术单位試驗証实之当地草藥,依据品种不同,分別介紹了别名、科属
形态、生长环境、性能效用以及在临床治疗、除四害中的具体应用方法
和經驗,并配以插图,帮助讀者易于鉴别采取,以便全面掌握应用草藥
的知識。

本书不仅拓展了草藥用途,丰富了药材品种,同时也为各地医药机
构及从业人员提供了参考研究資料。

嶺 南 草 藥 志

广东省中医药研究所 合編
华南植物研究所

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

上海市书刊出版业营业許可証出003号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

商务印书館上海厂印刷

开本 787×1092 1/16 印張 12 插頁 49 字數 288,000

1961年12月第1版 1961年12月第1次印刷

印數 1—8,000

統一書号: 14119·1004

定 价: (十四) 4.55 元

前 言

本省位居嶺南，气候温和，药用植物繁多。近几年来，在党的社会主义建設总路綫和中医政策的光輝照耀下，群众积累草药防治疾病的經驗得到了推广，对人民保健事业起了很大的作用；尤其是1958年群众性的采風运动，发掘出来的資料异常丰富。事实証明，嶺南草药在长期防治疾病的实践中，为广大劳动人民所习惯使用。采取草药治病，可以就地取材，价錢便宜，疗效显著，是贯彻中医政策的一个不可分割的重要部分，我們应该把收集和推广草药經驗的工作做好。根据上級的指示，开始編写《嶺南草药志》，先后多次召开了专业性的会議，邀請省、市草医草药专家和药业老年工作者进行研究；編写人員曾到有关专区、县、市重点进行了采集标本、調查疗效等工作，經多方努力，始成此书。本书內容包括除四害、防治急性傳染病及治疗地方多发病的广东常用草药88种。对这些草药的科属、学名、性能、生长形态作了鉴定，产地分布、生长环境作了調查分析；此外，对各地应用这些草药的临床用法、用量等，也作了具体引証。过去各地在使用草药防治疾病时，常感有同物异名，同名异物，增加了不少困难，本书初步解决了这些問題。但是，由于編写人員水平有限，本书还存在一定缺点，希望广大医药同道們和科学研究工作着批評指导，以資改进。

广东省中医研究院

华南植物研究所

一九六〇年二月

凡 例

一、本書系通过整理、总结、推广使用民間草藥的經驗編写而成，主要要求能基本上解决指导臨床实用及使用草藥的有关問題，使疗效显著的民間草藥在除害灭病和防治多发病方面发挥更大作用，从而使中醫藥科學研究工作更好地为社会主义建設服务。这是編写本書的主导思想。

二、根据上項編写目的与要求，本書內容主要分列为常用名称、别名、学名、科属形态、生长环境、产地分布、药用部分(包括气味性能)、临床应用(包括臨床实验)、除四害、文献考証等項，按照項目性質，作了适当安排，并附原藥生长姿态插图，以便与文字对照，相互参考，知所鉴别，有助于解决采及移植等問題。

三、本書所載各草藥中，有系劇毒藥品，如誤服或服用过量时极易引起中毒，特附以中毒症状和解救方法，俾資注意。

四、本書文字力求通俗，技术名詞則以現代科學名詞为主，結合地方习惯名詞为輔，例如病名一項，有中名，有西名，也有地方民間习用的名称。形态中之度量衡名称則概以公制計算；由于編写时期关系，所用市秤仍以十六兩为一斤作准。

五、本書每一藥别名，是根据本省各县常用别名納入；但有些别名各地互有混淆，因此采入别名范围，只可供作参考。品种鉴定仍以本書收載的标题名称和科属形态为准。

六、本書所附的彩色插图，其中有的欠缺花果；因插图工作进行期間为季节時間限制，无法找到具有花果的新鮮标本所致。

七、附录科属、学名及药名笔画索引，以利查找。

八、文献考証，是摘录历史上主要有关草藥范围部分的一些記載，其他药用部分不属草藥使用范围的文献概从略。

九、書內藥名有以药用部分联称者，如金牛公蘆、烏白蘆、火秧筋、地胆头的蘆、蓮、筋、头等俱系广东地方习用之通俗名称，头、蘆都是指根，蓮即指枝梢嫩叶，筋即指硬刺等。

十、本書收載各藥有关用方中有为本册未及列載的草藥，将在第二、三册繼續列出。

目 录

丁哥王.....	1	旱蓮草.....	70
丁癸草.....	5	金香爐.....	72
三鞭苦.....	7	金櫻.....	78
土牛膝.....	9	狗肝菜.....	75
土銀花.....	11	青蕒.....	76
土狗.....	13	乳汁草.....	78
山梔.....	15	紅蘿卜.....	80
山大顏.....	17	紅莧菜.....	81
山芝麻.....	18	南瓜.....	82
千張紙.....	20	苦棟.....	84
大茶蔴.....	21	烏柏.....	88
大蒜.....	24	桃樹.....	91
大叶双眼龙.....	28	茶肤.....	94
大叶桉.....	31	臭蕒 附：土荆芥.....	97
大浮萍.....	33	除虫菊.....	99
广东金錢草.....	35	野菊花.....	101
五指柑.....	38	曼陀罗.....	104
五月艾.....	40	魚藤.....	107
水翁.....	42	魚腥草.....	108
水楊梅.....	43	崗稔.....	110
火秧霸.....	45	崗梅根.....	112
火炭母.....	47	貫众.....	113
木槿子.....	48	崩大碗.....	117
半边蓮.....	51	痕芋头.....	119
白花丹.....	55	繡叶七星劍.....	122
白花茶.....	57	黃皮.....	124
白鶴藤.....	58	番薯.....	126
白背叶.....	59	番石榴.....	128
布狗尾.....	60	菸草.....	129
布渣叶.....	61	黑面神.....	131
瓜子菜.....	62	葫蘆茶.....	133
地胆头.....	63	路兜筋.....	135
夹竹桃.....	68	椰果.....	136
羊角扭.....	69	較剪草.....	137

铁线草.....	138	荠菜.....	165
铁包金.....	140	鹅不食.....	167
辣蓼.....	142	蟾蜍附: 青蛙.....	171
鳳尾草.....	145	糯稻根.....	174
蒼耳草.....	148	雞骨草.....	175
算盘子.....	151	雞屎藤.....	177
榕树.....	152	蘿卜.....	180
苘麻.....	154	鷹不泊.....	182
樟树.....	158	科属索引.....	183
樟柳头.....	160	学名索引.....	185
鴉胆.....	162	药名笔画索引.....	187
鴨脚木.....	164		

了哥王

Wikstroemia indica C. A. Mey.

别名：南嶺莢花，地棉根，山臘皮，熱薯，熱珠，埔銀，九個藥，雀仔麻，假黃皮

科属形态 本品系瑞香科山臘皮属的一种分枝小灌木。高80~60厘米，有强韧纤维质的内皮。单叶，对生，纸质，近无柄，倒卵形至矩圆形，长2~5厘米，宽8~15毫米，两端均钝或短尖，边全缘，侧脉多数，极细。夏初顶生近无柄的丛生花序，无苞片；花被管状，黄绿色，秃净或近秃净，长约8毫米，裂片钝，长约2毫米，雄蕊8枚，2列，着生萼管喉部，花丝短；花盘的鳞片4枚，但通常两两合生而成2枚；子房上位，1室，胚珠1颗，柱头大，生于极短的花柱上。花后结浆果，卵形，长约6毫米，熟时大红色。

生长环境 生于荒山酸性土丛草或灌木丛中，粘质土壤，甚至浅薄表土的山岗、丘陵地带也有生长。夏季采叶，秋季采根。

产地分布 印度经马来至我国南部，南至澳洲。我国贵州、云南、广东、江西、福建、台湾等地均有分布，本省丘陵地带和台地均有野生，普遍，散生或丛生。

药用部分与气味功能 叶、根二层皮。叶有腥气，味苦，性寒有毒，如加酒九蒸九晒或久熬可降低其毒性，性亦由寒转凉。能攻诸结毒、结肿，及诸郁热、郁湿，顽痰怪症。

临床应用

1. 隔食 用化气草、了哥王、穿破石，先以了哥王二皮约1两度加食盐1撮，捣烂冲滚水服。如有呕吐，翻服下方：化气草、穿破石、桐油桐子壳少许，服法同上。（陈士苓献方）

2. 麻风

(1) 广东省皮肤慢性病防治研究所刘仲溥用了哥王治愈麻风病例很多，获得很大经验，方法：以晒干了哥王根4市斤，加水25市斤，煎煮5小时滤出，再将渣加水25市斤，煎5小时滤过，将两次煎液合併，即得了哥王煎剂。成人每次30毫升；1~3岁每次10毫升；4~8岁每次15毫升；9~12岁每次20毫升。（《广东中医》1957年第1号）

(2) 广西县广宁麻风防治站实验用了哥王根5斤，荆芥、秦艽、苍耳子、土茯苓、当归、陈皮、首乌、苍朮各4两，川乌、川牛膝、大风子肉各3两，羌活、桂枝各2两，菟丝子5两，炒熟米粉14两。制法：将了哥王切成片，加清水25斤，煮5小时，约剩水6斤，将水滤出另器装起，再加水25斤和药渣再煮5小时，约煎剩水6斤，将水倒出与前药液混合，以文火浓缩到3.5斤。将荆芥、秦艽等14味共研细末，与了哥王液混和，煮成稠糊状，加入熟米粉捏成丸剂，晒干备用。服用法：在第1~4周每天内服10克，早晚用开水或米汤送服，连服6天则休息1天；第5~8周每天内服15克，其他同上列所述；到9~13周以后，每天内服20克；14~17周，每日内服25克，均同上所述服6天休息1天。第18周以后，如病情情况良好，可酌量加至每天35克为止。服药剂量根据病者身体条件，及年岁病情进展等具体情况而定增减。服药不须特殊禁忌，一般忌酒、酸、辣、房事。此方在1年来的治疗观察，体会它具有4优点：1)无副作用，见效迅速。2)不发生反应，服药安全。3)虽类药治疗发生反应时可用它代替，亦收效果，不致疗效中断。4)具有促进食欲改善健康之功。本方经实验麻风病12例；其中有经服氯霉素无效或起不良反应，有早期和晚期的，计有瘤型3例，结核样型9例，疗效显著。一般在服药1~2月后，斑状损害开始缩小，知觉开始恢复，6个月后斑状大部分或全部消退，知觉完全恢复。服后无副作用。

(3) 埔銀根5斤,蒼耳子根4斤,切片,加水18斤,煎至8斤,其渣再加水18斤,煎剩8斤混合過濾,每1000毫升加安息香酸1.5克,每天早晚各服15毫升。(潮陽縣陳龍揚鍾江等獻方)

3. 鉤虫病

(1) 台山县海晏、四九、水南等医院用熬珠根(丁哥王)1斤,糖子0.5斤,清水3斤,煎至1斤水(濾过),加安息香酸0.2%防腐。用法:空腹服,每次20毫升,隔3小时服1次,共服2次,第2次服完后服泻盐20克,經实验10多个病例(每个檢驗有2~4条鉤虫),服药后培养鉤虫阴性;以該药水滴入鉤虫中很快死亡。此方制法简单,药物易取,既經濟,又无副作用(絕少数有些微量、腹痛),效果良好。(<广东中医>1960年第1号)

(2) 博罗县中医学校制成南岭菊花液在門診部实验治疗鉤虫,通过10多个病例的实验,認為效果很好。实验証明,它治鉤虫病是溶解虫体的作用(取活鉤虫浸入南岭菊花液中24~48小时以后,虫体即逐渐溶解为水),同时也証明它的毒性反应远不如文献上記載的严重,在临床上可以广泛使用。制法:取干藤丁哥王10斤,加水60斤,煎至20斤,傾出過濾,將渣再加水60市斤,煎至30市斤,再過濾,再煎,如此反复4次,最后將4次煎液混合一起,濃縮至5000毫升,加入0.3%苯甲酸,過濾裝入已消毒的瓶中密封备用。成人每天服2~3次,每次服20~30毫升。在医生指导下使用。

4. 晚期血吸虫病 紅藤烏柏樹根、丁哥王二層皮,每味5錢,煎水服之。(劉鏡昌獻方)

5. 腹脹

(1) 地棉根二層皮(去粗皮)干者5分,麝香1分,米粉5分,共研末,加蜜糖为小丸,早晨服,同时注射樟脑液、葡萄糖、維他命B₁₂混合剂,以后隔2~3天服1料,再后隔2~7天服1料。又可单用地棉根二層皮,每次5分,研末开水送服,如症狀減輕可減至3~4分。(和平苏恩傑獻方)

(2) 丁哥王二層皮3錢,湯煎煎水服。服后可能有嘔吐反应,疗效很快。(中山前山卫生院獻方)

(3) 用去粗皮地棉根5分,加熟米粉少许,再加滑石粉3錢,加糖調味为1剂,可服2~3剂,服至腹水消后,再用淮山2兩,芡皮3兩,澤瀉2兩,丹皮2錢5分,熟地1兩,牛膝1兩,車前子2兩5錢,田七2錢,地棉根4錢,研末制成小丸,每日服1次,每次服3錢。此方有根治腹水之效,經此方治愈者,四年未見复发。(紫金中環區溫瑞英獻方)

(4) 鮮地棉根2兩,紅枣肉5錢,由乳1錢,研末煉蜜为丸如綠豆大,每次服1錢5分,开水送下。服后2小时即瀉,如大瀉不止,可飲米粥解之,其瀉則止。(潮連中医驗方2集)

(5) 將鮮丁哥王二層皮晒干为末,以糯米粉为小丸,每服3錢,开水送下。服后1小时左右即下瀉,一日間腹部分消除七八成。以后用金匱腎气丸善后,仍間服少量丁哥王丸更妙。(广州中医學院进修鄒罗汝恒獻方)

(6) 地棉根二層皮晒干研末1錢,滑石粉3錢,生米粉少许为丸,朱砂为衣,如綠豆大,半饥时1次服完,每隔2天服1次;后用八味丸1料加地棉根2錢为丸,早晚空腹服,忌食盐类物品。(紫金藍塘卫生院鍾南福獻方)

(7) 地棉根2兩,紅枣肉5錢,研末加蜜为丸,每服1錢5分,开水送下。如大瀉,可食米粥則止。(翁元县雷洁如獻方)

6. 风湿骨痛

(1) 埔銀根5錢,白漆根1兩,土藤头1兩5錢,狗脚迹、瓦母头各2兩,刺葱根1兩,以清水3碗,煎剩1碗服之。(汕頭潮陽縣唐何瑞聯獻方)

(2) 晒干丁哥王皮(取地下根皮),每1市斤加水8市斤4兩,煎煮5小时(約剩1市斤),將水濾出,再加同上水量將渣再煎5小时,將水濾出,与第1次煎得的水合并,即得丁哥王煎剂,每日服3次,成人每次30毫升;1~3岁每次10毫升;4~8岁每次15毫升;9~12岁每次20毫升;13岁以上可按照成人剂量。如按上述方法泡制,剂量及服法,則全无毒性,效果良好。(<广东中医>1960年第5号陽春县馬水錫山矿站保健站陳景美獻方)

(3) 每天用丁哥王根3錢,鷄肉4兩,加适量水燉7小时,一次服下。此方治麻风、风湿骨痛,获效

例子很多。(博罗中医学校献方)

7. 哮喘,百日咳,腮腺炎 每天用了哥王根3钱,猪肉4两,加适量水煎7小时,一次服下。(博罗中医学校献方)

8. 赤痢 丁哥王5钱,煎水服,即泻下而愈。(新丰县卢日灵献方)

9. 妇科风结腹痛 增银2钱,增姜3钱,山甘草1两,水煎汤,和有壳鸭蛋同服;外敷:青金刺皮,增银叶,共捣烂加酒焙热贴之。(潮阳县陈唐、何瑞卿献方)

10. 鹅喉

(1) 雀仔麻根白皮5~6钱,煎水一小碗服。(江門罗南曾兆源献方)

(2) 取生增银叶2~3两(系5~11岁患者的一日一夜量),捣碎后放于手掌中,用两手压出药汁,边压边用冷开水冲下,压至无粘质为止,共约得药汁250毫升,再将药渣煎水,待冷后冲药汁给患者服。每小时服1次,每次服1汤匙,日夜不间断,连服3天3夜,服时可加入少许白糖。此方对白喉疗效迅速,经过良好,无反应。(潮阳县关埠卫生院献方)

11. 牙痛 地棉根二层皮,取黄豆大放入牙肉。(梅县李子忠献方)

12. 疳腮

(1) 广州刘仲汤医师经验,每次用了哥王根3钱,加水久煎,作一日一次服,治流行性腮腺炎甚有效。

(2) 丁哥王根4两,土银花4两,石蜡油1斤,薄荷根1斤(用二皮),共为末,贴用水调敷患处。(广州市中医进修班学员献方)

13. 热眼起膜 增银根叶、鸡蛋白、黄酒各适量,共捣烂,做成药饼状,敷上患眼,二三天即愈。(徐闻县杨正权献方)

14. 痰火瘰(腋下鼠眼生痰瘰或四肢关节疼痛)

(1) 生地3钱,地龙3钱,百足2条,川贝2钱,白芍3钱,甘草1钱,枯草3钱,银花2钱,加丁哥王根2钱(去皮青),水煎服。孕妇忌服。(广州市中医进修班范宁辉献方)

(2) 假黄皮叶(丁哥王)5钱,加入食盐少许,共捣烂敷患处,约敷3~5次可愈。(惠阳县黄焕然献方)

15. 乳癌、乳瘤

(1) 地棉根叶、苍耳子叶、一包针叶、水辣藤叶、单金刺叶、山梗叶、七枝莲叶各适量,酒醉半个,黄糖一小块,共捣烂敷患处,每隔8小时换药1次,连敷3~4次即愈。(梅县谢佛招献方)

(2) 丁哥王根加入食盐少许,共捣烂敷患处。(惠阳县黄焕然献方)

16. 瘰癧丸 丁哥王根(约七寸长)去皮切碎,猪小肚(膀胱)1个,净水适量,同煮四小时取服,连服数次即愈。(台山县李略平献方)

17. 辟毒

(1) 苦藤根、九信药、翻洋花梗、田七、芋麻头、红薯莨、美滴藤、朴李、水银(另制后入)每味8两,豆油12斤,将药炸枯滤净,去药渣,每油1斤加入黄丹8两,樟脑1两,先落黄丹后落樟脑,共调匀即成药膏。此膏能治一切疮科烂肉无名肿毒,并能拔出入肉之铁钉、竹木刺、玻璃等,均有良效。(东莞清溪乡医院姚北流献方)

(2) 晒干丁哥王根十蒸九晒,每服1两或数钱,煎水冲酒温服,去毒消肿止痛。(云浮县区仲仁献方)

(3) 丁哥王根晒干,成人量1~2两,多量水久煎,分2~3次饭后服。(博罗中医学校献方)

18. 鼠眼瘰癧 丁哥王根洗净切片,鸡蛋2只,水3碗,共煮至鸡蛋熟后,取出,用针在蛋的一端刺一小孔,再入煎,至水干为度,然后将鸡蛋去壳空腹服。(广州中医学院进修部李蔚良献方)

19. 蛇头瘰癧 丁哥王二层皮为末,鸡蛋5只,将鸡蛋顶上一孔,每个鸡蛋入了哥王粉1分5厘,搅匀煮熟,给患者服,每隔2小时1个。(清远县梁伯唐献方)

20. 梅毒、下疳

(1) 地棉根叶 2 两, 青壳鸭蛋 1 只, 先将鸭蛋轻轻打裂, 和地棉根叶加水适量煎 4 小时, 至水干为度, 取蛋去壳, 热酒送下。冷食无效; 服后卧床盖被。(锦平县卢秀材献方)

(2) 雀仔麻根 5 钱, 菊苣菜 1 两, 煮鸡蛋 2 只, 分 2 次服。疳疔、鱼口、便毒均效。(都南陈毓康献方)

21. 蛇、蜈蚣咬伤

(1) 丁哥王、两面针、田基黄、六月雪、盐铺霜各 5 钱至 1 两, 将上药共煎水 5 大碗, 先饮半碗, 不可多饮, 余药水洗患处。孕妇忌服, 食猪肉可能令筋缩, 宜戒。(云浮县赖章献方)

(2) 丁哥王根晒干用, 九蒸九晒, 每服用 5 钱至 1 两, 煎水湿服。(云浮县区仲仁献方)

(3) 地棉根叶酌量, 煎水服和洗。(合浦李德才献方)

22. 跌打

(1) 丁哥王皮 1 两, 用酒浸出味, 擦患处。(中医学院进修部罗汝桓献方)

(2) 白花地棉根, 每次 2 两, 加黄酒, 与猪蹄同煮食。(蕉岭第四人民公社北露卫生院陈德桂献方)

(3) 丁哥王根(浸) 4 两, 鸡蛋 1 只, 白酒 0.5 斤, 先将丁哥王为粗末, 用无油腻的锅炒至略焦, 加酒调湿再炒干, 同法连炒 7 次, 在末次以余下之酒倒在锅内, 将鸡蛋打开置酒内煮熟取出, 隔开酒和蛋, 尽酒量饮, 余渣在痛处敷一宿, 永不复发。(新兴县另竹赵仲权献方)

23. 拔枪弹及竹刺入肉 用了哥王和黄糖, 捣烂外敷患处。(蕉岭南露卫生院陈瑞祥献方)

除四害

1. 灭子丁

(1) 广西用了哥王干叶湿浸后投污水中, 每 100 斤污水用 2.3 斤, 经 24 小时, 死亡率 100%。(《药学报》1969 年 4 月号, 中医研究院中药研究所整理)

(2) 中央昆虫所试验, 用了哥王 20 倍水浸液, 对子丁杀虫率为 88%。(中国土农药志)

2. 灭蝇蛆 了哥王 15 斤, 乌桕叶 1 斤, 尖嘴辣椒 15 斤, 野芋头 7 斤, 苦楝叶 1 斤, 生熟茄子 0.5 斤, 茶仔饼 1 斤, 加水 30 斤, 煎煮 3~4 小时即成。同时将此水倒在粪坑里, 大约每缸粪用 1500 毫升(10~15 杯), 蛆虫接触后 4~5 小时便开始死亡, 隔夜便全部消灭。(《广东省消灭疟疾工作表名现场余献资料汇编》强固清经验)

文献考证

1. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载了哥王曰: 有大毒, 能杀人, 味辛, 性平, 此药能毒狗, 狗食之必死。清热毒疮。其子敷疮痛疽, 其叶和盐捣烂, 能去皮肤红黑瘀血, 鼓毒消肿, 手背生肉皮头, 可撕皮扎之自愈。其根名毒除根, 十蒸九晒, 治跌打将死, 酒煎服即回生。亦治毒恶疮, 和蜜捣敷。其子红色, 八哥雀爱食之。为末, 遇损伤惨之, 即止血。

2. 现代胡翼舜《山草药指南》载了哥王曰: 其根名毒除根, 十蒸九晒, 治跌打将死, 酒煎服即回生, 为末能止血。其子捣敷痛疽甚效, 捣敷疮毒, 能清热解毒。其根煎水服解花柳毒。其叶外敷能去皮肤红黑瘀血。

3. 现代陈立群撰《广西中兽医药用植物》载了哥王条曰: 其叶、皮可为最牛毒疮用。治猪瘟、猪丹毒。

丁 癸 草

Zornia diphylla (L.) Pers.

别名：鋪地鋪，苦地枕

科属形态 本品为蝶形花科丁癸草属中的一种矮小、一年生成或多年生宿根草本。茎纖細，綫形，分枝，披散或直立，高15~40厘米。复叶，紙質，互生，有小叶2枚生于叶柄之頂，披針形，长8~15毫米，有时长达2厘米，先端短尖；托叶卵状披針形，基部着生处伸延而成一距，有明显的脉数条。春季頂生总状花序，长2~6厘米，有小花2~10朵，黃色，为一对卵形的苞片所包藏，此苞片长约6毫米，基部着生处下延成一距；萼小而薄，上面2枚裂片合生，側面2枚小，最下一枚狭；花冠极突出，旗瓣圓形，翼瓣倒卵形或矩圓形，龙骨瓣內弯，短尖；雄蕊一束，花药2型，子房上位，无柄，有胚珠数顆；花柱綫形。花后結莢果，由2~6个莢节所成，外面通常有小刺。

生长环境 多生于草地上。夏天收采全草。

产地分布 分布于热带各地。本省以香順附近各地为多产。

药用部分与气味性能 全草。嗅无，味苦甘，性寒。能去痰火，清肝热，消痰，凉血，解毒。

臨床应用

1. 急性胃腸炎 丁癸草6錢，蝦壳草(老公根)5錢，蛇舌草2兩，上药共搗烂和盐水少許取汁，每次服1杯，每隔2时服1次。(广州中医学院进修部罗振华献方)
2. 黄疸(阳黄) 丁癸草(干)8錢，生魚1条，煎水服，每日1次，連服8~4天痊愈。(佛山馮秀嫻献方)
3. 喉头炎 将丁癸草調酸醋揉烂，放于口內含服。(广州中医学院进修部黃令煊献方)
4. 痰热腹痛(如肩背結聚而痛) 生丁癸草2兩，加酒适量，浸出后內服 $\frac{1}{4}$ ，余 $\frac{3}{4}$ 在痛处擦20分鐘，連用1~2天即愈。(丰順县刘庆坤献方)
5. 男女夹色 丁癸草8錢，老鴉孙5錢，共搗烂冲酒榨汁加蜜糖煮熟，服即愈。(陈輝南献方)
6. 跌打旧患疼痛 丁癸草2兩，猪骨肉1兩，好酒0.5兩，共煎15分鐘，冲酒服。服后3小时覺患处有些顫动，以后很舒服，此即药力的反应，一服即見效。(广州中医学院进修部伍少明献方)
7. 痛症 丁癸草全草酌量洗淨，加蜂蜜少許，共搗烂敷患处。(广州中医学院进修部蔡振藏献方)
8. 无名腫毒 丁癸草、梅片、北細辛、地龍根，各药酌量，共搗烂敷患处。
9. 牙痛 将丁癸草和食盐搗烂，敷于患处即消，或拔出膿液即愈。(吳德材献方)
10. 痔瘡 丁癸草4兩，銀花4兩，苦楝皮4兩，以水煎出味，倒于浴盆內，乘热坐于盆上熏肛門，待水稍凉后即坐于药水內浸洗，約浸半小时即可，每日1~2次，連服4~5天即愈。(汕头市献方)
11. 毒蛇咬伤 丁癸草5錢，老鴉胆叶3錢，假油麻連根4錢，以水1大碗煎至2茶杯，冲酒适量飲下；并以少許外搽伤口周圍，伤口处勿搽。此方效果很好，对一般危症均效。(曾伯傳献方)
12. 飞蛇咬伤 丁癸草不拘多少，蚯蚓2条，共搗烂和白酒涂擦伤口周圍。

文献考証

1. 清代何克謙撰《生草药性备要》載丁癸草曰：味甜性溫。敷大瘡，其根煎酒解熱毒，散痛疽，治疔瘡，治牛馬疔，共蜜糖外敷。治馬嘴疔，調蜜敷。急合瘡口，用根存性为末修之即愈。亦治蛇伤。
2. 现代肖步丹撰《岭南采药录》載丁癸草曰：味甘性溫。敷大瘡。其根煎酒，解熱毒，散痛疽。治牛

馬疔毒，和蜜搗敷。治馬嘴疔，生于上唇人中处者是，調蜜敷。合諸瘡口，連根煨存性為末，搽之。亦能治蛇傷及瘰癧。

3. 現代胡眞雲《山草藥指南》載丁癸草曰：取葉搗爛加蜜糖少許敷馬嘴疔，散毒生肌，其根煎酒服。取其根煨存性為末，添蛇咬傷。

三 桠 苦

Evodia lepta (Spreng.) Merr.

别名：三牙苦，三桠虎，三叉虎

科属形态 本品系芸香科吴茱萸属中的一种灌木；树皮灰白色，不剥落，嫩芽具短毛，其余秃净。指状复叶，纸质，对生，叶柄长4.5~4厘米，小叶8片，矩圆形，长椭圆形，长5~15厘米，宽2~5.5厘米，先端渐尖或急尖，基部渐狭或楔形而成一短柄，边全缘，叶面深绿色，背淡绿色，两面光秃。夏季腋生圆锥花序，有对生而扩展的分枝，长2.5~6厘米，被小柔毛；单性花，白色，直径约2毫米，生于短而细弱的柄上；萼4枚，矩圆形，长不及1毫米，具短毛；花瓣4枚，卵圆形，长不及1.5毫米；雄蕊4枚，长过花瓣的2倍，着生于花盘的基部；子房上位，4裂，被毛，通常4室，每室有胚珠2颗；花柱生于心皮的中央，花柄长1毫米。花后结蒴果，由4个分离的心皮所成，直径4~6毫米，间有退化为1~3心皮的果，直径4~6毫米。种子黑色，圆形，径约3毫米。

生长环境 生于荒山、丘陵，由山谷、溪边至山顶疏林下或高草丛中，半阴生。夏季采叶。

产地分布 我国南部各省，印度、菲律宾、日本、越南，均有分布。本省以化县附近各地为多产。

药用部分与气味性能 根皮、叶。嗅无，味苦，性寒。能清热毒，退大热，为湿火骨痛常用有效药。

临床应用

1. 脑炎 初期用三桠苦3钱，清水煎服，服至全愈为止。（中山石岐市梁德生献方）
2. 肠胃积滞痛 三桠苦5钱，山芝麻5钱，山芥兰3钱，牛牯楔5钱，独头姜3钱，九节茶3钱，白面风3钱，毛射膏2钱，煎服，连服1~4剂。（江門上步李树荣献方）
3. 耳内疮 三桠苦叶30片，好酒1碗，共置于罐内，用纸垫好，中央钻一孔，以火烧热后取其蒸气熏鼻孔，左耳痛以左鼻孔吸其蒸气，右耳痛以右鼻孔吸其蒸气而愈。（五华李叔敬献方）
4. 解钩吻中毒 三桠苦叶干者用2两，生者酌加，煎水服。（广州中医学院进修部曹南华献方）
5. 骨折
 - (1) 三桠苦、黄荬树、驳节茶、散血丹、透骨消、青力根、桃叶、韭菜头、老姜，上药酌量，共捣烂，加入好酒煮熟，但先以正骨手法将骨折复位后，才敷上药，用绸带绑好，不要转动。敷至对时即除去药，再将上药煎酒涂之。（韶关新丰县李得献方）
 - (2) 三桠虎4钱，千打捶5钱，千吊金钩4钱，乌脱骨3钱，黑尾草4钱，五加皮5钱，还魂姜3钱，川加皮3钱，生姜3片，和糯米饭适量，黑凤鸡（即鸡仔蛋）共捣烂敷对时即可。该方对骨折、刀伤、炮伤均效。（浦北兆通渠川献方）
 - (3) 三桠苦、红糯米，每味2两，火药1两，小雄鸡1只，两面针、雨伞根（春天用叶，冬天用根皮）酌量，共置于白内捣烂，加酒置铁锅内慢火炒熟，待温和后敷患处，外用木皮夹好，绸带固定，敷至24小时去药，一服即能将骨接好。（李专后献方）
6. 跌伤泄气（休克） 三桠虎洗净2两，蚯蚓5条（剖开洗净），共捣烂冲米酒适量灌下。又可用黑狗

胆汁1个,白蜡5钱,加入蜜便冲服,即愈。(李时珍方)

7. 鼠咬伤发作引起淋巴腺肿 三桠虎叶2钱,黄糖酌量,共捣烂冲滚水服,连服数剂。外用黑叶蕊、枝肉敷患处,连敷数次即愈。(新兴高林卫生院赵启鹏方)

8. 毒蛇咬伤

(1) 用三桠虎根皮酌量,捣烂敷患处,能消肿止痛。(清城卫生院廖师华方)

(2) 青蛇咬伤用三桠苦、老鸦仙各适量,好酒4两,拌药捣烂,取汁服下。另将药渣敷患部周围。(金沙镇周日星方)

文献考证

1. 现代胡翼撰《山草药指南》载三桠苦曰:味苦,性寒,清热毒,凡跌伤发热作痛,煎水服即止。

2. 现代陈立群撰《广西中兽医药用植物》载三桠苦曰:用根叶治牛挂蹄症。

土 牛 膝

Eupatorium chinense Linn.

别名：六月雪，六月霸，斑骨相思，多须公

科属形态 本品系菊科泽兰属的一种多年生草本，有粗条状圆形的须根，茎细，圆柱形，有细致的纵条纹，略被毛。单叶，纸质，对生，卵形或披针形，长2.5~5厘米，宽2.5~3厘米，先端短渐尖，基部阔楔形，边缘多少有粗齿，无毛或近无毛，有半透明的腺点；叶柄长约5毫米。秋季顶生头状花序，以伞房花序式排列；总苞片约10枚，不等大，复瓦状排列，外列近圆形，较小，内列的矩圆形，稍大；花两性，管状，5裂；雄蕊4~5枚；花药合生，基部钝；子房下位，1室，有胚珠1颗。瘦果有棱，顶冠有细毛，毛长于果。

生长环境 生于较湿润的荒地上，或村落附近路旁阴湿的隙地。

产地分布 我国、印度、日本均产。本省各地均有分布，普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 根。嗅无，味甘苦，性凉。能宽筋活络，解热凉血，宣痹行瘀。

临床应用

1. 预防白喉 (1) 新会棠下医院邓树棠医生根据老中医黄华庭经验，在该地白喉开始流行时，试用土牛膝煎剂或干青粉方法预防白喉病，结果控制了白喉的传播，初步收到预防效果。服法：小儿及成人每天用鲜土牛膝根0.8~2.0两，作2~3次分服。江門北街医院也作试验，证明有预防效果。

(2) 广州市西区防疫站在该区内发现有白喉传染时，对区内幼儿园展开服用土牛膝预防，很快便控制了白喉的传播，在观察过程中认为收到初步有效预防时间为15天；如疫情未扑灭，可服第2个预防用量，服法：小孩每日用土牛膝干根粗末3~5钱，经三次水煮，收集过液浓缩成为浓缩液，分1~3次服，连服4天，为1个预防用量。

(3) 广东省中医药研究所将土牛膝煮取煎液加砂糖再浓缩制成糖浆剂，目的便利儿童作预防服用。先后与锦电医院、广州市北区防疫站合作，同样证明了有预防和控制白喉传播效果。该两单位实验地区由于及时发现，控制后即无新病例发现，因此未能详细研究预防有效时间。

2. 治疗白喉 广东省中医药研究委员会于1957年总结了新会和佛山专区第二人民医院全面推广使用老中医黄华庭治疗白喉经验结果：1) 配合辨证论治法广泛治疗，在白喉流行期间对白喉、疑似白喉、咽喉炎症疗效显著确实。2) 采用土牛膝桑菊汤或土牛膝并阴清肺汤实验治疗白喉，均收到良好效果。中医治疗白喉经验交流会议在江門北街医院召开以后，广东省卫生厅即将这经验介绍到佛山专区和其他各专区推广使用，番禺、顺德、鹤山等县均重点采用，取得治疗成绩，解决了使用白喉抗毒素存在的困难，广泛地挽救了白喉病者的生命，并总结出中西医合作治疗经验，即以中医治疗为主的同时，用西医鼻饲、喉插管术、输液、给氧、强心急救和预防其他细菌感染、预防急性心脏麻痹为辅，体现了中西医合作到合流创造我国新医学派的优越性。附使用辨证论治各处方：1) 阴热白喉，症见喉中微痛，起有白块、白条或白点，脉象数而无力，或有微发热，甚或喉间白块、白点溃烂，痛楚难当，主用土牛膝并阴清肺汤（土牛膝根1两，生地1两，元参8钱，麦冬6钱，川贝4钱，丹皮4钱，白芍4钱，甘草2钱，薄荷2钱5分）。2) 阳热白喉，症见面赤唇裂，牙肉腐烂，口臭舌焦，发热口渴，喉间溃白，痛楚难当，脉象数实而大，主用土牛膝神仙活命饮（土牛膝根1两，石膏5钱，生地1两，栀子4钱，羌活4钱，胆草4钱，白芍4钱，黄柏4钱，薤白4钱，板蓝根4钱，甘草2钱）。3) 风热白喉，症见喉间起有白点、白块或白条，头痛恶寒，发热或

不发热，脉浮而带数，主用土牛膝桑葚汤（土牛膝根6钱，桑叶4钱，葛根1两，薄荷8钱，川贝4钱，甘草2钱，木通3钱，竹叶3钱，银花4钱，蜜皮4钱）。

3. 喉痛、双单蛾喉 六月雪鲜根0.5斤，捣烂榨汁取自然汁，加盐少许，或和熊胆皮、甘草适量，煎液汁缓缓吞咽，并留一部分含漱。（揭阳御甲豪，广州中医学院进修部余庆光等献方）

4. 牙疳肿痛 铁香爐、北細辛、桔梗、入地金牛、土牛膝根、甘草梢各适量，煎液汁趁热含漱，一日十数次。（江門鍾錫予献方）

5. 感冒高热（头痛、眩晕、口渴）（1）六月雪2两，切碎煎液汁，加蜜糖调服。（李士宽，龙川县防疫站献方）

（2）六月雪3钱，果盒草5钱，生木园根5~7钱，牛斗孟5钱，砂甘草5钱，灯笼草3~5钱，小儿酌减；如高热昏迷，倍用六月雪；如有呕吐，加痰芋头（广东狼毒）去皮1两同煎。（龙川县黄亚兰献方）

6. 血淋（1）土牛膝根4钱，香豉5钱，熟地4钱，黄柏4钱，知母4钱，熟附子3钱，肉桂心3分（另捣），王不留行3钱，甘草梢1.5钱。如夜間淋頻加淮山5钱，銀斛3钱。（番禺石礮園大龙医院孔錦榮献方）

（2）土牛膝根4两，加少量米酒和水煎服。（龙川县甘雨卿献方）

7. 劳伤胸膈（胸膈）吐血或吐血（1）土牛膝2两，土人參4钱，雞骨香4钱，过江龙4钱，过山香4钱，牛大力4钱，江柏（枳）根3钱，白毛雞屎藤头2钱，血見愁2钱，出血絲米1钱，上元叶4钱，紫背天葵2钱，水5斤，煎取12两，一日3次分服。重症倍量煎取12两，服法同上。（新兴洲口乡墟墟村温文萍献方）

（2）薑桂兴献方多九龍根4钱，加猪精肉同煎服。

8. 眼红肿痛 六月雪（又名七星草）捣烂贴眼外，二次全愈。（韶关新丰县献方）

9. 石灰伤目 急取新鲜根捣汁敷患眼上，止痛消肿。（汕头縣献方，五华县峰联安公社孔瞻五献方）

10. 湯火伤 六月雪煎取液汁冷敷患处。（龙川县陈嘉珍献方）

11. 外科肿毒 六月雪叶、地棉根共捣烂敷患处，或用七星草、山茨菇浸酒涂患处。（新丰附城鎮陈亚平、陈亚运献方）

12. 蛇头瘡指（瘡疽） 六月雪鲜根1两，蜚蠊虫10只，米酒3两，水1碗，同煎成液汁，待温浸患指，冷则换浸温液，至痛止为止，曾治疗多人，疗效显著。（东莞麻涌医院莫錦福献方）

13. 刀伤出血肿痛 六月雪、紅灯籠、假油麻、三叶蓮等量，加生姜3钱，捣烂敷患处，忌見生水。（分界圩嶺池献方）

14. 毒蛇咬伤 六月雪根酒浸液液外涂紅肿处；另用六月雪3钱、山芝麻3钱、金錢貼3钱、走馬風3钱，水酒各半煎服。（罗宵峯，清遠山塘乡卫生院溫錦光，新丰县附城鎮陈亚平等献方）

15. 狂犬病 六月雪根1两，煎液汁，日服一次，連服数天。（云浮县高凉，郁麟卫生院彭耀卿献方）

文献考証

1. 宋代夏德撰《卫生易简方》载土牛膝治折伤閃肭，搗搗之。

2. 赵学敏《本草綱目拾遺》载有六月霜，李时珍《本草綱目》曲节草一名六月霜，所述形态即今之土牛膝，而效用亦相符合。霜雪形似，往往并称，故俗又名六月霜。《綱目》引《圖經本草》载六月霜曰：甘平无毒，治食背消痛拔毒。赵学敏称余館率化，邑人暑月俱以此代茶，云消食解暑，于腹下气消食，更甚于枝叶，五月內山村人率刈乾束縛，挑入城市售賣，如干蕒蒿状，而长大倍之，莖上綴白珠成穗。

3. 清代赵寅谷撰《本草求原》载土牛膝曰：短而細，滑破血气，治小便淋痛，尿血，或沙石尿痛，煎液汁調乳香酒服。喉痹乳蛾，取鲜汁和人乳灌鼻，即痰涎从口鼻中出，加艾汁尤妙。痢下先赤后白，名腸壅，酒搗浸服。妇人血块，尿淋，室痛欲死，酒煎服。无名恶疮、金疮，生搗敷。又喉症骨相思曰：甘平。壮筋骨健腰膝，理跌打，屬食良。

4. 清代何克謙撰《生草药性备要》载斑骨相思曰：味甘，性平。治跌打伤，壮筋骨，补足腰，煎水洗亦可。一名土牛膝，又名多須公，又名六月霜，屬食者最良。

5. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载多須公曰：别名小罗伞。能散血止痛，理脾胃，取其根煎酒服。凡病脚足紅肿，色亮，其热如火，和豆腐渣搗烂敷患处。

土 銀 花

Lonicera confusa DC.

别名：土忍冬、山銀花、左纏藤

科属形态 本品系忍冬科忍冬属中的一种多年生常绿藤状灌木。长2~4米以上，老茎黄褐至黑褐色，嫩茎的节有环纹，幼时披短茸毛，成长时全部脱落近无毛。单叶，纸质，对生，卵形，长约4~5厘米，宽2~2.5厘米，先端钝或短尖，基部浑圆，边全缘两面被柔毛，叶背较浓密，叶面深绿色，叶背淡绿色；叶柄长2~5毫米，有短柔毛。春末夏初成对生于腋或顶的花序柄上，复由6~8朵合成头状花序或短的聚伞花序；花两性，左右对称，具芳香，近无柄；苞片叶状，长4~8毫米，小苞片极小；萼管与子房合生，被毛，歧5裂；花冠管状，长1.6~1.8厘米，稍被柔毛，初时白色，后变黄色；雄蕊5枚，着生于冠管上；子房下位，被毛。花后结浆果，椭圆形，长8~10毫米，顶冠以宿存的萼。

本品与山东等地所产之金银花(东银花，密花)不同，其区别处在本品萼管被毛，而川银花的萼管无毛。

生长环境 生于山野灌木丛中，或疏林下，溪谷，坡地，石灰岩山脚，不论沙壤或粘壤，半阴至阳光充足地方均可生长，以较肥沃的沙壤繁茂更易。

产地分布 越南至我国南部，如湖南、云南、广西、广东等地，本省各地均有分布，普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 藤茎、花。气芳香，味较苦，性凉。能解热清骨络湿火，宜透化湿毒温毒外出。

临床应用

1. 麻疹 开平县恩城公社伍乐民医生采用本药时医生经验用黄银藤治麻疹病60余例，取得显著疗效后，扩大使用，计1959年春共治105人，均获得疗效。并发肺炎高热各例，亦很快降热，大多在服药后2时显效。处方：山黄泥1两，加水1.5碗，煮沸离火澄定，取上层清液加入银花藤1两(藤的头尾不要)切碎，陈皮1钱，再煎数沸即成。2岁以上1天分2次服完，2岁以下1天分3次服完。

2. 细菌性痢疾 博罗中医学校取野苋菜(全草)5市斤，土忍冬藤(连叶)2.5市斤，金樱子根1.5市斤，石菖蒲1市斤(以上均以干药计算)，先将野苋菜、金樱根、忍冬藤三味，共放入锅中(砂锅及瓦缸)，加清水50斤，武火煎至15斤后，倾出煎液，过滤后另存于经消毒之清洁容器中，剩余药渣再加水40斤，煎至20斤后，再加入菖蒲煎至10斤，弃去药渣，取煎汁过滤后与第一次煎液混合，文火浓缩至5000毫升(煎成流浸膏样浓液)，乘热加入苯甲酸15克防腐，过滤后分装于已消毒之瓶内，即将煮熔之蜡浸封瓶口备用。如能做好消毒手續，成品可六个月不致变质。本品对痢疾和急性肠炎均有著效。成人每次可服10~30毫升，(经使服100毫升，亦无不良反应，在一些病例，顿服一次即可全愈)，每天可服2~4次，重病例最好每隔4小时服1次，持续服用，使药效继续维持，效力尤佳。小儿酌减。预防肠炎赤痢时，成人每天服1次，每次服40毫升，连服3天。此方经治细菌性痢疾、急性肠炎1100例，痢病均除，治愈率达100%。

3. 肋膜炎 金银花藤0.5斤，米酒4两，清水2碗，煎服。(伍文英献方)

4. 乳痈

(1) 土銀花1兩,穿山甲7錢,浙貝7錢,蒲公英1兩,水1800毫升,煎至300毫升,分3~4次內服。(三水林品生獻方)

(2) 生蒲公英4兩,大地龍2條,銀花藤葉1兩,上藥生打取汁,加甘草2錢煎服,將渣外敷患處,未成者可消,已成者可破,并能止痛。(南海九江醫院徐桂良獻方)

(3) 麥牙6錢,陳皮3錢,甘草3錢,共研粗末熱開水浸服,流膿患處,初起時用二三劑即散,若症重潰爛則以金銀花葉、生薑子、乒乓子,各味酌量,共搗爛敷患處。(陽江開坡鎮開坡醫院許紹棟獻方)

5. 外傷出血後發紅腫 銀花藤葉2兩,搗爛敷傷口,內服紅花1錢,白芷3錢,義乳3錢,當歸8錢,生地8錢,血竭1錢,自然銅8錢,田七1錢,麝香3分,將上藥浸酒2斤,每天服0.8茶杯,每日2次分服,溫服較好。(南雄方允隆獻方)

6. 毒瘡 土銀花10斤,龍胆木皮5斤,路邊青梗5斤,五倍子1斤,共煎取濃汁,先將新石灰2斤,用藥液少許倒于石灰中,待石灰溶化後,即置于藥液內浸泡攪勻,澄清後取此藥水貯于瓶內備用。用時以藥棉蘸敷患處,腫痛即止,宜頻換。(吳山坑牙龍鳳潭村陳敬業獻方)

7. 腳眼破爛(瘡毒) 銀花藤、山角絡、松樹二層皮,酌量,共煎水洗患處;待洗水干後,再用嫩松香油塗之,每日洗塗2次。(新豐潘裕生獻方)

8. 毛疔(疔瘡) 銀花葉和黃糖酌量,搗敷患處即愈。(梅縣羅必先獻方)

9. 槍炮傷 銀花藤葉、黑面神葉、吹筒草、燒眉豆葉、地龍草、沙仔葉、橫紋葉、豆豉葉、錢花葉,各藥酌量,搗爛敷傷口,屢驗特效。(增城莫蓮愛獻方)

殺菌毒

殺組 將金銀花葉片1斤,加水10斤,煮沸,半小時,殺組率達20%左右。(<中國土農藥志>四川叙永縣資料)

文獻考證

1. 清代何克謙撰<生草藥性各要>載金銀花曰:味甘性寒無毒,殺滑瘡道疔毒,止痢疾,洗瘡去皮膚血熱,乃外科之聖藥。

2. 現代胡翼撰<山草藥指南>載金銀花曰:別名忍冬,又名左纏藤,味甘性寒,凡患肚扭、泄瀉,將近成痢或已成痢,用金銀花3錢,木棉花3錢,棉茵陳3錢,蜜煎,加青梅2枚同煎,服一兩次即愈。又能解皮膚血毒。

3. 現代陳立卿撰<廣西中醫藥用植物>載山銀花曰:治牛凡惡症:軟脚症;喉風症;河血症(紅痢);炭疽(脾脏病);熱症;亦可治牛影膜症;氣腫症;蜜蜂咬症(為生于頸部的毒瘡,腫大有小孔似蜜蜂房,故名);瘡癤丹毒。

土 狗

Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois

别名：蟪蛄，耕狗，扒田狗

科属形态 本品系蟋蟀科中的一种有害昆虫。全身淡黑褐色，长3~4厘米，形似蝗，体圆长，首圆而长，有丝状短触角，足三对，前列第一对强大，爪短为锯齿样板刃，是防护及掘土之用。其翅前者短后者大，雄长雌短，雄者翅尾相叠突出，不能高飞，春秋善鸣，入冬栖息土中，掘土而行，颇为迅速。此虫于每年7月间产卵土中，经10天时间即孵化，至翌年即长成成虫。

生长环境 生长于丘陵作物地区，及沙质粘土，专咬取植物根芽为食料，植物嫩根经咬后即枯萎而死，可于枯萎植物中找到其掘行过的隧道而捕获之，一般多于夏季夜中诱捕。取得后用开水烫死，晒干，去足翅炒过备用。

产地分布 全国和本省各地均有产，普遍，散见。

药用部分与气味性能 去足翅用全身。气微腥，味甘微咸，性寒。能消积聚瘕痞，逐水，拔刺，下便。

临床应用

1. 晚期血吸虫病肝脾肿大单腹腹膜 土狗7只焙干研末，用大黄6钱，朴硝6钱，枳实3钱，川朴3钱，以水煎冲土狗末服。（张一平献方）

2. 瘕痞

(1) 沉香2钱，木香2钱，巴豆肉1钱5分，土狗2只焙干，共为末，用乌梅肉为小丸，每次服50粒，陈皮汤送下，服至腹消为度。约15天内渐渐自消。（陈玉山，番禺郭基献方）

(2) 土狗10只，置于新瓦上，加盐焙干研末，用酒送服，每服1钱5分，老年者不可服。（湛江市徐育芝，郁南刘泽楷献方）

(3) 土狗7只，砂仁3钱，大腹皮5钱，共研细末，老酒调服。（翁沅雷增亮献方）

(4) 土狗7只焙研末，和大腹皮2钱煎服。（《福建中医秘方》2集）

3. 小儿浮肿 土狗1只，置砂锅中炒干研末，用黄酒适量冲服。（《河北省中医集方》）

4. 虚肿 蟪蛄3~4只，用泥封固置火上煨透，去泥研末冲酒服。（《福建中医秘方》2集）

5. 黄疽 茵陈5钱，栀子3钱，白芍2钱，牛膝2钱，红枣3钱，百草霜3钱，土狗9只，青矾3钱，丹竹青1钱5分，共研细末为丸，每服2钱，日服3次。（董业农献方）

6. 半身不遂 土狗30只，左瘫取右，右瘫取左，研烂，酒调服；可服8~10天。（广州何中和献方）

7. 重舌（多见于小儿，舌下静脉肿大） 蟪蛄8只，半天椒1只，二味煨存性，敷于患处。敷后使舌下唾液管破裂流出毒血而愈。（陈振思献方）

8. 牙痛 土狗1只，糟蒜煨焦，去糟为末敷之。

9. 骨哽喉

(1) 土狗1只，焙干研末，吹入喉内，如不下再加鸡内金研末吹入喉内即下。（阳春县八甲卫生院献方）

(2) 急性子5分，灵仙5分，川射5厘，乌梅5分，玉簪花5分，土狗1只，共研末，冷开水调服。

(玉五蟾献方)

10. 沙淋

(1) 土狗 10 只,沙牛牯 10 只,蚯蚓 10 条,水煎服。

(2) 蟾蜍 7 枚,食盐 2 两,以新瓦焙干研末,温酒送服,每服 1 钱,食壳即愈。(苏颂)

11. 小便不通 用大蟾蜍 2 枚,取小体,以水 1 碗煮饮,不久即通。

12. 大小便闭 用土狗 7 枚,推車子 7 只(男用头,女用身),以新瓦焙焦为末,以向南得皮煎汁饮,一服即效。

13. 胎衣不下 以蟾蜍 7 只,水煮沸约经 20 分钟,澄服即下。

14. 老鼠偷粪(肛門边生疮) 土狗 4 只,黄牛尿适量阴干,拌黄糖炒研末,每次服 1 两,水煎 30 分钟,热服。

15. 取炮礪

(1) 土狗 3 只,沙牛牯 20 只,沙姜 2 两,红糖 2 钱,共研末敷之,次日改用黄牛尿再敷之。

(2) 土狗 2 只,生牡蛎 1 斤,推車子 3 只,鱈魚 3 条取内脏,共捣烂敷患处即出。

16. 出铁砂

(1) 野麻根,用量看伤口大小而定,每粒铁砂用土狗 1 只,共捣烂敷患处。每日换药 1 次。一般敷至 5 服即出。砂出后,可用生肌消毒药敷洗而愈。(楊戶寬献方)

(2) 土狗、柏子叶、鰓魚胆草、桔子核、灶鷄仔,各味酌量,共捣烂敷伤口。

(3) 土狗子、灶鷄子各 10 只,水翁叶 1 两,石螺子 10 只,買菜头酌量,将上药捣烂敷患处即出。(翁沅叶桂文献方)

17. 拔铁钉、竹木刺、玻璃入肉

(1) 土狗 10 只,灶鷄仔 10 只,四方梗青蛇仔叶 1 两,蓖麻仁 1 两,共捣烂敷患处。(英德苏振华献方)

(2) 石螺子 2 只,土狗仔 4 只,灶鷄仔 1 只,沙牛牯 2 只,黄蜡 1 条,沙姜 2 片,共捣烂敷之。

(3) 土狗 10 只,冰片 1 钱,黄蜡 5~8 钱,川断 8 钱,共捣烂敷之即出。(广州范任芝,黄少雄献方)

(4) 生土狗 7 只,蓖麻子 5 钱,共捣烂敷患处,用细布扎好,敷四小时即出。(罗南县陈文安献方)

(5) 用土狗 5 只,八角 2 钱,共捣烂敷伤口。(江門陈珍璽献方)

18. 箭簇入肉 以蟾蜍肝汁,滴上三五度自出。亦能治刺在咽喉。

19. 骨折 白芨、生绿豆、楊柳皮各 1 两,共捣烂酒煮敷。内服:当归、大黄、白芍、红花各 3 钱,生地 5 钱,然铜 2 钱,以水煎后,加入土狗 10 只,研烂冲服。(中山石岐市郑有云献方)

文献考证

1. 宋代日华子撰《大明诸家本草》载蟾蜍曰:治水肿,头面肿。

2. 元代朱丹溪撰《本草衍义补遗》载蟾蜍曰:治口疮甚效。

3. 明代李时珍撰《本草纲目》载蟾蜍曰:利大小便,通石淋,治瘰癧骨哽。

4. 清代黄宫绣撰《本草求真》载蟾蜍曰:气味寒成,性虽奇特,曾言将此分为上下左右四截,若以上截治肿,则肿即见上消,下截治肿,则肿即见下消,左截治肿,则肿即见左消,右截治肿,则肿即见右消。又截自腰以上以治,则能拔水上行,而使二便皆溼;自腰以下以治,则能使便立下。妇人难产,亦可照此以治,而产即解。瘰癧瘰癧肉刺,若生捣汁以涂,则刺与肿皆消。骨哽入喉不下,末吹即能见愈。此外箭簇入肉,用此涂贴患处,则箭即期见拔。究其治效,总因性善攻火,其性急迫,故能如此取效也。

山 梔

Gardenia jasminoides Ellis

别名：黄果树，黄梔子，水黄梔

科属形态 本品系茜草科梔子属中的一种常绿灌木，根深长，茎可达2米，全部无毛，惟幼枝上有短柔毛。单叶，革质，对生或三叶轮生，矩圆状披针形，有时卵状披针形，长4~7厘米，宽3~4厘米，先端短尖，基部楔形，边全缘，叶面深绿色而光亮，背面淡绿色，主脉较粗，侧脉延伸近叶缘而向前弯曲；叶柄长8~5毫米，稍厚而扁；托叶膜质，基部合生成鞘状。夏季开花，有芳香，顶生或腋生；花萼绿色，宿存，基部渐窄，周围有5~6条纵棱突起，先端分裂为5~6片，每一裂片线形，长1.5~3.5厘米；花冠白色，高脚杯状，裂片6枚，倒卵状矩圆形；雄蕊着生于冠喉上，无花丝；子房下位，1室；花柱肥厚，直立，伸出花冠管外。花后结果卵圆形至椭圆形，长2~4厘米，宽1.7~2.5厘米，肉质或带革质，黄色，通常有纵棱5~6条，内有红色粘液和扁平近圆形的种子，种子甚多，坚硬。

本品另一种名水梔，别名水横枝，叶果均比山梔为长大。疗效次于山梔。

生长环境 生于土山疏林中，半阴生，粘壤与沙壤，适应性颇强。野生或栽培。春季采根，冬季采收果实。

产地分布 我国东南部、中部和西南部及日本、越南均产。本省各县均有分布，普遍，散生或丛生。花县产较多。

药用部分与气味性能 根、果实。嗅无，味苦，微甘，性凉。能凉血止血，清热利湿。

临床应用

1. 胡豆黄(蚕豆黄) 和平县卫生防疫站在1966年3月间，用黄果树根合剂治疗胡豆黄72例，效果显著，一般服药1~2剂，即告治愈。继续扩大推广，服者皆愈。处方：黄果树根1两，过山龙根2钱，枫树果1钱，甘草1钱，水煎服，小儿酌减。

2. 黄痘

(1) 山梔子，黄花根，贯仙草，淡竹叶，有土猪加铁马鞭，以上每味用1两，浸酒1~2斤，每天下午服1小杯，功效卓著。(增城黄珠郑春华献方)

(2) 黄梔子根、黄藤、心酸藤根、黄皮木根、半边花藤根，每味各约1两，煮鸡肉或猪肉食。(合浦杨法章献方)

(3) 用山梔根1~2两，煮瘦肉食之见效。(郁南何柄生献方)

(4) 黄梔子叶1两，高脚箭古吊1两，矮罗伞1两(连叶梗用)，马蹄香1两，山豆豉3两，细样水榕木叶2两，草鞋青2两，共煎水服。早午晚空腹服。此方对阳黄热症适用，轻者一服可愈，重者二服而愈。(湛江献方)

(5) 黄梔子根5钱至1两，煎碎煮猪精肉食，连服2~3次痊愈。(佛山叶玉芳献方)

(6) 山梔子根、大枣二味各4两，浸酒服则愈。(王金清献方)

3. 感冒高热

(1) 黄梔子根2两，山麻仔根1两，鸭脚树二层皮2两，红花痴头婆根1两，煎服，或加酒少许冲

服。(高福民献方)

(2) 鸭脚树根3钱, 木槿根4钱, 金锦草2钱, 五指莲6钱, 鬼灯笼3钱, 海金沙2钱, 山槿根4钱, 蛇泡筋3钱, 青藤4钱, 白花枝头青3钱, 以水四碗煎至一碗服。(中山石岐市罗少泉献方)

4. 赤痢 水黄槿根、黑骨扇扇、鸭脚树根、亚婆麻根、山鸡米薯各等分, 上药数两, 用水数碗煎至三碗, 分四次服, 隔五小时服一次。忌食腥一个月。(沈从余献方)

5. 肾脏性水肿 黄槿子根4两, 椰子母鸡1只, 将药根与鸡加水炖烂去渣食之则愈。(丰顺人民医院冯子良献方)

6. 流鼻血

(1) 黄槿根1两, 茅根3钱, 柏子叶5钱, 茅利红5钱, 水煎服则愈。孕妇忌服。(普宁大坪卫生院献方)

(2) 生山槿根1两, 煮猪肉食之则愈。

7. 牙痛

(1) 山黄槿子根4两(勿碎), 用雄鸡一只, 以武火煮至鸡的骨肉脱离, 分作2天服。(广州中医学院进修部丘典史, 湛江霍济龙等献方)

(2) 山槿子根3两先煎, 加入冰糖4两, 鸡蛋2只(煮熟后去壳再煎), 日服1次, 连服2~3次。(石岐黄保唐献方)

(3) 山槿根1两, 白芍4钱, 水煎服。(广州何中和、刘满献方)

8. 瘰癧初起 山槿根2两, 水煎服, 连服3~5次即愈。(长布卫生院廖其仁献方)

9. 跌打损伤

(1) 山槿根、槲子刺根、每样木根各用2两, 煎水服。(潘树德献方)

(2) 山槿叶、干刀斩、独行平温、田基黄, 若已溃烂者先用煎葱茶煎水洗去腐肉, 后将上药捣烂敷患处则愈。(徐行庄献方)

10. 乳疮 山槿头1两, 生南星3钱, 生半夏3钱, 三枝莲根1两, 共捣烂作为10丸, 左乳生疮塞右鼻孔, 右乳生疮塞左鼻孔, 连塞4~5天则愈。(汕阜曾朝献方)

11. 蛇咬伤 山槿、苦楝根、苦楝木心、漆木心、松木心、葱头、大郎伞根, 各用5钱至1两, 水煎冲酒服。

文献考证

1. 明代李时珍撰《本草纲目》载山槿曰: 治吐血衄血, 血痢下血血淋, 损伤瘀血, 及伤寒劳复, 热厥头痛, 疝气渴火伤。

2. 清代赵黄谷撰《本草求原》载黄槿叶曰: 性寒, 消肿理跌打, 洗疮痔疔, 散毒瘰, 同葱煮食则祛风。

3. 现代胡真撰《山草药指南》载黄槿叶曰: 味苦涩, 性寒, 捣敷跌打伤, 能消肿。

山 大 顏

Psychotria rubra (Lour.) Poir.

别名：暗山公，大丹叶，山打大刀，山大刀，吹筒筒，鹿耳叶

科属形态 本品系茜草科九节属中的一种直立灌木。高1~8米；枝近四方形，后渐变为圆筒形。单叶，纸质，对生，椭圆状矩圆形，长8~20厘米，宽2~7厘米，先端长尖，基部渐狭而成一柄；边全缘，叶背主脉及侧脉突出明显，侧脉接近对生，背脉腋内有簇毛，余皆秃净，干时暗红色；托叶阔，膜质，早落。秋季顶生及腋生圆锥花序，长2~6厘米，8歧，短于上部之叶；花浅绿色或白色；萼管长约2毫米，裂片短三角形；花冠管状，阔，长约1.5毫米，裂片披针形，长约2毫米，外反；雄蕊通常5枚，着生于冠喉部；子房下位，二室，胚珠每室1颗。花后结核果近球形，长5~7毫米，熟时红色，干后有明显的棱。

生长环境 生于小丘陵高低台地或山坡疏灌木丛中，黄色或红色土壤均适合生长。

产地分布 沿马来群岛至我国台湾，日本。我国东南各地均盛产，为广州近郊山野极常见的野生植物。香港各县亦有产。

药用部分与气味性能 根、叶。嗅无，味极苦，性凉。能清热解暑，消肿拔毒，干水杀虫。

临床应用

1. 白喉 惠阳多祝人民公社卫生院刘佛磷蔡洗亮用山大顏嫩茎或嫩叶，鲜者1岁以内每服1.2两，1~3岁2.4两，4~5岁3.0两，6~10岁3.0两，煎服。又可将嫩叶5斤，水10斤煮成1斤（500毫升），配糖适量，1岁以内服30~40毫升，1~3岁服40~50毫升，4~5岁服50~60毫升，6~10岁服70~100毫升。在白喉流行期间试用此方法治疗118例各型白喉，治疗率达98.6%，其中2例在治疗过程中不能遵守医生规定按照剂量按照时间服食，引起毒素死亡外，仅1例无效，治愈率达99.15%。初步观察照量服3天，并有预防效果。

2. 瘧疾 山大顏根每次用2两，新陈煎好酒4两，在发作前1小时服即愈。

3. 妇人产后脚软风痲 用干山大刀头8两，豆豉姜2两，老母鸡1只，以上药和母鸡拌匀加适量好酒炖4小时，炖好后把药汁饮尽，并食鸡肉则愈。（何仲和献方）

4. 青竹蛇咬伤 山大顏2两，和酒煎服，并以此药涂伤口周围。（中顺县杨友生献方）

文献考证

1. 现代胡翼德《山草药指南》载山大刀曰：别名山大顏，又名大丹叶，叶如掌形，煎水变红色，为末，能干水杀蠹。作茶饮能清热去湿。煎水熏洗痔漏尤妙。

2. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载大丹叶曰：别名山大刀，暗山公，味苦，性温，干水杀虫。

山 芝 麻

Helicteres angustifolia Linn.

别名：假油麻，芝麻头，油麻甲，山油麻，崗芝麻，崗油麻

科属形态 本品系梧桐科山芝麻属中的一种矮灌木；表皮黑色，茎高0.6~1.5米，幼枝密生白色茸毛。单叶，纸质，互生，矩圆状披针形至狭披针形，长4~8厘米，宽1~1.5厘米，先端短尖或钝，基部钝，叶面绿色，近无毛或有星状毛，疏生，背浅绿色，被密灰色星状毛，基出脉8条；叶柄长6~7毫米，亦有星状毛。夏季腋生小花甚密，排成总状花序，有2~4朵，丛生，苞片1片，线状尖形，萼筒状，先端5裂，长6~7毫米，密被茸毛，花瓣5片，线形，浅紫色，长过萼1.5倍，肢之基部有2齿；雄蕊多数连合成一柱状与雌蕊柄合生，顶端5齿裂；花药群集于雄蕊柱的裂片间；子房着生于柱顶，5裂，5室；胚珠多数。花后结蒴果，矩圆形，长2~2.5厘米，表面有星状小柔毛，成熟时从缝裂开。种子多数，细小，果柄长约5毫米。

生长环境 生于荒山、丘陵、荒坡、路边的酸性土，不论干燥或阴湿地草中或灌木丛中，粘土或沙土均可生长。夏秋采收根部。

产地分布 我国广东、广西、台湾、福建、云南、湖南、安徽等地均产，本省以番禺附近各县生产较多。印度尼西亚、泰国亦产。普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 根。嗅无，味苦，性凉。能清热，凉血，散瘀，通利大便。

临床应用

1. 肺结核 假油麻根每次4钱，煮瘦猪肉食，如无肉可用糖代之，连服数次良效。（熊佛先、张益模献方）

2. 痢疾

(1) 山芝麻根、假芥兰叶、鳳尾草、車前草每味各5钱，水煎服，连服数天则愈。（严锦南献方）

(2) 单用山芝麻根水煎服，成人每用3两，小儿用1两，服至泻清为止，则愈。（高要黄集献方）

3. 痧气腹绞痛吐泻（肠胃炎）

(1) 山油麻头去外皮取二皮，每用约1两，水煎服之。（饒平樟溪卫生院献方）

(2) 山油麻1两，金銀藤5钱，以水4碗煎至2.5碗，加入烏糖适量服之，连服至愈为止。（洪阳卫生院方符杰献方）

4. 腹痛（寒性） 山油麻头1两，布荆叶1钱，藜艾1钱，以水2碗，煎至8成，服之则愈。（洪水生献方）

5. 感冒高热身痛 地胆头1两，山油麻根1两，鋪地錦1两，生石膏8钱研末，水煎服，小儿酌减，连服2剂则愈。（丰顺县胡秋波献方）

6. 小儿高热不退

(1) 山芝麻根5~6钱，若大渴加花粉2~3钱，水煎服，连服1~2剂见效。（翁元郭古愚献方）

(2) 山芝麻2两，荆芥5钱，煎汤服。治一切外感邪热痧气。（广西药用植物志）

(3) 用山芝麻、古羊藤根、两面针等分，共磨粉，每服1钱，开水送下，日服2~3次，治外感痧气、阳

黃疸、熱瘧有效。(廣西僑族自治區中醫藥研究所驗方)

7. 色感 山油麻根1兩，以水2碗，煎至1碗，加入米酒2兩，沖服即愈。(許益華、許遠白、唐社李兆森獻方)

8. 雙單蛾喉(扁桃腺炎)

(1) 假油麻根1兩，金櫻子根8錢，雞不食草1兩，共煎水內服。

(2) 假油麻根2兩，入地金牛根2兩，將二藥切碎，以水煎濃液含漱或服少許，不久則愈。(台山中醫研究所獻方)

9. 疳疔(腮腺炎) 用假油麻2~3兩，搗爛敷患處即愈。(封川附城衛生院卜麗榮獻方)

10. 小兒疳積遍身腫脹 山油麻根1兩，用米酒3兩，將山油麻浸一日夜，隔水溫煎一炷香之久，然後早晚空腹分服，服完藥即見效。(孫介垣獻方)

11. 无名腫毒(局部發炎) 山芝麻葉2兩，綠豆1兩，白花繡線菊葉2兩，共搗爛敷于患部，熱換之，日換3~4次，連敷2~3天則愈。(葉國良獻方)

12. 牙疳 大黃3錢，桔梗3錢，阿子2錢，甘竹節3錢，山豆根6錢，牛膝2錢，入地金牛5錢，鐵香爐2錢，細辛2錢，山芝麻3錢，水3碗煎至1碗，含漱，溫即吐之，以用完藥液為度，其毒自除而愈。(詹毓秀獻方)

13. 鶴膝風 假油麻根3錢，賊仔藥5錢，无名異5錢，地骨皮3錢，制乳香1錢5分，制沒藥1錢5分，上藥共研末，正川麝香1分，研勻，用黃酒、草蓆草汁各半，調藥末為薄糊狀，用白布1塊攤成與患部大小相同，用綢帶綁扎，不使移動，3~4日即見效而愈。如患部太大，藥可加倍，以免藥力不足。敷藥後患部感刺痒，暫即動作輕鬆。最後要服黃芪五物湯3~4劑，則全愈。(楊長和獻方)

14. 面部濕疹 用山油麻莖晒干研末3錢，黃蜂尿3錢，與清茶油調搽患處則愈。

15. 面疔 假油麻根、地香根，共搗酒塗之則愈。(鍾田清獻方)

16. 跌打入眼 山油麻根1兩，水煎服，跌打自出。如已發炎，可用鷄公雪羅杵搗蜜糖貼之，腫痛可除。(五華張愛華獻方)

17. 蛇症 山芝麻、茶梗2味酌量，煎水外洗患處即愈。(高明、陸扭獻方)

18. 毒蛇咬傷

(1) 山芝麻根2~3兩，用酒煎飲；另搗爛敷患處即愈。(清州心公社白嘉田園村向許聲獻方)

(2) 山芝麻、賊佬指梅、田基黃、紫背金牛，不論何種毒蛇咬傷，可用此藥酌量研末，酒調外搽患處即愈。(新興縣獻方)

19. 刀傷止血 六月霜、紅燈籠、假芝麻、三葉蓮，各味酌量，搗爛敷之。如腫者加生薑少許，合米粥共搗勻敷之則愈。

文獻考証

1. 清代何克謙撰《生草藥性各要》載山油麻曰：治瘡去毒，止血理口，又能潤大腸通便。

2. 現代胡眞撰《山草藥指南》載山油麻曰：別名山脂(芝)麻，其根味苦，性涼，敷瘡去毒，止血生肌，并潤大腸。

千 張 紙

Oroxylum indicum (L.) Vent.

别名：千紙肉，木蝴蝶，玉蝴蝶，朝陽，土黃柏，神仙劍

科属形态 本品系紫葳科木蝴蝶属中的一种大乔木，高7~12米，树皮厚。叶为3~4回羽状复叶，纸质，对生，长80~120厘米；小叶多，长18厘米，宽7.5~10厘米，椭圆形至卵形，先端短尖或渐尖，基部阔楔尖，边全缘，小叶柄甚短。夏季腋生及顶生总状花序，花序柄长约30厘米；萼肉质，钟形，长25毫米，宽20毫米；花冠肉质，紫红色，钟形而一面膨胀，长约6.5厘米，管口直径5~8.5厘米；雄蕊5枚，稍突出于花冠外，花丝基部被棉毛，第五枚花丝较其他四枚稍短；花盘大，肉质；花柱长约6厘米；柱头宽约1厘米，并具两枚半月形的薄片。花后结蒴果，长而扁平，形类朝鞋，长30~90厘米，宽5~8.5厘米，边缘稍内弯；果瓣木质；种子连翅共长6~7.5厘米，宽3.5~4厘米，除基部外，全部为膜质的翅所包围。

生长环境 野生或栽培。

产地分布 我国两广，印度、越南、马来亚均有产。

药用部分与气味性能 种子膜翅、树皮。嗅无，味微苦，性微凉。能宣解郁热，舒肝除烦，治喉痹，心气痛，赤眼，痰火核诸症。

临床应用

1. 传染性肝炎 千張紙树皮1~3两，水煎服（最好与猪脚同煎更好，但煎成后须将浮在碗面油脂去清）。浦北草药医生陈南山介绍，经本所雷芹生中医用此方在建筑南流江小江水庫山口团工地两个医疗站治疗20多个病例，服药3~5天，目黄减退，小便大量排出深黄色素，服至10天后小便由黄转淡，趋于正常，皮黄亦随之退清。服药期间病人饮食如常。

2. 咽喉肿痛 千張紙树皮4两，净水煎服。（罗南县刘吉仙献方）

文献考证

1. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载千張紙曰：味微苦，入肝经，清痰火，除膜热，治心气痛。王老吉凉茶中，必加1~2块。

2. 现代胡佩瑛《山草药指南》载千張紙曰：入肝经，清痰火，凡治气痛，肝气痛，胃气痛，及一切气痛，以此物焙研酒调服。

大茶药

Gelsemium elegans Benth.

别名：钩吻，胡蔓草，胡蔓藤，苦晚公，断肠草，断肠藤，野葛，
大柴药，虎狼草，朝阳草，荷斑药

科属形态 本品系马钱科胡蔓藤属中的一种木质藤本。单叶，膜质，对生，有时轴生，卵形至卵状披针形，长5~10厘米，宽3~5.5厘米，先端渐尖，基部浑圆或阔短尖，边全缘，侧脉4~5对，上面平坦，背面凸起；叶柄长8~12毫米。夏季顶生或腋生聚伞花序，圆锥形，苞片小而狭，边缘有时有小睫毛，长约2毫米；花柄长4~6毫米，略具棱，被疏散短柔毛；萼5深裂，复瓦状排列，卵状矩圆形，长8~4毫米，短尖；花冠漏斗状，长14~16毫米，裂片5枚，矩圆形，比冠管为短；雄蕊5枚，着生在花冠管上，且与花冠裂片互生，通常突出于冠管外，但短于裂片，纵开裂；子房上位，矩圆形，2室，每室胚珠多颗；花柱单生，柱头成4裂。花后结蒴果，长椭圆形，长10~14毫米，直径6~8毫米，稍肿胀，成熟时膜裂为2个具2裂的果瓣；种子多颗，压扁，周围围绕膜质，具不规则的齿缺的翅。

生长环境 多生于森林、丘陵灌木丛中，常缠绕在其他植物上生长。夏秋季采收。

产地分布 亚洲热带及我国浙江、福建、广东、广西、贵州、云南等省。少见，散生。

药用部分与气味性能 根皮、叶。气辛，味苦，性有大毒。外治能攻毒拔毒，生肌，杀蛇止痒。忌内服，误服能杀人。

临床应用

1. 内外痔 将大茶药根1斤煎好，乘热置于盆中，四面封闭，中间留1小孔，坐下熏痔，冷再煎热熏，每日熏2次，连熏10天可愈。（广州中医学院进修部廖光祥献方）

2. 对口疮 大茶药叶2两，与假锦兰敷患处，3天可愈。该药也能治背痛。（龙川县防疫站蓝日新献方）

3. 瓜藤疮 大茶药根皮、苧麻头，二味酌量，捣烂敷患处，不论已溃未溃均宜。忌入口。（罗南卓德道献方）

4. 过头蛇（头部淋巴管发炎红肿） 大茶药叶、酸藤叶、鬼面符、三丁苦叶、山乌柏、紫苏梗，各味酌量，煎水洗患处可愈。（云浮县张华献方）

5. 无名肿毒，痰核

（1）大茶药根2两，狼毒2两，锦地锦3两，吸膜膏1两，假菊花根2两，麝骨香5钱，九干菜3两，丁哥王1两，生油1斤4两，将上药浸4~5天，放入锅内煮至药枯，用纱布隔净渣，以药油1斤配合黄丹8两为度，炼成柔软硬膏，取贴患处，并有止痛消肿毒之良效。（宝安县刘伯泉献方）

（2）断肠草、酒糟，二药酌量，炖热敷患处。（陆丰罗少麟献方）

6. 痈疽 用断肠草晒干研末后，混合凡士林，制成软膏敷患处。此药有毒，忌入口。（海南梁家峰献方）

7. 疮疡烂肉

（1）大茶药20斤，用大锅放药，加水50斤，煎3天去药渣，再煎至超大泡成膏，敷患处愈。（广州

中医进修班李志龙献方)

(2) 大茶药叶和早米酌量捣烂，用开水调匀，待冷后涂患处，立即止痛、干水、排脓，连续治疗，逐日生肌痊愈。(新丰县罗健洪献方)

8. 蛇头指(瘰疬)

(1) 大茶药叶、石灰、二味捣烂，贴患指第三节，有膜即溃，无膜即消。(新丰县罗健洪献方)

(2) 用大茶药酌量，加入黄糖少许，捣烂贴患处则愈。

9. 远年瘰疬 鲜大茶药1斤，煎水洗患处(忌口服)，日洗数次，洗完后将药叶1张，贴盖疮口。如症见好转，疮口仍未愈合，可用远年石灰(最好古山坟用过的)，加热消毒后研成粉末撒布用，可加速封口。(英德县城联合医院江拯球献方)

10. 燙伤 大茶药叶和早米酌量，捣烂后开沸水，待冷后涂患处，连续敷次即愈。此方并能治烂脚，有消肿止痛之效。(新丰县卫生科李群、罗健洪献方)

11. 疥癩 白芷2钱，青黛2钱，五倍子2钱，枯矾2钱，断肠草2钱，马前子2钱，蛇退2钱，梅片4分，雄黄1钱5分，松香1钱5分，共为细末，以猪油熔化和药膏贴之。(梁都初献方)

12. 鹅掌风(癣) 断肠草根1两，龙胆木皮1两，儿茶1两，苦参2两，皂刺2两。共煎水洗患处。

13. 脱骨

(1) 大茶药根8两，生鸡仔一只约重10两，将药和生鸡(不去毛脏)共同捣烂外贴患处，先将骨折以手法复位，外加树皮和绷带固定，约敷1小时除去。(新丰县卫生科献方)

(2) 大茶药根、羊角扭根、蓖麻根，各药等量，共取药0.5斤，用生公鸡仔1只约重12两，加酒适量，共捣烂敷患处，敷1小时为度；敷药过久会致患处起节。先用正骨手法复位后上药，外加木皮绷带绑好。此后如肿不消，上消肿去瘀药。消肿去瘀药：三棱苦、桃叶、透骨消，三味酌量，和酒煎水洗患处。(新丰县李群献方)

(3) 石灰5斤，断肠草0.5斤，黄胆子根5斤，放入尿缸中浸3天，取出晒干，再炒研末各外用。(黄宗添献方)

(4) 生蒜头1两，生鸡1只，五倍子1两，生栀子1两，大茶药1两，羊角扭1两，珍珠、麝香(不拘多少)为引，共捣烂敷患处，能续筋脱骨。(黄宗添献方)

14. 脱筋 断肠草叶嫩茎捣烂贴断处，敷1小时可复原状。(吴乐齐献方)

15. 枪伤 苦晚公、菱古头、水翁树根，煎水洗患处。弹子未出者，用地胆、白茜共捣烂敷患处，弹子自出。(新兴天堂公社鍊金初献方)

16. 刀伤

(1) 大茶药根去青皮、站地风，二味酌量，共捣烂敷患处，功效卓著。(云浮县吴二妹献方)

(2) 大茶药捣烂敷伤口则愈。(郁南黄满方献方)

17. 皮肤炎症及燙火伤 蓖麻仁4两，生地青药叶16两，生芙蓉叶8两，生地棉根8两，生马齿苋16两，生大茶药16两，净油5斤，同药置锅内煮沸，再加松香1两，白蜡1两，樟木油1两，梅片1钱，候冷后下制乳香末8钱，溶化为膏为油，贮存去火毒备用。(中展献方)

18. 瘰疬 红老木薯、大茶药根，二味酌量，共捣烂，用酸醋煎1小时取药，候冷敷患处，连续3天，瘰疬则消散。(许华献方)

、除四害

1. 灭蚊 大茶药2份，鱼藤1份，桉树叶1份，上药加水1倍，浸24小时或煮1小时，去渣即成水剂，喷射使用。(广东省卫生厅防疫局土农药杀虫毒鼠介绍)

2. 灭蛆 大茶药全株磨细拌粪中，每100斤粪用4两，17小时死亡率100%。(中医研究院中药研究所整理贵州经验)

3. 毒雀

(1) 大茶药全株制成粉末，拌食物诱雀食。(《药学报》1960年4月号介绍云南经验)

(2) 用大茶药全株叶用水浸1天,取液将玉米糠加入泡后,取出诱雀食。(《药学报》1959年4月号介绍广西经验)

4. 灭蛆

(1) 大茶药1斤,田刀柄(葫蘆茶)1斤,石灰20斤,上药捣成粉末,混和为粉剂,撒布使用。(清远潘锡秋献方)

(2) 丁哥果根、苦晚公、羊角扭,以上各药晒干研末,用喷射器喷洒用。(新兴水台卫生院伍武之献方)

文献考证

1. 晋代稽含撰《南方草木状》载治葛曰: 蔓草也,蔓生,叶如罗勒,光而厚,一名胡蔓草,实繁者多杂以生,速速之,悟者速以药解,不尔,半日辄死,山羊食其苗,即肥而大,亦如鼠食巴豆,其大如纯,盖物类有相伏也。

2. 晋代葛洪撰《肘后方》载解中野葛毒曰: 凡中野葛毒,口不可开者,取大竹筒润节,以头拄其两胁及胸中,灌冷水入筒中,数易水,须臾口开,乃可下药解之,惟多饮甘草汁、人尿汁,白鸭或白鹅断头灌血入口中,或羊血灌之。(按: 广州山草医何中和、何开纪、刘满等均认为本法有效。)

3. 南北朝陶弘景撰《神农本草经集注》载野葛曰: 破瘕瘕,除脚膝痹痛,四肢拘挛,恶疮疥虫,杀鸟兽,捣汁入膏中,不入汤饮。

4. 唐代陈藏器撰《本草拾遗》载解野葛毒曰: 蓬菜捣汁,解野葛毒。

5. 明代李时珍撰《本草纲目》载野葛曰: 神农本草的吻一名野葛,草木状又名胡蔓草,显是藤生,吴普、苏恭所說正合本文。陶氏以藤生为野葛,又指小草为的吻,复疑是毛茛,乃祖雷教之說,諸家遂无定见,不辨其蔓生小草,但不得指为的吻尔。昔天竺对黄帝言: 黄精益寿,的吻杀人,乃是二草善恶比,对而言,陶氏不审,疑是相似,遂有此說也。

6. 清代何克廉撰《生草药性备要》载朝阳草曰: 祛风毒,洗疥癩。

7. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载朝阳草曰: 别名胡满藤(根),有大毒,不入服剂,祛风毒,洗疥癩及毒。

8. 现代胡真撰《山草药指南》载胡满藤曰: 别名朝阳草,又名大柴药,又称虎狼草,取茎叶煎水洗疥癩甚效。

〔附注〕 本所李蔚良医师在采风时发现用崩大碗(积雪草,錢番口,老公根)可解大茶药中毒,用鲜或干崩大碗多量煎水灌服,实例系据东莞清溪公社河柏桥生产队农业工人黄龄证明。

大 蒜

Allium sativum Linn.

别名：蒜，蒜头

科属形态 本品系石蒜科葱属中的一种具有鳞茎和强烈气味的直立草本；鳞茎有小瓣6~10枚，全部包藏于鳞被内，鳞被银白色或淡红色，膜质。叶数枚由基部发出，扁平而长尖，20~40厘米，宽2.5厘米以上，平行脉，中部叶脉略有棱。秋后开花，白色，有花茎，茎圆柱形，高出叶面，长约60厘米，为膜质的佛焰状总苞包围着，总苞有长喙，长7~10厘米，顶上着生稠密的小伞形花序，具膜质的苞片，花常不结实或杂以珠芽，淡红色，长约4毫米；花柄脆弱，长于花；花被6枚，披针形；花药和花柱突出；子房长椭圆状卵形，先端凹入，3室，每室有胚珠数颗。花后结蒴果，蒴果室裂。

生长环境 属于栽培蔬菜，一般平坡，冲积土，沙质肥沃土壤，排水佳良的地方均易生长。全草四季可采，蒜头多在冬春季采集。

产地分布 各地均有栽培，普遍。

药用部分与气味性能 全株、茎根（鳞片茎）。嗅特异，味辛，性微温。能化湿，消胀，健胃，杀虫。

临床应用

1. 控制流行性脑膜炎，感冒，麻疹，白喉，百日咳，痢疾流行

(1) 控制流行性脑膜炎 长沙市传染病院1959年第1季度内，选择100名健康人，进行生食大蒜对脑膜炎球菌灭菌作用实验。用白皮大蒜（据文献记载，紫皮者抑菌作用较好）去皮用清水洗3次，温开水冲洗1次，每人每天吃12克（成人量），约7~8瓣，分3次生食或吃饭时拌着吃，连续服6日。100名受检查者，有37人为流脑双球菌带菌者，带菌率为37%，生食大蒜3天后复查，带菌者6人，带菌率为6%，连食大蒜6天复查，仅1人带菌，带菌率为1%。根据文献记载，流脑流行期间，带菌者常达20%以上，若能将带菌者降至5%以下，则可控制脑炎的流行。磺胺嘧啶能在短期内将脑膜炎双球菌者减低至1%，故世界公认为控制流脑流行之良好药物。兹将大蒜与磺胺对带菌者灭菌作用作比较表如下：

磺胺嘧啶与大蒜对带菌者灭菌作用比较

报告时间	报告人	药 物	用 法	用药前 阳性率	用药后第 1次检查	用药量	阳性率	用药后第 2次检查	用药量	阳性率
1944年	Phair等	磺胺嘧啶	每日2次 每次1克	35~45%	第2日	2克	8%	第2日	8克	1%
1959年	长沙市 传染病院	大蒜	每日3次 每次4克	37%	第3日	36克	8%	第6日	72克	1%

（《医药卫生快报》1959年14期）

(2) 外用预防空气传播传染病 如流感等病流行时，民间常用大蒜米切去一端，交换塞于一侧鼻孔，传染病由空气传播流行时可采用为辅助预防方法之一。

(3) 内服预防麻疹白喉百日咳 蒜头总量1两，磨烂加温开水浸30分钟，再加砂糖适量调味，在72小时内分数次服完。服后再服煮老火葛水，以解除大蒜刺激性。中山医学院于1958年10月，在高等广

利人民公社南園村農場，進行實驗觀察，當時該農場附近白喉麻疹流行，採用本方給該農場 143 個孩子普遍服藥，結果全部小孩都沒有患上白喉麻疹。

(4) 內服預防痢疾 大蒜去皮 10 克搗爛，用溫開水 100 毫升，浸 6 小時，濾過後加適量糖漿，1 日 3 次分服。

2. 外治瘡疾 大蒜 1 份，老姜 2 份，熟烟尾指頭大，搗爛混和，在發作前 2 小時貼兩手寸口內关穴，上加膠帶固定，發癢時間過後除去；治療效顯著，貼藥 1~4 次症狀消失，原虫在 1~5 天內消滅。（茂名縣防疫站獻方）

〔附注〕 外治瘡疾方法，系民間一向常用，各縣獻方中都有應用，有和老虎須，有和桃葉等同用。

3. 輔助治療白喉 蒜頭 1 只，黃泥少許，搗爛為小粒如荷蘭豆大，把上藥一粒敷銀漿穴（太淵上方 1 寸，即在寸口附近），上面用膠帶扎住，經 5~6 小時會起水泡，用消毒針挑穿，流出泡內水液，消毒棉花保護水泡位。

4. 痢疾 大蒜 5 克，分數次服，1 天服完。可連服數天。或用大蒜 5~10% 浸液保留灌腸，在保留灌腸前用生理鹽水灌洗後施行。第 1 次有疼痛，可加入鎮痛藥。第 2 次疼痛即減輕，第 3 次痛即完全消失。治療後平均第 4 天大便即呈阴性，5~10 天大便即恢復正常。大蒜浸出液制法：大蒜 5~10 克，搗爛，加入裝有普通沸水 100 毫升的密封瓶中，浸 1 小時，再用紗布濾過使用（可保存一周左右）。（廣州工人醫院獻方）

5. 急性胃腸炎（吐瀉，腹痛） 大蒜 2 錢，食鹽少許，搗爛，溫開水沖服。廣州市工人醫院曾製成新鮮 10% 溶液或糖漿，治療急性胃腸炎，有良好效果。各縣獻方中多用此方治泄瀉腹痛，用法如上述外，尚有搗爛置鍋中炙焦，泔水沸起加鹽服；或和粘米同炒泔水服；或泔水後加薯類淀粉煮成稀糊加鹽服；或同時搗爛大蒜外貼臍孔及足心涌泉穴等方法。（宝安劉國香，丰順王協張文石，彩塘曾幼尚等獻方）

6. 中暑高熱昏迷 五指龍 1 斤，百草霜 2 兩，大蒜 3 兩，醃醋適量，以上諸藥共搗爛敷胸前，見熱即換，反復敷之。（惠來永西衛生所獻方）

7. 傷風

(1) 蒜米 1 粒去皮，一端以綫結扎塞入鼻腔，以治療鼻粘膜卡他；亦有用大蒜浸液，或大蒜油滴入鼻腔，亦好。（陳烈烈獻方）

(2) 傷風咳嗽 蒜頭搗碎擠出汁液，加入糖漿，每服半匙左右，可以止咳化痰，發汗，利尿。（《福建中醫藥》1957 年 6 月）

8. 小兒百日咳 大蒜 10~20 克，搗爛，浸溫開水 150 毫升，再加糖漿 50 毫升，混和，每服 30 毫升，1 日 5 次服完。5~10 歲，用大蒜 40 克搗爛，沖沸水 250 毫升，浸漬 10 小時濾過，每 2 小時服 1 湯匙。5 歲以下小兒 25 克，如上法制成 250 毫升，加單糖漿 20~30 毫升，每 2 小時服 1 湯匙。成人可用 60~80 克，制成 250 毫升，繼續服 3~4 星期。（廣州中醫學院進修部鍾貴，廉江羅華才，南海郭柱良，龍川人民醫院王望潮等獻方，基本相同）

9. 營養性水腫

(1) 蒜頭 1 兩，花生肉 1.5 兩，扁豆 1.5 兩，水煮熟透服。（湛江何成棟獻方）

(2) 蒜頭、花生米，煮熟多食幾次，良效。（博羅李福如獻方）

(3) 辣椒梗頭 4 兩，大蒜 2 兩，花生米 4 兩，紅棗 4 兩，煮食。（羅南吳獻方）

(4) 大蒜 2 兩，鮮禾虫 1 斤，扁豆 0.5 斤，陳皮少許，老姜 1 兩，煮作糧食。（江門馬安慢獻方）

〔附注〕 以上四方是民間常用的經驗方，如有廣東沿海土產禾虫干加入同煮食，療效更高。

10. 肝腹水腹脹

(1) 獨脾蒜子去皮一箇一個，糯米酒 70%，燒酒 30%，蒸熟，夏季隔夜始食，冬季可即食。不忌鹽。成人酌加增用量。（三水中醫陳亦毅獻方）

(2) 用花生油煮蒜頭作菜吃，連食 2~3 個月，治肝腹水腹脹有效。（信宜平西獻方）

11. 肺結核

(1) 用大蒜治疗,每天食 4~5 瓣,連續食 100 天有效。这是民間单方。(《中医杂志》1983 年 2 卷 2 期)

〔附注〕 广州工人医院对大蒜进行研究,認為它是一种揮发性物质,能杀死多种原虫及細菌,能抑制革兰氏阳性及阴性細菌,对結核杆菌及霍乱弧菌也有一定作用。值得我們作进一步探索研究。

(2) 大蒜 5 錢,金錢草 2 兩,过江龙根 4 兩,铁包金根 2 兩,加猪精肉适量和蜜枣数枚,煎服。(番禺县驗方)

(3) 蒜头捣烂,取汁 10~30 滴,入糖浆温服。(台山中医研究所驗方)

12. 鼻衄 大蒜約 2 兩,捣烂敷足心,右鼻孔出血敷右足心,左鼻孔出血敷左足心,如两鼻孔出血則两足心均敷之。待足心有灼热感时鼻血自止,疗效很高。(海南乐会吳春山,云浮赵裕才,新兴郑宝山,广州中医學院进修部顏貴班洪木星等驗方)

13. 妇人鷄瘕风(胃脘部疼痛难忍,飲食不下或吐酸苦水) 单片蒜头 10 只,酒餅 1 粒(研),鷄蛋清 1 个,茶叶 1 撮,胡椒 100 粒(研),将蒜头捣烂,水 2 碗煎至 1 碗,将上四药冲服,至吐出涎沫病愈。(汕头潮阳海門方書和驗方)

14. 小便壅閉

(1) 大蒜 1 只,山梔子 3 只,麝香 8 厘,用法:先将麝香研細置臍中,以梔子、大蒜捣烂制如餅状复蓋臍上,再用布帶繃扎約 10~20 分鐘,小便通后即将药除去。(《福建中医驗方》2 集)

(2) 大蒜、田螺肉同捣烂,敷臍中或臍下丹田穴,片刻小便可通。(民間常用单方)

15. 小儿邪风,忽然叫痛,手足屈伸困难 蒜子肉 1 大个,煎水洗患部。另蒜子米 2 粒,切开擦青药面,先落正梅片 1 分,牛黄 1 分,麝香 1 分。先用艾絨向患部灸至見痛后即將膏药貼上患处。(台山中医研究所驗方)

16. 破伤风 独蒜头 1 只,花生油 5 錢,将蒜、油二味捣烂,入更仙 5 錢,煎水加酒炖热服,汗出見效。(湛江专区卫生科關国臣驗方)

17. 狂犬咬伤 蒜头 1 兩捣烂,或蒜头与扁鹊子末和食盐各适量捣烂貼患处。(德庆县二区何仲芬、华健民驗方)

18. 蜈蚣咬伤 生蒜头捣烂擦伤部。

19. 疔疮疔毒无名肿毒

(1) 大蒜捣烂敷患处,上加艾絨灸至灼热知痛为止。除药后保护患处。(广州中医學院进修部李冠华驗方)

(2) 大蒜、綠豆粉、食盐各适量,捣烂敷。或大蒜和香薷叶捣烂敷疔疮。(海丰馬官刘家炎驗方)

(3) 大蒜、桂皮末、猪油各适量,捣烂敷疔毒。(海南琼山县大林卫生院陈定朝驗方)

20. 石便

(1) 蒜头 10 只,蜂蟻 10 只,蓖麻子 5 錢,生虾肉 5 只,将各药共捣烂敷患处。(湛江市雷济龙驗方)

(2) 生扁豆 4 錢,蒜头 3 粒,豆豉 3 錢,共捣烂敷患处。(中山郑乃乙驗方)

21. 皮肤湿疹及濕癬

(1) 蒜头 6 兩去皮,淨水 1.5 碗,煎至大半碗,加黃酒以醋为度。重者服 6 次,輕者服 1~2 次。外以梳打水洗,不可太热,洗十多次。(中山郑乃乙驗方)

(2) 大蒜 8 兩,胆矾 5 兩,白矾 2 兩,輕粉 5 錢,白降丹 3 錢,硫黃 5 兩,雄黄 3 兩,樟脑 5 錢,水銀 5 錢,松香 5 錢,白蜡 1.5 兩,桐油 1.5 斤,先将大蒜去皮,与胆矾、白矾、雄黄捣烂,再加輕粉、桐油,煮滾 25 分鐘之久,再用漏斗隔渣后加白蜡、樟脑、松香、硫黃、水銀(水銀与硫黃要先混勻),慢火煮成,最后加白降丹即成。搽擦患处。(电白县邢煜光驗方)

22. 异物入肉 蒜头、豆豉、蓖麻,和冷飯捣烂敷患处。(台山中医研究所驗方)

23. 汗斑 硫黃 3 錢,枯矾 3 錢,樟脑 3 錢,蒜子 1 兩,生姜 1 兩,黃糖 1 兩,梅片 1 錢,将黃糖、蒜子、生姜三味捣烂如泥,然后将其余各药末粉加入攪勻,用布包好搽擦患处,数日有效。(徐万益驗方)

24. 瘻管 用大蒜梗燒灰存性擦患处,其管自消。(《福建中医》1987 年 6 月)

〔附注〕 該方原出于《年希堯集驗方》。

文獻考証

1. 唐代蘇恭撰《新修本草》載大蒜曰：下氣消谷，化肉。

2. 宋代日華子撰《大明諸家本草》載大蒜曰：健脾胃，治腎氣，止霍亂轉筋，腹痛，除邪祟，解溫疫，疔勞瘡冷風，傳風損冷痛，惡瘡，蛇虫蠱毒，疥癬，沙虱，并搗貼之，以熟醋浸經年者良。

3. 明代李時珍撰《本草綱目》載大蒜曰：溫水搗爛服治中暑不醒。搗貼足心，止鼻衄不止。和豆豉丸服，治暴下血，通水道。搗汁飲，治吐血心痛。煮汁飲，治角弓反張。同鱖魚丸，治腸氣。同蛤粉丸，治水肿。同黃丹丸，治痢瘕孕痢。同乳香丸，治腹痛。搗膏敷臍，能達下焦，消水，利大小便。貼足心，能引熱下行，治泄瀉暴痢，及干濕霍亂，止嘔血。納肛中，能通幽門，治關格不通。

4. 清代趙學敏撰《本草綱目拾遺》載大蒜曰：凍瘡，種福益方，大蒜煎湯洗之。良朋匯集云，更應通試效過，防风、荆芥、地骨皮、川椒、斷艾、瓦松各5錢，槐柴1兩，陳蒜梗2兩，共入麻布袋內，煎滾熱湯止瘡，神效。

5. 清代趙寶谷撰《本草求原》載大蒜曰：辛溫小毒。能導陽氣歸于五臟，以宣陰中之滯氣，通竅；治寒濕氣痛，心腹冷痛，一切疥癬，水氣腫滿，寒濕冷痢，二便不通，衄血，胸滿鼻淵，暴痢泄瀉，產后金瘡中風，痛疽腫毒，辟邪惡，散濕消谷化肉，磨積，解暑，除痰，殺蛇虫蠱毒，中暑不醒，行諸氣以治有餘之病。多食生痰動火，散氣耗血，損目昏神，陰虛切忌。同田螺、草蓴子熬膏貼臍中，能消下焦水腫，從尿而出。搗納肛中，治關格二便閉。同黃丹為丸，長流水下，治寒濕冷痢。搗貼足心，又治暴痢泄瀉，及噤口痢、脫漏、鼻淵，皆引熱下行也。煮水灌產后中風。先搗紅地，以蒜磨地上成膏，將僵蛋去頭足，安蒜上，晝復一夜，取僵蛋為末，搗鼻，口含清水，治頭風痛。同梔子、鹽搗爛塗臍，通小便。和熟土搗，入新滾水取汁，灌中暑欲絕。搗和麻油，厚敷一切瘡腫，干即易，最效。又貼瘡上灸之，能消一切痛疽。或曰頭上灸，然不知痛者，虽頭毒不妨；昔東垣治腦疽，灸百壯始知痛而愈。薑水頓服，吐腹中虫積噎膈不下。腹熱如火手不可按者，皆效。

6. 現代陳立群撰《廣西中藥醫藥用植物》載大蒜曰：治牛眼膜症；腹肚症；水瀉症；出痘；炭疽（脾脏）病；誤吃野貓屎中毒；氣腫症；并可治牛喉風症；猪痘；雞痘。

大叶双眼龙

Croton tiglium Linn.

别名：猛仔叶，虫蚕草

科属形态 本品系大戟科巴豆属中的一种小乔木；枝条扩展，幼枝被稀疏星状柔毛。单叶，纸质，互生，卵形，阔有矩圆形，长8~18厘米，宽5~7厘米，先端渐尖，基部稍为广楔形，边全缘，两面近无毛或背面略被疏毛；叶柄柔弱，长2.5~6厘米，于顶端常具2个腺体。春夏季顶生总状花序，长5~8厘米，上部生雄花，下部生雌花；雄花萼片5(4~6)裂，近无毛，顶端有束毛，花瓣狭浅形绿色，边缘被细毛；雄蕊15~20枚，着生于被毛的花盘上，花丝分离；雌花萼片内面基部有毛，花瓣缺；子房上位，8室，每室有胚珠2颗；花柱2裂。花后结蒴果，倒卵形，有钝角8个，无毛或稍被毛。

生长环境 生于山谷、溪边，石灰岩山林亦有之，半阴生，稍为肥沃土即可生长。

产地分布 大陆热带植物。现各地多有栽培，我国四川、云南、广东、广西、台湾等省均有分布。

药用部分与气味性能 叶、实、根。味辣，性微温，根茎味微温微苦，叶味辣有微毒。外用多用枝、叶，内用多用根茎、实。能攻毒杀虫，逐瘀积，抗蛇毒疗毒。

临床应用

1. 钩虫病 大叶双眼龙叶晒干研末，用法：先服0.03山道年甘草3片，隔半小时后服本品1.5~2市分，装入胶囊才可服用。以上为成人一次量，隔12小时服1次，连服3次。鹤山县防疫站及人民医院以本方治疗10例中有9例驱出钩虫，占治疗人数90%，驱出虫数最多的2例有56~68条。副作用：服药后肠胃有灼热感，间有头晕心闷呕吐轻泻等反应，经过3~4小时大便后一般反应逐渐消失。注意：1)服药前宜半空腹，药用冷开水吞服。2)服药后不宜过食或饮热的东西，在服药期间不要食脂肪酸辣及酒类。3)对有感冒发热，肺胃弱病，孕妇及未满10岁的儿童不宜服。4)如服药后呕吐心闷，用甘草片2片含服，便能逐渐减轻。在试验过程中例数还不多，亦未发生过严重反应。仅有一病者因因胃不清，将胶囊除掉后服，服后食道灼热，发觉后给食甘草片2片，半小时反应消失。

2. 瘧疾

(1) 大叶双眼龙叶细末1厘，用胶囊装后，开水送服。曾治疗患者多人，均愈。(潘杏林，英德大湾卫生院高福民献方)

(2) 用大叶双眼龙叶3厘，尖横6分，研末用酒冲服。(广州黄春田献方)

〔附注〕据献方人称，此方得自禺北老中医谢植溪先生，患者服食，确有效果，且服药后患者即感全身温暖，故能制止寒战。

3. 白喉 巴豆内仁未变坏者与朱砂各等分，分研细，再混合研匀，每次称取1.0克，置一般万应膏药上为药心，贴病者眉心稍上印堂上，注意勿误入眼目，经8小时后取去，局部皮肤现红紫色，并生小水泡，小心刺穿吸去泡内水液，慎勿误入眼内，然后涂上龙胆紫液，并保护局部皮肤。中山人民医院实验治疗48例，治愈率达100%，顺德人民医院实验治愈率亦达95%以上。

4. 胃腹痛及痰痢

(1) 巴豆仁(去膜衣及油)1两，青皮5钱，沉香3钱，制南星5钱，半夏姜制5钱，共为细末，米糊为

丸如綠豆大，每服5~10丸，以瀉為度。此方對胃腹痛及痰瀉，凡屬子風痰聚集宜以溫通之法者，均有奇效。（汕頭市廖作民獻方）

（2）腹痛 用大葉雙眼龍根1條去粗皮晒干，放入尿缸浸一星期，取出再晒干切碎為末，每次用量4分，開水送服。（李澤民獻方）

5. 寒濕下墜下肢浮腫 用干大葉雙眼龍葉8錢，煎水熏洗。

6. 出入山虎（發背疔瘡） 大葉雙眼龍樹皮1撮，合肥豬肉搗爛，敷患處良效。（龐進新獻方）

7. 毒蛇咬傷

（1）大葉雙眼龍根1兩，入地金牛5錢，三角草2.5錢，共為末，酒調敷患處。此方對各種毒蛇咬傷均良驗。（佛山專區獻方）

（2）大葉雙眼龍葉5錢，獨腳蓮2兩，白花丹根2兩，春蓮秋柳3兩，毛射雪2兩，大小還魂各2錢，北細辛2兩，川連8錢，獨活2兩，吳萸7錢，靈仙1兩，麝香5錢。用米酒浸3~4天可用。被咬後，先服酒1杯，另用酒搽或濕敷傷口周圍。內服每天至多3次，每次1酒杯（約10毫升）。

（3）大葉雙眼龍根1兩，用酒搗爛塗患處，另先內服少許，以後將藥渣敷傷口周圍。若咬後留有蛇牙者，加入毛葉蓮（蛇喇草）合搗爛，使用方法如前述一樣。此方經治療80多例，均獲全愈。（清遠龍頸鄉留司洞黃伍獻方）

（4）巴豆樹根1兩，和槐酒燉出味，內服少許，其餘的用作外搽。（順德縣楊道生、羅定、黃逸周獻方）

8. 跌打

（1）大葉雙眼龍根1兩，浸酒1斤，擦患處。（英德黎洞衛生院莫繼昌獻方）

（2）大葉雙眼龍葉3錢，兩面針5錢，黑老虎5錢，金耳環3錢，千里馬5錢，千斤拔5錢，共為末，姜蔥搗爛，和藥末敷傷處。（英德黃宜興獻方）

（3）骨折 大葉雙眼龍根、金櫻根、雷公根、龜背草根各2兩，鷄1只，酒8兩，和藥搗爛炒熱敷患處。（陽江縣程村柯杰獻方）

9. 蛇頭癰指（瘰癧）

（1）雙眼龍3錢，川芎3錢，雄黃3錢，硫黃3錢，吳萸3錢，靈仙3錢，甘草3錢，共研末，用米粉糊調藥粉，外敷患處。

（2）用大葉雙眼龍樹根，煎水浸患指。（宋文明獻方）

10. 疥癩 巴豆5錢，大楓子肉1兩，蛇床子1.5兩，艾葉3錢，輕粉8錢，樟腦5錢，硫黃1兩，枯礬1兩，白芷1兩，將上藥為極細末，用茶油調勻適成膏狀乃合。濕癩用消毒棉球蘸藥搽上，干癩用消毒紗布包裹患處。（佛山羅俊杰獻方）

11. 牙痛 大葉雙眼龍樹根研末，取少許塞入齦齒內，其痛即止。（梅縣李子忠獻方）

除四害

1. 滅子丁

（1）巴豆葉或種子（大葉雙眼龍），搗爛加水浸泡，或煮煎成水劑，或加肥皂作成乳劑。對蚊、蠅、蚊幼蟲，每公升水用1克，24小時死亡70%。乳劑效果更好。（廣東省衛生廳防疫局土農藥殺蟲毒鼠介紹）

（2）醫學科學院病蟲系試驗，將巴豆（大葉雙眼龍）用熱水浸48小時，再製成5%濃度液，24小時子丁100%死亡。昆蟲所試驗……用20倍水浸液對子丁的殺蟲率為100%，用100倍酒精液為100%。（《中國土農藥志》）

2. 滅蠅蛆

（1）巴豆（大葉雙眼龍）搗爛加水浸泡，或煮煎成水劑，或加肥皂作成乳劑。試驗蠅蛆，每公斤糞便用200克，24小時全部死亡。（廣東省衛生廳防疫局土農藥殺蟲毒鼠介紹）

（2）大葉雙眼龍葉50%，白花丹15%，鉄板茶35%（葫蘆茶），為末，撒在蠅蛆孳生地，在6~8小時溶化顯效。每平方公尺約撒2~3兩。（新興集成公社紅旗營潘崇禹獻方）

(3) 将巴豆(大叶双腺龙种子)和水磨細加入粪中杀蛆效果显著(湖南)。将巴豆捣烂磨成粉末,在有蛆的粪便中按2%的用量,加入粪内,48小时粪内蛆死亡50%(四川叙永县)。将巴豆叶(大叶双腺龙)捣烂,按10~20%加入有蛆粪内,效果高的1日内开始死亡,3日死亡数可达90%,但效果不稳定,有时效果不如此(四川)。巴豆叶捣烂加石灰少許投入坑内,3~6天可见效(安徽)。(《中国土农药志》)

3. 灭蝇 巴豆乳剂:巴豆5斤,肥皂8两,加水50斤。先把巴豆碾碎,加水浸泡1周,每天用木棒搅动3~4次,然后放在火爐上細火煎至五分之四,用細網絲漏斗滤去渣滓,加入神肥皂3两,再煮沸0.5小时即成。使用时以1斤原液加水12斤进行喷洒。注意:巴豆毒性较大,对人的呼吸道粘膜有刺激性,故喷洒时应戴风鏡口罩,穿隔离衣。又因本剂气味较大,只适宜于喷洒厕所、拉圾堆、阴沟及下水道,不宜于室内喷洒;如使用时不慎接触皮肤,应迅速用肥皂水洗去(此指使用川巴豆应注意事項)。(《中级医刊》1959年2期)

4. 灭钉螺

(1) 每公斤水50克,1小时全部死亡。现场浸杀試驗,0.1%濃度,27小时死亡达92%。

(2) 浙江卫生实验院研究,巴豆为杀灭钉螺的特效药,以其液0.5%濃度浸杀,最为适宜。

(3) 将新鮮大叶双腺龙叶梗200克切碎,用冷水泡浸5小时,用于一平方米,效果可达98~100%。如成粉剂,晒干速壳研成粉用冷水泡浸5小时,每平方米药液1000~2000毫升,药量为50克一平方米,效果可达90.1%。(清远血吸虫病防治站林耀新)

5. 灭臭虫 将大叶双腺龙叶晒干研末放席下,經10天臭虫全部死亡。

文献考証

1. 現代肖步丹撰《岭南采药录》載双腺龙(大叶)曰:捣敷恶疮。凡核疫証及疮毒疥癩等疾,用之医治,极奏奇功。遇核証,則外敷內服。若疮毒疥癩,則将叶捣烂敷于患处,便可痊愈。

2. 現代陈立卿撰《广西中医药用植物》載巴豆(双腺龙)曰:治牛胎衣不下。并可治大便秘結,熱瘧。

【附注】本品根名割蛇劍,独行千里,果名巴豆、白花芥。

大 叶 桉

Eucalyptus robusta Smith

别名：大叶有加利

科属形态 本品系桃金娘科桉属中的一种乔木。干皮粗糙而有縱槽纹，色暗褐，枝的外皮淡紅色。单叶，互生，革质，边全緣，生于幼苗及萌生枝上的叶多数是对生；卵状披针形，长8~18厘米，寬3.5~7.5厘米，先端漸尖，基部楔尖，侧脉极多而細，边脉明显。夏季腋生繖形花序，有稍大白色的花4~8朵；花序柄长达2.5厘米，粗厚，有角或压扁，生于厚而有角的短柄上；萼管狭陀螺形或近壶状，与子房合生，长6~8厘米，下部漸狭而成柄；花瓣与萼片合生成一帽状体将雌蕊包藏，开放时由萼管頂成环状裂开而脱落；雄蕊极多数分离，花药少，近基部着生；药室近平行，縱裂；子房下位，通常3室，花柱不分裂。花后結蒴果。倒卵状长橢圓形，通常长约1.2厘米，成熟时頂部开裂成3~4果瓣，果緣薄，蒴果內藏，果瓣长期粘合成迟裂。

生长环境 喜生于土壤疏松，水分充足地方，但也有耐旱力，我国南部各省栽植面甚广，荒山、大小交通干道路旁均有栽植。

产地分布 原产澳洲；我国两广及福建、云南均大量栽植。本省各地山地、大小交通干道、村落均有栽植，采用甚为便利。

药用部分与气味性能 叶。气芳香，味微辛微涩，性平。能疏风解热，防腐止痒。

临床应用

1. 絲虫病 福建建甌县卫生会办公室陈明教用鮮桉树叶3两切絲，放水3倍，煎3小时，去渣濃縮至60毫升左右，一次頓服，小孩1~4岁服 $\frac{1}{2}$ ，5~10岁服 $\frac{1}{3}$ ，11~15岁服 $\frac{1}{4}$ ，共治疗31人，复查28人，阴轉12人(42.6%)，服药人数中有个别头晕腰痠，无海群生严重的恶寒发热反应。如用追踪及多次服药治疗，可能会再提高疗效。(《福建中医药》1959年8月)

2. 預防肺炎 廉州南康人民公社及三合口星星农場等地有肺炎流行，用大叶桉叶、黄皮叶各1两3錢，加水1.5碗煎至0.5碗，为成人1日1次服量，連服3天；儿童服量按年齡酌减。該地自試用本法預防肺炎以来，沒有再发现新病例。公社演岳連檢查小学生130人，发现咽喉带菌者26人(20%)，服药2日后复查，98人中咽喉带菌者仅8人(即由20%降至8%)；又在周江連檢查小学生112人，带菌者21人(18.8%)，服药3天后复查，103人中带菌者尚有11人(即由18.8%降至10.7%)。(中山医学院采風展覽)

3. 感冒及流感

(1) 博罗县中医学校制药厂用桉榕合剂疗效显著，制法：取新鮮細叶榕树叶5斤(切碎)，加水60斤，煎至40斤后，再加入新鮮大叶桉树叶5斤，共煎至20斤时，离火澄定濾过，药渣再加水40斤，煎至10斤，离火澄定濾过，弃去残渣，将二液混合加热濃縮至5000毫升，乘热加0.3%苯甲酸作防腐劑，濾过分貯于已消毒玻璃瓶中密封，成人每日3次，每次10~30毫升，小儿酌减。本品可兼治膿疮。(《广东除害灭病参考資料》第1期)

(2) 用大叶桉叶約5斤，煎湯熏浴有效。(周振修献方)

4. 麻风病潰瘍 福建古田縣麻風病院陳慈愛試用治癒多例患者，每天採新鮮桉樹葉約5兩揉碎，加適量水煮成100毫升，貯於滅菌玻璃瓶中密封，用時以消毒紗布適當厚度浸吸藥液敷在潰瘍面上。對用其他方法反復治療無效的，本法治兩星期痊癒。（《福建中醫藥》1957年5月）

5. 神經性皮炎（頑癬樣厚皮干濕疹，瘙癢劇烈） 用桉樹葉5兩，煎水約3碗，待溫度適宜時浸洗患部。該方人頸部患這病多治未效，後得友人介紹用此方浸洗9次即好轉，共治一個月痊癒。（連平人民醫院方書成獻方）

6. 小兒胎毒及濕毒瘡 新鮮桉樹葉、生松樹二層皮各1握（適量），加米泔水煎洗，每日2次，連用數天。（李順羅灼光、吳保生獻方）

7. 化膿性感染 四川隆昌用桉樹葉煎劑治療多種化膿感染外科疾患，如疔瘡癰疽，均有療效。（健康報1958年12月31日）

8. 創傷濕敷水 新鮮桉葉10片，冷開水洗淨揉碎，浸於1磅冷開水中，經24小時後濾去殘渣密封候用，藥液宜保持適當新鮮，用時以棉花紗布吸飽藥液濕敷患處。（佛山專區驗方）

9. 鼠咬傷 用桉葉搗爛敷患處。（梅縣劉錦興獻方）

除四害

1. 殺蚊、蠅、或驅蚊 將葉、果10斤搗碎，加水10~30斤浸泡或煮煎後，即成水劑，如加肥皂則可製成複合乳劑，為噴酒用。複合乳劑對致乏庫蚊幼蟲，每公斤水用2毫升，經24小時死亡占50%。（廣東省衛生廳防疫局土農藥殺蟲毒鼠介紹）

2. 殺蛆 將葉、果2斤，加水20斤煮透，將煮液倒在廁內，或將葉搗碎撒布廁所及貯糞池上，可不生蛆。（五華衛生防疫站）

3. 殺孑孓 將孑孓放入小葉桉浸的水中，經12小時殺蟲率達80~90%。對庫蚊孑孓的效果更高，1~2%的用量，3小時內孑孓全部死亡。大葉桉對庫蚊幼蟲以1~2%的用量，加入有孑孓的水中，3小時即可殺死；對按蚊幼蟲以同樣用量亦有80%以上的效果。（《中國土農藥志》四川叙永縣資料）

4. 殺蚊蠅幼蟲 大葉桉複合劑（廣西的殺蟲之寶）：大葉桉葉3斤，小葉桉葉2斤，肥皂1兩，生薑3兩，大蒜3兩，先將桉葉搗碎後，投入剛煮沸的25斤清水內煮20分鐘，取出過濾去渣，約得藥水20斤，然後取姜、蒜搗爛加清水榨取汁4兩，最後將肥皂切薄片，用沸水溶成糊狀，幾種藥液混和，再加桐油（即帶把油）3錢拌勻，即可噴酒。（廣東省衛生廳防疫局土農藥殺蟲毒鼠介紹）

大 浮 萍

Pistia stratiotes Linn.

别名：大蒲藻，猪鬃藻

科属形态 本品系天南星科大漂属的浮水无茎草本，生于静水中。叶簇生，倒卵状楔形，长2.5~10厘米，宽2~5厘米，先端截头状，或浑圆，基部厚，边全缘，两面均有小毛；叶面深绿色，叶背粉绿色；叶脉下面凸起，扇状。夏季中央生肉穗花序，白色，佛焰苞小，具短柄，长约1.2厘米，被茸毛，下部管状，上部张开；花单性，无花被；雄花生于上部，有雄蕊2枚；雌花生于下部，子房上位1室，有胚珠多数。花后结浆果，有种子多数。

本品一种叶上面绿色、背面紫色的称为紫背浮萍，是中医处方常用的浮萍，烧烟可驱蚊及作猪的饲料用。另一种系槐叶萍科，名蜈蚣浮萍，烧烟亦可驱蚊。

防止孑孓孳生的浮萍，系另一种浮萍属的浮萍，广东一般称为扁种浮萍，叶体扁平，倒卵形至圆形，直径4~7毫米，或再稍小，在静止水面上极易繁殖，很快可把整个静止水面复盖起来，使孑孓无法在水面吸空气而至死亡。

生长环境 常易生于淡水池塘或其他静水中，极易繁殖和移植。夏季间采收。

产地分布 热带、温带地区均有分布。本省随处均易采得，普遍，丛生。

药用部分与气味性能 全草。嗅无，味淡，性寒。能发汗散湿，利尿除湿消肿。孕妇忌服。

临床应用

1. 荨麻疹 浮萍3钱，胡麻4钱，皂刺4钱，白蒺藜5钱，海桐皮4钱，水煎服。有湿加茯苓5钱，有热加牛蒡子3钱，连翘3钱，妇女血虚加当归3钱。此方经湛江市联合诊所林煥等使用，疗效很好。

2. 湿疮 浮萍3两，焙干研末，炼蜜为丸，服之即愈。（蕉岭王省三献方）

3. 水壅 浮萍4两，加糖4两，清水3碗，煎取1碗，分2次服，服后大量排尿，肿胀便消。忌食盐。（广州卫协会献方）

除四害

1. 灭蚊 福建省用蜈蚣浮萍（槐叶萍科）叶部晒干研粉，每市斤加紫壳粉2~3两，制成烟熏剂，每3平方公尺用1两，1小时左右死亡率100%。（《药学报》1969年4月号，中医研究院中药研究所整理）

2. 灭孑孓 上海市西郊区曹杨乡曹杨农业生产社，位于曹杨新村住宅区右侧，与曹杨污水处毗连。全社以生产蔬菜为主，茭白和茭菇就种植150亩，灌溉全部是利用污水厂放出的污水。因此，由于水质污浊就大量孳生三带吻库蚊和淡色库蚊，虽经西区和普陀区爱卫会办公室共同组织人员用药物巡回控制，但由于有二个因素，一是水质含碱量较高，对666有效部分起了分解破坏作用，如药物浓度加高消耗量又大不经济，一是茭白生长过密过高，妨碍药物喷射的均匀程度，杀虫效果受影响。为此，市和爱卫办公室即组成工作组进行研究，试用浮萍灭孑孓。经过实验观察，凡是浮萍繁殖很密的地方就没有孑孓生长，在很稀的浮萍空隙中还找到孑孓。因此决定先在30亩的茭白田内试种，结果良好。后发展为100亩种植浮萍，获得了同等的效果。

用二只相等玻璃器装满污水和适量孑孓，一只容器内水面上布满浮萍不留一点空隙进行观察，经三

四分鐘后子孓激烈运动,先呈不安状态,经过20分鐘即开始死亡,二小时全部死亡。与另一只无浮萍的对照,容器内子孓安然无恙。

浮萍体积小繁殖快,密集在一起,布满水面,使水里子孓的呼吸不能伸出水面窒息而死。由于浮萍密布水面,也就能减少蚊子下卵的机会。計1亩茭白田种200斤浮萍,三星期可长满封平水面,繁殖后又可为养猪养鸡鸭的饲料。上海市人委已將这一法介绍各区准备推广。(全国医药卫生技术革命展览会)

文献考证

1. 汉代《神农本草經》載浮萍曰: 辛寒、无毒, 主治暴热身痒, 下水气, 醒酒, 长发须, 止消渴, 久服輕身。

2. 唐代孙思邈撰《千金备急要方》載: 五月取浮萍阴干, 燒烟去蚊。

3. 清代赵黄谷撰《本草求原》載浮萍曰: 即水浮蓮, 淡寒, 逐皮肤瘀血, 洗痲风, 治酒风脾痛煎猪肉食, 擦汗斑, 下死胎煎水熏。其紫背小浮萍, 亦下胎, 并发汗。

4. 现代肖步丹撰《岭南采药录》載大浮萍曰: 浮于水田池沼, 其叶高出水面, 与小浮萍不同, 俗呼猪越蓮, 牧猪者取以飼猪。味淡, 性寒, 治酒风脚, 和猪肉煎湯服之。可擦汗斑, 能散皮肤血热, 治痲风, 下胎, 煎水熏之。

5. 现代胡眞撰《山草药指南》載浮萍曰: 别名水浮蓮, 又名猪越蓮。煎水洗汗斑, 散皮肤血热; 搗敷消跌打腫痛; 和猪肉煎湯飲治酒风脚及脾氣、痲风。

广东金錢草

Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.

别名：落地金錢

科属形态 本品系蝶形花科山豆属中的一种直立亚灌木状草本。枝圆柱形，密被短而扩展的粗毛。叶互生，通常有小叶1枚，有时8枚，近革质，圆形，长与宽均2~4厘米，侧生的小叶较顶端的叶为小，先端略凹入，基部有时狭心形，上面秃净，绿色，背面被紧贴灰白色绒毛；叶柄长1~2厘米；托叶披针状锐尖，长约8毫米。秋季顶生及腋生总状花序，极稠密，长约2.5厘米左右，萼钟形，长约2毫米，被粗毛，上面的2齿裂，少合生；花冠紫红色，突出，长约4毫米；雄蕊10枚，9枚合生，上面1枚分离；子房上位有胚珠多数；苞片卵形，长约2毫米，被毛；花柄线形，长2~3毫米，下弯。花后结荚果，长1~2厘米，被短毛，有荚节8~5个。

生长环境 生于山坡、溪谷较阴湿地方，细沙质土。夏秋采收全草。

产地分布 我国南部，印度、越南均有分布。本省以东莞、增城等县为多产。

药用部分与气味性能 全草。气微香，味甘淡，性凉。能清利小便，解暑热口渴。

临床应用

1. 膀胱结石

(1) 金錢草、大黄、滑石、山栀、木通各适量煎服。中山医学院以此方曾治1例，疗程十天痊愈。

(2) 金錢草2两，木通1两，车前子1两，土银花5钱，川草薢1两，甘草5钱，水4碗，煎剩1碗，以砂牛1钱，琥珀1钱，共研细末，冲上药1次顿服。（严烟献方）

(3) 金錢草1.5两，车前草1.5两，粟米芯1两，用水4.5碗，煎至1.5碗，分2次温服。（佛山番禺献方）

(4) 金錢草2两，海金沙5钱，水煎服。（韩质卿献方）

(5) 金錢草、鸡内金各1两。煎服。（胡伯明献方）

(6) 用单味金錢草2~4两，煎水或加猪瘦肉同煎服。（和平县人民医院袁俊三，龙川县中医进修班邓锦生，德庆县陈炳南等献方）

2. 血尿

(1) 金錢草1两，丹皮5钱，磁石5钱，防党5钱，菟丝子5钱，滑石1两，车前子5钱，桃仁5钱，冬葵子6钱，猪苓5钱，共用水600毫升，煎至250毫升服。此方于该院治愈患者不少，疗效率达85%。（广东省人民医院中医科）

(2) 用单味金錢草4两煎服。（龙川县中医进修班邓锦生献方）

3. 肾结石

(1) 金錢草6钱，小茴1.5钱，大茴1.5钱，锦大黄5钱（后下），扁蓄1两，净水3碗，煎至1碗服。并多饮黄豆汤，助肾石加速排出。（广州高维博献方）

(2) 金錢草6钱，血琥珀1钱（研冲服），沉香1钱，锦大黄2钱，木通4钱，冬葵子4钱，生地4钱，归尾3钱，大枣6钱，净水3碗，煎至1碗服，每日1剂，渣复煎一次，均1~3星期，肾石自然排出；若有血尿加蒲黄3钱，淮牛膝3钱。中山医学院治疗20例，服药后肾石能排出，疼痛蛋白尿同时消失。

(3) 川滑石6錢，雞不食1兩，冬葵子4錢，桑椹子3錢，歸尾6錢，煨棟子3錢，血珀7分(后下)，沉香1.5錢。本方与上方，在临床上均获得良好效果。(中山医学院献方)

4. 晚期肝硬化 金錢草1兩，丹參5錢，三棱、莪朮各1.5錢，紫甲7錢，牡蠣7錢，茯苓6錢，郁金3錢，白芍3錢，赤芍2錢，補肺8錢，雞骨草8錢，甘草1錢。加減法：腸胃積熱加川連、白頭翁。積滯加麦芽、山查、雞內金。鼻衄及牙齦出血加仙鶴草、茅根、生地。失眠加五味子、熟地。尿少加木通、猪苓、澤瀉、生薏仁。氣虛加党參。血虛加何首烏、熟地。腎虛加蘇子、山萸肉。治疗标准有效率达71%。(广东省中医院献方)

5. 晚期血吸虫病腹水 千金錢草2兩，淨水煎服，为1次量，日服2次。花县血防站李启瑞以本方治疗1例晚期血吸虫病腹水病人，在50多天中得到了体征改善，腹水消退，食欲增加，一般情况好转出院。病者服药后第2天起由300毫升尿量增加至700毫升，最高达1900毫升(小便检查正常)，以后均保持1000毫升左右，腹圍日減，病人自觉轻松，精神良好，且食欲大增，每餐食米增至12兩，腹圍減至78厘米(比入院时縮小29厘米)，体重減至102市斤(比前輕20市斤)，检查：腹軟，左側稍高，肝未触及，脾脏大及骨盘可触及，皮肤干燥，两下肢无浮肿；紅血球815万，血色素6.3克，白血球2900，小便淡黄，蛋白(-)糖(-)，胆紅質(-)，尿胆(-)，尿胆素(±)，显微镜检查(-)。治疗中兼用温运健脾疏肝理气等法辅助，以加速机能恢复。(《广东中医》1988年第5号)

6. 单腹膨脹 第1方用金錢草、半边蓮、枳实、川朴、陈皮、当归各3錢，北芪、蒼朮各4錢，川芎2錢，水煎服；服后再服归脾湯3剂。第2方用枳实6錢，白芍8錢，大黃4錢，金錢草3錢，半边蓮3錢，水煎服，連服五天，每天1剂；以后加重半边蓮、金錢草二味，将原方去大黃，加神曲、麦芽、砂仁，連服十天；最后将此方做成小丸，每天服5錢，服半个月痊愈。在治疗中少食盐或完全戒盐。(翁源县刘瑞瑞献方)

7. 絲虫乳糜尿 金錢草3錢，草薢4錢，土茯苓4錢，金銀花3錢，薏苡1錢，連翹3錢，黃連2錢，白朮2錢，甘草1錢，归尾3錢，服5剂小便固定澄清，观察3周，未再发现乳糜尿。(中山医学院第一附属医院献方)

8. 黄疸 用单味金錢草2兩，水煎服。(江門洪理唐献方)

9. 小儿疳积。

(1) 金錢草适量，煮瘦猪肉食。(清远县沙河乡韦志雄献方)

(2) 1932年翁源县刘琴仙以金錢草叶煮猪精肉食，并以金錢草茎根煎水浴身，治疗疳积，内服外治能退潮热去积。曾治丘姓小孩，用药数日后潮热即退而彻夜安睡。未用药前常有遺失，日夜二三次，味甚酸臭，服此药和浴身之后，遺失稍減，食欲亦稍增，再予2服繼續服用，經十余天恢复健康，精神活潑。(《医林一擷》第2卷10号)

10. 乳腺炎 金錢草、老公根、酒糟，共捣烂敷患处。(博罗李天培献方)

11. 口腔炎及喉头炎 用金錢草5~10錢煎水冲蜂蜜服。(兴宁何志超、苏明华献方)

12. 断腸草中毒 金錢草1握，加第二次洗米水和入辣汁煎服。(丰順潭江卫生院献方)

文献考证

现代廖永祺謂金錢草治膀胱結石甚为奇效，原文載《医林一擷》第6期，茲摘要如下：余于1918年7月时，在石龙搭車往香港，順在車站訪陈君紫泉。見其呻吟床席間，問其故，則曰今患砂淋症，本欲函請先生来調治，今道求甚佳，并道其病歷曰：前20余天，小便刺痛不利，滴瀝而下，甚常如此，以为濕熱，略飲去濕之茶則愈，今則飲去濕熱之茶不獨不愈，且漸甚，已延數醫治之，皆无寸效，昨至今日連滴瀝之溺，亦不能出，下腹部則膨脹不安。余以手撫其腹，弱为弱蓄于膀胱中也。余即入石龙友人处借得尿管与之放尿，放出約磅半之多，放时順將管探其膀胱，果探得二石，一大如胡桃，一大如雀卵，且堅突而圓。溺放出后，陈君即能起坐，囑余为之治疗，余告之曰，欲根治之，必須就医院中剖取。陈君曰吾宁死亦不愿就此麻煩之治疗也。予謂除此之治法外，实无別法可以根治，故却之。越二月，道經此，順訪陈君，陈欣然有喜色，取一小白鉄罐示余，并問罐中是何物。予觀之，乃半罐板微之砂也。予問此砂之来。曰先生前言之砂淋，除西法剖取外，实无他法者，今則不用剖取，只服一味草药，而能將膀胱內之砂打碎而出。此即由

小便溺出之砂也。先生輕視中醫，謂除剖取外無別法，特留之以待先生之研究耳。予訝其神奇，余借探膀胱探之，確不能探得二石，故問是何藥。陳君言乃金錢草也，用量約10兩煎一大壺水，作茶飲，吾不過飲五六大壺而竟獲愈矣。余取數扎持歸，曾試一人，此人先覺小便刺痛，有時不利，以致点滴而下，或時沖出砂粒一二枚，及微砂些少，月余不愈，探得有石二三枚，如荔枝大，即給與金錢草3扎使服，服後出砂頗多，而刺痛不利大減，屬自覓再服，服三四次則溺已無砂見而愈矣。又一小兒五、六歲，有一砂如橘核大而扁，塞在溺管之中，近溺管口深半寸之處，以致小便不利及刺痛。余試與金錢草服之，二日全無效，則用剖取術取出。直至1923年4月，又有一農民患砂淋七、八年，時時小便刺痛，若行路多時，覺小腹有重物牽墜之感，起震動樣的痲痹及痛，近來更甚，故來求治，余探其石如鵝卵大，形橢圓，另有二粒如桂圓之核，余給金錢草四扎，分2日用，每日用2扎，煎水一大壺，作1日之用。2日後來診云，服後刺痛大減，砂粒亦有溺出。余再給與2日量，屬小便時以器貯之，不料第4日所見器中積有微砂甚多，較之有7兩余，痊愈，直至今未復發。

五 指 柑

Vitex negundo Linn.

别名：小荆实，牡荆，布荆，黄荆，埔姜，蚊雄叶

科属形态 本品系马鞭草科牡荆属中的一种灌木或小乔木，高达5米，有香气，小枝四棱形，被灰色的绒毛。叶对生，纸质，指状复叶，具长柄，通常有小叶5枚，有时只有3枚，中央一枚最长，长6.5~12厘米，宽2.5~3厘米，有明显的柄，其余的向两侧依次变小，最外的两小叶最小，长3~4厘米，宽1.8厘米，近无柄；小叶椭圆状卵形至披针形，先端渐尖，基部楔形，边全缘，或每边有浅锯齿2~6枚，干时上面变黑色，背面暗灰色，被小柔毛。夏末顶生圆锥花序，长10~20厘米或过之，被柔毛；花萼钟形，长约2毫米，外被灰色小柔毛，裂齿小，三角形；花冠淡紫色，长6~7毫米；雄蕊4枚，2长2短；子房上位。花后结核果，球形，直径2~3毫米，下面承托以扩大的宿萼。

生长环境 多生长在坡地、疏林、山麓、丘陵沃土、田野路旁或旷地，半阴生。夏季采叶，秋季采收种子。

产地分布 亚洲热带、马来亚及我国东南和西南各省均有分布。本省全境均产，尤以粤北、东江地区为多。普遍，丛生。

药用部分与气味性能 叶、实、茎汁、茎基二层皮。气芳香，味微辛微苦，性平。能化湿浊，透肌解表。茎汁名荆湿，能消风痰热痰壅盛。

临床应用

1. 疟疾 (1) 湖南慈利通津浦乡长谷铺中医联合诊所所用黄荆干叶6~12两泡茶喝，用作预防：分5~7天服完，每天服1次；用作治疗：分2天服完，每天服2次。长谷铺联合诊所负责地段(380户)内，每年疟疾流行，1955年发病人数286名，发病率达20%，1956年由于推广黄荆叶茶，加强预防措施，仅发生疟疾3人，发病率降至千分之一。铁业生产合作社22个社员，1955年有18个患疟，1956年用此方后，仅1人发似疟非疟。慈利社社员服后未有1人患疟。杉木小学1千多师生服药前已有20人患疟，服药后即控制流行。杉木岭卓老太患间日疟已连发四年，1956年服黄荆叶水后没有发病，群众反映良好。1957年不完全统计，共治疗29人，有28人治愈。湖南永湖联合诊所主任唐芳炳(中医，共产党员)根据这一经验改制成水泛丸剂，使更便利服用和携带，法取黄荆叶晒干研末，制丸如绿豆大；预防总量：成人2两，每次2~3钱，一天一次；治疗总量：成人1两，每次2.5钱，一天服2次，两日服完。疟疾停止发作，仍继续另服数天，每天3钱。(《全国医药卫生技术革命展览会资料汇编》)

(2) 湖南省用于抗复发预防服药4400人，治疗28人，痊愈27人。(全国爱国卫生运动展览会)

2. 流行性乙型脑炎 (1) 乳白草、埔姜嫩叶(即布荆)、雷公根、六角英、大竹草、罗网藤、消山虎、金花草、草前草、灯笼草、三月婆、地斩头、啼鸡尾、单片牙、扁扁翅等4钱，以水3碗，煎取2碗，服1碗，另一碗加米酒连渣布包，自头至脚擦之。如高热加羚羊3分；痰壅盛加珍珠3分。本方在揭阳河婆五经富人民医院应用很广，疗效很高。(汕头专区牛农医陈顺兴献方)

(2) 治小儿倒气风痰 生布荆树用火烘出油，滴在茶杯内，用开水冲服。

3. 吐泻腹痛 新鲜布荆嫩叶1~2两，或干叶1~5钱，煎水内服。(丰顺县卫协陈锡三献方)

〔附注〕 普宁房凌云、三水陈亦毅、丁德机等献方，与本方用法疗效基本相同。

4. 久年心气痛(胃神經痛) 紅心布荆根芽適量,煮猪肉取汁冲酒服。(普宁王潘国献方)
5. 預防狂犬病 山布荆二囊皮2兩,炖米酒,早晚各服一次。(龙川县藍日新献方)
6. 狗及蜈蚣咬伤 (1) 布荆叶(五指柑)取嫩叶搗烂和黃糖貼伤口。(丰順县丘美德献方)
- (2) 蜈蚣咬伤,用布荆叶酌量擦伤口。(惠东县永西卫所献方)
7. 生蛇(淋巴管炎) 布荆叶5錢,威灵仙根5錢,七叶一枝花根5錢,生黄果根5錢,上四味浸酒5兩搽患处,每小时搽1次。(河沅县叶道成献方)
8. 赤游风(丹毒) (1) 生布荆叶不拘多少,洗净,和黃糖搗烂敷患处。
- (2) 荆芥1.5錢,防风1.5錢,升麻8分,粉刈4錢,木通3錢,連翹3錢,赤芍2錢,元參3錢,生地3錢,銀花3錢,灯芯5条,水煎內服。(广州中医學院进修部梁快賓献方)
9. 馬眼疔 用五指柑莖(接近地面部分)取2厘皮適量,加黃糖和白飯各少許,搗烂敷患处良效。本方經本院陳覺民医生用以治疗3例,均获痊愈。(广州市郊区蘿崗洞人民医院献方)
10. 外伤 (1) 生布荆叶(不拘多少),搗烂敷患处則效。(英德雲洞卫生院莫繼昌献方)
- (2) 布荆叶、大风树叶,二味晒干研末备用,撒伤口良效。(江門周正之献方)
- (3) 刀伤血流不止,五爪埔葵叶(五指柑)、午时合、生地、葱根,酌量共搗烂貼之,七日后痊愈无痕。(海丰何監亭献方)
11. 足底石硬(因赤足远行为沙石触伤足底而起,甚者化膿) 生布荆叶2兩,火炙半生半熟,立即乘热擦患处則效。(五华李映元献方)

除四害

1. 杀蝇、蚊 (1) 布荆叶2份,茶麸1份,將上2药混合,加水6份煎煮1小时,冷却去渣后即成水剂。噴洒用。(广东省卫生厅防疫局土农药杀虫毒鼠介紹)
- (2) 布荆干叶研碎与木屑或糠壳混合成烟熏剂,用2~3斤,燒烟熏2小时,家蚊大部杀死,小蚊蛰伏墙上,活动力减退。(福建建宁县介紹)
2. 杀蛆 新鮮的全株杜荆,切碎,加水3倍,浸8~12小时,連同浸出液,一起撒在粪里,經72小时蛆死亡率达60%。(《中国土农药志》北京市防疫站資料)
3. 杀孑孓 据昆虫所試驗:20倍水浸液对孑孓的杀虫率达31.1%,100倍酒精浸液为66.6%。(《中国土农药志》)

文献考証

1. 南北朝陶弘景撰《本草經集注》載杜荆实曰:苦温无毒。除骨間寒熱,通利胃氣,止嘔逆下氣。叶,苦寒无毒。治久痢霍亂轉筋,血淋、下部瘡,濕癰薄脚,脚氣腫滿。根,甘苦平无毒。治心風、头風,肢體諸風,解肌發汗。荆莖治灼爛發熱。
2. 唐代陳藏器撰《本草拾遺》載荆瀝曰:飲之去心煩熱,头風旋運目眩,心头澁澁欲吐,率失音,小兒心熱驚癇,止消渴,除痰唾,令人不睡。
3. 明代李時珍撰《本草綱目》載荆瀝曰:除風熱,開經絡,導痰涎,行血氣,解熱劑。
4. 清代趙貢谷撰《本草求原》載五指柑(柑)曰:甘苦温无毒。治小兒五疳,煎湯散身熱骨腫痛;止嘔瀉;同米炒淬水飲;洗癰疥熱毒,治沙屎虫食脚爛,用叶擦或火燒熏。
5. 現代何克謙撰《生藥性要》載五指柑(柑)曰:味甘苦,性平,无毒。治小兒五疳;煎湯浴身散熱消疳腫痛;止嘔瀉火,米炒燉水飲;又洗癰瘡熱毒。
6. 現代肖步丹撰《岭南采藥錄》載五指柑(柑)曰:味甘苦,性平,无毒。治小兒五疳;煎湯浴身,散熱消疳腫痛;止吐瀉,和米炒淬水飲之;又洗癰瘡熱毒,又治沙虫蛀脚,用水煎脚后,以叶擦之最效。
7. 現代陳立卿撰《广西中藥醫用植物》載杜荆曰:治牛瀉血症(紅痢)。又載黃荆曰:治牛腹脹症;水瀉症;風濕症;軟脚症;喉風症;痢疾(紅白痢);瀉血症(紅痢);難產;腹脹症(食舌毒);熱症;腹胆症。并可治牛養亂症;傷寒症;慢性炭疽;氣腫症;猪丹毒。

〔附注〕本品抗戰前曾部分加工出口,銷至古巴,供华侨作茶葉用,为防治感冒發熱,食滯吐瀉良藥。

五月艾

Artemisia vulgaris Linn.

别名：野艾，火艾

科属形态 本品系菊科艾属中的一种直立灌木状草本，高50~80厘米，揉之有强烈香味。茎圆柱形，纖細，有明显的直棱，幼时被灰色柔毛，老时近秃净。叶互生，纸质，羽状分裂，长5~14厘米，裂片具粗齿或小裂片，基部裂片似托叶，上面近秃净，背面被灰白色绒毛，干后上面变黑褐色。夏秋季顶生头状花序而細小，长3~4毫米，直径约8毫米，近无柄，排成短的穗状花序，此花序复结成一长而顶生具叶的圆锥花序，在每个的头状花有管状花10~12朵，分敷輪排列，其最外一輪是雌花，其余的是两性花；苞片數輪，最外的較短；花冠淡黄色，基部纖細。花后結小瘦果，微有綫条紋，沒有冠毛。

生长环境 散生或成片丛生在土壤湿润、阳光較少的曠地或廢墟、村旁腐爛瓦礫混合土或粘土。秋季采收。益母艾莖方叶較闊，与本品不同，疗效接近，可通用。

产地分布 欧洲和亚洲的温带，亚热带高山地区均有分布。本省各地都有，普遍，多見丛生，少見散生。

药用部分与气味性能 莖叶、根。气芳香强烈，味辛微苦，性温。能驅風散濕，消腫止痒，調經止血。

临床应用

1. 妇科崩漏 新艾叶芯(莖梢)7个，每瓦上炒黑为末，用米酒适量，隔水炖温冲服。(惠阳林鼎献方)

2. 产后月风 艾叶(鮮)2两，黄狗头4两，散血丹2两，白牛耳风4两，生姜3片，煎服。(和平县林素陈嘉英献方)

3. 偏正头风 火艾叶、葱头各适量，混合捣烂生敷，或加酒煮敷，三日內不宜露风，便效。同时另用牛脑、川芎、白芷、荆子，上药煎汁，牛脑酒敷服。(江門专区封开县苏灿财献方)

4. 紅白痢

(1) 火艾叶15斤，鳳尾草30斤，益母草20斤，地新头20斤，均用生药捣烂取汁滤过熬膏，再放于太阳下晒干备用，每次用1錢和細茶泡服。如白痢加灶心土1錢研末冲服。(中順县刘兆芹献方)

(2) 小儿血痢 生艾叶4两，洗净捣烂榨汁，和純正蜂蜜2两煎熟服，如二天不愈，第三日再服一次。(毛江州献方)

5. 水肿 生艾叶、牛膝、柚叶、麻骨、埔葵叶适量，煎水加酒以盆装載药液，置于密室，使病者坐其上借热气熏蒸，并以毛巾蘸药液，扭干乘热拭患者头面及四肢。(汕头福安黄进召献方)

6. 霍乱吐瀉

(1) 生艾叶5錢，生姜1两，捣烂取汁，和适量米酒服。(合浦沙江叶超宜献方)

(2) 腹瀉不止 用五月艾根3錢，炒黄梗米5錢，灶心黄土一团约2两，清水煎服。(严海瑞献方)

7. 阴囊肿痛 生艾根2两，樟木二层皮6两，生姜2两(切碎)，葱头2两(切碎)，煎水熏洗，每日2~3次。(合浦蔡秀卿献方)

8. 鶴膝風 五月艾4两，北白芥子末1两，胡椒粉1两，同混和于热飯內，乘热敷患处。(英德县徐

洗医院黄宜兴献方)

9. 搥耳蛇 生艾根煎酒滴入耳内,立即止痛,經治愈十多个病例。(河玩巫鏡奎献方)

10. 脚底石硬 生艾叶一束搥取汁,食盐少許拌勻,用脚踩之,二至三次則愈。(海丰附城医院陈作阶献方)

11. 碎石伤眼 生艾叶、猪精肉适量,搥烂敷患处。(龙川县鶴市曾仁阶献方)

12. 跌打损伤 艾叶、野菊花、两面针、鸡骨香、石斑树,搥烂和米酒煮沸敷患处。(英德县望埠黄田、張岩胜献方)

除四害

1. 驅蚊蠅

(1) 晒干,适量,然燒熏蚊用。(《中国土农药志》安徽、云南等資料)

(2) 取野艾全植物 10 分,晒干研細,加樟木鋸屑 20 分混勻,放于火盆內,燒烟熏蚊,密閉窗戶 20 分鐘,或做成蚊香驅蚊,效果均好。(《江西中藥》1958 年 11 月除七害民間草藥)

2. 杀蛆

(1) 全株切碎,加水三倍,浸 8~12 小时,連浸液一同撒在糞坑中,有杀蛆之效。(《中国土农药志》)

(2) 采全株五月艾切細,以 10:100 的份量,投入廁所糞便中,7 小时內可以杀死蛆。(《江西中藥》1958 年 11 月除七害民間草藥)

文獻考証

1. 宋代刘珣世撰《孙公談圃》載驅蚊法:泰州西溪多蚊,使者行按,左右以艾熏之。

2. 清代赵学敏撰《本草綱目拾遺》載鴨脚艾曰:百草就(称)叶細多歧,間有闊者,杂之莖葉,如鴨脚脚然,故名,搥之作艾香。治脾氣疝氣。

3. 現代肖步丹撰《岭南采藥錄》載鴨脚艾曰:味苦,性温,无毒。活血通經,疗霍乱水瀉,止金創出血;治湯火伤,消火毒;治心氣痛,水腫。又治大小便血,产後余疾。(山草藥性指南內容同)

4. 現代陈立卿撰《广西中藥醫藥用植物》載五月艾曰:可用为有孕母牛安胎藥;又可治牛胎阳症;风湿症;軟脚症;头风症;牛发瘋症等用。

(附注) 本省艾有蕪艾、大风艾、益母艾、五月艾等多种,气多辛香,科属亦有不同,形态和味亦各有区别。清代赵寬谷《本草求原》卷三蕪草类艾叶条中曰:不拘州土,生田野复道类蒿者佳,俗称甜艾为上(指蕪艾),火艾次之(即五月艾味略苦)。說明各种艾的疗效是接近的,可就地所产使用。

本省汕头、合浦专区整理,五月艾疗效主要是散风寒,活血,治妇科崩漏及經痛、痢疾、腹痛等病。

水 翁

Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr.-Perry

别名：水 糖

科属形态 本品系桃金娘科水翁属中的一种大乔木，高可达15米，小枝近圆柱形或四方形，秃净。单叶，对生，近革质，阔卵状矩圆形或椭圆形，长8~20厘米，宽4~6.5厘米，先端渐尖，基部钝或渐狭，边全缘，两面无毛，干时背面常有黑色斑点；叶柄长1~1.5厘米。夏季腋生绿白色广歧分枝聚繖花序的小花；萼钟形，长约3毫米；近截头形，花瓣合生，帽状，顶端，有腺点，正个脱落；雄蕊多数，分离；子房下位，2室，每室有胚珠数颗；花柱线形，柱头小。花后结一核果状浆果，球形，宽约7毫米，熟时紫黑色，味甘微酸可食。

生长环境 喜生于水边，为固堤植物之一。夏季收采花蕾及枝皮。

产地分布 热带植物。本省东西北江及南路均有散生，以高要、东莞为出产较多。

药用部分与气味性能 花蕾、叶、枝皮。嗅无，味苦，性寒。能清暑解热，消滞。皮的疗效逊，多用于杀蛆止痒。

临床应用

1. 麻风病人的炎质水肿 用水翁树皮约1斤，洗净置锅煎煮沸，倒在盆内待水适合皮肤感受温度时，便可洗患处。此方经治愈80余人，功效神速，无毒性。（东莞县麻风防治站献方）

2. 肾囊痛 水翁树二层皮约1斤（如痛已穿加甘草节5钱），煎水洗患处，连洗十余次即愈。

3. 乳疮 水翁树叶4两，捣烂用酒煮热敷患处，连敷数次即愈。（陈阴科献方）

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求原》载水翁皮曰：酸平。杀虫，洗瘰癧，烂脚，浸疥疮。煎水染布，过泥则乌。

2. 清代何克廉撰《生草药性备要》载水翁皮曰：味微酸，性温。洗瘰癧杀虫。其子红黑者宜食，行气。煎水染布，过泥似真乌色。

3. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载水翁皮曰：味微酸，性平。洗疥瘰杀虫。能行气。煎水染布，再以泥涂之即乌色。患囊痛，取其二层皮煎水洗之，十余次即愈；如痛已穿，如甘草节5钱同煎。其子红黑者可食。其花清热。

水楊梅

Cephalanthus occidentalis Linn.

别名：假楊梅

科属形态 本品系茜草科风箱树属中的一种灌木，高1~4米，直径15厘米，分枝极多，幼枝略为压扁或近四方形。单叶，近革质，对生，很少有轮生，矩圆形或椭圆披针形，长7~13厘米，宽2.5~8厘米，先端短尖、长尖或钝头，基部浑圆或近心脏形，边全缘，叶面无毛，叶背被柔毛或茸毛；侧脉在背面凸起；叶柄长5~10毫米；托叶三角形，长约4毫米，先端削尖，常具一黑色腺点，基部广阔。秋末冬初顶生或腋生头状花序，或排成总状花序，花两性，萼管倒金字塔形，长约3毫米，外面被毛，裂片极短；花冠管漏斗形，白色，长约8.3毫米，外面秃净，里面有柔毛，裂片4，钝头；雄蕊4枚，着生于冠喉部；花丝短；子房下位，两室，每室胚珠1颗；花柱线形，露出花冠外。花后结蒴果，倒圆锥形，长约6毫米，直径约2毫米，顶端冠以宿存的花萼，有种子1颗，矩圆形。

生长环境 生于溪边、沟边、田边，低洼的荒坡，潮湿处，阳光充足的冲积土、水稻土、沙壤土等均可生长，插枝很易繁殖。全年采收。

产地分布 我国广东、广西、福建、台湾、浙江、云南、江西等省，印度、马来亚、北美洲均有分布。本省以三水县附近为多产区，丛生。

药用部分与气味性能 根、茎、叶嫩芽。味苦涩。能止血生肌，杀虫止痒，消肿拔毒。

临床应用

1. 慢性痢疾 水楊梅叶5钱，黄糖1两，将楊梅叶捣烂，煎取水1碗，去渣，和黄糖作1次内服，连服1~3次即愈。（邓佑献方）

2. 甲状腺肿 楊梅树根2~4两，荔枝干5个，清水煎服。（《福建中医秘方》2集）

3. 睾丸炎 水楊梅根6两，雞項（未产卵雞）1只（去腸杂），用白酒3.5斤，清水3.5斤，共煎至2碗内服。（三水林品生献方）

4. 腹痛吐瀉（胃腸炎） 楊梅树或二层皮，用重便浸2星期，洗净晒干研末，成人每服2钱。（汕头何朗明献方）

5. 跌打接骨 用楊梅树茎4两，或叶捣烂炖酒敷患处；外用树壳夹板绷带绑好固定原位。（龙川县老隆人民医院楊洪元献方）

6. 脱肛 水楊梅二层皮、田七各5分，先将水楊梅树二层皮酌量捣烂，加田七末和匀，再加入乳汁少许搅匀，敷于患处，连敷一个对时即愈。（英德黎溪乡黎洞圩邓斗石献方）

7. 跌打瘀痛

(1) 用水楊梅干根2两，浸酒1斤，外擦患处并内服。孕妇忌服。（蕉岭蓝坊卫生院江金增献方）

(2) 水楊梅树皮（老树更好）晒干研粉，用于外伤止血，可无痕迹。置酒浸至红色，取服可散瘀。（汕头伍朗明献方）

8. 止血止痛 水楊梅根皮晒干用酒浸一两天，焙干研末敷患处。（和平張桂芳献方）

9. 枪炮伤 水楊梅树根二层皮，捣碎，加入老毫树叶青，再捣碎混和如糊状，加些米汤汁调匀敷患处。（丰顺肖百良献方）

10. 凡牙痛 先以楊梅叶煎水含漱，使膿血出尽，后用牙痛散敷患处。牙痛散是将全副白鴿骨罐封煨成炭，鹽綿或燒麝數十只煨存性，白鴿骨灰3錢，和鹽綿灰1錢，研为散即成。（邓启修献方）

11. 坏疽（崩肉飞腐）用水楊梅根捣烂和米汁敷患处；严重者先用烏狗毛煎水洗淨患处后敷药。（广州中医学院进修部刘荣珍献方）

12. 疮痈 楊梅根每4两浸酒0.5斤，以棉花浸贴，勿令干燥，未成即消，已成即溃。（蕉岭三圳卫生院中医彭远初献方）

13. 对口疮 用水楊梅叶捣烂敷患处，并用其根煎水服良效。（惠阳黄俊勾献方）

14. 天泡疮 用大量水楊梅叶煨灰为末，加入大梅片1分，用生油调搽患处。（三水刘国未献方）

15. 脚生成疮（由接触脏脏或泥或粪灰之类而引起）水楊梅茎捣烂敷患处即愈。（郁南黄汝霖献方）

文献考证

1. 明代李时珍撰《本草纲目》载水楊梅曰：主治疗疮肿毒。用根。

2. 清代赵学敏撰《本草纲目拾遗》载水楊梅曰：一名金勾叶，家母利，藤勾子。此草结红子如楊梅，小儿采食。叶点牙疼，取叶捣汁点眼角，饮香茶一罐，闭目少顷，牙疼即止。

3. 清代赵寅谷撰《本草求真》载水楊梅曰：生田壟水边。叶对生，似布渣，一茎直上。苦涩不入服食。洗脚趾，外痔，敷脚趾湿烂，治水积沙尿虫食伤捣敷之。其根止牙痛立效，煎水含，若连藤叶，为末调搽。其寄生煎服或浸酒，治酒痰风肿脚痛。

4. 清代何克廉撰《生草药性备要》载水楊梅曰：味涩苦，略有毒，不入服食剂。宜煎水洗疮痈外痔，敷脚趾，治水渍趾伤。

5. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载水楊梅曰：味涩苦，略有毒。治疮痈甚有功效，煎水洗疥癬外痔，敷脚指趾及治手指水渍疮。凡牙痛，取其根煎水含之，三四次涎出即止痛；或取叶捣汁点眼角，饮香茶一杯，闭目少顷，牙疼即止。凡牙痈初起，取水楊梅茎叶煎水含之，要趁热含，一息吐之，又再含，经数十次自散。一脱味辛，性温，无毒。治疗疮肿毒，制丹砂粉霜，其于伏三黄白矾。

6. 现代胡翼撰《山草药指南》载水楊梅曰：凡脚指趾，或手指指疮，煎洗甚效。取梗叶煎水洗痔疮肿毒。

7. 国外学說：荷兰《药鏡》载水楊梅曰：水楊梅入药用根，辛温芳香收涩，气味如丁香。其收涩之质，含有一种油及苦味之盐，能使神經心胃温壮强健，略有发汗利尿之效，乃壮神之一良药；又能鎮靜透解之运劲，故用于因諸管纖維弛緩虛弱而起之症，殊能奏效；且驅風氣，治疝痛，用于腐敗熱或間歇熱，亦屬妙药，多有效驗；要之適用規那之病，此药无不宜之，他如起歇有时諸症，用之便驗；又治經久之下利及赤痢之虛症，止妇人崩漏白帶下，嘔血等，失血过多者，不妨試服之；又以治療瘰癧諸症，及大潰烂之膿瘍果效。其服量，用細末0.5錢至1錢，或加丸药、炼药用之；或以此根1两浸燒酒8兩，候药气出，飲服1匙，日三四次；或以此根1兩，加沸湯8兩，作为泡剂服之；或以此根1兩半，入水16兩，煎至減半，去滓，每半时服1匙。此药多加揮发强壯剂用之，故奏效殊捷。

火 秧 筋

Euphorbia antiquorum Linn.

别名：楊 Y

科属形态 本品系大戟科大戟属中的一种直立、肉质、含乳状液汁、无毛的灌木，高可达7米，一般栽种年期短的为2~3米，老茎圆柱状，或钝3~6角形；小枝有3~5条厚而作波浪形的翅，在翅的凹陷处有一对锋利硬刺。单叶，肉质，互生，由翅边拔生，倒卵形，先端浑圆，基部楔尖下延成1短柄，侧脉不明显。春季顶生或侧生，由三个总苞构成的短柄的聚繖花序；每个总苞为半球形，黄色，4~5裂，裂片间有腺体，包藏着多数的雄花和1朵雌花；雄花有一具柄的雄蕊，通常有极小的苞片；雌花无柄，生于总苞的中央，仅有一个8室的上位子房，承托以具睫毛的小苞片数枚；花柱分离，2裂。花后结蒴果，直径约1厘米。

生长环境 生长于村落附近篱笆界边，或屋隅的隙地上，古旧的泥土枯墙上，主要吸取空气水分生存。四季均可采用。

产地分布 热带地区有产，我国两广海南较多，本省多系移植品，散生。

药用部分与气味性能 叶、茎二层皮。嗅无，味苦，性寒。能泻水，拔毒，消肿；加米共炒煎水则性平，反能止霍乱吐泻。

临床应用

1. 瘰疬 火秧筋心切成黄豆大，用龙眼肉包裹，于发病前五小时吞服，久瘰不愈良效。（合浦洗平献方）

2. 腹膜

（1）火秧筋胶（用小刀在茎梗上刮开即有白色胶流出）、炒米粉、百草霜，以上3味和匀为小丸，晒干，朱砂为衣，大人每服1钱，小孩7分，用山楂、砂仁、白芍煎水送服，隔日在清晨服1次。服药后经过及应注意事项：服药1~2小时后会引起腹痛泄泻（间或引起作呕），待泻过4~8次后可服温白粥，则所有反应自然消失。由服药日起戒盐（包括盐制食品）100天，同时对参芪等补剂亦在禁忌之列，但不补药品如淮山、百合、莲子之类不忌。此方良效，是我家传数代秘方，我所知治愈的有百多人。（佛山专区东莞刘浩驹献方）

（2）火秧筋汁数滴滴入鸡蛋内，外用湿纸封固煨熟，连服数次，肿膜可消退。（云浮县区仲仁献方）

（3）取火秧筋汁与面粉和匀，制成小丸如胡椒大，滑石粉为衣，阴干，成人每服8丸，开水送服，服时注意切勿嚼破。（龙川县彭其昌献方）

3. 霍乱

（1）火秧筋1两去皮，加米少许炒黄煎服。（广州屈炳衡，广州中医学院刘伯茂献方）

（2）火秧筋叶，开水洗净，嚼烂咽下，以食至舌头有难过时即止，如重症可捣烂吞服。（南海袁滋非献方）

4. 偏枯 火秧筋二层皮4两，水浸半日晒干，猪蹄1只，水酒各半，煎8小时，去渣油饮净汤。如嘔或泻，不用戒心，越日饮三蛇血以畅流血液。（广州梁翰芬献方）

5. 心胃气痛 火秧筋4两去皮，猪心2两，淨水2碗煎成1碗，温服。（云浮县朱满献方）

6. 大便秘结

(1) 火秧箭汁 3~4 分, 生猪油 1 两, 同煎服。(英德洛洗卫生院刘玉善献方)

(2) 火秧箭汁, 加适量番薯粉, 为小丸如绿豆大, 用新瓦焙干候用, 每次服 1 丸。此丸服后 4 小时显效, 无副作用。(清远盘灼明献方)

7. 石硬 火秧箭 2 两, 金茶 4 两, 以适量淡酒同炒热, 用布包熨患处。(莫德才献方)

8. 风痰鹤膝 火秧箭叶 5 钱, 上熟烟 1 两, 熟石灰 3 钱, 青蒿 2 钱, 白槐水 2 钱, 共捣烂敷膝边两旁, 两小时后病者会吐; 如不吐, 再用丝瓜仁 6 粒打烂冲开水服, 一定吐痰。用药 2~3 次见效。(鄱南何伯明献方)

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求原》载火秧箭曰: 涩涩。叶解毒, 洗骨痛, 贴无名肿毒。其汁胶治大小便不通, 白蜜服, 二便通, 即食猪肉汤以解其毒。其茎治虚壅, 煎鸡蛋包好, 用八角茶送吞。

2. 现代何克廉撰《生草药要》载火秧箭曰: 味苦难食。治无名肿毒大疮, 剖开两边用火焙热贴之, 其疮毒自消。茎亦解毒, 叶能去毒, 治热泻泻, 其茎和鸡蛋煎食, 治中腹膜, 能消肿。

3. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载火秧箭曰: 味苦。治无名肿毒大疮, 以其茎剖作两片, 向火焙热贴之, 疮毒自消。折之有白汁出, 其白汁亦解毒。又以白汁和鸡蛋煎食, 治腹膜, 能消肿。其叶能治泄泻, 跌打因积瘀而大小便不通, 取其叶切细, 和生米炒至米黄色为度, 随下酒煮之, 饮其酒即下瘀血, 有起死回生之功。凡患疥癩, 以此箭切片, 香油 2 两, 貯瓦器, 煎至箭焦黑色, 去箭存油, 和入川黄連、枯乳、樟脑、三仙丹、雄黄、蛇床子为末, 带热敷之, 3 日痊愈。

4. 现代胡真撰《山草药指南》载火秧箭曰: 味苦。凡跌打因积瘀而大小便不通, 取叶切细, 和生米炒至米黄为度, 随下酒煮之, 饮其酒, 即下瘀血, 有起死回生之功。又治无名肿毒恶疮, 取茎剖作两片, 向火焙热贴之, 疮毒自消。其叶折之有白汁流出, 白汁亦解毒。取箭捣敷能杀虫蚀烂肉。凡患牛程毒(即石硬), 取叶捣敷。取白汁和鸡蛋煎食, 治腹膜, 能消肿。

5. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载火秧箭曰: 治牛跌伤新骨, 痼症(红白痢)。如为痼症, 用老干木质部分, 但以內結成黄褐色球状物者为佳。

火炭母

Polygonum chinense Linn.

别名：火炭星，斑鳩飯，麻更度，鵝糖梅，赤地利

科属形态 本品系蓼科蓼属中的一种直立或半攀援状、多年生亚灌木，高可达1米，茎蜿蜒状，秃净或近秃净，赤色，茎节略膨隆。单叶，膜质，互生，卵形或卵状矩圆形，长5~10厘米，先端渐短尖，基部截头状而短尖，边全缘，但有极微小的齿，两面均秃净而有小点，常有紫黑色人字形斑块；叶柄长1~1.5厘米，基部常有两耳，耳常早落；托叶斜截头状，短尖。秋季顶生及腋生圆锥花序；花被裂片5枚，白色或淡红色；雄蕊8枚，生于子房的周围，鞘状；子房上位，三角形；花柱2~3裂；苞片膜质，秃净；花序柄被粗腺毛。花后结坚果，三角形，包藏于干膜质的花被内，熟时青紫可爱。

生长环境 溪谷、阴林边、山岩崖边及低洼湿地、瓦砾地、沙质地等均可生长。

产地分布 印度、日本、马来亚均有分布。本省各地普遍，丛生；以花县、三水为多产。

药用部分与气味性能 全草。嗅无，味微酸微涩，性微凉。能缓解过度疲劳，宜导大腸滯滯。

临床应用

1. 黄疸 鷄骨草1两，土茵陈4钱，柴胡4钱，黄皮核3钱，郁金4钱，火炭母8钱，糖青藤片3钱，山栀2钱，水煎服。（广州杜明昭献方）

2. 痢疾 火炭母1握，和煮猪血数块，连猪血服，轻者一次，重者二次可愈。（广州中医学院进修部冯一鹏献方。南海县民间献方亦有收载）

3. 胃腸炎 火炭母（又名老虎尿）5块，与生米捣碎冲开水服，服药前先服阴阳水（即用盐1两炒熟，放水煮沸，冲冷水小茶杯），后服药。（惠东县吉隆黄埠卫生站郑智辉献方）

4. 夏季热 火炭母1两，猪血1两，用清水2碗，煎至0.5碗服。此为3~6岁的1次服量，连服2~3次则愈。（马海盛献方）

5. 跌打暗伤 火炭母叶1.5两，飞天藤叶1.5两，苦楝树心1两，烧酒3两，共捣碎和酒炒敷患处。（常乐陈芝旺献方）

6. 皮肤痒疹 火炭母适量，煎浓汁，日洗3次。（广州何开纪献方）

文献考证

1. 清代何克謙撰《生草药性各要》载火炭母曰：味酸性寒。炒蜜食能止痛，敷疮跌打，贴烂脚，拔毒干水收口。

2. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载火炭母曰：用叶，去皮肤风热，流注，骨节肿痛疼痛。

3. 现代胡佩撰《山草药指南》载火炭母曰：凡患瘰癧，煎水熏洗或捣叶敷之。不论赤痢或白痢，取叶和海金沙捣汁，加砂糖，冲沸水服必愈。取叶捣敷毒疮，能拔毒干水收口。凡皮肤风热流注，骨折肿痛，用叶煎水洗。如烂脚用叶贴。小儿身热微搐，取叶煎水服，或熏洗。

木 槵 子

Sapindus mukorossi Gaertn.

别名：无患子，洗手果

科属形态 本品系无患子科无患子属中的一种乔木，高达10~15米，枝圆柱状，幼时被小柔毛，后变秃净，有小皮孔。叶连柄长25~45厘米，有小叶5~8对，总轴被小柔毛或近秃净；小叶互生或对生，纸质，卵状披针形至长椭圆状披针形，多少不等，长7~15厘米或过之，宽2~5厘米，先端短尖或渐尖，基部斜楔尖，秃净，主脉细，两面均凸起，侧脉明显；小叶柄短，长不过5毫米。夏季侧生或顶生圆锥花序，多分枝，长15~30厘米，总轴和分枝均被小茸毛；花芽球形，小，径不过2毫米；花被白色，通常两性；萼片5枚，卵形，外面近秃净或被微柔毛，边缘具小睫毛；花瓣5枚，披针形，边缘具小睫毛，瓣柄内侧有被长柔毛的鳞片2；花盘端正，秃净；雄蕊8枚，突出，花丝下部被长柔毛；子房三角状卵形，秃净，花柱短。花后结核果，肉质，基部常有发育的分果片2个，球形，有棱，径约2厘米，未熟时淡绿色而有光泽，老熟时黄色或橙黄色；种子球形，黑色，质坚而硬。

生长环境 生于村边、园边、坡地、山边、路旁粘质土壤及较为肥沃的土中，半阴生。

产地分布 我国及朝鲜、印度均有分布。我国长江以南至两广、台湾均有栽培，少见。

药用部分与气味性能 果实、根。嗅无，味甚苦，性凉。能清解伏热郁热，疗喉肿闭。

临床应用

1. 白喉

(1) 木槵子33.3%，蜜糖66.7%，将木槵子横切3/4，以不分高成两截为度，用竹蒸笼盛之，离水三蒸三晒，每次蒸3小时，晒2天，晒至身干为度，将木槵放置盅内入蜜糖煎6小时，取出过滤备用。内服每日5次，每次5毫升；亦可用竹杆棉球蘸蜜糖擦喉，每小时1次，每日约5次。如作预防，每天可涂1次。经台山中医师试用观察，疗效尚好。本方并治一切喉科，亦收良效。（台山中医师研究所献方）

(2) 用川连5钱，牛黄1分，木槵根1只，儿茶3分，人中白2分，山豆根5钱，青黛3分，朱砂5厘，硼砂1分，共研末，用纸卷成筒，入药吹进喉内。（台山中医师研究所献方）

(3) 用干木槵树皮浸酒，病情严重的成年病者可口服药酒几次；又可用二便皮煎水含口，小孩适用。口腔炎亦有效。（龙川县防疫站献方）

2. 双单蛾喉

(1) 保正散：木槵子2钱，人中白1钱，木槵子5分，川贝3分，血竭3分，川连1钱，白芷3分，朱砂2分，雄黄1.5钱，黄柏3分，蒲黄3分，青黛5分，黄芩3分，连翘1钱，乌梅3个，灵仙1.5钱，硼砂2钱，皂角3分，麝香1分，牛黄1分，梅片3分，共研细末，吹入喉内。（中山县石岐市陈幼泉献方）

(2) 木槵子根2只，炒山甲2片，熟地1条，箭猪毛1钱，地蜂10只，共炒黄为极细末，分3次以竹筒吹入喉内，有膜即出，无膜出粘涎而愈。（合浦区李耀昌献方）

(3) 木槵子3钱，鼠尾草3钱，煎服。（新兴河口乡塘埔村温文汉献方）

(4) 木槵子1只，地蜂子7只，用瓦片乘载，置于火上煨存性研末，加入梅片少许吹喉。（台山中医

研究所,湛江市温文高献方)

(5) 木槿子 2 钱, 元明粉 1.5 钱, 梅片 6 分, 研极细末吹喉。严重者可加麝香 1 分。(花县麦锡全, 英德徐洗、吴开明、谢星南, 宝安县曾伟等献方)

(6) 木槿子和生盐煨为细末吹喉。如痰涎壅塞加牛黄、麝香。(封川附城卫生院梁标献方)

(7) 木槿子根 3 两, 捣烂或切片, 煎水含漱。(广州中医学院进修部张圣生、卓权献方)

(按: 以上诸方, 对一切喉科炎症疼痛等症, 均可采用。)

3. 感冒高热

(1) 木槿子根 3 钱, 蛇泡筋 2 钱, 榕树须 2 钱, 五指连 2 钱, 柳兜头 5 钱, 白筋头 2 钱, 海金沙 2 钱, 鬼灯籠 3 钱, 茅根 2 钱, 大炭经 3 钱, 清水 3 碗, 煎至 1 碗服。(石岐市罗小泉献方)

(2) 木槿根 4 钱, 鸭脚木 3 钱, 金线草 2 钱, 五指连 6 钱, 鬼灯籠 3 钱, 海金沙 2 钱, 山梗根 4 钱, 蛇泡筋 3 钱, 青藤 4 钱, 白花云头青 3 钱, 清水 4 碗, 煎至 1 碗服。(中山县石岐市罗少泉献方)

(3) 木槿根、榕树须、淡竹叶、尖横、鸭脚皮、董根、白芍、鬼箭羽、神横、苦瓜干、苏叶、芒果核各适量煎服。(中山县苏普英献方)

(4) 色感 木槿根 2 两, 龙眼根 1.5 两, 生竹节 10 个, 清水煎服。(中山县石岐市陈群照献方)

4. 百日咳

(1) 木槿树秧 7 株, 赤小豆 1 两, 红枣 5 枚去核, 净水 5 碗, 煎取 1.5 碗, 分 3 次服, 早午晚各服 1 次。(解放中路黎沛望献方)

(2) 木槿苗 2 钱(6岁用量), 煎水分服。(中山县石岐市梁伟卿献方)

5. 哮喘 木槿子煨灰, 开水冲服, 小儿每次 6 分, 成人每次 2 钱, 每日 1 次, 连服数天。(三水苞藤英献方)

6. 白浊、白带 木槿子根 4 两, 晒干煮鸡食。(郁南卫生院黄云卿献方)

7. 毒蛇咬伤

(1) 木槿子根 1 两, 黄牛木根 1 两, 六月雪根 5 钱, 山芝麻 5 钱, 生薏菜头 4 两, 煎服。此方治过基线蛇咬伤。(清远小塘乡卫生院温锡光献方)

(2) 木槿根 4 钱, 川白芷 4 钱, 蛇退步 4 钱, 川黄连 4 钱, 浙贝母 4 钱, 金香檀 4 钱, 粉甘草 4 钱, 雄黄精 4 钱, 六耳苓 4 钱, 吴茱萸 4 钱, 威灵仙 4 钱, 田基黄 4 钱, 清水 4 碗, 好酒 2 碗, 同煎服。若服后呕者可取三叠树根 1 两同煎服, 即不再呕。(番禺曾圣基献方)

8. 厚皮癣 木槿子酌量, 用好酒煎沸, 趁热擦洗患处, 数次即愈。(湛江市罗式周献方)

9. 痔疮 木槿根 3 钱, 荆芥 3 钱, 土茯苓 3 钱, 银花 3 钱, 槐花 3 钱, 鸡冠花 2 钱, 皂角 2 钱, 青蒿叶少许, 煎煎熏洗。洗后在痔疮收缩时有血流出, 可用鸡蛋壳 2~3 只, 大梅片 1 钱, 共研末, 以狗胆汁调搽则愈。(新会宗达卿献方)

10. 小儿腹中气胀 用木槿子仁 3~4 枚, 煨熟食之, 令放出矢气即消。(广州小梅卫生所王威献方)

11. 小儿疳积 用木槿子仁 6~7 枚(煨熟)和苏鼠一只煨灰, 共研为散, 分 3~4 次煮猪肝食。(广州金花街卫生所何仲和献方)

12. 小儿疳积上眼 用木槿仁(煨熟)研末, 煮猪肝食, 每服食 1~2 钱, 连服数天, 可口无副作用。(广州金花街卫生所何仲和献方)

除四害

灭钉螺 四川医学院寄生虫学教研组在进行灭螺药物筛选试验过程中, 发现木槿子有相当好灭螺效力。其最低有效浓度为 1/20000 (22.5~27°C), 在 1/1000~1/10000 各浓度溶液中, 浸泡 90 小时, 钉螺死亡率皆在 90% 左右。在 1/100 和 1/500 浓度时, 浸泡 48 小时后, 死亡率在 98% 以上。5/100 浓度时浸泡 24 小时全部死亡。木槿子灭螺效力受温度的影响极大, 温度愈高, 效力愈好。泥土潮湿度亦影响灭螺效果, 以潮湿与最潮湿者效果最好。制备木槿子液, 以 60°C 热水浸泡 48 小时的灭螺效果最好。用热水煮 0.5 小时、1 小时或 2 小时, 或用冷水浸泡 8~48 小时, 灭螺效力都较差。现场应用最低有效是

为每平方公尺用木槿子 20 克(24~26°C)。在夏季試驗中,用量 20 克/平方公尺,一天后釘螺死亡率仅及 29.5%,四天后则达 88.1%;用 40 克/平方公尺,一天后亦仅 48.4%;用 60 克/平方公尺及 80 克/平方公尺者,一天后釘螺死亡率即达 80% 左右。秋季效果极低。翻草后施药较未翻草者灭螺效果好。(1957 年血吸虫病研究資料汇编)

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求真》載木槿子曰:煨食杀腹内虫;浸酒(先煨过)止血止痛;熬膏拔毒生肌,祛风消肿,去酒风。洗皮肤疥癬疮。壳以盐煨治喉症。又曰:苦平,治喉痹开痰,主飞尸;其壳磨垢去面肝;核中仁烧之,辟邪邪;煨食辟恶气,去口臭。

2. 清代何克諫撰《生草药性备要》載木槿子曰:皮洗癰疽疥癩;子存性止血,煨食治小兒虫积,法臍;熬膏药祛风消肿拔毒。

3. 现代肖步丹撰《岭南采药录》載无患子(木槿子)曰:味微苦,性平,有小毒。去面肝,治喉痹,洗头祛风;其核中白仁,煨之食辟恶去口臭,治小兒五疳及鹅喉;将其子煨存性,止血,其子有杀虫去臍之功,用之以熬膏药,祛风消肿,拔毒生肌。又撞红胚,取其毒捣烂,冲酒饮之,神效。凡妄行吐血,用无患子根煎瘦猪肉汤,饮十余次即愈。

4. 现代胡眞撰《山草药指南》載无患子曰:味微苦性平,有小毒。凡妄行吐血,以病猪煎猪肉汤饮,速饮十余次即愈。取子煨存性,止血杀虫。其核中白仁,煨食辟口臭,治小兒五疳。取其毒捣烂,冲酒服,治撞红症神效。

5. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》載无患子曰:治牛喉风症;猪喉风症。

半边莲

Lobelia chinensis Lour.

别名：急解索、細米草、順風旋、单片茅

科属形态 本品系山梗菜科半边莲属中的一种匍匐状或半直立秃净草本；茎細弱，光滑无毛，于节上生根。单叶，互生，薄紙質，綫形或狭披針形，长1.2~2.5厘米，寬2.5~6毫米，先端漸尖，基部稍狭，边近全緣或有疏齿，叶具短柄或近于无柄。夏初腋生单花，淡紅色或淡紫色，萼5裂，花冠管常一边裂至基部，略弯曲，形如半边蓮花；雄蕊5枚，着生于冠管上；花药合生成管状环繞花柱，頂端有束毛；子房下位，2室，有多数胚珠。花后結蒴果，长4~6毫米，基部短尖，內藏多数种子。

生长环境 生于較湿润的土坡山麓杂草丛中，田基或淺水沟中，着根表土吸收水分和肥分，一般表土保持湿度即易生长。夏季及秋初均可采收。

产地分布 印度至我国南部和日本。我国四川、安徽、江苏、浙江、云南、湖南、湖北、江西、福建、台灣等省均有分布，本省各地均有产。

药用部分与气味性能 全株。无特异嗅气，味微甘淡，性寒。能退炎消肿，凉血解毒，利尿。

临床应用

1. 晚期血吸虫病腹水

(1) 浙江嘉兴血吸虫病防治院用半边莲1两，当归2錢，云苓4錢，丹参2錢，茯苓2錢（个别加党参3錢或草决子5錢），以上1日量，煎3次去渣，濃縮到210毫升，分3次服用，每日1剂，連續服用，疗程15~16天不等，平均33.3天。曾治60例晚期病人，腹水程度不一，大量腹水13例，中等14例，輕度33例，一般均呈营养不良、精神疲乏、消瘦、腹脹、貧血，其次为鼻衄、浮腫、气急、发冷发热等，3例合并有肺結核，7例有窦性心律不齐。本合剂消除腹水的作用，是在于利尿，但药后排尿量頗不一致，一般药后7~14天尿量增加最多，此后不太稳定，在疗效較好的病例，尿量增加頗为显著，在腹水消失或减少后，尿量亦随之减少。本組病例中63.4%可增加到普通排尿量，但腹圍未相应縮小，然而对初发之腹水及过去未曾使用导泻剂者疗效尙称滿意。60例腹水患者中縮小腹圍2厘米以上者22例，其中11例縮小有5~20厘米，反增大者5例，其他33例稳定于入院时状态（大都系輕度腹水伴肝脾肿大）。經半边莲合剂治疗后，大部分患者全身一般情况有所好轉，肝功能貧血亦有改善，对肝脾肿大和縮小則互有所見。初步認為本药对腹水有一定疗效，可改善体征及創造注射錫剂条件。（《血吸虫病研究資料汇编》）

(2) 浙江嘉兴血吸虫病防治院1957年初至1958年7月收治以半边莲合剂（处方同上）治疗为主的晚期血吸虫病患者102例的临床观察，平均有效率63.9%。根据临床經驗，半边莲合剂对腹水初发者結果比屢发者好，晚期而呈惡液質及有肝昏迷前驅状态者效果差，对消化道出血后之病人如已稳定則效果显著，腹水正进行者較难控制。应用本合剂后有36%可为錫剂創造条件。本合剂对肝功能之改善临床所見不显著，血象及赤血球一般有所增加，分別为5%及50万。（《治疗晚期血吸虫病資料汇编》）

(3) 安庆专区醫院內科治疗晚期血吸虫病呈肝硬变伴有腹水，用新鮮半边莲連根带叶淨洗烘干，

貯存备用，煎服時加水煮沸2小時，過濾後制成10~15%煎劑，酌加糖漿調味，成人每日劑量為原藥8~42克，分4次口服。治療病例40人（其中有8例系用大戟丸等中藥治療失敗或雖有療效但未能顯著好轉者在內），患者男38人，女4人，年齡11~66歲，多系農民，而有少數漁民、學生或小商販，肝脾腫大1~12年，腹水已16日至2年余，經檢查均有大量或中等量腹水，肝功能試驗顯著障礙，營養不良（紅血球64~378萬，血色素20~70%），其中有30例糞便或直腸組織中有活的血吸蟲卵，其餘作直腸鏡檢查發現鈣化蟲卵，或其病理改變，故診斷比較明確。住院13~107日用半邊蓮治療11~75日，平均38.4日。結果：獲得好轉率總的約占80%以上，40患者中至少有8例恢復體力，已經參加勞動，食量普遍增加。排尿量增加者92.5%，腹水消失者77.5%，腹圍縮小者90%，肝脾縮小者40%，門靜脈循環改善者68.2%，紅血球色素增加者70%，肝功能好轉64.9%。合理營養至為重要，忌鹽、少鹽和高蛋白飲食能幫助半邊蓮治療腹水提高療效。40例患者腸內或糞內發現活的血吸蟲卵，治療後有16個左右呈陰性。這成績主要仍歸功於藥劑，至半邊蓮能否滅蟲似屬可疑，尚待今後進一步觀察。半邊蓮無毒性平，長期應用亦無副作用，我們曾在每日6克的有效的基礎上，逐步提高6倍到每日36克，連用一月左右，不但沒有中毒，而療程似因劑量加大有所縮短，證明該藥并無劇毒性質。（江西中醫藥）

2. 肝腹水（肝腫大，肝脾腫大，門靜脈高壓腹水）半邊蓮1~2兩，煎水服，每天1次，連服8次，服後小便量增加，並有些頭暈腹痛，但停服後消失。（和平青洲衛生院賴杰獻方）

3. 單腹蠱脹

（1）半邊蓮4錢，枳實3錢，陳皮3錢，北黃4錢，當歸3錢，蒼朮3錢，川芎2錢，川朴3錢，炙草1錢，煎服。服後服歸脾湯3劑。（翁沅縣劉瑞璠獻方）

（2）半邊蓮、金錢草各3錢，大黃4錢，枳實6錢，水煎，連服5天，每天1劑；以後加重半邊蓮、金錢草二味，將原方去大黃，加神曲、麦芽、砂仁，連服10天；最後將此方做成小丸，每天服8錢，連服半個月。在治療中少食鹽。（翁沅縣劉瑞璠獻方）

4. 痢疾

（1）半邊蓮1兩，鳳尾草1兩，馬齒莧4兩，矮羅傘1兩，絲茅根2兩，地榆子1兩，檳榔8只，山梔子1兩，蘇木1兩（孕婦忌用），蜂蜜1兩另沖（每次2錢），大黃6錢（初起時用，過3日即除此味，但肚痛者過3日亦可用），水煎分多次頻服。此方治療一服至愈者多人。（湛江張學士獻方）

（2）生半邊蓮2兩，水煎和黃糖服。（五華張萬育，化縣張高士獻方）

5. 盲腸炎 半邊蓮8兩，加雙料酒適量，搗爛水煎，一日3次分服，渣再和入米酒少許外敷患處。（林瑞華獻方）

6. 久熱不退 半邊蓮晒干1錢，煎服。曾治一病例，發熱4個月不退，甚至發狂不寐百治無效，以上方連服2次痊癒。（廣東中醫1968年9期）

7. 吐瀉 半邊蓮1兩，洗淨搗爛，和開水榨汁，分2~3次服，神效。（中順縣衛協會吳通軍獻方）

8. 扁桃腺炎 半邊蓮適量，搗爛和酒燉，半食半搽之。（中順縣衛協會譚三獻方）

9. 鰍口瘡 半邊蓮與大碗頭草，取汁塗擦或內服，良效。（《廣東中醫》1968年第9號）

10. 腎炎水腫

（1）安徽醫學院副院長湯盡舟患腎炎水腫，同時發現肝硬化和胆囊結石，戒鹽和注射高滲葡萄糖液，水腫減退困難，改用腎氣丸，二天無變化，轉用半邊蓮15%煎劑，每次30毫升，每日4次。藥味甚淡易服。服藥後第一天小便量即增加500毫升，連服一個月，每日小便量常在1000毫升以上，水腫完全消退，腹圍恢復正常，食欲增加。小便蛋白質和紅血球消失。停藥後6個月一切正常無變化。（《健康報》1966年9月28日《半邊蓮治愈腹水的亲身体驗》）

（2）辽宁台安縣人民醫院用半邊蓮單味治療急性慢性腎炎，收到顯著療效。用法是每日用半邊蓮50克，分3次煎，混合一起，分次服用（上述量是8歲小孩用的），曾治愈2例。1例初服半邊蓮時，患兒感到頭昏、身上發熱，不久即消失，服藥2天后水腫迅速消退，尿量稍有增加之勢，連服3天后，患兒水腫完全消退，其他之自覺症已完全消失，食欲增加，即能戶外活動，從症狀外觀觀察，該患者已告痊癒。共計

服用半边莲约300克之多。另1例以单味半边莲治疗，结果只经过2次投药，亦同样的收到预期效果，后来水肿全部消退。使用半边莲治疗肾炎水肿效果良好，是可以肯定的，我们采用单味不混用他药，方法简便易行。服用本品治疗可不用绝对安静卧床，在水肿消退时，其他症状也随之消退，但在消退后仍需继续服用几剂，方能达到根治。（《辽宁医学杂志》1959年1月）

11. 小儿惊风 半边莲1两，伏龙肝2钱，煎服，不满周岁者，半边莲只用5~6钱。福建省中医学术研究会编印的《中医秘方》第3集根据莆田吴玉香、吴玉萍同志贡献治惊风的秘方。（《广东中医》1958年第9号）

12. 风热风痛 半边莲4两煎水冲黄酒，连服5~6次可愈。（新丰县吴上胎献方）

13. 牙龈炎 此方即同以下(21)湿疹第一方。曾治6人患右边白齿痛，牙龈肿不能食，不得眠，用药棉蘸半边莲液患处约敷十分钟，另换药一次，约半小时痛减，如是者数次痊愈。又其他同病例者均愈。（《江西中医》1955年2月号）

14. 急性中耳炎 用半边莲捣烂绞汁和酒少许滴耳。（张泽民献方）

15. 各种毒蛇蜈蚣咬伤

(1) 蜈蚣咬伤 青木香5钱，雄黄精5钱，八角5钱，制半夏5钱，制川芎5钱，吴茱萸5钱，五灵脂5钱，香白芷5钱，川黄连5钱，批把叶5钱，另加半边莲、蛇总管、秋苦瓜、蛇退步，以上四味均用干药，每味各5钱，如鲜者每味1.5两，共研细末，用消毒玻璃瓶收贮，密封备用。凡遇毒蛇咬伤，将此药散0.8~1.0钱用酒吞服；另将此药8分用酒调搽伤口四围，不要涂盖伤口，以便毒水易于流出，洗至黄水净尽乃愈。又如蜈蚣咬伤，无论其毒与否即将此药散1钱用酒煎煮，澄清后将药渣敷伤口，酒内服，涂药时不能密盖伤口，以待流出血水即愈。服此药后或自觉身心发热，待1~2小时后，其热自退。（周景孟遗方，石碁固新桥营一连四排周达需献方）

(2) 治毒蛇咬伤 半边莲、七枝莲、对面针、老鸦胆各适量，共捣烂敷患处。（湛江市何秀深献方）

(3) 半边莲5公斤，捣烂，用净水煎1小时，榨去渣取汁，隔水浓缩至1000毫升，待冷加适量防腐剂即成。曾治一妇人，晚间收衣服时竟有物刺肘部，初不感紧要，至深夜肿痛甚剧，翌日求治，除外搽此药日数次外，并内服两次（60毫升），2日后痊愈。又治1龙姓农民，因捕捉偏头风（毒蛇名）食指被咬，全手肿痛甚剧，除外搽此药外，并予内服，每日3次，共计100毫升，经数日即告痊愈。（《江西中医》1955年2月号）

(4) 半边莲浸酒搽之。（和平青州刘展文献方）

(5) 半边莲、乌柏树心，捣烂取汁冲酒服，又以一部分药渣外敷伤口。（合浦莫璋献方）

(6) 半边莲5钱，鸡冠花蕊1两，用米酒适量捣烂过滤，将药汁内服，药渣外敷伤口，次日肿痛止，能食能眠，共服药2帖，二三天后痊愈。此是符家秘方，效果良好。（海南文昌潭牛乡潭牛堆14号符致佳献方）

(7) 半边莲晒干1两，刁竹2钱，北细辛2钱，白芷2钱，共研末和米酒敷服，服时留下一些用作外搽患处（伤口不可搽）。（汕头专区丰顺县郑相伯、赵式训献方）

16. 跌打

(1) 半边莲、猫支箭根、拐子藤（即防己）各1两浸酒，内服或外搽伤口。（丰顺县良卫协会献方）

(2) 大半边莲、小半边莲、独脚乌柏、香附、桑木二皮、小槐伞、血葵、白尾木、黑尾草、水猫、白纸扇、旧石灰、砂草头、半骨梭、苧麻蕊、路边菊、韭菜头、人字草、蛇排根、倒扣草、五月艾、软葵、黑骨草、大茶药根各等分，共研末，若重伤即用灯草先敷伤口（要用灯草尾），然后将以上药敷上。忌食。此方兼治刀伤出血。（黄楚南献方）

(3) 散骨用半边莲、还魂草、鸡不食、田基黄、生虾公、生鸡、红花、刘水莲各适量，捣烂外敷。（中山陈鹤之献方）

(4) 损伤用半边莲浸液（与各种毒蛇蜈蚣咬伤栏第三方半边莲浸液同）外搽伤口，经数日可消肿散瘀。

17. 乳瘻

(1) 半边蓮 2 兩，露水葛 2 兩，木芋頭 1 兩，透骨消 1 兩，蓖麻子 5 錢，土黃連 5 錢，重將加田七末 5 分，共研細末，用蜜糖敷患處，每天更換 2 次。乳瘻潰者勿用。(三水林品之獻方)

(2) 半边蓮 5 錢，生南星 5 錢，生半夏 5 錢，蘇子 5 錢，生草烏 5 錢，木賊子 5 錢，以上各藥共為細末，和米酒敷患處即愈。(云浮縣羅桂亮獻方)

18. 无名腫毒

(1) 半边蓮葉搗爛加酒敷患處。(佛山穩山蔡白育獻方)

(2) 半边蓮 3 兩，生薑 1 兩，共搗爛敷患處。此方最治疔瘡。(廣州中醫學院進修部黃露青獻方)

19. 小兒生頭蛇 半边蓮搗爛加酒敷患處，止痛消腫。(佛山穩山袁鑑獻方)

20. 蛇頭指 半边蓮加糖少許，搗爛敷患處，每天更換 2~3 次，至癒為止。

21. 濕疹(包括香港腳)

(1) 半边蓮 5 公斤，搗爛用淨水煎 1 小時，濾去渣取汁，隔水濃縮至 1000 毫升，待冷加適量防腐藥即成。以棉花蘸藥液敷治香港腳。皮膚濕疹用作外搽。

(2) 半边蓮、蛇息管、蛇退步、秋苦瓜各等分，共研細末，用茶油或白醋調搽患處。此方最治爛頭胎毒。(廣州中醫學院進修部劉景良獻方)

22. 凍中寒凍瘡發痒或流水迂延難愈 鮮半边蓮搗爛取汁塗之，次日即見大效，連用幾天就可痊癒。(《廣東中醫》1955 年 9 號)

除四害

1. 殺子丫

(1) 用全株半边蓮切碎浸水，此浸液倒入污水溝，有殺子丫之效。(《浙江殺虫植物圖說》)

(2) 將半边蓮切碎，撒在草生子丫的水中，可殺子丫。(《中國土農藥志》云南資料)

2. 殺蠅蛆

(1) 用全株半边蓮切碎浸水，此浸液倒到糞坑中，有殺蠅蛆之效。(《浙江殺虫植物圖說》)

(2) 將全株半边蓮切碎，倒在廁所內，可以殺蛆。(《中國土農藥志》云南資料)

文獻考證

1. 明代李時珍撰《本草綱目》載半边蓮曰：辛平無毒。主治蛇鼠傷，搗汁飲，以滓圖塗之；又治瘰癧氣喘，及瘧疾寒熱，同雄黃各 2 錢，搗泥，碗內煑之，待色青，以飯丸梧子大，每服 9 丸，空心鹽湯下。

2. 清代趙寶谷撰《本草求原》載半边蓮曰：甘平淡。消腫散毒，治惡瘡，蛇傷，諸云：“驗得半边蓮，不怕共蛇眠”。白花者良。

3. 清代何克謙撰《盤車藥性考要》載半边蓮曰：味甜性平。治蛇咬傷，瘰癧消腫毒。類似丁葵草，半边蓮紫紅花。

4. 現代肖步丹撰《時南采藥歌》載半边蓮曰：味甘辛，性平。治蛇傷，敷惡瘡火瘡，消腫散毒。一說治瘰癧氣喘，及瘧疾寒熱。

5. 現代胡眞撰《山草藥指南》載半边蓮曰：搗敷治魚口便毒。味甘辛，性平。治毒蛇咬傷，搗爛敷患處。

6. 現代徐國鈞、趙守訓撰《生藥學》載半边蓮曰：本品含類似生物碱的黃色結晶體，名半边蓮素，含量約 0.18%，應用色層分離，可將半边蓮素分為四種色帶，可知係由數種物質所組成。效用為利尿，半边蓮素即為利尿成分。曾應用於血吸蟲病患者，有利尿消水的功效。煎劑口服或做成注射劑。近據報導，應用本品煎劑或浸膏，治療已到肝硬變階段，肝代謝機能不全，有腹水并消腫、貧血等病狀的血吸蟲病患者。又據藥理試驗謂本品浸劑行靜脈注射有降低血壓的作用。

7. 中國藥學會中藥研究委員會編《中藥鑑定參考資料》載半边蓮曰：由於利尿作用顯著而持久，且性平無毒，因此療效良好，現在正推广应用。

8. 現代鍾士心等編著《上海的寄生植物》載半边蓮曰：全草可治蛇咬傷，瘰癧，消腫毒。

白花丹

Plumbago zeylanica Linn.

别名：假茉莉，山波荖

科属形态 本品系萝藦科萝藦属中的一种攀缘亚灌木状草本。高达2~3米，分枝较多，除萼有腺体外，全部无毛，茎圆柱形周围有纵棱，茎心为白色疏松髓质。单叶，纸质，互生，矩圆状卵形至卵形，长4~10厘米，先端短尖或渐尖，基部渐狭而成一短柄；叶柄基部扩大而抱茎。冬季顶生穗状花序，长5~25厘米；萼绿色，长约1厘米，被以有柄的腺体；花冠白色或白而略染蓝色，长约2厘米。花后结果。

生长环境 栽培或野生。多野生于村边园地旁较阴湿地方或有杂树道旁。

产地分布 广布热带、温带地区，为我国南部山野常见植物。本省广州郊区有产，普遍，丛生。

药用部分与气味性能 叶、根。具青草嗅，性微温。根茎味微涩、微苦；叶辣有毒。入敷烂肉，驱风散瘀，消肿毒，解蛇毒，杀蚊止痒。内服用根茎以晒干为良；外治用枝叶。

临床应用

1. 脾脏肿大

(1) 白花丹根浸酒服。重症者并取叶和糯米捣烂，制成汤丸大，煮熟，晚间睡醒服一丸。（英德洛沈宋伯林献方）

(2) 用鲜白花丹根2两，猪横脷一条，煮食数次可愈。（广州市郊番禺高涌严结球献方）

2. 瘧疾 白花丹叶与冷饭捣烂敷两手寸关尺处。（英德洛沈李通献方）

3. 大热症 白花丹1两，白花莲2两，白火力苗1两，白矾1分，檸檬1.5两取汁，捣烂。冲开水一次服完。（中山县石岐市張初献方）

4. 退眼膜 白花丹叶或野芹菜（自扣草）捣烂，贴于脉門起泡，其膜自散。宜用綢綫置于脉門处然后将药贴上，以免起泡太大。（新丰县潘国兴献方）

5. 肿瘤 恶疮化膜不溃，白花丹叶少许（此药极毒，能刺起泡，不可多用），捣烂敷患处，2小时后即除去。（李灼华献方）

6. 跌打撞伤未破皮肿痛 白花丹茎叶捣烂敷患处，2小时除去。（英德洛沈李通，清远罗秀英，始兴刘深顺等献方）

7. 脱骨 白花丹、上山虎、朱佑根、箭柏根、天下随、苘麻叶、青漆叶、酒药叶、藜叶，加小雄鸡1只，上药同捣烂加酒炒热敷患处，敷药的一炷香久，即将药除下。再用上药之梗煎水加酒少许，每天外擦3~4次。（黄庆邦献方）

8. 伤重失语 用醋煮白花丹根0.5~1两，冲宣便服。

除四害

灭孑孓、蝇蛆

(1) 鲜白花丹100斤（干40斤），浸水200担，以浸液加入生长孑孓污沟或有蛆粪缸中。（蕉岭文昌卫生院儒村卫生站徐汉华经验介绍）

(2) 白花丹15%，双眼龙叶50%，剑板茶35%，共为细末，每平方尺面积约使用2~3两，撒放蝇

組草生地，6~8小时杀死。(新兴集成公社红旗堂潘宋禹)

文献考证

1. 现代胡翼撰《生草药指南》载白花丹曰：味涩苦，性寒。取其根煮猪肉服，去眼膜，止迎风下泪。其叶捣敷跌打，能去瘀消肿。根和猪精肉煎汤服又可治痢。外用治毒蛇咬伤，以叶捣烂敷患处。治瘰癧以根叶煎洗，并有祛风散热毒之效。

2. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载白花丹曰：治牛腹膜炎；腹阻症；气肿症（箭牌、黑腿）；热症；痢症；再血症（红痢）。

白 花 茶

Jasminum amplexicaule Buch.-Ham.

别名：假素馨，扭肚藤，青藤仔花，左扭藤

科属形态 本品系木樨科素馨属中的一种攀援小灌木，高达2~4米，幼枝圆柱形，微有毛。单叶，纸质，对生，具短柄，卵状披针形，长3~7厘米，宽1.5~3厘米，先端钝尖或短尖，基部浑圆或浅心形，边全缘，两面被毛或有时除背脉具毛外，其余近秃净。夏末顶生及腋生稠密的聚伞花序，多少被柔毛；萼被毛，裂片8枚，线形，锐尖，长5~10毫米；花冠高脚碟状，白色，甚柔弱，微香，长约2~3厘米，裂片8枚，矩圆形，短尖，扩展；雄蕊2枚，内藏；子房上位，两室；花柄极短。果肉质，球形，直径4~10毫米。

生长环境 生于小灌木林中、山麓，常攀援灌木伸延。夏秋收采。

产地分布 印度至我国南部均有分布。本省普遍，散生或丛生，以番顺县附近各地产量较多。

药用部分与气味性能 茎叶。嗅无，味微苦，性凉。能清利湿热及消滞。

临床应用

1. 四肢麻痺肿痛(风湿热并引起) 假素馨适量，与猪蹄煎汤服。(惠州市卫协会献方)

2. 湿热腹痛

(1) 扭肚藤适量煎水服，连服1~2次。

(2) 扭肚藤5钱，阮生龙5钱，烏柏树3钱，红救主3钱，七枝莲3钱，独脚柑3钱，槐花米3钱，水煎服。(湛江市莫德才献方)

3. 流血不止，扭肚藤晒干研末密封，适量内服或外用。(湛江市黄兰英献方)

4. 牙龈炎 扭肚藤叶5钱，不七草5钱，水瓜叶5钱，白菊花5钱，捣烂取水服，药渣加三黄散敷患处。(湛江市莫德才献方)

[附注] 牙龈炎是牙龈附近淋巴管炎，很快令牙关不能开合。

5. 乳癌 扭肚藤1两，赶狗草2钱，水煎服，连服1~2次可痊愈。(湛江市余昭荣献方)

6. 鼠疫 白花茶叶、老鼠柏，二味共煎酒内服，其渣外敷。(英德县献方)

文献考据

现代胡佩衡《山草药指南》载扭肚藤曰：凡患湿热腹痛，大便久利，腹痛若扭，煎服一二次即愈。

白 鶴 藤

Argyria acuta Lour.

别名：白青药根，白鹿藿

科属形态 本品系旋花科白鹤藤属中的一种缠绕藤本。单叶，纸质，互生，卵形至椭圆形，长5~11厘米，宽3~9厘米，先端短尖或钝，基部浑圆或有时微心形，边全缘，叶面近秃净，叶背密被银色紧贴的柔毛。秋季开花，通常为多花的聚伞花序或近头状花序，有长8.5~7厘米、密被银色柔毛的花序柄；苞片大；萼片5枚，复瓦状排列，不脱落，短圆状卵形或卵形，外面的长9~10毫米，内面的较小，花时薄，结果时厚，里面常淡红色，外面密被银色柔毛；花冠白色，长2~2.8厘米，外被银色细毛，裂片短圆形，长1.5厘米；雄蕊5枚；内藏；花药短圆形，非旋扭状；子房上位，4室，有胚珠4颗；花柱线形。花后结果，果近球形，直径约8厘米，黑红色，为卵形、凹陷的宿萼所包围。

生长环境 多生于丘陵地带灌木丛中或杂草丛中及平原篱界中。或河基旁边小灌木丛中。

产地分布 我国南部至越南，本省南海附近各处有产。

药用部分与气味性能 茎叶。嗅无，味微酸微苦，性凉。能化腐生肌，消单腹膜。

临床应用

1. 量腹 取白鹤藤茎叶1~2两，和米与黄糖捣烂煮成粥食，或制成饼食，亦可取效。（民间单方）

2. 疮毒，烂脚 用白鹤藤、蒲公英、银花藤煎水洗之，有消炎化腐去毒之效。（广州调镜山献方）

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求真》载白鹤藤曰：即白青药根。温甘平。宣筋壮骨。叶敷烂脚，化腐生肌；根浸酒用。

2. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载白鹤藤曰：可治量腹。

3. 现代胡翼撰《山草药指南》载白鹤藤曰：凡患量腹，取茎叶和米与黄糖捣烂，煮成粥食或煎饼食，甚效。或和苍朮煎水熏洗亦可。

白 背 叶

Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.

别名：白朴树，白泡树，白面筋，白膜树，白帽顶，白鹤树

科属形态 本品系大戟科野桐属中的一种灌木，高1.5~3米，树皮灰黑色，有纤维颇长，嫩枝有不正形棱形，灰白色，密生黄色鳞毛；髓心大而充实，白色。单叶，纸质，互生，卵圆形，长8.5~17厘米，宽6~16厘米，前端急尖，尖尾长1~2厘米，边缘浅波状几至全缘，基部平截至耳廓形或心脏形，叶面深绿色，主脉上有黄色鳞毛，叶背白色，密生倒伏绵毛及星状毛；叶柄长3~14厘米，与叶背同色，柄基微膨大；托叶2片，很小，早脱。夏秋顶生圆锥花序（雄）或穗状花序（雌），单性花，雌雄异株，很少同株，花小，无花瓣。花后结蒴果，表面密被羽毛状软刺，状如小棉球，灰白色，直径8毫米；果连成一串而下垂，开裂后为8个2裂的果片；种子黑色圆形，径3毫米，种脐白色。

生长环境 生于荒地，灌木丛中，林边，村边较为肥沃土，半阴生。

产地分布 安徽、四川、浙江、福建、广东、广西等地均产，本省普遍，散生。

药用部分与气味性能 根。嗅无，味微涩、微苦，性平。能收涩固脱。

临床应用

1. 脾脏肿大 根2两，猪胰1条，水煎服，每天服一次，6天可愈。（广州中医学院弼光群献方）
 2. 淋浊（1）白膜树根4钱，七指横根1两，煎水服。（龙川县平德卫生院郑云溪献方）
（2）白膜根5钱，茯苓4钱，茯苓3钱，煎水空腹服。（叶至坤献方）
 3. 脱肛及便后下血 用白鹤树根适量，煮猪大肠头食之，连服数次即愈。（英德献方）
 4. 子宫下垂 用白面筋根12两，米醋2斤，煎至0.5斤，夜间置于露天打露一宵，翌晨一次顿服，连服3剂便可治愈，并由治疗日开始卧床休息一星期。愈后煮黄头龟连食数天。此方服后腹部有微痛，此由于子宫收缩所致。（海南岛海口市陈月江献方）
 5. 妇人白带 白帽顶5钱，海狗肾3钱，鸡冠花3钱，煎水冲酒服。（民间献方）
 6. 产后风、血晕（1）白帽顶为主，加适量艾叶，酒煎服。（平远县张远梅献方）
（2）白膜叶4两研末，和鸡蛋2只，黄酒适量煮服。（和平县黄世南，五华县华城黄双献方）
 7. 新生儿鹅口疮（1）白鹤叶适量煮水，用消毒棉卷蘸水细心拭抹患处，随抹随清。一日8次，连抹2天。（广州小梅卫生所王威献方）
（2）白膜叶、枫子叶各适量捣烂，加茶油煎过，候凉取油汁涂小儿口内白烂，身热自退痊愈。（翁元唐定锦献方）
 8. 双单蛾喉 白朴根鲜根浸透去渣取汁液内服。（台山文村陈国荣献方）
 9. 中耳炎流脓 白膜树根研末，酒适量浸出液滴耳内，并外搽。（紫金中医药研究会）
 10. 产后风 白帽顶，艾叶适量，酒煎服。（平远县张远梅献方）
 11. 外伤出血、溃疡 白泡树叶晒干碾成棉线样收存，出血时取适量贴于外加绷带扎紧固定，立即止血，并且容易收口生肌。（河元船塘公社欧国献，平远县张远梅，海南新安塘公社符大宽等献方）
 12. 跌打 白帽顶根、三桠苦根，酒浸内服外搽。（新丰县罗高鉴，龙川县麻防始叶天士献方）
- 文献考证** 欽县《平吉本草》载白泡木曰：能治小兒白泡症及瘡毒，煎水洗用。

布 狗 尾

Uraria crinita Desv. var. *macrostachya* Wall.

别名：长穗狸尾草，长穗猪尾射，兔狗尾

科属形态 本品系蝶形花科瓦尾草属中的一种直立亚灌木，分枝少，茎被短毛，高达60厘米。叶互生奇数羽状复叶，薄革质，长28~80厘米，小叶对生，近无柄，3~5枚，有时7枚，矩圆形，卵状披针形或椭圆形，长10~15厘米，宽5~7厘米，先端略短尖，或钝至深圆，基部圆形至心脏形，边全缘，叶面无毛，叶背被柔毛；小托叶针刺状，长6~7毫米。夏秋季顶生总状花序，近无柄，有极稠密的花，初时甚短，成长时长30厘米以上，直径2.5~3厘米，下部的苞片卵形至披针形，宿存，具睫毛，上部披针形，亦具睫毛，突出于花之上而成一顶生的丛束，当花开放时即脱落，每苞片有花两朵，花柄长约4毫米，花后增长，先端弯曲；萼管极短，长约1毫米，裂齿5枚，上面2枚裂齿短，下面3枚通常延长，刚毛状；花冠蝶形，紫色，旗瓣阔，翼瓣与龙骨粘合；雄蕊2束，其最上一枚分离；子房上位，无柄，有胚珠数颗；花柱线形。花后结荚果，荚果由2~4个，卵形。种子1~2颗，椭圆形，黑褐色，有光泽。

本种与生草药性所载的狐狸尾 *U. lagopodioides* (L.) Don. 很相似，其不同之处，本种的小叶在茎下部常为3枚，在上部的为5~7枚，矩圆形，卵状披针形或为椭圆形，长10~15厘米，宽5~7厘米，而狐狸尾的小叶常为3枚或单叶，圆形或卵圆形，长2.5~5厘米，宽1.3~3厘米。又本种的叶较大而易粘着衣服，狐狸尾的叶较小，不易粘着衣服；本种荚果内卷，而狐尾则平展。

本种另有小叶的一种，疗效大致相同。

生长环境 生于干旱的荒地、山坡或小丘陵灌木林边，或杂草丛中。

产地分布 本省以(番)禺东古山、禺北太平场附近及高要等县为多产。

药用部分与气味性能 全株。味淡，性凉。能解热，杀虫。

临床应用

1. 血絲虫病 布狗尾2两(全株用)，水煎冲酒少许一次服，连服10余天奏效。曾治疗5例10~20年的患者，连服此方20剂，均获显著效果。(汕头专区海丰县汕尾医院庄耀华献方)

2. 疟疾 布狗尾2~3两，煎水和白糖少许冲服，日服1次，连服数天则愈。孕妇禁用。

(附注) 小儿疳积用狐狸尾根2~3钱，煎水服，连服1~2星期即愈。(英德县献方)

布渣叶

Microcos paniculata Linn.

别名：破布叶，囊衣叶

科属形态 本品系鼠李科解宝叶属中的一种灌木或乔木。单叶，互生，纸质，卵形或卵状矩圆形，长10~15厘米，宽4~8厘米，先端渐尖，基部浑圆，边缘具小锯齿，3脉，秃净或于主脉上被星状柔毛；托叶线状披针形，长为叶柄的一半。夏季顶生或上部腋生圆锥花序，被星状毛；花两性，2~3朵簇生于苞片内；萼片5枚，矩圆形，长约5毫米，被星状毛；花瓣5枚，黄色，矩圆形，长约为萼的1/3~1/2，基部内面有一腺体；雄蕊多数，生于一短的花托上；花药2室，纵裂；子房上位，通常8室，每室有胚珠4~6颗；花柱锥尖。花后结核果，近倒卵形，直径约7毫米，秃净，全缘，核有毛，8室。

生长环境 生于山野旷地灌木丛中或杂草丛中。夏秋割取枝叶。

产地分布 印度、印度尼西亚，至我国南部。本省以南海、番禺、增城、清远等县为多产。

药用部分与气味性能。叶。嗅无，味微酸涩，性平。能消滞清热，除黄疸，解蛊毒。

临床应用

1. 黄疸 破布叶2两，猪血4两，煎水服，一日一次，连服6日可愈。（本所许云庵献方）
2. 热滞腹痛 布渣叶、鸭脚木皮、黄牛木叶、路兜筋根、岗梅根，各药等量，每服可用4~8两，水煎作茶饮。此方民间常用清热除湿代凉茶饮，易服而无副作用，对一般因湿热盛而至身体不舒服者均适宜服用。（本所冯毓山献方）
3. 瓜藤疮 瓜布木叶、鸭脚木叶、茅瓜药、半牛蒡、食盐，各味酌量，捣烂和牛尿炒热，乘稍凉敷患处，后用高粱粟硬煮鳊鱼食之。（朱镇流献方）

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求原》载布渣叶曰：味甘平。解一切蛊腹药毒，清热消积食，黄疸，作茶饮佳。
2. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载破布叶曰：性平无毒。解一切蛊毒，消黄气，清热毒。作茶饮，去食积，一脱醒迷解梦。
3. 现代胡翼汉《山草药指南》载破布叶曰：性平。作茶饮，去食积，消黄气，解一切蛊毒。能治醒迷解梦，煎服，解渴解毒。

瓜子菜

Portulaca oleracea Linn.

别名：馬齒莧，蠅肉菜，酸味菜，老鼠耳

科属形态 本品系馬齒莧科馬齒莧属中的一种充淨、一年生匍匐或披散、肉质分枝草本。长10~50厘米；茎常为紅紫色。单叶，肉质，互生，有时在上部的近輪生，矩圓状倒卵形，长1~2.5厘米，頂端圓或平截或稍凹下，基部楔尖，边全緣，有膜质托叶状的附屬物，叶柄极短。夏季腋生和頂生少花的头状花序，单生或为聚繖状排列；萼片2枚，綠色，复瓦状排列，基部合生，分离部脫落；花瓣5枚，黃色，复瓦状排列，基部合生，早落；雄蕊8~12枚；子房半下位，1室，有胚珠多顆。花后結蒴果，橄欖形，質脆，长6毫米，直径4毫米，蓋裂。种子多数而小，圓腎形，紅褐色，密具網点。

生长环境 田边，菜園路旁，瓦砾地，荒地上，于黑沙質腐殖土壤及較湿润地势极易生长。夏季采收全草。

产地分布 广布温带和热带地区。我国南北各省均有产，本省普遍，丛生或散生。

药用部分与气味性能 莖叶。嗅无，味酸，性凉。能消癰，化腐，杀菌，治病。

临床应用

1. 痢疾

(1) 中国人民解放军某医院1956年7~10月試用馬齒莧粉剂治疗菌痢1例，效果良好。配製和应用方法：采取野生馬齒莧洗净晒干研末，加乳糖一倍，每次3克，每日3次，連服7天为一疗程。效果：体温下降一般为1~3天，平均1.5天；腹痛消失最久为4天，最短为24小时，平均2.7天；大便次数及膿血消失为2~3天，平均3天。用药后，第3天大便培养全部阴性，全部病例用药一疗程，症状均消失，大便連續培养均阴性。

(2) 南京市卫生防疫站赵助舉、吳晉維、姜坤范用馬齒莧、黄连素、S. G. 治疗痢疾带菌者实验病例176人，經采便培养阳性，确系痢疾带菌者，分中药组与西药组对照治疗。中药组分別采用馬齒莧及黄连素进行观察，西药组用S. G. 片。馬齒莧水泛丸，黄连素丸。馬齒莧成人每次服3克，日2次，連服5~8日；黄连素0.1克，日2次，連服5日。用以上两中药无不良反应。总计用馬齒莧治痢疾带菌者84例，黄连素治11例，S. G. 治81例，每人在服药完毕后1周進行采便培养检查，并在3个月内进行第2次及第3次采便培养复驗，最后复查結果說明馬齒莧或黄连素均超过S. G.。其結果如下表所示：

治疗痢疾带菌者三次采便培养复查情况

服藥名称	人数	第一次		絕對疗效率	第二次		絕對疗效率	第三次		絕對疗效率
		阳性	阴性		阳性	阴性		阳性	阴性	
馬齒莧	84	28	61	72.50	4	79	95.12	1	78	98.64
黄连素	11	0	11	100	0	11	100	0	11	100
S. G.	81	8	73	90.12	8	73	96.00	8	52	94.86

(《江苏中医》1959年第1号)

2. 杆菌痢疾及急性肠炎

(1) 用马齿苋 240 克制成 100 毫升的煎液。剂量：1 岁以下每次 14~20 毫升，每天 4 次。1~3 岁每次 25 毫升，每天 4 次。3~6 岁每次 30 毫升，每天 4 次。6 岁以上每次 40 毫升，每天 4 次。1958 年中国人民解放军某医院小儿科共用马齿苋煎液治疗杆菌痢疾 13 例，其中大便培养阳性 11 例，阴性 2 例，有急性肠炎 1 例。治疗结果，1 例急性肠炎痊愈，13 例杆菌痢疾中 10 例痊愈，3 例中 1 例大便培养为奈瑟氏痢疾杆菌，2 例大便培养阴性。服用马齿苋 4~8 天后，大便次数减少，大便性质好转，但未根本治愈，后改用呋喃西林片治疗。以上所治病例效果比去年更为显著，因使用煎液后收到结果。（《中医研究工作资料汇编》）

(2) 上海纺织工业局第二医院许昌路门诊部朱鳳麟、胡瑞嵩、徐烈等用马齿苋治杆菌痢 70 例观察，以 50% 马齿苋糖浆治疗体温降至正常日数，快者在服药次日即退热，最迟者第 8 日才降至正常。大便次数恢复正常日数，最快者服药后第 2 天，最迟者第 7 天，大多数在 3~5 天恢复正常，占 78%，平均 4.5 天。大便性状改变日期，肉眼观察多数病人服药后 2~4 日内，红白粘液消失，3~5 天渐趋正常，最快 1 天，最迟 9 天，镜检脓球粘液消失最快 2 天，最迟 6 天。粪便培养痢疾杆菌转为阴性天数，多数病例于服药后第 4 天培养转为阴性，最快第 3 日阴性，最迟 8 日，平均为 5.8 天。内有 2 例次日未见好转，改用他药治疗，其余均愈，治愈率为 98.7%。副作用，1 例有恶心，但不久即消失。（《中级医刊》1959 年 6 期）

(3) 马齿苋、防风各 4 两，小罗伞、地菰子、鳳尾草各 2 两，紅薤白菜头 7 只，横切 2 只，大莱 5 钱，提子 1 两，苏木 3 两，銅錢 1 百（以熟銅串一把代之亦可），蜜糖 2 两，用水 12 碗，煎好冲蜜糖当茶饮，小儿酌减。如四天后则去大黄，孕妇忌用。（宫桥張高士献方）注意：銅錢要洗净然后和药同煎。

(4) 马齿苋煮熟，紅痢和以蜜糖，白痢和以沙糖，紅白痢以蜜糖、沙糖各半和匀，連湯服之，2 次即愈。（中山县石岐市梁少珊献方）

(5) 马齿苋 2 两，黃連 1.5 钱，木香 1 钱，苦参子 30 粒，大黄 2 两，淨水 2 碗，將黃連木香馬齒苋煎至 1 碗，去渣加糖。另將苦参子去壳搗烂以時粉煮糊为丸，与上药同时一次服。服。（黃洪儒、洪宜逸、黃令德献方）

(6) 马齿苋 2 两，白矾少许，紅痢加蜜糖，白痢加沙糖，适量，紅白痢加蜜糖、沙糖各半煎服。（澄海陈荣波献方）

(7) 马齿苋 8 两，陈皮 0.5 个，牛肚 4 两，煎熟，只服湯和馬齒苋。（新興叶佩麟献方）

(8) 马齿苋 4 两，木棉花 2 两，水煎服。約 3 次痊愈。（饒平陈浩臣献方）

(9) 马齿苋 4 两，煎水加蜜糖冲服。（番禺罗仁星、詹沅胡应时献方）

3. 痢后痢疾 馬齒苋 1 两，淨水 2 碗，煎成 0.5 碗，分 3 次服。（台山中医研究所献方）

4. 闌尾炎 以大黄牡丹皮湯加鮮馬齒苋 2 斤，榨汁半碗，神效。若初起時闌尾炎只用馬齒苋汁可以治愈。（台山中医院，英德县卫协会献方）

5. 肝硬化

(1) 馬齒苋 8 两，水 4 碗煎至 2 碗，分次內服。（台山中医院献方）

(2) 广东省人民医院中医科主任卢宗强，吸取群众經驗，用瓜子菜治肝硬化（血枯癆）疗效最佳。并可与其他中药组成复方使用。（詳見《广东中医》1957 年 1 期）

6. 妇人血虛 馬齒苋 2 两，蜆肉 2 两，煎服。又法用馬齒苋 8 两，牛肚 4 两，陈皮 8 钱，煎服。（黃洪明献方）

7. 肺結核病 南翔第三联合診所用馬齒苋治疗肺結核，有相当疗效。病例：南翔乡星火社 10 队李錦章，患空洞型肺結核病，咳嗽痰中見紅，午后潮热，肌肉消瘦，試服馬齒苋干者 1.5 两（詳者加倍）煎服，服至 1 个月，咳嗽減輕，下午潮热消除，痰中血絲消失。服至 2 月后精神好轉。目前已服 4 个月余，体重增加，逐漸恢复正當。（《中医研究工作资料汇编》2 輯）

8. 肺癆

(1) 馬齒苋 3 两，蜜糖 1 两，搗烂加开水榨出汁和蜜糖服，每天 1 次，連服 15 天后，可隔天服一次。

直至全愈为止。曾有两例治愈。(丰顺县卫协会叶道千献方)

(2) 保定北街保健站振祥堂用馬齿莧汁1斤，蜂蜜2两，微火煎成膏状，每服2钱，日服3次；飯前白开水冲服。服药一周内可能发现紅色皮疹，一二日即消失，亦常有咳嗽增剧情况，但至第二周，逐渐輕快。孕妇忌服。忌食韭菜、落花生、羊肉。此方治愈病人300例，仅举一例：許金山，男42岁，住保定市达五道街6号。咳嗽吐膿样臭痰数年，經服本方3剂而愈。(《河北省中医藥集錦》)

9. 尿血

(1) 馬齿莧3~4两，狗干菜3~4两，淨水1~2斤，煎2小时，加食盐适量服之。曾治愈20多人。(东莞鍾張明献方)

(2) 馬齿莧3斤，黄酒2.5斤，將馬齿莧搗烂，浸酒三日夜，用白布滤出即成，每日飯前飲酒3钱。曾治愈1例尿血5年余，服此酒10日血止而愈。(河北威县王春堂献方)

10. 半身不遂初起 馬齿莧3两，斑魚1条(約5~6两)，淨水5碗，煎取1碗，每日1次，連服2~3日。(江門郭建謀献方)

11. 小兒脫肛 用瓜子菜(馬齿莧)3两，京柿1个，水3碗，煎至0.5碗服。(中山县石岐市梁偉卿献方)

12. 喉炎 馬齿莧搗烂，加酒取汁，含漱。

13. 风疹块 馬齿莧、紅背菜各8两生用，煎水冲洗全身。(龙川县車田楊榮文献方)

14. 馬齿莧

(1) 馬齿莧、黄砂鍋肉各适量，搗烂敷患处。(新兴苏阿權献方)

(2) 馬齿莧1束，蜘蛛1只，搗烂敷患处。(云浮县曾亮瑞献方)

(3) 馬齿莧、旧烂毡帽各1钱，片糖3钱，搗烂敷患处。另用白菊花4两煎水服。(新兴东风人民公社罗恒麻献方)

(4) 馬齿莧1两，南蛇菊2钱，田螺肉5钱，菊花叶1两，搗烂敷患处，三服即愈。(合浦李国智献方)

15. 疔疮肿毒 馬齿莧1把，石灰5分，共搗烂和雞蛋清敷患处。(饒平县詹綠例献方)

16. 乳腺炎充血紅肿疼痛 馬齿莧4两，蜜糖或黃糖1两，搗烂敷患处，日換药2次，2~3日可愈。(和平县黃日新，广州中医学院进修部黃華青、覃俊献方)

17. 蛇咬 馬齿莧、漆树子、黃麻子、扫把子各适量，搗烂敷患处，伤口要空出。

18. 鼠咬伤周身寒冷作痛 馬齿莧4两，黃糖1两，共搗烂敷患处。(惠阳县仲文献方)

19. 痈疮、馬齿莧、烏蛇草、水泉草、黃糖各适量，搗烂敷患处。(平远县熱拓卫生院李伯庆献方)

20. 嬰兒紅臀(尿布潮溼未能及时更換引起) 馬齿莧3钱，青黛粉3钱，凡茶末3钱，川黃柏2钱，五倍子1.5钱，以上各味共研极細末，再加入冰片3分，用凡士林4两調勻为油膏，外敷患处。倘为大小便潮溼須即更換。上海市第二妇嬰保健院一个多月共治疗40例，完全治愈，达到治愈效率100%。对先兆紅臀的治疗1~2天就全愈的共37例。第一度紅臀的有2例3天治愈；有1例已潰烂，腹股沟两侧有水肿，口腔发现起白点，舌下牙龈等，治疗7天而治愈(同时服西牛黃5分)。(《中医研究工作資料汇编》)

21. 拔枪彈 馬齿莧、蓖麻仁、鳳凰板、澤兰、四方青草、田蓋黃草，共搗烂敷患处。(山东診所周香海献方)

22. 痔瘡 馬齿莧、紅莖莧菜头各8两，煎水熏洗。此方將药量減半，可作內服治疗。(封开县陈鏡周，湛江市伍錦源献方)

23. 头瘡 馬齿莧搗烂外敷患处。

24. 白秃瘡 馬齿莧自然汁，調入陈石灰涂患处。石灰須炒至黃色，退火气后方可用。

除四害

灭蝇 据科学院昆虫所試驗，对家蝇用毒餌杀虫率为5%；对于20倍水浸液杀虫率为38.8%，100倍酒精浸液杀虫率为81.1%。(《中国土农药志》)

文献考证

1. 唐代苏恭撰《新修本草》载马齿苋曰：饮汁治反胃，金疮流血，破血癖、疰瘕，小儿尤良。用汁治紧唇、面疱，解马汗、射工毒，涂之瘥。

2. 宋代苏颂撰《嘉祐图经本草》载马齿苋曰：能肥肠，令人不思食，治女人赤白带下；又曰多年恶疮，百方不愈，或疮痛不已者，并捣烂马齿苋敷之，不过三两遍。此方出于唐武相国元衡，武在西川，自苦胫疮，疮肿不可当，百药无效，及到京有厅吏献此方，用之便瘥，李林甫记其事于兵部手集。

3. 宋代马志撰《开宝本草》载马齿苋曰：服之长年不白发，治痈疮杀诸虫。生捣汁服当利下恶物，去白虫；和梳垢敷疗瘡；又烧灰同陈醋渣先灸后封之即拔出。

4. 明代李时珍撰《本草纲目》载马齿苋曰：散血消肿，利肠滑胎，解毒通淋，治产后虚汗。

5. 清代赵寅谷撰《本草求真》载马齿苋曰：专入血脏，散血消肿，利二肠，解毒，治破伤风属半表半里者，杀虫，治血瘤，诸淋疳，赤白痢，赤白带下，血癖，小儿丹毒，滑产，治足趾甲疽肿烂，解马汗、射工毒。不可与蟹同食，食成紫腹。

6. 清代何克諫撰《生草药性备要》载马齿苋曰：味甜性凉。治红痢症，消热毒，洗痔疮疔。

7. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载马齿苋曰：味酸性寒无毒，一説味甘，性平。清热解毒，散血消肿，治红痢，洗痔疮，消水肿，疔疔食之，可解去白虫。捣汁服，下诸恶物。小儿丹毒捣汁饮之，并以渣敷之。

8. 现代胡眞撰《山草药指南》载马齿苋曰：味甘性寒。凡妇人患膈下腹上，下连二阴，遍生湿疮，状如马瓜疮，痒而痛，大小便涩，出黄汁，用瓜子菜4两，捣烂，入青黛1两，研匀涂之。清热散毒，捣汁服治疔。取茎叶捣汁服，治小便热淋涩痛。

地胆头

Elephantopus scaber L.

别名：地胆草，苦地胆，天芥菜，土公英，草鞋根

科属形态 本品系菊科苦地胆属中的一种略粗壮、直立、多年生草本，高80~60厘米，多少粗糙，有时全体被白色粗毛，毛紧贴；主根粗壮，圆锥形，须根颇多；茎二歧分枝，枝少而硬。单叶，互生，有根生叶和茎生叶两种：根生叶匙形或矩圆状披针形，长5~10厘米，或更长，先端钝或短尖，基部渐狭，边缘稍具钝锯齿；茎生叶少而细。夏秋之间顶生头状花序，约有小花4朵，通常为三枚卵形至矩圆状卵形，长1~1.5厘米的叶状苞片所包围；头状花序在每一花束内多个，紧挤；总苞片长8~10毫米，全为管状花，两性，相似，花托秃净；萼管与子房合生；花冠淡紫色或白色，长8~9毫米；雄蕊4~5枚，子房下位，一室，有胚珠一颗。花后结有棱的瘦果，顶端冠以4~6枚长而硬的刺毛。

生长环境 生于旷野、村边、路旁、丘陵坡地的沙质土壤或粘质土壤的低草丛中，地势干燥或稍潮湿均可生长。夏秋收采。

产地分布 广布热带温带各地，印度尼西亚、印度及我国云南、贵州、浙江、福建、湖南、广西、台湾等省均有分布，本省各地均产，普遍丛生。

药用部分与气味性能 叶、根、全株。嗅无，味苦，性微寒。能凉血解热，消肿拔毒。

临床应用

1. 红白痢 鳳尾草30斤，益母草20斤，地胆头20斤，大艾叶15斤，四味均生用，共捣汁去渣，煎煮成膏（名益元膏），再于太阳下晒干备用，每次用膏1钱，和老细茶泡水服。如白痢加益底灶心土1钱同服。（丰顺县卫协金兆芹献方）

2. 初起吐泻

（1）地胆头、布惊叶、枫树叶，共研为末，每次服3钱，以阴阳水送下（冷开水与热沸水各半相和，便成为阴阳水）；取上药生用捣烂以沸水冲服亦可。服下约0.5小时左右则止。（连南潘记明献方）

（2）单用地胆头洗净，嚼烂咽汁，也有效。

3. 阳黄疽 地胆头连根叶洗净，鲜者4~6两，煮猪肉食，连服四五天则愈。

4. 肾脏炎 白花地胆头、黑豆，二味酌量，煎水服，连服数天即愈。（英德浚洗卫生院卢坚渠献方）

5. 感冒高热 地胆头1两，山油麻根1两，锦地锦1两，生石膏5钱研末，水煎服，儿童酌减，连服2剂即愈。（丰顺县胡秋波献方）

6. 脚气、身脚浮肿 黑豆1两，腹皮3钱，小茴3钱，生苡仁5钱，莱菔子5钱，当归1两，姜皮5钱，台乌5钱，苦地胆5钱，尖板3钱，沙姜3钱，陈皮2钱，川椒目3钱，隔皮5钱酒洗，川枳实2钱，水煎服，连服二三剂见效，在服药前后三天均宜戒米，可食白薯薯或心菜为宜。（中山石岐市周頌霖献方）

7. 单腹腹膜 苦地胆2两，煎水分早晚二次服，或和赤猪肉炖服。（《福建中医秘方》2集）

8. 水煎

（1）苦地胆草头2两，墨鱼一条，炖水服，即通大便。（《福建中医秘方》2集）

（2）地胆头晒干为末，每用5钱，连服3~5天。此方对脚气病尤宜。（普宁大坪卫生院余达明献方）

9. 糖尿病 地胆头10株（连根、叶），生姜5钱，水煎作茶饮。（五华陈福三献方）

10. 中風 地胆頭、童子鞋(草葯),共搗汁和童便灌下則愈。(鄒進球獻方)

11. 鼻出血

(1) 地胆頭、豬肝各酌量同煎服,連服3~4次則愈。(湛江市溫文高獻方)

(2) 地胆頭、茅根、綠竹青(竹外皮),各酌量,水煎,加入食鹽少許或黃糖調服。(中順張文石獻方)

(3) 地胆頭4兩,豬鼻孔1兩,煎服,連服2次則愈。(英德浚洗衛生院盧堅堤獻方)

12. 胃痛(胃部作痛)

(1) 白花地胆頭1~2兩,煎服即愈。(潘國新獻方)

(2) 地胆頭、土靈仙,焙干研末,每次2錢,加酒適量,敷1小時服。如身熱加山梔子1錢,寒加細辛1錢。(龍川縣張遠仁獻方)

13. 脫肛 地胆頭2兩去葉,田螺4兩,水煎服。(揭陽鍾廷廷獻方)

14. 乳腺炎

(1) 地胆頭取根搗爛沖酒敷患處。又可煎水沖酒服。曾用此方治愈8人。(河元劉建方獻方)

(2) 地胆頭、三月泡、烏柏樹葉,搗爛蒸熱貼患處。(歐志雄獻方)

15. 乳痛 黃花地胆頭連葉4兩,米酒適量,搗爛和酒煎沸熱服,其渣敷患處。(丰順楊愛恩,河元李換庭獻方)

16. 雙單蛾喉 地胆頭去葉搗爛浸酒含,含至熱時將痰涎一并吐出,連含幾次則愈。小兒可用此藥搗爛外敷。(英德石美衛生院何炳林獻方)

17. 瘰癧 地胆頭、桑葉1兩,煮豬肚食。(劉仿彭獻方)

18. 唇疔 地胆頭、烏豆、灶前龜子各7個,白菊花葉、蜜銀花、白菊花、紫花地丁各5錢,銀杏仁10粒,知母、桔梗、甘草各3錢,共搗爛貼之。疔瘡破後外貼,并以此藥煎水內服。(海丰县彭希澄獻方)

19. 蛇頭指(瘰癧) 地胆頭葉、白花蜜菜各1兩,熱酒4錢,或指甲花搗爛貼患處。(彭茂青獻方)

20. 小兒頭部濕疹 地胆頭2兩,豬肉5錢,煎水半面盆洗患處。(廣州中醫學院進修部卓叔獻方)

21. 虎咬傷 地胆草3斤,松毛3兩,落地楊枝1斤,將藥搗爛塞入傷口,待藥自然退出便愈(如醫牛傷者)。熱天加黃糖,冬天加豬油,煎爛敷患處(忌食雞肉)。(封開梁澤民獻方)

22. 毒蛇咬傷 吳萸1錢,苦地胆2錢,芫花3錢,銀花2錢,老木耳2錢,黃連3錢,丁香3錢,防己3錢,丹皮1錢,加白酒1~2兩煎服,其藥渣外敷傷口周圍。(番禺原永基獻方)

23. 獾狗咬傷

(1) 生地3錢,桃仁3錢,當歸4錢,北杏4錢,川金2錢,枳實2錢,大黃2錢,朴硝2錢,乳香2錢,沒藥2錢,甘草1錢,清水煎服,每隔1日服1次,連服三四次。再用北杏、片糖研末敷傷口;又用苦地胆研碎沖酒服,其渣搗敷傷口。(中山石岐胡大炳獻方)

(2) 地胆頭、桑葉各等分,水煎沖酒服。(電白山寧聯合診所周普海獻方)

24. 毛虫刺傷 地胆頭葉搗敷患處即愈。(岳塘衛生院徐鎮邦獻方)

25. 蜈蚣咬傷 生地胆6只,搗爛敷患處即愈。(何其夫獻方)

26. 石炭傷足底 地胆頭、生鹽,二味酌量,搗爛敷患處即愈。(英德大灣衛生院李揚生獻方)

27. 皮膚瘙癢 地胆頭煎水外洗,數次則愈。(蕉嶺南嶺衛生院陳君祥獻方)

文獻考證

1. 清代趙賓谷撰《本草求原》載苦地胆曰:苦辛平。涼血,消毒,散瘡,理蛇鼠傷,去痰。根解暑熱,同扁豆、片糖煎,治牙痛煎含。

2. 清代何克謙撰《生葯性要》載苦地胆曰:味辛,性平。散瘡涼血,消毒去痰,理鼠咬蛇傷,亦能止血;其根同白豆、片糖煎水飲,治中暑熱盛;牙痛煎酒含。

3. 現代陳立卿撰《廣西中醫葯用植物》載地胆頭曰:治牛膝腫症;百頁胃(重瓣胃)病;腹阻症;大便秘結;小便秘症;縮陽症;瀉血症;(紅痢);牛瘟症(爛腸瘟);氣腫症;(箭脚、黑腿);誤食草烏中毒;頭風症;多吃污水中毒。可治豬丹毒。

夹竹桃

Nerium indicum Mill.

别名：柳叶桃

科属形态 本品系夹竹桃科夹竹桃属中的一种直立灌木。高1.5~8米。单叶，革质，3~4枚轮生，线状披针形，长11~15厘米，宽2~2.5厘米，先端渐尖，边缘背卷；侧脉多数而密，直，与中脉成45°角伸出。冬春季顶生分枝聚伞花序；萼紫色，5裂，外面密被柔毛，内面基部有线状腺体；花冠分离，花瓣上部扩大，有红、白、黄三种颜色，常为重瓣，相互掩盖；雄蕊5枚，花丝短，有白色长毛，药隔延伸成一长约1厘米的丝状附属物，上面密被白长毛，螺旋状扭转而伸出，花药有钩状的附属体；子房上位，有胚珠多数。花后结蒴果，长柱形，长约17厘米。

生长环境 全系栽培，多见于公园及庭院，为观赏植物。各种土壤均适合生长。夏秋采叶。

产地分布 广植于热带及温带地区。

药用部分与气味性能 叶。嗅无，味极苦，性寒有大毒。能毒杀四害。

除四害

1. 灭蝇 将叶切碎，拌在粥中，蝇食之48小时100%死亡。（《中国土农药志》北京市防疫站资料）

2. 灭蛆

(1) 定海县防疫站用1%浓度浸出液，6天内杀灭蝇蛆效率达66%。（《浙江杀虫植物图说》）

(2) 将叶切碎，加6倍水，煮20分钟，取药液撒于粪面，72小时灭蛆效力达64%。（《中国土农药志》北京市防疫站资料）

3. 杀孑孓 将叶切碎，加水6倍，煮20分钟，撒于孑孓水面，72小时杀孑孓效率达83%。（《中国土农药志》）

〔附注〕 本省各地多有栽培，可适当采用为消灭四害之用，但毒性剧烈，口服极少量也会引起中毒，因此只适用于粪便灭蛆之用。

文献考证

现代胡真撰《山草药指南》载夹竹桃曰：味苦，性大寒。为治哮喘圣药，取黄花的叶3片，粘米1小杯，同捣烂，加片糖煮粥服极效（孕妇忌食）。又曰：取叶3~4片煎服，通经，不宜多服。

〔附注〕 本植物毒性很大，内服必需在有使用经验的医师指导下方可使用。又本植物以开黄花的为适合治病之用。

羊角扭

Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook.-Arn.

科属形态 本品系夹竹桃科羊角扭属中的一种直立或藤状秃净灌木。有时高达2米，茎通常黑褐色，有白色的皮孔。单叶，革质，对生，椭圆形或矩圆形，长5~10厘米，宽8~4厘米，先端渐尖，基部阔楔尖，边全缘；叶柄长4~8厘米。春夏间顶生1朵或数朵合成一个8歧状无柄的聚伞花序；萼5裂，里面有腺体，裂片披针形或线形，长约10毫米。花冠淡黄色，漏斗状，管长约1.2厘米，裂片基部披针形，先端线形，长约5厘米；雄蕊通常5枚着生于冠管内，内藏；花药围绕柱头，先端丝状；子房上位，为2个分离的心皮组成。花后结蓇葖果，羊角状，木质，极坚硬，长10~15厘米；种子狭，长达2.5厘米，先端细长如尾，基部密生絨毛。

本药另一种名細种羊角扭 *Toxocapu wightianus* Hook. et Arn. 系蘿藦科弓果藤属藤本植物，叶较羊角扭小一倍，蓇葖果亦小一倍以上。效用相近，与本品同等入药。

生长环境 生于山野灌木林中山坡上，或湿润地方。秋冬间采收果实。

产地分布 广西、福建、广东山野均有分布，普遍，丛生或散生。

药用部分与气味性能 叶、种子。嗅腥，味苦，性寒有毒。能杀虫，拔肿毒，通痹，续骨。俱作外用，忌内服。种子含 Strophanthin，可为心脏血管病治疗剂；但不可随便轻用。

临床应用

1. 毛虫茧 (多生于手足掌趾间红肿痒痛) 細种羊角扭4两，清尿8两，将药煎成和入清尿浸患处。(广州中医学院进修部张高士献方)

2. 瓜疮 羊角扭根、粉身铜、酒饭团根皮、吊吊蛇根皮，食盐少许，同捣烂敷患处。(和平叶仙献方)

3. 慢性风湿性关节炎 羊角扭2两，毛藤叶8钱，披针茄8两，黑鸡蛋4两，鱼肝叶8两，红紫苏5钱，尖尾风1斤，走马风1斤，五指风1斤，桂木皮4两，大蒜头2两，将以上药加酒糟捣烂，取蓖麻叶包裹煨热，去叶热敷患处有效。(湛江市谭兰英献方)

4. 跌打骨折 羊角扭根、辣椒树根、楊柳树皮各等分，共为末，韭菜头捣烂煎酒拌匀，温敷折骨处。在敷药前要将折骨复位，以夹板固定。另用月桂花阴干为末4分，透骨消晒干为末1分，土狗3只，土鳖5只，自然铜2钱，将二虫捣烂和其他三味以热酒冲服。

除四害

1. 灭蚊蝇 羊角扭8份，苦楝藤(大茶药)3份，辣藤3份，烟骨1份。将上药切碎加水3份，煮煎2小时，去渣后加适量肥皂(100斤水剂加四两)，拌匀后即可使用。(《广东中医》1959年第1号)

2. 灭蝇蛆 100%羊角扭煮出液，能在3时30分钟内将蝇蛆全部杀死。

3. 灭鼠雀 枝叶果温水或煎水后，与花生拌浸，可杀地下害虫、老鼠、麻雀。(《中国土农药志》)

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求原》载羊角扭曰：苦寒有毒，能杀人，不可入口。止痒痒，治疥癩热毒。其子似羊角，角内有花，能止刀伤血。

2. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载羊角扭曰：其子似羊角，不入服剂，能杀人。洗疥癩。其花治刀伤极效，为末敷之，不半日即合口。

旱 蓮 草

Eclipta alba (L.) Hassk.

别名：白花蟛蜞菜，白花蟛蜞菜，鳢肠，墨汁旱莲，黑墨草

科属形态 本品系菊科鳢肠属中的一种一年生、匍匐状或有时近直立、被粗毛的草本；茎柔弱，绿色，有时变紫色，折断茎叶流出的汁，经空气氧化后，即变黑如鳢肠色，匍匐地面的茎于节上常生不定根。单叶，纸质，近对生，线状矩圆形至披针形，长1~5厘米，宽约2厘米，先端短尖或钝，基部楔尖至稍钝，边缘绿或略具锯齿。夏秋之间腋生或顶生头状花序，卵形，长5~6毫米，宽约5毫米，结果时更宽，异形，具舌状花和盘状花；总苞绿色，苞片少数，2列，外列的阔，花托扁平，有线状的鳞片；舌状花雌性，约2列，发育或不发育，白色，舌小，全缘或2齿裂；盘状花多数，两性，管状，全发育，4~5裂；雄蕊4~5枚，着生于冠管上，花药合生；子房下位，1室，有胚珠1颗。花后结瘦果，黑色，长约8毫米，顶端秃净。

生长环境 生于坡地、耕地、旱田，近水边、路边、半阴潮湿地中草丛中生长，对酸性土或石灰岩附近的微酸性土均能生长。夏秋采收。

产地分布 遍布温带地区。我国广东、广西均有分布，普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 全草。嗅无，味微酸微甘微苦，性凉。能凉血固阴，涩精涩血，乌须发，清阴热。

临床应用

1. 瘧疾

(1) 旱莲草1钱，紫苏叶1钱，共研末，以纱布包裹如花生仁大，塞鼻中，经治百余例，都获显著效果，治愈率达90%。（《福建中医药》1959年3月）

(2) 旱莲草叶为末布裹，男左女右，塞入鼻腔，发作为前2小时开始施行。（新丰县许阳春献方）

2. 白喉 白花蟛蜞菜2~3两，捣烂，加盐少许，冲开水去渣服，服后吐出涎沫则愈。此方曾治愈4例。（鹤山县卫生科）

3. 痢疾 白花蟛蜞菜（旱莲草）、凤尾草、尖舌草，三味煎水冲蜜糖服。（广州中医学院曾子豪献方）

4. 吐血

(1) 旱莲草1两，生石膏2两，生藕节1两，莲叶1两，黑栀子5钱，生甘草4钱，水煎服。如血色鲜红者加百草霜4.5钱冲服，止后用六味地黄汤早晚各服1次。（丰顺县陈子芳献方）

(2) 旱莲草新鲜4两，捣烂冲重便服，或加生柏叶共同用尤效。（云浮县曾仲炼献方）

(3) 咳血 旱莲草3钱，田七1.5钱，冬瓜仁6钱，红絳珠3钱，北杏3钱，茜根3钱，牛蒡子3钱，鲜竹茹4钱，青天葵3钱，净水3碗，煎至1碗服。孕妇忌用。（佛山专区吴少岳献方）

(4) 衄血 旱莲草煨存性，煲墨鱼服，墨鱼不用去灰。（蔡文楷，汕头林建德献方）

(5) 溺血 旱莲草6钱，生车前草适量取汁，共煎服。（平远县刘民添献方）

5. 急性胃肠炎 生旱莲草2两，捣烂煎水冲服。（三水梁松年献方）

6. 标蛇症（广东民间俗称病名） 白花蟛蜞菜3两，红茅乌孔叶1.5两，崩大碗2两，藏琥珀叶1两，水牛大林8钱（生于水边形似芫荽），苦楝叶5钱，细叶蛇泡筋5钱，黑骨苦8钱，假多枯菜4块，辣蓼叶2块，均采生药，以嫩叶为佳，将药捣烂，用水3碗，煎至1碗，加蜜糖1两冲服。

此症初期发热头痛骨痛,或大便秘结,或水泻下痢,或有咳嗽,晚期发高热胸悶,即俗称为猪毛疔。如病者兼见坐臥不安、气促,即須鉴别其是否患蛇症,鉴别方法:用匙刮或用手指屈着向胸前左右乳房上方各刮数次,如有紅痕1条或2条浮起,即为蛇症之明証。刮之浮起的紅痕即起即落,要用食中二指屈曲捉(钳)至紅紫或紫黑色为度,即服上草药方1~2剂奏效。如紅痕上至肩鎖骨以上者症重,过24小时則难治。(中山县石岐市郑肅乙献方)

7. 夹色伤寒 白花蟛蜞菜4~8两,捣烂加酒4两取汁,加白糖5錢燉热,作一次服。(中山县石岐市罗少泉,云浮县丘万方等献方)

8. 撞紅

(1) 旱蓮草1两,血見愁1两,崗稔根2錢,山雞头1两,金不换1錢,水煎服。(云浮县赵耀棠献方)

(2) 旱蓮草2两,苏木5錢,綠壳鸭蛋1只,酒水各半煎服。(海口市联合医院王树森献方)

9. 尿道炎、膀胱炎 旱蓮草1两,煎水加白糖服。(江門朱慎修,兴宁何志超献方)

10. 小儿疳积 旱蓮草3~5錢,蒸猪肝或牛肝食。(广东民間单方)

11. 腫脹 旱蓮草3~4两,山虾2两,清水煎服。(高明何琴献方)

12. 乳瘤

(1) 新鮮旱蓮草叶1两,鮮芙蓉叶1两,黑柏叶1两,川連2两,白薯根2两,黃柏2两,牛膝2两,生馬錢2两,糯米粉2两,白糖2两,研末和勻敷患处。(江門林德新献方)

(2) 旱蓮草、秤星树叶,共捣烂和酒燉热敷患处。另用蓖麻叶、罗阿藤煎水洗患处。此方兼治痈疮。(丰順吳保生献方)

13. 蛇头指 旱蓮草、紅背草各适量,捣烂敷患处。本方治愈14病例。(龙川县張敬阳献方)

14. 接骨

(1) 旱蓮草、鷄不食、田基黃、老鴉酸、轉信草、半天娃、澤兰、鳳凰儿、公雞屎、白鴿屎、地蛙,捣烂,将折骨复位固定后把上药敷上。(合浦陈光美献方)

(2) 打伤吐血 旱蓮草2两,捣烂取自然汁和蜜便服。(丰順县陈淑义、冯子良献方)

15. 刀枪伤 烏墨菜(旱蓮草)、艾叶少许,捣烂敷之。如子弹不出,用槐枝、田螺、土狗捣烂外敷伤口,子弹自出。至外毒去清,可用炉甘石4錢,梅片4分,珍珠1分,研成药末撒布伤口,以催促肌肉生长。(和平县陈文廷献方)

16. 飞揚疮(濕疹) 旱蓮草捣烂取汁,加茶油調勻擦患处。(龙川县刁世裕献方)

17. 一般异物入肉或跌打刺伤 白花墨菜1捆,捣烂敷患处。(广州苏任之、黃兆章,連平县防疫站鄧君函献方)

18. 停止哺乳后乳房結痛 旱蓮草1两,捣烂冲酒服。(海南島李柏茂献方)

文献考証

1. 唐代李勣等撰《唐本草》載龍胆曰:甘酸平,无毒。主治血痢,(洪)血不止,(敷)之立已。汁涂鼠食,生速而繁。

2. 宋代日华子撰《諸家本草》載龍胆曰:止血,排膿,通小腸,敷一切疮。

3. 明代李时珍撰《本草綱目》載龍胆曰:烏鬚发,益腎阴。

4. 清代赵寅谷撰《本草求原》載旱蓮草曰:甘酸平,汁黑。补腎血,烏須黑发,治血痢、漏血、吐血成盆,取汁同京墨、蜜便熬膏,藕节湯下。酒頂,蛇伤跌打酒痰,杀蠱,止痒,干水,消小腸气,勞淋,傳毒止血排膿,固齿,通小腸,灸疮血出。但性凉不益脾胃,宜和姜汁蜜熬膏用。

5. 清代何克謙撰《生草药性备要》載旱蓮草曰:味甜咸,性寒。治跌打伤,理酒頂,化痰,杀蠱,止痒,干水,烏須。

6. 現代胡眞撰《山草药指南》載白花蟛蜞菊曰:取白花者捣敷跌打,能散瘀血。又曰:味甘酸,性平。煎茶治赤痢甚效。取全草煎服,能散熱,消毒,排膿,穿疮。

7. 現代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》載龍胆曰:治牛热症;炭疽病;多吃人尿中毒。馬鼻疽。

金 香 爐

Osbeckia chinensis Linn.

别名：鉄香爐，天香爐，金鐘草

科属形态 本品系野牡丹科金錦香属中的一种直立草本或灌木，高达60厘米，茎四棱形，有紧贴的粗毛。单叶，对生，有时三枚轮生，薄纸质，线状矩圆形至披针形，长2~5厘米，宽2~6毫米，先端短尖，基部钝；边全缘；有纵脉8~5条，两面均被粗毛；叶柄甚短。秋季顶生无柄的头状花序；苞片卵形，背秃净或被疏散长毛，边缘具睫毛；萼管状，长约6毫米，秃净，裂片4枚，三角状披针形，长约与萼管相等，具睫毛，片间基部之外有具睫毛的附加鳞片十数枚；花瓣4~5枚，淡紫色或白色，长约1厘米；雄蕊8枚，花药有一腺，长约药管的1/2；子房下位，4~5室，顶上有刚毛16条。花后结蒴果，4裂，果萼近顶部稍收缩，截头形。

生长环境 生于荒野小丘陵矮小杂草中。

产地分布 印度，马来亚，中国，日本，南至澳洲。本省以三水县附近各处较多。

药用部分与气味性能 全草。气微香，味淡，性平。能化湿清滞，解热镇痛。

临床应用

1. 痢疾

(1) 金香爐1两，金銀花4錢，川連5分，广木香1錢(后下)，沉香3錢，山楂3錢，尖板3錢，淨水煎服。

(2) 金香爐1两，土銀花6錢，綿茵陳6錢，加京柿2只去蒂切片，煎水服。(云浮县區陳年獻方)

2. 闌尾炎 金香爐、千斤拔、山芝麻各5錢，白立头、金不换各6錢，鉄包金4錢，雞骨香5錢，鳳凰雞5錢，水3碗煎至1碗服，3剂大驗。此方治疗急性或慢性闌尾炎405例，均有显著疗效。(中山县万顷沙人民医院楊求獻方)

3. 毒蛇咬伤 金香爐4錢，木棉根4錢，吳茱萸4錢，白芷4錢，貝母4錢，大耳苓4錢，蛇蜕4錢，黃連4錢，雄黃4錢，靈仙4錢，田基黃4錢，清水4碗，酒2碗同煎服。服后如吐，可加山稔根1两同煎服。

4. 牙脚疳(齿槽膿漏)

(1) 金香爐3錢，大黃3錢，桔梗3錢，呵子2錢，甘草节3錢，山豆根5錢，入地金牛5錢，淮牛膝2錢，北細辛2錢，山芝麻3錢，水3碗煎至1碗，適溫含漱，每口約含5分鐘，吐出再含一口，繼續含至湯尽为止。病起未久輕症，兩剂可痊愈。(江門聶松波獻方)

(2) 金香爐、下山虎(小)酌量，水酒各半煎煮沸后含漱。

文献考証

1. 現代肖步丹撰《岭南采药录》載天香爐(金香爐)曰：味微辛，性温。治痢疾神效。牙痛煎水含。遇經絡，搗汁以酒冲服。

2. 現代胡眞撰《山草药指南》載天香爐曰：蛇伤之，搗汁和酒冲服，能止痛。

3. 現代陈立卿撰《广西中藥医药用植物》載天香爐曰：可治牛痢症，及洗毒疮。

金 櫻

Rosa laevigata Michx.

别名：糖響籐，黃茶瓶，脫骨丹

科属形态 本品是蔷薇科蔷薇属中的一种攀援灌木，茎有粗壮倒刺，褐色。叶互生，羽状复叶，通常有小叶8~7枚，革质，光亮而绿色，无毛；小叶卵形，椭圆形至卵状披针形，顶端一枚，长4~7厘米，或过之，宽2.5~4厘米，侧生的较小，先端短尖，基部浑圆或阔楔尖，边缘有小而锐利的锯齿；叶柄和小叶的背面中脉上无刺或有疏刺；托叶中部以下与叶柄合生，其分离部线状披针形，篦状撕裂，脱落。花两性，春末单生于侧枝的顶，大，白色，直径5~8厘米；花柄粗壮，与萼管同被长刺；萼片大，尾状长尖，被小毛，其中有些于顶端扩大而为叶状；花瓣5枚，大型，先端浑圆，与雄蕊同着生于花盘上；雄蕊多数，分离，心皮多数，分离，藏于萼管之内，有胚珠1颗。花后结肉质的果，果近球形或倒卵形，长2~2.5厘米，宽约1.5厘米，有直刺，顶冠以长而扩展或外弯的宿萼，成熟时橙红色。

生长环境 生于荒地、溪边、山腰、山麓灌木丛中，路旁，不论沙壤或粘壤，较为肥沃的半阴地方，均易生长。

产地分布 原产我国，现美国、日本均有移植。我国盛产于东南部，湖北西部，广东、广西均有分布。本省粤北、西江各地产量甚多，普遍丛生。

药用部分与气味性能 根、叶、果。嗅无，味甘微酸，性平。根解郁痛；果固精敛喘。

临床应用

1. 胃痛

(1) 金樱子根取第二层皮4两(一次量)，煎服或捣汁用开水冲成500毫升当茶饮，用2~3次即愈。(河源南湖卫生院肖衍棠献方)

(2) 心气痛(胃痛) 金樱子根4两，白银香根4两，苦楝子根4两，共为细末，每服1钱，用开水冲服。(清远徐福田献方)

2. 瘧疾 金樱子根不拘多少，以酒水各半煎服，研末制丸亦可。(中山县石岐市徐步灵献方)

3. 胆黄症(胆管炎) 金樱用全部，每天用4~6两，煎水作茶饮即好。(河口卫生院邓耀机献方)

4. 遗精 金樱子根2两，五味子3钱，将上药煮精猪肉食之则愈。(龙川县中医进修班邓锦生献方)

5. 小兒初起疳血 金樱子根4两，木棉花树根1两，猪瘦肉2两，以水三碗煎至半碗，服之则愈。(江門王河清献方)

6. 妇人乳脉阻塞 金樱子嫩叶和红糖捣烂，贴之即通。(博罗李天增献方)

7. 慢性肾炎 金樱子根3~4两，去粗皮切碎，和猪脚煎水服之则愈。(李泽民献方)

8. 小便淋浊短涩或刺痛，久治不愈

(1) 金樱子根1两，石菖蒲2两，水煎，分2次服可愈。(伍斯沂献方)

(2) 金樱子根3钱，牛乳树根3钱，白花菜尿藤根3钱，煮猪脾食之则愈。

9. 小便閉塞

(1) 金樱子根2两，煎水一碗服，约2小时左右即通，通后再服一次，即恢复正常。(兴宁城隍庙若仙献方)

(2) 金櫻子根 4 兩，川滑石 1 兩，煎水內服即通。(云浮縣勉裕才獻方)

10. 風濕性關節炎 金櫻子根不拘多少，煮豬蹄服。(平遠人民醫院陳秀彬獻方)

11. 撞紅 青皮 1 兩，金櫻子根 1 兩，和豬骨或肉煮食即愈。(連南陳昌記獻方)

12. 脫骨

(1) 糖髒筋根、烏咀貫根、半天飛烏根，共搗爛敷患處，至自覺有响聲為度。敷藥時不可重舉，用桐子根煮豬肉食，每 10 歲用 1 寸根，余类推。(新豐回龍衛協榮正鎮獻方)

(2) 驚菜根 1 兩，金櫻子根 1 兩，羅箇竹根 1 兩，榕樹須 1 兩，田七 2 錢，馬蹄香 1 兩，轉骨王 1 兩，脫骨消 1 兩，鴨脚木皮 1 兩，火秧根 1 兩，共搗爛敷患處。

13. 跌傷、扭傷

(1) 金櫻子寄生 2 兩，油柑木寄生 2 兩，共煮雞食即愈。(廣州中醫學院進修部李干西獻方)

(2) 金櫻子根、石薑頭根、漆樹根、網馬不根、算盤子樹根、松樹節、地棉根(少許)、石斑竹根各等分，共浸酒服，即消腫止痛。(新豐縣陳老伯獻方)

(3) 脫骨丹 4 兩，橫江席 4 兩，星桐木 1 兩，酒半斤，兩面針 1.5 兩，金櫻子根 1 兩，大茶藥 3 錢，干粉 1 錢，生鷄 1 只，共搗爛敷患處。

14. 湯火傷 金櫻子根 1 斤，搗爛浸水冷敷傷處，連敷 5~6 次可愈。(封開葉德時獻方)

15. 骨哽喉

(1) 金櫻子根煎水含，慢慢咽下，其骨則落。(紫金縣陳雨和獻方)

(2) 金櫻子根去粗皮取嫩二皮 2~3 兩，水煎，加入蜜糖 1 兩，酸醋一杯，攪勻，給病者口含吞咽立下。(大跃进公社柯大志獻方)

16. 疔瘡潰爛不收口 金櫻子葉 5 錢，松子葉 5 錢，香桃葉 5 錢，无爷藤尾 5 錢，共搗爛敷患處。(廣州中醫學院進修部張高士獻方)

17. 石硬傷脚底 金櫻子根 8 錢，瘦豬肉 1 兩，以水 3 碗煎至 1 碗，加好酒少許沖服。連服二至三次可愈。(花縣午山梁慶云獻方)

18. 手脚生重皮病 金櫻子根頭、明矾，煎水洗患處則愈。(黃岡國藥業余羅梅獻方)

文獻考證

1. 明代李時珍撰《本草綱目》載金櫻子曰：東行根止滑痢，煎醋服，化骨哽。其花止冷熱痢，杀寸白虫，和鉄粉研勻，按白塗，塗之即生惡瘡，亦可染須。其叶治瘡腫，搗叶研爛，入少鹽塗之，留頭泄氣。又金瘡出血，五月五日采，同桑叶，苧叶等分，阴干研末傳之，血止口合，名軍中一揀金。

2. 清代趙廣谷撰《本草求原》載金櫻子曰：酸溫平溫。治腸滑泄痢，腎虛失精，小便不禁，血妄行，汗漏，皆溫以止脫。九月取半黃者去刺核，干研用。若待紅熟熬膏，則甘而失溫味。其根氣味亦同，治陰虛脫肛，下寸白虫同糯米煮，化骨哽醋煮服。

3. 清代何克謙《生草藥性備要》載金櫻草曰：味甜性溫。正根旺血理氣火，洗疳疔痔瘡聖藥，其子熬膏并精益腎，又能固精止咳。老年跌傷用大金櫻。(又名糖罌子，脫骨丹)

4. 現代肖步丹撰《嶺南藥錄》載金櫻根曰：味溫，性溫。旺血，理氣火，為洗疳疔痔瘡之聖藥。以之煎醋服，止滑痢，化骨哽；其花止冷熱痢，杀寸白虫，能染黑須髮；其叶治瘡腫，傳金瘡出血；其子味酸性溫平，入脾肺腎三經，治脾泄下痢；去毛刺，浸水搗汁熬膏，添精益腎，又能固精；治老人跌傷；又治牙痛，煎水含飲少許，其痛即止，不復發；治風濕跌打損傷，年少有瘡敷患處。

5. 現代胡眞撰《山藥指南》載金櫻子曰：取叶根搗汁能染黑須髮。其根煎水含飲少許止牙痛。和水酒各半煎服，治牛程瘻(即石硬)甚效。取其子 3 斤去毛刺，浸水搗汁熬膏，能添精益腎固精，治老人跌打傷，外敷內服。取根 2 兩，水 10 兩，煎服能散癰。凡患斑痧，取根 1 兩，苦地胆 1 兩，煎服奇效。取根煎水洗疳疔痔漏亦有奇效。內傷吐血，以其根和豬精肉煎湯飲，數次便愈。其寄生味甘苦，又能化痰止咳。

狗 肝 菜

Dioliptera chinensis (Vahl) Nees

别名：青蛇仔

科属形态 本品系爵床科狗肝菜属中的一种1~2年生草本。高30~80厘米，通常被微毛，直立或披散，茎有4棱，节膨大。单叶，薄纸质，对生，卵形至卵矩圆形，长2.5~7厘米，宽1~2.5厘米，前端急尖至渐尖，基部阔楔尖，边全缘，嫩叶时有睫毛状短毛，叶面深绿色，脉上有柔毛，背绿色，脉上柔毛较少，近于秃净；叶柄长1厘米，柄内面有浅槽，柄背面圆形，秃净。花两性，初冬腋生疏散的花束或具柄的聚伞花序；苞片绿色，对生，稍被毛，最下一对线形而尖，长约5毫米，其余的倒卵形或圆形，长6~10毫米，先端钝或短锐尖；小苞片狭长，长约4毫米；萼5裂，狭窄，与小苞片等长；花冠淡红色，两唇形，长1.2~1.4厘米，被柔毛；雄蕊2枚；花药2室，其中一室着生于他室之下；子房上位，2室，每室有胚珠2颗。花后结一蒴果，棒状，长约5毫米，略被柔毛，成熟时室裂，裂时从胎座基部升起将种子弹出；种子坚硬，褐色扁圆形。

生长环境 多数培植，少数野生，适宜于半阴地方，沙漠或沃土均适宜。

产地分布 印度至我国南部，安徽、广东、广西等地均有分布。本省除栽植外，三水、南海等县平原荒地均有野生。

药用部分与气味性能 茎、叶。嗅无，味微甘，性凉。能清肝热，凉血生津，除湿火骨痛，斑疹发热。

临床应用

1. 斑疹 狗肝菜2~3两，豆豉2钱，青壳鸭蛋一个（后下），水3碗煎至1碗，连蛋一次服完。（台山县中医研究所献方）

2. 感冒高热 白花蛇头菜、狗肝菜、毛甘蒲头，以上生用各等分，共半斤，石膏1两，赤糙米一握，以水煎煮至二三碗，分3次服，可加适量黄糖同服。如患者体弱，可将药渣除去后再加黑豆同煮服。

3. 潮血 狗肝菜3~4两，马齿苋3~4两，净水1~2斤，煎2小时，加食盐适量服之则愈。此方曾治愈20多人。（东莞鍾明献方）

4. 无名肿毒及痰核 狗肝菜3两，大茶药根2两，狼毒2两，锦地锦3两，吸麻膏1两，假菊苣根2两，鹅骨香5钱，丁香王1两，生油1斤4两，将上药浸4~5天，放入锅内煮至药枯，用纱布隔净渣，以药油1斤，配合黄丹8两为度，调匀即成药膏。该药膏贴之有止痛消肿毒之良效。（宝安县刘伯康献方）

5. 疯狗咬伤

（1）狗肝菜、狗芽花叶、狗咬草、酸茄药捣黄糖敷，并以适量煎水和黄糖服。戒食肉类房事。（孔英德）

（2）狗肝菜1两，杏仁3钱，黄糖1斤，红酸梅1只，捣烂敷伤口，再以煮熟鸡蛋白盖伤口上用艾绒灸数十次，内服韭菜汁1碗，隔7天后再服1碗，服至49天。（高要梁端培献方）

文献考证

1. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载狗肝菜曰：性寒凉，散热，有本地羚羊之称。凡热盛气盛，肝火重，服之甚有功效。

2. 现代胡凤撰《山草药指南》载狗肝菜曰：味甘，性寒凉，散热，有本地羚羊之称。凡热盛肝火重，用狗肝菜和猪肉煎服，甚有功效。

青 药

Piper betle Linn.

别名：药叶，药膏，薑叶，檳榔药

科属形态 本品系胡椒科胡椒属中的一种攀援状藤本。茎枝圆柱形，无毛，有明显膨大的节，节上常生不定根。单叶，革质，互生，阔卵形，长8~18厘米，宽4.5~8厘米，先端短尖，基部心脏形，稍不对称，边全缘；叶柄长约2厘米，有托叶。花单性，异株，无花被，只有盾状、圆形或倒卵形的苞片，春季开花，为腋生的穗状花序；雄花序在开花时与叶片同长，被柔毛，雄花有雄蕊2枚；花药椭圆形，花丝短；雌花序长约5厘米，直径约10毫米，被绒毛，雌花子房上位，1室，有胚珠1颗，柱头无柄，常埋藏于花轴中，并与其合生。花后结一浆果，嵌生于花轴中，顶端稍凸，有绒毛。

生长环境 常栽培于庭院墙壁处，或屋隅的隙地，缘壁攀援墙上。夏秋季采叶。

产地分布 马来亚，越南和我国南部。本省以南海、番禺附近各县较多栽培。

药用部分与气味性能 茎叶。气芳香，味辛微甘，性温。能祛风，治寒湿，理外感；外用敷疮毒，熏痔疮，理跌打，杀蚊止痒。

临床应用

1. 感冒有热或无热咳嗽 药叶2钱，白茅根4钱，木棉花4钱，北杏4钱，芒果8钱，枇杷叶5钱，大枣3枚，净水4碗煎至1碗，温服。（石岐黎肇初献方）

2. 夹色 青药3钱，捣烂冲烧酒服。药渣炒热擦胸前与背后及四肢。药后或吐或汗出，病即全愈。

3. 全身水肿 药叶大者3片，黑豆3钱，绿豆3钱，赤豆3钱，糯米4钱，粟谷米4钱，蒜头连皮1只，黑丙药（做粽子的碱）少许，煮至豆烂，加糖当饭食，二服大效。禁食盐。（潮阳吴瑞克献方）

4. 子宫痛流血不止 青药叶3片，尿缸脚白藤的茎，薄荷的茎，白线1只。制法：将新瓦盛放尿缸脚煅干为末，用青药叶3片煎水冲尿脚粉末8钱服，服至血止为度；同时将病人下臀部垫高，再用白线冲酒服，其白线肉用红骨薄荷炒熟食。（湛江市杨汉文献方）

5. 小儿露口（鹅口疮） 药叶数片煎水漱口。（封开陈秀峰献方）

6. 破伤风 生药叶1两，生桐油1只，生艾叶1两，生羊食木叶1两，生甘草2钱，苦楝根5钱，先将上药和冷饭、生桐油捣烂敷伤口，约8小时见效。亦可内服，连服5剂有效。（海南中和长塘社长塘村单晋福献方）

7. 夜盲 药叶末2钱，百草霜8分，猪肝4两，同煮熟食之，连服3次有效。（刘国香献方）

8. 汤火伤 青药叶汁、蜜糖，和匀抹患处。（新兴洞口卫生院余竹軒献方）

9. 梅毒全身起红疹，骨酸痛，头起疙瘩，鼻烂，筋挛，眼烂痛

（1）药叶3钱，银朱3钱，水银3钱，盐3钱，儿茶3钱，药粉3钱。先以水银、药叶搅匀，继下各药作成丸，每重3钱，置炭灰中使烟熏鼻，口含绿豆水，时时漱之。（恩平梁启忱，江門曹寶巨献方）

（2）梅毒入骨 药青叶2两，水仙茶5分，灯心炭2钱，朱砂5钱，白朴硝5钱，麝香3钱，三仙丹3钱，水银3钱，先将药青、水银搅匀，做成药饼晒干候用。用时置于炭火上煨烤取烟熏吸，每次用药饼1个，并先准备甘草、绿豆水含漱，以免毒气上升致牙肉浮肿。（鄞城全献方）

10. 胞衣不下 青药8片，令患者嚼烂，开水送下，经片时胞衣可下。（广州中医学院邵维源献方）

11. 鼻中瘻肉 青蒿叶和横槓搗烂敷患处。一法无横槓。(罗南县沈擇林、巫心如献方)

12. 馬咀疔及一切面疔

(1) 青蒿2錢, 石螺肉20只, 生馬鞭草2錢, 黃糖2錢, 芥菜1兩, 蠅虎4只, 鱸魚肉3錢, 共搗烂敷患处。(罗定县黃之献方)

(2) 青蒿、白虎仔、塘边青苔、葱头、黃糖各适量, 搗烂敷患处。(罗定县黃之献方)

(3) 疔疮 青蒿适量, 葱头1粒, 豆豉5粒, 搗烂敷患处。(罗南县唐榮周献方)

(4) 青蒿、細种田特菜、水蜘蛛、入地蜘蛛适量, 豆豉10粒, 葱头1只, 共搗烂敷患处。(廖仲英献方)

13. 跌打 青蒿叶4兩, 搗烂敷酒敷患处, 2小时除下。(英德县三江塘丘水秀献方)

14. 痔瘡

(1) 鮮青蒿叶2兩, 鮮臭花叶4兩, 紫苏叶1兩, 白醋1.5斤, 清水0.5斤, 放瓦鍋煮数沸后离火, 置于密房炭爐上, 爐旁放木凳兩張, 令患者騎坐如大便状, 粪門对正蒸氣上熏, 应取适当距离, 不要太热以防燙伤局部, 時間約半小时为度, 每日早晚各1次, 熏时用力努責, 使肛門痔瘡突出, 药力得渗透更好。熏时有粘液分泌滴下。一煎药可用二次, 当日使用。熏后用温开水冲洗肛門, 用消毒紗布吸干湿水然后臥床休息, 如有分泌物流出, 随时用紗布吸干, 倘覺有些刺痛, 逾时自能逐步消失。初熏药的首三天沒有不适感, 至第四天以后漸感刺痛, 日益更甚, 第八天后始逐漸緩和, 而痔核亦萎縮告愈。广州市文化局編導室傅偉生患痔瘡13年, 用此方熏了20次而愈。原方是由大沙头鉄路边10号門牌看貨仓的老工人陆庆沂傳授, 他本人患痔40余年, 也用此法治愈, 并介紹許多人使用, 效果都很好。

(2) 青蒿、假橫槓根、橫槓、瓦面石灰、鋪地錦各适量, 醋水各半煎煮, 約三次見效。另用假橫槓4兩, 煮瘦猪肉食。(順德胡門爐、鳳炎喧献方)

(3) 青蒿叶10片, 榕樹須5兩, 皮硝5錢, 枯乳1錢, 上药煎水乘热熏洗患处, 数次即愈。(湛江市龙国柱献方)

15. 癰疽 青蒿叶煎水洗患处。倘已潰損, 則改用青蒿晒干为末, 調蜜糖搽患处。(番禺县驗方)

16. 因伤发毒 青蒿、大头霉、冷飯、黃糖, 和勻搗烂敷患处。(赵式訓献方)

17. 手指潰瘍 青蒿1兩, 黃糖5錢, 熟盐5錢, 石灰5錢, 碱水5錢, 煎水洗患处。(东兴謝其新献方)

18. 秃发症(俗名鬼剃头) 青蒿叶数張, 猪肝少許, 搗烂敷患部約一天去药, 經7~10天后可长出如面上絨毛, 以后漸漸变粗轉黑而愈。如仍不生长, 复如法治1~2次必愈。(刘国偉献方)

19. 疥疮 青蒿叶5錢, 錫粉2錢, 硫黃1兩, 樟腦2錢, 蛇床子2錢, 风子肉5錢, 元胡1錢, 水銀5分, 輕粉2錢, 生人言2錢, 共为末調茶油擦患处。(英德清洗卫生院沈仕來献方)

20. 魚鱗贅 用青蒿叶蘸橫槓灰时时搽患处, 連搽数天可愈。(汕头陈說三献方)

文献考証

1. 清代赵学敏撰《本草綱目拾遺》載蕒油曰: 岭南人取其叶合橫槓食。今人名橫叶, 用其叶封固, 隔年載收貯待用, 可留数十年, 非独疏积滯、消瘰癧, 治痢亦伙。

2. 清代赵實谷撰《本草求原》載药叶曰: 辛温, 无毒。下气, 温中, 破痰, 散結气, 祛风, 解瘰癧, 今人以之合橫槓食, 亦取其辛香破瘰耳。其子名药條, 可以調羹, 亦草苳之类也。叶洗风毒脚疥瘡。

3. 現代胡翼撰《山草药指南》載青蒿曰: 取叶晒干为末, 凡湯火伤, 搽之甚效。又曰: 性温, 味苦温。凡产妇胞衣不下, 取青蒿叶搗汁一小杯飲之即下, 此奇方也。又可取叶搗敷或煎水洗, 能杀蠅止痒。凡患馬咀疔, 取叶搗烂敷之, 立效。治风寒咳嗽, 用叶7片和北杏仁1兩, 猪精肉8兩, 煎湯飲之。

乳 汁 草

Euphorbia thymifolia Linn.

别名：小飞杨，痢子草，乳仔草

科属形态 本品系大戟科大戟属中的一种一年生匍匐状草本。茎多分枝，略被毛，长约15厘米，通常带红色，于晨间摘断鲜草茎部，即有多量乳汁状粘液流出。单叶，纸质，对生，椭圆形至矩圆形，长6~8毫米，很少达2厘米，先端钝，基部偏斜略成截头状，边缘有极小的锯齿，叶面深绿色，主脉平坦，叶背浅绿带灰白色，主脉线状隆起，老株经秋全部淡褐红色，脉上具短茸毛，疏生；叶柄甚短；托叶细小着生在叶柄基部之侧。四季腋生大枝花序，大枝花序由1枚无柄的雌花居中和多枚具1雄蕊的雄花同生于总苞内组成，数个大枝花序聚合而成一近无柄腋生的聚伞花序；总苞长约1毫米，淡紫色。花后结蒴果，蒴果有毛，三角形，长约1.5毫米；种子有纵沟纹5~6条。本品另一种为同一科属的“大飞杨”，疗效大致相同。

生长环境 生于荒坡、耕地、园中、路边、村边低草或中草丛中，最适宜稍肥沃的细沙质疏松土壤。夏季收采。

产地分布 分布热带地区及温带一部分地区。我国广东、广西等地均有产，本省南海、番禺、从化、四邑等地均多产，普遍，丛生。

药用部分与气味性能 全草。嗅无，味酸，性凉。能内清湿热，外解湿毒。

临床应用

1. 痢疾

- (1) 乳汁草、木莲花、红头桔、黑尾草，各适量煎水服。（广州中医学院林辉献方）
- (2) 乳汁草、盐酸草、猪母菜（红骨）、金银花，共捣烂和蜜糖冷服。
- (3) 乳汁草1两，老茶叶5钱，煎水冲蜜糖服。（丰顺县黄玉廷献方）
- (4) 乳汁草、箭筈根、扁脚笔各等分，水煎冲蜜糖服。（广州中医学院罗振华献方）
- (5) 乳汁草4两，麦面糊4两，赤糖2两，和水煨面熟，法草食面。（澄海刘振达献方）
- (6) 乳汁草、易老柴各5钱，煎水和蜂蜜冲服。
- (7) 乳汁草2两，水煎以蜂蜜或黄糖冲服。（海门前进公社卫生院李坎，遂平县忠信廖光强，龙川县世德杨大力士献方）

2. 乙型脑炎 乳仔草、猪姜心、雷公根、六角菱、大竹草、罗网藤、消山虎、金花草、车前草、灯笼草、三月葵、地胆头、啼鹤尾、单片牙、胡蝇翅，上药各等分，每次共用4两为度，水8碗煎成2碗，一碗分服，另一碗加米酒调造以布包裹全身由头至脚。高热加羚羊3分，痰壅加珍珠末3分，同服奏效。（揭阳县陈顺兴献方）

3. 疟疾

- (1) 乳汁草生用3两，干用1.5两，以水4碗，煎至2碗，分4次服，在疟疾发作前一天，临睡前服0.5碗，翌晨服0.5碗，早饭时服0.5碗，至疟将发时服0.5碗。本方能治久疟病患。（黄仲文献方）
- (2) 生乳仔草4两，红砂糖适量，水煎冲砂糖，在发作前2小时服。（洪水生献方）

4. 感冒风寒 乳汁草捣烂,加酒3两,煮熟去渣服之。药渣煎酒。(汕头王寿达献方)

5. 腹泻口渴,小便赤,腹痛 乳汁草3钱,眼楸树皮5钱,煎服(分2次服)。(梁煥然献方)

6. 小儿急惊

(1) 乳仔草约2两;洗净捣烂,合米泔水捣匀,去渣煎沸,冲蜜糖服。(广州中医学院进修部郭玉史献方)

(2) 乳汁草酌量,捣烂取汁冲蜜糖服。(郑新生献方)

7. 挫伤出血;日久面黄肌瘦 乳汁草、瓜楼草、芙蓉根,先用乳汁草、瓜楼草煎水冲酒服。连服2~3次后,改用芙蓉根煮猪瘦肉食,连食4~5次即愈。(湛江林煥章献方)

8. 疳积眼、夜盲 乳汁草3钱,猪肝1两,治疳积眼捣烂贴两眼,夜盲则煎水服。(和平朱潮如皮、古崔、黄沙、何国友献方)

9. 乳痛 乳汁草和片糖捣烂敷患处,有消炎退肿之效。(蕉岭南露卫生院助产士孙智疏献方)

10. 缠腰蛇 乳汁草1握,蒜头1只,捣烂调冷开水涂患处。(五华刘防彭献方)

11. 牙疳 乳汁草4两,红背草1两,乌蝇翼草2钱,芙蓉膏2钱,捣烂冲冷开水含漱,含熟吐之再含,日含数次,连续数天则愈。

文献考证

1. 清代何克廉撰《生草药性备要》载小飞搗草(乳汁草)曰:味酸性烈。治小儿飞搗疮满面,头耳眼淋漓;敷洗消肿毒。叶如瓜子样,采摘下有白汁乳状液。

2. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载小飞搗草(乳汁草)曰:味酸性烈。治小儿烂头疮,疮毒蔓延满耳面,脓水淋漓,以之捣敷。煎水洗,能消肿毒,解胡满藤毒。

紅 蘿 卜

Daucus carota L. var. *sativa* DC.

别名：金笋，胡萝卜

科属形态 本品系伞形科胡萝卜属中的一种1~2年生多少被刺毛的草本。茎直立，多分枝，高0.7~1.0米；根粗厚，圆锥形肉质，红色或赤色。叶互生，纸质，为2~3回羽状复叶，裂片披针形或近线形；叶柄长5~8厘米，基部扩大。春季开花，花小，白色或淡黄色，为复伞形花序，生于一长枝的顶端；总苞片叶状，深细裂，小伞形花序，多数，球形，其外缘的花有較大而相等的花瓣；萼管与子房合生，萼齿小或不明显；花瓣5枚，倒卵形，生于子房之上；雄蕊5枚，着生于花盘的周围；子房下位，2室，每室有胚珠1颗。花后结果，果为2个不开裂、多少背向压扁的心皮构成，矩圆形，长约8毫米，有縱棱，沿棱上有刺。

生长环境 栽植于园圃、耕地、松疏沙质土排水良好地方。注意中耕施肥。

产地分布 各地均有栽植。

药用部分与气味性能 块根。嗅微辛，味甘淡，性平。能透解麻痘毒，又可补充病中营养。

临床应用

1. 麻疹 紅萝卜4两，芫荽3两，荸薺2两，加多量水久煮成2碗，为1日服量。
2. 水痘 紅萝卜4两，风栗3两，芫荽3两，煎服。
3. 小儿百日咳 紅萝卜4两，紅枣12枚連核，以水3碗煎成1碗，隨意分服。此方服二天后对咳嗽等症狀显著減輕，連服十余次即愈。（广州中医学院进修部黃志齡献方）
4. 小儿发热 紅萝卜2两，水煎，連服数次即愈。（广州中医学院进修部梁妙齡献方）

文献考证

现代胡眞撰《山草药指南》載紅萝卜曰：味甘淡，性凉。能清熱解毒。凡出麻疹，不断以之煎水飲，干用亦可。

紅 莧 菜

Amaranthus tricolor Linn.

别名：莧 菜

科属形态 本品系莧科莧属中的一种直立粗壮一年生草本。高达60~90厘米，无毛，绿色或赤色，或红色。单叶，纸质，互生，具长柄，叶型变异极大，由披针形至圆形、卵形，或三角状卵形，长5~10厘米，先端浑圆，或长而柔弱，但常钝而凹入，基部阔三角形或长楔尖，绿色或紫红色或斑驳。夏秋之间开花，数朵簇生成无柄的花束，该花束又聚生于每一叶腋内，有时在基部的叶腋内亦有之，在上部的常为短穗状花序，在枝顶或茎顶的更长，有干膜质的苞片，苞片长约4毫米，有芒；花小，单性，无花瓣，花被裂片8枚，多少干燥而膜质，宿存，复瓦状排列，披针形，约与苞片等长或略长，钝尖；雄蕊8枚，花丝基部合生成一短管，其间常有膜质的假雄蕊；子房上位，1室，有胚珠1颗。花后结一胞果，盖裂，短于花被；种子黑色，有光泽，扁圆，甚小。

生长环境 栽培于水稻土或黑色沙质土壤，及新开荒的紅土坡上阳光充足地方。春夏采苗叶，秋季采收种子。

产地分布 广植温带地区。我国华东、华南各地均有产，本省普遍栽植。

药用部分与气味性能 茎叶、根。嗅无，味微甘，性凉。紅色种能入血散瘀，凉血。

临床应用

1. 子宫痛 生紅莧菜3~4两，或干者1~2两，水煎服，连服1~2个月，間服水魚(鯪)数次而愈。本病症状：小腹部常有微痛感，阴道常排出秽物如行經状。曾以上方治愈1例。(广州大南街卫生所何开纪献方)

2. 阻塞性黄疸 鯪魚、莧菜，二味酌量作菜食，速食数次则愈。(李浩平献方)

3. 紅白痢 紅莧菜酌量，煎水冲蜂蜜调服。忌酸辣。(新布国药分站黄泉香献方)

4. 鼻血不止 莧菜头5钱，冬瓜碧5钱，田根5钱，共煎服则愈。(汕头沙隅卫生院姚逸民献方)

5. 走蛇(由热毒所致，患者皮肤透現紅綫，沿皮肤上行，本病多起于四肢) 莧菜、青梅根、打額草，各味酌量，加入黄糖少许，共捣烂贴之则愈。(鍾田清献方)

6. 狂犬咬伤 莧菜酌量，加入黄糖少许，同煮米粥食，速服数次则愈。(翁元胡应时献方)

文献考证

1. 汉代《神农本草经》載莧菜曰：甘寒无毒。主治青盲，明目，利大便，去寒热，久服益气力，不饥，輕身。

2. 南北朝陶弘景撰《名医别录》載莧菜曰：治白翳，杀蛔虫。

3. 唐代苏恭撰《新修本草》載莧菜曰：赤莧主赤痢，射工沙虱。

4. 宋代日华子撰《大明诸家本草》載莧菜曰：益精气。

5. 明代李时珍撰《本草纲目》載莧菜曰：治肝气热，翳目黑花。

6. 清代赵寅谷撰《本草求原》載莧菜曰：甘平无毒。除热通窍，利大小肠，滑胎易产，青者治气痢，紅者治赤痢，杀虫毒。但劲风冷中，脾弱易泻，勿用。忌酸粉，蟹肉。

南 瓜

Cucurbita moschata Duch.

别名：番瓜，金瓜

科属形态 本品系葫芦科南瓜属中的一种蔓生草本；茎中空，极长，有卷须，略分枝，粗糙或被粗毛。单叶，纸质，互生，通常阔卵形或近圆卵形而不分裂，有时浅裂而作五角形或七角形，长15~30厘米，密被或略被硬茸毛，常于脉上有白色的斑纹，基部裂口狭，非圆形。花单性同株，春季单生于叶腋内；花萼绿色，管浅钟状，裂片5枚；花瓣合生，黄色，钟状，有皱褶的裂片5个；雄蕊8枚，花药合生，1枚1室，其余2枚2室；雌花有一长椭圆形下位的子房；花柱短，柱头3枚2裂；花柄在结果时顶端扩大。花后结一肉质瓠果，果极大，有长椭圆形的，有卵形的，有扁圆的，有狭颈状的，外皮暗绿色或绿白色相间，成熟时赤褐色，不开裂；种子很多，通常藏在瓤内，扁平，有边，平滑。

生长环境 栽培于富含腐殖质的沙质土壤最佳，其他荒地、坡地、河边冲积土，村边屋旁隙地有阳光和排水好的地方，均可种植。

产地分布 适合生长于温带和热带地区。我国各地均有栽培，本省各地均有分布。

药用部分与气味性能 瓜仁、瓜蒂、瓜肉。嗅无，味甘，性平。肉能解火毒，拔枪弹；蒂能安胎；仁能驱虫。

临床应用

1. 血吸虫

(1) 患有血吸虫病的病人，每天口服去壳去油的南瓜子粉220克，分为三顿服用，结果证明，急性血吸虫病病人如果有发热不退食欲不振的现象，在吃了南瓜子粉后，平均在7天左右热度就降至正常，食欲增加，精神恢复，体重也增加。连服30天后，大多数病人的大便虫卵是阴性，检查大便时找不到血吸虫卵。（《大众医学》1959年1期）

(2) 用南瓜子去油制成粉剂，每日240克，分三次口服，连服28天，以此法曾治疗28例急性病人，对慢性病人12例，其中11例三次以上大便毛蚴孵化为阴性，对急性病人13例在治疗前均有40°C以上高热，服药后有5例在3~6天高热开始下降，最快在2~3天退尽，一般6~8天退至正常，其中有2例并用锑剂，效果显著。（嘉兴市血吸虫病防治院）

2. 肺病 牛肉0.5斤，南瓜1斤，煮熟食之（勿加盐、油），连服数次后，则服六味地黄汤5~6剂，忌服肥腻。（封开县陈德普献方）

3. 胸痛 南瓜络烧灰5钱，元胡3钱，川楝子3钱，香附子3钱，以上四味共煎水冲南瓜灰服。（新丰县潘裕生献方）

4. 骨哽喉 南瓜蒂灰、血余灰、片糖各适量，米糊为丸服。（刘英福献方）

5. 小儿疳积 南瓜叶1斤，黑豆叶（即大眼南瓜子叶）0.5斤，剃刀柄2两，晒干研末，每次5钱，蒸猪肝服。（新丰县潘裕生献方）

6. 汤火伤

(1) 南瓜瓢（按伤口大小而定用量）捣烂敷伤口。如痛不止加冰片少许，共捣敷。（顺德蔡恒光献方）

(2) 将溃烂之南瓜, 貯于瓶罐中, 經 2~3 个月則化为清水, 以此水涂敷患处, 每日涂 3~4 次, 連涂敷天則愈。(广州中医学院进修部廖光群献方)

(3) 将南瓜 1 个, 切細搗烂敷患处。(江門黃頌麟献方)

7. 打伤眼球

(1) 以南瓜瓢搗敷伤眼, 連敷 12 小时左右, 其痛則止, 輕者痊愈。(琼山王大綱献方)

(2) 先用南瓜瓢搗烂敷患处, 繼用川芎 1 錢半, 归身 2 錢, 生地 4 錢, 白芍 4 錢, 荆芥 2 錢, 防风 2 錢, 煎水服, 連服 1~2 剂。(定安中医門診部黃鴻南献方)

8. 枪彈伤 将南瓜瓢搗烂敷于伤部, 能消炎去火毒及止痛。(广州中医学院进修部陈立楨献方)

9. 鼠咬伤 南瓜瓢、老鼠瓜, 共搗烂敷伤口, 敷至痛止痊愈为止。(林楊华献方)

10. 对口疮 用南瓜蒂燒灰調茶油涂患处, 連涂至痊愈为止。(南雄黃名山献方)

11. 內痔 南瓜子 2 斤, 煎水熏之, 每日 2 次, 連熏数天。忌食鷄芥魚。(番禺瑞团凌边分診所凌洪献方)

文献考証

1. 清代赵学敏撰《本草綱目拾遺》載南瓜蒂曰: 保胎: 神妙湯保胎, 用黃牛鼻 1 条, 煨灰存性, 南瓜蒂 1 兩煎湯服, 永不墮。疔疮(《行篋檢秘》): 用老南瓜蒂数个, 焙研为末, 麻油調涂立效。治湯火伤(《慈航活人書》): 伏月收老南瓜瓢, 連子裝入瓶內, 愈久愈佳, 凡遇湯火伤者, 以此敷之, 即定疼如神。

2. 清代赵翼撰《本草求原》載南瓜曰: 有二种, 一种小而色紅潤, 一种長大而皮白。皆甘温, 入心解毒, 补中益氣, 蒸晒浸酒佳。

3. 现代陈立群撰《广西中藥医药用植物》載南瓜曰: 用瓜蒂治牛胎衣不下。

苦 楝

Melia azedarach Linn.

别名：森树，洋花梨

科属形态 本品系楝科楝属中的一种乔木。高达10米，有挺直粗大的树干和扩展的枝条；干皮灰褐色，纵裂；小枝有明显凸起的叶痕。叶互生，近纸质，2回羽状复叶，间有8回羽状复叶，长20~40厘米；小叶多对，奇数排列，卵形至披针形，长3~7厘米，宽1.5~2.5厘米，先端长尖，基部多少偏斜，边缘有钝锯齿，中脉在两面凸起，侧脉明显，每边9~12条。春季腋生圆锥花序，长10~20厘米，薄被粉末状星毛；花略有香味，连柄长1.3厘米，5数；萼被毛，裂片矩圆形，花瓣淡紫色，矩圆状匙形，长约1厘米，略被短柔毛；雄蕊的花丝合生成一管状，短于花瓣，通常紫色，先端有雄蕊8裂的狭裂片10枚；花药长椭圆形，着生在雄蕊管顶的齿间；花盘环状；子房上位，花柱细长。花后结核果，球形至椭圆形，长1~2厘米，直径1.5厘米，中果皮肉质，内果皮木质，种子椭圆形，果实成熟时呈淡黄色至深黄色。

生长环境 喜生于低海拔的旷野间，常见栽培于屋隅空地湿润沃土上，或近村道旁。夏秋间采收树皮果实，冬季采根皮。

产地分布 广布于热带、亚热带和亚洲。我国黄河以南地区常有栽培，北部则少见。两广所产苦楝特特点是叶大、果小，与四川等邻近各省所产的叶小、果大，有所不同。本省各地均有分布，普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 干根二层皮、叶、果实。气微有苦腥臭，味苦，性寒微有小毒。能杀蛔驱虫，清热燥湿坚阴，抗蛇毒，消肿痛。

临床应用

1. 钩虫 (1) 湖南省全面推广使用贯众汤消灭钩虫病进行普治，根据中共湖南常德县常委灭病领导小组2批共2807例一次服药疗法，2~3次大便盐水漂浮法检查证明疗效达82.5~85.63%，肯定了贯众汤的疗效。处方：贯众3两(鲜4.3两)，苦楝树二层皮5钱，山紫苏5钱，土荆芥5钱，为成人一次煎服量，如无山紫苏可用家种紫苏，无藜科土荆芥可用唇形科土荆芥。

(2) 两阳县平网除害灭病工作队用苦楝树根皮合剂治疗钩虫病27例作一次服药观察，二星期后作盐水漂浮大便检查法二次均呈阴性。处方配剂是苦楝根皮(鲜)31两，贯众10两，苏梗2两，甘草2两，混和后加水煎药至650毫升，10~18岁服20毫升(含鲜楝根皮1两)，18岁以上服25毫升，服药后1例头部血管搏动加剧，2例头痛，二天后即消失。(《广东中医》1959年第3号)

(3) 清远县血吸虫病防治站用苦楝树二层皮治疗钩虫病，成人一日量：鲜的3两(干的1两)，加水900毫升，煎药3小时，浓缩成300~400毫升，去渣空腹一或二次服下，服药后5天开始分期粪检，到一个月止，阴转率由7.63%增至46.16%，证明楝根白皮对钩虫病有一定疗效。(《广东中医》1959年5月)

(4) 中山医学院在海康地区实验治疗钩虫病，用单味苦楝树煎剂，每日一次1~4两，疗程1~3天，治疗及复查人数237人，有效率50%。用贯众3钱，苦楝皮3两，复方煎剂一次疗程治疗61人，有效率70.5%。剂型方面，片剂比煎汤的毒性较大，孕妇忌服。

(5) 湖南石門县防治鉤虫病試驗組用榧子杀虫丸复方試治 568 人, 涂片追蹤檢查 61 人, 阴轉率 82%, 飽和盐水漂浮追蹤檢查 48 人, 阴轉率 43%, 体征大部消除, 血色素迅速上升, 体重增加, 胃腸機能好轉。該組还創造“清水漂浮新鮮大便法”, 由于淘虫观察发现本方杀虫威力大, 在服藥后 4~7 天进行淘虫, 所淘出的鉤虫尸体大都残缺不全, 同时打下的蛔虫, 毀伤程度也是一样。清水漂浮新鮮大便法比过去漂浮法效率高, 其法: 从患者服藥第一天起, 将排出的大便, 即排即洗, 洗净后把篩子放在清水缸內到太阳底下漂浮找尋, 連淘四天即得。处方: 榧子連壳 7 錢, 檳榔 7 錢(不泡切宜搗碎), 紅藤 7 錢, 百部 7 錢, 苦楝樹根皮 7 錢, 雄黃 1 錢, 大蒜 3 錢取汁, 共研末米糊为丸, 每次 4 錢, 空腹米湯送服, 一日 3 次, 連服 3 天为 1 疗程。用稀粥或米湯送丸, 可减少恶心嘔吐反应。服藥期忌食葷油。

2. 蛔虫病 (1) 重慶市第一中醫院与四川中藥研究所合作用苦楝樹皮(除去表面粗皮)先后制成川楝片粗剂(0.3 克)和精制剂(0.5 克)及新制剂(0.05 克)等三种, 經試驗治疗 524 例, 有效率达 74.3%, 排出的蛔虫有 1/2 是死的。剂型疗效的对比是: 以粗制剂为最高(75.5%), 但其副作用也最大, 副作用一般为腹脹痛; 新制剂副作用最少。新制剂和片剂无气味, 服后不須服泻剂, 适合兒童服用。剂量: 2~4 岁每次服 2 片, 4~8 岁服 3~4 片, 9~15 岁服 5~6 片, 16 岁以上服 6~8 片。

(2) 武汉市第二人民医院, 用苦楝樹根白皮驅蛔虫試驗 143 例, 有效率服藥一次为 80.4%, 二次为 85.14%, 三次为 87.83%, 方法: 制成 200% 煎液, 即每毫升等于生药 2 克, 剂量每公斤体重用 4~5 毫升, 于清晨空腹服, 一次服下, 服后不需另服泻药。(全国医药卫生技术革命展覽会消灭寄生虫病)

(3) 海南人民医院內科云昌扶用楝根白皮治疗患有蛔虫病者(多兼患鉤虫病) 422 例, 有效率为 84.68%, 其中以新鮮楝皮疗效較佳, 在 80% 以上。鮮皮用量关系方面計 5 克/公斤为 91.39%, 7 克/公斤为 95.45%, 用量以 5 克/公斤为适中, 减少中毒出現。(《广东中医》1958 年第 1 号)

(4) 大場醫院小兒科用苦楝根白皮 4~6 克, 檳榔 15 克, 加水 10 倍, 煎成 100% 溶液, 空腹一次頓服, 驅蛔虫疗效比山道年(78%)有效率为高。(《中医研究工作資料汇编》)

(5) 其他驅蛔用苦楝樹根白皮的有梅县王梓均、陈增龄、惠阳林振鵬、饒平吳秋奎、余大道、李鎮华, 广州中医學院進修部張圣生、梁梓溪, 广州市兒童醫院何壽謙, 广州市保甲衛生所潘繼華等驗方。用樹上干枝白皮的有广州中医學院進修部熊瑜伯、張圣生等, 根据他們的經驗: 1) 用苦楝根皮必須用土中的根皮, 不要用露出土面的根皮; 2) 最好加調味剂, 如加糖或猪肉同煎空腹服, 或令患者先聞嗅炙香雞蛋一回, 然后将雞蛋食下, 以先誘蛔虫之食欲, 繼即將苦楝藥汁頓服, 驅蛔率便更好; 3) 复方配合較单味疗效提高而准确, 如与檳榔合剂, 与使君子合剂等。如病人患蛔虫病, 病情复杂或严重时, 必須根据中医辨症論治方法对病情全面綜合治疗, 不适合配任何单味药剂。(广东省中藥研究所整理)

3. 蛔虫病 (1) 北京市中医医院兒科用苦楝皮 2.5 兩, 百布草 5 兩, 烏梅 3 錢, 加水 800 毫升, 合煎成 400 毫升, 每人每次 20~30 毫升, 保留灌腸 2~4 次, 治疗 20 人, 疗效 98%。灌腸第一次肛門发痒症状消失。

(2) 河北唐山市治蛔虫病驗方: 苦楝皮 5 錢, 鶴虱 3 錢, 雷丸 5 錢, 黑丑 8 錢, 榧子 2 錢, 使君子 5 錢, 大黃 1 兩, 共研細末, 每服 3 錢, 与熟猪头肉同服, 早晚各 1 次, 空腹服, 小兒減量。

4. 中华分枝吸虫、鞭虫 佛山专区三水中医院用华矾丸杀三虫的疗效, 中华分枝吸虫 70%, 鉤虫 80%, 鞭虫 100%, 处方: 蕪荑 4.5 兩, 青矾 6 兩醋拌炒透至紅色, 枯矾 7.5 兩, 苦楝皮 3 兩, 檳榔 4.5 兩, 黑丑 2.25 兩, 广木香 2.25 兩, 青皮 2.25 兩, 都金 3 兩, 貫众 3 兩, 雷丸 3 兩, 干漆 2.25 兩炒至全黑烟去尽为度, 蕪荑 6 兩, 土茵陈 9 兩, 苡米 3 兩, 以土茵陈和苡米煎水 and 面糊为丸如綠豆大, 成人每服 5 克, 每日 2~3 次, 忌飲茶、酒。

5. 瘧疾 (1) 蕉岭三圳衛生院彭远初在抗日战争时期, 用苦楝樹叶和亞婆子叶晒干, 每用各 3 錢, 清水煎服, 不拘时, 孕妇忌用。

(2) 治疗单热无寒的瘧疾 广州中医學院進修部學員叶通千以苦楝治恶性瘧疾高热, 方法用苦楝樹枝梢嫩者 1.5 市兩, 搗汁和蜂蜜及洗米水煮沸后冲服。

6. 夹色伤寒 苦楝樹根适量, 和适量米酒煎服。(汕头专区驗方)。

7. 疔毒 (1) 苦楝树根与黄糖捣烂敷患处。(和平陈肥三献方)

(2) 苦楝树叶、乌柏树蕊, 二味酌量, 捣烂敷患处。(清远禾云卫生院梁财献方)

8. 疔疮 (1) 用苦楝叶煎水洗患处, 洗至疮退炎为止, 连续几次全愈。(新中罗永富献方)

(2) 马咀疮 用苦楝树二层皮 1 团(与木相近层色白者佳), 黄沙槐 3~4 只, 黄糖一小块, 共捣烂敷患处, 一次痊愈。(清远丘俊华献方)

(3) 苦楝根皮煎水洗患处则愈。(梅县黄晓修献方)

(4) 牛毒疮 用苦楝树皮、苦瓜仁、乌柏皮酌量, 共捣烂敷患处。(河元国龙卫生所利顺文献方)

9. 乳疮 苦楝叶、落地生根、芙蓉叶、羊蹄草各等分, 捣烂贴患处。未破用酒, 已破用水或用黄糖同捣匀。(广州中医进修班江杏英献方)

10. 睾丸肿痛 金铃子树二层皮、棕树根、侧柏叶根, 先用金铃子树二层皮 2 两煎水空心服, 止痛后用棕树根、侧柏叶根各 2 两煎水服, 其肿即退。(英德沙口卫生院黄远玲献方)

11. 痔疮 生防仁 1 两, 生黄柏 4 钱, 苦楝树皮 8 钱, 生甘草 1 两, 共研细末和菜油搽患处, 数天即能生效。(河口邓德机献方)

12. 化脓性皮肤病 苦楝叶 1 斤, 水 6 斤, 煎 1 小时, 冷后滤过即成, 可用作湿敷及洗剂或浴剂(如制痔备用可加 10% 石炭酸 5 毫升作防腐剂), 经试用 20 例, 平均约用药 6 次痊愈。(湛江专区献方)

13. 皮肤湿疹 生苦楝树叶酌量, 煎水一盆, 浸洗患处, 连洗数天即愈。该树叶有杀菌止痒作用, 对湿疹有卓效。(梅林张博林献方)

14. 头癣 根据中国科学院皮肤性病研究所和江西省皮肤性病研究所, 用苦楝子焙黄研成粉末, 加入熟猪油或植物油混合调匀, 制成 50% 的油膏, 治疗 150 例, 多可获得较为迅速而明显的临床进步, 部分患者且达到临床治愈程度; 其中对白癣的疗效较黄癣为高, 治愈率为 86.1%, 黄癣为 39.1%, 在 150 例中, 毫无疗效者只有 3 名, 这说明了苦楝子油膏治疗头癣具有一定疗效, 值得进一步作临床实验研究。

15. 毒蛇咬伤 苦楝树根 1 两, 地桑麻 1 两, 樟木皮 8 钱, 煎水冲酒服。(海南符正镜献方)

16. 疯狗咬伤 (1) 苦楝木皮 1 两, 乌柏木皮 1 两, 麦冬 3 钱, 生地 2 钱, 红枣 5 枚, 水煎, 用好酒冲服。(湛江市梁德伍献方)

(2) 苦楝树根(去老皮取二层皮)、红枣树根(去老皮取二层皮)各 8 两, 米 4 两, 共煮粥食。外治用黑钱子 4 两, 木瓜 2 两, 将 2 味煎水洗, 其渣捣烂敷患处。(泉乡陈沃俊献方)

17. 跌打扭伤挫伤 (1) 苦楝树(四会名桑木树)、落地金钱、大还魂、小还魂、五指牛落、丁哥辣梗(鹿不泊)、渴水树皮、大罗伞、小罗伞、田基黄、生梗子、鹅不食草, 以上各 2 两, 用刀切碎共捣烂, 加酒炒热敷伤口, 连敷 24 小时, 重伤者敷十余次, 轻者 3~4 次可愈。(四会南塘大寨林乡管献方)

(2) 不分新伤旧伤, 用苦楝叶 4 两, 加酒少许, 同捣烂取汁, 先煎 2 小时, 然后再加酒适量冲服。外用渣擦伤处。(顺德人民医院献方)

18. 跌打出血疼痛作肿 (1) 处方: 大罗伞、小罗伞、大还魂、小还魂、细姜黄、田基黄、落地金、大树松、松根、苦楝根、黑骨芒、老鹿须、鹅骨香、白背木耳、寒刁竹、千斤拔、大胆五、地松根、白风藤、满天星、金棋璫、七星剑、量地干、盆上田七、金锁匙、六月霜、入地金牛、七叶一枝花、过江龙、駝骨草、过山香、崧根藤、铁罗汉、日行千里、金耳环、清明树、双眼龙, 上药各 1 两, 共研末炼蜜为丸, 每丸重 3 钱, 以蜡为衣, 每服 1 丸, 化服。

(2) 跌打出血 用苦楝树叶酌量捣烂敷患处。(71 社林鸿山献方)

19. 跌打新久疾患 (1) 苦楝树正根煎酒冲重便服。

(2) 用苦楝叶捣烂取汁, 煎 2 小时后冲酒服, 2 次痊愈。外可用渣擦患处。(顺德流溪医院献方)

(3) 駝骨 用生松叶、土鳖虫、细辛各 3 钱, 駝骨、地龙各 2 钱, 大田漆、生艾各 1 钱半, 川断 2 分, 大梅片 4 分, 水蛭 2 条, 土狗 4 只, 青竹蜜 1 只, 苦楝蕊 1 两, 共研细末, 另用小雄鸡一只去肠不可洗水, 与上药同捣烂敷患处。再加上绷带固定, 24 小时后即除去药(亦可再用 1 剂), 但仍须固定一段时间, 待骨折恢复才愈。

(4) 細叶榕树叶、猪血木叶、筋古叶、苦楝叶、罗伞树叶、蕲树叶、細辛末，加小雄雞1只去毛腸什(不見水)，白酒糟少許，同煮烂加热后敷患处，約敷三柱香后除去药。(博罗李天培献方)

(5) 外伤骨折 用苦楝树皮为末，糯米适量，捣烂敷患处。患者如达50岁以上者，要炒熟药敷40分鐘，中年患者敷30分鐘，小儿敷20分鐘为适宜，連續敷几天可痊愈。(中山廖寿民献方)

除四害

1. 灭蝇蛆、孑孓、釘螺 (1) 以干皮和根皮浸出液实验灭蝇蛆、孑孓，48小时死亡率达100%，灭釘螺12小时达100%；用叶效果較差。(《中级医刊》1959年2期全国爱国卫生运动經驗介紹專輯)

(2) 浙江建德专区药工會議上农药效果試驗記录表內用5%苦楝树試驗，以釘螺10只，放入药汁中，經4小时32分鐘，釘螺全部死亡。(《全国医药卫生技术革命經驗交流大会汇刊》)

(3) 苦楝叶3分，魚藤3分，羊角槿3分，辣藤3分，烟膏1分，搗烂后加水25分浸漬8小时，或煮煎去渣，即成水剂，或加肥皂做乳剂，杀蚊蝇及农业害虫。

(4) 苦楝叶1斤，生扁鹊子0.5斤，丁哥王15斤，烏柏叶1斤，尖咀辣藤18斤，木芋头7斤，茶仔餅1斤，加水31斤，煮3~4小时即成水剂，杀蝇蛆用。

(5) 将苦楝树叶1斤，放在15斤粪中，60小时后，2/3蛆可杀死(福建建宁县)。又以叶及树皮1斤，加水5斤搗烂过滤，配制成20%的溶液100毫升，放入蛆50条，8小时后100%死亡(安徽)。亦可用苦楝花搗碎放入粪中，24小时对蛆有效，經2天則蛆全部死亡，且能保持药效20天。如用苦楝叶杀蛆，每10担粪需叶8斤，虽能杀死蛆，但效力不如花(陕西)。(《中国土农药志》)

(6) 苦楝枝皮或根皮，切碎制成5%濃度液，48小时杀孑孓100%(浙江)。另外医学科学院病毒系将干苦楝种子，搗碎煮15分鐘，再浸48小时，在用此药液杀蛆，經48小时，孑孓有70%死亡。还有苦楝根皮及果实、花与柏、菖蒲各0.1斤，研細微火熬燒之，可以熏蚊(云南)。(《中国土农药志》)

(7) 据昆虫所試驗：苦楝子毒餌对家蝇的杀虫率为19%，用苦楝皮毒餌对家蝇的杀虫率为29%，如用孑孓作20倍水浸液及100倍酒精浸液作試驗，則不同地区的結果如下：安徽省阜陽用苦楝叶所得結果死亡率为3.3%及23.3%，用苦楝子所得結果为12.3%及47.7%；江苏泰兴所得結果死亡率为6.6%及52.2%；山西所得結果为30%及7.7%。(《中国土农药志》)

2. 灭蚊 中山医学院在海康地区实验用苦楝叶全干每立方公尺用0.1市斤，杀蚊率96.77%，用0.2市斤杀蚊率100%。

文献考証

1. 唐代孙思邈撰《千金备急要方》載：用楝树皮或枝燒灰，猪脂調敷，治小儿諸疮惡瘡，浸淫疮。

2. 宋代洪迈撰《夷堅志》載：治消渴有虫，苦楝根白皮一握切焙，入麝香少許，水二碗煎一碗，空心飲之，虽困頓不妨，下虫如蛔而紅色，其渴自止。消渴有虫，人所不知。

3. 宋代日华子撰《大明諸家本草》載金鈴根木皮曰：治游风，熱毒，风疹，惡瘡，疥癬，小儿壯熱，并煎湯浸洗。

4. 明代方賢撰《奇效良方》載：用楝根皮、皂角去皮刮于等分为末，猪脂調涂疥疮风虫。

5. 清代赵良谷撰《本草求原》載苦楝根皮曰：苦寒。吐虫毒，治游风熱毒，俱煎內服。风疹疥疥，煎洗。諸痛痒痒杀虫，治虫耗津液而成消渴，根皮濃煎加片糖少許服下，其虫即出，先服炙鷄蛋一只，次服苦楝根湯，又以炙蛋压之，則虫积消尽自止。根赤者毒，杀人，取白者二層皮以糯米同煎杀毒。若渴，以冷粥止之，不渴以熟葱粥发之。其花燒烟辟蚊；皮洗疥痒疔疮，故：毒拔鉄刺。

6. 現代肖步丹撰《岭南采药录》載苦楝根曰：其根味涩苦，性寒。治虫积肚痛，消熱毒和猪肉煮湯食；退热用二層皮同片糖煎水飲之，亦治痢証虫出。洗疥癬。取根向东方坐者为妙，吐虫毒，治游风熱毒风疹疥痒，收效杀虫。

7. 現代胡眞撰《山草药指南》載苦楝曰：取叶搗敷，能消跌打腫痛，止刀伤出血；取根莖之二層皮1~2錢，水煎加白糖少許能治痢症；其根叶煎水洗疥癬止痒。取根1两煎服，能治虫积腹痛。

8. 現代陈立撰《广西中兽医药用植物》載楝树曰：治牛气腫疽(箭脚黑腿)；猪丹毒。

烏 柏

Sapium sebiferum Roxb.

别名：烏芥，紅叶，蠟子樹

科属形态 本品系大戟科烏柏属中的一种乔木；高达15米，直径40厘米，有时由于新伐过甚而成灌木状，老树树皮黑灰色，有深沟纹，枝广展，有乳状树液。叶互生，薄纸质，菱形至闊菱状卵形，长3~7.5厘米，寬3~9厘米，先端微突尖至渐尖，基部闊楔尖至鈍形，边全緣，叶面綠色光亮，叶背初时粉白，后漸成綠色，到秋后則变紅色而脱落；侧脉纖細，每边5~10条与中脉成45~50°角斜出；叶柄細长，长2.5~6厘米，頂端有腺体2个。夏季单生穗状花序，下垂，长5~10厘米，密生黄色小花，单性，雌雄同株，无花瓣，雌花1~4朵，单生于花序的基部，着生处的两侧各有近肾形的腺体1个；花柱上端略膨大，有菱状卵形的苞片3枚；花被3深裂；子房上位，3室；花柱3枚基部合生，柱头向外卷曲。雄花每10~15朵簇生于一苞腋内，苞片菱状卵形，寬約1毫米，頂端渐尖，近基部两侧亦各有近肾形的腺体1个；花被杯状，浅3裂；雄蕊2枚，很少3枚，突出花被外面，花絲分离，花药球形。花后結蒴果，木质，近球形，直径約12毫米，熟时黑褐色，3室，每室有种子1顆；种子黑色，外被白色蜡层，附着于蒴果中軸上。

生长环境 常見于村落曠地、田旁小路和河畔低地阳光充足地方，粘質土或沙質土均能生长。夏秋采叶，有紅芯和白芯两种，秋冬季采种子，冬春季采根。

产地分布 广植我国和日本、印度等地。我国湖南、广东、台灣、云南、河南、山西、陕西、甘肃、四川、山东、江苏、福建、安徽等省均有产。本省全境均有分布，普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 根二層皮、叶。嗅微腥，味苦，性微温，有小毒。能泻水，拔毒，杀虫，消肿定痛。

临床应用

1. 血吸虫病晚期 安徽省宁国血吸虫病防治站用烏柏根皮治疗22例晚期患者，经过15天治疗过程的观察，9例腹水消失，12例腹水減輕，8例脾脏縮小，6例肝脏縮小。其中有13例出院时直腸鏡檢和2月底随訪粪便孵化檢查，都没有找到血吸虫卵。这批实验治疗所得經驗較少；且在治疗过程中，病人服药有嘔吐、腹痛等反应；有些重症腹水病人，服药后腹水虽消除，却因为药物的作用，有一部分胃腸充氣。（《健康报》1966年4月27日）

2. 腹脹

(1) 烏柏樹根二層皮切碎1~3兩，白米1撮，炒至微黃色，每日1次，連服3~6日，服法：1) 顺德勒流医院廖百平介紹，加北芪3錢同煎水服。2) 佛山潘福介紹，連米搗爛加糖煮服。

(2) 烏柏木根3兩，桑樹根1兩，用水5碗煎至1碗，分3次服下。（《福建中医驗方》）

3. 二便不通 烏柏樹根鮮白皮0.5~1.0兩，搗爛，加冷開水榨去药渣取汁頓服，服后如再不止，再服冷白粥即止。（湛江市郑荣献方）

4. 夹色 烏柏樹根白皮約5錢，水兩碗，煎服，連服3天。（新兴陈秋献方）

5. 食死牛馬中毒 烏柏木皮 2~3 兩，淨水 3 碗，煎取半碗，作 1 次服。(欽北邓清舫獻方)
6. 軟性下疳(魚口便毒) 烏柏葉、白蟻瓜(茄瓜)各適量，搗爛加蔗糖和勻敷患處。(浦北小須鄉葉國永獻方)
7. 湯火傷 烏柏樹花晒干 5 兩，梅片 2 錢，共研末和茶油塗患處。(平順潭江衛協會許振剛獻方)
8. 毒蛇咬傷
 - (1) 烏柏樹二層皮(鮮 1 兩，干 5 錢)搗爛，米酒適量和勻，去渣，一次飲至微醉為度，將藥渣敷傷口周圍，療效很好。(北海市人民中醫院蘇立民，浦北官果河鄉羅耀明，合浦陳德偉、潘偉才、高鴻標，防城沈春余等獻方)
 - (2) 烏柏葉 2 錢；或加木棉葉 2 錢，苦楝嫩葉 2 錢；或加指天椒根，搗爛，加入冷開水適量，榨汁內服。(台山中醫研究所獻方)
 - (3) 烏柏嫩葉、半边蓮適量，搗爛取汁，米酒沖服，藥渣敷傷口周圍。(合浦莫輝緒獻方)
 - (4) 蛇咬後傷口潰爛者，用烏柏葉、火炭母葉煮水洗後，另用鮮藥搗爛敷患處。
9. 狂犬病 烏柏樹根白皮 2 兩，酒糟 0.5 碗，加水煎服，再服人參敗毒散去人參地榆、紫竹根。
10. 風疹塊 烏柏樹根適量，煎水暖洗 1~2 次即愈。(廣州中醫學院鄭碧泉獻方)
11. 蛇頭瘻指(瘻疽)
 - (1) 烏柏樹葉搗爛，酒煮熱，加三黃散少量調敷。(郁南丘湛元獻方)
 - (2) 烏柏樹葉和生鹽搗敷。(連南藥網衛協會區子飛獻方)
 - (3) 烏柏樹葉和熟烟葉汁浸約 20 分鐘，以不痛為度；再另用烏柏葉、熟烟搗爛敷患處。(叶雨丹獻方)
12. 瘡瘍背痛
 - (1) 紅蓮烏柏葉、紅蓮烏不企、細葉石斑葉，共研末，用酒加鹽糖和勻調成糊狀敷患處。(清遠羅佐獻方)
 - (2) 肩部生瘡，用烏柏葉和白蜡蒸透敷洗 3~4 次可愈。(連南縣三江中醫診所陳昌記獻方)
 - (3) 坐板瘡 用烏柏葉、油柏葉煎水，將沸取出，乘熱坐熏之。(新豐羅亞藍獻方)
 - (4) 对口瘡(項後髮際處，在髮際以上俗名上山虎，髮際以下俗名下山虎) 用烏柏葉搗爛加酒適量和勻敷患處。(翁沅鴻珍義獻方)
 - (5) 瘡瘡癒後出血水 用烏柏樹葉、辣蓼、苦瓜藤、老猪骨，煎水洗之。(連山黃佩居獻方)
 - (6) 濕瘡、干濕癬搔痒 紅蓮大葉烏柏 10 分，覆頂葉 1 分，搗爛水洗患處；又另將葉搗爛煮白醋搽患處，連用 3~7 天全愈。(宝安黃俊偉獻方)
13. 皮膚濕疹潰瘍
 - (1) 烏柏葉約半斤，煎水候暖，慢慢洗之，2~3 次可愈。(南沃后光鎮吳卓娟獻方)
 - (2) 頭部濕疹 烏柏葉、陀僧末各適量，生油調勻，煮沸候冷搽患處，2~3 次可愈，屢試屢驗。(三水西南陳大康、林幼慈獻方)
 - (3) 小兒皮膚胎毒 紅蓮烏柏皮(去粗皮)，晒干為末，調茶油塗患處。(普寧吳和申獻方)
 - (4) 飛揚瘡 紅蓮烏柏葉 4 兩，搗爛煮米酒搽患處。(平順陳克家獻方)
 - (5) 香港腳 烏柏樹葉煎水洗之，止痒極效。
 - (6) 爛脚 烏柏葉、鵝不食、山茨菇、生南星各適量，先將山茨菇、生南星二味煨熟，合諸藥加黃糖搗爛敷患處。(清遠黎偉獻方)
14. 跌打
 - (1) 烏柏樹葉 3 兩，生薑 3 兩，搗爛敷患處。(和平縣青州賴求仁獻方)
 - (2) 紅蓮烏柏樹嫩葉搗爛，加酒或童便作外敷，或內服，屢驗。(陽江縣蔡方成、游玉珊獻方)
 - (3) 紅蓮烏柏葉 2 兩，榴梿核根 2 兩，搗取汁沖酒服。(台山中醫研究所獻方)
 - (4) 烏柏 6 兩，生銹鐵釘 4 斤，胡椒 2 兩，烏醋 6 斤，順茄子 180 個，先將鐵釘炒至紅色，然後放入烏

諸及各藥，隨即轉入坛內封固，浸兩月後可用。(南海鹽步吳偉伯獻方)

(5) 烏柏木葉 5 市斤，晒乾研末，每用 1 兩，煎熱沖酒服；另用 2 兩和酒蒸熱外敷患處。孕婦忌服。
(廣州中醫學院進修部張高士獻方)

18. 刀傷斷筋跌打骨折 烏柏根、水蘊菜、半邊旗、筆塔草、面牙郎、雞不食、松木心、山黃茶、水邊紅，共搗爛敷患處。(東興羅文英獻方)

除四害

1. 殺孑孓

(1) 昆蟲所試驗用 20 倍水浸液對孑孓的殺蟲率為 80%，用 100 倍酒精浸液為 47%，湖南宜章的烏柏葉殺蟲率分別為 11.1% 及 94.4%，而廣東的則分別為 14.4% 及 48.8%。(《中國土產藥志》)

(2) 取烏柏葉、苦楝葉各 1 斤，各加水 10 斤，分別浸泡 24 小時，以 10:10 混合(即 10 分烏柏葉水，10 分苦楝葉水)，加水 100 斤，再加 6% 可濕性 666 粉 4 兩混勻，噴殺蛆、孑孓，效果很好。(《江西中醫藥》1968 年 12 月號)

2. 滅蛆

(1) 開平縣防疫站用烏柏葉 1 斤，熟蔞(丁哥王)根葉 1.5 斤，尖嘴辣椒 1 斤，野芋頭 2 斤(連莖葉)，苦楝葉 1.5 斤，馬錢子 0.5 斤(最好用生馬錢)，茶仔餅 1 斤，加水 30 斤，煎 3~4 小時便成。用量大約每缸美用 10~15 茶杯(約 1500 毫升)，蛆蟲接觸後 4~5 小時便開始死亡，隔夜便全部消滅。(《廣東省滅蟲工作茂名現場會議資料匯編》)

(2) 將烏柏葉搗碎加些菸葉，發酵三天，倒入廁所，便可殺滅。此藥亦可用以消滅才才。(《中藥通報》1959 年 2 月號)

文獻考證

1. 南北朝陶弘景撰《肘後百一方》載烏柏木曰：治二便失格(不通)二三日則殺人，用烏柏根白皮，干為末，熱水送服二錢，先以芒硝二兩煎湯服，取吐甚效。

2. 五代陳士良撰《聖惠方》載：烏柏皮治水腫，小便澀，用烏柏皮、檳榔木各一兩為末，每服二錢米飲下。

3. 宋代《聖濟總錄》載：烏柏根治暗疔昏狂，瘡頭凸，用紅柏樹根二尺許，去表皮搗爛，并華水調一盞服，待瀉過，以三角銀杏浸油搗敷患處。

4. 明代李時珍撰《本草綱目》載烏柏根曰：性沉而降，利水通腸，功勝大戟，一人病肺滿氣壯，令掘此根搗爛，水煎服一碗，連下數行而病平。氣虛人不可用之。

5. 清代趙賓谷撰《本草求原》載烏柏根皮曰：苦辛涼沉降，利水通腸，功勝大戟，治疔腫，解砒毒，泄食六畜中毒腹痛；柏子油塗患處則不白，敷一切腫毒瘡疥；柏油作燭，去心，導大便秘結。

6. 現代肖步丹撰《嶺南采藥錄》載烏柏曰：味甘苦性寒。治疔腫、疥癩、蛇傷。其根利水通腸，治疔腫，解食六畜毒腹痛。又疔腫欲死者，以其葉搗汁敷患處，得大利去毒即愈。其根白皮，味苦性微溫，治乳痛、酒風脾；治坐板瘡，搗爛以鹽和入炒熱坐之，冷即換熱者。又疔頭風，通大小便，消水腫脾氣，患橫痃便毒。其莖之紅色者，治跌打已死，酒蒸服能還魂。惟氣虛人不可服，其氣猛勝大戟。又患黃胖証，取高地約五寸之二層皮青，和米搗爛加片糖少許，煎成粉食之必瀉，瀉後神倦約一日可消。

7. 現代陳立卿撰《廣西中醫藥用植物》載烏柏曰：治牛喉風症；腹脹症；大便秘結，瘰癧(爛腸瘻)；傷寒(傷風)症；誤吃草烏中毒；熱症；頭風症；被毒蛇咬傷。并可治牛吊胆(吊黃精)；豬丹毒。

桃 树

Prunus persica (L.) Batsch.

科属形态 本品系蔷薇科樱桃属中的一种落叶小乔木。枝秃净，灰褐色，遍布斑点及横折纹。单叶，薄纸质，互生，矩圆状披针形至阔披针形，长7~12厘米，宽8~8.5厘米，先端渐尖，基部楔尖，幼时叶的边缘有锐利的小锯齿，成长时则为粗而钝的锯齿，两面无毛；叶柄短，长5~10毫米，在柄的顶部或在叶的下边缘有2个腺体；托叶小，脱落。春季先叶开放花，单生，无柄，直径1.2~2.5厘米；萼片5枚，分离，外面或至少在边缘被柔毛；花瓣5枚，粉红色，大小不等，因品种而不同；雄蕊多数，与花瓣同着生于萼管上；花丝分离，子房上位，生于萼管的基部，有胚珠2颗；花柱细长，不分裂而具头状的柱头。花后结核果，大小形状不等，熟时黄红色或胭脂红色，被柔毛，果内黄白色浆果状，肉多，核极厚硬，有不规则的深槽及窝孔，与果肉分离或不分离。核内藏扁圆心脏形种子1枚，被红褐色种皮。

生长环境 生于村边坡地、园圃、沃土阳光充足地方。春季采花，夏季采叶及果实。

产地分布 遍植世界各地。国内华东、华北、华南、西北等地区均有产，本省普遍。

药用部分与气味性能 叶、花、实、种子。嗅微香，味甘酸，微苦，性寒。能入血消瘀，通经，利水，叶则散风消肿。

临床应用

1. 瘧疾

(1) 桃叶7张，胡椒7粒，共研捻成团，在瘧未发前3小时，将药团敷于患者手腕脉门处。本方经治愈病人几百例，花较少收效大，值得推广使用。（福建中医秘方2集）

(2) 桃叶1握，大蒜3小粒，生姜少许，捣烂，在发前2小时敷于一侧桡骨动脉部，男左女右，用纱布包好，可制止发作。如未愈可继续再敷。（广州中医学院进修部陆宜逸献方）

(3) 桃叶7片，辣椒2个，各研烂，雄黄2分研。于病发前1小时，以上列药敷于患者手腕脉处，先敷桃叶，次敷雄黄，后敷辣椒，用布包好，约0.5小时解去，其病自愈。（《江西中医药》1959年1月号）

(4) 桃叶、苦楝叶、吴茱萸、蒜头，上药各等分共捣烂，贴桃动脉（男左女右），发前1小时进行；过发期除去。（广州中医学院进修部许松林献方）

2. 半身不遂 桃叶5钱，生艾叶1两，柳树叶1两，青漆叶1两，犁头草5钱，鸡不食草3钱，将以上各药炖酒，每次服1杯，药渣用布包擦全身。另灸水沟（单）、肩井（双）、曲池（双）、合谷（双）、手足三里（双）、风廉（双）、环跳（双）、阳陵泉（双）、绝骨（双）、昆仑（双）。（惠东永昌卫生所蔡月仙献方）

3. 瘰癧膏药 桃树枝1.5两，生地3两，银花3两，赤芍3钱，连翘9钱，蓖麻肉9钱，木鳖肉4.5两，川芎9钱，红花9钱，白芷9钱，黄柏5钱，桃仁9钱，浙贝母9钱，防风9钱，花柳9钱，柳枝1.5两，蜈蚣40个，归尾1.5两，甘草9钱，梔子3两，角刺9钱，白芷4钱，槐角9钱，桑枝1.5两，黄芩9钱，黄连9钱，山甲9钱，羌活9钱，白薇9钱，大青3两，川乌1.5两，槐枝1.5两，用黑麻油10斤，飞净黄丹90两炒过，先将各药放在油内浸10余日，用文武火煮至药枯去渣，又将油滤清入锅内再煮至滴水成珠，又将黄丹落在油内再煮成膏，将油离火过盆后，加入下列药末，捣至混匀，去清火毒合用。配药：血珀、川连、牛黄、朱砂、血竭、梅片、田七、儿茶、麝香、珠末、乳香、雄黄精、水石、没药，共为细末。（中山石岐郑寿彬献方）

4. 淋巴腺炎 桃叶1把捣烂，炒后拌红酒敷患处，涂数次可愈。（《福建中医秘方》）
5. 夹色伤寒 桃树皮去青2两，甘草5分，淡豆豉5钱，煎服即愈。（云津梁国球献方）
6. 盗汗 桃叶适量，煎水沐浴。（罗式同献方）
7. 马上风（此症为性交后腹痛） 桃树皮1两，红苘麻根1两，麻头根5钱，煎水冲酒内服。（普宁大坪卫生院献方）
8. 撞红 桃子叶5钱，杨桃叶5钱，龙眼叶心5钱，扁担子5钱，共捣烂冲酒榨汁，加蜜糖蒸服，连服数次即愈。（湛江市陈辉南献方）
9. 妇女月經閉止 桃叶4两，研碎煎水服。孕妇忌用。（中顺县徐俊杰献方）
10. 妇科血崩 桃树寄生叶20余片，捣烂敷两足心，约15分钟，其血即止。（坛城王祖謀献方）
11. 小月风（小产后头痛骨酸痛） 桃树寄生1握，水煎冲酒服。（五华孔林安献方）
12. 胞衣不下 桃树寄生为末，用水调制成团，敷贴脐下。（合江唐敬南献方）
13. 牙龈出血不止 桃木根、酸醋，将桃根去粗皮，煎水冲醋含之，随含随吐，不可吞下，每日含8~10次。（阳江绿管医院陈寿乔献方）
14. 口腔炎 桃树皮和米泔水合煎，用药棉蘸拭口腔。（中顺县保生献方）
15. 石硬 桃叶和盐合捣烂贴患处，24小时即愈。（中顺县达顺献方）
16. 疔疮（毛脚疔、面部疔、鼻疔） 用桃叶和黄糖，或油茶叶，或活地龙，捣烂敷患处。（海丰县刘家炎、盛敢、英德阮仕求，湛江市霍济龙等献方）
17. 腰疮
 - (1) 生桃叶捣烂，和入猪油，再捣匀贴患处，初觉痒难忍，继则缓和痒止。本方治足部腰疮更验。（广州中医学院进修部洪水生献方）
 - (2) 桃叶、红糖，捣烂敷患处。治对口疮良效。（刘举兴献方）
18. 飞擦致头面手足俱肿
 - (1) 白桃树皮2.5两，杨桃叶适量，煎服或煎水洗。（英德县潘洗半边街吴开明献方）
 - (2) 桃叶、黄菊花各5钱，蛭肉7个，上药和红糖共捣烂敷患处。（兴福乡卫生院黄剑琴献方）
19. 白痢 桃叶10片，捣烂擦之。（和平县曹仅吉献方）
20. 蛇咬（饭罐头） 桃树皮2两，煎水服。
21. 跌打重伤 桃叶一握，白糖2两，捣烂冲童便1碗服。如牙关紧闭时灌下，即醒。（兴宁石堆献方）
22. 接骨 桃叶4钱（干），杉木炭5两，刘寄奴1斤，共为粗末，用酒调敷，如红肿胀者用油类或蜜糖调敷。（广州中医学院进修部）

除四害

1. 杀孑孓

(1) 用桃叶捣烂，加水浸泡，或加热煮煎4小时，即成水煎液。试验杀孑孓幼虫，每公斤水3克，24小时死亡80%；每公斤水10克，12小时全部死亡。（广东省卫生厅卫生防疫局土农药杀虫毒鼠介绍）

(2) 在每平方尺污水中投桃叶12两，一般于24小时内即可全部杀灭。（《中医医刊》1959年2月号陕西省资料）

(3) 将桃叶制成20%浓度，33小时后100%死亡，若浓度为0.4%，24~48小时，89%死亡（安徽）。将桃叶制成10%浓度药液，20小时全部孑孓死亡（陕西）。以鲜毛桃叶，加水煮沸后，再煮15分钟，更浸48小时过滤，将滤液制成5%浓度的药液，放入孑孓，24小时有80%死亡，48小时有88%死亡（中国医学科学院病毒系）。据昆虫所试验：四川省达县的桃叶用20倍水浸液，对孑孓的杀虫率为3.3%；用100倍酒精浸液为38.9%；山东平原的桃叶杀虫率分别为0%及10%；安徽阜南的桃叶杀虫率分别为4.4%及31.1%。（《中国土农药志》）

2. 灭蝇蛆

(1) 鮮桃叶切碎,投入粪坑,可以杀蛆。(《中国土农药志》山西資料)

• (2) 將桃叶搗碎加水浸泡,或加热煮煎4小时,用以灭蝇蛹效果也好,24小时达90%死亡。(广东省卫生厅卫生防疫局土农药杀虫毒鼠介紹)

(3) 把桃叶切碎投入粪坑内灭蛆。(《中級医刊》1959年2月号辽宁省、山西省資料)

文献考証

1. 明代李时珍撰《本草綱目》載桃叶曰:疗伤寒时气,风痹无汗,治头风,通大小便,止霍乱腹痛。

2. 現代胡眞撰《山草药指南》載桃树曰:凡妇人阴部作虫痒或生油蟻;取叶搗烂,綿裹納入阴中,日易三四次,其虫蟻自灭而痒止。凡患腿肿,用桃梗8两,牛蒡子根2斤,牛七2斤,慢火熬成膏如飴,每次热酒冲服一匙,在飯前飲最佳。春季清晨摘取桃花之将开者,放在飯鍋上蒸熟,焙干,連蒂入药,能凉血解毒,凡痘疹症最适用。

3. 現代陈立翔撰《广西中兽医药用植物》載桃叶曰:治牛蛆胞(子宫内有生)症;脚生沙虫;喉风症;难产;生疮;生瘤;蹄疫(杏甲)。

茶 麸

Camellia sinensis (L.) O. Ktze.

科属形态 本品系山茶科茶属中的一种小乔木的蒴果榨油后的副产品。市面供应有厚片薄片二种：厚片圆厚，表面混粘稻草；薄片圆薄，表面混粘稻谷壳。为秋末冬初收油茶种子压去油后所留存的残渣，内含树脂、单宁、皂素、蛋白、纖維等物，用本品舂成細末，篩去粗糠后收貯候用。色为淡褐黄色至深褐黄色。

生长环境 多栽培于丘陵地带，不論山麓、山腰、山顶，紅黃土壤，粘質松硫酸性土，阳光充足的地方均能生长，以向南方者为佳。

产地分布 印度、越南至我国。我国中部、西南部、南部一带栽培极广，本省以东江、北江山区为多产区，其次西江的郁南，南路的茂名亦有产。

药用部分与气味性能 嗅微有油脂辛腥气，味辛苦涩，性有小毒。能除垢滌污，驅湿杀虫，湿疹痛痒。內服必須煨存性，否則有劇烈催吐作用。其油可調藥，又能驅風。

临床应用

1. 心气痛(包括寄生虫心腹痛) 茶麸适量，煨存性为末，取水一大碗，煎沸送服。(赵式訓献方)
2. 夹色伤寒
 - (1) 茶麸2錢煨黑，生盐1錢炒紅淬水，煎服。(德庆何溶科献方)
 - (2) 茶麸炒4錢，木槵子煨燒炭4錢，蠟肉4兩，煮食。(郁南县孔灿南献方)
 - (3) 茶麸2~3兩，用法：先准备冷开水一碗，然后以鉗把茶麸鉗入爐內燒至紅色无烟，就即放入預备的冷开水中，攪勻澄清服之。(湛江市何仲文献方)
 - (4) 茶麸2~3兩打碎，用清水2碗，煎至一碗，溫服。服后約一小時便大吐，吐后可愈(如到3~4天，將此药煎服，当药入口不觉涩者便屬对症)。(海南島袁濂非献方)
3. 子宮脫垂 茶麸4兩，黑醋1斤，煎湯先熏后洗。同时內服补中益氣湯加酸牡蠣1兩。
4. 带状疱疹(又名蛇疱疹，痛痒异常) 茶麸粉1錢，木槵子肉5錢，血余炭5分，黃連2錢，雄黃3錢，冰片3分，白糖1錢，共研細末，用米漿煮糊調藥，先用紅色耳榜菜煎水洗后敷上药。(中山高亮春献方)
5. 阴囊湿疹 茶麸2兩，青蒿5錢，煎水5錢，煎水洗患处良效。(广州甄厚南献方)
6. 蛇头瘻指(瘻道) 茶仔末，槐水各适量，調成稀糊狀外敷，在敷药前先用以上二味煎水洗滌局部。(赵式訓献方)
7. 嘴角疽 油茶叶、桃树叶、黃糖，搗烂敷患处。(英德洛洗卫生院阮仕來献方)
8. 毛虫疮 茶麸5兩，蒼耳子3兩，煎水浸患处，以后再用下药研末搽上患部：雄黃1兩，白矾3兩，北細辛3兩，槐花4兩，荆芥3兩，川足2条，川烏2兩，草烏2兩，共为細末候用。(苏崇怡献方)
9. 小儿阳具紅肿 茶仔、雞屎藤、辣蓼，煎水洗之。另用吹火竹筒吹之更好。(中山县梁炳財献方)
10. 小儿臉部生瘡 用茶油涂于患部，日涂數次，經數日可愈。(广州中医学院进修部金宗文献文)
11. 小儿蛲虫瘡 茶仔、香艾，煎水洗患处。
12. 湯火伤 茶油、鴨蛋白、百草霜，共攪勻搽伤处。(兴宁凌奇輝献方)
13. 跌打 茶麸4錢，酒糟2兩，將茶麸用火煨研末，加上酒糟，調勻敷患处。(龙川石金献方)
14. 石硬 熟烟1兩，茶子麸5錢，新蕩草5錢，白醋2兩，用水5碗煮沸10分鐘，取湯浸患处。(湛

江市罗炳聪献方)

15. 铁钉刺伤脚底 茶油跌和桐油搗敷患处, 釘刺自出。(徐闻县林有成献方)

16. 魚骨刺伤 茶跌 2 錢, 食盐 2 錢, 黄皮核 10 粒, 上药共搗烂敷患处即愈。(合浦袁偉廷献方)

除四害

1. 灭蚊蝇

(1) 茶跌加水煮沸約 30 分鐘, 使用溶液倒入粪坑, 或过滤后用噴霧器噴洒, 或将茶跌研成粉状, 与石灰等其他药物混合成粉剂噴撒。效果: 試驗三节吻庫蚊幼虫, 每公斤水 1 克, 8 小时 50% 中毒, 24 小时全部死亡。試驗蠅蛆, 每公斤粪便 200 克, 24 小时死亡 79%。(广东省卫生厅防疫局土农药杀虫毒鼠介紹)

(2) 广西玉林专区商业局召集几个县及专区商业局制药厂會議介紹, 以茶跌 1 斤, 碾成粉剂, 放适量清水煮沸 0.5 小时后, 用于 70 担水的积水中, 杀虫有效期半个月。适用于温粪池及蚊蝇孳生地的处理。(《广东省消灭瘟疫工作茂名現場會議資料汇编》)

(3) 布渣、茶跌合剂 布渣 2 份, 茶跌 1 份, 混合, 加水 6 份, 煮煎 1 小时, 冷却去渣后, 即成水剂。杀蚊蝇及农业害虫蛀心虫。(《广东中医》1959 年第 1 号)

2. 灭子丁

(1) 以茶跌研粉投入污水, 100 斤污水用 2 两, 經 24 小时, 有效率达 100%。(《药學通报》1959 年 4 月号, 山西、四川、广西、广东等省資料)

(2) 用茶跌 20 倍水浸液对子丁的杀虫率为 100%, 用 100 倍酒精浸液杀虫率为 51%(昆虫所試驗), 以茶餅 0.8% 濃度 48 小时子丁全部死亡(陕西)。(《中国土农药志》)

3. 灭蛆 5% 浸出液灭蛆, 24 小时死亡率达 100%。每担粪加茶子餅 2~4 两, 用力攪拌, 20 小时后, 蛆可全部杀死。(《浙江杀虫植物图說》)

4. 灭釘螺

(1) 江苏省血吸虫病防治所用茶子餅制成浸膏粉、粗制皂素、茶子餅浸液等三种制剂对釘螺尾蚴进行杀灭試驗結果:

各种制剂对釘螺尾蚴之作用

浸膏粉、粗制皂素及茶子餅浸液灭螺效力之比較(温度 14~20°C)

作用時間(小时)	浸膏粉溶液 (1%)	粗制皂素 (ppm)			茶子餅浸液 (1%)	对 照
		1	10	50		
24	0	0	0	0	8.8	0
48	88	0	18	66	70	0
72	100	0	48	40	96	0

1. 在 30~35°C 1% 的浸膏粉液, 10 ppm 的粗制皂素及 1% 的茶子餅浸液均能使浸于其中的釘螺(每組 30 只)全部死亡。

2. 粗制皂素与茶子餅浸液杀灭尾蚴效力的比較: 十万分之二的粗制皂素溶液, 在 28 分鐘使 10 只尾蚴全部死亡; 万分之一的茶子餅浸液, 在 29 分鐘使 14 只尾蚴全部死亡。

3. 茶子餅之揮发性物質对釘螺无致死作用。

(2) 上海第一医学院卫生系以茶子餅浸液抑制釘螺开卵的試驗, 以二万分之一的浸液使 80% 以上的釘螺閉卵, 稀釋度虽高至八万分之一时, 仍略有抑制开卵的作用。茶子餅浸液抑制釘螺放逸尾蚴的試驗, 以感染血吸虫之釘螺放于不同濃度茶子餅浸液內, 在 25~30°C 观察有无尾蚴逸出。茶子餅浸液量稀釋至 1:40,000, 仍能抑制釘螺放逸尾蚴。茶子餅浸液杀灭尾蚴的試驗, 以新逸出的血吸虫尾蚴投入不同稀釋度之茶子餅溶液內, 在不同温度下观察尾蚴死亡情形, 結果見下頁表。

(3) 茶子餅浸液抑制尾蚴感染終宿主的試驗, 1957 年 10 月 7~14 日在皖南績溪县楊柳村 就水田一块进行試驗, 試驗期間温度为 17~28°C, 田中澆水深 10 厘米, 故意放入釘螺数万只, 加茶子餅粉之量

在不同溫度下不同稀釋的茶子餅浸液杀灭尾蚴所需時間

8~6°C			18~18°C			80°C		
茶子餅溶液	試驗尾蚴數	全部死亡時間	茶子餅溶液	試驗尾蚴數	全部死亡時間	茶子餅溶液	試驗尾蚴數	全部死亡時間
2:100	40	20分鐘	1:100	26	10分鐘	1:100	19	5分鐘
1:100	40	30分鐘	1:1000	26	80分鐘	1:1000	28	80分鐘
5:1000	40	60分鐘	1:5000	27	4小時	1:5000	40	60分鐘
5:10,000	72	4小時	1:10,000	14	7小時	1:10,000	23	2小時
1:10,000	64	22小時*	1:20,000	22	24小時	1:20,000	42	8小時
			1:40,000	80	46小時*	1:40,000	23	5小時
			1:100,000	25	46小時*	1:100,000	45	8小時
			清水對照	19	46小時*	清水對照	23	8小時
					死16條			死27條

* 是次日或再次日的第一次觀察結果。

茶子餅浸液杀灭尾蚴的作用，不仅同浸液濃度有关，亦同溫度有关，在較高的溫度中尾蚴死亡亦較快。

按田中水量二萬分之一計算。撒后用竹竿攪和田水使粉均勻分布。于撒粉前，撒粉后即時，撒粉后2小時，4小時，1天，2天，3天，5天，7天，分別用小白鼠使與水面接觸4小時，然后飼養40~45天，解剖檢驗。撒入茶子餅粉2小時后，田水即失去其感染性，自該時起無感染期至少可維持3~4天，第五日虽有感染發生，但仍甚輕。對照田中之水使小白鼠100%感染。

(4) 茶子餅粉綁腿布作个人防护的試驗。以寬7厘米的綁腿布二條，一面密密撒上茶子餅粉一層(30~50克)，再以一條綁腿布蓋复其上，即成一夾層的綁腿布，綁在兩腿上，由膝至膝，試驗者在田中走步8小時，每小時自綁腿布剪下樣布兩小塊，分為雙層、單層及外單層三種，各放在剃過毛的鼠腹上，并各以尾蚴50~60條隔布感染半小時，并一月后剖驗，結果茶子餅粉綁腿布在稻田中經過8小時蹣跚之后，不論單層或雙層布樣塊均能保護小白鼠不被尾蚴感染。另將撒有茶子餅粉之綁腿布綁在一段毛竹筒上代替人腿，放在流動河水中，照前項試驗中所用之方法，每小時剪下綁布一小塊(雙層)，移放在小白鼠腹上，用尾蚴50~60條進行人工感染，觀察剪下之布有無防禦尾蚴鑽過之作用，連續採樣八次，試驗之鼠發養一月余之后剖驗，結果各次剪下之布均能防禦尾蚴感染。

(5) 江苏省血吸虫病防治所進行茶子餅个人防护實驗，从初步實驗結果來看，茶子餅杀灭尾蚴的效果很好，0.2%的懸液，6分鐘即可杀死全部尾蚴。50%茶子餅凡士林軟膏，有显著的防护作用，但由于軟膏粘性較差，經摩擦后的效果如何，尚待進一步研究，或尚須考慮其他制剂方式。茶子餅塊及茶子餅粉石膏磚懸入水中，或可用于安全用水，由于作用較慢，用量至少在0.4%以上，流水中的作用，尚待繼續觀察。茶子餅撒入布袋，每平方公尺用35克的量即足以防止尾蚴感染達5.5小時，流水情况下的作用，尚待觀察。茶子餅毒性不高，小白鼠尾部塗藥一月后，无不良后果發現，对塗藥者的手指亦无刺激作用。現場實驗尚未結束，結果待以后報告。(以上預防血吸虫實驗資料摘自《血吸虫病研究資料匯編》)

(6) 天釘螺48小時死亡率达100%。每亩用茶子餅25~30斤，敲碎，加熱開水2倍，2小時后再加水5~10倍稀釋，倒入田間，15分鐘后尾蚴可全部死亡，每周施用一次。(《中級医刊》1959年2期《除四害的野生植物》)

(7) 5%濃度浸出液灭釘螺，48小時死亡率达100%。(《浙江杀虫植物圖說》)

文獻考証

1. 明代李時珍撰《本草綱目》載茶子曰：苦寒，有毒。主治喘急咳嗽，法疾痞，癰仁洗衣，除油膩。

2. 現代陳立卿撰《广西中藥藥用植物》載茶油曰：除供人食用外，又可供藥用，如小雞仔耳內有虫害，每當夜晚，就有叫声，不治則易死亡，治法：用茶油滴入雞仔耳內。用茶油治牛眼胆症；水瀉症；脚生沙虫；癩症(生蠟)；痢症(紅白痢)；炭疽(脾脏病)；伤寒(傷風)症；氣腫疽(筋脾、黑腿)；眼吃野猫屎中毒。雞痘(痢症)。

奧 藜 藿

附：土荆芥

Chenopodium ambrosioides Linn.

别名：土荆芥(西药译名)，杀虫芥，鉤虫草

科属形态 本品系藜科藜属中的一种一年生直立分枝草本；高80~100厘米，茎有縱槽紋，被腺毛，揉之有一种不快的气味。单叶，纸质，互生，具短柄，着生在茎基部的叶为矩圆形至矩圆状披针形，长3~16厘米，边缘有不规则的鈍齿及波浪形，着生在茎上部的叶较少，边全緣，逐步变狭小而成綫形或綫状披针形的苞片，叶背有腺点。夏秋間頂生或腋生小花束，排成分枝或不分枝的穗状花序，再汇成具叶的圓錐花序；萼片5枚，有时3枚；雄蕊5枚，花絲分离，花药内向，黄色；子房上位，1室，扁圆形。花后結胞果，长不及1毫米，包藏在萼內。

生长环境 村落附近曠地，田边較低湿地方，表土有适当自然肥即易繁茂，各种土壤均可生长，喜生于瓦砾地混有腐草或垃圾地方。夏末秋初收采，如遇雨天或早晨收采能降低有效物质含量。

产地分布 广布热带及温带地区。我国南北各省均有分布，本省各地普遍，丛生。

药用部分与气味性能 莖叶。除阴干可直接使用治疗外，尚可制成油剂。气有奇异嗅，味辛微苦。能杀虫驅虫，驅風消肿止痒。

临床应用

鉤虫病

(1) 藜科土荆芥阴干，不用太阳晒，采集嫩叶、嫩枝和种子，研細末做成药丸，一般治疗成人每天早晚各服1錢，連服3~6天。过去，我們根据安流地段医院使用这个方法，按病的程度决定，有服一天以至到六天不等，经过显微镜观察，治疗效果良好，其优点是服此丸时可不服泻药便可达到驅虫目的。本品也已制成油剂，疗效与进口貨相同。(五华县人民医院献方)

(附注) 五华县这經驗，已在省推广，近该县又改进服用方法，用鮮土荆芥榨取自然汁服，疗效巩固而提高。

(2) 藜科土荆芥1斤，煨制針砂皂矾各半斤，茵陈1两，香附1两，陈皮1两，研末加糖为丸，每天服3次，每次服3錢，連服10天。(五华張爱华献方)

(3) 根据广西僮族自治区岑溪县中医公开用鉤虫草(藜科土荆芥)治疗鉤虫病有效，經防疫站試用，疗效仅次于四氯乙炔。且此药还可驅蛔虫、蟯虫。该县已大量种植，供炼油之用。

土 荆 芥

唇形科土荆芥(别名紅花月味草)，为一年生纖細芳香草本。直立，高20~50厘米，徑2~3.5毫米，嫩莖4棱，老莖圓形，被短柔毛，分枝，枝条向上斜出。单叶，纸质，对生，綫状披斜形，长1~2厘米，寬3~6毫米，前端漸尖，基部楔形，边缘疏生細齿；叶背及叶面具短茸毛，有油腺体，主脉显露；叶柄长5~8毫米，柄面有綫槽，柄背则为半圓形，均密被茸毛。秋季頂生总状花序，序长1~2厘米，全徑8毫米；花冠粉紅色或白色，柱头扁平，2裂，子房上位，花柄长约1毫米；萼5裂，宿存，裂片針状，密被短茸毛，內

面秃净。花后结实圆形，细小。广东于秋季采收作西药子出售。另有一种普通称大荆芥，又名野荆芥，形态比本品为大。疗效接近。喜生于干燥坡地、山岗上阳光充足地方，全省普遍可见。药用花叶及嫩枝，气香，味微辛，性微温。能发汗解热，疏风消肿止痒。

1. 肺积水

(1) 红花月味草(唇形科土荆芥)适量，煮猪肉食之。(惠阳张圣生献方)

(2) 土荆芥成人量日服茎叶粉5钱，3次分服。(五华献方)

2. 疥疮 唇形科土荆芥开花时采摘候干，蛇床子，二味酌量，研末擦患处。(普宁大坪卫生所余达明献方)

3. 马眼疮(生于眼眦阳白穴，色瘀黑由头肿至胸部) 用土荆芥、马蹄子二味捣烂敷之即愈。

4. 天蛇疮 土荆芥酌量，和红糖捣烂敷之即愈。(梅县梅城罗绍荣献方)

5. 痢疾 土荆芥4两煨存性，以水2碗，煎至1碗服。(揭阳朱泉生献方)

6. 慢性肾炎 土荆芥、柚叶、香附、桃叶、半枝莲等分，煎水加醋洗之。(揭阳陆恒才献方)

7. 跌打伤 土荆芥、满天星、金耳环、金边香各3钱，独行千里7钱，竹叶8钱，延胡、三棱、牛膝、杜仲、川断、莨菪各3钱，共为细末备用，如关节扭伤等先以手法正骨后，则用此药粉调酒或调开水敷患部。如关节扭伤而引起成为关节炎时，用生地龙7钱研烂，加葱1两，煎水调上药末敷之神效。(中山石岐刘庆桥献方)

8. 毒蛇咬伤 土荆芥、红脚笔、半边莲、山靛蓝、山芋合、胡椒根、纳降藤、鹤脚笔，共捣烂敷患处。(揭阳梅岗蔡俊良献方)

文献考证

1. 清代何克廉撰《生草药性备要》载土荆芥曰：味辛，性温，善于驱风止痛，宜煎水洗；小儿麻痘脱唇洗之，胜于靛水。

2. 现代胡翼翥《山草药指南》载土荆芥曰：味辛，性温，小儿麻痘脱唇后煎水洗，胜于靛肉水，能祛风杀虫。

3. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载土荆芥曰：味辛，性温，祛风止痛，宜煎水洗；小儿麻痘脱唇后，洗此胜于靛水。

4. 现代陈立群撰《广西中兽医药用植物》载土荆芥曰：治牛眼膜症；水泻症；风湿症；出痘；胎衣不下；腰膝症；并可治牛海虫症；慢性炭疽；气肿症；暑热症。

〔附注〕 以上文献考证俱系唇形科广东品种的土荆芥。

除 虫 菊

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.

科属形态 本品系菊科菊属中的一种多年生柔弱草本，被灰色柔毛，分枝少，高30~60厘米。叶互生，纸质，单叶，轮廓矩圆形至卵形，连柄长30~60厘米，羽状分裂至中脉上，每一裂片再行羽状深裂而成线形短尖的裂片，两面均被灰色短柔毛。春夏间顶生头状花序，直径2.5~4厘米，着生舌状花和管状花，舌状花雌性，排成一轮在外缘，扩展成倒披针形，白色，先端钝，具脉，长约5毫米；管状花多数两性，长约8毫米；萼管与子房合生，萼裂齿状，花冠管状，5齿裂；雄蕊4~5枚着生在冠管上，花药合生；子房下位，1室有胚珠1颗。花后结瘦果，近圆柱形而有棱（翅），长4~4.5毫米，顶冠以鳞片的杯状物。

生长环境 系栽培植物，一般土质均可繁殖。在花开时应立即采摘，过早过迟都使有效成分降低。由于品种的不同以及气候、土壤等其他因素影响，所含有效成分有所不同，一般在0.8~1.4%之间。

产地分布 我国华北栽培较多。

药用部分与气味性能 花或全株。各种除虫菊均能溶于石油等有机溶剂，若较长时间的接触到日光、空气、碱等均能使之失效。除虫菊对于人及其他温血动物的毒性极低，使用甚为安全。

除四害

1. 灭蛆 用除虫菊花制成蚊香可驱蚊。（《中国土农药志》贵州资料）

2. 杀孑孓

（1）据昆虫所试验：20倍水浸液对孑孓杀虫率为100%，100倍酒精浸液杀虫率为100%。（《中国土农药志》）

（2）除虫菊粉末75克，石油1.8公升，浸粉末于石油中，密闭二昼夜，用稀布滤过。本液滴于污水，可杀孑孓，在室内喷射，可杀蚊蝇。（徐国钧、赵守训编著《生药学》）

3. 驱蚊蝇

（1）将除虫菊粉制成蚊香燃点可驱蚊蝇，但除虫菊不易挥发，且遇热易被氧化，故效力不大。其配制法：1）除虫菊20，除虫菊茎叶粉30，香粉40，糊料9，颜料7。2）除虫菊茎粉20，锯屑20，将上各种材料混合，加适量水，调成糊状，制成盘香或条香。（徐国钧、赵守训编著《生药学》）

（2）除虫菊花20%，榆树皮30%，除虫菊落叶30%，一起研细，用开水调匀压成圆形条状蚊香或盘香，熏5分钟，蚊子即掉下死亡。（《中级医刊》1969年第2期）

（3）取花2两，以石油1升浸2日，所得滤液和肥皂粉12~15钱，以水5合为乳剂，临用稀释2~3倍，滴入污水可杀孑孓，室内喷射可杀蚊蝇，研成粉末制成蚊香可驱蚊。（《浙江杀虫植物图说》）

〔附注〕 贮藏与保管：除虫菊花经采收后，如能在日光下迅速晒干，其所含的除虫菊素并无显著的分解，如以热气加热，温度过高则除虫菊分解失效，故温度必须保持在60°C以下。干燥程度以用手指可碾碎为限。干燥的除虫菊可装在麻袋中，或最好放在密闭的桶中贮藏，贮藏时间一年以后，则有30~38.4%的除虫菊可能分解。

(4) 以花4两,加1斤火油,浸48小时后,制成5%液体喷酒。又用花1分,茎叶2分,樟树皮7~9分,加火油、胶水制成蚊香,烟熏。(摘自《药学报》1959年7卷4期)

(5) 1)研碎,配成杀虫剂,烟熏。2)晒干捣碎,制成蚊香,烟熏。(《药学报》1959年4月号)

(6) 将花、茎、叶,晒干研粉制成除虫粉喷酒或蚊香烟熏。又可用花2两,石油2升,浸2天,滤液加肥皂粉做成乳剂,喷酒时稀释2~5倍。(《药学报》1959年4月号)

野菊花

Chrysanthemum indicum Linn.

别名：路边黄菊，甘菊，黄菊仔，野黄菊

科属形态 本品系菊科菊属中的一种多年生宿根草本。茎直立或斜举，高60~100厘米，生在低草丛中或低疏灌木林边，多分枝。单叶，纸质，互生，卵形至椭圆状卵形，长4~9厘米，宽4~5厘米，前端作大锯齿状，边缘有不整齐的羽状分裂，裂片每边复有浅裂或不整齐的锯齿2~3个，基部楔形，叶面深绿色，背绿中带灰白色，两面均有短柔毛，唯背面较密；叶柄前端渐作翅状延下，柄长1厘米，有短柔毛。夏秋季腋生及顶生头状花序，作伞房花序式排列，有长梗，每一头状花序直径1.5~2.5厘米，绿花1~2列，雌性花冠为舌状，舌扩展，黄色，长于花柱3倍，内层的花冠为筒状，先端五齿裂，尖头，内有聚药雄蕊，围绕花柱；雌蕊1，冲出花药之上，柱头2裂，开展而微曲；子房下位，无冠毛；外苞片革质而中央被短毛；内苞片全膜质，卵圆形至椭圆形；总苞宽约12毫米。花后结瘦果，颇短，微曲，稍黑色。

生长环境 生于河边、树边、路旁、山岗台地、坡地、杂草丛中，不论粘土、沙土、酸性土或钙质土，稍有自然有机肥便能蔓延生长。耐旱力、适应性都很强。夏季采叶，夏秋采半开的花蕾。

产地分布 我国及日本。我国如江苏、浙江、福建、台湾、云南、贵州、四川、湖南、湖北、江西、安徽、河北、甘肃、广西、广东等省均产，本省各地均有分布，普遍，散生或丛生。

药用部分与气味的性能 花、叶。气香，味甘微苦，性平。能清胃腑积热，宜透外感伏热，有清热解毒之效。

临床应用

1. 高血压病 上海第二医学院附属广慈医院将野菊花制成流浸膏，每毫升含生药2克；由于味苦，加糖浆制成合剂，每毫升野菊花流浸膏加单糖浆5毫升。因野菊花有毒性，为慎重起见，开始每次用5毫升（等于野菊花浸膏1毫升），每日三次。以本法治疗高血压病38例，男性23名，女性12名。31~60岁病例82.8%，30岁以下60岁以上者各3例。病程1年以下者9例，1~2年者11例，2~5年者9例，5~10年者6例。其中4~5年者为75%，属于早期者22人，晚期者13人。治疗效果附表说明如下：

降 压 情 况 米 氏 分 期	显 著 有 效	有 效	无 效 或 效 果 不 显
I 2	2	8	8
II 1	4	7	8
III 2		7	4
IV 1		1	1
总 人 数	6	18	11
百 分 率	17.14%	51.43%	31.43%

症 状	头 眩	头 痛	眩 暈	失 眠	心 悸	眼 花
病 例	9	14	15	9	6	3
改 善 例 数	7	7	8	8	1	2
改 善 百 分 率	77.7%	50%	53.3%	88.8%	16.6%	100%

根据上表的情况,野菊花对高血压症状改善很显著,如头痛头眩失眠等都有良好作用,尤以对失眠有良好影响,計九人中有八人改善和消失。又在野菊花应用过程中,未发生任何毒性反应,病人服药后没有什么不适。初步临床观察,患者疗效率为68.57%,早期病人的疗效率为72.72%。症状改善显著,证明历代祖国医学家对于肝阳之头痛头眩的诊治,确有丰富的临床经验。(《医药卫生快报》1959年20期)

2. 防治脑膜炎

(1) 野田边菊4钱,熟石膏3钱,煎水一饭碗,每日服1次,連續服5天以作預防。

(2) 田边菊、薑根、大青叶,每周服1次。

(3) 野菊花3钱,甘草1.5钱,鮮薑根5钱,金銀花3钱,薄荷1钱,淨水煎服。(以上三方,《医药卫生快报》1959年17期长沙市卫生局資料)

3. 催生 路边菊8钱,捣烂炒黑,用酒水各半煎服即产。(郁南施义献方)

4. 狂犬咬伤 路边菊2两,豆腐2块,清水煎服。(德庆何立卿献方)

5. 妇人乳瘤

(1) 路边菊叶加黃糖捣烂敷患处,效良。(怀集紅旗公社莫祿元献方)

(2) 用路边菊1握,煎水熏及热敷患处。(怀集徐以慰献方)

(3) 野菊花叶适量,捣烂和酒煎热服3~4次,渣留作外敷患处。(丰顺县陈子芳献方)

6. 瘰癧 野菊花根捣烂,用酒煎服,渣外敷患处。

7. 一般瘰癧

(1) 田基菊花1两,丁哥王叶2两,馬蹄香1两,生猪油5钱,将上药捣烂敷患处。(广州中医学院进修部丘載新献方)

(2) 野菊花适量,捣烂敷患处。亦有合黃糖同捣使用。(梅县中医院張紹农,江門張子潤,广州中医学院进修部王煥昭,平远石子凌巧玉献方)

(3) 野菊花5公斤(除根),用淨水煎1小时,压去渣取汁,隔水濃縮至1000毫升,待冷加防腐劑便成。用时以药棉吸野菊花液溼敷患处。本方对一般无名肿毒及疮癤,能使消散,或膿出后而愈,愈后疮口平复。(《江西中医药》1957年9月号)

8. 疔疮

(1) 野菊花和黃糖捣烂贴患处,如生于发脚(际),加梅片、生地龙同敷。(汕头中医药研委会献方)

(2) 先用銀朱少許水調涂疮面周围紅肿处,然后再用野菊花叶适量,生硃5~7粒,連壳捣烂,和黃糖敷1~2服即愈。(張敏九献方)

(3) 野菊花茎和人乳同捣烂加黃糖少許,調勻外敷。(蕉岭丘凱英献方)

(4) 野菊花、蒲公英、紫背天葵子、金銀花、紫花地丁各3钱,水煎冲酒1两温服。服后蓋被取汗方效。外用雄黃、白矾各等分为末,清茶調涂患部。(民間經驗方)

9. 跌打扭伤筋腫痛

(1) 野菊花、酒糟同捣烂敷于伤处,或晒干研末同黑沙糖調敷。(《江西中医药》1957年12月号)

(2) 野菊花連根晒干1两,水煎冲童便与酒少許服。(梅县黃曉修,江門叶子榮献方)

(3) 野菊花(全草)秋月采之,挂糖前当风处阴干,研极細末,每次服3钱,以开水和米酒冲服,跌打

不醒人事服 1~2 次即能苏醒。(东莞麻涌中心医院陈本源献方)

10. 蛇咬伤 路边菊、方苦草、紫背金牛、两面针、人字草、乌柏头、半边莲、麒麟草、洋胆草、石榴叶、膨麒麟草,上药各适量,炒黄,用好酒冲服,药渣敷患处,立愈。止痛加田基黄,消肿加析仔根。(三水周天池献方)

11. 蜈蚣咬伤

(1) 野菊花根研末,或咬烂敷伤口四周。(湖北雷运楷献方)

(2) 生路边菊酌量用酒炒,捣烂外敷患处,能止痛消肿。

除四害

1. 灭孑孓

(1) 将野菊花浸液 10% 的用量,加入有孑孓孳生水中,在 96 小时孑孓全部死亡。(<中国土农药志>四川叙永县资料)

(2) 据昆虫所试验: 20 倍水浸液对孑孓杀虫率为 13.3%, 用 100 倍酒精浸液杀虫率为 82.2%。(<中国土农药志>)

2. 灭蝇蛆 将蝇蛆放在 10% 浸液中, 48 小时可有 25% 左右的蛆死亡。(<中国土农药志>四川叙永县资料)

文献考证

1. 明代李时珍撰<本草纲目>载野菊花曰: 治痢肺疔毒, 瘰癧眼道。

2. 清代赵寅谷撰<本草求真>载野菊花曰: 气恶味苦。茎叶并用, 同甘草浸煎, 治五疔, 杨梅疮, 血衄疔尤宜, 以诸疔皆肝经风火之毒也。

3. 现代肖步丹撰<岭南采药录>载路边菊曰: 味甘性寒。治疔疔疮, 捣烂酒煎服, 渣敷患处; 又治疔疽大毒疮。其根捣烂和蜜, 敷属咀疔效, 为解毒之妙药。

4. 现代胡佩瑛撰<山草药指南>载路边菊曰: 味苦性寒。煎水服, 止妇人五带及白浊。捣敷疔疽甚效。捣烂酒煎服治疔疔, 渣敷患处。根捣烂和蜜糖敷属咀疔甚效。

5. 现代陈立群撰<广西中基医药用植物>载野菊花曰: 治牛黄腺症; 眼腺症。亦治慢性炭疽; 血疔疮。

曼陀罗

Datura metel Linn.

别名：广东闹洋花，风茄儿，金盘托荔枝

科属形态 本品系茄科曼陀罗属中的一种直立分枝、粗壮草本或亚灌木；高0.5~2米，秃净或略被毛，茎的基部通常木质化，幼枝略带紫色。单叶，纸质，互生，着生在上部的叶常呈对生状，卵形至矩圆状卵形，长9~18厘米，先端渐尖，基部两侧不相等，边微波状或不规则的浅裂或每边有3~4短齿，主脉及侧脉在叶下面突起，侧脉每边有4~6条，近边缘处向前转曲而呈网状结合；叶柄长1.5~4厘米，近圆柱形，上部中央有浅槽。全年四季在叶腋或在枝分叉之处生花，花有长约8毫米的花柄，花萼圆筒状，黄绿色，长约5厘米，直径1.5~2厘米，先端5裂，裂片有时再裂，三角形，萼筒随花而凋萎，但须隔数天始于近基部处周裂而脱落，其残留部分随着果实的成长而略为扩大，呈浅盘状，绿白色，不脱落；花冠白色漏斗状，长达15厘米，喉部直径约8厘米，渐渐向上扩大，开放时呈喇叭状，边缘有5个尖齿；雄蕊5个，不伸出花冠管口，花丝下部贴生在花冠管内，上部分离，顶端着生直立、线形的扁平花药；子房上位，通常2室；花柱2裂。花后结一蒴果，球形，绿色，直径3~3.5厘米，有短而粗壮的刺，基部有浅盘状的宿萼，成熟时淡褐色。

生长环境 近村田边道旁、瓦砾隙地的各种土质均能生长。四季均可采收。

产地分布 广布热带各地，温带地区亦有栽培。我国江苏、浙江、江西、福建、广东、广西均有产，广东全境均有分布，多野生，少见丛生或散生。

药用部分与气味性能 花、子、叶、根。气嗅，味苦，性温。能消肿定痛，拔炮烙钉刺入肉。

临床应用

1. 丝虫病 浙江绍兴县漓渚人民公社保健院治疗下肢象皮肿，内服加减独活寄生汤，外用曼陀罗花或凤仙花熏洗。加减独活寄生汤：独活2钱，桑寄生、当归、川牛膝、赤芍、威灵仙、苏木各3钱，生地4钱，穿山甲、红花各1.5钱，防己5钱，上为1日量，每日1剂，水煎分2次服，连服5剂为一疗程。熏洗剂：曼陀罗花1两，水煎成2000毫升，置盆内，先以热气熏患肢，待稍温后用以洗足，至药液凉为止，早晚各1次。或凤仙花4两，用法同上。此方法经试验38例，患单侧右下肢者3例，左下肢者1例，双侧者4例（右侧较重），腓肠肌前后周最大的是41公分，最小的是28.5公分，当时伴发流火者2人，下肢疼痛伴有尿酸尿者1例，下肢寒冷感者2例，8例中5例进行了血检，阳性者3例，经1个疗程的治疗，连续2次血检，均转为阴性，下肢寒冷感及疼痛均消失，象皮肿除2例无效外，其余均有不同程度的好转。初期象皮肿，病情在四年以内者效果较好，病情过长，腿粗过大者疗效不显著，甚至无效。个别病例在服药后有流火症状出现，可能是药物刺激成虫引起的反应。（《浙江中医》1959年3月号）

2. 哮喘 曼陀罗正开花时，采取全草，切碎入锅，煮如烂粥状，约余4两，入远志末4两，甘草末4两，和入适量之蜜为丸，如黄豆粒大，每丸分4次服，1日服2次，开水送服，不可超量。（《河北省中医药集》）

3. 中耳道炎 闹洋花2~3朵，鲜者半两，捣烂滤汁滴3~4点入耳内，约4~5分钟即俯侧，使药液

流出,再滴新液,日滴8~10次,經10天治疗可愈。(电白李乃良献方)

4. 肿毒恶疮 生鮮隔洋花2朵,鮮荷叶1錢,搗烂成糊状敷患处。(江門区一桂献方)

5. 瘰癧伤口久不愈合。以鮮曼陀罗叶酌量,加泡米湯同搗候凉外敷。或隔日取用。每次換药时須將伤口洗淨,方可敷药。每日更換2次,5~8天可愈。(<福建中医驗方>)

6. 疔疮 隔洋花、生猪油、石灰,三味共搗烂敷患处。(湛江市楊才奇献方)

7. 蛇头瘰癧(瘰癧)

(1) 隔洋花叶和酒糟搗烂敷患处。(鍾育标献方)

(2) 隔洋花4錢,食盐3錢,共搗烂敷患处。(合浦常乐陈澄等献方)

8. 核疮

(1) 隔洋花适量搗烂,加盐少許,根热敷之可消散。(合浦刘教珍献方)

(2) 隔洋花根或叶,和酒糟搗烂热敷患处。(灵山陈貴礼献方)

9. 毒蛇咬伤

(1) 外敷药:假石榴、盐霜柏、雪豆花、和花紋、生柑桔、隔洋花、六耳苓、蛤蟆一个去內脏,共上药搗烂敷患处,能消肿止痛。咬伤后伤部如荔枝红皮样肿,人体寒颤等,不可飲生水,立服內服方:用細辛3錢,甘草3錢,川連3錢,防风2錢,吳萸4錢,白芷3錢,法夏2錢,灵仙2錢,沒药3錢,雄黃2錢,赤芍3錢,乳香3錢,牛膝2錢,三棱2錢,以水3碗煎存1碗,加酒冲服。(仙村蛇医王林献方)

(2) 田基黃、竹吊木芯、曼陀罗根少許,三味共搗取汁冲酒服,能散瘀,消肿、止痛。但要及时將伤口刺穿消毒,待毒液流出。(湛江林煥章献方)

10. 玻璃或炮烙入肉 用隔洋花子和黃糖搗烂敷之即出。(广州市苏任之、黃少雄献方)

11. 跌打

(1) 生川烏4錢,錦黃4錢,姜黃4錢,細辛2錢,沒药2錢,紅兰花4錢,羌活2錢,生半夏4錢,生地1兩,生南星4錢,白芷2錢,赤芍2錢,制馬錢2錢,苏木4錢,乳香4錢,山梔2錢,独活4錢,骨碎补4錢,隔洋花2錢,归尾2錢,共为末,加生薑、葱白搗烂,面煮为糊状,敷患处。(江門高明陈卓乾献方)

(2) 隔洋花根5錢,隔洋花实5只,紅萸麻叶5張,散血丹3張,接骨丹1把,米酒4兩,搗烂敷患处。(海口市联合医院董世元献方)

(3) 草薢2錢,田七1錢,隔洋花5錢,細辛1錢,川烏5錢,顯菰根1兩,川椒2錢,草烏5錢,生南星5錢,胡椒5錢,蟾酥1錢,共研末,用酒調勻外搽患处,自然止痛。此方对施手术的麻醉止痛最宜。(陈舜培献方)

(4) 隔洋花一朵(干),麻黃1錢,制馬錢2錢,乳香2錢,沒药2錢,清水煎服。(广州中医进修班李蔚良献方)

12. 脫骨

(1) 生川烏5錢,生半夏2.5錢,隔洋花2.5錢,草烏5錢,炒木鱉肉2.5錢,去毛馬錢2.5錢,生南星2.5錢,北辛2.5錢,川活2.5錢,苏木1兩,姜黃5錢,田七4錢,沉香3錢,川断3錢,紅花1兩,乳香3錢,归尾1兩,麝香3分,碎补2錢,澤兰3錢,沒药5錢,血竭2錢,共为末,用凡士林調敷患处。(中山石岐市郑官球献方)

(2) 大拳頭2兩,小联盘叶1兩,隔洋花1兩,小菊花1兩,小花瓜叶1兩,共搗烂敷患处。(海南占县中和卫生院邢启才献方)

(3) 細种脫骨消、隔洋花、独脚蓮、黑姜、鷄不食草、尖鷄尾、仙人对坐、田基黃、透地龙、菊花叶、鳳仙花各等分,加酒和面粉共搗烂成膏,敷患处。(梁郁初献方)

除四害

1. 灭蚊

(1) 曼陀罗花1斤,加溫水8斤,浸泡10天,經常攪拌,再用溫火煮沸30分鐘,過濾即成。取濾液1斤,加水0.5斤噴洒,蚊子立即落地。(<中药通报>1959年2月江苏資料)

(2) 曼陀罗1斤,烟茎1斤,肥皂4两,水10斤;配制法:烟茎切碎,加水10斤煮沸后过滤,俟滤液冷却,再将曼陀罗、肥皂片加入,不断搅拌,即成。经烟茎合剂喷洒后,灭蚊蝇效果达90%以上。(《中药通报》1959年2月号安徽资料)

(3) 曼陀罗2斤,桃叶2斤,烟草1斤,红萝卜2片,煤油0.5斤,肥皂4两,水35斤;配制法:将红萝卜、曼陀罗、桃叶、烟草等切碎,加水煮沸,俟冷却后,再加入肥皂、煤油、水搅拌均匀即成。效果:此浸液对杀灭臭虫、蚊、蝇、蛆等效果,均达90%。(《中药通报》1959年2月号安徽资料)

2. 灭子丁

(1) 浙江卫生实验院在杭州留下实验杀灭子丁效率达100%,对蝇蛆亦有一定的杀灭作用。曼陀罗花6两,加水3斤,煮成1.5斤浓液,每斤原液加水6斤,作喷雾剂用。每亩棉田用100斤,杀灭棉蚜虫效率达100%。

(2) 医学科学院病毒系:将果实切碎用水浸渍48小时,制成5%溶液,于48小时后100%子丁被杀死。其花制成5%溶液,亦能使子丁48小时后100%杀死。(《中国土农药志》)

(3) 据昆虫所试验,用毒餌诱杀家蝇,杀虫率达33%;20倍水浸液对子丁杀虫率达62.2%,100倍酒精浸液杀虫率达78.8%。(《中国土农药志》)

3. 灭蝇 曼陀罗花1斤,加温水8斤,浸泡10天,经常搅拌,再用温火煮沸30分钟,过滤即成。灭蝇取滤液1斤,加水0.5斤喷洒,蝇触之15分钟内80%死亡。(《中药通报》1959年2月江苏资料)

4. 灭蛆 安徽用新鲜叶捣碎投粪中,100斤粪用2.5斤,16小时死100%。四川用花叶晒干研末投粪中,100斤粪用2~3斤,效果很好。浙江用全株晒干研末投粪中,每缸用6~8两,12小时死90%以上。内蒙古自治区用全株冷水浸24小时过滤投粪中,麻蝇48小时死84.6%。福建用全株捣碎投粪中。江西用叶捣碎,用热水浸投粪中,100斤粪用5斤。(《药学报》1959年4月号)

5. 灭钉螺 将闹洋花全草切碎,冷水浸泡24小时,配成20%的浓液,每平方米喷射500公撮,钉螺死亡率可达95%以上。用粉撒杀,每平方米面积20~25克,钉螺及血吸虫卵可以杀死。(《江西中医药》1959年1月号)

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求真》载闹洋花曰:花辛温大毒。治贼风在皮肤中淫痛,中风瘫痪痿痹,湿痹。除恶毒,却顽痰,切切同生熟烟食。按局方伏虎丹用之治中风瘫痪,治量毒方有闹洋花散,其毒烈可知,切忌多用。中其毒者,黄耆、黄砂、蝎尾、绿豆可解。其根入酒饮,能杀人,不可近眼,令人昏瞶;同闹星、川草乌尤甚。其子数无名肿毒,可消。

2. 现代日本《和汉药考》载曼陀罗曰:前人行外科手术时,每以曼陀罗华配和为麻醉药,从前外科大家华冈清洲秘制麻醉方剂,曾配合曼陀罗华,医事启源载之,兹摘录如下:“曼陀罗花8分(陈旧者佳,新者发呕),草乌头2分,白芷2分,川芎2分,上四味为粗末一淘,空心服之,须臾心气昏晕,手足麻痹,或沉眠不觉,或闭乱发狂,乘时治之。即宜以浓茶,又与黄连解毒加石膏汤,二三时乃醒,如目眩、咽干,神气不复者,用黑豆汤即解。倘其不醉者,更饮温酒,或乘醉动搖必醉,其醉有迟速者,由天资有躁静尔。”

〔附注〕解毒法:曼陀罗、闹洋花,颠茄一类内服过量时,即出现中毒症状,喉内及口内干燥,口渴,作恶,呕吐,皮肤红而干燥,瞳孔扩大,脉强,脉搏亢进,躁妄,咽下困难,嘶哑,颜面潮红,遍体热痒疹,颈动脉强搏动,呼吸与脉搏频数,眩晕。重症:共济运动障碍,躁狂发作,幻觉,间发性痉挛,知觉丧失,括约肌麻痹,嗜眠,昏迷。

急救法:中毒症状开始,发觉早时即用催吐剂催吐,或用单宁酸,或用过锰酸钾0.1%液洗胃,吐清或洗清胃内药毒时,再用单宁酸水(番石榴叶、诃子、儿茶等富含单宁酸),或碘水(碘、碘化钾各2克,水300毫升),每隔5分钟服1食匙,使进入肠管药毒被单宁酸混合或被碘破坏。如药毒已大量吸收,出现躁狂幻觉时即需用麻醉剂,如内服足量阿片酊或注射足量吗啡以拮抗药毒,每0.5~1小时注射1次。如由躁狂进入昏迷危险阶段,即需用针灸或注射强心剂安那加、尼可拉明,并给多量咖啡茶、红茶等热饮料,用樟脑、丁香、肉桂等油刺激皮肤,使患者采半卧位或坐位不使入睡。

魚 藤

Millettia lasiopetala (Hay.) Merr.

别名：白药根，雷公藤

科属形态 本品系蝶形花科雞血藤属的木质藤本；茎皮有纵条纹和皮孔；嫩枝黄褐色，被柔毛。叶互生，革质，奇数羽状复叶，小叶对生，9~11枚，有锐尖的托叶，倒卵形、卵形或长方形，长5~17厘米，先端钝，浑圆或稍凹入，基部常常浑圆，上面秃净，背面被黄色或褐色柔毛，边全缘略背卷。秋季腋生或侧生圆锥花序，或总状花序，长10~15厘米，被黄褐色柔毛；萼为钟形，被褐黄色柔毛，裂齿通常短或几乎不显明，花冠粉红色，有香气，旗瓣近肾形微缺，外被金黄色茸毛，内面秃净；雄蕊1束；子房线形，无柄，有胚珠数颗；花柱线形，内弯，秃净。花后结荚果，矩圆形，膨胀，长5~9厘米，宽8.5厘米，厚2厘米，嫩时被黄色绒毛，后渐变为秃净；果瓣厚木质，老时有皮孔，8~9月成熟；种子近于肾形。

生长环境 生于河岸沿海路边，或稀疏，或散生于阴林中，或沿溪畔灌木丛中。夏末秋初采收。

产地分布 云南、广东、广西均有分布。本省近山区地方为多产，散生。

药用部分与气味性能 全株连根。嗅无，味苦，性有大毒。忌内服。外用能杀虫止痒，逐湿痹。

临床应用

1. 游走性关节炎 魚藤5钱，天仙子（广东进口品种）适量，共研末，先将魚藤以开水1杯浸渍，后入天仙子粉，即成糊状，敷于患处奏效。（广州廖均洪献方）

2. 湿痹 魚藤2两，白醋4两，上药煎水适量，每日洗1次，连洗2日。（江門赵定和献方）

除四害

灭蚊

（1）魚藤难溶于水，大量配制时以配成乳剂为宜。用法1:20或1:30，先将少量水混成糊状，然后倒于布袋浸泡在全部水中约10小时，搓揉挤出汁来，再把肥皂切成片，用热水浸溶充分混和，即成乳剂。效果：用水剂试验三节吻虫，每公斤水1克，8小时80%中毒，24小时达100%，对致乏孺蚊幼虫，24小时死亡率80%。（《广东中医》1959年第4号）

（2）寒魚藤6份，大茶药2份，浸渍8小时，或煮煎，去渣后即成水剂，或加肥皂做成乳剂。对杀蚊、蝇及农业害虫三化螟、卵块均效。（《广东中医》1959年第4号）

（3）广西玉林专区，取毒魚藤根（红根的）干粉8两，切成薄片，或用慢火焙干捣碎研成粉末，用较大的筛斗筛过即成。用时加清水1斤混成糊状，用布袋套好浸在10斤清水里，浸约10小时，搓揉挤出汁来，再将1两肥皂切成片，用水浸溶冲入这汁里混和，倒入喷雾器喷射，效果也和按叶混剂一样。（广东省消灭疟疾工作茂名县分会资料）

魚腥草

Houttuynia cordata Thunb.

别名：狗贴耳，臭菜，蕺菜，佛耳草，吉耳菜

科属形态 本品系三白草科蕺菜属中的一种多年生草本，茎的下部伏地，生根；上部直立，长30~60厘米，顶端或有稀疏短毛，有时紫色。单叶，互生，心脏形，长5~7厘米，宽4~6厘米，先端渐尖，基部心形，5~7脉，边全缘，两面除叶脉略被柔毛外，全秃净，新鲜时上面暗绿色，有细粒密生，揉烂之有恶臭如鱼腥味，背面现紫色；叶柄长3~8.5厘米，基部鞘状；托叶下部与叶柄合生，线状短圆形，先端钝。夏秋顶生与叶对生的穗状花序，长约1.5厘米，顶端有苞片4枚；苞片白色，倒卵状短圆形，先端钝，长1~2厘米；花小而密，白色，无花被，只有极小的小苞片1枚；雄蕊8枚，花丝下部与子房合生；子房由8个一室、一部合生的心皮组成。花后结一蒴果，顶端开裂；种子卵形，有条纹。

生长环境 生于山谷溪边、沟边、池沼旁阴湿地方，含腐殖质土特别喜生。夏秋间采收。

产地分布 我国长江以南诸省随处皆有分布。本省各县均产，以清远附近各县产量较多。

药用部分与气味性能 全草。气腥，味辛，性平温。能散结毒痈肿，湿热内蕴诸症。外用内服均可。

临床应用

1. 肺病

(1) 鱼腥草(全株)，每次用量2~4两，洗净，捣取自然汁服，连服3~5天。此物气味腥臭，而对治疗肺病确有奇效，尤其对兼有痰热者更妙。在抗菌素未发明前，中医界都用之，群众知其疗效自行服用的也不少。它的优点是没有任何过敏反应和抗药性，而疗效又很好，因此值得加以研究和推广。(《中医研究工作资料汇编》)

(2) 鱼腥草鲜者每用1两2钱，干者减半，水煎服，如混合血糖多者加叶底红(羊蹄草)1钱同煎，冲鸡蛋一二枚服。或用鱼腥草6钱，忍冬藤3钱，枇杷叶3钱，水煎服。(《江西中医药》1957年10月号)

(3) 鱼腥草绞汁和冰糖和服，经常服，服至痰涎吐出即愈。(《福建中医秘方》)

2. 咳嗽咯痰 生鱼腥草1.2两，干者用6钱，水煎服。(《江西中医药》1957年10月号)

3. 肺结核 鱼腥草叶2两，水2碗煎至1碗，冲冰糖4两，分3次服，1天服完，连服1星期，久患的病者连服2星期。如腹泻及妊娠时勿服。(海南中医交流会介绍)

4. 痢疾

(1) 鱼腥草6钱，山楂炭2钱，水煎加冰糖同服。(《江西中医药》1957年10月号)

(2) 狗贴耳1两，鳳尾草5钱，车前草1两，水煎去渣入冰糖1两冲服。老弱者的减。(翁元丘白云献方)

(3) 鱼腥草2两，水煎冲冰糖服。(北海黄昌成献方)

5. 黄疸 鱼腥草6两，水煎温服，一服见效，二服病减，三服即愈。阴黄不可用。(东莞罗寿南献方)

6. 暑热腹痛 用鱼腥草煎水作茶饮。(蔡少棠献方)

7. 小儿疳积 魚腥草 2~4 錢，煮猪肝食之；如疳积上眼，以魚腥草捣烂外敷则效。（罗定譚文通献方）

8. 白帶白濁 每用魚腥草 5~6 錢，水煎服，連服數次則效。（《江西中医药》1957 年 10 月号）

9. 疔疮

(1) 魚腥草 1.2 兩，干者減半，煎服。再以此草研末蜂蜜調敷，未成者則消，已成者能排膿。（《江西中医药》1957 年 10 月号）

(2) 魚腥草和虾蟆肝捣烂貼之，如疮瘍成膿不出，以此貼 3~5 次則可出膿，可代刀割或用針刺破之術，故又稱代刀草。（蔡少棠献方）

10. 痔瘡 魚腥草干者 5 錢，生者酌加，水煎服。再取魚腥草 1~2 斤水煎，置盆中坐薰。并治脫肛。（《江西中医药》1957 年 10 月号）

11. 面疔 狗貼耳和黃糖捣烂貼之，則止痛消腫。（大埔埔城卫生院張和甫献方）

文献考証

1. 宋代日华子撰《大明諸家本草》載魚腥草曰：淡竹筒內煨熟，搗敷惡疮白禿。

2. 明代李时珍撰《本草綱目》載魚腥草曰：散熱毒癰腫，疮痔脫肛，斷疔疾，解穢毒。

3. 明代羅希雍撰《本草經疏》載魚腥草曰：莖生于下濕之地，味辛气温，能治痰熱壅肺，发为肺癰吐膿血之要药。辛温主散，故能治癰腫濕熱。肺主气，辛温能散气，故多食令气喘。肺与大肠相表里，大肠濕熱盛則为痔瘡，得辛散之气，則大肠清宁，故又为痔瘡必須之药。

4. 現代胡眞撰《山草药指南》載狗跌耳曰：有臭味，取全草煎服，治痢疾。

崗 稔

Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.

别名：稔子，山东稔，桃金娘，烏肚子，当梨子

科属形态 本品系桃金娘科桃金娘属中的一种矮小常绿灌木；高1~2米，外皮灰褐色，幼枝密被柔毛，小枝浅黄色，嫩苗红色，顶芽灰白色。单叶，薄革质，对生，椭圆形或倒卵圆形，长3~6厘米，宽1.5~3.5厘米，先端钝，基部阔楔尖，边全缘，基部有主脉3条，很少5条，叶面深绿色无毛，叶背灰绿色密被茸毛；叶柄短，长4~6毫米。夏初开花1~8朵，生于腋生的花序柄上，直径约2厘米；萼钟形，长约6毫米，多少与子房合生，基部有卵圆形的小苞片2枚；裂片圆形，4~5枚，不甚相等，长4~5毫米，外面与花瓣同被灰色茸毛；花瓣4~5枚，玫瑰红色，扩展；雄蕊多数，分离，排成数列；子房下位，2~6室，每室有胚珠多颗。花后结一浆果，球形，直径可达1.4厘米，熟时暗紫色，味甜可食，顶上有宿存的萼片。

生长环境 生长于阳光充足的丘陵灌木丛中或杂草丛中，荒山由山坡至山顶，甚至小石砾裸露的山脊土质浅薄地方，多生于酸性黄色土壤，抗旱力强。春季采根，夏末秋初采收果实。

产地分布 锡兰至我国南部，越南、印度尼西亚、马来群岛、日本和菲律宾等地。国内云南、广东、广西、福建、台湾等省均有产。本省各地均有分布，湛江专区各县尤多，普遍，丛生。

药用部分与气味性能 根、茎叶、果实。气微香，味甘微涩，性平。茎叶能止血止泻，根能解久热不退，果能滋养补血。

临床应用

1. 急性胃肠炎 用生岗稔叶2~4两，干者酌减，煎水服，吐泻即止。（蕉岭南藤卫生院陈君祥献方）
2. 血崩
(1) 将干稔子晒干炒黑如炭，为细末存贮候用，每服用5钱至1两，以开水冲服。此方对吐血及刀伤出血均有奇效，外伤可作外敷用。（江门叶子荣献方）
(2) 山稔子树叶3两，切碎，用瓦桶加酒炒焦后，以水2碗煎至1碗，服之即止。（江门余子森献方）
3. 黄疸 用稔子树根1~2两，生鸡1只去毛屎切碎，与稔子根置锅中炒后，加水适量煎服，甚效。（龙川县黄亚祿献方）
4. 脱肛 山稔子2~3两，煮猪大肠服。（陈煥文献方）
5. 鼻血 稔子干5钱，塘虱鱼2条，以清水3碗煎至大半碗，服之即愈。（江门林振瑞献方）
6. 外伤出血 用山稔叶捣烂敷伤口即止血。（台山中医研究所）
7. 汤火伤 山稔根烧灰研细末，用牛油调涂患处。（江门张子润献方）
8. 痔疮 稔子树根2两，槐花米6钱，与猪大肠同煮，煮熟后去药渣，服其汤和猪大肠，连服数次即愈。（广州中医学院进修部林鸣标献方）
9. 小儿头疮 稔子叶8两，煎水洗患处，每天洗一次，连续洗数天即愈。（广州中医学院进修部强

圣德献方)

10. 烂脚久不收口 山慈子干 3 钱, 冰片 1 钱, 寒肉 3 钱, 共为细末, 用茶油调涂患处。(广州中医学院进修部李勉昭献方)

11. 炮伤

(1) 旧伤口用山东慈叶加硼砂少许, 捣烂敷伤口。新伤口用白豆蔻草、生盐、猪骨各等分, 共捣烂外敷患处。(石岐方福献方)

(2) 慈子叶、火筒叶、糯米各等量, 共捣烂加入蜜糖捣匀, 敷伤口则愈。(台山中医研究所献方)

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求原》载山慈曰: 花如桃花, 六七月子熟红黑色, 叶对生, 湿平。止血止痢, 生肌, 治疳积, 消痞, 洗痔瘡, 热毒, 瘰疬, 烂脚, 理蛇伤。其子甘平, 生采晒干, 止痢赤白带, 生肌止血。根治心气痛。

2. 清代何克諫撰《生草药各要》载山慈曰: 味甘性平。止痛散热毒, 止血拔膜生肌。其根治心痛, 子亦可食, 健大腸, 亦治蛇伤。

3. 现代胡寅撰《山草药指南》载山慈子曰: 别名倒慈子, 又名都念子, 又称海漆, 又名山慈。其实如莲子大, 熟软如柿, 外紫内赤, 中有细核, 甘美可口。能活血补血, 与黄精同功。

4. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载桃金娘曰: 在树上未脱落而离干的果或根部的皮枝叶部均可用。治牛水泻; 痢症; 大便秘结温带泻血症; 痢症(红白痢); 泻血症(红痢)。也可治猪痢症。

崗 梅 根

Ilex asprella Champ.

别名：点秤星，七星星，槽流星，槽梗星，山梅根，梅叶冬青

科属形态 本品系冬青科冬青属中的一种灌木；枝圆柱状，紫黑色，有很明显的散生、椭圆状的凸点。单叶，膜质，互生，卵形，长8~8厘米，宽2~4.5厘米，先端尾状短尖，尖头长达8~10毫米，基部短尖至浑圆，边缘有小锯齿，叶面深绿，秃净或略被短毛，叶背绿色，有时被毛比叶面为密，中脉隆起，在鲜叶时折断中脉则有白色丝状物相连；叶柄长8~10毫米。花单性，异株；有时杂性，夏季腋生伞形花序；花柄1~4个聚生，极纤细，长5~10毫米；萼片、花瓣和雄蕊通常4枚，有时5~6枚；子房上位，花柱短，柱头浅裂。花后结一浆果，球形，有纵棱，长6~8毫米，先端有宿存的花柱；果柄长1~2厘米。

生长环境 生于荒山、坡地，不论山麓山顶及沙滩、粘壤，较为松疏的土壤均可生长，适应性颇强，多生于大山林中。秋冬采根。

产地分布 我国南部各省，如湖南、江西、广西、广东等均有产，本省各地均有分布，普遍，散生成丛生。

药用部分与气味性能 根。嗅无，味先苦后甘凉，性凉。能清热解毒，散瘀活络，生津止渴，为凉茶重要原料。

临床应用

1. 肺病 秤星根0.5斤~1斤，煎水服，连服数次即愈。（梅县刘锦灵献方）

2. 双单蛾喉

（1）点秤星、满天星、假油麻（俱用根）、白饭树根、油柑根、山豆根，各药酌量，煎水冲蜜糖服，即愈。（新兴天堂公社洪林献方）

（2）点秤根、篇菜根，二味适量捣烂，加入蜜糖少许，用白布包好置于口内含嚼即愈。（上洋人民医院吴永清献方）

（3）点秤星根1两，竹蜂4只，陈皮2钱，细辛1钱，水煎服。（新兴县苏西阶献方）。

（4）点秤星根8两，晒干为末，或单用鲜根切片，以水3碗煎至1碗服。（台山文村区村，新兴潘香兰献方）

3. 小腸气痛 用点秤星根7~8两，煎水服，连服数次即愈。（郁南卫协会张世义献方）

4. 痢疾

（1）点秤星叶、烏柏树蕊、龙船花、小牡丹，各药酌量，加入酒精少许，共捣烂贴患处。（朱芝梅献方）

（2）秤星树叶和米糟或鸡蛋，共捣匀敷患处即愈。

5. 痔疮出血 秤星树根8两，去皮切碎，煮猪肉食，其血即止。（梅县刘香晚献方）

文献考证

1. 清代何克廉撰《生草药性备要》载崗梅根曰：杀蛇，理跌打损伤如神。

2. 现代胡翼撰《生草药指南》载崗梅根曰：又名槽梗星，枝似梅，根味甘。内服外敷，治跌打如神。又能清热解毒，煎茶饮，能杀疥虫。

3. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载崗梅根曰：杀疥虫，理跌打损伤如神。

蕨 众

Woodwardia japonica Sw.

本品在本省現在使用有三种：(1)在五华召开全省灭病现场会时介绍五华土产，与湖南使用相同灭钩虫疗效最好的一种烏毛蕨科的黑狗脊。(2)省市药材公司收購的烏毛蕨科中的烏毛蕨。(3)五华使用灭钩虫疗效略差的一种蕨众科中国綿馬。現分別叙述这三个品种：

科属形态 1. 黑狗脊 *Woodwardia japonica* Sw. 又名小毛蕨，小蕨众，鳳尾草，系烏毛蕨科烏毛蕨属中的一种多年生常綠草本。根茎傾斜或匍匐或平臥，与叶柄下部均被大而广闊的鱗片；鱗片棕色，膜質，綫状披針形，长2厘米或更长，寬約8毫米；叶柄木質粗大，稻秆色至褐色，长30~60厘米，与中軸均被稀疏鱗片；叶片长矩圓形至卵状披針形，长25~80厘米，寬20~40厘米，2回羽状分裂，上部羽片急縮成羽状深裂的頂片；羽叶10对左右，披針形至綫状披針形，长15~25厘米，寬2.5~4厘米，斜向，先端漸尖，基部无柄，上側楔形，下側圓形，或多少呈心形；羽軸疏被鱗片，羽片作羽状分裂，裂深自1/8~2/8，裂片卵状矩圓形，长1~2厘米，寬1~1.5厘米，急尖，具細鋸齒；叶脉分离，或在近叶軸处联結；囊群綫形，着生于裂片中肋兩旁，囊群蓋褐色。

2. 烏毛蕨 *Blechnum orientale* Linn. 又名大蕨众，赤蕨头，龙船蕨，系烏毛蕨科烏毛蕨属的一种陆生多年生草本。根茎粗壯，木質，直立，密被暗褐色綫形光亮的鱗片；根茎橫剖面具放射状，叶柄基部、根茎的基部着生細根呈分枝状，略硬，叶同型为一回奇数羽状复叶，近革質，闊披針形，长达1米，寬25~40厘米，羽片多数，狭綫形，近互生，无柄，长16~22厘米，寬1~1.5厘米，先端漸尖成尾状，边全緣或微波浪形，深綠色，兩面均保淨，頂端羽片的基部下延，最末的一枚羽片最长；叶脉明显，密集，平行；叶軸粗壯，稻秆黃色，保淨；叶柄簇生，坚硬，直立，长10~40厘米，基部密被鱗片。孢子囊群着生于小叶背脉上，在中脉兩側各成一行与中脉平行，形成一連續的綫形排列。

3. 中国綿馬 *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott 又名大毛蕨，羊齿。为蕨众科鱗毛蕨属的一种多年生草本。根茎短，較黑狗脊为粗壯，直立，密被灰褐色闊披針形鱗片。二回奇数羽状复叶，厚紙質或革質，卵状披針形，长30~100厘米，寬20~80厘米，羽片披針形，頂端漸尖，深裂达于叶軸，裂片多数，密集，鈍头，边全緣有細微鋸齒，叶軸密被黑褐色錐尖鱗片。孢子囊体較大，多数，在叶背脉兩側各排成一列，略接近中脉，子囊群蓋腎形，保淨，凹部較深。

生长环境 喜生于阴湿酸性土中，多見于溪谷及山石巉岩地方，或小丘陵杂木林中。全年四季均可采收。

产地分布 广布温带及热带地区。我国云南、貴州、四川、江苏、浙江、江西、湖南、广东、广西、福建、台灣等省均有产，本省普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 根茎。嗅无，味微苦涩。能辟疫、杀虫、止崩带，孕妇不宜服用。

临床应用

1. 钩虫病

(1) 中共湖南常德县委除害灭病领导小组在常德已取得显著疗效的治钩虫病处方,经过第一批 844 个病例 1 次服药疗法,和 2 次大便盐水漂浮法检查,证明疗效达 82.8%,第二批 2,533 例 1 次服药,3 次如上的粪检,疗效升至 88.63%,肯定了黄众扬的疗效,已在湖南省全面推广,增量内服,灭钩虫率提高至 93.4%。本方对孕妇禁忌使用,在普查中要注意调查妇女是否有孕,注意登记,避免治疗。处方:黄众干 3 两(鲜 4~5 两),苦楝树二层皮 5 钱,山紫苏 5 钱,土荆芥 5 钱,右为成人 1 次煎服量。如无山紫苏,可用家紫苏,无紫科土荆芥,可用唇形科土荆芥。大量制药时,可单味煮取浸糖一定比例后再混合。

(2) 复方黄众糖浆:鲜黄众 93.75 市斤,鲜苦楝树皮 20 市斤,洗净切碎,混和溶锅,加入清水约 200 市斤(以水面恰好浸到药面为宜),然后用猛火煎煮,经常用铁耙翻药料,使其容易出味。大约煎煮 4 小时,将水煎成约 45 市斤,同时用另一锅,加入荆芥(干) 12 市斤,清水约 70 市斤(以水面恰好浸到药面为宜),煎煮 1 时 30 分钟,约得水 18 市斤,然后将两液混和过滤,再置锅中煎约 30 分钟,使药液浓缩为 50 市斤(相当 24000 毫升左右),再加入适量红糖和调味的香精,便可持用。以成年人每次内服 60 毫升计算,足可供 400 人次服用。倘药物供应条件较好时,可按原方酌加山紫苏 5 市钱,金银花 3 市钱,土茯苓 8 市钱,甘草 1 市钱(均为成年人 1 次剂量),共同煎剂,则更为理想。使用黄众糖浆的剂量:5~10 岁服 20 毫升 1 次,11~15 岁每次服 40 毫升,16 周岁以上每次服 60 毫升。空腹 1 次顿服,作为一个治疗程,亦可达到治疗目的。为了提高疗效,可以采用一日早晚 2 次服药疗法或两日疗法(每日服药 1 次)。此外,又可以将每次内服药量提高到 5~10 周岁 30 毫升,11~16 周岁 50 毫升,16 周岁以上 80 毫升。该药对孕妇、严重慢性病、正在患急性病的病人,身体极度衰弱的,均宜禁忌。服药后一般无反应,仅个别有头晕、恶心等轻微反应。

表为黄众糖浆同时治疗钩虫病及蛔虫病的疗效统计表

我县公社复查结果			专区鉴定结果		
病名	钩虫病	蛔虫病	病名	钩虫病	蛔虫病
复查人数	2120 人	1528 人	复查人数	848 人	556 人
服药后平均天数	10 天	12 天	服药后平均天数	28 天	28 天
镜检阴性人数	1598 人	1097 人	镜检阴性人数	235 人	281 人
镜检阳性人数	580 人	427 人	镜检阳性人数	108 人	75 人
阴 阳 率	69.51%	73.84%	阴 阳 率	69.5%	73.1%

(中共常德县委除害灭病领导小组办公室)

此方又可治疗流感,成人每日服 3 次,每次服 10~20 毫升,预防流感及麻疹每日 10~20 毫升,分 3 次服。孕妇忌服。(博罗县中医学学校)

2. 血吸虫病

(1) 浙江诸暨县除害灭病指挥部报导经验:将黄众制成剂型,分液剂、粉剂、丸剂三种:液剂用黄众 1 斤,加水适量,煎成浓液 1500 公撮,加红糖适量;粉剂将黄众焙干研细末,加等量红糖;丸剂将黄众粉搓成小丸。剂量及服法:液剂每人不分年龄服 30 毫升,在中饭或晚饭后用等量黄酒(小孩不会饮酒者,改用开水)冲服(瑞山公社曾以每公斤体重用 3 克的干黄众煎成液剂,一日 3 次,二天服完的大剂量治疗 16 人);粉剂及丸剂每人(不分年龄)3 钱(纯黄众量),在中饭或晚饭后吞服。疗效追踪复查情况:枫桥公社共追踪复查 105 人,这些人都经厚滴血片一次(一滴)检查,阳性的血吸虫病人无体征,经治疗半个月后作厚滴血片(二滴)检查(采血量为 40 立方毫米,采血时间为下午 9 时至次晨 2 时),镜检结果阴性 56 人,疗效达 53.3%。瑞山公社追踪复查 12 人也是无体征,镜检阳性的血吸虫病人,经用黄众大剂量治疗一月后复查(采血量及采血时间与枫桥同),阳性 1 人,隔 2 天后再进行复查,又发现阳性 1 人,共计阳性 2 人,阴性 10 人,疗效达 83.3%。(《浙江中医》1959 年 3 月号)

(2) 貫众 3 两, 苦楝树皮 1 两(或 8 錢), 荆芥 5 錢, 加水煎存 60 毫升, 一次服。服此方治疗 15 天, 复查 152 人, 轉阴性人数 139 人, 阳性者 13 人, 阴轉率为 91%。又复查鉤虫病人 168 人, 轉阴性 149 人, 阳性者只 19 人, 阴轉率为 88.6%。(东莞县防疫站灭三虫有效驗方)

3. 驅虫驅虫 黔东南苗族侗族自治州卫生防疫站用此方驅牛帶絛虫与蛔虫 78 例, 此药对牛帶絛虫疗效尚佳。个别病例于腹瀉前自行排出, 有 2 例各排出絛虫 14 条, 蛔虫 17 条, 一般服驅虫药后 10~18 小时虫排出, 早者 6 时许, 个别可至 46 小时。蛔虫排出时一般較絛虫为迟。处方: 貫众 1 两, 苦楝皮 2 两, 南瓜子 2 两, 先将苦楝根外皮与貫众外須拋弃, 切片置入水中, 沸两次, 2~4 小时, 然后将春碎之南瓜子加入, 沸 20~30 分鐘, 冷却后过滤(或全部春碎成粉不再沸, 南瓜子粉按分量服用, 先服水剂, 再服粉剂), 药液再濃縮为 150 毫升, 1~3 岁服成人量五分之一, 4~6 岁服五分之二, 7~10 岁服五分之三, 11~15 岁服五分之四, 16~60 岁服成人量即 150 毫升; 80 岁以上服五分之四。在服药当天禁食晚餐, 于 7 时服驅虫剂, 次晨服硫酸銨催瀉。服药后驅出之蛔虫用肉眼观察, 将排出的絛虫用水洗净, 每条清理分別用放大鏡、显微镜检查有无头节。在驅虫的結果中虽然排出, 其头节虫体只占总数之 44.8%, 有頸占总数 55.1%, 而头节未驅者均至被細处断下, 其中仍有大部头节排出, 同时絛虫生长的部位主要在頸节, 体节是由頸节远端生长而成, 我們認為均已治愈。无反应者 15 例, 占 19.2%, 一般反应于服驅虫剂后 15 小时发生, 反应达 80.8%, 程度均輕亦能劳动, 驅虫疗效达 78%, 較单用貫众治疗絛虫提高疗效 3 倍, 驅蛔虫 95.2%。(《貴州卫生》1959 年 3 月)

4. 慈虫熱 广州巴故名医刘福康善用貫众与清營解熱寒类药治慈虫病高热不退, 收到滿意疗效, 其子刘之永中医师繼承这經驗, 亦擅治这类病。(中医药研究会赵恩克整理)

5. 預防流瀉 貫众 2~3 錢, 連服二次。用貫众防治流瀉, 是徐水容城县新华联合診所中医們援引过去經驗和古人記載首先創用的。約在 20 年前, 該县曾有流瀉大流行, 李士元老先生拟方重用貫众, 对同类型患者, 皆以一方向治, 或一家数口同用一剂药, 无不应手而愈, 这一經驗傳流, 也給大家以很大印象。同时在医籍中有貫众于水缸中可避时疫的記載, 說明祖国人民在几千年以前对傳染病的預防即已相习采用而流傳至今, 从这方面又給了他們很大的启示。他們首先在北城村对 50 余个患病戶和学校学生进行試用, 經三日后的調查結果, 服用貫众后第二天重病減輕, 輕病痊愈, 健康人在三日內无发病者。迅速推广到全县使用, 在 26000 余人的流瀉患者, 經用貫众防治的結果疗效显著, 对感染較重和已接近发病阶段者, 服后还要发病, 但发病很輕微, 不治自愈。(《中医杂志》1959 年 1 期)

6. 防治麻疹

(1) 貫众每人每日量 6.5 錢, 水 1 碗煎至 0.5 碗內服, 連服 3~5 天。(台山中医研究所)

(2) 將貫众研成粉, 6 个月至 3 岁小儿每日服 2 次(每日用 0.5 克分 2 次服), 連服 3 天为一期, 每隔一个月使用一期, 經 68 人服用, 此药經使用 6 个月, 68 人中除有 6 人往他处效果不明外, 其余 62 人均未发病。(《河北省中医藥集錦》)

(3) 貫众、銀花、蘆根、山梅根、茅根、竹叶、甘草, 6 岁以上各用 5 錢, 6 岁以下用 3 錢, 1 岁以下用 2 錢, 第 1 次用此方治疗 134 人, 服药有效 130 人, 有效率 97%; 第 2 次 640 人, 服药有效 640 人, 有效率 100%。(中山医学院在采風期間試用)

7. 血崩

(1) 貫众 4 两去根去毛, 放小瓦盆內以適量米醋浸一宿, 最好用醋浸透, 砂鍋上焙干研末, 米糊为丸如梧桐子大, 每服 1 錢, 早晚各服一次。(《河北中医藥集錦》)

(2) 貫众炭 3 錢, 崗松叶炭 3 錢, 棕繩炭 5 錢, 煎水飲即止。若虛人加圓參 1 錢, 血令炭 2 錢, 同煎服。(南丰李滋生獻方)

(3) 貫众炭每次 4 錢, 冷开水送下即愈。(伍行獻方)

8. 漆瘡 貫众煎水洗, 尖板研末撒布患处。(赵式訓獻方)

除四害

1. 杀子孓

(1) 将黄众根茎磨成粉末撒在水中可杀孑孓。(《中国土农药志》浙江资料)

(2) 据昆虫所试验: 对孑孓, 20 倍水浸液杀虫率为 51%, 100 倍酒精浸液杀虫率为 100%。(《中国土农药志》)

文献考证

1. 宋代苏颂撰《嘉祐图经本草》载黄众曰: 为末水服 1 钱, 止鼻血有效。

2. 明代李时珍撰《本草纲目》载黄众曰: 治下血、崩中、带下, 产后血气腹痛, 斑疹毒、漆毒, 骨哽, 解猪狗。

3. 明代缪希雍撰《本草经疏》载黄众曰: 味苦而又微寒, 止应云有小毒, 以其苦寒, 故主腹中邪热气诸毒, 三虫皆由湿热所生, 苦寒除湿热, 则三虫自死矣。苦以泄之, 亦兼有散之义, 故破痼膜。苦寒能除风热, 故止头风。金疮出血后必发热, 泄热散结, 则金疮自止。

4. 清代黄宫绣撰《本草求真》载黄众曰: 黄众即俗称为管仲者是也, 味苦微寒无毒, 世遇天时行不正之气, 人多用此置之水缸, 使人食之不染。且不独力能解毒, 凡遇崩中带下, 并痲疹痘疹, 虫壅骨哽, 皆可用之, 盖以苦能杀虫, 寒能散热故也。昔王季百一造方, 言食鯪鱼鳃为骨所哽, 百药不效, 或令以黄众煎汁灌进, 一略而出, 可见软坚之功, 其殆若是之神矣。形似狗脊而大, 汁能制三黄, 化五金, 伏蠱乳, 结沙蛭, 解毒软坚。

5. 清代赵震谷撰《本草求真》载黄众曰: 即鳳尾草、草鴉頭, 俗名管仲, 味苦, 微寒, 有小毒, 生于山阴近水处, 得阴气最厚。尚解腹中邪热诸毒, 杀虫, 治鼻衄为末水下。诸下血, 为末醋糊丸米饮下, 或煨同麝香为末服。血崩, 血痢便毒肿痛俱酒煎。产后亡血气痛, 醋炙研米饮下。年久赤白带下, 方同上。久嗽肺血, 同苏木末淡姜汤下。劳瘵, 为末鱼肝煎食。痲疹斑疹痘疹不快, 同淡竹、甘草、升麻、赤芍, 皆泄热散结之功。辟时疫, 浸水缸中饮之; 化骨哽, 酒煎水灌进, 或同砂仁, 甘草末含咽最效。治中风因邪热毒入于腹, 故危而急, 宜先解毒, 故保命活命二金丹用之。头疮白秃, 同白芷末油搽; 漆疮作痒, 为末油涂; 轻粉毒发, 齿齕臭肺, 同黄连煎入冰片少许漱之; 酒痢血痔, 方同上诸下血。止金疮, 理猪狗。汁能制三黄, 化五金, 伏蠱乳, 制杀, 解毒之功可知。同黑豆煮, 晒至汁尽, 日食豆五七粒, 可食百草木叶以救荒。恶赤小豆。

6. 现代胡真撰《山草药指南》载黄众曰: 浸水缸中, 能辟时疫微生虫, 解水毒, 杀菌毒, 解邪热毒。

7. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载黄众曰: 味苦性微寒, 治下血崩中带下, 产后血气腹痛, 破痼结, 发斑疹毒, 治漆毒, 解水毒, 能解邪热之毒, 化骨哽, 杀三虫。其根之汁, 能制三黄, 伏蠱乳, 软坚。浸水缸中, 能辟时疫。

崩大碗

Centella asiatica (L.) Urban.

别名：积雪草，跌打碗，錢斷口，老公根，黃連菜，灯臺菜，蛤粉帽，雷公碗

科属形态 本品系伞形科积雪草属中的一种多年生小草，柔软匍匐状草本，节上生根，嫩茎秃净或略被疏茸毛，老则脱落。单叶，薄纸质，互生，圆形或肾形，直径2~4厘米，基部凹陷如碗崩去一角，边缘有钝齿，掌状脉，无毛或被疏毛；叶柄长1.5~7厘米。春季腋生伞形头状花序，花序柄2~3个聚生，长不及1厘米，无毛或被毛，每一柄的顶部有8~6朵无柄的花聚生成头状花序，此花序又为2枚卵形的苞片所包围，花两性，萼片截头形，花瓣5枚，红紫色，长约1毫米；雄蕊5枚，着生于花盘的周围，花丝白色，花药2室，纵裂；子房下位，长2.5~3毫米，2室，每室胚珠1枚。花后结果，果为2个不开裂偏向压扁的心皮构成，长2.5~3毫米，有网纹，每侧有2稜。

生长环境 生于潮湿或低草丛中，耐阴性颇强，不论石山、土山，酸性或微酸性土均能生长，村旁、园边、圃基土肥较好地方生长繁殖特别好，茎叶亦特别壮大。

产地分布 广布于热带和亚热带地方。我国部分温带地方亦有产，如江西、浙江、云南、广东、广西、湖南、台湾等省均有产，本省普遍，丛生。

药用部分与气味性能 全草。嗅无，味微甘微苦，性寒。能清热解毒，消肿拔毒。

临床应用

1. 肝脏肿大 崩大碗每次约0.5~1斤，煎水服。(广州中医学院李浩平献方)
2. 肋膜炎 崩大碗每用0.5斤，以水8碗煎取1碗服，连服1~2次即效。(广州中医学院方超献方)
3. 麻疹 崩大碗每次用1~2两，煎水服。民间常以此药作治疗及预防麻疹，收效良好。(高要梁梓汰献方)
4. 小儿百日咳
 - (1) 崩大碗3两，瘦猪肉1两，同煎1小时，分2次服，连服数天有效。(广州中医学院进修部黎嘉春献方)
 - (2) 崩大碗2两，莲藕节1个，麻黄8分，以水5碗煎至0.5碗服，连服3~4次良效。(广州中医学院进修部李德兴献方)
5. 肠胃炎 以崩大碗4两，煮水冲蜜糖1两，冷服。(河元县程其英，平东水乡叶济卿献方)
6. 白浊 崩大碗0.5斤，捣烂取汁冲白糖4两服，连服2~3次即愈。(新兴梁学林献方)
7. 双单蛾喉(扁桃腺炎) 崩大碗1两，蜂窠1只，黄糖少许，共捣烂含之有效。(和平井鹤黄世协献方)
8. 反骨疔 老公根、沙姜、蜜糖、辰砂各适量，先将老公根、沙姜二味捣烂，后加入蜜糖、辰砂，调匀涂患处。(东兴曹炳森献方)
9. 疳疔 蒲公英、崩大碗、千金藕皮、熊胆草、沙葛草、三点金，各药酌量，加米糠共捣烂敷于患处即消。另内服北耆1两，归身4钱，银花5钱，炮山甲5钱，白芷3钱，赤芍3钱，木瓜2钱，牛膝2钱，煎水冲酒服，连服2剂良效。(阳江县上洋圩吴永清献方)
10. 无名肿毒 崩大碗、虾钳草各等量，加入大梅片少许，共捣烂外敷患处，连敷数服可愈。(梁炳

献方)

11. 刀伤出血 以崩大碗酌量,捣烂外敷伤口则止血。(新兴天堂公社鍊金衍献方)
12. 误食砒霜或其他食物中毒 老公根4两,胆矾1钱,煎水服。此方对大茶药及草中毒等均有著效。(和平陈南勋献方)
13. 大茶药中毒
 - (1)崩大碗适量,捣烂,和生鸡蛋1只,搅匀灌下即效。(平溪林一达献方)
 - (2)崩大碗2斤,捣汁灌之即解。(翁元林庙塔献方)
14. 食物中毒 崩大碗1~2两,煎水服。(清远浸潭何塔献方)
15. 骨哽 老公根煎水内服,服时须慢慢咽下。
16. 跌打肿痛 老公根、马鞭草、干槿根、姜汁、蜂蜜1只,共捣烂取汁冲酒服。其法炒熟敷患处。(陈毓南献方)
17. 老鼠咬伤 崩大碗2~3两,用开水洗净,捣烂敷伤口。愈后有结痂则敷上。如有并发症而引起胸部疼痛,恶寒发热等症,则用荔枝核3钱去外皮,雄黄粉9分,共研末开水冲服。(翁元林庙塔献方)
18. 百足咬伤 用黄皮纸或崩大碗酌量捣烂敷患处。(中山石岐市何毓献方)
19. 初生小儿肛門肿胀 崩大碗3~4两,煎水洗患处,连洗数次可愈。(广州金花街卫生所何中和献方)

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求原》载老公根曰:即崩大碗,又名叫葵蓬菜。甘淡辛寒,除热毒,治白浊,浸痔疮,理小腸气。滾水浸过姜醋拌食。
2. 现代胡翼撰《山草药指南》载老公根叶曰:别名崩大碗,又名葵蓬菜。取梗叶煎服,能清火散热。
3. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载老公根叶曰:味辛甘,性温。治白浊,散湿热毒。治小腸气发,用沸水泡过,姜醋拌食。煎水洗痔疮。
4. 现代陈立群撰《广西中兽医药用植物》载灯盏菜曰:别名大銀錢、崩大碗、雷公根。可治牛热症。

瘦芋头

Alocasia odora (Roxb.) C. Koch

别名：奚芋头，广东狼毒，尖尾凤，海芋，野芋头

科属形态 本品系天南星科海芋属中的一种肉质粗壮多年生常绿草本。茎皮黑褐色，残留很多枯萎的叶痕，形成环状纹节，茎重的最大者可重达 100 公斤，含淀粉及粘液，具异性蛋白样的过敏性刺激性物质；这些粘液接触到一般皮肤立即引起剧烈搔痒，形成过敏性皮炎症状。叶极大，阔卵形，长 80~90 厘米，宽 20~60 厘米，先端短尖，基部广心状箭头形，裂片先端浑圆，近叶柄处短合生，其连合之程度约为裂片全长的 1/10，裂口狭；侧脉约 9~12 对，粗壮而绿色；叶柄粗壮，长 60~90 厘米，下部粗大。老茎于夏初春末着生肉穗花序，花序柄粗壮，每一叶腋内约 2 个，长 15~20 厘米；佛焰苞的管长 8~4 厘米，粉绿色；苞片舟状，长 10~14 厘米，宽 4~5 厘米，绿黄色，先端锐尖；肉穗花序短于佛焰苞；雌花序长 2~2.5 厘米，中性花序长 2.5~3.5 厘米，雄花序长 3 厘米，附属体长约 8 厘米，有网状槽纹，雄蕊连合成一六角形的体，子房 1 室，每室有胚珠 1 至数个。花后结淡红色浆果。

本品与尖尾凤的区别是：尖尾凤茎根与叶生长较细，叶前端渐狭长而尖，叶面色较为淡青绿色，叶缘略呈波浪状。二者疗效相同。

生长环境 多生于村落隙地腐殖质土，或断壁颓垣、荒地瓦砾中及厕所旁。生长在这些地方的海芋易遭斩伐，茎块高度多在 20 公分左右，叶亦较小，生花机会亦较少；如生于山谷溪边人迹少到地方，则茎块长而粗壮，叶亦较大，生花机会亦较多。本品生命力极强，切取茎块一段弃之野地或瓦砾中，即自能生根、萌芽、抽叶，因此极易繁殖。

产地分布 我国南部至马来亚及印度。国内广东、广西二省分布极普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 茎块、叶。嗅无，味淡涩微辛。水煎久熬能清热解毒，可代替犀角治疗一部分适应症，外治有攻拔恶毒结肿，化腐生肌之功。本品与华北、东北所用大戟科的狼毒完全不同，应注意区别使用。

临床应用

1. 流行性感冒

(1) 野芋头 10 斤，大米 0.5 斤，白盐 2 两，先将野芋头洗净切片，与大米、白盐混合放锅中炒 30 分钟，将大米炒成黑色，放水 40 斤，再煮 30 分钟，待米烂即成。每日每人服半口盅，连服 3 天可预防流感。治疗则每人每天服 3 次，每次半口盅，服至退热为止。湛江专区鹤地水库河堤团北联营共有 100 多人，其中患流感者 20 人，饮汤后当晚退热；进行全面口服预防量后，只发现新病例 1 人。

(2) 野芋头 1.5 两，六月雪 1 两，煎水服。此方对流感高热，昏迷嗜睡，服之能退。（龙川县防疫站献方）

(3) 野芋头 2 两，六月雪 3 钱，果盒草 3 钱，木槿子根 3 钱，牛兜孟根 5 钱，砂甘草 3 钱，灯盏草 3 钱，淨水煎服。（龙川县老隆黄亚兰献方）

2. 肺结核 新会棠下中心医院邓树棠医生实验方法：瘦芋头 4~12 两，最初一剂 4 两，以后逐日加 1 两为 1 剂，直加至 12 两为度，此后每日减 1 两为 1 剂，渐减至 4 两，以后又渐加至 12 两，为一疗程，即

停药5~7天再服。制法：将瘦芋头晒干去皮，切成薄片，勿触水，否则服后有副作用，甚至中毒，煎煮时必须候锅中水煮至沸，然后将瘦芋头和猪瘦肉4市两或猪骨0.5斤，煎30分钟至1小时，煎时切勿搅动，煎成后将汁倒出内服。服后若见副作用或中毒时可用甘草6钱，水2碗，煎成8/10碗内服即解。曾治20例，结果经X光检查，13例症状完全消失，2例痊愈，5例显著好转。新会县人民医院根据上法进行抗结核杆菌实验初步观察有效后，进行临床实验，获得同样疗效，并在实验中改变了剂量：即有效量由6市两起，每日增加1市两，至16市两时止为第一次；第二次由16两起，每天递减1两，转回至6两止；第三次又由7两起至16两止。共服先三次来往药后为一个疗程，然后休息一星期观察，如未痊愈，继续再服一疗程。

汕头市结核病防治院用上法治浸潤型肺結核87例，病人经过治疗，一般症状减轻，咳嗽痰量减少，胸痛减轻，食欲和体重也有增加，病人觉得精神好转。其中一例邓×，原来双侧肺野都有斑点状阴影，用野芋头治疗后，镜检双侧肺野病灶绝大部分已吸收消失，空洞缩小。（《南方日报》1959年4月20日）

3. 腸伤寒

(1) 1954年广西柳州人民医院以瘦芋头治疗腸伤寒，曾做临床实验，疗效甚好，尚未发现有不良副作用。其用法以瘦芋头2斤（成人一日量）去皮切片，加水2000毫升，慢火煎至800毫升，以水转紅色为度，分3次服，每8小时1次。（或加鲜辣蓼4两同煎亦可）

(2) 瘦芋头8两，切成薄片，和白米1两炒至微黄，用清水约4斤，煮约8小时許，煎成约2碗，1日3次分服，第二天热即减退，连服6~7天即可全愈。（灵山县丰塘乡人民医院，广州周志伟献方）

4. 絞腸痧腹痛

(1) 野芋头4两炒黄，扫管叶（尚松）2两炒黄，先将野芋煎好，再将扫管叶趁沸放下煎片刻，去渣温服。忌飲米湯。（文樓李忠光献方）

(2) 野芋头1两，鱸屎1两，生姜3片，酒1两煎服。另外用野芋2两和雞蛋1只捣烂敷臍。（海口市中山路中医門診部刘任献方）

5. 扁桃腺炎 瘦芋头3两，燒酒6两，浸2旬，每次飲2~3錢，其痛即止。（朱景桐献方）

6. 痔瘡便血

(1) 瘦芋头2斤煮爛，煮12小时，取湯飲之，亦可將湯共服下。（云浮县卫聚彬献方）

(2) 瘦芋头、煎珠头、瓜子菜、酸味菜、馬齒莧头、崩大碗、陈砂灰头、白醋。煎水熏洗。（甄炎喧献方）

7. 狂犬病 瘦芋头4两，煎水飲。亦有加入雞肉同煮，連服半个月。亦有兼用瘦芋头挂烂敷伤处。（郁南陆兆基，濠江何成森，台山中医藥研究所献方）

8. 毒蛇蜈蚣咬伤 瘦芋头2两，生油甘木皮1两，用盐水和药捣烂，以湿紙或树叶包裹煨热敷患处。（欽州卜裕選献方）

9. 蛇头指(瘰癧)

(1) 野芋头、蓖麻叶、雞嘴木心、茶麸各2錢，石灰2錢，生盐1錢，硫黃5錢，片糖少許，共捣烂敷患处。（叶秀光献方）

(2) 野芋头酸醋煮熟，滤去渣，酸醋浸患指。药渣待浸后敷上。（浦北龍門乡張子汉，和平陈明中献方）

10. 疮毒

(1) 瘦芋头4两，蟾蜍50只去脏杂，人发1两，旱辣蓼4两，大风艾4两，木賊肉4两，用桐油1.4斤煮至黑色，去渣，加黃丹6两，慢火煎成膏。对疮科有拔毒生肌愈合疮口之效。（中山石岐周顯霖献方）

(2) 背疔 瘦芋头和酒精捣烂敷患处神效（已潰者勿用）。（博罗县李天培献方）

(3) 臀部生坐板疮 瘦芋头、猪油，捣烂敷患处。（鏡平县余光明献方）

(4) 阴疮 瘦芋头、生半夏、生南星、生草烏、北細辛各適量，共研末，以油类調敷患处。

(5) 瓜藤疮(俗名) 瘦芋头、茄瓜叶、五月艾、生薑、葱白共捣烂，加醋煎微热敷患处。（云浮县林煥章献方）

(6) 小儿烂头腐 痕芋头1两,茶油2.5两,煎,取油搽患处。(英德县城联合医院区少英献方)

(7) 疮瘍潰后不收口 痕芋头叶酒煮外敷患处。(湛江市龙国柱献方)

(8) 廉疮潰瘍久不愈合 用尖尾凤叶加米醋蒸熟,取贴封潰瘍面,早晚换药二次,速贴之可加速治愈。

11. 皮肤湿疹搔痒流水 痕芋头1个,中间开一孔,取生油注入孔中,置炭火上將痕芋头煎熬,油沸后待冷却取出搽患处,功效良好。(江門黃頌麟献方)

12. 疥癩 痕芋头去皮搗烂和硫黄搅匀,用布包好,煮茶油搽之。搽后經20~40分鐘用肥皂洗淨。每天用2~3次。(罗南县献方)

除四害

灭蠅蛆 痕芋头2斤(連莖叶),丁哥王1.5斤,烏柏叶1斤,尖嘴辣椒1斤,苦楝叶1.5斤,生馬錢子0.5斤,茶仔餅1斤,將上药加水30斤,煎煮3~4小时,即成水剂。放入粪缸杀蛆,一般每缸倒入药液1.5公斤,4~5小时后开始死亡,隔一夜即全部死亡。

文献考证

1. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载野芋曰:尖叶者良。治痼疽肿毒大疮,切片火焙热贴之,冷又换热者,数次立效。感冒发热,切块擦胸前及背。妇人赤白帶下,切細和米炒,加醋煮食立愈。有消暑之用;若將芋根之皮削去,切成薄片,用瓦釜干炒片时,再加米三指撮,水煎服,可治感冒暑气。凡感暑觉头痛身倦,將芋根用湿紙封好煨热之,以擦头額及腰脊前后心手脚等处,可令人通身舒适。二三月野芋有花,花后結实如米,取其实晒干,如有小腸气証,每服6~7粒即效。

2. 现代胡眞撰《山草药指南》载野芋曰:别名木芋头。切成薄片,用瓦釜干炒片时,再加米三撮,水煎服可治感冒暑气。凡感暑头痛身倦,將芋根用湿紙封好煨热之,以擦头額及腰脊前后心手脚等处,可令人通身舒适。取实晒干,每服6~7粒,治小腸气。治痼疽肿毒,切片火焙热贴之,冷即换,数次立效。

3. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载野芋曰:治牛伤寒(伤风)症。猪丹毒。

[附注] 誤食未煮透的痕芋头或生食痕芋头发生中毒解救方法:(1) 飲好的米醋。(2) 飲生姜湯。(3) 飲蜜糖或片糖水。

細叶七星劍

Mosla cavaletaei Levl

別名：野香薷

科属形态 本品系唇形科石薺宁属的直立、一年生草本，揉之有强烈香味。单叶，纸质，对生，具柄，椭圆状披针形，先端渐尖，基部渐狭或楔尖，边缘有锯齿，两面有透明的腺点。夏季顶生和腋生总状花序；苞片叶状，生在下部的椭圆形或狭矩圆形，长1.8~2.2厘米，宽3~6毫米，先端短尖或钝，基部阔楔尖或浑圆，边全缘或上部有锯齿2~8个，被毛，具透明的腺点；萼钟状，被粗毛，结果叶增大，长5毫米，5齿裂，裂片刚毛状，彼此近相等；花冠粉红色，2唇形，上唇2裂，下唇延长近全缘，渐尖；雄蕊4枚，发育的2枚，花药2室，广歧；子房上位，有心皮4个，4裂，4室，每室有胚珠1颗；花柱着生于子房基部，顶端有深而近相等的2裂。花后结果，由4个具1颗种子的小坚果组成，生于萼的基部。

生长环境 原是野生，多生于山谷、疏林、湿润的林下。本省多为移种。夏季采收全草。

产地分布 我国南部，日本。本省以香顺县种产为多。

药用部分与气味性能 全草。香气强烈，味辛，性温。能解蛇毒，祛瘀定痛。

临床应用

1. 子宫瘤 先服第1方：七星劍、五叶合、雨伞根各1两，生用，干者用5钱，煎水适量，冲酒少许，连服3天。第4天服第2方：熟地4钱，当归4钱，北芪1两，洋参3钱，肉桂1钱，炙草1钱，水煎1次服。第5~7天续服第1方；第8天服第2方；第9~11天又服第1方；以后服第2方，连服10剂而愈。（海丰县袁学勤献方）

2. 毒蛇咬伤

(1) 七星劍6两，石香薷8两，丁刁竹2两，大金10两，独脚烏柏6两，入地金牛4两，通心蓮2两，蛇总管1斤，七叶一枝花2两，田基黃6两，独脚蓮2两，鱧魚草8两，香花草4两，半边旗6两，山青梅叶6两，磨地苦6两，蛇王草1斤，糖烂烘干备用，每次用1两擦伤口外部，或冲酒服。（番禺吳河庭献方）

(2) 黃連、貝母、降香、白芷、山甲、香附、法夏、連翹、吳萸、雄黃、乙金、甘草、五靈脂、細辛、澤蘭、槐子各5钱，加入生药七星劍、入地金牛、蛇总管、山白菜、半边旗各1两，混合研末，炼蜜为丸，朱砂为衣，每丸重1钱5分，輕症服1丸，重者服2丸，酒化冲服。（台山附城公社蛇医刘清献方）

(3) 七星劍、七星合、七姊妹、上山虎、下山虎、平山虎、三丫虎、石上香、九星香、雞骨香、一枝香、独脚蓮、半边蓮、大力牛、黑面神、金雞爪、丫胆头、烏不泊、了吊草、英雄菜，每味用1钱，加入灵仙3钱，防风3钱，没药3钱，甘草3钱，細辛3钱，青皮3钱，白芷3钱，法夏3钱，赤芍3钱，吳萸3钱，桔梗3钱，紅花3钱，山甲3钱，角刺3钱，黃芩3钱，乳香3钱，香附3钱，生草3钱，沉香3钱，連翹3钱，蒼朮3钱，薄荷3钱，雄黃精3钱，以上生草药君臣药合共43味，可浸酒1斤。成人每次服1~1.5两，如服后再痛，再加服一两；也可丸，大丸每丸重2钱，小丸重1钱，酌量輕重，分別采用，以酒化服，孕妇忌服。（增城县仙村卫生院蛇医郭业林献方）

(4) 青木香、白芷、五靈脂、吳萸、黃連、法夏、八角、枳叶、雄黃精，各用5钱，蜈蚣2条去头足，另加生草药：金牛公模、蛇总管、蛇退步、七星劍、半边蓮、秋苦瓜，每味干者用5钱，如用生青每味1.5两，共

末，炼蜜为丸，朱砂为衣，每丸重1钱5分，蜡壳封固。每次服1丸，停数小时再服1丸，取效尤捷。用时以酒化服一半，余一半以酒调敷伤口周围；注意勿阻止毒水排泄，毒水流尽便能痊愈。方内生草药蛇退步又名三枝标、仙人对坐草、半边旗、山百足。此方宜平时制备，以应急需。如无则用单味入地金牛公根，和生盐擦之亦可。（广州中区清平街卫生所区韩世献方）

（5）半边旗5钱，半边莲5钱，三角草5钱，七星剑5钱，田基黄5钱，将上药置锅内煮熟后捣汁，冲入好酒8两，1次或分2次服。如伤口污秽者可用大艾，白苣粗（即香茅草），酸草，不予煎水洗。（珠海县唐家湾联合医院黄润德献方）

3. 跌打瘀痛 桂枝1两，三棱1两，乳香1.5两，牛膝1两，田七2两，莪朮1两，血竭1两，泽兰1两，没药1.5两，血珀1两，熊胆5钱，另生草药：大罗伞4两，细蕤集4两，田基黄4两，越地拉4两，大树桉3两，松栝3两，苦楝3两，黑骨芒2两，老虎须2两，鸛骨香3两，大还魂3两，小还魂3两，白背木耳3两，丁刁竹3两，千斤拔3两，大胆王2两，地松柏2两，白鳳藤2两，满天星3两，金英嫩叶3两，七星剑3两，量地千3两，盆田73两，金鎖匙3两，入地金牛3两，七叶一枝花2两，过江龙3两，駁骨草3两，珍珠草2两，过山香4两，松根藤4两，六月霜3两，铁罗汉3两，日行千里2两，金耳环2两，清明树3两，将上药煮熟浸酒25斤，浸100天可用，可内服外涂。此方对跌伤不省人事，新伤旧伤，均可治疗，能消肿止痛，去瘀生新，于产后瘀血作痛，手足面目浮肿，破伤风，蛇虫咬伤，及心胃气痛等疾患，均有奇效。（宝安洗应登献方）

4. 生蛇（带状疱疹，淋巴管炎，瘰疬）痒痛异常 细叶七星剑适量，煎水洗患处，另取适量煎服。（广州金花街生草药诊所何中和献方）

5. 慢性皮肤湿疹痒痒 七星剑适量，煎水洗之。（何中和献方）

6. 风痰症（多发性脓肿） 七星剑适量，捣烂加酒混和，煮沸后候温敷患处，及适量内服。（何中和献方）

文献考证

1. 清代何克諱撰《生草药性各要》载七星剑曰：味香性辛，专治獾狗毒蛇恶物咬伤，遇跌打，敷大疮等症。叶似桃柳，花如珍珠，根枝花叶俱是对面所生，梗圆。此药实出在外省名山，移来栽种。今有本地老虎须相似，可以乱之，取药者请辨别可也。

2. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载七星剑曰：味辛香，专治獾狗毒蛇咬伤，遇跌打，敷大疮。

3. 现代胡真撰《山草药指南》载七星剑条曰：有大叶小叶两种，花如珍珠，根枝花叶俱对生，味辛，气香。凡獾狗咬伤或毒蛇及毒物咬伤，或周身起蛇形红肿，捣敷或和鸡肉煮食。

黃 皮

Clausena lansium (Lour.) Skeels

科属形态 本品系芸香科黃皮属中的一种直立多枝小乔木；茎枝粗糙灰黑或暗灰绿色，枝叶揉之有香气。叶互生，薄革质，奇数羽状复叶，长10~25厘米，有小叶5~13枚；小叶互生，具短柄，阔卵形，椭圆形或披针形，通常偏斜，长7~12厘米，宽2.5~6厘米，先端钝，基部阔或阔楔尖，常为不对称，边缘波浪形。初春开花，为顶生或腋生、直立、由基部分枝的圆锥花序，枝粗壮，花白绿色，直径约5毫米，花柄极短而厚；萼4~5裂；花瓣4~5裂，分离，长3~4毫米，凹陷，复瓦状排列；雄蕊8~10枚，着生于—伸长的花盘周围；花丝基部扩大，顶端钝尖；子房上位，4~5室，每室有胚珠2颗。花后结一浆果，近球形，长1.5~2.5厘米，果皮具腺体，有柔毛；种子绿色，扁卵圆形，前端略弯曲，基部保留斑纹。

生长环境 栽培于村旁、庭院或坡地肥沃的土壤中。夏季采收果实后随即采叶。

产地分布 亚洲及热带地多栽培。我国广东、广西、福建等省均产，广东以清远、阳山、南海等县栽培为多；普遍。

药用部分与气味性能 叶、核、根。气香，味微辛苦，性平。能宣解郁热，理疳痛。

临床应用

1. 瘧疾流感

(1) 用阴干黃皮叶2.5市斤，加水24市斤，用瓦鍋煎煮4小时，約余8市斤，傾出，再加水20市斤，將渣再煮4小时，約得8市斤，傾出和前次煎出的水合并，再濃縮至8市斤(約1卡含量)，趁熱加入安息香酸粉10克攪勻，使粉溶解作为防腐劑即得。每毫升黃皮叶水相当于生药0.3克余。服用劑量：成人每次服30毫升，每日服3次(每次服至60~80毫升，亦无不良反应)。小儿每次服15毫升，亦可服30毫升，每日服3次。連服3~6天。此方法对瘧疾和流感的治疗均有显著效果和优点，該方經治愈瘧疾20多例，流感200多例，效果确可靠，絕大部分病者于服药1~2天体温即恢复正常，其他病状亦随之消失。退热作用緩和，无发汗及其他副作用，且能助消化，服后能維持食欲。又可取鮮黃皮叶1兩(如用干者約5錢)，以水2碗煎取大半碗，一日一次服。(广东省皮肤慢性病防治研究所刘仲漢献方)

(2) 龙川县卫生防疫站刘国光制成二次煮取混合濃縮液(1:1)，成人每次服12~20毫升(鮮黃皮叶1.2~2.0市兩)，一日三次，小儿酌減，連服2天，防治流行性感胃获得显著疗效。

(3) 中山医学院于采風期間，曾在德封莫村公社古青生产队一梁姓家，共5人，有2人患流感，即取黃皮叶5兩煎水，3人一次服完，未患流感的2人，服药后始終未有出現感染。

2. 急性黃疸 鷄骨草1兩，黃皮叶1兩，金錢草1兩，清水2碗煎至1碗空心服。(海南陈风大献方)

3. 胡豆黃 以茵陈蒿湯服之，大小便不通加大黃、車前酌量；另用黃皮叶約1兩許煎水，加入黃糖少許同服。(兴宁陈瑞其献方)

4. 胃痛、心氣痛

(1) 以黃皮樹根2兩切碎，鷄1只去內脏，加老酒4兩，开水8兩，炖烂空服。一般服三次即可，对多年胃痛及雙關均效。(《福建中医驗方》，广东各地亦均有此驗方)

(2) 老黃皮樹根或梅花樹根3兩，黑梔7~8个，水煎，用好酒冲服。(广州赵思宽献方)

(3) 在五月五日午时，采生黃皮果晒干，用时則取男双数女单数，搗烂煎水一盅，服之則愈。(赵式訓

献方)

5. 水肿

(1) 黄皮叶、芒果叶各等量，不拘多少，以水煎去渣，每在中午时以此水趁热洗浴，连洗一星期则愈。(增城黄明柱献方)

(2) 黄皮叶1把，烧灰，以水滤七八次，将滤出之水煎服，服后即泻下，以后再服四君子汤加味。(黄大教献方)

(3) 生草5钱，川枳实4钱，黄皮根8钱，细粟1两，研为细末，另用朴硝5钱浸水为丸，分作15粒，第一天服3粒，第二天起每天服2粒，共连服7天痊愈。(河沅县董煥基献方)

6. 疝气偏坠

(1) 黄皮树寄生4两，瘦猪肉4两，以水8碗煎至1碗服。或用黄皮果连皮、蒂、核服亦可。

(2) 小腸气痛 用黄皮树根3两，净水煎服则效。(中山石岐市陈群兴献方)

(3) 黄皮树根、鸡核子根各1两，煎水服，消后再服当归蘆薈丸，每日3次，每次4钱，连服几天则愈。(新丰張經周献方)

(4) 黄皮树根1两，红骨猪鬃喉1.5两，酒饼3只，煎水冲酒服。(湛江市梁德伍献方)

(5) 黄皮树寄生2两，打粉泡1两，鸡蛋1个，共煎水服之则愈。(英德江自华献方)

7. 夹色 黄皮树根3两，青壳鸭蛋1只，煎水服，连服2~3次可愈。(英德江自华(古)塘巫济良献方)

8. 无名肿毒 黄皮树根干研为散，用时以水煮熟，待温，加入梅片少许，敷之则效。

9. 妇人经闭 黄皮叶1~2两，捣烂取汁冲酒服。(湛江市詹达卿献方)

10. 风疮 黄皮叶嫩芽、雄黄精、蜜糖、面粉各适量，为末，以蜜为小丸如胡椒大，早午晚每次服20粒。另用黄皮嫩芽酌量，与猪肾共煮，服两三次，外用黄皮叶嫩芽、烏孔叶各等量捣烂敷之。(中山县梁炳财献方)

(附注) 风疮即风痰流注或深部脓肿。

11. 毒蛇咬伤 黄皮叶2两，好酒2两煎熟，内服一半，外敷一半，如患者神志不醒时，则先灌酒2杯，服药后约30分钟左右则醒。搽药时首先从外到近伤口处为止。(阳春县春湾医院蔡云成献方)

12. 狂犬咬伤 黄皮叶、韭菜叶头、白苗魚藤叶、飯瓜去核，临时酌量用，以冷开水捣烂敷伤口，并将捣烂的汁饮少许，戒食花生、芝麻、肥猪肉和戒房事一百天。但生油可食。(清远县龙塘卫生院献方)

13. 老鼠咬伤 黄皮树根1两，铁包金叶1两(又名狗脚迹、烏云薑月)，以水4碗煎至1碗，空腹服，连服4~5次。病后宜戒热性及有刺激性食物。(阳江白沙医院郑兆平献方)

14. 脱臼骨 黄皮树根、石猛(石馒头)、山胡椒、蚯蚓各酌量，生鸡1只，和药捣烂敷在伤处。敷药时間以燒完火香八寸則去药。(新丰附城游振平献方)

15. 食狗肉誤食綠豆中毒

(1) 以黄皮树叶2两，煎水服则愈。(江門洪星唐献方)

(2) 以黄皮树叶1~2两，加生盐1撮捣烂，用滾水冲服。(广宁沙坪卫生院郭麟献方)

文献考証

1. 清代赵学敏撰《本草綱目拾遺》載黃皮果曰：酸平无毒。消食順气，除暑，止嘔逆痰水，胸膈滿痛，蛔虫上攻，心下作痛。其核可涂瘡癰治疝气。

2. 清代赵寅谷撰《本草求原》載黃皮树皮曰：辛苦温。消风肿，去痞积，散热积，通小便，煎酒飲；叶解痧除痞；嫩叶退黃肿；子消食；核治疝气。

3. 现代胡眞撰《山草药指南》載黃皮叶曰：煎水洗疥癩，能去热散毒，消肿解痧恶。

4. 现代肖步丹撰《岭南采药录》載黃皮叶曰：消风肿，洗疥癩，去热毒，酒煎服；用叶一二两煎水服能通小便；煎水洗，解痧恶。其果味甘酸，性平。消食順气，除濕热，主嘔逆痰水，胸膈滿痛，蛔虫上攻心痛。多食荔枝发瘡者，用此解之。其核治疝气，研烂涂小兒头上疳癰。

(附注) 广东民間对小兒两脚突然痿軟不能走動，認為是小兒赤足踏过苏(藤)鼠行过的脚印所致，即用黃皮叶約10~16两煎湯趁热熏洗两足全部。

番 薯

Ipomoea batatas (L.) Poir.

别名：白薯、红薯

科属形态 本品系旋花科牵牛属中的一种蔓生具乳状液汁的草本；无毛或稍被毛，有白色，黄色，红色或紫斑色的块根；茎长约1~3米。单叶，纸质，互生，卵形至矩圆状卵形，长6~14厘米，先端渐尖，基部截头形至心形，边有角或有缺刻，有时指状深裂。冬季开花，辐射对称，大而美丽，数朵生于一粗壮的花序上；萼片淡绿色，长约1厘米，先端钝但有小锐尖；花冠漏斗状，长4~5厘米，紫红色或白色；雄蕊5枚，内藏；子房上位，2~3室，胚珠通常4颗。花后结果，果为1个4~6瓣裂的蒴果。

生长环境 全系人工培植，适宜于黑色沙质土或褐黄色沙质土疏松排灌良好地方，按插枝后预计收采时间收采。

产地分布 温带、热带，普遍繁殖生产。

药用部分与气味性能 块根、叶、藤。嗅无，味甘淡微涩。藤能止吐泻，叶、根能通利大便。

临床应用

1. 急性肠胃炎(俗名提痧。其症状：腹中绞痛，上吐下泻，汗出，甚则抽搐等状)

(1) 番薯藤干者1两，或生者2~3两，樟木二皮5钱，勾藤5钱，茶叶5钱，竹茹3钱，煎水一碗服，速服2~3次则愈。(广州中医学院进修部冯毓山献方)

(2) 番薯藤、辣蓼头，二味酌量，煎水饮立愈。(德化县谢兆陵献方)

(3) 藿香4钱，尖槟3钱，杜仲3钱，吴茱3钱，附子3钱，川芎1.5钱，升麻1钱，苍朮4钱，枇杷叶3钱，藜艾5钱(醋炒)，煎水服。另用番薯藤2~3斤，煎水一大盆，冷擦手足可免抽筋。如脉有力加川连；脉无力加干姜、桂枝；如失音闭口，用桂林纸滤烟熏鼻，待口开时刻灌上药可免服入即吐。忌米粥及生姜。(欧占棠献方)

(4) 番薯藤2~3两，加生盐炒焦，冲水煎服。(高要沙埔卫生院吴托勋献方)

(5) 番薯藤、川木瓜，二味重用，煎服即愈。(高要沙埔卫生院陈光愿献方)

2. 斑痧(腹痛干呕，大小便秘急等状) 番薯藤干8两，白矾2钱，煎水服。(罗定七区卫协会林灿献方)

3. 腹水

(1) 薯苗叶、猪菜嫩叶，黄糖少许，共捣烂敷臍部，经1~2小时即泻下，泻尽水气即愈。(新丰县罗健洪献方)

(2) 番薯叶2斤，用文武火煮熟食之。(台山中医研究所献方)

4. 疟疾 番薯0.5斤，将番薯洗净和常山适量煮食，在发作前3小时服，不论双单疟疾皆效。妇女及元气虚弱者忌服。(广州中医学院进修部张高士献方)

5. 夜盲症 番薯叶4两和猪肝煮食，速服2~3次则愈。(广州中医学院进修部黄光后，清远热拓卫生院林益达献方)

6. 面疔 番薯叶1两,金絲蜘蛛1只,黃糖少許,搗爛貼患處。(劉香曉獻方)
7. 对口瘡 番薯叶、蝦醬各適量,共搗爛敷患處則愈。(廣州中醫學院進修部曾子豪獻方)
8. 乳瘡 用白番薯搗爛敷患處,見熱即換,連敷數天即愈。(江門潘伯成獻方)
9. 纏腰蛇 番薯叶適量,梅片少許,共搗爛塗患處即愈。(丰順縣徐景初、劉紀明、杜日光、王玉磨獻方)
10. 玻璃及鐵釘刺傷 番薯、攪鼓(或單用冲菜),搗爛敷患處即愈。(封川彭海山獻方)
11. 槍傷 番薯叶搗爛敷傷處即效。(韶關新丰县丘雪枚獻方)
12. 舌腫大 用番薯藤煎水服之則愈。
13. 瘡毒發炎 生番薯洗淨磨爛,敷患處,有消炎去毒生肌之效。(范良春獻方)
14. 出血不止 田七、番薯叶二味酌量,搗爛敷患處則止。(和平叶亞坤獻方)
15. 中河豚毒
 - (1) 番薯叶心2兩,搗爛煎水服,即吐,若不吐則再服,多服亦無妨。(黃炎金獻方)
 - (2) 番薯叶約10兩,和水搗爛取汁灌服,灌下后吐出粘痰則愈。(海康治塘鄉茂咀村余文光獻方)
16. 狂狗咬傷
 - (1) 用生番薯叶和黃糖共搗爛貼患處,每日換二次,連貼數天則愈。(潮陽山夾山灯塔社劉只寧獻方)
 - (2) 馬錢子、番薯叶不拘多少,共搗爛敷傷口則愈。(海康烏石港,中山石岐胡大炳獻方)
 - (3) 番薯叶、片磨、威酸木叶、珍珠果,上藥酌量,共搗爛成膏,敷傷口。(陽春三甲衛生院彭君培獻方)
17. 百足咬傷 用番薯苗心搗黃糖敷患處則效。(廣州中醫學院進修部黃煥培,順德歐陽才獻方)
18. 阴囊濕疹 用番薯苗叶加白鹽少許,煎水洗,洗后用薯粉、滑石粉二味適量敷患處。(翁沅鴻雲香獻方)

文獻考証

1. 清代趙賓谷撰《本草求原》載番薯叶曰：醋蒸貼爛囊癰并爛脚，拔毒。
2. 現代胡眞撰《山草藥指南》載番薯藤曰：凡霍亂抽筋，取藤煎服。毒蛇咬傷，可內服外敷。

番 石 榴

Psidium guajava Linn.

别名：番榴，花榴，雞屎果，拔子

科属形态 本品系桃金娘科番石榴属中的一种乔木；高10米，直径10~15厘米，树干秃净，树皮浅黄褐色，老时成鳞片状剥落，嫩枝四方形，具白色短毛，老则脱落，芽密被白色短毛。单叶，革质，对生，稀有轮生，矩圆状椭圆形至卵圆形，长5~12厘米，宽3~5厘米，前端圆形或短尖，基部钝至浑圆形，边全缘，叶面深绿色，叶背浅绿色，均粗糙；叶面主脉微凹或平坦，叶背主脉则微凸，嫩时疏生短毛，老则脱落；叶柄长4毫米。夏初开花，白色，芳香，单生或2~8朵同生于一长1~2.5厘米的柄上；花萼梨状，绿色，长1~1.5厘米，有不规则的裂片4~5；花瓣4~5枚，扩展；雄蕊多数，分离，着生于花盘上；子房下位，4~5室。花后结一浆果，球形，卵形，梨形，长2.5~8厘米，直径3~5厘米，熟时常具黄色、白色或胭脂红色的肉，内藏多数种子；种子卵圆形，坚实，细小，淡白色。野生种所结的果，一般绿色而小，开花期比栽培种较长。番石榴多系栽培，鸡屎果多系野生。

生长环境 生于村边、溪边、稻田围基、山岗低丘陵的红色或黄色土壤，粘质或砂质土壤。四季可采果实茎叶。

产地分布 热带各地均有分布。国内四川、云南、福建、广西、广东等省均有产，本省珠江三角洲产量较多。

药用部分与气味性能 未成熟小果实、叶、茎皮。嗅具特异微香气，味涩，性平。能收敛，止吐泻无度。

临床应用

1. 急性性肠炎

(1) 番石榴嫩叶晒干研末，每次用2钱，加面粉少许，放入锅内煮熟服下。（梅县陈增经献方）

(2) 番石榴茎1两，炒干煎水服下，能迅速止泻和止腹痛。（北海人民医院献方）

(3) 新鲜番石榴叶适量，用开水洗净，以口嚼烂，吞服其汁。（广州市郑先贵献方）

2. 外感食滞 番石榴叶4钱，黄皮叶4钱，威灵3只，磁片1片，净水煎服。（番禺谢村周宇献方）

3. 房事感冒及撞红 番石榴叶3两，海金沙苗6两，共捣烂，和酒1两，取汁冲开水服。如撞红加木槿子树根6两煎服，更妙。（新丰县会前卫生站陈小琼献方）

4. 妇人崩漏 番石榴嫩灰，每服3钱，以开水送服。（五华张乃清献方）

5. 毒蛇咬伤 番石榴叶适量，捣烂以滚水冲服。（清远赖祺献方）

6. 痲症久不愈合 番石榴根、生姜、冰糖，捣烂贴患处。（《福建中医秘方》2集）

7. 蜂蝎瘡 番石榴嫩叶2~10片，捣烂敷患处。（陈裕泰献方）

文献考证

1. 现代胡真撰《山本草指南》载番石榴曰：取向东之根，刮取其皮，以白醋煎含，止牙痛。取树皮煨灰，和臭草汁涂挤瘡甚效。小儿头面疮痍，取根和鸡毛煎水洗。

2. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载鸡屎果曰：治牛痢症（红白痢）。

菸 草

Nicotiana tabacum Linn.

科属形态 本品系茄科菸草属中的一种直立粗壮一年生草本；高达2米，全部被粘质柔毛，上部分枝。单叶，厚纸质，互生，着生茎上部的较小，着生基部的长达35厘米，宽18~24厘米，椭圆状卵形至矩圆形或倒卵形，先端渐尖，基部下延，多少抱茎。夏季顶生或近顶生圆锥花序；萼为管状，绿色，长约2厘米，有披针形裂片5枚，结果时增大，不脱落；花冠漏斗状，淡红或玫瑰红色，长4.5~5厘米，顶5深裂；雄蕊5枚，内藏，与花冠裂片互生；花丝1/3与管合生；子房上位，2室，每室有胚珠多数。花后结蒴果，卵形，长约1.5厘米，与宿萼等长。

生长环境 栽培于肥沃沙质泥土，干湿适中，排灌便利的地方。夏秋季采收。

产地分布 广植于温带、亚热带地区。我国各地均有分布，本省以高明、鹤山产量最多，新会次之。

药用部分与气味性能 叶。气香，味辛辣，性温。能辟瘴雾及蛇虫，消肿逐湿，杀虫止痒。

临床应用

1. 跌打 熟菸4两，沙姜末4两，黄泥适量。用法：以水煮匀敷患部。另用生鸡一只，剖净后以酒煮服。（揭阳凌振基献方）
2. 蜂巢疮背痛 熟菸、米酒调敷。或用熟烟1钱，樟脑5分，陈石灰1分，蜂蜜3钱，捣匀敷之。（梁剑雄、陈玉轩献方）
3. 风痲脚膝 熟菸灰2两，横搏灰2两，牡蛎5钱，白芷1两，为末外敷。（中山石岐陈桂棠献方）
4. 蛇头指 熟菸5钱，茶麸5钱，黄山藤1握，苦楝树皮适量，共捣烂敷患处。
5. 痲肿不论初起已溃，皆可使用 熟菸丝、冷饭，共捣烂敷患处。（汕头林建德献方）
6. 三角风 生切菸、百部各适量，以好酒浸取浓液搽之。（江門曹賢钰献方）
7. 香港脚 将熟菸醋煎热洗患处，另用陀僧粉搽之，每日1次。
8. 汤火伤 黄菸丝4两，好醋1斤，以醋调黄菸丝敷患处。（龙川县黄人可献方）
9. 毒蛇咬伤（青竹标蛇） 熟菸、扫把木子（即岗松，民间多作帚把用），将上药给伤者口嚼食，感味是甜者为青竹蛇咬伤，百发百中。如感味辣臭者服之无效。（泉水乡陈耀俊献方）
10. 跌打积瘀 菸丝0.5两，鸡蛋白1个，香油、米酒、血蜡壳（又名苏碱，瓦楞一类东西）煨灰，共调匀，做成一个饼置于患处，另用纸条蘸香油熬热隔饼灸患处。（海口董世元献方）

除四害

1. 灭蝇蛆子

（1）菸叶1斤或菸骨2斤，浸水35~40斤，经24小时过滤，经试验对致乏库蚊幼虫，每公斤水用烟骨浸液1克，24小时死亡50%。（广东省卫生厅防疫局土农药杀虫毒鼠介绍）

（2）又法：菸叶1斤，生石灰1斤，加水40~60斤浸泡，效果比上法更好，每公斤水用10克，2小时将致乏库蚊幼虫杀死50%，8小时全部死亡。试验蝇蛆，每公斤粪使用200克，24小时死80%。（广东省卫生厅防疫局土农药杀虫毒鼠介绍）

(3) 四合液杀虫剂：菸茎(或叶)3份，雷公藤7份，刺梨头(或馬錢子)4份，清水80份，取上药切碎，加水浸泡，汁浸出后过滤即成。用时每斤原汁可加水5斤稀释，用作喷洒，对杀蝇蛆孑效果很好；并能根治稻蝗、浮尘子、稻飞虱等，据农民使用反映，效果很好。(江西除害灭病总指挥部)

(4) 菸茎切碎，以每担粪2桶倒入粪坑中搅匀，24小时后，蛆开始死亡，38小时全部死亡。(《中国土农药志》山西资料)

(5) 将菸梗加热水4倍，浸12小时，撒在孑孓孳生之地，每平方米撒3升，72小时孑孓死亡62%。(北京市防疫站)。或将菸茎切碎，用热水浸17小时，制成1%浓度，24小时孑孓死亡率达100%(医学科学院药毒系)。(《中国土农药志》)

2. 杀蚊蝇

(1) 杀虫药水剂：菸骨粉15%，石灰50%，茶麸15%，辣藤粉20%，将上四种药混合制成药粉贮存，使用时加水10份，拌匀后喷洒用。(广东省卫生厅防疫局土农药杀虫毒鼠介绍)

(2) 菸茎谷壳烟熏剂：菸茎3份，谷壳3份，取菸茎切碎晒干，或研末，加谷壳混和，放于火盆内燃烧，每个立方丈房用12市两，门窗关闭，烟熏30分钟，成蚊可在20分钟内死亡，苍蝇30分钟死亡。(《江西中医药》1958年11月号)

(3) 菸叶烤焦或晒焦研末，放入稀粥或米汤搅匀(加入少量糖更好)，诱杀苍蝇，蝇吃后因神经被麻痹而死，一盆稀粥可用5~7天；稀粥存放3~4天后，由于稀粥变酸，蝇更喜吃，效果更大。(《药学报》1959年4月号浙江、山西资料)

(4) 菸茎合剂：菸茎1斤，曼陀罗1斤，肥皂4两，水10斤，配制法：菸茎切碎，加水煮沸后过滤，俟滤液冷却后再将曼陀罗、肥皂片加入，不断搅拌，即成。效果灭蚊蝇达90%以上。(《中药通报》1959年2月号安徽资料)

3. 灭鼠 流行病研究所试验菸草加水浸1小时，水浴上煮0.5小时，过滤，再加水煮0.5小时，过滤，两次滤液合并，浓缩至浓度1:1。体重20克的小白鼠灌0.01毫升，立致死亡。(《中国土农药志》)

4. 灭螺 以浸渍三天后的菸草叶浸液，配成0.01%、0.5%及1%三种浓度浸渍法灭螺结果，发现浓度1%72小时的效果为96%。(《血吸虫病研究资料汇编》)

5. 灭臭虫 用曼陀罗2斤，桃叶2斤，菸草1斤，红辣藤2斤，煤油0.5斤，肥皂4两，水35斤，将红辣藤、曼陀罗、桃叶、菸草等切碎，加水煮沸，俟冷却后，再加入肥皂、煤油、水，搅拌均匀。效果：对杀灭臭虫、蚊、蝇蛆等，效果达90%。(《中药通报》1959年2月号安徽资料)

文献考证

1. 清代赵学敏撰《本草纲目拾遗》载菸草曰：味辛性温。开郁，燥吸解倦，毒伤止血。菸油有毒，杀虫最捷，诸虫咬伤，涂之即失。慈航活人书：毒蛇咬伤，先避风挤去恶血，用生菸叶捣烂敷之，无鲜叶用干者，研末敷，即菸油、菸灰皆可。不药良方：治毒蛇及毒虫伤，用鱼腥草、嫩面草、菸叶、草决明等分，杵烂敷之。百草镜：毒蛇伤，先取妇人旧油头绳扎住肿处，勿令肿上，再取耳垢封之止痛，随用多年油黑竹菸筒杆，紫色者亦可，毛竹者佳，一般约长三寸，咀嚼咽汁，渣淡吐去，并取杆中之油搽患处，菸杆味辣，服之反甜。蛇毒亦随解，痛止自愈，试效多人。凡蛇咬有蛇齿留肉内者，菸油涂之自出。刘羽仪方：毒蛇咬，取吃菸杆内脂膏，涂在咬伤处，用手指搽入肉中，痛即止，最效。刘氏方：蜈蚣咬，用菸筒内膏油，涂在咬处，或菸灰敷之，立止痛。

2. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载菸草曰：治牛腹膜炎；腹胆症；瘤阳症；牛尾被铁链蛇毒伤；误吃野猫屎中毒；伤寒(伤风)症；气肿疽(箭牌、黑腿)；牛被蜈蚣入鼻；头风症。并用制牛膏药膏。

黑面神

Breynia fruticosa (L.) Hook. F.

别名：鬼面符，夜兰茶，繡爐草

科属形态 本品系大戟科黑面神属中的一种秃净小灌木，分枝多。单叶，纸质，互生，卵形至卵状披针形，长2.5~4厘米，宽1.8~2.4厘米，先端短尖或钝，基部闊楔尖，叶面深绿色，叶背粉绿色，其中有些叶面或叶背生成白色有光或半焦环纹痕迹，有似蜗牛爬过时遗留之分泌物，因此有鬼面符名称，鲜叶晒干后叶面常变黑色，背面灰白色，因此又有黑面神名称。叶柄极短，有小托叶。春末秋初腋生单性花，雌雄同株，每一叶腋着生2~4朵；雄花生于下部花束上；萼长约2毫米，陀螺形；雄蕊3枚，花丝合生成一柱，柄长2~3毫米；雌花生于全部花束上；萼基部陀螺形，边扩张，6裂，直径约4毫米，结果时扩大1倍，呈盘形；子房上位，3室，每室有胚珠2颗；花柱3枚，2裂。花后结核果，近球形，直径约6毫米，肉质，不开裂，位于扩大宿存的萼上。

生长环境 生于荒地及小丘陵或台地灌木丛中及道旁。夏秋采叶，秋冬采根。

产地分布 马来亚至我国南部。本省以从化、番禺为多产，较普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 叶、根。气味微苦，性微寒。能解热散毒，行瘀化滞。

临床应用

1. 黄疸·黑面神根2钱（去粗皮），猪苓3钱，茵陈2钱，共为细末，取猪胆1只，将药末纳入猪胆内蒸熟食，服3~4次即愈。愈后用鸡屎藤约8两，露十夜，舂成细末，和米粉制成饼，当作干粮食，病不复发。（同庆长岐李家献方）

2. 痢腹痛

（1）黑面神5钱，捣烂成浆状，用温开水冲服。（台山中医研究所献方）

（2）黑面神连枝叶2~3两，用水2~3碗煎服。（灵山县黄升宜献方）

（3）黑面神1两，五娘草5钱，三大鞭5钱，共捣烂，冲开水连服3次，每隔8小时服1次。（云浮县黄温生献方）

3. 双单蛾喉（乳蛾）·黑面神、山豆根、耳环草、雷公筋梗、红倒勾藤、黄糖各适量，捣烂，以布包如橄榄大，连续含3~4枚，共约1小时即可，含之过久会使牙齿松动。另以生地、红花、麦冬、花粉、灯心花、银花、连翘各适量，净水煎服。若因肿痛影响颌关节时，另用鹿角草、鸡不食、雷心筋、红草带藤，煮汤热敷颌关节。（湛江合浦县陈家持献方）

4. 膀胱结石·黑面神5钱，地榆头3钱，假苏叶2钱，滑石粉1.5钱，甘草梢5钱，通草5钱，竹叶3钱，净水6碗煎至1.5碗，早上空腹服。服后如有尿意，仍应忍之，等到不能再忍时，然后用力排尿。如此结石可逐渐排出。（广州解放中街卫生所黎沛璠献方）

5. 疔疮·黑面神捣烂敷患处。（湛江市李德初献方）

6. 股阴疽·黑面神1两，三棱1两，莪术1两，先将三棱、莪术二味研末，后将黑面神捣烂，加入三棱、莪术粉末和匀，用蕉叶包煨熟，加食盐少许敷患处，2~3次即愈。（合浦谢进益献方）

7. 美奇症（生在脐下约五寸处）·黑面神头去皮青、鸡蛋、黄糖各适量，煎服。首次另用落地生根捣烂敷之。以后改用落地生根、假韭菜、全蒜仔捣烂敷之。（新兴温南记献方）

8. 蛇咬伤

(1) 黑面神根煎水服1次,以后用下方: 吴茱萸、川贝、贯众、雄黄、白芷,有肿加细辛,煎服。渣捣烂敷患处周围。(封开县叶耀荣献方)

(2) 蛇总管、黑面神叶、黑骨走马,将药洗净捣烂取汁,再用洗米水将药煎汤一小碗加入药汁和服,药渣外敷伤口周围。忌饮生水及生水浸渍伤口。(华石乡祖贞献方)

9. 白油 黑面神根1两,煎水冲蜜糖服。(清远太平卫生院潘金水献方)

10. 蜘蛛咬伤肿痛不止 黑面神、黄糖各等分,捣烂敷患处。

11. 芒果疮 鬼面符根2两,鸡蛋连壳1只,正米酒8两,煎服。(清北泉水乡石毓珍献方)

12. 跌打骨折

(1) 黑面神、亮茄木叶、鸡不食、樟木白皮、杉木白皮、松树白皮、细叶榕、凤凰子、黑蒺藜、田基黄、红苞牙郎,以上11味捣烂敷数次,再放罐内加好酒炒热再敷。(黄志宝献方)

(2) 红心黑面神、小罗伞、生提子、乱发草、刀枪木叶、王瓜根叶、金樱根心、鸡不食、红雪豆叶、化眉木叶、竹筒罐、老公根、细接骨草、叶下红、凤凰儿,以上15味药捣烂后用籽米饭搅匀敷患处。如断筋加淡水蜆蜆10只共捣敷。(欽州李明卿献方)

(3) 黑面神5钱,龙骨乳尖1两,四方草1两,筋茶梗1两,透骨消5钱,木节兰1两,狗木叶1两,榕木叶5钱,爆牙槌5钱,离辣木皮5钱,田基黄5钱,天香爐5钱,灶心土1两,生姜3钱,葱头3只,银鳞匙5钱,白颈蚯蚓3条,煨水蛭7条,煨田蟹2只,竹筒罐2只,煨金边土鳖4钱,共捣烂,取生鸡1只,用酒灌死,杵烂后合以上各药加面粉7钱,籽米饭拌双料烧酒1斤,放锅内煮熟敷患处。在敷药前先将折骨复位固定,然后将药敷上。小孩敷药时间8小时,中年人敷药时间6~9小时,老年人7~10小时。

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求原》载黑面神曰: 苦甘微寒。散疮,消毒,洗腐烂,治漆疮。解牛毒。根浸酒,祛风壮筋骨。

2. 清代何克廉撰《生草药性备要》载黑面神曰: 味甘性寒。散疮消毒,洗烂肉及漆疮。解牛毒。偶中诸毒,食此必见香甜。

3. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载黑面神曰: 味甘性寒。散疮消毒,洗烂肉,治漆疮。人遇毒食之,则觉香甜。解牛病热毒。其根浸酒良。

4. 现代胡佩撰《山草药指南》载黑面神曰: 味甘性寒。散热解毒,洗烂肉,去腐生肌,治漆疮。

葫蘆茶

Pteroloma triquetrum (L.) Desv.

别名：田刀柄，劍板茶，咸魚草，百勞舌，追頭草

科属形态 本品系蝶形花科葫蘆茶属中的一种直立亚灌木状草本或灌木；高1~1.5米，枝为三棱形，稜上被粗毛，后变秃净。单叶，互生，纸质，卵状矩圆形至披针形，长6~12厘米，宽1.5~3厘米，先端短尖，基部浅心形或钝，背面脉上有极稀疏的短毛；叶柄长1~3厘米，有闊翅，翅闊4~8厘米，形象倒轉葫蘆，基部有脱落的小托叶两枚；托叶披针形，长约1.8厘米，基部闊3毫米，有縱槽紋。夏末頂生和腋生总状花序，长5~30厘米，有鑽状苞片，花为淡紫紅色或淡紫色，长5~7毫米；萼为闊鐘形，长约8毫米，下面裂齿线形，长过萼管；雄蕊10枚，上面1枚全部分离，其余9枚合生；子房上位，具极短的柄。花后结荚果，长2~5厘米，有荚节5~8个，被毛。

生长环境 散生于阳光充足或半阴的荒山坡地草丛或草坪上，宜于粘土及沙质土而較湿润的地上，过于干燥则生长不良。夏秋采收。

产地分布 印度、马来亚至我国南部。本省全境均有分布，番禺較多、較普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 叶。嗅无，味微苦微涩，性平微凉。能消暑清热，利尿，化积消滞，杀虫。

临床应用

1. 急性肾炎 广州市第三人民医院用葫蘆茶治急性肾炎，每次用1两，每天服2次，清水煎1小时服，服后小便量由每天600毫升，增加至1400毫升，在54个病例的治疗过程中，浮肿消退者37人，症状减轻者8人，有效率83%。无明显改变者7人，无效者2人，无效率16.7%。

2. 暑季煩渴 广东农村常用以代茶叶，煎成作日常飲料，有解暑清热止渴之效。

3. 痢疾

(1) 葫蘆茶(全草)、細叶扯头孟根各用2~3两，加雞蛋1个同煎，煎至雞蛋熟时，將蛋壳除去再煎，加生盐調味，湯蛋同服。(花县何曉明献方)

(2) 食菠蘿(凤梨)引起腸炎腹痛下痢，以本品煎濃汁作飲料可解。(广州市药材公司刘滿献方)

4. 咽喉肿痛 葫蘆茶2两，煎水含咽；如喉內紅肿不能咽水时，則先用消毒过的針刺穿，然后用上药含咽为佳。(电白岑鳴源献方)

5. 鷄骨哽喉 葫蘆茶3两，千斤拔根3两，喜炮內火药2錢，蓖麻仁5錢，沙姜2錢，共搗烂用蕉叶裹紧，取出乘温热敷于頸部哽处，約五小时后，可食粥飯使骨順下。(刘愛良献方)

6. 远年烂脚 先将葫蘆茶煎水洗淨患处，然后再用葫蘆茶研末撒患处，外用綢带包裹保护。(和平周錫三献方)

除四害

1. 杀灭蝇蛆 葫蘆茶36%，双眼龙叶50%，白花丹15%，共为末，撒布于蝇蛆孳生地，在6~8小时溶化，每平方公尺面积，約用2~3两生效。(新兴集成公社紅旗堂潘峰万献方)

〔附注〕 本植物性温和平，在夏季可作茶飲料，又具杀虫功效，广东常用本品鮮草或干草全株拌同

腌咸魚，能防止蝇蛆孳生，故又名咸魚草。亦可晒干研粉撒在肉类上，防止蝇蛆发生。将干粉末和飯搗勻，撒在有蝇地方，蝇吮食后能致死亡。

2. 杀虫 葫蘆茶、大茶药、假黄皮、辣蓼、烏柏叶、羊角扭、苦楝叶、青根、布荆叶、白花丹、葛蒲头、山姜，将上药制成水剂，名叫“万能杀虫水”。施下約 10 分鐘，就能把稻龙虱、蠹虫、稻叶卷虫、稻包虫、蝴蝶及蜉蝣都杀死。（《南方日报》1959 年 8 月 11 日）

3. 杀孑孓 据昆虫所試驗，用 20 倍水浸液对孑孓杀虫率为 55%，用 100 倍酒精浸液杀虫率为 63%。（《中国土农药志》）

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求真》載葫蘆茶曰：性平。消食，杀虫，治五疳，退黄疽，作茶饮妙。

2. 清代何克諫撰《山草药性名要》載葫蘆茶曰：味涩性平。消食杀虫，治小儿五疳，作茶饮。

3. 现代肖步丹撰《岭南采药录》載葫蘆茶曰：叶如葫蘆，秋老结子作穗，四时采之。味涩，性平。消食杀虫，治五疳，作茶饮，又退面黄。疳久有虫，敷之即愈。又解热毒，去疳积。干置衣箱中，辟蠹去蛀益。

4. 现代胡眞撰《山草药指南》載葫蘆茶曰：能杀虫，消小儿疳积。

路 兜 筋

Pandanus tectorius Parkins

别名：勒角藤，婆羅藤，山波羅，山葫古

科属形态 本品系路兜树科路兜树属中的一种直立分枝灌木，干具支柱根。单叶，革质，聚生于枝的顶端，线状披针形，长达1.5米，宽3~5厘米，先端长尾状渐尖，边和背面上中脉有利刺，刺端向上。老树于夏季开花一次，花单性异株，无花被，雄花序稍倒垂，长约50厘米；苞片披针形，渐尖，近白色；雄花无数，芳香，密排，花丝合生，花药直立顶端有芒基生，退化雄蕊缺；雌花退化雄蕊缺，子房有胚珠一颗。果大，单生，椭圆形或球状椭圆形，长约20厘米，由50~70或更多的倒圆锥形、稍有稜角纖維状肉质的核果构成，核果长4~6厘米，基狭而顶平，核4~10室，顶部于室间有槽，成熟时黄红色。

生长环境 喜生于海滨地区，山麓、坡地、田边、路旁黄红色粘土、砂质土壤均可生长。也有用人工移植的。

产地分布 广布于热带、亚洲至太平洋各岛。本省沿海普遍，散生或丛生；湛江专区和海南岛特别多产。

药用部分与气味性能 茎根、叶芽、果核。嗅无，味甘淡微涩，性微凉。茎根能解諸輕重实热；叶芽能凉血止血生肌，杀蠅止痒。茎上的草菌止热痢。

临床应用

1. 小儿夏季热（适应症为眼蓝色，舌苔薄白，唇红，指纹现紫色，疲倦，食欲不振，口渴，午后潮热，早晨凉，久热不退，便黄溺赤）路兜筋3钱，淡竹叶2.5钱，冬桑叶2.5钱，天花粉2.5钱，茯苓2.5钱，山楂2.5钱，生苡米3钱，知母2.5钱，清水2碗煎至0.5碗，分3次温服。如腹不胀无青筋，口不渴，溺清长时可去花粉、生苡米，加党参2钱，焦躁夜啼加灯心1扎。本方为三岁剂量，采用时按年龄大小增减。（广州中医学院进修部学员献方）

2. 牙龈不止 用路兜筋叶基部（不见太阳照射而色嫩白的）约1两，煎水含漱。恩平县恩城人民公社中心卫生院曾治1例牙龈，病者衄血数日不止，经注射止血剂和抗坏血酸等药无效，后用本方含漱，衄血即止。（恩平谭伯英献方）

3. 糖尿病 用路兜筋根适量煎服。（汕头专区献方）

4. 大茶药中毒 路兜筋4两捣汁，将药汁频频灌服，屡见大效。（云浮县小河卫生院麦炳荣献方）

5. 疮疡烂肉生虫 取路兜筋心和黄豆捣烂敷患处，毒虫自出。

文献考证

1. 清代赵吉谷撰《本草求原》载路兜筋曰：甘平微寒。取心用，凉血止血，生肌，散热毒，麻疹斑丹恶疮最验。杀烂脚生虫。其藟，治夹阴伤寒，日久舌底已黑。其藟止热痢。

2. 清代何克廉撰《生草药性备要》载路兜筋曰：味香甜，性寒。清风散热毒疮，止血生肌。

3. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载路兜筋曰：其根治夹色伤寒。

4. 现代胡真撰《山草药指南》载路兜筋曰：煎服治眼热痛。如溃瘍有腐骨，取藟捣烂敷之，能拔出腐骨。

椰 果

Cocos nucifera Linn.

别名：椰子，椰果

科属形态 本品系棕榈科椰子属中的一种乔木；高达20~25米，茎粗壮，常弯拱有明
显的环纹，基部特厚大，常有簇生小根。复叶羽状深裂，革质，簇生于茎顶，有纵折，长3~4
米，裂片极多，线状披针形，长65~100厘米或更长，宽3~4厘米，先端渐尖。四季腋生肉穗
花序，长1.5~2米，最初直立，最后下垂。花单性，同株，雄花形小，多数，聚生于分枝的上
部，雌花形大，少数，生于下部或有时雌雄花混生，雄花：萼片8枚，甚小，鳞片状，复瓦状排
列，花瓣8枚，镊合状排列，革质，矩圆形，长约1厘米，雄蕊6枚，花丝粗厚，退化雌蕊极
小或无；雌花：萼片和花瓣各8枚，阔圆形，复瓦状排列，萼片革质，直径约2.5厘米，花瓣
比萼片小些；子房上位，3室，每室有胚珠1颗，但通常有2个不发育；花柱短；柱头3枚，
外弯。花后结果，近球形或倒卵状，有不明显的三棱，长15~25厘米，厚而具纤维质，内果
皮坚硬，近基部有孔迹8个，其中一孔与胚芽（椰心）相对，以便发芽时穿出；胚乳（椰肉）衬
贴于内果皮，中藏丰富的水液（椰子水）。

生长环境 栽培于热带、亚热带，近海岸的平地。四季皆可采集。

产地分布 印度、印度尼西亚、菲律宾、马来亚及我国海南岛，普遍，丛生。

药用部分与气味性能 椰果汁、椰果肉有椰肉香气，味甘，性温。肉能补虚、强筋、健
骨；汁能补津液，化虫。

临床应用

姜片虫 江门市卫生防疫站史福达、陈可仪、彭志尧等根据新会民间习用椰子治姜片虫（即姜片虫）
的经验进行实验治疗，分椰子观察组和横切对照组，共治疗319例。椰子观察组又分别用椰子水、椰
肉浸汁和全椰等三法，服后均不用泻剂。观察结果，横切组疗效为49.7%，椰子组以全椰法效果最好，
在69例中有30例排虫，有效率43.48%，并未发现任何副作用，而且大部分在排虫后自觉症状减轻，排
出的姜片虫最多为417条，最少为1条，平均76条，均在服药的当天或第二天排出，虫体大多数尚能活
动。服药后大便时最好蹲坐温水盆中，使虫体易于全条排出。两组对比，横切组疗效虽较高，但椰
子组用法简单安全，易为患者乐于接受治疗，并易于反复治疗。全椰组服法：在早晨空腹时，成人每
次服1/2~1个椰子，先饮椰水后细嚼服椰肉，只服1次。服后不需另服泻药，隔3小时以后可进食。（《广
东中医》1987年第7号）

文献考证

1. 唐代李珣撰《海药本草》载椰子浆（水）曰：治吐血，水肿，去风热。又曰：多食，冷而助气。
2. 宋代《开宝本草》载椰子浆曰：益气。椰子浆（水）曰：止消渴，涂头发令黑。椰子皮曰：止血，疗
鼻衄。又曰：吐逆霍乱，煮汁饮之。
3. 元代朱丹溪撰《本草衍义补遗》载椰子浆（水）曰：椰子生海南极热之地，土人颇此解夏月毒渴，天
之生物，各因其材也。
4. 明代李时珍撰《本草纲目》载椰子浆（水）曰：性热，故饮之者多昏如醉状。异物志云，食其肉则不
饥，饮其浆（水）则（增）渴。

較 剪 草

Dianella ensifolia (L.) DC.

别名：山猫儿，山管兰

科属形态 本品系百合科山管兰属中的一种多年生草本；高达1~2米，茎坚挺。叶二列，近革质，挺直，线状披针形，长30厘米以上，宽1.2~2.5厘米，先端渐尖，基部嵌叠状，鞘极长，有龙骨。夏季顶生圆锥花序，疏散，分枝少而短，有匙状苞片，花青紫色或绿白色；裂片6枚，分离，披针形，长6~8毫米，内面3枚外反；雄蕊5枚，着生于花被基部；花丝短而扁厚；花药阔线形，长过花丝，顶孔开裂；子房上位，3室，每室有胚珠4~8颗。花后结浆果，直径约8毫米，成熟时紫蓝色。

生长环境 喜生于山野草丛粘质土中。四季可采收。

产地分布 太平洋群岛和澳洲至马来亚经我国到印度半岛。我国广东、广西、台湾等省均有产，本省各地均有分布，但少见，产量不大，散生。

药用部分与气味性能 全草。有大毒，忌内服，为毒鼠专药。

除四害

1. 毒杀老鼠 广东开平县东山镇联星社族古岭生产队九户人家，使用本植物制成毒鼠米1斤，一夜毒鼠120只，现在全县推广使用。方法：用较剪草根2斤，加水8斤，煎取1.5斤，去渣候温，投白米1斤于药液内，使汁吸干后，即可使用。毒鼠时每堆米约60粒。（广东省卫生厅防疫局土农药杀虫毒鼠介绍，始兴清化隘子管守林献方）

2. 杀蚊、蝇 将叶捣碎加水浸泡或煮煎，即成水剂，可供喷洒。试验致乏库蚊幼虫，每公斤水10克，24小时死亡80%，48小时死亡80%。试验蝇蛆，4天死亡80%。（广东省卫生厅防疫局土农药杀虫毒鼠介绍）

3. 灭蝇 剪草、藜芦用白酒同汁浸一宿，去酒留汁，蝇食之即死。（《广嗣要略》引斗蝇传）

文献考证

现代肖步丹撰《岭南采药录》载山猫儿曰：有毒，不入服剂。捣敷瘰癧，能解其毒。以其自然汁和米炒香，又将汁浸米炒香，能毒鼠。

鉄綫草

Adiantum flabellulatum Linn.

别名：鉄綫蕨，烏脚槍，鉄魯基，黑骨芒箕，烏蠅翼，小熊胆

科属形态 本品系鳳尾蕨科鉄綫蕨属中的一种多年生草本；莖短，直立或近直立，有狭披针形、渐尖的鳞片。叶革质，为2回或多回叉状分枝的羽状复叶；中央的羽片最大，线状披针形，长10~15厘米，宽2厘米，顶端钝头；小羽片斜方状椭圆形至扇形，交错互生于叶轴两侧，长1厘米，宽1.5厘米，具被毛的短柄，上缘及外缘圆形，有细微锯齿，下缘成直角形，略呈复瓦状排列于叶轴上，也有疏生的；叶脉不明显，扇形，叶轴黑褐色，光亮，秃净或上面略被毛；叶柄簇生，基部无节，坚韧，深褐色至紫黑色，光亮，基部具鳞片，上部秃净，长10~25厘米。孢子囊群椭圆形，生于小羽片的上缘或外缘的叶脉顶端，通常连接；子囊群盖与孢子囊群同形，由叶缘锯齿反折而成。

生长环境 喜生于潮湿处，为酸性土的指示植物。夏秋采收。

产地分布 印度、马来亚、日本及琉球群岛。我国华南及台湾均有分布，本省以东江及广州市郊、香顺、中山等地较多产。

药用部分与气味性能 全草。嗅无，味淡有清凉感，性凉。能清利表里热及郁滞，舒筋活络定痛。

临床应用

1. 传染性肝炎 鉄魯基(連莖叶)4两，黄糖1两，煎水2大碗，一天三次分服，并給予低脂高糖食物。第二天服药后，小便量增加而色泽较前为淡，至第三天大便正常，小便较为清白，巩膜及皮肤黄疸完全消失，病者恢复健康。經此方治疗传染性肝炎35例，获得短期内治愈，疗效显著。(五华安流公社卫生院献方)

2. 阿米巴痢

(1) 烏脚槍2两，雞鷄尾2两，大蒜1两，共煎水服即愈。小儿酌减。(五华經江福岭卫生所献方)

(2) 鉄綫蕨、鳳尾草各2两，煎取湯約0.5斤，一次或二、三次分服。如白痢多，增大鉄綫蕨量，减少鳳尾草量；紅痢多則反之。(广西僑族自治区中医药研究所)

3. 流行性感冒 烏蠅翼、牛斗踏各4两，切碎，水煎服。成人无发热者加少許酒冲服；小儿加糖，用量减半。(龙川县楊新芝献方)

4. 感冒 烏蠅翼、魚草、一枝香、艾叶，均生用，各用1两，水煎服。(丰順刘庆坤献方)

5. 盲腸炎 烏蠅翼1两，酒水煎服，渣貼患处。(平远林一达、李紹唐献方)

6. 吐血 烏蠅翼根、血見愁根(又名青藤)，各2两，加入瘦肉或猪脚煮服，連服数次即愈。此方經治5例，患者均获痊愈。(新丰县卫生科学季爵献方)

7. 砂淋

(1) 烏蠅翼2~3两，与猪肉同煎服。(龙川县黃柏英、陈紹禹献方)

(2) 鉄綫蕨2~3两，同銀器煎水內服效。(《广西药用植物图志》)

8. 跌打内伤

(1) 小熊胆根1两，炒干研末，冲白酒0.5斤，砂糖1两，水煎服。(文昌潘靈山献方)

- (2) 跌打还魂 小熊胆浸酒服。(新丰罗心鑽献方)
- (3) 续筋接骨 铁线蕨捣烂酒炒热敷患处,连用 11 天接上。(《广西药用植物志》)
9. 疔毒 烏蝇翼、蒲草浸酒内服,药渣外敷。(新丰罗心鑽献方)
10. 蛇头指 烏蝇翼草 2 两,加黄糖少许,共捣烂敷患处。(焦岭徐汉华献方)
11. 火伤 烏蝇翼 5 錢,柏子树叶 2 两,研末,水調敷患处。(和平黄罗梯、賴运遠献方)
12. 毒蛇咬伤 烏蝇翼根、蛇舌草、千斤拔根、两面针根、羊不食根(又名鴉胆子根),此药可内服外洗及敷,效驗。(泉水乡許老三献方)
13. 鼠咬伤起瘡核 烏蝇翼草和黄糖共捣烂敷患处。(郁南覃水坤献方)

鉄包金

Berchemia lineata DC.

别名：烏口仔，老鼠耳

科属形态 本品系鼠李科勾儿茶属中的一种半藤状小灌木；小枝被毛。单叶，纸质，互生，具短柄，卵圆形或近圆形，长5~10毫米，先端钝而有小凸点，基部浑圆或微心形，边全缘，上面深绿色，背面苍白色，侧脉5对，直而平行。秋季开花，两性或杂性，2至多朵簇生于叶腋内或枝的顶端，有3~6毫米长的短柄；萼片5枚，长2~3毫米，狭披针形或线形；花瓣与萼片同数，等长或略长，线状披针形；雄蕊5枚，有时6枚；子房上位，藏于花盘内，但彼此分离，2室，顶端狭而成一柱。花后结果，长卵状，肉质，长4~6毫米，熟时紫色。

生长环境 山野、矮林或杂草丛中，路旁、坡地、小丘陵均有常见，但近村落生长的多被刈割作柴薪用，因此常见小苗，而根块则逐年增大。

产地分布 越南至我国南部，北至琉球群岛，均有分布。本省普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 根。嗅无，性平味涩。能化痰；除咯血吐血，并有除湿毒定痛功效。

临床应用

1. 肺结核

(1) 鉄包金3两，穿破石3两，大甘草3两，以水7碗，加猪精肉煮至1碗，一次服，每隔2~3天再服一次。孕妇忌用。

本方为广东流传之常用效方，增城县新塘镇联合诊所何泽芬采用本方加味，疗效甚佳。何泽芬并曾一度在省银行邮电联合疗养院实验，均获疗效。龙川人民医院中医谢作材根据这经验推广使用，并加以研究，也得出同样良好效果。

〔附注〕何泽芬治疗肺结核分初期、确定期和完成期为辨证施治的原则，并结合并发症而随症用药和加减药量。从经验中一向采用鉄包金2两，穿破石2两为主要药；阿胶3钱，白芨4钱；为次要药；又用瓜蒌仁6钱，北杏仁3钱，枇杷叶4钱，紫苑3钱，百合4钱，川贝母3钱，为辅助药。这是治疗肺结核的基础方剂。另参考症状，发热甚加天冬、麦冬，午后潮热加丹皮，有肺炎加青天葵、马兜铃，盗汗加牡蛎、龙骨，大便溏或再加云苓、莲子、淮山，倘有其他症状，则灵活加减运用。经过多年的临床实验，这基础方剂具有疗效，实验118例，痊愈34例，好转79例，有效率达93.5%。

谢作材治疗肺结核经验，采用鉄包金2两，穿破石2两，当归3钱，北杏3钱，川贝3钱，瓜蒌仁3钱，薏苡仁6钱，紫苑3钱，白芨4钱，阿胶3钱，半夏3钱，这方治疗肺结核已有46例，其中有服1~2剂或5~6剂停药不计外，服至15剂以上者共有24人，在24例中治好的5例，好转的15例，无效的4例，无恶化的，有效率达83.2%。好转的15例中，有8例纯用本方，未配合西药同用。治疗期间，以一个月为一疗程，每天一剂，可将渣再煎服。如体弱的加北芪、党参、茯神、淮山，有遗精的加金樱子、龙骨、牡蛎等，有盗汗则加浮小麦、黄芪等，午后有潮热则加银柴胡、青蒿等，灵活运用。（《广东中医》1958年第4号）

(2) 鉄包金6两，生地3两，穿破石1两，千打捶1两，用水12碗煎至2碗服。（三水彭老英献方）

2. 闌尾炎 鉄包金 4 錢, 金香爐 5 錢, 千斤拔 5 錢, 山芝麻 6 錢, 白立頭 6 錢, 金不換 6 錢, 雞骨香 5 錢, 鳳凰雞 5 錢, 淨水 3 碗煎至 1 碗服。(中山萬頃沙人民醫院楊球獻方)

3. 大食黃 用鉄包金 5~10 錢, 煮猪瘦肉食。(云浮縣陳公佐獻方)

4. 小兒腹瀉 鉄包金樹根 8 錢, 煎水服。此為七、八歲小孩用量, 應用時可按年齡增減。(徐聞縣鍾坤臣獻方)

5. 跌打損傷瘀積骨痛腹痛

(1) 鉄包金、黃姜各 6 錢, 蛤爪草根頭、百芽香各 6 錢, 馬尾榕茹、香附各 5 錢, 羊肚壳頭、桑白皮各 6 錢, 切碎, 用酒 1 斤浸 24 小時后用。每日 1 次, 約服 2 兩, 另取一些擦傷處, 連用三數天可愈。(洪位高獻方)

(2) 跌打損傷 鉄包金 5 錢, 鉄牛入石 1 錢, 血葵 1 錢, 歌葵 2 錢, 豆豉葵 5 分, 雞骨香 5 錢, 九龍根 3 錢, 兩邊針 2 錢, 雞兒筋 2 錢, 乳香 3 錢, 沒藥 3 錢, 歸尾 2 錢, 共搗爛敷傷處。如藥太干, 可加米水調勻敷之(如斷筋者加牛筋頭草、榕樹皮研末炒過)。(羅定譚淪生獻方)

(3) 跌打出血不止 鉄包金 1 把, 苦刺心適量, 搗爛敷上即止。(海口林獻賢獻方)

(4) 跌打苦傷咳血 鉄包金 1 兩, 与猪瘦肉煮水服。(英德縣獻方)

6. 湯火傷 鉄包金葉適量, 搗爛調茶油外敷患處。(英德縣城聯合醫院戴昭明獻方)

7. 无名腫毒 鉄包金 1 兩, 散血丹 1 兩, 鉄馬鞭 5 錢, 三十六棍 5 錢, 雷公藤根 5 錢, 上山虎 5 錢, 田基黃 5 錢, 雞不食 5 錢, 六角英 5 錢, 野吳芝 5 錢, 楓柳葉 5 錢, 爬山虎 5 錢, 將藥切碎搗爛, 以白酒煮沸, 用布包暖脫, 冷后将藥敷上患處。忌食酸辣、蝦、羊肉、魷魚、紅魚。(海口林天輝獻方)

8. 疔瘡 鉄包金葉 1 兩, 搗爛加鹽花少許敷患處。并用白菊 2 兩, 甘草 5 錢煎服。(海口何啟昌獻方)

9. 毒蛇咬傷 用鉄包金搗爛調米粉敷傷口即愈。(欽北袁電獻方)

辣 蓼

Polygonum hydropiper Linn.

别名：水蓼，旱蓼

科属形态 本品系蓼科蓼属中的一种一年生草本；高80~100厘米，茎直立或下部伏地，稍粗壮，通常无毛，褐红色，略有分枝，节部膨大。单性，叶互生，纸质，披针形，矩圆披针形，长5~12厘米，宽1.5~1.8厘米，先端短尖，基部楔尖，边全缘，两面无毛，有时在中脉上和边缘被粗短毛，常具腺点，干后常呈褐色；叶柄极短或无柄；托叶鞘状，膜质，有散生紧贴的粗毛隐藏在表皮下面，而先端突出，顶端有短睫毛。夏末初秋顶生线形总状花序，弯曲下垂，间断；花序柄秃净或有时具腺点；苞片疏离，或生于花序上部的略啣接，秃净或被疏毛，有时有腺点，顶端有短睫毛；花被淡红色，有散生腺点；雄蕊着生于子房的周围；子房上位，压扁，有2~3裂的花柱。花后结果，钝三角形，有时两面凸起，长2~3毫米，黑褐色，整个包藏在宿存的花被内。气味辛芳香辣，为本品鉴别要点，旱地生长的较浓，低洼地及溪沼旁边生长的较淡。全无香辣气味的不是药用辣蓼。气味极香辣的一种其叶较细长，全草亦较深绿，部分地方称苏蓼，亦合用。与辣蓼相类似的品种有春蓼（田蓼）、红草（茎叶密生茸毛）、马蓼（多年生草本）、火炭母（赤地利治病亦有效）、奔草等四种。

生长环境 多生于村旁、道旁及沼泽、下水道等低洼湿润地方，一般称为水蓼，根部附生须根甚多。生于小丘陵、台地、道旁地方的一般称为旱蓼，根部为枝状，量少，质硬。粘壤或沙壤均易生，但表土肥沃则繁殖更大更快。夏季采茎叶，秋采实及根。

产地分布 广布于温带或亚热带地区。我国各地和本省均有分布，旱蓼较少见，散生或丛生；水蓼多见，普遍，丛生。

药用部分与气味性能 根、茎、叶、实。气香，味辣，但根不辛辣，与茎叶性能不同。根性平，能除湿治泻痢。茎、叶、实性温，能除湿化滞，驱风，杀虫，止痒，镇痛，健骨。

临床应用

1. 丝虫病 淋巴管炎，用辣蓼煎汤洗患处。（《福建中医秘方》2集）

2. 胃肠炎

（1）辣蓼全草，洗净晒干研末，稀米糊为丸，每丸3钱，每次服1丸，开水化服。（兴宁何志超献方）

（2）鲜辣蓼全草3两捣烂，生白矾4分研末，阴干水冲服，并用消毒针刺舌下紫筋流出黑血，可加快治愈。（宝安张修慧献方）

3. 痢疾

（1）广东省中医药研究委员会于1984~1987年四年中，在省内各地如工地、矿场、部队、医院等医疗机构，组织实验，用辣蓼根治疗肠炎痢疾，进行填记统计资料的实验有540多病例，对急性慢性肠炎和细菌性痢疾，疗效达90%以上，对结肠炎和原虫性痢疾增加倍量服药，亦收到满意疗效。辣蓼治疗肠炎痢疾是民间有效秘方。总服药的有5000多病例，经过实验，已肯定了辣蓼根的疗效。现在广东制药厂已投入生产大量制成干膏粉末供应医疗需要。肠炎痢疾使用辣蓼干根，一日量为8钱，二次分服。鲜根则为3两。剂型初期依照规定剂量制成80毫升二次煮取浓缩液，不加任何防腐剂密封，间歇加温消毒。

后保存时间不能超过三个月。后改进浓缩为 20~10 毫升，保存时间延长至半年，但仍存在缺点：1) 虽无发酵霉败，仍有少数分解变色变味，不能使用。2) 辣蓼根含有树脂淀粉质和其他沉淀物增加，即使解加解理不影响疗效，群众仍有怀疑不敢将沉淀一同服下。再后研究改进试验，一法用多量酒精沉淀滤清后收回酒精，浓缩至 10 毫升时，浓缩液褐黑色有光泽而澄明，但临床疗效显著减低。一法水煮三次稀液混合精滤后，在蒸气锅中蒸发浓缩至稠膏状时，把所有沉淀物保留，继续床观察疗效增加。为了保胎增加疗效，便利服食和携带，最后将稠膏再蒸发成干膏，制成干膏粉末，按成人一日服量比例，分装小玻璃管中以防吸湿分解，供应医疗需要。据广东药厂试制品送给农业社试治鸡鸭痢疾，也收到同样显著疗效。(广东中医药研究所整理)

(2) 辣蓼根 8 两，黑豆 4 两，煎成浓汁温服，如腹中闭急者，可加大黄 3 钱，小童减半。(梁开基献方)

(3) 辣蓼根 4 两，野苋菜 0.5 斤，煎服。(龙川县中医进修班献方)

(4) 辣蓼根 5~8 两，随症轻重酌用，煎服。(三水唐群好献方)

4. 单腹腹痛 辣蓼叶、猪大肠，煮至板烂，只服汤液。(北海市人民医院献方)

5. 风湿性关节炎 旱辣蓼干 7 钱，鹅不食草 7 钱，煎水分二次服，渣复煎一次服。(平远县王京盛献方)

6. 妇女风肿 辣蓼根 4 两炒黄，煎水去渣加鸡蛋 1 只，煮熟服之。(新兴东风公社罗显林献方)

7. 狂犬咬伤 辣蓼根 5 钱，川连 2 钱，地龙 3 钱，净水煎服 2~4 次。另用马钱子 2 钱，合白饭少许捣烂敷之。(五华水宁上福卫生站，五华黄伯寅献方)

8. 蛇咬伤

(1) 鲜辣蓼草 8 两，捣烂取汁加酒冲服，渣敷伤口周围。(广州中医学院进修部姚奇春，丰顺县杨道生等献方)

(2) 蛇伤毒攻遍身起水泡 先将水泡刺穿排泄水液，用下药煎水洗，药用：辣蓼、韭菜头各 3 两，白花鬼灯籠根 8 两。(信宜公社卫生院献方)

9. 蛇头瘰疬(瘰疬) 辣蓼 2 钱，竹草根 1 两(或用叶梗亦可)，熟苎 1 钱，石灰 1 钱，麻肤 1 钱，上药捣烂敷患处，如药干燥加水湿润。(合浦陈祖猷，梅县谢佛昭献方)

10. 跌打肿痛

(1) 辣蓼根、三点乌各适量，共炒冲酒内服外搽。另用白花辣蓼 3 份，消山虎 1 份，捣烂敷患处。(新丰罗心慎，揭阳榕城医院献方)

(2) 辣蓼根、韭菜头、生盐，共捣烂敷患处。(新丰罗盛洪献方)

(3) 辣蓼叶 5 两，石斑叶 4 两，田基黄 3 两，浪伞叶 5 两，白银香叶 3 两，用酒精焗热擦患处，最后将药敷上。(清远梁财献方)

11. 骨折 先用跌打酒(即用辣蓼 2 两，鹅不食 1 两，浸酒 1 斤)搽骨折之肌肤以止痛，然后将骨折部复位，再敷下药：辣蓼 5 钱，鹅不食 5 钱，生葱 1 两，生姜 2 两，酒饼 5 只，共捣烂焗热加酒适量(约 1.5 两)，用杉树皮三数块夹住缚上绷带固定(杉树皮每块要留出小缝)，每天换药一次；经一星期后可除去夹板。如局部红肿不消，以致不易将骨折整复者，则先用杉树皮略固定，再用熏药：柚树皮、鸡屎藤、上树柏各 8 两煎浓汁，用法：应顺着由上至下用布密敷熏之，连熏 2~3 次，约一天可消肿；消肿后将折骨复正紧夹固定，余法如前。不化脓者，用生姜 5 钱，生葱头 5 钱，加黄糖捣烂敷之，轻者经过 1 个对时。如穿破肌肤之骨折伤口化脓者，用五加皮 1.5 两，鹅不食 1 两，没药 1.5 钱，地锦 2 钱，黄糖半匙捣烂敷伤口，每日换药三次，伤口以外仍敷接骨药。至伤口愈合，则全部敷接骨药。除以上按各种不同情况之局部处理外，均应服用下方：鹅不食 5 钱，辣蓼 1 两，水煎冲酒服，每天 1 剂，分 2 次服，约服 10 天。(平远王京盛献方)

12. 刀伤 辣蓼叶、猪油各适量，捣烂敷患处，能止血生肌。(汕头市献方)

除四害

1. 杀蛆

(1) 辣蓼晒干研末。用量8斤，投于100斤的粪便中，24小时可杀死蛆蛆。或取新鲜全草加热水(2:1)浸4小时，投入粪便，每100斤粪便用8斤，可灭蛆蛆。(《江西中医药》1958年11月号除七害民间草药)

(2) 辣蓼切成半寸左右，放在有蛆的粪缸里搅拌后，两天内杀虫率为80%(江苏)。将新鲜辣蓼全株切碎，加三倍水，浸8~12小时，同浸液一起撒到粪缸中，可以灭蛆(北京防疫站)。(《中国土农药志》)

2. 杀子丁 将马鞭草制成1%水浸液，毒杀子丁，有98%死亡。如用0.5%浸液，有93%死亡。(《中国土农药志》)

3. 杀蝇、蚊

(1) 辣蓼15斤，白药、大蒜叶、猛子叶、烟枯各10斤，煎水20斤，煎成后加适量石灰水，喷杀蚊蝇，经试用效果良好。(广东灭蝇工作茂名现场会阳春圭同乡资料)

(2) 用新鲜辣蓼晒干，加薯蓣、青蒿草、紫甲各等量研末，熏杀蚊蝇有效。或用辣蓼10斤，硫磺粉4两，苦楝叶5斤，煤油、石灰适量，水100斤，将辣蓼、苦楝叶加水煮沸后，再加硫磺、煤油充分拌匀，即成黑色，加少量石灰即成黄色，拌匀后即成。用以喷酒，杀虫率达90%，名曰辣蓼杀虫合剂。又以辣蓼草40%，烟茎20%，苦楝叶10%，樟树皮(或叶、锯木屑)15%，硫磺5%，将上药晒干研末混匀，并加20%石灰，即成万能杀虫粉，用喷粉器喷酒，杀虫力强，对各种害虫有效。又法：辣蓼30份，肥皂1份，取辣蓼草加水浸煮(药与1:4)，时间约1小时，过滤加肥皂液混合即成辣蓼液，用时加水2份稀释，若肥皂凝固应使其溶化，然后用药液喷酒。(《江西中医药》1958年11月号除七害民间草药)

文献考证

1. 汉代《神农本草经》中品载蓼类曰：气味辛温无毒。主治温中明目，耐风寒，下水气，面浮肿及痛痹。

2. 汉代张仲景《金匮要略》内蓄蓼丸方中有神蓼，系由野蓼汁、青蒿汁、苍耳汁、赤豆、杏仁、白面经发酵而制成，具有调中消滞功效，是治泻痢感冒的常用药物。

3. 南北朝陶弘景《本草经集注》载野蓼茎叶功用曰：干之酿酒，主治风冷大良。同时在他的名医别录又载：除大小肠邪气，利中益志。

4. 唐代孙思邈《千金备急要方》中治胃脘冷不能饮食，用晒干野蓼叶煮汁拌米饭酿酒饮之，治霍乱转筋用蓼叶煎水服，治小儿冷痢用蓼叶捣汁服。

5. 唐代甄权《药性本草》论野蓼疗效曰：叶治霍乱转筋和香豉煎服。

6. 《唐本草》述水蓼叶疗效曰：蛇伤捣敷之。绞汁服之，解蛇毒入腹心闷，又治脾气肿痛成疮，水煎汁渍之。(据商务版《本草纲目》)

新修本草述水蓼可供食用。

7. 宋代寇宗奭《本草衍义》曰：水蓼子半生半炒为末，酒服治痼疾，已破亦治，久则效，效则止。

8. 《圣济总录》霍乱门有水蓼饮方，治干霍乱不吐利，四肢烦疼，身冷汗出，用水蓼，香薷煎服。

9. 明代朱橚撰《救荒本草》曰：蓼草能治跌打损伤，通筋骨。

10. 清代赵学敏《本草纲目拾遗》述用辣蓼制白酒药酒法曰：酿酒芳馨，炒焦拌食消积滞。

11. 清代赵学敏《本草求原》载辣蓼洗湿毒痒，擦毒，辟瘴气，其汁能毒蚯蚓，作神效之用。

12. 清代梅启熙增订《植物名实图考》载霍乱方内，有时疫痧气霍乱良方，用辣蓼草半斤捣烂，宣木瓜四两切片，黄酒二斤加水煎沸乘热洗手足麻木处。

13. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载辣蓼曰：味苦温，性平，洗湿毒痒，擦毒，其汁能毒蚯蚓。

14. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载辣蓼可治牛痘；霍乱症；伤寒症。猪霍乱；猪喉风。

鳳尾草

Pteris ensiformis Burm.

别名：井欄苗，小鳳尾，翠云草

科属形态 本品系鳳尾蕨科鳳尾蕨属中的一种多年生常綠草本；地下莖粗壮，坚硬，匍匐，节間短，密被披針形黑褐色鱗毛。叶丛生，一束状，近革質，为1~2回羽状分裂，裂片卵形，长20~40厘米，寬15~25厘米；叶柄长5~23厘米，直立，坚韧，无毛，或疏生鱗片毛，淺綠色；叶軸无毛，有翅，翅的下部最窄，有时在最基部的两对羽片无翅，叶軸頂部翅寬3.5~6毫米；羽片每側有3~5小片，对生，最上部的小羽片单出，特长，长10~15厘米，寬8~7毫米，頂端短尖或漸尖，营养叶的邊緣有小鋸齒，下部的羽片，有2~3裂片，較有短柄，叶面綠色，背淺綠色，主脈明显。孢子囊群綫形，膜質，着生在叶背的邊緣，嫩时白色，后黃色。

生长环境 生于村边古屋边阴湿地方，古井井口、石隙、石灰岩上，以鈣質土为普遍，耐旱力頗强。

产地分布 马来亞、印度、日本及我国。我国华南各省頗为普遍，本省分布亦广，以香順附近各地岩石山間为多产。

药用部分与气味性能 全株。嗅无，味淡微涩，性平。能消滯除湿而不伤阴，并有固阴壯筋絡之效。

臨床应用

1. 痢疾

(1) 生鳳尾草5两，生野菊花1两，生金扣紐根1两，生紅背草1两，生車前草1.5两，先将各药洗淨杵烂，即放于瓦鍋內，以水1公斤煎至500毫升，去渣，为成人一日量。但須即日煎即日服完，隔夜后容易发酵变酸失效。服法分緩急两种：急服法是首次先服200毫升，以后每隔4小时服一次，每次服150毫升，第一日連夜可服2剂；緩服法即將全日量分三次服，每次服約160毫升，每4小时服一次。急服法宜于病勢急的严重患者，緩服法則宜于病勢和緩患者，尤其是年老或体弱之人更为切当。若果胃腸虛弱，食欲不振的病人，可以加炒大米2两同煎服。倘患者病程已逾一周以上者，又可加蜂蜜1~2两冲服，收效益著。

(附注) 此方对痢疾及急性腸炎，均有显著疗效。广西靈塘廖平农場医院凌海如、陈衍英用以治疗痢疾25人，急性腸炎27人。疗效情况及治愈日期列表說明如下：

鳳尾草合剂疗效情况統計表

項 目	急性腸炎	細菌性赤痢	原 虫 痢	营养不良性下痢	合 計
就医人数	27	9	3	3	52
治愈人数	23	5	6	5	39
显著进步	2	3	2	3	10
无效者	2	1			3

治愈日期统计表

日 数	3	5	6	7	8	12	17	20	合 計
人 数	9	6	4	4	10	2	2	2	89

(《广东中医》1959年第4号)

(2) 将鳳尾草弄根洗净,按鮮草 150 克或干草 50 克加水 1000 毫升比例;慢火煎之,待沸騰后 30 分鐘,即剩 700~800 毫升为止,滤出药液热服即可。其味如茶微苦,无毒性反应。每次服 40~100 毫升,日服 4 次,7 日为一疗程。

桂林某部队周志奇以此方治疗急性细菌痢 70 例,从临床实际过程来看,对几种痢疾症状的消退及粪便细菌培养阴转观察,此药均较一般治痢药物收效迅速,腸粘膜病变亦均预期恢复,特別退热作用及精神状况迅速恢复,确较其它药物优越。另对粪便显微镜下观察情况更为突出;平均 3.4 天恢复正常。治疗 70 病例均在 10~19 日内治愈出院,平均住院天数为 14.4 天。根据以上实践证明,此药对急性菌痢疗效确不亚于一般治痢药物。(《中级医刊》1959 年 6 月号)

(3) 成人每日以 25~30 克鳳尾草,加水 200~250 毫升,煎至剩下药液约 100 毫升为止,再加入 5 克白糖或冰糖,分 3 次口服,亦可較大量預制放在冰箱供数日使用。福州市傳染病院副院长王子野及福州市防疫站医师刘庆清用本方治疗细菌性痢疾 80 例,全部在临床症状消失、大便成形及連續两次大便阴性培养后出院,治愈率为 100%。退热日数平均为 1.6 日,最短者 1 日,最长者 8 日。大便被控制至每日二次之内,日数平均为 2.4 日,最短者 1 日,最长者 7 日。大便鏡檢正常日数,平均为 4~3 日,最短者 2 日,最长者 10 日。腹痛与里急后重消失日数,平均为 2~0 日,最短者 1 日,最长者 7 日。大便培养轉为阴性日数,平均为 3~7 日,最短者 2 日,最长者 12 日。(全国医药卫生技术革命展览会資料选編)

(4) 鳳尾草 8 份,鉄錢蕈 1 份,海金沙藤 1 份,炒黑制成流浸膏,每服 10~15 毫升,冲开水一倍,日三服。(广西僑族自治区中医研究所驗方)

(5) 每次用鳳尾草 4 两洗净,1/2 煎濃汁,1/2 搗烂榨取自然汁,两者在服时混和服,每日服两次。据丘东华使用本方多在 3~4 日内把細菌痢治愈,疗效确实。(《中医杂志》1955 年 10 月号)

(6) 鳳尾草鮮的 4~6 两,石榴叶 1~2 两,火麻仁 7 錢(研),水 4 碗,煎取 3 碗,加蜜糖少許,6 小时内分 3 次服,小儿酌減。歙县防疫站治疗細菌痢 74 例,均以本方全部治愈,平均治愈日数为 2 天。

(7) 鳳尾草 4 两,鷄儿茶、八足草、紅半筋菜根、乱麻制、芋头草根、勾藤、顯花、六月雪、白背藤各 8 錢,煎湯服。紅痢加老鼠藤、冬豆、紅薯苗各 8 錢,腹痛加毛荔枝、金耳环梗、川朴根、金銀花、薄荷叶各 3 錢,蜂蜜 1 两冲服。(北海郭李球驗方)

(8) 鳳尾草、鉄蕈、披瓜藤、筋莧菜头梗各适量,水煎服。(合浦謝車发驗方)

(9) 鳳尾草 2 两,鉄蕈、雄雞尾、虾蟆藤适量,煎服。(平远县驗方)

(10) 鳳尾草、老鼠耳、車前草不拘多少,搗烂冲开水候凉榨出汁,和蜜糖服,連服 3 天即愈。(平远县卫协金朱芝梅,翁元錦子清驗方)

(11) 鳳尾草 1~4 两,煎水酌加黃糖或白糖、蜜糖服。如白痢用白糖,赤痢用黃糖冲服。(封开县孔敬达,海南澄迈美浮卫生所刘桂兰,海南范楷,佛山永安一所賴毓装,海南海口何启昌,梅县戴道元,普宁大坪卫生院金达明,惠来卫生防疫站,汕头金泉文,惠阳洪宝烈,广州中医学院黃容蔚,翁元立培等驗方)

(12) 鳳尾草 1 两,黃連 1.5 錢,木香 1 錢,甘草 1 錢,淨水煎服。(海口馮运华驗方)

(13) 鳳尾草 1 两,紅牛奶木或寄生 1 两,紅厚皮墙皮 1 两,水果子 1 两,馬齿莧 1 两,錢串草 1 两,塘鳢筋根 1 两,淨水煎服。(湛江市徐万益驗方)

(14) 鳳尾草、蒼耳子蕈、鷄儿藤、黑脚蕈各适量,煎服;或加鷄蛋煎亦可。如白痢用首二味,紅白相兼四味全用。

(15) 鳳尾草 1 两,生地炭 5 分,梔子炭 3 錢,木耳 5 錢,以上四味加銀器合煎,連服数剂。(湛江市龙国柱驗方)

(16) 鳳尾草干 3 錢，楓樹根干 3 錢，橫樑 5 分，漆樹叶 5 分，加陳米一撮，蜜糖 1 兩，用水一碗半煎至大半碗，候冷加蜜糖調服，重症可連服 7 劑，輕症 3 劑已可愈。(興寧刁綺月獻方)

(17) 鳳尾草 4 兩，錢串草 2 錢，山橘叶 10 張，五月艾根 1.5 錢，水 4 碗煎成 1 碗，一次服。(陽江新州醫院林維贊獻方)

(18) 鳳尾草 1 兩，烏脚美笑 1 兩，鼻血仔樹叶 1 兩，梗米 2 兩，以上四味入鍋炒，炒至米熟后煎水服。(龍川縣防疫站劉國光獻方)

(19) 鳳尾草 3 錢，白花蜜菜 2 錢，烏脚槍 4 錢，蝦蟆藤 5 錢，煎服。(三本紅旗衛生所曾荆楚獻方)

(20) 鳳尾草 2 兩，白頭翁 1 兩，蜜糖 1 兩，水 3 碗煎成 1 碗，沖蜜糖服。(台山中醫研究所獻方)

(21) 鳳尾草 1 束，萊菔子 1 兩(略炒)，柿餅 1 塊，將萊菔子、柿餅煎水，鳳尾草搗爛和入萊菔子、柿餅湯中，榨取藥汁，沖蜜糖服。(豐順潭江衛協全驗方)

(22) 鳳尾草大的叶 1 片，土茯苓 4 錢，煎服。(惠陽張聖生獻方)

2. 吐瀉 鳳尾草 3 錢，馬松草 3 錢，五加皮 4 錢，艾叶 2 錢，石榴心 3 錢，灯芯草 3 股，甚者加薑本 3 片，九節利寄生 2 錢，煎服。

3. 感冒發熱惡寒，口渴小便赤，身骨疼痛 鳳尾草、白茅根、蒲公英、鴨腳草、大古龍、望子藤、淫藤、錢站草、豬屎膏、含化草各 1 把，共搗爛用米湯沖取汁服。(海南文昌白潭南洋村林樹基獻方)

4. 急性喉炎 鳳尾草頭 10 余只，搗爛，浸蜜糖备用。(和平陳道珍獻方)

5. 淋巴結核

(1) 鳳尾草根 4 兩，煎水沖老紅酒 1 茶杯，連服一星期，其核即消。(廣州中醫學院黃令爐獻方)

(2) 鳳尾草(生石壁上者) 1~4 兩，煮豬瘦肉 2 兩內服，1~2 次見效。(曲江郭漢光獻方)

6. 胃痛 鳳尾草搗爛絞汁，沖蜜糖 5 錢服。(《福建中醫驗方》)

7. 撞紅夾色

(1) 鳳尾草 1 兩取汁，沖開水服。(翁元郭子清獻方)

(2) 鳳尾草、鉄灶撈，取汁沖蜜糖服。

8. 牙痛 鳳尾草根、蛇泡筋根等分，入鹽少許，搗爛敷塞牙齦上，立能止痛。(廣西僑族自治區中醫藥研究所驗方)

9. 婦女白帶 鳳尾草 6 兩，煎水服。(海南南聖衛生所黃德硯獻方)

10. 竹木刺入肉不出 鳳尾草、大芡肉、蓖麻子、推草子，搗爛敷患處。(排沙鄉橫坑衛生站羅天喜獻方)

11. 刀傷出血

(1) 鳳尾草 4 兩，白芨 1 兩，地榆 1 兩，將上藥制成粉末，為外敷止血料。(五華陳巨天獻方)

(2) 鳳尾草不拘多少，有腫痛或流黃水者加苦楝叶，有風傷口紫黑者加防風、樟腦少許，搗爛敷傷處。

(3) 扭傷腰骨 鳳尾草為末 1~2 兩，和雞蛋煎水，以糯米酒沖服。(蕉嶺紅旗第三公社石峰第六大隊農民羅正興獻方)

文獻考証

1. 明代李時珍撰《本草綱目》載井口邊草曰：五月五日，取井中側生草，燒研水服，勿令知，即惡酒不飲，或飲亦不醉也。

2. 清代趙學敏撰《本草綱目拾遺》載鳳尾草曰：治痔漏，同胡桃叶煎洗。治吐血神效。百草鏡：女子吐血，鳳尾草 3 錢水煎服。又曰：女子忽腹背患起紅瘰，蔓延腰如帶，乃風火所結，血凝滯而成，予擬其入山樵采染虫毒，乃以蠟斷厚黃銳除之不效，二三日瘰愈大作膿，復與以如意金黃散敷之，又不效，次日瘰傍復起紅暈，更為闊大，有老嫗教以用翠云草搗汁涂之，一夕立消；此草解火毒如此，又不特治血神效也。

3. 現代肖步丹撰《嶺南采藥錄》載鳳尾草曰：味苦性微寒，有小毒。專解腹中邪熱諸毒，殺虫，治鼻衄，諸下血，血崩，血痢，便毒腫痛。治跌打折傷，浸疔疔瘡，亦治痢症。煎水飲，退黃氣。一說治痰嗽。

4. 現代胡眞撰《山草藥指南》載鳳尾草曰：其子味苦有小毒。煎服治心氣痛。煎水飲治退黃氣血痢。

5. 現代陳立卿撰《廣西中藥醫藥用植物》載鳳尾草曰：治中風濕症；痢症(紅白痢)。

蒼耳草

Xanthium sibiricum Patr.

别名：蒼耳，痴头婆，風麻头

科属形态 本品系菊科蒼耳属中的一种粗壮一年生草本；高40~80厘米，莖有很明显的直棱，被毛。单叶，纸质，互生，粗糙，基部8出脉，三角形或稍圆形，3~5裂，长6~8厘米（不连柄），宽7~15厘米，先端短尖或渐尖，基部心形，开角广阔，楔尖成一长2.5~10厘米的柄，边缘有不规则的粗齿。夏季顶生或腋生头状花序，浅黄色，单性同株；雄花序球形，多花，总苞片小，单列，花为管状，5齿裂；雄蕊4~5枚，花药合生，花丝极短，药隔延长，内弯；雌花序卵形，有花2朵，总苞片短，2或3裂，其内面2枚大，固结成一个2室的硬体，外面有刺，每室有花一朵，花无花冠，花柱线状，突出于总苞外；子房下位，1室，有胚珠一颗。花后结一瘦果，椭圆形，长1~1.4厘米，外面有钩刺，顶上有直或稍弯曲的喙。

生长环境 生于村边、坡地、河塘边、园边、路边，沙质壤土，微有荫蔽，较为肥沃的地方。春末夏初采收全草，秋季采子。

产地分布 广布于温带地区。我国中部、东南、西南各省均有分布，本省各地普遍，以清远、番禺邻近各县较多，丛生为多。

药用部分与气味性能 全草、叶、根、种子。嗅无，味微苦，性平。能宣湿痹，化结滞，通穿，活络，镇痛，并能治麻症。

临床应用

1. 血吸虫病早中期腹痛，大便脓血，肝脾肿大，消化不良 蒼耳草干1.5两，枣儿核1.5两，为丸，每服5钱，日3次，空腹开水送服，以20天为一疗程。广州中医学院张景述与广东省血吸虫病防治站合作试治90例，结果大便阴性率70~90%，3个月后复检阴性率降至60%，一般治疗后体征好转或消失，食欲增加，营养改善，劳动力增加。

2. 钩虫病 蒼耳草、杏仁煎水服。（《江西中医药》1988年11月号）

3. 麻风

(1) 蒼耳丸：鮮蒼耳草（未开花结实）去根洗净，将枝叶切成寸许，放入铁锅中，加水一倍量，煮沸一小时滤出药液，再加水半倍量入药渣中，再煮一小时，加压过滤，滤液与第一次混合，并放入净锅中，低温蒸发，浓缩成膏状（以玻璃管沾滴纸上，不散开即可）后，加入干燥淀粉约为蒼耳膏1/3，混合均匀，做成丸剂，每日3次，饭前服。每次用量相当原药4~8两（市秤）；服后并无不良反应。經江西麻风防治所试用，对各类麻风病人，在短期內都获得显著进步，在11例患者中，服药20日就见到效果。又据本草称蒼耳草忌猪肉、馬肉、米泔，但江西麻风防治所患者服用蒼耳丸后，并未忌猪肉，未发生中毒或降低疗效现象。（《中药通报》1989年1月号）

(2) 在夏至前采集蒼耳草10斤，洗净，加水10倍，煮一天，去渣入蜜糖10斤，再煮成稀膏，瓷瓶装貯，放地下退火毒三天后取用，每日空心服2两，每隔3小时服1次，开水送服。（龙川陈一龙献方）

(3) 于小暑后立秋前采集鮮蒼耳子叶茎洗净晒干，每料用药5斤，加水12倍，煎煮6小时，浓缩成流膏500毫升，成人每日服3次，每次服10~30毫升。小童酌减。（台山中医药研究所，沈庆炳献方）

(4) 蒼耳子 1.28 兩, 石菖蒲 2 錢, 木鱉子 6.4 錢, 五加皮 3.2 錢, 蕲蛇 1.08 錢, 鐵乳石 3.2 兩, 笠紅根 10 兩, 石南葉 3.2 錢, 天麻 2.5 錢, 白朮 3.2 錢, 田七 6.4 分, 兒茶 2.4 錢, 胡麻 6.4 錢, 蟬退 2 錢, 升麻 2 錢, 桑寄生 3.2 錢, 丁香 2 錢, 川滑石 3 錢, 黃柏 1.4 錢, 獨活 2.5 錢, 桃仁 3.2 錢, 全虫 1.4 錢, 沒藥 2 錢, 笠黃根 10 兩, 二丑 3 錢, 朱砂 2.5 分, 蒼木 5 錢, 芥菜 3.2 錢, 歸尾 1 錢, 牙皂 2 錢, 角刺 5 錢, 大風子肉 2 兩, 海桐皮 5 錢, 白鮮皮 1.28 兩, 白附子 5 錢, 木瓜 3.2 錢, 制草烏 3.2 錢, 川牛膝 2.4 錢, 川紅花 3.2 錢, 蒼耳子根 10 兩, 共研末製成丸, 每天服 2~3 次, 每次服 4.5 克, 飯後服。此方經觀察三年, 療效達 90% 以上, 僅稍潭麻風醫院已治愈 46 人出院, 全省許多單位都用中藥治此病, 單服用此復方的病例就有 200 多名, 據了解均有顯著療效。(東莞稍潭麻風醫院劉炳章獻方)

4. 瘰癧 新鮮蒼耳根用水、酒各 1 碗, 煎至 1 碗, 瘰癧發作前四小時服一半, 瘰癧一小時半再服一半。(台山中醫研究所獻方)

5. 霍亂 蒼耳根約 3 兩煎水, 加食鹽少許, 內服。此方于抗日戰爭期間霍亂流行時曾以治愈多人。(汕头市永平路三和生藥房第 17 門市部蕭輝德獻方)

6. 紅白痢 蒼耳根 5 錢煎服。虛者加蜜糖沖服。(平山鄉梁家舖, 合浦廉州 71 社林鴻山獻方)

7. 感冒、感冒、頭重頭脹, 口渴煩悶, 或吐瀉 蒼耳草 2~4 兩煎服。(番禺王承烈、萬斯年獻方)

8. 頭痛

(1) 蒼耳草 1 斤搗爛, 加酒少許和勻, 炒熟敷頭。并用蒼耳草根 2 兩煮豬瘦肉食。(江門羅南、李成軒獻方)

(2) 頭風痛久病 蒼耳草根 1 兩, 烏豆皮 3 錢, 先將上藥煎水去渣, 加豬腦一個燉食。(陳軒巨獻方)

(3) 蒼耳子 1~1.5 兩煎服。(蕉嶺高恩衛生院湯伯喬獻方)

9. 狂犬病 蒼耳根 2 兩, 清水煎服。(江門區高明何玉用獻方)

10. 瘰癧 蒼耳根 1 撮, 天麻 3 錢, 青竹蛇 1 條, 苦楝根 1 撮, 天燈籠 1 撮, 細辛 2 錢, 鷄角筋根 1 撮, 刺楸根 1 撮, 先將青竹蛇放入土埕內, 加蓋用泥全部封好, 用火烘之存性, 取出與上藥用酒 2 碗浸 5 日, 每日早晚服 3 酒杯。并開服下方: 白芍 3 錢, 歸身 5 錢, 白朮 3 錢, 甘草 2 錢, 柴胡 3 錢, 半夏 3 錢, 茯苓 3 錢, 土茯苓 3 錢, 杜鵑 3 錢, 枯草 3 錢, 陳皮 2 錢, 山甲 2 錢, 川貝 3 錢, 元參 3 錢, 淨水煎服。(廣州中醫學院歐天鵬獻方)

11. 濕熱白濁 蒼耳根、山梔子根、車前草各適量, 煎水服。(封川附屬醫院陳煥文獻方)

12. 慢性關節炎與梅毒性神經痛 蒼耳草及子用大量煎成流浸膏, 如欲久存不壞, 可酌加防腐劑。服法: 每日數次, 飯後用開水送服 1~2 匙。(《江蘇中醫》1957 年第 5 期淮陰縣三樹鄉衛生所王養柏獻方)

13. 上頰囊炎

(1) 蒼耳子 1000 克, 辛夷 60 克, 洗清後全部碾碎, 再加入茜草、菊花、金銀花各 60 克, 混合一起, 在瓦鍋內煎 8 小時, 最後將全部濾液保存, 渣滓再連續煎 3 次, 每次 1 小時, 最後將全部濾液混合濃縮, 乘熱加入蜂蜜 500 克, 候冷即以消毒藥瓶盛裝即可。每日 3 次, 每次 5 毫升, 可連續服用 1~2 個月(总量達 1000~2000 毫升)。服 15 日為一療程, 隔 5 日後再服第二療程。東台縣人民醫院姚廣修、賈沛寧以本方治療病例 21 人, 全部用針穿刺有膿液, 明確診斷為上頰囊炎, 經治療症狀消失及好轉的有 19 例, 占 90.48%, 無效的有 2 例, 占 9.5%。復發的有 2 例, 占 9.5%。(《江蘇中醫》1959 年第 5 期)

(2) 蒼耳草約 5 斤, 用兩倍水煎成濃液, 去渣加蜜糖 2 斤, 再煎至起泡即成。每日服 3 次, 每次一湯匙。(黃煥生獻方)

14. 糖尿病 白花蒼耳根晒干 1 兩, 每天煎服一次。曾治愈附城鎮徐竹嬌, 47 歲, 1956 年 12 月起, 檢查尿有糖(++) , 注射胰島素 10 多次後, 症狀好轉一些, 但尿糖仍(++), 直至 1957 年轉服本方, 連續服用十五、六天後, 再往人民醫院檢查, 尿糖呈陰性。(阜順衛協會洪錫珍獻方)

15. 婦女白帶 蒼耳子根 1.5 兩, 同豬脚炖服。(《福建中醫驗方》2 集)

16. 婦女血崩 蒼耳子根 5 錢, 炒荊芥 5 錢, 同兔子炖服。如无兔子以母鴨代之。(《福建中醫驗方》2 集)

17. 乳癌 蒼耳子葉、一包針、水辣蓼葉、單企棘葉、七枝連葉、山梔葉、酒餅粉各等分，將藥研末敷于患處，八小時一次。（梅縣謝佛招，廣州何開紀獻方）

18. 毒蛇咬傷

（1）蒼耳子連根葉約2兩，搗爛榨汁，將渣用洗米水再煎湯，濾後和入榨汁服。藥渣敷傷口外面。（欽州黃占石獻方）

（2）白花蒼耳子莖4兩，煎酒服。並取黃花蒼耳草根搗爛敷傷口周圍，極效。（北通王耀生，北海蘇立民獻方）

19. 腫瘍瘡瘍 蒼耳根晒干1兩，煎水加黃糖約5錢和服。另用芙蓉葉搗爛與酒糟混和外敷患處。內服藥每天1劑，連服3~4劑。（潮陽海門鄭若民獻方）

20. 瘡瘍 蒼耳子煎水洗，可殺菌解毒。（合浦石灣黃宏政獻方）

21. 外傷出血 蒼耳葉1.5錢，芒招圍1.5錢，韓信草1.5錢，禾蝦氣1錢，紅菩薩草1.5錢，結招蕊3朵，稔子蕊3朵，蟠桃蕊3朵，將上藥搗爛敷傷口，即可止血生肌。（廣州中醫學院進修部張高士獻方）

22. 毒麻疹 蒼耳葉14片，烏豆4錢，金銀花藤4錢，加黃糖少許，淨水煎服。

除四害

據昆蟲所試驗：用20倍水浸液，對孑孓殺蟲率為17.7%，用100倍酒精浸液為8.8%。（《中國土農藥志》）

文獻考證

1. 清代趙賓谷《本草求原》載蒼耳草曰：莖葉微苦辛。治大風，癰疽，頭風濕痹，風毒在腰膝骨髓，婦人血風攻腦，頭旋倒地，癰疽疔瘡，瘰癧疥癩，牙疼喉痹，反花瘡，產後痢，生肌。

2. 現代肖步丹撰《嶺南采藥錄》載蒼耳草曰：莖葉浸出液，可用為收斂藥。

3. 現代陳立卿撰《廣西中醫藥用植物》載蒼耳草曰：有效部分為果實及全株，能治牛被毒蛇咬傷，并可治喉風症。

4. 現代錢士心、劉民壯、順庚生等編著《上海的野生植物》載蒼耳曰：莖葉搗爛治疥癬、濕疹、虫咬等有效。

5. 現代胡眞撰《生草藥指南》載蒼耳草曰：能治婦人血風攻腦，頭暈悶絕不省人事，平時取嫩莖陰干為末，必要時以紹酒炮服1錢即愈。又曰：本品味淡性平，并治跌打，以正根煎酒服。

算 盘 子

Glochidion puberum (L.) Hutch.

别名：野南瓜，狮子滚球，山馒头，果盒草

科属形态 本品系大戟科算盘子属中的一种直立多枝灌木；密被短柔毛。单叶，纸质，互生，羽状脉，矩圆形，矩圆状卵形，长3~5厘米，宽6~20毫米，先端钝或短尖，基部阔楔尖，叶面绿色，有疏短茸毛，背浅绿色，经秋后或稍变红色，有疏茸毛，边全缘；侧脉5~7对，将达叶缘而弯曲；叶柄长2~3毫米，着生较密短茸毛；托叶三角形，长1.5~2毫米，着生于叶柄基部之两侧。夏季腋生花束，单性同株，无花瓣；雄花通常多数生于长4~8毫米的柄上，萼片长不及2毫米，狭，外被小柔毛，雄蕊3枚；雌花成束，柄长不及1毫米，萼片较雄花稍短而厚，被毛较密；子房上位，通常5室，被茸毛；花柱合生成一短而厚杯状的盘。花后结蒴果，干燥，有毛，直径约8~16毫米，有浅纵槽或棱起，开裂为3个或3个2裂的果瓣；种子扁圆状，长3毫米，黄褐色至红色；种脐及脐带白色。

生长环境 生于荒地、丘陵地带、灌木丛中，或旷野、路边酸性土及阳光充足地方，干燥土壤也能生长。夏秋季采收枝叶及根部。

产地分布 分布我国东南部、中部及南部各地，如山西、四川、浙江、江苏、福建、广东、贵州等省均有生产，本省各地更为普遍，丛生。

药用部分与气味性能 根茎叶。无特异嗅，味微涩性凉，清利湿热，舒筋活络，消肿拔毒。

临床应用

1. 感冒及色感伤寒 (1) 算盘子根1两，生姜5分，食盐5分，煎水服。(梅县梁兰基献方)
(2) 算盘子根5~8钱，煎服。(龙川县献方)
(3) 用算盘子树茎叶酌量，煎水服。(平远县汉英献方)
 2. 休息痢 山馒头树根4两，以水一大碗，煎取一茶杯，空腹服。(鍾景云献方)
 3. 喉痛 (1) 苦蛇根、蘿藦薯、黄莲、七叶莲、木紫子、石蟾蜍、刁小豆根，以清茶捣汁灌之，先取净口涎，然后灌药。再用酸藤根、鬼面符、六月雪、独脚黄芽、盐霜柏、地胆头、火筒泡、算盘子树、山豆根，以上用根，加木槿子壳二只，同煎水洗之。(云浮县张焯华祖传秘方)
(2) 用算盘子根2两煎服，或用茎叶内服外洗。(平远县汉英献方)
 4. 白浊白带 用茎叶酌量，内服外洗。(平远县汉英献方)
 5. 穿盘(生于脚板底，甚则上下皆穿烂) 黄蛇退壳根、中算盘木，共煎水洗。又用细样田特菜、草鞋头、白兰香、半边莲、大样算盘木叶、大青蛇叶共捣烂敷，如寒者可加1/3酒调敷搽。(罗定廖仲英献方)
 6. 蛇咬伤 算盘子根适量，浸酒2两，先用开水煮，洗身，不洗伤口，另用叶捣烂敷百余穴。内服用鲜根2两煎米酒服，也可擦伤口周围。(龙川县防疫站，麻疹防治站献方)
 7. 老鼠咬伤 用算盘子根2两，黄酒煎服，留些外搽。(平远县汉英献方)
- 除四害** 杀蛆 撒叶子粪中可以杀蛆。(《中国土农药志》浙江资料)

文献考证 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载算盘子曰：治牛腹膜炎；胎衣不下；多吃人尿中毒；寒症；水泻症；排尿带血症；痢症(红白痢)；发疽病；气肿疽(箭脚，黑腿)。用根部或枝部。

榕 树

Ficus retusa Linn.

别名：網叶榕

科属形态 本品系桑科榕属中的一种大乔木；高达80米，直径约1米，树冠扩大成伞状，树皮粗厚，具乳状树汁，常从树干上生气根，长可及地，挺直如柱。单叶，革质，互生，阔倒卵形或近圆形，有时倒卵状矩圆形，长4~8厘米，宽2~4厘米，先端短尖而钝，基部狭，边全缘，两面均秃净，基部出3脉，侧脉5~6对，上面不明显；叶柄长6~8厘米，粗壮；托叶长约8毫米。夏季腋生头状花序，球形，无柄，单生或成对，直径约8毫米，熟时黄色或淡红色，有斑点，基部有钝圆卵形的苞片，内藏有管状花，雄花最多，无柄或具短柄，萼片8枚；雌花或瘿花无柄或具短柄，瘿花的萼片8枚，阔匙形，雌花的萼片较小。

生长环境 生于村边坡地、河边，大都植为荫蔽树、风景树及防风树，适应性颇强；但高山砾土不易生长。可用粗枝扦插繁殖。四季均可采叶及气根。

产地分布 印度及我国广东、广西、台湾等省均有产，本省极普遍。

药用部分与气味性能 叶、气根（须）、树脂。嗅无，味淡微涩，性凉。叶能解热理湿滞；气根能发汗散湿；树脂能除翳膜明目。

临床应用

1. 痧症大热（感冒高热） 榕树须2钱，五指莲2钱，路兜头5钱，白箭头5钱，海金沙2钱，鬼灯锦3钱，茅根2钱，火炭母3钱，木槿根3钱，蛇泡筋2钱，清水3碗煎至1碗服。（中山石岐罗水泉献方）

2. 夹色 生榕树根2两，羽箭5钱，煎水服。（龙川县防疫站曾仲林献方）

3. 植红 榕树须或树根4两，苦楝树根2两，水煎服。（翁元丘广泰献方）

4. 瘧疾 榕树叶4两，麦冬1.5钱，糖冬瓜1两，以水5碗煎至1碗服。（番禺郭大王献方）

5. 百日咳 东边榕树叶2两（取鲜嫩叶），瘦肉2两，以水2碗煎至1碗服。可连服2~3天，每天服1次。（佛山专区献方）

6. 鼻衄不止 倒吊榕树根1两，煎水1碗，冲白糖服。（南沃傅列邦献方）

7. 喉喉

（1）榕树须6两，黑醋1汤碗，煎好候温，含漱数次。曾用此方治疗200余例，疗效达90%。（广州邓柏祥献方）

（2）榕树须5钱，水浮莲3钱，黄京胆3粒，煎水含至吐痰后饮之。再用正冰片1分，生硼砂3分，正朱砂1分，为末，吹入喉内即愈。（新兴集城乡彭应才献方）

8. 苏癆

（1）榕树须、木棉花根、五桠树寄生、两边针根，各药适量，煎水服。（车岗乡荔枝咀徐长兴献方）

（2）榕树须1.2两，龙眼叶1.2两，以清水4碗煎至1碗服。（江門郭建謀献方）

9. 阳萎症 榕树吊须2钱，吴萸嘴七尺，老虎耳3片（热性人勿用），白鳢屎炒过1.5钱，煎水服。（海口市人民医院符育青献方）

10. 小便不通 榕树吊须1把，沙糖、米酒各适量，水煎服。（湛江市吴兰南献方）

11. 半身不遂 榕樹吊須4兩，老生雞1只去頭及毛脏切碎，與上藥共煮至濃後去榕樹須，服雞湯及肉，連服1~2次立愈。(江門林显芝獻方)

12. 小兒面部爛瘡 榕樹須4兩，煎水洗患處，數次則愈。(開平余松振獻方)

13. 脫骨

(1) 生草、田七、骨碎補、五倍子各3錢，乳香、沒藥、枳殼、自然銅各2錢，川烏、桂枝各1.5錢，川加皮1兩，共研細末，加入榕樹須或葉、雞不食草、倒埋樹葉、散血丹各適量，小雄雞1只，共搗爛加酒少許敷患處，外用杉樹皮固定。內服：骨碎補4錢，生地3錢，乳香、沒藥各2錢，紅花、川烏各1.5錢，自然銅、赤石脂、血竭、桃仁、田七、桂枝、金邊土黨各1錢，水煎服。(陳聯芳獻方)

(2) 榕樹吊須5錢，開洋花5錢，生薄荷5錢，禾草兒5錢，田基黃3錢，對面針根5錢，馬蹄香3錢，扶楊木根1兩，飯團子根5錢，韭菜頭4兩，生葱頭1兩，共搗爛，再加灰面4兩，好酒4兩攪勻，炒熱敷患處。禁忌鰱魚、片糖、芋頭。(彭柄實獻方)

(3) 細葉榕、大郎傘、小郎傘、龍胆、毛七公、刁古張、尖尾風、大涼藤、五指風、牛吊斯、過山風、葱頭、生艾、生薑、韭菜頭，用酒炒熱敷患處。(廣州中醫學院進修部張宗鉅獻方)

(4) 榕樹葉、饅頭藤葉各等分，生鷄子1只，共搗爛用酒炒熱敷患處，敷時不可超過24小時，至腫消盡則愈。又以牛耳康葉、油麻樹葉、推車樹葉酌量煎服。(英德石美鄉卫生院何炳林獻方)

14. 男女陰瘡及腳下癰 榕樹吊須0.5斤，鉄掃把頭0.5斤，鹽頭4兩，食鹽4兩，煎水洗患處。(廣州中醫學院進修部許武連獻方)

15. 內外痔瘡 榕樹須、九里明各4兩，煎水洗患處。另用鮮柏葉4錢，槐角4錢，錦黃3錢，荆芥2錢，桃仁2錢，朴硝3錢，西芫2錢，皂柏3錢，生地3錢，枳殼2錢，大青葉2錢，煨獐皮3錢，清水煎服。另煎洗外痔用榕樹吊5兩，皮硝5錢，枯礬1錢，青蒿葉10塊，上藥煎水3碗，乘熱熏之，然後洗患處，連洗數次。(湛江市龍國柱獻方)

文獻考証

1. 清代趙學敏撰《本草綱目拾遺》載榕樹須曰：止牙痛，取榕樹須須搗斷，入竹管內，將鹽塞滿，以泥封固，火燒存性為末，擦牙，効捷者亦堅。去竹管不用。

2. 清代趙廣谷撰《本草求原》載榕樹曰：榕有大小二種：大榕葉，濕平，祛筋骨，止痛消痰，去骨內風；夾陰傷寒初起，取落地仰面者同米及椰衣炒碎水服之。小葉榕，濕平，止痛，消骨內痰；散瘀理跌打，取汁和酒服；取黃落葉，名落地金錢，浸酒尤良。其蒸治暴赤眼；其吊須治跌打，浸酒；并治夾色傷寒，日久舌黑，同路兜筋藤、老鼠筋藤、圓柏葉。

3. 清代何克謙撰《生草藥性要》載榕樹曰：大榕葉，味劫(濕)性平，除骨內風，又能祛骨，葉似柚葉，名万年陰，佛山南泉廟有一株，俗稱為婆羅樹。凡遠年骨痛，取葉煎醋送飯常食應驗。小榕葉，味劫(濕)性溫，消骨內陰痰，敷跌打，止痛沖酒飲。其樹蒸(割傷樹皮流出乳汁拌樹脂)治赤眼與粥沖食；其吊須浸酒飲治跌打，散瘀；驗真假麻風作茶飲，名半天吊。

4. 現代胡眞眞撰《山草藥指南》載榕樹葉曰：凡跌打傷，取葉搗敷，能止痛。又將葉搗爛，酒炒至黑，可以脫骨。榕樹須(吊風根)煎茶飲，可驗麻風真假，如真者，覺其味甘。

5. 現代尙步丹撰《嶺南藥錄》載大榕葉曰：味濕性平，除骨內風；又能祛骨，以其葉搗敷；遠年骨痛，取葉煎醋佐膳，常食應驗。

蓖 麻

Ricinus communis Linn.

科属形态 本品系大戟科蓖麻属中的一种直立灌木；高达5米。有红白两种：红蓖麻茎及叶柄红色或淡紫色，高度及叶、果实均比白蓖麻为小；白蓖麻茎及叶柄为淡绿色，幼嫩部被白粉。单叶，厚纸质，互生，盾状，掌状深裂，直径20~60厘米，裂片卵状披针形至矩圆形，先端渐尖，边缘有锯齿，齿端有腺；叶柄长达25厘米，顶端有腺体。花单性同株，春、夏、秋三季顶生圆锥花序，长15~30~60厘米以上，无花瓣；雌花在上，密集，花萼为佛焰苞状，早落；雄花在下，花萼膜质，3~5裂，雄蕊多数，花丝分枝；子房上位，8室，每室有胚珠1颗；花柱深红色，广展，2裂。花后结蒴果，近球形，直径1~1.5厘米，绿色或淡紫色，密被软刺；种子长椭圆形，平滑，褐色或白色，有斑纹。

生长环境 通常栽培于屋旁隙地、公园、庭院、路旁，极易生长，山坡、平原各种土壤均适合栽种；惟茎干松散，易受大风吹折，栽植地要有适宜防护。现在各地农场大量栽植，为榨油及作作蛋饲料、制纸等之用。

药用部分与气味性能 叶、根、种子。无特异嗅气，味苦。能拔毒消肿。药用多用红蓖麻。

临床应用

1. 破伤风 鲜红蓖麻子树根6钱（干者效力不足），切碎加酒炒，以水一碗半煎剩大半碗，分两次服，隔二小时服一次。以上系成人量，初生小儿可用四分之一，分四次服。四天可愈。（东莞企石人民医院中心医院邓民生献方）

2. 子宫脱垂（阴挺）（1）先服补中益气汤，服后约过2~3小时左右，然后用蓖麻叶一大把，捣烂酒炒敷上阴部，顷刻则收。（惠阳林振鹏，惠州市卫协会献方）

（2）鲜红蓖麻子树根2两切片，雄鸡1只约1斤重去毛脏，和药入锅加净茶油炒香，用糯米酒煮熟，日分3次服食。先取鸡不食草2两，煎水2杓，乘热倾入木盆，上加木板一条，令患者坐上熏洗阴部，洗毕即涂上净茶油于阴部，然后用手将子宫送入阴道内，用经带扎好即卧床休息，待子宫收缩后即服补中益气汤。并注意适当休息和戒房事。（龙川县防疫站谢当桐献方）

（3）红蓖麻叶、燕子泥、灶心泥，共捣烂煨热，先在百会穴灸1壮，后将药贴于；重用白醋1两，市饼8只，蜜糖1两，煎服。后再用花旗参3钱，炙芪5钱，归身4钱，白朮3钱，茯苓3钱，川芎3钱，酒芍3钱，熟地4钱，水煎服。（梁赛五献方）

3. 脱肛（1）用蓖麻仁50粒，去壳捣如泥，再和饭粒子捣成饼，贴于顶百会穴（两耳尖直上顶正中），次日即收上。兼服真人养脏汤而愈。（《江苏中医》1959年第2期）

（2）红蓖麻子树根2两，老公鸡1只，煎水服。（龙川县黄伯英献方）

（3）蓖麻根1两切成片，放入猪肠头内，以水2碗煎服。另用酒饼1只研末，和开水洗净脱肠头，然后用蓖麻叶根热，用手轻轻将脱肠托入原位后，令患者卧床休息1~2天即愈。

（4）红蓖麻子酒糟炒热，敷百会穴，经1小时久；另内服补中益气汤。（黄族筠献方）

4. 赤白痢 将蓖麻叶晒干研末，成人每次用3钱，以水2碗，加入黄糖或白糖适量煎服。小儿减半，孕妇忌服。（广州中医学院进修班范家辉献方）

5. 口眼喎斜（面神经麻痹） 蓖麻子仁2两，江子仁（巴豆）5分，雄黄精2钱，共为末炒做成饼，加

麝香1分撒于餅面，右患貼左边、左患貼右边，等待回復正常即洗去之。(丰順、潭江卫协会献方)

8. 喉风 喉嚨外部呈現結核左右各1个，即用艾炷脫結核各灸1壮，再用蓖麻二层皮、磨谷根、楊桃子、白矾煎水含之，吞下亦可。如患者舌肿大流涎，用勞柏子根二层皮、黃糖、耳環根梗二層肉，共搗爛做成餅两个，將該餅含于口中，4小时換1次药。(合浦縣成張色新献方)

7. 小便不通 (1) 用蓖麻根5寸(不拘大小)，煮猪骨加食盐少許，食之良效。(江門譚岭沛献方)

(2) 紅心蓖麻叶2块，灯籠草4錢，水煎冲酒內服。孕妇忌服。(普宁吳登寿献方)

(3) 蓖麻根0.5斤，冷飯0.5碗，共搗爛敷于臍下。(海口市林天輝献方)

8. 风痰鶴膝骨痛 蓖麻、牛大艾、桃子叶、樟木皮、細叶榕、葱头、生姜头、风指叶，共搗酒糟炒熱敷之。(台山中医研究所献方)

9. 难产，盘腸产 (1) 船民陆某妻，年36岁，难产已一昼夜，服药无效。后用蓖麻子60粒，和漲胖了的黃豆，搗匀，敷两足心。未一刻，即起陣痛，胎兒即生；因未洗去药泥，子宮亦下，一家惊慌，后将蓖麻泥剝下，改貼頂心，当即收上。又袁姓妇人，年40岁，住上游公肚，产后胎衣不下。用蓖麻子50粒，搗貼两足心，即下。(徐杏甫摘自《江苏中医》1959年第2期)

(2) 盘腸产 蓖麻子搗爛敷百会穴。(江門市李鏡如献方)

10. 胞衣不下 (1) 蓖麻子6錢至1两，搗爛，并用其树叶包裹煨热，置产妇脚心，待胞衣下立即取去其药，以免子宮下垂。(合浦符可能，新興甘增欽，云浮黃煜生，和平卢寨，向国友等献方)

(2) 蓖麻仁2两，麝香1分，共研細末搗冷飯貼于两足心，胎衣即下。(揭陽梅崗卫生院李偉基献方)

(3) 蓖麻叶和竹尾燒灰搗落炒熱貼二足心即下，下后速將药洗去，否則子宮亦会下脫。(丰順、潭江卫协会献方)

11. 月經不調或性交后腹痛 (1) 蓖麻5錢，白花根5錢，搜山虎3錢，桑子根5錢，嫩鷄1只同煮服。(普宁大甲卫生院鍾之五献方)

(2) 閉經 用紅蓖麻強3条，苏木1錢，煎水冲酒少許服。(湛江市郑榮献方)

12. 疔瘡熱毒瘡 (1) 黃丹2錢，銀朱2錢，蓖麻仁4錢，松香1两，輕粉1錢，將上药共研細末，搗成膏貼患處。(林光南献方)

(2) 背痛或其他部位痛，其症先在皮下肿痛，硬結，以后化膿呈蜂窩狀，疮面呈暗黑色，多为劇痛 以蓖麻叶酌量，加入黃糖少許，共搗爛敷之則愈。(和平陳道珍献方)

(3) 臍腫 紅心蓖麻仁或叶，和酒糟共搗爛敷患處，疗效良好。(海南乐金王日东献方)

(4) 蓖麻叶、芙蓉叶、爛王头、酒糟，搗爛外敷。諸痛皆可，但脚痛不用芙蓉叶，肚痛不用爛王头。(民間驗方)

(5) 正紅蓖麻仁1两，火麻仁2两，黃糖酌量，加入开水少許，將上药搗爛和勻敷患處，敷至疮口边不高起为止，便改換生肌药。(合浦苏贊耀献方)

13. 乳瘤(乳腺炎) 半边蓮2两，霧水葛2两，木芋头1两，透骨消1两，蓖麻叶5錢，土黃連5錢(症甚加田七末5分)，將上药共搗爛后和黃糖少許敷患處，每天換2次。(三水林百生献方)

14. 疔瘡 (1) 銀朱1錢飞淨晒干，淨黃丹、蓖麻仁各1錢，輕粉5分，松香5錢，共搗成膏貼患處。(潮安洋波治、郑鶴云献方)

(2) 蓖麻仁去壳14粒，乳香1.5錢，搗爛外敷。內服菊花、地丁、公英各3錢，水煎服。

15. 过头蛇 蓖麻叶、山茨菇、田基黃各3.5錢，搗爛，酌加开水少許敷患處。

16. 蛇头纏指 紅心蓖麻叶5張，雞蛋壳5只，头发6錢，石灰4錢，片糖2錢，熟烟2錢，桐油1两，先将雞蛋壳和头发煨好，然后和上药搗勻敷患處，連敷二、三次即愈。(合浦李芳廷献方)

17. 痔瘡 (1) 生蓖麻子2錢，生川烏末1錢，生半夏末1錢，先将蓖麻子去壳，研至极爛，加入二味药末搗勻，如太稠可加些花生油。用时先把药膏填入肛內，留少許药貼在肛外，敷小时后痔核反突，即換上枯痔散。(湛江獻方)

(2) 用紅色蓖麻樹1条(連叶根莖斬碎)，生者用1斤，煎水2次，乘熱坐于盆內浸洗，日用2~3次，

連浸數次則愈。(梅縣羅均文獻方)

18. 跌打 (1) 蓖麻子 4 兩, 榕木葉 2 兩, 姜黃 4 錢, 刀板木葉 4 兩, 澤蘭 3 錢, 生薑 5 錢, 梔子葉 2 兩, 韭菜頭 10 只, 葱頭 8 只, 共搗爛加米酒 6 兩, 和勻燉熱敷患處, 每次敷 1.5 小時, 再燉再敷 (敷藥時留一小孔不封密), 每日敷 4~5 次。如無米酒用清酒水敷之亦可。(欽縣陸屋人民公社育塘衛生院馬龍光獻方)

(2) 續筋散 白蜡 4 錢, 蓖麻子仁 1 碗, 七枝蓮 5 錢, 生地 2 錢, 山八角 3 錢, 黃蠟 2 只, 牛胆 1 只, 生川烏 5 錢, 田七 3 錢, 梅片 2 錢, 大茶藥根 1 兩, 白芷 5 錢, 老姜 3 錢, 過山龍 5 錢, 照藥根 5 錢, 西紅花 4 錢, 蜈蚣 2 條, 豬胆 8 只, 鐵扣 1 兩, 細辛 3 錢, 蜂窩 1 只, 京皮 3 錢, 馬錢 8 錢, 草烏 1 錢, 丹皮 3 錢, 川山甲 3 兩, 石脂 3 錢, 三桠 3 錢, 黃丹 10 兩, 蛇衣 5 錢, 麻油 3 錢, 鉛粉 6 兩, 薄荷 5 錢, 龍骨 2 錢, 象皮 3 錢, 連翹 8 錢, 花粉 8 錢, 山茨菇 2 錢, 肉桂 5 錢, 以上藥加淨茶油 0.5 斤, 山蒼油 1 斤, 松節油 0.5 斤, 蓖麻油 0.5 斤, 桐油 3 斤, 共煎成藥膏, 各外敷用。(蕉嶺藍坊生院黃院香獻方)

(3) 刀傷 用蓖麻子、黃糖共搗爛貼傷口即愈。(龍川縣上坪人民醫院黃人耳獻方)

(4) 駁骨 用生雞 1 只 (約 10 兩重), 剖開取出腸胃, 加入紅蓖麻根 6 兩, 鐵打散 1~2 兩, 搗爛敷患處, 24 小時除去; 再用田基黃 2 兩, 藕哥刺 2 兩, 酸味草 2 兩, 榕樹葉 2 兩, 松仔尾 2 兩, 烏荳葉 2 兩, 蓖麻子 (根更佳) 3 兩, 山桔葉 2 兩, 生葱 1 兩, 上藥共研粗末, 用時先加酒煮透, 再入鐵打散 7 錢, 雞蛋 1~2 個, 全部搗勻敷患處 (藥散看傷處大小酌用)。凡骨折先服經驗還魂跌打丸 1 枚或 0.5 枚, 繼用手術復正骨位後才敷上兩方。(東莞陳茂生獻方)

(5) 用紅蓖麻 0.5 斤, 歸尾、血竭各 1~2 兩, 生雞仔 1 只去腸胃, 用石臼將上藥搗爛, 敷骨折處; 并加固定, 一晝夜以後即可輕輕除去更換新藥。另用紅蓖麻、烏柏樹根浸酒, 早晚各飲一杯。(黃亞錦獻方)

19. 炮傷 (1) 蓖麻子 8 兩, 熟雞蛋黃 2 個, 二味搗爛敷傷口, 經 1~2 天, 子彈便去。(順德均安醫院馮顯潮獻方)

(2) 蓖麻子、茶油、雞屎、番瓜瓢, 初用番瓜瓢敷之止痛後, 將蓖麻子炒黑研末, 調清茶油塗之; 或加雞屎同調塗亦可。并服食豬蹄精肉 0.5 斤。忌葱、蒜、雞肉。如打穿胫骨, 忌酸辣。(下東區徐水生獻方)

(3) 蓖麻 6 粒, 巴豆 2 枚, 糯米 70 粒, 共搗爛為丸, 放入藥膏內貼敷傷口, 炮彈即出。(順德人民醫院獻方)

(4) 紅蓖麻嫩蕊、仙人刺、金英刺、酸味草、金剛藤、滑石共搗爛, 水調敷。如果子骨鍊不出, 用白芷 5 錢, 梅片 3 錢, 和上藥同敷。如發紅腫, 用生葱 0.5 斤, 面粉 0.5 斤, 開水搗爛塗患處即消。如不出, 再用牛屎尿、灶雞、土狗共搗爛敷患處必出。愈後傷口用梅片、石脂、草節、白芷。洗用仙人刺、薄荷、葱頭、花心、田七等。(云浮縣黃廷芳獻方)

(5) 蓖麻 2 兩, 生牛膝 2 錢, 生川烏 5 錢, 生土狗 1 兩, 生杏仁 3 錢, 生沙雞 5 錢, 生草烏 5 錢, 用烏魚一條, 開肚, 加入糯米飯適量, 和藥一并搗爛敷患處。如跌傷加黃泥 1 兩, 錫礪加松香 8 錢, 銅礪加礪砂 5 錢, 敷之則出。如傷口化膿, 用鴨兒菜、青蠅草、紅芋莖、白大薯, 共搗爛敷之。(德慶徐信田洗兆元獻方)

(6) 蓖麻子 3 錢, 清花魚仔 2 條, 奴古虫 2 錢, 推車子 1 只, 土狗 2 只, 灶頭雞 1 錢, 黃蜂 1 錢, 沙雞 1 錢, 地疾 1 錢, 土地鼠 1.5 錢, 蚯蚓 1.5 錢, 沙蛤 1.5 錢, 竹蜂 1 錢, 此藥共用新瓦焙干, 研末敷患處。後用山梔子葉 5 錢, 雀指甲 (水指甲) 6 錢取葉或根, 地榆葉 6 錢, 水蕉葉 6 錢, 鬼燈檉葉 5 錢, 點秤星葉 5 錢 (火毒加發葉敷以便生肌, 又名高港葉), 除外敷外, 并取以上各藥之根, 煎水洗傷口。內服下方: 犀角 5 分研沖服 (重症用至 1 錢), 梔子 3 錢, 川連 4 錢, 竹茹 3 錢, 田七 1 錢, 黃芩 4 錢, 淡竹葉 4 錢, 羚羊 5 分研沖服, 銀花 4 錢, 甘草 2 錢, 生地 4 錢, 蘇木 2 錢, 乳香 2 錢, 金櫻 3 錢, 沒藥 2 錢, 另加雞胆 4 分, 水煎服。忌房事。(高要區區獻方)

(7) 蓖麻仁 5 錢, 打梅葉 5 錢, 推車子 5 錢, 將蓖麻子去壳, 打梅葉、推車子煨, 三種同搗爛成糊狀敷患處, 重者一天, 輕者半天, 其彈自出。用量可按傷口大小而酌量增減, 療效顯著。(河泥歐陽獻方)

(8) 推車子 5 只, 蓖麻仁、竹杰子核各 1 兩, 翻手狗 10 只, 共搗爛敷之, 彈子即出。(吳山陳敬業獻方)

(9) 生蓖麻仁 3 兩, 磁石 1 兩, 白芷 7 錢, 共搗爛敷患處 (藥須炒熱用), 半天炮彈即出。(黃叔獻方)

20. 异物入肉 (1) 竹、木、鐵釘、玻璃刺入肉, 以蓖麻子 1 兩, 冰片 1 錢, 黃糖少許, 共搗爛敷之則出。

(广州苏任芝、黄少雄献方)

(2) 红苘麻木蕊1条,花牡蛎1条,沙姜1钱,炮药2钱,共捣烂敷之则出。(彭煥群献方)

(3) 用红苘麻心和酒糟少许,加黄糖适量共捣烂,敷之则出。(郭李球献方)

(4) 苘麻子2钱,沙姜1钱,一般杂物刺入肉,捣烂敷之则出。(吴德隆献方)

(5) 红心苘麻子40粒,捣生猪油少许,敷患处,连敷2天,可以拔出。(东莞樟木头中心医院蔡汉策献方)

(6) 灶头鸡5只,苘麻仁5钱,冰片5分,黄糖少许,糯米饭5钱,乌梅2只,牛膝2钱,生地3钱,共捣烂敷之则出。(冯毓山献方)

(7) 红苘麻叶2张,鳊鱼6钱,共捣烂敷之则出。(郁南吕靖佳献方)

(8) 骨碎入肉,以乌梅3只,苘麻子5粒,白糯米2钱,鳊鱼肉5钱,共捣烂成膏,敷于患处则出,或即化去。

(9) 铁钉入肉,以苘麻仁4两,捣烂敷患处,钉即出。(湛江市杨汉文献方)

(10) 苘麻子肉2钱,牛膝2钱,如见血加归尾2钱,共捣烂敷之则出。(江門陈理磨献方)

(11) 磁器入肉,以苘麻子肉5钱捣烂,加入酸梅少许,共捣匀敷之则出。(赵式训献方)

(12) 苘麻子8粒,生油麻2钱,共捣烂敷之则愈。(潘丰林俊岳献方)

21. 猪根咬伤 白苘麻叶酌量,加蜜糖少许,共捣烂敷患处则愈。(方时杰献方)

除四害

1. 灭子丁 中国医学院根据全国各地有关苘麻根、茎、果、叶、壳灭子丁的资料,进行了研究,证明苘麻叶、果壳的浸剂和煎剂灭子丁的效果最好,苘麻根、茎、种子的浸剂或煎剂杀子丁的效力较差。2%~5%的苘麻叶子、果壳的浸剂和煎剂,应用48小时后,可以100%的杀灭子丁,较一般的野生植物的效力高数十倍。估计可以适用于浅水坑洼或稻田中杀子丁,以弥补药物之不足,各地可结合农业积肥,推广试用。(《医药卫生快报》1980年第5期)

2. 灭蛆 (1) 取苘麻子外壳捣碎,撒入厕所,能杀蛆。(《中级医刊》1980年第2期)

(2) 先将苘麻叶捣烂,然后放下厕所即可。用于水厕杀蛆,最低浓度1.5%(88.5斤粪用苘麻叶1.5斤),经6小时后蛆100%死亡,浓度越大,死亡时间越迅速。(阳江县)

文献考征

1. 唐代苏恭撰《新修本草》载苘麻叶曰:脚气风脚不仁,煮捣裹之,日二三易即消。又油涂炙热,熨额上,止鼻衄,大效。

2. 宋代日华子撰《大明诸家本草》载苘麻曰:研傅疮痍疥癩,涂手足心催生。

3. 元代朱丹溪撰《本草衍义补遗》载苘麻曰:苘麻属阴,其性善收,能追膜取毒,亦外科要药;能出有形之毒物,故取胎产胞衣剥骨膜血者用之。

4. 明代李时珍撰《本草纲目》载苘麻曰:主偏风不遂,口眼喎斜,失音口噤,头风耳聩,舌膜喉痹,脚气,脚气毒肿,丹瘤,汤火伤,针刺入肉,女人胎衣不下,子肠挺出,开通关窍经络,能止诸痛,消肿追膜拔毒。

5. 清代赵寅谷撰《本草求原》载苘麻曰:甘辛温有毒,苗盛于夏,实结于秋,故主吸出有形之毒物,拔膜毒。取胎产胞衣,研膏涂脚心。剥骨胶血散瘀,敷患处。收子肠,研涂顶或贴丹田。涂擦疔毒,瘤肿四肢肿块,皆吸毒外出。汤火伤,同蛤粉开油搽。又性善走,能通窍络,故治风气郁头痛,间乳香食盐贴太阳。舌膜塞口,喉痹,牙关紧,俱取油作燃熏吸。偏风手足不举、口目喎斜,同羊脂山甲煎膏加磨日摩渐正。叶主治脚气风脚不仁,痺痿不遂,或麻木酸痛,煮热捣烂,乘热裹之,取汗二三次,内服疏风活血方。红者散风湿,白者消肿。

6. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载苘麻叶曰:散风湿,消肿毒。有红白两种,红者功以散风湿胜,白者功以消肿毒胜。其仁能下胎衣,捣烂敷产妇脚心即下,下即除去。治跌打,和酒糟捣烂敷患处。

7. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载苘麻曰:治牛癩症(生疮);痢症(红白痢);难产;胎衣不下。并可治牛子宫脱出。

樟 树

Cinnamomum camphora Sieb.

科属形态 本品系樟科樟属中的一种常绿乔木；高达25米，直径达80~50厘米，树皮和叶极芳香，小枝有棱。单叶，革质，互生，羽状脉，椭圆卵形或矩圆卵形，长6~12厘米，宽3~6厘米先端短渐尖，基部楔尖或阔楔尖，边全缘，上面深绿色，光亮，背面苍白色，侧脉每边4~5条；叶柄长1.5~3厘米。花两性或杂性，同株，绿白色，夏季开花，为顶生的伞房花序，比叶短；萼片6枚，长椭圆形，顶端钝，外面近秃净，内面有短柔毛；发育雄蕊9枚，排成3轮，第3轮的每1花丝的基部有腺体2个，第4轮常为退化雄蕊；花药4室，瓣裂；子房上位，1室，有胚珠1颗，花柱1，柱头单1。花后结浆果，球形，黑色，直径6~8毫米，附着于延长的萼管上。

生长环境 生于高海拔地区的原始森林中，或丘陵的杂木林内，一般土壤均易生长。秋末采收果实。

产地分布 印度半岛、马来亚及我国均有分布。我国江苏、安徽、江西、湖北、湖南、广东、四川、云南、贵州均有产，以福建、台湾为尤多，本省北部较多。

药用部分与气味性能 果实(樟木子)、叶、树干、根、皮。气香，味辛，性温。能散风消肿，止痒镇痛。

临床应用

1. 急性胃肠炎(吐泻腹痛)

(1) 樟树皮(去粗皮取2皮)适量，加生盐少许，置锅内炒至黄色为度，以阴阳水(半开水半冷水)各半碗同下锅煎，取起乘热服下。(南雄湖口人民医院门诊部黄云霖献方)

(2) 老樟木树格4钱，藿香2钱，横梗2钱，砂仁1钱，以水2碗煎至1碗，服之即效。如吐泻、腹膨服有口渴、大汗等症者，忌食辣姜及米汤。(浦北泉水乡周铭南献方)

(3) 樟树二层皮2两，番葱叶(番石榴、鸡屎果)10片，辣藤根1.5两炒黄，水煎服。(封开弄平贤，郁南弄华贤等献方)

(4) 樟木二层皮3钱，辣藤根3钱，高粱粟3钱，上三味炒过煎水服。外用吴茱萸1两捣烂，加酒1两，拌匀蒸热擦手足，即止抽筋。

(5) 樟木二皮5钱，薯蓣藤干2两，勾藤4钱，陈茶叶5钱至1两，煎水服。(广州中医学院进修部冯毓山献方)

(6) 樟树子3钱，赤石脂3钱，台乌3钱，甘草3钱，白芍3钱，广木香2钱，煎水服。(清远镇金明献方)

(7) 樟木皮5钱，或用樟木子5钱，煎水服。或樟木子2钱研末冲开水服。(云浮县黄勉臣，封开中医院苏卓活，饶平三饶卫生院陈仲宁等献方)

(8) 樟木子3钱，藿香3钱，木香1.5钱，台乌3钱，灶心土1两，寒砂1.5钱，晚蚕砂6钱酒炒过，以水3碗煎至0.5碗温服。(江门赵定和献方)

2. 气痛 樟树二层皮、乳香、末药、山甲、半夏、吴茱萸、甘草、山药、猪鬃草根(香附子)、横梗各适量，水煎服。(合浦常乐陈德光献方)

3. 脚气 樟木树寄生2斤,蒜子衣3两,辣蓼1斤,以水1桶约煎30分钟,将水置于浴盆中,以凳或板架在浴盆上,令病人坐上,再用被面盖只露头部,熏约30分钟后病人出汗如粘液状为度,熏后以药水冲洗全身。此症大便闭结者,先食蕃薯及醋等品,食至脾不肿而转软时便可食饭;开始食饭时最好取黄头黑蛇1条,不论大小,去肠脏及鳞、头,加瘦猪肉1两制成肉饼,再加鸡蛋1只和匀,以酒水各半煮食。(新兴中医门诊部叶仲璋献方)

4. 风湿痛 樟香4钱,以温火炙化后,热擦患部数次。(广州中医学院进修部金宗文献方)

5. 感冒

(1) 有格樟木枝梗、老姜、野艾头各适量,煎水服。(北海郭季球献方)

(2) 樟木皮适量,煎水饮之,汗出即愈。(赵貳坤献方)

6. 瘰癧 大种樟木梗5钱(取二皮),土狗6只,韭菜头2钱,酒糟5两,捣烂敷患处,连敷1~20次而愈。(广州中医学院进修部刘文英献方)

7. 对口疮 樟树二层皮捣烂调蜂蜜敷患处,神效。(五华张永秀献方)

8. 足底疮 樟木皮、石灰末、生盐适量,煎水浸洗患处3~4天,日浸2次,以后用生肌散撒之则愈。(合浦曾振澄献方)

9. 骨折 樟木二皮6钱,黄柏4钱,血竭、大蓟、梔子、木耳、生地、自然铜煅醋淬、乳香、川乌、白蜡、无名异、五加皮、当归、红花、桃仁、姜皮、白及、田七,以上各4钱,土鳖30只,姜汁、葱头少许,加芙蓉叶9两,捣烂去渣取汁,用酒面煮成稀糊敷伤部。(江門苏荣成献方)

10. 蛇咬伤 樟木叶酌量捣烂,调米酒涂患部周围敷次,毒轻者即愈。(龙恒初献方)

文献考证

1. 唐代陈藏器撰《本草拾遗》载樟皮曰:本品煎汤洗脚气,疥癣,风痒,作履有除脚气之效。

2. 明代李时珍撰《本草纲目》载樟木屑曰:霍乱及干霍乱须吐者,以樟木屑煎液汁吐之甚效。又中恶鬼气卒死者,以樟木烧烟熏之,待苏乃用药。此物辛烈香窜,能去湿浊,辟邪恶故也。

3. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载香樟曰:用叶或皮部治牛痢症(红白痢);泻血症(红痢);气肿疽(箭脚、黑腿);瘰癧(烂肠疽);胎衣不下;跌脚病;转圈症;膨胀症(食舌草);热症;寒症;乌痧症。用果实(有粉状物的)治膜胆症;小牛排白粪。用根部治牛风湿症,并可治牛热症带痢血;喉风症;伤寒症;误吃野猫尿中毒;鼻鼻疽。用樟脑治鼻疽。

樟 柳 头

Costus speciosus (Koenig) Sm.

别名：广东商陆，白石笋

科属形态 本品系姜科閉鞘姜属中的一种高大草本；有块状平生的根茎，基部为木质，高1.5~2.5米，通常在上部分枝。单叶，近革质，螺旋排列，矩圆形或披针形，长15~20厘米，宽6~7厘米，先端渐尖或突尖，基部浑圆，边全缘，有直出平行的羽状脉，由中脉斜出，上面近无毛，背面密被稠密绢毛，叶鞘阔而封闭。夏季开花，为穗状花序，无柄；具苞片，椭圆形或卵形，生于基顶，长5~13厘米，宽3~8厘米；苞片革质，卵形，红色，复瓦状排列，长约2厘米，具增厚和略锐利的短尖头，每一苞片内有花1朵，其侧有一长1.2~1.5厘米的小苞片。萼为管状，3裂瓣，红色，长1.8~2厘米；花冠管状短而大，裂片椭圆形或卵形，长2.5厘米，白色或带红色；唇瓣白色，中部橙黄色，长宽约4~8厘米，先端具裂片或皱波状；雄蕊1枚，花瓣状，长3.5厘米，花药线形。长约9毫米，平行；子房下位，2~8室，有很多的胚珠；花后结蒴果，稍带木质，长约1.8厘米，红色，内含数颗黑色光亮圆形种子；种子长约8毫米。

生长环境 生于林下阳光较稀薄的潮湿土壤，或溪旁灌木及草丛中。秋末采收。

产地分布 广东、广西等省，本省各地均有分布，以增城附近各县产量较多。一般丛生或散生。

药用部分与气味性能 根。气辛，味酸，性寒。能通利水道，消肿拔毒，内服、熏洗、敷贴均宜。

临床应用

1. 水肿

(1) 樟柳头、土茯苓、山芥菜(地胆头)、云苓、檳榔、大青皮、银杏、法夏、黄芩，各药酌量煎水服。(江門市潘伯均献方)

(2) 樟柳头3钱，去皮切片，水煎服，连服数天呈效。(佛山吳桂卿献方)

(3) 生樟柳头(开白花的)0.5斤，鯉魚1条，煎服，每天服1次，连服3~4天，其肿渐消。(黃善良献方)

(4) 商陆5钱，麝香1分，研细末调田螺水，贴于脐中。(《福建中医秘方》2集)

(5) 商陆1两，佛手1两，炒黑存性研末，合猪肝8两，煎汤分2次服下。(《福建中医秘方》2集)

2. 风疹 鲜樟柳头3两，煎水洗，其痒随洗随止，红肿即消。(广州邓植献方)

3. 小儿偏瘫病 樟柳头、松节、宽筋藤、豆豉姜、入地金牛各1两，当归、红花、桃仁、续断、苍朮、杜仲各3钱，羌活、牛膝、独活、乳香、没药、秦艽、牛骨髓各3钱，生南星、狗脊、生附子、生半夏、生川乌、甘草、细辛、草乌各4钱，田七1两，食盐2钱，苏合油1.5两，麝香1分(用时加入)，用酒水各1斤，浓煎，取药液乘热熏患部，再以新布蘸药液敷之，冷即换，连续数次即效。(江門關錦麟献方)

文献考证

1. 汉代《神农本草经》载商陆曰：主治水腫痼癰，殺除痛腫，殺鬼精物。

2. 南北朝陶弘景撰《名医别录》载商陆曰：疗胸中邪气，水肿，痿痹，腹满洪直，疏五脏，散水气。
3. 唐代甄权撰《药性本草》载商陆曰：泻十种水病，喉痹不通，薄切醋炒，涂喉外良。
4. 宋代日华子撰《大明诸家本草》载商陆曰：通大小肠，泻壅毒，堕胎，煨肿毒，傅恶疮。
5. 明代李士材撰《本草图解》载商陆曰：酸辛有毒，通大小肠，疏泄水肿，攻消痰癖。捣烂敷肿毒喉痹。小儿痘毒，同葱白煨臍。白者可入汤散，赤者但堪外贴。古赞云：其味酸辛，其形类人，疗水贴肿，其效如神，与大戟、甘遂，异性同功；虚者不可用；止用贴臍，小便利即消肿。
6. 清代黄宫绣撰《本草求真》载商陆曰：商陆辛酸苦寒，有毒。功专入脾行水，其性下行最峻，有排山倒海之势，功与大戟、芫花、甘遂相同。故凡水肿水胀，疝瘕痞肿，喉痹不通，湿热壅毒恶疮等症，服此即能见效。如仲景牡蛎泽泻散之用商陆，以治大病后腰以下肿，用此急迫以散之也。若脾虚水肿，因服轻剂未愈，遂用苦劣有毒纯阴之药迅迫，效虽稍见，未几即发，决不可救。取花白者良，赤者只堪贴臍。黑豆汤浸蒸用，得蒜良。
7. 清代何克廉撰《生药药性各要》载商陆曰：味酸辛，性寒，有大毒。治水肿消痞肿恶症，落胎杀虫。白者良，赤者不可服，误食杀人。风疾最妙。
8. 现代胡真撰《山草药指南》载樟柳头曰：凡赤色头烂，絹包縛臍上自愈。取白色根和猪精肉煎汤服，治閉口痢，三次可愈。取白根和猪精肉煎服，治百子痰打（腹脹）极效。并治白浊及十种水病。
9. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载商陆曰：味酸辛，性寒，有大毒。洗水肿，消痞肿恶疮，落胎。白者良，赤者不可服，能杀人。以之洗风疾最妙。

鵝 胆

Brucea javanica (L.) Merr.

别名：鵝胆子，老鵝胆，苦参子

科属形态 本品系苦木科鵝胆子属中的一种灌木；树皮有苦味，枝、叶柄和花序均被黄色柔毛。叶互生，纸质，奇数羽状复叶，长达20~40厘米，小叶5~11枚，卵状披针形，长5~10厘米，宽2.5~8厘米，先端渐尖，基部阔而偏斜，边缘有粗齿，两面均被柔毛，背面较密。夏季腋生圆锥花序，总轴延长达50厘米，被黄色柔毛；雄花序长15~25厘米，雌花序常为雄花序长度的1/2；花小，杂性，暗紫色，直径1.5~2毫米；萼小，4裂；花瓣4枚，大于萼片，线状匙形复瓦状排列；花盘4裂；雄蕊4枚，着生于花盘之下；子房上位，由4个完全分离的心皮组成，每心皮有胚珠1颗。花后结核果，长卵圆形，长6~8毫米，熟时变黑色，干时具皱缩网状凸纹；种子卵形，长4~5毫米，淡黄色。本品一名苦参子，与豆科的苦参种子是两种不同的东西。

生长环境 生长于山坡、台地、山麓及干枯冲刷沟两旁砂砾土或粘质土，或灌木杂草丛中，村落路旁土壤比较湿润的旷地亦有产。夏秋二季采叶，秋季收集果实。

产地分布 广布于印度及我国南部和澳洲北部。我国广东、福建、台湾、云南等省皆有产，本省以湛江专区和海南野生最多，其他地区亦有分布，散生或丛生。

药用部分与气味性能 叶、种子。气微腥臭，味极苦，性寒。能清血热病，杀虫，腐瘰疬肉。

临床应用

1. 早期血吸虫病 江苏常熟市第五联合诊所鄒良村于1985年，用鵝胆子仁试治一姓杨的血吸虫及阿米巴原虫病病人，每次11粒装于胶囊中，每日2次，饭后吞服，连服4天，大便脓血即止。检查大便血吸虫卵及痢原虫卵均消失，后再复检亦呈阴性。（《江苏中医》1986年试刊号）

2. 疟疾

(1) 上海第一医学院张昌绍用鵝胆子试治疟疾27例，三日疟10人，间日疟10人，恶性疟7人，剂量每次用鵝胆子仁10粒，用胶囊盛好，一日3次，第4~5日减半，全疗程5日。服药后1~2日血中疟原虫减少，3~4日内症状消失。服药后2日内退热的81.42%，服药后发作当即停止的44.43%，只发作一次的40.73%，二者合计85.16%。（《中药研究汇编》）

(2) 鵝胆子7粒，冷饭少量，共捣烂，症发前3小时敷于第五颈椎（俗称三节骨）陶道穴位，到时发作与否要除去，涂上油脂保护该部皮肤。如未愈再敷。（宝安陈寿康献方）

3. 原虫病

(1) 杭州市保健医院用鵝胆子治疗住院阿米巴痢65人，疗效达94%弱，其优点为成本低，疗效确，与西药特效药未有何差别。服法：鵝胆子净12粒（打碎），奶糖15克，上药装入胶囊中为一次量，每日三次。（《中医杂志》1985年1月号）

(2) 吉林铁路医院内科实验用鵝胆子治疗原虫病36例（半数具急性症状），治愈率91.6%，用法：将整个大色黑鵝胆子研碎，一日12粒，分三次用胶囊分服，食后服。（《中药研究汇编》）

(3) 鴉胆子8錢,槐花6錢,呵子6錢,文蛤6錢,地榆炭4錢,荆芥6錢,川連6錢,木香4錢,烏梅肉6錢,枯礬3.3錢,上藥研末為丸,朱砂為衣,每日服2次,每次服3分。(江門車子森獻方)

(4) 鴉胆子肉5錢(去油),呵子肉8錢,烏梅肉1兩,先將烏梅肉以水浸透,和上藥研末為丸,如綠豆大,晒干,每服4粒,每日一服。(龍川縣老鹽人民醫院劉子銘獻方)

(5) 鴉胆子肉(去油)2兩,生軍3兩,石榴皮8錢,百草霜3錢,枳殼3錢,陳皮1兩,共為末,米糊為小丸,每次成人量服1~1.5錢。(廣州鄧植獻方)

(6) 單味服用鴉胆子淨仁治原虫病 每次10~15粒,日服3次,以膠囊裝載或龍眼肉包裹吞服。有四會黃岡余家達,和平會穀合,海南文昌清瀾衛生所曾令文等獻方,其用法基本相同。

4. 毒蛇咬傷 鴉胆子、半边蓮、七枝蓮、對面針各適量,搗爛敷患處。(湛江市何秀深獻方)

5. 蛇頭瘻指(瘰癧) 鴉胆子葉芯和米酒糟搗爛敷患處。(劉繼仁獻方)

6. 雞眼(瘡疣)

(1) 天津市工人醫院用鴉胆子油塗治雞眼240例,輕者一次,重者數次,痊愈者209例。

(2) 先將患部以熱水浸漬,使雞眼軟化後,即將患部進行消毒,以消毒的小刀分次由淺至深削去雞眼,隨即用鴉胆子搗爛敷患處固定,三數天可愈。藥量按雞眼大小而定。(汕頭戴士林,廣州中醫學院進修部香麗謀獻方)

(3) 治胼胝(腳墊) 鴉胆子搗餅貼患處,外用包裹固定,一日夜腳墊自落。(河北邯鄲專區威縣田承訓獻方)

7. 耳痔 同濟醫學院耳鼻喉科李寶英用鴉胆子油治療外耳道乳頭狀瘤(耳痔、耳草、耳挺),根據中醫經驗和文獻記載,試治有效後,改進使用方法:用醚提取鴉胆子油,便于滴入耳內。在重慶、上海兩地共治41例,除8例未來復診外,全部治愈。(《中藥研究匯編》)

除四害

鴉胆子味甚苦,對殺虫效能與種子相類似;在華南溫熱地帶分布甚多,尤以海南和湛江專區特多。產區可利用其苗葉為殺子牙及編組試用。

文獻考證

1. 清代何夢瑤撰《醫碕》載鴉胆丸:用鴉胆子去壳搗去油1錢,文蛤醋炒,枯礬、川連炒各3分,糊丸,朱砂為衣;或鴉胆霜、黃丹各1錢,加木香2分亦可,烏梅肉丸,朱砂為衣;二方俱丸綠豆大,粥皮,或鹽梅皮,或圓眼干肉,或芭蕉子肉,包吞11~12丸,治痢立止。

2. 清代趙學敏撰《本草綱目拾遺》中載苦參子曰:一名苦參子,一名鴉胆子,出閩廣,蔞華中均有,形如梧子,其仁多油,生食令人吐,作霜搗去油入藥佳。

3. 清代趙賓谷撰《本草求原》載老鴉胆曰:其子能膏肉,止積痢。葉洗熱毒,理跌打。根治牛疔并中牛毒。

4. 現代張錫純撰《衷中參西錄》第二卷鴉胆子解:味極苦,性涼,為涼血解毒之要藥,善治熱性赤痢(赤痢間有涼者),二便因熱下血,最能清血分熱及腸中之熱,防痼生肌,誠有奇效。愚生平用此藥治愈至險之赤痢不勝紀。用時去皮,每服25粒;極多至50粒,白糖水送下。此物圓圓吞服,去皮時仁有破者,去之勿服,服之恐作嘔吐。鴉胆子諸家未言治症解毒,而愚用之以治梅毒及花柳毒淋皆有效驗;搗爛醋調敷疔毒,效驗異常,洵良藥也。

5. 現代肖步丹撰《嶺南采藥錄》載鴉胆子曰:形如梧子,其仁多油,生食令人吐,作霜搗去油入藥佳。治痢病久瀉患瘕者,以子7粒,包圓肉吞下,立愈。一說味苦,性平,涼血,去皮膚惡毒,理跌打;治牛毒牛疔,搗汁飼之。

鴨·脚·木

Schefflera octophylla (Lour.) Harms

别名：鴨脚皮，鴨掌柴

科属形态 本品系五加科鴨掌柴属中的一种大乔木；茎松脆，皮粗厚。叶为指状复叶，通常有小叶6~8枚，叶柄长8~25厘米，与托叶合生，小叶革质，椭圆形或长卵圆形，长7~17厘米，宽3~6厘米，先端渐尖，基部楔尖，边全缘，两面近秃净，小叶柄在侧面的长1.5~2.5厘米，中央的长3~5厘米。冬季开花，白色，芳香，排成伞形花序，这些花序复结成长约25厘米、頂生的大型圆锥花序；萼5~6裂，被毛；花瓣5枚，镊合状排列，肉质，长2~3毫米；雄蕊5枚，着生于肉质花盘的周围；子房下位，花柱合生成一短柱，长不过1毫米。花后结果，球形，直径3~4毫米。

生长环境 多生于灌木林中。

产地分布 越南，我国东南部极常见。本省各地均有分布，普遍，散生或丛生。

药用部分与气味性能 茎皮。嗅无，味苦涩，性微温。能除湿舒筋活络，清胃肠酒湿积滞。

临床应用

1. 感冒大热发瘧 (1) 鴨脚木头2钱，木槿根4钱，金线草2钱，五指连6钱，鬼灯籠2钱，海金沙2钱，山梔头4钱，蛇泡筋2钱，青藤4钱，白花坎头青2钱，清水4碗煎至1碗服。(罗少泉献方)

(2) 夹色伤寒 老桑枝5钱，鴨脚木皮5钱，蛇泡筋头5钱，地骨皮5钱，金雨头4钱，山梅头6钱，鹿含草3钱，路兜头4钱，五指连8钱，水干水大5钱，四方骨4钱，煎水服。(番禺黄派福献方)

2. 疴嘔肚痛 鴨脚木皮4两，葵扇柄2两，灯心1扎，芒梨壳3两，牛屎干煨灰5钱，淨水煎服。(封开罗董家德时献方)

3. 红白痢疾 鴨脚木皮去外皮洗净，1蒸1晒，每用4两煎服。

4. 腹脹 鴨脚木适量，紅金櫻皮2只，茶渣5钱，共燒灰，用溜灰水煮粥食即可。(揭陽袁振基献方)

5. 喉炎 鴨脚木寄生、点秤屋根、紅扶拐木根各等分，煎水含漱或吞咽少許。(彭国团献方)

6. 食木薯中毒 用鴨脚木皮0.5斤，水煎濃液服之，以后繼服生油1~2两可愈。(浦北黄康伯献方)

7. 纏身蛇 用鴨脚木皮煎水洗之則愈。(英德献方)

8. 乳痞 散血丹、鴨脚树根皮、还魂草、早糯米，共搗烂敷之有效。(鍾田清献方)

9. 駝骨 (1) 鴨脚树皮2两，冷飯团根2两，生雞一只，共同搗烂，将骨复位后用杉木皮和药夹敷患处。(巫炳廷献方)

(2) 鴨脚木皮、山梔子、三把茶、前寬藤、芥头、蛤仔叶、落地藤、老江藤藤、大黃、雄黃，各药酌量，用酒炒熟外敷患处，并能止痛消肿。(新兴松村塘塘村徐日佳献方)

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求原》載鴨脚树根皮曰：淡甘辛温。治酒頂，洗烂脚，敷跌打；九蒸九晒浸酒，专门追风。

2. 现代胡眞撰《山草药指南》載鴨脚木叶曰：煎水洗烂脚甚效。以叶搗敷跌打尤妙。将叶十蒸九晒，浸酒飲，祛风去痰。

薺 菜

Capsella bursa-pastoris (L.) Medico

别名：薺角菜，地菜

科属形态 本品系十字花科薺属中的一种一年生或二年生，直立、纖弱草本；茎分枝，高15~40厘米，无毛或有分枝的毛。基部叶为羽状深裂，罕有全緣的，上部最頂的叶为三角形，中部叶为矩圆形或披针形，长约8厘米，寬約2厘米，全緣或有齿缺，基部耳形而抱茎。冬末春初开花，花小，輻射对称，排成总状花序；萼片4枚，分离，长矩圆形，先端钝，基部截平；花瓣4枚，分离，匙形；雄蕊6枚，子房上位，具侧膜胎座2个，常由一个膜质的假隔膜将两个侧膜胎座连接成假2室；胚珠多数，花柱极短。花后结一短角果，果倒心脏形或倒三角形，长约6毫米，柄纖弱，果瓣光滑，种子多数，长椭圆形。

生长环境 冬春間滋生於耕地附近草坪、道旁、篱边地方，随处可见。入夏后即萎謝，无法采取，以冬末春初采其嫩苗为好，迟则老硬不能作佐膳之用。

产地分布 广布温带各地。国内各地有产，本省普遍，丛生。

● **药用部分与气味性能** 全草。嗅无，味甘淡，性凉。能利尿止血；子能明目去翳障。

临床应用

1. **肾结核** 广东省中医药研究委员会与广东省人民医院，市一、二人民医院，中山医学院第一医院组成薺菜治肾结核研究小组，根据卫生厅古鸿烈厅长使用薺菜治肾结核經驗，每次用鮮薺菜8市两，或干薺菜1市两，加水約3碗，于瓦鍋中煮至水1碗时，打入雞蛋1个，再煮至蛋熟透时，加盐少许，离火候温，将菜湯和菜雞蛋一同食下，菜干不能食时可嚼吞菜汁，渣弃去不食。上法对輕症每日1次，重症一日2次，連服一个月为1疗程，服至症状消失后仍可續服1~2疗程。經实验治疗40多个病例，观察效果良好。一般在服药10天左右，患者的血尿、腰痛症状大减或消失。典型病例：一女医师患者，22岁，于1953年11月13日入省人民医院检查确诊为肾结核，左肾已完全破坏，而右肾又有明显的輸尿管腎盂及腎盂扩张。治疗至1954年初摘除左肾，手术经过良好，1954年4月出院休养。至同年10月尿频血尿症状复发，入院时伴有休克、高热，施行紧急措施和注射大量抗结核药后稍为好轉，但仍高热不退，时有血尿。延至1955年初，認為无法挽救时，开始試用薺菜疗法治疗，将所有抗结核药停止使用，服薺菜至一星期后，体温已降至正常，排尿症状亦好轉，并且可下床活动，繼續服至同年10月，检查病灶恢复正常出院。出院后至今未見复发，工作照常，夜尿亦已消失。

2. **乳糜尿** 华东紡織局第一医院泌尿外科陆鴻鍾等，用薺菜治疗7例乳糜尿患者，全部治愈，服法：每日采用新鮮全草4市两至1市斤煎成濃液，分3次服，連服1~3个月，乳糜尿由濃轉淡，由淡轉清，最快3天，最迟48天，小便达到澄清，澄清后观察9~30个月，均未見再发。（《中华外科杂志》1956年12月号）

3. **腎炎水肿** 薺菜子、薺菜根各2市两，煎服。（中山医学院第一医院張永强献方）

4. **骨痛** 薺菜干1市两煎水服，对老年骨痛属于骨历火者服3~4次即效。（广州中医学院李煥良献方）

文献考証

1. 南北朝陶宏景撰《神农本草經集注》載薺菜曰：薺菜甚多，此是今人可食者，叶作菹羹亦佳。气味

甘温无毒，主利肝气，和中。其类主明目，目痛。

2. 唐代甄权撰《药性本草》载薺菜曰：根叶烧灰治赤白痢，极效。

3. 宋代自华子撰《大明诸家本草》载薺菜曰：其根治目痛。采花为末，枣汤送服2钱治久痢。

4. 现代时逸人撰《中国药理学》载薺菜曰：花和中健胃，消食化积滞，治脘腹饱闷，久痢腹脹，又有化痰明目之功，能消因食积粉过多而积食者。

B. 现代叶橘泉撰《现代实用中药》载薺菜曰：全草含失水戊糖 (Pentosan)、失水乳糖 (Glactan)、胆碱 (Choline) 及有降低血压作用的乙酰胆碱 (Acatylcholine) 与有止血作用的薺菜酸 (Bursin acid)，此外尚含有肌糖 (Inosite) 及维生素 A、B、C 等。种子含苷类物质 (Diosmin)，水解后则生成鼠李糖 (Rhamnose)，此物质含于绿色的果实皮间。……L. Dryon 氏谓本品之止血作用，已获证实。……为一种很好的止血剂，治肺出血、子宫出血、流产出血、月经过多，为子宫紧缩剂，并为高血压之治疗药，对头疼目痛、视网膜出血有良效，又为止泻药，治肠炎、赤白痢，并有利尿解热作用。

鵝不食

Epaltes australis Less.

别名：石胡荽，地胡椒，珠子草

科属形态 本品系菊科苣荬菜属中的一种披散或匍匐状一年生草本；长6~20厘米，基部分枝，无毛或被粗毛。单叶，纸质，互生，具柄，倒卵形或倒三角状矩圆形，长1~2.5厘米，宽5毫米，先端短尖，基部渐狭，边全缘或有粗齿。春末至夏季偶生头状花序，无柄或具短柄，扁球形，直径约5毫米；总苞半球形，绿色；苞片圆形，凹陷而钝；花全为管状，异型，外圈的雌花短，紫色，短于总苞，极多数；盘花两性，但通常不结果，较少；花管3~5裂；花药基部有小尾尖；子房下位，1室。花后结瘦果，极少，无冠毛。

本品与石胡荽很相似，尤以花序为甚，其分别点除花药基部尾尖特征可资区别外，并可由较宽的半球形总苞，及圆形的苞片以识别之。但草药这两种都通用，因此有石胡荽的别名。

本品另一种大叶的鹅不食草是伞形花科天胡荽属中的一种草本，梅县称细叶钱蒲口，本草纲目称野圆荬，学名为 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. 不是普遍常用的鹅不食。

生长环境 喜生于稻田卑湿之地，平原荒地亦可普遍找到。夏秋之间采收。

产地分布 我国南部、印度、澳洲均有分布。本省普遍有产，丛生。

药用部分与气味性能 全草。嗅气辛辣，味亦辛辣，性温。能通窍散湿，化毒退翳膜。

临床应用

1. 瘰疬

(1) 鹅不食草5钱，米酒1两，捣烂取汁内服。药渣敷寸口，男左女右，于发作前8小时服药及外敷始能奏效。（台山中医研究所，汕头潮阳陈店何瑞卿献方）

(2) 鹅不食草、鸡蛋各适量，煎水冲酒内服。（广州中医学院林建德、曾勤业献方）

(3) 鹅不食草、胡椒、冷饭各适量，捣烂，于发作前8小时敷两手寸口。（广州市黄少雄献方）

2. 百日咳

(1) 福建长汀县中西医联合医院儿科，用本品治疗小儿百日咳160例，临床症状全部消失，已恢复如常者105例(65.62%)；临床症状基本消失，仅有一些轻咳者36例(22.5%)；显著好转，未进行完成一个疗程而症状大部消失者19例(11.87%)。法用新鲜鹅不食草5两，除去杂草与污物，用水洗净，盛入罐中，加水700毫升，文火煎至500毫升，过滤后以本煎液500毫升配糖浆500毫升，加入1克安息香酸，俾资防腐，以便贮存。用法与用量：一周岁儿童每日服20毫升，分4次服。如夜间咳嗽较剧者，可留一次于午夜服下。三周岁者服30毫升，5岁以上者可酌加至40毫升（约等于生药2钱），一岁以下者照年龄酌减。（《医药卫生快报》1959年第6期）

(2) 佛山市中医院彭玉林、吴佩响应用本品糖浆剂实验治疗百日咳20例，5天痊愈的6例，6天痊愈的10例，14天痊愈的2例，不明的2例，总治愈率占90%。不明的指服药一天后未来复诊的。制法：取本品全草1500克，切碎后置蒸汽器中溜取饱和芳香液，过滤除去油点，加入同量糖浆搅拌均匀即成。剂量：1~2岁一次5毫升，2~5岁10毫升，5岁以上15毫升，一日3~4次，开水和服。

3. 慢性鼻炎及鼻窦炎

(1) 广东省人民医院中医科陈治平用茄花石胡荽液滴剂,并内服苍耳辛夷煎,取得显著疗效。处方: 1)茄花石胡荽液滴剂:茄花 500 克,石胡荽 2000 克,苍耳茎叶 500 克,辛夷花 500 克,白芷 500 克,薄荷 250 克,细辛 250 克,梅片 90 克,正麝香 30 克。制法:上处方中药,共 9 味,计重量 4580 克,先除出梅片、麝香两味共重 60 克研极细粉末另贮外,尚有药 7 味重量 4500 克,共磨成粗粉,和 10000 毫升清水,放入反应锅加热水浴,因这 7 味药,均含有挥发性,先吸取挥发气味的药液 1000 毫升,先行放起,再加热 8 小时,直至提炼药的成分出尽时,由反应锅倾出药液和渣滓,以布袋装妥,用压榨机榨尽药液,过滤加热,浓缩为 1000 毫升,与先吸取挥发气味的药液 1000 毫升,混合为 2000 毫升,加入梅片、麝香粉末,和适量的防腐剂,经 24 小时,再行过滤,严密高压消毒,以橡皮口砂塞玻璃瓶贮藏备用。用法:以消毒玻璃吸管吸入药液,滴入鼻腔,每天三次。2)苍耳辛夷煎内服方:苍耳子 500 克,辛夷花 500 克,茜草 250 克,菊花 500 克,金银花 500 克,地龙干 250 克,赤小豆 250 克,藿香 250 克,薄荷 250 克,熟地 500 克,山萸肉 500 克。制法:上处方中药,共 11 味,计重量 4250 克,先共磨成粗粉,由这药粉取出 10 分之 2,得 850 克粗药粉,再以药粉加酒精过滤成极细的粉末,另放起。因上药有辛夷花、菊花、藿香、薄荷四味,都有挥发性,因此,趁将 3400 克粗粉,和清水 3400 毫升放入反应锅加热,先吸取具有挥发气味的药液 500 毫升,贮藏放起。其余加热 8 小时,将这药成份提取出尽,由反应锅倾出待冷后,用压榨机榨尽药液,过滤后再以这药液放入反应锅加热浓缩至 500 毫升,以前吸取挥发气味的药液 500 毫升,与这浓缩药液 500 毫升,混合一起,成为 1000 毫升药液,以除去的 10 分之 2 药粉 850 克,与这 1000 毫升药液混合成为药饼,放入干燥箱,待干燥后,再研筛过,成为细粉,配适量胶浆,以打药机打成药片,共得若干片,大约每片含药分量 0.5 克,以橡皮口砂塞玻璃瓶贮藏备用。服法:成人服量,每天早晚服两次,每次服 4 片,以开水送下,儿童减半。

(2) 鹅不食草 4 钱,北细辛 2 钱,白芷 2 钱,辛夷花 2 钱,麝香 2 分,以上各药,捣为细末,装瓶密封备用。用时启开瓶塞用鼻吸入其气,每日 3~5 次或 10 余次,有的除喷嚏外无其他不良反应。田仁德候汉忱治疗病例虽多,但未注意整理,因而不易查找。现仅根据 1953 年 8~11 月间治的 5 例,4 周后痊愈 1 例,3 周后痊愈 1 例,2 周后痊愈 1 例,1 周后减轻 1 例,12 周后痊愈 1 例。患病年限 2~10 年。(《山东医刊》1957 年第 1 期)

(3) 鹅不食草 98%,樟脑 5%,将两药分开研为细末,然后和匀,装于消毒密瓶。用时以薄纸包裹药末少许塞鼻。每天换药一次。(台山中医研究所献方)

(4) 鹅不食草洗净捣烂冲沸水,随即连续吸入其水蒸气,若干次可愈。(广州中医学院张威献方)

4. 过敏性鼻炎

(1) 鹅不食草研末,制成 10~50% 不同含量散膏三种,用时浸于纱布条塞鼻腔内,每日一次,每次放置 1~1.5 小时取出,两星期为一疗程。天津市第六医院治疗 28 个病例,1~2 月症状完全消失,观察 2 个月,其中 17 例未复发,6 例有轻度复发。优点是治愈快速,费用经济,手续简便。

(2) 鹅不食草 1~2 钱,捣烂取汁滴入鼻腔,每天 3 次。(中山县高山人民医院李为香献方)

5. 鼻衄血 用鹅不食草塞入鼻腔。(黄瑞文献方)

6. 伤风流涕鼻塞(急性卡他性鼻塞) 鹅不食草 10 克,加冰片适量,研成细末,每 1 病人 0.1 克,3 小时 1 次,分数次嗅鼻。(《中医研究工作资料汇编》第二辑国营上海第二印染厂保健站介绍)

7. 夹色伤寒 鹅不食草 5 钱,老公根 1 两,共捣烂,加米酒 1 两,熬热取汁内服,药渣敷臍上。内服外敷后腹内雷鸣者即见效。(广州中医学院林鼎宗献方)

8. 黄疸 鹅不食草叶茎 2~4 两,以生盐 5 钱共捣烂,加入冷开水少许,榨汁内服。(海南文昌县潭牛圩符致佳献方)

9. 腹痛吐泻等症 鹅不食草 3 钱,雄黄粉 3 钱(用水飞净),石膏粉 5 钱,枯矾 5 钱,草澄 3 钱,小牙皂角 3 钱,苍朮 5 钱,白芷 1 钱,丁香 3 钱,北细辛 4 钱,大梅片 7 分,川麝香 3 分,上药共研细末过筛,用磁瓶或玻璃瓶密封装瓶,切勿泄气。每服 2~3 分,小儿酌减。或以 1~2 分放置臍内,外用普通膏药贴上,

亦有良效。本方兼治痧气暴症，鼻塞头痛，中风中痰，山嵐瘴气，天行瘟疫，牙关紧闭，人事不知，以及四时不正之气等病。如不能服药时，可用此药少许点入眼角内（男左女右）1~2次，或吹入鼻腔，可以开窍。

10. 肾炎水肿 鹅不食草6钱，旱辣蓼6钱，净水煎，分作两次内服。（新兴红旗公社卫生院苏雨楷献方）

11. 小儿身热不退 鹅不食草约8两，生盐2两，先将二味炒至黄色，放入浴盆，用滾水冲入盆中，待至温暖适度，将患儿先洗周身，后擦头部及四肢。宜于密室进行，切勿当风。（封开梁云生献方）

12. 风湿性关节炎 鹅不食草、旱辣蓼各用干药7钱，煎水分2次服。另用：艾叶8两，生姜4钱，虎皮2钱，捣烂，加飯湯炒熟敷患部，冷炒熟再敷，每剂連敷三次。（平远王京盛献方）

13. 上馬风肚痛 鹅仔草3钱，煎米酒内服。（普宁吳益寿献方）

14. 妇女經閉 鹅不食草2两，白蜡2钱，将鹅不食草切碎加酒炒，再以清水一碗，下白蜡同煮，空腹頓服。或分三次亦可。（广州中医学院进修部李蔚良献方）

15. 頸瘰 鹅不食草适量煎服。清晨空腹服。

16. 脱肛 鹅不食草4两，洗净，入水2杓，煎濃液熏洗肛門，洗后涂上菜油，慢慢还納便愈。（龙川县防疫站謝当桐献方）

17. 鼻疔 鹅不食草适量，捣烂塞入鼻腔患侧。（湛江市李德初献方）

18. 跌打

(1) 鹅不食、地骨皮、淮牛膝、川紅花、大生地、急性子、透骨消，用好酒浸透，然后煮熟，加入食盐少许搽患处。（广州中医学院进修部黎逢泰献方）

(2) 鹅不食和燒酒敷患处。（龙川县防疫站献方）

(3) 骨折 鹅不食草、田基黃、紅四方草、韭菜头、入骨消、紅筋菜根、老鴉孙、駝骨草、出山虎根皮、入山虎根皮、川乳香各5钱，正田七3钱，川烏3钱，小鷄1只，灰面2两，捣烂，和双料酒敷患处，扎紧，經燒五寸大香時間即將药除下。（合浦南康喻日嵩献方）

(4) 鹅不食草8钱，接骨草1两，生姜5钱，葱头8只，共捣碎煎米酒敷患处。（欽县陆屋人民公社青塘卫生院馬龙光献方）

(5) 鹅不食草、田七、川續断、牛膝、自然銅、骨碎补、加皮、乳沒药、白胡椒、白芷、牛勒糖、三丫虎、鸡骨香各适量，共猪脚肉捣烂外敷。

(6) 鹅不食草、三丫虎、大接骨、小接骨、老鴉酸、山烏柏、朝天師、榕樹蘇，生鷄1只，共捣烂酒炒敷，用夹固定。（興山县武到第六卫生所苏玉堂献方）

(7) 鹅不食草、老鴉酸、灰面、鷄仔豆，共捣烂，和双料酒炒熟敷上。（合浦专区献方）

(8) 鹅不食草适量，金边黃琪2条焙干研末，二味捣烂敷患处。（新丰張梅金献方）

(9) 鹅不食草5钱，生姜2两，生葱1两，辣蓼5钱，酒餅5只，捣烂加酒1.5两，敷热外敷。在敷药前先将骨折复位，以夹板固定，放置夹板时須將每块距离一小指，才可將药敷上。每日換药1次，一星期后可脫除夹板。如骨折初起局部紅肿不易复位者，用柚树叶、鷄屎藤、上树北各0.5斤，煎濃汁，連煮2~3次，約一天可消肿。如化膿者用青力拔1.5两，鹅不食草1两，沒药1.5钱，地棉2钱，黃晒0.5匙，捣烂敷伤口，每日換药3次，伤口以外仍敷接骨药。（平远王京盛献方）

(10) 鹅不食草4两，烏柏树皮1两，金边土黨1两，共捣烂，加生油煮，并以鷄蛋白和勻敷患处，每天換药1次。（珠海前山卫生院万群献方）

19. 跌打后发热

(1) 鹅不食草、蛇舌草、黃花子草各1两，捣烂，取自然汁和米泔汁服。（丰順陈淑义献方）

(2) 跌打瘀血不清 鹅不食草、桃仔叶、半边蓮、石关蕊、土田七，共捣烂，用好酒炒熟敷患处。亦可取少许内服。（清遠温成龙献方）

(3) 鹅不食草1两，榕树叶2两，大罗伞叶8钱，刀枪木叶4钱，四眼木叶8钱，小罗伞叶8钱，芋藤叶4钱，鬼面符6钱，杉木白皮1两，蛇响草3两，共捣烂，米酒炒熟敷患处。

(4) 跌打刀伤 酒军 8 钱, 鹅不食草 5 钱, 田七 1 钱, 归尾 1.5 钱, 生地 3 钱, 西红花 1 钱, 黄藤 5 分, 血竭 3 钱, 麝香 5 分, 熊胆 1 钱, 醋制自然铜 5 钱, 泽兰 5 钱, 续断 3 钱, 研末蜜为丸, 每丸重 5 分。(江門李仁年献方)

20. 足内踝脱臼肿大筋头突出 鹅不食草、月草叶、接骨消、铁马鞭, 煎水冲酒熏洗。另用地龙 4 钱, 归尾 3 钱, 然铜 6 钱, 放纸 3 钱, 生芪 4 钱, 桑枝 1 两, 寄生 5 钱, 赤芍 8 钱, 独活 4 钱, 枳壳 4 钱, 加皮 5 钱, 忍冬藤 5 钱, 灯地根 6 钱, 鸡骨藤 8 钱, 椿根藤 8 钱, 灵仙 8 钱, 虎骨 5 钱, 木瓜 5 钱, 共研细末, 每日服 2 钱, 一次顿服。再用大黄 1 两, 川乌 3 钱, 红花 5 钱, 川连 5 钱, 草乌 3 钱, 归尾 3 钱, 黄柏 5 钱, 乳没药 1 两, 三七 3 钱, 泽兰 5 钱, 赤芍 3 钱, 共研末调酒外敷。于肿消后即须进行脱臼复位。

21. 中耳炎 鹅不食草 1~2 两, 洗净酒蒸, 将药汁滴入耳道, 经多次滴药, 自可痊愈。

22. 眼疾

(1) 鹅不食草、锦地锦、蜜糖、梅片各适量, 捣烂, 用纱布裹药塞患眼对侧鼻孔, 又将药涂上纱布贴患眼处。二法同时并用, 能收奇效。海丰县红草乡竹园村洪胜之母曾治疗 30 多例, 90% 以上治愈后未复发。(海丰县献方)

(2) 鹅不食草 1 把, 捣烂, 敷额部及塞鼻孔中, 翳自能消散。(林培康献方)

(3) 鹅不食草 1 撮, 生牛蒡 2 撮, 红米 2 撮, 共捣烂, 蜜糖调贴印堂, 觉痒除去, 待半刻换药再敷。(台山中医研究所献方)

23. 一般眼疾

(1) 鹅不食草 5 钱, 胆矾 3 钱, 麝香 1 分, 赤芍 5 钱, 铜青 3 钱, 酸草 5 分, 米碎草 5 分, 冰片 2 钱, 黄连 2 钱, 熊胆 1 粒, 上药用纱布包后放入开水中浸 1 晚, 即可用以点眼。(海南汀迈瑞沐乡新吴镇吴乾成献方)

(2) 鹅不食草 5 钱, 胆矾 3 钱, 麝香 1 分, 赤芍 5 钱, 铜青 3 钱, 酸草 5 分, 乌龙茶 1 钱, 用水 1000 毫升, 将草药及赤芍煎成 500 毫升溶液, 去渣后加入胆矾、铜青(研末)、麝香, 溶解后可用。但要过滤, 必须无沉淀, 方可用以滴眼。

(3) 眼部被竹木刺伤 鹅不食草 3 钱, 牛膝 3 钱, 红糖适量, 将上药共捣烂敷患处。(灵山工商界新兴天堂人民公社梁镇明、黄家琪献方)

24. 小儿传染性疱疹 鹅不食草(捣取汁)、川连、陀僧、黄柏、蜈蚣去头尾、大黄各适量, 为末, 以鹅不食草汁拌匀点搽患处良效。(佛山普君医院吴达文献方)

25. 疳疔疔毒 鹅不食草 5 钱, 田基黄 5 钱, 散血丹 5 钱, 金锁匙 5 钱, 铁包金 5 钱, 野灵芝 5 钱, 天灯盏 5 钱, 地灯盏 5 钱, 衣红草 5 钱, 枫柳叶 3 钱。捣烂敷患处。

文献考证

1. 明代李时珍撰《本草纲目》载石胡荽曰: 辛温, 汁制砒石、雄黄。通鼻气, 利九窍, 吐风痰, 去目翳, 接塞鼻中, 翳膜自落, 疗痔瘡, 解毒明目, 散目赤肿云翳, 耳聾头痛脑眩, 治痰喘胸胎, 鼻塞不通, 塞鼻患肉自落, 又散疮肿。

2. 清代赵寅谷撰《本草求真》载鹅不食草曰: 淡辛温寒。端午取阴干。治风火赤眼暗目疾, 及痘后眼膜, 理跌打折骨, 止痛消肿。又曰: 生阴湿地, 温升辛散, 寒至阴而达至阳, 能透膜利窍, 故通鼻气, 落患肉, 治头风, 散除翳以明目。

3. 清代何克廉撰《生草药性备要》载鹅不食草曰: 味腥性寒。理跌打折骨, 止痛消肿, 去痘后眼膜。五月五日午时摘之阴干, 医眼科眼疾配入药用。

4. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载鹅不食草曰: 气腥性寒, 一脱味辛性温。理跌打折骨, 搗烂酒炒热敷患处, 止痛消肿除热; 去痘后眼膜, 端午节午时采取阴干, 治眼科眼疾, 配入药用; 一脱通鼻气, 利九窍, 吐风痰, 去目翳, 接塞鼻中翳膜自落, 疗痔瘡, 解毒明目, 散目赤肿云翳, 耳聾头痛脑眩, 治痰喘胸胎, 鼻塞不通, 塞鼻患肉自落, 又散疮肿。

5. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载石胡荽曰: 可治牛生毒(生瘰), 用鲜的搽患处。

蟾 蜍 附：青蛙

Buso vulgarisaur Toad

别名：癞虾蟆，蟾蜍

科属形态 本品系蟾蜍科中的一种两栖类脊椎动物。全形如蛙，惟性迟钝，体较肥大，背部皮为黑褐或灰黑色，皮面粗而不调、多疣状突起，有分泌腺分泌毒液，腹旁有灰色直条纹，腹面为灰色，斑褐斑，眼放金光，口亦阔大，颌无齿，后肢比前肢稍长，有五趾，无蹼，不能如蛙的活泼跳跃，常徐徐爬行，能耐饥渴，不易死，经冬必须冬眠，幼时变化如蛙，平时陆栖，非产卵期不入水中。

生长环境 昼间潜伏树洞垣隙败叶中，夜出寻食，嗜虫类，捕食时亦如蛙之延取。捕采时多在断壁颓垣瓦砾堆生杂草中可找到，或庭园阴湿松土中。收集后用刺激法刮取皮脂毒汁，曰蟾酥。

产地分布 全国各地均有分布。

药用部分与气味性能 全体、蟾皮、蟾酥。气腥，味甘(肉)辛麻(皮)，性温。能消壅除痞，拔散恶肿疔毒，消除湿毒外发，内服外用。注意加工，与他药或赋形药稀释后方可直接服用，否则起腐蚀作用。

临床应用

1. 单腹腹

(1) 蟾蜍1只(要粗纹色的)，巴豆10粒去壳，先将巴豆放入蟾蜍口内，然后用针线将蟾蜍嘴缝好，再用小绳绑两后脚倒吊死，置土瓦焙干为粉末封貯，每次服5分，不可超过分量，用开水或米汤送下，服后2小时即下出粘稠的毒质。一般一二服后其肿即消退，待消尽后服补中益气汤二三剂即愈。(广州中医学院进修部张宗钰献方)

(2) 以蟾蜍数只，每只喂入巴豆仁10粒，针线缝口高吊数日，取下剖去蟾蜍内脏，用瓦载煨成灰为末，每只蟾蜍早晚二次分服，以好酒送下，服至肿展消失为止，后服补中益气汤以健脾胃。此方对虚肿均效。(广州中医学院进修部杨月英献方)

(3) 蟾蜍4只，砂仁8钱，共置于猪肚内，加好酒载满扎好煮一宿，取起剖去蟾蜍肠脏，将猪肚内之汤物尽量服下，特泻出恶物秽气，即消矣。(德庆何洛科献方)

2. 小儿肿腹 蟾蜍1只，麝香5厘，将蟾蜍剖腹后，先将麝香置于小儿脐中，即将蟾蜍敷盖脐部，用布绑紧，约燃一枝香久，则将药除去，其肿自消。(彭延春献方)

3. 急性肾炎水肿 黄蟾蜍1只去肠脏，将芫花3钱，大戟3钱，共研末置于蟾蜍腹内，放新瓦上炙酥研末；再用沉香2钱，南木香2钱，姜黄3钱，甘遂3钱，厚朴3钱，正脊砂3钱，黑丑5钱，制香附5钱，土狗20只(炙酥研末)，煎水一碗，将上药末分二次冲服。(冯良献方)

4. 哮喘

(1) 蟾蜍1只(去肠脏不洗水)，猪肚一具洗净，将蟾蜍纳猪肚内置于煨盅煨2小时，当哮喘发作时取服即效。(海南王煥昭献方)

(2) 蟾蜍1只去肠脏及外皮，将白胡椒3钱，陈皮1钱，半夏2钱，共研末置于蟾蜍腹内缝好，外用黄泥封固，置炭火内煨后研末，分3次开肉汤服。此方经验数次，效验如神。(《宝安方交流集》赖伟权)

献方)

5. 閉口痢 以大蟾蜍二三只,去外皮头爪及內脏,入油盐姜炒香,泔水煮熟食之。若不欲食者,可令病人以鼻吸其气味,其胃口即开思食。(中山石岐市健生献方)。

6. 小儿疳积 蟾蜍1只剖去內脏,置入胡連末1錢,以綫縫合,外涂黃泥,置炭火上炙存性,候冷去泥,加入薑黃10分,麝香1分,熊胆5分,共研末,每次服5分,日服2次,以开水送服。(北海市苏健金献方)

7. 濕疹 蟾蜍1只去皮脏,煮粥食,連服10次則愈。(順德崔珍献方)

8. 疔疮 蟾蜍肝1具,丁香2錢,朱砂2錢,共研烂敷于患处即效。(郭仕明献方)

9. 鼻疔 蟾蜍胆3只,鮮人中白適量,梅片2分,共搗烂搽患处。(英德县城联合医院江拯球献方)

10. 穿心疔 将蟾蜍剖腹取腸塞疔孔,随即將蟾蜍貼上患部,連換數貼三四次即愈。(楊振煊献方)

11. 唇疔 活蟾蜍肝剖开,用銀末末1錢,撒在肝面上,然后敷于患处。(黃强达献方)

12. 对口疔 黃蟾蜍肝1具,沙牛10只,梅片5分,共搗烂貼患处,分二三次貼之即效。(中順县杜日光,高要陆南昭,新兴天堂公社梁汝显等献方)

13. 穿腮疔 用蟾蜍胎塞貼患处即效。(广州中医學院进修部李干西献方)

14. 喉毒喉烂 蟾蜍肝、人中白、冰片、麝香各等分为末,吹于患部,數次則愈。

15. 疳疮 活蟾蜍1只去腸脏,浮萍根4兩,旱辣藤4兩,人头发4兩股,木賊4兩,大风子4兩,桐油20兩,和上药共煮至黑色去渣,加入黃丹8兩,調成膏狀备用。此膏有拔毒生肌之效。(周啟霖献方)

文献考证

1. 南北朝陶弘景撰《本草集注》載蟾蜍曰:燒灰敷疔,立驗。又治濕痢安斑因驚者,去腸生搗食一二枚,无不痊者。

2. 唐代甄权撰《药性本草》載蟾蜍曰:杀疔虫,治鼠漏惡疮,燒灰敷一切有虫惡痒滋風瘡。

3. 宋代日华子撰《大明諸家本草》載蟾蜍曰:治疔气,小兒面黃腫气,破瘡結,燒灰油調,敷惡疮。

4. 明代李时珍撰《本草綱目》載蟾蜍曰:治一切五疳,下痢,腫毒,破伤风病,脫肛。

5. 明代羅希雍撰《本草經疏》載蟾蜍曰:虾蟆、蟾蜍,本是二物,經云一名蟾蜍者,蓋古人通稱蟾为虾蟆耳,經文虽名虾蟆,其用实則蟾蜍也。今世所用者皆蟾蜍,而非虾蟆,其功益可見矣。味辛气寒,毒在屑皮汁中,其主痛腫、阴疮、阴蝕、疽瘡、惡疮、漏大伤疔者,皆熱毒气伤肌肉,辛寒能散熱解毒,其性急速,以毒攻毒,則毒易解,毒解則肌肉和,諸症去矣。凡瘟疫邪气,得汗則解,其味大辛,性善发汗,辛主散毒,寒主除熱,故能使邪气散而不留,邪去則胃气安而熱病退矣。破瘡堅血者,亦以其辛寒能散血熱壅滯也。陶隱居云,其肪涂玉則刻之如蜡,故云能合玉石。近世治小兒疳疾多用,以其走阳而能消积滯。

6. 清代赵寅谷撰《本草求原》載蟾蜍曰:即蟾虾蟆形大而背多疙瘩者是,本土之精,厚重行迟,甘平无毒,上应月魂,入腸胃,退熱行濕解毒杀虫,为疔腫痛疽諸症要药。治濕痢发狂,生搗汁飲。腫脹及疳勞腹大,砂仁入蟾蜍腹內,泥包煨存性,黑糖調服,下尽青黃粪即愈。若染不能發注而淋漓不前,元氣已乏,不治。疳癰黃瘦,一枚阿膠角去皮弦1錢,俱燒存性,加蛤粉、麝香为丸,米湯下。狂犬伤,先去頂心紅发,杵汗生飲,小便見沫即解。破伤风,二枚生杵取汁,開川椒一两炒酒服。其皮辛凉有毒,貼瘡瘻艾炙甚妙,內服去皮取肉生搗,或风干煨存性用。目赤噴赤者有毒。蟾蜍燒灰敷鼠漏,阴蝕疽瘡,破瘡瘻俱效。

青 蛙

与蟾蜍不同科的蛙科青蛙(广东称田雞)根据献方經驗介紹也有蟾蜍类同的效能,綜合有关选方如下:

1. 水腫 虾蟆7只,砂仁49粒,每虾蟆填入春砂7粒(由虾蟆口填入),用黃泥將虾蟆包好,用武火煨成炭,去泥土为細末,每日早上空腹服1只,黃酒送下,药尽病除。禁忌慎飲水,忌盐百日,以后再用百日开盐法。制盐法:用黃土泥作二寸厚泥碗四个,再將盐1斤分放在二个泥碗內,用另二个泥碗扣上,用黃土泥將两碗縫抹上,放在作飯的灶內,燒49天,取出食盐用。曾用此方治愈80余人,效果显著。

(《河北中藥集錦》)

2. 心脏性或肾脏性水肿 田雞两只，韭菜根3~5顆，將田雞两只不剖肚不洗水，與韭菜根叶共煮水半碗服之，也可將煮熟之田雞蘸醋嚼食。(陳嘉祥獻方)

3. 氣壅 大蝦蟆1只，剖開腹不去腸肚，入打碎春砂仁2兩，用黃泥封固陰干，以炭火燒至見青烟起為止，即去泥取出蝦蟆，入梅片5分，共研細末為散，每天早晚服3分，陳皮湯送下，服至全消為止。(德慶甘肅和獻方)

4. 肺傷咳症見咳嗽痰涎腥臭者 用蝦蟆二个(取眼睛不紅，腹有八字形的)，川貝2錢，白及5錢，先將蝦蟆去皮、頭、及爪、肚，取淨肉入上二味同燉熟，分早、午、晚3次服。(台山中醫研究所獻方)

5. 哮喘

(1) 取田雞3斤，去皮、頭、爪、肚，切碎，加入果皮1錢，生薑4片，生油、食鹽適量，共置鍋炒焦，煎水3碗，再加牛乳樹仔洗淨10個，同上藥液煎剩2碗，連湯肉食之，連服几次神效。(余竹軒獻方)

(2) 雄青蛙約1斤，用竹籠養2天，每日用清水沖洗數次，以瓦罐2只，分裝青蛙于罐內，用糞粘黃泥密封罐口，外用鉄絲扎固，罐身塗封黃泥后再封上沙紙一層，外面再加黃泥塗封，約封至2寸厚黃泥左右，以炭煨燉1.5小時為度，然後將罐取起，候冷1晝夜后，取出备用。每服1分，入大梅片1分，煨白果肉10只，白粥送下，每天服2次，服至痊愈為止。(木成祥獻方)

(3) 大蝦蟆1個，白鷄产的蛋1只，將鷄蛋置于蝦蟆腹內，然後以紙包裹蝦蟆，再用陰陽瓦2片，反復蓋好，外塗泥半指厚，置于火爐烤干，候鷄蛋煮熟時，取下將瓦打開，由蝦蟆腹內取出鷄蛋食之，後飲黃酒2兩，發汗即愈。(《河北省中藥集錦》)

6. 黃疸 先用川麝香1分置臍上，取黃皮蝦蟆1只，剖開連腸肚反蓋臍上，用布帶綁扎固定，每日換一次，如此數次則愈。(江門簡錫禧獻方)

糯稻根

Oryza sativa Linn.

别名：秣

科属形态 本品系禾本科稻属中的一种一年生草本——大糯，长达1.5米，秆直或稍下倾，秃净中空有节。单叶，膜质，互生，二列，由叶鞘和叶片两部分组成，叶片扁平，长而稍粗糙，长40~80厘米，宽1~2厘米，边全缘，具平行脉。叶鞘位于叶片的下端，包裹着秆和枝，叶片与叶鞘连接处的内侧有一透明、膜质的小片名叶舌。夏初或秋末顶生圆锥花序，疏散而狭，直立或点垂，长25~35厘米，分枝多，长而上举；小穗短圆形，长6~8毫米，两侧压扁具脊，被柔毛，有芒或无芒，绿色至深黄色，颖极退化，呈半月形的痕迹于小穗柄之顶；不孕小花的外稃近等长，披针形，长为小穗的1/4~1/3。结实小花的外稃背上被硬毛，不孕小花的内稃退化结实小花的内稃与外稃相似；雄蕊6枚，花药线形，花柱短，离生，柱头偏伸。花后结颖果，离生，矩形。根为须状，干燥供药用的糯稻根为簇生团块，金黄色，在密生须根上部尚留截存残茎基部，周围留有杂糖部分，根柔软，弯曲，黄白色。

生长环境 各地农村最肥沃的水田中均有栽植。广东以大糯为最大，又称多糯，其他尚有荔枝糯、乌篇糯、黑糯等较小品种，小糯夏末或多初收割。

产地分布 广植全球。国内广东省珠江三角洲肥沃水田均有产。

药用部分与气味性能 须根。嗅无，味甘淡，性平。养胃阴，治久热不退、小儿脾虚发热。

临床应用

1. 疟虫病

(1) 湖北医学院杨明瑞实验用糯稻净根，总剂量疗程分为三种：1) 1~2.5斤，10天分服。2) 2.5~5斤，5天分服。3) 6斤，3日分服。均以清水煎服。以此方法经治疗510例疟病人，分組进行，治愈率平均在80%以上。以中剂量2.5~5斤疗程5日的疗效为最好(83.3~84.8%)，无其他大的反应，仅部分发轻热、发冷、头痛、头昏，少数有恶心，但仍能参加劳动。(《浙江中医》1959年3月号)

(2) 据武汉医学院除害灭病委员会小组，用糯稻根4斤加水1.5倍煮煎，煎成2碗，分早晚二次服，再用鸡鸣散9钱分3次服，治疗332例血热虫阳性病人，服药后复查，除55例仍为阳性外，余均转为阴性，疗效达83.4%。在332例中在服药前15天内有4例急性发作，而在服药后28天内无一例急性发作。

(《浙江中医》1959年3月号)

2. 狗毛虫毒(被狗毛虫的毛刺于手足皮肤而引起红肿溃烂) 用糯稻秆烧灰、猪油、黄蜡、青蒿、蜂窠(泥做的)，共捣烂，取东叶裹根，乘温热敷于患处，药冷即去，连敷数次愈。(广州中医学院林日照献方)

3. 湿疹 糯米粉5钱，雄黄粉2钱，大梅片5分，共为细末，同米酒调匀搽患处。(高明杜著堂献方)

4. 汗斑 大糯米禾草0.5斤，酒尾0.5斤，共煎水洗患处，连洗数次即愈。(湛江市龙国柱献方)

5. 止渴 糯稻根烧灰浸开水饮，止口渴，又能止虚汗。(《江苏省植物药材志》)

文献考证

1. 清代赵寅谷撰《本草求原》载糯稻根须曰：甘辛平，无毒。入肺肾，补气化痰，滋阴，壮胃，平肝去风湿，除寒安胎，治冻疮刀伤。

2. 现代胡真撰《山草药指南》载糯稻秆曰：取秆炒研成末，酒送服，治黄病。将糯稻根烧灰并去虫黄。

鷄 骨 草

Abrus cantoniensis Hance

别名：广东相思子，細叶龙鳞草，黃食草

科属形态 本品系蝶形花科相思子属中的一种披散灌木，高45~60厘米，小枝通常黑褐色。羽状复叶，有小叶8~11对，膜质矩圆形或倒卵形，长5~12毫米，宽8~5毫米，先端钝而有小锐尖，基部浑圆，上面被疏毛，背面被紧贴的粗毛，小脉在两面均凸起，小托叶极小。秋初开花，为腋生的总状花序；花萼钟形，有4~5枚阔而短的齿；花冠淡红色，极突出，旗瓣卵状，基部与雄蕊贴连，翼瓣狭，龙骨瓣弓形；雄蕊9枚，合生成一管，上部开裂；子房上位，1室，有胚珠多颗。花后结一荚果，矩圆形，扁平，被疏毛，有种子4~8颗；种子矩圆形，扁平，褐黑色。与本种相似的一种，为缠绕藤本，叶柄和叶轴被黄色长毛，不适合疗治黄疸病。

生长环境 生于旷野灌木林边，或沙石太山中。夏季收采。

产地分布 广东、广西均有分布。本省以宝安、东莞、顺德等县为多产，散生或丛生。

药用部分与气味性能 全草。嗅无，味微甘，性凉。能清郁热，舒肝，和脾，横折伤。荚果有毒，用时必须拣出弃去。

临床应用

1. 传染性肝炎

(1) 将干燥鷄骨草(根、茎、叶)和瘦猪肉共煎，煎时火力不宜过大，沸騰后再煎2~3小时即可。剂量：儿童1~2两，成人2~4两，猪肉均为2两，三次分服。在治疗上，一般除卧床休息，进少脂高蛋白和高碳水化合物饮食，及少数病例补充少量维生素外，禁用其他药物。于1958年开始用上法经44例治疗，效果良好，治愈率达95%以上，治愈时间为7~41天，平均为21天，自觉症状在一周内消失，肝功能恢复也快，无不良反应。(广西维吾尔自治区南宁市工人医院)

(2) 上海市立第二人民医院，从1958年冬至1958年春一年多时间内，儿科共收治本病患者66例，其中用鷄骨草治疗者9例，用茵陈蒿汤加減者10例，及一般支持疗法(包括用金霉素等)47例，初步试验，认为对上海市常年散发性流行的儿童传染性肝炎，在临床疗效方面，如黄疸的消退，肝功能的恢复，鷄骨草组较其他疗法为迅速。

组 别	鷄 骨 草 组	茵 陈 蒿 汤 组	支持疗法组
临床黄疸消退平均日数	16天	9天	11天
肝肿大消退平均日数	17天	16天	18天
肝功能试验 T ₁ T ₂ T ₃ 进院时	8.9~11	8.8~11	2.9~20
肝功能试验 T ₁ T ₂ T ₃ 出院时	2.6~8.9	5.1~10	1.8~11
肝功能试验二次平均间隔日数	15天	16天	19天
出院时仍有肝肿者	42%	60%	64%

[注] 鷄骨草组内有一例并发支气管炎，肝肿及黄疸消失均达30天之久；若本例除外，则鷄骨草组之黄疸消退平均为10天，肝肿消退为18天。剂量合用法：按儿童不同年龄，每日5~8~15公分用瘦猪肉一两，以淘米水洗去脂肪，煎水一剂至半茶杯作一次服，每日一服。(摘自《中医研究工作资料汇编》上海市卫生局编)

(3) 雞骨草 1 兩, 丹皮 1.5 錢, 山梔 1.5 錢, 綿茵陳 5.0 錢, 甘草 1 錢, 水煎, 2 次分服。(廣州兒童醫院)

(4) 雞骨草 1 兩, 土茵陳 6 錢, 山梔 3 錢, 滑石 4 錢, 黃柏 4 錢, 麝香 3 錢, 蜜沙 4 錢, 木通 4 錢, 黃芩 4 錢, 水煎, 2 次分服。(廣州一德路衛生所朱劍鴻獻方)

(5) 風濕性心臟病并發肝炎 主要使用雞骨草單味, 每日 1 兩, 加紅棗 4 枚, 水煎服, 并注射葡萄糖, 經治一例, 黃疸當日減退, 2 星期病愈出院。(廣州市第三人民醫院獻方)

2. 晚期肝硬化腹水 第一方: 消水丹加田七末蜜水沖服。第二方: 萊菔子、葶藶子、瞿麥、尖橫、腹皮、雞骨草、木瓜、丹參、海藻、枳殼、川朴、胆草、青皮等藥, 經治四例均治愈。(廣州市第二人民醫院獻方)

3. 黃疸

(1) 雞骨草 1 兩, 土茵陳 4 錢, 柴胡 4 錢, 黃皮椒 2 錢, 川郁金 4 錢, 火炭星 8 錢, 糖香椿 3 錢, 山梔 2 錢, 水煎服, 連服 10 劑全愈。(廣州中醫學院杜明昭獻方)

(2) 雞骨草 4 兩, 土茵陳 1 兩 5 錢, 土茯苓 1 兩 5 錢, 車前草 8 錢, 煮豬肝飲湯佐膳, 連服數次良效。(江門潘伯均獻方)

(3) 雞骨草 2 兩, 紅棗 7~8 枚, 煎服, 連服數劑則愈。(李中獻方)

(4) 黃食草 1 兩(雞骨草), 煮瘦肉食; 外用黃食草 2 兩煎水洗身, 每天 1 次; 連內服外洗 3~4 天則愈。(佛山專區石岐鍾惠民獻方)

4. 水腫 雞骨草 4 錢, 萊菔子 3 錢, 金鎖匙 3 錢, 蚌花 4 錢, 牙子棒 4 錢, 商陸 5 錢, 水煎服。(都南衛生院黎沛棠獻方)

5. 跌傷 大還魂、小還魂、大羅傘、小羅傘、雞骨草、田基黃、雞不食、金錢艾、山大力、山牡丹、滿天星、雙眼龍、金貝葉各 2 錢, 共研末, 酒煮外敷患處則效。(佛山專區石岐李英新獻方)

6. 過基俠蛇咬傷 雞骨草 1 兩(去骨), 煎水飲之則愈。(佛山潘福獻方)

文獻考証

1. 現代肖步丹撰《嶺南采藥錄》: 雞骨草別名黃頭草、黃仔藤, 葉似鉄錢, 形如冬瓜子, 對生。凡黃食証, 取其莖約七八錢, 和豬骨約二兩, 煮四五點鐘服之, 三四次便愈。

2. 《全國醫葯衛生技術革命展覽會資料選編》廣西南宁市工人醫院撰雞骨草治療傳染性肝炎初步觀察文中引述《南寧本草綱目》: 雞骨草屬蔓草類, 小葉對稱, 味辛性溫, 功能入厥陰肝經。主治跌打損傷, 瘀血內傷, 續筋接骨, 黃疸, 風濕骨痛……據草醫說以廣東佛山出產為佳。

雞 屎 藤

Paederia scandens (Lour.) Merr.

別名：皆治藤，牛皮冻，青风藤

科属形态 本品系苦草科雞屎藤属中的一种缠绕藤本；长2~5米，老茎秃净，嫩枝稍被短毛。单叶，近膜质，对生，很少8枚轮生，卵形，椭圆形，矩圆形至披针形，长8.5~12厘米，宽2~7厘米，先端急尖，稀有渐尖，基部浑圆或楔尖，边全缘，叶面绿色，叶背浅绿色，两面近秃净；托叶三角形，长3~5毫米，易脱落。秋季开花，两性，白紫色，为顶生和腋生的广展、分枝、蝎尾状聚伞花序，复排成圆锥花序式；萼管狭钟状，长约8毫米；花冠管状，长7~10毫米，被粉状柔毛，裂片4~5枚，短，镊合状排列，边缘有皱纹；雄蕊4~5枚，着生于冠喉，花丝极短；子房下位，2室，每室有胚珠1颗，柱头2裂。花后结果，球形，直径5~7毫米，外果皮膜质而脆，成熟时光亮，草黄色，分裂为圆形或矩圆形，膜质或革质的小坚果2个，小坚果宽4~5毫米。

生长环境 生于园圃篱笆或灌木丛中、河边、沟边、村旁，适应性较强，肥沃土壤更易繁殖。

产地分布 印度、马来亚、日本。我国除东北外，其他各地多有产。本省各地均有分布，普遍，丛生。

药用部分与气味性能 叶、根。气香特异，味微甘微涩，性平。根涩性较大而微苦，性微温。能预防暑毒，消胃肠积滞，化五淋，固阴气耗散。

临床应用

1. 痢疾

(1) 雞屎藤叶8两，捣烂取汁，加入黄糖适量，煮米糊内服，日食2次代饭，连食3天可愈。本方对阿米巴痢效果显著。(广州中医学院陈介生献方)

(2) 雞屎藤叶、鳳尾草各1两，捣烂，冲开水加蜂蜜服。(普宁鍾貞声献方)

(3) 雞屎藤叶和米炒黄，煎水滚加糖少許温服。(云浮县区仲仁献方)

(4) 雞屎藤、鳳尾草、水泉草各3两，烏骨胡荽2两，牛斗薺3两，煎水内服即愈。(合浦刘彩阶献方)

(5) 雞屎藤头1.5两，净水煎服。(黄乙生献方)

2. 黄疸 雞屎藤头、六耳芥头、胜鼓草、雞蛋各适量，煎服数次愈。(英德大瀾陈金瑞献方)

3. 肺癆咯血

(1) 雞屎藤5钱，蜜枣1大只，石仙桃1两，鳳凰雞(有毛)5钱，扁柏5钱，藕节5钱，一天一剂，煎服良驗。(广州赵思宽献方)

(2) 雞屎藤叶、山里企叶各适量，捣烂取汁内服。(普宁吳益寿献方)

(3) 肺結核 雞屎藤头适量，煮猪瘦肉服，效力极好。(温秀康献方)

4. 咳嗽

(1) 雞屎藤干約5~10钱，猪肝5~6两，煮食。(罗振华，潮安張小野献方)

(2) 雞屎藤5錢，馬安藤4錢，馬蹄香2錢，白蛇根5錢，茶匙紅3錢，日服一劑，連服3劑。(汕頭陳店步陳秀良獻方)

5. 慢性喉結核 白花雞屎藤煮猪瘦肉食。(梅縣中醫院陳耀存獻方)

6. 百日咳 雞屎藤葉搗爛取汁，另取猪粉腸一段，將一端以綫結扎，把雞屎藤汁裝入加鹽少許，然後結扎，煮熟食之良效。用量1~3歲小孩，用雞屎藤汁1/3匙，3~5歲小孩用雞屎藤汁1/2匙，6~9歲小孩用雞屎藤汁1匙。本方不宜于初起病者服用，患病10天以外者才合使用。(海豐縣楊建明獻方)

7. 大熱人事不醒 雞屎藤葉、霸王葉，煎服即醒。(新豐縣馮修金獻方)

8. 胃痛 雞屎藤根適量炒黑，酒泡內服1錢。(揭陽榕城衛生院獻方)

9. 鼻衄、牙衄、嘔血 雞屎藤2兩，猪肉適量，煎湯服。(河沅楊鳳鳴獻方)

10. 大便下血

(1) 長草5錢，雞屎藤1~2兩，滾水煎服。(清遠黃煊獻方)

(2) 云連3錢，黃芩3錢，胡麻5錢，共研細末，以雞屎藤煎水為丸如黃豆大，日服2次，每次8粒，飯前開水送服。(蔡岐鳴獻方)

11. 瀉血 雞屎藤根0.5~1斤，煎2小時，分兩次服，為一日量。連服3天，瀉血即止，服10余天全部痊癒。

12. 疝氣偏墜

(1) 雞屎藤2兩，生魚重約8兩，共煮食，多食幾次病可痊愈斷根。(中山石岐胡謙山獻方)

(2) 雞屎藤根3兩，濃煎後沖酒服。

(3) 雞屎藤2兩，煮猪板油服之愈。(汕頭溫善文獻方)

13. 風寒濕痹 鳳凰胎2只，地風根3錢，雞屎藤3錢，香附3錢，水一碗，隔水燉二小時服。

14. 馬上下 白花雞屎藤嫩心搗爛，和白酒榨汁內服。(安流衛生院獻方)

15. 蕪勞 雞屎藤適量，搗爛加些開水取汁服。忌食雞、鴨、羊、狗肉及生蝦。(曾桂興獻方)

16. 婦人產後腹痛 雞屎藤葉1兩，雞蛋2只，將雞屎藤搗爛調雞蛋，煎至兩面黑色為度，沖黃酒4兩，一次頓服。(興寧薛輔軍獻方)

17. 神經性牙痛 雞屎藤根1兩，山梔子1.5兩，猪蹄1只，將藥搗碎用紗布包好，同猪蹄共煎約4小時，去渣渣內服。本方治愈多人，有的一次可愈，有的仍有些痛，再服1次即愈。(興寧劉鎮濤獻方)

18. 湯火傷

(1) 雞屎藤葉、生扁柏葉、川連末、白芷末、口米砂，共搗爛敷傷處，即時痛止。(陽江大南鎮醫院李昌平獻方)

(2) 雞屎藤搗爛取汁，以消毒棉花蘸藥濕敷。(佛山专区獻方)

19. 跌打

(1) 雞屎藤搗爛取汁，沖宣便1杯，酒1兩，服。(饒平風江中醫院林豪趾獻方)

(2) 外傷新筋 雞屎藤葉、三黃散、蜂糖，共搗爛如泥敷傷處，每日更換1次。(合浦蘇贊龍獻方)

(3) 刀傷出血 雞屎藤不拘多少，搗爛敷之即止。(德慶梁杏芳獻方)

20. 毒蛇咬傷

(1) 紅骨雞屎藤、波羅葉、白藤子葉、馬蹄草、蛤蜊葉各2兩，搗爛外敷。(徐聞李南烈獻方)

(2) 雞屎藤頭、指甲各適量，研爛加酒搽傷口即愈。(廣州中醫學院進修部彭增祥獻方)

21. 香港腳 白毛雞屎藤1撮，紅糖少許，先將雞屎藤搗爛，然後再加入紅糖搗成糊狀，用時先將患部洗滌清潔後將藥塗上，一天換藥3~4次。此為祖傳秘方。治癒4~7天就干水止癢，再過3~5天患處發微痛，并生異色皮痂，再敷3~4天停藥，不久黑痂自行脫落而愈，不再復發。(海康衛生科李時棟獻方)

22. 蛇頭指 雞屎藤葉，用米酒糟或米酒共搗爛敷之。(梁有光獻方)

23. 老鼠偷門 雞屎藤、紫蘇葉、雞冠花、白菊花各等量，煎水洗患處，洗後即用下藥為末，調茶油

或干粉搽之，药用：猫头骨、马头骨、田鸡骨、川连、大梅片各适量，研为细末用。（吴东成献方）

文献考证

1. 清代赵学敏撰《本草纲目拾遗》载治藤曰：蔓延墙壁间，长丈余，叶似泥藤。中暑者以根叶作粉食之；虚损者杂猪胃煮服。

2. 清代赵寅谷撰《本草求原》载鸡屎藤曰：苦辛温。其头治新内伤痰火，补血益肾，清热毒，理脚湿肿烂，蛇伤；洗疮止痛。

3. 现代肖步丹撰《岭南采药录》载治藤曰：味苦性平。其近根之头，治初内伤，煮猪肉汤饮之，补虚益肾，除火补血；其藤与叶，洗热疮，消热散毒；其叶和米粉捣烂，加糖煮食，能止痢；凡眼胞上下生疮，用此藤和鲫鱼一条，及雄黄捣烂敷之，愈后无崩缺破皮之患；中暑者，以根叶作粉食之；虚损者，和猪胃煮食。其头近竹树妨太寒，近火秧筋妨有毒，均不可采用。鸡屎藤乃管之藤。

4. 现代胡翼撰《山草药指南》载治藤曰：味辛苦，性平。取叶和米粉捣烂加糖煮食，能清热止痢。凡中暑发热，取根叶和粉煎食；洗热疮亦效。凡小儿脱肛，取其头之老者，用酒蒸晒干次，和羊肠煮食之，连食五次即愈。

5. 现代陈立卿撰《广西中兽医药用植物》载鸡屎藤曰：可治牛，宽筋活络；可治鸡瘟。

蘿 卜

Raphanus sativus Linn.

别名：萊 菔

科属形态 本品系十字花科蘿卜属中的一种两年生或一年生直立肉质草本。块根圆锥状，肉质白色，茎绿色具短刚毛。单叶，纸质，互生，有两种：一种名爬齿蘿卜，叶成束从根生出，长舌状，椭圆形，全长20~40厘米，宽8~12厘米，前端短尖，边缘浅波状，有不整齐锯齿或小尖点齿，近基部每为深裂，叶柄长3~4厘米；一种名大蘿卜，叶着生于茎上，互生，无柄。两种蘿卜均同用。截取块根顶部及留取叶柄部分，鲜用或晒干用均可。

生长环境 栽于园地、耕地，沃土排水佳良，或沙质土壤，阴润地方。

产地分布 各地均有栽培。

药用部分与气味性能 根、种子。嗅微，味辛甘，性平。根苗蒂部能擅解感冒发热食滞，咳甚上气。种子能消膨化气。根、茎、叶榨汁生服，善化温病伏邪结气。

临床应用

1. 砂肺 鲜蘿卜汁、鲜茅根汁、荸荠汁、鸡内金、麻黄、贝母、牛蒡子、桔梗、枳壳、石斛、枇杷叶，用上列各药随症加减，治疗砂肺21人，效果显著，一般在一个月內黑痰消失，九个月粘痰消失，一年左右恢复健康。据痊愈后的病人反映，经过一段治疗时间后，胸紧、咳嗽完全消失，饮食和睡眠完全恢复正常，体重迅速增加。（湖南新化中医院献方）

2. 百日咳 蘿卜干3钱，青黛7分，生石膏2钱，杏仁1.5钱，甘草8分，北沙参1.5钱，牛蒡子1.5钱，桔梗8分，连翘1.5钱，桑白1.5钱，姜皮1.5钱，冬瓜仁2钱，以水煎适量，临睡时服。（广州中医学院进修部刘振武献方）

3. 呃逆 生蘿卜头大者一条，捣出汁，加入蜜糖5两冲服即止。（广州中医学院进修部郭玉史献方）

4. 慢性支气管炎

(1) 新鲜蘿卜汁8两，饴糖1两，上药共煎化候温，每日二次温服。适应症：持续久咳，早晚及夜间增剧，痰液粘稠。（潮安陈吉润献方）

(2) 外感后因食肥腻，致咳嗽气促胸痛（民间认为外感传里），蘿卜英（茎）2两，水煎浓汁服，服二次症状即迅速好转。本药可加入治疗处方与芒果核等同用。（广州民间卫生常识方法之一）

5. 红白痢

(1) 将蘿卜菜干置于瓦面上日晒夜露，勿被雨湿，候时约半月之久，貯于瓶中越久越好，每服用1~2两，煎浓汁饮下。（云浮县陈就章献方）

(2) 将留种蘿卜头数个煎水，将该水煮鸡蛋2个，连汤服；如痢疾已久，可用猪肉煮，亦连汤服。（封开江口联合诊所梁云生献方）

(3) 蘿卜皮、马齿苋，二味适量水煎，冲蜜糖服。（广州中医学院罗振华献方）

(4) 蘿卜皮、行菜姑、猪母酸，三味等量，捣烂取汁冲蜜糖服。（黄令煌献方）

(5) 晒干蘿卜叶8两，水煎冲蜜糖服。（清远林有华献方）

(6) 蘿卜2斤，鲜牛肉1斤，生姜1两，共切成薄片，以水和上各味置砂锅煮5小时，至肉烂为度，用纱布榨出汁，加入食盐少许，分三至四次服之。（罗舜玉献方）

6. 脾氣水腫

(1) 萊菔壳2兩,茯苓皮1兩,淮山1兩,淨米糖2兩,共研細末,以粥和為丸如龍眼核大,飯後以米湯送下一丸,日服三次。(《福建中醫驗方》2集)

(2) 蘿卜汁、砂仁,以蘿卜汁浸砂仁炒干,連浸炒數次後,將砂仁為末,每服2錢,用米湯送下。(海南海口雲列伍獻方)

7. 偏頭風痛 生蘿卜帶約一寸長,搗汁,把汁灌于患者鼻內,左痛灌右鼻,右痛灌左鼻。(阜順譚錫三,中山石岐市阮杏泉獻方)

8. 赤眼紅腫疼痛

(1) 蘿卜1只,薄荷3錢,將薄荷剪碎放入蘿卜內,置鍋內蒸熟取汁洗眼,日洗三次,連洗三天則愈。(翁沅胡占元獻方)

(2) 雙眼紅腫生膜 蘿卜、蘆竹筍(去壳取內層),榕木芯水洗,生蝦肉,共搗爛敷患眼則愈。

9. 熱結,臍下劇痛 生蘿卜1斤,淨朴硝5錢,先將生蘿卜洗淨,以水三碗煎至一碗,分三次沖朴硝服,每隔50分鐘服一次。如有嘔吐,則用代赭石1兩研末,分2~3次沖滾水內服。結痛未止,再用蔥白切絲燻炒至極熱後,用布包熨痛處,冷時炒熱再熨。如有大便過多時須防虛脫,則用紅棗肉4兩煎水服。1~2劑即愈。(揭陽新亨鄉衛生院林榮波獻方)

10. 辜丸炎 老蘿卜頭5~6只洗淨,用水20斤,煮沸1小時,然後倒在木盆中,待水稍溫時,令病者坐于約水盆內浸0.5小時,每日早晚二次,兩天即愈。(紫金中壩區張漢強獻方)

11. 中煤氣毒昏迷 將中毒者移置于空氣流通處臥下,把蘿卜汁從患者口中頻頻灌之即醒。如無蘿卜,用白糖代之亦可。(謝光鏡獻方)

12. 食木薯中毒 用生蘿卜搗汁,灌與患者服下即愈。(黃美廷,合浦楊蒼生獻方)

13. 鼻血不止 用蘿卜搗汁和無灰酒飲之,再用沉香塞住鼻孔,另用艾火灸兩足眼則止。

14. 阴道滴虫 蘿卜去外皮塞陰戶,或搗爛取汁滴入陰戶內,均能治愈。(佛山专区李為吾獻方)

15. 眼初上膜 生蘿卜5錢,白信1錢,共搗爛貼在風府穴,約貼0.5點鐘久,連貼1~2次則愈。(昌感新街鎮衛生院張錦良獻方)

16. 小便出血 用鮮蘿卜搗汁和好墨少許,飲之即效。(海南海口雲列五獻方)

17. 砂淋 以生蘿卜磨汁飲之有效。

18. 乳痛 生蘿卜搗爛敷之即效。(光澤生獻方)

文獻考証

1. 清代趙賓谷撰《本草求原》載萊菔曰:根辛甘,生搗汁飲,則辛全,下氣消痰削血,止渴,寬中,去邪熱,治吐血。汁和酒溫飲兼滴鼻中,消食,制面毒,解酒毒。火傷,雖死灌之即蘇。食物作酸,同豬羊肉益脾胃。同鱸魚止咳。痘疹忌之。敷跌打傷紫,散瘀。揩凍瘡煖熱搗之。治偏頭風痛,取近蒂青色者取汁滴鼻;左痛滴右,右痛滴左。喉口爛丹瘤游風,搗涂。解附子毒,但耗氣傷血,與生地、首烏同食,白人麝食,生莖能制其毒。夏月多食其菜,冬不患病。冬月取葉陰干,或攤屋瓦上,任霜雪打壓,至春收之,赤痢沙糖煮,白痢糖霜煮服,初痢最宜,久痢胃虛勿用。口含萊菔或飲其汁,可辟烟毒。根熟食則辛去甘存,反滯腸停飲或胃熱降者膠。其子,微甘而辛,利血中之氣,生則升,能吐風痰,以水搗取汁,和香油蜜溫服,雞翎探吐,散風寒,寬胸膈,發癰疹;炒熟則降氣,消痰定喘,炒研和皂莢灰姜汁蜜為丸白湯下。治面積氣脹,以汁浸砂仁一夜,炒干再浸再炒,凡七次,為末,米飲下如神。風秘氣秘,搗水和皂莢末服立通。下痢後重,止氣痛,消面食,下氣甚速,氣行則疾化,故丹溪謂其治痰則破墻倒壁之功。虛人忌之。葉莖溫腸下氣,久露曬干食,永無喉疾。

2. 現代陳立卿撰《廣西中藥醫藥用植物》載萊菔曰:治牛痢症(紅白痢);治胎衣不下;亦可治豬丹毒。

鷹不泊

Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.

别名：鳥不宿，土花楸，勒欖，管欖欖，面厘架

科属形态 鷹不泊名称有几个品种，均系茎枝密生銳刺的木本植物，现就治肝炎有效的一种勒欖叙述之。本品系芸香科花椒属中的一种直立、秃净具刺灌木，茎老则刺老而大，枝嫩则刺嫩而小，刺紅褐色。叶互生，奇数羽状复叶，有小叶7~15枚；总軸长7~12厘米，有少刺或无刺；小叶具短柄，斜方状倒卵形或斜矩圆形，很少斜方状披針形，长2~5厘米，寬1~2厘米，最頂一枚矩圆形，长达7厘米，先端通常鈍，基部狭而成一短柄，邊緣稍作波浪形，有透明的腺点。夏秋頂生圓錐花序，为疏散的3枝或2~8次伞形花序式的分枝，与叶同长；花序柄长5~9厘米，花单性，花瓣5枚，白色，长约2毫米；雄蕊3~5枚，或在雌花中的退化为鳞片；子房在雄花中退化，在雌花中为1~5个偏斜、1室的心皮；花柱近側生，柱头头状。花后結蒴果，为两个心皮組成，成熟时直徑3.5~4毫米，种子黑色而亮。

生长环境 常散見于荒山、坡地、溪谷、灌木杂草丛中。全年四季均可采收其根部。

产地分布 越南，菲律宾至我国南部。本省以花县附近各地为多产。

药用部分与气味性能 根部。气微香，味辛，性微温。能化湿，驅风，消肿，退黄理臌，治瘧退热。

临床应用

1. 肝炎。

2. 慢性肾炎

(1) 广东省中医院張景遠醫師用鷹不泊1斤切碎，先用双燕酒1斤和上药煮熟候冷，浸双燕酒6斤，置15日可用；每次服1~2两，日服2次，飯后飲用，30天为一疗程；必要时可用二疗程。服后有腹鳴轉矢气及小便加多。如貧血体弱者隔日进归脾湯一剂，收效更速。該院曾作臨床試驗研究，計治療有3例，初步获得显著疗效。臨床观察：1)服药酒一个月尿量日漸增加，全身面浮肿全部消退。2)尿蛋白由++++減至+，紅血球血色素均有增加。3)腎功能有所改善，酚紅試驗接近正常，尿顆粒管型部分消失。4)全身症状消失或好转，营养改善出院，能恢复劳动生产。5)追踪检查，其中一例一年后无复发，二例有复发，但仍能生产劳动。

(2) 鷹不泊、雞壳筋、老墙皮、白果壳、樟榔头各等量，濃煎以瓦壺乘載，令患者乘热坐瓦壺上熏之。重者并用樟榔头1两同精猪肉煮食。忌食盐。(三水中医院陈亦毅献方)

3. 關尾炎 鷹不泊1两，淨水煎服。(順德鍾斌献方)

4. 肝炎 广州市卫生局根据群众宋繼祖献方，叙述他本人患发黄，疲倦，食欲全缺，飲水入口即吐的严重情况，經当地医院診斷为肝炎，治疗未見收效，結果由一魚販介紹了治这病的单方治疗，服药四天以后，即告痊愈，至今十年未見复发。方用：鷹不泊2两，鷄肉4两，水煎服。

文献考证

1. 現代肖步丹撰《岭南采药录》載鷹不泊曰：味辛性温。大祛寒火，理酒痰，理咽喉，治跌打，去風，治黃肿。又治伤寒夹色，煎水盡量飲，至吐出痰涎即愈。又治黃食，患乳疮，用其嫩叶搗烂，煎酒冲服，以醉为度，用其渣敷疮之四圍，中留孔以通气，醉醒则痛止而愈。

2. 現代胡眞撰《山草药指南》載鷹不泊曰：味辛性温。治黃食及黃肿症，消跌打伤肿。

科属索引

烏毛蕨科 Blechnaceae

貫众 Woodwardia japonica Sw. (113)

貫众(烏毛蕨) Blechnum orientale Linn. (113)

貫众科 Aspidiaceae

貫众(中国綿馬) Dryopteris filix-mas (L.) Schott (113)

三白草科 Saururaceae

魚腥草 Houttuynia cordata Thunb. (108)

桑科 Moraceae

榕树 Ficus religiosa Linn. (152)

蓼科 Polygonaceae

火炭母 Polygonum chinense Linn. (47)

辣蓼 Polygonum hydropiper Linn. (142)

藜科 Chenopodiaceae

莧菜 Chenopodium ambrosioides Linn. (97)

莧科 Amaranthaceae

紅莧菜 Amaranthus tricolor Linn. (81)

馬齒莧科 Portulacaceae

瓜子菜 Portulaca oleracea Linn. (62)

樟科 Lauraceae

樟树 Cinnamomum camphora Sieb. (153)

薔薇科 Rosaceae

桃树 Prunus persica (L.) Batsch. (91)

金櫻 Rosa laevigata Michx. (73)

芸香科 Rutaceae

黃皮 Clausena lansium (Lour.) Skeels (124)

三桠苦 Evodia lepta (Sprang.) Merr. (7)

鷹不泊 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC. (182)

苦木科 Simarubaceae

鴉胆 Brucea javanica (L.) Merr. (162)

楝科 Meliaceae

苦楝 Melia azedarach Linn. (84)

大戟科 Euphorbiaceae

黑面神 Breynia fruticosa (L.) Hook. f. (131)

大叶双腺龙 Oroton tigilium Linn. (28)

火秧箭 Euphorbia antiquorum Linn. (45)

乳汁草 Euphorbia thymifolia Linn. (78)

算盤子 Glochidion puberum (L.) Hutch. (151)

白背叶 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg. (59)

蓖麻 Ricinus communis Linn. (154)

烏柏 Sapium sebiferum Roxb. (88)

无患子科 Sapindaceae

木櫨子 Sapindus mukorossi Gaertn. (48)

梧桐科 Sterculiaceae

山芝麻 Helicteres angustifolia Linn. (18)

瑞香科 Thymelaeaceae

丁哥王 Wikstroemia indica C. A. Mey. (1)

桃金娘科 Myrtaceae

水鏡 Gleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. & Perry (42)

大叶桉 Eucalyptus robusta Smith (31)

番石榴 Psidium guajava Linn. (128)

崗松 Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. (110)

五加科 Araliaceae

鴨脚木 Schefflera octophylla (Lour.) Harms (164)

傘形科 Umbelliferae

崩大碗 Centella asiatica (L.) Urban. (117)

紅蘿蔔 Daucus carota L. var. sativa DC. (80)

馬錢科 Loganiaceae

大茶药 Gelsemium elegans Benth. (21)

夾竹桃科 Apocynaceae

夾竹桃 Nerium indicum Mill. (68)

羊角扭 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. & Arn. (69)

馬鞭草科 Verbenaceae

五指柑 Vitex negundo Linn. (38)

唇形科 Labiatae

細叶七星劍 Mosla cavaleriei Levl (122)

茄科 Solanaceae

曼陀罗 Datura metel Linn. (104)

菸草 *Nicotiana tabacum* Linn. (129)

紫葳科 *Bignoniaceae*

千張紙 *Oroxylum indicum* (L.) Vent. (20)

茜草科 *Rubiaceae*

水楊梅 *Cephalanthus occidentalis* Linn. (43)

山梔 *Gardenia jasminoides* Ellis (15)

雞屎藤 *Paederia scandens* (Lour.) Merr. (177)

山大藥 *Psychotria rubra* (Lour.) Poir. (17)

忍冬科 *Caprifoliaceae*

土銀花 *Lonicera confusa* DC. (11)

葫蘆科 *Cucurbitaceae*

南瓜 *Cucurbita moschata* Duch. (82)

山梗菜科 *Lobeliaceae*

半邊蓮 *Lobelia chinensis* Lour. (51)

菊科 *Compositae*

五月艾 *Artemisia vulgaris* Linn. (40)

除虫菊 *Chrysanthemum cinerariaefolium* Vis. (99)

野菊花 *Chrysanthemum indicum* Linn. (101)

旱蓮草 *Eclipta alba* (L.) Hassk. (70)

地胆頭 *Elephantopus scaber* L. (66)

雞不食 *Epilobium australe* Less. (167)

土牛膝 *Eupatorium chinense* Linn. (9)

蒼耳草 *Xanthium sibiricum* Patr. (148)

天南星科 *Araceae*

瘋芋頭 *Alocasia odora* (Roxb.) G. Koch (119)

大浮萍 *Pistia stratiotes* Linn. (33)

石蒜科 *Amastyllidaceae*

大蒜 *Allium sativum* Linn. (24)

百合科 *Liliaceae*

較剪草 *Dianella ensifolia* (L.) DC. (137)

姜科 *Zingiberaceae*

樟榔頭 *Costus speciosus* (Koernig) Sm. (160)

鳳尾蕨科 *Pteridaceae*

鐵線草 *Adiantum flabellulatum* Linn. (138)

鳳尾草 *Pteris ensiformis* Burm. (146)

冬青科 *Aquifoliaceae*

崗梅根 *Ilex asprella* Champ. (112)

蝶形花科 *Papilionaceae*

雞骨草 *Abrus cantoniensis* Hance (175)

廣東金錢草 *Desmodium styracifolium* (Sw.)

Merr. (35)

魚藤 *Millettia lasiopetala* (Hay.) Merr. (107)

葫蘆茶 *Pteroloma triquetrum* (L.) Desv. (133)

布狗尾 *Uraria crinita* Desv. var. *macrostachya* Wall. (60)

丁癸草 *Zornia diphylla* (L.) Pers. (5)

胡椒科 *Piperaceae*

青藤 *Piper betle* Linn. (76)

旋花科 *Convolvulaceae*

白藤藤 *Argyrea acuta* Lour. (58)

番薯 *Ipomoea batatas* (L.) Poir. (126)

野牡丹科 *Melastomaceae*

金盞花 *Osebeckia chinensis* Linn. (72)

鼠李科 *Rhamnaceae*

鐵包金 *Berberis lineata* DC. (140)

爵床科 *Acanthaceae*

狗肝菜 *Dicliptera chinensis* (Vahl) Nees (75)

路兜樹科 *Pandanaceae*

路兜樹 *Pandanus tectorius* Parkins (135)

棕櫚科 *Palmaeae*

椰果 *Cocos nucifera* Linn. (136)

木樨科 *Oleaceae* (*Fraxinus*)

白花茶 *Jasminum amplexicaule* Buch.-Ham. (57)

山茶科 *Theaceae*

茶葉 *Camellia sinensis* (L.) O. Ktze. (94)

藍雪科 *Plumbaginaceae*

白牡丹 *Plumbago zeylanica* Linn. (53)

十字花科 *Cruciferae*

薺菜 *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic (105)

蘿卜 *Raphanus sativus* Linn. (180)

椴樹科 *Tiliaceae*

布渣叶 *Microcos paniculata* Linn. (61)

禾本科 *Gramineae*

糯稻根 *Oryza sativa* Linn. (174)

蟾蜍科 *Bufonidae*

蟾蜍 *Bufo vulgaris* Linn. (171)

蟋蟀科

土狗 *Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois (13)

学名索引

A

- Abrus cantoniensis* Hance 鷄骨草 (178)
Adiantum flabellulatum Linn. 鉄綫草 (138)
Allium sativum Linn. 大蒜 (24)
Alocasia odora (Roxb.) C. Koch 痕芋头 (119)
Amaranthus tricolor Linn. 紅莧菜 (81)
Argyrea acuta Lour. 白鶴藤 (58)
Artemisia vulgaris Linn. 五月艾 (40)

B

- Berchemia lineata* DC. 鉄包金 (140)
Breynia fruticosa (L.) Hook. f. 黑面神 (131)
Brucea javanica (L.) Merr. 鴉胆 (162)
Buso vulgaris Laur. 繡綫 (171)

C

- Camellia sinensis* (L.) O. Ktze. 茶秧 (94)
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic 薺菜 (165)
Centella asiatica (L.) Urban. 崩太碗 (117)
Cephalanthus occidentalis Linn. 水楊梅 (43)
Chenopodium ambrosioides Linn. 臭薺菜 (97)
Chrysanthemum indicum Linn. 野菊花 (101)
Chrysanthemum cinerariifolium Vis. 除虫菊 (99)
Clausena lansium (Lour.) Skeels 黄皮 (124)
Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr.-Perry 水翁 (42)
Costus speciosus (Koenig) Sm. 樟柳头 (160)
Cocos nucifera Linn. 椰果 (136)
Cinnamomum camphora Sieb. 樟树 (188)
Oroton tiglium Linn. 大叶双眼龙 (28)
Cucurbita moschata Duch. 南瓜 (82)

D

- Datura metel* Linn. 曼陀罗 (104)
Daucus carota L. var. *sativa* DC. 紅蘿卜 (80)
Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr. 广东金

錢草 (35)

- Dianella ensifolia* (L.) DC. 較剪草 (137)
Dicliptera chinensis (Vahl) Nees 狗肝菜 (78)
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 中国綿馬 (113)

E

- Eclipta alba* (L.) Hassk. 旱蓮草 (70)
Elephantopus scaber L. 地胆头 (66)
Epilates australis Less. 雞不食 (167)
Eucalyptus robusta Smith 大叶桉 (31)
Eupatorium chinense Linn. 土牛膝 (9)
Euphorbia antiquorum Linn. 火殃箭 (45)
Euphorbia thymifolia Linn. 乳汁草 (78)
Evodia lepta (Spreng.) Meisn. 三桠苦 (7)

F

- Ficus retusa* Linn. 榕树 (152)

G

- Gardenia jasminoides* Ellis 山梔 (18)
Gelsemium elegans Benth. 大茶药 (21)
Glochidion puberum (L.) Hutch. 算盘子 (151)
Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois 土狗 (13)

H

- Helicteres angustifolia* Linn. 山芝麻 (18)
Houttuynia cordata Thunb. 魚腥草 (106)

I

- Ilex asprella* Champ. 崗梅根 (112)
Ipomoea batatas (L.) Poir. 番薯 (126)

J

- Jasminum amplexicaule* Buch.-Ham. 白花茶 (57)

L

- Lobelia chinensis* Lour. 半边莲 (51)
Lonicera confusa DC. 土银花 (11)

M

- Mallotus apelta* (Lour.) Muell.-Arg. 白背叶 (59)
Melia azedarach Linn. 苦楝 (84)
Microcos paniculata Linn. 布渣叶 (61)
Millettia lasiopetala (Hay.) Merr. 鱼藤 (107)
Mosla cavaleriei Levl 细叶七星桐 (122)

N

- Nerium indicum* Mill. 夹竹桃 (68)
Nicotiana tabacum Linn. 菸草 (129)

O

- Oroxylum indicum* (L.) Vent. 千张纸 (20)
Oryza sativa Linn. 糯稻根 (174)
Osbeckia chinensis Linn. 金香爐 (72)

P

- Paederia scandens* (Lour.) Merr. 雞屎藤 (177)
Pandanus tectorius Parkins 路兜筋 (135)
Piper betle Linn. 青蒟 (76)
Pistia stratiotes Linn. 大浮萍 (33)
Prunus persica (L.) Batsch. 桃树 (91)
Polygonum chinense Linn. 火炭母 (47)
Polygonum hydropiper Linn. 辣蓼 (142)
Portulaca oleracea Linn. 瓜子菜 (62)
Pteris ensiformis Burm. 鳳尾草 (145)
Pteroloma triquetrum (L.) Desv. 葫蘆茶 (133)
Plumbago zeylanica Linn. 白花丹 (88)
Psidium guajava Linn. 番石榴 (128)

- Psychotria rubra* (Lour.) Poir. 山大癩 (17)

R

- Raphanus sativus* Linn. 蘿卜 (180)
Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. 崗松 (110)
Ricinus communis Linn. 蓖麻 (164)
Rosa laevigata Michx. 金櫻 (73)

S

- Sapindus mukorossi* Gaertn. 木蠟子 (48)
Sapium sebiferum Roxb. 烏桕 (88)
Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook.-Arn. 羊角扭 (89)
Schefflera octophylla (Lour.) Harms 鴨脚木 (164)

U

- Uraria crinita* Desv. var. *macrostachya* Wall. 布狗尾 (80)

V

- Vitex negundo* Linn. 五指柑 (38)

W

- Wikstroemia indica* O. A. Mey. 丁哥王 (1)
Woodwardia japonica Sw. 貫眾 (113)

X

- Xanthium sibiricum* Patr. 蒼耳草 (148)

Z

- Zanthoxylum avicennae* (Lam.) DC. 藤不泊 (182)
Zornia diphylla (L.) Pers. 丁癸草 (5)

药名笔画索引

二 画

丁哥王(1)
丁癸草(8)
七星藤(112)
九信药(1)

三 画

三桠苦(7)
三仔苦(7)
三桠虎(7)
三叉虎(7)
土牛膝(9)
土银花(11)
土黄柏(20)
土狗(13)
土花椒(182)
土荆芥(97)
土忍冬(11)
土公英(66)
山大娘(17)
山银花(11)
山梔(18)
山油麻(18)
山芝麻(18)
山东参(110)
山猫儿(137)
山菅兰(137)
山雁皮(1)
山馒头(151)
山波芥(55)
山波罗(135)
山菊古(135)
山打大刀(17)
山大刀(17)
山梅根(112)
千张纸(20)
千纸肉(20)

小荆实(38)
小飞扬(78)
小鳳尾(145)
小熊胆(138)
大茶药(21)
大蒜(24)
大叶加利(31)
大叶双膜龙(28)
大叶按(31)
大浮萍(33)
大涌藻(33)
大柴药(21)
大丹叶(17)
广东隔洋花(104)
广东相思子(175)
广东商陆(160)
广东金钱草(35)
广东狼毒(119)

四 画

六月雪(9)
六月霜(9)
五指柑(38)
五月艾(40)
天香爐(72)
天芥菜(66)
井闾苗(145)
水翁(42)
水榕(42)
水杨梅(43)
水蓼(142)
水黄槐(15)
火炭母(47)
火炭星(47)
火秧筋(45)
火艾(40)
牛皮冻(177)
木蝴蝶(20)

木槵子(48)
无患子(48)
中国锦鸡(113)
风茄儿(104)
长穗狸尾草(60)
长穗猫尾射(60)

五 画

半边莲(51)
白花茶(87)
白花丹(55)
白薯(128)
白藤藤(58)
白膏药根(58)
白底絲綢(58)
白药根(107)
白背叶(59)
白朴树(59)
白泡树(59)
白面筋(59)
白膜树(59)
白情顶(59)
白鹤树(59)
玉蝴蝶(20)
白石笋(160)
白花蜘蛛菊(70)
白花蜘蛛菜(70)
布狗尾(60)
布渣叶(61)
布荆(38)
扒田狗(13)
左藤藤(11)
左扭藤(57)
石胡荽(167)
瓜子菜(62)
田刀柄(133)
甘菊(101)

六 画

参须公(9)
地棉根(1)
地胆头(66)
地胆草(66)
地菜(165)
地胡椒(167)
老鼠耳(62, 140)
老藤胆(162)
老公根(117)
灯盏菜(117)
夹竹桃(68)
羊角扭(69)
吉耳菜(108)
当梨子(110)
百劳舌(133)
尖尾凤(119)
虫蚕草(28)
杀虫芥(97)

七 画

冤狗尾(60)
旱莲草(70)
旱参(142)
赤地利(47)
牡荆(38)
吹筒树(17)
扭肚藤(57)

八 画

金香爐(72)
金鐘草(72)
金櫻(73)
金瓜(82)
金盘托荔枝(104)
金笋(80)
乱麻头(148)

單片芽(81)
 狗肝菜(75)
 狗貼耳(108)
 青蒿(76)
 青風藤(177)
 青藤仔花(87)
 青蛇仔(75)
 青蛙(172)
 面眉架(182)
 佛耳草(108)
 乳汁草(78)
 乳仔草(78)
 夜兰茶(131)
 追頸草(133)
 果金草(151)
 花鈴(128)
 拔子(128)
 芝麻頭(18)
 油麻甲(18)
 虎狼草(21)

九 画

紅蘿卜(80)
 紅莧菜(81)
 紅薯(126)
 南瓜(82)
 南嶺薺花(1)
 咸魚草(133)
 柳叶桃(68)
 洋花森(84)
 胡蔓草(21)
 胡滿藤(21)
 胡蘿卜(80)
 苦地枕(5)
 苦地胆(66)
 苦棟(84)
 苦參子(162)
 苦晚公(21)
 紅叶(88)
 急解索(51)
 点秤星(112)
 洗手果(48)
 佗藤槿(182)

皆治藤(177)
 十 画
 耕狗(13)
 烏柏(88)
 烏弄(88)
 烏肚子(110)
 烏毛族(113)
 烏口仔(140)
 烏脚枪(138)
 烏蠟翼(138)
 桃樹(91)
 桃金娘(110)
 茶肤(94)
 臭菜(108)
 臭蕨(97)
 秧(174)
 鬼画符(131)
 蚊蠟叶(38)
 劍板茶(133)
 埔葵(38)
 埔銀(1)
 馬齒莧(62)
 草鞋根(66)
 脂紅叶(17)
 神仙劍(20)
 除虫菊(99)
 奚芋頭(119)
 海芋(119)
 破布叶(61)
 秋薑草(117)
 十一 画
 野香菊(122)
 野菊花(101)
 野黃菊(101)
 野南瓜(151)
 野艾(40)
 野葛(21)
 野芋頭(119)
 曼陀羅(104)
 魚腥草(108)
 魚藤(107)

十 画

十一 画

崗稔(110)
 崗梅根(112)
 崗芝麻(18)
 崗油麻(18)
 假黃皮(1)
 假油麻(18)
 假楊梅(49)
 假紫藤(57)
 假茉莉(55)
 貫众(113)
 膽大碗(117)
 痕芋頭(119)
 斷腸草(21)
 斷腸藤(21)
 雀仔麻(1)
 細米草(51)
 細叶七星劍(122)
 細叶龍鱗草(175)
 細叶榕(152)
 順風旗(51)
 莧菜(81)
 荷葉葯(21)
 烏不宿(182)
 勒角蕨(135)
 勒欖(182)
 婆羅蕨(135)
 脫骨丹(73)
 球子草(167)
 梅叶冬青(112)
 麻更藤(47)
 猛仔叶(28)

十二 画

斑骨相思(9)
 斑鳩飯(47)
 黃食草(175)
 黃菊仔(101)
 黃槿子(15)
 黃果樹(15)
 黃茶瓶(73)
 黃荊(38)
 黃皮(124)
 番薯(126)

番石榴(128)
 番薯(128)
 番瓜(82)
 蔞草(129)
 菱角菜(165)
 萊蕪(180)
 葶耳(148)
 朝陽草(21)
 朝簡(20)
 黑面神(131)
 黑狗脊(113)
 黑骨芒笑(138)
 黑墨草(70)
 喇子草(78)
 跌破碗(117)
 森柯(84)
 鈎吻(21)
 鈎虫草(97)
 猪籠蓮(33)
 蛤撈帽(117)

十三 画

鉄鏈草(138)
 鉄鏈蕨(138)
 鉄香基(138)
 鉄香爐(72)
 鉄包金(140)
 路兜菊(135)
 路邊黃菊(101)
 梅果(136)
 榔子(136)
 榔果(136)
 榔子(110)
 葫蘆茶(133)
 葫(24)
 較葛草(137)
 雷公藤(107)
 雷公菊(117)
 楊丫(45)
 親肉菜(62)
 獅子滾球(151)
 蕒叶(76)
 蕒青(76)

痴头婆(148)
葵蓬菜(117)
落地金錢(35)
暗山公(17)

十四画

辣蓼(142)
鳳尾草(145)
蒼耳草(148)
算盤子(151)
翠云草(145)
榕树(152)
苘麻(154)
蒜头(24)
蜡子树(88)
酸味菜(62)

十五画

樟树(158)
樟柳头(160)

鴉胆(162)
鴉胆子(162)
熟薯(1)
熟珠(1)
蕒叶(76)
樟流星(112)
錦地錦(5)
墨汁旱蓮(70)

十六画

鴨脚木(164)
鴨脚皮(164)
錢雷口(117)
蓑衣叶(61)
糖墨筋(73)

十七画

鍾馗草(131)
蠟姑(13)
蕒菜(108)

槐樓星(112)

十八画

檳榔蕒(76)
薺菜(165)
鵝掌柴(164)
鵝不食(167)

十九画

蟾蜍(171)
鵝糖梅(47)
螞蟥(171)

二十画

稻稻根(174)

二十一画

縮蝦蟆(171)
鵝骨草(175)
鵝屎藤(177)

鵝屎果(123)

二十三画

蘿卜(180)

二十四画

鷹不泊(182)
鰾腸(70)