A-PDF MERGER DEMO

脚氣鈎要目錄

上卷

總論……一
原因……三
腫滿……四
麻痺……五
候脈……五
候膻中……七
診法……七
治法……八
補瀉……九
食戒……九
外因……一〇
烏頭湯……一一
麻黃加朮湯……一二
桂枝芍藥知母湯……一二
六物附子湯……一三
鐵甲湯……一三

內因

蠶石湯……一三
木防己湯……一四
吳茱萸湯……一五
十棗湯三花神祐丸……一五
越婢加朮湯……一六
小半夏湯……一七
唐侍中瘰脚氣方……一七
文仲瘰脚氣方……一八
廣濟瘰脚氣方……一八
茱萸湯……一九
崔氏瘰脚氣方……一九
犀角梔子花湯……一九
降氣湯……二〇
紫蘇子湯……二〇
沉香降氣湯……二一
小柴胡湯……二一

杉木湯……二二
風引湯……二二
靈砂……二三
紫雪……二三
養正丹……二四
崔氏八味丸……二六
千金一方……二七
蘇恭防己湯……二七
烏苓通氣湯……二七
三和散……二七
澤漆湯……二八
實脾散……二八
導水茯苓湯……二九
主脚氣大便澁方……二九
紅豆煎……二九
起廢湯……二九
鐵砂丸……二九
高蜜丸……二九
化毒丸……二〇
針灸……二一
千金灸穴……二一
外臺灸穴……二一
備案七則……二二
卷下
藥能……二七
石膏……二八
人蔘……二九
地黄……四一
大黄……四二
附子……四二
牛膝……四四
朮……四四
芍藥……四五
薏苡仁……四五
橘皮……四六
厚朴……四六
防己……四六

併病

枳實……四七
茯苓……四八
麻黃……四八
木瓜……五〇
吳茱萸……五〇
沉香……五〇
檳榔子……五一
大腹皮……五一
牽牛子……五一
半夏……五二
蘇……五二
桂枝……五二
犀角……五三
甘遂……五三
大戟……五四
芎藭……五四
木香……五四
鼠黃……五五
香附子……五五
縮砂……五五
烏藥……五六
郁李仁……五六
獨活……五六
桑白皮……五七
杏仁……五七
柴胡……五七
黃耆……五八
鐵……五八
旋覆花……五八
羚羊角……五九
巴豆……五九

脚氣鉤要卷上

上毛　今邨亮祗卿甫著

總論

脚氣之病。創見于宋齊梁隋之世。而諸家所論。或爲風毒。或爲濕痺。或緩風。或脚氣。或厥。或瘟。詳其治法者。雖莫孫王二氏如焉。猶無有定論矣。所謂千方易得。一効難求。得其要。則一方可治百病。不得其要。則百方不可治一病。雖多亦何益。蓋此病者。一種之水毒。地氣所生。而非風寒暑濕所干涉。其發必始於夏。終於秋。希有涉冬矣。予嘗謂。暑月陽氣泄外。伏陰在內。運輸不健。水道不利之所致。而原其所由。則有從外因而來者。有從內因而致者。有與諸病併發者。驗之於患者。大抵由內因者。十之八九。由外因者。十之二三。與諸病併發者。十之五六。夫王侯貴官。出則肥馬華轎。入則高堂大廈。未嘗履地。其多患此病者。無他。膏腴過分。酒食越度。因以致之。是生於內因者也。田夫奴隸。負重涉遠。冒雨蹈埠。坐臥濕地而得之。是發於外因者也。傷寒中風。鼓脹瘧痢。寒疝黴毒。娩產之後。皆嬰此患。是與諸病併發者也。然而症有緩急。質有堅脆。不可執一而論焉。浮腫見于外者。比之於不見者。其毒較輕。千金方曰。脚不得一向以腫爲候。亦有腫者。

有不腫者。其小腹頑痺不仁者。脚多不腫。三五日令人嘔吐者。名脚氣入心。死在旦夕。水毒發于外者。尙延日。然至冲心則無異矣。又曰。食飲嬉戲氣力如故。唯卒起脚。屈弱不能動。又曰。脚氣未覺異。而頭項臂膊。已有所苦。有諸處皆悉未知。而心腹五內已有所困。風毒之中人也。或見食嘔吐。憎聞食臭。或有腹痛下利。或大小便秘澁不通。或胸中衝悸。不欲見光明。或身體冷。痰煩發班蚊迹。以此相貌。須認陰陽經來路。又曰精神昏憒。或喜迷妄。語言錯亂。或壯熱頭痛。或身體酷冷痰煩。或覺轉筋。或脚脛腫。或不腫。或脛腿頑痺。或緩縱不隨。或百節攣急。或小腹不仁。此皆脚氣狀貌也。又曰。風毒脚氣之候也。其候難知。當須細意察之。不爾必失其機要。一朝病成。難可以理。以予視之。是徒論派症。而似遺源本。雖症有數候。其要在於呼吸小便之何如耳。呼吸促迫。則毒侵心之兆。小便赤澁。則毒蓄之內。而漸加之。自汗嘔吐。肩息氣逆。其死不旋踵矣。內經曰。治病求於本。又曰。治之極於一。余家治之。以利水爲急。夫人之水氣滲出腸胃。留潴膀胱。下出爲溺。此其常也。今患者失常。欲利所畜之水氣。自非嚴禁鹽味。猛制膏粱。服藥無效矣。腸胃分泌水穀。譬如漉濁水。桶底穿穴。從宜納砂乎其中。則水瀝瀝而出。若使砂盛滿。則水道壅塞而不出。是同一理。不禁鹽膏。則猶納砂盛滿矣。乃治此病。初不問其由。嚴禁滋味鹽氣。使之嚼紅豆碎

麥。乃淡薄之品。而後對症施治。取效極易。是舍其見症。而極於一求於本之典訓也。症重者。固勿論。雖輕者。非飲食。戒帷房。節行步。愼喜怒。而灸腰脚。是其大較也。楊大受曰。脚氣壅疾也。用宣通之劑。王德膚曰。無補法。有利性。勿漫用補藥。是醫之大禁。二子者。可謂有所見。然猶未爲得深詣。凡用峻藥行瀉下。病勢雖摧。元氣從損。元氣從損。則雖病不增進。而羸然遂至死者。比比有焉。此皆駛藥攻伐所使然也。許仁則論乾濕。蘇長史五種。王宇泰屬肺。張戴人吐法。羅天益地勢。張景岳內外因之說。各不無自出機杼發揮妙理者。然長短得失互有之。要不過於欲衒己說。詩張偏見耳。聖惠聖濟。頗勝於諸子。而亦拘泥繁瑣。後世醫人。眩惑名義。而不尋討本源。徒因襲踐迹。不通活法。抑可嘆矣。

原因

脚氣之爲恙。係水毒之所爲。其毒慓悍猛烈。外之則瘴癘不仁。內之則嘔吐衝心。侵入血隧。壅塞水道。斃人於數日之間。其猛可畏矣。蓋水性潤下。濕就于卑。自然之理也。故支法存仰道人輩。見其自下起。而上衝心胸。遂下脚氣之名焉。蓋永嘉喪亂。公卿徒跣跋涉。侵江南之蒸氣。不習水土。飲食亦異。脆弱之質。爲脚弱爲腫滿。比比相斃。支仰之徒。留心經方。偏善治術。晉室仕望。多獲全濟。不唯功于當時。令後人倚賴。孫氏亦有瘴毒之說。

蓋嶺南瘴烟卑濕之地。炎蒸毒霧不可行。感之則病。此不過表其所起之地。今不限南北。不分都鄙。所在皆行。則不止地氣卑濕瘴炎毒霧所致。而人身所自招可知矣。余漫遊諸州。熟視此病。江戶最多。京師浪華次之。餘陬地方希見。是似病從都鄙爲之差。而其實則出於都人飽昇平之澤。而游惰縱慾焉。貴人固也。下至賈豎。輕煖薰身。雉膏染唇。倦於淫樂。困乎過飲。精神爲之虛。形體爲之萎。釀一種之水毒於陽氣外泄之間。此其本源也。故嘔吐腫滿衝心氣逆。其候可以推其毒矣。乃觀其斃者。非死于脚氣而死於水毒。寥亦非脚氣之愈。而生於水毒之除。使毒遏住於脚部。而不奔騰於心胸。則豈見暴死之患哉。蓋水毒者本。而脚氣者標也。爲醫者。通此理而救之。則守禦馳驅之策。可運諸掌上矣。

腫滿

毒見于外者。其病屬輕。然水氣充于內。而溢于外。則亦有暴速之變。所謂濕脚氣是也。須預慮焉矣。其毒莫不內外貫通。表裏環會。與水腫病之引日彌月者。迥異焉。治方倣治水之例。非所及也。泛然事利水。腫雖消。毒仍滯。遂有衝突丹府之變。比比所目擊也。拘泥水腫。而不審水毒之因。何如決流。或決之。津液枯涸。不能回生也。鑒之之要。在於胸動呼吸小便。此三者須細察之。古人事於內者顧外。事於外者顧內。不辨之於始。症輕者亦

難復陽。醫審此治之。如禹之行水。莫有不救者矣。

麻痺

水毒有壅塞表氣。使血氣不宣通者。謂之麻痺。所謂乾脚。氣是也。至其甚者。搔皮膚如隔衣。謂之不仁。有機關緩縱。筋絡弛解。不能收攝者。謂之攣曳。又血氣相搏疼痛者。屈弱不能起者。轉筋攣急者。雖證候有等。並係水毒所爲。今驗之患者。脚弱而麻痺強者。多不爲腫。小便不利者。雖發腫氣無有及週身。足脛大腫者。麻痺及少腹少。麻痺強者。腫氣必少。其脈滯緩。皮膚枯瘦者。亦屬輕症。脈沉而實者。則水道閉塞。而其腫塡滿一身。是其初起。辨痺與腫之大較也。又有麻痺漸逆。入少腹。過膻中迫心肺者。其脈必數急。動氣奔騰。嘔吐不止。呼吸短息。肩息煩悶。是沖心之兆。死在旦夕。不可一刻失治也。

候脈

脈者。醫門之法律。淺深緩急係焉。安危存亡判焉。不可不最詳也。夫血之在于心臟。出者爲經。入者爲絡。人身中血氣所注。經脈所輸。外則皮毛肌肉。內則藏府關節。凡腠理之所通會。猶張網羅。會合環回。上下來往。自有生之初。至衰老之終。晝夜運行。無有間斷。神氣雖睡。血氣無睡。是肺藏開闔之機所然也。乃人身有病。則經脈不順利。或沸騰。或凝泣。或緩或急。或

實或虛。必徵諸脈行而知焉。古來診脈者。專於薄肉處候之。曰三部。曰扶陽。曰人迎。按方寸之地。切微末之動。而決生死者。似近誣。然古人往往百不失一。何也。人之所以生。因飲食。其要以胃氣爲本也。素問云。平人之常氣。稟於胃。胃者人之常氣也。人無胃氣曰逆。逆者死。蓋脈者。血之體而氣之用也。活潑流動。得中土之精英。得者生。失者死。故氣之盛者。血行疾而脈強大。氣之衰者。血行遲而脈弱小。是故生機熄。則脈亦絕矣。是所以胃爲原也。中藏經曰。脚氣之病。傳於心腎。則十死不治。入心則恍惚忘謬。嘔吐食不入。眠不安。口眼不定。左手寸脈。乍大乍小。乍有乍無者是也。入腎則腰脚俱腫。小便不通。呻吟不絕。目額皆見黑色。氣時上衝胸腹而喘。其左右尺中脈絕者是也。又千金舉三品之脈。曰病人脈浮大而緊駛。此是三品之最惡脈。或沉細而駛者。此脈正與浮大緊者。同是惡脈。浮大者。病在外。沉細者。病在內。治亦不異。當消息以意耳。外臺引蘇長史曰。脚氣脈三種。以緩脈爲輕。沉緊爲次。洪數者爲下。自三十年。凡見得此病者數百。脈沉緊多死。洪數者並生。緩者不療自差。余亦屢驗之。脚氣不論乾濕。緩爲吉。急爲凶。短促爲險。沉伏爲死。須量人之少長肥瘠。與病之緩急劇易而救療之。至生死存亡之機。應手得心。不可筆以傳。不可言以說。存之於其人。

候膻中

人身中。莫不有動氣。而動氣亦察病之一端。獨於腳氣。動氣之候居重矣。夫心與肺互相應。心以出納血脈。肺以橐籥呼吸。俱係至貴之地。水毒衝之。生機即絕矣。膻中者。經血二脈之大幹。出自心藏。而達週身之本。乃候膻中者。察血之本也。診手足者。候血之標也。標本相照。源委互參。決死生判劇易。莫切於此矣。夫水毒潛匿心胸。阻閉血隧。則血往而無所還。逆行而逼心。值此之際。動跳築築然。見于膻中。譬猶奔泉之激石。洪流之觸洲。水怒浪翻。所以水之迫心胸。可徵矣。又方其初起。有忽然見跳動者。是尤急候。其禍不可測。又雖有短息嘔吐心胸煩悶等惡候悉備焉。而膻中無動者。必無冲心之虞。宜甄別之。而決死生於其初矣。

診法

水毒之發。衝心者爲必死矣。不論腫不腫也。而衝心之驗。醫非逆察而處之。則何得救。譬陰雲密布。而雨漸來。人預知之。晴天忽變。風雨驟至。非候天氣者。不能預察之。察衝心之候。專在動氣。動氣得于手。而應于心。則死生判于一診。是我門之眞訣。動築自膻中上雲門。騰驤有勢。而氣息促迫者。其死不旋踵。小便短少。煩渴滿悶者。水毒伏于內之候。遂至衝心。心下暴悶。氣逆嘔吐不止者危候。言語聲氣不足者凶候。項頸或手足。或胸間。

突然發腫氣者。可甚怖之候。腫氣不滿遍身。而聚于一偏者。爲水毒凝結。衝心之候。小便赤澁。大便溏泄者。屬不治。服利水劑。小便雖通。腫滿不減者。亦不治。指頭及口鼻氣冷者死候。腫氣堅者難治。軟者易治。堅者肉間之水也。軟者皮下之水也。是診法之大較。如其蘊奧。則不易縷述焉。

治法

病因有三道。如前所說。須子細尋來路。自外因者。宜發泄表氣之劑。自內因者。宜開洩壅滯之劑。與諸病併發者。宜隨證之主客。而斟酌療之。是其大概也。來路雖異。末節一歸于奔騰。小便秘澁者。胃元失權也。宜從事淡滲。下脘衰憊者。專從滋補水毒不泄。勢必衝突。宜瓜萊檳朴之類。至煩悶嘔吐上氣沖心。則非靈鐵鎮墜之方。不能奏偉勳於頃刻之間。揚大受云。脚氣之疾。自古尚疏下。爲壅疾故也。然不可太過。太過則損脾胃。使運營之氣。不能上行。反下注爲脚弱。又不可不及。不及則使壅氣不能消散。要之體質之強弱。病勢之劇易。水毒之寬猛。尤宜甄別而施治。不明此理而求速效。則補其所不當補。攻其所不當攻。參差錯亂。不能奏效。故雖良方用之不中。則反致害。甄別之診。其可忽哉。古謂藥不貴執方。而貴合宜。方即兵家之法略。匠氏之規矩也。法可以授人。而不能使之必取勝。矩可以授人。而不能使之必取巧。運用之妙。存于其人矣。

補瀉

補瀉者。治療之大綱。死生之所繫。最不可苟且鹵莽也。蓋脚氣之爲患。係精虛邪實之症。瀉之則速死。補之則促命。二者不可行之。其故何。蓋水毒不在腸胃。在于膜外。而混淆血脈。環迴百體。終上騰于心肺。其候爲胸脇滿悶。下氣喘急。嘔吐中心。若誤下之。一旦雖減其勢。反激生卒然不測之變。治之。惟當以漸分泄水毒。輸之尿道。其意與水腫忌下藥正同。夫尿者。膀胱之津液。血之所化也。故尿之通塞。必徵之於氣血之流動。昧者不達此理。孟浪貪效。妄施攻擊。不止害胃氣。速其死更急。若誤補之。水毒愈鬱。經脈愈閉。胸脇脹滿。心煩嘔逆。助上奔之勢。蹙命期。古人以爲難疾。雖補瀉殊途。其害性命者則同焉。難經有虛虛實實之戒。亦以此爾。故漫用補瀉。不至殺人者。雖有寡焉。千金方說補瀉甚簡。聖惠方敷演爲說。頗爲精確。錄備參攷。曰夫脚氣病者。雖虛羸。不可多服補藥。補藥令人心腹脹氣實便死。非瀉不瘥。又不可見虛而不瀉也。見氣實而死者甚衆。十中無一人服藥致虛而殂者。縱甚羸。亦須微微通泄。亦宜時取汗也。其有太虛者。微用補藥助之。

食戒

人之所以生。因飲食。滋養身體。以餌爲主。然此病禁粱肉滋味。不可不最

嚴也。其故何也。膏粱者。其性油膩。平時多喫。猶膠滯血液。沮其宣布。況其嬰病。藥力難達。斃命必矣。病者能守禁忌。斷平無有不效之藥。嚴斷膏滋。澹泊攝養。古來以爲良策。其可喫者。不過紅豆薏苡平澹滲通之品。患者犯戒。責效於草根樹皮則非也。凡人好食膏滋。不能中土爲之分佈。腸胃阜敦。身體肉脹。是以豪家多病。而華門少患。王公貴人。身無操作之勞。體有暖飽之佚。不唯華屋之宴安。更擁衽席之翠珠。頤養過厚。體力軟脆。以故患脚氣水腫者。十居七八。藜藿之家。則喫蔬取勞。以堅筋骨。以運氣血。病之難犯。不外於此也。東坡蔬食三益之說有云。寬胃以養氣。病家能曉此理。省膏滋。而服藥石。何憂其不瘳。此不特療脚氣。戒之平平生。則攝生保壽必可期矣。

外因

外因。得之於侵雨涉水。或坐臥濕地。或勞勩中風。或飢飽不時。若大兵之後。若凶歉之時。蓋係壅塞表氣。凝滯氣血之所致也。靈樞曰。虛邪不能獨傷人。必因身形之虛而客之。正謂之也。蓋氣血者。如車輪。邪或乘之。心者血之主。肺者氣之主。氣主噓之。血主濡之。灌溉筋脈。升降有常。自然運行。今邪犯肌肉。是以水血否澁。而鬱蓄成毒。內則浸漬藏府。外則流溢皮膚。古謂之緩風。又謂之濕痺。謂之脚氣。其狀貌有麻痺不仁

者。有攣筋疼痛者。有心腹脹急者。有寒熱煩渴者。有小便短少者。有驚悸迷亂者。有足脛浮腫者。其末路。遂並歸于衝心。然較之乎由內者。其勢稍緩。治法皆取之於發泄表氣運動水血之劑。風濕血痺。雖稍異其因。至其情機。則同焉。是所以須桂麻朮附之品也。

史載脚腫。今拈出證由外因者。梁武帝大通三年。侯景圍建康。閉城之日。男女十餘萬。擐甲者二萬人。被圍既久。人多身腫氣急。死者什八九。隋煬帝大業元年劉方征林邑。士卒腫足。死者什四五。後梁紀。會陰雨積旬。黃澤道險。堇泥深尺餘。士卒援藤葛而進。皆腹疾足腫。死者什二三。醫宗金鑑。載青腿牙疳門。北路隨營醫官陶起麟。言其治法。內地人。初居邊外。得此症。十居八九。蓋中國人。不耐邊外嚴寒。更坐臥濕地。致腿青腫。內體頑硬。步履艱難。又緣缺少五穀。多食牛羊等肉。胃火上熏致下疳。按如此症。古所未聞。思亦後世。因地氣寒濕。發此種毒。因想方今江戶士人。多充北營。恐亦嬰此患。庶幾令其士醫人預慮治方。

烏頭湯（金匱）治脚氣疼痛。不可屈伸。

麻黃　甘草　川烏　黃耆　芍藥

右五味。內蜜煎中。更煎之。　案。此方用之於外因脚氣。閉塞表氣者。治

關節疼痛。肌肉頑痺。君以麻黃通表氣。開痺着。臣以芍藥。緩和筋絡。黃耆逐水固表。助以烏頭雄烈。驅寒燥濕。且甘蜜之和潤。可濡血養液。五味相合。其勢翕翕。行於肌肉關節之間。如此而外之凝滯者行。內之冷結者去。是長沙化工之妙手。

麻黃加朮湯金匱 濕家身煩疼。發其汗爲宜。

麻黃　杏仁　桂枝　甘草　朮

右五味。　案。此方表氣壅滯。血凝氣阻。不快於運行。故麻桂以達表。杏朮以逐水。綢繆失治。必變浮腫。至壅滯較深者。則可用麻黃杏仁薏苡甘草湯。

桂枝芍藥知母湯金匱 諸肢節疼痛。身體尪羸。脚腫如脫。頭眩短氣。溫溫欲吐。

桂枝　芍藥　甘草　麻黃　生薑　知母　朮　防風　附子

右九味。　案。此方治歷節之劑。今用之脚氣。能治痛痺轉筋不仁。蓋人之氣血。得溫則流動。遇寒則凝沍。經盜于肌肉。攔阻表氣。是以桂麻防風之辛燥。開表行氣。知芍戮力。調和血液。於其間加附子。走偏邪於經隧中。助桂麻爲驅逐。朮能祛表裏之水。薑以其辛溫。使諸藥宜行也。名

護屋丹水曰。今脚氣痛風。及鶴膝風。治之用獨活寄生湯。當歸拈痛湯劑。其效力甚鈍。誰知之用之耶。嗚呼。當時醫道未闢。丹水發此言。可謂卓識矣。

六物附子湯 三因方 寒濕脚氣。疼痛不仁。兩尺脈來沉細者。

附子　桂枝　防己　朮　茯苓　甘草

右六味。　案。此方即仲景甘草附子湯。加防己茯苓者。孫氏四物附子湯。方後云。體腫者。加防己。悸氣小便不利者。加茯苓。七味附子湯。方後云。濕痺緩風。身體疼痛。欲折肉。如錐刺。濕緩異名。其爲脚氣則一也。陳氏概謂之痺症。

蠲痺湯 楊氏家藏方 治風濕相搏。身體煩疼。項臂痛重。舉動艱難。及手足冷痺。腰腿沉重。筋脈無力。

當歸　羌活　薑黃　芍藥　黃耆　防風

甘草

右七味。入薑棗。　案。此方治痛痺之奏法也。歸黃能入血分。和經除。羌防耆薑。逐水氣。斂肌表。芍甘緩筋絡。利關節。衆味湊合。通暢血氣。羈持經絡。或加附子薏苡。其力更捷。

礬石湯 金匱 治脚氣衝心。

案此方渫脚之法也。以其出金匱。姑附于斯。然非仲景原方。千金論脚氣云。魏周之代。無此疾。出後世。可以證矣。脚氣涉日者。間有效。屬衝心者。實非此方所及也。

内因

此病近世所行者。係一種水毒。其毒酷厲峻烈。淫血脈。則爲麻痺痿弱。盜水道。則爲尿少浮腫。下注則膝脚不仁。上奔則冲心悶絶。與淡飲之水。迥然不同。如淡飲。其氣滲澹。縱爲腐敗。不過胸痛嘈雜惡心嘔吐心痛腹滿下利憒憒悶悶等症。至死亡者。斷無而僅有焉。水毒則甚峻。請詳論之。蓋昇平日久。人人遊惰。奉身飽煖。處形安逸。加之膏腴過分。房闈越節。自耗其元氣。元氣已耗。則脾胃不健。氣血不行。因釀一種之水毒焉。抑情慾成病居多。豈止脚氣。不可不猛戒也。男子春心未動。女子情竇未開。並不覩發脚氣。老人還童。慾念既斷者亦復然。則可以證其由内因者。而其證屬重。亦可徵焉。蓋其水從腸胃。直趨膜外。内而臟腑。外而經絡。凡衝脈所行之地。無處不到。駸駸乎將迫心藏。心藏爲之沸戾激拒。發見于胸間。謂之心跳。至其劇。毒氣貫心。悶絶卽斃。謂之衝心。近日所見。愈多愈重。可知天下之病。隨時隨地。變化無窮。乃自非照氣化之厚薄。察時世之體性。而知病不必出于天。人人自招之。何以治之。

墨守古人之成法。治今之脚氣。所謂膠柱刻舟。不能爲用也。要之須先知古人立方之意而處變。妄自處方。亦我所不取也。

木防己湯 金匱 膈間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黧黑。其脈沉緊。得之數十日。醫吐下之不愈。木防己湯主之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。木防己去石㽲。加茯苓芒硝湯。

木防己　石膏　桂枝　人蔘

右四味。　案。水毒奔騰于上。呼吸息迫。胸膈滿悶。心下石鞕。煩渴喘急。動氣如獺。是爲衝心之兆。須用此急救矣。防桂並能行水散結。石膏清熱。人蔘滋液。其虛者。外雖痞堅。內無結聚。水去氣行而愈。其實者。復聚。仍依前方。減石膏。加芒硝之鹹寒。峻開鬱塞。以茯苓之滲利。直輸之水道。未有不愈者。吁。配合之妙。非後世所及也。

吳茱萸湯 傷寒論 食穀欲嘔者。吐利手足厥冷。煩躁欲死者。嘔而胸滿者。乾嘔吐涎沫。頭痛者。

吳茱萸　人蔘　大棗　生薑

右四味　按。脚氣嘔吐。率屬危險。不可輕視。其變起于不虞。檢之於古經。長沙治嘔吐之方。不過十四方。其中雖有兼寒兼熱夾食夾蚘數症。大要不出於驅逐水飲之劑。當水毒冲心之時。無有抗其勢者。獨此方

直入奏功。嗚呼偉矣。然須察勢之劇易。症之慢緊。而審可爲之機。且勿擬定一方。

十棗湯傷寒論千金同外臺聖濟宣明論丹溪心法分量互有異同

芫花　甘遂　大戟

右三味爲散。煮大棗。去滓內藥末。服之。　案。此方利水飲之猛劑。深師所謂朱雀湯是也。脚氣上入胸痛煩悶。喘息自汗。氣欲斷。非此方不能抵當其勢。如逡巡失治。則禍在反掌。不可嫌其峻。坐待斃也。槩施攻擊之法。無不危矣。醫者不察于此。急於獲效。病者喜利藥。求通快。不知暫時取快。眞氣愈傷。去死不遠也。亦不哀哉。但其機可以言傳。非筆之所及。臨處之際。須仔細甄別。尤審之。徐彬曰。甘遂性苦寒。能瀉經隧水濕。而性更迅速。大戟性苦辛寒。能瀉臟腑之水濕。而爲控涎之主。芫花性苦溫。能破水飲窠囊。故曰破癖。須用芫花。合大棗者。大戟得棗。即不損脾也。

三花神祐丸宣明論　治一切水濕腫滿。

甘遂　大戟　芫花各等分　牽牛二兩　大黃一兩　輕粉一錢

右六味爲丸。溫水下。至快利。病去爲度。　按。儒門事親。載神祐丸。無輕粉。玉機微義。作宣明三花神祐丸。此方當以劉氏爲祖。蓋此方及舟車

丸。皆自十棗湯。而變化之者。

越婢加朮湯金匱 裏水者。一身面目黃腫。其脈沉。小便不利。裏水主之。

麻黃　石膏　大棗　甘草　生薑　朮

右六味　按。微寒熱。舌上有苔而渴。小便不利。脚弱腫滿。是此方之正候也。又案。金匱裏水越婢湯主之。外臺引古今錄驗。作皮水。於義似穩。然如皮水。當以甘草麻黃湯爲正對。蓋人身之於血氣。莫所不貫通環會。固不可論表裏內外也。蓋麻石同隊。則行水驅飲。其力稍勝。麻杏甘石湯。越婢加半夏湯。厚朴麻黃湯。小青龍湯。雖各有所主。至其逐水之功則同矣。要在臨病之際。隨其淺深。而斟酌之耳。又案。千金脚氣門所載。越婢加朮湯。加附子。外臺亦同。蓋從胡洽方也。此方加附子。其功更峻。用流走之性。逐週身之水。猶川有堤防。水由地中行矣。爲醫者。玩索方意。運用得宜。亦如禹之行水。聖惠方。麻黃散。治風水遍身腫滿。骨節疼痠。惡風脚弱。皮膚不仁。卽本方加甘草防己桑根。

小半夏湯外臺 文仲療脚氣入心悶絕欲死

半夏　生薑

右二味。　愚常用此湯。吐仍不止者。加鐵砂。屢取功。趙以德曰。半夏之味辛。其性燥。辛可散結。燥可勝濕。用生薑。以利其悍。孫眞人云。生薑嘔

家之聖藥。嘔爲氣逆不散。故用生薑散之。

唐侍中療苦脚氣攻心。此方甚散腫氣。極驗。外臺

大槟榔　生薑　橘皮　吳茱萸　紫蘇　木瓜

右六味。　案。此方爲治脚氣正對之方。驅逐水毒。渙散鬱塞。槟榔能分泌水血。導之尿道。木瓜能滲入血液。收斂汗濁。茱萸溫中降氣。蘇橘芬香行氣。衆味合力爲功。實爲溫利水毒之良方。推其立方之意。則亦足以知脚氣所起之理。散腫氣極驗五字。方中骨子。豈可不深味乎。案此方後人增減頗多。今牽聯。錄之左方。

蘇恭尋常氣滿。三日兩日服一劑湯。於本方。去紫蘇木瓜。加厚朴。又蘇恭腫滿小便少者。紫蘇湯。於本方。去吳茱萸木瓜。加甘草。又許仁則曰。但覺脚腫疼悶沉重。有時緩弱。乍衝心腹滿悶。小腹下不仁。有時急痛。吳茱萸湯。於本方。去木瓜。加桂心。聖惠。治脚氣心腹脹滿。煩悶喘息。槟榔散。於本方。去吳茱。加猪苓桑根白皮。朱氏集驗。加桔梗。名鷄鳴散。治脚氣第一隻藥。不問男女。皆可服。

文仲脚氣冷毒悶。心下堅。背膊痛。上氣欲死者。外臺

吳茱萸　槟榔　木香　犀角　半夏　生薑

右六味。　案。此證有瘀血。與水毒相結。聚心下。迫背膊。故方中伍犀角。

方下云冷毒。方後云破毒氣尤良。立方之意可推知矣。

廣濟療脚氣急上衝。心悶欲死者方。外臺

檳榔子　生薑　童子小便

右三味。攪頓服。須臾即氣退。　案。人尿性溫味鹹。又主收斂。降逆氣。傷寒論用之於下利不止。厥逆無脈者。褚氏遺書。用諸款血殺人之症。

茱萸湯。藝長史方千金治脚氣入腹。困悶欲死。腹脹方。

吳茱萸　木瓜

右二味。進一服。或吐或汗。或大熱悶即差。此起死人方。　按。至脚氣冲心。無藥可療。只此二味。較之諸湯。其效尤峻。足以奏功乎。燃眉之際。千金贊之云。此起死回生之方也。殆不誣矣。外臺毒氣攻心。手足脈絕。此亦難濟。不得已作此湯。十愈七八。於本方。加青木香犀角。聖惠治脚氣衝心。悶亂不識人。手足脈欲絕。於本方。加檳榔生薑。三因茱萸圓等分爲末。酒糊丸。即本方。

崔氏療脚氣遍身腫方。外臺

大豆　桑根白皮　檳榔　茯苓

右四味。　案。此方滲利之良劑。治遍身洪腫。煩悸殊甚者。愚每以水四合。先煮黑豆貳兩。減二合。內諸藥及郁李去殼一錢。取一合。日三劑。今

加郁李仁。據聖濟。

犀角旋覆花湯千金　脚氣之病。先起嶺南。稍來江東。得之無漸。或微覺疼痺。或兩脛腫滿。或行起澁弱。或上入腹不仁。或時冷熱。小便秘澁。喘息氣衝喉。氣急欲死。食噎不下。氣上逆者

犀角　旋覆花　橘皮　茯苓　生薑　大棗　香豉　紫蘇莖葉

右八味服之。以氣下小便利爲度。崔氏名小犀角湯。如其不下。服後大犀角湯。即本方。加白朮桂心防己黃芩前胡桑白皮。

降氣湯元和紀用經　定上氣息鳴卒喘。便欲絕者。入口氣下。萬金不傳。

吳茱萸　桑白皮

右㕮咀。分四處。每一。以水二升酒一升。煮三沸取清汁。作三服立驗。每煮成。入生薑汁一匙匕。煮一沸爲準。自神龍致仕孟伊陽傳云。用無不效。　案。醫心方引葛氏方。生薑同煮。不用汁。並無方名。又萬安方。引可用方降氣湯。治氣虛喘促。及大病後虛喘。於本方。加五味子。蓋降氣之名。以元和紀用爲藍本。和田泰純。於此方中。加犀角茯苓。名豁胸湯。專治脚氣上冲欲死者。又合之於沉香降氣湯。治心下急迫尤甚者。曾聞泰純長于診候。決死生於一視。蓋踵事刓精之所得也。然如其藥方。率

屬浮泛。難以爲準。獨此方不失古意。其力最峻。可以奏功於切迫之際。

紫蘇子湯千金方 治脚弱上氣。昔宋湘東王在南州。患脚氣困篤。服此湯大得力。

紫蘇子　半夏　前胡　厚朴　甘草　當歸

橘皮　大棗　生薑　桂心

右十味。　案。脚氣痰喘上氣者。宜此方。方下云。困篤服此湯。今試之。此方不能敵困篤。古人之言。不可悉信也。局方易簡方。名之曰蘇子降氣湯。

沉香降氣湯局方 患脚氣人。毒氣上衝。心腸堅滿。肢體浮腫者。尤宜服之。

沉香　香附子　甘草　縮砂

右四味。鹽少許。沸湯點服。　案。此劑皆辛溫。解鬱開壅。下氣散滯。故能治脚氣迫于心胸者。蓋此三方。其旨趣相均。緩急稍異。要在臨床之際。隨其劇易處置之耳。

小柴胡湯傷寒論 治脚氣胸脇痞塞。寒熱如瘧者。

柴胡　黃芩　半夏　大棗　人蔘　甘草

生薑

右七味。　按。本方加常山。更覺有驗。千金常山甘草湯。可併攻。

杉木湯（證類本草本事方今據醫臺軌範）唐柳柳州云。元和十二年二月。得脚氣。夜半痞絕。脇有塊。大如石。且死。困塞不知人三日。滎陽鄭洵美杉木湯。服半日。食頃大小便三次。氣通塊散。

杉木節（一大升）　橘葉（一升無葉以皮代之）　大腹檳榔（七個合子碎之）　童子小便（三大升）

共煮一升半。分二服。若一服得快利。停後服。　案此煎法不明。恐有脫字。愚以意酌量。吳崐曰。杉木節質重而氣芳。質重則能達下。氣芳則能疏壅。橘皮味苦而厚。過于青皮。檳榔質實而重。等於鐵石。味厚則泄。質重則降。故能令邪氣大下。童便鹹寒物也。鹹則能引邪氣。以走濁陰。寒則能平熱氣。使不上逆。活人書。檳榔散。即此方變方。余嘗驗杉木。肉色紅者。爲油杉。堪用。白色者無效。

風引湯（金匱）巢氏云。脚氣宜風引湯。

大黃　乾薑　龍骨（各四兩）　桂枝（三兩）　甘草　牡蠣（各二兩）
寒水石　滑石　赤石脂　白石脂　紫石英
石膏（各六兩）

右十二味。杵粗篩。以韋囊盛之。取三指撮。井花水三升。煮三沸。溫服一升。徐靈胎曰。此乃臟腑之熱。非草木之品所能散。故以金石重藥。清其裏。

靈砂方法上盛下虛。痰涎壅盛。最能鎮墜。升降陰陽。和五臟。

水銀一斤　硫黃四兩

右二味。用新鐵銚。炒成砂子。或有烟焰。即以醋洒。候研細。入水火鼎。醋調赤石脂。封口。鐵線扎縛。煞乾。鹽泥固濟。用炭二十斤。煅如鼎子。烈筆醮赤石脂。頻抹其處。火盡爲度。經宿取出。研爲細末。糊爲丸。如麻子大。每服三丸。空心棗湯。米飲。并花水。人薄湯任下。量病輕重。增至五七丸。

案。此鎮墜之要藥。脚氣嘔吐。或上冲。或動氣甚者。皆用之。有殊驗。東坡有靈砂說。文繁不錄。宜閱。

附

凡嘔吐不納藥者。最難救療。藥入即吐。安能見功。胃口愈逆愈翻。萬難處分。記安政戊午。自夏涉秋。暴瀉流行。其症洞瀉傾盆。須臾發嘔吐。上翻下出。急者一二時。緩者一二日。脈絕即斃。時師以其不納。種種怪藥。強灌之。而一吐傾囊。束手俟死。愚偶閱幼幼集成。載靈砂止嘔治驗。因試之多得功。其法做局方丸靈砂。如梧子大。初服三丸。次服五丸。久之服十丸。冷水送下。胃口已安。候不復吐。始用對症之藥。脫人於困厄不少。眞扶危濟死之神丹也。

紫雪　崔氏療脚氣。毒遍內外。煩熱口中生瘡者方。活人書曰。大煩躁者。紫雪最良。　案。千金翼與外臺分量不同。局方全據千金翼。蘭臺軌範。

減二消。用十分之一。黃金百兩。以飛金一萬頁代之。吾師家據外臺。擬定劑量。精核的當。屢得偉功。因錄告後學。

黃金煮汁六合　寒水石　石膏　滑石　磁石各六錢六分三厘五毛四絲

右五味以水一升五合。煮取六合。

玄參　升麻各二錢二分一厘一毛八絲　鈴羊角　犀角　沉香

木香各六分九厘一毛二絲　丁子一錢三分八厘二毛四絲　甘草一錢一分五毛九絲

右八味八錢四分三厘四毛八絲　以前煮汁合一升二合　煮取四合五勺入消石一合二勺　芒消二錢一分一厘八毛四絲

右煎欲凝。入朱砂四分六厘八絲　麝香一分七厘二毛八絲　攪調令勻。磁器收藏。藥成霜雪紫色。水調下。外臺。又曰服紫雪。強人一服二分。弱者一服一分。和水服。當利熱毒。　按此方。藥品太雜。似無法度。用之傷寒中風驚癇脚氣等。其功殆不可言。蓋除祛熱毒。鼓盪神氣。要清涼之劑。非此方。不能達大症。信醫家必備之藥也。

養正丹局方　療元氣虛虧。陰邪交蕩。正氣乖常。上盛下虛。氣不升降。呼吸不足。頭旋氣短。及中風涎潮。不省人事。陽氣欲脫。

水銀　硫黃研細　朱砂研細　黑錫去鉛枰與水銀結砂各一用

右四味。火上鎔黑鉛成汁。次下水銀。以柳杖攪。

少。

攪令稀見壁子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如助元氣之候冷取出研如粉極細用糯米粉煮糊爲丸如菉豆大每服二拾粒加至三十粒鹽湯下此藥升降陰陽既濟心腎空心食前棗湯送下神効不可具述易簡方曰脚氣之患入腹衝心或見嘔吐之證無法可療千金以大黃利之大黃性寒病既深入必難導達是速其嘔吐也不若用養生丹或黑錫丹來復丹之類煎降氣湯嚥下更須多服以大便通利爲度脚氣無補法此有利性即非補藥服之無疑

案脚氣頑痺不仁緩縱不隨行動難艱轉筋屈倒是其常態不足大畏但膻中動劇者大可畏須決意救療之不論乾濕胸脇逆滿氣上急迫者其變起于不測寬者猶延日但動氣奔騰毒氣迫心氣喘不停自汗數出其脈短促沉伏嘔吐不止者皆屬死候方此之時非草根木皮可衝抗非金石猛厲強差之間何能奏凱不可憚其峻束手待斃也

併病

脚氣與諸病相併者傷寒痢後瘧後產後往往發之蓋五內未調氣血不健而生一種水氣者是也宜照合前款審病之淺深緩急而爲之處療此編所舉者蓋緩治之策也然忽之則命亦忽諸爾之之責我得辭

哉。

崔氏八味丸金匱　治脚氣上入。少腹不仁。

地黃　山茱萸　薯蕷　澤瀉　茯苓　桂枝

牡丹皮　附子

右八味。　案。蓋此方據蘇長史脚氣因于腎虛之說。則當編之於內因中。然功力迂慢。非猛制水毒之劑。仍收入于茲。又案。此方和血滲濕之劑。加以附子之健悍。行地黃之濡滯。使頹惰之氣。斡旋于經隧之中。施之於諸病後。少腹頑痺。腰脛委弱。帶腫氣。淹留彌日者。每見殊效。如脚氣上入。毒氣撞心。恐非此方所對也。又案。此方仲景所製。而治脚氣上入者出於崔氏所傳。故標以崔氏。崔氏名知悌著纂要方十卷。見舊唐書經籍志。吳昆方考載。漢武帝病渴。仲景爲處此方進之。無稽之談。不足信。又王海藏醫壘元戎。引易老云。八味丸。益火之源。以消陰翳。壯水之主。以制陽光。此語原係于王大僕素問注語。薛己專取此語。附會八味六味二丸。爲補腎益精之說。遂開誨淫誘欲之路。此藥元無壯陽之効。且非所製之本意。甚矣其爲惑也。

又按。嚴氏於本方中。加牛膝車前子。名加味腎氣丸。治腎虛腰重脚腫。小便不利。又張璐玉本方加沉香。治脚膝枯瘦色淡。小腹不仁。腹急痠

痛。上氣喘急。

千金一方　治脚氣氣血凝滯者。

大黃　木香　生薑　檳榔　枳實　橘皮

甘草

右七味。　案。此方原千金方。山脇氏加桂枝紫蘇。治脚氣兼痞積者。尤有驗。

蘇恭防己湯外臺　主通身體滿。小便澁。上氣上下。痰水不能食。食則脹者。

桑白皮　大豆　防己　橘皮　茯苓　麻黃

生薑　旋覆花　杏仁　紫蘇莖葉

右十味。小便利。腫氣消。下冷多。加茱萸。熱多加玄參。

烏苓通氣湯葛氏病回春

烏藥　當歸　芍藥　香附　糖毬　陳皮

茯苓　白朮　檳榔　玄胡　澤瀉　木香

甘草　生薑

右十四味。惡寒加吳茱萸。　案。此方。沈家患脚氣。腰脚麻痺。或下部帶腫氣者。殊有功。

三和散局方　治脚氣上攻。胸腹滿悶。大便不通。

大腹皮　紫蘇　獨活　沉香　木瓜　川芎
白朮　木香　甘草　檳榔　橘皮

右十一味。　案。此方原出于傳家秘寶。名大三脘散。治三焦氣逆。解大便秘滯。下胸脇滿脹。沉陳蘇檳開滯破鬱。川芎散血滯。獨活逐水濕。木瓜利筋絡。朮甘調和脾胃。夫氣血壅滯。則筋脈不利。三焦不和。則運輸不健。一用此湯。鬱滯開而三焦通。所以有三和之名也。

澤漆湯聖濟治痢後腫滿。氣急喘嗽。小便如血。

澤漆葉　桑根白皮　郁李人　杏人　人蔻
白朮　陳橘皮

右七味。　案。本草澤漆。味苦微寒。主大腹水氣。四肢面目浮腫。凡精氣衰憊。峻猛之劑。恐不能堪。故不得不取之於滲利。

實脾散本事方治陰水。

木香　菓仁　大腹子　附子　茯苓　乾薑
甘草

右七味。　案。嚴氏濟生方所載。實脾散。治水腫。比此方。多厚朴白朮茯苓木瓜。蓋嚴氏原于本事。加四味。醫學綱目實脾散。同本事。嚴氏一時太醫。後世以爲實脾之祖者謬。

導水茯苓湯　治水腫徧身如爛瓜。喘滿倚息。不能轉側。

茯苓　麥門冬　澤瀉　白朮　紫蘇　檳榔

桑白皮　木瓜　陳皮　砂仁　木香　燈草

大腹皮

右十三味。　愚每用之於水腫脚氣混淆者。加郁李仁更效。然未詳出于何書。姑據方賢奇效良方。併錄于此。證治準繩。醫宗必讀。醫燈續焰。皆載此方。稱其功。

主脚氣大便澁方千金月令

大黃五兩　大麻三兩

右二味。羅大黃爲末。和麻仁。以蜜爲丸。

紅豆煎家方　治水腫。嚴斷米粟。專食菽麥。令疏通水毒。本林一一烏祕方。

起廢湯家方　脚氣日久。腰脚瘦削。或攣急。或麻痺。或骨痿韓曳。一切虛羸。用之滋養。

鍼砂丸家方　治胃虛一身洪腫者。余家每用鋼鐵。鐵家所磨鐵細末

季仲南永類方云。腫藥用鐵蛾及鍼砂。入丸子者。一生須斷鹽。蓋鹽性濡潤。腫者再作。不可爲矣。此說信然。

高蜜丸家方　治腫滿。

絲瓜十枚燒存性　巴豆一枚去皮熬研如脂

右二味。煉蜜丸如梧子大。強人初服五分。弱者半之。此方原出香祖筆記。元鮮于伯機。記杭醫宗會之者。善治水蠱。以乾絲瓜一枚去皮。剪碎入巴豆。黃色爲度。去巴豆用絲瓜。炒陳倉米。如絲瓜之多少。候米黃色。去絲瓜研之。爲末。和清水爲丸。如桐子大。每服百丸。皆愈。宗言巴豆逐水。絲瓜象人脈絡。去而不用。藉其氣以引之也。　予試之。洞瀉如傾。用之於水腫膨脹。間覺有效。但脚氣忌巴豆之說。見于後條。

化毒丸　治痿痹不能起者。

薰陸一匁　大黃　鷄冠雄黃　亂髮霜各三匁　生生乳一匁

右五味糊丸。　此藥剛烈。愼勿過用。二三分至四五分。服後有發赤疹者。有爲發熱者。皆中肯綮也。宜止後服。若服後覺瞑眩者。宜飲冷水喫冷粥。立定。

友人淺田識此曰。此方原出陳司成徽瘡秘錄。癸字化毒巳字化毒之類耳。山脇氏拔其精英。爲五味。治諸頑痼沉滯之病。案。生生乳奇功靈驗。不可勝紀。然未詳其所始。蓋起于天官瘍醫歟。凡療瘍以五毒攻之。鄭玄注云。五毒者。五藥之有毒者。今醫方有五毒之藥。作之合黃整。置石膽丹砂雄黃礬石磁石其中。燒之三日三夜。其煙上著。以鷄羽掃取

之。以注創。惡肉破骨則盡出。是乃生生乳之祖。陳氏曰。如水銀一物。得雲母礬石同煉。其毒即解。不比粉霜輕粉之酷烈也。配風藥而治大麻風。配瘡藥而治傳屍瘡。配蟲藥而治諸蟲疾。配膈藥而治噎塞翻胃。配瘡藥而治頑毒頑癬久漏骨痛。種種奇効。不獨治廣瘡毒氣之聖藥也。

針灸

灸治刺血者。非拔本之法。然稱偏痺緩風者。隨症時用亦可。孫眞人王燾。專用炳灸。蓋取之於聲動經脈。宣通壅塞。如痛痺麻木痿痺緩縱拘急轉筋者。宜灸其腰脚。凡灸而不覺熱者。其毒深也。乃至覺熱益佳。加多無妨。待身體輕利。然後可休矣。楊大受則以砭針出血爲第一。各有所見。如其灸法。千金外臺載之甚詳。用者當照看原文。茲揭其穴名。

千金灸穴

風市　伏兔　犢鼻　膝兩眼在膝頭骨下兩傍陷者宛宛中是

三里　上廉　下廉以上五穴陽明胃經　絕骨少陽膽經

外臺灸穴

風市　膝目　絕骨　陽陵泉　陽輔三穴少陽膽經

上廉　條口　下廉　犢鼻四穴陽明胃經　崑崙　委中

承筋　承山四穴太陽膀胱經　大衝　復溜　涌泉三穴少陰腎經

曲泉　中都二穴屬陰肝經　三陰交　陰陵泉二穴太陰脾經

少陽維在內踝後一寸動脈中　太陰在內踝上八寸骨下陷中　太陰蹻在內踝下向宛宛中是

余家別有打膿之術。施之於三里三陰交。及腰腿肉隙骨間。釀瘡洩毒。凝者散。滯者通。其功優于灸治。屢驗。

備案

一商人患脚氣。已歷諸醫。又請余。氣急喘悶。上攻已極。氣息奄奄。殆無脈。告不治而歸。家人猶留。曰生死命也。請既一劑。殘喘尚存。何忍束手視死。余乃再候之。惟面目神光。猶似存生機。手足既厥。綫息欲斷。與茱萸湯。入童便如法。告曰。服之。厥回汗出。或得活路。不然。雖司命。亦無奈之何。因宿其家。屢起診之。及曉大汗出。大熱悶。頃之厥回脈出。困悶頗安。余喜曰。得之矣。既而氣漸復。神漸旺。仍護前方。兼養生丹。調理五日。危候始穩。微喘未除。因轉方。投沉香降氣湯。服之旬有五日。得奏全績。顧幸矣。非余之功。病家之命數未盡也。初當告不治之際。豈知有今日哉。

一婦人娩後十餘日。惡露不下。心胸滿悶。煩渴微嘔。前醫以爲瘀血。用桃核承氣湯。下利日三四行。瘀血不下。小便益短少。脚腿痿腫。麻木不仁。延予診之。心胸堅滿。動氣泄衣。每動搖。自汗息迫。予謂水毒使瘀血不下。蓋水毒爲之源。而瘀血則委也。於是作木防己湯與之。兼服鍼砂丸。嚴戒鹽

味。小便通。瘀血下。經二旬而愈。

一沽豎年二十三。形質肥胖。染疫。舌上黃褐色。其脈弦大。譫語潮熱。時時蹙頻。時時嘔吐。按腹。若腹痛者。用大柴胡加芒硝湯。大下之數日。續下利。裏急後重。腸垢雜下。二十行至三十行。飲啖少進。熱勢大減。始自告所苦。轉均藥湯。諸候向安。一日忽息迫。不能坐臥。膻中動氣如奔馬。予知其變于脚氣。急疊用蘇長史吳茱萸湯及甘遂大戟之類。不及而斃。按此症初而疫邪。中變痢。終變脚氣。固雖屬危險。非無可救之術。蓋攻伐屢用。胃元頓虛。遂生水毒。然復以駛藥刼之。我速其死必矣。今而思之。不能無赧然于懷。

一商人年四十餘。患脚氣。其症足脛麻痺屈弱。時不能起。按之有微腫。脈數而有力。膻中無動。小便短澁。至夜微嘔。晝則神色如平。投唐侍中一方。加旋覆花。間三日往診。狀貌依然。又間三日診之。嘔止小便通。如報善候者。但口鼻氣冷。以指候之。舌心愈冷。意謂呼吸者。元氣所通。知是水毒伏心。神機竭于內之候。蓋異症也。大怖辭去其家。招一醫。醫來診曰。此脚氣常態。口鼻氣冷者。胃中有寒飲。溫之即愈矣。家人大喜曰。苟再造之恩。服藥一日。小便不通。嘔吐復發。冲心而死。

一士人上自頭腦面部。下至心腹臍下。麻痺不仁。呼吸逼迫。言語蹇澁。小

便赤少。腰腿以下如常。時時顛躓不能起。家人大駭。招一友某。某至診不能詳其因。簡余議焉。余往察之。脈緊而有力。膻中生動。有跳騰之勢。謂某曰。病候甚似風痺狀。然非風也。蓋脚氣也。某曰。何以徵之。曰膻中有動。呼吸息迫。小便赤澁。是不水毒難伏于內。而逼心肺耶。麻痺不仁。腰脚屈弱。是不水毒淫于外。而壅塞表氣耶。是病涉表裏者必矣。曰何藥處之。曰以麻黃加朮湯。發洩其表鬱。可使氣血通暢周行。兼以木茱湯。收其水而輸之尿道。則內外並行無相悖矣。經曰。清陽出上竅。謂呼吸也。濁陰出下竅。謂二便也。蓋體之變異。必徵之於此二者。呼吸與二便。其出入關竅。所以爲生之要。曰善矣。乃投所擬。不日而痊。

一士人年強仕。職居繁劇。初覺脚重短息。以鞅掌無暇。置而不療。腫漸增。氣愈急。請余診之。心下堅滿。膻中築築然。余曰。是脚氣也。慫請之遲。趣早療之。何至此。與唐侍中一方。兼服禹功丸。小便快通。諸候殆安。一日召同僚。會飲。犯禁饕餮。息迫復發。小便閉塞。涓滴不洩。小腹膨脹。苦楚喊叫。擡首擷項。不能安臥。家人吃驚。走僕邀余。至則呼吸短息。時時冲心。作大黃甘遂湯。一瀹投之。庶幾穀道幸開。尿道從通。頻服前方。須臾稀溏數行。呼吸平穩。冲心稍安。然尿道未通。技殆窮矣。其家相議。延蘭醫。醫至。用導溺管。猶不能通一滴。無復策可出。又召二醫。蘭醫曰。實芟海葱疏之。漢醫曰

附子溫之。或曰。大黃盪之。議論全出。亂投調停者。十餘日。全軀洪腫。短氣息迫。虛里如奔馬。自心下。至少腹。膨脝鼓然。青筋如貫索。陰囊斗大。陽莖沒其中。又會衆醫商議。而紛然不決。余謂衆曰。今水路塡塞。不泄一滴。滲出之水。不能入脬。泛濫百體。爲此洪腫。猶川瀆壅塞。水潰于野。勢將裹山。一旦衝丹府。死不旋踵。用慢藥坐待斃。豈如投駛藥乎。或回生於萬一。引本經。證班蝥利水之效。將用之。衆醫猶疑。余奮曰。孤注視病者。有時不得不敢。執柯伐柯。前賢所驗。余亦數試用。縱不利於病。必不至裂肝碎腸。決策遂投。其夜溺初通三夕。翌一合五勺。於是用木防己加茯苓湯。仍兼服班蝥。如是兩三日。小便日通一升五合。既見建瓴之勢。洪腫漸減。氣急亦弛。尙護前方。止班蝥。飲啖少進。精氣日旺。家族欣然。始動喜色。自初病起。至此凡五十七日。病已除十之九矣。此役也。凡自通利分消之藥。至攻擊推搬之品。遍用不遺餘力。卒無影響。然一蟲能建奇勳。豈不偉乎。姑錄告同志。使知治法隨時處劑。而不可拘于常套。但大患重恙。變起不測。不可不懼而戒也。

藥者毒也。不可輕用。蓋養胃莫粱肉若焉。攻病莫藥石若焉。粱肉猶禮樂也。藥石猶攻伐也。人有病。不得已用藥。無病而服之。必惹利害。崔寔政論有云。蓋爲國之法。有似理身。平則致養。疾則攻焉。夫刑罰者。治亂之藥石

也德教者。與平之粱肉也。以德教除殘。是以粱肉治疾也。以刑罰治平。是以藥石供養也。近坊富家之子某。其質嬌軟。年甫十九。乃翁太鍾愛焉。時屬仲秋。某遊郊。帶醉散步。渴多飲水。明日脛生微腫。而其所親狎醫某。不學無術。奉承爲業。視之曰。脚氣腫滿之漸。雜藥亂投。腹滿微嘔。醫駭曰。恐爲衝心。於是家人惶惑。招數醫乞治。余亦見延。診之。其脈緩。氣息如平。膻中無動。又無麻痺。但腹中有飲。按之漉漉然。蓋腸間之水耳。無脚氣可徵。余曰。是湯液過飲所致。蓋軟脆之質。不慣行步。煩渴飲水。因發微腫。今吐水者吉兆。胃惡濕。欲排泄之耳。紅豆粥代藥。不出數日。應自愈矣。翁陽諾。陰疑。余亦不強而去。衆醫日夜環守床褥。甲曰。宜逐暑邪。乙曰。宜滲利。丙曰。宜溫補。爭欲効功。前藥未行。後藥繼至。各陳臆說。湯液丸散。種種怪藥。疊進頻服。嗟呼。軟脆腸胃。何堪多藥之毒。某遂斃於藥。可憐也哉。要是出於醫人貪利之不仁。而世俗不解藥之爲毒之過也。富家死於藥。往往有焉。況王公貴人。爲臣子者。可不鑒戒哉。

脚氣鉤要卷下

上毛　今邨亮祗鄉甫著

藥能

語曰。工欲善其事。必先利其器。器不利而善成其事者。未之有也。醫欲治病。須先審藥性之功能。而應病證之變遷。病之陽。投之以陰。病之陰。投之以陽。陰不至於痼。陽不至於亢。方症相當。則其治必矣。或反之。陰者死於陰。陽者死於陽。惡乎救焉。然而神農本經。說藥能不純粹。諸家之說亦龐雜。馳多岐焉。陷邪徑焉。倀倀昧昧。愈讀愈迷。或拘寒熱氣味。或謬補瀉剛柔。說是而藥非。方可用而論不中。襲習沉痼。其害非淺也。是以藥棧之能。非取徵於張氏方中及孫王之說。則不足信焉也。夫治療之道。以法爲師。以藥爲器。器既利。法從活。及可遊也。苟獲其要。則數種而足。苟不獲其要。則百藥不能奏功。藥益繁而理愈昧。說益奇而術愈疎。老子曰。少則得。多則惑。醫之於藥亦然。故郭履道有云。藥之爲用。不過六十四品。如易爻旒傳。運用不窮。褚澄曰。用藥如用兵。善用兵。徒有車之功。善用藥者。薑有桂之能。華元化處方。亦不過數種。古人於藥。識之精。而用之簡。猶能肉骨者。相望于簡册。非如今之支離煩碎。爲用

之少也。輓近匪學者。讀蠻土夷域之書。探深山幽谷之枝。競採異藥。爭衒新奇。且刳死體。檢臟腑。配當藥品。以瑣末之學。製奇怪之藥。自稱爲窮理。顧夫理也者。造化之妙。形而上之物。可得諸心。非目可覩也。則豈得言窮之。不止自欺。使後學守局。不知處活物之機變。抑可嘆矣。凡人食穀續命。穀不過數種。飲藥治病。藥亦不貴多。在處方之何如耳。今揭其驗於脚氣者若干種。爲用藥之標的。庶幾乎不背張氏孫王之意焉。

石膏

張長沙。用石膏數方。其症顯著。無有疑惑。而後人妄開寶逕。陷荆棘。不可不辨也。白虎湯條曰。表有熱。裏有寒。又曰。脈滑者。裏有熱也。加人參湯條曰。服桂枝湯。大汗出。大煩渴。又曰。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升。又曰。渴飲水。口乾舌燥者。加桂枝湯條曰。身無寒但熱。大青龍湯條曰。不汗出而煩躁者。又曰。無少陰症者。又曰。溢飲者。越婢湯條曰。風水一身悉腫。加朮湯條曰。一身面目黃腫。因是觀之。則長沙隊伍之妙。較然明晰矣。白虎之爲症。兇燄暴虐。侵入皮膚。爍熬胃中。與承氣相近。而其所異者。係熱之聚散已。大青龍者。表氣壅塞。緊束骨節。壓迫營衛之所使。是以身體疼痛。無汗煩躁。是麻黃之症。而進一等者也。越婢者。水道壅閼。溢滿肌肉。遂爲腫滿者。猶流水不歸川瀆。泛濫原野。以爲民害也。據此數條。則

石膏之爲効。一則可以清熱。一則可以泄汗。一則可以利尿。其雄戈偉勳。固可以與烏喙將軍。駢驥而弁騁也。長沙之道。不語隱怪。不涉奇僻。正大明實。如青天白日然矣。後之醫者。不由正路。不履實學。爲邪說所惑。不覺墜窠臼。所謂一盲引衆盲終載胥及溝。哀哉。

人蔘

人蔘之說。載在歷代本草。人所共知。而其說曖昧不明。要之。不過補虛益氣之說耳。予初好使用韓產。試之者數百人。其中有害而無益者。十居七八焉。於是檢傷寒論。論中用人蔘者。二十有七方。而治心下痞鞕者十一。治嘔吐涎沫者十一。是其彰明較著者也。而其量最多者。木防己湯。主用之者。人蔘湯。其證曰。支飲喘滿。心下痞堅。又曰虛者即愈。實者三日復發。復與而不愈者。去石膏加茯苓湯。所謂虛者。非體氣衰憊之謂也。實者。非體氣盛旺之謂也。用木防己湯。三日復發者。邪熱既深也。乃非用蕩刷。則不能除之。故曰。加茯苓芒硝湯主之。是人蔘芒硝。分治心下痞鞕與痞堅也。古人立方。可謂精微矣。赤石脂禹餘糧湯條曰。理中理中焦。此利在下焦。此爲粗工。被攻擊。遂致下腸滑脫。以故用赤石脂禹餘糧之品。固澁收斂之也。又曰喜唾不了了者。理中丸。大病差後。胃中未復。轉輸未健。水飲停滯爲痞者。此湯所宜也。因是觀之。蔘之主治。衝痞緩鞕。行水生津者。可

推知也。乃改舊轍。專用官畤人蔆不經蒸焙者。其味初苦後甘。是蓋蔆之正味。而試之於患者。其功効。與論中所舉相符。桐雷二氏之論。不我欺也。且性力敏捷。大勝於韓產。聞韓人貪利之甚。用糞滋之。且多方極製造。然則今商舶所輸。皆脫眞味。何存排闥直入之力。然而尊崇之甚。比之金玉。使人徒費資財耳。夫自甄權始唱補虛。後醫熒惑。牢不可解。至薛巳張介賓李時珍王肯堂張石頑之輩。主張其說。以爲續命者。果然則朝饔夕飧。當保數百年而不死。此決無之理。三尺童子猶知之矣。藥者毒也。以偏氣救變。無病餌之。其生害必矣。久患長怠。元氣衰憊。及薄禀漸虛之人。豈人蔆所能使壯哉。越人曰。攻病以毒藥。養精以穀肉菓菜。有病服藥。固可也。無病則常餌穀肉。省思慮。節飲食。愼起居。遠帷幄。或可以充元氣而壯弱體也。余嘗意。寓內之大。坤輿之廣。不覩人蔆之國。必有之。而患者未必皆死。則雖無此物。亦不爲闕事也。陶隱居曰。人蔆與甘草同効。孫思邈曰。無人蔆。以扶苓代之。據二子之言。則蔆亦一裨將。豈有統帥之戈乎。故曰小寇可拒。大敵非其所當。是誠知蔆者。可謂獲我心矣。金元巳降。延命長壽之說。盛行于世。而蔓延于我邦。乃今有病之家。每遇危篤。不問可否。必餌之。醫亦容悅用之塞責。終至於使正氣日蹙。自招其死。不亦痛歟。嗚呼。苟志于濟生者。忍乎爲之。司命之職。宜猛省焉。

地黃

地黃。古方所用。生與乾已。其稱熟者。亦不過於用酒灌焙。而後世九蒸九暴。以酒氣損其性。是出於庸醫過鑿。既失眞味。豈中於用乎。此物春生苗。其葉毛茸皺文。似車前草而無光澤。花如胡麻。其色有黃紅紫之別。黃者爲眞。大抵莖長數寸。連皮肉皆黃。根發黃色。則結實。形如小麥粒。質重實。投水卽沉。爲黑色者。係腐敗耳。凡草木堪寒氣者。其性屬寒。而地黃則怯寒。遇霜卽死。故種者用藁裹之。置火於其上。取暖俟春。由是觀之。神農經及本草。言性寒者。不足信也。味甘質潤。經久不乾。其能滲入血中。養血液。營運行。夫血液虧乏。按脈無力者。係虛候也。其脈細數者。爲瀕死之候。非地黃之力。不能挽回矣。案。莖葉毛皺無澤者。蓋以其氣專鍾於根蔕也。故雖滋潤。澁而不滑。能治吐血衄血下血。且調婦人產後亡血。以其滋血液導運行也。芎歸膠艾湯。可以見其效能。婦人在草蓐。發露得風。四肢苦煩。宜三物湯者。以君地黃。臣苦辛。黃芩解其煩也。虛勞腰痛。少腹拘急。小便不利者。宜八味丸。轉胞亦用八味丸。以地黃滋潤。利血中水氣也。又治脚氣入腹。小腹頑痺。痛痒不覺。短氣有微飲。當從小便去。則苓桂朮甘湯主之。而兼用八味丸。要之。血水同道而並行。故主地黃。伍茯苓澤瀉之滲利。男子消渴。亦以此治之。是仲景氏妙手段也。錢仲陽八味丸中去桂附。稱

六味丸。以療小兒。夫小兒血氣未厚。故脈多疾數。乃用地黃丸。其治五遲五軟等證。其方雖失古意。可謂能知地黃之能者矣。薛己始唱補虛益精之說。後醫信其妄。不惟舉之於口。又筆之於書。遂使此草藥爲恣慾誨淫之媒。何其寃乎。

大黃

神農經曰。大黃味苦寒無毒。蕩滌腸胃。推陳致新。夫蕩滌腸胃者。大黃之所主。而推陳致新者。人身之天機也。喻如竹木刺入肉。知痛者神氣而非皮肉也。所傷生膿。則自拔。是天機爾。乃助天機者。一切治療之要紐也。大黃能入腸胃。掃除諸惡液。是所以逐瘀留飲宿食諸邪氣。自大便下之。其性膩速滲透血中。以故服之。小便帶黃色。大便從瀉下。配之乎枳實。利甚急。合之乎甘草。利較緩。所以大承氣與調胃承氣有差別也。合黃連黃柏梔子等。則瀉心胸。清瘀熱。配水蛭虻蟲桃仁等。則下瘀血。與甘遂。則瀉水氣。明醫錄云。治女子寒血閉脹。小腹痛。諸老血留血。誠然矣。其治諸瘡瘍。亦以有解毒之能也。用之泄瀉下利。解熱逐毒。毒盡則自止。治食已即吐者。及痢病後重。並以疏滌惡液。健運腸胃也。可謂藥中之將軍矣。

附子

天雄。烏頭。附子。側子。漏籃子。詳于本草綱目。而其種本一物。因年歷多少。

異名焉耳。而仲景氏。獨用烏附者。蓋取力之優者。猶如芋魁於側子也。余少時。漬附子於水。減其鹽。經宿洗之。手指觸毒熱痛。後洗土芝。指甚痒已。於是悟附子辛熱。自毛孔滲入發痛。而土芝蔓氣。自汗孔滲徹發痒。二物固並有毒。然附子則宿根所生。經寒暑而成。故其毒猛烈。土芝則春種秋熟。其質軟脆。不堪寒暑。且係食料。故毒亦從薄。功能之別可推知矣。烏附氣味雄悍。驅寒冷。補衰弱。開達表氣。以溫百體。乃服之過度。必生瞑眩。至其甚。脈絕大吐水。是與縱飲之人。不堪酒氣慓悍。發嘔吐。同一理。仲景氏附子去桂加朮湯條曰。一服覺身痺。三服都盡。其人如冒狀。又烏頭桂枝湯條曰。如醉狀。皆言其瞑眩之狀。所謂藥不瞑眩。厥疾不瘳是也。然其氣猛悍。難施之於元氣衰薄之人。不可不戒者也。大凡腸胃生寒。而血液敗。則藏府爲之拘攣掣痛。或繞臍而痛。或腹中絞痛。或雷鳴切痛。或手足厥冷。其治舉屬於烏頭。大烏頭煎條曰。治寒疝繞臍痛。脈沉弦者。烏頭桂枝湯條曰。寒疝腹中痛。逆冷。附子粳米湯條曰。腹中寒氣。雷鳴切痛。案。陽氣壅塞。則身體鬱滯。生敗液。經脈爲之乖戾。從其毒之所在而發痛。是痛風脚氣之因。發浮腫。亦屬烏附主治。故烏頭湯曰。風濕相搏。身體疼痛。不能轉側。是用烏附。除敗液。豁滯氣也。又發汗。病不解。反惡寒者。其人虛也。芍藥甘草湯主之。發汗遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。

桂枝加附子湯主之。是並亡陽之症。非附子。不能治也。陽窮生陰。人天一理。乃漸甚。則玄武四逆白通等。隨症投之。但人身虛實不同。寒熱異途。而邪氣亦不一。則或直見少陰症。麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。附子湯。玄武湯。此皆附子所主治也。脈沉。沉小。沉微。沉緊。浮而濇。是皆係寒冷所致。人爲寒氣所襲。血氣不和。運行從阻。譬如魚肉汁。遇寒凝結。非附子辛熱。何以得溶解之哉。傷寒金匱。所載藥方二百有餘。而烏頭附子配合者二十九。烏附功能居多可知矣。夫切於人身者。無如水火。而其爲害者。亦無如水火。火者熱也。水者寒也。乃治熱用寒藥。治寒用熱藥。是固理所然。雖然術存乎其人。果得奏効。豈易易也哉。

牛膝

此物有脂膩之氣。滲徹血中。清淨瘀液。開散鬱塞。疏通水道。神農經曰。主寒濕痿痺。四肢拘攣。不可屈伸。蓋此品。雖有養血營筋之力。非以之治四肢拘攣膝痛也。嘗試之。爲拘攣跛曲者。以關節含廢液滯血也。醫苟不達此理。則藥屬徒用。且此物。能引諸藥下行。乃腰腿之疾。不可缺之品也。

朮

逐水止瀉。燥濕除痰。朮之用。得桂枝附子。則治小便自利。得麻黃石膏。則治面目黃腫。小便不利。配桂枝人參。則治利下不止。在眞武湯。治四肢沉

重疼痛。在茯桂朮甘湯。治心下有痰飲。古唯謂朮。無蒼白之別。陶氏方分兩種。自宋以來。始言蒼者苦辛氣烈。白者苦甘氣和。自此世人。多貴白賤蒼。蓋蘇頌作之俑也。今試之。性功不甚相遠。其質多脂且氣烈。故能滲透血肉。宣通水道。此爲滲利之專劑矣。猪苓澤瀉。亦疏通之品。因隊伍各異其使用。宜類推取驗矣。

芍藥

傷寒論中。用芍藥十八方。主腹痛者七方。主體痛者八方。腹痛頭痛。身體不仁。脚攣急。皆係筋絡拘急。而芍藥之功居多。且用之廣。合朮苓則逐水氣。合蒡歸則走血脈。合桂枝則開腠理。其他効用極博。故經驗方。用之於風毒骨痛。事林廣記。用之於脚氣腫痛。古今錄驗。用之於衄血咯血。聖惠方。用之於血崩帶下。詳載愚著藥能考。今不復贅焉。

薏苡仁

神農經曰。治筋急拘攣。不可屈伸。筋急拘攣者。係風濕痺。乃仲景氏治風濕相搏。身體疼痛者。用麻黃杏仁薏苡甘草湯。可以知其然矣。此方去薏苡。加石膏。治喘急。古人立方之意。不忽諸也。薏苡附子湯。治胸痺緩急。而敗醬散。則於此方中。加敗醬。以治腸內癰腫。馬援在交趾時。餌薏苡仁。言輕身資慾。又勝瘴氣。其避濕邪。可以徵焉。

橘皮

呂氏春秋曰。果之美者。江浦之橘。雲夢之柚。是則名產取對耳。孔安國禹貢注。小者爲橘。大者爲柚。神農經曰。主治胸中痰熱逆氣。利水穀。按橘橙柚柑拘橼之屬。性功相似。時珍說其功甚精細。然不足盡信也。往初垂仁帝。命田道間守。求非時香於海外。按寒天萬果皆墜。然橘獨存。非時之名。蓋取之於此。又聖武帝時。播摩直弟兄。始齎甘子。自唐歸。甘子卽柑。今則所在繁殖。其皮不乏藥用。青陳之別。因采時老嫩耳。非二物也。其功能開胃驅痰。和中焦。故仲景氏伍之大黃芒硝湯。治胸間宿滯。如橘皮竹節湯。則專主橘皮治嗳逆。芳芬之氣。開豁肺胃也。

厚朴

張元素曰。厚朴之用有三。平胃一也。去腹脹二也。孕婦忌之三也。試之二者果如其言。在孕婦不必然也。按。是見承氣湯中有枳朴。便謂枳朴大泄元氣。甚可恐。是所以爲是說。吠聲之徒不察。槩爲瀉泄之物。而不知其辛溫提滯氣。治腹脹也。平脾胃者。健運營也。以故仲景氏大小承氣湯。厚朴七物湯。配之於大黃。以蕩滌腸胃。後世平胃散。伍之於蒼朮橘皮。以主消導。非專主瀉也。

防己

防己別漢朮。而爲二種者。出于後世。外臺云。漢中木防己。出漢中爲上好。蘇頌曰。折其莖。一頭吹之。氣從中貫。如木通然。因知其功。透胸間腸胃。達四肢。開閉塞。泌水氣。實利水之仙藥。無可代之者。故用木防己湯。治膈間支飲。其爲喘爲痞者。皆因水氣也。防己茯苓湯。治四肢爲腫者。祛水氣也。他如防己黃芪湯。治身重。己椒歷黃丸。利腸間水。要與木通滲泄之劑同焉。

枳實

按。枳卽橘柚之屬也。故其形狀似橘。其葉似橙。多刺。周禮云。橘踰淮而北。爲枳是也。時珍不辨之。別載于灌木條者誤矣。七八月采者。稱枳實。八十月采者。呼枳殼。寇宗奭曰。枳實枳殼一物也。小則性酷而功速。大則性詳而功緩。宋開寶本草。始出枳殼條。香川太仲非之。謂不解殼實字義。但唐人詩。處處春風枳殼花。采盡高山枳殼花。然則殼實二字。古不必差別。後世實殼分爲二。乃說主治亦異途。可謂泥矣。此方出薩州者。臭橘而非眞枳也。凡橘柚柑枳之類。皆有刺棘。而枳最多。因知其性直入腸胃。衝蕩滯畜之汙物。資食物消化之機。故古人譬之於衝牆倒壁。可謂善喻矣。仲景氏治心下堅。大如盤。邊如旋杯。用枳朮湯。蓋此證。胃中瘀液滯緒之所爲。乃枳實朮俱戮力。衝破結實。使之疏通。四逆散亦配合枳芍。以治胸脇苦

滿。心下痞塞。腹痛泄利。產後腹痛。煩滿不得臥者。用枳實芍藥散。是配酸味收斂之枝。以消導瘀血也。如排膿散亦然。大黃枳實合力。則蕩滌腸胃。最猛烈。是以大小承氣。大柴胡湯。皆併用之。調胃承氣湯。除枳實。用芒硝。加甘草。以主緩緩。因此觀之。則破結塞。消脹滿。逐停水。止下重者。皆取功于枳也。

茯苓

氣味甘淡性滋滲。帶脂氣。故滲入血肉。滋滲水氣。聚之輸送尿道。通利小便。是以仲景氏用之於茯苓四逆湯。治汗下後之煩躁。又用之於眞武湯。治心下悸。頭眩身瞤動。筋惕肉瞤之症。若衝脈激動。而爲悸者。則桂枝甘草湯。所主治也。桂枝條可併見焉。小便不利。厥而心下悸者。茯苓甘草湯所主也。葵子茯苓散。主頭眩小便不利。茯苓桂枝白朮甘草湯。主心下逆滿頭眩。二方俱水氣之所爲。茯苓滲濕之功。可推知矣。

麻黃

此物纖細勁直。外黃內赤。中空有節。如竹。形宛似毛孔。故有疏通之功。因知其氣入腸胃。透徹血脈。遂達肌表。發越閉塞。令邪從汗出焉。又至肌表怯弱。汗自出者。則還收斂其汗。是資表陽之氣。使之適宜也。外感之邪。猛悍慓疾。壅塞表氣。直逼于骨節。爲身體疼痛。逼于肺。爲喘爲欬。用麻黃湯。

發泄鬱陽。則疼痛欬喘爽然而痊。麻黃湯症。而壅塞尤劇者。爲大青龍湯症。治無汗煩躁。本方加麻黃六兩石膏雞子大。其峻烈可推知矣。桂枝麻黃各半湯。桂枝二越婢一湯。桂枝二麻黃一湯。並係纏滯之邪。小青龍湯之兼飲。麻杏甘石湯之兼喘。葛根湯之兼項背強急。此屬太陽病之治例也。蹉臥惡寒。脈沉小者。麻黃附子併用。以鼓舞表陽。是爲麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯之症。此屬少陰病之治例也。蓋汗之與尿。俱津液所化。故麻石同合。則驅水。越婢湯。文蛤湯。厚朴麻黃湯。可以見焉。麻桂同配。則逐汗。小青龍湯。葛根湯。麻黃加朮湯。桂芍知母湯。可以證焉。蓋仲景氏用麻黃之法。雖有數方。大率無出此範圍。擴充而運用之。則病之宜發汗。又宜利水。皆不得不取法於此矣。或曰。木賊。燈心草。接續草等。皆中空。而仲景氏何獨用麻黃。曰木賊外皮糙澁不滑。燈心內有白穰。並少透徹之力。接續輕浮。固不堪藥用也。古來說麻黃之功者曰。治衛實無汗。又曰。肺經專藥。後人因更爲說。附會不足取。予經驗似有所得。是所以與昔人之解不同也。又案。仲景氏煎法曰。先煮麻黃。去上沫。內諸藥。陶弘景曰。沫使人煩。陶說恐非也。予嘗觀世之搗紅花製臙脂。初則色淡。去滓之後見濃紅。麻黃去沫。正與之同。去上沫得純精。所以逞其功也。葛根亦同。瓜蔞根水飛。以爲天花粉。則極有功。牡蠣亦燒之。治敗液。其他經製而見功者多。

不可不知也。

木瓜

爾雅曰。楙。木瓜也。郭璞注。木實如小瓜。味酢可食。一月花紅色。其實小而似瓜。故謂之木瓜。味極酸。故滲入血肉中。收斂血液。絞出津液。馳筋脈牽縮。故晉唐方書。多用之於脚氣。又治轉筋。痛亦縮脚筋。故用之見功。又治霍亂煩渴。陶隱居曰。木瓜最療轉筋。如轉筋時。但呼其名。及書上作木瓜字。皆愈。按呼名作字。理所可疑。然呼青梅口生津。人心感物。此理不可謂必無矣。雷斅曰。凡使木瓜。勿犯鐵器。以銅刀削用。凡藥有專長。有專忌亦不可不知者也。

吳茱萸

茱萸有三種。藥品者。以其出吳地。故冠吳字。其味辛溫。神農經曰。溫中下氣。仲景氏用吳茱萸湯。治吐利厥逆。又治嘔而胸滿者。及乾嘔涎沫頭痛者。是其氣質之力。豁胸膈。止嘔吐。溫胃中。治煩亂。孫眞人半夏湯之外。皆用之於痛氣風氣脚氣冲心者。取辛溫推下之能也。

沉香

沉香。楊億談苑。范成大桂海志。張郎正倦游錄等。辨之甚精。但就薰香而隱之耳。至服用之功。置不論焉。按此物生蕃國。本草所載。亦不能無疑矣。

其伍藥方者。蓋昉千金五香湯。歷代運用極廣矣予試之患者。降氣祛痰。開豁閉塞。其質堅硬鎮墜。香氣芬芳所致也。且治水腫。療喘急。檢之取少許投水。其沉者爲良。沉香之名。可謂一言蔽之也。

檳榔子

質堅硬。味澁而苦辛。治水毒逆搶心下者。與鐵石之沉重。能墜諸液。至於下者正同焉。分泌水血。通大小便。是以消穀逐水。除痰去癖者。如本草所載。且治水腫積聚。止痢之後重。又能下蟲截瘧。其他功能見于古人經驗中。羅氏崔林玉露云。嶺南人。以檳榔代茶禦瘴。朱晦菴檳榔詩云。檳病收殊效。修眞錄異功。亦足以證其能焉。

大腹皮

時珍曰。大腹皮與檳榔同功。又曰大腹皮檳榔子皮也。今碎視之。總有筋絲。蓋其線質滲入血肉。開洩閉塞。驅逐水氣。故局方五皮湯。泄膜外之水。入門大腹皮湯。亦能逐水氣治脚氣。伍紫蘇和氣飲。爲產前通治之方。且療惡阻胎動。時珍曰。健脾開胃。消肌膚中水氣浮腫。是也。

牽牛子

氣味辛辣。逐水利氣。用之少。則動大便。多則瀉下。劉守眞張子和之徒。專表其功能。至今爲通用下藥。蓋用碎之。配他藥者。恐氣脫也。或言其色黑

者屬水。而破血中之氣。白者屬金。而瀉氣分濕熱。是附會之說。不足辨也。

半夏

性辛溫有發氣。能消頑痰。止嘔吐。治欬逆。利咽喉。按飲食過度。留滯胃中。漸成積聚。胃不能堪任。鬱結爲粘痰。爲敗液。而惡心嘔吐並發。半夏能散結聚。以輸停水。瀉出敗液。嘔吐從止。故仲景氏大小半夏湯。半夏乾薑湯。專治嘔吐。附子粳米湯。及半夏瀉心湯。皆伍半夏。治嘔吐下利。其功可以見。如半夏苦酒湯蓋屬外襯。亦半夏之一活用也。

蘇

古昔單稱蘇。後世有白蘇。故加紫字別之。猶陶氏辨朮之蒼白。其紫色者。氣極香。味辛溫。略類桂。有行氣利膈之功。故仲景氏配半夏厚朴湯。治咽中如有炙臠。後世伍香蘇散參蘇飲。治感冒微邪。又配正氣天香湯蘇人湯。開散愁鬱。又伍紫蘇和氣飲。治產前諸患。其辛溫芳香。開排閉塞發揚表氣。是以三和散之治疝氣。正氣散之逐風邪。檳蘇散之療脚氣。蘇子降氣湯之下氣。除喘鳴。消痰飲之類。極見奇驗。揚雖輕浮。豈可棄之哉。采葑之詠。可以推焉。

桂枝

凡愛好香。而嫌惡臭者。情之所然也。嗅之快。則飲之亦快。理之所然也。是

知桂枝氣味芳烈辛溫。其香鼓舞精神。助衰微運營衛。故傷寒論中。發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。用桂枝甘草湯。又發汗後。臍下悸者。欲作奔豚者。苓桂甘棗湯主之。按其悸雖異心臍。其源一耳。何則。人身中。有一大幹在于腹底潛伏運行。以掌心血下行。內經謂之衝脈。難經謂之腎間動脈。爲發汗所激生悸。但在心下者。與桂枝甘草湯。在臍下者。與苓桂甘棗湯。是仲景微旨也。其悸惕惕然跳動者。精神之衰弱已。其劇者。曰奔豚氣。桂枝加桂湯所之也。桂枝善爽精神。順血運行。故鎮動氣。傷寒金匱中諸方。多出于桂枝湯變方。桂枝者。可謂衆藥之長矣。

犀角

犀有三種。山犀爲上品。時珍曰。角者精靈之所聚也。胃爲水穀之海。飲食藥物。必先受之。故犀角能解諸毒。能療諸血及驚狂斑痘之證。按時珍解毒之說。原于金匱犀角湯。療血之解。據千金犀角地黃湯。今試之。其功涼血熱。而旁利水毒。是以犀角地黃湯。治諸血妄行。醫學綱目犀角湯。治傷寒伏熱在心。怔忡驚悸不得眠者。千金月令。崔氏旋覆花湯。延年茯苓飲等。治脚氣。皆用之以理血分。豁胸膈。通小水也。

甘遂

始來爲佳。味辛烈性慓悍。泄水之聖藥也。凡水毒結胸中。非此不能破之

其氣直透所結處。故攻決爲用。十棗湯。大陷胸湯。甘遂半夏湯。大黃甘遂湯。湊合之妙。可以觀矣。但其有毒不可輕用。凡馱藥除病。其功速。然有弊。如甘遂之煩。桃花之渴。營實之下重是也。王璆百一選方。用甘遂。治脚氣上攻者。是亦可以備一時之需。猶戒之於脾胃虛羸之人。

大戟

味辛烈入腸胃。逐水氣。淮南子繆稱訓曰。大戟去水。葶藶愈脹。用之不節。反爲病。宜臨症斟酌矣。

芎藭

字典。菅香草又作芎。引本經注云。人頭穹窿。高天之象。此藥上引專治頭痛諸疾。故號芎藭。仲景方中。雖無治頭痛之文。此物氣味芳烈。而脂質。因推其理。能入血分。順血行。開氣鬱。案古方大抵芎歸併用。伍當歸芍藥散。治腹中急痛。合膠艾湯。治漏下。其單用者。爲酸棗仁湯白朮散。一曰虛煩不得眠。侊酸棗仁。治血液枯燥不能眠。一曰心下毒痛。倍加芎藭。乃知藭不特調血分。又有破氣止痛之功。奔豚氣用芎。亦不外于此義。又案。歸甘平主和柔。芎辛溫主排散。猶仁與義相依。而全其德也。香川太仲。以氣味論優劣。恐不當矣。

木香

木香產于蕃。不能詳其形狀。味苦辛氣芳烈。因知溫煖脾胃。敏盪神機。開氣鬱。散血滯。故用之霍亂嘔瀉。痢疾裏急後重。及積聚血痛。要以香竄之氣。逞宣通之功也。與沉香俱屬氣劑。同途異轍。

薑黃

李時珍曰。姜黃鬱金莪蒁三物。形狀功用皆相近。古方五痺湯。用薑黃治風寒濕痺手臂痛。戴氏要訣云。入手臂。治痛。

香附子

李時珍曰。此乃近時日用要藥。而陶氏不識。諸注亦略。乃知古今藥物。興廢互有。則本草諸藥。亦不可以今之不識便廢棄之。遂至爲之說曰氣病之總司。女科之主帥。愚嘗熟檢此物。葉如老韭而硬。如劍背有稜。根大如羊棗而兩頭尖。是知此草。備功能於形狀。入胃中。助消化之機。透血分。祛污濁之液。開愁鬱。舒氣血。使運動得其宜。小便通。月水調。故配之香砂平胃散。治食傷。資消化。主沉香降氣湯。開壅滯。順升降。又用之脚氣衝心方後云。常服則開胃消痰。散壅思食。時珍盛舉候沙之功。旁引精密。然皆他物之功。而非本分之所有也。

縮砂

縮砂白豆蔻益智草蔻。大抵形狀相似。性功亦相似。但各有專長。蔻之於

瘧，蔻之於醒，縮益之健脾胃，散鬱塞，蓋皆取乎其芳香氣烈之性，世有用伊豆縮砂者，此物係高良薑實，以其名紅豆蔻，遂混用謬人，宜辨別。

烏藥

烏藥，辛溫香竄，能散諸氣，溫冷痛，佐烏藥順氣散，則治半身不遂，配四磨湯，開七情鬱結，合烏沉湯，祛一切滯氣，會聞享保中，嚮商汎，齎天台烏藥，種之於諸州，熊野山最繁殖，土人窄油爲燈火，充之藥料，芳氣淡薄，不中用，蓋地氣令然也。

郁李仁

爾雅所稱，棠棣即是，碎核取仁，味微酸，本草曰，主治大腹水腫，面目浮腫，愚數試之，蓋似收斂血液，而輸之尿道者，利水之功，殊優于諸藥，若過量則瀉下。

獨活

本經曰，獨活一名羌活，以出羌地爲上品，坊間宿根爲獨活，新根呼羌活，蓋舊者其氣薄，新者其氣烈，生切浸水，則脂浮水面，瞥瞥然，其莖葉有毛茸，可知其質含脂膏，故透徹關節，止疼痛，資陽氣，配之三和散，治疝氣，合羌活導滯湯，治脚氣，若沉香天麻湯，治癇症，佐小品葛根湯，治子癇，是皆由隊伍之功，又入膀胱，則利小便，入子宮，則除污濁，用時宜選舶來上好。

邦產力稍劣。

桑白皮

其功滲入肺中。治咳嗽喘滿。又治水氣塡體中。發喘滿者。陶氏所謂利水道也。外臺崔氏。治脚氣遍身腫滿方。君桑根。聖濟桑白皮湯。治痢後身腫脹滿。頗有驗。

杏仁

李杲曰。散結潤燥。此說得之。思夫無脂膩。不能潤燥。無尖質不能散結。合桂枝。則透徹汗管。開毛竅。能發汗。伍麻黃石膏。則滲入肺中。治喘急息迫。又能驅停飲。消腫氣。配薏苡。則治風濕。併麻仁。則潤燥。本經曰。主欬逆上氣雷鳴。蓋今之哮喘。

柴胡

人皆知石羔大黃附子之多功用。而不知柴胡亦然也。蓋柴胡之用。徵諸先哲配合之旨。則主治邪滯于胸脇。而熱爲往來者。聖惠聖濟。用之於脚氣。治心胸滿悶。楊仁齋用之於血熱。薛鎧用之於鎭肝。東垣取之升提。聖濟合之虛熱。其功甚博。他如補中益氣湯及逍遙散之類。升發精氣。開豁鬱塞。皆不離小柴胡湯之旨。世醫或安其平穩。不問得失。濫用謬誤。不可不審焉也。

黃耆

耆之功。大端有二矣。一則逐表濕。黃耆桂枝五物湯。烏頭湯。耆芍桂酒湯。桂枝加黃耆湯。皆能祛濡滯之邪。陶氏所謂風水家要藥是也。一則托內虛。黃耆建中湯。治裏虛。張元素所謂壯脾胃補諸虛是也。蓋此物健血液之運行。資水道之通利。此其所專長也。故能治爲痺。爲腫。爲黃汗。爲歷節疼痛。爲衛虛漏汗者。然其性和緩。非配燥熱之品。則不能奏效。故得桂朮附酒之向導。而逞運行之力。長沙配合之微旨可察焉矣。因隊伍各異其能。非一味兼衆功。顧在於用之如何耳。後世不達此意。哀合柴胡升麻。逢虛人必用黃耆。專于補虛。所以久服必生偏勝之害也。

鐵

本經載金石之功。多涉于方士服食致長生之說。至藥能則略焉。不能徵之于此。按鐵之爲物。頑塊剛戾。無味。又無臭氣。素問始說治狂疾驚癇之功。歷世遵用。其功顯然。予嘗用之平脚氣及水腫。頗策偉勳。蓋其性鎮墜。功屬收斂。故能入血脈。泌別水氣。鎮動悸。降上攻。又有資運行之功。又助飲食消化之機。凡藏府及諸部。縱緩萎衰。而發水腫脹滿者爲之要藥。但用之者。非得肯綮而執樞機。不能著其功。詳之于藥能考。不復贅焉。

旋覆花

仲景治心下痞鞕。噫氣不除。用旋覆代赭石湯。治婦人用旋覆湯。胡洽治痰飲在兩脇脹滿。用旋覆花丸。皆取驅飲。甄權曰。主水腫。逐大腹。開胃止嘔逆。不誣也。

羚羊角

此物邦產雖與漢產少異形狀。性功則同。先輩既辨之。本經逢原曰。諸角皆能入肝。散血解毒。而犀角爲之首。蓋以精銳之氣。破鬱結之毒。故用之鎮癇。又用之眼疾。又用之利水飲。觀其除伍。可知其功能焉。或云所觝之羚羊角者。山驢之角也。本草云。其角長尺餘有節。特起環繞。如人手指握痕。得二十四節者。尤有神力。今所見即此物。蓋非山驢也。

巴豆

其性辛熱大毒。擾亂腸胃。蕩滌水穀。走馬湯。白散。備急丸。紫丸之屬。藥陣中無有爭鋒者。乃大用之。則有斬關奪門之功。少用之。則有撫綏調中之妙。以故消堅摩積。通腸泄水。不可一日無者。然用之於脚氣。服後枯渴律液。耗疲天眞。變症轉生。快藥之害。不可不畏而戒也。

古人以醫術。比軍術。誠然矣。病者敵也。不可不攻。而病勢有強弱。病候有虛實。或合或併。或緩或急。其症多端。乃應證處方。猶臨敵設謀。辨性用藥。猶命將攻敵。大黃附子巴豆石膏。則其性雄猛絕倫。即戡亂之將

也。如漢高用韓彭。而功可取矣。否則。不止不能成功。或爲大害矣。陳皮茯苓紫蘇黑豆。則其性平淡。不過督卒伍充防禦之役。然將卒相待。君臣相資。可以奏其全功。卒豈可闕焉哉。要之。善用將。則敵可陷。善用藥。則病可治。且藥石之於病。有單捷奏功者。有參伍成功者。有衆味戮力致功績者。是亦所謂知彼知我而可戰也。醫人非知病知藥。安得奏捷。摧陷廓清。策功于千載。其可不期乎哉。

脚氣鉤要後序

溫熱瘧痢。非不厲。然一匙可起。膈脹瘵瘧。非不惡。然其斃有漸。唯脚氣則不然。寢啖如故。神色依舊。一朝冲心而絕者。比比有之。況於其誤治者乎。然則病之尤可畏。醫之尤可慎者。孰加於此。余平生於脚氣。無能治愈。百方研究。未得其肯綮。蓋古今名一而病則異。和漢證齊而因不同。是以處治無統。衆說紛紜。特吾邦山脇東門林一烏磬瀨玄策等。所論述。差爲庶幾。但其學淺薄。其書鄙俚。不足傳信。每以爲憾矣。吾友了菴今村君。以三世之學穎敏之才。深潤世之死于斯病者夥。著書以公于世。其辨論若犀之燭淵。若電之破闇。惜不使起前數子刮目稱快也。嗚呼臨至險之病。施至當之治。苟非能運古法。而應機變。出新奇而不離規矩。則未易臻此域也。余風塵碌碌。愛莫助之。姑書所感以返之。

文久元年辛酉三月

淺田惟常識此