常用中成药

天津人民出版社

常用中成药

张大宁编著

C0144426

天津人民出版社

常 用 中 成 药

张 大 宁 编 著

*

天津人民出版社出版

（天津市赤峰道124号）

天津市第一印刷厂印刷　　天津市新华书店发行

*

开本787×1092毫米　1/32　印张3 3/4　字数50,000

一九七三年十一月第一版

一九七三年十一月第一次印刷

印数1－55,000

统一书号：14072.51

每册：0.24元

内 容 提 要

本书对常用的225种中成药，按照中医辨证论治的原则，进行了归纳和分类，并着重介绍了它们的应用范围和使用方法。该书还对中成药的一般常识和中医的治疗原则作了介绍。书后附中成药索引。

本书内容简明扼要，通俗易懂。可供赤脚医生、基层保健大夫、药工和广大工农群众参考应用。

前　言

中成药是根据我国劳动人民几千年来同疾病作斗争的经验和长期临床验证行之有效的方剂配制而成。其特点是疗效显著，服用方便。所以很早以来就为我国劳动人民广泛采用，在医疗保健事业中起到了积极的作用。

当前，在毛主席革命卫生路线的光辉照耀下，一个西医学习中医，中西医结合的群众运动正在蓬勃兴起。因此，中成药的应用就越来越广泛了。但是如何准确无误地使用中成药，目前还存在一些问题。为了正确地使用中成药，更好地发挥药物疗效，现将225种常用中成药的应用范围和适应症状，按照中医辨证论治的原则进行了归纳分类，供医药界同志们和广大工农兵群众参考。

本书在编写过程中，承蒙天津市医药科技委员会中医师李少川同志的指导和一些医院、卫生院、药厂、药店的大力支持和帮助，在此一并表示感谢。

由于编者水平所限，书中还会有不少缺点，希广大读者批评指正。

编　者

目　录

绪论……1

一、中成药的一般知识……1

二、中医治疗原则……3

内科……9

一、感冒类……9

附：中成药组成（1—11）……11

二、咳喘类……13

附：中成药组成（12—27）……16

三、清热类……19

附：中成药组成（28—51）……22

四、痹症、痿症类……26

附：中成药组成（51—65）……29

五、中风类……33

附：中成药组成（66—73）……35

六、理气类……37

附：中成药组成（77—93）……40

七、脾胃疾患类……44

附：中成药组成（94—106）……49

八、补益类……51

附：中成药组成（107—126）……56

九、夏令常见疾患类……60
附：中成药组成（127—140）……62
妇科……66
一、月经病类……67
附：中成药组成（141—153）……73
二、带下类……76
附：中成药组成（154—158）……77
三、胎前、产后及杂病类……79
附：中成药组成（159—168）……81
儿科……84
一、小儿发热类……85
附：中成药组成（169—189）……89
二、小儿消化不良类……93
附：中成药组成（190—196）……95
三、疮疖及其它类……96
附：中成药组成（197—199）……97
外科及其它……98
一、一般皮肤疾患与痔漏类……98
附：中成药组成（200—215）……100
二、跌打损伤与其它类……103
附：中成药组成（216—225）……104
中成药索引……107

绪　论

中成药是祖国医药学的重要组成部分，也是我国劳动人民长期同疾病作斗争的经验总结。早在二千多年前的春秋战国时期，在祖国医学的经典著作《黄帝内经》中，已有关于中成药丸、散、膏、丹的记载。到东汉末年，著名医学家张仲景整理总结了当时劳动人民和历代医家的经验，发展了中成药的剂型、制作及应用。给后来中成药的发展奠定了良好的基础。至宋代中叶，已有国家制定的成药处方集——《太平惠民和剂局方》。以后在不断的实践中逐步发展，至今已有中成药数千余种，在我国医疗保健事业中起到了积极的作用。

一、中成药的一般知识

中成药，指用中草药制作的成药。它的剂型种类丰富多彩，有丸、散、膏、丹、片、药酒等十余种剂型。下面把常用的几种剂型作一下简单的介绍。

丸剂：是最常用的一种剂型。制法是先将药物研成细粉，混合均匀，然后加入粘合剂，作成圆粒，以汤水送服。通常有四种类型：

1.蜜丸：用熬炼后的蜂蜜作粘和剂而制成的丸剂。蜜和药粉的比例一般在1：1左右。蜜丸的种类，根据患者病情需要而制成大小不等的药丸。

2.水丸：用冷开水或其它粘性溶液，如米汤汁、阿胶水等作粘合剂制成的丸剂。它在胃中比蜜丸易化，而较散剂为慢，故可用于较为急性的病症。

3.糊丸：以面粉或米粉等，用水或酒润湿后加热，而成稠糊，作为粘合剂制成丸剂，叫做糊丸。面粉或米粉一方面作为粘合剂，另一方面也可调养胃气，减少或缓冲药物对胃的刺激，所以类似这样的处方常制成糊丸。

4.蜡丸：原指用溶化的蜂蜡做粘合剂，而制成的丸剂。近年来已很少应用。现在所说的腊丸，多指用蜡皮包裹用以保持药品疗效，防止受潮发霉等的丸剂。

散剂：将药物晒干或烘干后制成细粉，混合均匀，过筛制成。散剂可分为内服和外用两种，内服一般比丸剂容易吸收，外用可干撒或用茶水、醋、酒等调后涂敷，随症选用。

膏剂：分为内服外用两种。内服膏又称膏滋或蜜膏。制法是将药物用水煎后，去滓加入蜂蜜或糖，然后浓缩成半流体状制品，多用于慢性病。外用膏又分为药膏和膏药两种，药膏是用植物油、蜂蜡或凡士林作为基质制成的外敷膏剂；膏药是将药物经一定方法制成膏后，分摊于布或牛皮纸上而成，其特点是药效持久，方便易藏。

丹剂：系指用升华或熔合等方法制成的水银制剂。后来有些丸剂、散剂等也称为丹。如活络丹、七宝美髯丹等。实际上已不属于原始丹剂的范畴。

药酒：一般用白酒或黄酒为溶媒，浸出药料中的成分，所得到的浸出液就是药酒。

片剂：中成药中的片剂，是一种新剂型。目的在于缩小体积，便于服用。

总之，中成药的种类非常丰富，以上介绍的仅是临床最常用的几种，其他如药露、锭剂等近年来已不大应用，所以没作介绍。

二、中医治疗原则

要正确地掌握和运用各种中成药，还必须对中医治疗原则和特点(包括中医对疾病的认识、中医的辨证论治等内容)有个概括的认识。

中医认为，人是一个矛盾着的双方——阴、阳对立统一的整体。在正常的时候，这两方面是处于不断运动着的相对平衡的状态。由于某种原因，正常的阴、阳平衡遭到破坏(所谓阴阳失调)，疾病就会发生。

中医把病因分为三大类：外因（六淫：风、暑、湿、燥、寒、火。）、内因（七情：喜、怒、忧、悲、恐、惊、思。）和不内外因（如房劳、外伤、饮食过度等）。这些因素（邪气)能否引起人体发病，主要还在于人体的抵抗力(正气）。用中医的术语讲，叫作“正气存内，邪不可干”“邪之所凑，其气必虚”。这种思想是符合毛主席关于**“唯物辩证法认为外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用”**的论述的。

中医看病，讲究“辨证论治”。什么是“辨证论治”呢？“辨证论治”就是医生通过四诊（望、闻、问、切）了解病情，然后进行分析研究，找出疾病的本质，再结合病人的整体情况，环境条件等多方面因素，定出治疗方针，然后处方用药，实施治疗，这就叫“辨证论治”。“证”在这里并不是指单纯的症状，而是指“证候”，即对疾病所表现的

各种症状和体征的概括，为正邪斗争的反映。如：同是感冒咳嗽，要分析清楚是风寒咳嗽还是风热咳嗽，风寒嗽咳就要用辛温解表的治法，风热咳嗽就要用辛凉解表的治法。

总之，中医治病主要就是通过对病证的分析，找出疾病的本质，通过“扶正”或“祛邪”的方法来解决人体阴、阳这对矛盾的平衡问题，从而达到治疗的目的。

（一）中医的辨证

中医的“辨证”是指导治疗和处方用药的根据。“辨”是辨识、分析的意思；“证”指证候。“辨证”就是把四诊所获得的感觉材料，通过分析研究，按照八纲的体系加以综合归纳，说明疾病的发生、发展和本质，为治疗指明方向。

八纲：指阴、阳、表、里、寒、热、虚、实，这是中医诊病的基本纲要，也是中医辨证论治中很主要的一环。

〔阴阳〕　阴、阳在祖国医学上系指一切对立统一的关系和属性。是八纲中的总纲。表、热、实可归阳的范围；里、寒、虚可归阴的范围。临床常用的阴阳辨证有两种情况：

1.阳证和阴证：凡病在表，热证，实证，正气未衰，反应强烈的表现，都称之为阳证。如：发热，烦燥，语言响亮，呼吸声粗，舌质红，脉浮数等。凡病在里，寒证，虚证，正气已衰，反应虚弱的表现，都叫作阴证。如：发冷，精神萎靡不振，语言低微，呼吸音弱，舌质淡，脉沉迟等。

2.阴虚和阳虚：所谓阴虚和阳虚，多指肾阴虚和肾阳虚，也称真阴不足和真阳不足。

阴虚：潮热，盗汗，五心烦热，口舌咽干，眩晕，耳鸣，舌质红绛，脉象细数等。

阳虚：后背发凉，四肢冰冷，五更泄泻，阳萎滑精，舌质胖淡，脉沉迟无力等。

〔表里〕 表里是区别病变的部位，病邪在皮肤、肌肉、经络为表证，病邪在脏腑为里证。

表证：发热恶寒，头痛，周身疼痛，鼻流清涕，咽喉肿痛，舌苔薄白，脉浮等。

里证：发热不恶寒，腹痛腹满，大便秘结，神志不清，脉沉等。

〔寒热〕 指病证表现上的征象和属性。

寒证：面色苍白，怕冷喜热，四肢不温，脘腹冷痛，得热则减，大便稀薄，舌苔白，舌质淡，脉迟等。

热证：面色红赤，喜冷怕热，口渴喜冷饮，大便秘结，小便黄赤，舌苔黄，舌质红，脉数等。

〔虚实〕 虚实主要指人体邪正的盛衰。正气不足为虚，邪气有余为实。

虚证：四肢无力，精神萎靡不振，自汗，心慌气短，痛处喜按，阳萎滑精，二便失禁，舌质胖嫩，脉细弱无力等。

实证：精神兴奋，声高响亮，痛处拒按，大便秘结，脉实有力等。

总之，八纲是临床辨证的纲要。由于疾病的错综复杂，八纲病证往往是合并出现的，这就要全面分析，辨明主次，找出主要矛盾，给予适当治疗。

（二）中医治法

中医常用的治疗方法大体有八种：

1.汗法：汗法又称解表法，就是通过发汗来解除表邪的一种方法。一般分为辛温解表和辛凉解表两种，用以发散在

表的风寒和风热。此外，汗法还有透疹作用，故麻疹初期可用发汗透疹的方法进行治疗。其它如水肿初起，上半身较重者也可以使用汗法。但是汗法在使用上要注意适当，汗出过多可以伤津，甚至造成虚脱，所以体质虚弱的人，应当慎用。

2.吐法：利用涌吐药使病人呕吐，以达到治病的目的。但这种方法如使用不当，容易伤人正气，所以现在很少应用。

3.下法：利用泻下药使病人腹泻，达到清热泻火、排除胃肠积滞、寄生虫和消除体内异常水液等目的。一般分为五种：

温下：以温性药物为主，配合泻下药，以治疗里寒实证。

寒下：用苦寒泻下的药物，治疗里热实证。

峻下：运用峻猛泻下的药物，治疗腹水、便秘等实证。

润下：以润肠药为主，适当配合泻下药，达到润肠通便的目的。这种方法适用于体弱、产后或老年人及津液亏损的患者。

驱虫：用驱除或杀灭肠内寄生虫的药物驱除胃肠道寄生虫，以达到消除虫积等目的。此种药易损伤脾胃，故应用驱虫药后要注意调补脾胃。

下法容易损伤正气，如果使用不当，往往容易引起不良反应，所以在应用上，要中病即止。孕妇和体弱的病人须慎用。

4.和法：即和解法。利用有和解疏泄作用的药物来调和肝脾，和解表里等，以达到治疗的目的。一般分为两种：一

种为和解少阳，适用于邪气居于半表半里的疾病，如：寒热往来，口苦，咽干，疟疾等病症；另一种为调和肝脾，适用于肝脾失调、肝胃不和的证候。如情志抑郁，两胁胀痛，月经不调，食欲不佳等症。

有的把调和营卫、表里双解、补泄合用等也称为和法。但通常所说的和法主要指上述两种。

5.温法：是用温热的药物补益阳气，消除寒证。一般分为两种：一种为温中祛寒，主要用于脾胃阳虚而造成的虚寒证，如脘痞腹胀，纳谷不旺，手足不温，舌酸呕吐，大便不实，形神衰疲等；另一种为回阳救逆，适用于疾病严重时出现的四肢冰冷，恶寒蹑卧，吐利汗出，脉象微细或沉伏欲绝等阳虚证。

6.清法：利用寒凉的药物，达到清热泄火、解毒、凉血等目的。一般分为清热解毒和滋阴清热两种。

7.补法：利用补益的药物，通过补益体质和机能的不足达到治疗的目的。一般分为补气、补血、补阴、补阳四种。有的将固涩法也归在补法的范畴，即用酸涩收敛药物固其滑脱，适用于各种虚证所引起的自汗，滑精，脱肛，尿频等症。

8.消法：运用消导、疏理的药物达到消食导滞和消痞散结等目的。若气虚中满及虚寒腹胀者应当忌用。

总之，疾病的变化过程是一个“正”“邪”斗争的复杂过程。治疗也就应当随着病情的变化而灵活地使用八法。必要时需要几个方法配合使用，才能收到予期的效果。此外，在治疗疾病时，除了要看到“病邪”这个外因条件外，更要时刻看到人体的内因——“正气”，这个具有决定意义的因

素。要本着急则治标，缓则治本的原则，抓住主要矛盾，施使治疗，从根本上解决问题。例如一个素常肾虚腰痛的患者，最近又得了感冒，感冒是标证，肾虚是本证。我们必须首先治疗感冒，待感冒好后再使用补肾的方法治疗肾虚这个本证。再如一个肾虚哮喘的患者，当哮喘发作严重时，先要以平喘为主，待喘息好转后，再行补肾，以达到从根本上治愈疾病的目的。这就是中医所说的“急则治标，缓则治本，治病必求其本”的道理。

内　科

中医内科在整个中医临床各科中占着很大的比重，范围极为广泛。概括地说，可分为外感时病和内科杂病两大类，前者指外感六淫之邪而致的疾病，如感冒等；后者泛指除外感病以外的一般内科疾患。以下我们将内科中常用的中成药，按照通俗的分类方法加以介绍。

一、感　冒　类

感冒为临床常见的外感疾病。中医所说的感冒包括现代医学的上呼吸道感染和流行性感冒等疾病。临床上以头痛，鼻塞，流涕，恶风，发热为主要见症。按其病情轻重可分为两种：其轻者一般俗称“伤风”；其重者，称为重伤风或时行感冒，因其有较强的传染性和流行性，所以古人列为“时行病”之一。中医认为感冒的发生，多因人体虚弱，或内有伏热，加之外界气候突变，冷热失常，感受时邪而引起。临床一般可分为风寒、风热、时行感冒和暑湿感冒等四种。

（一）风寒

风寒感冒为外感风寒邪气而发病。临床以恶寒重，发热轻，头痛无汗，肢体痠痛，鼻流清涕，喉痒咳嗽等为主要见症，舌苔薄白，脉象浮紧。治疗应以辛温解表的方法。一般可服通宣理肺片(1)。若素体气虚，再外感风寒，而见头痛无汗，咳嗽痰多，痰白清稀，胸闷不舒，脉弱等症，可服用

“祛邪中少佐扶正”的参苏理肺丸或糖浆(2)(方内有少许人参，可补气扶正）。在使用上述两种成药中，要注意两点：一是要掌握“恶寒重，发热轻”；二是不能有“热证”，如咽喉肿痛，口干舌燥等。

此外，还有一种“外感风寒，内有实热”的情况，症见憎寒壮热，目赤睛痛，大便秘结，小便赤涩等，可服防风通圣丸(3)，表里同治，以达到外散风寒，内清实热的目的。

（二）风热

风热感冒为外感风热邪气而发病。临床以发热重，恶寒轻，头痛或晕，无汗或少汗，咽痛口渴，舌苔薄白或微黄，脉象浮数等为主要见症，治疗当以辛凉解表的方法，一般可服银翘解毒片(4)。若内热较重者，可服用清热作用较大的羚翘解毒片(5)或羚羊感冒片(6)等。若风热感冒以头晕头痛，咳嗽为主症者，可服用桑菊感冒片(7)，以疏风散热，止咳化痰。

（三）时行感冒

中医所说的时行感冒，多属于现代医学的流行性感冒，此种感冒发病较急，病情较重，传染较快，故须加强预防。时行感冒特点以全身症状较重，多发生在冬、春两季，主要见症为突然发冷发烧，有时体温可达40℃左右，周身严重痠痛不适，或有剧烈头痛，舌质红，苔微黄，脉浮数有力，中医称为“瘟邪袭表”（瘟字，有传染之意），治疗应以清瘟解表，发汗退热为宜，可合服清瘟解毒片(8)、银翘解毒片(4)。风热感冒和时行感冒多有咽喉肿痛的现象，一般可予喉痛丸（原名六神丸）(9)含化，或内服牛黄噙化丸(10)。音哑者可服清音丸(11)。

关于暑湿感冒的证治，因其多发生于夏月季节，所以放

到“夏令常见疾患类”一篇中讲述。

附：中成药组成（1--11）

（1）通宣理肺片

〔组成〕紫苏叶　麻黄　葛根　前胡　陈皮　半夏　杏仁　茯苓　黄芩　桔梗　枳壳　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服四片，温开水送下。

（2）参苏理肺丸（糖浆）

〔组成〕党参　紫苏叶　葛根　前胡　橘红　半夏　茯苓　桔梗　枳壳　木香　甘草　生姜　大枣

〔服法与用量〕丸剂每日服一次，每次服三钱，温开水送下。糖浆每日服二次，每次服20毫升，温开水调服。

（3）防风通圣丸

〔组成〕芥穗　防风　麻黄　薄荷　连翘　桔梗　黄芩　石膏　川芎　当归　白芍　大黄　芒硝　白术　栀子　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

（4）银翘解毒片

〔组成〕银花　连翘　桔梗　薄荷　牛蒡子　豆豉　竹叶　芥穗　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服4—8片，温开水送下。

（5）羚翘解毒片

〔组成〕羚羊角　银花　连翘　桔梗　薄荷　牛蒡子　豆豉　竹叶　芥穗　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服4—8片，温开水送下。

（6）羚羊感冒片

〔组成〕羚羊角　银花　连翘　桔梗　薄荷　牛蒡子　豆豉　竹叶　芥穗　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服4—8片，温开水送下。

（7）桑菊感冒片

〔组成〕桑叶　菊花　薄荷　连翘　桔梗　杏仁　芦根　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服4—8片，温开水送下。

（8）清瘟解毒片

〔组成〕大青叶　牛蒡子　连翘　柴胡　防风　竹叶　黄芩　葛根　元参　花粉　羌活　桔梗　白芷　川芎　赤芍　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服4—8片，温开水送下。

（9）喉痛丸（原名六神丸）

〔组成〕牛黄　珍珠　雄黄　麝香　冰片　蟾酥

〔服法与用量〕每次口含十粒，徐徐咽下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

（10）牛黄噙化丸

〔组成〕牛黄　麝香　黄连　冰片　金果榄　柿霜　朱砂　雄黄　硼砂　绿豆粉

〔服法与用量〕每次一丸，随时噙化。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(11) 清音丸

〔组成〕桔梗　寒水石　薄荷　诃子　青黛　硼砂　冰片　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

二、咳　喘　类

咳嗽和喘是临床常见的病症。许多疾病如感冒、气管炎、支气管哮喘、心脏病等都可以引起咳嗽或喘，但这些疾病临床上不一定以咳嗽和喘为主症。下面所谈的是以咳嗽和喘为主症的疾病，主要指现代医学急慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿等疾病。

(一) 咳嗽

咳嗽为肺系疾患的主要症状之一。祖国医学将有声无痰的称为“咳”，有痰无声的称为“嗽”，有痰有声的称为“咳嗽”。实际上咳与嗽往往并见。

咳嗽一症，有急、慢之分，急性多属外感暴咳；慢性多属内伤久咳。外感咳嗽，其病因由于感受四时邪气，如风寒、风热等，或从口鼻而入，或从皮毛而侵，影响肺脏，肺气失于宣降，气逆而为咳。内伤咳嗽，或由外感咳嗽病久不愈而致，或由于他脏有病累及肺脏而成。若咳嗽反复发作，还可导致咳喘。临床上一般可将咳嗽分为风寒、风热、肺热、阴虚肺热、痰湿、虚弱等六种类型。

1.风寒：风寒咳嗽系由风寒邪气犯肺，致使肺气不能宣畅而致。症见咳嗽痰稀，鼻塞流涕等，多兼有风寒感冒的症状，舌苔薄白，脉浮。治疗当以解表，散寒，宣肺之法，可

服通宣理肺片(1)，素禀气虚者，服参苏理肺丸或糖浆(2)。

2.风热：风热咳嗽为风热邪气犯肺，肺失清肃而致。症见咳痰白粘或黄，口渴咽痛，身热有汗，或见恶风头痛头晕，舌苔白或微黄，脉浮数等。治疗宜解表清热，宣肺之法，可服桑菊感冒片(7)。

3.肺热：肺热咳嗽多由风热咳嗽发展而来。临床主要见症为咳嗽黄痰，痰质粘稠，口干舌燥，大便秘结，舌苔白或黄，脉弦滑或数等，治宜清热止咳化痰之法，可服清肺抑火膏或丸(12)。但应注意外感风寒咳嗽者忌用。若肺热不重，但兼有胃经湿热而并见胸脘痞闷，咳嗽痰多者，可服橘红丸(13)。若肺热咳嗽，兼有喘息，呼吸气逆，或有身热汗出，鼻翼搧动，口渴等症者（包括部分现代医学所说的肺炎），可服止嗽定喘丸(14)，以清肺，化痰，定喘。由于本药中麻黄含量较大，故高血压、心脏病者忌用或慎用。一般肺热咳喘痰多者，可服止嗽青果丸(15)。

4.阴虚肺热：肺阴不足，兼有肺热，表现为干咳无痰或痰量极少，咽干肿痛，口渴鼻燥，或偶见痰中带血，舌质红少苔，脉细数等（包括部分现代医学所说的慢性咽炎），可服用养阴清肺膏或丸(16)。咳血较重者，加服荷叶丸(17)。

5.痰湿：中医认为，痰的生成多由水湿停留而致，而水湿停留的原因，多半由于脾虚不足以运化而成。所以古人有“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”的说法。痰湿咳嗽主要症见咳嗽痰多，痰白而粘，胸膈胀满，或有恶心，头眩等，舌苔白腻，脉濡滑。治宜健脾燥湿化痰之法，可服用二陈丸(18)。若胃经症状不大明显，单见咳嗽痰多者，可服止嗽丸(19)。

6.虚弱：虚弱咳嗽多为病程较长的慢性咳嗽，中医认为

肺为气之主，肾为气之根；肺主呼气，肾主纳气。故肺、肾两脏的虚弱，也可造成咳嗽。若虚劳久嗽，咳嗽无力，痰多壅盛，而兼有口燥咽干等症者，可服二母安嗽丸[20]。

若肾阴虚弱，长期干咳无痰，但发作不甚，而全身症状较明显者，如腰膝痿软，四肢无力，骨蒸劳热，脉沉细数等，可常服麦味地黄丸[21]，滋阴补肾、敛肺止咳，但要注意这种药滋阴作用较强，所以痰多湿盛的患者不宜服用。

上述两种成药均系治疗慢性虚弱咳嗽所用，所以凡初起外感咳嗽，无论其属寒属热，均应绝对禁用，否则邪气被敛，病情更会加重。

（二）喘证

喘证以呼吸短促急迫，甚至张口抬肩为特征。临床上一般分为虚实两类，实喘为邪气壅肺，气失宣降所致；虚喘为肺不降气，肾不纳气，精气内虚而成。至于虚中夹实之喘，法当权衡轻重缓急，标本兼治。

1.风寒：此为风寒侵肺，壅阻气机，肺气不得宣降，而发生喘症。症见咳喘胸闷，痰白质稀，多兼恶寒，无汗的表证，舌苔薄白，脉浮紧。当以疏表散寒，宣肺平喘之法，可服通宣理肺片[1]。若外感风寒，内有痰饮，而症见呼吸急促，喉中痰声如水鸡音，脉沉紧等，可服寒喘丸[22]，以解表逐饮止喘。

2.肺热：肺热喘症，或由表邪化热入肺，或因肺中素有蕴热，致使肺气郁闭，气逆而为喘。临床症见出气粗长，痰涎壅盛，色黄质稠，胸膈满闷，咽干口渴，舌苔黄，脉滑数等，治宜清热、平喘之法，可服百花定喘丸[23]。若痰少或伴有咳嗽者，可服止嗽定喘丸[14]。

3.痰浊：人体脾胃虚弱，运化失常，致使水湿停留，生痰上扰于肺，肺为痰阻，宣降不得，气逆而成喘。主要见症为喘咳痰多粘稠，气粗胸满，口粘，大便不爽，舌苔腻，脉滑等，可服橘红化痰丸[24]，以燥湿，平喘。

以上风寒、肺热、痰浊三型均为实喘。

4.虚喘：虚喘多由肾脏虚弱所造成。一般表现为呼吸无力，呼多吸少，动则气短，汗出肢冷，喘甚则尿不禁，或兼腰脊冷痛，阳萎滑精等，舌质淡，或胖嫩，脉沉无力，此为肾气虚弱而致，可服金匮肾气丸[25]。若肾阴虚弱，喘而痰少，咽干口燥，舌质红，脉细等，可服麦味地黄丸[21]。此两种药均应常服，方可获效。

若虚喘发作较甚，偏于肾气虚者，可服蛤蚧定喘丸[26]；偏于阴虚而兼肺热痰多者，可服用二母安嗽丸[20]。

如病情严重，真元亏惫，喘促加剧，汗出肢冷，脉浮大无根者，可服黑锡丹[27]回阳救脱。但此药不可久服。

附：中成药组成（12—27）

（12）清肺抑火膏（丸）

〔组成〕黄芩　黄柏　花粉　栀子　前胡　桔梗　大黄　苦参　知母

〔服法与用量〕膏剂每日服二次，每次服五钱，温开水冲服。丸剂每日服二次，每次服一丸。

〔禁忌〕孕妇忌服。

（13）橘红丸

〔组成〕橘红　浙贝母　茯苓　麦冬　杏仁　石膏　萎皮　陈皮　生地　桔梗　紫菀　半夏　紫苏子　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(14) 止嗽定喘丸

〔组成〕麻黄　杏仁　石膏　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二钱（相当于浓缩丸十粒），温开水送下。

〔禁忌〕高血压、心脏病者忌用或慎用。

(15) 止嗽青果丸

〔组成〕青果　川贝母　冬花　白果　半夏　黄芩　马兜铃　杏仁　石膏　桑皮　百合　麻黄　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(16) 养阴清肺膏（丸）

〔组成〕生地　元参　浙贝母　薄荷　麦冬　丹皮　白芍　甘草

〔服法与用量〕膏剂每日服二次，每次服五钱，温开水冲服。丸剂每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(17) 荷叶丸

〔组成〕荷叶　生地炭　茅根　栀子炭　蒲黄炭　大蓟　小蓟　牛膝　槐花炭　紫菀　仙鹤草　侧柏炭　三七　龟鹿二仙胶　黄酒

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(18) 二陈丸

〔组成〕半夏　茯苓　陈皮　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

(19) 止嗽丸

〔组成〕桔梗　百部　陈皮　荆芥　白前　紫菀　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

(20) 二母安嗽丸

〔组成〕浙贝母　知母　冬花　紫菀　百合　元参　麦冬　杏仁　罂粟壳

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(21) 麦味地黄丸

〔组成〕熟地　山药　山茱萸　丹皮　茯苓　麦冬　五味子　泽泻

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(22) 寒喘丸

〔组成〕半夏　麻黄　细辛　五味子　冬花　紫菀　射干　干姜　大枣

〔服法与用量〕每日服一次，每次服三钱，温开水送下。

(23) 百花定喘丸

〔组成〕百合　丹皮　陈皮　黄芩　桔梗　天冬　紫菀　麦冬　杏仁　麻黄　花粉　前胡　薄荷　冬花　沙参　石膏　五味子

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(24) 橘红化痰丸

〔组成〕橘红　罂粟壳　川贝母　五味子　白矾　杏仁　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(25) 金匮肾气丸

〔组成〕熟地　山药　山茱萸　丹皮　茯苓　泽泻　附子　肉桂

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(26) 蛤蚧定喘丸

〔组成〕蛤蚧　瓜蒌　黄芩　鳖甲　麦冬　杏仁　紫菀　百合　麻黄　黄连　紫苏子　石膏　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(27) 黑锡丹

〔组成〕黑锡　肉豆蔻　故纸　沉香　茴香　胡芦巴　木香　附子　硫黄　阳起石　川楝　肉桂　糯米面

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一钱，温黄酒或温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

三　清　热　类

本类指以清解里热为主要功用的中成药。

中医所说的热证，不一定指人体体温的升高，而是指阳热之邪（如风温、燥火等）侵入人体或人体本身机能亢盛所造成的一系列证候。如发热，口渴，口臭，面赤，便燥，舌质红，脉弦数等。多见于现代医学的感染性疾病，以及能量代谢增高的疾病，如急性支气管炎，甲状腺机能亢进等。热证一般分为“实热”和“虚热”两种。实热拟以清热泻火之法；虚热应以滋阴清热之法。

清热类的药物和方剂范围很广，有些没有制成成药，有些分别放在其它类中介绍，如治疗虚热的一些成药，就放在“补益类”中讲述。以下仅就一般治疗“实热”的成药，分为上焦热、肺胃热、肝胆热、热入心包、膀胱湿热等五类作

一简单的介绍。

（一）上焦热

这里所说的上焦热，是一个俗称。它指一些以头部热证表现突出的病症，实际上包括部分风热外感在内。一般外感风寒，内有郁热，而以头晕头痛，暴发火眼，鼻塞不通，脉象浮数等为主要见症者，可服芎菊上清丸[28]。若风热上攻，而以头眩头痛为主症者，可服清眩丸[29]。

若上焦实热，头晕头昏，齿龈肿痛，口舌生疮或糜烂者，可服黄连上清丸[30]。热重者可服牛黄上清丸[31]。若热重而以大便秘结为突出表现者，可服牛黄解毒片[32]，清热通便。

若咽喉红肿疼痛者，可予喉痛丸[9]含化，内服牛黄噙化丸[10]，或外吹锡类散[33]。口舌生疮或溃疡，齿龈溃烂者，可外吹珠黄消疳散[34]、冰硼散[35]等。

（二）肺胃热

一般肺胃有热，症见头眩齿肿，衄血，口舌生疮，大便秘结，舌质红，脉象弦数或洪数，可服栀子金花丸[36]，以清肺胃之热。若以肺热为主，症见咳嗽黄痰，大便秘结者，可服清肺抑火膏[12]（参见“咳喘类”）。若以胃肠热盛为主，症见口臭口苦，齿龈肿痛，唇角糜烂，大便干燥，舌苔黄，脉洪数者，可服清胃黄连丸[37]。

若肠胃有热，兼有饮食停滞，而以胸脘满闷，大便秘结为主症者，可服清宁丸[38]。若积滞热甚，大便不通，或溏而不爽，腹满痛，脉数有力者，可服九制大黄丸[39]。

（三）肝胆热

肝胆湿热，症见面红目赤，烦热口苦，两胁胀痛，尿赤

尿痛，舌苔黄，脉弦数者，可服清肝胆、利湿热的胆草泻肝丸（原名龙胆泻肝丸）[40]。

若肝胆热盛，而以耳聋耳鸣为主症者，可服耳聋通窍丸[41]。若肝火旺盛，头晕耳聋，神志不宁，面赤目红，大便燥结、脉弦有力者，可服用泻肝作用较强的当归龙荟丸[42]。使用以上两种成药时，要注意一定用于热盛的实证，凡肾虚耳鸣耳聋，应当绝对禁止。

若因肝火上冲而致的暴发火眼，两目昏暗，羞明怕光者，可服黄连羊肝丸[43]。

（四）热入心包

中医所说的心包（也称心包络）是心的外围，具有保护心的作用。湿热病邪发展至心时，首先侵犯心包络，出现神经系统意识障碍的症状，如神智昏迷，谵语狂躁等，叫做“热入心包”，治疗宜清热、解毒，开窍。若以发热，神志不清，谵语为主症者，可服抗热牛黄丸（原名安宫牛黄丸）[44]；若以高热，抽搐为主症者，可服紫雪散[45]；若以昏迷为主症者，可服清热解毒丸（原名局方至宝丹）[46]。

（五）膀胱湿热

膀胱为贮尿、排尿的器官，若湿热之邪侵及膀胱，则可出现小便赤短，尿道热痛，或尿频，尿急，小便不利，点滴刺痛等症，中医称为“淋症”。治宜清热导淋，可服八清五淋丸[47]。若病情较轻，症见小便赤涩，淋漓[illegible]等，可服妇科五淋丸[48]，此药并非妇女专用，男子淋症较轻者也可使用。

此外，妊娠期间胎热上攻，而见头眩目赤，口舌生疮等症者，可服孕妇金花丸[49]。若血分有热，烦躁口渴，牙疼

咽干，胎热作呕者，可服清热凉血膏[50]

附：中成药组成（28——50）

（28）芎菊上清丸

〔组成〕菊花　黄柏　大黄　黄芩　川芎　桔梗　栀子　防风　薄荷　荆芥　滑石　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

（29）清眩丸

〔组成〕川芎　白芷　薄荷　荆芥穗　石膏　大黄　天麻　菊花　元参

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

（30）黄连上清丸

〔组成〕大黄　栀子　黄芩　连翘　桔梗　石膏　川芎　防风　黄柏　薄荷　荆芥穗　菊花　白芷　蔓荆子　黄连　旋复花　甘草

〔服法与用量〕每日服一至二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

（31）牛黄上清丸

〔组成〕大黄　石膏　黄连　桔梗　荆芥穗　赤芍　白芷　川芎　黄芩　当归　栀子　连翘　莲子心　菊花　薄荷　黄柏　生地　冰片　甘草　牛黄

〔服法与用量〕每日服一至二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(32) 牛黄解毒片

〔组成〕牛黄　石膏　桔梗　雄黄　大黄　冰片　黄芩　朱砂　甘草

〔服法与用量〕每日服一次，每次服四片，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(33) 锡类散

〔组成〕象牙屑　青黛　壁钱炭　人指甲　珍珠　牛黄　冰片

〔用法与用量〕将此药少许吹喉咙患处，一日数次。

(34) 珠黄消疳散

〔组成〕花粉　青黛　黄连　硼砂　大青叶　薄荷　儿茶　牛黄　珍珠　冰片　甘草

〔用法与用量〕涂擦患处，一日数次。

(35) 冰硼散

〔组成〕冰片　硼砂　朱砂　元明粉

〔用法与用量〕每次少许，吹于患处。

(36) 栀子金花丸

〔组成〕栀子　黄芩　大黄　黄柏　花粉　知母　银花　黄连

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(37) 清胃黄连丸

〔组成〕黄连　黄芩　黄柏　栀子　知母　桔梗　花粉　连翘　生地　石膏　元参　甘草　赤芍　丹皮

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

(38) 清宁丸

〔组成〕大黄　半夏　槐条　绿豆　桑枝　麦芽　车前草　厚朴　陈皮　白术　香附　黄芩　黑豆　黄酒

〔服法与用量〕每日服一至二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(39) 九制大黄丸

〔组成〕大黄　黄酒

〔服法与用量〕每日服一次，每次服二钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(40) 胆草泻肝丸（原名龙胆泻肝丸）

〔组成〕龙胆草　泽泻　柴胡　生地　栀子　木通　车前子　当归　黄芩　甘草

〔服法与用量〕每日服一次，每次服三钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(41) 耳聋通窍丸

〔组成〕龙胆草　黄柏　大黄　栀子　菖蒲　当归　芦荟　黄芩　黄连　磁石　木香　跻路通

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一钱五分。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(42) 当归龙荟丸

〔组成〕当归　龙胆草　芦荟　栀子　黄连　黄柏　黄

芩　熟大黄　青黛　木香　麝香

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(43) 黄连羊肝丸

〔组成〕羊肝　黄连　龙胆草　充蔚子　木贼　密蒙花　黄柏　青皮　夜明砂　柴胡　胡黄连　决明子　黄芩　石决明　刺蒺藜

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(44) 抗热牛黄丸（原名安宫牛黄丸）

〔组成〕黄连　郁金　黄芩　栀子　牛黄　朱砂　犀角　雄黄　珍珠　麝香　冰片

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇及三岁以下儿童遵医嘱服用。

(45) 紫雪散

〔组成〕寒水石　滑石　磁石　石膏　青木香　元参　升麻　芒硝　硝石　沉香　丁香　羚羊角　朱砂　犀角　麝香　黄金

〔服法与用量〕每日一至二次，每次五分至一钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(46) 清热解毒丸（原名局方至宝丹）

〔组成〕犀角　玳瑁　朱砂　雄黄　琥珀　安息香　牛黄　麝香　冰片

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一丸，温开水送下。

(47)分清五淋丸

〔组成〕大黄　木通　黄芩　滑石　猪苓　泽泻　黄柏　萹蓄　栀子　瞿麦　知母　车前子　茯苓　甘草

〔服法与用量〕每日服一至二次，每次服三钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(48) 妇科五淋丸

〔组成〕当归　生地　川芎　滑石　木通　栀子　白芍　石苇　黄连　海金砂　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(49) 孕妇金花丸

〔组成〕栀子　银花　川芎　黄柏　黄芩　当归　白芍　生地　黄连

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

(50) 清热凉血膏

〔组成〕生地　黄芩

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一两，温开水冲服。

四、痹症、痿症类

痹症、痿症系为中医术语。因其均以四肢疾患为主要见

症，故合在一篇中讲述。

（一）痹症

中医所谓的痹症，包括现代医学的风湿性关节炎、类风湿性关节炎等疾患。“痹”就是闭塞不通的意思。人体素禀正气不足，再加感受外邪，如久卧湿地或劳累之后，淋雨冒寒等，致使风、寒、湿三邪乘虚而入，留着于经络之间，气血运行不畅而出现四肢肌肉疼痛、麻木的病症，称为痹症。

痹症虽然因风寒湿三气侵入而造成，但因人体体质强弱的差异，病邪性质的不同，临床表现也就不一样。如风气偏胜的，表现为疼痛游走不定，称为风痹，又名行痹；如寒气偏胜，疼痛比较厉害，痛有定处，遇热则减，遇冷则甚，称为寒痹，又名痛痹；如湿气偏胜，痛虽不甚但尤感沉重麻木，活动不灵，肌肉不仁，称为湿痹，又名着痹。痹症虽作上述分类，但临床上往往错综复杂，必须抓住主要矛盾，辨证施治。

在治疗方面应针对病因，施以祛风、散寒、除湿之法。一般风寒湿痹均可服用老鹳草膏[51]。苦风寒之邪偏重，症见周身串痛，遇寒加重，而肢体沉重不明显者，当以散风，除寒为主，佐以祛湿活血之剂，可服骨疼丸（原名骨疼紫金丹）[52]。若风湿之邪偏重者，当以祛风除湿之剂，可服豨签丸[53]。若寒邪偏重，症见肢体疼痛较剧，自觉冷感，得热稍差，当以散寒为主，佐以疏风燥湿温通之剂，可服小活络丹[54]，外用坎离砂[55]。若筋骨素弱，复感外邪，症见肢体疼痛，筋骨无力，四肢麻木，行步艰难者，应予强筋壮骨、祛风除湿之品，可服虎骨木瓜丸[56]、虎骨酒[57]或五加皮药酒[58]。若平素肝肾虚弱，正气不足，被风寒湿邪乘虚而

入，造成腰膝冷痛，肢体痿软，屈伸不便，脉弱无力等症状，当以扶正祛邪之剂，可服独活寄生丸[59]。若风寒湿痹较重者，可酌服风湿关节炎片[60]（此药内含有毒性较大的中药马钱子，所以使用时应当注意）。

上述各种风寒湿痹症，均可选用舒筋活络膏[61]、追风膏[62]等外用药。

临床上尚有一种病势较急，关节局部红肿热痛，触之痛甚，屈伸不利，甚则不能活动，伴有发热，口渴，烦燥，舌质红，苔黄，脉数者，中医称为热痹，多见于风湿病急性活动期。由于患者体质素属热盛，加之风寒湿邪的侵扰，邪郁化热而成。此种痹症目前尚无相应的中成药治疗，可用白虎加桂枝汤加减（桂枝、石膏、知母、地龙、连翘、赤芍）。

（二）痿症

痿症又名痿躄。是指肢体的筋脉弛缓，手足痿软无力，不能运动的一类病症。包括现代医学的重症肌无力、小儿麻痹后遗症、多发性神经炎、周期性麻痹以及进行性肌萎缩等疾病。

祖国医学认为，痿症的发病不外乎“外邪”“内伤”两个原因造成。“外邪”多由温毒之邪灼伤肺胃之阴，或湿热浸淫而成；“内伤”多因肝肾亏损，精血不足所致。下面分三种类型讲述：

1.湿热浸淫：因久处湿地，或冒雨露，感受外来之湿邪，郁而生热，浸淫筋脉，以致筋脉弛缓不用，成为痿症。症见两足痿软或微肿，按之微热，胸脘痞闷，身重困倦，喜凉恶热，口喝不欲饮，小便黄或者小便赤涩热痛，舌苔黄腻，脉象濡数等。治疗应以清热渗湿为主，可服二妙丸或三

妙丸[63]。

2.肝肾亏损：因体虚病久，正气亏损，或房劳过度，精血两伤而至肝肾不足，筋骨经脉失去濡养，致成本病。症见下肢逐渐痿弱不用，兼有遗精早泄，遗尿，腰脊痠软，头昏目眩等，久则骨肉瘦削，舌质红少苔，脉细数等。治疗应以滋阴清热，补益肝肾为主，可服健步虎潜丸[64]。为了加强其滋补肾阴的作用，可加服六味地黄丸[65]。服法是每日1—2次，每次各一丸。

3.肺热熏灼：即古人所谓"肺热叶焦，发为痿躄"之意，主要是由于温邪犯肺或病后邪热未清，肺受热灼，阴津受伤，筋脉失于濡养，导致手足痿弱不用，发为痿症。这种类型的痿症，多发生于温热病中或病后。症见两足痿软不用，心烦口渴，咳呛喉干，小便短赤热痛，舌红苔黄，脉细数。治疗当以清热润燥，养肺益胃为主。目前尚无适当中成药，可以清燥救肺汤加减（人参、麦冬、沙参、石膏、杏仁、胡连、牛膝）。

此外，上述各型痹症和痿症，在服用中成药的同时，如能配以针灸、推拿、理疗等疗法，则效果更佳。

附：中成药组成（51——65）

（51）老鹳草膏：

〔组成〕老鹳草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一两，温开水冲服。

（52）骨疼丸（骨疼紫金丹）

〔组成〕木瓜　牛膝　杜仲炭　虎骨甘草　桂枝　红花

独活　钻地风　防风　乳香　没药　麻黄　当归　羌活　千年健　浙贝母　鹿角胶　刺蒺藜　川贝母　三七

〔服法与用量〕每晚临睡时服一钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(53) 豨签丸

〔组成〕豨签草　黄酒

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二丸，温开水送下。

(54) 小活络丹

〔组成〕川乌　草乌　胆南星　地龙　乳香　没药

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(55) 坎离砂

〔组成〕麻黄　当归　附子　透骨草　红花　干姜　桂枝　牛膝　白芷　荆芥　木瓜　羌活　独活　防风　生艾绒　铁落花

〔用法与用量〕将药取出用好醋三、四钱拌潮，仍装布袋内，用棉物盖好，约一小时，热后，放在患处。如热度过高，应注意防止烫伤。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱使用。

(56) 虎骨木瓜丸

〔组成〕虎骨　木瓜　当归　白芷　威灵仙　青风藤　海风藤　川芎　牛膝　川乌　草乌　人参

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(57) 虎骨酒

〔组成〕白酒　虎骨胶　乳香　没药　官桂　砂仁　豆蔻仁　檀香　松节　木香　丁香　虎骨酒膏　红糖　蜂蜜　再造丸　活络丹　透骨搜风丹　红曲　玉竹　陈皮

〔服法与用量〕每日服二次，每次温服三至五钱。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(58) 五加皮药酒

〔组成〕白酒　冰糖　玉竹　党参　姜黄　五加皮　陈皮　菊花　红花　牛膝　白术　白芷　当归　青风藤　川芎　威灵仙　木瓜　海风藤　檀香　肉豆蔻等

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(59) 独活寄生丸

〔组成〕独活　桑寄生　秦艽　防风　细辛　当归　芍药　川芎　生熟地　杜仲　牛膝　人参　茯苓　甘草　桂心

〔服法与用量〕每次服一丸，每日一至二次，温开水送下。

(60) 风湿关节炎片

〔组成〕制马钱子　乳香　没药　钻地风　羌活　苍术　川断　地龙　桂枝　红花　木瓜　当归　麻黄　千年健　桃仁　穿山甲　牛膝

〔服法与用量〕每日仅服一次，每次服四片，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇禁服。

(61) 舒筋活络膏

〔组成〕虎骨　防风　红花　木瓜　老鹳草　牛膝　骨

碎补　青风藤　海风藤　功劳叶　当归　麻黄　乳香　没药　麝香　麻油　漳丹

〔用法与用量〕温水化开，贴于患处。

〔禁忌〕孕妇禁贴腹部。

(62) 追风膏

〔组成〕牛膝　蜈蚣　当归　天麻　羌活　穿山甲　细辛　乌药　白芷　独活　海风藤　威灵仙　蛇蜕　没药　乳香　雄黄　檀香　冰片　血蝎　丁香等

〔服法与用量〕贴患处。

〔禁忌〕孕妇禁贴腹部。

(63) 二妙丸

〔组成〕苍术　黄柏

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

三妙丸

〔组成〕苍术　黄柏　牛膝

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱。温开水送下。

(64) 健步虎潜丸

〔组成〕人参　虎骨　木瓜　枸杞　牛膝　黄芪　黄柏　知母　龟板　白芍　秦艽　菟丝　防风　羌活　补骨脂　熟地　远志　川断　杜仲炭　当归等

〔服法与用量〕每次服一丸，每日服二次，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(65) 六味地黄丸

〔组成〕熟地　山茱萸　山药　丹皮　泽泻　茯苓

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

五、中　风　类

“中风”是中医的病名。它以突然昏倒，不省人事，或言语困难，口眼歪斜，半身不遂等为主症。因其起病迅速，而又变化多端，与自然界里“风的善行数变”特征相似，故称为中风。一般包括现代医学的脑溢血，脑血管痉挛，脑血栓形成，脑栓塞，特发性蛛网膜下腔出血等病。其病因多由人体素禀虚弱，心、肝、肾三脏阴阳平衡失调，加之外界精神刺激，或嗜好饮酒及久食肥甘厚味，致使阴虚阳亢，化火、生痰、动风，横窜经络，甚则迫动气血上冲脑部。

中风依其病情程度，可分为中经络和中脏腑两种。

（一）中经络

为中风的轻证，又可分为两种情况。

1.风痰：症见口眼歪斜，颜面麻木，四肢麻木不仁，活动不利，甚则半身不遂，手足拘急，脉浮滑等。治疗当以养血祛风通络之法，服活络丹[66]（注意不是小活络丹）。若症状较重者，可服再造丸[67]。

2.阴虚阳亢：症见突然发生口眼歪斜，舌强语言不利，或半身不遂，头痛眩晕，耳鸣、目不清，舌质红，脉弦滑数等。治疗当以平肝潜阳，化痰通络之法。目前尚无完全适合的成药，若需用成药，可予钩藤（八钱——一两）煎汤冲服天麻丸[68]，另服脑立清[69]。若痰多者，可加服竹沥膏[70]。

（二）中脏腑

为中风的重证。症见突然昏倒，不知人事，口眼歪斜，口中流涎等。治疗当急以针灸，辨别闭证、脱证，配合成药治疗。

1.闭证：属实。一种症见两手握固，牙关紧闭，气粗痰壅，面赤身热，大便秘结，小便没有，舌苔黄或腻，甚则舌卷缩，脉弦滑有力或数等，这种情况中医称为“阳闭”，治疗宜以“凉开”之法。可急以针刺人中、太冲及十二井穴放血，即服抗热牛黄丸(44)或清热解毒丸(45)。症轻者，可服万氏牛黄清心丸(71)。

另一种症状表现为静而不烦，面白唇紫，痰涎壅盛，四肢不温，舌苔白或腻，脉象沉滑等，这种情况中医称为“阴闭”，治疗宜以“温开”之法。可急以针刺人中、太冲等穴，即服苏合丸(72)或十香丹(73)。

2.脱证：属虚。症状表现为突然昏倒，不省人事，眼合，口开，呼吸微弱，四肢冷或手撒，二便失禁，大汗出，舌质淡，苔白滑，脉细弱等。这是一种元气衰微的虚证，最忌用抗热牛黄丸、清热解毒丸及苏合丸等药。如果误用这些药物，不但达不到治病的目的，反而会造成严重的不良后果。应当急以艾灸关元、神阙温纳阳气，速服参附汤（人参、附子）回阳救脱。目前尚无适当的中成药治疗。

（三）后遗症

一般中风病人，经过上述方法处理后，有些完全恢复，有些则留有后遗症。若以半身不遂，语言不利为主症者，可服活络丹或再造丸；若以口眼歪斜为主症者，可自配方剂牵正散（白附子、僵蚕、全蝎等分。共为细末，每服三钱，热酒调服）。

此外，一般高血压者，平素可选服牛黄清心丸[74]或降压片[75]等，兼有肢体麻木者，可服豨桐丸[76]。

附：中成药组成（66—76）

（66）活络丹

〔组成〕蕲蛇肉　乌梢蛇肉　威灵仙　檀香　草乌　天麻　全蝎　何首乌　龟板　地龙　麻黄　羌活　细辛　沉香　乳香　没药　附子　虎骨　血竭等

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，黄酒送下、温开水亦可。

（67）再造丸

〔组成〕龟板　山甲　青皮　麻黄　三七　赤芍　全蝎　黄连　沉香　细辛　川芎　血竭　红花　乳香　没药　丁香　白芷　肉桂　人参　羌活等

〔服法与用量〕每次服一丸，白开水送下。

〔禁忌〕孕妇禁服。

（68）天麻丸

〔组成〕天麻　牛膝　元参　萆薢　杜仲炭　当归　附子　生地　独活　羌活

〔服法与用量〕每次服一丸，每日服二次，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

（69）脑立清

〔组成〕生磁石　生赭石　半夏　生酒曲　冰片　熟酒曲　牛膝　珍珠母　薄荷冰

〔服法与用量〕每日服二次，每次服十粒，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇禁服。体弱虚寒者不宜服用。

(70) 竹沥膏

〔组成〕竹沥水　饴糖

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水冲服。

(71) 万氏牛黄清心丸

〔组成〕牛黄　朱砂　黄连　黄芩　栀子　郁金

〔服法与用量〕每次服一丸，每日服一次，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(72) 苏合丸

〔组成〕诃子　檀香　乳香　丁香　白术　木香　荜拨　香附　沉香　安息香　朱砂　犀角　麝香　冰片　苏合香

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(73) 十香丹

〔组成〕藿香　天麻　莲子心　木香　降香　僵蚕　麝香　冰片　苏合香　牛黄　朱砂　安息香　甘草　琥珀　香附　丁香　乳香　沉香　檀香　柯子等。

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(74) 牛黄清心丸

〔组成〕牛黄　当归　川芎　黄芩　柴胡　阿胶　人参　山药　白芍　麦冬　肉桂　麝香　羚羊角　犀角　雄黄　白术　冰片　朱砂　白蔹　大枣等

〔服法与用量〕每次服一丸，每日服二次，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(75) 降压片

〔组成〕花生叶　黄苓　槐角

〔服法与用量〕每日三次，每次四片，饭后服。

(76) 豨桐丸（片）

〔组成〕　豨签草　臭梧桐

〔服法与用量〕　每日服二次，每次服一丸，温开水送服。片剂日服二次，每次服 8 片至12片，温开水送服。

六、理　气　类

“气”是中医常用的术语，它的含意很广。概括说来，中医学里的“气”，概念有三个：一是指维持生命活动的精微物质，如“水谷之气”、“大气”等；二是指人体本身以及各个脏腑的机能活动，如“元气”、“中气”、“心气”、“肺气”等，临床常说的“气”，多指于此；三是指病邪方面，如“邪气”、“寒气”、“暑气”等。

中医诊治疾病相当重视气的作用，根据气的变化，采取相应的治法。一般说来，气的病理变化有四种：即气虚、气陷、气滞（气郁）和气逆。气虚宜用补气的方法，气陷宜用升气的方法，气滞宜用疏气的方法，气逆宜用降气的方法。我们下面要介绍的“理气类”，就是以疏利气机为主要作用的中成药。

引起气分郁滞的原因很多，主要为七情，其次是痰湿等阻滞而成。一般所说的疏气，常用于肝与脾胃。七情等精神刺激易伤肝经。痰湿等阻滞易伤脾胃。但肝与脾胃关系密切，一脏有病，每易影响另一脏，故临床上须审明因果，辨

清主次，辨证施治。

理气类中成药多具有行气、解郁、止痛、和胃、健脾等作用，但其大多辛香而燥，重用、久用能耗气伤津，故对于气虚、血虚、阴虚火旺以及妊娠患者均当慎用或禁用。

（一）肝气郁滞

中医所说的肝，与西医所指不同。祖国医学把一部分精神活动也归于肝脏的功能，称为“肝主谋虑”“性喜条达”，所谓“条达”就是象树枝条一样自由伸展的意思。正常情况下，肝气要自由地向四面伸散，若过强或长久地精神和情绪变化，肝气就会郁结停滞，不得舒展，也就是常说的“肝失疏泄”“肝失条达”或“肝气郁滞”了。肝气郁滞一般症见两胁胀痛或窜痛，胸闷食少，妇女乳房胀痛或月经不调，脉弦等，治法应以舒肝解郁的方法，可服舒肝丸(77)。若肝郁症状较重，两胁胀痛较甚，或兼有大便燥结者，可服舒肝调气丸(78)。若肝郁兼有脾胃寒凉者，如既有两胁胀痛，又有脘腹胀满，或有冷感等，可服舒肝解郁丸(79)。若肝郁化火的实证，症见两胁疼痛，脘痞吞酸，嘈杂嗳气，口苦舌红，脉象弦数等，而其中又以吞酸嘈杂为主症者，可服左金丸(80)。

若肝郁血虚，致使肝脾不和，且兼有热证者，如两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，脉象弦细等，可服加味逍遥丸(81)，以疏肝解郁，和调肝脾。

若以肝寒为主，症见小肠疝气，偏坠疼痛，或小腹疼痛，睾丸抽痛者，可服茴香橘核丸(82)，以理气、暖肝、散结。

（二）脾胃气滞

严格地讲，这一种情况很难与上述情况完全区分开，原因是肝与脾胃关系密切，生理上互相辅佐，病理上互相影

响。临床上一般可以胀满疼痛的部位作为鉴别参考，即肝气郁滞以两胁为主，脾胃气滞以胸脘腹部为主。为了便于应用，我们再将脾胃气滞按主症分为三类：

1.以胸脘胀满为主症者：因脾胃气滞而致的胸脘胀满，每兼见食欲减退，呃逆恶心等，一般可服开胸顺气丸[83]。若胸脘略有疼痛，或兼有大便不通，腹胀停食者，可服木香顺气丸[84]。

2.以脘腹疼痛为主症者：脘腹疼痛，临床多以脾胃气滞为主，而兼有肝气郁滞。若症见胃脘疼痛为主，或兼两胁胀满疼痛，饮食不佳，呕吐酸水者，可服沉香舒郁丹[85]。若胃脘疼痛较重，且兼有寒凉者，如遇寒则甚，遇热则减等，可服朴沉化郁丸[86]，此方较上方略加温胃、祛寒、止痛的药物。

若胃脘疼痛，寒凉较大，患者自己感觉脘腹冷痛，遇冷则甚，遇热则减者，可服十香止痛丸[87]。

3.兼有停食停水症者：停食，指因过食肥甘厚味，或饮食过量，而造成的食物不消，停于胃脘的病症。因食停胃脘，影响脾胃气机升降，则可出现气滞兼食滞的现象，症见胸脘痞闷，吱腐吞酸等。一般病情很轻，或过食肉类食物后，自觉胸闷不适者，可服山楂丸[88]。若病情较重，甚则腹胀时痛，大便泄泻不消化食物，舌苔厚腻，脉滑者，可服健胃宽胸丸[89]。

停水，在这里指因脾虚不能运化水湿而造成的腹胀，水肿等症。脾胃虚弱，势必影响气机及食消，所以停水症每与停食及气郁相兼。一般气滞兼停食停水，症见脘腹痞满胀痛，二便不利，饮食不佳等，可服木香槟榔丸[90]，行气导滞，

兼以泄热通便。

若兼停水停食较甚，积滞久留，病人体质不虚，症见胸腹胀满，倒饱嘈杂，二便不利等，可服槟榔四消丸[91]。若脘腹兼有疼痛者，可服烂积丸[92]。

若停水实证，症见腹胀浮肿，口渴气粗，二便秘结，脉沉数有力者，可服行气逐水的舟车丸[93]。此方中有大戟、芫花、甘遂等峻下逐水之药，故虚弱病人不可使用。且此三味药与甘草“相反”，不能合在一起使用，否则将会引起不良后果，故忌与含甘草的药物同服，服后须禁食盐酱等物。

附：中成药组成：（77—93）

（77）舒肝丸

〔组成〕白芍　姜黄　豆蔻仁　枳壳　厚朴　沉香　川楝　茯苓　陈皮　木香　砂仁　元胡

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

（78）舒肝调气丸

〔组成〕陈皮　元胡　莪术　郁金　菖蒲　百灵　枳实　龙胆　丹皮　郁仁　厚朴　牵牛子　白芍　姜黄　香附　木香等。

〔服法与用量〕每日服一次，每次服二钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

（79）舒肝解郁丸

〔组成〕枳壳　三棱　莪术　益智仁　肉桂　陈皮　槟

榔　干姜　甘草　木香　厚朴　青皮　肉豆蔻

〔服法与用量〕每日服一次，每次服二钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(80) 左金丸

〔组成〕黄连　吴茱萸

〔服法与用量〕每日服一次，每次服三钱，温开水送下。

(81) 加味逍遥丸

〔组成〕柴胡　当归　白芍　丹皮　白术　茯苓　栀子　薄荷　甘草

〔服法与用量〕　每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

(82) 茴香橘核丸

〔组成〕小茴香　橘核　川楝　荔枝核　乌药　海藻　昆布　桃仁　厚朴　木通　枳壳　元胡　肉桂　木香　吴茱萸　荜拨

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，黄酒送下，温开水亦可。

(83) 开胸顺气丸

〔组成〕槟榔　木香　山楂　神曲　麦芽　厚朴　枳实　青皮　乌药　大黄　莱菔子　甘草

〔服法与用量〕每日服一次，每次服二钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(84) 木香顺气丸

〔组成〕陈皮　青皮　乌药　三棱　大黄　山楂　黄芩　莪术　桔梗　甘松　厚朴　槟榔　枳实　枳壳　木香　肉桂　香附　吴茱萸　牵牛子

〔服法与用量〕每日服一次，每次服三钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(85) 沉香舒郁丹

〔组成〕沉香　陈皮　厚朴　木香　青皮　香附　元胡　柴胡　枳壳　豆蔻仁　砂仁　姜黄　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(86) 朴沉化郁丸

〔组成〕豆蔻仁　沉香　木香　厚朴　砂仁　青皮　柴胡　元胡　丁香　檀香　香附　莪术　姜黄　陈皮　枳壳　良姜　肉桂　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(87) 十香止痛丸

〔组成〕香附　乌药　檀香　元胡　香橼　蒲黄　沉香　厚朴　零陵香　降香　丁香　五灵脂　木香　排草香　砂仁　乳香　良姜　大黄

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(88) 山楂丸

〔组成〕山楂　白糖

〔服法与用量〕每日服三次，每次服一丸，温开水送下。

(89) 健胃宽胸丸

〔组成〕白术　莱菔子　枳实　香附　山楂　神曲　陈皮　厚朴　连翘

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二钱，温开水送下。

(90) 木香槟榔丸

〔组成〕大黄　牵牛子　黄芩　木香　槟榔　青皮　当归　枳壳　陈皮　黄连　香附　黄柏　莪术　三棱

〔服法与用量〕每日服一次，每次服三钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(91) 槟榔四消丸

〔组成〕大黄　牵牛子　槟榔　香附　猪牙皂　五灵脂

〔服法与用量〕每日服一次，每次服三钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服法。

(92) 烂积丸

〔组成〕大黄　牵牛子　陈皮　山楂　枳实　青皮　莪术　三棱　槟榔

〔服法与用量〕每日服一次，每次服二钱，温开水送下。儿童酌减。

(93) 舟车丸

〔组成〕牵牛子　大黄　甘遂　红芽大戟　芫花　木香　青皮　陈皮　轻粉

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

七、脾胃疾患类

脾胃在祖国医学中占有很重要的地位，由于它具有吸收、运化水谷精微（营养物质）的功能，直接关系到人体的生长发育和强弱，所以被称为“后天之本”。具体地讲，脾有运化（消化和运输）水谷、统摄血液运行的作用，并主四肢和肌肉，而脾的许多功用又是在胃的配合下实现的，所以一些消化系统疾患，如胃溃疡、慢性胃炎、慢性肝炎、肝硬变等多与脾胃有关。此外，治疗一些慢性出血疾患、肌肉萎缩等也应考虑到脾胃。

以下将常见的一些脾胃疾患分为一般脾胃虚弱、水肿、泄泻、痢疾、便秘等五个方面加以介绍。有关脾胃气滞的内容可参考“理气类”。

（一）脾胃虚弱

脾胃虚弱，指脾气虚和胃气虚同时出现。食物的吸收，首先要靠胃的“受纳”，然后由脾消化，把谷食变为含有营养物质的“精微”，叫做“脾能磨谷”。在这些作用中，胃也协助脾起到一定的作用。变化后的水谷精微，还要靠脾的作用，才能输布周身，营养各部。所以若脾胃虚弱，则会出现以消化机能减低为主的一系列身体衰弱的症状，如面色萎黄，倦怠无力，食欲减少，胃脘满闷，肌肉消瘦，舌质淡苔

白，脉象濡弱等，治疗当健脾和胃，以补“后天之本”，可服香砂六君子丸。[94]若兼有浮肿，泄泻者，可服人参健脾丸。[95]若脾胃虚弱而兼有胃胀，吞酸哎气等症者，可服香砂养胃丸[96]。若兼有食滞，症见四肢无力，面色萎黄，食欲不振，胸膈满闷者，可服百补增力丸[97]。

脾胃虚寒较甚，突出表现为胃脘冷痛，得热则减，不敢食冷，自觉按着舒服，或有泄泻等症，舌质淡，脉沉迟无力者，治疗当以健脾温阳祛寒之法，可服附子理中丸[98]。

若心脾二脏虚弱，症见饮食无味，腹胀便溏，并兼有心悸气短，失眠健忘等心虚症状者，可服人参归脾丸[99]。以补心脾两脏。

（二）水肿

水肿指因体内水液潴留，泛滥肌表，而引起头面、目窠、四肢、腹部、甚至全身浮肿者。中医有时称为“水”，如称阴水、阳水等。引起水肿的原因很多，一般将因风邪外侵、雨湿浸淫等因素造成的水肿，称为阳水。其病程较短，来势较急，如一些现代医学称为急性肾炎的水肿多属于此。另一种因饮食不节、房劳过度而致脾肾虚弱的水肿，称为阴水。其病程较长，阴水也可由阳水转变而成，如慢性肾炎等多属于此。这里我们主要介绍因脾虚而致水肿的中成药治疗。

上面我们曾介绍过脾的运化功能。若人体脾阳虚弱，运化水湿之能失职，则水湿停留，即为水肿。一般症见遍身浮肿，晨起头面较甚，劳动后则下肢肿胀，饮食不佳，舌淡，脉弱等，可服参苓白术丸[100]。此外，若腰以下肿甚，腰痛疲重，尿中带白，纳呆乏味，大便溏薄，舌质胖淡，脉象沉迟

者，多因脾肾阳虚而致，可合服参苓白术丸和金匮肾气丸。

（三）泄泻

泄泻，指排便次数增多，粪便稀薄，或清稀如水。包括现代医学急慢性肠炎、胃肠神经官能症、肠结核、过敏性肠炎以及消化不良等疾病。引起泄泻的原因很多，主要是感受外邪、伤于饮食和脏腑虚弱等。但其根本，总以脾胃功能障碍为基础，胃主受纳，脾主运化．脾胃有病，受纳、运化功能不灵，清浊不分，混杂而下，并走大肠，则形成泄泻。一般可分为以下几种：

1.伤于饮食：因食伤脾胃，宿食停滞所致，症见泻下粪便臭如腐败的鸡蛋，泻后腹痛则减，嗳气不思饮食，舌苔垢浊，脉沉弦或滑，治宜消食导滞，可服健胃宽胸丸(89)，加味保和丸(101)等。

2.脾胃虚弱：病程较长，泄泻水谷不化，不思饮食，或有浮肿，舌淡苔白，脉象缓而无力等。治疗当以健脾和胃之法，可服参苓白术丸(100)。若脾胃虚寒较重者，如见胃脘冷痛，喜热喜按等，可加服附子理中丸(98)，以温中祛寒。若久泻不止，中气下陷，或有脱肛，胃下垂等，可服补中益气丸(102)，升提中气。

3.脾肾阳虚：水谷的运化是靠脾胃的功能，但还必须靠“肾阳”的帮助。就好象要煮熟一锅稀粥一样，既要有锅（胃主受纳），又要有勺（脾主运化），还要有火（肾阳的熏蒸），三者缺一不可。若肾阳不足时，也可引起脾胃功能的减低，发生腹泻，这种泄泻经常发生在清晨起床时，故称为“五更泻”，患者往往自诉无论几点起床，都需马上大便，而且便下不成形；有些患者表现为饭后泻，即食后即泻，原

因也多是脾肾阳虚所致。此外，患者还常兼有腰痛，腹冷，腹痛，甚则滑精等症，脉沉迟无力，此病当以温补脾肾之法，可合服四神丸(103)和参苓白术丸(100)。

关于外感邪气所致的泄泻，因多挟湿邪，多发生在夏季，故放到“夏令常见疾患类”一篇中讲述。

（四）痢疾

痢疾是常见的肠道传染病之一。根据病因不同一般可分为细菌性痢疾和阿米巴痢疾两种，前者由感染痢疾杆菌而引起，后者因感染溶组织阿米巴原虫所引起。病原体在肠内放出毒素，使大肠粘膜发生充血、水肿和溃疡等变化，并可产生全身中毒症状。少数病人，尤其儿童和老人，病情重，起病急、发病快，症见高热，惊厥，神志不清，甚至出现休克或呼吸衰竭等，称为中毒性痢疾，应予中西医结合治疗。

痢疾的主要症状为腹痛，里急后重，大便脓血。病因为外感风暑湿热之气，内因为饮食不节，冷热不调，以致脾胃受伤，湿热郁蒸，肠道气血阻滞，气血与暑湿热毒互结，化为脓血而成。诊断痢疾多无困难，但要注意和泄泻相鉴别，泄泻没有里急后重和大便脓血的现象，从大便常规的化验中也可以作出鉴别。痢疾按病程来分可有急、慢之别，急性痢疾多发生于夏秋二季，所以我们将其列在“夏令常见疾患类”中介绍。

如痢疾病程延至二月以上，腹痛腹泻，脓血便时发时止，反复不愈；或大便次数增多，脓血便虽不明显，但便有粘液者，均属于慢性痢疾。慢性痢疾多属虚证，当以温补固涩为主，古人有“初痢不可止，久痢不可泻”的说法。

一般慢性痢疾，症见下利日久，脓色淡白，或有脱肛，

肢体乏力，肌肉消瘦，舌淡苔白，脉象沉而无力等，多属于阳虚所致，可服补中益气丸[102]。若久痢虚寒较甚，症见腹部冷痛，喜按喜热，脉沉迟无力等，可服附子理中丸[98]。若兼见肾阳虚弱，下利无度，或有腰膝痠痛等症，可服四神丸[103]。上述几种情况，均可合服泻痢固肠丸[104]。

慢性痢疾急性发作，可参考急性痢疾的治法。阿米巴痢疾患者，可用中药鸦胆子仁，以桂园肉包裹吞服，每次五至十粒，每日一至二次，连服七至十天。

（五）便秘

中医书里的“便”字，多指大便，如“便溏”就指大便溏；“小便”一般可称“溲”，如“溲赤”就指小便赤；若称“二便”，即指大、小便而言。便秘，指大便秘结不通，排便时间延长，或欲大便而艰涩不畅的病症。便秘的原因很多，有因燥热内结者，有因津液亏损者，有因气机郁滞者等等。故有热秘、气秘、虚秘、冷秘等四种类型。我们日常生活中，使用中成药治疗便秘主要有两种情况：一是热火炽盛，燥热内结；二是津液亏损，水乏舟停。

关于热火炽盛，燥热内结而造成的便秘，我们在“清热类”中已作了介绍，一般均采用清热泻火通便的治法，如牛黄解毒片等。另一种情况，即津液亏损，水乏舟停者，多见于老年人、产后妇女或大病之后（尤其是高热之后）的体弱患者，原因是由于人体津液亏损，致使肠道艰于传送大便，而成便秘。中医比喻为“水乏舟停”，意思是河里水源缺乏，船行不利。这种情况不能用大凉的清热泻火通便药物，而应以润下通便的方法，即“增水以行舟”，一般可服五仁润肠丸[105]若体质尚好，便秘津亏而兼有燥热者，可服麻仁

滋脾丸[106]。

附：中成药组成（94—106）

（94）香砂六君子丸

〔组成〕党参　白术　陈皮　半夏　茯苓　砂仁　木香　甘草

〔服法与用量〕每日服一次，每次服三钱，温开水送下。

（95）人参健脾丸

〔组成〕人参　白术　茯苓　扁豆　陈皮　当归　山药　苡仁　砂仁　青皮　木香　枳壳　神曲　山楂　炒麦芽　莲子　芡实　甘草

〔服法与用量〕每日服一次，每日服一丸，温开水送下。

（96）香砂养胃丸

〔组成〕党参　苍术　陈皮　香附　木香　神曲　白术　厚朴　砂仁　蔻仁　藿香　炒麦芽　茯苓　半夏曲　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱。

（97）百补增力丸

〔组成〕神曲　麦芽　苍术　山楂　党参　陈皮　白术　厚朴

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

（98）附子理中丸

〔组成〕附子　人参　白术　干姜　甘草

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一丸。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(99) 人参归脾丸

〔组成〕人参　当归　黄芪　白术　龙眼肉　木香　远志　酸枣仁　茯苓　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(100) 参苓白术丸

〔组成〕党参　白术　茯苓　山药　扁豆　莲子　砂仁　苡仁　桔梗　陈皮　甘草

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一袋，温开水送服。

(101) 加味保和丸

〔组成〕白术　半夏　苍术　茯苓　莱菔子　枳实　香附　黄芩　山楂　神曲　陈皮　厚朴　连翘　鲜姜

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二钱，温开水送下。

(102) 补中益气丸

〔组成〕黄芪　白术　陈皮　升麻　柴胡　当归　党参　甘草

〔服法与用量〕每服二至三钱，每日二次，温开水送下。

(103) 四神丸

〔组成〕补骨脂　干姜　肉豆蔻　五味子　红枣　吴茱萸

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

〔禁忌〕忌食生冷油腻食物。

(104) 泻痢固肠丸

〔组成〕罂粟壳　白术　白芍　茯苓　陈皮　甘草　诃子　肉豆蔻　党参

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二钱，温开水送下。

〔禁忌〕生冷油腻食物。

(105) 五仁润肠丸

〔组成〕生地　肉苁蓉　陈皮　大黄　当归　桃仁　火麻仁　柏子仁　郁李仁　松子仁

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一丸，温开水送服。

(106) 麻仁滋脾丸

〔组成〕火麻仁　郁李仁　杏仁　枳实　厚朴　白芍　当归　大黄

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

八、补　益　类

补益的方法在祖国医学中占有很重要的地位。很大程度上，可以说弥补了现代医学的空白。它是运用药物（或其它方法）扶助人体正气，补益脏腑虚损，增强体质，提高身体抵抗力和自然修复力，压倒邪气，消除各种衰弱症状，从而使人体恢复健康。也就是说，补益法，适合于虚证的患者。

日常生活中，经常遇到这样的说法："我的身体很弱，但就是'虚不受补'。"真的有"虚不受补"吗？我们说是不存在的，虚证就得使用补法，中医称"虚者补之"。但为什么确有一些人，本来身体很弱，而吃了补药后反感到更不合适了呢？其原因主要是补不得当，具体的说，或是时机不对，或是对象不准。首先，补法要掌握时机。人虽虚弱，但邪气很盛时，要以祛邪为主，不能使用补法，若误用了补法，不但达不到补益人体的目的，相反还能助长邪气，使病情加重。只有当邪气已衰，病势呈现虚证时，才能使用补法。这就是"急则治标，缓则治本"的道理。当然也有"祛邪兼扶正"的治法，不过也须分清主次，权衡邪正，辨证施治。

再有，补益的对象也很重要。人体虚弱，虽然多表现为全身症状，但总要以某一部位为主，如气虚的应当补气，血虚的应当补血，阴虚的应当补阴，肾虚的应当补肾等。若气虚反补血，阴虚反补阳，肾虚反补肝……，那自然就达不到补益的目的，但这绝不意味着"虚不受补"，只是补的对象不对罢了。

通常使用的补益类中成药，一般可分为补心、补肾、补益气血、补脾胃等四种类种。其中补脾胃的中成药，已在"脾胃疾患类"中讲述，以下仅从其它三个方面予以介绍。

（一）补心类

心，在中、西医当中所指含义是不完全一样的。中医认为心有"藏神"和"主血"的功能。所谓藏神，一方面指精神意识思维活动；另一方面，指心有调节其它内脏、部位的功能。主血，指心有推动血脉营养周身的作用。前者实际上包括了神经系统，尤其是大脑皮层的功能；后者包括了解剖

学上心脏的功能。所以一些高级神经系统和心脏方面的疾患，如失眠，健忘，精神病，心脏病等，多与心病有关。

一般心血不足，多见心悸，失眠，多梦，健忘，或面色不华，舌质淡，脉细无力等症，治疗应以补心养血之法，可服柏子养心丹(107)。若阴亏血少而热症较为明显者，症见心悸心烦，睡眠不安，口舌生疮，大便干燥，舌红或绛，少苔或无苔，脉细数等，治疗应以滋阴补血，养心安神为主，而佐以清热降火，可服补心丸（原名天王补心丹）(108)。若以心悸或失眠多梦为主症者，可服朱砂安神丸(109)。

若以心气不足为主，症见心悸，气短，惊恐，自汗等，舌质淡，苔白，脉细弱，治疗当以补气养心之法，可服安神补气丸(110)。在这里，鉴别心血虚和心气虚的要点，在于心血虚者，心悸而烦，多伴有失眠，多梦等症状；而心气虚者，心悸惊恐，多伴有自汗，嗜眠等症状。两者病理不同，治法用药也就不同了。

若心脾两脏虚弱，每易见心悸，气短，健忘，惊悸，饮食不振，或兼有腹胀，浮肿，便溏等症，舌质淡，脉沉弱无力。治疗应以心脾两补之法，可服人参归脾丸(99)。

（二）补肾类

中医学里的“肾”，不等于现代医学中的肾脏。它的概念较为广泛，生理功能比较复杂，在人体中起着非常重要的作用，被称为“先天之本”。具体地说，有如下四个功能：一是“肾藏精”。精是人体中很重要的东西，包括“先天之精”和“后天之精”。这种“精”关系着人体生殖机能，以及整个人体生长、发育、衰老、死亡的过程。所以大凡人体早衰，性功能减退，男子遗精，早泄等症，多与肾有关。肾的第二

个功能是“主骨、开窍于耳、其华在发”。“主骨”指骨的生长、发育和肾有密切的关系。骨骼发育不好，牙齿枯槁等，多由于肾虚所造成。临床上采用补肾的方法，不但可治疗腰膝痿软，痿弱无力等症，而且能促进骨折的愈合。“开窍于耳，其华在发”，指肾气的充足与否，可反映在耳及毛发的润泽上。肾气足，则听力良好，毛发润泽；肾气虚，则耳鸣，耳聋，头发脱落，未老发白等。肾的第三个功能是“主水，开窍于二阴”，即体内水液的代谢，大小便的排泄等均与肾有关。如慢性水肿，多尿，五更泻等多从肾论治。肾的第四个功能是“主纳气”。中医认为人的呼吸主要是肺的功能，但空气的吸入则与肾有关。若肾气虚弱就无力“纳气”，则会发生喘症，临床上叫做“肾不纳气”，应采取“温肾纳气法”予以治疗。总之，中医学里的肾，实际包括了与现代医学的脑垂体、肾上腺、性腺、肾脏以及其它一些内分泌器官的功能。

肾病只有虚证，包括肾阴虚和肾阳虚。治疗上只能采取“补虚”的方法，而不能“泻实”。腰脊痿疼，下肢痿软，或见耳鸣，耳聋等是肾虚的共症，但肾阴虚和肾阳虚又各有自己的兼证。

1.肾阴虚：在肾虚共症的基础上，可见一些阴虚内热的症状，如男子梦遗，头晕目眩，舌红少苔，脉象沉细而数等，治疗当以滋阴补肾之法，可服六味地黄丸(65)。症轻者，可服二至丸(111)。若阴虚火旺，症见潮热骨蒸（潮热：指长期下午发热，因象潮水一样有规律，所以叫潮热。骨蒸：指患者自觉骨内发热外蒸），颧红唇赤，脉象沉细而数等，可服知柏地黄丸(112)。阴虚火旺较甚，而无脾胃虚弱。食少便溏者，可

服大补阴丸[113]。若兼有肝血不足，症见手足麻木，妇女经少色淡者，可服归芍地黄丸[114]，肝肾并补。若兼两目发干，眼花头眩者，可服杞菊地黄丸[115]。若兼肺阴虚弱，长期干咳虚喘而痰少者，可服麦味地黄丸[21]。若肾阴虚而兼有下焦湿热者，症见尿浊尿多等，可服滋肾丸[116]。

属于一般肝肾不足者，可服九转黄精丹[117]。若以毛发脱落为主症，或年少发白等，可服七宝美髯丹[118]。

男子梦遗较重者，可在上述辨证的基础上，加服金锁固精丸[119]。

若肾阴不足，浮阳上越，而耳鸣耳聋，视物昏花较重者，可加服磁朱丸[120]。

2.肾阳虚：在肾虚共症的基础上，兼见一些机能衰退，或寒凉的症状，如下半身常有冷感，小便不利，或尿后余沥，舌体胖嫩，质淡，脉弱等，治疗应温补肾阳，可服金匮肾气丸[25]。若腰重足肿，小便不利较甚者，可服济生肾气丸[121]。若男子滑精阳萎，或化验精子量少，发育不全等，可服益肾丸（原名五子衍宗丸）[122]。若以腰脊痠痛，两膝痠软为主症者，可服金鸡虎丸[123]。若男子滑精，早泄较重者，可在上述辨证施治的基础上，加服金锁固精丸[119]。

如肾阳虚甚，元阳亏损，症见腹冷较重，五更泄泻，或痰壅气喘，汗出肢冷，脉沉微等，当以温壮元阳之法，可服黑锡丹[27]，但此药不能久服。

（三）补益气血类

气、血分别属于阳和阴，关系相当密切，它们既有区别，又相互依存。血的生成和运行有赖于气的作用，而气的活动又赖于血来维持；气有病会影响到血，血有病也会影响到气；

如气虚每兼血虚，血滞每兼气滞等，治疗上就要互相兼顾。所以中医学中常说“气为血帅，血为气母”。

一般气血两亏，身体较弱，症见面色苍白，周身无力、食欲不振，气短懒言，妇女经少，色淡，舌质淡，脉沉无力等，可服十全大补丸(124)，以气血两补。若兼见惊悸，失眠，多梦者，可服人参养荣丸(125)。

中气不足，症见气短自汗，脱肛崩漏，或有胃下垂，子宫下垂，上眼睑下垂等病，可服补中益气丸(102)。

若因放射线或化学药物治疗后，白血球降低者，可服血苏(126)。

附：中成药组成（107—126）

(107) 柏子养心丹

〔组成〕柏子仁　枸杞　元参　当归　熟地　麦冬　菖蒲　茯苓　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(108) 补心丸（原名天王补心丹）

〔组成〕丹参　元参　柏子仁　麦冬　生地　人参　远志　天冬　五味子　黄连　菖蒲　茯苓　枣仁　桔梗　当归　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(109) 朱砂安神丸

〔组成〕朱砂　当归　黄连　生地　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送

下。

(110) 安神补气丸

〔组成〕党参　黄芪　茯苓　五味子　朱砂　远志　熟地　柏子仁　枣仁

〔服法与用量〕每日服二次，每次服20粒，温开水送下。

(111) 二至丸

〔组成〕女贞子　旱莲草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二十粒，温开水送下。

(112) 知柏地黄丸

〔组成〕熟地　山药　丹皮　山茱萸　茯苓　泽泻　知母　黄柏

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(113) 大补阴丸

〔组成〕黄柏　知母　熟地　龟板

〔服法与用量〕每日服三次，每次服一丸，温开水送下。

(114) 归芍地黄丸

〔组成〕熟地　山药　丹皮　山茱萸　茯苓　泽泻　当归　白芍

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(115) 杞菊地黄丸

〔组成〕枸杞子　菊花　熟地　山药　山茱萸　丹皮

茯苓　泽泻

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕辛辣食物。

（116）滋肾丸

〔组成〕黄柏　知母　肉桂

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

（117）九转黄精丹

〔组成〕当归　黄精　黄酒

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

（118）七宝美髯丹

〔组成〕何首乌　枸杞子　补骨脂　菟丝子　牛膝　当归　茯苓

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，淡盐水送下。

（119）金锁固精丸

〔组成〕牡蛎　芡实　莲须　龙骨　沙苑　蒺藜

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，淡盐水送下。

（120）磁朱丸

〔组成〕磁石　朱砂　神曲

〔服法与用量〕每日服二次，每次五分至二钱，温开水送下。

（121）济生肾气丸

〔组成〕附子　肉桂　山药　茯苓　泽泻　山茱萸　熟地　丹皮　车前子　牛膝

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

（122）益肾丸（原名五子衍宗丸）

〔组成〕枸杞子　五味子　复盆子　菟丝子　车前子

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

（123）金鸡虎丸

〔组成〕狗脊　鸡血藤　牛大力　黑老虎　千斤拔　金樱子

〔服法与用量〕每次十至廿粒，每日服二次，温开水送下。

（124）十全大补丸

〔组成〕党参　熟地　黄芪　白术　当归　白芍　肉桂　川芎　茯苓　甘草

〔服法与用量〕每次服一丸，每日服二次，温开水送下。

（125）人参养荣丸

〔组成〕人参　熟地　当归　黄芪　茯苓　白术　陈皮　远志　大枣　五味子　干姜　肉桂　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸。温开水送下。

（126）血苏

〔组成〕枸杞　侧柏叶　当归　乳香　天冬　冬瓜子　红枣　骨碎补　黄芪　党参　黑豆

〔服法与用量〕每日服二次，每次服30克，温开水送下。

九、夏令疾患类

夏季，天气闷热多雨，暑湿之邪较重，再加上有些人喜欢贪凉而睡，或过食生冷食物，往往容易发生中暑、肠炎、痢疾等病，所以在治疗上就要针对它的特点，采取相应的方药。

下面把一些夏季常见的疾病，及有关中成药的适应症状作如下简单的介绍。

（一）夏令感冒

中医认为，人与自然环境有着十分密切的联系。夏令感冒，虽也属于风寒、风热之邪袭于肌表，但由于夏季多暑，而暑邪又多挟湿，因而临床表现比较复杂。若外感风热，内挟暑湿，症见身热不退，心烦口渴，小便短赤，头痛头重，四肢痠痛，鼻流浊涕，舌苔黄腻，脉濡数等。治疗应以解表清暑，芳香化湿为主。可合服清瘟解毒片(8)、银翘解毒片(4)。

若外感风寒，内伤湿滞，或贪凉饮冷，而症见头痛发热，恶寒无汗，胸脘痞满，恶心呕吐，肠鸣泄泻，口淡苔腻，脉濡者，治疗当以解表和中，理气化浊之剂，可服藿香正气水（丸）(127)。

（二）中暑

夏季，在炎暑烈日下劳动时间过长，远途旅行；或在高温作业时不注意防暑降温工作，而出现头痛头晕头重，恶心呕吐，四肢痠软等现象，甚至忽然晕倒，不省人事，牙关紧

闭等，就叫作“中暑”。

中暑一般可分为“轻症”、“重症”两种。

轻症见身热头昏，头重如裹，微汗胸闷，恶心口渴，四肢痠重，舌苔黄腻，脉象洪数等，当用祛暑清热之法，可服六一散(128)或益无散(129)。若症状较重者可加服去暑丸(130)。

中暑重症见突然昏倒，不省人事，牙关紧闭，手足厥冷，气促而喘，脉弱等，治疗应以开窍避瘟，解毒祛暑之法。当急以武红灵丹(131)吹鼻取嚏。内服八宝红灵丹(132)。

为了予防中暑的发生，可选服仁丹(133)、避瘟散(134)等。

（三）急性胃肠炎

现代医学的急性胃肠炎，属于中医“吐泻”、“霍乱”等范围。临床上以呕吐，胃脘痛为主要症者，称为急性胃炎；以腹泻，腹部周围疼痛为主症者，称为急性肠炎；呕吐、泄泻均明显者，为急性胃肠炎。

中医认为，本病发生多因夏日饮食不洁，暴饮暴食，再加外感暑湿之邪，以致脾、胃、肠运化功能失调，水谷清浊不分，而发生此病。若吐泻过甚，津液大伤，还可发生虚脱。根据中医辨证，一般可分为二型。

1.寒湿：因寒湿之气，壅滞中焦，阳气受遏，脾胃功能失常，以致清浊不分，症见呕吐清水食物，泻下淡黄稀便，肠鸣，四肢清冷，胸膈痞闷，或有恶寒，发热，头痛等，舌苔白腻，脉象濡弱。治疗以芳香化浊，温中燥湿之法，可服藿香正气丸（水）(127)。若寒邪较重而见四肢厥冷，上吐下泻，肚腹痛疼者，当用散寒祛湿，止泻定痛之剂，可服纯阳正气丸(135)。若湿邪较重而以胸膈痞满，呕吐泄泻，舌苔白滑等为主症者，应用和中化湿，升清降浊之剂，可服六和

定中丸[136]。若腹疼较甚，上吐下泻者，可服周氏回生丹[137]。

2.湿热：此型多因暑湿秽浊之气，郁遏中焦，再兼内热炽盛，故症见呕吐酸腐食物和粘液，腹中绞痛，泻下深黄稀便，臭气大，自觉肛门灼热，口渴心烦，发热头痛，舌苔黄腻，脉象濡数。治疗当以清热化湿，清秽泄浊之剂，目前尚未有完全适合的中成药，可予葛根芩连汤加减（葛根、黄芩、黄连、地锦草、木香、六一散）。

（四）痢疾

痢疾分急、慢性两种。急性痢疾为夏秋季流行的常见疾患之一。以腹痛，里急后重，赤白痢下，脓血便为特征。中医认为本病多由外受湿热疫毒之气，内伤饮食生冷，损及脾胃与肠而成。治疗当以清热解毒，调气行血之剂，可服香连化滞丸[138]、痢疾丸[139]、或调中化痢丸[140]。若便血较多者以痢疾丸为佳。若兼有食滞者，以调中化痢丸为佳。

此外，需要指出的是，上述急性胃肠炎、痢疾等病，只要我们认真贯彻“予防为主”的方针，积极开展群众性的爱国卫生运动，除四害，讲卫生，移风易俗，搞好个人卫生和集体饮食卫生，不吃不洁和腐败变质的食物，把住“病从口入”这一关，是完全可以预防的。

附：中成药组成（127——140）

（127）藿香正气水（丸）

〔组成〕藿香　大腹皮　茯苓　白芷　紫苏叶　陈皮　桔梗　白术　厚朴　半夏　甘草

〔服法与用量〕丸剂每服二钱，每日二次，温开水送

下。液剂日服二次，每次5毫升，重者加倍，儿童酌减。

（128）六一散

〔组成〕滑石　甘草

〔服法与用量〕　每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

（129）益元散

〔组成〕滑石　甘草　朱砂

〔服法与用量〕　每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

（130）去暑丸

〔组成〕藿香　紫苏叶　甘草　香薷　木瓜　檀香　丁香　茯苓

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

（131）武红灵丹

〔组成〕硼砂　火硝　金礞石　朱砂　冰片　麝香　蟾酥　明雄黄

〔用法与用量〕吹鼻取嚏。

（132）八宝红灵丹

〔组成〕硼砂　火硝　礞石　朱砂　冰片　麝香　雄黄

〔服法与用量〕每日服一次，每次服二分，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

（133）仁丹

〔组成〕陈皮　檀香　砂仁　豆蔻仁　甘草　木香　丁香　藿香叶　儿茶　薄荷冰　冰片　肉桂

〔服法与用量〕 每次服10—15粒，温开水送下，不拘时。

(134) 避瘟散

〔组成〕香排草 零陵香 白芷 丁香 木香 檀香 玫瑰花 姜黄 甘松 麝香 冰片 薄荷冰 甘油 朱砂

〔用法与用量〕外用闻药，必要时亦可内服，每次服一分，温开水送下。

(135) 纯阳正气丸

〔组成〕木香 藿香 陈皮 丁香 半夏 苍术 白术 肉桂 茯苓 花椒 八宝红灵丹

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(136) 六和定中丸

〔组成〕神曲 麦芽 谷芽 厚朴 甘草 山楂 桔梗 茯苓 木瓜 檀香 陈皮 枳壳 木香 藿香 香薷 紫苏叶 扁豆

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(137) 周氏回生丹

〔组成〕神曲 五倍子 木香 红芽大戟 山慈姑 朱砂 甘草 沉香 丁香 檀香 千金子霜 雄黄 麝香 冰片

〔服法与用量〕每日服二次，每次服六分，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(138) 香连化滞丸

〔组成〕白芍　当归　陈皮　青皮　槟榔　黄芩　木香　枳实　黄连　滑石　甘草　厚朴

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(139) 痢疾丸

〔组成〕木香　黄连　地榆炭　枳实　生薏苡仁　槟榔　大黄　莱菔子　赤芍　黄芩　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(140) 调中化痢丸

〔组成〕大黄　山楂　槟榔　黄连　白头翁　枳实　木香　厚朴

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

妇　　科

妇科，是祖国医学中重要的一门科学，它是以妇女特有的疾病为研究对象的，主要包括经、带、胎、产和妇科杂病等五个部分。经，指妇女月经病；带，指带下病；胎，指妇女妊娠期间的各种特有疾病，如妊娠呕吐、子肿、子痫等；产，指产后病，如恶露不止、产后发热等；其它一些妇女疾病，如乳痈（即乳腺炎）、子宫脱垂等，则属于杂病范畴。

首先，我们介绍一下妇女在生理上的特点。从内脏来看，女子有其特有的器官——胞宫，又称女子胞(即子宫)，主司月经和胞胎，为冲脉和任脉的发源地。冲、任二脉为人体中的两条经脉，对于妇女尤为重要，中医称“冲为血海，任主胞胎”，意思是说冲脉与妇女血分关系密切，任脉主系人体胞胎。说明了冲、任二脉与妇女月经、妊娠之间的密切关系。由于妇女的这些特点，所以在其生长发育过程中，也就有相应的特点。一般地说，女子七岁以后，肾气开始旺盛．十四岁左右冲、任二脉通盛，月经便按期来潮，二十八岁左右，体力到达盛壮的高峰，到四十九岁左右，冲、任二脉开终衰退，月经便不再来潮，也就没有妊娠的可能了。此外，乳房的发达也是妇女的特点之一。

妇科病的致病因素，外感邪气方面，以寒、热、湿邪为多；内伤方面，以忧、思、悲、惊和房事不节者居多。这些因素往往引起人体气血失调，脏腑功能失常，导致冲、任二

脉损伤，而发生妇科病。

下面将妇科常见病的中成药及其适应症介绍如下。

一、月 经 病 类

月经是女性特有的生理现象。健康的女子，从十四岁左右，一至到四十九岁左右，中间三十多年中，有规律的每月来潮一次，因为是“月月来潮，经常不断”，所以取名月经。

月经的产生，主要赖于体内脏腑气血正常，水谷得以变化为血，并灌注于冲脉血海，血海充盈，就产生了月经。所以，脏腑气血的作用协调，月经即正常，反之就会出现疾病。

此外，有些妇女没病，但月经二月一至，称为并月；三月一至的叫作居经；一年一至的叫避年；终身不行经，届期微觉腰痠，且能受孕的叫做暗经，这些都属于妇女生理上的特殊情况，不应作为疾病治疗。

月经病，主要指月经周期、经量、经色、经质、经行腹痛等方面的改变。临床常见的月经病有经行先期、经行后期、痛经、经闭、崩漏、经断前后诸证等。

（一）经行先期

月经周期提前一周或一周以上，甚至一月两至者，称为“经行先期”。如仅超前三、五天，且无其他不适感觉的，属于正常现象。经行先期的原因主要有两个：即血热和气虚。

血为液体，得热则溢于经脉之外，叫做“血热妄行”；气虚亦可造成血不得摄，致使血流体外，叫做“气不摄血”。

若妇女内热，或肝郁化热，影响冲任二脉，则能迫使经血先期而下。症见月经先期，经量多少不定，经色较深，多有血块，或兼头晕胁痛、烦躁易怒等，脉象弦或数，治疗宜以解郁散热之法，可服加味逍遥丸(81)。若气虚造成的月经先期，可见月经量多，色淡或红，经质清稀，或兼有精神倦怠，言语无力，心悸气短等症，舌质淡，脉虚弱无力，治疗应以补气养血之法，可服人参归脾丸(99)。至于妇女因实热或虚热而致的月经先期，因无相应的中成药治疗，故不予介绍。

（二）经行后期

月经周期延后一周或一周以上，甚至于二月一至的称为“经行后期”。如仅延后三、五天，而无其他不适感的，属于正常现象。经行后期的原因主要有三个：血寒、血虚和气滞。

血为液体，得寒则凝。若妇女感受寒凉，尤其是行经时候，赤脚涉水，或过于饮冷等，则可造成血寒。一般症见经期延后，月经量少，颜色黯红，小腹冷痛，遇热则减，肢冷畏寒等，舌质淡，脉沉迟，可服艾附暖宫丸(141)，以温经散寒调经。若寒症较重者，可服温经丸(142)。

血虚所造成的经期延后，多见月经量少，颜色较淡，小腹隐痛，面色苍白，两目发干，心悸失眠等，舌质淡，脉沉细，治疗应以补血养血之法，少佐补气，以达“气生血长”的目的。一般可服人参养荣丸(125)。若经期延后较长，腹痛较重者，可服八珍益母丸(143)。

至于气郁而造成的经行后期，多因精神长久抑郁不舒，以致气机郁结，影响于血而成，所谓“气为血帅，气滞血郁”

之意。症见经期延后，经量较少，多挟血块，小腹胀痛，或引至两胁，胸闷不舒，脉象弦涩等，治疗当以开郁行气活血之法，可服七制香附丸(144)。

（三）痛经

一般妇女行经期间，多感小腹或腰部轻微胀痛不适，这是正常的现象。如果行经前后或正在经期，小腹及腰部疼痛较重，甚至剧痛难忍，并且随着月经周期持续发作，就叫做“痛经”。

发生痛经的原因，主要为气血运行不畅所致，所谓“痛则不通，不通则痛”。人体气血之所以运化不畅，多由气滞血瘀，胞宫寒湿，气血不足和肝肾亏损等原因所造成。一般经前或经期腹痛为实证，经后腹痛为虚证，腹痛喜按为虚证，不喜按者为实证，喜热为寒证，喜寒为热证。临床上须根据这些特征，参考其它症状，辨证论治。

气滞血瘀的痛经：有以气滞为主的，也有以血瘀为主的。以气滞为主的，多见经前脐腹胀痛，或胀多而痛少，时痛时止，痛而不喜揉按，情志急躁，脉弦等，当以行气为主，活血为辅，可服七制香附丸(144)。以血瘀为主的，症见经前脐腹持续疼痛，痛多而胀少，经色紫黯有血块，块下后疼痛即减，舌质紫，脉沉涩，治疗应以活血为主，理气为辅，可服得生丹(145)。若血瘀很甚，脐腹疼痛难忍，月经不畅者，可服益母草膏(146)。

胞宫寒湿的痛经：症见经前或经期小腹疼痛而冷，喜热而不喜按，经水量少有块，舌苔白腻，脉沉迟等，可服艾附暖宫丸(141)。若小腹冷痛较重者，可服温经丸(142)。

因气血虚弱而致的痛经，多见经后小腹隐隐作痛，按之

则减，面色苍白，言语无力，经色淡红，量少质清，脉虚等，可服人参养荣丸[125]。若腹痛较重者，可服八珍益母丸[143]，甚或八宝坤顺丹[147]。

一般肝肾亏损的痛经，多为病程较长，反复发作，但疼痛不甚，且兼肝肾阴虚的症状，如腰膝痿软，两目发干，手足麻木等，脉沉细无力，可长服九转黄精丹[117]或归芍地黄丸[114]。

（四）经闭

经闭就是月经闭而不来，并且兼有种种症状的病症。如少女超龄（14岁左右）过久而月经未至，或曾来后又中断，以及经行如常，忽然数月没有，同时出现其他症状的，均叫做“经闭”。

见到经闭的病人，首先要查问是原发性闭经（即18周岁后还未来月经），还是继发性闭经。前者应结合妇科检查，排除是否属于先天性畸形，如无子宫、阴道闭锁等。后者也应先要与妊娠相鉴别。在经过检查，除外上述情况后，再按下述辨证分型治疗。

引起经闭的原因，主要可分为虚、实两种。虚者多为阴血虚弱，“缺血则无以为下”；实者多因邪气阻滞、脉道不通，“道塞则无能为下”。治疗方法，前者宜补，后者宜通。具体地说，可分为血滞经闭和血虚经闭两大类。

血滞经闭属实。一般多属血郁气滞，但终以血郁为主。症见经闭不久，小腹胀痛，或引及两胁，脉弦等，宜以活血兼理气之法，可服得生丹[145]。若腹痛较重者，可服益母草膏[146]。如血瘀较甚，症兼腹痛，或摸有硬块等，治疗应使用活血力量较大的药物，可服通经甘露丸[148]或调经丹[149]。若

经闭以腹内冷痛为主者，可外用养血调经膏(150)。若瘀血日久，小腹有硬块，按之痛而不移，面黄消瘦，两目呈青黑色，舌上有瘀点，脉多涩中带弦，此为瘀血重者，治疗应用破血祛瘀生新之法，可服大黄䗪虫丸(151)。

虚症经闭一般可分为脾虚经闭和阴血虚弱经闭两种类型。脾虚经闭系由脾虚不运，水谷不能化为阴血所致，一般症见面色淡黄，精神疲倦，食欲不振，甚则浮肿，心悸，气短，便溏等，舌质淡，脉缓弱，治宜健脾、补气、养血之法，可合服参苓白术丸(100)和八珍益母丸(143)。阴血虚弱的经闭，多见面色苍白，头目眩晕，心悸失眠，舌淡，脉细等，可合服人参养荣丸(125)，八珍益母丸(143)。若经闭兼有，潮热，身体消瘦等，可服妇女通经丸(152)。

（五）崩漏

崩漏：指妇女在行经期间，或不在行经期内，大量出血或持续不断，不能自止的病症。崩即血崩，指经血突然大下，好象山崩地裂一样；漏即经漏，指经血淋漓不断，好象房屋漏水一样。但二病不能绝对分开，漏不止则可转化为崩，崩后亦多有漏，故一般统称崩漏。

崩漏主要因冲、任二脉损伤，不能固摄所致。临床上可分为虚证、实证两种。

虚证多为气虚，病变在于脾、肾二脏。脾有统血之能，若脾虚不能统血，则阴血自流，而为崩漏；肾为先天之本，肾气虚则冲、任不固，亦可形成崩漏。脾虚崩漏，多见血多色淡红，质清稀，气短懒言，心悸失眠，食欲不振等，脉缓弱，治疗宜以健脾补气摄血之法，可合服人参归脾丸(99)和崩漏丸(153)。若兼有脱肛，子宫下垂或久泻等症，多为中气

下陷所致，可合服补中益气丸[102]和崩漏丸[153]。肾虚崩漏者，多为崩漏日久，且兼腰膝痠痛，背冷肢凉等症，当合服金匮肾气丸[25]、崩漏丸[153]。

若血崩症出血过多，而出现虚脱证候，如汗出肢冷，不知人事，脉微欲绝等，可急服独参汤（吉林参四至六钱，煎汤内服）；若四肢厥逆，大汗出不止者，为心肾阳俱衰的危证，可服参附汤（吉林参五钱、熟附子五钱，水煎服）。

实证多由血热或血瘀而致。血热崩漏多见骤然下血，或淋漓日久，血色深红，头晕，舌红，脉数等；血瘀崩漏多见血色紫黑有块，小腹疼痛拒按，血块出后疼痛减轻，脉沉涩等。前者尚无适合的成药治疗。后者可合服得生丹[145]与崩漏丸[153]。

此外，需要指出的是，出血不止或经常出血的，应进行妇科检查，注意是否有子宫颈息肉或外伤性出血；更年期的妇女，出现崩漏，尤其是绝经之后，又出现来血，白带多，且有恶臭气的，应注意是否有子宫颈、体的癌症。

（六）经断前后诸证

经断前后诸证，即现代医学所谓更年期证候群。更年期，指妇女绝经(49岁左右)前后的二、三年。这一段时间，正是妇女卵巢功能逐渐衰退的过程。由于内分泌发生的暂时紊乱，有些妇女可能出现一些症状，如头晕，头痛，眼花，耳鸣，失眠，易怒，食欲不振，便秘等，统称为“更年期证候群”。中医认为其发病原因是“任脉虚、太冲脉衰少”而致。一般可作如下辨证施治。

若以肝郁化热为主证的，症见头晕，耳鸣，易怒，两胁胀痛，失眠健忘，舌质红，脉弦等，可服加味逍遥丸[81]，解

郁清热。若以阴血不足，心火上炎为主证的，症见失眠心悸，口干舌燥，五心烦热（即手、脚心和心中烦热），舌质红，脉细数等，可服补心丸[108]，养血滋阴清热。心悸失眠为主症者，可服朱砂安神丸[109]。

在上述用药的时候，均要辨别其“肾虚”证，加服补肾药。肾阴虚者加服知柏地黄丸[112]，肾阳虚者加服金匮肾气丸[25]。以补养肾脏，调节体内内分泌紊乱。

附：中成药组成（141—153）

（141）艾附暖宫丸

〔组成〕艾叶炭　当归　黄芪　吴茱萸　续断　香附　川芎　白芍　肉桂　生地

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

（142）温经丸

〔组成〕党参　白术　茯苓　黄芪　附子　厚朴　干姜　郁金　吴茱萸　肉桂　沉香

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

（143）八珍益母丸

〔组成〕党参　白术　茯苓　当归　白芍　熟地　川芎　益母草　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

（144）七制香附丸

〔组成〕香附　白芍　元胡　白术　川芎　当归　益母草　砂仁　茯苓　熟地　天冬　生艾叶　稻米　黄芩　阿胶　人参　茴香　山茱萸　枣仁等

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二至三钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

（145）得生丹

〔组成〕益母草　当归　白芍　柴胡　木香　川芎

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

（146）益母草膏

〔组成〕益母草　当归　川芎　生地　白芍　红花

〔服法与用量〕每日服一至二次，每次服一两，白开水冲服。

〔禁忌〕孕妇禁忌。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

（147）八宝坤顺丹

〔组成〕人参　白术　茯苓　熟地　白芍　生地　当归　黄芩　橘红　川芎　益母草　沉香　砂仁　牛膝　木香　琥珀

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

（148）通经甘露丸

〔组成〕熟大黄　川芎　当归　红花　木香　百草霜

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用

(149) 调经丹

〔组成〕大黄　紫草茸　莪术　三棱　血竭　苏木　红花　凌霄花

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(150) 养血调经膏

〔组成〕当归　小茴香　大腹皮　干姜　红花　莪术　三棱　陈皮　蕲艾叶　益母草　木香　麻油　漳丹

〔用法与用量〕遵医嘱，外用，贴肚腹。

〔禁忌〕孕妇忌贴。

(151) 大黄䗪虫丸

〔组成〕大黄　生地　桃仁　赤芍　水蛭　干漆　干蛴螬　虻虫　䗪虫　黄芩　杏仁　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(152) 妇女通经丸

〔组成〕柏子仁　牛膝　卷柏　泽兰　续断　熟地

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(153) 崩漏丸

〔组成〕棕榈炭　贯仲炭　莲房炭　血余炭　茜草　党参　当归　生地　杏仁皮炭　白芍　陈皮　枳壳　栀子　木香　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二钱，温开水送下。

二、带　下　类

带下：指妇女阴道里流出的一种粘腻的物质，因为象带子一样连绵不断所以叫做带下。至于妇女在发育成熟时期，月经前后或妊娠初期，或房事之后，排出的少量液体，无色透明，多属于生理现象，一般不作病论。

引起带下病的原因，有因肝郁脾虚，湿热下注的；有因胞宫虚寒，感受风冷的；有因肾气不足，下元亏损的等。但无论哪种原因，总离不开一个"湿"字，古人有"带下之病，皆由于湿"的说法，所以治疗上应处处兼顾到湿。带下的种类，古人分类很多，一般可根据颜色，分为白带、黄带、赤带、黑带、青带等五种。但临床多见的带下病，为白带、黄带和赤白带三种。

（一）白带

妇女从阴道里流出来的色白腥臭的粘液，称为白带。一般由于脾虚、痰湿、湿热、肾虚等原因所造成。

脾虚者，症见带下色白，无臭，如涕如唾，面黄肌瘦，四肢无力，食欲不振，脉缓弱等，治疗应健脾补气除湿，可合服白带丸(154)和参苓白术丸(100)。若中气下陷，兼见子宫脱垂，脱肛，久泻不止等，可合服白带丸(154)与补中益气丸(102)。若脾虚兼阴血不足，兼见心悸，潮热，两目发干等症

者，可服乌鸡白凤丸[155]。若脾虚湿痰较盛，症见白带量多，且兼痰多恶心等症者，可合服白带丸与二陈丸[18]。

湿热而致的白带，颜色较黄，臭味较大，质较粘稠，脉濡缓等，可服千金止带丸[156]。若湿热较甚，而人体不虚，症见带色较黄，质稠，气味臭秽，阴道发热，红肿作痛作痒，舌质红，脉滑数者，可服胆草泻肝丸[40]，以清热利湿。

肾虚者，白带清稀，兼见腰膝痠软疼痛，小腹隐隐作痛，脉沉迟无力等，可合服白带丸与济生肾气丸[121]，以补肾、利湿、止带。

（二）黄带和赤白带

黄带是带下色黄，粘腻，其味恶臭，且多兼阴部或肿或痒，小便涩痛等症，脉数，一般多因脾虚湿热所致，可服千金止带丸[156]。湿热重者，服胆草泻肝丸[40]。

赤白带下，指带下或白或黄，但兼夹红色者，此多因湿毒内踞，损伤冲任所致，可服胆草泻肝丸[40]。

此外，有些中成药适应证较为广泛，可在临床上广泛使用。一般月经不调，赶前错后，或经量过多，痛经，带下日久，不属热证者，均可服安坤赞育丸[157]、妇科金丹[158]等药。

附：中成药组成（154—158）

（154）白带丸

〔组成〕芡实　党参　白术　茯苓　海螵蛸　当归　吴茱萸　椿白皮　肉桂　白芍　香附　补骨脂　杜仲炭　木通　鹿角霜　续断　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二钱，温开水送

下。

(155) 乌鸡白凤丸

〔组成〕乌鸡　人参　鹿角胶　白芍　当归　生地　熟地　生鳖甲　丹参　天冬　生牡蛎　香附　桑螵蛸　黄芪　山药　川芎　鹿角霜　银柴胡　芡实　甘草等

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(156)千金止带丸

〔组成〕椿白皮　鸡冠花　牡蛎　青黛　白芍　香附　当归　川芎　杜仲炭　元胡　砂仁　白术　木香　续断　补骨脂　党参　茴香

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

(157)安坤赞育丸

〔组成〕鹿茸　人参　丹参　木香　乌药　生地　没药　柴胡　黄芩　天冬　红花　橘红　远志　血涂炭　牛膝　鸡血藤　杜仲炭　龟板　黄柏　沉香等

〔服法与剂量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

〔禁异〕孕妇遵医嘱服用。

(158)妇科金丹

〔组成〕人参　鹿角　阿胶　黄芪　没药　乳香　熟地　杜仲炭　木香　白芍　当归　益母草　白术　黄芩　血余炭　艾叶炭　红花　陈皮　川芎　甘草等

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

三、胎前、产后及杂病类

胎前（即妊娠期间）、产后及杂病类，和其他一些妇病种一样，种类很多，但相应的中成药不多，治疗多采用“汤药”的方法，以下仅把可服中成药的几种病症作一下简单的介绍。

（一）胎前

妇女怀孕之后，生理上起了特殊改变，多表现为月经停止不来，乳头乳晕颜色增深，初期有恶心呕吐，择食，厌食，喜吃酸食等，以后这些症状逐渐减轻或消失，肚腹膨大，一直到九个月左右生产。妇女从怀孕到生产前的一段时间，叫作胎前。在这一段时期内，必须特别注意身体的保养，以防止胎前、临产和产后各种疾病，并确保婴儿的安全和健康。

胎前疾病的治疗原则，应以治病和安胎并举，除根据一般寒、热、虚、实辨证论治外，还要处处照顾到肝、脾、肾，因肝为藏血之脏，脾为益血之源、后天之本，肾为固胎之脏、先天之本，兼顾好这三脏，才能达到养胎固胎的目的。所以在用药上，凡峻下、破气、耗气、活血、滑利以及一切有毒的药品，均应忘用和慎用。

恶阻：指妇女妊娠二、三月时，出现的恶心呕吐，心中烦闷，恶闻食气，甚至进食或见食即吐的症状。一般在三个月后就逐渐消失，反应重的可持续到五、六个月，甚至一直到临产，有些妇女由于身体内得不到应有的营养物质，而逐渐消瘦，甚或诱发其他疾病。恶阻的原因，主要由于胎气上逆或脾胃虚弱所致，一般可服成药胎前和气丸(159)，以和

胃、止呕、安胎。若呕吐较重者，可服小汤药妊娠止呕汤（半夏、陈皮、茯苓、伏龙肝、竹茹、甘草、生姜），也可用伏龙肝一味二两，煎汤分次服。若人体素禀脾胃虚弱，怀孕后二、三月，出现恶心呕吐，脘腹胀闷，全身无力，或兼有浮肿，消瘦等症者，可服香砂六君子丸(94)。

先兆流产和习惯性流产，中医称为胎动不安、胎漏和滑胎。其原因或因劳累太过，房劳过度，或不慎摔倒等，致使冲、任二脉亏损，摄纳无权，胞胎不固。其症状多见下腹及腰痠痛，甚则阴道有少量出血，脉虚弱无力，一般可服保胎丸(160)。若气虚较甚，症见胎动下坠，面白㿠白，阴道不时下血，舌淡，脉沉弱等，可合服保胎丸与补中益气丸(160)，以增强其补气安胎的作用。若流产症状不明显，略感下腹及腰部痠痛者，可服胎产金丹(161)。上述各药，若以中药苎麻根一至三两，煎汤冲服，则保胎作用更好。

怀孕期间，妇女出现热证时，可选服孕妇金花丸(49)和清热凉血膏(50)，详见内科“清热类”。

（二）产后

妇女生产之后，由于分娩时造成的出血，元气受损，气血俱亏，抗病力弱，若不注意保养，则很容易引起各种疾病。一般地讲，产后妇女在饮食上，应选择些易消化而营养价值较高的食物；适当多休息，不可入浴；六周之内绝对禁忌房事，精神方面也要保持乐观等。

产后诸病：产后诸病多因体内瘀血和失血、伤津液所造成。所以恶露、血虚、发热等，就成了产后的主要问题。

恶露：指产后由子宫流出来的暗红色的瘀血，有时为凝块状。它是由子宫里创伤部出血和子宫颈阴道的分泌液混合

而成。正常的恶露、生产后一、二天时主要为血液，色较深，第三、四天流出的，色较淡，或带褐色，以后逐渐淡下去，第十天左右，成为黄色或无色，到一个来月时就没有了。中医认为，恶露属于瘀浊败血，必须从体内排出，如果不下，则会造成腹痛，甚至血晕，血膨等症。所以产后妇女不要马上服用补药，可先服产后药[162]，活血行瘀，待恶露已尽，再根据情况，服用补血补气等药物。若产后气滞血瘀较甚，症见恶露不下，小腹疼痛，或兼胸胁胀痛，脉弦涩等，可服乌金丸[163]，活血理气化瘀。

若产后恶露很少，分娩后突感头晕目眩，坐立不得，恶心呕吐，甚至神昏口噤，不省人事等，这是"产后血晕"的实证，由于瘀血而造成。如果症状较轻，只感头晕目眩，恶心呕吐者，可服黑神丸[164]。对于产后乳汁较少或全无的"缺乳"患者，包括不在产后而哺乳的妇女，可服催乳丸[165]或生乳糖浆[166]。若乳汁未经婴儿吮吸而自出，或产后不欲哺乳者，可用炒麦芽一两，水煎，代茶饮，可以回乳。

（三）妇科杂病

脏躁：症见妇女精神不正常，神志烦乱，情绪很易波动，发作时悲伤欲哭等，舌质淡或微红，脉细弦，此为血虚不能养神所致，属于现代医学癔病的范畴，可服脑乐静[167]。

阴痒：指妇女阴道内或外部搔痒难忍，或有时流出黄水的病症。本病的发病原因，多因素常注意卫生不够，感染病虫；或肝经湿热，下注而成，可用蛇床子片[168]外洗。

附：中成药组成（159——168）

(159)胎前和气丸

〔组成〕陈皮　苍术　厚朴　藿香　桔梗　砂仁　木香　益智仁　甘草。

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(160) 保胎丸

〔组成〕当归　白芍　黄芪　白术　菟丝子　生地　川芎　艾叶炭　羌活　川贝母　枳壳　芥穗　黄芩　砂仁　厚朴　甘草。

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

(161) 胎产金丹

〔组成〕当归　茯苓　黄柏　元胡　白芨　赤石脂　没药　香附　丹皮　益母草　沉香　艾叶炭　白薇　紫河车　熟地黄　五味子　鳖甲　肉桂　人参　甘草等。

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送。

(162) 产后药

〔组成〕当归　熟地　红花　赤芍　肉桂　干姜　蒲黄　黑豆　莪术。

〔服法与用量〕每日服二次，每次服三钱，温开水送下。

(163) 乌金丸

〔组成〕蒲黄　白芍　香附　元胡　三棱　莪术　川芎　熟地　吴茱萸　百草霜　益母草　艾叶炭　当归　木香　茴香　补骨脂。

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，温开水送下。

（164）黑神丸

〔组成〕 天麻 当归 红花 神曲 百草霜 香墨 没药

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一钱，温开水送下。

（165）催乳丸

〔组成〕当归 黄芪 生地 白芍 鹿角霜 川芎 漏芦 木香 穿山甲 生麦芽 通草 王不留行

〔服法与用量〕每日服三次，每次服二丸，温开水送下。若使用黄酒送服，疗效更好。

（166）生乳糖浆（原名生乳灵）

〔组成〕花粉 白马悬蹄 穿山甲 丝瓜络 沙参 鹿角

〔服法与用量〕每日服三次，每次服40毫升，温热服用。

（167）脑乐静

〔组成〕甘草 浮小麦 大枣等

〔服法与用量〕每日二至三次，每次二调羹，温开水冲服。

（168）蛇床子片

〔组成〕蛇床子

〔用法与用量〕睡前将阴部洗净，取药片一片，放入阴道内即可。

儿　科

中医儿科的年龄范围，一般从初生儿到十四岁之前。在这一段时间内，小儿正处在生长发育时期，生理、病理上都与成年人有很大不同。由于发育不成熟，脏腑娇弱，所以容易感受外邪，引起伤风感冒等外感疾病，或一些传染性疾病，如百日咳、麻疹等。在饮食上，小儿自治力弱，加上有时护理不当，又易引起停食、呕吐、泄泻等消化不良的疾病。

小儿病，无论属于那一种情况，都容易引起发热的病症，而发热过甚时，大伤津液，又往往发生抽搐和惊风，有些还可以发生虚脱，由实证转为虚证。所以中医常说：小儿病易虚易实，易寒易热，发病容易，变化迅速，而又易于康复。

儿科病在诊断上，一般和成人没什么区别，唯有“看指纹”，则是三岁以下儿童的一种独特诊断方法。指纹，在两手食指内侧，从虎口而上，按指节分为三关：初节为风关，次节为气关，三节为命关。诊断时，面对阳光，医生以左手握患儿食指，用右手大拇指侧面，蘸以清水，由命关向气关、风关推，指纹颜色红黄相兼，隐隐露出的为无病，紫纹属热，红纹属外感寒邪，青属小儿惊风，白属疳证，指纹显露于风关为病轻，至气关为病重，如至命关，多属难治。儿科的问诊，多由成人代诉，所以应询问直接护理的家长或媒

姆。

由于小儿服药比较困难，所以处方用药，应力求精，药物剂量小而效力高。这样中成药在儿科中使用就比较广泛，有些丹剂、散剂，还可以调在乳汁或粥内服用。

以下将儿科常见的发热、消化不良和疮疥等病症的中成药治疗作一简单介绍。

一、小儿发热类

发热，是小儿常见的一个症状，无论感冒，肺炎，惊风，麻疹以及一些消化系统疾病，都能引起发热。发热的时候，人体津液就要受伤，若高热较甚，津液、阴血大伤时，则又容易发生抽搐、惊风等症，中医叫作“热极生风”。所以在小儿科清热、解表、退烧的方药中，往往加一些镇惊、熄风的药物。

（一）感冒、咳喘

小儿感冒的发病原因，一般与成人相同。但由于小儿体质的特点，往往多见风热外感，且易兼夹其它病症，如夹食、夹惊以及化热变喘等。所以治法上多以辛凉解表 清热为主，并佐以消导、镇惊、止咳平喘等药物。

一般小儿感冒，症见发热，恶寒，鼻流清涕，咳嗽鼻塞，或有咽喉肿痛等，治疗应以辛凉解表，清热止咳之法，可服桑菊感冒片[6]，剂量一般掌握在成人量的二分之一至四分之一。若兼痰涎壅盛者可服小儿回春丹[169]。若夹有食滞，症兼腹胀腹痛，食欲不振，大便秘结或泄酸臭便，舌苔黄厚等，可将有消食导滞作用的保和散[170]与小儿回春丹合服。若小儿感冒，咳嗽较重者，可服小儿金丹[171]或小儿百

寿片[172]后者还兼有消导的作用。若痰热较重，而以发热，咽喉肿痛，痰涎壅盛，咳嗽频作，指纹紫或脉数等为主要见症者，可服太极丸[173]，化痰清热定惊。夏日感冒，多夹暑湿之邪，往往见发热头痛，呕吐泄泻，四肢沉重，腹痛腹胀，小便不利，脉濡数等症，治疗当以清热解表、祛湿和胃为主，可服香苏正胃丹[174]或小儿至宝丹[175]。

咳喘，在小儿也属常见。一般外感咳嗽，热症不甚者，可服解肌宁嗽丸[176]。若兼内热，痰多咳重者，可服泻白丸[177]，若肺热咳嗽，咳吐黄痰，痰多，口干舌燥，口渴时欲饮水，或有便干等症，脉滑数，可服小儿止嗽金丹[178]，清热润肺、止嗽化痰。若肺热不甚，但咳喘痰多，痰色不黄，且兼有恶心呕吐等症状者，可服用婴儿保肺宁[179]。如火热之邪郁于肺脏，症见身热面赤，口渴引饮（即大量饮水），气急鼻翼煽动，咳喘痰多，色质黄稠，舌质红，苔黄，脉滑数等，可服止嗽定喘丸[14]，清热平喘，此种情况多指现代医学的肺炎疾患。

百日咳，症见小儿咳嗽日久，缠绵不愈，所以叫做百日咳。本病以冬末春初发病较多，可在儿童中传染及流行，以一至六岁为常见。患病以后，很少再复发。中医认为，其病因多由时邪外侵，痰火内蕴，肺气壅遏不通，而成剧烈的阵咳。一般可服用百日咳片[180]或小儿久嗽丸[181]。也可用鸡苦胆一个，取汁，加白糖调服。一岁以内三天一个，两岁以内两天一个，两岁以上一天一个，如找不到鸡苦胆时，可用猪苦胆代替，一个猪胆，相当于五、六个鸡胆，服法相同。

（二）麻疹

麻疹俗称出痧子，是一种小儿最常见的传染病，由麻疹

病毒引起，多流行于冬春两节，以一至五岁儿童为最多，患过本病一次后，一般不再重患。麻疹发病过程，一般可分为初热、见形、收没三个时期，大约需要半个月左右。发病前几天，多有些类似“伤风”的先兆症状，如咳嗽，流涕、喷嚏，不思食等，应马上注意隔离，防止传染。

初热期：麻疹初起，一般须发热三、四天才见疹点，称为初热期。这时期的症状，多与感冒相似，症见发热，鼻塞，流涕，眼胞微肿，眼泪汪汪，不思饮食，指纹浮露而色红或脉浮数等，口内粘膜有小白点（西医叫克氏斑），治法上宜用辛凉宣透的方法，一般可服红丸药[182]、小儿回春丹[169]等。或用草药鲜芫荽四钱至六钱，水煎，每日服三次。

见形期：从疹点开始出现至疹点透发完毕，称为见形期，时间约三天左右。症见发热增高，疹点先从耳后，项背出现，逐步在口周围，头面，后背，前胸，腰腹，四肢等处，由上而下出现，最后全身及手足心均布满疹点。治法上宜用宣透，清热，解毒的方法，一般也可服红丸药、小儿回春丹等。若见疹色紫赤暗滞，稠密成片，身高热，神昏，抽搐，舌干绛等症者，为热入心包，应急服紫雪散[45]、抗热牛黄丸[44]、清热解毒丸[46]等，通窍泄热、豁痰镇惊。

收没期：如疹点透发顺利，在疹出三、四天后，开始逐渐隐退，先从头面收起，次至躯干、四肢，其它症状也逐渐消失。皮肤上初有糠状落屑，并留下棕色斑痕，十多天后恢复正常。这一阶段可服些清解养阴的药物，可用鲜芦根六钱、鲜茅根六钱，水煎服，每日一剂。

（三）惊风

惊风是中医的名词，指以频繁抽风和意识不清为主要症

状的疾患，常发生于三岁以内的小孩。一般分为急惊风和慢惊风两种。急惊风病势较急，实证突出，多由外感时邪，内蕴痰热所引起；慢惊风病势较缓，虚证明显，多因久吐久利，脾虚肝盛所致。急惊风多有发热的症状，慢惊风虽不发热，但其同属惊风范畴，所以也在此略加介绍。

急惊风的主要症状是高热，牙关紧闭，神志昏迷，痰鸣气促，颈项强直，四肢抽搐，指纹青紫相兼或脉象弦数。临床上按其主症不同，而分为热、痰、惊、风四证。

热证：高热抽搐，口中气热，渴喜冷饮，便秘溲赤，舌绛，苔黄，指纹紫，治疗应以清热泻火为主，可服万氏牛黄清心丸(71)、或紫雪散(45)等。大便秘结较甚者，加服保婴镇惊丸(183)。

痰证：痰热壅盛的，治疗应以清热化痰为主，可服牛黄抱龙丸(184)、牛黄镇惊丸(185)、小儿解热丸（原名至圣保元丹）(186)等，症重者服用抗热牛黄丸(44)。上述诸药，均可酌情加服竹沥膏(70)。

惊证：惊惕不安，神志昏迷的，可服小儿琥珀丸（原名琥珀抢龙丸）(187)，症重者，可服清热解毒丸(46)。

风证：牙关紧闭，口噤不开，手足抽搐，病势较急的，可先外用通关散通窍（蜈蚣、姜蚕、胆南星、麝香、牙皂角，研末，取少许吹鼻取嚏）。再服牛黄抱龙丸、牛黄镇惊丸等。

慢惊风的主要症状，为抽风，昏迷，体温低下，四肢厥冷，呼吸微弱，脉象沉细无力等，多由脾、肾虚肝旺所致。发作期间可服百效丸(188)。若发作已止，但仍见脾肾阳虚者，可服福幼理中丸(189)。

附：中成药组成（169——189）

（169）小儿回春丹

〔组成〕黄连　赤芍　浙贝母　生地　葛根　黄芩　豆豉　大青叶　芥穗　木通　荆胡　元参　桔梗　花粉　山川柳　牛蒡子　柴胡　犀角　羚羊角

〔服法与用量〕每日服二次，一岁服二粒，两岁服三粒，三岁以上服五粒，芦根水或温开水化服。

（170）保和散

〔组成〕神曲　山楂炭　茯苓　陈皮　莱菔子　砂仁　厚朴　枳壳　连翘　半夏　藿香叶

〔服法与用量〕每日服一次，三至五岁服五分至一钱，五至十岁服一至二钱，温开水送下。

（171）小儿金丹

〔组成〕川贝母　橘红　羌活　生地　大青叶　芥穗　桔梗　前胡　元参　半夏　枳壳　薄荷　天麻　防风　犀角　羚羊角　朱砂　冰片等廿六味。

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以下酌减，温开水化服。

（172）小儿百寿片

〔组成〕川贝母　桔梗　橘红　陈皮　薄荷　芥穗　竹黄　牛蒡子　双花　元参　大黄　连翘　柴胡　犀角　羚羊角　朱砂　冰片　牛黄　麝香等廿九味。

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（173）太极丸

〔组成〕竹黄　胆南星　大黄　僵蚕　糯米粉　麝香　冰片

〔服法与用量〕1至2岁每次服二分，周岁以内酌减，温开水送下。

（174）香苏正胃丹

〔组成〕陈皮　扁豆　厚朴　藿香　香薷　枳壳　砂仁　茯苓　山楂　神曲　麦芽　紫苏叶　益元散

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（175）小儿至宝丹

〔组成〕厚朴　半夏　陈皮　芥穗　砂仁　苍术　桔梗　黄连　藿香叶　麦芽　花粉　枳壳　大黄　木通　山楂　木香　朱砂　冰片　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（176）解肌宁嗽丸

〔组成〕半夏　桔梗　天麻　陈皮　前胡　杏仁　葛根　枳壳　浙贝母　花粉　茯苓　元参　紫苏叶　木香　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（177）泻白丸

〔组成〕紫苏叶　前胡　杏仁　紫菀　石膏　麻黄　桑皮　薄荷　川贝母　冬花　瓜蒌仁　葶苈子　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（178）小儿止嗽金丹

〔组成〕元参　麦冬　杏仁　南星　紫苏子　槟榔　桔梗　竹茹粉　桑皮　花粉　紫苏叶　川贝母　瓜蒌仁　知母　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（179）婴儿保肺宁

〔组成〕川贝母　生赭石　竹黄　百部　硼砂　半夏　石膏　紫苏梗　紫苏子　滑石　桔梗　橘红　朱砂　冰片

〔服法与用量〕每日服一次，四、五岁小儿每次服一包，周岁以内酌减，糖水调服。

（180）百日咳片

〔组成〕禽胆膏

〔服法与用量〕一岁每次一片，10岁以上每次10片——15片，每日3次。

（181）小儿久嗽丸

〔组成〕石膏　杷叶　竹茹粉　桑叶　半夏　冬花　桑皮　葶苈子　海浮石　紫苏子　杏仁　僵蚕　藿香　金银藤　沉香　菖蒲　麻黄　梨膏清汁

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水送下。

（182）红丸药

〔组成〕荆芥　连翘　葛根　僵蚕　板兰根　前胡　元参　浮萍草　升麻　马勃　牛蒡子　薄荷　枳壳　桔梗　花粉　黄芩　蝉蜕　双花　黄连等廿八味。

〔服法与用量〕不满周岁服半丸，一至四岁服一丸，五至九岁服二丸，温开水送服。

(183) 保婴镇惊丸

〔组成〕大黄　朱砂　甘草

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一丸，周岁小儿酌减，温开水送下。

(184) 牛黄抱龙丸

〔组成〕南星　钩藤　全蝎　竹黄　姜蚕　羌活　防风　白附子　川贝母　橘红　琥珀　雄黄　朱砂　牛黄　麝香　冰片　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

(185) 牛黄镇惊丸

〔组成〕川芎　茯苓　羌活　川贝母　南星　薄荷　天麻　全蝎　钩藤　沉香　川乌　大黄　白附子　竹黄　菖蒲　地龙　牛黄　麝香　冰片　雄黄等廿四味。

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水送下。

(186) 小儿解热丸（原名至圣保亢丹）

〔组成〕南星　防风　羌活　茯苓　竹黄　陈皮　麻黄　钩藤　薄荷　青礞石　僵蚕　全蝎　天麻　蜈蚣　琥珀　朱砂　珍珠　牛黄　麝香　冰片等廿二味。

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

(187) 小儿琥珀丸（原名琥珀抱龙丸）

〔组成〕琥珀　竹黄　檀香　人参　枳壳　枳实　白茯苓　山药　南星　朱砂　甘草

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一丸，婴儿每丸分

三次化服，温开水送下。

（188）百效丸

〔组成〕川贝母　厚朴　肉豆蔻　柴胡　元参　肉桂　知母　血竭　朱砂　冰片　麝香　净巴豆霜

〔服法与用量〕每次服三丸，周岁以内酌减，白开水化服。

（189）福幼理中丸

〔组成〕人参　枣仁　枸杞　熟地　干姜　白术　黄芪　当归　山萸肉　故纸　核桃仁　白芍　肉桂

〔服法与用量〕每次服一丸，周岁以内酌减，白开水化服。

二、小儿消化不良类

小儿消化不良，是临床常见的儿科疾患。发病原因多由饮食无节，乳食过多，或过食生冷瓜果而引起。一般可分为吐泻、积滞和疳积。

（一）吐泻

小儿吐泻与成人大致相同。分为急性吐泻和慢性泄泻。

急性吐泻多发生于夏暑季节，气候炎热多湿，饮食不洁，或过食生冷，外感暑邪，肠胃为湿热所困滞，逐成吐泻。症状多见头痛头沉，身热身重，呕吐泄泻，脘腹胀痛，舌苔腻，脉濡等，可服香苏正胃丹(174)、小儿四症丸(190)等。若患者自觉肛门灼热，或兼痢疾者，可服小儿至宝丹(173)。若发热较重，咳嗽痰多，或兼痢疾者，可服小儿至宝锭(191)。

慢性泄泻多由饮食不洁或脾胃虚弱所致，若不及时治

疗，可以转为慢惊风，甚至气脱液竭而死亡。伤食泄泻症见腹痛胀满，痛则泄泻，泻后痛减，泻下粪便臭如败卵，食物不化，不思乳食，舌苔腻，指纹紫滞或脉滑等。治疗应以消食导滞之法，可服保和散(170)。脾虚泄泻症见食后泄泻，大便稀溏，腹胀面黄，食欲不振，脉缓弱等，当以健脾补气和胃之法，可服参苓白术丸(100)。虚寒较甚，脘腹冷痛者，可服福幼理中丸(189)。若泄泻较重，引起抽搐，痉厥的，应按慢惊风论治。

（二）积滞

小儿内伤乳食过久，伤及脾胃，而见不思乳食，腹部胀满，形体消瘦等症者，叫做积滞。积滞的治疗应以消导为主，实证见食乳或食物后即吐，或口中有乳酸味（指食乳小儿），腹部胀痛，不喜揉按，泻后痛减，夜间啼哭，或伴有低热等症，舌苔腻，脉滑，可服小儿香橘丹(192)。虚证多见身体瘦弱，面黄身倦，不思饮食，食后腹胀，腹满喜按，脉缓弱等，可以健脾、补气、和中、消导之法。其中以脾虚为主的，可服香砂六君子丸；脾虚滞重的，可服启脾丸(193)；寒重的，可服福幼理中丸(189)。

此外，积滞病症，如配合使用针灸及推拿疗法，则效果更好。

（三）疳证

一般地说，伤食日久可变积滞，积滞日久而成疳证。疳证是一种慢性虚弱性疾病，多由久食肥甘食品，或乳食无节，过伤脾胃之阴，积热耗损气血所致。若症见面色萎黄，食欲不振，腹部胀满，大便秘结或腹痛泄泻，泻后痛减等，可服一捻金(194)。

此外，小儿感染诸虫日久，伤及脾胃，耗伤体内营养物质，长久也可转化为疳。所以中医一些治疳药方，多兼驱虫之药。这种疳证多见肌肉消瘦，不思饮食，但喜食泥土杂物，肚腹胀大，时有腹痛，睡时咬牙，面黄有淡白色成片的虫斑。一般可服肥儿丸(195)、疳积散(196)等。

附：中成药组成（190——196）

（190）小儿四症丸

〔组成〕陈皮　厚朴　藿香　白术　茯苓　麦芽　苍术　花粉　泽泻　山楂　猪苓　半夏　神曲　白芷　桔梗　滑石　砂仁　木香　紫苏叶　琥珀

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（191）小儿至宝锭

〔组成〕陈皮　全蝎　勾藤　薄荷　滑石　山楂　蝉蜕　槟榔　藿香　天麻　川贝　南星　紫苏叶　琥珀　牛黄　麝香　冰片等廿六味。

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（192）小儿香橘丹

〔组成〕木香　橘红　青皮　神曲　麦芽

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（193）启脾丸

〔组成〕党参　白术　猪苓　茯苓　青皮　陈皮　砂仁　神曲　麦芽　厚朴　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（194）一捻金

〔组成〕人参　大黄　槟榔　牵牛子　朱砂

〔服法与用量〕每日服二次，每次服二分，三岁以下婴儿酌减，糖水化服。

（195）肥儿丸

〔组成〕使君子仁　肉豆蔻　胡连　麦芽　神曲　槟榔　白术　枳实　山楂　木香

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（196）疳积散

〔组成〕鹤虱　海螵蛸　槟榔　茯苓　雷丸　三棱　莪术　红花　内金　使君子仁

〔服法与用量〕每日服二次，小儿五岁以上每次服一钱，五岁以下酌减。温开水化服。

三、疮疖及其它类

疮疖类的儿科中成药较少，一般小儿疮疖，症见皮肤生疮起疖，红肿热痛者，可服五福化毒丹(197)，清热解毒。若在一些发疹发斑疾病中，出现神昏谵语发狂，大便秘结，小便赤黄，舌质红绛，脉象洪数等症者，可在原治疗药物中，加服赛金化毒散(198)。

脐风：脐风是因断脐处理不当而引起的严重疾患。因多发生于出生后四至七天，所以俗称四天风或七天风。一般症见牙关紧闭，唇青口撮，甚至四肢抽搐，角弓反张等。可服

脐风散[199]，临床上应配合汤药及外用药。

遗尿也是儿科常见的病症，又称“尿床”。一般指四周岁以上的儿童，不能自主排尿，且经常发生的，应视为疾病。病因多由先天不足，肾气虚弱所致，治疗宜培元补肾为主，适当配合针灸，效果更佳。一般可用止尿汤（桑螵蛸、乌药、益智仁、山药、熟地），合服金匮肾气丸[25]。若兼有脾虚中气不足者，如兼见大便泄泻，食欲不振等，可用上方合服补中益气丸[102]。

附：中成药组成（197——199）

（197）五福化毒丹

〔组成〕生地　连翘　桔梗　元参　芒硝　赤芍　牛蒡子　银花　龙胆草　青黛　黄连　犀角　甘草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，周岁以内酌减，温开水化服。

（198）赛金化毒散

〔组成〕大黄　乳香　没药　川贝母　黄连　赤芍　花粉　牛黄　冰片　珍珠　雄黄　甘草

〔服法与用量〕每日服三次，周岁每瓶分三次服，二、三岁者，每次服二分，四岁以上者，每次服三分，温开水化服。

（199）脐风散

〔组成〕猪牙皂角　全蝎　大黄　当归　牛黄　朱砂　巴豆霜

〔服法与用量〕每次服三厘，乳汁或糖水化服。

注：儿科使用内科成药时，剂量为成人量$\frac{1}{2}$至$\frac{1}{4}$。

外科及其它

祖国医学外科的概念，和现代医学不完全一样。它多指发生于人体体表的疾患，如痈，疖，瘰疬等，所以古称疡科。至于现代医学一些发生于内脏的外科疾病，如阑尾炎、急性胰腺炎、胆囊炎等，则分别列入内科各门中。

外科类的中成药不多，所以与伤科（跌打损伤）及其它一些成药合在一起介绍。

一、一般皮肤疾患与痔漏类

一般皮肤疾患，中医的名称很多，如痈、疔、疖、瘰疬等，但概括起来，主要需分清阳证和阴证。

阳证：多属病灶浅在肌表，症见肿胀高起，范围局限，颜色红赤，皮肤灼热，疼痛拒按，肿块软硬适度，病势迅速，病程较短等，多指一些急性感染，一般为较轻症。

阴证：多属病灶深在筋骨，症见局部平塌，范围散漫，颜色不变或苍白，青暗，皮肤不热或仅有微热，隐痛或不痛，肿块或软陷，或坚硬如石，病势缓慢，病程较长等，如结核性感染、肿瘤等慢性病一般为较重症。

属于阳证的肿疡，一般发生于肿疡的初期，多采用消散、外托和清热的方法；阴证的肿疡，一般发生于肿疡的后期，多采取补益、生肌的方法。但无论何证，均与体内的脏腑气血等有密切的关系，古人所谓“痈疡虽属外科，其本实

根于内”。所以，在治疗时，不应当孤立地对局部症状治疗，而应结合全身症状，从整体出发，全面处理。

一般地说，疖、疔、痈症初起时，红、肿、热、痛的，多属于阳证，痈症久治不愈、瘰疬等慢性疾患，多属于阴证。疖，指单个毛囊及其所属的皮脂腺发生急性化脓性感染，或皮肤上的小脓肿。好发于颈后、背后和臀部，多见于青壮年。发生在面部及四肢的疖，中医称为疔，与疖性质相仿。治疗均应采取清热解毒的方法，一般可服连翘败毒膏（丸）(200)。痈，多指聚集一起的多个毛囊和皮脂腺的急性化脓性感染。一般痈症初起，多为一个红肿的硬结，既痒又痛，以后肿块逐渐扩大，红肿热痛加重，再以后化脓、溃破，最后脓腐脱后，肉芽生长，逐渐愈合。前一阶段，多伴有一些全身症状，主要是发热，寒战等，且化验血时，白细胞总数及中性粒细胞百分率增高。治疗上，初期可服清血解毒膏(201)。若来势较猛，发展较快的，可服蟾酥丸(202)，或外用蟾酥锭(203)，以解表驱毒。若痈症红、肿、热、痛较重，当以清热解毒为主，可内服一粒珠(204)，外用如意金黄散(205)。

急性乳腺炎：中医称为“乳痈”。多见于产后哺乳的妇女。症见患侧乳房初起疼痛，有硬块，以后迅速出现红肿热痛，最后化脓溃破，常伴有发热，恶寒等症状，血中白细胞总数及中性粒细胞百分率增高。一般初起可合服连翘败毒膏(200)和夏枯草膏(206)，以后可合服一粒珠(204)和夏枯草膏，外用如意金黄散(205)。化脓后，应作外科处理。

痈症久治不愈，流脓嗜水，久不收口，多转为阴证。一般无论溃破与否，只要其属于阴寒证的，均可外用阳和解凝膏(207)。瘰疬，指颈部淋巴结核，中医认为多由痰气郁滞而

成，早期未溃破时，可服小金丹(208)，消瘀通络，祛痰散结。偏于阴虚有热者，可服内消瘰疬丸(209)。以上凡属阴证、溃脓流水，肌肉不生，久不收口者，可外用生肌散(210)。一般各种皮肤湿痒，黄水疮，秃疮等，只要其属于湿邪偏胜的，均可外用四圣散(211)。各种癣症，多年不愈者，可外用顽癣敌(212)。

轻度烫伤，红肿起泡，疼痛不止，一般可用獾油(213)外涂。

痔漏：痔漏从中医来讲，范围很广。"痔"指凡孔窍中有瘜肉突出的，就叫作痔，如耳痔、鼻痔、肛痔等，生于肛门外面的叫外痔，生于肛门里面的叫内痔。漏，指凡外疡溃破不收口，疮口深陷，脓水淋漓的，就叫作漏，如脐漏、肛门漏等。这里我们只介绍肛门的痔漏，一般所讲的痔漏，即指这一种。痔疮，多由于便秘，久坐久立，妊娠等原因，使肛门直肠的痔静脉同流受阻，痔静脉丛发生曲张、扩大而成，中医认为气血壅滞，瘀血浊气下注肛门而致。一般可服脏连丸(214)。若内热较重，大便秘结较甚，或有肛门疼痛者，可服槐角丸(215)。若热症不明显，脱肛较为突出者，可服补中益气丸(102)，升提中气。至于漏症，多用于手术治疗，无相应的成药。此外，需要指出的是，中医外科对痔漏一病，积累的丰富的手术疗法，如挂线疗法、结扎疗法等，既简便易行，疗效又高，可推广使用。

附：中成药组成（200—215）

（200）连翘败毒膏（丸）

〔组成〕连翘　双花　蝉蜕　地丁　公英　栀子　白芷

黄芩　赤芍　浙贝母　元参　桔梗　木通　防风　白藓皮　甘草　花粉　大黄

〔服法与用量〕每日服二次，每次服五钱，温开水冲服。丸剂日服一次，每次三钱，温开水送服。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(201) 清血解毒膏

〔组成〕大黄　荆芥　公英　防风　地丁　黄芩　木通　生地　连翘　甘草

〔服法与用量〕每日服一次，每次服二钱，温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(202) 蟾酥丸

〔组成〕朱砂　雄黄　铜绿　蟾酥　白矾　胆矾　乳香　麝香　没药　寒水石　活蜗牛　轻粉

〔服法与用量〕每日服一次，每次服一分，用葱白五寸，嚼烂同黄酒送下。

〔禁忌〕孕妇忌服

(203) 蟾酥锭

〔组成〕雄黄　活蜗牛　朱砂　麝香　冰片　蟾酥

〔用法与用量〕用好醋磨汁，涂沫患处。

〔禁忌〕疮疖溃破者勿用。

(204) 一粒珠

〔组成〕穿山甲　乳香　没药　朱砂　麝香　蟾酥　冰片　雄黄　牛黄　糯米面　珍珠

〔服法与用量〕每日服一次，每次服五分，黄酒送下，温开水亦可。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(205) 如意金黄散

〔组成〕花粉　僵黄　陈皮　天南星　黄柏　白芷　甘草　大黄　苍术　厚朴

〔用法与用量〕调浓茶敷患处。

(206) 夏枯草膏

〔组成〕夏枯草

〔服法与用量〕每日服二次，每次服五钱，温开水冲服。

(207) 阳和解凝膏

〔组成〕麻油　漳丹　凤仙花　白附片　牛蒡　香橼　白蔹　桂枝　地龙　川乌　草乌　赤芍　乳香　没药　木香　麝香　川芎等。

〔用法与用量〕贴患处。

(208) 小金丹

〔组成〕白胶香　地龙　五灵脂　草乌　糯米面　没药　当归　香墨　麝香　马钱子

〔服法与用量〕每日服二次，每次服五分，用黄酒送下。

(209) 内消瘰疬丸

〔组成〕夏枯草　元参　大青盐　海藻　浙贝母　薄荷　花粉　锻蛤壳　白蔹　连翘　熟军　甘草　生地　桔梗　枳壳　当归　元明粉

〔服法与用量〕　每次服一袋，白开水送下。

(210) 生肌散

〔组成〕血竭　锻龙骨　乳香　没药　海螵蛸　象皮

赤石脂

〔服法与用量〕上患处，外贴朱砂膏。

(211) 四圣散

〔组成〕漳丹　官粉　枯矾　松香

〔服法与用量〕用花椒油调敷患处，脓水过多者干敷。

(212) 顽癣敌

〔组成〕麻油　黄蜡　柳蘑

〔服法与用量〕　擦抹患处。

(213) 獾油

〔组成〕獾油　冰片

〔服法与用量〕涂抹患处。

(214) 脏连丸

〔组成〕黄芩　槐角　生地　炒槐花　赤芍　阿胶　地榆炭　当归　芥穗　黄连　猪大肠

〔服法与用量〕每次服一丸，白开水服下。

(215) 槐角丸

〔组成〕槐角　芥穗　地榆炭　生地　黄芩　大黄　炒槐花　红花　当归　赤芍　防风　枳壳

〔服法与用量〕水丸每次服一袋，蜜丸每次服一丸，白开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

二、跌打损伤及其它类

(一) 跌打损伤

跌打损伤是日常生活中常见的病症，属于中医伤科的范

畴。主要是因为受暴力撞击，高处跌下，强力扭转等原因所造成。一般将破坏肢体，皮肉，筋骨的称为外伤，影响到体内脏腑的称为内伤。外伤又分为创伤、扭伤和折伤。大体上将局部红肿灼热或皮肉裂开出血者，称为创伤；只有筋脉肌肉受伤，虽有肿痛，皮肤尚完整者，为扭伤；骨节变位或折断者为折伤。

创伤：如仅肌肤红肿灼热而未破裂出血者，可内服紫金锭(216)，或外用如意金黄散(205)、紫金锭(216)等。若创伤出血较多，身热，脉浮者，可调服三黄宝腊丸(217)。若创口经久不愈，多属气血两亏，可服十全大补糖浆(124)。

扭伤：一般可服跌打丸(218)。若扭伤较甚，血瘀作痛者，可服七厘散(219)。

（二）其它

一般暴发火眼，两目红肿痛等疾患，多由肝火上冲所造成，可服黄连羊肝丸(43)，清肝泻火明目。并可外用八宝梅片锭(220)、八宝眼药(221)等。若肝肾阴虚，精血不能上荣于目，则两目发干，视物昏暗不清，或有迎风流泪等，治疗当以滋阴明目之法，可服明目地黄丸(222)。兼有热症者，可服石斛夜光丸(223)，滋阴清热。

此外，若耳内生疮，耳肿耳痛，流脓流水，疼痒难忍者，可用耳底油(224)，或红棉散(225)。

附：中成药组成（216—225）

（216）紫金锭

〔组成〕山慈姑　红芽大戟　五倍子　千金子霜　朱砂　雄黄　麝香

〔用法与用量〕内服每日一次，每次五分，温开水送下。外用醋研涂于患处。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(217) 三黄宝腊丸

〔组成〕天竺黄　雄黄　藤黄　大戟　刘寄奴　血竭　当归　儿茶　乳香　琥珀　轻粉　麝香　黄蜡　芒硝　水银

〔服法与剂量〕每日服一次，每次服一丸，黄酒温服，或温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(218) 跌打丸

〔组成〕乳香　白芍　苏木　血竭　没药　红花　三棱　土鳖虫　防风　当归　丹皮　木通　骨碎补　枳实　桃仁　刘寄奴　自然铜　三七　川断　姜黄等

〔服法与剂量〕每日服二次，每次服一丸，黄酒温服，或温开水送下。

〔禁忌〕孕妇忌服。

(219) 七厘散

〔组成〕乳香　当归　没药　血竭　儿茶　红花　朱砂　麝香　冰片

〔服法与用量〕每日服一至二次，每次服五分至一钱，黄酒温服，或温开水送下。

〔禁忌〕孕妇遵医嘱服用。

(220) 八宝梅片锭

〔组成〕锻炉甘石　冰片　熊胆　硼砂　黄连　蜂蜜

〔用法与用量〕日点数次，每次取药蘸凉开水，点入两眼角。

（221）八宝眼药

〔组成〕锻炉甘石　冰片　硼砂　熊胆　琥珀　珊瑚　朱砂　麝香　珍珠

〔用法与用量〕用玻璃棒蘸凉水和药，点入眼角中。

（222）明目地黄丸

〔组成〕生地　熟地　石斛　防风　枳壳　杏仁　牛膝

〔服法与用量〕蜜丸每日服二次，每次服二丸；水丸每日二次，每次二钱；温开水送下。

（223）石斛夜光丸

〔组成〕石斛　人参　天冬　熟地　麦冬　生地　黄连　肉苁蓉　犀角　菟丝子　青葙子　菊花　防风　枳壳　牛膝　决明子　羚羊角　川芎　杏仁　甘草等

〔服法与用量〕每日服二次，每次服一丸，淡盐水或温开水送下。

（224）耳底油

〔组成〕核桃油　麝香　冰片

〔用法与用量〕先将耳内用棉花擦净，再用此药润敷之。

（225）红棉散

〔组成〕枯矾　锻炉甘石　麝香　冰片　苏木　红花

〔用法与用量〕先用棉花擦净耳内脓水，再用纸卷筒，将药吹入耳内。

中成药索引

〔一　划〕

一粒珠……101
一捻金……96

〔二　划〕

二母安嗽丸……18
二至丸……57
二妙丸……32
二陈丸……17
人参健脾丸……49
人参归脾丸……50
人参养荣丸……59
七厘散……105
七制香附丸……73
七宝美髯丹……58
八珍益母丸……73
八宝坤顺丹……74
八宝红灵丹……63
八宝梅片锭……105
八宝眼药……106
九制大黄丸……24
九转黄精丹……58
十全大补丸……59
十香丹……36
十香止痛丸……42

〔三　划〕

三妙丸……32
三黄宝腊丸……105
大黄䗪虫丸……75
大补阴丸……57
小儿四症丸……95
小儿回春丹……89
小儿金丹……89
小儿香橘丸……95
小儿百寿片……89
小儿至宝丹……90
小儿止嗽金丹……90
小儿至宝锭……95
小儿久嗽丸……91
小儿解热丸……92
小儿琥珀丸……92
小活络丹……30
小金丹……102
千金止带丸……78
山楂丸……43
万氏牛黄清心丸……36

〔四　划〕

太极丸……89
五仁润肠丸……51

五加皮药酒……31
五福化毒丹……97
六一散……63
六合定中丸……64
六味地黄丸……32
仁丹……63
内消瘰疬丸…… 102
分清五淋丸……26
天麻丸……35
木香顺气丸……41
木香槟榔丸……43
止嗽丸……17
止嗽定喘丸……17
止嗽青果丸……17
牛黄上清丸……22
牛黄抱龙丸……92
牛黄清心丸……36
牛黄解毒片……23
牛黄噙化丸……12
牛黄镇惊丸……92
开胸顺气丸……41
风湿关节炎片……31

〔五　划〕

石斛夜光丸…… 106
四神丸……50
四圣散…… 103
加味逍遥丸……41
加味保和丸……50
左金丸……41
去暑丸……63
归芍地黄丸……57
生肌散…… 102
生乳糖浆……83
白带丸……77
艾附暖宫丸……73
孕妇金花丸……26

〔六　划〕

再造丸……35
麦味地黄丸……18
冰硼散……23
如意金黄散…… 102
竹沥膏……36
朱砂安神丸……56
百日咳片……91
百花定喘丸……18
百补增力丸……49
百效丸……93
耳底油…… 106
耳聋通窍丸……24
老鹳草膏……29
血苏……59
舟车丸……43
当归龙荟丸……24
朴陈化郁丸……42
妇女通经丸……75
妇科金丹……78
妇科五淋丸……26
产后药……82

芎菊上清丸……22

〔七　划〕

坎离砂……30
补心丸……56
补中益气丸……50
阳和解凝膏……102
安坤赞育丸……78
安神补气丸……57
杞菊地黄丸……57
沉香舒郁丹……42
防风通圣丸……11
抗热牛黄丸……25
苏合丸……36
连翘败毒膏……100

〔八　划〕

武红灵丹……63
周氏回生丹……64
知柏地黄丸……57
明目地黄丸……106
肥儿丸……96
虎骨木瓜丸……30
虎骨酒……31
金匮肾气丸……18
金鸡虎丸……59
金锁固精丸……58
附子理中丸……49
参苓白术丸……50
参苏理肺丸（糖浆）……11

〔九　划〕

保和散……89
保胎丸……82
保婴镇惊丸……92
活络丹……35
红丸药……91
红棉散……106
泻白丸……90
泻痢固肠丸……51
香砂六君子丸……49
香砂养胃丸……49
香连化滞丸……64
香苏正胃丹……90
柏子养心丹……56
独活寄生丸……31
养血调经膏……75
养阴清肺膏(丸)……17
追风膏……32
胎前和气丸……82
胎产金丹……82
胆草泻肝丸……24
降压片……37
济生肾气丸……58

〔十　划〕

珠黄消疳散……23
疳积散……96
乌鸡白凤丸……78
乌金丸……82

益母草膏……74
益元散……63
益肾丸……59
烂积丸……43
纯阳正气丸……64
茴香橘核丸……41
荷叶丸……17
骨疼丸……29
顽癣敌……103
桑菊感冒片……12
橘红丸……16
夏枯草膏……102
橘红化痰丸……18
脐风散……97
脏连丸……103
脑立清……35
脑乐静……83

〔十一划〕

健步虎潜丸……32
健胃宽胸丸……42
启脾丸……95
崩漏丸……75
得生丹……74
栀子金花丸……23
清血解毒膏……101
清肺抑火膏(丸)……16
清胃黄连丸……23
清音丸……13
清眩丸……22
清宁丸……24
清热凉血膏……26
清热解毒丸……25
清瘟解毒片……12
羚羊感冒片……12
羚翘解毒片……11
婴儿保肺宁……91
通宣理肺片……11
通经甘露丸……74
麻仁滋脾丸……51
蛇床子片……83

〔十二划〕

温经丸……73
寒喘丸……18
痢疾丸……65
紫金锭……104
紫雪散……25
舒肝丸……40
舒肝调气丸……40
舒肝解郁丸……40
舒筋活络膏……31
黄连上清丸……22
黄连羊肝丸……25
蛤蚧定喘丸……19
跌打丸……105
黑神丸……83
黑锡丹……19

〔十三划〕

催乳丸……83
滋肾丸……58
解肌宁嗽丸……90
喉痛丸……12

〔十四划〕

槐角丸……103
槟榔四消丸……43
福幼理中丸……93
豨签丸……30
豨桐丸(片)……37
银翘解毒片……11
赛金化毒散……97
磁朱丸……58

〔十五划〕

调中化痢丸……65
调经丹……75

〔十六划〕

避瘟散……64
锡类散……23

〔十九划〕

蟾酥丸……101
蟾酥锭……101

〔二十划〕

藿香正气水（丸）……62
獾油……103