

典型病例

刘某, 男性, 生后 25 天全身及巩膜黄染明显, 经皮胆红素测定值为 $291\mu\text{mol/L}$, 治疗先按摩基本反射区大脑、肾、输尿管、膀胱, 采用轻度刺激手法, 每一反射区按摩 20 下。后按摩重点反射区: 肝、胆、脾、胃、肠, 采用中度刺激手法。每一反射区按摩 100 下, 每日按摩 2 次。按摩后让患儿饮水 50ml。7 日后患儿巩膜及全身黄染渐退, 经皮胆红素测定已降至 $143\mu\text{mol/L}$ 。

体会

新生儿高胆红素血症属中医“胎黄”范畴, 发病机理多为湿热熏蒸、寒湿阻滞、肝郁血瘀。按摩大脑可调节全身各脏腑功能, 按摩肝、胆、脾、肠、输尿管、膀胱等反射区可疏肝健脾、利湿退黄, 使湿邪从二便排出。此法简便、安全, 无副作用, 易为患儿及家属接受。

(收稿日期 2002-06-25)

· 药膳疗法 ·

民间四神方治疗小儿厌食症

苏 齐 余琼琼¹

(福建省泉州市医药研究所, 362000)
1. 福建省泉州市卫生学校

四神方是流传于闽南泉州地区的民间验方, 由淮山药、茯苓、芡实、莲子肉等四味药物组成, 用于治疗小儿厌食症。笔者近几年来应用本方与西药常规治疗小儿厌食症的方法进行对照研究, 报告如下。

一般资料

小儿厌食症患者共 110 例, 随机分为治疗组 60 例及对照组 50 例。治疗组中男性 41 例, 女性 19 例; 年龄 6 个月~12 岁, 平均 5.3 岁; 平均病程 8 个月。对照组中男性 26 例, 女性 24 例; 年龄 6 个月~12 岁, 平均 5.8 岁; 平均病程 7 个月。两组临床资料无显著性差异, 具有可比性。

治疗方法

淮山药、茯苓、芡实、莲子肉各 500g, 共研细末。每日 3 次, 每次 3~6g, 温开水冲服。婴幼儿可加入喂养的主辅食中, 3 岁以上者可酌量配合用猪膀胱、猪肚炖食。若兼呕恶者, 用法半夏 6g, 陈皮

6g, 生姜 3g, 煎汤送服上药; 腹胀者, 用槟榔 6g, 川朴 6g, 陈皮 6g, 煎汤送服上药。

对照组予口服胃蛋白酶合剂 3~6ml, 每日 3 次; 多酶片 1~2 片, 每日 3 次; 葡萄糖酸锌 1~2 片, 每日 3 次。

两组均以 30 天为 1 个疗程。

治疗效果

疗效评定标准: 痊愈: 食欲恢复正常, 其它症状消失; 好转: 食欲增加, 但未恢复到正常儿童饮水量, 其它症状有所改善; 无效: 治疗前后症状无变化。

结果治疗组痊愈 52 例, 好转 6 例, 无效 2 例。对照组痊愈 30 例, 好转 12 例, 无效 8 例。治疗组疗效明显优于对照组。临床观察两组食欲增加和恢复正常时间, 治疗组亦明显优于对照组。

体会

四神方民间用于治疗小儿厌食症年代久远, 方中淮山药味甘性微温, 益气补脾, 现代研究其作用与其所含营养成分和粘液质淀粉酶等有关; 茯苓味甘, 性平, 能健脾补中化湿, 二者共为主药。芡实味甘、涩, 性平, 能收敛、滋养、强壮、健脾补肾; 莲子肉味甘、涩, 性平, 补脾胃清心火。小儿“心常有余, 肾常虚”, 故伍以莲子清心, 芡实补肾。四味药合用, 实为标本兼治。且四味均集药、食为一体, 性味甘平, 口感亦佳, 制成药散, 不论单独服用或调入主辅食, 患儿均可接受。

(收稿日期 2002-07-17)

· 药械并用 ·

硬膜外注药加牵引治疗 腰椎间盘突出症 39 例

张景萍

(河南省洛阳市第四人民医院, 471000)

笔者近几年来应用硬膜外注药加牵引治疗腰椎间盘突出症 39 例, 疗效满意, 现报告如下。

一般资料

39 例中男性 27 例, 女性 12 例; 年龄 28~72 岁; 患者均有腰腿痛症状, 检查直腿抬高试验阳性; 经 CT 或 MRI 检查示腰椎间盘突出; 其中有腰扭伤史者 25 例, 无明显诱因者 14 例。

民间四神方治疗小儿厌食症

作者：[苏齐](#)，[余琼琼](#)
作者单位：[苏齐\(福建省泉州市医药研究所, 362000\)](#)，[余琼琼\(福建省泉州市卫生学校\)](#)
刊名：[中国民间疗法](#)
英文刊名：[CHINA' S NATUROPATHY](#)
年，卷(期)：2002, 10 (9)
被引用次数：1次

引证文献(1条)

1. [丁国栋](#). [孙远岭](#) [中医药治疗儿童厌食症及作用机制的研究进展](#)[期刊论文]-[中国中医药科技](#) 2006 (4)

引用本文格式：[苏齐](#). [余琼琼](#) [民间四神方治疗小儿厌食症](#)[期刊论文]-[中国民间疗法](#) 2002 (9)