

歌
诀
白
话
解
丛
书

中医妇科

歌 诀 白 话 解

程绍恩 夏月辉 戴秀敏◎主编



ZHONGYI FUKU
GEJUE BAIHUAJIE



北京科学技术出版社

中医妇科




ZHONGYI FUKU
GEJUE BAIHUAJIE

责任编辑：赵 晶

封面设计：视觉传达

ISBN 978-7-5304-1842-0



9 787530 418420 >

定价：15.00元

中医妇科歌诀白话解

主 编 程绍恩 夏月辉 戴秀敏
副主编 王凤材 温淑珍 王云鹭

图书在版编目(CIP)数据

中医妇科歌诀白话解/程绍恩,夏月辉,戴秀敏主编.-北京:北京科学技术出版社,2009.8(重印)

(歌诀白话解丛书)

ISBN 978-7-5304-1842-0

I.中… II.①程… ②夏… ③戴… III.中医妇科学 IV.R271.1

中国版本图书馆CIP数据核字(96)第04723号

中医妇科歌诀白话解

主 编:程绍恩 夏月辉 戴秀敏

责任编辑:赵 晶

责任校对:黄立辉

封面设计:回归线视觉传达

出 版 人:张敬德

出版发行:北京科学技术出版社

社 址:北京西直门南大街16号

邮政编码:100035

电话传真:0086-10-66161951(总编室)

0086-10-66113227(发行部)

0086-10-66161952(发行部传真)

电子信箱:bjkjpress@163.com

网 址:www.bjkjpress.com

经 销:新华书店

印 刷:三河国新印装有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

字 数:193千

印 张:8.375

印 次:2009年8月第4次印刷

ISBN 978-7-5304-1842-0/R·355

定 价:15.00元



京科版图书,版权所有,侵权必究。

京科版图书,印装差错,负责退换。

前 言

医乃仁术,铁肩之道义,为苍生患疾活命之所依托者。故范文正公有言曰:“不为良相,必为良医。”然则良相易,则良医实难矣。

祖国医学浩博源长,其籍汗牛充栋。虽有良医之愿,每致初学者望洋兴叹。何得举纲而目系其中,置枢纽而寓于纵横,循阶造顶,方能捷径于后人。兹轩岐至今,惟清吴谦等所撰《医宗金鉴》一书,致后人行由有径,言简而意赅。终因年移代革,医学速飞,咸日新其用而华叶递荣。故其书又落于时代之后,远不济于今日之需。

目前,大专院校之中医教材,继往开来,发古人之未发,启前人之未启,内容丰富多彩,但因多为论述之文,而篇长幅广,致初学者难以诵记,多有合卷茫然之感。

临渊羡鱼,莫如退而结网。余不揣鄙陋,集同道与门下,从仿《医宗金鉴》之体,撰成系列丛书,刊行于世,俾学者循此阶梯,升堂入室,造福于炎黄之裔。

长春中医学院 程绍恩 教授

目 录

总 论

第一节 妇科学定义范围和发展概况	(1)
一、妇科学定义和范围	(1)
二、妇科学发展史概况	(2)
第二节 女性的解剖和生理特点	(4)
一、女性生殖器官的解剖	(4)
二、月经的生理	(5)
三、妊娠与产育	(7)
(一) 妊娠	(7)
(二) 产育	(7)
第三节 病因病机	(8)
一、病因	(9)
(一) 寒、热、湿邪	(9)
(二) 生活所伤	(10)
二、病机	(12)
(一) 脏腑功能失常	(12)
(二) 血气失调	(14)

(三) 冲、任二脉损伤	(15)
第四节 诊断概要	(16)
一、四诊	(16)
(一) 问诊	(16)
(二) 望诊	(17)
(三) 闻诊	(18)
(四) 切诊	(19)
二、辨证要点	(20)
(一) 气虚	(20)
(二) 气郁	(21)
(三) 血虚	(21)
(四) 血瘀	(21)
(五) 血寒	(21)
(六) 血热	(22)
(七) 肾虚	(22)
(八) 脾虚	(23)
(九) 肝郁	(23)
(十) 肝经湿热	(24)
(十一) 肝阳上亢	(24)
(十二) 肝风内动	(24)
第五节 治法概要	(25)
一、补肾滋肾法	(25)
(一) 肾阳虚	(25)
(二) 肾阴虚	(26)
二、疏肝养阴法	(26)
三、健脾和胃法	(27)
(一) 健脾法	(27)

(二)和胃法	(28)
四、补益气血法	(28)
(一)气虚	(28)
(二)血虚	(29)
五、活血化瘀法	(29)
六、理气行滞法	(30)
七、清热凉血法	(31)
八、温经散寒法	(31)
九、利湿除痰法	(32)
十、解毒杀虫法	(32)
第六节 预防与保健	(33)
一、月经期	(34)
二、劳逸结合(不妄劳作)	(34)
三、饮食有节	(34)
四、调和情志	(34)
五、防御外邪	(34)
六、孕期	(35)
七、慎起居	(35)
八、哺乳期	(35)
九、绝经期	(35)

各 论

第七节 月经病	(37)
一、月经先期	(38)
二、月经后期	(44)
三、月经先后无定期	(49)

四、月经过多	(54)
五、月经过少	(58)
六、经期延长	(62)
七、痛经	(65)
八、经间期出血	(73)
九、闭经	(77)
十、崩漏	(84)
十一、经行乳房胀痛	(94)
十二、经行发热	(97)
十三、经行头痛	(100)
十四、经行身痛	(104)
十五、经行泄泻	(106)
十六、经行呕吐	(109)
十七、经行吐衄	(111)
十八、经行口糜	(116)
十九、经行风疹块	(119)
二十、经行眩晕	(121)
二十一、经行浮肿	(123)
二十二、经行情志异常	(125)
二十三、绝经前后诸证	(127)
第八节 带下病	(131)
第九节 妊娠病	(139)
一、妊娠恶阻	(139)
二、妊娠腹痛	(144)
三、异位妊娠	(148)
四、胎漏、胎动不安	(151)
五、堕胎、小产、滑胎	(156)

六、胎萎不长	(160)
七、胎死不下	(163)
八、子烦	(167)
九、子肿	(170)
十、子满	(173)
十一、子晕	(175)
十二、子痫	(177)
十三、子悬	(180)
十四、子瘕	(182)
十五、子嗽	(184)
十六、子淋	(186)
十七、妊娠小便不通	(189)
十八、难产	(192)
第十节 产后病	(195)
一、产后血晕	(195)
二、产后痉症	(198)
三、产后腹痛	(201)
四、产后恶露不绝	(203)
五、产后大便难	(206)
六、产后发热	(208)
七、产后排尿异常	(214)
八、产后自汗、盗汗	(217)
九、产后身痛	(220)
十、缺乳	(224)
十一、乳汁自出	(227)
第十一节 杂病	(230)
一、癥瘕	(230)

二、不孕症	(235)
三、脏躁	(241)
四、阴挺	(243)
五、阴痒	(246)
六、阴疮	(250)
七、阴吹	(253)

总 论

第一节 妇科学定义范围和发展概况

一、妇科学定义和范围

妇科定义中医理,认识解剖生理情,
诊疗规律特有病,临床妇女学科成。
范围子宫胞络脉,门户产道生月经,
妊娠哺乳前阴乳,经带胎产治不同。

【注】 中医妇科学:根据中医理论来认识研究妇女的解剖、生理、病理、病情和诊疗规律以及特有的疾病,而成为一门临床科学。

其研究范围:在解剖学上有子宫、胞脉、胞络、子门、阴户、产道等。在生理上有月经、妊娠、分娩、哺乳等。在疾病上有前阴、乳疾、月经、带下、胎前、产后等病。在病机和治疗上与内科、男科亦均有所不同。

二、妇科学发展史概况

发展概况始殷商,《内经》胞宫脉络当。
仲景金匱妇女病,晋代叔和脉经详,
隋巢原候妇产证,唐孙妇科《千金方》,
宋代妇产书兴盛,金元四家各主张,
明肯堂绳论妇产,清朝《金鉴》妇法良,
近代以来新中国,中西结合效非常。

【注】我国妇产学科早在三千多年前的殷商时代就有记载,如现存古典著作《易经·爻辞》中有“妇孕不育”等内容。

两千多年前的医著《黄帝内经》已有妇女解剖、生理、诊断、妇科特有病证的描述。在《素问·上古天真论篇》上说:“女子……二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。”在经络中对任督二脉、胞宫、胞络等亦有所论述。

仲景的《金匱要略》有“妇人妊娠”、“妇人产后”、“妇人杂病”三篇,内容包括月经病、带下病、妊娠病、产后病及杂病等,既有证候描述,也有方药治疗,共收 30 多个方子。

晋代名医王叔和著有《脉经》、《平妊娠分别男女将产诸症第一》提出:“肾名胞门、子户、尺中肾脉也,尺中之脉,按之不绝,法妊娠也。三部脉浮沉正等,按之无绝者,有娠也。”还提出“居经”、“避年”、“激经”等月经异常的现象。

隋代以巢元方为首,集体编著《诸病源候论》,其中 37~44 卷是论述妇产科病证的,共论述了 283 种证候。在此明确了妊娠期为 10 个(阴历)月左右,并提出要有人工流产法。

唐代孙思邈著《千金要方》将“妇人方”三卷居于全书之首,明确论述了求子、妊娠疾病、月经、带下、杂病等证治,收集药方

数百首,其中治疗绝产的方药和灸法延用至今。

宋代是世界医事制度上妇产科最早的独立分科。其中产科10人,设有产科教授。故是妇产科专书兴盛之时,如李师圣、郭稽中的《产育宝庆集》、朱瑞章的《产科备要》、薛仲轩的《坤元是保》、齐仲甫的《女科百问》、陆子正的《胎产经验方》、无名氏《产宝诸方》、杨子建的《十产论》、陈自明的《妇人良方大全》等等。

金元时代,刘、李、朱、张四大医家对妇科各种疾病的治疗及病机、转归各有主张。如刘完素认为火热之邪是导致各种证候的主要原因,谓“六气皆从火化”,治法主要用寒凉,同时也用于妇科。主要用寒凉泻火之法以通经。他说:“女子不月,先泻心火,血自下也。”

李东垣认为“内伤脾胃,百病由生。”故治法上着重升发脾胃阳气以除湿,亦广用于妇科。如《兰室秘藏·妇人门》论述经闭不行,引用《内经》“二阳之病发心脾,有不得隐曲,女子不月”之文,谓:“妇人脾胃久虚,或形羸气血俱衰,而致经水断绝不行……病名曰:血枯经绝,宜泻胃之燥热,补益气血,经自行矣。”其论经漏,则认为“皆由脾胃有亏,下陷于肾,与相火相合,湿热下迫,经漏不止……宜大补脾胃而升举气血。”此法治崩漏,至今每多取效。

朱丹溪提出:“阳常有余,阴常不足”的理论,重视保精养阴。对产前的调治以清热养血为主,黄芩、白术为安胎之妙药。

张子和主张“贵流不贵滞”的理论,认为痰水之邪与气血是互相关联的。他著的《儒门事亲》,善用汗、吐、下三法以驱病。他认为“养生当论食补,治病当论药攻”戒人不可随便拟补。他说:余虽用补,未尝不以攻药为其先,何以?盖邪未去而不可言补,补之则适足资寇。”这种观点,也常用于妇科。如他治月经

病往往用吐、下法驱逐痰水而取效。

综上金元四大家的经验和理论,从不同角度丰富了妇科的内容,使妇科专著得到了不断地充实和提高。

明代继承宋、金、元各家的理论和经验加以总结提高,出现了较详尽、系统的妇科专著,如王肯堂的《证治准绳》设女科先述治法通论,次为调经门,再次为杂病门、胎前门、产后门等。每门分为若干证,证后有方。他对陈自明、薛立斋之说,多加采纳,取其养正为主。其后武之望所编的《济阴纲目》基本上以该书为蓝本。此外李时珍《本草纲目》对月经病亦有颇详的论述。

清代将妇产科统称为妇人科和女科,著作颇多,如肖慎斋的《女科经纶》、陈修园写的《女科要旨》、阎纯玺编《胎产心法》、沈尧封著的《女科辑要》、无名氏《竹林女科》,对后世影响较大的是《傅青主女科》,最佳的著作是《医宗金鉴·妇科心法要诀》,至今指导临床实践,疗效辉煌。

中华人民共和国成立后,妇科学得到了不断的发展和提高,也取得了很大的成绩,如用中西医结合非手术疗法治疗宫外孕;用针灸纠正胎位、用中医中药治疗宫颈癌及妇科多发病、常见病都收到了满意的疗效。

第二节 女性的解剖和生理特点

一、女性生殖器官的解剖

女性生殖解剖异,子宫多名胞血室,
宫中胞脉系胞络,子门宫颈口分离,

产道阴道儿生路，阴门阴户交骨奇。

【注】 女性与男性的不同之处，就在于生殖器官相异。《灵枢·经水》上说：“若夫八尺之士，皮肉在此，外可度量，切循而得之，其死可解剖而视之。”古人经过对妇女解剖观察到女性生殖器官有子宫、胞脉、胞络、子门、产道、交骨等。子宫之别名较多，有女子胞、胞宫、胞脏、子脏、子处、血室等名。

子宫之中有胞脉，连系子宫的还有胞络，胞络之脉上系心脏，下系肾脏，为月经之源，妇产科疾病之根。《素问·评热论篇》说：“胞脉者，属心而络于胞中。”“月事不来者，胞脉闭也。”《素问·奇病论篇》说：“胞络者，系于肾。”胞宫、胞脉、胞络三者功能协调，相互作用则月经正常，孕育而生。

子门：指子宫口而言，子宫口与阴道分离之处谓子宫，即是子门。

产道：指阴道而言，即胎儿出生时所经过之道路。

阴门：亦称产门，即阴道口处。

阴户：指妇女的外阴部，如大、小阴唇等。

交骨：即耻骨联合处。交骨开则胎生。

二、月经的生理

月经每月信守期，二七而至去七七，

经来持续三七日，十一为早十八迟。

腰腹微痛乳作胀，一避二并三月居，

月经之原基天癸，胞宫冲任督带机。

【注】 月经，又称为月信，是指妇女有规律的、周期性的子宫出血，一般每月一次，经常不变，应期而来，故为信守期。健康女子一般由二七十四岁左右月经来潮，称为初潮。到七七四十

九岁月经去,停止不来又称为绝经。由初期到绝经期,为35年左右。《素问·上古天真论篇》说:“女子二七天癸至,任脉通、太冲脉盛,月事以时下,故有子。……七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。”由第一次月经开始到第二次月经来潮,称为月经周期。月经周期一般为28天,不应少于21天,也不应超过35天,经期持续时间一般为3~7天。经量第一天稍少,第二、三天较多,第四天后逐渐减少,总量为50~80毫升。经色多为暗红,开始较浅,继而逐渐加深,最后又成淡红。经质不稀不稠,不凝固,无血块,无特殊臭气。初潮年龄可因地域、气候、风俗、民族、营养等不同,一般早在11岁或晚至18岁。故“11为早18迟”。临经前或行经初期,可伴有轻微的腰腹酸痛,或少腹、乳房胀满,或情绪不稳定等现象。当月经过后一切症状及反应则自然消失,它不属于疾病,无须治疗。健康无病妇女月经一年一至为避年;每二月定期行经一次者为并月。每三个月定期行经一次者谓居经,又称为季经。三者均属正常,不属病证。

月经之基础,来源于天癸,天癸是由先天肾气生成的一种阴精;它有促进人体生长发育和月经来潮与生殖作用。故《素问·注证发微论篇》上说:“天癸者,阴精也。……由先天之气蓄极而生”月经与冲、任、督、带四脉和胞宫的机制关系更为密切,胞宫是月经和孕育胎儿的器官。而冲、任、督三脉同起于胞中,为之一源三歧,即任脉从胞出行身前,督脉从胞出行身后,冲脉从胞出行身侧,带脉绕身一周,约束诸脉,各司其职调节月经的产生和维持其生理功能。

三、妊娠与产育

(一) 妊娠

妊娠胚胎分娩前，厌食择酸头晕眩，
倦睡淡呕三月后，脉滑乳隆晕色全，
四月胎动乳汁有，五月宫大平脐缘。
预产末经一日起，该月九日加在先，
阳历加七阴十四，总数二百八十天。

【注】 妇女怀孕，从胚胎形成至分娩以前，统称为妊娠。妊娠之后，由于胎儿的生长发育的需要，母体发生了一系列的适应性变化，首先是月经不潮。常见的症状有厌食、择食，喜食酸物。头目眩晕、倦怠嗜睡、晨起口淡、欲恶心、呕哕等现象。一般在3个月后可以消失。妊娠3个月，脉象流利滑疾，按之应指。乳房明显增大隆起，乳头乳晕全部着色。妊娠4个月后开始有胎动，乳头可挤出少量乳汁。5个月子宫增大，小腹膨隆，宫体与脐缘平高。胎儿逐渐增大，孕腹逐渐增大，所谓“怀胎十月，婴儿而生。”

预产期的计算方法：即从末次月经第一天算起，再以该月份数加9，阳历日数加7，阴历日数加14，总计280天左右，即是妊娠10个月的预产期，便要分娩。

(二) 产育

临产腰腹阵胀坠，指跳尿频临盆谓。
弄胎腹痛腰不痛，九月腹痛试胎类。
浊液排出名恶露，三周洁净渐消退。
产后十二时有乳，日达一千克为贵。

【注】 临产是妊娠足月，胎位已向下移，时见腰腹坠胀疼痛，有便意，尿频数，或有“见红”。必见孕妇双手中指两旁中节至指端的脉管应手搏动者，是谓临产离经之脉。亦称为“临盆”。

弄胎即月数已足，腹痛或作或止，腰不痛者，此名弄胎。妊娠八九个月时，或腹中痛，痛后如常者，此为试胎。

恶露即指新产后有余血浊液从子宫通过阴道排出而定名为“恶露”。开始血色呈黯红或鲜红，后则渐淡、量少、无臭气，一般在3周左右干净。

产后12个小时便开始分泌乳汁，可开始哺乳，泌乳量每天可达1千克为贵。

第三节 病因病机

妇人病因寒热湿，食劳房情素体虚。

病机脏腑气血脉，冲任督带胞络区。

【注】 妇女致病因素，有寒、热、湿邪伤身，饮食不当伤脾胃，房劳伤肾，情志伤肝等四类，但这四类病因主要是素常身体虚弱才能发病。故《素问·评热论篇》说：“邪之所凑，其气必虚。”

病机：是由上述四类致病因素，破坏人体脏腑、气血、经脉、胞络、冲脉、任脉、督脉、带脉的生理功能，而发生病证的变化。该疾病变化的机转过程谓之病机。如肝气郁结、血瘀、气滞、阴虚、阳衰等等皆是病机。

一、病 因

(一) 寒、热、湿邪

寒性收引挛缩拘，凝滞经脉气血瘀，
热性发热弛张肤，耗气津血速流兮，
湿性黏腻浊沉重，阻滞升降气化机。

【注】 风、寒、暑、湿、燥、火六淫之邪，皆能导致妇科疾病的发生，但因妇女以血为主，寒则血凝不通，热则血液妄行，湿则黏滞秽浊，经带病生。六淫邪气，虽有风、寒、暑、湿、燥、火之分，但妇科疾病寒热湿邪为多。故以此为重点论之。

寒性收引挛缩拘急，凝滞气血经脉，造成气机不通而出现拘急、疼痛之症状，如月经不调、痛经、经闭、白带多、胎动不安、堕胎或小产、产后身痛、畏寒肢冷、小腹冷痛、腰膝酸冷、舌淡苔白、脉沉迟等，皆寒邪为病所致。《内经》所谓“痛者寒气多也。”

热邪之性，发越升散可使皮肤弛张，此乃冷缩热张之理。即《内经》所谓：“热则皮肤缓，腠理开，汗大出。”热能使血流加速，耗气、伤津、动血。迫血妄行，损伤血络，热扰冲任，可出现月经过多、崩漏、经行吐衄、胎漏、恶露不绝等。热邪致病，还有实热、虚热热毒之分，如妇科热症的高热病，带下增多，带色黄稠，臭秽味大，舌红脉数，皆是下焦热毒所致。又如血内蕴热、胞脉壅阻，经血瘀滞不行，烦躁而胸腹胀痛，舌质深红或紫红，苔黄厚或干。脉弦数有力等均是实热。虚热是体内虽有热邪，但不炽盛，同时患者身体比较虚弱，阴分不足，正邪交争不剧，往往迁延时日。临床表现可见产后低热、月经淋漓不断、色鲜红而质稀、烦躁不寐、口干不欲饮、舌偏红少苔、脉细数无力等。

湿邪，有形之阴邪，其性重浊黏滞，足以困阻气机。湿与寒

并,则成寒湿;寒邪日久,转化为热,则为湿热。聚液成痰,则成痰湿;湿热蕴积日久,或感受湿毒之邪,浸淫机体,致成溃腐脓血,则成湿毒。

湿邪可分为外湿和内湿。如生活在湿度较大的环境或久卧湿地,或冒雨涉水,或在水中浸泡至久,以致影响身体气机的运行,因而发生肢体疲倦、疼痛、头重、纳呆,或发热缠绵不退、舌苔白腻、脉浮濡缓等,这是外湿。若因脾土虚弱,运化失职,水湿内留,停注下焦,影响冲任带脉,这是内湿。湿邪致病,可见带下增多,或经前泄泻,或月经前后浮肿;孕妇则见肢体浮肿,胎水肿满等。肥胖妇女,脾虚气弱,脂膏壅积,聚液成痰,可以成为痰湿不孕。湿毒之邪下注胞宫,浸淫冲、任,以致生殖器官糜烂、溃腐,排出臭秽脓液等病。

(二) 生活所伤

生活所伤食不节,劳逸房劳多产妇,
跌仆创伤七情损,体质先天禀赋出。

【注】 生活所伤包括饮食不节、劳逸失常、房劳过度、产多乳重、跌仆损伤、先天亏损、禀赋不足等诸多因素,是出现疾病的根源。

1. 饮食不节 如过食辛热助阳之品,可使冲、任蕴热,迫血妄行,因而出现月经先期、量多,经行吐衄、胎漏等症;过食寒凉生冷,尤其是在月经期、妊娠期,易致脾阳受损,寒凝血脉,影响冲、任二脉,可出现痛经、闭经,或月经不调,带下、胎动不安等症。

2. 劳逸失常 月经、妊娠、产育等期间,特别要注意劳逸结合。过劳可致月经过多、流产、堕胎、子宫脱垂等病。过于安逸,懒而不动,则损伤脾胃而致纳少、肢倦等慢性脾胃病的发生。

3. 房室过度、多产 可致肾气亏损,身体虚羸,易生疾病,尤其是在经期、孕期、产后更宜慎戒房事,以免导致月经、妊娠、产褥诸病。故古人强调“节欲以防病”。妇女孕产(包括堕胎、小产或人工流产)过频过多,更易耗损气血,损伤冲、任二脉,往往成为经、带、胎、产诸病的因素。

4. 跌仆创伤 月经或妊娠期,若不慎而出现跌打损伤或登高持重、闪挫、碰撞腰腹,损伤任、冲胞脉,则可造成妇科疾病的发生。

5. 七情内伤 七情内伤,属精神致病因素,凡突然、强烈或长期的精神刺激,或生活环境改变,都可引起机体的阴阳失调,气血不和,脏腑功能失常,或进而影响胞宫,损伤冲、任而发妇产科疾病,七情之中,尤以忧、怒、悲、恐影响较著。如郁怒伤肝,肝气失于调达舒畅而横逆,可致月经不调、痛经、月经过多,经行吐衄等。忧思过度则伤脾,脾为气血之源,又称统血之脏,脾气耗损,可致月经失调、闭经等病。恐惧过度则伤肾,肾失闭藏,则冲、任不固,而经、带、胎、产诸病均可发生,尤易多发崩漏。

6. 体质因素 人体由于先天禀赋之差异和后天条件(环境、年龄、饮食、营养、房劳、疾病、劳动条件、药物等等)的影响,可形成不同类型的体质因素,如发育不良、身体衰弱,或偏于阳虚、阴虚,或偏于脾虚、肾虚,或性情抑郁,或形体过胖,或过于消瘦。这些体质因素,能影响机体对某种致病原因的易感性。如吴德汉在《医理摘要·锦囊觉后篇》中说:“要知易风为病者,表气素虚;易寒为病者,阳气素弱;如热为病者,阴气素衰;易伤食者,脾胃必亏;易劳伤者,中气必损。须知发病之日,即正气不足之时。”妇科经、带、胎、产诸疾的发生,往往与

过多、子肿等；素体肾虚者，往往出现崩漏、绝经前后诸症、胎漏、胎动不安，不孕等。临证时宜据患者之体质禀赋、生活环境、个性嗜好以及形、体、气、色等表现，分析疾病发生的原因，以帮助诊断和治疗。

二、病 机

病症转变谓病机，脏腑气血失常期，
肾气阴阳虚肝火，肝郁脾虚运统湿，
心主血脉藏神志，血病血虚寒热瘀，
气病虚陷气郁逆，冲任胞络损伤虚。

【注】病机是指某一疾病转变为另一种疾病，或某一症状转变为另一症状，其转变过程之中由动转而定为某一证候，即是病机。亦称之为该病的病理机转。如“腰痛”这一症状，其病机转变多端，有外感风寒湿气，其机转为实邪；有内伤肾脏转化为虚邪，而虚邪的机转，又有阴虚、阳虚和阴阳两虚等等。又如“崩漏”病，其病机转变，则有血热、脾虚多端。血热所致崩漏病，又有虚热和实热的不同。医者必须查明病机，详加辨证，才能立法、处方用药。恰中病机其病症必除矣。妇科病机可以脏腑功能失常，气血失调，冲、任胞络损伤等而论之。

（一）脏腑功能失常

1. 肾虚 肾有阴阳二气。古人谓“肾为阴阳之脏，水火之宅。”肾阴、肾阳彼此互相依存，互相支持，以维持相对的动态平衡，矛盾共处于统一体之中，以保持机体的正常活动。若先天肾气不足，或早婚多产，不节房事，损伤肾气，则可致肾虚而影响冲、任的功能。其中可分为肾阳虚、肾阴虚、肾阴阳两虚。

（1）肾气虚：肾气，乃肾精所生之气，概指肾的功能活动。

肾气的盛衰与天癸的至与竭有直接的关系。冲、任之本在肾，胞络系于肾，肾气虚往往导致冲、任不固，故肾气虚可发生月经病、带下病、妊娠病、产后病、妇科杂病等多种证候。

(2)肾阴虚：肾阴亏损，精血不足，以致冲、任失养，临床上可出现月经后期、量少、闭经、阴中干涩或漏下淋漓不断、绝经前后诸证、不孕、胎萎不长等。如阴虚生内热，虚火妄动，可致月经先期、崩漏、经行吐衄，经行发热等。以上病症，必以五心烦热、舌红少苔，脉细数为辨证指标。

(3)肾阳虚：肾阳虚弱，命门火衰，则胞宫失于温煦，临床可见阴部寒冷、性欲低下、宫寒不孕、胎萎不长或堕胎小产等；又阳虚气微，封藏失职，以致冲、任不固，而出现崩漏、带下等症；阳虚温化失职，可见行经泄泻，妊娠水肿等。但必以畏寒肢冷、乏力、自汗、舌淡嫩，脉迟缓为辨证根据。

(4)肾阴阳两虚：由于阴损可以伤阳，阳损可以伤阴。若病程日久，往往可出现肾阴阳两虚。上述肾阴虚及肾阳虚见证，可以夹杂出现。但在临床上，肾阴阳两虚之中，亦可以偏于阴分较虚或阳分较虚者，应详加分析，细为辨认，治疗上有所侧重，才易显效。

2. 肝失和调 肝为将军之官，其性刚强，故须疏泄条达，以柔和为顺。如素多抑郁，或暴怒伤肝，可使肝的疏泄功能失常，以致肝郁气滞，或久郁化热而成肝火亢盛。又肝藏血，体阴而用阳，如肝阴（血）不足，或阴虚阳亢可导致妇科诸疾。

肝郁化火：郁则气盛，气盛则化火，火性炎上，肝火旺盛，则肝气容易上逆，或迫血妄行，或迫乳汁外溢，或行经头痛、月经先期，或月经过多，妊娠眩晕，如进一步发展为热极生风，肝风内动，则可导致妊娠痫证、产后痉证等。这些病变的机制是阴不足而导致的阳亢，火盛风动而出现的痉抽等症状。若肝郁脾虚，湿

热内生,下注冲任,则带下、阴痒。

3. 脾虚 脾为中土,主运化水谷精微,乃气血生化之源;又主运化水湿,为水液代谢之枢纽。脾主中气,有统血益气的功能。若素体脾虚,饮食不节,或劳倦、思虑过度,伤损脾气,则可导致脾虚,出现脾失健运,或脾虚失摄等病机。①脾失健运:一方面不能正常运行水谷精微,生化之源不足,以致血虚气少,血海不能按期满盈,临床常见经行泄泻、带下,或经行浮肿,子肿等。若水湿壅阻,湿聚成痰,痰湿阻滞冲任,以致胞脉闭塞,或痰湿凝聚胞中,结而成块,可出现闭经,不孕,癥瘕等症。②脾虚失摄:由于中气虚弱,统摄无权,以致冲任失固,可出现月经先期、量多、崩漏。脾气虚陷,则可导致阴挺下脱、子宫脱垂。又心主血,藏神。若忧愁思虑损伤心脾,以致营血不足,血海不能按时满盈,则见月经后期量少、闭经等症。若心火偏亢,不能下交于肾,肾水不能上济于心,水火不能相济,则可见经绝前后诸证、子烦等症。

(二) 血气失调

血气失调是妇产科疾病重要机制之一。因为月经、妊娠、分娩、哺乳都以血为用,而易耗损阴血,故机体相对地往往常感血分不足,而气分则偏于有余。血气是互相济生和互相依存的,气为血帅,血为气母,血病可以及气,气病可以及血,彼此有极其密切的关系。但从其病理变化来说,则有主次之分。血病及气,病在血分为主;气病及血,则病在气分为主。故古时有:“在气”、“在血”之称。病在血分者,有血虚、血瘀(滞)、血热、血寒;病在气分者,有气虚、气陷、气郁(滞)、气逆等。兹分述如下。

1. 血虚 血虚可致血海不盈、冲任失养而引起多种妇科疾病,如月经后期、量少、闭经、缺乳、产后血晕等。

2. 血瘀 《三国志·华佗传》指出:“血脉流通,病不得生。”《素问·调经论篇》说:“血气不和,百病乃变化而生。”血瘀,也

是血气不和之一。由于妇女以血为主,故血瘀便是妇产科常见病之病机。临床上血瘀所致的妇科病有痛经、闭经、崩漏、异位妊娠、产后腹痛、恶露不绝、不孕、癥瘕等。其病证虽各异,而机制都属于瘀阻胞脉、冲任、以致经遂不通之故。

3. 血热 血热是血内蕴热。火热之性具有炎烈冲激作用,故热邪可以损伤血络而迫血妄行。临床上可出现月经先期、量多、崩漏、经行吐衄、或经行头痛、或胎漏、或产褥感染,又热邪易伤阴津,而妇女以血为主,以血为用,经、孕、产、乳均足以耗损阴血,故往往阴血偏虚,而阴虚又可生内热,所以虚热为妇科病所常见之病机,可出现月经先期量少,经期延长、漏下不止等。

4. 血寒 血寒由素体阳虚,寒从内生,以致阳气不运,影响生化功能;也可由于外寒入侵,寒客胞中,血为寒凝,经脉受阻,从而可影响冲任胞宫的正常功能而致病。寒邪所致妇科病常见的有月经后期、量少、痛经、闭经、不孕、胎萎不长、产后腹痛等。

5. 气虚 气主运行和统摄血脉,并主卫外为固。故气虚可致冲任失固而出现月经先期、量多、崩漏下血、胎动不安、小产等。气虚下陷,可致子宫脱垂;气虚不能卫外则出现经行感冒、产后自汗等。

6. 气郁(气滞) 气郁(气滞)主要与肝脾有关。气机以条达舒畅为顺,肝气不舒精神郁闷,可使气机郁滞,障碍血行,从而导致冲任失调。临床上可见月经先后无定期、量多少不定、痛经、经行乳胀,甚则闭经或不孕。若气郁日久,郁久化火,则可出现肝经郁火或血热的见证。

7. 气逆 气郁不达,则肝气横逆而上扰肺胃二经。临床常见于经行期间吐衄、妊娠恶阻、子悬等。

(三) 冲、任二脉损伤

冲、任二脉损伤,是妇产科疾病中最重要的发病机制。不论

感受寒、热、湿邪或生活所伤、内伤七情、体质因素或脏腑功能失调、气血失调,往往直接或间接地损伤冲任,使胞宫、胞脉、胞络发生病理性变化,从而导致妇科疾病,出现经、带、胎、产诸证,这是妇产科病理上的特点。

第四节 诊断概要

一、四 诊

妇科诊断内科同,特点问诊必先明,
经期先后量与质,婚龄经血闭与停。
经血过多崩与漏,带下腥臭黄白脓,
望闻问切同诊断,滑为妊娠扪子宫。

【注】 妇科疾病的诊断,是以中医诊断为基础,其诊法大致与内科诊法相同。由于妇女在生理上和病理上有其特点,以望、闻、切三诊很难判断疾病的性质,必须以问诊这一诊法去全面地了解病情。故《景岳全书》十问篇,将问诊视为诊断之要领,临床之首务,可见问诊在妇科诊断中的重要性。

(一) 问诊

问年龄、现病史等是问诊的常规。

1. 问经期 月经先后,经期、经量、经质首先要了解。如月经先期,量多色深红、质稠黏,或挟有血块者,多属实热。若月经先期,量多色淡质稀,多属气虚,虚寒。经行后期,量少,色淡,质稀、多属血虚。经行后期,量少,色黯滞,有小血块,小腹冷痛者,多属于寒。经行先后无定期,量或多或少,色紫黯,挟有小血块,

腹胀不舒多属肝郁。经色紫红，量多或淋漓不断，血块多而刺痛，血块排出后则刺痛减者，多属血瘀。一般经期或经前，小腹疼痛拒按者，多属实证。若经后小腹隐痛，喜按者，多属虚证。经行小腹冷痛，得热则减，多属寒证。经前小腹胀痛，痛甚于胀者，多属血瘀。经前或经期胀甚于痛者，多属气滞。

育龄期妇女，月经一向正常，突然停经不来者，应注意是否妊娠。若月经二三月不来潮又无症状所苦，谓之停经。多因体力或脑力过劳，或饮食欠佳，所致耗伤精血，或饮食欠佳，血无所生而停经。如月经长期不来潮谓之经闭。经闭者病因多端，临床可辨证施治即可。若经血突然大下不止者，名曰经崩。若经血长期淋漓不断，断而又来者名曰经漏。

2. 问带下 妇女阴道内流出一种黏液性液体称为带下。每逢经期前后，经间期，或妊娠期，带下稍有增多，为正常的生理现象。若带下味腥色白质稀，多属虚证、寒证。若带下味臭，色黄，质黏稠者，多属实证湿热。若带下色黄或白，或赤、淋漓不断，自觉外阴瘙痒多为肝经湿热下注，或下焦湿热。若带下五色杂见，如脓血者，多为热毒或湿毒或有恶性肿瘤。

3. 问经产史和既往史 问结婚年龄，以知早婚、晚婚，对其机体生理的影响；妊娠产育如否，以了解对母体的损伤。问既往史可了解过去患过何病，有无产后大出血，做过哪些手术，有无药物过敏反应等以助于诊断治疗。

(二) 望诊

主要是观察病人的神、色、形、态及分泌物、排泄物的色质等变化，以测知病情。妇科望诊与中医诊断学的内容基本一致。兹不赘述，仅就其望诊特点，简述如下。

1. 望面色 面眺白，体胖虚浮，可见于月经过多、月经先期、带下病、不孕等症；面色萎黄，而身体消瘦，可见于月经后期、月

经过少、闭经、不孕症等；面色浮红而颧赤，多为阴虚火旺血热，可见月经不调、闭经、绝经前后诸症等。若面色青紫，多为瘀血停滞，常见痛经、闭经、癥瘕等病；若面色晦暗，颊部额部有黑斑，或眼眶暗黑，多为肾气虚，常见闭经、崩漏、胎动不安、滑胎不孕、带下等。

2. 望唇舌 唇色与舌质色是一致的。因唇舌是血管脉络最丰富之处。有热则脉管充血而色红；血少血虚则脉络亏损而唇舌色淡白无华。若血液瘀滞血管脉络之内，则唇、舌隐隐色青、紫黯色，舌质或有瘀斑、黑紫色瘀血点或呈斑块状，故唇舌色红绛者为热，常见于月经先期、月经过多、崩漏、经行吐衄、胎漏、子痫、黄赤带多、味臭秽、阴痒等病。若唇舌色淡红或淡白，可见于崩漏、月经后期、月经过少，闭经、产后大出血等。唇舌色淡黯青紫、或舌质隐青有瘀斑者，是寒凝血瘀，可见于痛经、经闭、癥瘕等病。

舌苔：是胃气上潮的产物。在正常的情况下，是淡红舌薄白苔。在异常的情况下，发生苔色苔质的变化。如见苔薄者病邪较轻；苔重者病邪较重，黄者属热，白者属寒；若干燥者伤津，苔湿润色白者为寒湿；苔湿润色黄者为湿热。又如苔质厚、苔色黄腻者可见黄白带多、味臭秽、阴痒、月经先期，色红紫、腰腹痛等症状。

3. 望形态 女人十四岁左右，是青春期开始的标志。表现出女人特有的体态。若年逾 18 岁，身体矮小，肌肉消瘦，乳房扁平，是肾气不足，月经不潮的征兆。如体格矮小、肥胖浮肿，是痰湿内阻，可见闭经或不孕等症。

（三）闻诊

包括听声音、闻气味两种。听声音除听胎儿心音（妊娠 20 周后，可以从母腹外听到胎儿心动音声）之外，其他闻声音诊

病,与诊断学的闻诊相同。闻气味:经、带、恶露之味臭秽者为热,腥味者多寒、多湿。腐臭难闻者多为湿热蕴结成毒,以防癌变。

(四)切诊

切诊包括诊皮肤、切脉象、按摸腹部,与中医诊断学相同者,不重复赘述,仅就妇科切诊特点论述如下。

1. 月经脉 脉滑或弦滑略数,若无身热口干、无妊娠者,多属月经初潮期(经期),为经期之常脉。若滑数而洪大有力,乃冲任伏热多见月经先期,或月经过多亏血之脉也。若脉沉迟而细者,则为阳虚内寒,血海不足,可见月经后期,月经过少。脉细而数,多见血虚经闭。脉虚大弦数,或虚大而芤,多见崩中初期。或暴崩不止,脉细弱无力,多见于久漏不愈。

2. 带下脉 脉弦滑而数,主带下量多,是湿热下注所致。脉缓滑、白带黏稠如涕,多为脾虚湿困。尺脉沉迟微弱,白带清凉质稀,多属肾阳虚衰之候。

3. 妊娠脉 育龄期平素月经正常,而突然月经不潮,诊其脉滑流利,尺中有力者为孕脉。《素问·阴阳别论篇》说:“阴搏阳别,谓之有子”。《脉经》云:“若问女子何因,尺中不绝,胎脉方真”。现代医学实验证明,孕妇的血流量快,可增加30%,所以妊娠脉比平人脉滑而数。

4. 临产脉 《产孕集》说:“尺脉转急如切绳转珠者,欲产也”,尺脉有力,浮数散乱为临产离经之脉,是临产之兆。此外孕妇临产之时,双手中指两旁脉搏动应手,是临产脉。以此诊断临产,有一定实用价值。

5. 按肌肤 头面四肢浮肿、按之凹陷不起者为脾虚水肿;妊娠子肿则随按随起者为气肿;妊娠子气有之。

6. 扪腹部 包块之有无,其包块所在部位、大小、软硬、形状

等以判断包块性质。如按之坚硬、推之不移、按之痛甚者，多属血瘀，为癥。按之不坚如囊裹水状，推之移动者，多属气滞、痰凝，为瘕。月经腹痛，喜按者为虚、拒按者为实。

妊娠之后，可扪腹部以了解子宫大小，与孕月是否相符及胎位是否正常。妊娠3个月子宫呈鹅卵大，5个月子宫与脐平高，7个月子宫底在脐上3横指。9个月子宫底在剑突下两横指。若妊娠后，腹形明显大于正常，皮肤光亮、胀满者，多是胎水过多症。如腹形明显小于正常者，多为胎萎不长。

二、辨证要点

经带胎产辨要点，气血虚实肾脾肝。

气病气虚气郁滞，血病虚瘀寒热参。

肾气阴阳虚损证，脾失健运统血关。

肝郁气滞化热火，湿热阳亢动风先。

【注】 妇科的辨证，必须围绕经、带、胎、产为重点，依据临床表现，辨别病因在气、在血、在肾、在脾、在肝，才能立法，处方用药。

（一）气虚

月经先期，量多质稀、色淡、崩漏下血不止、产后恶露不绝、乳汁自出、阴挺下脱、面白、神疲、少气懒言、头晕目眩、心悸自汗、舌胖嫩、苔薄白、脉沉缓无力者，属于气虚证候。

对此证候的病机分析就是辨证：气主升提与固摄卫外作用，若气虚无力升提固摄、卫外则出现月经先期、崩漏下血、恶露不绝、乳汁自出、阴挺下脱、自汗、头晕目眩的症状。气有温煦作用，若气虚温煦功能衰退，阳热之气不足，津液不化，则有经量多、经质稀。面白、神疲少气懒言。舌淡苔白、脉沉缓无力，皆为

气虚,活动能力衰退的表现。

(二) 气郁

月经后期,或先后不定期,痛经、胁痛、经行乳胀、小腹胀、子肿、癥瘕、缺乳、舌隐青、苔薄白、脉沉弦者,属于气郁证候。气是流动着的微小物质,代表人体功能动力。若外感六淫或内伤情志、饮食不当、劳倦所伤,皆能造成气流不畅,而出现月经后期或先后不定期等病证。古人所说:“行则不痛、痛则不行”。气郁滞不通故有经期腹痛、胁痛、子肿等病。气郁滞塞、小腹(子宫)、乳房等处经络的活动功能,则有经期乳胀、产后缺乳、小腹胀痛。气郁重者,则形成癥瘕等病(子宫肌瘤、卵巢囊肿)。

(三) 血虚

月经后期,量少色淡、质稀、经后腹痛、胎萎不长、头晕眼花、心悸少寐、四肢麻木、面白、舌淡、苔薄白、脉细者,是血虚证候。

血液虚少则经血不足,故月经后期量少色淡而质稀。血虚少,不滋润胞宫,不养育胎儿,故经后腹痛,胎萎不长。血少不能充养于头目,故头晕眼花。心血不足,心神失养故少寐多梦,血少不能充养四肢脉络故四肢麻木,所谓“气少则木,血亏则麻”是也。舌淡、苔白、脉细弱皆血少不能充养脉络所致。

(四) 血瘀

痛经、闭经、崩漏、癥瘕、产后腹痛、恶露不下,肌肤甲错,病位处刺痛不移,舌质紫黯,边有瘀斑、瘀点。脉沉涩者是血瘀证候。

血脉者循环不已,流动不居,某些病因所致血脉不通,故有痛经、闭经、癥瘕、产后腹痛等症,皆是血瘀所致。

(五) 血寒

月经后期、量少、色黯有块、块下痛减、面青白、畏寒肢冷、苔

白、脉沉紧为寒实证；若月经色淡、带下青白、冷凉、腰酸背痛、腹部凉冷、尿清、便溏、舌淡嫩、脉沉迟无力谓虚寒。

寒则气收，凝滞经脉，故有寒实表现。阳虚生外寒、气虚体弱、寒从中生。故经色淡，带下青白、尿清、便溏者，为虚寒。

（六）血热

经行先期，量多质稠、色深红，行经吐衄、崩漏、尿短赤、便干结、舌红绛、苔黄干、脉滑数、洪大者为实热；若月经色鲜红、或漏下不止，胎动不安，两颧红、低热、潮热、五心烦热、咽干、盗汗、少寐者是虚热证候。

热则血沸溢而妄行，经行先期，吐衄、崩漏。热伤津液，故经质稠，尿短赤、便干结。热则血行加快，压力增强，故舌红绛、脉滑数洪大。若经色鲜红、漏下不止，胎动不安、两颧发红，是血少阴虚，虚火上炎所致。虚热上炎扰心神，灼伤手足心脉络，故五心烦热、少寐、盗汗。

（七）肾虚

月经不调、经闭、崩漏、带下、胎动不安、滑胎、不孕等病，必兼有腰痛、腰膝酸软、头晕耳鸣、乏力、性欲减退。

腰为肾之府，肾府空虚则腰痛，腰膝酸软。肾主骨生髓，髓充于脑，开窍于耳，故肾虚则头晕耳鸣。乏力、性欲减退是因肾主藏精，是生殖之本，动力之源不足而致。

1. 兼气虚 兼小便频数、或尿后余沥不尽、舌质淡红苔薄白，脉沉弱无力者，是气虚。气虚不能固摄而下流所致。

2. 兼阴虚 兼五心烦热、失眠、盗汗、尿短赤、便干结、舌红、少苔、脉细数者，是肾阴虚。阴虚生内热，热灼阴经、伤津耗液、扰乱神志，故有上述症状。

3. 兼阳虚 兼畏寒肢冷、尿频数、五更泄泻、舌淡嫩、苔薄白

而润、脉沉迟无力者，是肾阳虚。阳虚生外寒、寒则肾气不固，肾阳不足，命门火衰，故有上述证候。

（八）脾虚

月经不调、经闭、崩漏、不孕等病必伴有脾失健运、统血无权、中气下陷者是谓脾虚证。

兼有头晕、心悸、神疲、纳少、乏力、肢倦、面色萎黄、舌淡苔薄白，脉沉细者，是脾失健运的脾虚血少证候。脾主运化而升清阳之气、脾气虚则清阳之气不升，故头晕、面色萎黄。脾虚不能生血，血少不能养心脏、安心神，则心悸、神疲。脾胃相表里，脾虚则胃弱故纳谷不香，食少纳呆。脾主四肢、统血益气、脾虚血少，则有乏力，肢倦症状。

兼有头晕沉、浮肿、虚胖、胸脘痞闷、唾涎多、大便稀薄、舌淡嫩、苔白腻、脉沉缓者，是脾虚湿盛。因脾虚失其运化水湿之功能，湿从中生，阻碍清阳的升发故头晕沉重。湿邪散溢肌肤，阻塞胸腹故浮肿虚胖，胸脘痞闷。脾失健运，则津液不布，水湿不利故唾涎多、便稀薄。

兼有月经先期，经血量多，崩漏下血不止，面苍白，舌淡嫩，脉沉弱者，是脾虚不能统摄血液，则下血不止，是脾失统摄证候。

兼有阴挺、阴脱（子宫脱垂）、脱肛、脘腹下坠，全身乏力，少气懒言，舌淡苔白，脉沉弱者，是脾虚下陷所致，脾失升提故有见证。

（九）肝郁

可致月经不调、痛经、经闭、不孕、缺乳、带下、阴痒等病。

兼胸胁胀满，腹胀纳少，急躁易怒、善叹息，月经先后不定期，经前乳胀，舌质暗红苔白、脉弦者，是肝郁气滞证候。肝脉绕阴器，抵少腹，布胁肋，上胸循乳，系目系。故肝气郁滞，肝之经

脉郁塞不畅而致胁、腹、乳部胀痛。肝主疏泄，在志为怒，肝郁则“气不舒，志不随。”故有急躁易怒、善叹息。若肝郁化热，热灼伤肝，经脉血行加快，故月经先期。火热迫血妄行，则可出现崩漏下血，经行吐、衄、乳汁自出等症。肝火上炎，灼伤头部肝脉、官窍，则有头痛、眩晕、耳鸣、口苦咽干、目赤肿痛等。

(十) 肝经湿热

妇科病证伴有头晕沉、脑胀痛、耳鸣聋，胁肋痛，胸闷纳呆，心烦口苦咽干，带下黄白相兼，量多质稀，秽浊而臭、阴痒，便溏，舌质红舌体胖，舌苔黄腻、脉沉弦而数者，是属肝经湿热证候。

湿邪黏腻重浊，湿热夹杂所致头部肝脉不能畅通，故头晕沉，脑胀痛。肝胆相表里，胆脉环绕于耳。湿热之邪浸肝犯胆，故耳鸣耳聋。肝脏居胁下，肝脉挟胃上行布胁肋，循喉咽，湿热之邪阻滞脉络，脉气不通，故胁肋痛，胸闷、纳呆、心烦、口苦、咽干。水湿外溢，湿热下注，故带下多、味臭、便溏。

(十一) 肝阳上亢

妇科诸症，常兼有头晕痛、面红眼花、耳鸣聋、失眠多梦、四肢震颤麻木、妊娠抽搐、舌尖红、苔薄黄或少苔、脉细数者，属于肝阳上亢证候。肝阴虚，肝阳胜，胜则上亢，虚火上炎，故面红、眼花、头晕眩、耳鸣、耳聋。阳热上炎，扰乱神志不宁，而少寐多梦。阳亢生风，风盛则动，故震颤肢麻、子痫抽搐。舌红苔黄，脉细数皆是阴虚阳盛，虚火上炎所致。

(十二) 肝风内动

是属实火动风(肝阳上亢多属虚火上炎)火热上攻，热盛生风，风扰肝脉，挛急而动，故可出现胎前产后抽搐，拘挛等病证。或头晕痛、颈项强直、语言不利，昏不知人，痉厥，舌红绛，花剥苔，脉弦数有力的临床证候。《素问·至真要大论篇》中说：“诸

风掉眩，皆属于肝。……诸暴强直，皆属于风。”

第五节 治法概要

治法概要整体调，亦可采用局部疗，
补疏和益活理气，清温利解法难逃。

妇科的治法概要，主要着重于整体调治。亦可采用局部疗法。其治法概要有：补肾滋肾，疏肝养肝，健脾和胃，补益气血，活血化瘀，理气行滞，清热凉血，温经散寒，利湿化痰，解毒杀虫等治疗法则。或用外治的局部治疗法。对各种疑难的妇科病证，亦难逃脱这些治疗法则。分述于下。

一、补肾滋肾法

补肾滋肾治肾虚，阳虚温补阴虚滋，
命门火衰阳虚弱，桂附仙茅覆菟丝。
肾阴亏损滋养法，龟精龙牡六味知。

【注】 肾藏精、主骨生髓，髓充于脑，是机体生命活动的根本。维持人体生命活动的基本物质即是肾精，精之耗损，需后天水谷之精气的不断补充，才能维持其相对的平衡。故妇科病在肾者，多属肾虚。临床分为阳虚和阴虚而分别治之。

（一）肾阳虚

重者命门火衰，呈腰痛，腰膝酸软，手足凉冷，神疲乏力，白带清稀等症状，以补肾温阳为法，方以桂附地黄丸、二仙汤等；药用肉桂、附子、仙灵脾、仙茅、覆盆子、菟丝子等。

(二) 肾阴虚

妇科疾病,兼有腰痛、低热、五心烦热、口干舌燥、头晕耳鸣、舌质红、脉细数者,可用补肾滋阴法。常用方剂:六味地黄丸、知柏地黄丸等。药用生地黄、山萸肉、丹皮、龟版、黄精、龙骨、牡蛎等。

正如明代医家张景岳所说:“益火之源,以消阴翳;壮水之主,以制阳光。”“益火之源”就是以温补肾阳增添命门相火,则能消除阴寒肢冷的病证。“壮水之主”,就是以滋补肾阴为主,则制约阴虚所致的阳亢(五心烦热、低热、口干)等阳热之症状。临床常见肾虚一证,往往阴虚和阳虚同时出现。即有肾阴虚症状,又有肾阳虚症状。对此称之为:“肾阴阳两虚证候。”以阴阳双补为法,方用肾气丸、寿胎丸、归肾丸等。在治疗中还应注意,在滋阴中,少佐以温阳行气之药,以防滋阴药多腻滞之弊。在补阳方中,亦宜佐以益阴之品,以防补阳中的温燥之害。正如《景岳全书》说:“善补阳者,必阴中求阳,则阳得阴助,而生化无穷;善补阴者,必于阳中求阴,则阴得阳升,而泉源不竭。”此之意也。

二、疏肝养阴法

肝郁疏肝理气主,逍遥四逆为基础,

肝血虚亏滋养法,一贯二至三甲补。

【注】肝郁,是因肝的疏泄、条达、舒畅的生理功能失常。出现肝气郁滞的病理反应。如妇科疾病的月经不调,乳房胀痛,乳房硬结不消等。兼有肋胁痛,头胀痛,善叹息、急躁易怒等症均属肝气郁结证候。根据肝郁这一病理变化,而确立疏肝理气的法则治之。其代表方剂有逍遥汤、四逆散等。常用药物有柴胡、香附、枳实、白术、郁金等。临床以逍遥汤治疗妇女月经不调效果极佳。月经先期多为血热,加生栀子、牡丹皮。月经后期

多为血寒，加附子、干姜、吴茱萸、丁香之类，其病可愈。

肝血虚亏，阴液耗损，所致肝阴不足者，在妇科病中，常见月经量少，血色为鲜红，或月经闭止，胎萎不长，产后乳汁不足等病症，但必兼有：面白颧红、五心烦热，或午后低热盗汗、胁痛、易怒、心烦、少寐多梦等表现。这是阴虚导致的阳胜、虚热伤血耗阴的病理变化。对此证候，必以滋阴养肝法治之。用一贯煎、二至丸、三甲复脉汤方剂。其常用药物有沙参、麦冬、当归、生地、枸杞子、女贞子、旱莲草、龟版、鳖甲等。若热动肝风者，可以用镇肝熄风汤、羚羊钩藤汤等方剂。

三、健脾和胃法

脾胃后天气血源，冲任经孕产乳全。

失运统摄健脾法，参苓白术归脾丸，

胃失和降胀满呕，橘皮竹茹热苓连。

【注】脾胃为后天之本，水谷生化之地，气血、精气生化之源，五脏六腑、四肢百骸、肌肉筋骨赖以滋养。冲任二脉，月经、孕育、产后、乳汁等全部以脾胃为资生条件。脾与胃是一表一里，一阴一阳，一升一降，一湿一燥，相互对立又是相互为用对立统一的关系。具体地说，脾为五脏，藏精气，能升清阳；胃为六腑，传化物，才能降浊阴。若脾不升清，胃不降浊，即是脾胃不和。脾喜燥恶湿；胃喜润而恶燥，胃得脾的湿润，则纳谷消食，饮食正常。脾得胃燥，则有运化、统摄之权。二者调和为湿燥相因。某些原因破坏了这一对立统一关系，则疾病丛生，症状多端。

（一）健脾法

用于食少纳呆、纳谷不香、胀满浮肿、月经过多、崩中、漏下等症。其病理病机是脾虚失其运化、统血之功能而出现的病证。

以健脾和胃为法，方用四君汤或六君汤、参苓白术散。药用人参、白术、茯苓、半夏、陈皮等。健脾统血法可用于崩漏病，或月经过多病，方选归脾汤。药用人参、茯苓、白术、甘草、枣仁、木香、当归、黄芪等。

（二）和胃法

用于脘腹胀满、恶心、呕吐、嗳气、呃逆等病证。其病理机制属于胃气上逆者，可用和胃降逆法，方用橘皮竹茹汤加减治之。其有热者，加黄芩、黄连。有寒者加白豆蔻、干姜、生姜、吴茱萸之类。若脾虚挟食而上逆者，可用六君子汤加山楂、麦芽、鸡内金等。若脾虚挟湿者，加藿香、厚朴、薏米之类。

四、补益气血法

补益气血妇重点，协调月经孕乳产，
气虚四君益气举，血虚四物当归选。

【注】 补益气血法，是妇科治疗法则的重点内容。气是人体生命活动的动力，血是机体活动的物质基础。古人所说：“气为血之帅，血为气之母”。气血二者相互依存，相互为用，气能生血，血能益气。气血充盈则月经调，按月守期而至，阴阳和则孕育有子，乳汁充盈，产后诸疾不起。若气血虚亏，则月经不调，闭经不孕，产后乳汁不足，产后诸疾蜂起。

（一）气虚

月经量少、色淡、质稀，或经闭，或不孕症，或乳汁不足、无乳，或产后诸疾，如子宫下垂等。兼有气短、神疲、乏力、头晕、耳鸣、自汗、舌质淡、舌苔少，脉象微弱，辨证为气虚。气是机体活动的动力，肺主气。肺气虚则功能活动衰退不能养神志，充头脑，润空窍，固腠理而致气短，乏力、神疲、头晕、耳鸣、自汗等症

状。气虚不能帅血、养舌充于脉，故舌质淡、脉微弱。以补气养血为法。选用四君子汤、补中益气汤、举元煎、保元汤等。常用药物有人参、黄芪、甘草、茯苓、白术等药。

根据气血相互为用的关系，在补气方中佐以养血药物，如加入当归、熟地等疗效更佳。

（二）血虚

妇科诸疾，兼有面色苍白、唇舌色淡、头晕眼花、心悸、失眠、手足发麻、脉细无力等临床表现。因血液虚少，不能上升于头面，滋润于唇舌，故面唇色白，舌质色淡。头晕眼花。心主血而藏神，血虚不能养心安神故心悸、失眠等。血虚不能充养四肢脉络，故手足发麻、脉细无力。以养血益气为法。方用四物汤、当归补血汤、当归生姜羊肉汤之类。常用药有当归、熟地、何首乌、枸杞子、阿胶、黄精等。血虚必然损伤于气，故补血药中必佐以理气药，如归脾汤中加入木香之类则补而不滞。

五、活血化瘀法

活血化瘀法妇科，血液浓黏凝聚多，
滞渗清任瘀汤类，生化汤与大黄蜚。

【注】血是人体营养液物质的重要组成部分。运行于脉道之中，循环不息，运行不休，生养五脏六腑，滋濡五官九窍、四肢百骸。筋骨、肌肉腠理、皮毛皆赖血以养之。所谓“血脉流通则百病不生”。若血液由某些致病因素造成血液黏稠、滞涩、凝结、积聚等以致流通不畅或流动受阻、渗出血管之外的离经之血。若妇科诸病兼有：局部肿胀刺痛、痛有定处，日轻夜重、面色晦黯、口唇青紫、舌质隐青或紫黯、舌边有紫黑色、瘀血斑点或斑块。脉沉细涩等表现，均可诊为血瘀病证。

因血瘀于局部而流动受阻,故有局部肿胀疼痛。瘀血有形之物,阻滞某一组织部位不通故痛有定处。白昼阳气隆盛而能活血,黑夜属阴,气温低下,则血行减慢,瘀血病变加重,故有日轻夜重的病情变化。面色、唇、舌紫暗之色,皆是瘀血阻滞脉络而呈现于外所致。以上证候皆以活血化瘀为法,选用清代医家王清任研制的各类逐瘀汤。如头部瘀血用通窍活血汤,胸部瘀血用血府逐瘀汤,膈下有瘀血用膈下逐瘀汤等。还可对症选用生化汤、大黄蛰虫丸。常用药物有桃仁、红花、蒲黄、灵脂、赤芍、丹参等。

六、理气行滞法

气在人体畅流行,经孕产乳理功能,
气郁气逆气结聚,越鞠金铃乌香棱。

【注】 气是人体内流动着的精微物质,有宗气、营气、卫气等名称。水谷化生的精气与吸入自然界的清气,二者结合积于胸中为之宗气。宗气之中又可分为营气、卫气等等,故气在人体内是流动畅通而不停息的。人体之气的又一个概念,是指机体中各个组织器官的功能活动。如五脏的功能活动在心者称为心气,心的功能活动力弱,称为心气虚。其他诸如肝气虚、肝气郁、肾气虚、脾气虚、肾气虚衰等等。妇科的经、孕、产、乳等生理功能活动都是气的作用。若气机郁滞或气逆上壅,甚或气结积聚则产生妇科各种疾病,如月经不调,经闭、痛经、子悬、癥瘕等病。如兼有胸胁痞满、脘腹胀闷、纳呆、噯气、舌质红、舌苔黄、脉沉弦者,可诊为肝气郁结证候,立理气行滞法。方选越鞠丸、金铃子散、乌药汤、香棱丸等。常用药有香附、厚朴、郁金、橘核、荔枝核、沉香、乌药等。

七、清热凉血法

清热凉血热邪壅，血内蕴热伤任冲，
经多吐衄与胎漏，产后发热带下崩，
实热银翘解毒用，虚热芩连四物清。

【注】感受热邪，或内有郁积蕴热，所致热邪壅盛，损伤冲任、迫血妄行，可见月经过多，行经吐衄、胎漏、恶露不绝、产后发热、黄白带下、量多质稠、味秽浊而臭，血崩，舌质绛、苔黄腻、脉沉数者是热邪壅盛证候。立清热凉血法。方用：芩连四物汤、黄连解毒汤、银翘散、龙胆泻肝汤等。常用药有黄芩、黄连、黄柏、山栀子、当归、生地、白芍、川芎、金银花、连翘、蒲公英、地丁、鱼腥草、败酱草、白薇等。若因血少阴虚，而导致低热者，可用芩连四物汤，加丹皮、焦栀子、胡连、地骨皮、银柴胡、鳖甲等疗效更佳。

八、温经散寒法

温经散寒寒邪治，寒分内外实与虚，
经带胎产寒为病，温经暖宫桂附枝。

【注】温经散寒法，是治疗寒郁证候。外寒、内寒、寒实、寒虚皆可出现寒、郁。“寒则气收”乃“冷缩热张”之理也。寒可导致皮肤收引、收缩、拘急、凝滞血脉不能畅行而出不同部位凉冷疼痛的病证。如外寒则有恶寒发热、肌肉关节痛的症状，以麻黄汤温经散寒，以汗出而解之。内寒腹痛、腹泻、呕吐、四肢凉冷者，以温中散寒的理中汤或附子理中汤，服之则愈。寒实证中痛经、经闭、经期腹痛不可忍受者，可用温经汤，暖宫丸。虚寒腹痛、腹隐痛、白带多、行经腹痛、泄泻者，以大温经汤、桂附理中丸等治之。常用药有肉桂、附子、桂枝、吴茱萸、小茴香、补骨脂等。

九、利湿除痰法

利湿除痰脾为根，水湿不化寒热分。

湿遏阳气寒湿病，导水苓桂甘术温。

湿邪日久化为热，龙胆泻肝涤痰斟。

痰湿贮留胖不孕，导涤汤芥星夏君。

【注】 水湿的停聚、痰液的形成，其病之根责于脾。全身的水液代谢，主要是以“脾的运化”功能。脾气健运则水湿消散，浮肿消退，肺内清肃痰涎不生。若脾失运化，则水湿蓄积，外见浮肿，内生痰疾。若湿遏气，则阳气不能温煦而化为寒湿，如腰酸痛、浮肿、白带清稀而多、经期、呕吐、泄泻等临床表现，辨证为寒湿证候。治以温阳利湿法。方用茯苓导水汤、苓桂术甘汤，肿甚则用五皮饮等。常用药物有茯苓、姜皮、肉桂、草果、附子、泽泻、车前子、木瓜、防己等。

若湿郁日久，可以化热，则为湿热证候。如带下黄白浓稠，味秽浊而臭、阴痒。尿道灼热，尿频急而痛，五心烦热，头晕耳鸣等表现。以清热利湿法治之。方如龙胆泻肝汤、萆薢渗湿汤等。常用药有山栀子、柴胡、龙胆草、泽泻、车前子、萆薢、败酱、茵陈、蒲公英等。

若脾气不运，聚液成痰，痰湿贮留于内，下注胞宫，影响胞脉，胞络，往往导致机体肥胖而不孕。对此以健脾化湿燥痰法。方用导痰汤、涤痰汤，以白芥子、胆南星、半夏为君药。

十、解毒杀虫法

解毒杀虫湿毒带，味臭脓血阴痒疼。

内服五味消毒饮，舌草枝莲土茯苓。

外用熏洗敷熨导，百部雄黄苦杀虫。

【注】 湿热蕴郁，浸淫阴中，久而不愈，热毒必生，湿热郁毒腐蚀阴道，外阴轻则阴部奇痒难忍，重则流注如脓如血五色夹杂黄白带下，其味臭秽难闻，阴部疼痛难忍，以解毒杀虫法。用方：五味消毒饮、龙胆泻肝汤等加入白花蛇舌草、半枝莲、土茯苓、蒲公英、地丁等。杀虫药常用蛇床子、百部、雄黄、硫黄、苦参等。其常规以清热利湿、解毒药内服。杀虫等药多外用熏洗。

妇科外治法有多种，如阴道熏洗、阴道冲洗、阴道纳药、肛门导入、外敷、热熨、切开、排脓、药物离子导入、推拿、针灸、割治、拔火罐等等外治法均可达到杀虫止痒、清热解毒、止血、止痛、祛寒止带、消肿排脓、生肌长肉等功效。《金匱要略》有“温中坐药蛇床子散”，《医宗金鉴·注释》云：“生疮蚀烂，乃湿热不洁而生匿也，用狼牙汤洗之，以除湿热杀匿也。”可见我国由汉代至清代医家对妇科外治法的应用研究是较精细的。

第六节 预防与保健

妇科防保重卫生，经孕产乳期绝经，
劳逸结合食有节，调和情志共性通。
胎教戒房定期检，产褥起居外阴清，
哺乳清洗定时给，绝经出血防瘤瘕。

妇科的预防和保健是根据其生理特点，要注重月经期、妊娠期、产褥期、哺乳期、绝经前后期的卫生。因在此期间是妇女气血亏虚、抵抗力低下，易发生疾病的时期。正如《内经》所说：“邪之所凑，其气必虚”之理也。凡在经、孕、产、乳、绝经这5个

时期内,都必须做好清洁卫生,做到饮食有节,起居有常,不妄劳作(劳逸结合)防御外邪感冒,方能预防和减少有关疾病的发生,以保护妇女的健康水平。

一、月 经 期

须保持外阴清洁,禁止性交以防病毒感染(外邪内侵)而发病。

二、劳逸结合(不妄劳作)

劳动太过,则耗气动血。经期过劳可致月经过多,或经期延长。孕妇过劳,可伤胎堕胎。产后过早劳动,可造成子宫脱垂、脱肛等。

三、饮食有节

经期过食辛热香燥之品,易耗损阴津,而致血热,热则迫血妄行。若过食寒凉生冷,可致经脉凝涩血行受阻,而致痛经病证。孕期勿令过饥过饱,饥则营养不良,以致胎儿发育不全。过饱损伤脾胃,以防子肿、子满等病的发生。

四、调和情志

月经期要消除紧张、烦闷恐惧的心情,保持心情舒畅,以免出现月经不调之病。绝经期,亦是更年期,在此期间更要消除紧张情绪,保持心情舒畅,以免出现头晕、耳鸣、心悸、失眠、易怒等症状。

五、防御外邪

是上述经、孕、产、乳、绝经期的注意防范的重点内容。风、

寒、暑、湿、燥、火这六种之气的太过、不及随时都可侵入人体而发病。可造成月经不调、痛经、经闭、经行吐泻等病，也可造成胎前、产后诸病的发生。

六、孕 期

要注意胎教、慎戒房事。孕妇的生活、思想、言行，足以影响胎儿。正如在《叶氏女科证治》所说：“胎前静养，乃第一妙法，不较是非，则气顺不伤矣。情无淫荡，则精自足矣。”这就是说：妇人怀孕期间，其思想、视听、言行，均应端正，则胎儿可得到感化，即是胎教。

妊娠3个月以内和7个月以后必须避免房事，以防流产或早产。定期检查，是保障母子健康的重要措施。通过胎前检查，可及时发现和处理异常情况，预防难产的发生。

七、慎 起 居

产后气血亏虚，应慎起居，避风寒、以防外感。注意外阴清洁卫生，勤洗勤换内衣，以防污浊感染。

八、哺 乳 期

婴儿哺乳前，要用温开水清洗乳头、乳母要在哺乳前洗手，避免婴儿吮乳时带入不洁之物而发生胃肠疾病。

定时哺乳：初生儿在产后12小时后即可哺乳，一般每隔3~4小时哺乳1次为宜。哺乳期常为6个月至12个月，但亦可延长2~3年以上。

九、绝 经 期

绝经期前后，常有月经紊乱现象，有时月经提前而至，亦有

错后 2~3 个月而来。若阴道出血或带下秽浊,如脓、如血,其味秽臭难闻者以防肿瘤、癥瘕之癌变。

绝经期前后,亦是阴阳不能保持相对平衡的更年期。常出现:头晕、耳鸣、心烦、意乱、心悸、失眠多梦、易怒、烘热、口干、便秘等症状,是年过七七(即 49 岁),任冲二脉虚备,天癸枯竭所致。此时应当消除紧张情绪,保持心情舒畅,慎起居,节饮食,注意调理脾胃,补养后天,以免诸病发生。

各 论

第七节 月 经 病

经病先后不定期，多少长痛出血时，
闭经崩漏乳胀痛，发热头身痛泻稀，
吐衄口糜风疹块，晕肿情异更年期，
治疗原则调经血，辨证论治以调之。

【注】 月经病是指月经的周期、经期、经量、经色、经质的异常，或以伴随月经出现的症状为特征的疾病。

常见的疾病有：月经先期、月经后期、月经先后无定期、月经过多、月经过少、经期延长、痛经、经间期出血、闭经、崩漏、经行乳房胀痛、经行发热、经行头痛、经行身痛、经行泄泻、经行吐衄、经行口糜、经行风疹块、经行眩晕、经行浮肿、经行情志异常及绝经期（更年期）前后诸证等。

月经病治疗原则，重在调经。调经之法，必以辨证论治为主，如气滞者理气；血瘀者，活血化瘀；肾虚者补肾；脾虚者扶脾、

健脾。如《景岳全书·妇人规》说：“故调经之要，贵在补脾胃以资血之源，养肾气以安血之室，知斯二者，则尽善矣。”

一、月经先期

月经先期七日多，气虚血热虚实说。

气虚神疲腹空坠，纳少便溏益气痿。

实热稠黏清经散，肝郁丹栀逍遥克。

虚热颧红五心热，两地玄麦白芍阿。

【注】 月经周期提前 7 天以上，甚至 10 余日一行者称为“月经先期”，亦称“经期超前”、“经行前期”或“经早”。如仅提前三五天，且无其他明显症状者，属正常范围。或偶然超前一次者，亦不作月经先期病论。

本病的病因病机，主要是气虚和血热。因为气能摄血，气虚则统摄无权，冲任失固；血热则流行散溢，以致血海不宁，二者均可使月经提前而至。具体的病机有气虚和血热。血热之中，又可分为实热和虚热。

【辨证论治】

1. 气虚

〔主症〕 月经周期提前，经量增多，色淡、质稀，神疲，肢倦，或小腹空坠，纳少便溏，舌质淡，脉细弱。

〔病机〕 中气虚弱，统摄无权，则经来先期，量多。脾虚化源不足，不能奉心化赤，则经色淡，质清稀。中气不足，失于旁达升举，则神疲肢倦，小腹空坠。脾虚运化无力，则纳少便溏。舌淡，脉细弱均为脾气虚衰，中阳不振之候。

〔治法〕 补气摄血调经。

〔方药〕 补中益气汤（《脾胃论》）。

人参 黄芪 炙甘草 当归 陈皮 升麻 柴胡 白术

〔方义〕 本方以人参、黄芪益气为君；甘草、白术补中健脾为臣；当归补血，陈皮理气为佐；升麻、柴胡升阳为使。共奏益气补中，升阳举陷，摄血归经之效，使月经自调。

〔加减〕 如兼怔忡心悸，眠差梦多为心脾气虚，可于前方去升麻、柴胡、陈皮，加入茯神、枣仁、远志、桂圆肉、木香、生姜、大枣。桂圆肉补脾益血；茯神、远志养心安神宁血；木香宣畅三焦滞气，调气健脾，使全方补而不滞，气固血宁，归脾所统，则经调如期。

如伴量少，色黯淡，质稀薄，或腰骶酸痛，或溲多便溏，舌淡而嫩，为脾肾气虚，又宜脾肾双补。可予补中益气汤去升麻、柴胡、陈皮，加入鹿角胶、菟丝子、杜仲、制附子等以温肾阳，益精气。溲多、便溏者，再加益智仁，补骨脂以温补脾肾，以止泻、缩小便。

2. 血热

(1) 实热

阳盛血热

〔主症〕 经来先期，量多，色深红或紫，质稠黏，或伴心胸烦躁，面红口干，小便短黄，大便燥结，舌质红，苔黄，脉数。

〔病机〕 邪热伏于冲任，迫血妄行，致经来先期、量多。血为热灼，故经色鲜红或紫红而质稠黏。热邪扰心，则心胸烦躁。热伤津液则口干、小便短、大便燥。面赤、舌红、苔黄、脉数，均为热盛于里之象。

〔治法〕 清热凉血调经。

〔方药〕 清经散(《傅青主女科》)。

丹皮 地骨皮 白芍 生地 青蒿 黄柏 茯苓 薄荷

〔方义〕 方中丹皮、青蒿、黄柏清热泻火，生地、地骨皮清

热凉血，白芍柔肝和阴，茯苓行水泻热。全方虽属清热泻火之剂，但有养阴凉血之品，使热去而阴不伤，血安而经自调。

〔加减〕 经量多者，去茯苓之渗利，以免伤阴，酌加地榆炭，炒槐花以清热、凉血止血。

肝郁血热

〔主症〕 月经提前，量或多或少，色紫红有块。或少腹胀痛，或胸闷、胁胀，乳房胀痛或心烦、易怒，口苦、咽干，舌红，苔薄黄，脉弦数。

〔病机〕 肝郁化热、热迫血行，则月经提前，经色紫红。疏泄失调，故经量或多或少。气郁血滞，则有瘀块。气滞肝经，则乳房、胸胁、少腹胀痛。心烦、易怒、口苦、咽干，舌红，苔薄黄，脉弦数，均为肝郁化热之象。

〔治法〕 清热解郁调经。

〔方药〕 丹栀逍遥散(《内科摘要》)。

丹皮 炒栀子 当归 芍药 柴胡 炙甘草 白术 茯苓

〔方义〕 方中丹皮、炒栀子、柴胡疏肝解郁散热为君，当归、白芍柔肝养血为臣，白术、茯苓培脾为佐，薄荷助柴胡疏达肝气为使。煨姜辛燥，非血热所宜，故去而不用。肝气疏达，热清血宁，经自如潮。

(2) 虚热

〔主症〕 经来先期，量少或量多，色红质稠。或伴两颧潮红，手足心热，舌红，苔少，脉细数。

〔病机〕 本证由于素体阴虚，或久病伤阴，或上述各型血热先期，热盛伤阴发展而来。阴虚内热，热扰血海，迫血妄行，故月经先期而至。水亏火旺，故量少，色红而质稠。若虚热伤络，血受热迫，则经量可多。虚热上浮而两颧潮红。手足心热，舌红，苔少，脉细数，均为阴虚内热之征。

〔治法〕 养阴清热调经。

〔方药〕 两地汤(《傅青主女科》)。

生地 地骨皮 玄参 麦冬 阿胶 白芍

〔方义〕 方中生地滋阴清热凉血;地骨皮泻肾火,清骨中之热;玄参、麦冬滋阴壮水;阿胶滋阴补血;白芍养血敛阴。全方重在滋水,使水足而火自平,阴生而阳自秘,则经行如期。

【验方医案】

1. 阴虚内热方(《男女科病千首妙方》)

白芍 15 克 生地 20 克 小蓟 20 克 旱莲草 10 克 女贞子 10 克 茜草 10 克 槐花 10 克 生蒲黄 10 克 丹皮 10 克 丹参 10 克 生牡蛎 30 克 水煎服,每日 1 剂,经前 10 天服用。

张某,20 岁,月经提前已有 4~5 个月,每次月经 20 多天一潮,甚则 1 月两至,色红,量不多,伴有心烦口渴,思凉饮,手足心热,时有鼻衄。舌尖红,苔薄白,脉细数。证属阴虚内热,冲任不调,治以滋阴清热,凉血止血之法。投上方 12 剂,2 个月痊愈。

2. 丹栀逍遥方加减(《中医医案医话集锦》)

柴胡 9 克 当归 9 克 白芍 9 克 白术 9 克 丹皮 9 克 栀子 9 克 生地 9 克 甘草 6 克 薄荷 5 克 地榆炭 15 克 荆芥穗 5 克 白茅根 15 克 益母草 9 克 水煎服 1 天 1 剂。

梁某,女,29 岁,已婚。月经先期,由初潮至今始终未愈。甚至半月 1 次。量多色紫黑有块,质黏稠。在行经前腰酸腹胀,心烦易怒,口干苦,胸闷不适,舌质红,脉弦数。辨证为肝郁化火,热伤冲任,迫使月经提前。治以疏肝解郁,养阴清热为法。以上方每月经前连服 3 剂。每天服 1 剂。共服 6 剂。2 个月后经来潮正常,诸症悉除。

3. 胸胁胀痛方(潘养之《医案选》)

当归 12 克 白芍 12 克 柴胡 6 克 茯苓 9 克 香附 9 克

郁金 12 克 白术 12 克 合欢 12 克 薄荷 4 克 丹皮 12 克
乳香 6 克 没药 6 克 鲜姜 3 片 大枣 3 枚 山梔子 9 克 水
煎服。每天 1 剂。

边某,女,26 岁。1963 年 4 月 6 日诊。自述行经先期,超前
而至,头晕,两胁胀痛,口苦,乳房发胀,纳差,脘腹不适,口燥咽
干,疲乏无力,舌苔黄,脉弦而虚而致肝郁血虚有热所致。用上
方 3 剂后又于 1963 年 4 月 10 日二诊:服药后头晕、两胁肋胀
痛、乳房发胀等症状均大减,脉转和缓,此乃药中病轻,再取原方
4 剂。药后诸症消失。

4. 气虚方(《百灵妇科》)

人参 9 克 黄芪 9 克 甘草 6 克 当归 9 克 白术 9 克
茯神 9 克 远志 9 克 枣仁 9 克 桂圆肉 9 克 木香 3 克 水
煎服,每天 1 剂。

若气虚下陷者加升麻 2 克;血多者加地榆炭 30 克、棕榈炭
12 克 水煎服,每日 1 剂。日服 2 次。对气虚、气短、气急促、
气喘、头痛、体倦,心烦,食少无味,月经先期,量多色淡质薄,脉
大而虚,苔白质淡者,可以上方为基础辨证施治。

5. 当归芍药散(《湖北中医杂志》1982 年第 3 期)

当归 芍药 茯苓 白术 泽泻 川芎 水煎服。

治疗效果:治疗 439 例,包括月经不调 45 例,月经过多 194 例
(取环后出血 54 例,流产后出血 48 例,产后恶露不尽者 48 例),
治愈好转率为 91.3%,无效率 8.7%,1 剂有效率为 61.4%。

6. 先期汤(《医部全录·妇人经脉门》)

生地 10 克 川芎 10 克 当归 10 克 白芍 10 克 黄柏 5
克 知母 5 克 艾叶 5 克 香附 5 克 黄芩 5 克 黄连 5 克
阿胶 10 克 炙甘草 5 克 水煎服。治经水先期而来,宜凉血
固经。

7. 地骨皮饮(《医宗金鉴·妇科》)

当归 川芎 白芍 生地 地骨皮 丹皮 水煎服。月经先期,虚热者宜服。

8. 芩连四物汤(《医宗金鉴·妇科》)

当归 川芎 白芍 生地 黄芩 黄连 水煎服。月经先期,实热者宜服此方。

9. 清经龙牡汤(《妇科验方选》)

生地 15 克 丹皮 9 克 白芍 12 克 地骨皮 12 克 女贞子 15 克 旱莲草 30 克 青蒿 9 克 生龙骨 30 克 生牡蛎 30 克 五味子 9 克 水煎服。治肝肾阴虚之月经先期为宜。

【文献选要】

《傅青主女科》:夫同是先期而来,何以分虚实之异?……,先期者火气之冲,多寡者水气之验。故先期而来多者,火热而水有余也;先期而来少者,火热而水不足也。倘一见先期之来,俱以为有余之热,但泄火而不补水,或水火两泄之,有不更增其病者乎!

《景岳全书·妇人规》凡血热者,多有先期而至,然必察其阴气之虚实。若形色多赤,或紫或浓,或去多,其脉洪滑,其脏气饮食喜冷畏热,皆火之类也。

先期而至,虽曰有火,若虚而挟火,则所重在虚,当以养营安血为主。矧亦有无火而先期者,则或补中气,或固命门,皆不宜用过寒凉。

《医学心悟·月经不调》:方书以趱前为热,退后为寒,其理近似,然亦不可尽拘也。假如脏腑空虚,经水淋漓不断,频频数见,岂可便断为热?又如内热血枯,经脉迟滞不来,岂可便断为寒?必须察其兼症。如果脉数内热,唇焦口燥,畏热喜冷,斯为有热。如果脉迟腹冷,唇淡口和,喜热畏寒,斯为有寒。阳脏阴

脏,于斯而别。

《沈氏女科辑要笺正·月事不调》:先期有火,后期火衰,是固有之,然持其一端耳。如虚不能摄,则虽无火,亦必先期。或血液渐枯,则虽有火,亦必后期,

二、月经后期

月经延后十日内,血寒血虚气滞关。

血寒量少色黑暗,小腹冷痛温经先。

虚寒隐痛艾附暖,血虚心悸补元煎。

气滞胸胁乳腹胀,乌药汤中加梔丹。

【注】 月经周期延后 7~10 日之间,甚者 40~50 日一至者。称为“月经后期”,亦称“经行后期”或“经期错后”、“经迟”。如仅延后 3~5 天,且无其他不适者,不作月经后期病论。若偶见 1 次延期,下次仍然如期来潮者;或青春期初潮后数月内或于更年期月经时有延后,不伴其他证候者,一般不属病证。

本病发病机制有虚有实。虚者有虚寒、血虚或因营血亏损,或因阳气虚衰,以致血源不足,血海不能按时满溢。实者有血寒、气滞或因气郁血滞,冲任受阻,或因寒凝血瘀,冲任不畅,致使经期延后。

【辨证论治】

1. 血寒

〔主症〕 经期延后,量少,色黯有血块,小腹冷痛,得热减轻,畏寒肢冷。苔白,脉沉紧。

〔病机〕 外感寒邪或过食寒凉,血为寒凝,运行不畅,则经期延后,量少,色黯。寒邪客于胞中,与血相结,故经来有块,小腹冷痛,得热则减。寒为阴邪,易伤阳气,阳不外达,故畏寒肢

冷。苔白，脉沉紧，为寒邪在里之象。

〔治法〕 温经散寒调经。

〔方药〕 温经汤(《校注妇人良方》)。

人参 当归 川芎 白芍 桂心 莪术 丹皮 甘草 牛膝

〔方义〕 方中桂心温中散寒，当归养血调经，川芎行血中之气，三药配伍有温经散寒调经的作用；人参益气扶正，助三药宣通阳气而散寒邪；莪术、丹皮、牛膝活血祛瘀；白芍、甘草缓急止痛。全方有温经散寒，益气通阳调经之效。宜于寒邪阻滞胞脉所致的月经后期、经量过少、痛经等症。

〔加减〕 如经量过多，则去莪术、牛膝活血祛瘀之品，酌加炮姜、焦艾叶温经止血。

如腹痛拒按，时下血块者，加蒲黄、五灵脂以化瘀止痛。

2. 虚寒

〔主症〕 经期错后，量少，色淡红，质清稀，无血块，小腹隐痛，喜热喜按，腰酸无力，小便清长，大便稀溏。舌淡苔白，脉沉迟或细弱。

〔病机〕 阳气不足，阴寒内盛，使气血生化不足，运行无力，故经行后期，量少，色淡红，质清稀。阳虚胞失温煦，故小腹隐痛，喜热喜按。阳虚肾气不足，肾府失养(腰为肾之府)，故腰酸无力。膀胱失煦故小便清长。阳虚脾失健运，清气不升，故便溏。舌淡，脉沉迟细弱，均为阳虚不能生血行血，血脉不充之象。

〔治法〕 扶阳祛寒调经。

〔方药〕 艾附暖宫丸(《沈氏尊生书》)。

艾叶 香附 当归 续断 吴茱萸 川芎 白芍 黄芪 生地黄 肉桂

〔方义〕 方中四物汤养血调经；黄芪配肉桂补气扶阳，以消阴寒而助气血生化；艾叶、吴茱萸引桂、芪入冲任，温经暖宫；

香附疏肝理气调经，使气行血行；续断补肝肾，强腰膝而止腰疼痛。全方扶阳祛寒，调经暖宫。原治子宫虚寒不孕，今用以治虚寒月经后期、量少、痛经等。

〔加减〕 如兼溲清，便溏者，加补骨脂、白术、肉蔻。如气短、乏力、自汗者，重用黄芪加人参。

3. 血虚

〔主症〕 经期延后，量少，色淡红，无块，或少腹隐痛；或头晕眼花，心悸少寐，面色苍白或萎黄。舌质淡红，脉细弱。

〔病机〕 营血虚少，冲任血虚，血海不能如期满溢，故经期延后，量少。血虚气弱，胞脉失养，运行无力，故少腹隐痛。血虚不能上荣于头，故头晕眼花，面色苍白或萎黄。血虚不能养心，故心悸、少寐，舌淡。血不充于脉，故脉细弱。

〔治法〕 补血调经。

〔方药〕 大补元煎(《景岳全书》)。

人参 山药 熟地 杜仲 当归 枸杞 山茱萸 炙甘草

〔方义〕 方中人参大补元气为君，气生则血长；山药、甘草补脾气，佐人参以益生化之源；熟地、当归、枸杞、山萸肉滋肝肾，益精血，补天一之真水，乃补血贵在滋水之意。

〔加减〕 若脾虚不运，食少便溏，去当归，加白术、扁豆、砂仁以增强健脾和胃之力。心悸少寐，加远志、五味子以交通心肾，宁心安神。如血虚阴亏，兼有潮热，盗汗，心烦，加女贞子、旱莲草、何首乌、地骨皮以养阴清虚热。

4. 气滞

〔主症〕 经期延后，量少，色黯红，或有小块，小腹作胀，或胸腹、两胁、乳房胀痛，舌苔正常，脉弦。

〔病机〕 忧思郁怒，以致气机郁结，血为气滞，血海不能按时满溢，故月经后期，量少，色黯红或有小血块。肝郁气滞，经脉

壅阻，故小腹、胁肋、乳房胀痛。病因气滞，内无寒热，故舌苔正常。弦为肝脉，肝气郁滞，故脉弦。

〔治法〕 理气调经。

〔方药〕 乌药汤(《兰室秘藏》)。

乌药 香附 木香 当归 甘草

〔方义〕 方中乌药理气行滞为君；香附疏肝理气，木香行脾胃滞气为臣；当归养血调经为佐；甘草调和诸药。

〔加减〕 量少有血块者，加川芎以活血调经。胁痛甚者加柴胡、郁金以疏肝解郁。小腹痛甚者，加玄胡以行气活血止痛。如气郁化火，除以上主症外，兼量多、色红、心烦、舌红苔薄，脉弦数者，加丹皮、栀子凉血清热。

【验方医案】

1. 血虚型月经后期方(《刘奉伍妇科经验》)

当归 15 克 川芎 3 克 吴茱萸 9 克 仙灵脾 15 克 肉桂 4.5 克 红花 9 克 半夏 6 克 木香 4.5 克 炮姜 3 克 桃仁 3 克 水煎服。

月经后期，伴有月经量少，色淡或晦暗，低热，食少体倦、健忘怔忡，惊悸少寐，腹痛，腰痛，脉弦细，或虚弱，舌质淡，无苔者为之适应证。

2. 月经后期，虚寒型方(《百灵妇科》)

当归 9 克 熟地 9 克 杜仲 9 克 牛膝 9 克 枸杞子 9 克 炙甘草 6 克 肉桂 6 克 人参 9 克 附子 6 克 水煎服。行经前每天 1 剂。

主治：月经后期，冲任虚寒，畏寒肢冷，气短、乏力、腰痛、腹凉冷而痛，白带清稀，舌淡苔白，脉沉无力。

3. 月经后期肝郁气滞方(《当代名医验方大全》)

当归 10 克 白芍 10 克 川芎 6 克 柴胡 8 克 香附 10

克 枳壳 10 克 云苓 10 克 白术 6 克 郁金 10 克 元胡 10 克 丹皮 10 克 甘草 3 克 川楝子 10 克 水煎服。每天 1 剂,分两次温服,早、晚各服 1 次。

耿某,女,29 岁。1967 年 4 月初诊。8 年前,正值经期,因生气月经停止,此后经期错后,腹胀痛,月经不畅,血色紫红有块,经前胸腹、乳房胀痛、烦躁易怒,婚后 4 年未孕,舌质淡红,舌苔薄白,脉象沉弦。选用上方加减口服。用 4 剂,腹胀减轻,继服前方,月经如期。血行顺利,症状消失。而后受孕,足月生一健儿。

4. 经行后期腹痛方(《中医医案医话集锦》)

当归 15 克 川芎 6 克 白术 12 克 元胡 9 克 灵脂 9 克 桃仁 9 克 红花 9 克 官桂 6 克 蒲黄 9 克 乳香 9 克 没药 6 克 陈皮 9 克 甘草 3 克 炙黄芪 18 克 小茴香 9 克 水煎服。

梁某,女,29 岁,农民。1972 年 4 月 7 日初诊。自述月经后期,少腹胀痛,气短,精神不振,纳谷不香,月经挟有小血块,少腹痛拒按,舌苔白腻,脉沉迟。此乃气虚血瘀之象。服上方加减 14 剂,各症大减,腹痛消失,自述月经按期而至。

5. 加减桂枝茯苓丸(《妇科验方选》)

桂枝 9 克 桃仁 9 克 赤芍 9 克 茯苓 9 克 益母草 30 克 马齿苋 30 克 水煎服。连服 3~4 剂。

主治:月经后期,经行腹痛,崩漏,产后恶露不绝。

6. 过期饮(《医宗金鉴·妇科》)

当归 10 克 白芍 10 克 川芎 5 克 熟地 10 克 桃仁 5 克 红花 5 克 香附 10 克 莪术 5 克 肉桂 3 克 木香 5 克 木通 5 克 炙甘草 5 克 水煎服。

因虚而致月经后期者,可用“双和饮”、“养荣汤”等治之。

【文献选要】

《景岳全书·妇人规》：血热者，经期常早，此营血流利及未甚亏者多有之，其有阴火内灼，因血本热而亦过期者，此水亏血少，燥涩而然，治宜清火滋阴，以加味四物汤，加减一阴煎，滋阴八味丸之类主之。

凡血寒者，经必后期而至。然血何以寒？亦惟阳气不足，寒从中生而生化失期，是即所谓寒也。至若阴寒由外而入，生冷由内而伤。或致血逆，或为疼痛，是又寒滞之证，非血寒经迟之谓也。当详辨之。

凡阳气不足，血寒经迟者，色多不鲜，或色见沉黑，或涩滞而少；其脉或微或细，或沉迟弦涩；其脏气形气必恶寒喜暖。凡此者皆无火之证，治宜温养气血，以大营煎、理阴煎之类加减主之。大约寒则多滞，宜加姜、桂、吴萸、茺苢之类，甚则须加附子。

惟忧愁思虑，心气受伤，则脾气失养，郁结不通，腐化不行，饮食减少，斯有血枯血闭，及血少色淡，过期或数月一行也。

三、月经先后无定期

月经先后过七天，连续出现三月间。

肝郁胸胁乳腹胀，逍遥丹益热栀丹。

肾虚腰疼耳鸣晕，定经汤与固阴煎。

【注】 月经周期时，或提前或延后7天以上者，称为“月经先后无定期”。或称“经水先后无定期。”《圣济总录》即有“经水无定”之说。

本病发病机制，在于气血失于调节而导致血海蓄溢失常。其病因多由肝气郁滞或肾气虚衰所致。根据月经周期不固定，时或提前时或退后7天以上，并连续出现3个月经周期以上者，

可诊断为本病。

【辨证论治】

1. 肝郁

〔主症〕 月经周期不定,经量或多或少,色紫红,有块,经行不畅,或有胸胁,乳房,少腹胀痛,脘闷不舒,时叹息,暖气食少。苔薄白或薄黄,脉弦。

〔病机〕 郁怒伤肝,疏泄失常,血海蓄溢失度,故经行先后无定期,经量或多或少。肝郁气滞,经脉不利,故有胸闷,乳房、少腹等肝经循行之处胀痛。肝气欲舒,则叹息;肝气犯胃,则暖气食少。气郁血滞则经行不畅,有块。气郁化火,可见经色紫红,苔薄黄等证。脉弦为肝郁气滞之象。

〔治法〕 疏肝理气调经。

〔方药〕 逍遥散(《和剂局方》)。

柴胡 白术 茯苓 当归 白芍 甘草 薄荷 煨姜

〔方义〕 方中柴胡疏肝解郁,薄荷助柴胡疏达之力,当归、白芍养血调经,白术、茯苓、甘草和中健脾,煨姜温胃行气。全方重在疏肝理脾,使肝气得舒,脾气健旺,则经自调。

〔加减〕 若肝血不足,肝阳偏盛而见头晕目眩、舌红口干者,宜减去煨姜、薄荷之辛散。若因肝郁致瘀,经期小腹胀痛,经血有块的,酌加丹参、益母草、延胡索、蒲黄之类。肝郁化热而经多、色红、质稠者,加丹皮、栀子,亦可暂去当归、煨姜。肝郁木不疏土,纳呆,脘闷显著者,加厚朴、陈皮。

2. 肾虚

〔主症〕 经来先后无定,量少,色淡黯,质清。或腰骶酸痛,或头晕耳鸣,舌淡苔少,脉细尺弱。

〔病机〕 肾气虚弱,封藏失司,冲任不调,而血海蓄溢失常,以致月经错乱,先后不定。肾气不足,阴阳两虚,阴不足则经

色淡而清，肾虚则髓海不足，孔窍不利，故头晕耳鸣。腰为肾之府，而胞脉又系于肾，肾虚失养，则腰骶酸痛。舌淡苔薄，脉细尺弱，皆为肾气不足之象。

〔治法〕 补肾调经。

〔方药〕 固阴煎(《景岳全书》)。

人参 熟地 山药 山茱萸 菟丝子 远志 五味子 炙甘草

〔方义〕 方中熟地、山萸肉、菟丝子补肾益精，人参、甘草、山药益气健脾，五味子、远志交通心肾。

如症见肝肾同病，则肝肾同治，用定经汤(《傅青主女科》)

柴胡 炒荆芥 当归 白芍 山药 茯苓 菟丝子 熟地

本方柴胡、荆芥疏肝解郁，当归、白芍柔肝养血调经，山药、茯苓健脾和中，菟丝子、熟地补肾而益精血。全方疏肝肾之气，补肝肾之精血，肝肾之气疏，肝肾之经血旺，则经水自能定期。

【验方医案】

1. 治月经先后无定期方(《朱小南妇科经验选》)

当归9克 川芎4.5克 白芍6克 制香附9克 郁金6克 枳壳4.5克 合欢花9克 丹参9克 巴戟天9克 焦白术6克 汉防己6克 秦艽9克 水煎服。

刘某，34岁，女。

初诊：多产体弱，已结扎，经期先后无定，本次迟10天而行，行则量少即止，隔10天又复行。胸闷腹胀，纳谷不香，周身关节酸楚。按脉虚细而弦，舌苔薄白，证属肝郁脾虚，气血不调。治疗采用理气解郁，扶土益血法。

复诊：用上方加减法治后，脉象虚细而数，舌质绛而苔薄黄。诊后认为多产伤肾，肾水不足以涵木，肝郁化火，阴虚内热，乃采用固肾疏肝，养血清热法。

当归9克 白芍9克 玄参9克 白术6克 陈皮6克 柴胡4.5克 青蒿6克 女贞子9克 山萸肉9克 合欢皮9克 制香附9克。服药后,阴虚火旺的症状日减,而经水已调。

2. 月经无定期方(《王文选医案》)

升麻1.5克 柴胡3克 青皮4.5克 香附4.5克 山梔子3克 羌活4.5克 白芷3克 细辛3克 茯苓4.5克 甘草1.5克 水煎服,每天1剂。

马某,21岁,农民。1957年7月19日初诊。患者当年元月,月经将来,因怒气数日,使月经淋漓日久,以后月经时前时后而无定期,经期小腹痛,腰痛酸困,精神佳良,性情急躁,善言声高,舌滑润,脉弦尺沉。证属肝气不疏。服前方3个月,月经正常而怀孕。

3. 经行先后无定期方(《潘养之医案》)

当归12克 白芍9克 熟地12克 枸杞子9克 桑寄生12克 柴胡9克 香附6克 山药10克 杜仲10克 菟丝子6克 每天1剂,水煎服。

张某,女,30岁,农民。1973年7月12日初诊。

自述近几月来,经行断续,或前或后,血量或多或少不定,色淡,乳房胀痛,胸闷不舒,头晕眼花,腰酸乏力,舌淡苔白,脉沉弦。治以疏肝解郁,益肾养血。连服上方10剂,症状消失,月经如期而来。

4. 肝郁气滞方(《百灵医案》)

当归9克 白芍9克 柴胡6克 茯苓9克 白术9克 甘草6克 薄荷6克 水煎服。行经前服4~6剂,每天1剂。

月经时而赶前,时错后而无定期。血量涩少难下,紫暗色,胸胁胀满,乳胀,小腹疼痛,无故多怒、善叹息,面色晦暗,舌淡苔薄白,脉弦数有力。

若气滞甚者加川楝子9克,以理气调经。

若气滞化热,热甚者加黄芩9克、栀子9克、丹皮9克以清热凉血。

5. 温肾扶阳固冲方(《百灵医案》)

人参 熟地 远志 附子 肉桂 山萸肉 菟丝子 补骨脂 五味子 炙甘草 水煎服。每天1剂,早、晚分服各1次。

月经赶前错后无定期,血量少,色淡,头眩、健忘、耳鸣、腰酸腿软,小腹坠胀,大便溏泻、小便清频,四肢不温,面色晦暗,舌淡润,脉沉弱者,服之为宜。

6. 补肾固经汤(《中医妇科验方选》)

白芍15克 熟地15克 当归10克 茯苓10克 山药15克 柴胡3克 焦芥穗6克 水煎服。

主治月经先后无定期,可见于肾虚或肝郁,水不涵木者为宜。

7. 月经先后无定期属于瘀血停滞者,方用加味调经方(《千家妙方》)

茜草12克 丹参12克 桃仁3克 土鳖虫6克 川军6克 当归3克 赤芍12克 红花3克 干姜3克 水煎服,每天1剂。

或将上药共为细末,每晚临睡前服4.5克。

临床实验证明,此方屡用屡效,病获痊愈。

【文献选要】

《景岳全书·妇人规》:凡欲念不遂,沉思积郁,心脾气结,致伤冲任之源,而肾气日消,轻则或早或迟,重则渐成枯闭。

凡女人血虚者,或迟或早,经多不调。

《傅青主女科》:妇人有经来断续,或前或后无定期,人以为气血之虚也,谁知是肝气之郁结乎!夫经水出诸肾,而肝为肾之子也,肝郁则肾亦郁矣。肾郁则气必不宣,前后之或断或续,正

肾气之或通或闭耳。或曰肝气郁而肾气不应，未必至于如此。殊不知母子关切，子病而母必有顾复之情，肝郁而肾不无缱绻之谊。肝气之或开或闭，即肾气之或去或留，相因而致，又何疑焉。治法宜疏肝之郁，即开肾之郁也。肝肾之郁既开，而经水自有一定之期矣，方用定经汤。

四、月经过多

月经过多自然停，气虚血热血瘀型。

气虚淡稀元煎举，血热保阴安冲明。

血瘀难净色黑块，失笑血余茜益灵。

【注】 月经量较以往明显增多，周期基本正常者，称为“月经过多”，亦称“经水过多。”

因其经量明显增多，在一定时间内能自然停止，是本病的诊断要点。但临床上有与周期提前同时出现，如月经先期量多。有与后期同时出现的，也有仅经量增多而周期正常的。如经量特多，暴下如注，或下血日久不止，或伴有周期紊乱，则已发展为“崩中”之证。

【辨证论治】

本病辨证，以量多为特征。辨证重点在经色、经质。通常以量多、色淡、质薄的属气虚；量多、色鲜红或紫而稠黏的属血热；色紫黑有块，伴小腹疼痛的属血瘀。同时结合其他伴随证候审辨虚实。治疗大法，经期以摄血止血为主，目的在于减少血量，防止失血伤阴。平时宜安冲固冲以治本。血瘀者重在化瘀以止血。总宜慎用温燥走而不守之品，以免动血耗血。

1. 气虚

〔主症〕 经来量多，色淡红，质清稀。或兼见面色㿔白，气

短懒言，肢软无力；或小腹空坠；或心悸、怔忡。舌淡，脉细弱。

〔病机〕 气虚则冲任不固，经血失约，故量多。气虚火衰不能化血为赤，故经色淡而清稀。气虚阳气不布，故面色㿔白，气短懒言，肢软无力。气虚失于升举，故小腹空坠。气虚血少不能养心，故心悸、怔忡。舌淡，脉虚弱，均为气血虚弱之征。

〔治法〕 补气摄血固冲。

〔方药〕 举元煎(《景岳全书》)。

人参 黄芪 白术 升麻 炙甘草

〔方义〕 方中人参、黄芪、白术、甘草补中益气；升麻助黄芪升阳举陷，气升则血升，不治血而自有摄血固冲之效。方中人参临床亦可用大量的党参代替。

〔加减〕 如正值月经量多，加阿胶、焦艾叶、乌贼骨、炮姜炭以固涩止血。如月经期过长，日久不断，加炒蒲黄、益母草、以活血止血。腰腹冷痛，加续断、破故纸、艾叶补肝肾、固冲任、温经止血。

2. 血热

〔主症〕 经来量多，色鲜红或深红，质稠黏。或有小血块，常伴心烦口渴、尿黄、便秘。舌质红，苔黄，脉滑数。

〔病机〕 热盛于里，扰及血海，乘经行之际，迫血下行，故使血量增多。血为热灼，则色深红或鲜红而质稠。热壅气滞，经血行而不畅，故有小血块。邪热扰心则心烦，伤津口渴，尿黄、便秘，舌红、苔黄，脉滑数，皆邪热内盛之象。

〔治法〕 凉血清热止血。

〔方药〕 保阴煎(《景岳全书》)加地榆、槐花。

生地 熟地 黄芩 黄柏 白芍 山药 续断 甘草

〔方义〕 方中熟地、白芍益血敛阴；生地清热凉血，养阴生津；黄芩、黄柏清热泻火，直折热邪；地榆、槐花凉血止血；甘草调

和诸药。

〔加减〕 若有以上血热主症，又伴见倦怠乏力，气短懒言，或心悸少寐等证，乃失血伤气耗阴，气虚血热之象。治宜益气养阴凉血止血，加党参、白术、黄芪、生龙骨、生牡蛎。若外感热邪化火成毒，经量多，经色黯红，臭秽，发热恶寒、少腹硬痛拒按，又宜清热解毒化瘀加败酱草、红藤、桃仁、丹皮、黄连、栀子、公英、地丁。

3. 血瘀

〔主症〕 经行量多，或持续难净，色紫黑，有血块，或伴小腹疼痛拒按，舌有瘀点，或舌质紫黯，脉细涩。

〔病机〕 瘀血内阻，络伤血溢，故经量增多。瘀阻胞络，新血难安，则经来持续难净；瘀血凝结，则色黯有块；阻滞胞宫，则小腹疼痛拒按。舌质紫黯，或有瘀点，脉细涩，亦为瘀血阻滞之征。

〔治法〕 活血化瘀止血。

〔方药〕 失笑散（《和剂局方》）。

蒲黄、五灵脂加血余炭、茜草、益母草。

〔方义〕 方中蒲黄活血止血，五灵脂散瘀止痛，二药合用，有活血散瘀、止痛止血之效。加血余炭止血消瘀；茜草、益母草活血祛瘀止血，以增强活血止血之效。

〔加减〕 如见舌红无苔、口干咽燥、五心烦热、自汗、盗汗等阴虚症状者，酌加沙参、麦冬、五味子或女贞子、旱莲草。

【验方医案】

1. 心脾两虚气不摄血方（《医案集锦》）

党参 15 克 黄芪 24 克 白术 9 克 木香 4.5 克 当归 9 克 远志 9 克 元肉 9 克 枣仁 12 克 阿胶 9 克 生地 9 克 甘草 4.5 克 大枣 6 个 地榆炭 15 克 仙鹤草 15 克 焦芥穗

4.5 克 每日 1 剂,水煎服。煎 3 次兑匀分 2 次服之。早、晚各 1 次。

贾某,34 岁,已婚。1963 年 4 月 6 日初诊。

因劳累过度,经行半月不去,量多如流水,色淡红,头晕,心悸,气短。精神困倦,食少,身出虚汗,面色苍白,舌质淡,脉细弱。

辨证为心脾两虚,劳伤脾气,中气不足,治之补脾益气,养血宁神,摄血止血。以上方归脾汤加减,连服 3 剂,血量减少大半。以诸症均有好转。又以八珍益母丸调理气血而痊愈。

2. 温经汤加减治月经过多症(《千首妙方》)

桂枝 15 克 当归 15 克 麦冬 15 克 白芍 10 克 吴萸 10 克 半夏 10 克 川芎 10 克 丹皮 10 克 艾叶 10 克 羊藿叶 10 克 生姜 10 克 贯众炭 30 克 甘草 6 克 水煎服。三七粉 5 克(吞服)。

李某,女,45 岁。行经月经不净,近 3 天来月经量增多,色鲜红,有血块。舌质淡苔薄白。脉沉细。证属血寒挟瘀,冲任不固予上方 2 剂出血量明显减少。服 4 剂后血止。

3. 月经过多(中期出血)阴虚内热证,加味清经汤(《千家妙方》下册)

生地炭 24 克 地骨皮 12 克 白芍 12 克 荠菜 30 克 旱莲草 15 克 女贞子 12 克 槐米炭 30 克 仙鹤草 30 克 鹿衔草 30 克 水煎服,每天 1 剂,连用 5~7 剂。

江某,女,38 岁,已婚。1977 年 3 月 7 日初诊。

主诉月经期月经出血量多。平时口苦,咽干,烦躁烘热,腰酸,舌质红,苔薄黄,脉弦数。服上方 5 剂而愈。

4. 生脉二至乌茜汤(《妇科验方选》)

治月经过多,经期延长者有效。

党参 30 克 麦冬 15 克 五味子 10 克 女贞子 15 克 旱莲草 15 克 益母草 15 克 生地 12 克 乌贼骨 24 克 地骨皮 15 克 炒贯众 30 克 炒槐花 12 克 茜草 20 克 水煎服。

5. 益母固冲方(《妇科验方选》)

党参 24 克 黄芪 25 克 白术 12 克 升麻 10 克 枳壳 10 克 补骨脂 10 克 鹿角胶 10 克 贯众 10 克 艾叶 6 克 水煎服。

治疗月经过多,经期延长,崩漏,产后恶露不绝。连用 4~6 剂而愈。

(6) 天门冬饮(河南商丘市妇幼保健院经验方)

天门冬 10 克 水煎服。治疗 100 例,多在 1~3 天经血止。

【文献选要】

《证治准绳·女科》:经水过多,为虚热,为气虚不能摄血。

《傅青主女科》:妇人有经血过多,行后复行,面色萎黄,身体倦怠,而困乏愈甚者,人以为血热有余之故,谁知血虚而不归经乎!……血不归经,虽衰而经亦不少,……惟经多是血之虚,故再行而不胜其困乏,血损精散,骨中髓空,所以不能色华于面也。治法宜大补血而引之归经。

《妇科玉尺》:经水过多不止,平日肥壮,不发热者,体虚寒也。

经水过多不止,平时消瘦,常发热者,由火旺也。

妇人 49 岁,经当止,今每月却行过多,及五旬外,月事比少时更多者,血热或血不归经也。

五、月经过少

月经过少点滴期,肾虚血瘀和痰湿,
血虚滋血汤调养,肾虚腰酸归肾医,

血瘀紫块腹胀痛，桃红四物汤化瘀，
痰湿质黏呕恶闷，苍附导痰丸治之。

【注】 月经周期基本正常，经量明显减少，甚或点滴即净，或经期缩短不足两天，经量亦少者，称为“月经过少”。亦称“经水涩少。”

月经过少，有虚有实。虚者或因化源不足，血海亏虚；或因精血衰少，血海不盈。实者多由瘀血内停；或痰湿阻滞，经脉壅阻，血不畅行。

【辨证论治】

1. 血虚

〔主症〕 月经量少，或点滴即净，色淡无块，或伴头晕眼花，心悸怔忡，面色萎黄，小腹空坠。舌质淡红，脉细。

〔病机〕 营血衰少，血海满溢不足，则经行量少色淡。血虚不能上荣于脑，则头晕眼花。血不养心，则心悸怔忡。血不荣于肌肤，则面色萎黄。血虚胞脉失养，则小腹空坠。舌淡红，脉细均为血虚之象。

〔治法〕 养血调经。

〔方药〕 滋血汤（《证治准绳·女科》）。

人参 山药 黄芪 白茯苓（去皮） 川芎 当归 白芍
熟地

〔方义〕 方中人参、山药、黄芪益气健脾以资生化之源，使气生血长；四物汤补营养血，佐参、芪以生血，气充血足，则经自调。

〔加减〕 如经来过少，点滴即止者，为精血亏虚将成闭经之象，加枸杞、山茱萸以滋养肝肾，填精益血。如脾虚食少者，滋血汤加砂仁、陈皮以行气健脾。

2. 肾虚

〔主症〕 月经量少，色淡红或黯红，质薄，腰脊酸软，足跟

痛,头晕耳鸣,或小腹冷,或夜尿多。舌淡、脉沉弱或沉迟。

〔病机〕 肾气亏虚,精血不足,故经来量少,色淡红。肾阳虚,血不化赤,则经色淡黯,质薄。肾主骨生髓,脑为髓海,督脉贯脊络肾,肾、督阳虚,则头晕耳鸣、腰脊酸软,足跟痛。胞系于肾,肾阳不足,胞失温煦,故小腹冷。肾虚,膀胱之气不固,故夜尿多。舌淡、脉沉弱或沉迟,为肾虚阳气不足之象。

〔治法〕 补肾养血调经。

〔方药〕 归肾丸(《景岳全书》)。

菟丝子 杜仲 枸杞 山萸肉 当归 熟地 山药 茯苓

〔方义〕 菟丝子、杜仲补益肾气,熟地、山萸肉、枸杞滋肾养肝,山药、茯苓健脾和中,当归养血调经。全方治肾而兼顾肝脾,冲任得养,经自如期。

〔加减〕 本方肾阴阳双补,重在益精养血。如以经色黯红,小腹冷痛,夜尿多等肾阳虚证候为主者,选加补肾阳药,如仙灵脾、巴戟天、仙茅、补骨脂、益智仁等。

如以经色红,手足心热,咽干口燥,舌红苔少,脉细数等血虚阴亏,肾阴不足为主症者,则加生地、玄参、女贞子等滋养肾阴药。

3. 血瘀

〔主症〕 经行量少,色紫黑有血块,小腹胀痛拒按,血块排出后胀痛减轻,舌正常,或紫黯,或有小瘀点,脉细涩或弦涩。

〔病机〕 瘀血内停,经随阻滞,血不畅行,故经来量少有块,小腹胀痛拒按,血块排出则瘀滞稍通,故胀痛减轻。舌质紫黯,或有瘀点,脉涩,乃瘀血内停之征。

〔治法〕 活血化瘀调经。

〔方药〕 桃红四物汤(《医宗金鉴》)。

桃仁 红花 川芎 当归 白芍 熟地

〔方义〕 方中桃仁、红花、川芎活血祛瘀；当归养血调经，活血止痛；白芍柔肝缓急止痛；熟地补血滋阴。全方有活血化瘀，调经养血之效。如小腹胀痛以胀为甚，或兼胸胁胀满，为气滞血瘀，原方加香附、台乌药以理气行滞。

〔加减〕 如小腹冷痛，得热痛减，为寒凝血瘀，原方加桂枝、吴茱萸以温通血脉。

4. 痰湿

〔主症〕 月经量少，色淡红，质黏腻如痰；形体肥胖，胸闷呕恶，或带多黏腻。舌淡，苔白腻，脉滑。

〔病机〕 痰湿内停，阻滞经络，与血相结，使气血运行不畅，血海满盈不足，故经量减少，色淡质黏腻。脾失健运，痰浊内停，则胸闷呕恶。痰湿下注，任带二脉受损，则带下量多而黏腻。舌淡，苔腻，脉滑，为痰湿内停之象。

〔治法〕 化痰燥湿调经。

〔方药〕 苍附导痰丸（《叶天士女科诊治秘方》）。

茯苓 法半夏 陈皮 甘草 苍术 香附 胆南星 枳壳 生姜 神曲

〔方义〕 方中二陈汤化痰燥湿，和胃健脾；苍术燥湿健脾；香附、枳壳理气行滞；胆南星燥湿化痰；生姜温中和胃。全方燥湿健脾，行气消痰，使痰湿消除，则经量可调。

【验方医案】

1. 沙参麦冬汤加减（《辽宁中医杂志》1982年第4期）

治疗气阴两虚型月经过少。

北沙参9克 麦冬9克 石斛9克 知母9克 玉竹9克 地骨皮9克 山药12克 扁豆12克 生鳖甲30克 粉甘草3克 水煎服。

邹某，女，22岁，近两月来，月经若有若无，量少，色淡，脉细

数,舌红苔净。服上方6剂后经期经量恢复如初。

2. 调肝理中汤(《妇科验方选》)

柴胡10克 白芍10克 茯苓10克 荷叶10克 乌梅10克 泽泻10克 香附10克 当归10克 益母草10克 牛膝10克 水煎服。

应用于肥胖妇女,烦躁易怒,恶热多汗,头目眩晕,腰痛乏力,月经量少,或闭止不行者,每天1剂。

3. 乌鸡补血汤(《妇科验方选》)

月经量少,经行腹痛,赤白带下,久不受孕,身体虚弱等。

乌鸡肉250克 当归15克 黄芪30克。先将当归、黄芪加水煎出药汁,后下鸡肉煮熟加少许食盐调味。吃肉喝汤。

【文献选要】

《万氏女科》:瘦人经水来少者,责其血虚少也。四物加人参汤主之。

肥人经水来少者,责其痰凝经坠也。用二陈加芎归汤主之。

《证治准绳·女科》:经水涩少,为虚为涩。虚则补之,涩则濡之。

《女科证治约旨》:如因形瘦多火,消烁津液,致成经水衰少之候,宜加味少营煎主之。

六、经期延长

月经延长半月淋,按时而至月数匀。

血瘀有块脉弦涩,少腹逐瘀桃红寻。

阴虚血热质稠燥,两地二至效如神。

【注】 月经周期基本正常,行经时间超过七天以上,甚或淋漓半月方净者,称为“经期延长”,亦称“月经不断”、“月水不

绝”、“经事延长”等。若终月不尽者，则为“漏下”。

本病的发病机制，有虚有实，实者多因瘀血郁滞冲任，新血不得归经；虚者多由阴虚内热，扰动血海以致经期延长。

【辨证论治】

经期延长的治疗原则，重在缩短经期，使达正常范围，故以止血为要。瘀血阻滞，以通为止，重在活血化瘀。阴虚血热，重在养阴清热，安冲宁血，不宜概用固涩药。

1. 血瘀

〔主症〕 经来淋漓八九日至十余日始净，量少，色黯有块，小腹疼痛拒按。舌质紫暗，或有瘀点，脉弦涩。

〔病机〕 瘀血内停阻滞胞脉，新血不得归经而妄行，故月经淋漓八九日至十余日，血瘀于内，运行不畅，则经来量少，色黯有块，腹痛拒按。舌黯或有瘀斑，脉涩，亦为瘀血阻滞所致。

〔治法〕 活血祛瘀止血。

〔方药〕 桃红四物汤合失笑散或用少腹逐瘀汤。

当归 15 克 川芎 10 克 赤芍 15 克 生地 15 克 桃仁 10 克 红花 10 克 蒲黄 10 克 灵脂 10 克 水煎服。

〔方义〕 方中桃红四物汤养血活血祛瘀，失笑散祛瘀止痛止血。

〔加减〕 加茜草、益母草活血祛瘀止血。

2. 阴虚血热

〔主症〕 月经持续八九日至十余日，量少，色红，质稠。咽干口渴，或有颧红，潮热或见手心灼热。舌质红少津，苔少或无苔，脉细数。

〔病机〕 阴虚内热，扰及冲任，血海不宁，故经血过期未尽。火旺则面色红，水亏则经量少，质稠。津液不能上承则咽干口渴。颧红潮热，舌红苔少，脉细数，亦为阴虚内热之象。

〔治法〕 养阴清热止血。

〔方药〕 两地汤加二至丸。

两地汤:生地 地骨皮 玄参 麦冬 白芍 阿胶

二至丸:女贞子 旱莲草

〔方义〕 方中两地汤滋阴壮水以平抑虚火;二至丸中女贞子,旱莲草滋养肝肾而止血。

〔加减〕 上方加入茜草活血祛瘀,加乌贼骨固涩止血,加益母草祛瘀止血。

全方滋阴而不滞血,止血而不留瘀。

【验方医案】

1. 归脾汤加丹皮栀子方(《女科临证集要》)

白术 15 克 黄芪 30 克 茯神 10 克 党参 30 克 远志 6 克 当归 6 克 桂圆肉 15 克 丹皮 10 克 栀子 10 克 水煎服。每日 1 剂。

黄某,女,35 岁。1978 年 6 月 8 日初诊。

月经周期尚正常,惟近两年来,经期延长每次行经淋漓不净达 10 天以上,量多色淡,质清,神倦乏力,心悸少寐,纳少便溏,手足心热,咽干口燥。舌淡苔薄,脉细数,此气虚血热所致。用上方于月经期连服 8 剂血止。

又予归脾丸,每服 1 丸,每日 2 次,连服 1 个月。再次行经时,6 天而净,病告痊愈。

2. 滋阴固冲方(《女科临证集要》)

龟版 20 克 熟地 30 克 白芍 15 克 地骨皮 10 克 黄柏 10 克 乌贼骨 30 克 茜草 10 克 旱莲草 10 克 地榆炭 15 克 龙骨 30 克 牡蛎 30 克 甘草 6 克 水煎服。

解某,女,27 岁。1993 年 7 月 4 日初诊。

月经周期正常,近半年来,每次行经期延长,经期半月始止。现

正值行经已7天,量多色红,头晕耳鸣,腰膝酸软,口干咽燥,五心烦热,舌质红,苔少,脉虚数。此肝肾阴虚,虚火内扰,冲任失固所致。

以上方3剂经尽,又服3剂,后续服知柏地黄丸40丸,以巩固疗效。此后则经期正常,诸症悉除。

【文献选要】

《诸病源候论》:妇人月水不断者,由损伤经血,冲脉任脉虚损故也,冲任之脉,为经脉之海,手太阳小肠之经也,手少阴心之经也,此二经为表里,主下为月水,劳伤经脉,冲任之气虚损,故不能制其经血,故令月水不断也。凡月水不止,而合阴阳,冷气上入藏,令人身体面目萎黄,亦令绝子不产也。

《校注妇人良方》:妇人月水不断,淋漓腹痛,或因劳损气血而伤冲任,或因经行而合阴阳,以致外邪客于胞内,滞于血海故也。但调养元气,而病邪自愈。若攻其邪则元气反伤矣。

《沈氏女科辑要笺正》:经事延长,淋漓不断,下元无固摄之权,虚象显然。

七、痛 经

痛经经期腹腰疼,气滞血瘀膈下灵。

胞寒阳虚温经用,少腹苍苓寒湿凝。

湿热下注清热治,调血汤中加红藤。

气血虚弱圣愈补,肝肾虚损调肝明。

【注】 妇女正值经期或行经前后,出现周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚则剧痛昏厥者,称为“痛经”,亦称“经行腹痛。”

本病的临床特征是经行小腹疼痛,伴随月经周期而发作。疼痛可引及全腹或腰骶部,或外阴、肛门坠痛。一般疼痛多发生于行经第1~2天或经期前1~2天,随后即逐渐减轻或消失。

偶有延续至经净或于经净后始发病的,但亦有1~2日内痛可自止。疼痛程度有轻有重,一般无腹肌紧张或反跳痛,经血排出流畅时,疼痛常可缓解。临床上常见有气滞血瘀、寒凝胞中、湿热下注、气血虚弱、肝肾虚损等证候。也有因子宫发育不良或畸形,或子宫位置过度不正等而发生痛经的。

【辨证论治】

1. 气滞血瘀

〔主症〕 每于经前1~2天或月经期小腹胀痛,或经量少,或经行不畅,经色紫暗有块,血块排出后痛减,经净疼痛消失。舌紫黯或有瘀点,脉弦或弦滑。

〔病机〕 肝司血海,又主疏泄,肝气条达,则血海通调。因情志拂郁,冲任气血郁滞,气血流行欠畅通,故经前1~2天或经期少腹胀痛、拒按,或经量少或行而不畅。经血瘀滞故色黯有块。血块排出,瘀滞减轻,气血暂通,故疼痛缓解。瘀滞随经血而外泄,故经后疼痛自消。若郁滞之因未除,则于下次月经周期又复发。舌紫黯有瘀点,脉弦,为瘀滞之征。

〔治法〕 理气化瘀止痛。

〔方药〕 膈下逐瘀汤(《医林改错》)。

当归 川芎 赤芍 桃仁 红花 枳壳 延胡索 丹皮
乌药 香附 五灵脂 甘草

〔方义〕 方中以枳壳、乌药、香附理气调肝,当归养血和血,川芎、赤芍、桃仁、红花、丹皮活血行瘀,延胡索、五灵脂化瘀止痛,甘草缓急调和诸药。气顺血调则疼痛自止。

〔加减〕 若兼口苦、苔黄,月经持续时间延长,经色紫黯,经质稠黏,为肝郁化热之象,当佐以清泄肝热,上方加栀子、夏枯草、益母草。若兼先后二阴坠胀者加川楝子、柴胡;若肝郁伐脾,症见胸闷,食少者加炒白术、茯苓、陈皮。若痛甚而见恶心呕吐

者,为肝气挟冲气犯胃,当佐以和胃降逆,上方加吴茱萸、黄连、生姜。

2. 寒凝胞中

(1) 阳虚内寒

〔主症〕 经期或经后小腹疼痛,喜按,得热则舒,经量少,经色黯淡,腰腿酸软,小便清长,脉沉,苔白润。

〔病机〕 肾为冲任之本,胞脉系于肾而络于胞中,肾中虚弱,虚寒内生,冲任,胞宫失煦,虚寒滞血,故经期或经后小腹冷痛,经少色黯淡。寒得热化,故得温则舒。非实寒所凝聚,故喜揉按;肾阳不足,故腰腿酸软,小便清长。脉沉,苔白润为虚寒之象。

〔治法〕 温经暖宫止痛。

〔方药〕 温经汤(《金匮要略》)。

吴茱萸 当归 芍药 川芎 人参 生姜 麦门冬 半夏 牡丹皮 阿胶 甘草 桂枝

〔方义〕 方本吴茱萸、桂枝温经散寒,兼通血脉以止痛;当归、川芎养血活血调经;阿胶、麦冬合当归以养血滋阴;丹皮化瘀行血;芍药、甘草缓急止痛;人参益气;生姜、半夏和中。

〔加减〕 本方温经散寒,养血祛瘀,加附子、艾叶、小茴香以增强温肾暖宫、散寒止痛之效。若手足不温,面色青白,舌质淡嫩,宜去麦冬、阿胶,以防其阴腻阻碍阳气滞塞血脉。

(2) 寒湿凝滞

〔主症〕 经前数日或经期小腹冷痛,得热痛减,按之痛甚,经量少,经色黯黑有块,或畏冷身痛,苔白腻,脉沉紧。

〔病机〕 寒湿之邪重浊凝滞,客于冲任,胞中与经血搏结,使经血运行不畅,故于经前1~2日或经期小腹冷痛。血为寒凝,故经色不鲜有块。得热则凝滞稍减,故疼痛减缓,苔白腻,脉沉紧,均为寒湿内闭,气血瘀滞之征。

〔治法〕 温经散寒除湿，化瘀止痛。

〔方药〕 少腹逐瘀汤(《医林改错》)加苍术、茯苓。

小茴香 干姜 延胡索 没药 当归 川芎 肉桂 赤芍
蒲黄 五灵脂

〔方义〕 方中肉桂、小茴香、干姜温经散寒除湿；当归、川芎、赤芍养血、活血、行瘀；延胡索、五灵脂、蒲黄、没药化瘀止痛；加苍术燥湿化浊，茯苓健脾渗湿。全方温经散寒，活血祛瘀止痛。

各 〔加减〕 痛甚而厥，症见手足不温，或冷汗淋漓，为寒邪凝
论 闭阳气之象，宜于方中加附子，以温壮阳气而运血行。

3. 湿热下注

〔主症〕 经前小腹疼痛拒按，有灼热感，或伴腰骶胀痛；或平时少腹时痛，经来疼痛加剧。低热起伏，经色黯红，质稠有块，带下黄稠，小便短黄，舌红苔黄而腻，脉弦数或濡数。

〔病机〕 外感或内蕴湿热之邪，犯及下焦，盘踞冲任、胞中，经前血海气血充盈，湿热与血胶结，故下腹疼痛拒按，或痛连腰骶，或小腹灼热。湿热缠绵，故低热起伏，或平时小腹亦痛。经色黯红有块质黏稠，瘀热扰血所致。湿热留连冲任，可有月经失调，湿热壅遏下焦，故带下异常，小便短黄。舌红苔黄而腻脉弦数，均为湿热之象。

〔治法〕 清热除湿，化瘀止痛。

〔方药〕 清热调血汤(《古今医鉴》)加红藤、败酱草、苡米。

清热调血汤：牡丹皮 黄连 生地 当归 白芍 川芎
红花 桃仁 莪术 香附 延胡索

〔方义〕 本方以清热凉血化瘀；生地清热凉血；黄连清热解毒，燥湿；当归、白芍养血和血；川芎、桃仁、红花、莪术活血祛瘀；香附、延胡索调气止痛。全方清热化瘀，理气调血。

〔加减〕 败酱草、红藤、苡米以增强清热解毒，除湿消瘀之力。如兼有月经不调，带下异常者加公英、地丁、马齿苋。如湿重浮肿者加益母草、泽泻、车前子。

4. 气血虚弱

〔主症〕 经后1~2日或经期小腹隐隐作痛，或小腹及阴部空坠，喜揉按，月经量少，色淡质薄，或神疲乏力，或面色不华，或纳少便溏。舌质淡，脉细弱。

〔病机〕 气血不足，冲任亦虚，经行之后，血海更虚，血虚濡养不足，气虚运行无力，血行迟滞，故经后1~2天小腹隐隐作痛而喜揉按。经后数日，冲任气血渐复，故隐痛自消，若体虚而未复，遇经期失血伤气则经净腹痛复作。气虚阳气不足，血虚经血不荣，故经量少而色淡质薄，面色萎黄不华，气血虚弱，脾阳不振，故神疲、纳呆，便溏。舌淡，脉细弱为气血两虚证。

〔治法〕 益气补血止痛。

〔方药〕 圣愈汤(《兰室秘藏》)。

人参 黄芪 当归 川芎 熟地黄 白芍

〔方义〕 人参、黄芪补气，四物汤养血调血。气血充盈，血脉流畅则痛自除。

〔加减〕 血虚肝郁，症见胁痛，乳胀，小腹胀痛，上方加川楝子、柴胡、小茴香、台乌药。血虚甚，症见头晕、心悸、眠差者加鸡血藤、大枣、枣仁。兼肾虚，症见腰腿酸软者，加菟丝子、川断、桑寄生。腹胀满隐隐作痛者加入元胡、川楝、香附。

5. 肝肾虚损

〔主症〕 经行后1~2天内小腹绵绵作痛，腰部酸胀，两胁隐痛、经色黯淡、量少，质稀薄，或有潮热，或耳鸣，脉细弱，苔薄白或薄黄。

〔病机〕 肝肾不足或亏损，冲任俱虚，精血本已不足，经

行之后,血海空虚,胞脉更失濡养,故经后小腹疼痛绵绵,经量少而色黯淡,质稀薄。肾虚故腰酸耳鸣。肝脉布胁肋,肝虚则两胁隐痛。阴虚生内热,可见潮热,苔薄黄。脉细弱为精血有亏之象。

〔治法〕 益肾养肝止血。

〔方药〕 调经汤(《傅青主女科》)。

当归 白芍 山茱萸 巴戟天 阿胶 山药 甘草

〔方义〕 方中当归、白芍养血柔肝,山茱萸益精气养肝肾,巴戟天温肾益冲任,阿胶滋阴益血,山药健脾补中。

〔加减〕 痛及腰骶加川断、杜仲。兼少腹两侧或两胁肋疼痛,乃挟肝郁所致,宜佐以调气,上方加川楝子、延胡索、或加小茴香、橘核、郁金等。

【验方医案】

1. 活血调经止痛方(《新中医》1983年第3期)

丹参15克 当归9克 赤芍9克 泽兰9克 三棱9克 桃仁9克 红花9克 牛膝9克 延胡9克 制香附9克 益母草9克 川芎6克 木香4.5克 柴胡4.5克 川断9克 菟丝子9克 橘叶6克 水煎服,每天1剂。

孙某,29岁,已婚。1980年5月17日诊。

痛经4年,曾在西医妇科治疗,诊为膜样痛经。结婚半年痛经未改善。末次月经5月16日,经水已行,小腹剧痛,腰臂酸楚,经来量不多,经前乳房胀,舌苔薄,脉细弦。此乃肝气郁滞,气血瘀阻。治宜理气活血调经。即投以上方6剂。另嘱:平时服四制香附丸、逍遥丸。即痊愈。

6月11日二诊:经水将临,腹痛未作,乳胀已减,舌苔薄,脉细弦,再按原方,嘱服5剂。1980年7月27日因月经过期未行而来就诊,神疲肢倦,偶有恶心,查尿妊娠试验阳性。

2. 气滞血瘀型痛经方(张志兴《临床实效录》)

当归24克 川芎9克 桃仁12克 红花9克 川牛膝12克 赤芍9克 乳香9克 没药9克 盐小茴6克 川楝子12克 炒蒲黄9克 炒灵脂9克 青木香6克 丹参30克 炒杜仲12克 川断12克 桑寄生12克 醋香附24克 茜草24克。黄酒引子 水煎服。1日1剂,行经前服4~5剂。

用于行经前1~2天,或经期小腹胀痛,拒按,或伴有胸胁乳房作胀,或经量少,经行不畅、或经色紫暗有块,血块排出痛减,经净疼痛消失。舌紫暗或瘀点,脉弦滑。

3. 行气化瘀方(《千家妙方》下册)

丹参30克 乌药10克 枳壳10克 香附12克 桃仁10克 红花10克 水煎服。每次月经前服之。每天1剂(身有热者,以丹参易丹皮10克)。

李某,女,20岁,工人。经期少腹胀痛已4年,近半年来加重……痛重时面色苍白,冷汗淋漓,恶心肢冷。舌黯红,苔薄白,脉涩。服上方3剂,痛经已减。嘱其下次月经来潮前,始服上方5~7剂。连服3个月经周期,病获痊愈。痛经未再发生(此方系名老中医傅乃杰所传)。

4. 寒凝气滞痛经方(《中国当代名医验方大全》)

川楝子10克 小茴香9克 桃仁10克 红花6克 香附9克 五灵脂9克 蒲黄9克 官桂6克 水煎服,每日1剂早晚各服1次。

陈某,女,25岁。1975年3月初诊。痛经数年,久治不愈。潮至则痛经难忍,脉沉弦迟。此乃寒凝血滞,气机不利,以上方加炮姜5克,服3剂痛止。下期来潮,痛未再发。数月后经来又痛,嘱照原方服后痛又止,从此再未发。

5. 黄芪建中汤加味(《男女科病千首妙方》)

黄芪30克 酒白芍30克 桂枝6克 炙甘草6克 乌药9克 元胡9克 饴糖50克 生姜10克 大枣15个 水煎服。

谢某,女,18岁。体质差,月经量少,色淡质稀,小腹疼痛,肢冷,腰膝酸软,小便频数,舌淡苔少,脉沉细。予以上方3剂痛除,7剂而愈。

6. 红酱金灵四物汤(《中医妇科验方选》)

当归10克 生地12克 川芎9克 赤芍10克 苏木10克 红藤30克 败酱草30克 金铃子10克 五灵脂15克 元胡12克 炙乳香5克 炙没药5克 青皮5克 陈皮5克 水煎服。

虞某,女,27岁。痛经久而不愈,小腹疼痛,来潮第一天痛甚,及至发现膜样脱落前又见一阵剧痛,继而血块落下则痛减,舌质红脉弦。确诊为热性痛经。于行经前,服上方7剂,治疗2个月后经周期后痛经减轻。3个月周期后痛经痊愈。

7. 加味桂枝茯苓丸(《中医妇科经验选》)

桂枝9克 茯苓9克 桃仁9克 丹皮9克 白芍18克 甘草9克 川牛膝9克 蒲黄9克 五灵脂12克 香附14克 元胡9克 水煎服,每天1剂。

温经散寒、活血利气,缓急止痛。适用于经期后延,行经时四肢凉冷,小腿及腰腿部剧痛难忍者。

每于月经前服3~5剂。连服3个周期愈。

【文献选要】

《格致余论》:将行而痛者,气之滞也;来后作痛者,气血俱虚也。

《景岳全书·妇人规》:经行腹痛,证有虚实。实者,或因寒滞,或因血滞,或因气滞,或因热滞;虚者,有因血虚,有因气虚。

然实痛者，多痛于未行之前，经通而痛自减；虚痛者，于既行之后，血去而痛未止，或血去而痛益甚。大都可按可揉者为虚，拒按拒揉者实。有滞无滞，于此可察。但实中有虚，虚中亦有实，此当于形气禀质兼而辨之，当以察意，言不能悉也。

《名医类案》：石山治一妇瘦小，年二十余，经水紫色，或前或后，临行腹痛，恶寒喜热，或时感寒，腹亦作痛。脉皆细濡近滑，两尺重按，略洪而滑。汪曰：血热也。或谓恶寒如此，何谓为热。曰：热极似寒也。遂用酒煮黄连4两（120克），香附、归身尾各2两（60克），五灵脂1两（30克），为末粥丸，空腹吞之而愈。

八、经间期出血

经间出血两月中，二三日净少月经。

肾阴虚证腰酸痛，两地二至丸收功。

湿热乏力节酸楚，清肝止淋汤适应。

瘀血少腹胀刺痛，通瘀止血汤化通。

【注】 经间期出血，是指在两月经周期之中间出血。出血可持续2~3天，出血停止。血量少于正常月经量。对此亦常称为排卵期出血。该病原因系雌激素的水平不调而致。长期可致女子不孕。

本病多由肾阴不足，湿热内蕴，瘀血阻滞等因而成病。

【辨证论治】

1. 肾阴虚

〔主症〕 经间期出血量少，或稍多，色红，无血块，腹不痛，头晕腰酸，夜寐不熟，便艰，尿黄，舌红，脉细弦略数。

〔病机〕 肾阴亏损，在絪縕之时，阳气内动，损伤阴络，冲任不固，因而出血。但非因邪热煎迫，故血量不多，阴虚阳动，故

色红。肾阴虚,故腰酸头晕难寐。阴液不足,故便难而尿黄,舌红,脉细弦略数,为肾阴虚损之征。

〔治法〕 滋阴止血。

〔方药〕 两地汤(方见“月经先期”)合二至丸(方见“经期延长”)。

〔方义〕 方中生地、地骨皮滋阴清热;元参、麦冬补益肾阴;白芍养阴敛阴;阿胶滋阴养血,且有止血之功。《傅青主女科》谓此方:“只专补水,水即足而火自灭矣。”女贞子、旱莲草,不仅有利于滋阴,且有利于控制出血。

〔加减〕 心肝郁火,上方加醋柴胡、黑栀子。

2. 湿热

〔主症〕 经间期出血量少或多,色红质黏腻,无血块,或如赤白带、赤带,神疲乏力,骨节酸楚,胸闷烦躁,纳食较差,小便短赤,平时带下亦多,质黏腻。舌苔黄白腻,根部稍厚,脉细弦。

〔病机〕 湿热因阳气动而扰动血海,故经间期出血,量少色红;湿浊与血俱下则质黏腻或如赤带,赤白带;湿热互结,热重于湿者则出血量多,胸闷烦躁,小便短赤;湿重于热则神疲乏力,周身骨节酸楚,纳食较差,平时带多,质黏腻等。舌苔黄白腻,根部稍厚,脉细弦者,为湿热之征。

〔治法〕 清热利湿。

〔方药〕 清肝止淋汤(《傅青主女科》)。

当归 白芍 生地 丹皮 黄柏 牛膝 制香附 黑豆

〔方义〕 本方原治赤带,方中有阿胶、红枣,因纳食较差,苔腻,故去之。方中白芍、当归、生地、黑豆补肾养血柔肝;丹皮清肝泻火;香附疏肝解郁;黄柏清热燥湿;小蓟清热止血;茯苓利水渗湿,牛膝引药下行。

〔加减〕 方中再加薏米仁、苍术等更佳。

3. 血瘀

〔主症〕 经间期出血量少或多，色紫黑或有血块，少腹两侧胀痛或刺痛，胸闷烦躁。舌质或有紫点，脉细弦。

〔病机〕 血瘀阻滞胞络，因阳气动而血亦动，动则血海不宁，络脉损伤，故出血色紫黑而有血块，且伴有少腹胀痛，刺痛之感觉；气滞不畅，故胸闷烦躁。舌质有紫点，脉细弦，为瘀血之象。

〔治法〕 化瘀止血。

〔方药〕 逐瘀止血汤（《傅青主女科》）。

生地 大黄 赤芍 丹皮 归尾 枳壳 桃仁 龟版

〔方义〕 方中生地、归尾、赤芍养血活血；桃仁、大黄、丹皮活血祛瘀；枳壳行气散结，龟版养阴止血。全方有活血祛瘀，养阴止血的作用。

〔验方医案〕

1. 益气养阴固经汤加减（《浙江中医学院学报》1985年第2期）

党参 15 克 白术 15 克 女贞子 15 克 侧柏炭 15 克 地榆炭 15 克 炒升麻 6 克 旱莲草 30 克 炒槐花 12 克 茜草炭 9 克 十灰丸 15 克（包煎） 水煎服。

徐某，女，32 岁。经间期出血 1 年余。量少，色红，或时为赤白带样物。3~4 天净。脉细数，舌淡红，苔薄。证属气阴两虚，以上方 3 剂，出血即止。

2. 清热利湿法与养阴清热法并用（《中医妇科学》）

杨某，女，27 岁，未婚，1973 年 4 月初诊。

两年来每于月经过后 10 天左右，阴道即见有少量出血，色褐，持续 4~5 天始止。经期前错，色红，量多，间有小血块，经前

小腹胀痛,月经前后,带多质稠,腰酸乏力,眠食俱差,舌红。苔黄薄腻,脉弦滑无力。证属肝热血虚,湿热下注。该诊经期方过,头晕、腰酸,带下量多,拟予清热利湿,养血平肝。

处方:秦当归9克 杭白芍9克 女贞子9克 旱莲草9克 桑寄生15克 白蒺藜9克 杭白菊花(后下)9克 车前子12克(包煎) 椿根白皮15克 瞿麦15克 黄芩9克 粉甘草6克3剂 水煎服。

另用蛇床子9克 川黄柏6克 淡吴萸3克 布包,泡水,坐浴,每天2次。

二诊(5月6日):

上方续服8剂,带下止,经间亦未见出血,腰膝乏力诸症皆减轻。今晨月事来潮,量较多,并见腰酸腹坠,脉弦滑略数,再予养阴清热,凉血固经法。

处方:秦当归15克 杭白芍9克 大生地15克 川芎片4.5克 粉丹皮9克 炒地榆15克 川茜草6克 刘寄奴9克 制香附6克 生侧柏9克 乌贼骨15克 条黄芩6克 陈阿胶9克(烊化冲服)3剂 水煎服。

三诊(5月20日):

上方服5剂,月经已止,此次经量较上次为少,用纸不足两包。舌红苔薄白,脉弦缓。

嘱每日上午服加味逍遥丸方1剂,下午服二至丸20粒,7天后仍服一诊方5剂,并于下次经潮时服二诊方3~5剂。恪守此法调理4个月,经期、经量近常,经间未再出血。

3. 固经汤(《中医妇科验方》)

生地15克 山萸肉15克 粉丹皮15克 盐黄柏10克 女贞子15克 旱莲草15克 乌贼骨30克 炒芥穗6克 水煎服。

主治经间期出血(排卵期出血)每于月经周期第10天始服,连服7剂。

【文献选要】

《女科准绳》:“天地生物,必有絪縕之时,万物化生,必有乐育之时,……凡妇人一月经行一度,必有一日絪縕之候,于一时晨间,……此的候也,……顺而施之则成胎矣。”可见明代以前,已认识月经周期中有一日是受孕的“的候”——絪縕期,即现今所称之“排卵期”。关于这一时期的出血,前人虽无专论,但可参考月经先期、经漏、赤白带下等有关文献。

九、闭 经

闭经三月经不行,肝肾归肾首血藤。

阴虚血燥一阴用,气血虚弱参养荣。

气滞血瘀胸腹胀,血府逐瘀重桃红。

痰湿阻滞呕恶胖,苍附导痰加归芍。

【注】 女子年逾18周岁月经尚未初潮,或已行经而又中断达3个月以上者,称为闭经。妊娠期、哺乳期暂时性的停经、经绝期的绝经或有少女初潮后,一段时间内有停经现象等,均属生理现象,不作闭经论。也有妇女由于生活环境的突然改变,偶见一两次月经不潮,又无其他不适者,亦可暂不作病论。

【辨证论治】

1. 肝肾不足

〔主症〕 年逾18周岁尚未行经;或由月经后期量少逐渐至经闭,体质虚弱,腰酸腿软,头晕耳鸣。舌淡红,苔少,脉沉弱或细涩。

〔病机〕 禀赋素弱,肾气不足,天癸未至,冲任未通,故月

经迟迟不潮；天癸虽曾至而不持续，则来潮而又中断。或损伤冲任。故月经逐渐延后量少而至停闭。腰酸头晕耳鸣，舌淡红苔少，脉沉弱涩，均为肝肾不足之征。

〔治法〕 补肾养肝调经。

〔方药〕 归肾丸(方见月经过少条)加鸡血藤、首乌。

〔方义〕 本方以补肾益精血调肝脾为主，加鸡血藤、首乌以增强补血为效，肾气得充，肝血和调，化源充足，冲任得养，血海渐盈，则月经可复。

〔加减〕 若出现潮热，五心烦热，甚至盗汗，骨蒸劳热等象，为肝肾阴虚生热所致。可参照阴虚血燥经闭处理。

2. 阴虚血燥

〔主症〕 经血由少而致停闭，五心烦热，两颧潮红，交睫盗汗，或骨蒸劳热，或咳嗽唾血。舌红苔少，脉细数。

〔病机〕 阴虚内热，热燥血亏，血海渐涸，故月经由少以致停闭，并见五心烦热，盗汗、颧红等虚热症状。

若阴虚日久，精血亏损，虚火内炽，致成阴虚劳热，可见形体羸瘦，骨蒸潮热，或咳嗽吐血等证。

〔治法〕 养阴清热调经。

〔方药〕 加减一阴煎(《景岳全书》)加黄精、丹参、枳壳。

生地 熟地 白芍 麦冬 知母 地骨皮 炙甘草

〔方义〕 方中生地、麦冬、知母滋阴清热；熟地、黄精、白芍养血益精；地骨皮凉血退蒸，除虚热；丹参活血凉血，除烦安神；枳壳调气宽中；甘草健脾和中。

〔加减〕 虚烦潮热甚者，加青蒿、鳖甲；兼咳嗽、唾血者酌加五味子、百合、川贝、阿胶。

虚烦少寐，心悸者，加柏子仁、夜交藤。若因实火灼阴，而致血燥闭经者，宜于方中加玄参、黄柏。如有结核病，同时应给以

抗癆治疗。

3. 气血虚弱

〔主症〕 月经逐渐延后，量少，经色淡而质薄，继而停闭不行。或头昏眼花，或心悸气短，神疲肢倦，或食欲不振，毛发不泽或易脱落，羸瘦萎黄。脉沉缓或虚数，舌淡苔少或白薄。

〔病机〕 履伤于血，或心脾受损，化源不足，血虚气弱，冲任失养，血海空虚，以致月经停闭，余证为血虚不荣，气虚不布所致。

〔治法〕 补气养血调经。

〔方药〕 人参养荣汤(《和剂局方》)。

人参 黄芪 煨白术 茯苓 远志 陈皮 五味子 当归 白芍 熟地 桂心 炙甘草

〔方义〕 方中人参大补元气，配以黄芪、白术、茯苓、陈皮、甘草补中益气，当归、白芍、熟地养血调经，五味子益气养心，远志宁心安神，桂心温阳和营。全方补气生血养营，以补益生发之气。阳生阴长，精充血旺，经行如常。

〔加减〕 若因产后大出血所致的经闭，除见气血虚弱证象外，更见神情淡漠，阴道干涩，阴、腋毛脱落，性欲减退，生殖器萎缩等症，此乃精血亏败，肾气虚惫，冲任虚衰之证，可于上方加鹿茸、鹿角霜、紫河车等血肉之品，长期服用。

若因虫积而致血虚闭经，当先治虫(同于内科)，继以扶脾胃，补气血而治经闭。

4. 气滞血瘀

〔主症〕 月经数月不行，精神抑郁，烦躁易怒，胸胁胀满，少腹胀痛或拒按。舌边紫黯，或有瘀点，脉沉弦或沉涩。

〔病机〕 气以宣通为顺。气机抑郁，不能行血，冲任不通，则经闭不行。气滞不宣，则精神郁闷，烦躁易怒，胸胁胀满。瘀

血内停,积于血海,冲任受阻,则少腹胀痛拒按。舌紫黯,有瘀点,脉沉弦或沉涩,为瘀滞之象。

〔治法〕 理气活血,祛瘀通经。

〔方药〕 血府逐瘀汤(《医林改错》)。

桃仁 红花 当归 生地 川芎 赤芍 牛膝 桔梗 枳壳 甘草 柴胡

〔方义〕 方中桃仁、红花、当归、川芎、赤芍、生地即桃红四物汤活血祛瘀,牛膝引血通经,柴胡、枳壳疏肝理气,桔梗开胸宣气,甘草和中。诸药合用能行血分瘀滞,解气分郁结,瘀去气行,则诸证可除。

〔加减〕 偏于气滞,症见胸胁及少腹胀甚者,上方加苍术、青皮、木香。偏于血瘀,症见少腹疼痛拒按者,上方加姜黄、三棱。若寒凝血瘀,症见四肢不温,小腹冷痛,苔白,脉沉紧者,治宜温经散寒,活血通经,可用温经汤(方见“痛经”)。若因实热滞涩而瘀者,症见小腹疼痛灼热、带下色黄,脉数,苔黄,宜佐以清热化瘀,可于上方加黄柏、败酱草、丹皮。因实热伤阴而闭经者,参照阴虚血燥闭经处理。

5. 痰湿阻滞

〔主症〕 月经停闭,形体肥胖,胸胁满闷,呕恶痰多,神疲倦怠,或面浮足肿,或带下量多色白,苔腻,脉滑。

〔病机〕 肥胖之体,多痰多湿,痰湿阻滞,气血不畅,冲任壅塞,故月经停闭。痰湿困脾,故胸闷呕恶,神疲倦怠。湿浊下注,则带下量多色白,脾湿不运,痰湿内阻,故面浮足肿,苔白腻,脉滑。

〔治法〕 豁痰除湿,调气活血,通经。

〔方药〕 苍附导痰丸(方见“月经过少”)合佛手散(《普济本事方》)。

佛手散：当归 川芎

〔方义〕 方用苍附导痰丸燥湿健脾，行气消痰，当归、川芎养血活血通经，使痰湿消除而经水得通。

【验方医案】

1. 解郁活血方(《医案医话集锦》)

柴胡9克 当归9克 杭白芍9克 桂枝9克 茯苓9克 丹皮9克 桃仁9克 陈皮9克 香附12克 甘草6克 藏红花4.5克 生姜6克 水煎服。

李某，女，25岁，已婚。1962年4月1日初诊。自述闭经8年，自17岁月经初潮至今未行，平素性情抑郁，胸胁胀闷，食少，面色青暗，舌质紫，苔薄白，脉沉弦涩。辨证为“气滞血郁经闭，治宜疏肝解郁，调气活血。”用上方，每天1剂，连续服17剂。月经正常而告痊愈。

2. 补脾调经方(《千家妙方》)

生山药30克 炒白术30克 生鸡内金15克 当归12克 白芍12克 水煎服，1天1剂。

该方加减如下：①气虚者加党参、黄芪；②血虚者加何首乌、熟地。③肾虚加菟丝子、巴戟天、枸杞子。阴虚加鳖甲、龟版。虚寒兼少腹冷痛，四肢不温者加附子、肉桂、吴茱萸。④痰湿加茯苓、半夏。⑤气郁兼两胁胀满者加柴胡、香附。⑥血瘀加桃仁、红花。

张某，24岁，素体弱，月经每月一行，量少，色淡。近9个月来经闭。经中西医治疗均未获愈。病人乏力，心悸、失眠、纳差。查见皮肤不润、无泽，舌质淡红、脉沉细涩无力。证属心脾两虚，经血不足，血虚经闭。服上方3剂后精神转佳，食欲渐增。少腹有下坠感。继服3剂，月经来潮，经量正常。又服6剂，随访月经正常。

王某,25岁,诉因争吵后,经血不行5月,曾接受理气活血治疗无效。现觉两胁胀满,少腹坠痛,纳差,少头晕。诊见舌红,脉弦细。证属肝郁气滞。用上方加柴胡9克、醋香附9克,连服3剂诸症皆减。月经来潮,再服3剂获愈。

3. 痰湿中阻方(《男女科病千首妙方》)

苍术12克 白术15克 半夏10克 茯苓10克 香附10克 川芎10克 陈皮10克 海藻10克 炮姜6克 当归12克 水煎服。每天1剂。

王某,23岁,闭经2年。形体肥胖,痰多清稀,少腹冷,月经周期前后白带剧增,舌苔白腻,脉濡缓。证属痰湿中阻,气郁血闭。服上方8剂月经来潮。

4. 柴楂通经汤(《广西中医杂志》1984年第2期)

柴胡10克 北山楂3克 木香10克 川芎9克。红糖两茶匙为引 水煎服,每天1剂。连服3~5天。

刘某,女,29岁。经闭年余,体重逐渐减轻,身体消瘦,少腹胀硬疼痛,按之痛甚,精神忧郁不乐,急躁易怒,纳呆,舌质淡红,舌边有瘀点,脉沉弦而涩。证属气机郁滞闭经投上方5剂愈。

5. 理气活血化瘀方(《女科临证集要》)

熟地30克 当归20克 川芎10克 赤芍20克 桃仁10克 红花10克 柴胡10克 香附10克 元胡10克 川楝子10克 莪术10克 桂枝10克 鸡内金10克 山楂10克 水煎服。

贺某,女,23岁,未婚。1981年9月20日初诊。17岁月经初潮,月经不规则,平素精神抑郁,肝气不疏。此次月经半年未行,少腹胀痛,两胁胀满不舒,纳食不香。舌质紫暗,脉沉弦而涩。治宜理气活血化瘀。以上方,连服12剂,月经来潮,又予逍遥丸以善其后。

6. 通经方(《中医妇科学方选》)

当归 15 克 川芎 10 克 桃仁 20 克 炮姜 10 克 肉桂 5 克 枳壳 15 克 红花 20 克 附子 10 克 元胡 15 克 赤芍 10 克 牛膝 20 克 川朴 15 克 乌药 15 克

用于寒凝气滞所致闭经,可奏疏肝活血温经散寒之功效,使瘀血祛而经血行。气血虚弱而致经闭者忌用。

7. 血滞闭经方(《中医妇科学方选》)

当归尾 15 克 川芎 10 克 赤芍 12 克 桃仁 10 克 红花 10 克 益母草 15 克 泽兰 10 克 山楂 10 克 丹参 15 克 牛膝 10 克 桑寄生 30 克 香附 10 克 鸡内金 10 克 青皮 10 克 水煎服。

用于血滞日久,形成癥瘕,月经闭止,多见腹有硬块,胀痛拒按,身痛腰酸,烦热眩晕。经前连服尤效。

8. 癆病经闭方(《吉林省中医验方秘方汇编》)

西红花 2 克 酒军 5 克 当归 12 克 斑蝥 3 个(去头尾翼)。共为细末,匀 4 包,隔日服 1 包。引用红花 8 克 赤木 5 克 木通 5 克 甘草 5 克。煎汤送服上方面药 1 包。

用于月经闭止,羸瘦,心悸,气短,咳嗽,午前轻,午后重,发热,面潮红,两颧红润。腰疼腹痛,全身倦怠,不思饮食,脉频数细小者。

9. 桃红四物坤山黄金方(程绍恩妇科验方)

当归 15 克 川芎 10 克 赤芍 20 克 生地 20 克 桃仁 10 克 红花 10 克 益母草 30 克 山楂 25 克 蒲黄 10 克 鸡内金 15 克 水煎服。每剂中药煎 3 次,兑匀后再分 3 次服。每天早、晚各服 1 次。

用于血滞经闭,可连服 10 剂,月经则通。

【文献选要】

《诸病源候论》:妇人月水不通者,由劳损血气,致令体虚受

风冷。风冷邪气客于胞内，伤损冲任之脉，并手太阳少阴之经，致胞络内绝，气血不通，故也。

《本草衍义》：夫人之生以气血为本，人之病未有不先伤其气血者。……思虑过度，多致劳损，……女则月水先闭。

《景岳全书·妇人规》：血枯之与血隔，本自不同。……凡妇女损至旬月半载之后，则未有不闭经者。正因阴竭，所以血枯。枯之为义，无血而然，故或以羸弱，或以困倦，或以咳嗽，或以夜热。或以饮食减少，或以亡血失血，及一切无胀无痛，无阻无隔，而经有久不至者，即无非血枯经闭之候。欲其不枯，无如养营；欲以通之，无如充之。但使雪消而春水自来，血盈则经脉自至。源泉混混，又孰有能阻之者奈何。今之为治者，不论有滞无滞，多兼开导之药。其有甚者，则专以桃仁、红花之类，通利为事。岂知血滞者可通，血枯者不可通也。血既枯矣，而复通之，则枯者愈枯。其与榨干汁者何异？为不知枯字之义耳，为害不小，无或蹈此弊也。

十、崩 漏

崩漏量多血虚空，淋漓为漏大下崩。

血热虚者保阴用，血热实者清固经。

肾阳虚用右归饮，肾阴虚用左归功。

脾虚归脾固本止，血虚四物失效应。

【注】崩漏一证，是指月经之血，淋漓不断或大下量多不止，以致血脉空虚病情危重。临床以血液淋漓不断而量少者为“漏”；经血大下，量多不止者为之“崩”。亦有先漏而后转为崩，亦有先崩而后变为漏。故崩与漏往往相互转化的。

本病的发病机制主要是冲任损伤，不能制约经血，故经血从

胞宫非时妄行。常见病因有血热、肾虚、脾虚、血瘀等。可突然发作,亦可由月经失调发展而来。

【辨证论治】

崩漏的主症是血证,故辨证当根据出血的量、色、质变化,参合舌、脉以及发病的久暂,辨其虚、实、寒、热。一般而言,崩漏虚证多而实证少,热者多而寒者少,但“即使是火,亦是虚火,非实火可比。由于崩漏发病缓急不同,出血新旧各异。因此,治疗崩漏,尚须本着“急则治其标,缓则治其本”的原则,灵活掌握塞流、澄源、复旧三法。

塞流:即是止血。暴崩之际,急当止血防脱,一般采用固气摄血法。

澄源:即正本清源,亦是求因治本,乃治疗崩漏的重要阶段。一般用止血法后,待血势稍缓便须根据不同证情辨证论治。

复旧:即固本善后,治法或补肾,或调肝,或扶脾。

治崩漏三法又不可截然分开,塞流需要澄源,澄源当固本。

1. 血热

(1) 虚热证

〔主症〕 经血非时突然而下,量多势急或量少淋漓,血色红或质稠,心烦,潮热,或小便黄少,或大便干结。苔薄黄,脉细数。

〔病机〕 阴虚失守,冲任不固;阴虚血热,热迫经血。故经血非时妄行。阴虚血量可少,热炽则血量增多。尿黄便结,苔黄脉细数均为虚热之象。

〔治法〕 滋阴清热,止血调经。

〔方药〕 保阴煎(方见“月经过多”)加入沙参、麦冬、五味子、阿胶。

〔方义〕 本方生地养阴凉血,熟地、白芍滋阴养血,黄芩、

黄柏清热止血,川断益肾止血,山药、甘草补脾固气和中。加入沙参、麦冬、五味子以双补气阴,阿胶滋阴益血止血。

(2) 实热证

〔主症〕 经血非时忽然大下,或淋漓日久不净,色深红质稠,口渴烦热,或有发热,小便黄或大便干结。苔黄或黄腻,脉洪数。

〔病机〕 热盛于内,损伤冲任,血海沸腾,迫血妄行,故经血崩下或淋漓不净,血色深红质稠。热扰心神则烦热,热伤胃津,故口渴,热邪内蕴可有发热。苔黄,脉洪数,俱是血热之征,若挟有湿邪,则苔黄腻。

〔治法〕 清热凉血,止血调经。

〔方药〕 清热固经汤(《简明中医妇科学》)加沙参。

黄芩 焦栀子 生地 地骨皮 地榆 阿胶(溶化) 生藕节 陈棕炭 炙龟版 牡蛎粉 生甘草

〔方义〕 方中黄芩、焦山栀、地榆、藕节清热止血;沙参益气,并与生地同滋阴血;阿胶养血止血,龟版、牡蛎育阴敛血,陈棕炭收涩止血。全方寓滋阴敛血于清热凉血之中,使热除血止。

〔加减〕 兼少腹及两胁胀痛,心烦易怒,脉弦者,为肝经火炽,宜清肝泻热。上方加柴胡疏肝,夏枯草清肝热,益母草化瘀血。苔黄腻,少腹疼痛者,为湿热阻滞冲任所致,宜加蚕矢以清热除湿止血,黄柏清热燥湿止血。实热耗气,兼见少气懒言神疲者,加党参以益气。

2. 肾虚

(1) 偏肾阳虚证

〔主症〕 经来无期,出血量多或淋漓不尽,色淡质清,畏寒肢冷,面色晦暗,腰腿酸软,小便清长。舌质淡,苔薄白,脉沉细。

〔病机〕 肾气不足,肾阳虚弱,封藏不固,冲任失约,故经

来无期量多或淋漓。阳虚则真火不足，经血失煦，故色淡质稀。余证均为阳虚失煦之象。

〔治法〕 温肾固阳，止血调经。

〔方药〕 右归丸（《景岳全书》）去肉桂、当归、加黄芪、覆盆子、赤石脂。

右归丸：制附子 肉桂 熟地 山药 山茱萸 杞果 菟丝子 鹿角霜 当归 杜仲

〔方义〕 方中制附子温补命门之火，以强壮肾气；杜仲、菟丝子温补肾阳；鹿角霜温肾气养精血固冲任；熟地、山萸肉、枸杞子补益精血；山药补脾固气；加黄芪补气摄血，覆盆子、赤石脂固肾涩血。肉桂温血，当归辛温活血，故宜去之。

〔加减〕 患者若为年少肾气不足，可于上方加紫河车、仙茅、仙灵脾，以加强补肾益冲之功。肾阳虚，脾阳失煦，证兼浮肿，纳差、四肢欠温者，加茯苓、砂仁、炮姜健脾温中。症见出血量多色黯红有块，小腹疼痛者，为寒凝致瘀，可酌加乳香、没药、灵脂，共奏温经活血之效。

（2）偏肾阴虚证

〔主症〕 经乱无期，出血淋漓不尽或量多，色鲜红，质稍稠，头晕耳鸣，腰膝酸软，或心烦，舌质偏红，苔少，脉细数。

〔病机〕 肾水阴虚，冲任失守，故经乱无期，量多或淋漓不尽。阴虚血热，则色鲜红，质稍稠。肾阴不足，不能上荣于脑，故头晕耳鸣。精亏则腰腿酸软，水不济火，故心烦。舌脉为肾水亏虚之象。

〔治法〕 滋水益阴，止血调经。

〔方药〕 左归丸（《景岳全书》）去牛膝，合二至丸（方见“经期延长”）。

左归丸：熟地 山药 枸杞 山茱萸 菟丝子 鹿角霜

龟版胶 川牛膝。

〔方义〕 方中熟地滋阴养血，龟版胶益阴潜阳敛血，枸杞、山茱萸、菟丝子、山药补肝肾益冲任，鹿角霜温养精血。因川牛膝引血下行，故不用。合二至丸滋养肝肾。肝阴失养，症见咽干，眩晕者，加夏枯草、牡蛎。心阴不足，症见心烦，眠差者，加五味子、夜交藤。阴虚生热者，可按虚热崩漏证处理。肾阴肾阳俱虚者，可综合上述两法，灵活化裁运用。

3. 脾虚

各 〔主症〕 经血非时而至，崩中继而淋漓，血色淡而质薄，气
论 短神疲，面色㿔白，而面浮肢浮，手足不温，或饮食不佳，舌质淡，苔薄白，脉弱或沉弱。

〔病机〕 脾虚气陷，统摄无权，故忽然暴下，或日久不止，遂或漏下。气虚火不足，故色淡而质薄。中气虚故气短，神疲。脾阳不振，故四肢不温，纳差，面色㿔白。脾虚不运，可有浮肿。舌、脉为气虚、脾阳不足之象。

〔治法〕 补气摄血，养血调经。

〔方药〕 固本止崩汤（《傅青主女科》）去当归，加升麻、山药、大枣、乌贼骨。

固本止崩汤：人参 黄芪 白术 熟地 当归 黑姜

〔方义〕 方中人参、白术、黄芪补气培元，固中摄血；熟地养血滋阴；黑姜温中止血。当归药性温行，故暂不用。加升麻以升提气机，山药、大枣补中益血，乌贼骨涩血固冲。

〔加减〕 兼血虚者，加首乌、白芍、桑寄生。久漏不止，或少腹胀满者，加黑荆芥、木香、益母草。

4. 血瘀

〔主症〕 经血非时而下，时下时止，或淋漓不净，或停闭日久又突然崩中下血，继而淋漓不断，色紫黑有块，小腹疼痛或胀

满,舌质紫暗,苔薄白,脉涩。

〔病机〕 胞宫瘀滞、新血不安,于是经乱无期,离经之血时瘀时流,故经血时来时止。若冲任阻隔,则经血不止;蓄极而满,但瘀血不去,新血难安,故血又暴下。血瘀故血色紫黯有块,瘀阻则气血不畅,故作痛。舌质紫黯,苔薄白,脉涩,为有瘀之征。

〔治法〕 活血化瘀,止血调经。

〔方药〕 四物汤(《和剂局方》)合失笑散(方见“月经过多”),加三七粉、茜草炭、乌贼骨。

四物汤:熟地 当归 川芎 白芍

〔方义〕 方中四物养血和血调经;失笑散活血化瘀止血。

〔加减〕 加三七粉、茜草炭化瘀止血,乌贼骨涩血而不滞瘀。兼气滞者,症见胁胀甚,方中加炒川楝子、香附。久漏不净加桃仁、红花、益母草。崩下不止暂去川芎、当归,加党参、仙鹤草、益母草。瘀而化热,症见口干苦,血色红而量多,苔薄者,加仙鹤草、地榆、茜草根、夏枯草。

【验方医案】

1. 参芪阿胶煎(《千家妙方·下册》)

参须9克 当归9克 乌贼骨9克 茯神9克 阿胶9克
地榆炭15克 黄芪15克 炙甘草6克 艾叶炭3克 水煎服。每天1剂。

加减:崩血难止加仙鹤草15克、田三七3克。肢冷,脉迟加附子6克。口渴,脉数加黄芩、生地各9克。

向某,女,36岁,工人。1966年6月24日初诊。主诉经血淋漓持续20天未止。来诊时上午八时,血如潮涌,头晕目眩,耳鸣,心悸、出冷汗,面色苍白,舌淡白,脉微欲绝。诊为元气衰亏、冲任不固,急以参芪阿胶方加川断15克,煅龙牡15克。连服8剂,其病得愈。

2. 止崩方(《中国当代名医验方大全》)

黄芩 10 克 白芍 10 克 生地 15 克 丹皮 6 克 旱莲草 15 克 白茅根 15 克 乌贼骨 10 克 血余炭 6 克 茜草根 6 克 水煎服。每天 1 剂。

刘某,女,30 岁。血来不止,血注如崩,身出斑点,口鼻衄血,身热,收入住院。曾输血、血略止,忽又大下。伴心烦不寐,口干,溲赤、脉数、舌红。遂用上方加入阿胶,不分昼夜时时频服。3 剂后,发热退,斑点少,血渐止又服 6 剂。病愈。后未再发。

3. 崩漏止血汤(《中国当代名医验方大全》)

生地 25 克 当归 15 克 白芍 25 克 侧柏炭 25 克 地榆炭 20 克 莲房炭 15 克 棕炭 15 克 杜仲炭 20 克 川续断 20 克 醋柴胡 15 克 炙升麻 10 克 茜草 15 克 水煎服,每天 1 剂,早晚各服 1 次。

王某,女,28 岁。1985 年 7 月 6 日初诊。临产时阴道壁裂伤、流血不止已 4 个月余,下腹坠胀隐痛,腰痛膝软,肢体乏力,脉虚浮无力,颜面浮肿,舌质淡,苔薄白,服上方 3 剂流血即止。下腹坠痛随之消失。惟感疲乏无力,带色黄,量多,改用参芪四物汤加白术、茯苓、蒲公英、金银花、牡蛎等以善其后,药后带色转白而量少,继投 3 剂乃康复。

4. 胶红饮加味(《江西中医药》1984 年第 4 期)

阿胶 30 克 红花 24 克 当归 30 克 冬瓜仁 15 克 黄芪 15 克 赤参 6 克 每天 1 剂 水煎服。本方对气血两虚,瘀血内阻之血崩,确有良效。

吴某,女,47 岁。行经 7 天,突然小腹刺痛难忍,经血如注,色紫挟血块,伴头晕目眩,身浮肿。舌淡苔白,脉细无力。尚未诊毕,患者晕倒。予上方 1 剂。次日复诊述药后血块即除,精神转佳。惟见少许血水,左下腹仍觉疼痛。原方加元胡 18 克。2

剂后血净腹痛止。

5. 益气摄血汤(《千家妙方》下册)

生地 20 克 白芍 15 克 女贞子 15 克 旱莲草 15 克 炒槐花 15 克 大蓟炭 9 克 小蓟炭 9 克 茜草炭 9 克 熟地榆 15 克 水煎服。每天 1 剂。

王某,女,16 岁,学生。因学习过于紧张而经潮,流血过多,淋漓 40 余天不止,经门诊诊断为功能性子宫出血而收住院。住院后经中西医结合治疗,1 个月而痊愈出院。出院后 4 天,无任何诱因,而又突然发生了阴道流血不止,再次来诊治疗,病人出现血下不止,时多时少,淋漓不断,色淡红,质清稀,伴头晕,心悸,气短,少寐,纳少,疲乏无力,腰酸困,自汗,脉细弱,舌质淡红,苔薄白。用上方连服 20 余剂。病获痊愈,追访数月未见复发。

6. 养阴凉血白头翁汤(《中医医案医话集锦》)

白头翁 10 克 秦皮 10 克 生地 15 克 白芍 10 克 丹皮 6 克 炒山栀 6 克 银柴胡 6 克 地骨皮 10 克 炙鳖甲 10 克 白茅根 15 克 元参 10 克 青蒿 10 克 水煎服,每天 1 剂。

袁某,女,29 岁,护士。1970 年 5 月 20 日初诊。

一年多来月经提前,有时 1 月两次月经来潮,色鲜红,量中等。10 余日始净。经净后 4~5 天又来潮。近 5 个月来,经血淋漓不断。伴头晕、失眠、多梦,自觉身热(但体温不高)五心烦热,口干喜冷饮。经妇科检查,盆腔无异常。诊断为子宫功能性子宫出血。曾服归脾汤 50 余剂,仍漏下不止,故转诊治疗。现症:形体消瘦,舌质红少苔,舌尖红刺,语声正常脉细数。证属阴虚血热,血不循经而漏下。以上方 4 剂,漏下已止。身热口干,五心烦热等症已明显好转。舌红少苔,脉细不数,以前方加白薇 10 克。继续 4 剂诸症消失,病告痊愈。

7. 固冲止崩方(同前)

煅龙骨 15 克 川断 10 克 乌贼骨 18 克 炒白术 10 克
黄芪 15 克 煅牡蛎 20 克 山萸肉 15 克 白芍 12 克 棕榈炭
10 克 炒地榆 10 克 茜草 3 克 水煎服,每天 1 剂。

艾某,女,42 岁,工人。1957 年 8 月 13 日初诊。

病史:两个月前时病人值经期第 3 天,因搬运超重,当晚出血甚多,有较大血块。当时去医院急诊。经用止血药后血量减少。1 周后自觉腰酸腹痛,又大出血如前,如是又去妇产科检查,盆腔无病变,未发现肌瘤。诊断为子宫功能性子宫出血。经中西医结合治 2 个月无效。相隔数日即大出血 1 次,昨日又下血如注,其势甚急,不待接盆,血已流至腿足。面色苍白,舌淡少苔,语声低微,脉沉细。证属冲脉损伤,致成崩下。以固冲脉,止血崩为法。用上方 3 剂下血已止。

但感体倦乏力,心悸、气短、头晕、眼花、舌质淡、少苔、脉细。乃因失血日久,气血两虚之故。以双补气血方用八珍汤去川芎加黄芪、山萸肉、川断、炒杜仲 水煎服。以善其后。

8. 补血止崩方(《崩漏专辑》)

党参 30 克 黄芪 30 克 益母草 30 克 马齿苋 30 克 仙鹤草 30 克 生地炭 30 克 旱莲草 30 克 煅龙牡 30 克 升麻 9 克 白术 9 克 生蒲黄 9 克 小蓟 9 克 川断 15 克 黑芥穗 6 克 炙甘草 6 克 水煎服。每日 1 剂,连续服 3~6 剂即可止血。

9. 三合止崩汤(《中医妇科验方选》)

生黄芪 50 克 当归 10 克 海螵蛸 40 克 茜草 10 克 生地榆 50 克,加醋 30~50 毫升 水煎服,每日 1 剂,4 次分服(此乃地榆炭苦酒煎、当归补血汤、乌贼骨等 3 方组合而成,临床疗效满意)。

10. 止崩化瘤汤(《中医妇科验方选》)

黄芪 50 克 党参 30 克 贯众炭 15 克 焦栀子 10 克 焦黄芩 10 克 山甲珠 15 克 皂角刺 15 克 山慈姑 15 克 海藻 15 克 昆布 15 克 三七 10 克(冲服) 丹皮 10 克 杜仲 15 克 白花蛇舌草 15 克 半枝莲 15 克 水煎服。

主治崩漏下血过多,兼有腰膝酸痛、气短懒言、四肢乏力、子宫肌瘤出血、功能性子宫出血、子宫内膜增殖症等。治疗子宫肌瘤症 50 多例,均获满意疗效。

11. 崩漏止红汤(《吉林中医药》1991 年气血病论文专辑)

天冬 10 克 麦冬 10 克 大蓟 10 克 小蓟 10 克 龙骨 15 克 牡蛎 15 克 焦栀子 10 克 藕节 15 克 代赭石 20 克 浙贝母 10 克 白茅根 15 克 丹皮 10 克 酒炙大黄 10 克 炒蒲黄 10 克 桔梗 10 克 黄芩 10 克 白芍 10 克 甘草 10 克 生地 10 克 白及 15 克 棕榈炭 15 克 阿胶 10 克(烊化) 水煎服。1 天 1 剂。

无论崩漏新久,血量多少,服之即可应手取效。连服 5 剂均可痊愈。

【文献选要】

《东垣十书·兰室秘藏》:……脾胃有亏,下陷于肾,与相火相合,湿热下迫,经漏不止,其色紫黑……

《薛己医案·女科提要·经漏不止》:其为想因脾胃虚损,不能摄血归源;或因肝经有火,血得热而下行;或因肝经有风,血得风而妄行;或因怒动肝火,血热而沸腾;或因脾经郁结,血伤而不归经;或因悲哀太过,胞络伤而下崩。

《景岳全书·妇人规》:崩漏不止,经乱之甚者也,盖乱则或前或后,漏则不时妄行,由漏而淋,由淋而崩,总因血病,而但以其微甚耳。

崩淋之病，有暴崩者，有久崩者。暴崩者，其来骤，其治亦易；久崩者，其患深，其治亦难。且凡血因崩去，势必渐少，少而不止，病则为淋，此等证候，未有不由忧思郁怒，先损脾胃，次及冲任而然者，崩淋既久，真阴日亏，多致寒热咳嗽，脉见弦数或豁大等证，此乃元气亏损，阴虚假热之脉，尤当用参地归术甘温之属，以峻培本源，庶可望生。

若素多忧郁不调之患，而见此过期阻隔，一便有崩决之兆。若隔之浅者，其崩尚轻；隔之久者，其崩必甚。此因隔而崩者也，当预服四物八珍之类以调之，否则恐其郁久而决，则为患深大也。

《妇科玉尺》：崩漏，究其源，则有六大端：一由火热，二由虚寒，三由劳伤，四由气陷，五由血瘀，六由虚弱。

十一、经行乳房胀痛

经期经后乳胀明，乳头痒痛触衣疼。

肝气郁结疏肝散，肝肾阴虚一贯能。

【注】 经期前或经期、经后，出现乳房胀痛，或乳头胀痒疼痛，甚至不能触衣者，是谓“经行乳房胀痛。”本病多由肝气郁结，气血运行不畅，脉络欠通；或因肝肾精血不足，脉络失于滋养所致。

【辨证论治】

1. 肝气郁结

〔主症〕 经前乳房胀痒作痛，胸闷胁胀，精神抑郁，时叹息，苔薄白，脉弦。

〔病机〕 肝经之脉，布胁肋，绕乳房上入颞颥，肝气郁结则脉络不畅，故乳胀，胸胁胀闷不舒。肝志怒，主疏泄，肝郁则情志抑郁时有叹息，以缓郁结之苦。

〔治法〕 疏肝解郁、理气止痛、除胀。

〔方药〕 柴胡疏肝散(《景岳全书》)。

柴胡 芍药 枳壳 炙甘草 川芎 香附 陈皮

〔方义〕 柴胡、香附疏肝解郁；枳壳、陈皮理气；川芎活血行气；芍药、甘草缓急止痛。使肝气得疏，气滞疏通，则乳胀自愈。

〔加减〕 若乳胀硬，结节形成结块者加夏枯草、王不留行、生麦芽、通络软坚散结。

若乳房胀硬触，痛甚者，加蒲公英 50 克、生麦芽 50 克、路路通 20 克，清热散结止痛。

若五心烦热，口苦咽干，尿黄便干，脉弦数者，可改服丹栀逍遥散(方见“月经先期”)加入蒲公英 50 克、地骨皮 20 克、麦芽 50 克。

2. 肝肾阴虚证

〔主症〕 经行前后两乳胀痛，两目干涩，咽干口燥，腰膝酸软，五心烦热，舌红少苔，脉细数。

〔病机〕 肝经布胁肋，过乳房，上于头，开窍于目，肝阴虚，不能滋养肝脉，故乳胀，目涩。肝为肾之府，膝为骨之干，肾阴不足，不能滋濡而腰膝酸软。阴虚则阳胜化热，虚热灼伤四肢及心胸脉络，故五心烦热，口干咽燥。舌红少津，脉细数皆阴虚之象。

〔治法〕 滋肾养肝。

〔方药〕 一贯煎(《柳州医话》)。

沙参 麦冬 生地 枸杞子 川楝子 当归

〔方义〕 方中沙参、麦冬、生地皆为滋阴生津之品，乃补养阴液之主要；当归生新血，去瘀血；川楝子疏肝理气以佐沙参、麦冬、生地之滋腻；枸杞子补肾阴之不足；阴不虚而疏泄功能恢复，则乳胀自愈。

〔加减〕 若胀痛不解,可加青皮、瓜蒌、公英、麦芽,则乳胀消失。

【验方医案】

1. 加味柴胡疏肝方(《女科临证集要》)

柴胡10克 白芍15克 香附10克 陈皮10克 枳壳10克 川楝子10克 郁金10克 路路通10克 白术10克 当归15克 橘络6克 甘草6克 水煎服。

刘某,女28岁,1979年9月7日初诊。近2年来,每月前半月,脘腹及两乳发胀,乳头疼痛不能触衣,小腹胀满疼痛,疼痛连及胸胁,烦躁易怒,经后痛止,月经周期尚准,量少,色淡,舌淡苔薄,脉弦。此肝郁气滞,经脉壅阻所致,治宜疏肝理气通络。服上方3剂,诸症减轻,又服6剂,诸症悉和。

2. 藻布夏草汤(《女科临证集要》)

海藻10克 昆布10克 夏枯草10克 甲珠6克 路路通6克 郁金10克 柴胡10克 香附10克 白芍10克 橘络6克 贝母10克 合欢10克 丹皮10克 栀子10克 石决明20克 水煎服。每天1剂。

王某,女,29岁,1980年10月4日初诊。经前两乳胀痛,且有硬块,经后胀减痛除,硬块不消。心烦易怒,头痛眩晕,耳鸣,胸闷脘痞,口苦口干,月经常先期,量多色红,质黏而稠,舌红脉弦。治宜疏肝解郁,软坚散结。以上方10剂,两乳痛减轻,乳块缩小,又服10剂乳块消失,诸症悉除。

3. 甲珠白芷方(《女科千首妙方》)

穿山甲6克 白芷6克 木通6克 王不留行6克 小茴香6克,共为粗末,包煎,每天1剂,3剂见效。

4. 公英麦芽方(程绍恩教授验方)

蒲公英50克 麦芽50克 生山楂30克 水煎服。每天1

剂,连服6剂,胀痛消失。

十二、经行发热

经行前后身发热,血热内盛清经能,
肝肾阴虚两地用,气血虚弱补中灵,
瘀热壅阻挟血块,血府逐瘀重桃红。

【注】 经期或经期前后出现发热为主症者,称为“经行发热”。发热病因病机不外为血热内盛、肝肾阴虚,气血虚弱,瘀热壅阻等病理变化。大抵血热内盛者,多有身热心烦,阴虚者多潮热,气虚者多低热怕冷,瘀热者多乍寒乍热。当审因立法,辨证施方。

【辨证论治】 临床根据发热的时间、性质以辨阴、阳、虚、实。大抵实热者,身热心烦;阴虚者多潮热;气虚者多低热怕冷;瘀热者多乍寒乍热。当审因论治。

1. 血热内盛

〔主症〕 经前或经期身热面赤,或心烦易怒,口干喜饮,尿黄便结,唇红舌赤,脉滑数。

〔病机〕 血热内盛,经前或经行气火偏旺,阳气外发,则身热面赤;热扰心胸,则心烦易怒;热灼阴津,则口干喜饮,尿黄便结。唇红舌赤,脉滑数,为血热内盛之象。

〔治法〕 清热凉血调经。

〔方药〕 清经汤(方见“月经先期”)加益母草。

2. 肝肾阴虚

〔主症〕 经期或经后,则午后潮热,两颧红赤,五心烦热,烦躁少寐,舌红而干,脉细数。

〔病机〕 经行或经后,阴血既泄,阴虚不能敛阳,阳气外

越,则见午后潮热,五心烦热。虚火上浮,故两颧红赤。热扰心神,则烦躁少寐。舌红而干,脉细数,乃肝肾精血不足,阴虚内热之象。

〔治法〕 养阴清热。

〔方药〕 两地汤(方见“月经先期”)。

3. 气血虚弱

〔主症〕 经行或经后发热,形寒,自汗,神疲肢软,少气懒言,舌淡苔白润,脉虚缓。

〔病机〕 气血虚弱,卫外之阳气失固,故发热形寒自汗。气虚中阳不振,则神疲肢软,少气懒言。舌淡苔白润,脉虚缓,乃气血虚弱之候。

〔治法〕 益气固表。

〔方药〕 补中益气汤(方见“月经先期”)。

4. 瘀热壅阻

〔主症〕 经前或经期发热腹痛,经色紫黯,挟有血块,舌黯或尖边有瘀点,脉沉弦数。

〔病机〕 瘀热交结阻碍血行,则经前、经期发热腹痛。瘀热煎熬,则经色紫黯而有血块。舌黯或尖边有瘀点,脉沉弦数,乃瘀热之象。

〔治法〕 化瘀清热。

〔方药〕 血府逐瘀汤(方见“闭经”)加入丹皮。

〔方义〕 方中四物养血活血,桃仁、红花、赤芍、牛膝活血化瘀,柴胡、丹皮凉血清热,枳壳、桔梗宣通上下气机,使气调血和,瘀去热除。

【验方医案】

1. 小柴胡汤加减方(《千家妙方》下册)

柴胡 10 克 半夏 10 克 当归 10 克 黄芩 10 克 赤芍 10

克 郁金 12 克 丹皮 10 克 竹茹 10 克 青蒿 10 克 陈皮 5 克 甘草 5 克 大枣 5 枚 生姜 3 片 水煎服, 1 天 1 剂。

高某, 女, 34 岁, 医生。1977 年 6 月 22 日初诊。

连续 3 个月经周期, 均在经前一天开始先冷后热, 体温达 38 ~ 39.5℃。入夜发作, 深夜热退, 如此连续 6 ~ 7 天至经净为罢。妇科检查无异常。西药治疗无效。经期发热口苦, 欲呕, 纳少, 舌黯苔黄, 脉弦, 诊为热入血室发热, 治宜和解少阳, 佐清血分, 以上方 6 剂未再服药, 观察 1 年未发。

2. 丹栀逍遥丸(《女科临证集要》)

当归 10 克 白芍 15 克 柴胡 10 克 白术 10 克 茯苓 10 克 甘草 6 克 薄荷 6 克 丹皮 10 克 栀子 10 克 水煎服, 每天 1 剂。

解某, 女, 27 岁。1976 年 3 月 10 日诊。月经提前, 经行不畅, 近半年来, 每次行经时身体发热, 乳房、胸胁胀痛, 心烦易怒, 舌质红, 苔黄, 脉弦数, 此气火内郁所致。服上方 6 剂而愈。

3. 经行发热医案(《孙浩铭妇科临床经验》)

陈某, 女, 39 岁, 工人。1973 年 5 月 24 日初诊。

1963 年起月经错后, 40 余天一行, 经量涩少, 历程 3 天, 伴有凝块, 每行经前 1 ~ 2 天自觉寒热, 腹痛恶心。现月经逾期数天未行, 寒热又作, 少腹疼痛, 腰酸。脉细弦, 舌质淡, 苔薄白。此为厥阴气滞, 寒湿不化, 营卫不调, 治宜和血调营。

处方: 毛柴胡 4.5 克 小桂枝 6 克(后人) 枯黄芩 6 克 泡吴萸 4.5 克 北干姜 4.5 克 香薷本 6 克 元胡索 9 克 煮半夏 9 克 秦当归 6 克(后人) 川芎 6 克 茯苓 12 克 京丹参 12 克。

次诊: 服 3 剂后, 于 5 月 30 日月经来潮, 量中等, 未见寒热, 今值行经第 3 天, 小腹微痛, 脉舌如上。照上方加苏梗 4.5 克、

香附9克,服3剂后,观察3个月,经期均无寒热发作。

经前寒热交作,脐腹疼痛,经量涩少。滑伯仁谓:“乃寒湿搏于冲任,寒湿生浊,宜辛散苦温血药。”方中桂枝、柴胡、干姜、藁本取其辛散,反佐黄芩以和解肝络,吴茱萸、元胡苦温行气止痛,煮半夏、茯苓燥化湿浊,且用丹参、当归、川芎诸血药者,令引药入血分,同收温通之效。复诊更加苏梗、香附,以行血中滞气。由于投剂中肯,寒滞尽化,故能速奏功效。

【文献选要】

各
论

《丹溪心法·妇人》:发热之中,有常时发热者,有经行发热者,则常时为血虚有积,经行为血虚有热也。

《中医临证备要·寒热往来》:妇人月经不调,经前常有忽寒忽热,头胀,胸胁胀闷等现象,系肝气或肝火郁结所致。

《医宗金鉴·妇科》:经行发热,时热潮热之病,若在经前则为血热之热,经后则为血虚之热。……属热而实者,用四物汤加黄芩、黄连清之;属热而虚者,用四物汤加地骨皮、丹皮凉之,名地骨皮饮。

十三、经行头痛

经行头痛属血虚,八珍汤加首杞菊,

肝火杞菊夏蒺藜,通窍活血治血瘀。

【注】每逢经期或经期前后,出现以头痛为主症者,多属血虚不能荣头部脉络,或肝火内盛,上攻于头,或瘀血,阻滞脉络不畅所致。

【辨证论治】

1. 血虚

〔主症〕 经期或经后,头晕头痛、心悸少寐,神疲乏力,舌淡苔薄,脉虚细。

〔病机〕 因素体血虚,化源不足,遇经行则血愈虚,血不上

荣,故头晕头痛。血不养心,则心悸少寐,神疲乏力。舌淡苔薄,脉虚细,乃为血虚之候。

〔治法〕 养心益气。

〔方药〕 八珍汤(《正体类要》),酌加枸杞、首乌,以滋阴养血。

八珍汤:当归 川芎 白芍 熟地 人参 白术 茯苓 炙甘草

〔方义〕 方中当归、川芎、白芍养血和血;熟地、枸杞、首乌养肝血,滋肾精;人参、白术、炙甘草益气健脾;茯苓健脾宁心安神。全方有养血之功,使气旺血足,自无行经头痛之疾。

2. 肝火

〔主症〕 经行头痛,甚或巅顶掣痛,头晕目眩,烦躁易怒,口苦咽干,舌质红,苔薄黄,脉弦细数。

〔病机〕 素体肝阳偏亢,经行阴血下注冲任,气火偏旺,因足厥阴肝经与督脉上会于巅,而冲脉附于肝,故肝火易随冲气上逆而致巅顶掣痛。肝火内炽,则头晕目眩,烦躁易怒口苦咽干。舌红苔薄黄,脉弦细数,均为阴虚肝热炽盛之象。

〔治法〕 养阴清热,柔肝熄风。

〔方药〕 杞菊地黄丸(《医级》)酌加苦丁茶、夏枯草、白蒺藜平肝熄风。

杞菊地黄丸:熟地黄 山萸肉 山药 泽泻 丹皮 茯苓 枸杞 菊花

〔方义〕 方中以六味地黄汤滋肾养肝,枸杞、菊花养血平肝。酌加苦丁茶、夏枯草、白蒺藜以助清肝熄风之力,使肝肾得养,肝火平熄,则头痛自除。

3. 血瘀

〔主症〕 每逢经前,经期头痛剧烈。经色紫黯有块,伴小

腹疼痛拒按，舌黯或尖边有瘀点，脉细涩或弦涩。

〔病机〕 经行以气血通畅为顺，气顺血和，自无疼痛之疾。因瘀血内停，络脉不通，阻塞清窍，则每逢经行瘀随血动，欲行不得，故头痛剧烈。血阻于胞，则经色紫黯有块，小腹疼痛，拒按。舌黯或尖边有瘀点，脉细涩或弦涩，均为血流欠通，气行不畅之象。

〔治法〕 通气活血，化瘀通络。

〔方药〕 通窍活血汤（《医林改错》）。

赤芍 川芎 桃仁 红花 老葱 麝香 生姜 大枣

〔方义〕 方中赤芍、川芎、桃仁、红花直入血分，以行血中之滞，化瘀通络；取老葱、麝香串以通上下之气，气通则血活；姜、枣以调和营卫。共奏调气活血，化瘀通络之功。

【验方医案】

1. 宣郁通经汤（《江西中医药》1987年第5期）

当归 15 克 白芍 15 克 牡蛎 15 克 丹皮 15 克 山栀子 10 克 枸杞子 10 克 生地 12 克 白蒺藜 12 克 柴胡 3 克 香附 3 克 郁金 3 克 黄芩 3 克 生甘草 3 克 水煎服。每天 1 剂。

尤某，28 岁。产后失子，嗣后每逢经期头痛如锥钻样，目眩乳胀，腰痛少腹坠痛，经量不多，紫红色，苔薄黄，舌红，脉弦，投上方 12 剂愈。

2. 补中益气汤加减（《辽宁中医杂志》1987年第5期）

炙黄芪 18 克 太子参 15 克 蔓荆子 15 克 白术 9 克 陈皮 9 克 当归 9 克 枸杞 9 克 菊花 9 克 牛膝 9 克 川芎 12 克 白蒺藜 10 克 甘草 6 克 水煎服。

陈某，38 岁，女。月经期头痛已 2 年，平素头晕，气短无力，食欲不振。舌淡少苔，脉沉弱无力。证属脾虚气弱，清阳不升所

致,以上方9剂,末次月经头痛未发。

3. 行气活血方(《女科临证集要》)

当归10克 川芎10克 乌药10克 香附10克 香橼10克 甘草6克 钩藤10克 天麻10克 白芍15克 白芷6克 丹参10克 红花10克 牛膝10克 石决明30克 水煎服。每天1剂。

武某,女,43岁。1976年8月9日诊。结婚10年未孕,月经后期,量少色黯有块,每逢临经头痛如锥钻刺,规律性发作已数年,深感痛苦。诊时正值临经前,头痛如裂,伴见胸胁乳部作胀,腰酸肢楚,小腹胀甚而痛,脉弦涩,治宜开郁行气,活血止痛。以上方,3剂头痛缓解,又服3剂诸症好转,头痛减半。又服6剂诸症消失,再次临经未发作。

4. 小柴温胆汤(《中医妇科验方选》)

柴胡9克 黄芩6克 半夏9克 党参10克 甘草6克 陈皮9克 茯苓15克 枳壳6克 竹茹15克 钩藤15克 草决明12克 白蒺藜15克

辨证属于“肝郁脾湿”性头痛者,用疏肝解郁,燥湿化痰法,用上方于每月行经前7天服,连服至经期,则头痛消失。

5. 川白全牛汤(《中医妇科验方选》)

川芎10克 白蒺藜20克 全虫6克 川牛膝15克

功能:清热疏肝,明目止痛,镇痉除头风。

主治:肝郁气滞,经前血热上行而止经期头痛,呕吐者。水煎内服,每天1剂,经前服3剂为妥,经后巩固服药10~15天。

6. 逍遥汤加减(程绍恩教授经验方)

当归10克 茯苓15克 白术10克 白芍25克 柴胡10克 薄荷10克 甘草15克 怀牛膝30克 白蒺藜25克 生石膏30克 菊花10克 蔓荆子10克

月经前1天,开始服之。连服4剂可愈。

张某,女,31岁。2年以来,每逢经期头痛如裂不可忍受,痛苦欲死,头顶墙壁呻吟不停,吭叫不止。诊其舌红,目赤脉弦数,余诊为肝郁化热,郁热上扰清窍所致。以上方4剂头痛止。随访下次临经头痛止,未再复发。

十四、经行身痛

经行身痛血虚瘀,当归补血治血虚,

寒瘀腰膝关节痛,趁痛散加寄生鸡。

【注】每逢经行前后或正值经期,出现身体疼痛为主症者,谓之经行身痛。经行身痛的病因,大致分为血虚、血寒而瘀两种证候。血虚者,可用当归补血汤治之;血寒瘀者,当用趁痛散加桑寄生、鸡血藤治之。

【辨证论治】

1. 血虚

〔主症〕经行时肢体疼痛麻木,肢软乏力,月经量少,色淡质薄,舌质淡红,苔白,脉细弱。

〔病机〕血虚不能濡养筋脉,经行时气血益感不足,则肢体疼痛麻木。血虚气弱,则肢软乏力,经行量少,色淡。舌淡苔白,脉细弱,为气血虚弱之象。

〔治法〕养血益气,柔筋止痛。

〔方药〕当归补血汤(《兰室秘藏》)。

当归补血汤:黄芪 当归加白芍 鸡血藤 山茱萸。

〔方义〕方中以黄芪、当归益气养血,白芍、鸡血藤、山茱萸养肝柔筋。共奏养血益气,缓急止痛之功。

2. 血瘀

〔主症〕经行时腰膝关节疼痛,得热痛减,遇寒疼甚,经行

量少色黯；或有血块，苔薄白脉沉紧。

〔病机〕 经行以气血通畅为顺，寒邪凝滞经络，则气血运行不畅，故腰膝关节疼痛。血得热则行，遇寒则凝滞痛甚，故得热痛减。血为寒凝则经行量少，色黯有块。苔薄白，脉沉紧，乃寒凝血瘀之象。

〔治法〕 养血祛风，散寒除痛。

〔方药〕 趁痛散(《校注妇人良方》)加鸡血藤、桑寄生。

趁痛散：当归 黄芪 白术 炙甘草 桂心 独活 牛膝 生姜 薤白

〔方义〕 方中用当归、黄芪以益气养血；白术、炙甘草健脾益气，寓气生血长之义；桂心、薤白、独活温阳散寒止痛；牛膝、寄生补肝肾；鸡血藤活血通络。

【验方医案】

1. 加味当归补血汤(《女科临证集要》)

当归 15 克 黄芪 60 克 桂枝 10 克 羌活 6 克

赵某，女，47 岁。1976 年 7 月 22 日诊。

月经延后，量少色淡，质清稀，心悸，少寐，面色苍白。近一年来，每次经行时身痛拘急，经后则止。此血虚兼夹风寒所致。服上方 20 剂后病愈。

2. 羌桂四物汤(《医宗金鉴·妇科》)

当归 15 克 川芎 10 克 酒白芍 15 克 熟地 15 克 羌活 15 克 桂枝 15 克

主治：血脉壅阻，经行不畅所致经期身痛。该方有和血活血，疏通经脉作用。

3. 黄芪建中汤(《医宗金鉴·妇科》)

黄芪 30 克 桂枝 15 克 白芍 20 克 甘草 10 克 饴糖 40 克 生姜 20 克 大枣 6 克

主治:经期经血过多,血不养身而致身痛者。

【文献选要】

《女科准绳》:外亏卫气之充养,内乏荣血之灌溉,血气不足,经后欲行,身体先痛也。

《医宗金鉴·妇科心法》:经来身体疼痛,若有表证者,酌用麻黄四物,桂枝四物等汤以发之。若无表证,乃血脉壅阻也,宜用四物汤加羌活、桂枝以疏通经络……若经行后或血去过多者,乃血不荣也,宜用黄芪建中汤补之。

十五、经行泄泻

经行泄泻水溲薄,脾肾虚损精亏夺,

脾虚参苓白术散,肾虚健固四神活。

【注】 每逢经期,或行经前后大便溲薄,甚则稀如清水,日便数次称为经行“泄泻”。其主要病位在脾、肾二脏,脾虚不能运化水湿;肾虚精亏,命门火衰,则失温煦而成泄泻。脾虚者以参苓白术散治之。肾虚者宜健固汤合四神丸治之。

【辨证施治】

1. 脾虚

〔主症〕 月经将潮,或正值经期,大便溲泄,脘腹胀满,神疲肢软,或面浮肢肿,经行量多,色淡质薄,舌淡红,苔白,脉濡缓。

〔病机〕 因脾虚不能运化水湿,湿渗大肠,则大便泄泻、溲薄,脘腹胀满。水湿泛溢肌肤,则面浮肢肿。脾阳不振,则神疲肢软。阳虚不能奉心化赤,则经色淡红质稀薄。量多者,乃为气虚不能摄血所致。舌淡红,苔白,脉濡缓均系脾虚之候。

〔治法〕 健脾益气,化湿调经。

〔方药〕 参苓白术散(《和剂局方》)。

参苓白术散：人参 白术 扁豆 茯苓 甘草 山药 莲肉 桔梗 薏苡仁 砂仁

〔方义〕 方中以人参、白术、茯苓、甘草、山药健脾益气，扁豆、莲肉、薏苡仁健脾化湿，砂仁和胃理气，桔梗载药上行。使脾气散精，水精四布，自无泄泻之疾。

〔加减〕 若脾虚肝木乘之，则腹痛即泻，兼两胁胀痛。治宜补土泻木，用“痛泻要方”（《丹溪心法》）。

痛泻要方：白术 白芍 防风 陈皮

方用白术健脾燥湿；白芍柔肝，缓急、止痛；防风搜风止泻；陈皮理气和中。全方为扶脾抑肝之剂，使土旺脾健，则痛泄自止。

2. 肾虚

〔主症〕 经行或经后，大便泄泻，或天亮前泄泻，腰膝酸软，头昏耳鸣，畏寒肢冷，经色淡，质清稀，舌淡苔白，脉沉迟。

〔病机〕 肾阳虚衰，命火不足，不能上温脾阳，水湿下注，是以泄泻，或天亮前作泻。阳虚经脉失于温煦，则畏寒肢冷。腰为肾之府，肾主骨，生髓，脑为髓海，肾虚则头晕耳鸣，腰膝酸软。肾阳虚衰，不能温养脏腑，影响血之生化，故经色淡而质清稀。舌淡苔白，脉沉迟，均为肾阳虚衰之候。

〔治法〕 温肾扶阳，暖土固肠。

〔方药〕 健固汤（《傅青主女科》）合四神丸（《校注妇人良方》）。

健固汤：党参 白术 茯苓 苡仁 巴戟天

四神丸：补骨脂 吴茱萸 肉豆蔻 五味子

〔方义〕 方中以党参、白术、茯苓、苡仁健脾渗湿，巴戟天、补骨脂温肾扶阳，吴茱萸温中和胃，肉豆蔻、五味子固涩止泻。使肾气得固，脾气健运，湿浊乃化，泄泻自愈。

【验方医案】

1. 小建中汤加减(《河南医药杂志》1980年第3期)

白芍20克 桂枝10克 白术10克 茯苓10克 党参16克 黄芪16克 山药16克 炙甘草8克 当归8克 大枣8克 饴糖15克 生姜15克 水煎服。每天1剂。

金某,女,28岁。素体虚弱,月经不调,每逢经期,腹泻纳差,呕吐,多方治疗不效。形体消瘦,语言低微,面容苍白,四肢酸软,乏力。舌淡苔薄白,脉细数,服上方10剂愈。

2. 升柴参苓白术散(《女科临证集要》)

党参30克 茯苓15克 白术10克 山药20克 莲子10克 扁豆10克 苡仁15克 砂仁10克 桔梗6克 升麻4克 柴胡5克 炙甘草6克 水煎服。

康某,女,40岁,1975年4月9日诊。

经行先期,量多色淡,质清稀,神疲肢软,心悸气短,纳差。近几个月来,每次行经时大便泄泻,舌淡苔薄,脉弱无力。此脾虚胃弱所致。服上方6剂而愈。

3. 金锁固精丸加味(《女科千首妙方》)

潼蒺藜12克 芡实12克 莲子肉12克 莲须12克 龙骨12克 煅牡蛎12克 肉豆蔻10克 补骨脂10克 五味子10克 制附子10克 每天1剂 水煎服。分3次服。

程某,女,31岁,近年来月经延期,经量或多或少,色淡质稀,每行经必腹泻,日泻5~7次不等,舌淡红,苔薄白,脉沉迟细弱证属肾气虚亏,失于固摄所致。服上方15剂愈。

4. 附子理中加桂方(《韩百龄妇科》)

人参9克 白术9克 甘草6克 干姜3克 附子6克 桂枝6克 水煎服。每天1剂,两次分服。

经前泄泻如鸭溏,肠鸣冷痛,喜温喜按,四肢厥冷,面色青

白。经色清稀如水，舌淡，苔白，脉沉迟无力。临经前服4~6剂则可愈。

【文献选要】

《医宗金鉴·妇科》：经行泄泻，乃脾虚也。若鸭溏冷痛，是寒湿也。……经来泄泻乃脾虚也，宜用理中汤。肌热渴泻，乃虚热也，宜用七味白术散。

《傅青主女科·调经》：经水将动，而脾先不固，脾经所统之血，欲流注于血海，而湿气乘之，所以先泄水而后行经也。

《叶天士女科·闭经上》：经来之时五更泄泻，如乳儿尿，此乃肾虚也。

十六、经行呕吐

经行呕吐胃逆缘，胃阴虚衰与胃寒，
阴虚益胃芦根主，胃寒香砂六君丸。

【注】 经期或行经前后，出现呕吐、哕逆者，谓之行经呕吐证。呕吐的主要病机是胃气上逆的缘故。胃阴不足，胃气虚寒皆可使胃气上而呕吐。胃阴虚者，宜益胃汤加芦根治之。胃虚寒者，可用香砂六君丸（汤亦可）治之。

【辨证论治】

1. 胃阴虚

〔主症〕 经期呕吐，胃脘灼热而痛，口干舌燥，五心烦热，盗汗，便干，少寐多梦，舌尖红，苔黄白而薄，脉细数。

〔病机〕 胃阴虚则胃阳胜，阳胜损伤胃津，而胃气不降而上逆，故呕吐，胃脘灼热。阴虚则阳胜，阳胜伤津故口干舌燥便干。手足阴经之脉，阴液不足而有手足心热，心烦。阴虚盗汗，舌脉皆谓阴虚之象。

〔治法〕 养阴益胃止呕吐。

〔方药〕 益胃汤加芦根(《温病条辨》)。

沙参 麦冬 生地 玉竹 芦根 冰糖

〔方义〕 沙参、玉竹养胃生津,生地滋阴凉血,麦冬甘寒清热,芦根和胃止呕吐。诸药相合共奏益胃生津止呕降逆之效。

2. 胃虚寒(胃阳虚)

〔主症〕 经期呕吐,胃脘隐痛,畏寒肢冷,乏力,自汗,纳少,便溏,舌淡,苔薄白,脉沉弱。

〔病机〕 经期伤血,血少阳衰,胃气虚损而不降。故上逆而吐。胃气虚郁故胃脘隐痛。阳虚生外寒,故畏寒肢冷。阳虚不卫外故乏力自汗。阳虚则胃府呆滞,水湿不化,故纳少便溏。舌淡脉弱,皆阳虚所致。

〔治法〕 温阳和胃

〔方药〕 香砂六君子丸(汤)(《和剂局方》)。

人参 茯苓 白术 炙甘草 半夏 陈皮 木香 砂仁

〔方义〕 人参温阳益胃气,补胃阳之不足,茯苓、白术健脾利湿和胃降逆。半夏、砂仁专能和胃降逆止呕吐。木香、陈皮理气化郁健胃。甘草调和诸药。上药合之共奏健脾养胃,益气和中,止呕吐之功效。

【验方医案】

1. 附子理中汤加味(《四川中医》1980年第5期)

附子10克 党参18克 白术15克 干姜8克 半夏15克 茯苓20克 炙甘草8克 生姜15克 水煎服。

刘某,女,19岁。体质丰肥,平素甚为恶寒,吐涎频作。近年来每月于月经来潮前10天左右,发生不明原因之呕吐,若弯腰活动即发头目昏黑,眩晕恶心呕吐,发作后卧床休息3天即不药而愈。舌淡胖嫩,苔薄润,脉沉迟无力,予以上方20剂而告痊愈。

2. 橘半芦麦方(程绍恩教授临床经验)

橘红 20 克 麦冬 20 克 半夏 20 克 竹茹 15 克 生甘草 15 克 生姜 25 克 芦根 100 克 水煎服,每天 1 剂。分 3 次服。

张某,女,27 岁。月经愆期,乏力,气短,动则自汗,咳嗽,痰多。每逢经期前两天即恶心,胃脘部嘈杂,随即吐出,食物本色不变。吐后自感胃部宽松。舌淡嫩,齿痕多,苔滑润而薄白,脉沉缓。诊:素有痰湿,胃气不和。于呕吐发作时服上方 4 剂而愈。下次临经期前后再未复发。

【文献选要】

《医宗金鉴》:经行呕吐是胃弱也。若呕出涎饮,则是伤饮。若吐出食物则是伤食。若伤食者多痛而吐食。伤饮者,不吐而呕饮也。……呕饮痰水,乃虚湿也,宜用香砂六君子汤。

十七、经行吐衄

经行吐衄名逆经,肝经郁火上攻冲,

清肝引经汤为主,肺肾阴虚顺经通。

【注】每逢行经前后,或正值经期,出现吐血或衄血者为“经行吐衄”古人称此为之“逆经”。其主要病因是肝经郁火上逆灼伤脉络所致,方宜清肝引经汤治之。若因肺肾阴虚虚火上炎损伤肺络而致肺窍出血者,方宜顺经汤治之,其经血则通调下行矣。

【辨证论治】

1. 肝经郁火

〔主症〕 经前或经期吐血、衄血,量较多,色鲜红,心烦易怒,或两胁胀痛,口苦咽干,头晕耳鸣,尿黄便结,月经可提前,量少甚或不行。舌红苔黄,脉弦数。

〔病机〕 证属肝经郁火,值经前或行经之时,冲气挟肝火

上逆,热伤阻络,血随气升,故吐血、衄血,量较多而色红。热扰冲任,则经期亦屡超前。因吐血,衄血较多,故经行量少,甚至不行。两胁为肝经所布,肝气郁结,则两胁胀痛。肝郁化火,则心烦易怒,口苦咽干。肝火上扰则头晕耳鸣。热灼阴津,则尿黄便结。舌红苔黄,脉弦数,为肝热内盛之象。

〔治法〕 疏肝清热,引血下行。

〔方药〕 清肝引经汤(《中医妇科学》四版教材)。

当归 白芍 生地 丹皮 栀子 黄芩 茜草 牛膝 甘草 川楝子 白茅根

〔方义〕 方中当归、白芍养血柔肝,生地、丹皮凉血清热,栀子、黄芩清热降火,川楝子疏肝理气,茜草,白茅根佐以生地以增清热凉血之功,牛膝引血下行,甘草调和诸药。

〔加减〕 若兼小腹疼痛者,为瘀阻胞中,于上方中加桃仁、红花以活血祛瘀止痛。

2. 肺肾阴虚

〔主症〕 经前或经期吐血、衄血,量少,色黯红。平素可有头晕耳鸣,手足心热,两颧潮红,潮热咳嗽,咽干口渴。月经每先期、量少。舌红或绛,苔花剥或无苔,脉细数。

〔病机〕 肺肾阴虚,虚火上炎,损伤肺络,故血上溢而为吐血、衄血,量少,色鲜红。阴虚内热,故头晕耳鸣,手足心热,潮热,两颧潮红。热伤胞络,故月经先期、量少。灼肺伤津,则咽干,口渴,咳嗽。舌红绛,苔黄剥或无苔,脉细数,为阴虚内热之象。

〔治法〕 滋肾润肺,引血下行。

〔方药〕 顺经汤(《傅青主女科》)加牛膝。

顺经汤:当归 熟地 沙参 白芍 茯苓 黑荆芥 丹皮

〔方义〕 方中当归、白芍养血调经,沙参润肺,熟地滋肾养肝,丹皮清热凉血,茯苓健脾宁心,黑荆芥引血归经,牛膝引血

下行。

【验方医案】

1. 平肝清热方(《刘奉五妇科经验》)

白茅根 30 克 藕节 30 克 丹皮 6 克 胆草 9 克 牛膝 12 克 黄芩 9 克 枳壳 6 克 麦冬 9 克 栀子 9 克

钟某, 20 岁。经期鼻衄已 6 年。于 12 岁月经初潮, 月经周期提前 10 天, 量少色黑, 行经 2 天, 经行鼻衄, 每遇情志影响则衄血量较多, 有血块。经期烦躁易怒, 头晕。平素白带量多, 腰痛, 腹痛, 末次月经 9 月 8 日行经 1 天。舌边尖红, 脉弦滑。诊为肝旺血热, 逆经倒行。治以平肝清热。服上方后, 10 月 15 日经潮, 未见倒经, 月经正常, 未见腹痛。随访半年余, 未再发生倒经现象。

2. 滋阴降逆汤(《中国当代名医验方大全》)

生地 15 克 旱莲草 15 克 鲜荷叶 15 克 丹皮 9 克 白芍 9 克 茯苓 12 克 泽泻 9 克 怀牛膝 6 克 麦冬 9 克 山药 15 克 甘草 3 克 水煎服, 每天 1 剂。2 次分服。

马某, 女, 20 岁。13 岁月经初潮, 一向错后, 3~6 月一行。但每月均有周期性鼻衄, 量少。平时头晕, 腰酸, 夜难入寐, 如经行于下则鼻衄即止。苔薄白, 舌尖红; 脉弦细数。证属阴血不足, 虚火上炎, 每月经前服 6 剂, 连服 3 个月, 经行正常, 疗效巩固。

3. 归脾汤加味(《江西中医药》1985 年第 5 期)

黄芪 30 克 白术 10 克 茯神 10 克 枣仁 10 克 杞果(或桂圆肉) 10 克 远志 6 克 红参 6 克 炮姜 6 克 炙甘草 6 克 当归 9 克 生姜 9 克 红枣 4 枚 水煎服。1 天 1 剂。

张某, 女, 38 岁。月经量多, 色淡, 鼻衄如涌, 有时竟从口出, 经净衄止。伴心悸、气短、头晕、眼花, 面色萎黄, 舌淡胖, 脉

沉而细。此乃心脾两虚，统摄无权。服上方 5 剂经净衄止。归脾丸 20 丸，每服 1 丸，每天 2 次善后，经行正常。

4. 血府逐瘀汤加减(《四川中医》1989 年第 1 期)

柴胡 12 克 枳壳 12 克 牛膝 12 克 玄胡 12 克 桃仁 9 克 红花 9 克 当归 9 克 川芎 9 克 生地 6 克 赤芍 6 克 甘草 3 克 水煎服。每日 1 剂，分 2 次服用。

刘某，18 岁。3 年前，月经初潮时，经量点滴，紫暗色，伴鼻衄血。3 天后月经止，鼻衄亦止，嗣后月经期，鼻衄量多，继之每月周期性，每月 1 次鼻衄而无月经，多方求医无效，时有两胁肋及少腹胀痛，而每以周期来临时加剧，舌质淡红，舌边有瘀血点。证属肝气不舒，气滞血瘀服药 2 剂后，月事而下，未鼻衄。继服 4 剂，随访 7 年无复发。

5. 凉血降逆方(《中医医案医话集锦》)

龙胆草 9 克 黄芩 9 克 山栀子 7.5 克 生地炭 18 克 元参 18 克 白茅根 15 克 牛膝 9 克 丹皮 9 克 甘草 3 克 水煎服，每天 1 剂 2 次分服。

孙某，女，18 岁，学生。素性急躁，经来之前，胁腹胀痛，出现鼻衄，衄量甚多，心烦易怒，继则月经来潮。常伴有口苦耳鸣，舌淡红，苔黄，脉弦数。证属肝郁化火，血随火动上逆所致。服上方 3 剂，衄血止，各种症状消失。

6. 倒经汤(《千家妙方·下册》)

生地 30 克 丹皮炭 12 克 炒山栀 9 克 荆芥炭 9 克 牛膝炭 15 克 炒黄芩 9 克 珍珠母 30 克 生甘草 3 克 水煎服，每天 1 剂。

于周期性，吐衄前服完 5 剂。如未收效，于下个月周期性吐衄前再煎服 5 剂。共治疗 13 例。其中未婚 9 例，已婚 4 例，年龄均在 35 岁以内。服药 5 剂，治愈 4 例。服药 10 剂的治愈 3

例。服药 15 剂的治愈 3 例。服药 20 剂的治愈 1 例。无效者 2 例。

7. 顺经散(《中医妇科学方选》)

当归 9 克 白芍 9 克 生地 15 克 牛膝 15 克 白茅根 30 克 黄芩 10 克 山梔 10 克 水煎服。每次衄血前 3~5 天,连服 3~5 剂。到月经来潮止。一般需要用 2~3 个月为 1 个疗程。

8. 茅地顺经饮(《中医妇科学方选》)

白茅根 60 克 生地炭 10 克 生地榆 10 克 丹皮 10 克 牛膝 10 克 水煎服。

9. 肾虚肝热逆经方(《精选千家妙方》)

旱莲草 12 克 怀牛膝 9 克 柴胡 3 克 鲜生地 24 克 焦梔子 9 克 炒当归 6 克 炒赤芍 6 克 焦楂炭 9 克 丹参 9 克 白茅根 15 克 水煎服。每天 1 剂,分两次服。

【文献选要】

《类证治裁·经闭》:按月倒经,血出口鼻,此由肝火上迫,不循常道也……倒经:经期气逆,直犯清道而为吐衄,宜折其逆势而调之。用山梔子,丹皮、生地、丹参、白芍、苏子、郁金、童便服之。因怒火伤肝致逆经者,龙胆、丹皮、青皮、黄芩、白芍、山梔。因心气不足,衄血面黄者,茯苓补心汤。

《沈氏女科辑要笺正·月事异常》:倒经一证,亦曰逆经,乃有升无降,倒行逆施,多由阴虚于下,阳反上冲,非重剂抑降,无以复其下行为顺之常。甚者且须攻破,方能顺降。盖气火之上扬,为病最急。

十八、经行口糜

每逢经期口舌糜，阴虚火旺知柏与，
胃火熏蒸口干臭，凉膈甘露二方奇。

【注】 每逢经期或行经前后，出现口舌糜烂者，是谓“经行口糜”。该病主要原因是阴虚，火旺灼伤所致，可给予知柏地黄丸降火滋阴而愈。若胃热熏蒸所致口干臭者，可用凉膈散或为甘露消毒丹二方有奇效。

【辨证论治】

1. 阴虚火旺

〔主症〕 经期口舌糜烂，口燥咽干，五心烦热，尿少色黄。舌红苔少，脉细数，均为阴虚内热之征。

〔病机〕 阴虚火旺，火热乘心，则经期口舌糜烂。阴津不能上乘，则口燥舌干。阴虚不能敛阳，则五心烦热。内热灼伤津液，则尿少色黄。舌红苔少，脉细数，均为阴虚内热之征。

〔治法〕 滋阴降火。

〔方药〕 知柏地黄汤（《症因脉治》）。

熟地黄 山萸肉 山药 泽泻 丹皮 茯苓 知母 黄柏

〔方义〕 方中熟地、山萸肉、山药补肝肾之阴，知母、黄柏、丹皮清肾中伏火，佐茯苓、泽泻引热由小便下行。

2. 胃热熏蒸

〔主症〕 经行口舌生疮，口臭、口干喜饮，尿黄便结，舌苔黄厚，脉滑数。

〔病机〕 口为胃之门户，胃热炽盛，熏蒸于上，则口舌生疮，口臭口干。热盛灼伤津液，则尿黄便结。苔黄厚，脉滑数，均为胃热炽盛之象。

〔治法〕 清热泻火，荡涤胃热。

〔方药〕 凉膈散(《太平惠民和剂局方》)。

大黄 朴硝 甘草 山栀 薄荷叶 黄芩 连翘 竹叶

〔方义〕 方中朴硝,大黄清热泻下,连翘、栀子、竹叶、黄芩清热解毒,甘草缓急和中,薄荷清上。全方咸寒苦甘,清热泻下,则胃热自清,口糜自愈。

〔加减〕 若脾虚湿热内盛者,则口糜或口唇疱疹,脘腹胀满,大便溏臭。治宜芳香化浊,清热利湿,方用甘露消毒丹(《温热经纬》)。

甘露消毒丹:飞滑石 绵茵陈 黄芩 石菖蒲 川贝母 木通 藿香 射干 连翘 薄荷 白豆蔻

〔方义〕 方中藿香、石菖蒲、薄荷、白豆蔻芳香化湿,宣泄气机;黄芩、连翘清热解毒;滑石、木通、茵陈利湿清热;射干、贝母散结泻火。全方清热于湿中,渗湿于热下,使湿化清热,气机得宣,诸证自除。

【验方医案】

1. 地麦玄芍方(程绍恩教授临床验方)

生地 15 克 麦冬 15 克 玄参 15 克 白芍 10 克 甘草 5 克 贝母 5 克 薄荷 10 克 丹皮 10 克 金银花 15 克 蒲公英 30 克 板蓝根 20 克 水煎服。每日 1 剂,3 次分服。

丛某,女,34 岁。月经愆期,每逢月经临潮,出现口舌糜烂,已 2 年之久,并常伴有口臭,五心烦热,乏力,盗汗,舌红苔黄,脉细数。诊为阴虚内热。以增液解毒为法,以上方 4 剂而愈。下次月经期间,口糜未复发。

2. 辨证施方(《罗元恺医著选》)

杜某,女,39 岁,已婚,医院职工。于 1973 年 6 月 29 日初诊。

患者曾足月顺产两胎。近年余,经前后头顶痛,口舌生疮,经后面目虚浮,胃纳差,平素血压偏低,曾患梅尼埃综合征。月

经周期常提前四五天,量中等,末次月经6月24日。现经水适净,面色较黄,舌质淡红,苔薄白,脉细弱。

辨证:血虚肝旺,虚火上炎,兼有脾虚。

治则:滋肾养肝为主,佐以健脾益气。

处方:熟地15克 生地15克 女贞子15克 怀山药25克 党参15克 太子参15克 甘草6克 生龙骨30克 3剂,每天1剂。

另,冰硼散1瓶,蜜调外涂口舌溃烂处。

各 7月27日二诊:本次月经刚净2天,口舌生疮较前减轻,但
论 头痛仍剧,至今未止,舌心红,脉弦细。

治则:滋肾益阴,佐以平肝潜阳。

处方:熟地15克 生地15克 黄精30克 杞子15克 白芍12克 山药15克 钩藤15克 杭菊花10克 4剂,每天1剂。

8月10日三诊:月经将潮,烦躁,口微苦,唇舌各有一溃疡面,巅顶痛稍减,舌苔微黄,脉弦细。

治则:滋肾柔肝养血。

处方:生地25克 黄精30克 桑椹子15克 怀山药20克 白芍15克 郁金12克 桑寄生20克 制首乌15克 4剂,每天1剂。

10月5日四诊:近2月来,经前服上方加减5~6剂,经前后头顶痛显著减轻,口舌生疮已除,仍守前法。

处方:熟地20克 黄精30克 女贞子15克 白芍12克 制首乌25克 天麻9克 白芷9克 怀山药20克。陈皮5克 生龙骨30克 4剂,每天1剂。追踪5年无复发。

十九、经行风疹块

经行风疹成块团，瘙痒异常忍受难，
血虚当归饮子主，风热消风散可痊。

【注】每逢行经期间，周身皮肤出现瘙痒，异常难以忍受，而皮肤发红，出现丘疹、成块、成团，搔之随之出现红色成条样凸起皮肤，如画地图形，经净疹退者谓之。本病多由血虚风热等因而病。

【辨证论治】

1. 血虚

〔主症〕 经行风疹频发，瘙痒难忍，入夜尤甚，面色不华，肌肤枯燥，舌淡红苔薄，脉虚数。

〔病机〕 营阴不足，血虚生风，风胜则痒。经行时阴血愈虚，故风疹频发。因血属阴，故入夜痒甚。血虚不能上荣于面，则面色无华。血虚肌肤失荣，则肌肤枯燥。舌淡红，苔薄脉虚数，均为血虚生风之象。

〔治法〕 养血疏风。

〔方药〕 当归饮子(《证治准绳》)。

当归 川芎 白芍 生地 防风 荆芥 黄芪 甘草 白蒺藜 何首乌。

〔方义〕 方中四物汤加何首乌、荆芥、防风养血祛风，白蒺藜疏肝泄风，黄芪、甘草益气固表，扶正达邪。

2. 风热

〔主症〕 经行身发红色风团，疹块，瘙痒不堪，感风遇热，其痒尤甚，口干喜饮，尿黄便结，舌红苔黄，脉浮数。

〔病机〕 风热相搏，邪郁肌腠，则身起红色风团，瘙痒异常。热甚伤津，则口干喜饮，尿黄便结。舌红苔黄，脉浮数，均为

风热内盛之象。

〔治法〕 疏风清热。

〔方药〕 清风散(《外科正宗》)。

荆芥 防风 当归 生地 苦参 炒苍术 蝉蜕 木通
胡麻仁 生知母 煅石膏 生甘草 牛蒡子

〔方义〕 方中当归、生地、荆芥、防风、牛蒡子、蝉蜕养血清
热泄风;苦参、苍术燥湿清热解毒;胡麻仁养血润燥;知母、石膏
清热泻火;木通、甘草清火利尿,导热由小便下行。

【验方医案】

1. 丹栀逍遥散加味(《陕西中医学院学报》1985 年第 3 期)

丹皮 10 克 焦栀子 10 克 茯苓 10 克 杏仁 10 克 白蒺
藜 10 克 防风 10 克 生地 12 克 当归 12 克 白芍 12 克
柴胡 6 克 蝉蜕 6 克 蛇蜕 6 克 生甘草 6 克

刘某,女,28 岁,近 3 个月来,每逢经前 1~3 天,风团遍身
群起,奇痒难忍。询知月经周期不准,伴有乳房、小腹胀痛,心烦
易怒,小便黄;舌质红苔薄黄,脉数。证属肝郁化火,木火刑金,
肺气失宣,邪热郁于肌肤所致。嘱患者每月经前 1 周服上方 6
剂,经来则停。因经期不准第 1 月仅服 2 剂,症状减轻,第 2 月
服 5 剂,皮疹大减,又连服 2 月,经准疹消,1 年后随访痊愈。

2. 二仙汤加味(《男女科病千首妙方》)

仙茅 12 克 仙灵脾 12 克 女贞子 12 克 当归 10 克 知
母 10 克 巴戟天 10 克 黄柏 6 克 蛇蜕 6 克 蝉蜕 6 克 炙
甘草 3 克

张某,女,36 岁。每逢经期来潮前周身出现片状荨麻疹,至
经后 3~4 天方退。经期推后,伴小腹隐痛,月经色淡量少,腰脊
酸楚,头昏耳鸣,多方治疗无效。舌质淡红,苔薄白,脉沉细无
力。证属肝肾亏损,肌肤失濡,生风化燥。治宜滋补肝肾,祛风

化燥。于经期5天始服药,每天1剂,连服6剂。第2月药后疹退,月经正常。又服3月固期效。半年后询访正常。

3. 经期荨麻疹腹泻方(《中医妇科验方选》)

丹皮10克 赤芍12克 马齿苋30克 鳖甲12克 地肤子10克 白茅根30克 生甘草10克 水煎服,每天1剂(忌食辛辣刺激性食物)。

对经期荨麻疹,痒不可忍,腹泻及食欲减退者有效。

二十、经行眩晕

每逢经期头晕眩,血虚归脾汤可痊,

阴虚阳亢钩藤饮,痰湿半白天麻丸。

【注】 每逢经期,或行经前后,出现头目眩晕或视物昏花,伴随月经周期发作者是为本病。其病因有血虚所致心脾不足,宜归脾汤治之;阴虚阳亢致眩者,宜天麻钩藤饮,若脾虚挟痰,湿痰内阻致眩者,宜半夏白术天麻丸(汤)治之。

【辨证论治】

1. 血虚

〔主症〕 经行或经后,头目眩晕,经行量少,色红质稀,面色萎黄,或㿔白无华,心悸少寐,舌质淡,苔薄白,脉细弱。

〔病机〕 血虚不能上荣,则头目眩晕。血虚经血来源不足,则经行量少,色淡红质稀。血虚不能上荣于面,则面色萎黄或㿔白无华。血不营心则心悸少寐。舌质淡,苔薄白,脉细弱,均为血虚之候。

〔治法〕 养心益脾。

〔方药〕 归脾汤(《校注妇人良方》)加枸杞、制首乌。

人参 炒白术 炒黄芪 元肉 茯神 当归 远志 炒酸枣仁 木香 炙甘草 生姜 大枣

〔方义〕 方中人参、黄芪、白术、炙甘草益气健脾，当归、枸杞、首乌滋阴养血，茯苓、远志、枣仁、元肉宁心安神，广木香，生姜、大枣醒脾理气和胃，使脾健则血长，眩晕自愈。

2. 阴虚阳亢

〔主症〕 经行头晕目眩，量多色鲜红，烦躁易怒，口干咽燥，舌红苔黄，脉弦细数。

〔病机〕 阴虚阳亢，风热上扰清窍，则经行头晕目眩，阴虚生内热，热盛迫血妄行，故经行量多色红。阴虚不能敛肝，则烦躁易怒，阴虚津液不能上承，则口干咽燥。舌红苔黄，脉弦细数，均为阴虚阳亢之象。

〔治法〕 滋阴潜阳。

〔方药〕 天麻钩藤饮(《杂病证治新义》)。

天麻 钩藤 山栀 黄芩 杜仲 生石决 川牛膝 益母草 桑寄生 夜交藤 朱茯神

〔方义〕 方中用天麻、钩藤、石决明平肝潜阳，杜仲、桑寄生补益肝肾，山栀、黄芩清肝泻火，益母草入血分以清风热，川牛膝引热下行，辅以夜交藤、朱茯神宁心安神。

3. 脾虚挟痰

〔主症〕 经行前后，头晕沉重，胸闷泛恶，少食多寐，苔白腻，脉濡滑。

〔病机〕 脾虚湿盛，聚而成痰，痰湿交阻，清阳不升，浊阴不降，以致头晕沉重。痰浊停阻中焦，气机不利，故胸闷恶心。脾阳不振，则少食多寐。苔白腻，脉濡滑，乃痰湿内蕴之征。

〔治法〕 宜健脾温阳，化湿祛痰。

〔方药〕 半夏白术天麻汤(《医学心悟》)。

半夏 白术 天麻 陈皮 茯苓 生姜 炙甘草 蔓荆子 大枣

〔方义〕 方中二陈汤化湿除痰，白术健脾，天麻熄风化痰，蔓荆子载药上行而止头痛，姜枣调和营卫。

〔加减〕 若痰郁化火，症见头目胀痛，心烦口苦，舌苔黄腻，脉弦滑者，可于方中加黄芩、竹茹以清热涤痰。

【验方医案】

1. 补中益气生脉方(程绍恩临床验方)

黄芪 20 克 党参 20 克 甘草 5 克 升麻 10 克 柴胡 10 克 当归 15 克 白术 15 克 陈皮 15 克 五味子 10 克 麦门冬 15 克 荆芥穗 10 克 薄荷 5 克 菊花 5 克 水煎服，每天 1 剂。

谢某，女，28 岁。月经愆期不定。每逢头晕目眩加重时，则月经应之而来。面晄白，唇白，乏力，心悸、气短，动则自汗。纳呆，少食。舌淡少苔，脉虚无力。诊为中气不足，阳气不升而致。以上方药服 4 剂而愈。下次临经之际，未见头晕。

2. 桂枝茯苓丸加味(《中医妇科验方选》)

桂枝 9 克 桃仁 9 克 丹皮 9 克 茯苓 12 克 白芍 10 克 代赭石 12 克 橘皮 15 克 半夏 9 克 水煎服。

专治经期眩晕、呕吐、目不敢睁者，连服 3~4 剂，可用 3 个月经周期，有温经活血，下气降逆，止晕之功效。忌食生冷及辛辣之物。

二十一、经行浮肿

经行浮肿脾肾虚，苓桂术甘化水湿，

脘闷胁胀汤八珍，属于气滞与血瘀。

〔注〕 每逢经期前后，或正值经期，头面四肢出现浮肿者谓之本病。其浮肿病因有脾肾阳虚和气滞血瘀两种。脾肾阳虚者，宜苓桂术甘汤化气利水渗湿，加补骨脂、川芎、巴戟天，以增加温肾升阳之功。若气滞血瘀而致浮肿者，可用八珍汤加泽兰、

茯苓皮治之。

【辨证论治】

1. 脾肾阳虚

〔主症〕 经行面浮肢肿，腹胀纳减，腰膝酸软，大便溏薄，经行量多，色淡红质薄，舌苔白腻，脉沉缓，或濡细。

〔病机〕 脾肾阳虚，水湿泛溢，则见四肢浮肿。脾虚失运，则纳减腹胀，大便稀溏。腰为肾府，肾虚则腰膝酸软。肾阳虚损，经血失固，则经行量多、色淡红质薄。舌淡苔白腻，脉沉缓或濡细，乃为阳虚不足之候。

〔治法〕 温肾，健脾，利水。

〔方药〕 苓桂术甘汤(《伤寒论》)加补骨脂、川芎、巴戟天。

白术 茯苓 桂枝 甘草

〔方义〕 方用白术、茯苓健脾利水，补骨脂、巴戟天、桂枝温阳化气行水，川芎理血中之滞，佐以甘草调和脾胃。共奏温肾健脾，化气利水之功。

2. 气滞血瘀

〔主症〕 经行肢体肿胀，脘闷胁胀，善叹息，苔薄白、脉弦细。

〔病机〕 气滞血行不畅，则肢体肿胀。苔薄白，脉弦细，均为气滞血瘀之征。

〔治法〕 理气活血。

〔方药〕 八物汤(《济阴纲目》)加泽兰、茯苓皮。

当归 川芎 芍药 熟地 延胡索 川楝子 炒木香 槟榔

〔方义〕 方中四物汤以养血活血，延胡索行血中之滞，泽兰活血消肿，川楝子、木香、槟榔疏肝理气。气行则血行，以收理气消肿之效。

【验方医案】

1. 猪苓汤加减(《女科病千首妙方》)

猪苓 12 克 泽泻 12 克 滑石 10 克 桑皮 10 克 阿胶 10 克 麦冬 10 克 白术 10 克 佩兰 10 克 参须 4 克 水煎服。

谭某,女,34 岁。患暑热,入院治疗。大势已刹,余焰将清之际,突经水早泛,量多,面目浮肿,口燥而渴,微咳而呕,溲短急而频。舌尖红,苔薄白,脉细数,以上方 4 剂愈而未发。

2. 肝郁脾湿方(《四川中医》1989 年第 3 期)

柴胡 12 克 枳壳 12 克 陈皮 12 克 白芍 15 克 泽泻 15 克 白术 18 克 香薷 6 克 桔梗 10 克 甘草 5 克 茯苓皮 20 克 薏苡仁 30 克

刘某,女,42 岁。经行则全身浮肿 3 年。乳房及小腹胀痛,纳差,精神疲乏,动则汗出。腰痛,性情忧郁,暖气。舌淡苔白,脉弦缓。证属肝气郁结,脾虚湿盛。

令刘某每次行经前连服 5 剂,4 个月后,月经周期正常病告痊愈。

二十二、经行情志异常

经行情异怒躁烦,悲哭自语夜不眠,

肝郁气滞逍遥散,痰火铁落饮涤痰。

【注】每逢经期前后,或正在经期,出现烦躁易怒,悲伤啼哭,或喃喃自语,彻夜不眠等证,为“经行情志异常”。若因肝气郁结而致病者,宜逍遥散治之。若因痰火上扰所致者,宜生铁落饮,以清热涤痰自愈。

【辨证论治】

1. 肝气郁结

〔主症〕 精神抑郁不乐,情绪不宁,胸闷胁胀,不思饮食,

苔薄腻，脉弦细。

〔病机〕 病因为情志所伤，肝失条达，故精神抑郁，情绪不定。足厥阴肝经布胁肋，肝郁气滞，则胸闷胁胀。肝气犯脾，故不思饮食。苔薄腻，脉弦，为肝郁之象。

〔治法〕 疏肝解郁。

〔方药〕 逍遥散（方见“月经先后无定期”）。

2. 痰火上扰

〔主症〕 狂躁不安，头痛失眠，面红目赤，心胸烦闷，舌红或绛，苔黄厚或腻，脉弦大滑数。

〔病机〕 痰火内扰神明，则狂躁不安，头痛失眠。肝热痰火上扰清窍，故面红目赤。痰火结于胸中，则心胸烦闷。舌红或绛，苔黄厚或腻，脉弦大滑数，均属痰火内盛，阳气独亢之象。

〔治法〕 清热涤痰。

〔方药〕 生铁落饮（《医学心悟》）。

天冬 麦冬 贝母 胆南星 橘红 远志 连翘 茯苓
茯神 玄参 钩藤 丹参 辰砂 石菖蒲 生铁落

〔方义〕 方中生铁落重镇降逆，胆南星、贝母、橘红清热涤痰，菖蒲、远志、辰砂宣窍安神，二冬、玄参、连翘、钩藤养阴清热。使热去痰除，则神清志定而病自除。

【验方医案】

1. 桃仁承气汤加味（《湖南中医杂志》1988年第4期）

桃仁 12 克 大黄 10 克 丹皮 10 克 赤芍 10 克 桂枝 6 克 芒硝 6 克 炙甘草 3 克 知母 9 克 水煎服。1 天 1 剂。

刘某，女，24 岁。半年前与人发生口角，彻夜不眠，翌日清晨起床后，呆立不语，第 3 天恰逢月经来潮，月经过后，诸症不治而愈。从此以后，每到月经来潮，即发作四五天，某院诊断为周期性精神病。多方治疗无效。月经量少而黑，口舌干燥，舌红苔

黄,脉弦大而数。证属下焦蓄血症。用上方治疗两个月经周期而愈。

2. 疏肝理气导痰开窍方(《四川中医》1990年第1期)

柴胡 10 克 当归 10 克 白芍 10 克 茯神 10 克 丹皮 10 克 菖蒲 10 克 郁金 10 克 桃仁 10 克 香附 10 克 路路通 10 克 丹参 15 克 姜黄 15 克 龙骨 30 克 牡蛎 30 克 浮小麦 30 克 甘草 6 克 水煎服。每天 1 剂。

张某,女,32岁。素性沉郁。2年前因情绪而致月经失调,先后不定。经量少,色黑小腹痛,每逢月经前狂躁,言多,哭笑无常,甚则寻绳自杀,经后逐渐平静,舌红紫,苔薄黄,脉细弦。证属肝郁失志,痰气互结,蒙蔽心窍。治以疏肝理气,导痰开窍,佐以活血化瘀。服上方 21 剂,连续 3 个月经周期愈。

二十三、绝经前后诸证

绝经前后诸证全,晕鸣热汗悸失眠,
经乱长短或浮肿,纳呆便溏怒躁烦,
肾阴不足左归饮,肾阳不足右归丸。

【注】有些妇女,在绝经前后,出现多种多样的症状,这些不可命名的表现又称之为更年期。如眩晕、耳鸣、烘热汗出、心悸失眠、经期紊乱,或长或短。或有浮肿、纳呆便溏、急躁易怒、烦躁不安等表现。

其主要病机是肾的阴阳虚损所致。故在治疗上,属于肾阴虚者宜左归饮;肾阳不足者,以右归丸治之。

【辨证论治】

1. 肾阴虚

〔主症〕 头目眩晕、耳鸣,头部、面颊阵发性烘热,汗出,五心

烦热,腰膝酸痛,或月经先期或后期不定,经色鲜红,量或多或少,或皮肤干燥、瘙痒,口干,大便干结,尿少色黄,舌红少苔,脉细数。

〔病机〕 肾阴虚不能上荣于头目脑髓,故头目眩晕而耳鸣;阴不维阳,虚阳上越,故头面烘热,汗出,五心烦热;肾虚则腰膝酸痛;肾阴虚冲任失调,则月经先期或后期、多少不定。阴虚血燥生风,故皮肤干燥或瘙痒;阴虚内热,故口干便秘潮短赤;舌红少苔脉细数均为阴虚之象。

〔治法〕 滋养肾阴,佐以潜阳。

〔方药〕 左归饮(《景岳全书》)加制首乌、龟版。

熟地 山药 枸杞 山茱萸 茯苓 炙甘草

〔方义〕 方中熟地、枸杞、山茱萸,制首乌益肝肾,补精血以滋先天;山药、茯苓、炙甘草健脾和中,补后天以养先天;龟版育阴潜阳,补益冲任。

〔加减〕 如皮肤瘙痒者,可酌加蝉蜕、防风、海桐皮、玉竹以润燥疏风。头痛、眩晕者,可酌加天麻、钩藤、石决明以平肝熄风,或再加牛膝、桑寄生以引血下行。

若肝肾阴虚,肝阳上亢,而兼烦躁易怒,胁痛口苦,失眠多梦者,宜滋肾柔肝,育阴潜阳,方用左归饮合二至丸(方见“经期延长”)加龟版、郁金。

若肾水不能上济心火,以致心肾不交,而见心悸怔忡,失眠多梦,健忘,甚或情志失常者,宜滋肾宁心安神,可兼服补心丹(《摄生秘剖》)。

补心丹:生地 玄参 麦冬 天冬 党参 丹参 茯神 枣仁 远志 五味子 柏子仁 桔梗 当归 为蜜丸,朱砂为衣。

2. 肾阳虚

〔主症〕 面色晦黯,精神萎靡,形寒肢冷,腰膝酸冷,纳呆

腹胀,大便溏薄,或经行量多,或崩中暴下,色淡或黯,有块,面浮肢肿,夜尿多或尿频失禁,或带下清稀,舌淡,或胖嫩边有齿印,苔薄白,脉沉细无力。

〔病机〕 肾阳虚惫,命门火衰,阳气不能外达,经脉失于温煦,故面色晦黯,精神萎靡,形寒肢冷,腰膝酸冷;肾阳既虚,则不能温煦脾阳,脾失健运,故纳呆腹胀,大便溏薄;肾虚冲脉不固,则经行量多或崩中暴下,肾与膀胱相为表里,肾阳虚则膀胱气化无力,而水道莫制,故小便频或失禁,夜尿多。面浮肢肿,舌质淡或胖嫩,苔薄白,脉沉细无力,均为肾阳虚之象。

〔治法〕 温肾扶阳,佐以温中健脾。

〔方药〕 右归丸(方见“崩漏”)合理中丸(《伤寒论》)。

理中丸:党参 白术 干姜 炙甘草

〔方义〕 方中熟地、山茱萸、枸杞滋养肝肾;附子、肉桂、干姜、鹿角胶、杜仲、菟丝子温补肾阳;党参、白术、山药、炙甘草健脾益气;当归养血调经,如便溏者,可去之,酌加肉豆蔻以温涩止泻。

〔加减〕 温肾药物可用补骨脂、仙灵脾、仙茅、覆盆子等,较之附、桂更适用于本病。

如肾阴阳俱虚,错杂并见,时而见畏寒、时而见烘热汗出,头晕耳鸣,腰酸乏力,舌苔薄,脉细。治宜补肾扶阳,益养冲任。方用二仙汤(《中医方剂临床手册》)合二至丸加熟地。

二仙汤:仙茅 仙灵脾 当归 巴戟天 黄柏 知母

方中以仙茅、仙灵脾、巴戟天温肾阳,熟地、女贞子、旱莲草滋养阴精,黄柏、知母泻相火而益阴,当归温润养血而调冲任。

〔验方医案〕

1. 安神润燥汤(《中国当代名医验方大全》)

当归 12 克 白芍 15 克 天冬 12 克 麦冬 12 克 女贞子

15 克 龟版 15 克 元参 15 克 茯神 15 克 竹茹 10 克 浮小麦 30 克 生地 12 克 甘草 5 克 水煎服。每天 1 剂。

王某,女,49 岁。于 45 岁时自感烦躁不安,情绪波动,时冷时热,但月经尚属正常,近年来症状逐渐加重,经各医院内、妇、脑系等科检查,未发现器质性病变,诊为更年期综合征。现烦躁颇甚,时常悲伤欲哭,阵阵出汗,头痛头晕,周身不适,睡眠不安,纳谷不香,有厌世感。月经数月未行,口干唇绛,舌质暗红,苔薄白中微黄,少津,脉弦滑。以上方加磁石 30 克 生龙骨 20 克 生牡蛎 20 克 丹皮 10 克。连服 10 余剂,诸证均减,周身舒适,精神转佳。纳食较香。继服 20 余剂诸症消失。

2. 甘麦大枣合剂(《中国当代名医验方大全》)

甘草 8 克 大枣 5 枚 浮小麦 30 克 夏枯草 10 克 白芍 10 克 节菖蒲 10 克 远志 10 克 丹皮 10 克 龙齿 15 克 茺蔚子 10 克 白蒺藜 10 克 水煎服。每日 1 剂,早晚各服 1 次。

魏某,女,49 岁。月经 5 个月未行,头晕、心烦、失眠,烘热,汗出,腰痛,便秘,舌质红,苔少,脉弦细。此乃肾气亏虚,心肝失养所致。治以甘润滋补养心安神。药用甘麦大枣汤合剂。服 9 剂诸症减轻,自汗消失,夜寐佳。血压维持正常,但仍有口干,原方加女贞子 10 克、天冬 10 克、麦冬 10 克。继续 6 剂,诸症消失,月经来潮,间断治疗 3 个月,月经自然闭止而愈。

3. 滋阴柔肝,育阴潜阳方(《女科临床集要》)

熟地 30 克 枸杞 15 克 菊花 10 克 黄柏 10 克 白芍 15 克 龟版 20 克 天麻 10 克 珍珠母 30 克 龙骨 30 克 浮小麦 30 克 甘草 6 克 大枣 5 枚 水煎服。每天 1 剂。

史某,女,48 岁。1977 年 4 月 10 日诊。

近年来经常头晕、头痛，心烦躁，汗出。频发潮热，失眠，心慌，气短，口苦，咽干，右下肢麻木，伴有月经先期，量多，色红有块，舌红苔薄，脉弦细。西医诊断：更年期综合征。中医辨证：肾阴亏损，水不涵木，虚阳上亢，治以滋阴柔肝，育阴潜阳。服上方4剂后，诸症好转，又服6剂，症状逐渐消失。

4. 更年期方(《中医妇科验方选》)

龟版20克(先煎) 白芍12克 女贞子15克 旱莲草15克 泽泻12克 丹皮12克 怀山药15克 白蒺藜15克 水煎服，每天1剂。

用于治疗更年期头痛，五心烦热，烘热，口干，经量少，色黯。经前6天开始服，每天1剂 水煎服。

第八节 带下病

带下阴户液体流，蛋清量少正常求。

脾虚淡黄完带主，肾阳内补丸必投。

肾阴知柏地黄用，湿热量多臭质稠。

止带方能利湿热，热毒五味饮消毒。

【注】 正常妇女，阴道内流出少量蛋清样液体，色白，无臭，是润滑阴道黏膜的分泌物，不属病态。若因脾虚所致，则带色淡黄稀薄，宜完带汤治之。若肾阳虚者，宜投内补丸。若肾阴虚者，宜知柏地黄丸。若湿热下注所致者，则带下量多，味臭秽，质黏稠，宜《世补斋》止带汤治之。若湿热重则成毒，宜五味消毒饮治之。

【辨证论治】

1. 脾虚

〔主症〕 带下色白或淡黄，质黏稠，无臭气，绵绵不断。面色㿔白或萎黄，四肢不温，精神疲倦，纳少便溏，两足跗肿，舌淡苔白或腻，脉缓弱。

〔病机〕 脾气虚弱，不能运化水湿，水湿之气下陷而为带下。脾虚中阳不振，则面色不荣而呈㿔白或萎黄，四肢不温，精神疲乏。脾虚失运，则纳少便溏，两足跗肿。舌淡苔白或腻，脉缓弱，也为脾虚中阳不振之象。

〔治法〕 健脾益气，升阳除湿。

〔方药〕 完带汤（《傅青主女科》）。

白术 山药 人参 白芍 苍术 甘草 陈皮 黑芥穗
柴胡 车前子

〔方义〕 方中重用白术、山药以健脾束带；人参、甘草补气扶中；苍术燥湿健脾；柴胡、白芍、陈皮疏肝解郁，理气升阳；车前子利水除湿；黑荆穗入血分祛风胜湿。全方脾、胃、肝三经同治。具有健脾益气，升阳除湿之功。

〔加减〕 如肾虚腰痛者，加杜仲、菟丝子。寒凝腹痛者，加香附、艾叶；若带下日久，滑脱不止者，可选加固涩止带药，如金樱子、龙骨、芡实、乌贼骨之类。

若湿蕴化热者，症见带下黏稠色黄，治宜清热利湿止带，方用易黄汤（《傅青主女科》）。

易黄汤：山药 芡实 黄柏 车前子 白果

方中山药、芡实、车前子健脾化湿；白果固涩止带；黄柏清热燥湿，使热去湿化，则带自止。

2. 肾虚

(1) 肾阳虚

〔主症〕 白带清冷，量多，质稀薄，终日淋漓不断，腰酸如折，小腹冷感，小便频数清长，夜间尤甚，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉沉迟。

〔病机〕 肾阳不足，阳虚内寒，带脉失约，任脉不固，故带下清冷，量多，滑脱而下。肾阳不足，命门火衰，不能下暖膀胱，故小便频数清长；不能上温脾阳，故大便溏薄。腰为肾之外府，肾虚失养，则腰酸如折。小腹为胞宫所居之处，胞络系于肾，肾阳虚衰，不能温煦胞宫，则小腹有冷感。舌淡，苔薄白，脉沉迟亦为肾阳不足之征。

〔治法〕 温肾培元，固涩止带。

〔方药〕 内补丸（《女科切要》）。

鹿茸 菟丝子 潼蒺藜 黄芪 肉桂 桑螵蛸 肉苁蓉
制附子 白蒺藜 紫菀茸

〔方义〕 方中鹿茸、肉苁蓉温肾阳，生精髓，益血脉；菟丝子补肝肾，固任脉；黄芪补气；肉桂、附子温命门，补真火；潼蒺藜温肾止腰痛；白蒺藜疏肝泄风；紫菀茸温肺益肾；桑螵蛸收涩固精。全方有温肾壮阳，益精固涩之力。便溏者，去肉苁蓉、加补骨脂、肉豆蔻。

（2）肾阴虚

〔主症〕 带下赤白，质稍黏无臭，阴部灼热，头昏目眩，或面部烘热，五心烦热，失眠多梦，便艰尿黄，舌红少苔，脉细略数。

〔病机〕 肾阴不足，相火偏旺，损伤血络，任、带失固，故带下赤白、质黏，阴部灼热；阴虚不能潜阳，虚阳上扰则头昏目眩，面部烘热，五心烦躁。肾水亏损，不能上济于心，则失眠多梦。便艰尿黄，舌红少苔，脉细数，均为肾阴亏损之象。

〔治法〕 益肾滋阴，清热止带。

〔方药〕 知柏地黄汤（方见“月经病、经行口糜”）加芡实、

金樱子,补肾固涩止带。

3. 湿热(毒)

(1) 湿热

〔主症〕 带下量多,色黄或黄白,质黏腻有臭气,胸闷口腻,纳食较差,或小腹作痛,或带下色白质黏如豆腐渣状,阴痒等,小便黄少,舌苔黄腻或厚,脉濡略数。

〔病机〕 湿热蕴积于下,损伤任、带二脉,故带下量多,色黄或黄白,质黏腻,有臭气;湿热内阻则胸闷口腻,纳食较差;湿热伤津,则小便黄少。舌苔黄腻,或厚,脉濡略数,均为湿热之象。偏于湿热者,可见带多色白,质稠如豆腐渣状,阴痒等症。

〔治法〕 清利湿热。

〔方药〕 止带方(《世补斋·不谢方》)。

猪苓 茯苓 车前子 泽泻 茵陈 赤芍 丹皮 黄柏
栀子 牛膝

〔方义〕 方中猪苓、茯苓、车前子、泽泻利水除湿,茵陈、黄柏、栀子,丹皮清热泻火解毒,牛膝引药下行。

〔加减〕 若肝经湿热下注,症见带多色黄,或黄绿。质黏或呈泡沫状,有臭气,阴部瘙痒疼痛,头部昏痛,烦躁易怒,治当清肝利湿,用龙胆泻肝汤(《医宗金鉴》)。

龙胆泻肝汤:龙胆草 山栀 黄芩 车前子 木通 泽泻
生地 当归 甘草 柴胡

外治法参见“阴痒”。

(2) 热毒

〔主症〕 带下量多,或赤白相兼,或五色杂下,质黏腻,或如脓样,有臭气,或腐臭难闻,小腹作痛,烦热口干,头昏晕,午后尤甚,大便干结,或臭秽,小便黄少,舌红,苔黄干,脉数。

〔病机〕 热毒损伤任、带、血、气，故带下赤白，甚或五色杂下，质黏如脓样，且有臭气者，均是热毒蕴蒸之象。热毒伤津，故灼热，口干，便难，尿黄，热毒伤正，阴血大耗，故头昏，午后尤甚等。舌红，苔黄，脉数，均为热毒之征。

〔治法〕 清热解毒。

〔方药〕 五味消毒饮《医宗金鉴》加白花蛇舌草、樗根白皮、白术。

蒲公英 金银花 野菊花 紫地丁 天葵子

〔方义〕 方中蒲公英、金银花、野菊花、紫花地丁、天葵子均为清热解毒之品；白花蛇舌草既能清热解毒，又可利湿；樗根白皮在清利湿热中兼有止血的作用；白术健脾利湿。若脾胃虚弱，正气不足者，可加黄芪以扶正托毒。

【验方医案】

1. 健脾祛湿汤（《中国当代名医验方大全》）

山药 30 克 芡实 15 克 黄柏 10 克 薏仁 25 克 泽泻 20 克 莲须 15 克 苍术 10 克 土茯苓 30 克 金樱子 20 克 乌贼骨 10 克（研末冲服） 甘草 3 克 水煎服。每天 1 剂。

傅某，女，45 岁。患白带日久不愈，带下如浊似涕，甚至腥臭异常，面色无华，身体倦怠，脾胃虚弱，饮食少，舌淡红，苔薄微腻，脉虚弱。上方服 5 剂，身体倦怠，好转，白带略有减少，腥臭秽气大减。原方加乌贼骨 10 克，研末分成 2 次服。再进 3 剂，身体倦怠缓解，食欲增加，白带消失。

2. 益肾固带汤（《中国当代名医验方大全》）

熟地 15 克 黄肉 15 克 参须 10 克 白术 12 克 附子 6 克 鹿角胶 10 克 狗脊 15 克 莲须 15 克 煅龙骨 30 克 煅牡蛎 30 克 升麻 6 克 柴胡 6 克 水煎服。

荀某，女，36 岁。素体消瘦，婚后益见衰惫。人流 3 月来，

腰酸如折，带下晶莹黏稠，细长如丝。小腹冷痛，性欲低下，苔薄白，舌淡红，边有齿痕，脉沉细迟弱。以上方 30 剂后，带下净，精神振。嘱上方 2 天服 1 剂，继服 10 剂，诸症消失。

3. 补中益气汤加减(《男女科病千首妙方》)

黄芪 15 克 党参 15 克 牡蛎 15 克 芡实 15 克 椿根皮 15 克 炒白术 30 克 山药 30 克 陈皮 9 克 补骨脂 12 克 柴胡 6 克 升麻 6 克 炙甘草 6 克 水煎服。

马某，女，27 岁。年余来的白带量多，清冷，多如小便，色白如唾，曾服愈带丸有效，但停药后又复发。舌质淡润，苔薄白，脉虚缓。证属脾虚不运，湿浊下注。治宜健脾益气，升阳除湿，佐以固涩。服上方 12 剂愈。

4. 清热解毒除湿止带方(《女科临证集要》)

猪苓 15 克 茯苓 30 克 车前子 15 克 泽泻 10 克 茵陈 20 克 苍术 10 克 黄柏 15 克 梔子 10 克 丹皮 10 克 金银花 15 克 连翘 10 克 蒲公英 15 克 椿根白皮 15 克 水煎服。

康某，女，43 岁。1976 年 5 月 7 日诊。

黄带频流不止，色黄绿如脓，中夹血迹，味气恶臭，不能近人，腰腹胀痛，精神不振，语言无力，二目无神，小便短赤，口苦咽干。舌质红，苔黄，脉滑数。此湿毒内侵，损伤冲任。治宜清热解毒，除湿止带。以上方 6 剂好转，又服 14 剂，诸证悉除。

5. 英地蓝花汤(程绍恩临床经验方)

蒲公英 40 克 地丁 30 克 马齿苋 50 克 板蓝根 20 克 金银花 10 克 当归 10 克 山梔子 10 克 柴胡 10 克 龙胆草 10 克 甘草 5 克 生地 15 克 木通 10 克 车前子 25 克 泽泻 25 克 黄芩 15 克 水煎服。

张某，女，36 岁，月经前期，色红量多，黄白带下量多，质黏稠，如黄色鼻涕，其味秽臭难闻，内裤每天更换 2 次，用卫生纸 1

包,否则不能进入人群之中,众人皆说不知何处来此臭味。并伴有头晕耳鸣,五心烦热,四肢发麻,倦怠乏力。腰酸腹胀,食少纳呆,急躁易怒,舌红绛,苔黄白腻;脉弦数。诊为肝胆湿热证。湿热郁滞,下注冲任,故以清热利湿解毒为法。以上方4剂后黄白带明显减少,气味渐消失。症状明显好转。以效不更方的原则,继服上方6剂,诸症消失,病告痊愈。

6. 清肝利湿止带汤(《精选千家妙方》)

茵陈30克 胆草10克 车前子10克 黄柏20克 柴胡5克 白芍10克 乌梅30克 生地榆30克 生薏仁30克 乌贼骨20克 白果10克 水煎服。每天1剂。

主治肝经湿热型黄白带,阴中热痒,便血或小便赤涩。伴胁痛口苦、耳聋、耳肿,热痒阴肿,腹中作痛,舌红苔黄。脉弦滑或滑数。

7. 清热解毒渗湿止带方(《精选千家妙方》)

归尾18克 赤芍12克 银花18克 土茯苓30克 苦参15克 黄柏9克 苍术12克 猪苓12克 泽泻9克 木通9克 车前子12克 甘草6克 水煎服。每天1剂,2次分服。

用于治疗带下量多,或赤白相兼,或五色带下,质黏腻,或如脓样,有臭气,或腐臭难闻,小腹作痛,烦热口干,头晕眩,午后尤甚,大便干结或臭秽,小便黄少,舌红苔黄干,脉数。

8. 滋阴润燥方(《中医妇科验方选》)

女贞子30克 旱莲草30克 枸杞子15克 麦冬12克 山萸肉12克 何首乌30克 巴戟天15克 陈皮3克 水煎服。每天1剂,两次服。

用于治疗带下过少,阴道干燥症。阴道干涩灼热疼痛,性欲减少,性交不能,伴头晕耳鸣,五心烦热等症。(本方曾治阴道干燥症38例。有效率达94.7%。6天为1个疗程,一般须服

1~3 个疗程,皆愈。)

9. 解毒逍遥汤(《中医妇科验方选》)

蒲公英 30 克 连翘 30 克 败酱草 30 克 白花蛇舌草 30 克 红藤 15 克 柴胡 6 克 白术 12 克 茯苓 12 克 当归 9 克 川芎 6 克 青皮 6 克 香附 6 克 薄荷 6 克 甘草 6 克 水煎服。

用于治疗肝郁所致的白黄带下,量多,味臭,月经愆期,附件炎等症。

10. 清宫化滞丸(《男女科病千首妙方》)

草薢 12 克 地丁 12 克 益母草 12 克 篇蓄 10 克 黄柏 10 克 丹皮 10 克 川楝子 10 克 赤芍 10 克 牛膝 10 克 香附 10 克 连翘 10 克 公英 15 克 元胡 6 克 甘草 6 克。共为细末,水泛为丸。每服 6 克,1 天服 2~3 次。

此方临床治疗多例下焦湿热郁滞型黄白带下,并有腰酸胀坠,腹胀痛者,屡试屡验。

【文献选要】

《傅青主女科》:夫带下俱是湿证。而以带名者,因带脉不能约束而有此病。

《女科经纶》引缪仲淳语:白带多是脾虚,肝气郁则脾受伤,脾伤则湿土之气下陷,是脾精不守,不能输化为荣血,而下白滑之物,皆由肝木郁于土中使然,法当升提肝气,补助脾气盖以白带多属气虚,故健脾补气要法也。

《妇人秘科》:带下之病,妇人多有之。赤者属热,兼虚兼火治之。白者属湿,兼虚兼痰治之。年久不止者,以补脾胃为主兼升提。大抵瘦人多火,肥人多痰。

《沈氏女科辑要笺正》:古病多属虚寒,故巢氏病源,孙氏千金,皆以辛热治带下,此今时所绝无仅有之候,可以存而弗论。

若湿热则今病最多，而亦最易治，其所下者，必秽浊腥臭，甚者且皮肤湿痒，淫溢欲腐。若夫脾虚气虚之症，固亦有之。则东垣之所谓清阳下陷，果属气陷，参芪补中，而少少升清，亦尚易治。但立斋、养葵所言，则几几乎万病尽然，断不足据。丹溪以湿痰立论，实即湿热之病，不足为异。景岳以脾肾两虚为言，则带出精窍，言肾较为切近，视专论脾胃清气不升者，尤为明白，新甫即立斋，而尧封似乎认作二人，是其失检。若缪仲淳以为木郁地中，实即相火郁窒横行而疏泄太过耳。古人许多治法，惟戴人大攻，断不可训，此外则大温大寒大补，各有对药之病，因证立方，具有至理，不可偏废。

第九节 妊娠病

妊娠病多恶阻先，腹痛胎漏动不安，
堕小滑胎萎不长，胎死不下子烦痢，
子肿满晕悬痞嗽，子淋尿闭与产难。

妊娠病，又称胎前病。其病证较多，妊娠初期首先见有恶阻病，另还有妊娠腹痛、胎漏、胎动不安、堕胎、小产、滑胎、胎萎不长、死胎不下、子烦、子痢、子肿、子满、子晕、子悬、子痞、子嗽、子淋、尿闭（妊娠小便不通）、难产等病，分别论治如下。

一、妊娠恶阻

恶阻恶心呕吐频，厌食头晕烦少神，
脾虚香砂六君子，脾胃不和苏黄寻。

【注】 妊娠后出现恶心呕吐频多,伴有厌食,头晕,心烦,精神不振(少神)者,是谓妊娠恶阻病。

【辨证论治】

1. 脾胃虚弱

〔主症〕 妊娠以后,恶心呕吐不食,口淡或呕吐清涎,神疲思睡,舌淡苔白润,脉缓滑无力。

〔病机〕 证由脾胃素虚,孕后血盛于下以养胎,冲脉之气上逆,胃气不降,反随逆气上冲,则呕吐不食,或食入即吐。脾胃虚弱,中阳不振,浊气不降,故呕吐清涎,口淡,神疲思睡。舌淡苔白润,脉缓滑无力,均为脾虚胃弱之征。

〔治法〕 健脾和胃,降逆止呕。

〔方药〕 香砂六君子汤(《名医方论》)。

党参 白术 茯苓 甘草 半夏 陈皮 木香 砂仁 生姜 大枣

〔方义〕 方中四君子汤健脾胃,和中气,砂仁,生姜、半夏温胃降逆止呕,陈皮、木香理气行滞,大枣补脾。全方补脾胃而降逆气,使呕吐得止。

〔加减〕 若夹痰饮而胸脘满闷,呕吐痰涎者,用小半夏加茯苓汤(《金匱要略》)加白术、砂仁、陈皮。

小半夏加茯苓汤:半夏 生姜 茯苓

方中半夏降逆豁痰止呕;茯苓,白术健脾渗湿;生姜温胃止呕;砂仁、陈皮宽中理气,行滞止呕。

2. 肝胃不和

〔主症〕 妊娠初期,呕吐酸水或苦水,胸满胁痛,嗳气叹息,头胀而晕,烦渴口苦,舌淡红苔微黄,脉弦滑。

〔病机〕 肝气郁结,失于疏泄,肝脉挟胃贯膈,肝气上逆犯胃,则胸满呕吐。肝气不疏,则两胁胀痛,嗳气叹息。肝气逆走

空窍则头胀而晕。肝与胆相表里,肝气上逆,则胆火亦随之上升,胆热液泄,故呕吐酸水或苦水,烦渴口苦。舌苔微黄,脉弦滑,亦为肝胃不和之象。

〔治法〕 抑肝和胃,降逆止呕。

〔方药〕 苏叶黄连汤(《温热经纬》)酌加半夏、陈皮、竹茹、乌梅。

苏叶黄连汤:苏叶 黄连

〔方义〕 方中苏叶、陈皮和胃理气;竹茹清热止呕;黄连苦寒以降胃气;半夏降逆止呕;乌梅味酸抑肝,使肝胃得和,逆气得降,则呕自平。如呕甚伤津,舌红口干者,加沙参、石斛以养胃阴。

以上两型,均可因呕吐不止,饮食少进而导致阴液亏损,精气耗散,出现精神萎靡,形体消瘦,眼眶下陷,双目无神,四肢乏力。如呕吐剧烈,甚则有呕吐带血样物,发热口渴,尿少便秘,唇舌干燥,舌质红,苔薄黄而干或光剥,脉细滑数无力等气阴两亏的严重证候(病情严重者,检查尿酮常呈阳性反应)。治宜益气养阴,和胃止呕,用生脉散(方见“崩漏”)合增液汤(《温病条例》)加陈皮、竹茹、天花粉。

增液汤:玄参、麦冬、生地

方中生脉散益气生津;增液汤增液补阴;竹茹、天花粉清热止呕,治烦渴;陈皮和胃气,止呕逆(必要时,可中西医结合治疗,给予输液,纠正酸中毒及电解质的紊乱)。若经治疗无好转,或见体温升高,脉搏增快,出现黄疸等现象,则应及时考虑终止妊娠。

【验方医案】

1. 清肝止呕方(《百灵妇科》)

许某,女,22岁,某中学教员,1975年秋初诊。

该患者妊娠2月左右开始恶心呕吐,逐渐发展到食入即吐,不食亦吐酸苦,呕吐黄绿或挟有血液,虽经中西医多方治疗,然病势不减。中医多以为是脾虚胃弱,中阳不振,痰水潴留而致,投以健脾和胃祛痰降逆之方药。亦有诊为肝气郁滞,升降失常,冲气上逆而致呕吐,投以调肝理气降逆之品,治疗数日,呕吐反而加剧。该患者痛苦难忍,欲求人工流产,其婆母不允,经人介绍前来求诊。

余望其神情郁闷,形体消瘦,面红,舌赤,苔黄燥;闻其语声高亮,又时时太息。问其病情,经闭两月余,半月前开始呕吐酸苦,心烦、易怒,胸胁胀满,喜冷饮或酸咸果食,经治疗无效。又服偏方藕汁、白梨汁等,服后暂安,但不过半天,仍然呕吐。10余日米粥不入,大便秘结,小便短赤;切其脉象弦滑有力。

根据四诊分析,该患者属性躁多火,肝经血燥且失条达,肝气益急,气火越上逆而致呕吐,非脾虚痰滞之呕吐。施以调肝清热,通秘降逆之方:黄连9克 芦根9克 麦冬9克 竹茹9克 黄芩9克 陈皮9克 枳实9克 大黄2.1克 嘱其水煎服2剂。

3日后复诊,服药后呕吐稍止,大便已通,小便红赤,日进半碗米粥,脉弦滑稍缓。其病势渐退,乃以上方加白芍9克、生地9克,以敛阴生血,嘱其再服3剂。

1周后又复诊。观其精神如常,问其现状,诸症消失,饮食如常,察其脉象弦滑和缓,知其胃气已复,勿需服药。告戒房事,可保万全。于1976年安然分娩一男婴。

2. 孕吐调中汤(《中国当代名医验方大全》)

党参30克 茯苓15克 白术15克 半夏15克 陈皮8克 香附12克 白蔻12克 生姜6克 大枣12克 柴胡12克 黄芩10克 白芍15克 牡蛎30克 水煎服。每天1剂。

赵某,女,29岁,恶心呕吐10余天,逐渐加重,食入即吐,时

吐苦水,伴心悸,气短头晕,不能起床,脉略弦。苔白微黄,妊娠试验阳性。诊为妊娠恶阻(孕吐)服上方4剂,则少量食而不吐,又服2剂诸症消失。

3. 益气养阴止呕方(《女科临证集要》)

太子参30克 麦冬15克 五味子10克 元参15克 生地30克 天花粉15克 陈皮10克 竹茹6克 乌梅15克 石斛15克 知母10克 甘草6克 水煎服。

张某,女,27岁。1964年3月10日诊。妊娠2月,中脘痞闷,呕吐频作,食入即吐,入水也吐,呕吐带血样物,发热口渴,尿少便秘,唇舌干燥,精神萎靡,形体消瘦,眼眶下陷,双目无神,四肢乏力,舌质红,苔薄黄而干,脉细滑数无力。此属气阴两亏的危重症候治以益气养阴和胃止呕。以上方3剂,呕吐减少,诸症减轻,按原方继服6剂诸症悉解。

4. 苏叶黄连汤(《女科临证集要》)

苏叶10克 黄连10克 半夏10克 陈皮10克 竹茹6克 乌梅15克 水煎服。每日1剂。

郝某,女,28岁,1984年3月5日诊。经停70天,呕吐近1月,食入即吐,不食亦吐,空腹时呕吐苦水。呕甚小便失禁,头昏心悸,脘闷纳呆,有时腹痛腰酸,小便短赤,大便干结,舌红苔黄,脉滑数。服上方3剂后,呕止能食。又服3剂痊愈。

5. 妊娠呕吐方(《中医妇科学方选》)

姜半夏10克 炒决明子12克 生赭石15克 旋覆花10克 陈皮6克 水煎服。每天1剂。

功效:抑肝和胃,降逆止呕。可用于各种类型的呕吐(虚者慎用)。

【文献选要】

《胎产心法》:恶阻者,谓有胎气,恶心阻其饮食也。妊娠禀

受怯弱，中脘宿有痰饮，便有阻病，其证颜色如故，脉息平和，但觉多卧少起，肢体沉重，头目昏眩，恶闻食气，喜噉酸咸，或嗜一物，或大吐，或时吐痰与清水，甚者或作寒热，心中愤闷，呕吐痰水，胸膈烦满，恍惚不能支持，此皆胃气弱而兼痰与气滞者也。亦有素体不虚，而一受胎孕，则冲任上壅，气不下行，故呕吐者。又有由经血既闭，水渍于脏，脏气不宜通，故心烦愤闷，气逆而呕吐，及三月余，而呕吐渐止。

《胎产新书·女科秘旨》：怀孕三月，恶心而阻隔饮食是也。亦有六七个月，尚病呕者治同。然肥人责之痰，瘦人责之火，俱宜二陈汤加白术、黄芩，或加香附、砂仁、姜汁、竹茹，与吐家同，如或因气者，脉必沉，治兼舒郁，加川芎、香附，不可过用辛药。

二、妊娠腹痛

妊娠腹痛胞阻名，血虚当归芍药灵，
气郁胁胀逍遥散，虚寒暖宫胶艾平。

【注】 妊娠期，因胞脉阻滞或失养，气血运行不畅而发生小腹疼痛者，称为“妊娠腹痛”亦称为“胞阻”病。如因血虚而致胞阻者，宜当归芍药散治之。若因气郁所致，则有胁肋胀痛症状，可用“逍遥散”治之。虚寒者，宜暖宫止痛，胶艾汤治之，则平安无事。

【辨证论治】

1. 血虚

〔主证〕 妊娠小腹绵绵作痛，面色萎黄，或少寐心悸，苔薄白舌质淡，脉细滑弱。

〔病机〕 血虚气弱，胞脉失养，故小腹绵绵作痛。血虚不能上荣，故面色萎黄；不能内养于心，故少寐心悸。舌淡苔薄白，

脉细滑而弱,均为血虚之象。

〔治法〕 养血安胎止痛。

〔方药〕 当归芍药散(《金匮要略》)去泽泻,加首乌、桑寄生。

当归 白芍 川芎 茯苓 白术 泽泻

〔方义〕 方中当归养血和血,川芎行血中之滞,白芍养血缓急止痛;茯苓、白术健脾以益生化之源。加首乌、桑寄生养血固胎。气血充沛,脉络流通,则痛止胎安。

〔加减〕 若见小腹冷痛,可于方中加艾叶以暖宫止痛。

2. 气郁

〔主症〕 孕后小腹胁肋作痛,或情志不爽,或急躁易怒,脉弦滑,苔薄黄。

〔病机〕 孕后胎体渐长,容易影响气机之升降,又因肝气怫郁不舒,气机失调,胞脉气血阻滞,故小腹胀痛。肝脉布胁肋,肝气郁结,故胁肋胀痛。苔黄为郁而化热之候,脉弦病在肝,滑为有孕之象。

〔治法〕 疏肝解郁,止痛安胎。

〔方药〕 逍遥散(方见“月经病、月经先后无定期”)加苏梗宽中行气安胎。郁而化热者加栀子、黄芩。

3. 虚寒

〔主症〕 妊娠小腹冷痛,绵绵不止,形寒肢冷,面色㿔白。或纳少便溏,舌淡苔薄白,脉细弱。

〔病机〕 肾阳偏虚,寒从中生,胞脉失于温煦,影响气血运行,故小腹冷痛绵绵不止;阳气不能外达,故形寒肢冷,面色㿔白。脾阳失煦,故食少便溏。舌淡苔薄白,脉细弱,皆为虚寒之象。

〔治法〕 暖宫止痛,养血安胎。

〔方药〕 胶艾汤(《金匱要略》)加巴戟天、杜仲、补骨脂。

阿胶 艾叶 当归 川芎 干地黄 甘草 白芍

〔方义〕 方中艾叶暖宫止痛,川芎、当归温养血脉,白芍、甘草缓急止痛,阿胶养血安胎。加巴戟天、杜仲、补骨脂以温肾补阳,使阴寒消散,气血流畅,则腹痛可解。

【验方医案】

1. 胞阻方(《广州近代老中医医案医话选编》)

当归 18 克 白芍 9 克 白术 9 克 茯苓 15 克 菖蒲 2.4 克 香附 9 克 木香 4.5 克(后下) 甜橙皮 9 克 素馨花 6 克 苏梗 4.5 克 苧麻根 9 克 桑寄生 15 克

某妇,怀孕后时常腹痛,痛连腰胁,亦不能寐,此为胎气不调,气血不和,应慎防流产。治宜调气安胎。服后腹痛减,照方再服而安。

2. 当归芍药散加减(《湖北中医杂志》1983 年第 4 期)

当归 10 克 白芍 10 克 党参 12 克 白术 10 克 茯苓 10 克 炙甘草 3 克 姜半夏 10 克 苏梗 10 克 川芎 3 克 壳砂 6 克 大枣 20 克 水煎服。

王某,31 岁。停经 4 个月。腹痛绵绵,肢倦乏力,心悸气短,双足轻度浮肿,苔白,脉弦数。妊娠反应阳性。证属中土虚弱,胞脉阻滞。法当健脾理气。予上方 2 剂而安。

3. 当归芍药散(《陕西中医》1985 年第 7 期)

当归 10 克 白芍 15 克 茯苓 10 克 白术 15 克 川芎 10 克 泽泻 6 克 水煎服。

于某,23 岁。孕后 1 个月,小腹隐痛,时作时止。4 个月 after 腹痛牵涉两胁,呈游走痛,胸闷太息,身沉纳少,面色萎黄。舌正常,苔黄白,脉弦滑,关脉弦细。证属肝郁脾虚,予以上方 2 剂,腹痛即除。

4. 延益资生汤(《中医医案医话集锦》)

党参 10 克 白术 6 克 茯苓 6 克 桑寄生 10 克 藿香 10 克 红蔻 10 克 续断 6 克 苏叶 6 克 当归 10 克 吴萸 4 克 水煎服。

吴某,女,24 岁。1959 年春初诊。素体较弱,现又怀孕 3 月余。小腹阵痛发凉。背恶寒,四肢不温,时恶心呕吐,偏食酸辣,嗜卧懒动,舌质淡苔白,脉滑。以上方 2 剂,腹痛减轻,恶心呕吐消除,饮食增进。原方再服 3 剂。腹痛已除,病告痊愈。

5. 加味承气汤(《女科临证集要》)

枳实 10 克 厚朴 10 克 大黄 12 克 芒硝 10 克 黄芩 10 克 当归 10 克 白术 10 克 菟丝子 10 克 水煎服。

崔某,女,24 岁。1981 年 4 月 23 日诊。怀孕 5 个月,腹痛 7 日,时而痛剧,汗出,拒按,胸腹满闷,气促,日晡潮热,大便秘结,舌干燥苔老黄而腻。审证参脉,此胃肠食积化燥化热所致。以上方 1 剂。泻下燥便甚多,腹痛止,又予逍遥散 3 剂而愈。

6. 附子汤(《女科临证集要》)

附子 15 克 白术 25 克 茯苓 15 克 党参 25 克 白芍 15 克 水煎服。

王某,女,35 岁。经产妇,怀孕 7 个月,忽腹部疼痛,绵绵不休。经多方治疗,痛益甚。伴畏寒,腹寒凉。口中和,喜热饮,泛清涎,舌淡,脉弦而无力。以上方 3 剂而愈。至期生一男,甚壮。

【文献选要】

《圣济总录》:妊娠脏腑虚弱,冒寒湿之气,邪气与正气相击,故令腹痛。痛不已,则伤胞络,令胎不安,治法宜祛湿散寒,安和胎气,则病自愈。

三、异位妊娠

异位妊娠宫外孕，部位不同卵管多，
属于妇科急腹症，破裂腹痛现休克，
中医活血化瘀法，西医手术莫蹉跎。

【注】 凡孕卵在子宫腔外着床发育，称为“异位妊娠”，俗称“宫外孕”。但两者含义稍有不同，宫外孕指子宫以外的妊娠如输卵管妊娠、卵巢妊娠、腹腔妊娠、阔韧带妊娠；异位妊娠指孕卵位于正常着床部位以外的妊娠，按部位不同有输卵管妊娠、卵巢妊娠、腹腔妊娠、阔韧带妊娠、宫颈妊娠及子宫残角妊娠。因此异位妊娠的名称含意更广。中医学中无此名，其按临床表现，散见于“妊娠腹痛”、“胎动不安”，“癥瘕”等病之中。

异位妊娠最常见为输卵管妊娠，占95%，故本节以其为例叙述。当输卵管妊娠破裂后，可造成急性腹腔内出血，发病急，病情重，处理不当可危及生命，是妇科常见急腹症之一。过去此病一经确诊，立即手术治疗。近年来，我国用中西医结合非手术治疗，临床实践证实，效果良好。

【辨证论治】

本病主要是“少腹血瘀”之实证，治疗始终以活血化瘀为主。临床分未破损期和已破损期。

1. 未破损期

指输卵管妊娠尚未破损者。

〔主症〕 患者可有早孕反应，或下腹一侧有隐痛，双合诊可触及一侧附件有软性包块有压痛。尿妊娠试验多为阳性。脉弦滑。

〔病机〕 停经妊娠，故可有早孕反应，孕卵于输卵管处种

植发育,气机阻滞,故一侧有包块,压痛,及下腹一侧隐痛。脉弦滑亦为阻滞之征。

〔治法〕 活血化瘀,消癥杀胚。

〔方药〕 宫外孕Ⅱ号方(山西医学院附属第一医院)。

赤芍 15 克 丹参 15 克 桃仁 9 克 三棱 3~6 克 莪术 3~6 克

〔方义〕 方中赤芍、丹参、桃仁活血化瘀,三棱、莪术消癥散结。可同时用天花粉针剂,以提高杀胚效果。

2. 已破损期

指输卵管妊娠流产或破裂者。

(1) 休克型:输卵管妊娠破裂后引起急性大量出血,临床上
有休克体征者。

〔主症〕 突然下腹剧痛。面色苍白,四肢厥逆,或冷汗淋漓,恶心呕吐,血压下降或不稳定,有时烦躁不安。脉微欲绝或细数无力,并有腹部及妇科检查的体征。

〔病机〕 孕卵停滞于胞宫之外,胀破脉络,故突发下腹剧痛。络伤内崩,阴血暴亡,气随血脱,则面色苍白,四肢厥逆,冷汗淋漓。亡血心神失养,故烦躁不安。脉微欲绝或细数无力均为阴血暴亡,阳气暴脱之征。

〔治法〕 回阳救脱,活血祛瘀。

〔方药〕 参附汤(方见“崩漏”)与生脉散(方见“崩漏”)合
宫外孕Ⅰ号方(山西医学院附属第一医院)。

参附汤可补气回阳救脱。

生脉散可益气敛汗,养阴生津。

宫外孕Ⅰ号方:赤芍 丹参 桃仁,可活血化瘀。

此型患者来院后,立即吸氧,输液,必要时输血。在此同时,服用独参汤或生脉散积极抢救,补足血容量纠正休克后即加服

宫外孕Ⅰ号方。并早期防治兼症。此型病人需绝对卧床勿过早活动,严格控制饮食,禁止灌肠和不必要的盆腔检查。

(2)不稳定型:输卵管妊娠破损后时间不长,病情不够稳定,有再次发生内出血可能者。

〔主症〕 腹痛拒按,腹部有压痛及反跳痛,但逐渐减轻。可触及界线不清的包块,间有少量阴道流血,血压平稳,脉细缓。

〔病机〕 脉络破损,伤络而血溢,血不循经成瘀,瘀血阻滞不通,则腹痛拒按。瘀血内阻,新血不得归经,故阴道流血。气血骤虚,脉道不充,故脉细缓。

〔治法〕 活血祛瘀,佐以益气。

〔方药〕 宫外孕Ⅰ号方(见休克型)加党参、黄芪。

此型病人常兼有虚象,用药宜和缓,免伤正气。又因本型有再次内出血可能,应作好随时抢救休克的准备。

(3)包块型:指输卵管妊娠破裂时间较长,腹腔内血液已形成血肿包块者。

〔主症〕 腹腔血肿包块形成,腹痛逐渐消失,可有下腹部坠胀或便意感。阴道出血也逐渐停止。脉细涩。

〔病机〕 络伤血溢于少腹成瘀,瘀积成癥,故腹腔血肿包块。癥块阻碍气机,则下腹坠胀。脉细涩亦为瘀血内阻之征。

〔治法〕 破瘀消癥。

〔方药〕 宫外孕Ⅱ号方(见未破损期)。

为加快包块吸收,可辅以消癥散(经验方)

消癥散:千年健 60 克 川断 120 克 追地风 60 克 川椒 60 克 五加皮 120 克 白芷 120 克 桑寄生 120 克 艾叶 500 克 透骨草 250 克 羌活 60 克 独活 60 克 赤芍 120 克 归尾 120 克 血竭 60 克 乳香 60 克 没药 60 克。上药共末,每 250 克为 1 份,纱布包裹,蒸 15 分钟,趁热外敷,每天 1~2 次,10

天为1个疗程。

或双柏散(经验方)外敷。

双柏散:侧柏叶 60 克 大黄 60 克 黄柏 60 克 薄荷 30 克 泽兰 30 克,制用法如消癥散。

尿妊娠试验两次阴性,确诊胚胎已死亡者,可在门诊治疗。

对兼症的处理:非手术治疗输卵管妊娠的过程中,必须重视对兼症的处理。最多见及最重要的兼症是腑实证,表现为腹胀便秘,胃脘不适,腹痛拒按,肠鸣减弱或消失,尤以休克型及不稳定型最易伴见,严重地影响治疗效果。

四、胎漏、胎动不安

胎漏阴道少量血,辨别有无腰腹酸,
肾虚胎坠寿胎用,血热便干保阴煎,
气血虚弱胎元饮,跌仆伤胎圣愈先。

【注】 妊娠期阴道少量流血,时下时止而无腰酸腹痛者,称为“胎漏”。若妊娠期,阴道少量出血,伴有腰酸、腹痛下坠者,称为“胎动不安”。胎漏与胎动不安,均是小产的先兆,亦称为“先兆流产”。

其病因属于肾虚而屡次堕胎者,以寿胎丸加党参、白术治之。属于血热便干者,以保阴煎加苧麻根治之。若因气血虚弱者,以胎元饮加黄芪、阿胶治之。跌仆伤胎者,以圣愈汤加菟丝子、寄生、续断等药治之。

【辨证论治】

胎漏与胎动不安的辨证论治基本相同,但若已发展为堕胎、小产,则临床经过与处理又各异,另有堕胎、小产节中阐述。

胎漏、胎动不安当结合不同原因所致的各种证候来辨证。

特别应注意体质因素(夫妇双方的体质情况、健康情况等)和有
无外伤史、其他病史、服药史以及情志因素等。

本病的治法以安胎为主。并根据不同情况采用固肾、调气
养血、清热等法,经过治疗,出血迅速控制,腹痛消失,多能继续
妊娠。若继续出血量多,腰酸、腹痛加重则已发展至堕胎或小
产,又当急以去胎益母,按堕胎、小产处理。

1. 肾虚

〔主症〕 妊娠期,阴道少量下血,色淡暗,腰酸腹坠痛。或
伴头晕耳鸣、小便频数,夜尿多甚至失禁,或曾屡次堕胎,舌淡苔
白。脉沉滑尺弱。

〔病机〕 胞络系于肾,肾虚则冲任不固,胎失所系,因而阴
道下血或腰酸腹坠。肾虚髓海不足,脑失所养,故头晕耳鸣;肾
与膀胱相表里,肾虚则膀胱失约,故小便频数,甚至失禁。舌淡
苔白,脉沉弱,均为肾虚之候。

〔治法〕 固肾安胎,佐以益气。

〔方药〕 寿胎丸(《医学衷中参西录》)加党参、白术。

菟丝子 桑寄生 续断 阿胶

〔方义〕 方中菟丝子补益肾精,桑寄生、续断固肾壮腰以
系胎,阿胶养血止血,党参、白术健脾益气。全方重在补肾益气,
固摄冲任,则胎自安。若小便失禁者,再加益智仁、覆盆子以温
肾固涩。

2. 气血虚弱

〔主症〕 妊娠期,阴道少量流血,色淡红,质稀薄;或腰腹
胀痛或坠胀,伴神疲肢倦,面色㿔白,心悸气短,舌质淡,苔薄白,
脉细滑。

〔病机〕 气以载胎,血以养胎,气血虚弱,濡养不足,胎气
不固,故阴道少量下血或腰腹胀痛。心悸气短,舌淡苔白,脉细,

均为气血虚弱之象。

〔治法〕 补气养血，固肾安胎。

〔方药〕 胎元饮(《景岳全书》)去当归，加黄芪、阿胶。

人参 当归 杜仲 白芍 熟地 白术 陈皮 炙甘草

〔方义〕 方中以人参、白术、炙甘草、黄芪益气健脾；白芍、熟地、阿胶滋阴养血；杜仲固肾安胎；佐陈皮理气和中，使熟地、阿胶补而不滞。

3. 血热

〔主症〕 妊娠期阴道下血，色鲜红，或腰腹坠胀作痛。伴心烦不安，手心烦热，口干咽燥，或有潮热，小便短黄，大便秘结，舌质红，苔黄而干，脉滑数或弦滑。

〔病机〕 热伏冲任，迫血妄行，以致血海不固，故阴道下血而色鲜红，或腰腹胀痛。热扰心神，故心烦不安。热伤阴津，故手心烦热或兼潮热，口干咽燥，小便短黄而大便秘结。舌红，苔黄而干，脉滑数或弦滑，均为阴虚血热之象。

〔治法〕 滋阴清热，养血安胎。

〔方药〕 保阴煎(方见“月经过多”)。

〔方义〕 生地、熟地滋阴养血；白芍益血敛阴；黄芩、黄柏清热泻火；续断固肾安胎；山药补脾益血；苎麻根凉血止血，兼能安胎。全方有滋阴凉血，清热安胎之效。

〔加减〕 下血较多者加阿胶、旱莲草、养阴止血。腰酸者加菟丝子、桑寄生、固肾安胎。

4. 跌仆伤胎

〔主症〕 妊娠外伤，腰酸，腹胀坠，或阴道下血，舌质淡白，脉滑无力。

〔病机〕 跌仆闪挫或劳力过度，损伤气血，冲任，胎气受损，胎系于肾，腰为肾之府，故腰酸腹胀坠，或阴道下血。

〔治法〕 补气和血,安胎。

〔方药〕 圣愈汤(方见“痛经”)加菟丝子、续断、寄生。

〔方义〕 方中圣愈汤补气和血,菟丝子、寄生、续断固肾安胎。若下血较多,去当归、川芎,加艾叶炭、阿胶养血止血。

【验方医案】

1. 归脾汤加减《男女科病千首妙方》

黄芪30克 党参30克 茯苓15克 白术15克 白芍15克 熟地15克 桂圆肉15克 枸杞子15克 菟丝子15克 肉苁蓉15克 木香10克 炙甘草10克 水煎服。

陈某某,女,34岁。2年前顺产一胎,今又妊娠2月,因劳累阴道出血3天,气短、懒言,头晕心悸,腰酸尿频,小腹痛。舌淡脉细滑。证属气血两虚,胎失所养,治以补气益血,健肾固冲安胎。服上方10剂愈。

2. 固肾保胎饮(《中国当代名医验方大全》)

熟地30克 当归15克 黄芪24克 阿胶18克 续断15克 杜仲15克 白术15克 陈皮6克 艾叶6克 菟丝子18克 桑寄生15克 太子参30克 炙甘草9克 水煎服。每天1剂。

张某某,女,39岁。曾怀孕2次,均先后流产,1981年3月2日来诊。已停经2个月余,尿妊娠试验阳性,症见腹痛,腰胀,阴道少量出血,恶心,气短,舌苔薄白,脉濡而尺滑。用上方加白芍15克,砂仁6克。连服3剂,腹痛大减,出血停止。续服3剂而安。后顺产一男孩。

3. 固胎汤(《中国当代名医验方大全》)

党参30克 炒白术30克 炙甘草3克 扁豆15克 山药15克 熟地30克 山茱萸15克 杜仲9克 枸杞9克 续断9克 桑寄生15克 白芍15克 水煎服。每天1剂。

杨某,女,30岁。1974年10月23日诊。自述怀孕4次,皆于孕2月余流产。此次又停经56天。妊娠试验阳性。现感腰痛,小腹坠,纳差,脉滑,舌质淡红苔灰滑。证属脾肾两亏,胎动不安,以上方加减,服30余剂,于1975年6月9日,顺产一男婴。

4. 加减磐石饮(《千家妙方·下册》)

炙黄芪15克 党参12克 白术12克 当归12克 熟地12克 白芍10克 川芎5克 续断12克 砂仁5克 炒糯米50克 水煎服。每天1剂。连用5~10剂,至胎元得固后,再每月服3~5剂。临产为止。

李某,女,中学教师,婚后数年,已孕多次,然每孕每坠。此后又孕数月,又有滑胎之征,余诊后投上方,并告其遵医嘱服用。直至临产。患者足月顺产一婴孩。母子均健,全家皆欢。(此方系湖南朱佑武经验方。临床应用多年治疗不少习惯性流产患者,屡用屡效。)

5. 习惯性流产方(《千家妙方·下册》)

当归10克 黄芩10克 白术10克 甘草6克 杜仲6克 黄芪3克 续断3克 砂仁3克 菟丝子6克

陈某,女,28岁。患者21岁结婚后,怀孕6个月时,因负重而流产。以后连续3次,均在怀孕5个月时流产。现怀孕4个月,因此诊时已有流产之征。其腰痛,少腹胀痛坠感,伴胸闷不舒、厌食、恶心。诊其脉浮滑,舌质淡苔薄微腻。服上方5剂后,孕情转佳,诸症悉除。又嘱其自后每月用上方2剂,连服4个月(8剂上方)。适时足月顺产一胎儿,母女均安然无恙。

【文献选要】

《校注妇人良方》:夫人以胃气壮实,冲任荣和,则胎得所,如鱼处渊。若气血虚弱,无以滋养,其胎终不能成也,宜下之,以

免其祸。

《医宗金鉴·妇科心法要诀》：孕妇气血充足，形气壮实，则胎气安固。若冲任二脉虚损，则胎不成实，或因暴怒伤肝，房劳伤肾，则胎气不固，易致不安；或受孕之后，患生他疾，干犯胎气，致胎不安者亦有之。或因跌仆筑磕，从高坠下，以致伤胎，堕胎者亦有之。

五、堕胎、小产、滑胎

堕胎妊娠三月间，小产成形五月先，
滑胎堕小三次上，辨证保胎治相关，
堕胎小产生化用，滑胎补肾固冲安。

【注】 妊娠3个月左右而胚胎自然殒落者谓之“堕胎”。妊娠5个月先后，胎已成形而流产者称为“小产”，亦称为“半产”。堕胎或小产连续发生3次以上者为“滑胎”。对上述3种情况的治疗，主要是辨证保胎，是其关键所在。堕胎或小产多用生化汤治之。滑胎者，可用补肾固冲汤或丸剂治之。

【辨证论治】

1. 堕胎、小产

〔主症〕 怀孕早期出现阴道流血量多，色红有块，小腹坠胀，或有胎块排出，乃为堕胎之象。

怀孕4~7个月，出现小腹疼痛，阵阵紧迫，会阴逼胀下坠，或有羊水溢出，继而出血，出血量多，甚或大出血，此即小产之兆。

除上述征兆之外，或见气短心悸，或面色苍白，或头晕烦闷，或眼花恶心；脉滑或涩，或细数。

〔病机〕 因故伤胎，殒胎阻滞胞中，新血不循经，故流血量多，且小腹疼痛阵阵加剧，胎坠欲出，故会阴坠胀。

伤胎小产,胎气逼坠,子宫阵阵缩痛,故腹痛阵阵紧逼,会阴逼胀。胎膜破裂,故有羊水溢出。产门渐开,可少量出血。若胎衣剥离,出血量可增多。胎儿排出后,胎衣不下或有残缺滞阻,可酿成大出血。

失血过多,精血亏虚,故心悸,气短,面色苍白,头昏眼花,烦闷等证,若脉微涩或虚数,乃阴脱阳绝之兆。

〔治法〕 活血逐瘀,养血止血。

〔方药〕 生化汤(《傅青主女科》)加牛膝、红花、车前子。

当归 川芎 桃仁 炮姜 炙甘草

〔方义〕 当归、川芎、桃仁、炮姜温经止血,甘草和中,红花祛瘀,牛膝、车前引血下行。堕胎、小产在严密观察下,可用此方,以促使殒胎或瘀血排出。如出血过多,残留胎块不净,又不可拘泥此法此方,当采用它法尽快排出宫内残留物。

若为死胎稽留不下者,而无明显邪毒感染征象者,按“胎死不下”处理。若发热,腹痛,阴道溢液秽臭,为复感邪毒之象,去胎同时应予以清热解毒,上方加益母草、败酱草、红藤、蒲公英、丹皮。可按产后感染邪毒发热(见“产后发热”)处理。

若堕胎,小产后血止,证除可按产后调护。

2. 滑胎

〔主症〕 屡孕屡堕,甚或应期而堕,体质衰弱,腰膝酸软,精神萎靡,面部黯斑,或心悸气短,月经或有不调,或滑胎后又难于再孕,夜尿频多,脉沉弱,舌质淡嫩,苔薄白。

〔病机〕 先天不足。复损于肾气,以致不能荫胎、系胎,或脾虚中气亏损,化源匮乏,以致不能摄养胎元而滑胎。余证均为肾虚脾弱所致。

〔治法〕 补肾益脾,调冲任。

〔方药〕 补肾固冲丸(《中医学新编》)。

菟丝子 240 克 续断 90 克 巴戟天 90 克 杜仲 90 克
当归 90 克 熟地 150 克 鹿角霜 90 克 枸杞 90 克 阿胶 120
克 党参 120 克 白术 90 克 大枣 50 枚(去核) 砂仁 15 克。
上药共为细末,蜜为丸。宜在孕前服用,1 天 3 次,每次 6 克,月
经期停服。

此方适用于滑胎未孕前及孕以后检查无器质性病变者。

〔方义〕 方中菟丝子、续断、巴戟天、杜仲、鹿角霜补肾固
冲;当归、熟地、枸杞、阿胶养肝滋血;党参、白术、大枣补气益脾;
砂仁理气调中。全方肾、肝、脾,气血同治,以益冲任之本。

〔加减〕 若证兼难寐多梦,心烦咽干,大便结燥,苔黄薄,
此多因患者素体阴虚,孕后益虚,易生内热,热伤胞络,损及胎元
所致,治宜养血清热,方用保阴煎(见“月经先期”),以除虚热,
继可用补肾固冲丸调治。

【验方医案】

1. 加味固肾安胎汤(《千家妙方》)

当归 10 克 黄芩 10 克 白术 10 克 杜仲 6 克 菟丝子 6
克 黄芪 3 克 续断 3 克 砂仁 3 克 水煎服,每日 1 剂。

陈某,女,28 岁。患者 20 岁结婚,婚后怀孕 6 个月时,因负
重而流产。以后连续 3 次,均在怀孕 5 个月时流产。现怀孕已
4 个月,因此来诊。诊时已有流产之兆,其腰痛,少腹胀痛坠感,
伴胸闷不舒,厌食恶心,脉浮滑,舌质淡,苔嫩白腻。服上方 5 剂
后,孕情转佳。诸症悉除。又嘱其自后每月服上方 2 剂。连用
4 个月,则足月顺产。其后又孕产 1 胎,均安然无恙。

2. 龙胆泻肝汤加减(《四川中医》1980 年第 3 期)

当归 12 克 胆草 12 克 生地 12 克 熟地 12 克 木通 8
克 泽泻 8 克,车前子 10 克 柴胡 10 克 山栀 10 克 黄芩 10
克 白术 15 克 砂仁 6 克 煅龙骨 15 克 牡蛎 15 克 甘草 3

克 水煎服。每天1剂。

郑某,女,28岁。4年流产3次,多方治疗无效。诊近来怀孕50天,颜面黄胖,脘腹痞满,纳呆,恶心呕吐,口干苦,尿黄臭。苔黄腻,脉濡数。证属湿热下注胞宫,胎元不固。治宜清利湿热,固摄胎元法。服上方7剂愈。

3. 胶艾汤加减(《湖南中医院杂志》1984年第3期)

阿胶20克 黄芪20克 艾叶12克 当归12克 白芍12克 党参12克 白术12克 杜仲12克 续断12克 熟地15克 枣仁15克 水煎服。每天1剂。

吴某,女,31岁。停经2月,诊为早孕。现腰部酸痛,少腹坠胀,下血量少,色浅红,头晕乏力,舌淡苔白,脉沉细滑。曾自然流产两次。诊为流产先兆。服上方6剂,症状除,足月顺产。

4. 逐瘀保胎汤(程绍恩临床经验方)

山药15克 菟丝子10克 续断15克 寄生15克 杜仲5克 小茴香5克 炮姜5克 元胡9克 灵脂5克 没药5克 当归10克 蒲黄5克 川芎4克 官桂5克 赤芍7克 水煎服。每天1剂。

陈某,女,28岁。婚后4胎,均在5个月以上流产。现已怀孕4个月,腰酸痛,小腹坠胀,阴道见红,心慌不安,恐其流产,服保胎药无效而来诊。近来卧床不敢动转,不敢登厕,不敢坐立。余诊其舌隐青边有瘀血点。脉滑数。诊为胞宫血瘀,不能养胎,而致坠落。以上方4剂症状消失,阴道流血已止。继服此方4剂,足月生一男婴,母子健壮无恙。患者感谢之言不尽矣。

【文献选要】

《景岳全书·妇人规·胎动欲堕》:若腹痛血多,腰酸下坠,势有难留者,无如决津煎、五物煎助其血而落之,最为妥当。……若胎已死,当速去其胎,以救其母……凡气血衰弱无

以滋养其胎,或母有弱病,度其终不能成者,莫若下之,以免他患。

《景岳全书·妇人规·数堕胎》:凡妊娠之数见堕胎者,必以气脉亏损而然……盖气虚则提摄不固,血虚则灌溉不周,所以多致小产。

《叶天士女科全书》:有屡胎屡堕者,由于气血不充,名曰滑胎。

《妇产科理论与实践》:自然流产中染色体异常的胚胎占相当的比例,染色体畸形率占2%~50%,早期流产中染色体畸变率更高,有报道可达60%。

放射线照射、试剂(包括放射线离子)、药物、病毒等均会引起染色体断裂,缺失,环形成和易位等结构异常,而能导致流产。

六、胎萎不长

胎萎不长失滋养,气血虚弱宜八珍,

脾肾不足温土毓麟,去曲巴盆山术参。

【注】妊娠4~5月后,其腹形明显小于妊娠月份,胎儿存活而生长迟缓者,称为“胎萎不长”。胎萎不长的主要原因是胎儿失于滋养所致。若因气血虚弱者,宜八珍汤治之。若因脾胃不足者,宜温土毓麟汤去神曲治之。

【辨证论治】

1. 气血虚弱

〔主症〕妊娠4~5月后,胎儿存活,而腹形明显小于正常妊娠月份,身体羸弱,面色萎黄或㿗白,头晕气短,舌淡嫩少苔,脉细弱无力。

〔病机〕胎赖血以养,血虚气弱,则胎元失养,故胎虽存活,但生长迟缓,而腹形明显小于妊娠月份。血虚脑所失养,则头晕,气虚阳气不布,则气短不足以息。体瘦面色萎黄,舌淡少

苔，脉细弱无力，均为气血不足之候。

〔治法〕 补气益血养胎。

〔方药〕 八珍汤（方见“经行头痛”）

2. 脾肾不足

〔主症〕 腹形小于正常妊娠月份，腰部酸冷，纳少便溏，或形寒怕冷，手足不温，舌淡苔白，脉沉迟。

〔病机〕 因胞脉系于肾，脾肾不足，精血乏源，则胞脉失养，故胎不长养。脾虚失运，故纳少便溏；脾肾阳气虚衰，外腰失于温煦，则见腰部冷痛；不能温养胞脉肢体，则见形寒怕冷，手足不温。舌淡苔白润，脉沉迟，乃为脾肾不足之候。

〔治法〕 健脾温肾。

〔方药〕 温土毓麟汤（《傅青主女科》）去神曲。

巴戟天 覆盆子 白术 人参 山药 神曲

〔方义〕 方用巴戟天、覆盆子温肾暖胞以养胚胎；人参、白术、山药健脾益气以滋化源，使源盛流畅，则血有所生，胎有所养；神曲乃消食导滞之品，有碍胎元，故去之。

【验方医案】

1. 补胎汤（《中国名医大全》）

当归 15 克 熟地 15 克 炒白芍 10 克 炒白术 9 克 菟丝子 10 克 续断 12 克 炒杜仲 15 克 狗脊 12 克 陈皮 9 克 石斛 9 克 党参 12 克 炙黄芪 15 克 炙甘草 6 克 水煎服。每天 1 剂，早、晚各温服 1 次。

陈某，女，25 岁。1970 年 3 月 2 日。初诊。停经 5 个月，妊娠试验阳性，但腹部无感觉，少腹也无膨隆之象，妇科检查胎音不清，不觉胎动。自觉无不适感，脉象滑数，别无它恙，显系胎萎不长。嘱上方连服 10 余剂，胎儿逐渐发育。足月产一男孩。体健无病。

2. 十全大补汤加减(《妇科临证集要》)

红参 10 克 白术 10 克 茯苓 10 克 炙甘草 6 克 熟地 30 克 白芍 10 克 当归 10 克 川芎 6 克 杜仲 10 克 续断 10 克 阿胶 10 克 桑寄生 10 克 炙黄芪 30 克 菟丝子 15 克

李某,女,29 岁。1982 年 2 月 7 日初诊。怀孕 3 个月,由于操劳过度,先感腰酸神疲,腹坠漏红。经服中药漏红虽止,但此后发育不良,胎位不见长大,延至怀孕 6 月间,腹部不见增大,亦无胎动感觉,兼有精神疲倦,腹痛阵作,秽带连绵等象。他医认为胎已死,乃来就诊。脉虽细软但稍带滑,乃气血两亏,不能营养胎儿所致。治宜补气血,固肾益胎,予上方,服 12 剂后胎动,胎儿渐渐增大,至期产一女婴,母女平安。

3. 八珍汤加味(程绍恩教授临床经验方)

人参 10 克 白术 15 克 茯苓 15 克 炙甘草 10 克 当归 10 克 川芎 5 克 酒芍 10 克 熟地 20 克 山药 20 克 菟丝子 15 克 续断 15 克 桑寄生 20 克 水煎服。每天 1 剂。

侯某,女,31 岁。平素月经不调,时前时后,兼下白带。怀孕已 5 个月,腹部不见增大,兼有乏力,心悸、气短,面色皤白。舌淡,脉细弱无力。予上方 6 剂,停药后,腹部逐渐增大,足月生一女孩。

【文献选要】

《胎产心法》:胎气本乎血气而长,其胎不长者,亦惟气血之不足,故有受胎之后而漏血不止,则血不归胎者;有妇人中年气血衰败,泉源日涸者;有因脾胃病,仓禀薄,化源亏而冲任穷者;有多郁怒,肝气逆,血不调而胎失所养者;有血气寒而不长,阳气衰,生气少者;有血热而不长,火邪甚,真阴损者。种种不一,凡治此病,则宜补,宜固,宜温,宜清,因其病而随机应之,胎气渐充,自无不长。然又有妊母气血自旺,而胎不长者,此必父气孱

弱,又当大剂保元,专补其气,不得杂一味血药助母,则子气方得受益。总之,胎之能长而旺者,全赖母之脾土,输气于子。凡长养万物,莫不由土,故胎之生发虽主乎肾肝,而长养实关乎脾土。所以治胎气不长,必用八珍、十全、归脾、补中之类,助其母气以长胎。

七、胎死不下

胎死不下腹痛冰,口出秽气舌质青,
气血虚弱丹救母,瘀血脱花芒硝攻。

【注】胎死腹中,不能自行产出者,称为“胎死不下”。其诊断常见症状,腹部凉冷疼痛(“腹痛冰”)下坠,口出秽臭之气,舌质青黯。如因气血虚弱者,以养血活血益气下胎法,方用救母丹治之。若因瘀血而死胎者,方用景岳脱花煎,加芒硝攻之。

【辨证论治】

1. 气血虚弱

〔主症〕胎死腹中,小腹疼痛或有冷感,精神疲倦,面色苍白,气短懒言,食欲不振,或口有恶臭,舌淡黯,苔白腻,脉虚大而涩。

〔病机〕由于气血虚弱,运行无力,故死胎不能自下。胎死腹中,气机不利,不通则痛,故小腹疼痛或冷感。胎死日久,腐臭之气上逆,故口出恶臭。营卫不足,不能外荣于面,故面色苍白。中气不足,则神疲气短;气虚不运,中阳不振,则食欲衰退而苔腻。舌淡黯,脉虚大而涩,亦为气血虚少,运行不畅之象。

〔治法〕养血活血,益气下胎。

〔方药〕救母丹(《傅青主女科》)。

人参 当归 川芎 益母草 赤石脂 芥穗(炒黑)

〔方义〕方中当归、川芎、益母草养血活血;人参补气以助运血之功;赤石脂化恶血,使恶血去,而胎自下;炒荆芥引血归

经,使胎下而不致流血过多。

2. 血瘀

〔主症〕 妊娠胎动停止,阴道流血,包紫黑,口气恶臭,小腹疼痛,面色青黯,口唇色青,舌紫黯,脉沉涩。

〔病机〕 胎死腹中,故小腹疼痛,阴道下紫黑血块。胎死瘀久则口臭。面青唇黯,舌紫脉涩,均为血瘀之征。

〔治法〕 活血行气,祛瘀下胎。

〔方药〕 脱花煎(《景岳全书》)加芒硝。

当归 川芎 肉桂 车前子 牛膝 红花

〔方义〕 方中当归、川芎活血,川芎又能行血中之气,肉桂温通血脉,红花祛瘀,牛膝引血下行。更助车前子、芒硝滑利泻下以下死胎。合而用之,瘀血去而死胎下。如流血多者,加血余炭、炒蒲黄、茜草根以祛瘀止血。

【验方医案】

1. 医案一则(《朱小南妇科经验选》)

范某,37岁,已婚,工人。

患者33岁结婚,妊娠5个半月时腹部被撞伤,曾经两度见红,胎动消失。10月5日至某医院检查,检验小便妊娠试验阴性,认为胎儿已死腹中,久而不下,建议手术取胎,患者不愿。经该院介绍,来诊。

初诊:1985年11月6日,近日胸闷纳呆,撞伤至今已有月余,腹部不感胎动,虽妊娠6个半月,而胎反见萎缩,如4个月形状,切脉弦涩,乃采用活血下胎法。

当归尾9克 桃仁9克 牛膝梢9克 红花9克 京三棱9克 蓬莪术9克,煎汤送服大黄廬虫丸12克,3剂。

复诊:据述药后小腹隐痛,阴道已流血惟胎儿尚未落下,刻感精神疲乏,头晕肢软,脉弱虚弦,舌苔薄白,乃用黑神散加减,

温中活血。

当归9克 赤芍9克 熟地12克 黑豆12克 泽兰叶12克 肉桂3克 京三棱9克 蓬莪术9克 生甘草3克

死胎连胎盘全下,落下时胎儿已经腐烂,除腹部略有胀痛外,流血不多,经过良好。

2. 疗儿散加减(《四川中医》1989年第9期)

人参15克 牛膝藤15克 当归50克 益母草30克 川芎30克 乳香7克 1剂。水煎服。每4小时服1次。

胡某,23岁,妊娠9个月,因胎位不正,转胎时,术者动作不慎,胎心消失。诊断为胎儿死亡。证属:中气不足,胎死腹中,治宜补益正气,破瘀堕胎,予上方1剂15小时后,腹部有下坠感,痛剧,随之死胎顺下,孕妇安。

3. 医案一则(《中医妇科学·邓铁涛医案》)

陈某,妊娠8个月,胎动消失7天入院,诊断为死胎。入院后,未用其他方法治疗。诊其舌淡嫩,苔薄白,中有剥苔,脉大而数,重按无力。根据舌苔脉象的分析,舌嫩苔剥是津液受损,脉数大无力是气分不足,脉舌合参属气津两虚。问诊知其妊娠反应较重,呕吐剧烈,致伤津耗气。但胎死腹中属实证,是病实而体虚。考虑不宜纯用攻法。

一诊:治则以养津活血,行气润下。药用沙参、当归、枳实、玄明粉。

针刺足三里、合谷等配合治疗,连用2天,腹中毫无动静。

二诊:试用平胃散加味。

苍术9克 厚朴12克 陈皮12克 枳实12克 甘草4.5克 玄明粉12克(后下),2剂 水煎服。

第1剂服后滑下大便2次,第2次则毫无反应。

三诊:改用脱花煎(川芎、当归、牛膝、车前子、桂枝)服1

剂。死胎依然不下。

四诊:连用数方攻之不动,改用补气活血法。方用:五爪龙 党参 陈皮 当归 川芎但亦无效。

五诊:考虑前方补气行气之力不足,便改用加味开骨散。方用黄芪 120 克 当归 30 克 川芎 15 克 血余炭 9 克 龟版 24 克 煎服。

下午 4 时许服药,6 时许开始宫缩,晚上 8 时加用按摩针灸。先指按三焦俞、肾俞以行三焦之气,但按摩后,宫缩反而减弱,改用艾灸足三里,这一强壮穴以增强体力,灸半小时,继用针刺中极穴,每 2~3 分钟捻转 1 次,针后 1~3 分钟宫缩 1 次,宫缩甚为有力,共针 15 分钟,至夜间 11 时,死胎产下,为脐带绕颈。

【文献选要】

《景岳全书·妇人规》:凡子死腹中者,多为触伤,或犯禁忌,或以胎气薄弱不成而殒,或以胞破血干持久困败,但察产母腹胀舌黑者,其子已死。若非产期而觉腹中阴冷重坠,或为呕恶,或秽气上冲而舌见青黑者,皆子死之证,宜速用下死胎方下之。

《胎产心法》:子死腹中,急于胞衣未下。盖胞衣未下,子与母气尚相呼吸,若子死腹中,则躯形已冷,胞藏气寒,胎血凝冷,气不升降。欲下死胎,若以至寒之药用之,不惟无益而害母命者多矣。所以古人有用附子汤,使胎藏温暖,凝血流动,以附子能破寒气堕胎也。又有因患伤寒热病温症之类,胎受邪热,毒气内外交攻,因致胎死留于胞脏,古人深虑胎受毒气,必然胀大,故用朴硝、水银、硃砂之药,不惟使胎不胀,又能使胎形化烂,再付以行血顺气之药,死胎即下……

然下胎最宜谨慎,必先验明产母,面赤舌青,腹中阴冷重坠,

口秽气喘的确，方可用下，若见紫黑血块血缕，尤为确候。亦必先固妊妇本元，补气养血而后下之。予故重佛手散、香桂散、滑胎煎为下死胎之王道药也。倘孕妇遇有不安，医者未能审详，遂用峻厉攻伐，难免不测之祸，慎之慎之。

八、子 烦

子烦妊娠郁怒烦，阴虚参麦加心莲，
痰火呕恶胸脘闷，竹沥汤治头晕眩。

【注】 妊娠期间出现郁闷不乐，急躁易怒，心烦不安者，称为“子烦”。子烦属于阴虚者，宜人参麦冬散加莲子心治之，对心烦而兼有头目眩晕，心悸脘闷者有显效。

【辨证论治】

1. 阴虚

〔主症〕 妊娠心中烦闷，坐卧不宁，或午后潮热，手足热，烦热，口干咽燥，干咳无痰，渴不多饮，小溲短黄，舌红，苔薄黄而干，或无苔，脉细数而滑。

〔病机〕 心主神明，心火亢盛，神明不安，故烦乱不宁。阴虚内热，故午后潮热，手足心灼热。火热内炽，耗损津液，不能润肺，故口干咽燥，干咳无痰。渴不多饮，小溲短黄，舌红，苔薄黄而干或无苔，脉细数而滑，皆为阴虚生内热之候。

〔治法〕 清热养阴，安神除烦。

〔方药〕 人参麦冬散（《妇人秘科》）加莲子心。

人参 麦冬 茯苓 黄芩 知母 生地 炙甘草 竹茹

〔方义〕 人参益气生津；生地滋肾益阴以济心火；麦冬养心除烦，润肺生津；知母泻肾火，使水火既济；黄芩、竹茹清热除烦；莲子心清心火；炙甘草和中。共奏清热养阴，宁心安神

之效。

2. 痰火

〔主症〕 妊娠心胸烦闷，头晕心悸，胸脘满闷，恶心呕吐，苔黄而腻，脉滑数。

〔病机〕 素有痰饮停滞胸中，积久化热，痰火上乘心肺，故心悸；痰火上扰清阳，故头晕；痰湿内蕴，脾胃升降失常，故胸脘满闷，恶心呕吐。苔黄腻，脉滑数，乃痰火内盛之候。

〔治法〕 清热涤痰。

〔方药〕 竹沥汤（《千金要方》）去防风加浙贝母。

竹沥 麦冬 黄芩 茯苓 防风

〔方义〕 方中竹沥、浙贝母清热涤痰；麦冬养阴润肺，清热除烦；茯苓健脾宁心；黄芩泻火，使热去痰化，则烦自除。

【验方医案】

1. 清热化痰除烦方（《中医妇科学·子烦·案二》）

黄芩6克 麦冬6克 大乌豆24克 白芍6克 竹茹15克 忍冬藤15克 赤小豆9克 苦参9克 狗脊9克 水煎服，每天1剂。

陈某，女，40岁。工人。1964年12月4日。初诊。妊娠7个月，近2周来，时时心中烦闷，胸室痰黄，夜寐不安，口干心悸，腰酸，下肢筋惕，小便短赤，胎动不安，观其面赤唇红，舌苔薄黄，质红，切其脉来滑数。揣其病因，当是胎火痰热上扰所致。拟予清热化痰，以安胎元。以上方服3剂后，心中烦闷大瘥。续服5剂，烦闷心悸均除。

2. 人参麦冬散加减方（《女科临证集要》）

太子参30克 麦冬15克 茯神15克 黄芩10克 知母10克 生地30克 竹茹6克 莲心6克 甘草5克 川黄连6克 水煎服。每天1剂，早晚各服1次。

杨某,女,37岁。1979年7月14日初诊。怀孕5月余,近半月来,心中烦闷,坐卧不宁,午后潮热,手足发热,口干舌燥,渴不多饮,辗转床帷,时发呻吟。自言有无法形容之苦。视其舌红,苔薄黄而干,诊脉细数而滑,此乃“子烦”。心火偏亢,热扰心胸。治以清热养阴,安神除烦,用上方3剂而安。又服3剂痊愈。

3. 温胆汤加减(《女科临证集要》)

橘红10克 茯苓10克 甘草6克 枳实6克 竹茹6克 天竺黄10克 竹叶10克 黄芩10克 山栀子5克 贝母10克 水煎服。每天1剂。

吕某,女,25岁。1977年6月7日诊。妊娠7个月,烦躁不安,心惊胆怯,头晕心悸,胸脘满闷,恶心呕吐,苔黄而腻,脉滑数。此痰火郁积胞中所致。以上方6剂而愈。

4. 竹沥汤加减(《妇科探真》)

竹沥10克 麦冬15克 炒黄芩15克 炒黄连10克 竹茹10克 山楂10克 水煎服。每天1剂。

蒋某,女,26岁。妊娠3个月,胸闷,心烦不安,夜不能眠,恶心呕吐,头晕目眩,已5天。舌鲜红,苔黄厚微腻,脉弦滑略数。服上方3剂,心烦明显好转,继服3剂而愈。

【文献选要】

《重订严氏济生方》:妊娠……四月受少阴君火气以养精,六月受少阳相火气以养气,所以如是。又有不拘此两月,而苦烦闷者,由母将理失宜,七情伤感,心惊胆怯而然也。

《校注妇人良方·妊娠子烦方论》:妊娠苦烦心者……产宝云,是心肺虚热或痰积于胸,若三月而烦者,但热而已,若痰饮而烦者,吐涎恶食。大凡停痰积饮,寒热相搏,吐甚则胎动不安。

九、子 肿

子肿头面四肢肿，脾虚身肿白术明，
肾虚腰酸真武用，气滞导水天仙藤。

【注】 妊娠后，肢体面目发生肿胀者，称为“子肿”。因脾虚而肿者，由头面四肢，遍及周身皆肿。可用白术散加砂仁治之（白术明也）。若因肾虚而肿者，则有腰酸膝软症状，用真武汤治之。因气滞而肿者，可用茯苓导水汤或天仙藤散治之。

【辨证论治】

1. 脾虚

〔主症〕 妊娠数月，面目四肢浮肿，或遍及全身，肤色淡黄或㿔白，皮薄而光亮。胸闷气短，懒于语言，口淡无味，食欲不振，大便溏薄。舌质胖嫩，苔薄白或薄腻，边有齿痕，脉缓滑无力。

〔病机〕 脾主肌肉，四肢，脾阳不运，水湿停聚，浸渍四肢肌肉，故面目四肢浮肿。脾虚中阳不振，故胸闷气短，懒于语言。中焦运化失司，故口淡纳少，大便溏薄。水聚皮下，则皮薄而光亮。肤色淡黄，舌质淡胖嫩，边有齿痕，苔薄腻或薄白，脉缓滑无力，俱为脾虚中阳不振之候。

〔治法〕 健脾行水。

〔方药〕 白术散（《全生指迷方》）加砂仁。

白术（蜜炙） 茯苓 大腹皮 生姜皮 橘皮

〔方义〕 方中白术、茯苓健脾利水；砂仁、生姜皮温中理气；大腹皮下气宽中行水；橘皮调气和中。全方具有健脾理气，温中行气作用。

2. 肾虚

〔主症〕 孕后数月，面浮肢肿，下肢尤甚，按之没指，心悸

气短，下肢逆冷，腰酸无力，舌淡苔白润，脉沉细。

〔病机〕 肾阳不足，上不能温煦脾阳，下不能温运膀胱，则脾失健运；膀胱气化不行，水湿莫制，泛滥肌肤，故面浮肢肿；阳虚不能外达，故下肢逆冷；水气凌心，故心悸气短；腰为肾之府，肾虚则腰酸无力。舌淡苔白润，脉沉细，亦为肾阳不足之征。

〔治法〕 化气行水。

〔方药〕 真武汤（《伤寒论》）。

附子 生姜 茯苓 白术 白芍

〔方义〕 方中附子温肾化气行水；生姜、白术、茯苓运脾阳以行水；白芍开阴结，与附子同用能引阳药入阴以消阴霾之气，共奏温阳、化气、行水之效。方中附子有毒，用量不宜过重，同时应于久煎，以减少毒性。或可易桂枝以通阳化气行水。

3. 气滞

〔主症〕 妊娠3~4个月后，先由脚肿，渐及于腿，皮色不变，随按随起，头晕胀痛，胸闷胁胀，食少，苔薄腻，脉弦滑。

〔病机〕 证因气机郁滞，升降失司，清阳不升，浊阴下滞，故先由脚肿，渐及于腿。此因气滞而非水停，故皮色不变，随按随起。清阳不升，浊阴上扰，故头晕胀痛。气滞不宣，故胸闷胁胀而食少。苔薄腻、脉弦滑，均为妊娠气郁之象。

〔治法〕 理气行滞，佐以健脾化湿。

〔方药〕 天仙藤散（《校注妇人良方》）合四苓散（《丹溪心法》）。

天仙藤 香附 陈皮 甘草 乌药 生姜 木瓜 紫苏叶
茯苓 猪苓 白术 泽泻

〔方义〕 方中天仙藤、香附理气行滞；陈皮、生姜温中行气；苏叶理气宽中；乌药开下焦之郁滞；木瓜行气除湿；甘草调和

诸药;合四苓散健脾行水,共奏理气行滞,健脾化湿之功。

〔加减〕 如偏于湿阻者,症见头昏头重,胸闷呕恶,纳少便溏,苔厚腻,脉沉滑。用茯苓导水汤(《医宗金鉴》)去槟榔。

茯苓导水汤:茯苓 槟榔 猪苓 砂仁 木香 陈皮 泽泻 白术 木瓜 大腹皮 桑白皮 苏叶

方中茯苓、白术、猪苓、泽泻,健脾行水,木香、砂仁、苏叶,醒脾理气。大腹皮、桑白皮消胀行水,木瓜行气除湿。

【验方医案】

1. 温阳化水汤(《中医妇科学》)

桂枝 10 克 巴戟天 10 克 破故纸 10 克 云茯苓 30 克 白术 10 克 生姜皮 3 克 水煎服。每天 1 剂,早、晚各服 1 次。

李某,女,28 岁。干部,1975 年 8 月 6 日诊。妊娠 4 个月,面浮肢肿,顽固不消,阴唇及下肢肿甚,妨碍行动,心悸气短,下肢逆冷,腰酸无力,尿少。诊之舌淡苔白,脉沉迟。服上方 3 剂后,下肢浮肿消一半。腰仍酸痛,前方加杜仲 10 克(壮腰止痛)。继服 3 剂后,诸症消失而痊愈。

2. 健脾行水方(《女科临证集要》)

白术 15 克 茯苓皮 10 克 大腹皮 10 克 生姜皮 10 克 陈皮 10 克 砂仁 6 克 党参 30 克 黄芪 50 克 木香 10 克 炙甘草 5 克 防己 5 克 车前子 30 克 水煎服,每天 1 剂。早、晚各服 1 次。

李某,女,28 岁。1976 年 4 月 7 日诊。妊娠 7 个月,双下肢高度浮肿月余。症见下肢肿甚,肤色淡黄,皮薄而光亮,按之凹陷,胸闷气短,懒于语言,并有低热,咳嗽少痰,小便短少,大便溏薄,食欲不振,舌淡苔少,脉滑。此脾阳不运,水湿停聚所致。治宜健脾行水。以上方 3 剂,小便逐渐增多,浮肿开始消退。又服 6 剂,浮肿显著消退。续服 6 剂,病告痊愈。

【文献选要】

《医宗金鉴·妇科心法要诀》：头面遍身浮肿，小水短少者，属水气为病，故名曰子肿。自膝至足肿，小水长者，属湿气为病，故名曰子气。遍身俱肿，腹胀而喘，在六七个月时者，名曰子满。但两脚肿而肤厚者，属湿，名曰皱脚；皮薄者属水，名曰脆脚。大凡水之为病多喘促，气之为病多胀满。喘促属肺，胀满属脾也。

十、子 满

子满腹大胸膈满，喘不得卧气息短，
胞中蓄水脾湿盛，千金鲤鱼汤加减。

【注】 妊娠五六个月出现胎水过多，腹大异常，胸膈满闷，喘不得卧，气息短促，呼吸困难者，名曰“子满”。（西医称为“羊水过多”）。此证属于脾虚湿盛，胞中蓄水过多。宜千金鲤鱼汤加减疗效甚佳。

【辨证论治】

〔主症〕 妊娠中期，出现腹大异常，胸膈满闷，呼吸迫促，神疲肢软，舌淡胖，苔白腻，脉沉滑无力。

〔病机〕 脾土湿盛，胞中蓄水，则腹大异常。水湿上迫心肺，则胸膈满闷，呼吸迫促。脾虚中阳不振，则神疲肢软，舌淡胖。苔白腻，脉沉滑无力，为脾虚湿盛之象。

〔治法〕 健脾渗湿，养血安胎。

〔方药〕 鲤鱼汤（《千金要方》）加陈皮。

鲤鱼 白术 生姜 白芍 当归 茯苓

〔方义〕 方中鲤鱼行水消肿；白术、茯苓、生姜、陈皮健脾理气渗湿以行水；当归、白芍养血安胎，使水行而不伤胎。

〔加减〕 如阳虚者，可酌加桂枝通阳化气。

子满常见胎儿畸形，除按上法治外，可结合现代医学有关检

查,如发现胎儿畸形,应及时终止妊娠。

【验方医案】

1. 加减茯苓导水汤(《千家妙方·下册》)

党参12克 白术15克 茯苓12克 猪苓12克 泽泻12克 桂枝6克 篇蓄12克 木香6克 陈皮9克 桑白皮12克 砂仁6克 水煎服。1天1剂。

悦某,女,29岁。妊娠5个月,而腹大如8个月之状,小便不利,呼吸不畅,下肢明显浮肿。舌淡,苔白,脉滑。诊为:胎水多症(羊水过多)。投上方7剂。小便通利,腹胀减轻。又进5剂,下肢浮肿已消退。嘱其照原方继续服用。减为每3天服1剂,服药50余天,未见水肿再发。

2. 加减全生白术散(《中国当代名医验方大全》)

炒白术20克 炒陈皮6克 大腹皮10克 猪苓10克 茯苓10克 炒枳壳10克 冬瓜皮30克 水煎服。每天1剂。

蒋某,女,30岁。怀孕5月余,半月前发现面、脸浮肿,胸膈胀满,腹部胀大异常……近日病情加重,行动不利,舌苔薄白腻。脉濡。宫底脐上4指,腹周93厘米。诊为急性羊水过多。病属脾虚湿盛,水渍胞中,急宜健脾行气利水消肿,以免后患。服上方5剂尿量增多,肿势顿减,喘促轻微。惟腰酸如故,仍服上方5剂后,以香砂六君子汤后而痊愈,足月顺产一女婴。

3. 茯苓导水鲤鱼汤(《女科临证集要》)

茯苓30克 木香10克 砂仁10克 陈皮10克 白术20克 泽泻10克 大腹皮10克 人参10克 枳壳10克 葶苈子10克。另用鲤鱼1条(500克重)煮熟去鲤鱼,以鱼汤煎药。

孟某,女,24岁。1980年7月3日诊。怀孕6月余,孕后经常头晕目眩,心悸、气短,下肢酸软,食欲欠佳,日渐加剧,近20余天来,腹部突然增大,腹围90厘米。身重体困腹胀气喘,少腹

坚而小便少,大便微溏,舌淡苔白,脉沉细。妇科检查诊为“羊水过多”病。治疗效果不显而来就诊。此为“子满”因脾虚不能制水,水停胞宫所致。予上方3剂病减。又连服9剂而告痊愈。

【文献选要】

《胎产心法》:所谓子满者。妊娠至五六个月。胸腹急胀,腹大异常,或遍身浮肿,胸胁不分,气逆不安,小便艰涩,名曰子满。又为胎水不利。若不早治,生子手足软短有疾,甚至胎死腹中。宜服千金鲤鱼汤治其水。如脾虚不运,清浊不分,佐以四君五皮。亦有用束胎饮以治子满证甚效。

十一、子 晕

子晕妊娠头晕眩,阴虚肝旺杞菊丸,
脾虚肝旺面肢肿,白术散加钩石痊。

【注】 妊娠中期或晚期出现头目眩晕,状若眩冒者称为“子晕”或称“子眩”。如出现阴虚肝旺症状者,以杞菊地黄丸加石决明、钩藤、龟版、何首乌治之。若子晕兼有脾虚肝旺症状者,宜白术散加钩藤、石决明等则痊愈。

【辨证论治】

1. 阴虚肝旺

〔主症〕 妊娠头晕目眩,心悸怔忡,夜寐多梦易惊,颜面潮红,舌红或绛,脉弦细,或滑数。

〔病机〕 胎赖精血以养,若素体肾精肝血不足,孕后精血益虚,空窍失养,则头晕目眩;心失所养,则心悸怔忡,夜寐多梦;精血不足,虚热上乘,则面色潮红。舌红或绛,脉弦细或滑数,乃为阴虚肝旺之象。

〔治法〕 育阴潜阳。

〔方药〕 杞菊地黄丸(方见“经行头痛”)加石决明、钩藤、

龟版、何首乌。

〔方义〕 方中以六味地黄丸滋肾壮水；枸杞、菊花清肝明目；加石决明、龟版育阴潜阳；钩藤镇静平肝，首乌养血。共奏养肝阴，镇摄浮阳之效。

2. 脾虚肝旺

〔主症〕 妊娠中后期，面浮肢肿，头昏头重如眩冒状，胸胁胀满，纳差便溏，苔厚腻，脉弦滑。

〔病机〕 脾虚运化失司，水湿泛滥肌肤，则面浮肢肿。脾虚湿浊挟肝阳上扰，则头脑昏重如眩冒状。脾虚肝郁则胸胁胀满，纳差便溏。苔厚腻，脉弦滑均为脾虚肝旺之征。

〔治法〕 健脾利湿，平肝潜阳。

〔方药〕 白术散（方见“子肿”）加钩藤、石决明。

【验方医案】

1. 子晕方（《中医妇科验方选》）

龙胆草 5 克 丹皮 9 克 炒山栀 9 克 当归 9 克 生地 12 克 白芍 9 克 钩藤 12 克 白蒺藜 12 克 生石决明 15 克（先煎） 茯苓 9 克 天仙藤 30 克 水煎服。

功效：泻肝清眩，养血柔肝。

主治：妊娠后期、高血压综合征。头晕头胀，下肢浮肿，口苦且渴，有时鼻衄，夜寐不安，血压升高，小便有蛋白尿，舌红苔薄，脉弦数者。

2. 平肝清眩饮（《中医妇科验方选》）

生石决明 50 克 草决明 50 克 珍珠母 20 克 白芍 20 克 生地 20 克 菊花 30 克 黄芩 20 克 生龟版 20 克 水煎服。每天 1 剂。

功效：平肝潜阳，养阴清眩。

主治：妊娠眩晕，或子痫及一切肝阳上亢之征。

3. 阴虚肝旺方(《精选千家妙方》)

生地 30 克 菊花 15 克 白芍 30 克 女贞子 30 克 旱莲草 30 克 黄芩 12 克 寄生 30 克 珍珠母 30 克 水煎服,每天 1 剂。

功效:育阴潜阳。

主治:妊娠头晕目眩,心悸、怔忡、夜寐多梦、易惊、面潮红、舌红绛、脉弦细滑数者。

【文献选要】

《女科证治约旨》:一妊娠眩晕之候,名曰子晕。如因肝火上升,内风扰动,致昏眩欲厥者,宜桑丹杞菊汤主之。桑叶、丹皮、菊花炒杞子、煨天麻、焦山栀、生地、钩藤、橘红。如因痰涎上涌,致眩晕欲呕者,宜加味二陈汤主之,法半夏、陈皮、茯苓、甘草、川贝、瓜蒌皮、淡竹沥、姜汁。

十二、子 痫

子痫产前抽搐频,肝风痰火并加临,

肝风羚角钩藤饮,痰火牛黄清心神。

【注】 妊娠晚期或正值临产期,或新产之后,发生抽搐,昏不知人,手足搐搦,全身强直,双目上视,须臾而醒、醒而复发,或昏迷不醒者,称为子痫。子痫病因,属于肝风内动者,宜羚角钩藤汤治之;属于痰火上扰者,宜牛黄清心丸加竹沥治之。

【辨证论治】

1. 肝风内动

〔主症〕 妊娠后期,颜面潮红,心悸烦躁,突发四肢抽搐,甚则昏不知人,舌红苔薄黄,脉弦滑。

〔病机〕 肾精不足,肝阳上亢,则颜面潮红。心火偏旺,则心悸而烦。热扰神明,则昏不知人。风火相煽,筋脉挛急,则手

足搐搦。舌红苔薄黄，脉弦滑数，均为心肝二经热极生风之候。

〔治法〕 平肝熄风。

〔方药〕 羚角钩藤汤(《重订通俗伤寒论》)。

羚羊角 (后人)钩藤 桑叶 菊花 贝母 鲜竹茹 生地 白芍 茯苓 甘草

〔方义〕 方中以羚羊角、钩藤平肝清热，熄风镇痉；桑叶、菊花清肝明目；竹茹、贝母清热化痰；生地、白芍养阴清热；茯神宁心安神，甘草缓急和中。全方共奏平肝、育阴、熄风镇痉之效。

2. 痰火上扰

〔主症〕 妊娠晚期，或正值分娩时，猝然昏不知人，四肢抽搐，气粗痰鸣，舌红苔黄腻，脉弦滑。

〔病机〕 心肝热盛，灼津伤液，炼液成痰，痰火上扰清阳，则昏不知人，气粗痰鸣。痰阻经脉，精血输送受阻，肝失濡养，肝风内动，则四肢抽搐。舌红苔黄腻，脉弦滑，乃属痰热内盛之征。

〔治法〕 清热、豁痰、开窍。

〔方药〕 牛黄清心丸(《痘疹世医心法》)加竹沥。

牛黄 朱砂 黄连 黄芩 栀子仁 郁金

〔方义〕 方中牛黄、竹沥清心、化痰、开窍；黄连、黄芩、山栀以清心肝之热；朱砂安神镇惊；佐郁金以开心胸之郁，使气通利，经脉畅，则痰热除，抽搐止。

【验方医案】

1. 育阴潜阳镇肝熄风方(《中医妇科学》)

羚羊角 2 克(研末吞服) 生地 30 克 麦冬 10 克 牛膝 10 克 生白芍 12 克 紫石英 10 克 沙参 10 克 川贝母 10 克 菊花 10 克 僵蚕 10 克 玉竹 10 克 女贞子 10 克 乌梢蛇 10 克 槟榔 10 克 蜈蚣 2 条

贺某,女,30岁,农民。住某产院治疗。1971年11月15日初诊。预产期已过,住院待产。于本日下午4时,突发抽搐,两目上翻,人事不知而厥。脉弦数而细,舌尖红绛。诊为“子痫”。先以铁秤锤烧红入醋,就鼻熏之,稍得安静,口不紧咬之后服上方1剂,每4小时服1次。服后渐次停止抽搐,人事渐清醒,天明分娩,母子平安。

2. 八珍汤加减(《男女科病千首妙方》)

白芍12克 当归10克 川芎9克 黄芪30克 党参30克 熟地20克 茯苓20克 白术10克 五味子10克 炙甘草3克 砂仁6克 水煎服,每天1剂。

王某,女,25岁,停经5个月,并发四肢顽固性抽搐与颤抖(双上肢明显),阵阵牙关紧闭,血钙 2.38mmol/L ,舌质淡而苔少。脉弦细。证属血虚生风。治以养血熄风,补气养血营筋之法。投上方10剂,抽搐停止。续用月余,诸症悉除,足月顺产一男婴。

3. 羚羊钩藤汤加减(《女科临证集要》)

羚羊角粉3克(另炖服) 钩藤10克 菊花10克 白芍10克 当归10克 石决明30克 龙齿30克 黄连6克 黄芩10克 生地20克 竹茹6克 水煎服。

侯某,女,31岁。1974年10月7日诊。怀孕9月余,在近期内,全身浮肿明显,头晕头痛,心悸、气短,面色潮红,日前抽搐2次,当日连续抽搐4次。此名“子痫”,服上方1剂后子痫未再发作。8日又服1剂,即行分娩,产后未再复发。

【文献选要】

《诸病源候论·妊娠痉候》:体虚受风,而伤太阳之经,停滞经络,后复遇寒湿相搏,发则口噤背强,名之为痉。妊娠而发者,郁冒不识人,须臾醒,醒复发。亦是风伤太阳之经作痉也。亦名

子痛，亦名子冒也。

《沈氏女科辑要笺正·妊娠似风》：妊娠病源有三大纲。一曰阴亏，人身精血有限，聚以养胎，阴分必亏。二曰气滞，腹中增一障碍，则升降之气必滞。三曰痰饮，人身脏腑接壤，腹中遽增一物，脏腑之机括为之不灵，津液聚为痰饮。知此三者，庶不为邪说所惑。妊妇猝倒不语，或口眼歪邪，或手足瘳痲，皆名中风。或腰背反张，时昏时醒，名为痉，又名子痛。古来皆作风治，不知猝倒不语，病名为厥。阴虚失纳，孤阳逆上之谓。口眼歪邪，手足瘳痲，或因痰滞经络，或因阴亏不吸，肝阳内风暴动。至若腰背反张一证，临危必见戴眼，其故何欤？盖足太阳膀胱之经脉，起于目内眦，上额交巅，循肩臂内，夹脊抵腰中；足太阳主津液，虚则经脉时缩，脉缩，故腰背反张。经云：“瞳子高者，太阳不足”，谓太阳之津液不足也。脉缩急则瞳子高，甚则戴眼。治此当用地黄、麦冬等药，滋养津液为主。胎前病，阳虚者绝少，慎勿用小续命汤。

各
论

十三、子 悬

子悬胸膈胀满成，甚则喘急烦不宁，

紫苏饮加黄芩效，续用阿胶养血灵。

【注】 妊娠胸膈胀满，甚则喘急，烦躁不宁者，称为“子悬”。《医宗金鉴·妇科心法》曰：“胸膈胀满子悬名，喘甚由胎上逼心。”故亦名“胎上逼心。”方用紫苏饮加黄芩，可收满意疗效。服上方若症状缓解，惟烦躁不安者，可继续服用阿胶养血汤更有灵验。

【辨证论治】

〔主症〕 妊娠胸腹胀满，痞满不舒，呼吸迫促，坐卧不舒，烦躁不安，苔薄黄，脉弦滑。

〔病机〕 孕妇素体肝郁脾虚，肝为刚脏，性喜条达，肝气郁结而乘脾。脾胃气壅，升降失调，故胸腹胀闷疼痛，坐卧不安，甚则烦躁不宁。胎气上逆迫肺，则呼吸不畅，甚则喘促。苔薄黄，脉弦滑，也为肝旺脾弱所致。

〔治法〕 疏肝扶脾，理气行滞。

〔方药〕 紫苏饮(《普济本事方》)加黄芩。

紫苏 陈皮 大腹皮 白芍 当归 川芎 人参 甘草

〔方义〕 方中紫苏、陈皮、大腹皮宽中下气；当归、白芍养血柔肝；川芎疏肝理气；人参、甘草益气扶脾；加黄芩以清热安胎。全方重在疏肝理气，调和肝脾，以达到胎气安和之目的。

〔加减〕 服上方后，若胸腹胀满，呼吸促迫等标病已解，惟觉烦躁不安者，又宜滋阴养血以培其本。方用阿胶养血汤(《中医妇科治疗学》)。

阿胶养血汤 阿胶 生地 沙参 麦冬 女贞子 旱莲草 桑寄生

方中阿胶，生地以养血，沙参、麦冬以滋阴，合女贞子、旱莲草、桑寄生补肝肾之阴以安胎。

【验方医案】

1. 紫苏饮加味(《河北中医》1984年第4期)

苏梗10克 当归10克 陈皮10克 大腹皮7克 白芍12克 川芎3克 人参5克 甘草5克 黄芩3克 水煎服。每天1剂。

廉某，女，36岁。妊娠5个月，自觉胸闷腹胀，时时作痛，日益加重，伴呼吸急迫，坐卧不宁，食欲减少。舌苔薄黄，脉弦滑。诊为“子悬”。服上方3剂，后改服阿胶养血汤，隔日1剂愈。

2. 疏肝扶脾理气行滞方(《女科临证集要》)

紫苏15克 陈皮10克 大腹皮10克 白芍10克 当归

10克 川芎6克 党参15克 甘草5克 黄芩10克 水煎服。每天1剂。

刘某,女,25岁,1981年5月9日诊。

怀孕6个月余,近日忽觉胸膈胀满疼痛,视其舌苔色薄黄,脉象弦滑。诊为“子悬”予上方1剂,胀痛衰其大半。3剂痊愈。

【文献选要】

《医学心悟》:子悬者,胎上迫也。胎气上逆,紧塞于胸次之间,名曰子悬。其症由于恚怒伤肝者居多。亦有不慎起居者,亦有脾气郁结者,宜用紫苏饮加减主之。

各
论

十四、子 瘖

子瘖声哑语言难,九月晚期阴虚原,
咽干头晕掌心热,沙麦六味地黄丸。

【注】 妊娠晚期,九月之后,出现声音嘶哑,语言难出者,称为“子瘖”。《医宗金鉴·妇科心法》曰:“子瘖声哑细无音,非谓绝然无语声,九月胎盛阻其脉,分娩之后自然通。”其主要原因,是由阴血养胎,阴虚不能滋润舌本所致。故有咽干、头晕、五心烦热(掌心热)等症状,宜六味地黄丸加沙参、麦冬等养阴之药治之。

【辨证论治】

〔主症〕 妊娠八九月,声音嘶哑,咽喉干燥,头晕耳鸣,掌心灼热,心悸而烦,便结,小便短赤,舌红苔花剥,脉细数。

〔病机〕 肺肾阴虚,复因胎体渐长,阴津益感不足。肾精不能上乘,则声音嘶哑,咽喉干燥。肾主骨,骨生髓,脑为髓海,开窍于耳。肾虚脑失所养,则头晕耳鸣。阴虚不能敛阳,故掌心灼热,心悸而烦。肺与大肠相表里,肺失濡润,则大便燥结。阴虚内热,则小便短赤。舌红苔花剥,脉细数均为阴津不足,虚热

内生之象。

〔治法〕 滋肾益阴。

〔方药〕 六味地黄丸(《小儿药证直诀》)加沙参、麦冬。

熟地 山茱萸 山药 泽泻 茯苓 丹皮

〔方义〕 本方可改用汤剂服用。方中熟地、山茱萸补肝肾之精;山药健脾益肾;丹皮,泽泻清热泻火;茯苓淡渗利小便。

〔加减〕 加沙参、麦冬生津润肺,使津充液盛,上荣舌本,则声自出。如肺挟痰火,咳吐浓痰,咽干口燥,则宜滋阴润肺,可于方中去泽泻、山茱萸,加瓜蒌仁、芦根、桔梗、贝母清热化痰,润肺生津。

〔验方医案〕

1. 加味地黄汤(《女科临证集要》)

熟地 20 克 山茱萸 10 克 山药 15 克 茯苓 10 克 泽泻 10 克 丹皮 10 克 五味子 10 克 麦冬 10 克 大海 3 克 水煎服。每天 1 剂。

刘某,女,28 岁,1981 年 7 月 4 日诊。瘖哑难言,其妹代诉:“患者妊娠 9 个月期间开始喉咙干燥,颧颊潮红,头晕耳鸣,腰酸腿困,五心烦热,心慌失眠,大便时干时稀,小便黄赤。数日后先声哑,后不语”,舌苔花剥,脉细数,两尺脉尤弱。此胎孕受足少阴养之,肾为声音之根。肾水亏损,津液不能上荣于舌本,而致失音不语,拟用麦味地黄汤,壮水制火,生津润肺。以上方 3 剂好转,5 剂痊愈。

2. 生脉补肺汤(《女科临证集要》)

红参 10 克 五味子 10 克 麦冬 10 克 炙甘草 5 克 炙黄芪 20 克 熟地 20 克 紫菀 10 克 桑皮 10 克 枳壳 10 克 桔梗 10 克 水煎服。每天 1 剂。

张某,女,29 岁。1982 年 3 月 4 日诊。怀孕 7 个月后,气短,自汗,面色苍白,常易外感,喉中哮喘,痰涎常吐。一日突然

发现声哑不语,舌淡白,脉虚无力。拟以生脉补肺汤,生津润燥。上方3剂,声音始发,但还痰多咳嗽,说话困难,又以上方加川贝母5克,杏仁10克,白芥子8克。续服5剂而语言复旧。

【文献选要】

《女科证治约旨》:妊娠音涩之候,名曰子瘖。由于少阴之脉,下养胎元,不能上荣于舌,故声音不扬。待足月生产,自能复常,本非病也。即《内经》“妇人身重,九月而瘖”之谓,可不必治。如必欲治之,宜加味桔梗汤主之(桔梗、甘草、元参、麦冬、金石斛、细辛)。

各
论

十五、子 嗽

子嗽久咳五心烦,阴虚肺燥肺火痰,

阴虚百合固金用,痰火清金降火痊。

【注】 妊娠期中久嗽不已,或伴有五心烦热者;称为“子嗽”。子嗽属于阴虚肺燥者,宜百合固金汤;属于痰火犯肺者,宜清金降火汤。

【辨证论治】

1. 阴虚肺燥

〔主症〕 妊娠咳嗽,干咳无痰,甚或痰中带血,口干咽燥,手足心热,舌红少苔,脉细滑数。

〔病机〕 阴虚津亏,虚火内生,则灼肺伤津,故干咳无痰,口干咽燥。肺经受损,则痰中带血。五心烦热,则为阴虚阳浮之象;舌红少苔,脉细滑数,乃为阴虚热盛之兆。

〔治法〕 养阴润肺,止嗽安胎。

〔方药〕 百合固金汤(《医方集解》引赵戴庵方)去当归、熟地加桑叶、阿胶、黑芝麻、炙百部。

玄参 桔梗

〔方义〕 方中百合、百部润肺止咳；麦冬、玄参养阴清肺；白芍养血敛阴；生地、芝麻以补肝肾之阴；贝母化痰止咳；桑叶、桔梗、甘草清肺利咽；阿胶助白芍养血止血。全方重在养阴，润肺，滋肾，使金水相生，阴津充足，虚火自平，则咳嗽自愈。

2. 痰火犯肺

〔主症〕 妊娠咳嗽，咳痰不爽，痰液黄稠，面红口干，舌红苔黄腻，脉滑数。

〔病机〕 素有痰湿，郁久生热，痰热壅肺，灼肺伤津，则咳痰不爽，痰黄而稠；痰热内扰，津液不能上承，故面红口干。舌红苔黄腻，脉滑数，均为痰热内盛之象。

〔治法〕 清金化痰，止咳安胎。

〔方药〕 清金降火汤（《古今医鉴》）去石膏，加桑叶、枇杷叶。

黄芩 北杏仁 贝母 前胡 瓜蒌仁 石膏 炙甘草 陈皮 茯苓 法半夏 桔梗 生姜 枳壳

〔方义〕 方中黄芩、桑叶、枇杷叶清金宣肺，并能安胎；北杏仁、贝母、瓜蒌仁、前胡、桔梗化痰止咳；茯苓、炙甘草、陈皮、法半夏、生姜、枳壳健脾除湿，利气化痰。共奏清金化痰，止咳安胎之效。

【验方医案】

1. 清肺安胎饮加减（《陕西中医》1983年第3期）

知母4.5克 贝母9克 白术9克 木瓜9克 黄芩9克 炒苏子3克 麦冬6克 茯苓6克 枳壳6克 元参6克 秦艽6克 灯心草1克 每天1剂，水煎服。

乔某，女，26岁。妊娠后咳嗽不止，潮热盗汗，手足心热，小便赤少，头面肢体浮肿，舌干苔腻，脉滑数。证属肺火上扰肺阴，肺气上逆，予上方2剂，咳嗽大减，续服2剂痊愈。

2. 紫菀汤(《中医妇科验方选》)

紫菀9克 知母9克 贝母9克 杏仁9克 前胡9克
桑皮9克 黄芩9克 桔梗6克 甘草6克 紫苏15克 青
蛤散15克 麻黄3克 干芦根30克 水煎服。

功效:清肺祛热,泻火止咳,安胎。

主治:子嗽、干咳无痰者。

【文献选要】

《医宗金鉴·妇科心法要诀》:妊娠咳嗽,谓之子嗽。嗽久每致伤胎。有阴虚火动痰饮上逆,有感冒风寒之不同。因痰饮者,用二陈汤加枳壳、桔梗治之;因感冒风寒者,用桔梗汤,即紫苏叶、桔梗、麻黄、桑白皮、杏仁、赤茯苓、天冬、百合、川贝母、前胡也。若久嗽,属阴虚,宜滋阴润肺以清润之,用麦味地黄汤治之。

《校注妇人良方》:嗽久不愈者,多因脾土虚而不能生肺气,而腠理不密,以致外邪复感;或因肺气虚不能生水,以致阴火上炎所致。治法当壮土金,生肾水为善。

十六、子 淋

子淋妊娠尿频急,尿道涩痛尿淋漓,
实热口疮导赤散,湿热加味五淋奇,
阴虚颧红五心热,麦味知柏地黄宜。

【注】 妊娠期间出现尿频、尿急、尿道涩痛,尿淋漓不尽者,称为“子淋”。子淋有实热和阴虚之分,实热而口舌生疮者,宜导赤散,湿热下注者,宜加味五淋散。阴虚者,必兼颧红及五心烦热症状。宜知柏地黄汤加麦冬、五味子、车前子治之。

【辨证论治】

1. 实热

(1) 心火偏亢

〔主症〕 妊娠期间，尿少色深黄，艰涩而痛，面赤心烦，甚者口舌生疮，舌红欠润，少苔或无苔，脉细滑数。

〔病机〕 因证属心火偏亢，心火上炎，则面赤心烦，口舌生疮；心火移热于小肠，则尿少淋痛。舌红少苔，脉细滑数，均为心火偏旺。

〔治法〕 泻火通淋。

〔方药〕 导赤散(《小儿药证直诀》)加玄参、麦冬。

生地 木通 甘草梢 淡竹叶

〔方义〕 方中生地凉血清热，玄参滋肾壮水，麦冬养阴宁心，淡竹叶清心泻火，木通、甘草梢利小便，泻心火，使热退而小便自通。

(2) 湿热下注

〔主症〕 妊娠期间，突感小便频数而急，尿黄赤，艰涩不利，灼热刺痛，面色垢黄，口干不多饮，胸闷食少。舌质红，苔黄腻，脉滑数。

〔病机〕 湿与热搏，蕴结膀胱，气化不行，水道不利，故小便频数而短，尿黄赤，灼热刺痛。脾胃湿热，熏蒸于上，故面色垢黄，口干不多饮。湿困脾胃，则胸闷食少。舌质红，苔黄腻，脉滑数，皆为湿热内盛之象。

〔治法〕 清热、利湿、通淋。

〔方药〕 加味五淋散(《医宗金鉴》)。

黑栀子 赤茯苓 当归 白芍 黄芩 甘草梢 生地 泽泻 车前子 木通 滑石

〔方义〕 方中黑栀子、黄芩、滑石、木通清热泻火通淋；茯

苓、泽泻、车前子利湿通淋，甘草梢泻火、止淋、缓痛，使火热之邪由小便而出。佐当归、白芍、生地养血安胎，使邪去而不伤正，治病而不动胎，诚为治湿热子淋之良方。惟滑石一味，性较滑利，易动胎气，须慎用。

2. 阴虚

〔主症〕 妊娠数月，小便频数淋漓，灼热刺痛，量少，色深黄，形体消瘦，两颧潮红，午后潮热，手足心热，心烦不寐，大便不畅，舌质红，苔薄黄而干，脉细滑数。

〔病机〕 肾阴不足，命火偏旺，津液亏耗，膀胱不利，故小便淋漓而痛，量少色深黄。津伤不能濡润肠道，则大便不畅。虚火上炎，故颧红、心烦不寐，阴虚内热，故潮热、五心烦热。舌红苔薄黄，脉细滑数，均为阴虚内热之象。

〔治法〕 滋阴润燥、通淋。

〔方药〕 知柏地黄汤（方见“经行口糜”）加麦冬、五味子、车前草。

〔方义〕 方中熟地、山萸肉滋阴补肾，养血润燥；丹皮清肝胆相火，兼泻血中之热；麦冬、五味子补肺，滋肾，生津，润燥；茯苓、泽泻、车前草利尿通淋；知母、黄柏泻命门相火，使火平水足，津液来复，淋痛自愈。或用子淋汤（《沈氏女科辑要笺正》）亦佳。

子淋汤：生地 阿胶 黄芩 山梔仁 木通 甘草梢。

【验方医案】

1. 加味四苓汤（《中医妇科学》）

猪苓 10 克 茯苓 10 克 白术 10 克 泽泻 10 克 黄柏 10 克 知母 10 克 甘草 10 克 水煎服。

陈某，女，23 岁，工人。妊娠 6 个月，小便淋漓不利，时而尿道涩痛，尿色淡黄，四肢浮肿，身重疲倦，起则头晕。胸闷腹胀，

纳呆,舌苔白腻,脉濡滑。诊为:“下焦湿热”,以上方3剂诸症好转,小便亦不涩痛,守上方,再进3剂而愈。

2. 子淋汤(《女科临证集要》)

生地30克 阿胶10克 黄芩10克 山梔子10克 木通5克 甘草6克 水煎服。

陈某,女,24岁。1976年7月8日诊。

妊娠6个月,近几日,小便淋漓涩痛,尿色深黄,午后潮热,心烦不寐,舌质红苔薄黄。此乃胃中虚热移于膀胱所致,以上方5剂而愈。

【文献选要】

《沈氏女科辑要笺正》:小便频数,不爽且痛,乃谓之淋。妊妇得此,是阴虚热炽,津液耗伤者为多,不比寻常淋痛,皆由膀胱湿热郁结也。故非一味苦寒胜湿,淡渗利水可治。转胞亦是小溲频数,不能畅达,但不必热,不必痛,则胎长而压塞膀胱之路,府气不得自如,故宜归、芎之升举。窃谓此证与子悬,正是两两对峙,彼为胎元之太升,此是胎元之太降。惟子淋与转胞,必不可竟认作同是一病。

十七、妊娠小便不通

妊娠小便不畅通,气虚益气导溺应,
肾虚肢冷腹胀满,金匱肾气丸有功。

【注】 妊娠期间出现小便不能通畅,甚则尿闭,小腹胀急疼痛,心烦不得卧者,为之“妊娠小便不通”或名曰“转胞”,气虚所致者宜导溺汤治之,若肾虚所致者,宜金匱肾气丸治之。

【辨证论治】

1. 气虚

【主症】 妊娠期间,小便不通,或频数量少,小腹胀急疼

痛,坐卧不安,面色㿔白,精神疲倦,头重眩晕,短气懒言,大便不爽,舌质淡,苔薄白,脉虚缓滑。

〔病机〕 气虚无力举胎,胎重下坠,压迫膀胱,水道不通,溺不得出,故小便不利,或频数量少。溺停膀胱,膀胱胀满,故小腹胀急疼痛,坐卧难安。气虚下陷,清阳不升,中气不足,故头重眩晕,面色㿔白,气短懒言。舌淡、苔薄白,脉虚缓,皆气虚不足之象。

〔治法〕 补气、升陷、举胎。

〔方药〕 益气导溺汤(《中医妇科学治疗学》)。

党参 白术 扁豆 茯苓 桂枝 炙升麻 桔梗 通草
乌药

〔方义〕 方中党参、白术、茯苓、扁豆补气健脾以载胎;升麻、桔梗升提举胎;乌药温宣下焦之气;桂枝、通草化气行水而通溺。全方共奏益气导溺之效。或用补中益气汤疗效亦佳。

2. 肾虚

〔主症〕 妊娠小便频数不畅,继则闭而不通,小腹胀满而痛,坐卧不宁,畏寒肢冷,腰腿酸软。舌质淡,苔薄润,脉沉滑无力。

〔病机〕 肾虚系胞无力,胎压膀胱,或命门火衰,不能温煦膀胱以化气行水,故小便频数不畅,甚至小便不通。溺蓄脬中,则小腹胀急而痛,坐卧不宁。肾虚,阳气不振,则畏寒肢冷,腰腿酸软。舌质淡,苔薄润,脉沉滑无力,均为肾虚之候。

〔治法〕 温肾扶阳,化气行水。

〔方药〕 肾气丸(《金匱要略》)去丹皮。

干地黄 山药 山茱萸 泽泻 茯苓 丹皮 桂枝 附子

〔方义〕 方中地黄、山茱萸、山药为滋肾补肝之品;泽泻、茯苓渗利行水;桂枝通阳化气;附子通阳化气以行水。附子一般

列为妊娠禁忌药,用时宜久煎,并用量要小,恐有伤胎之弊。丹皮泻火伤阳,故去之。

〔其他疗法〕 ①主穴取气海、膀胱俞(双)、阴陵泉(双),灸关元;配穴取大椎、足三里(双)。手法:强刺激,留针15~20分钟,每隔1~2分钟捻转1次。须有通上达下的酸麻胀感。出针后用电灸或艾卷灸,直至局部皮肤呈轻度充血为止(按孕妇宜灸不宜针,针刺可造成流产,请注意)。②热熨法:四季葱(大葱连须)每天用500克,洗净,用时截断,稍捣烂,放入锅内炒热,分2次轮流使用,每次250克。用布或毛巾包裹,热熨下腹部(自脐部顺次向耻骨部熨下)。冷则易之。每天1次(不拘时,每次约30分钟)。

【验方医案】

1. 温补肾阳行水方(《中医妇科学》)

熟地10克 山药10克 萸肉10克 泽泻10克 茯苓10克 丹皮6克 桂枝6克 附子6克 水煎服。

周某,女,29岁。干部。妊娠8个月,面目及四肢浮肿,疲乏,头晕、怕冷,小便不通,大便溏泻。舌质淡,苔薄白,脉沉迟而虚。以温补肾阳行水法。用上方3剂,尿量增多,浮肿消退。但便溏,腰膝酸软未除。继服上方加白术10克、巴戟天10克。6剂而愈。

2. 举元煎(《江西中医药》1985年第4期)

黄芪18克 党参15克 白术9克 桔梗9克 升麻4.5克 甘草3克 水煎服。

黄某,女,38岁,怀孕8个月,近半月来,尿频量少,渐至点滴不通,已2天,少腹胀急疼痛。舌质淡,脉虚缓。证属气虚不能载胎,胎气下坠,压迫膀胱所致。治补气升陷举胎法,以上方4剂病告痊愈。

【文献选要】

《金匱要略》：问曰：妇人病饮食如故，烦热不得卧，而反倚息者，何也？师曰：此名转胞，不得溺也。以胞系了戾，故致此病。但利小便则愈，宜肾气丸主之。

《医宗金鉴·妇科心法要诀》：妊娠胎压胞系了戾，不得小便，饮食如常，心烦不得卧者，名曰转胞。宜用丹溪举胎法。令稳婆香油涂手举胎起，则尿自出，以暂救其急。然后以四物汤加升麻、人参、白术、陈皮煎服。服后以指探吐，吐后再服再吐，如此三四次，则胎举而小便利矣。如不应，则是有饮，用五苓散加阿胶以清利之。

十八、难 产

妊娠足月娩出难，气虚血瘀是根源，
虚用圣愈神杞版，瘀用催生坤草全。

【注】 妊娠足月到分娩时，胎儿不能顺利娩出，名曰“难产”。气血虚弱，气滞血瘀是难产的主要根源。虚者宜用圣愈汤（当归、川芎、白芍、党参、黄芪）去生地加茯神、枸杞子、龟版（即蔡松汀难产方）。瘀者宜催生饮加坤草（益母草）则可催生安全。

【辨证论治】

1. 气血虚弱

〔主症〕 分娩时阵痛微弱，宫缩时间短，间歇时间长。产程进行缓慢，或下血量多，而色淡，面色苍白，神疲肢软，心悸气短，舌淡苔薄，脉大而虚或沉细而弱。

〔病机〕 气血俱虚，无力促胎外出，故阵痛微弱，宫缩短而间歇时间长。阳气衰微，气虚不摄，故下血多而色淡。血虚不能上荣，故面色苍白。气虚中阳不振，则神疲肢软，心悸气短。舌质淡苔白，脉虚大或细弱，皆为气血虚弱之征。

〔治法〕 大补气血。

〔方药〕 蔡松汀难产方(经验方)。

黄芪(蜜炙) 当归 茯神 党参 龟版(醋炙) 川芎
白芍(酒炒) 枸杞 水煎只取头煎,顿服。

〔方义〕 方中党参、黄芪大补元气;当归、白芍、川芎养血活血;茯神健脾宁心;枸杞滋补肝肾;龟版填精补血,润胎催产。

2. 气滞血瘀

〔主症〕 分娩时腰腹疼痛剧烈,宫缩虽强,但间歇不匀,产程进展缓慢,或下血暗红,量少。面色紫黯,精神紧张,胸脘胀闷,时欲呕恶,舌质暗红,苔正常或腻,脉弦大而至数不匀。

〔病机〕 气滞血瘀,气血运行受阻,胎儿欲娩不出,故腰腹剧痛,辗转不安,久产不下。因气滞血行不畅,故血色暗红,量少。气血凝滞,气机不利,升降失调,故面色紫黯,胸脘胀闷,时欲呕恶。舌质黯红,脉弦大至数不匀,均为气滞血瘀所致。

〔治法〕 理气活血,化瘀催产。

〔方药〕 催生饮(《济阴纲目》)加益母草。

当归 川芎 大腹皮 枳壳 白芷

〔方义〕 方中川芎、当归、益母草活血;大腹皮、枳壳破气散结下胎;白芷芳香开窍。共奏行气活血,催生下胎之功。

【验方医案】

1. 加味开骨散(《中医妇科验方选》)

炙龟版 15 克 当归 15 克 川芎 9 克 牛膝 6 克 加入本人头发少许 水煎服。

用于妊娠预产期已过而不生者。

2. 加味芎归汤(《中医妇科验方选》)

当归 15 克 川芎 3 克 龟版 18 克 胎发元 12 克 冬葵子 9 克 生黄芪 24 克。

此方益气养血,活血催生。产妇临产小腹阵痛微弱,宫缩乏力,胎儿久久不能娩出,伴有神疲乏力,面色苍白,冷汗淋漓,心慌气短,脉虚大或沉细而弱者服之。

3. 加味芎归汤又名开骨散(《世医得效方》)

当归 30 克 川芎 30 克 龟壳一个(醋炙) 头发 1 把(烧存性) 水 200 毫升。屡效。

生死胎服上方亦均可下也。

各
论

此方补气养血,开骨催生,用于妇人难产 5~7 日不下,垂死者及妇人矮小者,交骨不开或死胎不下。

病案举例:

李孟卿之继室,妊娠虚其难产,以加味芎归汤 4 剂备用。分娩时,果产门不开,只服 1 剂而产。后有继服此方者无不应验。

难产一症,各种原因,古方难治矣。如骨盆狭窄、胎位不正者,横生倒养,服中药亦难于顺产。现有妇产科助产士,运用手法、手术使胎儿分娩则无其难产危笃之忧也。故于此难产一题不举更多方例以陈述其治疗作用。

【文献选要】

《妇人大全良方·产难门》:妇人以血为主,惟气顺则血和,胎安则产顺。今富贵之家,过于安逸,以致气滞而胎不转动;或为交合,使精血聚于胞中,皆致产难。若腹或痛或止,名曰弄胎。稳婆不悟,入手试水,致胞破浆干,儿难转身,亦难生矣。凡产直候痛极,儿逼产门,方可坐草。时当盛暑,倘或血运血溢,当饮清水解之。冬末春初,产室用火和暖下部,衣服尤当温厚,方免胎寒血结。若临月洗头濯足,亦致产难。

第十节 产后病

产后体虚病多端，晕痉腹痛露不干，
便难发热尿异常，汗出身痛乳病关。

产后因伤血耗津而致身体虚弱，抵抗力弱，诸病丛生故病多端也。其病包括产后血晕、痉证、腹痛、恶露不绝（露不干）、大便难、发热、排尿异常、出汗（自汗、盗汗）、身痛，与乳病相关之病有缺乳、乳汁自出等。

一、产后血晕

产后突然头晕花，心胸满闷呕恶发，
血虚气脱独参固，瘀闭夺命归芎加。

【注】 产妇分娩之后，突然出现头晕眼花不能坐起，或心胸满闷，恶心呕吐发作，痰涌气急，心烦不安，甚则口噤神昏，人事不醒者，称为“产后血晕”。

因血虚气脱而晕者，宜独参汤，益气固脱。因瘀阻气闭而晕者，宜夺命散加当归、川芎治之。

【辨证论治】

1. 血虚气脱

〔主症〕 产后失血过多突然晕眩，面色苍白，心悸，愤闷不适，渐至昏不知人，眼闭口开，甚则四肢厥冷，冷汗淋漓。舌淡无苔，脉微欲绝或浮大而虚。

〔病机〕 由于失血过多，则心失所养，故心悸，愤闷不适，

昏不知人。出血多则气随血脱，阳气不能达于四肢，故肢冷。阴不内守，虚阳外越，则冷汗淋漓。舌淡无苔，脉微欲绝或浮大而虚，是血虚气脱之征。

〔治法〕 益气固脱。

〔方药〕 独参汤(《十药神书》)。

独参汤：人参

〔加减〕 若汗出肢冷，则用参附汤(方见“崩漏”)，以回阳救逆；若伴阴道出血不止，则于参附汤中加姜炭以止血。

2. 瘀阻气闭

〔主症〕 产后恶露不下或量少，少腹阵痛拒按，甚至心下急满，气粗喘促，神昏口噤，不省人事，两手握拳，牙关紧闭，面色紫黯，唇舌均紫，脉涩。

〔病机〕 由于产时受寒，气血凝滞，以致恶露不下，停蓄小腹，则痛而拒按，甚则心下急满。瘀血不去，则新血不能上荣，致使心肺受损，故神昏，气粗喘促。营卫流行不畅，经络阻滞，故两手握拳，口噤。面色、唇舌均紫。脉涩亦为瘀阻气滞之征。

〔治法〕 行血逐瘀。

〔方药〕 夺命散(《证治准绳》)加当归、川芎。

夺命散：没药、血竭

〔方义〕 方中没药、血竭逐瘀止痛；川芎、当归活血行瘀，瘀去则气畅，晕厥可除。若兼胸闷呕哕者，则加姜半夏以降逆化痰。

〔其他疗法〕

针刺：眉心、人中、涌泉、十宣放血；或艾灸百会。

【验方医案】

1. 参附童便汤(《女科临证集要》)

人参 30 克 附子 10 克。水煎入童便 1 次服之。

高某,女,27岁。1968年8月9日诊。

产后突然昏倒,呕恶,继则面色苍白,四肢逆冷,牙关紧咬,视之见厥绝如尸,解开衣襟按臆中,尚有余温及微微心搏,视瞳子未散大。诊趺阳,重按应指,询恶露有大量下血,诊此乃初产去血过多之“血晕症”。阴耗不能敛阳,因而心气不振则失神,急以撬牙灌入童便,又将秤锤烧红,投入醋盆中,使蒸气熏鼻,产妇徐徐回苏。急服上方1剂,服后神识清。当日又予生化汤1剂。翌日患者病情良好。又予加参生化汤连服3剂而愈。

2. 参附芎归汤(《女科临证集要》)

人参15克 附子10克 川芎6克 当归15克 桃仁6克 炙甘草6克 炮姜6克 水煎服。

刘某,女,28岁。1983年3月10日诊。产后3天,恶露不下,突然昏晕,面色苍白,心悸、恶心呕吐,痰涌气急,牙关紧闭,昏不知人,四肢厥冷,冷汗淋漓,脉弦涩。此产后气血两亏,瘀血上攻所致。急以童便(撬牙)灌入,又用醋炭熏之,然后以上方1剂晕止。又予加参生化汤3剂而愈。

3. 回魂汤(《陕西中医》1990年第4期)

人参60克 丹参30克 黄芪30克 煅龙骨30克 当归15克 川芎6克 荆芥炭10克 每天1剂,水煎服。

小腹胀痛拒按,舌质暗红者加红花、赤芍、桃仁;血热妄行者加蒲黄炭等。病重者多用铁器烧红淬醋熏鼻,并针灸百会、关元穴。

【文献选要】

《诸病源候论》:运闷之状,心烦气欲绝是也。亦有去血过多,亦有下血极少,皆令运。若产去血过多,血虚气极,如此而运闷者,但烦闷而已;若下血过少而气逆者,则血随气上掩于心,亦令运闷,则烦闷而心满急。二者为异。

《景岳全书·妇人规》:产时胎胞既下,气血俱去,忽而眼黑

头眩，神昏口噤，昏不知人。古人多云恶露乘虚上攻，故致血晕。不知此证有二，曰血晕，曰气脱也。若以气脱作血晕，而用辛香逐血化瘀等剂，则立刻毙矣，不可不慎也。

二、产后痉症

产后抽搐项背强，甚则口噤角反张，
阴虚血亏三甲脉，感染邪毒撮风汤。

【注】 产后发生抽搐，四肢拘急，口噤不开，角弓反张者，称为“产后痉症”，或称为“产后破伤风症”，为产后急重症之一。

若因阴血虚亏而发痉者，宜三甲复脉汤，加天麻、钩藤、石菖蒲。如因感染邪毒发病者，宜撮风散加桑寄生、白芍等。

【辨证论治】

1. 阴血亏虚

〔主症〕 产后骤然发痉，头项强直。牙关紧闭，四肢抽搐，面色苍白而萎黄。舌淡红无苔，脉虚细。

〔病机〕 产后亡血伤津，筋脉失养，血虚生风，肝风内动，则四肢抽搐，头项强直。血虚不能上荣于面，则面色苍白。舌淡红无苔，脉虚细，皆为血虚之候。

〔治法〕 滋阴养血，柔肝熄风。

〔方药〕 三甲复脉汤（《温病条辨》）加天麻、钩藤、石菖蒲。

白芍 阿胶 龟版 鳖甲 牡蛎 麦冬 干地黄 炙甘草 麻仁

〔方义〕 方中白芍、阿胶、生地、麻仁滋阴养血；龟版、鳖甲、牡蛎育阴潜阳；天麻、钩藤平肝熄风；菖蒲芳香开窍；甘草健脾和中。全方有滋阴养血，柔肝熄风之效。使津充血足，筋脉得养，则诸证自愈。

2. 感染邪毒

〔主症〕 新产后头项强痛,发热恶寒,牙关紧闭,口角抽搐,面呈苦笑,继而项背强直,角弓反张,舌质正常,舌苔薄白,脉浮而弦。

〔病机〕 产后感染毒邪,邪初入侵,正邪交争,故发热恶寒,头项强痛,邪毒内陷,窜入筋脉,则牙关紧闭,面呈苦笑,甚则项背强直,角弓反张。

〔治法〕 解毒镇痉,理气祛风。

〔方药〕 撮风散(《证治准绳》)加桑寄生、白芍。

蜈蚣 钩藤 朱砂 蝎尾 麝香 僵蚕 上药共研为细末,竹沥汁调之。

〔方义〕 方中蜈蚣、蝎尾、僵蚕解毒镇痉熄风;钩藤平肝熄风;麝香芳香开窍;朱砂安神定志;桑寄生、白芍养血柔肝;调以竹沥汁清热祛痰。全方共奏解毒镇痉熄风,养血柔肝止痉之效。

破伤风病情急重,应千方百计控制抽搐发生,可配合现代医学方法抢救,同时注意加强护理,避免声、光、热的刺激,防止创伤、窒息等。

【验方医案】

1. 加味当归散(《女科临证集要》)

当归 30 克 荆芥穗(童便拌炒) 10 克 川芎 10 克 桃仁 12 克 炙甘草 6 克 炮姜 4 克 天麻 10 克 阿胶 10 克 菖蒲 5 克 白芍 10 克 水煎服。

王某,26 岁,1981 年 11 月 7 日诊。

产后 10 天恶露滞下,量少,小腹胀痛,拒按,汗多,心悸,今日骤然发抽,头项强直,牙关紧闭,四肢抽搐,面色苍白,不省人事,脉虚细,此产后妄血伤津,筋脉失养,瘀阻风动所致。治宜祛风止痉,活血通瘀。以上方 1 剂后痉止神清。又服 2 剂诸症悉

除,又以加参生化汤3剂调治以善后。

2. 当归散(《妇科临证集要》)

当归、荆芥穗各等份,共为细末。用10克,水煎1盏,酒半盏,煎至1盏,撬牙灌之。

许某,女,34岁。1980年3月7日诊。患者已生3胎,昨晚生产第4胎,分娩后即出现四肢抽搐,腰背强直,角弓反张,口噤嗜睡,舌强不能伸。神志呆钝,语言不清,腹痛、头痛等症。诊其腹部按之痛甚,脉微滑,证属产后发痉,急撬牙灌服上方,服后1小时许,患者神志稍清,诸症缓解。再拟疏风散邪,化瘀祛痰方:

人参15克 当归30克 川芎10克 桃仁10克 炙甘草6克 炮姜5克 荆芥穗10克 半夏10克 水煎服。服后神志清楚,又服2剂,诸症悉除,又以加参生化汤3剂以善后。

3. 华佗愈风散加减(《中医妇科验方选》)

荆芥炭30克 蜈蚣2条 僵蚕5克 防风10克 寄生20克 水煎服。

祛风理血,解毒镇痉,治疗产后发痉。

4. 加味生化汤(《胎产秘书下卷》)

川芎9克 人参9克 当归18克 天麻2.4克 荆芥2.4克 黄芪4.5克 炙甘草1.5克 大枣3枚 水煎服。

补气固表。用于产后汗多不止,阴竭阳微,筋脉拘急,项强口噤,发抽者。忌辛辣食物。

若口渴者,加麦冬、五味子。虚脱者,加人参、附子。便秘者,加火麻仁。有痰者加竹沥、姜汁。

5. 加味天麻散(《中医妇科学》)

天麻12克 炮白附子9克 炮天南星9克 姜半夏9克 钩藤9克 炒全蝎6克 陈皮6克 水煎温服。亦可为细末,每服3克。

燥湿祛风。用于产后发痉，语言謇涩或口噤不语，痰涎壅盛，四肢瘫痪者用之皆可。

三、产后腹痛

产后腹痛儿枕名，血虚血瘀病因成，
血虚肠宁汤可治，血瘀生化汤最灵。

【注】 产后以小腹疼痛为主者，是谓“产后腹痛”。古书对产后腹痛又称为“儿枕痛”等名。其病因有血虚和血瘀两种。因血虚而致腹痛者，宜肠宁汤；因血瘀而致腹痛者，宜生化汤加益母草最有灵验。

【辨证论治】

1. 血虚

〔主症〕 产后小腹隐隐作痛，喜按，恶露，量少色淡，头晕耳鸣，便燥，舌质淡红，苔薄，脉虚细。

〔病机〕 由于产后失血较多，经脉空虚，运行无力，冲任失养，故小腹隐隐作痛而喜按。气血亏损，故恶露量少色淡。精髓不足，故头晕耳鸣。血虚津液不足，大肠失调，是以便燥。舌质淡红，脉虚细，为产后血虚之征。

〔治法〕 补血益气。

〔方药〕 肠宁汤（《傅青主女科》）。

当归 熟地 阿胶 人参 山药 续断 麦冬 肉桂 甘草

〔方义〕 方中当归、熟地、阿胶、麦冬养血滋阴；山药、甘草扶脾健中；续断补肾养肝；佐肉桂少许，取其温通。全方具有补血益气之功。如津亏便燥较重，去肉桂，加肉苁蓉温肾润肠。

〔加减〕 若血虚兼寒，症见面色青白，腹痛得热则减，手足逆冷，脉细而迟，宜养血散寒。方用当归建中汤（《千金翼方》）。

当归建中汤：当归 桂心 芍药 甘草 生姜 大枣
饴糖

方中饴糖、炙甘草、大枣温中补虚；生姜、桂心温阳；当归、芍药养血，且芍药与甘草合用，为芍药甘草汤，具有缓急止痛之功，共成甘温建中补虚缓急之剂。

2. 血瘀

〔主症〕 产后小腹疼痛，拒按，或得热稍减，恶露量少，涩滞不畅，色紫黯有块，或胸胁胀痛，面色青白，四肢不温，舌质黯，苔白滑，脉沉紧或弦涩。

〔病机〕 寒邪入侵，血为寒凝，或因肝郁气滞，血行不畅，滞而不通，故小腹疼痛拒按，恶露量少，色紫黯有块。血得热则运行稍畅，故疼痛得缓。肝郁气滞不宣，则胸胁胀痛。舌质黯，苔白滑，脉沉紧或弦涩，均为瘀血内停之征。

〔治法〕 活血祛瘀，散寒止痛。

〔方药〕 生化汤（方见“堕胎、小产、滑胎”）加益母草。

〔方义〕 方中当归、川芎活血行血；桃仁活血化瘀；炮姜温经散寒；甘草和中缓痛；加益母草以增强活血散瘀之力。全方为温经活血行瘀之剂。若小腹胀甚于痛，胸胁胀满者，属气滞血瘀之征。

〔加减〕 上方加枳壳、乌药、广木香，以理气行滞消胀。

【验方医案】

1. 加减生化汤（《中医医案医话集锦》）

当归4.5克 川芎4.5克 灵脂3克 青皮6克 香附4.5克 连翘3克 山栀3克 炮姜3克 厚朴6克 羌活4.5克 甘草1.5克 泽兰4.5克 益母草4.5克 水煎服。每天1剂。

王某，女，20岁。1957年8月29日诊。

产后 20 多天,小腹仍然绞痛不已,痛时阴道流少量紫血块,有恶臭气。脉沉舌青。证属儿枕。子宫郁以瘀血不易复原。治之化瘀之剂,以上方 2 剂而愈。

2. 活血散寒止痛方(《女科临证集要》)

当归 20 克 川芎 10 克 桃仁 10 克 炙甘草 6 克 炮姜 10 克 山楂 10 克 桂枝 10 克 小茴香 6 克 艾叶 10 克 水煎服。

李某,女,27 岁。1977 年 10 月 9 日诊。产后 6 天,开始小腹疼痛,拒按、恶露量少,面色青白,脉沉紧。此寒邪入侵,血为寒凝,治以活血散寒止痛。服上方两剂腹痛减半。又服 2 剂腹痛消失。

【文献选要】

《医宗金鉴·妇科心法要诀》:产后腹痛,若因去血过多而腹痛者,为血虚痛;若因恶露去少及瘀血壅滞而痛者,为有余痛;若因伤食而痛者,必恶食胀闷;若因风寒乘虚入于胞中而作痛者,必见冷痛形状。

《景岳全书·妇人规》:产后腹痛,最当辨查虚实。血有留瘀而痛者,实痛也;无血而痛者,虚痛也。大都痛而且胀,或上冲胸胁,或拒按而手不可近者,皆实痛也,宜行之散之;若无胀满或喜揉按或喜热熨,或得食稍缓者,皆属虚痛,不可妄用推逐等剂。

四、产后恶露不绝

恶露持续二十天,淋漓污浊永不干,
气虚补中益气主,血热质黏保阴煎,
气瘀恶露挟瘀块,生化加减细详参。

【注】 产后恶露持续 20 多天,仍淋漓不断者,称为“恶露

不绝”。即裹儿污浊之水，淋漓不干者是也。如因气虚所致者，宜补中益气汤为主方。如因血虚而致，恶露质黏者，宜用保阴煎加阿胶、旱莲草、乌贼骨等。若因瘀血所致恶露不绝者，宜生化汤加益母草、炒蒲黄等仔细详参可也。

【辨证论治】

1. 气虚

〔主症〕 产后恶露过期不止，量多，或淋漓不断、色淡红，质稀薄，无臭气。小腹空坠，神倦懒言，面色㿔白。舌淡，脉缓弱。

〔病机〕 气虚胞宫失摄，故产后恶露过期不止而量多。气虚则阳气不振，血失温煦故恶露色淡、质稀无臭气。气虚下陷，故小腹空坠，神疲懒言。面色㿔白，舌淡，脉缓弱，亦为气虚之征。

〔治法〕 补气摄血。

〔方药〕 补中益气汤（方见“月经先期”）加鹿角胶、艾叶炭。

〔方义〕 方以补中益气汤补益中气，加鹿角胶、艾叶炭以温阳益气摄血。

2. 阴虚血热

〔主症〕 恶露过期不止，量较多，色深红，质稠黏，有臭秽气，面色潮红，口燥咽干，舌质红，脉虚细而数。

〔病机〕 产后阴液耗损，阴虚生内热，热扰冲任，迫血下行，故恶露过期不止而量较多，色深红，质黏稠。热邪上扰，面色潮红。热伤阴液，则口燥咽干。舌红，脉虚细而数，均为阴虚血热之征。

〔治法〕 养阴、清热、止血。

〔方药〕 保阴煎（方见“月经过多”）加阿胶、旱莲草、乌贼骨以助养阴清热止血之力。

〔加减〕 若肝郁化热、恶露不绝，症见两胁胀痛，心烦、舌苔黄，脉弦数者，治宜疏肝解郁，清热凉血。方用丹栀逍遥散（方见“月经先期”）加生地、旱莲草、茜草根以清热凉血止血。

3. 血瘀

〔主症〕 产后恶露淋漓涩滞不爽，量少，色紫黯有块，小腹疼痛拒按，舌紫黯或边有紫点，脉弦涩或沉而有力。

〔病机〕 血被寒凝，瘀阻胞脉，故产后恶露淋漓不爽。血瘀于内，则色紫黯，小腹疼痛拒按。舌紫黯或边有紫点，脉弦涩或沉实有力，为瘀血阻滞之象。

〔治法〕 活血化瘀。

〔方义〕 生化汤（方见“堕胎、小产、滑胎”）加益母草、炒蒲黄、以祛瘀止血。

〔加减〕 若为气虚挟瘀，伴小腹空坠者，加党参、黄芪；若瘀久化热，恶露臭秽者，加红蚤休、蒲公英。

〔验方医案〕

1. 生化汤合失笑散加减（《中医妇科学》）

当归 13 克 川芎 5 克 赤芍 7 克 炒灵脂 7 克 生蒲黄 10 克 益母草 15 克 焦山楂 9 克 炙甘草 6 克 姜炭 1 克
水煎服。每日 1 次。

方某，女，32 岁。1971 年 1 月 6 日诊。

产后 50 天阴道流血淋漓不断。患者初产一女，已 3 岁。今又足月产一女婴已 50 天，阴道出血时多时少，淋漓不断，血色深红，少腹疼痛，胀坠身热汗出，食欲欠佳，大便正常，小便短赤，脉沉弦。舌质暗红，苔薄白。证属产后血瘀内滞，恶露不绝。以上方 2 剂。服 1 剂后阴道流血量增多；服 2 剂之后血量减少，腹痛减轻。再按上方去赤芍、五灵脂，加炒远志、续断，连服 2 剂，改用当归丸内服痊愈。

2. 二妙散加味(《湖南中医杂志》1987年第2期)

苍术10克 黄柏10克 泽泻10克 当归15克 茯苓15克 黄芪15克 苡米20克 川芎6克 水煎服。1天1剂。

陈某,女,28岁,产后9个月恶露不绝,淋漓不断,服参茸百余剂无效。诊见形体肥胖,舌质红、苔薄黄;脉弦滑数。证属湿热瘀阻,治宜养血调气,清热祛湿,服上方8剂而愈。

3. 补中益气汤加减(《广西中医药》1985年第6期)

党参15克 黄芪24克 甘草6克 升麻4克 白术10克 当归10克 山楂15克 生蒲黄5克 炒蒲黄5克 水煎服。

黄某,女,29岁。其人工流产后,阴道下血不止,色淡,质薄,或暗红成块,阴户下坠,少腹疼痛,历时两月有余。舌质淡红偏暗,脉细涩无力。此乃清阳下陷,脾不统血所致。

【文献选要】

《医学心悟·恶露不绝》:产后恶露不绝,大抵因产时,劳伤经脉所致也。若肝气不和,不能藏血者,宜用逍遥散。若脾气虚弱,不能统血者,宜用归脾汤。若气血两虚,经络亏损者,宜用八珍汤。若瘀血停积,阻碍新血,不得归经者,其症腹痛拒按,宜用归芎汤,送下失笑丸,先去其瘀而后补其新,则血归经矣。

五、产后大便难

产后耗津大便难,肠道失润不能传,

便干数日不能解,四物苁蓉麻仁丸。

【注】 产后亡血耗津,肠道失其濡润,不能传导水谷糟粕者为“产后大便难”。大便艰涩难通。数日不能排便,方宜四物汤加肉苁蓉等,或用麻仁丸加麦冬、玄参、生地等药治之。

【辨证论治】

〔主症〕 产后大便干燥,数日不解,或解时艰涩难下,但腹

无胀痛,饮食如常。面色萎黄,皮肤不润,舌淡苔薄,脉虚而涩。

〔病机〕 由于产后失血伤津,液少津亏,则肠道失于濡润,以致便难。证非外感里实,故饮食如常,腹无胀痛。血虚不荣于外,则面色萎黄,皮肤不润。舌淡,脉虚涩,为血少津亏之征。

〔治法〕 养血润燥。

〔方药〕 四物汤(方见“崩漏”)加肉苁蓉、柏子仁、生首乌、火麻仁。

〔方义〕 方中四物汤养血润燥,加肉苁蓉、柏子仁、火麻仁、生首乌以滋补阴精,滑肠通便。全方为养血润燥通便之剂。

〔加减〕 若兼有内热者,则症见口干,胸满腹胀,舌质红,苔薄黄,脉细数,宜养血润燥,佐以泻热,方用麻仁丸(《证治准绳》)加麦冬、元参、生地。

麻仁丸:麻仁(研如泥) 枳壳 人参 大黄为末,炼蜜为丸如梧桐子大,空心温酒下 20 丸,未通渐加数丸,不可太过。

本方以麻仁、麦冬、元参、生地养阴滋燥,枳壳、大黄泻热通便,人参益气扶正。

若兼气虚者,则症见气喘自汗,头晕目眩,精神疲倦,脉大而虚,宜补气养血,佐以润肠,方用《圣愈汤》(方见“痛经”)加杏仁、郁李仁。

【验方医案】

1. 补中益气汤加减(《辽宁中医杂志》1987 年第 5 期)

黄芪 15 克 当归 15 克 熟地 15 克 肉苁蓉 15 克 火麻仁 15 克 郁李仁 15 克 人参 9 克 白术 9 克 陈皮 9 克 升麻 6 克 甘草 6 克 水煎服。每天 1 剂。

杨某,女,32 岁。产后 1 周来,大便排出艰难,汗出,气喘,神疲懒言。舌淡苔白,脉细弱。

证属产后失血耗气,气运无力所致。治宜益气补中,养血润

肠。服上方 5 剂好转,改服八珍汤,以调善后。

2. 大承气汤加味(《女科临证集要》)

大黄 10 克 枳壳 3 克 厚朴 5 克 元胡粉 6 克 当归 30 克 太子参 30 克 桃仁 10 克 赤芍 15 克 水煎服。

贾某,女,24 岁。1978 年 7 月 9 日诊。

产后 8 日大便未解,发热烦躁,小腹硬痛,近晚热甚,时有谵语,口渴欲饮,小溲黄赤,苔黄而糙,脉沉实有力。脉证合参、证属实热,治拟泻热养血。以上方 1 剂大便通,诸证悉解。又予四物汤加火麻仁、生首乌、桃仁、益母草、太子参、甘草,服 2 剂而愈。

【文献选要】

《圣济总录》:大肠者,传导之官,变化出焉,产后津液减耗,胃中枯燥,润养不足,糟粕壅滞,故大便难而或致不通,凡新产之人,喜病此者,由去血多,内亡津液故也。

《寿世保元·产后》:产后大便不通,因去血过多,大肠干涸,或血虚火燥干涸,可不计其日期,饮食数多,以药通润之。必待腹满觉胀,自欲去下不能者,乃结在直肠,宜用猪胆汁润之。若服苦寒药润通,反伤中焦元气,或愈加难通,或通而泻下不能止,必成败证。若属血虚火燥,用加味逍遥散。气血俱虚八珍汤。慎不可用麻子、杏仁、枳壳之类。

六、产后发热

产后持续不退热,感染邪毒体温高,
解毒活血银花母,瘀血发热生化消,
外感荆防四物用,血虚八珍甲青蒿。

【注】 产后发热不退,或突然高热寒战,或伴有其他症状者为“产后发热”。

因感染邪毒而发热者,其体温高达 39℃ 以上,即高热寒战并见。可用解毒活血汤加银花、益母草治之(“银花母”也)。若因瘀血发热者,宜生化汤加丹皮、益母草,其热可消退。因外感而发热者,可用荆防四物汤加苏叶。因其症状不同,亦可随症选方,如银翘散、小柴胡汤、清暑益气汤等。

因血虚发热者,宜八珍汤加鳖甲、青蒿。

【辨证论治】

1. 感染邪毒

〔主症〕 高热寒战,小腹疼痛拒按,恶露量多或少,色紫黯如败酱,有臭气,烦躁口渴,尿少色黄,大便燥结,舌红苔黄,脉数有力。

〔病机〕 感染邪毒,直犯胞宫,正邪交争急剧,故高热寒战。邪毒入胞,与瘀血相结,以致小腹疼痛拒按,恶露量多或少,色紫黯有臭气。热盛于内,灼伤津液,故烦躁口渴,尿少色黄。大便燥结。舌红苔黄,脉数有力,均为邪毒感染内热之征。

〔治法〕 清热解毒,凉血化瘀。

〔方药〕 解毒活血汤(《医林改错》)加金银花、益母草。

连翘 葛根 柴胡 枳壳 当归 赤芍 生地 红花 桃仁 甘草

〔方义〕 方中连翘、葛根、柴胡、甘草清热解毒,升散退热;生地、赤芍、当归凉血和血;红花、桃仁活血化瘀;枳壳散结行滞;赤芍配甘草缓急止痛,加金银花、益母草以增强其解毒祛瘀之功。

〔加减〕 若症见高热汗出,烦躁,斑疹隐隐,舌红绛,苔黄燥,脉弦细而数,为邪已入营分而累及血分。治宜清营解毒,凉血养阴。

方用清营汤(《温病条辨》)加地丁、红蚤休。

清营汤:玄参 生地 麦冬 金银花 连翘 竹叶心 丹

参 黄连 犀角

若小腹痛剧,恶露不畅,有臭气,高热便秘者,此为热毒与瘀血互结胞中,治宜清热泻下逐瘀,方用大黄牡丹皮汤(《金匮要略》)加败酱草、红藤。

大黄牡丹汤:大黄 丹皮 桃仁 冬瓜仁 芒硝

方中大黄、芒硝泻瘀热结聚,清热解毒,软坚散结;丹皮清热凉血;桃仁活血散瘀滞;冬瓜仁清湿热,排脓散结消痈。加红藤、败酱草,以增强其清热解毒之功。

各
论
若高热不退,神昏谵语,甚或昏迷,面色苍白,四肢厥冷,脉微而数,为热入心包之象。治宜清心热,养阴液及芳香开窍。方用清营汤(《温病条辨》)送服安宫牛黄丸(《温病条辨》),或用紫雪丹(《和剂局方》)。

本型发热,势急症重,必要时中西医结合救治。同时注意加强护理,如取半坐卧位,以利恶露排出,注意营养,多饮水;高热者或以物理降温;保持外阴清洁,以及床边隔离,防止交叉感染等。

2. 血瘀

〔主症〕 寒热时作,恶露不下,或下亦甚少,色紫黯有块,小腹疼痛拒按,口干不欲饮。舌紫黯或有瘀点,脉弦涩。

〔病机〕 由于产后恶露不下,或下亦甚少以致瘀血内阻,营卫失调,故寒热时作。气机不畅,故恶露紫黯有块,少腹疼痛拒按。瘀血内阻,津液不得上承,故口干而不欲饮。舌紫黯,脉弦涩,亦为血瘀之征。

〔治法〕 活血化瘀。

〔方药〕 生化汤(方见“堕胎、小产、滑胎”)加丹参、丹皮、益母草,以助其活血化瘀之力。瘀去则热自除。

3. 外感

〔主症〕 产后恶寒发热,头痛肢体疼痛,无汗,或咳嗽流

涕。舌苔薄白、脉浮。

〔病机〕 产后气血虚弱，卫外之阳不固，风寒乘虚侵袭，正邪交争，则恶寒发热。外邪入侵，首及太阳之表，太阳经脉络于头目项背，故头痛、肢体疼痛。腠理为寒邪所闭，则无汗。风寒之邪侵肺，肺气失宣，故咳嗽流涕。舌苔薄白，脉浮，均为风寒袭表之征。

〔治法〕 养血祛风。

〔方药〕 荆防四物汤(《医宗金鉴》)加苏叶。

荆芥 防风 川芎 当归 芍药 地黄

〔方义〕 方中四物汤养血，荆芥、防风祛风解表，加苏叶以疏风散寒。方为养血祛风解表之剂。

〔加减〕 若症见发热，微恶风寒，头痛，咳嗽、口渴、微汗出或无汗，舌红边尖均红，苔薄白，脉浮数，为风热之邪，乘虚侵袭肺卫，卫气被遏，开阖失司所致。治宜辛凉解表，疏风清热，方用银翘散(《温病条辨》)。

银翘散：金银花 连翘 竹叶 荆芥穗 牛蒡子 薄荷 桔梗 淡豆豉 甘草 芦根

方中金银花、连翘清热解毒，轻宣透表；荆芥穗、薄荷、淡豆豉辛散表邪，透热外出；牛蒡子、桔梗、甘草合用，能解毒利咽散结，宣肺祛痰；竹叶、芦根甘凉轻清，清热生津止渴。共奏疏散风热，清热解毒之功。

若症见往来寒热，口苦咽干作呕，舌苔白润，脉弦者，为外邪客于少阳之半表半里，治宜和解表里，用小柴胡汤(《伤寒论》)。

小柴胡汤：柴胡 黄芩 人参 炙甘草 生姜 半夏 大枣

方中柴胡散邪透表，使半表之邪得以外宣；黄芩除热清里，使半里之邪得以内撤；半夏降逆和中；人参、甘草补正和中

以祛邪；生姜、大枣配甘草调和营卫。共奏和解少阳，补中扶正之功。

若产时正值炎热酷暑季节，症见身热多汗，口渴心烦，体倦少气，舌红少津，脉虚数，为感染暑热，气津两伤。治以清暑益气，养阴生津。方用清暑益气汤（《温热经纬》）。

清暑益气汤：洋参 石斛 麦冬 黄连 竹叶 荷梗 知母 甘草 粳米 西瓜翠衣

方中西瓜翠衣清热解暑；洋参益气生津；石斛、荷梗、麦冬清热养阴生津；黄连、知母、竹叶清热解毒除烦；甘草、粳米益胃和中。全方有清暑益气、养阴生津的作用。

4. 血虚

〔主症〕 产后失血过多，身有微热，自汗头晕目眩，心悸少寐，腹痛绵绵，手足麻木。舌淡红、苔薄，脉虚微数。

〔病机〕 产后失血伤津，阴不敛阳，虚阳外浮，故身有微热自汗。血虚清窍失养，则头晕目眩。血不养心，则心悸失眠。胞脉失养，则腹痛绵绵。血虚不能濡养四肢，则手足麻木。舌淡红、苔薄、脉虚数，为血虚之征。

〔治法〕 补益气血。

〔方药〕 八珍汤（方见“经行头痛”）去川芎加黄芪补气。

〔加减〕 如午后热甚，两颧红赤，口渴喜冷饮，大便干燥，小便黄赤，舌质红，苔薄黄而干。脉细数者，为阴虚内热。治宜滋阴清热养血。方用加减一阴煎（方见“闭经”）加青蒿、鳖甲。

一阴煎方中生地、白芍、麦冬滋阴养液；知母、地骨皮清火退热；熟地滋肾补血；甘草益气和中。加青蒿、鳖甲增其益阴退热之功。

此外，尚有伤食发热，由于产后饮食太过，症见发热，不思饮食，吞酸噯腐，脘腹胀满。舌苔厚腻，脉濡滑。治宜健脾和胃，消导化滞。方用保和丸（《丹溪心法》）。

保和丸:连翘 山楂(炒) 神曲(炒) 莱菔子 制半夏
陈皮 茯苓 麦芽(炒)

方中山楂、神曲、麦芽称“焦三仙”,善消一切饮食积滞;半夏、陈皮、茯苓消痰行滞,和胃健脾;食积易于化热,故以连翘清热散结。本方消导和胃,药性平和,故以保和名之。

【验方医案】

1. 四物汤加荆芥、柴胡方(《中医妇科学》)

川芎6克 当归10克 白芍10克 地黄10克 荆芥6克 柴胡10克 水煎服,每天1剂。

陈某,女,26岁,干部。1975年4月7日诊。产后10天发热怕冷,面色苍白,略带淡黄,形体消瘦、头痛眩晕、腰酸骨楚、心悸寐少。舌质淡苔薄白,脉浮细。服上方3剂病情好转。发热怕冷消除。再服3剂而愈。

2. 小柴胡汤加减(《四川中医》1986年第11期)

柴胡15克 黄芩15克 半夏9克 人参9克 当归9克 甘草9克 石膏18克 川芎6克 干姜6克 大枣10枚 水煎服。1天1剂。

王某,女,29岁。产后7天恶寒发热(体温39℃),伴有大汗。2小时左右热退,即发生口渴大饮,其后变为寒热往来,发无定时,口苦咽干,下腹疼痛。舌质淡红、苔薄白,脉虚弱。服上方11剂愈。

3. 生化汤加减(《湖北中医》1983年第3期)

当归12克 赤芍20克 败酱草20克 川芎5克 红花10克 厚朴10克 柴胡10克 黄芩10克 益母草30克 茯苓15克 银花15克 炮姜3克 水煎服。

何某,女,26岁,产后1周,昨日突然恶寒发热,头身痛、汗出、恶露有臭气,少腹无触痛,体温39.5℃。诊为产后外感而收入院,

西药治疗7日后,体温仍在39.4℃,汗多,口干喜热饮,大便结,恶露少。舌边紫暗,苔黄腻,脉弦滑数。证属邪毒内侵,湿热与血互结,瘀阻胞宫。治宜活血化瘀,清热利湿,予上方加减10剂而愈。

【文献选要】

《医宗金鉴·妇科心法要诀》:产后发热之故,非止一端,如饮食太过,胸满呕吐恶食者,则为伤食发热。若早起劳动,感受风寒,则为外感发热。若恶露不去,瘀血停留,则为瘀血发热。若去血过多,阴血不足,则为血虚发热。

各
论
《女科经纶》引吴蒙斋曰:新产后伤寒,不可轻易发汗,产时有伤力发热,有去血过多发热,有恶露不去发热,有三日蒸乳发热,有早起劳动,饮食停滞发热,状类伤寒,要在仔细详辨,均不可便发汗。大抵产后大血空虚,汗之则变筋惕肉瞤,或郁冒昏迷,或搐搦,或便秘,其害非轻。

《沈氏女科辑要笺正》:新产发热,血虚而阳浮于外者居多,亦有头痛,此是虚阳升腾,不可误谓冒寒,妄投发散,以煽其焰,此惟潜阳摄纳,则气火平而热自己。如其恶露未尽,稍参宣通,亦即泄降之意,必不可过于滋填,反增其壅。感冒者,必有表证可辨,然亦不当妄事疏散,诸亡血虚家,不可发汗,先圣仪型,早已谆谆告诫。

七、产后排尿异常

产后排尿不正常,气虚补中举升阳,
肾虚肾丸蛭盆子,黄芪当归治损伤。

【注】 产后小便不通,或尿意频数,小便失禁,或尿急、尿痛等现象,统称“产后排尿异常。”因气虚不能升举阳气,而出现尿失禁或频数者,宜补中益气汤,加益智仁、金樱子、桔梗等。若因肾虚者,宜肾气丸加桑螵蛸、覆盆子。若因膀胱损伤而致排尿

异常,宜黄芪当归散加白及治之。

【辨证论治】

1. 气虚

〔主症〕 产后小便不通,少腹胀急,或小便频数甚或失禁,少气懒言,四肢无力,面色少华,舌质淡,苔少,脉缓弱。

〔病机〕 产后气虚,不能通调水道,膀胱气化不行,故小便不通。脬中尿液蓄积,故小便胀急,气虚膀胱失约,故小便频数或失禁。气虚中阳不振,则少气懒言,四肢无力,面色少华,舌淡脉缓弱,均为气虚血少之候。

〔治法〕 补气通利。

〔方药〕 补中益气汤(方见“月经先期”)加桔梗、通草、茯苓。

〔方义〕 补中益气汤补益中气,使膀胱得以气化,加桔梗、通草、茯苓升清降浊,以增益气通溺之效。

〔加减〕 若小便频数不尽者,宜益气固涩,则用补中益气汤加益智仁、金樱子,以固涩小便。

2. 肾虚

〔主症〕 产后小便不通,小腹胀满而痛,或小便频数,甚则遗尿,面色晦黯,腰膝酸软。舌淡苔润,脉沉细而迟。

〔病机〕 肾阳不足,命门火衰,膀胱失于温化,气化不行,故小便不通,小腹胀满而痛。肾虚,膀胱气化不及或失约,则小便频数或遗尿。肾主骨,肾虚则腰膝酸软。肾阳虚则面色晦暗,舌淡苔润,脉沉细而迟。

〔治法〕 补肾温阳,化气行水。

〔方药〕 肾气丸(方见“妊娠小便不通”)

〔加减〕 肾虚致小便频数或失禁者,宜于肾气丸方中加桑螵蛸、覆盆子、补骨脂以温肾固涩。

3. 膀胱损伤

〔主症〕 产后小便不能约束而自遗,或排尿淋漓挟有血丝。舌正常,脉缓。

〔病机〕 由于分娩损伤膀胱,以致小便失禁,日久可形成尿痿。

〔治法〕 益气固脬。

〔方药〕 黄芪当归散(《医宗金鉴》)加白及。

黄芪 当归 人参 白术 白芍 甘草 生姜 大枣 猪尿脬 水煎服。

〔方义〕 方中人参、黄芪、白术、甘草补气;当归、白芍和血;用猪尿脬温固膀胱,求其同类相求,为补虚固涩之剂,加白及生肌收敛。

【验方医案】

1. 补中益气汤合五苓散加减(《千家妙方·下册》)

黄芪 20 克 党参 15 克 白术 12 克 升麻 6 克 茯苓 10 克 猪苓 10 克 泽泻 10 克 车前子 10 克 柴胡 10 克 桂枝 10 克 枸杞子 12 克 甘草 3 克 水煎服。每天 1 剂。

董某,女,26 岁,产后小便不通已 5 天。因胎儿较大,行侧切手术,当时出血较多,午后患者欲解小便,却点滴不出,少腹胀痛。曾用导尿,服消炎利尿药配合针灸热敷等法均未收效。诊其面色苍白,体倦乏力,时有自汗,心悸,时感腰酸,恶露量多,舌淡白,脉虚细。此系产后肾气受损,中气下陷,膀胱气化不利所致,投上方 6 剂,小便已通畅,后以十全大补丸善后。

2. 加味缩泉丸(《陕西中医》1990 年第 4 期)

益智仁 10 克 乌药 10 克 黄芪 20 克 党参 15 克 益母草 15 克 白术 10 克 升麻 10 克 当归 10 克 芡实 10 克 金樱子 10 克 生地 12 克 甘草 6 克 水煎服,每天 1 剂。

李某,女,34岁。产后小便淋漓,不禁已3天。气短、乏力,汗多。舌淡红,苔白而干,脉细略数,证属气虚血亏;膀胱失约兼子宫瘀滞,予上方3剂,小便能自控,原方加减又进2剂而愈。

3. 桃仁承气汤加味(《女科临证集要》)

桂枝 10 克 甘草 6 克 芒硝 6 克 大黄 10 克 桃仁 10 克 茯苓 15 克 通草 6 克 白芍 10 克 水煎服。

艾某,女,27岁。1976年4月17日诊。产后恶露不下,腹部疼痛有块,并有高热。自汗恶风,汗出热不退,大小便不通已经5天,曾用导尿管引流,打针,服药治疗,小便仍不解,诊舌色紫暗,脉弦涩。此血瘀气滞所致。以上方1剂后大便通畅,小便利,高热退。又服生化汤3剂愈。

【文献选要】

《诸病源候论·妇人产后诸病候下》:因产用气,伤于膀胱,而冷气入胞囊,胞囊缺漏不禁,小便故遗尿,多因产难所致。

因产动气,气冲于胞,胞转屈辟,不得小便故也。亦有小肠本挟于热,因产水血俱下,津液竭燥,胞内热结,则小便不通也。然胞转则小腹胀满,气急绞痛,若虚热津液竭燥者,则不甚胀急,但不通。津液生,气和,则小便也。

产则津液空竭,血气皆虚,有热客于胞者,热停积,故小便痞涩,而难也。

八、产后自汗、盗汗

产后自汗伤阳气,补气固表黄芪剂,

盗汗阴虚伤津血,生脉散加浮麦蛎。

【注】 产后损伤阳气,阳气亏虚动则汗出津津者为之“自汗”,宜补气固表黄芪汤。伤津亡血造成阴虚,睡则汗出,醒则汗止,为之“盗汗”。盗汗宜生脉散加浮小麦、煅牡蛎等药治之。

【辨证论治】

1. 气虚产后自汗

〔主症〕 产后汗出较多，不能自止，动则加剧，时或恶风，面色㿔白，气短懒言，语声低怯，倦怠乏力，舌淡苔薄，脉虚弱。

〔病机〕 因产伤血，气随血耗，卫阳不固，故自汗恶风。气虚则面色㿔白，气短懒言，语声低怯，倦怠乏力，舌淡苔薄，脉虚弱，均为气虚之象。

〔治法〕 补气固表，和营止汗。

〔方药〕 黄芪汤（《济阴纲目》）。

黄芪 白术 防风 熟地黄 煅牡蛎 白茯苓 麦冬 甘草 大枣

〔方义〕 方中黄芪、白术、茯苓、甘草补气健脾固表；熟地、麦冬、大枣养阴滋血；牡蛎固涩敛汗；防风达表，助黄芪、白术益气御风，且黄芪得防风，其功益彰。

2. 阴虚产后盗汗

〔主症〕 产后睡中汗出，醒来自止。面色潮红，头晕耳鸣，口燥咽干，渴不思饮，或有五心烦热，午后较甚，腰膝酸软。舌嫩红或绛，少苔或无苔，脉细数无力。

〔病机〕 因产伤血，营阴耗损，阴虚生内热，故在睡中汗出。醒后阳气外卫，故汗即止。阴虚阳浮于上，则面色潮红，头晕耳鸣，口燥咽干，渴不思饮，乃虚热灼津，不得上承。五心烦热，午后较甚及腰膝酸软等，为阴虚损及肝肾。舌嫩红或绛，脉细数无力，为阴虚热扰于内之征。

〔治法〕 养阴益气，生津敛汗。

〔方药〕 生脉散（方见“崩漏”）加煅牡蛎、浮小麦。

〔方义〕 方中人参益气生津；麦冬、五味子滋阴敛汗，加牡蛎固涩，浮小麦止汗。共奏益气养阴、生津敛汗之效。

【验方医案】

1. 玉屏风散(《男女科病千首妙方》)

黄芪 30 克 白术 20 克 防风 15 克

李某,女,27 岁。产后 8 天汗出不能自止,动则加剧,微恶风,面色㿔白,气短,心慌,神疲乏力,舌质淡,舌苔薄,脉象虚弱。证属脾肺气虚,治宜补气固表、和营止汗。服上方 10 剂而愈。

2. 补中益气汤加减(《辽宁中医杂志》1987 年第 5 期)

黄芪 30 克 浮小麦 30 克 升麻 6 克 甘草 6 克 人参 9 克 白术 9 克 当归 9 克 陈皮 9 克 桂枝 9 克 牡蛎 15 克 五味子 15 克 白芍 9 克 山萸肉 15 克 大枣 10 枚 水煎服。

张某,女,26 岁。产后 7 天,身汗淋漓不止,低热,神疲乏力,舌质淡无苔,脉沉细弱。证属产后卫阳不固。治宜益气固表,和营敛汗。服上方 6 剂愈。

3. 益气养阴敛汗方(《女科临证集要》)

黄芪 50 克 当归 10 克 熟地 30 克 煅牡蛎 20 克 煅龙骨 20 克 五味子 10 克 白芍 15 克 山萸肉 10 克 浮小麦 20 克 甘草 6 克 水煎服,每天 1 剂。

牛某,女,35 岁。1980 年 9 月 7 日诊。

产后 10 天,睡中汗出,面色潮红,头晕耳鸣,五心烦热,腰膝酸软,现已 3 个月。舌红无苔,脉细数。此阴虚所致。服上方 6 剂愈。

【文献选要】

《诸病源候论·妇人产后诸病候下》:夫汗由阴气虚,而阳气加之,里虚表实,阳气独发于外,故汗出也。血为阴,产则伤血,是为阴气虚也。气为阳,其气实也,阳加于阴,故令汗出。而阴气虚弱不复者,则汗出不止也。凡产后皆血虚,故多汗,因之遇风则变为痉,纵不成痉,则虚乏短气,身体柴瘦,唇口干燥,久

变经水断绝，津液竭故也。

《医宗金鉴·妇科心法要诀》：产后血去过多则阴虚，阴虚则阳盛。若微微自汗，是荣卫调和，故虽汗无妨。若周身无汗，独头汗出者，乃阴虚阳气上越之象也。若头身俱大汗不止，则恐有亡阳之虑也。

《傅青主女科》：产后睡中汗出，醒来即止，犹盗汗入睡，而谓之盗汗，非汗自至之比。杂症论云：自汗阳亏，盗汗阴虚，然当归六黄汤又非产后盗汗方也，惟兼气血而调治之，乃为得耳。

各
论

九、产后身痛

产后身肢麻重疼，血虚芪桂五物灵，

风寒独活寄生用，肾虚壮肾汤养荣。

【注】 妇女产后出现身体四肢酸痛，麻木重著者，称为“产后身痛”。若因血虚而痛者，宜黄芪桂枝五物汤加秦艽、当归、鸡血藤等。因风寒而痛者，宜养血祛风，散寒除湿，用独活寄生汤治之。若因肾虚而痛者，宜养荣壮肾汤加熟地治之。

【辨证论治】

1. 血虚

〔主症〕 遍身关节疼痛，肢体酸楚，麻木头晕心悸，舌淡红，少苔，脉细无力。

〔病机〕 产后血虚，筋脉失养，则遍身关节酸楚，麻木。血虚不能上荣，则头晕。心失所养，则心悸。舌淡红，少苔，脉细无力，均为血虚之象。

〔治法〕 养血益气，温经通络。

〔方药〕 黄芪桂枝五物汤（《金匮要略》）加秦艽、当归、鸡血藤。

黄芪 桂枝 白芍 生姜 大枣

〔方义〕 方中当归、白芍、鸡血藤养血活血通络；黄芪益气以助血之运行；秦艽祛风；桂枝温经通络；生姜、大枣调和营卫。共奏养血益气，温经通络之效。

2. 风寒

〔主症〕 周身关节疼痛，屈伸不利，或痛无定处，或疼痛剧烈，宛如锥刺，或肢体肿胀，麻木重着，步履艰难，得热则舒。舌淡，苔薄白，脉细缓。

〔病机〕 产后体虚，风、寒、湿邪乘虚而入，留滞经络，气血受阻，不通则痛，故关节疼痛，屈伸不利。风邪偏胜，则痛无定处。寒邪独盛，则疼痛剧烈，宛如锥刺。湿邪偏盛，其性重浊留滞，影响气血运行，则四肢肿胀，麻木重着。血得热则行，故喜热熨。舌淡，苔薄白，脉细缓，均为血虚之象。

〔治法〕 养血祛风，散寒除湿。

〔方药〕 独活寄生汤（《千金要方》）。

独活 寄生 秦艽 防风 细辛 当归 白芍 川芎 干地黄 杜仲 牛膝 人参 茯苓 甘草 桂心

〔方义〕 方中四物汤养血和血；人参、茯苓、甘草益气扶脾；独活、寄生、秦艽、防风祛风胜湿；牛膝、杜仲补益肝肾，强筋壮骨；细辛搜风散寒；桂心温经止痛，合为扶正祛邪之剂。

3. 肾虚

〔主症〕 产后腰脊酸痛，腿脚乏力，或足跟痛。舌淡红苔薄，脉沉细。

〔病机〕 素体肾气亏损，因产后气血俱虚，胞脉失养，则腰脊酸痛，腿脚乏力。足跟是足三阴经脉所过之处，故肾虚则足跟痛。舌淡红苔薄，脉沉细，均为肾虚之象。

〔治法〕 补肾、强腰，壮筋骨。

〔方药〕 养荣壮肾汤（《叶氏女科证治》）。

当归 川芎 独活 肉桂 防风 杜仲 川断 桑寄生
生姜

〔方义〕 川芎、当归养血活血；生姜、肉桂温经散寒；防风、独活祛风胜湿；杜仲、川断、桑寄生补肾强腰壮筋骨，加熟地滋肾填精补血。全方具有补肾养血，强腰壮筋骨的作用。

〔加减〕 有产后瘀血阻滞经络，以致关节不利。症见产后身痛，四肢关节屈伸不利，或腹痛，恶露下而不畅。舌质紫暗或有瘀点，脉沉涩。治法：活血祛风，通络止痛。方用身痛逐瘀汤（《医林改错》）。

身痛逐瘀汤：秦艽 川芎 桃仁 红花 甘草 羌活 没药 当归 灵脂 香附 牛膝 地龙

〔方义〕 方中当归、川芎活血；香附理气；桃仁、红花、没药、五灵脂活血逐瘀止痛；地龙祛风通络；牛膝破血行瘀，强筋壮骨；秦艽、独活祛风胜湿利关节；甘草缓急止痛。

【验方医案】

1. 四物汤加味（《福建中医药》1985年第5期）

当归 13 克 酒炒白芍 13 克 熟地 15 克 黄芪 15 克 羌活 15 克 桂枝 8 克 川芎 6 克 蜈蚣 1 条 水煎服。

李某，女，27 岁。产后 25 天，全身疼痛，自汗无力，怕风喜暖，大便干结，小便清长，舌质红，苔薄，脉细弱。证属产后荣卫俱虚，感受外邪，投以补血和营，祛邪固卫法。予以上方进 3 剂愈。

2. 养血祛风散寒除湿（《女科临证集要》）

当归 15 克 川芎 10 克 白芍 10 克 熟地 30 克 桃仁 10 克 炙甘草 6 克 炮姜 6 克 千年健 10 克 威灵仙 10 克 黄芪 30 克 羌活 10 克 秦艽 10 克 独活 10 克 水煎服。

郝某，女，27 岁。1981 年 4 月 6 日诊。

患者第 2 胎足月妊娠，由于产程过长，肢体着凉。分娩后

2 日即感右臂及下肢疼痛,宛如锥刺,屈伸不利,不能行走,亦不能平卧,终日呻吟不安。妇产科诊断为神经炎,用西药治疗效果不显,而求中医诊治。此产后着凉,风湿稽留络道,营卫运行失其常度。治拟养血祛风,散寒除湿法,以上方 6 剂,病情大为好转,疼痛基本解除,已能扶床下地,又服 10 剂病告痊愈。

3. 黄芪桂枝五物汤(《女科临证集要》)

黄芪 50 克 桂枝 10 克 当归 10 克 白芍 10 克 干姜 10 克 附子 10 克 甘草 6 克 水煎服。

张某,女,40 岁。1974 年 10 月 3 日诊。

产育过多,今其因难产大出血后,卧床将 7 个月,始起觉背肌发麻,继又觉四肢发麻,清晨厥冷不温,十指屈伸僵拘不灵,面容苍白,头晕目眩,心悸少寐,形寒怕冷。舌淡红,苔薄,脉虚数。此为血痹症。以上方 6 剂后诸症减轻。又服 12 剂而告痊愈。

4. 独活寄生汤(程绍恩教授临床经验方)

独活 10 克 寄生 20 克 秦艽 15 克 防风 15 克 细辛 5 克 当归 10 克 川芎 10 克 白芍 10 克 熟地 20 克 川牛膝 15 克 杜仲 10 克 甘草 10 克 茯苓 15 克 党参 20 克 桂枝 10 克 水煎服。每天 1 剂。

张某,女,33 岁。产后 9 天,浑身痛,腰膝痛甚,四肢关节重着麻木,身有津津汗出,畏风怕冷,气短、心悸、乏力,肢凉。舌淡苔白,脉沉缓。诊为阳虚气弱,风寒湿痹。服上方 4 剂,诸症明显好转,疼痛麻木减轻,体力增强,饮食增进,以效不更方的原则,又服上方 4 剂痊愈。

【文献选要】

《校注妇人良方》:产后遍身疼痛者,由气虚百节开张,血流

骨节,以致肢体沉重不利,筋脉引急,发热头痛,宜用趁痛散治之。陈无择云,若兼感寒伤食宜用五积散,若误作伤寒发汗,则筋脉抽搐,手足厥冷,则变为痉,当大补气血为主。

《叶天士女科》:产后遍身疼痛,因气血走动,升降失常,留滞于肢节间,筋脉引急,或手足拘挛不能屈伸,故遍身肢节走痛,宜趁痛散。若瘀血不尽,流于遍身,则肢节作痛,宜如神汤。

趁痛散:当归 白术 牛膝 黄芪 生姜 肉桂 薤白
独活 桑寄生

如神汤:当归 延胡索 桂心

十、缺 乳

产后缺乳气血虚,气机壅滞属肝郁,

虚用通乳丹调治,肝郁下乳涌泉医。

【注】 产后乳汁甚少或全无,称为“缺乳”或“乳汁不足”,或“乳汁不行。”缺乳之因有气血虚弱和肝郁气滞两种。因气血虚弱而缺乳者,宜“通乳丹”。因肝郁气滞者,宜“下乳涌泉散”治之。

【辨证论治】

1. 气血虚弱

〔主症〕 产后乳少,甚或全无,乳汁清稀,乳房柔软,无胀感,面色无华,神疲食少,舌淡少苔,脉虚细。

〔病机〕 气虚血少,乳汁化源不足,无乳可下,故乳房无胀感。气虚血少,不能上荣,则面色无华。阳气不振,脾失健运,则神疲食少。舌淡少苔,脉虚细,均为气虚血少之候。

〔治法〕 补气养血、佐以通乳。

〔方药〕 通乳丹(《傅青主女科》)。

人参 黄芪 当归 麦冬 木通(或用通草) 桔梗

用猪蹄煮汤,或煮肉汤煎药服之。

〔方义〕 方中人参、黄芪补气;当归、麦冬养血滋阴;桔梗、通草利气宣络;猪蹄补血滋养。全方有补气养血,疏通经络之效,使气血充足,乳汁自生。

2. 肝郁气滞

〔主症〕 产后乳汁分泌少,甚或全无,胸胁胀闷,情志抑郁不乐,或有微热,食欲减退。舌正常,苔薄黄,脉弦细而数。

〔病机〕 肝主疏泄,性喜条达,产后情志郁结,肝气不舒,气机壅滞,影响乳汁运行,故乳房胀满而痛。肝脉布胁肋,气滞不宣,则胸胁胀闷。肝气犯胃,则食少。苔薄黄,脉弦细或数,乃肝郁气滞,郁而化热之象。

〔治法〕 疏肝解郁,通络下乳。

〔方药〕 下乳涌泉散(《清太医院配方》)。

当归 白芍 川芎 生地 柴胡 青皮 花粉 漏芦 通草(木通) 桔梗 白芷 穿山甲 王不留行 甘草

〔方义〕 方中当归、白芍、川芎补血、养血、行血;生地、花粉补血滋阴;青皮、柴胡疏肝散结;桔梗、通草理气宣络;漏芦、穿山甲、王不留行通络下乳;甘草以调和脾胃。全方有补血养血,疏肝解郁,通络行乳之效。

〔加减〕 如有身热者,酌加黄芩、蒲公英以清热。如乳房胀硬热痛,触之有块者,加丝瓜络、路路通、夏枯草,以通络散结。同时,外用蒲公英,捣烂敷于肿处。势欲成脓者,可按“乳痈”处理。

【验方医案】

1. 益气通乳汤(《中医妇科学》)

党参 15 克 黄芪 15 克 当归 10 克 麦冬 10 克 王不留行 15 克 穿山甲 15 克 天花粉 10 克 陈皮 4 克 通草 3 克

水煎服。每天1剂。

丘某,女,29岁。1975年9月4日诊。本人自述产后14天乳汁稀少。患者两乳部柔软,无胀感。心悸、气短,面色苍白无华。舌淡红,苔薄白,脉细弱,服上方3剂后,乳房有胀感,乳汁增多,心悸、气短减。又服上方3剂乳汁如常。

2. 疏肝通乳汤(《中医妇科学》)

当归10克 白芍10克 柴胡6克 薄荷5克 麦冬10克 川芎6克 青皮6克 穿山甲珠10克 王不留行10克 漏芦9克 瓜蒌15克 皂角刺3克 水煎服。

周某,女,28岁。1968年2月12日诊。产后21天,因家庭小事,与爱人吵架之后乳汁不行,乳房胀满而痛,精神郁闷,胸胁胀满,食欲减退,舌暗红,苔薄黄,脉弦数。服上方3剂后乳汁已通,但不够多,继服6剂而愈。

3. 通乳汤(《中国当代名医验方大全》)

党参15克 黄芪20克 当归15克 穿山甲珠10克 王不留行15克 通草7克 丝瓜络10克 路路通7克 知母7克 水煎服,每日1剂。

周某,女,27岁。头胎,产后第7天,乳汁不下,曾服猪蹄汤、大虾汤,乳汁仍不下。用手按压流少量清水,乳房无胀痛感觉,面色苍白,口干,食少,便秘,舌质淡,少苔,脉虚细,服上方3剂后,下少量乳汁,继服3剂乳汁增多,可满足婴儿吸吮。

4. 通乳猪蹄汤(程绍恩教授临床经验方)

当归10克 川芎10克 白芍10克 熟地15克 天花粉15克 王不留行15克 穿山甲珠10克 漏芦15克 僵虫15克 党参20克 黄芪30克 通草5克

以猪蹄两只煮熟漂去浮油,取汁煎药。每天1剂。

王某,女,26岁。产后4天,乳汁不行。乳房柔软,无胀感,

用手挤压乳房,仅清稀几滴少量乳汁流出。全家恐怕婴儿无乳吮,请中医用中药进行诊治。症见:乏力,自汗,时有心悸气短,腰腹微痛,恶露较多,舌淡苔薄白,脉沉弱。诊为产后气血虚弱缺乳证。以上方3剂服后诸症消失,乳房增大,胀满,乳汁满溢,婴儿食之不尽,时而有余乳汁而弃之。

【文献选要】

《三因极一病证方论》:产妇有二种乳脉不行。有气血盛而壅闭不行者;有血虚气弱,涩而不行者。虚当补之;盛当泻之。盛者当用通草、漏芦、土瓜根辈;虚者当用钟乳、猪蹄、鲫鱼之属,概可见矣。

《傅青主女科》:妇人产后绝无点滴之乳,人以为乳管之闭也,谁知是气与血之两涸乎!夫乳乃气血之所化而成也,无血固不能生乳汁,无气亦不能生乳汁。然二者之中,血之化乳,又不若气之所化为尤速。新产之妇,血已大亏,血本自顾不暇,又何以化乳?乳全赖气之力,以行血而化之也。今产后数日,而乳不下点滴之汁,其血少气衰可知。气旺则乳汁旺,气衰则乳汁衰,气涸则乳汁亦涸,必然之势也。世人不知大补气血之妙,而一味通乳,岂知无气则乳无以化,无血则乳无以生,不几向饥人而乞食,贫人而索金乎!治法宜补气以生血,而乳汁自下,不必利窍以通乳也。

十一、乳汁自出

产后乳汁自出来,虚弱郁热自然排,
虚用八珍固摄补,热用丹栀或免怀。

【注】 产后乳汁不经婴儿吮吸,而不断地自行流出来者,谓之“乳汁自出”。又称此为之“乳漏”,是由于气血虚弱不能固摄或肝经郁热迫使乳汁自然排出。因虚不固者,以八珍汤气血

双补，而固摄乳汁；因肝经郁热迫乳汁外排者，宜丹栀逍遥汤或用免怀散，清肝热化瘀则乳汁自回。

【辨证论治】

1. 气血虚弱

〔主症〕 乳汁自出，质清稀，乳房柔软无胀感，神疲气短。舌淡苔薄，脉细弱。

〔病机〕 产后气血虚弱，中气不足，胃气不固，乳汁失约，故乳房柔软，乳汁自出而质清稀。血虚则乳汁乏源而量少；气虚则摄纳无权而量多。中气不足，则神疲气短。舌淡苔薄，脉细弱，均为气血虚弱之征。

〔治法〕 补气益血，佐以固涩。

〔方药〕 八珍汤（方见“经行头痛”）去川芎，加黄芪、五味子、芡实。

〔方义〕 方中以党参、黄芪、白术、茯苓、甘草补中益气，熟地、当归、白芍养血柔肝，五味子、芡实固精止涩。共奏补气固摄敛乳之效。

2. 肝经郁热

〔主症〕 乳汁自出，量多质稠，乳房胀痛，情志抑郁，烦躁易怒，甚或心悸少寐，便秘尿黄。舌质红，苔薄黄，脉弦数。

〔病机〕 肝郁化热，热迫津液，故乳汁自出而量多，质稠。肝失条达，气滞不宣，故情志抑郁，乳房胀痛。肝郁化火，则烦躁易怒。热扰心神，则心悸少寐。津被热灼，则便秘尿黄。舌质红，苔薄黄，脉弦数，均为肝郁化热之象。

〔治法〕 如乳汁不多的妇女，逐渐减少哺乳次数，乳汁亦会渐渐减少，而达到停止分泌。产妇不欲哺乳者，可予回乳。

回乳方：

（1）麦芽 200 克、蝉蜕 5 克，水煎，作 1 天量服。

(2)免怀散(《济阴纲目》):红花、赤芍、当归尾、川牛膝水煎服。连服3剂。

(3)皮硝120克,装于布袋,排空乳汁后,敷于乳部,并扎紧,待湿后更换之。

【验方医案】

1. 补肾固摄方(《中医妇科学》)

熟地9克 山药9克 山萸肉9克 党参9克 炙黄芪9克 五味子9克 川断9克 炒杜仲9克 生白芍9克 炙甘草4.5克 水煎服。每天1剂。

陈某,女,22岁。

1965年7月7日初诊。初产3天起,乳汁自动外流,至今已1月余,医治无效。诊时乳房柔软,纳食正常,二便自如。据述腰疼如折,俯仰艰难,乳胀即出,流净为止。脉象细弱,舌质淡红,苔薄白。服上方3剂,即告治愈。

2. 丹栀逍遥散加减(《辽宁中医杂志》)

牡丹皮8克 山栀子10克 当归10克 茯苓10克 柴胡(醋炙)6克 炙甘草5克 白术10克 生地10克 郁金6克 生牡蛎30克 水煎服。每天1剂。

徐某,女,26岁。生育已4年,两年前乳汁自出,每浸湿数层衣服,曾用中西医多方治疗无效。询知患者,因家庭不睦,精神抑郁乳房胀满。经潮仅1日,量少色紫黑,舌质偏红,苔薄黄根腻,脉弦细。证属肝经郁热,疏泄太过。法当疏肝解郁,清热敛乳。服上方8剂痊愈。

第十一节 杂 病

妇科杂病生病内，不属经带胎产规，
癥瘕不孕脏躁证，阴挺阴痒疮阴吹。

【注】 凡与女性生理、病理特点密切相关，又不属于经、带、胎、产规范之内的杂病，称为“妇科杂病”。包括癥瘕、不孕、脏躁、阴挺、阴痒、阴疮、阴吹等病。

一、癥 瘕

癥瘕下腹结包块，伴有胀满出血疼，
癥积不动有定处，瘕聚推移无定形，
气滞为瘕香棱效，瘀血为癥桂茯苓，
痰湿结聚黄白带，开郁二陈汤化平。

【注】 妇女下腹部，腹中结有包块，伴有腹胀，满闷，或阴道出血，小腹疼痛者，统称为癥瘕病。癥与瘕亦有区分，即包块坚硬推之不移，痛有定处为癥积。包块按之不坚，推之移动，痛无定处者，名曰瘕聚。

气滞为瘕，即“瘕”的病因是气滞而成，宜香棱丸行气导滞。“癥”的病因是瘀血所致，宜用桂枝茯苓丸，活血化瘀散结。若“癥瘕”由痰湿结聚而成者，兼有黄白带下，宜用开郁二陈汤理气化痰，则癥瘕可平矣。

【辨证论治】

1. 气滞

〔主症〕 小腹胀满，积块不坚，推之可移，或上或下，痛无

定处，苔薄润，脉沉弦。

〔病机〕 此乃气滞所致，故虽有积块而不坚，推之可移。气聚痛作，气行则止，故痛无定处。气滞则血行不畅，故小腹胀满。脉沉弦亦为气机不畅之象。

〔治法〕 行气导滞，活血消癥。

〔方药〕 香棱丸(《济生方》)。

木香 丁香 三棱 枳壳 莪术 青皮 川楝子 小茴香
上药共研细末，面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。

〔方义〕 方中木香、丁香、茴香、枳壳均为行气导滞之品。青皮破气疏肝，川楝子清下焦郁热，且有行气止痛之效。佐三棱破血中之气滞，莪术逐气分之血瘀，以助行气导滞之力，朱砂，取其护心宁神之意。

〔加减〕 若月经不调者，加丹参、香附；带下过多者加茯苓、苡仁、白芷；腹痛剧烈者加延胡、田七等。

2. 血瘀

〔主症〕 胞中积块坚硬，固定不移，疼痛拒按，面色晦黯，肌肤乏润。月经量多或经期延后，口干不欲饮，舌边瘀点，脉沉细。

〔病机〕 血瘀不行，气机被阻，积结成癥，故积块坚硬不移，痛而拒按。脉络不通，血运失常，上不荣面，外不荣肌肤，故面色晦黯，肌肤不润。瘀血内阻，冲任失调，故月经量多或经期延后。津液不能上承，故口干不欲饮。舌边瘀点，其脉沉涩，均属瘀血内阻之征。

〔治法〕 活血散结，破瘀消癥。

〔方药〕 桂枝茯苓丸(《金匱要略》)加减。

桂枝 茯苓 桃仁 丹皮 芍药
各等份研细末，炼蜜为丸。

〔方义〕 方中桂枝温经,行气、通阳;丹皮、桃仁活血化瘀;茯苓渗湿健脾;赤芍行血中之滞。

〔加减〕 若月经过多,崩漏不止者,加失笑散、血余炭等。带下多者加苡仁、白芷。疼痛剧烈者加延胡、乳香、没药。月经过少,闭经者加牛膝、泽兰。

若邪实正盛,肌肤甲错,可选用大黄廔虫丸(《金匱要略》)。

大黄廔虫丸:大黄 黄芩 甘草 桃仁 杏仁 芍药 干地黄 干漆 虻虫 水蛭 蛭螬 廔虫

共为细末,炼蜜为丸,小绿豆大,酒饮服5丸,日服3次。

方中廔虫、水蛭、虻虫、蛭螬逐瘀消坚,破积通络。桃仁、干漆、大黄攻瘀荡邪。黄芩杏仁清热滑利。地黄、白芍滋血和营益阴。甘草解毒及调和诸药。全方具有逐积消坚,祛瘀生新之效。

3. 痰湿

〔主症〕 下腹包块时或作痛,按之柔软,带下较多,色白质黏腻,形体畏寒,胸脘痞闷,小便不多,舌苔白腻,舌质暗紫,脉细濡或沉滑。

〔病机〕 痰湿结于下腹,气血运行不畅,故有时作痛。包块系痰湿所凝结,故按之柔软。痰湿下注,故带多色白而腻。痰湿内阻,故小便不多。脾肾阳气不足,故形体畏寒,胸脘痞闷,苔白腻,脉细濡或沉滑,均为痰湿阻滞。

〔治法〕 理气化痰,破瘀消癥。

〔方药〕 开郁二陈汤(《万氏妇人科》)。

制半夏 陈皮 茯苓 青皮 香附 川芎 莪术 木香 槟榔 甘草 苍术 生姜

〔方义〕 方中青皮、香附、木香、槟榔为理气行滞之品;半夏、陈皮、茯苓有燥湿化痰之功;川芎为血中气药,功能调经;莪

术能消癥瘕。

〔加减〕 若脾胃虚弱,纳差神疲者,可去槟榔,加白术、党参以健脾益气;若形体壮实可加金礞石、葶苈子攻逐之品。

若为湿热癥瘕,症见带下量多,色黄白,质黏腻有臭气,或如脓样,小腹疼痛,胸闷烦躁,发热口渴,尿少色黄,舌苔黄腻而根部尤甚,舌质红,脉弦大或滑数。治宜清热利湿,破瘀散癥。方用大黄牡丹皮汤(见“产后发热”)加血藤、败酱草、桃仁、炙穿山甲等。

此外,根据病情需要,可采用手术治疗。

【验方医案】

1. 消癥散结方(《河北中医》1990年第3期)

丹参 30 克 生牡蛎 30 克 黄芪 30 克 夏枯草 15 克 海藻 15 克 三棱 15 克 香附 15 克 山慈姑 15 克 莪术 10 克 穿山甲 10 克 王不留行 10 克 桃仁 10 克 桂枝 10 克 琥珀粉 3 克(冲) 水煎服,每天 1 剂。

赵某,女,43 岁。月经先期,量多 2 年,血暗红,有血块,行经少腹疼痛,带下量多,色黄有味。舌紫暗,苔白,脉沉实。查子宫左前壁有 3 厘米×2 厘米大小之肿物。B 超提示:子宫肌瘤。中医诊断为“癥瘕”(血瘀型),治则活血化瘀,消癥散结。予上方 66 剂愈。愈后复查 B 超报告“肌瘤图像消失”。随访 1 年未发。

2. 理中汤加减(《四川中医》1986 年第 1 期)

当归 20 克 川芎 15 克 赤芍 15 克 黄柏 15 克 党参 15 克 黄芪 15 克 三棱 10 克 莪术 10 克 生水蛭 10 克 山药 15 克 鸡内金 15 克 水煎服。每天 1 剂。

张某,女,29 岁。下腹部隐痛,可触及包块新增大如鹅卵大。平素腰痛,白带多,味臭,面色不荣,形体消瘦,舌红苔薄白,

脉沉弦。妇检：右侧附件区可触及约 8 厘米×5 厘米大小的肿块，诊为：卵巢囊肿。证属气机阻滞，瘀血内停。治宜活血祛瘀、补气、清热燥湿法。服上方 30 剂痊愈。

3. 藿香益智莪棱方(程绍恩教授经验方)

藿香 10 克 益智 10 克 三棱 5 克 莪术 10 克 青皮 10 克 陈皮 15 克 黄连 7 克 半夏 10 克 木香 5 克 丁香 5 克 桂枝 10 克 茯苓 10 克 桃仁 10 克 丹皮 10 克 赤芍 10 克 水煎服，每剂煎 3 次，混合后，匀 3 次服之，每日早、晚各服 1 次。

陈某，女，27 岁。月经不调，小腹隐痛胀满，白带多，腰痛，乏力，气短心悸，四肢发麻，现已闭经 3 个月，时有五心烦热。舌红，苔黄腻，脉沉弦。腹诊扪之小腹部包块硬韧，推之不移，呈手拳大，压痛明显。服上方 6 剂，腹部轻松，诸症好转。又服 12 剂，包块消失，诸症悉除。

【文献选要】

《三因极一病证方论》：多因经脉失于调理，产褥不善调护，内作七情，外感六淫，阴阳劳逸，饮食生冷，遂致营卫不输，新陈干忤，随经败浊，淋露凝滞，为癥为瘕。

《景岳全书·妇人规》：瘀血留滞作癥，惟妇人有之，其证则或由经期，或由产后，凡内伤生冷，或外受风寒，或恚怒伤肝，气逆而血留，或忧思伤脾，气虚而血滞，或积劳积弱，气弱而不行，总由血动之时，余血未净，而一有所逆，则留滞日积，而渐以成癥矣。

《医宗金鉴·妇科心法要诀》：凡治诸癥积，宜先审身形之壮弱，病势之缓急治之。如人虚，则气血衰弱不任攻伐，病势虽盛，当先扶正气，而后治其病；若形证俱实，宜先攻其病也。经云：大积大聚，衰其大半而止，盖恐过于攻伐，伤其气血也。

二、不孕症

不孕婚后二年余，配偶正常未分离，
肾阳毓麟河丹附，肾阴养精种玉奇，
肝郁开郁种玉治，痰湿启宫少腹瘀。

【注】 女子结婚2年以上，配偶生殖功能正常，夫妇同居，未有两地分居，未避孕而不孕者，称为“原发性不孕症”。如曾生育或流产后，无避孕而又2年以上不再受孕者，称“继发性不孕”。因肾阳虚而不孕者，宜《景岳全书》毓麟珠方，加紫河车、丹参、香附。因肾阴虚不孕者宜《傅青主女科》养精种玉汤加女贞子、旱莲草。因肝郁不孕者，宜开郁种玉汤。因痰湿不孕者，宜启宫丸加石菖蒲。因血瘀不孕者，宜少腹逐瘀汤。

【辨证论治】

1. 肾虚不孕

(1) 偏阳虚

〔主症〕 婚久不孕，月经后期，量少色淡，或月经稀少，闭经。面色晦黯，腰酸腿软，性欲淡漠，小便清长，大便不实，舌淡苔白，脉沉细或沉迟。

〔病机〕 肾虚冲任失养，血海不充，故婚久不孕，月经后期，量少，色淡，月经稀少，闭经。腰为肾之府，肾阳不足，命门火衰，故面色晦黯，腰酸腿软，性欲淡漠。肾阳虚衰，上不能温暖脾阳，下不能温化膀胱，则大便不实，小便清长。舌淡苔白，脉沉细或沉迟，均为肾阳虚衰之象。

〔治法〕 温肾补气养血，调补冲任。

〔方药〕 毓麟珠(《景岳全书》)加紫河车、丹参、香附。

人参 白术 茯苓 白芍 川芎 当归 炙甘草 熟地

菟丝子 杜仲 川椒 鹿角霜

共为细末，炼蜜为丸。

〔方义〕 方中四物汤补血；丹参、香附理气和血调经；四君子汤健脾而益气；菟丝子、杜仲、鹿角霜、紫河车有温养肝肾，调补冲任，补阴益精之功；佐川椒温督脉以助阳。全方即温养先天肾气以生精，又培补后天脾胃以生血，并佐以调和血脉之品，使精充血足，冲任得养，胎孕易成。

〔加减〕 如腰痛似折，小腹冷甚，脉沉迟者，可于上方加巴戟天、补骨脂、仙茅、仙灵脾等温肾壮阳。

(2) 偏阴虚

〔主症〕 婚久不孕，月经先期，量少，色红无血块，或月经尚正常，但形体消瘦，腰腿酸软，头昏眼花，心悸失眠，性情急躁，口干，五心烦热，午后低热，舌质偏红，苔少，脉细数。

〔病机〕 阴血亏虚，每致阳气偏旺，血海蕴热，故婚久不孕，月经先期；精血亏少，故月经量少；精血虚损，肢体失荣，故形体消瘦；阴血不足，心肝失养则头昏眼花，心悸失眠；腰为肾之府，肾精不足，故腰腿酸软；肾阴亏虚，君相火旺，则心情焦急，五心烦热，午后低热；舌质红，苔少，脉细数，均为阴虚火旺之象。

〔治法〕 滋阴养血，调冲益精。

〔方药〕 养精种玉汤（《傅青主女科》）加女贞子、旱莲草。

当归 白芍 熟地 山萸肉

〔方义〕 方中当归、白芍养肝和血；女贞子、旱莲草滋养肝肾；熟地、山萸肉补益精血。全方补血滋阴；适合妇女常服。

〔加减〕 若症见形体消瘦，五心烦热，午后潮热者，皆属阴虚火旺，可加丹皮、地骨皮、黄柏、龟版以清热降火、滋润填精。

2. 肝郁

〔主症〕 多年不孕，经期先后不定，经来腹痛，行而不畅，

量少色黯，有小血块，经前乳房胀痛，精神抑郁，烦躁易怒，舌质正常或黯红，苔薄白，脉弦。

〔病机〕 情志不畅，则肝失条达，气血失调，冲任不能相资，故多年不孕。肝郁气滞，血行不畅，故经前乳胀，经行量少，色黯有块。肝郁则情志抑郁，郁而化火，则烦躁易怒。疏泄失常，则经行先后不定。舌质黯红，苔薄白，脉弦，均为肝郁之象。

〔治法〕 疏肝解郁，养血理脾。

〔方药〕 开郁种玉汤（《傅青主女科》）。

当归 白术 白芍 茯苓 丹皮 香附 花粉

〔方义〕 方中当归、白芍养血柔肝；丹皮凉血活血；香附调气解郁；白术、茯苓益脾；花粉生津清热，共奏疏肝、平肝、益脾之效。

〔加减〕 如胸胁胀满甚者，去白术，加青皮、玫瑰花、绿萼梅疏肝。梦多而睡眠不安者，加炒枣仁、夜交藤以益肝宁神。乳胀有块，酌加王不留行、橘叶、橘核、路路通。乳房胀痛有灼热感或触痛者，加川楝子、蒲公英。

若气滞而挟瘀血者，可见小腹痛胀，经期或劳累后加重，痛时拒按，则宜温阳化气，活血行瘀。方用少腹逐瘀汤（方见“痛经”）去干姜、肉桂，加丹参、香附、桂枝。

3. 痰湿

〔主症〕 婚后久不受孕，形体肥胖，经行延后，甚或闭经，带下量多，质黏稠，面色㿠白，头晕心悸，胸闷泛恶，苔白腻，脉滑。

〔病机〕 形体肥胖为本型特征。痰湿壅阻气机，胞脉闭塞，不能摄精成孕，故婚久不孕月经后期，甚或闭经。痰湿内阻，升降失宜，清阳不升，故面色㿠白，头晕心悸，胸闷泛恶。脾虚湿困，湿浊下注，故带下量多，质黏稠。苔白腻、脉滑、亦为痰湿内

蕴之征。

〔治法〕 燥湿化痰，理气调经。

〔方药〕 启宫丸（经验方）加石菖蒲。

制半夏 苍术 香附 神曲 茯苓 陈皮 川芎

共为细末，为丸。

〔方义〕 方中半夏、茯苓、陈皮、苍术燥湿化痰；石菖蒲芳香化浊；神曲健脾消滞；香附、川芎理气和血。

〔加减〕 如经量过多，去川芎，酌加黄芪、续断益气固肾。若心悸者，加远志以宁心。

备
论

4. 血瘀

〔主症〕 婚久不孕，月经后期量少，色紫黑，有血块，或痛经，平时少腹作痛，痛时拒按。舌质紫黯或舌边有紫点，脉细弦。

〔病机〕 瘀血阻于胞脉，故婚久不孕，月经后期量少或痛经。瘀血随经血下泄则经色紫黑，有血块。瘀阻不畅，则腹痛拒按，舌黯有紫点，脉细弦为血瘀之征。

〔治法〕 活血化瘀，调经。

〔方药〕 少腹逐瘀汤（方见“痛经”）。

【验方医案】

1. 调经种子汤（《中国当代名医验方大全》）

全当归 15 克 川芎 10 克 炒白芍 12 克 熟地黄 15 克
川续断 12 克 丹参 15 克 菟丝子 12 克 延胡索 10 克 阿胶
珠 10 克 香附 12 克 炒杜仲 10 克 水煎服，每天 1 剂。

张某，女，38 岁。结婚后 15 年未孕，经多方治疗无效，已失去治疗信心。患者月经基本正常，经前腹痛，但不甚剧，伴腰痛乏力。妇科检查：左侧输卵管不通，子宫后倾。舌淡红，苔薄白，脉弦细略沉。照上方连服 2 个月，月经至期未行。妊娠试验阳性，足月剖腹产一男婴，母子皆健。

2. 保育灵(《中国当代名医验方大全》)

熟地 25 克 白芍 20 克 山萸肉 15 克 龟版 15 克 川断 20 克 桑寄生 20 克 杜仲 70 克 山药 15 克 牡蛎 15 克 牛膝 15 克 丹皮 15 克 水煎服,每日 1 剂。

赵某,女,28 岁。婚后 3 年未孕,月经 18 岁初潮,3~6 个月一行。舌红脉细数,余无所苦。服药不及 2 月,即身怀有孕。翌年产一男婴。

3. 少腹逐瘀汤加减(《辽宁中医杂志》1988 年第 9 期)

蒲黄 10 克 灵脂 10 克 没药 10 克 川芎 10 克 益母草 10 克 延胡索 15 克 白芍 15 克 小茴香 6 克 炮姜 3 克 官桂 3 克 香附 12 克 水煎服。每天 1 剂。每于月经来潮始服至经净止(服 6~7 剂)。

张某,女,35 岁。结婚 10 年未孕,每逢经期腹痛,拒按,经量少,色紫暗,多血块。月经每 2 月来潮 1 次。宫腔碘油造影报告,左侧输卵管壶腹部阻塞,右输卵管狭窄。察形体消瘦。舌红边紫,脉弦细涩。证属瘀阻胞宫,治宜活血祛瘀。予上方服用 5 个月经周期,平素则与逍遥散加减调理,经行腹痛已止,经色正,宫腔碘油造影显示,两侧输卵管通畅。至第 7 个周期受孕,顺产一女婴。

4. 加减逍遥汤(程绍恩教授经验方)

当归 15 克 茯苓 15 克 白术 15 克 白芍 10 克 柴胡 10 克 薄荷 10 克 甘草 5 克 麦芽 50 克 香橼 30 克 丹参 30 克 三棱 5 克 山药 15 克 菟丝子 15 克 续断 15 克 桑寄生 20 克 水煎服。每剂煎 3 次,3 次药液混匀,分 3 次服之,每日早晚空腹温服(每剂药服一天半)。

李某,女,27 岁。婚后 9 年未孕。这次前来就诊不是治疗不孕症,而是求治现有的病症:腕闷、腹胀,胸背憋满,胁肋胀痛,

急躁易怒，善太息。每次月经前后乳房胀痛，月经不调，前后不定，白带较多。心烦不安。舌红苔黄，脉沉弦。诊为肝气郁结证，以上方 12 剂，症状消失。时隔 3 年之久，前来长春中医药大学，请余为她妹妹治疗不孕症。余曰：我没有治疗不孕症的专方。该患者说：“3 年前，您在市中医院带学生实习期间，给我诊治。说我是肝气郁结，当时服您开方 6 剂中药，症状已去大半，为了防止复发，又服 6 剂而痊愈。事隔两月，已妊娠，生一男孩。我虽结婚 9 年未生孩子，可服您 12 剂汤剂后生一男孩，现已带来，请看看这男孩多么健壮。您确有治疗不孕证的绝招。现我妹妹已结婚 5 年未孕，请您治疗”。余根据该患者现有症状，进行辨证施治。该患者服药与否，不作报告。按前一患者之体会，妇人不子之故，只能辨证论治可也。不能单凭治疗不孕证的专方而可。《医宗金鉴·妇科心法》曰：“不子之故伤任冲，不调带下经漏崩，或因积血胞寒热，痰饮脂膜病子宫。”说明妇女不孕之因非止一端，必须除其病因则能孕育。伤冲任二脉者，调补冲任也；月经不调者，则调其经脉；带下多者，查其带下之因调经而治之。经漏经崩者，应调经而止崩漏；有积血者，应化积活血；胞寒者温之；胞热者清之；痰饮者化痰；脂膜厚者，亦减肥法；可治其不孕也。

【文献选要】

《校注妇人良方·求嗣门》：窃谓妇人之不孕，亦有因六淫七情之邪，有伤冲任，或宿疾淹留，传遗脏腑，或子宫虚冷，或气旺血衰，或血中伏热，又有脾胃虚损，不能营养冲任。审此，更当察其男子之形气虚实何如，有肾虚精弱，不能融育成胎者，有禀赋微弱，气血虚损者，有嗜欲无度，阴精衰惫者，各当求其源而治之。

《医林改错·少腹逐瘀汤》：可出奇者，此方种子如神，每经

初见之日吃起，一连吃5剂，不过4月必成胎。

《医宗金鉴·妇科心法要诀》：女子不孕之故，由伤冲任也。经曰：女子二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故能有子。若为三因之邪伤其冲任之脉，则有月经不调，赤白带下，经漏、崩漏等病生焉。或因宿血积于胞中，新血不能成孕，或因胞寒胞热，不能摄精成孕，或因体盛痰多，脂膜壅塞胞中而不孕，皆当细审其因，按证调治，自能有子也。

三、脏 躁

脏躁精神忧郁烦，哭笑无常不安眠，
方用甘麦大枣治，再加枣仁柏仁痊。

【注】 凡妇人精神忧郁，情志烦乱，哭笑无常，呵欠频作，失眠或睡眠不安者，称之为：脏躁。脏躁病，多由精血内亏，五脏失于滋濡所致，宜甘麦大枣汤加枣仁、柏仁治之。

【辨证论治】

【主症】 精神不振或情志恍惚，情绪易于波动，心中烦乱，睡眠不安。发作时，呵欠频作，哭笑无常，不能自主，口干，大便结，舌质红或嫩红，苔少，脉细弱略数或细弦。

【病机】 本病主要表现在神志的异常改变，如神志恍惚，情绪易于波动，均系血虚不能养神所致。神有余则笑，不足则悲，故发作时悲伤欲哭，喜笑无常。志火内动，则使心烦，睡眠不安。呵欠亦为神疲之征。阴津不足，则口干便秘。舌质红或嫩红，苔少，脉细弱略数，或细弦。均为阴血亏虚之候。

【治法】 甘润滋补，养心益脾。

【方药】 甘麦大枣汤（《金匱要略》）加枣仁、柏仁。

小麦 甘草 大枣

【方义】 方中以小麦养心；甘草、大枣润燥缓急；专以甘平

之味宁神健脾;枣仁、柏子仁宁心安神。

〔加减〕 若肝肾阴亏,症见头晕耳鸣,腰膝酸软,手足心热,烦躁易怒,心悸不安,甚则意识蒙眛,舌质红,脉弦细略数,治法当以补养肝肾,养心安神,方用百合地黄汤(《金匱要略》)加味,即百合、生地黄,加入枸杞、白芍、枣仁、麦冬、茯神等。如兼夹痰浊者,则以前方加入胆南星、茯苓、郁金、石菖蒲。

【验方医案】

1. 甘麦大枣汤与百合地黄汤加减(《中医妇科学》)

甘草 18 克 浮小麦 240 克 大枣 10 枚 炒枣仁 15 克
野百合 60 克 生牡蛎 30 克 水煎服,每天 1 剂。

邓某,女,32 岁。头昏冒,喜欠伸,精神恍惚,时悲时喜,自哭自笑,默默不欲食,心烦,失眠,怔忡心悸,多梦纷纭,喜居暗室,颜面潮红,舌苔薄白,脉象弦滑。诊为“脏躁”,虚热相搏,扰乱神明。以上方 20 剂愈。

2. 安脏汤(《女科临证集要》)

柴胡 10 克 香附 10 克 生地 30 克 栀子 10 克 半夏 10 克 竹茹 6 克 白芍 15 克 浮小麦 30 克 甘草 15 克 大枣 5 枚 甘松 10 克 珍珠母 30 克 龙齿 30 克 水煎服。

陈某,女,38 岁。1978 年 6 月 10 日诊。经常睡眠不好。半年前因家庭纠纷发生,郁而发病,哭笑无常。常边走边哭边笑,乱语不识亲疏。心烦胸闷,时时叹息,神志呆滞,呵欠频作,食欲减退,夜间少寐,脉沉弦细。舌红苔薄黄。诊断:“脏躁”,服上方 3 剂病情好转,又续服 9 剂诸症消失而痊愈。观察 2 年未复发。

许某,女,43 岁。1979 年 11 月 17 日诊。精神忧郁,数月以来头晕目眩,心悸、烦躁不宁,失眠、胆怯,哭笑无常,语无伦次,呵欠频作,厌食、口干、大便秘结,有时全身颤抖,四肢抽搐。舌红

苔少,脉弦细,诊为:“脏躁症”。以上方 12 剂,诸症悉除,病告痊愈。

【文献选要】

《金匱心典》:血虚脏躁,则内火扰而神不宁,悲伤欲哭,有如神灵,而实为虚病。……小麦为肝之谷,而善养心气,甘草、大枣甘润生阴,所以滋脏气而止其躁也。

《医宗金鉴·订证金匱要略》:脏,心脏也。心静则神藏,若为七情所伤,则心不得静,而神躁扰不宁也。故喜悲伤欲哭,是神不能主情也,像如神灵所凭,是心不能神明也,即今之失志癫狂病也。

四、阴 挺

阴挺子宫下垂多,一口二外三全脱,

气虚补中益气举,肾虚补元加河车。

【注】阴挺即指子宫下垂,脱出阴户之外(阴道之外)或阴道壁膨出,古书有阴菌、阴脱等名,是妇科多见病之一。子宫第Ⅰ度脱垂不超越阴道口;第Ⅱ度脱垂,宫体脱出阴道口外;第Ⅲ度脱垂整个宫体全部脱出。因气虚而致阴挺者,宜补中益气汤提举之。肾虚而致阴挺者,宜大补元煎,加紫河车等药治之。

【辨证论治】

1. 气虚

〔主症〕 子宫下移或脱出阴道口外,劳则加剧,小腹下坠,四肢无力,少气懒言,面色无华,小便频数,带下量多,质稀色白,舌淡苔薄,脉虚细。

〔病机〕 脾主中气,脾虚则中气不足而易下陷,故小腹下坠,子宫下脱。脾主四肢,脾虚中阳不振,则四肢无力,少气懒言,面色少华。下元气虚则膀胱失约,故小便频数,脾虚不能运

化水湿，湿浊下注，则带下量多，质清稀。舌淡苔薄，脉虚细，均为气虚之象。

〔治法〕 补气升提。

〔方药〕 补中益气汤（方见“月经先期”）加川断、金樱子。

〔方义〕 方中黄芪、党参、甘草益气升提；黄芪必须重用，取效才佳。升麻、柴胡升提阳气，以助益气之力；白术健脾；当归补血；炒川断补肾；金樱子收涩固脱。

〔加减〕 若继发湿热，带下量多，色黄质黏腻，有臭气者，可于原方去金樱子、党参加黄柏、败酱草、苡仁等以清热利湿。

2. 肾虚

〔主症〕 子宫下垂，腰酸腿软，小腹下坠，小便频数，夜间尤甚，头晕耳鸣，舌淡红，脉沉弱。

〔病机〕 腰为肾之府，肾藏精而系胞，肾虚则冲任不调，带脉失约，而致子宫脱出；腰酸腿软；小腹下坠。肾与膀胱相表里，肾虚膀胱气化失司，故小便频数，夜间尤甚。肾精不足，清窍失养，故头晕耳鸣。舌淡红，脉沉弱，均为肾虚所致。

〔治法〕 补肾固脱。

〔方药〕 大补元煎（方见“月经后期”）加金樱子、芡实、鹿角胶、紫河车。

〔方义〕 方用当归、熟地养血滋阴；杜仲、山萸肉、枸杞补肝肾；山药、炙甘草健脾和中；鹿角胶、紫河车温肾填精；金樱子、芡实收敛固脱。如命门火衰，元气不足者，可酌加破故纸、肉桂。

若子宫脱出阴道口外，常因摩擦损伤，继发湿热证候者，可出现红肿溃烂，黄水淋漓，带下量多，色黄如脓，有秽臭气，肛门肿痛，发热口渴，小便黄赤，灼热而痛等症状。轻者可于前方加黄柏、苍术、土茯苓、车前草等，以清利湿热；重者应首先清热利湿，待湿热清除后，再行扶正，可先用龙胆泻肝汤（方见“带下

病”)加减。

(1)外洗法:①丹参 15 克 五倍子 9 克 诃子 9 克。煎水趁热熏洗;②蛇床子 60 克 乌梅 60 克。煎水熏洗;③金银花 30 克 紫花地丁 30 克 蒲公英 30 克 蛇床子 30 克 黄连 6 克 苦参 15 克 黄柏 10 克 枯矾 10 克 煎水熏洗坐浴,此方用于子宫脱出并伴有黄水淋漓,湿热下注者。

(2)子宫托:适用于第Ⅰ度与第Ⅱ度子宫脱垂。常用的为塑料制的环状子宫托,放入阴道内,将子宫上托,早上放入,晚上自行取出,清水洗净抹干保存。月经期及妊娠 3 个月后停放。

(3)手术疗法:经上述治疗无效者,应作手术治疗。术式的选择,按术者子宫脱垂的程度、年龄及对生育的要求等,选用不同的手术。

【验方医案】

1. 加味补中益气汤(《千家妙方》)

黄芪 30 克 甘草 4.5 克 人参 4.5 克 白术 15 克 当归 15 克 熟地 15 克 金樱子 18 克 菟丝子 18 克 葛根 9 克 五味子 9 克 升麻 6 克 柴胡 6 克 水煎服,每天 1 剂。可随证加减疗效更佳。

孙某,女,42 岁。子宫脱垂已 9 年,平时腰及下腹痛,阴部闷坠,大便不适,尿失禁。妇科检查:宫体全部脱出阴道之外,膀胱直肠膨出。舌淡苔薄白,脉细。诊为第Ⅲ度子宫脱垂。以上方服用,另加枳壳 120 克、升麻 15 克,煎汤熏洗坐浴。服上方 6 剂后,子宫已明显回缩。又以原方加益智、川断、枳壳,连进 5 剂。其宫颈位置恢复正常,诸症消失。随访未见复发,其后并怀孕生一子。

2. 苦参汤(《四川中医》1983 年第 4 期)

苦参 60 克。水煎去渣,熏洗患部。每日 3~6 次。1~2 天

用药 1 剂。

何某,女,45 岁。子宫脱垂 3 厘米左右,以上方 6 剂治愈。

3. 固脱灵(《中医妇科验方选》)

党参 15 克 黄芪 30 克 白术 10 克 升麻 9 克 柴胡 9 克 陈皮 9 克 枳壳 18 克 煅龙骨 30 克 煅牡蛎 30 克 芡实 15 克 炙甘草 10 克 水煎服。功效:补气升提固脱,主治子宫脱垂。忌房事与过劳。

【文献选要】

《医宗金鉴·妇科心法要诀》:妇人阴挺,或因胞络伤损,或因分娩用力太过,或因气虚下陷,湿热下注。阴中突出一物如蛇,或如菌如鸡冠者,即古之癰疽类也。属热者,必肿痛,小便赤数,宜龙胆泻肝汤。属虚者,必重坠,小便清长,宜补中益气汤加青皮、梔子。外用蛇床子、乌梅煎水熏洗之。更以猪油调藜芦末敷之,无不愈。

《校注妇人良方·薛己案》:一妇人阴中挺出 5 寸许,闷痛重坠,水出淋漓,小便涩滞,夕以龙胆泻肝汤分利湿热,朝以补中益气汤升补脾气,诸症渐愈,再以归脾汤加山梔、茯苓、川芎、黄柏,间服调理而愈。后因劳役或怒气,下部湿痒,小水不利,仍用前药即愈。

五、阴 痒

阴痒外阴阴道痒,痒痛难忍带下多,

肝经湿热革藓渗,阴虚知柏地黄瘥。

【注】 妇女阴痒以外阴或阴道瘙痒不堪,甚则痒痛难忍,伴有黄白带下增多者,称为“阴痒”。因肝胆湿热而痒者,宜革藓渗湿汤加减;因肝肾阴虚而痒者,宜知柏地黄汤加减治之。

【辨证论治】

1. 肝经湿热

〔主症〕 阴部瘙痒,甚则痒痛,坐卧不安,带下量多,色黄

如脓，或呈泡沫米泔水样，其气腥臭，心烦少寐，口苦而腻，胸闷不适，纳谷不香，舌苔黄腻，脉弦数。

〔病机〕 由于脾虚生湿，肝经郁热，湿热下注，或感染虫蠓，虫蚀阴中，则阴痒。湿热下注，损伤任带，秽液下流，则带下量多，色黄如脓，或泡沫米泔样，其气腥臭，痒痛难忍，心烦少寐，坐卧不安。湿热内盛，阻于中焦，则口苦而腻，胸闷不适，纳谷不香。苔黄腻，脉弦数，为肝经湿热下注所致。

〔治法〕 清利湿热，杀虫止痒。

〔方药〕 萆薢渗湿汤(《疡科心得集》)加苍术、苦参、白鲜皮、鹤虱。

萆薢 苡仁 黄柏 赤茯苓 丹皮 泽泻 通草 滑石

〔方义〕 方中苍术、苡仁健脾化湿；黄柏清下焦湿热；丹皮清热凉血；泽泻、通草、赤茯苓、滑石、萆薢清热利湿；鹤虱、苦参、白鲜皮杀虫止痒。

若肝经湿热，症见带多，阴部瘙痒，烦躁易怒，胸胁胀痛，口苦而干，大便秘结，小便短赤，舌红苔薄黄，脉弦数者，方用龙胆泻肝汤(方见“带下病”)。

2. 肝肾阴虚

〔主症〕 阴部干涩，灼热瘙痒，或带下量少色黄，甚则如血样，五心烦热，头晕目眩，时有烘热汗出，口干不欲饮，耳鸣、腰酸、舌红少苔，脉细数无力。

〔病机〕 肝肾阴虚，精血两亏，血虚生风化燥，则阴部干涩，灼热瘙痒。肾虚带脉失约，任脉不固，阴虚生内热，则或带下量少色黄，甚则如血样。阴虚阳亢，则五心烦热，口干不欲饮，时有烘热汗出。精血不足，清窍失养，则头晕目眩，耳鸣。腰为肾之府，肾虚则腰酸。舌红少苔，脉细数，均为肝肾阴虚之象。

〔治法〕 滋阴降火，调补肝肾。

〔方药〕 知柏地黄汤(方见“经行口糜”)加当归、白鲜皮、制首乌。

此外还有脾虚血少,症见阴部瘙痒,头昏心慌、眠差,纳呆腹胀,大便易溏,神疲乏力,脉细弦,舌质淡红,治以健脾养血,方用归脾汤(方见“经行眩晕”)。

【其他疗法】

阴痒要重视局部治疗。常用熏洗、外搽或阴道坐药。

1. 外洗方

(1)塌痒汤(《疡医大全》):鹤虱 30 克 苦参 15 克 威灵仙 15 克 归尾 15 克 蛇床子 15 克 狼毒 15 克,煎汤熏洗,临洗时加猪胆汁 2 个更佳,每天 1 次,10 日为 1 个疗程,如外阴并发溃疡者忌用。

(2)蛇床子散(《中医妇科学》):蛇床子 10~15 克 川椒 10~15 克 明矾 10~15 克 苦参 10~15 克 百部 10~15 克,煎汤趁热先熏后坐浴,每天 1 次,10 次为 1 个疗程。若阴痒破溃者,则去川椒。

2. 珍珠散(《中医妇科学》)

珍珠、青黛、雄黄各 3 克 黄柏 9 克 儿茶 6 克 冰片 0.03 克,共研细末外搽用。

外搽方适用于阴痒皮肤破损者。

3. 阴道坐药

可根据白带涂片检查的结果选用。

【验方医案】

1. 血府逐瘀汤加减(《辽宁中医杂志》1987 年第 11 期)

生地、何首乌各 15 克 当归、桃仁、白鲜皮、川牛膝各 10 克 赤芍、丹皮各 12 克 红花、枳壳各 5 克 柴胡 9 克 水煎服,每天 1 剂。

赵某,女,51岁。阴痒已8月余,夜间痒甚搔抓外阴,起粟样大小疙瘩,局部轻度灼热,皮色不变。舌暗红,脉弦细而涩,证属瘀血阻滞肝经,血燥而痒。治以活血化瘀,清热止痒。以上方5剂,阴痒减半,继用上方加紫草10克服5剂后(澄出药液余下药渣再煎水外洗)症状消失未见复发。

2. 解毒止痒汤(《中国当代名医验方大全》)

土茯苓30克 槟榔10克 苦参15克 忍冬藤15克 车前草15克 地肤子12克 甘草6克 水煎服,每天1剂。

袁某,女,32岁。已婚。1982年9月10日诊。月经尚可。带下量多,黄白相兼。质稠臭秽。外阴部经常瘙痒难忍,夜间尤甚。脉濡缓,舌尖红。

阴道分泌物镜检:霉菌(++)。证属湿热郁滞下焦,治以清热利湿,解毒杀虫。以上方加白芍12克、当归12克、黄柏6克、苍术6克 水煎服,每天1剂。(并以蛇床子30克、枯矾15克、火炭母60克,煎水熏洗患处。)共服20剂痒止带消,镜检霉菌(-)。

3. 龙胆泻肝汤加味(程绍恩教授经验方)

当归10克 山栀子10克 柴胡10克 龙胆草15克 生地15克 木通10克 车前子20克 泽泻20克 黄芩15克 甘草10克 白蒺藜50克 蒲公英40克 地丁30克 苦参20克 水煎服。每剂煎3次,药液混匀后再均3次分服,每天早饭前,晚饭后各服1次。

张某,女,31岁。外阴及内阴部奇痒难忍,白昼坐立不安,入夜不眠,痛苦已极,欲自杀而死。伴有腰痛,小腹胀满,黄白带多,味臭秽难闻。舌红苔黄腻,脉弦数。诊为肝胆湿热,湿毒下注。服上方4剂瘙痒减轻,又连服10剂而告痊愈。

4. 外用熏洗方(《中医妇科验方选》)

蛇床子 30 克 地肤子 30 克 苦参 30 克 川椒 15 克 苍术 15 克 黄柏 15 克 防风 15 克,煎汤熏洗。

5. 外阴痒痛方(程绍恩教授经验方)

白及细面,不拘多少,用醋调成膏状,涂于痒痛之处。涂后虽有热痛感,但瘙痒即止,涂过几次即可痊愈。

【文献选要】

《医宗金鉴·妇科心法要诀》:妇人阴痒,多因湿热生虫,甚则肢体倦怠,小便淋漓,宜服逍遥散、龙胆泻肝汤。

六、阴 疮

阴疮阴户肿化脓,黄水淋漓热寒凝,

热毒五味消毒饮,寒凝托里阳小成。

【注】 妇人阴户肿痛,甚化脓溃瘍,黄水淋漓。可分成为热毒、寒凝两型(热寒凝也)。因热毒而成疮者,可用五味消毒饮。因寒凝成疮者宜托里消毒散,或阳和汤、小金丹等成药故曰“托里阳小成”。

【辨证论治】

1. 热毒

【主症】 本病初期,阴户一侧或双侧忽然肿胀疼痛,行动艰难;继则肿侧高起,形如蚕茧,不易消退,3~5 天便欲成脓,并易向大阴唇内侧黏膜处溃破;溃后脓多臭秽而稠,一般约经 5~7 天即可收口而愈,但亦有经常反复出脓而形成窦道者。当局部症状进展时,全身出现恶寒发热,口干纳少,大便秘结,小便涩滞,舌苔黄腻,脉沉而数等证。

【病机】 热毒入侵,气血壅阻,以致阴户忽然肿胀疼痛,妨碍行动;邪热与气血搏结,故肿处高起;由于热毒蕴结,血气蒸腐

化脓，脓液多臭秽黏稠，脓毒排出后，邪热外泄，则肿退痛上；如热毒未尽，可反复出脓形成窦道。热毒与血气相争，故恶寒发热，口干便艰。苔黄腻，脉数等，为热毒炽盛之象。

〔治法〕 清热解毒，活血化瘀。

〔方药〕 五味消毒饮（方见“带下病”）加乳香、没药、赤芍、丹皮。

〔方义〕 方中以蒲公英、银花、野菊、地丁、天葵清热解毒；乳香、没药化瘀止痛；丹皮、赤芍凉血活血。共奏清热解毒，化瘀排脓，以治疗疮肿之要剂。

高热肿胀，疼痛将化脓或已化脓者，可用仙方活命饮（《校注妇人良方》）。

仙方活命饮：银花 甘草 穿山甲 皂角刺 当归尾 赤芍 乳香 没药 天花粉 陈皮 防风 贝母 白芷

〔方义〕 方中以银花、甘草、天花粉、防风清热解毒消风；穿山甲、皂角刺、归尾、赤芍、乳香、没药化瘀止痛消结；贝母、白芷祛风排脓。如二便秘涩者，可加大黄、槟榔等。

2. 寒凝

〔主症〕 肿块坚硬，皮色不变，不甚肿痛，经久不消。又或日久溃烂，瘙痒出血，脓水淋漓，疮久不敛，神疲体倦，纳谷不香，心悸烦躁，舌质淡嫩，苔淡黄腻，脉细软无力。

〔病机〕 寒凝气血，故肿块坚硬，或日久溃腐；由于津液内亏，气血不足，内无力托毒外出，故溃烂而血水淋漓，经久不敛；神疲体倦，纳谷不香，心悸烦躁，均为气血不足，脾胃薄弱，津液内亏之象。

〔治法〕 益气养血，托毒外出。

〔方药〕 托里消毒散（《外科正宗》）。

人参 川芎 当归 白芍 白术 黄芪 甘草 茯苓 银

花 白芷 皂角刺 桔梗

〔方义〕 方中四君子汤补气；当归、白芍、川芎养血和血；黄芪、桔梗扶正托邪；银花、皂角刺、白芷，解毒消肿。

〔加减〕 若体弱者，去白芷，倍人参。

若阳虚寒凝，症见阴户一侧肿胀结块，不红不热，状如蚕茧，经久不消者，治当温经散寒，化痰养荣，阳和汤合小金丹治之。

阳和汤（《外科全生集》）。

麻黄 熟地 白芥子（炒研） 炮姜炭 甘草 肉桂 鹿角胶

方中重用熟地，温补营血；鹿角胶养血助阳；姜炭、肉桂温经通脉；麻黄、白芥子通阳散滞而消痰结；甘草生用，解脓毒而调诸药。全方具有温阳补血，宣通血脉，散寒祛痰之功。用于阴疽之证，犹如日照当空，阴霾自散，可使阴凝散而阴阳和。

小金丹（《外科全生集》）。

白胶香 草乌头 五灵脂 地龙 木鳖子 乳香 没药 麝香 墨炭 当归身

方中诸药芳香温化寒瘀，和经通络，能消散肿块，为临床常用的成药。

【验方医案】

1. 阴疮肿痛溃烂方（《医宗金鉴·妇科心法》）

阴疮肿痛者，用四物汤加柴胡、山栀子、龙胆草。

阴疮溃烂出水而痛者，用加味逍遥散（加蒲公英、地丁、金银花、连翘、马齿苋等）。

阴疮坚硬下坠而痛者，用补中益气汤。

2. 除湿解毒汤（《男女科 5000 全方》）

白鲜皮 15 克 大豆黄卷 12 克 生苡仁 12 克 土茯苓 12 克 山栀子 6 克 丹皮 9 克 金银花 15 克 连翘 12 克 地丁

9 克 木通 6 克 滑石 15 克 生甘草 6 克 水煎服,每天 1 剂。
清热解毒,利湿消肿。用于急性女阴溃疡。

3. 儿茶轻粉散(《男女科 5000 全方》)

儿茶 3 克 鸡内金 3 克 轻粉 1.5 克 冰片 1 克,共为细末,外敷患处。解毒敛疮,治疗女阴溃疡,阴疮。

【文献选要】

《校注妇人良方》:妇人少阴脉数而滑者,阴中有疮,名曰蠹,或痛或痒,如虫行状,脓水淋漓,亦有阴蚀几尽者,皆由心神烦郁,脾胃虚弱,气血流滞耳,内当补心养胃,外以药敷洗乃可。

《医宗金鉴·外科心法要诀》:妇人阴疮系总名,各有形证各属经……阴肿劳伤血分成,阴蚀胃虚积郁致。

《医宗金鉴·妇科心法要诀》:蠹蚀成疮脓水淋,时痛时痒若虫行,少腹胀闷溺赤涩,食少体倦嗜热蒸,四物柴梔丹田草,溃腐逍遥坠补中。

七、阴 吹

阴吹阴道矢气声,胃气下泄腑不通,

腑气不通麻仁润,痰湿橘半虚补中。

【注】 妇女阴道中,时时出气,或出气有声状如矢气之声,名曰:“阴吹”。是因胃气下泄不循常道,逼走前阴所致。其具体原因有三:即腑气不通,宜麻仁丸润燥通便;因痰湿下注者,宜橘半桂苓枳姜汤化痰燥湿;因气虚不固者,宜补中益气汤。

【辨证论治】

1. 腑气不通

〔主症〕 阴吹较剧,大便干燥秘结艰行,口干烦热,腹部胀气,舌苔黄腻,脉弦滑。

〔病机〕 阴吹由于大便干燥所致，腑气不行，胃气下泄，逼走前阴所致。口干烦热者，乃胃腑燥结。腹部胀气者，亦由腑气不行之故。脉舌均为阳明燥实，腑气不通之象。

〔治法〕 润燥通便。

〔方药〕 麻仁丸（方见“产后大便难”）。

2. 气虚

〔主症〕 阴吹时断时续，时甚时微，头昏神疲，四肢乏力，倦怠嗜卧，胃脘痞闷，或有小腹下坠，舌质淡，苔白，脉细弱。

〔病机〕 气虚阴吹，时断时续，时甚时微，气虚时营血不足，常见头昏不已；气虚脾弱，故四肢乏力，倦怠，嗜卧之症；脾胃失和，则胃脘痞闷；气虚下陷，故小腹下坠。舌淡苔白，脉细弱者，乃气血俱虚之象。

〔治法〕 益气升清，调理脾胃。

〔方药〕 补中益气汤（方见“月经先期”）。

3. 痰湿

〔主症〕 阴吹而带下增多，色白质黏腻无臭，胸闷脘痞，口腻痰多，舌苔黄白腻，脉细滑。

〔病机〕 痰湿下注，气随湿下，则带多阴吹；痰饮阻塞中焦，则胸闷脘痞，口腻痰多。舌苔腻，脉细滑，均为痰湿之象。

〔治法〕 化痰燥湿，健脾和胃。

〔方药〕 橘半桂苓枳姜汤（《温病条辨》）加白术、苡仁。

桂枝 茯苓 生姜 橘皮 制半夏 枳实

〔方义〕 方中桂枝、茯苓温化痰饮；二陈汤燥湿化痰；生姜散寒温中；枳实泄下除痰；再加白术、苡仁等健脾利湿之品，使痰饮化而脾胃健。

〔加减〕 若偏于湿热，症见带下量多，色黄或黄白质黏有臭，可去上方中桂枝、生姜，加入黄柏、萆薢等品。

【验方医案】

1. 少腹逐瘀汤加减(《四川中医》1991年第1期)

小茴香、延胡索、当归、乌药、赤芍各12克 川断、丹参、益母草各30克 水煎服,每日1剂。

尹某,女,32岁。患者3个月前做人工流产术。嗣后每次月经量甚少,出现周期性腹痛,半月前阴出声如矢气状而有声。妇科检查,探宫显示子宫部粘连。舌质紫暗,脉细涩。证属寒客胞宫,气滞血瘀。治以暖经散寒、活血行气。予上方2剂后,前阴出声消失。

2. 橘半桂苓枳姜汤(《广西中医》1985年第1期)

枳实、陈皮、桂枝、佩兰各9克 半夏、茯苓各12克 生姜3克 水煎服,每天1剂。

贾某,女,34岁。夏暑之际,恣食生冷,后渐觉阴道内有矢气声,胃脘胀闷,身体困重,呕吐清水,口淡,不思饮食。舌淡苔白滑,脉弦。证属饮邪停中。治宜温阳理气化饮。服上方5剂,阴吹止。

3. 膏发煎(《广西中医》1985年第1期)

猪膏250克 乱发如鸡子大3团,洗净油垢,和膏中煎之。发消花成,分2次服之。

高某,女,28岁。婚后半年,阴道内有气体排出,纳谷不香,脘腹胀满,口干咽燥,大便秘结,小便黄赤。舌红苔黄腻,脉滑有力,证属胃热肠燥。治宜润燥通便。服上方3剂后大便通,阴吹止。

【文献选要】

《金匱心典》:阴吹,阴中出声,如大便矢气之状,连续不绝,故曰正喧。谷气实者,大便结而不通,是以阳明下行之气不得从其故道,而乃别走旁窍也。