




山脇家方函

山脇東門

1736-1782

ヤ 9

1071



山脇家方函



諸家經驗雜

艾山湯 治小兒胎毒頭瘡虫癬腹痛積

年不已或發熱惡寒狀如瘰者下蛇虫

穢物 一名鷓鴣菜湯

鷓鴣菜 二錢 大黃 三分 蒲黃 三分

耳草 一分 苦楝皮 同 一本無

右五味以水二合煎至一合空心頓服



香膠散 治經閉帶下或痢後腹中生癰

手足痿弱者方

香附子生

阿膠炒

大黃生

反鼻各

右四味為末每服一錢日二溫酒送下
痔疾不已者長服佳

療癰風方

稀荇葉

酸醬艸各半分硫黃一錢

輕粉五分

右四味先搗稀荇酸醬次末輕粉硫黃

合搗盛絹袋擦痒處日三度

三靈散 治喘息

好茶末二錢

黃礬二錢五分

麵粉二錢五分

右三味合調白湯飲下一錢或一錢半

日三服

信良丸 治同上

茶實

生熟者佳

礬石

百部根

各半分

右三味搗和調為丸日服三錢一方無
百部根

赤丸 治婦人血瘕痼癖積年不愈者

生漆 大黃 麵粉 各十錢

右三味以蜜和調為丸白湯送下五分

鯉魚湯 療水腫

生鯉魚一尺者佳洗去鱗腸

右以水六合煎至三合去鯉魚服一合

日三若覺腥臭者加柚子及山椒芽亦

佳凡服不用土器為避腥氣故也

按鯉魚汁元出范汪我黨用鯉魚必不去腸者
大法缺于此屢試屢功

解毒湯 治諸結毒瘡疹餘毒

土伏苓 一錢 金銀花 七分 芎藭 六分

大黃 五分

右四味以水二合煎至一合日三服

琥珀湯 治產後水腫及諸血毒腫者

琥珀 一錢 商陸 二錢 桂枝 七分 猪苓 七分

反鼻 芬

右五味以水二合煎至一合日三服

赤小豆湯 治諸瘡毒內攻變腫者

赤小豆五錢

高陸三錢

大黃

三分或五分

麻黃五分

丁子三分

猪苓

七分反鼻五分

右七味以水三合先煮小豆減一合內諸藥煎取一合日三服一方有生薑一錢

征虫丸

治腰痛或氣倦胸塞者

胡黃連

苦參

各十錢

梅楊皮

二十錢

黃柏

十錢

木香

黃連

各二錢

百艸霜

右七味為末以糊丸白湯飲下

南星散

治床瘡

天南星

鹿角霜

括萎根

黃柏

各五分

右四味為末以水和調敷患處

蘆薈丸

治小兒疳癖腹痛

蘆薈

使君子

各五分

右二味為末以糊丸白湯飲下

治痘毒入眼方

破生雀頭血入眼妙方也

荊艾湯

療風癰惡寒發熱

荊艾八分

麻黃八分

桂枝一錢

右三味以水二合煎取一合頓服厚覆取汗愈

治淋疾疼痛

阿膠

滑石

大黃

甘草

各一分

右四味為末每服一錢白湯送下日三

又方

合勸木

二錢半大黃一分

右二味以水二合煎一合三服

甘連湯

治小兒胎毒方

黃連三分

紅花二分

大黃一分

甘草一分

右四味盛紅絹袋漬沸湯日服數次

馬錢飲

治獐犬毒方

馬錢

五錢

甘草一錢半

右二味為末白湯飲下每服一錢或二

錢日三以見奇證為効毒盡怪症自止

治轉胞方

批把實

十箇

巴豆五分

於久利加武幾利

四分

田螺泥二箇

右四味先末把實次內於久理加武幾
利巴豆田螺研塗一寸五分紙貼臍下
一寸以小便通為度劇者尤驗

輕粉丸

治一切癰毒方

一名梅肉丸

牽牛子二錢

竹茹一錢

輕粉一錢

梅肉

箇一

右四味為末以糊丸好茶末為衣每服
三分日三百湯飲下盡一劑必不盡一
劑隨病者強弱病輕重多少量之後服
備急圓穢物當大下用後方亦多少遲

速隨時宜尤峻烈慎勿過用凡服此劑
口爛者含下遠志金銀花湯立止

陶按內痔連年不愈者輕粉丸主之服訖又用
備急圓如前條梅肉當用塩梅

蓼蛭散

治癰疽方

馬蓼

水蛭

各燒為霜等分

右二味每服一錢白湯飲下日一夜若
食莧莢者作劑如前

馬明湯

療小兒疳癖一切虫症方

馬明退

一錢隨年
損益之

紅花

大黃

二錢
日上一

青黛

勝上

耳草

三分同上

右五味以水一合煎至五夕

虎杖散

治淋疾

虎杖

合歡

滑石

耳草

各半分

右四味為末每服一錢生姜下日三

犀角湯

治妊娘口中熱生瘡者方

犀角

六分

當飯

七分

芍藥

日

芎藭

五分

生地黃

八分

右五味以水二合煎取一合日二服

玉蒸丹

治諸結毒方

水銀

一錢

芒硝

綠礬

各二錢

戎塩

五分

棗肉

右五味合搗和調一丸一分以蜜臘為

衣日服五丸白湯飲

紅藍湯

治男女及七八十氣血未衰喜

勞精神時眩暈耳鳴鼻乾大便秘澀

紅監

一錢

甘草

五分

右二味以水二合煎至一合日二服

烏豆湯

治脚氣遍身洪腫者

烏豆

三錢

桑白皮

一錢

檳榔子

一錢

高陸

三錢

大黃

三分

生姜

七分

右六味以水三合先煮烏豆減一合內諸藥煎取一合日三服

治魚毒發熱者方

山查子

二錢

右以水二合煎取一合頓服立愈

松葉酒方 治脚氣手足不仁或卒急及

風濕身軀疼痛不已者

松葉

三錢

牛膝

枝桂

大

烏頭

羌活

三錢

右五味以好酒一升漬七宿日盡一合不嗜酒者隨性用之

治上氣熱毒口中生瘡者

礬石

二錢

甘草

五分

右二味以水一合半先煮甘草減半合內凡石烱消含日數

延胡索湯 治婦人經水滯時々腹痛裏急後重者方

延胡一錢當飯七分桂枝日乾姜六分甘草三分
右五味以水二合煎取一合日二服長服益佳

鐵砂丸 治黃胖病氣上動胸短息小便不利等病

鐵砂九分 喬麥十錢

右二味醋糊丸每服五十九白湯送下

又方 治同上
鐵砂十錢 辰砂 大黃各錢

右三味為末糊丸每服一錢日三服

又方

鐵砂九錢 礬石二錢半 大黃二錢半

右三味為末以糊丸每服五九分白湯下

治鵝口瘡方

天南星 為末水解令如泥薄紙貼湧泉穴即愈

治水腫方 西瓜子三錢 楮白皮一錢半

商陸 小麥各三錢半

右四味以水二合煎取一合日三服
芎黃散 治諸結毒上焦諸瘡

芎藭二兩 大黃三錢

右二味為末溫酒或白湯飲下

參連湯 治諸氣疾衝心直視煩悶或吐

血不止者方 朱丹侯方

人參 黃連 各五錢或一錢

右二味以水二合煎至一合少加熊膽
汁亦佳用產後血暈有奇功

治痘毒入眼方

白罌粟子

右一味極研和寒時水令如膏傳紙貼
左右湧泉穴妙

治腹痛不已者

樟 五錢

右一味以水二合半煎至一合服

治頑癬方

硫黃 葵脂 糖瀝

紙後亦盛糖置火如煎液便漚也

以紙張陶器口盛糖其上置炭火候糖燒盡易

右三味為末內糖瀝燕和調令如膏泥
痒處日三

五寶散

治諸結毒骨疼不已或咽喉腐

爛目赤耳鳴頭眩不能行步者

鐘乳石

各一分 琥珀一分 辰砂二分 真珠五厘

龍腦一分

飛白麵三錢

右六味極末合調土伏苓二十錢以水
一升二合煎至六合去滓三分取二合
內散二分空心頓日三七日病不盡者

作劑如前以知為度忌塩醋辛臭物

治諸結毒方

槲木

二錢

夏枯草

一錢

地骨皮

一錢

右以水二合煎取一合或加大黃三分

治惡阻嘔逆百藥無效

伏竜肝

五錢

白木

猪苓

各二錢五分

右三味為末每服自三分至五分日數
白湯送下產後嘔逆亦佳

治浸淫瘡方

阿仙藥

右末敷瘡上

桃花湯 治水腫逆上滿方

桃花

二錢末
同者佳

大黃

三分或
五分

甘草

一分

右三味以水二合煎至一合日二服或
三服以瀉水升餘為度

桃花散

下停飲方

桃花

未同者佳

右一味為末空心白湯頓服二錢頃刻
當瀉水患宿酒者立愈

下蛭虫方

啄木鳥生燒食溫酒任用霜

亦佳勞虫又佳

治噎逆不愈 灸乳根三壯知者不待數

而止

又神灸 治噎噎自大椎至七椎每節間

至七八壯息發於臍間為其効

治黃胖病上逆動氣兼主下血後動氣眩

暈不能行步者方

鐵砂

醋煮水洗

薇粉

一本
無

葛根

各十錢

硫黃

八錢

胡礬

二錢

甘草

一錢

右為末以溫酒送下日一錢或二錢

治臙瘡奇方

楊梅皮各伏苓各桔梗七厘耳艸五厘

右四味細剉以水一合煮減一勺取九勺日三夜二分溫服盡五日間每日以水一合煮前滓漸減至五勺是為一劑服三劑已雖當時不已者明年不再發

白龍散 治狂癇方

白刀豆 米粉各十錢反鼻二錢

右三味細末服日三錢白湯送下含不

得咽者冷水亦得初發四五十日狂踈

者益佳喜睡者是其驗經數年者不驗

銀荊湯 治小兒及大人胎毒生瘡

銀花一錢荊花一錢芩六分弓菊六分大黃自二分至五

右四味以水二合煮至一合日二服或

三小兒以意減之又曰胎毒發細疹有

寒熱者宜去大黃加桂亦佳

療血淋方 牛角細末蒲黃各小分

右二味以白湯送下日二錢或三錢

芍藥湯

治產後下利及經閉帶下上氣

足冷時發熱自汗心腹妨脹雷鳴切痛

不止者方

芍藥三錢 香附子一錢半

乾姜 芍

縮砂 芍

耳艸 三分

右五味以水二合煎至一合日二劑三

劑不過五日下利漸減神驗有嘔加半

夏二錢又可

笏爾膏

治一切金瘡止痛

一名百効油紅夷傳

麻油 各

椰子油 罌

乳香 一錢六分

小麥 一合

右油內鍋內入小麥焦色而

漉去麥滓入椰乳煉收有口授能

與州七戶當夏秋之間有賊風其氣甚熅

暄士人因名曰火風過之者身軀微腫往

來寒熱手足酸疼療之方

茵陳

桃皮

朔蘗

各一虎口

右三味細剉濃煮取浴之或以藥摩四

軀三日而愈若不早理則關節疼痛手

足痿終身不痊

凡諸腫物發要害處難理者從之方

以麻油和牛蠟煮之須臾下火候冷入
絲瓜霜勻撒貼腫旁右貼則腫左移左

貼則右移

理火傷湯爛方

黑砂糖十兩 辰砂一錢

右二味調塗患處從手愈

解鯀魚毒方

烏賊骨 煎服
以馬屎蒸之

蒸痔方

理遺溺方

猫屎

曝屋上者佳

防己

甘草

右三味為末合調一服一錢日三

又方

雄雞屎

一云倭雞屎二錢

右極末當晡食攪飯中而喫之服藥時

減食生三之一

又方

蜜臘

右一味為丸一服一錢白湯送下日三
理口中湯爛方

青黛

黃柏

各半分

右二味為末塗之

打撲抗傷新久悉主之

鯢魚

當飯

六分

川芎

五分

大黃

四分

右四味以水二合煮一合先食日二服

服之患處覺痛久者服十余劑神驗

理瘡方

大蒜

右一味搗傅紙貼足心着輒而寐乃不

復發數試效

令痘瘡貫膿方

當歸

一錢

黃耆

同

人參

七分

生薑

同

右四味以水二合煮取一合日三服

理虛勞方

黑猫膽

陰干一具

右一味為末糊丸每日平旦空腹白湯

服三分病重者夜又服四五日後吐出

小虫是其驗

又方

靈天蓋

石膏各十錢

紫河車

五錢
陰干

右三味為末白湯送下

療食草中毒幾死者方

礬石

茶末各等分

右二味水煎服之須臾腹痛泄明日復

常

理疝方

薏苡仁五錢

右一味以水三合煮取一合或服或洗

亦妙也

試妊娠方

大麻糝

右一味燒為霜一服五分日二白湯送

下過七日而後不見月經者此妊娠否者

非妊娠矣

理頭屑方

黑大豆

右一味以酢濃煎數洗甚妙

理鵝掌風癬方

以豆油塗掌中以裂火灸之

又方

章魚煮汁洗患處日數度不過四五日而愈

又方

縛手大拇指刺爪中白肉際出血患左者刺左患右刺右患足如手亦然

截瘡方

刺十指頭即愈

理齧齒方

捫牙車上有核而為動者及尺澤痛已

理小兒咳嗽久不已者方

蛤粉 青黛 各二分

右二味盛絹袋浸白湯數嚥少許日盡二劑神驗

按疔方

杉芽 蓬萍艸 川骨也 紅花 各半分 陰干燒為霜 右三味以蘗薑汁和調塗瘡上愈

理痘毒浸淫方

兜糞

酒糟 各半分

右二味為末和麻油塗患處以紙覆其上以護之切不可用及全紙油乾牽粘皮膚或有燥烈之患須溫紙裂之小紙片數十枚用重疊鋪覆譬如覆屋上瓦子之狀乃無牽粘之患油乾之後不妨患處之屈伸甚妙

療打撲方

接骨木汁塗痛處

和名二上

理過傷目方

反鼻

生補為霜一錢

礬石三分

右二味極末以水和調注傷處立効

百虫入耳方

急以右手掩口左手捻兩鼻極令氣息

喘迫則出

治蜈蚣入耳疼痛不可忍者

急灑猫尿

取猫尿法撿猫而大蒜二

箇納其鼻則尿又蕪荭水亦得

人年三十已上目昏不見人者刺尺沢穴



每日二度

中烏頭毒瞑眩似欲死者刺湧泉痊

療齒痛方

蜀椒一錢

礬石七分

右二味盛絹囊大如手大拇指頭啣痛處須更痛已吐熱津為驗用輕粉刮後口中痛者含之亦佳

左金丸

治虫癖積塊累年不痊諸藥

不効者

山椒

不拘多少

右一味末為泥糊丸空心服三十丸

治水腫內攻心下痞手足偏腫

蕺菜

絞取汁不拘多少強吞之心下

小緩得小便通而痊

理痘毒入眼失明方

鴨頭花染色紙一枚

臍帶一枚

右二味先濡紙絞去頭汁次用水七勺極令濃去紙漬臍帶一日一夜去帶以汁洗患眼數度如失明未踰一期者不過十日而愈雖十年若二十年者亦不過

三十日神驗

骨鯁方

枇杷實

独核者

右一味為末以管吹喉中

淋疾方

茄子花

二錢
陰干

右一味以水二合取一合

小兒龜背方

鵝霜 右一味白湯送下每服二分日

三服

癩風方

信石

礬石

丁香

石膽

又方 右四味極末以雞冠血煉調貼紙覆瘡

稀薺葉

酸醬草

各半分

硫黃 一錢

輕粉 五分

右四味先搗稀酸次末輕硫合搗盛絹袋擦痒處日三度

小兒遺溺方

益智

右一味糊丸每夜溫酒服五分百日愈

綠豆湯 療咽喉腫痛飲食不通者

綠豆_{二錢} 半夏 耳草各_{一錢}

右以水二合煎至一合不過二三服愈

療霍膝風方 生蘿蔔

右一味削之作八以紙一包之埋於熱灰中取出鋪于痛处以帛裹其上數換之以黃汁汚染其蘿蔔片為度換以他片別以味噌汁煮日食之以共愈為度凡七八日而痊

鵝掌風方 章魚

右一味煮之汁洗患處日數度不過四五日而愈

又方 烏頭_{二錢} 耳艸_{一錢}

右二味以水三合煎至一合半洗患處三四度不過三四日而愈

刺牙方 繒_{七寸} 右一味敷痛處經宿出

治大人小兒遺尿方 溫他小便每日二蛤殼日三不過六七日而痊

療疽方

取鹽魚頭

右一味取汁洗痛處則愈

侃按刺齧也煮可用也

又方

雄鼠屎

火者雄也

右一味以糊和調傳患處隨手愈

腋臭方

雷佐羅志

一錢

石膽

一錢

胡椒

芬

右三味為末勻和以新布拭淨腋下以藥搗之日三

酒皸鼻方

油桐皮

赤土

輕粉

各分

右三味以水二合先煮油桐皮取一合太滓盛他器中內赤土及輕粉一匙攪勻令如泥浸粗布苦摺瘡上日三四日後又用後方

附子

芍藥

梔子

蓮肉

生地黃

右五味以水一合半煎取一合日服三劑三日後又用後方

赤土大 雞冠雄黃 小 輕粉 中 辰砂 小

薔薇新芽 三錢 陰干 大豆 七粒

右六味為末調菜子油以絹裹之置器中密封之時々取出摺瘡上已後亦常蓄之疾少萌輒復摺之必不可忽也

理癰疔腫兼療鼠毒方

石蟹 二枚燒為霜

反鼻 二枚生捕燒為霜

沈香 一錢

角石 五錢

右四味為末每服五分白湯或溫酒下

口中燥烈齒痛方

蘆會 沒藥

阿仙藥

黃柏 各五分

人中白 半錢

右極末調蜜塗痛處而摻之若齒根浮搖者塩梅萬莖亦為霜加之亦佳

療一切結毒熱腫方

櫻茹 四錢

檳茹 同

楊梅皮 二錢

耳草 錢

忍冬枝葉並用 各五錢

右五味以水三合煎至一合半日二劑

七日而已尾藩侯世々相傳常服此藥
不以癩毒腫先子東洋先生所受也
理淋疾不久愈方

松脂 砂糖 各半分

右二味為末白湯送下日二錢

又方 乾漆 漆桶粘着者為霜

右一味臨卧空心酒服一匙

刺牙方 乾柿

右一味研令如膏塗患處立挺出神驗

清中飲 治腹中積塊久不已或痛或動

者兼婦人帶下經水不行遂腸中為塊
或引四肢痛時逆上面有熱色及鬱冒
如狂態者 一云打撲傷損主之

戴菜一錢 草三稜 八分 蒲黃 七分

右三味以水二合煎取一合日二劑四
五十日而愈一百日而痊婦人加蒲黃
七分益佳

理喘息方 白刀豆 糖霜 各分

右二味合調生薑湯飲下二錢日三

療諸瘡久弗瘳者方

晚鬼處燥 麻油

右二味合煮一時許傳瘡上神驗

神祐丸 治痢疾如神

阿片 黃連 沈香 縮砂 黃柏

木香 各五分 甘艸 三分

右七味細末小麵麥丸如綠豆大辰砂為衣水飲一丸日三立愈神驗 凡毒

盛者初二三日量其輕重投三黃承氣之類候稍毒退而後用此藥若方其毒盛時用此方而當時利止熱解後癰塊癰痿腫脹等之病慎不可侵用

理水腫方

鯽魚燒為霜白湯送下每服五分日四夜二陶按本草鯽魚膾下孫思邈理脚氣風毒及上氣其他肉骨頭膽鯽等大抵理瘡血毒痢之則水腫關係於瘡毒

者其驗可槩知矣
療便毒已後核不消者方

虎杖

右一味為末每服一錢日一夜一白湯
或溫酒送下

禹功湯 治水腫日久諸藥不驗者

赤小豆大少炒 商陸各五錢 木通少炒大

猪苓少炒各三錢 冬葵子少炒十錢

右以水一升煮取五合日一劑氣急者

先與備急圓隨病輕重後用此湯驗

療久淋方 燈心草一錢 箱根草

忍冬少 商陸同 甘草一分 艾葉芬

右六味以水二合煎取一合日二服或

三服或加大黃五分佳

療婦人淋瀝痛劇者方

薤菜葉大陰干 欬冬根中生山溪者佳 甘草少

右三味以水二合煎至一合日二服

療產後血暈甚者方

猿膽

右投焚湯中研和服之以知為度神驗
療一切血毒疥瘡癰癬瘡肉不已者方

楊梅皮二錢 荊芥二分或一分

右二味以水二合煎至一合日二劑或
三劑膿瘡積年不已者亦服此湯即結
毒脹癰瘡已瘡乾不過三旬全愈
療大人小兒遺溺方

兒屎一錢新者尤佳

右一味以水一合二勺煎取一合日晡

空腹頓服

鼈甲湯 治男女一切癰癬腰滿寒熱

鼈甲 桃仁各一錢二分 虎杖一錢 大黃二分

右四味以水二合煮取一合日二劑療
穢血塊從大便出股痛甚者大驗

理利疾衰急後重方

三年古酒三合 冰糖六錢

右二味投土鍋中以緩火煮令如飴教

服之半日許行減穢物大下數日而愈
湯火傷爛方

鉛丹

右一味水和練令如泥塗之痛止後不見痕神驗

又方

黃柏

細末

雞子黃白

右二味研勻為餅子烈日乾為末平日貯之臨時水和令如泥塗之痛已愈
新榮丸 治小兒疳疾黃瘦者方

蟾頭

一枚令灸黃色

鱖魚

同上

芦會

各三錢

胡黃連

三錢

五倍子

同

苦棟根皮

夜明砂

雀甕

一名天漿子

麝香

各錢

青袋

三錢

熊膽

一錢

雄黃

二錢

右十二味細末以粳米飲丸麻子大一歲兒二十九空心米飲送下日三十丸

理瘰癧方

班猫

二錢

薄荷

四錢或作荆芥

右二味極末粳米糊丸如麻子大空腹

白湯送下日三五丸以下黑物為度

四物解毒湯 治諸結毒方

銀花一錢 戴萊五分 川芎六分 大黃三錢

右四味以水二合煎至一合日三服

理服輕粉後口中腫爛

甘草二錢 青黛一錢五分 銀花三錢

右三味以水六合煎至一合半噲之

咸亨丸 治癰毒積久者方

薰陸 胡桃肉炒令焦黑 槐花炒令少焦

細末

大棗各十二錢 炒令焦末 輕粉錢

右五味別炒胡桃槐花大棗等次炒薰

陸候其鎔沸黑色內槐花拌取出同大

棗搗篩胡桃細末與輕粉並諸藥合調

糊丸以後方送下土伏苓七錢薑薤二

錢以水五合煎取三合午前空腹汝湯

一合送下丸藥五分餘湯二次服盡病

重者服八分或一錢數日後款口中腐

爛者日三分長服取効陶按此藥必拘

當去隨時應其宜湯劑亦不須土伏苓
萎蕤等用解毒劑送下亦佳惟宜量其
輕重表裏深淺強弱等精審用升以左
右收切也

勞瘵雖具諸症能食者用有神効方

蜃珠二分 歸參五分 丁子二分 輕粉二分

唐蒼木五分 山椒二分 塩梅一箇黑燒

右七味細末糊丸每日五分二三度用
之若有瞑眩則一日止之翌日如平常

則二分五厘用之如此兩三度必得効

常山湯 療瘧發作無常心下煩熱者

常山二兩 甘草兩 豉各

右三味切以水六升煮去滓取二升再
服當快吐仍節飲食忌海菰菜生葱等

石出外臺時後東洋先生教用數効

產後腹中絞痛及小腹不可忍

白藟豆

右一味為末白湯或味噌汁送下

清頭散 治眼目赤脉上氣有惡血甚効

大黃錢 當飯錢 川芎 雞舌

芍藥 沈香 白芷各錢 羌活錢

右八味以水二合取一合服

椒梅丸 治小兒疳虫一名教虫

烏梅 罌椒各小分

右為末糊丸梧子大每服白湯送下

產前後熱毒口中腐爛不得食者方

楊梅皮 南天實各錢 甘艸分

右以水二合煎至一合食前含之初慘痛不可忍二三次已食前含已食乃進

坐藥 治婦人經閉帶下出金匱要畧

杏仁三分 礬石二分

右二味搗成泥以紅絹裹之令李子

蒲黃地黃湯 治經行久不止

當飯 生姜各五分 乾姜 大黃各四分

蒲黃 甘草各三分

右六味以水二合取一合日二服

治小瘡擦藥方

巴豆三錢

乾姜三錢

黑胡麻二錢

右三味搗為麝末布包之酒浸一日許
擦瘡上五日然後可用下劑

同握藥方

大楓子十錢

胡桃實三枚 去皮

樟腦五錢

輕粉二分

山椒三十粒

右調合如泥握之後用後方
大黃五錢 忍冬五錢

右二味以水二合煎取一合頓服日三
服以差為度

松脂丸 治心下痞鞭大便結者方

松脂七錢

大黃三錢

右二味為末以糊丸白湯服三丸

治中暑濕者方

香薷錢

厚朴二錢

伏苓

橘皮各一錢

干姜六分

右五味為末常服佳

桑山小粒丸 治一切解毒小兒疳虫

熊胆 馬錢

右二味等分搗如芥子大丸

五靈脂湯 治婦人血氣頭痛耳鳴眩暈

不能起者方

延胡索_{一分} 紅花_{一分} 五靈脂_{三分}

桂枝_{一分} 大黃_{三分}

右五味以水二合煮取一合日二劑大便秘者去大黃加芍藥一錢亦佳

耳遂丸

惜哉未能脫而不可得雖然愚按疑治水腫迫上息喘等之症能可下水欬

耳遂_{七錢} 蕎麥_{三錢}

右二味別為末以蜜丸麻子大空腹白湯送下一錢或半錢

小兒驚風熱毒衝胸煩悶不止者主之

積雪艸 蕞菜_{十分}

右二味研取汁入青黛八分用甚者加午黃二分

治乳岩潰爛者精神日衰方

水蜥蜴生者研令如膏泥貼患處立令精神快爽連日益佳

治痔瘡其痛不已者

杏仁 雞子黃 各半分

右二味合研貼痛即止神効

令痘毒起脹方

南天藥 不拘多少

以水煎令浴而被覆熱汗出明朝起張
臙瘡十年不差者枳實梔子湯加綠礬愈

治噎膈久不愈 服藍汁一盞日三一說

服藍汁泡又加石灰炒妙

寬中湯 治上氣腹急大便燥結方

蠶豆 一匙 糖霜 同 雞子黃 一枚

右三味以水一合先煮豆一二沸去滓
內糖雞攪勻空心頓服急大便滑通老
人患便秘常服佳

理遺溺方 鷲屎大 桂枝中 丁子小
右極末以酒服之奇効

治積氣小腹隱痛者方

草三稜

生剉一把

右一味以水二合煮取一合去滓分溫
三服凡諸藥不効者服七八日無必不
應也

治熱毒流連諸節疼痛不止者

乳香

沒藥

大黃

雄黃

芍藥

各二

右以水二合煎至一合去滓溫服日三
夜三

冰硼散

治咽喉腫痛及重舌木舌

硼砂

天竺黃

各二錢

朱砂

一分

冰片

二分

玄明粉

八厘

右為末以管吹入口中

鉤玄湯

理大人小兒胎毒諸症

胡薄荷

藪萊

各二錢

青黛

三分

右三味以水二合煮取一合日二服以
長服為佳

喉痺腫痛者刺兩手二間穴血出痛止

面疔 灸手腕骨前一寸二十壯即愈
齧齒疼痛者刺尺沢穴不愈者更刺

外臺秘要脚氣方拔萃

東洋先生經驗

廣濟療脚氣急上衝心悶欲死者方

檳榔

三顆細末

生姜汁三分

童便

二升新者

右三味攪頓服須臾即氣退若未全差
更服最佳利三兩行無所忌

近効救脚氣衝心此方甚効

換根

六顆

右一味搗末童子小便半升微溫和末

强半頓服如一炊久不轉動更取半准前服令盡得通即好甚良

唐療上氣方

栝榔 二十七枚

杏仁 四十枚

右二味以小便一大升煮取半升分為二服相去五六里許此方甚下氣一日一服之佳如腹中欲須利栝榔良并子槌碎如前煮取汁服之即快利也

又若毒氣攻心手足脉絕此又難濟不得

已作此湯十愈七八方

千金方曰治脚氣入腹困悶腹脹者吳茱萸湯主之

吳茱萸 六升

木瓜 二枚

右二味以水一斗三升煮取三升分三服或以吐汁便活蘇恭曰服獨活甚易但鑽擊 一作急 少時契胸耳此方是為起死是高麗老師方與徐主方相似故應神妙借急千金蘇徐同方云無木瓜可取吳茱萸一色煮服之又方加青木香三兩犀角二兩屑亦云此湯起死人

又療脚氣攻心悶腰脹氣急欲死者

吳茱萸三升 木瓜二合 檳榔二十顆

竹葉 罷

右四味以水一斗煮取三升分三服得
快即差

又方療脚氣心煩氣急卧不安者

半夏一升 生姜八兩 桂三兩 檳榔二兩半

右四味切以水八升煮減半內檳榔末
煎取二升八合絞滓分溫三服別相去

如人行五六里進一服微利度

陶按方中加童便者甚効

文仲療脚氣腰滿小便少方

檳榔 四枚 大豆 三升 桑白皮根 二升

右三味以水二斗煮取六升分六劑間
粥亦得若冷脹加吳茱萸二升姜二兩
又佳

唐侍中療苦脚氣攻心此方甚散腫氣極
驗

栝根七枚 生姜二兩 橘皮 吳茱萸
紫蘓 木瓜各兩 新加大黃
右七味切以水三升取一升三合再服
又脚氣冷毒同心下堅背膊痛上氣欬死
者主之

吳茱萸三升 栝良罕枚 青木香二兩
犀角二兩 半夏二兩 生姜六兩
右六味切以水一斗煮取三升分三服
大効破毒氣尤良

又紫蘓湯方

紫蘓莖二兩 甘草 橘皮各二兩半
生姜三兩 栝良五枚

右五味切以水五升煮取二升分三服
相去五里久若能長脇之永氣消下
蘓茶尋常氣滿三兩日服一劑湯方

栝根七枚 橘皮二兩 厚朴二兩 生姜四兩
吳茱萸二兩
右五味切以水二升煮取一升二合三

服相去五六里久復服之此藥性溫去冷氣

又諸脚氣定時候胸滿腹脹不能食者四時俱得服下氣消脹方

栝榔七枚 生姜二兩 橘皮二兩 杏仁三十枚

右四味切以水四升煮取一升五合分二服相去七八里久或作半劑一服亦得氣脹癉則服之差止

許仁則方 治同前

吳茱萸二兩 生姜二兩 橘皮二兩

栝榔子十枚 桂枝二兩

右五味切以水七升煮取一升半去滓分溫三服相去如人行五六里久服覺諸狀可欲重合服亦佳服湯後將息

救急療風水毒氣遍身腫者方

穀櫨白皮二兩 大豆二升 橘皮二兩

桑白皮二兩 紫蘓 生姜各四兩

右六味切以水九升煮取一大升絞去

滓分為四服不過三劑必當差百日来

唯禁大醋

又療遍身腫小便澁者宜用麻豆方

黑大豆

一升以水四升煮取一升

桑白皮

五升

大麻子

二升炒研

防己

八兩

右以水四升煮取二升內大豆汁溫服
日三服神効



寬政二^戌夏四月書於洛陽客館

京富小路御池通下東側僑居

