

丸散膏丹集成

鄭顯庭編

上海衛生出版社

丸散膏丹集成

鄭顯庭編

上海衛生出版社

一九五八年

內 容 提 要

本書搜集古今著名丸散膏丹的成方，分为六十二类，每方下分列发明、功用、藥品、制法、用法、参考等項，明确了病各有方，方各有用，使医家病家不至誤用，而葯剂人員可以按方配合，免失制方原意。

本書汇总方剂，比較丰富，其有限于时代，方傳已久，而葯难齐集者，茲亦偶有列入，以資参考。在緒論中并将有关丸散膏丹的基本知識，酌量介紹。卷末附有索引，及一般市售丸散膏丹备查表，頗便檢查。

丸 散 膏 丹 集 成

鄭 顯 庭 編

*

上海衛生出版社出版

(上海南京西路2004号)

上海市書刊出版业營業許可証出 080 号

土山灣印刷厂印刷 新华書店上海發行所總經售

*

开本 787×1092 耗 1/44 印張 20 1/11 插頁 4 字數 730,000

1958年6月第1版 1958年6月第1次印刷

印數 1—10,000

統一書号 14120·419

定價 (9) 2.40 元

再版自序

中藥製劑中的丸散膏丹。是我們祖先在數千年很長時期所積累的經驗遺留下來的。不容湮沒。編者在一九三五年主持湖北中醫專校教務時。課餘之暇。曾取古人丸散膏丹擇要彙集成書。遇有必須說明者。則在方後略加註解。對原方內容概不稍加更改。免失原來面目。出版至再。早已無餘。近因黨和政府重視祖國醫藥遺產。上海衛生出版社爲了適應讀者需要。對本書計劃重印。並提出修訂要求。回想此書問世已久。編者年已及暮。而研求之念。老而未衰。除各項舊作將分別整理完稿外。今特先將丸散膏丹集成檢閱一過。並補列緒論在本書的前面。以助瞭解而資參考。不當之處。尙希指正。

惟更須言者。中藥劑型之改進。固爲今後所應努力的方向。但前仍應依原有方法爲基礎。以免影響臨床療效。若不從實地研究。徒求便利。或只圖美觀。則難免害多利少。再中藥化學成分的研究。也是應當做的。但是現在的研究結果。往往與原有經驗難以一致。因綜合和分析的作用。各有異同。正如蘇聯全盟科學研究院化學製藥所貝爾戈利氏所說。植物性藥劑。含有多種的有效成分及組成部分。具有多方面的生理作用。這些物質。被人體吸收後所起的主要治療作用。係由於其有效能的多樣性及組成的複雜性。故欲確定其標準的組成和治療作用。是困難的。我們的目的。在利用其多樣性和複雜性。使在醫藥預防上起綜合性的良好作用。（見一九五七年三月號中藥通報）由

此可見。祖國醫學的方劑配伍。有它一定的特點。不能一律以提煉西藥的方式方法來隨便搬用。我們必須以嚴肅的態度。來對待中藥劑型的改進工作。而原有理論和實際操作的繼承與發揚。尤不可忽略。庶幾“全面掌握”的精神得以貫徹。使祖國醫學能更好地為社會主義建設服務。這是我們共同努力的偉大任務。

鄭顯庭識於沙市中醫院 一九五七年十月

原 序

千金論云。夫尋方學之要。以救速為貴。是以養生之家。須預合成熟藥。以備倉卒之急。按熟藥即謂丸散膏丹。臨時按症施治。用以救急拯危。甚為穩妥。惜乎名目繁夥。記憶頗感困難。若不分析清楚。往往臨時忽遽。頗忘治療善法。以致貽誤生命。殊堪扼腕。爰選古今經驗良方。及有裨實用者。彙輯成編。復分別門類。以便臨時檢查。庶知一病有一病之方劑。一方有一方之妙用。不致貽誤病機。且鄉區僻壤。或深夜急症。俱可按圖索驥。以備緩急。至調補諸方。亦可考察體質之強弱。斟酌施治。俾醫家病家。雙方均獲其益。案頭置此一編。即不啻得一醫藥顧問。即或心存濟世。願三折肱於此道者。讀此書而研究之。亦可獲一滿意之答覆。爰書所感。以誌緣起。尚望海內明達。進而教之。丁丑二月編者識

凡 例

一、本書係博採古今著名之丸散膏丹成方。並加以分析而成。俾知一方有一定之功用。開卷瞭然。其非以丸散膏丹立名者。概不錄。

一、本書分類清晰。檢查便利。如某種病應查某類。即可知某種病應用何種藥品。俾不知醫者。可以按類查藥。即知醫者。亦可按方治療。以免僥事。

一、本書專為醫家及病家檢查運用。其不在本方範圍以內之議論。概不採取。

一、本書所分類別。雖為簡斷。然大抵為一般人所最易明瞭者。故或以病證現象分類。或以治療方法分類。務使各切實用。不受模糊影響之弊。

一、書中有一方數見者。如某方專治某病。亦可兼治某病。故於各該類中並列之。以備參考。

一、本書共分六十二類。每類諸方。又按其首字筆劃多少。以為先後。俾知其方首字是幾筆。一檢即得。

一、每方下先列“發明”。次“功用”。次“藥品”。次“製法及用法”。次“參考”五項。其有病名簡單。或藥品普通者。不列“參考”一項。以免蛇足。

一、本書此次重訂。另作緒論補入。將有關丸散膏丹的基本知識。略為介紹。

一、斟酌使用經驗。各類方劑。並有減省或增加之處。間或參以鄙見。冀免用時失當。

一、本書所載丸散膏丹。為數甚多。著名成方。大致

已備。但市上供應者有限。特另編一般市售丸散膏丹備查表。開列名稱及其主要作用。附入本書。以便檢查。

緒 論

(一) 丸散膏丹之類別與意義

(1) **丸劑** 丸劑創始甚早。內經有四烏鰂一盧茹丸。丸者緩也。力雖緩而效久。或逐風冷。或破堅癥。或消積聚。或健脾胃。或舒營衛。或開關竅。隨所宜而用之。而於慢性病爲尤宜。凡下焦病久病不能速去者。則以丸緩治之。應用甚廣。其製法先將諸藥分別研細。(否則易細者量減。難細者量多。與原定分量。便多差異。故不宜合研。)絹篩濾過。再行秤準配合。諸藥要混合極勻。再加粘性物。作成圓粒。以湯水吞服。治上焦病宜小。中焦病次之。下焦病宜大。又依治療與藥理的性質。用爲賦形藥之原料亦不同。計分下列各種。

(甲) **蜜丸**。一稱煉蜜丸。是以熬煉之蜜。(煉蜜即蜜之經火熬煮者。每蜜一斤。加水四兩。置鑊中。用火煎熬至熟後。掠去沫。滴水不散爲度。以熬去蜜中所含水分。)和藥末爲丸。煉稠之蜜。含水分少。作用是使其在胃中緩緩吸收。可氣透經絡。一方面又便於保存。防止霉爛。且其粘性較強。便於制丸。製法是先將蜜燉熱。將藥末和入。置臼內。搗千百杵。使之軟熟。再作條捻丸。夏晒冬烘。(須用炭火。桑炭火尤佳。不可太焦或太嫩。太焦則丸不易化。且恐變質。太嫩則日久生虫。不耐保存。)一般多爲大中小型。亦有小型者。但欲取其易服。似以小型爲宜。蜜本身含有營養價值。入補藥尤宜。取蜜以白淨如膏者良。微黃或黃者次之。帶紅棕色者不適用。並應注意須用純淨者。

其中一些夾雜物。必須去掉。特別是蜜中如夾有幼蜂。容易引起發酵。又如生蜜。其粘着力及防腐性。都不可靠。故非用煉蜜不可。

(乙) 糊丸。亦稱麩糊丸。以麥粉等加水。納化爲泥狀。做粘劑。其性質有稀稠之分。稀麩糊丸。取其易化。和麩糊丸。取其緩化。因爲糊所製成的丸。晒乾後就硬結。在胃中當然要遲遲崩解。所以糊丸多爲小型丸劑。則防其崩解太遲。有時與酒並用。以能加速崩解而易吸收。糊劑中有米糊。是以米粉爲糊劑。麵糊。是以麵粉爲糊劑。麩糊之煉合力。較米糊爲大。應用也較米糊廣泛。粥糊。是以稀米粥爲糊劑。湯浸蒸餅糊。是將已經蒸熟之米糕加水爲糊。捏合而成。其中有湯浸蒸餅。水煮蒸餅之分。凡此皆取其有粘着性。另一方面。可減少或緩沖藥物對胃的刺激。以穀爲胃氣所喜。可以調護胃中真元之氣。使不爲藥所傷。於補胃藥尤宜。或者取其遲化而達下焦。

(丙) 水丸。亦稱水泛丸。或水滴丸。即以水和藥末爲丸。但須依藥之有無粘着性。酌量選用水製（即所謂滴水製丸）。或用有粘性溶液混合而製之。如米湯汁、蜜甘草水、阿膠水等稍帶粘性之溶液。此蜜丸較易化。比散劑又較慢。略等於糊丸而更易化。可用於比較急性病症。又因其體內較易崩解。入口稍遲便化。治上焦病更宜。惟放置易誘起發酵霉敗。水必須潔而沸。放冷後再用。以天晴時在乾燥處製爲宜。務使其速乾。以免易壞。此外更有以酒醋等泛丸者。陶宏景謂“酒主行藥勢”。又謂“醋酒爲用。無所不入”。近人謂酒是優良溶媒。能溶解植物中樹脂及膠等等。以增加藥物的粘性。並使混合益勻。既提高藥效。又可防腐。醋爲酸性。又能使藥物在水中不易溶

止其成分者。得充分發揮作用。因此更有酒與醋混合或煎與糊混合爲烔劑。如酒煮米糊爲丸。醋煮米糊爲丸。應用均較廣泛。

(丁) 蠟丸。蠟丸是利用蠟之粘着作用最強。以此和藥末作丸。最堅固而難化。是取其固護藥氣。迂迴關隘。而徐徐收效。尤其是使丸中含有刺激性較強的劇毒藥。不易在胃中崩解。俟藥在腸中。再慢慢吸收。以免傷胃或中毒。但爲上述目的而用蠟丸者。現已少有應用。今多以蠟包固於丸之外。外禦氣候之變遷。內防藥性之滲泄。以鎮久藏之用。用時始去蠟服丸。唐宋時就用蠟紙裹藥。以便保存。現在有將蠟皮包裝。改作上蠟紙匣。還是古法。

(2) 散劑 散劑首見於史記倉公傳。在應用上僅次於丸劑。即以諸藥打碎磨細。取其服後極易被吸收消化。迅速發揮藥效。比丸劑爲捷。不僅用以去風邪暑濕之氣。摭寒濕痺濁之毒。發散口腹之壅滯。除翳去臟之結伏。有開腸和胃行脈通經之功用。除內服之外。亦多用於塗敷肌膚潰瘍。所謂散者撒也。即今所稱撒布藥。製法以藥物入搗臼或乳鉢。研爲細粉。其外用者。羅篩篩過之。愈細愈好。用茶水和蜜。或酒或醋等等。塗敷腫瘍等症。如如意金黃散等。潰瘍則逐搽患處。如提膿拔毒散等。內服者。則用熱水或冷開水。或其他飲料調服。有不篩者。則用清水煎服。古稱煮散。

(3) 膏劑 膏劑應用較晚。分內用外用兩種。內服膏劑由湯藥(煎劑)濃縮演變發展而來。本草綱目載益母膏製法“以水浸過二三寸。煎煮候草爛。水減三分之二。濾去草。取汁……入盆中。浸半日。以綿濾去濁滓。以清汁入釜中。煎如稀飴狀。慢火煎取一斗。如稀飴狀。瓷瓶封收。”

所謂煎如稀餳狀。當即現代之流浸膏。所謂更煉至可丸。即再濃縮成丸劑塊狀。便是今日之浸膏劑。今人即以諸藥浸水中。入鍋內用文火慢慢煎取汁。去渣。濾出清汁。又澄清。將盆底之砂屑濾淨。再入鍋中加熱。和以粘稠性之冰糖、蜂蜜、飴糖或膠類等收膏。用開水沖服。多用於治久病及虛損症。外貼膏藥多以麻油與鉛丹爲基礎劑。煉製過程亦較複雜。大致先以藥浸油中三日。乃煎之。煎至藥枯。以絹濾淨。煎熱。下黃丹或胡粉或密陀僧。煎至滴水成珠不散。傾入器中。以水浸三日。去火毒。攤貼於絹帛或油紙上應用。粘貼皮膚。其作用有二。一以治表。如提膿去腐。止痛生肌。遮風護肉等等。其膏宜輕薄而日換。如黑膏藥等。一以治裏。如祛風寒。活氣血。消痰痞。壯筋骨等等。其膏宜厚重而久貼。凡病在皮膚筋骨有定所者皆宜。蓋以膏藥閉塞其氣。使藥力從毛孔透入腠理。通經貫絡。或提而出之。或攻而散之。如附桂紫金膏等外用膏藥。即現今所稱之硬膏。尙有一種外用油膏劑。由來甚古。導源於內經之“豕膏”。後世即以諸藥配齊。再納麻油於鐵鍋中。將藥投入油中。文火細熬。煎至藥渣焦枯。用淨紗布濾去藥渣。將鍋揩擦淨盡。復將藥油再下鍋中。加熱後。投入方中之細藥(如乳香、冰片、血竭等)。又下白蠟、黃蠟適度。然後用鐵簞盛之。俟冷定。油膏即成。塗敷潰瘍等症。可以防腐生肌。止痛療瘡。如玉紅膏等是。

(4) 丹劑 原始的丹即丹砂製劑。原爲汞劑。晉唐諸朝。道家以汞類等藥用升華法。煉成藥劑。稱爲煉丹術。當時盛行其術。後因內服不能長生而反傷身。遂廢服食之法。僅製以供外用。如紅升丹、小升丹、白降丹等等。皆用水銀等重金屬。依升華法提煉而成。舊稱升丹。爲外科上不可

少之妙藥。在另一方面。後人將其他製劑（包括內外科製劑）。凡經精製配合者。亦稱爲丹。以誇示效高者。此與原始煉丹藥。實不相似。且多爲植物或動物藥製成之丸劑或散劑。甚至是腎滋藥或錠劑等。如小金丹、八寶紅靈丹等等。劑型不一。應用範圍甚廣。此則習俗使然。已非古義矣。

(5) **藥酒** 內經有湯液醪醴論。又血氣形志篇云“病生於不仁。治之以按摩醪藥。”醪醴即酒劑。金匱有紅藍花酒。千金有酒醴方。聖濟總錄並列有製法及用途。古代所用酒劑。多用藥物和入麴米共釀製成。後世改用酒冷浸或熱浸生藥製成者更多。釀酒者。或以藥煮汁和飲。或以藥袋安置酒中。或煮藥和飯同釀。皆隨方法。又有煮酒者。以生絹袋藥入罐。密封。置大鍋中。水煮一日。埋土中七日。出火毒乃飲。其中浸酒一法。近來應用最多。凡清酒藥。皆須細切。生絹袋盛。入酒密封。隨寒暑日數。視其濃烈。便可漉出。滓可曝燥。微搗更漬。補益損症。宜少服。攻風濕症。宜多飲。

(6) **藥露** 露之製劑更晚。始見於清初葉天士溫熱論。其製備方法。詳見清趙學敏本草綱目拾遺。一般以甑蒸取。小則用壺。皆可蒸取。由藥中蒸出滴下之汽水。即是藥露。其質輕。其色淡。只可以氣別。而不可以色別。只取其清冽之氣。不似湯劑有貳滯腸膈之弊。其最著者。如金銀花露、薄荷露、枇杷葉露、夏枯草露、甘菊花露、桑葉露、地骨皮露、藿香露、佛手露。皆各有功用。清代馬培之治吐血久咳用肺露。乃以多種藥品配合蒸取。亦取其補而不滯。

(7) **錠劑** 錠劑是將諸藥各研極細。再合研勻。漸加糯米濃粥。調和爲塊狀、棒狀或紡錘狀等。亦可用其他煉合劑配製之。要皆非常堅實。不易溶化。可耐久存。尤易

搽帶。服時可用開水等研服。外用可以水、酒、醋等磨敷。

(二) 炮製法之定義與作用

凡以種種方法。煨煉藥物。變更其形狀或性質者。稱爲炮製法。通常依據雷公炮炙論。但中藥之修治。其炮製法遠在雷穀以前。今炮炙論原本已亡佚。目前坊刻雷公炮製藥性賦。本爲後人所依托。並非雷穀作品。昔時原有炮製十七法中(炮、燻、煨、炙、煨、炒、燬、煉、製、度、飛、伏、鎊、煨、熬、爆、露)或有不屬於炮製法者。亦有近於重複者。而十七法外。後人又續有增加。散見於各家本草。今結合實際。酌爲增減歸併。分別列舉如下。

(1) 洗 中藥多爲植物。應洗淨其附着之灰土砂粒。其次是動物或礦物。也不免有髒髒或泥砂雜物粘附。均須洗淨用之。

(2) 泡 藥之爲烈性者。暫置藥品於水中。酌泡若干時。以解其烈性。惟時間過短。恐烈性未去。過長又失其藥性。暫置即不宜過長之意。但亦非指極短時間。宜加注意。

(3) 漬 久置藥品於水中。取其質汁氣味兼出。得收藥效。而盡其用。

(4) 伏 藥物用水或他種溶媒浸潤後。置密閉器中。經一定時間。使其潤軟。取出切片。或作其他加工。如防風、桔梗、當歸、大黃、白芷。都用此法。一稱“息”。謂藥物經水浸濕後。入甕中。息久再切片也。

(5) 飛 取藥末置水中。研之使極細。並以漂去其浮於水面之粗屑。石類之藥多用之。如銀朱、滑石、石膏等。

(6) 炒 置藥物於鍋中。用火炒至黃而不焦。“焙”亦相似。

(7) 煨 以藥物置炭火上。煨之使熟也。

(8) 煨 置物於火中。燒令通紅也。藥中如石、貝、介類用之。如甘石、磁石等。

(9) 煉 即藥石之加火久熬者。

(10) 燒存性 植物藥品之應燒者。宜煨之如炭。使之枯而不碎。蓋以瓦缶。使熱氣不外泄而自冷。則性質存而不散。若過用火。則散碎而成死灰。故必須存性。以煨至色呈淺黑色。庶不失原性。

(11) 煨 置藥物於火上炕乾也。

(12) 炮 置藥物於火上加熱。以煙起為度。或將整塊藥物。用潤滑的麵粉或厚紙包裹後。埋熱灰中。炮至外面黃焦爆裂為度。如附子、天雄、薑等。

(13) 升煉 先將藥研細。鋪於鐵器內。上覆一瓦盆。篩牡灰鹽水調和。封固盆口。約三、四分厚。約升打二、三炷香。或至五炷香。退火冷定開看。則藥粉升於盆上。掃下。收貯瓶內備用。如輕粉、紅升丹、小升丹等。外科用升藥。大致如上法製成。故謂之升丹。即今化學上之升華法。凡化合物由固體直接變為氣體。又氣體遇冷亦能直接凝為固體。而皆不使成液體者。謂之升華。

(14) 蒸 用竹製蒸籠。納藥於籠中。以水氣蒸之。其作用有二。(甲)如黃精、地黃、首烏之屬。非蒸得熟而又不熟。就不適於治療之用。故多用九蒸九晒法。(乙)凡生藥之乾勁堅韌者。必用蒸法蒸之。始能切片。如安桂、芍藥、天麻、落萐、大戟等。

(15) 煮 置水煮之也。如草烏、南星之屬。非煮過則毒力太甚。不可入內服藥。

(16) 淬 即將藥物燒紅。迅速投入水中或醋中。取出。

再燒再淬。反覆多次。如自然銅、礞石等。

(17) **燂** 通稱燂。即將藥置鍋中。用水加熱。使之微熱爲度。如燂杏仁去皮。燂桃仁去皮。以燂後則皮因潤濕而易脫。爲便於加工也。

(18) **烺** 即炖化也。

(19) **重湯** 即隔湯炖溫。即先於鍋中貯水。罐中盛藥。安置鍋中。灶內加火。所以又稱重釜。

(20) **炙** 將藥物加以蜂蜜或薑汁等。於炭火上微熱。通常多用蜜炙。如甘草、黃耆、黨參等。又有用醋炙、水炙、酥炙者。

(21) **曝** 將藥物置烈日下晒乾。又“𦔻”。謂經日光也。即將濕潤之藥。在日光下晒乾之。義亦同曝。

(22) **露** 即將藥物放在戶外。任其日晒夜露。故謂之露。又將藥物用蒸氣蒸溜。集其溜出之芳香汽水部分。亦稱露。猶如近地水汽。夜著於草木等易散熱之物體。因冷而凝結成露之意。同樣稱露。而性質自別。

(23) **鎊** 鎊者。取屑也。即用金屬製成的銼。用以銼獸類骨角及木類之堅硬藥物。削之成屑。便於製爲細末。以利服用。如犀角、羚羊、虎骨、沉香、檀香、肉桂、三七等。

(24) **揅** 即將生藥用械側擊使扁。俗謂劈破或搥扁。

(25) **酒製** 酒能流行氣血。又能監制苦寒藥。或助藥力上行頭目。其中又有洗、炒、浸、調之別。(甲)酒洗。但洗藥物之表面。使之略得酒性。凡病在咽下膈上。須用芩、連、知、柏苦寒藥者。則用此法。使藥力不直往下行。得以留在膈以上。以免誅伐無過。(乙)酒炒。使酒性滲入藥內。力量較洗者爲多。凡病在頭面及手指皮膚。須用芩、連、知、柏苦寒等藥者。則用此法。義亦同上。而上行之

力較大。(丙)酒浸。浸則時間最久。滲透最深。力量最重。(丁)酒調。並酒與藥共服。爲力更大。則又不在藉其監制苦寒藥或使上行。而是藉以行氣血。或除邪。又爲調敷陰症外科藥料之用。

(26) **鹽製** 用鹽水炒。或浸、或洗、或炙之類。可使走腎而軟堅。下行而不燥。

(27) **醋製** 古說以藥物經醋製者。使走肝而收斂。今人謂凡藥物在水中不易煮出其成分者。即須加醋製之。是使其易溶。能充分發揮藥效。如醋炒、醋淬、醋浸、醋炙等。

(28) **蜜製** 藥物之燥者。即以蜜製法潤之。且可藉其甘緩。補益元氣。如清燥藥中參以白朮。則用蜜炙。補氣之用參耆。也用蜜炙。兩者製法無二。而意義則大不同。

(29) **薑汁製** 藥物經薑汁製者。便溫散而不滯。如薑汁炒以及或浸、或調之類。

(30) **酥製** 藥品之欲其脆者。則以酥炙之。酥即牛羊乳所熬之油。又名酥油。

(31) **乳汁製** 藥物經人乳汁製者。請可潤枯養血。

(32) **童便製** 童便製者。在除劣性而使下降。與鹽製之功用相似。但須取六、七歲以下無病小兒之尿。僅取中段爲宜。去頭尾不用。

(33) **麴製** 麴者。朽也。取藥料和以澱粉、辣蓼等。經發酵變質者。有助腸胃消化之功。如神麴等。左傳魯宣公十二年。即有麥麴之製劑。其法亦古。

(34) **麵煨** 藥物之以麵糊裹煨者。亦是取其能抑酷性。使之勿傷上膈。

(35) **米泔製** 藥物經米泔水製者。有去燥和中之功。泔二二泔。即第二次淘米水。

(36) **漿水製** 即取炊熟粟米。投冷水中。浸可、六日。水渾。(甜而酸。即使呈酸味。)生白花。置其汁用之。性涼善化而化毒物。

(37) **米炒** 凡藥物恐其過潤而有礙胃氣者。就用米炒。如米忌於朮、黨參。米炒寸冬、天冬等。

(38) **麸炒** 藥品之須殺氣者。則以麥麸炒微黃色用之。

(39) **土製** 和中健胃藥。每以東壁土炒之。東壁土即東方壁上之牆泥。愈久愈良。以其受日光最久。以陽氣以助運化之意。

(40) **自然汁** 即將新鮮生藥搗爛或搗碎。用絹絞取其自然汁。或壓榨而取其汁。不攪和他水。稱為自然汁。亦即鮮汁。如姜汁、藕汁、荸薺汁、生地汁、韭菜汁等。除具有原來療效外。因為鮮汁未經加熱的處理。可能含有維生素或其他成分。比乾燥者、煮熟者。自然有別。此外又可利用其粘合作用。作為煉合劑用。

(41) **紙包壓** 藥物含油。如有毒者。或有刺激性者。則以紙包。壓去油。以除去其烈性。取霜用。或因脂肪過多存在而影響療效。亦有將脂肪壓去後使用者。去油後即謂之霜。如巴豆霜、杏仁霜。但有效成分在油中者。則不當採用此法。

(42) **煇炭火** 為木炭之一種而着火易燃者。宜烹煎、焙炙百藥丸散。

(43) **文火武火** 古時尚無溫度計。對炮製過程難以掌握。單憑經驗運用火力。以達到適當加熱之目的。有所謂文火武火。以別火力強弱。文火就是不見火燄之火。溫度較低。力緩而慢。宜煎煮滋補之藥。時間不嫌其長。武火就是有火燄的火。溫度較高。力猛而烈。宜煎表散之藥。

時間切忌太久。在燃料方面。以桑柴火煎藥爲最好。煎膏藥尤宜。燂炭火及柴炭亦宜。但不宜用煤火。

(三) 古方度量衡名義之考察

炮製十七法中。有所謂“度”者。乃量度之意。以量藥物之大小長短。不屬製藥範圍。且古之度量衡。其法繁多。古法多以植物種子、或泉布(古錢幣)、或用器。秤量藥物。後來乃漸漸有各種度量衡制定。茲據古今文獻。簡釋如下。

(1) 古方製丸。謂如細麻者。即胡麻也。如黍粟者。以十六黍爲一大豆也。如大麻子者。即今大麻仁也。準三細麻也。如胡豆者。即青斑豆也。以二大麻子準之。如小豆者。即今赤小豆也。以三大麻子準之。如大豆者。以二小豆準之。如梧桐子者。以二大豆準之。有云以一大黃豆準之。如彈丸及雞子黃者。以五梧子或十梧子準之。

(2) 古人有“方寸匕”及“刀圭”。爲量藥末之用。陶宏景云“丸散藥有云刀圭者。十分方寸匕之一。準如梧桐子大也。方寸匕者。作匕正方一寸。抄散取不落爲度。”

(3) 古人所謂“杓”者。乃六質取水之器。即木瓢也。亦用爲量藥之器具。

(4) 古人所謂“字”者。是權名。古以銅錢抄藥末。後世相沿。稱一銅錢所抄藥末之量曰一錢。古錢上共有四字。故又稱一錢幣之四分之一曰一字。二字則五分也。但錢幣大小。隨時代而有不同。很不一致。

(5) 古人有所謂“錢匕”者。以漢之五銖錢爲之。抄取藥末。以不散落爲度。千金方云“錢匕者。以大錢上全抄之。半錢匕者。則是一錢抄取一邊耳。錢五匕者。五銖錢邊五字者以抄之。”一錢匕。準今五分六釐。半錢匕。準今

二分八釐。錢五匕。準今一分四釐。

(6) 古人所謂“黍”。係指穀類中之黍而言(即黃小米)。黍子粒勻而無參差。故古人定分寸。度空徑。以此爲準。千金方曰“十黍爲一銖。六銖爲一分。四分爲一兩。十六兩爲一斤。”東垣十書曰“古之一升。即今之一茶盞。古云六銖。即今之二錢半。古云三兩。即今之一兩。”諸家所說不同。不必悉舉。或謂以古三兩爲今一兩。古三升爲今一升。亦有謂古之一兩約當今三錢。照漢時分量三折一。即就古方所載之斤兩升合。只取三分之一。再視病者年齡及體質之宜。斟酌用之。

〔附〕古書藥用量與新秤對比算法(據一九五七年浙江中醫雜誌一月號節錄大意)。

據最近朱晟同志古今湯方劑量異同的考證一文。古醫書中藥用量。基本上只採用兩種制度。唐代及其以前用漢秤。宋代以後大體上近於舊秤(即庫平制)。雖然宋及後世醫藥書亦列有按漢秤計量之處方。但只要注意到各方來源。仍易察別出來。近年改舊秤爲新秤。(一斤等於五〇〇・〇克。)但量差甚小。(舊秤〇・八五二五斤等於新秤一斤。舊秤一兩等於新秤一・一七三兩。)今將該文原附古今分量換算表轉載如下。以供參考。

斤 (漢)	兩 (漢)	分 (漢)	銖 (漢)	克	厘 (新)	分 (新)	錢 (新)	兩 (新)	斤 (新)
1	= 16	= 64	= 384	= 100	= 3200	= 320	= 32	= 3.2	= 0.2
	1	= 4	= 24	= 6.25	= 200	= 20	= 2	= 0.2	
		1	= 4	= 1.56	= 50	= 5	= 0.5		
			1	= 0.26	= 8.3	= 0.83			
				1	= 32				

總目

補養類.....	1	中風類.....	331
發散類.....	65	癰疽類.....	335
和解類.....	74	驚悸類.....	343
消導類.....	90	疳積類.....	361
疏散類.....	106	瘋癲類.....	383
通利類.....	115	怔忡類.....	396
收瀉類.....	119	瘧厥類.....	397
鎮攝類.....	133	黃疸類.....	400
攻逐類.....	140	痰飲類.....	401
表裏類.....	149	喘哮類.....	401
理氣類.....	163	咳嗽類.....	403
理血類.....	179	除痰類.....	409
祛風類.....	200	風溼類.....	427
祛寒類.....	246	瘡癤類.....	428
清暑類.....	259	痔漏崩帶類.....	444
利溼類.....	265	淋濁類.....	457
潤燥類.....	274	癰疽類.....	465
瀉火類.....	280	經產類.....	470
清熱類.....	294	小兒類.....	523
消毒類.....	300	跌打損傷類.....	549
殺蟲類.....	303	癰疽瘡瘍類.....	559
嘔吐類.....	308	痘疹丹毒類.....	649
泄瀉類.....	311	癰疽疥癩類.....	666
腫脹類.....	316	走馬牙疳類.....	687
痞滿類.....	318	火毒類.....	689
積滯類.....	320	腫痛類.....	694
噎膈類.....	322	癰疽類.....	698
疝瘕類.....	322	麻醉類.....	699

耳目口鼻類.....	699	腰膝類.....	783
咽喉類.....	761	脾胃類.....	785
骨齒類.....	775	雜症及急救類.....	789

補養類

二筆

【人參丸】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治產後失虛心悸。虛煩不眠少氣。

藥品 人參、茯苓、麥門冬(去心)、薯蕷、各二兩。澤瀉、甘草、黃蘗、乾薑、桂心、各一兩。

制法及用法 研爲末。蜜和棗膏搗丸。如梧桐子大。每服二三十丸。空腹時溫酒送下。日三次。

【人參丸】

發明 見十便良方。

功用 養陰。生血。補虛。

藥品 人參、鹿角膠(炒)、熟地黃、芍藥、當歸、白朮、川芎、各等分。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時米飲送下。

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 補虛。調胃氣。送乳食。止吐瀉。

藥品 人參、茯苓、蓮肉(去心炒)、各一分。黃耆、五錢(鹽蜜水炒炙)。甘草、二錢(炙)。

制法及用法 研爲末。嬰孩每服一字。二三歲五分。四五歲一錢。清水一藥注。或半銀匙。加棗子半片。煎十數沸服。

【人參黃耆散】

發明 見王肯堂六科準繩。即人參黃耆湯之方藥也。

功用 治虛勞客熱。消瘦倦怠。口燥咽乾。目哺潮熱。五心煩熱。盜汗胸滿。少食作渴。咳嗽膿血。

藥品 人參、一兩(一作三錢)。黃耆(炒)、五錢。天門冬(去心)、三兩(一作一兩)。半夏、知母(炒黃)、桑白皮、赤芍藥、紫苑、甘草(炙)、鼈甲(醋炙)、各五錢。白茯苓(一作三錢)、柴胡(一作七錢)、秦艽(一作七錢)、生地黃(一作七錢)、熟地黃、地骨皮(一作七錢)、二兩。桔梗、一兩(一作三錢)。一方無熟地黃。一方有生薑。

制法及用法 剉散。每服三五錢。清水煎服。

【人參固本丸】

發明 見葉氏方。

功用 治肺勞虛熱。咳嗽失血。自汗盜汗。水泛爲痰。

藥品 人參、五錢。生地黃(洗、一作酒浸、有痰用薑汁炒)、熟地黃(洗蒸、一作酒浸、有痰用薑汁炒)、天門冬(去心

炒)、麥門冬(去心炒)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉白蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸(一作三錢)。空腹時溫酒或鹽湯熱湯送下。

參考 此方以生地清血。熟地補血。天冬清肺。麥冬補肺。再加以人參之補氣益中。久服自有滋陰養血清金降火之妙。

【人參養營丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治脾肺氣虛。營血不足。驚悸健忘。寢汗發熱。食少無味。身倦肌瘦。色枯氣短。毛髮脫落。小便赤澀及發汗過多。身振脈搖。筋傷肉瞤。

藥品 人參、白朮、黃耆(蜜炙)、甘草(炙)、陳皮、桂心、當歸(酒拌)、各一兩。熟地黃、五味子(炒杵)、茯苓、各七錢。遠志、五錢。白芍藥、一兩五錢。生薑、一兩。大棗、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。薑棗煎濃汁泛丸。每服三錢。熱湯送下。

參考 古人治氣用四君。治血用四物。氣血俱虛用八珍。甚則加黃耆肉桂。仍有不效者。蓋補氣而不用行氣之品。則氣虛之甚者。淺無氣以運動。補血而仍用行血之物。則血虛之

甚者。更無血以流行。故加陳皮以行氣。而補氣者。悉得其效用。去川芎行血之味。而補血者。因以奏其功。只此一加減中。便有轉旋造化之妙。然氣可召而立至。血易虧而難成。苟不求其血脈之主而養之。則營氣終歸不足。故倍人參爲君。而佐以遠志之苦。先入心以安神定志。使甘溫之品。始得化而爲血。以奉生身。又心苦緩。必得五味子之酸以收斂神明。使營行脈中。而流於四臟。名曰養營。最爲恰當。大瘡愈後服之。確能營血易復。不致變生他症。

【人參健脾丸】

功用 治脾虛氣弱。食入不化。

藥品 人參、白朮(土炒)、陳皮、麥芽(炒)、各二兩。山楂(去核)、一兩五錢。枳實、三兩。

制法及用法 研爲末。神麴糊丸。每服三錢。米飲送下。

參考 近人有於此方中。加木香、黃連、茯苓、神麴、砂仁、山藥、苡仁。去枳實。名同上。實即證治準繩方之健脾丸加苡仁。去甘草肉豆蔻。參閱健脾丸。

【二至丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治老人腎虛腰痛。頭旋眼黑。下體痿痺。

藥品 附子(炮去皮膽、一作一枚)、桂心(不見火)、杜仲(去皮剉、鹽酒炒去絲、一作二兩)、補骨脂(炒、一作二兩)、各一兩。鹿茸、五錢(酒炙、一作酥炙、一具)。鼈茸、二兩(鑊、一作酥炙、一具)。

制法及用法 研爲細末。青鹽五錢。熱酒中化。去沙土。入鹿角二兩(鎊、一作鹿角膠、一兩)。酒煮。米糊爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時鹽湯或醇酒同胡桃肉一枚。細嚼送下。惡熱去附子。加肉蓯蓉、龜板膠各一兩。倍杜仲、補骨脂。

參考 此方鹿藥二茸並用。故名二至。加以桂附、杜仲、補骨脂。較溫腎肝。尤爲調補下元要藥。

【二至丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

藥品 女貞子、不拘多少(冬至日採、陰乾、蜜酒拌蒸、過一夜、粗袋擦去皮、曬乾爲末、用瓦瓶收貯、或先熬膏、旱蓮膏旋配用)。旱蓮草、不拘多少(夏至日採、搗汁熬膏)。

制法及用法 九蒸九晒。研

爲細末。煉蜜和丸。或加桑椹乾爲丸。或加桑椹熬膏和人。每服七十丸。空腹時核桃肉細嚼。淡鹽湯或鹽酒送下。

【二妙散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 養肝氣。治目昏下淚。

藥品 當歸、熟地黃、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢匕。不拘時無灰酒調下。

【二冬膏】

發明 沈氏尊生書方。

功用 治肺胃燥熱。痰涎咳嗽。

藥品 天門冬(去心)、麥門冬(去心)、各等分。

制法及用法 熬膏。煉白蜜收。不時嚼熱嚥之。

參考 二冬皆稟少陰水精之氣。麥冬稟水精而上通於陽明。天冬稟水精而上通於太陽。夫冬主閉藏。門主開轉。故名門冬者。俱能開轉閉藏而上達。合二冬制熬成膏。消痰潤肺。生脈清心。久服則腎固氣平。體健身輕。不老不飢。爲益非淺。

【二參丹】

發明 沈氏尊生書方。

功用 養神。和血。治中風

後健忘。

藥品 人參、五錢。丹參、熟地、天門冬、各一兩五錢。茯苓、甘草、麥門冬、各一兩。遠志、硃砂、菖蒲、各五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。清晨煎羌活愈風湯送下。或臨臥時再以羌活愈風湯送下四白丹。

【七珍散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 開胃。養氣。溫脾。進食。

藥品 人參、白朮、黃耆(蜜炙)、山藥、白茯苓、粟米(微炒)、甘草、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。加生薑、大棗。清水煎服。如仍不思飲食。加扁豆一兩。

【七味都氣丸】

功用 滋腎納氣。治陰虛咳嗽。水泛爲痰。腎水不固。精滑。甚則津液枯燥。喘不得臥。咽痛聲啞。

藥品 熟地黃(砂仁酒拌、九蒸九晒)、八兩。山藥黃肉(酒潤)、四兩。山藥、四兩。牡丹皮、三兩。茯苓(乳拌)、三兩。澤瀉、三兩。五味子、三兩(一作一兩)。

制法及用法 研爲細末。煉白蜜和丸。水泛亦可。每服三錢。淡鹽湯送下。

參考 按此方即六味丸加五味子。

【七製固脂丸】

發明 驗方。

功用 補火。壯陽。固精。種子。保真元。壯筋骨。健脾胃。長精神。除疾病。治命門火虧。下元虛損。耳聾眼花。腰痛腿軟。腎冷精流。陽痿不舉。小便過多。筋骨疼痛。肚腹畏寒。脾胃虛弱。飲食難消。夜多盜汗。精神疲倦。時愛躺臥。

藥品 固脂、十斤。

制法及用法 ①淘米水泡一夜。晒七日。②黃柏二斤。熬濃汁。泡一夜。晒七日。③杜仲二斤。照前法製。④生鹽二斤。照前法製。⑤魚鱗三斤。照前法製。⑥核桃肉六斤。照前法制。⑦黑棗、糯米各三斤。煮粥。將固脂磨細末(忌鐵器)。和勻。搗融爲丸。如梧桐子大。每服一錢。空腹時淡鹽湯送下。服至一月後加三分。加至二錢爲止。忌食羊血、油菜、菜油。若陰虛水虧者。早服此丸。晚服六味地黃丸。則水火兼補。不至偏枯。服至半

年後方效。

【七製香附丸】

發明 見鮑相微驗方新編。

功用 治心血虧虛。心腎不交。夜夢遺精。

藥品 香附、一斤(洗淨)。

制法及用法 ①淘米水泡一夜。石上擦去毛。曬乾。②陳酒泡一夜。曬乾。③童便照前法製。④鹽水照前法製。⑤牛乳汁照前法製。⑥小扁黑豆煮水。照前法製。⑦茯神、六兩。去皮木心。共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。空腹時淡鹽湯送下。

【七寶美髯丹】

發明 邵應節方。

功用 補腎元。烏鬚髮。延年益壽。治氣血不足。羸弱周痺。腎虛無子。消渴、淋瀝、遺精、崩帶、癰瘡、痔腫等症。

藥品 何首烏、赤白雌雄、各一斤(一作赤白重斤餘者各一枚)。牛膝、八兩(去苗、以何首烏先用夾泔水浸一日夜、竹刀刮去粗皮、切作大片、黑豆鋪甌中一層、鋪首烏一層、再鋪豆一層、鋪牛膝一層、又豆一層、重重相間、面上鋪豆覆之、以豆熟爲度、去豆曬乾、次日如前用生豆再蒸如法、蒸七次或九次、晒七次或九次、去豆用)。

破故紙、八兩(清水洗淨、黑芝麻同炒、無聲爲度、去芝麻、一作四兩)。白茯苓、八兩(去皮、人乳汁拌、浸透、曬乾、蒸過)。黃絲子(淘淨、酒浸一宿、洗去沙土、曬乾、蒸三次、晒三次)、取淨末八兩。當歸身(酒洗淨、切晒、勿見火)、取淨末八兩。枸杞子、八兩(去帶枯者、搗碎、酒浸、曬乾)。一方有赤茯苓八兩。去皮。黑牛乳汁拌。浸透曬乾蒸過。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如龍眼大。制藥勿犯鐵器。每服一丸至二三丸(一作三錢)。空腹時細嚼。溫酒、或熟湯、鹽湯、米湯送下。忌食萊菔、豬血、糟、醋。

【八仙丹】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 補精髓。壯筋骨。益心智。安魂魄。令人悅澤。駐顏。輕身。延年。益壽。治虛損經水不通。

藥品 伏火硃砂、礞石、赤石脂、代赭石、石中黃、禹餘糧石、乳香、沒藥、各一同。

制法及用法 研爲極細末。糯米濃飲和丸。如梧桐子大。或豆大。每服一丸。空腹時鹽湯送下。

【八仙糕】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治脾胃虛弱。食少體倦。易吐易瀉。

藥品 人參、茯苓、山藥、芡實、蓮子肉、各六兩。

制法及用法 研爲末。加糯米粉三升。粳米粉七升。和勻。以白蜜一斤。白糖二斤八兩。用水熬化。拌藥粉中。置籠上蒸熟。切成條糕。火烘乾。瓷器收貯。每日清晨服數條。百日後漸覺體健。久服則培養脾胃。壯助元陽。輕身耐老。妙難盡述。

參考 鄭氏秘方。去人參。加菟絲子、魚鱉、慈苳仁、白扁豆、穀芽、糯米粉、粳米粉。均炒黃。不用蜜。名同上。治脾泄腎泄。及遠年休息痢。久服自效。又沈氏尊生書方。去芡實。加枳實、白朮、山楂肉、陳皮。名同上。治腸風殘泄。

【八味丸】

發明 見陳修園方。

功用 治腎虛火炎。發熱作渴。口舌生瘡。牙根潰蝕。喉痛嗽痰。

藥品 熟地黃(砂仁酒拌、九蒸九晒)、八兩。肉桂、一兩。牡丹皮、澤瀉、茯苓(乳拌)、各三兩。山藥黃肉(酒潤)、山藥、五

味子、各四兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。空腹時淡鹽湯送下。

參考 此即八味地黃丸。以五味子易附子也。亦名八味丸。藥肆中稱此爲陳氏八味丸者。俾與崔氏之八味丸(即八味地黃丸)有別也。

【八珍丸】

發明 見玉旨堂六科準繩。

功用 治一切久病後氣血並虧。神疲肢倦。面色萎黃。納少內熱。及外科潰膿。久而不斂。

藥品 人參、白朮(土炒)、茯苓、各二錢。甘草(炙)、一錢。當歸(酒洗)、地黃、各三錢。白芍藥、二錢。川芎、一錢五分。

制法及用法 研爲末。薑棗煎湯泛丸。或蜜丸亦可。每服三錢。熱湯或米飲送下。

【八仙長壽丸】

功用 治陰虛火旺。咳嗽吐血。遺精潮熱。盜汗等症。久服生精益血。卻病延年。

藥品 即六味地黃丸加五味子、二兩。麥門冬、三兩。

制法及用法 同六味地黃丸。

參考 張氏醫通方之清金壯水丸。與此方名異而實同。虛

損勞熱。加紫河車。

【八味地黃丸】

功用 ①治命火衰而腎虛。或小便頻澀。或胞轉溺阻。或夜多漩溺。或脚氣入腹。少腹不仁。上氣喘急。嘔吐自汗。耳鳴虛鳴。②治命火衰而脾虛。或便溏食少難化及瘵勞。或流注鶴膝遊火等證。不能消潰收斂。

藥品 熟地黃、八兩(九蒸搗膏)。乾山藥、山茱萸肉、各四兩。白茯苓(去蘆)、牡丹皮、澤瀉、各三兩。肉桂、附子(炮去皮臍)、各一兩(一作各二錢)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。尋常每日服三十丸。分兩次溫酒下。若乳母命火衰。兒飲其乳致病者。子母同服。脚氣及小便不通。則每日服五十丸。鹽湯下。兩耳虛鳴聽職。則每日服一百丸。並加全蠍末少許。溫酒下。以上均空腹服。服後以美膳壓之。

參考 崔氏製千金腎氣丸法。易金匱腎氣丸之桂枝爲肉桂。稱爲八味地黃丸。方中以附子肉桂壯命門之火。熟地山茱萸以增血益精。茯苓懷藥以健腸滲瀝。丹皮澤瀉以滌血液中廢物。元陽壯而精血充。則

腎強。腸溼去。則脾健。脾腎虛寒之病(若虛寒過甚宜去丹皮、澤瀉。加杜仲、牛膝、五味、鹿茸之屬)。固可因此而痊。即虛火之外浮者。亦可歸納於本原之處。誠內傷之要劑也。

【九製硫黃丸】

發明 驗方。

功用 補先天本元。健脾胃。壯筋骨。卻百病。治虛弱齒落陽痿。久服面如童顏。老當益壯。

藥品 舶硫黃(土硫黃不可用)。

制法及用法 ①用老白豆腐。將黃研末。用淨砂鍋。以竹籬夾鍋底。鋪上蓋豆腐一層。鋪黃一層。疊疊鋪好。入水煮。至豆腐黑黃色爲度。用清水漂淨腐渣。再煮二次。每黃一斤。豆腐一斤。或黑豆拌煮亦可。

②用大蘿蔔挖空。將黃末入內。蓋緊縛好。慢火煮至蘿蔔黃黑爛爲度。清水漂淨。復煮二次。或蘿蔔切片拌亦可。一黃二箇。

③將鮮紫背浮萍洗淨。拌黃末。煮至黃腐爛爲度。但萍根鬚葉最多。清水漂淨。或打爛取汁拌煮亦可。一黃三萍。④用新菘豆揀淘洗淨。以黃末拌煮。至豆爛爲度。清水漂淨。一黃二豆。⑤用石菖蒲或菖蒲洗淨。

切小段。拌黃末。入水煮至爛爲度。取汁拌黃更妙。⑤松柏葉各半。洗淨。去枝用葉。搗碎。拌黃煮至藥爛爲度。清水漂淨。⑥或藕或梨。或藕梨各半。切片。同黃煮至藕梨爛爲度。⑦肥豬大腸洗淨氣味。將黃末研細漂淨。裝入大腸。兩頭紮緊。勿令走漏。煮至大腸熟爛爲度。清水泡過夜。澄出陰乾。⑧用地黃、二兩。全當歸、天門冬、麥門冬、各一兩。川芎、陳皮、枸杞、杜仲、茯苓、甘草(炙)、前胡、防風、澤瀉、蛇床子、五加皮、各五錢。每黃一斤。用藥一料。照黃遞加。用清水煮濃。將黃末投入。煮至藥汁乾。起出陰乾。用糯米黃粥拌爲丸。如綠豆大。陰乾。瓷瓶裝收。每服第一月用三分。第二月月四分。三月六分。四月八分。五月一錢。每月遞加。至二錢爲度。空腹時鹽湯送下。如恐服久發毒。病愈則止。自無妨礙。忌一切牲畜血及細辛。

【九轉靈砂丹】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 鎮墜虛火。升降陰陽。和五臟。助真元。治上盛下虛。痰涎壅盛。

藥品 水銀、四兩。硫黃、一

兩。

制法及用法 用新銚內炒成砂子。入水火鼎煅煉爲末。糯米糊丸。如麻子大。一法入陽城罐內。赤石脂封口。鹽泥固濟。三足釘釘打火。罐內置水。勿令乾。候三炷香足爲度。每服三丸。空腹時棗湯、或米湯、井花水、人參湯送下。重病輕重。可增至五七丸。忌豬羊血、綠豆粉、冷滑之物。

參考 九轉云者。謂靈砂之用九度抽添周天火而成也。爲硫黃水銀之化合物。此物以至陽釣至陰。脫陰反陽。造化之妙。具水火之功。治諸虛調冷。爲扶危拯急之神丹。鎮墜虛火之良品。於反胃吐逆。小兒驚吐。其效如神。服時以陰陽水送下尤佳。然不可久服。胃虛嘔吐。傷暑霍亂。心肺熱鬱者。均忌之。

【十補丸】

發明 秘方。

功用 治婦人諸虛百損。榮衛不調。寒熱往來。體瘦面白。背倦口苦舌乾。汗多心忪。血崩帶下。墮胎等證。

藥品 熟乾地黃(淨洗、酒浸、蒸過、焙乾)、四兩。肉蓯蓉(酒浸、焙乾)、人參、黃耆(去蘆、蜜炙)、川芎、當歸(去蘆、酒

浸、焙)、白芍藥(酒浸)、白茯苓、白朮(去蘆、洗炒)、各二兩。甘草(炙)、五錢。桂心、一兩。

制法及用法 研爲細末。清調山藥末打糊爲丸。如梧桐子大。每服六七十丸。食前米湯或溫酒送下。

【十補丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎臟虛冷。面黑足寒。耳聾膝痠。小便不利。小兒解額經輭。膝蓋不生。

藥品 熟地黃、四兩。附子(炮)、五味子、各二兩。山茱萸肉、山藥、牡丹皮、鹿茸、桂心、茯苓、澤瀉、各一兩。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服六七十丸。鹽湯送下。

【十補丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

藥品 附子、一兩(切如豆大、用防風、一兩、鹽、四兩、黑豆、一合、同炒、以附子裂爲度、去諸藥、只取附子)。胡蘆巴、木香、巴戟、肉桂、川棟子、玄胡索、蘆薈、茴香、破故紙、各一兩。

制法及用法 共研細末。酒糯米粉糊丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服三五十丸。溫酒

送下。

【十補丸】

發明 見鮑相璈驗方新編。

功用 治老年乏嗣。中年陽痿。或精冷不同。下部重應。久服廣嗣延年。強筋力。興陽道。

藥品 鹿茸、二兩。麥門冬、淮山藥、山茱萸肉、菟絲子、淮牛膝、川杜仲、枸杞子、各四兩。熟地黃、八兩。五味子、一兩。

制法及用法 共研爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。用鹽湯送下。

【十全大補丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 升陽。滋陰。治諸虛百損。五勞七傷。頭暈昏聩。耳鳴目眩。口舌生瘡。牙齒不固。心煩作渴。喘嗽呃逆。羸瘦不食。胸腹悶痛。氣攻脊骨。經絡拘急。夢遺便泄。足膝無力。及潰瘍寒熱作痛。膿清而少。或流注、瘰癧、便毒。久不作膿。或膿成不潰。潰而不斂。

藥品 人參、熟地黃(酒洗焙蒸)、黃耆(鹽水拌炒、一作蜜酒炙)、各一錢五分(一作各一錢)。白朮(炒、一作飯上蒸)、當歸(酒拌)、白芍藥(炒、一作酒洗)、肉桂(一作五分)、

各一錢。川芎藭(一作一錢)、白茯苓(一作一錢)、甘草(炙、一作五分)、各八分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。但上係湯量。丸量即準此酌加。每服三五錢。

參考 此方原有木香、沉香。無黃耆、肉桂。至李東垣始用黃耆代木香以益氣。肉桂代沉香以溫血。以治氣血俱衰。陰陽並弱。法天地之成數。故名十全。雖本保元之意。實則四君、四物、黃耆建中、三方合成。因飲食勞倦而致煩熱。肌肉消瘦者宜之。若房勞傷精。思慮傷神。陰虛火旺。咳嗽失血者。誤用反致陰火上乘。病勢轉劇。

三 筆

【小安腎丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治腎氣虛乏。下元冷慙。夜多遺溺。倦怠羸瘦。腰膝沈重。憔悴昏潰。耳鳴目暗。牙齒蛀痛。湯鳴泄瀉。小腹寒疝作痛者。

藥品 香附子(一作宣便製二兩)、川烏頭(一作炮淨一兩)、川棟子(一作酒蒸取肉三錢)、各一斤(以上各用鹽四兩、清水四升、同煮候乾、切焙)。茴香、十二兩(青鹽微焙、一

作三兩)。熟地黃、八兩(一作四兩)。川椒、四兩(去目及閉口者、微炒出汗、一作一兩)。

制法及用法 研爲細末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空腹鹽湯。臨臥鹽酒、或溫酒送下。

【小菟絲子丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治五勞七傷。百黑骨乾。口燥。目暗耳鳴。心忪氣短。寐驚神倦。喜怒無常。悲憂不樂。飲食無味。心腹脹滿。脚膝痠軟。少腹拘急。陰痿不舉。小便或滑數。或澀痛。或出血。或遺瀝。四肢痠疼。股內淫癢。久服填骨髓。續絕傷。補五臟。益顏色。輕身益年。聰耳明目。

藥品 菟絲子、五兩(酒浸、一作十兩)。石蓮肉、二兩(一作四兩)。白茯苓、一兩(焙、一作四兩)。五味子、一兩二錢五分(一作十兩)。

制法及用法 研爲細末。用山藥七錢五分(一作四兩)。打糊。攪和爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時溫酒或鹽湯送下。如脚膝無力。晚食前木瓜湯送下。

參考 按茯苓丹。多山藥。

其餘藥品與此同。惟分量小異。

【三才丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治氣血俱虛。虛勞咳嗽。精神不固。

藥品 天門冬、熟地黃、人參、各等分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。每服一百丸（一作三錢）。空腹時溫酒或茶飲送下。

參考 此方天冬補肺以生水。地黃補腎以益精。人參補脾以健食。藥有天地人之名。而補益亦有上中下之別。故名。

【大補陰丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 降陰火。益腎水。治陰虧火旺。肺痿咳血。嘔逆煩熱易飢。骨蒸盜汗。足膝疼痛虛勞症。

藥品 黃柏（鹽酒拌、新瓦上炒褐色）、知母（去皮、酒拌溼炒、一作鹽水炒）、各四兩。熟地黃（懷慶肥大沉水者、酒洗焙乾、一作酒蒸）、敗龜版（酥炙黃）、各六兩。

制法及用法 研爲細末。豬脊髓加煉蜜和丸。如梧桐子大。日乾。每服五十丸（一作三錢）。空腹時、溫鹽湯、或淡鹽湯送下。

參考 陰常不足。陽常有餘。

善衛生者。宜常養其陰。俾陰與陽齊。則水能制火。體強無病。今人縱慾者多。精血既虧。相火必旺。真陰愈竭。孤陽妄行。而勞擦潮熱盜汗骨蒸咳嗽咯血等症易作。所以世人火旺致此病者。十居八九。火衰成此疾者。百無二三。是方能驟補真陰。承制相火。較之六味。功效尤捷。蓋因此時以六味補水。水不能遽生。以生肺保金。金不免猶燥。惟急以黃柏之苦以堅腎。則能制龍家之火。繼以知母之清以涼肺。則能全破傷之金。若不顧其本。即使病去。猶恐復來。故又以熟地龜版。大補真陰。是謂培其本。清其源矣。雖有是症。若食少便瀉。則爲胃虛。不可輕用。

四 筆

【五子丸】

發明 見世醫得效方。

功用 治淋濁遺精。小便不禁。或熱結膀胱。溺如米泔。

藥品 益智仁、小茴香（炒）、蛇床子（炒）、韭菜子（略炒）、菟絲子（酒製）、各一兩。

制法及用法 研爲細末。酒煮米糊和丸。每服三錢。淡鹽湯送下。

【五味子散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治肝腎兩虛。大便不實。午後或夜間五更泄瀉。不思食。食亦不化。

藥品 五味子(炒)、吳茱萸(泡、一作五錢)、各二兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。陳米飲調下。或另以紅棗四十九枚。生薑(切)四兩。入水煮熟。去薑取棗肉。和藥搗勻作丸。如梧桐子大。空腹時鹽湯送下。

參考 此證由於命門火衰。不能生土。肝臟氣衰。不能發陳。故以五味子之酸溫。收命門耗散之火。吳茱萸之辛溫。順肝木欲散之勢。爲水氣開滋生之路。二者之機能完健。則泄瀉可止也。

【五子衍宗丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 添精。補髓。益腎。

藥品 枸杞子(產甘州者)、菟絲子(酒浸搗成餅)、各八兩。五味子、一兩。覆盆子、四兩(酒洗去白)。車前子(炒)、二兩。

制法及用法 晒乾。研爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。修合日。春取丙丁巳午。夏取戊己辰戌丑未。秋取壬癸亥子。冬取甲乙寅卯。忌師尼鰥寡之人。及雞犬牲畜見之。每服空

腹九十九丸。上床時五子丸。白沸湯或鹽湯送下。冬月溫酒送下。懷遠精者。去車前。月蓮子。

【六神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾胃虛弱。津枯食少。虛熱。

藥品 人參、白朮、茯苓、甘草(炙)、白扁豆(炒)、黃耆(蜜炙)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。清水半盞。加生薑一片。大棗一枚。煎至三分。去滓。不拘時溫服。身熱甚者。加烏梅少許。

【六君子丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治脾胃虛弱。不能運化。胸滿腹脹。大便溏泄等症。

藥品 人參、白朮、茯苓、半夏(製)、各二錢。甘草(炙)、陳皮、各一錢。

制法及用法 研末。以薑棗煎湯泛丸。每服三錢。熱湯下。

參考 此係湯方分量。丸量須照此酌加。

【六味地黃丸】

發明 見錢乙方。

功用 治腎經不足。虛火炎上。面生雀斑。頭目眩暈。咽

喉燥痛。口舌瘡裂。耳聾齒搖。腰膝痿軟。骨熱痠痛。足跟痛。小便淋瀝或不禁。遺精夢泄。水泛爲痰。自汗盜汗。亡血消渴。尺脈虛大。婦人經事不調。小兒虛損。腎疳腦熱。疳毒。

● **藥品** 熟地黃、八兩(砂仁酒拌、九蒸九晒拌膏)。山茱萸肉(酒潤炒)、乾山藥(炒)、各四兩。牡丹皮(酒洗微炒)、白茯苓(人乳汁製焙)、澤瀉(淡鹽酒拌炒、一作二兩)、各三兩。

制法及用法 研爲細末。和地黃膏加煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服七八十丸(一作二三錢)。空腹食前、淡鹽湯或百沸湯送下。

參考 腎虛精少。虛火妄行。則下虛上實。百病叢生。此方脫胎於腎氣丸。去附桂之辛熱。而注重於填補。地黃山萸。補血益精。以壯水之主。山藥茯苓。健脾滲瀉。以培水之源(脾旺則能運化食物而生精血)。丹皮澤瀉。清血排毒。疏水道之滯。如血虛陰衰。則以熟地爲君。滑精則以山茱萸爲君。小便或多或少。或赤或白。則以茯苓爲君。小便淋瀝。則以澤瀉爲君。心意不足。則以丹皮爲君。皮膚乾澀。則以淮山藥爲君。腎虛腰膝酸痛。加杜仲、

牛膝、各二兩。小便頻數。去澤瀉。加益智仁、三兩。月經不調。加香附米、二兩(童便浸三次炒)。斷芫蕪、一兩(去筋醋煮)。隨用皆宜。至用縮砂製地黃。不特無減食作瀉之虞。並可助脾氣之轉運。以遂其陽生陰長之妙。

【天真丸】

發明 見御藥院方。

功用 治一切亡血過多。形槁肢羸。津液枯竭。食飲不進。腸胃滑泄。久服生血養氣。緩胃。駐顏。

藥品 精羊肉、七斤(去筋膜脂皮批開)。肉蓯蓉、十兩。當歸、十二兩(洗去蘆)。山藥(溼者去皮)、十兩。天門冬(去心焙乾)、一斤。

制法及用法 研爲末。安羊肉內裹縛。用無灰酒四餅。煮令酒盡。再入清水二升。煮飲肉糜爛。再用黃耆末、五兩。人參末、三兩。白朮末、二兩。熟糯米飯焙乾作餅。將藥末和丸。如雞丸。用蒸餅五七枚焙乾。入臼中杵千下。丸如梧桐子大。每服三百丸。溫酒送下。每日二次。

參考 此方製法。甚屬精良合用。蓋用血肉有形之品。以形補形。平調營衛。不用地黃

之滋膩。恐礙脾胃。故極為妥善。

【天王補心丹】

發明 見世醫得效方。

功用 寧心。保神。益血。固精。壯力。強志。清三焦。化痰涎。祛煩熱。除驚悸。治思慮過多。心血不足。神志不寧。津液枯涸。咽乾口燥。健忘怔忡。大便不利。口舌生瘡等症。

藥品 生地黃(洗)、人參(去蘆)、白茯苓(去皮)、遠志(去心)、石菖蒲(去毛)、元參、柏子仁、桔梗(去蘆)、天門冬(去心)、丹參(洗)、酸棗仁(去壳炒)、甘草(炙)、麥門冬(去心)、百部(洗)、杜仲(薑汁炒斷絲)、茯神(去木)、當歸(去蘆尾)、五味子(去枝梗)、各等分。一方有熟地黃、黃連。無生地黃、石菖蒲、甘草、百部、杜仲、茯神。一方無白茯苓、甘草、百部、杜仲。

制法及用法 研為細末。煉蜜和丸。每兩作十丸(一作梧桐子大、一作椒目大)。金箔為衣(一作辰砂)。每服一丸(一作二三十丸)。食後臨臥燈芯大棗湯、或桂元湯化下。或臨臥時燈草竹葉煎湯送下。或白湯送下。

參考 此方用生地黃為君。取其下足少陰以滋水而伏火。

其次則清氣無如柏子仁。補血無如酸棗仁。再以參苓之甘補心氣。五味之酸收心氣。二冬之寒。清氣分之火。當歸之甘補心血。丹參之寒生心血。元參之鹹。以清血中之火。更加桔梗為舟楫。遠志為嚮導。和諸藥入心以安神。火清血足。心得其養。則神明充暢。諸疾自除。

【心腎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治水火不濟。心下怔忡。夜多盜汗。便赤夢遺。

藥品 鹿膠(去苗酒浸)、熟地黃、菟蓉(酒浸)、各二兩。菟絲子(酒浸)、三兩。鹿茸(去毛酥炙)、附子(炮去皮臍)、人參(去蘆)、龍骨(煅)、絲黃耆(蜜炙)、五味子、茯神(去木)、山藥(炒)、當歸(去蘆酒浸)、遠志(甘草水煮、剝去心、薑汁炒)、各一兩。

制法及用法 共研細末。酒煮米糊為丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時棗湯送下。

【孔聖枕中丹】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治讀書善忘。久服能智聰明。

藥品 取龜版(酥炙、一作鱉甲)、龍骨(研末、入雞腹煮一

官)、遠志、九節菖蒲、各等分。

制法及用法 研爲細末。水泛丸。每服一錢。熟湯送下。

參考 龜屬陰而強。龍屬陽而靈。藉二物之陰陽。以補吾身之陰陽。假二物之靈氣。以補吾心之靈氣。再佐以芳香苦辛。以通腎氣。開心竅。故功效頗著。

【巴戟丸】

發明 見李杲醫學發明。

功用 脈空面白。悲愁欲哭。戴陽。止汗。斂精氣。補真元。悅肌膚。進飲食。治肝腎俱虛。

藥品 巴戟(去心)、白朮、五味子、茴香(炒)、熟地黃、肉蓯蓉(酒浸)、人參、覆盆子、菟絲子(酒浸)、牡蠣、益智仁、骨碎補(洗去毛)、白龍骨、各等分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。焙乾。每服三十丸。食前米飲送下。每日二三次。虛甚入物湯送下。

【牛膝丸】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 益精。緩中。治腎肝損。骨癢。筋弱。

藥品 牛膝(酒浸)、萆薢、杜仲(炒去絲)、白蒺藜、防風、菟絲子(酒浸)、肉蓯蓉(酒浸)、各等分。官桂(一作肉桂)、減半。

制法及用法 俱與金剛丸同。

五 筆

【加味地黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎水枯竭。虛火上炎。咳嗽煩渴。食減形悴。小便頻數。白濁陰痿。或黑夜睛明。口瘡齦爛喉痛。或吐瀉日久。津液虧耗。口乾作渴。或五臟俱損。發汗發熱。或痰氣上湧。手足厥冷。腿腫脚瘦。瘰癧疔等證。常服除渴疾。壯氣血。

藥品 熟地黃(肥大洗水者、酒洗淨、瓷碗盛之、大沙鍋內竹柁架起、湯浸過碗底、原蓋蓋之、澄紙糊縫、勿令泄氣、以火從巳至酉蒸之、候冷取出、晒極乾、秤準、再如前法蒸之、乘熱杵膏。一作酒蒸七兩焙乾、八次)、乾山藥、四兩(炒)、山藥黃肉、五兩(去核、酒洗焙)、白茯苓(去皮、乳拌蒸、晒乾)、牡丹皮(去骨酒洗)、各四兩。澤瀉、三兩(酒浸芻焙)。肉桂、六兩(去粗皮、不見火、發熱者以次加之)。五味子(炒)、三兩。一方加炙鹿茸、二兩。一方無肉桂、五味子。有羌活、防風、各二兩。一方無肉桂。有柴黃、柴胡。一方無肉桂。有柴

胡。

制法及用法 研爲細末。入膏煉蜜或米糊和丸。如梧桐子大。每服三五十九至七八十丸。五更初未行時溫酒或淡鹽湯、熱湯送下。午前。晚間。空腹時再服。忌食蘿蔔。

【加味地黃丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治久病。

藥品 熟地黃、山藥、山藥、牡丹皮、茯苓、當歸、黃連、澤瀉、人參。

制法及用法 研爲細末。糯米爲丸。熱湯送下。

【加味虎潛丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治心腎虛勞。

藥品 虎潛丸加人參、牛膝、山藥、使奴紙、杜仲、五味子、菟絲子、枸杞子。

制法及用法 研爲末。豬脊髓和丸。熱湯送下。

【甘露散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腫脹用下藥得利後。以此補之。

藥品 人參、白朮、茯苓、豬苓、各三錢。滑石、六兩。澤瀉、甘草、各一錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。食前白滾湯調下。

【甘菊花露】

功用 其性甘苦 微寒 無毒。功能祛頭風。除目翳。久服消痰、寬胸、耐老延年。

【四君子丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治嘔吐泄瀉。氣短面白。聲微肢困。食少不化。口舌生瘡。吐血便血。以及胎前產後諸病。凡屬於脾胃虛弱細軟脈象者。皆可治。

藥品 人參、一錢至三錢(嘔逆者、薑汁炒、瀉痢者、土炒、吐血者、青鹽或秋石水製)。白朮、一錢至二錢(溼痰者、生用、薑汁拌、泄瀉者、蒸熟、土炒焦、燥咳或便難者、蜜水拌蒸、脾胃虛者、陳米飯上蒸數次)。茯苓、一錢至一錢五分(吐痰嘔逆者、生薑汁拌、胃燥噎膈者、人乳拌蒸、小便不通者、肉桂酒拌)。甘草、六分至一錢(嘔吐者、生薑汁製、痞滿者、砂仁汁製、小便不利者生用、補虛者炙用、一方無甘草、有炙黃耆)。

制法及用法 上係湯匙。丸量宜準此酌加。共研爲末。用生薑大棗煎湯泛丸服。內傷虛弱，或飲食不化作酸。加炮薑。

參考 此爲補氣之方。補氣必從脾胃着手。故以參朮苓草爲主。人參滋胃。白朮健脾。茯苓滲溼以扶脾。甘草和中以養胃。四物均甘溫之品。扶助中宮。展布津液。不偏不倚。純粹無疵。故有君子之稱。蓋人身以脾胃爲本。脾胃強。則消化多。而五臟受澤。脾胃弱。則消化少。而百病叢生。故凡病之久虛不愈。諸藥不效者。唯有用此湯隨症加減。培養中土。使消化之機能健全。水分之精微敷布。則體氣自然強壯。

【左歸丸】

發明 見張景岳方。

功用 治腎水不足。營衛失養。或虛熱往來。自汗盜汗。或神不守舍。血不歸原。或遺淋不禁。或氣虛昏暈。或眼花耳鳴。或口燥舌乾。或腰痠腿軟。一切精髓內虧。津液枯涸等症。

藥品 熟地黃、八兩。山茱萸肉、枸杞子、鹿角膠（敲碎炒珠）、菟絲子（製）、山藥（炒）、龜版膠（敲碎炒珠）、各四兩。牛膝（酒洗蒸熟）、茯苓、各三兩。一方無枸杞子、鹿角膠、茯苓。

制法及用法 共研末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服百餘丸。開水或淡鹽湯送下。

參考 此方比六味地黃丸多

鹿角膠、龜版膠、菟絲子、枸杞、牛膝。無丹皮、澤瀉。雖曰滋補腎陰。而不宜痰多氣壅胃弱精滑等人。故不及六味地黃丸服用之廣。

【右歸丸】

發明 見張景岳方。

功用 治命門火衰。脾胃虛寒。嘔惡脹腹。翻胃噎膈。脾腹多痛。虛淋寒疝。便溏泄瀉。肢節痠痛。水邪浮腫。眼見邪祟。陽衰無子等症。

藥品 大熟地、八兩。肉桂、川附子（製）、各二兩。山茱萸肉、淮山藥（炒）、川杜仲（薑汁炒、一作鹽水炒）、枸杞子（鹽水炒）、菟絲子（製）、各四兩。鹿角膠（炒成珠）、全當歸（酒炒）、各三錢。一方無附子、山茱萸、有棗皮、三兩。一方多茯苓、補骨脂、各三兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服二三丸。或三錢。細嚼。熱湯送下。

參考 此方比桂附地黃丸多杜仲、枸杞子、菟絲子、鹿角膠、全當歸。無丹皮、澤瀉、茯苓。便溏當歸不要。餘藥無礙。

【打老兒丸】

發明 見華佗方。

功用 壯筋骨。補陰陽。

藥品 石菖蒲（銅刀刮去皮、

用嫩桑枝相拌蒸、晒乾、去桑枝不用、不可犯鐵器、令人吐逆)、山藥(蒸晒乾)、牛膝(去蘆、用黃精自然汁浸、撈出、換酒浸一宿、若無黃精、酒浸三日、撈出焙乾)、山茱萸肉(慢火焙乾)、遠志(用甘草水浸一宿、撈起晒乾、又浸晒)、巴戟(用枸杞子湯浸一宿、去心、酒浸一宿、撈出、用菊花同包、炭火焙令黃色、去菊花不用)、續斷(酒浸、去內裏筋、文火炒半乾晒)、五味子(蜜湯浸去子、再以漿水浸一宿、焙乾)、茯苓(去皮筋搗細於水中掙去浮者)、楮實子(水浸三日、掙去浮者不月、撈起晒乾、酒浸一宿、濾出蒸、從辰至午、焙乾)、枸杞子(去帶)、熟地黃(蒸、取出放冷、又以酒蒸、取出令乾、又拌蒸三四次、勿犯鐵器)、小茴香(酒浸一宿、炒乾)、肉蓯蓉(洗、酒浸一宿、刮去沙皮毛、劈破中心、去白膜一重如竹絲、飯上蒸、從寅至未、再用酥炙黃)、杜仲(去皮酥炙、炒無絲)、各等分。

制法及用法 共爲細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹時溫酒送下。

參考 或謂此方服五日。便覺身輕。十日精神爽快。二十日語言響亮。一年白髮變黑。行

步如飛。功效之大。難以盡述。因某婦年過百歲。得其老兒子不肯服此丸。故有仙姑打老丸之稱。藥味同還少丹。

【平補鎮心丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治心虛血少。驚悸顫振。夜臥不寧。

藥品 龍齒、一兩(煨通紅、醋淬、水飛淨)。遠志(甘草湯泡去骨)、人參、各一兩。茯神、酸棗仁(炒)、各一兩五錢。柏子仁、當歸身、石菖蒲、各一兩。生地、二兩(一作熟地)。肉桂、一兩(不見火)。山藥、一兩五錢。五味子、五錢。麥門冬、一兩五錢(去心)。硃砂、五錢(另研、水飛淨)。一方無柏子仁。酸棗仁、石菖蒲。有車前子、天門冬、白茯苓。

制法及用法 研爲細末。煉白蜜和丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服三五十丸。米湯、或人參湯、龍眼湯、醇酒送下。空腹臨臥各一服。

【玉屏風散】

發明 見世醫得效方。

功用 治風邪久留不散。及衛虛自汗不止。

藥品 防風、二兩。黃耆、六兩。白朮、二兩。

制法及用法 研爲細末。每服三四錢。黃酒調服。或不研。加生薑、大棗。清水煎服。

參考 此係固肌表之方。防風獨行運身。爲風藥中之潤劑。黃耆能補三焦而實衛。爲元府禦風之關鍵。是補劑中之風藥。二者相合。其功愈大。白朮健脾胃。溫肌肉。培土即以寧風。夫以防風之善驅風。得黃耆以固表。則外有所衛。得白朮以固裏。則內有所據。風邪既去而不能復入。無邪氣留連之患。此所以當依如屏而珍如玉也。按證治準繩方。中有白朮黃耆湯(白朮、一錢、黃耆、三錢、防風、一錢五分、清水煎、食前服)。亦治風虛汗多。許蔭宗有防風黃耆湯(防風、黃耆、各等分、清水煎服)。治中風不語。脈遲弱者。蓋風邪在肌表。必用防風以驅逐之。邪之所湊。其氣必虛。故用黃耆以鼓舞正氣。黃耆得防風。其功愈大者。一攻一補。有相須相得之義也。今人治風。惟以發散爲正法。而禁用參耆。不知日盲日瞶。皆元氣不足之徵。則補氣以禦風。扶正以却邪。安可少哉。

【半硫丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治痿癱。冷氣。冷秘。虛秘。

藥品 半夏(湯洗七次、焙乾、一作薑製)、三兩、硫黃(明淨者、研極細、柳木槌子殺過)、二兩。

制法及用法 研爲極細末。生薑自然汁同熬。入乾蒸餅末。攪和勻。入臼內。杵數百下爲丸。如梧桐子大。小兒如黍米大。每服十五丸至二三十丸。小兒三五丸。空腹時無灰酒、或米飲、生薑湯送下。婦人醋湯下。

【石刻安腎丸】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治真氣虛損。脚膝軟弱。夜夢遺精。小便數滑。久服多子。

藥品 鹿茸(製)、一兩。淡菴蓉(酒浸)、白茯苓、赤石脂(煅)、遠志肉(製)、菟絲子(製)、小茴香(酒炒)、肉桂、川楝子(酒蒸)、川石斛、柏子仁、山茱萸肉、川附子(製)、茅朮(製)、韭菜子(微炒)、川杜仲(製)、破故紙(酒炒)、川椒(去目、微炒出汗)、葫蘆巴(炒)、白茯苓、川烏、巴戟天(製)、各二兩。青鹽、四錢。懷山藥、四兩。一方無川椒。有金銀花。

制法及用法 共爲細末。將

懷山藥酒煮。研鹽化水和糊打丸(一作將石斛煎湯代水爲丸)。每服三錢。空腹時淡鹽湯送下。

【白朮丸】

發明 見玉璽是齋百一選方。

功用 治脾肺氣虛。

藥品 白朮、二錢。人參、黃耆、茯苓、各一錢。山藥、百合、各七分五釐。甘草、五分。前胡、柴胡、各二分五釐。

制法及用法 研爲細末。滴水和丸。生薑三片。大棗二枚。煎湯泛丸。熱湯送下。

六 筆

【肉蓯蓉丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治腎虛。

藥品 肉蓯蓉、山茱萸、石菖蒲、金石斛、巴戟、磁石、鹿茸、菟絲子、茯苓、各二兩。沉香、川椒、各一兩。

制法及用法 共研末。水泛丸。熱湯送下。

【肉蓯蓉丸】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 益精神。生氣血。駐容顏。烏鬚髮。

藥品 肉蓯蓉(酒浸一宿、刮

去皺皮、炙乾)、菟絲子(酒浸三日、曝乾、別碾爲末)、各二兩。熟地黃、鍾乳粉、天雄(炮去皮臍)、五味子、桂心、人參(去蘆)、乾薑(炮)、白朮、遠志(去心)、杜仲(去粗皮、炙黃)、巴戟(去心)、牛膝(去苗)、山茱萸(去核)、覆盆子、川椒(去目、並合口者、炒出汗)、各一兩。甘草(炙)、五錢。天門冬(去心焙)、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。

【肉桂七味丸】

發明 見瘍醫大千方。

功用 治腎虛火炎。發熱作渴。口舌生瘡。牙齦潰爛。咽喉作痛。或形體憔悴。盜汗。

藥品 六味丸加肉桂、一兩(臨用去皮、忌火、勿出氣、一作二兩)。

制法及用法 俱與六味丸同。

參考 此方用肉桂於壯水藥中、爲引無根虛火下降歸經之劑。

【老奴丸】

發明 良方。

功用 治年高氣虛。風溼腰脚疼痛。

藥品 木香、五錢。燈芯、二

錢。大蜘蛛、七個。畢澄茄、胡桃肉(另研)、車前子(炒)、馬兜花(酒浸)、葶藶、牡蠣(火煅)、韭子、木通、各一兩。全蠍(去毒)、山茱萸(去核)、破故紙(酒浸)、桑螵蛸(酒浸)、龍骨、各一兩五錢。母丁香、紫荷花、蛇床子、肉蓯蓉(酒浸)、菟絲子(酒蒸)、白茯苓(去皮)、仙靈脾、八角茴香、巴戟(去心)、遠志(去心)、當歸、各二兩。沈香、七錢。乾漆(炒去煙)、三兩。熟地黃、五兩。一方無桑螵蛸、當歸、沉香。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。七日見效。無婦人者勿服。此藥易興陽事。欲解者。飲涼水三口。

【老奴丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 填精補髓。興陽種子。治五勞七傷。腰膝痠痛。小腸疝氣。及下元虛損。久無子嗣。

藥品 紫荷花、破故紙、淫瀉、肉蓯蓉、馬兜花、松子仁、菟絲子、畢澄茄、川烏頭(製)、韭藥子、淡乾薑、巴戟肉、川棟子、枳椇子、大茴香、車前子、燈草、各二兩。廣木香、遠志、母丁香、沉香、各五錢。山茱萸肉、桃仁、桑螵蛸、蛇床子、木通、淫

羊藿、各一兩。熟地黃、四兩。大蜘蛛、七個。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。每服四錢。淡鹽湯送下。

【羊腎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎勞。

藥品 熟地黃(酒蒸焙)、杜仲(炒)、菟絲子(酒蒸另研)、石斛(去根)、黃耆、續斷(酒浸)、肉桂、磁石(煅醋淬)、牛膝(酒浸、去蘆)、沈香(另研)、五加皮(洗)、山藥(炒)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。用雄羊腎兩對。以烈椒酒煮爛、入少酒糊杵丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時鹽湯送下。

【羊腎丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治腎虛。

藥品 鹿茸、菟絲子、各一兩。茴香、五錢。

制法及用法 研爲末。以羊腎二對。入酒煮爛。搗泥和丸。陰乾。每服三十五丸。溫酒送下。每日三次。

【安腎丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治腎虛久候陰寒。腦

臍虛冷。下元交迫。耳重目眩。腰腿腫疼。脇腹擠痛。兩脅剝脹。小腹堅疼。下部溼癢。夜夢遺精。恍惚多驚。皮膚乾燥。面無光澤。口淡無味。不思飲食。大便澀澀。小便滑數。神困健忘。常服補元陽。益腎氣。

藥品 肉桂(去粗皮、不見火)、川烏頭(炮去皮臍)、各一斤。桃仁(鈇炒)、白茯苓(炒去刺)、巴戟天(去心)、乾山藥(薑汁炒)、茯苓(去皮)、肉蓯蓉(酒浸、炙、去腐)、石斛(去根、炙、一作酒炒)、川萆薢(炒)、白朮、補骨脂(炒)、各三斤。一方無肉桂、茯苓。一方無桃仁。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸至七十丸。空腹鹽湯。臨臥溫酒送下。小腸氣茴香酒下。

參考 此方因腎臟爲風寒所襲。故用烏頭茯苓以祛風散寒。等風去則腎自安。原無事於溫補也。其他桂苓朮薢脂戟萆薢。雖曰兼理脾胃。而實從事於祛濕利水。醇醪入房。汗隨風蔽。所以肢體沈重。非藉疏通滯澀。病必不除。因彷彿地黃飲子而爲製劑。彼用地黃首志冬味黃附。以交心腎之氣。此用萆薢白朮補骨脂烏頭。以祛坎陷之風。與崔氏八味丸迥異。

【地黃丸】

發明 見玉背堂證治準繩。

功用 治心腎不交。

藥品 熟地黃、十兩(卷九次、曝九次)。菟絲子(酒浸)、鹿角霜、各五兩。茯苓(去皮)、柏子仁、各三兩。附子(炮去皮臍)、一兩。

制法及用法 研爲細末。另用鹿角膠煮糊和丸。如梧桐子大。每服一百丸。空腹時鹽酒送下。

【西洋參酒】

功用 西洋參所浸之酒也。其性甘寒微苦無毒。功能滋脾胃。養血氣。生津止渴。治肺虛咳嗽。胃枯食少。及上中二焦陰虛液少諸症。與西洋參同。

【全鹿丸】

發明 見張景岳方。

功用 補腎。填精。益氣。培元。通脈。和血。利節。健步。治五勞七傷。諸虛百損。精神衰憊。頭眩耳聾。髓質虛弱。脊背痠軟。腰膝無力。緩疝腹痛。精寒陽痿。肌膚甲錯。筋脈骨疼。步履艱難。婦女虛羸。癆瘵。骨蒸發熱。陰寒腹痛。崩漏經阻。赤白帶下。大腸飢紅。久服和顏悅色。壯陽種子。返老還童。延年益壽。

藥品 活大鹿、一隻。熟地

菴、黃耆(炙)、人參、當歸、正地黃、牛膝、天門冬、茯苓、枸杞子、麥門冬、肉蓯蓉、補骨脂、巴戟肉、鎖陽、杜仲、菟絲子、山藥(炒)、五昧子、秋石、茯苓、續斷肉、胡蘆巴、甘草(炙)、覆盆子、焦於朮、川芎、新會皮、橘實、各一斤。川椒、小茴香、沉香、青鹽、各八兩。一方無川椒。有葵藜、女貞子、蓮肉、山茱萸肉、各一斤。川黃連、八兩。

制法及用法 共爲末。將活鹿纏死。去毛。破肚。洗淨。將肚實亦洗淨。同入鹿內。加好陳酒煮爛。取肉、切薄片。焙乾。磨細末。將肚實仍入原湯熬成膠。收入藥末。再將其骨炙酥。研末。共諸藥末攪勻。和煉蜜打丸。如梧桐子大。焙乾。用生絹作小袋五十隻。每袋約盛一斤。懸透風處。陰溼時須用火烘一二次。每服四錢。空腹臨臥薑湯或鹽湯送下。冬月溫酒下。

七 筆

【延齡廣嗣丸】

功用 治男子下元虛損。陽痿精冷。腰膝痠痛。一切先天稟受不足。少年虧喪過度之症。久服培元固本。益精添精。興陽種子。益壽延年。

藥品 何首烏(製)、大生地、熟地、旱蓮草、各三兩。杜仲(炒)、覆盆子、槐角、茅薑、菟絲餅、菊花、枸杞子、補骨脂、五加皮、懷牛膝、川黃蘗、澤瀉、肉蓯蓉、蛇床子、金櫻子、石菖蒲、各五錢。茯苓(人乳拌)、當歸身、青鹽、山藥(人乳拌)、各一兩。

制法及用法 水煎濃汁。入野料豆三升七合。女貞子一斤八合五勺。將前藥汁拌入。晒乾。再拌再晒。汁盡爲度。研細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。淡鹽湯或熱湯送下。

【坎離既濟丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治陰火。

藥品 當歸(酒製)、二兩。熟地、生地(酒製)、山茱萸、牛膝(酒製)、天門冬、麥門冬、各四兩。白芍(酒製)、五味子、山藥、龜版(酥炙)、各三兩。知母(酒製、鹽製)、各二兩。川黃柏(酒製、鹽製)、各三兩。川芎、一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三五丸。溫湯送下。

【妙香散】

發明 見王荊公方。

功用 安神、閉精、定心氣。

藥品 龍骨(瓦色者)、益智仁、人參、各一兩。白茯苓(去皮)、遠志(去心)、茯神(去木)、各五錢。硃砂(研)、甘草(炙)、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時溫酒調下。

八 筆

【金剛丸】

發明 見張潔古痰機氣宜保命集。

功用 益精。治腎虛。骨痿。不能起動。

藥品 萆薢、杜仲(炒去絲)、肉蓯蓉(酒浸、去鱗甲焙乾)、菟絲子(酒浸)、各等分。

制法及用法 研爲細末。酒煮豬腰子搗和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。空腹時溫酒送下。

參考 按張氏醫通改定方。用川萆薢(鹽酒炒)、杜仲(鹽酒炒)、肉蓯蓉(酒浸、去腐切焙)、菟絲子(酒煮、搗作餅焙)、巴戟肉(酒煮)、各四兩。鹿胎、一具(酥炙)。研爲細末。鮮紫河車。弱水熬膏。搗和爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時參湯米湯。臨臥時溫酒送下。脾虛少食。大便不固者。加

人參、二兩。乾山藥、三兩。精氣不固者。更加山茱萸肉、二兩。

【金液丹】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治陰極發躁。厥冷厥伏。爪甲昏青。自汗吐利。小便不禁。或陰結畏寒。二便不通。及小兒脾胃虛寒。吐利。肢厥、神昏。多睡露睛。口鼻氣冷。將成慢驚。

藥品 舶上硫黃、五兩。

制法及用法 研細水飛。入沙罐內。鐵蓋蓋定。鐵線纏口。鐵釘旋緊。水調赤石脂封口。鹽泥固濟。候乾埋地坑。以三足釘釘於地。將罐置釘上。另用一盞。盛水置罐上。再用鹽泥固濟。慢火煨養七日夜(一作三日夜)。再加頂火。用炭十斤爲度。候冷取出。用柳木髓於乳鉢中研細。每末一兩。用蒸餅一兩。打糊爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。空腹時、熟湯、煎湯、米飲送下。陰極冷甚者。每服一百丸。

【金水六君丸】

發明 見張景岳方。

功用 治脾腎虛寒。水泛爲痰。或年邁陰虛。血氣不足。外受風寒。咳嗽喘惡。多痰喘急。

藥品 大熟地、三兩(一作四兩)、全當歸(一作一兩)、茯苓、半夏(製、一作一兩五錢)、各二兩。甘草、一兩(炙、一作五錢)、陳皮、一兩五錢(一作一兩)。一方加潞黨參、三兩。炒白朮、二兩。

制法及用法 共研細末。薑棗湯泛丸。每服三錢。熱湯送下。

參考 二陳湯爲祛痰之通劑。蓋以痰之本。水也。茯苓利水以治其本。痰之動。溼也。茯苓溼以制其動。方中只此一味。是治痰正藥。其餘半夏降逆。陳皮順氣。甘草調中。皆取之以爲茯苓之佐使耳。故仲景書凡痰多俱加茯苓。嘔者俱加半夏。古聖不易之法也。此方取熟地寒潤。當歸辛潤。加此二味。年邁陰虛者或可。若用爲脾腎虛寒水泛爲痰之劑。不知肺寒非乾薑細辛合用不可。腎寒非薑附重用不可。今用歸地之寒溼。助其水飲。則陰霾四布。水勢上凌。而氣逆欬嗽之病日甚矣。

【金匱腎氣丸】

發明 見金匱要略方。

功用 治虛勞腰痛及男子消渴小便多。婦人轉胞不得溺。

藥品 熟乾地黃、八兩。山

藥、山茱萸肉、各四兩。茯苓、丹皮、澤瀉、各三兩。附子、一枚(炮)。桂枝、一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。溫酒送下。日再服。

參考 此方以熟地山藥。滋腎臟之陰。山茱附子。壯腎臟之陽。桂枝化肺氣。茯苓行水道。丹皮澤瀉以排除血液中毒質。使腎臟之機能健。則小便之多者能少。秘者可通。腎臟之精血充。則虛損可除。而腰痛可止矣。千金腎氣丸。藥品同上。惟附子作二兩。以桂心二兩易桂枝。純爲溫補下元之劑。與金匱之主表散者不同。故於肝腎虛勞最對症。崔氏之八味地黃丸。改桂心爲肉桂。實抄襲千金也。所以現在藥肆中。只有金匱腎氣丸。而千金腎氣丸。無存在之必要。蓋有習用之崔氏八味地黃丸以代之也。

【河車丸】

發明 見玉青堂證治準繩。

功用 治勞嗽。一切勞瘵、虛損、骨蒸等疾。

藥品 河車、一枚(初生男子者尤良、於長流水中蕩洗血淨、入瓷器內、重湯養爛入藥)。雲白茯苓、五錢。人參、一兩。乾

山藥、二兩。

制法及用法 研爲細末。入河車汁。加麴糊爲丸。如梧桐子大。麝香末少許爲衣。每服三五十丸。空腹時米飲、溫酒、或鹽湯送下。嗽甚者。五味子湯下。

【河車丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治骨蒸。

藥品 河車、秋石、五味子、人參、乳粉、阿膠、鼈甲、地骨皮、人中白、銀柴胡。

制法及用法 研爲細末。用白朮、青蒿、童便、陳酒、熬膏爲丸。熱湯送下。

【河車大造丸】

發明 見吳球方。

功用 治虛損癆瘵。神志失守。內熱水虧。

藥品 紫河車、一具。人參、黃柏(鹽酒炒)、杜仲(酥炙)、各一兩五錢。牛膝、天門冬、麥門冬、各一兩。龜版(炙)、熟地黃、各二兩。

制法及用法 共研細末。另用茯苓六錢。煮爛和勻。酒米糊爲丸。每服三錢。空腹時淡鹽湯送下。

參考 此方又能烏髮黑髮。聰耳明目。有奪天地造化之功。

惟只宜於陰虛之體。非陽虛者所宜。

【虎潛丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治腎陰不足。筋骨痿軟。不能步履。膝猶筋骨痿弱。下元虛冷。清血虧損。及骨蒸勞熱等症。

藥品 敗龜版(酥炙)、黃柏(鹽酒炒、一作三兩)、各四兩。知母(鹽酒炒)、熟地、各二兩(一作各三兩)。牛膝、三兩五錢(酒蒸、一作二兩)。白芍藥、一兩五錢(酒炒、一作二兩)。續陽(酒潤、一作二兩)、虎腰骨(酥炙)、當歸(酒洗、一作二兩)、各一兩(一作各一兩五錢)。陳皮、七錢五分(鹽水潤、一作七錢、一作一兩、一作二兩)。乾薑、五錢(冬月用之、一作一兩)。

制法及用法 共研細末。羯羊肉二斤。酒煮搗膏爲丸。如梧桐子大。酒煮米糊爲丸亦可。每服三錢。空腹時淡鹽湯送下。

參考 腎虛精枯。則血液枯槁。淫熱風毒。遂乘虛襲入。而成不能步履。腰膝筋縮之症。方中黃蘗。清陰中之火。燥骨間之溼。且苦能堅腎。可使足膝強壯。爲治痿要藥。龜性稟陰最厚。首常向腹。善通任脈。

能人補真陰。深得夫潛之意義。用此二者爲君。一以固本。一以治標。再以熟地填腎情。知母清肺氣。牛膝入肝舒筋。歸芍佐之。陳皮疎之。又感熱則生風。逗遛關節。則用虎骨以驅之。純陰無陽。不能發生。則用鎖陽以溫之。補之以味。故以羊肉爲丸。急於入腎。故以淡鹽湯下。於潛字之意最合。如痿而厥冷。更加附子半枚。方法盡善。所以又稱健步虎潛丸。

【虎骨木瓜丸】

功用 治溼傷經絡。或房事飲酒無度。以致肝腎虛虧。肢腿疼痛。脚膝拘攣。筋骨無力。步履艱難。或熱痛如火。或冷痛如冰。

藥品 虎骨(炙)、木瓜、楓樹葉、龜版(炙)、當歸、自然銅、血竭、桂心、乳香、沒藥、毛茛、安息香、廣木香、甜瓜子、地龍(去土)、各一兩。

制法及用法 共爲末。酒糊和丸。每服二三錢。空腹時熱湯或溫酒送下。忌火酒房事。

【虎骨四斤丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治肝腎虛寒。而挾風溼。足膝疼痛。

藥品 虎脛骨、一兩(塗酥炙、如無脛骨、隨前後左右用掌骨亦可、一作二兩、一作一具)。宣州木瓜(去瓢)、天麻(去蘖)、肉蓯蓉(酒洗去腐)、牛膝(去蘖)、各一斤。附子(炮去皮尖)、二兩。

制法及用法 先將木瓜、天麻、蓯蓉、牛膝。用無灰酒五升浸。春秋各五日。夏三日。冬十日。取出焙乾。切片曬燥。入附子、虎骨。共研爲細末。用浸藥酒打麵糊和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。食前鹽湯送下。臨臥時。浸藥酒送下。酒完。以陳酒代之。

【青娥丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 益精。助陽。烏鬚。壯脚力。治腎虛腰痛。妊娠腰腹背痛。

藥品 補骨脂(酒炒)、杜仲(去粗皮、鹽酒炒斷絲、或用生薑二兩五錢、燉淹炒乾)、各四兩。一方有大蒜四兩。苘炒熬膏。

制法及用法 研爲細末、用胡桃肉(連皮)、三十枚。青鹽(去砂土淨)、一兩。同搗成膏。少入煉白蜜和丸。如彈子大。每服一丸。空腹時溫酒化

下。或食前調氣散煎湯送下。

【附子七味丸】

功用 治陽虧畏冷。氣虛火衰。自汗盜汗。腹痛便溏。

藥品 附子(製)、一兩。熟地(砂仁酒拌、九蒸九晒)、八兩。山茱萸肉(酒潤)、山藥、各四兩。牡丹皮、澤瀉、茯苓(乳拌)、各三兩。

制法及用法 共為細末。煉白蜜和丸。每服三錢。淡鹽湯或開水送下。

參考 按此方即六味丸加附子。

【附子都氣丸】

功用 治陽虛惡寒。小便頻數。下焦不約。咳嗽痰喘。

藥品 附子(製)、一兩。熟地(砂仁酒拌、九蒸九晒)、八兩。山茱萸肉(酒潤)、懷山藥、各四兩。雲茯苓(乳拌)、牡丹皮、澤瀉、五味子、各三兩。

制法及用法 共研細末。煉白蜜為丸。每服三錢。空腹時淡鹽湯送下。

參考 按此方即六味丸加附子五味子。

【固本丸】

發明 張氏醫通方。

功用 治上消下消。老人津血俱虧。咳逆便秘。

藥品 生地黃、熟地黃(俱用

竹刀切)、麥門冬(去心、淡酒浸一日、鹽湯浸二日)、天門冬(去心醇酒浸三日)、各八兩。人參(括去皮、飯鍋上蒸極熟、一作西洋參)、四兩。

制法及用法 甘泉水於沙鍋煎至味盡。去滓。慢火熬成膏。和入薯蕷粉搗丸。如梧子大。或晒乾研末。煉蜜為丸。亦可。每服五七十丸。每晨淡鹽湯或清酒送下。

參考 此方雖主扶陰抑陽。然二冬二地。俱屬純陰之品。和以人參。似覺味勝於氣。甚有去而不用者。經云無陽則陰無以化。以陰柔之味。不得陽和之力。每致奪食作瀉。故食少便滑者忌用。

【固真散】

發明 證治準繩方。

藥品 白龍骨、一兩。韭子、一合。

制法及用法 研為細末。每服二錢匕。空腹時溫酒調下。

【固精丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治下虛胞寒。小便白濁。或如米泔。或若凝脂。腰重少力。婦人白淫。帶下。

藥品 牡蠣(煅)、白茯苓(去皮)、桑螵蛸(酒浸炙)、白石脂、韭子(炒)、五味子、菟絲子(酒

浸、焙乾)、龍骨、各等分。

制法及用法 研爲細末。酒蒸米糊和丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時淡鹽湯送下。

【固精丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治嗜欲過度。勞傷腎經。精元不固。夢遺白濁。

藥品 肉蓯蓉(酒浸焙乾)、陽起石(火煨研細)、鹿茸(去毛酥炙)、川巴戟(去心酒浸)、赤石脂(火煨七次)、白茯苓(去皮)、附子(炮去皮臍)、鹿角霜、龍骨(生用一作煨)、韭子(炒)、各等分。一方有五昧子。

制法及用法 研爲細末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時鹽湯送下。

參考 此治勞傷腎經之陽虛。藥肆中所謂補益固精丸。殆即此也。

【固精丸】

發明 見沈氏尊生書方。

功用 補肝腎。治色慾勞傷。

藥品 黃蘗、知母、各一兩。牡蠣、茯苓、蓮鬚、茯苓、遠志、各三錢。龍骨、二錢。山茱萸、五錢。

參考 此治勞傷腎中之水也。

【定志丸】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 補心。強志。治一切神志不足。驚悸健忘。言語失倫。喜笑發狂。色傷泄精。及能近視不能遠視。

藥品 石菖蒲(炒)、遠志(甘草湯泡、去心)、各二兩。白茯苓(一作茯苓)、人參、各三兩(一作各一兩、一方有茯苓、白朮、麥門冬)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。硃砂一兩五錢(研細、一作三錢)爲衣。每服十丸至七八十丸。食後來飲或淡湯送下。亦可作湯服。目能近視者。每服三錢。龍眼湯送下。血虛加當歸。有痰加橘紅、半夏、甘草、生薑。

【定志丸】

發明 見張子和方。

功用 安魂。定魄。治驚。

藥品 人參、茯苓、遠志(去心)、茯苓、柏子仁、酸棗仁。

制法及用法 共研細末。酒調米糊爲丸、淡薑湯送下。

【知柏地黃丸】

功用 治相火旺盛。咽痛耳鳴。勞熱骨蒸。虛煩盜汗。骨蒸髓枯。尺脈大者。

藥品 即六味地黃丸加知母、黃柏、各二兩。

制法及用法 俱與六味地黃丸相同。

參考 此方乃壯水之主以制陽光。故宜於尺脈旺者。

【枇杷膏】

發明 驗方。

功用 治勞傷虛損。吐血咳嗽。體瘦發熱。四肢疲憊。精神疲倦。腰背疼痛。飲食不進。以及一切弱症。

藥品 枇杷葉、五六十片(新鮮者更佳、洗淨毛)。大梨、二個(深臍者佳、去皮心、切小片用)。白蜜、半罐(先熬、滴水成珠、大便乾燥者多加、大便溏瀉者不用、以白糖代之)。大棗、八兩(或黑棗微棗皆可)。微蓮肉、四兩(不去皮)。

制法及用法 先將枇杷葉放銅鍋或砂鍋內。以河水煎出濃湯。用紙絹瀝清汁。去葉與渣不用。後將梨、棗、蓮、蜜和入煎熬。以蓮肉融爛爲止。用經瓶收貯。隨意溫熱食之。

參考 凡虛弱服藥多。則脾胃受傷。飲食減少。病更加重。虛弱咳嗽者。若不早治。肺損難治。惟此方最宜肺臟。治咳嗽應效如神。輕者二三料。重者四五料除根。如虛弱並不咳嗽者。枇杷葉不用。只用河水同煮。咳嗽多痰者。加川貝母一兩。研極細末。俟煮熟時。入內煮一二滾以起。若吐血。

用藕節二十一個。搗汁同煮。冬月多製。久收不壞。夏月隨食隨製。貧富可用。不必另服他藥。免致誤用害事。即無病常服。可保身強神。一方鮮枇杷葉。不拘多少。刷去毛。清水煎濃汁。去渣濾清。加冰糖收成膏。名枇杷葉膏。功亦止咳潤肺。治肺熱久嗽頓咳。惟枇杷實雖有愈渴、下氣、潤臟、除上焦熱之說。多食則致痰熱傷脾。凡食必俟其極熟。若味帶生酸。則助肝伐脾。令人中滿泄瀉。

【兩儀膏】

發明 見景岳全書方。

功用 滋精氣大虛。或克伐太過。耗損真氣。諸藥不應者。

藥品 人參、八兩。大熟地、一斤。

制法及用法 河水熬膏。加冰糖或白蜜收老爲度。不拘時服。

參考 凡虛在陽分而氣不化精者。宜參朮膏。若虛在陰分而精不化氣者。莫妙於此。其未至大病而素覺陰虛者。用以調元尤善。

【阿膠】

功用 清肺。養肝。滋腎。和血液。堅筋骨。利大小腸。治癱緩偏風(微炙熟、先煮蔥豉

懈、另水煮香波去渣、入膠更煮、膠好如饅服、再吃葱蒜粥)。一切風痛。虛勞羸瘦。肺痿吐膿。咳嗽。喘急。吐血。衄血。小腹痛。心腹內崩。水氣浮腫。腰痛。四肢酸痛。骨節疼痛。血淋。尿血。血秘(炒、同葱白水煎化、入蜜溫服)。腸風。下痢。婦女血崩。血枯。經水不調。經水不止(炒焦爲末、酒服)。崩中。帶下。妊娠尿血(炒黃爲末、食前粥飲送下)。血疔(酒煎服)。下血(炙爲末、酒煎化服)。胎動(炙研、香波葱水煮、入膠化服)。胎前產後諸疾。療癰疽腫痛。久服輕身益氣。令人有子。

藥品、制法及用法 以阿井泉和畜皮熬成。用犛牛、水牛、驢皮者爲上(古時多用牛皮、後世易以驢皮)。豬馬驢駝皮者次之。俱取生皮水浸四五日。洗刮極淨。以山東阿井水熬煮。時時攪之。水乾則添。煮皮至爛。濾汁再熬成膠。傾入盆中。待冷凝固。黃透如琥珀色。或光黑如鹽漆。以清而不膩。入藥易溶化者爲佳。今人或以馬皮舊草鞍靴之類。用他水熬煮。其氣濁臭。入夏燂燂。皆不堪入藥。以純黑驢皮所製而陳久燥烈者爲佳。或火炙用。

或先以豬脂浸一宿。取出。柳木火上炙乾所用。或炒成珠用。或以麴粉炒。或以草灰炒。范疔則以蛤粉炒。行血則以蒲黃炒(一說不可炒、炒則濟水之性失)。或酒化或吞。或水化成膏。或童便和用。皆預爲使。畏大黃。

參考 阿井泉爲濟水諸泉之一。合驢皮血肉之品以熬膠。故能入肺肝腎三經。治一切血症。瘀者能通。崩者能止。升清降濁。俾周身血液。復其常軌。爲婦科清熱益陰之要品。氣味雖平和(甘平無毒、或作微溫)。然性黏膩難消化。脾胃弱者忌之。且此物所以宜於血分諸疾者。以阿井泉水含有特殊礦質。故和以黑驢皮。不過取其黏性作用。實則重水不重皮也。今阿井之水久涸。世俗遂以他水代煮。雖驢皮不差。而水質不同。安能有效。

九 筆

【香茸丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 補精血。益真元。治下焦陽竭。膀胱疝痛。飲食減少。目視眩暈。夜夢鬼交。遺泄失精。肌肉消瘦者。

藥品 麝香(另研)、五錢。

鹿茸、麋茸(俱用火燎去毛、酥炙)、各二兩。沉香、五味子、白茯苓(去皮)、白龍骨(火煨)、肉蓯蓉(酒浸一宿、切焙乾)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。和勻。用熟地黃三兩。焙乾爲細末。以酒二升熬成膏。投藥入臼內。搗千杵。如硬。更入酒少許。丸如梧子大。每服五十丸。空腹時溫酒或鹽湯送下。

【香砂六君子丸】

功用 治中虛氣滯。痰滯內阻。胸中滿悶。食難運化。嘔噦腹疼。腸鳴泄瀉等症。

藥品 人參、茯苓、法半夏、白朮(炒焦)、各二兩。甘草(炙)、陳皮、各一兩。木香、砂仁、各八錢。共爲細末。薑棗煎湯泛丸。每服三錢。空腹時、熱湯送下。

參考 此爲通補兼施之方。人以胃氣爲本。脾胃一有不和。則氣機停滯。或痞悶噯噦。或生痰留飲。因而不思飲食。肌肉消瘦。諸症蜂起。而形消氣微矣。四君子爲治氣分之總方。人參致沖和之氣。白朮培中宮。茯苓清治節。甘草調五臟。胃氣既治。病安從來。然機亂反正。又不能無爲而治。必舉

大行氣之品以補之。則補者不至泥而不行。故加陳皮以利肺金之逆氣。半夏以煉脾土之滯氣。而痰飲可除。加水香以行三焦之滯氣。砂仁以通脾腎之元氣。而順鬱可開。補而兼通。則功力倍宜。通而兼補。則元氣大振。相得而益彰矣。

【柏子養心丸】

發明 見體仁彙編方。

功用 治勞慾過度。心血虧損。精神恍惚。夜多怪夢。怔忡驚悸。健忘遺泄。常服寧心定志。補腎滋陰。

藥品 柏子仁(蒸晒去壳)、四兩。枸杞子(酒洗晒)、三兩。麥門冬(去心)、當歸(酒浸)、石菖蒲(去毛洗淨)、茯神(去皮心)、各一兩。玄參、熟地(酒蒸)、各二兩。甘草(去粗皮)、五錢。

制法及用法 先將柏子仁熟地黃蒸過。石器內搗如泥。餘藥研末和勻。煉蜜爲丸。如梧子大。每服四五十丸。早晚燈心湯或圓眼湯送下。

【珍珠丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治肝虛。

藥品 珍珠、麝香、各三錢。熟地黃、當歸、各一兩五錢。酸

棗仁、人參、柏子仁、各一兩。犀角、茯神、沈香、各五錢。冰片、一錢。虎睛、一對。

制法及用法 共研細末。煉蜜和丸。硃砂、金箔爲衣。每服五十丸。薄荷湯送下。早午夜臥各一服。

【封髓丹】

發明 見王海藏方。

功用 治心火狂陽太盛。腎水真陰虛損。固真元。降心火。益腎水。

藥品 黃蘗(炒)、二兩。縮砂仁(鹽水炒)、一兩。甘草(炙)、五錢。半夏(炒)、豬苓、茯苓、紅蓮花蕊、益智仁、各二錢五分。

制法及用法 研爲末。芡實粉打糊或鹽湯和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。空腹時糯米飲送下。

十 筆

【桑椹膏】

發明 驗方。

功用 治貧血心悸。神經衰弱。兼具潤腸作用。

藥品 桑椹子、一千六百兩。

制法及用法 煎三次。榨淨澄清過濾。蒸發成濃汁。加冰糖六百六十兩。收成膏九百兩。每次半食匙。開水沖服。

參考 桑枝膏製法相同。而其效則爲專治骨節疼痛筋絡牽強等症。與此不無區別。

【桑螵蛸散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治產後湯氣虛弱。小便頻數。或爲遺尿。

藥品 桑螵蛸、三十個(煨、一作炒)。鹿茸(酥炙、一作酥炒)、黃耆、各三兩。牡蠣(煨)、人參、赤石脂、厚朴、各二兩。一方無厚朴、石脂。有甘草、生薑。

制法及用法 研爲末。每服二錢。空腹時粥飲調下。

【桑螵蛸散】

發明 見衍義方。

功用 安神魂。定心志。治健忘。及勞傷心腎。致小便頻數。如糯米泔色。

藥品 桑螵蛸(鹽炙)、遠志(去心)、龍骨、石菖蒲(鹽炙)、人參、茯苓(一作茯神、去木)、龜板(醋炙、一作鼈甲)、當歸、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。臨臥時人參湯調下。

【草靈丹】

發明 見鮑和敬驗方新編。

功用 益壽。延年。添精。補髓。烏髮髮。固齒牙。強筋骨。壯氣血。治老人陽氣虛。便溺不禁。

藥品 川椒(去子、炒出汗)、茅山蒼朮(酒浸焙乾、一作米泔浸、刮去皮、飯鍋上酒煮透)、各四兩。茴香(鹽水炒)、白茯苓(去皮炒)、各二兩。川烏(去皮臍)、甘草(炙)、各一兩。熟地黃(酒浸)、山藥、各三兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸至四五十丸。空腹時溫酒送下。服後以乾食物壓之。忌食黑羊肉、鷄鵒、桃李。

【桂附地黃丸】

發明 見崔氏方。

功用 ①治命火衰而腎虛。或小便頻澀。或胞轉溺阻。或夜多瀉溺。或脚氣入腹。少腹不仁。上氣喘急。嘔吐自汗。耳鳴虛鳴。②治命火衰而脾虛。或便澹食少難化及瘡勞。或流注鶴膝遊火等症。不能消潰收斂。

藥品 熟地黃、八兩(九蒸搗碎)。乾山藥、山茱萸肉、各四兩。白茯苓(去蘆)、牡丹皮、澤瀉、各三兩。肉桂、附子(炮去皮臍)、各二兩(一作各二錢)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。尋常每日服三十丸。分兩次溫酒下。若乳母命火衰、兒飲其乳致病者。子母同服。脚氣及小便不通。則每日服五十丸。鹽湯下。

兩耳虛鳴聾聵。則每日服一百丸。並加全蝎末少許。溫酒下。以上均空腹服。服後以美膳壓之。

參考 崔氏製千金腎氣丸法。易金匱腎氣丸之桂枝爲肉桂。稱爲八味地黃丸。方中以附子肉桂。壯命門之火。熟地山茱萸。以增血益精。茯苓懷山藥。以健腸滲瀉。丹皮澤瀉。以滌血液中廢物。元陽壯。精血充。則腎強。腸滲去。則脾健。脾腎虛寒之病。固可因此而痊(若虛寒過甚、宜去丹皮澤瀉、加杜仲、牛膝、五味、鹿茸之屬)。即虛火之外浮者。亦可歸納於本原之處。誠內傷之要劑也。參看腎氣丸。又張氏醫通方。去肉桂附子。加沉香一兩。砂仁二兩。名納氣丸。治脾腎皆虛。蒸熱咳嗽。倦怠少食。如泄瀉少食者。用乾山藥末調糊代蜜爲丸。

【秘旨安神丸】

發明 見秘旨方。

功用 治心經虛熱。睡中驚悸夜啼。

藥品 人參、酸棗仁(炒)、茯神、半夏(湯泡)、各一錢。當歸(酒洗)、橘紅、赤芍藥(炒)、各七分。五味子、五粒(一作七粒)。甘草(炙)、三分。

制法及用法 研爲末。薑汁和丸。如芡實大。每服一丸。生薑湯或薄荷湯化下。

參考 此方名祕旨安神丸者。傳與磁砂安神丸。有所區別。

【茸桂百補丸】

功用 壯水培元。添精補髓。治氣血不足。諸虛百損。五勞七傷。脾胃虛弱。神困體倦。腰膝痠軟。筋骨不舒。元陽衰敗。久服延年益壽。

藥品 鹿茸、二兩。肉桂、三兩。菟絲子、枸杞子、杜仲、當歸、巴戟天、白芍藥、肉蓯蓉、各二兩。熟地黃、五兩。山茱萸肉、冬朮(炒焦)、茯神、牛膝、各三兩。人參、四兩。甘草(炙)、一兩。

制法及用法 酒拌曬乾。共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。鹽湯送下。

【海參丸】

功用 補氣。壯陽。益腎。強筋骨。健步。治腰痛、夢遺、泄精。久服填髓、種子、烏髮、黑髮、延年、益壽。

藥品 海參、一斤。全當歸(酒炒)、巴戟肉、牛膝(鹽水炒)、破故紙、龜板、鹿角膠(烱化)、枸杞子、各四兩。羊腎(去筋生打)、十對。杜仲(鹽水炒)、

菟絲子、各八兩。胡桃肉、一百個。豬脊髓、十條(去筋)。

制法及用法 共研細末。鹿角膠和丸。每服四錢。溫酒送下。

【神效虎肚丸】

發明 驗方。

功用 扶正氣。和脾胃。治反胃、噎膈、嘔吐、吞酸、飲食少進、不服水土等症。

藥品 虎肚、川厚朴、甘草(炙)、廣陳皮、各一兩。茅朮(米泔水浸)、二兩。

制法及用法 共研細末。水泛丸。如梧桐子大。每服五分。幼者三分。薑湯送下。

參考 按虎肚。即虎胃。有治反胃吐食之功。取生者勿洗。存滓穢。新瓦固煨存性。入平胃散末一兩和勻。每白湯服三錢。神效。出保壽堂方。此虎肚丸所由作也。

十一筆

【鹿角散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治色慾耗傷。及陰虛諸證。

藥品 鹿角屑、鹿茸、各一兩。茯苓、七錢五分。人參、川芎、當歸、桑螵蛸、補骨脂、龍骨

(煨)、韭子(酒浸一宿焙)、各五錢、柏子仁、甘草、各二錢五分。

制法及用法 每服五錢。加生薑五片。大棗二枚。粳米一百粒。清水煎。空腹時服。

【鹿角膠】

功用 補中。益氣。長肌。增髓。止痛。安胎。黑髮髮。強筋骨。壯腰膝。生精血。治傷中勞絕。氣弱虛損(炙搗酒服)、勞嗽。吐血。多汗淋瀝。腰痛羸瘦。四肢作痛。承精。下血。婦人血閉無子。崩中不止。漏下赤白。瘰癧瘍、腫毒、跌傷、湯火灼傷(水煎令稠、冷塗)。令人肥健悅色。久服輕身延年。

藥品 即鹿角煮爛成粉。取粉所熬成。或僅以濃汁熬成。

制法及用法 取鹿角寸截。用長流水浸三日。刮淨。入黃燂炙三日夜。乾則添水。乃去角取汁重煎。滴水不化。膠成。切片陰乾。不可日晒。晒則融化成水。一法取新角寸截。河水淨七日。刮淨。桑柴火炙七日。取汁加無灰酒熬成膏。

參考 此物性質甘平無毒。或作溫。蓋鹿爲陽獸。夏至見陰而角解。其功長於補陽。故此物入腎經。兼入心肺心包三

經。爲溫補下元之品。得火者良。杜仲爲使。畏大黃。

【鹿茸丸】

發明 見濟生方。

功用 治腎臟真陽久虛。下體痿弱。疼痛喘嗽。水泛爲痰。

藥品 鹿茸(去毛、酒炙)、牛膝(鹽酒炒)、五味子、各二兩。石斛(去根)、巴戟肉、附子(炮)、川棟肉(酒蒸)、山藥(炒)、肉桂(不見火)、杜仲(鹽酒炒)、澤瀉(鹽水炒)、各一兩。沈香(另研)、五錢。一方多白棘、菟絲子、磁石、陽起石。

制法及用法 共研細末。酒煮米糊爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。清晨溫酒送下。

【鹿茸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎虛。腰膝冷痛。夜遺小便。

藥品 鹿茸(去毛、酥炙黃)、烏賊骨(去甲、微炙)、各三兩。白芍藥、當歸、桑寄生、龍骨(另研)、人參、各一兩。桑螵蛸、一兩五錢(中劈破、慢火炙黃)。

制法及用法 研爲細末。入龍骨同研令勻。每服一錢。溫酒調下。空腹日午晚臥各一次。

【鹿茸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小便不禁。陰痿脚

弱。

藥品 鹿茸、二兩(去毛酥炙)、韭干(微炒)、羊鬍鬚(酒拌、炒乾)、附子(炮)、澤瀉、桂心、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前粥飲調下。

【參朮散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治脾虛泄瀉。及痘證虛泄。

藥品 黨參(高麗參更佳)、五錢。白朮(土炒)、一兩。白茯苓、砂仁、甘草(炙)、薏苡仁(炒)、白蓮肉(去心炒)、神麴、山楂肉、各五錢。肉豆蔻(麴裏煨熟、去麴、切細、紙包、打去油)、訶子(火內煨、去核)、廣陳皮(去筋)、各四錢。南木香、三錢。

制法及用法 共爲細末。每服二錢。空腹時米湯調下。小兒如不肯服。或調稀粥服亦可。

【參朮膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治中風虛弱。產後久瘡不愈。

藥品 人參、一兩。白朮、一斤(米泔浸一宿、剉焙)。

制法及用法 清水六碗。煎至二碗。再煎二次。共汁六碗。合在一處。將藥汁又熬成一碗。

每服半酒盞。空腹時米湯化下。產後久瘡不愈。宜與加減養胃湯相兼服之。

【參朮膏】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治癰疽、發背、等證。潰後氣血大虛。

藥品 人參、八兩(切片、用水五大碗、砂鍋內慢火熬至三碗、將渣再煎汁一碗、共用密絹濾清、復熬稠厚、益罐收貯)。白朮、地黃、各六兩(均熬同上法)。

制法及用法 諸藥熬完畢。各用瓷蓋碗盛之。置冷水中。待冷取起。蓋勿泄氣。①如患者精神短少。懶於言動。短氣自汗者。以人參膏、三匙。白朮膏、二匙。地黃膏、一匙。俱用無灰好酒一杯。燉熱化服。②如脾氣虛弱。飲食減少。或食不知味。或已食不化者。用白朮膏、三匙。人參膏、二匙。地黃膏、一匙。好熱酒化服。③如患者腰膝酸軟。腿脚無力。皮膚手足。粗澀枯槁者。用地黃膏、三匙。人參膏、白朮膏、各二匙。熱酒化服。④如氣血脾胃相等無偏勝者。三膏各二匙。熱酒化服。俱於清晨及臨睡時各進一次。自然精神強健。氣血頓充。新肉易生。瘡口易

合。無論若何危險。膿多瘡鉅。可保終無變證。如夏天炎熱。恐膏易變。則分作二次熬用。愈後能常服。可使鬚髮變黑。返老還童。功難盡述。

【參乳丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心氣不足。怔忡自汗。

藥品 人參(去蘆)、一兩。乳香、三錢(另研)。當歸、二兩。

制法及用法 共研細末。令勻。山藥黃樹爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後棗湯送下。

【參乳丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 大補氣血。

藥品 人參、人乳粉、各等分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【參香散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治諸虛百損。心氣不寧。肢體沈重。情思不樂。夜多異夢。盜汗失精。恐怖煩悸。喜怒無時。口乾咽燥。渴欲飲水。飲食減少。肌肉瘦瘠。漸成勞瘵。常服安神。守中。補

精血。調心氣。進飲食。

藥品 人參、山藥、黃耆(製)、白茯苓(去皮)、石蓮肉(去心)、白朮(煨)、各一兩。烏藥、縮砂仁、橘紅、乾薑(炮)、各五錢。丁香、南木香、檀香、各二錢五分。沈香、二錢。甘草(炙)、七錢五分。一方有熟附子、五錢。

制法及用法 剉散。每服四錢。清水一大盞。加生薑三片。大棗一枚。煎至七分。去滓。空腹時服。

【參苓白朮散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治脾胃虛弱。飲食不進。多困少氣。胸中痞滿。噫嘔腹逆。喘嗽泄瀉。大便不實及久瀉。癰疽潰後不思食者。

藥品 人參(去蘆)、一斤八兩。白茯苓(蒸去皮)、一斤。於朮、二斤(土炒)。乾山藥(炒去黑皮)、石蓮肉(炒去心)、白扁豆(去皮、薑汁浸、炒)、各一斤八兩。桔梗(炒黃)、砂仁、薏苡仁(炒)、甘草(炙)、各一斤。一方有陳皮、神麴。無桔梗。一方多陳皮。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。米湯或棗湯、熱湯、石菖蒲湯調下。或加生薑、大

棗。清水煎服。或棗肉和藥末爲丸(薑棗煎湯泛丸亦可)。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時米湯或棗湯送下。或煉蜜爲丸。如彈子大。熟湯化下。

參考 此方不寒不熱。性味和平。調理病後痢後尤宜。常服調脾悅色。順正去邪。功難盡述。

【參桂鹿茸丸】

發明 通行方。

功用 治虛損乏力。畏寒肢冷。腰膝痠軟。食減便溏等症。

藥品 別直參、五兩。炙黃耆、十兩。黨參、十兩。毛鹿茸、五兩。炙甘草、五兩。續斷、五兩。炒冬朮、十兩。茯苓、八兩。肉桂、五兩。陳皮、八兩。炒白芍、十兩。當歸、十兩。熟地、十二兩。炒遠志、十兩。枸杞子、十兩。肉蓯蓉、十兩。

制法及用法 共研細粉。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每次三錢。淡鹽湯送服。

【參茸衛生丸】

發明 通行方。

功用 治精力虧乏。遺精陽痿。頭眩耳鳴。腰膝痠軟等症。

藥品 人參、一兩。毛鹿茸、二兩。沉香、一兩。肉桂、一兩。茯苓、一兩。山藥、一兩。製首烏、一兩。肉蓯蓉、一兩。鹿

角膠、一兩。炙甘草、五錢。炒遠志、五錢。炒杜仲、一兩。巴戟肉、一兩。枸杞子、一兩。虎鞭、四兩。黃狗鞭、一兩。五錢。附子(炮去皮、製)、五錢。

制法及用法 共研細粉。以鹿角膠烊化加煉蜜爲丸。每粒潮重二錢。蠟殼同封。每次一丸。開水化服。

【參桂百補丸】

發明 驗方。

功用 治氣血不足。諸虛百損。五勞七傷。脾胃虛弱。神困體倦。腰膝痠軟。筋骨不舒。元陽衰敗。久服添精補髓。延年益壽。

藥品 潞黨參、三兩。桂圓肉、山藥、各四兩。熟地黃、八兩。白芍藥、杜仲、枸杞子、黃耆(炙)、冬朮、菟絲子、桑椹、川續斷、白茯苓、各三兩。甘草(炙)、一兩。遠志、狗脊、牛膝、酸棗仁、當歸、各二兩。一方加入參、肉桂、各一兩。

制法及用法 共研細末。桂圓肉和煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。淡鹽湯送下。

【參茸固本丸】

發明 驗方。

功用 治諸虛百損。五勞七傷。元氣不足。酸痛耳鳴。四肢痠軟。形體瘦弱。

藥品 人參、三兩。鹿茸片、白芍藥、小茴香、陳皮、於朮、各一兩五錢。黃耆(炙)、牛膝、桂心、枸杞子、各二兩。巴戟肉、菟絲子、山藥、茯神、肉苁蓉、當歸身、各三兩。熟地黃、六兩。甘草(炙)、一兩。

制法及用法 共研細末。將熟地搗爛。加煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。淡鹽湯送下。

【參麥六味丸】

發明 驗方。

功用 治肺腎並虧。咳嗽氣喘。內熱口燥。一切陰虛勞熱等症。

藥品 人參、四兩。麥門冬、三兩。熟地黃、八兩(砂仁、酒拌、九蒸九晒)。澤瀉、山茱萸肉(酒潤)、懷山藥、各四兩。茯苓(乳拌)、牡丹皮、各三兩。

制法及用法 共研細末。煉白蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【礞砂安神丸】

發明 見李東垣方。

功用 治心經血虛。心亂煩熱。頭暈氣浮。驚悸怔忡。心神顛倒。兀兀欲吐。寤寐不安。胸中氣亂而熱。有似懊惱之狀。

藥品 淨礞砂、一錢(研、水飛、一半爲衣)。黃連、一錢五分

(酒炒、一作酒洗、一作酒蒸)。甘草、五分(炙)。生地黃、當歸頭、各一錢。

制法及用法 共研極細末。酒泡蒸餅或飯糊、煉蜜爲丸。如黍米大。礞砂爲衣。每服十丸或十五丸至三十丸。臥時津液下。獨參湯或補中益氣湯送下亦可。如一二服不應。當以歸脾湯補之。

參考 心爲君主之官。主不明則精氣亂。神太勞則魂魄散。所以寤寐不安。淫邪發夢。輕則驚悸怔忡。重則癡妄顛狂。礞砂具光明之體。色赤通心。重能鎮怯。寒能勝熱。甘以生津。抑陰火之浮遊。以養上焦之元氣。爲安神之第一品。再佐黃連之苦寒以瀉之。甘草之甘平以緩之。當歸之甘溫以養之。地黃之甘寒以補之。心血足。則肝得所藏而魂自安。心熱解。則肺得其職而魄自寧也。

【逍遙散】

發明 見集成方。

功用 治婦人血虛勞倦。五心煩熱。肢體疼痛。頭目昏重。心忪煩赤。口燥咽乾。發熱盜汗。減食嗜臥。及血熱相搏。月水不調。臍腹脹痛。寒熱如瘧。大便秘澀。室女血弱陰虛。榮衛不和。痰嗽潮熱。肢體羸瘦。

漸成骨蒸。

藥品 白茯苓（一作茯神）、白朮（去蘆、土炒）、白芍藥（酒炒）、當歸（去蘆、酒浸半日、微炒）、北柴胡（去苗）、各一兩。甘草、一兩五錢（炙、一作五錢）。

制法及用法 剉散。每服三四錢。清水一盞。加煨薑三片。麥門冬二十粒（去心、一作薄荷三分）。煎至六分。去滓。不拘時熱服。①熱甚。加牡丹皮、梔子。②骨蒸。加知母、地骨皮。③咳嗽。加五味子、紫菀。④吐痰。加半夏、貝母、瓜蒌仁。⑤飲食不消。加山楂、神麴。⑥發熱。加麥門冬、天花粉。⑦胸中作熱。加黃連、梔子。⑧心慌。加遠志、棗仁。⑨吐血。加阿膠、生地黃、牡丹皮。⑩自汗。加黃耆、棗仁。⑪久瀉。加乾薑（炒黑）。⑫遍身痛。加羌活、防風、川芎。⑬手足顫掉。加防風、荆芥、薄荷。⑭氣惱胸膈痞悶。加枳實、青皮、香附。⑮怒氣傷肝。眼目昏花。加龍胆、黃連、梔子。⑯小腹痛。加香附、延胡索。⑰經閉不通。加桃仁、紅花、蘇木。⑱左腹血塊。加京三稜、蓬朮、桃仁、紅花。⑲右腹氣塊。加木香、檳榔。

【紫金丹】

發明 見魏夫人方。

功用 治男子元氣衰憊。五勞七傷。腰膝冷疼。肢體酸痛。上盛下虛。頭目暈眩。心神恍惚。血氣衰微。及中風癱瘓。手足不遂。筋骨拘攣。腰膝沉重。容枯肌瘦。目暗耳聾。口苦舌乾。飲食無味。心腎不足。精滑夢遺。膀胱疝墜。小腸淋瀝。夜多盜汗。久瀉久痢。嘔吐不食。八風五痹。一切沈寒痼冷。婦人血氣不足。崩中漏下。虛損帶下。或脈虛細。手足或冷。胎前無子。常服鎮心神。駐顏色。溫脾胃。理腰膝。除尸疰蟲毒。辟鬼魅邪癘。令人身輕。

藥品 禹餘糧（火煨醋淬、不計遍數、手撚得碎爲度）、紫石英、丁頭代赭石（如禹餘糧炮製）、赤石脂、各四兩。

制法及用法 並作小塊。入坩堝內。鹽泥固濟。候乾。用炭十斤。煨通紅火盡爲度。入地埋二宿。出火毒。次用糯米香（另研）、沒藥（去砂石研）、五靈脂（去砂石篩）、各二兩。硃砂（水飛過）、一兩。並爲細末。以糯米粉煮糊爲丸。如雞頭實大。曬乾出光。每服一丸。空腹時溫酒或冷水任下。忌食豬羊血。恐減藥力。婦人每服三

丸。醋湯送下。或芎藭、木香、煎湯。或陳皮、香附子、煎湯送下。靈砂丹亦可。治驚風、九竅出血。獨參湯送下。孕婦不可服。

【羚羊角丸】

發明 見錢乙方。

功用 補益肝腎。治小兒腎虛。或病後筋骨弱。數歲不能行。

藥品 羚羊角(尖細而節密者、剉取末)、虎脛骨(敲破、塗酥炙黃)、生乾地黃(焙)、酸棗仁(去皮炒)、白茯苓、各五錢。桂(去皮、取有味處、不見火、一作五分)、防風(去蘆頭、切焙、一作一錢)、當歸(製同上)、黃耆(切焙、一作一錢)、各二錢五分。一方無白茯苓。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如皂子大。每服一丸。見火者加之。食前溫湯化下。日三四次。久服取效。

【魚鰾種子丸】

發明 驗方。

功用 治身體虛弱。酒色過度。頭眩。耳鳴。目花。腰膝痠疼。四肢無力。自汗盜汗。下元虛損。夢遺。精滑。陽痿。或男子精寒腎虛。陽物不舉。不能久堅。元陽衰敗。或女人血寒氣弱。子宮久冷。赤白崩帶。

經水不調。久不受孕。有子者服之。亦可却病保元。

藥品 上白魚鰾、一片(牡蠣粉炒成珠、磨細)。當歸(酒洗、曬乾)、淫羊藿(去枝梗荊刺、羊油酥炙炒)、白蓮蕊(揀淨去灰)、肉蓯蓉(酒洗曬乾)、川杜仲(去皮、青鹽水炒斷絲)、菟絲子(淘淨灰土、用甜酒浸一宿、又以水養、再合酒養、成餅、曬乾)、沙苑蒺藜(皮貨店帶者爲真、碧綠猪腰形者佳、去灰土、分四股、青鹽、人乳、老酒、童便、各拌二兩、微炒)、各八兩。雲苓(去皮、切片、人乳拌蒸、曬乾)、枸杞(紅色肉厚者、揀淨去蒂)、各四兩。牛膝(肥長者佳、去蘆、切片、酒洗、曬乾)、破故紙(揀淨、青鹽水炒)、各六兩。上肉桂(去粗皮、切片、不可見火)、二兩。大附子、二個(每個重一兩四錢、去臍、切四塊、以甘草水浸七日、每日一換、至期用麴八兩、裹好、放炭火中煨熟、切片、焙乾)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每早服一百丸。鹽湯送下。晚服一百丸。陳黃酒、或甜酒送下。

參考 方中桂附二味。年老并虛弱者可用。壯實者少用。

十二筆

【黑丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治肝勞。

藥品 當歸(酒製)、鹿茸、各一兩。

制法及用法 共研細末。烏梅肉爲丸。如梧桐子大。每服五六十丸。溫酒送下。

【黑錫丹】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 升降陰陽。墜痰定喘。治真元虧損。上盛下虛。心火炎盛。腎水枯竭。三焦不和。嘔吐痰喘。冷氣刺痛。腰背沉重。男子精冷滑泄。婦人赤白帶下。血海久冷。無子。及陰症陰毒。四肢厥冷。不省人事。

藥品 黑鉛(熔去渣)、硫黃、各二兩。沈香、附子(炮)、胡蘆巴(酒浸炒)、陽起石(煨、研細、水飛)、破故紙、新上茴香(炒)、肉豆蔻(麴裏煨)、金鈴子(酒蒸、去皮核)、木香、各一兩。肉桂、五錢。一方無陽起石。一方有巴戟一兩。

制法及用法 將黑錫入鐵鉢內熔化。入硫黃如常法製。結成砂子。攤地上出火毒。研令

極細。餘藥並細末和勻。自朝至暮。研至黑光色爲度。酒麴糊丸。如梧桐子大。陰乾。藏鉛罐內。擦令光瑩。每服四五十丸。空腹時。淡鹽湯、或薑湯、大棗湯、送下。婦人艾湯送下。急症可投百丸。即能回陽。

參考 此方以火熱之硫黃和黑錫所結成之砂子爲君。諸純陽香燥之藥爲臣。以金鈴子苦寒一味爲反佐。沈香引入至陰之分爲使。凡陰火逆衝。眞陽暴脫。氣喘痰鳴之急症。用以鎮固其陽。則坎離可交於頃刻。藥肆中所謂局方黑錫丹者。即此方也。一方將黑錫鎔化。漸入硫黃。候結成片。研至無聲爲度。米糊爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。棗湯、或人參湯、米飲湯送下。治同上。藥肆中名爲二味黑錫丹。

【黑地黃丸】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治脾腎不足。房室虛損。形瘦無力。面色青黃。腸紅久痔。

藥品 蒼朮(油浸、一作白朮炒黑)、熟地黃(炒黑)、各一斤。五味子(蒸熟)、八兩。乾薑(清水浸淡)、秋冬一兩。夏五錢。春七錢。

制法及用法 研爲細末。菜肉和丸。如梧桐子大。每服一百丸。食前米飲或溫酒送下。

參考 脾惡溼。腎惡燥。方中朮地均炒黑。去其味而留其氣。去脾溼而不礙於腎。去腎燥而不礙於脾。溼去則脾健運而能攝血。血足則腎強而血得養。又以五味之酸收。乾薑之溫通。使血不下滲。而有陽生陰長之象。故以此治血虛久痔甚妙。而爲補氣益血脾腎雙補之簡易方。有謂溼勝者爲宜。血虛者。尚宜酌量加減。亦是。

【無比山藥丸】

發明 張子和方。

功用 健脾益胃。培元滋腎。治諸虛百損。五勞七傷。肌體消瘦。腰痠膝軟。目暗耳鳴。飲食無味。

藥品 山藥、三兩（一作二兩）。赤石脂（煨）、茯神（去皮木、一作茯苓）、山藥黃（去核）、熟乾地黃（酒浸）、巴戟（去心）、牛膝（去苗酒浸）、澤瀉、各一兩（一作各二兩、一作各五兩）。杜仲（去皮切、薑汁炒）、菟絲子（酒浸）、各三兩。五味子、六兩（揀、一作一兩五錢）。肉蓯蓉、四兩（酒浸一作一兩）。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三

十丸。空腹時溫酒、或鹽湯、米飲送下。禁醋蒜凍臭等物。

【無價保真丸】

發明 驗方。

功用 治一切勞損諸疾。

藥品 熟地黃（九製忌鐵）、四兩。全當歸（酒浸）、二兩五錢。川芎（酒浸炒）、杜仲（薑汁炒去絲）、白茯苓（人乳拌蒸）、各一兩五錢。甘草（酒炒）、金櫻子（酒浸、去皮子）、淫羊藿（去邊梗、酥炙或羊油炙）、各一兩。金石斛（酒製）、三兩。

制法及用法 俱用頂好燒酒製。杜仲另研爲末。同各藥末加入生白蜜。共搗一千杵。丸如梧桐子大。每服三錢。空腹時溫酒（不拘何酒）送下。

參考 此方或謂服至一月。面目光潤。半年後。返老還童。飲食房事。無異少年。百病不生。冬月手足不冷。夏月身體不熱。男子鬚髮不白。婦人能多生育。益精補髓。功效無窮。

【黃明膠】

功用 牛皮所熬之膠也。功能補陰。活血。潤燥。利大小腸。治風溼走痛等症。性味平補。宜於虛熱之人。芎阿膠難得。亦可以此概用。

【黃耆散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人熱勞羸瘦。四肢煩疼。心躁口乾。不欲飲食。

藥品 黃耆、一兩。人參、黃牛、當歸、各七錢五分。北柴胡(去皮)、一兩五錢。地骨皮、赤茯苓、麥門冬(去心)、生地黃、赤芍藥、各一兩。甘草(炙)、一錢五分。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一盞。加生薑五片。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【黃耆膏】

功用 補中益氣。固胃調營。即黃耆根熬膏服。

【黃連散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人骨蒸勞熱。四體昏沈。背膊疼痛。面色痿黃。漸漸無力者。

藥品 黃連(去鬚)、知母、各一兩。鼈甲(醋炙)、二兩。柴胡、木通、各一兩五錢。麥門冬(去心)、白朮、地骨皮、黃芩、犀角屑、各七錢五分。龍膽草(去蘆)、甘草(炙微赤)、各五錢。

制法及用法 研為粗散。每服四錢。清水一中盞。加生薑一錢。大淡竹葉二十七片。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【勝金丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治男子五勞七傷。積年手足麻痺。半身不遂。婦人崩中帶下。子宮虛冷不育。死胎不下。產後諸疾。

藥品 人參、白芍藥、赤芍藥、川芎、牡丹皮、各一兩五錢。茯苓、肉桂、牛膝、各二兩五錢。當歸、白薇、各四兩。蘗本、三兩。

制法及用法 共合一處。酒浸一日。井水淘出。焙末。加四製香附末、一斤。熟地黃、四兩。打和一處。再入赤石脂、白石脂、各二兩。乳香、沒藥、各一兩。琥珀、硃砂、各五錢。煉蜜為丸。如梧桐子大。金箔為衣。每服二十丸。溫酒送下。虛勞婦人。臨產服之尤宜。

【斑龍丸】

發明 見醫統方。

功用 壯精神。除百病。養血氣。補百損。育子嗣。常服延年益壽。

藥品 鹿角霜、鹿角膠、菟絲子(製為)、柏子仁、熟地黃、各八兩。白茯苓、補骨脂、各四兩。

制法及用法 將膠先溶化。量入無灰酒。打糊為丸。如梧桐子大。每服六七十丸。空腹時。鹽湯或溫酒送下。

【斑龍二至百補丸】

發明 驗方。

功用 固本保元。生精養血。補虛損。益五臟。除骨蒸。壯元陽。充內脈。強筋骨。美顏色。久服延齡益壽。聰耳明目。黑潤鬚鬚。

藥品 鹿角、五十兩(新取連腦骨者佳、鋸二寸長、長流水洗、米泔浸一宿、刷洗淨、晒乾)。黃精、八兩。枸杞子、熟地黃、菟絲子(熱水淘)、金櫻子(去毛子)、各四兩。牛膝(酒洗)、天門冬(去心)、麥門冬(去心)、楮實子(水洗)、各二兩。龍眼肉、一兩。

制法及用法 同角和勻。入淨罈內。層層放實。用新汲淡水注罈中平肩。以密綾布四層封口。以新磚壓之。置大鍋中井字架上。以木甑蓋好。重湯煮三日夜。不可間斷火候。旁用小鍋燒滾水。不時添注罈內。並鍋內。勿使乾涸。日足取起。濾去滓。將汁用絹絞出。入淨沙鍋內。文火熬成膏。約一斤八兩。再煉蜜二斤。滴水成珠攪入。和鹿角霜、十兩。人參、五兩。綿黃耆(蜜炒)、茯苓、白茯苓(去皮)、淮山藥(炒)、山茱萸肉(鹽水洗過)、生地黃(酒洗、飯上蒸過)、知母(鹽水炒)、各四兩。五味子(去梗)、一兩。夏月加川黃蘗四兩(炒褐色)。

研為細末。用前膏和勻成塊。石臼木杵。杵千餘下為丸。如梧桐子大。每服八十丸。空腹時鹽湯送下。隨用煮熟蓮子肉或晒乾棗子數枚以壓之。

【脾腎雙補丸】

發明 驗方。

功用 治脾腎虛寒。發泄瀉。或酒溼傷脾。飲食嘔惡。

藥品 人參(一作一兩五錢)、山茱萸肉(煨、一作一兩五錢)、山藥(炒、一作一兩八錢)、破故紙(鹽水浸二日、一作一兩)、蓮子肉(炒、一作一兩八錢)、各一兩六錢。巴戟肉(甘草汁煮、一作一兩五錢)、車前子(米泔水洗、一作一兩)、各一兩二錢。肉果(煨、一作一兩五錢)、一兩。兔絲子(一作二兩)、五味子(蜜蒸、一作一兩)、各二兩四錢。廣陳皮(去白、一作八錢)、縮砂仁、各六錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜、或神麴煮糊為丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【琥珀多寐丸】

發明 驗方。

功用 治心血不足。腎氣虧損。致怔忡健忘。寤寐不安。心忡恍惚。

藥品 琥珀、黨參、茯苓、遠志肉、羚羊角、甘草、各一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。燈心湯送下。

【腎氣丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治腎氣不化。小便瀉數。

藥品 熟地黃、四兩。茯苓、三兩。山藥、山茱萸、各二兩。丹皮、澤瀉、各一兩五錢。牛膝、車前、各一兩。附子、肉桂、各五錢。

制法及用法 共爲細末。煉白蜜爲丸。每服十五丸。空腹時淡鹽湯送下。一日三次。

參考 此方專爲健利腎臟之機能而設。用千金腎氣丸法。減熟地以防膩。減山藥山茱萸以免瀉。加車前牛膝以導竅。於蒸化之外。尤重利水。但牛膝滑精。精不固者勿用。本方加砂仁、補骨脂、益智仁。名脾腎丸。治老人因虛衰而致喘者。出嵩崖尊生書方。

【腎氣丸】

發明 見張仲景金匱要略。

功用 治虛勞腰痛。及男子消渴小便多。婦人轉胞不得溺。

藥品 熟乾地黃、八兩。山藥、山茱萸、各四兩。茯苓、丹皮、澤瀉、各三兩。附子、一枚(炮)。桂枝、一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。溫酒送下。日再服。

參考 此方以熟地、山藥。滋腎臟之陰。山黃、附子。壯腎臟之陽。桂枝化肺氣。茯苓行水道。丹皮、澤瀉。以排除血液中毒質。使腎臟之機能健。則小便之多者能少。秘者可通。腎臟之精血充。則虛損可除。而腰痛可止。

【腎氣丸】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治虛勞不足諸證。

藥品 乾地黃、八兩。山茱萸、山藥、各四兩。澤瀉、丹皮、茯苓、各三兩。桂心、附子、各二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。溫酒送下。日再服。

參考 此方改金匱方之桂枝爲桂心。易表散爲溫下。純爲溫補下元之劑。故於肝腎虛勞最對證。崔氏改桂心爲肉桂。而八味丸之功用大著。實抄襲此方也。參看八味地黃丸條。

【湧泉膏】

發明 驗方。

功用 治下元虛損。五勞七

傷。咳嗽喘氣急。左癱右換。手足麻木。筋骨疼痛。腰脚軟弱。肚腹受寒。男子遺精白濁。婦人赤白帶下。

藥品 海龍、一對(雄黑雌黃、長尺餘者佳、如無、用海馬亦可、終不如海龍之妙)。生附子、一個(重一兩五錢、切去蘆頭、熱童便、甘草水、各浸一日、洗淨)。零陵香、大片穿山甲、鉅湯、各三錢。

制法及用法 將各藥切碎。用香麻油一斤四兩。將藥浸入。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。然後用木炭火熬至藥枯。去淨渣。將油再熬。至將要滴水成珠時。秤準分兩。每油一斤。加黃丹(飛淨)、六兩五錢。小火熬至滴水成珠。用撓枝不住手攪動。再下製陽起石末、麝香末、各五錢。冬蟲夏草末、野高麗參末、川椒末、母丁香末。各三錢。攪極勻。埋入土內七日。去火毒。每用膏三分。攤如錢大。貼兩足心。十日一換。不可間斷。五十歲內外貼之。方見功效。若少年無病者貼之。足心作癢起泡。反無益也。

【菟絲子散】

發明 證治準繩方。

功用 治腎虛、小便多或不禁。

藥品 菟絲子、二兩(酒浸三日曬乾另研)。牡蠣(煅粉)、五味子、附子(炮去皮臍)、各一兩。雞距頭(去黃皮微炒)、肉苁蓉(酒浸炙黃)、各二兩(一方有杜仲無附子)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。熱湯調下。

【菟絲子丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治腎氣虛損。五勞七傷。脚膝痠痛。面色黧黑。目眩耳鳴。心中氣短。時有盜汗。小便滑數。

藥品 菟絲子(酒洗製)、嫩鹿茸(酥炙去毛)、澤瀉、石龍芮(去土尖)、附子(炮去皮)、肉桂、各一兩。石斛(去根)、熟地黄、牛膝(酒浸焙)、白茯苓、山茱萸肉、續斷、防風、肉苁蓉(酒洗焙)、川杜仲(製)、補骨脂(去毛酒炒)、菟澄茄、巴戟肉、沉香、茴香(炒)、各七錢五分。五味子、川芎、桑螵蛸(酒浸炒)、覆盆子、各五錢。

制法及用法 上藥二十四味。在白內共研爲細末。酒浸麵糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。溫酒或淡鹽湯送下。

【菟絲子丸】

發明 見沈金鑑次氏尊生

書。

功用 治腎虛精少。

藥品 菟絲子、山藥、蓮肉、茯苓、杞子。

制法及用法 共研爲末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。用熟湯送下。

【菟絲子丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 添精。補髓。治腎氣虛損。五勞七傷。面色黧黑。目眩耳鳴。心悸氣短。遺泄盜汗。脚膝痠痛。小便不禁。陽物不興。久無子嗣。

藥品 菟絲子、肉苁蓉、鹿茸、各二兩。香附(製)、五味子、各一兩。桑螵蛸、雞內金、各五錢。

制法及用法 共研爲末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服四錢。鹽湯送下。

【陽起石丸】

發明 見沈氏尊生書方。

功用 治精清精冷無子。

藥品 陽起石(煨另研)、菟絲子(酒製)、鹿茸(酒蒸焙乾另研)、天雄(炮)、韭子(炒)、菟蓉(酒製)、各一兩。覆盆子(酒浸)、桑寄生、石斛、沉香、原蠶蛾(酒炙)、五味子、各五錢。

制法及用法 共研細末。酒煮糯米糊爲丸。如梧桐子大。每

服三四錢。空腹時鹽湯送下。

【陽起石丸】

發明 見沈氏尊生書方。

功用 治色慾傷之屬於虛寒者。

藥品 陽起石(煨)、鍾乳粉、各等分。附子大、減半(酒製)。

制法及用法 共研細末。水雀麵糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時米飲送下。以愈爲度。

十三筆

【補天丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治氣血衰弱。六脈細數。虛勞之症。

藥品 紫河車、一具。黃蘗(酒炒)、龜版(酥炙)、各三兩。杜仲(薑汁炒)、牛膝(酒浸)、各二兩。陳皮、一兩。冬加乾薑、五錢。夏加炒五味子、一兩。

制法及用法 酒糊爲丸用。

參考 此即河車大造丸加陳皮而除肺家藥。蓋彼治肺腎虛損。此治腎損。

【補火丸】

發明 見驗方。

功用 治冷勞氣血枯竭。肉瘠齒落。肢倦言微。

藥品 石硫黃、一斤。豬大腸、二三尺。

制法及用法 將硫黃爲末。置腸中。燻養三時。取出。去皮。蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服十丸。熱湯送下。日漸加之。

【補心丸】

發明 秘方。

功用 治心虛怔忡。

藥品 川芎、全當歸(酒洗)、生地黄、各一兩五錢。人參、甘草、各一兩。遠志(去心)、二兩五錢。酸棗仁(炒)、柏子仁(去油)、各三兩。金箔、二十片。麝香、一錢。琥珀、三錢。茯神(去皮木)、七錢。硃砂(另研)、牛胆南星、各五錢。石菖蒲、六錢。

制法及用法 共研細末。蒸餅糊爲丸。如綠豆大。硃砂爲衣。每服七八十丸。津唾嚥下。或荏湯送下。

【補心丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治讀書傷心。

藥品 人參、丹參、玄參、天門冬、麥門冬、生地黄、茯神、遠志、酸棗仁、當歸、硃砂、菖蒲、桔梗、柏子仁、五味子。

制法及用法 研爲細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【補肝丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治肝虛。

藥品 川芎、當歸、白芍藥、生地黄、防風、羌活。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【補肝散】

發明 見滑伯仁方。

功用 治肝腎氣血虧損。頭眩寒熱。脅脹痛。身痛。經候不調。

藥品 山茱萸肉、當歸、五味子(炒杵)、山藥、黃耆(炒)、川芎、木瓜、各五錢。熟地黄(自製)、白朮(炒)、各一錢。獨活、酸棗仁(炒)、各四錢(一作各四兩)。

制法及用法 研爲末。每服五錢。加大棗。清水煎服。

【補肝散】

發明 見滑伯仁方。

功用 溫中。行滯。和血。消積。

藥品 山茱萸、柏心、薯蕷、天雄、茯苓、人參、各五分。川芎、白朮、獨活、五加皮、大黃、各七分。橘皮、三分。防風、乾薑、丹參、厚朴、細辛、桔梗、各一兩五錢。甘草、菊花、各一兩。貫衆、五錢。陳麥麴、大麥蘖、

各一升。

制法及用法 研爲末。每服方寸匕。溫酒調下。一日二次。若食不消。食後服。若止痛。食前服。

【補肝散】

發明 見傅青主生化綱方。

功用 治產後肝經血虛。氣滯脅痛。

藥品 山茱萸、當歸、各二錢。五倍子、十粒。黃耆、獨活、各八分。川芎、六分。熟地黃、一錢五分。木瓜、白朮、酸棗仁、各一錢。

制法及用法 加生薑一片。清水煎服。

【補宮丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人諸虛不足。久不妊娠。骨熱形羸。崩中帶下。

藥品 白薇、牡蠣、白芍藥、鹿角霜、山藥、白朮、白茯苓、烏鰂魚骨、白芷、各等分。

制法及用法 共研細末。麵糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時米飲送下。

【補陰丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治腎火。咳血。

藥品 煅龜版(酒炙)、黃蘗(酒炒)、知母、側柏葉、枸杞子、五味子、杜仲(薑汁炒、去絲)、

砂仁、各等分。甘草、減半。

制法及用法 共研末。豬脊鹽加地黃膏爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。熱湯送下。

【補陰丸】

發明 見王肯堂方。

功用 治腎火、咳血。

藥品 黃蘗(鹽酒拌炒)、知母(鹽酒拌炒)、熟地黃、龜版(酥炙)、各四兩。白芍藥(煨)、陳皮、牛膝(酒浸)、各二兩。虎骨(酥炙)、續斷(酒浸、酥炙)、當歸(酒洗)、各一兩五錢。乾薑、五錢五分(冬月加之)。

制法及用法 共研末。酒煮羯羊肉爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。鹽湯送下。

【補腎丸】

發明 見傅仁宇眼科審視瑤函方。

功用 治神水將枯。

藥品 厚杜仲(薑汁炒)、牛膝(酒洗)、陳皮、各二兩。黃蘗(鹽水炒)、龜版(酥製)、各四兩。五味子、一兩(焙乾、夏月加之)。乾薑、五錢(炒、冬月加之)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時鹽湯送下。

【補腎丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治黑風不足證。

藥品 熟地黃、澤瀉、菟絲子、山藥、菟絲子、各一兩。五味子、細辛、各三錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二錢。空腹時鹽湯送下。

【補腎丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治腎水不足。

藥品 龜版(酒製)、四兩。黃蘗(酒製)、知母(酒製)、各三兩。乾薑、一錢。

制法及用法 共研細末。米糊爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。空腹時鹽湯送下。

參考 方名補腎者甚多。此方專滋腎中之陰。藥肆中稱滋陰補腎丸者。殆即此也。餘不盡述。

【補腎丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治陰火。

藥品 熟地黃、菟絲子、各八兩。當歸身、三兩五錢。肉蓯蓉、五兩。山茱萸、二兩五錢。知母、黃蘗(均酒製)、各一兩。補骨脂、五錢。

制法及用法 共研細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服三

四錢。空腹時鹽湯送下。

【補天大造丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 壯元陽。滋腎水。治房室過度。五心煩熱。虛勞不足。久服延年益壽。

藥品 紫河車、一具(製)。熟地黃、當歸(酒製)、茴香(酒製)、黃蘗(酒製)、白朮、各二兩。生地黃(酒炒)、牛膝(酒製)、天門冬、麥門冬、杜仲、各一兩五錢。五味子、枸杞子、各七錢。陳皮、乾薑、各二錢。側柏葉(向東枝者、焙)、二兩。

制法及用法 共研細末。紫河車搗泥爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。米飲或溫酒送下。一日二次。

參考 此方壯陽滋腎。有天地交泰之妙。

【補天大造丸】

發明 見吳球方。

功用 治諸虛百損。五勞七傷。陰精乾涸。陽事痿弱。久服生精。養血。益氣。安神。順暢三焦。培填五臟。聰耳。明目。益智。寧神。烏鬚。黑髮。固齒。牢牙。潤肌膚。壯筋骨。除腰痛。健步履。卻諸病。

藥品 紫河車、一具(長流水

洗淨、用烏鉛匣、拌蜂蜜八兩、藏入匣中、仍將匣口烙沒、隔水煮一炷香、候冷開出、石臼中搗爛、拌入諸藥末中、搗千下、烘脆重壓。鼈鹿茸(酥炙)、虎脛骨(酥炙)、大龜版(炙酥)、補骨脂(鹽酒拌炒)、各二兩。懷生地(九蒸九晒)、八兩。懷山藥、山茱萸(酒洗、去核)、枸杞子、當歸身(酒洗)、各四兩。白茯苓(乳拌三次、晒乾)、澤瀉(去毛)、牡丹皮(去骨、陳酒洗)、天門冬、麥門冬(均去心)、遼五味、菟絲子(酒煮)、懷牛膝(去蘊、酒洗)、川杜仲(去皮酒炒)、淡荊蓉(酒浸)、各三兩(加入參尤妙)。

制法及用法 共磨細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。空腹時溫酒或鹽湯送下。

參考 此方不寒不燥。有奪造化之奇功。爲補身體之聖藥。

【滋腎丸】

發明 見李東垣方。

功用 治下焦陰虛。脚膝軟弱。陰汗陰痿。足熱不能履地。及熱在血分。不渴而小便濇痛。肚腹腫脹。或皮膚脹裂。或神水將枯。眼瞳突出。及腎虛發熱。作渴便赤。

藥品 黃蘗(酒洗焙、一作酒

拌、炒焦、一作鹽水製)、知母(酒洗焙、一作酒拌、炒焦、一作酒浸、炒、一作鹽水炒製)、各二兩。肉桂(去粗皮)、二錢。

制法及用法 共研細末。熬水或煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三五丸至一二百丸。空腹時百沸湯或鹽湯送下。

參考 小便屬於膀胱。其經閉之因有二。口渴者。熱在上焦氣分。病屬於肺。不渴者。熱在下焦血分。病屬於腎。此方以黃蘗之苦寒。清腎中之伏熱。補水潤燥。故以爲君。以知母之苦寒。滋肺經之化源。瀉腎火。故以爲佐。而以肉桂之辛溫引之。服後覺前陰若刀刺火燒。溺如湧泉。則膀胱之氣化矣。故曰通關。此方原爲肺痿聲嘶喉痹咳血煩躁而設。東垣借用以治癰閉喘脹。總之此方爲治下焦陰虛補水之良劑。腎之陰虛。則溼熱壅於下焦。而脚膝軟弱。陰痿陰汗。衝脈起於三陰之交。直衝而上至膈。水不制火。故氣逆而喘。肺痿聲嘶喉痹咳血煩躁等。皆腎之陰虛所致。故原方名爲滋腎丸。

【滋陰百補丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治婦人諸虛百損。五勞七傷。陰陽不和。乍寒乍熱。心腹疼痛。不思飲食。羸弱無力。

藥品 香附、一斤(用酒、醋、鹽、蜜便、浸各四兩、焙)。益母草、八兩。當歸(酒洗)、六兩。熟地黃(薑汁炒)、川芎、白朮、各四兩。白芍藥、三兩。延胡索、人參、茯苓、各二兩。甘草(炙)、一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五六十丸。鹽湯送下。

【滋陰百補丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治男婦陰虛。五心煩躁。骨蒸內熱。四肢無力。困倦羸瘦。自汗盜汗。遺精白濁。五淋帶下。

藥品 熟地黃、八兩。牡丹皮、澤瀉、各三兩。山茱萸肉、山藥、龜版(炙)、各四兩。知母、茯苓、黃蘗、各二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。鹽湯送下。

【滋陰地黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎虛不足。兩耳虛鳴。膿汗不乾。

藥品 熟地黃、一兩。山茱

萸、五錢。白茯苓、甘菊花、牡丹皮、何首烏(黑豆蒸三次)、黃蘗、各四錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三五十丸。熱湯送下。

【滋陰地黃丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 生津。養血。

藥品 熟地黃、四兩。山茱萸、山藥、天門冬、麥門冬、生地黃、知母、貝母、當歸、香附、各二兩。茯苓、牡丹皮、澤瀉、各一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三五十丸。熱湯送下。

【滋補大力丸】

發明 驗方。

功用 治五勞衰弱。諸虛百損。七情內傷。久服健脾胃。進飲食。長肌肉。益精髓。堅筋骨。增膂力。

藥品 大熟地、四兩。酸棗仁、菟絲餅、冬朮(炒)、山茱萸肉、龜板(炙)、茯苓(人乳汁製)、枸杞子、川杜仲、山藥(人乳汁製)、各二兩。全當歸、七兩(一作七錢)。地龍(酒浸洗)、五錢。虎骨、三兩(炙、一作二兩)。地龍蟲(炙)、二十隻。白

芍藥、覆盆子、自然銅(煨)、淡荊蓉、破故紙、各一兩。青鹽、乳香、沒藥、各三錢。

制法及用法 用大鱈魚一條(約重一斤)。酒水各半。煮爛去骨。和藥末。加煉白蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。空腹時熱湯送下。

【溫中丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治婦人衝任虛損。血氣虧傷。月水斷續。腹中疝痛。寒熱煩壅。咽燥舌乾。心神忪悸。頭目眩暈。肢體倦怠。腰背引痛。筋脈拘急。帶下赤白。

藥品 生地黃、生薑、各一斤(均切碎、各研取汁、將薑汁炒地黃渣、再將地黃汁炒生薑渣)。白芍藥、二兩。人參(去蘆)、蒲黃(炒)、當歸(酒洗)、琥珀(另研)、白茯苓(去皮)、黃耆(蜜炙)、延胡索(炒)、麥門冬(去心)、烏梅肉(焙)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。另用白艾葉一斤。清水一斗。煎取濃汁。熬成膏。和前藥爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹食前。溫米飲送下。

【葆真丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 起陰。發陽。安魂。定魄。健脾。固腎。去冷。除風。安五臟。強筋骨。益精髓。消積聚。治九醜、五勞、七傷、心胸伏熱、腎精虛寒。不能生育。常服明目。輕身。延年。

藥品 鹿角膠、八兩(剉如豆大、以鹿角霜拌炒成珠)。杜仲、三兩(去粗皮、切碎、用生薑汁一兩、同蜜少許、拌炒斷絲、一作鹽水拌炒)。乾山藥(微焙)、白茯苓(去粗皮、人乳汁拌蒸、晒乾、凡五七天)、熟地黃、各二兩(一作各三兩)。菟絲子(酒蒸、揅、焙乾)、山茱萸肉(一作三兩)、各一兩五錢。北五味子、川牛膝(去蘆酒蒸)、益智仁(去壳、鹽水拌炒)、遠志(泔煮、去骨、一作甘草湯泡去骨)、小茴香(青鹽三錢同炒)、川楝子(去皮核、取淨肉、酥炙、一作酒煮)、川巴戟(酒浸、去心、一作酒炒)、破故紙、胡蘆巴(同破故紙入羊膠內、煮汁盡爲度、焙乾、一作羊腎)、各一兩。柏子仁(去壳、另研如泥)、五錢。穿山甲(酥炙)、沉香(另研爲細末、勿見火、一作五錢)、各三錢。全蠍(去毒)、一錢五分。一方無菟絲子、川牛膝、小茴香、柏子仁、穿山甲、全蠍。一方無川楝子、穿山甲、沉香、全蠍。有

龜板膠、四兩。續斷、枸杞子、枳殼、各一兩。石菖蒲、五錢。

制法及用法 研爲極細末。以好嫩肉苁蓉四兩。酒洗。去鱗甲皮垢。切開。心有黃白膜去之。取淨二兩。好酒煮爛。搗如糊。同煉蜜和藥木杵勻爲丸。如梧桐子大。每服五七十丸。漸加至一百丸。空腹時淡秋石湯或溫酒送下。以乾美物壓之。精薄者。加鱘膠六兩。服七日。四肢光澤。脣赤色。手足溫和。面目滋潤。消食開胃。和氣輕身。語言清亮。是其效也。

參考 此方不用桂附助陽壯火。純用溫養精血之品。獨以沉香益智。散其氤氲。又以棟子抑其陽氣。引諸陽藥歸宿下元。深得廣嗣之旨。

【資生丸】

發明 見繆仲淳方。

功用 健脾。開胃。消食。止瀉。調和臟腑。滋養營衛。治妊娠三月。脾虛嘔吐。或胎滑不固。小兒疳夏。神疲便溏。不思飲食。

藥品 白朮(米泔水浸)、用山黃土拌蒸九次、晒九次、去土、切片焙乾)、人參(去蘆、人乳汁浸透、飯鍋上蒸熟)、潞菖仁(淘淨、炒、一作一兩五錢)、

各三兩。白茯苓(去粗皮、水飛、去筋膜、人乳汁拌、飯鍋上蒸熟、晒乾)、一兩五錢(一作二兩)。山查肉(蒸、一作一兩五錢)、橘紅、神麴(炒)、各二兩。川黃連(薑汁炒、一作四錢)、白豆蔻仁(微炒、一作八錢)、澤瀉(去毛炒)、各三錢五分。桔梗(米泔浸炒)、藿香(洗)、甘草(蜜炙、去皮)、各五錢(一作各一兩)。白扁豆(炒、去殼、一作一兩五錢)。蓮肉(去心、一作二兩)、各一兩。乾山藥(炒、一作二兩)、麥芽(炒、一作二兩)、芡實(淨肉炒)、各一兩五錢。一方無澤瀉。有砂仁、一兩五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。常服每丸重二錢。婦人如彈子大。尋常每服一丸。醉飽後二丸。淡薑湯送下。婦人每服二丸。米飲送下。

參考 此方以參、朮、茯、草、蓮、芡、山藥、扁豆、薏苡之甘平補脾元。陳皮、麴、蘖、砂、蔻、藿、桔之辛香調胃氣。如有溼熱。則以黃連清之燥之。既無參苓白朮散之補滯。又無香砂枳朮丸之燥消。能補能運。臻於至和。於以固胎。永無滑墮。平人服之。亦有調中養胃之益。

十四筆

【遠志丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治因事有所大驚，夢寐不寧。登高涉險。神不守舍。心志恐慌。及心腎不足。夢遺滑精。

藥品 遠志(甘草湯泡、去骨)、石菖蒲、各五錢。茯神(去皮木)、白茯苓(一作棗仁)、人參、龍涎(醋煨飛)、各一兩。硃砂、五錢(水飛、一半爲衣)。

制法及用法 共研細末。煉白蜜爲丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服五十丸至七十丸。空腹時沸湯、臨臥溫酒送下。精斂不守者。加五味子、五錢。傷事不舉者。加山藥、山茱萸肉、各一兩。肉桂、五錢。自汗不時者。倍棗仁。加黃耆、一兩。

【毓麟丸】

發明 驗方。

功用 種子。

藥品 新棉花仁(去壳、取白色肉十二兩、用秋石二兩四錢化水、拌入花仁、酒煮、蒸黑用)、一斤八兩。大熟地黃、十二兩(清水煮爛、加砂仁四兩、陳酒一斤、貯瓶內、隔水煮三日、取出晒乾)。枸杞子、八兩。魚鱔膠、沙苑蒺藜、各六兩。牛

膝(酒炒)、川萵藜(酒炒)、麥門冬、全當歸、各四兩。補骨脂(桃肉炒)、五味子、梔實子(酒炒)、各二兩五錢。川杜仲、柏子仁(去油)、各三兩。茯苓(人乳拌蒸)、五錢。

制法及用法 微火焙乾。共研細末。用內外羊腎膜四件。酒蒸爛。打和藥末。重加煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。溫酒或鹽湯送下。一日三次。婦人帶下。去牛膝。加覆盆子(酒浸一日)、二兩五錢。

十五筆

【熟地黃丸】

發明 見李東垣方。

功用 治血弱陰虛。不能養心。心火旺盛。肝木自實。瞳子散大。咳嗽眩暈。

藥品 熟地黃、一兩(一作五錢)。柴胡、八錢(去苗、一作三錢)。當歸身(酒洗)、黃芩(酒炒、一作三錢、一作六錢)、各五錢。生地黃、七錢五分(酒浸、焙、一作一兩五錢)。五味子、天門冬(去心焙)、地骨皮(一作二錢)、黃連(酒炒、一作一兩)、各三錢。人參(一作一兩)、枳殼(炒、一作三錢)、甘草(炙、一作三錢)、各二錢。

制法及用法 共研細末。煉

蜜爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。食後茶湯送下。一日三次。大忌辛辣寒冷等物。

參考 此方主治以緩。緩則治其本也。故以黃芩、黃連苦寒。除邪氣之盛爲君。當歸身辛溫。生熟地黃苦甘寒。養血涼血爲臣。五味子酸寒。體輕浮上。收神水之散大。人參、甘草、地骨皮、天門冬、枳殼、苦甘寒。瀉熱補氣爲佐。柴胡引用爲使。亡血過多之病而有熱者。亦甚相宜。

【熟地黃丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 補肝腎。

藥品 熟地黃、金石斛、菟絲子、防風、羌活子、車前子、黃耆、覆盆子、肉蓯蓉、地膚子、磁石(煅)、各一兩。兔肝、一具(炙乾)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。空腹時鹽湯送下。

【從蓉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治老年健忘。

藥品 肉從蓉(酒浸)、續斷、各二錢五分。遠志(去心)、石菖蒲、白茯苓(去皮)、各七錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後溫酒調下。

【震靈丹】

發明 見南嶽魏夫人方。

功用 治男子真元衰憊。五勞七傷。脾腹冷疼。肢體痠痛。上盛下虛。頭目眩暈。心神恍惚。血氣衰微。及中風癱瘓。手足不遂。筋骨拘攣。腰膝沉重。容枯肌瘦。目暗耳聾。口苦舌乾。飲食無味。心腎不足。精滑夢遺。膀胱疝墜。小腸淋瀝。夜多盜汗。久瀉久痢。嘔吐不食。八風五痺。一切沉寒痼冷。婦人血氣不足。崩中漏下。虛損帶下。或脈虛細。手足或冷。胎前無子。常服鎮心神。駐顏色。溫脾胃。理腰膝。除尸疰蟲毒。辟鬼魅邪癘。令人身輕。

藥品 禹餘糧(火煅醋淬、不計遍數、手搥得碎爲度)、紫石英、丁頭代諸石(如禹餘糧炮製)、赤石脂、各四兩。

制法及用法 並作小塊。入坩堝內。鹽泥固濟。候乾。乃炭十斤。煨通紅火盡爲度。入地埋二宿。出火毒。次用滴乳香(另研)、沒藥(去砂石研)、五靈脂(去砂石篩)、各二兩。硃砂(水飛淨)、一兩。並爲細末。以糯米粉煮糊爲丸。如雞頭實

火。晒乾出光。每服一丸。空腹時溫酒或冷水任下。忌食豬羊血。恐減藥力。婦人每服三丸。醋湯送下。或芍藥、木香煎湯。或陳皮、香附子煎湯送下。鱉砂丹亦可。治驚風、九竅出血。獨參湯送下。孕婦不可服。

十六筆

【龜版膠】

功用 理血。補心腎。治痿癱。心悸。浮敗。血弱。什蒸。勞復。陰虧。腰酸。骨痛(酒化、同鹿角膠服)。瘧疾。久痢。下血。脫肛。五痔(酒化同黃耆煎服)。婦人經痛。血崩。漏下。陰蝕。難產(酒化、同當歸炭、血餘炭、布包煎服、可以催生)。產後血痢。瘀血毒初起。

藥品 採取陳年水龜版。

制法及用法 洗淨搥碎。酒炙。水浸三日。用桑柴火熬製即成。服時均須用酒化。否則腥味難堪。易於敗胃。

參考 性質與水龜甲膠同。用於陰虛陽亢之症。較龜版尤良。

【龜鹿二仙膠】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 大補精氣。益氣養神。治視物不清。

藥品 龜版、自敗者五斤。鹿角、鹿者十斤。枸杞子、一斤十四兩、人參(另末)、十五兩。一方有桂元肉。

制法及用法 龜版擊碎。鹿角敲碎。浸長流水中三月。刮去垢。入砂鍋。以河水慢火。桑柴煮三晝夜。不可斷火。常添淡水。至三日取出。晒乾。碾爲末。另用河水。將末並枸杞、人參。復煮一晝夜。濾去滓。再慢火熬成膏。瓷瓶收貯。初服一錢五分。漸加至三錢。空腹時無灰酒化下。

參考 人生以精氣神爲本。精傷無以從氣。氣傷無以生神。補精以味爲主。鹿爲陽氣最全。善通督脈。精強充足。故能多淫而壽。龜得陰氣最足。善通任脈。其氣最堅。故能伏息而壽。二者氣血之品。味最純厚。兼以人參益氣。枸杞生精。佐龜鹿以補陰補陽。無偏勝之憂。入氣入血。有和平之美。由是精生而氣旺。氣旺而神昌。庶幾龜鹿之壽。故有二仙之稱。

【豬肚丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人熱勞羸瘦。

藥品 北柴胡、赤茯苓、人參、黃耆、各一兩。黃連、三兩。

地骨皮、木香、各五錢。桃仁、鼈甲、各一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。用好嫩豬肚一枚。洗淨。將藥末入豬肚內。以綫縫合。蒸令爛熟。於砂盆內研如膏。丸如梧桐子大。每服三十丸。食前粥飲送下。午食前再服。

【豬肚丸】

發明 見孫允賢永類鈴方。

功用 治骨蒸勞。唇頰赤。氣粗口乾。肚熱盜汗。大腸秘澀。小便赤黃。飲食減少。

藥品 石膏、鼈甲(醋炙)、北柴胡、木香、生乾地黃、各一兩。青皮、五錢。官運、二兩。

制法及用法 研爲細末。以豬肚一個。洗淨。入藥在內。縛定。蒸令極爛。研如泥爲丸。如綠豆大。每服十五丸。空腹時熱湯送下。每日三次。忌食溼麪等物。

十七筆

【還少丹】

發明 見楊氏方。

功用 大補心、腎、脾、胃、四經虛損。治精血不足。精髓不固。飲食不進。發熱盜汗。牙齒浮腫。神衰力弱。腰痠體倦。久服輕身還童。婦人服之。澤容顏。暖子宮。去一切病。

藥品 與打老兒丸同。惟無續斷、分量亦少異。石菖蒲、熟地、枸杞子、各五分。餘各一兩。至山藥、牛膝、比餘藥均多三倍。

制法及用法 共研細末。煉白蜜、同紅棗肉爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。至五七十丸。清晨鹽湯、臥時溫酒送下。一日三次。

參考 此方服五日。覺身力十日精神爽。半月氣壯。二十日日明。一月夜思飲食。冬日手足常暖。如熱。加梔子一兩。心氣不寧。加麥門冬一兩。精神短少。加五味子一兩。陽弱。加續斷一兩。精滑。去牛膝加續斷二兩。

【濟陰丸】

發明 見沙圖穆蘇瑞竹堂經驗方。

功用 治婦人血虛挾火。子宮乾澀。不能孕。久不受孕。

藥品 當歸、乾地黃、生地黃、川芎、芍藥、各二兩。香附米、八兩。人參、八錢。肉桂、七錢。黃芩、一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。食前米湯或溫酒送下。

十八筆

【薯蕷丸】

發明 見張仲景金匱要略。

功用 治虛勞諸不足。及風氣百病。

藥品 薯蕷、三十分(一作二錢)。人參、阿膠、各七分(一作各五分)。白朮、芍藥、芎藭、麥門冬、杏仁、防風、各六分(一作各四分)。茯苓、桔梗、柴胡、各五分(一作各四分)。甘草、二十分(炙、一作一錢二分)。當歸、乾地黄、桂枝、神麴、大豆黃卷、各十分(一作各七分五厘)。乾薑、三分(一作二分)。大棗、一百枚(爲膏、一作十五枚)。白蜜、二分(一作一分五厘)。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。空腹棗溫酒送下。一百丸爲劑。

參考 人之元氣在肺。人之元陽在腎。既剝削。則難於還復。惟有賴後天之穀氣以資益之。此方以薯蕷爲主。專理脾胃。上損下損。至此可以撐持。再以人參、白朮、茯苓、乾薑、大豆黃卷、大棗、神麴、甘草、以除溼益氣。當歸、芎藭、芍藥、地黄、麥冬、阿膠、以養血益陰。柴胡、桂枝、防風、以祛邪散鬱。杏仁、桔梗、白蜜、以

下氣開鬱。則氣血平順。補益得宜。此爲理虛之良法。

【歸腎丸】

發明 驗方。

功用 治腎陰不足。精血虧損。形體憔悴。腰痠脚軟。夢遺滑精。

藥品 熟地黄、白茯苓、牛膝、山茱萸肉、杜仲、全當歸、枸杞子、菟絲子、各四兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服四錢。熱湯送下。

【歸芍六君丸】

發明 驗方。

功用 治氣血不足。脾胃虛弱。飲食不思。脘脹腹痛。嘔吐痰水。氣鬱神倦。

藥品 全當歸、白芍藥(炒)、人參、冬朮(炒)、茯苓、半夏(製)、各二兩。甘草(炙)、陳皮、各一兩。

制法及用法 共研細末。生薑大棗煎湯泛丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【歸芍地黄丸】

發明 驗方。

功用 治肝腎真陰不足。相火內動。頭眩耳鳴。午後潮熱。或兩脅攻痛。手足心熱。

藥品 當歸、白芍藥、各二兩。大熟地(砂仁酒拌、九蒸九

嗽)、八兩。山茱萸肉(酒潤)、淫山藥、各四兩。茯苓(乳拌)、牡丹皮、澤瀉、各三兩。

制法及用法 共研細末。煉白蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【雞血藤膠】

功用 生血。和血。破血。壯筋骨。緩腰膝。通七竅。走五臟。宣經絡。興陽道(酒服)。治百病。胃寒痛。筋骨酸痛。風痹。瘡瘍。轉筋。虛損。遺精。白濁。大腸下血。老人氣血虛弱、手足麻木、癱瘓。婦人勞傷氣血、乾血勞、子宮虛冷、經水不調、赤白帶下。瘀跌打損傷。

制法及用法 即以雲南所產雞血藤研斷流出如血之汁。熬之而成(或云熬時被孕婦見、膠即凝成)。

參考 此物氣清而香。性捷。能走血分。大補氣血(和酒服)。爲治虛勞百病之良品(老人尤宜)。凡男子不能生育。及婦女不受胎孕者。甚有功效。以投入滾湯中有一綫如雞血走散者爲真。服時忌食酸冷之物。又按滇遊日記謂以雞血藤煎一日一夜。將藥汁澄清過濾收成膏。亦治跌打損傷。月經不調等症。具有和血作用。每次半

食匙。開水送服。

十九筆

【瓊玉膏】

發明 見朱丹溪方。

功用 填精。補虛。潤真。養性。補百損。除百病。治虛勞乾咳。久服返老還童。萬神俱足。五臟充溢。髮白還黑。齒落更生。行若奔馬。

藥品 生地、四斤(搗絞取汁)。白茯苓、十二兩。白蜜、二斤(煉去滓)。人參、六兩。

制法及用法 先以生地黃汁同蜜熬沸。用絹濾過。將人參、茯苓。研爲細末。入前汁和勻。以磁瓶用綿紙十數層。加箬葉封瓶口。入砂鍋內。以長流水沒瓶頸。桑柴火煮三晝夜。取出換紙紮口。以蠟封固。懸井中。一日取起。再入舊湯內。煮一晝夜。以出水氣。如夏熱天置陰涼處。或藏水中。或埋地中。須於不聞雞犬聲幽靜淨處。不令婦人喪服人見之。亦勿犯鐵器。每服一二匙。溫酒調服。如不飲酒。熱湯亦可。一日二三次。忌食葱蒜菜菔醋酸等物。

參考 乾咳者。有聲無痰。火來乘金。肺液枯涸。此本源之病。非涵濡漸漬。難以成

功。若誤用苦寒。徒傷脾土。反損其母。故方中以地黃爲君(故亦稱生地黃膏)。壯水以息火。用人參爲臣。補氣以益肺。茯苓淡滲健脾。以培萬物之本。白蜜爲百花之精。潤脾肺而緩燥火。四者皆溫良和厚之品。日進數服。可免飢渴。一料分五劑。可救癰瘰五人。一料分十劑。可救勞瘵十人。珍貴瓊瑤。故以爲名。

【獾肝丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人骨蒸勞熱。體瘦煩疼。不欲飲食。

藥品 獾肝、一具。鼈甲(醋炙)、北柴胡、各一兩五錢。川升麻、桃仁(製)、犀角屑、梔子仁、地骨皮、知母、各一兩。黃耆、七錢五分。甘草、五錢。麝香、二錢五分(另研)。硃砂、一兩(細研水飛)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時熱湯送下。

二十筆

【黨參膏】

發明 通行方。

功用 治貧血萎黃。病後衰弱。及一切慢性虛症。

藥品 黨參、九百六十兩。

制法及用法 煎三次、榨淨澄清過濾。蒸發成濃汁。加水糖三百二十兩。收成膏七百二十兩。每次一食匙。開水沖服。

二十一筆

【續斷丸】

發明 見趣用和濟生方。

功用 治肝虛勞寒。眼昏脅痛。攣縮瘰癧。

藥品 續斷(酒浸)、川芎、當歸(酒浸)、半夏(薑製)、橘紅、乾薑(炮)、各一兩。桂心、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。溫湯送下。

二十四筆

【鼈甲丸】

發明 見朱櫟普濟方。

功用 治熱勞。

藥品 鼈甲(醋炙)、一兩。河車、一具。桔梗、白芍藥、大黃(煨)、甘草、苦參、貝母、知母、秋石、鼓心、龍膽草、黃藥子、蓬莪朮、犀角屑、硝石、各五錢。

制法及用法 研爲末。以前膏子爲丸。熱湯送下。

【鼈甲丸】

發明 類證普濟本事方。

功用 治膽虛不眠。四肢無

力。

藥品 龜甲、酸棗仁(炒)、羌活、淮牛膝(酒炒)、歸黃芪(炒)、人參、各一兩。五味子、五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服三四十丸。溫酒送下。

【龜甲丸】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人血風勞氣。四肢羸瘦疼痛。經水不利。飲食無味。漸加虛困。

藥品 龜甲、紫苑、桂心、川芎、防風、川牛膝、當歸、秦羌、人參、桃仁、琥珀、各一兩。黃耆、赤芍藥、龜蟲(製)、水蛭(製)、鬼箭羽、白朮、羌活、各七錢五分。熟地黃、一兩五錢。麝香、二錢五分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服三十丸。空腹食前溫酒送下。

【龜甲散】

發明 湯氏方。

功用 治筋骨熱。

藥品 龜甲(九肋者、湯浸、童便燻炙)、黃芪(蜜炙)、白芍藥、各一兩。生熟地黃、地骨皮、當歸、人參(去蘆)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服二

錢。溫酒送下。煎服。

【龜甲膠】

功用 補肝陰。清肝熱。治勞瘦骨蒸。寒熱往來。溫病瘧母。頭暈目眩。血虛痔核。婦人經閉、產難。小兒驚風、疳積。癰腫瘰癧。即龜甲所熬之膠也。

【靈砂寧志丸】

發明 證治準繩方。

功用 治大病後。損傷榮衛。失血過多。精氣虛損。心神恍惚。不得眠睡。飲食全減。肌體瘦弱。

藥品 辰砂、二兩(不夾石者、夾絹袋盛、懸於釵石器內、用椒紅、三摩、取井花水調敷、入於器內可入分、另用銀子注水、置辰砂器內、重湯煮令魚眼沸、三晝夜爲度、取出辰砂、細研水飛)。白朮、鹿茸(燎去毛、酥炙黃)、黃芪(蜜炙)、茯神(去木)、人參、各三兩。石菖蒲、一兩。

制法及用法 研爲末入辰砂研勻。蜜肉和杵丸。如梧子大。每服三十丸。空腹時溫酒或米飲送下。

發散類

二筆

【人參敗毒散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治時疫。傷風。風溼。寒熱。頭眩。項強。目疼。肢疼。咳嗽。鼻塞。聲重。瘡瘍。邪氣在表應發者。以及小兒感冒。發熱。惡風。痰阻胸膈。頭目不清。風熱瘰癧。瘰癧疔。潰核。毒瘡。

藥品 人參、羌活、獨活、柴胡、前胡、川芎、枳殼(麸炒)、桔梗(炒)、赤茯苓、各一錢。甘草、五分(炙、人中黃更佳)。一方有陳皮。

制法及用法 研爲粗末。加生薑二三片。一方有薄荷。清水煎服。每日二次。

參考 此乃時疫初起。煩熱痞悶之主方。服之多有毒邪驟發。其勢轉甚者。蓋時疫之發。或值歲氣併臨。或當水土雜糅。雖種種不同。然必先傷中土。止其百骸。無分經絡。毒氣流行。隨虛輒陷。最難回測。應乘邪氣未陷時。儘力峻攻。庶克有濟。其立方之妙。

全在人參一藥。力致開闢。始則鼓舞羌獨柴胡。各走其經。而與熱毒以分解之門。繼則用禦津補血氣。各守其邪。以斷邪氣復入之路。與桂枝湯中芍藥護營之意無異。故能爲濟世藥以成功也。

【二聖救苦丸】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治感冒風寒。

藥品 紫蘇葉、四兩。陳皮、二兩。茅山龍、二兩。葛根、四兩。當歸、三兩。防風、三兩。甘草、一兩。白芷、三兩。羌活、四兩。黃芩、三兩。川芎、二兩。細辛、一兩。香附、三兩。

制法及用法 共研細末。水泛爲丸。每服一二錢。綠豆湯送下。

三筆

【寸金丹】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治中風中寒中暑。及霍亂吐瀉。一切感冒雜證。

藥品 川厚朴、三兩。縮砂仁、三兩。羌活、三兩。赤茯苓、三兩。草果仁、一兩五錢。烏藥、三兩。防風、三兩。藿香、三錢。薄荷、三兩。前胡、三兩。廣木香、三兩。砂砂、三兩。枳殼(炒焦)、一兩五錢。香附

(製)、三錢。半夏、三錢。陳皮、三兩。川芎、三錢。白芷、三兩。紫蘇葉、三兩。甘草(炙)、一兩五錢。豆蔻、三兩。蒼朮(炒焦)、三兩。六神(炒焦)、三兩。

制法及用法 研爲末。用神麴和姜汁爲糊。每重三錢。丸硃砂爲衣。水乏亦可。每服一丸。淡姜湯化下。

【上清散】

發明 奇效方。

功用 治頭風痛。眉骨痛。眼痛。

藥品 川芎、鬱金、赤芍藥、荆芥穗、薄荷葉(一作一兩)、芒硝、各五錢。乳香(另研)、沒藥、各一錢(另研、一作各一兩)。冰片、五分(另研、一作一錢五分)。

制法及用法 研爲細末。每月一字。搽入鼻內。

【川芎茶調散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治諸風上攻。頭目昏重。偏正頭痛。

藥品 薄荷、八兩。川芎、荆芥、各四兩。羌活、白芷、防風、甘草(炙)、各二兩(自川芎至甘草、一方皆作一兩)。細辛、一兩。一方無細辛。有香附(童便浸炒)、二兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後茶清調下。一日三次。婦人產後豆淋酒調下。輕者三服。重者五七服效。

四 筆

【止痛散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 止痛。消腫。活血。通經。辟風。驅寒。

藥品 防風、荆芥、當歸、蔥艾、牡丹皮、鶴蟲、升麻、各一錢。苦參、鐵線透骨草、赤芍藥、各二錢。川椒、三錢。甘草、八分。

制法及用法 研爲末。裝白布袋內。紮口。煎滾熨洗。

【五香散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 宣利三焦。疏導壅滯。發散表邪。熱腫痛結核。或頭痛惡心。寒熱氣急。似起癰癤之狀。

藥品 青木香、丁香、沈香、乳香、藿香、各等分。

制法及用法 剉散。每服三錢。清水一盞半煎。食後溫服。

五 筆

【白芷丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻流清涕。

藥品 白芷、不拘多少。

制法及用法 研爲細末。葱白搗爛和丸。如小豆大。每服二十丸。不拘時茶湯送下。

【加味清胃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱毒在表者。

藥品 升麻、白芷、防風、白芍藥、乾葛、甘草、當歸、川芎、羌活、麻黃、紫背浮萍、木賊草、各等分。

制法及用法 每服五、七錢。清水煎服。

七 筆

【延胡索散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治婦女七情六鬱。心腹作痛。或連腰脅背脊。上下攻刺。甚作搐搦。經候不調。及一切血氣疼痛。

藥品 延胡索、當歸(酒製)、赤芍藥、蒲黃(炒)、官桂(忌火)、各五錢。黃連(薑汁炒、一作薑黃)、木香(忌火)、乳香、沒藥、各三錢(一作各三錢五分)。甘草(炙)、二錢五分。

制法及用法 咬咀。每服四錢。加生薑五片。清水煎。食前服。吐逆加半夏、橘紅各五

錢。

【妙香丸】

發明 見拔萃方。

功用 安神。通隔。辟惡氣。

藥品 辰砂、九厘。龍腦、膩粉、麝香、各七錢五分。牛黃、五錢。金箔、九十片。

制法及用法 研爲細末。和勻。煉蜜去蠟淨。入白沙蜜七錢五分。同煉爲丸。每兩作三十丸。米飲化下。每服三十丸。

【防風天麻丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 開鬱。散結。宜風。通氣。

藥品 防風、天麻、川芎、羌活、白芷、草烏、白附子、荆芥穗、當歸、甘草、各五錢。滑石、二兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服半丸或一丸。熱酒化下。覺藥力運行。微麻爲度。

八 筆

【羌活散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 驅除風溼。發汗。治手發背。

藥品 羌活、當歸、各二錢。

獨活、烏藥、厥靈仙、各一錢五分。升麻、前胡、荆芥、桔梗、各一錢。生甘草、五分。肉桂、三分。

制法及用法 酒水各一鍾。煎至一鍾。食遠服。

【羌活散】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治風毒上攻。眼目昏翳。霧膜生翳。及偏正頭風。目小。黑花累累者。

藥品 羌活、川芎、天麻、旋覆花、青皮、南星(炮)、藁本、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。加生薑三片。薄荷七葉。清水煎服。

【羌活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 解熱。散毒。治風寒欲作瘡毒者。

藥品 羌活、獨活、川芎、桔梗、蟬蛻、前胡、柴胡、地骨皮、甘草(炙)、瓜蒌、天麻(炙)、荆芥、防風、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。清水三分盞。加薄荷三葉。煎至二分盞。通口服。壯大小加減。

參考 此方治風治驚。下痰涼脾。利熱透肌。一切實熱。

無所不治。如稟受怯弱。或脾胃弱。或外熱。目白時青色。皆衰無熱。不可輕用。

九 筆

【紅綿散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 發表。

藥品 余參、玉個。麻黃(去節)、僵蠶、白芷、川芎、桔梗、天麻、各二錢。甘草、蘇木、各一錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。加紅綿少許。清水煎溫服(一方加熱荷葉三片、好酒四五盞、同煎)。有熱加荆芥。

【香蘇散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治四時感冒。及婦人妊娠傷寒。惡寒頭痛。

藥品 香附(薑汁浸、勿炒、一作三錢)、紫蘇葉、各二兩(一作二錢五分、一作二錢)。陳橘皮、一兩(去白、一作一錢五分、一作一錢)。甘草、五錢(炙、一作一錢。一作五分)。一方有蒼朮。

制法及用法 研爲末。每服五錢。加生薑三片。大棗一枚(一作遵古五葉)。清水煎。

去滓熱服。暖覆取微汗。日三夜一次。以得汗身涼爲度。①如得肝脈。是膽經受病。面青善怒。其三部脈浮而弦。惡寒裏和。清便日調者。加羌活、防風、各一錢。②如得心脈。是小腸受病。面赤口善笑。其三部脈浮而洪。惡寒裏和。加黃牛、石膏、各一錢五分。③如得脾脈。是陽明受病。面黃善噯善思。其尺寸浮而緩。惡寒裏和。加白朮、防己、各一錢五分。④如得肺脈。是大腸受病。面白善噦善悲。不樂欲哭。其尺寸浮而濇。惡寒裏和。加黃耆、防風、各一錢。⑤如得腎脈。是膀胱受病。面黑善恐。其尺寸浮而濡。惡寒裏和。加附子(炮)、一錢。惟有孕婦人。須斟酌用之。

【枳殼散】

發明 見沈全齋沈氏尊生書。

功用 治微熱。

藥品 枳殼、桔梗、經辛、川芎、防風、葛根、甘草。

制法及用法 清水煎服。

【封顙散】

發明 見王氏方。

功用 治顙腦風張。咳嗽鼻塞。

藥品 柏子仁、防風、天南

星、各四兩。

制法及用法 研爲細末。每用一錢。豬膽汁調勻。稀糊得所。攤在絨絹帛上。如顙子大小剪貼。一日一換。不得令乾。時時以湯潤動。

十 筆

【神朮丸】

發明 元太平惠民和劑局方。

功用 治傷風頭痛。無汗。項背拘急。鼻流清涕。及風寒咳嗽。時行泄利下痢。

藥品 蒼朮(洗浸、麻油拌炒)、藁本、川芎、羌活、各一錢。白芷、甘草(炙)、細辛、各五分。一方無白芷。

制法及用法 研細。薑棗煎湯泛丸。每日空腹時。溫酒下三錢。

參考 北方純月風藥。與羌活勝濕湯(羌活、獨活、藁本、防風、蔓荊子、川芎、甘草)。相去不遠。泄利下血來自陽明者。色必鮮明。來自太陰者。色必清稀。其源各異。故治法亦不同。然皆不外風能勝溼之義。蒼朮專主木邪乘土。故能治外內諸邪。以風木之邪。內干土臟。故用羌藁芎辛等風藥。兼川芎以引入血分。甘草以調和

胃氣。胃氣敷布有據。泄利下血自止。發汗即血之液。奪其汗。則血中之溼熱邪氣。悉從外泄。而無內滯之患矣。

【神朮丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治傷風頭痛。無汗。項背拘急。鼻流清涕。及風寒咳嗽。時行泄利下血。

藥品 蒼朮(泔浸、麻油拌炒)、藁本、川芎、羌活、各一錢。白芷、甘草(炙)、細辛、各五分。一方無白芷。

制法及用法 薑棗煎湯泛丸。每日空腹時溫酒下三錢。

【退毒散】

發明 見玉背堂證治準繩。

功用 治便毒腫結。

藥品 穿山甲(醋炙焦)、五錢。木綿子(醋炙)、三錢。

制法及用法 研爲末。每服二錢。食前老酒調下。外用醋煮肥皂研膏敷之。

【退毒散】

發明 見玉背堂證治準繩。

功用 治腮腫。

藥品 木綿子(去油)、天南星、生半夏、赤小豆、白芷、草烏(連支尖)、各等分。

制法及用法 研爲細末。硬則法醋調敷。熱嫩則蜜水調敷。

十一筆

【敗毒散】

發明 見朱氏氣證活人書。

功用 治傷寒溫疫。風溼風眩。拘攣風痰。頭痛目眩。四肢作痛。憎寒壯熱。項強暗疼。或惡寒咳嗽。鼻塞聲重。

藥品 羌活、獨活(製)、前胡、柴胡、川芎、枳殼(炒)、白茯苓、桔梗、人參、各一兩。甘草(炙)、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。清水一盞。加生薑三片。煎至七分。溫服。或沸湯點服。日二三次。以知爲度。煩熱口乾者加黃芩。

參考 此方治風邪傷衛之證。風氣留連肌表。宜與汗解。然汗雖出於陽。而源於陰。陽虛則榮衛不和。而汗不能作。陰弱則津液枯涸。而汗不能滋。方中於發表藥之外。配以人參、甘草、以滋陰液。再以生薑爲使。使留連於肺部。俾上焦之氣分益固。差補中兼發。則邪氣不致留連。發中帶補。則真元不至於耗散。施之於東南卑暖之鄉。最爲相宜。亦可

用黃芩者。以諸藥氣味辛溫。恐其僭亢。一以潤之。一以清之也。

【敗毒散】

發明 見李氏方。

功用 治初發熱壯盛證。

藥品 前方加升麻、荆芥穗、牛蒡子、蟬蛻、山查、地骨皮、薄荷、紫蘇、紫草。減獨活、柴胡、茯苓、人參。

制法及用法 加生薑一片。清水煎。臨時加葱白汁五茶匙沖服。如熱甚加柴胡、黃芩。夏加香薷。冬加麻黃。瀉加豬苓、澤瀉。

【敗毒散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治暑瘍。及一切癰疽初發。憎寒壯熱。甚者頭痛拘急。狀似傷寒。

藥品 茯苓、甘草、枳殼、桔梗、柴胡、前胡、薄荷、羌活、獨活、川芎、連翹、防風、荆芥、金銀花。

制法及用法 加生薑三片。清水煎服。

【連翹散】

發明 見朱肱煩證活人書。

功用 治諸毒及傷寒熱在表面不厥。

藥品 連翹、防風、梔子、甘

草、各等分。

制法及用法 研爲末。清水煎服。

【連翹散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治粉刺及面上肺風瘡。

藥品 連翹、川芎、白芷、片芩、桑白皮、黃連、沙參、荆芥、梔子、貝母、甘草、各七分。

制法及用法 清水煎。食後服。

【連翹飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人乳癰。

藥品 連翹、川芎、瓜蒌（一作金銀花）、皂角絨、柝葉、青皮、甘草節、桃仁、各二錢。

制法及用法 清水二鍾。煎至一鍾。食遠服。已破者。加人參、黃耆、當歸。未破者。加柴胡、升麻。

【鹿角散】

發明 見顧世澄傷寒大全。

功用 治乳癰初起。結腫疼痛。憎寒發熱。但未成膿者。

藥品 鹿角尖、三寸。

制法及用法 炭火煨稍紅。存性研末。每服三錢。食後熱酒一茶鍾調下。甚者再一眼必消。或以生鹿角尖剉細末。生

酒冲服三錢立消。

【硃砂丸】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治破傷風。

藥品 硃砂、生半夏、洗川烏、各一兩。雄黃、五錢。鳳凰臺、三錢。麝香一字。

制法及用法 共研末。棗肉爲丸。如梧子大。每服一丸或二丸。冷水送下。以吐爲度。如不吐。加一丸。或吐不住。煎葱白湯止之。汗出爲效。

【麻黃散】

發明 見李東垣方。

功用 治頭痛惡寒。血虛肝旺。

藥品 麻黃根(不去節)、羊脛骨(燒灰)、龍膽草(酒洗)、生地黃、各二錢。羌活、一錢五分。防風、藁本、升麻、黃連、草豆蔻、各一錢。當歸、熟地黃、各六分。細辛根、少許。

制法及用法 共爲極細末。塗之。

十二筆

【菊花散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒腦戶傷風。鼻涕神昏。

藥品 甘菊花、白朮、細辛、白茯苓、甘草(炙微赤剉)、防風

(去蘖)、人參(去蘖)、各一分。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。沸水一小盞。加生薑少許。煎至五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小。以意加減。

【菊花散】

發明 見張漢方。

功用 治小兒腦戶傷風。鼻涕神昏。

藥品 甘菊花、防風、前胡、各一兩。細辛、桂心、各五錢。甘草、一分。

制法及用法 搗羅爲細末。每服五分。加乳香少許。乳後煎荊芥湯調下。

十三筆

【聖散子】

發明 見蘇東坡方。

功用 治傷寒時疫風溼。陰陽兩感。表裏未辨。或外熱內寒。或外寒內熱。肢節拘急。頭項腰脊疼痛。發熱惡寒。喘逆喘咳。鼻塞聲重。及食飲生冷。傷在胃脘。胸膈飽滿。脇脅脹痛。心下痞結。手足逆冷。腸鳴泄瀉。水穀不消。小便不利等證。

藥品 藜蘆子(炒)、砂仁(炒研)、檳榔、陳皮、玄胡索、各八錢。厚朴、防風、蒼朮(製)、藁

本、藁香葉、柴胡、獨活、石膏、蒲、澤瀉、枳殼、細辛、各五錢。草豆蔻(去殼)、十箇。

制法及用法 共研粗末。每服五錢。清水一盞半。煎至一盞。去滓。不拘時溫服。遍身微汗即愈。時氣不和。空心飲之。可辟邪疫。

【辟瘟丹】

發明 太倉公方。

功用 辟瘟疫。

藥品 蒼朮、八兩。白朮、烏藥、黃連、羌活、各四兩。川烏、草烏、細辛、紫草、防風、獨活、藁本、白芷、香附、當歸、荊芥、肉桂、甘松、三柰、白芍藥、乾薑、麻黃、皂角、甘草、各二兩。麝香、三錢五分。

制法及用法 共研細末。棗肉爲丸。如彈子大。每用一丸。燒之。即今藥肆所謂辟瘟丸也。

十六筆

【橘皮散】

發明 見張氏方。

功用 治乳癰、吹乳、妬乳。

藥品 陳皮(湯浸去白、曬乾、麴炒微黃)。

制法及用法 加麝香少許。共研細末。每服二錢。溫酒調下。初發覺赤腫疼痛。未成即

散。已成即潰。一服見效。

【獨活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治惡核風結腫毒。四肢煩熱拘急。

藥品 獨活、木香、射干、桑寄生、連翹、升麻、沈香、生川大黃、生甘草、各一兩。

制法及用法 剉碎。每服四錢。清水一盞。煎至六分。去滓。加竹瀝五勺。更煎一二沸。溫服。一日三次。得快利爲度。

十七筆

【薄荷油】

功用 其性辛涼無毒(或作溫、或作苦平)。功能散風。清熱。治頭風。目赤。咽痛。牙疼。皮膚風熱(摩擦之)。即以薄荷製成之油也。

【薄荷葉露】

功用 其性辛涼無毒(或作溫、或作苦平)。功能和中。疏逆。發汗。解熱。宣滯。涼膈。清頭目。散風寒。治頭痛。熱嗽。皮膚痧疹。耳目咽喉口齒諸病。即以鮮薄荷葉蒸取之露也。氣烈味辛。爲清涼發散之品。體虛及素有鼻衄等人。不宜多服。

和解類

二筆

【人參散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 鎮肝。去邪。治肝癰氣逆。胸脅引痛。眠臥多驚。筋脈掣急。

藥品 人參、二兩。杜仲(去鱗皮、炒)、黃芩(蜜炙)、酸棗仁(微炒)、茯神(去木)、各一兩。五味子、細辛(去苗)、熟地黃、秦艽(去苗土)、羌活(去蘘)、丹砂(另研)、芍藥、各五錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服一錢。不拘時溫酒調下。每日三次。

【人參散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治經絡邪熱。痰嗽煩熱。頭目昏痛。盜汗倦怠。一切血熱虛勞。

藥品 人參、白朮、茯苓、赤芍藥、半夏麴、柴胡、甘草、當歸、乾葛、各一兩。黃芩、五錢。

制法及用法 每服三錢。清水一盞。加生薑四片。大棗二枚。煎至七分。不拘時溫服。

【人參散】

發明 見太醫局方。

功用 調中。和氣。止嘔逆。除煩渴。治昏困多睡。乳食減少。及傷寒時氣。胃氣不順。吐利止後。燥渴不解。

藥品 人參(去蘘頭)、白茯苓(去皮)、各一兩。木香、甘草(炙剉)、藿香葉、各一分。乾葛(剉)、二兩。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水一中盞。煎至七分。去滓。不拘時溫服。

【丁香煮散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治脾胃虛冷。嘔吐不食。

藥品 丁香(不見火)、紅豆、甘草、乾薑、青皮、川烏頭(去皮)、陳皮、高良薑、胡椒、益智、各等分。

制法及用法 剉散。每服三錢。清水一盞。加生薑三片。煎至六分。入鹽一捏。不拘時服。

【丁香煮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治反胃嘔逆。嘔噦瀉瀉。

藥品 丁香(一作三七粒)、石蓮肉(去心)、各十四枚。北

棗、七枚(切碎)。生薑、七片。黃稭米(洗)、五勺。一方無北棗。

制法及用法 清水一盞半。煮稀粥。去藥吸粥。

參考 此做附子粳米湯之制。彼用粳米。此用糯米。皆取其達胃勝。雖其勢稍平。亦是突圍之將。

【七寶散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治時氣傷風。傷寒頭昏。體熱咳嗽。及脾胃脾藏不和。口中腥氣。或牙縫微有餘血。調理諸病後小證。

藥品 紫蘇(去老梗)、淨香附、各三兩。甘草、陳皮(去白)、桔梗(剉炒)、各二兩五錢。川芎、白芷、各一兩。

制法及用法 咬咀。每服二錢。清水一盞。加生薑二片。煎至七分。不拘時溫服。痰嗽加製半夏。口中腥氣入鹽煎。調理諸疾加棗子。

三 筆

【子芩散】

發明 見拔萃方。

功用 涼心肺。和榮衛。解勞。除熱。止血。

藥品 子芩、五錢。黃耆、一兩。白芍藥、人參、白茯苓、麥

門冬(云心)、生乾地黃、各五錢。苦梗、二錢五分。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。先用竹葉一握。小麥七十粒。清水三盞。加生薑三片。煎至一盞半。入藥末。煎至七分。去滓溫服。

【上清散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 清利頭目。寬快胸膈。

藥品 黃耆、甘草、各二錢。人參、葛根、各一錢五分。防風根、一錢。蔓荊子、五分。

制法及用法 分作二服。清水一盞半。煎至一盞。去滓。臨臥時溫服。以夾衣蓋覆面首。須臾汗出。並於服藥之前後各一日間。均閉口不語。方有效。

四 筆

【六合定中丸】

功用 治暑月長冷。嘔痢霍亂。胸悶惡心。頭疼腹痛。或吐或瀉。寒熱如瘧。小兒發熱發搐。吐乳驚悸。一切腸胃不和之症。

藥品 藿香、蘇葉、香薷、扁豆(炒)、各八兩。木香、檀香、各一斤二兩。赤茯苓、枳殼、桔梗、木瓜、廣皮、山楂(炒焦)、厚朴、甘草、各一斤八兩。麥芽

(炒)、穀芽、神麴、各六斤。一方無扁豆、桔梗、麝皮、山楂、麥芽、穀芽、神麴。

制法及用法 研爲末。水泛丸。每丸重一錢。每服一丸。熱湯送下。

【木香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人脾胃虛冷。心腹脹滿。不欲飲食。

藥品 木香、桂心、白朮、乾薑(炮)、陳皮(去白)、草果仁、訶梨勒、人參、各一兩。神麴(炒黃)、七錢五分。甘草(炙)、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。熱茶清點下。

【分心氣飲】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治憂思鬱怒。諸痞氣滿停滯。噎塞不通。二便虛秘。

藥品 紫蘇梗、一錢五分。青皮、芍藥、大腹皮、陳皮、各一錢。木通、半夏、各八分。官桂、六分。赤茯苓、桑皮(炒)、各五分。

制法及用法 清水二鍾。加生薑三片。燈心十莖。煎至八分。食前服。

五 筆

【白朮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後霍亂吐利。腹痛煩渴。手足逆冷。

藥品 白朮、橘紅、麥門冬(去心)、乾薑、人參、各一兩。甘草、五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服四錢。清水一盞。加生薑五片。同煎。去滓溫服。

【白朮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠霍亂。腹痛吐利。

藥品 白朮(炒)、益智仁、枳殼(麸炒)、橘紅、各七錢五分。草豆蔻仁(煨)、高良薑(炒)、各五錢。

制法及用法 爲散。每服三錢。加生薑五片。清水煎。不拘時溫服。

【白朮散】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治霍亂煩渴。虛損氣弱。及酒積嘔噦。

藥品 白朮、茯苓(去皮)、人參、藿香、各五錢。葛根、一兩。木香、二錢五分。甘草(炙)、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。白湯調下。如煩渴加滑石二兩。甚者加薑汁。續續飲之。

【白花蛇膏】

發明 見雞峯備急方。

功用 治營衛不和。陽少陰多。手足舉動不快。

藥品 白花蛇、一條(酒養、去皮骨、瓦焙、取肉一兩)、天麻、狗脊、各二兩。

制法及用法 除白花蛇外。餘研爲細末。和勻。銀盃盛無灰酒一升浸之。重湯煮稠如膏。銀匙攪之。入生薑汁半杯同熬勻。瓷瓶收藏。每服匙半。好酒或白湯化下。每日二次。

【正氣散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治溼鬱。

藥品 藿香、紫蘇、白芷、茯苓、白朮、陳皮、厚朴、桔梗、甘草、半夏麴、大腹皮。

制法及用法 加生薑、大棗。清水煎服。

【瓜蒂散】

發明 見張仲景傷寒金匱。

功用 治寸浮胸痞上脘有宿食者。

藥品 瓜蒂、二分(熬黃、一作一分)。赤小豆、一分(一作二分)。

制法及用法 各另搗篩爲散。取一錢匕。以香豉一合。

用熱湯七合。煮作稀粥。去滓。取汁和散。溫頓服之(一作溫漿水調下)。不吐者少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家忌之。

參考 此爲吐劑之主方。凡胸中寒熱溼濁痰飲鬱結之病。非汗下所能及者。必得酸苦湧吐之品以越之。則上焦得通而陽氣可復。方中瓜蒂極苦。赤豆味酸性降。相須相益。除胸胃之實邪。而佐香豉粥汁合服者。藉穀氣以保胃氣也。服之不吐。少少加服。得快吐而即止者。恐傷胃中元氣也。

【生犀角散】

發明 見錢氏方。

功用 治心經虛熱。

藥品 生犀角(剉取末)、二錢。地骨皮(白採佳)、赤芍藥、柴胡根、乾葛(剉)、各一兩。甘草(炙)、五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服一二錢。清水一盞。煎至七分。食後溫服。

六 筆

【地黃煎】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治風熱心煩咳喘便秘。或脾胃壅熱。飲食不下。

藥品 生地黃(酒搗取汁)、枸杞子(酒搗取汁)、荆瀝、竹

瀝、各八兩。酥、生薑汁、各一合。人參、天門冬(去心)、各一兩。白茯苓、八錢。大黃(酒蒸)、梔子(薑汁炒黑)、各五錢。

制法及用法 以後五味研爲細末。入前六汁內。每服調方寸匕。再服漸加。以利爲度。

【地黃煎丸】

發明 見孫允賢永類鈴方。

功用 解勞。生肌。進食。活血。養心。

藥品 用生地黄汁、杏仁汁、生薑汁、藕汁、各五升。薄荷汁、鵝梨汁、各一升。法酒、二升。沙蜜、四升。慢火熬成膏。次用北柴胡、三兩。木香、人參、白茯苓、山藥、柏子仁(去皮炒)、遠志肉、枳實(製炒)、白朮、各一兩。秦艽、苦梗、麝香、各五錢(另研)。熟地黄(洗、焙、酒蒸)、四兩。

制法及用法 研爲細末。以前膏子和丸。如梧桐子大。每服二三十丸。食後甘草湯送下。

【如聖散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治當心痛。遍身骨節牽疼。或嘔吐瀉心。疝氣。

藥品 枳殼(麸炒)、三兩。小茴香(微炒)、三錢。鹽磚(錫上

燒紅)、三分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒調下。不愈。再服一錢。

【回生散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治霍亂吐瀉過多。

藥品 蒼香、陳皮、各五錢。

制法及用法 研爲末。熱水調下。

七 筆

【沉香散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治久疝。

藥品 沉香、紫蘇、白豆蔻仁、各一錢。

制法及用法 研爲末。每服五七分。柿蒂湯調下。

【沉香飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治吐瀉後脾胃虛弱。神昏體倦。煩熱。盜汗。食少不化。或聞食作惡。

藥品 沉香、丁香、南木香、藿香葉、各二錢五分。陳皮(去白)、白朮、半夏(湯洗七遍、薑汁製)、白茯苓(去皮)、肉豆蔻、各五錢。甘草(炙)、三錢。

制法及用法 除沉香、丁香、

木香、不過火。餘七味。或曬或焙。仍同三味研爲細末。每服五分至一錢。空腹時紫蘇、木瓜或大棗煎湯調下。

【赤石脂丸】

功用 治腹痛。

藥品 赤石脂、乾薑、各一兩。黃連、當歸、各二兩。

制法及用法 研爲細末。煨蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲送下。

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 和經絡。

藥品 防風、五錢。川芎、二錢五分。人參、一錢二分五釐。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。臨臥時米飲調下。

【杏仁煎】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治咳嗽失音不出。

藥品 杏仁(去皮尖雙仁、研)、三兩。生薑汁、白蜜、飴糖、各一兩五錢。白桑皮、貝母(去心)、木通、各一兩二錢五分。紫菀(去土)、五味子、各一兩。一方無桑皮、貝母。一方加款冬花、知母、各一兩。

制法及用法 剉碎。清水三升。熬至五合。去滓。入前杏仁等四味再熬成膏。每服一匕。口含化下。

【吳茱萸丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治肝厥脅痛院痛。或時嘔吐。食不消化。

藥品 吳茱萸、白芍藥、各一兩四錢。生甘草、法半夏、廣陳皮、各一兩五錢。人參、茯苓、各三兩。

制法及用法 共研細末。生薑、大棗、煎湯泛丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【豆蔻散】

發明 見錢乙方。

功用 治吐瀉煩渴。腹脹小便少。

藥品 豆蔻、丁香、各五釐。舶上硫黃、一錢。滑石、五分。

制法及用法 研爲細末。每服一字至五分。不拘時米飲調下。

【利膈散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治陰盛。

藥品 木香、檳榔、各七錢五分。大黃、厚朴、各二兩。人參、當歸、藿香、甘草、枳實、各一兩。

制法及用法 研爲細末。水泛丸。如梧桐子大。每服二三錢。熱湯送下。

八 筆

【和中丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治病久不能食。臟腑或秘或結或瀉。常服和中理氣。消痰去滯。厚腸胃。進飲食。

藥品 白朮、二兩四錢。厚朴(薑製)、二兩。陳皮(去白)、一兩六錢。半夏(湯泡)、一兩。檳榔、枳殼、各五錢。甘草(炙)、四錢。木香、二錢。

制法及用法 研爲末。生薑自然汁浸蒸餅和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食遠溫水送下。

【和中散】

發明 見錢乙方。

功用 和胃。止吐瀉。定煩渴。治腹痛。不思食。

藥品 人參(去蘆)、白茯苓、白朮、甘草(炙)、乾葛、黃耆(炙)、白扁豆(炒)、藿香葉、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。清水一盞半。加大棗二枚(去核)。生薑五片。煎至八分。食前溫服。

【和中散】

發明 見曾氏方。

功用 治久病脾虛。食物過

傷。停飲生痰。留滯中脘。耗虛真氣。或成吐瀉者。常服和胃氣。進飲食。悅顏色。理風痰。

藥品 人參(去蘆)、扁豆(炒去殼)、白茯苓(去皮)、川芎、縮砂仁、半夏(製)、香附子、甘草(炙)、各一兩。肉豆蔻、訶子(去核)、各七錢五分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一盞。加生薑三片。大棗一枚。煎至七分。空腹或不拘時溫服。

【和解散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治傷寒頭痛。煩躁自汗。咳嗽吐利。

藥品 厚朴(去粗皮、薑汁製)、陳皮(洗)、各四兩。藁本、桂梗、甘草、各八兩。蒼朮(去皮)、一斤。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。清水一盞半。加生薑三片。大棗二枚。煎至七分。不拘時熱服。

【定痛散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸損腫痛。

藥品 當歸、川芎、赤芍藥、白芍藥、熟地黃、羌活、獨活、牛膝、川續斷、白芷、杜仲、各二

兩。川烏(炮)、乳香、沒藥、肉桂、各一兩。南木香、角茴、丁香皮、各五錢。

制法及用法 研爲末。溫酒調下。

【定痛散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 安胃和中。

藥品 當歸、生地、細辛、乾薑、白芷、連翹、苦參、川椒、黃連、桔梗、烏梅、甘草、各一錢。

制法及用法 清水煎。嚥漱後嚥下。

【青蒿丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人熱勞咳嗽。肌體消瘦。心膈煩熱。夜多盜汗。四肢痠痛。食少無力。

藥品 青蒿、杏仁(湯浸、去皮尖雙仁、麩炒黃)、鼈甲(醋炙黃、去裙襖)、各一兩五錢。天門冬(去心、焙)、柴胡(去苗)、地骨皮、旋覆花、紫苑(洗去苗土)、貝母、人參(去蘆)、秦艽(去頭)、蕤蕤、黃耆、川大黃(剉微炒)、枳殼(麩炒、微黃去瓤)、各一兩。甘草(炙、微赤、剉)、七錢五分。龍膽草、五錢。硃砂、一兩(紙研水飛過)。麝香、五錢(紙研)。

制法及用法 共爲末。入研

藥和勻。煉蜜和搗三五百杵爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。不拘時麥門冬湯送下。

【狗寶丸】

發明 見楊氏方。

功用 治反胃膈氣。

藥品 狗寶、三錢。硫黃、水銀、各一錢。

制法及用法 先以硫黃、水銀。同炒成金色。入狗寶爲末。以雞卵一枚。去白留黃。和藥攪勻。紙封泥固。燒火煨半日。取出研細。每服五分。燒酒調下。

九 筆

【胡黃連丸】

發明 見朱儲普濟方。

功用 治婦人熱勞煩悶。肢黃羸痛。時有咳嗽。不欲飲食。

藥品 胡黃連、知母、川升麻、玄參、人參(去蘆)、當歸、甘草(炙、微赤)、檳榔、桔梗(去蘆)、各五錢。赤芍藥、犀角屑、地骨皮、茯神、杏仁(湯浸、去皮尖雙仁、麩炒微黃)、紫苑(洗、去苗土)、川大黃(剉碎、微炒)、秦艽(去苗)、枳殼(麩炒微黃、去瓤)、各七錢五分。柴胡(去苗)、一兩。麥門冬(去心、焙)、一兩五錢。鼈甲、一兩(醋炙黃去裙襖)。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時湯飲送下。

【胡黃連散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒冷熱不和。下利腹痛。

藥品 胡黃連、母丁香、桂心、木香、肉豆蔻(去殼)、當歸(剉、微炒)、麝香(細研)、各一分。犀角屑、五釐。

制法及用法 搗細羅爲散。每服五分。粥飲調下。一日三四次。是兒大小加減。

【枳實散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治脅痛。

藥品 枳實、一兩。白芍藥(炒)、雀腦芎、人參、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前生薑、大棗、煎湯或溫酒調下。一日三次。

【枳實散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腹背痛。

藥品 枳實(麸炒)、二兩。官桂(去麋皮)、一兩二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒或橘皮湯調下。日午臨臥空腹時各一服。

【前胡散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治脾胃不和。見食欲嘔。心胸壅悶。

藥品 前胡、蘆根、各三分。桂心、一分。人參、白朮、赤茯苓、枇杷葉(去毛炙)、甘草(炙)、厚朴(薑炙)、各五錢。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一盞。加生薑少許。煎至五分。不拘時溫服。

【香甲丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 健脾胃。暢神氣。充肌膚。澤顏色。治氣血虛弱。肌膚消瘦。百節疼痛。潮熱煩熱。四肢逆冷。不思飲食。中滿氣滯。及婦人經血凝滯。

藥品 柴胡、生乾地黃、京三稜、各三分。鼈甲(醋炙黃)、神麴、杏仁、熟乾地黃、麥蘖(炒)、各一兩。牛膝、木香、菴黃、當歸、各五錢。白朮、川芎、各一分。

制法及用法 研爲細末。白麴糊丸。如梧桐子大。每服十丸。空腹時茶清或米飲送下。

參考 此方挾熱者宜之。

十 筆

【草豆蔻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風。冷氣攻痛。脾胃嘔逆。不納飲食。

藥品 草豆蔻、白茯苓(去皮)、枇杷葉(炙)、半夏(湯洗七次)、各七錢五分。高良薑、白朮(去蘆)、縮砂仁、桂心、木香、青橘皮(去白)、甘草(炙)、各五錢。人參(去蘆)、一兩。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一中盞半。加生薑七片。煎至一大盞。去渣。不拘時溫服。

【草豆蔻散】

發明 見玉肯堂證治準繩。

功用 治腸痹。風寒溼內攻。腹疼發泄。

藥品 草豆蔻、陳橘皮(去白焙)、各一兩。官桂(去粗皮)、白豆蔻仁、肉豆蔻、當歸(切焙)、木香、白朮、丁香、高良薑、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。食前生薑、大棗、煎湯調下。

【草豆蔻散】

發明 見玉肯堂證治準繩。

功用 治妊娠心腹常痛。飲食減少。四肢不和。

藥品 桂心、乾薑、木香、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服四錢。清水一盞。加大棗二

枚。煎至六分。去滓水服。

【茯苓丸】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治妊娠惡阻。心中煩悶。吐痰眩暈。不能健運。

藥品 茯苓、人參、桂心(熬)、乾薑、半夏(湯泡七次、炒黃)、橘皮、各一兩。白朮、葛根(煨)、甘草(炙)、枳實、各二兩。一方加麥門冬、一方加五味子。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。漸加至三十丸。米飲送下。一日三次。

【茯神散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人血風勞氣。目赤。胸背氣壅。四肢疼痛。心煩驚悸。不欲飲食。

藥品 抱茯神、羚羊角、防風(去蘆)、川獨活、人參(去蘆)、赤芍藥、天門冬(去心)、郁李仁(去皮微炒)、生乾地黃、枳殼(欬炒去瓢)、各一兩。柴胡(去苗)、石膏、各二兩。甘草(炙)、五錢。桃仁(湯浸、去皮尖雙仁、麩炒黃、研如泥)、一兩五錢。

制法及用法 研爲末。每服四錢。清水一中盞。加生薑五片。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【秦艽丸】

發明 見王肯堂證治準繩。**功用** 治小兒麻痺發熱。心神煩悶。小便黃赤。**藥品** 秦艽(去苗)、桑根白皮、枳殼(麸炒、微黃、去穢)、地骨皮、黃耆(剉)、人參(去蘆頭)、赤茯苓、甘草(微炙)、犀角、龍膽(去蘆頭)、各一分。柴胡、三分(去苗)。**制法及用法** 搗羅爲末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。不拘時粥飲送下。更量兒大小加減。

【秦艽散】

發明 見錢乙方。**功用** 治潮熱。減食羸瘦。**藥品** 秦艽(去頭、切焙)、甘草(炙)、各一兩。薄荷葉(切焙)、五錢。**制法及用法** 研爲粗末。每服二錢。清水一鍾。煎至八分。食後溫服。

【桃仁丸】

發明 見王肯堂證治準繩。**功用** 治婦人頭目昏重。心神煩悶。或時寒熱。肢節疼痛。不欲飲食。**藥品** 桃仁(湯浸、去皮尖雙仁、麸炒微黃)、芍藥、白朮、柴胡(去苗)、人參(去蘆)、生地黃、酸棗仁(微炒)、各一兩。赤

茯苓、訶梨勒皮、各七錢五分。枳殼(麸炒微黃、去穢)、赤芍藥、各五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。生薑、荆芥、薄荷煎湯送下。

【純陽正氣丸】

發明 驗方。**功用** 治天行時邪。感癘觸穢。中滿神昏。腹痛吐瀉。霍亂轉筋。絞腸痧症。小兒鬼忤。急驚瀉痢。痰迷心竅。四肢厥冷。**藥品** 土藿香、廣陳皮、生茅朮、半夏(薑製)、公丁香、官桂、生冬朮、青木香、白茯苓、各一兩。**制法及用法** 共爲極細末。花椒五錢。煎湯泛丸。紅糖汁四錢爲衣。每服五分。陰陽水送下。小兒減半。孕婦忌服。**參考** 按此方皆燥熱藥。宜於因感受寒溼而致上吐下瀉等症者。

十一筆

【逍遙丸】

發明 見集成方。**功用** 治婦人血虛勞倦。五心煩熱。肢體疼痛。頭目昏重。心忪煩赤。口燥咽乾。發

熱盜汗。減食嗜臥。及血熱相搏。月水不調。濟腹脹痛。寒熱如瘧。大便秘澀。室女血弱陰虛。榮衛不和。痰嗽潮熱。肢體羸瘦。漸成骨蒸。

藥品 白茯苓(一作茯神)、白朮(去蘆、土炒)、白芍藥(酒炒)、當歸(去蘆、酒浸、半日、微炒)、北柴胡(去苗)、各一兩。甘草、一兩五錢(炙、一作五錢)。

制法及用法 劉散研細。再用濃滋薄荷煎湯。泛丸如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。如有兼證。可酌加味煎湯爲引。

- ①熱甚。加丹皮、梔子。
- ②骨蒸。加知母、地骨皮。
- ③咳嗽。加五味子、紫菀。
- ④吐痰。加半夏、貝母、瓜蒌仁。
- ⑤飲食不消。加山楂、神麴。
- ⑥發渴。加麥門冬、天花粉。
- ⑦胸中作熱。加黃連、梔子。
- ⑧心慌。加遠志、棗仁。
- ⑨吐血。加阿膠、生地黃、牡丹皮。
- ⑩自汗。加黃耆、棗仁。
- ⑪久瀉。加乾薑(炒黑)。
- ⑫遍身痛。加羌活、防風、川芎。
- ⑬手足顫掉。加防風、荆芥、薄荷。
- ⑭氣惱胸膈痞悶。加枳實、青皮、香附。
- ⑮怒氣傷肝。眼目昏花。加龍膽、黃連、梔子。
- ⑯小腹痛。加香附、延胡索。
- ⑰經閉不通。加桃仁、紅花、蘇木。
- ⑱左腹血塊。加

京三稜、蓬莪朮、桃仁、紅花。

⑳右腹氣塊。加木香、檳榔。

【逍遙散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治肝氣抑鬱。血虛火旺。頭痛目眩。頰赤口苦。倦怠煩渴。寒熱咳嗽。兩脅作痛。臍部脹痛。小腹重墜。婦人經水不調。脈弦大而虛。

藥品 柴胡、七分(炒)。白朮(蜜水拌蒸)、茯苓、當歸、各一錢。白芍藥、一錢五分(酒炒)。甘草(炙)、陳皮(略去白、乾咳用蜜製、一作六分)、各八分。薄荷葉、五分(一作七葉)。煨薑(乾咳用蜜製)、三片。一方無陳皮。

制法及用法 咬咀。沸水煎。臨臥或半饑時熱服。

參考 肝之性急善怒。能達則順。不能達則鬱。鬱則火動而諸病生。發於上則爲頭眩。耳鳴。目赤。發於中則爲胸滿。脅痛。吞酸。發於下則爲少腹疼痛。洩瀉不利。發於外則爲寒熱往來。似瘧非瘧。凡此諸證。皆爲肝鬱之象。其成因又有二端。一爲土虛不能升木。一爲血少不能養肝。蓋肝爲木氣。全賴土以滋培。水以灌溉。若中土虛則木不升而鬱。陰血

少則肝不滋而枯。方用白朮、茯苓者。助土德以升木也。當歸、芍藥者。益榮血以資肝也。薄荷解熱。甘草和中。獨柴胡一味。既是爲厥陰之報使。又可作升發諸陽之用。所謂木鬱達之。以遂其曲直之性也。故以逍遙爲名。若內熱外熱俱盛者。則加丹皮解肌熱。炒梔清內熱。此又加味逍遙散之義也。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒風邪侵襲。榮衛不通。手難伸展。

藥品 羚羊角、羌活、五加皮、白蘚皮、桂心、各二錢五分。麻黃、五錢(去根節)。甘草(微炙赤)、一錢二分五釐。

制法及用法 爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。量兒大小加減。不拘時溫服。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

藥品 羚羊角屑、黃芩、犀角屑、甘草(炙)、茯神、各一分。麥門冬、五錢。

制法及用法 搗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。量兒大小。增減服之。

【健脾丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾胃不和。飲食勞倦。

藥品 白朮、二兩五錢(炒)。木香(另研)、黃連(酒炒)、甘草、各七錢五分。白茯苓(去皮)、二兩。人參、一兩五錢。神麴(炒)、陳皮、砂仁、麥芽(炒取麴)、山楂肉、山藥、肉豆蔻(麴裏浸熟、紙包、槌去油)、各一兩。

制法及用法 共研細末。蒸餅爲丸。如綠豆大。每服五十丸。陳米湯送下。空腹下午各一次。

【健脾丸】

功用 治脾虛氣弱。食入不化。

藥品 人參、白朮(土炒)、陳皮、麥芽(炒)、各二兩。山楂(去核)、一兩五錢。枳實、三兩。

制法及用法 研爲末。神麴糊丸。每服三錢。米飲送下。

【通氣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 和胃。通腸。

藥品 郁李仁(去皮研)、芍藥、人參、各五錢。大黃、山芋、官桂(去皮)、各一兩。檳榔、三枚。牡丹皮、木香、細辛(去苗)、甘草(炙)、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。令

勺。每服一錢匕。空腹時溫酒調下。

【通聖散】

發明 見劉河間方。

功用 治一切風濕暑溼。饑飽勞役。內外諸邪。氣血怫鬱。表裏三焦俱實。憎寒壯熱。頭目昏暈。目赤睛痛。耳鳴鼻塞。口苦舌乾。咽喉不利。唾涕稠黏。咳嗽上氣。大便秘結。小便赤澀。瘡瘍腫毒。折跌損傷。瘀血便血。腸風痔漏。手足濕癢。驚狂譫妄。丹斑癰疹等證。

藥品 防風、川芎、當歸、芍藥(焙、一作酒炒)、大黃(煨)、蘇薄荷葉、麻黃(去節)、連翹、芒硝、各五錢(一作各一兩)。石膏(煨)、黃芩(焙)、桔梗、各一兩。滑石、三兩(飛過、一作一兩、一作煨)。生甘草、二兩(一作三兩)。荊芥穗、白朮(土炒)、梔子(炒)、各二錢五分。

制法及用法 研爲粗末。每服二三錢。清水一大盞。加生薑(一作五片)三片(一方有蔥白)。煎至六分。食前溫服。或白湯調下亦可。①解利四時傷寒。及一切內外傷者。每一兩加益元散、一兩。葱白、十莖。鹽豉、一合。生薑、五錢。清水一鉢。煎至五七沸。或煎至一

小飽。溫服一半。以筋投之。即吐。吐罷後。服一半。稍熱服。汗出立解。②頭旋腦熱。鼻塞濁涕時下者。每一兩加黃連、薄荷、各二錢五分。如風傷於肺。咳嗽喘急者。每一兩加半夏、桔梗、紫苑、各二錢。③氣逆加木香末、一錢。④涎嗽。加半夏、五錢製。⑤諸風痼筋。大便秘結。筋轉驚悸。肌肉蠕動。及小兒驚風。每一兩加大黃、二錢。梔子、二錢。茯苓末、二錢匕。如肌肉蠕動者。調羌活末、一錢。⑥飲酒中風。身熱頭痛者。加黃連鬚、二錢。葱白、十莖。清水煎服。慎勿用桂枝麻黃湯解之。⑦勞汗當風。寒薄爲熱。鬱乃汗。去芒硝。倍加芍藥、當歸。⑧破傷風在表者。則辛以散之。在裏者。則苦以下之。兼散之。汗下後。通利榮血。祛逐風邪。每一兩加荊芥穗、大黃、各二錢。調全蠍末、羌活末、各一錢。⑨腰脊走注疼痛者。每服加硝石、當歸、甘草、各二錢。調車前子末、海金砂末、各一錢。⑩小便淋閉。去麻黃。加滑石、連翹。煎藥中調木香末、一錢匕。⑪瀉。去芒硝、大黃。⑫禿瘡。須將藥醇酒浸焙。研爲細末。每服一錢或二錢。食後白

滾湯調下。服至頭上多汗爲驗。⑤風刺癢疹。或赤或白者。去芒硝。倍麻黃。加鹽豉、葱白。清水煎服。發其汗。後依方中加四物湯、黃連解毒湯。三藥合而飲之。每日二次。⑥打撲損傷。皮節疼痛。腹中惡血不下者。每一兩加當歸、大黃、各三錢五分。調沒藥、乳香末、各一錢。

參考 此方以防風麻黃。解風熱之在皮膚者。使由汗而泄。荆芥薄荷。清上焦風熱之在顛頂者。使由鼻而泄。大黃芒硝。通腸胃風熱之在內部者。使由後而泄。滑石梔子。利水道風熱之在膀胱者。使由溺而泄。石膏桔梗。清肺胃之邪。連翹黃芩。祛諸經之火。川芎歸芍。和血以平肝。甘草白朮。和胃而健脾。於表裏三焦之病。皆可解矣。然非表裏俱實。大小便秘者。宜慎用。

【速效散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 疏肝。清熱。

藥品 黃連、黃蘗、黃芩、梔子、連翹、薄荷、柴胡、荆芥、當歸、生地黃、地骨皮、天花粉、蔓荊子、甘菊花、甘草、惡實、白蒺藜、枳殼、石決明、草決明、各五

分。

制法及用法 清水煎。食後服。

【麥煎散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治榮衛不調。夜多盜汗。四肢煩疼。面黃肌瘦。

藥品 柴胡(去苗)、秦艽、鼈甲(醋煮三五沸、去裙襖、再用醋炙黃)、各二兩。乾漆(炒煙盡)、人參、茯苓、乾葛、川烏(炮去皮尖)、玄參、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。先用小麥三七粒。煎湯一盞。去麥入藥。再煎三五沸。食後服。

【啓脾丸】

發明 見楊氏方。

功用 治脾胃不和。氣不升降。中滿痞塞。心腹膨脹。腸鳴泄瀉。不思飲食。

藥品 人參、白朮、青皮(湯洗去蘆)、陳皮(湯洗去白)、神麴(炒)、麥蘗(炒)、縮砂仁、乾薑(炮)、厚朴(去粗皮、剉、生薑汁製)、各一兩。甘草(炙)、一兩五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。食前細嚼。米飲送下。

十二筆

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血氣攻心腹。煩躁悶亂。疼痛不止。

藥品 琥珀(另研)、沒藥(另研)、當歸(炒)、赤芍藥、牡丹皮、延胡索、蒲黃、蓬莪朮、桂心、各等分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。溫酒調下。

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風。走注疼痛。

藥品 琥珀(另研)、當歸(去蘆)、牛膝(酒浸)、川大黃(剉微炒)、羌活(去蘆)、各七錢五分。沒藥(另研)、血竭(另研)、乾漆(炒煙盡)、玄胡索、防風(去蘆)、羚羊角屑、各五錢。桂心、一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。一日二次。

十三筆

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠中惡。心腹疼痛。

藥品 當歸、丁香、川芎、各三兩。青橘皮、二兩。吳茱萸、五錢(去梗、湯泡三次、炒黑)。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。不拘時溫酒調下。

十五筆

【駐車丸】

發明 見孫思邈千金方。

功用 治陰虛發熱。下痢膿血。及休息痢。

藥品 阿膠、十五兩(搗碎、蛤粉炒成珠、爲末、以醋四升、熬成膏、一作三兩)。黃連、一斤十四兩(去鬚、炒黑、一作六兩)。當歸、十五兩(去蘆、一作三兩)。乾薑、十兩(炮、一作二兩)。

制法及用法 研爲末。搗篩。醋煮阿膠膏爲丸。如梧桐子大。每服三四十丸。食前來飲送下。一日三次。小兒服。丸如麻子大。更量歲數加減之。

參考 三車運精氣神。分治三焦。以調適陰陽。此因陽熱過旺。陰精受傷。故用黃連以駐鹿車之驟。乾薑以策牛車之疲。阿膠以挽羊車之陷。當歸以和精氣神之散亂。故名駐車丸。

二十筆

【藿香正氣丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治外感風寒。內傷飲食。憎寒壯熱。頭痛嘔逆。胸悶腹脹。痰嗽氣喘。傷冷、傷濕、傷暑。霍亂吐瀉。癰瘡、山嵐、瘴癘。不服水土等症。

藥品 藿香、大腹皮、白芷、茯苓、紫蘇、各三兩。陳皮、白朮(土炒)、厚朴(根製)、苦桔梗、半夏、各二兩。甘草(炙)、一兩。

制法及用法 研末。以生薑、大棗、大腹皮、煎湯泛丸。每服三五錢。

參考 四時不正之氣。由口鼻而著於腸胃。故不用發汗以解表。而用芳香消導以和裏。兼用奠安中土之藥以扶之。故爲治一切四時不正之氣之通用品。或以蒼朮易白朮。於溼重者尤宜。

消導類

二筆

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒脾血虧。多時不瘥。腹痛羸瘦。不欲飲食。

藥品 人參(去蘆頭)、當歸(微炙)、地榆(微炙)、阿膠(搗碎炒黃)、黃連(去鬚微炒)、子芩、黃柏(微炙)、赤芍藥、熟地(微炒)、厚朴(去粗皮、塗生薑汁炙令香熟)、各五錢。

制法及用法 搗粗器爲散。每服一錢。清水一小盞。加薤白一莖。豆豉五十粒。煎至五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小加減。

【人中白散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒疳氣。寒熱。積滯不化。肚腹脹痛。

藥品 人中白、一分。麝香、五釐。蝦蟇(塗酥炙焦)、蘆薈、各五錢。

制法及用法 研細爲散。每服五分。量兒大小加減。空腹時及晚後熟湯調下。服後當下惡物。

【二神散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治諸淋急痛。

藥品 海金沙、七錢。滑石、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢五分。用燈心、木通、麥門冬、新汲水煎。入蜜少許。食

前調下。

【二聖散】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 疎風。和血。

藥品 大黃、五錢。皂角刺、三錢。

制法及用法 先以皂角刺燒灰。研爲細末。每服二錢。即用大黃煎湯調下。早服樺皮散。中以升麻湯下瀉青丸。晚服此散。爲緩治。

【七宣丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治胸中虛痞食少。腹中各種積聚。便秘溺澀。積年腰脚疼痛冰冷。或脚轉筋攣急痛。或脚氣衝心煩憤。心神恍惚難眠。風毒頭面俱腫。

藥品 桃仁(去皮尖炒)、六兩。柴胡(去苗)、訶子皮、枳實(麸炒)、木香、各五兩。甘草(炙)、四兩。大黃(麵裹煨)、十五兩。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前臨臥米飲送下。以利爲度。覺病勢退。服五補丸。此方不問男女老幼。皆可服。量虛實加減丸數。

【八仙糕】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治腸風。發泄。

藥品 枳實、白朮、山藥、各四兩。山楂肉、三兩。茯苓、陳皮、蓮子肉、各二兩。人參、一兩。

制法及用法 研爲末。加粳米粉五升。糯米粉一升五合。白蜜三斤。和蒸作糕。焙乾食之。

【十全丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治丁奚喘露。

藥品 尖檳榔、枳實(麸炒)、青皮、陳皮、荆三稜(炒)、蓬莪莖(炒)、砂仁、各五錢。丁香、木香、各一分。香附、一兩(一方去香附、砂仁、丁香、荆三稜、枳殼、加五靈脂、白豆蔻、使君子、蘆薈、蝦蟆、川芎)。

制法及用法 研爲末。神麴煮糊和丸。如黍米大。每服一百丸。空腹食前米飲送下。

【丁香脾積丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治脾積腹滿。

藥品 丁香、木香、各三錢。三稜(去皮毛煨)、蓬莪朮(去皮炒)、神麴(炒)、各七錢。青皮、巴豆霜、小茴香(炒)、陳皮、各五錢。

制法及用法 研爲細末。薑調神麴糊和丸。如菉豆大。每服五七丸。薑湯送下。

三 筆

【三聖丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治心中嘈雜。

藥品 白朮、四兩。橘紅、一兩。黃連(炒)、五錢。

制法及用法 研爲細末。神麴糊和丸。如綠豆大。每服七八十丸。食遠津唾化下。或生薑湯送下。

【三聖膏】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治痞積。

制法及用法 用風化石灰十兩(一作八兩)。細篩過。炒用。急用好醋熬成膏。入錦紋大黃末一兩。官桂末五錢。攪勻。以瓦器封貯。紙攤。火烘熱貼患處。

【三稜散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治諸般停滯。痞積發熱。瀉痢酸醜。水穀不化。常服和脾胃。進飲食。長肌肉。益神氣。

藥品 三稜(泡剉)、香附、各一兩五錢。青皮(去白)、人參(去蘆)、各七錢五分。益智仁、

陳皮(去白)、枳殼(去穰剉片、麸炒)、神麴(炒)、生穀芽(洗焙)、半夏(製)、蓬莪莖(醋煮透、瀝乾剉焙)、大黃(半生半泡)、紫蘇(去老梗)、各五錢。甘草(半生半熟)、一兩二錢。

制法及用法 剉碎。每服二錢。清水一盞。加生薑三片。倉米一百粒。煎至七分。不拘時溫服。氣虛者。加白茯苓、一兩。

【三稜煎丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 順氣。消積滯。除膨脹。治心腹堅脹。骨硬。胸痞。喘滿短氣。

藥品 京三稜、八兩(生搗爲細末、以酒或醋三升、於銀石器內熬成膏)、杏仁(湯泡、去皮尖、炒令黃色、一作一兩)、乾漆(炒煙盡、一作二兩)、陳麝香(炒)、各三兩。小青皮(去白)、白蘿蔔(炒、一方用子)、神麴(炒、一作三兩)、各二兩。礞砂(飛研)、一兩。

制法及用法 研爲細末。三稜膏和丸。如梧桐子大。每服二三十丸。食後溫米飲生薑湯送下。

【小阿魏丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治食肉太多。腹中積

聚脹痛

藥品 山查肉、三兩。石鹽、三錢。半夏、一兩。

制法及用法 研爲末。加阿膠五錢。醋浸米糊和丸。熱湯送下。

【小阿魏丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治食肉太多。腹中積聚脹痛。

藥品 阿膠(醋化)、山查、各一兩。黃連、六錢五分。連翹、五錢。

制法及用法 研爲細末。醋煮米糊和丸。熱湯送下。

【小溫中丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治腹實。黃胖足腫。食少口淡。或腹脹內熱。小便不清。脾虛肝旺。不能健運。雖有積聚。不可下者。

藥品 陳皮、半夏(湯泡、去皮擠)、神麴(炒)、茯苓、各一兩。白朮、二兩。香附子(不可烘曬)、鍼砂(醋炒紅)、各一兩五錢。苦參(炒)、黃連(炒)、各五錢。甘草、三錢。

制法及用法 研爲末。米醋清水各一盞。打糊爲丸。如梧棋子大。每服七八十丸。用白朮六錢。陳皮一錢。生薑一

片。清水煎湯送下。虛甚者。加入參、一錢。各用本方。去黃連。加厚朴、五錢。忌口。病輕者服六七兩。小便即長。病甚者服一斤。小便始長。

【大黃丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治龜胸。肺熱壅滯。心悶滿隔。

藥品 大黃、七錢五分(微炒)。天門冬(焙)、百合、苦杏仁(麩炒微黃)、木通、桑白皮、甜葶藶(隔紙炙紫)、朴硝、各五錢。一方無朴硝、有石膏。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如棗豆大。每服五丸。不拘時溫湯化下。量兒大小加減。

【山查糕】

功用 山查實和糖蜜製成之糕。性質酸冷無毒。或作甘微溫。能消肉積。治痰飲。行氣活血。發小兒痘疹。與山查實同。而較和潤。不傷脾胃。

四 筆

【木香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒乳積。食積。氣積。逆後肚有癖塊。

藥品 木香、蓬莖朮、縮砂仁、陳皮(去白)、礞砂、代赭石、

各二錢。丁香、川巴豆肉(紙壓去油)、各一錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。水飛白麵糊和丸。如麻子大。每服二三丸。乳傷。乳汁送下。食傷。米飲下。

【木香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠傷食。

藥品 木香、二錢。三稜、人參、白茯苓、各三錢。

制法及用法 研爲細末。水煮麵糊和丸。如綠豆大。每服三四十丸。熟湯送下。

【木香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣。心腹脹滿。堅硬不消。

藥品 木香、訶梨勒皮、檳榔、各一兩。桂心、七錢五分。川大黃(煨)、鼈甲(醋炙)、各一兩。

制法及用法 每服八錢。沸水一鍾半。加生薑五片。煎至一鍾。不拘時服。

【木香檳榔丸】

發明 見御藥院方。

功用 疎導三焦。寬利胸膈。破積逐飲。快氣順腸。消食。治熱秘。風秘。

藥品 木香、檳榔、枳殼(鈇炒)、杏仁(去皮尖炒)、青皮(去

瓤)、各一兩。半夏麴、皂角(去弦子酥炙)、郁李仁(去皮殼另研)、各二兩。

制法及用法 研爲細末。另以皂角四兩打碎。漿水一碗浸之。去渣。搓揉熬膏。更加煉蜜少許和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹或食後薑湯送下。

【木香檳榔丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治食積。

藥品 木香、檳榔、白朮、枳實、陳皮、香附。

制法及用法 研爲末。水泛丸。熟湯送下。

【木香塌氣丸】

發明 見王好古醫壘元戎。

功用 治單腹脹。

藥品 丁香、胡椒、各二錢。郁李仁、四錢。蠅尾、木香、檳榔、各五錢。枳實、白牽牛、各一兩。

制法及用法 研爲細末。米飯和丸。如綠豆大。每服十丸至十五丸。陳皮湯或生薑湯送下。

【化痞膏】

發明 見劉長隨方。

功用 化痞積。

藥品 當歸尾、紅花、金銀

花、三稜、白芥子、蓬莪朮、葫蘆巴、昆布、生地黃、桃仁、亂頭髮、大黃、熟地黃、鼈甲、穿山甲、各一兩。海藻、兩頭尖、阿魏、蓖麻子、川烏頭、巴豆仁、黃連、天南星、漏蘆、大貝母、半夏、川草薢、大戟、胡黃連、甘遂、鳳仙子、芫花、海浮石、阿膠、威靈仙、檳榔、直僵蠶、全蠍、爪兒血竭、乳香(去油)、粉草、金線重樓、沒藥(去油)、各三錢。土木鼈、番木鼈、獨蒜、各三十個。蜈蚣、三十條。水紅花子、四兩。鮮商陸、八兩。活鯽魚、一尾(重半斤者)。麻油、三斤。黃丹(飛晒炒)、一斤八兩。麝香、一錢。

制法及用法 用麻油熬成膏。惟乳沒竭勝阿魏五味。另研收貯。臨攤時摻膏藥上。

【化癥丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治乳癖結塊。

藥品 巴豆霜、五錢。膩粉、硃砂、各一錢。黃鷹糞、二錢五分。硃砂、雄雀糞、各一字。

制法及用法 共研如粉。糯米飯和丸。如黍米大。一歲兒每服二丸。空腹時皂莢仁煎湯送下。取下惡物爲度。

【勻氣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

藥品 木香、青皮、各五錢。山查肉、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。甘草湯調下。

【天門冬丸】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治伏邪傳注。腹有硬塊。積氣壅心胸作痹。痛引脅背。脘脛滿悶。

藥品 天門冬(去心)、鬼白、各七錢五分。巴豆、莽草、不蛀皂角、葉子雄黃、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如小豆大。每服一丸。漸加至三五丸。空腹臨臥白湯送下。常服宜斟酌。勿令泄瀉。忌食鯉魚山豬蘆符。

【五香散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 宣利三焦。疎導壅滯。發散邪熱腫痛結核。或頭痛惡心。寒熱氣急。似起癰癤之狀。

藥品 青木香、丁香、沈香、乳香、菴香、各等分。

制法及用法 剉散。每服三錢。清水一盞半煎。食後溫服。

五 筆

【白朮丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傷豆粉溼麵油膩之物者。

藥品 白朮、半夏(製)、神麴(炒)、枳實(炒)、各一兩。橘紅、七錢。黃芩、五錢。枯白礬、一錢。

制法及用法 研爲末。湯浸蒸餅和丸。量所傷多少加減服之。如素食多用乾薑。故以黃芩瀉之。

【白朮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾勞。嘔吐不食。腹痛泄瀉。胸滿喜噫。

藥品 白朮、人參、草吳仁、厚朴(製)、肉豆蔻(麴裏煨熟、取出去麴)、廣陳皮(淨)、木香、麥蘗(炒)、各一兩。甘草(炙)、五錢。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一盞。加生薑五片。大棗子一枚同煎。不拘時服。

【白龍丸】

功用 固精。壯陽。治房勞。

藥品 鹿角霜、牡蠣、各二兩。生龍骨、一兩。

制法及用法 研爲細末。酒煮米糊和丸。每服三十丸。空腹時溫酒或鹽湯送下。

【半夏丸】

發明 見楊士瀛仁壽齋直指。

功用 治下血、吐血、痰喘急

滿、虛腫、霍亂、諸病、婦人屢中、帶下。

藥品 半夏、不拘多少(圓白者、刮淨徒屑)。

制法及用法 以薑汁調飛白麵作餅。包炙黃色。去麵取半夏。研爲末。水煮米糊和丸。如綠豆大。每服十丸。溫熱水送下。或芍歸湯、沈香降氣湯各半煎送下。

【半夏散】

發明 見姚僧坦集驗方。

功用 治脚氣。煩悶嘔逆。心胸壅悶。不能飲食。

藥品 半夏(湯洗七次切片)、桂心、各七錢五分。赤茯苓(去皮)、人參(去蘆)、陳橘皮(去白)、前胡(去蘆)、檳榔、各一兩。紫蘇葉、一兩五錢。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一中盞半。加生薑七片。淡竹茹二盞。煎至七分。去滓。不拘時溫服。

【平胃丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治溼滯脾胃。不能運化。積飲痞滿。不思飲食。心腹脹痛。口苦短氣。泛胃惡心。噯氣吞酸。面黃體瘦。體痛嗜臥。壯熱自利。轉筋肢廢。霍亂吐瀉。風泄水蠱。五

噎入噎。胎死腹中等症。常服調氣。緩胃。化宿食。消痰飲。辟四時不正之氣。

藥品 厚朴、五兩(去皮、薑汁炒、一作三兩四錢、一作三兩)。陳皮(泡去浮白、一作五兩、一作三兩四錢、一作三兩)、甘草(炙、一作三兩、一作一兩八錢)、各一兩。蒼朮、八兩(米泔浸七日、去皮、麻油拌、炒黃、一作四兩、一作五兩)。

制法及用法 研爲末。用生薑、大棗煎湯泛丸。每日服三次。每服二錢至四五錢。沸湯或薑湯送下。如酒泄、飲後獨甚者。加丁香、縮砂、麥芽、神麴、各五錢。研爲末。每服二錢。空腹時米飲調下。①泄瀉脾溼。加茯苓、丁香、白朮。或加藿香、半夏。瘟疫時氣。傷寒頭痛壯熱。加葱白(連鬚)、五寸。豆豉、三十粒。煎二三沸。取微汗出愈。②五癆七傷。脚手心熱。煩躁不安。百節痠痛。及痢疾寒熱。加柴胡。③痰嗽喘弱。加半夏(薑製)。④小腸氣痛。加苦楝、茴香。⑤水氣腫滿。加桑白皮。⑥婦人赤白帶下。加黃耆。⑦酒傷。加丁香。飲冷傷。加高良薑。⑧滑脫泄瀉。加肉豆蔻。⑨風痰。四肢沉困。加荆芥。⑩腿膝冷

痛。加牛膝。⑪渾身虛腫拘急。加地骨皮。⑫腿膝溼痹。加菟絲子。⑬白痢。加吳茱萸。赤痢。加黃連。⑭頭風。加藁本。⑮轉筋霍亂。加梓木皮。⑯七邪六極。耳鳴夢泄盜汗。四肢沉重。腿膝痿弱。婦人宮臟久冷。月經不調者。加桂枝。⑰胃寒嘔吐。多加生薑。或加茯苓、丁香、各三兩。⑱氣不舒快。中脘痞塞。倍厚朴。減甘草。加砂仁、木香、枳殼。⑲飲食減退。加神麴、麥芽。⑳小便赤澀。加茯苓、澤瀉。溼季同此。㉑米穀不化。飲食傷者。多加枳實。㉒脾胃困弱。飲食不思。加人參、黃耆。㉓有痰。加半夏。㉔咳嗽飲食減少。脈弦細者。加當歸身、黃耆。脈洪大緩者。加黃芩、黃連。㉕大便硬者。加大黃、三錢。芒硝、二錢。先以桃仁(麩炒)、嚼爛送下。㉖胎死腹中。酒水各一鍾。煎至一半。加朴硝末五錢。再煎三五沸。去滓溫服。其胎即化爲水而出。

參考 此爲健運腸部滯滯之主方。方中重在用朮。爲燥溼健脾之用。脾燥則不滯。所以能健運而得其平。第白朮柔緩。蒼朮猛悍。此方以發汗除溼爲重。故以蒼朮爲君。厚朴

色亦苦溫。能助火以生氣。故以爲佐。溼因於氣之不行。氣行則愈。故更以陳皮佐之。甘先入脾。脾得補而健運。故以炙甘草爲使。名曰平胃。實化溼調腸之劑也。

【平瘧養脾丸】

發明 驗方。

功用 治久瘧體虛。

藥品 焦白朮、人參(無則用高麗參)、漂蒼朮、製半夏、茯苓(人乳蒸)、陳皮(酒炒)、青皮(醋炒)、紫川朴(薑製)、北柴胡、黃耆(炙)、豬苓(炒)、澤瀉(炒)、桂枝(焙)、常山(焙)、鼈甲(醋炙)、白當歸(酒炒)、甘草(炙)、草果仁(薑製)、川芎(酒炒)、各等分。

制法及用法 共研細末。酒煮麵糊爲丸。如米粒大。每服一二錢。米湯送下。有痞者。加三稜、蓬莪朮。

【四消丸】

功用 消酒。消食。消氣。消痰。治飽悶脹滿。嘔吐。憎寒壯熱。

藥品 香附(製)、五靈脂、皂刺、黑白朮、各二兩。

制法及用法 共研末。水泛丸。每服三錢。熱湯送下。

六 筆

【回生丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治腫脹。

藥品 青皮、陳皮、三稜、蓬莪朮、連翹(以巴豆、一兩五錢、同炒、去巴豆)、木香、甘遂、商陸、木通、澤瀉、乾漆(炒至煙盡)、萊菔子、各三錢。赤茯苓、桑皮、椒目、各五錢。胡椒、一錢。黑丑、一兩。

制法及用法 研爲細末。醋煮米糊和丸。初服十五丸。五更時葱酒煎湯送下。次服十八丸。桑皮、陳皮、煎湯送下。三服二十丸。射干煎湯送下。患水腫者。忌食鹽魚肉雞麵羊湯。並忌房事。

七 筆

【妙香丸】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 通竅豁痰蕩滯。治男婦大小百病。

藥品 辰砂(飛)、一兩。牛黃、生龍腦、麝香、各二錢五分。金箔、十四片。粉霜、膩粉、各一錢。黃蠟、二兩。巴豆、一百二十粒(肥者、去皮心膜、炒熟、研如麵、一方無粉霜)。

制法及用法 研爲細末。和勻。煉黃蠟入白蜜三分。同煉令勻爲丸。每兩作三十丸。①傷寒時疾。毒氣結伏。脈息交亂者。每服一丸。或分作三丸。龍腦、膩粉、米飲調下。②結胸潮熱。狂走躁擾。二便不通者。每服一丸。大黃、甘草(炙)、煎湯送下。③中毒吐血。悶亂煩躁者。每服一丸。生人血送下。④中酒毒。食毒。茶毒。氣毒。以及風痰伏痞吐逆者。膩粉、龍腦、米飲調下。⑤毒利下血者。黃連煎湯。調膩粉少許下。⑥小兒驚風百病。丸如綠豆大。每服二丸。龍腦、膩粉、蜜湯調下。⑦食積痰滯。煩躁吐利者。每服一丸。金銀花、薄荷、湯送下。⑧虛中積食。寒熱心腹滿痛者。服一丸如彈子大。夜半後龍腦、漿水送下。⑨凡臟虛者。製丸如小豆大。每服三丸。龍腦、米飲調下。⑩凡欲藥力速行。即以鍼刺數孔。冷水浸少時服之。若欲藥勢緩。則按令扁。服之。服後所下一切惡毒中。仍有藥丸包裹在內者。可以水洗淨。用油草紙裹埋土中。五日後仍可依法用之。惟一丸經三人服過。即不堪再用。

【妙應丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痞塊。

藥品 附子、四個(七錢重者、去皮臍、剉作塊、入礞砂、共一兩七錢、麴裏煨熟、去麴)。葶藶、破故紙、腎皮、各三兩五錢。

制法及用法 共研細末。米糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。生薑、陳皮、煎湯送下。

【佛手露】

功用 其性香淡無毒。功能悅脾。舒肝。寬胸。解鬱。疎氣。開胃。進食。治氣膈。煩熱。竹葉。爲消痞之要藥。亦平肝之良品。

【牡蠣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血疳。

藥品 牡蠣(煨)、當歸(酒拌)、甘草節、滑石(煨)、各一錢五分。大黃、三錢。木鼈子、五枚(杵)。

制法及用法 清水二鍾。煎至一鍾。露一宿。五更頓服。冬月火溫服。未潰膿血從大便出。

參考 此方爲鹹寒導滯之劑。若久曠房室。大小便秘。發熱欲痛。或交感強則精氣。致精血交錯。腫結疼痛。便秘

者宜之。

【利膈丸】

發明 見王袞博濟方。

功用 治三焦氣逆。胸膈壅塞。頭眩目昏。涕唾痰涎。精神不爽。

藥品 牽牛、四兩(半生半熟)。皂角(不蛀者、塗酥炙)、二兩。

制法及用法 研爲細末。生薑自然汁煮米糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。臨臥時荆芥湯送下。

八 筆

【阿魏丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肉積。

藥品 阿魏、山查肉、各一兩。連翹、五錢。黃連、六錢五分。

制法及用法 研爲末。阿魏醋煮糊和丸。如梧桐子大。每服五六十丸。食前熱湯送下。脾胃虛者。用白朮三錢。陳皮、茯苓各一錢。煎湯送下。

【阿魏丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒食積。腹如蜘蛛。肚痛。小便白濁。

藥品 阿魏(醋浸一宿、研如泥)、黃連(炒)、連翹、各五錢。

花鹼(研如粉)、三錢。山查肉、一兩。半夏(皂角水浸一宿)、一兩。

制法及用法 研爲末。神麴炒糊和丸。如菟子大。每服二十丸。空腹時米飲送下。喫果子多者、加胡黃連。米食多者。加神麴、山查肉。肉食多者。加阿魏。

【阿魏膏】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治一切瘡塊。

藥品 羌活、獨活、玄參、官桂、赤芍藥、穿山甲(泡)、生地黄、兩頭尖、大黃、白芷、天麻、各五錢。槐柳、桃枝、各三錢。紅花、四錢(一作三錢)。土木鼈子、二十枚(去殼、一作十枚)。亂髮(如雞子大)、一團。一方無羌活、玄參、白芷、天麻、生地、赤芍。有川烏、南星、半夏、甘遂、甘草、人參、五靈脂、各五錢。

制法及用法 用真麻油二斤四兩(一作二斤)、浸。春五、夏三、秋七、冬十日。煎黑去滓。入亂髮。再熬濾清。徐下黃丹煎。較輒便得中。入芒硝、阿魏、乳香、沒藥各五錢。取起離火。再入蘇合香油五錢。麝香三錢。調勻成膏。瓷器收藏。每用兩許。攤大紅綾上。

貼患處。內服健脾。消積。開
離藥。凡貼背須正當痞塊。不
可偏。偏則隨藥少處遁去。即
不得力。貼後以錦紙施。用芒
硝隨患處鋪半指厚。用熱熨斗
熨一時許。日熨三次。硝耗再
加。月餘藥力盡。其背自脫便
愈。年久者。連用二背。無不
消盡。若是肝積見於左脅。即
蘆薈末和硝熨之。倘積去。於
此遁處。再貼一背。必仍歸舊
窠。宜更服規連丸。

九 筆

【枳朮丸】

發明 見張潔古方。

功用 消食強胃。治胃虛溼
熱。脾不健運。飲食不化。氣
滯痰聚。心下痞悶。或臟腑輭
弱及便血。

藥品 枳實(去穢炒)、一
兩。白朮(土炒)、二兩。

制法及用法 研爲細末。荷
葉裹燒陳米飯和丸。如梧桐子
大。每服四五十丸或七八十
丸。空腹時、白朮煎湯。或米
飲、白朮湯送下。

參考 此爲易老本仲景枳朮
湯之意而立方。以白朮氣味之
苦甘。去溼熱而補脾元。枳實
之苦溫。泄痞悶而消積滯。朮
多於枳一倍。則先補後消。不

爲峻厲。荷葉芬芳養胃。以之
煨飯和藥。與朮協力。養穀
氣。更有五積散助之妙。

【枳實散】

發明 見王肯堂證治準繩

功用 治胸膈、

藥品 枳實(麸炒)、赤茯苓
(去皮)、前胡(去蘆)、陳皮(去
白)、各一兩。木香、五錢。

制法及用法 咬咀。每服五
錢。清水一大鐘。加生薑、三
片。煎至五分。去滓。食前溫
服。

【枳實散】

發明 見王肯堂證治準繩

功用 治息賁。腹脅脹硬。
咳嗽見血。痰粘不利。

藥品 枳實(麸炒)、木香、檳
榔、赤茯苓(去皮)、五味子、甜
葶藶(隔紙炒令紫色)、訶梨勒
(去核)、甘草(微炙)、各五錢。
杏仁、一兩(湯洗、去皮尖雙仁、
麸炒黃色)。

制法及用法 咬咀。每服三
錢。清水一中鐘。加生薑五
釐。煎至六分。去滓。不拘時
溫服。

【枳實消痞丸】

發明 見李東垣方。

功用 開胃。進食。治心下
痞痞。惡食懶倦。右關脈浮
弦。

藥品 枳實、黃連、各五錢。白朮、人參、半夏麴、各三錢。厚朴(炙)、四錢。乾薑、甘草(炙)、白茯苓、麥蘖、各二錢。

制法及用法 研爲細末。湯浸蒸餅和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。不拘時白湯送下。量虛實加減。

【香稜丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治五積六聚氣塊。

藥品 三稜、檳榔、各三兩。山楂肉、二兩。香附、蘿蔔子、枳實、枳殼、陳皮、青皮、蓬莪朮、各一兩。黃連、神麴、麥芽、鼈甲、乾漆、桃仁、硃砂、縮砂仁、當歸身、木香、甘草、各一錢。

制法及用法 共研細末。醋煮麵糊爲丸。每服四五十丸。熱湯送下。

【香橘餅】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒過傷乳食。或吐或瀉。及病後虛中。感積成痢。氣弱神昏。面黃目慢。

藥品 南木香、陳橘皮(去白)、青皮(去白)、各二錢五分。厚朴(去粗皮薑汁製)、七錢。縮砂仁、神麴(漚紙裹炮)、麥芽(淨洗焙乾)、各五錢。三稜(炮

剉)、三錢。

制法及用法 木香不過火。餘七味剉焙。同木香研爲細末。煉蜜作餅。如芡實大。每服一餅至三餅。棗湯化開。空腹溫服。米清湯亦可。

【香砂枳朮丸】

發明 見張潔古方。

功用 和血補血。治胸膈脹滿。氣滯食滯。痰滯停留。嘔惡便泄。飲食少進。霍亂野泄。

藥品 木香、砂仁、枳實(麸炒、一作枳殼)、各一兩。白朮(土蒸)、三兩。

制法及用法 共研爲末。荷葉包陳米煎湯泛丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

參考 此方破滯氣。消飲食。健脾胃。爲攻補兼施之良方。

【香砂養胃丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 通氣和胃。

藥品 香附、砂仁、木香、枳實、豆蔻仁、厚朴、藿香、各七分。白朮、陳皮、茯苓、半夏、各一錢。甘草、三分。

制法及用法 上係湯量。丸量準此酌加。研細。用生薑、大棗、煎湯泛丸服。

【保和丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 和血。補血。治食積。酒積。痰飲。胸膈痞滿。噯氣吞酸。泄瀉腹痛。及癰痢。

藥品 山楂肉、二兩(薑汁泡、一作二兩五錢、一作三兩、一作一兩)。半夏(薑製、一作一兩五錢)、橘紅(炒、一作五錢)、神麴(炒、便血月紅麴、一作一兩五錢)、麥芽(炒去殼、一作五錢)、白茯苓(一作五錢)、各一兩。連翹殼、蘿蔔子(炒、一作一兩)、黃連(薑汁炒)、各五錢。一方無黃連。一方無黃連、麥芽。一方無茯苓、連翹殼、蘿蔔子。

制法及用法 共研細末。水泛爲丸(一作神麴糊丸、一作米糊爲丸)。如梧桐子大。每服二三錢。茶清或熟湯送下。

參考 方中麥芽傷腎。薊子傷脾胃之氣。恐非丸劑所宜。久服之品。當易枳實、香附子。功用不殊。而不致過傷先後天之真氣也。

十 筆

【消乳丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 溫中。快膈。止嘔吐。消乳食。

藥品 香附子(炒)、二兩。甘草(炙)、陳皮(去白)、各五錢。

縮砂仁、神麴(炒)、麥蘗(炒)、各一兩。

制法及用法 研爲末。泡雪糕和丸。如黍米大。七歲以上如綠豆大。每服三十丸。食後生薑湯送下。

【消乳丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒乳哺飲食取冷過度。脾胃不和。宿食不消。常服寬中。快氣。消乳食。正顏色。

藥品 縮砂仁(炒)、陳皮(炒)、三稜(煨、一作炒)、神麴(炒)、麥芽(炒)、各五錢。香附子、一兩(米醋浸一宿炒)。一方加蓬莪茂(煨)、枳殼、檳榔、烏梅、各五錢。丁香、二錢五分。

制法及用法 共研細末。水煮麵糊爲丸。如綠豆大。每服二三十丸。食後紫蘇湯或熟湯送下。量兒大小加減。

【消積丸】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒食積。發熱吐瀉。大便酸臭。

藥品 丁香、九枚。縮砂仁、十二枚(一作二十枚)。烏梅肉、三枚(焙、一作二枚)。巴豆、二枚(去皮油心膜、一作二十枚、一作二錢)。

制法及用法 研爲細末。水。

煮麪糊和丸。如黍米大。三歲以上每服三五丸。以下每服二三丸。不拘時熟湯送下。

【消積丸】

發明 見沈金鰲 沈氏尊生書。

功用 治痞塊。

藥品 黃連(一半以吳茱萸、五錢同炒、去吳萸、一半以益智仁、五錢同炒、去益智)、蘿蔔子(炒)、白芥子(炒)、各一兩五錢、梔子、川芎、京三棱、蓬朮、桃仁、香附、山楂肉、神麴、各一兩。青皮、五錢。

制法及用法 共研細末。蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服五六十丸。熟湯送下。

【消痞狗皮膏】

功用 治痞塊、血塊、癰疽、瘰癧、腹脹疼痛等症。

藥品 阿魏、一兩。肉桂、公丁香、各五錢。麝香、一錢。木香、四錢。乳香(去油)、沒藥(去油)、各六錢。

制法及用法 共爲細末。用萬應膏藥肉(即萬應寶珍膏之不加細料者)一斤八兩。隔水燉化。將藥末攪入。攤膏。每用一個。在滾茶壺上烘至極熱。貼於患處。再用暖手揉百餘轉。後能自作寒熱。腹痛下穢。其疾自愈。百日內忌酒色。氣惱。

勞役。發物。

【消痞阿魏丸】

發明 見衛生寶鑑方。

功用 治痞積、積聚、痞塊。

藥品 阿魏(醋浸)、五錢。山楂肉、南星(皂角水浸)、半夏(同南星浸)、麥芽、神麴(炒)、黃連、蘿蔔子(蒸)、各一兩。連翹、貝母、瓜蒌、各五錢。風化硝、石鹼、胡黃連、白芥子(一作食鹽)、各二錢五分。

制法及用法 研爲末。薑汁浸炊餅和丸。每服二錢。熟湯送下。服後慎食胡桃肉。虛者忌服。嗽加香附、蛤粉。

【神麴】

功用 行氣。化痰。消食。調中。健脾。開胃。煨胃。下氣。治日疾。霍亂。食積。心痛(燒紅滓酒服)。腹痛。脹滿。癰結。積滯。赤白痢。婦人產後血暈(研末服)。胃反。閃挫腰痛(煨過、滓酒服)。回乳。下胎。

制法及用法 三伏吉日。以白麵百斤。青蒿、蒼耳、野蓼自然汁、杏仁泥、赤小豆末各三升。和作餅。麻葉或楮葉包裹。如造醬黃法。待生黃衣。晒乾收用。陳久者良。

參考 此物氣辛散。味甘。辛溫無毒。陽中之陽。入脾胃

二經。爲消導之品。其治目疾。生用能破其生氣。熟用能斂其暴氣。惟脾陰虛。胃火盛者忌之。又能解渴。孕婦宜少食。

十二筆

【開結導飲丸】

發明 見李東垣方。

功用 治食滯胸悶。脚氣流注。

藥品 陳皮、白朮、澤瀉、茯苓、半夏(製)、神麴、麥蘖、各一兩。枳實(炒)、青皮、乾薑、各五錢。

制法及用法 共研末。湯浸蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。至七十丸。食遠溫湯送下。如有積塊者。加巴豆霜。一錢五分。

【勝金散】

發明 見鄭氏方。

功用 治妊娠因食傷胎。氣虛冷。通小腹脹痛。腰重便秘。

藥品 吳茱萸(酒浸)、陳皮(淨)、川芎、乾薑(炮)、生薑(切焙)、各一錢五分。甘草(炙)、厚朴(薑製)、各三錢。一方加續砂仁。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。陳米飲調下。入鹽煎服尤妙。

【順氣消食化痰丸】

發明 見瑞竹堂經驗方。

功用 治酒食生痰。胸膈膨悶。五更咳嗽。

藥品 半夏(薑製)、膽星、各一斤。青皮、陳皮(去白)、生萊菔子、蘇子(洗水者炒)、山楂(炒)、麥芽(炒)、神麴(炒)、葛根、杏仁(去皮尖、炒)、香附(製)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。薑汁和蒸餅糊丸。如梧桐子大。每服三錢。薑湯送下。

十三筆

【葛花解酲丸】

發明 見李東垣方。

功用 治飲酒太過。嘔吐痰逆。頭痛心煩。胸膈痞塞。手足顫搖。小便不利。大便瀉瀉。

藥品 葛花、白豆蔻、續砂仁(炒)、各五錢。青皮(去瓢)、蓮花、各三錢。木香、五分。橘紅、人參、豬苓(去皮)、白茯苓、各一錢五分。神麴(炒)、澤瀉、乾薑、白朮(炒)、各二錢。一方無蓮花。一方無澤瀉、乾薑、白朮。有知母。

制法及用法 研細末。爲丸服。但上係湯量。丸量準此酌加。

參考 酒爲溫熱之品。少飲調和氣血。內助消化。外捍風

邪。恣飲無度。則傷胃昏腦而眩暈作。君葛花之辛香。臣神麴之消導。使苓澤之淡滲。服後取汗。足以外解肌肉。內清陽明。俾酒毒四面分消。體內自臻和泰。如再佐以芩連之苦燥。方尤貼切。惟不可恃此醺飲。頓服取汗。自損天年。

十六筆

【橘半枳朮丸】

發明 見張路玉張氏醫通方。

功用 補脾。調氣。治脾虛不化。痰多嘔吐。脫痞食少。

藥品 枳實(去瓤、麸炒)、一兩。白朮(土炒)、二兩。橘皮、半夏、各五錢。

制法及用法 研爲細末。荷葉裹煨陳米飯和丸。如梧桐子大。每服四五十丸或七八十丸。空腹時。白朮煎湯或米飲白滾湯送下。

【導氣丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 除積聚。

藥品 青木香、蘿蔔子、茴香、檳榔、黑牽牛、各四兩。

制法及用法 共研細末。薄粥爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。熱湯送下。

十七筆

【霞天麴】

功用 消痰飲。健脾胃。

藥品 霞天膏、四兩。川貝母、八兩。

制法及用法 將膏烊化。和川貝粉成餅。服之。

參考 此爲麴之一種。

十八筆

【檳榔丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 消宿食。破滯氣。

藥品 檳榔、三錢。木香、人參、各二兩。陳皮、五錢。甘草、一錢。

制法及用法 共研末。蒸餅爲丸。每服二三十丸。食前熟湯送下。

疏散類

七筆

【辛夷散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻塞涕出不已。或氣息不通。不聞香臭。

藥品 辛夷、川芎、木通(去節)、細辛(洗去土)、防風(去蘆)、羌活、藁本(去蘆)、升麻、

白芷、甘草(炙)、各等分。蒼耳子、減半。一方無羌活、蒼耳子。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後茶清調下。

【阜角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治吹爛。

藥品 阜角(煨灰)、蛤粉(研細)。

制法及用法 和勻。每服八字。熱酒一杯調下。

【抑青丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝經虛熱發瘧。或發熱咬牙。或驚悸寒熱。或嘔吐痰涎。腹脹少食。睡臥不安。

藥品 梔柴胡、甘草、各五分。川芎、八分。當歸、白朮(炒)、茯苓、鉤藤鉤、各一錢。

制法及用法 清水煎。子母同服。

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腦熱鼻淵。濁涕不止。

藥品 防風(去蘆)、一兩五錢。黃芩、人參、甘草(炙)、川芎、麥門冬(去心)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每日二錢。食後沸湯點下。每日三次。

【沉香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣。心腹脹滿。四肢癱瘓。不思飲食。

藥品 沉香、枳殼(去瓢、麸炒)、桂心、各七錢五分。大腹皮(剉)、赤茯苓(去皮)、檳榔、赤芍藥、川大黃(煨)、訶梨勒皮、桑白皮、各一兩。吳茱萸(湯洗)、木香、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服八錢。清水一中盞半。加生薑五片。煎至一盞。去渣。不拘時溫服。

【沒藥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人一切血氣脾腹撮痛。產後兒枕塊痛。

藥品 沒藥、血竭、桂心、玄胡索、當歸、蒲黃、紅花、乾漆(炒煙盡)、木香、芍藥、各等分。

制法及用法 研細末。每服二錢。食前溫酒調下。

八 筆

【羌活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒傷風時氣。頭痛發熱。身體煩疼。痰嗽失音。鼻塞聲重。及時行下痢赤白。

藥品 羌活、人參(去蘆)、赤茯苓(去皮)、柴胡(去蘆)、前胡

(去蘆)、川芎、獨活、桔梗(剉炒)、枳殼(去瓤、麸炒微黃色)、蒼朮(米泔水浸一宿、去粗皮、瀝乾剉片、炒至微黃色)、甘草、各一兩。

制法及用法 剉散。每服二錢。清水一盞。加生薑二片。薄荷三葉。煎至七分。不拘時溫服。發散風邪。入葱白同煎。拘攣。加生薑、倉米煎。

【乳香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治頭目痛。血攻。筋急。身疼。

藥品 乳香、沒藥、夏蠶沙、草烏、各五錢。五錢脂、二錢。木鼈子、五枚。

制法及用法 研爲末。酒煮麵糊和丸。如梧桐子大。每服七丸。薄荷茶湯送下。如頭疼。連進三服即止。

【抱龍丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治傷風。瘟疫。發熱。昏聩。痰實。壅嗽。中暑。煩躁。肚熱。蟲毒。室女白帶。小兒驚風。痘疹欲出發搐。

藥品 陳膽星(如無、只以生者剉炒熟用)、四兩。天竺黃、一兩。雄黃(水飛)、辰砂(另研、飛淨、一半爲衣)、各五錢。

麝香(另研)、一錢。一方有全蠍二十個。

制法及用法 研爲細末。煮甘草膏和丸(服片鹽水煮甘草和藥尤佳)。如阜角子大。辰砂或金箔爲衣(一法用漿水或新水浸兩星三日、候透、煮軟三五沸、取出、乘輒切去皮、只取白蟻者、薄切焙乾、炒黃色、取淨末八兩、以甘草二兩五錢、拍破、清水二碗、浸一宿、慢火煮至半碗、去滓、漸漸傾入南星末中、慢研、令甘草水盡、方入餘藥)。每服三五丸。五歲兒一二丸。百日小兒。每丸分作三四服。溫水化下。潮熱燈芯湯下。急驚每股一丸。薄荷湯化下。服後嘔吐稠痰即愈。如痘疹發驚。去辰砂。易琥珀三錢。伏暑每服一二丸。用鹽少許。細嚼。新汲水送下。

九 筆

【苦參丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

藥品 苦參、二兩。防風、荆芥、川烏、白芷、赤芍藥、何首烏、川芎、獨活、山梔、赤茯苓、阜角、山藥、蔓荊子、菠薐、黃耆、羌活、白附子、各五錢。草烏、一錢五分。

制法及用法 共研細末。水泛丸。熟湯送下。

【宣風散】

發明 見錢乙方。

功用 疏導風熱。治急驚風熱。痘毒乘腎。腹脹黑陷。

藥品 雞心檳榔、二個(一作五錢)。甘草(一作二錢五分)、橘紅、各五錢(一作各二錢)。黑牽牛(四兩、半生半炒、取頭末)、一兩二錢五分。一方有防風。一方有青皮、二錢。

制法及用法 共研細末。一歲以下服三分。二歲以上服五分。五歲以上服七分。食前蜜水調下。微泄一二次爲妙。已泄則不必服。

十 筆

【神芎散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風熱上攻。頭目眩痛。鼻塞牙痛。

藥品 川芎、鬱金、荊芥、薄荷、紅豆、各等分。

制法及用法 研爲細末。入盆硝研勻。搐於鼻內。力慢加藥。

【神芎散】

發明 見沈金鰲 沈氏尊生書。

功用 治風熱上攻。頭目眩

痛。鼻塞牙痛。

藥品 川芎、蔓荊子、青黛、各一錢二分。鬱金、芒硝、細辛、各一錢。石膏、一錢五分。薄荷、二錢。紅豆、一粒。

制法及用法 爲末搐鼻。

【骨碎補丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治肝腎風虛。上攻下注。筋脈拘攣。骨節疼痛。頭面浮腫。手臂少力。腰背強痛。脚膝緩弱。屈伸不利。行履艱難。

藥品 骨碎補(去毛炒)、荊芥穗、白附子(炮)、牛膝(酒浸、焙乾)、肉苁蓉(酒浸一宿、切片、焙)、威靈仙(去苗)、縮砂仁、各五錢。地龍(去土、微炒)、沒藥、各二錢五分。自然銅(醋淬九次)、草烏頭(炮、去皮臍)、半夏(湯洗七次)、各五錢。

制法及用法 共研細末。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服五丸至七丸。溫酒送下。婦人醋湯或當歸酒下。妊娠忌服。

【骨碎補丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治走注疼痛。

藥品 骨碎補、一兩五錢。威靈仙、草烏頭(炒)、各一兩。天南星(薑製)、木鼈子(去殼)、楓

香脂(另研)、自然銅(醋淬)、地龍(去土炒)、各一兩。沒藥、乳香(俱另研)、各五錢。

制法及用法 共研爲細末。和令勻。醋煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服五丸。加至十丸。不拘時溫酒送下。每日二次。

【草豆蔻丸】

發明 見李東垣方。

功用 治客寒客熱犯胃。

藥品 草豆蔻、一錢四分(麩裏煨熟、去皮)。吳茱萸(湯泡去苦)、益智仁、礞石(炒)、人參、黃耆、陳皮、各八分。當歸身、炙甘草、青皮、各六分。神麴、柴胡、薑黃、各四分。生甘草、三分。桃仁(去皮)、七個。半夏(湯泡七次)、澤瀉(小便利減半)、各一錢。麥蘖(炒黃)、一錢五分。

制法及用法 除桃仁另研如泥外。餘研爲極細末。和勻。湯浸炊餅爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食遠熱湯送下。止可一二服。不可多用。

【草豆蔻丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治胃心痛。

藥品 草豆蔻(煨)、白朮、各一兩。枳實、二兩。麥芽、神麴、半夏、各五錢。乾薑、青皮、陳

皮、各二錢。炒鹽、五分。

制法及用法 共研細末。蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。熱湯送下。

【追風散】

發明 見玉肯堂證治準繩。

功用 治小兒感冒發熱。手足拘攣。

藥品 人參、茯苓、防風、川芎、柴胡、羌活、枳殼、桔梗、甘草、各等分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一鍾。加生薑三片。煎至五分。不拘時服。

【烏龍丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 通行經絡。

藥品 川烏、草烏、各一兩(將二味以黑豆半升、煮透輟、去皮臍切、曬乾)。白附子、天麻、地龍、各五錢。

制法及用法 共研細末。酒煮米糊爲丸。空腹時鹽湯送下。

十一筆

【犀角丸】

發明 見錢希楨方。

功用 治胎毒瘡瘡。

藥品 犀角、天竺黃、防風、羚羊角、全蠍(酒洗)、白僵蠶、羌活、明天麻、京墨(煨微煙爲

度)、川黃連、膽南星、麻黃、西牛黃、各等分。

制法及用法 共研細末。蒸餅打糊爲丸。如芡實大。硃砂、金箔爲衣。每服一丸。薄荷湯送下。

【犀角丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 除三焦邪熱。疎一切風氣。治風盛痰實。頭目昏重。肢節拘急。痰涎壅滯。腸胃燥澀。大小便難。

藥品 犀角(鎊)、黃連(去蘆)、各十兩。人參(去蘆)、一斤四兩。大黃、五斤。黑牽牛、七斤八兩(炒、搗、取粉三斤十二兩)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。臨臥時溫湯送下。更量虛實加減。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣衝心。煩喘悶亂。頭痛口乾。坐臥不得。

藥品 犀角屑、枳殼(去蘆、鉄炒)、沈香、各七錢五分。檳榔、紫蘇莖葉、麥門冬(去心)、赤茯苓(去皮)、各一兩。木香、防風(去蘆)、各五錢。石膏(研細)、二兩。

制法及用法 咬咀。每服八錢。清水一中盞半。煎至一大盞。去滓。加淡竹瀝一合。更煎一二沸。不拘時溫服。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣風毒。生瘡腫痛。心神煩熱。

藥品 天麻(煨)、犀角屑、枳殼(去蘆、鉄炒)、羌活、防風、黃耆(三味均去蘆)、白蒺藜(炒去刺)、黃芩、白鮮皮(酒洗)、各七錢五分。檳榔、一兩。甘草(炙)、五錢。烏梢蛇、二兩(酒浸)。

制法及用法 咬咀。每服八錢。清水一中盞半。加生薑五片。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人客熱。四肢悶痛。飲食不下。

藥品 犀角屑、赤芍藥、地骨皮、赤茯苓、紅花、人參、枳殼、麥門冬、各一錢。柴胡、二錢。黃耆、二錢五分。甘草、五分。

制法及用法 清水二鍾。加生薑三片。煎至一鍾。不拘時服。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠諸風熱因倦。

時發昏眊。

藥品 犀角、揀參、梔子仁、川羌活、黃連、青黛、川芎、吳白芷、代茶、甘草(炙)、各一錢。

制法及用法 清水二鍾。加生薑三片。竹葉七片。煎至一鍾。食遠服。

【犀角解毒丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治小兒初生。胞胎積熱。及痘疹後餘毒未消。或生痘毒。或生瘡癤。或痘後多服溫補藥。必須清解者。並治口破。胃爛。鵝口。馬牙。膿瘡。牙齦出血。煩渴。狂躁。面赤。咽乾。便秘。溺赤。

藥品 烏犀角、大生地、防風、川黃連、全當歸、荆芥穗、各一兩。連翹殼、赤芍藥、白指梗、大力子、黃芩、各七錢。薄荷葉、甘草、各五錢。一方無黃連。

制法及用法 共研細末。煉白蜜爲丸。每重一錢五分。月內嬰兒每服半丸。月外至五六歲者一丸。燈草煎湯送下。

【清神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治氣鬱。頭目不清。耳常重聽。

藥品 甘菊花、白麝香(炒)、各五錢。羌活、荆芥穗、木通、川芎、防風、各四錢。木香、一錢。

石菖蒲、甘草、各一錢五分。

制法及用法 併爲細末。每服二錢。食後茶清或米湯調下。

【麻黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠外傷風冷。痰逆咳嗽不食。

藥品 麻黃(去節)、陳皮(去白)、前胡、各一兩。杏仁(湯洗炒)、人參、白朮、枳殼(炒)、貝母、甘草、各五錢。

制法及用法 咀咀。每服四錢。加葱白五寸。生薑三片。大棗一枚。清水煎服。

十二筆

【疏風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒祕結。

藥品 枳殼(製)、五錢。防風、羌活、獨活、檳榔、白芷、威靈仙、蒺藜(炒赤、去刺)、麻仁(炒、另研)、杏仁(湯洗、去皮尖、炒、另研)、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 剉散。每服二錢五分。清水一盞半。加生薑五片。白蜜一匙。煎服。

【雄株散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治因驚憂悲哀或感尸氣。似冷似熱。風氣觸則發。

藥品 硫黃、礞沙、枯梗、羌活、芍藥、當歸、升麻、川芎、龍腦、川烏、南星(炮)、白梔、陳皮、木香、藜蘆、白朮、枳殼、檳榔、黃芩、紫蘇子、龜蠶(炒)、虎骨(醋炙)、鬼箭羽(炒)、各等分。麻黃、五分。蜈蚣、一條(酒炙)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。溫酒調下。一日三次。

【趁痛散】

發明 見戒煙方。

功用 治產後氣弱血滯。遍身疼痛。及身熱頭痛。

藥品 牛膝、當歸、桂心、白朮、黃耆、獨活、生薑、各五錢。甘草(炙)、薤白、各二錢五分。一方有桑寄生。

制法及用法 咀咀。每服五錢。清水三盞。煎至一盞半。去滓。食前服。

參考 此方兼治太陽經感風頭痛。腰背痛。目汗發熱。若因感寒傷食憂恐驚怒等而致發熱頭痛。及勞勞諸證者。則非此方所能療。宜以五積散醋煎服。

【開關散】

發明 見鮑相璣驗方。

功用 治心經疔。及感冒風寒。

藥品 牙皂、細辛、法半夏、

廣木香、各三錢。陳皮、藿香、桔梗、薄荷、貫衆、白芷、防風、甘草、各二錢。雄黃、二錢五分。枯礬、五分。

制法及用法 共研細末。裝瓶收貯。用蠟封口。不可洩氣。每用三分。先吹入鼻孔內。再將藥研足一錢。薑湯沖服。服後用紙捻擦照心窩背心二處。見有紅點發現。用鐵挑破。內有紅筋挑出。方保無事。

【鈎藤散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治肝厥頭暈。清利頭目。

藥品 鈎藤、陳皮(去白)、半夏(湯洗七次、切片)、麥門冬(去心)、茯苓(去皮)、茯神(去木)、人參(去蘆、一作一兩)、甘菊花(一作一兩)、防風(去蘆、一作一兩)、各五錢。甘草、二錢五分(炙)。石膏、一兩。一方無茯神。

制法及用法 咀咀。每服四錢。清水一盞半。加生薑七片。煎至一盞。去滓熱服。一日二次。

十四筆

【漢防己散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治上焦風痰攻注。頭目旋暈。心神煩亂。

藥品 漢防己、麥門冬(去心、焙)、前胡、各一兩。半夏(湯泡)、旋覆花、防風、細辛、甘草(炙)、各五錢。赤茯苓、人參、芎藭、羚羊角屑、枳實(麸炒)、荆芥、各七錢五分。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一中盞。加生薑五釐。煎至六分。不拘時溫服。忌食飴糖羊肉。

【碧雲散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治頭痛腦痠。外翳攀睛。眵淚稠黏。腫脹紅赤。昏暗羞明。隱澀疼痛。風機鼻塞。及楊梅結毒入於頭頂。致頭疼眼痛如破。

藥品 鵝不食草、二錢。青黛、川芎、各一錢。一方多北細辛、牙皂末、各一錢。

制法及用法 研爲細末。先嚙涼水滿口。每用米許綠豆許嗅入鼻內。以嚏淚爲效。吹後吐去涼水。

參考 此方以鵝不食草清散頭腦爲君。青黛去熱爲佐。川芎除邪破結爲使。爲升透宣散之劑。常嗅之能使邪毒不閉。有出路。諸目病俱可用。

十五筆

【蔓荊子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺臟蘊熱。風毒如翹。變戾嬰風者。

藥品 生蔓荊子、菊花、苦參(去渣)、各四兩。梔杷子、天麻、二兩。天南星(薑製)、胡麻(炒熟)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時荆芥煎湯或茶清調下。一日二次。

【蔓荊子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風邪頭暈。起則欲倒。

藥品 蔓荊子、甘菊花、半夏(湯泡)、羚羊角屑、枳殼(麸炒)、茯神(去木)、芎藭、黃芩、防風、各七錢五分。麥門冬(去心焙)、石膏、各一兩。地骨皮、赤箭、細辛、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一中盞。加生薑五釐。煎至六分。去滓。不拘時溫服。忌食熱麵、飴糖、羊肉。

十六筆

【嚙化上清丸】

發明 見鮑明徵驗方新編。

藥品 薄荷葉、一兩六錢。縮

砂仁、四錢。甘草、二錢。防風、黃芩、桔梗、各一錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。每一兩作二十丸。每服一丸。嚥化嚥下。

【獨活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人風眩。頭疼嘔逆。身體時痛。情思昏悶者。

藥品 獨活、一兩。蒼朮(去蘆)、防風(去蘆)、細辛(去苗)、人參(去蘆)、芎藭、荆芥、各七錢五分。半夏(湯洗七次、切片子)、赤芍藥、甘草(炙)、各五錢。石膏、二兩。

制法及用法 咬咀。每服八錢。清水一中盞半。加生薑七片。薄荷七葉。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。

【醭散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傷風鼻塞聲重。

藥品 細辛、五錢。川芎、一兩。薄荷、一兩五錢。川烏(炮、去皮臍)、撫芎、白芷、甘草、各二兩。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。蔥茶或薄荷湯調下。

二十九筆

【鬱金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治頭痛眩暈。

藥品 鬱金、滑石、川芎、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一二錢。空腹時薑汁調下。若胸中有宿痰者。白帶散吐之。

通利類

十一筆

【通關散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 通心經。利小便。

藥品 梔子仁、川大黃(炒)、各一分。木通、甘草(炙)、車前子(炒)、赤茯苓、瞿麥、人參、滑石、各三分。葛蓄(炒)、五分。

制法及用法 剉細。清水一盞。加燈心十根、煎至半盞。溫服。

十二筆

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治老人虛人。心氣閉塞。小便不通。

藥品 琥珀、不拘多少。

制法及用法 研爲末。每服一錢。人參濃煎湯調下。

【換骨丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 利氣通腸。

藥品 陳粟米、一合。陳皮、白皮(均剉)、黑牽牛、各五錢。黑豆(去殼)、一錢五分。

制法及用法 炒令焦黃色。洗去巴豆不用。另加水香五錢。研爲細末。水菰麴糊和丸。如黍米大。每服十丸。橘皮湯送下。

【腎氣丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治腎氣不化。小便瀝數。

藥品 熟地黃、四兩。茯苓、三兩。山藥、山茱萸、各二兩。丹皮、澤瀉、各一兩五錢。牛膝、車前、各一兩。附子、肉桂、各五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。空腹時淡鹽湯送下。一日三次。

參考 此方專爲健利腎臟之機能而設。用干金腎氣丸法。減熟地以防膩。重茯苓以滲水。加牛膝、車前、以導竅。於蒸化利水。兩得其妙。但牛膝滑精。精不固者勿用。即黑地黃丸加五味子。

十三筆

【滑石散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治轉筋。

藥品 滑石、一兩。凝水石、二兩。葵子、一合。

制法及用法 研爲末。清水一斗。煮取五升。時時服。一升即利。

【滑石散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治產後淋。

藥品 滑石、一兩二錢五分。通草、車前子、葵子、各一兩。

制法及用法 研爲末。每服方寸匕至二匕。漿水調下。

【滑石散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治轉胞。

藥品 白滑石、亂髮灰、車前子、木通、各一兩。寒水石、二兩。冬葵子、一合。

制法及用法 剉散。清水一斗。煮取五升。時時服。一升即利。

【滑石散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒溺短作痛。

藥品 滑石、梧樓根、石葦(去毛)、各等分。

制法及用法 搗羅爲散。每服五分。煎大麥飲清調下。一日二次。量兒大小加減。

【葶藶丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治消渴後成水病浮腫。

藥品 甜葶藶(隔紙炒)、瓜蒌仁、杏仁(湯浸、去皮尖及雙仁、鉄炒黃)、漢防己、各一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前赤茯苓煎湯送下。每日三四次。

【葶藶丸】

發明 見張路玉張氏醫通方。

功用 治水分。

藥品 甜葶藶(隔紙煨)、續隨子(去皮)、各五錢。乾筍末、一兩。

制法及用法 共研細末。紅棗肉爲丸。如梧桐子大。每服七丸。篇蓄煎湯送下。大便利者減葶藶、續隨子各一錢。加白朮五錢。

【葶藶子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠遍身紅腫者。

藥品 葶藶子、一兩。白朮、五兩。茯苓、桑白皮、都季仁、各二兩。

制法及用法 研爲粗末。清水六升。煮取二升。分溫三服。小便利即瘥。

【當歸丸】

發明 見張路玉張氏醫通方。

功用 治熱入血分。大便嘔結。三五日不通。

藥品 當歸、五錢。黃連、二錢。大黃(酒蒸)、紫草、各三錢。甘草、一錢。

制法及用法 先以當歸、紫草、熬成膏。後將餘藥研細末。膏和爲丸。如彈子大。每服一丸。清水煎三四沸。和滓服之。不下再服。以利爲度。

十四筆

【蒲黃散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治小便轉胞。

藥品 蒲黃、滑石、各等分。

制法及用法 研爲末。每服三錢。雞子清調下。

【蒲黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心腎有熱。小便不通。

藥品 生蒲黃、木通、升麻、車前子、桑白皮(炒)、滑石、燈心、赤芍藥、赤茯苓、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前葱白、紫蘇、煎湯調下。

【漏蘆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治乳婦氣脈壅塞。乳汁不行。及經絡凝滯。癰乳脹痛。留蓄邪毒。或作癰腫。

藥品 漏蘆、二兩五錢。蛇蛻、十條(炙)。枯樓、十枚(急火燒焦存性)。一方有牡蠣燒存性。

制法及用法 研爲末。每服二錢。不拘時溫酒調下。服藥後。即以豬蹄羹投之。

十五筆

【寬氣飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 消痰。逐水。進食。通利關節。除胸膈痞結。治蓄氣而成積。傳變急慢驚風。氣逆不和。精神昏倦。

藥品 枳殼(水浸、去瓢、鉄炒微黃)、枳實(製同上)、各一兩。人參(去蘆)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 剉焙爲末。每服五分至一錢。不拘時淨湯調下。驚風發搐。薑汁葱湯同調。熱極者。入寬熱飲、薄荷蜜湯或麥門冬湯調下。

十六筆

【澤瀉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣。二便泌澀。膀胱氣壅。心腹痞悶。

藥品 澤瀉、赤茯苓(去皮)、枳殼(去瓢、鉄炒)、各七錢五分。木通(去皮剉)、豬苓(去蘆)、檳榔、各一兩。牽牛、二兩五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。生薑、葱白、煎湯調下。一日二三次。以利爲度。

【澤瀉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠氣壅。身體腹脅浮腫。喘急。大便不通。小便赤澀。

藥品 澤瀉、木通、桑白皮、赤茯苓、枳殼、檳榔、各一錢五分。

制法及用法 清水二鍾。加生薑五片。煎至一鍾。食前服。

【獨聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠小便不通。

藥品 芫荽子。

制法及用法 研爲末。每服二錢。食前濃煎葱白湯調下。

十八筆

【檳榔丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣發時。二便秘澀。腹中滿悶。膀胱裏急。四肢煩疼。

藥品 檳榔、赤茯苓(去皮)、紫蘇葉、大麻仁、郁李仁、各一兩。川大黃(煨)、二兩。木香、桂心、各五錢。澤瀉、枳殼(去瓢、麸炒)、木通(去皮)、羚羊角屑、各七錢五分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三四十丸。食前熟湯送下。以利爲度。

收瀉類

二筆

【七味豆蔻丸】

功用 治積滯已通。久痢不止。小兒痘後。虛寒腹瀉。

藥品 肉蓯蓉(煨)、一兩。訶子肉、一兩。木香、一兩。縮砂仁、一兩。赤石脂、一兩五錢。龍骨(煨)、一兩。桔槿、六錢。

制法及用法 研爲細末。水煮麵糊和丸。每服一二錢。米湯送下。

【八仙糕】

發明 見鄭氏秘方。

功用 治脾泄、腎泄。及連年休息痢。

藥品 菟絲子(焙)、魚腰(切片、乾麴炒珠)、山藥(炒)、芡實(炒)、白茯苓、蓮蓬肉(去心炒)、薏苡仁(炒)、白扁豆(炒)、各四兩。穀芽(炒)、八兩。

制法及用法 研爲末。加糯米粉(炒黃)十八兩。和米粉(炒黃)三十六兩。和勻。每晨以開水及白糖調服一二兩。積久自效。

【九龍丹】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治斷喪太過。敗精失道。滑泄不禁。

藥品 枸杞子、金櫻子(去皮剝核)、蓮鬚、蓮肉(去心)、芡實(去殼)、山藥黃肉(一作山查)、當歸身(酒洗)、熟地黃(酒蒸、另研)、白茯苓、各三兩。

制法及用法 研爲末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服一百丸。溫酒或鹽湯送下。如精滑便濁者。服二三日。溺清如水。飲食倍常。行步輕捷。

三筆

【三仙丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治夢遺。泄精。

藥品 益智仁、二兩(用鹽二兩炒、去鹽)。烏藥(炒)、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。用山藥一兩。煮糊和丸。如梧桐子大。磁砂爲衣。每服五十丸。臨臥時空腹鹽湯送下。

【三才封髓丹】

發明 見衛生寶鑑方。

功用 滋陰養血。降心火。益腎水。治虛火上炎。夢遺失精。

藥品 天門冬(去心、一作二兩)、熟地黃(一作二兩)、人參(一作一兩)、各五錢。黃蘗(酒炒)、三兩。縮砂仁、一兩五錢。甘草(炙)、七錢五分。

制法及用法 研爲細末。水煮麴糊和丸(一作煉白蜜爲丸)。如梧桐子大。每服五十丸(一作三四錢)。用瓷磬五錢。切片。酒一盞。浸一宿。次日煎三四沸。去滓。空腹時送下。

四 筆

【止汗散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 止一切汗。及產後盜汗。

藥品 牡蠣(煅研粉)、小麥(炒令黃色、煅爲粉)、各等分。

制法及用法 和勻。每服二錢。不拘時煮豬肉汁調下。

【止汗散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治睡中多汗。

藥品 故蒲扇(燒存性)。

制法及用法 研爲細末。每服一二錢。溫酒或烏梅湯調下。

參考 蒲灰止血利小便。舊蒲扇沾汗既多。汗即血之液。故主治睡汗。有同氣相求之妙。

【木香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治久冷傷脾。下痢泄瀉。穀不化。食無味。肌瘦。心曠。產後虛冷泄瀉。

藥品 木香、破故紙(炒)、各一兩。高良薑、縮砂仁、厚朴(製)、各七錢。赤芍藥、橘紅、桂心、白朮、各五錢。吳茱萸(湯泡七次)、胡椒、各二錢五分。肉豆蔻、四枚。檳榔、一個。

制法及用法 研爲末。每服三錢。用豬肝(不落水者)四兩。去筋膜。批爲薄片。重重摻藥。置一鼎中。加漿水一甌。醋一茶匙。煮肝熟。入鹽一錢。葱白三莖。細切。生薑彈子大一塊。拍破。同煮至在水欲盡。空腹時冷食之。初服雖微瀉。少時自止。經年冷痢滑瀉、一服即愈。若服後口渴。即飲粥湯。忌生冷油膩物。

【木香散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治脾胃虛弱。兼挾風

冷。泄瀉注下。水穀不化。腹中聲鳴。臍下疔痛。及積寒久痢腸滑。

藥品 丁香、木香、當歸(去蘆、洗焙)、肉豆蔻仁(炮，一作一兩)、甘草(炙)、各二兩。附子(去皮臍、醋煮、切片焙)、赤石脂、各一兩。藿香葉、四兩(洗焙，一作一兩)。訶子皮、一兩五錢(一作訶子肉、一兩)。一方有炮薑、二兩。無當歸。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水一鍾半。加生薑二片。大棗一枚。煎至六分。空腹時溫服(一作每服三錢)。陳米飲調下。

【五味子丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治脾腎虛寒泄瀉。

藥品 五味子、益智仁(炒)、肉蓯蓉(酒浸焙)、巴戟天(去心)、人參、骨碎補(去毛)、土茴香(炒)、白朮、覆盆子、白龍骨、熟地黃(洗)、牡蠣、菟絲子、各等分。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時鹽湯送下。

【五味子丸】

發明 見上肯堂六科準繩。

功用 治脾腎虛寒洩瀉。

藥品 五味子、人參、破故紙(炒)、白朮、各二兩。山藥(炒)、白茯苓、各一兩五錢。吳茱萸、巴戟天(去心)、肉果(麩裹煨)、各一兩。龍骨(煨)、五錢。

制法及用法 研爲末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時鹽湯送下。

【水陸二仙膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 益精。滋陰。治精脫腎虛。夢遺。白濁。婦人淋漓帶下。

藥品 金櫻子(洗淨、甑中蒸熟、湯淋取汁、入銀銚內、慢火熬稀膏、和茯苓)、芡實肉(研粉)、各等分。

制法及用法 酒糊或乳汁爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前溫酒或鹽湯送下。

參考 近今多製爲膏而服之。以熬膏益良。說見前。

【斗門散】

發明 見譚氏方。

功用 治小兒瀉利青黃。令轉滑腸。下部脫肛。焦瘦羸弱。

藥品 訶子、枳殼、地榆、各等分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。米飲調下。一歲以下。每服五分。

【不二散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸般瀉痢。

藥品 礬菜殼、青皮(去瓢、焙乾)、陳皮(去白、焙乾)、各二兩。當歸(去蘆炒)、甘草(炙)、甜藤(如無即以乾葛代之)、各一兩。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一盞。煎至七分。去滓。通口服。如赤白痢。加酸石榴皮一片。

五 筆

【白朮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒自汗盜汗。

藥品 白朮、三兩。小麥、一合(炒)。

制法及用法 清水一鍾半。煮乾。去麥。研爲末。綿黃耆煎湯調下。蜚兒大小服。忌食蘿蔔辛辣炙煨之類。乳母尤忌。

【白朮散】

發明 見劉完素宣明論方。

功用 治虛風多汗。食則汗出如洗。少氣痿劣。

藥品 白朮、一兩二錢五分。牡蠣(殼)、三錢。防風、二兩五錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。不拘時溫水調下。如惡

田 位此開 白朮 全江而腫

倍牡蠣。

【白朮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治體虛汗多。

藥品 白朮、不拘多少(剉作小塊)。浮麥、一升。

制法及用法 清水煮乾。如朮尚硬。再加水煮饅取出。去麥不用。切作片。焙乾。研爲細末。每服二三錢。不拘時另用浮麥煎湯調下。

【白朮散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治盜汗。

藥品 白朮、四兩。分作四包。一以黃耆一兩炒。一以石斛一兩炒。一以牡蠣一兩炒。一以小麥欬一兩炒。至白朮黃色爲度。

制法及用法 揀淨。研爲末。每服三錢。粟米湯調下。盡服爲妙。

【四神丸】

發明 見濟察方。

功用 治腎泄。脾泄。

藥品 肉豆蔻、二兩。茴香(炒)、一兩。木香、五錢。破故紙(炒)、四兩。一方無茴香、木香。有神麴、麥芽。

制法及用法 研爲細末。生薑老薑肉和勻。加塩梔子水。

鹽湯送下。

【四神丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾腎虛寒。五更泄瀉。不思飲食。或久痢虛痛。腰痠肢冷。

藥品 肉豆蔻(麩裏煨)、五味子(炒、一作三兩)、各二兩。補骨脂、四兩(酒浸一宿炒)。吳茱萸(鹽湯泡淡炒)、一兩。

制法及用法 研爲末。用生薑八兩(切、一作四兩、一作六兩)。紅棗一百枚(一作四十九枚、一作六十五枚)、清水煮爛。去皮核。與藥末搗和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。食前空腹時米飲、熱湯或鹽湯送下。

參考 此方以補骨脂之辛燥。入腎以剷水。肉豆蔻之辛溫。入脾以緩土。五味子之酸溫。收坎宮耗散之火。使少火生氣以培土。吳茱萸之辛溫。以順肝木欲散之勢。爲水氣開滋生之路。丸以紅棗。久辛甘發生諸陽之義。或用木香代五味子。但陰虛惡燥者忌之。

【加減地黃丸】

發明 見鮑和璣驗方新編。

功用 治遺精。

藥品 熟地、六兩。山萸肉、山藥、各四兩。茯苓、丹皮、茯

苓、各二兩。蓮鬚、一兩。生龍骨(研、水飛)、三錢。魚鱉、四兩(蛤粉炒)。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。早晚熱湯送下。一日即止。

六 筆

【地榆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瀉痢。血痢。

藥品 地榆、訶子、甘草、各等分。

制法及用法 研爲末。鹽米湯調下。有熱加黃芩。

【肉蓯蓉丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治稟賦虛勞。小便頻數。

藥品 肉蓯蓉、八兩。熟地黃、六兩。五味子、四兩。菟絲子(搗研)、二兩。

制法及用法 研爲細末。酒煮山藥糊和丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時鹽酒送下。

七 筆

【牡蠣丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治滑脫。

藥品 牡蠣、三兩(白者、盛瓷器內、更用鹽泥四兩、煮頭鋪

底、以炭五斤、燒半日、取出研、赤石脂三兩、搗碎、醋拌勻溼、於生鐵鉢子內、慢火炒令乾。

制法及用法 研爲細末。和勻。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時鹽湯送下。

【牡蠣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 止盜汗。

藥品 牡蠣粉、二兩。麻黃根、赤石脂(細研)、糯米粉、各一兩。龍腦、一錢。

制法及用法 研爲末。和勻。每用一匙頭。新綿包。每日及夜。常常撲身體頭面有汗處。

【牡蠣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 蒸陰勞生瘡。或溼水癢甚。腋汗。腳心汗。

藥品 牡蠣、黃丹(炒)、各二兩。枯白礬、四兩。

制法及用法 研爲細末。遇夜睡時。用手捏藥。於陰癢處擦之。不一時又擦之。三四次後頓減。次夜再擦。雖大減又擦。後自然平復。如腋汗。亦須擦之。如腳汗。先擦。後裝藥靴內或鞋底上。腳板上塗藥。經脚裏之亦可。

【牡蠣散】

發明 見陳言三因極一病證

方論。

功用 治諸虛不足。或新病暴虛。自汗。盜汗。

藥品 牡蠣(煅研)、麻黃根、黃耆、各等分。一方麻黃根易生地。一方有知母。一方作牡蠣、黃耆、麻黃根、各一兩。白朮、五錢。甘草、二錢五分。一方作牡蠣粉、白朮、防風、各等分。研爲末。每服三錢。酒服。止盜汗極效。

制法及用法 對散。每服三五錢。清水一盞半。加小麥一百粒。煎八分。不拘時服。

【牡蠣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治帶下。及經水過多。或暴下片血。

藥品 牡蠣、龍骨、赤石脂、肉蓯蓉(酒浸切焙)、石斛(去根)、烏鰂骨(去甲)、黃耆(剉)、各一兩五錢。牛角膠灰、河膠(炒燥)、熟地黃(焙)、芍藥(炒)、各二兩。乾薑(炮)、當歸(切焙)、人參、白朮、桑耳、各一兩二錢五分。桂(去粗皮)、芍藥、附子(炮、去皮脊)、艾葉(炒)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。平日米飲調服。一日二次。

參考 此方補而澀溫。有外

邪者易致痼閉在內。不可輕用。

【妙香散】

發明 見王荊公方。

功用 安神。閉精。定心氣。

藥品 龍骨(五色者)、益智仁、人參、各一兩。白茯苓(去皮)、遠志(去心)、茯神(去木)、各五錢。磁砂(研)、甘草(炙)、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時酒調下。

八 筆

【固氣丸】

發明 見九驚衛生方。

功用 治小兒脾胃虛怯。泄瀉腹痛。

藥品 肉豆蔻(極大者)、一枚。滴乳香、一塊。

制法及用法 將豆蔻劈破。填入乳香。用礬麵裹。慢火焙熟。去麵。研爲細末。麵糊和丸。如綠豆大。每服二十丸。乳食前米飲送下。

【固氣丸】

發明 見傅青主方。

功用 治少婦血崩。屬於房帟不慎者。

藥品 人參、一兩。白朮(土炒)、熟地黃、各五錢。當歸(酒洗)、杜仲(炒黑)、各三錢。茯苓、山藥黃肉(蒸)、各二錢。廿

草、遠志(去心)、各一錢。五味子、十粒(炒)。

制法及用法 清水煎服。一劑血止。連服十劑可愈。

參考 此方固氣而兼補血。已去之血。可以速生。將脫之血。可以盡攝。凡氣虛而崩潰者。此方悉可通治。非僅治小產之崩。其最妙者。不去止血而止血之味含於補氣之中也。

【固腸丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治溼氣下痢。大便下血。婦人白帶。

藥品 檳皮、四兩(炒)。滑石、二兩。一方無滑石。

制法及用法 研爲細末。米粥和丸。熱湯送下。

參考 此方用於去脾胃陳積之後。以燥下溼。然滯氣未盡者。不可遽用。因此藥性涼而燥也。

【固腸丸】

發明 見危亦林世醫得效方。

功用 治臟腑滑泄。晝夜無度。

藥品 吳茱萸(陳年)、黃連(去鬚)、罌粟殼(去硬漿)、各等分。

制法及用法 研爲末。酢漿米糊和丸。如梧桐子大。每服

三十丸。空腹時米飲送下。

【固腸丸】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治泄瀉。

藥品 人參(去蘆)、蒼朮(米泔浸一宿)、茯苓、木香(不見火)、訶子肉(煨)、烏梅肉、肉豆蔻(麩裏煨)、罌粟殼(去帶瓢)、各等分。

制法及用法 研爲末。水煮麵糊和丸。如梧桐子大。每服四十丸。米飲送下。

【固腸丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治滑泄。

藥品 龍骨、附子、訶子、枯礬、丁香、石脂、高良薑、豆蔻仁、縮砂仁、木香。

制法及用法 研爲末。水煮米糊和丸。熟湯送下。

【固精丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 補肝腎。治色慾勞傷。

藥品 黃蘗、知母、各一兩。牡蠣、芡實、蓮鬚、茯苓、遠志、各三錢。龍骨、二錢。山茱萸、五錢。

制法及用法 研爲末。山藥糊丸。硃砂爲衣。每服五十丸。空腹時淡鹽湯送下。

【金箔丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治下焦虛損。白淫。夢遺。

藥品 晚蠶蛾(炒)、破故紙(炒)、韭子(炒)、牛膝(酒浸)、肉苁蓉(酒浸)、龍骨、山茱萸、桑螵蛸(酒炙)、菟絲子(酒浸)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。

【金櫻膏】

功用 治肝腎兩虧。夢遺滑精。脾瀉下痢。小便頻數等症。

藥品 即以金櫻子熬成。

參考 此物化澆爲甘(準繩云、熬膏則甘、全失澆味)。補益之功尤勝。

【金鎖固精丸】

功用 治真元虧損。心腎不交。夢遺、滑精。盜汗虛煩。腰痛耳鳴。四肢無力。

藥品 沙苑蒺藜(炒)、芡實(蒸)、蓮鬚、各二兩。龍骨(酥炙、一作煨)、牡蠣(鹽水煮一日夜、煨粉)、各一兩。一方無蓮鬚。

制法及用法 共爲細末。湘蓮肉煮糊和丸。每服三錢。空腹時淡鹽湯送下。

九 筆

【厚朴散】

發明 見張渙方。

功用 治洞泄注下。

藥品 厚朴(生薑汁製)、訶梨勒(炮取皮)、肉豆蔻、各一兩。白朮、乾薑(炮)、各五錢。

制法及用法 搗罷爲細末。每服一錢。清水八分盞。加生薑、粳米各少許。煎至五分。去滓溫服。

【柏子仁丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 養心。安神。和衛。固陽。戢陽氣。進飲食。退經絡熱。治陰虛火旺。寐則盜汗。

藥品 柏子仁(一作三兩)、半夏麴(一作一兩)、各二兩。牡蠣(甘鍋子內火燉醋淬七次焙乾)、人參、麻黃根(慢火炙、拭去汗)、白朮、五味子、各一兩。淨麴(炒)、五錢。

制法及用法 研爲細末。棗肉和丸。如梧桐子大。每服三五十丸。空腹時米飲送下。一日二次。得效。減一服。得愈即住。作散亦可。

【封髓丹】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治夢遺失精及與鬼

交。

藥品 黃蘗、三兩。砂仁、一兩。甘草(炙)、一錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。空腹時每服三錢。淡鹽湯送下。

參考 腎者主水。受五臟六腑之精而藏之。肝木爲子。偏喜疏泄母氣。厥陰相火一動。精即隨之外溢。且肝又藏魂。神魂不攝。則鬼交精泄之譌作。方中以黃蘗之苦寒堅腎清火以益陰。砂仁之辛溫健脾運氣以益陽。甘草之甘溫以調和黃蘗、砂仁之一寒一熱。俾有水火既濟之功用。則火平而髓自固矣。

【威喜丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治元陽虛弱。精氣不固。餘瀝常流。小便白濁。夢寐頻洩。婦人血海久冷。白帶。白淫。下部常溼。小便如米泔。或無子息。

藥品 黃蠟、白茯苓、各四兩(去皮、切塊、用豬苓二錢五分、同於瓷器內、煮二十餘沸、日乾、不用豬苓)。

制法及用法 茯苓研爲末。煉黃蠟和丸。如彈子大。每服一丸。空腹時細嚼。滿口生津。

徐徐嚥下。以小便清利爲度。
忌米醋氣怒勞力。

參考 茯苓千萬歲。其上生小木。狀似蓮花。名咸喜芝。今以名方者。須擇雲茯苓之年深質結者。製以豬苓。導之下出前陰。蠟淡歸陽。不能入陰。須用黃蠟性味緩濇。有續絕補髓之功。專治斷喪之陽。分理潰亂之精。故治元陽虛憊而爲遺濁帶下者。若治肺虛。痰火久嗽。茯苓不必結。而豬苓亦可不用矣。

十 筆

【桑螵蛸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人虛冷。小便數。

藥品 桑螵蛸、三十枚(炒)。鹿茸、牡蠣粉、甘草、各二兩。黃耆、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。食前薑湯調下。

【桑螵蛸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠小便不禁。

藥品 桑螵蛸、二十枚(炙黃)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時米飲調下。或用益智仁研爲末。米飲調下亦效。

【桑螵蛸散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治產後小便多。及夜睡遺溺。

藥品 桑螵蛸、白龍骨(煨)、牡蠣(左顧者)、各等分。

制法及用法 共研細末。每服三錢。熱湯調下。

【烏金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治夢泄遺精。

藥品 九肋龍甲、不拘多少(去裙襖、淨洗過、燒灰存性)。

制法及用法 研爲細末。每服一字。用清酒小半盞。童便小半盞。陳葱白七八寸。同煎至七分。去葱白。和滓日西時服。須臾得黏臭汗爲度。次日進粟米粥。忌食他物。

【烏梅丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治便血。

藥品 烏梅、三兩(燒存性)。

制法及用法 研爲細末。醋煮米糊和丸。每服二十丸。空腹時米飲送下。每日二次。

【眞珠丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治虛勞。夢遺泄精。

藥品 眞珠、六兩(以牡蠣六兩、用水同煮一日、去牡蠣)。

制法及用法 研爲細末。却入水於乳鉢內研。三五日後。寬著水飛過。候乾用。蒸餅和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前溫酒送下。

【茯菟丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治心腎不交。成遺精白濁、強中、消渴等症。

藥品 白茯苓、三兩。菟絲子、十兩。五味子、八兩。石蓮肉、三兩。山藥、六兩。

制法及用法 將菟絲子用酒浸。以浸過餘酒煮山藥糊爲丸。每服三錢。漏精鹽湯下。赤濁。燈心湯下。白濁。茯苓湯下。消渴。米飲下。

參考 按證治準繩方之茯菟丸。無五味、山藥。僅用白茯苓(去皮)三兩。菟絲子(酒浸)、五兩。石蓮子(去殼)二兩。研爲細末。酒煮米糊爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。空腹時鹽湯送下。亦治思慮太過。心腎虛損。真陽不固。溺有餘瀝。小便白濁。夢寐頻泄。婦人帶下等症。

十一筆

【鹿茸散】

發明 見陳自明婦人良方。

功用 治婦人小便頻數。

藥品 鹿茸、烏賊骨、桑寄生、龍骨、各一兩。白芍藥、當歸、附子、各七錢五分。桑螵蛸、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前溫酒調下。

【鹿角霜丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治上熱下寒。小便不禁。

制法及用法 用鹿角帶頂骨者。不拘多少。鋸作挺子。長三寸、洗淨。水桶內浸。夏三冬五晝夜。以浸水同入鍋內煮之。覺湯少。添溫湯。日夜不絕。候角酥糜爲度。輕漚出。用刀刮去皮如雪白。放在篩子上。候自乾。微火焙之。其汁慢火煎爲膏。候角極乾。研爲細末。酒糊和丸。如梧桐子大。每服三四十丸。空腹時溫酒或鹽湯送下。

【麻黃根散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後虛汗不止。

藥品 麻黃根、當歸、黃耆、牡蠣(煨爲粉)、人參、甘草、各等分。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一盞。煎至七分。去滓溫服。

【麻黃根散】

發明 見王肯堂證治準繩。

藥品 麻黃根、二兩。黃歸、黃青、各一兩。

制法及用法 吹咀。每服三錢。清水一盞。煎至七分。去滓服。

【既濟丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治膀胱虛。小便不禁。

藥品 菟絲子、益智仁、肉蓯蓉、茯苓、韭子、當歸、熟地黃、各五錢。牡蠣、黃蘗(鹽水炒)、知母(鹽水炒)、山茱萸(酒製去核)、各三錢。五味子、一錢。

制法及用法 共研細末。神麴煮糊爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。空腹時鹽湯送下。

【參朮散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治虛寒泄瀉。

藥品 人參、白朮、炮薑、白豆蔻、縮砂仁、丁香、陳皮、甘草、各一錢。生薑、三片。

制法及用法 清水煎服。加炒蛤粉二錢。尤妙。

十二筆

【菟絲子丸】

發明 見錢用和濟生方。

功用 治小便多或不禁。

藥品 菟絲子(酒蒸)、肉蓯蓉(酒浸)、各二兩。乳蠣(煨粉)、附子(炮)、五味子、鹿茸(酒炙)、各一兩。雞鳴腫(炙)、桑螵蛸(酒炙)、各五錢。

制法及用法 共研爲末。酒煮米糊爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時鹽湯或鹽酒送下。

【菟絲子丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小便多或不禁。

藥品 菟絲子(去土、洗、酒浸、絞乾、蒸鴿焙)、桑螵蛸(炙)、各五錢。澤瀉、二錢五分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹時清米飲送下。

【訶子散】

發明 見劉河間方。

功用 治泄瀉腹痛漸已。瀉下漸少。

藥品 訶子、一兩(半生半熟)。木香、五錢。甘草、二錢。黃連、三錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。白朮芍藥湯調下。如止之不已。宜因其歸而送之。於本方內加厚朴一兩。以竭其邪氣。

【黃耆散】

發明 見錢乙方。

功用 治虛熱盜汗。

藥品 黃耆、牡蠣(煨)、生地黃、各等分。

制法及用法 研爲末。清水煎。不拘時服。

【草薢丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小便頻數。

藥品 川草薢、一斤。

制法及用法 研爲細末。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。食前鹽湯或溫酒送下。

十四筆

【聚精丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎虛。封藏不固。夢遺滑泄。

藥品 黃魚鱔膠、一斤(白淨者、碎切、蛤粉或牡蠣粉炒成珠、再用乳酥拌炒、則不粘韌)。沙苑蒺藜、八兩(馬乳浸一夜、隔湯浸一炷香、焙乾或曬乾勿炒、一作五兩)。一方加五味子、二兩。

制法及用法 研爲細末。煉白蜜中。加入陳酒再沸。候蜜將冷爲丸(不可熱搗、熱搗則膠黏難丸)。如綠豆大。每服八九十丸。空腹時溫酒或鹽湯熱湯

送下。忌食諸魚牛肉。

十五筆

【磁石散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡腸出。

藥品 磁石(煨)、滑石、鐵精、各三兩。一方無鐵精。

制法及用法 研極細末。和勻。每服一錢匕。溫酒或白米飲調下。空腹、日午、晚間、各一服。仍以鐵砂塗其腸上。其腸自收入。

十六筆

【豬肚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小便頻數。

藥品 豬肚、一箇(以蓮子二升、同煮一週日、取出、去皮心、焙乾爲末)。舶上茴香、破故紙、川棟子、母丁香、各一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時溫酒送下。

【豬肚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小便頻數。夢遺白濁。肌肉消瘦。婦人淋帶。

藥品 牡蠣(煨透水飛)、白朮(飯上蒸炒)、各四兩。苦參、三兩(酒浸晒七次)。

制法及用法 研爲細末。以豬肚、一具。煮極爛。剉研如膏和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲或熟湯送下。每日三四次。此藥神應。瘦者服之即肥。莫測其理。

【豬肚丸】

發明 見三因極一病證方。

功用 治下元虛弱。溼熱鬱結。強中消渴。小便頻數。甚至夢遺白濁。赤白帶淋。

藥品 黃連(去鬚)、粟米、瓜蒌根、茯神、各四兩。知母、麥門冬(去心)、各二兩。一方加入參、熟地、乾葛。一方無知母、粟米。有小麥。

制法及用法 研爲細末。用大豬肚一個。洗淨。入藥末於內。以麻線縫合口。置甑中。炊極爛。取出。藥另研。以豬肚爲膏。再入煉蜜。搜和前藥。杵勻爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。人參湯或熟湯送下。

【龍骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腸虛脫肛。

藥品 龍骨、訶子、各二錢五分。沒石子、二枚。罌粟殼、赤石脂、各二錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。米飲調下。

【龍齒丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治精濁。

藥品 龍齒、茯神、遠志、人參、菖蒲、知母、黃蘗。

制法及用法 研爲細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。熟湯下。

【龍膽散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治盜汗。

藥品 龍膽草、防風、各等分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。臨臥米湯調下。

十七筆

【縮泉丸】

發明 補遺方。

功用 治腎氣不足。小便頻數。晝甚於夜者。

藥品 天台烏藥、益智仁(鹽拌炒、去鹽)、各等分。

制法及用法 共研細末。酒煎山藥糊爲丸。如梧桐子大。每服五七十丸。空腹、臨臥時。鹽湯或溫湯送下。或研爲末。溫酒調下。

十八筆

【雞腸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治膀胱有熱。小便不禁或遺尿。

藥品 鷄腸、一具(男病用雌鷄、女病用雄鷄、燒存性)。牡蠣、茯苓、桑螵蛸(炒)、各五錢。桂(去粗皮)、龍骨、各二錢五分。

制法及用法 研爲極細末。仍以雞腸脬一具。同雞腸燒存性。研極細末。同前藥末一錢。食前溫酒調化服。

鎮攝類

十筆

【茯神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 安神。定志。治婦人血風。五臟虛弱。驚悸怔忡。

藥品 茯神(去木)、人參、龍齒(另研)、獨活(去蘆)、酸棗仁(微炒)、各一兩。防風(去蘆)、遠志(去心)、桂心、細辛(去苗)、白朮(去蘆)、各七錢五分。甘草(炙)、乾薑(炮)、各五錢。一方無甘草。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一中盞半。煎至一盞。去滓。不拘時溫服。或蜜丸亦可。

【茯神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後血邪。心神恍惚。言語失度。睡臥不安。

藥品 茯神(去皮木)、一兩。人參、龍齒、琥珀、赤芍藥、黃耆、牛膝、各七錢五分。生地黄、一兩五錢。桂心、五錢。

制法及用法 研爲末。每服三錢。清水一盞。煎至七分。去滓。不拘時溫服。

【茯神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心臟風邪。妄語妄見。

藥品 茯神(去木)、一兩。遠志(去心)、黃連、沙參(去蘆)、各五錢。人參(去蘆)、石菖蒲、羚羊角屑、各七錢五分。赤小豆、四十九粒。甘草(炙)、二錢五分。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一中盞。煎至七分。去滓。不拘時溫服。

【茯神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治陰氣虛冷。四肢厥疼。心神畏恐。不能獨處。胸中滿悶。

藥品 茯神、一兩。遠志、防風、細辛、白朮、前胡、人參、桂心、熟地黄、甘菊花、各七錢五分。枳殼、五錢。

制法及用法 研爲末。每服三錢。清水一盞。加生薑三片。煎至六分。溫服。

【茯神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風驚。心神不定。常多恐怖。

藥品 茯神(去木)、生乾地黄、人參(去蘆)、石菖蒲、沙參(去心)、各一兩。天門冬(去心)、一兩五錢。甘草(炙)、遠志(去心)、犀角屑、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一中盞。加赤小豆二十粒。煎至七分。去滓。不拘時溫服。

【茯神散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治產後乍見鬼神。

藥品 茯神、柏子仁、遠志、黨參、當歸、生地黃、甘草(炙)、各一錢。肉桂、五分。獾豬心、一個。

制法及用法 水酒各一盞。煎至一半。入童便一鍾。調辰砂一錢。食後服。

【茯菟丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治思慮太過。心腎虛損。真陽不固。溺有餘瀝。小便白濁。夢寐頻洩。婦人帶下。

藥品 白茯苓(去皮)、三兩。

菟絲子(酒浸)、五兩。石蓮子(去殼)、二兩。

制法及用法 研爲細末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服三五丸。空腹時鹽湯送下。

【茯菟丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治心腎不交。或遺精、白濁、強中、消渴等證。

藥品 白茯苓、三兩。菟絲子、十兩。五味子、八兩。石蓮肉、三兩。山藥、六兩。

制法及用法 將菟絲子用酒浸。以浸過餘酒煮山藥糊爲丸。每服三錢。漏精。鹽湯下。赤濁。燈心湯下。白濁。茯苓湯下。消渴。米飲下。

十一筆

【硃砂丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治勞役心跳。

藥品 硃砂、當歸身、白芍藥、側柏葉、各三錢。川芎、陳皮、甘草、黃連(炒)、各一錢五分。

制法及用法 用豬心血爲丸。如粟米大。每服一百丸。龍眼湯送下。

【硃砂丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 鎮心神。化痰涎。退潮熱。利咽膈。止煩渴。

藥品 硃砂、五錢。鐵粉、海金沙、天竺黃、各一兩。金箔、銀箔、各二十片。腦子、五分。生麝香、一錢。人參、輕粉、犀角、各二錢。

制法及用法 共研末。水泛爲丸。共作六百丸。硃砂爲衣。每服一丸至五丸。痰盛潮熱。薄荷、沙糖、生葛自然汁、井水送下。狂言譫語。涎壅膈上。地龍三兩。薄荷及沙糖水研送下。心神不寧。金銀箔、薄荷、煎湯化下。

【清心丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治驚熱煩躁。

藥品 人參、茯神、防風、硃砂、柴胡、各三錢。金箔、三十片。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一二丸。竹瀝送下。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心痹。精神恍惚。恐畏悶亂。不得臥。語言錯謬。

藥品 犀角屑、牛黃(另研)、麝香(另研)、羚羊角屑、茯神(去木)、白蘚皮、沙參(去蘆)、天竺黃(另研)、防風、天麻、獨

活、人參、升麻、龍齒、遠志(去心)、甘草(炙)、各二錢五分。麥門冬(去心)、丹砂(另研)、各五錢。龍腦(另研)、一錢二分。

制法及用法 研爲細末。入另研藥。再研令極細。每服二錢。不拘時麥冬湯調下。

十二筆

【甯志丸】

發明 見危亦林世醫得效方。

功用 治心風。

藥品 人參、白茯苓、當歸(洗、去土及蘆)、石菖蒲、乳香(另研)、酸棗仁(用五兩許、湯浸去皮、取淨仁五錢、炒令赤香熟爲度)、各五錢。

制法及用法 研爲末。另用好硃砂一兩。將熟絹一小片。包裹線紮。繫豬心一枚。竹刀切開。不犯鐵。用紙揩去血。入硃砂包於豬心內。再用線縛合。又用甜筍殼重裝。麻皮紮定。無灰酒二升。入銀器或砂罐內煮。煮至酒盡。取出硃砂另研。將豬心竹刀細切。砂盆內研爛。却入前藥末。並硃砂棗肉爲丸。少留硃砂爲衣。藥末須每日碾下。煮肉於煮豬心日絕早煮熟。去皮核。取肉四兩和丸。如梧桐子大。每服五

十丸。人參湯送下。

【甯志丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人因失血過多。心神不安。言語失常。不得睡臥。

藥品 辰砂(另研)、酸棗仁(炒)、人參、白茯神(去木)、琥珀(另研)、各一分。糯米香(另研)、一錢。一方無茯神、琥珀。

制法及用法 研爲末。和停。每服一錢。空腹時濃煎燈心熱湯調下。一方蜜丸彈子大。每服一丸。薄荷湯化下。

【甯志丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心虛血少多驚。

藥品 人參(去蘆)、茯神(去木)、白茯苓(去皮)、柏子仁、遠志(酒浸、去心、焙)、酸棗仁(酒浸、去殼、微炒)、當歸、琥珀、各五錢(一作各五分)。石菖蒲、硃砂(另研)、乳香、各二錢五分(一作各三錢)。一方有梔子、無柏子仁。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後棗湯送下。

【黑錫丹】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 升降陰陽。墜痰定喘。

治真元虧損。上盛下虛。心火炎盛。腎水枯竭。三焦不和。嘔吐痰喘。冷氣刺痛。腰背沈重。男子精冷滑泄。婦人赤白帶下。血海久冷。無子。及陰證陰毒。四肢厥冷。不省人事。

藥品 黑鉛(熔去渣)、硫黃、各二兩。沈香、附子(炮)、葫蘆巴(酒浸、炒)、陽起石(煨、研細、水飛)、破故紙、舶上茴香(炒)、肉豆蔻(麴裏煨)、金鈴子(酒蒸、去皮核)、木香、各一兩。肉桂、五錢。一方無陽起石。一方有巴戟、一兩。

制法及用法 將黑錫入鐵鉢內熔化。入硫黃如常法製。結成砂子。攤地上出火毒。研令極細。餘藥並細末和勻。自朝至暮。研至黑光色爲度。酒麴糊丸。如梧桐子大。陰乾。藏鉛罐內。擦令光瑩。每服四五十丸。空腹時淡鹽湯或薑湯大棗湯送下。婦人芫湯送下。急證可投百丸。即能回陽。

參考 此方以大熱之硫黃和黑錫所結成之砂子爲君。諸純陽香燥之藥爲臣。以金鈴子苦寒一味爲反佐。沈香引入至陰之分爲使。凡陰火逆衝。真陽暴脫。氣喘痰鳴之急證。用以鎮固其陽。則坎離可交於頃刻。

【黑錫丹】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治上盛下虛。裏寒外熱。及痰飲。伏暑。霍亂。泄瀉如水。婦人產後敗血衝胃。

藥品 硝石(一作焰硝)、硫黃、各一兩(同硝石爲末、銀石器內、慢火炒、柳木槌攪之、不可猛火、以傷藥性、研極細)。太陰玄精石(研、水飛、如無真者、以青鹽代之)、一兩。五靈脂(酒飛、去砂石、澄攪、曬乾用)、青皮(去蘊)、陳皮(去膜)、各二兩。一作各二錢。

制法及用法 研爲末。醋煮米糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時米湯送下。

參考 此方本二氣丹而立。以硝黃二味。大抵中宮寒凝宿垢。更以玄精石清鎮胎金。使氣化下行歸就膀胱。兼二皮五靈。以破食積痰血之滯。雖大抵腸胃。而不礙乎陽虛。故爲治伏暑水瀉之聖藥。但小便赤澀不利者禁用(中熱不溲者、不可服五石、石藥精悍不得數溲、服之將發難)。又此方古法以醋糊和丸。米飲下。然醋性易壞。不若但用米飲糊丸。醋湯送下爲安。

十三筆

【睡驚丸】

發明 見王氏方。

功用 除熱。化痰。鎮心神。治驚悸。吐逆。

藥品 半夏(薑製)、乳香、犀角末、各一錢。

制法及用法 共研末。生薑自然汁煮麴糊爲丸。如綠豆大。每服一丸。臨臥薄荷湯送下。

【睡驚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒一切驚疳、食積、風癰等證。

藥品 使君子、五十個。香墨、一塊(如棗大)。金箔、銀箔、各七片。膩粉、二錢。

制法及用法 先將使君子燒灰存性。同墨研細。次入金銀箔乳鉢內研。次入膩粉并麝香少許。研令極細。稀糊爲丸。如梧桐子大。陰乾。每服一丸。薄荷湯磨下。一歲以下。每服半丸。

十四筆

【遠志丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後藏虛。心神驚悸。腹中急痛。夜臥不安。

藥品 遠志(去心)、麥門冬

(去心)、黃耆、當歸(炒)、人參(去蘆)、白朮(去蘆)、獨活(去蘆)、白茯苓(去皮)、桂心、柏子仁、石菖蒲、熟乾地黄、山茱萸、鐘乳粉、阿膠(碎炒)、各一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時溫酒送下。一日三次。

十五卷

【養正丹】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治上盛下虛。氣不升降。元陽虧損。氣短身羸。心腎不交。驚惕不眠。及中風涎潮。不省人事。傷寒陰證。自汗腎腎。婦人血海久冷。

藥品 水銀、黑錫(去滓、與水銀結成砂子)、硫黃(研、一作雄黃)、硃砂(水飛細)、各一兩。

制法及用法 先將黑錫入鐵鍋內鎔化。下水銀。以柳木槌搗。次下硃砂搗令不見星子。放下少時。方入硫黃末。急攪成汁和勻。如有騰起。以醋灑之。候冷取出研細。糯米糊丸。如綠豆大。每服三十丸。鹽湯或漿水、參湯送下。或丸如芡實大。每服一丸。服後得睡勿驚覺。

參考 腎氣不歸。遊散於上。則上盛下虛。故用水銀、黑錫。以鎮固之。然二藥非藉硫黃之力。則滯而不行。如砂結不透。服之即頭痛。以其陰降太速。虛陽擾動不安耳。用硃砂者。正以交通心氣也。古人每以來復、黑錫、養正三丹和服。名曰三和。蓋黑錫專溫腎肝。來復兼理脾肺。養正收攝心腎。總欲使三焦真火。各歸其部耳。

【熟地黄散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後心虛驚悸。神思不安。

藥品 熟乾地黄、二兩。黃耆(去蘆)、白薇、龍齒(另研)、各一兩。人參(去蘆)、茯神(去木)、羌活、遠志肉、各七錢五分。桂心、防風(去蘆)、甘草(炙)、各五錢。一方無黃耆、有荊芥。

制法及用法 咀咀。每服五錢。清水一大盞半。加生薑五片。大棗三枚。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。

【從蓉丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 益精。同陽。令人有子。

藥品 從蓉(消浸)、磁石(煅碎)、熟地黄、山茱萸、桂心、山

葵(炒)、牛膝(酒浸)、茯苓、澤瀉、黃耆(鹽湯浸)、鹿茸(去毛切醋炙)、遠志(去心炒)、石斛、覆盆子、五味子、萆薢、破故紙(炒)、巴戟(酒浸)、龍骨、菟絲子(酒浸)、杜仲(去皮剉、薑汁製、炒斷絲)、各五錢。附子、一個(重六錢者、炮、去皮臍)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時米飲送下。

十八筆

【鎮心丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 涼心經。治驚熱痰盛。及癰病。

藥品 甜硝(白者)、人參(去蘆、取末)、各一兩。甘草(炙)、寒水石(煨)、各一兩五錢。乾山藥(白者)、白茯苓、各二兩。硃砂、一兩。龍腦、麝香、各一錢。

制法及用法 共研末。熟蜜爲丸。如雞頭大。如使色紅入坯子臘脂二錢。每服半丸至一二丸。食後熱湯送下。

【鎮心丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心風。狂言多驚。迷悶恍惚。

藥品 牛黃、鉛霜、鐵粉(俱

另研)、各七錢五分。硃砂(水飛)、龍齒(另研)、龍腦草、天竺黃(另研)、遠志(去心)、生乾地黃、各五錢。金箔、五十片、人參(去蘆)、茯神(去木)、犀角屑、各一兩。

制法及用法 研爲細末。入另研藥和勻。煉蜜爲丸。如小豆大。每服七丸。不拘時白米煎湯送下。

【鎮心丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 安神。鎮心。

藥品 硃砂、龍齒、牛黃、各一錢。鐵粉、琥珀、人參、茯神、防風、各三錢。全蠍、七個(炙)。

制法及用法 共研細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服一二丸。燈心湯送下。

二十一筆

【鐵粉丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治心痰。

藥品 鐵粉、銀屑、員連、苦參、石蜜、龍腦草、龍齒、牛黃、秦艽、牡丹皮、白朮皮、地骨皮、罌丸、犀角。

制法及用法 共研細末。水泛丸。如梧桐子大。每服二十丸。熱湯送下。

【鐵精丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治驚風恍惚。寢寐不安。

藥品 鐵精 (另研)、龍齒 (研)、犀角屑、麥門冬 (去心)、人參 (去蘆)、茯神 (去木)、防風 (去蘆)、各一兩。石菖蒲、遠志 (去心)、各七錢五分。生乾地黄、一兩五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。不拘時粥飲下。

攻 逐 類

一 筆

【一醉膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心病。

藥品 香油、四兩。無灰酒、二碗。楊柳枝、二十條。

制法及用法 先將無灰酒、香油、和勻。用柳條逐條捲一二百下。候香油與酒相入成膏。煎至八分濃之。熟睡迨醒。或吐或下即安。

二 筆

【七宣丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生

書。

功用 治胃實。

藥品 大黃、一兩。木香、一錢。檳榔、三錢。訶子皮、一錢五分。桃仁、十二枚。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。每服五十丸。熱湯送下。以利爲度。

【七聖丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治風氣壅盛。痰熱結搏。頭目昏重。涕唾稠黏。心煩面熱。咽乾口燥。肩背拘急。心腹脅肋脹滿。腰腿重疼。大便秘。小便赤。睡臥不安。

藥品 肉桂 (去皮)、川芎、大黃 (酒蒸、一作煨八錢) 檳榔、木香、各五錢。羌活、郁李仁 (去皮)、各一兩 (一作各一兩五錢、一作各一錢)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食後熱湯送下。山嵐瘴地。最宜服之。量虛實爲加減。

【丁香脾積丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治脾積腹滿。

藥品 丁香、木香、巴豆霜、高良薑 (醋炒、或炙)、醋、各一錢七分。三稜、蓬莪朮、各一錢。

青皮、一錢五分。皂莢、一片(燒灰、存性)。百草霜、一匙。

制法及用法 研爲細末。水煮米糊和丸。如麻子大。每服二三十丸。熱湯送下。

【九製大黃丸】

功用 治溼熱下痢。傷寒熱結。及癥瘕積聚。留飲、宿食等症。

藥品 錦紋大黃。不拘多少。

制法及用法 酒浸一晝。九蒸九曬。研爲細末。黃酒泛丸。每服三錢。熱湯送下。

參考 此丸有推陳致新蕩滌腸胃之效。

【十棗丸】

發明 見傷寒金匱方。

功用 治太陽中風。表解裏未和。及懸飲支飲。或因水而咳。

藥品 大棗、十枚。芫花(熬)、甘遂、大戟(炮去骨、一作炒)、各等分。一方加生薑汁。一方加肉桂。

制法及用法 上係湯量。丸量準此酌加。爲丸服。

參考 芫花、甘遂、大戟。皆辛苦寒毒。蕩滌峻利。水飲之停積於胸膈經絡之間者。非此不除。慮其猛峻傷胃。故以大棗爲君。然非元氣充實者。不宜輕用。

三 筆

【三稜煎】

發明 見選奇方。

功用 治婦人食積、痰滯、血瘀、血癥。

藥品 三稜、蓬莪朮、各二兩。青橘皮(去白)、半夏、麥芽(炒)、各一兩。

制法及用法 好醋六升。煎乾焙爲末。醋糊和丸。如梧桐子大。每服三四十丸。淡醋湯送下。痰積從湯送下。

【三稜煎】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治氣塊、血積、食積、疰癆。

藥品 三稜、蓬莪朮、各四兩。芫花、一兩。

制法及用法 米醋五斗。瓷器內浸之。封口。文火煨令乾。取出稜末。將芫花以餘醋炒令微焦。共焙乾爲末。醋糊和丸。每服十五丸。生薑湯送下。

【三物備急丸】

發明 見金匱要略方。

功用 治中惡客忤。鬼擊鬼打。面青口噤。胸腹刺痛。脹滿氣急。卒死暴厥。以及寒氣冷食。積留胃中。胸腹滿痛。便秘。

藥品 巴豆(去皮心膜油、研如脂)、一錢。乾薑(生泡、去皮)、二錢。川大黃、三錢(溼紙裹煨、一作二錢)。

制法及用法 先以大黃、乾薑。搗爲細末。入巴豆霜。合搗千杵。和蜜爲丸。如小豆大。密器收藏。勿洩氣。每服三四丸。溫酒、或熱湯、米飲、苦酒送下。未醒。更服三丸。腹中鳴轉。得利即活。若中惡重症。如卒死者。捧頭起灌。令下咽。須臾當噤。不噤。更與三丸。當腹中鳴。即吐利便瘥。若口噤者。須化開用葶管從鼻孔吹入。自下於咽。

參考 腹痛便秘。當分陽結陰結。陽結有承氣更衣之劑。陰結則此方爲主。乾薑散中焦寒邪。巴豆逐腸胃冷積。大黃通地道。又能解巴豆毒。是有制之師也。白散治寒結在胸。故用桔梗佐巴豆。用吐下兩解法。此則治寒結腸胃。改用大黃佐薑巴。以直用下法。然傷寒熱傳胃腑。舌苔黃黑刺裂。唇口赤燥者。誤用必死。以巴豆大熱傷陰故也。婦人有孕者忌用。

【大黃散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治脅如石。

藥品 大黃、三稜(炮)、各一兩。

制法及用法 研爲末。醋熬成膏。每服一匙。空腹時薑橘皮湯調下。以利爲度。

【大陷胸丸】

發明 見張仲景傷寒論方。

功用 治傷寒發熱誤下。成結胸者。

藥品 大黃、八兩(一作六兩)。苦葶藶子、五合(熬)。杏仁、五合(去皮尖、炒黑)。芒硝、五合。

制法及用法 先以大黃、葶藶、搗篩。次納杏仁、芒硝、合研如脂。和散。另搗甘遂末一錢匙。白蜜二合。丸如彈子大。每服一丸。清水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下。更服。取下爲效。禁如藥法。亦可作湯服。

參考 此方以大黃、芒硝、瀉胸腹之熱。甘遂、葶藶、行胸腹之水。杏仁、行水中之氣。稍以白蜜之甘緩和之。於利水攻積之力甚捷。然非身體壯實者。不宜輕服。

【小陷胸丸】

發明 見張仲景傷寒論方。

功用 治心下結痛。氣喘悶。脈浮滑者。

藥品 黃連、一兩（一作三錢）。半夏、五合（湯洗、一作三合）。栝蒌實、大者一枚。

制法及用法 上係湯量。丸量準此製成。

參考 心下結痛者。胃中不和也。脈浮滑者。胃有痰結也。方中用黃連之苦寒以清胃。半夏之辛溫以和胃。栝蒌之涼滑以降胃中之痰滯。皆爲除熱散結之法。

四 筆

【化痞膏】

發明 見顧世澄醫醫大全。

功用 治痞積。

藥品 生大黃、一兩。半夏、荆三稜、蘇木、穿山甲、陳皮、當歸尾、全蠍、番木鱉、紅花、陳枳殼、厚朴、蓬莪朮、血餘、大貝母、川烏頭、天南星、香附、赤芍藥、草烏頭、檳榔、各三錢。蜈蚣、十條。巴豆仁、五十粒。土大鼈、一個（切四塊）。桃枝、楊枝、桑枝、槐枝、各十寸。葱、十根。水紅花子、五錢。白鳳仙根、五根。

制法及用法 麻油三斤同煎。藥枯去渣。再入東丹、二十四兩。收之成膏。取起冷定。篩入阿膠、蘇合油、各五錢。血竭、沒藥（去油）、肉桂、孩兒茶、

潮腦、滴乳香（去油）、虎骨（煨）、青黛、各三錢。冰片、麝香、乾漆、各二錢。皮硝、一兩。瓦楞子（煨）、三錢。攪勻攤貼。

【化毒丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治腫瘍。

藥品 乳香、沒藥、各五錢（另研）。巴豆、四十九粒（去皮心另研）。草烏頭（醋浸、炮製）、浮石（醋淬七次）、各一兩。

制法及用法 共爲末。以製烏頭及浮石之醋調麵糊爲丸。每服五七丸。食後冷酒下。忌熱飲。服後以利二三次或吐出惡物爲效。

【木通散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脅肋痛。心下小腹牽痛。

藥品 木通（去皮節）、青橘皮（去白）、蘿蔔子（炒）、舶上茴香（炒）、川楝子（去皮核、取肉、用巴豆五錢同炒黃、去巴豆不用）、各一兩。蓬莪朮、木香、滑石（另研）、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。不拘時煎葱白酒調下。一服即愈。甚者不過二三服。

【木香檳榔丸】

發明 見羅天符衛生寶鑑。

功用 治一切滯氣。心胸腹脅痞滿。二便澀滯。

藥品 木香、檳榔、枳殼(麸炒)、青皮(去白、醋炒)、陳皮(去白炒)、蓬莪朮(煨切、一作醋煮)、莛連(吳茱萸炒)、各一兩。黃蘗(去粗皮、酒炒)、香附(醋炒)、大黃(酒蒸、一作炒)、各三兩(一作各二兩)。牽牛頭末、四兩(腹滿便秘用黑者、喘滿膈塞用白者、一作二兩)。一方有三棱。一方有當歸、黃芩。

制法及用法 研爲細末。朴硝泡水和丸。如豌豆大。每服三五十丸至七十丸。食遠薑湯送下。以利爲度。

【巴豆丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人疝瘕。及血氣疼痛。

藥品 巴豆(去皮心、醋煮半日)、二錢五分。礞砂、大黃(炒)、各一兩。五靈脂、桃仁、各七錢五分。木香、五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如綠豆大。每服五丸。空腹時或醋湯或熱酒送下。

七 筆

【芍藥散】

發明 見惠眼方。

功用 治大小便下藥不通者。

藥品 芍藥、大黃、甘草(炙)、當歸、朴硝、各一分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水一盞。瓦器中煎至半盞。去滓溫服。即通。

【皂角散】

發明 見會編方。

功用 治大小便不通。

藥品 大皂角(燒存性)。

制法及用法 研爲末。米湯調下。又以豬脂一兩。煮熱。以汁及脂俱食之。又服八正散加檳榔、枳殼、朴硝、桃仁、燈芯草、茶根。

【妙香丸】

發明 見鮑祖徽驗方新編。

功用 治傷寒發熱驚狂。噎隔。風痰。鼈刺。及胸中鬱熱。語言恍惚。痰迷心竅。嘔吐。

藥品 巴豆、三十粒。麝香、梅片、各五分。黃蠟、六錢。犀牛角、輕粉、各一錢。硃砂、蜜糖、各三錢。金箔、四十張。

制法及用法 共研細末。即用黃蠟、蜜糖爲丸。如梧桐子大。每服六七丸。熱湯送下。

八 筆

【青黛丸】

發明 見沈金鰲 沈氏 尊生書。

功用 治癰積。

藥品 青黛(炒)、一錢。千金子、三十枚。膩粉、二錢。

制法及用法 研爲細末。糯米飯和丸。如芡子大。每服一丸。打破。以大棗一枚蒸熟。去皮核。同嚼。冷茶送下。半夜後取下積聚惡物爲效。

九 筆

【枳殼丸】

發明 見沈金鰲 沈氏 尊生書。

功用 治三焦約。二便不通。

藥品 枳殼、二兩。陳皮、一兩。檳榔、五錢。木香、二錢五分。黑牽牛子、四兩(一半生用、一半炒熟、搗取頭末一兩五錢、餘不用)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。熱湯送下。

【枳朮導滯丸】

發明 見李東垣方。

功用 治脾胃困於溼熱。不得運化。胸悶腹痛。積滯泄瀉。

藥品 枳實、五錢(麩炒、去瓤、一作三錢、一作一兩)。白朮(土炒、一作五錢、一作四錢)、黃芩(酒炒、一作二錢、一

作五錢、一作一兩)、茯苓(一作四錢)、訖連(薑汁炒、一作酒炒五錢、一作一兩)、各三錢。澤瀉、二錢(炒、一作四錢)。神麴、五錢(炒、一作四錢、一作一兩)。大黃、一兩(煨、一作酒蒸、一作生用、一作二兩)。

制法及用法 共研細末。湯浸蒸餅。或神麴煮糊爲丸。如梧桐子大。每服三錢。食遠熱湯送下。

參考 此方乃枳朮丸(枳實一兩、白朮二兩)、合三黃湯(黃連、黃芩、大黃等分)而兼五苓之法(五苓即茯苓、豬苓、白朮、澤瀉、桂、此則僅有茯苓、澤瀉、白朮、而無豬苓與桂)，兼有祛溼熱行宿滯之力。

【香稜丸】

發明 見嚴用和齊生方。

功用 破痰癖。消癥塊。治一切積聚。

藥品 木香、丁香、各五錢。三棱(酒浸一夕)、枳殼(麩炒)、蓬莪炭(細剉、每一兩用巴豆三十粒、去殼同炒、待巴豆黃色、去巴豆不用)、青皮(製)、川楝子肉(炒)、茴香(炒)、各等分。

制法及用法 研爲末。醋煮麴糊和丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服三十丸。薑鹽湯或溫酒送下。

【紅丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 壯脾胃。消宿食。去膨脹。治冷積等證。

藥品 京三稜(浸軟、切片、炒)、蓬莪茂(煨)、青皮(去白炒)、陳廣皮(去白炒)、各五斤。乾薑(炮)、胡椒、各三斤。一方無胡椒。一方有阿魏。

制法及用法 研爲末。醋煮麵糊或陳酒麴糊爲丸。如梧桐子大。擘紅爲衣。每服三十丸。或三十五丸。食後薑湯送下(一作食前沸湯送下)。①大病後。穀食難化。及中脘停醋。並生薑湯送下。②脾寒瘕疾。生薑橘皮湯送下。③心腹脹痛。紫蘇橘皮湯送下。④脾痛作楚。萸萸湯送下。⑤酒疸發疸。遍身發黃。大麥湯送下。⑥兩脅引乳痛。沉香湯送下。⑦酒積食積。面黃腹脹。時或乾嘔。煨薑湯送下。⑧婦人脾血作楚。及血瘕氣塊。經血不調。或過時不來。甚至寒熱往來。並醋湯送下。⑨產後敗血上攻。迷亂心神。狀如癲癩。熱醋湯送下。妊婦惡阻嘔吐。全不納食。二陳湯送下。

參考 方中三稜蓬莪。本能破癥消癖。其性猛烈。人不輕

服。然今所用者。以生產之地隔絕。二藥不得其真。乃以紅蒲根之類代之。性雖相近。而不傷耗真氣。凡老弱虛人小兒妊婦。服之無害。若妊婦惡阻嘔吐。全不納食。用此方佐二陳湯服之。最妙。但人畏其墮胎。多不肯服。若易名用之。頗有神效。

十 筆

【桃花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治膀胱氣滯血澀。大小便秘。及產後二便不通。

藥品 桃仁、葵子、滑石、檳榔、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時蔥白湯調下。

【桃符丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治積熱及結胸。

藥品 已豆霜、大黃、黃蘗、各一錢。輕粉、硃砂、各五分。

制法及用法 研爲細末。水煮麵糊和丸。如粟米大。一晝兒每服五七丸。五歲二三十丸。未晝兒二三丸。臨臥時桃枝煎湯送下。

【除溼丹】

發明 見劉河間方。

功用 治血壅、水腫、水脹。

飲癖、積氣、形氣俱實者。

藥品 黑牽牛、四兩(炒、一作四錢)。大黃、二兩(酒浸)。甘遂(麴裏煨)、大戟(麴裏煨)、芫花(醋炒)、青皮(炒、一作五錢)、橘紅(一作五錢)、各一兩。木香(煨)、檳榔、各五錢。輕粉(另研)、一錢。一方無檳榔。

制法及用法 研爲細末。水泛和丸。如椒子大。每服五分。五更時熟水送下。大便利三次爲度。若一二次不通利。次日仍服。或六分七分。漸加至一錢。若服後大便利四五次。或形氣不支。則減其服。三分二分俱可。或隔一二三日服一次。以愈爲度。甚者忌食鹽醬百日。

參考 此治水腫之主方也。故備舉甘遂、大戟、芫花、牽牛、大黃。直攻水之巢穴。使從大小二便而出。佐青皮、陳皮、木香、以行氣。使氣行則水行。可以腫脹漸消。其尤峻厲之處。則在少加輕粉。使諸攻水行氣之藥。迅烈莫當。無微不入。無窮不達。用之若當。功效神奇。百發百中。然非形實或邪盛者。不可輕試。

【破棺散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治諸熱陣風熱發熱多

汗。大渴便秘。譫語結陽。及瘡氣入腹危急者。

藥品 大黃、二兩五錢(半生半熟)。芒硝、甘草、各二兩(一作各一兩)。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如彈子大。每服半丸。痰重一丸至二丸。食後童便入酒半盞化服。或白湯合酒化服。忌冷水。

十一筆

【通神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治實熱大便不通。小腹痛脹。煩悶能飲食。

藥品 大黃(炒)、芒硝、檳榔、郁李仁(湯浸去皮、微炒)、桃仁(杵)、各一兩(一方有木香五錢)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。空腹時粥飲調下。

【犀角丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒風熱痰實。或三焦邪熱。面赤便秘。

藥品 生犀末、一分。人參(去鬚切)、枳實(去穢炙)、檳榔、各五錢。黃連、一兩。大黃、二兩(酒浸用巴豆一百粒、貼在大黃上、紙裹、飯上蒸三次、切、炒令黃焦、去巴豆不用)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如麻子大。每服一二十丸。臨臥時熱湯送下。未動加丸數。亦治大人。孕婦無損。

十二筆

【椒目丸】

發明 見金匱要略。

功用 治腹滿口舌乾燥。腸間有水氣。

藥品 防己、椒目、葶藶、大黃、各一兩。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。先食飲服一丸。日三服。稍增。口中有津液渴者。加芒硝五錢。

參考 此方以防己椒目。導飲於前。大黃葶藶。推飲於後。前後分消。則腹滿減而水飲行。脾氣轉而津液生矣。

【順氣散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 通大便。

藥品 大黃、芒硝、各二錢。甘草(炙)、一錢。

制法及用法 研爲末。清水煎服。

十三筆

【遇仙丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治器上痰氣。魚鼈蠶蟲諸積。

藥品 黑丑頭末、四兩(半生半炒、一作白丑頭末二兩、半生半炒)。三棱(醋炒)、蓬莪朮(醋炒)、生苡苳藟(一作三錢)、白檳榔(一作一兩)、大皂莢(去皮弦子、酥炙淨末、一作三錢)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。浸揉汁煮。白麵一兩。打糊爲丸(一作醋煮、米糊爲丸)。如綠豆大。每服三錢。五更時茶清送下。病淺者一服見效。病深者再服。天明當有所下。有積去積。有蟲去蟲。小兒量服。孕婦忌之。

【遇仙丹】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 追蟲。逐積。消癖。利痰。

藥品 黑丑頭末、檳榔、各四兩。三棱、蓬莪朮(醋炙)、各一兩。大黃、二兩。木香、五錢。

制法及用法 共研爲細末。用大皂角去子。打碎。煎濃湯去滓。煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服四五十丸。五更時茶清送下。如未通。再飲溫茶助之。取盡蟲積惡物。以白粥補之。

【搜風丸】

發明 見沈金鰲 沈氏尊生書。

功用 攻積。

藥品 黑丑頭末、二兩。大黃、枳實、檳榔、各五錢。

制法及用法 共研末。米糊爲丸。如梧桐子大。每服二三錢。米飲送下。

十五筆

【潤下丸】

發明 見沈金鰲 沈氏尊生書。

功用 治大腸燥實。二便秘結。癰毒壅盛者。

藥品 大黃(酒製)、四兩。黑丑頭末、二兩(炒)。

制法及用法 共研末。牙皂煎汁爲丸。如鵝仙子大。每服一錢。多至二錢。燈心湯送下。

十八筆

【檳榔散】

發明 見形證論方。

功用 攻堅。破積。

藥品 檳榔、大黃(蒸)、青皮、各二錢五分。黑牽牛、一錢。木香、少許(炮)。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。薄荷蜜水調下。

表裏類

二筆

【人參散】

發明 見朱橚普濟方。

功用 治婦人骨蒸。身熱。臂痛。經閉。形瘦。兩脅氣刺。腹內生塊。咳嗽時作。胃弱不欲食。

藥品 人參、鼈甲(醋炙黃、全去裙襖)、柴胡(去苗)、地骨皮、各三兩。羚羊角屑、赤茯苓、枳殼(鈇炒微黃、去瓤)、牛膝(去蘆)、貝母、栝蒌根、各二兩。知母、一兩五錢。赤芍藥、桃仁(湯浸搯去皮尖雙仁、鈇炒微黃)、各一兩。黃芩、當歸、各七錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服五錢。以豬肝一具。鹽醋葱白各少許。和煮。空腹時食之。後飲溫酒二盞。

參考 此爲攻補兼施之方。

【人參荆芥散】

發明 見張潔古方。

功用 下痰。去熱。治身熱痰嗽。胸膈不利。

藥品 人參、五錢。荆芥穗、一兩。大黃、二錢。

制法及用法 研爲細末。清

水煎。調檳榔、木香、細末五分。輕粉、一字。小兒下乳後服。如身熱潮熱。宜服清涼飲去大黃。三服之後。卻入大黃服之。令疎利則愈。

【七聖散】

發明 見鮑相敬騷方新編。

功用 治姪娠嘔久不返轉甚者。

藥品 柴胡、黃芩、甘草(炙)、知母、草果仁、常山(酒炒)、各一錢五分。烏梅、三箇(去核)。

制法及用法 水酒各半煎。露一夜。臨發五更時嚥溫服。忌食生冷雞魚。

【七寶散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 涼心曠。消風熱。治小兒溫壯伏熱。傷寒煩躁。面赤氣喘。夜熱曉涼。

藥品 大黃(蒸)、赤芍藥、甘草(炙)、當歸、各二錢五分。麻黃、白朮、荆芥穗、各二錢。

制法及用法 研爲末。一錢一錢。清水平盞。加葱白一寸。薄荷一葉。煮至三分。不拘時溫服。

【七寶散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 一切諸疾。或先寒後熱。或先熱後寒。或寒多熱

少。或熱多寒少。或一日一發。或一日二三發。或連日發。或間日發。或三四日一發。不問鬼瘧食瘧。不服水土。山嵐瘴氣似瘧者。皆可治之。

藥品 常山(醋炒)、厚朴(薑製)、青皮、陳皮、檳榔、草果(去皮)、各一錢。甘草(炙)、七分。一方多生薑、七片。一方多半夏、一錢。大棗、一枚。

制法及用法 咬咀。每服五錢。於未發隔夜。水酒各一邊。煎至一大盞。去滓露一宿。再用水煎水一次。去滓。亦露一宿。來日當發之早。湯溫面東。先服頭藥。少頃再服藥滓。大有神效。

三 筆

【寸金丹】

發明 驗方。

功用 治中風、中寒、中暑、及霍亂吐瀉。一切感冒雜症。

藥品 川厚朴、三兩。縮砂仁、三兩。羌活、三兩。赤茯苓、三兩。草果仁、一兩五錢。烏藥、三兩。防風、三兩。藿香、三錢。薄荷、三兩。前胡、三兩。廣木香、三錢。硃砂、三兩。枳殼(炒焦)、一兩五錢。香附(製)、三錢。半夏、三兩。陳皮、三兩。川芎、三錢。白芷、三兩。

紫蘇葉、三兩。甘草(炙)、一兩五錢。豆蔻、三兩。蒼朮(炒焦)、三兩。六神(炒焦)、三兩。

制法及用法 生曬爲末。用神麴糊和薑汁爲丸。每重三錢。硃砂爲衣。水泛亦可。每服一丸。淡薑湯送下。

四 筆

【牛黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治溫壯熱。或寒熱往來。

藥品 牛黃、甘草、各五錢。柴胡、梔子(酒炒)、龍膽草(酒炒)、黃芩(炒)、各二錢五分。

制法及用法 研爲末。每服五分。金銀薄荷湯調下。

【牛蒡散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治四肢拘急。

藥品 牛蒡子、新豆豉(炒)、羌活、各三兩。生地黄、一兩五錢。黃芩、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹食前熟湯調下。一日三次。

【五積散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治外感寒邪。內傷生

冷。頭疼。身痛。項背拘急。惡寒。腹痛。嘔吐。以及寒濕客於經絡。腰脚痠疼。婦人經血不調。難產。

藥品 產朮(米泔浸、炒去皮)、八錢。桔梗(去皮)、六錢。麻黃(去節根、泡)、枳殼(去瓢、麸炒)、陳皮(去白)、各五錢。厚朴(去粗皮、薑製)、乾薑(泡過)、各四錢。半夏(湯洗七次、薑製)、茯苓、甘草、白芷、當歸身、白芍藥(酒洗)、川芎、肉桂、各三錢。

制法及用法 研爲末。每服四五錢。加生薑三片。葱白三莖。清水煎。去滓熱服。溫服取微汗。冒寒用煖蓋。表邪甚者。去茯苓。加香薷。陰寒脈細。去茯苓。加熟附。逆氣乾嘔。加吳茱萸。虛加入參、白朮、香附、砂仁。婦人調經催產。加艾醋。

參考 此方本平胃爲主。參以二陳。專主內傷生冷。又合桂枝麻黃。但少杏仁。故兼治外感寒邪。加以四物去地。而合甘草、乾薑。爲治血中受寒之聖藥。枳桔甘草。並爲清氣治嗽之首方。白芷專走陽明。治風熱頭痛。桂苓甘朮換蒼朮。以滋飲散邪。使飲半從表散。內藏小半夏茯苓湯。合本

盡之飲。驅之從小便出。此雖類集十餘方。而不嫌冗雜者。得辛溫散邪之大旨也。但難合複方。原不拘全用。如無血病。則不藉芍歸。設不咳嗽。則何煩枳桔。無頭痛。則白芷奚取。有汗。則麻黃安施。要在臨證審之。

【午時茶】

發明 見經驗百病內外方。

功用 治風寒感冒。停食。水土不服。腹瀉、腹痛等症。

藥品 茅朮、陳皮、柴胡、連翹、白芷、枳實、山楂肉、羌活、前胡、防風、藿香、甘草、神麴、川芎、各十兩。陳茶葉、二十斤。厚朴、桔梗、麥芽、蘇葉、各十五兩。

制法及用法 研為細末。拌勻。宜於陰曆五月五日午時糊成小塊。每服三錢。加蔥薑少許。煎熟服。汗出即效。

五 筆

【玉雪救苦丹】

功用 治傷寒時行瘟疫。寒熱頭痛。胸悶髀痠。身熱神昏。譫語氣逆。痰涎壅塞。一切咽喉急症。小兒痧痘時疹。急慢驚風。兼治癰疽、發背、腦疽、疔毒、無名腫毒等症。

藥品 水安息、三錢。血珀、

三錢。竹門子、三分。薄荷石、三錢。犀牛角、三錢。真珠、三錢。日螺殼、一錢。赤石、三分。川連、一兩。左秦艽、八錢。桂枝、八錢。細辛皮、八錢。厚朴、一兩。木通、八錢。赤芍藥、八錢。寒水石、一兩。枳殼、八錢。陳皮、八錢。大豆卷、八錢。柴胡、八錢。福羅麴、八錢。辰砂、二兩。連翹、八錢。象貝母、八錢。赤茯苓、八錢。木香、八錢。茯苓皮、八錢。防風、八錢。前胡、八錢。生軍、八錢。天花粉、八錢。白朮、八錢。大力子、八錢。枳實、八錢。荆芥、八錢。大麻仁、八錢。車前子、八錢。麻黃、八錢。豆豉、八錢。甘草(炙)、八錢。六神麴、八錢。藿香、八錢。大腹皮、一兩六錢。石膏、八錢。玉桔梗、八錢。半夏麴、八錢。茅朮、八錢。蘇合油、二兩。

制法及用法 共研為末。用神麴粉四兩。加煉蜜打丸。每粒潮重六分。辰砂為衣。日曬壳護。每服一丸。如未效。再服一丸。輕則半丸。

【甘露茶】

發明 驗方。

功用 疎風、清熱。去滯、逐邪。治一切感冒時氣。頭痛腹

脹。不服水土等症。

藥品 陳皮、四錢(鹽水洗)。穀芽、一兩(炒)。神麴、一兩五錢。山楂、五十粒(炒)。烏藥、厚朴、枳殼、各八錢。陳茶葉、三兩。

制法及用法 共爲粗末。每服二三錢。生薑湯煎服。

【白朮散】

發明 見錢乙方。

功用 治吐瀉已久。虛熱而渴。

藥品 白朮、人參、白茯苓、藿香(去土)、木香、甘草(炙)、各一兩。乾葛、二兩。一方無藿香、有生薑。

制法及用法 研爲末。每服三錢。清水煎。溫服。如飲水多。多與服之。

【石膏散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傷寒陽盛。通身壯熱。目眩頭痛。

藥品 石膏、二兩。麤朮(去土)、龍齒、各一兩(另研)。犀角屑、前胡(去蘆)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一大盞。加豆豉五十粒。葱白七莖。同煎至五分。去滓。入牛黃末一字。攪令勻。不拘時溫服。

【生地黄丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治惡風體倦。乍寒乍熱。面赤心悸。或時自汗。三部無寒邪脈。但厥陰弦長而上魚際者。

藥品 生地黄、二兩。柴胡、秦朮、黃芩、各五錢。芍藥、一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時烏梅湯送下。一日三次。

六 筆

【再造散】

發明 見陶節菴方。

功用 治無陽證。

藥品 黃耆(酒洗)、人參、桂枝、甘草(炙)、各一錢。熟附子、細辛、各五分。羌活、防風、川芎、各八分。煨薑、五片(一作生薑、三片)。一方有大棗、二枚。

制法及用法 清水煎。將成。加芍藥一撮(酒炒、一作一錢)。更煮三沸。去滓溫服。

七 筆

【沉香麴】

功用 疎表。化滯。舒肝。和胃。治肝胃氣滯。胸悶。脘

脹。腹痛。嘔吐。吞酸。

藥品 沉香、木香、各二兩。柴胡、厚朴、鬱金、白豆蔻、縮砂仁、各一兩。枳殼、麥芽、青皮、防風、葛根、烏藥、前胡、廣皮、桔梗、檳榔、白芷、穀芽、各四兩。藿香、檀香、降香、羌活、各三兩。甘草、一兩五錢。

制法及用法 生曬研末。麴糊作塊。重二三錢。每服一塊。河水煎服。

【防風通聖散】

發明 見劉河間方。

功用 治一切風溼。暑溼。饑餒勞役。內外諸邪。氣血怫鬱。表裏三焦俱實。憎寒壯熱。頭目昏運。目赤睛痛。耳鳴鼻塞。口苦舌乾。咽喉不利。唾涕稠結。咳嗽上氣。大便秘結。小便赤澀。瘡瘍腫毒。折跌損傷。瘀血便血。腸風痔漏。手足癰癢。驚狂譫妄。丹斑癰疹等症。

藥品 防風、川芎、當歸、芍藥(焙、一作酒炒)、大黃(煨)、蘇薄荷葉、麻黃(去節)、連翹、芒硝、各五錢(一作各一兩)。石膏(煨)、黃芩(焙)、桔梗、各一兩。滑石、三兩(飛過、一作一兩、一作殺)。生甘草、二兩(一作三兩)。荆芥穗、白朮(土炒)、梔子(炒)、各二錢五分。

制法及用法 研爲粗末。每服二三錢。清水一大盞。加生薑三片(一作五片、一方有葱白)。煎至六分。食前溫服。或白湯調下亦可。

參考 此方以防風、麻黃、解風熱之在皮膚者。使由汗而泄。荆芥、薄荷、清上焦風熱之在頭項者。使由鼻而泄。大黃、芒硝、通腸胃風熱之在內部者。使自後而泄。滑石、梔子、利水道風熱之在膀胱者。使由溺而泄。石膏、桔梗清肺胃之邪。連翹、黃芩祛諸經之火。川芎歸芍。和血以平肝。甘草白朮。和胃而健脾。於表裏三焦之病。皆可解矣。然非表裏俱實。大小便秘者。宜慎用。

八 筆

【知母散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人熱勞。體瘦壯熱。四肢頭疼。咽喉不利。少思飲食。

藥品 知母、黃芩、各七錢五分。柴胡(去苗)、生乾地黃、各一兩。赤芍藥、麥門冬(去心)、射干、川升麻、各七錢五分。甘草、五錢(炙微赤剉)。

制法及用法 研爲細末。每服四錢。清水一中盞。加生薑

五釐。淡竹葉二十七片。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

九 筆

【柴胡散】

發明 見太平聖惠方。

功用 清肺。治婦人骨蒸勞熱。咳嗽痰壅。腹脅妨悶。不欲飲食。

藥品 柴胡(去苗)、桑根白皮、麥門冬(去心)、赤茯苓、各一兩。錦紋大黃(剉碎微炒)、枳殼(麸炒、去瓤)、百合、秦光(去苗)、紫菀(洗)、黃芩、赤芍藥、知母、川木通(剉)、各七錢五分。半夏(湯洗七遍、去滑)、甘草(炙微赤)、各五錢。鼈甲(醋炙)、二兩。

制法及用法 研粗末。每服三錢。水一鍾。加生薑一錢三分。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【柴胡散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒寒熱往來。乳食不下。四肢無力。心腹脹滿。上焦痰壅。漸漸羸瘦。

藥品 柴胡(去苗)、鼈甲(塗醋炙令黃色、去裙襖)、各一兩。人參、前胡、桔梗、訶梨勒皮、地骨皮、赤芍藥、甘草(炙微赤)、陳橘皮(湯浸去白、焙)、杏仁

(湯浸、去皮尖雙仁、麸炒微黃)、各五錢。

制法及用法 搗篩爲散。每服一錢。清水一小鍾。煎至五分。去滓。不拘時溫服。依兒大小加減。

【柴胡散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠頭目昏重。心胸煩悶。不思飲食。

藥品 柴胡、一兩五錢。赤茯苓、麥門冬、各一兩。枇杷葉(去毛)、人參、橘紅、甘草、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一鍾。加生薑三片。煎至七分服。

【柴胡散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人寒熱體瘦。肢節疼痛。口乾心煩。不欲飲食。

藥品 北柴胡、赤茯苓、黃芩、白朮、各一錢。麥門冬(去心)、三錢。鼈甲(醋炙)、二錢。人參、地骨皮、枳殼(醋炙)、生地黃、桑根白皮、赤芍藥、桔梗、甘草、各五分。一方無鼈甲。

制法及用法 清水二鍾。加生薑三五片。煎至一鍾。不拘時服。

【枳殼丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腸胃氣壅風盛。大便秘實。

藥品 枳殼(炒)、皂角(去皮弦子炙)、大黃、羌活、木香、橘紅、桑白皮、白芷、各等分。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時米飲送下。一方只用枳實、皂角、各等分。以飯飲爲丸。

【洗心散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 清表裏氣血諸熱。

藥品 當歸、生地黄、木通、黃連、麻黃、大黃(酒洗)、薄荷葉、各等分。

制法及用法 研爲細末。清水一盞。加燈心、煎至七分。去渣溫服。

【范志麴】

發明 建神麴之一種。福建晉江縣范志吳亦飛所創造也。

功用 搜風。解表。開胸。快膈。調胃。健脾。和中。消積。進食。解酒。利水。止瀉。治感冒。瘧疾。發熱。頭眩。瘴氣。咳嗽。嘔吐(並同生薑煎服)。傷食。腹痛。痞滿。氣痛。泄瀉(同烏梅煎服)。痧疾(須加倍用、同好酒茶心煎服)。托邪毒。療痘疹初發。

制法及用法 以藥九十六

味。配合君臣佐使。另加十二味青蒿、紫蘇、薄荷等物。搗爛煎湯。共一百零八味。製爲小方塊。重一兩。以每年舊曆五月五日、及六月六日。依法製造。

參考 此物甘香和平。爲調和氣血。疏解寒溼。輔助消化之良品。以形色淡黃。切片煎湯。藥渣不散者爲佳。攜帶旅行最宜。入瘴癘之鄉。尤不可少。性質甘淡無毒。並可代茶常服。服時忌食生菜。孕婦忌用。

【建神麴】

功用 搜風。解表。消積。行痰。開胸。專隔。調胃。健脾。止瀉。消腫。收痧。消斑。治瘟疫。嵐瘴。風寒。暑濕。發熱。表汗。感冒。頭痛。頭眩。瘧疾。霍亂。嘔惡。吞酸。咳嗽。心煩。食滯。吐瀉(薑煎溫服)。腹痛。赤白痢疾。小兒傷飢食飽。凡屬於脾胃諸症。

藥品 川厚朴、廣木香、冬朮、青皮、檳榔、葛根、茯苓皮、柴胡、桔梗、荆芥、前胡、香附、羌活、紫蘇、蘇薄荷、茅朮、獨活、豬苓、防風、烏藥、枳實、大腹皮、藿香、木通、香薷、澤瀉、白芥子、各二兩。丁香、白豆

菴、甘草、麻黃、川芎、木瓜、沉香、白蘇子、肉果、檀香、縮砂仁、左秦艽、草果仁、白芷、各一兩。廣皮、半夏(製)、萊菔子、光杏仁、各三兩。麥芽(炒)、蘇芽(炒)、山楂肉(炒)、各四兩。

制法及用法 共爲粗末。和薑汁用神麴糊作塊子。每重三四錢。每服一塊。河水煎服。

參考 此物味甘苦而氣芳香。善治感冒四時一切不正之氣。具有和胃化滯之能力。故凡旅行水土不服。及飲食不進等症。功效如神。以色青黑煎之成塊不散而有清香氣者爲真。陳久者良。產福建晉江縣。故名。以開元寺造者爲佳。

十二筆

【菩提救苦丸】

發明 驗方。

功用 治春夏感冒風寒。時行瘟疫暑濕。頭痛口渴。身熱目脹。筋骨疼痛。惡心怯寒。脈息洪數。

藥品 紫蘇、葛根、羌活、各四兩。蒼朮、赤芍藥、香附、天花粉、玄參、各三兩。陳皮、生地黃、白芷、防風、川芎、黃芩、厚朴、各二兩。甘草、細辛、各一兩。

制法及用法 共研末。新荷梗、荷葉煎水爲丸。每重二錢五分。大人每服一丸。小兒半丸。內傷飲食。外感風寒者。炒神麴煎湯化下。餘俱用生薑湯或開水下。惟受暑勿用薑。日久藥味發變更妙。

【屠蘇酒】

功用 辟疫癘及一切不正之氣。

藥品、制法及用法 以赤木、桂心、防風、菰莖、蜀椒、桔梗、大黃、烏頭、赤小豆。同入絳囊盛之。於除夕夜懸井底。元旦日取出。置酒中。煎數沸飲之。

【黑散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治小兒變蒸。中挾時行溫病。或非變蒸時而得時行病者。

藥品 麻黃(淨末)、苦杏仁(另研)、各二錢。大黃(淨末)。一錢。

制法及用法 和勻。納密器中。一月小兒服小豆大一枚。百日小兒服棗核大一枚。乳汁和。臥令汗出。以溫粉撲之。勿見風。

十三筆

【萬應神麴糕】

發明 見驗方。

功用 搜風。解表。開胸。快膈。調胃。健脾。消積。進食。解酒。止瀉。利水。治四時不正之氣。感冒發熱。頭眩咳嗽。及傷食腹痛。痞滿氣痛。嘔吐泄瀉痢疾。飲食不進。不服水土等症。

藥品 前胡、大黃、良薑、蒼朮、羌朮、防風、薑黃、山楂、柴胡、厚朴、紫蘇、豆蔻、葛根、檳榔、薏苡米、黃芩、荆芥、麻黃、青皮、使君子、甘草、黃蘗、百合、梔子、薄荷、羌活、陳皮、蒲黃、扁豆、杏仁、車前、砂仁、澤蘭、獨活、木香、益母草、麥芽、烏藥、桔梗、訶子、大腹皮、豬苓、茯苓、三稜、枳實、草果、半夏、淮山藥、木通、枳實、藿香、建澤瀉、香菇、菖蒲、訶連、木瓜、香附、枳殼、小豆、花椒、各四兩。

制法及用法 共爲細末。又用鮮青蒿、四斤。鳳尾草、大蔡草、各二斤。小蔡草、蒼耳草、各三斤。同煎濃汁。又用小麥、十五斤(洗淨、略蒸、曬乾)。酒麴粉、六兩。五月五日。或六月六日。或七夕、重陽。或天德、月德、黃道、吉日。均可製配。臨時先將藥與麴粉同拌勻。入草藥水拌揉。做成塊子。

外用荷葉包好。以苧麻紮緊。上籠蒸一個時辰。取出涼三四時。以冷爲度。裝入桶內。一層稻禾草。一層神麴。蓋密。至十二天取出。曬過月餘。極乾。然後剝去荷葉。再露七夜。曬七日。俟乾透收藏。每月仍須曬數次。以免霉爛。大人每服三錢。小兒一錢(多則一錢五分)。清水煎服。外感發熱。咳嗽瘧疾嘔吐。俱加生薑同煎。泄瀉加烏梅同煎。痢疾大人每服四五錢。小兒二三錢。加陳茶葉同煎。

【萬應寶珍膏】

發明 驗方。

功用 治五勞七傷。筋骨疼痛。負重傷力。腰膝痠軟。貼兩膏肓穴(即膏肓俞穴、屬足太陽膀胱經、在四椎下一分、五椎上二分、兩旁相去脊各三寸)。及兩腎俞穴(屬足太陽膀胱經、在十四椎下、兩旁去脊各一寸五分、前與臍平)。左癱右瘓。手足麻木。擊急偏枯。滿肩疼痛。貼兩肩井穴(屬足少陽膽經、在肩上陷中、缺盆上、大骨前一寸半)。兩曲尺穴(屬手陽明大腸經、在肘外髁骨、屈肘橫紋頭陷中)。兩手腕穴(在手太陽小腸經、在手外側腕前、起骨下陷中)。兩膝眼穴(即膝關

穴、屬足厥陰肝經、在額鼻下、二寸旁陷中)。心胃氣痛。肚腹飽脹。貼臍中穴(屬任脈經、在玉堂下一寸六分、橫量兩乳間陷中)。及中腕穴(屬任脈經、在上腕下一寸臍上四寸)。鼻塞腦漏。偏正頭風。貼太陽穴(在眉後陷中、太陽紫脈上、用帛一條以纏項、紫脈見處即是、或以手緊束其額、亦見)。及風門穴(屬督脈經、在項後入髮際一寸、或作二寸、大筋內宛宛中)。冷哮咳嗽。痰鳴氣急。貼肺俞穴(屬太陽膀胱經、在第三椎下、兩旁去脊各一寸五分、或對乳引繩度之、或以搭手、左取右、右取左、當中指末是)。及臍中穴。遺精。滑精。淋濁。貼丹田穴(別名石門穴、屬任脈經、在臍下二寸、三焦募也)。及俞門穴。月經不調。赤白帶下。貼關元穴(屬任脈經、在臍下三寸、爲小腸之募)。及尾間穴。滿身走氣。閃挫疼痛。貼章門穴(屬足厥陰肝經、在大橫外、直季脅肋端。臍上二寸、兩旁六寸)。寒溼脚氣。偏膝痠軟。貼膝眼穴。小腸疝氣。偏墜木子。貼氣海穴(屬任脈經、在臍下一寸半宛宛中)。脾虛泄瀉。久瀉痢疾。受寒腹痛。貼腹臍穴。一切跌打損傷。風

溼積聚。瘰癧流注。各貼患處。

藥品 生地黄、茅朮、枳殼、五加皮、義朮、桃仁、白朮、當歸、川烏、陳皮、烏藥、山礬、川軍、何首烏、草烏、柴胡、防風、劉寄奴、牙皂、川芎、官桂、羌活、威靈仙、赤芍藥、天南星、香附、荊芥、白芷、海風藤、藁本、川續斷、高良薑、獨活、麻黃(去節)、甘松、連翹、各三錢。

製法及用法 用麻油、四斤。入藥煎枯。濾去渣。下淨血餘二兩。熔化。再下樟片、三十兩。熬成膏。再下肉桂、麝香(後入)、各一錢。附子片、木香、各二錢。冰片、洋樟、茴香、乳香、沒藥、阿膠、細辛、各三錢。共研細末。攪入膏內。還火攪勻。用法詳功用。

參考 此膏不知細料。名萬應膏藥肉。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 調氣血。和表裏。利胸腹。理百病。治婦熱停積。自利煩躁。

藥品 川當歸(去蘆、酒洗)、赤芍藥、各二兩。甘草、一兩(半生半炙)。大黃、一兩二錢(半生半泡)。川芎、麻黃(製)、各五錢。

制法及用法 剉碎。每服二錢。清水一盞。加生薑、二片。煎至七分。不拘時溫服。

【辟瘟丹】

發明 驗方。

功用 治時行痧疫。初起嘔惡。霍亂轉筋吐瀉。絞腸腹痛。中風。中暑。中痰。卒然倒地。不省人事。山嵐瘴癘。瘡疹初起。爛喉隱疹。傷寒瘧痢初起。肝胃疼痛久積。哮喘呃逆。心腹脹滿。周身掣痛。二便不通。蟲積蟲毒癰塊。婦女腹中結塊。小兒驚嘔。十積五疳。瘧後餘毒。療無名腫毒。

藥品 羚羊角、朴硝、牙皂、廣木香、黃蘗、茅朮、茜草、黃芩、半夏(薑製)、文蛤、銀花、川連、犀角、川厚朴、川烏、玳瑁、大黃、藿香、玄精石、廣鬱金、茯苓、香附、桂心、各三兩。赤小豆、降真香、鬼箭羽、硃砂、毛茛、大棗、各四兩。甘遂、大戟、桑皮、千金霜、桃仁霜、檳榔、蓬莪朮、胡椒、葶藶子、西牛黃、巴豆霜、細辛、白芍藥、公丁香、全歸、禹餘糧、山豆根、滑石、各一兩。麻黃、麝香、菖蒲、水安息、乾薑、蒲黃、丹參、天麻、升麻、柴胡、紫蘇、川芎、草河車、檀香、桔梗、白芷、各二兩。紫

菀、八錢。芫花、五錢。雌黃、琥珀、冰片、廣皮、腰黃、各一兩五錢。斑蝥、三十隻。蜈蚣、七條。石龍子、三條。

制法及用法 各研淨粉。糯米糊爲錠。每重八分。密收勿洩氣。每服一錠。重者倍之。小兒減半。周歲兒一二分。熱湯或溫酒送下。如急暴惡症。不限錠數。小兒痘後餘毒。磨敷患處。已有頭者。圈頭出毒。無名腫毒。醋磨敷之。

參考 此方攻病之力極大。不傷元氣。夏秋感症服之。無不應手立效。取汗吐下三者得一爲度。若服之過少。藥力不足。未免自誤。虛弱之人。宜乘病症初起。元氣未瀉者。急服立效。倘遲延多日。邪氣入裏。正氣已虧。神昏自汗。則宜斟酌。然香味甚重。孕婦三四個月胎氣不足者忌服。如月足胎元實者。遇此急症。不妨酌服。

十五筆

【磁石丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治表虛裏寒。

藥品 磁石(火煅醋淬七次)、防風、羌活、黃耆(鹽水浸焙)、木通(去皮)、白芍藥、桂心

(不見火)、各一兩。人參、五錢。

制法及用法 研爲末。用羊腎一對。去脂膜搗爛。打酒糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時溫酒或鹽湯送下。

二十四筆

【鼈甲丸】

發明 見聖濟總錄方。

功用 治三陰瘕久不愈。

藥品 鼈甲(炙)、何首烏(製)、各四兩。川厚朴、芍藥、廣皮、山楂、六神麴、黃芩、麥芽(炒)、半夏(薑汁製)、各二兩。常山、柴胡、青皮、蓬莪朮、京山稜、各一兩五錢。

制法及用法 共研細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服三錢。鹽湯送下。忌食生冷麵物雞卵等。

【鼈甲煎丸】

發明 見金匱要略方。

功用 治瘕此。

藥品 鼈甲(炙)、一兩二錢。鼠婦(熬)、黃芩、各三分。柴胡、蟅螂(熬)、各六分。乾薑、大黃、桂枝(一作桂心)、石韋(去毛)、厚朴、紫葳、半夏、阿膠、芍藥、牡丹皮(熬)、廔蟲(熬)、各五分。葶藶(炒)、人參、各一分。烏扇(燒)、瞿麥、蜂窠(炙、

作炒)、各四分。赤硝、一錢二分。桃仁、二分。一方有海藻三分。人戟、一分。無鼠婦、赤硝。

制法及用法 研爲末。取煨鼈下灰一斗。清酒一斛五升。浸灰。俟酒盡一半。取鼈甲於中。煮令泛爛如膠漆。絞取汁。細諸藥煎爲丸。如梧桐子大。每服七丸。空腹時熱湯送下。一日三次。忌食生冷雞卵豆麥等物。

參考 此方都用異類竊動之物。行氣逐血之藥頗多。而不嫌其峻。俱恐諸蟲擾亂神明。故君鼈甲以守之。其泄厥陰破癥瘕之功。有非草木所能比者。阿膠達表熄風。鼈甲入裏守神。蟅螂動而性升。蜂窠毒可引下。廔蟲破血。鼠婦走氣。葶藶泄氣閉。大黃泄血閉。赤硝蠱堅。桃仁破結。烏扇降厥陰相火。紫葳破厥陰血結。乾薑和陽退寒。黃芩和陰退熱。和表裏則有柴胡、桂枝。調營衛則有人參、芍藥。厚朴達原。劫去其邪。丹皮入陰。提去其熱。石韋閉上焦之水。瞿麥瀝下焦之水。半夏和胃而通陰陽。鼈灰性溫走氣。清酒性緩走血。統而言之。不越厥陰陽明二經之藥。故久瘕邪去

替衛而著臟腑者。即非 蠟母。亦可借以裁之。金匱惟此方與 聖濟丸藥品最多。皆治正虛邪著久而不去之病。非 集血氣之藥。以補衆施。未易奏功也。

二十五筆

【觀音救苦膏】

發明 驗方。

功用 治百病。

藥品 大黃、甘遂(研)、蓖麻子、番木鱉(研)、各二兩。生地黄、川烏、草烏、三稜、義朮、各一兩。巴豆(研)、羌活、黃蘗、麻黃、豬牙皂角、肉桂、枳實、紅芽大戟、白芷、各八錢。香附、芫花、厚朴、杏仁(研)、穿山甲、防風、天花粉、獨活、全蠍、檳榔、桃仁(研)、細辛(研)、五倍子、元參、各七錢。蛇蛻、黃連、各五錢。當歸、一兩五錢。蜈蚣、十條。一方無肉桂、防風。有蟬蛻、紅花。

制法及用法 預先齋戒。將麻油五六斤。浸五日。用火熬。熬時忌婦人雞犬。並忌污穢。齋戒沐浴。於淨室內。供觀音大士神位。默誦大悲大懺救苦救難廣大懺感觀世音菩薩聖號一千遍。用柳枝攪勻。熬至滴水成珠。再加黃丹(水飛)、二斤

四兩。密陀僧、四兩。不老不嫩。收入瓷瓶。放水中。拔盡火氣(一方加桂心一兩五錢、黃木香乳香沒藥各五錢、蘇合油二兩)。外治用布攤貼。內服煉蜜爲丸。如綠豆大。①偏正頭風。左患貼左。右患貼右。正患貼印堂。兼捲條塞鼻孔中。口含甘草嚥之。②眼科七十二症腫痛。將耳上角鍼刺血出貼之。星膜翳膜。捲毛倒睫。迎風落淚等症。捲條。左患塞左鼻孔。右患塞右鼻孔。常飲甘草湯。③牙痛貼牙上。④喉嚨三十六症。單蛾。雙蛾。喉閉。喉風。俱貼喉上。口含甘草水。如要速效。開水送服七丸。不可飲甘草水。⑤咳嗽哮喘吐痰。貼前後心。勿吞服。⑥噎膈貼胃口。並服七丸。⑦吐血鼻血。貼兩脚心。並服甘草湯。⑧中風。用調羹搗爛口。滾水灌下七丸。⑨膨脹貼臍下丹田。並服七丸。⑩瘡癤有蟲。貼脊背尾間肚腹。飲甘草湯。七日癩蟲盡死。⑪瘡疾一二三等口。俱貼肚臍。飲甘草湯。如發過四五次者。早晨服七丸。飲熱酒數杯。即日傾止。⑫傷寒。葱白湯服七丸。一汗而愈。⑬大小便閉。俱貼肚臍。飲甘草水。自通。如數

日不通。危在旦夕者。開水送服七丸。再用葱汁、甘草汁、調敷小腹。立下。勿服甘草水。
 ⑤各種痢疾。俱貼胃口肚臍。四五日不愈者。紅痢用龍眼壳核七個。打碎煎湯。送下七丸。白痢用荔枝核壳七個。打碎煎湯。送七丸。赤白兼者。用龍眼壳核。荔枝壳核。各七枚。打碎煎湯。送七丸。
 ⑥便血、腸風、夢遺白濁。俱貼肚臍。
 ⑦痔漏。內則捲條插入。外則貼之。
 ⑧婦人難產、逆生。胞衣不下。熱酒送下七丸。立刻便產。再煎甘草水頻洗產門小腹。不可服甘草湯。
 ⑨婦人赤白帶下。貼肚臍及下丹田。常服甘草湯。
 ⑩血塊痞疾。貼患處。體壯者服七丸。即瀉出。
 ⑪小兒驚風。作條塞鼻。並服七丸。
 ⑫小兒諸般疳症。貼肚臍。口併貼牙床。

參考 此方合三十六天罡之數。或貼或服。應驗如神。內治祇可服七丸。切不可多。孕婦忌服。

理氣類

二筆

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治諸咳嗽喘急。語言不出。

藥品 人參、知母、貝母、馬兜鈴(去皮用肉)、麻黃(去節)、杏仁(生用)、半夏、各一錢五分。天仙藤、一錢。

制法及用法 清水二鍾。加烏梅一枚。白蜜一匙。煎至一鍾。臨睡時服。

【八仙散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治婦人血氣不和。心腹疼痛。

藥品 當歸、厚朴、芍藥、枳殼(製)、人參、各四分。甘草、茯苓、各五分。肉豆蔻、二分。

制法及用法 研爲細末。清水二升。煮取八合。空腹分三服。不拘時。

【二聖散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治風痰壅閉。語言不出。氣促喘悶。手足動搖。

藥品 訶子(大者、半生、半炙、去核)、十枚。大腹皮(洗淨焙乾)、五錢。

制法及用法 剉散。每服二錢。清水一盞。煎至七分。不拘時溫服。

【丁香散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治婦人臟腑虛冷。脾胃氣弱。食則嘔吐。水穀不消。

藥品 丁香、白朮、縮砂仁、草果仁、橘皮、各七錢五分。當歸、白豆蔻、藿香葉、神麴、訶子皮、甘草、各五錢。人參、一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。生薑大棗湯調下。

三 筆

【三白散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治陽水壅腫。二便不通。小兒盤腸氣釣。

藥品 白牽牛(頭末)、二兩。桑根白皮(薑汁炒)、白朮、陳皮、木通、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時淡薑湯調下。小兒每服五分。不拘時服。服後再服鉤藤膏。

【三稜散】

發明 見湯氏方。

功用 治積氣腹痛。

藥品 三稜、縮砂仁、甘草、益智(炒去殼)、蓬莪朮、青皮(炒)、各等分。

制法及用法 研爲末。熱湯點下。

【大腹皮散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治諸證脚氣腫滿。小

便不利。

藥品 大腹皮、三兩。木瓜、紫蘇子、檳榔、荊芥穗、烏藥、陳橘皮(去白)、紫蘇葉、各一兩。蘿蔔子、五錢。沉香、桑白皮、枳殼(去蘊、麸炒)、各一兩五錢。

制法及用法 咬咀。每服八錢。清水一盞半。加生薑五片。煎至一大盞。去渣溫服。一方加水通、白茯苓、炒茴香、炙甘草。

【小安胃丸】

發明 驗方。

功用 治肝胃氣痛。嘔吐。

藥品 製香附、四兩。花椒、二兩。茴香、一兩。熟地黃、四兩。川棟子、二兩。

制法及用法 用川棟子煎汁。去棟子。用汁煮香附地黃。熬乾焙透。共研爲末。白蜜和丸。每服二三錢。開水送下。

四 筆

【木香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治單腹脹。

藥品 木香、青皮、白朮、蜜黃、草豆蔻、各五錢。阿膠、寧澄茄、各一兩。

制法及用法 研爲細末。醋

煮米糊和丸。如菽豆大。每服二十丸。生薑湯送下。

【木香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腹痛。

藥品 木香、檳榔、各等分。

制法及用法 研爲細末。熱湯調下。

【木香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣衝心煩悶。臍下氣滯。

藥品 木香、五錢。檳榔、木通、各一兩。

制法及用法 咬咀。每服八錢。清水一鍾半。加生薑五片。葱白七寸。煎至一鍾。不拘時溫服。

【木香順氣丸】

發明 見李東垣方。

功用 治陰陽癰滯。氣不宜通。胸膈痞悶。腹脅脹滿。大便不利。

藥品 廣木香、草豆蔻(炒)、益智仁、蒼朮、各三兩。茯苓、澤瀉、陳皮、青皮、吳茱萸(湯泡)、乾薑、半夏(製)、各二兩。升麻、煨柴胡、各一兩。當歸、五兩。川厚朴、四兩。

制法及用法 研爲細末。酒泛爲丸。每服三錢。熱湯送下。

【木香順氣散】

發明 見統旨方。

功用 治氣滯腹痛三焦咳。

藥品 木香、香附、檳榔、青皮(醋炒)、陳皮、厚朴(薑汁炒)、蒼朮(米泔浸一宿)、炒枳殼(麸炒)、縮砂仁、各一錢。甘草(炙)、五分。一方無檳榔。

制法及用法 清水二鍾。加生薑三片。煎至八分。食前服。亦可爲丸。

【木香順氣散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治氣鬱。

藥品 木香(一作五分)、烏藥、香附子、枳殼、青皮、陳皮、厚朴、川芎、蒼朮、各一錢。縮砂仁、五分。肉桂、甘草(炙)、各三分。一方無川芎、蒼朮。有半夏、一錢。乾薑、三分。

制法及用法 加生薑三片。清水煎服。

【木香塌氣丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治中滿腹脹。下焦虛損者。

藥品 蘿蔔子(炒)、陳皮(去白)、各五錢。胡椒、二錢。草豆蔻(麩裹煨)、木香、青皮、各三錢。蠟梢(去毒)、二錢五分。

制法及用法 共研細末、水

煮麪糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。溫米飲送下。忌食油膩等物。服白粥一百日。重者一年。小兒丸如麻子大。每服十丸。桑白皮湯下。一日三次。大人陰囊紅腫水冷。須用青鹽、乾薑、白麪、各三錢。清水和膏。攤紙上塗貼。

【五香丸】

功用 治痰積。食積。氣瘕。痰迷心竅。蟲脹腫脹。痞聚攻痛。痢疾初起。

藥品 五靈脂、一斤。生香附、一斤(去淨毛、水浸一日)。黑丑、白丑(並取頭末)、各二兩。

制法及用法 以一半用微火炒熟。一半生用。共研細末。和勻。醋煮米糊爲丸。如茱萸子大。每服七八分。或一錢。臨臥時薑湯送下。次早再服即愈。孕婦忌服。小兒減半。虛人慎用。

【五香散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治食魚傷。泄瀉不止。氣刺奔衝。妊娠瀉痢。胎動。腹痛。血氣。產後敗血衝心等證。

藥品 烏藥、白芷(炒)、枳殼、白朮、高良薑(炒)、甘草、蓬莪朮(孕婦減半)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒調下。孕婦瀉痢。食前陳米飲調下。胎動。糯米飲調下。產後敗血衝心。敗蒲煎湯調下。

【勻氣散】

發明 見御苑方。

功用 治脾肺氣逆。喘咳面浮。胸膈痞悶。小便不利。

藥品 桑白皮、陳皮、各一兩五錢。桔梗(炒)、甘草(炙)、赤茯苓、各一兩。藿香、五錢。木通、四兩。

制法及用法 加生薑。清水煎服。

【化癖丸】

發明 見曾氏方。

功用 治癖結氣塊。日久不化。乍寒乍熱。臟腑不調。米穀不消。噎氣喘促。胸腹痞悶。及丁奚哺露。

藥品 南木香、橘紅、蓬莪朮(炮剉)、三稜(炮剉)、青皮(巴豆五粒、去皮膜心、微炒、去巴豆)、枳殼(去瓢、麸炒)、檳榔、各五錢。白朮、丁香、各二錢。細辛(燒存性)、四錢。

制法及用法 除木香、檳榔、丁香、不過火。餘七味焙。同前三味研爲末。神麪煎煮和糊丸。如麻仁大。每服十五丸。至二十一丸。空腹時清米湯送

下。有寒熱往來。以柴胡飲間服。忌油膩生冷。

【天門冬丸】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治婦人喘嗽。手足煩熱。骨蒸寢汗。口乾引飲。面目浮腫。

藥品 天門冬、十兩(去心)。麥門冬、八兩(去心)。生地黃、三斤(取汁熬膏)。

制法及用法 研爲細末。地黃膏和丸。如梧桐子大。每服五十丸。造適散。去甘草加入參。或人參荊芥散。煎湯送下。若面腫屬風。宜麻黃桂枝發其汗。後與柴胡飲去大黃。

【分心氣飲】

發明 見楊士瀛仁齋直指。

功用 治憂思鬱怒。諸痞氣滯停滯。噎塞不通。二便虛秘。

藥品 紫蘇莖葉、三兩。半夏(製)、枳殼(製)、各一兩五錢。青皮(去白)、陳橘紅、大腹皮、桑白皮(炒)、木通(去節)、赤茯苓、南木香、檳榔、蓬莪朮(煨)、麥門冬(去心)、桔梗、辣桂、香附、藿香、各一兩。甘草(炙)、一兩二錢五分。

制法及用法 剉散。每服三錢。清水一大盞。加生薑三片。大棗二枚。燈心十莖。煎

至七分。不拘時服。

五 筆

【白朮丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治息積病。脅下滿悶。喘息不便。呼吸引痛。

藥品 白朮、枳實、官桂、各一兩五錢。人參、二兩。陳皮、桔梗(醋炒)、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五十丸。不拘時溫酒送下。每日三次。

【白朮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠氣不調和。易傷飲食。

藥品 白朮(炒)、乾紫蘇、各一兩。人參、白芷(炒)、各七錢五分。川芎、訶子皮、青皮、各五錢。甘草、二錢五分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一盞。加生薑三片。煎至七分。溫服。

【四神丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治厥疝。

藥品 吳茱萸(醋酒各半分浸焙)、萸澄茄、青木香、各五錢。香附、一兩。

制法及用法 研爲細末。水煮米糊和丸。鹽湯送下。

【四製香附丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治氣鬱經閉。

藥品 香附、一斤(用酒、醋、鹽水、童便、各浸三日、焙研)。烏藥、八兩。

制法及用法 共研細末。醋煮米糊爲丸。開水送下。

【正氣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

藥品 甘草(炙)、三分五釐。陳皮、藿香(去梗)、白朮、各五分。厚朴(薑製)、半夏(薑製)、各一錢五分。

制法及用法 細切。加生薑三片。大棗一枚。清水煎服。

【正氣天香散】

發明 見劉河間方。

功用 治九氣。

藥品 烏藥、一兩。香附子、八兩。陳皮、紫蘇葉、乾薑、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服一錢匙。鹽湯調下。

【平氣散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 平氣。通滯。

藥品 白牽牛、一兩(半生、半炒、取頭末一半)。青皮(去白)、雞心檳榔、各三錢。陳皮

(去皮)、五錢。川大黃、七錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。不拘時生薑湯一盞調下。

參考 經曰。肺苦氣上逆。急食苦以瀉之。牽牛苦寒。瀉氣分溼熱。上攻喘滿。故以爲君。陳皮苦溫。體輕浮。理肺氣。青皮苦辛。平散肺中氣滯。故以爲臣。檳榔辛溫。性沉重。下痰降氣。大黃苦寒。蕩滌滿實。故以爲使也。

六 筆

【安神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治吐瀉後心虛煩悶。觸物易驚。氣鬱生涎。與氣相搏。不能安睡。

藥品 人參、白茯苓、半夏(製)、甘草(炙)、陳皮(去白)、枳實(製)、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一盞。加生薑二片。大棗一枚。竹茹一小團。煎至七分。不拘時溫服。有微熱渴。加麥門冬(去心)。

【地黃丸】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 生肌。治胃氣不調。不嗜食。

藥品 乾地黃、大黃、各一兩

六銖。茯苓、十八銖。杏仁、柴胡、當歸、各五錢。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如桐子大。每服五丸。熱湯送下。一日三次。

【交感丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治鬱氣。

藥品 香附、一斤(長流水浸三日炒)。茯神、四兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。細嚼。降氣湯(製香附、茯神、甘草、各一錢)送下。

七 筆

【沉香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 助胃氣。止吐瀉。

藥品 沉香、丁香、木香、藿香、厚朴(製)、甘草(炙)、各一錢。茯苓、二錢。

制法及用法 研爲末。每服一合。米飲湯調下。

【沉香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腹脹氣喘。

藥品 沉香、木香、各二錢五分。枳殼(麸炒)、蘿蔔子(炒)、各三錢。

制法及用法 清水二鍾。加

生薑三片。煎至一鍾。不拘時服。

【沉香飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 升降陰陽。治痞氣。

藥品 沉香、木香、羌活、桑白皮(微炒)、人參、獨活、白茯苓、紫蘇葉、各等分。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一盞半。加生薑五片。大棗二枚。煎至七分。去滓。食前溫服。二滓又作一服。

【沉香化氣丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸般積滯。阻鬱胸腹作痛。腸胃不暢。疫氣瘴氣。中毒惡氣。茶癖惡腫。瘡瘍腫痛。跌撲損傷。及中六畜等毒。

藥品 沉香、四錢(上好角沉水者、另研爲末、一作五錢)。大黃(錦紋者酒蒸)、黃芩(條實者)、各一兩(一作各二兩)。人參(官揀者去蘆)、白朮(肥者去蘆)、各三錢(一作各三兩)。

制法及用法 除沉香另研爲末外。餘均剉碎。用鹽汁、竹瀝。七浸七曝。候乾。研爲細末。和沉香末再研勻。用竹瀝入鹽汁少許。神麴 煮糊爲丸。如綠豆大。硃砂(水飛)爲衣。曬乾。勿見火。每服一二錢。小兒六分。淡鹽湯送下。

參考 此方做滾痰丸之製。去礞石。加參朮。以祛食積痰飲。雖較滾痰丸稍遜。然二黃得參朮以鼓其勢。亦是突圍之師。勿以其中有參朮。視為兼補漫施。以伐後天。爲害非鮮。

【沉香化氣丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治胸腹留飲。喘促吐酸。痞塞疼痛。

藥品 沉香、五錢。甘草、香附（製）、廣木香、陳皮、縮砂仁、各一兩。蓬莪朮、焦麥芽、廣藿香、神麴、各二兩。

制法及用法 共爲末。水泛丸。如梧桐子大。每服三錢。熟湯送下。

【沉香化滯丸】

功用 治肝胃不和。食滯不化。胸腹悶痛。一切氣塊等症。

藥品 沉香、六錢。厚朴、白朮（製）、法半夏、廣陳皮、廣木香、縮砂仁、尖檳榔、廣藿香、各一兩二錢。大黃（錦紋者）、黃芩、焦山楂肉、各一兩五錢。焦枳實、三兩。

制法及用法 共爲細末。竹礞、薑汁、調糊爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熟湯送下。

【沉香降氣丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 通順氣血。治一切留飲氣滯。胸脅痞悶。喘促短氣。噫醋吞酸。婦人經水不調。少腹刺痛。

藥品 沉香、二錢五分（另研、一作四錢）。甘草、五錢五分（炙、一作八錢、同砂仁拌溼炒、一作一兩二錢）。縮砂仁、七錢五分（搗炒、一作四錢、一作五錢）。香附子（鹽水炒、去毛、一作薑汁拌、一作童便浸、去外皮微炒、二兩、一作四兩）、六兩二錢五分。一方有烏藥。

制法及用法 研爲末。水泛丸。如梧桐子大。每服二錢。熟湯送下。

參考 原爲散服。

【沉香降氣散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 通順氣血。治一切留飲氣滯。胸脅痞悶。喘促短氣。噫醋吞酸。婦人經水不調。少腹刺痛。

藥品 沉香、二錢八分（另研、一作四錢）。甘草、五錢五分（炙、一作八錢、同砂仁拌溼炒、一作一兩二錢）。縮砂仁、七錢五分（搗炒、一作四錢、一作五錢）。香附子（鹽水炒、去毛、一作薑汁拌、一作童便浸、去外皮、微炒、二兩、一作四

兩)、六兩、二錢五分。一方有烏藥。

制法及用法 研爲極細末。每服二錢。空腹時沸湯或淡薑湯、鹽湯、調下。虛者人參湯下。

【沉香降氣散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

藥品 沉香、木香、柴胡、白芍藥、細辛、青皮、陳皮、紫蘇子。

制法及用法 爲末。清水煎服。

【良附丸】

發明 驗方。

功用 治氣滯胸膈膈軟處一點疼痛。或經年不愈。或母子相傳者。

藥品 ①高良薑、四錢。香附(製)、四兩。乾薑、二兩。沉香、一兩。青皮、當歸、木香、各三兩。②高良薑(酒炒)、香附(醋炒)。寒痛、良薑加倍用。氣痛、香附加倍用。

制法及用法 ①共研細末。水泛丸。如梧桐子大。每服三錢。米湯送下。②共研細末。米湯爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。食遠熱湯送下。

【吳茱萸丸】

發明 見李東垣方。

功用 調中。順氣。治脾胃

胸膈不通。

藥品 吳茱萸、阜豆蔻仁、各一錢二分。橘支、益智仁、人參、黃耆、升麻、各八分。白朮、澤瀉、崑崙、柴胡、各四分。當歸身、甘草(炙)、各六分。木香、二分。青皮、三分。半夏、一錢。大麥麴、一錢五分。

制法及用法 研爲細末。湯浸蒸餅和丸。如綠豆大。每服三十丸。不拘時細嚼白湯送下。

【芍藥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人脅痛。

藥品 白芍藥、玄胡索(炒)、肉桂、各一兩。香附子、二兩(用醋、一斤、鹽、五錢、同養乾)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時白湯調下。

【沒藥散】

發明 見王袞博濟方。

功用 治婦人血氣疼痛不可忍者。

藥品 沒藥(另研)、紅花、延胡索(炒)、當歸、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。童便黃酒各半盞。同煎至六分。熱服。或用燒赤秤錘。淬過調服亦可。常服只用溫酒。

【妙應散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 疎風。理氣。固齒。烏髭髮。

藥品 人參、細辛(去苗)、白茯苓、香附子(炒去毛)、川芎、白蒺藜(炒去角)、砂仁、各五錢。百藥煎、白芷、石膏(煨)、龍骨(另研)、各六錢。麝香(另研)、少許。

制法及用法 研爲細末。早晨臨臥溫湯刷漱之。

【延胡索散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人血氣攻心腹痛。

藥品 延胡索、當歸、川芎、桂心、各七錢五分。木香、枳殼、赤芍藥、桃仁、各五錢。熟地黃、一兩。

制法及用法 咬咀、每服三錢。酒水一盞。加生薑三片。煎至七分。去滓熱服。

八 筆

【肥氣丸】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治肥氣。

藥品 當歸頭、蒼朮、各一兩五錢。青皮、一兩(炒)。蛇含石(火煨醋淬)、七錢五分。三

棱、蓬莪朮、鐵華粉(與三棱、蓬莪朮、同入醋、煮一伏時)、各三兩。

制法及用法 研爲末。醋煮米糊和丸、如綠豆大。每服四十丸。食遠當歸浸溫酒送下。

【肥氣丸】

發明 見李東垣方。

功用 治肥氣。

藥品 柴胡、二兩(一作一兩)。黃連、七錢。厚朴、五錢。川椒、四錢(炒去汗、去目及閉口者、一作一兩)。甘草、三錢(炙、一作二錢)。蓬莪朮(炮)、昆布、人參、各二錢五分(一作各一錢五分)。皂角(去皮弦子煨)、白茯苓(去皮)、各一錢五分(一作各一錢六分)。川烏、一錢二分(炮、去皮臍、一作二分)。乾薑、巴豆霜、各五分。

制法及用法 除茯苓、皂角、巴豆外。研爲極細末。再另研茯苓、皂角、爲細末。和勻。方漸漸入巴豆霜。和勻。煉蜜爲丸。如梧桐子大。初服二丸。空腹時淡醋湯送下。一日加一丸。二日加二丸。漸加至大便微溏。再從兩丸加服。周而復始。積減大半。勿服。秋冬加厚朴一半(通前重一兩)。減黃連、一錢五分。若治風癰。加人參、茯苓、菖蒲、各三錢。黃

連、只依春夏用七錢。雖秋冬不減。

【青金丸】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治肺虛氣壅咳嗽喘滿。咯吐痰血。

藥品 杏仁、二兩(去皮尖、用牡蠣煨成粉、與杏仁同炒黃色、去牡蠣粉)。青黛、一兩。

制法及用法 研爲末。令勻。用黃蠟一兩。熔化。攪和爲丸。如彈子大。壓扁如餅。每用梨三個。或輭柿餅一個(去核)。入藥在內。溼紙裹煨。約藥熔。方取出去火毒。細嚼。糯米飲送下。

【金鈴子散】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治熱厥心痛。或作或止。

藥品 金鈴子(酒煮去皮核)、玄胡索(醋炒)、各一兩。

制法及用法 研爲末。每服三錢。溫酒調下。痛止與枳朮丸。

【玫瑰花露】

功用 其性香酸、淡無毒。功能平肝。養胃。和營。悅脾。寬胸。和血。活血。散鬱(點酒服)。進食。調和肝脾。治肝

氣。胃氣。脘痛。鬱結。九種心痛。氣香而味淡。爲和血散鬱之良品。

九 筆

【香朴丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治老人氣悶。

藥品 木香、三分。厚朴、二錢。附子、七分。

制法及用法 研爲細末。水泛和丸。熱湯送下。

【香附散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治噯氣。

藥品 香附、山梔、黃連、橘紅、半夏。

制法及用法 爲散。清水煎服。

【胡蘆巴散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治氣攻頭痛如破。去瘴癘後頭痛。

藥品 胡蘆巴(炒)、三棱(剉、醋浸、炒乾)。乾薑(炮)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫生薑湯或溫酒調下。

【枳殼散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治心下蓄積。痞悶作痛。噫敗卵氣。

藥品 枳殼(去穢炒)、白朮、各五錢。香附、一兩(炒)。檳榔、二錢。

制法及用法 研爲細末。每服一二錢。空腹時米飲調下。一日三次。

【枳殼散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治五種積氣。三焦痞塞。胸膈滿悶。嘔吐痰逆。口苦吞酸。常服順氣。寬中。除痰癖。消積聚。

藥品 枳殼、三稜、陳皮、益智仁、蓬朮、檳榔、肉桂、各一兩。乾薑、厚朴、甘草、青皮、肉豆蔻、木香、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一盞。加生薑、大棗。煎至七分。不拘時熱服。

【胃痛散】

發明 驗方。

功用 治胃脘作痛。消化性潰瘍。

藥品 延胡索、一兩五錢。白芷、一兩五錢。片薑黃、七錢五分。製香附、一兩。

制法及用法 共爲細粉。每

次一錢。開水送服。

參考 按用片薑黃。不如用蓬朮尤爲善。

十 筆

【桑白皮散】

發明 見朱肱類證活人書方。

功用 治腳氣盛發。兩腳浮腫。小便赤澀。腹脅脹滿。上氣喘急。坐臥不得。

藥品 桑白皮、郁李仁、各一兩。赤茯苓、二兩。木香、防己、大腹子、各一兩五錢。紫蘇子(一方月葉)、木通、檳榔、青皮、各七錢五分。

制法及用法 每服三錢。加生薑三片。清水煎服。

【桑白皮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺氣壅塞。毒熱上攻。白睛腫脹。日夜疼痛。心胸煩悶。

藥品 桑白皮、玄參、川升麻、旋覆花(去枝梗)、赤芍藥、杏仁、甘菊花(去枝梗)、甜葶藶(炒)、防風(去蘖)、黃芩、枳殼(去穢炒)、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一盞半。加生薑三片。煎至八分。去滓。食後溫服。

【草豆蔻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人脾胃虛。氣攻兩脅脹痛。

藥品 草豆蔻、訶子肉、各一兩。桂心、苦梗、厚朴、各三分。甘草、一分。川芎、當歸、乾薑、檳榔、各五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服四錢。清水一盞。煎至七分。去滓。食前熱服。

【眞珠散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒氣喘多涎。

藥品 眞珠末（一作四錢）、生犀角屑（一作二錢）、各五分。香附末、四錢（一作一錢）。龍腦、少許。

制法及用法 共研細末。每服一錢。一歲以下服五分。桃仁煎湯調下。母忌乳食生冷油膩一切毒物半月。

【烏龍丸】

發明 驗方。

功用 治肝胃膈院氣滯。及腰腹疼痛。並脾胃虛寒泄瀉。

藥品 九香蟲、一兩五錢。車前子、新會皮、於朮、各四錢。杜仲、八錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。每服一錢五分。早晚

鹽湯送下。

【海蛤散】

發明 見楊氏方。

功用 治小兒陰癰。由啼叫怒氣閉結於下而成者。

藥品 海蛤、三錢。茴香（炒）、七錢五分。薏苡仁、白朮、檳榔、各五分。

制法及用法 研爲末。食前溫酒調下。量兒大小加減。

十一筆

【通氣散】

發明 見補遺方。

功用 治婦人憂怒傷肺。或服燥藥過多。大便祕澀。

藥品 陳皮、蘇葉、枳殼、木通（去皮節）、各等分。

制法及用法 剉散。每服四錢。清水煎溫服。

【參香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾虛作脹。痞氣。

藥品 人參、官桂、甘草（炙）、各七分。桑白皮、桔梗、陳皮、枳實（欬炒）、麥門冬（去心）、青皮、大腹皮、半夏、各一錢。紫蘇子、茯苓、香附子、木香、各一錢二分。

制法及用法 清水二鍾。加生薑三片。紅棗二枚。煎至一鍾。食前服。

十二筆

【復原通氣散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治氣不宣通。而成痞癰。並治閃挫氣血凝滯。腰脅疼痛。血疝。及心脾痛。

藥品 舶上茴香(炒)、穿山甲(蛤粉炒、去粉、一作炮、一作炙)、各二兩。玄胡索(去皮)、白桑牛子(炒)、陳皮(去白)、甘草(炙)、各一兩。南木香(勿見火)、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。沙糖調熱酒送下。病在上。食後服。病在下。食前服。不飲酒者。南木香煎湯或生薑湯調下。一日二次。

【痞氣丸】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治痞氣。

藥品 赤石脂(火煨、醋淬)、川椒(炒去汗)、乾薑(炮)、各二兩。桂心、附子(炮)、各五錢。大烏頭(炮、去皮臍)、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服五十丸。食遠米湯送下。

【痞氣丸】

發明 見李東垣方。

功用 治痞氣。

藥品 厚朴、五錢(製、一作四錢)。黃連(去鬚)、八錢。吳茱萸(洗)、三錢。黃芩、白朮、各二錢。茵陳(酒製、炒)、縮砂仁、乾薑(炮)、各一錢五分。白茯苓(另爲末)、人參、澤瀉、各一錢。川烏(炮、去皮臍)、川椒、各五分。巴豆霜(另研)、肉桂、各四分。

制法及用法 除茯苓、巴豆霜、另研爲末旋入外。餘藥同爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。初服二丸。一日加二丸。漸加至大便微瀉。再從二丸加服。食遠淡甘草湯送下。周而復始。積減大半。勿服。

【訶黎勒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠心腹脹滿。氣衝胸膈煩悶。四肢少力。不思飲食。

藥品 訶黎勒、赤茯苓、前胡、各一兩。陳皮、大腹皮、桑白皮、各七錢五分。枳殼、川芎、白朮、各五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服四錢。清水一盞半。加生薑三片。大棗一個。煎至七分。去滓。不拘時溫服。

【越鞠丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治一切溼痰食火氣血諸鬱。牙疼。口瘡。胸悶。脘痛。腹脹。腹痛。吞酸。腿痠。黃疸。婦女經病。帶下。產後中風。小兒食滯。癆瘵疔腫毒。

藥品 香附(童便浸、一作醋炒)。蒼朮(米泔浸一宿、去粗皮、麻油炒)、川芎(童便浸)、各二兩。山楂子(生薑汁炒黑)、神麴(炒香)、各一兩五錢。一方有山楂、炒麥芽。一方加陳皮、半夏、茯苓、砂仁、甘草、蘇子、萊菔子。

制法及用法 研爲末。滴水和丸(一作神麴煮米糊和丸)。如綠豆大。每服一百丸。食遠熱湯送下。陰虛多火者禁用。

參考 此方用香附以開氣鬱。蒼朮以除溼鬱。川芎以行血鬱。山楂以清火鬱。神麴以消食鬱。五藥相須。共收五鬱之效。仍當視何鬱病甚。而以何藥爲主。隨證加減可也。

十三筆

【場氣散】

發明 見惠濟方。

功用 治氣滯。

藥品 茴香(炒)、白牽牛(炒)、甘草(炙)、木香、各一分。

制法及用法 研爲末。每服五分。紫蘇湯調下。

【補中益氣丸】

發明 見李東垣方。

功用 治氣虛。氣少。氣高。氣喘。內傷。勞倦。陰虛(指太陰脾土而言、非陰血之陰)。發熱。頭痛。口渴。表熱。自汗。畏風。惡寒。體倦。怔忡。食少無味。心煩。脈大。瘡勞。勞淋。遺泄。交腸。凡屬脾胃虛弱。元氣不足之症。及瘡瘍過服敗毒藥。以致中氣不足者。

藥品 黃耆、一錢(蜜炙、或酒炒、熱甚者、倍用)。人參、三分(有嗽去之、氣虛者、可加至一錢)。甘草、五分(炙、可加至一錢)、當歸身(酒製或土炒、或酒拌)、橘皮、升麻、柴胡、各二分。白朮、三分(土炒、若脅下痛者、有瘀血、宜生用)。

制法及用法 上係湯量。丸量準此酌加。研細。用生薑、大棗、煎湯泛丸服。

參考 此方爲治勞倦傷脾。穀氣不盛。陽氣下陷。陰中發熱之良劑。蓋風寒外傷。其形爲有餘。脾胃內虛。其氣爲不足(後天之氣、出於胃、即所謂清氣、衛氣、穀氣、營氣、運氣、生氣、陽氣、春生之氣、後天三焦之氣也。分而言之雖異。其

實則一也)。故遵內經勞者溫之。損者益之之義。以辛甘溫之劑。溫足太陰厥陰。升足少陽陽明。黃耆、當歸。和營氣以暢陽。佐柴胡引少陽清氣從左出陰之陽。人參、白朮。實衛氣以填中。佐升麻引春生之氣從下而上達陽明。陳皮運衛氣。甘草和營氣。原其方不特重參考歸朮。溫補肝脾。義在升麻、柴胡。升舉清陽之氣。轉運中州。故不僅名補中。復申之曰益氣。凡脾胃不足。喜甘惡苦。喜補惡攻。喜溫惡寒。喜通惡滯。喜升惡降。喜燥惡溼者。此方最宜。惟不宜於肝腎。蓋陰虛於下者。不宜於升提。陽虛於下者。尤屬最忌。倘若兩尺虛微。或腎中水竭。或命門火衰。而誤用此方。則如大木將搖。而撥其本矣。此外如表不固。汗不斂。或外無表邪。陰虛發熱。或陽氣無根。格陽戴陽。或脾肺虛甚。氣促似喘。或命門火衰。虛寒泄瀉。或水虧火亢。吐血衄血。或四肢厥逆。陽虛欲脫。均不可用。

十四筆

【奪天造化丸】

發明 驗方。

功用 治五勞七傷。九種心

痛。諸般飽脹。胸膈肚痛。虛浮腫脹。內傷脫力。四肢倦怠。行步氣喘。遍身疼痛。情滑湯痿。腸紅痞塞。面黃腰痛。男婦沙淋。白濁白帶。經水不調。行經腹痛。產後勞傷。惡露未淨。二便不利。

藥品 生地黄、廣木香、各二兩。紅花、麥門冬、橘紅、牡丹皮、青皮、烏藥、木通、川芎、紫蘇子、地骨皮、香附(製)、陳皮、澤瀉、山楂(炒焦)、枳殼(炒)、各一兩。川貝母、四兩。神麴(炒焦)、當歸(酒製)、鍼砂、赤芍藥、五加皮、牛膝(酒炒)、秦艽、各一兩五錢。

制法及用法 共研細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服一錢。熱湯送下。或每服二三錢。淡鹽湯送下。

十六筆

【磨積丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治虛氣。

藥品 胡椒、一百五十粒。全蠍、十個。木香、二錢五分。

制法及用法 共研細末。粟米飯爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。橘皮湯送下。

十七筆

【檀香油】

功用 其性苦溫。功能開胃。除惡氣。止吐逆。治心腹疼。腰腎痛。消熱腫(並塗擦之)。即檀香榨取之油也。爲理氣之藥。

理血類

二筆

【十灰丸】

發明 見醫統方。

功用 治吐血。衄血。血崩。一切血出不止。

藥品 ①錦灰、黃絹灰、馬尾灰、艾葉灰、藕節灰、蓮房灰、油髮灰、赤松皮灰、櫻櫚灰、蒲黃灰、各等分。②大蓟、小蓟、丹皮、茅根、茜草、薄荷、側柏葉、山梔、陳櫻櫚皮、絲綿、各等分。

制法及用法 ①研爲細末。醋煮米糊和丸。如梧桐子大。每服七十丸至一百丸。空腹時米飲送下。②炒爲炭。藕汁泛丸。每服三錢。開水送下。

參考 一方於①方中。以大黃易絲綿。功力較勝。蓋絲綿僅能止血。大黃不特止血。且能行瘀。惟均專治火炎上湧之

血。不可誤用於陰邪固結之血。又驗方。用黃蘗、藕節、荆芥、蓮房、陳櫻櫚皮、松皮、馬尾、蕪艾、絲綿、血餘、各一兩。逐味炙灰存性。研末。糯米糊丸。如梧桐子大。每服三錢。米湯送下。亦名十灰丸。治同上。

【十灰散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治下血不止。

藥品 錦片、木賊、櫻櫚皮、柏葉、艾葉、乾漆、鱧魚鱗、鯉魚鱗、血餘、當歸、各等分。

制法及用法 火化存性。研爲細末。加麝香、少許。調勻。每服二錢。空腹時溫酒調下。

【十灰散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治虛癆心肺損。吐血、咯血。

藥品 大蓟、小蓟、側柏葉、薄荷、茜草根、茅根、山梔、大黃、牡丹皮、櫻櫚皮、各等分。

制法及用法 燒灰存性。紙裹蓋地上一宿。出火毒。研爲細末。每服二三錢至五錢。空腹時童便或藕汁。萊菔汁。磨京墨半盞調下。如不效。用花蕊石散以消之。無不愈者。

參考 此方專治火炎上湧之血。不可誤用於陰邪固結之證。

【人參丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血分有病。

藥品 人參、當歸、大黃(漚紙裹、飯上蒸熟、去紙切炒)、桂心、瞿麥穗、赤芍藥、茯苓、各五錢。葶麻(炒、另研)、一錢。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。加至二三十丸。空腹時米飲送下。

【人中黃散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治吐血。

藥品 人中黃。

制法及用法 研末。每服三四錢。茜根汁、薑汁、竹瀝、調下。

三 筆

【大阿膠丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治肺虛客熱咳嗽咽乾。多唾涎沫。或有鮮血。及勞傷肺胃。吐血嘔血。

藥品 阿膠(炒)、茯苓、山藥、五味子、熟地黃、各一兩。麥門冬(去心)、丹參、貝母(炒)、防風、茯神、柏子仁、百部根、杜仲(製)、各五錢。遠志肉、人參、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。清水一盞。煎至六分。和滓服。

【大阿膠丸】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治嗽血唾血。

藥品 阿膠(微炒)、卷柏、生地黃、熟地黃、大薊(獨根者曬乾)、雞蘇葉、五味子、各一兩。柏子仁(另研)、茯苓、百部、遠志、人參、麥門冬、防風、各五錢。乾山藥、一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。以小麥、麥門冬煎湯。於食後嚼下。

【大黃蟻蟲丸】

發明 見金匱要略方。

功用 治五勞虛極羸瘦。腹滿不能飲食。食傷。憂傷。飲傷。房室傷。飢傷。勞傷。經絡營衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。

藥品 大黃、二兩五錢(酒蒸、一作十兩)。蟻蟲、五合(去頭足炒、一作八兩、一作一兩)。黃芩、二兩(炒)。甘草、三兩。桃仁、一升(去皮尖炒、一作四兩)。杏仁、一升(去皮尖炒、一作四兩)。芍藥、四兩。乾漆、一兩(煨令煙盡、一作炒)。蘇蟲、一升(去翅足炒、一作一兩)

五錢)。乾地黃、十兩。水蛭、一百枚(豬脂熬、一作炙黃)。蟬蛻、一百枚(炒、一作一升、一作一兩五錢)。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如小豆大。每服五丸(一作五十丸)。溫酒送下。每日三次。

參考 五勞虛火久蒸。使經絡內結成乾血。瘀滯不通。即有新生之血。亦不得暢茂條達。惟有日漸膨脹而致斃命。此方君大黃從胃絡中宣瘀潤燥。佐黃芩清肺衛。杏仁潤心營。桃仁補肝虛。生地滋腎燥。乾漆性急飛竄。破脾胃關節之瘀血。蟲蟲性升。入陽分破血。水蛭性下。入陰分逐瘀。蟬蛻去兩脅下之壅血。塵蟲破堅。通絡行陽。却有神功。芍藥、甘草。扶脾胃。解藥毒。絡中瘀血既去。則氣血自可回復。再能與補血大劑合服。尤妙。

【寸金散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治心經煩熱。血妄行。舌上血出不止。

藥品 新蒲黃、新白麵、各三錢匕。牛黃、龍腦、各半錢匕。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服一錢。食後生藕汁調下。

四 筆

【五灰散】

發明 見沈金鑒沈氏尊生書。

功用 治血崩。

藥品 蓮蓬殼、百草霜、黃絹、血餘、櫻皮、各等分。

制法及用法 燒存性。加山梔、薄荷(炒)、血竭、京墨。研爲細末。每服一二錢。熱湯調下。

五 筆

【生地黃散】

發明 見劉河間方。

功用 治鬱熱衄血、咯血、吐血、陰虛者。

藥品 枸杞子、柴胡、黃連(炒)、地骨皮、天門冬(去心)、白芍藥、甘草(炙)、黃芩(炒)、黃耆(炒)、生地黃、熟地黃(自製)、各五分。

制法及用法 清水煎服。下血加地榆。

【生地黃飲】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治一切血證。

藥品 生地黃、熟地黃、枸杞子、地骨皮、天門冬、黃耆、芍藥、黃芩、甘草、各等分。

制法及用法 剉碎。每服一

兩。清水二盞。煎至七分。食後溫服。如脈微身涼惡風。吐血者。多有此證。加桂三分。

【生熟地黃丸】

發明 見沈金鑒沈氏尊生書。

功用 治血虛。

藥品 生地黃、熟地黃、玄參、石膏、各一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。空腹時茶清調下。

【四生丸】

功用 治陽盛陰虛。血熱妄行。或吐或衄。

藥品 生地黃（一作生地葉）、生荷葉（一作薄荷葉）、生側柏葉、生艾葉、各等分。

制法及用法 搗爛爲丸。如雞子大。不可近火。每服一丸。清水三杯。煎至一杯。去滓。不拘時溫服。或鹽湯化服亦可。

參考 此方以生地清心腎而通氣脈之源。柏葉清肺金而調榮衛之血。艾葉入脾胃而去瘀生新。荷葉入肝家而和臟血攝血。四味皆清寒之品。盡取其生者。所以涼而瀉之也。搗爛爲丸者。所以全其水氣也。五志之火既清。五臟之陰自安。則陰平陽秘。而血歸經矣。然此祇可暫用。以遏妄行之熱血。如多用則有弊。蓋血得寒。則

瘀血不散。而新血不生。故但知清火涼血。不用歸脾養榮等劑。以善其後。鮮有不綿連歲月而斃者。

【四神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後血虛。或瘀血不消。積聚作塊。心腹切痛。

藥品 川芎、當歸（去蘆）、白芍藥（一作赤芍藥）、各一兩。乾薑（炮）、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。食遠溫酒調下。

【加減地黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血少、血虛、亡血。及七情五臟飢飽勞役之病。睛痛。或目爲物傷。傷寒愈後。亦宜服。

藥品 生地黃（酒蒸）、熟地黃、各八兩。牛膝、當歸各三兩。枳殼（麸炒）、二兩。杏仁（去皮）、羌活、防風、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹食前溫酒或淡鹽湯送下。病睛痛者。兼服當歸養榮湯。

參考 此方以地黃補腎水真陰。退相火爲君。牛膝逐敗血。當歸益新血爲臣。枳殼和胃氣。以補其原。血少則生燥。杏仁

以潤其燥爲佐。羌活、防風。俱升發祛利。大除風邪也。

【必勝散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治吐血。衄血。嘔血。咯血。

藥品 熟乾地黄、小蓟(並根用)、烏梅肉、人參、蒲黃(微炒)、川當歸(去蘆)、芍藥、各一兩。

制法及用法 搗羅爲粗散。每服五錢。清水一盞半。煎至七分。去滓。不拘時溫服。

【白朮丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治便血。

藥品 白朮、一斤(土炒研末)。生地、八兩(飯上蒸熟)。

制法及用法 搗和。乾則少入。酒爲丸。每服十五丸。米飲送下。日三次。

【立效散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治血崩臍腹痛。

藥品 香附、三兩。當歸、一兩。赤芍藥、高良薑、五靈脂、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服三錢。酒一盞。童便少許。煎

服。

【代抵當丸】

發明 見王肯堂證治準繩方。

功用 治療血。蓄血。血痛。

藥品 大黃(片產、如錦紋者、去皮心、酒洗浸)、四兩。芒硝、一兩(如欲穩、以元明粉代之)。桃仁、六十枚(麩炒黃、去皮尖、另研如泥、一作二十枚、一作一兩)。當歸尾(酒洗)、生地黃、穿山甲(蛤粉炒)、各一兩。桂、三錢。或五錢。一方有蓬莪朮一兩。無穿山甲。

制法及用法 研爲極細末。煉蜜和丸。如蓄血在上焦者。丸如芥子大。臨臥時。去枕仰臥。以津嚥之。令停留喉下。搜逐膈上之瘀積。中焦食後。下焦空腹。俱丸如梧椰子大。百沸水煎湯送下。如血老成積。攻之不動者。去當歸、生地。加蓬莪朮一兩(醋浸透、焙乾)。肉桂、七錢(一作各加倍)。

參考 抵當丸用水蛭、蝱蟲。藥性險峻。世人不敢用。故更製代抵當丸。然尙恐其太峻。此方之用生地、當歸。欲下血而不損血。且能引諸藥至血分。諸藥皆隨悍。故以此和之也。

六 筆

【如神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治尿血。

藥品 阿膠(蛤粉炒)、一兩。山梔仁、車前子、黃芩、甘草、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服五分或一錢。井花水調下。每日二次。

【如聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血崩。

藥品 棕櫚、烏梅肉、各一兩。乾薑、一兩五錢。

制法及用法 煨存性。研爲細末。每服二錢。空腹食前烏梅酒調下。久患不過三服可愈。

【如聖散】

發明 見華元化方。

功用 治一切失血。筋脈緊急。汗後搖擗。婦人產後中風口噤。手足瘳癱。角弓反張。或血暈不省人事。四肢強直。或心眼倒築。吐瀉欲死。

藥品 荊芥穗(微焙)。

制法及用法 研爲細末。每服三五錢。豆淋酒或童便調下(一作先同大豆黃卷炒、以酒沃之、去黃卷、取清水調、和滓服)。輕者一服。重者二三服。

即止。口噤則撬齒灌之。斷噤則灌入鼻中。或加當歸、等分。清水煎服亦可。氣虛者忌服。

【地黃散】

發明 見王好古醫壘元戎。

功用 治衄血久不愈。

藥品 生地黃、熟地黃、地骨皮、枸杞子、各等分。

制法及用法 焙乾。研爲細末。每服二錢。不拘時蜜湯調下。

【地黃飲】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治血風瘡癢極不眠。

藥品 生地、熟地、生何首烏、各三錢。當歸、二錢。牡丹皮、黑參、白蒺藜(炒、去刺)、殭蠶(炒)、各一錢五分。紅花、生甘草、各五分。

制法及用法 清水煎。早晚服。

【地黃煎】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人血風勞。心忪發熱。

藥品 生乾地黃、熟乾地黃、各等分。

制法及用法 研爲細末。生薑自然汁和水。打糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後地黃湯送下。或茶酒醋湯下亦

可。一日三次。覺臟腑虛冷。耳間先服八味丸一服。

參考 此方爲治肝脾血虛發熱。盜汗作渴。體倦骨痛。筋脈拘攣。生痰咳嗽之良劑。不可謂地黃性冷而畏之。大概陰虛則發熱。而地黃能補陰益血退熱也。若因肝脾腎精血燥熱生痰。胸膈痞滿。喘咳作渴。及一切虛火者。則必用六味丸爲主。

【地榆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治崩中漏下不止。

藥品 地榆(剉)、蒲黃、白芍藥、白茯苓、柏葉(微炒)、蟹爪(微炒)、熟地黃、鹿角膠(搗碎、炒令黃燥)、漏蘆、各一兩。芎藭、當歸(剉炒)、各七錢五分。伏龍肝、一兩五錢。乾薑(炮)、桂心、甘草(剉炙赤)、各五錢。

制法及用法 剉散。每服三錢。清水一中盞。加竹茹一分。煎至七分。去滓。食前溫服。

參考 方中伏龍肝。爲止血之聖藥。先賢治崩。用旋覆花半夏。治腸間溼痰而崩止者。亦此意也。

【地榆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治敗血。

藥品 地榆、何首烏、肉桂、白芷、各等分。

制法及用法 研爲粗末。每服二錢。米泔一盞半。沙糖一小塊。煎至八分。去滓。空腹食前服。

【伏龍肝散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治五臟結熱。吐血衄血。

藥品 伏龍肝、生地黃、各一斤。竹茹、一升。芍藥、黃芩、當歸、川芎、甘草、各二兩。一方有桂心二兩。

制法及用法 咬咀。清水一斗三升。煮竹茹減三升。納藥。煮取三升。分爲三服。

七 筆

【牡丹散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腸癰冷證。腹濡而痛。時時利膿。或下血。

藥品 牡丹皮、人參、天麻、白茯苓、黃芩(炒)、木香、當歸、川芎、官桂、桃仁(去皮炒)、各七錢五分。白芷(炒)、薏苡仁、甘草(炙)、各五錢。一方無官桂、木香。

制法及用法 研爲細末。每服三五錢。清水一盞。煎至七分。食前溫服。

【牡丹散】

發明 見靈效方。

功用 治婦人久虛羸瘦。血塊走注。心腹疼痛。不思飲食。

藥品 牡丹皮、桂心、當歸、玄胡索、各一兩。蓬莪朮、牛膝、赤芍藥、各三兩。京三稜、一兩五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。水酒各半盞煎。食前服。

【牡丹散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治虛損。經閉。潮熱體羸。漸成骨蒸者。

藥品 牡丹皮、一兩。乾漆(炒)、二兩。蘇木、蓬莪朮、鬼箭、各一分。甘草、當歸、桂心、芍藥、延胡索(炒)、淨陳皮、紅花、烏藥、沒藥(另研)、各一兩。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一盞。煎至七分。不拘時溫服。

【牡蠣丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血海虛損。經水不斷。

藥品 牡蠣粉、赤石脂、代赭石、各一兩。阿膠、川芎、當歸、鹿茸、續斷、乾薑、各三兩。甘草、二錢五分。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。

【沒藥丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後惡露忽斷。驟作寒熱。臍腹百脈痛如鉅刺。

藥品 沒藥(另研)、桃仁(去皮尖、炒、另研)、各二錢五分。當歸、一兩。桂心、白芍藥、各五錢。鼈蟲(去足翅炒)、水蛭(炒焦)、各三十枚。

制法及用法 研爲細末。醋煮米糊和丸。如豌豆大。每服三丸。淡醋湯送下。

【沒藥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風走注。肢節疼痛。發時往來不定。

藥品 沒藥(另研)、乳香(另研)、芍藥、當歸(炒去蘆)、桂心、漏蘆(去蘆)、木香、各五錢。白芷、琥珀(另研)、地龍(去土、微炒)、各七錢五分。安息香(另研)、麝香(另細研)、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。入研藥拌勻。每服一錢。不拘時溫酒調下。

【芍藥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱壅生風。耳引頭

痛流膿血。

藥品 赤芍藥、白芍藥、川芎、木鼈子、當歸、大黃、甘草、各一錢五分。

制法及用法 清水二碗。煎至一鍾。食後服。

【芎藭散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風。身體骨節疼痛。心弱壅滯。飲食少思。

藥品 川芎、一兩。赤芍藥(去皮)、酸棗仁、桂心、當歸(去蘆)、木香、牛膝(酒浸)、各七錢五分。羌活(去蘆)、枳殼(去瓢、麸炒)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一大盞半。加生薑五片。煎至一大盞。去滓。不拘時熱服。

【豆淋酒】

發明 見素書方。

功用 破血。去風。治中風口喎。陰毒腹痛。小便尿血。婦人產後一切中風諸病。及產後猶有餘血水氣者。

藥品 黑豆、五升。

制法及用法 熬令煙盡。於瓷器內以酒一斗淬之。浸一晝夜。去豆。任量飲之。

參考 此酒能治汚血。又可發表。故送藥多用之。

八 筆

【花蕊石散】

發明 見流冤錄方。

功用 治白瘰。及刀切殺傷不透過者。

藥品 花蕊石、五錢(火煨、童便淬七次)。草烏頭、天南星、白芷、厚朴、紫蘇、羌活、沒藥、輕粉、龍骨(煨)、細辛、檀香、蘇木、乳香、蛇含石(火煨、童便淬三次)、當歸、降真香、各二錢。麝香、三分。

制法及用法 共研細末。先用葱湯洗淨患處。將藥搽上。輕綿紙蓋繫。一日一換。

【花蕊石散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治虛勞吐血。五內崩損。或氣虛血凝。瘀積癰聚。胸脇作痛。產後敗血衝心。血衝心。血迷血暈。或子死腹中。胎衣不下。療一切金瘡。打撲損傷。諸刺入肉。日久血凝腫脹。牛馬貓狗咬踢諸傷。

藥品 花蕊石、四兩。硫黃、一兩(一作二兩)。

制法及用法 共研細末。入瓦罐內。鹽泥固濟。曬乾。安四方磚上。以炭火從巳午時煨至經宿。候冷取出研細。每服

二錢(一作一匙)。童便入酒煎熱調下。乃以獨參湯調理。①臟腑有瘀血。內損煩悶欲死者。服此則化爲黃水。或吐出或下泄出甚效。②金瘡打傷跌傷。急於傷處搽之。其血化爲黃水。再服藥便活。更不疼痛。③牛解腸出不損者。即納腸入內。以細絲或桑白皮爲線。縫合肚內。搽上藥末。血止立活。如無桑白皮。用生麻縷亦可。④產婦血暈。但心頭覺暖。急以童便調一盞灌之。取下惡物如肝片。終身不患血風血氣。若隔上有瘀血。化爲黃水。即時吐出。或從大便下。

【金丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸般熱證。癰腫。金瘡。

藥品 天花粉、三兩。斑黃、白芷、赤芍藥、各一兩(俱研末)。

制法及用法 ①無論血盛血衰。如有瘀血。無藥可止者。若在手足。可用茶調敷手足上下尺餘遠。在腦背腰腹。則全體敷之。再用斲血藥(如五倍子末是)。即愈。②病勢大熱。用熱茶調敷。如證稍溫。則用酒調。若用以搗膿。可用薑汁、三分。茶、七分。調塗。即成

膿流出。③瘡口被風所襲。破處肉硬不消者。加獨活。用熱酒調。再不消。加紫荊皮。④調塗熱毒及湯火瘡。隨吃隨痛。赤腫不退者。用雞子清調敷。⑤金瘡在頭面上。血出不止者。急用茶調固敷頭上及瘡口邊。截其血路。⑥金瘡重者。急用繩及絹袋縛住手臂。再以此方從手臂上用茶調敷住血路。然後用斲血藥拔口。⑦金瘡著水。肉翻花者。用薑汁調敷瘡口兩旁。以火熨炙之。或用旱稻稈。燒煙熏瘡口。水出即愈。如無水出。即是風襲。可用南星茶調敷之。⑧打撲損傷右腳脛。用藥通之而瘀血不下者。可用綠豆水調服。即吐出血而愈。⑨從高墜下。用通血藥不下數日。勢甚危急者。此必天時寒凍。又服大黃等涼藥。以致血凝片不行之故。可用熱酒調軍薑末飲之。即通。婦人產後鼻衄舌衄吐血。或經絕血行逆上。心不能主者。用井華水或生艾汁調敷頸上。其血立止。然後服藥以絕原。如舌衄必有血泡。破之復脹。可用線於舌根頸縛住。於頸項上截血。內服黃芩荊芥涼心之藥。或四物湯加荊芥、薄荷、硃砂。以收其原。舌上用蜜調結口之藥。泡破除線。

則血不脹。

參考 此方性涼而通。既能滯血凝血。又能破血退腫。既能去死肌爛肉。又能涼肌生肉。既能作痛閉膿。又能止痛出膿。且能化血爲水。曲盡一反一復之妙。於諸般熱證癰腫金瘡多易奏效。然非十分陽證。不可輕用。恐或凝寒。治療費力耳。

【金華散】

發明 見張璪方。

功用 治血室有熱。崩漏不止。服溫藥不效者。

藥品 延胡索、瞿麥穗、當歸、乾薑、牡丹皮、各一兩。石膏、二兩。桂心(另研)、威靈仙、各七錢五分(一作各七錢)。蒲黃、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。清水一盞半煎。空腹時溫服。一日二次。

【抵當丸】

發明 見張仲景傷寒論方。

功用 治傷寒蓄血。發狂善忘。小腹硬滿。小便自利。大便色黑。身體發黃。脈沉而結。及婦人經水不利。脈症俱實。

藥品 蟅蟲(去足熬熬)、水蛭(酥脂熬黑、如無以陸鯉甲生漆塗炙代之、一作五分)、各二十個。大黃、三兩(酒浸、一作

一兩、一作五錢)。桃仁、三十五個(去皮尖、一作二十個、一作五錢)。

制法及用法 搗細入蜜。分爲四丸。或以麴糊爲丸。清水一升。煮一丸。取七合服盡。晝時當下血。不下更服。

參考 抵當者。至當也。蓄血者。死血之屬。氣運行而不入者也。故草木不能獨治其邪。務必以靈動嗜血之蟲。爲之向導。飛者走陽絡。潛者走陰絡。引領桃仁攻血。大黃下熱。破無情之血結。誠爲至當不易之方。無懼乎藥之險也。既有湯而復爲丸。以證狀之較久而較重者。施治不能急遽。則以此丸劑護之。使之緩達病所。

【松花散】

發明 見方賢奇效良方。

功用 治吐血久不止。

藥品 松花、一兩五錢。生地黃、鹿角膠(炒黃)、瞿麥、各一兩。艾葉、二錢五分。茜草根、白茯苓、紫菀(去苗)、人參、百合、刺薊、甘草(炙赤)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時米飲調下。

【抽刀散】

發明 見陳日華方。

功用 治婦人血風。血氣。

藥品 五靈脂(炒)、一兩。延
莖朮、桂心、望蘂子(炒)、各五
錢。

制法及用法 研爲細末。每
服二錢。酒或各半煎。煎至八
分。不拘時熱服。

【定痛散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生
書。

功用 和血定痛。

藥品 蒼耳子、骨碎補、自然
銅、血竭、白附子、赤芍、當歸、
白芷、肉桂、沒藥、防風、牛膝、
各七錢五分。虎脛骨、龜板、各
五錢。天麻、五加皮、羌活、檳
榔、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每
服一錢。溫酒調下。

九 筆

【胃苓丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 補血。和血。治脾胃
受濕。飲食停積。嘔吐呃逆。
浮腫泄瀉。四肢痠痛。小便短
少。淫疝水蠱。及妊婦傷風。
產後泄瀉。

藥品 蒼朮、厚朴(紫油者、
薑汁炒)、陳皮、白朮、茯苓、各
一錢五分。澤瀉、豬苓、各一錢。
甘草、六分。肉桂、五分。一方
無豬苓。有白芍藥、木香、竹

葉。

制法及用法 上供湯量。丸
量準此酌加。研細。用生薑、大
棗煎湯泛丸。

參考 即平胃五苓二方合
用。平胃本平胃之散。若因
脾土之虛。不能消運。又須稍
藉參苓、如養胃之類。然復有
土衰不能分利而成腫脹。且氣
壅不勝參朮難合理中者。乃合
五苓以健運水土。與正氣散之
假蘇蘆以散客邪同義。

【紅花散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生
書。

功用 治婦人血氣。

藥品 紅花、沒藥、官桂、赤
芍藥、蘇木、青皮、各二錢五分。
當歸、一兩。

制法及用法 清水煎服。

【紅花散】

發明 見張潔古病機氣宜保
命集。

功用 治產後血昏、血暈、血
崩。及經水不調。遠年乾血氣。

藥品 紅花、乾荷葉、牡丹
皮、川當歸、蒲黃(炒)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每
服五錢。酒煎。連渣溫服。如
胎衣不下。榆白皮煎湯。調服。

參考 此方爲破血輕劑。

【活血丹】

發明 見三好古醫壘元戎。

藥品 熟地黃、三兩。當歸、白朮、白芍藥、續斷、人參、各一兩。

制法及用法 共研末。酒煮米糊爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。熱湯送下。

【香附散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治吐血。

藥品 香附、不拘多少。

制法及用法 研爲末。每服二錢。童便調下。

十 筆

【茜根散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血痢。煩熱腹痛。不思飲食。

藥品 茜根、地榆、生乾地黃、當歸(微炒)、犀角屑、黃芩、各一兩。梔子仁、五錢。黃連、二兩(去鬚、微炒)。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一中盞。加豆豉五十粒。藕白七寸。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【茜根散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治蠱毒下血。如雞肝

色。體熱。心腹煩悶。

藥品 茜根、川升麻、犀角屑、地榆(剉)、黃芩、黃連(炒)、各一兩。

制法及用法 研爲末。每服四錢。清水一中盞。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【烏金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血崩不止。

藥品 棕櫚毛(燒存性)、一兩。龍骨(煨過)、二錢。

制法及用法 研爲細末。令勻。每服三錢。空腹時好酒調下。二服立止。

【烏金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠墮胎後。惡血不下。兼治諸血病。

藥品 好墨、一兩(折二寸錠子、燒通赤、用好醋一升、煎七遍、又再燒通赤、放冷、另研爲末)。沒藥、麒麟竭、各二錢五分。麝香、一錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢匕。溫酒調下。如血逆心。每服二錢匕。童便加酒調下。

【桑白皮散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治咳血。

葎品 鮮桑根白皮、一斤(米泔浸三宿、刮去黃皮、剉碎、入糯米四兩、焙乾)。

制法及用法 研爲末。每服一錢。米飲送下。

【桑白皮散】

發明 見沈金鑒沈氏尊生書。

功用 治金瘡出血。

葎品 桑白皮、四兩。密陀僧、二兩。烏賊骨、龍骨(煨)、枯礬、各五錢。黃丹(炒)、二錢五分。

制法及用法 共研細末。敷之。定血如神。

【神功丸】

發明 見李東垣方。

功用 ①治嗜啖膏粱。口臭齒蝕。斷脫牙落。血出不止。②治血崩下血褐色。或紫黑色。脈洪大而緩。③治婦人血崩。④治厥氣上衝。妄聞妄見。

葎品 黃連、一兩(去鬚淨、酒洗、一作五錢)。縮砂仁、五錢。生地黃(酒浸)、生甘草、各三錢。木香、當歸身、各一錢。升麻、藿香葉(如無、用藿香葉代之)、各二錢。

制法及用法 研爲細末。水浸蒸餅和丸。如綠豆大。每服一百丸。加至三百丸。熱湯送下。血痢空腹時米飲下。

【神效方】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血淋。

葎品 海螵蛸、生乾地黄、赤茯苓、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。柏葉、車前子煎湯調下。

【神塞丸】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治耳衄鼻衄。

葎品 麝香、一分。生白礬、一錢。沉香、三分。糯米、五十粒。

制法及用法 共研細末。水煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每丸薄棉裹之。如左耳出血。塞右鼻。右耳出血。塞左鼻。左鼻出血。塞右耳。右鼻出血。塞左耳。兩耳俱出血。塞兩鼻。兩鼻俱出血。塞兩耳。

【桃仁散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦女血閉不通。五心煩熱。

葎品 桃仁(炒)、紅花、當歸、牛膝、各等分。

制法及用法 研爲末。每服三錢。空腹時溫酒調下。

【海蛤散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人傷寒。血結胸

隔。

藥品 海蛤(煨)、滑石(水飛)、甘草、各五錢。芒硝、一兩。

制法及用法 研爲末。每服二錢。鷄子清調下。小腸通利。其結血自散。更鍼期門穴。再以桂枝紅花湯發其汗則愈。

【荆芥散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治衄血。

藥品 荆芥、不拘多少(燒炭)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。陳皮湯調下。不過二服即效。

十一筆

【鹿茸散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人勞損。虛羸尿血。

藥品 鹿茸、當歸、熟地黃、冬葵子、蒲黃、續斷、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒調下。一日三次。

【鹿茸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小便尿血。日夜不止。

藥品 鹿茸(酒洗去毛、塗酥

炙令黃)、生地黃(焙)、當歸(焙)、各二兩。蒲黃、一合。冬葵子(炒)、四兩五錢。

制法及用法 研爲極細末。每服三錢匕。空腹時溫酒調下。一日二次。

【麥門冬飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治吐血久不愈。或肺氣虛短。氣不足以息。或腎虛發熱唾痰。皮毛枯燥。

藥品 麥門冬(去心)、當歸身、人參、各五分。五味子、十粒。梓黃耆、生地黃、各五錢。

制法及用法 研爲粗末。清水二盞。煎至一盞。去渣。不拘時稍熱服。並以三稜鍼於氣衝出血。立愈。

【紫霜丸】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治舌上出血。衄如鍼孔。

藥品 紫金砂(研)、一兩。蘼薈(研)、三錢。貝母(去心)、四錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如櫻桃大。每服一丸。清水一小鍾化開。煎至五分。溫服。吐血、衄血。溫酒化下。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠血風。身體疼痛。手足無力。心神壅悶。

藥品 羚羊角屑、酸棗仁(炒)、生乾地黄、檳榔、各一兩。五加皮、防風、赤芍藥、當歸(酒洗)、骨碎補(炒去毛)、海桐皮、川芎、各七錢五分(一作各五錢)。甘草、五錢(一作三錢)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒調下。

十二筆

【黃芩丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒衄血、吐血、下血。

藥品 黃芩、不拘多少。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如雞頭實大。三歲兒每服一丸。濃鹽湯送下。

【黃耆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治虛熱。口苦咽乾。咳膿血。

藥品 黃耆、四兩。甘草、二兩。

制法及用法 研爲細末。每服一二錢。熱湯點下。每日三次。

【黃連丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治便血。

藥品 黃連、四兩(分作四分、一生研、一炒研、一炮研、一水浸曬研)。條芩、防風、各一兩。

制法及用法 研爲末。水煮麵糊和丸。如梧桐子大。每服五十丸。米泔浸枳殼水送下。冬月加六黃(酒蒸)一兩。

【黃連膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全方。

功用 治胃枯血枯。

藥品 黃連(研爲末)、牛乳汁、白蓮藕汁、生地黄汁、各一斤。

制法及用法 將汁熬膏。和黃連末。搗爲丸。如小豆大。每服二十丸。少呷熱湯送下。日進十服。

【琥珀丸】

發明 見王袞博濟方。

功用 治血風虛勞。上熱下冷。心中煩躁。困乏無力。飲食不甘。醋心口瘡。經水不調。肌肉黃瘁。腸鳴腹痛。氣塊攻衝。時作寒熱。頭旋痰逆。手足麻痺。

藥品 琥珀、當歸、木香、川芎、防風、檳榔、各一兩。三棱(炮)、乾薑(炮)、桂心、各一兩二錢五分。白朮(洗)、柴胡、人

參、各五錢。青皮、吳茱萸(洗泡)、全蠍(炒)、附子(炮)、草豆蔻、赤芍藥、柏葉、白芷、天麻、各七錢五分。桃仁(去皮尖、麩炒)、鼈甲(醋炙)、各一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。溫酒送下。空腹午前近晚各一服。如覺暖。近晚不須服。如腹內塊積攻築。於鼈甲、桃仁、檳榔、三稜、各加一倍爲妙。忌生冷葱蒜菜蕪魚等物。

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人經絡痞塞。腹內瘀血。痛不可忍。

藥品 琥珀、乳香、沒藥、各五錢。

制法及用法 各研細末。每服二錢。水酒各半盞。煎至七分。加生地黄自然汁二合。再煎數沸。去滓。不拘時溫服。

【勝金丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腸風下血。溺血不止。及穢毒便血。

藥品 百藥煎、三兩(一兩生用、一兩炒焦、一兩燒存性)。

制法及用法 研細末。麝飯爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時米飲送下。或研爲末。米湯調服二錢。

【菖蒲丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人脾血積氣。及心脾疼。

藥品 菖蒲(九節者)、六兩。吳茱萸(泡)、香附子(炒去毛)、各四兩。

制法及用法 剉細。以醪醑、五升。浸乾爲度。焙乾。研細末。以好神麴打糊爲丸。如梧桐子大。每服四五十丸。空腹食前淡薑湯送下。一日三次。或不拘時橘皮湯下亦可。

【猾皮散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治血汗。

藥品 刺猾皮。

制法及用法 燒灰。每服二三錢。米飲調下。肉煮食之更妙。

【椒目丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血分。

藥品 椒仁(炒)、甘遂、續隨子(去皮研)、附子(炮)、郁李仁(去皮)、黑牽牛頭末(炒)、五靈脂(酒研、去淨砂土)、當歸、吳茱萸(揀淨、湯泡炒)、延胡索、各五錢。芫青(去頭翅足、同糯米炒黃、去米)、斑蝥(去頭足翅、糯米炒黃、去米)、各十枚。

芫花(醋浸、一作酒炒二錢、一作三錢)、膽礬、信礬、各一錢。石膏、二錢(一作三錢)。一方無斑蝥。一方無信礬。

制法及用法 共研細末。水煮麴糊爲丸(一作神麴煮糊爲丸)。如豌豆大。每服一丸。空腹時橘皮湯送下。

參考 此方藥雖峻厲。所用不多。若畏而不服。有養病害身之患。常治虛弱之人。亦未見其有誤也。

【黑歸脾丸】

功用 治心脾血虛。驚悸怔忡。盜汗、腸紅、崩漏等症。

藥品 即歸脾丸加熟地黃。

參考 歸脾丸專治心脾陰中之陽虛。故不用地黃、白芍。後人加熟地黃。名爲黑歸脾。殊失立法之旨矣。

十三筆

【當歸丸】

發明 見王海藏方。

功用 和血。

藥品 四物湯、防風、獨活、全蠍、各五錢。茴香(炒)、續斷、各一兩。青棟、玄胡索、各七錢。木香、丁香、各二錢五分。

制法及用法 共研細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。空腹時溫酒送下。

【當歸丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治月經不調。血積。

藥品 當歸、赤芍藥、川芎、熟地黃、蓬朮、京三稜、各五分。神麴、百草霜、各二錢五分。

制法及用法 共研細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服二三錢。熱湯送下。

【當歸散】

發明 見孫一奎赤水玄珠。

功用 治婦人小便出血。或尿血。

藥品 當歸、羚羊角屑、赤芍藥、各五錢。生地黃、一兩。大薊葉。七錢五分(一作三分)。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。清水煎。去渣食前服。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血脈不通。

藥品 當歸、穿山甲(灰炒)、蒲黃(炒)、各五錢。辰砂(另研)、一錢。麝香、少許。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前溫酒調下。

【當歸飲】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治血嗽。

藥品 當歸、川大黃、蘇木、

生地黃、赤芍藥、各等分。

制法及用法 研爲末。每服三錢。溫酒調下。

【當歸煎】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 去敗血。生好血。

藥品 四物湯第一方加甘草、五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。每兩作八丸。酒醋共半杯。煎送同化。不拘時調下。如人行五里許再服。

十四筆

【槐花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治衄血。

藥品 槐花、一兩(炒)。蒲黃、五錢。川麴蘖、一分。

制法及用法 搗羅爲細末。每服五分。新汲水調下。

【槐花散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治吐血。

藥品 槐花、二兩。百草霜、五錢。

制法及用法 研爲末。每服二錢。茅根湯調下。

【槐角丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治大腸火盛。痔瘡便血。

藥品 槐角(去梗炒)、四兩。枳殼(麸炒)、當歸(酒製)、地榆、防風、黃芩、各二兩。一方有黃蘗、秦艽、生地黃、苦參。

制法及用法 共研細末。酒糊或神麴糊爲丸。如梧桐子大。每服三錢。空腹時米飲或熟湯送下。

參考 按瘍醫大全方。月槐角子、槐花、各八兩。檳榔、四兩。黃芩、三兩。刺蝟皮、二個(酒浸焙)。共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。亦名槐角丸。每服一百丸。治痔漏。空腹時。熟湯送下。

【團參丸】

發明 見奇效方。

功用 治吐血咳嗽。

藥品 人參、黃耆、飛綿麵、各一兩。百合、五錢。

制法及用法 研爲細末。水泛丸。如梧桐子大。每服三五十丸。食遠茅根煎湯送下。

【團參丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治嗽血。

藥品 人參、皂子黃、各五錢。

制法及用法 共研細末。加阿膠、五錢。湯烱膠爲丸。如

雞頭實大。每服一丸。熟湯送下。

【蒲黃散】

發明 見沈金鰲 沈氏尊生書。

功用 治便血。

藥品 蒲黃(研末)、二兩。

制法及用法 每服方寸匕。清水調下。服盡止。

十六筆

【豬臟丸】

發明 見沈金鰲 沈氏尊生書。

功用 治流血。

藥品 槐子、一兩。牙皂、七分。黃連、四兩。糯米、八兩。

制法及用法 共爲末。用豬大腸、一條。洗淨。將藥入內。兩頭紮住。砂罐內煮爛。搗丸如梧桐子大。每服三五十丸。米飲送下。

十七筆

【濟陰丹】

發明 見魏夫人方。

功用 治產後百病。百晷內常服。除宿血。生新血。令人有子。且生子充實。

藥品 木香(炮)、京墨(煨、一作煨)、茯苓、桃仁(去皮尖、鉄炒)、各一兩。蠶布(燒)、藥

本、秦羌、石斛(酒浸炒)、桔梗(炒)、人參、甘草、各二兩。牡丹皮(去心)、乾薑(炮)、細辛、桂心、當歸、川芎、各五錢(一作各一兩五錢)。蒼朮(米泔浸)、八兩。大豆黃卷(炒)、五合。川椒(去目並合口、炒出汗)、山藥、各三兩(一作各七錢五分)。澤蘭葉、熟地黃(酒浸、蒸焙)、香附子(炒)、各四兩。糯米(炒)、一升。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。每兩作六丸。如彈子大。每服一丸。空腹食前細嚼。溫酒送下。或淡醋湯化下。亦可。或以醋糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。依前法服。

【濟陰丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治室女經水不通。婦人血海虛冷。久無子息。產後敗血衝心。中風口噤。子死腹中。墮胎腹中攻痛。橫生逆產。胎衣不下。血暈血癖。血崩血滯。血入四肢。諸種風氣。或傷風吐逆咳嗽。寒熱往來。遍身生瘡。頭痛惡心。經脈不調。赤白帶下。乳生惡氣。胎臟虛冷。數曾墮胎。崩中不定。因此成疾。常服暖子宮。和血氣。悅顏色。退風

冷。能消除萬病。

藥品 三稜、二兩。蓬莪朮、一兩(切片煨)。蒼朮(浸去皮)、枳殼(去瓤)、大艾(去梗)、劉寄奴、香附子(淨)、敗薑、各一兩五錢。烏豆、三合(以上九味、以穀醋三升煮乾、取出焙乾)。當歸身(酒蒸)、橘皮(去白、以細紅者佳)、白芍藥、各一兩五錢。蒲黃(隔紙炒)、牡丹皮(去骨)、官桂(去粗皮)、赤芍藥、片蓴黃、青皮(去白)、各一兩。生地黃、熟地黃(均酒浸)、川芎、各七錢五分。玄胡索(炒)、五靈脂(酒煮)、白朮(煨)、各五錢。

制法及用法 共研細末。糯米粉、穀醋、打糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時沉香湯或蘇木湯、鹽湯送下。中風口噤者。搗開口灌之。

【薏苡仁散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治咯血。

藥品 薏苡仁(爲末)、熟豬肺(切)。

制法及用法 以肺蘸末。空腹時食之。

參考 此方薏苡仁補肺。豬肺引經也。

十八筆

【斷紅丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治下血久不止。虛寒色淡晦者。

藥品 側柏葉(炒黃)、川續斷(酒煨)、鹿茸(火去毛醋煮)、附子(炮、去皮臍)、阿膠(蛤粉炒成珠子)、黃耆(去蘆)、當歸(去蘆酒浸)、各一兩。枯白礬、五錢。

制法及用法 共研末。醋煮米糊爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時米飲送下。

【斷紅丸】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治下血久不止。虛寒色淡晦者。

藥品 側柏葉(炒香)、川續斷(酒炒)、各三錢。鹿茸、一具(酥炙)。

制法及用法 共研細末。醋煮阿膠爲丸。如梧桐子大。每服四五十丸。烏梅湯或人參湯、米飲送下。

【雞蘇散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人吐血。心煩昏悶。

藥品 雞蘇葉、阿膠、刺薊、生地黃、各一兩。黃耆、羚羊角

屑、葛根、甘草、各五錢。麥門冬、黃芩、當歸、伏龍肝、各七錢五分。

制法及用法 研爲粗末。每服四錢。清水一盞。加生薑、三片。竹茹、半雞子大。煎至六分。去滓溫服。

【歸脾丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治憂思傷脾。血虛發熱。食少體倦。或脾虛不能攝血。致妄行吐下。或健忘怔忡。驚悸少寐。或心脾作痛。自汗盜汗。或肢體腫痛。大便不調。婦人經候不準。晡熱內熱。或妊娠鬱結傷脾。或因乳母心脾二經有熱。瘡不結痂。或瘡痕赤色。或瘡瘻流注。不能消散潰斂。

藥品 當歸身(酒洗)、一錢。人參、白茯苓(一作茯神)、黃耆(炒、一作一錢五分)、白朮(土炒、一作蒸熟透)、龍眼肉(一作桂元肉、八枚)、酸棗仁(炒研)、各二錢。廣木香、甘草(炙)、各五分。遠志(去心)、一錢。

制法及用法 上係湯量。丸量準此酌加。研細。加生薑、大棗、龍眼、煮爛打丸服。

參考 心臟神而生血。脾藏意而統血。思慮太過。則脾臟受傷而血不歸經。心血不足。

則健忘怔忡。驚悸不寐。脾血不足。則嗜臥少食。體倦肢痛。不能統血。遂致妄行。甚則氣鬱而心脾作痛。在婦女則帶下而月經不調。茲取參耆黃朮炙草。甘溫可以補脾。龍眼、棗仁、歸身、遠志。濡潤可以養心。佐以木香者。蓋思慮所傷。三焦氣阻。藉其宣暢。調氣舒脾。則氣和而血和。且平肝可以實脾。而血之故於外者。悉歸中州。而聽太陰所攝矣。故曰歸脾。

二十九筆

【鬱金散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治溺血。

藥品 鬱金、槐花、各一兩。

制法及用法 研爲末。每服二錢。淡豆豉湯調下。

祛風類

一 筆

【一字散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 醒風。爽精神。

藥品 天南星、五錢(微炮製)。蟬殼(微炒)、乾蠍、白僵

靈、各一分。

制法及用法 搗羅爲細末。加蕎麥麵一分。用醋石榴殼一枚。納入諸藥。鹽泥封裹。竈下慢火烘之。泥乾燥爲度。取出再研勻。每服一字。溫酒調下。

【一字散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治破傷風。

藥品 金頭蜈蚣、一條(去頭足炙)。草烏頭、天麻、各五錢。全蠍、一錢。白芷、三錢。

制法及用法 研爲細末。每服五分。如但發熱。茶清調下。寒溫或酒調下。不拘時服。

【一字散】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治頭風。

藥品 雄黃、細辛、各一錢(一作各五錢)。川烏尖、二錢(一作五枚)。

制法及用法 研爲細末。每服一字。不拘時薑汁或清茶調下。每日三次。

【一粒金丹】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治腰膝風走注疼痛。

藥品 草烏頭(剉炒)、五靈脂、各一兩。地龍(去土炒)、木鼈子(去殼)、各五錢。白膠香(另研)、一兩。細墨(煨)、乳香

(另研)、各五錢。沒藥(另研)、當歸(去蘆)、各一兩。西香(另研)、一兩。

制法及用法 研爲細末。水煮糯米糊和丸。如梧桐子大。每服二丸至三丸。溫酒送下。服後遍身微汗爲效。

二 筆

【八風散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治風氣上攻。頭目昏眩。肢體拘急煩疼。或皮膚風瘡痒痛。及寒濕不調。鼻塞聲重。

藥品 藁香(去土)、八兩。白芷、前胡(去蘆)、各一斤。黃耆(去蘆)、甘草(炙)、人參(去蘆)、各二斤。羌活(去蘆)、防風(去蘆)、各三斤。

制法及用法 研爲細末。每服一二錢。清水一盞。加薄荷、少許。煎至七分。去滓。食後溫酒、或臘茶清調下亦可。小兒虛風。每服五分。乳香臘茶清調下。更量兒大小加減。

【八風散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治風虛面色青黑如土。不能見日月光。脚氣痺弱。

藥品 菊花、一兩。石斛、天

雄、各四錢五分。人參、附子、甘草、各五錢。萆薢、續斷、黃耆、澤瀉、遠志、細辛、秦光、石葦、牛膝、菖蒲、杜仲、茯苓、乾地黄、防風、白朮、乾薑、革解、各三錢。烏頭、一錢五分。

制法及用法 研爲末。每服方寸匕。溫酒調下。每日三次。不效加至二匕。

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治心臟風邪。有如鬼語。悶亂恍惚。

藥品 人參(去蘆)、赤茯苓(去皮)、石菖蒲、鬼箭、犀角屑、各七錢五分。龍齒、一兩(研)。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一中盞。煎至七分。去滓。不拘時溫服。

【七聖散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治脾臟中風。心腹煩躁。頭面微腫。冷汗頻出。

藥品 枳殼(去蘊、麸炒)、天麻、各一兩。大黃、地骨皮、白茯苓、芍藥、各五錢。薏苡仁、七錢五分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。不拘時熱湯調下。忌食生冷、油膩、豬、雞。

【九製稀莖丸】

發明 見張詠方。

功用 治中風喎僻。語言蹇澀。肢緩骨疼。風痹走痛。或十指麻木。肝腎風氣。風溼諸瘡等症。

藥品 稀莖草、不拘多少(以五月五日、七月七日、九月九日採者爲佳、揀去粗莖、留枝葉花、實用)。

制法及用法 酒拌。九蒸九曬。研爲末。煉蜜和丸。每服五十丸。空腹時無灰酒送下。

三 筆

【川芎丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治風盛壅膈。鼻塞流涕。眼淚多眵。齒緊。偏正頭痛。

藥品 川芎、柴胡、各一兩。半夏麴、甘草(炙)、甘菊花、人參、前胡、防風、各五錢。一方加細辛、五錢。

制法及用法 每服四錢。清水一盞。加生薑、三四片。薄荷、五葉。煎至七分。去滓。食後溫服。

【川芎丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 消風癰。化痰涎。利咽膈。清頭目。治頭痛旋運。

心忪煩熱。頸項緊急。肩背拘倦。肢體煩疼。皮膚瘙癢。腦昏目疼。鼻塞聲重。面上遊風。狀如蟲行。

藥品 川芎、水蘇(焙乾)、各七十五兩。桔梗、一百兩。甘草(燬)、三十五兩。防風(去苗)、二十五兩。細辛(洗)、五兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。每一兩五錢。分作五十丸。每服一丸。食後臨臥細嚼。臘茶清送下。

【川芎散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治風眩頭暈。

藥品 小川芎、五錢。山茱萸肉、一兩。山藥、甘菊花(野菊勿用)、人參(去蘆)、白茯神(去木)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。一日三次。

【川芎散】

發明 見李東垣方。

藥品 川芎、一錢二分。青黛、二錢五分。蔓荊子、一錢二分。鬱金、芒硝、各一錢。石膏、一錢三分。細辛根、一錢。薄荷葉、二錢。紅豆、一粒。

制法及用法 研爲末。搗鼻。

【川芎散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治偏頭風。

藥品 川芎、甘菊花、石膏、白殭蠶、各六錢。

制法及用法 研爲極細末。每服三錢。茶清調下。

【川芎散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治偏正頭風。

藥品 川芎、細辛、羌活、槐花(一作槐子)、甘草(炙、一作生)、香附子、石膏、各五錢。荊芥、薄荷、甘菊花、防風(去叉、一作柴胡)、茵陳、各一兩。

制法及用法 研爲末。每服二錢。食後茶清調下。一日三次。忌食動風物。

【川芎茶調散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治諸風上攻。頭目昏重。偏正頭痛。

藥品 川芎、四兩。薄荷、八兩。荊芥、四兩。羌活、白芷、防風、甘草(炙)、各二兩(自川芎至甘草、一本皆作一兩)。細辛、一兩。一方無細辛。有香附(童便浸炒)、二兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後茶清調下。一日三次。婦人產後豆淋酒調下。

輕者三服。重者五七服效。

【三聖膏】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治白癰風。

藥品 硫黃(生研)、黃丹(研)、各五錢。

制法及用法 用生絹袋盛。緊縛定。蘸生薑自然汁擦之。日夜十次。自愈。

【三聖散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治手足拘攣。口眼喎斜。左癱右瘓。骨節痠疼。脚弱步艱。及一切風疾。

藥品 當歸(去蘆)、肉桂(去粗皮)、玄胡索、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹臨臥溫酒調下。每日三次。孕婦忌之。

【山茱萸丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

藥品 山茱萸、大黃(剉炒)、菊花、各一兩二錢五分。朴硝、三兩七錢五分。川附子(炮、去皮臍)、獨活、各七錢五分。秦艽(去苗土)、一兩五錢。蔓荊子(去白皮)、山梔子(去皮炒)、防風、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。老人亦宜服。妊娠去附子。加細

辛、半分。

【大活絡丹】

功用 治一切中風。癱瘓。痿痹。痲厥。拘攣。疼痛。癱疽。流注。跌撲損傷。小兒驚癇。婦女停經。

藥品 白花蛇、烏梢蛇、威靈仙、兩頭尖(俱黃酒浸)、草烏、天麻(煨)、全蠍(去毒)、首烏(黑豆水浸)、龜版(炙)、麻黃、貫仲、甘草(炙)、羌活、官桂、藿香、烏藥、黃連、熟地黃、大黃(蒸)、木香、沉香(用心)、各二兩。細辛、赤芍藥、沒藥(去油)、丁香、乳香(去油)、麝香、天南星(薑製)、青皮、骨碎補、白豆蔻仁、安息香(酒熬)、黑附子(製)、黃芩(蒸)、香附(酒浸焙)、玄參、白朮、各一兩。防風、二兩五錢。葛根、虎骨(炙)、當歸、各一兩五錢。血竭、七錢。地龍(炙)、犀角、麝香、松脂、各五錢。牛黃、片腦、各一錢五分。人參、三兩。

制法及用法 各研稱準。合和再研。蜜丸如桂圓核大。金箔爲衣。白蠟爲圓。每服一丸。陳酒送下。

參考 頑痰惡風。熱痰瘀血。入於經絡。非此丸不能透達。乃肢體大證必備之藥。

四 筆

【天麻丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝疳。風疳。疳眼。

藥品 天麻、青黛、川黃、五
靈脂、夜明砂(微炒)、川芎、蘆
薈、各二錢。龍膽草、防風、蟬
殼(去足)、各一錢五分。全蠍、
二枚(焙)。麝香、少許。乾蟾
頭(炙焦)、三錢。

制法及用法 研爲細末。豬
膽汁浸糕和丸如麻子大。每服
十丸。薄荷湯送下。

【天麻丸】

發明 見張潔古方。

功用 治腎臟虛熱生風。筋
脈牽掣。遍身疼痛。手足麻
木。口眼喎斜。半身不遂。以
及寒痰相持等症。

藥品 天麻(酒浸三宿、曬
乾、一作酒浸二日焙)、牛膝(酒
浸一宿焙乾、一作酒浸二日
焙)、草薢(另研)、玄參、各六兩
(一作各四兩)、杜仲、七兩(酒
炒去絲)、附子、一兩(炮去皮、
一作一枚)、當歸(全用)、十兩。
羌活、十兩(或十五兩、一作四
兩)、生地黃(酒浸、焙)、一斤。
獨活、五兩。一方無獨活。

制法及用法 研爲細末。煉
蜜和丸。如梧桐子大。每服五

七十丸。病甚者加至一百丸。
空腹食前。溫酒或白湯送下。
平明服藥。日高時覺飢則食。
不飢則止。大忌壅塞。失於通
利。服至半月。稍覺壅塞。微
以七宣丸瀉之。

參考 方中雖以歸、地補陰
陰血爲君。其妙用全在天麻與
牛膝同浸同焙。俾風痰濁滯。
咸從下趨而不致上逆。得力又
在附子之雄。引領歸地直入下
焦。填補其空。使風邪無復入
之慮。草薢、杜仲以祛其在裏
溼熱。羌活、玄參以疏在表風
熱。標本合治。具有方法。世
稱易老天麻丸。即此方也。蓋
潔古係易州人。

【天麻散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治中風涎盛。半身不
遂。言語艱澀。不省人事。小
兒急慢驚風。

藥品 天麻、二錢五分。半
夏、七錢。甘草(炙)、茯苓、白
朮、各三錢。

制法及用法 清水一盞。入
瓷罐內。煮藥令水乾。再加老
生薑、三錢。同煮候乾。研爲
細末。每服一錢五分。薑棗湯
調下。

【天麻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰風。癩疾。

藥品 天麻、二兩。何首烏、胡麻子、各三兩。蔓荊子、威靈仙、萹蒲、荊芥穗、地骨皮、苦參(去蘆)、白蒺藜、甘菊花、牛蒡子(炒)、各一兩。薄荷、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。溫酒或茶清調下。每日二次。先食前服半月。次食後服半月。大有神效。

【天麻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒咳嗽有痰。氣壅面紅。

藥品 天麻、三錢。天南星(水浸、春秋五日、冬七日、夏三日)、五錢。辰砂、一錢。麝香、一字。

制法及用法 研爲末。每服一字。杏仁或人參湯調下。

【天南星散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風口噤。四肢拘急。或痰氣上壅。

藥品 天南星(薑汁炒黃)、白附子(炮)、黑附子(炮)、烏蛇肉(酒炙)、全蠍(炒)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服五分。生薑汁溫酒調。拗開口灌下。

【牛黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心虛風動。筋脈掣搖。神昏語澀。

藥品 西牛黃、龍腦、硃砂、麝香、各一錢。蟬蛻、烏梢蛇肉、一兩(酒浸)。全蠍(炒)、僵蠶(炒)、桑螵蛸、羚羊角、阿膠(炒)、天麻、防風、甘菊花、蔓荊子、桂心、細辛、附子(炮、去皮)、獨活、犀角、各五錢。麻黃、七錢五分。

制法及用法 研爲細末。和勻再研。每服一錢。豆淋酒調下。

【牛黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心臟中風。

藥品 牛黃(另研)、麝香(另研)、犀角屑、羚羊角屑、龍齒(另研)、防風、天麻、獨活、人參(去蘆)、沙參、茯神(去木)、川升麻、甘草(炙)、白鮮皮、遠志(去心)、天竹黃(另研)、各二錢五分。龍腦(另研)、一錢。硃砂(水飛)、銀粉(另研)、麥門冬(去心)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。令勻。每服二錢。不拘時麥門冬煎湯調下。

【牛黃抱龍丸】

功用 治中風。痰迷心竅。神昏譫語。手足拘攣。瘋癲狂亂。小兒急驚風。

藥品 牛黃、琥珀、各二錢五分。西黃、五分。膽星、一兩。赤茯苓、五錢。全蠍、辰砂、各一錢五分。白殭蠶、三錢。天竹黃、三錢五分。麝香、二分。一方無西黃、茯苓。有木香、珍珠、防風、沉香、雄黃、貝母、天麻、橘紅、枳殼、石菖蒲。

制法及用法 各取淨粉。膽星烊化打丸。每丸潮重四分。金箔爲衣。每服一二丸。鈎藤泡湯送下。

【牛黃清心丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 去風痰。散驚熱。

藥品 天南星(洗)、半夏(洗)、白附(洗)、川烏(洗)、各一兩。川鬱金、五錢。

制法及用法 研爲粗末。用臘月黃牛膽、二三枚。取汁和藥。入膽中。扎懸當風處。一月乾取出。入馬牙硝、磁砂、雄黃、礞砂(如膽藥一兩、四味各一錢)、龍腦、麝香、各少許。稀麵糊爲丸。如麻子大。一歲兒每服十丸。金銀薄荷湯送下。二歲倍之。

【牛黃清心丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治諸風緩縱不隨。目奪心怔。健忘恍惚。眩冒煩

鬱。痰涎壅塞。及心神不足。驚恐悲憂。虛煩少睡。喜怒無時。或發狂癲。神情昏亂。小兒躁鬧。項背強直。腰背反張。時發時醒。

藥品 牛黃、一兩二錢(另研)。白芍藥、麥門冬(去心)、黃芩、當歸(去苗)、防風(去苗)、白朮、各一兩五錢。柴胡(去苗)、桔梗、川芎、白茯苓(去皮)、杏仁(去皮尖雙仁、麩炒黃、另研)、各一兩二錢五分。神麴(炒)、蒲黃(炒)、吉林人參(去蘆)、各二兩五錢。羚羊角、麝香(另研)、龍腦(另研)、各一兩。肉桂(去粗皮)、大豆黃卷(碎炒)、阿膠(剉碎、蛤粉炒)、各一兩七錢五分。白蘇、乾薑(炮)、各七錢五分。犀角屑、二兩。雄黃(另研飛)、八錢。乾山藥、七兩(一作十兩)。甘草(剉炒、一作五錢)、五兩。金箔、一千二百片(內四百片爲衣)。大棗、一百枚(蒸熟、去皮核、研成膏)。

制法及用法 除棗、杏仁、金箔、二角屑、及牛黃、雄黃、龍腦、麝香外。餘研爲細末。入餘藥和勻。用煉蜜與棗膏爲丸。每兩作十丸。金箔爲衣。一方有磁砂一兩五錢爲衣。每服一丸。食後溫水化下。小兒驚風。

即酌度多少。以竹葉湯溫化。

【五生丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治風癰。

藥品 川烏頭(生用、去皮臍)、附子(生用、去皮臍)、生南星、生半夏、乾生薑、各五錢。

制法及用法 研爲細末。醋煮大豆汁作糊和丸。如梧桐子大。每服五丸。不拘時冷酒送下。

【五退散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治風喉。

藥品 蟬退、蛇退(醋煮)、蠶退紙、豬蹄殼、荊芥穗、各二錢五分。穿山甲、川烏(炮)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服二錢。食後鹽湯調下。

【五加皮酒】

發明 見太平聖惠方。

功用 治腎氣虛寒。小便餘瀝。婦人陰冷癖瘕。腰膝時痛。及癱瘓拘攣等症。

藥品 五加皮、熟乾地黃、丹參、杜仲(去粗皮、炙微黃)、蛇床子、乾薑、各三兩。地骨皮、二兩。天門冬、一兩。鍾乳石、四兩。一方有枸杞子。無地骨皮。

制法及用法 細剉。生絹袋盛。酒一斗五升。漬二宿後。濾清。加冰糖一斤八兩。每服一大杯。空腹時。及晚食前。緩服。

參考 酒家所售者。與此不同。藥業即用此方配製。

【五加皮散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治筋緩。

藥品 五加皮、油松節、木瓜、各等分。

制法及用法 研爲末。每服二三錢。溫酒調下。

【丹參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治風痿膚赤。癢發痒。搔之生瘡。

藥品 丹參、人參、苦參、防風(以上均去蘆)、雷丸、牛膝(酒浸)、白附子(炮)、白花蛇(浸酒)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前甘草煎酒放溫調下。

【火龍膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療風寒暑溼毒襲經絡。筋攣骨痛。或溼痰流注作痛。不能行步。及鶴膝風。歷節風。

藥品 生薑(取汁)、八兩。牛皮膠、二兩。

制法及用法 入鍋內化開。入乳香、沒藥末、各五錢。麝香、一錢。調勻。待溫。攤貼患處。

【木瓜散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治中風筋脈掣急。腹痛轉筋。舌卷囊縮。面蒼唇白。不思飲食。手足爪甲俱痛。

藥品 木瓜(去子酒浸、一作七錢五分)、虎脛骨(醋炙、一作酥炙、一具)、五加皮(洗)、人參(去蘆)、桑寄生(如無、以續斷代之)、酸棗仁(炒)、當歸(去蘆酒浸)、柏子仁、黃耆(蜜酒炒)、各一兩。甘草(炙)、五錢。

制法及用法 咬咀。每服四五錢。清水一鍾半。加生薑五片。煎至七分。去滓。不拘時溫熱服。

【木香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人冷勞。

藥品 木香、琥珀、吳茱萸(泡)、當歸、牡丹皮、赤芍藥、三稜、附子(炮)、延胡索、川芎、各三分。乾薑、人參、桂心、各五錢。北柴胡、白朮、鼈甲(醋炙、去裙炙)、厚朴、熟地黃、陳橘皮、各一錢。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。

【太乙神鍼方】

發明 見本草拾遺方。

功用 治痛風寒濕。筋骨疼痛。

藥品 人參、四兩。三七、八兩。山羊血、二兩。千年健、一斤。鑽地風、一斤。肉桂、一斤。川椒、一斤。乳香、一斤。沒藥、一斤。穿山甲、八兩。小茴香、一斤。蒼朮、一斤。蕪荑、四斤。甘草、二斤。麝香、四兩。防風、四斤。

制法及用法 共爲細末。用純紙一層。高方紙三層。紙寬裁一尺二寸五分。長一尺二寸。將藥末薄薄鋪勻在上。一針約用藥七八錢。捲如花炮式。以緊實爲貴。兩頭用紙封固。外用印花布包面。務令整潔。將針以火焙著。或按穴道。或在痛處。下襯以方寸新紅布數層。將鍼按上。若火旺布薄覺疼。多墊布數層。但針必須三四隻。一針已冷。再換一針。運用七針。無不應驗。

五 筆

【白朮酒】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風口噤。

藥品 白朮(剉)、黑豆(炒熟)、各三兩。一方有獨活。

制法及用法 酒四升。煎至二升。去滓。溫分四服。搗口灌之。得汗即愈。

【白芷丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治風眩痛。沐浴後眩暈頭痛。及暴寒乍暖。頭目不清。

藥品 白芷(新鮮者)、二兩。

制法及用法 蘿蔔汁浸。曬乾。研爲末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。細嚼清茶或荊芥湯送下。

【白芷散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治中風口眼喎斜。

藥品 白芷、杏仁(湯泡、去皮尖)、細辛、各一錢。全蠍、二個(焙)。

制法及用法 研爲細末。麻油調敷。

【白芷散】

發明 見李東垣方。

功用 治頭風。

藥品 白芷、鬱金、石膏、芒硝、各二錢。薄荷、三錢。

制法及用法 研爲細末。口含水。搐鼻。若證在太陽。加

羌活、二錢。防風、一錢。紅豆、二粒。爲末搐之。

【白花蛇丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治大麻風。

藥品 白花蛇、一條(去皮骨、酒浸炒)。川芎、天麻子、羌活、白附子(炒)、當歸、蔓荊子、獨活、威靈仙、蟬蛻、赤芍藥、雷丸、蒼耳子、枳殼、川草薢、雄黃、石菖蒲、甘草、大楓子、防風、何首烏、烏藥、白僵蠶、牛膝、苦參、皂角、各等分。

制法及用法 研爲末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。溫酒送下。

【白花蛇丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治大風惡疾 嫩赤腐爛。

藥品 白花蛇、一條(去頭尾生用)。烏梢蛇、一條(去頭尾、不犯鐵、石臼中搗)。防風(去苗)、二兩。荊芥穗(酒洗)、一兩五錢。金銀花(去葉)、二兩。川芎、一兩。枸杞子(甘州者)、二兩。黃芩、黃連(酒炒)、山梔子、黃蘗、全蠍(醋浸一日、去鹽味)、各一兩。蟬蛻、二兩(草鞋踏去土)。漏蘆、八兩(洗淨去苗、取四兩)。烏藥、何首烏(不犯鐵)、牛膝(去蘆)、牛蒡子、

連翹、天花粉、白蒺藜、威靈仙、細辛、金毛狗脊、胡麻子(炒)、蔓荊子、各一兩。槐花、苦參、生地黄、各二兩。一方有風藤、一兩。

制法及用法 除烏梢蛇外。餘研爲粗末。同白花蛇搗和焙乾。再爲細末。米飲糊丸。如梧桐子大。每服五六十丸。清茶送下。每日三次。如瘰癧上腫。加白芷一兩。肌肉潰爛。加皂角刺、一兩。

【白花蛇酒】

發明 ①見瑞竹堂經驗方。②見瀕湖集簡方。③見瀕湖集簡方。

功用 ①治諸風頑痹。口眼喎斜。癱瘓急疼痛。惡瘡疥癩。②治諸風頑痹。口眼喎斜。癱瘓急疼痛。惡瘡疥癩。③治中風傷酒。半身不遂。口目喎斜。膚肉痺痺。骨節疼痛。惡瘡癰癧。

藥品 ①白花蛇一條。酒浸去皮骨取肉。②白花蛇肉、一條(溫水洗淨、頭尾各去三寸、酒浸、去骨刺、取淨肉)、一兩。全蠍、當歸(炒)、防風、羌活、各一錢。獨活、白芷、天麻、赤芍藥、甘草、升麻、各五錢。③白花蛇肉、一條(酒浸透、去骨刺取肉)、四兩。羌活、當歸身、天

麻、秦艽、五加皮、各二兩。防風、一兩。

制法及用法 ①絹袋盛之。蒸糯米一斗。安麴於缸底。置蛇麴上。以飯安蛇上。用物密蓋三七日。取酒。以蛇曬乾爲末。每服三五分。溫酒送下。仍以濁酒及糟作餅食。②剉碎。以絹袋盛貯用。糯米二斗。蒸熟。如常造酒。以袋置缸中。待成。取酒同袋密封。煮熟。置陰地七日。出毒。每溫服數杯。③剉碎和勻以生絹袋盛之。入金華酒罈內。懸走安置。入糯米生酒醅五壺。浸袋箬葉密封。安罈於大鍋內。水煮一日。取起。埋陰地七日。取出。每服一二杯。仍以渣曬乾碾末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。溫酒送下。忌見風、犯慾、及魚羊鵝麪發風之物。

參考 末方與次方相似。惟多秦艽、五加皮。無全蠍、獨活、白芷、赤芍、甘草、升麻。其當歸、防風、天麻。彼此均有。按蛇性皆善竄善走。善行善蛻。故治一切風病風症。能引藥至經難達之處。而去皮膚癢風(俗稱癩風)之疾。並爲陰濕之品。而花蛇又食石南。生土穴陰竈之處。裏幽暗毒厲之氣。

陰中之陰。所以於透骨搜風。我驚定搐最宜。爲風痹驚搐癱瘓惡瘡要藥。入肺肝二經。以產於湖北蕪春者爲佳。入藥最良。即藥肆中所謂風疾蕪蛇酒也。

【白花蛇散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治紫癱風。

藥品 白花蛇、二兩。晚蠶蛾、二錢五分。白僵蠶(炒)、烏犀角屑、麻黃(去節)、何首烏、天南星(薑製)、天麻、白附子(炮)、桂心、草薢(酒浸)、白鮮皮、羌活(去蘆)、蔓荊子、防風(去蘆)、各五錢。礞石、一兩(醋淬研爲末)。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服二錢。食前溫酒調下。忌食熱麵、騷、魚、蒜等物。

【白花蛇散】

發明 見聖濟總錄。

功用 治頭風或偏頭風。腦作痛。

藥品 白花蛇(酒浸去皮骨)、天南星(漿水煮軟切炒)、各一兩。石膏、荆芥、各二兩。地骨皮、二錢五分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。茶清調下。每日三次。

【白附子散】

發明 見許叔微類證普濟本

事方。

功用 治風寒客於頭中。疼痛牽引兩目。遂至失明。

藥品 白附子(炮)、一兩。麻黃(不去節)、川烏、天南星(泡)、各五錢。全蠍(炒)、五個。乾薑、辰砂(另研、一作一字)、麝香、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。不拘時溫酒調下。略睡少時有效。

【白蒺藜散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治肝腎虛熱生風。目赤多淚。

藥品 白蒺藜(炒)、菊花、蔓荊子、草決明、甘草(炙)、連翹、各等分。青箱子、減半。

制法及用法 爲散。每服三四錢。清水煎。去滓熱服。

【白僵蠶散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風。角弓反張。口噤唇麻。筋脈抽掣。

藥品 白僵蠶、一兩(炒)。麝香、二錢五分(另研)。黃蛇肉(炒令黃)、蟬殼、桑螵蛸(炒)、犀屑、天麻、獨活(去蘆)、天南星(炮)、川烏頭(炮、去皮膽)、白附子(炮)、硃砂(另研水飛)、防風(去蘆)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。和

勻。每服二錢。不拘時溫酒調下。每日三次。

【白殭蠶散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

藥品 白殭蠶、蟬退、防風、甘草、蒼耳子、白芷、川芎、茯苓、荆芥、厚朴、陳皮、人參、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。豆淋酒調下。

【石膏散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治頭風患眼。

藥品 生石膏、二兩。藁本、生白朮、甘草(炙)、各一兩五錢。白蒺藜(炒、去刺)、一兩。

制法及用法 爲散。每服四五錢。熱茶清調下。空腹臨臥各一服。

【石膏散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治風熱頭痛。

藥品 生石膏(碎)、麻黃(去根節、泡)、各一兩。何首烏(生曬乾)、葛根、各七錢五分。

制法及用法 爲散。每服三錢。加生薑三片。芽茶一撮。清水煎。稍熱服。取微汗效。春夏麻黃量減。不可執一。

【玉真散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治破傷風諸證。

藥品 白芷、南星(薑汁炒)、天麻、羌活、防風、各一兩。白附子、十二兩。

制法及用法 研爲細末。唾津調敷。如破傷風初起。角弓反張。牙關緊急。每用三錢。熱童便調服亦妙。如溼爛不能收口者。用熟石膏二錢。黃丹二分。共研極細。加入敷之。

【玉樞丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治白癰瘰癧。

藥品 苦參、當歸、玄參、荆芥、蒼朮、各八兩。羌活、烏藥、胡麻、藁本、蒼耳子、川芎、獨活、白芷、白蒺藜、防風、大楓肉、甘草、麻黃、紅花、牛蒡子、天麻、白殭蠶、琉璃(煅灰)、海風藤、薄荷、玄胡索、秋石、夏枯草、犀角、旱蓮草、虎骨、血竭、柴胡、蘇木、蟬蛻、各二兩。牛黃、一錢。麝香、二錢。木香、沉香、檀香、乳香、沒藥、仙鱗脾、各一兩五錢。桑螵蛸、葵仁、大黃、桔梗、貝母、烏藥、半夏、各一兩。

制法及用法 共爲末。將粗藥頭煎汁。煮米糊爲丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服一百丸。用黃芩、大黃、羌活、獨活、

防己、防風、連翹、黃蘗、桔梗、荊芥、當歸、山梔、木通、甘草、半夏、紫蘇、薄荷、升麻、川芎、麻黃、烏藥、等味。煎汁送下。或用酒下。朝夕二服。須避風。

【四生丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血風。骨節疼痛。舉臂不起。行履艱難。遍身麻痺。及癰疽日久。纏綿骨痛。

藥品 白殭蠶(炒)、地龍(去土)、生白附子、五靈脂(炒)、生草烏頭(炮、去皮尖)、各等分。

制法及用法 研爲細末。水煮米糊爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。食前溫酒或清茶送下。或研爲末。每服五錢。不拘時溫酒調下。每日二次。

【四神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風。眩暈頭痛。

藥品 菊花、當歸(去蘆)、旋覆花、荊芥穗、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。清水一中盞。加葱白三寸。茶末一錢。煎至七分。通口服。良久。去枕仰臥少時。

【左龍丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治破傷風。牙關緊急。目直視。

藥品 左盤龍(微炒)、白殭蠶(炒)、江蘇膠(蛤粉炒)、各五錢。雄黃、一錢(水飛)。

制法及用法 研爲細末。飯糊爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。溫酒送下。一日三次。如證重不已。每藥末一錢。飯糊中加入巴豆霜五釐。每服中加一丸。如此漸加至十丸。以利爲度。若搐搦不已。宜服羌活湯。

【正舌散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治中風舌強語澀。

藥品 雄黃、荊芥穗、各等分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。豆淋酒調下。

【半夏丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痰證、及驚搐後風涎潮作。

藥品 生半夏、二兩。赤茯苓(去皮)、枳殼(製)、各一兩。風化朴硝、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。生薑自然汁煮糯米粉和丸。如綠豆大。小兒如粟大。每服三十丸。至五十丸。食後臨睡。淡薑湯送下。

【史國公藥酒】

功用 治左癱右瘓。四肢頑麻。骨節痠疼。諸般寒濕風氣。

藥品 虎胥骨(酒浸一日焙乾酥炙)、當歸、龍甲(炙)、羌活、防風(去蘆叉)、草薢、秦艽、牛膝、晚蠶砂、松節(一作杜仲)、各二兩。乾茄根(蒸熟)、八兩。枸杞子、五兩。一方有獨活、蒼耳子。

制法及用法 研爲粗末。絹袋盛之。浸膏粱酒十斤。封十日。濾清。加冰糖一斤。每日飲之。不可間斷。飲時切勿以面向壩口。恐藥氣冲人頭面。飲盡。藥滓曬乾爲末。米糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時溫酒送下。忌食發風動氣之物。

六 筆

【如聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 止血。定痛。治破傷風。

藥品 蒼朮、六兩。川烏(炮、去皮)、兩頭尖(炮)、各四兩。草烏(炮、去皮)、防風、細辛、各二兩五錢。白朮、川芎、白芷、各一兩五錢。蠟梢(微炒)、雄黃、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。不拘時溫酒調下。如損傷折骨。加乳香五錢。

【如聖餅】

發明 見太平惠民和濟局方。

功用 消風。化痰。暖胃。治氣厥。偏正頭痛。

藥品 防風、生半夏、天麻、各五錢。天南星(洗)、川烏頭(炮、去皮尖)、乾薑、各一兩。川芎、甘草(炙)、各二兩。

制法及用法 研爲細末。湯浸蒸餅和丸。如芡實大。捻作餅子。曬乾。每服五餅。同荊芥穗三五莖。細嚼。不拘時茶湯或溫酒白湯送下。

【全蠍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒口眼喎斜。語言不清。

藥品 全蠍(炒)、川芎、黃芩、僵蠶(炒、去絲嘴)、赤芍藥、甘草、硃砂、南星(湯泡、去皮臍、焙)、天麻、各三錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。不拘時生薑湯調下。

【全蠍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療腎臟風發瘡癢。

藥品 全蠍、三枚(焙)。明硫黃、二錢。生虢丹、一錢。輕

粉、五分。雞心檳榔、一大個(破開、好黃丹一錢合內、溼紙裹煨)。麝香、少許。

制法及用法 研爲細末。瓷盒收存。每用少許。麻油調抹兩掌。先以鼻嗅。男以兩掌揅外腎。女以兩掌揅兩乳。各睡至醒。次日依前再用藥。屢效。

【地黃丸】

發明 見宣明論方。

功用 治心腎不交。舌瘡足痹。

藥品 熟地黃、三兩。巴戟(去心、酒浸)、山茱萸(去核)、肉蓯蓉(酒浸、去腐、切焙)、金銀石斛、附子(炮)、白茯苓、石菖蒲、遠志(甘草湯泡、去心)、官桂(炮、一作甜肉桂)、麥門冬(去心)各一兩。五味子、五錢。

制法及用法 上係地黃飲分量。丸量準此酌加。共爲細末。加薄荷少許。用生薑大棗煎湯泛丸。每服三錢。熱湯送下。

參考 方中桂附巴戟。原爲驅逐濁陰痰涎而設。不可輕去。綜觀全方。熟地滋根本之陰。蓯蓉、巴戟、官桂、附子、以返真元之火。石斛安脾而秘氣。山茱溫肝而固精。菖蒲、遠志、茯苓、補心而通腎臟。麥冬、五味、保肺以滋水源。使水

火相交。精氣漸旺。而風火自熄矣。此方不用風藥者。以中風舌瘡不能言。足痿不能行。此少陰氣厥不至。名曰風痺(如癱瘓是)。實非外中於風。良由將息失宜。心火暴甚。腎水虛衰。不能制之。則陰虛火升。熱氣拂鬱。心神昏冒。筋骨不用。而卒倒無知也。亦有因喜怒悲思恐五志過極而卒中者。皆爲熱甚。俗言風者。言末而忘其本也。此症風爲末。火爲本。但火之有餘。由水之不足。乃虛火上炎。不可作實火論。所謂類中風也。法宜清肝氣以益水之源。納腎氣以制火之僭。俾水能涵木。孤陽不升。則心氣通而舌瘡自解矣。惟足痿不能行。尙當加壯筋利節之藥。桂附所以引火歸源。免孤陽發越。水平則風熄。不治風。正所以治風。此與治真中風之用風藥。截然不同。惟水虛而火不虛者。六味地黃丸主之。忌用辛熱之藥與參芪之品。必陰虛而火不歸源。火亦虛者。此方宜之。

【地榆散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治腹風。

藥品 地榆、卷柏、各五錢。

制法及用法 盛砂瓶中。清水煮十餘沸。溫服。

【再造散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治大風惡寒。營血受病。先起於足者。

藥品 鬱金、五錢（如無真者、赤檳榔代之）。大黃（皂莢煎、酒煨）、一兩。大皂角刺（炒）、五錢。白牽牛頭末、六錢（生炒各半）。

制法及用法 爲散。分作五服。五更時無灰酒調下。服後當下惡物。禁食一切厚味發毒動風物。及鹽醬糟醋椒薑膩麵等。

【回生再造丸】

發明 驗方。

功用 治中痰中風。口眼歪斜。手足拘攣。言語不清。左癱右瘓。筋骨疼痛。半身不遂。步履艱難。

藥品 水安息、四兩。人參、二兩。蕲蛇（小者爲佳、去骨並頭尾三寸、酒浸炙、取淨末）、四兩。當歸、川芎、川連、羌活、防風、玄參（以上酒炒）、麝香、白芷、茯苓、麻黃、天麻、川葶藶、片子薑黃（以上炒）、甘草（炙）、肉桂（研、不見火）、白豆蔻仁（研、不見火）、何首烏（料豆水拌、蒸九次）、西琥珀（研）、黃耆

（蜜炙）、大黃（酒蒸）、草豆蔻仁（研）、雄鼠糞、熟地、各二兩。穿山甲（前後四足、各用五錢、麻油浸炙）、二兩。全蠍（去頭尾足）、威靈仙（酒炒）、葛根（炒）、桑寄生（烘乾）、各二兩五錢。剉辛、赤芍（炒）、烏藥（酒炒）、青皮（麵炒）、於朮（土炒）、廬蠶（洗炒）、乳香（去油）、沒藥、辰砂、骨碎補（酒炒）、香附（去皮毛、酒炒）、天竺黃、製附片、生龜板（火炙熬過者不用）、沉香、母丁香、膽星、各一兩。紅花（酒浸烘乾）、犀角尖、各八錢。厚朴、地龍（炙乾）、松香（養九次）、各五錢。廣木香、四錢（不見火）。梅花冰片、犀牛黃、各二錢五分。血竭、八分。虎脛骨、一對（炙酥）。

制法及用法 共爲末。煉蜜和勻。搗數千槌爲丸。每丸重一錢。金箔爲衣。蠟殼封固。每服一丸。生薑湯送下。孕婦忌服。

參考 人參回生再造丸。其藥品及功用完全與此方相同。

【至寶丹】

發明 太平惠民和劑局方。

功用 治中風卒倒。中惡氣絕。痰飲不語。神魄恍惚。頭目昏眩。眠睡不安。唇口乾燥。傷寒譫語。心肺積熱。伏

熱嘔吐。邪氣攻心。大腸風秘。血氣不通。寒熱交錯。暗風。中熱。疫毒。山嵐瘴毒。陰陽二毒。水毒。蟲毒。中一切物毒。婦人難產悶亂。胎死不下。產後血暈。口鼻出血。惡血攻心。煩躁。氣喘。吐逆。小兒諸癰。急驚心熱。卒中客忤。煩躁不眠。風涎搐搦。

藥品 生烏犀角(鎊)、硃砂(研、水飛)、雄黃(研、水飛)、生玳瑁(鎊)、琥珀(勿見火研)、各一兩。麝香(研、一作五錢)、龍腦(研)、各一錢(一作各一錢五分、一作各二錢五分)。金箔(半入藥、半爲衣)、銀箔(研、一作三十片)、各五十片。西牛黃(研)、五錢。安息香、一兩五錢(爲末、以無灰酒搜澄、飛過、瀉去砂土、約取淨一兩、微火熬成膏、如無、以蘇合香油代之)。一方無雄黃、龍腦、金銀箔。一方加人參、天竺黃、各一兩。天南星(水煮軟、切片)、五錢。一方加天南星、二錢五分。人參、六錢。龍齒(煨)、二錢。

制法及用法 將生犀、玳瑁、研爲細末。入餘藥令勻。以安息香膏重湯煮烱。入諸藥中。和搜成劑。盛於不津器中。並旋丸如梧桐子大。分作百丸。如乾。入熟蜜少許。用蠟護

之。每服三丸至五丸。小兒二歲。每服二丸。並人參湯、或溫湯送下。日二三服。卒中山嵐瘴氣。及產後惡血攻心。用童便一合。生薑自然汁三五滴。入童便內。溫過化下。

參考 此治心臟神昏從表透裏之方。即藥肆中所謂清心至寶丹或犀黃至寶丹也。黃犀琥珀。以有靈之物。內通心竅。雄硃二箔。以重墜之品。安鎮心神。佐以麝香安息。搜剔幽隱諸竅。故熱入心包絡。舌絳神昏者。以此丹入寒涼藥中用之。有祛陰起陽。立展神明之效。若病因頭痛而即神昏不語者。此肝虛魂升於頂。當用牡蠣救逆以降之。又非此丹之所宜也。

七 筆

【防己散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠中風。口眼喎斜。手足頑痺。

藥品 防己(去皮)、羌活(去蘆)、防風(去蘆)、麻黃(去節)、黃松木節、羚羊角屑、各一兩。桂心、荊芥穗、薏苡仁、甘草(炙)、桑寄生、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服五錢。酒水一中盞半。加生薑五

片。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。

【防風丸】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治風入胞門。崩漏下血。色清淡者。

藥品 防風(勿見火)。

制法及用法 研爲末。米醋和丸。如梧桐子大。每服二錢五分。空腹時葱白湯送下。

【防風丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治一切風及痰熱上攻。頭痛惡心。項背拘急。目眩心怔。手足無力。骨節疼痛。言語蹇澀。口眼喎動。神思恍惚。痰涎壅塞。昏憤健忘。虛煩少睡。

藥品 防風(洗)、川芎、天麻(去苗、酒浸一宿)、甘草(炙)、各二兩。硃砂、五錢(研、水飛)。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。每兩作十丸。硃砂爲衣。每服一丸。不拘時荊芥湯化下。茶酒嚼下亦得。

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝風。筋脈拘攣。四肢疼痛。心膈痰壅。不思飲食。

藥品 防風(去蘆)、麻黃(去

節)、赤茯苓(去皮)、麥門冬(去心)、薏苡仁、牛膝(酒浸)、羚羊角屑、犀角屑、各一兩。半夏(湯洗、七次)、白朮(去蘆)、芍藥、人參(去蘆)、當歸(去蘆)、大黃、甘草(炙)、各五錢。杏仁(麸炒、去皮尖)、七錢五分。

制法及用法 咬咀。每服五錢。用清水一中盞。加生薑五片。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾臟中風。手足緩弱。舌強語澀。胸膈煩悶。志意恍惚。身體沉重者。

藥品 防風(去蘆)、麻黃(去節)、人參(去蘆)、川芎、附子(炮、去皮臍)、桂心、黃耆(去蘆)、赤茯苓(去皮)、酸棗仁、白朮、獨活(去蘆)、桑白皮(剉)、羚羊角屑、各七錢五分。甘草(炙)、五錢。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一中盞。加生薑五片。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風虛勞。筋脈拘攣。腰膝疼痛者。

藥品 防風(去蘆)、五加皮、草薢(酒浸)、薏苡仁、海桐皮、枳殼(去瓢麩炒)、赤芍藥、桂心、熟乾地黃、黃耆(去蘆)、杜仲(鑿去絲)、牛膝(酒浸)、各一兩。續斷、鼠黏子、羚羊角屑、各七錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒調下。每日三四次。忌食生冷油膩滑魚肉。

【防風散】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治風痞癰。

藥品 防風(去蘆)、杏仁(麩炒、另研爲泥)、白廬蠶(炒)、各二兩。甘草(炙)、一兩。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。空腹時蜜水或溫酒調下。每日二次。

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風。言語蹇澀。四肢拘急。身體壯熱。頭疼目眩。心胸不利。

藥品 防風(去蘆)、一兩。石膏、二兩五錢。麻黃(去節)、漢防己(去皮)、各七錢五分。細辛(去苗)、黃芩、川升麻、當歸(去蘆)、桂心、芎藭、赤茯苓(去皮)、甘草(炙)、羌活(去蘆)、各五錢。

制法及用法 研爲粗散。每

服八錢。清水一中盞半。煎至一大盞。去滓。加淡竹瀝一合。更煎一二沸。不拘時溫服。

【芎藭散】

功用 治小兒腦受風冷。鼻內多涕。精神昏悶。

藥品 芎藭、五錢。甘菊花、白朮、防風、人參、細辛、白茯苓、甘草(炙)、各一分。

制法及用法 搗羅爲散。每服一錢。清水一盞。加生薑少許。煎至五分。去滓溫服。

【芎藭散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治頭風眩暈。目昏痛。體倦心忪。

藥品 芎藭、前胡、白廬蠶(炒)、人參、各一兩。蔓荊子、天麻(酒浸焙)、防風(去叉)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後溫酒調下。

【芎藭散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人卒中風。四肢不仁。善笑不息。

藥品 芎藭、一兩五錢。石膏、二兩五錢。當歸(去蘆炒)、麻黃(去節)、秦艽(去蘆)、乾薑(炮)、桂心、各一兩。杏仁、二十枚(麩炒)。黃芩、一兩。

制法及用法 研爲細末。每

服八錢。清水一中盞半。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。日二三次。

【何首烏丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺風、鼻赤、面赤。

藥品 何首烏、一兩五錢。防風、黑豆(去皮)、荊芥、地骨皮(洗)、各一兩。桑白皮、天仙藤、苦參、赤土、各五錢。一方有蘇木一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三四十丸。食後茶清送下。

【何首烏散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治脾肺風毒攻腫。延成癰瘡。甚至肩背拘急。手足皸裂。肌肉頑癢。及紫癰、白癰、頑麻等風。

藥品 何首烏、荊芥穗、蔓荊子、威靈仙、甘草(炙)、防風、蛇蛻草、各等分。

制法及用法 搗細末。每服一錢。食後溫酒或沸湯調下。

【豆淋酒】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治因金瘡中風反強者。

藥品 大豆、六合、雞矢白、一合。

制法及用法 炒令大豆焦

黑。次入雞矢白同炒。乘熱傾於三升酒中。密蓋良久。濾去滓。每服五合。如人行五里。更一服。汗出佳。未瘳即更作服之。汗出爲度。服後宜食熱生薑粥。

【走馬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風口噤。四肢強直。

藥品 附子(炮、去皮臍)、天麻、各五錢。桂心、石膏(研如麵)、麻黃(去節)、川烏頭(炮、去皮臍)、天南星(炮)、蠍梢、各二錢五分。麝香(另細研)、五分。

制法及用法 研爲細末。入麝香末和勻。每服二錢。不拘時豆淋酒調下。口噤幹閉灌之。

【沒藥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風冷搏於肺臟。上攻鼻痛者。

藥品 沒藥、乾蠍(去土、炒)、天南星(炮)、白附子(炮)、雄黃(另研)、當歸(焙)、丹砂(另研)、胡黃連、牛黃(另研)、麝香(另研)、白芷、官桂(去皮)、丁香、甘草(炙)、各二錢五分。烏蛇(酒浸、去皮骨、炙)、五錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服五分。溫酒調下。早晚二次。

【沒藥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治遍身百節風虛勞冷。麻痺困弱。走注疼痛。

藥品 沒藥、二兩(另研)。虎骨、四錢(醋炙)。

制法及用法 研爲細末。每服三五錢。不拘時溫酒調下。一日二次。

【阜角丸】

發明 見危亦林世醫得效方。

功用 治腸中有風、大便秘澀。

藥品 豬牙皂角、厚枳殼(去蘊)、羌活、桑白皮、檳榔、杏仁(製、另研)、麻仁(另研)、防風、川白芷、陳皮(去白)、各等分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三五十丸。溫白湯或蜜湯送下。有熱加大黃。

八 筆

【虎骨酒】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 去風。補血。益氣。

壯筋骨。強脚力。

藥品 虎脛骨、草薢、仙靈脾、薏苡仁、牛膝、熟地黃、各二兩。

制法及用法 細剉。絹袋盛。浸酒二斗。飲取一盞。復入一盞。可得百日。婦人去牛膝。

【虎骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治皮膚走注疼痛。麻木困弱。

藥品 虎骨、四兩(醋炙)。五靈脂(炒)、白殭蠶(炒)、地龍(去土炒)、白膠香(另研)、威靈仙、各一兩。川烏頭、二兩(炮、去皮臍、一作一兩五錢)。胡桃肉、二兩五錢(去內皮、搗研如泥)。一方無地龍、胡桃肉。

制法及用法 研爲細末。令勻。酒煮麵糊和丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。空腹時溫酒送下。一日二次。婦人當歸酒送下。打撲損傷。豆淋酒送下。老幼加減服之。

【虎骨散】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治腰膝連脚膝痛。

藥品 虎脛骨(酥炙)、敗龜板(酥炙)、當歸、川草薢、牛膝、各二兩。川芎、桂心、羌活、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每

服二錢或四錢。空腹時溫酒調下。亦可煉蜜爲丸。溫酒送下。

【虎骨散】

發明 見陳履新簡易方。

功用 潤筋。去風。治半身不遂。肌肉乾瘦。

藥品 虎骨、赤芍藥、續斷、白朮、蜜本、各一兩。當歸、二兩。烏蛇肉、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後溫酒調下。骨中煩疼。加生地黃一兩。感寒自利。加天雄五錢。

【虎骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風濕走注疼痛。

藥品 虎脛骨(醋炙)、敗龜板(醋炙)、各二兩。麒麟竭(另研)、沒藥(另研)、自然銅(醋炙)、赤芍藥(去蘆)、當歸(去蘆)、蒼耳子(炒)、骨碎補(去毛)、防風(去蘆)、各七錢五分。牛膝(酒浸)、天麻、檳榔、五加皮、羌活(去蘆)、各一兩。白附子(炮)、桂心、白芷、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。

【虎骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風。身體骨節疼痛。

藥品 虎脛骨、一兩五錢(酥

炙)。麝香、二錢五分(另研)。桂心、川芎、海桐皮、當歸(去蘆)、牛膝(酒浸)、天麻、附子(炮、去皮臍)、骨碎補、沒藥(另研)、琥珀(另研)、各一兩。羌活(去蘆)、木香、各五錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服二錢。不拘時溫酒調下。一日二次。

【虎骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風。走注疼痛者。

藥品 虎脛骨、二兩(酥炙)。乾蠍(炒)、琥珀(另研)、各五錢。當歸(炒)、威靈仙、牛膝(酒浸)、羌活(去蘆)、桂心、各一兩。漏蘆(去蘆)、芎藭、沒藥(另研)、各七錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。一日二次。

【虎骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡風痙。肢節筋脈拘急。

藥品 虎脛骨(酥炙)、敗龜板(酥炙)、當歸(微炒)、乾蠍(微炒)、桃仁(去皮尖、雙仁、微炒)、芎藭、各一兩。黑豆、五合。松脂、二兩。桂心、三分。

制法及用法 先將松脂、黑

豆。炒令熟。後和諸藥。搗爲末。每服二錢。不拘時溫酒調下。

【虎骨散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治白虎歷節走痛。

藥品 虎骨、二兩。白花蛇肉、天麻、防風、牛膝、白僵蠶、當歸(酒製)、乳香、肉桂、各一兩。甘草(炙)、全蠍、各五錢。麝香、一錢。一方加自然銅、白附子、羌活、檳榔、川芎、白芷、各一兩。地龍、沒藥、雄黃、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒調下。豆淋酒尤妙。

【虎骨膠】

功用 補益氣血。壯健筋骨。治筋骨受風。不能屈伸等症。即虎骨熬成之膠也。

【虎骨木瓜丸】

功用 治溼傷經絡。或房事飲酒無度。以致肝腎虛虧。腰腿疼痛。脚膝拘攣。筋骨無力。步履艱難。或熱痛如火。或冷痛如冰。

藥品 虎骨(炙)、木瓜、楓樹葉、龜板(炙)、當歸、自然銅、血竭、桂心、乳香、沒藥、毛茛、安息香、廣木香、甜瓜子、地龍(去土)、各一兩。

制法及用法 共爲末。酒糊和丸。每服二三錢。空腹時熟湯或溫酒送下。忌火酒房事。

【虎骨木瓜酒】

功用 追風。定痛。除溼。驅寒。壯筋。強骨。調和氣血。治風寒溼氣。流入經絡。筋脈拘攣。骨節痠痛。四肢麻木。目眼歪斜。山嵐瘴氣。展節風痛。

藥品 虎骨(酥炙)、一兩。木瓜、三兩。川芎、川牛膝、當歸、天麻、五加皮、紅花、川續斷、白茄根、各一兩。玉竹、二兩。秦艽、防風、各五錢。桑枝、四兩。一方有羌活、獨活、千年健、山梔、陳皮。無天麻、防風、續斷、白茄根。

制法及用法 研爲細末。絹袋盛。浸好藥酒二十斤。浸七日。濾清。加冰糖二斤。任量飲之。

【定痛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風虛走注痛。

藥品 威靈仙、木鼈子(去殼)、川烏(炮、去皮臍)、防風(去蘆)、白芷、五靈脂、地龍(去土炒)、各五錢。水蛭(糯米炒熟)、礞砂(水飛)、各三錢。

制法及用法 研爲細末。酒煮麪糊和丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服十丸。空腹時溫

酒送下。婦人紅花酒送下。常服輕身、壯骨。

【定痛丸】

發明 見沈金鑒沈氏尊生書。

功用 治風邪入絡。

藥品 乾蠍、七錢五分。

制法及用法 焙爲末。以酒及蜜便各三升。煎如稠膏丸。每服二十丸。溫酒送下。

【羌活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風。筋脈拘急。肢節痠疼。言語蹇澀。頭目不利。

藥品 羌活(去蘆)、天麻、各一兩。芎藭、酸棗仁(微炒)、各七錢五分。蔓荊子、白附子(炮)、柏子仁、牛膝(酒浸)、桂心、薏苡仁、當歸(去蘆炒)、羚羊角屑、烏蛇肉(酒拌炒令黃)、蟬蛻(炒)、各五錢。麝香(另研)、一錢五分。

制法及用法 研爲細末。入麝香和勻。每服一錢。豆淋酒不拘時調下。

【羌活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚搐。

藥品 羌活、一錢二分。獨活、荊芥、各八分。前胡、防風、各一錢。柴胡、白芷、蟬蛻、甘

草、各四分。細辛、一分。

制法及用法 加薄荷、三葉。清水一鍾。煎至五分。不拘時服。發搐及熱盛不退者暫服。煎熟用製砂調下。治搐如神。

【附子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風。

藥品 附子(炮、去皮臍)、細辛、各七錢五分。當歸(去蘆炒)、芎藭、前胡(去蘆)、枳殼(麸炒、去瓤)、黃芩、白鮮皮、茯神(去木)、羌活(去蘆)、杏仁(麸炒)、漢防己(去皮)、甘草(炙)、麻黃(去節)、桂心、各一兩。

制法及用法 研爲粗末。每服五錢。清水一盞半。加生薑五片。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。

【附子散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治中風手臂不仁。口面喎僻。

藥品 麻黃附子細辛湯加乾薑、桂心、人參、防風、芎藭、羚羊角。

制法及用法 爲散。清水煎。加竹瀝服。一劑可效。

【附桂膏】

發明 驗方。

功用 治感受風溼。手足麻木。筋骨疼痛。及肚腹畏寒者。

藥品 生大附子(切片)、肉桂(研極細末)、各八兩。麻油、三斤。柏枝尖、松毛心、各五斤。黃丹、鉛粉、各十兩。

制法及用法 先將麻油入鍋燒滾。下柏枝、松毛、附子。次第入油鍋熬枯。去渣。下肉桂末。再熬。下黃丹、鉛粉。不住手攪動。至滴水成珠。入瓦器內。浸水中。拔去火毒。用布攤貼。肚腹畏寒者貼肚臍。用大張連臍眼貼。並貼背後腎俞穴(屬足太陽膀胱經、在十四椎下兩旁去脊各一寸五分、前與臍平)。其餘筋骨麻木痠疼。俱貼患處。

【乳香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瀉風。

藥品 乳香、二十兩。苦參(肥好者、去蘆剉)、四兩。

制法及用法 先以好酒五升。浸苦參於瓶內。以重湯煮一伏時。常用文武火慢熬。令小沸爲候。一伏時取出。濾去渣。將酒浸乳香於銀沙石器內。煎如餿。入天麻末、四兩。大麻仁(另研如膏)、二兩。入於乳香膏內。攪勻。慢火熬之。丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹及晚食前大麻仁酒送下。

九 筆

【急風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治偏正頭風。夾腦風。太陽穴痛。坐臥不安。

藥品 生川烏頭(去皮臍)、辰砂、各一錢。生天南星、二兩。

制法及用法 研爲細末。酒調塗痛處。小兒貼額門。

【急風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸瘡。破傷風。

藥品 麝香(另研)、五分。硃砂、一兩。生黑豆、二錢五分。草烏頭、三兩五錢(燒存性)。

制法及用法 研爲細末。和勻。破傷風每服一錢。不拘時溫酒調下。如出箭頭。先用酒調一錢。就將此藥貼上。

【急風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風病。

藥品 蛇蛻皮(微炒)、鈎藤、乾蟻梢、各一分。硃砂、一分(細研水飛)。麝香、牛黃、各五分。

制法及用法 研爲細末。每服一字。取竹瀝、一兩。同乳汁調下。

【苦參丸】

發明 見顧世澄醫大全。

功用 治諸風。

藥品 苦參、六兩。白蒺藜、防風、各三兩。牛蒡子、胡麻、當歸、蕪蛇、荑荊子、各一兩。

制法及用法 共爲末。大楓子肉三兩(去油)。同飯糊丸。如梧桐子大。每服三十丸。熱酒送下。

【苦參散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺癰久積風毒。或白癰風。

藥品 苦參(去蘆)、三兩。松脂、附子(去皮鹽)、泥子仁、木蘭皮、露蜂房、各一兩。烏蛇、二兩(酒浸)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。

【封臍散】

發明 見張煥方。

功用 治臍風。

藥品 當歸、五錢(洗焙)。天漿子、三個(微炒)。亂髮、一錢(燒灰存性)。

制法及用法 搗羅爲細末。加麝香一字。拌勻。每用一字至五分。敷臍中。時時用之。

【封臍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

藥品 亂髮灰、亂髮灰、白薑灰、紅布灰、南星、白蘞、當歸

頭、赤小豆、五倍子、血竭、龍骨、赤石脂(煨)、海螵蛸、百草霜、膽脂、各五分。

制法及用法 研爲極細末。溼則乾敷。乾用清油塗。忌生水浴。

【保命丸】

發明 見顧世澄醫大全。

功用 治大麻風。

藥品 苦參、十斤。胡麻、當歸、防風、蕪荑、白蒺藜、各五斤。大風子、薔薇葉、土木鱉、荊芥、各二斤。胡黃連、銀柴胡、各十二兩。

制法及用法 研爲末。水泛丸。細茶送下。一日四次。約二合。輕者不過七八升。重者一斗五升。再重者二三斗可愈。
 ①春加連翹、二斤。夏加黃連、二斤。薄荷、一斤。秋加白朮、一斤。蒼朮、二斤。冬加烏藥、二斤。
 ②眉髮脫落。遍身發瘡。癰滿頭面。有蠅蟲瘻者。此肺家受毒。加黃芩、十兩。
 ③面起紫泡。身如紫雲染。四肢先見者。乃肝屬木而有此瘡也。春二三月。秋九十月。各發一次者。此肝經受毒。加山梔、連翹、各一斤。
 ④遍身浮腫。加乳香(去油)、沒藥(去油)、各四兩。
 ⑤遍身起紫塊。手足拳攣。口眼歪斜者。此腎經受毒。加

破故紙、十兩。④身發多瘡。或生溼毒。通身如蛇皮。或破流血水者。是脾經受毒。加白朮、十兩。⑤手足破傷麻木。通身發紫塊。白皰瘡。滿身肉痛者。此胃經受毒。加厚朴、十兩。⑥腳底先穿。眼淚如珠流者。通身骨節刺痛。發血瓣如桃花染者。此心經受毒。加黃連、山梔、各一斤。⑦骨節疼痛。加虎骨、三斤。⑧五臟受風者。加川續斷、何首烏、威靈仙、各八兩。⑨五臟受病。則藏於內。不發於外。多生冷疾。手足如癱瘓軟狀者。加蒼朮、黃蘗、各八兩。甘草、四兩。⑩六腑受病。如紫雲塊。似核桃樣。多內熱兩鼻出血。筋脈弛長。四肢無力。行步艱難。加威靈仙、川續斷、各八兩。何首烏、一斤。⑪人生此患。各受一經。兼二經三經者。此方萬無一失。若六經通遍。五臟先露凶者不救。

【胡麻丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治紫白癰風。

藥品 大胡麻、四兩。苦參、防風、石菖蒲、威靈仙、各二兩。白附子、獨活、各一兩。生甘草、五錢。

制法及用法 研爲細末。白

酒漿和丸。如綠豆大。每服二錢。形瘦者一錢五分。食後溫臥白滾水送下。

【紅綿散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒風熱。頭目不清。

藥品 白僵蠶(炒)、二兩。生天麻、一兩。天南星(切薄片、油浸黃)、二兩。蘇木節(另研)、二兩五錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。清水一鍾。加紅綿少許。煎至六分。溫服。傷寒有表證發熱者。每服加麻黃(去節研末)五釐。有裏熱心煩口渴者。加滑石末五分。

【宣風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治初生小兒。因斷臍後外傷風溼。唇青口撮。多啼不乳。口出白沫者。

藥品 全蠍、二十一個(顯尾全、去毒、用無灰酒少許、塗炙)。麝香(另研)、一小字。

制法及用法 研爲極細末。每服半字。食遠含銀煎湯或麥門冬(去心)、煎湯調下。

【活絡丹】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治寒溼襲經絡作痛。

肢體不能屈伸。及跌打損傷。瘀血停滯。

藥品 川烏頭(炮、去皮臍)、草烏頭(炮、去皮臍)、地龍(去土另研、一作三兩二錢)、天南星(炮、一作牛膽製)、各六兩。乳香(另研)、沒藥(酒研飛、澄定曬乾)、各二兩二錢(一作各三兩三錢)。

制法及用法 研爲末。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。乾透蠟護。每服二三十丸。剖開。空腹、日午、冷酒或荊芥湯、或四物湯化下。痛處色紅腫者勿用。

參考 本方亦名小活絡丹。

【南星散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風。牙關緊急。四肢強直。

藥品 生天南星(薑製)、麻黃、半夏(湯洗七次、薑製)、赤箭、各五錢。川烏頭(炮、去皮臍)、桂心、生蠟梢、各二錢五分。麝香、五分(另研)。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服一錢。不拘時豆淋酒調下。一日二次。

十 筆

【扶神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心臟中風。精神不安。語澀昏悶。四肢沈重。

藥品 伏神(去木)、羌活(去蘆)、麻黃(去根節)、龍齒(另研)、各一兩。赤芍藥、甘草(炙)、各五錢。蔓荊子、薏苡仁、麥門冬(焙去心、一作一兩)、人參(去蘆)、防風、遠志(去心)、犀角屑、各七錢五分。

制法及用法 咬咀。每服三四錢。清水一盞半。加生薑四五片。煎至一盞。去滓。不拘時溫服。

【扶神散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治中風舌強語澀。

藥品 伏神木(炒)、一兩。薄荷(焙)、二兩。蠟梢(去毒)、五錢。

制法及用法 研爲末。每服一二錢。溫酒調下。

【追風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒感冒發熱。手足拘攣。

藥品 梨蘆、雄黃、川芎、石菖蒲、全蠍、白芷、藿香、鵝不食草(如無、用片腦少許)、薄荷、苦丁香、各等分。麝香、少許。

制法及用法 研爲細末。每用少許。吹入鼻中。

【追風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癘風。

藥品 錦紋大黃、六兩。皂角刺、一兩五錢。川鬱金、一兩八錢(炒)。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。用好真小油入無灰酒調藥末。量虛實加減服之。取下蟲。多年者色黑。日近者色赤。隔二三日再服。直候無蟲方寢。即止其藥。後祇服平常風藥及諸補藥。下藥切不可許病人知。恐蟲藏匿。則病難愈。六十日內。戒絕葷腥房事。屏除嗔忿雜念。心意空虛。外邪不犯。自可有效。一方共研細末。每服五六錢。加大風子油、一錢五分。朴硝、一錢。五更空腹時溫酒調下。直待晨時。又如前調藥。加熱蜜少許服之。以蜜解口。切不可臥。良久。痛瀉數次不妨。以稀粥補之。如第一日服消風散。第二日即服此藥。第三日服磨風丸。周而復始。又如此服之。瘦弱者。十日內祇用一服。老弱者勿服。

【追風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治偏正頭疼。肝臟久虛。血氣衰弱。或風毒上攻。頭痛頭眩目暈。心怯煩熱。百節痠疼。腦昏目痛。鼻塞聲重。項

背拘急。皮膚瘙癢。面上游風。狀若蟲行。及一切頭風。婦人血風攻注。頭目昏痛等證。常服消風。化痰。清頭目。利咽喉。

藥品 川烏頭(炮、去皮尖臍)、防風(去蘆)、石膏(煨)、川芎、粉甘草(炙)、荆芥穗、白殭蠶(炒去絲)、各一兩。天南星(炮)、羌活、天麻、地龍、白附子(炮)、全蠍(去尾鉞)、白芷、各五錢。草烏頭(炮、去皮尖臍)、沒藥(另研)、乳香(另研)、雄黃(另研)、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服五分。入好茶少許同調。食後及臨臥時服。

【消風散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治諸風上攻頭目昏痛。項背拘急。目眩肢痛。鼻塞多嚏。咳嗽。遍身疥癩。皮膚頑癢。瘡疥癰疹。及妊娠眼昏眩暈。小兒虛風。胎熱胎寒。瘡疹餘熱。

藥品 荆芥穗、甘草(炙)、各一錢。人參、白茯苓、白殭蠶(炒)、川芎、防風(去蘆)、藜蘆葉、羌活、蟬蛻(去毒)、各五分。陳皮(去白)、厚朴(薑製)、各三分。一方無人參。一方無川芎。

制法及用法 研末。每服二

三錢。茶清或薄荷湯調下。或加細茶葉二分。清水煎服。小兒驚風。乳香荊芥湯下。久病頭風日翳者。每日三服。

參考 此方妙用。全在厚朴、人參。當知肌表之疾。無不由胃而發。故用厚朴清理其內。即以人參助諸風藥。消解風熱於外。則羌、防、荊芥等。方始得力耳。

【消風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠肝熱上攻。胸膈鬱壅。頭眩目暈。或腮項腫核。

藥品 石膏(煨)、防風(去蘆)、川羌活(去蘆)、甘菊花(去枝梗)、川芎、羚羊角(鎊)、當歸(酒浸去蘆)、大豆黃卷(炒)、荊芥穗、白芷、各一錢。甘草(炙)、五分。

制法及用法 清水二鍾。加芽茶五分。煎至一鍾。食遠服。或研爲細末。每服三錢。食後細茶湯調下。

【消風散】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治鈕扣風。及身癢。

藥品 荊芥、防風、當歸、生地黃、苦參、蒼朮(炒)、蟬蛻、胡麻仁、牛蒡子(炒研)、生知母、石膏(煨)、各一錢。生甘草、木

通、各五分。

制法及用法 清水二鍾。煎至八分。食遠服。

【消風散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治脾熱風溼。

藥品 茯苓、蟬退、川芎、蠶繻、人參、藿香、防風、荊芥、甘草。

制法及用法 茶酒各半煎服。

【消風散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治癰風。

藥品 白芷、全蠍、人參、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。先一日勿食晚飯。次日空腹時溫酒調下。身上微躁爲效。

【荊芥散】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治風熱。皮膚瘙癢。生瘡癰。

藥品 荊芥、赤茯苓(去皮)、苦參(去蘆)、各一兩。蔓荊子、明天麻、人參(去蘆)、防風(去蘆)、獨活(去蘆)、枳殼(銹炒)、各五錢。牛蒡子(炒)、黃芩、各七錢五分。烏蛇肉(酒浸)、二

兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。

【荆芥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺風皰瘡。

藥品 荆芥穗、四兩。杏仁(去皮尖)、防風、蒺藜(炒去刺)、白殭蠶(炒)、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後茶清調下。

【荆芥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風熱蘊結皮膚中。

藥品 防風、天花粉、羌活、生地黃、當歸、蟬蛻、各等分。

制法及用法 清水煎服。

【荆芥散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治頭風。

藥品 荆芥、石膏(煨存性)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。加生薑三片。葱白(和鬚)三寸。清水一盞。煎至七分。食後熱服。

【烏蛇丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風。角弓反張。或身體強直。牙關緊急。

藥品 烏蛇肉(酒浸)、犀角、白附子(炮)、天麻、各一兩。半夏(湯洗七遍、生薑製)、天南星(炮)、麻黃(去節)、獨活(去蘆)、白殭蠶(炒)、晚蠶沙(炒)、乾蠍(微炒)、桂心、各五錢。麝香、二錢五分(另細研)。

制法及用法 研爲細末。入麝和勻。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時豆淋酒送下。一日二次。

【烏蛇散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘰癧風。斑駁如白癰。

藥品 烏蛇、三兩(酒浸)。犀角屑、一兩。防風(去蘆)、羌活(去蘆)、黃芩(去蘆)、苦參(去蘆)、各二兩。人參(去蘆)、丹參(去蘆)、玄參(去蘆)、沙參(去蘆)、桂心、秦艽(去蘆土)、川芎、梔子仁、白鮮皮、川升麻、通草、白蒺藜、枳殼(麩炒、去麩)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食遠溫酒調下。忌鷄豬魚蒜麵食熱物之類。

【烏蛇散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風口噤。

藥品 烏蛇肉(酒浸)、乾蠍(炒)、白殭蠶(炒)、天南星

(炮)、天麻、各五錢。膩粉、五分(另研)。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服二錢。生薑酒調。幹開口灌之。

【神效膏】

發明 見劉元賓神巧萬全。

功用 治風毒走注疼痛。上下不定。

藥品 牛皮膠、一兩(水溶成膏、一作牛膝二兩、酒煮研爲膏)。芸薹子、安息香(酒煮爲膏)、生川椒、生附子、各五錢。

制法及用法 研爲細末。入膠中和成膏。調勻紙攤。隨痛處貼之。

【神應養真丹】

發明 見劉河間方。

功用 治氣傷肝經。左癱右瘓。涎潮昏塞。半身不遂。手足頑痹。脚膝無力。語言蹇澀。頭旋目眩。牙關緊急。氣喘自汗。心神恍惚。氣血凝滯。遍身疼痛。婦人產後中風。角弓反張。跌打損傷等症。

藥品 當歸(酒浸去蘆)、熟地黃、天麻、川芎、羌活、白芍藥、各等分。一方無羌活。加木瓜、阿膠。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸(一作當歸、地黃、酒蒸枳實、和蜜爲丸)。如彈子大。

每服一丸。空腹時木瓜、菟絲子酒煎送下(一方以木瓜菟絲子加入藥品中丸。用溫酒或鹽湯送下)。中風。溫酒或米飲下。脚痹。薏苡仁煎酒下。

【祛風丸】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 寬中。祛痰。搜風。理氣。和血。駐顏。延年。益壽。理痰飲聚於胸膈。或嘔逆涎流。或一臂麻木。或頭目昏眩。或腰脚疼痛。或左癱右瘓。或厥然仆地者。

藥品 半夏麴、荊芥、各四兩。槐角子(炒)、白礬、橘紅、礞砂、各一兩。

制法及用法 研爲末。生薑汁煮米糊和丸。每服五六十丸。生薑、皂角子仁、煎湯送下。一日三次。

【祛風至寶丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書方。

功用 治風中臟昏冒及風熱。

藥品 滑石、一兩五錢。川芎、當歸、各一兩二錢五分。甘草、一兩。白芍藥、防風、各七錢五分。白朮、六錢五分。石膏、黃芩、桔梗、熟地黃、天麻、人參、羌活、獨活、各五錢。梔子、三錢。連翹、荊芥、薄荷、麻

黃、大黃、芒硝、川連、黃蘗、細辛、全蠍、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。細嚼。茶湯或溫酒送下。

參考 喻嘉言謂此爲中風門中不易之專方。

【茶調散】

發明 見孫一奎赤水玄珠。

功用 治風熱上攻。頭目昏痛。及頭風熱痛不可忍。

藥品 片芩、二兩(酒拌炒三次、不可令焦)。小川芎、一兩。細芽茶、三錢。白芷、五錢。薄荷、二錢。荊芥穗、四錢。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。茶清調下。如頭巔及腦痛。加細辛、藁本、蔓荊子、各三錢。

【茵陳酒】

功用 治風疾筋骨攣急。

藥品 茵陳(炙黃)、一斤。秫米、一石。麴、三斤。

制法及用法 如常法釀酒飲之。

【鬼箭羽散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風瘙癢疹。

藥品 鬼箭羽、白蒺藜、防風(去蘆)、白蘇、甘草(炙)、枯白礬、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每

服二錢。不拘時熱湯調下。但先用粟米粉五合。摻於身上。然後服藥。甚效。

十一筆

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切頭眩。

藥品 羚羊角、茯神、各二錢五分。芍藥、防風、白芷、甘草、半夏(湯洗)、各五錢。枳殼、附子、各二錢五分。

制法及用法 研爲粗末。每服四錢。清水一鍾。加生薑五片。慢火煎至七分。溫服。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝風。筋脈拘攣。四肢疼痛。

藥品 羚羊角屑、一兩。甘草(炙)、梔子仁、各五錢。川升麻、防風(去蘆)、酸棗仁、桑白皮、羌活(去蘆)、各七錢五分。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一中盞。加生薑五片。煎至六分。去滓。不拘時溫服。忌食熱麵、豬肉、大蒜。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風癢疹遍身癢痛。心胸滿悶。

藥品 羚羊角屑、白蘚皮、白

桑螵(去蘆)、麻黃(去蘆)、甘草(炙)、羌活(去蘆)、防風、各一兩。枳殼(去瓤、麸炒)、五錢。人參(去蘆)、苦杏仁(去皮尖、麸炒)、黃芩、各七錢五分。

制法及用法 咬咀。每服四錢。加生乾地黄。清水一中盞。煎至五分。去滓。入酒一合。更煎一兩沸。溫服。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風熱。皮膚生瘡癩癢痛。

藥品 羚羊角屑、烏蛇肉(酒浸)、川大黃、玄參(去蘆)、各一兩。枳殼(去瓤、麸炒)、白蒺藜、甘草(炙)、各五錢。秦艽(去蘆土)、防風(去蘆)、各七錢五分。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一中盞。煎至七分。去滓。入牛蒡根汁五勺。更煎一兩沸。不拘時溫服。

【犀角丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心臟中風。言語顛倒。神思錯亂。頭面心胸煩熱。或時舌強語澀。驚悸不安。

藥品 犀角屑、羚羊角屑、天麻、防風、羌活、沙參(三味均去蘆)、遠志(去心)、茯神(去木)、川升麻、天門冬(去心)、麥蘗(去皮)、玄參、各七錢五分。牛

黃(另研)、麝香(另研)、各二錢五分。龍齒(另研)、鐵粉(另研)、硃砂(水飛)、各一兩。金箔(另研)、銀箔(另研)、各五十片。

制法及用法 共研爲細末。入另研藥和勻。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。不拘時薄荷湯送下。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風癢疹心悶。

藥品 犀角屑、川升麻、人參(去蘆)、玄參(去蘆)、沙參(去蘆)、防風(去蘆)、白鮮皮、白蒺藜、各一兩。甘草(炙)、馬牙硝、各五錢。牛黃、二錢五分(另研細)。

制法及用法 研爲細末。入牛黃末同研令勻。每服二錢。不拘時。竹葉湯調下。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝臟中風。流注四肢。上攻頭面疼痛。言語蹇澀。及上焦風熱。口眼喎斜。脚膝痛無力。

藥品 犀角屑、石膏、各一兩。羌活(去蘆)、羚羊角屑、各七錢五分。人參、川獨活、黃耆、當歸、防風(五味均去蘆)、甘菊花、川芎、白朮、黃芩、天麻、酸棗仁、枳殼(去瓤、麸炒)、

白芷、各五錢。甘草(炙)、二錢五分。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一盞。加生薑五片。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【通關散】

發明 見漢東王先生方。

功用 治小兒驚風。聲啞不能言。

藥品 天南星(炮)。

制法及用法 研爲末。每服小兒半字或一字。三五歲五分。八九歲一錢。積豬膽汁調。令兒嚥入喉中。便能言語。

【通關散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腦風。鼻息不通。或鼻流清涕多嚏。肩項拘急。頭目昏痛。風府怯寒。

藥品 原蠶蛾(瓦上焙黃)、白附子(炮)、益智仁(去皮)、漢藥(炒去角)、薄荷、苦參、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。不拘時溫酒調下。

【通關散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治卒中風。口噤氣寒。不省人事。

藥品 細辛、皂角、薄荷、雄黃、各一錢。一方有南星、半夏。

制法及用法 研爲末。每用少許。吹入鼻中取嚏。無嚏難治。

【清神散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治風癰。化痰涎。治頭昏目眩面熱。

藥品 檀香(剉)、人參(去蘆)、羌活(去蘆)、防風(去蘆)、各一兩。薄荷(去土)、甘草、荊芥穗、各二兩。石膏(研)、四兩。細辛(去苗、焙)、五錢。

制法及用法 研爲末。每服二錢。沸湯點下。或人茶末點服亦可。此方虛熱可用。

【清心牛黃丸】

發明 證治準繩方。

功用 治暴中神昏不語。痰塞心包。口角流涎。煩熱氣急。一切痰熱閉遏之症。

藥品 西牛黃、二錢(一作三錢)。陳膽南星、黃連(薑汁浸炒、一作五錢)、各一兩。當歸身(一作三錢五分)、甘草(炙、一作三錢五分)、辰砂(水飛)、各五錢。

制法及用法 共研極細末。湯浸蒸餅爲丸。如綠豆大。金箔爲衣。每服五丸。臨臥時。唾津嚥下。或生薑湯、薄荷湯、人參湯。量虛實選用調服。

參考 此方爲治內熱熾盛。外受風邪者之方。與萬氏牛黃清心丸、安宮牛黃丸之治純屬內熱熾盛。引起內風者有別。宜辨症施治。不可誤投。

【清心導痰丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝風。

藥品 白附子(薑製)、天花粉、各一兩。天南星、半夏(均薑製)、各二兩。白腦蠟(炒、去絲嘴)、天麻、羌活、各五錢。川烏頭(鹽製)、二錢。黃連(炒)、鬱金、各七錢五分。

制法及用法 共研細末。薑汁糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。通天愈風湯送下。

【細辛散】

發明 見李東垣方。

功用 治寒邪、邪風、犯腦痛、齒痛。

藥品 細辛、三分。麻黃(去節)、三錢。桂枝、羊脛骨灰、各二錢五分。羌活、草豆蔻、各一錢五分。柴胡、升麻、防風、白芷、藁本、蒼朮、當歸身、各五分。

制法及用法 研爲細末。以水先漱。然後擦之。

【細辛散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺傷風冷。鼻流清

涕。頭目疼痛。胸膈不和。

藥品 細辛、一兩。附子(炮、去皮臍)、白朮、訶梨勒(煨、去核)、蔓荊子、芎藭、桂心、各七錢五分。枳殼(麩炒)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 咬咀、每服三錢。清水一盞。加生薑五釐。煎至六分。去滓。食後溫服。

【硃砂丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒口眼喎斜。筋脈牽引。

藥品 淨硃砂、五錢。全蠍(炒)、天麻、白附子(炮)、鹽蠟(炒去絲嘴)、乾薑(炮)、牛黃、各五分。麝香、一分。

制法及用法 共研末。糯米糊爲丸。如黍米大。每服三十丸。不拘時。薄荷湯化下。

【排風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治兩喙黏睛外障。目眼牽動。

藥品 明天麻、桔梗(一作一兩)、防風、各二兩。五味子(烘乾)、烏蛇(焙乾)、全蠍(去鉤頭乾)、細辛、芍藥(炒)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。或一錢五分。加茶三錢。食後米飲調下。

【密陀僧散】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治紫白癩風及汗斑。

藥品 密陀僧、石膏、各一錢。雄黃、硫黃、蛇床子、各二錢。輕粉、五分。

制法及用法 共研爲末。醋調搽之。或用黃瓜蒂蘸擦。

十二筆

【硫黃丸】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治頭風。頭痛。

藥品 硫黃、二兩。硝石、一兩。

制法及用法 研爲極細末。滴水和丸。如指頭大。每服一丸。空腹時鹽茶清嚥下。中暑者以冰水服之。下咽即洒然。傷冷艾湯下。

【硫黃膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治紫癩風。

藥品 硫黃(細研)、白礬(細研)、各一兩。硝砂(細研)、白附子、各五錢。附子、雄黃(細研)、各七錢五分。蛇蛻、一條。

制法及用法 研爲細末。和勻。用清油四兩。黃蠟二兩。先煎油三四沸。下蠟。後入藥末。煎成膏。每用少許。塗於患處。一日三度。

【草薢散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風中腎經。多汗惡風。面龐浮腫。脊骨疼痛。不能行立。肌膚變色。坐覺腰痛者。

藥品 草薢(酒浸)、狗脊、杜仲(去皮、剉炒)、白茯苓(去皮)、各一兩。何首烏、天雄(炮去皮臍)、澤瀉、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時米飲調下。

【開關散】

發明 見陳梅澗重樓玉鑰方。

功用 清諸風。止頭目痛。

藥品 撫川芎、一錢。杭白芷、八分。

制法及用法 研爲末。清酒煎服。

【菊花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風熱赤痛。目眇面腫。

藥品 甘菊花、旋覆花、防風(去蘆)、枳殼(去瓢、剉炒微黃)、川羌活(去蘆)、蔓荊子、生石膏、甘草(炙)、各一錢五分。一方有牛蒡子、獨活。無防風、枳殼、蔓荊子、生石膏。

制法及用法 噉嚥。每服五錢。清水三升，加生薑五片(一作三片)。煎至一鐘。不拘時

服。

【疏風散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治諸風。

藥品 薄荷、羌活、獨活、荆芥、各三錢。葛根、黃蘗、各七錢。苦參、五錢。牛蒡子、梔子、何首烏、人參、各一錢。白僵蠶、防風、白蘚皮、黃連、蔓荊子、連翹、明天麻、黃芩、各五分。威靈仙、白蒺藜、各八分。全蠍、白芷、甘草、仙靈脾、各五分。

制法及用法 先用酒煎服二十劑。後用水煎服。服後飲酒盡量。至百劑。四月之後。病必全愈。再照前藥加十倍爲末。加乳香、沒藥、沈香、血竭、各一兩。牛黃、冰片、各一錢。麝香、三錢。用薏苡仁爲末。酒煮糊丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服一百丸。溫酒調下。兼治壁泥癩。

【雄株丸】

發明 見葉氏方。

功用 治失心風。

藥品 雄黃、硃砂、各一錢五分。白附子、一錢。

制法及用法 共研細末。豬心血爲丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服五六丸或九丸。人參、苜蓿、煎湯送下。無入參。

黃耆代之。

【無價散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治馬脾風。

藥品 辰砂、二錢五分。輕粉、五錢。甘遂(麪裹煑焙乾)、一錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服一字。溫漿水少許。入滴油一點。挑藥在上。沈下去。却以漿灌之。立效。

十三筆

【愈風丹】

發明 見王海藏方。

功用 治癰風。

藥品 苦參(取末)、四兩。皂角(剉寸許、無灰酒浸一宿、以水一碗、撥成汁、去滓、入砂器中文武火熬)、一斤。土花蛇(去腸、陰乾、酒浸、取淨肉、曬乾爲末)、白花蛇、烏梢蛇(依前酒浸、取肉爲末)、各一條。

制法及用法 研爲末。入前二味和丸。如梧桐子大。每服六七十丸。空腹時煎蓬聖散送下。乾物壓之。一日三次。間日浴之。汗出爲度。

參考 此方治癰風甚效。惜因肝經血熱。脾經血虛。腎經虛火。脾肺氣虛。致遍身作癢。屑破成瘡。或內熱生風而眉鬚

脫落。或皮膚赤皰。或微起白屑。形似癰風而實非癰風者。不可服。服之反成癰風。不可不慎。

【愈風丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治足三陰虧損。風邪所傷。致肢體麻木。手足不隨等證。

藥品 天麻、牛膝(酒浸焙)、革藓、玄參、各六兩。杜仲、七兩。羌活、十四兩。當歸、熟地黃、生地黃、各一斤。獨活、五兩。肉桂、三兩。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五七十丸。熱湯送下。

【愈風丹】

發明 見張子和方。

功用 治諸痹寒熱交作。筋骨疼痛。手足拘牽。麻木不仁。及諸風癱瘓。口眼歪斜。半身不遂。風溼等症。

藥品 甘草、三錢。芍藥、川芎、桔梗、白僵蠶(炒)、細辛、羌活、南星(薑製)、各五錢。麻黃(去節)、白芷、防風、天麻、全蠍(炙)、各一兩。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如彈子大。硃砂五錢爲衣。每服一丸。細嚼。清茶或溫酒送下。

【蜈蚣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治破傷風。

藥品 蜈蚣、一對。魚鱗(炒)、左蟠龍(炒煙盡)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。防風湯調下。如前藥解表不已。覺直轉入裏。當服左龍丸。漸漸看大便輕硬。加巴豆霜。

【蜈蚣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治破傷風。

藥品 蜈蚣、一對。鱗、三錢。

制法及用法 研爲細末。防風湯調下。

【搜風丸】

發明 見劉河間方。

功用 治邪氣上逆。風熱上攻。頭目眩暈。二便結滯。

藥品 人參、薄荷、茯神、各五錢。藿香、二錢五分。蛤粉、天南星(一作五錢)、大黃、滑石、黃芩、各二兩。牽牛、四兩。乾薑、生白礬、半夏、寒水石、各一兩。

制法及用法 研爲細末。滴水和丸。如小豆大。每服十丸。加至二十丸。生薑湯送下。一日三次。

【搜風順氣丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 疎風順氣。補精駐顏。治三十六種風。七十二般氣。上熱下冷。腰脚疼痛。四肢無力。多眠少食。漸漸羸瘦。顏色黃赤。惡寒下注。口苦無味。憎寒毛聳。積年癰瘰氣塊。男子陽事斷絕。婦人久無子嗣。久患寒疝。吐逆瀉痢。變成勞疾。百節痠疼。痔漏腸風。風熱喉結。元氣充實者。療白疳瘡。

藥品 車前子、二兩五錢(酒炒、一作一兩五錢)。白檳榔、大麻仁(微火焙、去殼、另研)、郁李仁(滾水浸、去皮)、菟絲子(酒浸、焙、泡、曬乾、一作酒煮)、土膝(酒浸二宿)、乾山藥(炒)、各三兩。枳殼(去瓢、麸炒)、防風(去叉)、獨活、各一兩。錦紋大黃、五錢(生熟各半、一作五兩、酒浸蒸曬九次)。一方有山茱萸二兩。一方無檳榔、防風、獨活。有羌活、山茱萸肉。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。清茶、或溫酒、米飲、熱湯送下。早晨、臨臥各一服。

參考 服至一月。脾健消食。二月腸內宿滯去。三月無倦少睡。四月精神強勝。五月耳目聰明。六月腰脚輕健。一年百

病俱除。老者返少。如服之覺臟腑微動。以羊肚肺羹服之。久患腸風便血。服之除根。如頭語蹇澀及癱瘓。服之隨即平復。酒後一服。宿醴盡消。百病不生。如貪色縱慾及老人大便結燥者最宜。惟孕婦忌之。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治皮風。紫白癬風。

藥品 當歸(去蘆)、赤芍藥、苦參(去蘆)、各五錢。赤土、一兩。

制法及用法 研爲細末。生豬油二兩。熬油去滓。同蜜一兩。作一處調藥。隔一宿。每一大匙。熱酒調下。空腹食後各一服。忌雞鴨無鱗魚豆腐等物。

十四筆

【碧雲散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治頭風。

藥品 川芎、鵝不食草、各一兩。細辛、辛夷、各二錢。青黛、一錢。

制法及用法 研爲細末。每用少許。口噙凉水。令人以簾筒吹入左右鼻孔內。取嚏爲效。鼻常吸之。其效緩。

【漏蘆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風走注疼痛。

藥品 漏蘆、當歸、牛膝、各三分。防風、羌活、地龍(去土)、桂心、白芷、沒藥、甜瓜子、各五錢。虎脛骨(酥炙)、敗龜板(醋炙)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時熱酒調下。

【稀莖膏】

發明 驗方。

功用 治經綿風氣。四肢麻痺。筋骨冷痛。腰膝無力。風溼贅瘍。

藥品 稀莖草(鮮者)、不拘多少。

制法及用法 搗汁熬膏。以生地黃、甘草、煎膏。煉蜜收之。酒潤尤妙。每服一匙。開水送下。

十五筆

【摩風膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 白癰風。

藥品 附子、川烏頭、防風、各二兩。凌霄花、躑躅花、露蜂房、各一兩。

制法及用法 研爲細末。用豬脂三斤。煎煉。看藥黃焦。去滓候冷。收盛器中。摩擦患

處。以瘡爲度。

【摩風膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 白癰風。

藥品 硫黃、密陀僧、膩粉、乳香、杏仁、白鹽蠶(炒)。

制法及用法 研爲細末。酥調成膏。先以漿水洗瘡。以生布繫破塗之。日夜四五次。

【摩風膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治面上或身上風熱浮腫。癢如蟲行。肌膚乾燥。時起白屑。次後極癢。抓破流水。或破爛見血。痛楚難忍。

藥品 麻黃、五錢。羌活、一兩。升麻、防風、各二錢。白檀香、白芷、當歸身、各一錢。

制法及用法 用香油五兩。將藥浸五日。文火燻黃。即撈去渣。加黃蠟五錢。熔化盡。用絹濾過。撻冷。每用少許。塗抹瘡上。十日可愈。

十六筆

【獨活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 消風。化痰。

藥品 獨活、防風、薑朮、旋覆花、川芎、蔓荊子、各一兩。細辛、石膏、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服

三錢。加生薑三片。清水一大盞。煎至七分。食後服。

【獨聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 吐風痰。

藥品 瓜蒂、鬱金、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢或二錢。薑汁調下。用雞翎探吐。後服愈風餅子。

【獨聖散】

發明 見顯世澄瘍醫大全。

功用 治鼓植風。

藥品 川烏、一枚(重八錢者)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。用葱頭七個。酒一碗。煎濃服。

【頭風膏】

發明 驗方。

功用 治風熱頭痛及酒後吹風頭痛。

藥品 北細辛、白芷、薄荷油、各等分。

制法及用法 研爲細末。調入膏藥肉內。每藥一分。用膏四分。每用一個。貼於患處。兩邊痛俱貼之。

十八筆

【蕞本散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風流注。腰

脚疼痛難忍。

藥品 蕞本(去蘆土)、一兩五錢。狗脊、天麻、骨碎補、淫藥(另研)、血竭(另研)、蟬殼(微炒)、細辛、各一兩。虎脛骨、敗龜板、穿山甲(均醋炙)、各二兩。麝香、五錢(另研)。

制法及用法 研爲細末。拌勻。每服二錢。空腹食前生薑豆淋酒調下。每日二次。

二十筆

【蘇合香丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治傳屍。骨蒸。癰疽。肺痿。疰忤。狐鬼。邪祟。驚癇。中風。痰厥。心腹猝痛。昏迷僵仆。寒症氣閉。寒霍亂吐利。時氣瘴濕。赤白暴痢。婦人瘀血經閉。小兒驚搐吐乳。療疥癬疔腫。

藥品 蘇合香油、五錢(白色者佳、入安息香膏內)。丁香、安息香(另爲末、用無灰酒五合、熬膏、飛去砂土)、青木香、白檀香、沉香(另研極細)、藿香、香附子(炒去毛)、訶梨勒(煨取肉)、烏犀角屑(鎔、另研細末)、硃砂(另研、水飛、以一半爲衣)、各一兩。蘇合香(另研)、龍腦(另研)、各五錢。麝

香(另研、勿經火)、七錢五分。一方加白朮、去白檀香、華撥、訶梨勒。一方無訶梨勒。有白朮。一方無華撥。有白朮。

制法及用法 研爲細末。入另藥和勻。用安息香膏、並煉白蜜和丸。如芡實大(約重八分)。硃砂爲衣。蠟殼封護。每服一丸。中風昏迷。驚癇鬼忤。不省人事。薄荷湯送下。卒暴心痛。霍亂吐瀉。淡薑湯下。時氣瘴癘。赤白暴痢。藿香湯下。瘀血逆癖。溫酒下。驚風吐乳。燈心湯下。若用蠟紙裹一丸。盛緋絹袋。當心佩之。能辟一切邪物。

參考 此方取諸香以開寒閉。與牛黃丸皆爲中風門中奪門開關之將。然牛黃丸開熱阻關竅。此則開寒阻關竅。方中用犀角爲寒因寒用之嚮導。與至寶中用龍腦桂心無異。若夫口開手撒。眼合聲嘶。自汗遺尿等虛脫症。急用參附峻補。庶或可救。若用牛黃蘇合香之藥。入口即斃矣。一方去檀香、華撥、訶梨勒三味。以其太溫燥之故。又方中冰麝分量太重。用時宜減大半。

二十一筆

【霹靂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治急慢驚風。不省人事。

藥品 豬牙皂、三錢。細辛、川芎、白芷、各二錢。躑躅花、一錢五分。

制法及用法 剉曬爲末(不可焙、否則不應)。每用少許。入燈芯三寸。蘸點鼻內。得噴嚏爲效。

參考 此臥龍丹和川芎、白芷。去西牛黃、金箔、冰片、荆芥、麝香、硃砂、燈芯炭。亦用以治各種痧疹等症。要之此散乃開竅之藥。

二十三筆

【蠲痹丸】

發明 見醫氏方。

功用 治中風身體煩痛。項背拘急。手足冷痺。腰膝沉重。舉動艱難。

藥品 黃芪(蜜炙)、四兩。當歸身(酒洗)、片子薑黃(酒炒)、各三兩。羌活、防風、赤芍藥(酒炒)、各二兩。甘草(炙)、一兩。

制法及用法 共研細末。生薑、紅棗。煎湯泛丸。如梧桐子大。每服三四錢。熱湯或溫酒送下。

二十四筆

【靈寶如意丹】

發明 驗方。

功用 治中暑、中惡、傷寒、中風、霍亂、瘧疾、小兒急熱驚風、疑難危急等症。

藥品 白粉霜、血竭、硼砂、腰黃、天麻、辰砂、各一兩。麝香、梅片、人參、各一錢。糖酥、六錢。一方有巴豆霜。

制法及用法 各研末。取淨粉。燒酒化糖酥泛丸。如芥子大。辰砂爲衣。每服七丸。小兒二丸。俱不可多用。孕婦忌服。●中暑眩暈。絞腸腹痛。脘悶飽脹。陰陽反錯。不省人事。手足厥逆。惡心嘔瀉。山嵐瘴氣。感受邪穢。中惡頭痛。一切痧氣。俱用涼茶送下。●傷寒三四日。風寒咳嗽。用葱白(連鬚)。生薑煎酒熱服。煖蓋取汗。●中風不語。痰涎神昏者。薑湯送下。●口眼喎斜。手足麻木者。生薑、桂枝煎湯送下。●瘧疾。草果、檳榔煎湯送下。●溫症疹子不出。葱鬚煎湯送下。●痢症瘋迷。生薑湯送下。●飢飽勞碌。沙參湯送下。●癱瘓。淡薑湯送下。●噎膈咽喉胸膈疼痛。桔梗、柿蒂煎湯送下。●惡心嘔雜。

砂仁湯送下。●牙痛。高良薑湯送下。再含一丸於痛處。其痛立止。●心胃氣痛。淡薑湯送下。●心胃蟲痛。九種胃痛。俱用艾醋湯送下。●氣熱、木香柿蒂煎湯送下。●水蟲、葶藶湯送下。●中酒毒、陳皮湯送下。●陰寒、白川湯送下。●忘前失後。石菖蒲湯送下。●小便尿血。車前子湯送下。●二便不通。生薑湯送下。●水瀉。車前子湯送下。●赤痢、紅花湯送下。●白痢。吳茱萸湯送下。●噤口痢。石蓮子湯送下。●偏墜疼痛。小茴香湯送下。●腿膝疼痛。牛膝木瓜煎湯送下。●跌撲損傷。昏迷不醒。熱酒或童便送下。●疥癩。噙化一丸。●癰疽、疔瘡、惡毒初起。葱白、生薑煎湯。熱服取汗。或黃酒化敷患處。●疔瘡腫爛太甚。口津研化二丸塗之。再用酒服一丸。立愈。●疔瘡走黃。熱酒送下。再以銚鏹挑破疔頭。入一二丸於瘡內。外以膏藥貼之。●天泡瘡。楊梅瘡。初起生薑煎酒。熱服取汗。次日再用熱湯送下。●諸瘡潰破。生黃芪、銀花、煎湯送下。●蛇蠍蟲毒。用黃酒化敷。●婦人經閉。紅花湯送下。●婦女鬼迷失魂。夢與鬼交。

桃仁湯送下。⑤子死腹中。白芥子湯送下。⑥產後見神見鬼。黑荆芥湯送下。⑦產後腹脹。厚朴湯送下。⑧小兒乳積食積。風寒驚啼。熱湯送下。

祛寒類

二筆

【人參丁香散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治妊娠惡阻。胃寒嘔逆。翻胃。心腹刺痛。

藥品 人參、丁香、柿蒂、各二錢。甘草、高良薑、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時熱湯送下。

【丁香爛飯丸】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治脾胃虛弱。飲冷傷中。食滯不化。脘腹疼痛。

藥品 丁香、蓬莪朮(炮)、荆三稜(炮)、木香、甘草(炙、一作二錢)、各一錢。甘松(去土)、益智仁、廣皮(一作二錢)、縮砂仁、各三錢。香附子、五錢。

制法及用法 研爲細末。湯浸蒸餅和丸。如綠豆大。每服三十丸。不拘時熱湯送下。或細嚼下亦可。

【七香丸】

功用 治寒滯內阻。胸腹不暢。

藥品 香附、丁香皮、各一兩二錢。甘松、八錢。益智仁、六錢。縮砂仁、蓬莪朮、廣陳皮、各二錢。

制法及用法 研爲細末。神麴糊調勻。爲丸。服一二錢。

【十香丸】

發明 驗方。

功用 治氣滯寒滯諸痛(如癰疽之屬)。以及胃脘胸腹疼痛。嘔吐吞酸等症。皆可以此治之。

藥品 沈香、廣木香、公丁香、小茴香、金香附、廣陳皮、台烏藥、建澤瀉、荔枝核(煨黑)、肥皂莢(炙至煙盡)。

制法及用法 共研細末。酒泛丸。如梧桐子大。每服三錢。溫酒或熱湯送下。

三筆

【三層茴香丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 溫導陽氣。漸退寒邪。補虛消痞。暖養腎經。治腎與膀胱俱虛。寒疝不散。脘腹疼痛。陰核偏大。或冷硬如石。膚囊癢腫。或癢癢不止。時流出黃水。浸成瘡瘍。或長怪肉。

藥品 舶上茴香(用鹽五錢、同炒焦黃、和鹽研)、川楝子(炮、去核)、北沙參(洗剉、一作四兩)、廣木香、各一兩。

制法及用法 研爲末。水煮米糊爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹時溫酒或鹽湯送下。每日三次。小病可一料安。如不愈。再加藜蘆、一兩。檳榔、五錢(研)。依前糊丸。丸數湯使亦如前。服後仍不愈。再加白茯苓、四兩(累食者去黑皮)。黑附子、五錢(炮、去皮臍、一作一兩)。依前糊丸。丸數加至三十丸。湯使如前。雖小腸氣頗發及三十年者。寒疝氣如棗核大者。皆可消散。一方無黑附子。

五 筆

【四神丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾腎虛寒。五更泄瀉。不思飲食。或久痢虛痛。腰痠肢冷。

藥品 肉豆蔻(麩裏煨)、五味子(炒、一作三兩)、各二兩。補骨脂、四兩(酒浸一宿炒)。吳茱萸(鹽湯泡洗炒)、一兩。

制法及用法 研爲末。用生薑、八兩(切、一作四兩、一作六兩)。紅棗、一百枚(一作四十九

枚、一作六十五枚)。清水煮爛。去皮核與藥末搗和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。食前空腹時來飲、熱湯、或鹽湯送下。

參考 此方以補骨脂之辛燥。入腎以制水。肉豆蔻之辛溫。入脾以煖土。五味子之酸溫。收坎宮耗散之火。使少火生氣以培土。吳茱萸之辛溫。以順肝木欲散之勢。爲水氣閉滋生之路。丸以薑棗。又辛甘發生諸陽之義。或用木香代五味子。但陰虛惡燥者忌之。

【玉粉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治冷瀉日久。不思飲食。

藥品 紅豆(揀淨)、大附子(炮、去皮臍)、乾薑(炮)、各五錢。舶上硫黃(另研)、二錢五分。

制法及用法 研末。和勻。每服二錢。空腹時半稀半稠粟米飲送下。至晚再服。重者十服必效。輕者三五服可愈。

【白芷散】

發明 見李東垣方。

功用 治大寒犯腦。齒痛。

藥品 白芷、吳茱萸、各四分。麻黃(去節)、草豆蔻、各一錢五分。黃耆、桂枝、各二錢五分。藁本、三分。羌活、八分。

當歸身、熟地黃、各五分。升麻、一錢。

制法及用法 研爲細末。先用水漱洗。以藥擦之。

【仙靈脾散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風走注。

藥品 仙靈脾、威靈仙、芎藭、蒼耳子(炒)、桂心、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。不拘時溫酒調下。

七 筆

【見呢丸】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治寒氣客於下焦。腹中石瘕堅大。日久不消。

藥品 附子(炮、去皮臍)、四錢。鬼箭羽(如無、穿山甲代之、肥人痰闊、鬼白南星代之)、紫石英(另飛)、各三錢。澤瀉、肉桂(勿見火)、延胡索、木香、各二錢。檳榔、二錢五分。血竭、一錢五分(另研)。水蛭、一錢(炒煙盡、如無、蓬莪茂代之)。桃仁、三十粒(湯浸、去皮尖、麸炒另研、一作乾漆灰拌炒、去漆灰)。京三稜、五錢(剉)。大黃、二錢(剉、用酒同三稜浸一宿焙、一作三錢、一作七錢)。

制法及用法 研爲末。入另

研藥和勻。原浸藥酒(一作紅酒)。打糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前淡醋湯或溫酒送下。虛者去水蛭、三稜。加人參、一兩。當歸、五錢。虛甚者。十全大補湯送下。

【見呢丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傷寒冷飲食而喘。及產後傷食痞悶。

藥品 薑黃(炒)、三稜(醋炒)、莖澄茄、陳皮(去白)、高良薑、人參、蓬莪茂(酒炒)、各等分。

制法及用法 研爲細末。蘿蔔搗爛。絞取汁。煮麵糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。蘿蔔湯或白湯送下。

【辰砂膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治慢脾風。冷痰壅滯。手足冷而微搐者。

藥品 黑附子、一枚(重一兩以上者、去皮臍、頂上挖一空、入辰砂末一錢、仍用附子塞之、炭火燒存性)。牛膽南星、五錢。白附子(炮)、五寶脂、蠟梢、各二錢五分。

制法及用法 共研爲末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二三錢。生薑汁泡湯送下。

【赤丸】

發明 見金匱要略。

功用 治寒氣厥逆。

藥品 烏頭、二兩(炮、一作二枚)。茯苓、半夏、各四兩(一方用桂)。細辛、一兩。一方用人參。一方無半夏。有附子、桂心、射干。

制法及用法 研爲末。納真硃砂爲色。煉蜜和丸。如麻子大。每服三丸。食後溫酒送下。一日二次。一服不知。稍增。以知爲度。

參考 寒氣而至厥逆。陰邪極也。方中烏頭、細辛。以溫散獨盛之寒。茯苓、半夏。以降泄其逆上之氣。而以硃砂爲色。以鎮寒氣之浮。而爲保護心主之用。用意尤妙。

【辛夷散】

發明 見陳言三因極一病證方論。

功用 治鼻塞腦冷。清涕不已。

藥品 辛夷、細辛、川椒、乾薑、川芎、吳茱萸、附子、各七錢五分。皂角屑、五錢。桂心、一兩。豬油、六兩。

制法及用法 煎豬脂成膏。苦酒浸諸藥。取入油煎。附子黃色爲止。以綿裹塞鼻中。

【冷哮丸】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治背受寒氣。即發喘嗽。頑痰結聚。胸膈痞滿。倚息不得臥。

藥品 麻黃(泡)、生川烏、細辛、蜀椒、生白礬、牙皂(去皮弦子、酥炙)、半夏麴、陳膽星、杏仁(去雙仁者、連皮尖用)、生甘草、各一兩。紫菀茸、款冬花、各二兩。

制法及用法 研爲細末。薑汁調神麴末打糊爲丸。如梧桐子大。每遇發時。臨臥時生薑湯服二錢。羸者一錢。更以三建膏貼肺俞穴中。服後時吐頑痰。胸膈自寬。服此數日後。以補脾肺藥調之。俟復發再服。

參考 此少變麻黃附子細辛湯之法。而合稀涎散以涌泄其痰。爲開發肺氣之剛劑。但氣虛少食。及痰中見血。營受傷者忌之。以其專司疎泄。而無溫養之功也。觀用法之瀉補互施。使得擒縱緩急之妙。

【豆蔻丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治臟寒泄瀉。

藥品 肉豆蔻(麴裏煨香)、不拘多少。

制法及用法 研爲細末。陳米白飯和爲丸。如綠豆大。每服一百丸。空腹時粟米飲送

下。

八 筆

【附子散】

發明 見張路玉張氏醫道。

功用 治陰毒傷寒。唇青面黑。

藥品 附子(炮、去皮)、七錢五分。桂心(一作肉桂)、當歸、白朮、各五錢。乾薑(炮)、半夏(薑製)、各二錢五分。

制法及用法 爲散。每服三錢。加生薑三片。清水煎。去滓。不拘時溫服。煖覆取汗。如人行十里許。未汗再服。

【附子散】

發明 見傅青主方。

功用 治產後霍亂吐瀉。手足逆冷無塊痛者。

藥品 附子、五分。丁香、黑薑、陳皮、甘草、各四分。當歸、二錢。白朮、一錢。

制法及用法 研爲末。每服二錢。粥飲調下。

【附子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傷寒陰痿。

藥品 附子(炮)、一兩。白朮、一兩。桂心、川芎、各三錢(一作各五錢)。獨活、五錢。

制法及用法 每服三四錢。清水一盞。加生薑二片。大

棗一枚。煎至五分。去滓溫服。

【羌活散】

發明 見李東垣方。

功用 治寒溼頭痛。

藥品 羌活根、一錢五分。麻黃(去根節)、白芷、防風根、各三錢。薑本、當歸身、各三分。細辛根、柴胡根、升麻、蒼朮、各五分。羊脛骨灰、二錢五分。草豆蔻、桂枝、各一錢。

制法及用法 研爲細末。先用溫水漱口。後搽之。其痛立止。

【羌活膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒傷寒。脾胃虛或吐瀉後爲慢驚。

藥品 羌活、五錢。防風(去蘆)、川芎、人參(去蘆)、白附子(炮)、赤茯苓(去皮)、各五錢。天麻、一兩。白僵蠶(湯浸炒黃)、乾蠍(炒、去毒)、白花蛇(酒浸焙)、各一分。川附子(炮、去皮臍)、麻黃(去節)、各三錢。沈香、母丁香、肉豆蔻、藿香葉、木香、各二錢。輕粉、眞珠末、牛黃、各一錢五分。龍腦、半字。麝香、辰砂、雄黃、各一錢(上七味另研)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如豆大。每服一二

丸。食前薄荷湯或麥門冬湯化下。實熱急驚勿服。性溫故也。

【和中丸】

發明 見李東垣方。

功用 理氣分。消痰積。去溼滯。厚脾胃。進飲食。治胃弱痞積。乾嘔吞酸。

藥品 乾薑、甘草(炙)、陳皮、各一錢。木瓜、一枚。人參、白朮、各三錢。

制法及用法 研爲末。蒸餅或水泛丸。每服三錢。食前白湯下。

參考 按此方即六君子丸。以乾薑、木瓜。易茯苓、半夏。故適用於中焦虛寒。嘔吐便瀉等證。久即理中丸加陳皮、木瓜。故能理氣分。消痰積。去溼滯。

【阿魏丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血氣攻心。疼痛及一切積冷氣。

藥品 阿魏(麝香煨、以麝熟爲度)、當歸、桂心、青皮、附子(炮)、白朮、川芎、吳茱萸(泡)、各一兩。木香、乾薑、各三分。檳榔、肉豆蔻(煨)、延胡索、蓬莪朮、各一兩。硃砂(細研)、五錢。

制法及用法 研爲細末。先以醋一升。煎阿魏成膏。和藥

末爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前熱酒送下。

【抽刀散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治積冷。

藥品 白薑、五兩(入巴豆肉、二錢二分五釐、同炒黑、去巴豆)。高良薑、五兩(入斑蝥二十五個、同炒黑、去斑蝥)。石菖蒲、五兩(不炒)。糯米、六兩(炒黃)。

制法及用法 共爲末。每服二錢。溫酒調下。

【定痛散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傷寒腹痛。及冷氣痛。

藥品 神麴、香附、各一錢。山楂、二錢。高良薑、當歸、甘草、各五分。

制法及用法 加生薑三片。大棗二枚。清水煎服。手足逆冷。加大附子二分。

九 筆

【扁鵲玉壺丸】

發明 見元壽先生方。

功用 治命門火衰。陰寒惡疾。陽氣暴絕。寒水臌脹。

藥品 硫黃、八兩(外洋者佳、土硫黃斷不可用)。麻油、

八兩。

制法及用法 硫黃打碎。入冷油內。放炭火爐上熬熱。微以桑枝緩緩攪動。候硫融盡。即傾入水缸內。急撇去面上浮油。取缸底淨硫。稱過若干兩。再配麻油若干兩。照前火候再融再傾。連前共製三次。第四次用棉花子油配硫若干兩。照前火再融再傾。入水缸內。急撇去面上浮油。第五次用肥皂四兩。水中同煮六時。第六次用皂莢四兩。放水中同煮六時。拔淨油氣。第七次用爐中炭火淋鹽水製六時。第八次用水豆腐同煮六時。拔淨皂鹽之性。第九次用田字草搗汁。和水煮六時。曬乾研細如香灰。凡淨硫一兩。配炒糯米粉二兩。煮汁爲丸。每服八分。漸加至三錢。開水送下。

【胡蘆巴丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治寒溼。

藥品 胡蘆巴（酒浸一宿焙）、破故紙、各四兩。

制法及用法 共研細末。以木瓜切頂去瓢。安藥在內。令泥簍合。蒸爛搗丸。每服七十丸。空腹時溫酒送下。

十 筆

【桂香丸】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治臟腑虛弱。爲風寒溼所搏。冷滑泄下不禁。

藥品 桂心、木香（炮）、乾薑（炮、一作白薑）、各五錢。丁香、二錢五分。附子（炮）、肉豆蔻（炮）、白茯苓、各二兩（一作各一兩）。

制法及用法 共研細末。水煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時米飲送下。

【桂香散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治脾臟久冷。空心腹痛。

藥品 肉桂、二錢五分。草豆蔻（煨）、高良薑（炒）、白朮、縮砂仁、甘草（炙）、煨薑、厚朴、棗肉、各一兩。青皮、訶子肉、各五錢。

制法及用法 清水一碗。同煮令乾。杵作團。曬研粗末。每服三錢。入鹽少許。沸湯點服。

【桂附丸】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治風冷入乘心絡。或

臟腑暴感風寒。上乘於心。令人卒然心痛。或引背脊。乍緩乍甚。經久不瘥者。

藥品 桂(去粗皮)、二兩。黑附子(炮)、川烏(炮、去皮臍)、各三兩。乾薑(炮)、赤石脂、川椒(去目微炒)、各二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。熱湯送下。覺至痛處即止。若不止。加至五十丸。以知爲度。若早服無所覺。至午時再服二十丸。久心痛服盡一料。終身不發。

【烏頭丸】

發明 見崔氏方。

功用 治風冷邪氣。入乘心絡。或臟腑暴感寒氣。卒然心痛。或引背脊。經久不瘥。

藥品 川烏頭(炮、去皮臍)、附子(炮、去皮臍)、赤石脂、各三兩。蜀椒(去閉口者、炒、去汗)、桂心、乾薑(炮)、各二兩。

制法及用法 杵爲細末。煉白蜜和丸。如梧桐子大。每服三丸。冷酒送下。覺至痛處痛即止。若不止。加至五六丸。以知爲度。若早服無所覺。至午再服三丸。若久心痛。每晨三丸。加至十丸。劑終不發。忌食豬肉生葱。

【神應丸】

發明 見王好古醫壘元戎。

功用 治傷一切冷物 瀉乳。腹痛腸鳴發泄。

藥品 木香、一錢。丁香(另研)、乾薑(炮)、百草霜(研細)、杏仁、巴豆(炒、去油盡、微存性)、各五錢。蠟、二兩(醋煮去脂)。

制法及用法 共研如泥。將上四味和勻重羅。入杏仁巴豆泥中。熔化蠟。入小油五錢。研數百遍。至凝結丸。每重一錢。蠟紙封裹。每服一丸。米飲送下。

【眞武丸】

發明 見張仲景傷寒論方。

功用 治少陰經虛寒證。及太陽證。因發汗而引動少陰之氣者。

藥品 茯苓、芍藥(酒洗)、生薑、各三兩。白朮、二兩。大附子、一枚(炮去皮、破八片)。

制法及用法 研末爲丸。咳加五味子。並細辛、乾薑。小便利者。去茯苓。下利去芍藥。加乾薑。嘔去附子。加生薑。足成八兩。

參考 此方爲回陽去水扶土之重劑。少陰經之主方也。方中以白朮鎮脾。芍藥和脾。茯苓利水。更以附子逼下焦少陰之絡。輔以生薑散絡內之寒。

故凡腹痛下痢。四肢厥冷。以及太陽多汗引動下焦衝氣諸證。皆可治之。

十一筆

【理中丸】

發明 見張仲景傷寒論。

功用 治中焦脾胃虛寒。不能運化。嘔吐泄瀉。不飲不食。胸痹胸痞。腹痛痠多。傷寒直中太陰。自利不渴。寒霍亂吐瀉。四肢逆冷。自汗脈虛。便血血痢。婦人妊娠虛寒等證。

藥品 人參、白朮(炒焦)、甘草(炙)、各三兩。乾薑(炮)、二兩。

制法及用法 搗篩爲末。煉蜜爲丸。如雞子黃大。以沸湯數合。和一丸研碎。溫服。日三四次。夜一次。一作研細末。麵糊和丸。如綠豆大。每服十丸至二十丸。不拘時米飲送下。如腹中未熱。可增至三四丸。①臍上築者。腎氣動也。去白朮。加肉桂、四兩。②吐多者。去白朮。加生薑、三兩。③下多者。仍用白朮。④悸者。加茯苓、二兩。⑤渴欲飲水者。加白朮。足前成四兩五錢。⑥腹中痛者。加人參。足前成四兩五錢。⑦寒者加乾薑。足前

成四兩五錢。⑧腹滿者。去白朮。加附子、一枚。⑨霍亂吐多利少者。取枳實、三枚(炙去瓤、四破)。清水三升。煮取一升。和一丸服。吐少利多者。加乾薑、一塊。⑩吐利乾嘔者。取半夏、五錢(泡去滑)。清水二升。煮取一升。和一丸服。⑪體疼痛不可堪者。取大棗、三枚。清水二升。煮取一升。和一丸服。⑫吐利太甚轉筋者。以蔥汁洗腹腎。從胸至足踝勿逆。即止。⑬若體冷微汗。腹中寒。取附子一枚(炮去皮、四破)。清水二升。煮取一升。和一丸服。⑭吐利悉止。脈不出。體猶冷者。可服諸湯補之。

參考 中焦必須溫和。方能運化水穀。生發中氣。若脾胃陽虛。則中氣失發宣之能力。故下利清穀。上失滋味。五臟均受其病矣。方中人參扶胃。白朮扶脾。再以甘草和之。乾薑溫之。則中氣沖和。陽氣健運。五臟六腑。皆可沾受水穀之精氣。故名爲理中。謂其權衡悉操於中焦也。本方加附子。名爲附子理中丸。兼溫腎扶陽。其與舊作用。其力較大。

【細辛膏】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治腦冷鼻塞。常流涕。

藥品 細辛、川椒、川芎、黑附子(炮、去皮臍)、乾薑、吳茱萸、各二錢五分。桂心、三錢三分。皂角屑、一錢六分五釐。

制法及用法 以豬脂、二兩，煎油。先一宿以米醋浸藥。納入豬油內同煎。至附子色黃爲度。以酥蘸藥。塞入鼻中。

【牽牛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治冷氣流注。腰痛不可以俯仰。

藥品 黑牽牛、玄胡索(微炒)、種牛脂、各二兩。一方無玄胡索。

制法及用法 另炒。另研取末。煨蒜研膏爲丸。如梧桐子大(一作鉄炒爲末、酒糊丸)。每服五十丸。食前葱酒或鹽湯送下。

【既濟丸】

發明 見會編方。

功用 治腎格脈沈細。手足厥冷。

藥品 附子、一兩(炮熟、童便浸)。人參、三兩。麝香、少許。

制法及用法 共研細末。陳米飲糊爲丸。如梧桐子大。麝香爲衣。每服七丸。或十丸。

加至三十丸。米飲或燒心湯送下。

參考 此方乃參、附加麝。單刀直入。以破中下二焦之結。藥雖峻而用法最緩。不可不詳此義而擅改作湯也。

十二筆

【異功散】

發明 見陳氏方。

功用 治損傷陰惑陽虛。發熱作渴。手足並冷。脈虛無力。大便自利。至飲沸湯而不知其熱者。及痘瘡灰白伏陷。大渴泄瀉。

藥品 木香、當歸、各三錢。桂枝、白朮、茯苓、各二錢。陳皮、厚朴(薑製)、人參(去蘆)、肉豆蔻、各二錢五分。丁香、半夏(薑製)、附子(炮去皮)、各一錢五分。

制法及用法 咬咀。每服二錢。清水一盞。加生薑五片。大棗三枚。煎服。

參考 此方惟脈虛細而身體四肢冷者宜之。若虛而不寒。宜服血氣俱補之劑。

【異功散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血氣虛冷。時發刺痛。頭目昏悶。四肢無力。寒熱往來。狀似勞倦。

藥品 烏藥、川芎、苦梗、玄胡索、當歸、陳皮、各一錢五分。官桂、牡丹皮、芍藥、白芷、乾薑、各一錢。

制法及用法 清水二鍾。加生薑三片。煎至一鍾。入酒半盞。再煎一二沸。不拘時服。

參考 此方性寒多者宜之。若無滯氣汚血。尤不宜服。

【訶子散】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治霍亂吐利。九種心痛。及心脾冷痛不可忍。

藥品 訶子(炮、去核、一方用皮)、甘草(炙)、厚朴(薑製)、乾薑(炮)、神麴(炒)、草果(去殼)、高良薑(炒)、麥芽(炒、一作麥門冬)、白茯苓、陳皮、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。候發不可忍時。用清水一鍾。煎至七分。入鹽少許服。急則鹽點。

十三筆

【當歸散】

發明 見錢氏方。

功用 治小兒臟寒腹痛。面青手冷。不乳夜啼。

藥品 當歸(去蘆頭)、白芍藥、人參、桔梗、陳皮(不去白)、

各一錢。甘草(炙)、五分。

制法及用法 研爲細末。每服五分。清水煎。時時少服。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治變蒸有寒無熱。

藥品 當歸、二錢。木香、官桂(辣者)、甘草(炙)、人參、各一錢。

制法及用法 每服一錢。加生薑、大棗、清水煎服。

【葱白丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治婦人受寒氣鬱腹痛經閉。

藥品 阿膠、香附、各二兩。川芎、當歸、厚朴、各三兩。

制法及用法 研爲末。將膠烊化。葱白、薑汁爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【葫蘆巴丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治小腸疝氣。偏墜陰腫。小腹有形、如卵。上下往來。痛不可按。或絞結繞臍攻刺。嘔吐悶亂。

藥品 葫蘆巴(炒)、一斤。小茴香(鹽炒)、十二兩。吳茱萸、十兩(洗炒、一作半酒、半醋、浸一宿焙)。川棟子、一斤二兩(蒸、去皮核炒、一作一斤)。巴

戟天(去心炒)、川烏(炮、去皮臍)、各六兩。一方有牽牛子頭末十兩。

制法及用法 共研細末。酒煮麴糊爲丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。空腹時溫酒送下。小兒每服五丸。食前茴香湯送下。

【煖臍膏】

發明 驗方。

功用 治寒邪入裏。太陰受病。脫脹腹痛。大便泄瀉。

藥品 母丁香、胡椒、各二錢。倭硫黃、綠豆粉、各三錢。吳茱萸、一錢。

制法及用法 研爲細末。用太乙膏四兩。隔水燉化。將藥末攪入和勻。貼於臍上。即寒化氣和。痛愈爲止。

【感應丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治中氣虛冷。不能運化。飲食積滯。胸脇滿痛。臍腹絞痛。霍亂吐瀉。大便頻數。久痢赤白。水穀不化。中酒嘔吐。痰逆惡心。喜睡頭眩。四肢倦怠。不思飲食。

藥品 南木香、肉豆蔻、丁香、各一兩五錢。乾薑(炮)、一兩。巴豆、七十粒(去皮心膜研去油)。杏仁、一百四十粒(湯

泡去皮尖研)。百草霜、二兩。

制法及用法 以前四味。研爲末。外入百草霜研。與七味同和勻。用黃蠟六兩。溶化成汁。以重絹濾去滓。更以酒一片。於銀石器內。煮蠟數沸。傾出。候酒冷。其蠟自浮於上。取蠟。春夏修合。用清油一兩。銚內熬令香熟。次下酒。煮蠟四兩。同化成汁。就銚內乘熱拌和前項藥末。秋冬修合。用清油一兩五錢。同煎。和前藥末。分作小錠。油紙裹放。旋丸如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫湯送下。

【雷公散】

發明 霍亂論方。

功用 治霍亂吐瀉。及暑令受寒而引起之急性胃腸炎。

藥品 硫黃(製)、五錢。吳茱萸、一兩八錢。母丁香、一兩二錢。肉桂、八錢。麝香、四錢。

制法及用法 共研極細粉。瓶裝固封。每次二分。開水送服。孕婦禁忌。

【溫六丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治因寒吐瀉反胃。

藥品 滑石、六兩。甘草、一兩。甘藷、五錢。

制法及用法 共研細末。米飯爲丸。如梧桐子大。每服二

錢。薑湯下。

十四筆

【銀黃散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治心胃寒痛年久者。並治寒痧及肚腹寒痛。

藥品 銀硝、八兩。黃丹(飛淨)、二兩。

制法及用法 用大銀鍋放炭火上(火要大、不可太猛)。將銀硝放鍋內。用銅筷不住手順攪(不可逆一下)。再將黃丹分作數次加入。銀硝即化爲水。攪至半個時辰。硝丹合爲一色。傾入冷水內。候冷定。取出研細。瓷瓶收貯。埋地下一月。收去火毒。每用五分。體弱者用三分。滾燒酒沖服。如不知氣痛是寒是熱。先煨胡椒末。其痛略緩者是寒。然後再服此方。

十六筆

【橘核丸】

發明 見濟生方。

功用 治癰疽。卵核腫脹。偏有小大。或堅硬如石。痛引臍腹。甚則腐爛腫脹成瘡。時出黃水。或成癰潰爛。

藥品 橘核(炒)、海藻(洗、一作鹽酒炒)、昆布(洗、一作鹽

酒炒)、桃仁(麩炒)、海帶(鹽水炒)、川棟子肉(炒)、各一兩(一作各二兩)。厚朴(製)、木通、枳實(麩炒)、延胡索(酒炒)、桂心、木香、各五錢。

制法及用法 共研細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服六七十丸。空腹時鹽酒或溫酒、鹽湯送下。虛寒甚者。加川烏(炮)一兩。堅脹久不消者。加硃砂二錢。醋煮旋入。

十七筆

【薑桂丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治五飲。

藥品 乾薑(炮)、肉桂、各八兩。白朮、一斤。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。熱湯送下。

十八筆

【雞腸散】

發明 見張氏方。

功用 治膀胱有熱。小便不禁或遺尿。

藥品 雞腸草、龍骨、麥門冬(去心焙)、白茯苓、桑螵蛸、各五錢。牡蠣粉、七錢五分。

制法及用法 搗爲粗散。每

服一錢。清水一小盞。加生薑、少許。大棗、二枚。煎至六分。去滓溫服。量兒大小加減。

二十一筆

【辟瘟散】

發明 驗方。

功用 治寒凝腹痛。

藥品 麝香、四分。生香附、一錢八分。硫黃、五分。肉桂、八分。母丁香、一錢四分。

制法及用法 除麝香、硫黃另研外。餘藥共研和勻。每次一分。開水送服。

清暑類

二 筆

【二香散】

發明 見沈全齋沈氏尊生書。

功用 治暑風。

藥品 香薷、香附、各二錢。荷朮、蘇葉、陳皮、各一錢。厚朴、扁豆、甘草、各五分。

制法及用法 加生薑三片。水二二片。葱白二莖。清水煎服。

【二香散】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治暑溼相搏。霍亂轉

筋。煩渴悶亂。

藥品 檀香、香薷、白朮、厚朴、陳皮、茯苓、半夏、紫蘇、桔梗、白芷、芡實、扁豆、各一錢。大腹皮、甘草、各五分。

制法及用法 清水二鐘。加生薑五片。葱白三根。煎至一鐘。不拘時服。

【八寶紅靈丹】

功用 治霍亂痧脹、肢厥脈伏、轉筋昏暈。瘴癘時疫。暑毒下痢等證。並治喉痹牙疳諸病，湯火金刀諸傷。

藥品 硃砂、牙硝、各一兩。雄黃(飛)、蓬砂、各六錢。礞石(煨)、四錢。梅花冰片、當門子、各三錢。飛金、五十頁。

制法及用法 擇吉日淨室中、各研極細。再研勻。瓷瓶緊貯。鎔蠟封口。毋使泄氣。內症每服一分。涼開水送下。小兒減半。孕婦忌服。外症均搽患處。若以此佩帶身上。可辟疫氣。牛馬羊瘟。以此點其眼即愈。

三 筆

【三香寶暑散】

發明 驗方。

功用 治七十二種痧證及霍亂轉筋。

藥品 檀香、降香、沉香、細

辛、各三錢。荊芥、四錢。鬱金、一錢。

制法及用法 生曬研末。每服一錢。重者二錢。小兒減半。涼茶吞服。忌米飲。或研末滾水調丸如綠豆大用亦可。勿令洩氣。只可少服。

四 筆

【六一散】

發明 見劉河間方。

功用 治諸熱症。及熱泄煩躁。小便不通。石淋。癰疹色紫黑者。

藥品 桂府滑石(水飛過淨)、六兩。甘草(去皮)、一兩。

制法及用法 研爲細末和勻。每服一錢。冷熱水。或薄荷湯、燈心湯調下。疹子、冬日溫水調。夏日新汲水調下。

五 筆

【白荷花露】

功用 其性苦甘溫無毒。功能清暑。涼脾。清熱。止血。治喘嗽。煩渴。痰血。安胎。爲夏月常服之妙品。

八 筆

【臥龍丹】

功用 治諸痧中惡。霍亂五絕。諸般卒倒。不省人事。療

癰疽、發背。蛇蝎蜈蚣咬傷。

藥品 西牛黃(一作五分)、金箔(飛、一作十五張)、各四分。冰片(一作八分)、荊芥、羊躑躅(一作六分)、各二錢。麝香、五分。硃砂、六分(水飛、一作四分)。豬牙皂角、一錢五分(一作六分)。燈心炭、二錢五分(一作四錢)。一方無荊芥。有北細辛、五分。白火硝、明月石、各一錢。蟾酥、一錢五分。

制法及用法 共研細末。瓷瓶密收。勿使泄氣。每用少許。吹入鼻中。得嚏立愈。垂危重症。亦可以涼水調灌少許。瘡瘍蟲咬。用酒調塗。凡暑月入城市。抹少許於鼻孔。可辟穢惡諸氣。孕婦忌服。

參考 本方去金箔、荊芥、硃砂。加細辛、蟾酥。名神效搐鼻散。治同。出霍亂論方。

【枇杷葉散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治中暑伏熱。煩渴引飲。咽喉惡心。頭目昏眩。

藥品 枇杷葉(去毛炙)、陳皮(湯浸、去瓤焙)、丁香、厚朴(去皮塗薑汁炙)、各五錢。白茅根、麥門冬(去心)、乾木瓜、甘草(炙)、各一兩。香薷、七錢五分。

制法及用法 搗羅爲末。每服二錢。清水一盞。加生薑三片。煎至七分溫服。或溫湯調下亦可。如煩躁、井花水調下。小兒三歲以下。可服五分。更量大小加減。

九 筆

【香薷丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 ①治傷暑伏熱。燥渴發悶。頭目昏眩。胸膈煩滿。咽喉惡心。口苦舌乾。肢體困倦。不思飲食。或發霍亂。吐利轉筋。②治夏秋臟腑冷熱不調。飲食不節。暑熱乘之。陽氣爲陰邪所遏。致頭痛發熱。惡寒煩躁。口渴引飲。腹中不和。心腹疼痛吐瀉者。

藥品 ①香薷(去根)、一兩。紫蘇(去粗梗)、乾木瓜、藿香(洗去砂土)、茯神(去木)、各五錢。甘草(炙赤)、檀香(剉)、丁香、各三錢五分。②香薷、二錢。厚朴(薑汁炒)、一錢。白扁豆(炒研)、一錢五分。甘草(炙)、一錢。

制法及用法 ①研爲細末。煉蜜和丸。每兩作三十丸。每服一丸至二丸。細嚼溫湯送下。②上係飲量。丸量準此酌

加。泛丸冷服。身熱欲得汗者。熱服。中暑熱盛、心煩口渴者。去扁豆。加黃連。溼盛加茯苓、木瓜。以去脾溼。暑溼內傷。加參、芪、橘、朮、苓、草以益氣調中。隨症加減。以憑香薷之用。

參考 ①方完全照和劑局方製成。②方即和劑局方香薷飲之藥品爲丸服。故藥肆於①方上加和劑二字。名和劑香薷丸。於②方則單名香薷丸。以示區別。鄙意不如將香薷飲爲散服(香薷飲原到爲散、清水煎、井中沈冷、服之身熱、欲得汗者、熱服)、即定名爲香薷散(類證活人書方、用香薷四兩、厚朴去皮、薑汁炒、黃連薑汁炒、各二兩、甘草五錢、研爲末、每服四錢、服法同香薷飲、證治準繩方、用香薷二錢、白扁豆炒去殼、打碎、厚朴薑汁製、各一錢、或加茯苓、砂咀、服法大致相同、俱名爲香薷散)。較爲得當。至於兩方適用之範圍。①方宜於中暑熱閉而外感不甚重者。②方則治傷暑伏熱而貪涼飲冷過甚者。否則內無大寒。脾無鬱火。上吐下瀉。治以丁香。是揚湯止沸反助火也。只可如②方之但用香薷。以香薷芳香辛溫。能發越陽氣。有微上

受暑之功。故治暑者君之。然勞倦內傷。必用清暑益氣。內熱大渴。必用人參白虎。若用香薷。是重虛其表。而反濟其內熱矣。氣虛者尤不可服。㊟方亦宜審而用之。

【香薷散】

發明 見朱肱類證活人書。

功用 治霍亂轉筋。

藥品 香薷、四兩。厚朴(去皮、薑汁炒)、黃連(薑汁炒)、各二兩。甘草、五錢。

制法及用法 研爲末。每服四錢。清水煎服。不犯鐵器。慢火煎之。治吐利霍亂。須井中沈令極冷。頓服之。乃效。

【香薷散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治伏暑吐瀉。霍亂轉筋。

藥品 香薷葉、二錢。白扁豆(炒、去殼打碎)、厚朴(薑汁製)、各一錢。一方有茯苓。

制法及用法 咬咀。清水一大盞。酒一分。慢火濃煎至六分。去滓。井中浸令冰冷。不拘時頓服。或清水煎。候溫。調益元散二匙服。

【飛龍奪命丹】

發明 近時通行方。

功用 治痧脹疔痛。霍亂轉筋。厥逆脈伏。神昏危急。及

受溫暑毒疫穢惡陰晦諸邪。眩暈痞脹。腎亂昏狂。或卒倒身強。遺溺不語。身熱痰壅。宛如中風。或時疔逆傳。神迷狂譫。小兒驚癇。角弓反張。牙關緊閉。

藥品 牛黃、二錢。辰砂(飛)、二兩。麻黃(去節)、冰片、各四錢。人中白(漂淨)、八錢。月石、麝香、珍珠、牙皂、各三錢。腰黃、燈草灰、各一兩。青黛(飛)、明礬、各五錢。蟾蜍、銀硝、各一錢五分。赤金箔、三百頁。

制法及用法 各研極細末。裝入瓷瓶內。封固。勿令洩氣。每用少許。吹鼻取嚏。重者再用一分。開水調服。小兒減半。孕婦忌服。

參考 此方芳香辟穢。於化毒驅邪。宣氣通營。有斬關奪隘之功。具起死回生之力。無論家居遠出。皆宜備之。所謂痧氣飛龍奪命丹者即此。亦與外科用飛龍奪命丹有別也。

十 筆

【益元散】

發明 見劉河間方。

功用 止渴。除煩。降火。利尿。清暑熱。利小便。催生。下乳。治暑傷元氣。表裏俱

熱。面赤氣粗。煩渴引飲。小便短赤。霍亂吐瀉。下利腸澼。及積聚水畜。裏急後重。暴注下迫。石淋等症。婦人善搏血崩。妊娠霍亂。產後。

藥品 桂府滑石、六兩(臠片者水飛)。甘草(炙)、六錢、(生)、四錢。

制法及用法 加辰砂三錢。研爲極細末。每服三錢。新汲水或溫酒調下。熱吐用薑汁調燈心湯下。吐甚者。井花水下。如發故溫病熱病。加葱白、五六莖。香豉四合。清水煎。溫服。白痢加吳茱萸。血痢加紅麴。止瀉加炮薑(兼消飲食)。治痢加荷葉(兼散肝火)。肺熱咳嗽者。加薄荷。胃熱口渴者。加石膏。小兒身熱咳嗽。微帶驚風者。燈心湯調服。

參考 元氣爲暑熱所傷。既不能用參耆以補氣。致邪愈甚。亦不能用苓連以清熱。致氣更傷。但滑石稟土中汁和之氣。寒能勝熱。甘不傷脾。含天乙之精。而具流走之性(異於石膏之凝滯)。能上清水源。下通水道。蕩滌六腑之邪。俾暑熱從小便而泄。甘草稟草中沖和之性。調和內外。止渴生津。用以爲佐。保元氣而瀉虛火。則五臟自和矣。然心爲五

臟主。暑熱擾中。神明不安。必得硃砂以鎮之。則神氣方可適復。涼水以滋之。則邪熱方可急除也。並治熱痢初起。裏急後重者。以滑可去蓄也。催生下乳。積聚蓄水等證。亦同此義。惟老人虛人及病後傷津。小便不利者。均忌之。

【消暑丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治傷暑發熱。頭痛眩暈。嘔逆瀉利。煩渴引飲。脾胃不和。夏日常服。止瀉。利小便。

藥品 半夏、一斤(用醋五升煮乾)。生甘草、茯苓(去皮)、各八兩。

制法及用法 研爲細末。薑汁煮米糊爲丸(勿見生水)。如梧桐子大。每服五十丸至七八十丸。不拘時熱湯、或酸漿水、烏梅湯、淡醋湯送下。痰飲停積者。生薑湯下。

參考 此方爲夏月不可缺少之劑。消暑在消其溼。故於二陳湯內除去橘皮。而倍用半夏爲君。又以半夏性燥。故用醋煮以斂其性。而使之下行。且不耗津液也。其用生甘草、茯苓者。不忘滌痰消溼之本意也。去橘皮者。惡其上升耗氣。

也。夏月之氣。易於耗散。一切破氣之藥。皆當禁用。不獨此方之槓皮也。

十一筆

【清六丸】

發明 見王肖堂證治準繩。

功用 治溫熱泄瀉。

藥品 滑石、六兩。甘草、一兩。紅麴、五分。

制法及用法 共研細末。米飯爲丸。如梧桐子大。每服三四十丸。熱湯送下。

【清暑益氣丸】

發明 見李東垣方。

功用 治長夏溼熱蒸炎。四肢困倦。精神減少。頭痛身熱。氣高心煩。自汗口渴。便黃溺赤脈虛者。

藥品 黃芪(酒炒、汗少減五分、一作蜜炒)、蒼朮(泔浸、去皮、瀝油炒、一作一錢、一作五分)、各一錢五分。升麻、一錢(醋洗、一作醋炒、一作炙、一作七分、一作五分)。人參(去蘆、一作六分)、白朮(鹽炒)、陳皮(炒)、神麴(炒)、澤瀉(一作二分、一作三分)、各五分。甘草(炙)、黃蘗(鹽酒浸炒)、乾葛(酒燉、一作二分)、青皮(去蘆、麸炒、一作二分)、當歸身(酒洗)、麥門冬(去心)、各三分。五味子

(杵)、九粒。一方無黃蘗。

制法及用法 上係湯量。丸量準此酌加。研細。薑棗煎湯泛丸。如梧桐子大。每服三四錢。食遠熱湯送下。

參考 長夏兼暑溼兩氣。暑傷則表氣易泄。溼傷則中氣不固。黃芪。所以實表。白朮、神麴、甘草。所以調中。醋炙橫流。肺金受病。人參、五味、麥冬。所以補肺、斂肺、清肺。經所謂扶其所不勝也。火盛則水衰。故以黃蘗、澤瀉。滋其化源。津液亡則口渴。故以當歸、乾葛。生其胃液。清氣不升。升麻可升。濁氣不降。二皮可理。蒼朮之用。尤溼令之要品也。

十二筆

【痧藥蟾酥丸】

發明 驗方。

功用 治暑月食涼飲冷。食物不化。兼吸穢氣。成痧腹脹痛。或霍亂吐瀉者。

藥品 蟾酥(燒酒化)、九錢。天麻(焙乾)、腰黃、礞砂(均飛)、麻黃(去節焙)、各三兩六錢。甘草(去皮、微炒)、四兩四錢。茅朮(米泔水浸、切、焙)、三兩。麝香、三錢。大黃(鹽乾)、六兩。丁香、六錢。

制法及用法 生曬各取淨粉。以糯米粥漿和杵丸。如葉顛子大。辰砂爲衣。每服七丸。納舌下。少頃陰陽水送下。若研細吹鼻亦可。

參考 一方有牙皂。無天麻、麻黃、甘草、大黃。各研極細。蟾酥打丸。如鳳仙子大。仍用辰砂爲衣。用法同上。一方有廣木香、白檀香、赤金箔。無天麻、麻黃、甘草、大黃。各取淨末。高粱酒化。蟾酥泛丸。如蘿蔔子大。金箔或仍用辰砂爲衣。每服三五丸。冷茶送下。孕婦忌服。

十四筆

【碧玉散】

發明 見劉河間方。

功用 功同益元散。更能消斑。兼散肝火。

藥品 即益元散加青黛。參閱益元散。

十六筆

【諸葛行軍散】

功用 辟疫氣(搐鼻)。去風熱障翳(點之)。治口瘡喉痛。霍亂痧脹。山嵐瘴癘。及暑熱穢惡諸邪。直于包絡。頭目昏暈。不省人事。危急等症。

藥品 牛黃、麝香(當門子)、

珍珠、梅花冰片、蓬砂、各五錢。明雄黃(飛淨)、八錢。火硝、三分。飛金、二十張。

制法及用法 各研極細末。再合研勻。瓷瓶密收。以蠟封固。每服三五分。涼開水調下。

參考 按人馬平安散。即此方加硃砂。去麝香、珍珠、牛黃(一方有牛黃也)。主治相同。

二十筆

【藿香露】

功用 其性辛微溫無毒(或作甘苦)。而偏於散。功能清暑。正氣。和中。開胃。快氣。止嘔。去惡氣。進飲食。即以藿香蒸氣所取之露也。暑時穢。爲夏令不可少之品。

利溼類

二筆

【二妙丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治溼熱。筋骨疼痛。痿弱。瘡瘍等症。

藥品 黃柏(炒)、蒼朮(炒去皮)、各等分。

制法及用法 研爲末。煉蜜或薑汁和丸。如梧桐子大。每

服三錢。熱湯送下。

參考 有氣者加氣藥。血虛者加補血藥。或以二妙爲君。加甘草、羌活、陳皮、芍藥、威靈仙、酒炒尤佳。

【二妙散】

功用 治下體溼熱。筋骨疼痛腫。

藥品 黃蘗(酒炒、一作薑汁製數次淨)、蒼朮(茅山者、去皮切、麻油炒淨)、各等分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。生薑研入湯煎沸。空腹時調下。痛甚者。以薑汁熱服之。表實氣實者。溫酒少許作之。有氣者。加氣藥。血虛者。加補血藥。一法二妙爲君。加甘草、羌活、各二錢。陳皮、芍藥、各一錢。威靈仙(酒炒)、一錢五分。研爲末服。尤佳。

【十全丹】

發明 見玉肯堂證治準繩。

功用 治脚氣上攻、心腎相繫、足心隱痛。小腹不仁。煩渴。小便或秘或利。關節攣痺疼痛。

藥品 肉苁蓉(酒浸)、石斛、狗脊、萆薢(酒浸)、茯苓(去皮)、牛膝(酒浸)、枸杞子、遠志(去心)、各一兩。熟地黄、杜仲(去粗皮、剉、炒去絲)、各三兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五十丸。溫酒或鹽湯送下。

三 筆

【三仙丹】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 除寒溼。

藥品 生烏頭、一兩(去皮、剉作骰子塊、鹽五錢、同炒黃、去鹽)。茴香、三兩(炒香)。蒼朮、二兩(米泔浸一宿、刮去皮、切碎、葱白一握、同炒黃、去葱)。

制法及用法 研爲末。酒煮麴糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹溫酒或鹽湯送下。

【三妙丸】

功用 治溼熱下流。兩脚麻癢。或如火烙。

藥品 蒼朮(米泔浸)、六兩。黃蘗(酒炒)、四兩。牛膝、二兩。

制法及用法 研爲細末。水煮麴糊和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。溫鹽湯送下。

【三妙散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 止癢。溼。治臍中出水及溼癬。

藥品 檳榔、蒼朮、黃蘗、各

等分。

制法及用法 研爲細末，乾摻患處。溼癬以蘇合油拭擦。

【小溫中丸】

功用 治黃胖。

藥品 鐵砂、一斤(醋炒)。

制法及用法 研爲末。入糯米(炒極黃、研爲末)一斤。醋煮米糊和丸。如梧桐子大。每服四五十丸。米飲送下。忌口。輕者服五兩。重者不過七兩。即愈。

參考 此方宜癯瘠之人服之。蓋其飲食無積。但補陰燥濕可矣。

【小溫中丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治脹實。黃胖足腫。食少口淡。或腹脹內熱。小便不清。脾虛肝旺。不能健運。雖有積聚。不可下者。

藥品 陳皮、半夏(湯泡、去皮垢)、神麴(炒)、茯苓、各一兩。白朮、二兩。香附(不可烘曬)、鐵砂(醋炒紅)、各一兩五錢。苦參(炒)、黃連(炒)、各五錢。甘草、三錢。

制法及用法 研爲末。米醋清水各一盞。打糊爲丸。如梧桐子大。每服七八十丸。用白朮、六錢。陳皮、一錢。生薑、一片。清水煎湯送下。虛甚者。

加入參、一錢。各用本方。去黃連。加厚朴、五錢。忌口。病輕者服六七兩。小便即長。病甚者服一斤。小便始長。

【大溫中丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治脾虛溼熱內阻。氣化不行。腹膨肢腫。黃胖水臃。飲食減少。

藥品 厚朴(薑製黑)、五兩。蒼朮(泔水浸)、五兩。白朮、三兩。廣皮、三兩。白芍、五兩。粉草、二兩。茯苓、三兩。苦參、春夏二兩、秋冬一兩。青皮、六兩。香附(製、童便浸、春夏一宿、秋冬三宿)、十六兩。山楂、五錢。針砂、十六兩(炒紅醋煨三次)。

制法及用法 研爲細末。神麴粉同醋和爲丸。每服三四十丸。瘦人米飲送下。肥人白朮湯下。忌油膩生硬難化之物。

四 筆

【五皮散】

發明 見華佗中藏經。

功用 治風溼客於脾經。氣血凝滯。致面目虛浮。四肢腫滿。心腹膨脹。上氣促急。並治皮水。妊娠胎水。

藥品 五加皮、地骨皮、生薑皮、大腹皮、茯苓皮、各等分。

一方加白朮。

制法及用法 咬咀。每服三五錢。清水煎。不拘時熱服。一方應洗香、木香、沖入。

【五苓散】

發明 見傷寒金匱方。

功用 治水分有熱。小便不利。煩渴。或水飲內停。臍下悸。

藥品 茯苓(去皮)、豬苓、白朮(土炒)、澤瀉、各三分。桂枝(去皮)、二分。

制法及用法 爲散。以白飲和服方寸匕。一日三服。多服暖水。汗出愈。疝氣卒痛。小便澀。加川楝子一分。下部淫瘡。每服二錢。熱湯調下。女孩陰腫。清水煎服。宜加其量。

參考 此爲治水熱小便不利之主方。君澤瀉之鹹寒。走水府而瀉熱邪。臣二苓之淡滲。通水道而瀉水熱。佐白朮之香燥。健運脾土以輸水。使桂之辛溫。蒸化三焦以行水。澤瀉得二苓。則下降利水之力足。白朮得桂。則上升通陽之效捷。欲其發散表邪。則用桂枝而熱飲。欲解膀胱虛寒。則用肉桂而熱飲。欲利小便則冷飲。使澤瀉得力。欲吐則溫服。而復以熱湯探之。惟不可誤投於陰虛水竭之虛證。金匱

要略方以木方五分。與茵陳一錢和勻。名茵陳五苓散。治黃疸。蓋溼熱凝鬱。薰蒸成黃。非茵陳蒿推陳致新。不足以除熱退黃。非五苓散轉輸利溼。不足以發汗行水。二者合用。有表裏兩解之妙。

【五淋散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治五淋。

藥品 山茵陳、淡竹葉、各一錢。木通、滑石、甘草(炙)、各一錢五分。山梔仁(炒)、赤芍藥、赤茯苓、各二錢。

制法及用法 清水二鍾。煎至一鍾。食前服。

【五加皮丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治腫溼。

藥品 五加皮(酒浸)、遠志(酒浸)、各四兩。

制法及用法 曬乾研末。酒糊丸。每服四五十丸。空腹時溫酒送下。

【木通散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣。遍身浮腫。喘促煩悶。小便不利。

藥品 木通(去皮)、紫蘇葉、豬苓(去皮)、各一兩。飛煨白皮(薑汁拌炒)、檳榔、赤茯苓

(去皮)、各二兩。

制法及用法 咬咀。每服四五錢。葶水一鍾半。加生薑五片。葱白三莖。煎至一鍾。去渣。空腹時溫熱服。

【中滿分消丸】

發明 見李東垣方。

功用 治中滿熱脹。二便不利。

藥品 厚朴、一兩(薑汁炒、一作五錢)。茯苓(去麩炒、夏月用一兩五錢)、半夏(薑汁炒)、川黃連(薑汁炒)、江枳殼(一作枳實)、各五錢。澤瀉、三錢(一作五錢)。乾薑、茯苓、各二錢(一作各五錢)。白朮(同枳殼拌炒焦、一作五錢)、豬苓(去皮、一作五錢)、人參(去蘆、一作五錢)、甘草(炙)、各一錢。

制法及用法 除茯苓澤瀉乾薑外。餘研為細末。和勻。湯浸熟餅為丸。如梧桐子大。每服一百丸(一作二錢)。食後沸湯送下(一作早晚燈心湯送下、焙熱服)。寒脹忌之。脾胃氣滯。食積脹滿。加陳皮、三錢(一作四錢、一作五錢)。縮砂仁、二錢(一作五錢)。經脈溼滯。腹皮腿臂痛不可拊者。加片子薑黃、一錢。肺熱氣化不行。溺底喘渴者。加知母、四錢(炒、一作三錢)。

參考 東垣分消湯。主治中滿寒脹。溫中散滯。此則上治中滿熱脹。清熱利水。原其立方之旨。總不外內經平治權衡。去宛除壅。開鬼門。潔淨府等法。所謂寒脹者。乃下焦陰氣逆滿。壅遏中焦陽氣。有似乎陰之象。故藥中雖用烏頭之辛熱。宜布五陽。為辟除陰邪之嚮導。即用逐寒之苦寒以降泄之。若非風水府脈脹浮。症起於表者。孰敢輕用開鬼門之法。以鼓動其發達四塞乎。熱脹用黃芩之清揚。以降肺熱。則用豬苓澤瀉。以利導之。故專以潔淨府為務。無事開鬼門。宜布五陽等法也。

五 筆

【白朮酒】

發明 見陳言三因極一病證方論。

功用 治中溼骨節疼痛。

藥品 白朮、一兩。

制法及用法 酒三盞。煎一盞。不拘時頻服。不能飲酒。以水代之。

【白朮丸】

功用 治淋濁初起。小便澀痛。溼熱下注。

藥品 川大黃、穿山甲、雄黃、昆蟲、各四兩。乳香、沒藥、

各三兩。

制法及用法 共研細末。酒泛爲丸。滑石六兩爲衣。每服二錢。熱湯送下。不宜多服。

【立消散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治膀胱熱毒。陰囊赤腫腹痛。

藥品 赤小豆、赤芍藥、生枳殼、蜆殼、瓜化朴硝（另研後入）、各五錢。

制法及用法 不過火。曬乾。研爲末。側柏枝煎湯。候冷。調二錢或三錢。塗腫處。仍服五苓散。加車前子、澤苡仁。清水煎服。

【代木丸】

發明 驗方。

功用 治皮膚黃腫如土色者。

藥品 茅荒（炒）、二斤。神麴（炒）、四兩。皂礬、一斤（醋拌曬乾煨透）。

制法及用法 共研末。好醋泛丸。如梧桐子大。每服三四十丸。陳酒或米湯送下。日服二三次。

六 筆

【舟車丸】

發明 見劉河間方。

功用 治血熱。水腫。水脹。

飲滯。積氣。形氣俱實者。

藥品 黑牽牛、四兩（炒、一作四錢）。大黃、二兩（酒浸）。甘遂（麴裏煨）、大戟（麴裏煨）、芫花（醋炒）、青皮（炒、一作五錢）、橘紅（一作五錢）、各一兩。木香（煨）、檳榔、各五錢。輕粉（另研）、一錢。一方無檳榔。

制法及用法 研爲細末。水泛爲丸。如椒子大。每服五分。五更時熱水送下。大便利三次爲度。若一二次不通利。次日仍服。或六分七分。漸加至一錢。若服後大便利四五次。或形氣不支。則減其服。三分二分俱可。或隔一二三日服一次。以愈爲度。甚者忌食鹽齋百日。

參考 此治水腫之主方也。故備舉甘遂、大戟、芫花、牽牛、大黃。直攻水之巢穴。使從大小二便而出。佐青皮、陳皮、木香以行氣。使氣行則水行。可以腫脹兩消。其尤峻厲之處。則在少加輕粉。使諸攻水行氣之藥。迅烈莫當。無微不入。無窮不達。用之若當。功效神奇。百發百中。然非形實或邪盛者。不可輕投。

七 筆

【防己散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治皮水腫。如裹水在皮膚中。四肢習習然動。

藥品 漢防己、桑白皮、黃耆、桂心、各一兩。赤茯苓、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一大盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。

八 筆

【羌活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 祛風利溼。

藥品 羌活、茯苓、薏苡仁、各等分。

制法及用法 每服三五錢。清水煎。竹瀝一匙沖服。

【治濁固本丸】

發明 見醫學正傳方。

功用 治胃中溼熱。流入膀胱。下濁不止。

藥品 甘草(炙)、三兩。豬苓、二兩五錢。白茯苓、縮砂仁、益智仁、半夏(薑製)、黃蘗(炒)、各一兩。黃連、蓮蕊、各二兩。

制法及用法 研為末。蜜浸棗餅和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。空腹時溫酒送下。

九 筆

【香蘇散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治水氣虛腫。小便赤澀。

藥品 陳皮(去白)、一兩。防己、木通、紫蘇葉、各五錢。

制法及用法 研為末。每服二錢。清水二盞。加生薑三片。煎至一盞。去滓食前溫服。

【封臍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治臍內出水不乾。

藥品 當歸頭(去蘆)、一錢。絲(縛臍帶、燒灰、或舊綿)、一錢。

制法及用法 研為極細末。加麝香一小字。同研。每月少許。乾摻臍上。

【禹餘糧丸】

發明 見三因極一病證方。

功用 治水氣膨脹。腳膝腫。三焦痞滿。小便不利。

藥品 禹餘糧、三兩。蛇含石、三兩(大者以新鐵銚盛、入炭火中、燒石與銚子一般紅、用鉗取石、傾入醋中、候冷、取出、研極細)。鎮砂、五兩(先以水淘淨、炒乾、入餘糧一處、用米醋二升、煮銚內煮醋乾為度、後用銚並藥入炭中、燒紅鉗出、傾

藥淨礱地上候冷、再研細)。羌活、木香、茯苓、川芎、牛膝(酒浸)、桂心、白豆蔻(炮)、六茴香(炒)、蓬朮(炮)、附子(炮)、乾薑(炮)、青皮、荆三棱(炮)、白朮、當歸(酒浸一宿)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。入前三藥拌勻。以湯浸蒸餅。搗去水。和藥再拌極勻。丸如梧桐子大。每服三十丸至五十丸。食前溫酒、或熱湯送下。最忌鹽。一毫不可入口。否則發疾愈甚。但試服藥。即於小便內旋去。不動臟腑。病去日。日三服。兼以溫和調補氣血藥助之。熱濕忌服。

十 筆

【茵陳五苓散】

發明 見金匱要略。

功用 治黃疸。

藥品 茵陳、一錢。五苓散、五分。

制法及用法 和勻。先食飲服方寸匕。日三服。

參考 黃疸由溼熱瘀滯。蒸成黃。非茵陳不能除。故新。不足以除熱退黃。非五苓散不能利溼。不足以發汗行水。二者合用。有表裏兩解之妙。

【茵陳五苓散】

發明 見玉肯堂證治準繩。

功用 治傷寒溼熱。發爲黃疸。小便黑赤。煩渴發熱。

藥品 茵陳、五錢。五苓散、一兩。車前子、一錢。木通、柴胡、各一錢五分。

制法及用法 分爲二服。清水一碗。加燈草、五十莖。煎至八分。去渣。食前服。渣再煎服。服至小便清利爲度。傷酒成疸。加乾葛、二錢。

【除溼丹】

發明 見統旨方。

功用 治腎著。

藥品 檳榔、竹瀝、芍藥(煨)、威靈仙、澤瀉、草薢、各二兩。乳香、沒藥、各一兩。大戟(炒)、三兩。陳皮、四兩。黑牽牛頭末、一兩。

制法及用法 研末。麵糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時燈草湯送下。

【桂苓丸】

功用 治溼氣上逆。水泛爲痰。逆而涌上。及冒暑煩渴。飲水過多作瀉。

藥品 肉桂、一兩。茯苓、二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。每丸重二錢。每服一丸。沸湯送下。

十一筆

【清肺散】

發明 見李東垣方。

功用 治濕而小便閉。或黃或溼。

藥品 茯苓、二錢。豬苓、三錢。澤瀉、瞿麥、虎珀、各五分。燈心、一分。藟藟、木通、各七分。通草、二分(一作六分)。車前子(炒)、一錢。一方有白朮。

制法及用法 研爲細末。每服三五錢。沸水一盞半。煎至一盞。食前稍熱服。

十二筆

【萆薢分清丸】

發明 見楊氏方。

功用 治真元不固。時下白濁。凝如膏脂。或小便頻數。

藥品 川萆薢、益智仁(鹽水拌一宿炒)、石菖蒲(鹽水炒)、烏藥、各等分。一方加茯苓、甘草。

制法及用法 上係飲量。丸量準此酌加。研細水泛爲丸。每服三錢。空腹時。淡鹽湯送下。

參考 精通尾腎。洩出膀胱。溼潤攸分。源流各異。洩便不禁。乃下焦陽氣失職。故用益智之辛溫以約制之。得鹽

之潤下。並烏藥之降氣。則不致上竄。萆薢能清胃中之濁溼使下滲。菖蒲則通九竅而利小便。此外不及瀉腎固精之品者。溼濁去則分泌自清也。

【黃病絳礬丸】

發明 驗方。

功用 治溼熱腸紅。脫力勞傷。黃病腹脹。腿足浮腫。食積、痞塊瘕瘕。

藥品 絳礬、六兩。厚朴、白朮(炒焦)、茯苓、各三兩。枳殼(炒焦)、茅朮(炒焦)、廣皮、各二兩。一方無白朮、茯苓、枳殼、茅朮。有甘草。

制法及用法 共研細末。米湯泛丸。如梧桐子大。每服二三十丸。熱湯送下。

十三筆

【葶藶丸】

發明 見劉河間方。

功用 治涌水疾。行則胸噎。如蠶食水漿之聲。

藥品 甜葶藶(礬紙炒)、澤瀉、椒目、杏仁、桑白皮、豬苓(去黑皮)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。麥白湯送下。以利爲度。

十四筆

【蒼朮丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治飲癖。

藥品 蒼朮、一斤(去皮切片)。

制法及用法 研爲細末。加麻油、五錢。清水二錢。漚研汁。入大棗、五十枚(去皮核)。搗糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。漸加至一二百丸。空腹時熱湯送下。忌食桃李雀肉。服三月愈。常服不嘔不吐。胸膈寬利。初服時。必覺微燥。以山楂末煎湯解之。久則自不覺燥。

潤燥類

四筆

【五仁丸】

發明 見世醫得效方。

功用 治氣血虛弱。津枯便秘。

藥品 桃仁、杏仁(炒、去皮尖雙仁)、各一兩。柏子仁、五錢。松子仁、一錢二分五釐。郁李仁、一錢(炒、一作二錢)。陳皮、四兩(另爲末)。

制法及用法 研如膏。再入陳皮末研勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時米飲送下。

五筆

【生地黄飲】

發明 見陳履新簡易方論。

功用 治消渴咽乾。口赤煩燥。

藥品 生乾地黄(洗)、熟乾地黄(洗)、人參(去蘆)、黃耆(蜜炙)、天門冬(去心)、麥門冬(去心)、枳殼(去蘊炒)、石斛(去根炒)、枇杷葉(去毛炒)、澤瀉、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 剉散。每服三錢。清水一盞。煎至六分。去滓。食後臨臥服。

參考 此方乃全用二黃丸甘露飲料。生精補血。潤燥止渴。佐以潤瀉。枳殼疎導二腑。使心火下行。則小腑清利。肺潤經澤。則大腸流暢。宿熱既消。其渴自止。

【生乾地黄丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人客熱。口赤頭疼。口底心煩。飲食無味。

藥品 生乾地黄、一兩。羚羊角屑、白蘇皮、萎蕤、各五錢。黃連(去鬚)、七錢五分。黃耆

(炙微赤)、五錢。麥門冬、二兩(去心焙)。玄參、犀角屑、地骨皮、甘草(炙微赤)、各五錢。川大黃、一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和搗二三百杵爲丸。如梧椰子大。每服三十丸。不掠時熟湯送下。

六 筆

【地黃丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治肝虛。

藥品 生地黃、甘菊花、防風、杜蘅、決明子、石決明、白芍、茯神。

制法及用法 研爲細末。水泛爲丸。熟湯送下。

【地黃煎】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒壯熱心煩。臥不安。

藥品 生地黃汁、一升。白沙蜜、三合。酥、三個。生門冬汁、三合。

制法及用法 重湯煮至成膏。每服數劑。

【地骨皮散】

發明 見錢乙方。

功用 治虛熱作渴。傷寒壯熱餘熱。

藥品 地骨皮、知母、甘草(炙)、半夏(洗七次)、銀柴胡(去蘆)、人參、赤茯苓、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。加生薑三片。清水煎。食後溫服。童兒人小加減。有驚熱。加蟬蛻、天麻、黃芩。

參考 此即小柴胡湯加減法。自汗者宜之。

七 筆

【含化丹】

發明 見寇宗奭方。

功用 治婦人肺熱久嗽。身如炙。肌瘦。將成肺勞。

藥品 枇杷葉(去毛)、桑白皮、款冬花、木通、紫菀、杏仁、各等分。大黃、減半。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如櫻桃大。食後夜臥。含化一丸。

【芎黃散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治臟腑有熱。腹脅妨悶。二便祕塞。

藥品 芎藭、五錢。川大黃(剉、微炒)、郁李仁(湯浸、去皮微炒)、各三分。

制法及用法 搗細羅爲散。每服一錢。溫水半杯調下。量兒大小加減。以利爲度。

【更衣丸】

功用 治津液不足。腸胃乾燥。大便不通。

藥品 硃砂、五錢(研如飛麵)。蘆薈、七錢(研細生用)。

制法及用法 滴好酒少許和丸。如梧桐子大。每服一錢二分。好酒或米湯送下。

參考 胃爲後天之六。不及固病。太過亦病。然太過復有陽盛陰虛之別。兩陽合明而胃家實。仲景製三承氣湯以下之。三陽燥結而津液亡。前賢又製更衣丸以潤之。方中硃砂、以汞爲體。性寒重墜下達。蘆薈、以液爲質。味苦膏潤下滋。衆以大寒大苦性之味。能潤燥結。從上導下。而胃關閉。合以爲丸。兩者相須。得效最宏。奏功甚捷。

八 筆

【青蒿散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人骨蒸勞熱。四肢煩疼。日見羸瘦。

藥品 青蒿、鼈甲(醋炙)、各二兩。柴胡(去苗)、一兩五錢。黃連(去鬚)、黃芩、桑根白皮、白朮、各一兩。梔子仁、知母、各七錢五分。地骨皮、甘草(炙微赤)、各五錢。龍膽草(去蘆)、

一錢五分。

制法及用法 研爲粗散。每服四錢。清水一中盞。加生薑一錢三分。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【青蒿散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治虛勞盜汗。骨蒸潮熱。咳嗽。胸悶。皮毛乾皴。肢節食少。骨節疼痛。咽燥唇焦。煩赤煩燥。渴睡強臭。驚悸羸弱。

藥品 青蒿、天仙藤、鼈甲(醋炙)、香附子(炒去毛)、桔梗(去蘆)、柴胡(去苗)、秦艽、各一兩。烏藥、五錢。甘草(炙)、川芎、各一兩五錢。

制法及用法 每服三錢。加生薑三片。清水煎。不拘時溫服。小兒骨蒸勞熱。肌瘦減食者。每服一錢。清水一盞半。加小麥三十粒。煎服。

【青蒿散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肢體倦冷。虛勞寒熱。

藥品 青蒿(八九月間、將或實時採、去枝梗、童便浸三日、曬乾)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。加烏梅一個。煎至七分。溫服。

參考 此方熱多者宜之。

【卷柏丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 養血。潤燥。治婦人衝任虛。月水不調。赤白帶下。三十六疾。常服和經絡。經五臟。潤肌膚。長髮。去黥。除風。令人有子。

藥品 卷柏(去根)、當歸(洗焙)、艾葉(炒)、各二兩。熟地黃(洗焙)、川芎、柏子仁(微炒)、白芷、肉蓯蓉、牡丹皮、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹食前溫酒或米飲送下。

九 筆

【威靈仙丸】

發明 見危亦林世醫得效方。

功用 治年高氣衰。津液枯燥。大便秘結。

藥品 威靈仙、黃耆(蜜炙)、枳實、各等分。一方有防風。無黃耆。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。不拘時煎湯或白湯送下。忌茶。

【活血潤腸丸】

發明 見證治準繩方。

功用 治大便秘結血秘。時常結燥。

藥品 當歸梢、一錢。防風、二錢。羌活、大黃(煨)、各一兩。麻子仁、二兩五錢。桃仁、二兩(研如泥)。皂角仁(炮、存性、去皮)、一兩。

制法及用法 除桃仁、麻仁。另研如泥外。研爲極細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。熱湯送下。二三服後。須以蘇子麻子粥、每日早晚食之。大便日久再不結燥。餘藥以瓷器盛之。紙密封勿使見風。

參考 方中皂仁。其性得溼則滑。滑則燥結自除矣。

十 筆

【烏金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦女身熱口燥。氣塊築痛。下黃水如葵汁者。

藥品 百草霜(炒)、紫金皮(米泔浸黃、炒黃)、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。空腹時艾湯或醋湯調下。●心膈。瘀血入脛酒下。●白帶。用鯉魚、一尾。去腸。不去鱗。將油髮、一團。入魚肚

內。黃泥固濟。炭火內煨存性。去泥。研魚爲末。每用一錢。以陳酒調。同前藥服。

【神功丸】

發明 見經六益衛生寶鑑。

功用 治三焦氣壅。心腹痞悶。腰腿疼痛。肩背重疼。頭昏面熱。口苦咽乾。心胸煩躁。睡臥不安。及素有脚氣。大便結燥。

藥品 大麻仁(另搗如膏)、人參、各二兩。訶梨勒皮、大黃(錦紋者、麤炭煨)、各四兩。

制法及用法 研爲細末。入麻仁搗研勻。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。食後臨臥時溫湯或溫酒、米飲送下。大便不通。可倍丸數。以利爲度。

十一筆

【麻仁丸】

發明 ①見傷寒金匱方。②見雜天益衛生寶鑑方。

功用 ①治脾約。②順三焦。和五臟。潤腸胃。除風氣。治冷熱壅結。津液耗少。大便艱秘。及虛人便秘。

藥品 ①麻仁、二升(熬曬去殼、另研)、芍藥、枳實(炙、一作鉄炒)、各八兩。大黃、一斤(去皮蒸焙)。厚朴、一尺(去皮炙、一作留汁炒)。杏仁、一升(去

皮尖、熬研作脂)。②大麻仁(另搗研)、郁李仁(去皮另研)、大黃(半生半蒸)、各四兩。枳殼(去蘊鉄炒)、白檳榔(半煨、半生)、菟絲子(酒浸另研)、山藥、防風(去叉枝)、山茱萸、肉桂(去粗皮)、車前子、各一兩五錢。木香、羌活、各一兩。

制法及用法 ①研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸(一作二十丸、一作五十丸)。每日三次。漸加。以大便通利爲度。②研爲細末。入另研藥令勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。臨臥時溫湯送下。

參考 脈浮爲陽盛。脈濇爲陰傷。陽盛陰傷。則腸液枯而輸送難。致成小便多數。大便秘結等症。所謂脾約是也。①方以麻仁之多脂者爲君。杏仁之甘潤者爲臣。枳實、厚朴之順氣行滯者爲佐。大黃之泄熱逐下者爲使。又以煉蜜爲丸以緩行之。使藥力在腸中。少作存留。庶可熱去津回。而大便從此通暢。但此方偏於實症者宜之。若平素氣虛及年老精血枯少者。仍嫌其峻燥。不可輕用。②方更峻燥。藥肆中所售麻仁丸。多自①方配成。③方藥肆中鮮有售者。故又稱④方

爲脾約麻仁丸。俾與^⑤方有別也。又證治準繩方。用麻仁(另研爲泥)、枳殼、人參、各一兩。大黃、五錢。俱爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。亦名麻仁丸。治產後大便秘澀。每服二十丸。空腹時溫酒送下。未通漸加。不可太過。

【麻仁丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後大便秘澀。

藥品 麻仁(另研如泥)、枳殼、人參、各一兩。大黃、五錢。

制法及用法 研末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹時溫酒送下。未通漸加。不得太過。

【通腸丸】

發明 見沈氏尊生書。

功用 治腸癰未成。

藥品 忍冬藤、當歸尾、白芷、皂角刺、乳香、沒藥、甘草、忍豆仁、天花粉。

制法及用法 研細。用白礬、黃蠟各一兩。爲丸服。

【清音丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治久嗽音啞。

藥品 訶子肉、阿膠、天門冬、知母(鹽水炒)、各五錢。黃蘗(蜜炙)、麥門冬、茯苓、當歸

身、生地黃、熟地黃、各一錢。人參、三分。烏梅、二個。人乳汁、牛乳汁、梨汁、各一盞。

制法及用法 煉蜜爲丸。每重一錢。每服一丸。口含化下。

【梅蘇丸】

發明 見簡易方。

功用 止渴生津。治消渴脈熱煩躁。

藥品 白梅肉、紫蘇葉、烏梅肉、各五錢。麥門冬(去心)、七錢五分。百藥煎、三兩。訶梨勒(煨、用皮)、人參、各二錢五分。甘草(炙)、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。煉黃蠟汁和丸。如鷄頭實大。每服一丸。不拘時。含化嚥津。行路解渴。

參考 驗方用鹽梅肉、白糖、冰糖、各六兩。茶葉、薄荷葉、蘇葉、柿霜、麥門冬、各四兩。研末。以鹽梅水烱化。和入二糖爲丸。名梅蘇丸。每重一錢。每服數丸。口含嚥下。生津止渴。商旅行程。佩帶最便。

十五筆

【潤腸丸】

發明 見李東垣方。

功用 潤燥。和血。疏風。治脾胃伏火。痰結。大腸乾燥。或風熱血結。大便秘澀。

不思飲食。

藥品 羌活、當歸尾、大黃(綠礬水浸淨、紙裹煨)、各五錢。麻仁、桃仁(泡、去皮尖、一作生地黄)、各一兩。一方加皂角仁、秦艽、防風、各五錢。

制法及用法 先以麻仁、桃仁。另研如泥。餘研細末。煉蜜或豬膽汁爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。食前空腹時熱湯或溫酒送下。若結在直腸。宜豬膽汁導之。

參考 此方有潤燥和血疏風之功。若因失血。或腎虛。或津液不足。脾氣虧損。當滋陰培補者。皆忌之。

【潤腸丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胸膈痞滿。大便澀滯。

藥品 麻子仁(另研泥)、川大黃(酒煨)、各一兩五錢。當歸尾、枳實(麩炒)、白芍藥、桃仁(另研泥)、升麻、各五錢。人參、生甘草、陳皮、各三錢。木香、檳榔、各二錢。

制法及用法 除桃仁、麻仁外。餘研爲末。入麻桃二仁泥。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服七八十丸。食前溫湯送下。

【潤腸丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生

書。

功用 治血燥快熱。

藥品 川當歸、生地黃、枳殼、桃仁、麻仁、各一兩(或酌加大黃、黃芩)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。熱湯送下。

【潤腸丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治肺腸不潤。

藥品 杏仁、麻仁、枳殼、陳皮、各五錢。阿膠珠、防風、各二錢五分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。老者蘇子湯送下。壯者荆芥湯送下。

瀉火類

二筆

【二聖救苦丸】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治時氣頭痛壯熱。

藥品 生大黃、一斤。豬牙皂莢(去皮弦微炒)、四兩。

制法及用法 研爲末。和勻。水泛丸。每服三錢。無根水送下。弱者減服。

參考 此方用法。與水解散同。但一則治冬疫。一則治春疫。蓋冬疫多寒。非表裏雙解不可。春疫多熱。則泄其裏已足。故水解散爲治冬疫之主方。此爲治春疫之主方。方中以大黃泄其熱。皂莢引其閉。扼要而治。將可去矣。

【人參平肺散】

發明 見李東垣方。

功用 治心火起肺。傳爲肺痿。咳嗽喘滿。喘滿壅盛。胸膈痞滿。咽隘不利。

藥品 人參(一作五分)、甘草(炙、一作五分)、地骨皮(一作五分)、茯苓(一作七分)、天門冬(去心、一作八分、一作五分、一作四分)、各一錢。青皮(一作五分、一作四分)、陳皮(一作五分)、各六錢(一作各一錢)。知母(炒)、一錢五分(一作一錢、一作七分)。五味子、三十粒(搗碎、炒、一作二十粒、一作十粒、一作五分、一作四分)。桑白皮、二錢(炒、一作一錢)。

制法及用法 清水二鍾。加生薑五片(一作三片)。煎至一鍾。食遠溫服(一作每服二三錢)。如熱甚。加黃芩、薄荷葉各一錢。

【八味丸】

發明 見陳修園方。

功用 治腎虛火炎。發熱作渴。口舌生瘡。牙根潰蝕。喉痛喉疾。

藥品 熟地黃(砂仁酒拌、九蒸九曬)、八兩。肉桂、一兩。牡丹皮、澤瀉、茯苓(乳拌)、各三兩。山茱萸肉(酒潤)、山藥、五味子、各四兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。空腹時淡鹽湯送下。

三 筆

【三黃丸】

發明 見李東垣方。

功用 治上焦有熱。致目赤頭痛。口舌生瘡。中焦有熱。致心膈煩躁。飲食不美。下焦有熱。致小便赤澀。大便祕結。或因五臟熱。而生驚癇瘡。及五痔。肛門腫痛。下膿血。

藥品 黃連、黃芩、川大黃(煨)、各十兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜或米糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後熱湯或米飲送下。視臟腑虛實加減。或丸如豆大。用腦麝爲衣。夜間嚙化一二丸。

【三黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱痢腹痛。口舌生

瘡。咽喉刺痛。及一切實火之證。

藥品 黃連、黃芩、黃蘗、各等分。

制法及用法 研爲末。水煮米糊和丸。如梧桐子大。每服七八十丸。熱湯送下。

【三黃散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治腎疳。崩沙。

藥品 西牛黃、大黃、生地黃、木香、青黛、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢匕。熱湯調下。

【大黃散】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治上焦煩熱。不能臥睡。

藥品 大黃、山梔仁、鬱金、各五錢。甘草、二錢五分。

制法及用法 研爲末。每服五錢。清水煎。溫服。微利則已。

【大金花丸】

發明 見張子和方。

功用 治中滿熱極。淋瀝溺血。

藥品 黃連、黃蘗、黃芩、大黃、各等分。

制法及用法 共研細末。水泛丸。如小豆大。每服三十丸。

新汲水送下。

四 筆

【五黃散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治內外俱大熱之證。

藥品 黃連、黃芩、黃蘗、梔子黃、大黃。

制法及用法 研爲末。每用二錢。清水煎服。

【天竺黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治上焦風熱。口鼻生瘡。兩目赤腫。咽喉不利。痰涎壅滯。氣不通暢。驚悸煩悶。神思昏迷。

藥品 天竺黃、鬱金(如無、以山梔仁代之)、茯神(去皮根)、甘草、各五錢。硼砂、牙硝、白芷、川芎、麝香(去絲)、枳殼(麸炒、微黃)、各二錢五分。硃砂(水飛)、二錢。麝香、一字。蟬殼、十五枚(洗去泥土嘴足)。

制法及用法 除硼砂、牙硝、硃砂、麝香。乳鉢細杵外。餘焙乾。研爲末。同入乳鉢內。再杵勻。每服五分。或一錢。不拘時溫薄荷湯。或麥門冬湯調下。

【牛黃清心丸】

發明 見萬氏方。

功用 治傷寒邪入心包。中風痰火祕結。癰瘰眩暈。語蹇神昏。小兒驚風痰涎。手足牽掣。疹疹煩躁。

藥品 牛黃、二分五釐。川連、五錢。黃芩、二錢五分。生梔子、三錢。鬱金、一錢(一作二錢)。辰砂、一錢五分。

制法及用法 共研細末。照神水調神麵糊爲丸(一作蒸餅爲丸)。每丸重四分五釐。每服一丸。燈心湯送下。

參考 此方與安宮牛黃丸略同。惟缺犀角、雄黃、梅片、麝香、真珠。

五 筆

【甘露飲】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治胃熱未宣。齰腫出膿。目赤腫痛。飢煩不食。目眇咽痛。瘡疹已發未發。及脾胃受溼。癰熱在裏。溼熱成疸。肢腫胸滿。氣短身熱。二便秘澀。

藥品 梓杷葉(剝去毛)、乾熟地黃(去土)、天門冬(去心焙)、枳殼(去瓤炒)、山茵陳(去梗)、生乾地黃、麥門冬(去心焙)、石斛(去蘆)、甘草(炙)、黃芩、各等分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一盞。煎至七分。食後臨臥。去滓溫服。小兒一服分兩服。仍量歲數加減。

【甘露消毒丹】

發明 見葉天士方。

功用 治發熱倦怠。胸悶腹脹。肢痠嘔痛。斑疹身黃。頭腫口渴。溺赤便閉。吐瀉痢。淋濁瘡瘍。凡暑溼時疫之邪在氣分。舌胎淡白、或厚膩。或乾黃者。皆甚效。並治水土不服諸症。

藥品 飛滑石、十五兩。綿茵陳、十一兩。淡黃芩、十兩。石菖蒲、六兩。川貝母、木通、各五兩。藿香、射干、連翹、薄荷、白豆蔻、各四兩。

制法及用法 曬燥生研爲末。或以神麵糊丸。如彈子大。每服三錢。開水調下。一日二次。

【四生丸】

發明 見張子和方。

功用 治一切火逆熱結。常服潤證耐老。

藥品 黑牽牛頭末、三兩。人黃(去粗皮、酒洗、紙包煨香有性、不可過)、生皂角(去皮)、各一兩。生芒硝、五錢。

制法及用法 研爲末。水泛丸。如梧桐子大。每服二三十

丸。熟湯送下。

【白蒺藜散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱毒瘡癰癢煩躁。

藥品 白蒺藜(炒)、白礬皮、青防風(去蘆)、川大黃(剉炒)、赤芍藥、梔子仁、子芩、麥門冬(去心焙)、玄參、桔梗(去蘆)、甘草(炙赤、剉)、前胡。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後薄荷湯調下。

【玄參丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺臟積熱。白睛腫脹。遮蓋瞳人。開張不得。赤澀疼痛。

藥品 玄參、川升麻、漢防己、羚羊角屑、沙參、車前子、梔子仁、桑根白皮、杏仁(湯浸去皮尖雙仁、麩炒黃)、各一兩。大蘇仁、川大黃(微炒)、各一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食後熟湯送下。臨臥時再服。

【左金丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治肝火燥盛。左脅作痛。吞酸嘔吐。筋疝痞結。一切肝火之症。並治霍亂轉筋。火邪內熾。及噤口痢。飲食不

口即吐者。

藥品 川黃連、六兩。吳茱萸(鹽水泡、一作湯煮片時)、一兩。

制法及用法 共爲末。水泛爲丸(一作米粥和丸)。每服三錢。熟湯送下(一作空腹時、白朮陳皮煎湯送下、或加味逍遙散煎湯送下)。霍亂用陳木瓜五錢。煎湯送下。

參考 此治肝火之正劑也。故獨用黃連爲君。從實則瀉子之法。以直折其火上炎之勢。佐以吳茱萸。從類相求。引熱下行。並以辛燥開其肝鬱。懲其扞格。然必本氣實而土不虛者。庶可相宜也。此方亦名佐金丸。

六 筆

【地骨皮丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺臟壅熱。口臭銛膩。作渴。溺頻。

藥品 地骨皮、黃耆、桑白皮、山梔子、馬兜鈴、各等分。

制法及用法 研爲細末。甘草膏和丸。如芡實大。每服一丸。食後口噙化下。

【地黃煎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒風癇。膈上煩

熱。鼻衄口瘡。咽喉腫痛。或五心常熱。多渴飲水。

藥品 生地黃、熟地黃、各一兩。薄荷葉、一兩一錢。甘草(微炒)、山梔仁、玄參、各七錢五分。片腦、五分。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如芡實大。每服一丸。乳後白湯嚥化下。

【安神丸】

發明 見沈金鰲 沈氏尊生書。

功用 治心火。

藥品 黃連、六錢。磁砂、五錢。生地、二錢五分。甘草(炙)、當歸、各二錢。

制法及用法 研爲細末。水泛和丸。熟湯送下。

七 筆

【含化丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治上焦煩熱。口舌乾燥。心神不清。頭目不利。

藥品 石膏(研細水飛過)、寒水石(細研)、白蜜、各八兩。

制法及用法 清水四大盞。煎取一大盞半。綿濾過。入蜜同煎。令稠爲丸。如雞頭實大。每服一丸。口含嚥津。

【抑青丸】

發明 見張路玉張氏醫道。

功用 治肝火脅下急痛。

藥品 川黃連、六兩。吳茱萸(揀去明者、取淨)、一兩。

制法及用法 二味煎乾。擦去吳萸。取黃連焙燥。研爲末。水泛和丸。如梧桐子大。每服四五十丸。空腹時沸湯。臨臥時陳酒送下。

【車前散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱積小腸。甚至尿血。

藥品 車前子、甘草(炙微黃、剉)、川朴硝、各一分。牡蠣(燒爲粉)、五錢。

制法及用法 搗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。不拘時服。量兒大小加減。

八 筆

【金釵石斛膏】

功用 涼性。勝尋常石斛。於小兒胃熱症最宜。即以本藥之莖。鮮者尤良。所熬之膏也。

【青麟丸】

功用 去心積癰熱痰積。治百病。

藥品 錦紋大黃、二十斤。

制法及用法 用米泔水浸一週時。每日翻動。曬乾。研灰

酒浸一宿。先將鮮側柏葉、鋪籠底。蒸三炷香。取出曬乾。後用綠豆、黑豆、麥芽、各三升。槐枝、桑葉、桃葉、柳葉、車前、鮮茴香、各一斤。陳皮、薄荷、銀花、蘇葉、冬朮、蘼艾、半夏、厚朴、黃芩、香附、縮砂仁、甘草、澤瀉、豬苓、各八兩。逐味照前法煎湯製。候蒸透。曬乾磨粉。每斤加牛乳、蘇葉、梨汁、薑汁、童便、各二兩。加陳酒泛丸。或先用嫩藕汁蒸透曬乾。後用牡丹皮、地骨皮、甘蔗汁、澤瀉、薄荷、韭菜、赤茯苓、石斛、黃蘗、側柏、玄參、連翹、木通、當歸、知母、車前、豬苓、廣皮、生地、貝母、甘草、苡仁、青鹽。逐味照前法煎湯製。九蒸九曬。曬乾研爲細末。再用陳酒泛丸。以上兩法。均經過二十四次之手續。故稱二十四製青麟丸。每服二三錢。熱湯送下。如火毒盛者。俱從小便出。或色深黃。不必疑忌。●舌麻（一作麻）口碎。目赤鼻瘡。骨腫喉閉。齒痛耳聾頭痛。時疫暑熱。火鬱喉咳。甘桔湯送下。燈芯湯亦可。●吐血齒血。溺血便血。遺精淋濁。燈芯湯送下。●肺癰、腸癰、淡火昏狂。如醉如癡者。燈芯湯送下。●胸悶腹脹。氣阻噎膈。肝胃氣痛。大小便

閉者。香附湯送下。●溼熱黃疸。瘴氣瘟疫。水腫喘脹。食積腹痛。大腹皮湯送下。●痢疾初起。裏急後重不爽。赤痢、焦槐米湯下。白痢、淡薑湯下。●從高墜下。損傷蓄血於內。不思飲食者。童便送下。蘇木湯亦可。●婦女經痛。經事不調。產後惡露不盡。瘀血作痛。痰擾頭暈。氣悶嘔惡。發熱腹痛便閉者。益母草湯送下。●婦女赤白帶下。骨蒸發熱。地骨皮湯送下。●小兒驚風。疳積食積。形瘦肉熱。薄荷麥芽（炒）煎湯送下。

【虎睛丸】

發明 見劉河間方。

功用 治癲疾潮搐。恍惚煩亂。口乾譫語。

藥品 虎睛、一對。犀角屑、遠志（去心）、桐子仁（一作五錢）、川大黃、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服二十丸。食後溫酒送下。

九 筆

【香參丸】

發明 見正肯堂證治準繩。

功用 治心藏熱盛。舌上出血。

藥品 人參、生薑黃、麥門冬

(去心)、當歸(切焙)、各五錢。
生地黄、一兩(焙)。甘草、二錢
五分(炙)。

制法及用法 研爲細末。煉
蜜和丸。如小彈子大。每服一
丸。溫水化下。一日三四次。

【香連丸】

發明 見證治準繩方。

功用 治腹痛腹瀉。赤白痢
疾。

藥品 黃連、二十兩。吳茱
萸、十兩(去枝梗)。

制法及用法 先用熱水拌
和。入瓷器內。置熱湯燉一
日。同炒。至黃連紫黃色。去
茱萸用連爲末。每四兩。用木香
末一兩。淡醋米飲爲丸。如梧
桐子大。每服二三十丸。滾湯
送下。久痢中氣下陷。用補中
益氣湯送下。中氣虛者。用四
君子湯送下。中氣虛寒者。加
生薑、肉桂。

【洗心散】

發明 見太平惠民和劑局
方。

功用 治心肺積熱。風寒痰
盛。頭目昏痛。眼澀多淚。口
苦唇焦。咽喉腫痛。口舌生
瘡。涕唾稠黏。心神煩躁。五
心煩熱。肩背拘緊。肢節疼
痛。小便赤澀。大便秘滯。並
治痘瘡壯熱。狂言多渴。二便

不利者。

藥品 當歸(去苗洗)、二兩。
大黃(酒拌、麴炭煨、去麴、切
焙)、三兩。生麻黃(連節、一作
去節)、赤芍藥、荆芥穗、各一
兩。甘草(炙)、二兩。生白朮、
一兩。一方無白朮、芍藥、荆
芥、甘草。有生地黄、二兩。黃
連、木香、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每
服三四錢。加生薑三片。薄荷
七葉。清水煎。去渣溫服。或
茶清調下。一日二次。

參考 此方以白朮、大黃入
心。故名洗心。而從以麻黃、
荆芥。亦爲表裏之劑。

十 筆

【栝樓根散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風熱口乾舌裂生瘡
等證。

藥品 栝樓根、胡黃連、黃
芩、各七錢五分。白僵蠶(炒)、
白蘚皮、大黃(剉炒)、各五錢。
牛黃(另研)、滑石(另研)、各二
錢五分。

制法及用法 研爲細末。和
勻。每服二錢。不拘時竹葉湯
調下。

【栝樓根散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒熱病不止。煩悶。

藥品 杭棧根、三分。黃芩、知母、各五錢。

制法及用法 搗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。加小麥、粟米、一百粒。煎至五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小加減。

【烏金散】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治熱中。

藥品 黃丹(炒)、細墨(燒)、各一兩。

制法及用法 研爲末。和勻。每服三錢。食後先用水漱口。待心中熱渴欲水。便以冷水調下。

十一 筆

【涼膈散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治溫病表裏實熱。及心火上盛。心經膈熱。中焦燥實。煩躁多渴。頭昏目赤。面發毒熱。唇焦咽燥。舌腫喉閉。口血衄血。頰頰結硬。口舌生瘡。痰實不利。涕唾稠結。大小便閉。諸風癰瘡。胃熱發斑。譫語狂妄。小兒急

驚。痘瘡黑陷。一切諸積熱等症。

藥品 川大黃、二兩(酒浸)。芒硝(一作朴硝)、連翹(去心)、黃芩(酒炒)、各一兩。甘草(炙)、六錢。梔子仁(炒)、八錢。薄荷葉、七錢。一方加生石膏。

制法及用法 研爲末。每服四五錢至一兩。加竹葉十五片(一作七片、一作十片、一作二十片)。或不用竹葉。用生薑、一片。大棗、一枚。蔥白、一莖。清水煎。去滓溫服(一方加蜂蜜少許和服)。日三夜二次。得下熱退爲度。去六經熱。減大黃、芒硝。加桔梗、甘草、人參、防風。

參考 此方爲上中二焦瀉實火之劑。熱淫於內。治以鹹寒。佐以苦甘。故以連翹、黃芩、竹葉、薄荷散火於上。而以大黃芒硝之猛利。瀉熱於中。使上升下行。而膈自消矣。用甘草、生薑者。病在膈。甘以緩之也。若專治溫熱時行。則用竹葉。若感冒之症。則用蔥白、薑、棗可也。張潔古於此方中減硝黃。加桔梗。爲舟楫浮而上行。以治上焦諸熱。而便不實者。甚得變通之妙。

【涼膈散】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治癰腫疔毒。

藥品 芒硝、大黃、車前子、黃芩、知母、梔子(炒)、羌活、各一錢。黑參、一錢五分。

制法及用法 研爲粗末。清水二盞。煎至一盞。食後溫服。

【涼膈散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治實火熱痛。

藥品 防風、荊芥、桔梗、黃芩、山查、天花粉、枳殼、赤芍藥、甘草。

制法及用法 爲散。清水煎服。

【清涼膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治暴赤火眼腫痛。及血癰作疼發熱。

藥品 大黃、黃連、黃芩、赤芍、細辛(連葉)、薄荷葉、風化朴硝、各一兩。

制法及用法 先以前六味或曬或焙。研爲末。次入朴硝。乳鉢內同杵勻。每用一錢至二錢。新汲水或冷水加生薑汁。調塗太陽穴。熱癰則以涼米湯調塗。

【清咽太平丸】

發明 驗方。

功用 治臨上有火。早間咯

血。兩頰常赤。咽喉不潤。

藥品 薄荷、一兩。犀角、防風、甘草、柿霜、川芎、各二兩。桔梗、三兩。

制法及用法 共研爲細末。煉白蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。熱湯送下。

【犀角丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治心熱。

藥品 犀角、硃砂、各二錢。牛黃、人參、各三錢。

制法及用法 共研細末。水泛爲丸。如麻子大。每服二錢。燈心、龍眼、煎湯送下。

【犀角散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人熱勞。心胸煩熱。不思飲食。四肢多疼。經脈澀滯。

藥品 犀角屑、黃芩、甘草(炙、微赤、剉)、各五錢。赤芍藥、虎朮、茯苓、地骨皮、麥門冬(去心)、當歸、枳殼(微炒、微黃)、各七錢五分。柴胡(去苗)、紅藍花、龍甲(醋炙黃、去鹽)、各一兩。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。清水一中盞。加生薑五錢。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【敗毒散】

發明 見顧世澄癰醫大全。

功用 治瘡後口臭。口瘡唇爛。咽喉疼痛。

藥品 生地黄、一錢五分。桔梗、連翹、牛蒡子、天花粉、玄參、金銀花、各八分。牡丹皮、柴胡、各七分。生甘草、三分。黃蘗(蜜水炒)、薄荷、赤芍藥、各五分。熟石膏、一錢。

制法及用法 加淡竹葉一錢。燈心五十寸。清水煎。再加生犀角磨汁沖服。每日用米泔水洗十餘次。若不頻洗。又不服藥。內熱熾甚。則變爲走馬牙疳。

【紫雪】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治脚氣毒遍內外。煩熱不解。口舌生瘡。狂越躁亂。癰疽毒腐。卒死溫瘧。五尸五疰。邪熱卒黃。蟲毒鬼魅。心腹疔痛。一切實火閉結。小兒驚癇百病。解熱藥毒發。

藥品 黃金、六斤四兩(實金鋪中葉子者佳、以飛金一百兩代之尤妙)。石膏、寒水石(如無真者、以玄精石代之)、礞石(醋煨、一作水煮)、白滑石、各三斤。

制法及用法 搗碎。清水一斛。煮至四斗。去渣。次用犀角屑、羚羊角屑、青木香(搗碎)、沈香(搗碎)、各五兩(一作各五斤)。玄參(洗焙、搗碎)、升麻、各一斤。甘草(炙)、八兩。丁香、一兩(搗碎)。入前汁中。再煮取一斗五升。濾去渣。次用朴硝、十斤(一作二斤)。消石、四升(每升重七兩七錢五分、一作二斤)。入前汁中。微火上煎。柳木篦攪不住手。候有七升。投入木盆中。半日欲凝。次用麝香(當門子)、一兩二錢五分(研)。硃砂(研細、水飛淨)、三兩。入前藥中。攪勻。勿見火。冷二三日。候凝結成霜雪。紫色。鉛罐收貯(一方無黃金、一方無礞石、滑石、消石)。每服三四分至一二錢。杵細。食後新汲水或薄荷湯調下。大人小兒臨時以意加減。

參考 此即千金玄霜。局方於方中參入甘草、丁香、硃砂。遂名紫雪。但此專主石藥毒火。方中丁香一味。須審用。以其香味易散。故較原方減小其製。本品又稱紫雪丹。

【雪梨膏】

發明 驗方。

功用 內服涼心。潤肺。止嗽。消痰。清喉。降火。潤燥。

冷風。醒酒。解心。利大小腸。治煩渴熱嗽。痰喘。中風。失音。

藥品 雪梨、不拘多少(去皮核切片)。

制法及用法 煎濃汁。去渣。濃汁。加冰糖熬膏。每服一匙。開水沖服。

參考 一方用雪梨六十枚。取汁二十杯。生地、茅根、藕、各取汁十杯。蘿蔔、麥冬、各取汁五杯。將六味煎煉。入蜂蜜一斤。飴糖八兩。薑汁半杯。再熬如稀糊。則成膏矣。每日取一二匙含咽。治咯血、吐血、勞嗽久不止。

十二筆

【黃瓜霜】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治急心痛。實火牙痛或喉痛。

制法及用法 黃瓜一條。破兩邊。去肉去子。入生白礬末、填入。合住藕棚。懸挂有風無日之處。陰乾。候皮外起白霜。取下。研細收瓷瓶內。片蠟封口。如急心痛欲死者。口有微氣。用此霜點眼四角。立愈。喉痛者吹入。牙痛用霜擦之。因寒心痛及牙喉虛火忌用。

【黃連上清丸】

發明 驗方。

功用 治上焦積熱。眼痛咽痛。口舌生瘡。心膈煩熱。肺火上升。風熱鼻赤等症。

藥品 黃連、黃芩、黃蘗、梔子(炒黑)、各八兩。白菊花、當歸尾、各四兩。桔梗、葛根、薄荷、玄參、天花粉、川芎、各二兩。藜蘆、連翹、各六兩。大黃、十二兩。

制法及用法 共爲細末。煉白蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【黃連阿膠丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治冷熱不調。下痢赤白。裏急後重。臍腹疼痛。口燥煩渴。小便不利。

藥品 川黃連、三兩(去鬚)。阿膠(碎炒)、一兩。茯苓(去皮)、二兩。

制法及用法 連苓研爲細末。水熬阿膠成膏和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫米飲送下。

參考 按養生必用方。用黃連(去心)、一兩五錢。阿膠(碎研、漫火炒如珠子白色、另杵爲細末)、白茯苓、白芍藥、各五錢。除阿膠外。研爲細末。以

米醋斟酌多少。熬阿膠得所。和勻。入磁器杵丸。如綠豆大。小兒丸如黃米大。亦名黃連阿膠丸。治熱痢下重、膿血疼痛、腹中痛不可忍。每服自二十丸爲始。止於五十丸。食前溫米飲送下。每日二三次。以知爲度。未知加藥更丸一等。

【黃連解毒丸】

發明 見劉河間方。

功用 治上焦肺胃有熱。煩燥作瀉。多酒積熱等症。

藥品 梔子(炒)、黃連(煨)、黃蘗、各一兩。黃芩、五錢。

制法及用法 共研細末。水泛丸。如豆子大。每服五丸。熱湯送下。日二三次。大便實。加錦紋大黃、一兩。

十三筆

【當歸龍薈丸】

發明 見錢氏方。

功用 治肝經實火。頭暈目眩。耳聾耳鳴。神志不寧。驚悸搖擗。躁擾狂越。咽乾不利。大便秘結。小便澀滯。或胸脇作痛。陰囊腫脹。並治盜汗。常服宣通血氣。調順陰陽。

藥品 全當歸(酒浸焙)、龍膽草(酒洗炒焦)、梔子仁(炒)、川黃連(炒)、黃蘗(炒)、淡黃芩

(炒)、各一兩。大黃(酒浸炒)、龍薈、青黛(水飛)、各五錢。木香、二錢五分(一作二錢)。麝香、五分(另研、一作一錢五分)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如小豆大(一作炒、神麪糊丸、如梧桐子大)。每服二三十丸。生薑湯送下。

參考 肝木爲生火之本。肝火盛。則諸經之火。相因而起。爲病不止一端。故以當歸、龍薈、龍膽草、青黛、直入本經之氣血兩途。先平其甚者。而諸經之火。自無不散。再佐以黃芩清肺火。黃連瀉心火。黃蘗瀉腎火。大黃瀉腸胃火。梔子瀉三焦火。儒學大苦大寒而直折之。使上中下三焦之火。悉從大小二便利出。稍加木香、麝香者。取其調氣開竅。靈通周至也。然非實火。不可輕投。

十四筆

【碧雪丹】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治一切積熱。咽喉腫痛。口舌生瘡。心中煩躁。噤口痢。或喉閉壅塞。水漿不下。及天行時疫。發狂昏憤。

藥品 寒水石(飛研)、石膏(煅飛研)、青黛(飛研)、馬牙硝、朴硝、礞石、甘草、各等分。

制法及用法 先以甘草煎湯二升。去滓。入諸藥再煎。用柳木篋不住手攪。令治熔合度。乃入青黛和勻。候入砂盆內。候冷凝成霜。研爲末。每服一錢許。含化嚥津。或滾開水調下。如喉閉壅塞。不能嚥物者。用小竹筒吹藥入喉中。舌病塗患處。頓用神效。

十六筆

【噙化上清丸】

發明 驗方。

功用 止嗽。清音。化痰。寬胸隔。治口舌生瘡。咽喉腫痛。

藥品 ①玉露霜、柿霜、款冬花、五味子、黃芩、海浮石、薄荷葉、烏梅、甘草(炙)、寒水石、訶子肉、大麥芽、川貝母、青黛、各等分。②薄荷葉、一兩六錢。縮砂仁、四錢。甘草、二錢。防風、黃芩、桔梗、各一錢。

制法及用法 ①共研細末。煉蜜爲丸。如芡實大。每服一丸。噙化嚥下。②共研細末。煉蜜爲丸。每一兩作二十丸。用法同上。

十八筆

【瀉肝散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治雷頭風障質證。

藥品 黃芩、桔梗、芒硝、大黃、黑參、羌活、車前子、當歸、知母、各一錢。龍膽草、五分。

制法及用法 研爲粗末。沸水二盞。煎至一盞。去滓。食後溫服。

二十二筆

【臟連丸】

發明 見儒門事親方。

功用 治腸風膿血下血。

藥品 黃連、八兩。槐花米、二兩。枳殼、一兩。防風、粉草、槐角子、香附、豬牙皂角、木香、各五錢。

制法及用法 用陳倉熟米三合。同香附一處爲末。以上藥共爲細末。用豬大腸約二尺長。清水洗淨。裝入香附、倉米。縛定口。入沙鍋內。量用水二大碗。炭火煮。乾即添水。浸火煮爛。至雞腸如泥。取起。和藥。搗如糊。再入黃連等末。同搗爲丸。如梧子大。每服八十丸。空腹時米飲送下。忌食麪蒜生冷煎炙之物。一料可愈。

參考 按證治準繩方。用宜黃連、二兩(酒炒)。公猪大腸、一段(肥者長二尺、水洗淨、泡去油膩、一方加槐花、二兩)。將宜黃連研末。裝入大腸內。兩頭用線紮緊。置沙鍋內。下煮酒二斤八兩。浸火熬之。以酒乾爲度。將藥腸取起。共搗如泥。如藥濃。再曬一時許。添糕糊和丸。如梧桐子大(一作同菲菜蒸爛、搗作餅、焙乾、研爲末、水煮米糊爲丸)。亦名臟連丸。每服四五十丸。至七十丸。空腹時、溫酒或米湯、烏梅湯送下。治大便下血正赤。日久不止。多食易飢。腹不痛。裏不急。肛門墜腫。久服除根。兩臟連丸大同小異。惟血色晦淡者禁用。藥肆所售大概宗儒門事親方。

清熱類

四筆

【六一散】

發明 見劉河間方。

功用 治諸熱證。及熱泄煩躁。小便不通。石淋。痲疹色紫黑者。

藥品 桂府滑石(水飛過淨)、六兩。甘草(去皮)、一兩。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服一錢。冷熱水或薄荷湯燈心湯調下。疹子冬日溫水調。夏日新汲水調下。

五筆

【甘露膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治消渴。自汗。喜食而瘦。大便燥結。小便頻數。

藥品 石膏、二錢。知母、一錢五分。甘草(生)、一錢。(炙)、五分。防風根、一錢。人參、半錢(製)、蘭香、白豆蔻、連翹、桔梗、升麻、各五分。

制法及用法 研爲末。水浸蒸餅和丸。或捏劑作餅子。曬乾、碎如米大。每服二錢。淡薑湯調下。

八筆

【知母散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠煩躁悶亂。口乾咽痛。及胎臟熱。

藥品 知母、麥門冬、甘草、各五錢。黃耆、子芩、赤茯苓、各七錢五分。

制法及用法 咀咀。每服四錢。清水一盃。煎至七分。去滓。加竹瀝一合。更煎三二沸。溫服。

【金花丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疹熱積熱不解。

藥品 黃連、黃蘗、黃芩、梔子、各等分。

制法及用法 研爲細末。水泛或煉蜜和丸。每服三十丸。熱湯送下。便秘加大黃、等分。

十 筆

【神犀丹】

發明 見溫熱經緯方。

功用 治溫熱營變初起。神情昏躁。舌赤口乾。或邪不即解。耗液傷營。逆傳內陷。癰癤昏狂。謔語發斑等症。兼治痘瘡毒重。夾帶紫斑危症。及痘毒後發毒內熾。口糜咽腐。目赤神煩。

藥品 犀角尖(磨汁)、石膏、黃芩、各六兩。真懷生地(冷水洗淨浸透、搗絞汁)、銀花(如有鮮者、絞汁用、尤良)、各一斤。薄荷(如無、可加入中黃四兩研入)、連翹、各十兩。板藍根、九兩(如無、以飛浮青黛代之)、香豉、八兩。玄參、七兩。花粉、紫草、各四兩。

制法及用法 各生曬研細。忌用火炒。以犀角、地黃汁、薄荷、搗爲丸(切勿加蜜、如難丸、可加香豉黃爛爲丸)。每重三

錢。每服一丸。小兒減半。涼開水送下。每日二次。

十一筆

【清心丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治經絡熱。心神恍惚。脛熱步遺。

藥品 黃蘗皮、一兩。冰片、一錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十丸。加至十五丸。麥門冬濃煎湯送下。

【清心丸】

發明 見上海藏方。

功用 治熱。

藥品 生黃蘗、二兩。麥門冬(去心)、黃連、各一兩。龍腦、一錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十丸。臨臥時門冬酒或薄荷湯送下。

【清心散】

發明 見張路玉張氏醫道。

功用 治溫熱時行壯熱。神昏不語。便溺秘澀。

藥品 涼膈散第一方加黃連、一兩。

制法及用法 研爲末。每服

四五錢。加竹葉一把。白蜜少許。清水煎服。頭痛加川芎、防風、石膏。不應。加麻黃。

【清胃散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治積熱。

藥品 當歸身、生地黃、牡丹皮、黃連、各一錢五分。升麻、三錢。石膏、二錢。細辛、三分。黃芩、一錢二分。

制法及用法 清水煎服。

【清熱解毒丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治五臟積熱。毒氣上攻。咽喉腫大。赤眼壅腫。頭面發熱。唇口乾燥。兩頰生瘡。精神恍惚。心煩悶亂。坐臥不安。及傷暑毒。面赤身熱。心煩口渴。飲食不下。

藥品 寒水石、石膏、各八兩。青黛、四兩。

制法及用法 研爲末。入青黛和勻。蒸餅七個。水調爲丸。如芡實大。每服一丸。食後新汲水化下。或細嚼生薑湯下。如中諸毒。並宜服之。若驚風潮熱。痰涎壅塞。心胸煩躁。頰赤多渴。坐臥不穩者。每服半粒。量大小加減。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺熱。心煩煩悶。鼻乾無涕。

藥品 犀角屑、木通、升麻、赤茯苓、黃耆、馬牙硝、杏仁(去皮尖、雙仁、炒黃)、各五錢。麥門冬(去心)、一兩。硃砂、龍腦、甘草(炙)、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。食後竹葉湯調下。

【麥門冬丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治實熱。

藥品 麥門冬、一兩。黃連、五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。麥門冬煎湯送下。

【麥門冬散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人客熱。四肢煩痛。飲食不下。

藥品 麥門冬、赤茯苓、赤芍藥、柴胡、各一錢五分。桑白皮、生地黃、黃耆、羚羊角屑、各一錢。甘草、五分。

制法及用法 清水二鍾。加生薑三片。煎至一鍾。不拘時服。

【麥門冬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒心肺熱癰。渴飲水不止。

藥品 麥門冬(去心)、桐子仁、犀角屑、知母、甘草(炙)、黃芩、各五錢。

制法及用法 爲散。每服一錢。清水一盞。加竹葉七片。煎至五分。不拘時服。量兒大小加減。

【麥門冬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒身上有赤。煩熱。

藥品 麥門冬(去心)、蘆根(剉)、葛根(剉)、犀角屑(鑊)、各一分。滑蘆、甘草(炙微赤)、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水一盞。加竹葉十片。同煎去滓。不拘時溫服。

十二筆

【黃耆丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 補虛。退熱。潤燥。治婦人骨蒸煩熱。四肢麻痺疼痛。口乾心躁不得眠。

藥品 黃耆、麥門冬(去心)、茯神、北柴胡、甘草、生乾地黄、各一兩。酸棗仁(炒)、郁李仁、杏仁(去皮尖雙仁、麸炒黃)、枸杞子、人參(去蘆)、黃芩、各七

錢五分。百合、枳殼(去蘆、麸炒)、赤芍藥、知母、秦艽、各五錢。鼈甲(製)、二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時清粥送下。

【黃耆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 涼肌。散熱。治壯熱不退。

藥品 黃耆、柴胡、乾葛、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。加薄荷三葉。清水半盞。煎至三分。約三呷。空腹時服。若發熱數日未退。其熱是痞疹者。量其虛實用之。

【黃連丸】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 清血分溼熱。

藥品 川黃連(去鬚微炒)、黃蘗(微炒)、厚朴(去皮、生薑汁塗炙、令香)、各七錢五分。當歸(微炒)、乾薑(炮製)、木香(勿見火)、地榆、各五錢。阿膠(搗碎、炒黃燥)、一兩。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。不拘時粥飲送下。

【黃連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒疳熱煩渴。

藥品 黃連(去鬚)、天竺黃(細研)、牛黃(細研)、甘草(炙微赤、剉)、梔子仁、款冬花、葛根(剉)、紫菀(洗去苗)、犀角屑、各二錢五分。川朴硝、五錢。竹瀝、二合。

制法及用法 搗羅爲末。先用竹瀝拌和。入煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。新汲水研破服。每日四五次。量兒大小加減。

【黃蘗丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治陰火。

藥品 黃蘗、不拘多少。

制法及用法 炒研爲末。滴水丸。如梧桐子大。每服三錢。空腹時熟湯送下。

【惺惺散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 除風熱。治傷寒時氣。瘡疹發熱。咳嗽。

藥品 白茯苓(去皮)、細辛(去葉、一作減半)、苦桔梗、瓜蒌根(一作羌活)、人參、甘草(炙)、白朮、各等分。一方有川芎。

制法及用法 研爲細末。每服一二錢。加生薑一片。薄荷三葉。清水煎。去滓。不拘時

溫熱服。取微汗愈。不愈再作。加葱白、香豉。

十三筆

【葛根散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠數月。胸膈煩躁。唇口乾渴。身熱少食。

藥品 葛根(野大者用)、黃芩、人參、麥蘗、黃耆、甘草、各等分。

制法及用法 咀咀。每服四錢。清水一大盞。加竹茹一團(如錢大)。煎至七分。不拘時溫服。

十四筆

【槐花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘧瘡餘熱不退。

藥品 槐花(炒)、赤小豆(炒)、各二錢。麝香、少許。

制法及用法 研爲細末。每服五分。不拘時蜜湯調下。

【熊膽丸】

發明 見鮑杲療驗方新編。

功用 清熱。解毒。治肝膽有熱。火邪爲病。

藥品 熊膽、黃牛膽、各一個。石決明、大生地、車前子、羌活子、龍膽草、澤瀉、細辛、各一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服四十丸。食後溫酒送下。

十六筆

【導赤散】

發明 見湯氏方。

功用 治心熱。小便赤。眼目赤腫。

藥品 赤芍藥、羌活、防風、各五錢。大黃、甘草、各一錢。

制法及用法 研爲末。加燈心、黑豆。清水煎。食後服。

十八筆

【瀉黃散】

發明 見錢乙方。

功用 治脾胃實熱。口臭口甘口瘡。煩渴引飲。身黃肢熱者。

藥品 茵香葉、七錢。梔子仁(薑汁炒黑)、一兩。甘草、二兩(生炙各半、一作三兩)。石膏(煨)、五錢。防風(去蘆切焙)、四兩。

制法及用法 剉散。薑酒拌。微炒香。研爲細末。每服一錢至二錢。清水一盞。煎至五分。去滓。澄清汁。不拘時溫服。一作清水煎。去滓。加生白蜜少許調服。

【瀉黃散】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治皮翻證。清脾胃積熱。

藥品 石膏、五錢(煨)。三梔子仁、一兩。生甘草、三兩。防風、二兩(酒拌、微炒香)。豬苓草、四兩(酒蒸、曬乾)。

制法及用法 研爲細末。壯者每服二錢。弱者一錢。小兒六七分。白滾水調下。

【雙解散】

發明 見正骨堂證治準繩。

功用 治溫熱時行絞腸。表裏大熱。

藥品 防風、麻黃、薄荷葉、川芎、連翹、當歸、白芍藥、大黃(酒洗)、芒硝、各五錢。石膏、黃芩(酒洗)、桔梗、各一兩。甘草、二兩(炙)。白朮(薑汁拌、勿炒)、荊芥穗、梔子、各二兩五錢。滑石、三兩。一方無麻黃、芒硝、梔子。加桂枝。

制法及用法 剉散。每服三錢。加生薑三片(一方有葱白二個)。清水二杯。煎至一杯。去渣。不拘時溫服。

參考 此方即防風通聖合益元散之製也。方中以防風、麻黃、解肌表之風熱。荊芥、薄荷、清頭頂之風熱。大黃、芒硝、瀉大腸之溼熱。黑朮、滑石、清膀胱之溼熱。石膏、桔梗、清肺胃

之熱。連翹、黃芩、清經絡之熱。川芎、當歸、白芍藥、和肝血而熄肝風。白朮、甘草、和胃氣而健脾土。以發汗與通利並施。故曰雙解。

消 毒 類

一 筆

【一上散】

發明 見張潔古方。

功用 療蠱蝥痛。

藥品 生半夏、雄黃(另研)、各一字。巴豆、一個(去皮、研如泥)。

制法及用法 研爲細末。和勻敷之。

十二筆

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治藥毒箭頭入肉。

藥品 雄黃、一分。粉霜、五錢。生蟻螂、四枚。生巴豆、三粒(去皮殼、另研如泥)。

制法及用法 研爲細末。令勻。創處取乳汁。塗點其上。頻頻貼之。七日瘡熟。箭頭自出。

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治中蠱毒吐血。

藥品 雄黃、二錢五分(另研)。代龍肝、五錢(另研)。斑蝥(去足翅、糯米炒、去糯米)、十四枚。麝肝、一塊(如棗大、炙)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時醪漿調下。吐出蝥蟥及蛇蟲等。即效。

【雄黃散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治傷寒陰毒。中惡。客忤。五尸入腹。鬼刺。鬼瘵及中蠱。吐血。下血。心腹滿痛。

藥品 雄黃(研、水飛)、芫花(醋拌炒、一作五錢)、桂心(一作五錢)、各二兩。丹砂(研、水飛、一作二兩)、蜀椒(一作五錢)、各一兩。藜蘆、巴豆(去皮心膜油)、各一分(一作各二錢五分)。附子(炮製、去皮膜、一作七錢五分)、野葛、三分(一作七錢五分)。

制法及用法 巴豆另治如脂。餘合治下篩。以巴豆合和。更搗令勻。盛銅器中。密貯。勿令泄氣。每服一字匕。可加至半錢匕。不拘時溫湯調下。老幼減半。病在頭自衄。在脇自吐。在腹自利。在四肢當汗出。所謂如湯沃雪。隨手而愈。

【黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療癰瘡。清熱解毒。

藥品 黃連、五兩。五倍子、一兩。

制法及用法 研爲末。唾津調塗。

十三筆**【解毒丸】**

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 解一切毒。

藥品 山豆根、山茨菰、綠豆粉、各三兩。板藍根、土馬鞭、黃藥子、紫河車、續隨子仁、木通、益母、藿香、五味子、薄荷、貫衆、寒水石、白應靈、乾葛、雄黃、百藥煎、各二兩。茜草根、大黃、硃砂、各一兩。麝香、五錢。甘草(蠟月竹筒盛、置藥清內、春日開取、陰乾)、四兩。

制法及用法 研爲細末。蒸餅和丸。如彈子大。以蠟青三兩。和勻。留一半爲衣。每服半丸。生薑蜜水化下。

【解毒丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒熱毒。

藥品 寒水石、石膏、各一兩。青黛、五錢。

制法及用法 先以二石細研如粉。入青黛和勻。湯浸蒸餅

爲丸。如芡實大。每服一丸。食後新汲水化下。或細嚼薑水下亦可。三歲兒每服半丸。更量歲數加減。

【解毒丸】

發明 見邵道人方。

功用 治楊梅瘡、楊梅漏。

藥品 黑鉛(打成片、剪如豆大)、山中黃土(研細)、各一斤。

制法及用法 入鍋炒至鉛化。去鉛不用。只將黃土水藥爲丸。如梧桐子大。每服三錢。溫酒送下。十服即愈。

【解毒丸】

發明 見張潔古方。

功用 治四時傷寒。時邪瘟疫。伏暑霍亂。山嵐瘴氣。食毒酒毒。遊風丹毒。虛煩發躁。目赤口瘡。及不服水土。一切諸毒。常服補真。益氣。化毒。除風。

藥品 滑石、黃芩、貫衆、茯苓、梔子、乾薑、草龍膽、大豆、青黛、甘草、薄荷、寒水石、各一兩。益母仁、砂仁、大黃、山豆根、生地黃、桔梗、百藥煎、紫河車、綠豆粉、馬屁勃、板藍根、黃藥子、各五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。新汲水化下。細嚼或嚙化亦得。

小兒半丸。婦人血暈不省。生薑薄荷水磨下一丸。

【解毒丸】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治誤食毒草及百物毒。

藥品 板藍根、四兩(乾者、洗淨、曬乾)。生甘草、貫衆(剉去毛)、青黛(另研)、各一兩。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。青黛爲衣。如稍覺精神恍惚。即是誤中諸毒。急取十五丸。嚼爛。新汲水送下。即解。或用水浸蒸餅爲丸。常服三五丸。大解暑熱。

【解毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰瘡初起。

藥品 犀角屑、川升麻、川朴硝、赤芍藥、木通(剉)、各一兩。石膏、二兩。玄參、麥門冬(去心)、生甘草(剉)、各五錢。

制法及用法 每服四錢。清水一中盞。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【解毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風瘡。解外毒。

藥品 巴豆肉、皮硝、各一兩。黃蜂巢、黑狗脊、各七錢。白芷、雄黃、豬牙皂角、羊蹄根、

輕粉、蟬蛻(去土)、枯礬、寒水石、各五錢。

制法及用法 研爲末。臘豬油調塗。外毒既去。却塗黃連散。

參考 洗藥雖能疎通腠理。而損元氣。此方雖能攻毒。而傷良肉。不宜多用。

【解毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘母。

藥品 金銀花、五兩(一作八兩)。生甘草節、一兩。川木通、防風、荆芥、連翹、牛蒡子、各三錢。一方無牛蒡子。

制法及用法 酒水各半煎。溫分三服。以腫消痘出爲度。
①泄者加訶子、豆蔻。②痘色紅者。加黃芩(炒)、芍藥。③瘡癢者。加當歸身、生地黃。或加何首烏。④疼痛者。加赤芍藥。

【解毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

藥品 寒水石、滑石、石膏、各等分。

制法及用法 研爲末。入辰砂少許。燈心湯調下。量兒大小加減。

【解毒散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治一切毒蛇猛獸所

傷。惡毒入腹。眼黑口噤。手足強直。

藥品 白礬、甘草、各等分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。不拘時冷水調下。更敷傷處。

十四筆

【綠雲散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治金石毒生瘍或發背。

藥品 鳳尾草葉(背有金星者、生井中尤佳、炙乾)、一兩。

制法及用法 黃酒一碗。煎至五六沸。入冷酒一碗飲。以醉爲度。

殺蟲類

一 筆

【一笑散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 療疔腫。

藥品 川椒、爲末。巴豆、一紋。

制法及用法 研成膏。飯和爲丸。綿裹安蛀孔內。即愈。

二 筆

【二聖丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 消穀。逐水。下氣。去風。治腹內諸蟲。

藥品 檳榔、一兩。巴豆、十五丸(大好者、去殼膜心、存油)。

制法及用法 先以檳榔剉曬爲末。巴豆碎切。在乳鉢內杵極細。乃入檳榔末。同杵勻。水煮麵糊爲丸。如綠豆大。每服七十七丸至九十九丸。五更初空腹時。溫茶陸續送下。見蟲下盡。便止藥。進以稀粥自安。

【七寶丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 解蟲毒。

藥品 敗鼓皮(燒存性)、蠶退紙(燒存性)、刺蝟皮、五倍子、續隨子、硃砂、雄黃、各等分。

制法及用法 研爲細末。糯米糊和丸。如梧桐子大。每服七丸。空腹時熱湯送下。

四 筆

【化蟲丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治諸蟲積、吐腹常熱。嘔吐清涎。唇色紅白。

藥品 鶴蟲(去土炒)、檳榔、杏棟根皮、胡粉(炒)、各一兩。枯礬、二錢五分。一方有蕪荑、五錢。使君子、一兩。

制法及用法 研爲細末。水煮米糊和丸。如梧桐子大。一歲兒每服五丸。大人七八十丸。溫酸漿水入生麻油三四點。打勻送下。清米湯亦可。痛時用蜀椒湯調化下。其蟲細小者化爲水。大者自下。

參考 證治準繩方用白蕪荑、黃連、神麴、麥芽、各等分。炒研爲末。水煮米糊和丸。如黍米大。亦名化蟲丸。治積熱。空腹時米飲送下。豬膽汁尤佳。

【丹砂膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 殺蟲。治一切惡瘡。及疥癬癢不止。

藥品 硃砂、雄黃、雌黃(均研細)、亂髮、白蠟、松脂(研末)、各一兩。鹿脂(爲末)、二兩。巴豆、十粒。豬脂、二斤。

制法及用法 先以豬脂煎亂髮令消盡。次下巴豆、白蠟、松脂。煎十餘沸。綿濾去滓。候稠。即入雌黃、硃砂等末。攪令勻。瓷盒內盛。每用少許。不拘時厚塗。以瘡爲度。

【巴豆膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切疥癬有瘰。時作瘰癧。

藥品 巴豆、蕪荑、七粒。硃黃、白礬(煨枯)、各五錢。豬脂、三兩。

制法及用法 共研爲細末。豬脂煉成油。入煎藥末。調和令勻。每用如蓮子大一塊。於手掌內搓塗之。

七 筆

【妙應丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治蟲痛及飲食中毒。或食水陸果菜。于卵入腹。而生蟲蛇魚鼈。或宿食留飲。結爲癥瘕。

藥品 檳榔、一兩二錢。黑牽牛頭末、三錢。大黃、雷丸、錫灰、蕪荑、木香、使君子肉、各一錢。

制法及用法 研爲細末。葱白煎濃湯露一宿。和丸如粟米大。每服四錢。五更時葱湯送下。如取寸白蟲。石榴根皮煎湯送下。小兒服一錢或五分。天明取下蟲物。此丸不損真氣。有蟲則下蟲。有積即下積。有氣即消氣。一服見效。

八 筆

【使君子丸】

發明 見汪訥菴醫方集解。

功用 治小兒疳蟲腹痛。食勞發黃。疳脹食積。腹見青筋。嘔吐。

藥品 使君子(去殼)、二兩。南星(薑製)、檳榔、各一兩。

制法及用法 喜食生米。用麩一斤。拌炒至藥黃色。喜食茶葉。用茶葉炒之。喜食炭土。用炭土炒之。揀去炒藥。取研爲末。煉蜜和丸。每服三錢。早晨沙糖水送下。

十 筆

【烏梅丸】

發明 見傷寒金匱方。

功用 治蛔厥、吐蛔、久痢。

藥品 烏梅、三百枚。細辛、桂枝(一作肉桂)、附子(炮)、人參、黃蘗、各六兩。乾薑、十兩。黃連、一斤。蜀椒(炒去汗)、當歸、各四兩。一方無乾薑。

制法及用法 各搗篩。合治之。以苦酒浸烏梅一宿。去核。蒸之五升米下。飯熟搗成泥。和藥令相得。搗臼中。與蜜杵二千下。丸如梧桐子大。先食服十丸。稍加至二十丸。每服三次。禁生冷滑物臭食等。

久痢諸藥不瘥。去細辛、附子、人參、黃蘗。桂枝換桂心。

參考 風木久鬱而不宣。致肝邪熾蒸胃脘。蘊釀溼熱。而生蛔蟲。蟲多則肝邪益張而爲厥。或吐就於胃口之外。無非木土相剋之病。故方中用烏梅之大酸爲君。以泄肝家之本病。黃連、黃蘗之苦燥爲臣。以瀦胃中之溼熱。更兼酸苦通泄之義。以疏達停滯中焦之熱鬱。乾薑、蜀椒之辛溫爲佐。以殺胃中之蛔蟲。桂、附、當歸之和營衛經絡者爲使。則肢厥亦可解除。惟諸藥均剛燥辛竄之品。恐非胃家所宜。故又以人參之甘潤扶胃而和諸藥。使胃氣不致益傷。凡蛔蟲、多係生冷之物。與溼熱互結而成。得酸則靜。得辛則伏。得苦則下。故藥亦苦酸糲濟。寒熱雜用。實爲蟲劑之祖方。痢疾易桂枝爲肉桂。去參、附、辛、蘗者。重在溫養下元。而兼以酸苦爲治。與通和經絡無涉。且尤不宜以參附之補以滯腸胃也。

【烏犀丸】

發明 見危亦林世醫得效方。

功用 治小兒疳熱。腹內生蟲。肚大。手足疲弱。丁奚瘰癧。

藥品 黑牽牛、青皮、各二

兩。使君子肉、七錢五分。苦楝皮(一作蘆荅)、雷丸、各二錢五分。鶴蟲、五錢。

制法及用法 同人鍋內炒焦。研爲末。水煮麵糊和丸。如黍米大。三歲兒每服二十丸。食前米飲送下。

【追蟲丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切蟲積。

藥品 黑牽牛頭末、檳榔、各八兩。雷丸(醋炙)、南木香、各二兩。

制法及用法 研爲末。用苳陳、二兩。大皂角、苦楝皮、各一兩。煎濃汁。水泛爲丸。如綠豆大。大人每服四錢。小兒三錢。或二錢。或一錢五分。五更時沙糖湯送下。待追去惡毒蟲積二三次。方可以粥補之。

【追蟲丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治一切蟲積。

藥品 續隨子、檳榔、牽牛、大戟、各五分。麝香、三分。甘遂、芫花、各一錢。

制法及用法 共研細末。米泔爲丸。如梧桐子大。每服十丸。溫酒送下。

【茯神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 下蟲。

藥品 茯神、白茯苓、人參、遠志(去心)、龍骨、肉桂、甘草、陳皮、各一兩。當歸、五味子、各一兩五錢。黃耆、二兩。

制法及用法 研爲末。分作八服。每服加大棗七枚。生薑一錢。清水一升五合。煎至一升。空腹時服。

十一筆

【牽牛丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治蟲聚。

藥品 牽牛、大黃、檳榔、雄黃。

制法及用法 研爲細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

十二筆

【雄銖丸】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治蟲毒從酒食中下者。

藥品 雄黃、硃砂(俱另研、水飛)、赤腳蜈蚣(微炙、去足)、續隨子、各一兩。麝香、二錢五分(另研)。

制法及用法 研爲細末。入雄黃、硃砂、麝香拌勻。再研。以糯米粥和丸。如芡實大。端

午日修合尤妙。每服一丸。熟酒送下。毒當與藥俱下。

【雄黃丸】

發明 見蘇東坡方。

功用 治蠱毒及蟲蛇畜獸諸毒。

藥品 雄黃、生明礬、各等分。

制法及用法 於端午日合研細。熔黃蠟和丸。如梧桐子大。每服七丸。念藥王菩薩藥上菩薩七遍。熱湯送下。

十三筆

【萬應丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 取積。追蟲。

藥品 黑牽牛、二斤(生取頭末十兩)。大腹子、一斤(生取末七兩)。蓬莪朮、二兩(煨)。京三棱(炮)、雷丸(炮)、廣木香(煨)、各五兩。

制法及用法 研爲細末。令勻。用皂角八兩(紫色者、去皮弦子、切碎)。清水兩大盞。浸一宿。冬月浸兩宿。撈去粗滓。入銅器內熬數沸。以白沫出爲度。放冷和藥。揉搗爲丸。如梧桐子大。每服四錢。五更時沙糖水送下。溫冷不妨。至天明利三五行。看取出是何蟲積。以溫白粥補之。忌食生冷

魚腥硬物。孕婦忌服。

十四筆

【熊膽丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治五疳出蟲。

藥品 熊膽、硃砂、麝香、蜆蛇膽、蟻蛭(炒)、瓜蒂、各五錢。

制法及用法 研爲極細末。令勻。用獺猪膽汁和丸。如綠豆大。先用桃柳湯浴兒。後用粥飲下三丸。青衣覆之。自有蟲出。

十五筆

【翳紅丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 消癖積。殺諸蟲。進飲食。

藥品 乾漆(炒煙盡)、紫菀花(醋拌炒)、各一錢。巴豆(去皮膜心、不去油)七粒。

制法及用法 共研細末。醋和爲丸。如梧桐子大。用紅紗包。紅線縛定翳下。每服一丸。另用南木香、雷丸、生三棱、生蓬莪朮、百部、貝母、檳榔、生大黃、各一兩。使君子肉、四十九枚(半生半拌)。生牽牛(取頭末)、三兩五錢。研爲細末。以皂角、十錠(搗碎)。山茵陳、苦楝根皮、各一兩。清水四五碗。砂鍋內慢火煎至一小碗。將前

末拌和爲丸。如梧桐子大。小兒如粟米大。每服二錢五分。隨證湯使引下。五更初服。服後並用斑蝥、七枚。去頭足翅。炒研。時塞兩鼻孔。忌葷腥油膩生冷等物。①小兒諸證。沙糖水或蜜水調下。②小兒驚風。喘急咳嗽。桑白皮煎湯送下。③取寸白蟲。石榴根煎湯送下。④取蛔蟲 苗蟲。沙糖水送下。⑤脚氣腫不能步。木瓜煎湯或蜜水調下。⑥酒刺酒積。百藥煎煎湯送下。⑦婦人經水不通。溫蜜水或溫茶送下。⑧婦人血蠱。葱白煎湯送下。⑨腸風下血。山楂煎湯送下。⑩二便不通。淡醋湯送下。⑪食積氣塊。溫蜜水或溫茶湯送下。

【翦紅丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治因蟲熱痛。

藥品 蓬莪朮、京三稜、雄黃、木香、尖檳榔、貫仲、乾漆、陳皮、大黃。

制法及用法 研爲細末。米糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。米湯送下。

十八筆

【雞肝散】

雞肝散 治陰虛。

功用 治陰虛。

藥品 燕麥、蛇床子、硫黃、川椒、潮腦、枯礬、雄黃、海螵蛸、黃連、各等分。麝香、少許。

制法及用法 共研細末。取旋半雞肝一具。將藥末塗肝上。乘癢時。插入陰戶內。

二十筆

【蘆薈丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痢症。

藥品 蘆薈、安息香、胡黃連、枳殼(炒)、各一錢。使君子(炒)、三七枚。燕麥、一牙。定粉、一錢五分。麝香、少許。

制法及用法 共研細末。豬膽汁和米糊爲丸。如綠豆大。每服五七丸。米飲湯送下。

嘔吐類

七筆

【赤石脂散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治吐水。

藥品 赤石脂、一斤。

制法及用法 搗篩。每服方寸匕。溫酒或米飲調下。稍加至三七。服盡一斤。終身不吐。

據水。又不下氣。補五臟。令人肥健。

八 筆

【青金丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切嘔吐不已。

藥品 硫黃、二錢。水銀、一錢。

制法及用法 入鉢內慢火熬化。以木篦子撥炒成砂。再入乳鉢研黑。不見星。以薑汁糊丸。如綠豆大。每服二三十丸。米飲送下。

【金花丸】

發明 見張潔古方。

功用 治吐食而脈弦者。

藥品 半夏(湯洗)、一兩。檳榔、二錢。雄黃、一錢五分。

制法及用法 研爲細末。薑汁浸蒸餅爲丸。如梧桐子大。小兒另丸。薑湯送下。從少至多。漸次服之。以吐止爲度。

十 筆

【草豆蔻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣嘔逆。胸中滿悶。不下飲食。

藥品 草豆蔻仁、紫蘇葉、赤茯苓(去皮)、前胡(去蘆)、木通(去皮剉)、檳榔、各一兩。吳

茱萸、二錢五分。半夏(湯洗七次、切片)、枳實(去蘆、麸炒)、各七錢五分。

制法及用法 咬咀。每服八錢。清水一中盞半。加生薑七片。煎至一盞。去渣。不拘時溫服。

【神朮丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治停飲成癖。久則嘔吐酸水。吐已。停飲復作。

藥品 蒼朮、一斤(米泔浸)。生芝麻、五錢(月清水二杯、研細取漿)。大棗、十五枚(煮熟、去皮核、研細)。

制法及用法 以蒼朮焙乾爲末。後以芝麻漿及棗肉和勻拌丸。如梧桐子大。每服五十丸。溫酒送下。忌食桃李雀鴿。初服覺燥。以山梔末一錢服。

十一筆

【麥門冬散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治小兒嘔吐。脈數有熱。

藥品 麥門冬、半夏、人參、茯苓、各二錢。甘草、一錢。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一盞。加生薑三

片。煎至五分。去渣溫服。每日二三次。

【麥門冬散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒嘔吐不止。心神煩熱。

藥品 麥門冬(焙)、淡竹茹、各五錢。人參、茅根、陳皮(去白焙)、甘草(炙)、各一分。

制法及用法 研爲粗末。每服一錢。清水一小盞。加生薑、少許。煎至五分。稍熱頻服。量兒大小加減。

十二筆

【開胃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後胃氣不和。嘔吐不止。全不納食。

藥品 訶子肉、一兩五錢。人參、一兩。甘草、五錢。

制法及用法 研爲細末。另以半夏、五釐。生薑、一分。薤白、二十七莖。清水一大盞。煎至六分。去滓。分兩次服。

【訶黎勒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風。氣攻脾胃。嘔逆不納飲食。

藥品 訶黎勒皮、陳橘皮(去白)、各一兩。半夏(湯洗七次、切片)、人參(去蘆)、桂心、白

朮(去蘆)、細辛(去苗土)、當歸(炒去蘆)、甘草(炙)、各五錢。藿香、赤茯苓(去皮)、芎藭、各七錢五分。

制法及用法 咀咀。每服五錢。清水一中盞半。加生薑七片。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。

十四筆

【銀白散】

發明 見楊士瀛仁齋直指。

功用 助胃驅風。治嘔吐作慢驚候者。

藥品 蓮肉、扁豆(炒)、白茯苓、各一分。人參、天麻、白附子、全蠍(炒)、木香、甘草(炙)、藿香、各五釐。陳米(炒香)、三錢。一方加白朮一分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。加生薑一片。冬瓜子仁七粒。清水煎服。或陳米飲調下。

【槐花散】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治腸熱生瘻嘔吐。

藥品 槐花(炒令黃黑色)、皂莢(去皮燒烟絕)、白礬(熬沸定)、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。熱湯調下。

十五筆

【磁石丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治雷頭風變內障。頭旋惡心嘔吐。屬虛證者。

藥品 磁石(燒赤醋淬三次)、五味子(炒、一作五錢)、乾薑、牡丹皮、玄參、各一兩。附子(炮)、五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十丸。食前茶清或鹽湯送下。

十六筆

【豬苓散】

發明 見金匱要略。

功用 治嘔吐思水。

藥品 豬苓、茯苓、白朮、各等分。

制法及用法 杵爲散。每服方寸匕。米飲調下。每日三次。

十七筆

【縮砂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠胃虛氣逆。嘔吐不食。胎動不安。及氣鬱血崩。

藥品 縮砂仁、不拘多少(新瓦上炒令香熟)。

制法及用法 研爲細末。嘔

吐每服一錢。生薑汁調米飲下。
血崩每服三錢。米飲調下。

二十筆

【藿香散】

發明 見錢乙方。

功用 治脾胃虛熱。面赤嘔吐痰涎。

藥品 藿香葉、一兩。麥門冬(去心焙)、半夏麴(炒)、甘草(炙)、石膏、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服五分至一錢。清水一盞半。煎至七分。食前溫服。

【藿香散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒嘔逆不止。

藥品 藿香、紫菀(洗去苗土)、各一分。甘草(炙赤)、五分。麥門冬、三分(去心焙)。桂心、五釐。

制法及用法 爲散。每服一錢。清水一盞。煎至五分。去滓。候溫。綿點滴口中。

泄瀉類

九筆

【厚朴散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒水穀利。羸瘦

面黃。不欲飲食。

藥品 厚朴(去粗皮、塗生薑汁、炙令香熟)、龍骨、黃連(去鬚微炒)、各五錢。丁香、當歸(剉微炒)、木香、白朮、肉豆蔻、各一分。

制法及用法 搗細羅爲散。每服五分。粥飲調下。一日三四次。量兒大小加減。

【厚朴散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒脾胃不和。洞泄下利。羸瘦食少。

藥品 厚朴(去粗皮、塗生薑汁、炙令香熟)、人參(去蘆頭)、訶黎勒(煨用皮)、白朮、黃連(去鬚微炒)、地榆(微炙剉)、各一分。甘草(炙微赤剉)、乾薑(炮裂剉)、各五錢。肉豆蔻、一枚(去殼)。

制法及用法 搗細羅爲散。每服五分。粥飲調下。一日三四次。量兒大小加減。

【香朴丸】

發明 見玉肯堂證治準繩。

功用 暖脾胃。治腸胃虛冷。泄瀉注下無度。脾虛氣閉。不進飲食。

藥品 北茴香、三兩。大厚朴、五兩。白朮、陳皮、各三兩。訶子、赤石脂、各一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。麩

糊和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時米飲送下。

【香茸丸】

發明 見玉肯堂證治準繩。

功用 治酒泄。骨立不能食。

藥品 生麝香(另研)、一錢。嫩鹿茸(火燎、去毛、酥炙黃)、肉豆蔻(火煨)、各一兩。

制法及用法 共研末。白糯米飯爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時米飲送下。熱者服酒煮黃連丸。

【香連丸】

發明 見茅先生方。

功用 治瀉利。

藥品 木香、黃連(柴黃五錢、同於鐃內炒令烟起、取出、去柴黃)、肉豆蔻、訶子(炮去核)、各五錢。阿膠(麩炒)、礞砂、各一錢。

制法及用法 研爲細末。麩飯和丸。如梧桐子大。每服十丸至十四丸。米飲送下。小兒碎之。

【保安丸】

發明 見玉肯堂證治準繩。

功用 治小兒積滯、傷食泄。

藥品 香附子(淨)、縮砂仁、各一兩。白朮(炮)、青皮(去蘊)、陳皮(去白)、三棱(炮)、蓬朮(炮)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 研爲末。麥蘖

麴糊和丸。如綠豆大。每服三丸。食前溫湯送下。

十一筆

【清胃散】

發明 見張漢方。

功用 治小兒快熱泄利。

藥品 川棟子、川黃蘗(微焙炙)、當歸(洗焙乾)、地榆(炙)、黃連(去鬚炒)、各五錢。

制法及用法 搗羅爲細末。每服一錢。清水八分。煎至四分。去滓。乳食前溫服。

十二筆

【訶黎勒丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治大腸虛冷。泄瀉不止。腹脅引痛。飲食不化。

藥品 訶黎勒(麴裏煨)、附子(炮)、肉豆蔻(麴裏煨)、廣木香、吳茱萸(炒)、生龍骨、白茯苓(去皮)、藁朮、各等分。

制法及用法 共研細末。生薑汁煮麴糊爲丸(一作醋糊爲丸)。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時米飲送下。

【訶黎勒散】

發明 見金匱要略方。

功用 治下利失氣。

藥品 訶黎勒、十枚(煨)。

制法及用法 爲散。粥飲和

頓服。

參考 結利者。肺氣下脫。腸胃俱虛。氣隨尿下。急用此方瀉腸胃以固脫。又凡粥飲法中以轉氣。氣轉而瀉自止矣。

【黃芩散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒痢。渴不止。

藥品 黃芩、訶黎勒(煨、用皮)、檳榔皮、各五錢。瓜蒌根、黃連(去鬚)、當歸(剉微炒)、各三分。烏梅肉、一分(微炒)。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。童兒大小加減。

【黃連丸】

發明 見莊氏方。

功用 治疳瀉。疳痢。

藥品 黃連(削淨洗乾)、燕麥仁、各等分。

制法及用法 乳鉢內研爲細末。和勻。以糯米相和。煮稀粥爲丸。如小綠豆大。三歲兒每服七丸至十丸。三歲以上。十五丸至二十丸。空腹時陳米飲送下。每日三次。

十三筆

【溫中丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒胃寒瀉白。腸鳴腹痛。吐酸不食。及霍亂吐瀉之虛者。

藥品 人參、白朮、甘草、各等分。

制法及用法 共研細末。薑汁麵糊爲丸。如綠豆大。每服二三十丸。不拘時米飲送下。

【溫白丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒久瀉。脾虛不食。食即瀉出。不能消化。

藥品 白朮、一分(米泔浸切焙)。丁香、五分(炒)。半夏、一錢(米湯泡洗七遍)。

制法及用法 共研細末。生薑自然汁。煮麵糊爲丸。如梧桐子大。半歲兒每服三丸。三歲五七丸。淡生薑湯送下。早晚二次。

【溫白丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒脾氣虛困。泄瀉瘦弱。冷疳洞利。及因吐瀉。或久病成慢驚癇瘳者。

藥品 天麻、五錢。白附子、天南星(剉、湯洗、焙乾)、白僵蠶(炒)、各一兩。乾蟬(去毒)、一錢。

制法及用法 共研細末。湯浸寒食麵爲丸。如綠豆大。仍於寒食麵中養七日。取出用。

每服五七丸。至二三十丸。空腹時生薑汁和米飲送下。並病勢漸加丸數服之。

【萬金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治水瀉下痢。久而不痊者。

藥品 罌粟殼(去帶、一半剉碎、醋和蜜炒、一半生用)、甘草(不去節、半生半炙)、陳皮(去白)、各二兩。烏梅(和核)、一兩。

制法及用法 碎散。每服二錢。熱湯一盞。略煎一二沸。和滓傾出。盤內。上以蓋蓋定。候澄清。去滓。空腹時溫服。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腸胃寒溼瀉瀉。腹內疔刺疼痛。

藥品 當歸(切焙)、乾薑(炮)、肉豆蔻(去殼炮)、廣木香、各五錢。訶黎勒(炮去核)、黃連(去鬚炒)、各七錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。用甘草、生薑各一分。黑豆一合(均半生半炒)。清水四盞。煎取二盞。分作二次。空腹日午調服。

十五筆

【調中散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傷食瀉。

藥品 人參(去蘆)、白茯苓、白朮、木香、乾薑(炮)、藿香葉、香附子(炒去毛)、縮砂仁、甘草(炙)、丁香、各等分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。薑棗湯調下。肚痛熱湯下。量兒大小加減。

參考 此方不宜遽用。宜先用消食藥或紫霜丸。取其積盡。然後用之。

十六筆

【龍骨丸】

發明 見農全方。

功用 治小兒冷熱不調。洞泄下利。

藥品 龍骨、黃連、白石脂、白礬(燒令煙盡)、乾薑(炮)、木香、各五錢。

制法及用法 搗羅爲末。醋煮麴糊爲丸。如麻子大。每服五丸。粥飲送下。每日三四次。量兒大小加減。

【龍骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治水瀉腹痛。不進飲食。

藥品 龍骨、當歸(炒)、肉豆蔻(麴裏煨)、木香、各一兩。厚朴、二兩(去粗皮、薑汁炙)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前粥飲調下。

【龍骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒羸利。

藥品 龍骨、芫花(去鬚微炒)、各一兩。當歸(剉微炒)、枳殼(麸炒、微黃、去麴)、各五錢。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小加減。

二十筆

【蘆薈丸】

發明 見吉氏方。

功用 治疳瀉不止。不食腹脹。

藥品 丁香、肉豆蔻(去皮)、木香(剉)、各五錢。

制法及用法 用麴裏。慢火中煨熟爲度。取出去麴。加蘆薈、一兩。使君子肉、五丸。同研細末。稀米糊爲丸。如黍米大。每服十丸至二十丸。米飲送下。

腫脹類

十一筆

【犀角飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸風腫。

藥品 犀角、一錢(鎊)。玄參、連翹、柴胡(去苗)、各五錢。川升麻、木通、各七錢。芒硝(生用)、麥門冬(去心)、各一兩。沈香、檀香、射干、甘草(炙)、各二錢。

制法及用法 研爲末。每服五錢匕。清水一盞半。煎至八分。去滓。食後溫服。夜食後再服。利多即減。

十三筆

【塌氣丸】

發明 見錢乙方。

功用 治肝氣乘脾腹脹。

藥品 胡椒、一兩。蠟尾(去毒、滾醋泡、炒香)、五錢。一方有木香、一錢。

制法及用法 共研末。麴糊爲丸。如粟米大。每服五七丸至二三十丸。不拘時陳米飲送下。

【塌氣丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腹脹。

藥品 木香、五錢。雞心檳榔、一雙。黑牽牛、二兩(半生半炒、取頭末、一兩)。

制法及用法 共研細末。神麴糊爲丸。如黍米大。每服二三十丸。藍湯送下。

【塌氣散】

發明 見楊氏方。

功用 治小兒腹脹。氣喘體腫面浮。

藥品 陳米(炒黃)、青皮(去瓢、巴豆二十一粒、同炒至黃色、去巴豆)、甘草(炙)、各五錢。黑牽牛、二錢五分(半生半炒)。肉豆蔻、二個(煨香)。檳榔、一個。

制法及用法 研爲末。每服五分。米飲調下。

【塌氣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒腹脹氣粗。並疳疾相攻。面目浮腫。

藥品 木香、一錢。青皮、五錢。巴豆、二十粒(同豆炒黃色、去巴豆)。

制法及用法 研爲末。三歲兒每服五分。食前米湯調下。連進即效。

【溫中丸】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治黃胖而足腫脹。

藥品 橘皮、半夏、茯苓、各

一兩。甘草(炙)、五錢。黃連、香附、苦參、鐵砂(醋煨鋪過)、各五錢。白朮、二兩。神麴、一兩。

制法及用法 研爲細末。醋水各半泛丸。如梧桐子大。每服七八十丸。用白朮、六錢。陳皮、一錢。生薑、三片。煎湯送下。虛加入參、一錢。病輕者。服六七兩。小便即長。病甚者。服一斤。小便始長。積聚去淨。再以六君子之類調補之。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治水腫心腹堅脹。喘滿不安。

藥品 當歸、桂心、木香、赤茯苓、木通、檳榔、赤芍藥、牡丹皮、陳皮、白朮、各一錢三分。

制法及用法 清水二鍾。加紫蘇五葉。木瓜一片。煎至一鍾。不拘時服。

十五筆

【鋪臍藥餅】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治腫脹。

藥品 真輕粉、二錢。巴豆、四兩。生硫黃、一錢。

制法及用法 研爲末。令勻

成餅。先用新棉鋪臍上。次鋪藥餅。外以帛緊束之。約人行五七里許。惡水自下。待下三五次。即去藥。以溫粥補之。一餅可治一二十人。久患者。隔日取水。

【鋪臍藥餅】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治水鼓。

藥品 商陸根(取赤者)。

制法及用法 杵爛。貼臍上。以帛縛定。水從小便出。

【褐丸子】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳腫脹。

藥品 蘿蔔子、一兩(微炒)。陳皮、青皮、檳榔、五靈脂、蓬莪朮(煨)、黑牽牛(取淨末、半生半炒)、赤茯苓、各五錢。木香、二錢五分。

制法及用法 共研細末。水煮麵糊爲丸。如綠豆大。每服十五丸。熱湯或紫蘇葉煎湯送下。

二十四筆

【鼈甲散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣。心腹脹滿。小便不利。

藥品 鼈甲(去裙爛、醋炙

焦黃)、檳榔、赤茯苓(去皮)、各一兩。邵李仁(湯浸去皮)、木通(去皮)、各七錢五分。

制法及用法 咬咀。每服八錢。清水一中盞半。煎至一大盞。去渣。不拘時溫服。

痞滿類

十二筆

【黃連消痞丸】

發明 見李東垣方。

功用 治心下痞滿。壅塞不散。煩熱喘促不寧。

藥品 黃連、一兩。黃芩(炒)、二兩。半夏、九錢。枳實(炒)、七錢。橘紅、豬苓、各五錢。茯苓、白朮、甘草(炙)、各三錢。澤瀉、薑黃、各一錢。乾生薑、二錢。

制法及用法 研爲細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【黃連消痞丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治心下痞滿。壅塞不散。煩熱喘促不寧。

藥品 黃連、黃芩、各六錢。枳實、五錢。半夏、四錢。薑黃、白朮、澤瀉、各三錢。人參、

陳皮、厚朴、各二錢。茯苓、一錢五分。砂仁、乾薑、神麴、甘草、各一錢。

制法及用法 共研細末。蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服一丸。熱湯送下。

十三筆

【溫白丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治胸腹中一切積聚、久癥、堅痞、胸滿聚腹脹、嘔噦、氣逆、氣滿、氣脹、水飲、疝氣、食滯、五種淋證、九種心痛、七十二種風證、癰痹、偏枯、眉落、髮墮、通尸、疰忤、癰癧、蟲積、婦女經帶、憂鬱、肝氣、鬼胎、等證。

藥品 桔梗、柴胡、青蒲、吳茱萸(湯泡七次、焙乾)、紫菀(去苗土)、黃連(去毛)、肉桂(去粗皮)、厚朴(去粗皮、薑汁炙)、人參(去蘆)、赤茯苓(去皮)、皂角(去皮子、炙)、蜀椒(去目、並合口、炒出汗)、巴豆(去皮心膜、出油炒、細研)、各五錢。川烏頭(炮、去皮臍)、二兩五錢。一方有炮薑五錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三丸。漸加至五七丸。食

後臨臥薑湯送下。如急貨。加入參、紫菀。伏梁。加菖蒲、黃連、桃仁、痞氣。加吳茱萸、乾薑。肥氣。加柴胡、川芎。奔豚。加丁香、茯苓、遠志。久病服之。皆能瀉出蟲蛇惡穢之物。

【葶蘆丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心下痞。胸中不利。

藥品 葶蘆(酒洗、炒)、人參、柴胡、獨活、甘草(炙)、羌活、黃芩(半炒半酒洗)、各三錢。半夏(洗)、厚朴(炙)、石膏、青皮、各五分。當歸身、七分。白豆蔻仁、縮砂仁、茵陳(酒製炒)、乾葛、各一錢。

制法及用法 研爲細末。湯浸蒸餅和勻。篩子內擦如米大。每服二錢。臨臥時白湯少許送下。

十六筆

【導氣丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸痞塞。關格不通。腹脹如鼓。大便秘結。小腸腎氣等證。

藥品 青皮(用水蛭等分、同炒赤、去水蛭)、蓬莪朮(用鼈蟲等分、同炒赤、去鼈蟲)、胡椒(茴香炒、去茴香)、三稜(乾漆炒、去乾漆)、檳榔(斑蝥炒、去斑

蝥)、赤芍藥(川椒炒、去川椒)、乾薑(礞砂炒、去礞砂)、附子(苧蘆炒、去苧蘆)、萊菔(牽牛炒、去牽牛)、石膏滑(桃仁炒、去桃仁)、各等分。

制法及用法 剉碎。與所製藥炒熟。去水蛭等不屑。祇以青皮等十味。研細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。加至七十丸。空腹時紫蘇湯送下。

十八筆

【檳榔散】

發明 見劉完素宣明論。

功用 治傷寒陰證。下後虛痞。

藥品 檳榔、枳殼、各等分。

制法及用法 研爲末。每服三錢。黃連煎湯調下。

二十四筆

【鼈甲丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痞氣。當胃脘結聚如杯。積久不散。腹脅疼痛。體瘦成勞。不能飲食。

藥品 鼈甲、三兩(去裙襖、以米醋一小盞、化礞砂一兩、用塗鼈甲、炙、以醋盡爲度)。附子(炮、去皮臍)、京三稜(炮)、乾漆(搗碎、炒烟盡)、木香、各

一兩。吳茱萸、五錢(湯泡微炒)。川大黃、二兩(剉碎、醋拌炒乾)。

制法及用法 研爲細末。醋煮麴糊爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹時溫酒送下。

積滯類

十一筆

【紫金丸】

發明 見莊氏方。

功用 治因驚積聚黏滑毒物在脾胃。風藥不下。變成噎中積。

藥品 蟾梢、三七個。犀角末、銀末、硃砂、各一錢。

制法及用法 研極細末。水煮麵糊爲丸。如綠豆大。①大人吐食。心腹脹滿。夜有虛汗。日漸瘦弱者。每服七丸。生薑、大棗、煎湯送下。②婦人血氣。每服五丸至七丸。米飲送下。③小兒驚積。體熱困重。不開目。一歲以上。三歲以下。每服三丸。再小。祇可服一二丸。用黃連、甘草、桃仁、薄荷、煎湯。化膩粉、一字許送下。

【紫霜丸】

發明 見王肯堂遵治準繩。

功用 消積聚。

藥品 巴豆(去油心膜)、杏仁(去皮尖)、各二十一箇。代赭石、一錢(研細水飛)。

制法及用法 共研細末。米飯爲丸。如粟米大。每服三四丸至十丸。不拘時阜角仁煎湯送下。見小者減之。

【逍遙散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 開鬱。行滯。消結。清毒。治上搭手。

藥品 當歸(酒洗)、白芍(酒洗)、白茯苓、白朮(土炒)、陳皮、香附(酒炒)、各一錢。柴胡、八分。黃芩、薄荷、各五分。生甘草、六分。

制法及用法 清水二鍾。煎至八分。食遠服。

十二筆

【琥珀膏】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治一切積塊痞塊。

藥品 大黃、朴硝、各一兩。

制法及用法 研爲末。大蒜搗爲膏。和勻。作片貼之。

十三筆

【當歸散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人瘀血氣攻心腹

病。不能飲食。

藥品 當歸(剉微炒)、檳榔、各七錢五分。木香、桂心、陳橘皮(去白各半)、京三棱、何李仁(去皮微炒)、桃仁(去皮、炒微黃)、吳茱萸(湯泡七次、焙乾)、各一兩。

制法及用法 粗搗篩。每服三錢。清水一中盞。煎至六分。去滓。不拘時稍熱服。

參考 此方爲攻積之劑。全無補件。虛人禁用。貧者亦須以四君湯物湯兼服乃可。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人久積。血氣疔刺。小腹疼痛。四肢無力。不能飲食。

藥品 當歸、赤芍藥(酒洗)、劉寄奴、沒藥、枳殼、延胡索、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一二錢。不拘時熱酒調下。

【遇仙丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 悅顏。進食。治蟲積氣塊。五勞七傷。赤白痢疾。便血注下。皮黃水腫。

藥品 牽牛、三斤。大腹子、二斤。錫灰(炙乾爲末)、大黃、雷丸、各四兩。青木香、鶴蟲、乾漆、各二兩。皂角、四條。

制法及用法 先將鶴蟲、乾漆、皂角煎湯。用粟米煮粥。初用牽牛末。次用大腹末。三用錫灰。四用大黃。五月雷丸。六用青木香。和劑爲丸。如梧桐子大。每服五七九丸。或細末三四錢。生薑湯或熟湯送下。服時不宜食晚飯。三更時茶清送下。次早取蟲積惡物。方可洗面。再以溫粥補之。傷寒及孕婦忌服。

【聖散子】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治遠年積塊。婦人乾血氣。

藥品 礞砂、大黃、各八錢。麥蘗、六兩(炒取淨麴)。乾漆(炒煙盡)、三兩。扁蓄、茴香(炒)、檳榔、各一兩。婦人乾血氣。加穿山甲、二兩(炮)。

制法及用法 研爲細末。每服五錢。小兒用一錢。十五歲以上者。用三錢。臨臥時溫酒調下。仰臥至天明。大便如爛魚腸、小便色赤爲驗。

十四筆

【礞砂煎丸】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治積塊痞癖。一切凝滯。

藥品 礞砂、木香、各三錢。

黑附子、二枚(各重五錢以上、正坐安者、炮製、去皮臍、剉作麤子)。破故紙(隔紙微炒)、葶藶、各一兩。

制法及用法 先以礬砂研末。清水一盞。續續化開。納在甕內。火上熬乾。研爲末。置附子甕內。用剉出附子末填蓋口。和成白麵裹之。約半指厚。慢炭火內燒至黃色。去麵。同木香等研爲細末。用原麥附子熟黃蘗爲末。醋煮米糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸至三十丸。生薑湯送下。

十六筆

【磨積丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治茶積。

藥品 陳倉米、五合(用巴豆七粒、同炒令米赤、去巴豆)、青皮、橘紅、各二兩。

制法及用法 共研細末。米醋和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生薑湯送下。

噎膈類

十一筆

【麥門冬飲】

發明 見劉完素宣明論方。

功用 治心移熱於肺。傳爲肺治。胸滿心煩。精神短少。

藥品 麥門冬、人參、茯苓、五味子、生地黃、甘草(炙)、知母、葛根、瓜蒌根、各等分。

制法及用法 咬咀。每服五錢。加竹葉十四片。煎至七分。不拘時溫服。

【通腸丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治噎膈反胃。

藥品 大黃(酒浸)、滑石(飛研)、各二兩。陳皮(去白)、厚朴(薑製)、各一兩五錢。人參、當歸、貫衆(去毛)、乾漆(炒烟盡)、各一兩。木香、檳榔、各七錢五分。三稜(煨)、蓬莪朮(煨)、川芎、薄荷、玄明粉、雄黃、桃仁泥、甘草、各五錢。

制法及用法 共研細末。用竹瀝、童便、韭汁、人乳、驢尿、蘆根汁、茅根汁、甘蔗汁、燒酒、米醋、白蜜、各二杯。醬汁、一怀。隔湯煮濃。和丸如芥子大。每服三錢。去枕仰臥。唾津嚥下。

疝瘕類

三筆

【三稜散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治緩痛。

藥品 三棱、八錢。川芎、四錢。大黃(醋展)、一錢。

制法及用法 研爲末。清水煎服。

四 筆

【木香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心疝。小腹痛悶。

藥品 木香、陳皮、高良薑、乾薑、訶子(去核)、枳實、各一錢五分。草豆蔻、黑牽牛、各一錢。

制法及用法 清水二鍾。煎至一鍾。食前服。或研爲細末。每服二錢。白湯調下。

八 筆

【疝氣散】

發明 驗方。

功用 治寒疝腹痛。

藥品 胡蘆巴、一兩五錢。川楝子、一兩六錢。小茴香、一兩五錢。吳茱萸、一兩。巴戟肉、六兩。黑牽牛、八錢。

制法及用法 共爲細粉。每次二錢。開水送服。

【金珠丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治冷疝氣痛。及疝囊浮腫。

藥品 金鈴子肉、一兩。家園茱萸、五錢。

制法及用法 研爲末。酒煮麵糊和丸。如麻仁大。兒小者丸如粟粒大。每服三十丸至五十丸。空腹時溫鹽湯或溫酒送下。

【金鈴散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疝氣愈而復作者。

藥品 金鈴子肉、六錢。荆三棱(炮、剉)、蓬莪朮(醋煮、剉)、青皮(去白)、陳皮(去白)、各二錢五分。赤茯苓(去皮)、茴香、各五錢。南木香、二錢。甘草(炙)、四錢。檳榔、枳殼(去瓤、麸炒黃)、鉤藤(和鉤)、各三錢。

制法及用法 除檳榔、木香、不過火。餘剉焙。同檳、香爲末。每服五分至一錢。炒茴香湯無灰酒。空腹時試服。不飲酒者。煎炒茴香湯調下。

【金鈴散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治癰疝腫痛。

藥品 金鈴子、巴豆肉、各三十枚(各切片、同炒焦色、去巴豆、以茴香炒、與金鈴肉等分、

並入木香一錢五分)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。水酒各半。煎葱白湯調下。

【奔豚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治奔豚。

藥品 穿山甲(鉄炒)、破故紙(鉄炒)、香附(去毛)、各五錢。土狗、十枚(去頭尾、瓦上焙乾)。海藻(焙)、茴香、木香、各一兩。散牽牛頭末、四兩。全蠍、十五枚(去毒)。吳茱萸、一兩五錢。

制法及用法 研爲末。大蘿蔔、一枚。剝去心肉。裝入茱萸。以糯米一碗。同蘿蔔煮飯爛爲度。出茱萸曬乾。同諸藥爲末。次將蘿蔔細切。入米飯搗丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。食前鹽酒送下。

【奔豚丸】

發明 見李東垣方。

功用 治奔豚。七疝。女子瘕聚。帶下。脈沈滑。

藥品 厚朴(薑製)、七錢。黃連(炒)、五錢。苦楝子(酒煮)、三錢。白茯苓(另研)、澤瀉、菖蒲、各二錢。延胡索、一錢五分。附子(去皮)、全蠍、潤滑、各一錢。川烏頭(炮)、丁香、各五分(一作各五錢)。巴

豆霜、四分(一作五分、一作五錢)。肉桂、二分。

制法及用法 除巴豆霜、茯苓、另爲末後入外。餘研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。初服二丸。食遠淡鹽湯送下。一日加一丸。二日加二丸。漸加至大便微瀉。再從二丸加服。周而復始。積減大半勿服。秋冬加厚朴、五錢。通前一兩二錢。如積勢堅大。先服前藥不減。於一料中加牡蠣(煨存性)、三錢。疝帶下勿加。如積滿腹或半腹。先治其所起是何積。當先服本藏積藥。諸疾自愈。如服藥人覺熱加黃連。氣短加厚朴。悶亂減桂。

【昆布丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治陰疝腫大偏癰。

藥品 昆布(洗去鹹、炙)、海藻(洗去鹹、炙)、燕麥仁(炒)、茯苓子(炒去角)、檳榔(剉)、各一兩五錢。枳殼(去瓢、鉄炒)、大麻仁、各二兩。訶黎勒(炒去核)、黃耆、木香、各七錢五分。陳皮(去白、炒)、桃仁(去皮尖、炒研)、菟絲子(酒浸一宿、另研)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。令勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫酒或鹽

湯送下。

【定痛散】

發明 見朱丹溪方。

功用 治寒疝疼痛。

藥品 枳殼、十五枚。山梔子(炒)、棠欒子、吳茱萸(炒過)、荔枝核(炒)、各等分。

制法及用法 研爲末、每服一二錢。空腹時長流水調下。

【阿魏丸】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治癰疽。積聚。痞塊。

藥品 阿魏(醋浸)、五錢。山查肉、南星(皂角水浸)、半夏(同南星浸)、麥芽、神麴(炒)、黃連、蘿蔔子(蒸)、各一兩。連翹、貝母、瓜蒌、各五錢。風化硝、石蠟、胡黃連、白芥子(一作食鹽)、各二錢五分。

制法及用法 研爲末。薑汁浸炊餅和丸。每服二錢。熱湯送下。服後類食胡桃肉。虛者忌服。嗽加香附、蛤粉。

九 筆

【胡蘆巴丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治小腸氣。

藥品 胡蘆巴、益智仁、大茴香、蓮菰蕊、牽牛子、山茱萸肉、牛膝(酒製)、川斷、川芎、防風、

甘草。

制法及用法 研爲末。每服二錢。溫酒調下。

【胡蘆巴丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治小腸疝氣。偏墜陰腫。小腹有形如卵。上下往來。痛不可按。或絞結 繞臍 攻刺。嘔吐悶亂。

藥品 胡蘆巴(炒)、一斤。小茴香(鹽炒)、十二兩。吳茱萸、十兩(洗炒、一作半酒半醋浸一宿、焙)。川棟子、一斤二兩(蒸、去皮核、炒、作一斤)。巴戟天(去心炒)、川烏(炮、去皮臍)、各六兩。一方有牽牛子 頭末、十兩。

制法及用法 共研細末。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。空腹時溫酒送下。小兒每服五丸。食前茴香湯送下。

【香附散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽。

藥品 香附、不拘多少。

制法及用法 研爲末。每服二錢。先用酒一盞。入海藻一錢。煎至半盞。先細嚼海藻。用煎酒調香附末服。

【前胡散】

發明 見劉河間方。

功用 治肉苛及癰疽瘡瘍。諸風痛癢。傷折墜損。

藥品 前胡、白芷、細辛、官桂、白朮、川芎、各三兩。附子(炮)、吳茱萸(湯泡、炒)、當歸、川椒(去目並閉口者、生用、一作三錢)、各三兩。

制法及用法 剉散。茶酒三升拌勻。同窖一宿。以煉成豬脂膏五斤。入藥煎。候白芷黃紫色。漉去渣。成膏。在病處摩之。以熱爲度。

十 筆

【桃仁散】

發明 見朱橚普濟方。

功用 治婦人癥瘕。心腹脹滿。不能飲食。體瘦無力。

藥品 桃仁、一兩(湯浸、去皮尖雙仁、麸炒微黃)。訶子皮、白朮、赤芍藥、當歸、各七錢五分。京三稜(剉微炒)、一兩。鼈甲(醋炙、去裙爛)、一兩五錢。陳皮(湯浸、去白焙)、三兩。

制法及用法 爲散。每服三錢。清水一盞。加生薑一錢三分。煎至六分。去滓。食前稍熱服。

參考 此方皆攻積之藥。性多穢悍。用者慎之。

【桃仁煎】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治婦人血積癥瘕。經水不行。

藥品 桃仁(去皮尖、炒)、大黃(漚紙裹、蒸)、朴硝(另研、一作二錢)、各二兩。䷔蟲、一兩(去足翅炒黑)。

制法及用法 研爲細末。用醋二升五合。銀石器中慢火熬膏。却入大黃、桃仁、䷔蟲。不住手攪之。度可丸。乃入朴硝。再攪出之。丸如梧桐子大。每服五丸。前一日不食晚飯。五更初溫酒送下。至日午取下如赤豆汁蝦蟆衣雞肝狀。未下再服。如鮮血來即止。隨以調補血氣藥補之。氣虛血弱者忌用。

【海蛤丸】

發明 見張潔古方。

功用 治癰疽。

藥品 海蛤(燒醋淬七次)、當歸、海金沙、膩粉、礞砂、各一錢。海藻、粉霜、各五分。水蛭、二十一條(炒)。青黛、滑石、乳香、各一錢。硃砂、二錢(另研)。地龍、二十一條(去頭足)。

制法及用法 研爲細末。鹽漿麵糊和丸。如小豆大。硃砂爲衣。每服十丸。空腹時燈心

湯送下。小便下冷膿惡物爲效。再以黃連、紫河車、板藍根各二錢。煎湯漱口。以固牙齒。或去板藍根。加貫衆。

【海藻丸】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治偏墜。小腸氣。

藥品 海藻、海帶、各一兩。蟹螯、二十八枚(去足翅)。巴豆、二十八個(去殼完全者)。

制法及用法 先以蟹螯、巴豆、同裝生絹袋中。用好醋一碗。以瓦銚盛四味同煮。將乾。去蟹螯、巴豆不用。只將海帶二味。研爲細末。以淡豆豉、一百粒。以煮藥餘醋略浸。蒸餅爲骨。和藥末爲丸。如梧桐子大。每服用麝香、少許。硃砂、三錢。乳鉢細研至無聲。却入麝香、再研勻爲衣。令乾。以新瓦瓶收之。初服七丸。再服十丸。三服十五丸。若未愈再進二三服。皆用十五粒。仍以鹽炒茴香細嚼。空腹時溫酒送下。忌鴨子、鮮醬、動氣等物。久病三五服效。此藥貴新合效速。若合下稍久。多服爲佳。

【茱萸內消丸】

發明 見祕傳方。

功用 治腎虛邪襲。奔豚痿痺。寒疝陰囊。偏大引痛。或

生瘡瘍出黃水。

藥品 吳茱萸(半酒半醋浸一宿、焙乾)、山茱萸(蒸去核)、馬蘭花(醋浸焙)、黑牽牛(炒取頭末)、延胡索(微炒)、川棟子(蒸去皮核)、舶上茴香(鹽炒)、海藻(洗去鹹、焙)、橘皮、青皮(去白)、官桂、各一兩(一作各五錢)。桃仁(炒、去皮)、白蒺藜(炒、杵去刺)、木香、各五錢。一方有山藥、二兩。無黑牽牛、延胡索、海藻、桃仁、白蒺藜。

制法及用法 研爲細末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服四五十丸。食前溫酒或鹽湯送下。

【茱萸內消丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒陰癰偏大。上攻臍腹疼痛。腎囊腫脹。或生瘡瘍。時出黃水。

藥品 吳茱萸、食茱萸、各五錢。山茱萸(去核)、桔梗、青皮、各一兩。川棟子(炒)、一兩五錢。大腹皮、五味子、海藻(洗)、玄胡索、各一兩二錢五分。木香、七錢五分。茴香(炒)、桂心、川烏頭(炮去皮臍)、桃仁(微炒另研)、各五錢。

制法及用法 共研細末。鹽糊爲丸。如麻子大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。

【烏梅散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腹疼。及初生孩臍下冷痛疝氣內疝等疾。

藥品 烏梅(去核)、玄胡索、甘草(半生半炙)、各五錢。乳香、沒藥、鉤藤鉤、各二錢(一作各二錢五分)。

制法及用法 咬咀。每服二錢。清水一鍾。煎至七分。空腹時溫服。

【酒煮當歸丸】

發明 見李東垣方。

功用 治寒束熱邪。疝瘕諸痛。婦人經聚帶下。

藥品 當歸(去蘂)、附子(炮去皮鹽)、茴香(炒)、川楝子(酒煮、去灰核、一作五錢)、各一兩。

制法及用法 以好酒三升。煮至酒盡。焙乾。次入丁香、木香、各五分(一作各二錢、一作各三錢)。玄胡索、五錢(醋炒、一作一兩)。全蠍、十三枚(淡醋泡去鹹、一作十四枚)。一方有肉桂、五錢。共研細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸至一百丸。空腹食前溫酒送下。

參考 凡七疝帶下。皆屬於風。全蠍爲治風聖藥。川楝、茴香、皆入小腸經。當歸、玄胡

索、行血止痛。疝氣帶下。皆積寒邪在小腸之間。故以附子佐之。丁香、木香、爲引導也。

十一筆

【蚯蚓散】

發明 見錢乙方。

功用 治陰卵腫硬成疝。

藥品 乾蚯蚓糞、不拘多少。

制法及用法 先用葱椒煎湯洗。次以津唾調糞敷之。須避風冷溼地。

【通經丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治月經不通。或成血瘕。

藥品 桂心、青皮(去白)、大黃(炮)、乾薑(炮)、川椒(炒出汗)、川烏(炮)、蓬莪朮、乾漆(炒煙盡)、當歸(酒洗)、桃仁(製炒)、各一錢。一方去川烏。加紅花。一方無川椒、川烏。有延胡索。

制法及用法 研爲末。先將四錢。用米醋熬成膏。和餘六錢末成劑。白中杵丸。如梧桐子大。曬乾。每服二十丸。加至三十丸。空腹時淡醋湯或溫酒送下。

十二筆

【黑神丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治五隔。癥瘕。抄癖。疝瘕。血崩。難產。死胎不下。產後諸血。漏下赤白。

藥品 神麴、茴香、各四兩。木香、椒(炒出汗)、丁香、各五錢。檳榔、四枚。漆、六兩(一半生用、一半用重湯煮半日、令香)。一方無木香。

制法及用法 除椒、漆外。餘皆半生半炒。研爲細末。生熟漆和丸。如彈子大。用茴香末、十二兩。鋪地上陰乾。並茴香貯器中。迨極乾。乃去茴香。每用一丸。分四服。死胎不下。每服一丸。皆綿黃溫酒送下。難產每服一丸。用葵子、四十九粒。炒搗酒煎送下。諸疾不過三服。疝氣十服。臍氣癥瘕五服。血瘕三丸當瘥。

十三筆

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人疝瘕。及血氣攻刺。心腹疼痛。

藥品 當歸(剉微炒)、桂心、檳榔、川大黃(剉微炒)、各一兩。鼈甲(醋浸、炙黃)、二兩。

川芎、吳茱萸(湯泡七次、焙乾)、木香、青橘皮(去白)、各五錢。蓬莪朮、赤芍藥、桃仁(湯浸去皮尖、麩微炒黃)、各七錢五分。

制法及用法 爲散。每服三錢。清水一盞。加生薑一錢三分。煎至七分。去滓。不拘時稍熱服。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒癰疔。

藥品 當歸、大黃、桃仁(去皮尖、湯泡)、各二錢五分。牽牛(微炒取仁)、辣桂、各五錢。全蠍、一錢五分。

制法及用法 剉碎。每服一錢。清水一鍾。加白蜜半匙。煎至五分。食前服。以利爲度。

十四筆

【礞砂丸】

發明 見許叔微類書普濟本事方。

功用 通氣。消癥結。

藥品 礞砂、一錢(研)。木香、沉香、巴豆肉、各一兩。青皮、二兩。銅青、五錢(研)。

制法及用法 先以木香、沉香、青皮。同巴豆慢火炒令紫色。去巴豆。研爲細末。入礞

砂、銅青。同研勻。蒸餅和丸。如梧桐子大。每服七丸至十丸。空腹食前鹽湯送下。一日二三次。

【礞砂丸】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人食癰。瘦弱食少。

藥品 礞砂、青礞石、三稜(炒)、穿山甲(炙)、乾漆(炒令煙盡)、硫黃、各五錢。巴豆、三十枚(去皮心、炒、不去油)。

制法及用法 共研細末。麩飯爲丸。如小豆大。每服五丸。生薑、橘皮、煎湯送下。

【礞砂丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人疝瘕。及瘀血在臟。腹脅攻痛。

藥品 礞砂、川芒硝、各一兩。當歸、雄黃、桂心、各五錢。大黃(炮)、三稜、各二兩。

制法及用法 研爲細末。米醋一碗。熬大黃末爲膏。次入餘藥末和丸。如梧桐子大。每服十丸。空腹時溫酒送下。漸漸加至二十丸。以利下惡物爲度。

【礞砂煎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人冷勞。心腹積

聚。腹脅疼痛。虛瘦不食。

藥品 礞砂、二兩(醋一斗熬成膏)。鼈甲(醋炙)、桃仁(去皮尖、麩炒)、木香、五靈脂(去土石炒)、當歸、各一兩。

制法及用法 共研細末。礞砂膏爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹時溫酒送下。

參考 此方礞砂太多。不宜輕用。

【奪命丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小腸疝氣。偏墜掙痛。臍下脹痛。或外腎腫硬。日漸滋長。陰間溼癢。抓之成瘡。及奔豚氣上衝。

藥品 吳茱萸、一斤(去枝梗浮、四兩酒浸、四兩鹽湯或白湯浸、四兩醋浸、四兩重便浸、各浸一宿、焙乾)。澤瀉、二兩(去灰土、切作片、去粗皮、酒浸一夜)。

制法及用法 共研細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。食前鹽酒或鹽湯送下。

【蜘蛛散】

發明 見金匱要略。

功用 治陰狐疝氣。偏有大小。時時上下者。

藥品 大蜘蛛、十四枚(去頭足、熬焦)。肉桂、五錢。

制法及用法 研爲末。每服

一錢。飲和服。或溫酒送下。一日二次。蜜丸亦可。

參考 陰狐疝氣。即內經之狐風疝。爲厥陰經病。方中蜘蛛。性陰而厲。隱見莫測。可定幽暗之風。故厥陰肝經之病。其力在殼。能泄下焦結氣。肉桂芳香入肝。專散沈陰結疝。而爲蜘蛛之引導。二者合用。其法甚妙。

十九筆

【獺肝丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治食魚鱸生瘕。常欲食鱸者。

藥品 獺骨肝肺、大黃、各八分。蘆根、鶴骨、各七分。桔梗、乾薑、桂心、各四分。斑蝥、二十一枚(炙)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。溫酒送下。一日二次。

二十一筆

【麝香丸】

發明 見楊氏方。

功用 治脅痛及癰疔。

藥品 麝香、一錢。木香、胡椒、各一兩。全蠍、巴豆霜、各四錢。

制法及用法 共研細末。蒸餅爲丸。如麻子大。硃砂爲衣。每服五七丸。熱湯送下。

參考 此方能尋諸處痛。凡膀胱氣、脅下痛、最難治者。宜之。

二十三筆

【濁痛丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治癰疔、小腸氣、膀胱氣、一切疝痛。

藥品 延胡索、一兩。川棟肉、茴香、各五錢。白牽牛頭末、當歸、高良薑、青皮、木香、烏藥、各二錢五分。全蠍、七個。

制法及用法 共研細末。薑汁浸蒸餅糊丸。如梧桐子大。每服三五十丸。燒綿灰調酒送下。

中風類

五筆

【四生丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治左癱右瘓。口眼喎斜。中風痰急。半身不遂。

藥品 五靈脂、補骨脂、川烏

頭(去皮尖)、當歸、各等分。

制法及用法 共研細末。以無灰酒打麵糊爲丸。如梧桐子大。每服七丸。漸加至十五丸。溫酒送下。勿服靈寶丹。恐藥無效。

十一筆

【牽正散】

功用 治中風頭暈。口眼喎斜。

藥品 天麻、四錢。白附子、四錢。全蠍(焙)、二錢七分。僵蠶(炙)、二錢七分。

制法及用法 共爲細粉。每次一錢。開水送服。孕婦禁忌。

十二筆

【勝金丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治中風卒倒昏悶。四肢不收。痰涎上壅。氣閉不通。

藥品 生薄荷、五錢。豬牙皂角、二兩(搥碎、清水一升、同薄荷浸取汁、研爲膏)。瓜蒂末、一兩。藜蘆、二兩。硃砂、五錢。一方有粉霜、粉鉛。無藜蘆。

制法及用法 共研細末。皂角膏爲丸。如龍眼大。硃砂爲衣。每服一丸。甚者二丸。溫

酒化下。以吐爲度。得吐即醒。不醒者不可治。

【琥珀散】

發明 見玉肯堂證治準繩。

功用 治產後中風。恍惚語澀。心神煩劇。四肢不遂。

藥品 琥珀(另研)、茯神(去木)、各一兩。遠志肉、石菖蒲、黃耆、防風、獨活、人參(並去蘆)、麥冬(去心)、芍藥、桑寄生、赤芍藥、羚羊角屑、各五錢。甘草、二錢五分。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一中盞半。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。

【順氣丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治卒中昏不知人。六脈沈伏。口眼歪斜。半身不遂。及痰厥氣厥。

藥品 生天南星、一兩。生川烏、五錢(去皮)。生附子、五錢(去皮)。木香、二錢(一作二錢五分、一作三錢五分)。

制法及用法 搗羅爲散。每服五錢。加生薑十片。清水煎。去滓溫服。如氣虛卒倒者。另加人參一兩許。口噤不省人事者。用細辛、皂角各少許。研爲細末。以蘆管吹入鼻中。候噴嚏。其人少蘇。然後

進藥。痰涎壅盛者。每服加全蠍四枚。仍用養正丹鎮墜之。因氣中者。以浮陽化蘇合香丸。乘熱灌服。仍用前藥汁濃磨沈香一呷許。再煎一沸服之。候服藥已定。審的是風。再投治風之劑。

參考 此爲治卒中之主方。蓋風爲陽邪。祇中風而無寒者。其害淺。惟兼挾寒。其害始劇。寒輕而在表者。宜發汗以逐邪。寒重而入裏者。非溫中補虛。終不可救。此方取三物之大辛大熱。不泡不製。更佐以木香。乘其至剛至銳之氣而用之。非專以治風。實兼以治寒。然邪之所湊。其氣必虛。若但知攻邪而不顧正氣。則不免倒戈爲患。故遇氣虛之人。必用人參兩許以駕馭之。方可收效。

【換骨丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治風癱。及暗風風癱。中風喎斜癱瘓。

藥品 蒼朮、槐實、桑白皮、川芎、白芷、人參、防風、何首烏、威靈仙、蔓荊子、各一兩。苦參、五味子、木香、各五錢。冰片、麝香、各五分。

制法及用法 麻黃煎膏。和

搗萬杵。每兩作十丸。硃砂爲衣。修合時。勿令陰人進大見之。每服一丸。磨溫酒半盞。以物含定。不令透氣。食後臨臥。各呷咽之。衣覆取汗。即瘳。

【稀涎散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治中風不語。牙關緊急。單蛾雙蛾。痰厥昏迷。

藥品 江子仁、六粒(每粒分作兩半、去皮膜、研、壓去油)、豬牙皂角、三錢(切片、一作四條、去皮弦子、酥炙、另研末)。明礬、一兩(半生半枯、另研末)。

制法及用法 先將明礬化開。入二藥攪勻。待礬枯。研爲末。每用三四分。吹入鼻中。痰涎壅盛者。以一錢或一錢五分。燈心湯或溫水調灌。喉中之痰逆上者即吐。膈間者即下。醒後再用藥調理。方免後患。一方不用江子仁。研爲末。每服五分匙。溫水調下。未吐。少頃鵝翎探吐之。

參考 無形之風。挾有形之涎。膠結不散。宜蠲以去垢。辛以利竅。故方用礬石之鹹滲。以消痰涎。牙皂之辛苦。以搜風秘。俾涎散而風解。惟潤氣風湧而上。清陽失位暴仆。

以此先治其標。至咽喉疎通。能進湯藥即止。若攻盡其痰。則液無以養筋。令人攣急筋枯。此爲大戒。

【開關散】

發明 見鮑相家驗方。

功用 治中風口噤。

藥品 皂角、二錢。北細辛、三分。

制法及用法 共研細末。每用少許。吹入鼻中。即醒。

十三筆

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後中風。牙關緊閉。不省人事。口吐涎沫。手足攣痙。

藥品 當歸(去蘆)、荆芥穗、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。清水一盞。黃酒半盞。煎至一盞。灌之。如牙關緊急。幹開微微灌之。如能下咽即生。

【滌痰丸】

發明 見醫用和方。

功用 豁痰。清熱。利氣。補虛。治中風痰迷心竅。舌強不能語。

藥品 半夏、膽星(並盞製)、各二兩五錢。枳實、橘紅、茯

苓、各二兩。石菖蒲、人參、各一兩。竹茹、甘草、各五錢。

制法及用法 共爲細末。將膽星烱化泛丸。如梧桐子大。每服二三錢。熱湯送下。

十四筆

【碧霞丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治卒中僵仆。痰涎壅塞。心神迷悶。牙關緊急。目睛上視。及五癰涎潮搐搦。

藥品 石綠(研九度、飛)、十兩。附子尖、烏頭尖、蠟梢、各七十個(一作各五十個)。

制法及用法 研爲末。入石綠令勻。麴糊爲丸。如雞頭實大。每服一丸。急用薄荷汁化下。更入酒半盞。溫緩服之。須臾吐出痰涎。然後隨證治之。如牙關緊急。幹開灌之。立驗。

十九筆

【蠟附散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風邪頭痛夾腦。痰涎壅盛。嘔逆惡心。暗風旋暈。牙關緊急。口眼喎斜。面目瞤動。頭項拘急。肩背引疼。耳癢目昏。四肢麻木。及沐浴感風。頭目昏痛。兩太陽

疼。

藥品 全蠍(炮)、一錢五分。附子(炮、去皮臍)、三錢。雄黃、硃砂(均水飛)、各一錢五分。川烏頭(炮、去皮臍)、麻黃(去節)、天南星(薑製)、防風(去蘆)、白殭蠶(炒)、各三錢。白芷、藜蘆(去蘆土)、各五錢。一方用蠍梢、白附子。

制法及用法 研爲細末。每服五分。食後蔥茶調下。孕婦忌服。兼嚼如聖餅子。治眼羞明多淚見物不明有效。

二十筆

【礬石散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治感風寒溼。舌強不能語。

藥品 枯礬、桂心、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。置舌下。

癰 癩 類

四 筆

【牛黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風癰虛乏。痰在胸臆。嘔吐煩悶。

藥品 牛黃(另研)、麝香(另

研)、各五錢。虎睛、一對。蜈蚣(去頭足翅)、犀角屑、安息香、獨活(去蘆)、抱茯神(去木)、遠志(去心)、甘草(炙)、各一兩。防風(去蘆)、一兩五錢。人參(去蘆)、鐵粉(另研)、硃砂(水飛)、龍齒(另研)、各二兩。

制法及用法 研爲細末。和勻再研。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時荆芥湯送下。

【牛黃膏】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治熱入血室。發狂。

藥品 牛黃、二錢五分。硃砂、鬱金、牡丹皮、各三錢。冰片、甘草、各一錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如皂角子大。每服一丸。新汲水化下。

【牛黃清心丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治諸風緩縱不隨。言謇心怔。健忘恍惚。眩冒煩鬱。痰涎壅塞。及心神不足。驚恐惡夢。虛煩少睡。喜怒無時。或發狂顛。神情昏亂。小兒躁鬧。項背強直。腰背反張。時發時醒。

藥品 牛黃、一兩二錢(另

研)。白芍藥、麥門冬(去心)、黃芩、當歸(去苗)、防風(去苗)、白朮、各一兩五錢。柴胡(去苗)、桔梗、川芎、白茯苓(去皮)、杏仁(去皮尖雙仁、麩炒黃、另研)、各一兩二錢五分。神麴(炒)、蒲黃(炒)、吉林人參(去蘆)、各二兩五錢。羚羊角、麝香(另研)、龍腦(另研)、各一兩。肉桂(去粗皮)、大豆黃卷(碎炒)、阿膠(剉碎、蛤粉炒)、各一兩七錢五分。白薇、乾薑(炮)、各七錢五分。犀角屑、二兩。雄黃(另研飛)、八錢。乾山藥、七兩(一作十兩)。甘草(剉炒、一作五錢)、五兩。金箔、一千二百片(內四百片爲衣)。大棗、一百枚(煮熟、去皮核、研成膏)。

制法及用法 除棗、杏仁、金箔、二角屑、及牛黃、雄黃、腦、麝外。餘研爲細末。入餘藥和勻。用煉蜜與棗膏爲丸。每兩作十丸。金箔爲衣(一方有硃砂一兩五錢、爲衣)。每服一丸。食後溫水化下。小兒驚癇。即酌度多少。以竹葉湯溫化。

【五生丸】

發明 見李仲南方。

功用 治陰癰。

藥品 天南星、半夏、川烏

頭、白附子、各一兩。大豆(去皮、一作一兩)、二錢五分。

制法及用法 生研爲細末。滴水和丸(一作薑煮糯米汁丸、如梧桐子大)。每服三丸至五丸。不得過七丸。薑湯送下。

【五色丸】

發明 見錢乙方。

功用 治五癰。

藥品 硃砂、五錢。水銀、一分(一作二錢五分)。雄黃(熬)、一兩。鉛、三兩(同水銀熬結砂子)。眞珠、一兩。

制法及用法 研爲極細末。煉蜜和丸(一作煮麴糊水爲丸)。如麻子大。每服三四丸。金銀薄荷煎湯送下。

【五癰丸】

發明 見楊氏方。

功用 治癰癤。

藥品 白附子(炮)、五錢。半夏(湯洗)、阜角、二兩(槌碎、清水五合浸透、揉汁、去渣、與白礬一處、熬乾爲度)。天南星(薑製)、生白礬、烏蛇、各一兩(酒浸、一作各二兩)。全蠍、二錢(炒、一作二兩)。蜈蚣、半條。白僵蠶(炒)、一兩五錢。麝香、三字。硃砂、二錢五分(水飛、一作一錢五分)。雄黃(水飛)、一錢五分。

制法及用法 研爲細末。生

薑汁煮麵糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後溫生薑湯送下。

【五癰丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治五癰。

藥品 露蜂房(焙)、石綠、各一兩。桂心、遠志(去心)、人參、各五錢。硃砂、一錢。

制法及用法 研爲末。稀粥和丸。如梧桐子大。每服二三十丸。熱湯送下。

五 筆

【白金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸癰潮發不省。

藥品 白朮、五錢(湯洗、炒微黃、搗羅爲細末)。天竺黃、二錢五分。牛黃、一錢。麝香、龍腦、各五分。

制法及用法 研爲細末。拌勻。每服五分。薑汁調。放溫灌之。

【白花蛇膏】

發明 見陳言三因極一病證方論。

功用 治癰疾。

藥品 白花蛇(酒浸、去皮骨、炙乾)、五寸。雄黃(水飛研勻)、一兩。白沙蜜、杏仁(去皮尖研爛)、各一斤。

制法及用法 同煉成膏。每服一錢。溫酒化下。每日三次。須先服通天再造散。下去蟲物。乃服此除根。

【半夏丸】

發明 見姚僧坦集驗方。

功用 治心風狂。

藥品 半夏、一兩(生薑汁煮三五沸、取出、切作塊、更煮令熟、焙乾爲細末)。麝香(研)、一錢。水銀、五錢。生薄荷、一大握(和水銀研如泥)。

制法及用法 入薄荷泥內。更研千百下。丸如芥子大。每服十五丸。臨臥時金銀湯送下。三日再服。

六 筆

【地龍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒諸癰。

藥品 乾地龍、五錢(焙)。虎睛、一對(炙)。人參、二錢五分。金銀箔、三十片。天竺黃、硃砂、代赭石(煨醋淬)、鐵粉、各二錢五分。雄黃、一錢五分。輕粉、五分。

制法及用法 研爲末。每服五分。不拘時紫蘇湯調下。

七 筆

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人風邪類邪。啼泣不止。歌笑無度。心神恐懼。言語失常。

藥品 防風、茯神(去木)、獨活、人參、遠志(去心)、龍齒、菖蒲(去毛)、石膏、牡蠣、各一兩。秦艽、禹餘糧、桂心、各五錢。甘草、七錢五分。蛇蛻、一尺(炙)。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。清水一盞半。煎至七分。去滓溫服。

【辰砂散】

發明 見沈括癰疽方。

功用 治風痰諸癰。及不寐證。

藥品 辰砂、一兩(須光明有牆壁者)。酸棗仁(微炒)、乳香(光瑩者)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。先量所患人飲酒幾回。令恣飲沈醉。但勿令吐。至靜室中。以前藥都作一服。溫酒調。作一盞。令頓飲。如飲酒素少人。俱以隨量取醉。服藥訖。便安置床枕令臥。病淺者半日至一日。病深者二三日。令家人潛伺之。鼻息勻調。但勿喚覺。亦不可驚觸使覺。待其自醒。即神魂定矣。萬一驚寤。不復可治。

八 筆

【金黃散】

發明 見張渙方。

功用 治瘰癧日久。及風氣傳於經絡。變爲癰疾。

藥品 川黃連、二錢五分。胡粉、龍骨(燒灰)、各一錢。

制法及用法 各另研。復合研爲細末。每片少許。敷瘰中。時時用之。

【金箔丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心臟風邪。恍惚狂言。意志不定。

藥品 金箔、二百片。膩粉、五錢。

制法及用法 用新小鐵子。中先布金箔。逐重用膩粉隔之。後下牛乳一小盞。文火煎至乳盡。金箔如泥。即於火上焙乾。研爲末。蒸餅和丸。如小豆大。每服五丸。食後新汲水送下。

【羌活膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人胎癰。昏困不省。

藥品 羌活、獨活、各一兩。天麻、全蠍、人參(去蘆)、白殭蠶(微炒)、各五錢。烏蛇肉、一兩(酒浸一宿、焙)。

制法及用法 搗細研末。煉蜜和膏。如皂角子大。麝香、荊芥、湯化下。

【虎睛丸】

發明 見王肯堂治準繩。

功用 治小兒驚風。邪氣入心。

藥品 虎睛(細研)、遠志(薑製、焙、去心)、犀角(鎊)、大黃(溼紙裏煨)、石菖蒲、麥門冬(去心)、各二錢五分。蜈蚣、三枚(去足翹炒)。

制法及用法 研為細末。粟米粉打糊為丸。如梧桐子大。每服五七丸。不拘時竹葉煎湯或全銀煎湯磨化下。

【返魂丹】

發明 見王海藏方。

功用 治小兒癰癰、潮發瘰癧、口眼相引、項背強直、牙關緊急、及諸病久虛、生風多睡者。

藥品 烏犀(剉屑)、二兩。水銀、天麻(酒洗焙乾)、檳榔、獐齒(去絲嘴微炒)、硫黃(研末、入水銀、置瓷石盞內、慢炒成沙)、各五錢。白附子(炮)、川烏(炒通赤、留煙少許、入碗內、以一盞子蓋上、新土圍之、待冷取出)、獨活(去蘆)、乾蠍(炙)、革薺(炒)、肉桂(去粗皮)、當歸(酒浸焙乾炒)、細辛根、防風

(去蘆)、天南星(薑汁煮軟、炒黃)、阿膠(杵碎炒)、麝香(洗去土)、烏蛇(酒浸一宿、炙熟、去皮骨)、沈香、槐膠、羌活、白花蛇(酒浸一宿、炙熟、去皮骨)、麻黃(去根節)、半夏(薑汁浸三宿、炒)、羚羊角(鎊)、陳皮(去白炒)、各一兩。入竺黃(研)、木香、人參(去蘆)、乾薑(炮)、茯苓(去皮)、蔓荊子(去白皮)、晚蠶沙(微炒)、敗龜板(醋酒炙黃)、藁本(去土)、桑螵蛸(炒)、白芷、何首烏(米泔浸一宿、煮焙)、虎骨(酒醋塗炙黃)、縮砂仁、白朮(米泔浸一宿、切焙)、枳殼(炒去白)、丁香、厚朴(去皮、薑汁塗炙)、各三分。蟬殼(炒)、川芎、附子(水浸泡、去皮尖)、石解(去根)、肉豆蔻(去殼微炒)、龍腦(另研)、雄黃(研、水飛)、硃砂(研、水飛)、各一兩。膩粉(另研)、麝香(另研)、各一錢。烏雞、一隻(去嘴翅足)。狐肝、三具(二味臘月內、入瓦瓶固濟、火煨赤、候冷取出、研用)。金箔、三十片(為衣)。

制法及用法 炮製如法。煉蜜和丸。如梧桐子大。金箔為衣。每一歲兒服一丸。不拘時溫薄荷自然汁化下。

九 筆

【保安丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒諸風癇。

藥品 五靈脂、五錢。生川烏(去皮尖)、二錢五分。

制法及用法 爲細末。豬心血和丸。如梧桐子大。每服一丸。不拘時生薑湯化下。

十 筆

【烏金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後狂言亂語。目見鬼神。

藥品 當歸、遠志肉、川芎、酸棗仁、白朮、赤芍藥、香附子、辰砂(另研入)、熟地黃、羌活、防風、各二錢。茯神、二錢五分。半夏、三錢。全蠍、麥門冬、人參、牛膝、天麻、各一錢。甘草、九分。陳皮、白芷、各一錢五分。

制法及用法 剉碎。分作二服。清水一鍾半。加生薑、三片。葱白三枚。入金、銀同煎一飽。不拘時溫服。

【酒養當歸丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人癲癇。面垢背寒。目眩口痞。食不下。嘔噦

不止。心痞懊懣。身重。行步欹側。腿膝枯細。大便秘結。小便頻數或遺。脈厥緊澀。按之空虛。

藥品 當歸、一兩。茴香、五錢。黑附子(炮、去皮臍)、高良薑、各七錢。

制法及用法 均剉如麻豆大。以好黃酒一升五合。同煮至酒盡爲度。炭火焙乾。共研極細末。入炒黃鹽、丁香、各五錢。全蠍、柴胡、各二錢。升麻根、木香、各一錢。苦楝子、甘草(炙)、各五分。玄胡索、四錢。共研細末。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹宿食消盡時。淡醋湯送下。忌食油膩冷物溼麵。

十一筆

【犀角丸】

發明 見劉河間方。

功用 治風癲癇。發作有時。揚手擲足。口吐痰涎。不省人事。暗倒屈伸。

藥品 犀角末、五錢。赤石脂、三兩。朴硝、二兩。白僵蠶、薄荷葉、各一兩。

制法及用法 研末。麵糊爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。不拘時。溫湯送下。一日三次。如覺痰多。即減丸數。

忌酒膩炙燥。

【蛇黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒諸瀉。

藥品 蛇黃、一個(煨、醋淬七次、研細)。雄黃、麝香、各二錢。青礞石、硃砂、各一錢。鐵粉(篩淨細研)、三分。

制法及用法 共研末。粳米飯爲丸。如梧桐子大。每服三五丸。不拘時人參煎湯磨下。

【蛇黃丸】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒驚癇。

藥品 蛇黃、三兩(火煨、醋淬)。麝香、七分。麝香(另入)、一匙。

制法及用法 共研爲末。米飯和丸。如梧桐子大。每服一二丸。煎金銀磨刀水化下。

【密陀僧散】

發明 見世傳方。

功用 治心癰失音及驚氣入心絡。不能語者。

藥品 密陀僧。

制法及用法 研極細末如粉。每服一錢匕。米醋湯或茶清調下。大人每服一錢。熱酒調下。

十二筆

【勝金丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風癰。

藥品 天南星(生薑製)、生川烏頭、細辛(去苗)、烏角(去皮弦子)、桔梗(去蘆)、威靈仙、何首烏、白礬(煨枯)、白麝香(炒)、烏蛇(酒浸)、各一兩。荆芥穗、川芎、各二兩。

制法及用法 共爲細末。酒煮米糊爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。食後溫酒送下。一日二次。

【勝金散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治癡病狂怒叫號。

藥品 白砒、一錢。綠豆、三百六十粒(清水浸去殼、同白砒研如泥陰乾)。肥梔子、四十枚(去殼曬乾、勿見火)。雄黃、雌黃(均水飛)、各一錢。急性子(去皮研)、二錢。

制法及用法 研爲極細末。每服七八分。強人至一錢。臨服時加西牛黃、五六釐。冰片、三五釐。細研勻。同和入糕餅內食之。但失心風癲。悲愁不語。元氣虛者。禁用。一方加珍珠(豆腐內煮、研)、琥珀、狗寶、各一錢。分作二十服。臨時加西牛黃、五釐。冰片、三釐。上好白麵、一兩五錢。將麵勻作二分。先將一半。入白糖

鉛、一錢五分。作藥爲餡。一半亦入白糖霜、一錢五分。裹外作餅。煨熟與食。食後。生薑湯過口。少頃。即上吐下瀉而愈。不吐。以肥阜角肉、一錢。搗水灌吐。吐後鑷釘磨水。頻進六七次。以鎮其神。永不復發。但藥中有砒。大忌燒酒。又須入團餅內食之。以搜頑痰。方能得力。

【琥珀散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治癩。

藥品 琥珀、人參、茯神、遠志、菖蒲、乳香、酸棗仁。

制法及用法 研爲細末。調熱湯下。

【甯志膏】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治喪心病狂。

藥品 人參、酸棗仁、各一兩。辰砂、五錢。乳香、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。薄荷湯送下。

十三筆

【雌黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒癩癧。

藥品 雌黃、黃丹、各一兩。麝香(研)、一錢。

制法及用法 研爲末。拌令極勻。用牛乳汁五合。熬成膏。入前藥末杵丸。如綠豆大。每服三丸。溫熱水送下。一日三次。

十四筆

【奪魂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 定癇。

藥品 白殭蠶、五錢(去絲、炒令黃色)。蛇含石(燒紅、米醋淬七八次、碾碎)、白附子(炮)、各二分。生銀、生金、牛黃(如無以膽製倍加用之)、烏梢蛇頭(七八寸許酒炙)、白茯苓、天麻、各二錢。天南星末、一分(生薑汁浸一宿、焙)。半夏末、二錢(生薑汁浸一宿、焙)。赤脚蜈蚣、一條(酒浸炙焦)。犀角(鎊)、二錢。腦子、麝香、各少許。

制法及用法 共研細末。棗肉爲丸。如麻子大。硃砂爲衣。每服十丸。至十五丸二十丸。金銀薄荷煎湯送下。

驚悸類

二筆

【人參丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治心臟風虛。驚悸心忪。或因憂慮恍惚。心神不安。

藥品 人參(去蘆)、乾熟地黃、龍齒(另研)、各一兩。茯苓(去木)、一兩五錢。白朮、甘草(炙)、麥門冬(去心)、各五錢。防風(去蘆)、七錢五分。金箔、銀箔、各五十片。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。不拘時粥飲送下。

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治產後臟腑虛弱。心忪驚悸。言語錯亂。

藥品 人參(去蘆)、麥門冬(去心)、各八錢。西牛黃(另研)、白朮、各二錢。茯神(去木)、獨活(去蘆)、防風(去蘆)、遠志(去心)、生地黃、硃砂(水飛)、天竺黃(另研)、甘草、龍齒(另研)、各四錢。龍腦(另研)、麝香(細研)、各一錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時薄荷湯調下。

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治腎弱膽虛。畏恐不能獨臥。頭目不利。

藥品 人參、枳殼、五味子、桂心、甘菊花、茯神、山茱萸、甘杞子、各七錢五分。柏子仁、熟地黃、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒調下。

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒中寒吐乳。或因吸乳受驚。致作驚嚇之狀。面唇青白。手足心熱。口多清涎吐逆。或瀉五色黏穢物。以及乳食不化等證。

藥品 人參、白朮、茯苓、沉香、赤芍藥、甘草、各五錢。

制法及用法 研爲細末。以密器收之。半歲兒每服一字。二三歲五分。大者一錢。煎棗子米飲。或陳紫蘇湯調下。吐瀉並作。丁香煎湯或陳皮湯調下。

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治風驚渴亂恍惚。

藥品 人參(去蘆)、甘草(炙)、龍齒、各二兩。犀角屑、生乾地黃、白茯苓(去皮)、各一兩。麥門冬(去心)、一兩五錢。

制法及用法 咬咀、每服五錢。清水一中盞。煎至七分。去滓。不拘時溫服。

【八仙散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治慢驚虛風。

藥品 天麻、白附子、白花蛇肉、防風、半夏麴、天南星、全蠍、冬瓜仁、各二分五釐。川烏、一分。

制法及用法 加生薑二片。大棗一枚。薄荷二葉。清水煎服。

三 筆

【大醒脾散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒吐瀉脾困。不能食。痰作驚風。

藥品 天南星、白茯苓、陳皮、各一分。全蠍(焙)、甘草(炙)、白附子(炮)、蓮肉、人參、木香、各五釐。陳倉米、二百粒。

制法及用法 研爲末。每服三字。加生薑、大棗煎服。

四 筆

【天竺黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚風熱。

藥品 天竺黃、麝香、山梔

子、白礬(炒去絲質)、蟬殼(去土)、甘草、各等分。

制法及用法 研爲末。一歲兒每服五分。不拘時熱湯或薄荷湯調下。

【天南星散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 驅風。豁痰。治小兒慢驚。

藥品 天南星、重八九錢者一個(掘地深尺許、先用炭五斤燒通紅、以好米醋一碗洒坑中、即投南星入內、以火炭密蓋、又用盆覆時許取出)。琥珀、全蠍、各一錢。

制法及用法 研爲末。每服二字。生薑、防風煎湯調下。

【牛黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治陽痿。

藥品 牛黃(另研)、麝香(另研)、犀角屑、硃砂(水飛)、人參(去蘆)、赤茯苓(去皮)、防風(去蘆)、芍藥、甘草(炙)、麥門冬(去心)、杜心、地骨皮、天麻、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服二錢。不拘時竹瀝調下。

【牛黃膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治壯熱。咽喉腫響。

或不省人事。或左右手偏搐。
或口眼鼻顫動。

藥品 西牛黃、少許。蠟尾、
四十九枚。巴豆肉(去油膜)、
一錢五分。梅花腦、半匙。辰
砂、二錢。鬱金、三錢(皂角水
煮)。麝香、一匙。

制法及用法 研爲末。每服
一匙。蜜水調下。量兒虛實用
之。

【比金丸】

發明 見鄭氏方。

功用 治急驚壯熱。喘粗痰
嗽。二便不利。及痘後餘毒。

藥品 輕粉、滑石、各一錢五
分。南星、一錢一字。青黛、五
分。

制法及用法 研爲末。稀糊
和丸。如小豆大。一歲兒每服
二丸。薄荷湯調下。如頭熱足
冷。口噤面青痰壅。加一丸。
桃皮湯送下。

【木香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治驚風內釣。腹痛驚
啼。

藥品 木香、一錢(一作五
分)。乳香(另研)、沒藥(另研、
一作一錢)、全蠍、各五分。鈎
藤鈎、舶上茴香、各一錢。一方
無乳香。

制法及用法 研爲末。和勻。

取大蒜少許。研爛爲丸。如梧
桐子大。每服二丸。鈎藤鈎煎
湯送下。

五 筆

【正舌散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治驚痰塞竅。肝熱生
風。舌強不正。

藥品 蠟尾(去毒、淡醋泡
炒)、三錢。茯苓、一兩(同薑汁
拌曬)。

制法及用法 研爲末。每服
二錢。溫酒調下。並擦牙齦。
一日三度。面赤倍蠟尾。加薄
荷五錢。每服四錢。清水煎熱
服。取汗效。

【白茯苓丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後心虛驚悸。神
志不安。

藥品 白茯苓(去皮)、熟乾
地黃、各一兩。人參(去蘆)、桂
心、遠志(去心)、石菖蒲、柏子
仁、琥珀(另研細)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。煉
蜜和丸。如梧桐子大。每服三
十丸。不拘時粥飲送下。

參考 此方於內無熱而脈遲
且微者宜之。

六 筆

【安神丸】

發明 見祕旨方。

功用 治心經虛熱。睡中驚悸夜啼。

藥品 人參、酸棗仁(炒)、茯苓、半夏(湯泡)、各一錢。當歸(酒洗)、橘紅、赤芍藥(炒)、各七分。五味子、五粒(一作七粒)。甘草(炙)、三分。

制法及用法 研爲末。薑汁和丸。如芡實大。每服一丸。生薑湯或薄荷湯化下。

【安神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治驚啼。

藥品 犀角、雄黃、人參、車前子、各五錢。茯苓、一兩。

制法及用法 研爲末。每服一錢。桃仁湯調下。

【全蠍散】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒驚風中風。口眼喎斜。言語不正。手足偏廢不舉。

藥品 全蠍(去毒炒)、僵蠶(直者炒)、川芎、黃芩(去心)、甘草、桂枝、赤芍藥、麻黃(去節)、各一兩。天麻、六錢。天南星(湯泡七次、去皮臍、切、焙乾)、五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。清水一鍾半。加生薑七片。煎至七分。不拘時溫服。每日三四次。量兒大小加減。忌食羊肉。

【全蠍散】

發明 見薛鎧保嬰撮要。

功用 治小兒急慢驚風。發搐。

藥品 全蠍、二十四個(新薄荷葉包、以竹夾住、於慢火下炙數次、或乾薄荷葉酒泡開包炙亦可)。僵蠶、五錢(炒、去絲嘴、用薄荷依法炙)。南星、一兩(取末、以生薑一兩、切片、新薄荷葉二兩、同搗和、捏作餅子、曬乾、慢驚用之、如急驚宜易煨大黃一兩)。白附子(炮)、三錢。防風(去蘆叉)、天麻、甘草(炙)、硃砂(水飛)、川芎、各五錢。

制法及用法 研爲末。一歲兒每服一字。二歲五分。薄荷湯調下。量兒大小加減。身熱發搐。煎大府散調。慢驚吐瀉後發搐。生薑湯調。急驚搐。煎大府散加大黃湯調。

【回生散】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒吐瀉。或誤服冷藥。脾虛生風。成慢驚者。

藥品 天南星、一個(八九錢

以上者)。

制法及用法 掘地坑一個。深三寸許。納炭五斤燒紅。入好酒半盞。後入南星。用炭火兩三條。蓋地坑上。候南星微裂取出。剉碎。再炒令熟。不可稍生。置冷。研爲末。每服五分。濃煎生薑防風湯調下。

七 筆

【辰砂膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治口噤目閉。啼聲不出。吐乳不化者。

藥品 辰砂、三錢(一作一錢)。硼砂(一作五分)、馬牙硝(一作一錢)、各一錢五分。玄明粉、二錢。全蠍(一作五分)、真珠末(一作三分)、各一錢。麝香(一作三分)、一字。一方無玄明粉。

制法及用法 研爲細末。和棗肉、好絹包起。自然成膏。每服一字或一豆許。諸驚金銀薄荷湯送下。潮熱甘草湯下。月內嬰兒。用乳汁調敷乳頭。令兒吮之。

【防風丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治驚風痰熱。神昏驚悸。

藥品 防風、天麻、人參、川

芎、各一兩。全蠍、甘草、僵蠶、硃砂、端黃、牛膽南星、各二錢五分。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如雞頭實大。每服一丸。薄荷湯送下。

【妙香散】

發明 見洗括蘇沈良方。

功用 固氣。澀精。疎肝。和脾。通竅。解鬱。治精神恍惚。驚悸鬱結。虛煩少睡。盜汗遺精。婦人敗血冲心。產後心神顛倒。言語錯亂。如見鬼神狀。常服稍益氣血。安寧心神。

藥品 山藥(薑汁炙、一作二兩)、茯苓(去皮)、茯神(去皮木)、遠志(去心炒)、黃耆(炒)、各一兩。人參(一作一兩)、桔梗(去蘆、一作三錢)、甘草(炙、一作一錢)、各五錢。木香(煨)、二錢五分。辰砂、三錢(另研、一作一錢、一作二錢)。麝香、一錢(另研、一作二錢)。

制法及用法 研爲細末。後入麝香和勻。每服二三錢。不拘時溫酒、白湯、或蓮肉煎湯。或生地、當歸、煎湯調下。一作加黃蠟、茯苓、各四兩。作塊同煎。

參考 腎陰虛。則精不藏。肝陽強。則氣不固。故精脫而

成夢矣。方中山藥益陰。兼能
 滴精。故以爲君。人參黃耆。
 用以固氣。遠志二伏。用以寧
 神。神寧氣固。則精自守其位
 矣。丹砂鎮心安魂。二香開鬱
 通竅。枳梗載諸心藥。久留膈
 上。甘草調和諸藥。交和於
 中。是方不以瀉火固藩立法。
 但安神固氣。使精與神氣相
 依。而夢少精秘矣。

【利驚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒急驚。

藥品 輕粉、青黛、各一錢。
 黑牽牛頭末、五錢（微炒、一作
 三錢）。天竺黃、二錢（一作一
 錢）。

制法及用法 研爲細末。水
 煮米糊或煉蜜和丸。如小豆大。
 一歲兒每服一丸。薄荷湯化
 下。

八 筆

【定志丸】

發明 見張子和方。

功用 安魂。定魄。治驚。

藥品 人參、茯神、遠志（去
 心）、茯苓、柏子仁、酸棗仁。

制法及用法 共研細末。酒
 調米糊爲丸。淡薑湯送下。

【定志丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治驚風已退。神志未
 定者。

藥品 琥珀、茯神、遠志肉
 （薑製焙）、人參、白附子（炮）、
 天麻、天門冬（去心）、甘草
 （炙）、酸棗仁（炒）。一方有乳
 香。

制法及用法 研爲末。煉蜜
 和丸。如阜角子大。硃砂爲衣。
 每服一丸。燈芯、薄荷、煎湯送
 下。

【定搐散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治急驚四證八候併
 作。

藥品 天麻、白附子（炮）、南
 星（炮）、各五錢。蝎梢（炒）、白
 花蛇頭（酒炙）、各二錢五分。硃
 砂、雄黃、乳香、各一錢。代赭
 石、一兩（米醋淬煨七次）。赤脚
 蜈蚣、一條（酒炙）。龍腦、麝
 香、各一字。

制法及用法 研爲細末。每
 服五分。金銀薄荷湯化下。煉
 蜜丸調亦佳。

【定搐散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒急驚。

藥品 赤脚蜈蚣、一條（大者
 酒浸、炙）。麻黃（去節）、南星
 （炮）、白附子、直鹽蠶（炒）、羌
 活、代赭石（醋煨七次）、蝎

梢、川薑黃、各二錢。硃砂、一錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。荊芥、紫蘇、煎湯調下。如搐不止。加烏蛇肉。

【金珠丸】

發明 見譚氏方。

功用 治小兒驚悸心忪。咳嗽痰多。胸膈煩熱。

藥品 天南星(炮)、白礬(煅)、半夏(湯浸七次)、硃砂(研細)、各五錢。人參、乾山藥、各一錢。膩粉、二錢。金箔、十片。

制法及用法 研爲細末。薄荷汁同水打糊爲丸。如綠豆大。金箔爲衣。每服一丸。食後生薑湯送下。

【金箔鎮心丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風痰痰熱。驚悸煩渴。唇焦頰赤。譫語狂妄。夜臥不安。

藥品 金箔、十二貼。硃砂、一兩。白茯苓、人參、甘草、各五錢。山藥、一兩五錢。片腦、牙瑱、各一錢五分。麝香、五分。草薢河車、二錢五分(黑豆煎煮)。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。每五錢。作五十丸。金箔爲衣。每服一丸。薄荷湯化

下。含化亦可。

【金箔鎮心丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治癲癇驚悸。怔忡氣鬱。一切痰火之證。

藥品 膽星、一兩。硃砂、兩琥珀、天竺黃、各五錢。牛黃、雄黃、珍珠、各二錢。麝香、五分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。每兩作三十丸。金箔爲衣。每服一丸。薄荷湯送下。

【青金丸】

發明 見王維德外科證治全生集。

功用 治小兒胎熱。化痰涎。鎮驚邪。

藥品 人參(去蘆)、天麻(煨)、茯神(去皮木)、白附子(炮)、牛膽南星(炒)、各二錢。甘草(炙)、一錢五分。青黛、一錢。

制法及用法 研爲極細末。煉白蜜和丸。如梧桐子大。鈎藤皂莢子煎湯。不拘時研化服。

【青黛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒天釣客忤。五疳八痢。十二種驚癇。

藥品 青黛、天竺黃、乾蝦蟆、一個(黃泥包裹、燒赤去泥)。乾蝟牛殼、黃連、人參、地龍(去土)、鈎藤(炒)、龍膽草、各二錢五分。蘆薈、熊膽、各五錢。牛黃、麝香、雄黃、丹砂、各一錢。夜明砂(去土淨)、胡黃連、各二錢。

制法及用法 研爲細末。蒸餅糊丸。如麻子大。一歲每服三丸。空腹時米飲送下。

【乳香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚風內釣。腹痛驚啼。

藥品 乳香、五分。沒藥、沈香、各一錢。蠟梢、十四枚。雞心黃芩、一錢五分。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二丸(一作二三錢)。蒼蒲芍藥湯調下。

九 筆

【保命丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切驚風發熱。

藥品 天麻、鬱金、全蠍(去尾)、白附子(炒)、麝香(薑汁炒)、薄荷、蟬蛻、茯神、桔梗、各五錢。防風、甘草、青黛、各三錢。大半夏(炒、滾湯浸、曬乾、

又用薑汁浸、曬乾、又炒)、南星(製同上)、各一兩。鈎藤、牛黃、各二錢。麝香、五分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如芡子大。辰砂五錢(飛)爲衣。每服一丸。燈芯湯送下。

【南星散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 驅風。豁痰。治慢驚。

藥品 南星、一個(八九錢重者、掘地坑深尺許、用炭五斤、燒通紅、醋一碗灑坑中、即投南星、以火炭密蓋、又用盆覆時許、取出研爲末)。琥珀、全蠍、各一錢。

制法及用法 共研細末。每服二字。生薑、防風、煎湯調下。

【紅綿散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒四時感冒。遍身發熱。變蒸諸驚。及胎驚、丹毒等證。

藥品 人參、二錢五分。天麻(洗)、麝香(炒)、麻黃(去節)、全蠍(去毒)、各二錢。甘草(炙)、辰砂(另研細)、各一錢五分。

制法及用法 共研細末。入辰砂和勻。每服五分。清水半

煮。煎數沸。入乾膠脂少許。再煎一沸。不拘時溫服。

十 筆

【真珠丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒積聚驚風。及二便澀滯。腹脹。滯氣。

藥品 木香、白丁香、丁香末、輕粉（留少許爲衣）、各五分。白滑石、二錢。巴豆、十四粒（水浸一宿、研極膩）。

制法及用法 研爲末。和勻。溼紙裹燒。粟米飯和丸。如麻子大。一歲兒每服一丸。八九歲以上至十五歲。每服八丸。泡棗子煎湯。放冷送下。如挾風熱難動者。先服涼藥一服。乳癖者減丸數。隔日臨臥一服。

【真珠散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治客忤驚風。鬼疰驚邪。常服辟邪、安神。

藥品 真珠、海螵蛸、滑石、各一錢。白茯苓、人參、白附子、甘草（炙）、全蠍、麝香、腦子（另研）、各五錢。生珠（另研）、一錢。金箔、三十片。銀箔、二十片。

制法及用法 研爲末。和勻。每服五分。燈芯、麥門冬、煎

湯。入蜜少許調下。日午臨臥、各一服。

十一筆

【硃砂膏】

發明 見李士材方。

功用 治小兒驚積。驚熱。

藥品 硃砂、五錢。硼砂、馬牙硝、各三錢。珍珠末、一錢（另研）。玄明粉、二錢（另研）。龍腦、麝香、各一字。

制法及用法 研爲粗末。拌和。用瓷盒貯之。不久成藥自成膏。①諸驚。用藥一黃豆大。金、銀、薄荷、煎湯化下。②遍身潮熱者。甘草湯化下。③狂躁惡啼者。蚯蚓自然汁化下。④一歲及月內小兒不能服藥者。用乳調勻。塗在乳上。令兒吮之。自可徐臻平復。

【硃砂膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治五心煩熱。咳嗽壅盛。驚風搐搦。渴飲無時。睡中煩躁。口瘡糜爛。

藥品 硃砂（水飛）、五錢。馬牙硝、硼砂、玄明粉、各二錢五分。麝香、一字。金箔、銀箔、各十五片。

制法及用法 入乳鉢內細研。後用白附子、枳殼（炒微黃）、各三錢。川芎、甘草、各四

錢。人參(去蘆)、黃芩、薄荷葉、各二錢。剉焙爲末。仍入鉢中。同前藥和勻。煉蜜爲丸。如芡實大。每服一丸至二丸。不拘時麥門冬湯化下。

【清心丸】

發明 見張路玉張氏醫通方。

功用 治心熱神昏。驚悸不寧。

藥品 黃連、三錢。黃芩、二錢。西牛黃、五分。鬱金、一錢五分。

制法及用法 共研細末。豬心血爲丸。如黍米大。硃砂爲衣。三歲兒每服三十丸。燈芯湯送下。

【清神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚癇。

藥品 犀角屑、白鮮皮、石菖蒲、遠志(去心、薑製焙)、半夏(湯泡)、各二錢五分。茯神、五錢。大黃(焙)、人參、甘草(炙)、各一錢五分。一方無半夏、茯神、大黃。

制法及用法 研爲末。每服五七分。不拘時麥門冬(去心)煎湯調下。

【通神丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒肢動目閉。時

頃時喜。驚悸甲青。形似天釣。

藥品 茯苓(煨)、龍齒、各五錢。鉛丹、胡黃連、各一分。銀箔、瓦片。麝香、一錢。鈎藤、一兩(煨)。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如麻子大。每服十丸。米飲送下。

【通關散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚風搐搦。關竅不通。

藥品 南星(炮)、僵蠶(炮)、各一錢。麝香、一字。豬牙皂角、一枚(能存性)。赤脚蜈蚣、一條(炙)。

制法及用法 研爲末。以手點薑汁蘸少許擦牙。或用物滴入藥二三點。涎自出。口自開。

【乾蟾丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒五疳驚風。

藥品 乾蟾、一枚(五月五日者良)。蛇蛻皮、一條(火燉)。穀精草、二兩(與前藥同入罐子內、以鹽泥固濟、曬乾、燒令通赤、放冷、研細)。胡黃連(爲末)、瓜蒂(爲末)、母丁香(爲末)、牛黃、龍腦、硃砂、雄黃、蘆薈、天竺黃、麝香、各一分。青黛、五錢。

制法及用法 入乳鉢內。研

令極細。用糝豬膽汁煎麴糊爲丸。如綠豆大。一二歲兒每服五丸。溫米泔半合化下。服後。桃柳湯浴兒。以青衣蓋之。帝蟲何出衣上。及眉毛鬢邊。如細鉄片子。或如摻面塵毒。黃白色易治。黑色者難治。仍宜粥飲下二丸。每日三次。甚者半月瘥。

【乾蟾丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒五疳驚風。

藥品 乾蟾、一枚(燒灰)。天靈丹灰、五錢。麝香、五釐。蟬殼(去足炒)、鼈甲(酥炙黃焦、去頸腿)、各一分。

制法及用法 共研細末。燒飯爲丸。如綠豆大。小兒二歲以下。每服一丸。三歲以上至五歲二丸。蛤粉湯送下。服後。桃柳湯浴兒。用青衣蓋之。常有蟲出。赤白者輕。黑色者重。

【參苓散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒解顛。及驚氣。

藥品 人參、茯苓、白附子(炮)、羌活、甘草(炙)、芍藥、白朮(水煮)、各一分。犀角屑、京芎、藿香、各五釐。

制法及用法 研爲末。每服五分。清水一盞。加金、銀少許。薄荷三葉。煎至三分。溫

服。

【犀角散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒驚啼。

藥品 犀角屑、鈎藤、升麻、黃芩、甘草(炙)、各一分。人參、三分。

制法及用法 咬咀。每服一錢。清水一盞。煎至五分。溫服。

【麥煎散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒夾驚傷寒。吐逆壯熱。氣粗喘急。面赤自汗。或狂語驚叫。或不語無汗。及癰疹遍身赤癢。往來潮熱。時行癰疹餘毒。身腫脹。或變急慢驚風。手足掣搐。眼目上視。及傷風頭疼。

藥品 滑石、地骨皮、赤芍藥、石膏、白茯苓、杏仁、知母、甘草、葶藶子(炒)、人參、各五錢。麻黃(去節)、一兩五錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。麥子煎湯調下。如初生芽兒。感冒風冷。鼻塞身熱。噴嚏多啼。每服一字。麥子煎湯調下。一方去地骨皮、滑石。加羌活、川芎、薄荷、煎湯調下。

十二筆

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治急慢驚風。涎潮昏冒。目睛發搐。內釣腹痛。或驚癇時發。

藥品 琥珀、牛黃、殭蠶(炒去絲嘴)、牛膽南星、全蠍、白附子、代赭石、天麻、乳香、蟬殼(一作枳殼)、各一錢。辰砂、一錢五分。

制法及用法 研爲末。每服一二分。熱湯調下。

【琥珀散】

發明 見朱貢方。

功用 治婦人血風驚悸。

藥品 琥珀、沒藥、木香、當歸、芍藥、白芷、羌活、乾地黄、延胡索、川芎、各五錢。土瓜根、牡丹皮(去心)、白朮、桂心、各一兩。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水一盞。煎至七分。加酒一分。再煎少時。熱服。重者數服效。

【琥珀抱龍丸】

發明 見曾世榮曾氏方。

功用 治急慢驚風。發熱咳嗽作搐。痰喘驚悸。

藥品 琥珀、二錢五分(包在精豬肉內、煨過取出、研末二錢)。牛膽南星、一兩六錢(臘月用牛膽作成者佳)。殭蠶、二錢(炒)。雄黃、辰砂、茯苓、人

參、白茯苓、各三錢。天竺黃、五錢。鉤藤鉤、一兩五錢。牛黃、五分。麝香、一錢。

制法及用法 礱爲極細末。用甘草八兩。剉碎。以水四大碗。熬膏二盞。入藥末爲丸。每料二百丸。每丸重五分。金箔爲衣。外用黃蠟包之。每服一丸。生薑薄荷湯送下。忌食魚腥生冷。乳母同忌。①時行痘疹。發熱嘔吐驚跳者。熱湯送下。②傷風發熱。咳嗽鼻塞。驚哭者。葱湯送下。③因著驚發熱。睡臥不寧者。燈心湯下。④夏月發熱嘔吐者。麥門冬湯下。⑤因母發熱過乳。溫熱不寧者。甘草湯下。⑥脾胃不和。頭熱黃瘦懶食者。砂仁湯下。

【鉤藤散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒脾胃氣虛。吐利虛風。慢驚天釣。卒然驚悸。眼目翻騰。身熱足冷。

藥品 鉤藤(炒)、七錢五分。防風(去蘆)、人參(去蘆)、蟬殼、麻黃(去節)、白殭蠶(炒黃、一作七個)、天麻、蠍尾(炒去毒、一作五個)、各五錢。甘草(炙)、川芎、各二錢五分。麝香(另研)、一錢。一方無蟬殼、麝香。有蜈蚣三個。去頭足。炙

黃。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一杯。加生薑三片。煎至六分。不拘時溫服。寒多者。加附子五分。

參考 慢驚屬脾胃虧損之證。若小兒脾虛傷風。欲成慢驚。大便實者。宜服此湯。但吐瀉痰逆。身無大熱。四肢清冷。當用烏蠍六君之屬。此湯非所宜也。

【鈎藤散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治天鈎潮熱。

藥品 鈎藤、人參、犀角屑、各五錢。全蠍(去毒)、天麻、各二分。甘草、五釐。

制法及用法 研爲末。每服一錢。沸水煎服。

【鈎藤飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治天鈎風搐。

藥品 鈎藤、犀角、天麻、各七分。全蠍、五個。木香、甘草、各五分。

制法及用法 清水一鍾。加生薑二片。煎至五分。不拘時服。

【鈎藤膏】

發明 見錢乙方。

功用 治嬰兒驚風內釣。

藥品 乳香(研)、沒藥(研)、

木香、薑黃、各四錢。木鼈子仁、二十一個。

制法及用法 先將後三味。同爲細末。次併入上二味。煉蜜和成劑。收貯。一歲兒每服半皂子大。不拘時鈎藤煎湯化下。次用麝香散。

【鈎藤膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚風內釣。

藥品 鈎藤、玄胡索、當歸(酒洗)、粉草(炙)、乳香、各五錢。肉桂(去粗皮)、二錢。麝香、一字。

制法及用法 將前四味焙乾。桂不過火。同研爲末。以乳香用簞箕裏。熨斗盛火熨透。候冷。入乳鉢同磨細杵。後入前藥末。再杵勻。煉蜜和丸。如芡實大。每服一丸至二丸。空腹時熟湯化下。

【黃連安神丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治大驚。

藥品 黃連(淨酒炒)、一錢五分。硃砂(細研、水飛)、生地黄、當歸頭、各一錢。甘草(炙)、五分。

制法及用法 共研極細末。蒸餅爲丸。如黃米大。每服十丸。口津嚥下。

【疏風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治驚風痰熱。四證俱盛。

藥品 檳榔、陳皮(去白)、各二錢。牽牛、大黃(略慢)、各三錢。一方加朴硝一錢。

制法及用法 研爲末。每服五分。生蜜調下。或用大黃、黑牽牛、白牽牛(俱半生半熟)、檳榔、各五錢。研爲細末。蜜湯調下。痰多加輕粉。

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒暴中。急慢驚風。胸膈中寒。或涼或熱。坐臥不安。

藥品 明雄黃(紅亮者)、二錢五分。白藥(去黑皮)、川烏(炮裂去皮臍)、草烏(炮裂去皮)、天麻(明亮者)、川芎、各五錢。

制法及用法 除雄黃外。餘五味剉焙。同雄黃研爲末。驚風痰湧。每服五分或一錢。薑汁茶清調下。發汗、薑、葱、薄荷、水煎。併投三服。取效。

【甯神膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治急驚風。

藥品 乾生地黃、川木通、防風、甘草、麥門冬(去心)、天竺黃、茯神、硃砂、麝香。

制法及用法 共研極細。煉蜜和捏作小餅子。每服一丸。臨臥時薄荷湯化下。

【惺惺散】

發明 見王氏方。

功用 治小兒吐瀉脾弱。內虛生驚。

藥品 人參、茯苓、木香、天麻、扁豆、全蠍(炙)、陳米(炒)、各等分。

制法及用法 剉散。每服二錢。加生薑、大棗、清水煎服。

十三筆

【補心丹】

發明 見孫一奎赤水玄珠。

功用 治心氣不足。驚悸健忘。

藥品 麥門冬、二兩五錢。遠志(甘草湯煮)、石菖蒲、香附(童便浸)、各二兩。天門冬、瓜蒌根、白朮、貝母、熟地黃、茯神、地骨皮、各一兩五錢。人參、川當歸、牛膝、黃耆、各一兩。木通、八錢。

制法及用法 共研細末。大棗肉爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。溫酒或薤白湯送下。

參考 此方能安養心神。兼治五臟。無偏勝之弊。可以久服。

十四筆

【奪命丹】

發明 見謝氏方。

功用 治小兒急驚。不省人事。眼定不動。牙關不開。唇白並黑者。

藥品 天南星、硃砂、半夏、各四錢。真珠(新白者)、二錢。巴豆(去油淨)、一錢。金箔、銀箔、各十片。輕粉、麝香、各五分。

制法及用法 先以天南星、半夏、研末。巴豆汁和作餅子。曬乾。餘藥各研爲細末。和勻。飛羅麵打糊爲丸。如黍米大。每一歲兒服一丸。燈芯湯送下。

【奪命散】

發明 見危亦林世醫得效方。

功用 治小兒急慢驚風。

藥品 天南星(炮)、一兩。白附子、人參、各三錢。辰砂(另研)、二錢五分。黑附子(炮去皮臍)、防風、半夏、各五錢。全蠍(去毒)、七枚。蜈蚣(炙)、一條。麝香、五分。麝香(炒)、少許。

制法及用法 研爲末。三歲兒每服五分。薄荷、生薑自然汁、加好酒、沸湯、各少許調下。

急驚去黑附子。加輕粉、腦子、各少許。慢驚去僵蠶。

【奪命散】

發明 見湯氏方。

功用 控風涎。治小兒急慢驚風。痰潮壅盛。塞於咽喉。其響如潮。

藥品 青礬石、一兩(入坩堝內同礬硝一兩、炭火煅通紅、須消盡爲度、候冷如金色、取用)。

制法及用法 研爲細末。急驚風痰壅上。身熱如火。用生薄荷自然汁。入蜜調。微溫服之。良久。其藥自裏痰從大便出。如稠涕膠結。次服退熱祛風散驚等藥。慢驚風證。亦用此藥。以青州白丸子同研爲末。煎如稀糊。熟蜜調下。痰涎即墜入腹。次服花蛇、川烏、全蠍、蜈蚣等藥。

【奪命散】

發明 見茅先生方。

功用 治小兒天釣。脾風。客忤。卒死。撮口。鵝口木舌。喉痹。疳積。風壅吐涎。

藥品 銅青、硃砂、各二錢。膩粉、五分。麝香、少許。蠍尾、十四個(去鉞)。

制法及用法 研爲末。每服五分。薄荷臘茶清調下。後依證調理。

【酸棗仁丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治膽氣實熱。不得睡臥。神思不安。驚悸怔忡。

藥品 酸棗仁(炒)、茯神(去木)、遠志(去心)、柏子仁(炒)、防風、各一兩。枳殼(麸炒)、生地黄(杵膏)、各五錢。青竹茹、二錢五分。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服七八十丸。白滾湯送下。

十五筆

【調氣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚風吐瀉。不乳多啼。欲發慢驚。及慢驚之後。以此調理。

藥品 木香、香附子、人參、橘皮、藿香、甘草(炙)、各一錢。一方有製厚朴一錢。

制法及用法 研爲末。每服一二錢。加生薑三片。大棗一枚。清水煎。溫服。

十六筆

【醒脾散】

發明 見湯氏方。

功用 治吐瀉不止。痰作驚風。脾困不食。

藥品 白朮、人參、甘草(炙)、淨陳皮、白茯苓、全蠍、各

五錢。半夏麴、木香、各一分。白朮、四個(炮)。天南星、一個(炮、一作二個)。陳倉米、一百粒。一方無陳倉米。加蓮肉、一錢。一方無白朮、半夏。加石蓮肉、石菖蒲、各一錢。一方加天麻、麴蠶。無陳皮、半夏、陳米。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水半盞。加生薑一片。大棗半個。煎至二分。時時服之。頓服則吐。有熱去木香。

【醒脾散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚風後不語。

藥品 甘草(炙)、一錢。冬瓜子、防風、各五錢。人參、一分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。清水一盞。竹葉數片。燈心少許。煎至七分。去滓。食後隨睡時溫服。

【龍齒丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血氣上攻。心神恍惚驚悸。眠臥不安。

藥品 龍齒(另研)、茯神(去木)、各一兩。硃砂(研水飛)、人參(去蘆)、當歸(去蘆)、天麻、各七錢五分。檳榔、防風(去蘆)、生乾地黄、犀角屑、各

五錢。遠志(去心)、赤箭、各二錢五分。麝香(另研)、一錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時薄荷湯送下。

十八筆

【瀉青丸】

發明 見錢乙方。

功用 治肝膽實熱。多驚多怒。不能安臥。目斜視。黑暗緊小。白睛青赤腫痛。大便不通。腸風便血。陰汗燥臭。小兒急驚抽搐。痰熱。目直竄視。

藥品 當歸(去蘆焙)、龍膽草(焙、一作酒拌炒)、川芎、梔子仁(炒)、川大黃(溼紙裹煨、一作酒拌炒、一作酒蒸)、羌活、防風(去蘆)、各等分。一方無當歸。一方有柴胡。無防風。

制法用及法 共研細末。煉蜜爲丸。如芡實大。水泛亦可。每服半丸至一丸。竹葉煎湯。同冰糖溫水化下。或煎竹葉泡薄荷湯調下。一日二三次。成人每服可加至二三錢。如瀉去大黃。加荊芥。或服黃連瀉心湯一二劑亦可。

參考 此治肝膽實火之劑也。肝膽之熱。多由於鬱。鬱則火熾於內。而不得泄。則諸

病生矣。方中以羌活防風散其外。當歸川芎疏其中。然後以龍膽草。直清火邪。導以山梔、大黃。使從大小便而出。俾疏散與清泄合用。則肝膽之邪自去。

【鎮肝丸】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治小兒急驚風。

藥品 天竺黃(另研)、生地黄、當歸、竹葉、龍膽草、大黃(煨)、川芎、羌活、防風、各二錢五分。

制法及用法 共研爲細末。煉蜜爲丸。如雞頭大。每服二丸。沙糖水化下。後服天麻散。

【鎮驚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒急慢二驚。風痰上壅。手足抽掣。口眼喎斜。煩燥生嘔。精神昏悶。常服寧心。鎮驚。疏風。順氣。

藥品 人參(去蘆)、三錢。粉甘草(半生半炙)、茯神(去皮木根)、白僵蠶(去絲)、枳殼(麸炒微黃)、各五錢。白附子、白茯苓(去皮)、天南星(製)、硼砂、牙硝、硃砂(水飛)、各二錢五分。全蠍、十枚(去尖毒)。麝香、一字。

制法及用法 除牙硝、硼砂、

麝香、硃砂四味。用乳鉢細研。餘九味焙爲末。入乳鉢內和勻前四味。用糯米粉、清水煮糊爲丸。如梧桐子大。就帶潤以銀硃爲衣。每服三丸至五丸或七丸。急驚溫茶清磨化服。慢驚生薑、熟附子、煎湯。研化溫服。薄荷湯或麥門冬湯亦可。

【鎮驚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒急慢二驚。風痰上壅。手足抽掣。口眼喎斜。煩躁生瘳。精神昏悶。常服寧心。鎮驚。疏風。順氣。

藥品 辰砂、琥珀、眞珠母、青皮、粉甘草、各二錢五分。青黛、蘆薈、柴胡、青礞石(礞煨)、各五錢。天竺黃、膽星、各二兩。天麻、乳香、各一兩。雄黃、一錢五分。

制法及用法 共研末。甘草膏爲丸。如雞頭實大。每服一丸。慢驚參朮湯送下。急驚薄荷薑蜜湯送下。

【鎮驚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒一切驚癇。

藥品 茯神(去木)、鐵粉、遠志(去心、薑製、焙)、紫石英(燒、醋淬研)、人參(去蘆)、琥珀、滑石、蛇黃(煨、醋淬)、南星(炮)、各二錢五分。龍齒、熊

膽、各五釐。輕粉、三分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服三五丸。不拘時金銀煎湯磨化服。

二十筆

【蘆薈丸】

發明 見莊氏方。

功用 治小兒驚風、五疳。

藥品 蘆薈、胡黃連、牛黃、天竺黃、龍膽草、茯苓、各五錢。龍腦、麝香、人參、川大黃、雄黃、各一分。生犀角屑、二分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如綠豆大。每服三丸。薄荷湯或溫酒送下。

二十一筆

【鐵粉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治驚風面赤口乾。大便不利。

藥品 鐵粉、五錢。鬱金、牛黃、眞珠、胡黃連、各二錢五分。

制法及用法 各研細拌勻。每服一字。溫蜜湯調下。

【鐵粉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風驚。

藥品 鐵粉(研)、光明砂(水飛)、天竺黃(研)、鎖霜(研)、各

一兩

制法及用法 煎研如粉。每服五分。不拘時竹瀝湯下。

【驅風膏】

發明 見鄭氏方。

功用 治小兒肝風。筋脈拘急。面紅目青。眼上。驚搐及胎風。

藥品 辰砂、蠟尾、當歸、龍膽草、川芎、梔子仁、大黃、羌活、防風、甘草、各一錢。

制法及用法 研爲末。入麝香一字。煉沙糖和丸。如雞頭實大。三歲兒每服三丸。薄荷竹葉蜜湯化下。

【霹靂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治急慢驚風。不省人事。

藥品 豬牙皂角、三錢。細辛、川芎、白芷、各二錢。礞石花、一錢五分。

制法及用法 剉礞爲末（不可焙、否則不應）。每用少許。大燈心三寸。蘸點鼻內。得噴嚏爲效。

二十五筆

【觀音全蠍散】

發明 見滇山方。

功用 治精氣。固氣。補虛。益脈。開胃。止吐。治小

兒吐後寧爲慢驚慢脾。

藥品 全蠍、木香、甘草（炙）、蓮肉（炒）、扁豆（炒）、白茯苓、白芷、防風、羌活、各一錢。黃耆、人參、各一分。天麻、二錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。加大棗半個。清水煎。不拘時服。

【觀音全蠍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒外感風寒。內傷脾胃。吐瀉不止。遂成慢驚等證。

藥品 全蠍、二十一個。天麻（炮）、羌活、防風（去蘆）、各五分。川白芷、甘草（炙）、扁豆（炒製）、黃耆（蜜炙）、各三錢。砂仁、赤茯苓、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。不拘時冬瓜仁煎湯調下。

疳積類

三筆

【大黃丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒胃氣不調。不嗜食。不生肌肉。

藥品 大黃、乾地黃、茯苓、

當歸、柴胡、杏仁、各三分。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如麻子大。每服五丸。米飲送下。每日三次。

四 筆

【木香丸】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治冷疳泄瀉少食者。

藥品 木香、肉豆蔻、縮砂仁(炒)、各三錢。麝香、一錢。續隨子(去油)、三錢。乾蟾、三枚(燒存性)。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸至十五丸。薄荷湯送下。虛者去續隨子。加生薑、肉桂、人參、白朮。

【木香丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治內疳。

藥品 木香、蟬殼(微炒、去足)、麝香(細研)、黃連(去鬚)、黃丹(微炒)、熊膽(研入)、夜明砂(微炒)、乾蟾(塗酥、炙微焦)、各一分。赤石脂、五錢。肉豆蔻、一顆(去殼)。田父、五錢(炙令微黃)。

制法及用法 搗羅爲末。水浸蒸餅和丸。如麻子大。每服二丸。溫粥飲送下。量兒大小。以意加減之。

【木香丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治食疳。

藥品 木香、胡黃連、蟾蜍(炙令焦黃)、麝香、薑黃、青黛、雄黃、消梨、熊膽、各一分。使君子、五錢。

制法及用法 搗羅爲末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。粥飲送下。量兒大小。以意加減。

【木香丸】

發明 見錢乙方。

功用 治冷疳。

藥品 木香、青黛(另研)、檳榔、肉豆蔻(去皮)、各二錢五分(一作各一分)。麝香(另研)、一錢五分。續隨子(炒)、一兩五錢。蝦蟇、三隻(先用繩繫曬乾、燒存性)。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服三五丸。至一二十丸。食前薄荷湯送下。

【五色丸】

發明 驗方。

功用 治小兒痰涎壅塞。胸膈不利。乳食不消。變生癖積。脅肋片硬。按之疼痛。及一切急慢驚風發搐。

藥品 ①青丸子。青黛(研)、南星(薑製)、各五錢。巴豆霜、

五分。⑤紅丸子。硃砂(水飛)、半夏(薑製)、各五錢。巴豆霜、五分。⑥黃丸子。大黃(煨)、鬱金、各五錢。巴豆霜、五分。⑦白丸子。生白附子、寒水石(煨)、各五錢。巴豆霜、五分。⑧黑丸子。五靈脂(炒)、全蠍(炒)、各五錢。巴豆霜、五分。

制法及用法 前五藥各另研爲細末。入巴豆霜五分。和勻。水煮麪糊和丸。如粟米大。一歲兒每服五丸。乳汁或薑湯送下。急驚金銀薄荷湯。慢驚生薑全蠍湯送下。

【五疳丸】

發明 見古氏方。

功用 治五疳傷積。

藥品 白蕪荑、黃連、各一兩。神麴、五錢。使君子(連殼)、十四箇。鶴蟲、少許。

制法及用法 研爲末。豬膽汁調麪糊和丸。如綠豆大。每服十丸。米飲調下。

【五膽丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治渴疳。

藥品 豬膽、狗膽、牛膽、鯽魚膽、鰱魚膽、各一枚。

制法及用法 先以四膽汁並入牛膽內。右竈北後懸。候稍乾。可丸即丸。如黍米大。每服二丸。新汲水送下。以飲水

足爲度。空腹午後各一服。量兒大小加減。

【化蟲丸】

發明 見王肯綮證治鴻繩。

功用 治疳熱。

藥品 白蕪荑、黃連、神麴、麥芽、各等分。

制法及用法 炒研爲末。水煮米糊和丸。如黍米大。空腹時米飲送下。豬膽汁尤佳。

【六神丸】

發明 見古氏方。

功用 治疳瀉渴飲無度。

藥品 木香、丁香、肉豆蔻(以麪裹此三味、入慢火煨、候麪熟爲度)、使君子(去殼、一作一錢)、訶子(煨去核)、各五錢。蘆薈、一兩(一作一錢)。

制法及用法 研爲末。麪肉和丸。如綠豆大。每服三五丸。食前溫米飲送下。

【水澄膏】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治疳疔膿潰。

藥品 硃砂、二錢(水飛)。白芨、白蘚、五倍子、鬱金、各一兩。雄黃、乳香、各五錢。

制法及用法 研爲細末。米醋調濃。厚紙攤貼。

【牛黃丸】

發明 見錢乙方。

功用 治疳積。

藥品 雄黃(研、水飛)、天竺黃、各二錢。牽牛末、一錢。

制法及用法 研爲細末。和勻再研。麵糊和丸。如粟米大。每服三丸至五丸。食後薄荷湯送下。常服尤佳。大者加丸數。

六 筆

【安神丸】

發明 見錢乙方。

功用 治心疳。

藥品 麥門冬(去心焙)、馬牙硝、白茯苓、乾山藥、寒水石、甘草、各五錢。硃砂、一兩(水飛另研)。龍腦、一字(另研、一作二分、一作二分五釐)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如芡實大。每服半丸。不拘時沙糖水化下。

參考 此方以甘寒瀉火之劑爲君。小兒血氣虛而急驚者宜之。

【如聖丸】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒冷熱疳瀉。善食腹大。

藥品 胡黃連、白蕪荑(去扇炒)、川黃連、各二兩(一作各一兩)。使君子、一兩(去殼、一作二兩)。麝香、五分(別研)。乾蝦蟆、五枚(剉、酒熬膏、一作乾

蟾、煨存性)。

制法及用法 研爲細末。用膏和丸。如麻子大(一作煉蜜和丸、如彈子大)。二三歲者。每服五七丸。以上者十丸至十五丸(一作每服一丸)。不拘時人參湯送下。

【如聖膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治風疳。

藥品 當歸、五錢。巴豆、三錢(去殼)。

制法及用法 香油八兩。將藥燥枯。去滓。入黃蠟三兩。化盡。離火。絹濾淨。將凝。入輕粉二錢。攪勻。每用少許擦之。

【地骨皮丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳疔。

藥品 地骨皮、紫參、黃耆(剉)、大黃(剉碎、微炒)、邵李仁(湯浸、去皮尖、微炒)、各五錢。龍腦(去蘆頭)、子芩、枳殼(麩炒微黃、去瓤)、木香、麝香(去黑皮)、海蛤(細研)、各一分。

制法及用法 搗羅爲末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。溫水研下。一日三次。量小兒大小加減。常得微利爲效。

七 筆

【決明子丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒冷熱無辜疳。驚熱夜啼。便青黃白。頭熱身熱。頭髮作穗。黃瘦少食。

藥品 馬蹄決明子、二兩。

制法及用法 搗羅爲末。煉蜜和丸。如麻子大。每服三丸。食後。熟米湯送下。量兒大小加減。

【決明雞肝散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治小兒疳積目病及一切腎障。

藥品 決明子(曬燥、研爲極細末、勿見火)。雄雞肝(生者不落水)。

制法及用法 將雞肝燒爛。和決明子末。小兒每用一錢。大者二錢。研勻。同酒釀一杯。飯上蒸服。如目昏無腎。腹脹如鼓者。用蕪荑末一錢。同雞肝酒釀頓服。腎障腹脹。用雞內金、蕪荑、決明子末、同雞肝酒釀頓服。若小便如泔者。用黃蠟、同雞肝酒釀頓服。風熱腎障。加白蔞藥一錢。輕者數服。重者三十服。劇者四五十服。無不痊愈。或用生雞肝研糊爲丸服亦可。

【沉香丸】

發明 見張道方。

功用 治小兒急疳。疳癰脫肛。

藥品 沉香、人參、麝、胡黃連、乳香、各一分。龍骨、甘草、各五釐。

制法及用法 研爲細末。棗肉和丸。如麻子大。每服三丸。米飲送下。一日二次。久患七服效。

【豆蔻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳積冷利。腹大脚小。身熱面黃。

藥品 肉豆蔻、二個。胡黃連、五錢。使君子、四枚。青黛、棟根、蕪荑、厚朴(薑汁炙)、甘草(炙)、各五錢。麝香、少許。夜明砂(另研)、一錢五分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。或五分。蜜水或粥飲調下。

八 筆

【肥兒丸】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治小兒脾疳。

藥品 人參、二錢五分。白朮(土炒)、胡黃連、各五錢。茯苓、三錢。黃連、二錢。使君子肉、四錢。神麴(炒)、麥芽

(炒)、山查肉、各三錢五分。
甘草(炙)、丁香、各一錢五分。

制法及用法 共研末。黃米糊爲丸。如黍米大。每服二三十丸。米湯送下。

【肥兒丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 消蟲進食。治小兒食積。疳疔。

藥品 肉豆蔻(麴裏煨去油、一作二錢五分)、使君子肉(焙、一作二錢五分)、麥芽(炒)、黃連(薑汁炒黃色、一作一兩、一作胡黃連)、神麴(炒、一作一兩)、各五錢。檳榔、二枚(去穢、勿見火、一作三枚、一作三錢、一作一枚)。木香、二錢(勿見火、一作一錢)。一方加白朮、五錢。山查肉、枳實、各二錢。

制法及用法 研爲細末。蒸餅調糊。稍加白蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。空腹時米飲或熟湯送下。

參考 近世此方尙多胡黃連、雷丸、蕪荑等大苦大寒之品。蓋此方本爲疳熱、腹脹羸瘦而設。故用祛熱伐肝之劑。消去疳積。元氣得復。兒體自肥矣。若本無疳熱之病。而誤以爲小兒之常服品。以損削真元。則

流弊甚大。不可以其有肥兒之名。遂爲所誤也。

【肥兒丸】

發明 秘方。

功用 消疳。進食。

藥品 黃連、五錢。木香、一錢。神麴(炒)、白朮、麥蘗(炒)、各一兩。使君子肉(煨)、肉豆蔻(麴裏煨)、各五錢。檳榔、一枚。蝦蟆、一個。

制法及用法 研爲末。水煮麴糊和丸。如粟米大。空腹時米飲送下。量兒大小加減。

【肥兒丸】

發明 見朱氏方。

功用 治疳積。疳瘦。

藥品 白蕪荑(去殼)、黃連(去鬚)、神麴、麥蘗、各等分。

制法及用法 研爲末。煨豬膽煮米糊和丸。如大麻子大。每服三十丸。食前來飲送下。

【肥兒丸】

發明 見鮑相璵驗方新編。

功用 殺蟲。退熱。治小兒脾虛疳積。面黃體瘦。肚脹腹大。一切積滯。

藥品 厚朴、雞內金、茯苓、各四兩。新會皮、青皮、各二兩。五穀蟲、縮砂仁、胡黃連、各三兩。白朮(炒焦)、六兩。麥門冬(炒)、白扁豆、山查肉(炒焦)、各八兩。尖檳榔、一兩

五錢。乾蟾(炙)、十一具。六神龜、十二兩。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。每丸重二錢五分。每服一丸。米湯化下。忌食油膩溼麵生冷。

【青金丹】

發明 見茅先生方。

功用 治小兒諸積病。

藥品 滑石、白丁香(羅過)、天南星、各二錢七分。青黛(羅過)、二錢。輕粉、水銀、各二錢(先以錫二錢於銅鉢內熔化、便下水銀拌和勻、傾出於地、冷用)。川巴豆、七十二個(去皮心膜、無缺損者、不出油、井華水浸一宿、懸當風處吹乾、研爛)。

制法及用法 同拌合用。輕飯爲丸。如綠豆大。依形證用湯使下。

【青蒿丸】

發明 見趙氏方。

功用 取疳蟲。退諸臟積熱。治骨蒸勞熱。小兒疳積。

藥品 白檳榔、一枚。白無灰、四十九個。黃連(去鬚)、十四莖。夜明砂(淘淨)、二錢五分。太陰玄精石、麝香、小葱子(炒)、硃砂、各五分。蘆薈、天竺黃、青黛、各一錢。

制法及用法 將後七味。同

研細末。與前四味合一處。再研勻。令極細。取青蒿自然汁。慢火熬濃。用豬膽一枚。取汁同捻丸。如粟米大。每服五丸至七丸。米飲送下。醋湯亦可。取疳蟲煎醋石榴湯送下。二十服取蟲盡。小兒常服偏身香爲效。

【青黛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治五疳。

藥品 青黛、蘆薈、人中白、各五錢。豬牙皂角、蟬殼、各五釐。麝香、一分。胡黃連、三分。蟾蜍、人乳汁、各少許。

制法及用法 研爲末。五月五日午時修合。以粽子肉棗肉及蟾蜍乳汁和丸。如黍米大。先以桃柳湯浴兒。後以米飲送下三丸。青衣嬰兒。視身上有蟲出。青黑者不治。白黃赤者易瘥。

【青黛丸】

發明 見莊氏方。

功用 治小兒疳熱。

藥品 青黛(研)、一兩。胡黃連、寘連、天竺黃(研)、各五錢。硃砂(水飛)、二錢五分。麝香(研)、一錢。肉豆蔻、二個。牛黃、五分(研)。乾蟾、一枚(端午日取老、酒浸、洗去腸肝、塗酥炙黃)。

制法及用法 除研藥外爲末。再同研勻。綠豆粉煮糊和丸。如芥子大。每服三丸。空腹夜後熱湯送下。

【青黛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳疔。

藥品 青黛、硃砂(各細研)、夜明砂(微炒)、定粉、各一分。蟾酥(研入)、熊膽(細研)、羚羊角屑、犀角屑、各五釐。黃連、五錢(去鬚)。麝香、一錢(細研)。

制法及用法 搗羅爲末。麝飯和丸。如綠豆大。每一歲服二丸。粥飲送下。

【青黛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳疔。

藥品 青黛、三錢(細研)。牛黃、蘆薈、硃砂、麝香、雄黃(各細研)、胡黃連、蛇蛻皮(燒灰)、龍腦(去蘆頭)、蟬殼(微炒)、各一分。蟾、一枚(塗酥炙焦黃)。

制法及用法 搗羅爲末。令勻。水煮麪糊和丸。如黍米大。每服三丸。粥飲送下。一日三次。量兒大小。臨時增減。

【青黛散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治乾疳諸治無效者。

藥品 青黛、硃砂、蘆薈、地龍、夜明砂(各微炒)、乾蝦蟆(燒灰)、熊膽、各一分。麝香、二分。

制法及用法 細研爲散。每服五分。空腹時粥飲調下。更用少許。吹入鼻中。後以桃枝煎湯浴兒。衣溫蓋。蟲出爲效。

【使君子丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒臟腑滑瀉。疳瘦下痢。腹脅脹滿。不思乳食。常服安蟲補胃。治疳肥肌。

藥品 使君子(去殼、麩裏煨)、一兩。陳皮(去白)、一分。厚朴(去粗皮、薑汁塗炙)、五錢。甘草(炙剉)、訶子(半生半煨、去核)、青黛(是兼驚及帶熱渴者宜此、如只臟腑不調、去之)、各五錢。一方無青黛。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如小雞頭大。每服一丸。米飲化下。兒生百日以上。三歲以下。每服半丸。乳汁化下。

【使君子散】

發明 見王氏方。

功用 治疳熱。

藥品 使君子、不拘多少(麩

乾)。

制法及用法 研爲末。大者每服一錢。小者五分。空腹時米飲調下。取蟲出爲度。

【使君子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治蛔疳。

藥品 使君子、十個(瓦上炒)。甘草(膽汁浸一宿)、白蕪荑、各一分。苦楝子、五個(炮去核)。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水煎服。

【知母散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸般疳積肚脹。時或瀉痢。時或肚熱。狀如瘧疾。

藥品 知母、青皮(去白、焙乾、秤)、柴胡、各二錢。甘草(炙)、紫參、各三錢。訶子(煨熟用肉)、三枚。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。清水五分。煎至三分。溫服。有熱則退。有痢則除。有結則通。

【乳香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治走馬牙疳。

藥品 乳香、輕粉、砒、各五分。麝香、少許。

制法及用法 先以乳香研

細。入輕粉、麝、砒。共再研勻。用薄紙一韭菜闊。去藥內按過。揉紙少許。丸和黃米火。臨臥時將藥填在患處。至明則愈。忌食醬醋鹽等物。

【定命散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治五疳有蟲。

藥品 乾蝦蟆、一枚(燒灰)。蛇蛻皮(炒)、蟬殼、各一分。

制法及用法 研爲極細末。加麝香末五分。研勻。但是一切疳。至午時後暖水調下五分。一二歲即服一字。後煎桃柳湯。放溫浴兒。便用青衣蓋之。當有蟲出。即效。

【虎睛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒脾疳。

藥品 虎睛、一個。牛黃、二錢。桔梗、麝香、胡黃連、各一錢。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如麻子大。每服三丸。食前來飲送下。一日二次。

【阿魏丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治麵積。肉積。生蟲積。腹痛嘔惡。

藥品 阿魏(酒浸化)、肉桂、蓬莪朮、麥芽、神麴、萊菔子、青

皮、白朮、乾薑、各五錢。百草霜、三錢。巴豆霜、三七粒。

制法及用法 研爲細末。水煮米糊和丸。每服二三十丸。薑湯送下。麵傷。或麵湯送下亦可。

九 筆

【胡黃連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切疳。一切虛癆。

藥品 胡黃連、蘆薈、草黃連、肉豆蔻(炮)、桂心、人參、硃砂、使君子(去殼)、木香、鈎藤、龍齒、白茯苓、各一錢。麝香、一字(研入)。

制法及用法 各生用。研爲細末。取獾豬膽二枚。裂汁和末。令勻。裝入袋內盛之。用線紮定。湯煮半日。取出。切破袋子。加荳蔻子二錢。黃丹一錢。另研如粉。入前藥和勻。搗五百杵爲丸。如綠豆大。每服五七丸。粥飲送下。幼者三丸。不喫粥飲。塗乳頭令吮。

【胡黃連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳痢腹痛。

藥品 胡黃連、五錢。沒藥、木香、各二錢五分。

制法及用法 搗羅爲末。糯

米飯和丸。如綠豆大。每服五丸。粥飲送下。一日三四次。量兒大小加減。

【胡黃連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱疳。

藥品 胡黃連、川黃連、各五錢。硃砂、一分(另研、一作二錢、一方加蝦蟆五錢、不燒)。

制法及用法 研爲細末。和勻。填入豬膽中。以綿紮懸掛沙鉢子內。淡漿水煮一飯時久。取出。研入蘆薈、麝香、各一分(一作各二錢)。米飯和丸。如麻子大。每服一二十丸至五十丸。食後米飲送下。若熱疳生蟲。去硃砂。加燕麥仁、鵝蟲、青皮、雷丸。

【胡黃連丸】

發明 見萬全方。

功用 治肺疳不欲乳食。時腹痛。

藥品 胡黃連、當歸(煨微炒)、訶梨勒皮、木香、各五錢。青橘皮(湯浸、去白焙)、紫蘇子、杏仁(湯浸、去皮尖、銹炒微黃)、各一分。麝香、一錢(研入)。

制法及用法 搗羅爲末。粟米飯和丸。如綠豆大。每服三丸。粥飲送下。量兒大小加減。

【胡黃連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治乾疳。

藥品 胡黃連末、五錢。硃砂、波斯膏黛、麝香、各三分。麝香、一分。蛇蛻皮、一條(燒灰)。蟾酥、一杏仁大。

制法及用法 研爲末。用豬膽一枚。取法酒一盞。和藥末。於銚子內熬膏爲丸。如綠豆大。兒三歲以下。每服三丸。五歲至七歲。每服五丸。粥飲送下。一日三次。

【胡黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳熱乾瘦。

藥品 胡黃連、犀角屑、各二錢五分。生地黄汁、一合。羊肝、一具(切、取汁)。麝香、五分(細研)。蜜、五勺。

制法及用法 搗胡黃連、犀角、細羅爲散。入麝香研勻。以羊肝汁、地黄汁、蜜、調勻。每服一茶匙。竹葉煎湯調下。量兒大小加減。

【香甲丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 輕骨。長肌。治積疳。及老人 疳瘦不食。多汗喜哭。

藥品 木香、二錢五分。鼈甲(去裙襖、醋炙)、檳榔、使君子肉、柴胡(去蘆)、黃連(去

鬚)、各五錢。

制法及用法 研爲末。豬膽汁和丸。如綠豆大。每服二十丸。日中臨臥米飲送下。久發潮熱多汗無力者。服之即效。

【香橘餅】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傷冷積瀉。

藥品 木香、青皮、各一錢。陳皮、二錢五分。厚朴(薑汁製)、神麴、麥蘖、各五錢。

制法及用法 研爲末。蜜丸爲餅。紫蘇米飲調下。

【柴胡散】

發明 見茅先生方。

功用 治小兒疳熱。四肢如柴。

藥品 柴胡、知母、貝母(去心)、茯苓、茯神、乾葛、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 研爲末。每服一匙頭。加小麥一匙頭。清水一鍾。煎至六分。去滓服。

【前胡散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒腹內痞結。壯熱羸瘦多啼。

藥品 前胡、川大黃(微炒)、各三分。枳殼(炒微黃)、赤茯苓、犀角屑、郁李仁(湯浸去皮、微炒)、鼈甲(塗醋炙令黃、去裙

角)、各五錢。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓溫服。量兒大小加減。微利爲度。

【洗心散】

發明 見傅仁字眼科審視瑤函。

功用 治火疳。

藥品 大黃、赤芍藥、桔梗、玄參、黃連、荊芥穗、知母、防風、黃芩、當歸尾、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。食後茶清調下。

【紅丸】

發明 見沈括靈苑方。

功用 治五疳。

藥品 郁李仁、一百粒(溫水浸、去皮尖)。坯子胭脂、一分。麝香、五分(另研)。

制法及用法 先研郁李仁細爛。次入胭脂、麝香、同研。用粳米飯爲丸。如麻子大。每服三丸至五丸。薄荷煎湯送下。一日三次。量兒大小臨時加減。

十 筆

【茯苓丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒心疳。驚疳。

藥品 赤茯苓、茯神、蘆薈、

琥珀、黃連(淨)、各三錢。鈎藤皮、遠志肉(薑製焙乾)、蝦蟆灰、各二錢。石菖蒲、一錢。麝香、少許。

制法及用法 研爲末。粟米糊丸。如麻子大。每服十丸。薄荷湯送下。

【茯苓散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治乳食傷脾。或心經伏熱。小便白濁。

藥品 赤茯苓、三稜(煨)、蓬莪朮(煨)、縮砂仁、各五錢。青皮、陳皮、滑石、甘草、各一錢五分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。燈心湯調下。

【桃花丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒心臟積熱生疳。

藥品 寒水石、一兩(炭火燒熟、研如麵細)。硃砂、五分(細研)。

制法及用法 和勻。水浸蒸餅爲丸。如粟米大。每服三五丸。冷水送下。旬日自安。

【桃紅散】

發明 見劉氏方。

功用 治小兒驚積疳積。常服進食。面如桃花。

藥品 馬牙硝、硃砂、茯苓、

人參、各等分。

制法及用法 研爲細末。一歲兒每服一字。二三歲二字。四五歲三字。新汲水入蜜(約盞內三分許)調下。

【桃紅散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒食疳腹脹。

藥品 桃花、一分。乾蟾(塗酥、炙令黃)、肉豆蔻(去殼)、青黛(細研)、赤芍藥、紫筍茶、各五錢。

制法及用法 搗細羅爲散。每服五分。溫粥飲調下。量兒大小。臨時加減。

【眞珠丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒寒熱虛積。五臟煩滿。風涎積滯。驚食疳積。

藥品 南星末、半夏末、滑石末、各二錢。輕粉、四錢匕。巴豆、二七粒(去心油)。

制法及用法 研爲末。水煮麴糊和丸。如芥子大。每服十五丸或二十丸。蔥湯送下。

【眞珠散】

發明 見萬全方。

功用 治心疳。

藥品 眞珠末(一作三錢)、麥門冬(去心)、茯神、各五錢。天竺黃、胡黃連、羚羊角屑、川大黃(炒)、當歸(微炒)、犀角

屑、各三錢。金箔(研、臨時和入、一作二十五片)、銀箔(研、臨時和入)、各五十片。牛黃(細研)、雄黃、各一錢。硃砂、甘草(炙)、各二錢。麝香(細研)、少許。一方無銀箔、麝香。

制法及用法 搗羅爲散。每服五分。茵陳煎湯調下。量兒大小加減。

【烏金膏】

發明 見漢東王先生家寶方。

功用 治疳氣入陰。

藥品 通草、黃皮、火黃、各二錢五分。

制法及用法 各燒存性。研爲末。每服一錢。續豬膽調成膏。塗於陰上。如未退。蛇牀子煎湯洗。後再調塗。

【烏犀丸】

發明 見曾氏方。

功用 溫胃。調脾。治小兒積滯。夾驚夾風。吐逆醋氣。面黃肌瘦。

藥品 阜莢、三寸(剉、煨灰火中、見青煙起爲度、取出地上、瓦盤蓋定、存性、冷用七錢)。硫黃、白礬、各三錢五分。陳皮(去白)、川烏(炮去皮鹽)、各五錢。巴豆(去殼摸心、存油)、七十七粒。

制法及用法 先以硫黃研

細。除巴豆外。餘四味同焙爲末。却薄切巴豆細研。同前五味藥末杵勻。用粳米飯包作一大粽子。小瓦瓶盛水熟煮。候冷取出。沙鉢內杵爛。細布兜緊。絞出如稠糊。安在別器內。以藥末停分。同杵細糲爲丸。如粟米大。取諸積。每服五丸。或十五丸。或二十一丸。至三十三丸。並用淡薑湯泡冷飯取汁。五更初空腹送下。通利三五行。以勻氣散止補。治積吐有醋酸氣。每服三丸至五丸。淡薑湯入米醋少許。候溫空腹下。

【桂香丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治果菜積。

藥品 肉桂、一兩。麝香、一錢。

制法及用法 共研細末。米飯爲丸。每服十五丸。熱湯送下。

【消積丸】

發明 見顧世澄傷寒大全。

功用 治痞積。

藥品 廣皮、三稜、蓬莪朮、檳榔、青皮、枳實、蘿蔔子、麥芽、草豆蔻、各一兩。厚朴、山楂肉、各一兩五錢。神麴、二兩。廣木香、七錢。

制法及用法 爲末。黑沙糖

和丸。每重一錢。每服一丸。空腹時熱湯調下。

十一筆

【硃砂丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒一切無辜疳。黃瘦腹痛。或冷熱痢有蟲。

藥品 淨硃砂(細研、一作三分)、石膏蒲、漏蘆、雄黃(細研、一作三分)、各一分。乾蟾、一枚(醋炙令黃)。麝香、一兩(細研、一作一分)。

制法及用法 搗羅爲末。和勻。粟米飯爲丸。如麻子大。每服二丸。粥飲化下。空腹午後各一服。量兒大小。以意加減。

【硃砂丸】

發明 見顧類經方。

功用 治小兒疳痢。

藥品 硃砂、半石蓮大。阿魏、如硃砂大。蝙蝠血、三兩滴。蜜酥、少許。

制法及用法 研細和勻。每用少許。口脂調。先用桃柳枝煎湯浴兒。後視兒大小。以綠豆大填兒臍中。用紙蓋貼。青衣蓋兒。其蟲自出。黃色者輕。青黑色者重。

【殺疳散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳積羸瘦。腹中有蟲。

藥品 沒石子(細研)、瓜蒂(細研)、鶴虱(細研)、蟾頭(炙令焦黃)、蘆薈(細研)、青黛(細研)、各五錢。麝香(細研)、膩粉(研入)、各一分。

制法及用法 搗羅爲末。糯米飯和丸。如黍米大。每服五丸。粥飲送下。一日三次。量兒大小。以意加減。

【殺疳散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳積不止。

藥品 雄黃(細研)、麝香(細研)、牛黃(細研)、蘆薈(細研)、硃砂(細研)、龍骨(燒令赤色)、密陀僧(燒紅細研)、胡黃連、各二錢五分。青黛、五錢(細研)。金箔、十片(細研)。肉豆蔻、二枚(去殼)。蟾酥、一錢二分五釐(熱水化如泥)。

制法及用法 搗羅爲末。入研藥及蟾酥研令勻。湯浸蒸餅和丸。如黃米大。每服三丸。熱湯送下。再煎黃連苦參湯。洗身上。用青衣蓋。出蟲便瘥。

【參苓散】

發明 見莊氏方。

功用 治小兒因積成疳、脾胃虛弱、不思飲食。

藥品 人參、茯苓、川芎、各

一兩。甘草、芍藥、黃耆、各五錢。芎皮(去白)、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓溫服。

【啓脾丸】

發明 見李挺醫學入門。

功用 治脾積。五更瀉。消疳。黃脹腹痛。常服生肌。健脾。益腎。

藥品 人參、白朮、茯苓、山藥、蓮肉、各一兩。陳皮、澤瀉、山查、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。空腹時米飲化下。或爲散服亦可。

【紫霜丸】

發明 見吉氏方。

功用 治小兒久積。胸高臃瘦。赤白痢疾。肚腹痛甚。

藥品 丁頭代赭石、五錢(煅五遍、醋淬五遍)。杏仁、二七粒(取霜)。乳香、硃砂、木香、各一錢。宣黃連、一分(去頭)。輕粉、五分。麝香、少許。肉豆蔻、二個(麪裹煨)。巴豆、十粒(取霜)。

制法及用法 共研細末。稀麵糊爲丸。如梧桐子大。每服七丸至十五丸。紫蘇飯飲送下。

十二筆

【黃耆丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒羸瘦體熱。面色痿黃。不欲乳食。

藥品 黃耆(剉)、赤芍藥、人參(去蘆頭)、甘草(炙微赤、剉)、胡黃連、各五錢。麥門冬(去心焙)、鼈甲(塗醋炙微黃、去裙襖)、各一兩。柴胡(去苗)、三分。

制法及用法 搗細羅爲末。煉蜜和丸。如麻子大。每服五丸。不拘時粥飲送下。量兒大小以意加減。

【黃耆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒疳氣。飲食不進。

藥品 黃耆、五味子、厚朴(薑汁炙)、白朮、蒼朮、芍藥、甘草(炙)、陳皮、乾薑、乾鯁、當歸、各一兩。木瓜、二兩。

制法及用法 研爲末。每服五分。米飲調下。

【黃連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳勞。

藥品 川黃連、五錢(豬膽汁浸曬)。石蓮子、瓜蒌根、杏仁(湯浸去皮焙)、烏梅肉、各二

錢。

制法及用法 共研末。牛膽汁浸糕糊爲丸。如麻子大。每服五丸。烏梅、薑、蜜、煎湯送下。

【黃連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳疾瀉痢。

藥品 胡黃連、丁香、蜜陀僧、各五錢。肉豆蔻、一個。檳榔、一枚。紅雪、一兩。訶子、二枚(一枚煨、一枚生用)。

制法及用法 研爲細末。入麝香二錢五分。和勻。次入綠豆末少許。水和爲丸。如麻子大。小兒三歲以下每服一丸。三歲以上五丸。米湯下。①腦疳鼻癢及赤爛者。黃連湯下。②脾虛羸瘦泄痢。四肢虛腫者。青州棗湯下。③肝疳眼澀生翳者。甘草湯下。④骨疳冷地臥愛食土。紫蘇茶湯下。⑤肺疳上氣急喘者。橘皮湯下。⑥筋疳瀉血者。鹽湯下。⑦疳蟲及瀉無定者。生薑湯下。

【訶黎勒丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治食疳。

藥品 訶黎勒皮、三分。肉豆蔻、一枚(去殼)。青黛(細研)、麝香(細研)、蘆薈(細研)、硃砂(細研)、熊膽(研入)、各一

分。

制法及用法 搗羅爲末。都研令勻。酒煮糯米飯和丸。如黍粒大。每服三丸。粥飲送下。一日二次。量兒大小加減。

【訶黎勒散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒宿食不化。不欲飲食。四肢消瘦。腹脅多脹者。

藥品 訶黎勒皮、三分。人參、白朮、麥蘖(炒令微黃)、陳橘皮(去白)、檳榔、各五錢。甘草、一分(炙微赤)。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓溫服。一日四五次。量兒大小加減。

十三筆

【萬應丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腹中諸蟲血積。面黃肌瘦。小便如泔。

藥品 黑牽牛(取頭末)、大黃、檳榔、各八錢。白雷丸(醋黃)、南木香、各一兩。沉香、五錢。

制法及用法 將黑牽牛、大黃、檳榔、和研爲末。用大皂角(一作十錠)、苦楝皮(一作十片)、各四兩。煎汁泛丸。如綠

豆大。白雷丸、木香、沉香、和研爲末。每服三五十丸。五更時沙糖水送下。或作末服亦可。小兒量減。孕婦忌服。

【萬應丸】

發明 祕方。

功用 治腹內有蟲及食積氣塊痛。小兒疳病。

藥品 檳榔、一兩。三棱(醋炒)、蓬莪朮(醋炒)、陳皮(熟炒、黃色)、橘紅、雷丸、乾漆(炒煙盡)、使君子肉、麥蘖麵(炒)、神麴(炒黃色)、各五錢。蕪荑、二錢五分。高良薑(陳壁土炒)、縮砂仁(去殼)、各二錢。鶴蟲(微炒)、木香(不見火)、胡黃連(炒)、甘草(炙)、各三錢。

制法及用法 共研細末。醋打米糊爲丸。如綠豆大。每服二三十丸。空腹時淡薑湯送下。

【萬應丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸疳胃熱。飲食不進。頭髮作穗。面色萎黃。

藥品 五倍子(揀去蟲屑)、胡黃連、青皮(去白)、陳皮(去白)、黃蘗、神麴、麥芽(洗淨焙乾)、三棱(炮剉)、蕪荑、檳榔(不見火)、蓬莪朮(炮剉)、龍膽草、川楝子肉、使君子、各一兩。

制法及用法 除檳榔、麥芽、二味外。餘均剉碎。炒令微焦。

色。候冷。同檳榔、麥芽、研細。麵糊爲丸。如麻子大。兒小者丸如粟米大。每服三十丸至五十丸。或七十丸。空腹時米清湯送下。

【塌氣丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒疳氣。腹脹喘急。並面浮腫。

藥品 丁香、胡椒(炒)、各五錢。蘿蔔子(炒)、白牽牛、各七錢五分。

制法及用法 共研爲末。麵糊爲丸。如小豆大。三歲兒每服三十丸。米湯送下。

【當歸丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒冷熱不調。大便青黃。心腹多痛。或腹中氣滿。或時嘔逆。不欲飲食。

藥品 當歸、白芍藥、人參、川芎、各三錢。甘草(炙)、白朮、各五錢。

制法及用法 共研細末。水煮麵糊爲丸。如麻子大。三歲兒每服十丸。粥飲送下。每日三次。量兒大小加減。冷甚加陳皮、枳殼、尤妙。

十四筆

【漏蘆丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治無辜疳。羸弱不欲飲食。及腹內蟲動作。多吐清水。

藥品 漏蘆、二兩。豬肝(燒乾)、楮根白皮(剉)、各一兩。

制法及用法 搗羅爲末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。不拘時熟湯化下。更量兒大小加減。

【漏蘆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治無辜疳。肚脹、或時瀉痢。冷熱不調。

藥品 漏蘆、一兩。

制法及用法 搗細羅爲散。每服一錢。用豬肝一兩。鹽少許。清水煮熟。空腹時頓服。粥飲下。

十五筆

【蝦蟆丸】

發明 見譚氏方。

功用 治五疳。

藥品 絲蟬(爲末)、八兩。大棗、一升五合(去核)。

制法及用法 先用醋五升。並蟬煮棗熟。後入黃連、四兩。訶子(去核)、使君子、夜明砂、各二兩。乾蝦蟆、四個(燒灰存性)。同搗碎。入前藥內攪勻。直至乾焦爲度。再杵羅爲末。棗肉和丸。如黍米大。三四歲小

兒每服三十丸。乳食前興飲送下。

十六筆

【豬肚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒肌熱。時或泄瀉。及有積滯。不思飲食。肌肉消瘦。

藥品 龍甲、一兩(同童便並醋共一升、熱浸炙盡爲度)。白朮、薯蕷、各一兩。胡黃連、人參(去蘆頭)、紫苑(去土)、青橘皮、桃仁(湯浸、去皮尖雙仁)、木香、甘草(炙)、各五錢。柴胡(去蘆頭)、一兩一錢。

制法及用法 搗羅爲末。用豬肚洗淨。入藥在內繫定。煮令極爛爲度。取出。與藥同杵令黏爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。不拘時熱湯送下。

【豬肚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒骨蒸疳勞。肌體黃瘦。

藥品 木香、五錢。黃連、生地黃、龍甲(九肋者、湯浸、童便燻炙)、銀柴胡(去蘆)、青皮、各一兩。

制法及用法 研爲末。豬肚一枚。入藥於內。以線纏之。於沙罐內懸肚煮熟。取出細研。豬

肚爲丸。如麻子大。不拘時米飲送下。量兒大小加減。

【龍膽丸】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治疳病發熱。

藥品 龍膽草、黃連、使君子肉、青皮、各等分。

制法及用法 研爲末。豬膽汁和丸。如梧桐子大。每服三十丸。臨臥時熱湯送下。量兒大小加減。

十七筆

【膽礬丸】

發明 見錢乙方。

功用 治疳。消癖。進食。止瀉。和胃。殺蟲。

藥品 膽礬、一錢(爲粗末)。綠礬、二兩。大棗、十四個(去核)。

制法及用法 好醋、一升。同熬令棗爛。次用使君子、二兩(去殼)。枳實(去殼炒)、三兩。川黃連、訶梨勒(去核)、各一兩(並爲粗末)。巴豆、二七枚(去皮、破之)。同炒令黑。約三分乾。再用夜明砂、蝦蟆灰(存五分性)、各一兩。苦楝根皮末、五錢。同炒候乾。同前四物杵羅爲末。却同膏和入臼中。杵千下。如未成。更入熟棗肉。亦

不可多(恐服之難化)。太稠即入溫水。可丸即丸。如綠豆大。每服二三十丸。不拘時米飲或熱湯送下。

十八筆

【檳榔丸】

發明 見正傳經驗方。

功用 治疳病積氣成塊。腹大有蟲。

藥品 檳榔、一兩。三稜(煨去毛、切、醋炒)、雷丸、蓬莪朮(醋炒)、青皮(去蘗、鉄炒、黃色)、陳皮(去白)、乾漆(炒烟盡)、麥蘖麴(炒)、神麴(炒黃色)、山楂肉、各五錢。鶴蟲(略炒)、木香(不見火)、甘草(炙)、胡黃連、各三錢。蕪荑(水洗淨)、二錢五分。高良薑(陳壁土炒)、二錢。砂仁、一錢。

制法及用法 共研細末。醋糊爲丸。如綠豆大。每服三五十丸。空腹時淡黃湯送下。

【檳榔丸】

發明 見演山史君方。

功用 治小兒食肉太早。傷及脾胃。水穀不分。積滯不化。及疳癪等證。

藥品 生檳榔、肉豆蔻、各一個。芫連、胡黃連、陳皮、青皮、川棟肉(炒)、蕪荑(炒去皮)、神麴(炒)、麥蘖(炒)、木香、夜明

砂(淘淨炒)、蘆薈、川芎、各一錢。麝香、一釐。

制法及用法 共研末。豬膽汁薄荷爲丸。如麻子大。每服三五十丸。溫飯飲送下。

【雞肝散】

發明 見鮑杓嫩驗方新編。

功用 平肝。健脾。明目。去障。止瀉。進食。治小兒疳積。腹大泄瀉。面黃肌瘦。肝火上升。目珠生翳。

藥品 煅甘石(製)、六錢。赤石脂、滑石(飛)、胡黃連、各五錢。辰砂、四錢。青黛、三錢。石決明(煨)、一兩。

制法及用法 共研極細末。每服五分。用雞肝(不落水者)一具。竹刀破開。將藥末放入。煮熟食之。輕者一二服。重者三四服。可愈。

【雞肝散】

發明 通行方。

功用 治小兒疳積。

藥品 使君子肉、三錢。芫丸、三錢。鮮雞肝、一具。

制法及用法 將鮮雞肝和藥搗爛。低溫焙乾後研末。瓶裝固封。每藥料可分作四分服用。早晨空腹時溫開水送服。

二十筆

【蘆薈丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳癰。肌肉消瘦。發熱潮熱。不思飲食。口乾作渴。或肝疳食積。口鼻生瘡。牙齦蝕爛。

藥品 蘆薈、胡黃連、黃連(炒焦)、木香、川蘇莢(炒)、青皮、各五錢。當歸、茯苓、陳皮、各一兩五錢。甘草(炙)、七錢。

制法及用法 共研細末。米糊爲丸。如梧桐子大。每服七至十丸。米飲送下。

【蘆薈丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸疳癰。不生肌肉。

藥品 蘆薈、木香、赤芍藥、沒石子、各五錢。使君子(去殼)、胡黃連、各二錢五分。肉豆蔻、二錢。人參、一錢。

制法及用法 共研細末。麝香(另研細)五分。與藥末拌勻。蜜水打麵糊爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。空腹食前米飲送下。

【蘆薈丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內疳、疳痢、時作時止。

藥品 蘆薈(細研)、雄黃(細研)、沒石子、蟬殼(微炒去足)、丁香、熊膽(研)、蛇蛻皮(燒

灰)、各一分。麝香(細研)、蟾酥(研)、各一錢。黃連(去鬚)、五錢。

制法及用法 搗羅爲紅末。煉蜜和丸。如米粒大。每服三丸。粥飲送下。一日三次。又另研一丸。吹入鼻中。

【蘆薈丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治五疳。

藥品 蘆薈、牛黃、蟬殼、各一分。膩粉、粉霜、硫黃、麝香、各一錢。田父、一枚(燒煙似絕)。青黛、五錢。巴豆、十粒(去皮心膜油)。蛇蛻(燒灰)、一條。

制法及用法 共研細末。令勻。粳米飯爲丸。如綠豆大。每服二丸。熱湯送下。良久。以桃柳煎水洗兒。後用青衣蓋遍身。當有蟲出。白黃色者可治。青黑色者難治。

【蘆薈丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治疳積。氣盛牙呬。

藥品 蘆薈、小青皮、白朮丸、白燕羹、川黃連、胡黃連、鶴虱、麝香、各一錢。木香、三錢。

制法及用法 研爲末。蒸餅糊丸。如麻子大。每服一錢。空腹時清米湯送下。

【蘆薈丸】

發明 見太醫局方。

功用 治疳氣面黃肌瘦。色痿黃。腹脅脹滿。頭髮作穗。揉鼻咬甲。好食泥土。瘡色無定。寒熱往來。目澀口臭。齒齕爛黑。遍體生瘡。及婦人熱結經閉。作塊上衝腹痛。常服長肌。退黃。殺疳蟲。進乳食。

藥品 蘆薈、麝香、硃砂(另研細、水飛)、各一錢。乾蝦蟆(一作乾蟾)、一兩(同皂莢煨存性)。青黛、二錢五分。大皂角(去皮弦子)、一兩。

制法及用法 共研末。令勻。湯浸蒸餅爲丸。如麻子大。三歲兒每服二十丸。不拘時米飲送下。量兒大小加減。

【蘆薈丸】

發明 見莊氏方。

功用 治風疳。順肝氣。進飲食。

藥品 龍膽草、一兩(淨洗剉焙)。蘆薈(另研、或以皂角水磨)、一錢。

制法及用法 搗羅爲末。用皂角(不蛀者)三挺。清水二升。浸汁。生絹濾去滓。入銀器內。慢火熬成膏。入藥末。調和爲丸。如綠豆大。每服三丸至五丸。薄荷湯送下。

二十一筆

【麝香丸】

發明 見三冰元和紀用經方。

功用 治小兒疳瘦面黃。髮穗骨立。減食肌熱。驚風溼瘡。疳蟲疳疔。

藥品 麝香、蘆薈、各二分。胡黃連、四分。

制法及用法 共研令勻。水泛丸。如黃米大。一歲兒服三丸。三歲服五丸至七丸。人參湯送下。一日三次。

【麝香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚風等病。

藥品 麝香、瓜蒂、龍腦、牛黃、各一錢。龍膽草、胡黃連、各五錢。木香、蟬蛻(去頭足洗淨)、各一錢。

制法及用法 共研細末。豬膽汁爲丸。如梧桐子大。①驚疳或秘或瀉。每服五七丸至一二十丸。滑米飲送下。②眼疳。豬肝湯送下。③疳渴。持豬湯或豬肉湯送下。④驚風發搐。眼上竄。薄荷湯送下一丸。更水研一丸。滴鼻中。⑤牙疳瘡。口瘡。研貼患處。⑥蟲痛。苦楝根湯或白無灰湯送下。⑦百日內小兒二便不通。水研一丸

封臍中，有蟲。用乾漆、麝香、各少許。入生油一兩。點溫水化下一大丸。慢驚勿服。

【麝香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒五疳瘦弱。毛髮乾焦。口鼻多瘻有蟲。

藥品 麝香、蘆薈、粉霜、硃砂、各一分。蟾酥、一白豆許。皂莢、三寸(燒灰)。蛇蛻(燒灰)、五寸。蝙蝠、三個(取血拌入藥末)。

制法及用法 共研細末。以油熔蠟爲丸。如小豆大。先以桃柳湯洗兒。後用一丸塗臍中。上以醋麵封之。良久。蟲即出。黃白赤者易治。黑者難療。

【麝香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒內疳。下痢不止。肌體消瘦。

藥品 麝香(細研)、蘆薈(細研)、蛇蛻皮(燒灰)、夜明砂(微炒)、蝸牛殼、黃連(去鬚微炒)、沒石子、各一分。黃丹(微炒)、定粉(微炒)、各一兩。訶黎勒皮(煨)、五錢。

制法及用法 搗細羅爲散。都研令勻。每服五分。粥飲調下。早晨午後各一次。量兒大小加減。

二十四筆

【鼈甲散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒無辜疳。項細腹大。毛髮乾枯。

藥品 沈香、漏蘆、牛蒡子(微炒)、使君子、赤芍藥、訶黎勒皮、甘草(炙微赤剉)、各五錢。

制法及用法 搗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去渣。不拘時溫服。量兒大小加減。

【鼈甲散】

發明 見湯氏方。

功用 治疳勞骨熱。

藥品 鼈甲(九肋者、湯浸、童便塗炙)、菰青(蜜炙)、白芍藥、各一兩。生熟地黃、地骨皮、當歸、人參(去蘆)、各五錢。

制法及用法 咀咀。每服二錢。清水半盞。煎服。

瘋癲類

二筆

【人參丸】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治癲脈大熱。經脈不利。

藥品 人參、門冬(去心)、茯神、龍齒(煨)、石菖蒲、遠志肉、黃耆、各一兩。當歸、五錢(一作赤石脂)。地黃、二兩。

制法及用法 研爲末。煉白蜜和丸。如梧桐子大。每服五十丸。食前清米飲或醇酒送下。

四 筆

【五加皮酒】

發明 見太平聖惠方。

功用 治腎氣虛寒。小便餘瀝。婦人陰冷癖瘦。腰膝時痛。及癱瘓拘攣等證。

藥品 五加皮、熟乾地黃、丹參、杜仲(去粗皮、炙微黃)、蛇牀子、乾薑、各三兩。地骨皮、二兩。天門冬、一兩。鍾乳、四兩。一方有枸杞子。無地骨皮。

制法及用法 細剉。生絹袋盛。酒一斗五升。漬二宿後。濾清。加冰糖一斤八兩。每服一大杯。空腹時及晚食前服。

【五加皮酒】

發明 見李時珍本草綱目。

功用 壯筋骨。填精髓。治一切風溼痿痹。

制法及用法 以五加皮洗刮去骨。煎汁。和麴米釀之。或切碎。袋盛浸酒中。或加牛膝、

當歸、地榆諸藥。燙溫飲之。

【木瓜丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治腎虛腰膝少力。腿脚腫癢。脚心隱痛。筋脈拘攣。步履艱難。氣促面黑。二便秘澀。飲食減少。

藥品 乾木瓜、二兩。熟地黃(洗焙)、陳皮(去白)、烏藥、各四兩。黑牽牛、三兩(炒)。石南藤、杏仁(去皮尖)、當歸、菴蓉(酒浸焙)、續斷、牛膝(酒浸)、各三兩。赤芍藥、一兩。

制法及用法 研爲細末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服三五十丸。空腹時木瓜湯或溫酒送下。

五 筆

【左經丸】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治筋骨痛疾。手足不隨。

藥品 生草烏頭(肉白者、去皮臍)、木鼈、白膠香、五藏脂、各三兩五錢。當歸、一兩。斑蝥、一百枚(去趺足、少醋煮熟)。一方無當歸。

制法及用法 研爲末。黑豆去皮。生杵粉一斤。醋糊和丸。如雞頭實大。每服一丸。溫酒

磨下。不曾針灸傷筋絡者四五丸。十歲兒一丸。分三服。

參考 此方能通榮衛。導經絡。專治心腎肝三經。服後小便通暢。乃其驗也。然非內有汚血癥積不宜用。

【左經丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治左癱右瘓。手足顫掉。言語蹇澀。渾身疼痛。筋脈拘攣。項背強直。行履艱難。及跌仆閃腦。外損內損。常服通經絡。活血脈。疎風。順氣。壯骨。輕身。

藥品 生黑豆、一斤(以斑蝥二十一枚、去頭足、同煮、候豆脹爲度、去之、取豆焙乾)。川烏(炮去皮臍)、二兩。乳香(另研)、一兩。沒藥、一兩五錢。草烏(炮)、四兩。

制法及用法 研爲末。醋煮米糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時溫酒送下。

六 筆

【守中丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治大麻風。

藥品 防風、胡黃連、陳皮、黃芩、天麻、升麻、山梔、荊芥、苦參、連翹、各一兩。牛蒡子、

當歸、胡麻、皂角、白蒺藜、蔓荊子、各三兩。羌活、獨活、各一兩五錢。甘草、礞砂、白芷、各五錢。乳香、沒藥、麝香、冰片、各二錢。牛黃、一錢。

制法及用法 研爲末。米糊和丸。每服三錢。鹽湯送下。

【地黃飲】

發明 見劉完素宣明論方。

功用 治心腎不交。舌瘡足癢。

藥品 熟地黃、三兩。巴戟(去心、酒浸)。山茱萸(去核)、肉蓯蓉(酒浸、去腐、切焙)、金石斛、附子(炮)、白茯苓、石菖蒲、遠志(甘草湯泡、去心)、官桂(炮、一作甜肉桂)、麥門冬(去心)、各一兩。五味子、五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服三五錢。加生薑三五片。大棗一二枚。薄荷五七葉。清水一盞半。煎至八分。不拘時服。一日二次。

參考 方中桂附巴戟。原爲驅逐濁陰痰涎而設。不可輕去。

七 筆

【何首烏散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風。骨節疼痛。或手足麻痺。腰髀沉重。

藥品 何首烏、羌活(去蘆)、

當歸(炒去蘆)、赤箭、附子(炮去皮臍)、桂心、赤芍藥、芎藭、羚羊角屑、各七錢五分。威靈仙、牛膝(酒浸)、各一兩。防風(去蘆)、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時豆淋酒調下。

【沒藥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒走注疼痛。四肢麻痺。

藥品 沒藥(另研)、五加皮、乾山藥、桂心、防風(去蘆)、羌活(去蘆)、白附子(炮)、骨碎補(去毛)、香白芷、蒼耳(炒)、自然銅(醋炙)、各五錢。血竭(另研)、二錢五分。虎脛骨(醋炙)、敗龜板(醋炙)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。和勻。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹時溫酒送下。一日二次。

【防風丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱痺。

藥品 防風(去叉)、羌活(去蘆)、茯神(去木)、五加皮、枳殼(麸炒)、牛膝(酒浸)、桂心(去粗皮)、麥門冬(去心)、人參、玄參、薏苡仁、生地黄(焙)、芍藥、丹參、各一兩。檳榔、二錢。磁石(火煨醋淬)、四兩。大黃

(剉炒)、松子仁、木香、各五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。漸加至四十丸。空腹時溫酒送下。

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風。言語蹇澀。骨節疼痛。皮膚不仁。

藥品 防風(去蘆)、羌活(去蘆)、當歸(去蘆炒)、天南星、天麻、桂心、芎藭、烏蛇肉(酒浸)、白僵蠶、桑螵蛸(炒)、各五錢。麻黃、七錢五分(去根節)。麝香、硃砂(細研、水飛)、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服一錢。不拘時溫酒調下。

【防風天麻丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰風癱瘓。

藥品 防風(去蘆)、天麻、升麻、白附子(炮)、定風草、川芎、細辛(去苗)、人參(去蘆)、丹參(去蘆)、苦參(去蘆)、玄參(去蘆)、紫參(去蘆)、蔓荊子、威靈仙、穿山甲(炒)、何首烏(另搗爲末)、各一兩。蜈蚣、一對。

制法及用法 研爲細末。與何首烏末拌勻。每藥末二兩。

胡麻一片。淘淨曬乾。炒香熟。另碾爲極細末。與藥末一處拌勻。煉蜜和丸。共作九十丸。每服一丸。不拘時細嚼。溫漿水送下。每日三次。宜食淡白粥一百二十日。大忌房勞。須將息慎口。初服藥有嘔吐者勿怪。服藥得安如故。其效如神。

八 筆

【附子丸】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治溼痹。

藥品 附子(炮)、川烏頭(炮)、官桂、川椒、菖蒲、甘草(炙)、各四兩。骨碎補(切、薑汁拌炒)、天麻(煨)、生白朮、各二兩。

制法及用法 共研細末。煉白蜜和丸。如梧桐子大。每服三五十丸。溫酒送下。侵晨食前臨臥各一服。

【附子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人腰脚疼痛。積年不癒。

藥品 附子(炮去皮臍)、桂心、沒藥(另研)、威靈仙、乾漆(炒去煙)、牛膝(酒浸)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前溫酒調下。每日

二次。

【虎骨丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風攻注。腰脚骨節疼痛。

藥品 虎脛骨(酥炙)、敗龜板(酥炙)、檳榔、牛膝(酒浸)、各一兩。當歸(去蘆炒)、川大黃(炒)、木香、桃仁(浸炒)、海桐皮、各七錢五分。防風(去蘆叉)、附子(炮去皮臍)、赤芍藥、桂心、血竭、沒藥(另研)、地龍(去土炒)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹食前溫酒送下。一日二次。

【虎脛骨酒】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治中風偏枯。四肢不隨。諸風。筋脈攣攣。

藥品 虎脛骨(酥炙)、石斛(去根)、石楠葉、防風、當歸、茵芋葉、杜仲(酒炒)、川牛膝(酒浸炒)、芍藥、狗脊(燎去毛)、川續斷(酒浸炒)、巴戟(去心)、各一兩。

制法及用法 剉如豆大。絹囊盛藥。以酒一斗。漬十日。每服一盞。不拘時溫熱服。

【虎脛骨酒】

發明 見沈金鰲沈氏尊生

書。

功用 治中風弱枯。四肢不隨。諸風。筋脈掣拳。

藥品 虎胥骨(搗碎、炙黃)、白芍、各二兩。羚羊角屑、一兩。

制法及用法 酒浸七日。秋冬倍之。每日空腹飲一杯。

【羌活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風痺。手足不仁。

藥品 羌活、漢防己、防風、酸棗仁、道人頭、川芎、各一兩。附子(去皮臍、炮)、麻黃(去皮根節)、天麻、各一兩五錢。黃松節、薏苡仁、各二兩。荆芥、一握。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。

九 筆

【活命金丹】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治中風不語。半身不遂。肢節頑麻。痰涎上潮。咽喉不利。飲食不下。牙關緊急。口噤。及一切酒毒藥毒。發熱腹脹。二便不利。胸膈痞滿。上實下虛。氣閉面赤。汗後餘熱不退。勞病諸藥不治者。

藥品 黃耆、甘草、板藍根、乾葛、甜菊、各一兩。川大黃、

一兩五錢。牛黃(另研)、珍珠粉、生犀角、薄荷、各五錢。辰砂、四錢(另研、一半爲衣)。麝香(另研)、桂、青黛、各三錢。龍腦(另研)、二錢。

制法及用法 研爲末。與另研藥和勻。蜜水蒸餅爲劑。每兩作十丸。硃砂爲衣。就潛用真金箔四十片爲衣。數月修合。瓷器收貯。多年不壞。風毒。茶清化下。解藥毒。新汲水化下。汗後餘熱勞病及小兒驚熱。並用薄荷湯化下。量兒大小加減。

【枳實散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心痹。

藥品 枳實(麩炒)、桂心、細辛、桔梗、各七錢五分。青皮(去白)、一兩。

制法及用法 咀咀。每服三錢。清水一中盞。加生薑一錢五分。煎至六分。不拘時去渣溫服。

【紅膏藥】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治左癱右瘓。筋骨疼痛。漏肩風。跌打損傷。

制法及用法 松香、五斤。童便內浸三個月。取出曬乾。如不能三個月。可將松香熔化。傾入童便內。取出又熔化。傾

童便內。如此九次。再換水煮過片之。第一次用葱、十斤。取汁三碗。入鍋內。將松香化開。入麻油、四兩。攪勻。傾入水盆內。以手扯拔取起。第二次用生薑、十斤。取汁三碗。入鍋內。將松香化開。入麻油、二兩。攪勻。傾入水盆內。以手扯拔取起。第三次用綠豆、一升。煮汁三碗。入鍋內。將松香化開。入麻油、二兩。攪勻。傾入水盆內。以手扯拔取起。第四次用火酒、一斤。入鍋內。將松香化開。入麻油、二兩。攪勻。傾入水盆內。以手扯拔取起。第五次用好醋、一斤。入鍋內。將松香化開。入麻油、二兩。攪勻。傾入水盆內。以手扯拔取起。第六次用蒼朮、留羊花、川烏、草烏、光烏、天南星、半夏、各二兩。水二十碗。煎汁五六碗。入鍋內。將松香化開。入麻油、四兩。攪勻。傾入水盆內。以手扯拔取起。第七次復將松香入淨鍋內。熔化。俟各汁取乾爲度。然後下白煨礬紅細末、四兩。攪勻成膏。收入鉢中。攤貼患處。

十 筆

【海桐皮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治手足拘攣。

藥品 海桐皮、當歸(易洗焙乾)、牡丹皮、熟地黃、牛膝(酒浸焙)、各一兩。山茱萸、補骨脂、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。清水八分。加葱白二寸。煎至五分。去滓。食前溫服。

【海桐皮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風。身體骨節疼痛。

藥品 海桐皮、桂心、白芷、當歸(去蘆)、漏蘆、川芎、羚羊角屑、各一兩。赤芍藥、沒藥(另研)、川大黃(炒)、木香、檳榔、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。

【烏蛇散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人風痹。手足頑麻。筋脈搐搦。口眼不正。言語蹇澀。

藥品 烏蛇肉(酒拌炒)、土蜂兒(炒)、天南星(炮)、天雄(炮、去皮鱗)、赤箭、麻黃(去節)、浮苡仁、芍藥、各一兩。乾蠍(微炒)、桂心、桑螵蛸(微炒)、硃砂(研水飛)、羚羊角屑、

各五錢。當歸(炒去蘆)、陳棗仁(炒)、柏子仁、各七錢五分。

制法及用法 研爲細末。入硃砂和勻。每服一錢。食前溫酒調下。

【烏蛇散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治身體頑麻。及白癩風。

藥品 烏蛇、三兩(酒浸)。白僵蠶(炒)、獨活(去蘆)、天麻、胡麻子、各二兩。天南星、二錢五分。白附子(炮)、川烏頭(炮去皮臍)、桂心、防風(去蘆)、細辛(去苗)、枳殼(去穰、麸炒)、蟬蛻、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。

【烏頭丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治風癱身黑。肌體如木。皮膚蠟澀。四肢麻痺。

藥品 草烏頭、一斤。

制法及用法 入竹籬內。水浸。用瓦片於籬內就水中瀧洗。如打菱角法。宜候瀧洗去大皮及尖。控起令乾。用麻油、鹽、各四兩。入銚子內。炒令深黃色。傾出油。只炒鹽。並烏頭再炒。令色黑煙出爲度。取一枚。劈破。心內如米一點

白恰好。如日多尋留。趁熱取羅爲末。醋糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹晚食前溫酒送下。

十一筆

【細辛散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治胸痹連背痛。

藥品 細辛、甘草、各六錢。枳實、生薑、栝蒌實、乾地黄、白朮、各一兩。桂心、茯苓、各一兩五錢。

制法及用法 爲散。每服方寸匕。溫酒調下。

十二筆

【換骨丹】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治卒中手足頑麻。腰膝沉重。左癱右瘓。四時傷寒。婦人血刺痛。

藥品 桑白皮、何首烏、白朮、紫河車、威靈仙、蔓青子、人參、川芎、防風、地骨皮、各二兩。五味子、木香、苦參、各一兩。犀角屑、五錢。麝香、龍腦、各五分。

制法及用法 研爲細末。用地黃、三斤(去根不去節、剉細)。蒼朮、槐角、各八兩。清水一斗八升。同熬至三四升。

密絹漉去滓。徑清者。坐熬成膏。和煎藥。共兩作八丸。硃砂爲衣。每服一丸。酒一盞。搗碎。至夜溫化。臨臥時和滓服。

【換骨丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風痿痺弱。寒溼氣。鶴膝風等證。

藥品 薤朮（泔浸去皮、炒淨）、四兩。枸杞子、二兩五錢（一作五兩）。白茄根、二兩（洗淨、一作八兩、飯上蒸）。虎脛並掌骨（酥炙、一作一具）、當歸、敗龜版（酥炙）、秦朮（一作四兩）、羌活（一作二兩）、獨活（一作二兩）、防風（一作二兩）、川革薺（一作二兩）、牛膝（一作五兩）、晚蠶沙（炒、一作五兩）、油松節（一作五兩）、各一兩。

制法及用法 用無灰酒一大罇。將絹漉盛藥。懸於酒中。封固。浸至十四日。開罇取酒（不可以面對罇口、恐藥氣衝人面目）。每飲盞許。勿令藥力斷絕。飲盡病痊。將藥曬乾。研爲細末服。或酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服七八十丸。空腹食前溫酒或白滾湯送下。忌食動風辛熱之物。此藥可以常服。但嫩赤腫痛。甚於

春夏者。多屬溼熱。則非所宜。

【勝金丸】

發明 見王氏方。

功用 和血。溫經。安胎。催生。治男子下虛無力。婦人久虛不孕。血風麻痺。半身不遂。赤白帶下。血崩。疝痛。子死腹中。繞臍痛。產後傷寒。虛勞煩悶。血勞。血癖。羸瘦。失氣。汗不出。中風口噤。消渴。吐逆。心痛。目中見鬼。敗血上衝。寒熱頭痛。面色萎黃。肢腫無力。腹中結痛。月經不通。小便不禁。淋瀝痢疾。下血血痢。飲食無味等證。

藥品 芎藭、當歸（酒洗）、石脂（赤白皆可）、白芍藥、人參、白薇（酒洗）、川芎（勿見火）、牡丹皮、桂心、白芷、白茯苓、白朮（米泔浸土炒）、玄胡索、甘草（炙）、沒藥、各一兩。一方有沈香、無沒藥。一方有附子。一方有香附子（酒浸三日炒、曬乾爲末）、十五兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。溫酒化下。初產畢食前熱醋湯化下。妊娠臨月服五七丸。產時減痛。子宮冷者。服二十丸。妊婦常服更佳。

【黃耆丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾癰。

藥品 黃耆(剉)、石斛(去根)、附子(炮、去皮臍)、肉蓯蓉(酒浸、切焙)、益智(去皮)、白朮、人參、各一兩。厚朴(去皮、生薑汁炙)、桂心、各一兩五錢。五味子、當歸、白豆蔻(去殼)、枳實(麸炒)、沉香(剉)、高良薑、各七錢五分。訶梨勒(煨、去核)、二兩。吳茱萸(湯泡)、丁香、各五錢。

制法及用法 共研細末。棗肉爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前溫酒送下。

【黃耆丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治腎臟虛風攻注。手足顛倒癱瘓痛癢。或生瘡疥。癰瘡癰腫。

藥品 黃耆、烏藥、地龍、茴香、川棟肉、川椒、防風、赤小豆、白蒺藜、海桐皮、威靈仙、陳皮、各等分。

制法及用法 共研細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。

【草薢丸】

發明 見證治準繩方。

功用 治肝癰，緩筋脈。去

邪滯，調榮衛。

藥品 草薢、羌活(去蘊)、天麻(酒浸一宿、切焙)、各一兩。附子(炮、去皮臍)、五錢。乳香(另研)、沒藥(另研)、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。入乳香、沒藥合勻。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。空腹時溫酒送下。一日二次。

【草薢丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血痹。風痺。

藥品 草薢(炒)、白朮、川牛膝(酒浸)、山茱萸(去核炒)、熟地黃(焙)、澤瀉、各一兩。金狗脊(去毛)、地膚子(炒)、白朮、各五錢。乾漆(炒令煙盡)、天雄(炮、去皮臍)、車前子(炒)、蟬蛻(生、另研)、各七錢五分。茵芋(去皮莖)、二錢五分。

制法及用法 搗爲細末。入蟬蛻和勻。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。空腹時溫酒送下。日二夜一次。

【趁痛散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治歷節風痺之由血虛血瘀者。

藥品 乳香、沒藥、各一錢。桃仁、紅花、當歸、羌活(酒製)、地龍(酒炒)、牛膝(酒炒)、五靈

脂(酒炒)、甘草、香附(童便浸)、各二錢。一方加酒炒黃芩、酒炒黃蘗。

制法及用法 研爲末。每服二錢。溫酒調下。

十四筆

【酸棗仁丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒流注。四肢筋脈拘攣疼痛。少得睡臥。

藥品 酸棗仁、羚羊角屑、晚蠶沙(炒)、防風(去蘆)、檳榔、各一兩五錢。附子(炮去皮臍)、藁本、柏子仁、羌活(去蘆)、赤芍藥皮、一兩。熟地黃、二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時溫酒送下。一日二次。

【酸棗仁散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝風。筋脈拘攣。四肢疼痛。心神煩悶。睡臥不得。

藥品 酸棗仁、一兩。桑白皮、芍藥、甘菊花、枳殼(去穢、鈇炒)、甘草(炙)、各五錢。羌活(去蘆)、防風(去蘆)、各七錢五分。羚羊角屑、五錢。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一中盞。加生薑五

片。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【酸棗仁散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風煩悶。四肢疼痛。心神多躁。飲食減少。

藥品 酸棗仁、赤芍藥、赤茯苓(去皮)、當歸(去蘆)、紅花子、生乾地黃、羚羊角屑、各七錢五分。芎藭、防風(去又)、羌活(去蘆)、牛膝(酒浸)、桂心、地骨皮、麥門冬(去心)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服八錢。清水一中盞半。加生薑七片。薄荷七葉。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。

【蒼朮丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治乾溼脚氣。筋脈拘痛。不能行履。兼補下部。

藥品 生蒼朮(另研)、不拘多少。乳香(另研)、沒藥(另研)、各二錢。炒牛膝(酒浸)、青鹽(研)、各五錢。熟艾、四錢(米泔過、研)。全蠍、一錢(炒研)。川烏頭、三錢(炮、去皮臍)。

制法及用法 研爲細末。入研藥令勻。以木瓜、大者一枚。切頭作盞。去瓤納諸藥末於瓜內。將盞簽定。置黑豆中。蒸

令極爛。取出去皮。同藥研成膏。再入蒼朮末。拌令得所。丸如梧桐子大。每服五十丸。空腹時木瓜湯或鹽酒送下。一日三次。忌食血與蒜。

【豨薟散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治癰癤瘋。及風氣攻衝。遍身疼痛。

藥品 豨薟、蒼耳子、胡桃肉、各二兩。金銀花、五加皮、地骨皮、防風、海風藤、各一兩。當歸、五錢。紅花、二錢。

制法及用法 三白酒、一壺。將藥用絹包貯壺內。隔湯煮令透。冷一日。每空腹時服一鍾。三四日後服鍾半。酒盡病愈。

十六筆

【獨活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎臟中風。腰脊疼痛。不得俯仰。兩腳冷痹。緩弱不隨。頭昏耳聾。語音渾濁。四肢沉重。

藥品 獨活(去蘆)、附子(炮、去皮臍)、當歸(去蘆)、防風、天麻、桂心(一作肉桂)、各一兩。川芎、甘菊花、枳殼(去瓤、麸炒)、山藥(去核)、黃耆、丹參(去蘆)、牛膝(酒浸)、甘草(炙)、革薟(酒浸)、細辛

(去苗)、石菖蒲、白朮、各五錢。一方附子易牛蒡子。無黃耆。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一盞半。加生薑五片。煎至一盞。去滓。不拘時溫服。

十七筆

【薏苡仁酒】

發明 見朱肱類證活人書方。

功用 治脚痹。

藥品 薏苡仁、牛膝、各二兩。海桐皮、五加皮、獨活、防風、杜仲、各一兩。熟地黄、一兩五錢。白朮、五錢。

制法及用法 研爲粗末。入生絹袋內。用好酒五升浸。春秋冬二七日。夏秋熱盛。分作數帖。逐帖浸酒。每服一盞或半盞。空腹時溫服。每日三四次。常令酒氣不絕。久服覺脾胃下如數百條蟲行。乃風溼氣散之徵。

【薏苡仁散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肉質極。肌膚淫淫如鼠走。津液開泄。或時麻痺不仁。

藥品 薏苡仁、石膏(煨)、川芎、肉桂、防風、防己、羚羊角(鎊)、赤芍藥、杏仁(去皮、麸

炒)、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 清水煎服。

【薏苡仁散】

發明 見心印方。

功用 治筋脈拘攣。久風溼痹。

藥品 薏苡仁、一升。

制法及用法 搗取。清水二升。取末數匙。作粥。空腹時食。

【薏苡附子散】

發明 見金匱要略。

功用 治胸痹緩急。

藥品 薏苡仁、十五兩。大附子、一枚(炮、一作三枚)。

制法及用法 杵爲散。每服方寸匕。每日三次。

參考 薏苡裏陽明金氣可制風。肝爲風臟而主筋。故能治筋之緩急。合附子以大補陽氣。其旨尤妙矣。

十九筆

【蠍附散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 回陽。豁痰。治慢脾風。

藥品 全蠍、七個。附子(炮)、二錢。天南星(炮)、白附子(炮)、木香、各一錢。

制法及用法 咬咀。每服一

錢。加生薑五片。清水煎服。

二十一筆

【續斷丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 調中。益氣。涼血。益智。輕身。耐老。強筋骨。補五臟內傷。治肝腎風虛。腰脊疼痛。行止艱難。小便餘瀝。

藥品 川續斷、五加皮、防風、薏苡仁、羌活、牛膝(酒浸)、各三兩。萆薢、四兩。忍仙木。生地黄、各五兩。

制法及用法 研末。好酒三升化青鹽三兩。用木瓜八兩(去皮子)煮成膏。和杵爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。空腹食前溫酒或鹽湯送下。

【續斷丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治風寒溼痹。筋骨骨痛。

藥品 續斷(薑酒炒)、牛膝(薑酒炒)、川萆薢(薑汁炒)、各三兩。防風、一兩五錢。川烏頭(炮)、二枚。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。細嚼。醇酒送下。

【續斷丸】

發明 見方賢奇效方。

功用 治風溼流注。四肢浮腫。肌肉麻痺。

藥品 川續斷、當歸(炒)、萆薢、附子、防風、天麻、各一兩。乳香、沒藥、各五錢。川芎、七錢五分。一方無川芎。有白芍藥、二錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服四十丸。空腹時溫酒或米飲送下。

【麝香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治白虎歷節風痛。遊走不定。狀如蟲齧。晝靜夜劇。及一切手足卒作疼痛。

藥品 生全蠍、二十個。生黑豆、二十粒。生地龍(去土)、五錢。大八角川烏頭、三枚(去皮尖生用)。

制法及用法 共研細末。入麝香一字。同研。煮糯米糊爲丸。如綠豆大。每服七丸。甚者十丸。夜臥令膈空。溫酒送下。微出冷汗一身。便瘥。

【驅風膏】

發明 見王好古醫壘元戎。

功用 治風癱、瘰癧、遍身疥癬。

藥品 白花蛇肉(酒炙)、四

兩。天麻、七錢五分。薄荷、荆芥、各二錢五分。

制法及用法 研爲末。入好酒二升。白蜜四兩。石器內熬成膏。每服一盞。溫湯調下。一日三次。急於暖處出汗。十日即愈。

怔忡類

十一筆

【硃砂安神丸】

發明 見李東垣方。

功用 治心痞怔忡。心中痞悶。

藥品 硃砂、四錢。黃連、生地黃、各五錢。生甘草、二錢五分。蘭香葉、二錢(燒灰)。飼青、輕粉、各五分。

制法及用法 研爲末。乾敷之。

【逍遙散】

發明 見劉元賓神巧萬全方。

功用 治血風勞解。五心煩躁。心中怔忡。恍惚憂懼。頭目昏重。夜多盜汗。

藥品 人參、白茯苓(去皮)、柴胡(去苗)、白朮(炒)、黃耆、各等分。

制法及用法 爲散。每服三

錢。甘草一寸。煎至六分。溫服。

十六筆

【龍齒丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心血虛寒。怔忡不已。痰多恍惚。

藥品 龍齒、遠志(去心、甘草水煮)、酸棗仁(炒、去殼研)、官桂(去皮、不見火)、當歸(去蘆、酒浸)、琥珀、附子(炮、去皮臍、切作片、薑汁浸一宿)、天南星(剉碎、薑汁浸一宿)、各一兩。木香(不見火)、紫石英(煨醋淬)、沈香(另研、不見火)、熟地黃(溫蒸焙)、各五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服五十丸。不拘時棗湯送下。

【龍齒丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治因驚神志恍惚。久而成癰。時發時止。

藥品 龍齒(研)、白僵蠶(炒)、白花蛇肉(酒浸)、硃砂(水飛)、鐵粉(研)、石菖蒲、遠志(去心)、木香、檳榔(去白)、麻黃(去節)、天麻、天南星(薑製)、人參(去蘆)、各五錢。紫蘇子、一兩。龍腦(研)、五分。

全蠍(炒)、二錢五分。當門子、一錢(另研)。

制法及用法 研爲細末。次入研藥。和勻。煉蜜爲丸。每一兩作十五丸。每服一丸。空腹時薄荷湯送下。

癰厥類

六筆

【安宮牛黃丸】

發明 見吳鞠通溫病條辨。

功用 化痰。利竅。保腎。安心。治溫暑時邪。挾痰濁內閉。口噤神昏。飛尸卒厥。五癰中惡。及癰絕之因於熱者。

藥品 牛黃、麝香、犀角、黃芩、黃連、梔子、雄黃、硃砂、各一兩。梅片、麝香、各二錢五分。真珠、五錢。

制法及用法 研爲極細末。煉蜜和丸。每丸一錢。金箔爲衣。以蠟護之。每服一丸。脈虛者。人參湯送下。脈實者。銀花薄荷湯送下。重病體實者。日再服。甚至日三服。小兒服半丸。不效。再服半丸。

參考 此方藥味與萬氏牛黃清心丸。大致相同。略增幾味。而效力較強。具有強心開竅作用。

七 筆

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠中風卒倒。心神悶亂。口噤肢強。

藥品 防風(去蘆)、葛根、桑寄生、各一兩。羚羊角屑、細辛(去苗)、當歸(去蘆)、甘菊花、漢防己(去皮)、秦艽(去蘆)、桂心、茯神(去木)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服八錢。清水一中盞半。加生薑五片。煎至一大盞。去滓。加竹瀝五勺。攪勻。不拘時溫服。

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治陽痿。壯熱不解。筋脈拘急。牙關緊痛。

藥品 防風(去蘆)、木通、麥門冬(去心)、川升麻、虎杖、葛根、各一兩。甘草(炙)、七錢五分。石膏、二兩。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一大盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。

十一筆

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人中風。角弓反張。筋脈拘急。言語蹇澀。心神煩悶。

藥品 羚羊角屑、鹿角膠(搗碎、炒令黃燥)、赤箭、酸漿仁(炒)、薏苡仁、各一兩。白附子(炮)、芍藥、當歸(炒、去蘆)、人參(去蘆)、各七錢五分。羌活(去蘆)、白鮮皮、地骨皮、柏子仁、蔓荊子、犀角屑、各五錢。牛黃(另研)、麝香(另研)、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。入研藥令勻。每服一錢。不拘時。薄荷煎湯調下。一日三次。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傷寒陽痿。

藥品 羚羊角屑、犀角屑、防風(去蘆)、茯神(去木)、柴胡(去蘆)、麥門冬(去心)、人參(去蘆)、葛根、枳殼(去瓤、麸炒)、甘草(炙)、各二錢五分。石膏、龍齒(另研)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一中盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。

【麥門冬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傷寒陽痿。

藥品 麥門冬(去心)、地骨皮、麻黃(去節)、赤茯苓(去

皮)、知母、黃芩、赤芍藥、白鮮皮、杏仁(麩炒、去皮尖)、甘草(炙)、犀角屑、各七錢五分。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一大盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。

十二筆

【菖蒲丸】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒心氣不足。不能言語。

藥品 石菖蒲、三錢。人參(切去蘆焙)、五錢。丹參、二錢。天門冬(焙熟去心、切焙)、麥門冬(去心焙)、各一兩。赤石脂、三錢。一方有當歸、川芎、硃砂。一方無赤石脂。有赤茯苓、三錢。遠志肉、炙甘草、各一錢。

制法及用法 共研爲細末。煉蜜爲丸。如綠豆大。硃砂爲衣。每服五六丸至一二十丸。空腹時熱湯或燈心湯送下。一日三四次。久服取效。若病後將瘧不語者。宜兼服錢氏地黃丸。

【菖蒲丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治驚風恍惚寐不安。

藥品 石菖蒲、遠志(去心)、鐵粉(另研)、硃砂(水飛)、各一

兩。金箔、五十片。羚羊角屑、七錢五分。防風(去蘆)、七錢。白茯苓(去皮)、人參(去蘆)、各一兩五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。不拘時粥湯送下。

【硫黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治尸厥。

藥品 硫黃、一兩。硃砂、五錢。

制法及用法 研細末。分作三服。好酒調勻灌下(或用酒一盞同煎、覺欲起、便蓋著去火、候溫灌服)。如人行五里許。又進一服。不過三服即甦。

十四筆

【蒲黃酒】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治暴厥。

藥品 蒲黃、一兩(炒褐色)。

制法及用法 清酒十杯。沃之溫服。

十五筆

【熱地黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後腸中。頭暈神昏。四肢煩亂。不知人事。

藥品 熟乾地黃、伏龍肝、黃耆、赤石脂、各一兩。阿膠、甘草、白朮、芡實(炒)、川芎、人參、各五錢。當歸、七錢五分。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一盞半。加生薑三片。煎至七分。去滓溫服。

黃疸類

十一筆

【犀角飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒黃疸。

藥品 犀角(鎊)、一兩。茵陳、乾葛、升麻、龍膽草、生地黃、各五錢。寒水石、七錢五分。

制法及用法 剉散。清水煎服。

十二筆

【棗礬丸】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治食勞黃。

藥品 皂礬、不拘多少(置砂鍋中、木炭燒、炒通赤、米泔點之、一作白礬)。

制法及用法 研末。棗肉爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。食後薑湯送下。

【棗礬丸】

發明 見必用方。

功用 治食勞黃。

藥品 棗肉、二兩。皂礬、五兩(煨)。蒸粉、三兩。

制法及用法 研末。生薑汁爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。食前來飲送下。一日二次。

【棗礬丸】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治食勞黃。

藥品 平胃散加皂礬(麴裏煨紅)。

制法及用法 研末。紅棗肉爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。熟湯送下。

參考 此爲消磨宿滯之第一峻利方。較平胃之峻急百倍。於膏粱及體虛者。慎勿妄用。服後以穀壓之。否則恐其嘔吐也。

【黃連散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治黃疸。二便祕澀熱。

藥品 黃連、大黃(醋拌炒)、各二兩。黃芩、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 研爲極細末。每服二錢。食後熱酒調下。每日三次。先用瓜蒂散噀鼻。取

下黃水。再服此藥。

十三筆

【滑石散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治女勞疸。

藥品 滑石、一兩五錢。枯白礬、一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前大麥粥清調下。以小便出黃水爲度。

參考 此即硝石方。硝與滑字形相近。未知孰是。姑兩存之。

痰飲類

十一筆

【連翹散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痰飲。

藥品 連翹、葛根、赤芍藥、黃芩、梔子、桔梗、升麻、麥門冬、甘草、木通、牛蒡子。

制法及用法 清水煎服。

十四筆

【礞砂丸】

發明 見鮑相璣驗方。

功用 治腹內積聚痰飲。心

中時時引痛。

藥品 礞砂、青皮、三棱、巴豆(去油)、木香、白芷、乾薑、白川、各一錢五分。乾漆、大黃、各一兩。檳榔、肉果、各六分。

制法及用法 共研末。用米醋二斤。入巴豆四五粒。再下三棱、大黃同煎。再入礞砂。熬成膏。和藥末爲丸。如梧桐子大。每服四五錢。淡鹽湯送下。

【壽星丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痰飲被驚。

藥品 天南星、一斤(先掘土坑一尺、以炭火三十斤燒赤、入酒五升滲乾、乃安南星在內、盆覆定、以灰塞之、勿令走氣、次日取出、研爲末)。礞砂、二兩。琥珀、一兩。

制法及用法 共爲末。薑汁糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。至五十丸。人參、菖蒲煎湯送下。一日三次。

喘哮類

七筆

【阜莢丸】

發明 見沈氏尊生書。

功用 治久哮。

藥品 皂莢(去皮子弦、蜜丸)、紫菀、甘草(炙)、桑白皮、石菖蒲、半夏、各二錢。明礬、杏仁、白朮頭末、各一錢。膽星一錢五分。百部、一兩二錢。

制法及用法 煎膏爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。熱湯送下。

十一筆

【紫金丹】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治多年喘急哮喘。夕不得臥。

藥品 砒(水飛)、五分。淡豆豉、二錢。好者用水略潤少時。以紙搥乾。研膏。

制法及用法 以豉膏和砒。同杵極勻。如麻子大。每服五丸至十丸。量大小加減。臨臥時用臘茶清極冷送下。以愈爲度。

十二筆

【黃連膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治喘難坐臥。

藥品 川黃連、四兩。

制法及用法 入金、銀、各一錠。清水九碗。煎取二碗。

再用清水六碗。煎取一碗。再用清水二碗。煎取半碗。共成膏。加入乳汁、童便、各一碗。薑、韭、拍田螺汁、各一碗。薄蜜、收貯瓷器中。熱湯漸漸沖服。

十三筆

【葶蘆丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治喘嗽。

藥品 葶蘆(炒)、杏仁(煨)、防己(酒炒)、萊菔子(炒)、白牽牛(炒)、茯苓。

制法及用法 研爲細末。滴水泛丸。如梧桐子大。每服三五十丸。食後熱湯送下。

十四筆

【奪魂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 產後虛腫喘促。

藥品 生薑(取汁)、白麵、各三兩。大半夏、七枚。

制法及用法 生薑汁搜麵。裹半夏爲七餅子。煨焦熟。研爲末。清水一盞調下。小便利爲效。

十六筆

【噲化丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 止嗽定喘。

藥品 香附(童便浸)、北杏仁(童便浸、去皮尖炒)、梔子(炒)、青黛、海粉、瓜蒌仁、訶子肉、馬兜鈴。

制法及用法 研爲細末。加白礪砂少許。煉蜜少加薑汁爲丸。如芡實大。每噙化一丸。煎湯送下。

【噙化丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 清肺。止嗽。化痰。定喘。

藥品 薄荷葉、二兩。桔梗、鼠黏子(炒)、瓜蒌皮麴、各一兩。訶子肉、甘草、白煎蠶(炒)、各七錢。風化硝、五錢。

制法及用法 共研極細末。煉蜜爲丸。如芡實大。每服一丸。噙化嚥津。小兒不能噙。則調化。頻抹其口中。

咳 嗽 類

二 筆

【二母丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治陰虛咳嗽。

藥品 知母、貝母、各等分。

制法及用法 蜜丸服。

參考 原名二母散。亦可製爲丸服。或加淡薑汁少許亦可。但不宜多。咳血者尤忌。

四 筆

【天麻丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治乳嗽。

藥品 天麻、蟬蛻、殭蠶、人參、各一錢。川芎、一錢五分。甘草、二錢。礪砂、五分。辰砂、天竺黃、膽星、各二錢。白附子、坯、雄黃、各一錢。金箔、五片。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如芡實大。金箔爲衣。每服一丸。薄荷湯化下。

八 筆

【枇杷葉膏】

功用 止咳。潤肺。治肺熱久嗽。頓嗽。

藥品 鮮枇杷葉(刷去毛)、不拘多少。

制法及用法 清水煎濃汁。去渣濾清。加冰糖、收成膏。

參考 一方用枇杷葉五六十片(新鮮者更佳、洗淨毛)。大梨、二個(深膺者佳、去皮心、切小片用)。白蠟半鍾(先熬滴水成珠、大便乾燥者多加、大便溏瀉者不用、以白糖代之)。大

棗、八兩(或黑棗、酸棗皆可)。建蓮肉、四兩(不去皮)。先將枇杷葉放鍋內。以河水煎出濃湯。用細絹漚清汁。去葉與渣不用。後將梨、棗、蓮、蜜、和入煎熟。以蓮肉融爛爲止。用瓷瓶收貯。隨意溫熱食之。治勞傷虛損。吐血咳嗽。發熱肢軟。體倦身疼。飲食不進等症。輕者二三料。重四五料即愈。痰多加川貝一兩。研極細末。俟煮熟時。入內煮一二滾取起。吐血用藕節二十一個。搗汁同煮。冬月多製。久收不壞。夏月隨食隨製。按此方甚善。名枇杷膏。出發方。今市上所售枇杷膏。多用枇杷葉製。須知枇杷葉汁多涎。反能助溼生痰。此宜改善者也。

【枇杷葉露】

功用 其性苦平無毒(或作甘微辛冷)。功能清肺。和胃。下氣降火。消痰止嗽。治肺有伏熱。久嗽不止。嘔逆口渴。

十一筆

【陳橘皮散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒咳嗽。胸中滿悶。不欲乳食。

藥品 陳橘皮(湯浸、去白、焙)、桔梗、人參(均去蘆)、杏仁

(湯浸、去皮尖、麩炒微黃)、雞蘇、各一分。貝母(煨微黃)、五錢。

制法及用法 搗羅爲粗散。每服一錢。清水一小盞。加燈心十莖。煎至五分。去滓溫服。每日三四次。量兒大小以意加減。

【陳橘皮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒咳嗽。咽中作呀呷聲。

藥品 陳橘皮(湯浸、去白、焙)、桑根白皮(剉)、杏仁(湯浸、去皮尖、麩炒黃)、甘草(炙微赤剉)、甜葶藶(隔紙炒令紫色)、各一分。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。溫服。量兒大小加減。

【紫金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痰嗽日夜不得臥。

藥品 天南星(去皮臍)、白礬、甘草、各五錢。烏梅肉、二兩。

制法及用法 研爲粗末。於銀石器內慢火炒令紫色。放冷研細。每服二錢。臨臥時身體都入衾中。用葶藶汁七分。溫湯三分。稍熱調下。服後即仰

臥低枕。想藥入肺中。須與得
嚥。其嗽立止。

十二筆

【猴棗散】

發明 通行方。

功用 治急慢性枝氣管炎。
目的在消痰制喘。

藥品 猴棗、三分。川貝母、
二錢。天竺黃、一錢五分。沈
香、二錢。仙半夏、二錢。硃
砂(飛)、三分。

制法及用法 各取淨粉。和
勻研極細末。瓶裝固封。每次
一分。開水送下。

【異功散】

發明 見錢氏方。

功用 溫中。和氣。治久欬
不已。面腫氣逆。脾胃虛弱。
飲食少思。

藥品 人參、白茯苓、白朮、
甘草、陳皮、各等分。一方加木
香。

制法及用法 每服三四錢。
加生薑、大棗。清水煎服。

參考 此爲四君子湯、補脾
湯加減法也。凡小兒虛冷病。
先與數服。以正其氣。

【蛤蚧丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治肺間邪氣。胸中積
血。作痛失音。及久欬失音。

藥品 蛤蚧、一對(去嘴足、
溫水浸、去膜、刮去血脈、用好
米醋炙、一作酥炙)。生地黄、
阿膠(炒)、訶子(煨去核)、麥門
冬(去心)、北細辛(去苗)、甘草
(炙)、各五錢。

制法及用法 研爲末。煉蜜
和丸。如棗子大。每服一丸。
食後含化。

【蛤蚧丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人欬嗽不止。漸
成勞瘵。

藥品 蛤蚧、一對(酥炙)。紫
菀、款冬花、鼈甲(炙)、貝母(去
心)、皂角子(炒)、各一兩。杏
仁(炒去皮尖)、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。煉
蜜和丸。如梧桐子大。每服二
十丸。淡薑湯送下。

【黃芩散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒嗽。

藥品 黃芩、不拘多少(童便
浸三日、取出、剉碎、焙乾)。

制法及用法 研爲細末。每
服一字或五分。乳食後熱湯調
下。

【訶黎勒丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生
書。

功用 治勞嗽。

藥品 訶子皮、五錢。海粉、青黛、香附(童便製)、杏仁、貝母、瓜蒌仁、各二錢五分。

制法及用法 共研細末。薑汁和蜜爲丸。如櫻桃大。每服一丸。日含化下。

十三筆

【葶藶丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺氣欬嗽。面目浮腫。喘促不安。小便赤色及水蠱。

藥品 甜葶藶(隔紙炒)、川貝母(煨黃色)、木通、各一兩。杏仁(去皮尖雙仁炒)、防己、各二兩。

制法及用法 研爲細末。棗肉和丸。如梧桐子大。每服五十丸。食前桑白皮煎湯送下。

【葶藶丸】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒乳食衝脾。傷風欬嗽。面赤痰盛。身熱喘促。

藥品 甜葶藶(去土、隔紙微炒)、黑牽牛(微炒)、杏仁(去皮尖、炒、另研如膏)、漢防己、各一兩。

制法及用法 研爲細末。入杏膏拌勻。蒸陳棗肉和。再搗爲丸。如麻子大。每服五丸至七丸。乳食後或臨夜淡生薑湯

送下。量兒大小加減。

【葶藶散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治欬嗽。面目浮腫。不得安臥。涕唾稠黏。

藥品 甜葶藶(隔紙炒)、郁李仁(泡去皮炒)、桑白皮、各一兩。紫菀(去苗土)、旋覆花、檳榔、木通、各五錢(一作各八錢)。大腹皮、七錢五分。一方無紫菀。

制法及用法 爲散。每服三錢。清水一中盞。加生薑五片。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【葶藶散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺癰。咳嗽。氣急。睡臥不安。心胸脹滿。

藥品 甜葶藶子、二兩五錢(隔紙炒赤色)。百合(炒)、白附子、北五味子(炒)、甘草節、羅參、款冬花、百藥煎、紫菀(去木)、各一兩。人硃砂、五錢(另研)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。燈心湯調下。

【滋陰清化丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治火嗽。

藥品 生地黃(酒浸)、熟地

黃(酒浸)、天門冬、麥門冬、各二兩。黃蘗(鹽酒炒)、一兩五錢。白芍藥(酒製)、茯苓、山藥、枸杞子、玄參、薏苡仁、各一兩。五味子、七錢。甘草、五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。空腹時口含化。如痰嗽太甚。加陳皮、貝母、各一兩。

【滋陰清化丸】

發明 見沈金鰲 沈氏尊生書。

功用 治相火生痰。及內傷欬。

藥品 天門冬、麥門冬、生地黃、熟地黃、知母、貝母、茯苓、山藥、天花粉、五味子、甘草。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。口含化下。

【補肺散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治久患咳嗽。肺虛氣促。有痰惡心。

藥品 阿膠、一兩五錢(剉炒)。白茯苓、馬兜鈴(去老梗)、糯米、各五錢。甘草、四錢(炙)。杏仁、二十一粒(湯泡去皮尖)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一盞。煎至七分。不拘時溫服。

【雌黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治暴嗽。久嗽。勞嗽。

藥品 金粟花、加葉子雌黃、一兩。

制法及用法 研爲細末。用紙筋泥固濟小盒子一箇。令乾。勿令泥厚。將藥入盒子內。水調赤石脂封口。更以泥封之。候乾。坐盒子於地上。上面以未入簪瓦坯子。擁盒子作一尖。上用炭十斤圍定。頂上著火。一熨斗籠起令火從上漸熾。候火銷三分去一。看瓦坯通紅。則去火候冷。開盒子取藥。當如鑄面光明紅色。入乳鉢內細研。湯浸蒸餅和丸。如粟米大。每服三五丸。食後甘草湯送下。服後即睡。久久有效。

十四筆

【寧嗽丸】

發明 驗方。

功用 治嗽。

藥品 桔梗、川石斛、半夏(製)、川貝母、蘇子、茯苓、各二兩。薄荷、杏仁(一作天花粉)、桑白皮、各一兩五錢。橘紅、穀芽(炒)、各一兩。生甘草、五錢。

制法及用法 共研細末。水泛丸。如梧桐子大。每服三四錢。熟湯或淡薑湯送下。

十五筆

【潤肺百花膏】

發明 迺行方。**功用** 治肺弱咳嗽。痰中帶血。**藥品** 杏仁、二兩。決韋、四兩。阿膠、五錢。百合、四兩。款冬花、一兩。天門冬、二兩。麥冬、二兩。川貝、二錢。**制法及用法** 煎三次。去渣濾清。取濃汁。加白蜜二斤八兩收成膏。每次五錢。一日二次。開水沖服。**參考** 方中既有二冬之潤。阿膠粘膩。何能化痰。陳言未可盡信。且有礙消化。又能增高血壓。種種不宜。應予減去。不如加元參。有滋陰強壯之功。而不嫌其如阿膠之滯。沙參有皂素的一般藥理作用。可以豁痰。治慢性衰弱性氣管支炎甚宜。更加桑白皮祛痰。合枇杷葉清降火逆。如帶血。再加白芨或仙鶴草。其方更善。

十六筆

【噙化丸】

發明 見王肯堂證治準繩。**功用** 清肺。止嗽。化痰。定喘。**藥品** 薄荷葉、四兩。桑白

皮、天門冬(去心)、麥門冬(去心)、知母(去皮毛)、百部、貝母(去心)、柿霜、各二兩。枇杷葉(去毛蜜炙)、訶子肉、阿膠、橘紅、紫菀、款冬花、各一兩五錢。瓜蒌仁(去油)、瓜蒌皮蘗、杏仁(炒、去皮尖油、取淨霜)、黃芩、白茯苓、玄明粉、鉛白霜、桔梗、各一兩。旋覆花、馬兜鈴、五味子、各七錢五分。硼砂、五分。冰片、一錢。

制法及用法 共研極細末。梨膏爲丸(如無梨膏、則以白蜜、竹瀝、梨汁、熬至滴水不散爲度)。如龍眼火。每服一丸。噙化嚥下。

【噙化丸】

發明 見沈氏尊生書。**功用** 治久嗽。**藥品** 熟地黃、阿膠、五味子、貝母、款冬花、杏仁、人參、甘草(炙)。**制法及用法** 共研細末。煉蜜爲丸。如茱萸火。每服一丸。噙化嚥津。

【獨聖散】

發明 見鮑相璣驗方新編。**功用** 治多年咳嗽。肺痿咯血。**藥品** 白芨、三兩。**制法及用法** 研爲末。每服二錢。臨臥時糯米湯調下。

十七筆

【葶桂丸】

發明 見張潔古方。

功用 治寒痰欬嗽。

藥品 製半夏(洗)、官桂(去粗皮)、南星(洗)、各一兩。

制法及用法 共研細末。蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。食後生薑湯送下。如痰而能食。以大承氣湯微下之。痰而不能食。以厚朴湯主之。

【黛蛤散】

發明 通行方。

功用 治內熱乾咳。或痰粘不爽。及痰內挾血等症。

藥品 蛤殼(煅)、六兩。青黛、六錢。

制法及用法 分別研細粉。充分和勻。每次三錢至五錢。包煎服湯。亦可外用。

十八筆

【蟬殼散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒心胸痰壅。欬嗽不利。常作呀唧聲。

藥品 蟬殼(微炒)、半夏(湯洗七遍、去滑)、漢防己、甘草(炙微赤、剉)、各一分。桔梗(去蘆)、陳橘皮(湯浸、去白焙)、各五錢。

制法及用法 搗細羅爲散。

每服一字。三歲兒以上加至五分。生薑粥飲調下。

十九筆

【瓊玉膏】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治虛勞乾欬。喉中血腥。腸中隱痛。

藥品 鮮地黃、二斤八兩。人參、白茯苓(均另爲末)、各十兩。沉香、琥珀(均另研)、各五錢。

制法及用法 先以地黃熬膏。點紙上不滲。入人參、茯苓末。並入糖品一斤四兩。攪勻溶化。離火。再入琥珀、沉香、和勻。瓷罐收藏。清晨每服數匙。午前溫酒或沸湯和服。

除痰類

二筆

【人參丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治風旋目眩。痰逆惡心。胸膈痞滯。咳嗽痰涎。喘滿嘔逆。不欲飲食。

藥品 人參、白朮、旋覆花(炒)、炙甘草、各一兩。緩門冬

(去心焙)、枳殼(鉄炒)、前胡、各二兩。木香、五錢。

制法及用法 研爲細末。湯浸蒸餅和丸。如梧桐子大。每服五十丸。食後溫生薑湯送下。

【人參半夏丸】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 化痰。墜涎。止嗽。定喘。調和臟腑。治風痰。食痰。酒病。一切痰逆嘔吐。痰厥頭痛。或風氣偏正頭痛。風壅頭目昏。耳鳴。鼻塞。咽乾。胸膈不利。

藥品 人參、五錢。半夏、一兩。茯苓(去皮)、天南星、薄荷、各五錢。寒水石、白礬、豈屑、各一兩。蛤粉、二兩。藿香、二錢五分。一方加黃連、五錢、黃蘗、二兩。

制法及用法 研爲末。水煮麵糊和藥。如梧桐子大。每服三十丸。食後薑湯或熱湯送下。每日三次。

【二冬膏】

發明 見張氏醫通方。

功用 治肺胃燥熱。痰涎欬嗽。

藥品 天門冬(去心)、麥門冬(去心)、各等分。

制法及用法 熬膏。煉白蜜收。不時嚙熱嚙之。

參考 二冬皆稟少陰水精之

氣。麥冬稟水精而上通於陽明。天冬稟水精而上通於太陽。夫冬主閉藏。門主開轉。故名門冬者。俱能開轉閉藏而上達。合二冬製熬成膏。消痰潤肺。生脈清心。久服則腎固氣平。體健身輕。不老不飢。爲益非淺。

【二陳丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治一切痰飲爲病。咳嗽脹滿。嘔吐惡心。頭眩心悸。或中脘不快。或食生冷。飲酒過度。脾胃不和。

藥品 半夏(薑製)、二兩。甘草(炙)、五錢。廣皮、茯苓、各一兩。

制法及用法 研爲細末。薑汁泛丸。每服三錢。熱湯送下。

【八珍丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治肺痰結實。滿悶喘逆。

藥品 丹砂(另研)、五錢。犀角(鎊)、羚羊角(鎊)、茯神(去木)、牛黃(另研)、龍腦(另研)、各二錢五分。天南星(牛膽汁製)、硼砂(另研)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如芡實大。每服一丸。食後細嚼。人參荊芥散煎湯送下。

三 筆

【三仙丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治溼痰。

藥品 半夏、天南星、各一斤（於春末或夏初研爲末、薑汁調作餅、放篩中、艾葉發黃色、造成麴）。

制法及用法 每麴四兩。入香附細末二兩。薑汁煮糊和丸。每服五十丸。生薑湯送下。

【三聖散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治溼痰壅塞。

藥品 瓜蒂（揀淨、炒微黃）、防風（去蘆）、各三兩。藜蘆、一兩（一作五錢、一作三錢）。

制法及用法 研爲粗末。每服五錢（一作四五分）。以薑汁三茶盞。先用二盞。煎三五沸。去薑汁。次入清水一盞。煎至三沸。却將先二盞同一處熬二沸。去滓澄清。放溫徐徐服。以吐爲度。不必盡劑。

【三子養親丸】

發明 見韓忍方。

功用 治老人氣實痰盛。喘滿懶食。

藥品 紫蘇子（沉水者）、白芥子、萊菔子、等分。或看病所

主爲君。各微炒研爲丸服。

參考 此治痰而兼降氣者。氣實者宜之。若氣虛者。非所宜也。

【川芎丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治腦上痰。

藥品 川芎、一兩（紙剉、慢火熬熟）。川大黃、二兩（蒸令乾）。

制法及用法 焙乾。研爲末。用不蛀阜角五七挺。溫水揉汁。絹濾去渣。瓦罐中熬成膏。和藥末爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。小兒三丸。薑湯送下。

【小胃丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治老痰。頑痰。壅塞胸膈。喘急氣粗。大便閉結。

藥品 芫花（醋拌、過一宿、瓦器內攪炒黑、勿焦）、甘遂（溼麵裹、長流水浸半月、煮曬乾）、大戟（長流水煮一時、再用水洗、曬乾）、各五錢。大黃（溼紙裹煨、勿焦、切焙乾、再以酒潤炒熟焙乾）、一兩五錢。黃蘗（炒）、三兩。一方加木香、檳榔、各五錢。

制法及用法 研爲末。白朮煎膏和丸。如蘿蔔子大。每服一錢（一作五六分）。臨臥津液

吞下。或熱湯送下。取膈上滯痰熱積。以消消息之。欲利。空腹服之。

參考 此方藥力甚猛。壯實人痰飲最宜。老年及虛弱者均忌之。

四 筆

【天仙藤散】

發明 見沈金鰲 沈氏 尊生 書。

功用 治痰注。

藥品 天仙藤、白芷梢、白朮、羌活、各三錢。片薑黃、六錢。半夏、五錢。

制法及用法 每末五錢。加生薑五片。清水煮服。

【天門冬丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺藏壅熱。咳嗽痰壅稠結。

藥品 天門冬(去心、焙)、一兩五錢。百合、前胡、川貝母(煨)、半夏(湯洗去滑)、桔梗、桑白皮、防己、紫菀、赤茯苓、生乾地黃、杏仁(湯浸、去皮尖雙仁、麩炒黃、研如膏)、各七錢五分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。不拘時生薑湯送下。每日三次。

【天南星丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風虛痰。頭目旋暈。肢節拘急。

藥品 天南星(泡)、附子(炮去皮臍)、白附子(炮)、華陰細辛、旋覆花、半夏(湯泡)、芍藥、各五錢。天麻、一兩。

制法及用法 共研細末。麪糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。漸加至五十丸。不拘時荆芥、薄荷、煎湯送下。

【化痰丸】

發明 見沙區穆蘇瑞竹堂經驗方。

功用 治酒痰。

藥品 半夏、南星、生薑、白礬、皂角、各四兩。同入砂鍋內。清水先煮。以南星無白點爲度。去皂角不用。再入後藥。青皮、陳皮、葛根、蘇子、神麴、麥芽、山楂肉、萊菔子、香附、杏仁、各一兩。

制法及用法 生薑汁煮米糊和丸。每服五七十丸。食後臨臥時茶清或溫酒送下。

【化痰丸】

發明 見節齋方。

功用 治痰鬱。

藥品 天門冬、黃芩、橘紅、海蛤粉、瓜蒌仁、各一兩。芒硝、香附(鹽水炒)、桔梗、連翹、

各五錢。青黛、二錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜入薑汁少許和丸。如芡子大。每服一丸。紙嚼開水送下。

【巴豆丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治中風痰塞垂死者。

藥品 巴豆、二枚(去皮膜)。白礬(如拇指大)、一塊。

制法及用法 共研爲細末。瓦上煨。令豆焦赤爲度。煉蜜和丸。如芡實大。每用一丸。綿裹放口喉中近處。良久吐痰立愈。

五 筆

【半貝丸】

發明 見格言聯璧方。

功用 治風痰暑溼瘧疾。咳嗽多痰。飲食無味。兼治癰瘤瘰癧等症。

藥品 生半夏(漂)、四兩。川貝母、六兩。

制法及用法 共研爲細末。於端陽日合生半夏(一作生薑)、打汁爲丸。每服一錢或三錢。薑湯送下。

【半夏丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺氣不調。欬嗽喘滿。痰涎壅塞。心下堅滿。及

風痰嘔吐惡心。涕唾稠黏。

藥品 半夏、三兩(湯泡七次、生薑汁製一宿)。白礬、一兩五錢(焙)。

制法及用法 研爲末。生薑自然汁和丸。如赤豆大。每服十丸。薑湯送下。

【半夏丸】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治傷風痰作。喘逆惡心。

藥品 半夏、一兩。檳榔、雄黃、各三錢。

制法及用法 研爲細末。生薑汁浸蒸餅和丸。如梧桐子大。小兒服者如米大。每服三五丸。薑湯送下。

【半夏麴】

發明 見韓飛霞方。

功用 因製法而異。詳下製法。

制法及用法 ①半夏、薑汁浸透。名生薑麴。治淺近諸痰。②半夏礬水浸透。兼生薑和造。名礬麴。最能却水。治清水痰。③煮皂角汁煉成膏、和半夏末爲麴。或加南星。或加麝香。名皂角麴。治風痰。舒經絡。④以半夏入白芥子。三分之一。竹瀝和成。略加麴糊。名竹瀝麴。治皮裏膜外結核隱顯之

痰。③麻油浸半夏三五日。炒乾爲末。麪糊造成。油以潤燥。名麻油麪。治虛熱勞欬之痰。④用臘月黃牛膽汁、略加熱蜜和造。名牛膽麪。治癰疽風痰。⑤以半夏末合香附、蒼朮、川芎、等分。熬成膏。作麪。名開鬱麪。治鬱痰。⑥用芒硝居半夏三分之一。煖透爲末。煎大黃膏和成。名硝黃麪。治中風卒厥傷寒宜下由於痰者。⑦用海粉、雄黃、居半夏之半爲末。煉蜜和造。名海粉麪。治積痰沉痼。⑧用黃牛肉煎汁煉膏（即霞天膏）。和半夏末爲麪。名霞天麪。治沉痼痼痰。以上並照造麪法。草食七日。待生黃衣。懸掛風處。愈久愈佳。仙半夏製者尤佳。

【仙半夏】

制法及用法 揀半夏根大者一斤。石灰一斤。入滾水內攪涼。澄清去渣。將半夏根投水中。攪之。日曬夜露七日。撈出控乾。用井華水洗淨。如是三四次。泡三日。日換水三次。撈出控乾。用白礬、八兩。支硝、一斤。共入滾水攪涼溫。將半夏根投入。浸七日。日曬夜露。取出。清水洗三四次。泡三日。日換水三次。取出控乾。以甘草、南薄荷、共四兩。丁香、五錢。

白豆蔻、三錢。沉香、一錢。枳實、木香、川芎、肉桂、各三錢。陳皮、枳殼、五味子、青皮、砂仁、各五錢。切片。滾水晾溫。將半夏根同前各藥投入。泡二七日。日曬夜露。攪之。將各藥取出。同半夏根用白布包住。放熱坑上。以器皿扣住。三炷香時。去他藥。但取半夏根。曝乾收用。相傳此法爲仙人所傳。故名。

參考 此物研入痰中。立化痰爲水。故治痰如神。凡壯人痰火有餘之證。服之極效。體質虛者忌之。造麪用尤佳。

【白朮丸】

發明 見張潔古方。

功用 治溼痰咳嗽。

藥品 白朮、一兩五錢。南星（湯洗）、半夏、各一兩（湯洗）。

制法及用法 研爲細末。湯浸蒸餅和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。食後生薑湯送下。

【白金丸】

功用 治癰疽痰疾之實者。

藥品 礬金、七兩。明礬、三兩。

制法及用法 共研細末。水泛爲丸。每服一二錢。熟湯或薑蒲湯送下。

【白殭蠶散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠。中風口噤。痰涎壅滯。四肢強直。

藥品 白殭蠶(炒)、天麻、獨活(去蘆)、各一兩。麻黃(去節)、一兩五錢。烏犀角屑、七錢五分。白附子(炮)、半夏(湯洗七次薑製)、天南星(炮)、藿香、各五錢。龍腦、二錢五分(另研)。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服一錢。不拘時生薑薄荷湯調下。每日三次。

【加味定志丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痰盛。

藥品 茯苓、人參、各一兩。遠志、石菖蒲、各二兩。琥珀、鬱金、各五錢。

制法及用法 研爲細末。水泛和丸。硃砂爲衣。熱湯送下。

【玉粉丸】

發明 見張潔古方。

功用 治氣痰咳嗽。

藥品 天南星(湯洗)、半夏(湯洗)、各一兩。橘皮(去白)、二兩。

制法及用法 共研細末。湯浸蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服五七十丸。食後人參生薑煎湯送下。

【生犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治咳嗽痰逆喘滿。心忪驚悸。除風熱。解時氣。

藥品 杏仁(去皮尖炒)、桔梗、各二錢。茯苓、甘草、人參、半夏、各一錢。五味子、前胡、各一錢五分。

制法及用法 剉散。加生薑、薄荷、清水煎服。有熱加羌活。或加麻黃、細辛。

六 筆

【百花膏】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 瀉熱。下氣。清血。除痰。潤肺。寧心。補中。益氣。治七情內傷。酒色無節。虛火妄動。午後虛潮。咳嗽喘急。口乾聲啞。痰中帶血。諸虛百損等證。

藥品 百合(蒸焙)、款冬花、各等分。一方加百部等分。烏梅減半。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸如龍眼大。每服一丸。食後細嚼。生薑湯或熟湯送下。嚙化尤佳。切忌房事及助火之物。

參考 此治痰而兼清熱者。加紫草、百部、烏梅。名加味百花膏。畏辛散。嗽血忌之。噙

化爲妙。近多製爲膏服之，亦有製爲丸。名百花丸者。

【竹瀝達痰丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痰火喘急。昏迷不省。厥逆驚悸等證。

藥品 半夏(薑製)、陳皮(去白)、白朮(微炒)、大黃(酒浸、蒸曬乾)、茯苓、黃芩(酒製)、各二兩。甘草(炙)、人參、各一兩五錢。青礞石(同礞石一兩、火煨金色)、一兩。沉香、五錢。

制法及用法 以竹瀝一大碗半。薑汁三匙。拌勻。盛瓷器內曬乾。研細。如此五六度。再以竹瀝薑汁和丸。如小豆大。每服一百丸。臨臥時米飲或熟湯送下。能通痰從大便出。不損元氣。適可而止。虛者不宜服。孕婦忌服。

七 筆

【杏仁霜】

功用 利胸膈。健脾胃。除肺火。壯聲音。欲利氣而無須滑泄者用之。即以杏仁去油研末也。

【含化丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治肝火頑痰。

藥品 大黃(酒蒸)、煨薑、青黛、腦星、各等分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如芡實大。每用一丸。食後含化。

【冷哮丸】

發明 見王維德外科證治全生集。

功用 治痰飲經寒即發。哮喘氣急。不能平臥。

藥品 江西白豆豉、一兩。白朮、一錢。

制法及用法 研爲末。飯三錢。研爛。入天爲丸。如茶蘗子大。每服三四丸或二三丸。冷茶送下。童子服可除根。

八 筆

【法製半夏】

發明 見御藥院方。

功用 消飲。化痰。壯脾。順氣。

制法及用法 ①大半夏湯洗泡七遍。以濃米泔浸一日夜。每半夏一兩。用白礬一兩五錢(研細)。溫水化浸半夏。上留水兩指許。頻攪。冬月於暖處頓放。浸五日夜。取出焙乾。用鉛白霜一錢。溫水化。又浸一日夜。還七日。盡取出。再用藥水慢火煮。勿令滾。候藥水極熱。取出焙乾。以瓷器收貯。

每服一二粒。食後細嚼。溫薑湯送下。②依前製成半夏。每一兩用礬水少許。漬半夏。細飛硃砂末。淹一宿。歛乾焙用。③依前法亦可。以生薑自然汁漬焙用。

參考 此物性質。介於薑半夏(以薑汁所製之半夏根也、有寒痰者宜之)與竹瀝半夏(半夏根之以竹瀝製者、痰之偏於黃稠者宜之)之間。痰之不寒不熱者宜之。

【法製陳皮】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 消食化氣。寬利胸膈。

藥品 陳皮、八兩(湯浸、去白淨、四兩)。茴香(炒)、甘草(炙)、各二兩。青鹽(炒)、一兩。乾生薑、烏梅肉、白檀香、各二錢五分。

制法及用法 將陳皮切成細條。餘均研爲末。每用藥末三兩。清水一碗。同陳皮慢火煮。俟陳皮極軟。控乾少時。用乾藥末拌勻焙乾。每服不拘多少。隨時細嚼。溫薑湯送下。

參考 驗方。用陳皮、一斤(清水泡七日、去淨白)。白礬、甘草、各六兩。同煮一日。去參草。留陳皮。加川貝母、一兩五錢(研細)。青鹽、三兩。拌勻。再用慢火煮一日夜。以乾

爲度。亦名法製陳皮。功能消痰。化氣。止嘔。生津。熱痰燥痰宜用此方。寒痰宜用前方。

【青金丸】

發明 見演山方。

功用 治小兒驚風。痰熱壅盛。

藥品 巴豆霜、七錢。青黛、二錢五分。南星、九錢(炮)。輕粉、一錢。滑石、全蠍(去毒炒)、各二錢。一方加白附子。

制法及用法 研爲末。稀糊和丸。如麻子大。一歲每服五丸。二歲七丸。大小加減。薄荷茶清送下。以通爲度。

【青金錠】

發明 見鮑相璠驗方新編。

功用 治中風風痰痰厥。牙關緊閉。乳蛾不能言。及小兒驚風痰迷。

藥品 玄胡索、二三錢。或一枚。或二枚。牙皂、十四條(去皮弦、火燬)。

制法及用法 共爲細末。加青黛六分。麝香一分(一作五釐)。再研。清水調成錠子。每重五分。陰乾。每用一錠。新汲井水磨化。以綿紙蘸藥入鼻內。或但將藥滴入鼻孔。即進喉內。痰即吐出。立刻得生。如病沈重者。研末吹之。

【青礞石丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治經絡有痰。胸膈痞痛。四肢不遂。

藥品 青礞石(燒燉)、黃芩(一作四錢)、各五錢。半夏、二兩(一作一兩)。風化硝、二錢(一作三錢)。白朮、一兩。陳皮(一作五錢)、茯苓(一作八錢)、各七錢五分。

制法及用法 共研細末。炒神麴蘆汁爲丸。每服二錢。空腹時淡薑湯送下。

【青礞石丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治經絡有痰。胸膈痞痛。四肢不隨。

藥品 青礞石(煨)、天南星、茯苓、各五錢。半夏、七錢五分。風化硝、二錢五分。

制法及用法 研爲末。神麴糊丸。熟湯送下。

【青鹽陳皮】

發明 即陳皮以青鹽及各藥製者。爲蘇州宋氏遺法。

功用 治痰。降氣。生津。開鬱。遲脾調胃。解毒安神。

藥品 陳皮。

制法及用法 取陳皮以河水浸一日。竹刀輕刮去浮白。貯竹篾內。沸湯淋三四次。用冷河水洗淨。至不苦爲度。曬至半乾。初次以甘草、烏梅肉、煎

濃汁拌曬。夜露。俟酥。捻碎如豆大。再用川貝母、青鹽。研爲細末。拌勻。曬露乾。收貯用。

參考 性質與陳皮同而較潤。

【青州白丸子】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治風痰壅盛。嘔吐涎沫。口眼喎斜。手足癱瘓。婦人血風。小兒驚風。痰盛泄瀉。

藥品 半夏、七兩(水浸洗、去皮)。天南星、三兩。白附子、二兩(一作三兩)。川烏頭、五錢(去皮臍)。

制法及用法 生研爲末。生絹袋盛之。於井水內攪出粉。以盡爲度。置瓷盆中。日曬夜露。至曉撇去舊水。另用井水攪之。再曬再換。於是春五日。夏三日。秋七日。冬十日。去水。曬乾研細。糯米粉煎粥清爲丸。如綠豆大。每服二十丸。薑湯送下。癱瘓溫酒送下。驚風每服三五丸。薄荷湯下。

【知母散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治久嗽不止。痰喘氣噎。

藥品 知母、貝母、柴胡、黃耆(炙)、紫菀(洗)、馬兜鈴、杏

仁(去皮尖)、半夏(白礬水煮乾爲度)、桑白皮(炙)、白礬、款冬花、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。清水七分盞。煎至三分。去渣。不拘時服。或生薑自然汁煮糊爲丸。每服五七丸。生薑湯送下。

【枇杷葉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痰逆。不思飲食。

藥品 枇杷葉(拭去毛、炙黃)、半夏(湯泡)、白茯苓(去皮)、前胡、人參、大腹皮、白朮、厚朴(去粗皮、薑汁炙)、各一兩。青皮(去白脩)、草豆蔻、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一中盞。加老生薑五釐。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【定喘丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治稠痰壅盛。體肥實而喘者。

藥品 廣橘紅、二兩(用明礬五錢、同炒香、去礬不用)。半夏、一兩五錢。杏仁(麩炒)、瓜蒌仁(去油)、各一兩。甘草(炙)、七錢。黃芩(酒拌曬乾)、五錢。皂角(去皮弦子、燒存性)、三錢。

制法及用法 研爲末。餅餅用淡薑打糊爲丸。如綠豆大。每服一錢。虛弱人每服七分。食後白湯送下。一日二次。三五日大便下稠痰而愈。

九 筆

【前胡散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治咳嗽涕唾稠黏。心胸不利。時有煩熱。

藥品 前胡、桑白皮、貝母(煨)、各一兩。麥門冬(去心)、一兩五錢。甘草(炙)、二錢五分。杏仁、五錢(湯浸去皮尖雙仁炒)。

制法及用法 爲散。每服四錢。清水一中盞。加生薑五釐。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

十 筆

【射干散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治小兒發熱咳嗽。心胸痰壅。咽喉如水雞聲。

藥品 射干、麻黃(去根節)、紫菀(洗去苗土)、甘草(炙微赤、一作一分)、生薑(一作一片)、各五錢。半夏、三錢(湯洗七次、去滑、一作一錢、一作五釐)。桂心、二錢(一作一錢、一

作五錢)。大棗(一作三枚)、十五枚。一方無大棗。

制法及用法 剉散。每服二錢。清水一盞半。煎至五分。加白蜜半茶匙。攪勻。不拘時溫服。量兒大小加減。服後熱除而喘咳不已。本方去射干、麻黃、大棗。加細辛、款冬、阿膠。

【茯苓丸】

發明 見王貺全生指迷書。

功用 治中脘留伏痰飲。脾氣虛弱。痰邪相搏。以致手臂牽掣。或戰掉不能舉物。筋脈攣急而痛。或四肢不能移轉。背上凜凜惡寒。脈沉細。及婦人產後發喘。四肢浮腫。

藥品 茯苓、一兩(一作二兩)。半夏、二兩(盪製、一作半夏麴)。枳殼(去瓤、麸炒)、五錢。風化朴硝、二錢五分(如一時未易成、但以朴硝撒在竹篾中、少時盛水、置當風處、即乾如芒硝、刮取用)。

制法及用法 共研細末。生薑汁煮麵糊爲丸(一作生薑汁調神麴糊丸)。如梧桐子大。每服三五十丸。空腹時淡薑湯送下。

參考 上焦氣不清肅。不能輸布津液。留於胸中。陽盛則煎灼成痰。陰盛則凝蓄爲飲。

故治痰者。以清火爲主。實者利之。虛者化之。治飲者以燥溼爲主。實者逐之。虛者溫之。陽氣不盛。痰飲兼作者。則此方最宜。方中茯苓參溼。半夏燥溼。風硝軟堅。枳殼利氣。別於二陳之甘緩。遠於大黃、礞石之峻悍。殆攻中之平劑也。

【海蛤丸】

發明 見朱丹溪方。

功用 治痰飲、心痛。

藥品 海蛤(燒灰、研極細、過數日、俟火毒散用之)、栝蒌仁(帶瓢同研)。

制法及用法 以海蛤入栝蒌內。乾溼得中。和爲丸。每服五十丸。熱湯送下。

【烏蛇散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痰盛。

藥品 烏蛇、六錢。麻黃、一兩。川烏、白附子、附子、川芎、乾薑、天麻、各五錢。蠍梢、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。溫酒調下。一日三次。

【祛痰丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝風頭旋。痰逆惡心。胸膈不利。

藥品 生南星、生半夏、赤茯苓(去皮)、陳皮(去白)、乾薑(炮)、各等分。

制法及用法 研爲細末。水煮麵糊和丸。如梧桐子大。每服五十丸。不拘時溫米飲送下。

【祛痰丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風痰喘嗽。

藥品 人參(去蘆)、陳皮(去白)、青皮(去白)、茯苓(去皮)、白朮(煨)、木香、天麻、各一兩。槐角子、半夏(湯泡七次)、各七錢五分。酥牙皂角(去皮弦子酥炙)、五錢。

制法及用法 研爲細末。生薑汁煮麵糊和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。食後溫酒或生薑湯送下。

【祛痰丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痰。

藥品 皂角(薑製)、半夏、各一兩。橘紅、桔梗、天麻、各五錢。大黃(酒浸、紙包煨、再浸煨三次)、二兩。片苓、七錢。薄荷、三錢。青礞石、白芷、甘草、各一錢。

制法及用法 共研細末。蒸餅和丸。臨臥時茶湯送下。

十一筆

【清心導痰丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治火盛痰結。

藥品 大黃(酒蒸)、黃芩、各四兩。青礞石(同礞石煨如金色)、犀角、皂角、硃砂、各五錢。沉香、二錢五分。麝香、五分。

制法及用法 共研細末。水泛丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服六七十丸。熱湯送下。

【清氣化痰丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治熱痰。

藥品 半夏、二兩。陳皮、赤茯苓、各一兩五錢。黃芩、連翹、梔子、桔梗、甘草、各一兩。薄荷、荆芥、各五錢。

制法及用法 共研細末。薑汁糊丸。如梧桐子大。每服五十丸。薑湯送下。

【清氣化痰丸】

發明 驗方。

功用 清肺。健脾。順氣。寬胸。消食。化痰。寧嗽。定喘。開胃。進食。治一切熱痰。

藥品 半夏(薑製)、膽星、各一錢五分。橘紅、枳實(麸炒)、苦杏仁(去皮尖)、栝蒌仁(去

油)、黃芩(酒炒)、茯苓、各一兩。

制法及用法 共研細末。薑汁糊丸。如梧桐子大。每服二錢。薑湯送下。

參考 沈氏尊生書方去南星、枳實、杏仁、栝蒌仁。加迎翹、梔子、桔梗、甘草、薄荷、荊芥、川赤茯苓。製法同上。亦名清氣化痰丸。治熱痰。二方皆爲主治熱痰。若證治準繩法製清氣化痰丸(簡稱清氣化痰丸)。則專主消導。行氣。與此大異。

【清氣化痰丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 順氣。快脾。化痰。消食。治膏粱厚味之人。胸滿痰盛。內多積熱鬱結者。

藥品 半夏、天南星(去皮臍)、白礬、皂角(切)、乾薑、各四兩。陳皮、青皮(去蘊)、紫蘇子(炒)、蘿蔔子(炒另研)、杏仁(去皮尖炒)、葛根、神麩(炒)、麥蘖(炒)、山楂、香附、各二兩。

制法及用法 先以白礬、皂角、乾薑、用清水五碗。煎取水三碗。次入半夏、南星。浸兩日。再煮。至半星無白點爲度。曬乾。與餘藥共研爲末。蒸餅和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。臨臥食後茶湯送下。脾

胃虛弱者忌之。

【理中化痰丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾胃虛寒。痰涎內停。嘔吐。少食。或大便不實。飲食難化。咳唾痰涎。

藥品 人參、白朮(炒)、乾薑、甘草(炙)、茯苓、半夏(薑製)。

制法及用法 共研細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服四五丸。熱湯送下。

【控涎丹】

(一名子龍丸、又名妙應丸)

發明 見三因極一病證方。

功用 治腹水、溼性胸肋膜炎。以瀉下爲目的。尤其是治痰溼在經絡、頸項、胸肋、腰背、筋骨。牽引釣痛。流走不定。手足冷麻。氣脈不通。遍身或起筋塊。如瘤如粟。皮色不變。又不一定疼痛。但覺痠麻等症。有效。並治癰癤貼骨。一切陰疽。

藥品 紅大戟(泡透、去骨、晒乾)、甘遂(用甘草水浸、再用麵粉包煨)、白芥子(炒)、各等分。

制法及用法 共研細粉。水泛爲丸。如綠豆大。每次五分至一錢。開水送服。中病爲度。適可而止。不可多服。體虛者

用法：急服。又急與甘草同日而服。急後用六君子湯調補。驚痰加礞砂、全蠍。驚氣成塊。加穿山甲、鼈甲、延胡索、蓬莖朮。熱痰加風化硝。寒痰加丁香、肉桂、胡椒、乾薑。臂痛加桂枝、薑黃。酒痰加雄黃、全蠍。脚氣加檳榔、木瓜、松枝、卷柏。

參考 痰之本。水也。淫也。得氣與火。則結爲痰。大戟能泄臟腑水滯。甘遂能行經絡水滯。直達水氣所結之處。以攻決爲用。白芥子能散皮裏膜外痰氣。皆治痰之要藥。惟氣虛喘白。小便清利。大便不實者忌之。

十二筆

【琥珀壽星丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 安神。定志。去風。化痰。治心膽被驚。神不守舍。或痰迷心竅。恍惚健忘。妄見妄言。

藥品 琥珀、一兩(另研、一作四兩)。天南星、一斤(先掘坑深二尺、用炭五升、於坑內燒紅、取出炭、掃淨、用好酒一片澆、將南星乘熱下坑內、用盆急蓋紮、泥壅合、經一宿取出、

再焙乾爲末)。礞砂、二兩(研飛、一半爲衣、一作一兩)。

制法及用法 共研細末。生薑自然汁。打麵糊攪令粘和。入藥末爲丸。如梧桐子大(一方加獾豬心血三個)。每服五十丸。人參湯送下。每日三次。

【順氣散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痰塞。

藥品 人參、茯苓、白朮、白芷、青皮、陳皮、烏藥、各一錢。香附、二錢。甘草(炙)、五分。

制法及用法 研爲末。清水煎服。

十三筆

【滌痰丸】

發明 見王氏方。

功用 滌痰。

藥品 半夏麴、枯礬、皂角(火炙、刮去皮弦子)、玄明粉、白茯苓、枳殼、各等分。

制法及用法 研爲末。飯天膏和丸。如梧桐子大。每服二三十丸。熱湯送下。

【滋陰清化丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痰熱。

藥品 熟地黃、生地黃、天門

冬、麥門冬、當歸、龜甲、阿膠、白芍藥、茯苓、山藥、貝母、天花粉、甘草、五味子。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如芡實大。每服一丸。口含化下。

十四筆

【壽星丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痰迷。

藥品 遠志(薑製)、人參、黃耆、白朮、甘草、當歸、生地黃、白芍藥、茯苓、陳皮、肉桂、膽星、琥珀、硃砂、五味子。

制法及用法 共研細末。豬心血、薑汁糊爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。熱湯送下。

十五筆

【潤下丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治痰鬱胸悶。

藥品 陳皮(鹽水炒)、八兩。甘草(焙)、二兩。

制法及用法 共研末。水泛丸。如梧桐子大。每服二三錢。熱湯送下。

【調氣散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痰塞。

藥品 白豆蔻仁、丁香、檀香、木香、各二分。藿香、八分。縮砂仁、四分。甘草(炙)、七分。

制法及用法 加鹽少許。滾水煎服。

十六筆

【導痰小胃丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治風痰。痞積。眩暈。喉痹。癰瘕。不語。痞塊。頭風。頭痛。

藥品 芫花(醋拌、過一宿、瓦器內攪炒黑勿焦)、甘遂(溼麵裹、長流水浸半月、煮曬乾)、大戟(長流水煮一時、再用水洗曬乾)、各五錢。大黃(漚紙煨、勿焦、切焙乾、再以酒潤炒熟焙乾)、一兩五錢。黃蘗(炒)、三兩。南星(白礬、皂角、薑汁、水煮十五次)、半夏(製同上)、各三兩五錢。紅花、蒼朮(米泔、白礬皂角、水浸一宿、炒)、各二兩。桃仁(白礬水浸半日、去皮尖、炒紅色、酒蒸)、杏仁(製同上)、陳皮(白礬水泡半日、炒)、枳實(製同上)、白朮(土炒)、白芥子(炒)、各一兩。

制法及用法 竹瀝薑汁煮。神麴糊和丸。如綠豆大。每服

二三十丸。淡薑湯送下。癰痰不語。濃薑湯送下。宿塊頭風頭痛。臨臥食後服。

參考 按此即證治準繩方之小胃丹(一名小胃丸、又名導痰小胃丸、即以本方南星以上各藥、研爲末、白朮煎膏和丸、如蘿蔔子大、每服一錢、或五六分、臨臥津液吞下、或熱湯送下、取膈上溼痰熱積、以意消息之、欲利、空腹服之、治老痰頑痰、壅塞胸膈、喘急氣粗、大便秘結、藥力甚猛、壯實人痰飲最宜、年老者及虛弱者均忌之)。加清星等藥而成。故亦名加味小胃丹。

十七筆

【霞天膏】

功用 安中。益氣。養胃。健脾。補腰膝。治中風。偏廢。口眼歪斜。消渴。吐涎。積聚。痰涎壅塞。五臟六腑留痰。宿飲癖塊。手足皮膚中痰核。勞瘵蟲脹。久服潤澤枯槁。開爽精神。

藥品 肥嫩黃牛肉、三四十斤。

制法及用法 切作小片。去筋膜。洗極淨。入砂鍋中。長流水煎成糜。濾去渣。再熬成膏用。和竹瀝、橘紅、貝母、蘇

子、枯蕒根、桐骨葉之類。可治陰虛內熱之痰。和橘皮、白茯苓、蘇子、白豆蔻仁、半夏、蒼朮爲麴。可治脾胃積痰。和橘皮、貝母、蘇子、枯蕒根及仁、礪砂爲麴。可治積熱結痰。

參考 胃爲水穀之海。無物不受。胃病則水穀不能以時運化。稽留而爲痰飲。壅塞經絡。則爲積痰老痰結痰等症。陰虛內熱生痰。則爲偏廢。口眼歪斜。留滯腸胃。則爲宿飲癖塊。隨氣上湧。則爲喘急迷悶。流注肌肉。則爲結核。惟用霞天膏。皆可治之。蓋牛爲土畜。黃爲土色。肉爲胃味。熬而爲液。雖有形而無濁質。其性甘溫無毒。以脾胃所主之物。治脾胃所生之病。故能由腸胃而滲透肌膚毛竅。搜剔一切留結之物。和諸藥而治各種痰症也。

【癰症鎮心丸】

發明 驗方。

功用 治痰迷心竅。癰癩狂疾。謾言妄笑。如見鬼魅。及一切七情五志火逆之症。

藥品 犀黃、七分。膽星、犀角、各五錢。川黃連、辰砂、各三錢。甘草、一錢。麥門冬、茯神(一作茯苓)、各七錢。遠志、石菖蒲、珍珠、各二錢。酸棗仁、一兩。

制法及用法 各取淨末。煉蜜(一作蒸餅)和膽星爲丸。糊重四分。金箔(一作硃砂)爲衣。每服一丸。薑湯送下。

十九筆

【礞石滾痰丸】

發明 見養生主論方。

功用 治實熱老痰。結核異時。

藥品 青礞石(同硫磺三合、入陽城罐內、赤石脂封護、煨過、水飛淨、一作一兩、一作二兩)、沉香(另研、一方作一兩)、百藥煎、各五錢。川大黃(酒蒸少頃、翻過再蒸、少頃即取出、不可太過)、黃芩(酒炒)、各八兩。一方無百藥煎。

制法及用法 研細爲末。水泛丸。如梧桐子大。每服一錢至二三錢。食後空腹熱湯送下。量症加減消息之。惟虛寒者及孕婦忌服。

參考 此爲治老痰之峻劑。用黃芩清胸中無形諸熱。大黃瀉腸胃有質實火。礞石燥悍破積。沉香速降利氣。二黃得此爲使。則能迅掃老痰。直攻巢穴。胸中濁膩之垢。自可蕩而不留。百藥煎乃得之方外祕傳。蓋此丸得此藥。乃能收斂周身頑痰。聚於一處。然後利

下。此滾痰之所自名也。沈氏尊生書云。加犀角、皂角、硃砂、麝香。硃砂爲衣。名清心滾痰丸。治火盛痰結。

二十一筆

【鐵粉散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痰迷心竅。

藥品 鐵粉、半夏、南星、白附子、羌活、各二兩。生川烏、一兩五錢。硃砂、琥珀、白蠟、各一兩。枯礬、五錢。全蠍、五十個。金箔、三十片。

制法及用法 共研爲末。每服四錢。生薑汁調下。或水調亦可。

參考 方中鐵粉。不但化痰鎮心。且可摧抑肝邪。木旺多怒者。亦宜服之。

二十九筆

【鬱金丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 補魄。治風痰。

藥品 鬱金、硃砂、白礬。

制法及用法 研爲細末。水泛丸。如梧桐子大。每服三四十丸。熱湯送下。

風溼類

八筆

【狗皮膏】

發明 驗方。

功用 治風濕性筋骨痠痛。亦治跌打傷痛。

藥品 製乳香、六錢。阿膠、一兩。製沒藥、六錢。麝香、一錢。肉桂、五錢。公丁香、五錢。木香、四錢。

制法及用法 各研細粉和勻後。拌入清涼膏三十二兩內。攤狗皮上。大號每張用藥四錢。中號五錢五分。小號四錢。

十一筆

【紫金膏】

發明 見顧世澄醫醫大全。

功用 治寒濕氣。漏肩風。

藥品 白芷、六錢。鬧羊花、三奈、大茴香、青皮、草烏、川烏、威靈仙、甘松、小茴香、大黃、獨活、各七錢。乾蟾、一個。亂頭髮、三兩。

制法及用法 用麻油四十兩。同藥入鍋熬至髮化。滴水成珠。再下密陀僧(研細)、十二兩。收成膏。再下松香(葱汁、薑汁、鳳仙花汁、各煮一次、

研細)、五兩。入膏化盡。攪勻。傾在鉢內。重湯燉化。再下潮腦、七錢。青黛、桂皮、各六錢。丁香、雄黃、各五錢。輕粉、四錢。血竭、乳香(去油)、沒藥(去油)、兒茶、各三錢三分。滑石、三錢。龍骨、二錢五分。麝香、冰片、各五分。攪入和勻。收貯。攤厚貼之。立刻止痛。

十二筆

【黑丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治流注膝風。或閃跌瘀血。肢節腫痛。

藥品 百草霜、當歸、牛膝、白芍藥、各五兩。川烏(炮)、一兩五錢。赤小豆、白薇、各八兩。白芨、天南星(炮)、各二兩。骨碎補(焙)、四兩。

制法及用法 研爲末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服二三十丸。鹽湯、溫酒、或白湯送下。腫痛自消。若潰而發熱。則與補藥兼服自效。

十三筆

【愈風丹】

發明 見張子和方。

功用 治諸痹寒熱交作。筋骨疼痛。手足拘攣。麻木不仁。及諸風癱瘓。口眼歪斜。半身

不遂。風溼等證。

藥品 甘草、三錢。芍藥、川芎、桔梗、白僵蠶(炒)、細辛、羌活、南星(薑製)、各五錢。麻黃(去節)、白芷、防風、天麻、全蠍(炙)、各一兩。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如彈子大。硃砂五錢爲衣。每服一丸。細嚼。清茶或溫酒送下。

十四筆

【漏蘆丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風癰疹。

藥品 漏蘆、一兩。枳殼(麸炒去瓤)、苦參、各三兩。防風(去蘆)、川大黃(煨)、各一兩。烏蛇、二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後用溫漿水送下。

瘡 痢 類

三 筆

【三聖丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治諸癰。

藥品 穿山甲(湯浸透、碎剉、同熱灰在鍋內、慢火焙至焦

黃色)、常山、檳榔、各一兩(薄剉曬乾)。

制法及用法 再曬。研爲末。水資糯米粉和丸。如綠豆大。帶酒以紅丹爲衣。陰乾。每服三十丸至五十丸。未發前隔晚。空腹時溫酒送下。重者二服。經久不瘥。宜服祛癰丹。

四 筆

【木香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒泄瀉青白。膿血相雜。

藥品 木香、一錢。黃連(吳茱萸同炒、去茱萸)、一兩。肉豆蔻(煨)、二個。

制法及用法 研爲細末。水煮麵糊和丸。如黍米大。赤痢。粟米飲送下。白痢。厚朴湯送下。並空腹時服。

【木香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疳痢。

藥品 木香、二錢。黃連、三錢。紫厚朴(薑製)、夜明砂(隔紙炒)、各二錢。訶子肉(炒)、一錢。

制法及用法 研爲末。米飯和丸。如麻子大。食前乾艾生薑煎湯送下。

【木香散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治隔年痢。血痢。

藥品 木香(剉、用黃連五錢同炒)、罌粟殼(剉、用生薑五錢同炒)、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。加麝香少許。陳米飲調下。

【木香散】

發明 見張渙方。

功用 治食疳。下痢無度。

藥品 南木香(剉)、肉豆蔻(去殼)、各一兩。乾蟾、二個(酥炙)。胡黃連、使君子(去殼)、五靈脂、各一兩。巴豆、七個(去皮心膜、紙裏出油、另研)。麝香、一分(另研)。

制法及用法 研爲細末。拌勻。滴水於石臼中。搗一二百下。丸如黍米大。每服二丸至三丸。乳食後。溫生薑湯送下。量兒大小加減。

【木香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治冷熱痢 瘧損 腹痛。不能食。

藥品 木香、乾薑(炮)、甘草(炙)、黃芩、各五錢。側柏葉(炙)、當歸(炒)、白朮、乾熟地黃、各七錢五分。黃連(炒)、五錢。

制法及用法 剉散。每服三錢。清水一鍾。煎至五分。去滓。不拘時溫服。

【木香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒赤白痢久。腹脅疼痛。

藥品 木香、訶梨勒(煨用皮)、吳茱萸皮(微炙)、木賊、黃連(去鬚微炒)、各五錢。

制法及用法 搗細羅爲散。每服五分。粥飲調下。一日三四次。量兒大小加減。

【斗門散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治毒痢。臟腑 掃痛。腹血赤白。或下瘀血。或成片子。或五色相雜。日夜頻併。兼治噤口惡痢。裏急後重。久渴不止。全不進食。

藥品 黑豆(炒、去皮)、十二兩。乾薑(炮)、四兩。罌粟殼(蜜炒)、八兩。地榆(炒)、甘草(炙)、各六兩。白芍藥、三兩。

制法及用法 㕮咀。每服三錢。清水一盞。煎至七分。溫服。

【六神丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治赤白痢疾。

藥品 神麴(別爲末、留作糊)、麥芽、茯苓、枳殼、木香

(煨、白朮倍之)、黃連(赤痢倍之)、各等分。

制法及用法 研爲末。神麴末作糊和丸。如梧桐子大。每服五十丸。赤痢甘草湯送下。白痢乾薑湯下。赤白痢乾薑甘草湯下。

五 筆

【玉粉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血痢。

藥品 海蛤。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。蜜水調下。

【石蓮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒噤口痢。

藥品 蓮子肉(去心炒)。

制法及用法 研爲末。每服一錢。米飲調下。或用白朮爲末。米飲調下。

【瓜萸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治五色痢。久不愈者。

藥品 瓜萸、一個(黃色者、以炭火煨存性用、蓋在地下一宿、出火毒)。

制法及用法 研爲細末。溫酒調下。

【四神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痢疾。

藥品 乾薑、黃連、當歸、黃蘗、各等分。

制法及用法 並炒爲末。每服二錢。用烏梅一個。煎湯調下。赤痢加黃蘗。白痢加薑。後重腸痛加黃連。腹中痛加當歸。若治泄瀉。則等分亦可。

【戊己丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治脾胃受濕。下痢赤白。腹痛。米穀不化。

藥品 川黃連(去鬚炒)、吳茱萸(去梗炒)、白芍藥、各等分。

制法及用法 研爲末。米麴麵糊爲丸(一作神麴黃糊爲丸)。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時米飲、或砂仁湯、藳艾湯送下。

六 筆

【羊肝丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治休息痢羸瘦。

藥品 縮砂仁、一兩(去皮)、肉豆蔻、五錢(去殼)。

制法及用法 研爲細末。用羊肝半具。紮切許藥。以溼紙三五重裹上。更以麵裹。用慢火燒令熟。去麵並紙。入軟飯

鴉和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前粥飲送下。

【肉豆蔻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒赤白痢久。腹內疔痛。不食蟲閉。

藥品 肉豆蔻、二枚(去殼)。青橘皮(湯浸、去白瓢、焙)、黃牛角鯢(炙令微焦)、當歸、地榆、厚朴(去粗皮、塗生薑汁、炙令香熟)、黃連(去鬚微炒)、各五錢。乾薑、一分(炮製剉)。

制法及用法 搗細羅爲散。每服五分。粥飲調下。一日三四次。量兒大小。臨時加減。

【伏龍肝散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治婦人血氣勞傷。衝任脈虛腹痛。五色垢穢難下。黃瘦口乾。食少無力。虛煩驚悸。

藥品 伏龍肝、麥門冬(去心、一作一錢五分)、赤石脂、各一錢。熟地黃、艾葉(炒)、各一錢五分(一作各二錢)。當歸(去蘆炒、一作七分五釐)、川芎(一作三錢)、各二錢五分。肉桂(去粗皮)、乾薑(炮、一作七分五釐)、甘草、各五分。

制法及用法 研爲粗末。清

水二鍾。加紅棗二枚。煎至一鍾。食前服。

【地榆散】

發明 見言氏方。

功用 治小兒血痢。日久不瘳。

藥品 地榆、一分(炒)。訶子、五錢(炮去皮)。陳槐、黃連(炒)、各一錢。

制法及用法 研爲細末。每服五分或一錢。陳米飲調下。

【地榆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒痢渴。或下五色惡物。心神煩熱不止。

藥品 地榆、白茯苓、黃蘗(微炙、剉)、各一兩。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。不拘時服。量兒大小加減。

【地榆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治水穀利。日夜不止。

藥品 地榆(微炙剉)、厚朴(去粗皮、塗生薑汁、炙令香熟)、各三分。黃連、一兩(去鬚、微炒)。阿膠、五錢(搗碎、炒令黃色)。

制法及用法 搗細羅爲散。每服五分。不拘時粥飲調下。量兒大小加減。

七 筆

【沒石子丸】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒疳痢腹痛便泄溺渴。

藥品 沒石子、一枚(一作二枚)。南木香(濕紙包略煨)、黃連(剉碎薑汁炒)、各二錢五分。肉豆蔻、二枚(炮)。訶子、四枚(炮去核、一作三枚)。

制法及用法 研爲細末。加烏犀丸內。米飯糊丸。如粟米大。每服十丸至三十丸。或五十丸。空腹時米飲或溫白湯送下。量兒大小加減。

【沒石子丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒因瀉變赤白及五色痢。面或青或白。唇乾舌焦。手冷身熱。腹痛。

藥品 沒石子、木香、黃連、當歸、青皮、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。加阿膠一分。酒半盞。浸化。入麵少許。令勻。煮糊爲丸。如粟米大。或如椒目大。一二歲兒服如粟米大。四五六歲兒服如椒目大。每服五十丸。赤痢甘草湯送下。白痢乾薑湯或五倍子湯送下。

【赤石脂散】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒痢後脫肛。

藥品 赤石脂、伏龍肝、各等分。

制法及用法 研爲細末。每用五分。敷肛頭上。頻用按入。

【何首烏散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治瘧積滯去後。寒熱不止。至夜尤甚。

藥品 生何首烏、五錢(碎)。青皮、陳皮、甘草(炙)、各一錢。生薑、七片。大棗、三枚(劈)。

制法及用法 清水煎。露一宿。侵晨熱服。多汗而渴。加知母、烏梅。虛人腹痛。加入參、厚朴、木香。

【豆蔻丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治白痢腹痛。

藥品 肉豆蔻(麴裏煨熟)、草豆蔻(麴裏煨熟)、枇杷葉(去毛炙)、縮砂仁、母丁香、各一兩。木香、沉香、各五錢。地榆、二兩。罌(燒紅爲末)、五錢。

制法及用法 研爲細末。燒粟米飯爲丸。如櫻桃大。每服二丸。食前米飲化下。

八 筆

【附子散】

發明 見丁時發方。

功用 治小兒疳痢。有白膿。腹內疼痛。

藥品 附子(炮去皮臍)、一枚。龍骨、赤石脂、各五錢。密陀僧、黃丹、胡粉(炒)、烏賊魚骨(燒灰)、赤芍藥、各一分。

制法及用法 研爲末。每服五分。米飲調下。每日三次。

【乳香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切瀉痢。

藥品 乳香、一錢(用荷葉於炭火上、炙令半熔、放地上、用碗蓋、另研)。肉豆蔻、白薑、甘草(炙)、草果、各一兩。

制法及用法 新剉。用醋麵裹。於熱灰內煨令赤色。取出。去麵。研爲末。入乳香末拌勻。每服五分或一錢。陳米飲調下。

【阿膠丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治冷熱不調。傷犯三陰。痢下膿血。腹痛不已。

藥品 阿膠(剉碎、炒令燥)、乾薑(炮)、木香、黃連(炒、一作二兩)、當歸(炒)、黃芩、各一兩。赤石脂(醋煨水飛)、龍骨(醋煨水飛)、各二兩(一作各一兩)。厚朴、一兩五錢(去粗皮、生薑汁塗炙、一錢五錢)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜或米糊和丸。如梧桐子大。

每服三十丸。不拘時粥飲送下。日二夜一次。

九 筆

【香茸丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治下痢危困。

藥品 麝香、五分(另研、臨時入)。鹿茸、一兩(火燎去毛、酥炙黃、爲末、入麝香令勻)。

制法及用法 以燈心煮棗肉爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時熱湯送下。

【香連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治赤白下痢。煩瀉作痛。

藥品 南木香、五錢(不過火)。淨黃連、一兩(剉、用茱萸炒、去茱萸)。烏梅肉、二錢五分(薄切、用屋瓦慢火焙乾)。

制法及用法 研爲末。用阿膠五錢。剉碎。炒脹。水化爲糊。候冷入乳鉢內。同前藥末爲丸。如麻仁大。每服三十三丸。至五十五丸。或七十七丸。赤痢空腹時甘草湯送下。白痢空腹時白薑湯送下。赤白夾作。溫米清湯嚥服。

【香連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腹痛。腹瀉。赤白

痢疾。

藥品 黃連、二十兩。吳茱萸(去枝葉)、十兩。

制法及用法 先用熱水拌和。入瓷器中。置熱湯燉一日。同炒。至黃連紫黃色。去柴用連爲末。每末四兩。入木香末一兩。淡醋米飲爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。滾湯送下。久痢中氣下陷。用補中益氣湯送下。中氣虛者。用四君子湯送下。中氣虛寒者。加生薑、肉桂。

【香連丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治下痢赤白。白多於赤者。

藥品 木香、五錢(煨、一作不見火)。川黃連、二兩(去蘆、薑汁拌炒、一作用吳茱萸同炒、去吳茱萸)。一方加石蓮肉、陳皮。

制法及用法 共研細末。陳米飯或煉蜜或醋煮米糊爲丸。如綠豆大。每服一二十丸至五十丸。米飲或砂仁湯送下。調六一散亦可。

【香連丸】

發明 見古氏方。

功用 治赤白痢。

藥品 木香、黃連、訶子皮、

各一兩。肉豆蔻、一個。子芩、五錢。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如綠豆大。大人每服十丸。小兒五丸。煎薑漿湯送下。空腹日午再服。煎薑蜜湯送下。

【香參丸】

發明 見沈氏尊生書。

功用 治久痢。

藥品 木香、四兩。苦參(酒炒)、六兩。甘草、一斤。

制法及用法 共研細末。熬膏。每服三錢。白痢薑湯送下。赤痢甘草湯送下。噤口痢。砂仁、蓮肉、煎湯送下。水瀉、豬苓、澤瀉、煎湯送下。

【厚朴散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠下痢。黃水不絕。

藥品 厚朴(薑汁製)、黃連、各三兩。肉豆蔻、一枚(連皮用)。

制法及用法 研爲粗末。清水煎。頓服。

【柴胡散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠瘧疾。

藥品 柴胡、生大黃、各二錢。生黃芩、一錢五分。甘草、一錢。

制法及用法 咬咀。清水煎。

發日五更時溫服。取利爲愈。如胎上逼心。可服枳殼散。忌食油麵辛熱等物。

【胡黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒瘧。

藥品 胡黃連、人參、草果、檳榔、甘草、柴胡、各等分。

制法及用法 剉散。清水一盞。煎至三分服。

十 筆

【神效散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治休息痢。氣痢。膿血不止。疼痛困弱。

藥品 當歸、烏梅肉、黃連、各等分。一方加阿膠。

制法及用法 研爲細末。大蒜作膏和丸。如梧桐子大。每服三四十丸。厚朴煎湯送下。

【神效散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治赤白痢。晝夜頻數。食減腹痛。小便不利。

藥品 罌粟殼(去蒂梗、剉碎、蜜炙炒)、白芷、烏梅(和核)、各一兩。乳香、撫芎、各五錢。

制法及用法 研碎。每服二錢。清水一盞。煎至七分。空腹時溫服。

【桃花丸】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治腸胃虛弱。冷氣吞之。臍腹脹痛。下痢純白。或冷熱相搏。赤白相雜。腸澼不禁。日夜無度。

藥品 赤石脂(煨)、乾薑(炮)、各等分。

制法及用法 共研細末。煉蜜或麪糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹食前米飲送下。每日三次。若痢久虛帶去積不已。用蒼朮二兩。防風一兩。剉碎。清水一碗。煎至半碗。送下此丸或赤石脂丸。小便利則安。

【烏梅散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒熱痢。

藥品 烏梅、二枚(微炒去核)。黃連(去鬚微炒)、檳榔、各一分。犀角屑、阿膠(搗碎、炒令黃燥)、甘草(炙微赤、剉)、各五錢。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小加減。

【桔梗丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒久痢不斷。身體羸瘦。飲食不消。

藥品 桔梗(去蘆頭)、神麴(微炒)、各一兩。麥蘖、烏梅肉(微炒)、厚朴(去粗皮、塗生薑汁、炙令香熟)、白朮、人參(去蘆頭)、赤石脂、黃芩、龍骨、桂心、甘草(炙微赤、剉)、各五錢。黃連、一兩五錢(去鬚微炒)。黃雌雞骨、一具(淨洗、去肉、酒浸一宿、炙令黃)。

制法及用法 搗羅爲末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服十五丸。粥飲送下。一日三次。量兒大小加減。

十一筆

【犀角丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸痢。

藥品 犀角屑(取黑色文理粗者)、黃連、苦參、黃蘗(赤色緊薄者)、川當歸、各等分。

制法及用法 各搗研爲細末。和勻。每服方寸匕。爛煮糯米飲。空腹調服。一日二次。忌膩滑油黏生菜。

【犀角散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒熱。瘴氣爲瘧。

藥品 犀角屑、甘草(炙微赤剉)、川大黃(剉碎微炒)、知母、各五錢。鼈甲、一兩(塗醋炙

黃、去裙襖)。柴胡、常山、各七錢五分。

制法及用法 搗羅爲粗末。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓溫服。一日三四次。量兒大小加減。

【犀角散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒蟲毒血痢。心煩腹脹。不欲飲食。

藥品 犀角屑、白蘗荷根、地榆(微炙剉)、桔梗(去蘆頭)、蘇枋木(剉)、各三分。

制法及用法 搗粗羅爲末。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小加減。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱痢。下赤黃膿血。腹痛。心煩困悶。

藥品 犀角屑、黃連(去鬚微炒)、地榆、黃芩、各一兩。當歸、五錢(炒)。木香、二錢五分。

制法及用法 研爲末。每服三錢。清水一盞。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【梔子仁散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒熱痢腹痛。心煩口乾溺赤。不欲飲食。

藥品 梔子仁、當歸(剉微

炒)、各五錢。黃蘗、地榆(微炙剉)、各三分。黃連、一兩(去鬚微炒)。

制法及用法 搗細羅爲散。每服五分。粥飲調下。每日三四次。量兒大小加減。

【紫霞丹】

發明 見鮑相璣驗方。

功用 治痢疾。

藥品 厚朴、紅麴末、各四兩。木通、二兩。

制法及用法 共研細末。水泛丸。如梧桐子大。每服三錢。白痢。沙糖湯下。赤痢。米湯下。休息痢。烏梅冰糖湯下。

【通神丸】

發明 見王允傳方。

功用 治痢疾下膿血。裏急腹痛。臍腹疼痛。日久不瘥。

藥品 沒藥(研)、五靈脂(去砂石研)、乳香(炒)、各一錢。巴豆、七枚(去皮心膜、出壓油、一作五分)。

制法及用法 共研令細勻。滴水爲丸。如粟米大。每服一丸。生木瓜研水。不拘時送下。

十二筆

【黃芩丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒痢瀉不止。壯熱腹痛。

藥品 黃芩、瓜蒌根、黃連(去鬚微炒)、當歸(剉微炒)、各三分。臭椿根皮(炙微黃、剉)、訶黎勒(煨、用皮)、各五錢。烏梅肉、五枚(微炒)。

制法及用法 搗羅爲末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服七丸。粥飲送下。每日三四次。量兒大小加減。

【黃耆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱痢膿血。腹疼心煩。

藥品 黃耆(剉)、龍骨、當歸、各七錢五分。生乾地黄、五錢。黃連(去鬚微炒)、一兩。黃蘗、黃芩、犀角屑、地榆、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時粥飲調下。

【黃耆散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒痢瀉。心胸煩悶。不欲飲食。

藥品 黃耆(剉)、麥冬(去心焙)、淡黃芩、各三分。烏梅肉、三枚(微炒)。花龍骨、一兩。白朮、黃連(微炒去鬚)、各五錢。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。剉至。

五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小加減。

【黃連丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒久痢。輕重無定。

藥品 黃連(去鬚微炒)、人參(去蘆頭)、赤石脂、龍骨、甘草(炙微赤剉)、黃芩、厚朴(去粗皮、塗生薑汁、炙令香熟)、白茯苓、枳殼(去瓤、麸炒、微黃)、各五錢。烏梅肉、一分(微炒)。

制法及用法 搗羅爲末。煉蜜和丸。如麻子大。每服七丸。粥飲送下。每日三四次。量兒大小。臨時加減。

【黃連丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治妊娠赤白痢。

藥品 黃連(去鬚)、縮砂仁(炒)、川芎、乾薑(炮)、阿膠(蛤份炒)、白朮、各一兩。乳香(另研)、三錢。枳殼(去瓤、麸炒)、五錢。

制法及用法 研爲末。鹽梅肉三個。少入醋。同杵和丸。如梧桐子大。每服四十丸。白痢。乾薑湯送下。赤痢。甘草湯下。赤白痢。乾薑、甘草煎湯下。均食前溫服。

【黃連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱痢。休息痢。日夜頻併。或下血如雞肝色。

藥品 黃連、二兩五錢(去鬚)。羚羊角(銹屑)、黃蘗(去粗皮)、各一兩五錢。赤茯苓(去黑皮)、五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。薑蜜湯送下。暑月下痢。用之尤驗。或用白茯苓、臘茶、送下。

【黃連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後赤白痢。腹中攪痛不可忍。

藥品 黃連、四兩。阿膠、蒲黃、梔子仁、各一兩。當歸、二兩五錢。黃芩、黃蘗、各二兩。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服六七十丸。米飲送下。日三夜一次。

【黃連散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒血痢。煩熱口乾腹痛。

藥品 黃連(去鬚微炒)、犀角屑、白蘗根、黃芩、蔓青根、吳藍、各一兩。白頭翁、三分。甘草(炙微赤剉)、當歸(剉微炒)、各五錢。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一盞。煎至五

分。去滓。不拘時服。量兒大小加減。

【黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚風煩熱。飲水不止。

藥品 黃連(去鬚微炒)、牡蠣(煅爲粉)、各五錢。烏梅肉(微炒)、甘草(炙微赤、剉)、訶黎勒(煨、用皮)、各一分。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小加減。

【黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腸風下血。疼痛不止。

藥品 黃連、貫衆、雞冠花、烏梅肉、大黃、各三兩。甘草(炙)、三分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時米湯調下。

【黃連散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒赤白痢久不止。腹痛羸羸。不欲飲食。

藥品 黃連、一兩(去鬚微炒)。厚朴(去粗皮、塗生薑汁炙令香熟)、乾薑(炮製剉)、木香、艾葉(微炒)、龍骨、各五錢。當歸(剉微炒)、黃牛角觔(燒灰)、

各三分。烏梅肉、一分(微炒)。

制法及用法 研爲細末。每服五分。粥飲調下。每日三四次。量兒大小加減。

【黃連散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒疳積。久延不癒。肌肉消瘦。面黃髮焦。啼叫不常。

藥品 胡黃連末、白礬(燒令汁枯盡)、白龍骨末、各五錢。胡粉(微炒)、二錢五分。

制法及用法 細研爲散。一歲兒每服一字。二歲五分。米飲調下。隨兒大小。量病輕重加減。

【黃連散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒蟲毒。痢血體瘦。

藥品 黃連、一兩(去鬚微炒)。敗鼓皮(炙令黃焦)、白頭翁、甘草(炙微赤剉)、藍青、各五錢。犀角屑、白蘞荷根、黃芩、茜根(剉)、各三分。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。放溫。不拘時服。量兒大小加減。

【黃蘗丸】

發明 見錢氏方。

功用 治小兒熱痢下血。

藥品 黃蘗(去皮)、五錢。赤芍藥、四錢。

制法及用法 研爲細末。米飯和丸。如麻子大。每服二十丸。食前來飲送下。量兒大小加減。

【黃蘗丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒久白痢。腹脹疝痛。

藥品 黃蘗(微炙剉)、當歸(剉微炒)、各一兩。

制法及用法 搗羅爲末。煨大蒜和丸。如綠豆大。每服七丸。粥飲送下。每日三四次。量兒大小加減。

【黃連阿膠丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治冷熱不調。下痢赤白。裏急後重。臍腹疼痛。口燥煩渴。小便不利。

藥品 川黃連、三兩(去鬚)。阿膠(碎炒)、一兩。茯苓(去皮)、二兩。

制法及用法 連苓研爲細末。水熬阿膠成膏和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫米飲送下。

【黃連阿膠丸】

發明 見初學世養生必用方。

功用 治熱痢下重。膿血疼痛。腹中痛不可忍。

藥品 黃連(去鬚)、一兩五錢。阿膠(朽碎、慢火炒如珠子白色、另杵爲細末)、白茯苓、白芍藥、各五錢。

制法及用法 除阿膠外。研爲細末。以米醋斟酌多少。熬阿膠得所。和勻。入臼器杵丸。如綠豆大。小兒丸如黃米大。每服自二十丸爲始。止於五十丸。食前溫米飲送下。每日二三次。以知爲度。未知。加藥更丸一等。

【雄硃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒腸胃虛冷。下痢頻併。日夜痛不可忍。

藥品 雄黃、一分(細研水飛過)。乳香(細研)、白礬(煨)、各一錢。

制法及用法 研爲末。每服一字。二三歲兒服五分。陳米飲調下。一日三次。

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒久痢不瘥。羸瘦壯熱。毛髮乾焦。不能飲食。

藥品 雄黃、蘆薈、青黛、硃砂、熊膽、麝香(俱細研)、龍膽(去鬚頭)、黃連(去鬚、微炒)、黃蘗(微炙剉)、當歸(剉微炒)、

白芷、細辛、甘草(炙、微赤、剉)、各一分。蛭蟬、七枚(去足)。乾蝦蟆、一兩(塗酥炙、令黃焦)。

制法及用法 搗細羅爲散。入研藥。更研令勻。每服五分。井華水調下。日三四服。量兒大小。以意加減。

【勝金丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治子癰。

藥品 常山(酒炒)、四錢。檳榔、一錢。

制法及用法 共研細末。醋煮米糊爲丸。如綠豆大。每服三丸。發前三更時清酒送下。

【開胃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治赤痢。

藥品 白朮、茯苓、人參、各五分。石蓮子(去皮殼心)、十個。

制法及用法 研爲末。每服五分。薑香湯調下。

【訶黎勒丸】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治休息痢。晝夜無度。臍腹撮痛。諸藥不效者。

藥品 訶子、五錢(去核)。椿根白皮、二兩。母丁香、三十粒。

制法及用法 共研爲細末。

醋煮米糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。陳米飲湯入醋少許送下。一日三次。

十三筆

【聖效散】

發明 見張奐方。

功用 治血痢久不癒。

藥品 赤石脂(煨赤)、白龍骨、阿膠(炙)、各一兩。訶黎勒皮、木香、乾薑(炮)、黃連、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 搗羅爲細末。每服五分。食前粟米飲調下。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒痢渴。腹內疼痛不止者。

藥品 當歸(劉微炒)、黃連(微炒去鬚)、黃耆(剉)、各三分。乾薑(炮製剉)、甘草(炙微赤剉)、各五錢。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小加減。

十四筆

【對金飲】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治瘧疾愈後。調理脾

胃。

藥品 橘紅(炒赤黃色)、八兩。厚朴(薑製)、蒼朮(製)、甘草(炙)、各二兩。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一盞。加生薑三片。大棗一枚。煎服。

【蒲黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血痢。

藥品 蒲黃、三合。乾地黃、桑耳、甘草、芒硝、茯苓、人參、柏葉、阿膠、艾葉、生薑、各二兩。禹餘糧、黃連、各一兩。赤白脂、一兩二錢五分。

制法及用法 咬咀。清水一斗。煮取四升。分作五服。

【碧霞丹】

發明 見陶弘景肘後百一方。

功用 治久瘧不愈。

藥品 巴豆(取肉去油、另研、按東方甲乙木)、肉桂(去粗皮、研細、按南方丙丁火)、硫黃(去砂石、研細、按中央戊己土)、白礬(研細、按西方庚辛金)、青礬(另研細、按北方壬癸水)、各等分。

制法及用法 五月一日。用紙裹。以蠶絲。依前方位排定。忌貓犬婦人見之。安頓淨神前。端午日午時。用五家糴

尖和藥爲丸。如梧桐子大。令患人以綿裹一丸。塞入鼻中。男左女右。於未發前一日安之。約度尋常發過。少許方除。

十五筆

【瘰母丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘰癧結於左脅硬痛者。

藥品 鼈甲、三兩(醋炙)。骨皮(炒)、桃仁(炒)、神麴(炒)、麥芽(炒)、各一兩。三稜(醋養)、蓬莪朮(醋養)、海粉(醋養)、各五錢。香附、二兩(醋養)。紅花、三錢。

制法及用法 共研末。神麴糊爲丸。如梧桐子大。每服七八十丸。空腹時熱湯或淡薑湯送下。

【瘰母丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒瘰母。

藥品 鼈甲(醋炙)、二兩。三稜(醋浸透煨)、蓬莪朮(醋浸透煨)、各一兩。

制法及用法 共研細末。神麴糊爲丸。如綠豆大。每服二十丸。熱湯送下。量兒大小加減。

十六筆

【蕪荑丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治久疔不瘥。有蟲。及下部脫肛。

藥品 蕪荑(炒)、黃連(去鬚)、各二兩。蛇蛻、五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前杏仁湯送下。一日二次。

【蕪荑丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒疳積久不瘥。

藥品 蕪荑、五錢(研末)。羊子肝、一具。

制法及用法 先以羊肝切片。以蕪荑末摻在肝內。線縫合。米泔中煮令熟。搗爛。糯米飯和丸。如麻子大。每服五丸。粥飲送下。早晨晚後各一服。量兒大小加減。

【龍骨丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒赤白痢不止。腹痛。

藥品 白龍骨、黃連(去鬚微炒)、黃蘗(微炙剉)、木香、訶梨勒(煨用皮)、各一分。胡粉、三錢(炒微黃)。白礬(燒令煙盡)、乾薑(炮製剉)、當歸(剉微炒)、

各五錢。

制法及用法 搗羅爲末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。粥飲送下。每日三四次。量兒大小加減。

【龍骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒痢渴。體熱煩悶。

藥品 白龍骨、一兩。胡黃連、五錢。代神、人參(去蘆頭)、茅根(剉)、麥門冬(去心焙)、各三分。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小加減。

【橘皮散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治脾寒諸瘕。

藥品 廣橘皮、八兩(去白切、薑汁浸過一宿、砂罐內重湯煑乾、焙)。

制法及用法 研爲末。每服三錢。加大棗十枚(去核)。清水一碗。煎至半碗。趁熱前服。並食棗。惟寒不甚者勿服。

二十四筆

【鼈甲丸】

發明 見聖濟總錄方。

功用 治三陰濕久不愈。

藥品 龜甲(炙)、何首烏(製)、各四兩。川厚朴、草果仁、廣皮、山查、六神麴、黃芩、麥芽(炒)、半夏(薑汁製)、各二兩。常山、柴胡、青皮、蓬莪朮、京三棱、各一兩五錢。

制法及用法 共研細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服三錢。薑湯送下。忌食生冷麵物雞卵等。

【鼈甲丸】

發明 見沈金鰲 沈氏 尊生書。

功用 治瘕積。

藥品 鼈甲(醋炙)、一兩。京三棱、蓬莪朮、香附、青皮、桃仁、紅花、神麴、麥芽、海粉、各五錢。

制法及用法 研爲細末。醋煮米糊和丸。如梧桐子大。每服三五丸。熱湯送下。

二十九筆

【鬱金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切熱毒痢。下血不止。

藥品 川鬱金、槐花(炒)、各五錢。甘草(炙)、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服一二錢。食前用豆豉湯調下。

痔漏崩帶類

三 筆

【小胃丹】

發明 見張潔古方。

功用 治結痰白帶。

藥品 白朮、一兩。蒼朮、五錢。紅白葵花、二錢五分。白芍藥、七錢五分。

制法及用法 共研細末。蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹時四物湯送下。候鬱積行。卻服補藥。

四 筆

【五倍子散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 療痔瘡腫爛。

藥品 川文蛤(大者)、一枚。

制法及用法 先敲一小孔。用陰乾荔枝草、揉碎。塞入令滿。用紙塞孔。溼紙包煨。凡時許取出。去紙。研爲細末。每一錢加輕粉三分。冰片五釐。共研極細末。唾津調塗之。

五 筆

【白金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治新久痔痛。

藥品 海螵蛸、去粗皮。

用法 研爲細末。每用二三錢。生麻油調成膏。以雞翎拂上。每日夜用之。日久自消。

【白芷散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治赤白帶下。

藥品 白芷、二兩。海螵蛸、二個(煨)。胎髮、一個(煨)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時溫酒調下。

【加味地黃丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 滋陰。治五痔。

藥品 熟地黃、黃耆、各一兩五錢。槐花、黃蘗、杜仲、白芷、各一兩。山茱萸、獨活、山藥、各八錢。牡丹皮、茯苓、澤瀉、各六錢。白附子、二錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。每服五十丸。空腹時米湯送下。

六 筆

【伏龍肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治赤白帶下。怔忡乏力。脈微濡者。

藥品 伏龍肝(於竈直下、去

取赤土、炒令煙盡)、屋梁上懸塵(炒令煙盡、出火毒)、各等分。棕櫚、不拘多少(燒赤、急以盆蓋、陰令存性)。

制法及用法 研爲細末。和勻。加腦、麝、各少許。每服三錢。溫酒或淡醋湯下。患十年者半月可安。

【地榆散】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治血痔。

藥品 地榆。

制法及用法 研爲細末。每服二錢匕。食前米飲調下。一日三次。

【地榆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痔瘡腫痛。

藥品 地榆、黃耆、枳殼、檳榔、川芎、黃芩、槐花、赤芍藥、羌活、各一錢。白蘇、蜂房(炒焦)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 清水二鍾。煎至一鍾。食前服。

【艾煎丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治婦人崩傷淋瀝。帶下赤白。小腹疼痛。

藥品 當歸、地黃、芍藥、各二兩。川芎、人參、石菖蒲(炒)、吳茱萸(用開口者、醋炒)、各一

兩。

制法及用法 研爲末，用蕪艾四兩。酒煎濃汁。入糯米糊爲丸。如梧桐子大。每服一百丸，醇酒送下。

【艾煎丸】

發明 見王璠是齋百一選方。

功用 治婦人胎前產後一切虛寒。赤白帶下。或成血瘕。久服自化。

藥品 伏道艾葉、五兩(揉去塵土、擇淨枝梗、取葉、先用大鼎淮棗十二兩、砂罐內煮爛去核、同艾葉搗爛如泥、捻作薄餅子、猛火焙乾、乘熱急碾爲末)。大漢椒、五兩(去目枝梗及合口者、淨、以阿膠二兩、米醋三升、同椒於砂瓶內煮極乾、取出焙乾燥、碾爲細末)。當歸(去蘆、酒浸、焙乾)、白芍藥(焙乾)、川芎(炒乾)、白薇(焙乾)、附子(大者、炮、去皮臍、焙乾)、卷柏(取青葉、焙乾)、澤蘭(去枝梗、取葉、焙乾)、地黃(如鋪上質者、須淨洗、漉去浮者、曬乾、酒浸蒸曬、再入酒浸蒸五七次、如糖煎香美方可用、焙乾)、各一兩

制法及用法 研爲細末。與艾末椒末拌勻。醋煮米糊和丸。如梧桐子大。每服五七十

丸。至一百丸二百丸。空腹時艾醋湯送下。

七 筆

【阜角煎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內痔。脫肛裏面生核。寒熱往來。

藥品 阜角、三挺(滿一尺者、去弦核、醋炙)。白礬(煨)、刺蠟皮(炙黃)、薏苡仁、白芷(一作一錢)、各一兩。桃仁(去皮炒)、甜葶藶(炒)、川芎、桔梗、各五錢。雄豬後蹄垂甲、十枚(燒存性)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時桑白皮煎湯送下。

八 筆

【乳香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治牡痔。

藥品 乳香、豬牙阜角、鯨鯉甲、各二兩。箬葉(去頭粗梗、剉)、四兩。蛇蛻、一條(頭尾俱全者)。黃牛角尖、一對(長二寸者、剉)。

制法及用法 入沙罐內。蓋口。鹽泥固濟。晒乾。用炭十斤煨。候雪燄出。去火放冷。取出研爲細末。每服二錢匕。

剔桃肉一枚。細研拌藥。空腹時溫酒調下。

【乳香散】

發明 見陝西明婦人大全良方。

功用 治赤白帶下。

藥品 乳香、一枚(去皮、入麝香一小塊、用麝香裹、火炮焦黃、留性、取出、和麝用)。

制法及用法 研為細末。每服二錢。重者三錢。陳皮飲調下。

【卷柏丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦女冷熱相攻。心腹絞痛。腰腿疼痛。赤白帶下。面黃。肢倦。體羸。

藥品 卷柏(醋炙)、鹿茸(醋炙)、白石脂(火煨鹽淬七次)、赤石脂(火煨鹽淬七次)、芎藭、艾葉(醋炒)、桑寄生、代赭石(火煨醋淬七次)、鼈甲(醋炙)、當歸(去蘆、酒浸、炒)、地榆、各一兩。木香(不見火)、龍骨、各五錢。乾薑(炮)、七錢五分。黃耆(去蘆、蜜炙)、熟地黃(洗)、各一兩五錢。

制法及用法 研為細末。醋煮糯米糊和丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時米飲送下。

【固經丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後血崩。

藥品 艾葉、赤石脂(煨)、補骨脂(炒)、木賊、各五錢。附子、一枚(炮)。

制法及用法 研為末。陳米飯為丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前溫酒或米飲送下。

【固經丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治陰崩不止。

藥品 艾葉(醋炒)、鹿角霜、伏龍肝、乾薑、各等分。

制法及用法 研為末。鹿角膠熔和藥末為丸。每服五十丸。食後淡醋湯送下。

九 筆

【枯痔散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治痔瘡突出。

藥品 明礬、白砒、各四錢。輕粉、硃砂、各三錢。

制法及用法 先將礬入銅杓內煨滾。次入砒末攪勻。以礬枯為度。去火毒片時。次入輕粉、硃砂。再研極細。瓷罐收貯。每日辰午申三時。以溫湯洗淨痔上。唾津調塗。四邊好肉。須先用護痔散護住。七八日其痔自然乾黑枯盡。方上生肌藥。

【枯痔散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治諸痔。

藥品 紅砒(放舊瓦上火煨、白煙將盡、取起淨末)、一錢。枯礬、烏梅肉(燒存性)、各二錢。硃砂(飛淨)、三分。

制法及用法 共研極細末。以口渡淨手指。蘸藥於痔頭痔身上搓擦。一日三次。初敷不腫。五六日出臭水。出盡。其痔乾枯。輕者七八日全愈。重者半月收功。

【枯痔散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治痔瘡突出。

藥品 天靈蓋(童子者佳、用青鹽水浸片時撈出、火煨紅、再入青鹽水內淬之、如此七次、淨用)、四錢。砒霜、一兩。生白礬、二兩。輕粉、四錢。蟾酥、二錢。

制法及用法 研為極細末。入小新鐵鍋內。上用粗瓷盤密蓋。鹽泥封固。炭火煨至二炷香。待冷揭開盤。將藥研極細末。鉛罐收貯。每日辰午申三時。先以溫湯或葱湯洗淨患處。用油調捻如錢厚。貼痔上令著。以薄綿紙按輒掩上。捲束其藥。不使侵好肉上。至七八日。其痔枯黑堅硬。住藥裂

縫。待其自落。換落痔湯洗之。

【威靈仙丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治氣痔。大便澀。

藥品 威靈仙(去土)、乳香(另研)、枳殼(麸炒)、各一兩。

制法及用法 研為細末。粟米飯和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食前來飲送下。每日三次。

十 筆

【消管丸】

發明 見王士雄四科簡效方。

功用 治痔漏膿毒成管。

藥品 胡黃連(炒、取淨末)、二兩。穿山甲(煎油炒黃、取淨末)、石決明(煨、取淨末)、槐米(微炒、取淨末)、各一兩。

制法及用法 共研勻。煉蜜為丸。如麻子大。每服一錢。清米湯送下。早晚各一服。至重者四十日可愈。如瘡口四邊有硬肉突出者。加蠶繭二十枚(炒研和入)。

【消管丸】

發明 見林屋山人經驗方。

功用 治痔漏膿毒成管。

藥品 苦參、四兩。川連、二兩(酒炒)。當歸、槐花、葶藶、

各一兩。五倍子、五錢。

制法及用法 各爲細末。用小鼈二箇(約重八九兩)。柿餅四兩。共煮溶。去鼈骨。搗爛。入前藥末搗爲丸。每服四錢。空腹時滾水送下。其管自出。

【桑寄生散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治便血。

藥品 桑寄生。

制法及用法 研末。每服一錢。不拘時熱湯點下。

【神效方】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治痔瘻下血。日夜不止。

藥品 白礬、五兩。綠礬、三兩。黃丹、伏龍肝、蝟皮、各二兩。

制法及用法 搗碎。入瓷罐內。用炭火五七斤。燒至炭盡爲度。候冷取出。研如粉。以麪糊爲丸。如梧桐子大。每服十丸。空腹時滾水送下。

【神應散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治血崩不止。

藥品 桂心、不拘多少(炒極焦、存性)。

制法及用法 研爲末。每服一二錢。滾水送下。

【神應膏】

發明 見玉肯堂證治準繩。

功用 治漏瘡。腸毒。胃毒。

藥品 當歸、一兩一錢。赤芍藥、大黃、各一兩五錢。香白芷、官桂、各一兩。玄參、一兩三錢。川續斷、生地黃、各一兩二錢。蓬莪朮、一兩(一作九錢)。

制法及用法 細剉。用香油二斤浸。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。入鍋內。以文武火煎令黑色。濾去渣。熱天用黃丹二十兩。冷月用十五兩。旋旋下。不住手攪。滴水中沈爲度。不可令婦人雞犬見。如漏有孔者。以膏送入孔內。外以膏攤貼之。腸毒。胃毒。宜爲丸服。

【秦艽白朮丸】

發明 見李東垣方。

功用 治痔瘡、痔漏、有膿血。大便燥硬作痛。

藥品 秦艽、一兩。白朮、五錢(一作四兩)。桃仁(去皮尖另研)、皂角仁(去皮燒存性、一作五錢)、各一兩。當歸梢(酒洗、一作一兩)、澤瀉、枳實(麸炒黃)、各五錢。地榆、三錢。

制法及用法 研爲細末。和

桃仁泥研勻。煎熟湯打麵糊爲丸。如芡實大。令藥光滑。焙乾。每用五七十丸。空腹時熟湯送下。少食以美膳壓之。忌食生冷、硬物、水菓、澀麵、及五辛辣熱大料等物。犯之則藥無效。

【追毒丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治痔漏通腸。糞從孔出。

藥品 胡黃連(切片、薑汁拌炒)、蝟皮(炙切片、再炒黃色)、各一兩。麝香、二分。

制法及用法 共研細末。麪飯爲丸。如麻子大。每服一錢。食前溫酒送下。服後膿水反多。此藥力到也。莫懼。後服閉管丸。

【退管丸】

發明 見周鶴仙方。

功用 療痔漏。

藥品 當歸(酒洗)、露蜂房(用槐樹上者、微炒)、川黃連(酒炒)、象牙、各五錢。槐花(微炒)、川芎(炒)、乳香(包在新鮮箬葉內、去油淨)、各三錢。

制法及用法 共研細末。黃蠟二兩。熔化爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時漏蘆、爐甘石、煎湯送下。其管退出。用翦翦去。亦有化爲膿血

出者。忌房事、豆腐、火酒。雖愈。仍忌四十九日。

【骨碎補丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痔瘻。

藥品 骨碎補、補骨脂、熟地黃、當歸、菟絲子、川續斷、石南、金石斛、牛膝、杜仲、革薢、附子、白芍藥、川芎、沙參、羌活、防風、獨活、黃耆、大麻仁、各等分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。空腹時鹽湯送下。與大瘻丸間服。

十一筆

【痔漏丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治痔漏。有退管生肌之效。

藥品 石蓮蓬、冬青子、各三兩。川黃連、川芎、淮牛膝(酒炒)、赤芍藥、當歸(酒洗)、黃芩、黃蘗、熟大黃、各一兩。槐角子、象牙末、各二兩。蛇蛻(去頭尾)、全蠍、各五錢。金墨、一錠(約重三錢)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。早晨熱湯送下。至七日後

服二錢五分。又七日服二錢。忌火酒。又七日服一錢五分。每日早晚用柳鬚花椒。煎湯薰洗。一料服完。永不再發。忌羊肉、鴨肉、公雞、鯉魚、辛辣。

【痔漏丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治痔漏。

藥品 大熟地、四兩。白茯苓、山藥、山萸肉、牡丹皮、白芍藥、各二兩。象牙、一兩五錢。鼈甲、肉蓯蓉、何首烏、各三兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【痔漏丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治痔漏。

藥品 金銀花、一斤。甘草節、連翹(去心)、各三兩。

制法及用法 共研細末。用夏枯草八兩熬膏。加煉蜜少許。和杵爲丸。如彈子大。約重三錢。每服一丸。熱湯或溫酒化下。早晚各一服。戒房事及飲酒。一料全愈。

【痔漏丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治痔漏。

藥品 黃連、苦參、乳香(去油)、沒藥(去油)、雄黃、各一

兩。連翹、犀蠶、蟬蛻、防風、全蠍、槐角(入牛膽汁煮)、生地黃、牛膝、陳皮、穿山甲、當歸、枳殼、地龍(去泥、曬乾)、各二兩。蜈蚣(焙、去頭足)、二十條。象牙末、五錢。人參、二錢五分。蜂房、一個(入玄明粉於眼內、草紙溼透包好、用微火烘之)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。空腹時熱湯送下。忌飲酒發物及房事。

【鹿茸丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人衝任虛衰。爲風冷所乘。致經水過多。其色瘀黑。甚者崩下。吸吸少氣。臍腹冷極。甚則汗出如雨。尺脈微小者。

藥品 鹿茸(燎去毛、酥炙)、赤石脂(製)、餘糧(製)、柏葉、附子(炮)、各一兩。熟地黃、當歸(酒浸)、艾葉、續斷、各二兩。

制法及用法 共研細末。酒糊或煉蜜爲丸。如梧桐子大。一方無艾葉。每服三五十丸。空腹時溫酒送下。

參考 此方爲足少陰厥陰藥也。今人多用之。治血虛淫勝帶下。甚捷。

【鹿茸散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治婦人漏下不止。

藥品 鹿茸(酥炙)、阿膠(蛤粉炒)、各三兩。烏賊骨(醋炒)、當歸、蒲黃(篩淨、半生半炒)、各二兩。

制法及用法 爲散。每服方寸匕。溫酒調下。一日三次。

【鹿茸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治崩漏不止。虛損羸瘦。

藥品 鹿茸、一兩(去毛、塗酥微炙黃)。白龍骨、鼈甲(塗酥炙令黃、去裙)、熟地黃、白芍藥、白石脂、烏鰂骨(炙令黃)、續斷、各二兩。肉苁蓉、一兩五錢(酒浸一宿、刮去皺皮、炙乾)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前粥飲調下。

【鹿角霜丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治血崩成漏。

藥品 鹿角霜、柏子仁(去殼炒)、當歸身、茯神、龍骨(煨)、阿膠(蛤粉炒成珠)、各一兩。川芎、七錢。香附(醋製)、二兩。甘草(炙)、五錢。川續斷、一兩五錢。

制法及用法 共爲末。山藥五兩研末。煮糊爲丸。如梧子

子大。每服五十丸。空腹時溫酒送下。

十二筆

【喚痔散】

發明 見張路玉張氏醫通方。

功用 治內痔不出。

藥品 生草烏頭、刺蝟皮(燒存性)、各一錢。枯白礬、五錢(一作五分)。食鹽(炒)、三錢(一作三分)。麝香、五分。冰片、三分(一作二分)。

制法及用法 研爲細末。先用溫湯洗淨。隨用津唾調藥三錢。填入肛門。片時即出。去藥。上護痔膏。

【喚痔散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 內痔不出。

藥品 磁石、一兩。生草烏尖、五分。枯礬、五錢。乾薑、三分(炮、另研)。

制法及用法 共研極細。用生薑汁或蔥汁調塗肛門上。少頃。待瘡自肛內脫出。上下洗淨。四邊好肉上用護藥。次上枯藥。一日三上。用新筆蘸藥洗之。如此六七日。脫盡痔根。即用生肌藥收口。後用貼頂升陽散收入其腸。內服槐角丸。

【獬皮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肛門脫出不收。

藥品 獬皮、一張(罐內燒存性)。礞石、五錢(火煨、醋淬七次)。桂心、三錢。鼈甲、一枚(慢火炙焦黃)。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。食前米飲調下。仍用草鞋底炙熱按入。忌房事。

【腎氣丸】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治陽盛陰衰。脾胃不足。房室虛損。形瘦無力。面色青黃。腸紅久痔。

藥品 蒼朮(油浸)、熟地黃、各一斤。五味子、八兩。乾薑、秋冬一兩。夏五錢。春七錢。

制法及用法 研爲細末。棗肉和丸。如梧桐子大。每服一百丸。食前米飲或溫酒送下。

參考 此方爲補氣益胃之劑。治血虛久痔甚妙。

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人暴崩不止。

藥品 赤芍藥、香附子、梔子亂髮(皂莢水浸)、枯荷葉、當歸、樓櫚(炒焦、存性)、烏紗帽、各等分。

制法及用法 除樓櫚外。其

餘並用粗片。新瓦上煨成黑灰。存性三分。研爲細末。每服五錢。空腹時童便調下。如人行十里再一服。七八服即止。若產後去血過多。加米醋、京墨、麝香各少許。

【菖蒲酒】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後血暈。

藥品 菖蒲、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。酒二盞。煮取一盞。去滓。食前分溫三服。以菖蒲煎汁與米麴同釀。或但以菖蒲浸酒中。

【黑丸】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治久年痔漏下血。

藥品 百草霜、白礬、各一兩。木饅頭、三兩。烏梅、敗棕、柏葉、亂髮、各一兩二錢五分(俱各燒存性、爲末)。桂心、三錢。白芷、五錢。

制法及用法 研爲細末。令勻。醋糊爲丸。如梧桐子大。每服三四十丸。空腹時米飲湯送下。

十三筆

【椿皮丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痔漏下血疼痛。

藥品 椿根白皮(東行者)。

制法及用法 研細末。醋糊和丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時米湯送下。

【椿皮丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治瘦人帶下。熱勝於溼。

藥品 椿根皮、三兩。白芍藥、一兩。黃蘗(燒灰)、四錢。良薑(燒灰)、六錢。

制法及用法 研爲末。糊漿和丸。如梧桐子大。每服三錢。豆腐漿送下。

【補宮丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治赤白帶下。

藥品 鹿角丸、茯苓、白朮、白芍藥、白芷、牡蠣(煨、童便炒)、山藥、龍骨(煨)、赤石脂、各五錢。乾薑(炒)、二錢五分。

制法及用法 共研細末。醋漿爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時米湯送下。

【當歸煎】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治赤白帶下。腹內疼痛。不欲飲食。日漸羸瘦者。

藥品 當歸(酒浸)、赤芍藥、牡蠣(火煨取粉)、熟地黃(酒煮、焙)、阿膠、白芍藥、續斷(酒浸)、各一兩。地榆、五錢。

制法及用法 共研末。醋糊

爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時米飲送下。

十四筆

【槐角丸】

發明 見顯世濟醫大全。

功用 治痔漏。

藥品 槐角子、槐花、各八兩。檳榔、四兩。黃芩、三兩。剝蟬皮、二個(酒浸、焙)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。空腹時熱湯送下。

【槐花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脫肛。

藥品 槐花、槐角(炒香貨)、各等分。

制法及用法 研爲末。羊血蘸藥炙熟食。溫酒送下。

【蒲黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痔漏。

藥品 蒲黃、血竭、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每用少許。貼於患處。

【蒲黃散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治婦人漏下不止。

藥品 蒲黃、鹿茸、當歸。

制法及用法 研爲末。清水

煎服。

【熊膽散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治痔瘡堅硬作痛。脫肛腫泛不收。

藥品 熊膽、二分。冰片、一分。

制法及用法 研細。先將大田螺一個。用尖刀撿起螺鬚。入藥在內。放片時。待螺化出藥水。用雞翎搽痔上。頻頻用之。即愈。

【蓖麻子膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治暴患脫肛。

藥品 蓖麻子、一兩。

制法及用法 杵爛爲膏。捻作餅子。兩指寬大。每用一餅。貼於肛上。如陰證脫肛。加生附子(研末)。同葱蒜搗和作膏。依前法貼之。

十五筆

【蝟皮丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治痔漏。

藥品 刺蝟皮、三四個(酒浸、焙)。經霜槐角子、一斤。當歸、三兩。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一二百丸。溫酒送下。

【蝟皮丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸痔出血。裏急後痛。

藥品 蝟皮、一兩(炙焦)。槐花(微炒)、艾葉(炒黃)、白芍藥、枳殼(炒)、地榆、川芎、當歸、白礬(煨)、黃耆、貫衆、各五錢。頭髮、三錢(燒存性)。豬後懸蹄垂甲、十枚(炙焦)。鹽炙皂角、一挺(去弦核、醋炙黃)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。食前米飲送下。

【磁石散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肛門癢痛。

藥品 磁石、五錢(火煨醋淬七次)。

制法及用法 研爲末。每服一錢。空腹時米飲調下。

十六筆

【龍腦散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痔瘡熱痛。

藥品 鯽魚、一條(去腸肚、入穀精草填滿、燒存性)。

制法及用法 研爲末。入龍腦少許。蜜調敷之。

【獨聖散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人血崩不止。

藥品 防風(去蘆)、不拘多少。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。酒煮白麵清調下。空腹食前一日二次。更以麵作糊酒塗之。極驗。

【豬臙丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痔瘻下血。

藥品 豬臙、一條(洗淨、控乾)。槐花(炒、爲末、填入臙內、兩頭紮定、石器米醋煮爛)。

制法及用法 搗和丸。如梧桐子大。每服五十丸。食前當歸酒送下。

十七筆

【縮砂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治大腸虛熱。脫肛紅腫。

藥品 縮砂仁、黃連、木賊、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時米飲調下。

十八筆

【檳榔散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風氣稽留下部。結成牝痔生瘡。下血腫痛。

藥品 檳榔(剉炒)、澤瀉(酒浸)、瞿麥、甜葶藶(隔紙炒)、防己、蘗本(去苳土)、陳皮(去白炒)、郁李仁(同陳皮炒)、滑石、各五錢。芫花(醋拌炒黃)、木香、各一兩。乾漆(炒煙盡)、一錢二分五釐。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。一日三次。

二十一筆

【麝香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治牝痔。及一切內外痔。疼痛不可忍。

制法及用法 用新黃大瓜囊一枚。以刀開下頂子。不去瓢。選不蛀阜角子填滿。以開下頂蓋合。另用紙筋泥固濟。約三指厚。以炭火煨令紅。置一坵坑內。出火毒。一宿取出。入麝香末一錢。研令極細。瓷盒收盛。每服一錢匕。米飲調下。

二十二筆

【臙連丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治大便下血正赤。日

久不止。多食易飢。腹不痛。裏不急。肛門墜腫。

藥品 宣黃連、二兩(酒炒)。公豬大腸、一段(肥者、長二尺、水洗淨、泡去油膩、一方加槐花、二兩)。

制法及用法 將宣黃連研末。裝入大腸內。兩頭用線紮緊。置砂鍋內。下煮酒二斤八兩。慢火熬之。以酒乾爲度。將藥腸取起。共搗如泥。如藥濃。再曬一時許。添糕糊和爲丸。如梧桐子大。一作同韭菜蒸爛。搗作餅。焙乾。研爲末。水煮米糊和丸。每服四十五丸至七十丸。空腹時溫酒或米湯、烏梅湯、送下。久服除根。若血色晦淡者。禁用。

二十四筆

【鼈甲丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腸痔。

藥品 鼈甲、刺蝟皮(炙焦黑)、穿山甲(炙焦)、枯白礬、附子、豬牙皂角(炙焦存性)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。令勻。蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前米飲送下。一日三次。

【鼈甲散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治五種痔漏。膿血淋漓。或腫痛堅硬下墜。

藥品 鼈甲、露蜂房、蛇蛻、豬後懸蹄、絹皮、各二錢。麝香、一分。

制法及用法 除麝香另研外。餘俱燒存性研末。和勻。每服一錢。空腹時生地黃煎湯調下。更以末敷患處。

淋濁類

四筆

【五淋散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治五淋。

藥品 赤茯苓(一作白茯苓)、一錢五分。赤芍藥(去蘆、一作白芍藥)、一錢。山梔仁、一錢。當歸(去蘆)、甘草、各一錢二分。

制法及用法 研爲細末。加燈心二十莖。清水煎。食前服。或和五苓散。用竹園蓼、門冬草、蔥頭、燈心煎湯調下。

參考 此方治淋證之稍輕者。重者宜用八正散。

【牛膝膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治死血作淋。

藥品 牛膝、四兩(去蘆、酒洗一宿)。桃仁(去皮、炒)、歸尾(酒洗)、各一兩。赤芍藥、生地黄(酒洗)、各一兩五錢。川芎、五錢。

制法及用法 製片。用甜水上鍾。炭火慢慢煎至二鍾。加麝香少許。分作四次。空腹時服。如夏月涼水換此。則膏不壞。

【木香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人五淋。

藥品 木通、榆白皮、瞿麥穗、大寒仁、滑石、各一兩。葵子、貝齒、白茅根、各二兩。甘草、五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。清水煎。空腹時溫服。

五 筆

【石韋散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治腎氣不足。膀胱有熱。小便淋瀝。或如豆汁。或出砂石。勞倦即發。

藥品 石韋(去毛)、芍藥、白朮、滑石、葵子、瞿麥、木通、各二兩。當歸(去蘆)、甘草(炙)、

五不留行、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時小麥煎湯調下。一日二三次。

【石韋散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸淋。

藥品 石韋(去毛)、一兩。冬葵子、木通(剉)、赤茯苓、各五錢。車前子、瞿麥、榆白皮、滑石、甘草、各二錢五分。

制法及用法 搗羅爲末。每服一錢。清水一小盞。加葱白五寸。煎至六分。去滓溫服。如人行十里再服。量兒大小加減。

【石燕丹】

發明 見張氏方。

功用 治小便淋瀝痛澀。

藥品 石燕(燒赤、醋淬、灰冷、研細)、瞿麥、滑石、各一兩。木通(剉)、海蛤(細研)、各五錢。

制法及用法 搗羅爲細末。煉蜜和丸。如黍米大。每服一九。食前葱白湯送下。量兒大小加減。

【立效散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治下焦結熱。小便淋閉作痛。時或尿血。

藥品 瞿麥穗、四錢。山梔

子(炒)、二錢。甘草、一錢。

制法及用法 加生薑、燈心。清水二鈞。煎至一鐘。食前服。

【白龍丸】

功用 治淋濁初起。小便澀痛。溼熱下注。

藥品 川大黃、穿山甲、雄黃、姜蟲、各四兩。乳香、沒藥、各三兩。

制法及用法 共研細末。酒泛爲丸。滑石六兩爲衣。每服二錢。熱湯送下。不宜多服。

六 筆

【地黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎虛。膀胱熱結淋瀝。

藥品 生地黄(切焙)、黃耆、各一兩五錢。防風(去叉)、遠志(甘草水漬、去心)、茯神(去木)、鹿茸(去毛、酥炙)、黃芩(去黑心)、瓜蒌、各一兩。人參、一兩二錢五分。石韋(去毛)、當歸(焙)、各五錢。赤芍藥、戎鹽、蒲黃、甘草(炙)、各七錢五分。車前子、滑石、各二兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前溫酒或鹽湯送下。

【肉蓯蓉丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治冷淋。

藥品 肉蓯蓉(酒浸、切焙)、熟地黃、山藥、金石斛(去根)、牛膝(酒浸、切焙)、官桂(去麤皮)、檳榔、各五錢。附子(炮去皮臍)、黃耆、各一兩。黃連(去鬚)、七錢五分。細辛(去苗葉)、甘草(炙)、各二錢五分。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。鹽酒送下。

【如聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治沙淋。

藥品 馬蘭花、麥門冬(去心)、白茅根、車前子、甜葶藶、苦葶藶(炒)、檀香、連翹、各等分。一方無苦葶藶。

制法及用法 研爲末。每服四錢。清水煎服。如渴加黃芩入燒鹽少許服。

七 筆

【沉香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治氣淋。

藥品 沉香、石韋(去毛)、滑石、王不留行、當歸、各五錢(一作各一兩)。冬葵子、芍藥、各七錢五分。甘草(炙)、橘皮、各二錢五分。一方有瞿麥、一兩。

白朮、七錢五分。無槌皮。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時大麥煎湯調下。以利爲度。

【沉香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治膏淋。臍下妨悶。不得快利。

藥品 沉香、陳皮(湯浸、去白、焙)、黃耆、各七錢五分。麝香、三兩。榆白皮、韭子(炒)、滑石、各一兩。黃芩、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前清粥飲調下。

【車前子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸淋。

藥品 車前子、淡竹葉、赤茯苓、荊芥穗、各二錢五分。燈芯、二十莖。

制法及用法 新汲水二鍾。煎至一鍾。食前服。

八 筆

【金沙散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人諸淋。

藥品 海金沙草(陰乾)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。生甘草煎湯調下。

【金沙散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒小便淋瀝不通。

藥品 海金沙、鬱金、滑石、甘草、各等分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。地膚子煎湯調下。燈芯木通亦可。

【金黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血淋。

藥品 大黃(煨)、人參、蛤粉、黃蜀葵花(焙)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。燈芯煎湯調下。一日三次。

【固精丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治嗜欲過度。勞傷腎經。精元不固。夢遺白濁。

藥品 肉蓯蓉(酒浸、焙乾)、陽起石(火煨、研細)、鹿茸(去毛、酥炙)、川巴戟(去心、酒浸)、赤石脂(火煨七次)、口伏苓(去皮)、附子(炮、去皮臍)、鹿角霜、龍骨(生用、一作煨)、萆子(炒)、各等分。一方有五味子。

制法及用法 研爲細末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時鹽湯送下。

十 筆

【海金沙散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸淋澀痛。

藥品 海金沙、肉桂、甘草(炙)、各二錢。赤茯苓、豬苓、白朮、芍藥、各三錢。澤瀉、五錢。滑石、七錢。石葦、一錢(去毛)。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。清水一盞。加燈心三十莖。煎至七分。去滓。空腹時溫服。

【海金沙散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治背淋。

藥品 海金沙、滑石、各一兩。甘草、二錢五分。

制法及用法 研爲末。和勻。每服二錢。食前麥門冬煎湯或燈心湯調下。

【茯苓丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心腎俱虛。神志不守。小便淋瀝。

藥品 赤茯苓、白茯苓、各等分。

制法及用法 研爲細末。新汲水浸洗。澄去筋脈。絞乾復研末。加地黃汁、好酒。同於銀石器內熬成膏。搜和爲丸。

如彈子大。每服一丸。空腹時細嚼。鹽湯或溫酒送下。

【茯苓散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血淋帶下。積久不止。面黃體瘦。漸成虛勞。腰脚沈重。及妊娠胎氣多損。

藥品 白茯苓(去黑皮)、木香、熟地黃(焙)、訶梨勒皮、柏子仁(焙)、杜仲(去粗皮、炙)、青橘皮(去白、焙)、石菖蒲、烏鰂魚骨(去甲)、五加皮(剉)、艾葉(燒灰)、牛角鰓(燒灰)、秦艽(去苗土)、赤石子、菟絲子(酒浸、另搗)、當歸(切焙)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒或糯米飲調下。有胎息者。以鯉魚煮糯米粥調下。

十一筆

【鹿茸丸】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人久積虛冷。小便白濁。滑數不禁者。

藥品 鹿茸(炙)、椒紅、桂心、附子(炮)、牡蠣(煅)、補骨脂(炒)、石斛、肉蓯蓉(酒浸)、雞蹯脰(炙)、沉香、各一兩。桑螵蛸(炙)、五錢。

制法及用法 共研細末。酒

煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。

【鹿角霜丸】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治膏淋。

藥品 鹿角霜、白茯苓、秋石、各等分。

制法及用法 共研細末。米糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。米飲送下。

【羚羊角飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血淋。小便結熱澀痛。

藥品 羚羊角屑、梔子仁、葵子(炒)、各一兩。青箱子、紅藍花(炒)、麥門冬(去心)、大青、大黃(炒)、各五錢。

制法及用法 搗篩。每服三錢匕。清水一盞。煎至七分。去滓。不拘時溫服。

【麥門冬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心熱氣壅。澀滯成淋。臍下妨悶。

藥品 麥門冬(去心)、木通、赤芍藥、葵子、各一兩。滑石、二兩。川芒硝、一兩五錢。

制法及用法 爲散。每服四錢。清水一盞。加生薑五片。蔥白二莖。煎至六分。去滓。

食前溫服。

十二筆

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治五淋。

藥品 琥珀、滑石、各二兩。木通、當歸、木香、鬱金、麝香、各一兩。

制法及用法 研爲末。每服五錢。加蘆葦葉五片。清水一盞。煎至八分。食前服。一日三次。

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治五淋澀痛。小便出膿血。

藥品 琥珀、海金沙、沒藥、蒲黃(炒)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。食前通草煎湯調下。

十三筆

【葵子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治石淋澀痛不可忍。

藥品 冬葵子、一兩。石南、楡白皮(剉)、石葦(去毛)、木通(剉)、各五錢。

制法及用法 搗羅爲末。每服五分。葱白湯調下。一日二次。量兒大小加減。

【葵子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒諸淋。

藥品 冬葵子、車前子、木通、桑白皮(炒)、瞿麥、赤茯苓、樞子、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 清水一盞。煎服。

十四筆

【遠志丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小便赤濁。

藥品 遠志、八兩(甘草水煮、去心)。茯神(去木)、益智仁、各二兩。

制法及用法 共研細末。酒煮麴糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。臨臥時鹽湯送下。

【蒲黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治膀胱熱甚。血淋經痛。

藥品 蒲黃、冬葵子、生地黃、各五錢。

制法及用法 搗羅爲細末。每服一錢。清水一大盞。煎至六分。去滓溫服。量兒大小加減。

十五筆

【磁石丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治精虛體瘦。夢泄遺精。小便白濁。甚則陰痿者。

藥品 磁石、二兩(煨、醋淬)。肉蓯蓉(酒浸、焙)、鹿茸(酒蒸)、續斷(酒浸)、杜仲(薑炒)、赤石脂(煨)、柏子仁(炒、另研)、熟地黃(酒蒸、焙)、山茱萸肉、菟絲子(酒蒸、另研)、巴戟(去心)、韭子(炒)、各一兩。

制法及用法 共研細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時鹽酒或鹽湯送下。

【磁石丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治膏淋。

藥品 磁石(火煨、醋淬三七次)、澤瀉、肉蓯蓉(酒浸、切焙)、滑石、各一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。溫酒送下。

十六筆

【導赤散】

發明 見錢乙方。

功用 治心熱移於小腸。口糜舌瘡。小便赤澀。莖中作痛。熱淋不利。

藥品 生乾地黃、五錢。木通、生甘草梢、各一錢。一方無

甘草、有黃芩。一方多燈草。一方多車前。

制法及用法 研爲末。每服三錢。清水一鍾。加淡竹葉七片(一作一握、一作二十片)。煎至五分。食後溫熱服。溺血加辰砂五分。

參考 赤色屬心。導赤者導心經之熱。從小腸而出。以心與小腸爲表裏也。然所見口糜舌瘡。小便黃赤。莖中作痛。熱淋不利等病。皆心熱已移於小腸。而下焦之血分亦熱矣。故不用黃連直瀉其心。而用生地滋腎涼心。清下焦血分之熱。木通通利小腸。佐以甘草梢。取易瀉最下之熱。則莖中之痛可除。心經之熱可導也。此方於水虛火不實者宜之。以利水而不傷陰。瀉火而不伐胃也。若心經實熱。須加黃連、竹葉。甚者。更加大黃。亦釜底抽薪之法也。

【導赤散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒血淋。

藥品 生地黃、木通、各二錢。黃芩、生甘草、各三錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。加燈心。井水煎服。仍以米飲調油髮灰。空腹時瀉下。

【龍骨丸】

發明 見赤脚道人方。

功用 治白濁。

藥品 龍骨、牡蠣、各五錢。

制法及用法 研爲末。入鯽魚腹內。溼紙裹。入火內炮熟。取出去紙。將藥同魚肉搜和丸。如梧桐子大。鯽魚不拘大小。以能盛納上藥爲度。更加茯苓、遠志、各五錢。尤佳。每服三十丸。空腹時米飲送下。

【獨聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治沙石淋。

藥品 黃蜀葵(花子俱用、炒)、一兩。

制法及用法 研爲細末。每服一錢匕。食前米飲調下。

【澤瀉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治冷淋。

藥品 澤瀉、紫蘇、石草(去毛、炙)、蒲黃、赤茯苓(去皮)、當歸、琥珀(另研)、檳榔、各一兩。枳殼(欬炒)、桑螵蛸(炒)、各五錢。官桂、七錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢匕。冬葵子或木通煎湯調下。

十八筆

【雞蘇散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血淋。

藥品 雞蘇葉、木通、各二兩。生乾地黄、滑石、各三兩。刺繭根、一兩。

制法及用法 研爲粗末。每服五錢。清水一盞半。加筆竹葉三七片。煎至七分。去滓。食前溫服。

【瞿麥散】

發明 見方賢奇效方。

功用 治血淋尿血。

藥品 瞿麥穗、赤芍藥、車前子、白茅根(即無根用花)、赤茯苓、桑白皮(炒)、石韋(去毛)、生乾地黄、阿膠(炒)、滑石、黃芩、甘草(炒)、各二錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。加血餘一錢(燒灰)。食前沸湯調下。

痧 疫 類

二 筆

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治霍亂、心腹痛、不食。

藥品 人參、白朮、芍藥、草豆蔻、厚朴(薑炙)、當歸(炒)、陳皮(去白)、丁香、枳心、各一分。

制法及用法 搗羅爲散。每服五分。不拘時薑棗米飲調下。

【人中黃散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治火頭疫癘。及瘡瘡癰。

藥品 人中黃、一兩。辰砂、雄黃、各一錢五分(一作各一錢)。

制法及用法 研爲末。每服一錢。薄荷桔梗湯調下。日三次。

【人馬平安散】

功用 治霍亂痧脹、山嵐瘴癘。及暑熱穢惡諸邪。直干包絡。昏暈不省人事。

藥品 雄黃、硼砂、硝石、各一兩。硃砂、五錢。梅花冰片、當門子、各二錢。飛金、一百頁(或加牛黃)。

制法及用法 研爲細末。和勻。瓷瓶緊裝。每服二三分。涼開水調下。或嗅少許於鼻內。

【人馬平安散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治時疫毒氣臭毒。痧

眼喉痛。並治六畜瘟。

藥品 雄黃(水飛)、硃砂(水飛)、冰片、麝香、各五分。鐵硝、一錢。

制法及用法 共爲極細末。瓷瓶收貯。每用少許。點目大眇中。男左女右。用此入時疫病家。則不沾染。六畜瘟。亦點眼大眇。

【人參白朮散】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治霍亂吐瀉。

藥品 人參、白朮、白茯苓、甘草(炙)、木香、藿香、各五錢。乾葛、一兩。

制法及用法 研爲末。每服二錢。沸湯調下。或剉細。加生薑一片。清水一盞。煎至七分。去渣。不拘時溫服。吐甚者。加生薑汁頻頻飲之。

四 筆

【木瓜散】

發明 見楊士瀛仁齋直指。

功用 治吐瀉不已。轉筋胸悶。

藥品 木瓜、一兩。茴香、二錢五分(微炒)。吳茱萸、五錢(湯洗七次)。甘草(炙)、二錢。

制法及用法 剉散。每服四錢。加生薑五片。紫蘇十葉。清水煎。空腹時服。一方加

鹽一撮。烏梅一個。

六 筆

【肉豆蔻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒霍亂。吐瀉腹痛。

藥品 肉豆蔻、桂心、各一分。人參(去蘆)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服一錢。清水一小盞。加生薑少許。煎至五分。不拘時溫服。量兒大小加減。

七 筆

【車前子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治霍亂吐瀉。煩悶口渴。小便不利。

藥品 車前子(炒)、白茯苓、豬苓、香薷、人參、各等分。

制法及用法 研爲末。燈心湯調下。

九 筆

【香鼓散】

發明 見陳耕道疫痧草。

功用 治痧隱脈鬱。喉腐舌乾。邪火內伏等證。

藥品 香鼓、牛蒡、荊芥、桔梗、甘中黃、連翹、烏梅、馬勃

大貝。

制法及用法 清水煎服。

【飛龍奪命丹】

發明 近時通行方。

功用 治痧脹疔痛。霍亂轉筋。厥冷脈伏。神昏危急。及受溫暑瘴疫陰惡陰晦諸邪。肢蜷痞脹。驚亂昏狂。或卒倒身強。遺溺不語。身熱癰繼。宛如中風。或時證逆傳。神迷狂譫。小兒驚癇。角弓反張。牙關緊閉。

藥品 牛黃、二錢。辰砂(飛)、二兩。麻黃(去節)、冰片、各四錢。人中白(漂煨)、八錢。月石、麝香、珍珠、牙皂、各三錢。腰黃、燈草灰、各一兩。青黛(飛)、明礬、各五錢。蟾酥、銀硝、各一錢五分。赤金箔、三百頁。

制法及用法 各研極細末。裝入瓷瓶內。封固。勿令洩氣。每用少許。吹鼻取嚏。重者再用一分。開水調服。小兒減半。孕婦忌服。

參考 此方芳香辟穢。於化毒祛邪宣氣通營。有斬關奪隘之功。具起死回生之力。無論家居遠出。皆宜備之。

十一筆

【紫金錠】

功用 治霍亂。痧脹。暑淫溫疫。頭狂昏亂。五絕。暴厥。厥魘。嵐瘴中惡。水土不服。喉風。中毒。鬼胎。癰癤疽。蛇犬諸傷。

藥品 山慈姑、文蛤、各二兩。紅芽大戟、白檀香、安息香、蘇合泊、各一兩五錢。千金子(去油、研成霜)、一兩。明雄黃(飛淨)、琥珀、各五錢。冰片、當門子、各三錢。

制法及用法 各研極細。再合研勻。濃糯米飲杵丸。如綠豆大。飛金爲衣。每服一錢許。涼熱水送下。

參考 此方比蘇合丸而無熱。較至寶丹而不涼。備二方之開閉。兼玉樞之解毒。洵爲濟生之仙品。實紫金錠方之最完備合用者。

【通關散】

發明 見夏春農疫喉淺論。

功用 治疫喉邪鬱。痧四脈伏。牙關拘急。藥難下咽。鼻塞氣促。

藥品 薄荷葉、豬牙皂角、各等分。

制法及用法 共爲細末。每用少許。以紙撚入鼻內。俟得噴嚏口開。隨進湯藥。

十二筆

【開關散】

發明 見王孟英霍亂論。

功用 治番痧臭毒。腹痛如絞。氣閉神昏。

藥品 燈芯灰、一兩。羊躑躅、三錢。北細辛、蟾酥、牙皂、各二錢。牛黃、梅片、麝香(當門子)、各一錢。

制法及用法 共研極細。瓷瓶緊裝。毋令泄氣。每用少許。吹入鼻中。得嚏則生。

參考 本方即臥龍丹去月石、荊芥。

十三筆

【辟瘟丹】

發明 見太倉公方。

功用 辟瘟疫。

藥品 蒼朮、八兩。白朮、烏藥、黃連、羌活、各四兩。川烏、草烏、細辛、紫草、防風、獨活、藁本、白芷、香附、當歸、荊芥、肉桂、甘松、三柰、白芍藥、乾薑、麻黃、皂角、甘草、各二兩。麝香、三錢五分。

制法及用法 共研細末。預肉爲丸。如彈子大。每用一丸。燒之。

【辟瘟丹】

發明 見鮑桂激驗方。

功用 治時行痧疫初起。嘔惡。霍亂轉筋。吐瀉。絞腸腹痛。中風中暑中痰。卒然倒地。不省人事。山嵐瘴癘。瘡疹初起。爛喉隱疹。傷寒癰痢初起。肝胃疼痛。久積。哮喘呃逆。心腹脹滿。周身掣痛。二便不通。蟲積蟲毒癰塊。婦女腹中結塊。小兒驚風。十積五疳。痘後餘毒。療無名腫毒。

藥品 羚羊角、朴硝、牙皂、廣木香、黃蘗、茅朮、茜草、黃芩、半夏(薑製)、文蛤、銀花、川連、犀角、川厚朴、川烏、玳瑁、大黃、藿香、玄精石、廣鬱金、茯苓、香附、桂心、各三兩。赤小豆、降真香、鬼箭羽、硃砂、毛茛菪、大棗、各四兩。甘遂、大戟、桑皮、千金霜、桃仁霜、檳榔、蓬朮、胡椒、葶藶子、西牛黃、巴豆霜、細辛、白芍藥、公丁香、全當歸、禹餘糧、滑石、山豆根、各一兩。麻黃、麝香、菖蒲、水安息、乾薑、蒲黃、丹參、天麻、升麻、柴胡、紫蘇、川芎、草河車、檀香、桔梗、白芷、各二兩。紫菀、八錢。芫花、五錢。雄黃、琥珀、冰片、麝皮、腰黃、各一兩五錢。斑貓、三十隻。蜈蚣、七條。石龍子、三條。

制法及用法 各研淨粉。糯米糊爲錠。每重八分。密收勿

鴻氣。每服一錢。重者倍之。小兒減半。周歲兒一二分。熱湯或溫酒調下。如急暴惡證。不限錢數。小兒痘後餘毒。磨敷患處。已有頭者。圍頭出毒。無名腫毒。醋磨敷之。

參考 此方攻病之力極大。不傷元氣。秋夏感證服之。無不應手立效。取汗吐下三者得一爲度。若服之過少。藥力不足。未免自誤。虛弱之人。宜乘病證初起。元氣未漓者。急服立效。倘遲延多日。邪氣入裏。正氣已虧。神昏自汗。則宜斟酌。然香味甚重。孕婦三四箇月胎氣不足者忌服。如月足胎元實者。遇此急證。不妨酌服。

【雷擊散】

發明 見陳修園方。

功用 治羊毛痧、及七十二種痧症。

藥品 牙皂、細辛、各三錢五分。硃砂、雄黃、各一錢五分。薄荷、藿香、各三錢。桔礬、白芷、各一錢。桔梗、防風、木香、貫衆、陳皮、半夏麴、甘草、各二錢。

制法及用法 共研細末。收於瓶內。用蠟封口。每用二三分。吹入鼻中。再用一二錢。滾湯沖服。安睡片時。汗出即

愈。

十四筆

【瀉蘆散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治臟腑積熱發痧。時疫痧疹。頭面紅腫。咽喉堵塞。水漿不下。一切危惡疫癘。

藥品 瀉蘆、升麻、大黃、黃芩、各一兩。藍葉、玄參、各二匳。

制法及用法 研爲粗末。每服二錢。浸水煎服。腫熱甚者。加芒硝二錢五分。

十六筆

【獨活散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治瘟疫瘴氣。脚膝疼痛。發熱頭疼體痛。

藥品 獨活、羌活、細辛、防風、麻黃(去節、泡)、生枳殼、蔓荊子、甘菊花、黃芩(酒洗)、人參、茯苓、甘草(炙)、各一兩。石膏、二兩。

制法及用法 爲散。每服五錢。加薄荷五葉。生薑三片。清水煎。去滓。不拘時熱服。

二十九筆

【鬱金丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治痧證腹痛。並治九種心痛。

藥品 鬱金、木香(勿見火)、明雄黃(爲衣)、各三錢。五靈脂(醋炒)、一兩。玄胡索、八錢。砂仁(炒)、生明礬、各五錢。

制法及用法 共研細末。神麴糊丸。如蘿蔔子大。每服三四十丸。唾津嚥下。須少用熱湯。

經 產 類

一 筆

【一笑散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治血崩。

藥品 新綿、一握。

制法及用法 燒灰。研爲細末。空腹時溫酒調下。

二 筆

【人參丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治妊娠胎不長。

藥品 人參、白茯苓、當歸、柴胡、刺藹、厚朴、桑寄生葉、各一兩。枳殼、七錢五分。甘草、五錢。

制法及用法 研爲細末。東

蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前溫湯送下。

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治妊娠。熱氣乘於心脾。津液枯少。煩躁。壅熱。乾渴。

藥品 人參、麥門冬、赤茯苓、地骨皮、乾葛、黃芩、犀角屑、各七錢五分。甘草、五錢。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一盞。煎至六分。去滓溫服。

【人參散】

發明 見鄭氏方。

功用 治漏胎。敗血滲心。日漸胎乾。子母危困。

藥品 人參、黃耆(炙)、陳阿膠(炒)、各五錢。竹茹、木香、甘草(炙)、附子(炮)、各五分。川芎、陳皮、苧麻根、各二錢五分。生薑、三錢(炮黑)。

制法及用法 咬咀。每服五錢。加糯米三七粒。清水煎。熱服。忌食生冷雞鴨魚麵。

【人參散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治妊娠脾胃虛寒。霍亂吐瀉。心煩腹痛。飲食不入。

藥品 人參、厚朴(薑製)、枳紅、各二錢。當歸(炒)、乾姜

(泡)、甘草(炙)、各一錢。

制法及用法 清水二鍾。加生薑三片。紅棗三枚。煎至一鍾。不拘時服。

【人參丁香散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治妊娠惡阻、胃寒嘔逆、翻胃、心腹痼痛。

藥品 人參、丁香、藿香葉、各二錢五分。

制法及用法 爲散。每服三錢。清水一盞。煎至七分。去滓。不拘時溫服。

【人參白朮散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治妊娠口乾咽痛。產後下痢口渴。

藥品 人參、白朮、當歸、白芍藥、山梔子、大黃、連翹、澤瀉、天花粉、葛根、茯苓、各一錢。官桂、木香、藿香、各五分。甘草、六分。寒水石、四錢。石膏、八錢。磁石、芒硝、各六錢。

制法及用法 研爲末。每服五錢。加蜜少許。熱湯調下。漸加至兩許。每日二三次。

【人參半夏丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治妊娠惡阻。嘔心。胸腹冷痛。吐逆不食。

藥品 人參、半夏、乾薑、各五錢。

制法及用法 地黃汁浸。蒸餅和丸。熱湯送下。

【人參荆芥散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人血氣發熱。身疼。頭昏。目澀。心煩。體倦。寒熱。盜汗。頰赤。口乾。痰嗽。胸滿。精神不爽。或經水不調。臍腹疼痛。瘕瘕塊硬。疼痛發渴。或時嘔逆。飲食不進。或因產失調。漸成勞損。

藥品 人參、荆芥穗、生乾地黃、柴胡、鼈甲(醋炒)、酸棗仁(炙)、枳殼(製)、羚羊角(鎊)、白朮、各七錢五分。桂心、片草、防風、川芎、當歸、各五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服五錢。清水一盞半。加生薑三片。煎至八分。去滓。不拘時熱服。

【人參黃耆散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治婦人妊娠身熱、煩躁、口乾、食少。

藥品 人參、黃耆、葛根、麥門冬、赤茯苓、秦艽、各一兩。知母、七錢五分。甘草、五錢。

制法及用法 每服四錢。加生薑、竹葉。清水煎服。

【二香散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治妊娠胎動。氣不升降。飲食不美。嘔吐酸水。起坐覺重。

藥品 香附子、一兩。蜜香葉、甘草、各三錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時沸湯調下。

【二神丸】

發明 見陳氏方。

功用 治婦人血氣痛下血。經水不調。

藥品 蒲黃(泡)、藕撥(鹽炒)、各等分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。如不能飲酒。米酒亦可。兩服即止。

【二黃散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治胎漏。

藥品 生地黃、熟地黃(剉)、各等分。

制法及用法 清水三盞。煎半乾。去滓服。

【丁香散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治產後心煩咳噫。

藥品 丁香、白豆蔻仁、各五

錢。伏龍肝、一兩。

用法 研爲細末。每服一錢。桃仁、吳茱萸、煎湯調下。如人行五里頃。再進一服。

【丁香散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治妊娠傷食。

藥品 丁香、縮砂仁、白朮。

制法及用法 清水煎服。

【七珍散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治產後不語。

藥品 人參、石菖蒲、生地黃、川芎、各一兩。細辛、一錢。防風、辰砂(另研)、各五錢。

制法及用法 研爲極細末。每服一錢。不拘時薄荷湯調下。

【七聖散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治臨產時腰疼。

藥品 延胡索、沒藥、白礬、白芷、薑黃、當歸、桂心、各等分。

制法及用法 研爲末。每服三錢。臨產陣痛時。燒酒刃鐵(即犁頭)令道赤洋酒調下。服一二杯立產。

【七寶散】

發明 見產乳方。

功用 初產後服之。和中補

虛。安神鎮驚。

藥品 硃砂(水飛)、桂心、當歸(去蘆)、川芎、人參(去蘆)、白茯苓(去皮)、羚羊角(燒存性)、各二錢。乾薑、一錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。羌活豆淋酒(將護產婦用之)調下。不飲酒者。清米飲調下。如覺心煩熱悶。麥門冬。去心煎湯調下。若心下煩悶而痛。童便調下。若覺心胸煩熱。即減薑桂。覺寒則加之。腹痛加當歸。心煩加羚羊角。心虛氣怯加桂心。不思飲食或惡心加入參。虛煩加茯苓。以意斟酌。日二夜一服。

【七製香附丸】

發明 見醫學入門方。

功用 治經水不調。結成癥瘕。或骨蒸發熱。

藥品 香附米、十四兩。

制法及用法 分爲七份。①同當歸、二兩。酒浸。②同蓬莪朮、二兩。童便浸。③同牡丹皮、艾葉、各一兩。米泔浸。④同烏藥、二兩。米泔浸。⑤同川芎、延胡索、各一兩。水浸。⑥同荆三稜、柴胡、各一兩。醋浸。⑦同紅花、烏梅、各一兩。鹽水浸。各浸春五夏三秋七冬十日。晒乾。只取香附研爲末。以浸藥水打糊和丸。如梧桐子

大。每服八十丸。臨臥時。溫酒送下。

【八仙散】

發明 見沈括錢苑方。

功用 治婦人血氣不和。心腹疔痛。

藥品 棕櫚、二兩。當歸、一兩。麝香(另研)、一錢。

制法及用法 先將棕櫚剉碎。燒灰研末。同麝和勻。每服一錢。溫酒調下。

【八味地黃丸】

發明 見傳青主方。

功用 治產後虛汗不止。血塊不落。

藥品 熟地黃、八錢。五味子、五錢。黃耆(炙)、一兩。澤瀉、五錢。山茱萸肉、山藥、牡丹皮、茯苓、各八錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。每服三錢。臨臥以麻根湯送下。

參考 此方於崔氏方八味地黃丸(見補養類)中去桂附加五味黃耆者。因產後血虧。不可再以熱藥劫其陰。其虛汗宜除。故以五味斂之。黃耆補之。若血塊不落。小便不通。方中丹苓兩味。亦已顧到。不可再服通利之藥。

【八珍益母丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治氣血兩虛。食少無力。月經或先或後。或斷或續。或赤白帶下。身作寒熱。

藥品 益母草(忌鐵器、祇用上半節帶葉者)、人參、白朮(土炒)、茯苓、當歸(酒洗)、甘草(炙)、川芎、白芍藥(醋炒)、熟地黃(酒洗)、各二兩。

制法及用法 研爲末。煉蜜爲丸。如彈子大。或如小豆大。每服一丸。空腹時蜜湯送下。如不能嚥者。可服細粒七八十粒。

參考 服至一月之後。即可受胎。虛甚者。用藥一斤。必能對期受孕(此方即八珍丸加益母草)。脾胃虛寒者。加砂仁、一兩(薑汁炒)。腹中脹悶者。加山楂、一兩(飯上蒸)。多食者。加香附子、一兩(童便製)。

【九製香附丸】

發明 驗方。

功用 治經水不調。崩漏帶下。胎前產後。癥瘕積聚。氣逆。血塊。腹痛。令人有子。

藥品 金華香附、一斤。

制法及用法 分作九份。①酒洗。②醋洗。③鹽水洗。④童便洗。⑤小茴香、二兩。煎汁洗。⑥益智仁、二兩。煎汁洗。⑦萊菔、二兩。煎汁洗。⑧

丹參、二兩。煎汁洗。⑨生薑汁洗。各浸春三夏一秋三冬七日。同艾絨四兩。用無灰酒煮燥。焙乾研末。酒煮神麴打糊爲丸。如梧桐子大。每服四錢。熟湯送下。

三 筆

【大黃丸】

發明 見孫思邈千金方。

功用 治帶下百病。無子。

藥品 大黃(破如豆殼熬黑)、柴胡、芒硝、各一斤(一作各一升)。芎藭、五兩。乾薑、蜀椒(一作五錢)、各一升。茯苓、雞子大一枚(一作二兩)。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服七丸。加至十丸。食前米飲送下。以知爲度。五日微下。十日下血。二十日下長蟲及青黃汁。三十日病除。五十日肥白而能成孕。

【大聖散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治婦人經脈不通。血海虛冷。久無子息。或墮胎腹痛。橫生逆產。胎衣不下。血運血癖。血滯血崩。血入四肢。赤白帶下。產後收血衝心。中風口噤。子死腹中。乳生惡氣。及諸種風氣。或傷寒吐逆

咳嗽。寒熱往來。遍身生瘡。頭痛惡心。常服緩子宮。和血氣。悅顏色。退風冷。兼治丈夫五勞七傷。虛損等病。

藥品 澤蘭葉、石膏、各二兩。卷柏(去根)、白茯苓(去皮)、防風(去蘆)、川厚朴(去粗皮、薑汁炙)、北細辛(去苗)、柏子仁(微炒)、桔梗、吳茱萸(湯洗七次、焙乾)、各一兩。五味子(揀淨)、人參、蘆本(去苗)、乾薑(炮)、川椒(去目、閉口者、微炒出汗)、白芷、白朮、黃耆(去苗)、川烏(炮、去皮臍)、丹參、各三分(一作各七錢五分)。蕉莢(微炒赤)、甘草(炙)、川芎、芍藥、當歸、各一兩三分(一作各一兩七錢五分)。白薇、阿膠(碎炒燥)、各五錢。肉桂、一兩一分(一作一兩二錢五分)。生乾地黃、一兩五錢(一作一兩)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹臨臥。熱酒調下。若病急者。不拘時每日三服。

【大聖散】

發明 見鼓用和濟生方。

功用 治妊娠怔忡。腹脅膨脹。坐臥不寧。脚心作痛。

藥品 木香(不見火)、人參、甘草(炙)、各五錢。白茯苓(去

皮)、川芎、麥門冬(去心)、黃耆(去蘆蜜炙)、當歸(去蘆、酒浸)、各一兩(一作各七錢五分)。

制法及用法 每服四錢。清水一盞。加生薑五片。煎至七分。不拘時溫服。

【大腹皮散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治妊娠大小便赤澀。

藥品 大腹皮、枳殼(去白瓤炒)、甘草(炙、一作二分)、各一錢。赤茯苓、三錢(去皮、一作一錢)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時蔥白濃煎湯調下。

【三白散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治妊娠泄瀉。

藥品 白朮、白茯苓、各三錢。白芍、二錢。

制法及用法 剉散。清水煮服。

【三神丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治室女血氣相搏。腹痛引心。經行遲少疼痛。

藥品 橘紅(焙)、二兩。玄胡索(去皮、醋煎)、當歸(去蘆、酒浸剉、略炒)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。酒煮米糊或煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。加至一百丸。空腹時艾湯或溫酒、米飲、送下。

【三稜丸】

發明 見三肯堂六科準繩。

功用 治婦人經脈不通。氣痛。帶下。血瘕。

藥品 三稜(醋炒)、川芎、牛膝、玄胡索、蓬莪朮(醋炒)、蒲黃、菴朮、牡丹皮、芫花(醋炒)、白芷、當歸、乾地龍(去土、酒浸炒)、乾薑(炮)、各一兩。大黃、二兩(爲末、以米醋熬成膏和藥)。

制法及用法 研爲細末。大黃膏和丸。如梧桐子大。每服三五十丸。空腹時醋湯或紅花酒煎下。

【千金保孕丸】

發明 見孫思邈千金方。

功用 治妊娠腰背痠痛。慣於小產。常服則胎。

藥品 杜仲、八兩(搗去絲、用糯米一升、煮粥拌晒乾、再拌再晒、粥盡爲度、炒、研、一作四兩、切片、用糯米炒斷絲)。川續斷、六兩(酒拌炒、一作二兩、一作四兩)。

制法及用法 共爲末。山藥四兩(一作六兩)。煮糊和丸。

如梧桐子大。每服八九十丸。空腹時米湯送下。戒惱怒。忌食酒、醋、豬肝、發火等物。

【千金保胎丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治妊娠三月必小產。

藥品 熟地黃(棗汁炒)、白朮(土炒)、杜仲(蠶製)、當歸(酒製)、續斷(酒製)、阿膠珠、香附(四製)、益母膠、條芩、各二兩。陳皮、艾葉(醋製)、川芎、各一兩。縮砂仁、五錢。

制法及用法 共研細末。棗肉爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

參考 婦人三月小產。雖屬氣血不足。乃中衝脈有傷。中衝脈即陽明胃經。供應胎孕。至此時必須節飲食。絕慾戒怒。兼服此藥。庶可保全。

【女金丹】

發明 見王氏方。

功用 和血。溫經。安胎。催生。治男子下虛無力。婦人久虛不孕。血風痲痺。半身不遂。赤白帶下。血崩。疝痛。子死腹中。繞臍痛。產後傷寒。虛勞煩悶。血勞血癖。羸瘦。失氣。汗不出。中風口噤。消渴。吐逆。心痛。目中見泉。改血上衝。寒熱頭痛。

面色痿黃。肢腫無力。腹中結痛。月經不調。小便不禁。淋瀝痢疾。下血血痢。飲食無味等症。

藥品 薏本、當歸(酒洗)、石脂(赤白皆可)、白芍藥、人參、白朮(酒洗)、川芎(勿見火)、牡丹皮、桂心、白芷、白茯苓、白朮(米泔浸、土炒)、玄胡索、甘草(炙)、沒藥、各一兩。一方有沉香。無沒藥。一方有附子。一方有香附子(酒浸三日炒、晒乾爲末)、十五兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。溫酒化下。初產畢。食前熱酒湯化下。妊娠臨月。服五七丸。產時減痛。子宮冷者。服二十丸。妊婦常服更佳。

【女科八珍丸】

發明 見孫思邈千金方。

功用 治脾胃傷損。惡寒發熱。煩躁作渴。女人經病。

藥品 當歸(酒拌)、白芍、甘草(炙)、川芎、各一兩。人參、白朮、茯苓、各二兩。熟地黃、三兩。

制法及用法 研爲細末。水泛爲丸。每服三錢。開水送下。

參考 此方藥品與八珍丸無異。

【川芎散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治產後中風。身背拘急。

藥品 川芎、羌活(去蘆)、酸棗仁、羚羊角屑、芍藥、各四兩。桑白皮、一兩五錢。防風(去蘆)、一兩二錢。

制法及用法 咬咀。每服一兩。清水二大盞。煎至一盞半。去滓。不拘時服。一日三次。

四 筆

【天麻丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後中風。恍惚語澀。四肢不隨。

藥品 天麻、硃砂(水飛)、防風(去蘆)、羌活(去蘆)、各一兩。照蠶(炒)、七錢五分。乾蠶(炒)、白附子(炮)、五錢脂(炒)、各五錢。雄雀糞(炒)、牛黃(另研)、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。糯米飯和丸。如梧桐子大。每服二三十丸。薄荷熟湯下。每日二次。

【天麻丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 催生。除產後百病。

藥品 明天麻(六月間帶根在土採、曬乾、不拘多少)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如龍眼大。每服一丸。臨產時熱湯嚼下。

【天麻丸】

發明 見傅青主生化編。

功用 治產後中風。恍惚語謬。四肢不利。

藥品 天麻、一錢。防風、一錢。川芎、七分。羌活、七分。人參、遠志、柏子仁、山藥、麥門冬、各一錢。酸棗仁、一錢。細辛、四分。膽星、八分。石菖蒲、一錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。辰砂爲衣。每服六七十丸。清湯送下。

【天麻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後中風口噤。

藥品 天麻、七錢五分。白附子(炮)、天南星(泡)、半夏(湯洗七遍、去渣、薑製)、乾薑(炒)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。生薑薄荷酒調。旋開口灌之。

【天仙藤散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胎氣發腫。

藥品 天仙藤(洗、略炒)、香附子(炒)、陳皮、甘草、烏藥、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服三五錢。清水一大盞。加生薑、木瓜、各三片(一方無木瓜、有木香)。紫蘇、三五葉。煎至七分。放溫澄清。空腹食前服。每日三次。俟小便利。氣脈通。體輕。腫漸消即止。

【天南星散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後吹癰。小兒重勝、重齕、顙開、鼻塞。

藥品 天南星(大者微泡去皮)。

制法及用法 研爲細末。溫湯調。以鵝翎蘸塗患處。小兒米醋調塗絳帛上。貼顙上。炙手頻熨之立效。重膠重齕。醋調塗足心。男左女右。厚皮綿貼。乾即用醋潤之。

【五加皮丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治妊娠腰痛不可忍。或連髀痛。

藥品 五加皮、四兩。續斷(炒)、杜仲、各二兩五錢。萆薢、獨活、各三兩。狗脊、草薢、芍藥、訶子肉、各四兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服四十丸。空腹時溫酒送下。每日三次。先服五加皮散。然後服此。

【五加皮散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治婦人妊娠腰痛不可忍。或連胯痛。

藥品 五加皮、阿膠(炙後另入)、防風、金毛狗脊、川芎、白芍藥、細辛、革薢、各三兩。杜仲、四兩(炒)。杏仁、十八枚(去皮尖、欬炒)。一方有白茯苓。無白芍藥。

制法及用法 咬咀。清水九升。煮取二升。去滓下膠。分作三服。後服五加皮丸。

【木瓜煎】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治妊娠霍亂吐瀉。轉筋入腹。

藥品 木瓜(木刀切)、一兩五錢。吳茱萸(湯泡七次)、生薑(切)、各二錢五分(一作各七錢五分)。一方有茴香、七錢五分。甘草、一錢。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。加紫蘇。清水煎。去渣。不拘時熱服。

【木通散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治產後小便不通。

藥品 木通、滑石、葵子、檳榔、枳殼、甘草。

制法及用法 爲散。清水煎

服。

【止汗散】

發明 見傅青主女科。

功用 治產後盜汗。

藥品 人參、當歸、各二錢。熟地黃、一錢五分。麻黃根、黃連(酒炒)、各五分。浮小麥、一大撮。大棗、一枚。

制法及用法 清水煎服。

【丹參散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治經水不調。產後惡露不下。

藥品 丹參、不拘多少。

制法及用法 曬研乾爲末。黃酒送下。

【升麻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠壅熱。心煩口渴。

藥品 升麻、瓜蒌根、黃芩、人參、麥門冬、柴胡、梔子仁、犀角屑、茯苓、各一錢。知母、甘草、各五分。

制法及用法 清水二鍾。煎至一鍾。不拘時服。

【牛膝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治經水不利。膺腹作痛。或小腹引腰。氣攻胸膈。

藥品 牛膝(酒製)、一兩。桂

心、赤芍藥、桃仁(去皮尖)、玄胡索(炒)、當歸(酒浸)、牡丹皮、木香、各七錢五分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。空腹溫酒調下。

五 筆

【石蓮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後咳逆嘔吐。心忪目眩。

藥品 石蓮子(去殼心)、一兩五錢。白茯苓、一兩。丁香、五錢(一作五分)。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。不拘時米飲調下。

【白朮散】

發明 見金匱要略。

功用 治妊娠胎寒帶下。

藥品 白朮、川芎、蜀椒(炒去汗)、各三分。牡蠣(熬)。

制法及用法 杵爲散。每服一錢匕。溫酒調下。日三夜一次。但苦痛加白芍藥。心下毒痛。倍加芍藥。心煩吐痛。不能飲食。加細辛、一兩。大半夏、二十枚(一作大棗十枚)。後更服醋漿水。若嘔以醋漿水服之。復不解者。飲小麥汁。已後渴者。大麥粥服之。病雖愈。服之勿置。

參考 此方舊本三物各三

分。關牡蠣分量。按方下云。日三服夜一服者。牡蠣用一分可也。

【白朮散】

發明 見王貺全生指迷方。

功用 治妊娠。面目虛浮。如水腫狀。

藥品 白朮、一兩(一作二錢五分)。生薑皮、大腹皮(去外垢內膜)、茯苓皮、陳皮、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。不拘時米飲調下。或清水煎。和滓服。每日三次。

參考 此方較濟察五皮湯爲善。中間以白朮易桑皮。而功用懸殊。點鐵成金手也。

【白朮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠惡阻。吐清水。

藥品 白朮、一兩。人參、五錢。丁香、二錢五分。甘草、一錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。消水一盞。加生薑五片。煎至七分。溫服。

【白鳳丸】

功用 治婦人羸瘦。血虛有熱。經水不調。崩漏帶下。不能成胎。骨蒸等症。

藥品 白毛烏骨雄雞一隻

(須白絲毛烏骨高冠者、另養一處、以黃耆炒末飼之、不可近雌雞、閉死、去毛腸淨)、香附(四製)、一斤。熟地黃、四兩。生地黃、當歸、白芍藥、黃耆、牛膝、柴胡、牡丹皮、知母、川貝母(去心)、各二兩。黃連、地骨皮、乾薑、延胡索、各一兩。茯苓、二兩五錢。秦艽、一兩五錢。艾葉、青蒿、各四兩。

制法及用法 先將艾蒿一半。入雞腹內。餘置雞外。同入罐內。以童便和水。浸過二寸許。煮爛取出。去骨焙乾。再將各藥及雞共研爲末。用雞汁打糊爲丸。如梧桐子大。每服五六十丸至七八十丸。溫酒或米飲送下。忌食煎炒菓菜。

【白薇丸】

發明 見玉膏堂證治準繩。

功用 治婦人不孕。及上熱下寒諸病。

藥品 白薇、熟乾地黃、川椒(去目及閉口者、微炒出汗)、白龍骨、各一兩。麥門冬(去心焙)、一兩五錢。黃本、卷柏、白芷、覆盆子、桃仁(湯浸、去皮尖雙仁、麩炒微黃)、人參、桂心、菖蒲、白茯苓、遠志(去心)、各七錢五分。車前子、當歸(剉微炒)、芍藥、蛇床子、細辛、乾薑

(炮製)、各五錢。

制法及用法 杵羅爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹日午。溫酒送下。

【白薇丸】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治經水不利。閉塞絕產。

藥品 白薇、細辛、各一兩六錢。人參、杜蘅、牡蠣、厚朴、半夏、白蠟、當歸、紫菀、各十八銖。牛膝、沙參、乾薑、秦艽、各五錢。蜀椒、附子、防風、各一兩五錢。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。先食服三丸。不知。稍增至四五丸。此藥不可長服。覺有娠即止。

【白薇散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治妊娠肺熱遺尿。

藥品 白薇、白芍、各等分。

制法及用法 爲散。每服方寸匕。溫酒調下。日三夜二次。

【四紅丸】

功用 治婦人崩中漏下。經水淋瀝。面黃肌瘦。飲食不思。骨節痠痛。一切血病。

藥品 阿膠、蒲黃、全當歸、澤瀉(一作血餘)、各一兩。

制法及用法 共研末。煉蜜

爲丸。熱湯送下。

【四聖散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治婦人漏胎下血。

藥品 黃芩、白朮、阿膠、縮砂仁、各等分。一方有芍藥。無阿膠。

制法及用法 研爲末。每服二錢。艾葉湯調下。如改湯劑。砂仁減半。

【四物益母丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治經水不調。小腹塊痛。

藥品 川當歸(酒洗)、熟地黃(製)、各四兩。川芎、白芍藥(炒)、各一兩。益母草(忌鐵器)、八兩。香附(製)、一斤。吳茱萸(酒泡)、二兩。一方無香附、吳茱萸。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸(一作益母草熬膏爲丸)。如彈子大。每服一丸。空腹時。溫酒化下。或作小丸。吞服亦可。

【四製香附丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 調和婦人經脈。

藥品 香附子、一斤(分四製、一主降痰、以薑汁、鹽水煮

略炒、一主補血、以醋煮略炒、一主散鬱、以山楂四兩、同炒、去梔、一主降火、以童便洗)。川芎、當歸、各二兩。

制法及用法 研爲細末。水煮麵糊和丸。每服五七十丸。氣虛者。四君子湯送下。血虛者。四物湯送下。

【四製香附丸】

發明 見鮑相璈驗方新編。

功用 治氣鬱經閉。

藥品 香附、一斤(用酒醋、鹽、米、童便、各浸三日、焙乾)。烏藥、八兩。

制法及用法 共研細末。醋煮米糊爲丸。開水送下。

【四製香附丸】

發明 見鮑相璈驗方新編。

功用 治經水不調。赤白帶下。腹熱胞閉。陰虛氣滯。不能生育。

藥品 香附、一斤(分四份、一份用米泔水浸、一份用童便浸、一份用酒浸、一份用醋浸、各浸一宿、曬乾)。大熟地、白芍藥、川芎、各四兩。冬朮(土炒)、廣陳皮、澤蘭葉、各三兩。嫩黃蘗、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 共研細末。陳酒煮米糊爲丸。每服三錢。熱湯送下。早晨日午晚間各一服。忌食萊菔、牛肉、生冷等

物。

【立效散】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治胎動不安。腹內絞痛。其冷如冰。

藥品 川芎、當歸、各等分。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。清水煎。食前溫服。

【立聖散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治妊娠下血不止。

藥品 雞肝、三個。

制法及用法 黃酒一升。煮熟共食之。大效。

【玉露散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治產後乳脈不行。身體壯熱疼痛。頭目昏眩。大便澀滯者。

藥品 人參、茯苓、甘草、各五錢(一作各一錢)。川芎、苦桔梗(炒)、白芷、各一兩(一作各二錢)。當歸、二錢五分(一作一錢五分)。芍藥、七錢五分(一作一錢五分)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。清水一盞。煎至七分。溫服。氣熱甚大便秘者。加大黃、二錢五分。或三錢。

參考 此方有涼膈壓熱下乳之功。

【玉液金丹】

功用 治胎前產後經水不調。崩淋帶下。及婦人百病。

藥品 人參、二兩。山查肉、八錢四分。沈香、一兩六錢。甘草、三兩二錢。阿膠、二兩六錢。蓮子、六兩四錢。大腹皮、八錢四分。山藥、四兩三錢。川芎、二兩四錢。枳殼、一兩二錢。麥門冬、二兩五錢。紹砂仁、二兩九錢。蘇葉、二兩五錢。蘼艾、六錢四分。生地黃、一兩二錢。香附、二兩六錢。黃耆、一兩三錢。琥珀、八錢四分。黃芩、一兩五錢。益母草、六錢四分。羌活、八錢四分。丹參、四兩二錢。橘紅、一兩六錢。木香、八錢四分。白芍藥、一兩六錢。川續斷、六錢四分。厚朴、一兩五錢。當歸身、二兩二錢。川貝母、二兩二錢。肉蓯蓉、一兩二錢。茯苓、六兩四錢。杜仲、二兩六錢。菟絲子、三兩二錢。白朮、八錢四分。血餘、八錢四分。沙苑子、二兩二錢。

制法及用法 共爲細末。加煉蜜並酒化阿膠、杵爲丸。每丸二錢。潮重二錢四分。辰砂爲衣。蠟殼外護。①初孕疑似之間。腹脹嘔吐。用豆蔻仁、三分。煎湯下。②跌撲損胎。用白朮、五分。當歸一錢。煎

湯下。⑤胎動不安。用艾絨、五分。子芩、一錢。煎湯下。⑥感冒瘧疾。用蘇梗、四分。荊芥、五分。煎湯下。⑦咳嗽。用杏仁、一錢二分。桑白皮、五分。煎湯下。⑧小便不通。用冬葵子、八分。煎湯下。⑨潮熱。用知母、一錢五分。煎湯下。⑩頭眩。用炒銀花、一錢五分。煎湯下。⑪頭暈。用防風、八分。煎湯下。⑫子懸。用赤茯苓、八分。蔥白、一個。煎湯下。⑬子冒。用麥門冬、一錢。羚羊角、五分。煎湯下。⑭妊娠咳嗽。用桑白皮、五分。煎湯下。⑮子煩。用淡竹葉、七片。煎湯下。⑯子腫。用五加皮、一錢。赤茯苓、一錢。煎湯下。⑰子淋。用車前子、一錢。煎湯下。⑱胎漏。用生地黄、二錢。煎湯下。⑲尿血。用糯米、煎湯下。⑳孕產。用益母草、二錢。煎湯下。㉑臨產交骨不開。用龜腹板三錢。煎湯下。㉒難產及胎死腹中。用川芎、一錢。當歸、二錢。煎湯下。㉓胞衣不下。用牛膝、二錢。檀香、一錢。煎湯下。㉔惡露不行。用五靈脂、五分。桃仁、五分。蒲黃、五分。煎湯下。㉕產後喘。用藕汁、半杯。或薑汁、三匙下。當審證用之。㉖

虛脫。用人參、五分。煎湯下。

㉗胎前產後痢。用薏苡仁、三錢。煎湯下。㉘產後腫脹。用

茯苓皮、一錢五分。當歸、一錢。煎湯下。㉙尊勞。用官燕、三錢。煎湯下。㉚倒經吐血。用藕汁送下。㉛崩漏。用淡白鯊、三錢。煎湯下。㉜經期前後不定。艱於受孕者。每逢天癸到時。服三丸。開水下。

【失笑散】

發明 見經驗方。

功用 治經水不調。或瘀結少腹急痛。或胎前產後血暈血崩。產後心腹絞痛。或血迷心竅。不省人事。及一切氣痛。慣發痧脹者。

藥品 五靈脂(淨好者、酒研、澄去沙炒)、三錢。蒲黃(篩淨、半生半炒)、二錢。

制法及用法 研爲末。每服二三錢。醋醋一杓。調熬成膏。再入清水一盞。煎至七分。食前熱服。或酒煎。入沙糖少許。和滓服。少頃再服。瘀結腹痛。經水反多。元氣虧弱。藥力不行者。人參二三錢調服。

參考 產後瘀血停滯。心肝脾三經。皆受其病。以致心腹瘀痛。惡寒發熱。神迷眩暈。胸膈滿悶。凡此皆由寒凝不

滯。氣滯不行。非純用甘溫破血行血之劑。不能攻逐蕩平。是方用蠟脂之甘溫走肝。生用則行血。蒲黃辛平入肝。生用則破血。佐酒煎以行其力。庶可直接厥陰之滯。而有推陳致新之功。甘不傷脾。辛能散瘀。不覺諸證悉除。直可以一笑置之矣。

【正元丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 調經。種子。

藥品 香附、一斤(同艾三兩、先以醋同浸一宿、然後分開製之、酒、鹽、酥、童便、各製四兩)。阿膠(蛤粉炒)、二兩。枳殼、四兩(半麸炒、半生炒)。生地黃(酒洗)、熟地黃(酒浸)、當歸身(酒洗)、川芎(炒)、各四兩。白芍藥、八兩(半生、半酒炒)。

制法及用法 研爲末。米醋和丸。如梧桐子大。每服六十丸。空腹時鹽湯送下。帶下加白茯苓、琥珀。

【仙靈脾散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血風攻注。腰脚疼痛。

藥品 仙靈脾、桃仁(麸炒)、檳榔、各一兩。羌活(去蘆)、海桐皮、牛膝(酒浸)、當歸(去蘆

炒)、芍藥、骨碎補、玄胡索、桂心、枳殼(去瓢、麸炒)、木香、菴藷子、各七錢五分。蜘蛛(炒)、五錢。麝香(另研)、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前豆淋酒調下。每日二次。

【必效散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治月經不調。及崩漏不止。

藥品 棕皮(燒)、木炭炭(去節)、各二兩。麝香、一錢(另研)。

制法及用法 每服二錢。空腹時溫酒調下。

【生乾地黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人尿血不止。

藥品 生乾地黃、二兩。柏葉、黃芩、各五錢。阿膠、一兩(炒成珠)。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。清水一盞。加生薑三片。煎至七分。去滓溫服。

六 筆

【交加散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人氣多血少。腹

痛結竅。及胎前產後各病。

藥品 生地黄、一斤(研取自然汁)。生薑、十二兩(研取自然汁)。

制法及用法 先以生地黄汁炒生薑之滓。生薑汁炒生地黄之滓。各稍乾焙。研爲細末。每服三錢。用溫酒調下。

【交加散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人惡血腹痛。經水諸疾。

藥品 生薑、一斤(搗取汁、存滓用)。生地黄、二斤(取汁存滓)。白芍藥、當歸、桂心、各一兩。紅花(炒、無惡血不用)、沒藥(另研末)、各五錢。玄胡索(醋紙包、煨熟、用布擦去皮)、蒲黃(隔紙炒)、各一兩。

制法及用法 先以地黃汁炒生薑滓。生薑汁炒地黃滓。各焙乾。同諸藥研爲細末。每服三錢。溫酒調下。經水不依常。蘇木煎酒調下。腰痛糖酒調下。

【交加散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽頭脹。產後不省人事。口吐痰涎。

藥品 當歸、荊芥穗、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。清水一盞。黃酒少許。煎至七分。灌之。下咽即有生理。

【如聖散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人血氣不足。不耐寒暑。經水不調。久而心虛。狀若心勞。肢倦少力。盜汗易驚。五心煩熱。肌瘦頭昏。飲食無味。胸膈不利。及產前產後受病。

藥品 北柴胡、白茯苓、甘草、熟地黄、人參、當歸、各一兩。鼈甲、胡黃連、沈香、知母、各五錢。桑寄生、乾葛、各七錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。清水一盞。加烏梅、一個。大棗二枚。麥門冬數粒。煎至八分。不拘時服。

【如聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治難產。

藥品 紫蘇葉、當歸、各等分。

制法及用法 咬咀。每服三五錢。長流水煎服。如無流水。以水順攪動煎服即下。或取本犬褲帶五寸。燒存性。溫酒調下。或取槐樹東枝。令產

婦把之易產。或用紫蘇煎湯調
益元散服之。即產。

【如聖膏】

發明 見沈氏尊生書。

功用 治難產。及死胎不
下。十分危急者。

藥品 巴豆(去殼)、十六粒。
蓖麻子(去殼)、四十粒。麝香、
二錢。

制法及用法 同打如泥。攤
絹帛。貼臍上。一時產下。急
急洗去。

【如聖膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治難產。胎死腹中。
胞衣不下。

藥品 蓖麻子、七粒。

制法及用法 去殼。細研成
膏。塗脚心。胞即下。速洗
去。不洗腸出。再用此膏塗頂
上。腸自縮入。或用蓖麻子一
百粒。雄黃一錢。研細末。用
如上法。

【伏龍肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後中風。口噤不
語。腰背疼痛。

藥品 伏龍肝、一兩五錢。乾
薑、五錢(炮)。

制法及用法 研爲細末。每
服二錢。不拘時溫酒調下。每
日二次。

【安胎丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生
書。

功用 清熱。安胎。

藥品 條芩、白朮。

制法及用法 研爲細末。水
泛和丸。白湯送下。

【安胎丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生
書。

功用 治胎動不安。由於火
旺者。

藥品 黃芩、白芍藥、白朮、
當歸、川芎。

制法及用法 研爲細末。水
泛和丸。溫湯送下。

【安神丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生
書。

功用 治子煩。

藥品 礞砂、一兩。黃連、一
錢。生薑、當歸、甘草、各五分。

制法及用法 研爲細末。水
泛和丸。熟湯送下。

【地黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治足三陰虧損。經行
數日不止。或帶下不孕。

藥品 熟地黃(自製、一作二
兩)。山茱萸肉、白無灰仁、白
芍藥(微炒)、代赭石(醋淬)、各
一兩。乾薑(炮、一作一兩)、白

僵蠶(炒)、厚朴(薑製)、各三錢(一作各五錢)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服四五十丸。空腹時溫酒送下。一日三次。

【地黃酒】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後百病。

藥品 地黃汁、好麴、好淨糯米(蒸)、各二升。

制法及用法 先以地黃汁漬麴令發。準家法釀之至熟。封七日。取消者服。常服令酒氣相接。勿令絕。忌蒜、生冷、鮮滑、雞、豬肉一切毒物。凡婦人產訖皆可服。但夏三月不可釀。春秋始可釀之。以地黃汁並滓納米中炊合用之。若作一石十石。準此二升爲則。先服當歸湯。後服此妙。

【地黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後惡血不盡。腹痛。

藥品 生地黃(炒)、當歸、各二錢。生薑、五錢(切如茱萸大、新瓦上焙令焦黑)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時溫酒調下。

【地黃煎】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後諸疾。

藥品 生地黃汁、生薑汁、各一升。藕汁、五合。大麻仁、三兩(去殼研)。

制法及用法 和勻。銀器內慢火熬成膏。每服半匙。溫酒調下。更以北朮煎膏入半匙尤佳。一方無麻仁。用白蜜。治產後虛懸盜汗嘔吐。

【吉祥丸】

發明 見孫思邈千金方。

功用 治婦人子宮寒冷。瘀積胞門。任脈不榮。衝脈少藏。經事不調。積年不孕。

藥品 覆盆子、一斗。天麻、桃絮、牡丹皮、熟地黃、茯苓、桂心、各一兩。五味子、桃花、白朮、川芎、各二兩。桃仁(去皮尖)、一百枚。菟絲子、楮實子、各一升。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如豆大。每服五丸。空腹時醋湯送下。日中一服。晚一服。

【吉祥丸】

發明 見孫思邈千金方。

功用 治婦人子宮寒冷。瘀積胞門。任脈不榮。衝脈少藏。經事不調。終年不孕。

藥品 大熟地、八兩。鹿角霜、口芍藥、黨參、當歸、杜仲、茯苓、菟絲子、各四兩。甘草

(炙)、官桂、川芎、川椒、各二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五錢。淡鹽湯送下。

【艾煎丸】

發明 見李東垣方。

功用 治婦人諸虛。及經水不調。血氣刺痛。腹脅膨脹。頭暈惡心。崩漏帶下。

藥品 北艾葉(一作四兩)、大當歸(一半酒炒、一半醋炒)、各二兩。香附子、四兩(一作一斤)。

制法及用法 醋蒸半日。焙乾研末。醋煮米糊和丸。如梧桐子大。曬乾。每服五十丸。艾醋湯送下。有氣加枳殼、陳皮、各四錢。肌瘦加入參、二兩。白朮、四兩。茯苓、三兩。身熱加柴胡、四兩。

【艾附煖宮丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書方。

功用 通氣。補血。治子宮虛寒。不孕。及經水不調。行經腹痛。胸膈悶脹。肢怠食減。發熱盜汗。腰痠帶下。久服多子。

藥品 艾葉、三兩。香附、六兩(醋五片、煮一日夜、打爛勿作餅、慢火焙乾)。當歸、三兩。

續斷、一兩五錢。吳茱萸、川芎、白芍藥、黃耆、各二兩。生地黄、一兩。官桂、五錢。一方無續斷、吳茱萸、黃耆、肉桂。

制法及用法 研爲細末。醋煮米糊和丸。如梧桐子大。壬子日或天德月德生氣日製。每服五七十丸。食遠淡醋湯送下。

【回生丹】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治產後難症有裏熱者。

藥品 黑豆、三升(煮熟、取汁三盞、去豆)。紅花、三兩(炒黃色、入醇酒一大壺、煮三五沸、去紅花、取汁)。蘇木、二兩(剉碎、河水五盞、煎汁三盞、去滓)。大黃、一斤(研末、以好米醋三四盞攪勻、文武火熬成膏、如此二遍、次下紅花酒、蘇木湯、黑豆汁、共熬成膏)。當歸、熟地黄、川芎、白茯苓、延胡索、烏藥、香附、蒲黃、牛膝、桃仁(另研)、蒼朮(米泔水浸炒)、各二兩。白芍藥(酒炒)、甘草(炙)、羌活、山茱萸肉(酒浸)、三稜、陳皮、地榆、木香、五靈脂、各五錢。人參、白朮(土炒)、青皮、木瓜、各三錢。高良薑、四錢。乳香、沒藥、各一錢。

制法及用法 研爲細末。以

大黃膏和丸。如彈子大。每服一丸。黃酒燉化送服。

【回生丹】

發明 驗方。

功用 治經水不通。行經腹痛。室女經閉。產後諸疾。

藥品 錦紋大黃(研末)、一斤。蘇木、三兩(打碎、用河水五盞、煎汁三盞)。大黑豆、三升(水浸、取殼、用絹袋盛殼、同豆煮熟、去豆不用、將殼晒乾、其汁留用)。紅花、三兩(炒黃色、入好酒四盞、煎三五沸、去渣、取汁)。米醋、九斤(陳者良)。

制法及用法 將大黃末、一斤。入淨鍋。下米醋三斤。文火熬之。以長木箸不住手攪之。成膏。再入醋、三斤熬之。又加醋、三斤。次第加畢。然後下黑豆汁、三盞。再熬。次下蘇木汁。次下紅花汁。熬成大黃膏。取入瓦盆盛之。大黃鍋裏水鑊下。後入人參(一作台黨二兩)、當歸(酒洗)、川芎(酒洗)、香附(醋炒)、延胡索(酒洗、一作醋炙)、蒼朮(米泔浸炒)、蒲黃(隔紙炒)、茯苓、桃仁(去皮尖油)、各一兩。牛膝(酒洗)、五錢。甘草(炙)、地榆(酒洗)、川羌活、廣橘紅、白芍(酒炒)、各五錢。木瓜、青皮(去白

炒)、各三錢。乳香、沒藥、各一錢(一作各二錢)。益母草、三兩(一作二兩)。木香、四錢。白朮(米泔浸炒)、三錢。烏藥(去皮)、二兩五錢。高良薑、四錢。馬鞭草、五錢。秋葵子、三錢。熟地、一兩(酒浸九次、蒸、晒、如法製就、一作二兩)。三稜、五錢(醋浸透、紙裹煨)。五靈脂、五錢(醋煮化、焙乾、研細)。山茱萸肉、五錢(酒浸蒸搗)。三十味。並前黑豆殼。共曬為末。入石臼內。下大黃膏拌勻。再下煉熟蜜一斤。共搗千杵。取起為丸。每丸重二錢七八分。靜室陰乾。須二十餘日。不可日曬。不可火烘。乾後只重一錢有零。金箔為衣。熔蠟護之。備用。①產母病熱。子死腹中。用車前子一錢。煎湯送服一丸或二丸。甚至三丸。無不下者。若下血太早。以致子死。用台黨或人參三錢。和車前子一錢煎服。或用陳酒和車前子服。立下。②胎衣不下。用炒鹽少許。泡湯服一丸。或二三丸。立下。③產後血暈。用薄荷湯送服一丸。即愈。④產後三日。血氣未定。還走五臟。奔入肝經。血暈眼花。以滾湯送服一丸。即愈。⑤產後敗血走注五臟。停留四肢。化

七 筆

【牡丹散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治經水不利。臍腹疼痛。不欲食。

藥品 牡丹皮、大黃(炒)、各一兩。赤茯苓、桃仁、生地黄、當歸、桂心、赤芍藥、白朮、各七錢五分。石葶(去毛)、木香、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一盞。加生薑三片。煎至七分。空腹時溫服。

【牡丹散】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治產後血暈。

藥品 牡丹皮、大黃、芒硝、各一兩。冬瓜子、五勺。桃仁、三十粒(去皮尖)。

制法及用法 研爲末。每服五錢。清水三鍾。煎至一鍾半。去滓。入硝又煎。分作二服。如口噤。則於開口灌之。

【牡蠣散】

發明 見危亦林世醫得效方。

功用 治經水不止。產後乳汁不通。受乳脹痛。

藥品 牡蠣(火煨)。

制法及用法 研爲細末。醋

爲浮腫。口濕肢冷。開水送服一丸。即愈。②產後敗血熱極。中心煩躁。言語癡狂。如見鬼神。非風邪也。滾水送服一丸。即愈。③產後敗血。流入心孔。失音不語。用甘芳花三錢。槌碎、八分。煎送服一丸。即愈。④產後未滿月。誤食酸寒堅硬等物。與物相搏。流入大腸。不得尅化。泄痢膿血。山楂煎湯服一丸。⑤產後血入經絡。停留日久。虛脹腰痛。非溼症也。用酸棗、三分。煎湯送服一丸。即愈。⑥產後未滿月。飲食不得應時。兼致怒氣。餘血流入小腸。閉塞水道。小便澀結。溺血如雞肝者。用木通、四分。煎湯送服一丸。或流入大腸。閉塞肛門。大便澀結。有瘀成塊如雞肝者。用廣皮、三分。煎湯送服。⑦產後惡露未盡。飲食寒熱不調。以致崩漏形如肝色。漸熱往來。臂膊拘急。用白朮、三分。廣皮、二分。煎湯送服一丸。⑧產後敗血入臟腑。並走肌膚四肢。面黃口乾。鼻中流血。遍身斑點。陳酒化服一丸。即愈。⑨產後小便澀。大便閉。乍寒乍熱。如醉如醒。滾水送服一丸。

調成丸。再煨過通紅。候冷。研細。出火毒。卻用醋調艾末。熬成膏和丸。如梧桐子大。每服五十丸。醋艾湯送下。乳汁不通及乳痛。但研爲末。溫酒調下。不必製丸。

【牡蠣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後惡露淋瀝。頭重。目昏。胸悶。氣短。面黃。體瘦。力乏。煩熱。不思飲食。

藥品 牡蠣(煨)、川芎、熟地黃(一作生地黃)、白茯苓、龍骨、各一兩。續斷、當歸、艾葉(酒炒)、人參、五味子、地榆、各五錢。甘草(炙)、二錢五分。一方無續斷、五味子。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一中盞。加生薑三片。大棗一枚。煎至六分。去滓食前服。

【延胡索散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治兒枕痛。

藥品 延胡索、當歸、各一兩。琥珀、蒲黃(炒)、各二錢五分。赤芍藥、五錢。桂心、三錢。紅藍花、二錢。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。食前酒便合溫酒調下。

【延胡索散】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治產後臍下痛。

藥品 延胡索、桂心、各五錢。當歸、一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。熱酒調下。

【芎藭散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後中風。四肢掣急疼痛。背項強急。

藥品 芎藭、羌活、當歸(各去蘆)、酸棗仁(炒)、羚羊角屑、各七錢五分。防風(去蘆)、牛蒡子(炒)、各一兩。桂心、赤芍藥、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服八錢。清水一大盞半。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。

【芎藭散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胎衣不下。

藥品 芎藭、當歸(焙)、各五錢。榆白皮、一兩(剉)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前生地黃汁、同溫酒調下。

【沒藥丸】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治產後心胸煩躁。惡血不快。

藥品 沒藥(另研)、蟾蜍、延

胡索、乾漆(炒)、當歸、桂心、牛膝、牡丹皮、乾薑、各等分。

制法及用法 研爲細末。醋煮麴糊和丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。神麴煎湯送下。

【束胎丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 縮胎。易產。

藥品 白朮、枳殼、各等分。

制法及用法 水浸爛蒸丸。如梧桐子大。每服三四錢。熱湯送下。

八 筆

【阿膠丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後崩血不止。虛羸無力。

藥品 阿膠、赤石脂、各一兩五錢。續斷、川芎、當歸、甘草、丹參、各一兩。龍骨、鹿茸(酥炙)、烏賊魚骨、鼈甲(炙)、各二兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二三十丸。空腹時溫酒送下。

【阿膠散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠因顛撲胎動不安。腰痛腹滿。或有所下。或

胎上搶心。

藥品 阿膠、一兩。熟地黃、二兩。白芍藥、艾葉、當歸、甘草、黃芩、各一兩。一方有川芎。

制法及用法 咬咀。每服五錢。加生薑三片。大棗一枚。清水煎服。

【阿膠散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠胎動。腹中疼痛。不思飲食。

藥品 阿膠、七錢五分(炒)。甘草、二錢五分。白茯苓、白朮、川芎、各七錢五分。當歸(炒)、陳皮、各一兩。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一盞。加生薑三片。大棗、一枚。煎至七分。溫服。

【阿膠散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠胎動不安。心虛煩。腹內腫。

藥品 阿膠(杵碎、炒黃燥)、人參、川芎、各一兩。白茯苓、麥門冬(去心)、柴胡(去苗)、各七錢五分。甘草(炙)、當歸(剉炒)、黃芩、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服四錢。清水一中盞。加生薑五釐。大棗三枚。煎至六分。去滓熱服。

【固下丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血虛陰虧。溼熱不消。赤白帶下。不能受孕者。

藥品 白芍藥、五錢。高良姜(燒炭)、三錢。黃蘗(炒成炭)、二錢。椿根皮、一兩五錢。

制法及用法 共爲末。米粥和丸。如梧桐子大。每服三五丸。空腹時米飲送下。

【固經丸】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 補陰。清熱。治血虛有熱。經水不止。崩漏紫黑成塊。

藥品 黃蘗、白芍藥、各三兩。龜板(炙)、四兩。黃芩(一作茯苓)、二兩。椿根白皮、香附子(童便浸焙)、各一兩五錢。一方無黃蘗。一方有白朮、無白芍藥。

制法及用法 研爲細末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。食前空腹時熱湯送下。陽虛陰崩者忌用。

【金黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後惡血衝心。時發煩躁。

藥品 延胡索、蒲黃、各五

錢。桂心、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。烏梅煎湯。候冷調下。

【金鈴子散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治產時寒氣入於小腹。遂成寒證。

藥品 川楝子(去核)、小茴香、補骨脂、肉桂、各一錢。木香、四分。

制法及用法 磨兌。加生薑。清水煎。食前熱服。或羊肉湯更妙。

【知母丸】

發明 見姚僧坦集驗方。

功用 治妊娠日月未足。痛如欲產。及產難、子煩。

藥品 知母、不拘多少。

制法及用法 共研細末。煉蜜或棗肉爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。溫酒或粥飲送下。虛甚者。人參煎湯化下。每日三次。

【抽刀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後心腹脅肋脚痛。

藥品 五靈脂、不拘多少(炒令烟盡、存性)。

制法及用法 研爲末。每服三錢。水酒童便各半盞。煎至八分。溫口服。或止用童便丸

佳。或用霹靂酒調下。不飲酒者。烏梅、柏葉、煎湯下。中風及腸風下血。加草烏頭、五分。心煩口渴。加荷葉(炒)減半。瘀血不止加當歸、二片。酒煎服。

【附子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後霍亂。手足逆冷。

藥品 附子(炮)、白朮、當歸、吳茱萸(洗)、桂心、人參、丁香、通紅、甘草、各一兩五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服二錢。不拘時。粥飲調下。

【抵聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後腹脅滿悶嘔吐。

藥品 人參、半夏、各一兩。赤芍藥、六錢。澤蘭葉、四錢。甘草(炙)、橘皮、各三錢。

制法及用法 爲散。每服四五錢。清水煎。入薑汁數匙。和滓熱服。日二三度。以嘔吐止爲效。有瘀加山查(炮黑)、五錢。

參考 方中赤芍。性味酸寒。非產後嘔吐者所宜。宜易赤茯苓。下水止嘔爲當。此必傳寫之誤耳。

【返魂丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 安魂魄。養血氣。調經絡。治胎前產後諸疾。

藥品 菴藟(端午日採葉及花子、陰乾用)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜或米糊和丸。如彈子大。①婦人月經不調及血崩漏下者。溫酒送下。②婦人久不孕者。每服十丸至二十丸。溫酒送下。③妊娠臍腹刺痛。胎動不安。下血不止者。用秦芫糯米煎湯下。或當歸湯亦可。④如服臨月。用縮砂飲送下。一日三次。催生易產。產時先用一丸。童便化下。則百病不生。⑤臨產子死腹中者。童便、溫酒、各七分。化下。⑥胎衣不下。橫生不順。心悶欲死者。童便酒各七分。化下。或薄荷自然汁、鹽湯亦可。若血在胞中。及死胎經日不下。脹滿心痛者。炒鹽湯送下。⑦產後惡露正行時。用熟湯送下。虛者煎白朮、人參、陳皮湯下。能去瘀生新。⑧產後中風。牙關緊急。半身不遂。失音不語者。童便無灰酒各半送下。⑨產後寒熱往來如瘧。臍腹作痛。或作聲者。溫米飲或桂枝湯化下。⑩產後面黃赤。五心煩熱。或衄或血塊。臍腹奔痛。時發寒熱。有

冷汗者。童便酒各半送下。溫薄荷自然汁亦可。⑤產後兩太陽痛。呵欠心忡氣短。肌體麻痺。不思飲食。血氣身熱。手足頑麻。百節疼痛者。溫米飲湯送下。⑥產後眼前黑暗。血暈血熱。口渴煩渴。如見鬼神。狂言。不省人事者。薄荷自然汁化下。如無生者。濃煎薄荷湯或童便酒各半亦可。⑦產後鼻衄。口乾舌黑者。童便酒各七分化下。若心悶煩渴者。溫米飲童便各七分化下。⑧產後咳嗽。胸膈不利。惡心。口吐酸水。面目浮腫。脅痛舉動失力者。溫酒送下。吐逆不止者。溫酒化下。⑨產後遍身疼痛。百節開張。血乘虛流入腸中。停留不散。臍腹疼痛者。米飲化下。⑩產後四肢浮腫。及寒熱氣喘或小便澀者。溫酒化下。⑪產後骨蒸勞。童便酒各七分化下。⑫產後餘血。惡露不盡。結滯游腹刺痛。惡物上衝。心胸煩悶者。童便、酒各半化下。⑬產後崩中。漏下不止。狀如雞肝。脊背倦渴者。糯米、秦艽、煎湯化下。當歸桂枝湯亦可。赤白帶下者。煎秦艽湯送下。白帶下者。煎膠艾湯送下。⑭產後大小便不通。煩躁口苦者。薄荷自然汁化下。如

無生者。濃煎薄荷湯亦可。祇大便秘結。口苦煩渴者。童便酒各七分化下。薄荷酒亦可。⑮產後痢。及瀉血者。大棗煎湯化下。

【所以載丸】

發明 見陳修園方。

功用 治胎氣不安不長。婦人半產。或三月或五月按期而墮者。必終身不能大產。惟此丸可以治之。

藥品 白朮、一斤(去皮蘘、置糯米上、蒸半炷香、久勿洩氣、曬研爲末)。人參、八兩(焙爲末)。桑寄生、六兩(以自收者爲真、不見剉鐵爲末)。雲苓、六兩(生研爲末)。川杜仲、八兩(炒去絲、爲末)。

制法及用法 以大棗一斤、擘開、以長流水、熬汁疊丸。如梧桐子大。曬乾退火氣。密封。勿令洩氣。每早晚服三錢。以米湯送下。

參考 陳修園曰。白朮爲補土之正藥。土爲萬物之母、而載萬物。故本方取之爲君。茯苓感蒼松之氣而生。苗不出土。獨得土氣之全而暗長。寄生感桑精之氣而生。根不入土。自具土性之足而敷榮。一者伏於土中。儼若子居母腹。一者寄於枝上。居然胎繫母胞。二物

奪天地造化之功。故能滋養氣血於無形之處。而取效倍於他藥也。杜仲補先天之水火。而其多絲。尤能繫維而不墜。人參具三才之位育。而其多液。尤能涵養以成功云云。持論甚精。當非讀書多。臨證熟者。未易道此。

【兔腦丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治生產或橫或逆難下。

藥品 兔腦髓、一個(用十二月者去皮膜、研如泥)。乳香(另研)、二錢五分。母丁香(另研細末、一作二錢)、麝香(用當門子者另研)、各一錢。

制法及用法 拌勻。兔腦髓和丸。熱湯送下。爲催生第一神方。

九 筆

【紅花散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治倒經。

藥品 紅花、黃芩、蘇木、各八分。天花粉、六分。

制法及用法 清水煎。空腹時服。

【紅藍花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治半產惡露不下。奔

心悶絕。不省人事。

藥品 紅藍花(微熬)、男子髮(燒存性)、京墨(燒紅)、血竭、清黃(隔紙炒)、各等分。

制法及用法 共爲細末。每服二錢。童便小半盞調下。

【紅藍花散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人勞熱。四肢羸瘦。經脈不通。

藥品 紅藍花、當歸、生乾地黄、赤芍藥、鬼箭羽、虎骨、大腹皮、麥門冬(去心)、土瓜根、地骨皮、枳殼、甘草(炙微赤)、各五錢。柴胡、一兩五錢(去苗)。

制法及用法 共爲粗散。每服四兩。清水一中盞。加生薑五釐。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【柏子仁丸】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治血虛有火。月經耗損。漸至不調。臍腹而生潮熱。及室女思慮過度。經閉成癆。

藥品 柏子仁(炒另研)、牛膝、卷柏、各五錢(一作各二兩)。澤蘭葉、川續斷、各二兩。熟地黃、三兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時米飲送下。兼服

澤蘭湯。

參考 此方即藥肆所謂女科柏子仁丸。俾與收濟內之柏子仁丸有別。經曰。心氣不得下降。則月事不來。柏子仁、安神養心。熟地、續斷、牛膝、補肝益腎。澤蘭、卷柏、活血通經。

【柏子仁散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後敗血挾邪攻心。亂語狂言。乍見鬼神。

藥品 柏子仁、遠志(去心)、人參、桑寄生、防風、琥珀(另研)、當歸(炒)、生地黄(焙)、甘草、各等分。

制法及用法 研爲粗末。每服五錢。先用白羊心一個。切片。清水一大盞半。煮至九分。去羊心。入藥。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【柏子養心丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治血虛有火。月經耗損。漸至不通。日漸羸瘦。而生潮熱。

藥品 柏子仁、白茯苓、酸棗仁、生黃耆、當歸身、各二兩。五味子、硃砂(飛)、犀角尖、各五錢。甘草、四錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。金箔爲

衣。每服三錢。米飲送下。

【柏子養心丸】

發明 驗方。

功用 治血虛內熱。失眠心悸。並治婦女經少。瘦損潮熱。

藥品 柏子仁、二兩。茯苓、二兩。生地、二兩。五味子、五錢。甘草(炙)、四錢。當歸身、二兩。酸棗仁、二兩。犀角、五錢。黃耆、二兩。

制法及用法 共研細粉。煉蜜爲丸。如梧桐子大。硃砂五錢爲衣。每次三錢。開水送服。

參考 此方有生地。以硃砂爲衣。比上方較善。

【禹餘糧丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血虛煩熱。經水不調。赤白帶下。漸成崩漏。

藥品 禹餘糧(火煨、醋淬)、白石脂、各一兩。附子(炮、去皮臍)、鼈甲(去裙、醋炙)、桑寄生、白朮、厚朴(去鹽皮、製)、當歸(去蘆)、側柏葉(炒)、乾薑(炮)、各一兩。白芍藥、狗脊(去毛)、各七錢五分。吳茱萸(湯泡焙)、五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時溫酒或米飲送下。

【禹餘糧丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人久冷。經水不止。面黃肌瘦。虛煩減食。

藥品 禹餘糧、一兩。犀角膠、七錢五分(粉炒)。紫石英、續斷、赤石脂、熟地黃、川芎、各一兩。乾薑、黃耆、艾葉、柏葉(炒)、當歸(炒)、人參、白茯苓、各五錢。

制法及用法 研爲末。煉礬和丸。如梧桐子大。每三十丸。空腹時米飲送下。

【香桂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後臍下痛。

藥品 桂心、五分。川芎、當歸、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。分爲三服。酒一盞。煎三五沸。更入童便少許。煎至七錢。溫服。若不過再服。即瘥。

【香桂散】

發明 見張路玉廣氏醫通。

功用 治下死腹中。胞衣不下。

藥品 麝香、三分。肉桂、三錢。

制法及用法 爲散。酒煎和浮服。片時如手推出。加生川芎三錢。爲下死胎之聖劑。

【胡黃連散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人疲勞體瘦。經脈不通。四肢疼痛。口乾煩渴。不得眠臥。飲食減少。

藥品 胡黃連、七錢五分。鼈甲、一兩五錢(醋炙黃、去裙襖)。柴胡(去蘆)、生乾地黃、地骨皮、黃耆(剉)、川大黃(剉、微炒)、各一兩。犀角屑、當歸、青蒿、黃芩、各七錢五分。赤芍藥、木香、麝香(細研入)、各五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服四錢。酒水一中盞。煎生薑、一錢三分。桃心、柳心、各七莖。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【胎產金丹】

功用 治紅白淋帶。經事不調。臍腹作痛。腰痠無力。子宮寒冷。難於受孕。及胎前產後百病。

藥品 乳香(去油)、玄胡索、各三兩。牡丹皮、白薇、甘草(炙)、白朮(土炒焦)、黨參、白芷、各二兩。香附(製)、一兩。沒藥(去油)、肉桂、各一兩。赤石脂、白芍藥、各四兩。當歸、八兩。一方無沒藥。有人參、熟地黃、沉香、茯苓、紫河車、川芎、硃砂。

制法及用法 共研細末。煉

蜜和丸。每重二錢（一作一錢五分）。硃砂爲衣。蠟殼封固。每服一丸。去殼細嚼。熱湯嚥下。

十 筆

【栝樓散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人產後吹癰。

藥品 栝樓實、一個。乳香、一錢。

制法及用法 研勻。溫酒煎服。

【凌霄花散】

發明 見張璧方。

功用 治婦人血竭或積瘀。致經候不調。或斷續不定。時作腹痛。腰膝重疼。小腹緊硬。及室女經水不通。

藥品 紅花、當歸尾、紫葳、牛膝、甘草、蘇木（細剉）、各二兩。赤芍藥、九兩。劉寄奴、桂心、白芷、各一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。空腹時熱酒調下。食前臨臥再服（一作酒水各一盞、同煎至一鍾、空腹時溫服）。若血久不行。濃煎紅花酒送下。

參考 此爲調經破血之劑。孕婦忌服。

【烏金丸】

發明 驗方。

功用 治婦人七情悒鬱。氣滯食減。口苦咽燥。五心煩熱。面黃肌瘦。胸脅刺痛。崩中帶下。產後惡露上攻。敗血不止。

藥品 香附（製）、川大黃、各四兩。木香、乳香（炙）、沒藥、官桂、各五錢。五靈脂、桃仁泥、元胡索、天台烏藥、蓬莪朮、各一兩。全當歸、三兩。益母草、靈蘭、各二兩。一方無大黃、益母、靈蘭。

制法及用法 用黑豆洗淨一升。煮汁去渣。加紅花二兩。酒五碗。煎四五沸。去渣取汁。蘇木三兩。水煎。去渣取汁。將三汁和蜜爲丸。每服三錢。熱湯或溫酒、艾、醋湯送下。

【烏金散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治產後淋瀝。

藥品 當歸、五錢。百草霜、乾麵、各一兩。天麻、木香、各二錢五分。京墨（煨）、二錢。

制法及用法 爲散。清水煎服。

【烏金散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治產後淋瀝。

藥品 蘇炭、紫蘇葉、各等

分。

制法及用法 爲末。香油調塗。即能生如聖散之第二方。

【烏金膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胎癰潮發。

藥品 烏梢蛇、一條(取淨肉、酒浸一宿、焙)。蠶紙、一張(燒灰)。蟬殼、全蠍、硃砂(飛)、各五錢。金箔、二十片。龍腦、麝香、各五分。

制法及用法 研爲細末。令勻。煉蜜和丸。如阜子大。每服一丸。人參薄荷湯化下。

【烏梅丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治經來食物即吐。

藥品 木香、雄黃、各五錢。草果、一個。乳香、沒藥、各一錢。

制法及用法 烏梅爲丸。如彈子大。每服一丸。早晨口含化下。

【烏雞丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治婦人脾胃虛弱。衝任損傷。血氣不足。經候不調。以致無子。

制法及用法 白毛烏骨雞一隻。先以粳米(一作糯米)喂養七日。勿令食蟲蟻野物。用

繩吊死。去毛與腸雜。以一片爲率。用生地、熟地、天冬、麥冬、各二兩。放雞肚內。甜美酒十碗。入砂鍋煮爛。取出。再用桑柴火上焙。去藥。更以餘酒淹盡。焙至焦枯。研細末。再用杜仲(鹽水炒去絲)、川芎、白朮、當歸身、茯苓、各二兩。人參、甘草(炙)、肉蓯蓉(酒洗、去鱗甲、切片烘乾)、破故紙(炒)、小茴香(炒)、砂仁、各一兩。香附、四兩(醋浸三日焙)。共研末。和上末。酒調麵糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時溫酒或米湯送下。

【烏骨雞丸】

發明 見祕旨方。

功用 治婦人鬱結不舒。蒸熱咳嗽。月經不調。或久閉不行。或倒經血溢於上。或產後尊勞。或崩淋不止。及帶下赤白淫諸證。及男子斷喪太早。勞嗽吐紅。或虛損者。

制法及用法 用烏骨白絲毛雞、一隻(男雌女雄、製法同巽順丸)。將北五味子、一兩(碎)。熟地黃、四兩(如血熱加生地黃、二兩)。入雞腹內。用陳酒、酒釀、童便、於砂鍋中煮(如巽順丸)。次用綿黃耆(云皮、蜜酒拌炙)、於朮(飯上蒸九次)、各三兩。白茯苓(去皮)、當歸身

(酒洗)、白芍藥(酒炒)、各二兩。預研爲粗末。同雞肉搗爛焙乾。骨用酥炙、共爲細末、再用人參、三兩(虛甚加至六兩)。牡丹皮、二兩(酒淨、勿炒)。川芎、一兩(童便浸、切曬)。各研爲細末。和就藥中。另用乾山藥末、六兩。打糊。衆手成丸。曬乾勿令餿。欲隨收貯。每服三錢。清晨人參湯或沸湯送下。臥時醇酒再服二錢。大便實者。煉白蜜爲丸亦可。如骨蒸寒熱。加九肋鼈甲、三兩。銀柴胡、地骨皮、各一兩五錢。經閉。加肉桂、一兩。崩漏下血。倍熟地。加真阿膠、二兩。倒經血溢。加麥門冬、二兩。鬱結痞悶。加香附(童便製)、二兩。沈香、五錢。赤白帶下。加川草薢、二兩。香附(四製)、二兩。蘼艾、一兩。白淫。倍用人參、黃耆、茯苓、於朮。

參考 此方諸藥皆平常無奇。而調經最驗。蓋雞屬巽補肝。尤妙在烏骨益腎。變巽歸坎。甲癸同源。兼滋衝任也。

【烏骨雞丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治婦人氣血兩虧。羸瘦內熱。經水不調。崩漏帶下。骨蒸勞熱。不能受孕。

藥品 丹參、人參、鼈甲

(炙)、牛膝、青蒿、全當歸、沙參、麥門冬、各三兩。川芎、白朮(土炒)、牡丹皮、茯苓、縮黃耆、銀柴胡、玄胡索、秦艽、各二兩。貝母、艾絨、川連、地骨皮、各一兩。金石斛、生地黃、各四兩。

制法及用法 共研細末。將石斛、青蒿煎湯。煮雄烏骨雞一隻(去羽毛)。打和爲丸。每服四錢。鹽湯送下。

【烏雞白鳳丸】

發明 通行方。

功用 治婦女貧血體弱。月經不調。臨經腹痛。及赤白帶下等。

藥品 雄白鳳雞、三斤重一隻。甘草(炙)、一兩。盧子(廣東藥材)、二兩。黃耆(炙)、四兩。丹參、三兩。當歸、四兩。茯苓、三兩。續斷、三兩。黃芩(酒炒)、一兩五錢。熟地、六兩。人參粉、一兩五錢。春砂仁、二兩。延胡索(炒)、一兩五錢。龜皮膠、三兩。白薇、一兩五錢。香附(製)、一兩五錢。白芍(酒炒)、三兩。龜板膠、三兩。黨參(炙)、六兩。鹿角膠、三兩。川芎(炒)、三兩。毛鹿茸粉、三兩。於朮(炒)、三兩。枸杞子、三兩。益母草(製)、六兩。

制法及用法 先將白鳳雞經死。去外毛內垢洗淨。入枳子、熟地、於朮、加白酒蒸透去骨。搗爛。將各藥打和烘乾。研細粉。再入參茸粉拌和。再將龜鹿髓皮膠烊化。加煉蜜爲丸。大丸每粒潮重三錢。小丸如梧桐子大。大丸每次一丸。小丸每次三錢。開水送服。

【烏鰂骨丸】

發明 見素問腹中論。

功用 胸脅支滿。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。先唾血。四肢清。目眩。時時前後血。病名血枯。此得之年少時。有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。故月事衰少不來。

藥品 烏鰂魚骨、四分。蘆薈、一分(蘆薈即薔草之別名、一說即蘭薈、不知蘭薈本經言有毒、蝕惡肉、排膿血、薔草無毒、亦能通經脈、治六極傷、產後血暈、去瘀排膿、於婦女經閉、功效尤著、且蘭薈今人有名未用、薔草藥肆易得、且與病情相合、故以薔草爲是)。

制法及用法 二物並合之。丸以雀卵。大如小豆。以五丸爲後飯。飲以鮑魚汁。

參考 烏鰂骨丸皆血肉之品。帶血枯氣去。苟非有情之

物。焉能留戀氣血而使之生長。烏鰂魚骨鹹溫下行。性潛去脫。久服令人有子。可知其固精益氣之功。蘆薈鹹酸入肝。活血通經。疏氣行傷。丸以雀卵。壯陽益血。藥後即飯。復飲鮑魚汁。壓其藥性下行。便可利腸續絕。以五丸爲後飯者。言脫血入房肝傷。由於中氣之竭。故欲其留頓中宮。仍從脾胃轉輸於下也。若肺腎虛擾。喘嗽失血。強中滑精者。不可服。因其專主溫散。無涵養真陰之功也。

【桑寄生散】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治胎漏。經血妄行。淋瀝不已。

藥品 桑寄生、當歸(去蘆、酒浸)、川芎、川續斷(酒浸)、阿膠(蛤粉炒)、香附子(炒去毛)、茯神(去木)、白朮、各一錢。人參、甘草(炙)、各五分。

制法及用法 清水二鍾。加生薑五片。煎至一鍾。不拘時服。

【桂香散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治死胎不下。

藥品 桂枝、二錢。麝香(常門子)、一個。

制法及用法 同研。暖酒調服。須臾如手推下。

【桂香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後腹痛不可忍。

藥品 佛手散、桂心、各等分。

制法及用法 黃酒、童便、煎服。立效。

【桃仁散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治經水不調。或淋瀝不斷。斷後復來。狀如瀉水。四體虛倦。不能飲食。腹中堅痛。不可行動。經水或前或後。或經月不來。多思酸物。

藥品 桃仁、半夏、當歸、川牛膝、桂心、人參、蒲黃、牡丹皮、川芎、澤蘭葉、各一錢。赤芍藥、生地黃、各一錢五分。甘草、五分。

制法及用法 清水二鍾。加生薑三片。煎至一鍾。食前服。

【桃仁煎】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後百病諸氣。

藥品 桃仁、一千二百枚(去皮尖及雙仁、熬令黃色)。

制法及用法 搗令極細。以上等酒一斗五升。同研三四遍。如作麥粥法。以極細爲佳。入小長頸瓷瓶中。密塞。以麪封

之。納湯中煮一伏時。不停火。勿令火猛。使瓶口常出在湯上。勿令沒之。候熟取出。每服一合。溫酒調下。每日二次。

【茯苓丸】

發明 見鮑相敷驗方新編。

功用 治經來嘔吐。不思飲食。

藥品 茯苓、茯神、各八錢。遠志(去骨)、六錢。硃砂、三錢。豬心、一個。

制法及用法 稀粥爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。金銀花湯送下。

【茯苓散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後氣虛。昏亂狂語。精神昏亂。

藥品 茯苓(一作茯神)、生地黃、各三兩。遠志、白薇、龍齒、各二兩五錢。防風、人參、獨活、各二兩。一方加荊芥、二兩。甘草、一兩二錢五分。

制法及用法 研爲末。先以銀一大片。清水一斗五升。煮取七升。納藥再煮取三升。分溫三服。忌食菘菜、豬肉、生冷等物。

【益母丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 安魂魄。養血氣。調經絡。治胎前產後諸疾。

藥品 茺蔚 (端午日採葉及花子陰乾用)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜或米糊爲丸。如彈子大。①婦人月經不調。及血崩漏下者。溫酒送下。②婦人久不孕者。每服十丸至二十丸。溫酒送下。③妊娠 臍腹刺痛。胎動不安。下血不止者。用秦朮糯米煎湯下。或當歸湯亦可。④妊娠臨月。用縮砂飲送下。一日三次。催生易產。產時先用一丸。童便化下。則百病不生。⑤臨產子死腹中者。童便溫酒各七分化下。⑥胎衣不下。橫生不順。心悶欲死者。童便酒各七分化下。或薄荷自然汁、鹽湯亦可。若血在胞中。及死胎經日不下。脹滿心痛者。炒鹽湯送下。⑦產後惡露正行時。用熱湯送下。虛者煎白朮、人參、陳皮湯下。能去瘀生新。⑧產後中風。牙關緊急。半身不遂。失音不語者。童便無灰酒各半送下。⑨產後寒熱往來如瘧。臍腹作痛。或作聲者。溫米飲或桂枝湯化下。⑩產後面垢顏赤。五心煩熱。或結成血塊。臍腹奔痛。時發寒熱。有冷汗者。童便酒各半送下。溫薄荷自然汁亦可。⑪產後兩太陽痛。呵欠心忡氣短。肌體羸瘦。不思飲食。血

氣身熱。手足煩麻。百節疼痛者。溫米飲湯送下。⑫產後眼目黑暗。血暈血熱。口渴煩渴。如見鬼神。狂言。不省人事者。薄荷自然汁化下。如無生者。濃煎薄荷湯、或童便酒各半亦可。⑬產後鼻衄。口乾舌黑者。童便酒各七分化下。若心悶煩渴者。溫米飲、童便各七分送下。⑭產後咳嗽。胸膈不利。惡心。口吐酸水。面目浮腫。骨痛舉動失力者。溫酒送下。吐逆不止者。溫酒化下。⑮產後遍身疼痛。百節開張。血乘氣流入腸中。停流不散。臍腹疼痛者。米飲化下。⑯產後骨蒸勞。童便酒各七分化下。⑰產後餘血。惡露不盡。結滯臍腹刺痛。惡物上衝。心胸煩悶者。童便酒各半化下。⑱產後崩中。漏下不止。狀如雞肝。脊背倦悶者。糯米秦朮煎湯化下。當歸桂枝湯亦可。⑲赤白帶下者。煎秦朮湯送下。白帶下者。煎膠艾湯送下。⑳產後大小便不通。煩躁口渴者。薄荷自然汁化下。如無生者。濃煎薄荷湯亦可。祇大便秘結。口渴煩渴者。童便、酒、各七分化下。薄荷酒亦可。㉑產後氣及衄血者。大棗煎湯化下。㉒產後四肢浮腫。及寒熱氣喘。或小便澀者。溫酒化下。

【益母丸】

發明 見李樞醫學入門。

功用 治經水不調。腹有癥瘕。久不受孕。

藥品 益母、八兩。當歸、赤芍藥、木香、各二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。熱湯送下。服至百日。即可有孕。

【益母膏】

發明 驗方。

功用 治婦人經脈不調。一切胎產氣血諸病。並治折傷內損。瘀血積滯。天陰則痛。

藥品 益母草(端午日採紫花方莖者、連根洗淨)。

制法及用法 於石臼中搗爛。以布濾取濃汁。入砂鍋內。文武火熬成膏。如沙糖色爲度。每服一匙。棗湯調下。如有瘀者。黃酒下。

【神效膏】

發明 見鮑相璈驗方新編。

功用 治久慣小產。

藥品 當歸、條芩(酒炒)、益母、各一兩。生地黃、八兩。白朮、續斷、各六錢。甘草、三錢。白芍藥(酒炒)、黃耆、肉蓯蓉、各五錢。

制法及用法 用酥油二斤。浸七日。熬成膏。加白蠟一

兩。再熬三四次。加真丹(研)四兩五錢。再熬。再加龍骨(飛過)一兩。攪勻。以紙攤如碗口大。貼丹田上。十四日一換。貼過八個月爲妙。保胎萬全。

【神應散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治墮胞生。

藥品 生薑、酒釀、菜油、各半杯。

制法及用法 煎數沸。入香便服。潤腸易產。

【祛風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胎瘤多暗。

藥品 胡黃連、五錢。全蝎、犀角、天竺黃、麻黃(去節)、各二錢五分。

制法及用法 各研細末。和勻。每服五分。加麝香一分。乳汁調下。

【茶調散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治經閉。

藥品 大黃、黃芩、各二兩。牽牛、滑石、各四兩。

制法及用法 共研爲細末。滴水爲丸。如小豆大。每服十五丸。熱湯送下。不效加十丸。以利爲度。一日三次。

【秦朮散】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治經脈有熱。月水凝滯。凡心煩倦。

藥品 秦光、麥門冬、各一兩。生地黃、當歸、各五錢。地骨皮、鬱金、蘇木、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢五分。清水一盞。加紅花少許。煎至七分。溫服。若經脈閉。去紅花。忌酒與熱物。可服一年。

【荊芥散】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治產後風虛血暈。精神昏昧。

藥品 荊芥、一兩三錢。桃仁(炒)、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。熱湯調下。微喘加杏仁(炒)、甘草、各三錢。

十一筆

【紫金丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後惡露不快。腰痛小腹如刺。時作寒熱。頭痛。不思飲食。及有瘀血。經水不調。心痛。

藥品 五靈脂(水淘去砂石、焙乾、杵、炒爲末)、蒲黃。

制法及用法 先以米醋調五靈脂。慢火熬成膏。次以蒲黃末搜和爲丸。如櫻桃大。每服一丸。水與童便各半盞。煎至七分。化藥溫服。少頃。再一服。惡露即下。久有瘀血成塊。純水不利者。並用酒煎下。

【紫金丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治產後胸中有物。狀如噎氣。

藥品 代赭石、礞礪石、各等分。

制法及用法 研爲細末。醋糊和丸。如梧桐子大。每服二三十丸。溫酒送下。胸中痛。當歸湯送下。

【紫金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治經水過多。崩漏帶下。淋瀝不斷。腰腹重痛。一切五色帶疾。

藥品 禹餘糧(火煅、醋淬七次、細研、水飛、焙乾)、三兩。白芍藥、川芎、熟地黃、附子、赤石脂(煅另研)、龍骨(煅另研)、當歸、各一兩。乾薑(炮)、肉桂、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。加麝香少許。空腹時米飲調下。

【紫石英丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治經水乍多乍少。或前或後。時腹痛。

藥品 紫石英(細研、水飛)、川烏頭(炮)、川杜仲(炒、去絲)、禹餘糧(火煨、醋淬)、遠志肉、澤瀉、桑寄生、桂心、龍骨(另研)、當歸、人參、肉蓯蓉(酒浸)、石斛、乾薑(炮)、五味子、甘草(炙)、各一兩。牡蠣(煨)、川椒(去目及閉口者、炒出汗)、各五錢。

制法及用法 共研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前米飲送下。

參考 經水之病。陰乘陽則胞寒氣冷。血不運行。經所謂天寒地凍。水凝成冰。故在月後而行甚少。陽乘陰則血流散溢。經所謂天暑地熱。經水沸溢。故在月前而行甚多。此方平其陰陽。調其氣血。使各不相乘。經自調勻矣。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治子癰。

藥品 羚羊角(鎊)、獨活、酸棗仁(炒)、薏苡仁(炒)、五加皮、防風、當歸(酒浸)、川芎、茯神(去木、一作茯苓)、杏仁(去

皮尖)、各五分。木香、甘草(炙)、各二分。

制法及用法 加生薑。清水煎服。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後中風。身體反張。

藥品 羚羊角屑、當歸、各七錢五分。獨活(去蘆)、防風(去蘆)、麻黃(去節)、各一兩。人參(去蘆)、赤芍藥、細辛(去苗)、桂心、各五錢。

制法及用法 散服。每服八錢。清水一大盞半。加生薑五片。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。

【羚羊角飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後氣實。腹中堅硬。兩脅脹滿。心中煩熱。渴欲飲水。欲成痙逆中風者。

藥品 羚羊角(鎊)、五錢。防風(去蘆)、羌活(去蘆)、桔梗(去蘆)、敗醬、各八錢。桂心、柴胡(去蘆)、大黃(浸過腹)、各一兩二錢。

制法及用法 散服。每服五錢。清水一大盞。煎至一盞。去滓。不拘時溫服。更用地黃(切)一升。炒令黑。瓷瓶中下熱酒三升。密封口。煮令減

半。任意服之。

【通氣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠腹痛。

藥品 破故紙、不拘多少。

制法及用法 瓦上炒香熟。研分末。先嚼胡桃肉一個。每服三錢。空腹時溫酒調下。

【通經丸】

發明 見鮑相璣驗方。

功用 治月經不通。或成血瘕。

藥品 三棱、莪朮、赤芍藥、川芎、當歸、紫苑、劉寄奴、各八分。穿山甲、一片。

制法及用法 共研末。米糊爲丸。如梧桐子大。每服三丸。溫酒送下。

【犀角飲】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治產後亡津。自汗發熱困倦。唇口乾燥。

藥品 犀角、麥門冬、白朮、各五錢。柴胡、一兩。枳殼(麸炒)、地骨皮、生地黄、甘草(炙)、當歸、人參、茯苓、黃耆、各七錢。

制法及用法 咬咀。每服四錢。加生薑三片。浮麥七十粒。清水煎。溫服。

【救苦散】

發明 見陳自明婦人大全良

方。

功用 治死胎不下。

藥品 桂末、一錢。

制法及用法 痛時酒便調下。

【麥門冬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠心煩憤悶。虛躁吐逆。惡聞食氣。頭眩肢重。百節疼痛。多臥少起。

藥品 麥門冬(去心)、子芩、赤茯苓、各一兩。茯神、赤芍藥、陳皮、人參、苦茶、桑寄生、甘草、旋覆花、各五錢。生地黄、七錢五分。

制法及用法 研爲粗末。每服四錢。清水一盞。加生薑一錢。煎至七分。不拘時溫服。

【連翹散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治產後癰疽突出。

藥品 連翹、黃耆(炙)、天花粉、防風、梔子、各一錢。甘草、三分。

制法及用法 清水煎服。

【啓宮丸】

發明 驗方。

功用 治婦人體弱力弱。滯重氣滯。子宮脂膩。不能受孕。

藥品 半夏(製)、蒼朮(一作白朮)、香附(童便浸炒)、各四

兩。六神麴(炒)、茯苓(生研)、陳皮(鹽水炒)、各二兩。川芎(酒炒)、三兩。一方有生甘草。

制法及用法 共研細末。蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服三錢。溫酒送下。

【逍遙丸】

發明 克集戍方。

功用 治婦人血虛勞倦。五心煩熱。肢體疼痛。頭目昏重。心忪煩赤。口燥咽乾。發熱盜汗。減食嗜臥。及血熱相搏。月水不調。臍腹脹痛。寒熱如瘧。大便祕澀。室女血弱陰虛。營衛不和。痰嗽潮熱。肢體羸瘦。漸成骨蒸。

藥品 白茯苓(一作茯神)、白朮(去蘆土炒)、白芍藥(酒炒)、當歸(去蘆、酒浸半日、微炒)、北柴胡(去苗)、各一兩。甘草、一兩五錢(炙、一作五錢)。

制法及用法 研細。再用梔子、薄荷煎湯。泛丸如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【婦寶勝金丹】

發明 驗方。

功用 治胎前產後一切雜症。

藥品 人參、全當歸、白芍藥、赤芍藥、川芎、白芷、各三兩。熟地黃、九兩。茯苓、桂心、牛膝、牡丹皮、蘇木、各五

兩。血珀、硃砂(飛)、各一兩。白薇、八兩。赤石脂、白石脂、乳香、沒藥、各二兩。粉草、一兩五錢。香附(製)、二斤。

制法及用法 先將赤白石脂、醋浸三日。炭火上煨七次。再淬。醋乾爲度。研細。次將各藥用好酒酒浸。春五、夏三、秋七、冬十二日。曬乾爲末。與石脂和勻。煉蜜爲丸。每重三錢。辰砂、金箔爲衣。每服一丸。酌症用引化下。①經水不調。或先或後。或多或少。或經前腹痛。或經後淋漓。一切赤白帶下。血癰血瘕。及妊娠嘔惡冲逆。腹痛腰痠。胎氣不安。飲食少進。俱用砂仁殼湯下。②妊娠帶下見紅。似欲小產。人參湯化下。③妊娠臨月陣痛。腰痠下墜。乳香米湯化下。④產後偏身發熱。不省人事。凍黑魚頭煎湯化下。⑤產後風寒發熱。桔梗湯化下。⑥產後停食發熱。枳殼、茯苓、煎湯化下。⑦產後兒枕骨痛。山楂肉(炒焦)、三錢。煎湯化下。⑧產後血暈血崩。頭熱心煩。有汗者。每服一丸。人參、煎湯。加童便、少許化下。⑨產後惡露不盡。腰痛發熱。每服一丸。紅花湯化下。

十二筆

【黑白散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後。兒枕塊痛。

藥品 烏金石(火煨醋淬七次、另研)、寒水石(煨存性、爲末)。

制法及用法 各取一錢五分。水飲調下。痛止勿服。不愈再服。

【黑神散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治日時被損。吐血衄血。婦人難產熱病。胎死腹中。產後惡露不盡。胞衣不下。上攻心胸痞滿。或臍腹堅脹掣痛。血暈神昏。眼黑口噤。瘀血諸疾。並治產後十八證。

藥品 黑大豆(炒微香)、五合。熟乾地黄(洗切、焙乾、酒炒、一作酒浸)、當歸(去蘆、酒製)、肉桂(去粗皮)、乾薑(炮、去皮、一作炒)、甘草(炙)、芍藥(酒浸)、蒲黃(篩淨、炒黑)、各四兩。一方無黑豆。一方有百草霜、二兩。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。淋酒半杯。清水半杯。煎至一半。入童便半杯。不拘時調服。或酒、童便各半

煎溫服。氣虛加入參、三兩。黃耆、六兩。難產胎死腹中。每服二錢。米醋五勺許。沸湯六七分。浸起溫服。疑或之際。且進佛手散。酒水合煎二三服探之。若未死。子母俱安。若胎已死。立便逐下。的知其胎死。進此藥後。更進香桂散。須臾如手推下。用於催生。更加好滑石末、五錢。葵子、五十粒(搗碎)。黃枹葉、七八片。葱白、二寸。順流水煎湯調下。蓋滑石能利小便。枹葉行氣逐血。葱白內通陽氣。氣盛血行即產。

【黑神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後血塊痛。經後腹疼。及經事不調。

藥品 熟地黄、一斤。陳生薑、八兩。

制法及用法 同和炒乾爲末。每服二錢。烏梅湯調下。常服酒調。經脈不通。烏梅荆芥酒浸調下。

【黑神散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治墮胎。

藥品 熟地黄、當歸、川芎、甘草、肉桂、炮薑、蒲黃(炒)、巴豆、香附(醋炙)。

制法及用法 童便酒煎服。

【黑龍丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後血疾。產難胎不下。危急垂死者。

藥品 當歸、五靈脂、川芎、良薑、熟地黃、各一兩。

制法及用法 細剉。以沙罐盛赤石脂。鹽泥固濟。炭火十斤。煨令通赤。去火候冷。開看成黑糟色。取出細研。再入百草霜、五兩。硫黃、乳香、各一錢五分。花蕊石、琥珀、各一錢。並研細。與前藥和合再研。如法修製。和勻。醋煮麵糊爲丸。如彈子大。每服二丸。炭火燒令通赤。以生薑自然汁和酒及童便淬之。漉出研細。即用此汁調漉。得下即活。

【琥珀丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胎前產後。有病及三十六種血冷。七疝八癰。八風十二痹。心腹刺痛。卒中癱瘓。半身不遂。手足酸痛。乳中結。胎動不安。死胎不出。胎衣不下。

藥品 琥珀、辰砂(均另研)、河膠(碎炒)、五味子(揀淨)、金石斛(去根)、附子(炮、去皮臍)、肉桂(去粗皮)、沈香(勿見火)、川芎、各五錢。牛膝(去蘆、酒浸)、當歸(去鬚、炒)、肉蓯蓉(酒浸、炒)、人參、續斷、沒

藥(研)、熟地黃、木香(勿見火)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。空腹時溫酒化下。午後食前再服。能生新血。去惡血。①腹脅疼痛。繞臍如刀刺。及嘔逆上氣。築心痰毒。不思飲食者。用薑汁少許。和酒化服。②諸痢及赤白帶下。血冷崩中下血。漏胎下血。用生薑。與艾剉炒令赤色。入酒同煎數沸。去滓調服。③泄瀉不止。陳米飲化服。④瀝尿諸淋。通草、燈心、煎湯服。⑤血暈不知人。當歸煎湯調服。⑥上熱下冷。人參煎湯服。⑦遍身虛腫水氣。赤小豆煎湯服。⑧產內二毒傷寒。及中風角弓反張如板硬。麻黃煎湯服。以衣被蓋出汗。⑨月經不通。或間雜五色。頻併而下。斷續不止。飲食無味。肌膚瘦劣。面赤唇焦。乍熱乍寒。四肢煩疼。五心躁熱。黑黧。遍身血斑。赤腫走注。及血風勞傷無力。用童便入薑汁少許調服。常服以童便爲妙。若恐惡心。則和酒一半服之。⑩如懷胎於臨月一日一服。至產下不覺疼痛。或服至五服十服。日倍飲食。

【琥珀散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治婦人血風勞氣。臍腹疼痛。經水不調。漸加羸瘦。

藥品 血琥珀(細研)、白朮、當歸、桃仁(去皮尖、麩炒)、赤芍藥、各七錢五分。柴胡(去苗)、鼈甲(醋炙)、各一兩。延胡索、紅花、牡丹皮、桂心、各五錢。

制法及用法 爲散。每服四錢。清水一中盞。加生薑五釐。煎至六分。去滓。食前稍熱服。

【琥珀散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治月經壅滯。腹臍疼痛。產後惡露不快。血上搶心。迷悶不省。

藥品 京三稜、蓬莪朮、赤芍藥、劉寄奴(去梗)、牡丹皮(去木)、熟地黃(酒浸)、官桂(勿見火)、菊花、蒲黃、當歸(去蘆、酒浸)、各一兩。一方無菊花、蒲黃。有玄胡索、烏藥。

制法及用法 前五味用烏豆一升。生薑八兩(切片)。米醋四升。同煮豆爛爲度。焙乾。後入五味。同研末。每服二錢。空腹食前溫酒調下。若尋常血氣痛。祇一服。產後血衝心。二服便下。常服尤佳。

【琥珀散】

發明 見沈括靈苑方。

功用 治婦人心膈迷悶。腹臍撮痛。氣急氣悶。經水不通。

藥品 天台烏藥、二兩。當歸(一作二兩)、蓬莪朮、各一兩。

制法及用法 生研細末。每服二錢。溫酒調下。後以食壓之。忌食生冷油膩。產後諸疾。炒生薑酒調下。

【琥珀散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治老婦月經不止。

藥品 琥珀、三稜、各五錢。黃芩(炒黑)、香附(童便製)、各二兩。當歸、川芎、各一兩。

制法及用法 共研細末。黃米飲爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。空腹時熱湯送下。

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後經脈不調。四肢煩疼。飲食全少。日漸羸瘦。

藥品 琥珀、牛膝、生乾地黃、當歸、各一兩。桃仁、赤芍藥、各五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。清水一盞。加生薑三片。煎至六分。去滓服。

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後一切危急之疾。

藥品 琥珀、硃砂、麝香、香墨(醋炙)、白殭蠶、當歸、各二錢五分。桂心、鯉魚鱗(炒焦)、百草霜、白附子、桑上塵(炒令烟出、篩淨)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。炒生薑熱酒調下。

【琥珀黑龍丹】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治死胎胞衣不下。敗血上衝。

藥品 五靈脂(酒研、澄去砂)、當歸、川芎、乾地黄、高良薑、各三兩。

制法及用法 並入陽城罐內。鹽泥封固。炭火煨通紅。去火。候冷研細。後用琥珀、百草霜、硫黃、各三錢五分。花蕊石(煨)、乳香、各三錢。研爲細末。同前藥和勻。米醋和丸。如彈子大。每服一丸。用炭火煨通紅。投入生薑自然汁內。浸碎研化。以無灰酒入麝香少許。不守類服一口。加童便尤宜。

【湧泉散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治婦人乳汁不通。

藥品 瞿麥穗、麥門冬(去

心)、龍骨、穿山甲(炮黃)、土不留行、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。熱酒調下。一日三次。服後食豬蹄羹少許。並用木梳於左右乳上。各梳二三十次。

【湧泉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產乳無汁。及乳結癰腫。

藥品 穿山甲(洗淨灰炒燥)、一兩。

制法及用法 研爲細末。每服方寸匕。溫酒調下。

【開骨膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治難產。

藥品 乳香。

制法及用法 端午日午時。研爲細末。滴水和丸。如芡實大。每服一丸。無灰酒吞下。

【開骨膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治難產。

藥品 乳香、硃砂、各等分。

制法及用法 研爲細末。麝香酒調下。

【勝金丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治難產。

藥品 敗兔毫筆頭、一枚(燒灰)。

制法及用法 研爲細末。生藕搗汁一盞送下。若產母虛弱。及素有冷疾者。恐藕節動氣。即於重湯內暖過服。立產。

【勝金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治難產橫逆。子死腹中。

藥品 王不留行、酸漿草(死胎信用)、羌藟子(去刺)、五靈脂(行血宜生用)、各等分。

制法及用法 研爲末、每服三錢。酒一盞半。加白花劉寄奴子一撮。同煎溫服。

【勝金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治臨產兒枕血塊破碎。與胞中敗血壅滯。兒身不能便利。

藥品 麝香、一錢。鹽豉、一兩(青布裏、燒紅)。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。取秤錘燒赤。酒酒中。取酒服下。

【黃芩散】

發明 見楊氏方。

功用 治產後血竭。飲水不止。

藥品 黃芩、麥門冬、各等分。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一盞半。煎至八分。

去滓。不拘時溫服。

【黃耆丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後尋勞。寒熱進退。頭目眩痛。骨節痠疼。氣力虛乏者。

藥品 黃耆、鼈甲、當歸(炒)、各一兩。桂心、白芍藥、續斷、川芎、牛膝、茯苓、沉香、柏子仁、枳殼、各六錢五分(一作各七錢五分)。五味子、熟地黃、各五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服四五十丸。食後粥飲送下。

【黃蠟膏】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治產後癰疽脫出。

藥品 黃蠟、柏蓉、麻黃、各四分。

制法及用法 共研細末。熟湯沖服。

【無憂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠胎前肥厚。根蒂堅牢。行動艱難。臨產難產。

藥品 當歸(去血、酒浸)、川芎、白芍藥、枳殼(去白、鹽炒)、乳香(另研)、各三錢。木香(不見火)、甘草(炙)、血餘(燒灰存性、另研、以續斷心油和之)、各一錢五分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水煎。入乳香、血餘和勻。不拘時服。一日二次。

【芎藭散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治經水澀滯。陰戶腫痛。

藥品 石芎藭、當歸(炒)、各一兩(一作各二錢)。秦朮、七錢五分。吳茱萸、五錢。

制法及用法 研爲粗末。每服三錢。清水一盞。加蔥白五寸。煎至六分。空腹時溫服。更以枳實炒熟頻熨。

【硫黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後勞傷陰脫。

藥品 硫黃、烏賊魚骨、各五錢。五味子、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。摻於患處。

十三筆

【當歸散】

發明 見金匱要略。

功用 清熱。安胎。妊娠宜常服。並治產後百病。

藥品 當歸、黃芩、芍藥、川芎、各一斤。白朮、八兩。

制法及用法 杵爲散。酒服方寸匕。日再服。妊娠常服即易產。小兒且無疾。

參考 腹內爲大小腸結之區。腸前爲血脈萃集之處。在孕則二腸與血脈均被壓迫滯而熱生。故方中以白朮健腸之用。黃芩清腸之熱。當歸、川芎以行血脈之滯。芍藥以泄血脈之熱。二腸之消化。血脈之循環均能健運。則胎前子母自然無病。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胎前諸疾。或因怒中氣衝子臟。或衝肝脈。腹急肚脹。腰腹時疼。不思飲食。四肢浮腫。氣急時喘。大便忽難。小便忽澀。產門忽腫。

藥品 當歸、一兩。赤茯苓、枳殼、白芍藥、川芎、各二兩。川白蘘(炮)、木香(煨)、粉草、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一盞半。加生薑三片。煎至八分。去滓。不拘時溫服。如稟受氣弱及南人。枳殼減半。如氣實及北人。於方內加分兩服之。或連日大便秘澀。加蜜同煎。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後腹痛。脅肋脹滿。

藥品 當歸、乾薑、各等分。

制法及用法 研爲末。每服三錢。清水一盞八分。入鹽醋各少許同煎。食前熱服。一方用酒煎。

【當歸散】

發明 見陳履新簡易方。

功用 治經水不調。或三四月不行。或一月再至。

藥品 當歸、川芎、白芍藥(炒)、黃芩(炒)、各一兩。白朮、山藥、肉、各一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時溫酒調下。一日三次。如冷去黃芩。加肉桂一兩。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 抑陽助陰。調理經脈。

藥品 當歸(微炒)、地黃(酒蒸、焙)、川芎、白朮、白芍藥、黃芩、各等分。

制法及用法 每服三錢。清水一盞半。煎至八分。空腹時溫服。

【當歸養血丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後惡露不散。口渴腹痛。及惡露不快。臍下急痛。連及腰脚。

藥品 當歸、赤芍藥、牡丹皮、延胡索、各二兩。桂心、一兩。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三四十丸。空腹時溫酒送下。痛甚者細嚼下。

【當歸養血丸】

發明 驗方。

功用 治經水不調。赤白帶下。子宮寒冷。不能受孕。

藥品 全當歸、黃耆(炙)、香附(製)、茯苓、白芍藥(炒)、阿膠、各三兩。白朮(炒焦)、杜仲、各四兩。生地黃(一作生黃耆)、八兩。牡丹皮(一作艾絨)、二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

【催生如聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 催生。

藥品 黃蜀葵子、小半合(炒、一作二錢)。

制法及用法 研爛。酒浸去滓。溫服。漏血胎乾難產痛極者。並進三服。良久。腹中氣寬胎滑。即產。然須見正產候。方可服之。

【催生如聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 瘦胎。治逆產橫生。並治胎前產後崩漏等證。

藥品 百草霜、香白芷(不見

大)、各等分。

制法及用法 研爲末。和勻。每服二錢。臨產時。童便及米醋少許打爲膏。沸湯調下。或用酒、童便、各半煮同煎。纔沸乘熱服。難產者再服即下。

【萬病丸】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治婦人經閉。繞臍作痛。

藥品 乾漆(杵碎、炒煙盡)、牛膝(去苗、酒浸一宿、焙乾)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。以生地黄汁、一升。同二藥末。入銀器內。慢火熬。可丸即丸。如梧桐子大。每服二丸(一作二十丸)。空腹時米飲或溫酒送下。

【葱白丸】

發明 驗方。

功用 治婦人受寒氣鬱。腹痛經閉。

藥品 阿膠、香附、各二兩。川芎、當歸、厚朴、各三兩。

制法及用法 研爲末。將膠烱化。葱白、薑汁爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

十四筆

【奪命丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產婦瘀血入胞衣。脹滿難下。

藥品 附子(炮)、五錢。牡丹皮、乾漆(碎、炒令煙盡、一作二錢五分)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。醋醃、一升。加大黃末、一兩。熬成膏和丸。如梧桐子大。每服五十丸。不拘時溫酒送下。

【奪命散】

發明 見張堅方。

功用 治產後血暈。語言顛倒。健忘失志。及產後百病。

藥品 沒藥、血竭、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。纔產下使用童便、陳酒、各半煮。煎一兩沸。調下。良久再服。其惡血自循脈下行。不復上衝。免生百疾。

【槐子丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠不足月。腹痛欲產。

藥品 槐子、十四枚。蒲黃(炒)、一合。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。溫酒送下。以痛止爲度。

【蒲黃酒】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妊娠墮胎胞衣不

出。

藥品 蒲黃(炒)、一合。槐子、十四枚(研末)。

制法及用法 酒三杯。煎至二杯。去滓。分溫二服。未下再服。

【毓麟珠】

發明 見張景岳方。

功用 治婦人氣血俱虛。經脈不調。或斷續。或帶濁。或腹痛。或腰痠。或飲食不甘。瘦弱不孕。

藥品 人參、白朮(土炒)、茯苓、芍藥(酒炒)、鹿角霜、川椒、杜仲(酒炒斷絲)、各二兩。川芎、甘草(炙)、各一兩。當歸、熟地黃(蒸搗)、菟絲子(製)、各四兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一二丸。空腹時細嚼。溫酒或熱湯送下。或作爲小丸。如梧桐子大。每服三四錢亦可。如子宮寒甚。或泄或痛。加附子(製)、炮薑。

【寧坤丸】

發明 驗方。

功用 治婦人經水不調。諸虛百損。胎前產後一切病症。

藥品 人參、川牛膝、各四錢。熟地黃、香附(製)、生地黃、全當歸、橘紅、白朮、大川

芎、白芍藥、白茯苓、白芍藥、各一兩。紫蘇葉、阿膠、砂仁、黃芩、琥珀、廣木香、各五錢。沉香、一錢。甘草(炙)、三錢。益母草、六兩。

制法及用法 共磨細末。煉白蜜爲丸。每重三錢。蠟殼封固。每服一丸。隨症用引化下。

①血衰血敗。經水不調。全當歸、生地黃、煎湯送下。②經水不調。桃仁、紅花、當歸尾、煎湯送下。③大便下血。川黃蘗、生地黃、煎湯送下。④大便結艱難。廣陳皮湯送下。⑤久痢脫肛。肉果、訶子肉、煎湯送下。⑥小便不利。木通、燈心、煎湯送下。⑦氣血俱虛。麥門冬、白歸身、煎湯送下。⑧遍身虛腫。赤小豆(打碎)、煎湯送下。⑨遍身腫脹。米飲湯送下。⑩遍乳腫痛。蒲公英、金銀花、煎湯送下。⑪嗽喘。白杏仁(敲碎)、桑皮(炙)、煎湯送下。⑫咳嗽。款冬花、川貝母(去心、研碎)、煎湯送下。⑬赤白痢。連翹(去心)、煎湯送下。⑭赤白帶下。蘼艾、黑鹽皮、煎湯送下。⑮求孕。白歸身、白芍藥(酒炒)、煎湯送下。⑯行經身腰疼痛。防風、羌活、煎湯送下。⑰氣喘咳嗽。口吐酸水。遍身虛腫。兩脅疼痛。動止無

力。黃酒送下。⑤眼昏血暈。口渴煩躁。狂言亂語。不省人事。二便不通。童便或薄荷湯送下。⑥不思飲食。身體羸瘦。手足厥冷。骨節疼痛。開水送下。⑦氣喘急。蘇子湯送下。⑧嘔吐。淡薑湯送下。⑨兩脅痛。艾葉湯送下。⑩氣痛。木香湯送下。⑪泄瀉。米飲湯送下。⑫黃腫。燈心、木通、煎湯送下。⑬胎前齊腹刺痛。胎動不安下血。糯米湯化下。⑭胎前一切諸疾。溫酒或童便送下。⑮胎動下血不止。黑鹽皮膠、煎湯送下。⑯臨產數日前。服三四丸。溫酒化下。可免產後諸疾。⑰橫逆難產。葵子湯送下。⑱胞衣不下。童便化下。⑲橫生或子死腹中。炒鹽湯化下。⑳產後惡血未盡。膈腹刺痛。童便、或溫酒送下。㉑產後飲食不進。山楂(炒黑)、麥芽(炒)、煎湯化下。㉒產後大便閉結。郁李仁肉(打碎)、煎湯送下。㉓產後調理。去瘀生新。木香、當歸身、香附、煎湯送下。㉔產後血暈。不省人事。當歸煎湯、加童便送下。㉕產後中風。牙關緊閉。半身不遂。失音不語。溫酒加童便送下。㉖產後惡血上冲。血塊腹痛。或發寒熱。薄荷、蘇葉、煎湯。

加童便化下。如自汗不止。忌用蘇葉薄荷。㉗產後血崩。糯米湯、或黑荆芥、黑蒲黃、煎湯送下。

參考 按用引一味與三四味者。共用六分。清水一茶鍾。煎至六七分。外加童便二三分。將丸化開。隔水燉熱服之。切忌氣惱及大寒生冷等物。

十五筆

【調經散】

發明 見傅青主女科。

功用 治產後惡露不淨。停留胞絡致令浮腫者。

藥品 沒藥(另研)、琥珀(另研)、肉桂、赤芍藥、當歸、各一錢。

制法及用法 研為細末。每服五分。薑汁、酒、各少許。調服自愈。

【調經散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治產後敗血。乘虛停積於五臟。循經流入於四肢。留滯日深。腐壞如水。漸致身體面目浮腫。或因產後敗血上干於心。心不受觸。至煩躁臥起不安。如見鬼神。言語顛倒。

藥品 赤芍藥(一作二錢五分)、沒藥(另研、一作一錢)、桂

心(一作一錢)、琥珀(另研、一作一錢)、當歸(酒洗、一作二錢五分)、各一兩。麝香(另研)、細辛(去苗)、各五分。

制法及用法 研爲末。和勻。每服五分或一錢。溫酒入生薑汁少許調下。每服加龍膽一捻。得睡即安。火起產後虛浮。醫人不識。便作水氣治之。凡治水氣。多以導水藥。極是虛人。夫產後既虛。又以藥虛之。是謂重虛。往往因致耗天。但服此藥。血行腫消即愈。

【調經養血膏】

發明 通行方。

功用 治婦女血虧。行經腹痛。

藥品 當歸、四錢。香附、三錢。紫丹參、三錢。陳皮、一錢五分。焦白朮、三錢。延胡索、三錢。黨參、三錢。續斷、三錢。白芍、三錢。南柴胡、二錢。丹皮、三錢。川芎、二錢。

制法及用法 將藥煎汁三次。去渣濾清。以不粘紙爲度。再加阿膠三錢。益母膏三錢。紅糖一斤。攪勻收膏。每服五錢。開水沖服。

【調經益母丸】

發明 驗方。

功用 治氣血兩虧。月水不調。腰痛腹脹。赤白帶下。身

作寒熱者。

藥品 大熟地、四兩。香附(製)、白芍藥、各二兩。當歸、三兩。乾薑、延胡索、川芎、蒲黃、桃仁泥、各一兩。

制法及用法 共研細末。益母膏爲丸。如梧桐子大。每服三錢。空腹時蜜湯或陳酒送下。一月後即可受孕。

【調經種子丸】

發明 驗方。

功用 治婦人血虛氣滯。腰痠腹痛。經水不調。赤白帶下。子宮寒冷。不能受孕。久服氣血溫和。令人有子。

藥品 熟地黃、八兩。厚杜仲、香附(製)、各四兩。川芎、當歸、川續斷、蕪荑、各三兩。黃芩、阿膠、白芍藥(炒)、各二兩。一方有炒青皮、二兩。山藥、八兩。肉桂、一兩。無當歸、熟地黃、白芍藥、黃芩。

制法及用法 共研細末。益母膏和煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。溫酒送下。如已有孕。不可服。

十六筆

【獨行散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後血暈。衝心悶絕。

藥品 五靈脂、二兩(半生半炒)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒調下。口噤者。撬開口灌之。入喉即愈。或加荊芥爲末。童便調服。如血崩不止。加當歸、酒、童便煎。不拘時服。

【獨聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後心腹絞痛。或血迷心竅。不省人事。

藥品 南山楂肉(炒)、一兩。

制法及用法 清水煎。童便沙糖和服。

參考 山楂不惟消食健脾。功能破瘀。止兒枕痛。更益以沙糖之甘。逐惡而不傷脾。童便之鹹。入胞而不涼下。相得相須。功力甚偉。名曰獨聖。誠不虛也。

【龍骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治半產下血不止。

藥品 龍骨、當歸、地黃、各二兩。艾葉(炒)、一兩。地榆、阿膠、芍藥、乾薑、各一兩五錢。蒲黃、一兩二錢五分。牛角鰓(炙焦)、二兩五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前米飲調下。

【聖聖散】

發明 見產乳方。

功用 治產後惡露不盡。血結刺痛。及心腹諸疾。

藥品 聖聖子(隔紙炒)、當歸、桂心、赤芍藥、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒調下。產後可常服。

十七筆

【聖黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血臟久冷。月經不調。臍腹刺痛。

藥品 聖黃(片子者)、白芍藥、各二錢。玄胡索、牡丹皮、當歸、各一錢五分。蓬莪朮、紅花、桂心、川芎、各一錢。

制法及用法 清水二鍾。煎至一鍾。不拘時服。

十八筆

【雞內金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治產後遺溺。

藥品 雞腔脰、一具(並腸洗燒)。

制法及用法 研爲末。每服方寸匕。溫酒調下。

二十一筆

【續斷丸】

發明 見陳自明婦人大全良方。

功用 治經水不止。口乾心煩。四肢羸乏。飲食減少。

藥品 川續斷、當歸、烏賊骨、黃耆、牛角鯢(燒)、五味子、甘草、龍骨(煨)、赤石脂、熟地黃、各一兩。地榆、五錢。艾葉、附子、乾薑、川芎、各七錢五分。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹溫酒送下。

小兒類

一 筆

【一粒金丹】

發明 見鮑相璈驗方新編。

功用 治小兒啞驚風。痰壅發熱喘促。及急慢驚風。搐搦痙厥。

藥品 天竺黃、二錢。明雄黃、硃砂(飛)、麝香、各一錢。陳膽星、四錢。麝香、犀黃、各四分。血琥珀、六分。

制法及用法 共研末。用甘草、二錢。鈎藤鉤、一兩。煎濃膏。和化膽星。打和爲丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。加金箔、十張。每服一丸。燈心、薄荷、

泡湯化下。

【一粒金丹】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒五臟積熱。胸膜煩悶。五心煩熱。

藥品 人參、犀角、玳瑁、琥珀、防風、各一錢。茯苓、寒水石(煨)、甘草、各二錢。龍腦、硃砂(水飛)、各五分。

制法及用法 研爲細末。加麝香五分。陳米飯糊爲丸。如芡實大。金箔二十五片爲衣。每服一丸。麥門冬(去心)、煎湯送下。

【一捻金散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒重舌、木舌。

藥品 雄黃、二錢。硼砂、一錢。梅花腦子、少許。甘草、五分。

制法及用法 研爲細末。乾搗。或用蜜湯調。鵝翎刷嚥。

二 筆

【人參丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒哺露或失衣驚風。或冷水洗浴。以致腹脹瀉痢。或寒熱如瘧。不思食物。或食而不消化。或消化而不生肌肉。四肢羸瘦。

藥品 人參、麥門冬(去心

炮)、半夏(湯洗七遍、去滑)、黃耆、大黃(微炒)、白茯苓、柴胡、黃芩、各三分。訶梨勒(煨、用皮)、甘草(炙微赤、剉)、鼈甲(塗醋炙令黃、去裙襖)、各一兩。芎藭、五錢。

制法及用法 搗羅爲末。煉蜜和丸。如麻子大。一二歲兒每服三丸。四五歲五丸。粥飲送下。每日三次。量兒大小加減。

【人參丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒驚疳。

藥品 人參、龍膽草、黃連、烏牙硝、甘草(炙微赤)、枳實(麩炒微黃)、各二兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每用二丸。乳汁研。灌口中。每日四五次。

【人參散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒卒吐下。腹痛不止。

藥品 人參(去蘆頭)、當歸(剉微炒)、各五錢。甘草(炙微赤、剉)、乾薑(炮製剉)、黃耆(剉)、各一分。細辛、五釐。

制法及用法 研粗末。羅爲散。每服一錢。清水一盞。煎至五分。去滓稍熱服。量兒大

小加減。

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒寒熱往來。食少羸瘦。

藥品 人參(去蘆頭)、黃耆(剉)、柴胡(去苗)、白茯苓、鼈甲(塗醋炙令黃、去裙襖)、木香、各五錢。甘草(炙微赤、剉)、白朮、各一分。訶梨勒皮、三分。桃仁(湯浸去皮尖雙仁、麩炒微黃)、一分。

制法及用法 研爲末。每服五分。不拘時粥飲調下。量兒大小加減。

【二聖丸】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒泄瀉。羸瘦成疳。

藥品 黃連(去鬚)、黃柏(去粗皮)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。入豬膽內。湯煮熟。搗和爲丸。如綠豆大。每服二三十丸。不拘時米飲送下。量兒大小加減。

【丁香散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒久痢赤白。羸瘦不食。

藥品 丁香、厚朴(去粗皮、塗生薑汁、炙令香熟)、黃連(去鬚剉、微炒)、當歸(剉微炒)、訶

梨勒皮(煨)、白朮(剉微炒)、伏龍肝、各五錢。木香、一分。赤石脂、一兩。

制法及用法 搗細羅爲散。每服五分。粥飲調下。每日三四次。量兒大小。以意加減。

【七聖丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒疳疾。

藥品 三稜、蓬莪朮、川棟、青皮、陳皮、芫花、杏仁、各五錢(古方有巴豆)。

制法及用法 先以醋浸芫花一宿。炒漸乾。次入蓬、莪。同炒赤色。又入陳、棟等。再同炒一處。令微焦。取出爲末。再將杏仁湯浸去皮尖雙仁者。細研。和勻。醋煮米糊爲丸。如黍米大。一歲兒每服二丸。臨臥熟湯送下。使日間所餐之物。一夜而化。永無疳疾。

【九味蘆薈丸】

發明 見華佗中藏經。

功用 治小兒肝脾疳積。體瘦熱渴。大便不利。或瘰癧結核。耳內生瘡等症。

藥品 蘆薈、胡黃連、木香、白燕黃(去腸炒)、青皮、白朮丸(破開、赤者不用)、鶴蟲(微炒)、各一兩。麝香、三錢。

制法及用法 研爲末。蒸餅糊丸。如麻子大。每服一二錢。

空腹時熟湯或米飲送下。

三 筆

【三稜丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒停積。腹脅脹滿。乾噦惡心。不食。

藥品 三稜(煨)、木香、神麴(炒)、陳橘皮(去白)、薑製半夏、各一兩。丁香、官桂、各五錢。

制法及用法 研爲末。神麴煮糊和丸。如黃米大。每服二十丸。乳食後溫生薑湯送下。

【三稜散】

發明 見張渙方。

功用 治小兒乳癖結實。

藥品 京三稜(泡剉)、赤茯苓、當歸(洗焙乾)、鼈甲(醋炙黃去裙)、各一兩。枳殼(麴炒去穢)、木香、白朮、各五錢。

制法及用法 搗羅爲細末。每服一錢。清水一盞。加生薑七片。煎至五分。去滓。不拘時溫服。

【三稜散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 補脾。消食。化積。治小兒尿白。久則成疳。

藥品 三稜(炒)、蓬莪朮(炒)、各一兩。益智仁、甘草、神麴(炒)、麥芽、橘皮、各五錢。

制法及用法 爲末。每服一錢。熟湯調下。

【三稜煎丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒傷食不化。肚熱脚冷。痞癖寒熱。氣壅心腹。不得宣通。

藥品 京三稜(成塊煮)、蓬莪朮(炮)、各五錢。芫花、二錢五分(醋浸炒)。鼈甲(去裙、米醋炙焦)、五錢。豆豉、二錢。巴豆、二十一粒(去殼)。當歸、五錢。杏仁、二錢五分(去皮尖、炒令赤)。

制法及用法 先以三稜、蓬莪朮、芫花、鼈甲。用米醋一甌煮令乾。仍炒。更細到焙爲末。次入當歸末、杏仁、巴豆、淡豆豉。和水勻煮麵糊爲丸。如麻子大。每服二十丸。生薑湯送下。量兒大小加減。

【小兒化痰丸】

發明 驗方。

功用 治小兒風寒咳嗽。痰涎壅盛。大便熱閉。

藥品 川貝母、天南星(製)、白桔梗、廣楤紅、半夏(製)、白礬(炙)、天竺黃、天麻(煨)、天花粉、各一兩。薄荷葉、石菖蒲、硃砂(飛)、各五錢。

制法及用法 生曬爲末。蒸餅糊打丸。熟湯化服。

【小兒萬病回春丹】

功用 治小兒一切病症。

藥品 川貝母、一兩。白附(製)、三錢。雄黃、三錢。天竺黃、一兩。青防風、三錢。冰片、一錢五分。膽星、二兩。僵蠶(製)、三錢。西牛黃、一錢。羌活、三錢。全蠍(酒洗)、三錢。麝香、一錢五分。天麻、三錢。蛇含石(煨)、八錢。硃砂、三錢。

制法及用法 共爲細末。另用甘草一兩。鈎藤二兩。煎湯。和煉蜜打丸。如花椒大。外蠟殼封固。每匣五粒。如急驚。慢驚。發搐。癰癤。內外天吊。傷寒邪熱。斑疹煩躁。痰喘氣急。五疳痰厥。大便不通。小便溺血。俱用鈎藤、薄荷湯任下。如昏夜。用開水化服。或乳汁化服。服後即可飲乳。兒小者化開擦乳頭上。令兒吮之。一二歲。每服二粒。三四歲。每服三粒。十餘歲。每服五粒。

【大黃散】

發明 見張渙方。

功用 治小兒赤流熱如火。

藥品 大黃、鬱金、黃芩、膩粉、豬牙皂角(去皮子)、各五錢。

制法及用法 研爲末。生油

調塗。

【大醒脾散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒慢風內虛。昏悶不省。

藥品 人參、茯苓、木香(炮)、全蠍(焙)、天南星、白朮、陳橘皮、石蓮肉、甘草(炙)、丁香、砂仁、白附子(炮)、各等分。陳米、一撮(炒)。

制法及用法 剉散。每服二錢。清水一盞。加生薑三片。大棗一枚。煎至五分。不拘時服。量兒大小加減。

【千金丸】

發明 見沈括靈苑方。

功用 治小兒一切疳瘕。久服肥壯無疾。

藥品 川棟子肉、川芎、各等分。

制法及用法 共研細末。豬膽汁和杵爲丸。如麻子大。每服三丸或五丸。飯飲送下。一日二次。量兒大小加減。

四 筆

【五色丸】

發明 見張氏方。

功用 治小兒諸疳。久服肥壯無疾。

藥品 川棟子肉、川芎、各等分。

制法及用法 研爲細末。豬膽汁和杵爲丸。如綠豆大。分五分。用硃砂、青黛、白定粉、光墨、密陀僧爲衣。不拘時米飲送下。

【五香散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒胃脾久虛。食減羸瘦。

藥品 麝香、三錢(細研)。丁香、沉香、木香、藿香、白朮、各一兩。白茯苓、陳橘皮(湯浸去白瓤、焙)、黃耆(剉)、各一兩。訶黎勒皮、甘草(炙微赤剉)、各五錢。

制法及用法 搗篩爲散。清水五升。慢火煎至一升。以布絞汁。入鍋內煎。入麝香、蜜、各三合。生薑汁、五勺。棗肉、二十枚。慢火熬成膏。每服半茶匙。粥飲調下。量兒大小加減。

參考 此方挾冷者宜之。

【五疳丸】

發明 近時通行方。

功用 治小兒疳眼。面瘦皮黃。夜間潮熱。

藥品 制黃連、五錢。密陀僧(煨水飛)、綠礬(煨透紅)、夜明砂、各一兩。犀牛黃、一錢。

制法及用法 共研細末。大棗肉爲丸。如綠豆大。每服三

四十丸。空腹時米飲送下。

【五指丸】

發明 見莊氏方。

功用 治小兒五疳。

藥品 熊膽、熊羆(去皮)、各一錢。麝香、一字。胡黃連(別杵爲末)、一分。大乾蟾(用土截、去腸、判碎、入在瓶內、鹽泥固濟、以炭火燒通赤、取出停一夜、取細末)、一分。

制法及用法 先以熊羆研極細。次入麝香。次入胡黃連、乾蟾。研末令勻。傾出。却研熊膽。以沸湯溶化。再入前四味。更研令勻。水煮米糊爲丸。如綠豆大。二三歲兒每服十丸。四五歲十五丸。食前米飲調下。

【五味子散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒夜啼。及腹痛至夜輒劇。狀如鬼祟。

藥品 五味子、當歸、赤芍藥、白朮、各五錢。茯神、陳皮、桂心、甘草(炙)、各二錢五分。

制法及用法 研爲粗末。清水煎服。量兒大小加減。

【五倍子散】

發明 見張潔古方。

功用 治小兒脫肛。

藥品 五倍子、地榆、各等分。

制法及用法 研爲細末。每

服五分或一錢。空腹時米飲調下。

【五色兌金丸】

功用 治小兒五疳積滯。頭疼身熱。好食泥炭生物。面黃痞塊。腹膨泄瀉。小便如甜等症。

藥品 黑丑、二兩。飛滑石、一兩。胡黃連、五錢。雄黃、二兩。白丑、二兩。青黛、二兩。六神麴、五錢。膽星、五錢。大黃、二兩。石膏、一兩。黃連、三錢。乾蟾、一隻。

制法及用法 各研爲末。水泛爲丸。用黑丑、石膏、雄黃、青黛、大黃爲衣。一歲一丸。按歲加增。痛愈即止。不宜多服。忌食油膩、魚腥、生冷、麵豆等物。

【五福化毒丹】

發明 見湯氏方。

功用 清腸。涼血。治上焦壅熱。煩渴。瘡疹餘毒。口齒出血。牙宣口臭。齰鼻。唇舌生瘡。

藥品 玄參(洗焙)、桔梗(去蘆)、各一兩(一作各三兩)。赤茯苓(一作一兩五錢)、人參(一作五錢)、風化馬牙硝(一作一兩)、青黛(一作一兩)、甘草(焙、一作七錢五分)、各一分。麝香、五分(一作一字)。一方

有龍腦、五分。

制法及用法 除牙硝、麝香另研外。餘共研爲細末。次和青黛等煉蜜爲丸。如芡實大。金銀箔爲衣。每服一二丸。薄荷湯化下。上焦熱壅。口齒出血。牙宣口臭者。食後生地黃汁化下。痘疹餘毒。生犀角磨水化下。

參考 按六科準繩方。有生地黃、熟地黃(焙)、天門冬、麥門冬。無桔梗、赤茯苓、人參、麝香。醫宗金鑑方。有黃連、龍膽草、硃砂、冰片。僅缺麝香一味。就中惟六科準繩方。寒藥太多。雖爲涼血解毒之劑。即形病俱實者。宜一二丸即止。過則反傷元氣。變證不測矣。餘二方。較和平可服。

【木瓜丸】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒吐不止。

藥品 木瓜、麝香、膩粉、木香、檳榔、各等分。

制法及用法 研爲細末。水煮麵糊和丸。如小黃米大。每服一二丸。不拘時甘草煎湯送下。

參考 此方恐小兒臟腑脆弱。不能勝受。用者審之。

【木香丸】

發明 見朱氏方。

功用 開胃。進食。治小兒氣。

藥品 木香、人參、白茯苓、青皮、陳皮、肉豆蔻、各一分。三稜、一兩(泡)。

制法及用法 研爲末。水煮米糊和丸。如麻子大。每服十丸。薑湯送下。

【木香散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒尸疰。心腹滿痛。

藥品 木香、鬼鼠羽、桔梗(去蘆頭)、當歸(剉、微炒)、紫蘇莖葉、各五錢。檳榔、三分。

制法及用法 搗羅爲粗散。每服一錢。沸水一小鍾。加生薑少許。煎至五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小加減。

【升麻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒初中雜毒。

藥品 升麻、苦桔梗(去蘆頭)、枯藁根、各五錢。

制法及用法 搗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓溫服。一日四五次。量兒大小加減。

【升麻膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒頭面身體赤毒。腫起作片。

藥品 升麻、一兩。犀角屑、射干、赤芍藥、玄參、黃芩、梔子仁、大黃、大青、藍子、羚羊角屑、各五錢。生地黃、二兩。

制法及用法 剉細。豬脂一斤八兩。於鑊中慢火熬。不住手攪。成膏去滓。盛之磁盒。頻摩腫處。

【天麻丸】

發明 見楊上瀾仁齋直指。

功用 利驚下痰。治小兒食噤有痰。及吊膽、鎖肚、撮口等證。

藥品 天麻、白附子(炮)、馬牙硝、川蠶脂、全蠍(焙)、各一錢。天南星(炮)、一錢。輕粉、五分。巴豆霜、一字(去油、一作二錢五分)。

制法及用法 研爲細末。水煮稀麵糊和丸。如麻子大。每服一丸至十丸。不拘時薄荷或生薑煎湯送下。驚利後。即宜調胃助氣。定志寧神。防作慢驚。

參考 此方爲重下之劑。惟上寒下閉血氣充實脈沉而有力者宜之。

【天竺黃散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒乾疳。

藥品 天竺黃、五錢(細研)。牛黃(細研)、雄黃(細研)、硃砂

(細研)、蕤薈(細研)、麝香(細研)、蟾頭(炙令焦黃)、胡黃連、犀角屑、木香、甘草(炙微赤、剉)、鉤藤、各一分。龍腦、一錢(細研)。

制法及用法 搗細羅爲末。研令勻。每服五分。溫湯調下。每日三次。量兒大小以意加減。

【天竺黃散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒疳渴。體熱煩躁。

藥品 天竺黃(細研)、川黃連(去鬚)、馬牙硝、梔子仁、葛根(剉)、各五錢。甘草(炙微赤、剉)、牛黃(細研)、款冬花、紫菀(洗去苗土)、犀角屑、土瓜根、各二錢五分。

制法及用法 搗細羅爲散。研令勻。每服五分。不拘時蜜湯調下。量兒大小加減。

【天竺黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒諸熱。

藥品 天竺黃、鬱金(皂角水熬乾)、茯苓(去皮)、麥門冬、各五錢。蟬蛻(去足)、全蠍(去土)、白殭蠶、各十四個。甘草、一兩(炙)。硃砂、一分。龍腦、麝香、量加。

制法及用法 淨洗。研羅爲末。每服五分至一錢。蜜熟湯

調下。

【牛黃丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治小兒通睛。

藥品 牛黃、三錢。珍珠、三錢。麝香、少許。天竺黃、三錢。青黛、三錢。地龍、三錢。蘇合油、五錢。香附子(炮)、三錢。琥珀、三錢。香油、五錢。麝香、三錢。

制法及用法 各另研爲極細末。共爲一處，用細甘草梢、一兩。煎汁。次入蘇合油、香油。兌勻和藥爲丸。如黃豆大。金箔爲衣。每服一丸。薄荷湯化下。忌一切酒麵辛熱生痰等物。

【牛黃丸】

發明 見湯氏方。

功用 治小兒通睛。

藥品 牛黃、白附子(炮)、肉桂、全蠍、芎藭、石膏(煨)、各一錢。白芷、硃砂、各二錢。藿香、五錢。麝香、一分。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如芡實大。三歲以下。每服一丸。乳食後薄荷湯送下。忌油麵豬肉。

【牛黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘡疹毒入胃。便血腹痛啼哭。

藥品 牛黃、一分。鬱金、一

兩。

制法及用法 研爲細末。每服五分。漿水半盞。煎至三分。和滓溫服。一日二次。量兒大小加減。

【牛黃膏】

發明 見張渙方。

功用 治小兒驚啼。

藥品 牛黃、左牡蠣(煨粉)、各一分。人參、甘草(炙)、各五錢。辰砂(細研、水飛)、雄黃、各一分(細研、水飛)。龍腦、五分。

制法及用法 研爲細末。令勻。煉蜜和成膏。如雞頭實大。每服半粒至一粒。乳食後薄荷湯化下。久服除胎熱。

【牛蒡子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒心脾熱。多涎。

藥品 牛蒡子、梔子仁、甘草、川硝、鬱金、各五錢。枳殼、二錢五分(麸炒微黃、去瓤)。

制法及用法 爲細羅爲散。加龍腦五分。同研令勻。每服五分。不拘時薄荷水調下。量兒大小加減。

【牛黃抱龍丸】

功用 治中風。痰迷心竅。神昏譫語。手足拘攣。瘋癲狂亂。小兒急驚風。

藥品 牛黃、琥珀、各二錢五分。兩黃、五分。膽星、一兩。赤茯苓、五錢。全蠍、辰砂、各一錢五分。白僵蠶、三錢。天竺黃、三錢五分。麝香、二分。一方無西黃、茯苓。有木香、珍珠、防風、沉香、雄黃、貝母、天麻、橘紅、枳殼、石菖蒲。

制法及用法 各取淨粉。膽星煨化打丸。每丸重四分。金箔爲衣。每服一二丸。鈎藤泡湯送下。

【勻氣散】

發明 見茅先生方。

功用 治小兒驚風、冷疳、內吊、腹痛氣滯。

藥品 桔梗、五兩(去蘆頭、淨洗乾、一作二兩、剉炒)。甘草、二兩(炙、一作四錢)。縮砂仁(炒、一作五錢)。檀香(洗、一作炒、五錢)、陳橘皮(去白)、各一兩。白薑、一分(一作一錢五分炒、一作薑炭、二錢五分)。

制法及用法 研爲細末。每服五分。或一錢。空腹時沸湯調下。臍嗽。霜木瓜煎湯調下。如無即用紫蘇鹽煎湯。冷疳腹痛。煨薑湯調下。

【六神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒腹痛啼哭。面青口冷肢寒。曲腰而啼。或六

便泄瀉。不吮乳。

藥品 人參、乾山藥、白朮、各五錢。甘草(炙)、二錢。白茯苓、白扁豆(炒)、各一兩。

制法及用法 研爲末。每服一二錢。清水一鍾。加生薑二片。大棗一枚。煎至五分溫服。胃冷加附子。風證加天麻。痢加罌粟殼。

五 筆

【甘草散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒中魅。面青色白。

藥品 甘草(炙、微赤、剉)、龍骨、赤茯苓、牡蠣(燒爲粉)、生乾地黄、黃芩、桂心、各一分。當歸、元錢(剉微炒)。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。加淡竹葉七片。煎至五分。去滓。入白蜜一錢。更煎一二沸。量兒大小。以意加減溫服。一日三四次。若青黑色緣口。或覺病較晚者。死不治。

【甘草散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒痢渴不止。

藥品 甘草(微炙赤、剉)、烏梅肉(微炒)、各一兩。訶黎勒、二枚(煨用皮)。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。加生薑少許。煎至五分。去滓放溫。不計時服。量兒大小加減。

【生地黃散】

發明 見楊氏方。

功用 治小兒感受胎熱。生下面赤。眼閉。體熱。口熱。發黃。頻啼。

藥品 生地黃、赤芍藥、川芎、當歸(去蘆)、新陳根、各等分。一方有甘草。

制法及用法 改咀。每服五錢。清水一盞。煎至六分。產婦亦可服。以少許抹入兒口中。

【生乾地黃丸】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒十歲不行。

藥品 生地黃、當歸(焙)、防風、酸棗仁(微炒)、赤茯苓、黃耆、芍藥、羚羊角、羌活、甘草(炙微赤)、桂心、各等分。

制法及用法 搗爛。和蜜爲丸。如綠豆大。每服十丸。食前溫酒送下。量兒大小加減。

【生乾地黃散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒臟腑壅熱。氣血不榮。致額陷不平。

藥品 生乾地黃、二兩。烏雞骨、一兩(酥塗、炙黃)。

制法及用法 搗細羅爲末。每服五分。不拘時粥飲調下。

【白朮散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治小兒感寒吐瀉。脈遲細。

藥品 白朮、人參、半夏麴、各二錢。茯苓、乾薑、甘草、各一錢。一方無半夏麴。有木香、藿香。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一盞。加生薑三片。大棗一枚。煎至七分。去滓溫服。日二三次。

【白龍散】

發明 見鮑仁墩驗方新編。

功用 治小兒頭面胎毒。及痘後餘毒。

藥品 水牛糞。

制法及用法 曬乾。燒枯存性(燒太過無效)。探患處。即取水脫胎而愈。

【玉粉散】

發明 見張漢方。

功用 治小兒無辜疥癩。

藥品 胡粉、一兩。白龍骨、水磨雄黃(各研微炒)、檳榔白皮、漏蘆、白馬夜眼(洗淨焙乾)、各五錢。

制法及用法 搗羅爲末。拌勻。每服一字至五分。乳食前

雞卵清調下。

【半夏丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒脾熱。乳食不下。胸膈多涎。

藥品 半夏、五錢(生薑湯洗七遍、去滑)。皂角子仁、五錢。

制法及用法 搗羅爲末。生薑自然汁和丸。如豌豆大。每服三四丸。不拘時溫湯送下。量兒大小加減。

【四聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒胎毒。生下兩目不開。及胎驚丹毒伏熱在內者。

藥品 燈心、黃連、秦皮、木賊、紅棗、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服二錢。清水一盞。煎七分。澄清去滓。不拘時頻洗兩目。後服地黃膏。

【瓜蒂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒心滿堅硬。手足心熱。變爲黃疸。

藥品 瓜蒂、七枚。赤小豆、七粒。桃米、七粒。

制法及用法 研爲末。每用一字。吹入兩鼻內。令黃水出。餘未盡。清水調服之。得吐出黃水即愈。或用瓜蒂一兩。赤小

豆、四粒。研爲末。每服一錢。溫湯調下。服後即臥。當吐清黃汁爲效。然虛者不宜服。

【石南散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治小兒通睛。

藥品 石南葉、一兩。藜蘆、三分。瓜蒂、七枚。

制法及用法 研爲細末。每用少許。吹鼻中。一日三次。內服牛黃平肝藥。

六 筆

【地黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒腎虛顛不合。體瘦骨露。及腎疳。天柱倒。

藥品 熟地黃(洗焙)、八錢。澤瀉(洗)、二錢。牡丹皮(去心)、白茯苓、各三錢。山茱萸肉、牛膝、鹿茸(酥炙)、山藥、各四錢。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。三歲兒以下。每服二三丸。空腹時溫水化下。

【地黃飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治初生兒身面黃如食色。或面赤身熱。眼閉便秘。翻如梔汁。滿身生瘡。

藥品 生地黃、赤芍藥、各二

錢。羌活(去蘆)、當歸(去蘆)、甘草、各一錢。

制法及用法 研爲細末。食前燈心煎湯調下。乳母宜服。忌酒麪五辛之物。

【地黃膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胎熱。口舌生瘡。

藥品 山梔仁、綠豆粉、各一兩五錢。甘草、六錢。一方無甘草。

制法及用法 或曬或焙。研爲末。生地黄爛杵。取汁一兩五錢。好蜜一兩五錢。以新瓦器盛在銅銚中。水煮成膏。稠糊相似。俟冷停。分入前藥末。同在乳鉢內再杵勻和丸。如芡實大。每服一丸至二丸。麥門冬熱水不拘時化下。兒大者每用一丸。納口內含化。或以新汲水調點舌下。

【如聖散】

發明 見陳履新簡易方論。

功用 治小兒口瘡。

藥品 江子、一粒或二粒。

制法及用法 研爛。不去油。入硃砂、黃丹。敷紙絹上少許。剃開小兒頭門髮。貼在額上。如四邊起粟米泡。便用溫水洗去。以免成瘡。更用菖蒲水洗。其效如神。

七 筆

【杏仁煎】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒咳嗽。心氣喘粗。

藥品 杏仁(湯浸去皮尖雙仁、麸炒微黃、搗膏)、天門冬(去心)、寒食麪、各一兩。蜜、酥、各一合。生地黄汁、一大盞。貝母、五錢(微炒)。

制法及用法 先以清水煎貝母及天門冬至五分。便研絞取汁。入杏仁膏等同熬如稀餡。每服五分。溫水調下。量兒大小以意加減。

【杏仁煎】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒咳嗽聲不出。

藥品 杏仁(湯浸去皮尖、入水一大盞、研濾取汁)、二兩。酥、蜜、各一合。

制法及用法 先以杏仁汁於鍋中。以重湯煮減去半。入酥蜜。又湯煮二十沸。再入貝母、紫菀末、各一分。甘草末、五釐。更煎攪如餡。收在器中。每服五錢。清粥飲調下。日三夜一次。嗽止爲度。量兒大小加減。

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治初生小兒臍風。

藥品 防風(去蘆)、羌活、黃耆、當歸、川白芷、甘草、各五分。

制法及用法 研爲極細末。每服少許。不拘時。燈芯、麥門冬(去心)、煎湯調下。

八 筆

【肥兒丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 消蟲。進食。治小兒食積。五疳。

藥品 肉豆蔻(麴麥煨去油、一作二錢五分)、使君子肉(焙、一作二錢五分)、麥芽(炒)、黃連(薑汁炒黑色、一作一兩、一作胡黃連)、神麴(炒、一作一兩)、各五錢。檳榔、二枚(去臍、勿見火、一作三枚、一作三錢、一作一枚)。木香、二錢(勿見火、一作一錢)。一方加白朮、五錢。山楂肉、枳實、各二錢。

制法及用法 研爲細末。蒸餅調糊。稍加白蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。空腹時米飲或熟湯送下。

參考 按此方除局方外。見於他書者。如祕方(黃連、五錢、木香、一錢、神麴、炒、白朮、麥蘖、炒、各一兩、使君子肉、

煨、肉豆蔻、麴麥煨、各五錢、檳榔一枚、蝦蟆一個、研爲末、水煮麵糊和丸、如粟米大、空腹時米飲送下、量兒大小加減、功能消疳進食)之加白朮、蝦蟆。朱氏家傳方(白燕蕒、去壳、黃連、去鬚、神麴、麥蘖、各等分、研爲末、豬膽煮米糊和丸、如大麻子大、每服三十丸、食前米飲送下、治疳積疳瘦)之加白燕蕒。去肉豆蔻、使君子肉、檳榔、木香。醫宗金鑑方(人參、二錢五分、白朮、土炒、胡黃連、各五錢、茯苓、三錢、黃連、二錢、使君子肉、四錢、神麴、炒、麥芽、炒、山楂肉、各三錢五分、甘草、炙、蘆薈、各一錢五分、共研末、黃米糊爲丸、如黍米大、每服二三十丸、米湯送下、治小兒脾疳)之加人參、白朮、胡黃連、茯苓、山楂肉、甘草、蘆薈。去肉豆蔻、檳榔、木香。驗方(厚朴、雞內金、茯苓、各四兩、新會皮、青皮、各二兩、五谷蟲、縮砂仁、胡黃連、各三兩、白朮、炒焦、六兩、麥門冬、白扁豆、山楂肉、炒焦、各八兩、尖檳榔、一兩五分、乾蟾、炙、十一具、六神麴、十二兩、共研末、煉蜜爲丸、每丸重二錢五分、殺蟲、退熱、治小兒虛疳積、面黃體瘦、肚脹腹大、一切積滯、每服一丸、米

湯化下、忌食油膩溼麵生冷)之加厚朴、熱內金、茯苓、新會皮、青皮、五穀蟲、縮砂仁、胡黃連、白朮、麥門冬、白扁豆、山楂肉、乾蟾。去肉豆蔻、使君子肉、麥芽、黃連、木香。功效相同。近世多於其中加胡黃連、蜜丸、蘇耑等大苦大寒之品。蓋此方本爲治熱腹脹羸瘦而設。故用從熱伐肝之劑。治去疳積。元氣得復。兒體自肥矣。若本無疳熱之病。誤以爲小兒之常服品。以損削真元。則流弊甚大。不可以共有肥兒之名。遂爲所誤也。

【肥兒八珍糕】

功用 治小兒脾胃薄弱。飲食不化。形瘦色痿。腹膨更適。久服健脾開胃。進食生肌。氣血充足。百病悉除。

藥品 鮮黨參、三兩。白朮、二兩。陳皮、一兩五錢。茯苓、淮山藥、建蓮肉、薏苡仁、扁豆、芡實、各六兩。糯米、粳米、各五升。

制法及用法 共磨細末。用白糖十兩。和勻印糕。常常食之。大人脾胃虛弱者。亦可服。

參考 此即參苓白朮散、加芡實、糯米、粳米。去甘草、砂仁、桔梗。而以白糖爲糕也。

【使君子丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腹內蟲病口吐清水。

藥品 使君子(去殼、薄切、屋瓦焙乾)、檳榔、酸石榴根皮(東向者佳、淨洗、剉焙)、大黃(半生半炮)、各七錢五分。

制法及用法 除檳榔剉曬不過火。餘三味再焙。同檳榔爲末。沙糖水煮麵糊和丸。如麻仁大。每服三十丸至五十丸。空腹時淡豬肉汁或雞肉汁送下。

【使君子丸】

發明 見汪訥菴醫方集解。

功用 治小兒疳蟲腹痛。食勞發黃。疳脹食積。腹見青筋。嘔吐。

藥品 使君子(去壳)、二兩。南星(薑製)、檳榔、各一兩。

制法及用法 喜食生米。用麥一斤拌炒。至藥黃色。喜食茶葉。用茶葉炒之。喜食炭土。用炭土炒之。揀去炒藥。取研爲末。煉蜜和丸。每服三錢。早晨沙糖水送下。

【金蟾丸】

發明 見劉氏方。

功用 治五疳。

藥品 乾蝦蟆(煨)、五個。胡黃連、黃連、各三錢。鶴蟲、二錢。肉豆蔻(煨)、苦楝根白皮、

雷丸、生薑、蕪荑、各三錢。

制法及用法 共研細末。水煮麵糊爲丸。如綠豆大。雄黃爲衣。每服十五丸。米飲送下。

【定命散】

發明 見沈金鏞沈氏尊生書。

功用 治驚風。

藥品 蜈蚣、半條(酒浸炙)。川烏尖、三個。麝香、少許。

制法及用法 共爲細末。每服半字。金銀湯送下。

九 筆

【珍珠子丸】

功用 治小兒急慢驚風。痰迷心竅。夜臥驚悸。煩躁不寧。

藥品 珍珠、一錢。胡黃連、二錢。檳榔、牛黃、天竺黃、天南星(製)、各五錢。銀柴胡、白雷丸、西琥珀、廣木香、各三錢。雞內金十具。赤金箔、二十張。

制法及用法 共研細末。陳米煎湯泛丸。如芥子大。七歲以下。每服一丸。熱湯送下。驚風加倍。男女大小量病輕重加減。以三十丸爲則。每日三次。忌食生冷。腥氣。油膩麵蛋等物。

【洗心散】

發明 見朱氏方。

功用 治小兒乳食傷心。壯

熱氣喘。咳嗽多睡。

藥品 生甘草、一錢。麥門冬、一錢五分。皂角、五錢(入沙糖塗酥炙、後於盆下蓋良久、出火毒用)。

制法及用法 有爛不羅。每服二錢。清水一茶。煎至八分。分作五次。不拘時服。

【柏子仁散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚啼、驚啼、狀如物刺。

藥品 柏子仁、一兩。

制法及用法 搗細羅爲散。一二歲兒每服一字。三四歲兒每服五分。粥飲調下。一日三四次。量兒大小加減。

十 筆

【消食丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒哺乳飲食取冷過度。脾胃不和。宿食不消。常服寬中快氣。消乳食。正顏色。

藥品 縮砂仁(炒)、陳皮(炒)、三稜(煨、一作炒)、神麴(炒)、麥芽(炒)、各五錢。香附子、一兩(米泔浸一宿、炒)。一方加蓬莪朮(煨)、枳殼、檳榔、烏梅、各五錢。丁香、二錢五分。

制法及用法 共研細末。水煮麵糊爲丸。如綠豆大。每服二三十丸。食後紫蘇湯或熱湯送下。量兒大小加減。

【消疳丸】

發明 見驗方。

功用 治小兒泄瀉無度。嗜食無厭。肚大青筋。四肢羸瘦。或發夜熱。或腫面目。或腫手足。瘦弱垂死者。

藥品 蒼朮(米泔水浸去皮炒)、白朮(土炒)、當歸(酒炒)、白芍(酒炒)、麥門冬(去心)、薏苡仁、山楂肉(去核)、石斛(去蘆根)、神麴(炒)、麥芽(炒)、半夏麴、枳殼、萊菔子(炒)、陳皮、厚朴、使君子肉、茯苓、檳榔、黃耆(炙)、各一兩。青皮、蓬莖茂、木香、縮砂仁、各五錢。

制法及用法 炒乾爲末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。米湯送下。但能進食。瀉止食調。肌肉自生。小兒周歲後乳食夾雜。則易成疳。預服此丸。脾胃充實。保無疳症。或欲乳成疳者。亦應服之。此藥大和脾胃。生氣血。多服有益無病。

【消疳無價散】

功用 治小兒疳眼。

藥品 石決明、一兩五錢(煨)。爐甘石(童便泡一日夜、燒透、以能浮水者爲佳)、滑石、

海螵蛸(煨去壳)、各五錢。雄黃、二錢。硃砂、一錢。冰片、五分。

制法及用法 共爲細末。量兒大小。或三四分。或五六分。用不落水雞肝一副。竹刀切破。上開下連。摻藥在內。用線紮好。加淘米水。入砂罐煮熟。連湯食盡。雖疳積眼瞎。可以復明。神效之至。

【茯苓丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒初出胞胎不吮乳。

藥品 赤茯苓、川黃連(去鬚)、枳殼(炒)、各等分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服一丸。乳汁調下。

【鬼箭羽散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒中惡。心堅痛。

藥品 鬼箭羽、三分。珍珠末、一分。羚羊角屑、川朴硝、桔梗(去蘆頭)、各五釐。川升麻、赤芍藥、柴胡(去苗)、各五分。黃芩、六分。桃仁、十枚(湯浸、去皮尖雙仁、微炒微黃、一作四十九枚)。川大黃(剉、微炒)、八分。一方有硃砂、一分。鬼白、五釐。無珍珠。

制法及用法 清水四升。煮

一升二合。二歲兒分爲四服。更量大小加減。

【疳積散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒魃乳、病乳、夾乳、夾食。或病後飲食失調。或平居飲食過飽。致成疳積。面黃腹大。小便如泔。大便腐黃酸臭。頭皮乾枯。毛髮焦穗。甚至目澀流眵。睛生雲翳。形體骨立。夜熱晝涼。及丁奚(腫脹之腹無青筋者)。哺露(似丁奚而臟氣虛冷、食多吐逆、泄瀉無度、糞中有蟲、治法同丁奚、惟宜加養臟氣)等症。

藥品 厚朴(厚而紫色有油者佳、去粗皮、切片、生薑自然汁炒熟爲末、淨)、一兩。廣陳皮(去白爲末)、八錢。甘草(去皮淨爲末)、蘆薈(淨末)、各七錢。蕉黃(具孔林大而多白衣者佳、去白衣殼、淨末)、五錢。青黛(取顏料鋪中、淨碎如佛頭青色者、研淨末)、三錢。百草霜(淨末)、二錢。旋覆花(淨末)、一錢五分。

制法及用法 和勻。每一歲用藥一分。空腹燈心湯調下。服後病即愈。常用肥兒丸調理。如脾氣未實。用啓脾丸或大健脾丸。●疳氣未盡。用陳皮、一兩。白木香、三錢。白茯苓、五

錢。加平胃散、三錢。陳米粥湯調服。●疳眠。用生雞肝、一具(不拘大小雌雄)。二三歲兒。只用半具。外去衣。內去筋膜。研細如麵。入疳積散。調極勻。加好熟白酒厚薄相和。隔湯燉溫。空腹溫口服。用甜麵酒少加熱白酒亦佳。服至眼開睛散方止。●疳渴痢。紅白積滯。本散加黃連(薑汁土炒)、肉果。用濃燈心湯。稍加熱酒少許。調服。●食積成疳。縮砂仁湯調服。

十一筆

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒尸疰及中惡諸病。

藥品 犀角屑、川升麻、木香、川大黃(剉碎、微炒)、桑根白皮(剉)、檳榔、各五錢。麝香、一錢。桃仁(湯浸、去皮尖雙仁、麩炒微黃)、二七枚。

制法及用法 搗細羅爲末。每服五分。溫湯調下。一日四五次。量兒大小加減。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒胎黃。

藥品 犀角、芭陳、梔櫟根、升麻(煨)、甘草、龍膽草、生地

黃、寒水石(煨)、各等分。

制法及用法 咬咀。清水煎。不拘時服。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒骨熱。

藥品 鉅州柴胡、川大黃、甘草(炙)、川芎、茯苓、芍藥、麝香、桑白皮、地骨皮、梔子仁、黃芩、貝母、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水一盞。加青蒿一枝。小麥十粒。煎至七分。溫服。大段有患。更加麻黃、連翹、等分爲末。煎服甚效。

【犀角飲】

發明 見鄭氏方。

功用 治小兒骨蒸潮熱。盜汗肌瘦。

藥品 犀角屑、鼈甲(醋炒)、柴胡、知母、川大黃、桃枝、各五錢。地骨皮、胡黃連、各一兩。

制法及用法 咬咀。三歲小兒每服一錢。清水半盞煎。不拘時溫服。

【犀角解毒丸】

發明 驗方。

功用 治小兒初生。胞胎積熱。及痘瘡後餘毒未消。或生痘瘡。或生瘡癤。或痘後多服溫補藥。必須消解者。並治口破爛。鵝口。馬牙。膿瘡。

牙齦出血。煩渴。狂躁。面赤。咽乾。便秘。潮赤。

藥品 烏犀角、大生地、防風、川芎、全當歸、荆芥穗、各一兩。連翹殼、赤芍藥、白桔梗、大力子、黃芩、各七錢。薄荷葉、甘草、各五錢。一方無黃連。

制法及用法 共研細末。煉白蜜爲丸。每重一錢五分。月內嬰兒。每服半丸。月外至五六歲者一丸。燈草煎湯送下。

參考 拔醫宗金鑑方。用犀角、牛蒡子(炒)、荆芥穗、防風、連翹(去心)、金銀花、赤芍藥、生甘草、黃連、生地黃、各等分。共研細末。煉蜜爲丸。每重五分。亦名犀角解毒丸。(比驗方多金銀花。無全當歸、白桔梗、黃芩、薄荷葉。)治小兒赤遊風。發於頭面四肢。皮膚赤熱而腫。色若塗硃。遊走不定者。每服一丸。燈心湯化下。又瘍醫大全方。用犀角(磅)、一錢。桔梗、一兩。赤茯苓、牛蒡子、生地黃、各五錢。元參、連翹、各六錢。朴硝、甘草、青黛、各二錢。共研極細末。煉蜜爲丸。如龍眼大。亦名犀角解毒丸。(比驗方多赤茯苓、元參、朴硝、青黛。無防風、黃連、當歸、荆芥穗、赤芍藥、黃芩、薄荷葉。)治小兒

諸瘡毒。及痧痘後餘毒。喉嚨疼痛等症。每服一丸。薄荷湯化下。挾驚者。硃砂爲衣。

【硃砂丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治三歲以下小兒。胃口閉。不吃乳。

藥品 硃砂、牛黃、麝香、丁香、甘草(炙微赤)、人參、各一分。犀角、黃耆、石膏(研細、水飛)、五靈脂、各五錢。

制法及用法 搗羅研勻。煉蜜爲丸。如綠豆大。每服三丸。熱湯送下。一日四五次。

【硃砂膏】

發明 見吉氏方。

功用 治小兒驚啼。夜啼。

藥品 硃砂、人參、白茯苓、甘草、片腦、麝香、各少許。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如皂角子大。每服一丸。金、銀、薄荷、煎湯送下。

【麥門冬丸】

發明 見萬密齋萬全方。

功用 治小兒心肺壅熱。咽乾無涕。時煩躁。

藥品 麥門冬(去心、焙)、一兩。龍腦(細研)、五靈。甘草(炙)、牛黃(研入)、各一分。黃連、赤茯苓、犀角屑、粉霜、硃砂、馬牙硝(各研)、生乾地黄、子芩、各五錢。

制法及用法 搗羅爲末。入研藥令勻。每服五分。溫蜜湯調下。

【麥門冬丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒肌膚羸瘦。骨熱。小便赤黃。

藥品 麥門冬(去心、焙)、一兩。人參(去蘆頭)、黃耆(剉)、青蒿子、黃連(去鬚)、桑根白皮(剉)、枳殼(鈇炒微黃、去穢)、地骨皮、各五錢。柴胡(去節)、三分。

制法及用法 搗羅爲末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。不拘時熱湯化下。更量兒大小。以意加減。

十二筆

【黃耆丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒往來寒熱。多汗心煩。小便赤黃。不欲乳食。四肢羸瘦。

藥品 黃耆(剉)、麥門冬(去心、焙)、赤茯苓、白朮、子芩、甘草、各一分。柴胡(去苗)、鼈甲(塗醋炙令黃、去裙襖)、各五錢。

制法及用法 搗羅爲末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。粥飲送下。每日三四次。量兒

大小加減。

【黃耆散】

發明 見嬰孺方。

功用 治小兒腹痛嘔啼。

藥品 黃耆、當歸、芍藥、乾薑、各四分。甘草、三分。黃芩、六分銖。

制法及用法 研爲末。二十日兒。用乳汁和一胡豆大服。日三夜一次。五十日兒。一小豆大。百日。二小豆大。藥溫中無毒。若無黃耆可闕也。兒生便服。使寒氣不得生。亦不吐。服之期年。止服妙。若寒氣疔痛。啗不可忍。以清水煮飲之。如服理中丸法。服藥補益之。可數十倍。節度無苦。

【鈎藤飲】

發明 見正肯堂證治準繩。

功用 治小兒胎驚夜啼。

藥品 鈎藤、茯神、茯苓、川芎、當歸、木香、甘草(炙、一作五分)、白芍藥、各一錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。加生薑、大棗。清水煎服。①驚啼。加蟬蛻、防風、天麻。②驚搐。加蠅尾、五分。③心熱煩啼。臉紅舌白。小便赤澀。去木香。加硃砂六、一錢。每服一錢。小通湯調下。或剉散煎服。

【琥珀抱龍丸】

發明 見萬氏育嬰家祕方。

功用 治小兒諸驚。四時感冒。風寒瘟疫邪熱。致煩躁不寧。痰嗽氣急。皮膚疹欲出發搖。常服祛風。化痰。鎮心。解熱。和脾胃。益精神。

藥品 琥珀、天竺黃(一作一兩)、檀香(細剉)、人參(去蘆)、白茯苓(去皮)、各一兩五錢。生甘草、三兩(去節)。枳殼、枳實(二味水浸、去麤、麸炒微黃)、各一兩。硃砂、五兩(先以礬石引去鐵屑、次用水、乳鉢內細杵、取淨者飛過、淨器內澄清、去上餘水、硃砂淨盡、曬乾用、一作五錢)。山藥、一斤(去黑皮、剉作小塊、慢火炒、令熟透、候冷用)。天南星、一兩(剉碎、用臘月雄黃、牛膽、醃經一宿)。金箔、一百片(去護紙同硃砂在乳鉢內杵極細、一作四百片)。一方加牛黃、一錢。珍珠、五錢。蜂蜜、二斤。黃蠟、二十五斤。

制法及用法 除硃砂金箔不入礬內。檀香不過火外。餘九味。或曬或焙。同研爲末。和勻。硃砂、金箔每一兩。取新汲水一兩。入乳鉢內杵勻。隨手爲丸。如芡實大。陰乾。於晴霽時略曬。如燥裂。則仍還陰處。以共自乾。修合之時。但減少一味。即無效。常用瓦

瓶入麝香同收。勿使氣味散泄。每服一二丸。不拘時葱湯或薄荷湯化下。痰壅嗽逆者。淡薑湯下。痘瘡見形有驚。溫淨湯下。心悸不安者。燈草湯下。暑天悶迷。麥門冬熟水下。百日內嬰兒。每丸分三次服。

參考 此方藥性和平。不寒不燥。名以抱龍者。蓋保肝之義。肝應東方青龍木。木生火。肝爲母。心爲子。母安則子安。心藏神。肝藏魂。神魂既定。驚自不生矣。然枳殼枳實。能散滯氣。無滯氣者。能損胸中至高之氣。如慢驚及元氣弱者。當易當歸川芎各二兩以代之。

十三筆

【萬金散】

發明 見張漢方。

功用 治小兒臟寒。稟氣怯弱。或顛解。面色青白。過夜多啼。甚者狀若神祟。

藥品 當歸、沉香(剉)、丁香、人參、五味子、各一兩。赤芍藥、白朮、各五錢。桂心、一分。

制法及用法 搗羅爲細末。每服一錢。溫淡漿水一小盞。煎至五分。放溫。時時嚙兒口中。立效。

【萬應錠】

發明 驗方。

功用 治中風。中痰。中寒。中暑。半身不遂。口眼歪斜。喉閉。乳蛾。牙疳。霍亂。瘟疫。癰疽。血熱。便血。斑疹。傷寒。黃病。疔毒攻心。小兒痘證。驚風。療無名腫毒。癰瘡。傷水瘡。及驢馬水結糞結。黃病孤眼。狗生風毒。

藥品 京墨、二兩。兒茶、胡黃連、川黃連、各一兩。冰片、六分。麝香(當門子)犀牛黃、各五分。熊膽、二錢。

制法及用法 各取淨粉。再入人乳和糊爲丸。如梧桐子大。金箔爲衣。內證 每服四五分。小兒減半。熱湯化下。外證用醋研敷。畜病用無根水化服。孕婦忌服。

【萬應保赤丹】

(俗稱保赤散)

發明 驗方。

功用 治小兒猝患驚風。癰症疳疾。寒溼積聚。痰涎壅滯。腹痛胃呆。大便酸臭。並治大人痰實積聚。痰飲氣急。

藥品 巴豆霜、三錢。膽星、一兩。神麴、一兩五錢。

制法及用法 共研末。神麴打糊爲丸。如小綠豆大。硃砂一兩爲衣。每服二三丸。熱

湯化下。可略加白糖。或吞服亦可。

參考 此方下痰化滯。開竅安神。有起死回生之效。但只宜於寒濕痰滯、氣體壯實之小兒。體虛有熱而無積滯者忌服。近多爲收用之。慎勿多服。

【葱涎膏】

發明 見吉氏方。

功用 治小兒生三五日。鼻塞氣急。飲乳啼叫不止。

藥品 葱葉、豬牙皂角(爲末去皮)、各七條。

制法及用法 研爛。同皂角末成膏。貼額門上。即瘥。

【當歸散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒脚指拳縮不展。

藥品 當歸(焙)、麻黃(去根節)、各五錢。羌活、酸棗仁(微炒)、人參、杜仲(微炙)、桂心、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。清水一小盞。加生薑少許。煎至五分。乳前服。量兒大小加減。

十四筆

【蒲黃散】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治小兒口瘡。重舌夜啼。

藥品 蒲黃(微炒、用紙鋪地上出火氣)。

制法及用法 研爲細末。每用少許。搽於舌下。時時搽之。再以溫水蘸熱帛。裹指輕輕按捺之。按罷再搽。

十五筆

【楮銀丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治小兒急慢驚風。積癰。

藥品 青黛、三錢。水銀、一皂角子大(黑鉛砂炒)。寒食麵、黃明膠(炒焦爲末)、各二錢。輕粉(炒)、一豆許。雄黃、粉霜、硃砂、各一兩。巴豆、二十一粒(去油)。腦麝、少許。

制法及用法 共研細末。滴水爲丸。如麻子大。捏扁曝乾。瓷盒盛之。一歲兒一丸。隨意加減。煎棗子湯送下。不得化破。

【楮銀丸】

發明 見三肯堂證治準繩方。

功用 治小兒風涎。膈實上熱。及乳食不消。腹脹喘粗。

藥品 巴豆(去油膜皮心、細

研)、水銀、各五錢。黑鉛、二錢五分(同水銀炒、結砂)、麝香(另研)、五分。好墨(火燒醋淬、研)、八錢。

制法及用法 將巴豆末并墨再研勻。和入砂子、麝香。陳米粥和丸。如綠豆大。捏扁。小兒一歲。每服一丸。二三歲二三丸。五歲以上五六丸。食後煎薄荷湯放冷送下。不得化破。更量虛實加減。虛人先以益黃散實脾。後以此方下之。下後補肺。

【調中丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治小兒久傷脾胃。腹脹。

藥品 乾薑、橘紅、白朮、茯苓、木香、砂仁、官桂、高良薑、各等分。

制法及用法 共研細末。水黃米糊爲丸。如麻子大。每服二三十丸。食後熟湯送下。

【蝦蟆丸】

發明 見西京丁左藏方。

功用 常服肥兒。

藥品 大乾蝦蟆、一枚(泔浸三宿、去腸肚頭爪、淨洗、酥炙令黃香)。陳橘皮(去白)、二錢五分。胡黃連、一兩。麝香、蕪荑仁、各五錢。

制法及用法 研爲末。於陶器內用豬膽汁和。令稀稠得所。於飯上蒸熟爲度。取出半日。丸如綠豆大。每服五七丸。陳米飲送下。

【寬氣飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒風痰壅滿。風傷於氣。不能言語。

藥品 枳殼(去瓤)、一兩。人參(去蘆)、五錢。天麻、胆星(炒、去絲嘴)、羌活、甘草(炙)、各三錢。

制法及用法 剉碎。每服二錢。清水一盞。加生薑三片。煎至五分。不拘時服。

十六筆

【龍齒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒驚啼煩熱。眠臥不安。

藥品 龍齒、麥門冬、各五錢。白芍藥、川升麻、川大黃(炒)、甘草(炙)、各一分。

制法及用法 咬咀。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去渣溫服。量兒大小加減。

【龍膽丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒衄血不止

藥品 龍膽草、黃連、各等

分。

制法及用法 研爲末。米糊和丸。如小豆大。三歲兒每服三十丸。濃鹽水送下。或作散服亦可。

【龍膽丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒食後發熱。至夜則涼。

藥品 龍膽草(去苗)、青皮(去穢)、各二錢五分。宜黃連(去毛)、赤芍藥、各五錢。檳榔(大者)、一個。麝香、少許。

制法及用法 研爲末。豬膽汁入麵糊丸。如蘿蔔子大。每服二三十丸。空腹時米飲送下。

十七筆

【薏苡仁散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒經絡不舒。

藥品 薏苡仁、七錢五分。秦艽、防風、酸棗仁(微炒)、甘草(微炙赤)、各五錢。當歸(焙)、桂心、各二錢五分。

制法及用法 爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。不拘時溫服。量兒大小加減。

十八筆

【藍葉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒月內發丹毒。

藥品 藍葉、一兩。黃芩、犀角屑、川大黃(剉、微炒)、柴胡(去蘆)、梔子仁、各一分。川升麻、石膏、各一分五釐。甘草(微炙)。

制法及用法 研五釐。爲粗末。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。加竹瀝、五勺。再煎二三沸。不拘時溫服。量兒大小加減。氣怯弱者。去人黃。

【藍葉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒渴痢。煩熱不止。

藥品 藍葉、二分。赤茯苓、一分。赤石脂、一兩。冬瓜仁、黃連(去鬚、微炒)、石榴皮(剉碎、醋微炒)、各五錢。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。加白蜜、半茶匙。再煎二三沸。不拘時服。量兒大小加減。

【鎮驚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒急慢二驚。風痰上壅。手足抽掣。口眼喎斜。煩躁生瞋。精神昏悶。常服寧心鎮驚。疎風順氣。

藥品 人參(去蘆)、三錢。粉

甘草(半生半炙)、茯神(去皮木根)、白礬(去絲)、枳殼(麸炒微黃)、各五錢。白附子、白茯苓(去皮)、天南星(製)、硼砂、牙硝、硃砂(水飛)、各二錢五分。全蠍、十個(去尖毒)。麝香、一字。

制法及用法 除牙硝、硃砂、硼砂、麝香四味。用乳鉢細研。餘九味焙爲末。入乳鉢內和勻前四味。用糯米粉。清水煮糊爲丸。如梧桐子大。就帶潤以銀絲爲衣。每服三丸至五丸或七丸。急驚。溫茶清、磨化服。慢驚。生薑、熟附子、煎湯。研化溫服。薄荷湯或麥門冬湯亦可。

【鎮驚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒渴痢。煩熱不止。

藥品 琥珀、辰砂、真珠母、青皮、粉甘草、各二錢五分。青黛、蘆薈、柴胡、青礞石(研碎)、各五錢。天竺黃、膽星、各二兩。天麻、乳香、各一兩。雄黃、一錢五分。

制法及用法 共研末。甘草膏爲丸。如雞頭大。每服一丸。慢驚。參朮湯送下。急驚。薄荷蘆薈湯送下。

【鎮驚丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒一切驚風。

藥品 茯神(去木)、鐵粉、遠志(去心、薑製焙)、紫石英(煨、醋淬、研)、人參(去蘆)、琥珀、滑石、蛇黃(煨、醋淬)、南星(炮)、各二錢五分。龍齒、熊膽、各五釐。輕粉、三分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服三五丸。不拘時。金銀煎湯磨化服。

【雞肝散】

發明 驗方。

功用 平肝。健脾。明目。去障。止瀉。進食。治小兒疳積腹大。泄瀉。面黃肌瘦。肝火上升。目珠生翳。

藥品 蘆甘石(製)、六錢。赤石脂、滑石(飛)、胡黃連、各五錢。辰砂、四錢。青黛、三錢。石決明(煨)、一兩。

制法及用法 共研極細末。每服五分。用雄雞肝不落水者一具。竹刀破開。將藥末放入。煮熟食之。輕者一二服。重者三四服。可愈。

參考 藥肆稱此方爲小兒雞肝散。傳與治陰毒之雞肝散有別。

二十七筆

【鷓鴣涎丸】

發明 驗方。

功用 治小兒百日咳。

藥品 細辛、五錢。射干、一兩。石膏、二兩。蛤殼(煨)、二兩。杏仁(去皮尖)、二兩。牛蒡子(炒)、三兩。麻黃(去節)、八錢。青黛、一兩。山梔(炒焦)、二兩。天花粉、二兩。甘草、四錢。鷓鴣涎、三兩。

制法及用法 共研細粉。加煉蜜爲丸。每粒潮重八分。每次一丸。開水化服。

二十九筆

【鬱金散】

發明 見萬全方。

功用 治小兒風熱。鎮心壓涎。

藥品 鬱金、一兩(用皂角二枚、按水一碗、慢煮鬱金令乾、用水淨洗到)。天竺黃、馬牙硝(炙)、甘草、各五錢。硃砂、一兩(研)。龍腦、一錢(研)。

制法及用法 搗羅爲末。研令勻。每服五分。麥門冬湯調下。量兒大小以意加減。

跌打損傷類

二 筆

【七釐散】

功用 治跌打損傷。瘀血停滯。遍身疼痛。

藥品 血竭(另研)、一兩。乳香(去油)、沒藥(去油)、紅花、各一錢五分。孩兒茶、二錢四分。硃砂(飛)、一錢二分。麝香、冰片、各一分二釐。一作各三分。或加三七一錢五分。更佳。

制法及用法 研爲細末。瓷瓶密收。蠟封口。勿洩氣。愈久愈佳。每服七釐(一作一分)。童便或溫酒送下。不可多。孕婦但可外敷。不可內服。

【八釐散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 接骨散瘀。治跌打損傷。

藥品 蘇木麩、半兩。番木鱉(油燻去毛)、各一錢。自然銅(醋淬七次)、乳香、沒藥、血竭、各三錢。麝香、一分。紅花、二錢。丁香、五分。

制法及用法 研爲細末。溫酒或童便調下。

三 筆

【三仙散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治跌打腰痛。

藥品 羅裙帶葉、杉樹皮、槐樹皮、各等分。

制法及用法 清水煎。熱洗。其渣搗融炒熱。布包敷之。冷則隨換。

【三黃寶蠟丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 去瘀。活血。治跌打損傷，惡瘡，金瘡。箭傷。鎗傷。一切刺傷破皮。瘀血奔心。破傷風。傷力癆。瘋狗咬傷。蛇蟲毒物咬傷。墜馬跌傷。婦人產後惡露不盡。痰迷心竅。致生怪症，危在頃刻者。

藥品 藤黃、四兩(製法見黎洞丸內)、天竺黃(如無真者、以九轉南星代之)、雄黃(一作二兩)、紅芽大戟(去骨)、劉寄奴、血竭、孩兒茶(一作一兩)、各三兩。朴硝、一兩(一作一兩二錢)。當歸尾、一兩五錢(一作一兩二錢)。鉛粉(一作輕粉、一作三兩)、水銀(一作同輕粉研不見星)、乳香(去油、一作三兩)、麝香、各三錢。琥珀、二錢(一作三錢)。一方無藤黃、朴硝。有硃砂、一兩。

制法及用法 研爲極細末。

和勻。將水銀同鉛粉在鐵鍋內。火上熱研成末。入前藥內。共研勻。用淨黃蠟二十四兩。放瓷器或銅器內。燉滾水中化開。將藥入內。不住手攪勻。待半冷。捏作小丸。裝瓷罐中。病重者每服一錢。輕者每服三四分或五分。熱黃酒調下。立刻轉機。倘受傷至重。則連服數次。如鳥槍彈傷。鎗子在內。危在頃刻。飲酒數杯睡一時。汗出即愈。如外敷用香油隔滾湯化開。鷄翎蘸上。服藥後、飲酒出汗更妙。忌涼水生冷生菜發物燒酒三日。不忌燒酒則無效。如久病勢重者。服數丸。極能舒經活絡。去瘀生新。有起死回生之妙。

四 筆

【內傷膏】

發明 驗方。

功用 治閃腰岔氣。跌撲損傷。

藥品 羌活、一兩。麻黃、一兩。當歸、一兩。公丁香、二兩。獨活、一兩。生附子、一兩。蒼朮、一兩。草烏、一兩。升麻、一兩。紅花、一兩。法半夏、一兩。川烏、一兩。白芷、一兩。薑皮、一兩。桂枝、一兩。菖蒲、

一兩。

制法及用法 用香油三斤。將上藥浸七日。蒸枯去渣。煨至滴水成珠。下黃丹六十兩攪勻。用冷水浸去火毒備用。臨攤時另取肉桂、牙皂、千年健、乳香、沒藥、大黃、青皮七味。研極細粉。加入和勻。用油紙攤貼患處。

五 筆

【玉真散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治破傷風。及打撲傷損。項強口噤。

藥品 天南星（湯泡七次）、防風、各等分。

制法及用法 研爲末。先以熱童便洗淨瘡口。拭乾搽之。良久。渾身發作癢。瘡口出赤水。爲效。又以生薑汁和溫酒調下一錢。如牙關緊急。腰背反張。每用二錢。童便調服。雖已至死而心頭微溫者。急灌之。亦可救。

參考 南星爲防風所制。則有開闔定搐之功。而無麻人之弊。

六 筆

【回生丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治跌打損傷。

藥品 黑豆（炒去皮）、蒲黃、當歸、桂心、赤芍藥、乾薑、各八兩。茄種（曬乾）、四兩。

制法及用法 擇天德月德日修合。忌生人雞犬。碾細。煉蜜爲丸。每服二錢。童便沖酒送下。

【回生第一仙丹】

發明 驗方。

功用 治跌傷、壓傷、打傷、刀傷、銃傷、割喉、吊死、驚死、溺死等症。

藥品 土龍（用活大如指頭而雄者、去足放瓦上、小火焙黃、研細、用淨末）、五錢。自然銅（須自製、放瓦上、炭火內燒紅、入好醋內淬半刻、取出、再燒再淬、連製九次、用淨末）、三錢。乳香（每一兩、用燈草二錢五分、同炒枯、共研細、吹去燈草得淨末）、二錢。陳血竭（飛淨）、二錢。硃砂（飛淨）、二錢。巴豆（去壳研、用紙包壓數次、去淨油、用淨末）、二錢。麝香（須當門子者）、三分。

制法及用法 同研極細末。收入小口瓷瓶（口大藥易洩氣）。用蠟封口。不可洩氣。大人每用一分五釐。小兒七釐。沖酒服。牙關不開者。打開一

齒灌之。必活。灌時多用水酒。使藥下喉爲要。活後宜避風調養。若傷後受凍而死。須放暖室中。最忌見火。仍照凍死法參酌治之。如活轉。心腹疼痛。此瘀血未淨。服白糖飲自愈。

【自然銅散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治跌撲骨斷。

藥品 自然銅(煨、醋淬七次)、乳香、沒藥、蘇木、降香、川烏、松節、各五錢。地龍(炒)、水蛭(炒焦)、生龍骨、各二錢五分。血竭、一錢五分。土狗、五個(油浸焙)。

制法及用法 研爲末。每服五錢。溫酒送下。自項心尋病至下兩手兩足。周遍一身。病人自覺骨力習習往來。遇病處則颼颼有聲。

【自然銅散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治跌撲骨斷。

藥品 自然銅(煨通紅、醋淬七次、放溼土上、月餘用)、乳香、沒藥、當歸身、羌活、各等分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。醇酒調下。一日二次。骨傷用碎補五錢。酒浸搗絞。取汁沖服。

【地龍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腰脊痛。或打撲損傷。瘀積太陽經中。致腰脊脛腕臂痛不可忍。

藥品 地龍、官桂、蘇木、各九分。麝黃、七分。黃蘗、當歸梢、甘草、各一錢五分。桃仁、九個。

制法及用法 清水二鍾。煎至一鍾。食前服。

七 筆

【沒藥丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治中石疽、打撲內損。筋骨疼痛。

藥品 沒藥、乳香、川芎、川椒(去目及合口者)、赤芍藥、當歸、各五錢。自然銅(火煨、醋淬七次)、二錢五分。一方有桃仁、一兩炒。

制法及用法 研爲細末。黃蠟二兩。熔開。入藥末。不住手攪勻。丸如彈子大。每服一丸。好酒一鍾化開。煎至五分。乘熱服下。隨痛處臥。連服二三丸立效。

【沒藥散】

發明 見張潔古方。

功用 止杖瘡痛。令瘡不移。

藥品 沒藥、密陀僧、乳香、

各一兩。乾胭脂、一兩五錢。膩粉、五錢。

制法及用法 研爲細末。次入龍腦少許(若多更妙)。燒葱與生羊髓同研如泥。攤在絹上貼之。

【走馬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療骨折傷。

藥品 生柏葉、生荷葉、生皂角、骨碎補(去毛)、各等分。

制法及用法 研爲末。先將折骨處搗定。令入原位。以生薑汁調藥如糊。攤紙上。貼骨斷處。用杉木片夾定。以繩縛之。勿令轉動。三五日後開看。以溫葱湯洗。後再貼藥。從夾七日。如痛再加沒藥。

八 筆

【乳香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治打撲傷損。手足疼痛。不可忍者。

藥品 乳香(另研)、沒藥(另研)、各三錢。白芷、二錢。肉桂、白朮(炒)、當歸(炒)、粉甘草、各五錢。一方無肉桂。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服二錢。不拘時溫酒調下。

【乳香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治打撲傷損。手足疼痛。不可忍者。

藥品 乳香、一錢(研)。天仙藤、一兩(焙乾、爲末)。

制法及用法 每服一錢。溫酒調下。

【乳香膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治打撲傷損。

藥品 乳香、沒藥、各五錢。木鼈子(去殼、細剉)、當歸、各一兩。柳枝、二八寸(寸剉)。白膠香(明淨者)、四兩。

制法及用法 先以木鼈、當歸、柳枝。同以清油四兩。煎令黑色。後將乳香、沒藥、白膠香、同研細。入油煎化。用綿紙濾之。以煉藥 鐵銚令極淨。再傾前藥、油蠟在內。候溫。入黃丹一兩五錢。以兩柳枝攪極得所。再上火煎。不住手攪。候油沸起。住攪。注在水中。成珠不散爲度。秋冬欲軟。春夏欲堅。傾在水中出火毒。攪成劑收之。貼於患處。

【乳香膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治打撲傷損。

藥品 乳香、松香、楓香、五倍子、狗骨(煨)、各一兩。麝底墨、小麥麵、各五兩。

制法及用法 研爲末。好酒調爲糊樣。熱敷痛處。不可敷破處。若破爛者。只用鳳尾草爲末搽之。

【乳香定痛散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治跌撲傷筋疼痛。

藥品 乳香、沒藥、各五錢。川芎、白芷、赤芍藥、牡丹皮、生地黃、各七錢五分。甘草(炙)、二錢。一方有當歸、白朮。

制法及用法 爲散。每服四錢。醇酒和童便調下。每日二次。大便艱加大黃(酒製)。筋傷用生牛膝五錢。酒浸搗絞。取汁沖服。

【定痛散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 定痛。消腫。舒筋。和絡。治一切打撲損傷。

藥品 當歸、川芎、白芍、官桂、升麻、防風、各一錢。三柰、三錢。麝香、三分。紅花、紫丁香根、各五錢。

制法及用法 研爲細末。老葱搗汁。合敷患處。再用熨法。

【金絲膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傷筋動骨。損傷閃挫。風毒惡瘡。風溼筋寒諸病。

藥品 當歸尾、川白芷、杏仁(去皮尖)、玄參、豬牙皂角(去

皮弦)、草烏(生剉)、各三錢。白膠香(明者)、八兩。連鬚葉蔥(肥者)、十根。滴青(明者)、八兩。乳香、沒藥(另研爲末)、各五錢。黃蠟(明者)、一兩。男子亂髮(洗淨、按如雞子大)、一團。

制法及用法 用清油八兩。將八味依前法熬濃。入膠香、滴青攪勻。下黃蠟。又攪無煇。方下乳香、沒藥。攪貼患處。

【芙蓉膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治撲打傷損腫痛。

藥品 芙蓉葉、二兩。紫金皮、南星、各一兩。獨活、白芷、赤芍藥、各五錢。

制法及用法 研爲末。生薑汁、茶清、調溫貼縛。如傷損紫黑色久不退者。加肉桂五錢。

九 筆

【活血丹】

發明 見顧世澄醫醫大全。

功用 治跌打損傷。

藥品 土鼈(酒浸洗曬乾)、五加皮、劉寄奴花頭、桃仁(去皮尖)、山楂、各四兩。大黃(陳酒煮乾)、八兩。玄胡索(醋煮)、蓬莪朮(醋炒)、牡丹皮、當歸(酒洗)、牛膝(酒洗)、紅花、各

三兩。香附(童便浸炒)、三兩。京三棱(醋炒)、降香節、凌霄花、蘇木、青皮、枳實、赤芍藥、威靈仙、花檳榔、川芎、各二兩。乳香(去油)、沒藥(去油)、各一兩。

制法及用法 共研細末。每服二錢。壯者三錢。陳酒調下。核桃肉四五枚過口。

【活血丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治打撲損傷。金瘡。及諸般風疾。左癱右瘓。手足頑麻。婦人血風。浑身疼痛。冷痺。一切損傷。

藥品 青桑炭、一斤。當歸、牛膝、川芎、赤芍藥、熟地、黑豆(酒煮)、何首烏、天南星(製)、白芷、老松節(煨)、杜仲、破故紙、羌活、獨活、蒼朮(製)、防風、荆芥、骨碎補、桔梗、續斷、各四兩。草烏(醋煮炒)、川烏(炮、一作炒)、肉桂、木鼈子(炒)、角茴香、地龍(去土)、白蘇、白芨(煨)、細辛、降真香、檀香、松香、楓香、五錢脂、陳京墨(煨)、血竭、乳香、沒藥、各二兩。

制法及用法 共研末。酒煮糯米粉糊爲丸。如彈子大。曬乾。以生漆抹手上。搽漆爲衣。陰乾。却以布袋盛掛於風口。

經久不壞。亦不失藥味。每服用當歸酒磨下。如傷筋折骨。加自然銅二兩(煨、醋淬、金刃出血忌用)。

【活血散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治跌撲折傷手足。

藥品 綠豆粉、不拘多少。

制法及用法 新鐵銚內炒令紫色。熱酒同熱醋或新汲水調令成膏。敷貼損處。用紙花蓋貼。將杉木一二片。或桑皮縛定。其效如神。

十 筆

【神效散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治跌打損傷。

藥品 肉桂(去皮)、紅花、各一錢七分。川烏、草烏、各二錢。

制法及用法 共礱細末。每服二分。溫酒調下。傷重者。不過三分即愈。

【烏龍膏】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治跌打損傷。筋斷骨折。腫硬青紫。

藥品 白芨、百合、乳香、沒藥、各五錢。百草霜、白蘇、白部、各三錢。麝香、一分。糯米、一兩(炒)。陳粉子、四兩。

(隔年者佳、炒)。

制法及用法 研細末。燂熬爲膏。每用少許。塗於患處。

【骨科破瘀膏】

發明 驗方。

功用 治跌打損傷。腫脹疼痛。

藥品 生薑、一兩。赤芍、三錢。杜仲、三錢。紅花、六錢。牛膝、三錢。天麻、五錢。續斷、三錢。五加皮、二錢。草烏、三錢。桂枝、二錢。當歸、五錢。狗脊、二錢。土鱉、五錢。川烏、三錢。木瓜、一兩。乳香、三錢。硃砂、三錢。旱三七、三錢。冰片、三錢。沒藥、三錢。川芎、二錢。珍珠、三錢。血竭、一兩。自然銅、五錢。麝香、三錢。

制法及用法 先將乳香、沒藥、血竭、硃砂、自然銅、旱三七、冰片、珍珠、麝香、川芎。共爲細粉。另以餘藥用香油三斤炸枯。去渣。煉至滴水成珠。下黃丹十八兩。攪勻成膏。待溫。可將前藥粉攪入和勻。每張用膏藥肉一兩。貼患處。

十一筆

【接骨丹】

發明 見張潔古方。

功用 治骨折斷或出臼。

藥品 天南星、木鼈子、各四兩。沒藥、乳香、各五錢。官桂、一兩。

制法及用法 研爲細末。生薑一斤。去皮。爛研。取自然汁。入米醋少許。白麴打糊同調。攤紙上。貼傷處。以帛纏之。用杉木片夾定。麻索子纏住。

【接骨丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治骨折斷或出臼。

藥品 生南星、四兩。木鼈子、三兩。紫金皮、芙蓉葉、獨活、白芷、官桂、松香、楓香、各一兩。小麥麴、二兩。乳香、沒藥、各五錢。

制法及用法 研爲末。米醋、生薑汁、各少許。入酒調勻。攤油紙上夾縛。冬月熱縛。夏月溫縛。

【接骨丹】

發明 見王士雄回春錄。

功用 治骨碎筋斷。

藥品 古文錢、三個(火煨、醋淬七次)。當歸、七錢五分。川芎、骨碎補、沒藥、各五錢。川烏(煨)、四錢。乳香、二錢五分。木香、一錢。松香、六兩。香油、一兩五錢。

制法及用法 各爲末。和油成膏。攤油紙上貼之。

【接骨丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 接骨。

藥品 乳香、沒藥、當歸、川椒、自然銅(火煨、醋淬三次)、龍骨、川芎、赤芍藥、骨碎補(酒炙)、敗龜板(酥炙)、白芷、郁李仁、各一錢。

制法及用法 共研細末。黃蠟五錢。熔化爲丸。如彈子大。每服一丸。熱酒一盞。向東南攪散化下。

【接骨散】

發明 見朱丹溪方。

功用 接骨。

藥品 沒藥、乳香、各五錢。自然銅、一兩(醋淬七次)。滑石、二兩。龍骨、三錢。赤石脂、白石脂、各二錢。

制法及用法 研爲細末。好醋浸。炙乾炒燥。臨服時入麝香少許。挑小茶匙在舌上。溫酒送下。病分上下。食前後服。若骨已接尚痛。去龍骨、石脂。多服儘佳。

【接骨散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治跌撲閃挫骨折。

藥品 黃麻(燒灰)、二兩。頭髮(燒灰)、一兩。乳香(去油)、五錢。

制法及用法 碾勻。每服三錢。溫酒調下。疼痛立止。

【透骨丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治跌打損傷。深入骨髓。或隱隱疼痛。或天陰則痛。或四肢沉重無力。

藥品 真血竭、乳香(去油)、沒藥(去油)、各三錢。開羊花子、一兩(火酒浸炒三次、童便浸炒二次、再焙乾)。

制法及用法 各碾爲末。稱準和勻。再加麝香一分。再碾。裝瓶收貯。封固。每服三分。壯者五六分。不必喫夜飯。黃昏睡好方服。酒可儘量飲之。單用豬肉過口。素用豆腐過口。服後避風。有微汗出爲效。戒房事。忌食酸鹹茶醋等物。及諸般血。如虛弱者。間五日一服。壯實者。間三日一服。

十二筆

【黑末子】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治打撲損傷。折骨碎筋。瘀血腫痛。癱瘓頑痹。四肢酸疼。痛風等證。

藥品 雄雞毛(燒存性)、桑炭、老松節(炒存性)、嫩松心、側柏葉(醋漬)、各四兩。當歸、牛膝、何首烏、黑豆(酒炙)、南

星(製)、骨碎補、熟地黃、羌活、獨活、赤芍藥、川芎、白芷、各二兩。細辛、肉桂、川烏(炮)、草烏(製)、木鼈子、南木香、五寶脂、降真香、乳香、沒藥、楓香、各一兩。百草霜、五錢。

制法及用法 研爲末。熱酒調下。欲愈之際。加自然銅(製)一兩。只折骨者。便可用之。

【散血膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治打撲損傷。金瘡、惡獸傷。

藥品 耳草葉、澤蘭葉、各少許。

制法及用法 生採杵搗極爛。冷敷縛。刀斧斫磕等傷。破皮損肉者。先用羊毛餅貼。次貼此膏。瘡口四邊用散血膏敷貼。令血不聚。或不用羊毛餅。祇用金毛狗脊毛。薄薄鋪於患口上。次拔封口藥。再以此膏貼之。其效更速。

【黃金膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治跌打損傷刀傷。杖瘡湯火傷。

制法及用法 麻油、八兩。熬至滴水成珠。離火。入白蠟、黃蠟、各五錢。攪化。再入藤黃、一兩。攪勻收貯。愈疎愈

妙。如收久膏老。加熬過麻油。燉化攪勻。冷透敷之。惟癰頸者勿用。因藤黃毒入耳。

十三筆

【聖靈丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切打撲損傷。及傷折疼痛不可忍者。

藥品 乳香、五錢。烏梅肉、一枚。萵苣子、一大匙(炒、取二兩八錢)。白米、一撮。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。食後一伏時細嚼。熱酒送下。痛不止再服。

十四筆

【奪命散】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治跌打損傷。金刃創傷。瘀血凝積。心腹疼痛。及二便不通。

藥品 水蛭(用石灰慢火燒、令乾黃色)、五錢。黑牽牛、二兩(一方有大黃、二兩)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。熱酒調下。約行四五里。再用熱酒調黑牽牛末二錢催之。須下惡血成塊。以盡爲度。

十五筆

【養肝丸】

發明 見沈金鏊 沈氏 尊生書。

功用 治筋傷。

藥品 川芎、當歸、白芍藥、熟地黃、防風、羌活。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。熟湯送下。

【調經散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治跌撲損傷。疏利後用此藥調理。

藥品 川芎、當歸、芍藥、黃耆、各一錢五分。青皮、烏藥、陳皮、熟地黃、乳香(另研)、茴香、各一錢。

制法及用法 清水二鍾。煎至一鍾。不拘時服。

十八筆

【雞鳴散】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治跌打損傷。血瘀凝積。氣絕欲死。煩躁頭痛。

藥品 大黃、一兩(酒蒸)。桃仁(去皮尖)、二七枚。一方有當歸尾、三錢。一方無桃仁。有杏仁。

制法及用法 研細。酒一。碗。煎至六分。去渣。雞鳴時服。次日取下瘀血。即愈。若便覺氣絕。不能言語。取藥不及。急撬口開。用藥渣灌之即愈。

二十筆

【糯米膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治跌打損傷。筋斷骨折。

藥品 糯米、一升。皂角(切碎)、五合。銅錢、一百個。

制法及用法 同炒至焦黑。去錢爲米。酒調膏貼。

癰疽瘡瘍類

一筆

【一上散】

發明 見朱丹溪方。

功用 療疥瘡痛癢。或喜湯火烘洗。

藥品 蛇牀子(略炒)、雄黃(另研)、黑狗脊、寒水石(另研)、白膠香(銅銚熬熔過、傾乾石頭上放冷)、各一兩。白礬、黃連、各五錢。吳茱萸、三錢。硫黃、二錢五分(另研)。斑蝥、十四枚(去翅足)。

制法及用法 研爲細末。先以蒼耳草或羊不食草藤煮煎湯。洗去瘡痂。然後用香油調敷。

【一上散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療皮膚燥癢生瘡。

藥品 苦參、一兩。白芷、硫磺、枯礬、各五錢。荆芥穗、白芨、各三錢。寒水石、二兩(煨)。

制法及用法 研爲末。油調塗。

【一粒珠】

發明 驗方。

功用 治一切無名腫毒。癰疽。發背。及小兒驚風。

藥品 穿山甲、一具(約重十六兩、分四片、用麻油、米醋、蘇合香、松羅茶、各製一次)。犀黃、三錢。珍珠、麝香、各二錢。梅花冰片、硃砂、雄黃、各四錢(各取淨粉)。一方有蟾酥。

制法及用法 研爲細末。用人乳拌米糊打漿爲丸。每丸潮重四分五釐。外用蠟壳封固。腫毒等症。每服一丸。入乳汁化開。陳酒沖服。睡臥避風。小兒驚風。每服半丸。用鉤藤、橘紅、泡湯化下。

參考 此方藥貴力烈。爲外科要症所必用。

【一筆勾】

發明 見顧世澄醫醫大全。

藥品 蟬蟻蟲、三十四條。冰片、四分。

制法及用法 入罐內化爲水。入麻油八兩。封口收藏。勿令洩氣。初起用筆圈塗毒外四圍。顏顏圈之即消。已成敷滿。留頂透氣。

【一筆消】

發明 見全生集方。

功用 治癰疽、發背、諸疔、惡瘡、一切無名腫毒。

藥品 大黃、二兩。藤黃、一兩。明礬、蟾酥、各三錢。麝香、沒藥(去油)、乳香(去油)、各二錢。

制法及用法 用雞牛打爛作錠。曬乾。每錠潮重二分五釐。米醋磨敷。立即消散。白疔忌用。

【一醉膏】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治癰疽、發背、乳癰初起。

藥品 甘草、五錢。沒藥、二錢五分。瓜蒌、一個(去皮、研爛)。

制法及用法 黃酒三碗。煎至一碗半。分溫二服。重者再進一服。以瘰爲度。或加當歸、白芷、乳香、尤妙。如要宣毒。

加皂角刺一錢。

【一粒金丹】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治癰腫。惡瘡。無名腫毒。及中搭手之寒實不渴便秘者。

藥品 木香、沉香、乳香、各五分。已豆霜、一錢五分。

制法及用法 研爲細末。和勻。肥膠蜜二個半。去皮核。搗爛和丸。如芡實大。每服一丸。細嚼。白滾水一口送下。少頃再飲白滾水一口。即瀉一次。若飲滾水二口。即瀉二次。遇胃氣壯實兼毒滯盛者。服藥後連飲滾水三四口。即瀉三四次。不可太過。毒滯瀉盡。即以米飲補之。

【一粒金丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治魚鱗風、癩曳風。

藥品 白膠香、三兩五錢。京墨、紫背浮萍、阿膠、各二兩五錢。五靈脂、草烏頭(炒)、各二兩。香木鼈、五錢。當歸、乳香、沒藥、各七分五釐。地龍、麝香、各二分五釐。

制法及用法 研爲末。用麻黃二兩煎汁。煮大米飯爲丸。如龍眼核大。塗砂爲衣。每服一丸。溫酒送下。以有黑汗從脚底心出爲驗。

二 筆

【二仙丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治發背初起。

藥品 穿山甲、七片。牛皮膏、四兩。

制法及用法 同放新瓦上。燒存性研細。好酒調下。任量飲醉。出汗爲度。

【二仙散】

發明 見廣濟方。

功用 治發背、癰疽。未成、已成。未潰、已潰。痛不可忍者。

藥品 白芷(未潰用一兩、已潰用五錢)。貝母(未潰用五錢、已潰用一兩)。

制法及用法 水酒各半煎服。

【二妙散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治馬瘡。

藥品 馬蹄香、香圓橘葉。

制法及用法 搗爛。糟炒數之。又用秦椒酒煎。

【二金散】

發明 見王冰方。

功用 治含腮瘡。

藥品 雞內金、雞金、各等分。

制法及用法 研爲細末。先用鹽漿洗淨患處。然後貼之(一作吹之)。

【二金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治急疔毒盛。

藥品 砒霜、一分。麝香、五錢。

制法及用法 先以砒霜去紙上炒過。後入麝香。同研令細。每用一字。雞羽掠上。每日二三度。隨時去藥。無令嚙津。

【二金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療熱瘡。

藥品 黃連(去鬚)、黃柏、各一錢。

制法及用法 研爲粗末。乳汁浸一宿。焙乾。每用少許。新綿裹。荊芥湯浸溫熱。時時洗之。

【二神丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治癰疽。脾腎虛弱。晨或飯後五更泄瀉。飲食少思。食不消化。大便不實。腰痛見於尋常者亦可用之。

藥品 補骨脂(微炒)、四兩。肉豆蔻(生、一作麴麥煨、搗去油)、二兩。

制法及用法 研爲細末。先以大紅棗四十九枚(一作六十枚、一作四十枚)。老生薑(切碎)四兩。清水煮熟。去薑取

棗肉。和藥爲丸(一作蒸餅爲丸)。如梧桐子大。每服三十丸至四五十丸(一作二錢、一作三錢)。空腹時鹽湯或米湯、溫酒送下。如不應。係命門火衰。宜急服八味丸補火生土。

參考 脾虛不能制水。腎虛不能行水。故以補骨脂之辛燥補腎。肉豆蔻之辛溫補脾。兩臟之機能完健。則泄瀉自止。

【二黃散】

發明 見顧世澄瘍醫大全方。

功用 治熱瘡。

藥品 黃連、黃柏、各三兩。赤小豆、綠豆粉、各一兩。寒水石、紫蘇、漏蘆、各七錢。

制法及用法 研爲細末。麻油調搽。一日三次。

【七寶散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治熱汗浸漬成瘡。癢痛不止。

藥品 黃耆、當歸、防風、荊芥穗、地骨皮、木通、各二兩。白礬、一兩。

制法及用法 研爲粗末。每用一兩。清水三大碗。煎五六沸。濾去滓。稍熱沐浴患處。避風少時。

【七寶散】

發明 見許叔微類證普濟本

事方。

功用 療癰疽。止痛。拔毒。

藥品 乾荷蒂、不拘多少。

制法及用法 研爲末。每用三匙。沸水二盞。慢火煎至一盞半。放溫淋洗。搥乾。以木白膏敷之。

【八仙散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治遊風腫癰，疥癬瘡。

藥品 細辛、荊芥、白芷、茯苓、川芎、地骨皮、甘草、各等分。

制法及用法 研爲粗末。每用二兩。清水二碗。煎十沸。去滓。熱湯患處。

【八將丹】

發明 見顧世澄瘍醫大千方。

功用 治一切疽毒不起。疔毒不透。腐肉不脫。

藥品 西牛黃、三分。冰片、三分。蟬衣(煨)、七枚。蜈蚣(炙)、七條。麝香、三分。穿山甲(炙)、七片。全蠍(炙)、七個。五倍子(焙)、三錢。

制法及用法 共爲細末。每以少許搽於瘡頂上。以膏蓋之。

參考 此方提毒化毒甚妙。

【八寶丹】

發明 見邵道人方。

功用 治楊梅結毒。

藥品 鍾乳粉(製)、飛白麵(炒研)、各五錢。辰砂(飛)、三錢。真熊膽、珍珠、琥珀、西牛黃、冰片、各一錢。

制法及用法 研爲細末。瓷瓶收貯。每用一錢。土伏苓八兩。煎湯調下。如毒在下部。加薏苡米五錢同煎。

【八寶丹】

發明 見顧世澄瘍醫大千方。

功用 生肌長肉收口。

藥品 珍珠、一錢(綿布包、入豆腐內煮一伏時、研細、如治顛頂十手指尖十足指尖龜頭等二十二處、非圓滾珍珠合藥、不能包裹還原、若治癰疽一切瘡瘍、即飯塊珍珠皆可用)。牛黃、五分。象皮(切片)、琥珀(燈心同研)、龍骨(煨)、輕粉、各一錢五分。冰片、三分。爐甘石(銀罐內煨紅、研細)、三錢。

制法及用法 研爲極細末。瓷瓶密貯。每用少許。搽於患處。

【八寶丹】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 生肌。長肉。治一切瘡癰。溼爛不已。久不收口。兼治楊梅結毒。

藥品 牛黃、五分。花龍骨、人中白、血琥珀、各四錢。珍

珠、硃砂(飛)、各二錢。煨甘石(製)、五錢。梅片、一錢。

制法及用法 共研末。至無聲爲度。每用少許。搽於瘡口。立效。

【八寶丹】

發明 見鮑相璣驗方新編。

藥品 血竭、乳香、沒藥、各二錢。龍骨、煨甘石、石脂、各三錢。冰片、一錢五分。輕粉、一錢。

制法及用法 共研末。至無聲爲度。每用少許。搽於瘡口。無不立效。

【九一丹】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治腫瘍。潰瘍。結核。退膿管。

藥品 ①生石膏、九分。白降丹(須年久烈性退者)、一分。②石膏(煨)、九錢。陳升丹、一錢。

制法及用法 研爲極細末。視症之輕重。或八二七三攪和均可。腫瘍結核。將丹薄勻搽膏上。不可太多。多則有傷皮膚。潰瘍搽膏上貼之。提膿拔毒。毒盡生肌。惟臍口正面及踝骨。與凡肌薄無肉之處。不能化膿。僅有稠水者。忌用。緣提拔甚猛。誤用反痛。甚則流血。又用綿紙燃作藥線。潤以

麵粉。將丹拌上。插入膿管。能退管收功。

【九一丹】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治疔瘡潰破。拔疔根。搜膿。清熱。生肌。

藥品 石膏(煨)、九錢。黃蠟藥、一錢。

制法及用法 研爲極細末。搽患處。

【九龍丹】

發明 見陳實功外科正宗方。

功用 治惡癰、魚口、便毒、橫痃初起。尚未成膿者。

藥品 木香、乳香(去油)、沒藥、孩兒茶、血竭(另研)、巴豆(去油、不去心)、各等分。

制法及用法 研爲末。生蜜調成一塊。瓷盒收貯。臨用時。旋丸如豌豆大。每服九丸。空腹時熱酒一杯送下。行四五次。方食稀粥。腫甚者。間日再用一服。自消。

【九味蘆薈丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治下疳。

藥品 蘆薈、五錢。當歸、胡黃連、川芎、蘇黃、白芍藥、各一兩。龍膽草(酒浸、炒焦)、七錢。廣木香、甘草、各三錢。

制法及用法 研爲末。米粥

搗丸。如豌豆大。每服一錢或一錢五分。熱湯送下。若虛者。佐以加味歸脾湯、加味逍遙散治之。

【十寶丹】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 消腫瘍消濕。

藥品 海羊、二十一個。硃砂、輕粉、寒水石(煨)、雄黃、銅綠、各二錢。血竭、蟾酥、麝香、各一錢。麝香、五分。

制法及用法 研極細。酒丸如梧桐子大。硃砂爲衣。大人服七丸。小兒服三丸。先嚼葱白頭三根。吐手心(男左手、女右手)。包藥吞之。黃酒送下。盡醉。被蓋出汗。外用萬應靈丹點之。

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治虛症。內虛不足。

藥品 人參、白朮、白茯苓、枸杞子、各一兩。熟地黃、黃耆(剉)、各二兩。桂心、白芍藥、當歸(微炒)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 剉碎。每服四錢。清水一中盞。加生薑一片。大棗三枚。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【人中白散】

發明 見陳實功外科正宗

方。

功用 治小兒馬牙疳。口疳。牙齦腐爛臭黑。膿耳。手廉瘡。腿上傷。痔瘡。

藥品 人中白(煨紅)、二兩。孩兒茶、一兩。冰片、五分。黃蘗、白硼砂、薄荷、青黛、各六錢。黃連、五錢。一方無硼砂、黃連、黃蘗。有玄明粉、馬屁勃。

制法及用法 研爲極細末。先用陳松蘿茶洗淨。日吹五七次。吹後毒涎外流爲吉。入裏爲凶。膿耳吹耳內。傷手瘡乾搽。痔瘡用麻油調搽。

參考 此方舊法入麝少許。酒釀調服。然痘疹觸麝與酒。恐防發癢。不如勿用。

三 筆

【三仙丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 提膿、長肉、治小毒。

藥品 水銀、一兩。明礬、火硝、各一兩二錢。

制法及用法 用鐵鍋一隻。將藥研細傾入。上用平口宮碗一隻(先用生薑片擦碗內外。則不炸)。蓋定。碗內以潮皮紙攪擠緊。鹽泥封口。碗底俱泥固之。用炭三斤。爐內周圍砌緊。勿令火出。如碗上泥裂縫。以

鹽泥補之。昇三炷線香爲度。冷定開看。碗內藥。刮下。研細。瓷瓶收貯。一法。鹽泥只封碗口。不封鍋底。鍋底上貼溼白紙一塊。但看紙色轉黃。則藥已升上。鍋底之上。以鐵秤錘壓之。又一法。以潮皮紙擦。擠定碗口。外以研細石膏末按緊。不用鹽泥。只用鐵錘壓之。

【三白散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 去熱。解毒。療漆瘡。

藥品 鉛粉、一兩。輕粉、五錢。石膏、三錢(煨)。

制法及用法 研末和勻。並藥汁或涼水調敷。以紙覆之。

【三黃丸】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治惡癰紅腫。及熱毒大瘰。楊梅結毒。火毒疼痛。

藥品 熟大黃、三兩(酒磨汁)。雄精、五錢。牛黃、麝香、各三錢。乳香、沒藥、各一兩。

制法及用法 共研末。和大黃汁搗丸。如梧桐子大。每服五錢。熱湯送下。孕婦忌服。

【三黃散】

發明 見沈氏尊生書。

功用 治頸面腮部諸癰。小兒丹毒。

藥品 大黃、蘆黃、各二錢。

蒲黃、五分。冰片、五釐。麝香、二釐。

制法及用法 研爲細末。用白蜜調。加蔥薑汁二三匙。敷患處。或芭蕉根汁或扁柏汁和蜜調俱可。

【三黃散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治疔熱生瘡。膿水浸淫溼爛。

藥品 黃連、黃丹、各一錢。雄黃、五分。松香、五倍子、海螵蛸、各一錢。輕粉、五分。

制法及用法 研爲末。湯洗滲之。乾者香油敷。

【三才絳雲錠子】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰瘰、痔漏、六癰、惡瘡。

藥品 ①天才。爲第一步開瘡口緊要之藥。白礬(煨)、五錢。雄黃、三錢。信石、硃砂、硃砂、各二錢。生脂礬、乳香、沒藥、各一錢五分。麝香、片腦、各少許。②地才。爲第二步去死肉之藥。白礬(煨)、五錢。雄黃、三錢。信石(煨過)、硃砂、各二錢。生硃砂、生脂礬、乳香、沒藥、各一錢五分。兒茶、血竭、輕粉、各五分。麝香、片腦、各少許。③人才。爲第三步去瘰肉生新肌之藥。白礬

(煨)、五錢。雄黃、三錢。赤石脂(煨)、兒茶、硃砂、各二錢。側砂(水炙乾)、一錢五分。麝香(煨)、乳香、沒藥、輕粉、血竭、各一錢。麝香、片腦、各少許。

制法及用法 研爲末。糯米糊爲錠子。如豆大。帶屑些。陰乾。又作藥線如麻黃樣。先用鐵線穿點頭令黑。次經此錠。膏藥貼上。三日一換。腐肉不盡出者。可更用下品錠子(三品錠子之一、見三品錠子條)。及鍼頭散。取盡腐肉。祇有膿汁不乾者。用生肌乾膿散搽傷口。膏藥貼上。如要生肌。速用生肌散搽傷口上。膏藥貼之。

【寸金丹】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治發背腦疽癰腫。附骨腫痛。煩渴發熱。肢重體熱。

藥品 麝香、一分。南乳香、烏金石、輕粉(一作硼砂)、雄黃、狗寶、沒藥、各一錢。蟾酥、二錢。粉霜、黃蠟、各三錢。礞砂、五錢。鯉魚膽、狗膽(並用)、各一個。全頭蜈蚣、七條(全者酥炙黃色)。頭胎男孩兒乳、一合。

制法及用法 研爲細末。將黃蠟、乳汁、熬成膏子。同藥和丸。如綠豆大。小兒丸如芥子大。每服一丸。病重者加三丸。

白丁香七個(研爛)。新汲水調下。勿令透風。如無頭瘡腫。三服立效。服藥後食白粥瓜瀝就睡。大妙。如口瘡。但幹咽牙關澀之立生。

【寸金散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治癰疽腫毒。

藥品 天花粉、三兩。赤芍、白芷、蒼黃、白芨、芙蓉葉、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每用薑汁三分。涼茶七分。調敷。未破者敷頭。已破敷四傍。神效。

【小金丹】

發明 見全生集方。

功用 治流注、痰核、瘰癧、乳岩、橫痃、貼骨疽、鱧頭等症。

藥品 白膠香、草烏頭、五寶脂、地龍、木鼈、各一兩五錢。乳香(去油)、沒藥(去油)、當歸身、各七錢五分。麝香、三錢。墨炭、一錢二分。

制法及用法 各研細末。用糯米粉一兩二錢。和爲糊。打干撻。融爲丸。如芡實大。每料約二百五十粒。每服一丸。陳酒送下。醉蓋取汗。如流注將潰及潰久者。每日服二丸。

【大黃散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治石癰腫硬疼痛。心腹煩悶。不得宣暢。

藥品 大黃、一兩(炒)。芒硝、黑豆皮、枳殼(去蘊炒)、各五錢。牛蒡子(微炒)、當歸、芍藥、各二錢五分。甘草(生剉)、五錢。

制法及用法 剉碎。分作三服。清水一盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。以利爲度。

【千槌膏】

方見神效千槌膏下。

四 筆

【太乙膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽潰爛。

藥品 玄參、白芷、當歸身、肉桂、赤芍藥、大黃、生地黃、各一兩。

制法及用法 咬咀。用麻油二斤八兩(一作一斤)浸。春五、夏三、秋七、冬十日。入銅鍋內煎至藥黑。濾去渣。徐入淨黃丹一斤(一作十二兩)。再煎不住手攪。滴水成珠。捏之軟硬得中。即成。內癰作丸服。

【太乙膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽。癰毒。金瘡。箭鏃傷。

藥品 白芷、蒼朮、石膏(酒炒)、白膠香、乳香、沒藥、黃丹、各五錢。

制法及用法 研爲末。用麻油四兩(桐油亦可)。先煎油。柳枝攪。次入白芷等。煎少頃。再入白膠香、石膏等同煎。試欲成球。再入黃蠟一兩。同煎片時。用生布濾過。瓦器收藏。以油單紙攤之。損傷敗瘡口。自然肉生不痛而愈。

【太乙膏】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治癰疽、瘡瘍。

藥品 生地黃、土木鼈、玄參、赤芍藥、大黃、白芷、當歸、各五錢。乳香、沒藥、各二錢。阿膠、一錢。輕粉、一錢五分。血餘、一團。肉桂、二錢五分。黃丹(水飛)、六兩五錢。

制法及用法 先將草用麻油一斤浸之。春五、夏三、秋七、冬十日。傾入鍋內。文武火熬至枯浮起爲度。住火片時。用布袋濾淨藥渣。將鍋展淨。入油鍋內。下血餘再熬。以柳枝挑看。俟血餘熬枯浮起。方爲熬熟。每淨油一斤。將炒過黃丹六兩五錢。徐徐投入。不住手攪。候鍋內先發青煙。後起白煙疊疊升起。其膏已成。將膏滴入水中試看。吹硬適中。下鍋。方

下阿魏。散膏瓦上化過。次下乳沒輕粉末攪勻。傾入水內。以柳木棍攪成一塊。攤貼。肺癰腸癰。即以此膏藥品爲丸服之。

【太乙膏】

發明 通行方。

功用 治一切癰疽。不論已潰未潰。

藥品 麻油、一斤。桐油、一斤。血餘、一兩。飛黃丹、十二兩。

制法及用法 先將麻油入鍋。煎數沸。再入桐油。血餘煎至焦枯。將油濾清。再下飛黃丹。以柳木棍不住手攪和。文火徐徐收膏。以滴水成珠視老嫩適度後置冷水中以退其熱。儲磁器內備用。隔水燉烊攤貼。

參考 本方較爲簡單。藥味雖少。用以掩貼防護。仍有防腐殺菌之力。

【五灰散】

發明 見沈氏尊生書。

功用 治一切痔。

藥品 鼈蹄甲（左懸者）、露蜂房、鼈甲、蠟皮、各五錢。蛇退、一條。

制法及用法 各燒存性爲末。每服二錢。入麝香少許。空腹時井水調下。

【五香散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治嶺南毒氣射工中人。暴腫生瘡。

藥品 甲香、薰陸香、丁香、沉香、青木香、黃連、黃芩、各四錢。黃蘗、六錢。犀角、羚羊角、鼈甲、牡蠣、升麻、甘草、烏翼、各四錢。吳茱萸、三錢。

制法及用法 治下篩。每服方寸匕。清水調下。每日二次。并以水和少許洗之。仍以雞子白和散塗瘡上。乾即易之。

【五通丸】

發明 見外科正宗方。

功用 治癰疽大瘡。生於緊要穴道勢將劇烈者。

藥品 廣木香、五靈脂、麻黃、乳香（去油）、沒藥（去油）、各等分。

制法及用法 各研極細末。再秤準研勻。用黃米飯搗爛。入末再搗爲丸。如梧桐子大。每服五錢。川芎、當歸、赤芍藥、連翹、生甘草、煎湯送下。如與三黃丸間服。更妙。

【五黃散】

發明 見上肯堂證治準繩方。

功用 療杖瘡。定痛。

藥品 黃丹、黃連、黃芩、黃蘗、大黃、乳香、各等分。

制法及用法 研爲細末。新

水調成膏。絹紙攤貼。每日三易。

【五寶丹】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治楊梅結毒體虛者。

藥品 鉛粉、三錢(銅杓內隔紙微火緩焙黃色、勿令焦黑)。珍珠(勿見火、另研)、滴乳粉(煨淨、取極細末)、琥珀(勿見火、另研)、硃砂(水飛)、各一錢。

制法及用法 杵勻。湯浸蒸餅爲丸。如綠豆大。分作七服。弱者分十服。每服用土茯苓四兩。煎湯送下。

【五寶散】

發明 見邵道人方。

功用 治楊梅結毒。

藥品 滴乳石、三錢。琥珀、辰砂、各二錢。大珍珠、五分。冰片、二分(一作各二錢)。毒在上部者。加川貝母、三錢。赤茯苓、牛膝、各一錢。在中部者。加赤茯苓、三錢。川貝母、牛膝、各一錢。在下部者。加牛膝、三錢。川貝母、赤茯苓、各一錢。

制法及用法 研爲細末。入飛白麴、四兩。研勻。每服三分(一作五分)。用土茯苓、一斤。拭去泥土。以木槌搥碎。入砂鍋內。用水十二碗。慢火煎至八碗。濾去渣。將藥篩下攪

勻。再煎二三沸取起。陸續一日服完。三次即愈。①鼻腐爛者。每服加靈山柴(煨)、鹿鼻血(陰乾)、月經布(女子前三日者、煨存性研細)、各三釐。一作加辛夷三錢。和勻煎服。三服後。鼻即長如故。②陰莖腐爛者。每服加靈山柴(煨)、羊腎血(陰乾)、月經布(女子前三日者、煨存性研細)、各三釐。或加牛黃、胎骨。和勻煎服。三日後莖長如故。如成漏而流清水者。加當歸、人參、淮芩。③毒瘡在上者。用桔梗、半錢。浸水煎土茯苓。在下者。用甘草半錢。浸水煎土茯苓。④虛極寒戰咬牙。肢體如冰者。加炮附子、三分。以身溫戰止爲率。不可過服。⑤疼痛不可忍者。加乳香、沒藥(去油)、各三釐。⑥輕粉之毒。深入骨髓筋骨痛者。本方中倍珍珠。加乳香、沒藥、各三釐。輕粉之毒。流入口內而噎氣者。加沉香、木香、各五釐。⑦服藥後。小便不利者。乃藥驅毒下行。可用百草霜、二錢。搗井水清晨服之。或豇豆湯亦可。⑧結毒在手足屈曲之處。愈後尚不能活動者。可再服一二劑。其筋自舒。

參考 此方具有搜絡解毒之

功效。服後須戒勞碌、房事、惱怒。忌食鷄、鵝、豬首、牛、羊、雞、犬、蟹、鱉、魚、蝦、豆腐、麵筋、糟物、海味、葱、蒜、韭、菹、芡、菱、蘿蔔、辛辣、鹹、酸、肥、甘、油膩、煎炒、炙烤、苦茶、醇酒、酪酥、胡椒、生薑等物(豬肉肝肺腰子、鴨可食)。犯之則皮膚傾陷。所長之鼻莖。從此又爛。雖再以前藥治之。亦不能如前之效速。犯食忌者尚可治。更宜節其飲食。適其寒溫。滌其思慮。使氣血調和。臟腑安寧。正氣漸盛。庶無變異之恐。

【五寶散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 生肌。

制法及用法 人指甲、五錢。用紅棗(去核)包甲。以長髮五錢。將棗捆紮。同象皮薄片五錢。放瓦上。炭火內炙融。成團存性。加麝香七分、上冰片三分。共研細如香灰。每用少許。摻於瘡上。

【五福化毒丹】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 涼心膈。治熱毒蘊積。謔語。頰赤。咽乾。口舌生瘡。頭面瘡癰。虛火實熱腫痛。

藥品 生地黃、熟地黃(焙)、各五兩(一作各二兩)。天門冬(去心)、麥門冬(去心焙)、各

三兩(一作各二兩)。甜硝(另研、一作三兩)、玄參(一作二兩)、甘草(一作三兩)、各二兩五錢。青黛(另研)、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。拌勻。煉蜜和丸。如雞頭實大。每服半丸或一丸。食後熱湯化下。

參考 此爲生血涼血解毒寒中之劑。形寒俱實者宜之。但一二丸即止。不可過劑。否則反傷元氣。變證不測矣。

【內托散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治腫諸毒惡瘡。

藥品 大黃、牡蠣、各五錢。瓜蒌、二枚。甘草、三錢。

制法及用法 剉散。每服三錢。清水一大碗。煎至七分。去渣溫服。

【內消散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治癰疽結硬疼痛。

藥品 人參(去蘆)、瞿麥、白蘇、升麻、當歸(微炒)、黃芩、防風、黃耆(剉)、沉香、甘草(生剉)、各一兩。赤小豆(煮熟)、一合。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒送下。

【內消散】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治癰疽。發背。對口。疔瘡。乳癰。一切無名腫毒。惡瘡。

藥品 金銀花、知母、貝母、天花粉、乳香、半夏(製)、白芷、穿山甲、皂角刺、各一錢。一方無金銀花。

制法及用法 水酒各一碗。煎至八分。隨病上下。食前後服。留藥渣搗爛。加秋芙蓉葉一兩。研爲細末。再加白蜜五匙。用渣調敷瘡上。一宿即消。重者再用一服。能令癰疽內消。毒氣內化。從小便而出。勢大者雖不全消。亦可有轉重爲輕。移深居淺之效。

【內消散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治藕色毒。

藥品 皂角刺、七個。穿山甲(炒黃)、羚羊角(炒)、川大黃(俱爲末)、金銀花、天花粉、厚朴、各一錢。桃仁、四十九粒。乳香、一錢。

制法及用法 水一碗。先將金銀花、角刺、厚朴、花粉、桃仁五味。煎六分。調末服。未成膿即消。已膿從大便出。

【內消散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治一切癰疽。便毒。

藥品 大黃、三錢。金銀花、一錢。當歸尾(酒製)、一錢五分。木鼈干(去殼)、赤芍藥、白芷、乳香、沒藥、皂角刺、僵蠶、瓜蒌仁、天花粉、各一錢。甘草節、五分。穿山甲、三片(蛤粉炒)。

制法及用法 酒水煎服。初起即消。已腫即潰。血從大便出。

參考 此方與仙方活命飲略同。

【木香散】

發明 見張元素病機氣宜保命集。

功用 治小兒斑後生癰。

藥品 大香、五錢。麝香、一字。地骨皮、一兩。穿山甲(炙黃)、一錢五分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。米飲調下。

【木通散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治頸下結癰。欲成癰者。

藥品 木通、松蘿、桂心、蛤蚧(酥炙)、白蘗、琥珀、海藻(洗)、昆布(洗)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。

【水銀膏】

功用 療癰瘡。

藥品 水銀、銀硃、黃丹、無名異、百草霜、各等分。

制法及用法 除水銀銀硃外。均研爲極細末。和勻。用桐油調成膏。油紙攤作兩紙膏貼之。其油紙須先用黃連、炭、煎湯刷數遍。然後攤貼。

【水澄膏】

發明 見祕方。

功用 圍敷腫毒。

藥品 鬱金、白蘇、白芨、五倍子、各一兩。乳香、雄黃、各五錢。

制法及用法 研爲細末。清水調敷。如熱極者。用蠟水尤妙。

【水調膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽毒熱。赤嫩疼痛。

藥品 生大黃、杏仁（去皮尖）、鹽花、各三分。

制法及用法 研爲細末。令勻。新汲水和調。稀稠得所。每用少許。塗於腫上。乾即易之。

【不二散】

發明 見拔萃方。

功用 拔毒。去腐。治手足患毒。橫紋區處。並蛇頭眼腹等證。

藥品 牡蠣蛭、八錢（曬乾生

研）。雄精、四錢。

制法及用法 共研細末。同雄豬膽汁調和。敷患上。或生指頭。將藥入豬膽套在指上。如乾加膽汁。立刻止痛。套三四次即貴。潰後搽藥膏蓋。即拔膿去腐。再上生肌桃花八寶散收功。忌開刀。開即翻花。綿延難愈。灸即痛苦異常。萬勿用升降拔提之藥。倘誤用致橫肉疔空腫脹。實難收口。初起用飛龍奪命丹一二服汗之。汗之未愈。內宜服仙方活命飲外。用此收神效。

【丹砂膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽。

藥品 丹砂（細研）、射干、大黃（剉炒）、犀角屑、前胡（去蘆）、升麻、芍藥、沉香、木香、黃芩（去黑心）、各一兩。生地黃、二兩。麝香、一錢二分五釐（研）。豬脂、二斤八兩。

制法及用法 除丹砂、麝香、豬脂外。剉碎。醋五合。和勻浸一宿。先熬脂令沸。次下諸藥煎。候地黃至赤黑色。以綿絞去滓。入丹砂、麝香末、以柳篦攪勻。瓷盒盛之。每用少許。敷於患處。日三五次。再用藥如棗大。溫酒調。空腹日午服。或溫水調下半匙。

【升麻膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療疔瘡。頑瘡。癰疽。瘰癧。痰核。

藥品 升麻、二十兩。

制法及用法 用麻油五斤。浸一宿。煎枯去渣。慢火熬至滴水不散。入飛淨黃丹二十四兩。收成膏。塗患處。未成自消。已潰自斂。

【牛黃散】

發明 見太平聖惠方。

功用 療口瘡。

藥品 牛黃、白龍腦、硃砂、各一分。鉛霜、五錢。太陰玄精石、一兩。一方無牛黃、白龍腦、硃砂。有玄明粉。

制法及用法 研爲細末。先於腫處以鍼鍼刺出血。鹽湯洗拭。然後搽藥。

【月白珍珠散】

發明 見陳寶功外科正宗。

功用 治潰瘍新肉已生而無皮。及湯火傷痛。下疳腐痛。

藥品 青缸花、五分。輕粉、一兩。珍珠、一錢。

制法及用法 研爲末。撒之。下疳腐爛。豬脊髓調搽。

五 筆

【立消散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治腫瘍。

藥品 飛黃、二錢二分。穿山甲、三錢。生大黃(錦紋者)、芙蓉葉、五倍子(炒)、各五錢。

制法及用法 共研極細末。適時調敷。中留一孔透氣。如乾久擦。不過十次自消。

【立消散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治百會疽。

藥品 龍膽草、鑒本、西牛黃、白芷、地骨皮、雄黃、金銀花藤、各等分。

制法及用法 共研極細末。生酒調敷。中留一孔。透氣自消。

【立消散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治便毒腫。

藥品 全蠍(炒)、核桃(去殼肉、只用隔膜、炒)、各等分。

制法及用法 研爲末。每服三錢。空腹時溫酒調下。下午再服。三日全愈。

【立消散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治腫瘍。

藥品 生地黄、龍膽草、紫樹、防風、荊芥穗、槐花、骨木香、各等分。

制法及用法 酒水同煎。熱服。取汗。輕可立消。重者二

劑。如已成將潰禁服。瘡在上部加升麻。下部加牛膝。

【立效散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治癰疽、瘰癧。

藥品 皂角刺、八兩(炒赤)。粉草、二兩。黃瓜蔓、五個(連皮研碎)。乳香(去油、另研)、沒藥(去油、另研)、各一兩。

制法及用法 每服一兩。黃酒煎服。

【立應散】

發明 見郭氏方。

功用 治金瘡血出不止。及諸瘡久不生肌。

藥品 寒水石(煨)、一兩五錢。花蕊石、龍骨、黃丹、沒藥、各五錢。黃藥子、七錢五分。一方加白芨、乳香、輕粉。

制法及用法 研爲細末。如一切金刃刀鎌傷者。用藥敷上。絹帛繫之。不作膿。血瘡膿水。乾貼生肌定疼。

【立馬回疔丹】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治疔瘡走黃。

藥品 金脚信、蟾酥、血竭、硃砂、沒藥、各五分。輕粉、龍腦、麝香、各一字。

制法及用法 研爲細末。生草烏頭汁和作錠。如麥子大。先將瘡頂刺破。將藥一錠放瘡

口內。第二日瘡腫是效。

【立馬回疔丹】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治疔瘡。

藥品 輕粉、蟾酥(酒化)、白丁香、硃砂、各一錢。乳香(去油)、六分。雄黃(一作二錢)、硃砂(一作二錢)、麝香(一作五分)、各三分。蜈蚣、一條(炙)。金頂砒、五分。

制法及用法 研爲細末。麪糊搓如麥子大。先以針挑破。用一粒插入孔內。外以膏蓋。追出膿血疔根爲效。

【生肌散】

(附生肌八寶丹)

發明 見陳自明外科精要方。

功用 療癰疽瘡瘍潰後不斂。

藥品 寒水石(碎)、滑石(飛)、烏鰂骨、龍骨、各一兩。定粉、密陀僧、白礬灰、乾胭脂、各五錢。

制法及用法 研爲細末。乾摻之。

參考 按生肌散之名。見於各書上者甚多。功用大半相同。藥品大同小異。茲一一錄下。就各方面便利設想。以第七方爲適用。編者任沙市國藥管理

研究委員會委員兼研究組長時。曾與諸同道。將沙市國藥。整理一次。規定的生肌散。是以熟甘石、一兩。輕粉、二錢。赤石脂、五錢。龍骨、五錢。正梅片、一錢。黃丹、一錢。熟石膏、一兩。製乳沒、五錢。共研極細末。每月少許。撒患處。亦最適用。又據秦伯未張贊臣合編之丸散膏丹手冊所載驗方生肌八寶丹。是以煨石膏、一兩。赤石脂、一兩。輕粉、一兩。東丹、三錢。龍骨、三錢。血竭、三錢。製乳香、製沒藥、各三錢。各取淨末混和。研極細粉。搽患處。用膏藥掩貼。與編者所規定的。無甚出入。皆可適用。

【生肌散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 療癰疽瘡瘍潰後不斂。

藥品 乳香、沒藥、各一兩。海螵蛸(水煮)、五錢。黃丹(炒飛)、四錢。赤石脂(煨淨)、七錢。龍骨(煨淨)、四錢。血竭、三錢。熊膽、四錢。輕粉、五錢。梅冰片、一錢。麝香、八分。珍珠、二錢(另研)。

制法及用法 研爲極細末。鉛罐收貯。早晚搽二次。上用膏藥蓋之。

【生肌散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療癰疽瘡瘍潰後不斂。

藥品 白礬(枯)、檳榔、各一兩。黃丹、血竭、各一錢。輕粉、五分。密陀僧、一錢五分。

制法及用法 研爲極細末。貼於瘡口。

【生肌散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療癰疽瘡瘍潰後不斂。

藥品 人參、西牛黃、珍珠、琥珀、熊膽、乳香(去油)、沒藥(去油)、各二錢。煨甘石(煨)、海螵蛸、龍骨、石膏(煨)、輕粉、各五錢。杭粉、二兩。

制法及用法 共研細末。入冰片五分。再研干下。瓷瓶密貯。每用少許。搽於患上。收口如神。

【生肌散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療癰疽瘡瘍潰後不斂。

藥品 珍珠(生研)、冰片、各二分。象皮(切方塊、瓦灰拌炒)、白蠟、各一錢。乳香(簍上烘燥)、爪兒血竭、沒藥(簍上烘燥)、鉛粉、各五分。輕粉(真掃盆者)、四分。兒茶、三分。

制法及用法 共研極細。先

以猪蹄湯或農茶洗淨。用少許搽之。

【生肌散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療癰疽瘡瘍潰後不斂。

藥品 紅升丹、一錢。血竭、海螵蛸、象皮(煨焦)、黃丹、輕粉、各三錢。赤石脂、兒茶、紫河車(煨)、各五錢。乳香(去油)、沒藥(去油)、各二錢。

制法及用法 共研極細。搽瘡上貼之。瘡口紅熱。加珍珠二錢。瘡口寒白。加肉桂二錢。瘡口虛陷。加人參二錢。

【生肌散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療癰疽瘡瘍潰後不斂。

藥品 生石膏、赤石脂、輕粉、各一兩。滴乳香(去油)、一錢。胡桐、八兒血竭、龍骨、各三錢。

制法及用法 共研極細。先用當歸、白芷、甘草、各一錢。煎湯洗淨患處。再用此乾搽。輕油紙蓋紮。二日一洗換。

【生肌散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療癰疽瘡瘍潰後不斂。

藥品 輕粉、一錢。血竭、兒

茶、各一錢。自死螺螄、十個(連泥者、煨)。

制法及用法 共研極細。加冰片一分。收貯。每用少許。男用女乳女用男乳調搽。三次全愈。

【生肌散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療癰疽瘡瘍潰後不斂。

藥品 白螺螄殼(多年乾東土牆上者)。

制法及用法 以清水浸透。淘去泥沙。傾入銀罐內。炭火煨紅。冷定。研細如霜。加冰片搽瘡上貼之。

【生肌散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療癰疽瘡瘍潰後不斂。

藥品 鮮鹿腿骨(紙包、炭火內煨至黃脆爲度)。

制法及用法 研極細。搽瘡上。生肌甚速。

【生肌散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療癰疽瘡瘍潰後不斂。

藥品 木香、二錢。黃丹、枯礬、各五錢。輕粉、二錢。

制法及用法 各另研細末。用豬膽汁拌勻曬乾。再研細搽

患處。

參考 此方重在解毒去腐搜膿。而稱為生肌者。毒去腐盡。則肉自生也。

【生地黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰腫熱毒疼痛。心神煩悶。

藥品 生地黃、二兩。川大黃(剉碎炒)、川升麻、地骨皮、當歸(剉、微炒)、黃芩、木通、赤芍藥、黃耆、玄參、生甘草、各一兩。赤茯苓、一兩五錢。

制法及用法 爲散。每服四錢。清水一中盞。加竹葉二七片。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【生肌桃花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 生肌。

藥品 輕粉、血竭、密陀僧、乾胭脂、各一錢。

制法及用法 研爲細末。每用少許。乾摻瘡上。仍以膏藥貼之。

【生乾地黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡煩悶。

藥品 生乾地黃、白芷、當歸(炒)、桃仁(去皮尖雙仁、炒)、續斷、黃芩、赤芍藥、羚羊角屑、甘草(炙)、各一兩。芍藥、

朴心、各三分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前溫酒調下。一日三四次。

【生熟地黃丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治惡癰。

藥品 熟地黃(九蒸九曬)、生地黃(酒洗)、各三兩。柏子仁(去殼、隔紙炒)、丹參(酒蒸)、當歸(酒蒸)、白芍藥(酒炒)、各二兩。牡丹皮(酒蒸)、乾山藥(乳蒸)、白茯苓(乳蒸)、各一兩五錢。澤瀉(鹽水蒸)、一兩。敗龜版(童便浸去鹽、炙酥、研爲極細末)、遠志肉(甘草水泡透)、各四兩。

制法及用法 研爲細末。用金銀石斛四兩。金銀花十二兩。熬膏。和煉蜜搗丸。每服四錢。早晨淡鹽湯送下。

【玉紅膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

藥品 川椒、一兩(另研末篩細)。松香、八兩(用好醋加葱頭打碎、或取汁同煮)。黃丹、三兩。枯礬、二兩五錢。輕粉、七錢五分。

制法及用法 共研爲末。先以豬肉湯洗淨。茶調塗。

【玉紅膏】

發明 驗方。

功用 生肌。長肉。收口。治一切瘡口。發背。對口入骨。腐去孔深。洞見臟腑者。

藥品 當歸、二兩。紫草、二錢。白芷、五錢。甘草、一兩二錢。

制法及用法 用麻油一斤。浸五日。煎至藥枯。漚淨渣。將油再熬至滴水成珠。下血竭細末四錢。攪勻。再下白礬二兩。溶化。微冷。再下輕粉四錢。待成膏。蓋好。放水中三日。候至一日夜亦可用。拔去火氣。息火愈佳。用新棉花蘸塗之。

參考 此與醫宗金鑑方之生肌玉紅膏分兩製法均相同。在已潰流膿時先用甘草湯。甚者用豬蹄湯淋洗患處。輾絹拭淨。用物挑膏。於掌中捺化。遍搽新肉上。外以太乙膏蓋之。大瘡洗換二次。內服大補氣血之藥。新肉即生。瘡口自斂。爲外科收斂之神藥。

【玉容丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治雀斑。酒刺。皮膚粗糙。

藥品 甘松、明天麻、蔓本、北細辛、白蘇、白僵蠶、防風、白樹仁、川椒、白芷、荊芥、密陀僧、山茶、枯白礬、白芨、檀香

末、羌活、甘菊花、獨活、各一錢。紅棗、七枚。

制法及用法 共研細末。用鹿皂角、去淨弦膜一斤。同地作丸。如秋冬加生蜜五錢。如皮膚粗糙。加牛黃三錢。早晚洗之。

【玉容粉】

發明 驗方。

功用 治雀斑。酒刺。肺風。酒糟鼻。及面上一切斑點。

藥品 綠豆、一升。荷花瓣、二兩(曬乾)。滑石、白芷、白附子、各五錢。冰片、密陀僧、各二錢。

制法及用法 共研細末。早晚洗面擦之。

【玉容散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治雀斑。紅腫。

藥品 白牽牛、圓粉、白蘇、白細辛、甘松、白礬、白芨、白蓮蕊、白芷、白朮、白附子、白茯苓、白丁香、白附子、密陀僧、白扁豆、各一兩。防風、荊芥、獨活、羌活、各五錢。

制法及用法 研爲末。每用少許。放手心內。以水調濃。擦塗面上。良久再以水洗面。早晚日用二次。

【白玉膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療疔瘡及一切瘡。

藥品 白芷、煨甘石(煨)、甘松、當歸尾、乳香(去油)、五靈脂、三奈、北細辛、樟冰、各五錢。沒藥(去油)、象皮、白蠟、各三錢。松香、冰片、麝香、各一錢。鉛粉、十三兩。

制法及用法 先將麻油二斤。熬至煙起。離火。入白蠟、松香。又熬。不住手攪。看有大泡。便將鉛粉陸續下。但滾即取起。稍停又入火。如此數次。見有菊花紋小泡。便入前諸藥末。仍取起。滴水成珠。入冰麝攪勻。待凝定。傾水兩三盞。入罐收貯。攤貼之。

【白玉膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療多年頑癰。及毒瘡久不收口。

制法及用法 用白蠟二兩。豬板油四兩。熔化濾清。入潮腦六錢。研勻。冷定。加輕粉三錢。冰片二錢。和勻。紙上挑冷油紙蓋上。貼於患處。

【白玉膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 拔毒。提膿。生肌。收口。療一切瘡瘍、熱癰。

藥品 活鱧魚、六兩。白芷、穿山甲、木鼈子、象貝母、當歸、各一兩五錢。

制法及用法 用麻油二斤四兩。煎枯去渣。濾清。後再熬。滴水成珠。候冷。加鉛粉十二兩。收微膏後。入白芷二兩。掃盆三錢。乳香一兩。沒藥一兩。研細末。一同收入。貼之。陰疽忌用。

【白玉膏】

發明 通行方。

功用 治毒瘡腐爛。久不收口。

藥品 木鼈子、二兩。蓖麻子肉、二兩。巴豆、一兩。白芷、二兩。乳香(製)、五錢。丹皮、一兩。金銀花、二兩。天花粉、三兩。白蠟、五錢。沒藥(製)、五錢。赤芍、一兩。大黃、一兩。象貝母、二兩。鮮鳳仙花根葉、三斤。輕粉、三錢。鉛粉、七斤半。鮮鱧魚、八兩。鮮大力子根葉、三斤。麻油、十五斤。

制法及用法 除鉛粉、輕粉、沒藥、乳香、均研細粉外。將餘藥浸入麻油內三五日。隨後煎熬至藥枯。濾清俟冷。再加藥粉。用文火徐徐攪勻。至滴水成珠爲度。攤紙上。敷貼患處。不可入口。

【白金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒攻注。遍身熱

瘡。痛出黃水。

藥品 桂府滑石。

制法及用法 研爲細末。另用虎杖、甘草、豌豆、各等分。清水二碗。煎至一碗。去滓。微熱淋洗患處。水冷拭乾。將藥末搽上便睡。至醒可愈。

【白降丹】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治癰疽。發背。疔毒。

藥品 硃砂、雄黃(水飛)、各二錢(一作各三錢)。水銀、一兩(一作二兩五錢)。硼砂、五錢(一方用硃砂)。火硝、食鹽、皂礬、皂礬、各一兩五錢(一作各二兩五錢)。

制法及用法 先以硃砂、雄黃、硼砂、研爲細末。入鹽、礬、硝、皂、水銀、共研勻。以水銀不見星爲度。用陽城罐一個。放微炭火上、徐徐起藥。入罐化盡。微火逼令乾。取出(如火太乾、則汞走、如不乾、則藥倒下無用)。再用一陽城罐、合上。用棉紙裁半寸寬。將罐子泥、草鞋灰、光粉。研細以鹽鹵汁調極溼。一層泥。一層紙。糊合口四五重。及糊有藥罐上二三重。地下挖一小坑。用飯碗盛水放坑底。將無藥罐放碗內。以瓦揆坑口四邊鋪滿。不令炭灰落碗內。有藥罐上以生

炭火蓋之。不可有空處。煉時罐上如有絲煙起。急用筆蘸鹽泥固之。約三炷香。去火冷定。開看。約有一兩以外之藥。刮下研細。瓷瓶密貯。①瘡大者每用五六釐。小者一二釐。清水調塗瘡頭上。初起即起泡消散。成膿者即潰。腐者即脫。其妙在不假刀砭。一伏時便見功效。②如陰疽根脚走散。瘡頭平陷。即用七八釐、或分許。水調搽於瘡頭堅硬處。次日即轉紅活。③如瘡毒內膿已成。久不穿潰。只須留一小頭者。可用棉紙一塊。量瘡大小剪一孔。以水調貼瘡上。然後調降藥點放紙孔內。揭去紙。以膏貼之。則所降之頭。不致過大。若瘡小藥大。反令掀及良肉。④此丹可點鼻瘡。耳挺。斑痣。惟初生小兒。及婦女頭面皮肉嬌嫩。不可多用。否則必致漫腫貽患。⑤楊梅瘡初起。用此點之。可拔毒外出。惟此藥追蝕毒氣。必至病根方止。所以點後。疼痛非常。若內膿已脹。皮殼不厚。點之便不十分痛楚。如用蠟酥化汁調之。則其疼稍減。⑥凡癰疽以紅升丹提膿。兼用珍珠散收口。每見升提過甚。瘡口四邊起硬。亦有瘡口新肉高凸者。不如用陳白降丹

(火氣退盡)少許。同珍珠攷用之。不但西週瘡口平坦。又且不留餘毒。⑤新煉出白降丹研細。用玄色緞五寸。將藥篩勻其上。捲緊。以麻線捆紮。放瓦鉢內。清水煮。約一伏時內換水三次。將緞卷取起。掛風處陰乾。然後打開。以鷄翎掃下。裝瓶收貯。用治癰疽。並無痛楚。

【白膏藥】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治杖痕瘰癧。

藥品 光粉、一兩。甘草(煨、水淨飛過)、白石脂(煨)、龍骨、乳香、沒藥、楓香、樟腦、水銀、麝香、片腦、各一錢。黃蠟、五錢。白蠟、豬油、一兩五錢。

制法及用法 研爲末。先熔蠟。次入油。和勻。候冷。調末攪勻。油紙攤貼。瘰癧作薄紙膏貼之。

【白膏藥】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治諸瘡腫毒。潰破流膿。

藥品 巴豆肉、十二兩。蓖麻子、十二兩(去殼)。香油、三斤。蝦蟆、五個(各啣人髮一團)。活鯽魚、十尾。

制法及用法 先將巴豆肉、蓖麻子、入油內浸三日。再將

蝦蟆浸一宿。臨熬時入活鯽魚。共燥焦。去渣滓。慢火熬油。滴水成珠。離火。傾於淨鍋內。再加官粉二斤八兩。乳香末五錢。不時攪之。冷定爲度。重湯燉化。薄紙攤貼。

【白膏藥】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 療一切無名腫毒。及小兒胎毒。黃水溼瘡。

藥品 煨甘石(以輕能浮水者佳)。

制法及用法 炭火內燒三五炷香久。研末攤地上一日。冷透火氣。生硫磺油和勻。搗融攤貼。

【白薇散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡。煩渴疼痛。不眠。

藥品 白薇、枳實(欬炒)、辛夷仁、瓜蒌根、赤芍藥、甘草(炙)、各一兩。酸漿仁(微炒)、二兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前溫酒調下。每日三四次。

【白礬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治甲疽。

藥品 白礬、石膽、各五錢。麝香、麒麟竭、朱紅、各一分。

制法及用法 先以白礬、石脂、於鐵器內。以炭火煅過。入後三味。同研令細。每用少許。乾摻瘡上。以帛纏定。每日兩三度換之。

【白花蛇丸】

發明 見李時珍本草綱目。

功用 治楊梅瘡毒。

藥品 白花蛇肉(酒炙)、龜版(酥炙)、寒山甲(炙)、露蜂房(炙)、傾粉、硃砂、各一錢。

制法及用法 研爲末。紅棗肉和丸。如梧桐子大。每服七丸。冷茶送下。每日三次。忌食魚肉。宜先服發散藥。後服此方。再服土茯苓藥以調之。

【白花蛇酒】

發明 見瀕湖集方。

功用 治中風傷酒。半身不遂。口目喎斜。膚肉癢痹。骨節疼痛。惡瘡癰疽。

藥品 白花蛇肉、一條(酒洗浸透、去骨刺、取肉四兩)。羌活、當歸身、天麻、秦艽、五加皮、各二兩。防風、一兩。

制法及用法 剉碎和勻。以生絹袋盛之。入金華酒壺內。懸起安置。入糯米生酒醅五壺。浸袋簍葉密封。安壺於大鍋內。水煮一日。取起。埋陰地七日。取出。每服一二杯。仍以渣曬乾碾末。酒糊爲丸。如梧桐子

大。每服五十丸。或溫酒送下。忌見風。犯慾。及魚、羊、鵝、麵、發風之物。

【白膠香散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 療諸瘡。

藥品 白膠香、赤石脂、枯礬、各五錢。黃丹(淘)、乳香、沒藥、輕粉、各二錢。

制法及用法 共研細末。溼瘡乾摻。乾則香油調敷。如有膿水。再加輕粉一錢。

【玄參散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治懸壘痛不下食。

藥品 玄參、一兩。升麻、射干、大黃、各五錢。甘草、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。清水煎至七分。放溫。時時含嚥。

【玄參散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽瘰癧腫疼痛。

藥品 玄參、芒硝、大黃(微炒)、犀角屑、羚羊角屑、沉香、木香、黃芩、各一兩。生甘草、七錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫水調下。

【四聖丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治癰疽生於腦髑背腋孔。及腸癰、便毒。

藥品 黃瓜萐、一枚(生去皮、乾者二枚)。甘草、四錢(研末)。沒藥、三錢(研末)。乳香、一錢(研末)。

制法及用法 以好紅酒二大碗。慢火煎至一碗。分兩服。兩日服盡。若病在上。食後服。病在下。食前服。毒已結成。膿即化爲水。毒未成。即從小便而出。疾甚者再服。以退爲度。

【四聖散】

發明 見陳言三因極一病證方論。

功用 治肺癰。

藥品 桔梗、一兩。甘草(炙)、二兩。

制法及用法 每服四錢。清水煎服。

【瓜萐散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治便毒等惡瘡。

藥品 瓜萐、一枚。金銀花、牛蒡子(炒)、各三錢。生薑、甘草、各五錢。

制法及用法 不犯銅鐵器。搗碎。用酒一大升。煎數沸。空腹時溫服。

【瓜萐散】

發明 見沈金鑠沈氏尊生書。

功用 治男子乳癰。

藥品 瓜萐仁、青皮、各一錢。石膏、二錢。金銀花、甘草、沒藥、當歸尾、皂角刺、各五分。

制法及用法 水酒各半煎。青橘葉打汁二匙沖。空腹時服。未潰者即散。已潰者去石膏、沒藥、皂角刺、金銀花。將當歸尾換當歸身。加入參、黃耆、川芎、白芍藥。

【瓜萐散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治癰疽大毒。乳癰。及一切無名惡證。

藥品 南瓜蒂(陳年且老者佳)。

制法及用法 燒成炭。每服少許。溫酒沖下。再用麻油調敷。乳癰每服一箇。重者四五次立愈。

【石灰散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治一切瘡毒。及跌打損傷。

藥品 石灰(陳一年者、愈陳愈妙)、韭菜、各等分。

制法及用法 於端午日午時。或六月六日。同搗極爛爲

餅。陰乾。凡遇瘡毒。乾敷油調均可。

【石南散】

發明 見方賢奇效良方。

功用 治熱瘡。及諸風。

藥品 石南葉(醋炙)、山芋、姜蕤(剉)、天雄(炮去皮脊)、升麻、各一兩。黃耆(剉)、生桃花、菊花(未開者、炒)、甘草、各五錢。生石膏(另研)、一兩。珍珠(另研)、二錢五分。山茱萸(去核)、一兩五錢。丹砂、二錢五分(另研、仍與珍珠石膏末一處、同研極細)。

制法及用法 研爲細末。入另研藥。更研令勻。每服一錢。漸加至二錢。空腹時溫酒調下。

【加味太乙膏】

發明 見陳賈功外科正宗。

功用 治五損。七傷。遺精。帶下。瘰一切癰疽。膿瘡。諸毒。瘰癧流注。風溼偏身走注作痛。血風癩癧。湯火燒。刀傷棒毒。

藥品 白芷、當歸、赤芍藥、元參、肉桂、大黃、木鼈子、生地黃、各二兩。黃丹(水飛)、二斤八兩。血餘、一兩。乳香、五錢。輕粉、四錢(研不見星)。阿魏(切薄片)、沒藥、各三錢。柳枝、槐枝、各一百寸。

制法及用法 將白芷、當歸、

赤芍、元參、肉桂、大黃、木鼈子、生地黃八味。併柳槐枝。以麻油五斤。將藥浸入油內。煮五日。夏三日。秋七日。冬十日。入大鍋內。慢火熬至藥枯淨起爲度。住火片時。用布袋濾淨藥渣。將油秤準。再用細舊絹濾油入鍋內。須清淨爲佳。投入血餘。慢火熬至血餘淨起。以柳枝挑看。似膏熔化爲度。每淨油一斤。入黃丹六兩五錢(夏秋亢熱時、再加黃丹五錢)。徐徐投下。火漸加大。不住手攪。候鍋內先發青煙。候至白煙疊疊旋起。氣味香襲。膏已成。即住火。滴水中試輕硬。如老、加藥油。稀、加炒丹。務使老嫩得宜。候煙盡。撥下鍋來。下阿魏片、撒膏上。化盡。次下乳香、沒藥、輕粉、攪勻。傾入水中。以柳棍攪成一塊。再換冷水浸片時。乘溫。每膏八兩。扯拔百轉成塊。又換冷水。浸半日許。用時取一塊。銅杓內烊化。攤貼患處。遺精、白帶。并貼臍下。腸癰。爲丸服亦可。

【外科蟾酥丸】

發明 見陳賈功外科正宗。

功用 治疔瘡發背。腦疽乳癰。附骨等症。

藥品 蟾酥(酒化)、二錢。輕

粉、五分。枯礬、寒水石(煨)、銅綠、乳香(去油)、沒藥(去油)、膽礬、麝香、各一錢。雄黃、二錢。蝸牛、二十一個。硃砂、三錢。

制法及用法 各爲末。秤準。於端午日午時。在淨室中。先將蝸牛研爛。再同蟾酥和研稠黏。方入各藥。共搗極勻。丸如綠豆大。每服三丸。用葱白五寸。患者自嚼爛如泥。吐於手心(男左、女右)。將藥丸包在葱泥內。用無灰熱酒一茶鍾送下。被蓋約人行五六里許。出汗爲效。甚者再進一服。

參考 此方即飛龍奪命丹加枯礬去冰片、血竭、蜈蚣也。功用當然相同。

六 筆

【地黃煎】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻瘡風熱瘡癢痛不止。

藥品 生地黃汁、生薑汁、各一合。苦參、一兩(剉)。酥、三合。鹽花、二錢(後入)。

制法及用法 先以地黃汁、生薑汁、浸苦參一宿。酥和。於銅石器中煎。九上九下。至半却入鹽花。候汁入酥盡。去滓。傾入盒中。每用少許。滴於瘡

上。

【地黃膏】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治損傷及一切癰腫未破者。

藥品 生地(搗膏)、木香(研末)。

制法及用法 以膏隨腫大小攤紙上。搽木香末一層。再加攤膏。貼患處。不過三五換即愈。

【如神散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治凍瘡潰爛。

藥品 川大黃、不拘多少。

制法及用法 研爲細末。新水調搽凍破瘡上。痛止立效。

【如神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡血出不止。及久患惡瘡。

藥品 虎骨(炙)、鉛丹(火煨令赤)、龍骨、各五錢。乳香、一粒(如皂子大、另研)。膩粉、丹砂、各一錢。麝香、少許(另研)。

制法及用法 研爲極細末。和勻。一切瘡。先以黃連湯或鹽湯洗拭乾。搽藥在瘡上。不得衣黏着瘡口。

【如聖餅】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治流注。及一切瘡瘍硬腫。不能消散。或潰而不斂。

藥品 乳香、沒藥、木香、血竭、當歸、各等分。麝香、少許(一作減半)。

制法及用法 研爲末。酒煮米糲和餅。炙熱熨患處。惡瘡加蟾酥等分。

【托裏散】

發明 祿方。

功用 治一應瘡毒。始終常服。不致內陷。

藥品 大瓜蒌、一枚(杵)。當歸(酒拌)、黃耆(鹽水拌炒)、甘草、白芍藥、各一兩五錢。皂角刺(炒)、金銀花、天花粉、熟地黃(用生者、酒拌入瓷器蒸半日)、各一兩。

制法及用法 研爲粗末。無灰酒五茶鍾。和藥五兩。入瓷器內。厚紙封口。再用油紙重封。置湯鍋內煮。用蓋覆之。煮至藥香取出。分服。直至瘡愈。

參考 此方藥品平易。而消壅之功甚大。且不動臟腑。不傷氣血。不問陰陽腫潰。屢用屢效。若發背癰疽勢盛者。更隔蒜灸。脈沉實而二便秘者。先疏通而後用此。至大毒已退。不作膿或不潰者。亦宜。惟潰而不斂及膿清者。方宜峻補。

【托裏散】

發明 見李東垣方。

功用 治一切惡瘡。發背。疔疽。便毒。脈洪弦實數。腫甚欲作膿者。

藥品 大黃、牡蠣(煨)、瓜蒌根、皂角刺、朴硝、連翹(去心)、各三錢(一作各六分)。當歸、金銀花、各一錢(一作各二錢)。赤芍藥、黃芩、各二錢(一作各四分)。

制法及用法 研爲粗末。每服五錢。水酒各半。煎至八分。去渣服。三服消盡。

參考 此爲足厥陰太陰陽明三經之藥。

【托裏散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治一切瘡腫。發背疔瘡。

藥品 黃耆、一兩五錢。厚朴、防風、桔梗、各二兩。連翹、二兩二錢。廣木香、沒藥、各三錢(一作各五錢)。乳香、二錢(一作五錢)。當歸、五錢。川芎(一作二兩)、白芷、沒藥、官桂、人參、甘草節、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。黃酒一大盞。煎二三沸。和滓溫服。

【回生丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治癰疽。發背。諸毒。一切惡瘡。

藥品 五倍子 (整個大者)、一枚。

制法及用法 去一角。入上好銀硃。不拘多少。再用銀箔糊住角口。放銅勺內。微火慢焙。煙絕爲度。研細末。放地下出火氣。用雞蛋清調末。務要多摻勻濃。其藥稍乾。即以雞翎或硬筆蘸藥敷瘡。自腫處由外往裏。周圍敷之。留瘡口。一連三四次。住疼消散如神。破後敷之亦妙。

【回陽玉龍膏】

發羽 見陳實功外科正宗。

功用 治陰症。癰疽。發背。陰瘡不發熱。不作膿。及寒濕流注。鼓椎風久損痛。冷痺風濕。脚氣。鶴膝風。足頑麻痺。婦人冷血風諸陰症。

藥品 草烏頭、三兩(炒)。南星、一兩(煨)。軍薑、二兩(煨、一作三兩、炒)。白芷、一兩(不見火)。赤芍藥、一兩(炒、一作三兩)。肉桂、五錢(不見火)。

制法及用法 研爲細末。隨症熱酒調敷。①發背 發於陰。又爲寒藥所誤。或發於陽。而因寒藥變陰。滿背黑爛者。先用洪寶丹。敷四圍好肉上。中間以此藥敷之。一夜陽氣回。

黑者皆紅。察其紅活。即住。再以沖和仙膏收功。如不效。欲作膿者。以沖和膏加南星、草烏、用之。陽已回。黑已紅。惟中間一點黑爛不能紅者。蓋血已死。可以朴硝、明礬。或白丁香、硃砂、乳香。用唾調勻。於黑紅交處作一圈。上用沖和膏蓋之。至明晨起藥。黑肉即去。再以藥洗之。加以生肌合口藥收功。②流注 冷症。多附骨內。硬不消。骨寒而痛。筋縮不伸。若輕用刀鍼。並無膿血。止有乳汁清流。或有瘀血。宜用此藥敷之。若稍緩祇以軍薑、白芷、肉桂、草烏、各等分(或加木鱉。但不可多用、以其能解葷性也)。熱酒調敷。③鼓椎風。傷寒餘毒。或起於流注之壞疔。或起於風溼虛痹。未破。肌肉尙未死者。急以此藥熱酒調敷膝肘骨上腿處。又以沖和膏塗下腿冷處。復以此藥敷臑骨交處。內服追風丸。倍加乳香以伸筋。如欲此毒出者。可用五積散。加薑、桂、芍、歸、川芎、牛膝、枳殼、木瓜。或茶或酒調敷。④久患冷痺血風。手足頑麻。不能舉動。用綿紙夾帶此藥於中。作長片纏在痛處。絹袋繫定。能除骨痛。皮膚上覺如蟻緣。是其效也。如痹。

加丁香、吳茱萸、沒藥、川烏、各等分。內服追風丸。夾裏夾攻。去病如神。⑤風脚痛不可忍。內服追風丸。外以此藥。加生薑、薑汁、熱酒敷之。或加乳香、沒藥。熱酒調敷。可立止痛。⑥久損人骨。因墮壓跌撲折傷。死血在傷處不能流通。久則如鷄脚之附肋。若老年血衰。遇風寒雨濕。其病遂發。宜外以此藥熱酒調敷。內服搜風止痛丸。⑦石癰用此藥熱酒調敷。外再用洪寶丹箍住四週。使成膿易破。⑧婦人乳癰初起時。宜於此方中。用南星、薑汁、酒調勻熱敷。即消。欲速再佐以草烏。如已成癰腫。則從沖和膏法治之。或加草烏、南星、亦可。如已潰破。則因於寒者。用沖和膏收功。因於熱者。用洪寶丹生肌。且須用乳香、沒藥、止痛。以減其苦。內服栝蒌散。即栝蒌實、乳香、隨人虛實。參以通順散（即首烏、當歸、木通、赤芍、白芷、茴香、烏藥、枳殼、甘草、各等分、一名榮衛返魂湯）。十宣散（即人參、黃芪、當歸、川芎、厚朴、防風、桔梗、白芷、肉桂、甘草）相間服之。⑨宿痰失道、癰腫無膿者。以此膏點頭。病必旁出。如元陽虛耗敗症者。急以全藥

敷之。拔出成膿。病回即止。不可過用。內服通順散。加桔梗、半夏、當歸、肉桂、之屬。⑩凡氣血潮聚。趨熱避寒。多爲內癰。不能外現。間有微影欲出。而爲寒藥所觸。急以此藥拔出。作成外癰。以沖和膏收功。內服通順散加忍冬、牛膝。若自能外現者。僅用沖和膏可矣。不必輕試刀鍼。如犯鐵器。口不能合。以此藥貼癰頭上。四面圍以沖和膏。依法自破。若膿生不快者。以洪寶丹三分。生薑汁七分。茶調敷之。膿盡後。以十宣散平補生肌。外用沖和膏收功。此症陰多陽少。損人最甚。將愈之際。宜倍服內補之劑。以生氣血。既愈之後。尤宜多服。並加附子。症冷者。則於未破之先。預服附子。既破之後。切不可用急澀斂口之藥。忌食毒物。孕婦患此者。先與紫蘇飲安胎。勿輕服他藥。若臨月則兒與膿俱下。若尚遠則膿自大腸中下。癰在外面。其症熱者。用沖和膏。但須審輕重。庶免誤治。

參考 此方爲治陰寒外症之要劑。方中用軍薑、肉桂、以熱血生血。然既生既熱。而不能散。反以爲害。故佐草烏、南星、以破惡氣。驅風毒。活死

肌。除胃痛。消結塊。喚陽氣。又加赤芍、白芷、以散滯血。止痛生肌。加以酒行藥性。宣散陰毒。追回陽氣。大有殊功。故以爲名。

【百效丸】

發明 見金茂存方。

功用 治一切大毒惡瘡已潰未潰。

藥品 草烏頭(酒浸半日、刮去皮、切片炒)、馬前子(切薄片、炒黃色、篩去毛淨)、全當歸(切片、酒拌曬乾炒)、麻黃(去節、不見火、曬脆)、直隰蠶(酒洗炒、去絲)、穿山甲(沙炒、去沙)、各一兩。大甘草(不見火、曬乾研)、五錢。

制法及用法 研細。蔥汁熬湯。水泛爲丸。如芥子大。曬乾。瓷瓶密貯。高年者。每服五六分。中年者七八分。少年者三分。孕婦忌服。俱用蔥汁白湯送下。避風取汗。如出汗後。必須次日辰巳時方可起牀見風。如不遵戒守。汗出見風。則手足堅硬。凡犯此者。即用甘草末酒調服即解。

【至寶丹】

發明 見顯世澄瘍醫大全。

功用 治癰疽、腫毒、發背、對口、乳癰、結毒、危險諸證。

藥品 白朮(用豆腐一塊、厚

二寸、中挖一孔、納朮孔中、以豆腐蓋砒、酒煮三個時辰)、豬牙皂(去皮、酥炙)、乳香(去油)、熊膽、銅絲(水飛)、荆芥穗(去梗)、直隰蠶、穿山甲(炒)、血竭、膽礬、川烏、草烏(同川烏酒浸、剝去皮、麵包煨熟、取淨肉用)、沒藥(去油)、全蠍(石灰水洗、去頭足尾、瓦上焙乾)、蟬蛻(去頭足)、雄黃、各二錢。麝香、七分。硃砂(水飛)、三錢五分。蜈蚣、五條(大者、酒蒸、去足瓦焙、小者加倍)。

制法及用法 研極細末。飛麵打糊爲丸。每丸重四分。再用硃砂、三錢五分爲衣。黃蠟作殼收藏。用蔥頭三寸。生薑三片。黃酒煎一小鐘。將藥化開服。隨量飲醉。被蓋出汗。至重者二三服。

七 錄

【夾紙膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治癰疽。腐爛臭穢。痛癢不時。

藥品 黃丹(炒)、輕粉、兒茶、沒藥、雄黃、血竭、五倍子(炒)、銀硃、枯礬、各等分。

制法及用法 研爲末。量瘡大小。剪油紙二張。夾藥於內。紙周圍用麵糊黏住。紙上用鍼

刺孔。先將瘡口用葱椒煎湯。洗淨拭乾。然後貼上。以帛縛之。三日一洗。再換新藥貼之。

【夾紙膏】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治癰瘡腐爛臭穢。痛癢不時。

藥品 樟腦、三錢。銅綠、一錢。

制法及用法 用豬板油和藥搗爛。以油紙夾之。貼患處。一二日翻轉貼。三四日膿盡而愈。如四日後膿尚未盡。再換一紙。無不愈。

【夾紙膏】

功用 治癰瘡腐爛。臭穢。痛癢不時。

藥品 乳香、沒藥、各六錢。洋樟、四錢。爐甘石(製)、二錢。當歸、一兩。輕粉、五錢。白占、六兩。黃占、五兩。豬油、四斤。

制法及用法 將豬油二占同烊化。後和入前藥末。攪勻。用白皮紙拖之。陰乾。用時將膏以鍼刺密孔貼之。一日一換。

參考 夾紙膏有數種。此近時通行方也。

【赤石脂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 止痛。生肌。治癰子磨破成瘡。

藥品 赤石脂(細研)、黃蘗(去粗皮剉)、臘茶末、各五錢。白麵、二兩。龍腦、五分(另研)。

制法及用法 研爲細末。和勻。用綿搥撲之。

【何首烏丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治膝窩瘡。

藥品 何首烏、四兩。荊芥、威靈仙、防風、蔓荊子(炒)、車前子(炒)、甘草(炙)、各二兩。

制法及用法 研細。水泛藥丸。如梧桐子大。每服一錢五分。早晚淡酒送下。

【沒藥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治白口瘡。

藥品 沒藥、乳香、雄黃、各一錢。輕粉、五分。巴豆霜、少許。

制法及用法 爲末摻之。

【牡丹散】

發明 見許叔微類証普濟本事方。

功用 治肺癰。

藥品 牡丹皮、赤芍藥(一作一錢)、地榆、苦桔梗(一作一錢)、薏苡仁、川升麻(一作一錢)、黃芩、生甘草(一作一錢)、

各一錢五分。一方有敗醬、一錢。

制法及用法 清水二鍾。煎至一鍾。食遠服。

【牡丹散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡。箭頭在骨。遠年不出。

藥品 牡丹皮(去心)、白蘇、各一兩。桑白皮、二兩。藿香葉、丁香、麝香、各一分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。溫酒調下。一日三次。淺者十日。深者二十日。箭頭自出。

【牡蠣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療疔疽。

藥品 牡蠣頭(煨)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。研鹽花酒調下。一日三次。

【完肌散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡。

藥品 陳石灰、二兩。黃丹、五錢。龍骨、密陀僧、桑白皮、各四兩。麝香、一錢(另研)。

制法及用法 研爲細末。乾搽患處。

【完肌散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 生肌。長肉。

藥品 定粉、枯礬、黃連、乳香、龍骨、各二錢。黃丹、輕粉、各一錢。

制法及用法 研爲極細末。貼瘡上。

【阜英丸】

發明 見全醫要略。

功用 治肺癰初起。咳逆上氣。喉濁。

藥品 阜英、八兩(刮去皮、酥炙)。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大(一作棗肉和丸、如綠豆大)。每服三丸。棗膏和湯送下(一作每四五丸、桔梗湯送下)。日三次。

參考 此方治胸中痰積。膠結不解。或咳或喘。或痞或癰者宜之。故痰有固而不拔之勢。非此不足以開其壅塞。滌其汙垢。又以棗膏安其胃氣。祛中不離養正之法。來庭膏千縉湯等方之祖也。

【沉香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治潰瘍有餘熱。

藥品 沉香(剉)、柴胡(去苗)、黃耆、麥門冬(去心)、各一兩。白朮、七錢五分。熟地黃、二兩。黃芩、桔梗根、生甘草、各五錢。

制法及用法 剉散。每服四錢。清水一中盞。加竹葉、二十七片。小麥、五十粒。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【車螯散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽發背初起腫痛。

藥品 車螯、一雙(鹽泥固濟、火煨通紅、地上出火毒用)。輕粉、甘草、各二錢。大黃、五錢。黃芩、漏蘆(去鬚)、瓜根、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服二錢。薄荷湯調下。速利酒亦可。熱除爲度。

【坎宮錠】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治熱毒諸瘡。腫痛掀赤。痔瘡。

藥品 京墨、一兩。胡黃連、二錢。熊膽、三錢。麝香、五分。兒茶、二錢。冰片、七分。牛黃、三分。

制法及用法 研爲末。用豬膽汁爲君。加生薑汁、大黃(水浸取汁)、醋、各少許。和藥杵成錠。用涼水磨濃。以筆蘸塗之。

【沖和膏】

發明 見赤水玄珠方。

功用 行氣。疎風。活血。

定痛。散瘀。消腫。祛冷。輭堅。治偏正頭風。眼痛。癰疽流注。經絡中陰陽不和。一切外症之凝滯皮膚間者。

藥品 紫荊皮(炒)、五兩。獨活、三兩(去節炒、一作一兩五錢)。赤芍藥(炒)、二兩。白芷、一兩(曬乾、切忌火炒、一作三兩)。石菖蒲、一兩(曬乾、切忌火炒、一作一兩五錢)。

制法及用法 研爲細末。葱頭煎濃湯。或熱酒調塗。不必留頭。一日一換。以消腫不痛爲度。①如病熱勢極盛者。可倍加紫荊皮、石菖蒲。少用餘藥。亦能消散。如係寒症。則微加赤芍、獨活。亦能活血。雖消散之功較遲。而不壞病。②熱勢盛者。只可用葱泡湯、調熱敷(葱能散氣、血得熱則行、故熱敷也)。至熱勢稍減。再用酒調(酒能生血、過熱則血愈生、酒又能行血、溫則血愈行)。③熱勢盛者。不可使用涼藥。緣熱盛則氣血瘀會必多。火涼。則血退不撤。返凝於涼。故亦溫涼相半用之。血得溫則動。挾涼則散。可用此方加對停洪宮丹。葱湯調塗。④瘡口有赤肉突出者。因著水、或著風、或刀破後、刀口翻突之故。宜於此方中稍加南星以去風。用蠶

汁酒調敷。其不消者。必係誤以手按出膿核太重。又以寒敷藥涼透皮膚所致。若投以熱藥。則愈糜爛。宜用白礬、枯朴硝、爲末敷之。次用硫磺末搽之、內服營衛加對金飲。外貼此膏。

⑤瘡面有血泡成小瘡。不可用石菖蒲。恐因性黏之故。於去藥時皮膚受痛。宜用四味先敷。後用石菖蒲蓋在上面。覆過四圍。以截助攻之血路。(凡敷藥皆須熱敷。乾則又以原湯溼透之。使藥性溼蒸而行。其病自退。)⑥如用此方。而四面黑暈不退。瘡口全無血色者。是曾用寒性敷藥太過之故。不可使用玉龍膏。蓋肌未死。恐藥力緊添痛苦也。宜於此方加肉桂、當歸、以喚起死血。俟黑暈退而血回。便除加藥。但以此方取效。⑦如用此方而痛不住者。可取酒化乳香、沒藥、於火上使熔。然後將此酒調藥熱塗。其痛即止。

參考 此方爲治發背流注之第一妙藥。凡外症都由氣血凝滯而成。遇溫即行。遇涼即停。行則散。停則滯。方中紫荊皮、能破氣逐血消腫。獨活、能止風引氣。動蕩凝滯血脈。散骨中冷痛。去麻痺溼。赤芍、能生血活血。散瘀除痛。石菖蒲、

善破堅硬。生血止痛。祛風消腫。白芷、能去風生肌。定痛養血。蓋血生則肌肉不死。血動則經絡流通。故肌活不致潰爛。絡通不致癰腫。風去則血自散。氣行則硬可消。而毒亦自消。五者交治。則病痛自瘳。流毒骨疽冷症。用之尤效。

八 筆

【乳香丸】

發明 見土肯堂證治準繩。

功用 治發背一切疽瘡。潰爛痛不可忍。

藥品 乳香(另研)、沒藥(另研)、羌活、五靈脂、獨活、各三錢。川芎、當歸、綠豆粉、炙牡桂、川白芷、白膠香、各五錢。

制法及用法 研爲細末。陳蜜和丸。如彈子大。每服一丸。細嚼。薄荷煎湯送下。手足損痛不能起者。加草烏。用木瓜鹽湯送下。

【乳香散】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治瘡口大者。

藥品 乳香、沒藥、各五錢。寒水石(煨)、滑石、各一兩。腦子、少許。

制法及用法 研細和勻。每用少許。摻瘡口上。

【乳香散】

發明 見齊德之外科精義。

功用 治杖瘡。

藥品 乳香(去油)、沒藥(去油)、各三錢。自然銅(醋淬七次、一作二錢)、當歸、各五錢。茴香、四錢。

制法及用法 研爲細末。每服五錢。溫酒調下。

【乳香散】

發明 見郭氏方。

功用 治疔瘡、癰瘡、踝瘡、頑瘡。

藥品 乳香、沒藥、黃丹、各三錢。枯礬、白膠香、赤石脂、各五錢。輕粉、二錢。

制法及用法 研爲細末。加麝香、少許。如瘡溼乾上。乾則香油調敷。

【乳香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治赤口瘡。

藥品 乳香、沒藥、各一錢。白礬、五分。銅綠、少許。

制法及用法 研爲細末。搽之。

【乳香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治遠年惡瘡。

藥品 乳香、膩粉、各五分。黃蘗(去粗皮)、龍骨、大黃(剉)、各三錢。麝香、一字。

制法及用法 研爲細末。先以苦竹漚洗瘡。拭乾搽藥。

【乳香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治杖瘡腫痛。

藥品 乳香(另研)、沒藥(另研)、各一錢。大黃、黃連、黃蘗、黃芩、各三錢。片腦、少許。

制法及用法 研爲細末。和勻。冷水調。攤緋絹上貼之。

【乳香膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡杖瘡。

藥品 乳香、沒藥、川芎、自然銅、各七錢。當歸、羌活、獨活、川牛膝、石膏、劉寄奴、黑牽牛、黃蘗皮、破故紙、白膠香、生地黃、熟地黃、赤芍藥、白芍藥、紫金皮、黃丹、白芷、各五錢。黃蠟、一兩。清油、四兩。

制法及用法 除膠香丹蠟外。餘研爲末。入油內煎。以柳枝不住手攪。試將成膏。却入三味。更試成膏。以生布濾淨。瓦器盛水。傾在水中。用筴攤開。貼於瘡孔。深者搽成膏條。穿入孔中。如作熱者。加輕粉、片腦、朴硝。入膏內貼之。

【乳香膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸瘡痛。

藥品 乳香、一兩(另研)。食蠟、松脂、杏仁(去皮尖、研)、各一兩五錢。生地黄、十三合。白羊脂、八兩。黃蠟、三兩。

制法及用法 先熬羊脂令沸。下杏仁地黄汁蠟煎。候蠟熔盡。入香鹽松脂煎。以柳枝攪勻。稀稠得所。瓷盒盛之。取塗瘡上。每日二三度。

【乳香止痛散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘡腫疼痛。

藥品 乳香、沒藥、各一兩。藥殼、六兩(製)。白芷、三兩。陳皮、甘草(炙)、各一兩五錢。丁香、五錢。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一盞半。煎服。

【乳香定痛散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切癰疽傷損。潰爛疼痛。

藥品 乳香(去油)、沒藥(去油)、各五錢。滑石、一兩。冰片、一錢。一方多寒水石、一兩。一方有寒水石。無滑石。

制法及用法 研爲細末。葱汁調搽。其痛即止。若加南星、半夏。能止痛。更加蓖麻仁則尤佳。

【兒茶散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治下疳疔瘡。

制法及用法 銅絲、不拘多少。煅紅。放地上。冷定。又煅又冷定。研細。加兒茶等分。和勻。洗淨搽之。

【金花散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 去腐。生肌。治一切癰瘍、瘡毒、爛腿、腫瘡。連年不愈。臭爛不盡。

藥品 熟石膏、一斤(研極細)。黃丹(飛淨)、一兩。

制法及用法 和勻。再篩再研。用香油調搽。上蓋油紙。一日一換。不可用茶水洗。如有膿水流開。隨用藥敷水流之處。以免爛肉。若婦女一見月信。雖愈復發。發後再搽。自有功效。

【金花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 解毒。治惡瘡熱盛癢痛。作渴煩躁。

藥品 辰砂(另研)、白茯苓(去皮)、人參(去蘆)、甘草、各七錢五分(一作各三錢)。綠豆粉、四兩(研)。白豆蔻、朴硝(另研)、各五錢。雄黃(研)、腦子(研)、麝香(研)、各二錢五分(一作各一錢)。

制法及用法 共研爲末。和勻。每服一錢五分。不拘時搽。

湯調下。

【金黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 消毒。止痛。治天泡瘡。

藥品 滑石、甘草。

制法及用法 各研爲末。和勻。敷患處。如泡挑去。水敷之。加黃蘗尤佳。

【金黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰毒。令內消。

藥品 白芷、白芨、白蘞、各等分。

制法及用法 研爲細末。新汲水調敷。

【金傷散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡血出不止。及落馬打傷。肉綻血出。

藥品 白芨、白蘞、乳香、各一兩。石灰、八兩(遠年者佳)。龍骨、五錢。黃丹、少許。

制法及用法 研爲細末。入黃丹研如淡紅色。乾摻患處。上用糝紙並絹帛裹護。忌風水。乾血爲妙。

【金傷散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 辟風。生肌。止痛。治金瘡。

藥品 白芨、黃丹、陳石灰

(風化)、桑白皮、各二兩。龍骨、南星、白附子、各一兩。

制法及用法 研爲細末。乾貼之。

【金傷散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治金瘡。

制法及用法 端午日早朝使四人各出四方。採草木莖葉各半把。至午時入石灰一斤。同搗極爛。鑿大桑木二三株作孔。納藥竇築。以桑皮蔽之。油調石灰密塗。勿令泄氣。更以桑皮填周。至九月九日午時取出。陰乾百日。搗雜爲末。每用少許。摻之神效。

【金銀散】

發明 驗方。

功用 治惡瘡極癢。

藥品 硫磺、一兩。

制法及用法 入銅器內、在燈火上熔化(切忌放龜火及火爐上)。加頂上銀珠五錢。攪勻、離火。倒油紙上。候冷。研極細。如香灰細。不細敷之作痛。好醋調敷。其癢即止。如破爛孔內癢極者。用白蜜調敷。

【金箍散】

發明 見吳近宸方。

功用 治一切癰疽火毒。無名腫痛。

藥品 生大黃、三柰、生南星、薑黃、白半夏、各四兩。白芨、人中白、白芷、天花粉、各三兩。草河車、一兩。

制法及用法 共爲細末。黃蜜調敷。如紅白色者。米醋調敷。

【金箍散】

發明 見丁振字方。

功用 治一切大毒。

藥品 膽礬、硼砂、水銀、明雄黃、黑鉛、各二錢。

制法及用法 端午日修合。研爲細末。如不黏。加飛麵六錢。火酒調敷。

【金箍散】

發明 見馬氏方。

功用 治一切癰疽。發背。腦疽。疔毒。痰毒。無名腫毒。不論未成已成。未潰已潰。陰證陽證。

藥品 五倍子(炒黃)、白芷、各四兩。川烏頭、草烏頭、天南星、黃蘗、半夏、甘草、狼毒、各二兩。陳小粉(炒黃)、一斤。

制法及用法 各研細末。和勻。細絹羅篩。瓷罐收貯。勿令泄氣。未潰用葱汁蜜糖調敷。將潰及已潰。用陳醋蜜糖調敷。如皮破碎者。用紅茶蜜糖調敷。未成即消。已成即潰。已潰敷於膏藥四圍。能束住瘡

根。不致散漫。

【金銀花露】

功用 其性甘平無毒。功能開胃。寬中。養血。清火。散暑。解毒。止渴。稀痘。治溫熱痧症。癰疽。梅毒。血痢。小兒胎毒。熱毒諸瘡。痘疹。制汞毒。氣芬郁而味甘。即忍冬花蒸取之露也。鮮花蒸者。其香尤甚。爲清火解毒之良品。暑月用以代茶。則無瘡毒。

【金黃如意散】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治癰疽。發背。疔腫。跌撲損傷。溼痰流毒。大頭時腫。漆瘡。火丹。風熱天泡。肌膚赤腫。乾溼脚氣。婦女乳癰。小兒丹毒。

藥品 天南星、甘草、陳皮、厚朴、蒼朮、各二斤。大黃、黃蘗(一作五錢)、白芷、薑黃、各五斤。天花粉、十斤。

制法及用法 咀片曬乾。磨三次。用細絹羅篩。貯瓷罐。勿泄氣。引調法如下。①紅赤腫痛。發熱未成膿者。及夏月時。俱用茶清同蜜調敷。②欲作膿者。用葱湯同蜜調敷。③漫腫無頭。皮色不變。溼痰流毒。附骨癰疽。鶴膝風等症。俱用葱酒煎調敷。④風熱所及。皮膚亢熱。色亮遊走不定。俱

用蜜水調敷。⑤天泡火丹。亦遊丹。黃水漆瘡。惡血攻注等症。俱用大藍根葉。搗汁調敷。加蜜亦可。⑥湯癰變皮膚破爛。麻油調敷。

【拔毒散】

發明 秘方。

功用 治一切癰疽腫毒。

藥品 乳香、沒藥、穿山甲(炮)、當歸、木鼈子、各一錢。瓜蒌實、八錢。甘草(炙)、五分。忍冬藤、二錢。牙皂角(炒)、七分。大黃(生熟)、各一錢五分。連翹、一錢。貝母、七分。

制法及用法 研爲細末。酒水各一盅。煎至一盅。食前服。

參考 此爲攻毒止痛化膿之良劑。若有膿或已潰者。大黃不可用。恐泄其真氣。則膿者難潰。潰者難斂也。亦有膿雖潰。脈仍洪數。或沉實喜冷者。火邪尚在。又所宜用。

【拔毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸惡瘡。消腫。去毒。

藥品 天花粉、無名異、黃蘗、黃芩、木鼈子、大黃、牡蠣、各等分。

制法及用法 研爲細末。好醋調敷。

【拔毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽腫毒。能散能潰。

藥品 天南星(上等大白者)、一兩。草烏頭、白芷、各五錢。木鼈子仁、一個。

制法及用法 研爲細末。分兩次用。將醋入蜜調。敷紗貼之。

【拔毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疔瘡。

藥品 蜈蚣、一條(炙)。鹽白霜、粉霜、膽礬、礞砂(另研)、各一錢。

制法及用法 研爲末。和勻。先用羊骨鍼挑破頭。點藥在上。醋糊紙貼上。其根一時自出。

【拔毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱毒丹腫。遊走不定。

藥品 生石膏、寒水石、各四兩。黃蘗、甘草、各一兩。

制法及用法 研爲細末。新汲水調搗。芭蕉汁尤佳。或紙花子小貼。涼水潤之。

【拔毒膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腫毒。

藥品 馬齒莧(杵汁)、豬膏

脂、石蜜。

制法及用法 共熬爲膏。塗之。

【拔毒膏】

發明 見沈金鰲 沈氏尊生書。

功用 拔膿。長肉。

藥品 蓖麻子肉、銅青、各一兩(同研)。大蘗汁、一碗。豆油、春夏三兩。秋冬四兩。松香、一斤(水煎濾淨)。

制法及用法 先將油煎滾。入松香熔化。下大蘗汁、沸水。盡下水缸內。如絞糖法。入蓖麻、銅青、攪勻。以器盛之。重湯煮化。攤貼。

【芙蓉膏】

發明 見張秀峯方。

功用 治發背癰疽。痛如錐挖不可忍者。

藥品 芙蓉葉、黃荆子、各等分。

制法及用法 研細末。鍋子清調揉四圓。留頂。中間如煙霧起立效。用於未潰之先。將潰之際並效。

【芙蓉膏】

發明 見顧世澄 醫大全。

功用 治陽毒紅瘰。收根。束毒。

藥品 芙蓉葉(秋採)、六錢。榆麵、二兩。生大黃、五錢。皮

硝、一兩。

制法及用法 研細。蔥汁童便調敷留頂。初起敷之可消。不特收束根脚。

【芙蓉膏】

發明 見顧世澄 醫大全。

功用 治乳癰。發背。癰疽。拔根。止痛。斂口。

制法及用法 芙蓉花搗如泥。若無花取根。用竹刀刮去粗皮。只用內嫩白皮。搗如泥。入蜜少許調勻。如未穿即敷四圍。中留一孔透氣。如已潰即填入瘡口。其膿血自然湧出。候膿盡。再上乾膿收。

【返魂丹】

發明 見沙圖穆蘇瑞竹堂經驗方。

功用 治十三種疔。

藥品 硃砂、膽礬、各一兩五錢。血竭、銅綠、蝸牛、雄黃、枯白礬、各一兩。輕粉、沒藥、蟾酥、各五錢。麝香、少許。

制法及用法 將蝸牛、蟾酥、研爛。餘藥研爲細末。同研和丸。如鷄頭大。每服一丸。先嚼潔白三寸。吐在手心。將藥丸裝在潔白內。製酒一盞吞下。如重車行五里許。有汗出即瘥。如不能嚼葱。以湯裏下極效。

【返魂丹】

發明 見王肯堂 證治準繩。

功用 癰疽疔腫。毒氣入
隔者。

藥品 乳香、沒藥、辰砂、雄
黃、各一錢五分。輕粉、片腦、
麝香、各五分。海羊、不拘多
少。蟾酥、青黛、粉草、硼砂、各
一錢。一方加銅綠、寒水石、輕
粉、枯礬、各一錢。

制法及用法 研爲細末。用
海羊搗膏爲丸(如雞丸、加酒麵
糊些少)。如彈子大。每服一
丸。兼生葱頭二三個。細嚼嚥
下。得微汗即解。

【返魂丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治時毒。瘴氣。疔瘡。
惡瘡。

藥品 硃砂、雄黃、血竭、黃
丹、穿山甲(炮)、枯白礬、銅青、
乳香、沒藥、輕粉、蟾酥、各一
錢。麝香、二分五釐。

制法及用法 研爲末。酒煮
麵糊和丸。如胡椒大。每服二
丸。葱白一根。嚼爛裹丸。溫
酒吞下。

【狗寶丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治癰疽發背諸毒。初
起肝熱煩渴者。

藥品 狗寶、一兩。黑狗膽
(臘月者)、鯉魚膽(臘月者)、各
一枚。蟾酥、二錢。蜈蚣(炙)、

七條。硃砂、乳香、沒藥、輕粉、
雄黃、烏金石、各一錢。粉霜、
三錢。麝香、一分。

制法及用法 爲末。月首生
男兒乳一合。黃蠟三枚。熬藥
和丸。如綠豆大。每服一丸或
三丸。以白丁香七枚研。調新
汲水送下。暖臥取汗。食後白
粥補之。

【狗寶丸】

發明 見通玄論方。

功用 治赤疔瘡。

藥品 狗寶、八分。蟾酥、龍
腦、各二錢。麝香、一錢。

制法及用法 爲末。好酒和
丸。如麻子大。每服三丸。生
葱三寸同嚼細。用熱葱酒送下。
暖臥取汗。後服 流氣 追毒藥。
貼拔毒膏取愈。

【附子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治冷瘡疼痛。

藥品 附子、五錢(炮去皮
膽)。川椒(去目)、雄黃(細研)、
各二錢五分。白礬、七錢五分
(火煨另研)。膩粉(另研)、二
錢。

制法及用法 研爲細末。和
勻。清麻油調敷。

【定血散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡。止血定痛。生

肌收口。

藥品 密陀僧、八兩。烏賊魚骨、龍骨、枯白礬、各二兩。桑白皮、一斤。黃丹、一兩。

制法及用法 研爲細末。每用少許。乾摻患處。定血如神。

【青金錠】

發明 見郭氏方。

功用 治潰瘍。

藥品 銅綠、三錢。青礬、膽礬、輕粉、砒霜、白丁香、苦葶藶、各一錢。腦子、麝香、各少許。

制法及用法 將葶藶研細。次下各藥。同研極細。打稠糊爲錠。或煉蜜加白芨末一錢。爲錠。如麻黃粗細。約二三寸長。視瘡口深淺紐入。疼者可治。不疼難治。

【阿魏化堅膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治失榮。

藥品 蟾酥丸藥末一料。金頭蜈蚣、五條(炙黃去頭足共研勻)。太乙膏、二十四兩。

制法及用法 先將膏重湯炖化。離火。入前藥末。搗冷爲度。用時以重湯炖化。用紅絹攤貼。半月一換。輕者漸消。重者亦可少解。沿貼可保不致翻花。

九 筆

【珍珠散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治外症潰爛不長肉。

藥品 珍珠(煅淨)、一錢。煅甘石(製如絳雪膏法、淨)、八兩。琥珀(淨末)、七分。龍骨(煅、水飛淨)、四分。赤石脂(煅、水飛淨)、四分。鍾乳石(甘草湯煮一伏時、水飛、淨)、六分。硃砂(水飛淨)、五分。麒麟竭、二分。象皮(焙乾爲末)、五分。

制法及用法 研令極細。每一錢入冰片、二分。和勻。敷上立長。

【珍珠散】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 清熱、除痰、去腐、治疳瘡。

藥品 珍珠、黃連、黃蘗、定粉、輕粉、象牙、五倍子(炒)、兒茶、沒藥、乳香、各等分。

制法及用法 研極細末。先以米泔水洗患處。再撒此藥。

【珍珠生肌散】

發明 見徐氏方。

功用 生肌。結皮。平口。治外症膿毒已盡。

藥品 珍珠、一錢(人乳浸三日、夏天須每日換乳、珠寶質

最堅、尤宜研極細、如飛麵)。血竭、兒茶、各五分。石膏(煨)、一錢。爐甘石、一錢(以黃連五分煎汁、煨淨、研極細、水飛淨)。赤石脂(煨)、一錢。蠶絲吐頭(陳者煨存性)、五分。冰片、一分二釐。

制法及用法 各研極細末。和勻再研。瓷瓶收貯。勿令洩氣。每用少許。摻於患處。

【紅玉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸瘡。

藥品 煆石膏(煨)、五錢。黃丹(炒)、一錢五分。

制法及用法 研極細末貼之。

【紅玉膏】

發明 見駱氏和濟生方。

功用 治癰疽。瘰癧。乳癰。

藥品 乳香(另研)、沒藥(另研)、各二兩。蓖麻子仁、四百粒。木鼈子(去殼)、二兩四錢。當歸、四兩。血餘、五錢。兒茶、血竭、白蠟、黃蠟、各一錢。嫩柳枝、一兩(打碎)。黃丹(飛)、四兩。麻油、八兩。芸香(白嫩者)、一斤四兩。

制法及用法 先將麻油同柳枝、當歸、血餘、熬數滾。絞去渣。將油同芸香、蓖麻、木鼈、熬熟。絞去渣。入黃白蠟。將成膏。

入黃丹。離火。下乳、沒、兒、竭末。攪勻成膏。每用少許。貼於患處。

【紅玉膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 拔毒。去膿。

藥品 蛇蛻、蜈蚣、各一條。頭髮(洗去油垢)、黃蠟、各二兩。香油、四兩。

制法及用法 同熬濾清。用黃丹收膏。再下黃蠟。熔化。攤貼瘡上。

【紅升丹】

發明 見醫宗金鑑。

功用 拔毒。去腐。生肌。長肉。治一切瘡瘍潰後。瘡口堅硬。肉黯紫黑。

藥品 硃砂、雄黃、各五錢。水銀、二錢(一作一兩、一作二兩)。火硝、四兩。白礬、一兩(一作二兩)。皂礬、六錢。

制法及用法 先將二礬、火硝、研碎。入大鍋杓內加火酒一小杯。炖化。一乾即取起。研細。另將汞硃雄研細。至不見星爲度。再入硝礬末、研勻。先將陽城罐。用紙筋泥搪一紙厚。陰乾。常輕輕撲之。不使生裂紋(搪泥、罐子泥亦可用)。如有裂紋、以罐子泥補之。極乾再曬。無裂紋。方入前藥在內。罐口以鐵油蓋蓋定。加鐵

梁蓋。上下用鐵線繫緊。用棉紙擦條蘸蜜。周圍塞罐口縫間。外用熟石膏細末。醋調封固。蓋上加炭火二塊。使蓋熱。罐口封固。易乾。用火釘三根。釘地下。將罐子放釘上。罐底下置堅大炭火一塊。外砌百眼爐。升三炷香。第一炷香用路火（如火大則承先飛上）。第二炷香。用大半罐火。以筆蘸水擦蓋。第三炷香。火平罐口。用扇扇之。頻頻擦蓋勿令乾（乾則承先飛上）。三香完。去火冷定。開看方氣足。蓋上約有六七錢。刮下研極細。瓷罐盛用。再預以鹽漬汁調罐子稀泥。用筆蘸泥水掃罐口周圍。勿令洩氣。如陽城罐上有綠煙起。即承走也。急以筆蘸鹽泥。多多刷在出煙之處。封固爲要（一法收貯瓶內、以蠟封口、埋土中、去燥性）。每用少許。鷄翎掃上。立時紅活。如小毒。用骨簪。挑藥上瘡口上。癰疽口面大者。用小羅篩挑藥於內。以手輕輕彈之均勻。俱要上到。如有管。可用爛飯和丹擦成細條。陰乾。量瘡深淺取用。插入瘡管內。以膏貼之。其管自化。

【紅膏藥】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治杖瘡。癰瘡。

藥品 黃丹（飛炒）、二兩。乳香、沒藥、兒茶、血竭、硃砂、樟腦、水銀、各一錢。麝香、片腦、各一分。黃蠟、水牛油、豬油、各一兩。

制法及用法 研爲末。先以黃蠟熔化。次入油和勻。候冷。再入藥末攪勻。油紙攤貼。癰瘡作隔紙膏貼之。

【紅膏藥】

發明 通行方。

功用 治熱癰疔毒。初起未潰者。以此消散。

藥品 蓖麻子肉、一兩。樟腦、一兩。冰片、二錢。輕粉、三錢。銀硃、一兩。芸香、三兩。嫩松香、八兩五錢。菜油、一兩。

制法及用法 先將蓖麻子肉搗爛。陸續加入餘藥攪和成膏。攤紙上。貼患處。

參考 藥品與通行方干搗膏。大同小異。功用當亦無異。所以驗方干搗膏。亦名紅膏藥。

【胡粉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治月蝕瘡。

藥品 胡粉（炒微黃）、白礬（煨）、硃丹（煨）、黃連（淨）、輕粉、各二錢。胭脂、一錢。麝香、少許。

制法及用法 研爲末。先以溫漿水入鹽洗拭。後搽藥。如乾。麻油調敷。

【胡粉散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治天泡紅腫。發熱急腹疼痛。

藥品 石膏(煨)、蛤蜊粉、輕粉、各三錢。杭粉、一兩。

制法及用法 共研極細。先以錢挑破。搗乾。用此搽之。或用絲瓜葉搗汁調擦。如冬月無絲瓜葉。用染布青缸汁調擦。

【飛龍奪命丹】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治腦疳。疔瘡。發背。痘癰。痘疔。痘毒。乳癰疽。附骨疽。一切無名腫毒。惡瘡。或麻木嘔吐。或昏憤咬牙。

藥品 輕粉、冰片、麝香、各五分。血竭、膽礬、寒水石、各一錢。乾蟾酥(酒化一作三錢)、乳香(去油)、沒藥(去油)、硃砂(一作一錢)、銅綠、各二錢。雄黃、三錢。蝸牛、二十一個。蜈蚣(酒浸泡、炙、去頭足)、一條。一方無、冰片、血竭、膽礬、雄黃、蜈蚣。有枯白礬。一方無寒水石、蜈蚣。有明礬。

制法及用法 共爲細末。先將蝸牛連壳研如泥。和藥末爲

丸。如綠豆大。硃砂爲衣。如丸不成。入酒麪糊少許打丸。每服三丸。或七丸。或九丸。或十一丸。用葱白三五寸。令病人嚼爛。吐於手心(男左、女右)。將丸包裹。熱無灰酒送下。避風被蓋。約人行五六里頃。出汗爲效。如無汗者。以熱酒助之。重者再進一服。病在上者食後服。病在下者。食前服。如病人不能嚼葱。搗碎裹丸亦可。忌冷水、瓜茄、油膩、豬雞、魚腥、醬麵。及一切發物。孕婦忌服。疔瘡走黃過心者難治。出冷汗者死。病重者。外用隔蒜法灸。甚者多灸。或著肉灸。

參考 此方用以洗腋狐臭甚效。亦稱外科飛龍奪命丹。蓋因近時通行方中另有一種治痧氣之飛龍奪命丹。故加外科二字以別之。又近時通行方。以天南星、明雄黃、巴豆霜、各一錢。黃丹、乳香(製)、硃砂、信石、各五分。斑蝥(去頭足)、十六個。麝香、少許。各研細末。蟾酥一錢。化烱和丸。如蘿蔔子大。亦名飛龍奪命丹。治癰疽惡瘡。一切疔瘡腫毒初起。或黑陷毒氣內攻。用法同前。

【飛龍換骨 還元 水火仙丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治喉舌潰爛。耳鼻破損。溼痰流注。癰腫。氣瘰。遍身梅豆。梅癰。發背。血風。鵝膝。臙瘡。魚口。便毒。下疳。陰蝕。楊梅結毒。

藥品 製粉霜、阿魏、各五錢。槐花、三錢。當歸尾、白芷、小丁香、乳香(不去油)、沒藥(不去油)、雄黃、硃砂、各一錢。牛黃、五分。冰片、三分。製砒霜、一分。

制法及用法 共研細末。老米打糊和丸。如黍米大。硃砂爲衣。瓷瓶密貯。勿令泄氣。初服四丸。十日後服五丸。二十日後服至七丸。再不可多加。每日俱用土伏苓、四兩。豬牙皂角、一條。爲湯引。再照後引經藥同煎。用河水井水各二碗。煎成三碗。每早以一碗送丸藥。餘二碗留爲午晚當茶飲。服二十日全癒。忌酒醋發物。戒房事。虛者服此。必發寒熱、頭痛、喉疼、口臭。不必驚恐。停止二三日再服。①楊梅結毒。生於頭頂。或爛見骨。至重者。製粉霜、只用三錢。製砒霜、只用一分五釐。湯引內

加川芎、藁本、各五錢。煎湯送下。②結毒生於眼上者。製粉霜、只用一錢五分。製砒霜、只用一分。湯引內加川芎、白芷、藁本、羌活、各二錢。煎湯送下。③結毒生於鼻上者。製粉霜、只用二錢。製砒霜、一分。湯引內加山梔、川芎、各二錢。煎湯送下。④結毒生於喉中者。製粉霜、只用二錢。製砒霜、一分。湯引內加天花粉、石膏、川芎、各二錢。煎湯送下。⑤結毒生於臂上者。製粉霜、只用二錢。製砒霜、五釐。湯引內加川芎、柴胡、各二錢。煎湯送下。⑥結毒生於腰膈上下兩脇者。製粉霜、只用四錢(重者五錢)。製砒霜、二分。天花粉末、五錢。爲丸。湯引內加杜仲、懷牛膝、各二錢。煎湯送下。⑦結毒生於腿上下者。製粉霜、五錢。製砒霜、二分。天花粉、三錢。防風、五錢。爲丸。湯引內加木瓜、薏苡仁、懷牛膝、各二錢。煎湯送下。⑧結毒生於腳板底下者。製粉霜、六錢。製砒霜、二分。天花粉、沉香、各五錢。爲丸。湯引內加木瓜、懷牛膝、各二錢。煎湯送下。⑨結毒生於腎囊上下陰莖上者。製粉霜、六錢(重者用八錢)。製砒霜、二分。牡蠣

(煨紅、冷定、研極細末)、八錢。人參、五錢。爲丸。湯引內加黃芪、白朮、天花粉、懷牛膝、各二錢。煎湯送下。⑤結毒生於婦女陰戶內。上染風毒。年久不愈。潰爛見骨。或穿通肛門。肉爛極矣。手足不能伸縮。或生陰戶上下兩邊者。製粉霜、八錢。製砒霜、三分。天花粉、三錢。爲丸。湯引內加懷牛膝、二錢。煎湯送下。外用豬肝切長條。蒸熟。乘溫插入陰戶內。冷則換一條。如此十餘條。陰戶內生瘡作痛不可忍。另用輕粉、兒茶、各三錢。研細搽之。倘瘡癢如蟲一般。次早用槐杞根煎湯洗淨。仍用豬肝插換搽藥。數次即愈。⑥結毒下疳。用製粉霜、三錢。製砒霜、一分。湯引內加懷牛膝、豬苓、各二錢。煎湯送下。⑦魚口便毒。用製粉霜、二錢。製砒霜、一分。湯引內加懷牛膝、薏蘆、各二錢。煎湯送下。⑧瘰癧穿鼻日久者。用製粉霜、六錢。製砒霜、二分。外用玳瑁(剉碎)、絹帛包。置婦女乳上一宿。次早取下。研爲細末。五錢。爲丸。湯引內加夏枯草、海藻、滑石、天花粉、瓜蒌仁、各二錢。煎湯送下。

【保安萬靈丹】

發明 見陝實功外科正宗。

功用 治癰疽、疔毒、對口、發頤、風寒瘰癧。淫痰流注。附骨陰疽、鶴膝風、及左癱右瘓。口眼歪斜。半身不遂。血氣凝滯。偏身走痛。步履艱辛。偏墜疝氣。偏正頭痛。破傷風。牙關緊閉。截解風寒。

藥品 茅山蒼朮、八兩。麻黃、羌活、荊芥穗、防風、細辛、川烏(湯泡去皮)、草烏(湯泡去皮)、川芎、金銀石斛、全蠍、當歸、甘草(炙)、天麻、何首烏、各一兩。雄黃、六錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。每重三錢。硃砂六錢。研細爲衣。瓷罐收貯。視年歲老壯。病勢緩急。斟酌用之。如惡瘡初起二三日間。或癰疽已成至十日前後。未出膿者。狀若傷寒。頭痛煩渴。拘急惡寒。肢體疼痛。惡心嘔吐。四肢沉重。恍惚悶亂。皮膚壯熱。及傷寒四時感冒。傳變疫症。惡寒身熱者。俱用連鬚葱白九枝。煎湯調服一丸。蓋被出汗爲效。如汗遲。以葱湯催之。其汗必出。如淋如洗。令其自收。不可露風。患者自快。瘡未成者即消。已成者即高腫潰膿。如病無表裏相兼。不必發散。只用熱酒化服。服後當避風。忌冷物。戒房事。

參考 此方專於發散。又能順氣搜風。通行經絡。經所謂汗之則瘡已也。然藥性猛烈。只宜於強壯藪藪之人。凡無憎寒壯熱。及平日表虛氣弱。素多痰火。並有孕婦人。臨經女子。均忌服。

【洞天救苦丹】

發明 驗方。

功用 治乳癰。乳岩。瘰癧破爛。

藥品 露蜂房(中有子者、無子不效)、雄鼠糞、青皮、苦楝子(立冬後者佳)、各等分。

制法及用法 放新瓦上。焙存性。研末和勻。每服三錢。陳酒調下。隔兩日再服。不可日連服。

【香附餅】

發明 見顧世澄協醫大全。

功用 治乳吹。及一切癰疽。

藥品 香附、一錢。麝香、二分。

制法及用法 研末。以蒲公英二兩。酒煎濃汁調敷。

十 筆

【神功散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治發背。癰疽疔毒。瘰癧。瘰癧。

藥品 川烏頭(炮、去皮尖)、

川黃蘗(炙、去粗皮)、各等分。

制法及用法 研爲細末。唾津或米醋調稠成膏。如唾少。漱口水亦可。加血竭、尤佳。丹毒未破者。亦可用之。如發背、癰疽等瘡初起。敷宜留頭。乾則以淘米水常常潤溼。每日換藥一次。如已成將潰爛者。先以槐枝、艾葉、煎湯燉溫。洗瘡淨。用絹帛拭去膿血。香油潤之。綿紙照患處貼成圓錢。留頭貼上。後以藥塗紙。如乾。用淘米水潤。日換一次。任其自然流膿。不可手撻。如敷藥後。病人覺瘡痛止聲減。即愈。如肌生而腐肉不落者。剪割亦可。不宜用鍼。成氣怒房事勞役。忌酒及羊雞魚肉瓜茄薑辣諸物。並不可與孝服體氣飲酒之人同食。若因氣怒反復發腫者。依前法治之。對口及腦疽。則不必洗去舊藥。因逐次添藥。恐動瘡口。易惹風邪。

【神效方】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疔腫、癰疽、發背、瘰癧等症。

藥品 赤小豆(爲細末)。

制法及用法 新汲水調敷瘡上。及四邊赤腫處。乾則再敷。

【神異膏】

發明 見陳自明外科精要。

功用 治諸般惡瘡。毒癰。發背癰疽。

藥品 露蜂房(蜂兒多者佳、細篩淨)、一兩。全蛇蛻(鹽水洗淨、焙乾)、玄參(去蘆)、各五錢。綿黃耆、七錢五分。黃丹、五兩(研細)。杏仁(去皮尖、切小片)、一兩。男子亂髮、一團(如雞子大、洗淨焙乾)。麻油、一斤。

制法及用法 先將麻油入銀銚中。同亂髮於風爐上文武火慢熬。候髮焦焙盡。投入杏仁。候杏仁色變黑。好綿濾去淨。再將所熬清油入銀銚內。後入黃耆、玄參。慢火熬一二時。取出。置一冷風爐上。候半時久。火力稍息。旋入露蜂房、蛇蛻。將柳枝急攪。移銚於火上。不住手攪。慢火熬至黃紫色。用綿濾過。後復入清油於銚內。乘冷投黃丹。急攪片時。又移銚於火上。文武火慢熬。不住手用柳枝攪千餘轉。候藥油變黑色。滴於水中。凝結如珠子。則膏成矣。然後貯瓷器內。封收待用。或恐偶然熬火大過。稍硬難用。宜稍加蠟熬。添麻油在內。瓷器盛。封蓋。在甑上蒸。乘熱攪勻收用。惟熬成後。須用所盛瓷器置淨水盆中。出火毒一晝夜。歇三日。

方可用。每用少許。攤貼患處。

【神異膏】

發明 見玉青堂證治準繩。

功用 治癰疽癰爛。及諸瘡發毒。

藥品 綠黃、五錢。滑石、一兩。

制法及用法 研爲末。洗後搽之。外用綿紙蓋覆。

【神應散】

發明 見玉青堂證治準繩。

功用 治甲疽。

藥品 白礬、不拘多少。

制法及用法 燒汁盡取末。細細刮去甲角。搽於瘡中。能食惡肉生好肉。旬日即瘳。加雄黃、少許同搽。尤佳。

【神應散】

發明 見顧世登醫醫大全。

功用 治楊梅瘡。

藥品 何首烏、天花粉、荆芥穗、苦參、防風、各一兩。肥皂核(燒存性)、薄荷葉、各五錢。

制法及用法 共爲末。分十服。每日用新鮮白土茯苓、八兩。雄豬肉、四兩。入煎藥一服。用水七碗。煮爛去渣。其肉熟食。其湯代茶飲之。不過十日全愈。再無餘毒。如瘡咬肉者。可作六劑與之。

【神效千槌膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治瘡瘍、疔毒、瘰癧、腫毒、癰疽等症。

藥品 土木鱉、五個(去殼)。白嫩松香、四兩(揀淨)。銅綠(研細)、杏仁(去皮)、各一錢。乳香、沒藥、各二錢。蓖麻子、七錢(去壳)。巴豆肉、五粒。

制法及用法 合一處。石臼內搗三千餘下。即成膏。取起。浸涼水中。隨瘡大小、用手揪成薄片。貼瘡上。以絹蓋之。

參考 按驗方。用蓖麻肉(去壳)、五兩。嫩松香(嫩者製、研細)十兩。杏仁霜(研細)、二兩。銀珠、二兩。廣丹(飛)、二兩。掃盆(飛)、一兩。茶油、二兩(比前方多銀珠、廣丹、掃盆、茶油。無巴豆仁、乳香、沒藥、銅綠、木鱉)。先將蓖麻打爛。松香、杏仁、緩緩加入。打勻。再緩緩入銀珠、黃丹、掃盆。打極透。再緩緩入茶油。打成膏。須打數千槌。槌數愈多。成膏愈佳。隔水燉化。攤貼。亦名千槌膏。此方又名紅膏藥。能提毒拔膿。去腐止痛。止一切癰疽、發背、對口、疔瘡、小兒熱癰、癰疽頭。又海醫大全方。用杏仁、蓖麻仁、各四十九粒。琥珀(燈心同研)、冰片、各三分。珍珠(豆腐包

煮)、麒麟竭、當門子、乳香(去油)、沒藥(去油)、銅綠、黃丹、龍骨、輕粉、各六分。水安息(如龍眼肉大)、三塊。松香(入鍋內文火化開、用麻布濾去渣、冷定、用豆腐水煮數次、再用菉豆湯煮三次、又用葱韭生薑汁各一鐘、煮乾研細末)、八錢(比前方多琥珀、冰片、珍珠、麒麟竭、當門子、黃丹、龍骨、輕粉、水安息、無巴豆仁、木鱉)。先將杏仁蓖麻搗如泥。次將前藥細末。逐漸加入。搗數千餘下。至極勻膩。亦名千槌膏。治癰疽初起。貼之自消。將潰貼之。毒從毛竅中出。不致穿潰。用大紅緞攤貼。忌見火。若內覺有膿未熟。恐穿潰難於收功者。可加水鱉子(去殼)、七枚。黑鹽蹄(研細)、五分。和於膏內。即能隔皮取膿。

[附]千槌膏

發明 通行方。

功用 治癰疽瘡癰。初起未潰者。

藥品 嫩松香、十六兩。製乳香、一兩二錢。銀珠、三兩五錢。蓖麻子肉、十兩。製沒藥、一兩二錢。麝香、八分。

制法及用法 先將蓖麻子肉搗爛。和各藥粗粉搗數千次成膏。再入麝香和勻。隔水燉煉。

鹽紙上。貼患處。勿入口。

參考 按千槌膏。是以蓖麻仁爲主藥。據近人張山雷之研究。謂“其藥師朱氏。世以兼治外瘍名。凡按毒提膿藥中。從不用此。惟退消陽毒紅腫及乳頭瘰癧乳癰等症。有家製千槌膏。專用蓖麻子仁杵細。和乳香、膠香、銀硃、麝香成膏。即有紅赤嫩高。勢且醲脹者。亦可十消八九。則明是消散之功。何得誤認爲拔毒外出。古書以消腫、追膿拔毒六字。並作一氣。則消者欲其內消。追者拔者。欲其外出。內消之藥。不能拔毒。拔毒之藥。不能消腫”。由此可知蓖子仁是主消散而不是拔毒的藥。善走而速之使動。只能流動而使之行。散腫之功極驗。內消最有奇功。拔毒實無能力。此古書當有揚棄之處。不能不作批判的接受。在這些方子中。以最後進行方。最爲簡便適用。尤其是對適應症。分別清楚而不含混。使人知道他的用途。

【烏金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疔毒腫痛。及大指疽。一切無名腫毒。

藥品 牙皂、四分。人言(製)、蟾酥、麝香、各五分。血

餘(煨過)、蛇蛻(煨過)、蜂房(煨)、各一錢。蟬蛻(酒洗)、血竭、乳香(炙)、鹽蠶(炒去絲)、各二錢。辰砂(研水飛)、雄黃、穿山甲(炙黃)、各二錢五分。金蠍、三錢(湯泡七次)。天龍、四錢(酒炙、去頭足)。川烏尖、沒藥(炙)、各一錢五分。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服三分(一作三錢)。赤沙糖調葱頭酒送下。取汗爲度。

【烏金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療惡瘡。疔瘻。

藥品 樣斗子、二個。

制法及用法 以一個實黃丹。一個實白礬末。相合定。用黑狗屎炒好。火內燒。研爲細末。加麝香。少許。洗淨瘡口。以此貼之。

【烏金膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治潰瘍。發背。肉死不腐。

藥品 巴豆(去心膜、新瓦上炒黑)。

制法及用法 研如膏。先用降香煎湯洗瘡。點歹肉上。施用修合則不乾。若初起腫痛。用點數處。其毒頭消。若惡瘡、頑瘡。元氣無虧。久不收斂者。內有毒根。以紙燃薰其內。

【烏金膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切惡瘡。

藥品 桑枝、槐枝、榆枝、枸杞枝、桃枝、柳枝(各長一尺、粗如小指、俱截一寸、劈四破)。

制法及用法 用油四兩。熬令焦黑。濾去滓。入鉛丹五錢。黃蠟一兩。復熬令黑色。傾在瓷盒內。候冷。以新汲水拭出穴毒。以少許塗於患處。

【烏龍膏】

發明 見顧世澄醫醫大全。

功用 治一切癰疽、發背、無名腫痛初起者。

藥品 小粉(隔年陳久者)、不拘多少。

制法及用法 炒至黃黑色。研細。再炒再研。如此三四次。冷後研末。入陳米醋熬如黑漆。攤於紙上。剪孔貼患處。一法炒黑研細。滴醋調敷。乾則以醋潤之。或加五倍子。或加生大黃、天南星。更佳。

【烏龍膏】

發明 見姚僧坦集驗方。

功用 治癰疽諸毒紅腫。

藥品 木鼈子(去殼)、半夏、各二兩。小粉、四兩。草烏頭、五錢。

制法及用法 於鐵鍋內。慢火炒焦。研為細末。出火毒。

再研細。新汲水調稀稠得所。敷瘡四圍。中留頂。出毒氣。或用醋調。一日一換。

【消毒散】

發明 見醫醫大全。

功用 治多骨疽。及一切癰疽癰毒。無論有骨無骨。

藥品 芙蓉葉(曬乾)、大黃、五倍子、各一兩。藤黃、生明礬、各三錢。冰片、麝香、各三分。

制法及用法 各為末。米醋調成如厚糊。塗於多骨疽之左右。四邊以藥圍其皮肉。中留一頂如豆大。外以醋用鴨翎不時掃之。若不帶任藥乾圍。則無益矣。一日夜即內消。

【消毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治吹乳、乳癰、便毒。

藥品 青皮(去白)、金銀花、天花粉、柴胡、鼈蠶(炒)、貝母、當歸(酒拌)、白芷、各二錢。

制法及用法 清水二鍾。煎至一鍾。食遠服。如便毒。加大黃(煨)、一錢。空腹時服。如憎寒壯熱。或頭痛者。宜先服人參散毒散一二服。方可服此。如無前證。即服此藥二三劑。或服不消。宜服托裏藥。

【消毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切無名腫毒。瘡癰。

藥品 貝母(去心、切細、一半生鹽、一半微炒、和勻)。

制法及用法 研爲末。每服一錢。溫酒調下。病在上。食後服。病在下。食前服。

【消毒散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治唇疽。

藥品 綠豆、五倍子。

制法及用法 共研細末。米醋調搽。

【消腫散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切腫毒、瘡癰。

藥品 大黃、水仙子、山藥、芋根、青礬、赤小豆、寒水石、水蘊、香蟾粉、花蕊石。

制法及用法 研爲末。醋蜜調勻。如疽毒未成。則當頭搥退。若已成。四面圍之。留一頭。貼替鍼膏。

【桃花散】

發明 見馬氏方。

功用 提膿。拔毒。生肌。收口。治瘰癧、瘡瘍、潰後。膿水淋漓。口不收斂。

藥品 石膏(煨)、二兩。輕粉、一兩。桃丹、五錢。冰片、五分。

制法及用法 研極細末。搽於瘡口。外用膏貼。外皮破碎者。以此敷之立結反。

【桃花散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治諸瘡。

藥品 白芨、白蘇、黃蘗、黃連、乳香(另研)、麝香、黃丹(洗淨炒)、各等分。

制法及用法 研末。搽瘡口上。二三日即生肌平燥。

【桃花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 去風。生肌。活血。治一切惡瘡、金瘡。

藥品 烏魚骨、龍骨、虎骨、各一兩。寒水石、八兩(煨)。白石脂、赤石脂、白蘇、各五錢。黃丹、少許。

制法及用法 加白芨五錢。同研極細末。貼瘡大小數貼。

參考 方名桃花散者不一。不盡述。

【桃紅散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 斂瘡口。定痛。辟風邪。

藥品 消石、四兩。乳香、輕粉、各二錢。小豆粉(一作定粉)、一兩。寒水石、三兩(煨)。

制法及用法 研爲細末。乾

· 瘻口上。若血出不止。和燈草貼。上封膏藥。瘻口久不收。用小椒(去目、炒黑)、一兩。定粉、風化硝、各二錢。白礬、二錢五分。乳香、沒藥、各一錢。研爲細末搽之。

【追毒丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疔瘡。

藥品 海浮石(燒赤、醋淬七次)、五分。乳香、沒藥、各一錢。巴豆、四十粒。川烏、一兩。

制法及用法 研爲末。醋糊和丸。如梧桐子大。若患二三日。服十丸。五六日。服十四丸。隨病上下服。先飲冷酒半盞或一盞。又用冷酒送下。大便不動。再用三丸。如打頭抓破。用頭搗敷之。後服此藥。

【追毒丸】

發明 見方汝聖方。

功用 治腫瘍。

藥品 青竹蛇、防風、穿山甲(炮)、羌活、豬牙皂莢、各三錢。全蠍、二錢。麝香(當門子)蟾酥、各三分。爪兒血竭、乳香(去汨)、孩兒茶、沒藥(去汨)、明雄黃、白砒(肉製)、大磁砂、茜草、雷公藤、各五分。甘草、當歸尾、各八分。蜈蚣、三條。金銀

花、五錢。

制法及用法 共研極細末。凡一切癰疽大毒。大人每服三分至五分。小兒一分至二三分。無灰酒調下。令醉自消。

【追毒丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疔瘡。發背。

藥品 蝦蟆羹、二分。麻蟲、雄黃、黃丹、各一分。

制法及用法 研爲末。滴水和丸。如米大。每用一丸。將瘡撥開頭。入藥在內。外貼膏藥。

【桂附丸】

發明 見陳自明外科精要方。

功用 治氣滯諸瘡。

藥品 桂心、附子(炮製、米醋中浸、再炮三五次、去皮臍)、厚朴(薑製)、粉草(炙)、白朮、各一兩。木香、二錢五分。乳香、二錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。空腹時米飲送下。

【茯苓丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胞瘻。

藥品 赤茯苓(一作一兩)、防風、細辛、白朮、澤瀉、官桂、各五錢。瓜蒌根、紫菀茸(一作

一兩)、附子(炮、一作三錢)、黃耆、芍藥、甘草(炙)、各七錢五分。生地黃(一作一兩)、牛膝(酒浸、一作一兩)、乾山藥(一作一兩)、獨活、半夏(湯泡)、山茱萸肉(一作五錢)、各二錢五分。一方無防風、白朮、瓜蒌根、黃耆、芍藥、甘草、獨活、半夏。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸(一作五七十丸)。食前米飲送下。臨臥時溫酒送下。

參考 此方以茯苓通利。牛膝、地黃、山茱、山藥、調補精液爲主。更以桂、附之辛。行牛膝、地黃之滯。深得若沃以湯。適於小便之旨。用紫苑者。上滋化源。利膀胱也。妙在細辛一味開發上竅。專主上爲清涕而設。相配成方。又以防風、白朮、瓜蒌根等。能除氣耗陰。故削去之。

【破棺散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疔瘡走黃。

藥品 當歸、赤芍藥、梔子、牽牛、各二兩五錢。連翹、牡蠣、金銀花、紫花地丁、各一兩五錢。京三棱(泡)、甘草、各二兩。一方無當歸、赤芍、連翹、牡蠣、金銀花、地丁。

制法及用法 研極細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。食前童便或溫酒化下。便秘加大黃三兩。忌飲酒及生冷硬物。

【馬齒莧散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治甲疽。

藥品 馬齒莧(生牆上者、陰乾)、一兩。木香、丹砂(研)、鹽(炒研)、各二錢五分。

制法及用法 除丹砂、鹽外。剉碎拌勻。於熨斗內。以皮灰火燒過。取出細研。即以丹砂、鹽末、再炒勻。每用少許。敷於瘡上。日二三度。

【桑螵蛸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸惡瘡。

藥品 桑螵蛸、地龍、貝母、黃藥、各五錢。虢丹(煨)、一兩。乳香、二錢五分。糯米粉、二錢。麝香、五分。雄黃、輕粉、各一錢。

制法及用法 研爲細末。新汲井水和沙糖調敷。

【退毒散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治瘡中生管。

藥品 琉璃底、三錢(鉄皮拌、炒透)、辰砂(水飛、另研)、人指甲(鉄皮拌炒)、象牙末、各

一錢。蟬蛻(炒)、一錢五分。乳香(製)、沒藥(製)、枯礬、各八分。

制法及用法 各研細末。和勻。用黃蠟、三錢。熔化入藥攪勻。乘熱作丸。如綠豆大。初服十丸。逐日漸加一丸。加至十六丸以後。不必再加。溫酒送下。患上身者。加川芎六分。患下身者。加牛膝六分。連年服一料全愈。近年半料收功。雖患至二十年者亦效。忌食葱與有管之物百日。並戒房事。

【射干散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治療疽。

藥品 射干、川升麻、枳實(炒)、川大黃(剉、微炒)、甘草(生用)、各一兩。麝香(細研)、二錢五分。前胡(去蘆)、一錢五分。羚羊角屑、七錢五分。

制法及用法 剉碎。加麝香令勻。每服四錢。清水一中盞。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

十一筆

【密陀僧散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱毒。惡瘡臭爛。久不生肌。

藥品 密陀僧、雄黃、雌黃、定粉、各五錢。膩粉、三錢。

制法及用法 研為細末。先用柳枝一握。生甘草一兩。槌碎。漿水二升。煎至六七沸。去滓。稍熱淋洗瘡。拭乾敷之。

【密陀僧散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽。

藥品 密陀僧、自然銅、各五錢。杏仁(去皮尖雙仁)、二十七枚。

制法及用法 用苦竹筒一枚。入藥在內。紙封筒口。慢火煨。候筒黃色。取出。研為極細末。每用少許。新汲水調勻。雞翎掃塗。甚者不過二七日效。

【硃砂膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽、腫毒、瘰癧、疥瘡。

藥品 硃砂、一錢。石鎔灰、一兩(炒黃色)。白丁香、三錢(炒黃色)。黃丹、八兩。鹼、一斤(淋水五碗)。

制法及用法 研為極細末。鹼水煎作一碗。成膏待冷。以藥末入膏子和勻。藏瓷器中。每用少許。敷於患處。

【硃砂膏】

發明 見總相救驗方新編。

功用 去癰。輕堅。消腫。止

瘍。治癰疽。發背。對口。痰毒。痰核。瘰癧。乳癰。流注。流痰。無名腫毒。

制法及用法 用槐、杏、桑、柳、桃嫩枝各三尺。浸麻油十斤中三日。再入梔子、六百個。穿山甲、六兩。童子髮(鹽水洗)、四兩。慢火煎枯去渣。納飛黃丹、一百兩。收成膏、候溫微。再入沉香(身上護燥、勿見火)、兒茶、各二兩。血竭、三兩。琥珀、象皮(切片、微炒)、各一兩。梅片、麝香、各五錢。硃砂、四兩。共研極細末。和入膏內攪勻。隔水燉化貼之。忌火。因硃砂見火則力薄。未成即消。已成即潰。疔瘡忌用。

【清心丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治心經蘊熱生瘡瘍。

藥品 黃連、一兩。茯神、赤茯苓、各五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。米湯送下。

【清神散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治脫疽、疔瘡、發背。毒積發悶。心亂煩躁。譫語嘔吐不食。

藥品 綠豆粉、一兩。牛黃、

三分。甘草節、五錢。冰片、五分。硃砂、三錢。

制法及用法 研爲極細末。每服一錢。淡竹葉、燈心、煎湯調下。

【清涼膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 止痛。解毒。潤肌。生肉。治湯火傷。

藥品 梔子仁、黃連(去鬚)、白芷、各二錢五分。生地黃、二兩。葱白、十莖(擘)。黃蠟、五錢。清麻油、四兩。

制法及用法 剉粗。於油鍋中煎地黃焦黑色。綿濾去滓。澄清。再於鍋內入蠟。慢火熬。候蠟消。傾於瓷盒內。每用少許。雞羽蘸塗。以瘡爲度。

【清涼膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治初患癰腫疔瘡。熱嫩疼痛。

藥品 大黃、不拘多少。

制法及用法 研爲細末。漿水調攤貼之。醋磨亦可。

【清涼膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治癰疽、發背、腫毒。

制法及用法 先用白麵調成。圍圈患外。葱根搗泥。平鋪瘡上。用豬膽汁一枚。黃蜜二兩。傾器內和勻。茶匙挑臍

汁於內。一時即消。

【清涼膏】

發明 通行方。

功用 治癰疽瘡癤。

藥品 大黃、六錢。防風、六錢。玄參、六錢。黃芩、六錢。羌活、六錢。生地、六錢。白芷、六錢。當歸、六錢。木鼈子、三錢。烏藥、六錢。荆芥、六錢。麻黃(去節)、六錢。丹皮、三錢。官桂、四錢。黃柏、六錢。赤芍、六錢。棉子油、十一斤。東丹(炒)、三斤八兩。獨活、六錢。申薑(去毛)、六錢。

制法及用法 除東丹後下外。將餘藥入油內煎熬至枯。濾去渣滓。再入東丹充分攪勻成膏。攤於紙上。貼患處。東丹可依天氣冷熱適當調整分量。

【清涼拔毒膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治楊梅瘡。

制法及用法 先以杭粉、一斤。置廣鍋內。炭火炒至紅黃色爲度。取出。另以麻油二斤。入鍋內。熬至滴水成珠。再將杭粉篩入油內。用桃柳棍攪成膏。傾入水中。拔去火毒。每用少許。攤貼患處。諸瘡皆宜。

參考 按瘍醫大全另方。治

楊梅結毒。用麻油二斤。熬至滴水成珠。續下杭粉十三兩攪勻。成膏。傾入水內。片時取起。每用少許。貼於患處。名爲單油膏。與此方大同小異。

【清涼拈痛膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治杖瘡已破者。

藥品 如意金黃散、一兩。加樟腦末、三錢。

制法及用法 和勻。先用生白石灰塊三四斤許。以清水泡開。水高石灰二三指。露一宿。將石灰面上浮起油水結如雪片者。輕輕帶水取入碗內。凡水一鍾。對香油一鍾。竹筴攪百轉。自成稠膏。調前藥稀稠得所。不用蕩洗。徧敷傷處。紙蓋布繫。夏月一日。冬月二日。用葱湯淋洗乾淨。仍再敷之。以腫消痛止爲度。

【清膏藥肉】

功用 外科上用以攤貼掩護皮肉。有消毒防腐之效。無他作用。浙東習俗。遇冬月手指皮膚龜裂。亦取敷塗。

藥品 棉子油、十斤。東丹、三斤至五斤。

制法 先將棉子油煎透。加入東丹。熬至滴水成珠爲度。

【排膿散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腸癰小腹脹痛。或裏急後重。或時時下血。

藥品 當歸(酒拌)、黃耆(鹽水拌炒)、金銀花、白芷、穿山甲(蛤粉炒)、防風、連翹、瓜蒌仁(杵)、甘草、各一錢。

制法及用法 清水二鍾。煎至八分。食前服。若膿將盡。去穿山甲、連翹。加當歸、川芎。或研爲末。每服三錢。食後蜜湯調下亦可。

【排膿散】

發明 見金匱要略。

功用 治內癰膿從便出。

藥品 枳實、十六枚。芍藥、六分。桔梗、二分。

制法及用法 杵爲散。取雞子黃一枚。以藥散與雞黃相等。揉和令相得。飲和服之(一作煎如薄粥溫服)。日一服。

參考 枳枯行氣滯。芍藥通血滯。從氣血以排之。人所易知也。妙在揉入雞子黃一枚。取滋潤之物。以養心脾之陰。則排之之法。獨得其本矣。

【排膿散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 補肺。治肺癰吐膿。

藥品 黃耆(鹽水拌炒)、白芷、五味子(炒杵)、人參、各等分。

制法及用法 研爲細末。每

服一二錢至三錢。食後蜜湯調下。

【連翹散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰癤。

藥品 連翹、一兩。沉香、黃耆、各五錢。白蘇、川朴硝、大黃(炮)、甘草、各一分。

制法及用法 搗爲粗散。每服一錢。清水一盞。入麝香一釐。煎至五分。去滓。食後溫服。

【連翹飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 排膿。治癰腫瘡癤。

藥品 連翹、防風(去叉)、各三兩。薤白、白芍藥、黃芩(去黑心)、玄參、各二錢。人參、白茯苓(去黑皮)、桔梗(剉、沙炒)、前胡(去蘆)、甘草(炙)、各一兩。生黃耆、四兩。桑根白皮(剉炒)、一兩五錢。

制法及用法 搗篩。每服五錢。清水一盞半。煎至八分。去滓溫服。一日二次。

【連翹飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸惡瘡。紅赤癰癤。心煩口乾。及婦人血風成瘡。癢痛潰爛。破流黃水。

藥品 連翹、當歸、瓜蒌根、生乾地黄、荆芥、黃芩、赤芍藥、

麥門冬、粟麥、木通、半勞子(炒)、山梔子、防風、川芎、甘草、各等分。

制法及用法 以明。每服四錢。清水一盞半。加燈心二十莖。煎至八分。去滓。不拘時服。

【紫金丹】

發明 見張路玉張氏醫蘊。

功用 治金瘡出血不止。敷此即癒。

藥品 琥珀屑、降真香末、血竭、各等分。

制法及用法 研為細末。敷於傷處。愈後無癰痕。

【紫金錠】

功用 解諸毒、療瘡腫、利關竅、治百病。

藥品 山茨菇、二兩(藍汁洗、去皮毛淨、焙乾、一作一兩)。五倍子(揀去蟲土、搥碎、洗淨、一作三兩、一作二兩)、千金子(用白仁者、去殼油淨、一作二兩)、各一兩。硃砂(飛淨、一作一兩、一作五錢)、雄黃(鮮紅大塊者、水飛、一作一兩、一作五錢)、麝香(取當門子者、揀淨皮毛、一作二錢)、各三錢。紅芽大戟、一兩五錢(去蘆根、酒洗去骨脂、一作一兩)。一方無硃砂、雄黃。一方有全蝎、山豆根。

制法及用法 於淨室中製。各研為細末。候端午、七夕、重九、或天德月德日。各將前藥秤準。入於大乳鉢內。再研數百轉。方入細石臼中。漸加糯米泔漿調和。杵千餘下。至極光潤為度。每錠重一錢。合時忌婦人鷄犬見之。每服一錠或半錠。病重者二錠。薑汁、薄荷湯。或開水、井花水、磨服。瘡在上者必吐。在下者必利。吐利後以溫粥補之。正氣虛及孕婦忌服。又不可與甘草藥同進。⊙一切飲食藥毒、癰毒、瘴氣、惡菌、河豚毒、及白死、羊馬豬牛六畜肉等。以致昏亂卒倒。或生異形病證者。用清水磨服。或吐或瀉。其人必甦。南方山嵐瘴氣。煙瘴腐疫。最能傷人。偶有感觸。纔覺意思不快。感寒惡熱。欲嘔不嘔者。即用水磨一錠服之。得吐利便愈。傳尸癘瘵。諸藥不能取效者。每早清水磨服一錠。至三次後。遂下惡物尸蟲。異形怪類。其病自愈。女子久患癘瘵。為尸蟲所噬者。用清水磨服一錠。片時吐下小蟲十餘條。再服蘇合香丸。其病頓失。調理月餘而安。小兒父母遺毒。生下百日內。反塌爛斑。發道眼眶損壞者。俱用清水磨塗。⊙

銼入患處。臨發時。東流水煎桃柳枝湯磨服。⑤中風中氣。口眼歪斜。牙關緊急。言語蹇澀。筋脈攣痛。骨節風腫。偏身疼痛。行步艱辛。諸風諸癰。並用酒磨嫩煎服之。牙痛、酒磨塗痛上。仍含少許。良久嚥下。癰疽發背。對口疔毒。天蛇。無名腫毒。蛇咬疔。紅絲疔。楊梅瘡。諸般瘡。新舊諸毒。並用無灰淡酒磨服。外用水磨塗痛上。日夜塗數次。從癰而消。一切無蛇鼠犬毒。溪澗諸惡毒傷人。隨即發腫。攻注偏身。甚者毒氣入裏。昏悶響叫。命在須臾。俱用酒磨灌下。再吃藥湯一碗。被蓋出汗。立甦。打撲損傷。用松節、無灰酒磨服。⑥赤白痢疾。肚腹泄瀉。急痛霍亂。絞腸痧及諸痰喘。並用酒磨服。⑦自縊。溺死。驚死。壓死。鬼魅迷死。但心頭微溫未冷者。俱用續斷、生薑、煎酒磨服。⑧陰陽二毒。傷寒心悶。狂言亂語。胸膈痞滿。邪毒未出。瘟疫煩亂發狂。桃花瘡。喉閉。喉蛾。喉風。喉疔。俱用薄荷湯待冷磨服。小兒急慢驚風。五疳。五疳。脾病。黃疸。癰毒瘡癤。牙關緊急。並用薄荷浸水磨濃。加蜜服之。仍塗腫上。年歲幼者。

每錢分作數服。⑨年深頭脹。頭痛。太陽痛。偏頭風痛。反諸瘡愈後。毒氣攻注。腦門作脹者。俱用葱酒磨研服一錢。仍磨塗兩太陽穴上。⑩急中癰邪。喝叫奔走。鬼交。鬼胎。鬼氣。鬼魔。失心狂亂。羊兒諸癰等風。俱用石菖蒲煎湯磨服。⑪凡遇天行時疫。沿街闔巷。徧相傳染者。用桃根湯磨服。滴入鼻孔。次服少許。任入病家。再不相染。⑫婦人經水不通。紅花湯下。

參考 按此方治症雖多。多適用於外科諸癰瘡癤瘰癧氣等症。餘多不能適用。

【紫霞膏】

發明 見張乘六方。

功用 治癰疽。發背。對口。疔毒。

藥品、制法及用法 月製松香、一斤。加製藥油、四兩(夏月只用三兩五錢)。入鍋內熬化。看老嫩。火候得法。取起。傾鉢內。再入乳香(去油淨)、沒藥(去油淨)、血竭、龍骨(煨)、各五錢。各研細入膏內。用槐柳條攪勻。再入漂硃、角硃(俱研至無聲爲度)、各二兩。又攪令勻。連鉢置放在潮溼地上多日。出火毒。每用少許。攤貼患處。

【梅花點舌丹】

發明 見全生集方。

功用 治疔瘡。腦疽。發背。紅腫。癰癤。一切無名熱毒初起。及實火牙痛。喉痛。喉蛾。喉風。口舌諸瘡。小兒急驚風。

藥品 乳香(製)、沒藥(製)、硼砂、明雄黃、熊膽、血竭、葶藶、沉香、梅花冰片、各一錢。麝香(須當門子)、硃砂、犀牛角、各二錢。破大珍珠、三錢。一方有琥珀。

制法及用法 共爲細末。另用蟾酥二錢。入乳汁化開。和勻搗融。作五百丸。如菉豆大。金箔爲衣。蠟虎收好。每用一丸。入葱白內打碎。陳酒送下。睡臥蓋被。取汗。三個時辰。毒消而愈。或敷亦可。若慢驚風、及陰疽、陰虛、口舌牙喉等症。萬不可用。孕婦忌服。

【鹿茸丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣。腿腕生瘡。

藥品 鹿茸(酥炙、另搗成泥)、五味子(爲末)、當歸(去蘆、爲末)、熟地黃(搗膏)、各等分。

制法及用法 酒糊和丸。如梧桐子大。每服三四十丸。食前溫酒或鹽湯送下。次用川芎、當歸(去蘆)、各等分。研爲細末。每服二三錢。煎荊芥湯調

下。空腹及食後各一服。

【蚯蚓散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治陰疽瘡。

藥品 蚯蚓、二分。豆粉、一分。一方有豉一分。

制法及用法 清水研塗。乾再敷之。

【犀黃丸】

發明 見全生集方。

功用 療癰疽。石疽。失榮。乳岩。瘰癧。痰核。惡核。橫痃。流注。肺癰。小腸疝。一切腐爛陰疽。

藥品 犀黃、三分。麝香、一錢五分(一作三分)。乳香、沒藥(均去油)、各一兩(一作各二兩)。

制法及用法 先將乳香、沒藥、各研秤準。再加犀黃共研。用煮爛黃米飯一兩。入末搗和爲丸。如粟米大。曬乾。忌烘。每服三錢。熱陳酒送下。患在上部者。臨臥時服。在下部者。空腹時服。

參考 此方爲外科極妙之劑。治白疽與陽和湯相輔用之。尤見奇效。一方作西黃(即牛黃之產陝西甘肅者、入藥最勝)。餘藥及製法、分量、均同上。

十二筆

【勝金丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切瘰癧。疔毒。腫痛。

藥品 麝香、白砒(製)、各五分。熊酥、一錢。雄黃、辰砂、乳香、沒藥、血竭、各一錢五分。全蠍(炮)、天龍(去頭足炙)、穿山甲(炙)、各三錢。白殭蠶(炙、去絲)、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。沙糖調葱頭酒下。取汗。

【勝金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治下疳潰爛或疼痛。

藥品 黃連、黃蘗、輕粉、銀硃、孩兒茶、各五分。冰片、一分。

制法及用法 研爲細末。香油調塗。內服加味瀉肝湯。

【黃金膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 拔毒。生肌。

藥品 豬板油、四兩。乳香、沒藥(均去油)、各二錢。

制法及用法 熬枯去渣。加黃蠟、白蠟各一兩。熔化。再下黃藥細末五錢。攪勻。候冷。加冰片一錢。攤貼患處。

【黃耆丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治兩膝脚膝生瘡初起。

藥品 黃耆(剉)、川烏頭(炮、去皮擘)、川棟子(鹽水泡、去核)、地龍(去土、炒)、赤小豆、茴香(炒)、杜蒺藜(炒、去刺)、防風(去蘆)、各一兩。烏藥、五錢。

制法及用法 共研細末。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。空腹時溫酒或鹽湯送下。婦人醋煎滾。候溫送下。

【黃耆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽潰後。虛弱客熱。

藥品 黃耆、石膏、各二兩。知母、麥門冬(去心)、白芍藥、白茯苓、桂心、熟地黃、人參(去蘆)、升麻、各一兩。甘草(炙微赤)、五錢。

制法及用法 剉碎。每服四錢。清水一中盞。煎至六分。去滓溫服。每日三四次。

【黃蠟膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治瘰癧。生肌。消痛。

藥品 黃蠟、一兩。血竭、赤石脂(煨)、龍骨(煨)、各三錢。

(一作各三錢二分)。

制法及用法 除黃蠟外。餘研爲細末。先以蠟油一兩。入脂鬚(如栗子大)一箇。雜粘去滓。加入黃蠟、白膠香各三錢。融化盡。離火。再下血竭等末。攪勻候冷。瓷罐盛之。捏作薄片。貼於瘡上。綿帛縛定。三日後翻過貼之。

【黃蘗散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治瘡瘍。

藥品 黃蘗、三錢。豬膽(炙)、樛櫨核(燒存性)、陳蠟燭(燒存性)、各二錢。兒茶、輕粉、各一錢五分。

制法及用法 研爲末。先以甘草水洗淨。後摻此藥。

【黃蘗散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治濕瘡。

藥品 黃蘗(蜜塗、炙乾、去火毒)、白屈蠶(直者、置新瓦上、下以火焙斷絲、去火毒)、各等分。

制法及用法 研爲極細末。每用少許。摻於瘡上及舌上。吐涎。

【黃耆內托散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治癰疽初起後。內虛氣虛。

藥品 黃耆、當歸、川芎、厚朴、桔梗、防風、人參、甘草、白芍藥、白芷、各五分。官桂、三分。

制法及用法 研爲末。溫酒調下。

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治食瘡。弩箭傷。悶絕不省。

藥品 琥珀、不拘多少。

制法及用法 研如粉。每服一錢。童便調下。三服即痊。

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸癰瘡。表裏有熱。小便赤澀。

藥品 琥珀、白茯苓、黃芩、茵陳、紫草、瞿麥、茅根、石韋、烏藥、延胡、車前子、各等分。

制法及用法 研爲極細末。不拘時燈心湯調下。

【琥珀膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治髮際諸瘡。

藥品 琥珀、五分。定粉、一兩。血餘、八錢。輕粉、四錢。銀珠、七錢。花椒、十四粒。黃蠟、四兩。麻油、十二兩。

制法及用法 將血餘、花椒。

麻油燉焦。撈去渣。下黃蠟熔化盡。用夏布濾淨。傾入瓷碗內。預將定粉、銀炭、豆粉、琥珀各等極細。共合一處。徐徐傾入油內。用柳枝不時攪之。以冷爲度。每用少許。綿繭脂或紅紙紙攤貼。

【琥珀膏】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治氣血凝滯。結成流毒。皮色不變。漫腫無頭。不論新久。但未成膿者。

藥品 生大黃、二兩。鬱金、白芷、天南星、各一兩。

制法及用法 共爲細末。用大蒜去殼搗爛。入上藥再搗。略入酒一二匙。調勻。遍敷腫上。紙蓋。隨有熱痛。久有不痛者。俱待爽乾便效。次日有起泡有不起泡者。如有起。挑起泡中黃水。以膏貼之自效。

【琥珀蠟礬丸】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 護心護膜。攻而解毒。治癰疽發背。已成未潰者。

藥品 琥珀(另研極細)、一錢。黃蠟、一兩。白礬、一兩二錢。雄黃、硃砂、各一錢二分。蜂蜜、二錢。

制法及用法 先以琥珀、白礬、雄黃、硃砂、研爲細末。另將蠟蜜入銅杓內熔化。蠟火片

時。候蠟四邊稍凝。方將藥末入內攪勻。共成一塊。將藥火上微烘。急作小丸。如綠豆大。硃砂爲衣。瓷罐收貯。每服二三十丸。食後熱湯送下。惡甚者。早晚服。其功最速。

【雄黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疔瘡。大便秘實不通。或心腹痛者。

藥品 雄黃、全蠍、牙皂、大黃、鬱金、各一錢。巴豆、十四粒。麝香、少許。

制法及用法 共研末。米糊爲丸。如綠豆大。硃砂爲衣。每服五七丸。茶清送下。以利爲度。

【雄黃散】

發明 見郭氏方。

功用 治癰疽。發背。紫傘疼痛不止。

藥品 雄黃、黃丹、乳香、沒藥、各五錢。粟米小粉(炒)、二兩。草烏頭、天南星、絡石、百合、各一兩。白芨、二兩。

制法及用法 研爲細末。溫水調敷。

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽赤腫疼痛。未得膿潰。

藥品 雄黃(細研)、黃蘗、檳

樟、川大黃、麒麟竭、各七錢五分。麝香(另研)、一錢。黃連、一兩。白芷、木香、芎藭、桂心、各五錢。當歸(炒)、三錢。

制法及用法 研爲細末。臘豬脂調令勻。塗於絹上。貼腫處。候膿潰後。用膏藥搜膿生肌。

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疔瘡。

藥品 雄黃、硃砂、蒼耳草(燒灰)。

制法及用法 研爲末。醋調數次。將菊花搗爛。薑汁調。清者服之。濃者敷之。

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治冷瘡。

藥品 雄黃(另研)、百合、乳香、黃蘗(炙、去粗皮)、牆上爛白蜆殼、各一分。

制法及用法 研爲細末。令勻。用漿水煎甘草柳枝湯溫洗。或乾敷之。

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰瘡有惡肉者。

藥品 雄黃、一錢(另研)。巴豆(不去皮、研如泥)、乳香、沒藥、各少許。

制法及用法 研爲細末。少

少敷上。惡肉自去。

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人陰中生瘡。

藥品 雄黃、川芎、辰砂、麝蘆、北紙辛、當歸、川椒。

制法及用法 研爲細末。綿參紙陰中亦可。敷外瘡上。忌如常法。

【雄黃散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治蛇頭疔初起。紫痛根堅。

藥品 切雄黃、二錢。輕粉、五分。蟾酥、二分。冰片、一分。

制法及用法 共研細末。新汲水調濃。重湯燉溫。敷於患處。薄紙蓋之。日換三四次。

【黑末子】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘡癰毒。

藥品 羊角(連肉骨燒存性)。

制法及用法 研爲末。酒調三錢。分上下服。

【黑神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸瘡。

藥品 芫花(制)、青鹽、各等分。

制法及用法 均搗子一箇。

先入臙髒。次入龍膽草。以鹽泥固濟。留一孔。週圍用炭火燒。至孔中煙斷爲度。放冷。取出研細。入麝香少許。看瘡大小。乾擦之。牙疼或牙齦血出腫爛。擦之即愈。

【黑龍丹】

發明 見鮑相敬驗方新編。

功用 治一切惡瘡怪毒。瘡生努肉。如米如菌。

藥品 大熟地(切片、烘乾、炒枯)、一兩。烏梅肉(炒成炭)、三錢。

制法及用法 共研勻。礮極細。搽膏藥上(不論何項膏藥)。貼之。不過三五日。努肉自收。用收口生肌藥完功。如陰虛脫肛。諸藥不效者。以防風、升麻各一錢。煎湯調此丹塗之。立即收上。再服補腎之藥。後不再發。即烏龍粉。

【黑虎丹】

發明 驗方。

功用 治癰疽腫痛。

藥品 乳蘗(炒炭)、七分。磁石(醋煨、飛)、一錢五分。母丁香(炒黑)、一錢。全蠍(炒炭)、一錢五分。公丁香(炒炭)、一錢。冰片、一錢。麝香、五分。穿山甲(炙)、三錢。蜈蚣(炒)、二錢。牛黃、二分。蜘蛛(炒炭)、七只。

制法及用法 共研極細末。搽膏藥上。貼患處。不可入口。

【革薺散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痔瘡。楊梅瘡。初起或潰爛者。

藥品 革薺、當歸(酒洗)、白芷、皂角刺、薏苡仁、白蘚皮、木瓜(不犯鐵器)、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 清水煎。食前及空腹時服。如大人用之不應。或兒長大。則宜用革薺、五錢。當歸、白芷、皂角刺(炒)、薏苡仁、各一錢。白蘚皮、木瓜(不犯鐵器)、木通、金銀花、各七分。甘草、連翹、防風、各五分。茯苓、芍藥(炒)、各一錢。黃耆(炒)、二錢。川芎、生地黄、各八分。分作二三劑。清水煎服。幼者作一劑煎。分二三次服。

【舒筋活絡膏】

發明 驗方。

功用 治跌打損傷。筋骨痠痛。瘡瘍腫疼。

藥品 白芷、黃柏、木鱉子、各七錢五分。牙皂、麻黃、各五錢。大風子、七錢五分。細辛、四錢五分。甘松、一兩五錢。川芎、七錢五分。金銀花、當歸、甘草、各一兩五錢。杏仁、象皮、草烏、白芷、連翹、各七錢五分。黃

香、生地、各一兩五錢。赤芍、白薇、穿山甲、各七錢五分。天麻、五錢。火麻仁、三兩。巴豆、片薑黃、各五錢。香參、紫丹參、羌活、川烏、大黃、各七錢五分。丹皮、一兩五錢。蠶本、四錢五分。

制法及用法 上藥用香油十斤。煎枯去渣。煉至滴水成珠。加入黃丹五十兩收膏。待溫。將血竭、乳香、沒藥、各五錢。麝香、一錢。冰片、三分。輕粉、三錢。肉桂、七錢五分。共爲細粉。加入攪勻。大號每張用藥肉一兩。小號五錢。貼患處。每張約貼一二星期。

【替鍼丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 潰癰膿。

藥品 陳壞米、一錢。硃砂、五錢。雄雀糞、四十九粒。

制法及用法 研爲末。米粥和丸。如麥粒大。每用一丸。點瘡頭上。以膏藥貼之。半瞬。其膿自出。若瘡頭透膿不出。或出而愈痛。或發熱。血氣虛也。用托裏散。或作嘔。吐痰食少。體倦。脾氣虛也。用六君子湯。

【替鍼丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 潰癰膿。

藥品 白丁香、沒藥、乳香、各一字。硃砂。一字以上。

制法及用法 用石灰五升。爐灰三升。水五升。淋取清汁。入大鍋內。熬濃汁至二三升。用瓦器盛貯。臨用時以小膏匙盛取半盞。即用皮紙貼患中濃汁面上。安定後。取糯米十四粒。種在皮紙面上。一宿研爲細末。糯米飯和丸。如麥粒大。每用一丸。未破用津貼瘡頭薄處。即破。膿滯不快。則用一粒納瘡口內。使膿不滯。好肉易生。

【異功散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療癰中瘡。

藥品 亂骨(煨)、薄荷葉、蛇牀子、各二錢。輕粉、五分。

制法及用法 研爲極細末。每用少許。乾搽之。

【硫黃膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治面上生瘡。及赤白粉刺。百藥不效者。

藥品 生硫黃、白芷、胡楓根、鉛粉、各五分。羌活、七枚(去翅足)。全蠍、一枚。蟬蛻、五枚(洗去泥、一作七枚)。一方加雄黃、蛇牀子、各少許。

制法及用法 研爲細末。麻油、黃蠟各五分。熬烊離火。

入諸藥末調勻。瓷器收貯。久則愈妙。至夜洗面後。以少許細細擦之。擦過即拭去。否則起泡。近眼處勿擦。三四日間。瘡腫自平。赤色自消。鳳凰粉料。一夕見效。

【陽和解凝膏】

發明 見金生集方。

功用 專貼腦疽、背疽、乳疽、癰疽、凍瘡。及一切潰爛陰毒。兼治瘡癰。

藥品 牛蒡(取新鮮根葉梗)、三斤。川芎、白鳳仙梗(新鮮者)、各四兩。川附子、桂枝、大黃、當歸、肉桂、官桂、草烏、川烏、地龍、麝香、赤芍、白芷、白蘞、白芨、乳香、沒藥(均研細末)、各二兩。續斷、防風、荆芥、五靈脂、木香、香櫟、陳皮、各一兩。蘇合香油、四兩。麝香、一兩。

制法及用法 菜油十斤。先將牛蒡、白鳳仙、熬枯去渣。次將乳香、沒藥、麝香、蘇合香油外。餘藥均陸續入鍋煎枯。去渣濾淨。秤準斤兩。每油一斤。加黃丹炒透七兩。熬至滴水成球。不黏指爲度。撥下鍋來。將乳沒麝蘇合香油、入膏攪和。半月後可用。攤貼患處。若治瘡疾。貼背脊第三節骨上。**【黍米寸金丹】**

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治發背腦疽癰腫。附骨腫痛。須臾發熱。肢重體熱。

藥品 麝香、一分。南乳香、烏金石、輕粉(一作明砂)、雄黃、狗寶、沒藥、各一錢。蟾酥、二錢。硃砂、黃蠟、各三錢。硃砂、五錢。鯉魚膽、狗膽(乾用)、各一個。金頭蜈蚣、七條(全者酥炙黃色)。頭胎男孩兒乳、一合。

制法及用法 研爲細末。將黃蠟乳汁、熬成膏子。同藥和丸。如綠豆大。小兒丸如芥子大。每服一丸。病重者加服三丸。白丁香七個(研爛)。新汲水調下。勿令透風。如無頭瘡腫。三服立效。服藥後食白粥瓜瓞就睡。大妙。如口噤。但幹開牙關灌之立效。

十三筆

【隔紙膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內外癰疽。

藥品 當歸、白芷、黃連、五倍子、雄黃、沒藥、血竭、海螵蛸、白芨、白蘞、黃芩、厚朴、各五錢。黃丹、六錢。乳香(研)、二錢五分。輕粉、一錢。

制法及用法 研爲細末。令勻。清油調成膏。每用少許。

油紙貼敷瘡上。絹帛縛定。有膿水解開刮去不潔。再貼藥。如此數次。即愈。先用燒鹽湯洗淨。片帛拭乾。待片時。水氣乾。然後貼藥。

【隔紙膏】

發明 見胡公弼方。

功用 治內外癰瘡。

藥品 無名異(洗淨、微炒)、一兩。龍骨、血竭、乳香、沒藥、雄黃、牛黃、阿膠、海螵蛸、各二錢。赤石脂、鬱金、黃蘗、黃丹、各五錢。輕粉、一錢。

制法及用法 共爲細末。香油調。用黑傘紙刺孔作隔紙膏。先用鹽蔥花椒湯洗淨。拭乾。每用膏一個貼之。三日一換。

【隔紙膏】

發明 見曹羽文方。

功用 治白疔。

制法及用法 雄豬油。去皮膜。熬化冷定。入劈蓬立消丹。再加麻油二茶匙。飛丹三錢。收貯。搗隔紙膏貼之。

【萬金散】

發明 見三聖醫林集要方。

功用 治背疽。木硬堅闊。脈沉實者。及一切毒瘡。

藥品 大黃、一斤。白芷、六兩。

制法及用法 研爲末。每服三錢。熱酒調下。更以茶清調

塗患處。亦可水泛爲丸服。

【萬應膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治杖瘡不收口。

藥品 香柏、二斤(濾淨)。黃連、黃蘗、黃芩、各五兩。柏枝、槐枝、各一束(以上俱咬咀、去碎屑)。府丹、一斤(水飛、去標脚、曬乾)。乳香、沒藥、血竭、孩兒茶、各三錢(以上四味、用槌打碎和勻、入鍋中、炭火炒沸爲細末、篩篩過)。象皮灰(砂炒、去砂)、海螵蛸、各五分。半夏、一錢。龍骨、五分(以上八味、均研極細末、用極細之篩篩過、和勻)。阿膠、五分。

制法及用法 將香油入銅鍋中煎沸。入黃連、黃蘗、黃芩、槐、柏枝、煎三四沸。用細夏布或薄絹、紙濾去滓。揩淨銅鍋。仍入油於鍋中煎沸。納府丹。以槐條急攪。煎至滴水成珠。乘熱入瓷器中。再將上八味細末藥及阿膠漸入藥中。急攪不停。候和勻。去阿膠渣。藥冷爲度。杖後不可用手拍之。急以松香(明淨者)、水龍骨(煨灰存性)二味。研爲細末。鷄子清調敷。惡血自出(一方不用松香、而用大黃亦效)。若不收口。宜以此膏貼之。

【萬應膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治癰疽、發背、對口、痰核、流注。

藥品 川烏、草烏、生地黄、白蘞、白芨、象皮、官桂、白芷、當歸、赤芍藥、羌活、苦參、土木鱉、穿山甲、烏藥、甘草、獨活、玄參、定粉、大黃、各五錢。

制法及用法 除定粉外。用淨香油五斤。將藥浸入油內。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。候日數已足。入潔淨大鍋內。慢火熬至藥枯淨起爲度。住火片時。以布袋濾去渣。將油稱準。每油一斤。對定粉八兩。用桃柳枝不時攪之。以黑如漆。亮如鏡。滴入水內成珠爲度。每用少許。薄紙攤貼。

【萬靈丹】

發明 見張路玉氏醫鑑。

功用 治癰疽外證。狀若傷寒。頭痛發熱嘔渴。遍身拘急疼痛。左癱右瘓。口眼喎斜。半身不遂。及癘風麻木不仁。

藥品 茅朮、川烏頭(炮、去皮臍)、生何首烏、各二兩。全蠍(醋泡、炙黃)、石斛、天麻(煨)、當歸、甘草(炙)、川芎、羌活、荆芥穗、防風、麻黃、細辛、各一兩。硃砂(水飛淨)、明雄黃、各六錢。一方無甘草、雄黃、硃砂。有白麝香、草烏、腰黃。

制法及用法 研爲細末。煉白蜜杵勻。每兩者分作四丸。中者六丸。小者八丸。硃砂爲衣。瓷罐收貯。隨年歲老弱。病勢緩急酌用。空腹時葱白香豉湯或溫酒調服。服後以稀粥助令作汗。避風寒。忌食生冷。戒房事。孕婦忌之。

【萬病解毒丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治百病腐毒。

藥品 五倍子(搗碎、洗淨、焙乾)、三兩。山茨菇(去皮、淨末)、二兩。千金子(去殼油、淨霜)、大戟(去蘆焙乾爲末)、各一兩。麝香、三錢(另研)。

制法及用法 共研細末。糯米濃飲爲丸。分爲四十錠。每服一錠。熱湯化下。瘡口用東流水磨塗。

【萬靈黑虎丹】

發明 見經驗秘方。

功用 治一切外症。

藥品 益母草、五兩(炒成炭、退火研用三兩)。輕粉、四錢。青黛、六錢。血竭(另研)、乳香(炒去油)、沒藥(炒、去油)、各五錢。麝香、梅片、各二分五釐。蜈蚣(炒研)、七條。

制法及用法 共研極細末。收入小口瓶內。勿令洩氣。每

市少許。搽膏藥上貼之。初起即消。已成即潰。已潰即斂。

【萬靈黑虎丹】

發明 見馬氏方。

功用 提毒拔膿。消腫止痛。治癰疽。發背。對口。

藥品 蜈蚣(烘)、全蝎(烘)、蠟蠶(炙)、各七條。穿山甲(炙)、七片。磁石(飛)、公丁香(炒)、桂丁香(炒)、元寸香、冰片、各一錢。

制法及用法 共研極細末。收入小口瓶內。勿令洩氣。每用少許。搽膏藥上貼之。初起即消。已成即潰。已潰即斂。

【萬靈奪命丹】

發明 見郭氏方。

功用 治一切瘡癰。疔疽初起。脈沉實。及服汗藥後。毒氣在裏不盡者。

藥品 礞砂、鹽花、各二錢五分。雄黃、生明礬、楓香、各二錢。赤石脂、黃丹、琥珀、輕粉、各一錢五分。麝香、片腦、各一錢。

制法及用法 研爲末。用巴豆(去殼、清水煮十沸)、蓖麻子各四十九個。研膏和藥末爲丸。如和不就。加煉蜜成膏。收瓷器內。至用時。旋丸如茱萸大。每服一丸。并花水或熟湯送下。忌食熱物半日。小兒

以意加減與服。

【萬靈奪命丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治一切疔毒入脈。煩悶厚心。兼治癰疽。發背。惡瘡。

藥品 礞砂(水飛)、蟾酥(人乳汁泡)、輕粉、膽礬、各五錢。銅綠、血竭、各一兩。雄黃、枯礬、各二兩。

制法及用法 共研細末。麪糊爲丸。如茱萸大。每服一丸。令病人先將葱白三寸嚼爛。吐在手心。將丸包在蔥內。熱湯送下。出汗爲效。

【聖效散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治潰瘍毒已盡。收斂斂口。

藥品 黃礬(去粗皮、細切、炒黑)、穿山甲(炒黃)、各一兩。檀榔、木香(炒黃)、各五錢。生雞子殼、七枚。

制法及用法 研爲細末。候大膿出盡。先以蛇牀子煎湯洗淨。每用少許。乾摻瘡上。

【聖靈丹】

發明 見王維德外科證治全生集。

功用 化毒。去腐。生肌。收口。治楊梅結毒。腐爛臭穢。久而不愈。

藥品 珍珠、牛黃、冰片、各一錢。滴乳石、二錢。琥珀、四錢。劈砂、三錢。

制法及用法 研粉。入飛麪四兩。各研極細。和勻。每服五分。土茯苓湯調下。外去飛麪參之。

【聖靈解毒丸】

發明 驗方。

功用 治楊梅結毒、橫痃下疳、坑瘡、花柳毒、上攻五寶。內陷五臟。遍身斑點。四肢結毒。或發於頭面咽喉。或形如膿窠癰瘡等症。

藥品 川黃連、腰黃、犀角、各一兩。小生地、四兩。川黃蘗、全蟲、黃芩、防風、各二兩。天花粉、大黃、赤芍藥、各三兩。滴乳石、四錢。西牛黃、一錢。珍珠、三錢。

制法及用法 各取淨粉。鮮土茯苓五斤。煎膏打丸。如梧桐子大。每服二三錢。土茯苓露四兩。燉酒送下。諸症初起。邪火方盛者宜之。若久病氣血已虛者。宜五寶丹。

【滋陰清化丸】

發明 見顧世澄癆醫大全。

功用 治肺癆。

藥品 天門冬(去心)、麥門冬(去心)、枸杞子、知母(酒洗)、當歸(酒洗)、生地黃(酒

洗)、熟地黃(酒洗)、川貝母(去心)、各二兩。北五味、七錢。牡丹皮、山茱萸肉、玄參、各一兩。白茯苓、山藥、各一兩五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。空腹時熱湯送下。

【補肺散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺癰已吐出膿血。須以爲潤護者。

藥品 鍾乳粉、一兩。白滑石、二兩。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。米飲調下。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治附骨癰一切惡瘡。

藥品 當歸、五錢。甘草、一兩。梔子、十二枚。木鼈子、一枚(去殼)。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。冷酒調下。

十四筆

【翠玉膏】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治瘰癧。

藥品 漂青、一兩。黃蠟、銅綠、各二錢。沒藥、乳香、各一錢。

制法及用法 先將銅綠研爲細末。入香油調勻。又將黃蠟、瀝青、火上熔開。次下銅綠。攪勻。再將乳香、沒藥。旋入攪勻。用河水一碗。將藥傾於內。用手扯拔勻。油紙裝。看瘡大小。分大小塊。捻成餅子。每用一餅。貼於瘡上。紙封。三日一易。

【翠玉膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治癰膿結。

藥品 明松香、四兩。銅綠、二兩。蛇豬膽、三個。麻油、三錢。

制法及用法 先將松香熔化。入油令沸。再下膽汁、銅綠攪勻。入水中。以手扯拔。去火毒。瓷盒收貯。用絳光絹貼瘡大小攤貼。不必更換。聽其自落。

【奪命丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疔瘡。大便秘實不通。或心腹痛。

藥品 巴豆(去殼)、大黃、各一錢。鬱金、雄黃、乳香、各五分。硃砂、黃丹、各三分。輕粉、二分。麝香、少許。蟾酥、不拘多少。

制法及用法 共研細末。麵糊爲丸。如綠豆大。每服五七

丸至九丸。茶清送下。

【奪命丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治陰陽二氣疔寒熱。及疔瘡惡心。諸惡瘡腫痛者。

藥品 蟾酥(乾者、酒化、一作二錢)、輕粉、各五分。辰砂、三錢(水飛、爲衣、一作一錢)。白礬(煨枯)、寒水石(水飛、一作煨、一作二錢)、各一錢。銅綠(一作二錢)、麝香(一作五分)、各一字(一作各一錢)。蝸牛(連殼另研、一作三十一個、一作二十一個)、二十個。一方多乳香、沒藥、血竭、各一錢。雄黃、二錢。白砒(麝髮火煨)、五分。

制法及用法 除蝸牛研爛如泥外。餘研爲細末。和勻爲丸。如不能成。再加好黃酒少許。打三五百下作丸。如綠豆大。每服二三丸。先用薑白三五莖(一作一寸)。令病者嚼爛。自吐於手心內。男用左手。女用右手。將藥丸裹入葱泥內。用紙灰酒一大鍾。溫熱送下。如人行六七里。被蓋汗出爲度。重者不過三服。不可多用。忌冰水。

【奪命散】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治疔瘡。

藥品 烏頭尖、附子底、蠟梢、雌黃、雄黃、各一錢。蜈蚣、一兩。硃砂、粉霜、輕粉、各五分。砒、二錢五分。腦子、麝香、各少許。

制法及用法 研爲細末。先破瘡出惡血。以草杖頭用紙帶藥末插入於內。以深爲度。

【奪命散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘡疹已發未發。

藥品 升麻、糯米、紫草、甘草、各五錢。木通、二錢五分。

制法及用法 剉爲散。每服一錢。清水七分。煎至四分。去滓溫服。

【銀粉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治下疳腐爛作痛。及楊梅瘡熏後結毒。陰莖腐爛。

藥品 壁上白螺螄殼、不拘多少。

制法及用法 火煨酥爲末。飛過。先去土石粗者。次加輕粉等分。入藥末內。每用少許。乾貼瘡上。

【銀粉散】

發明 見曹振先方。

功用 生肌、止痛。治下疳。並舌斷。

藥品 水銀、輕粉、各二錢五

分。黑鉛、五錢。寒水石、三錢五分。硼砂、珍珠、各一錢。

制法及用法 先將黑鉛化開。投水銀研不見星。共爲細末。收好錫六錢。化開。入硃砂末二錢。攪炒砂枯。去硃砂留錫。再化開。入水銀一兩和勻。傾出聽用。又將杭粉一兩。鋪夾紙上。捲成一條。以一頭點火。燃至紙盡。次去粉灰。單用粉同前錫末。加輕粉一兩。共研極細末。貯收。用甘草煎湯漱洗患處。拭乾。以此藥搽上。

【銀粉膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治秋瘡。

藥品 光粉、一兩。乳香、沒藥、赤石脂、樟腦、各一錢。水銀、二錢五分。

制法及用法 研爲末。用豬脂二兩。黃蠟五錢。熔化調末成膏。每用少許。油紙攤貼。

【綠袍散】

發明 驗方。

功用 治口疳。疔瘡。

藥品 黃藥、二兩。青魚膽、一兩。人中白、青黛、梅花冰片、膽礬、硼砂、各三錢。

制法及用法 先將黃藥火上炙乾。取起。以魚膽塗上。再炙再塗。以膽盡爲度。切片。

研末。再加其餘各藥。研末。每用少許。乾貼患處。

【綠雲散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治灸瘡疼痛。

藥品 柏葉、芙蓉葉、各等分（並端午日午時採取、陰乾用）。

制法及用法 研爲細末。待灸瘡黑盡脫落。即用少許。水調如膏藥。攤紙上貼之。

【綠礬散】

發明 見危亦林世醫得效方。

功用 治甲疽。

藥品 綠礬、五錢（燒熟）。蘆薈、二錢五分。麝香、一字。

制法及用法 研細如粉。絹袋盛藥。納所患指於袋中。以線紮定。至瘡爲度。

【熊膽膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治急疔。

藥品 熊膽、五錢。蝮蛇膽、蘆薈、牛黃、各一分。龍腦、麝香、各一分。

制法及用法 研爲細末。井花水一小盞。攪和勻。以瓷器盛。置湯慢火熬成膏。每服一豆大。薄荷湯化下。兼塗患處。

【熊膽膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疔瘡不瘥。

藥品 熊膽、蝮蛇膽、蘆薈、各五錢。黃礬、一分（瓜洲者良）。麝香、牛黃、各一分。龍腦、一錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。井花水三合。攪勻。盛銀器中。重湯煮成膏。每用少許。塗於患處。

【熊膽膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切惡瘡。

藥品 熊膽、一錢。膩粉、一錢二分。雄黃、麝香、各五分。檳榔、一字。

制法及用法 研爲末。和勻。於臘月用獺膽、一枚。取汁和藥。仍入膽內。綿繩繫定。揉勻。以松明黑燄熏遍黑。掛於陰處。惡瘡有指面大者。用如黍米大貼之。如錢大者。用如綠豆大貼之。恐藥乾難貼。薄以津唾調如稀糊塗之。仍用薄樺皮蓋貼。舊帛繫之。藥不可多。

【漏蘆丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣生瘡膿血疼痛。

藥品 漏蘆（去蘆）、秦艽（去蘆）、萎蕤、枳殼（去瓢、麩炒）、檳榔、川大黃、各一兩。防風（去蘆）、獨活（去蘆）、黃耆（去

蘆)、黃芩、五加皮、赤芍藥、各七錢五分。烏蛇、二兩(酒浸)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三四十丸。不拘時溫酒送下。

【漏蘆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風癰瘡。熱腫。

藥品 漏蘆(去蘆)、川升麻、木通(去皮)、赤芍藥、甘草(炙)、防風、各一兩。羌活(去蘆)、枳殼(去穢炒)、川朴硝、各二兩。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一大盞。煎至六分。去滓。食後溫服。

【蒺藜丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎風瘡。

藥品 白蒺藜(去刺)、一兩。綿黃耆、牛膝、各五錢。羌活、獨活、川芎、防風、木香、白附子、各二錢五分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時鹽湯送下。後用木香、檳榔、防風、白芷、各二錢。白芨、一錢。龍骨、五分(煅、另研)。麝香、一字(另研)。蛇蛻、一條(煅灰)。膩粉、十五箇。研爲細末。和勻。先以鱸魚、一條(搗碎)。加白部、一兩

(切碎)。南椒、三銖。油、一兩。煎令得所。去藥。只用油塗瘡口。再敷藥末。油紙裹之。三日一換。每用藥時。先以柳枝、甘草、煎湯洗瘡。拭淨乾敷藥。

【蒲黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡血出。腹脹欲死。

藥品 蒲黃、生地黃、各一兩五錢。黃耆、當歸、芍藥、白芷、續斷、各一兩。甘草(炙)、三分(一作五錢)。

制法及用法 研爲細末。每服三錢匕。空腹時溫酒調下。日三四服。血化爲水而下。若口噤。斡開口與之。再加大黃一兩五錢調服。

【碧玉散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治燕窩瘡。色紅。疙瘩。津水黃色。

藥品 黃蘗末、紅棗肉(燒炭存性)、各五錢。

制法及用法 研爲極細末。香油調搽。

【絳葭散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽。發背。一切癰毒。

藥品 絳葭草、小薊根、五爪龍、生大蒜、各等分。

制法及用法 研爲細末。酒和勻。濾去渣。服一匙。得通身大汗而愈。

【鳳衣散】

發明 醫宗金鑑方。

功用 治下疳腐爛。四週腫痛作癢。膿水淋漓者。

藥品 鳳凰衣(焙)、黃丹(飛)、各一錢。輕粉、四分。冰片、二分。

制法及用法 共研極細末。密貯。無洩氣。破爛處乾搽。腫痛處用雞蛋清調敷。一日四五次。

十五筆

【摩風膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治面上或身上風熱浮腫。癢如蟲行。肌膚乾燥。時起白屑。次後極癢。抓破流水。或破爛見血。痛楚難忍。

藥品 麻黃、五錢。羌活、一兩。升麻、防風、各二錢。白檀香、白芷、當歸身、各一錢。

制法及用法 用香油、五兩。將藥浸五日。文火燉黃。即撈去渣。加黃蠟、五錢。熔化盡。用絹濾過。搗冷。每用少許。塗抹患處。十日可愈。

參考 按用蓖麻子、一兩(去皮研)。草烏頭、五錢(生去皮、

一作川烏頭)。乳香、一錢(另研、一作一錢五分)。以豬脂煉去沫成膏。再入藥攪勻。名同上。治風毒攻注。筋骨疼痛。塗摩攻注之處。以手心摩挲。覺如火之熱。再塗摩患處。又用附子、川烏頭、防風、各二兩。凌霄花、躑躅花、露蜂房、各一兩。研爲細末。用豬脂、三斤。煎煉看藥焦黃。去滓候冷。收磁器中。名同上。摩擦患處。以瘡爲度。又用硫黃、密陀僧、膩粉、乳香、杏仁、白殭蠶(炒)、研極細末。酥調成膏。名同上。治白癩風。先以漿水洗瘡。以生布擦破塗之。日夜四五次。餘不多贅。

【蝦蟆散】

發明 見鮑相璈驗方新編。

功用 治一切無名腫毒、惡瘡、陰疽、鼠瘻、楊梅結毒等證。久不收口。

藥品 硫黃、三錢。胡椒、二錢。

制法及用法 共研爲細末。調勻。取大癩蝦蟆、一個(眼紅腹無八字紋者勿用)。將藥納入口中。用線將口捆緊。外用黃泥包裹。入炭火中燒之。俟泥剛紅透取出。用碗蓋住。候冷去泥。取蝦蟆磨爲細末(忌鐵器)。調小磨麻油。用淨鴨翎

(舊筆亦可)蘸敷患處。候出惡水。數日毒盡即愈。永戒食蝦蟆。

十六筆

【癰癰丸】

發明 烏醫大全方。

功用 治淋巴腺結核腫脹。

藥品 元參、五兩。海藻、一兩。薄荷、一兩。天花粉、一兩。連翹、一兩。甘草、一兩。桔梗、一兩。炒枳殼、一兩。海粉、一兩。青鹽、五兩。象貝母、一兩。生地、一兩。白蘞、一兩。大黃(製)、一兩。夏枯草、八兩。當歸、一兩。芒硝、一兩。

制法及用法 除夏枯草、芒硝外。餘藥共研細粉。用夏枯草煎湯。芒硝化水。泛丸如綠豆大。每次三錢。開水送服。

【龍骨散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治臍瘻。

藥品 龍骨(煨)、枯礬、各等分。

制法及用法 研爲末。每用少許。摻於患處。

【龍骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治臍瘻。

藥品 龍骨(煨)、輕粉、各五

分。黃連(去鬚)、一錢五分。

制法及用法 研爲極細末。每用少許。乾摻臍上。

【龍骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚疽。及久遠惡瘡。

藥品 白龍骨(研)、輕粉、各二錢五分。檳榔、一錢(研)。蜈蚣(不拘多少、新瓦上焙乾、再入火中燒令紅、取出存性、研爲細末)、五錢。

制法及用法 共研令勻。先以口含鹽水。或溫鹽湯。洗令瘡淨見肉。再以真麻油調藥。隨瘡大小敷之。未愈再敷。三四日可愈。

【龍膽丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腦疳。及腦熱瘻。

藥品 龍膽草、升麻、苦楝樹皮(焙)、赤茯苓、防風、蘆薈、油髮灰、各二錢。乾青黛、淨黃連、各三錢。

制法及用法 研爲末。蜈蚣膽汁浸糕糊丸。如麻子大。每服二十丸。薄荷湯送下。仍以蘆薈末搗鼻。

【醒消丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 消諸癰。

藥品 乳香、沒藥(均去油)、

各一兩。麝香、一錢五分(一作三分)。雄精、五錢。

制法及用法 先將乳沒雄三味。各研秤準。再和麝香共研。煮爛黃米飯一兩。入末搗爲丸。如菜菔子大。曬乾(忌烘)。每服三錢。熱陳酒送下。醉覆取汗。酒醒癰消。孕婦忌服。

參考 按全生集犀黃丸方。即本方去腰黃。用牛黃。故彼又稱西黃醒消丸。示與本方有別。說者謂爲外科極妙之劑。治白疽。與陽和湯相輔用之。尤見奇效。所謂西黃者。即牛黃之產於陝西甘肅者。入藥最勝。詳見本書該方。

【樺皮散】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治風濕肺癰。風毒。瘡疥。癰疹。

藥品 樺皮(燒灰存性)、枳殼(去蘊、用炭火燒存性、一作炒、二兩)、各四兩。荊芥穗、杏仁(去皮尖雙仁、清水一碗、煎至減半、取出、令乾、另研、一作鉄炒)、各二兩。甘草(炙)、五錢。一方有生甘草、五錢。亞麻、三兩。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢至四五錢。食後溫酒或熟湯、米飲、調下。

【獨勝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽。

藥品 香附子(去毛令淨、以生薑汁淹一宿、焙乾、研極細)。

制法及用法 每服二錢。不拘時熱湯調下。

參考 癰疽多因鬱怒得之。若有此疾。心中必易忿怒。但服香附。進食寬氣。自有效。

十七筆

【螵蛸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治頭上黏瘡。

藥品 海螵蛸、二錢。白膠香、輕粉、各五錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。先用清油潤瘡。後搽藥。只一上可愈。

【螵蛸散】

發明 見張景岳方。

功用 治溼熱生瘡。水淋漓。或下部腎囊足股腫痛。下疳諸瘡。

藥品 海螵蛸(不必浸淡)、人中白(或人中黃亦可)、各等分。

制法及用法 研爲細末。先以百草多煎濃湯。乘熱薰洗。後以此藥搽之。如乾者。以麻油或熟豬油。蜜水。俱可調塗。

如腫而痛甚者。加冰片少許更妙。若溼毒膿水甚者。加密陀僧等分。或煨過官粉亦可。或煨爐甘石更佳。

【薄荷散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒瘡疹初起。

藥品 薄荷葉、一兩。麻黃(去節)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。清水一中盞。加大棗二枚。生薑三片。煎至六分。去渣溫服。每日服二三次。

參考 小兒稟受壯實。毒氣甚者宜之。蓋此方云。小兒纔覺是疹痘便服之。服之而汗出者服調中散。服薄荷散、若作寒熱脈反遲者。進脫齒散以溫之。詳其理非下藥之法也。實者服之未必安。虛者用之必危殆。

【薏苡附子散】

發明 見金匱要略。

功用 治腸癰。

藥品 薏苡仁、十分(炒)。附子、二分(炮)。敗醬、五分。

制法及用法 杵爲散。每服方寸匕。清水二升(一作二合)。煎減半。頓服。小便當下(後人改爲三味各一兩一分、每服四錢、清水一盞半、煎至七分、去滓、空腹時服)。

參考 此方爲辛熱之劑。心

氣抑鬱不舒。則氣結於小腸之頭。阻傳道之去路。而爲癰腫。即內經所謂臟不容邪。則還之於腑也。故重用薏苡。開通心氣。榮養心境。佐以敗醬。化膿爲水。使以附子。一開手太陽小腸之結。一化足太陽膀胱之氣。務令所化之毒。仍從水道而出也。

十八筆

【鵝黃散】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治梅毒潰爛成片。膿穢多而疼甚者。

藥品 石膏(煨)、黃蘗(炒)、輕粉、各等分。

制法及用法 研爲細末。乾搽爛處。即可生疤。再爛再搽。毒盡乃愈。

【鵝黃散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治瘰癧瘡作癢。抓之皮損。隨後又疼者。

藥品 綠豆粉、一兩。黃蘗、三錢。輕粉、二錢。滑石、五錢。

制法及用法 共研細末。輕絹帛蘸藥。撲於患上。止痛收乾。

【雞眼膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治雞眼。

藥品 芋薺、噤酥(線穿陰乾)、火丹草(陰乾)、蓖麻子、桃仁、穿山甲、三棱、紅花、蓬朮、天南星、各二錢。鱧魚血、半杯(陰乾爲末)。鷄肫皮(不見水)、十個。河豚眼(陰乾)、十枚。虎耳草(陰乾)、阿膠、各一錢五分。麝香、三分。麻油、六兩。黃丹(飛)、三兩。

制法及用法 熬膏。將鷄眼修淨攤貼。

【雞眼膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治雞眼。

藥品 鮮白朮(用外面綠皮)、不拘多少。

制法及用法 搥碎。桐油熬枯去渣。滴水成珠。不散爲度。加雄黃少許攪勻。收貯。先將鷄眼熱水泡軟。貼上。一伏時揭下。內有紅絲拔出。

【雞內金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治穀道生瘡。日久不愈。

藥品 雞腔脰、不拘多少。

制法及用法 燒灰存性。研爲極細末。每用少許。乾貼患處。

【蟬花散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治犬咬蟲嚙諸傷。或

諸瘡潰爛。夏日生蛆。臭惡不可近。及小兒痘爛生蛆者。

藥品 蟬殼(洗淨、焙)、青黛(澄去灰土)、各五錢。蛇退皮、一兩(火燒存性)。細辛、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。溫酒調下。一日二次。如六畜損傷成瘡。用酒灌下。如犬咬傷用醇子和食。蛆皆生爲水。蠅亦不敢再近。又以生寒水石細末乾之。

【瞿麥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽。發背。排膿。止痛。利小便。

藥品 瞿麥、桂心、赤芍藥、當歸、黃耆、芎藭、白蘇、麥門冬(去心)、各等分。赤小豆、一合(酒浸、炒乾)。

制法及用法 吹咀。每服四錢。酒煎溫服。如諸癰已潰未潰。瘡中膿血不絕。痛難忍者。加細辛、白芷、薏苡仁。

【藍葉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治渴癰。口乾煩熱。背生癰疽。赤癰疼痛。

藥品 藍葉、升麻、玄參、麥冬(去心)、黃耆、葛根、沉香、赤芍藥、犀角屑、生甘草、各一兩。大黃、二兩(微炒)。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一中盞。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【檳榔散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽潰後觸寒。腫軟僵硬。膿水清稀。內膿空虛。惡汁臭敗。或瘡邊乾燥。肌肉不生。

藥品 檳榔、木香、黃連、各等分。

制法及用法 研爲細末。每用少許。敷於患處。

【嶸嶸丸】

發明 見全生集方。

功用 治金瘡出血。跌撲損傷。瘀血奔心。昏暈不省。一切無名腫毒。昏困欲死。發背癰疽。惡瘡癰癰。杖刑犬咬。蜂蛇蠍毒。吐血癆瘵。喉口傷寒。婦人難產。下部重傷。惡血攻心。胸悶發熱。產後惡露不盡。兒枕骨疼。寒熱。乾血癆。血崩。血淋。白帶。小兒急慢驚風。牙關緊閉等危症。

藥品 牛黃、冰片、麝香、各一錢五分。阿膠、雄黃、各一兩。生大黃、孩兒茶、天竺黃、廣三七、爪兒血竭、乳香(去油)、沒藥(去油)、藤黃(以秋荷葉露泡之、隔湯煮十餘次、去浮沉取中、山羊血拌入曬乾)、各

二兩。山羊血、五錢(無鮮者以小子羊鮮心血代之)。一方無麝香。一方無大黃、乳香。一方無兒茶、山羊血。有五銖錢、四個(火煨紅醋淬七次)。

制法及用法 共研細末。取秋露水、將藤黃化開。并藥搗丸。白蜜二兩。黃蠟六錢。同煎化。離火攪勻。乘熱爲丸。分爲二種。一重三分。一重五分。陰乾。忌火烘。外用黃蠟封固。如在夏天修合。取天落水背之。爲丸。每服一丸。輕者三分。重者五分。無灰酒嚥化。盡量飲醉。蓋被取汗。外症用茶酒或黃酒磨塗。忌食一切生冷發物。

十九筆

【蟾酥丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疔瘡。一切惡瘡。

藥品 蟾酥、輕粉、各一錢。川烏、蓮花蕊、硃砂、各一錢五分。乳香、沒藥、各二錢。麝香、五分。

制法及用法 共研細末。米糊爲丸。如豌豆大。每服一丸。病重二丸。蔥白麥。熱酒送下。取汗。

【蟾酥丸】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治疔毒初起。及諸惡瘡。外用化腐消堅。內服驅毒發汗。

藥品 蟾酥(酒化)、雄黃、各二錢。輕粉、銅綠、枯礬、寒水石(煨)、膽礬、乳香、沒藥、麝香、各一錢。硃砂、三錢。蝸牛、二十一個。

制法及用法 研爲末。於端午日午時。在淨室中。先將蝸牛研爛。同蟾酥和研稠黏。方入各藥。共搗極勻。和丸如綠豆大。修合時。忌婦人雞犬等見之。每服三丸。用葱白五寸。令患者嚼爛。吐於手心內(男用左手、女用右手)。將藥丸裝入葱泥內。用無灰熱酒一茶鍾送下。被蓋。約人行五六里路。病者出汗爲度。甚者再用一服。如外用之法。搗條作餅。隨證用之。

【蟾酥丸】

發明 見王維德全生集。

功用 治一切疔瘡、腦疽、發背初起、紅腫疼痛。及無名腫毒。

藥品 寒水石、蟾酥(酒化)、蜈蚣(去足)、各三錢。血竭、乳香(去油)、沒藥(去油)、雄精、膽礬、銅青、膽礬、全蠍(酒炒)、穿山甲、各一錢。紅砒、枯礬、硃砂、冰片、皂刺、輕粉、各三

分。蝸牛、二十一個。

制法及用法 各研粗末。酒化蟾酥爲丸。金箔爲衣。每服一錢。用葱裹包。陳酒送下。醉者出汗。癰疽忌用。

【蟾酥餅】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治疔瘡。腦疽。乳癰。附骨疽。臂癰。一切惡症。或不痛。或大痛。或麻木者。

藥品 蟾酥(酒化)、沒藥(去油)、乳香(去油)、明雄黃、巴豆霜、各二錢。潮腦、硃砂、各一錢。輕粉、五分。麝香、三分。

制法及用法 各爲細末。於端午日午時。在淨室中。用蟾酥酒和丸。如菰豆大。每用一丸。口津調貼。以膏蓋之。此藥爲條爲丸爲餅。聽便施用。

【藜蘆膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘡口旁肉凸起。

藥品 藜蘆、不拘多少。

制法及用法 研爲末。生豬脂搗和成膏。每用少許。塗於患處。

【藜蘆膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸癰瘡生蟲。

藥品 藜蘆、松脂(細研)、苦參、雄黃(細研)、白礬(煨枯)、各二兩。

制法及用法 先搗藜蘆、苦參爲粗末。入豬脂一斤相和。煎一餘沸。綿濾去滓。次入松脂、雄黃、白礬等末。攪令勻。待冷。瓷盒收貯。每用少許。塗於患處。以摩爲度。

【離宮錠】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治疔瘡腫毒。一切皮肉不變。漫腫無頭。

藥品 血竭、膽礬、蟾酥、各三錢。硃砂、二錢。京墨、一兩。麝香、一錢五分。

制法及用法 研爲末。涼水調成錠。每用一錠。涼水磨濃塗之。

二十筆

【鯽魚膏】

發明 見吳近宸方。

功用 治一切無名腫毒。膿窠疔癰。

藥品 活烏背鯽魚、大蝦蟆、各七個。蓖麻仁、十二兩。

制法及用法 麻油、二斤。同鯽魚、蝦蟆、蓖麻文武火熬枯。濾去渣。熬至滴水成珠。離火。入輕粉四兩。鉛粉十二兩。瓷器收藏。每用少許。攤貼患處。未成即消。已成拔毒提膿。

【鯽魚膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治癰疽疔瘡。

藥品 大鯽魚、一尾。巴豆、四兩。蓖麻仁、六兩。甘草、五錢。

制法及用法 用菜油、麻油各一斤。先將鯽魚炸枯。去渣。再入巴豆、蓖麻、甘草。熬枯濾淨。熬濃離火。將鉛粉徐徐按下。攪勻成膏。每用少許。攤貼患處。

【鯽魚膏】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治諸瘡腫毒。潰破流膿。並治脚生雞眼。

藥品 活大鯽魚、五尾。巴豆肉、蓖麻子(去殼)、各六兩。香油、一斤八兩。蝦蟆、二個(每個啣人髮一團)。

制法及用法 先將巴豆肉、蓖麻子入油內浸三日。再將蝦蟆浸一宿。臨熬時。入活鯽魚共熬枯。去渣淨。慢火熬油。滴水成珠。離火。傾乾淨鍋內。再加鉛粉二斤八兩。乳香末五錢。不時攪動。冷定爲度。重湯燉化。薄紙攤貼。永戒食蝦蟆。但乳巖及一切色白陰疽均忌用。

【蘆薈散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治諸瘡毒水淋漓。並治坐板瘡。

藥品 蘆薈、一兩。甘草、五錢。

制法及用法 共研細末。先用豆腐水洗淨。將藥敷上。數日即愈。

二十一筆

【護心丹】

發明 見陳寶才外科正宗。

功用 治癰疽疔瘡。毒氣攻心。口乾煩躁。惡心嘔吐。

藥品 綠豆粉、二兩。乳香(去油)、一兩。甘草(炙)、五錢。辰砂(水飛)、二錢。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。熱湯調下。早晚各一次。

參考 此方原爲預防毒氣入心而設。故用辰砂以爲心經之嚮導。然性最沉著。不若易以沒藥而無鎮固毒邪之患也。

【護心散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治發背。癰疽。發腦。發鬚。發鬚。疔瘡煩躁發狂。及頭虛頭暈風溼之證。

藥品 綠豆粉(炒)、二錢。甘草(炙)、硃砂(研、水飛過)、各一錢。

制法及用法 研爲細末。熱湯調下。

【護心散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治疔瘡及一切入癰大毒。毒氣攻心。神昏嘔吐。

藥品 綠豆粉、一兩。乳香、五錢(用燈心、一錢二分、同炒枯、去燈心不用)。燈心炭(用活竹一段、留兩頭、節中開一眼、以燈心填滿、用竹塊塞緊、加泥封好、放穀殼火內、煅至竹成爲炭、取竹內燈心用)、三錢。

制法及用法 共研末。甘草一兩。煎湯送下。分數次服。輕者即愈。重者再服醒消丸。以平其勢。或用蝦蟆拔毒法更妙。

【鐵扇散】

功用 治金瘡、跌打損傷。

藥品 象皮、五錢(切薄片、用小鍋焙黃、使之乾而勿令焦)。生龍骨、五錢(上白者)。老材香(如無以數百年陳石灰代之)、寸柏香、松香(同寸柏香同化、打勻、傾水中、候冷取出)、白礬(入鍋熬透)、各一兩。

制法及用法 共研細末。貯磁罐中。遇受傷出血如注。搽藥急攪。血凝結痂。無痕無病。切不可使傷者坐臥擾地。夏宜涼處。冬忌火爐。傷處如腫。單用黃連水。鷄翎蘸洗。倘不流血。不必用扇。無論傷重。俟有氣息。收效不出數日。即

斷指墮地。他指尙溫。能接如常。被傷者越潰危急亦治。再創口忌布紮綿包。與置身煖處。恐得煖。則血難凝結。收效遲緩。

【鐵粉散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治冷疔。蝕腐。生肌。

藥品 鐵砂(如無、用黑鉛四兩、鐵杓化開、傾水中、候冷定取出、再化再傾、以鉛化盡爲度、去水、取末三錢)、黃丹(飛)、輕粉、松香、各一錢。麝香、一分。

制法及用法 各研細末。共和一處。再研勻。先以葱湯洗去血水腐臭。香油調藥。塗於患上。油紙蓋之。線紮。

【鐵箍散】

發明 見青囊方。

功用 治癰疽。

藥品 芙蓉葉、生大黃、牛蒡子、白芨、雄黃、各等分。

制法及用法 共研細末。看瘡勢大小。或用三錢或五錢。以雞翎攪入雞蛋清內。調敷四圍。束毒。不致走散開大。

【鐵箍散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治癰疽、發背、疔毒初起。

藥品 雄黃、熊膽、硃砂、各

二錢。京墨、五錢。麝香、三分。

制法及用法 共研細末。醋調敷。已成。祇用京墨磨汁。調敷四圍。

【鐵箍散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治腫瘍。

藥品 芙蓉葉(重陽日採、陰乾)、薑黃、五倍子(炒、去蟲)、白芨、白蘇、蟹殼(一作五個)、各五錢。生大黃、陳小粉(炒黑、一作二兩)、各一兩。

制法及用法 共研細末。熱米醋調如稀糊。敷圍。中留一孔透氣。初起立消。已成毒不走散。未潰有膿即潰。已潰膿即退出。

【鐵箍散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治諸般腫毒。

藥品 草烏、知母、天花粉、半夏、天南星、五倍子(炒)、芙蓉葉、各等分。

制法及用法 研爲末。蜜醋燉熱。調敷四圍。中留一孔透氣。

【鐵箍散】

發明 見吳丹垣方。

功用 治腫瘍陽瘡。根脚收斂。

藥品 五倍子、一兩(微炒)。

生大黃、四錢。秋芙蓉葉、六錢。一方加寒食麵、五錢。

制法及用法 醋一鍾。入杓內熬滾。投藥末攪勻。敷患上。留頂。紙蓋。乾則以醋掃之。陰疽以及皮色不變漫腫無頭者。不可敷。

【鐵箍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切癰疽、癰瘡。

藥品 芙蓉葉、黃蘗、大黃、五倍子、白芨。

制法及用法 研爲末。清水調敷四圍。

【蠟礬丸】

發明 見淮安楊氏祕方。

功用 治癰疽。定痛。生肌。化膿。厚膜。解毒。去穢。

藥品 黃蠟、白礬（如胡桃大）、各一塊（研）。蛇蛻、一條（陰陽瓦焙、研）。銀硃、一錢。

制法及用法 先將蠟熔化。入蜂蜜少許。再下生礬、蛇蛻、銀硃末。攪勻。將銅札放滾水內。急搓爲丸。如梧桐子大。先令患者洗浴。飲熱酒數杯。初服二十一丸。儘量飲酒。被蓋取汗。初起即消。已成疼痛不可忍者。服之可止一半。已潰服之。必出稠厚黃膿。量人虛實與服。第一日服二十一丸。第二日祇服十九丸。逐日

遞減兩丸。服至一丸爲止。

【蠟礬丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 托裏。消毒。排膿。止痛。固臟腑。療癰疽。發背。癰瘰。瘰癧。惡瘡。腸肺生癰。偏身生瘡。狀類蛇頭者。

藥品 黃蠟、五錢（一作七錢）。白礬、一兩（通明者、細研）。

制法及用法 焙化黃蠟。和礬爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。漸加至三十丸。食遠溫湯送下。每日三次。初起未破內消。已被自合。忌食雞肉三月。

【麝香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治妬精瘡癢而溼者。

藥品 麝香、黃礬、青礬、各等分。

制法及用法 研爲細末。小便後。每用少許敷之。

二十四筆

【靈寶如意丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治發背疔疽大毒。

藥品 人參、乳香（去油）、沒藥（去油）、辰砂、甘草、兒茶、各一錢。琥珀、珍珠、各二分。阿

膠、白芷、冰片、各一分。西牛黃、麝香(富門子)、各五分。

制法及用法 共研細末。瓷瓶密貯。勿洩藥味。先將瘡月全銀花、甘草、煎湯洗淨。每日搽藥四五次。用膏蓋之。膿水自然拔盡。忌口味。戒煩惱。慎勞碌。

痘疹丹毒類

一 筆

【一捻金】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治丹毒。唇焦便秘。

藥品 人參、大黃、黑丑、白芷、檳榔、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一字。蜜水調下。

【一粒金丹】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治痘疹。及痘黑陷倒靨。乾枯不起。

藥品 肥兒脾、原蠶蛾、冰片、各二分。鴉片、三分。麝香、一分。

制法及用法 研爲細末。滴水和丸。熱湯送下。

參考 此方治危急痘證。甚妙。

二 筆

【二神散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒傷冷。體寒腹痛。及痘瘡難發難壯。

藥品 丁香、九粒。乾薑(煨)、一錢。

制法及用法 研爲末。每服五分。量兒大小輕重用之。白湯調下。蓋被片時。令脾胃溫暖。陰反陽回。則痘變順。

【二聖散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 療痘疔。

藥品 雄黃、二錢。紫草、三錢。

制法及用法 研爲末。先以鍼挑破。然後和油臙脂。調點之。

【人牙散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治痘瘡寒閉。毒邪不發。黑陷。手足青。

藥品 人牙(燒存性)。

制法及用法 研爲極細末。每服四五分至一錢。續絳尾血調紫草湯下。

【人牙散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治黑痘。

藥品 人牙(自落者)、一枚。

制法及用法 火煨存性。入韭菜汁淬之。研爲末。加麝香五釐。穿山甲二分。用雞冠血、葱白煎酒調下。

【十全散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疹出喉痛。

藥品 黃連、黃芩、黃蘗、各一錢。苦參、孩兒茶、雄黃、各五分。硼砂、玄明粉、各三分。乳香、一分。片腦、少許(臨時入)。

制法及用法 研爲極細末。每用五釐。吹於患處。

三 筆

【三仙散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治痘疹。

藥品 紫花地丁、番白草、當歸尾。

制法及用法 爲散。清水煎。溫服。

【三黃散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治白癰疽。

藥品 雄黃、硫黃、各五錢。黃丹、天南星、枯礬、密陀僧、各三錢。

制法及用法 先以蠶汁擦患處。再以葯片蘸藥。擦後漸黑。

次日再擦。黑散則無。

【三黃散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治咽痛、頭癰、面癰、小兒丹毒。

藥品 生地黃、蒲黃、牛黃、冰片。

制法及用法 研爲極細末。芭蕉根汁或扁柏葉汁和蜜調敷。頭癰面癰。如腫硬不消。因氣凝血滯或痰塊結而不散者。則兼陰證。宜用薑汁、葱汁調敷。

【大黃散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒丹毒。臟腑壅大熱。心神煩悶。二便不通。

藥品 川大黃(微炒)、升麻、朴硝、葵子、各五錢。梔子仁、一分。

制法及用法 研爲粗末。每服一錢。清水一盞。煎至五分。去滓溫服。量兒大小加減。以利爲度。

【大黃散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒一切丹毒。遍身赤痛。

藥品 大黃、五錢(剉微炒)、防風、五錢(去蘆)。升麻、一分。黃芩、一分。麻黃、一分(去根節)。秦艽(去蘆)、一分。朴硝、

二分。

制法及用法 取咀。每服一錢。沸水一小盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。

【大聖散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治風毒上壅內熱。外生癰疹、丹毒。內生瘰癧。因多食煎燂所致者。

藥品 羌活、荆芥、升麻、薄荷、防風、甘草、大黃、黃芩、玄參、各等分(加赤芍藥、連翹)。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一盞。煎至六分。溫服。一方用牡蠣、二兩(火煨爲末)。玄參、一兩。甘草、五錢。爲末。每服二錢。茶清調下。

四 筆

【不二散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治痘瘡起脹灌漿時。泄瀉不止。

藥品 蓮肉(炒、去心)、一兩。鴉片、二錢(另研)。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服三四分。米飲調下。

參考 此方不但止瀉。亦治煩燥。一服即愈。如不應。乃元氣已脫。不可爲矣。

【五灰散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治瘰癧之屬於陰證及在肛門內者。

藥品 血管藤毛、血餘、蜈蚣、穿山甲、生鹿角、各等分。

制法及用法 燒灰存性。研爲細末。和勻。每服五錢。空腹時溫黃酒調下。

【五福化毒丹】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治赤遊丹毒。身熱驚搐。煩躁。唇焦。面赤。

藥品 人參、赤茯苓、桔梗、各二兩。牙硝、青黛、黃連、龍膽草、各一兩。生甘草、五錢。玄參、硃砂、各三錢。冰片、五分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如芡實大。金箔爲衣。每服一丸。薄荷燈心煎湯化下。

【內托散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治丹毒發疽。

藥品 綠豆粉、一兩。切乳香、五錢(慢火於銀石器中炒、手指攪使乾、急傾出、扇冷)。

制法及用法 研爲極細末。和勻。每服二錢至三錢。濃煎甘草湯調下。時時細呷。一日至三日內。宜連進十數服。令藥常在胸膈間。

參考 方由綠豆解毒丹。久

治石毒。味甘入陽明胃。性寒能補。故爲君。乳香去惡腫。入少陰。性溫善竄。故爲佐。甘草性緩。解五金八石及百藥毒。故爲使。此方專爲服石而發痘者設。如石毒衝心而嘔逆者。尤爲相宜。惟寒嘔則忌之。

【內托散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治痘瘡毒根在裏。頂陷。色灰白。不起發。根窠不紅。咬牙寒戰。

藥品 人參、甘草、肉桂、白芷、白芍藥、川芎、各一兩。黃耆、一兩五錢。桔梗、防風、各二兩。當歸、五錢。木香、一錢。一方加厚朴。

制法及用法 加生薑一片。大棗一枚。清水煎服。漿不滿。水酒各半煎服。有瘰。減肉桂。加紫草、黃芩(酒炒)、黃連、牛蒡子之類。色紅紫者。去肉桂、木香。加紫草、蟬蛻。色淡白者。去防風、白芷。加糯米。大便燥。加入乳汁。湯加訶子肉、肉豆蔻。

【升麻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切丹毒。遍身壯熱。煩渴。

藥品 升麻、一分。黃芩、一分。麥門冬、三分(去心)。葛

根、三分。大黃(微炒)、一分。朴硝、一分。

制法及用法 研爲粗末。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓。不拘時溫服。

【升麻膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治赤丹。

藥品 升麻、白蘇、漏蘆、芒硝、各一兩。黃芩、枳殼、連翹、蛇銜草、各一兩五錢。梔子仁、蒴藋、各二兩。

制法及用法 剉細。豬脂一斤八兩。慢火煎諸藥令色赤。去滓放冷。瓷盒收藏。塗患處。

【升麻膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切丹毒。

藥品 升麻、大黃、護火草、蛇銜草、梔子仁、寒水石、芒硝、藍葉、生地黄、芭蕉根、羚羊角屑、梧桐皮、各五錢。

制法及用法 細剉。研爲細末。竹瀝浸一宿。漉出。却入鍋中。以臘月豬脂一斤。慢火熬一食久。乘熱。以綿濾去滓。候冷成膏。盛以磁盒。磨塗患處。兼以膏如棗大。竹瀝化下。

【升麻膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸熱風毒。皮膚癢。赤起生瘡。兼有黃水。結

爲膿疱。

藥品 升麻、白蘇、漏蘆、枳殼、連翹、藍葉、黃芩、梔子仁、胡蘆根、玄參(去蘆)、大黃、蛇衛草、芒硝、犀角屑、各一兩。

制法及用法 細剉。竹瀝三升。拌勻。經一宿。用煉成豬脂二斤。同煎。候白蘇熬黃。絞去滓令凝。摩塗患處。一日六次即瘥。

【升麻膏】

發明 見張渙方。

功用 治赤丹。

藥品 升麻、白蘇、漏蘆、芒硝、各一分。連翹、梔子仁、各五錢。

制法及用法 細剉。豬脂八兩。慢火同煎諸藥。令赤色。去滓。放冷。每用少許。塗患處。

【牛黃散】

發明 見晏元獻公明效方。

功用 治小兒赤白丹毒。流走四肢。

藥品 牛黃、硃砂、蝸牛肉、全蠍、白僵蠶、天麻、白附子、乳香、麝香、各一分。生龍腦、一錢。螳螂翅、五對(五片中採)。

制法及用法 研爲細末。每服一字。薄荷水調下。初生小兒浴洗後。用乳調少許。塗口中。胎疾永除。

【牛黃清心丸】

發明 見寶漢卿寶太師全書。

功用 治鎖口瘡。

藥品 京牛黃、輕粉、各三分。膽星、一兩。雄黃、黃連末、各二錢。茯神、玄參、天竺黃、五倍子末、荊芥、防風、桔梗、犀角末、當歸、各一錢。冰片、麝香、珍珠(豆腐煮)、各五分。

制法及用法 研爲極細末。共和一處。再研勻。甘草熬膏和丸。如龍眼大。硃砂爲衣。日中曬乾。收入瓷瓶內。將瓶口堵嚴。勿令出氣。每服一丸。薄荷湯磨服。

參考 此方有開闢解熱之功。

【天花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹後失音。

藥品 天花粉、桔梗、茯苓、訶子、石菖蒲、甘草、各五錢。

制法及用法 研爲極細末。每服一錢。清水調在碗內。加小竹七莖。小荊芥七莖。縛作一束。點火就碗內煎。臨睡時服。

【木香散】

發明 見陳氏方。

功用 治痘疹泄瀉後。虛寒

癢塌。

藥品 木香、大腹皮、肉桂、半夏、青皮(炒)、柴胡、人參、赤茯苓、甘草(炙)、訶子肉、丁香、各等分。白汗癢塌。去大腹皮、青皮、柴胡。加黃耆、白朮、糯米。

制法及用法 研爲末。每服一二錢。加生薑、大棗。清水煎服。

【丹參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治小兒瘡毒。

藥品 丹參、黃芩、枳殼(去白麩炒)、葛根、犀角(鎊)、各一分。麻黃(去根節)、五錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水一小盞。加竹葉十片。竹茹五分。煎至五分。去滓。不拘時溫服。量兒大小加減。先以刀鋒鑲破。令血出。然後服藥。

【水澄膏】

發明 見姚僧坦集驗方。

功用 治熱毒赤腫疼痛。

藥品 大黃、黃蘗、鬱金、天南星、白芨、朴硝、黃蜀葵花、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每用新汲水一盞半。藥末二錢。攪調勻。候澄底者。去浮水。以紙花子攤於患處貼之。如急燥

津唾濁之。反覆白色者勿用。

五 筆

【生肌散】

發明 見陳梅澗重樓玉鑰。

功用 治魚鰓風。

藥品 赤石脂、一兩(水飛數次、再用)。乳香、一兩(去蕊油)。沒藥、三錢(去盡油)。輕粉、二錢五分。硼砂、二錢五分。龍骨、一兩(火燉紅、淬入米醋內、水飛)。孩兒茶、二錢五分。大梅片、三分。

制法及用法 研爲極細末。每用少許。搽於患處。

【生肌散】

發明 見顧世澄醫醫大全。

功用 療瘡痘口瘡臭爛。

藥品 黃連(土炒)、地骨皮、黃蘗、五倍子、生甘草、各等分。

制法及用法 研細末。乾搗之。若仍作熱作膿而不即愈者。乃內毒未盡也。仍用大連翹飲解之。

【白花蛇散】

發明 見王氏方。

功用 治痘疹黑陷倒壘。

藥品 白花蛇、一兩(連骨、火炙乾勿焦)。丁香、二十個。

制法及用法 研爲末。每服五分或二分。熱酒或清水和滾酒調下。移時身上發熱。其痘

頓轉紅活。

【玄參丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹後餘毒不收。再身生瘡不已。

藥品 玄參、赤芍藥、生地黃、赤茯苓、荆芥、防風、木通、桔梗、黃芩、硃砂、青黛、各等分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如芡實大。每服一丸。薄荷湯送下。量兒大小加減。

【玉露散】

發明 見馬氏方。

功用 治流火丹毒。癰癤瘡瘍。紅腫腐爛。及一切熱毒未破者。

藥品 芙蓉葉、不拘多少。曬乾研末。

制法及用法 以菊花露或茶露加白蠟調敷。皮破者。用麻油或蜜水調敷。

【仙靈脾散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹入眼。

藥品 仙靈脾、威靈仙、各等分。

制法及用法 研爲末。每服五分。食後米湯調下。

六 筆

【托裏散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘡瘍痘毒因氣血虛。不能起發腐潰收斂。及惡寒發熱者。

藥品 人參(氣虛者加倍用)、黃耆(炒)、各二錢(一作各五分)、白朮(炒、血虛倍用、一作五分)、陳皮、當歸(酒洗、血虛者加倍用、一作五分)、熟地黃(生者自製、一作二錢)、白芍藥(酒炒、一作五分)、白茯苓(一作五分)、各一錢五分。甘草、一錢。一方無陳皮、甘草。

制法及用法 每服三五錢。清水煎服。

【托裏散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治痘毒虛不能潰。

藥品 補中益氣湯去升麻。加熟地、茯苓、芍藥。

制法及用法 與補中益氣湯同。

【地黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒痘疹後。口瘡喉痛。牙疳臭爛。

藥品 天門冬、麥門冬、玄參、各三兩。甘草、薄荷、各一兩。

制法及用法 研爲細末。生熟地黃汁和丸。如櫻桃大。每服一丸。溫蜜水化下。

【地龍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒風熱癰疹。狀如傷寒。耳尖及手足冷。

藥品 地龍、五錢(洗去土焙乾)。穿山甲、五錢(以皂角灰炒令黃)。硃砂、二錢(研細)。

制法及用法 研爲細末。後入硃砂。和勻再研。每服一錢。不拘時紫草煎湯調下。量兒大小加減。

【百花膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘瘡癰。

藥品 石蜜、不拘多少。

制法及用法 略用湯和。時時以鵝翎刷之。則瘡癰易落無痕。

【安神丸】

發明 見鮑相敬驗方新編。

功用 治痘後譫語。

藥品 牛黃、五分。黃連、五錢。當歸、山梔(炒黑)、各二錢五分。

制法及用法 共爲末。入豬心血和勻爲丸。硃砂爲衣。燈心湯送下。無真牛黃。則加川貝母、膽星、琥珀。

【如聖餅】

發明 見朱肱類證活人書。

功用 治小兒痘疹毒攻咽喉腫痛。

藥品 牛蒡子(炒)、甘草、各一兩。麥門冬(去心)、五錢。桔梗、一兩。

制法及用法 研爲末。加淡竹葉。沸水煎。細細服。

【至寶丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘瘡脾胃虛寒。肢冷不食。伏陷不起。

藥品 戊腹糧(即將生糯米、與黃毛雄狗飽食、取其糞中米、淘淨炙乾)。

制法及用法 研爲細末。每一兩入麝香三分。隨證用溫補脾胃藥。或獨參湯、保元湯、調下。

七 筆

【決明散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒痘疹入眼。

藥品 決明子(一作二錢五分)、栝樓仁(一方用根)、各五錢。赤芍藥、甘草(炙)、各一分(一作各二錢五分)。

制法及用法 研爲細末。加麝香少許。和勻。每服二錢。食後或臨臥時生米泔水調下。

參考 此爲少陽大陰兩經之方劑。

【防風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹後風熱上攻。目赤腫流血。及痘風瘡。

藥品 防風、荆芥穗、當歸、川芎、赤芍藥、防己、梔子、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。茶清調下。清水煎服亦可。

【辰砂散】

發明 見玉肯堂證治準繩。

功用 治痘瘡不快。

藥品 辰砂、一錢。絲瓜、三寸(近蒂連子燒灰、存性)。

制法及用法 研爲末、蜜水調下。多者可少。少者可無。或以紫草甘草湯調服尤佳。

參考 方中絲瓜發痘瘡最妙。

【豆蔻丸】

發明 見陳氏方。

功用 治痘疹氣虛。吐利不止。

藥品 肉豆蔻(麵裹煨)、木香、砂仁、白龍骨(煨過水飛)、訶子肉(煨)、各五錢。赤石脂、枯白礬、各七錢五分。

制法及用法 研爲細末。神麴煮糊和丸。如黍米大。一歲兒每服二三十丸。三歲兒服一百丸。溫米飲送下。瀉止勿服。

八 筆

【金花散】

發明 見龔慶宣鬼遺方。

功用 治一切丹毒。熱痛焮赤。

藥品 鬱金、黃芩、甘草、山梔子、大黃、黃連、糯米(一作三合)、各一兩。一方無山梔子、大黃、甘草。

制法及用法 研爲末。冷水和。少加生蜜調藥。鵝毛掃上。乾即易之。

【金黃散】

發明 見郭氏方。

功用 治丹毒遊走不定。疼痛不止。

藥品 寒水石、二兩。鬱金、二枚。藍實、大黃、黃藥、黃連、景天、各一兩。

制法及用法 研爲細末。雞子清或水調敷。

【金黃散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治小兒疹後。重舌。並兩頰骨疙瘩。

藥品 硼砂、三錢。雄黃、一錢五分。硃砂、七分。

制法及用法 研爲末。鮮薄荷打汁調敷。數次可愈。

【拔毒散】

發明 見張漢方。

功用 治丹毒。

藥品 川朴硝、一兩。梔子仁、五錢。

制法及用法 研爲末。醋調塗患處。或用山梔子仁四兩。生鱈魚八兩。同杵如泥。每以醋化少許塗丹上。

【拔毒膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疔。

藥品 雄黃。

制法及用法 臘脂重浸水令濃。調雄黃點上。立時紅活。蓋雄黃能拔毒。臘脂活血也。

【和解散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治疹已出。遍身形如蠶種。色黑黯。皮肉匾硬。

藥品 麻黃(去節、取頭末)、綠豆(取生粉、隔紙焙熟)、各七分。

制法及用法 研爲細末。用鮮蒲公英、二兩。乾者七分。條芩、生地、各一錢。清水煎。調前藥末。春冬溫服。夏秋涼服。

【青黛散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘未作膿。滿黃。煩躁不安。

藥品 青黛(如棗核大)、一

塊。

制法及用法 清水調服。即安。

【卷柏散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治皮膚癢疹。及風熱生癰瘡。

藥品 卷柏、枳殼(麸炒、去麤)、羌活(去蘆)、麻黃(去節)、五加皮、各一兩。赤前、天竺黃、蘘本(去蘆)、防風(去蘆)、芎藭、黃耆、桑耳、犀角屑、各五錢。烏蛇、二兩(酒浸)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前薄荷調下。忌食熱麵、雞、豬、魚、蒜等物。

九 筆

【南星散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘癢倒靨。勢危諸藥不效者。

藥品 荷葉(霜後搭水紫背者)、白殭蠶(洗去絲、炒乾)、各等分。

制法及用法 研爲末。大者每服一錢。小者五分。芫荽汁和酒調下。水飲亦可。

參考 此證多有片點陷入牙者。卒難措辦。惟此劑無毒。而效且速。但荷葉紫背者甚難得。

【活血散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘色淡白。

藥品 當歸、赤芍藥(酒炒)、紫草、川芎、紅花、各五錢。血竭、一錢。木香、二錢。

制法及用法 研爲末。五歲兒。每服一錢。十歲以上者。每服二錢。好酒調下。熱極血焦不紅活者。酒煎紫草湯調下。

【紅散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治丹毒。土虺蛇咬傷。

藥品 茜草根、八兩。

制法及用法 研爲末。每服二錢。溫酒調下。

【珍珠散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治痘疔等證。

藥品 珍珠(生研)、綠豆(生研)、豌豆(煨存性)、髮灰、各等分。一方無綠豆。加冰片、少許。

制法及用法 爲散。胭脂調。銀錢挑破。口含清水。吮去毒血塗之。

十 筆

【栝樓散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘熱極發搐。

藥品 栝樓根、二錢。白附子、一錢。

制法及用法 慢火同炒老黃色。研爲末。每服二三分。薄荷湯調下。

【神功散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘瘡口渴。

藥品 人參、黃耆、甘草、牛蒡子、紅花、生地黃、前胡、紫草、白芍藥。

制法及用法 清水煎服。

【烏金膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治感受風寒。痘不起發。或紅紫。或驚搐。發熱不已。

藥品 蠶蠶(酒洗)、全蠍(去足尾、酒洗)、甘草、紫草、白附子(味苦內白者真)、麻黃、各五錢。穿山甲(炒末)、二錢五分。蟬蛻(去頭足、酒洗淨)、二錢。

制法及用法 研爲末。將紅花、紫草各一兩。好酒二鍾。熬去大半。去渣。入蜜五兩。慢火同煎。滴水成珠爲度。丸如龍眼核大。每服一丸。燈心湯化下。

【荆芥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹壅滯。或癰瘡大便自利。

藥品 荊芥、少許。

制法及用法 研爛。新汲井水調之。將布帛濾過。入麻油、一滴許。打勻飲之。便不亂悶。癰疽已出。用黃蠟煎青膠水飲即安。

參考 荊芥治皮膚血熱病。癰子便是疹子。風癢癰疹。皆皮膚之毒。用荊芥最宜。加麻油打勻。可以清竅。又以黃蠟煎青膠水服。則可滋血行榮衛。榮衛既順。癰疹自出矣。

【消毒散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 涼膈。去痰。治急驚風。毒。赤紫丹瘤。壯熱狂躁。睡臥不安。胸膈滿悶。咽喉腫痛。九道有血妄行。痘疹痛而起發遲。及一切瘡。遍身疥瘡。

藥品 防風(去蘆)、一兩。甘草、二兩(炙、一作一兩、一作五錢)。荊芥穗、三兩(一作二兩)。鼠黏子、四兩(炒、一作六兩、一作三兩)。一方無防風。有薄荷。

制法及用法 研為粗末。每服二三錢。清水一盞。煎至七分。去渣。食後溫服。一日二次。如生犀角尤妙。

【馬齒莧散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘痂不落。或癰痕者。

藥品 馬齒莧(搗汁)、豬脂膏、石蜜。

制法及用法 共熬成膏。塗於腫處。

十一筆

【紫金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘瘡出不快或倒靨。及遠年不愈惡瘡。

藥品 紫草、蛇蛻(炒焦)、牛蒡子(炒)、各五錢。

制法及用法 研為細末。每服一錢。清水半鍾。煎至減半。溫服。

【紫草散】

發明 見閻孝忠方。

功用 治痘疹血熱。口齒黑陷不能起發。

藥品 紫草(一作紫釧)、一錢。甘草(炙)、五分。糯米、一撮。黃耆、一錢五分。

制法及用法 清水煎服。一日二次。

參考 此方係保元湯去參易紫草之製。更送一味。而氣血攸分。且補中寓發。真是大匠運斤。足補桂岩未道。

【紫草散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 發癍疹。

藥品 紫草茸、鈎藤鈎、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一字或五分或一錢。不拘時溫酒調下。

【紫草飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹氣虛血熱。

藥品 紫草茸、人參、白芍藥、蟬蛻、甘草、穿山甲(土拌炒)、各等分。

制法及用法 研爲細末。清水一鍾。煎至五分。分溫三服。

【紫草飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹血熱。復感風寒。不能起發。

藥品 紫草、芍藥、麻黃、當歸、甘草、各等分。

制法及用法 研爲細末。清水煎。不拘時服。

【犀角丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治小兒走馬牙疳諸瘡。及痧痘後餘毒。

藥品 犀角、粉草、朴硝、各二錢。桔梗、一兩。赤茯苓、生地黃、連翹、牛蒡子、玄參、各五錢。青黛、一錢。

制法及用法 共研細末。煉

蜜爲丸。如龍眼大。每服一丸。薄荷湯送下。兼驚則硃砂爲衣。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒滯熱。赤遊丹毒。皮膚片片赤腫。不因消導而解者。

藥品 犀角屑、黃芩、黃耆、川升麻、梔子仁、漢防己、川朴硝、各一分。牛黃、五釐。

制法及用法 研爲細末。不拘時。竹葉煎湯調下。量兒加減。

【犀角消毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒赤丹瘤。壯熱狂躁。睡臥不安。胸膈悶滿。咽喉腫痛。

藥品 犀角、一錢五分。牛蒡子、一兩五錢。防風、甘草、各二錢五分。荊芥穗、五錢。

制法及用法 剉散。清水煎。不拘時服。

【犀角消毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癍疹丹毒積毒。發於肌表。頭面生瘡。或痛或癢。

藥品 犀角(鎊末)、二分。牛蒡子、甘草、荊芥、防風、各五分。金銀花、三分。

制法及用法 清水煎熟。入犀角傾出服。

【犀角解毒丸】

發明 見顧世澄揚醫大全。

功用 治小兒諸瘡毒。及痧痘後餘毒。喉齒疼痛等證。

藥品 犀角(鎊)、一錢。桔梗、一兩。赤茯苓、牛蒡子、生地黃、各五錢。玄參、連翹、各六錢。朴硝、甘草、青黛、各二錢。

制法及用法 共研極細末。煉蜜爲丸。如龍眼大。每服一丸。薄荷湯化下。挾驚者。硃砂爲衣。

【透肌散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 透肌膚。發癰疹。

藥品 紫草茸、綠升麻、粉甘草、各一錢。

制法及用法 細切。清水煎服。或與消毒飲同煎服。尤妙。

【透肌散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治癰疹初出。隱隱在肌肉內。旋出旋沒者。

藥品 牛蒡子、二錢五分(炒)。葛根、二錢。荆芥、一錢二分。蟬退、三十個。

制法及用法 酒一小杯。清水一大杯半煎。至六分。溫服。一次。本方加羌活、五分。二次。本方加紫蘇、枳殼、各六

分。三次。本方加牛膝、五分。

【連翹散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹餘毒。頭面生瘡。耳疼頰赤。

藥品 連翹、黃芩、瞿麥、木通、滑石、柴胡、荆芥、牛蒡子、防風、羌活、赤芍藥、甘草、各等分。

制法及用法 每服三錢。清水一盞。煎至半盞。溫服。加生薄荷尤佳。

【梔子仁散】

發明 見張路玉張氏醫道。

功用 治痘疹毒盛。色黑便秘。

藥品 梔子仁(熬黑)、一兩。白蘇皮、赤芍藥、升麻、各五錢。寒水石(如無、即以石鹽代之)、甘草(炙)、各三錢。

制法及用法 爲散。每服一二錢。清水煎。調紫草茸末半錢匕服。量兒大小加減。

【清肺散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘瘡咽乾聲啞。

藥品 麻黃、一錢五分。麥門冬、桔梗、各二錢。知母、荆芥、天花粉、各一錢。訶子、青蘗、各八分。

制法及用法 剉散。分作二服。加竹瀝、薑汁。清水煎服。

【麻黃散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治惡毒、丹毒、風疹。

藥品 麻黃、升麻、葛根、各一兩。射干、雞舌香、甘草(炙)、各五錢。石膏、五勺。

制法及用法 咬咀。清水三升。煮取一升。大人作一服。三歲兒分三服。每日三次。

十二筆

【無比散】

發明 見朱肱類證活人書。

功用 治瘡疹惡候。及痘夾黑點子。或黑陷黑痘等證。

藥品 辰砂、一兩(先研、一作一錢)。牛黃(如無、以牛膽南星代之、一作五分)、麝香(一作五分)、龍腦(一作冰片五分)、膩粉(細研、一作二錢)、各一分。一方有蟾酥。

制法及用法 研爲細末。一歲兒每服一字。大人五分。入水銀少許。刺小豬豬尾上血三兩滴。新汲水同調服。寧穩得睡。取下惡毒。如爛魚腸葡萄穗之狀。即愈。小兒用乳汁調。

參考 此方瀉內熱之極。不能開發於外者宜之。內雖過泄。外亦開發。透肌膚之功。與至寶丹同。小兒初熱服之。甚能稀痘。

【無價散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘毒傷胃黑陷。

藥品 人糞(或貓狗犬等糞、取臘月乾燥者)。

制法及用法 燒灰爲散。每服方寸匕。以糯湯調服。服後即變紅活。

【無價散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘毒傷胃黑陷。

藥品 小兒糞(用無病臘月內者)。

制法及用法 傾入銀罐。上下合定。鹽泥固濟。火煨通紅。取出。研爲末。每服一錢。鹽水調下。或加麝香、冰片各少許。

【無憂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘證。寒戰咬牙。

藥品 人牙、不拘多少(用自落者、火煨存性、淬入韭菜汁內、大牙三次、小牙二次、研極細末)。雄黃、珍珠、各五分。一方加牛黃、五分。

制法及用法 研爲末。每服三五分。多至一錢。荔枝煎湯調下。

【硝石散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治丹毒。遍身發熱。

藥品 硝石、一兩。乳香、一分。

制法及用法 研爲末。雞子清調塗。

【黃連安神丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疹勞。

藥品 黃連、當歸、龍膽草、各二錢。石菖蒲、茯神、各一錢五分。全蠍、七個(去毒)。

制法及用法 研爲細末。湯浸蒸餅。杵豬心血和丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服二錢。燈草湯送下。

【雄黃散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治疹瘡。

藥品 雄黃、一錢。黃蘗、二錢。麝香、五分。

制法及用法 艾葉湯敷洗。以平爲度。

十四筆

【奪命丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘瘡觸邪。黑陷不起。

藥品 麻黃(去節、蜜酒拌炒)、升麻、各五錢。山豆根、紅花子、大力子、連翹、各二錢五分。蟬蛻、紫草茸、各一錢五

分。人中黃、三錢。

制法及用法 研爲細末。酒蜜和丸。如梧桐子大。辰砂爲衣。兒大者每服二錢。中者一錢五分。小者一錢。薄荷葉煎湯化下。

【銀黃散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治男子陰頭。女子陰戶兩旁生瘡。溼爛腫痛發癢。小兒痘疤腫爛。痘後餘毒不消。滿頭黃泡等瘡。

藥品 白螺殼、一兩(取牆頭上白色者佳、去淨泥、火燒存性、取淨末)。橄欖核(火煨存性、研取淨末)、寒水石(另研極細、取淨末)、各二錢。

制法及用法 共研勻。瓷瓶盛貯。勿使出氣。每藥二錢。配梅花冰片一錢。麻油調擦。溼處乾搽。神效無比。

【蒺藜散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹入眼。

藥品 蒺藜、甘草、羌活、防風、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。清水調服。有撥雲見日之效。

十六筆

【獨勝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒發痘瘡。早微熱。晚大熱。目黃。脅動。身熱。足冷。其狀如驚者。

藥品 牛蒡子、五錢。白殭蠶、一分。

制法及用法 研爲粗末。每服一錢。清水六分盞。加紫草二七寸。煎至四分盞。連進三服。其痘便出。或爲末酒調服。

參考 此方用牛蒡子出透透肌。白殭蠶治遍身癰疹疼痛成瘡。又加紫草利膿。瘡疹無虛寒證者。服之立出。

【獨聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘瘡毒盛伏陷。

藥品 鼠黏子、殭蠶(炒研)、紫草茸、各等分。

制法及用法 清水煎服。一日二三次。

【樺皮散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘瘡。一切腫毒。

藥品 樺皮。

制法及用法 研爲末。清水煎。溫服。

十八筆

【藍根散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹出不快或倒

樞。

藥品 板藍根、一兩。甘草(炙)、七錢五分。

制法及用法 研爲末。每服五分。取雄雞冠血二三點。同溫酒少許。食後調下。甚則三五服立效。

【藍葉散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治赤遊丹毒盛者。

藥品 藍葉(曬乾)、川芎、赤芍藥、知母、生地黃、白芷、川升麻、柴胡、葛根、杏仁(炒、去皮尖)、生甘草、各一錢。石膏(煨)、梔子仁、各五分。

制法及用法 搗爲粗末。每服八錢。新汲水二杯。煎至八分。去渣服。熱甚者。加黃芩、玄參。

【蟬花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹遍身作癢。

藥品 蟬退(去頭足、洗去土、微炒)、地骨皮(炒黑色)、各一兩。

制法及用法 研爲末。每服一茶匙。水酒調下。一二服神效。

【雞鳴散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治發熱三四五日。或痘未形。或痘形隱隱。不能快

利。或煩躁譫語。或腹疼嘔吐。或痰喘惡濁。

藥品 白朮(炒)、當歸、川芎、甘草、大力子、茯苓、木通、桔梗、蟬蛻、升麻、橘紅、山查、紅花。

制法及用法 加燈草、生薑。清水沖服雞血並酒服。

二十一筆

【鐵箍散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治疹後餘毒流注肌肉之間。結成癰疽腫痛。

藥品 白芷、白蘇、各一兩。黃蘗、二兩。山豆根、連翹、黃芩、乳香、沒藥、各五錢。川烏、六錢。地骨皮、七錢。射干、三錢。

制法及用法 共研細末。茶清調敷。

【鐵箍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘後癰毒。

藥品 鳳凰退(煨灰)、一個。

制法及用法 醋調圍四畔。自出毒。

二十九筆

【鬱金散】

發明 見顧安常方。

功用 治痘始有白泡。忽插入腹。漸作紫黑色。無膿。日夜號叫煩亂。

藥品 鬱金、一枚。甘草、一分。

制法及用法 清水半碗。煮乾。去甘草。切片焙乾。研為細末。入腦子、五分同研。每服一錢匕。用生豬血五七滴。新汲水調下。甚者毒氣從手足心出如癰狀。二服即痊。

瘰癧疥癬類

一筆

【一上散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 瘰癧疥癬。

藥品 雄黃、熟硫黃、黑狗脊、蛇牀子(炒)、各五錢。寒水石、六錢。斑蝥(去翅足、研碎)、三個。

制法及用法 先以雄黃、硫黃、寒水石、研如粉。次入斑蝥和勻。蛇牀子、黑狗脊、另為細末。同研勻。洗疥癬令湯透去癩。油調手中擦熱。鼻中嗅二三次擦上。可一上即愈。如痛甚腫滿高起者。加寒水石一倍。如不苦癢。加狗脊。微癢加蛇牀子。瘡孔中有蟲加雄黃。瘡火炙湯燙加硫黃。口臭不止亦

可愈。

【一笑散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 療疥癩惡瘡。

藥品 檳榔、藳本、硫黃、蛇牀子、枯礬、五倍子、白膠香、各等分。

制法及用法 研爲細末。溼者乾搽。乾者香油調敷。如瘡在頭上。便搽上。不月剃。甚者不過三五次。平復如故。

【一掃光】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治一切疥瘡溼毒。風濕皮癢。久不愈者。

藥品 苦參、黃蘗、各一斤。煙膠、一升。木鼈肉、蛇牀子、點紅椒、明礬、枯礬、硫黃、楓子肉、雄冰、水銀、輕粉、各三兩。白砒、五錢。一方有寒水石、杏仁、雄黃、吳茱萸、火硝、升藥底。無明礬。

制法及用法 研爲細末。用熟豬油二斤四兩。化開。入藥攪勻爲丸。如龍眼大。用夏布或洋紗包裹。開水內略浸。藥從布眼內滲出。取搽患處。

二 筆

【二仙丹】

發明 見顧世澄醫大全。

功用 治瘰癧。

藥品 枳殼、一斤(每個切兩開、去瓢、入去翅足斑蝥七個、仍將兩片合住、以線十字扎緊、用上好醋浸足七天、再以醋煮五炷香、必要多加好醋、煮透冷定、解去線、揀去斑蝥、只將枳殼切片陰乾)。紫背天葵、一斤(如無、以九頭獅子草代之)。

制法及用法 研爲細末。將煮枳殼之餘醋麴糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。溫酒或熱湯送下。早晚各一服。未出頭者自消。已出頭者用膏貼之。自愈。

【人牙散】

發明 見顧世澄醫大全。

功用 治寒掘、腫毒。

藥品 人牙、二兩。麝香、五分。羌活(酒洗)、六錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如龍眼大。每服一丸。熱湯或溫酒磨服。

【丁香散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 療諸癰。

藥品 丁香、蝦蟆灰、各一兩。麝香、二錢五分。白礬(熬令汁枯)、五倍子、膩粉、各五錢。

制法及用法 研爲細末。和勻乾敷。以瘡爲度。

三 筆

【三神丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治一切癰。

藥品 刺蒺藜(炒)、海桐皮(剉)、草烏頭(鹽炒熟、去鹽)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。水調糊和丸。如綠豆大。每服十丸。加至十五丸。溫酒或鹽湯送下。

【三聖丸】

發明 見臧氏方。

功用 治癰癧。

藥品 丁香、十粒。斑蝥、十個。麝香(另研)、一錢。

制法及用法 研爲末。用鹽豉豆五十粒。湯浸研爛如泥。和藥末爲丸。如綠豆大。每服五七丸。食前溫酒送下。每日三次。忌溼麵毒食。五七日外。覺小便淋瀝。便效。若下莖如青筋膜狀。則病根去。

【三聖丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治疥瘡。

藥品 水銀、潮腦、各二錢。楓子肉、五十粒。

制法及用法 共研極細。加柏油二錢。搗勻爲丸。兼膿瘻者。加硫黃一錢。每用一丸。

於周身塗之。

四 筆

【內消散】

發明 見任中書方。

功用 治癰癧。

藥品 礞砂、血竭、各一錢。斑蝥(去翅足)、三分。

制法及用法 研爲細末。每服一分。空腹時燒酒調下。宜先服益氣養榮湯十餘劑。後服此。未破者三五日立消。已破者內服此藥。外用金頭蜈蚣一條。研極細末。用麻油一小鍾。浸兩晝夜。搽患處。其瘡即腫潰。過一二日腫消。可貼膏藥。瘡勢大者。二十日痊。小者十餘日平復。

【內消散】

發明 見吳中書方。

功用 治癰核。

藥品 天花粉、苦參、各五錢。阜角刺、四十九個。土茯苓、三斤。

制法及用法 煎湯當茶飲。忌牛肉。不拘已破未破。日期逼近。屢試屢驗。

【內消癰癧丸】

發明 見瘍醫大全方。

功用 治癰癧。

藥品 夏枯草、八兩。元參、青鹽、各五兩。海藻、貝母、續

荷、天花粉、白蘇、連翹(去心)、熟大黃、生甘草、生大黃、桔梗、當歸、枳殼、硝石、各一兩。

制法及用法 磨細。酒糊丸。如梧桐子大。每服三錢。臨臥時熱湯送下。

【內消瘰癧丸】

發明 見程國彭醫學心悟。

功用 治陰虛火盛。頸項瘰癧及一切瘰癧。

藥品 土貝母、玄參、各二兩。左顧牡蠣、四兩。

制法及用法 研爲細末。夏枯草煎湯泛丸。每服二三錢。雪羹湯或熱湯送下。

【五香散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治惡核。惡肉。瘰癧。風毒腫。疔瘡陽證潮熱。滿亂。譫語。六脈洪大。

藥品 木香、雞舌香、沉香、各一兩。麝香(細研)、二錢五分。薰陸香、射干、乾葛(剉)、升麻、獨活、桑寄生、連翹、甘草(生)、各二兩。川大黃、三兩(剉碎、微炒)。

制法及用法 剉碎。入麝香研勻。每服三錢。清水一中盞。煎至五分。去滓。加竹瀝半盞。更煎一二沸。溫服。每日三次。疔瘡陰證脈沉。四肢冷。瘡不發者。去大黃。加蒼耳、蓮肉、

酸棗仁、麝香、茯苓、黃耆、肉桂、當歸、防風、白芷、附子、生薑。半水半酒煎服。如潮熱者。此皮膚受毒。加生大黃、柴胡、地骨皮。如嘔逆者。此胃經受毒。加丁香。如喘嗽者。此肺經受毒。加杏仁(去皮尖)、貝母、秦艽、紫菀。如眠花者。此心經受毒。加硃砂、雄黃、麝香。如脚冷者。此腎經受毒。加水瓜(鹽炒)、牽牛(鹽炒)。如發渴自汗者。此肝經受毒。加黃芩、山梔。如大小便秘。腹脹滿者。此脾經受毒。加枳殼(炒)、木通、苦亭藤、生大黃。

【五倍子散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 瘰癧久不瘥。

藥品 五倍子(火燒煙盡)、一兩。黃蘗(剉)、當歸(剉炒)、膩粉、漏蘆、白礬(煅)、各一分。

制法及用法 研爲細末。先用鹽漿水洗。拭乾敷之。

【木香散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 生肌。止痛。治下疳瘡。一切瘡疥久不斂者。

藥品 木香、檳榔、黃連、各五錢。白芷、三錢。

制法及用法 研爲細末。洗淨乾貼。一日一次。有水出更貼之。或加地骨皮。研爲細末。

先於瘡口上。用溫漿水洗滌。搥乾貼之。

【化痞膏】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治痞積。療馬刀。瘰癧。

藥品 秦艽、三稜、蓬莪朮、黃蘗、當歸、各五錢。大黃、三錢。全蠍、十四個。穿山甲、十四片。蜈蚣、五條。木鼈子、七個。

制法及用法 共入菜油二斤四兩內。浸二日夜。煎焦黃色。去渣熬。略冷。下炒紫黃丹一斤二兩。不住手攪。黑煙起滴水不計。離火下阿膠、乳香、沒藥、各五錢。風化硝、三錢。琥珀末、一錢。臨用時入麝香少許。狗皮攤貼。

【水銀膏】

發明 見王肯堂證治準繩

功用 療一切癰。

藥品 水銀、二錢五分。蕪荑仁、薑黃、各五錢。酥、二兩。

制法及用法 先將蕪荑、薑黃、研末。次將酥和水銀以柳木杵研攪。俟水銀散。即下蕪荑薑黃末攪勻。瓷器盛之。搽癰上。一日二三次。

五 筆

【必效散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘰癧元氣無虧者。

藥品 南硼砂、一錢五分。輕粉、一錢。麝香、五分。巴豆、五粒(去皮心膜)。白檳榔、一個。斑蝥、四十個(去頭足翅、同糯米炒、去米、一作十四箇)。

制法及用法 研為細末。取雞子二個。去黃用清。調藥入殼內。以溼紙數重糊口。飯甌蒸熟。取出。曝乾。研細。每服五分。實者一錢。五更初炒生薑酒調下。如毒出小便澀痛。用益元散一服。其毒便從大便出而不痛。毒去後多服益氣養榮湯。瘡口自合。若元氣虛弱者。宜先補而後服之。癰毒已下。便與滋補。庶無他患。體虛者不可服。若孕婦及虛勞氣鬱所致者。尤不可服。

【必效散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治癰瘡之久頑者。

藥品 川槿皮、四兩。海桐皮、大黃、各二兩。百藥煎、一兩四錢。巴豆、一錢五分(去油)。斑蝥、一個(全用)。雄黃、輕粉、各四錢。

制法及用法 研為極細末。陰陽水調。將癰抓損。薄敷之。乾必待自落。

【白礬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切疥瘡。

藥品 枯白礬、硫黃、雌黃、胡粉、黃連、各一兩。蛇牀子、七錢五分。

制法及用法 研爲細末。令勻。豬膏和如稀麵粉。每以唾漿水洗。拭乾塗之。

【白礬散】

發明 見顧世澄醫大全。

功用 治遍身生癬。日久不愈。延至顏面。

藥品 白礬(研細)、獨莖羊蹄根(搗細)。

制法及用法 以極飛米醋調勻。抓破探竅。隔日再搽。不洩兩次即愈。

【白花蛇丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風癬瘡。皮膚瘙癢。日久不癒。

藥品 白花蛇、三兩(酒浸)。苦參(去蘆)、二兩。麥門冬、一兩五錢(去心)。黃芩、防風(去蘆)、白鮮皮、甘草(炙)、枳殼(麸炒、去蘆)、梔子仁、赤芍藥、川大黃、蒼耳子、羌活(去蘆)、黃耆(剉去蘆)、白蒺藜、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後薄荷酒送下。

【白花蛇散】

發明 見陳言三因極一、病證方論。

功用 治久濕癰腫。發於項腋間。憎寒發熱。或痛或不痛。

藥品 白花蛇(酒浸頓、去皮骨、焙乾)、二兩。犀角屑、青皮、黑牽牛(半生半炒)、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服二錢。加膩粉五分。研勻。五更時糯米飲調下。已時利下惡物。乃瘡之根也。更候十餘日。再進一服。忌食發風壅熱物。如已成瘡。一月可效。

【白附子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治面上熱瘡似癰。或生赤黑斑點。

藥品 白附子、密陀僧、決明子、白芷、定粉、各等分。

制法及用法 研爲末。先用蘿蔔煎湯洗面淨。後用羊乳調。至夜敷患處。次早洗去。

【白蒺藜散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切癰疥。風癢癩瘡。

藥品 白蒺藜、秦艽(去蘆)、土枳殼(麸炒、去蘆)、獨活、防風(去蘆)、各二兩。人參、苦參、玄參、丹參、沙參(均去蘆)、甘

菊花、梔子仁、黃芩、茯苓(去木)、茱萸、細辛(去苗)、麻黃(去節)、各二錢五分。烏蛇、四兩(酒浸、取肉)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前溫酒調下。

【立效散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰瘡。耳瘡。瘡疥。

藥品 定粉、松香、黃蘗、黃連、枯礬、各一兩。

制法及用法 各另研爲末。用薄荷油調搽。

【立效散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳瘡。

藥品 陳蠟皮(燈上燒黑)、一錢。麝香、少許。

制法及用法 研爲細末。和勻。每用少許。先以綿拭耳內。蠟上土藥。

【立應散】

發明 見王璠是齋百一選方。

功用 治癰瘡已破未破。皆效。

藥品 連翹、赤芍藥、川芎、當歸、甘草(炙)、滑石、各五錢。黃芩、三錢。川烏尖、七個。生白牽牛末、土蜂房(蜜水洗、飯上蒸、日乾)、各二錢五分。地膽(去頭翅足、拌糯米炒、米黃

爲度、去米、一作斑蝥)、三錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢匕。臨臥時濃煎木通湯調下。毒根從小便中出。澀痛不妨。毒根如粉片塊血爛肉。如未效。再服。繼以薄荷丹解其風熱。但地膽性毒。辭以爲尖。或衝上麻悶。不能強制。可嚼葱白一寸。茶清送下。以解之。如小便澀。燈心湯調服五苓散。瘡處用疔膏藥貼。若癰疽用此宜導惡毒。去黃芩不用。

【生肌乾膿散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰瘡。馬刀。膿汁不乾者。

藥品 黃連、白礬、各二錢五分。生肌散、草烏頭、斑蝥(去翅足)、青黛、各一錢。麝香、少許。

制法及用法 研爲極細末。每用少許。乾搽瘡口內。用膏藥蓋護。惡肉盡化膿水。

【半夏散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療一切瘡。

藥品 半夏、三兩。

制法及用法 搗爲末。陳醬汁調和如糊。厚塗癰上。日二三次。即瘥。

【四聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘰癧。服白花蛇散轉利。以此調之。永去其根。

藥品 海藻(洗)、石決明(煨)、羌活、鹽麩、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。米湯調下。以清水盡爲度。

六 筆

【百效丸】

發明 見劉氏方。

功用 治膿窠。血風。疥癬。

藥品 黃蘗(爲君)、苦參(爲臣)、連翹、川牛膝、何首烏、當歸尾、生地、牡丹皮(爲佐)、防風(瘡在上爲使)、防己、荆芥、紫蘇葉(瘡在下、此三味爲使)。

制法及用法 研爲末。神麴打糊爲丸。每服三錢。白湯送下。一斤服完。除根不發。加蛇蛻一兩(炒研)更妙。

【百部膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治牛皮癬。

藥品 百部、白蘚皮、鶴蟲、蓖麻子仁、生地黄、黃蠟、全蠍、各一兩。

制法及用法 蜜酒、八兩。入藥熬枯。去渣復熬。至滴水成珠。再下黃蠟二兩。試水不散爲度。取起鍋。入雄黃末和

勻。稍冷傾入瓷鉢中收貯。遇盡火氣。攤貼患處。

【如神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘰癧已潰。腐肉不去。瘡口不合者。

藥品 白礬(煨)、三錢、松香(熔化傾地上)、一兩。

制法及用法 研爲細末。挑少許於瘡口上。外貼膏藥。

七 筆

【何首烏散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疽。瘰癧。

藥品 何首烏、二斤(白米泔浸七日、夏月逐日換水、用竹刀刮令碎、九蒸九曬)。明麻子、四兩(九蒸九曬)。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前溫酒或薄荷湯調下。

【何首烏散】

發明 見羅元益衛生寶鑑。

功用 治癰疽。瘰癧。疥癬。諸皮膚病。

藥品 何首烏、蔓荊子、石菖蒲、荆芥穗、甘菊花、枳殼子、苦參(去蘆)、威靈仙、各三錢。

制法及用法 研爲細末。每服三五錢。食後溫酒或茶清蜜湯調下。每日二次。

【含化丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘰氣。

藥品 海藻、海蛤(煨)、昆布、瓦楞子(煨)、文蛤、訶子(去核)、五靈脂、各一兩。豬鬃、十四個(焙乾、另研)。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如芡實大。臨臥時含化一丸。時時嚥下。兼灸法。以助丸功。

【芋芳丸】

發明 驗方。

功用 治瘰。輭堅。化毒。生肌。治一切瘰癧。不論已潰未潰。

藥品 香梗芋芳(揀大者)。不拘多少。

制法及用法 切片。曬乾。研爲末。用陳海蜃漂炭。大芋蕒煎湯泛丸。如梧桐子大。每服三錢。陳海蜃皮、芋蕒、煎湯送下。

【阜角煎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒瘰癧。

藥品 皂角、三十挺(十挺炮黑、十挺酥炙、十挺用水一鍾煮軟揉取汁用)。何首烏、玄參、薄荷葉、各四兩。

制法及用法 研爲細末。皂角汁熬膏。煉蜜和丸。如豌豆

大。每服三四十丸。食後溫湯送下。

八 筆

【昆布散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘰氣結腫。胸膈不利。

藥品 昆布(洗)、海藻(洗)、松蘿、半夏(湯泡)、細辛、海蛤(細研)、白蘇、甘草(炙)、各一兩。龍膽草、土瓜根、檳榔、各二兩。

制法及用法 研爲細末。可服二錢。食後溫酒調下。

【昆布散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘰氣。去風火鬱滯。散痰氣壅結。

藥品 昆布、防風、荆芥、黃連(酒炒)、海藻、海粉、羌活、升麻、連翹、青皮、膽星、貝母、牛蒡子(炒)、夏枯草、沉香、香附子、撫芎、黃芩(酒炒)。

制法及用法 加薄荷。清水煎服。或末或丸俱可。痰多加南星、半夏。又宜灸天突穴爲妙。

【青金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒溼癬。浸淫瘡。

藥品 白膠香、一兩。輕粉、

五錢。青黛、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。乾擦患處。

【青金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒煉眉疥癬。遍身瘙癢。膿水淋漓。經年不愈。

藥品 松香、二兩。蛤粉、五錢。青黛、二錢五分。

制法及用法 研爲末。燭油調搽。或乾擦之。或加輕粉、枯礬、各三錢。尤效。

【青黛散】

發明 見顧世淨編醫大全。

功用 治奶癬。

藥品 青黛、黃蘗、枯礬、雄黃、百藥煎、硫黃、各等分。

制法及用法 共研細末。溼則乾擦。乾用香油調搽。以愈爲度。

【金華散】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒一切溼瘡。癬疥。

藥品 黃蘗、黃連、各五錢。黃丹、一兩(水飛)。輕粉、一錢。麝香、一字(另研)。

制法及用法 同研細末。令勻。先以溫水洗。後貼之。

【金華散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 收水。涼肌。解毒。治痘後肥瘡。疔瘡。疥癬。

藥品 黃丹(水飛過、火煨紅)、一兩。黃蘗、黃連、各五錢。黃芩、大黃、各三錢。輕粉、一錢。麝香、一分。

制法及用法 研爲細末。蜜溼乾擦。燥用臘油熬化調搽。

【羌活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治頑癬疥癩。風瘡成片流黃水。

藥品 羌活、獨活、明礬、白鮮皮、硫黃、狼毒、各一兩。輕粉、二錢五分。白附子、黃丹、蛇牀子、各五錢。

制法及用法 研爲細末。油調成膏。敷之。

【拔毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治疥癬、瘡癤。

藥品 生黃芩、生黃連、生白礬、雄黃、各五錢。銅綠、二錢(煨甚加之)。松香、一兩。

制法及用法 研爲末。乾擦患處。或用油調搽。疥瘡加枯礬、三錢。

九 筆

【苦參丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 補血。治肺毒邪熱。瘰癧疥癬。

藥品 苦參、不拘多少。

制法及用法 研爲細末。粟米飯或煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時熱湯或米飲、薄荷湯、送下。

【苦參丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疥癰癢。

藥品 苦參、一斤(爲末)。皂角、二斤。

制法及用法 將皂角沒入水中。揉濃汁。濾去滓。用清汁熬成膏子。和苦參末爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。不拘時煎荊芥酒或薄荷酒送下。

【苦參丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切癰。皮膚癰癢。

藥品 苦參(去蘆)、一斤八兩。菖蒲、四兩。烏蛇、八兩(酒浸、取肉)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時熱湯送下。

【苦參丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疥瘡瘍。遍身癰癢。

藥品 苦參、四兩。玄參、黃

連(去鬚)、大黃(剉碎、炒香)、獨活(去蘆)、枳殼(去蘆、炒)、防風(去叉)、各二兩。黃芩(去黑心)、梔子、菊花、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後漿水或茶湯、溫酒送下。一日三次。

【苦參丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疥。

藥品 苦參、一兩。白茯苓、胡麻、牛蒡子、各五錢。甘草、二錢五分。

制法及用法 研爲末。酒調麴糊爲丸。竹葉湯送下。

【苦參丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疥瘡瘍。

藥品 苦參、二兩(取粉)。丹參(去土、炙)、沙參(去土)、人參、防風(去叉)、五加皮、茯苓(炒去刺)、烏蛇(酒浸、去肉)、蔓荊子、敗龜板(酥炙黃)、虎骨(酥炙黃)、玄參(堅者)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。用不蛀皂角一斤。剉碎。清水三升。提取汁。去滓。於無油鐵器內熬成膏。用煉蜜四兩和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。荊芥薄荷酒送下。食後

良久夜臥共三服。

【苦參散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘡疥。

藥品 苦參(取頭末)、二兩。豬肚、一具(去脂)。

制法及用法 以苦參末摻豬肚內。用線縫合。隔宿煨乾。取出。洗去原藥。先不喫飯一日。至第二日先飲新水一盞。後將豬肚食之。如吐再食。食後一二時。用無憂散五七錢。肉湯調服。取出小蟲爲效。後用不蛀皂角一斤。去皮弦及子。搥碎。清水四甌。煮至一甌。用生絹濾去渣。再入苦參末。攪熟稀麵糊膏子相似。取出放冷。再入何首烏(去皮)、二兩。防風(去蘆)、一兩五錢。當歸(去蘆)、一兩。芍藥、五錢。人參(去蘆)、三錢。共研細末。入皂角膏爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。不拘時溫酒或茶清送下。一日三次。後用苦參、荆芥、麻黃。煎湯洗浴。

【苦參散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切疥。及風瘙癢。搔之成瘡。

藥品 苦參、丹參、各四兩。蛇牀子、八兩。

制法及用法 研爲細末。先

以溫水洗瘡。拭乾後敷之。

【枳殼丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切風熱瘡疥。

藥品 枳殼、四兩(麸炒、去瓤)。苦參(去蘆)、八兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後溫酒送下。

【枳殼丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘡疽。癰腫。瘰癧。

藥品 枳殼(去瓤、麸炒)、牽牛(炒取頭末)、木香、青皮、各一兩。甘草、大黃、各五錢。

制法及用法 研爲細末。用皂角長一尺許者三挺。約三兩。炮焦搥碎。好酒煮軟。接取汁。熬膏稠黏。和末爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。食後蔥茶煎湯送下。一日二次。

【枳殼散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰疥瘰癧。麻痺。

藥品 枳殼(麸炒、去瓤)、四兩。白蒺藜、五合。苦參(去蘆)、蔓荊子、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。不拘時溫酒調下。一日三次。

【胡粉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切癰瘡。癰癢甚者。

藥品 胡粉(另研)、雄黃(另研)、硫黃(另研)、各一錢五分。生草烏、二錢。斑蝥、一錢。砒、五分。蠟梢、三錢。麝香、三分。

制法及用法 研爲細末。先用羊蹄根蘸醋擦動。次用藥少許。擦於患處。

【胡麻丸】

發明 見顧世澄癰醫大全。

功用 治小兒風癰、疥癩。

藥品 胡麻子、何首烏、威靈仙、白蒺藜、荊芥穗、牛勞子、蔓荊子、各三錢。苦參、五錢。石菖蒲、甘菊花、各一兩。

制法及用法 共研細末。酒糊和丸。如綠豆大。每服一錢。竹葉、燈心、煎湯送下。

【南星散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治頸面諸瘤。如拳如栗。或軟或硬。不癢不痛。

藥品 生南星(大者)、一枚。

制法及用法 細研爛。入好醋五七點。杵如膏。先以細鍼刺患處。令氣透。再用膏藥攤貼。覺癢則頻頻換貼取效。切不可用鍼灸。

【香附餅】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治癰癢腫核及風寒流注。壅於經絡。結成腫痛。

藥品 香附子、不拘多少。

制法及用法 研爲末。酒和爲餅。覆於患處。以熱熨斗熨其上。未成者內消。已成者自潰。若風寒溼毒。直用薑汁作餅熨之。

十 筆

【烏蛇丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風癰多年不瘥。

藥品 烏蛇(酒浸去骨)、白附子(炮)、附子(小便浸一宿)、天麻、各二兩。全蠍(炒)、羌活、乳香、麝香(炒)、各一兩五錢。苦參、十兩。槐花、八兩。

制法及用法 研爲細末。生薑汁、白蜜各一斤。同熬成膏。入藥和丸。如梧桐子大。每服三四十丸。空腹時溫酒送下。夜晚荊芥湯送下。

【烏蛇散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風熱遍身。癢癢癢。

藥品 烏蛇肉(酒浸)、二兩。羌活(去蘆)、白鮮皮、桂心、甘草(炙)、枳殼(去蘆、欬炒)、蒲黃(炒)、蔓荊子、芎藭、當歸(去蘆)、各五錢。明天麻、麻黃(去

節)、秦光(去蘊)、干姜子(炒)、藜蘆(去蘊)、白麝香(炒)、各心錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。不拘時溫酒調下。

【烏頭丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治腎臟風。上攻下注。生瘡及癰。

藥品 川烏頭、草烏頭(二味以黑豆五合、煮透爛、去皮膠、切曬)、各一兩。天麻、地龍(去土)、白附子、各五錢。

制法及用法 研爲末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。每服一三十丸。空腹食前溫酒或鹽湯送下。

【神效方】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切惡瘡、疥瘡。

藥品 水銀、黃蘗、黃連、松脂(黃明者)、膩粉、土蜂窠、甘草、各等分。

制法及用法 將水銀置手掌中。以唾津殺爲泥。入瓷器中。以生麻油和研。生絹濾如稀餡。和藥末再研如稠餡。先用溫水洗瘡。帛拭乾塗之。一次即瘥。有黃水者。塗之隨手便乾。痛癢不堪忍者。塗之立止。疥則抓破敷藥。

【神異膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切瘡疥。

藥品 雄黃(細研)、蛇牀子、三錢。巴豆、七粒。皂角、一枚。輕粉、半字。金蠟、七枚。黃蠟、五錢。清油、一兩。

制法及用法 先將皂角、金蠟、巴豆、煎油變色。去三味。入黃蠟化開。取出。待冷。入雄黃、蛇牀子末、輕粉、和勻成膏。先用苦參湯溫洗。後以此藥擦疥上。

【神效瓜囊散】

發明 見周文榮外科集驗。

功用 治癰疽。瘰癧。乳癰。乳疔。乳巖。癰勞。

藥品 黃瓜囊、一個(子多者、去皮、焙爲末、如急用、只須研爛)、當歸(酒洗、去蘊、焙切)、生甘草、各五錢。乳香(去油、另研)、一錢。沒藥(去油、另研)、二錢五分。一方無乳香。一方有穿山甲、貝母。

制法及用法 無灰酒三升。入銀石器中。慢火熬取清汁一升。分爲三服。食後服之(一方各作末、入瓜囊中、黃綿紙封之、微火煨存性、爲末、每服二錢、溫酒調下)。如毒氣已成。能化膿爲黃水。如毒未成。即內消。甚者再服。以退爲度。

與立效散相間服甚妙。

【神效消癰丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治癰癧。

藥品 熟地黃、三兩。澤瀉、白茯苓、淮山藥、山茱萸肉、各一兩。玄胡索(一作元參)、牡丹皮、牡蠣、各一兩二錢。

制法及用法 磨細。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。

參考 按此即六味地黃丸加元胡索(一作元參)與牡蠣。

【消毒散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治遍身癢疥。

藥品 金銀花、連翹、白蒺藜、荊芥、白芷、牛蒡子、防風、白蘚皮、赤芍藥、甘草。

制法及用法 清水煎服。日久不愈加何首烏。乾燥加當歸。有熱加黃芩。下部多加黃蘗。小便澀加木通。

【消核散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治頸項痰癭癰癧。

藥品 海藻、三兩。牡蠣、元參、各四兩。糯米、八兩。生甘草、一兩。紅娘子、二十八個(同糯米炒焦黃色、去紅娘子、用米)。

制法及用法 研爲細末，每

服一錢。或一錢五分。溫酒調下。量人壯弱加減。

【浮萍散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治風癰疥癬。

藥品 浮萍(七月十五日採取、陰乾)、當歸、川芎、荊芥、赤芍藥、甘草、各一錢五分。麻黃、七分五釐(夏月只用三分)。

制法及用法 加葱白二根。豆豉五六十粒。清水煎。熱服取汗。患在手臂者加桂枝。在背者加羌活。在膝者加牛膝、薄荷。

【海藻丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰癧。

藥品 海藻(洗曬)、川芎、當歸、官桂、白芷、細辛、藿香、白蘇、昆布(洗曬)、明礬(煨)、各一兩。海蛤(煨)、松蘿茶、各七錢五分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。食後含嚥下。

【秦艽丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治遍身疥癢。搔之皮起。

藥品 秦艽(去蘆)、黃耆(去蘆)、苦參(去蘆)、川大黃(酒蒸)、各二兩。漏蘆(去蘆)、防

鼠(去膽)、黃連、各一兩五錢。
烏蛇肉、五錢(酒浸焙乾)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後溫酒送下。

【荆芥散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治多年溼癬。

藥品 荆芥穗(不拘多少、以瓦罐盛、晚泥固濟、只留一竅、用炭火燒、候出青煙、便去火、用溼紙塞竅、放冷取出、研爲細末)、五錢。麝香、一錢。膩粉、五錢。

制法及用法 研爲末。和勻。先以口含鹽漿水。洗瘡抓令破。用子搥乾。生油調藥敷之。

【凌霄花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風溼痛諸癬久不愈。

藥品 凌霄花、黃連、白礬、各二錢。雄黃、五分。天南星、羊蹄根、各五錢。

制法及用法 研爲細末。抓破用生薑汁調藥擦之。如癬不發。只用清油調藥。立效。

【夏枯草膏】

功用 治肝旺血燥。瘰癧堅硬。

藥品 夏枯草、一斤八兩。當歸、白芍(酒炒)、黑參、烏藥、浙

貝(去心)、殭蠶(炒)、各五錢。昆布、桔梗、陳皮、撫芎、甘草、各三錢。香附(酒炒)、一兩。紅花、二錢。

制法及用法 共入砂鍋內。水煎濃汁。布濾去渣。將汁復入砂鍋內。慢火熬濃。加白蜜八兩。再熬成膏。每用一二匙。滾水沖服。兼戒氣怒魚腥。亦可用薄紙攤貼。瘰癧自消。

參考 此方平和。不傷胃氣。可以常服。

【祛風丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒瘰癧。

藥品 何首烏(蒸)、乾薄荷葉、玄參(另末)、各四兩。精羊肉、八兩。皂角、三十挺(十挺火燒、十挺酥炙去皮、十挺水撈取汁、去渣)。

制法及用法 以皂角水煮肉使爛。細研。和藥爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹時溫酒或薄荷湯送下。

【祛風丸】

發明 見張潔古方。

功用 治疥癩風瘡。

藥品 黃耆、枳殼(炒)、防風、芍藥、甘草、地骨皮、枸杞子、熟地黃、生地黃(二地均酒拌、杵碎)。

制法及用法 各另研爲末。

入二錢許。以陳皮和丸。如梧桐子大。每服七八十丸。熱湯送下。

十一筆

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治身面生斑。或癢或腫。

藥品 羚羊角(燒爲灰)。

制法及用法 研爲極細末。以雞子清或清水和塗。

【犀角丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治諸般瘰癧。心火上攻。兩目赤澀。

藥品 犀角、青皮、黑牽牛(半生半炒)、陳皮、各一兩。連翹、五錢(去心)。薄荷、二斤。皂角、二枚。

制法及用法 先以犀角、青皮、牽牛、陳皮、連翹、共研細末。用皂角去子皮弦。泡搥。以布絞取汁一碗。又用新薄荷爲取汁。同熬成膏。和入藥末內爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後滾湯送下。

【紫霞膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治瘰癧初起。及頑癬。瘰癧。濕瘡。濕氣。棒瘡。疼痛不已者。

藥品 松香、一斤。銅綠、二兩。

制法及用法 各取淨末。用麻油四兩。銅鍋內先熬數滾。將水不乾。方下松香熬化。次下銅綠。熬至白煙將盡。其膏已成。候片時。傾入瓷罐。每用少許。湯內燉化。旋攤旋貼。瘰癧未成者自消。已成者自潰。已潰核存者自脫。或加頂上牙色梅花冰片、二三整。研極細。搽膏上貼之。

【連翹散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治項上惡核癰腫。

藥品 連翹、射干、獨活、升麻、木香、沉香、木通(剉)、各一兩。桑寄生、丁香、各五錢。川大黃(剉碎、微炒)、二兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。清粥飲調下。一日三次。

十二筆

【琥珀膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治頸項瘰癧。經久不愈。漸成瘻疾。

藥品 琥珀、一兩。丁香、木香、各三錢。桂心、硃砂、香白芷、當歸、防風(去蘆)、木通、木鼈子(去殼)、各五錢。黃丹、七

肉(一作八兩)。脂柳枝、三兩、松脂、二兩(一作八錢)。麻油、一斤二兩(一作一斤八兩)。

制法及用法 除琥珀、丁香、桂心、硃砂、木香、爲細末。餘藥細剉。以油浸一宿。入鑊中以慢火煎。候白芷焦黃。濾出。次下松脂末。濾去滓。再澄清油。卻入鑊中慢火熬。下黃丹。以柳木篦不住手調。令黑色。滴水中成珠不散。看硬得所。入琥珀等末調勻。瓷器收盛。視患大小。用火燭紙上攤勻貼之。

【琥珀黑龍丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治五癰六癰。不論新久。但未穿破者。

藥品 琥珀、一兩。天南星(薑汁拌炒)、京墨、五靈脂、海帶、海藻、各五錢。血竭、二兩。廣木香、三錢。麝香、一錢。

制法及用法 各研細末。和勻。煉蜜爲丸。每重一錢。金箔爲衣。曬乾密貯。每服一丸。熱酒一杯。量病上下。食前後化服。如患在下部。服後用美物壓之。

【黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療溼疥。

藥品 黃連、二兩。蛇床子、

五錢。赤小豆、糯米、胡粉、各一兩。水銀、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。生清油和斫。候水銀星盡如膏。旋取塗之。

【黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療癰溼癢不可忍。

藥品 黃連、黃蠟、胡粉(研細)、各一兩。雄黃(研細)、五錢。

制法及用法 研爲細末。令勻。先用溫水漿洗竅。然後取藥敷之。不過四五度。即瘥。

【黃連膏】(外科)

發明 通行方。

功用 治溼瘡及化膿性皮膚炎。

藥品 黃連、一兩。大黃、四兩。黃柏、四兩。黃芩、四兩。麻油、三斤。黃蠟、一斤。

制法及用法 將四藥浸麻油內。一天後文火熬煎至藥枯。去滓濾清。加入黃蠟。再用文火徐徐收成膏。

【黃連膏】

發明 見醫宗金鑑方。

功用 治爛皮溼熱。

藥品、制法及用法 先用桐油一斤。入鍋熬。起白星爲度。加黃蠟一兩五錢。熔化。再入大黃末一斤(研細炒黑)。攪

勻。加冰片二分。攤貼患處。

【黃連膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治諸癰。久不瘥。四畔疥侵。復變成癰。瘡肉赤黑。癢不可忍。搔之出血。

藥品 黃連(去鬚)、黃蘗(去粗皮)、鼓(細研)、蔓菁子、杏仁(湯浸、去皮尖雙仁、細研)、各五錢。水銀、一錢。

制法及用法 研爲細末。先以水銀於掌上。唾研如泥。次入瓷鉢內。下生油一合。和勻。再下藥末。同研成膏。瓷瓶盛之。每用少許。塗於瘡上。每日三上度。

【黃蘗散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治手足皮枯。破則如水窠。或癢如疥癬。並治雁來風。

藥品 黃蘗、黃連、防風、各四錢。胡椒、五錢。大楓肉、枯礬、各二錢。大茴香、花椒、各三錢。硫黃、硫黃、各五分。檳榔、二枚。斑蝥、十個。潮腦、一錢五分。

制法及用法 研爲末。臘豬油調塗。如麻木者。亦可搽。其癢處破擦之。則皮自然如舊。

【硫黃丸】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治疥瘡。

藥品 硫黃(精明者)、一兩。

制法及用法 研細末。糕粉搗丸。如梧桐子大。合三兩重。每服五六丸。荊芥湯送下。瘡上身多。食後服。下身多。食前服。

【硫黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒癰。偏身發癢。

藥品 硫黃(另研)、雄黃(另研)、硃砂(另細研)、麝香(另細研)、吳茱萸、生附子、各二錢五分。巴豆(去皮油)、川椒、各一錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。先用新布擦癰。令水出。便用醋調塗。不過二三次即瘥。

【硫黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治淫癰。癢痛不可忍。

藥品 硫黃、五錢。膩粉、二錢五分(另研)。龍腦、一錢。蟾蜍、五錢。

制法及用法 研細如粉。用面油調泥。癢痛時搽破。後用藥敷之。立瘥。

【硫黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治烏癰久不瘥。

藥品 硫黃、雄黃、雌黃、金星石、銀星石、淫雪石、水浮石、

寒水石、密陀僧、馬牙硝、不灰木、槐白皮、蟬蛻、亂髮灰、蜂窠灰、蛄牛子、牡蠣、麝香、各一錢。白礬、五錢。

制法及用法 研爲細末。用水銀五錢。以津唾殺研如泥。另入膩粉二錢五分。用生清油四兩。調勻。每於患處遍塗之。立效。

十三筆

【當歸飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心經風熱。發見皮膚。遍身疥癬風癩。或癢或痛。或膿水浸淫。或發赤疹痞癰。

藥品 當歸(去蘆)、白芍藥(酒炒、一作赤芍藥)、川芎、生地黃、白蒺藜(炒、去刺)、防風(去蘆)、荊芥穗、各一兩。何首烏(去蘆)、黃耆(去蘆、炒)、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服四錢。清水一盞半。加生薑五片。煎至八分。去滓。不拘時溫服。

十四筆

【蒺藜丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風盛癢生痞癰。

藥品 白蒺藜、秦艽(去蘆)、

赤茯苓(去皮)、各一兩。羌活(去蘆)、苦參(去蘆)、黃芩、細辛(去苗)、各五錢。枳殼、七錢五分(去瓢、鉄炒)。烏蛇肉、三兩(浸酒)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時溫蜜湯送下。

【蒺藜散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人風癢。皮膚中如蟲行。及生癰疹。搔之作瘡。面腫心煩者。

藥品 白蒺藜(炒)、莽草(炒)、羚羊角屑、各七錢五分。黃芩、人參(去蘆)、苦參(去蘆)、蛇牀子、秦艽(去蘆)、防風(去蘆)、麻黃(去節)、當歸(炒、去蘆)、甘草(炙)、枳殼(鉄炒、去瓢)、細辛(去苗)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一中盞半。煎至一大盞。去滓。不拘時溫服。一日二次。

【碧玉散】

發明 見顧明醫醫方彙編。

功用 治癬。

藥品 銅綠、硃砂、白礬、各等分。

制法及用法 研勻。香油調搽。

【綠雲膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘰癧已潰。瘡口不乾。

藥品 黃連、大黃、黃芩、玄參、黃蘗、木鼈子(去殼)、各一錢。

制法及用法 細切。用香油、一兩。同煎至焦色。去藥。入淨松香、五兩。再煎成膏。傾入水中。扯拔之。令爲金黃色。入銚內。再熬數滾。放溫。加豬膽汁、三枚。銅絲、三錢(醋一兩、浸一日、絹濾去渣)。同入膏內。趁竹籠或柳枝帶溫攪勻。至冷爲度。重湯燉融。攤於薄紙上貼之。加乳香、沒藥、輕粉尤佳。

【銀粉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切頑癬。

藥品 輕粉、黃丹、白膠香、臘膏、各等分。

制法及用法 研爲細末。麻油調。拭淨或抓破。竹篦挑塗。二次便乾。數次即剝去殘。

十八筆

【檳榔散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治氣毒瘰癧。心塞悶。不下飲食。

藥品 檳榔、前胡(去蘆)、赤

茯苓、牛蒡子(炒)、各一兩。人參(去蘆)、枳殼(去瓢炒)、沉香、防風(去蘆)、各五錢。甘草(炙)、二錢五分。

制法及用法 剉碎。每服四錢。清水一盞。加生薑五片。煎至六分。去滓。空腹時及晚食前溫服。

十九筆

【蟾酥膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘰癧將潰膿者。

藥品 蟾酥、寒水石、寒食麵、各黃豆大一塊。巴豆、五粒(去殼、一作十粒)。白丁香、十五粒(一作十粒)。

制法及用法 各另研爲末。和作一處。再研。煉蜜和丸。如綠豆大。搓作捻子。每服一丸或二三丸。先以鍼當癰頂鍼一孔。將丸插入孔內。綠雲膏蓋貼。三日後單換膏藥。數日頑根自脫。以膿盡硬退爲效。如膿未盡。再用數丸。以盡爲度。

二十筆

【鯽魚膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治諸癰疽。或乾或溼。痛癢難忍。

藥品 鯽魚(中者)、一尾。亂髮(如雞子大)、二枚。豬脂、八兩。雄黃、一兩五錢。硫黃、一兩。

制法及用法 先煎豬脂令沸。即下魚煎。令煙盡。次下髮。令消。漉去滓。下雄黃、硫黃末。攪令勻。盛於瓷器中。每用少許。不拘時塗之。以瘰爲度。

走馬牙疳類

十一筆

【紫金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒走馬疳。

藥品 黃丹、蛇牀子(炒令黑)、地龍(炒令黑)、各五錢。青礬、一分(煨過)。

制法及用法 研爲末。每用一字。搽牙齦上。一日三次。

十二筆

【無比散】

發明 見孔氏方。

功用 治走馬疳。

藥品 麝香、一分(另研)。蟾酥、綠礬、各五釐。膽礬、沒藥、各二分。

制法及用法 用大瓢一方。鑿中心作竅穴子。勿令透地。

便安四味藥在穴中。週圍用燒紅炭三斤。煨過取出。同麝香再研勻。以雞翎微溼。沾藥末掃於齒上。立效。

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治麻黃入胃。牙肉黑爛出血。及走馬疳。

藥品 雄黃、一錢。黃蘗、二錢。枯礬、五分。

制法及用法 共研細末。先用艾葉煎湯洗淨。後再搽藥。

十三筆

【聖散子】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒走馬疳。

藥品 膽礬、龍膽草、各一兩。

制法及用法 同於瓦瓶中煨煙盡。略存性。每用少許。貼於瘡上。

十四筆

【熊膽散】

發明 見張渙方。

功用 治走馬疳。

藥品 熊膽(細研)、菖蒲子(炒令微黑)、蝦蟆灰、白礬、各五錢。生硫黃、麝香(細研)、雄黃(細研)、蘆薈(細研)、各一分。

制法及用法 研爲末。拌勻。再研爲細末。每服一字。荊芥煎湯調下。如有瘡處。宜薄敷之。如鼻癢。取少許吹入。一日二三次。

十六筆

【龍骨散】

發明 見錢乙方。

功用 治疳瘡走馬疳。

藥品 龍骨、一錢。砒霜、蟾酥、各一字。粉霜、五分。定粉、一錢五分。龍腦、半字。

制法及用法 先研砒極細。次入龍骨再研。次入定粉等同研。每用少許敷之。

【燒鹽散】

發明 見曾氏方。

功用 治走馬疳。

藥品 樣斗、不拘多少。

制法及用法 每用大者兩個。入鹽滿煅。蓋作一合。或五六個至十數個。安在火內。和鹽燒透。取出。鐵絲繫定。置地上。瓦碗蓋定存性。候冷。入麝香少許。乳鉢內極細杵勻。每用五分。塗患處。常用小瓦盒盛貯。勿使紙裏。以防回潤。

十七筆

【膽礬散】

發明 見沈金鰲尊生書。

功用 治牙疳。

藥品 膽礬、兒茶、各五釐。胡荽、五錢。

制法及用法 研末敷之。

二十筆

【蘆薈散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治走馬牙疳。

藥品 蘆薈、一錢。黃蘗、五錢。人言、五分(用紅棗、五枚、去核、每棗納人言一分、火燒存性)。

制法及用法 研爲細末。先用米泔水漱淨疳毒。後敷藥末於堅硬及腐處。

二十一筆

【蘭香散】

發明 見演山方。

功用 治小兒走馬疳。牙齒潰爛。以至崩沙出血齒落者。

藥品 蘭香子、輕粉、各一錢。密陀僧(醋淬)、五錢。

制法及用法 共研如粉。敷齒及齦上。

【麝香散】

發明 見劉氏家傳方。

功用 治小兒走馬急疳。口臭齒頰。攻蝕唇鼻頰頰。

藥品 麝香、一錢。青黛、五

錢。黃蘗、一兩(去皮、杵末)。雄黃、一分(飛研)。

制法及用法 杵研極細。先以綿纏著。擦去齒上腐肉。紫帛拭去惡血。量瘡大小乾摻。日夜五次。若血盛者。加定粉五錢。

火毒類

十一筆

【紫雪】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治脚氣毒遍內外。煩熱不解。口舌生瘡。狂越躁亂。瘧疾毒瘕。卒死溫瘧。五尸五疰。邪熱卒黃。蠱毒鬼魅。心腹疔痛。一切實火閉結。小兒驚風百病。解熱藥毒發。

藥品、制法及用法 用黃金、六斤四兩(貨金鋪中葉子者佳、以飛金一百頁代之、尤妙)。石膏、寒水石(如無真者、以玄精石代之)、磁石(醋煨、一作水煨)、白滑石、各三斤。搗碎。清水一斛。煮至四斗。去渣。次用犀角屑、羚羊角屑、青木香(搗碎)、沉香(搗碎)、各五兩(一作各五斤)。玄參(洗焙、搗碎)、升麻、各一斤。甘草(炙)、八兩。丁香、一兩(搗碎)。入煎汁中。

再煮取一斗五升。漉去滓。次用朴硝、十斤(一作二斤)。消石、四升(每升重七兩七錢五分、一作二斤)。入煎汁中。微火上煎。柳木筴攪不住手。候有七升。投於木盆中。半日欲凝。次用麝香(當門子)、一兩二錢五分(研)。硃砂(研細、水飛淨)、三兩。入煎藥中。攪勻。勿見火。冷二三日。攪凝結成霜雪。紫色。鉛罐收貯(一方無黃金、一方無磁石、滑石、消石)。每服三四分至一二錢。杵細。食後新汲水或薄荷湯調下。大人小兒臨時以意加減。

參考 此即千金玄霜。局方於方中參入甘草、丁香、硃砂。遂用紫雪之名。但此專主石藥毒火。方中丁香一味。宜審用。以其香味易散。故較原方減小其製。

【紫雪】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治湯燙火燒。痛不可忍。潰爛成瘡。

藥品 松樹皮(燒灰)、二錢。澀青、一分。

制法及用法 研爲細末。清油調敷。溼則乾摻。一日二三次。忌用冷水洗。或單以松樹皮陰乾。研爲細末。加輕粉少許。生油調敷。以絹帛縛定。

即生癰而愈。

【紫金膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治一切損傷。赤腫焮熱。

藥品 紫金皮、芙蓉葉、各二兩(白花者佳)。

制法及用法 生搗。加生地黃同搗敷貼。或研爲末。雞子清加蜜少許和勻。調入生地黃。搗爛和敷。

【紫金膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治無名腫毒。一切惡瘡。風溼流火。小兒痘毒。

藥品 明松香、四兩(夏用紅者、冬用白者、秋冬紅白各半、以火熬滾、入水內扯拔百十下、研末、若貼痘毒、松香用黃豆水浸、入鍋內煮化、待溫、照上扯拔、研細末)。蓖麻仁、二兩(研細、放細篩羅底上、用穿山甲往來刮之、取羅下者用、上面粗者去之)。輕粉、五錢。銀硃、銅綠、各二錢五分。

制法及用法 用豬油(去衣膜)拌藥。放青石上。用鐵鎚搗數千下。盛瓷瓶內。每用少許。攤油紙上貼之。貼毒及多年痘毒。將膏中剪一孔。露頂透氣。若貼流火。竟貼頂上。不必剪孔。

【紫金錠】

發明 見太乙方。

功用 解諸毒、療瘡腫、利關節、治百病。

藥品 山茨菇、二兩(薑汁洗、去毛皮淨、焙乾、一作一兩)。五倍子(揀去蟲土、搥碎、洗淨、一作三兩、一作二兩)、仁金子(用口仁者、去殼油淨、一作二兩)、各一兩。硃砂(飛淨、一作一兩、一作五錢)、雄黃(鮮紅大塊者、水飛、一作一兩、一作五錢)、麝香(取當門子者、揀淨皮毛、一作二錢)、各三錢。紅芽大戟、一兩五錢(去蘆根、酒煮去骨焙、一作一兩)。一方無硃砂、雄黃。一方有全蠍、山豆根。

制法及用法 於淨室中製畢。各研爲細末。候端午、七夕、重九、或天德月德日。各將前藥秤準。入於大乳鉢內。再研數百轉。方入細石臼中。漸加糯米濃粥調和。杵千餘下。至極光潤爲度。每錠潮重一錢。合時忌婦人雞犬見之。每服一錠或半錠。病重者二錠。薑汁、薄荷湯。或開水、井花水、磨服。病在上者必吐。在下者必利。吐利後以溫粥補之。正氣虛及孕婦忌服。又不可與甘草藥同進。●一切飲食藥毒、難療、

瘴氣、惡菌、河豚毒、及自死牛馬豬羊六畜肉等。以致昏亂卒倒。或生異形病證者。用清水磨灌服。或吐或瀉。其人必甦。南方山嵐瘴氣。煙霧瘴疫。最能傷人。偶有感觸。淺覺意思不快。惡寒惡熱。欲嘔不嘔者。即用水磨一錠服之。得吐利便愈。傳尸癘瘵。諸藥不能取效者。每早清水磨服一錠。至三次後。逐下惡物尸蟲。異形怪類。其病自愈。女子久患癘瘵。爲尸蟲所噬者。用清水磨服一錠。片時吐下小蟲十餘條。再服蘇合香丸。其病頓失。調理月餘而安。小兒父母遺毒。生下百日內。皮塌爛斑。殺道眼腫損爛者。俱用清水磨塗。⑤新久癰瘰發時。東流水煎桃柳枝湯磨服。⑥中風中氣。口眼歪斜。牙關緊急。言語蹇澀。筋脈攣縮。骨節風腫。偏身疼痛。行步艱辛。諸風諸癰。並用酒磨濃熱服之。牙痛、酒磨塗痛上。仍含少許。良久嚥下。蠱疔發背。對口疔瘡。天蛇。無名腫毒。蛙節疔。紅絲疔。楊梅瘡。諸風癰疹。新久痔瘡。並用無灰淡酒磨服。外用水磨塗瘡上。日夜塗數次。覺癢而消。一切惡蛇風犬毒。溪間諸惡蟲傷人。隨即發腫。

攻注偏身。甚者毒氣入裏。昏悶響叫。命在須臾。俱用酒磨灌下。再喫葱湯一碗。被蓋出汗。立甦。打撲損傷。用松節、無灰酒研服。⑦赤白痢疾。肚腹泄瀉。急痛霍亂。絞腸痧及諸痰喘。並用薑湯磨服。⑧自縊。溺死。驚死。壓死。鬼魅迷死。但心頭微溫未冷者。俱用續斷、生薑。煎酒磨服。⑨陰陽二毒。傷寒心悶。狂言亂語。胸膈塞滯。邪毒未出。溫疫煩亂發狂。桃花症。喉閉。喉蛾。喉風。喉疔。俱用薄荷湯待冷磨服。小兒急慢驚風。五疳。五疳。脾病。黃腫。癰疹瘡。牙關緊急。並用薄荷浸水磨濃。加蜜服之。仍塗腫上。年歲幼者。每錠分作數服。⑩年深頭脹。頭痛。太陽痛。偏風頭痛。及諸瘡愈後。毒氣攻注。腦門作脹者。俱用葱酒磨研服一錠。仍磨塗兩太陽穴上。⑪急中癰邪。喝叫奔走。鬼交。鬼胎。鬼氣。鬼壓。失心狂亂。羊兒豬癰等風。俱用石菖蒲煎湯磨服。⑫凡遇天行時疫。沿街閭巷。偏相傳染者。用桃根湯磨濃。滴入鼻孔。次服少許。任入病家。再不相染。⑬婦人經水不通。紅花湯下。

【紫霞丹】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治楊梅結毒。年久毒攻鼻。損破腐爛。

藥品 龜板(放炭火上炙焦、用白酒漿塗之、再炙、以焦黃爲度、研末)、二兩。硃砂(飛)、石決明(用九孔大者、煨紅、童便淬一次)、各六錢。

制法及用法 研爲極細末。和勻。爛米飯爲丸。如麻子大。每服一錢。晝病上下。食前後服之。筋骨疼痛者。溫酒下。腐爛者。土伏苓煎湯下。

【羚羊角散】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治葡萄疫。及毒邪內陷。

藥品 羚羊角(鎊)、麥門冬(去心)、黃芩、知母、牛蒡子(炒研)、防風、玄參、各八分。生甘草、二分。

制法及用法 清水二鍾。加淡竹葉十片。煎至六分。食遠服。

【貫衆散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治一切熱毒。及食毒。酒毒。藥毒。

藥品 貫衆、黃連、甘草、路路通、各三錢。

制法及用法 研爲末。每服三錢。冷水調下。

【透骨丹】

發明 見姚僧坦集驗方。

功用 治一切走注。痛不可忍。

藥品 地骨皮、甜瓜子(炒)、雲臺子(葱根切餅)、各三兩。乳香(另研)、沒藥(另研)、草烏頭(剉炒)、各一兩。蒼朮、牛膝(酒浸)、赤芍藥、當歸(去蘆)、川烏頭(炮、去皮臍)、自然銅(醋煅)、五靈脂、各二兩。

制法及用法 共研細末。醋糊爲丸。如梧桐子大。每服十丸。加至十五丸。不拘時溫酒送下。先用甜瓜子一兩。炒香研爛。酒煎數沸。量虛實調黑牽牛末五錢服之。以利爲度。後服此藥。

十二筆

【復原通氣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治便毒初發。

藥品 南木香、延胡索、天花粉(酒浸)、舶上茴香(炒)、白牽牛(炒)、白芷、當歸、甘草、各一兩。青木香、五錢。穿山甲(酒浸、炙焦)、二兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前溫酒或木香湯調下。

【蛤粉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治湯火傷。

藥品 蛤蜊殼、不拘多少(炙焦黃色)。

制法及用法 研爲細末。生油調如膏敷之。或以蜜水調敷。疼立止。不膿不癢。

參考 此惟燒傷隨手用即效。少緩即不及。當先合以備用。

十三筆

【萬病解毒丸】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治中惡。邪氣。無名腫毒。疔瘡。癰疽。發背。腫瘍。時毒。狐狸毒。鼠奔毒。丹毒。驚毒。瘰癧。風毒。熱毒。蟲毒。河豚毒。疫死牛馬豬羊毒。蛇犬蜈蚣蜂蠍百蠱蟻咬毒。蕪毒。砒毒。藥毒。瘡毒。光粉毒。及一切邪熱之毒。湯火傷。

藥品 麝香、二錢。硃砂、五錢。山豆根、雄黃、續隨子(取仁)、紫河車、獨腳連、各一兩。紅芽大戟、一兩五錢。山茨菰、二兩。五倍子、三兩。

制法及用法 研爲細末。糯米糊和勻。杵搗一千餘下。印作錠子。隨意大小。視病輕重。每服一錠。井水磨化。冬月用薄荷湯磨服。日二三次。

【葛根散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱腫熱盛。口乾口渴。或乾嘔。

藥品 葛根、黃耆、升麻、麥門冬(去心)、瓜蒌根、赤芍藥、梔子仁、生地黄、各一兩。黃芩、七錢五分。生甘草、五錢。

制法及用法 剉散。每服四錢。清水一中盞。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

十四筆

【綠袍散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治口疳。疔瘡。

藥品 黃蘗、二兩。青魚膽、一兩。

制法及用法 先將黃蘗火上炙乾。取起。以魚膽塗上。再炙再塗。以膽盡爲度。切片。研末。再加入人中白、青黛、梅花冰片、膽礬、硼砂、各三錢。研末。每用少許。乾貼患處。

十八筆

【藍根散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 解藥毒。

藥品 藍根(剉)、藤根(剉)、各一握。綠豆(研)、二錢五分。潞脚(研)、一合。

制法及用法 先將二根用清

水一碗。煎至七分。去滓。次入綠豆、薤白、和勻。分三服。或一二服。利下惡物。不利再服。

【雞鳴散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治氣壅疼痛。及熱毒結核。或多煩悶。熱而不寒者。

藥品 黑牽牛、一兩。胡粉、一錢。大黃(蒸)、二錢。朴硝(煉成粉者)、三錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。雞鳴時井花水調服。以便利爲度。未利再服。

二十五筆

【觀音丸】

發明 見楊士瀛仁齋直指。

功用 治暑毒。癰諸毒。

藥品 生半夏(圓白者)、烏梅肉、母丁香、川巴豆(不去油)、各十枚。

制法及用法 研爲末。薑麵糊丸。如麻子大。以厚紙蓋貼。如有油滲出。再易紙蓋之。每服五丸。臨臥時冷水送下。

腫痛類

十二筆

【黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療石癰。消腫。化毒。止痛。

藥品 黃連、生川大黃、白蘇、馬牙硝、黃蘗、各一兩。麒麟竭、芎藭、各五錢。赤小豆(炒熟)、五勺。杏仁(湯浸、去皮尖)、四十九粒。

制法及用法 研爲細末。蜜水調塗。乾即易之。

【黃耆內托散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治便毒腫甚。

藥品 黃耆、當歸、川芎、各二錢。白朮(土炒)、金銀花、皂角刺、天花粉、各一錢。澤瀉、甘草(炙)、各五分。

制法及用法 清水二鍾。煎至八分。食前服。

【圍藥】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 消腫定痛。

藥品 無名異(炒)、木耳(去土炒)、大黃(炒)、各等分。

制法及用法 研爲極細末。蜜水調敷四邊腫處。

【圍藥】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 消腫定痛。

藥品 南星、草烏頭、黃蘗、白芨、各二兩。五倍子(炒)、一兩。一方有白蘇、朴硝。無南星、五倍子。

制法及用法 研爲細末。蜜醋調如糊。隨血圍匝。神效。

【圍藥】

發明 見沈氏尊生書。

功用 消腫定痛。

藥品 五倍子(炒焦黑)、陳小粉(炒黃黑)、各五斤。龜版(燒)、白芨、白蠟、朴硝、榆樹皮、各十二兩。白芷梢、大黃、南星、黃蘗、半夏、各八兩。黃連、牙皂、蓖麻子、各四兩。

制法及用法 醋調。瓦盆內慢火熬成膏。每用加白蜜、豬膽、醋、和勻。圍腫處。中留一孔。綿紙貼之。如紙乾。以刷子刷上。

【圍瘡藥】

發明 驗方。

功用 治腫瘍瘡癤。

藥品 雄黃、白礬、白芨、各等分。

制法及用法 共爲細末。磁瓶收貯。雞蛋清或米醋調勻。圍於瘡腫四週。

【復原通氣散】

發明 見陳自明外科神要方。

功用 止痛。消腫。治毒氣滯塞不通。耳痛。耳聾。乳癰。腹瀉。便癰。一切瘡疔無頭。

藥品 青皮、陳皮(去白)、各四兩。甘草、三兩(生熟各半、

一作二兩、一作三寸半、炙)、穿山甲(炮)、瓜蒌根(一作瓜蒌仁)、各二兩。金銀花、連翹、各一兩。一方無穿山甲、瓜蒌根、金銀花。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。熱酒調下。

【復原通氣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治打撲損傷作痛。及乳癰。便毒。一切腫毒初起。或氣滯作痛。

藥品 木香、茴香(炒)、青皮(去白)、穿山甲(酥炙)、陳皮、白芷、甘草、漏蘆、貝母(去心、薑製)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一二錢。溫酒調下。

參考 此方爲治打撲閃挫。或惱怒氣滯。血凝作痛之良劑。經云。形傷作痛。氣傷作腫。又云。先腫而後痛者。形傷氣也。先痛而後腫者。氣傷形也。若人元氣素弱。或因吐瀉血氣損傷。或過服剋伐之劑。或外敷寒涼之藥。血氣凝結者。則當用溫補氣血之劑爲妥善也。

十三筆

【當歸和血散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘡瘍未發出。內痛

不可忍。及婦人產前產後腹痛。

藥品 當歸、二錢。乳香、五分。沒藥、一錢五分。白芍藥、三錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。清水一中盞。煎至七分。和滓溫服。一日二次。婦人酒煎。瘡既發不用。瘡癢者加入參、木香。婦人服之加赤芍藥。

【當歸和血散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治瘡瘍未發出。內痛不可忍。及婦人產前產後腹痛。

藥品 當歸、升麻、各一錢五分。槐花、青皮、荆芥、白朮、熟地黃、各七分。川芎、五分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。空腹時米飲調下。

【礪砂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治懸癰腫痛。

藥品 礪砂(另研)、馬牙硝、滑石、寒水石、各二錢。片腦(另研)、五分。白礬、一錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服五分。不拘時新汲水調下。

十四筆

【綠雲膏】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 拔膿。收毒。消腫。止痛。治痔瘡頭時發時愈。並治疔瘡口破。膿尚未盡。及一切無名腫毒。

藥品 麻油、三兩(以蓖麻子四十九粒、入油內熬黏、去蓖麻子不用、濾淨渣、不淨貼之作痛)。松香(製)、八兩。豬膽汁、三兩。銅絲、二兩(研細)。

制法及用法 先將松香放銅鍋內。水上融化。再下各藥熬勻。搗千餘下。烘融。放水中。用手扯拔百餘遍。愈拔其色愈綠。收瓦鉢內。油紙攤貼。若瘡癰頭毒。用細布攤貼。一次全愈。不必再換。

十五筆

【蝦蟆散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治甲疽皮厚腫痛。

藥品 蝦蟆灰、五錢。黃連(研末)、膩粉、各五釐。麝香、雄黃、枯白礬(三味均各另研)、蝮蛇膽、各五分。杏仁、七粒(熬黑、研如泥)。鹿角、七寸(煨透、研細末)。

制法及用法 研爲細末。和勻。臘豬脂調如膏。先以甘草、蛇牀子、槐白皮煎湯洗瘡。拭乾敷藥。以油單紙裹。外更著

(腫痛類) 十五筆 蝦 十七筆 應 十八筆 檳 雞 697

綿帛裹之。三日。其刺肉刺甲皆當自落。三日一換。

【蝦蟆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治陰淫欲毒。瘡痛甚者。

藥品 蝦蟆、一枚(燒灰)。瓦礫、一兩。

制法及用法 研爲細末。每用少許。敷於瘡上。一日三四次。

十七筆

【應痛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治折傷後。爲四氣所侵。手足痛者。

藥品 破故紙、骨碎補(去毛)、生蒼朮、草烏頭(用生薑、一斤、搗爛、同淹兩宿、焙乾)、各八兩。穿山甲(去膜、桑柴灰炒、泡起爲度、柴灰亦可)、舶上茴香(炒)、各六兩。

制法及用法 共研末。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。溫酒或米湯送下。忌熱物片時。

【應痛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治走注疼痛。似附骨疽者。

藥品 蒼朮(去皮)、當歸、黑

牽牛、草烏頭(炮)、各一兩。

制法及用法 共研細末。醋糊爲丸。如小豆大。每服三十丸。空腹時煎湯送下。

十八筆

【檳榔丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治腎氣遊風。氣腫疼痛。

藥品 檳榔、俱殼(鉄炒)、各二兩。木瓜、一兩五錢。木香、一兩。大黃、四兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時白滾湯或黃酒送下。

【雞鳴散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脚氣疼痛。及風溼流注。足痛筋脈浮腫者。

藥品 檳榔、七枚。陳皮(去白)、木瓜、各一兩。吳茱萸、紫蘇葉、各三錢。桔梗(去蘆)、生薑(和皮)、各五錢。一方無陳皮。

制法及用法 咬咀。清水三大碗。慢火煎至一碗半。去滓。再入清水二碗煎沸。取一小碗。兩次藥汁相和。置牀頭。次日五更。分作三五服。皆冷服之。冬月略溫服。服後用乾物壓下。

如服不盡。留次日漸漸服之。至天明。大便當下黑糞水。早飯時痛住腫消。食飯宜少遲。

二十筆

【糯米膏】

發明 見施相敷驗方新編。

功用 治腋肋臂膊腰腿等處。忽如火熱。腫硬如石。痛不可忍。百藥不效者。

藥品 熟糯米飯、不拘多少。

制法及用法 少加葱與鹽。共搗融敷。過夜即鬆。或用熟糯米酒糟亦可。其渣務傾魚池。或入河內。敷一二次即愈。甚效。

二十九筆

【鬱金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒遊腫攻頭面。癰腫亦熱疼痛。

藥品 鬱金、甜葶藶、川芒硝、生川大黃、各五錢。赤小豆、一合。伏龍肝、二兩。

制法及用法 研爲末。三雞子白並蛋少許。調令稀稠得所。塗於患處。乾再塗之。

蠱 脹 類

十一筆

【犛羊角散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒中蠱。腹堅如石。面目青黃。小便淋瀝。

藥品 犛羊角屑、蓼荷、各一兩。梔子仁、七枚。赤芍藥、牡丹皮、黃連(去鬚)、各一分。犀角屑、五錢。

制法及用法 粗搗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。煎至五分。去滓溫服。日三四次。更量兒大小加減。

【貫衆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎勞熱。四肢腫急。腎中生有蠶蟲。

藥品 貫衆(大者去鬚)、三枚。乾漆(炒令煙絕)、二兩。吳茱萸(水洗七遍、焙乾炒)、一兩五錢。槐白皮(乾者剉)、胡粉(炒令黃色、研)、白蕪荑(炒)、各一兩。杏仁(去皮尖雙仁、炒)、五錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服二錢。空腹時井花水調下。五晚再服。

十五筆

【褐丸子】

發明 見張渙方。

功用 治疳氣。腹脹如鼓。及乳癖食癖。

藥品 蘿蔔子、一兩五錢

(炒)。黑牽牛、一兩(炒)。胡椒、二錢五分。木香、蓬莪朮(溼紙裹煨、切作片子)、各五錢。

制法及用法 共研細末。麪糊爲丸。如黍米大。每服二十丸。仙人骨煎湯送下。

麻 醉 類

十一筆

【麻藥】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 癰諸癰。

藥品 南星、半夏、川烏、川椒、石灰、草烏、各等分。一方無石灰。

制法及用法 生研爲末。醋調塗瘡上。或以唾調塗再用藥。則不痛。

【麻藥】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 整骨。

藥品 草烏、三錢。當歸、白芷、各二錢五分。

制法及用法 研末。每服五分。熱酒調下。即麻木不知痛。然後用手整骨。

【麻藥】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 割瘻瘡或取箭頭槍

子。敷之則麻木不痛。

藥品 川烏尖、草烏尖、生半夏、生南星、華撥、各二錢五分。蟾酥、二錢。胡椒、細辛、各五錢。

制法及用法 共爲細末。酒調塗之。

【麻藥】

發明 見鮑相璣驗方新編。

藥品 公麻雀糞、胡椒、各七粒。

制法及用法 研末。燒酒調敷。

耳 目 口 鼻 類

一 筆

【一字散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治口內白腐。

藥品 硃砂、貝砂、各五分。龍腦、朴硝、各一字。

制法及用法 研爲極細末。每用少許。蜜調。鵝翎蘸入口內。

【一捻金】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治眼睛痛。

藥品 乳香、沒藥、黃連、雄黃、盆硝、各等分。一方加片腦、麝香、各少許。

制法及用法 研爲細末。搗

入鼻內，

二 筆

【七寶丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內障冰翳。堅結睛上。

藥品 石決明、二兩。菴蔚子、人參、各一兩。琥珀、七錢五分。龍腦、二錢五分。熊膽、真珠、各五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。先以鍼撥取睛上。每服十五丸。加至二十丸。食前茶清送下。

【七寶散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治風眼。除癢熱。

藥品 當歸、芍藥、黃連、銅綠(細研)、各二錢。杏仁、七粒(去皮)。白礬、甘草、各一錢。

制法及用法 咬咀。清水同放瓷盞內。於鍋中燉煎至八分。去滓澄清。臨臥時洗之。

【二黃散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治胬肉攀睛。

藥品 黃芩、大黃、防風、薄荷、各等分。

制法及用法 清水煎。入蜜少許。食後服。

【二聖散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治耳出膿水。

藥品 羌活、白附子(炮)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。用豬羊腎各一隻。切開。每隻入藥末五分。不得著鹽。溼紙裹炙熟。五更初溫酒嚥下。吃粥壓之。

【人中白散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治口舌瘡。

藥品 人中白(煨)、一兩。黃蘗(炒黑)、三錢。

制法及用法 研爲末。搽口內。

【八寶眼藥】

功用 治眼目新久風火症。畏日怕風。努翳遮睛。及七十二種外障。

藥品 西牛黃、三分。珊瑚、五分。黃連、二錢。冰片、一錢五分。瑪瑙、五分。麝仁霜、一錢。爐甘石(製)、五錢。熊膽、六分。海螵蛸、七分。珍珠(人乳製)、一錢。青魚膽、二個。麝香、三分。葶薺(製份)、二錢五分。

制法及用法 研至極細無聲。瓷器密收。清水調點。合目靜坐勿躁。

三 筆

【三仙散】

發明 見沈金鑒尊生書。

功用 治聾耳。

藥品 黃藥(膽汁炒)、紅花(酒)、冰片。

制法及用法 研細吹耳。

【三黃散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 療耳內流膿。

藥品 雄黃、硫黃、雌黃、各等分。

制法及用法 共爲細末。以少許吹之。

【山茱萸丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治眼目多。

藥品 山茱萸、二兩。熟地黃、牡丹皮、牛膝、茯苓、澤瀉、各一兩。鹿茸、五錢。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食後鹽湯送下。

【川芎茶調散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治衝風淚出。

藥品 川芎、荆芥、薄荷、甘草(炙)、木賊、防風、羌活、石決明(煅)、菊花、石膏、各一兩。

制法及用法 研爲細末。令勻。每服三錢。食後茶清調下。

【大黃丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治目睛腫脹。痛不可忍。

藥品 大黃(剉炒)、蔓荊子(去皮)、甘菊花、土瓜根、防風(去叉)、陳皮(去白)、青皮(去蘊)、黃連(去鬚)、芍胡、丹參、吳藍、蒺藜、各一兩。決明子(微炒)、冬瓜子、青箱子、地膚子、車前子、各一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後溫酒送下。

四 筆

【日精月華光明膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治翳膜努肉。諸般眼疾。

制法及用法 用爐甘石、黃丹、各八兩。綠豆粉、四兩(炒黑)。黃連、一兩。當歸、硼砂、硃砂、玄明粉、決明粉、各二錢。輕粉、生白礬、白丁香、海螵蛸、片腦、自然銅、礞砂、各一錢。龍膽、乳香、沒藥、鷹條、雄黃、青鹽、麝香、銅青、牙硝、山慈姑、各二分五釐。麝香、樟腦、各五分(一方有殿貝子、貝齒、石燕、石蟹、水晶、真珠、珊瑚、琥珀、珊瑚各一錢。若加此九味

即去綠豆粉不用)。各另製細末。依方配合和勻。候至千萬餘下。熟絹羅過。次用雞柏根、一斤。黃連、八兩。龍膽草、黃蘗、生地黄、苦參、各二兩。大黃、黃芩、梔子、赤芍藥、防風、菊花、玄參、當歸、各一兩。羌活、木賊、蒺藜、連翹、蔓荊子、細辛、川芎、白芷、各五錢。夜明砂、蛇蛻、蟬蛻、各二錢五分(一方福建地有苦花子、地薄荷、地西瓜、田茶菊、七層樓、千里光、鐵梗子、地園葵、地胡椒、蛇不見、水楊梅根皮各生採一握、搗爛、另煎取濃汁、入前藥同熬成膏、此十一味草藥在內、用之效速、他處無此草藥、不用亦效)。冬蜜、八兩。各洗淨。剉碎。入井水於銅器內。浸三宿。慢火煎熬濃汁。濾去滓。以滓再煎再濾。慢火煎熬。槐柳桑枝攪。熬如飴糖。入蜜和勻。更入羯羊膽、雄豬膽、各二枚。和勻。瓷碗煆放湯瓶口上蒸成膏。復濾淨。濾沈水中成珠。可丸爲度。待數日出火毒。再焙化。入諸藥末和勻。杵爲丸錠。陰乾。金銀箔爲衣。每用少許。井水化開。鴨毛蘸膏。再以熱湯泡化洗眼。大有神效。

【日精月華光明膏】

發明 見于肯堂證治準繩。

功用 治一切內障。翳膜遮睛。及攀睛努肉。或一月兩目俱患。但能見人影者。

藥品 黃連、四兩(研末)。當歸、一兩。訶子、一對(去核、研)。石決明、二兩(細研)。石膏、一兩五錢(研、用臘月天水或雪水、浸三日)。大鵝梨、二十枚(搗碎、用布絞去滓)、豬胰、二具(草挾扭去筋膜)。爐甘石、四兩(火燒、童便淬燒五次)。黃丹(炒、細末)、四兩。馬牙硝(飛)、二錢五分。銅綠(研)、膽礬(研)、硼砂(另研)、各一錢五分。沒藥、四兩(另研)。乳香、二錢(另研)。防風、一錢。天花粉、五分。輕粉、一錢(另研)。麝香、五分(另研)。片腦、五分(另研)。

制法及用法 先以黃連等五味。浸三日。即用大砂鍋一口。納藥。再添滿七分水熬。重絹濾過。至四五碗。却入鵝梨、豬胰。再熬至三碗。再濾過。再下鍋。入爐甘石、黃丹。再熬至二碗。又濾過。却下馬牙硝等八味。以槐柳枝不住手攪勻。候成膏。仍濾淨。入瓶內。却入腦麝粉三味。攪入。以油紙密封。勿令水勻。放冷。水內浸三日。取出。每用少許。

飼菊點眼。

【五退散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼中翳障。

藥品 蟬退、蠶退、蛇退、豬退蹄、鯢鯉甲、防風、菊花、草決明、石決明、甘草、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後薄荷煎湯調下。

【五膽丸】

發明 近時通行方。

功用 治小兒雀目。視物不明。至夜昏迷。

藥品 熊膽、牛膽、青魚膽、青羊膽、各一枚。鯉魚膽、二枚。石決明(煅)、二兩。夜明砂、一兩。麝香、少許。

制法及用法 共研細末。即將五膽汁和丸。如綠豆大。每服三十丸。空腹時熱湯送下。

【水眼藥】

發明 見京方。

功用 治風火時眼。赤腫作痛。迎風流淚。畏日羞明。翳障胬肉。風沿爛眼。

藥品 爐甘石(製)、地栗粉、硃砂、各五錢。冰片、一錢五分。蕤仁霜、二錢。海螵蛸、九錢。月石(煅)、四錢。麝香、九分。

制法及用法 共研極細末。臨臥時黃連膏和白蜜。調點大

眼角內。神效。

【內消散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治眼目傷損。

藥品 羌活、獨活、蘇木、紅內消、當歸、川芎、大黃、鈎藤鈎、白芷、紅花、桃仁、甘草節、赤芍藥、生地黃、瓜蒌根、紫金皮、金鎖匙、血竭草。

制法及用法 清水煎。食後服。再用生地黃一兩。杏仁五十枚。搗爛貼眼上。復以豬豬肉貼之。

【止淚補肝散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治迎風流淚。

藥品 白蒺藜(炒去刺)、當歸、熟地黃、各二兩。川芎、白芍、木賊、防風、羌活、各一兩。香附(童便製)、二兩。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。加生薑三片。紅棗一枚。清水煎。去滓熱服。肥人加夏枯草一兩。瘦人加桂枝一兩。

【止淚補肝散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治眼目傷損。

藥品 當歸、熟地黃、各二錢。白芍藥(炒)、蒺藜、木賊、防風、各一錢。川芎、五分。

制法及用法 研爲細末。清

水二盞。煎至一盞。去滓。食遠溫服。

五 筆

【石燕丹】

發明 見葆光眼科龍木論。

功用 治冰瑕翳。及外障諸翳。風熱暴痛。

藥品 石燕、硼砂(銅杓內同水煮乾)、琥珀、礞砂(水飛)、各取淨末一錢五分。冰片、麝香、各一分五釐。爐甘石、四兩(用黃連一兩、當歸身、木賊、羌活、麻黃、各五錢、河水二升、煮便一升、同煮去滓、製法如絳雪膏、取淨一兩、一作入大銀罐內、隔泥封固、用八炭火煨一炷香、以罐通紅爲度、取起爲末、用黃連水飛過、再入黃芩、黃連、黃蘗湯內、將湯煮乾。以甘石如松花色)。麝糝白、一錢(如無、以白丁香代之)。

制法及用法 研極細末。至無聲爲度。每用少許。水蘸點眼大眇。如枯澀無淚。加熊膽一分。白蜜少許。血翳加河魃。黃翳加雞內金。風熱翳加蕤仁。熱翳加珍珠、牛黃。冷翳加附子尖、雄黃。老翳倍硼砂。加豬脂子。

【石決明散】

發明 見王肯堂龍治準繩。

功用 治目生障翳。

藥品 石決明(煨)、枸杞子、木賊、荆芥、晚桑葉、穀精草、甘草、金沸草、蛇蛻、蒼朮、白菊花、各等分。

制法及用法 研爲末。每服二錢。食後茶清調下。

【石決明散】

發明 見傅仁宇眼科審視瑤函。

功用 治如銀障。

藥品 石決明(煨)、防風、人參、羌活子、車前子、知母、白茯苓、遠五味、玄參、黃芩、各等分。細辛、減半。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前茶清調下。

【石決明散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治目生浮翳。

藥品 石決明、人參、茯苓、車前子、大黃、各一錢。細辛、五分。防風、羌活子、各一錢。桔梗、一錢五分。

制法及用法 研爲細末。令勻。每服二錢。食後來飲調下。

【石決明散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治翳目。

藥品 石決明、草決明、各一兩。青箱子、木賊、羌活、山梔、

赤芍藥、各五錢。大黃、荊芥、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。麥冬湯調下。

【石決明散】

發明 見洗金鑿 沈氏 尊生書。

功用 治膜入水輪。及一切丁翳根膜極厚久不癒者。

藥品 石決明、珍珠、西珀、各七錢五分。烏賊骨、五錢。冰片、一錢。

制法及用法 研爲末。每用如大豆許。以銅箸蘸點眼上。每日三次。

【石斛夜光丸】

發明 見洗括蘇沈良方。

功用 治目光不斂。神水漸散。色淡綠或淡白。昏如霧露。或見黑花。或視一爲二。及瞳人內障諸症。

藥品 石斛、五錢（一作七錢）。天門冬、二兩（焙）。菟絲子、七錢五分（酒浸、一作七錢）。人參、二兩。茯苓、二兩。甘菊花、七錢五分（一作七錢）。乾山藥、七錢五分（一作七錢）。麥門冬、一兩。熟地黃、一兩。肉蓯蓉、五錢。青箱子、五錢。生地、一兩。枸杞子、七錢五分（一作七錢）。羚羊角、五錢（鎊）。草決明、七錢五分（一作

八錢）。杏仁、七錢五分（去皮尖、一作七錢）。五味子、乾藜、川芎、甘草（炙）、黃連、防風、枳殼（麸炒）、烏犀角（鎊）、各五錢。牛膝、七錢五分（酒浸）。

制法及用法 研爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。溫酒或鹽湯送下。

參考 此方爲陽衰陰弱。不能升精於目而設。與千金磁珠丸並重。治證亦同。然磁珠爲鎮墜藥。此爲養補藥。中以二冬、二地、菟絲、枸杞、五味、牛膝、從蓉羣陰滋陰之品。以補肝腎之精血。復以人參、炙草、茯苓、山藥等。以培補中宮之健運。佐以藜蘆、川芎、枳殼、防風之行肝達氣。青箱、決明子之解結散滯。黃連、烏犀、羚羊之清火瀉熱。然必取石斛之妙合脾腎者。清而行之。要使升精歸明之用。臟腑合德。專精致一耳。其以爲丸者。補上治下。利以緩。利以久。不利以速也。

【立效散】

發明 見李東垣方。

功用 治齒牙劇痛。

藥品 防風、一錢。升麻、七分。甘草（炙）、三分。細辛、二分。龍膽草（酒洗）、四分。

制法及用法 清水一盞。煎

至五分。去滓。以匙抄在口中
深痛處。少時立止。如多惡熱
飲。更加龍膽草一錢。如更惡
風作痛。加草豆蔻、川黃連各
五分。勿加龍膽草。此外則隨
寒熱多少。臨時加減。

【立應散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內外障翳。昏澀多
淚。暴赤及一切目疾。

藥品 白芷(洗)、當歸(去
蘆、洗)、明雄黃(另研、後入)、
鵝不食草(淨洗曬乾)、川附子
(炮)、各等分。躑躅花、減半。
一方無附子。

制法及用法 研爲細末。加
麝香少許。和勻。含水嚙鼻
內。去盡鼻涕眼淚爲度。

【立應散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治冷淚。

藥品 橡斗子、一個。甘草、
三錢。

制法及用法 研爲細末。每
服二錢。熱湯調下。

【白龍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒聾耳。

藥品 枯白礬、黃丹、龍骨、
各五錢。麝香、一錢。

制法及用法 研爲極細末。
先以絛杖子拭盡耳內膿水。用

藥一字。分搽兩耳。每日二次。
勿令風入。

【白殭蠶散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治迎風淚出。

藥品 白殭蠶(炒)、甘草、細
辛、旋覆花、木賊、各五錢。荆
芥、二錢五分。嫩桑葉、一兩。

制法及用法 研爲細末。每
服七錢。清水煎。食後溫服。
或取末二錢。荆芥湯調下。

【加味定志丸】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治目能近視。不能遠
視。

藥品 大遠志(甘草湯泡、去
骨)、石菖蒲、各二兩。人參、四
兩。茯苓、三兩。黃耆(蜜酒
炙)、四兩。肉桂、一兩。

制法及用法 研爲細末。煉
蜜和丸。如梧桐子大。每服一
百丸。空腹時米湯或溫酒送
下。

【加味駐景丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝腎氣虛。目眈眈
無所見。

藥品 車前子(略炒)、五味
子、枸杞子、各二兩。當歸(去
尾酒洗)、熟地黃、各五兩。楮
實(曬乾、無髒者不用)、川椒
(炒去目淨)、各一兩。菟絲子

荷水淘淨、酒煮焙乾)、八兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜或水黃米糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸至七十丸。空腹時鹽湯。臥時溫酒送下。

【生地黄散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治目珠被損。

藥品 川芎、生地黄、羚羊角、大黃、赤芍藥、枳殼、木香、各一錢。

制法及用法 研爲粗末。清水二盞。煎至一盞。去滓。食後溫服。

【生熟地黄丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治肝虛目暗。膜入冰輪。眼見黑花如豆。或如飛蟲。或視物不明。淚睛冷淚。內外翳障者。

藥品 生地黄、八兩。熟地黄、十二兩(一作各一斤八兩)。石斛(鹽水炒)、牛膝(酒煮)、各四兩(一作各六兩)。菊花、六兩(去蒂、一作一斤)。羌活、防風、杏仁(湯泡、去皮尖)、枳殼、各二兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。以黑豆三升。炒令烟盡。浮好酒六升。每用半盞。食前

菴蓼湯。或鹽湯送下。用生雞肝搗爛爲丸。尤佳。

參考 此方防風、杏仁、枳殼。與地黄、牛膝並用者。以風襲入寒水之經也。若精血虧者。則當去此三味。易白堊、當歸、枸杞。

【玉鎖匙】

發明 見鮑和璈驗方新編。

功用 治雙乳蛾。

藥品 明礬、一兩。

制法及用法 銀罐內溶化。即下巴豆二十一粒。俟礬枯取起。放在地上越宿。次早去巴豆。用礬研末。每用少許。吹於患處。孕婦忌之。

【四神丸】

發明 見沙圖穆蘇瑞竹堂經驗方。

功用 補虛益損。治腎虛目昏。雲翳遮睛。

藥品 甘州枸杞子、一斤(揀赤色滋潤者、以酒一杯潤之、分作四分、一分獨炒、一分以川椒一兩同炒、去川椒、一分以小茴香一兩同炒、去茴香、一分以芝麻一合同炒、去芝麻)。熟地黄、白朮、白茯苓、各一兩。一方有甘菊花、當歸、生地、無熟地黄。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五

七十丸。空腹時溫酒送下。

【四寶丹】

發明 見顯世澄癆醫大全。

功用 治熱口。

藥品 雄黃、三錢。硃砂、二錢。甘草、一錢。冰片、二分五釐。

制法及用法 共爲末。蜜水調塗或乾搽。

六 筆

【羊肝丸】

發明 見類苑方。

功用 養肝。除障。治一切目疾。

藥品 羊肝(煮或生用)、四兩。夜明砂(淘淨)、礬石、木賊(去節)、當歸身、各一兩。

制法及用法 共爲細末。將羊肝去筋膜。水煮 搗爛 爲丸。每服三錢。熱湯送下。

參考 此方簡單扼要。爲治內障方之佳者。

【羊肝丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治青盲。

藥品 白羯羊肝、一片(薄切、新瓦上炒乾)。菴絲子、車前子、麥門冬(去心)、決明子、白茯苓、五味子、枸杞子、羌活子、苦杏仁、葵仁(去殼皮)、地

楳子(去殼)、澤瀉、防風、黃芩、杏仁(炒)、細辛、桂心、莽葶子、各一兩。熟地黃、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三四十丸。溫湯送下。一日三次。

【羊肝丸】

發明 見王肯堂證治進繩。

功用 鎮肝。明目。治目昏花。

藥品 羯羊肝、一具(新瓦盆中燂、更焙之、肝大止用一半)。甘菊花、羌活、柏子仁、細辛、官桂、白朮、五味子、各五錢。黃連、七錢五分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三四十丸。食前 空腹時 溫湯送下。

【羊肝丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治目昏及病後弱。

藥品 雄羊肝、一具。白蒺藜(炒去刺)、菊花、石決明、生地黃、各一兩。川芎、三錢。楮實子、當歸尾、槐角(炒)、甘草、黃連、五味子、各五錢。荊芥穗、二錢五分。葵仁、七錢(去殼油)。防風、二錢。

制法及用法 研爲細末。雄羊肝一具。滾水沸過。和前藥搗爲丸。如梧桐子大。每服五

六十丸。空腹時薄荷湯送下。

參考 此方用藥不偏。色色俱備。爲去外翳方之佳者。

【羊肝丸】

發明 見類苑。

功用 養肝。除障。治一切目疾。

藥品 羊肝(煮、或生用)、四兩。夜明砂(淘淨)、蟬蛻、木賊(去節)、當歸身(酒洗)、各一兩。

制法及用法 共爲細末。將羊肝去筋膜。水煮搗爛爲丸。每服三錢。熱湯送下。

參考 此方簡單扼要。爲治內障方之佳者。

【羊肝丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治目病。

藥品 白羊子肝、一具(去膜、青羊肝尤佳)。黃連、一兩。

制法及用法 先將黃連研末。和肝同研。衆手作丸。每服三十丸。空腹時熱湯送下。連服五劑可愈。

【羊腎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎虛耳聾。耳鳴。或勞頓傷氣。中風虛損。

藥品 山茱萸、乾薑、川巴戟、芍藥、澤瀉、北細辛、菟絲子

(酒浸)、遠志(去心)、桂心、黃耆、白朮、乾地黃、附子、當歸、松外皮、蛇牀子、甘草、肉從蓉(酒浸)、人參、各二兩。菟絲、一兩。胡風、一兩五錢。茯苓、五錢。

制法及用法 研爲末。以羊腎一雙。研細。酒煮麴糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸至五十丸。食前鹽湯或清酒送下。

【地芝丸】

發明 見李東垣方。

功用 補腎。治能遠視不能近視。及眼風成癢。

藥品 生地黃(焙乾、一作熟地黃)、天門冬(去心、一方無天門冬、用知母四兩)、各四兩。枳殼(炒、去穢、一作枳實)、甘菊花(去蒂)、各二兩(一作各三兩)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服一百丸。食後茶清或溫酒送下。

【地黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治勞損耳聾。

藥品 熟地黃(洗焙)、當歸、川芎、辣桂、菟絲子(酒浸三日、蒸乾、搗末)、大川椒(出汗)、故紙(炒)、白茯苓(炒榨去刺)、葫蘆巴(炒)、杜仲(搗碎炒、去絲)、白芷、石菖蒲、各二錢五

分。磁石(火燒醋淬七次、研細水飛)、三錢七分五釐。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時葱白溫酒送下。晚飯前再一服。

【地黃丸】

發明 見許叔微類證普濟本方。

功用 治肝虛風熱攻眼。赤腫羞明。漸生翳膜。及肝腎風毒。熱氣上衝。眼目澀痛。不可服補藥者。

藥品 熟地黃、一兩五錢。甘菊花、防風、光明礞砂、川羌活、桂心、沒藥、各五錢。決明子、黃連、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後熱湯送下。一日三次。

【地黃散】

發明 見王海藏方。

功用 治心肝壅熱。目赤腫痛。或赤翳白膜遮睛。及痘疹入目。

藥品 熟地黃(焙乾)、當歸身、各一分。黃連(酒洗炒)、大黃(煨)、防風、川羌活、烏犀角屑、蟬蛻(去土)、木賊草、穀精草、白蒺藜(炒)、沙苑蒺藜(杵去刺)、各一錢。生地黃、木通、甘草(炙)、各一錢五分。玄參、

五分。一方無防風、蟬蛻、沙苑蒺藜。

制法及用法 研爲細末。每服五分至二三錢。羊肝煎汁。食後調下。日三次。忌口將息。

【地黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治混睛。或睛白先赤而後癢痛。迎風流淚。隱澀難開。

藥品 生地黃、一兩。芍藥、土當歸(一作當歸)、甘草、各五錢。

制法及用法 每服三五錢。清水一盞半。煎至七分。食後溫服。

【地黃膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目外障或赤腫疼痛。

藥品 大黃、黃蘗、黃連、黃芩、赤芍藥、當歸、綠豆粉、芙蓉葉、薄荷、各等分。

制法及用法 研爲末。生地黃汁、雞子清、蜜同調勻。點太陽穴及眼胞上。

【地黃膏】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治目睛傷損。及風熱赤眼熱淚。

藥品 生地、一合(取汁)。黃連、一兩。黃蘗、寒水石、各五錢。

制法及用法 研爲末。和地黃汁作餅。以紙攤眼上。

【地龍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻中瘻肉。

藥品 地龍(去土炒)、二錢五分。豬牙皂角、一挺。

制法及用法 煨存性。研爲細末。先洗鼻內令淨。以蜜塗之。敷藥少許在內。出清水盪。瘻肉自除。

【安腎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治虛弱耳聾。

藥品 大安腎丸、四兩。磁石、五錢(醋煨)。石菖蒲、羌活、各五錢。

制法及用法 研爲末。混合爲丸。如梧桐子大。每服四五十丸。鹽湯或溫酒送下。

【如聖散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治眼目偏痛。及頭風。

藥品 麻黃(燒灰)、五錢。盆硝、二錢五分。麝香、腦子、各少許。

制法及用法 研爲細末。搗之。或用楊梅青、硝石、伏龍肝各等分。研爲末。搗入鼻

中。

【肉苁蓉丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎虛耳聾。

藥品 肉苁蓉(酒浸焙)、菟絲子(酒浸另研)、山芋、白茯苓(去皮)、人參、官桂(去粗皮)、防風(去叉)、熟地黃、芍藥、黃耆、各五錢。附子(炮去皮臍)、羌活(去蘆)、澤瀉、各二錢五分。羊腎、一對(薄切、去筋膜、炙乾)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時溫酒送下。

【交感丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳疳及因怒耳聾。

藥品 香附(童便浸透炒)、三錢。茯神、黃連、各二錢。桂心、甘菊花、各一錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢五分。燈心湯調下。

【耳聾左慈丸】

功用 治腎虛火升。耳鳴、耳聾、耳眩。

藥品 大熟地(砂仁酒拌、九蒸九曬)、八兩。粉丹皮、白茯苓(乳拌)、澤瀉、各三兩。磁石(煨)、軟柴胡、各一兩。山茱萸肉(酒潤)、懷山藥、各四兩。一方去軟柴胡、加五味子一兩。

制法及用法 共爲細末。煉白蜜和丸。每服三錢。淡鹽湯送下。

參考 按此方即六味地黃丸加磁石、柴胡也。

【耳疳散】

發明 劉河間方。

功用 治耳流膿水。

藥品 麝香、五寶、枯明礬、二錢。

制法及用法 共研極細粉。將麝棉捲淨耳孔。搽入少許。

參考 原方有胭脂。近因失真。故已不用。麝香最貴。可用冰片。加煅五倍子更妙。並爲外科藥。

七 筆

【決明丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼見黑花不散。

藥品 決明子、甘菊花、各一兩。防風(去蘆)、車前子、芎藭、細辛、梔子仁、蔓荊子、玄參、白茯苓、礬石、各五錢。生地黃、七錢五分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食後桑枝煎湯送下。一日三次。

【決明丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生

書。

功用 治毒攻兩目。

藥品 石決明、茺蔚子、細辛、枸杞子、澤瀉、生地黃、黃連、各五錢。麥門冬、當歸、車前子、各二兩。防風、枳殼、青葙子、各一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五七十丸。空腹時麥門冬煎湯送下。

【決明散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治目小 眦紅絲 努肉。色淡紅。屬於心經虛火者。

藥品 草決明、車前子、青葙子、各五錢。玉竹、黃連、枳殼(麸炒)、川芎、生甘草、羚羊角(鎊)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。食後服。臨臥時再服。

【決明子丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風熱上衝眼目。或因外受風邪疼痛。視物不明。

藥品 決明子(炒)、細辛(去苗)、青葙子、蒺藜(炒去角)、茺蔚子、蔓荊、獨活、羚羊角(鎊)、升麻、防風(去叉)、各五錢。玄參、枸杞子、黃連(去鬚)、各三兩。菊花、一兩。

制法及用法 研爲細末。煉

蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。淡竹葉煎湯送下。

【決明子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治翳膜遮睛。視物昏暗。

藥品 決明子、黃連(去鬚)、川升麻、枳殼(去瓤、麸炒)、玄參、各一兩。黃芩、七錢五分。車前子、梔子仁、地膚子、人參(去蘆)、各五錢。

制法及用法 剉碎。每服三錢。清水一中盞。煎至六分。去滓。食後溫服。

【決明子散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治赤翳。

藥品 決明子、石決明、黃芩、甘菊花、甘草、赤芍藥、石膏、川芎、羌活、木賊草、蔓荊子。

制法及用法 爲散。清水煎服。

【決明雞肝散】

發明 見張路玉張氏醫道。

藥品 火硝、一兩。硃砂、三錢。

制法及用法 研爲末。每服四分。用雞肝不落水者一塊。竹刀剖開。入藥勻好。同酒釀

半盞。飯上蒸熟。空腹服之。輕者一料。重者不過二三料。則翳膜便可搯去半邊而退。

【吹鼻散】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治風火眼痛。目中星翳。

藥品 鴉不食草、五錢(鹽乾)。青黛、川芎、各一錢。

制法及用法 共研細末。每用少許。搐入鼻中。或新白布泡水。蘸藥入鼻中亦可。日含溫水。以淚出爲度。數次必愈。

【吹鼻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 取嚏。

藥品 龍腦、五分。馬牙硝、一錢。瓜蒂、十四枚。

制法及用法 研爲極細末。每用如一豆大。吹入鼻中。

【芎藭散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目昏翳。視物不明。

藥品 芎藭、地骨皮、荆芥穗、何首烏(去黑皮)、菊花、旋覆花、草決明、石決明(刷淨)、甘草(炙)、各一兩。青葙子、蟬蛻(去土)、木賊、各五錢。白芷、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢匕。食後米泔水調下。

【芎藭散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻淵。

藥品 芎藭、檳榔、肉桂、麻黃(去節)、防己、木通、細辛、石膏、白芷、各一分。木香、川椒、甘草(炙)、各五釐。

制法及用法 咀咀。清水二盞。加生薑三片。紫蘇七葉。煎至八分。去滓。食遠溫服。

【芎藭散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻淵。

藥品 芎藭、辛夷、各一兩。細辛(去苗)、七錢五分。木通、五錢。

制法及用法 研爲細末。每用少許。綿裹塞鼻中。溼則易之。五七日痊。

【阜茨丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治沈翳及內外障膜。翳蔽不宜鍼撥者。

藥品 蛇蛻、七條。蟬蛻、白朮、龍膽草、玄精石、生當歸、白菊花、茯苓、木賊、連翹、赤芍藥、刺楸皮、穿山甲、穀精草、各一兩五錢。豬豬爪、二十枚。川芎、五錢。人參、一兩。

制法及用法 研爲細末。一半入牙皂十二挺(燒存性)。和勻。煉白蜜爲丸。如梧桐子大。

每服一錢五分。空腹時杏仁湯送下。一半入仙靈脾一兩。每服三錢。用豬肝三片。批開。夾藥煮熟。臨臥時細嚼。用原汁送下。如十六般內障。同生熟地黃丸用。

【車前散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝經積熱。上攻眼目。逆橫生翳。血灌瞳人。羞明多淚。

藥品 車前子(炒)、密蒙花(去枝)、草決明、白蒺藜(炒去刺)、龍膽草(洗淨)、黃芩、羌活、菊花(去枝)、甘草、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後米湯調下。

【杞菊地黃丸】

功用 治肝腎不足。虛火上炎。目赤腫痛。久視昏暗。迎風流淚。怕日羞明。頭暈。盜汗。潮熱。足軟等症。

藥品 枸杞子(一作一兩五錢)、甘菊花、各一兩。熟地黃、四兩。山茱萸肉、淮山藥、各二兩。白茯苓、牡丹皮、澤瀉、各一兩五錢。

制法及用法 共研細末。水泛或煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。淡鹽湯或熱湯送下。

八 筆

【金絲膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目昏如紗羅所遮。或疼痛。

藥品 宜黃連、五錢(剉碎、清水一盞、浸一宿、取汁、再添清水半盞、浸滓經半日、絞取汁、與前汁放一處、滓另用水半盞浸)。蜜、一兩。白礬、一字。井鹽、一分(如無以青鹽代)。山梔子、二錢(搥碎、與黃連滓同煮五七十沸、濾去滓、與前黃連汁一處、入餘藥)。

制法及用法 置銀瓷器內。熬十餘沸。用生絹上細紙數重。再濾過。常點目中。

【金絲膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風熱上攻。目赤腫痛。

藥品 黃連(去鬚)、二兩。大黃、黃蘗(去麁皮)、龍膽草、山梔子、當歸、各一兩。青竹葉、一百片(切)。大棗、二十枚(去核)。燈芯(切)、硼砂(明者)、乳香(研)、各二錢五分。

制法及用法 清水五升。不拘冬夏。浸二小時取出。於銀石器內慢火熬。不令大沸。候汁滓盡出。下火放冷。以絹絞

取汁。於無風塵處。澄二小時。再去渣。俟銀器內。慢火熬至減半。入白蜜八兩。同攪。使藥蜜勻和。候有蜜若。以箸挑起有絲則止。放冷。再以夾絹袋濾過。瓷盒收盛。每取一茶匙許。研龍腦一字極細。入膏內研一二千遍。令勻。取少許點之。

【空青丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治沈翳、遮睛障。

藥品 空青、一錢(一作一銖、一作二錢)。細辛、五味子、石決明(另研)、車前子、各一兩。知母、生地黃、防風、各二兩。

制法及用法 研為細末。煉蜜和丸。如梧子大。每服十丸。空腹時茶湯送下。

【空青丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝腎久虛。目暗漸生翳膜。

藥品 空青(細研水飛)、珍珠(另研)、各二錢五分。犀角屑、羚羊角屑、防風(去叉)、防己、升麻(剉)、各五錢。麥門冬(去心焙)、人參、羌活、陽起石(細研)、前胡(去蘆)、各一兩。虎睛、一對。

制法及用法 研為細末。煉

蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸。加至十丸。麥門冬煎湯送下。溫椒湯亦可。

【青金丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒攻眼。成外障翳膜。

藥品 銅青(真者)、蕤仁(去皮尖、與銅青同浸二宿、去水、研)、石決明(淨水磨濃乾)、生犀角(淨水磨紙上飛過)、各一錢。龍腦(研)、白丁香(水研飛去滓)、海螵蛸(水飛過)、各五分。

制法及用法 將銅青與蕤仁。先研如糊。次入白丁香研。後入四味研極細。用好墨研濃汁。於淨器中。和熟爲丸。如綠豆大。每用人乳汁化開貼眼。未用者。常以龍腦養於瓷器中。

【青黛散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼倒睫。

藥品 青黛、桑樹上黃直棘鍼、刺蝟皮(炒焦)、白芷、各等分。

制法及用法 研爲細末。口噙水。左眼倒睫。左鼻內嚙之。右眼倒睫。右鼻內嚙之。

【青黛散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治重舌、咽瘡。

藥品 青黛、牙硝、硃砂、各六分。黃連、黃蘗、各三錢。雄黃、牛黃、硼砂、各三分。冰片、一分。

制法及用法 共研細末。先以薄荷末抹口中。再以藥擦。

【青箱子丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝心毒熱。翳入黑睛。及一切眼病。

藥品 青箱子、紅藍實、枳殼(去瓤、麸炒)、大黃(剉炒)、菊花、甘草(炙)、各二兩。草決明、黃連(去鬚)、茺蔚子、細辛(去苗)、鹿黃(去根節)、車前子、各一兩五錢。鯉魚膽、雞膽、各一枚(陰乾)。羚羊角(鎊)、三兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食後茶清送下。一日三次。

【青箱子丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治肝虛目病。

藥品 青箱子、生地黄、各二兩。菟絲子、茺蔚子、防風、黑參、柴胡、澤瀉、車前子、茯苓、各一兩。五味子、細辛、各三錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三

錢。空腹時茶清送下。

【羌活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目風冷淚。久不瘥者。

藥品 羌活(去蘆)、二兩。木香、官桂(去粗皮)、胡黃連、山藥、升麻、艾葉(焙)、各一兩。牛膝(酒浸、切焙)、山茱萸(去核)、白附子(炮)、各七錢五分。

制法及用法 剉散。每服三錢。清水一盞。煎至八分。去滓。食後溫服。一日三次。

【羌活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風氣攻眼。昏澀多淚。

藥品 羌活、川芎、天麻、旋覆花、藜蘆、防風、蟬蛻(洗)、甘菊花、細辛、杏仁(去皮)、各一兩。甘草(炙)、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。清水一盞半煎。食後服。

【夜光椒紅丸】

發明 見錢路玉張氏醫通。

功用 治陰血虧虛。畏火離散。目無精光。至夜昏甚。

藥品 川椒(去白)、二兩。生地黃、熟地黃、枸杞子、麥門冬、各四兩。牡丹皮、三兩。

制法及用法 煉蜜和丸。如

梧桐子大。每服五七十丸。溫酒或鹽湯送下。

【夜光椒紅丸】

發明 見錢路玉張氏醫通。

功用 治陽精耗傷。真火無光。目昏。至夜益甚。

藥品 椒紅、四兩。巴戟肉、二兩。金鈴子肉、熟附子、茴香、各一兩。

制法及用法 另研乾山藥末二兩。酒黃米糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹時鹽酒送下。

【明目地黃丸】

發明 見近時通行方。

功用 治肝腎俱虛。風邪所乘。熱氣上攻。目翳遮睛。目澀多淚。瞳人散大。視物不清。

藥品 大熟地、八兩。白茯苓、白芍藥、牡丹皮、澤瀉、甘菊花、當歸身、枸杞子、刺蒺藜、各三兩。山藥、石決明、山茱萸肉、各四兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。每服四錢。熱湯送下。

參考 此方即六味地黃丸加白芍藥、甘菊花、當歸身、枸杞子、刺蒺藜、石決明諸目疾藥。故爲明目之專方。

【明目蒺藜丸】

功用 治肝腎不足。目生障翳。視物昏花。迎風流淚。羞

明怕日。雀目青盲。暴發赤腫。天行時眼。一切眼症。並治虛勞腰痛。常服補腎還睛。平肝明目。清肝降火。通利上焦。

藥品 白蒺藜、一斤。雞子清、十個。

制法及用法 將雞子清并蒺藜一宿。曬乾爲末。水泛丸。每服三錢。滾水送下。

【明目黃連膏】

發明 驗方。

功用 治火眼暴赤。

藥品 川黃連、二錢五分。

制法及用法 將黃連熬汁。去渣濾清。以不粘紙爲度。每兩汁中。入蜂蜜一兩收膏。將溫開水洗眼後。以膏藥少許點入。

【定志丸】

發明 見孫思邈千金方。

功用 補心強志。治一切神志不足。驚悸健忘。言語失倫。喜笑發狂。色傷泄精。及能近視不能遠視。

藥品 石菖蒲(炒)、遠志(甘草湯泡去心)、各二兩。白茯神(一作茯苓)、人參、各三兩(一作各一兩)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。硃砂一兩五錢(研細、一作三錢)爲衣。每服十丸至七八十丸。食後米

飲或滾湯送下。日能近視者。每服三錢。龍眼湯送下。

參考 一方有茯苓、白芍、麥門冬。血虛加當歸。有痰加橘紅、半夏、甘草、生薑。張氏醫通方。以茯苓易茯神。加黃耆(蜜酒炙)、四兩。肉桂、一兩。餘藥分兩多同。共研細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。用以治目能近視不能遠視。名加味定志丸。蓋爲真火不足目難遠視等症立方也。

【松花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳流膿水。

藥品 枯礬、五錢。馬勃、木香、松脂、花臘脂、各二錢五分。

制法及用法 搗羅爲末。先以綿杖子淨拭後。用藥吹耳中。

【乳香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內外障眼。攀睛瘀肉。倒睫拳毛。翳膜遮睛。一切目疾。

藥品 乳香、防風、荊芥、川芎、白芷、細辛、藁本、羌活、白菊花、石菖蒲、天麻、蔓荊子、瓜蒂、赤小豆、漢防己、菟絲子、穀精草、自然銅(製)、礬金、當歸、石膏(煨)、沒藥、雄黃、蛇蛻(炒焦)、蟬蛻(炒焦)、穿山甲(燒)、雞子蛻(燒)、龍腦薄荷、各五

分。麝香、片腦、各五釐。

制法及用法 研爲細末。每用少許。吹入鼻中。

【附子丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳聾。或出膿。疼痛。或耳鳴塞耳。

藥品 附子(炮去皮臍)、菖蒲(米泔浸焙)、枯白礬、蓖麻子仁(另研)、松脂(另研)、各一兩。乾蟬脂、五錢。杏仁、二兩(去皮尖雙仁炒、另研)。

制法及用法 研爲細末。令勻。熔黃蠟和搗。如棗核大。鍼穿一孔。令透。塞耳中。每日一換。耳聾不用黃蠟。只搗成膏。每月如棗核大。綿裹塞耳。

【法製黑豆】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治旋螺尖起。

藥品 黑豆、一升。大黃、黃連、黃芩、各五錢。甘草、密蒙花、礬硝、各一兩。

制法及用法 除黑豆外。餘研爲末。清水三碗。入豆及藥煮乾。去藥。每服二十粒。細嚼。清米泔送下。

【阿膠散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝受風冷。目有冷淚。流而不結。

藥品 阿膠、馬兜鈴、各一兩

五錢。紫菀、款冬花、各一兩。甘草、五錢。白礬炭、二錢五分(炒)。糯米、一兩。

制法及用法 咬咀。每服二錢。清水一盞半。煎至八分。不拘時溫服。

【枇杷葉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻疳赤爛。

藥品 枇杷葉(去毛、陰乾)、一兩。山梔子、五錢。百部、廣榔、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。兒小者二錢。更小一錢。熱湯調下。

【抵聖散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目偏風牽疼痛。

藥品 荊芥穗、二兩。芎藭、羌活(去蘆)、楮實(麸炒)、木賊、各一兩。甘草(炙)、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後茶清調下。

九 筆

【洗肝散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治肝實風毒上攻。暴作赤目。腫痛難開。淚澀哆淚。

藥品 薄荷葉、當歸、羌活、防風、山梔仁(酒炒黑)、甘草

(炙)、各一兩。大黃(酒蒸)、川芎、各二兩。一方無甘草。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。食後熱湯調下。一日二三次。清水煎服亦可。加龍膽草(炒)更佳。

【洗肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目生花翳。

藥品 川芎、當歸尾、赤芍藥、防風、生地黄、白蒺藜、木賊、蟬蛻、羌活、薄荷、蘇木、菊花、紅花、各五錢。甘草、三錢。

制法及用法 咬咀。每服三錢。加松絲十餘根。清水一盞半煎服。外用通明散、七寶膏、爐甘石散點眼。

【洗肝散】

發明 見傅仁宇眼科審視瑤函。

功用 治目病之常發於昏者。

藥品 當歸尾(酒洗)、川芎、薄荷、生地黄、羌活、梔子仁(炒)、防風、大黃(製)、龍膽草、各等分。甘草(減半)。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。熱湯調下。

【洗肝散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治蜜目障。

藥品 車前子、黃芩、玄參、

各一錢。柴胡、一錢五分。細辛、五分。菟藟子、二錢。

制法及用法 研爲粗末。清水二盞。加黑豆三七粒。煎至一盞。去黑豆。空腹溫服。

【紅玉散】

發明 見四氏方。

功用 治小兒膿耳。

藥品 白礬(煨枯)、乾桑脂、麝香、各一錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。先以綿裹竹木籤等沾淨膿水。然後以藥搽之。

【紅花散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治小兒癰瘡入眼。

藥品 紅花、甘草、當歸尾、生地黄、赤芍藥、大黃、連翹、紫草、各五分。

制法及用法 研爲粗末。加燈芯十莖。竹葉十片。清水一盞半。煎至五分。去滓。食遠溫服。

【紅棉散】

功用 治肝經鬱火。耳內生瘡流膿。及肝熱聾耳。

藥品 胭脂、二字(煨存性、乾油點膠更佳、一作一錢、一作三錢)。白礬(煨枯)、二錢。

制法及用法 研爲細末。先用棉杖子搽去膿水。另以柳杖子蘸藥。搽入耳底。自乾。肝

耳加麝香五錢。一併一分五錢。

參考 此即所謂耳聾紅棉散。示與治眼疾等之紅棉散有別。一方用煨甘石七兩五錢。煨礬七錢五分。麝香二分。冰片一錢。先用胭脂泡水。取其汁。加入枯礬、煨甘石細粉。晒乾後。再加麝香、冰片研和。治耳內腫痛。膿水流溢。以花椒炸香油。取油調藥。滴入耳內。

【紅藍花散】

發明 見張氏方。

功用 治聾耳久不癒。

藥品 紅藍花(洗、焙乾)、黃蘗(剉)、各一兩。烏賊魚骨、黃芩、各五錢。雄黃(水磨、細研)、四錢。麝香、一分(細研、一作五分)。

制法及用法 以前四味羅搗細爲末。後入雄麝和勻。以綿經搗藥塞耳中。日換二次。

【赴筵散】

發明 見陳實功外科正宗。

功用 治口糜多膿。

藥品 黃連、黃蘗、黃芩、北細辛、山梔子、乾姜、各等分。

制法及用法 共研細末。每用少許吹之。

【赴筵散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治舌上臭爛。

藥品 銅綠、白礬、各一錢。

制法及用法 研末摻之。溫鹽漱口。

【赴筵散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目赤。

藥品 薄荷、黃蘗、各等分。

制法及用法 研爲末。加青黛少許。搽之。

【柴胡散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風熱。眼眶澀爛。

藥品 柴胡、羌活、防風、赤芍藥、桔梗、荆芥、生地黃、各一錢。甘草(炙)、五分。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。清水煎。溫熱服。

【香附散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳中生瘡。

藥品 香附(去毛)、不拘多少。

制法及用法 研爲末。以綿杖送入耳中。

【珍珠散】

發明 見鮑恒敬驗方新編。

功用 治口瘡。牙根紅腫。口實大喉痛。

藥品 煨人珍珠、五分。雄精、明沙、川連、兒茶、人中白、梅花冰片(頂上牙色者)、薄荷、黃蘗、各一錢。

制法及用法 各研極細末(如香灰細、不細、撲之作痛)。和勻。收入瓷瓶。不可洩氣。每用一二分。吹入患處。

【春雪膏】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治風熱生翳。險硬腫爛。及一切目赤腫痛。淚出皆爛。

藥品 蕤仁(去殼皮、研細、紙包、壓去油、再研再壓數十次、取淨)、五錢。

制法及用法 加龍腦五分。煉白蜜(一作生蜜)一錢五分。再研勻。瓷罐收貯。每日少許。銅箸蘸點。

【禹餘糧丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治聾耳出膿水。

藥品 禹餘糧(煨、醋淬七次)、海螵蛸(去背上硬骨)、百草霜、伏龍肝、各二錢五分。大附子(去皮臍、生用)、一枚。

制法及用法 研爲末。以綿裹如圓眼核大。塞於耳內。日再易之。

十 筆

【凌霄花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治酒齕鼻。

藥品 凌霄花、山梔子、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後茶湯調下。

【消毒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治喉生風粒。

藥品 大黃(煨)、荆芥穗、各二錢。牛蒡子、甘草、各一錢。

制法及用法 清水煎。食後溫後。

【消翳散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 消翳。

藥品 蛤粉、煅精草、川鬱金、各五錢。羌活、龍膽草、黃芩(炒)、各三錢。升麻、二錢。麻黃、一錢五分。蟬蛻(一作蛇蛻)、甘草根(炙)、各五分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後溫茶調下。

【消翳散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治暴赤眼。

藥品 川芎、羌活、旋覆花、防風、各二兩。甘草、蒼朮(米泔浸一宿、去皮曬乾、不見火)、楮實、楮葉(上二味均八月採、陰乾)、各一兩。甘菊花、枳實、蟬蛻、木賊、各二錢五分。

制法及用法 木白中杵爲末。每服二錢。茶清調下。早

食後臨臥各一服。忌酒、滯麵。
合時不得焙。及犯鐵器。

參考 此方取楮葉必無質者。若陰陽二合相匹配耳。有質者陽也。無質取葉者陰也。所以不得買楮質者。悉無效。

【消翳復明膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治陽蹻受邪。內眥即生赤脈縷縷。根生瘀肉。瘀肉生黃赤脂。脂橫侵黑眼。漸蝕神水。銳眦亦然。俗名攀睛。並有眵淚。羞澀難開。

制法及用法 用黃丹(水飛)、四兩。訶子、八枚(去核取末)。海螵蛸、三錢(取末)。青礬(另研)、一兩。白蜜、一斤。先將蜜熬數沸。淨紙搭去蠟面。再下黃丹。用棍攪勻。旋下餘藥。將至紫色取出。次用黃連、十兩。龍膽草、二兩。木賊、一兩。杏仁、七十五粒(去皮尖)。麤仁、五錢。通入瓷器內。潑水一斗浸之。春秋五日。夏三日。冬十日。入鍋內。文武火熬至小半升。濾去渣。重湯燉成膏子。再入前藥熬之。攪成紫色。入龍腦、一錢。每用少許點上。藥乾。淨水化開用。

參考 此方以黃連爲君。爲療邪熱也。麤仁、杏仁、龍膽草爲臣。爲除赤痛。潤煩燥。

解熱毒也。黃丹、青礬、龍腦、白蜜爲佐。爲收澀爛。益腎氣。療赤腫。和百藥也。訶子、海螵蛸、木賊草爲使。爲澀則不移。消障應翳也。

【消翳復明膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼日昏花。翳膜遮睛。內外障眼。一切目疾。

制法及用法 用黃丹、一兩。青礬、二錢五分。海螵蛸、珍珠、各七分五釐。熊膽、麝香、各二分。片腦、五分(臨時加入)。槐枝柳枝、各四十九條。訶子、二枚(去核、研末)。冬蜜(熬一沸、去白沫濾淨)、四兩。先將蜜和黃丹煉至紫色。旋下餘藥。熬至滴水洗下成珠爲度。除腦麝成膏後入。次用黃連、二兩五錢。防風、當歸、龍膽草、生地黃、各五錢。木賊、白菊花、各二錢五分。麤仁、一錢。杏仁、五分。如前煎熬成膏。入蜜和勻。瓷碗盛放湯瓶口上。蒸嫩成膏。濾淨。入腦麝和勻。每用少許點眼。又以熱湯泡化洗之。

【眞珠散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝虛迎風熱淚。

藥品 眞珠、丹砂、各三分。乾薑、二分。貝齒、五枚(炭火

漿、水淬、一作一兩)。

制法及用法 各研極細末。以熟絹帛羅三遍。每用少許。仰臥點之。閉目少時。

【眞珠散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治血灌瞳人。生障膜。

藥品 眞珠、水晶、琥珀、馬牙硝、各五錢。硃砂、一兩。龍腦、少許。

制法及用法 研細如粉。每用如半小豆大。銅筋取點。

【眞珠散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼生翳膜。赤澀疼痛。

藥品 眞珠、五錢。青箱子、黃芩、各二兩。人參(去蘆)、甘菊花、石決明(搗碎細研、水飛)、萵藟、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。食後溫漿水調下。

【眞珠膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼病久不瘳。臨視不見物。

藥品 眞珠(研)、甘菊花(爲末)、香豉(炒黃、爲末)、井泉石(細研)、各二錢五分。

制法及用法 拌勻。用白蜜一合。鯉魚膽一枚。同藥慢火熬成膏。入好龍腦一錢。同拌

勻。每用少許。時貼眼中。

【眞珠膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼虛熱赤痛。生翳昏暗。

藥品 眞珠、一兩。麝香、硃砂、胡粉、各二錢五分。貝齒、五枚(燒灰)。鯉魚膽、二枚。白蜜、四兩(煎濾過)。

制法及用法 除魚膽、蜜外。餘研細如粉。以魚膽汁、蜜於銅器中調令勻。慢火煎成膏。每用少許。銅筋點之。一日三四次。

【烏金丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治飛絲入目。

藥品 京墨。

制法及用法 磨濃汁點之。即出。

【烏金膏】

發明 見顧世澄醫醫大全。

功用 治目外障。風瑣。血縷。樹障。努肉攀睛。雞冠蜆肉。漏睛瘡。

藥品 香礬、一兩。米醋(自造紅香者佳)、一碗半。

制法及用法 全入銅鍋內。文武火熬乾。如溼翻調焙乾。取出去火氣。研細末。用時不拘多少。再研至無聲。入生蜜

調勻。盛瓷罐內。塗點患處。久閉或五日七日。上下胞俱腫。方可吹藥。數日其紅腫盡消。翳輕重再點。如漏睛膿出。用糕和勻。作條曬乾。量穴深淺插入。化去瘀肉白管。則新肉自生。而膿自止。

【烏犀丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻痔。

藥品 烏犀(鎊)、羚羊角(鎊)、牛黃、柴胡、各一兩。丹砂、天門冬(去心煨)、貝母(去心、炒)、胡黃連、人參、各五錢。麥門冬(去心、焙)、知母、各七錢五分。黃芩、甘草(炙)、各二錢五分。

制法及用法 研為細末。和勻。煉蜜為丸。如梧子大。每服二十丸。空腹時溫酒送下。

【桃花散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治耳中生瘡。

藥品 延胡索、一錢。黃連、黃蘗、各五分。青黛、密陀僧、各三分。

制法及用法 研細吹之。

【桃紅散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 止血。治耳瘡、癰瘤。

藥品 石灰、十兩。麻油、半

盞。大黃、五錢(水浸透、取汁、半盞)。

制法及用法 將石灰炒紅。入麻油、大黃汁和勻。慢火炒如桃花色。搽之。

【退赤散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目赤。

藥品 大黃、黃芩、黃連、白芷、赤芍藥、當歸、山梔子、各等分。

制法及用法 剉為散。加桑白皮。清水煎。食後服。

【退赤散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目赤。

藥品 山梔子、一兩。當歸(酒浸)、五錢。大黃(煨)、甘草(炙)、各二錢。

制法及用法 咬咀。每服三錢。清水一盞半。煎至七分。去渣溫服。

【退赤散】

發明 見傅仁宇眼科審視瑤函。

功用 治白睛微紅。

藥品 桑白皮(蜜製)、甘草、牡丹皮(酒洗)、黃芩(酒炒)、天花粉、桔梗、赤芍藥、當歸尾、瓜蒌仁(去殼油、為霜)、各等分。

制法及用法 研為細末。每服二錢。麥門冬(去心)煎湯調

下。

【退翳丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治日生翳膜。

藥品 蟬退、白菊花、夜明砂、車前子、連翹、各五錢。黃連、一兩。蛇退、一條(炒)。

制法及用法 研爲末。米泔煮豬肝和丸。如梧桐子大。每服三十丸。薄荷湯送下。

【退翳丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

藥品 黑參、防風、各一兩。細辛、石決明、車前子、各五錢。桔梗、黃芩、各一兩五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。空腹時茶清送下。

【神功散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治痘入目生翳。

藥品 蛤粉、穀精草、各一兩。羌活、蟬蛻、各五錢。綠豆皮、四錢(一作五錢)。

制法及用法 爲散。每服二三錢至四錢。以豬肝一片。批開入藥末。線紮煮熟。不拘時與汁同服。

【神應膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘入目。

藥品 黃蘗、紅花、各一兩。

綠豆粉、一兩五錢。甘草、四兩。

制法及用法 研爲細末。胭脂水和蜜水調塗。

【茯神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治上焦風熱。耳忽響鳴。四肢滿急。胸脇痞悶。

藥品 茯神(去木)、麥門冬(去心)、各一兩。羌活、防風(去叉)、蔓荊子、薏苡仁、石菖蒲、五味子、黃耆、各五錢。薄荷、甘草、各二錢五分。

制法及用法 研爲末。每服三錢。加生薑三片。清水煎。去滓。食後溫服。

【桔梗丸】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治太陽經衛虛血實。目腫赤臉重。頭中溼淫。膚翳睛痛。肝風盛。腎虛眼黑。

藥品 桔梗、一斤。牽牛頭末、二兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服四五丸至一百丸。食前熟湯送下。一日二次。

【桑麻丸】

發明 見胡僧方。

功用 去風。涼血。補肝。益腎。駐容顏。烏鬚髮。起羸

底。除風澤。治肝陰不足。眼目昏花。或久不愈。肌膚甲錯。麻痺不仁。久服却病。延年。

藥品 嫩桑葉(須五月五日、六月六日、立冬日、採者佳、去蒂、洗淨、曬乾爲末)、一斤。黑胡麻子(淘淨)、四兩。

制法及用法 將胡麻搗碎。熬濃汁。和白蜜一斤。煉至滴水成珠。入桑葉末爲丸。如梧桐子大(一方桑葉爲末、胡麻蒸搗等分爲丸)。每服三錢。空腹時鹽湯。臨臥時溫酒送下。

參考 此方去風明目。烏髮黑髮。頗爲有功。方平易而效亦大。惟稱駐顏益壽。則譽之太過矣。

【益氣聰明丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內障初起。視物微昏。空中有黑花。神水變淡綠色。次則視物成二。神水變淡白色。久則不視。神水變純白色。兼治耳聾耳鳴。

藥品 黃耆、人參、各一錢二分五釐。升麻、七錢五分。葛根、三錢。蔓荊子、一錢五分。白芍藥、黃蘗(酒炒)、各一錢。甘草(炙)、五分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸服。但上係湯量。丸量準此酌加。

參考 此方以黃耆、人參之甘溫。治虛勞爲君。甘草之甘平和協。升麻之苦平微寒。行手陽明、足陽明、足太陰之經爲臣。葛根之甘平。蔓荊子之辛溫。皆能升發爲佐。芍藥之酸寒。補中焦。順血脈。黃蘗之苦寒。治腎水膀胱之不足爲使。酒製又炒者。因熱用也。或有熱。可漸加黃蘗。春夏酌加之。盛暑倍加之(再加多則不效)。脾胃虛者去之。

【草靈丹】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治鼻中時流黃色濁涕。

藥品 鮮鵝不食草、不拘多少。

用法 塞於患處。

【浮萍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘疹及豌豆瘡入眼。痛不可忍。

藥品 浮萍、不拘多少(陰乾)。

制法及用法 研爲末。每服一二錢。用羊肝一片。入藥內。以竹杖刺碎。投沸湯半盞。絞汁。食前調服二三次。即效。

十一筆

【密蒙花散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治風氣攻注。兩眼昏暗。眵淚羞明。暴赤腫痛。及痘毒入目。翳膜遮睛。

藥品 密蒙花、羌活、白蒺藜(炒、去刺)、木賊(去節)、石決明(煨)、各一兩。甘菊花(去蒂)、二兩。一方有白芍藥、炙甘草。無羌活。

制法及用法 研爲細末。每服二三錢。食後茶清調下。

【密蒙花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒痘瘡入眼。及無辜疔氣。熱毒入眼。

藥品 密蒙花、三兩。青箱子、決明子、車前子、各一兩。

制法及用法 研末拌勻。用羊肝一大片。薄批攤上。溼紙裹煨熟。空腹時服。量兒大小加減。以愈爲度。

【清心散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治舌上生瘡。

藥品 青黛、硼砂、薄荷、各二錢。牛黃、冰片、各三分。

制法及用法 研爲細末。先以鹽水洗舌。後以薑汁擦舌。將藥末蜜水調稀。搽舌本上。

【清肺散】

發明 見沈金鰲氏尊生

書。

功用 治目疾。

藥品 桑白皮、片苓、甘菊、花、枳殼、防風、荆芥、柴胡、升麻、赤芍藥、當歸尾、玄參、芍藥、甘草、白蒺藜、木賊草、旋覆花、甜葶藶。

制法及用法 清水煎。食後服。

【清胃散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治小兒口生瘡。

藥品 車前子、石膏、大黃、柴胡、桔梗、黑參、黃芩、防風、各一錢。

制法及用法 研爲粗末。清水二盞。煎至一盞。去滓。食後溫服。

【清胃散】

發明 見顯世澄瘍醫大全。

功用 治弄舌。

藥品 防風、天花粉、黃芩、熟石膏、厚朴(薑製)、枳殼、黃連、陳皮、甘草。

制法及用法 清水煎服。

【清涼膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治暴赤火眼腫痛。及瘰癧。打撲傷眼腫張。

藥品 川大黃、礞石(一作芒硝)、川黃連(酒炒)、川黃藥、赤芍藥、當歸、各一錢。細辛、五

分。芙蓉葉、三錢。

用法 研爲細末。生酒浸搗絞汁。入雞皮。白蜜五錢。同調成膏少許。貼太陽穴及眼

方去當歸、芙蓉葉、各同上。先將大黃、黃連、黃蘗、赤芍、細辛、薄荷葉、或曬或焙、研爲末。次入樸硝、乳鉢內同杵勻。用一錢或二錢。治暴赤火眼腫痛。新汲水或冷水加生薑汁。調塗太陽穴。治血癰作痛發熱。則以涼米湯水調塗。

【清涼膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目熱赤痛。

藥品 生南星、薄荷葉、各五錢。荆芥、百藥煎、各三錢。

制法及用法 研爲末。井水調成膏。貼眼角。自然清涼。

【清肝保腦丸】

發明 驗方。

功用 治腦蕩。鼻粘膜炎。

藥品 藿香葉、八十兩。豬膽、三十只。

制法及用法 將藿香研細粉。豬膽取汁。和水泛丸。如綠豆大。每次一錢至一錢五分。食後開水送服。

【犀角丸】

發明 見傅仁宇眼科審視瑤函。

功用 治瞳人欹側。

藥品 犀角屑、石決明（醋煨）、當歸身、麻黃、各減半。楮實、枸杞子、防風、各等分。

制法及用法 共研細末。麴糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。茶清送下。

【犀角散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治目疾。

藥品 犀角、羚羊角、各五錢。車前子、枸杞子、各一兩。槐子、五味子、牛蒡子、青葙子、宛蔚子、胡黃連、各七錢五分。兔肝、一具（微炙）。

制法及用法 共研細末。每服二錢。食後槐子湯調下。

【犀角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒壅熱。心胸痰滯。兩耳虛聾。頭重目眩。

藥品 犀角屑、甘菊花、煎胡、枳殼（麸炒黃）、石菖蒲、羌活、澤瀉、木通、生地黃、各五錢。麥冬（去心）、二兩。甘草（炙）、二錢五分。

制法及用法 研爲末。每服三錢。清水煎。去滓。食後溫服。

【犀角飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾火上升。

藥品 犀角(鎊)、一兩。羚羊干、龍腦草(炒)、黃芩(炒)、各五錢。人參、一兩。茯苓、二錢五分。鉤藤鉤、七錢五分。甘草、二錢。

制法及用法 每服一錢。清水煎服。

【犀角飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目中黃膜上翳。

藥品 犀角、二兩。白附子(炮)、麥門冬、各二錢五分。車前子、羌活、黃芩、各五錢。

制法及用法 清水煎。食後溫服。

【犀角飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風熱上壅。耳內聾閉。喉嚨掣痛。膿血流出。並治砂眼。

藥品 犀角(鎊)、木通、石薺蒲、甘菊花、玄參、赤小豆(炒)、赤芍藥、各二錢(一作各一錢五分)。甘草(炙)、一錢。

制法及用法 清水二碗。加薄荷三片。煎至一鐘。不拘時熱服。

【救苦散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治生疔瘡。

藥品 角芒、當歸、風、各元錢。

制法及用法 研爲末。服三錢。熱酒調下。

【救睛丸】

發明 見王肯堂證治

功用 治睛腫。旋螺青盲白翳。

藥品 蒼朮、枳實、甘草、川芎、荆芥、蟬蛻、薄荷、當歸、木賊、草決明、穀精草、各等分。

制法及用法 研爲末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。食後茶清送下。

【救睛丸】

發明 見傅仁宇眼科審視瑤函。

功用 治口珠突出。

藥品 枸杞子、蒼朮、枳子仁(炒熟)、赤芍藥、蘇薄荷、各等分。

制法及用法 共研細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服三錢。井花水或冷茶清送下。此丸宜於少年。若老者可服立退丸。

【細辛散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻脰有息肉。不聞香臭。

藥品 北細辛、瓜蒂、各等

分。

制法及用法 研爲末。綿裹如豆大。塞入耳中。

【細辛膏】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒耳聾。

藥品 細辛、黃芩、防風(去蘆頭)、川大黃(剉、微炒)、各一分。川椒(去目)、十粒。蠟、五錢。

制法及用法 研爲細末。用清麻油三合。煎藥至紫色。濾過下蠟。融盡爲膏。每用如大豆大。點於耳中。一日三次。

【紫金膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治勞肉攀睛。

藥品 煇甘石(入大銀罐內、盛泥封固、用炭火煅一炷香、以罐通紅爲度、取起、研爲末、用黃連水飛過、再入黃芩、黃連、黃蘗湯內、將湯煮乾、至如松花色)、黃丹(入鍋內炒黑、用草拭之、草杓提起、如此三次、研極細末、水飛)、各四兩。礞砂(研細、飛過)、礞砂(研細、飛過)、珍珠、各三錢。海螵蛸(去皮)、二錢。輕粉、玄鹽(水洗去泥)、白丁香(乳汁化開、去渣)、沒藥、乳香、枯礬、礞砂、當歸、川芎、黃連、甘草、麝香、冰片、各五分。

制法及用法 各研極細末。至無聲爲度。另片好白蠟十五兩。入鍋內。熬去渣沫。祇用白蠟十兩。先下煇甘石攪勻。次下黃丹攪勻。再下諸藥。不住手攪勻。至如紫色不黏手爲度。每用少許。點於患處。

【紫金錠子】

發明 見王肯堂證治準繩方。

功用 治一切眼疾。諸般翳膜。血灌瞳人。努肉攀睛。拳毛倒睫。積年赤障。暴發赤腫。白睛腫脹。沙澀難開。眵淚緊澀。怕日羞明。哆多曠淚。爛弦風癢。視物昏花。迎風流淚。目中留火。

藥品 煇甘石、黃丹、各八兩。黃連(另研)、礞砂、各一兩。當歸、礞砂、各五錢。海螵蛸、白丁香、生白礬、礞砂、輕粉、貝齒、珍珠、石蟹、熊膽、乳香、沒藥、麝香、各一錢二分五釐。片腦、二錢(久留恐失氣味、宜臨用時加入)。

制法及用法 除腦麝外。餘各另研爲末。拌合和勻。入黃連水。碾至千萬餘下。曬乾。次入麝香(研細、羅過)。又次入片腦(研細、羅過)。再入後膏。搜和作錠子。陰乾。用黃連、一斤。當歸、生地黃、各四

兩。防風、黃蘗、龍膽草、各二兩。葵仁、五錢。冬蜜、八兩(另熬、酥乾爲度)。訶子、八枚。鵝梨、八枚(取汁)。豬胰子、四兩(以稻草擲洗、去腎膜、潔淨無油爲度、再用布包、搗爛入藥)。各洗淨。研爲末。以水浸於銅器內。春五、夏三、秋四、冬七日。濾去渣。以渣復添水。熬三次。取盡藥力。用密絹綿紙重濾過。澄去沙土。慢火煎熬。以槐柳枝各四十九條。互換攪拌。不可住手。攪盡枝條。至如飴糖。加蜜和勻。瓷器收盛。置湯瓶上。重湯蒸燉成膏。復濾淨。至滴入水中沈下如珠。可丸爲度。待數日出火毒。再熔化。加入各末和勻。杵搗爲丸錠。陰乾。金銀箔爲衣。每用少許。新汲水浸化開。鵝毛蘸點眼大眇內。又可以熱水泡化洗眼。冷則更暖之。每日洗五七次。點十餘次。甚效。

【羚羊角丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

藥品 羚羊角、一兩。犀角、石決明、車前子、草決明、各七錢五分。猴棗、防風、甘菊花、蓮肉、梔子、藍實、甘草、各五錢。

制法及用法 共研細末。煉

蜜爲丸。如梧桐子大。每服三四十丸。熱湯送下。

【羚羊角丸】

發明 見沈括靈苑方。

功用 治肝肺壅熱。眼生翳肉。赤脈纏痛。及赤眼障翳。癢痛羞明。小兒風疳爛陽眼。

藥品 羚羊角屑、生甘草、白何首烏、瓦松、各一兩。生乾地黃(洗)、礬金(炮過、溼地上去火氣)、各二兩。

制法及用法 並細剉曝乾。搗輕細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。淡竹葉、黑豆濃煎湯。候冷送下。食後臨臥服。小兒丸如綠豆大。每服七丸至十丸。

【羚羊角散】

發明 見傅仁宇眼科審視瑣函。

功用 治視物顛倒。

藥品 羚羊角(剉細)、茯神、各一兩。半夏(製七次)、智歸身、川芎、白芷、防風、明天麻、枳殼、甘草、各一錢五分。

制法及用法 研爲粗末。每服四錢。加生薑三片。清水煎。去滓。湯服。

【羚羊角散】

發明 見張潔古病機氣宜保命集。

功用 治冰翳。

藥品 羚羊角屑、二兩。升麻、一兩五錢。細辛、一兩。甘草、九錢。

制法及用法 研爲末。一半煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五七十丸。一半泔水煎。食前吞送丸子。若陰虛有熱者。兼服神仙退雲丸。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒癰疹後。餘毒不解。上攻眼目。生翳羞明。移淚俱多。紅赤腫閉。

藥品 羚羊角(鎊)、一兩。黃芩、黃耆、草決明、車前子、升麻、防風、大黃、芒硝、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服二三錢。清水一盞。煎至半盞。去滓。食後稍熱服。

參考 此方以羚羊角明目爲君。升麻質內逐毒。黃耆質外禦邪爲臣。防風升清陽。車前子瀉濁陰爲佐。草決明療赤痛淚出。黃芩、大黃、芒硝。攻錮熱爲使。然大黃芒硝。乃大苦寒之藥。當量其虛實以爲加減。未滿二十一日而日換作者。消毒化癰湯主之。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治綠風內障。頭旋目痛。眼內痛澀。

藥品 羚羊角、防風、知母、人參、茯苓、玄參、黃芩、桔梗、車前子、各一兩。細辛、三兩。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水一盞。煎至八分。去渣。食後溫服。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內外翳障。但赤疼澀痛。不熱不腫者。

藥品 羚羊角屑、一兩(一作一錢五分)。白菊花、川烏頭(炮)、川芎、車前子、防風、羌活(一作二錢五分)、半夏(一作二錢五分)、薄荷(一作二錢五分)、各五錢。細辛、二錢。

制法及用法 爲散。每服二錢。生薑湯調。薄荷煎湯送下。如翳霧加升麻五錢。肉桂二錢。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝臟胃熱。眼前昏暗。時多熱淚。

藥品 羚羊角(鎊)、羌活(去蘆)、玄參、車前子、黃芩(去黑心)、梔子仁(炒)、瓜蒌(去油)、各五錢(一作各三錢)。胡黃連、菊花、各三分(一作各三錢、一作各七錢五分)。細辛、一分(去苗、一作一錢、一作二錢五分)。

制法及用法 研爲細末，每服二錢。食後竹葉湯調下。

【羚羊角散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝勞實熱。兩目赤腫。心中煩悶。

藥品 羚羊角(鎊)、柴胡(去蘖)、黃芩、當歸、決明子、羌活、赤芍藥、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 煎與續斷湯同。

【羚羊角飲】

發明 見葆光道人眼科龍木論。

功用 治風熱內障，不痛不癢者。

藥品 羚羊角、三兩。細辛、知母、車前子、人參、黃芩、各二兩。防風、二兩五錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水一盞。煎至五分。去滓。食後溫服。

【羚羊角飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風輪熱翳。及翳黑如珠外障。

藥品 羚羊角(鎊)、五味子、細辛、大黃(酒蒸)、知母、芒硝、各一兩。防風、二兩。一方無細辛。一方無五味子。

制法及用法 剉碎。每服五錢。清水一盞。煎至五分。去

滓。食後溫服。

參考 此方以羚羊角爲主。力能舒筋。入厥陰經甚捷，專在風輪者。用之爲宜。

【通耳丹】

發明 見顧世澄傷寒大全。

功用 治耳聾。

藥品 鼠膽、一枚(須覓一大鼠、先以竹籠養之、後以紙爲匣、引其藏身、內貯果品、令其自食、久之忽然用棒槌擊死、立時取膽、則膽在肝中、否則不可得、乾者可用水調化入藥末中)。龍齒、冰片、麝香、硃砂、各一分。潮腦、乳香、各五釐。

制法及用法 各研極細末。人乳汁爲丸。如梧桐子大。每用一丸。絲綿裹之。不可太大。塞入耳之深處。至不可受而止。塞三日取出。即耳聰。永不再聾。

【通耳丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳聾。

藥品 安息香、桑白皮、阿膠、各一兩五錢。硃砂、五分。

制法及用法 巴豆、蓖麻仁、大蒜、各七個。研爛。入藥末和勻。如棗核大。每用一丸。絲綿納入。如覺微痛。即出之。

【通神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳聾。

藥品 全蠍、一枚(泡、一作三枚)。地龍、土狗、各二枚(一作各三枚)。明礬(半生半煨)、雄黃、各五錢(一作各五分)。麝香、一字(一作二分五釐)。

制法及用法 研爲細末。每用少許。葱白蘸藥。引入耳中。閉氣面壁坐一時。三日一次。

【通神散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘瘡入目生翳障。

藥品 白菊花、綠豆皮、穀精草、各等分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。加乾柿一個。米泔一盞。同煎。候水乾。不拘時食柿。七日得效。遠者不過半月。

【通氣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳聾。

藥品 穿山甲、五錢。麝香、一錢。

制法及用法 研爲細末。以葱涎和塞耳。或葱管盛少許。置耳中。

【通氣散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治氣閉耳聾。

藥品 茴香、木香、全蠍(一作人參)、玄胡索、陳皮、菖蒲、各一錢。羌活、僵蠶、川芎、蟬

蛻、各五分。穿山甲、二錢。甘草、一錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。不拘時溫酒調下。

【通頂散】

發明 見王肯堂證治準繩方。

功用 治鼻鼈。

藥品 瓜蒂、梨蘆、各一錢。皂角肉、五分。麝香(研)、少許。

制法及用法 研爲細末。和勻。每用少許。吹入鼻中。

參考 大抵鼻者。由肺氣注於鼻。上榮頭面。若上焦壅滯。風寒客於頭腦。則氣不通。冷氣停滯。搏於津液。膿涕結聚。則鼻不聞香臭。遂成鼈也。

【通頂散】

發明 見王肯堂證治準繩方。

功用 治鼻內寒塞不通。不得喘息。

藥品 胡黃連、滑石(研)、各二錢五分。瓜蒂(研)、七枚。麝香(研)、一錢。蟾酥(研)、五分。

制法及用法 研勻。每用少許。吹入鼻內。即瘳。

【連翹飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目中溜火。陰經羞明。背緊昏花。迎風有淚。

藥品 連翹、當歸、紅葵花、蔓荊子、人參、生甘草、生地黃、各三分。黃芩(酒製)、黃耆、防風、羌活、各五分。柴胡、二分。升麻、一錢。

制法及用法 剉散。每服五錢。清水二盞。煎至一盞。去滓。食後稍熱服。

【排風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻塞。或生瘰肉。

藥品 防風、秦艽(去苗土)、吳茱萸(湯浸焙)、天雄(炮、去皮臍)、山芋、各一兩。羌活、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。空腹時溫酒調下。

【乾眼藥】

發明 驗方。

功用 治肝腎虧損。眼目昏花。星障雲翳。及一切新久目疾。

藥品 爐甘石(製)、地栗粉、各四兩。冰片、八錢。

制法及用法 研爲極細末。瓷器密收。每用少許。點入眼角。合眼靜坐片時。無不神效。

十二筆

【黃白散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻齜、肉癰、鼻痔等證。

藥品 雄黃、五分。白礬、瓜蒂、細辛、各一錢。

制法及用法 研爲細末。雄犬膽汁和丸。棉裹塞鼻。或研爲末。搽鼻。

【黃耆丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎虛。耳鳴或聾。

藥品 黃耆(酒炒)、一兩。沙苑蒺藜(炒、去刺、一作白蒺藜)、羌活、各五錢。生黑附子、一枚(大者、去皮臍)。羯羊腎、一對(焙乾)。

制法及用法 共研細末。酒煮米糊爲丸(一作羯羊腎一對、去脂膜、勿犯鐵、酒煮搗爛絞汁糊丸)。如梧桐子大。每服四五十丸。空腹食前煖葱鹽湯、臨臥溫酒送下。

【黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療口瘡。

藥品 黃連、朴硝、白礬、各五錢。薄荷、一兩。

制法及用法 研爲粗末。用臘月黃牛膽。將藥入膽內。當風處掛兩月。取下。用時。將藥研細。敷口瘡上。去其餘涎。即愈。

【黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療眼爛弦風。

藥品 黃連、防風、荊芥、赤芍藥、五倍子、蔓荊子、覆盆子根。

制法及用法 清水煎沸。入鹽少許。濾淨。又入輕粉末少許。和勻洗眼。

【黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療耳內生瘡。

藥品 黃連、五錢。白礬(煨枯)、七錢五分。

制法及用法 搗爲細末。每用少許。綿裹納耳中。

【黃連膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治時行火眼。赤腫疼痛。晝夜煩啼。及痘瘡餘毒攻目。哆多熱者。

藥品 川黃連、二錢五分。

制法及用法 細剉。以雞子清。瓦器盛之。入黃連末和勻。煎一時見黃色。以絹濾過成膏。點在仰目而臥。令人吐一守許。覺目內有苦味滿舌上。藥之效也。

【黃連膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治目中赤脈。如火溜熱炎。

藥品 黃連、八兩(去焦、刮去黑皮、洗淨、剉碎)。片腦、一錢。一方加熊膽、蝮蛇膽、各少許。

制法及用法 以黃連末。用清水三大碗。貯於銅鍋或瓷器內。文武火熬。減大半碗。濾去滓。再以滓復煎。濾淨澄清。入薄瓷器盛之。置湯瓶口上。重湯蒸燉成膏。再復濾淨。待數日出火毒。臨時旋加片腦。每用少許。點眼大眥內。

【黃連膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治目中赤脈。如火溜熱炎。

藥品 黃連、八兩。杏仁、菊花、梔子、黃芩、黃蘗、龍膽草、防風、當歸、赤芍藥、生地黃、各一兩。

制法及用法 清水煎濃汁。去滓。再煎。濾淨。碗盛置湯瓶口上。重湯蒸燉成膏。以滴入水中可丸爲度。加陽明散爲丸。臨用時。加片腦少許。研細。以井水化開。鴨毛蘸點眼內。

【黃連膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治目中赤脈。如火溜熱炎。

藥品 黃連、雞柏根、各多

用。地蒲荷、田茶菊、嫩柏葉、苦花子、苦參根、地胡椒、七厘樓、地芫蕪、千里光、各等分。

制法及用法 清水煎。去滓。濾淨復煎。候汁如稀餡。入冬蜜。稍停。即以篩盛之。置湯瓶口上。重湯蒸嫩成膏。加陽丹、一兩。和勻。再加硃砂、硼砂、各一錢。片腦、麝香、各一分。每用少許。點於眼內。

【黃連膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治鼻竇生瘡。乾燥疼痛。

藥品 黃連、黃蘗、薑黃、各三錢。當歸尾、五錢。生地、一兩。

制法及用法 香油十二兩。將藥燥枯。撈去滓。加黃蠟四兩。俟融化盡。用夏布將油濾淨。傾入瓷碗內。以柳枝不時攪之。候凝爲度。每用少許。搽於患處。

【琥珀散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治發年目生花翳。

藥品 琥珀、珊瑚、硃砂、白礬砂、烏賊骨(先於粗石磨去其腥、用好者一錢)、馬牙硝、各五錢。珍珠末、一兩。

制法及用法 研爲極細末。令勻。每日三五次點之。

【琥珀煎】

發明 見傅仁宇眼科審視瑤函。

功用 治冰瑕翳。久不癒。

藥品 琥珀(另研)、龍腦、各二錢五分。明礬砂(另研)、貝齒、各五錢。馬牙硝(煉過者)、七錢五分。

制法及用法 研極細膩如麵。清水一盞。加白蜜一兩。攪和。入乾淨瓷罐中。重湯煮。以柳木枝煎。約計一合。即取起。再以絹濾過。於乾淨瓷罐或銅器盛之。每用少許。點於患處。或但爲細末點之亦可。

【琥珀煎】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒。衝口腫赤癢痛。

藥品 乳香、二錢。薤仁、五錢。滑石、鉛丹、各二兩。黃連(以上五味均另研)、青皮、各一兩。黃芩(去黑心)、白蜜、各四兩。木鼈子、十枚(去殼)。槐枝、柳枝、各十枝(並用新青者、每枝長一寸五分)。

制法及用法 將槐柳枝、青皮、黃芩、滑石、以水三碗。同煎至兩碗。去滓。下乳香、薤仁、鉛丹、木鼈子。與蜜同熬如琥珀色。却下黃連末。再煎至一碗半。用熟絹濾去滓。入瓷

器內密封。繩繫罐井底一宿。出火毒。每用少許。銀箔貼之。目澀爲度。熬點俱忌鐵器。

【菊花丸】

發明 見傅仁宇眼科審視瑤函。

功用 治冷淚常流。

藥品 甘菊花(炒)、四兩。肉苁蓉(酒洗、去皮、焙乾、切)、二兩。芒硝(去心)、枸杞子(搗焙)、各三兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。食前空腹時溫酒或青鹽湯送下。

【菊花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘡疹入目。

藥品 白菊花、綠豆皮、密蒙花、旋覆花、殺精草、甘草、各一兩。

制法及用法 每服二錢。加柿餅一枚。粟米泔一盞。煎至水乾爲度。取柿餅食之。五七日即效。治痘後目翳者。以殺精草、蛇蛻、綠豆殼、天花粉。各研爲末。粟米泔浸。煮乾爲度。食之。

【菊花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目風流淚。見東南河則甚。漸生翳膜。

藥品 菊花(去蒂)、木賊(去節、用新者)、草決明(洗、曝乾)、菟芥穗、旋覆花、甘草(炙)、各一兩(一作各五錢)。蒼朮、四兩(肥者、同阜莢三枚、沙鍋內河水煮一日、去阜莢、以銅刀刮去蒼朮黑皮、切片、鹽水炒、曝乾、取三兩、一作八兩)。

制法及用法 研爲細末。每服一二錢。鹽茶五分點服。空腹臨臥各一次。有翳者。加蛇蛻二錢五分(洗炙、一作一錢)。蟬蛻七錢五分(洗焙、一作三錢)。

【菊花散】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治肝腎風毒。上衝眼痛。

藥品 甘菊花、牛蒡子(炒)、各八兩。防風、三兩。日炙麝(去刺)、一兩。甘草、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後臨臥時熱湯調下。

【菊花散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治肝受風毒。眼目赤腫。昏暗羞明。多淚澀痛。漸生翳膜。

藥品 白菊花、六兩。白麝(炒、去刺)、川羌活(去蘆、勿

見火)、木賊(去節)、蟬蛻(湯洗、去頭足)、各三兩。一方有荊芥、甘草、各二兩。

制法及用法 共研爲細末。每服二三錢。食後茶清調下。

【蛤粉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒瘡入眼。

藥品 蛤粉、穀精草、各等分。

制法及用法 研爲細末。每日一錢匕。豬肝一兩許。批開摻藥。用竹箸裹。麻線縛定。清水一碗。煮令熟。入收口瓷瓶熏眼。候溫取食之。十日可退。

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻中瘰肉。

藥品 雄黃、五分。瓜蒂、二枚。絲礬、一錢。麝香、少許。

制法及用法 研爲細末。每用少許。搽於鼻中。

【開關散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治口噤。

藥品 南星末、五分。冰片、一字。

制法及用法 研和。以中指蘸藥末。揩齒二三十度。其口自開。每用五分至一字。端午日合尤佳。

【苕蒲散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鼻內壅塞。不得喘息。

藥品 石苕蒲、皂角、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。綿裹塞鼻中。仰臥少時。

【硫黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治酒齶鼻。

藥品 生硫黃、輕粉、各一錢。杏仁(去皮)、二十七個。

制法及用法 研爲細末。臨臥時唾津調塗。早晨即洗去。

【鈎藤散】

發明 見傅仁宇眼科審視瑤函。

功用 治視定反動。

藥品 鈎藤、陳皮、麥門冬、石膏、家菊花、人參、明天麻、防風、白茯苓、鹿茸、半夏(製)、甘草、各等分。

制法及用法 研爲粗末。每服四錢。加生薑三片。清水煎服。

【散血膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目赤腫。不能開。睛痛。熱淚如雨。

藥品 紫金皮、白芷、大黃、

薑黃、南星、大柏皮、赤小豆、寒水石。

制法及用法 研爲細末。生地黃汁調成膏。每用少許。敷眼四圍。

十三筆

【補肝丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目光昏暗。將成內障。

藥品 羌蔚子、青箱子、枸杞子、五味子、決明子、杏仁、茯苓(去皮)、各一兩。乾地黃、三兩。菟絲子、二兩。淮山藥、車前子、地骨皮(焙)、柏子仁、大黃、黃芩(去黑心)、黃連(去鬚)、人參、細辛、防風(去叉)、甘草(炙)、各一兩五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。食後米飲送下。

【補肝丸】

發明 見傅仁字眼科審視瑤函。

功用 治瑪瑙障。

藥品 蒼朮(米泔水製)、熟地黃(焙乾)、蟬退、車前子、川芎、當歸身、連翹、夜明砂、羌活、龍膽草(酒洗)、菊花、各等分。

制法及用法 共研細末。米泔水養豬肝搗爛。入末爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。薄荷湯送下。

【補肝散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治目失明。

藥品 青羊肝、一具(去膜、薄切、以火燒新瓦上炙乾)。決明子、一錢五分(一作五合)。藜香、一合(熬令香)。

制法及用法 研爲末。每服方寸匕。食後粥飲調下。一日二次。稍加至三匕。不過一二劑即愈。能久服一歲。可夜證細書。

【補肝散】

發明 見陳履新簡易方。

功用 治肝虛目疼。冷淚不止。羞明怕日。

藥品 夏枯草、五錢。香附子、一兩。

制法及用法 研爲末。每服一錢。不拘時臘茶調下。

【補肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治三十年失明。

藥品 蒺藜子(七月七日收、陰乾)。

制法及用法 搗爲末。每服方寸匕。食後清水調下。

【補肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼痛如鍼刺。外障。

藥品 人參、茯苓、芎藭、五味子、藟本、各一兩。細辛、羌活、各一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。空腹時米飲調下。

【補肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝風內障。不痛不癢。眼中生花。或見五色。或視物成二形。

藥品 羚羊角、防風、各三兩。人參、茯苓、各二兩。細辛、玄參、車前子、黃芩(炒)、羌活、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。或一錢五分。食後來飲調下。煎服枯澀。加夏枯草。

【補肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝風內障。

藥品 熟地黃、白茯苓、白菊花、細辛、甘草、各七分。白芍藥、一錢。柏子仁、防風、各五分。北柴胡、一錢五分。

制法及用法 清水煎。食後服。

【補腎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎虛。眼目無光。目睛內障。

藥品 巴戟肉、山藥、覆故紙(鹽酒炒)、牡丹皮、小茴香(鹽水炒)、各五錢。肉蓯蓉(酒浸、去腐、切焙)、枸杞子、各一兩。青鹽、二錢五分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。至五七十丸。空腹時鹽湯或溫酒送下。

【補腎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治黑翳如珠外障。

藥品 人參、茯苓、細辛、五味子、肉桂、桔梗、各一兩。乾山藥、柏子仁、各二兩五錢。乾地黃、一兩五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十丸。空腹時茶清送下。

【補腎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎虛耳聾。

藥品 巴戟(去心)、乾薑(炮)、芍藥、山藥、桂心、遠志(去心)、細辛、菟絲子(酒製)、澤瀉、石斛、黃耆、乾地黃、當歸、蛇床子、牡丹皮、肉蓯蓉(酒浸)、人參、附子(炮)、甘草、各二兩。石菖蒲、一兩。茯苓、五錢。防風、一兩五錢。羊腎、二枚。

制法及用法 共研細末。以

羊腎研爛細。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時鹽酒送下。

【補腎丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎虛。眼目昏暗。瞳人不明。漸成內障。

藥品 磁石(煨、醋淬七次、水飛過)、菟絲子(酒蒸二次)、各二兩。五味子、枸杞子、川石斛(去根)、熟地黃(酒蒸、焙)、覆盆子(酒浸)、楮實子、從蓉(酒浸、焙)、車前子(酒蒸)、各一兩。沈香(另研)、青鹽(另研)、各二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。空腹時鹽湯送下。

【補腎丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治黑翳。

藥品 熟地黃、枸杞子、山茱萸、山藥、牡丹皮、補骨脂、核桃肉。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時茶清送下。

【照水丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治日生翳膜。

藥品 海螵蛸、一錢。硃砂、

五分。片腦、五燈。黃蠟、八分。

制法及用法 研爲末。先熔蠟搗微冷。入末和爲丸。如麻子大。帶扁些。每用一丸。臨臥時貼眼中翳膜上。次日照水自落。

【照水丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治日生翳障。侵及瞳人。及一切目疾。

藥品 龍腦、滑石、丹砂(通明者)、烏賊魚骨(去甲)、各一錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。先用黃蠟、一塊(如阜子大)。於新白瓷盞內。慢火熔。以紗帛濾在淨盞內。再熔化。將前藥末同拌和。捏作餅子。如綠豆大。用薄絹或紗袋盛之。以硃砂、五錢。放淨碗內。上置交橫竹片。鋪藥於上。熏之。勿令透氣。掘一地坑。放藥碗在內。蓋好。後以黃土蓋之。七日取出。貯淨瓷瓶中。去硃砂不用。每用一餅。臨臥時貼在眼眥。即睡至曉。用水一碗。煎之。其藥自落水中。淨浴目患。却用絹帛裹起。安潔淨處。臨臥依前再使。每餅可用半月。候藥力慢時。方易一餅。如兩目有疾。即用兩餅。

【養肝散】

發明 見縮天益衛生寶鑑。

功用 治雀目羞明。小兒宿眼翳膜。

藥品 夜明砂、青蛤粉、穀精草、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。五七歲以上二錢。豬肝一大片。批剝。摻藥在內攪勻。麻綿纏定。以米泔半碗。煮肝熟。取出肝。湯傾碗內。煎眼。分肝作三服。嚼訖。却用熱肝湯下。一日三服。不拘時候。大人雀目。空腹時服。至夜便見物。如急多時。一日服二次。

【煮肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內外障翳眼。

藥品 夜明砂末、二錢。

制法及用法 用豬肝二兩。批開。摻夜明砂末在肝內。麻綿纏定。清水一盞。煮令肝轉白色。取出爛嚼。用煮肝湯送下。食後服。

【煮肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼生黑花。漸生內障。及翳睛流淚。風毒攻眼。腫痛難療。短視倒睫。雀目。

藥品 羌活、獨活(均去蘆)、青葙子、甘菊花、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每

服三錢匕。羊子肝一葉(剉細)。淡竹葉數片。同裹如糝子。另用鍋黑豆四十九粒。米泔一碗。銀石器內。同煮至黑豆爛。泔乾爲度。取肝細嚼。溫酒送下。又將豆食盡。空腹日午夜臥服。

【當歸散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治口舌生瘡。牙根蟲發。大便乾結。

藥品 當歸、赤芍藥、各一錢。川芎、五分。大黃、三錢。生甘草、五分。

制法及用法 爲散。加生薑一片。清水煎服。

【當歸飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目淚不止。

藥品 當歸身、大黃、柴胡、人參、黃芩、白芍藥、各一兩。滑石、五錢。

制法及用法 剉細。每服三錢至五錢。清水一盞。加生薑三片。煎至七分。去滓溫服。

【當歸龍薈丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治左耳聾。

藥品 當歸、龍膽草、麝香、甘草、甘菊花、黃芩、荆芥、生地黃、赤芍藥。

制法及用法 共研細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服三錢。熱湯送下。有痰加半夏(薑製)。

【葱涎膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳聾耳聾。

藥品 葱汁、三合。細辛(去苗)、附子(炮、去皮)、各二錢五分。

制法及用法 細辛、附子研爲末。葱汁調令稀。灌入耳中。

【滋陰地黃丸】

發明 見李東垣方。

功用 治血弱陰虛。不能養心。心火妄盛。肝目自實。瞳子散大。咳嗽眩暈。

藥品 熟地黃、一兩(一作五錢)。柴胡、八錢(去苗、一作三錢)。當歸身(酒洗)、黃芩(酒炒、一作三錢、一作六錢)、各五錢。生地黃、七錢五分(酒浸、焙、一作一兩五錢)。五味子、天門冬(去心焙)、地骨皮(一作二錢)、黃連(酒炒、一作一兩)、各三錢。人參(一作一兩)、枳殼(炒、一作三錢)、甘草(炙、一作三錢)、各二錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。食後茶湯送下。一日二三次。大忌辛辣寒冷等物。

參考 此方主治肝緩。緩則治其本也。故以黃芩、黃連、苦寒。除邪氣之盛爲君。當歸身辛溫。生熟地黃苦甘寒。養血涼血爲臣。五味子酸寒。體輕浮上。收肝水之散大。人參、甘草、地骨皮、天門冬、枳殼、苦甘寒。瀉熱補氣爲佐。柴胡引用爲使。亡血過多之病而有熱者。亦甚相宜。

十四筆

【遠志丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治近視眼。

藥品 遠志、麥門冬、石菖蒲、甘菊花、各五錢。枸杞子、熟地黃、各四錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三四錢。熱湯送下。

【遠志丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 清心。明目。益肝。退翳。治內外障。

藥品 遠志(水浸去心曬乾、薑汁蘸焙)、車前子、白蔘(炒、去麩)、細辛、各七錢五分。全蠍、五枚。蟬殼、一兩(洗焙)。熟地黃(洗焙)、茯神(去木)、川芎、人參、羌活、獨活、各三錢。

珀、生地黄、蔓荊子、各五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時米飲送下。臨臥時薑蒲湯送下。

【綠袍散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治口瘡久不瘥者。

藥品 黃藥、四兩。甘草(炙)、二兩。青黛、一兩。

制法及用法 先以黃藥、甘草研爲末。再入青黛碾勻。每用少許。乾貼患處。

【綠袍散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治重舌。口瘡腐爛。咽喉不利。

藥品 荊芥穗、薄荷、各五錢。青黛、玄明粉、硼砂、各二錢五分。甘草、百藥煎、各三錢。

制法及用法 剉焙爲末。先以玄明粉、硼砂在乳鉢內細杵。再與前藥末杵勻。每用一字至五分。乾點舌上。令其自化。或新汲水入蜜調點。

【綠雲散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治舌瘡。

藥品 銅綠、鉛白霜、各等分。

制法及用法 研爲極細末。每用少許。搽於舌上。

【熊膽丸】

發明 見傅仁宇眼科龍視瑤函。

功用 治暴盲生翳。

藥品 熊膽、川黃連、密蒙花、羌活、各一兩五錢。蛇退(炙)、地骨皮、仙嬌脾、木賊(去節)、龍腦草、各一兩。旋覆花、甘菊花、瞿麥、各五錢。蕪仁(去殼皮、取霜)、三錢。麒麟竭、蔓菁子(并水淘淨)、各二錢。

制法及用法 除熊膽外。餘研爲細末。用羯羊肝一具。煮其半。焙乾。雜於藥中。取其生者半。去膜搗爛。入上藥作爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後米飲送下。

【熊膽膏】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治一切老翳。

藥品 煨甘石(煨過、水飛、爲丸如彈子大、每淨一兩、分作十丸、用川黃連三錢、煎去滓、燒淨之、汁盡爲度)、硃砂(水飛淨)、琥珀、各五分。珊瑚(水飛淨)、三錢。珊瑚(水飛淨)、珍珠(煨飛淨)、各三分。冰片、麝香、各二分。

制法及用法 和勻。瓷罐收貯。每用少許。點大眇上。一日二三次。

【蓖麻子丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治久聾。

藥品 龍腦子仁、二十一箇(去油)。皂角、半錠(煨取肉、一作五分)、生地龍、一條(一作大者二條)。全蠍、二箇(焙)。遠志(去心)、磁石(火煨、醋淬七次、研細水飛)、乳香、各二錢。一方有麝香、少許。

制法及用法 共研細末。黃蠟熔和爲丸。每用一丸。塞入耳中。

【龍麻子膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治酒齷鼻。及肺風。面赤生瘡。

藥品 龍麻子(去殼、研)、輕粉、瀝石(研)、硫黃(研)、黃蠟、各二錢。麻油、一兩。

制法及用法 熬成膏。瓷器盛之。每用少許。塗於患處。

【槐子丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝虛風邪上攻。目光偏視。

藥品 槐子仁、二兩。酸棗仁(微炒)、覆盆子、柏子仁、車前子、蔓荊子、羌蔚子、牛蒡子、蒺藜子、各一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服三十丸。空腹時熱湯送下。

【碧玉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼睛腫脹。紅赤昏暗。羞明怕日。隱澀難開。疼痛風癢。邪重鼻寒。腦鼻痠疼。翳膜勞肉。眵淚稠黏。拳毛倒睫。一切眼證。

藥品 珊瑚花、磁石、羌活、川芎、細辛、防風、荆芥、蔓荊子、白芷、各一錢。風化硝、石膏(煨)、青黛、黃連、各三錢。鵝不食草、三兩。

制法及用法 研爲細末。每用少許。吹入鼻中。一日二次。

【蒲黃散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治舌血。

藥品 蒲黃(炒)、海螵蛸、各一錢。

制法及用法 爲末搽之。

【蒼朮丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 明目補下元。治內外障。

藥品 金州蒼朮、一斤(揀大塊、刮令淨、分作四分、一分用無灰好酒浸三日、一分用米醋浸三日、一分用童便浸三日、一日二換、一分用米泔浸五日、一日一換)。

制法及用法 日數浸足。便

漉出。不必淘洗。切作片。或曬或焙乾。入黑芝麻三四兩。同入釜上。炒令甘香。搗爲細末。以前浸藥餘酒煮糊爲丸。如梧桐子大。若酒少。則入醋少許和丸。每服四五十丸。熱湯或溫酒送下。

【蒼耳散】

發明 驗方。

功用 治鼻淵。鼻流濁涕。頭痛昏眩。

藥品 蒼耳子、二錢五分。辛夷、五錢。白芷、一兩。薄荷葉、五分。

制法及用法 共爲細粉。食後每服一錢。蔥茶調服。或以新鮮葱白搗汁。用藥棉蘸藥粉塞鼻中。兩點鐘一換。

【夢靈丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內外障眼。

藥品 威靈仙(蜜炙)、防風、枸杞子、蕤仁(去殼)、蒼朮(米泔浸)、石決明(水一升煮乾)、蚌粉(飛過)、穀精草、各一兩。菊花、二兩。

制法及用法 研爲細末。用雄豬肝一具。竹刀切去筋膜。和藥搗千餘杵。入麴少許。共搗爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後鹽湯送下。忌食煎炒酢豆腐等毒物。

十五筆

【撥雲散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治眼發溼熱不退。翳膜遮睛。昏暗羞明。隱澀難開。

藥品 川芎、草龍膽、楮實、薄荷、羌活、荆芥穗、石決明、草決明、蒼朮、大黃、甘草、木賊、密蒙花、連翹、川椒、甘菊花、桔梗、石膏、地骨皮、白芷、白蒺藜、檳榔、各一兩。石燕、一對。

制法及用法 搗羅爲細末。每服三錢。食後溫茶清一盞調下。一日三次。忌食魚鳥諸肉。

【撥雲散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒。退翳障。治目赤爛弦。

藥品 羌活、防風、川芎、白蒺藜、荆芥、蟬蛻、甘菊花、各二兩。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食後桑白皮煎湯調下。

【撥雲散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒上攻。眼目昏暗。翳目遮障。羞明熱淚。隱澀難開。睛癢赤痛。眼眶紅爛。癢肉侵睛。

藥品 羌活、防風、柴胡、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每用二錢。清水一盞半。煎至七分。食後茶清或薄荷湯、菊花湯調下。忌食醃藏魚蟹鹽漿溼麵炙煨發風毒等物。

【撥雲散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘瘡入目及生翳膜。

藥品 桑螵蛸、一兩(炙焦)。

制法及用法 研爲細末。入麝香少許。每服二錢。米泔調下。

【撥雲散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒瘡疹後。目中生翳膜。

藥品 兔糞、一斤(如芒蘆花色者佳)。蟬退、木通、白蒺藜、各二兩。甘草、一兩。

制法及用法 研爲散。清水煎服。或研爲細末。煉蜜爲丸。如梧櫚子大。每服八十丸。食後熱湯送下。一日三次。以翳退盡爲度。

【撥雲退翳丸】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治翳睛。

藥品 蔓荊子、木賊(去節)、密蒙花、各二兩。川芎、白蒺藜(炒去刺)、當歸、各一兩五錢。菊花、五錢。荆芥穗、地骨皮、

各一兩。川椒皮、七錢(一作五錢)。天花粉、二錢。薄荷葉、楮桃仁、黃連(酒洗)、蟬蛻、各五錢。蛇蛻(酥炙)、甘草(炙)、各三錢。一方無地骨皮、天花粉。一方有羌活、一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜成劑。每兩作八丸。每服一丸。食後臨臥細嚼。茶清送下。

參考 此方爲奇經客邪而作。難經第二十八難曰。陽蹻脈者。起於跟中。循外踝上行。入風池。風池者。腦戶也。故以川芎治風入腦。以菊花治四肢遊風。一療其上。一平其下。爲君。蔓荊子、除手太陽之邪。蟬蛻、蛇蛻、木賊草、密蒙花、除翳。爲臣。薄荷葉、荆芥穗、白蒺藜、諸瘰癧風者。清其上。楮桃仁、地骨皮、諸通小便者。利其下。爲佐。黃連、除胃中熱。天花粉、除腸中熱。甘草、協和百藥。川椒皮、利五臟明目。諸所病處血亦病。故復以當歸和血爲使也。

【摩風膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治睛突眼痛。

藥品 黃連、細辛、當歸、防風、杏仁(去皮尖、爲霜)、松脂、各五錢。白芷、黃蠟、各一兩。麻油、四兩。

制法及用法 先將蠟油熔化。前藥研爲細末。慢火熬成膏。貼太陽穴。

【摩頂膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝腎虛氣上攻。眼生黑花。或如水淚。

藥品 空青、青鹽、各五錢。魂子、木香、附子、各一兩。牛酥、二兩。鵝脂、四兩。旱蓮草(搗取自然汁)、一升。龍腦、五分。丹砂、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。先以旱蓮草汁、牛酥、鵝脂、入銀器中。熬三五沸。下諸藥末。煎減一半即止。盛瓷器中。臨臥時用舊鉢鐵一片(重二三兩)。蘸藥於頂上摩二三十遍。令人髮竅中。次服決明丸。忌鐵器。

【摩頂膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼翳見花。黃黑紅白不定。

藥品 附子(炮、去皮膽)、木香、各一兩。硃砂、二錢五分。龍腦、五分。青鹽、一兩五錢。牛酥、二兩。鵝脂、四兩。

制法及用法 將前藥研爲末。同酥脂以慢火熬成膏。每用少許。不拘時頂上摩之。

【磁石丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治病後元氣虛弱。目無翳膜。視物昏暗。欲成內障。

藥品 磁石、二兩(煨、醋淬七次、杵碎細研、水飛過)。肉蓯蓉、一兩(酒浸一宿、刮去皺皮、炙令至乾)。菟絲子(酒浸五日、曝乾、另研爲末)、三兩。補骨脂(微炒)、巴戟(去心)、石斛(去根)、遠志(去心)、熟地黃、各一兩。木香、五味子、甘草(炙赤)、桂心、各五錢。一方有茯神。無遠志、石斛。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前溫酒送下。

【磁石丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝腎虛。蟹眼睛疼。

藥品 磁石、黃耆、青鹽、人參、紫巴戟、蓯蓉、附子、木香、沉香、防風、牛乳、牛膝、覆盆子、桂心、乾薑、遠志、熟地黃、茯苓、蒼朮、陳皮、白朮、川芎、檳榔、大腹皮、白芷、青皮、烏藥、獨活、各等分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。溫鹽湯送下。

【磁硃丸】

發明 見千金方。

功用 治目中神水寬大漸

故。昏如霧露中行。漸覩空中有黑花。或覩物成二體。腎膜內障外障。神水淡綠色、淡白色。及耳鳴耳聾癩癩諸症。

藥品 磁石、辰砂、神麴。

制法及用法 先以磁石置巨火中煅。醋淬七次。研細水飛。澄定曬乾。取淨二兩。辰砂亦研細水飛。曬乾。取淨一兩。用生神麴末。與前二味和勻。更以神麴一兩。水和作餅。煮浮爲度。搜入前藥。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。加至三十丸。空腹時米湯送下。

參考 此爲治內傷目疾之第一方。五臟六腑之精。皆上注於目。神水發於腎。神光發於心。故二臟關係尤重。心腎有虧。致神水乾涸。神光短少。則有昏眊內障諸症。方中以磁石之辛鹹寒澀爲君。收斂失之神。吸肺金之氣。以歸之於腎。辰砂之甘寒重鎮爲臣。收浮遊之火。壯清明之神。以歸之於心。神麴之辛甘微溫爲佐。以消食化穀健脾胃。俾水穀之精華。可以速化而上注於目。再用煉蜜和丸之甘緩。以爲之使。心腎之精華既聚。脾胃之運化復強。則真陰充沛。而目疾自除矣。

【磁石六味丸】

功用 治陰虧火旺。頭目昏花。瞻神散大。耳鳴耳聾。

藥品 即六味地黃丸加磁石。一稱磁石地黃丸。

【養肝丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治肝血不足。眼目昏花。或生膠淚。

藥品 當歸(酒洗)、車前子(酒蒸、焙)、白芍藥、防風(去蘆)、蕤仁(另研)、熟地黃(酒蒸、焙)、川芎、枳實、各等分。一方無川芎、枳實。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。不拘時熱湯送下。

【菴蓉丸】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治腎虛耳鳴。或風邪入於經絡。耳內虛鳴。

藥品 肉菴蓉(酒浸、焙)、山茱萸肉、石龍芮、石菖蒲、菟絲子(酒浸蒸、焙)、羌活、鹿茸(去毛、酒蒸焙)、石斛(去根)、磁石(火煅、醋淬、水飛)、附子(炮)、各一兩。全蠍(去毒)、七個。麝香、半字(旋入)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。空腹時鹽酒或薑湯送下。

【蔓荊子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內熱。耳出膿水。

藥品 蔓荊子、赤芍藥、生地黃、桑白皮、甘菊花、赤茯苓、升麻、麥門冬(去心)、木通、前胡、甘草(炙)、各一錢。

制法及用法 加生薑三片。紅棗二枚。清水二盞。煎至一盞。食前服。

【駐景丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝腎虧虛。眼昏生翳。

藥品 熟地黃、車前子、各三兩。菟絲子(酒煮)、五兩。一方加枸杞子、一兩五錢。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。食前白茯苓湯或石菖蒲湯送下。

十六筆

【蕤仁丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治雲霧移睛。眼見黑花飛蠅。澀痛昏暗。漸變青盲。

藥品 蕤仁(去皮殼)、地膚子、細辛(去苗)、人參、地骨皮(去土)、石決明(洗淨、另搗羅)、白茯苓(去皮)、白朮(炒)、各二兩(一作各一兩)。熟地黃(焙)、枳實、各三兩。空青(另研)、防風(去叉)、各一兩五錢

(一作各一兩)。石膽(另研如粉)、五錢。鯢魚膽、五枚。青羊膽、一枚。

制法及用法 研爲細末。令勻。以膽汁同煉蜜搜和爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。食後來飲送下。

【蕤仁丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治內外障眼。

藥品 蕤仁、三兩。車前子、黃連(去鬚)、各二兩。青蘘子(湯浸)、黃芩(去黑心)、秦艽(云苗)、生地黃、羚羊角末、防風(去叉)、各一兩五錢。人參、天門冬(焙、去心)、升麻、苦參(炒)、地膚子、菊花、玄參(炒)、羌活(去蘆)、決明子(炒)、地骨皮、甘草(炙)、丹砂、各一兩二錢五分。麥門冬(去心、焙)、七錢五分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。食後百合煎湯送下。但有瞳人。不拘內外翳。並可治之。

【蕤仁膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風熱眼。赤絲亂脈。癢痛無定。

藥品 蕤仁(去殼皮心膜油、研極細、取霜淨)、五錢。酥、一

粟子大。

制法及用法 和勻。研攤碗內。用艾一小團。燒煙出。以碗覆於煙上。熏待艾煙盡。即止。再研令勻（一作用秦皮濃煎汁調和、隔紙瓦上焙熱、有焦者去之、塗淨碗內、以艾一錢、分作三團、每團中置蜀椒一粒、燒煙起時、將碗覆煙上、三角墊起熏之、煙盡曬乾、再研）。入硃砂、麝香、各五分。瓷器收貯。每用如麻子大。點兩眦頭。一日二次。如點老翳。加硼砂少許。

【龍骨散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治膿耳。

藥品 龍骨、枯礬、麻脂坯、各一錢。麝香、少許。

制法及用法 研爲細末。以綿裹杖子拭去耳中膿。再吹一字入耳中。一日二次。加海螵蛸一錢。尤妙。

【龍腦散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒鼻翳。

藥品 龍腦、五分（細研）。瓜蒂、十四枚。赤小豆、三十粒。黃連、三大莖（去髮）。

制法及用法 搗細羅爲散。入龍腦研令勻。每用如綠豆大。臨臥時吹入鼻中。清水出

即效。

【龍腦膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治翳膜遮睛。攀睛瘀血。連眶赤爛。視物昏暗。隱澀多淚。迎風難開。

藥品 龍膽草（不拘多少、洗淨日乾不見火、研碎）、淨末一錢。爐甘石（不拘多少、揀粉紅梅花色者佳、用坩堝子盛煅七次、入黃連水淬七次、黃連不拘多少、搥碎水浸一宿、去滓、將煅紅爐甘石淬七次、同黃連水細研飛過、候澄下、去上面水、曝乾、再用乳鉢研極細、羅過用）、淨末三錢。桑柴皮（研末羅過）、淨末二錢。黃丹（羅過）、五分。

制法及用法 白蜜四兩。一處同入黑瓷器內。文武火慢熬。以竹篦子攪如漆色。不黏手爲度（勿犯生水、仍不用鐵器熬藥）。藥成。依舊以瓷器盛貯。每用如阜子大。新冷水半盞化開。先三日不用。每日洗數次無妨。藥盡須用紙蓋。不可犯塵灰。截赤眼極效。

【龍腦膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治聾耳。

藥品 龍腦、一錢二分（研）。椒目、五錢（搗末）。杏仁、二錢

五分(去皮)。

制法及用法 搗研合勻。每用如棗核大。綿裹塞耳中。一日二易。

【龍齒散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎虛耳鳴。

藥品 龍齒、人參、白茯苓、麥門冬(去心)、遠志(去心)、各五錢。丹砂、鐵粉、龍腦、牛黃、麝香、各二錢五分(俱另研)。

制法及用法 研爲細末。令勻。每服半錢匕。食後沸湯調下。一日三次。

【龍膽丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼胞黏睛。赤爛成瘡。

藥品 龍膽草、苦參、牛蒡子(炒)、各等分。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。食後米泔送下。

【龍膽散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治睛脹。

藥品 龍膽草、梔子、各二錢。茵陳、防風、荊芥穗、川芎、玄參、甘菊、楮實、甘草、各一錢。

制法及用法 研爲末。每服

二錢。食後茶清調下。

【龍膽飲】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝經實熱。目赤腫痛。

藥品 龍膽草、梔子仁、各二錢。防風、山茵陳、川芎、玄參、荊芥、甘菊花、楮實、甘草、各一錢。

制法及用法 研爲細末。每服一錢五分。食後清茶調下。

【龍膽飲】

發明 見張路玉張氏醫道。

功用 治肝經溼熱。目赤腫痛。

藥品 龍膽草、淡竹葉、各八分。黃芩、犀角、木通、車前、炭連、黑參、各一錢。梔子(炒黑)、大黃、芒硝、各一錢五分。黃蘗(酒炒黑)、五分。

制法及用法 清水煎。食後分二次熱服。

【豬苓散】

發明 見傅仁宇眼科聖驗瑤函。

功用 治雲霧移睛。

藥品 豬苓、木通、藜蘆、蒼朮、(泔水製)、黑狗脊、大黃(炮)、梔子仁、滑石(飛過)、各一兩。車前子(酒蒸)、五錢。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。食前青鹽湯調下。

【燒鹽散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治上唇瘻。

藥品 食鹽(火燒)、枯白礬、各等分。

制法及用法 研爲細末。筋頭蘸點患上。即消。

【澤瀉散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒肺積。鼻生贅贅。及鼻下赤爛。

藥品 川澤瀉、生川鬱金、甘草(炙)、梔子仁(炒)、各一分。

制法及用法 研爲末。嬰孩每服一字。二三歲五分。五七歲一錢。甘草湯調下。一日二次。外用青金散敷之。

十七筆

【濟陰丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治足三陰虧損。虛火上炎。致目睛散大。視物不清。或昏花澀緊。作痛畏明。或卒見非常之物。及陰虛虛燥。唇裂如繭等證。

藥品 五味子、麥門冬、當歸、熟地黃(自製、析膏)、肉蓯蓉、山茱萸(去核)、乾山藥、枸杞子、甘菊花、巴戟肉、各等分。一方無山茱萸。

制法及用法 研爲末。煉蜜

爲丸。如梧桐子大。每服七八十丸。空腹食前熱湯送下。

【還睛丸】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治風毒上攻。眼目赤腫。怕日羞明。多眵眵淚。隱澀難開。眶癢赤痛。臉背赤爛。癢肉侵睛。或暴赤眼。睛痛難忍。及偏正頭痛。一切頭風。頭目眩暈。

藥品 生白朮、菟絲子(酒浸、另研)、青箱子(去土)、防風(去蘆)、甘草(炙)、密蒙花、羌活(去苗)、白蒺藜(炒去尖)、木賊(去節)、各等分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。細嚼空腹食前熱湯送下。一日三次。

【還睛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼目昏翳。

藥品 蟬蛻、蒼朮、熟地黃、川芎、蒺藜(炒)、各一兩。羌活、防風、羌活子、木賊、白菊花、荆芥、蔓荊子、杏仁、菟絲子(酒漬、焙)、蛇皮(酒浸、洗淨焙)、石決明(煨)、各五錢。

制法及用法 共研末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。細嚼薄茶送下。

【還睛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目疾。

藥品 川芎、白蒺藜、木賊、白朮、羌活、菟絲子、熟地黃、甘草、各等分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。空腹時熱湯嚥下。

【還睛丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治目疾。

藥品 川芎、地黃、白朮、茯苓、石決明、杏仁、川芎、菟絲子、各三兩。當歸、防風、荆芥、薊刺子、各五錢。

制法及用法 研爲末。豬膽汁和丸。如梧桐子大。每服三十丸。麥門冬湯送下。

【還睛丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治目珠突高。

藥品 五味子、細辛、各五錢。茯苓、山藥、各一兩。人參、車前子、防風、遠志、羌活子、各二兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。空腹時茶清送下。

【還睛丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治高風障。

藥品 石決明(水飛)、覆盆子、羌活子、各二兩。槐實、人參、細辛、防風、柏子仁、茯苓、甘菊、川芎、各一兩。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。熱湯送下。

【還睛丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

藥品 人參、羌活子、知母、桔梗、熟地黃、車前子、黃芩、細辛、玄參、五味子。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。熱湯送下。

十八筆

【瀉肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝熱目赤腫痛。一切裏證。

藥品 梔子仁、荆芥、大黃、甘草、各等分。

制法及用法 爲散。每服二錢至四五錢。清水煎。食後熱服。

參考 此方治肝熱。不用赤芍、膽草、當歸。反用梔子清肝。則血熱疼腫。何能便退。詳此四味。治白睛赤痛則可。

治風輪赤痛則不可。

【瀉肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治天行後赤眼外障。

藥品 知母、黃芩、桔梗、各一兩五錢。羌活子、大黃、玄參、羌活、細辛、各一兩。

制法及用法 剉散。每服五錢。清水一盞半。煎至五分。去滓。食後溫服。

【鎮肝丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝經風熱。上攻眼目。昏暗疼痛。隱澀難開。多眵多淚。怕日羞明。時發腫赤。或生翳障。

藥品 遠志(去心)、地膚子、羌活子、蔓荊子、白茯苓(去皮)、防風(去蘆)、決明子、人參、各一兩。山藥、苘箱子、柴胡(去苗)、柏子仁(炒)、甘草(炙)、地骨皮、玄參、車前子、菊花、各五錢。細辛(去苗)、二錢五分。

制法及用法 研爲細末。蜜小黃麵糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後米湯送下。一日三次。

【鎮肝丸】

發明 醫宗金鑑。

功用 治暴赤翳。

藥品 礞石、一兩五錢。石

決明、二兩(煨)。細辛、五味子、各三錢。山藥(炒)、人參、茯苓、車前子、羌活、各一兩。

制法及用法 輕煨細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。空腹時茶清送下。

【蟬花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝經風熱。上攻眼目。翳遮膜睛。赤腫疼痛。視物不明。隱澀難開。多眵多淚。及內外各障。

藥品 蟬蛻(洗淨、去土)、羌活、甘菊花(去梗)、穀精草(洗、去土)、白蒺藜(炒)、防風(不見火)、密蒙花(去枝)、草決明(炒)、黃芩(去土、一作蒼朮)、川芎(不見火)、蔓荊子、桐子(去皮)、荊芥穗、木賊草(去節、童便浸曬)、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。茶清或荊芥湯入茶少許調下。食後臨臥皆可服。

【蟬殼散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼目風腫。及生翳膜。時疾後餘毒上攻眼目等疾。

藥品 蟬殼(去毛翹)、蛇骨皮、黃連(去鹽)、牡蠣皮(去木)、白朮、蒼朮(米泔浸、切焙)、菊花、各一兩。龍膽草、正

錢。甜瓜子、五合。

制法及用法 研爲細末。每服一錢。荊芥煎湯調下。食後臨臥各一服。忌食熱麵炒豆醋醬等物。

【蟬殼散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒鼻痔癢。

藥品 蟬殼(微炒)、青黛(細研)、蛇蛻皮(煨灰)、麝香(細研)、滑石、各等分。

制法及用法 搗細羅爲散。研令勻。每用如綠豆大。吹入鼻中。一日三次。疳蟲盡出。

【蟬花無比散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治一切風眼氣眼。昏暗不明。瞼生風粟。或痛或癢。漸生翳膜。及久患偏正頭風。牽搐兩眼。漸漸細小。速睚赤爛。小兒瘡疹入眼。白膜遮睛。赤澀隱痛。常服驅風。退翳。明目。

藥品 蟬蛻(去頭足翅)、二兩。蛇蛻(酥炙)、一兩。羌活、當歸(洗焙)、石決明(用鹽入東流水煮一伏時、漉出、搗如粉)、川芎、各三兩。防風(去叉)、茯苓(去皮)、甘草(炙)、各四兩。赤芍藥、十三兩。蒺藜(炒、去刺)、八兩。蒼朮(童便浸、去

皮、切片、麻油拌炒)、十五兩。一方無蒺藜。

制法及用法 研爲末。每服三錢。食後米泔或茶清調下。忌食發風毒等物。

參考 此方用蟬蛻、蛇蛻。取其重蛻之義以除翳爲君。川芎、防風、羌活之青利頭目爲臣。甘草、蒼朮、赤芍、當歸補脾胃之氣血爲佐。石決明之鹹降、白茯苓之淡滲爲使也。

【蟬花無比散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治兩眼喎偏。

藥品 蒼朮(童便浸一夜、切蠟)、白芍藥、各一兩。白蒺藜、八錢。茯苓、四錢。荊芥、細辛、蛇退(阜角水浸、焙)、各一錢。

制法及用法 共研末。每服二錢。茶清調下。

十九筆

【蠟附散】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治冷翳膜。

藥品 全蠍、附子尖、薑黃、青黛(一作細辛)、各二錢五分。薄荷、一兩(一作二錢五分)。鵝不食草、五錢。

制法及用法 研爲細末。口

含冷水。每用少許。噴入鼻中。

二十筆

【蘆薈丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治黑水凝翳內障。不痛不癢。頭旋眼震。

藥品 蘆薈、甘草、各二錢五分。人參、牛膽、各五錢。柏子仁、細辛、各一兩。羚羊角、二兩(蜜炙)。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十丸。空腹時茶清送下。

【蘆薈散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治口舌生瘡。

藥品 蘆薈、青蒿、蟾酥、羊蹄花、各五錢。白礬(煨)、麝香、牛黃、各一錢二分。乾蝟牛、三枚。瓜蒂、二十枚。丁香、細辛(去苗)、丹砂、各二錢五分。馬牙硝、七錢五分。熊膽、一錢。

制法及用法 研爲細末。令勻。先以頭髮裹指。於溫水內蘸指之。輾帛搥去膿水。取藥末少許。搽於瘡上。如輕者。可去蟾酥、蘆薈。

【爐甘石散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 明目去翳。退赤除風

止痛。祛溼熱。治一切外障。白睛傷破。攣弦風眼。

藥品 爐甘石、一錢。片腦、一分。黃連、二分五釐。

制法及用法 甘石、二兩。以黃蘗、一兩。黃連、五錢。煎濃汁。濾淨。投入甘石內。曬乾。以汁投曬盡爲度。依方秤合和勻。研爲細末。乳汁和調勻。鴨毛刷爛處。

【爐甘石散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治爛弦風眼。

藥品 爐甘石、三兩。

制法及用法 銀罐煨飛。丸如彈子。多刺以孔。先以童便一盞。煨淬七次。次以黃連三錢。煎濃汁。煨淬七次。後以芽茶一兩。濃煎。煨淬七次。又併餘汁合一處。再煨淬三次。安放也上一宿。出火氣。細研。加入冰片、麝香各少許。點於患處。煨時選大炭鑿一孔。以安爐甘石。一方不用童便、黃連、芽茶。用車前草一斤。搗取自然汁。淬數十次。汁盡爲度。細研。瓷罐收貯。臨用加冰片、少許。

【礬石散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳卒聾出膿。及耳聾有蟲。

藥品 枯礬(細研)、不拘多少。

制法及用法 以葦筒吹少許入耳中。一日三四度。或以綿法蘸後入塞耳中。或先以乾鹽摻之。次入礬末。或先以紙團候去耳中汁。次以礬末摻耳中。再以食鹽末摻其上。食久乃起。不過再度。永塞。

二十一筆

【麝香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治眼流冷淚不止。

藥品 麝香、蒼朮、各少許。香附子、川椒目、各等分。

制法及用法 研爲細末。令病者嚥水一口。將藥吹於鼻內。

【麝香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳內虛鳴。

藥品 麝香、五分。全蠍、十個。薄荷、十四葉(去麝香、全蠍、瓦上焙乾)。

制法及用法 研爲細末。滴水捏作錠子。塞入耳內。

【麝香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳疾。

藥品 麝香、少許。白礬、一錢(火煨)。五倍子、二錢。

制法及用法 研爲末。每用少許。紙捻子點入耳中。

【麝香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治耳疾。

藥品 麝香、一字。桑螵蛸、一個(炙)。

制法及用法 研爲末。令勻。每用半字摻耳。如有膿。先用綿杖子擦乾用之。

【蘭香散】

發明 見錢乙方。

功用 治瘰癧及鼻疔赤爛。

藥品 蘭香葉(煨炙)、二錢。銅青、五分。輕粉、二字(一作五分)。

制法及用法 研爲細末。和勻。貼於患處。乾者香油調敷。

二十四筆

【鼈甲丸】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治勞嗽及鼻流清涕。耳作蟬鳴。眼見黑花。一切虛證。

藥品 鼈甲、地骨皮、各三錢。五味子、二兩。

制法及用法 炙研末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每用三四十丸。空腹食前溫酒或鹽湯送下。婦人醋湯下。

二十五筆

【觀音丸】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治內外障失明。或欲結青光內障。或赤眼疼痛。

藥品 血竭、熊膽、各二錢。人參、蛇蛻(阜角水洗、新瓶焙)、各五錢。地骨皮(曬洗)、木賊(去節童便浸、焙)、蒼朮(童便浸二宿、曬)、鷹爪黃連(去蠶)、威靈仙、蔓荊子、茺蔚子、車前子、川芎、當歸、羌活、蟬蛻(洗蠶)、石決明(一半煨、一半生)、各一兩。蠶蛻紙、二十幅(炒焦)。

制法及用法 研爲細末。用羯羊肝、一具(去筋膜)。慢火煎。半生半熟。帶血性。和藥同搗。以粟米粉。用肝汁煮糊爲丸。如梧桐子大。每服七八十丸。食後溫米泔或石菖蒲湯送下。

咽喉類

一 筆

【一字散】

發明 見必用方。

功用 治喉閉氣塞。飲食不下。

藥品 雄黃(另研)、白礬、藜

蘆、各一錢。礞牙皂角、七個。蠶梢、七枚。

制法及用法 研爲末。每用一字。吹入鼻中。即時吐出頑涎而愈。

二 筆

【八仙散】

發明 見張紹棠咽喉秘集。

功用 治喉中破爛。

藥品 人中白、一兩。大黃、一兩二錢。石膏、五錢。玄參、一兩。黃芩、一兩四錢(酒炒)。玄明粉、七錢。麝香、三錢。瓜硝、七錢。輕粉、一錢(不可輕用)。

制法及用法 研爲末。煉蜜和錠。每重二錢。舌津化下。連連不斷。爛處自愈。

【八寶珍珠散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治喉中腐爛。聲音嘶啞。

藥品 孩兒茶、黃連末、貝母(去心另研)、青黛、各一錢五分。紅硃(燒灰存性)、官粉、黃蘗末、魚腦石(微煨)、琥珀末、各一錢。人中白(煨)、二錢。硼砂、八分。冰片、六分。西牛黃、珍珠(豆腐內煮半炷香時、取出研末)、各五分。麝香、三分。

制法及用法 研爲極細末。和合可研勻。以細管吹入喉內爛肉處。

【七寶散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治喉閉。經喉風。

藥品 礞石(直者)、十個。硼砂、雄黃、明礬、各一錢。全蠍、十個(去毒)。豬牙皂角、一枚(去皮弦)。膽礬、五分。

制法及用法 研爲細末。每用一字。吹入喉中即愈。

【十寶丹】

發明 見疫喉淺論。

功用 消痛。止痛。化毒。生肌。治疫喉已潰未潰。腫痛色黯。痘毒攻喉。疹痘後牙疳。梅毒咽爛。

藥品 西牛黃、貝母(去心)、馬勃、各三分。珍珠(入豆腐內煮、去油、另研)、六分。梅花冰片、五釐(潰爛者宜少用)、人指甲(瓦上煅焦、或以龍骨煅透代之)、硼砂、各四分。青魚膽(大者佳、陰乾收用、或以青果三錢、煨成炭代之)、人中白(煨)、琥珀(另研)、各五分。

制法及用法 共研細末。吹患處。

【二聖散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治痧症咽喉腫痛。

藥品 白礞石、二錢。苦參、三錢。

制法及用法 研爲細末。吹入患處。三四次即腫消痛止。

【人中白散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治重舌。喉蛾。喉腐。牙疔。舌根癰。

藥品 人中白、雞內金、掛金燈子、青黛、鹿角灰、蒲黃、薄荷、白芷、冰片、甘草。

制法及用法 共研爲末吹之。

三 筆

【小靈丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治疹後餘毒遏在咽喉。腫痛。嚥物不下。及一切餘毒。牙齦破爛。

藥品 硼砂、二錢。朴硝、三錢。辰砂、一錢五分。乳香、沒藥(均去油)、各三分。

制法及用法 研細爲末。吹敷俱可。

四 筆

【六神丸】

發明 見雷氏方。

功用 治時疫。喉毒。備喉。

丹痧。喉蛾。喉癰。雙單乳蛾。疔瘡。對口。癰疽。發背。腸癰。腹疔。乳癰。乳岩。一切無名腫毒。

藥品 犀黃、一錢五分。煨黃、一錢。陳粉、一錢五分。元寸香、一錢。冰片、一錢。麝香(燒酒化)、一錢。

制法及用法 研爲極細末。酒化麝香爲丸。如芥子大。百草霜爲衣。喉嚨。每服十丸。熱酒化開。徐徐嚥下。重者再進一服。

【木香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治咽喉中如有物噎塞。

藥品 木香、五錢。紫雪、射干、羚羊角屑、犀角屑、檳榔、各一兩。玄參、桑根白皮、升麻、各一兩五錢。

制法及用法 研爲末。每服二錢。清水一鍾。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【五香散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治咽喉腫痛。氣結不通。

藥品 木香、沈香、鷄舌香、蘇合香、各一兩。麝香、三分。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服二錢。清水一盞。

煎至五分。不拘時服。

【升麻散】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治熱毒。口舌生瘡。咽喉腫痛。

藥品 升麻、赤芍藥、人參、桔梗、乾葛、甘草。一方有黃連、大黃、玄參、麥門冬。

制法及用法 咬咀。加生薑。清水煎服。

五 筆

【玉樞丹】

發明 見鮑相璣驗方新編。

功用 治一切喉症。

藥品 山茨菇(洗淨爲末)、五倍子(淨)、各二兩。麝香、三錢。大戟(淨末)、草河車(淨末)、雄黃、各五錢。千金子(淨末)、一兩。

制法及用法 共爲末。米飲調和。搗干餘下爲度。每服五六分。甚者一錢。熱湯調下。

【玉鎖匙】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治咽喉腫痛。或垂下。及口舌強硬。

藥品 硼砂、一錢。朴硝、五分。麝香、一條。片腦、五釐。

制法及用法 研爲細末。每用少許。以竹管吹之。

【玉鑰匙】

發明 見陳言三因極一病證方。

功用 治風熱喉痹。及纏喉風。

藥品 硫磺、一兩五錢。硼砂、五錢。腦子、一字。白臘、二錢五分。

制法及用法 研爲末。每用五分。以竹管吹入喉中。立愈。

【立效散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒喉痹。

藥品 硼砂、龍腦、雄黃、朴硝、各五分。

制法及用法 研爲極細末。乾摻。

【瓜蒂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治纏喉風。

藥品 瓜蒂(採白落者、如未用、以檳榔葉裹於東牆有風處、挂令吹乾用、不拘多少)。

制法及用法 研爲細末。壯年每服一字。十五歲以下及年老者半字。早晨井花水調下。一時許。嚙沙糖一塊。良久涎如水出。涎盡。食粥一兩日。吐多困甚者。研麝香少許。溫水調下。

【半夏散】

發明 見張仲景傷寒論。

功用 治少陰咽痛。

藥品 生半夏(洗去涎水)、桂枝、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 各別搗篩已。合治之。白飲和服方寸匕。日三服。不能散服者。以水一升煎七沸。納散兩方寸匕。更煎三沸。下火令少冷。少少嚙之。

參考 少陰主樞。熱氣不能從樞而去。逆於經脈而咽痛。爲甘草湯證。寒氣不能從樞而出。逆於經脈而咽痛。爲半夏散及湯證。半夏運樞。桂枝解肌。甘草緩痛。和以白飲者。即桂枝湯啜粥之義。從中以達外。俾內外之經脈通而少陰之樞機運矣。如咽痛不能服散。以湯少少嚙之。取其輕捷。即湯亦同於散也。

【白喉鳳衣散】

功用 白喉外治月。

藥品 青黛炭、二錢。黃蘗、一錢。川貝母、一錢。冰片、五分。兒茶、一錢。薄荷葉、一錢。鳳凰衣、五分。各研細末。再入乳鉢內和勻。加冰片研細。每吹少許。

六 筆

【回生丹】

發明 見陳梅潤重樓玉鑰方。

功用 治一切喉證。

藥品 降香、六錢。麝香、四錢。硼砂、一錢。牙硝(用蘿蔔同煮透、再投入清水內、露一夜、沈結成膏)、三分。

制法及用法 研爲極細末。不見火。入瓷瓶封固。每挑少許。吹於患處。開關後次日。並體虛頭昏者。即宜去麝香。毒腫漸平。並用刀破後者。再去牙硝。加青黛。

參考 本方亦名冰硼散。若去麝香、牙硝。名呂雪丹。

【回生丹】

發明 見吳氏方。

功用 治喉證。開竅降痰。起死回生。

藥品 巴豆、二十一粒。生礬、一兩(入銀罐內浸之、看礬枯、去巴豆)。

制法及用法 每礬一兩。加小豆黃末一錢。麵糊爲丸。緋黃末二錢爲衣。如梧桐子大。每服七丸。薑湯送下。吊辰藥後。可服此丸。重者用之。輕者不用。

【冰硼散】

發明 見陳實功外科正宗方。

功用 治咽喉口齒腫毒碎爛。及痰火久嗽、音啞、咽痛等證。

藥品 冰片、五分。硼砂、玄

明粉、各五錢。硃砂、六分。

制法及用法 研極細末。每用少許擦患處。如咽喉腫痛。以麝筒吹之。甚者日吹五六次。立效。

【地黃散】

發明 見陳雅潤重樓玉鑰。

功用 治喉風。

藥品 小生地、二錢。京赤芍、牡丹皮、桔梗、各八分。蘇薄荷、生甘草、各六分。茜草、一錢。

制法及用法 加燈心二十節。紅內消一錢。開水泡藥蒸服。須與紫正散合用勿離。孕婦去丹皮。加四物湯。熱盛者。加連翹、犀角。頭痛閉塞加開關散。煩渴加銀鎖匙。潮熱者。加柴胡、黃芩。咳嗽加麥門冬、知母。大便秘結。小便赤澀者。加木通。數日不大便者。加玄明粉。熱癰肺閉。致氣喘促者。加肺黃五分(先滾去沫、再入藥中同蒸)。痰稠加貝母。陰虛者。合四物湯。

【如聖丸】

發明 見梅制方。

功用 治風毒喉痹。及肺癰。

藥品 樟腦(另研)、牛黃(另研)、桔梗、生甘草、各一錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。每兩作二十丸。每用

一丸。日食化下。

【西瓜霜】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治喉蛾喉痹。

制法及用法 用大黃泥鉢一個。將西瓜一個。照鉢大小。鬆鬆裝入鉢內。將瓜切蓋。以皮硝裝滿瓜內。仍以瓜蓋蓋之。竹簽扦定。再以一様大之黃泥鉢一個合上。外用皮紙條和泥將縫封固。放陰處。過數日。鉢外即吐白霜。以鷄毛掃下。仍將鉢存陰處。再吐再掃。以鉢外無霜爲度。每用少許吹之。

七 筆

【均藥】

發明 見喉證全科紫珍集。

功用 通治咽喉諸證。

藥品 黃藥、鬱金、硼砂、山豆根、麝香、青黛、俱倍用。兒茶、龍骨、人指甲、象牙末、冰片、硃砂、青魚膽、川烏、各等分。

制法及用法 共研極細末吹之。牙疳。加萬年乾、珍珠、金銀箔。喉疳。加明礬、血竭、草烏。

【均藥】

發明 見喉證全科紫珍集。

功用 治咽喉諸證。下刀後不消不潰而堅硬者。

藥品 梔子、七錢(炒)。薄荷葉、赤小豆、黃連、各一兩。川升麻、三錢。鷄內金(炙黃)、二錢(或加大黃、蒲黃、白礬、玄明粉、雄黃)。

制法及用法 共爲細末。吹患處。

【防風散】

發明 見：肯堂證治準繩。

功用 治咽喉疼痛。

藥品 防風(去蘆)、一兩。羌活、僵蠶(炒)、白藥子(蜜炒)、硼砂、梔子、黃藥子、大黃(澤瀉包、慢令香熟)、細辛、川芎、紅內消、山豆根、鬱金、甘草、各五錢。牙硝、三錢。薄荷、八兩。

制法及用法 研爲細末。薄荷汁同蜜少許調。每服一匙。不拘時服。虛者少用。實者多用。

八 筆

【金丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 消腫。去痰。治一切喉證。

藥品 鎗硝(提過者)、一錢八分。生蒲黃、四分。僵蠶末、一分(一作一錢)。豬牙皂角末、一分(一作一分五釐)。冰片、一分(臨時加入)。

制法及用法 研細吹之。●
證重者，加牛黃。●喉重及喉
痛。加薄荷、牙痛。●喉證只
用硝與蒲黃。●凡喉證及單雙
蛾。只用普丹。其他重證。全
用發之。須分先後多寡。初起
普丹九金丹一吹五管。後普丹
八金丹二。再吹普丹七金丹
三。如證重者。普丹金丹各半。
用至三五次後。痰涎必上湧。
然後金丹六普丹四。將管直入
喉中。重吹一吹。隨收管。
即吐出痰。●用金丹八普丹二
亦可。

【金鎖匙】

發明 見醫宗全錄。

功用 清火。散熱。清心降
火。治弄舌喉痛。喉蛾腫痛。
痰涎壅塞。口噤不開。湯水不
下。

藥品 礞石、一兩五錢(一作
一錢五分)。硼砂、五錢。白
礞石、一錢。明雄黃、二錢。人
片、二分五釐(一作一分)。

制法及用法 共研細末。只
竹管吹之。痰涎即出。如腫不
消。急鍼患處。去惡血。散煎
藥。或刺少商穴(此穴屬手大
陰肺經、在手大指內側、去爪
角韭葉許)。

參考 證治準繩方。用硼砂
一錢。礞石五分。雄黃一、同。

片礞五分。研爲細末。名玉鎖
匙。治咽喉腫痛。或垂下。及
口舌強硬。每用少許。以竹管
吹之。

【金鎖玉匙散】

發明 驗方。

功用 治咽喉腫痛。或癰疽
疔毒。

藥品 牛黃、三分。冰片、六
分。硃砂(炒)、二錢。硃砂、八
分。硼砂(煨)、四錢。金鎖匙、
二錢。西瓜霜、三錢。珍珠、四
分。

制法及用法 共爲極細粉。
瓶蓋封固。吹喉用。其他外症
按患處。

參考 按金鎖匙、西瓜霜。俱
見本書。可參閱。

【青黛散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒疳積不止。下
部發熱。

藥品 青黛、蟾蜍、胡粉(微
炒)、良薑(去鬚、微炒)、麝香
(酒研)、各二錢五分。赤石脂、
五錢。胡梨乾、一兩(微煨)。

制法及用法 搗羅爲散。每
服五分。乳汗調下。日三四次。
小兒大小加減。

【青黛散】

發明 見沈金賢 沈氏 尊生
書。

功用 治重舌咽瘡。

藥品 青黛、牙硝、硃砂、各六分。黃連、黃蘗、各三錢。雄黃、牛黃、硼砂、各三分。冰片、一分。

制法及用法 共研細末。先以薄荷末抹口中。再以藥搽。

【昆布丸】

發明 見沈括蘇沈良方。

功用 治五噎。咽喉妨塞。食飲不下。

藥品 昆布(洗去鹽水)、麥門冬(去心焙)、天門冬(去心焙)、訶黎勒(去核)、各一兩五錢。木通、川大黃(微炒)、川朴硝、郁李仁(湯浸去皮、微炒)、桂心、百合、各一兩。羚羊角屑、杏仁(湯浸、去皮尖、鈇炒黃)、紫蘇子(微炒)、射干、各五錢。柴胡(去蘆)、陳皮(湯浸、去白)、檳榔、各二錢五分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。不拘時熱酒送下。夜飯後用棉裹彈子大一丸嚥化。

十 筆

【射干散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治懸癰腫痛。咽喉不利。胸中煩熱。

藥品 射干、天竺黃、馬牙

硝、各一兩。犀角屑、玄參、川升麻、白礬、白藥、黃藥、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和搗二三百杵爲丸。如小彈子大。每服一丸。不拘時綿裹含津嚥下。

【射干散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治喉中如有物梗。噎塞疼痛。嚥物不下。

藥品 射干、檳榔、川升麻、犀角屑、各三錢。木香、木通、各五錢。紫蘇子(炒)、訶黎勒(去核)、檳榔、枳殼(去蘊、鈇炒)、赤茯苓、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 剉細。每服三錢。清水一盞。煎至八分。去滓。不拘時溫服。

【桑白皮散】

發明 見姚僧坦集驗方。

功用 治脚氣上氣。坐臥不得。咽喉不利。四肢煩痛。

藥品 桑白皮、赤茯苓(去皮)、柴胡(去蘆)、各一兩。生乾地黄、一兩五錢。甘草(炙)、五錢。射干、枳殼(去蘊、鈇炒)、貝母、前胡(去蘆)、赤芍藥、天門冬(去心)、百合、檳榔、各七錢五分。

制法及用法 每服八錢。清

水一中盞。加生薑五片。煎至六分。去渣。不拘時溫服。

【桃紅散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治喉中生瘡。腫赤紫色。咽痛難食。

藥品 金箔、十片。銀箔、十片。鉛白霜、少許。寒水石、四兩。太陰玄精石、二兩(同寒水石搗碎、入一盒子內、火煨令赤、取出、埋土中、去火毒)。馬牙硝、丹砂、甘草(炙)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服一字。甘草煎湯調下。或稀糯米粥和丸。如豌豆大。含化嚥津。

【追風散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治咽喉腫痛。

藥品 黃丹、朴硝、豬牙皂角(煨)、砂仁殼(煨灰)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每用少許。以鵝毛蘸敷舌上下及腫處。後以溫水灌漱。如咽喉間毒已破。瘡口痛者。用豬脂煎熟。淡薑醋蘸食下。

【珠黃散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治咽喉腫痛腐爛。牙疳口疳。梅毒上攻。疔腐去。小兒豆瘡後餘毒未消。口舌破

碎。

藥品 珍珠(豆腐製)、三錢。石膏、一錢。

制法及用法 研爲極細末。無聲爲度。密貯勿泄氣。每用少許。吹入患處。立能化毒去腐。清熱生肌。神效異常。

【烏龍膏】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治一切纏喉急證。

藥品 阜莢、二挺(去皮弦子、搗碎、滾水三升、泡至一時許、按片、去滓、砂鍋內熬成膏、入好酒一合、攪令稠)。百草霜、礞石、硼砂、人參(俱另研爲極細末)、各一錢。

制法及用法 拌勻。入白霜梅肉一錢。細研。和入阜莢膏內。每用少許。鷄翎蘸點喉中。通盡痰涎。却嚼甘草二寸。嚥汁吞津。若木舌先用青布蘸水揩之。然後用藥。

十一筆

【紫金丹】

發明 見夏春農喉症論方。

功用 治喉選毒。項中耳後一帶。漫腫堅硬。色紅或白。

藥品 多年尿池中陳麩、不拘多少。

制法及用法 炭火上煨紅。

入滴醋內浸透。再燉再沒。如此五七次。取出。研細末。每劑加麝香一分。用滴醋、白蜜各半。熬濃調敷。如喉中楊皮。形色紫黯者。用陳菜油或鷄蛋清調敷。

【清音丸】

發明 見統旨方。

藥品 桔梗、訶子、各一兩。甘草、五錢。硼砂、青黛、各三錢。冰片、三分。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如龍眼大。每服一丸。口嚙化下。

【清音丸】

發明 見沈金鰲 沈氏尊生書。

藥品 訶子肉、阿膠、天門冬、知母(鹽水炒)、各五錢。黃蘗(蜜炙)、麥門冬、茯苓、當歸身、生地黃、熟地黃、各一錢。人參、三分。烏梅、二個。人乳汁、牛乳汁、梨汁、各一盞。

制法及用法 煉蜜爲丸。每重一錢。每服一丸。口含化下。

【清胃散】

發明 見李東垣方。

功用 治脾胃滯熱。中脘作痛。脣口腫痛。齒齦潰爛。筋引頭腦。或惡寒發熱。飲冷作渴。口舌生瘡。或兩面發大熱痛。喜寒惡熱。小兒重舌馬牙。

吐舌流涎。

藥品 升麻、五分。生地黃、當歸(均酒洗)、各四分。川黃連(炒、夏日倍用、酒蒸)、牡丹皮、各三分。一方有甘草。

制法及用法 研爲細末。沸水煎至一半。去滓。候冷細細呷之。半日再服。小兒病。母子同服。如痛未止。可更加石膏之類。若因脾胃氣虛。寒涼剋伐。或虛熱上行。口舌生瘡。弄舌發熱。飲食少思。或嘔吐困睡。大便不實。流涎腥爛者。則宜用五味異功散。

參考 邪傷氣分。熱聚胃腑。燉其津液者。白虎湯主之。若醉飲肥厚炙博過度。以致滯熱壅於胃腑。逆於經絡。而爲是病者。此傷及血分。治宜清胃。方中以生地益陰涼血爲君。佐之以丹皮。去蒸而疏其滯。以黃連清熱燥浮爲臣。佐之以當歸。入血而循其經。仍用升麻之辛涼。爲本經捷使。引諸藥直達血所。則一切滯熱諸證。廓然俱清矣。

【通氣散】

發明 見土官定證治準繩。

功用 治時毒喉腫。咽喉不利。

藥品 玄參(一作玄胡索)、一錢五分。豬牙皂角、川芎、各

一錢。藜蘆、五分。羊躑躅花(一作二分五釐)、三分。一方有北細辛、草烏頭。

制法及用法 研爲細末。月紙撚蘸少許。入鼻內。取嚏爲度。一日二次。

十二筆

【異功散】

發明 見疫痧草方。

功用 治雙單喉蛾。

藥品 斑蝥(去翅足、糯米炒黃、去米)、四錢。血竭、乳香、沒藥、全蠍、玄參、各六分。麝香、三分。

制法及用法 共爲細末。瓷瓶收藏。封口。切勿走氣。不論爛喉風、喉閉、雙單喉蛾。用尋常膏藥一張。取此散如黃豆大。貼項間。患左貼左。患右貼右。患中貼中。三四時。即起泡。用銀針挑破。即愈。凡陰症起泡更速。

參考 此方即今之所謂喉症異功散。示與補劑上之異功散有別。

【發聲散】

發明 見王海藏方。

功用 治咽喉語聲不出。

藥品 枯樓皮(剉)、白殭蠶(去頭、炒黃)、甘草(炒黃)、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。溫酒或生薑自然汁調下。或用五分。綿裹嚙化嚥津亦可。一日二三次。

【發聲散】

發明 見紐天益衛生寶鑑。

功用 治咽喉嚙嚥微痛。

藥品 枯樓、一個。白殭蠶、五錢(炒)。桔梗、七錢五分(新白者、炒)。甘草、二錢(炙)。

制法及用法 研爲末。每用少許。乾摻咽喉中。若大腫痛。左右有紅。或只一壁紅紫長大。水米不下。用此藥五錢。朴硝一錢匕。和勻。乾摻喉中嚙津。如喉中生赤腫。或有小白頭瘡。用此藥一錢匕。白礬五分。細研如粉。和勻乾摻之。

參考 此證不宜用寒涼藥過泄。故用輕清潤上之法。以防壅遏熱邪之弊。

【黃瓜霜】

發明 見鮑相敬驗方新編。

功用 治實火喉痛。

制法及用法 嫩黃瓜有刺者。不論幾條。於端陽午時切開瓜頭。挖去瓜瓤。用皮硝裝滿。仍將瓜頭竹籤蓋好。將黃瓜掛檐下。勿令見日。候瓜外起霜。刷下。加冰片研末。吹患處。止痛如神。虛火喉痛忌用。

【黃耆散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治咽喉生瘡疼痛。

藥品 黃耆、檳榔、紫苑(洗、去土)、牛蒡子、梔子仁、赤茯苓、生甘草、各五錢。麥門冬(去心)、玄參、各一兩。川升麻、黃芩、各三錢。

制法及用法 剉碎。每服一錢。清水一盞。煎至六分。去滓溫服。

【黃連散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒心肺積熱。渴不止。咽喉乾痛。

藥品 黃連(去鬚)、射干、川升麻、白茯苓、麥門冬(去心、焙)、玄參、甘草(炙微赤、剉)、桑根白皮、黃芩、各五錢。

制法及用法 搗粗羅爲散。每服一錢。清水一小盞。加青竹葉七片。煎至五分。去渣。入白蜜五勺。更煎一二沸。放溫。時時呷之。

【稀涎散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治喉鼻。及痘瘡不收靨。

藥品 山豆根、熊膽、薄荷、芽茶、各等分。

制法及用法 研細。吹喉中。痘瘡不收。搽之。

【開關散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治喉風。氣息不通。

藥品 白礪(炒、去絲癆)、枯白礪、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。生薑、蜜水調下。細細服之。

十三筆

【礪砂散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治心脾風熱。咽喉生瘡腫痛。或子舌脹。或木舌重舌腫闊水漿不下。

藥品 礪砂(研)、三兩。薄荷葉、蒲黃、各一兩。寒水石(燒過、研)、二兩五錢。貫衆、玄參、青黛(另研)、白茯苓(去皮)、縮砂仁、滑石(另研)、荊芥穗、山豆根、生甘草、各五錢。

制法及用法 研爲細末。和勻。每服五分。不拘時新汲水調下。舌脹則摻在舌上。嚥津下之。

十四筆

【碧玉散】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治心肺積熱。上攻咽喉。腫痛閉塞。水漿不下。或喉痹重舌。木舌腫脹。

藥品 青黛、益硝、蒲黃、甘

草、各等分。

制法及用法 研爲細末。令勻。每用少許。吹入咽喉內。紙細蘸下。或用沙糖爲丸。每兩作五十丸。每服一丸。嚥化嚥下。

【碧雲散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 化喉涎。

藥品 白礬(一作青礬)、一錢。巴豆、一粒(去殼)。

制法及用法 以白礬研爲末。瓦上焙成。入巴豆在礬內。候礬乾爲度。細研。分作四服。每用一字。竹管吹入咽中。涎出爲效。

【碧雲散】

發明 見夏春農疫喉淺論。

功用 治疫喉腐爛太甚。或紅紫痛甚者。

藥品 西牛黃、三分。冰片、二分。硼砂、二錢。甘草、五分。黃連、黃蘗、青黛、各一錢。青魚膽、二個(曬乾、或以青果核灰代之)。

制法及用法 共研細末。每用少許。吹於患處。

【綠雲散】

發明 見周鶴仙方。

功用 治咽喉十八證。

藥品 青石、青黛、硃砂、白胡砂、各一兩(一作各一錢)。冰

片、三分。山豆根、二錢。明礬、人中白(煨)、玄明粉、各五錢。一方有玄胡索。無玄明粉。

制法及用法 共研細末。收貯瓷瓶。不可洩氣。每片二三釐至五六釐。吹入喉中。立愈。

十五筆

【養陰清肺膏】

發明 驗方。

功用 治陰虛白喉。

藥品 大生地、一兩。麥門冬(去心)、六錢。杭白芍(炒、一作杭白菊)、貝母(去心)、牡丹皮、各四錢。薄荷、二錢五分。玄參、八錢。生甘草、二錢。

制法及用法 上係湯量。熬膏準此酌加。①胸下脹悶者。加神麴、山楂(炒焦)各二錢。②大便燥結、數日不通者。加清寧丸、玄明粉各二錢。③小便短赤者。加木通一錢。澤瀉、知母各二錢。④燥渴者。加天門冬、馬兜鈴各三錢。⑤面赤身熱。或舌苔黃色者。加銀花四錢。連翹二錢。⑥喉間腫甚者。加石膏(煨)四錢。此爲湯之加減量。熬膏則依所加各藥爲引。水煎調服。

參考 此爲治白喉大中至正之藥。不可妄擬增減。初起發

熱。照方服。其熱自除。即白加甚。仍須守方。如發斑疹。係藥見功。始終服此至愈。而至重者。每日三劑。輕者二劑。忌妄用表散。如有脾泄之症。勢宜兼顧脾土。酌爲加減。

【噙化上清丸】

發明 見鮑相驗方新編。

功用 止嗽。清音。化痰。寬胸膈。治口舌生瘡。咽喉腫痛。

藥品 玉露霜、柿霜、款冬花、五味子、黃芩、海浮石、薄荷葉、烏梅、甘草(炙)、寒水石、訶子肉、大麥芽、川貝母、青黛、各等分。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如芡實大。每服一丸。噙化嚥下。

【摩風膏】

發明 見陳梅潤重樓玉論。

功用 治喉風。

藥品 川烏尖、一個(以乳鉢底濃磨汁、入角藥)。燈心灰、五分。

制法及用法 爲膏塗之。

十六筆

【橄欖露】

功用 清肺。開胃。下氣。除煩。生津。解酒。利咽喉。解諸毒及河豚毒。功用甚大。

患喉症者。以此代茶極佳。

【錫類散】

發明 見金匱翼方。

功用 治疫喉。乳蛾。牙疳。口舌腐爛。

藥品 象牙屑(焙)、珍珠(製)、各三分。青黛(飛)、六分。梅花冰片、三釐。壁錢、二十個(用泥壁上者、木板上者勿用、一作三十個)。西牛黃、人指甲(男病用女、女病用男)、各五釐。

制法及用法 共研極細末。密裝瓷瓶內。勿使泄氣。每用少許。吹於患處。

十八筆

【蟬花散】

發明 見錢乙方。

功用 治驚風夜啼。咬牙咳嗽。及咽喉壅痛。

藥品 蟬花(和殼)、白僵蠶(直者、酒炒熟)、甘草(炙)、各一分。延胡索、五釐。

制法及用法 研爲末。一歲兒每服一字。四五歲五分。蟬殼湯調下。

【雞蘇散】

發明 見嚴用和濟生方。

功用 治傷肺唾血。咽喉不利。

藥品 雞蘇葉、黃耆(炒)、生

地黃、阿膠(炒)、貝母、白茅根、各一錢。桔梗、麥門冬(去心)、蒲黃(炒)、甘草(炙)、各五分。

制法及用法 加生薑。清水煎服。

【雙解散】

發明 見陳耕道瘦痧草。

功用 治痧癰約。喉爛氣穢。神煩便閉。目赤脈實。證勢乍作。正強邪實者。

藥品 大黃、玄明粉、葛根、牛蒡、荆芥、大連翹、薄荷、蟬衣、枳殼、甘中黃、桔梗。

制法及用法 清水煎服。

二十一筆

【蠟燭丸】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治發頭及喉風穿腮出膿。

藥品 黃蠟、一兩。枯礬、五錢。乳香、沒藥(均去盡油)、各一錢五分。

制法及用法 研爲細末。黃蠟和丸。如梧桐子大。每服二錢。熱湯送下。

【鐵笛丸】

發明 驗方。

功用 治三焦有熱。肺火上炎。喉痛聲啞。口燥咽乾。兼治陰虛勞熱。水火不得升降。及語言過多。或叫呼耗散。致

失音聲啞。

藥品 薤白、四兩。甘草、桔梗、百藥煎、各二兩。川芎、連翹、各二兩五錢。訶子肉、砂仁、大黃、各一兩。

制法及用法 共研細末。雞蛋白和爲丸。每重一錢。每服一丸。嚙化或熱湯化下。

唇齒類

一筆

【一粒笑】

發明 見徐氏方。

功用 治一切牙痛浮腫。

藥品 五寶脂、麝香、各一錢。蟾酥、二錢。

制法及用法 先將二味研末。蟾酥烱化。作粒如麥子大。每用少許。嵌於患處。痛立止。如虛火牙痛。止後接服知藥八味丸。老人服還少丹。

三筆

【三香散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治牙根腫痛。

藥品 丁香、川椒紅(如無用萆撥代)、各等分。冰片、少許。

制法及用法 研爲末。敷之。

四 筆

【升麻散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治上齒痛。

藥品 升麻、細辛(焙)、黃蘗、知母、防己、黃連、白芷、蔓荊子、牛蒡子、薄荷。

制法及用法 研爲細末。薄荷湯調下。並擦牙齦。或清水煎服亦可。

【五倍子散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治牙齦爲物所傷。搖動欲落。

藥品 五倍子、乾地龍(去土微炙)、各等分。

制法及用法 研爲細末。先將生薑擦牙齦。後以藥敷之。五七日內不得嚼硬物。用竹碎補濃煎。時時漱之。如齒初傷欲落時。以膏擦藥貼齒槽中。至齒上。即牢如故。

五 筆

【玉帶膏】

功用 治風火蟲牙。腎虛齒痛。牙脉出血等證。

藥品 黃連、一錢。黃芩、黃蘗、各五錢。山梔仁、三錢。

制法及用法 煎濃汁。再入龍骨末、鉛粉、各五錢。冰片

(研)、一錢。麝香(研)、五分。黃占、三兩。隔水燉化攪勻。用棉花紙拖膏。臨臥時貼患處。次早取出。輕者色黃。重者色黑。屢試屢驗。

【玉帶膏】

功用 去風邪。止火痛。固牙齒。治疳氣。齒搖動不能食物。

藥品 生龍骨、二兩。宮粉、一兩五錢。梅花冰片、麝香、硼砂、各二兩五分。黃蠟(淨)、二兩。

制法及用法 除黃蠟外。共研細末。和勻。隨將黃蠟熔化。離火即入藥末攪勻。用棉花紙將藥傾上。竹刀刮勻。如膏凝難刮。又用熱湯蒸透使軟。再刮勻。攤紙上。剪作一小指寬。一寸長。收貯瓷瓶內。封固勿令泄氣。臨臥時用花椒水漱淨。每用一片。貼牙根上。次早取出。重者色黑。輕者色黃。

【玉泉散】

發明 長景岳方。

功用 治口腔發炎。嚴重齦痛。

藥品 生石膏、六兩。甘草、一錢。

制法及用法 各取細粉。充分和勻。每飲三錢至五錢。包煎服湯。

【牛肌散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 療癰瘡。

藥品 花蕊石(醋煨)、兒茶、雞內金、血竭、各二錢。大紅絨(煨灰)、黃連、飛丹(煨)、乳香、各一錢。

制法及用法 研爲細末。加冰片一分。乾搽。

【白芷散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治下牙牙疼。

藥品 白芷、防風、連翹、石膏(煨)、荊芥、赤芍藥、升麻(煨)、薄荷。

制法及用法 研爲細末。薄荷湯調下。及擦牙齦。或清水煎服亦可。

【失笑散】

發明 見江仍度方。

功用 治牙痛。

藥品 葶藶、八分。北細辛(淨葉)、一錢。大冰片、二分五釐。

制法及用法 共研極細。擦牙痛處。伏於桌邊流涎。片時見效。

【玄參散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治口舌生瘡。連齦斷爛痛。

藥品 玄參、升麻、獨活、麥

門冬(去心)、黃芩、黃蘗、川大黃(炒)、梔子仁、前胡、犀角、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 研爲末。每服五錢。清水一盞。煎至五分。不拘時溫服。

【甘露飲】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治齒齦。

藥品 犀角、生甘草、生地黃、銀柴胡、枳殼、麥門冬、知母、枇杷葉、黃芩、銀石斛、茵陳、各一錢。

制法及用法 加淡竹葉七片。燈心十根。清水煎服。

六 筆

【至寶丹】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 固齒。

藥品 雄鼠骨、全副(其鼠愈大愈好、至少在八兩以上、連毛用草紙包七層、再用稻草包緊、黃泥封固、用稻糠火煨熟、去肉、煉出全骨、酥油炙黃、研爲細末、入下藥)。北細辛(洗淨土澀)、沉香、各一錢五分。破故紙、青鹽(水炒)、白石膏(水炒)、骨碎補(去淨毛、蜜水炒)、全當歸(酒炒)、旱蓮草(酒炒)、各五錢。白芷(青鹽水炒)、煨生地(酒炒)、各三錢。綠升麻

(焙)、二錢。沒石子、雌黃、一對(酒煮火烘)。

制法及用法 研爲細末。同鼠骨末合在一處。拌勻。用銀盒或鉛盒盛之。每早擦牙漱嚥。久而不斷。牙齒動搖者。仍可堅固。不動者永保不動。少年有去牙一二三年內。竟可復生。頗小而白。久則如故者。故此方之靈效。妙不可言。

七 筆

【牢牙散】

發明 見李東垣方。

功用 治胃火上炎。齒牙不固。或齒齦腫痛。

藥品 升麻(一作四分)、羌活(一作一錢)、羊脛骨灰(一作地骨皮、一錢)、各一兩。龍膽草(酒洗)、一兩五錢。

制法及用法 研爲細末。以炒羅子羅骨灰作微塵末。和勻。臥時貼在牙齦上。或先以溫水漱口。用少許搽之。

【牢牙散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治齒牙無力嚼物。

藥品 升麻、三錢(一作二錢)。生地黃、石膏、各一錢。白茯苓、玄參(一作人參)、各五分。羊脛骨灰(一作二錢)、梧桐淚、各三分。黃連、一錢三

分(一作一錢)。麝香、少許(另研)。

制法及用法 研爲細末。和勻。每用少許。臨臥擦牙。復以溫水漱去。

【芎黃散】

發明 見楊氏方。

功用 治小兒齒不生。

藥品 川芎、生地黃、各五錢。山藥、當歸、甘草(炙)、各一分。

制法及用法 焙爲末。熟湯送下。或時以藥末擦齒齦。

【沉香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 固齒髮。

藥品 沉香、訶子皮、青鹽、青黛、各二錢。白檀、母丁香、各一錢五分。當歸、香附子(炒去毛)、細辛(去苗)、苦楝子(破四片、炒)、各五錢。荷葉灰、乳香、各一錢。龍膽(另研)、麝香(另研)、各五分。酸石榴皮、二兩五錢。

制法及用法 研爲細末。每用五分。如常刷牙。溫水刷漱吐出。每日早晚二次。

八 筆

【固齒白玉膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治牙痛不固。

藥品 官粉、一兩(研)。珍珠末、三錢。陽起石、一兩。龍骨、二兩。麝香末、二錢。象牙末、五錢。

制法及用法 用冠帶四十九條。防風、當歸、川芎、牙皂、青鹽、升麻、白芷、地骨皮、各五錢。細辛、蘇木、各三錢。共研粗末。長流水五碗。同入砂鍋內。以桑柴火熬至三碗。去滓。再入砂鍋內煎至一碗。將龍骨、二兩。陽起石、一兩。火煨通紅。入藥汁內淬之。如此七次。去藥汁。將龍骨、陽起石、焙乾研末。並加黃蠟、三兩。溶化濾淨。再化。離火候溫。入前藥和勻。乘熱攤紙上。如膏冷。將熨斗燒熱仰置。紙鋪熨斗底上攤之。用時先以溫水漱口。將膏藥剪一小條。貼於患處。閉口勿語。

【固齒擦牙散】

發明 見顧世澄瘍醫大全方。

功用 固齒。治牙宣。

藥品 食鹽(成塊者煨)、骨碎補、生石膏、各四兩。新鮮槐花、二兩。一方多寒水石、沒食子、酒煮火烘。

制法及用法 搗爛爲團。曬乾再磨末。擦牙齒妙。但藥肆無有售者。可請藥店配製。

十 筆

【烏金膏】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治牙齒動搖。鬚髮黃赤。

藥品 生薑、八兩(搗取自然汁、留滓待用)。生地黄、一斤(酒浸一宿、搗汁、留滓待用)。大皂莢、十錠(不蛀者、刮去黑皮、將前二汁和蘸皂莢、文火炙乾、再蘸再炙、汁盡爲度)。

制法及用法 將皂莢同地黄滓。入瓷罐內煨存性。研爲末。牙齒動搖。用藥擦齒。如鬚髮黃赤。以鐵器盛藥末三錢湯調。過三日。將藥汁蘸擦鬚髮。寢臥時用之。次早即黑。三夜一次。其黑如漆。不傷鬚髮。

【草豆蔻散】

發明 見朱丹溪方。

功用 治寒多熱少。牙齒疼痛。

藥品 草豆蔻、一錢二分。黃連、升麻、各二錢五分。細辛葉、防風、各二分。熟地黄、羊脂骨灰、各五分。當歸身、六分。

制法及用法 研爲細末。痛處擦之。

【神效散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治牙縫出血。

藥品 草烏、青鹽、皂莢、各等分。

制法及用法 入瓦器內。燒灰存性。每用一字。揩齒立效。

十一筆

【清胃散】

發明 見李東垣方。

功用 治脾胃溼熱。中脘作痛。脣口腫痛。齒齦潰爛。痛引頭腦。或惡寒發熱。飲冷作渴。口舌生瘡。或滿面發熱大痛。喜寒惡熱。小兒重舌馬牙。吐舌流涎。

藥品 生麻、五分。生地黄、當歸（均酒洗）、各四分。川黃連（炒、夏日焙用、酒蒸）、牡丹皮、各三分。一方有甘草。

制法及用法 研爲細末。清水煎至一半。去滓。候冷細細呷之。半日再服。小兒病。母子同服。如痛未止。可量加石膏之類（醫宗金鑑方、用石膏煨、四錢、牡丹皮、一錢五分、黃芩、生地黄、黃連、升麻、各一錢、清水二鍾、煎至八分、食後服、亦名清胃散、或湯、治胃中實火上炎、牙縫出血、此方多石膏、黃芩、無當歸）。若因脾胃氣虛。寒涼剋伐。或虛熱上

行。口舌生瘡。弄舌發熱。飲食少思。或嘔吐困睡。大便不實。流涎齦爛者。則宜用五味異功散。

參考 邪傷氣分。熱聚胃腑。燥其津液者。白虎湯主之。若醇飲肥厚炙烤過度。以致溼熱蘊於胃腑。迷於經絡而爲是病者。此傷及血分。治宜用此方以清胃。方中以生地益陰涼血爲君。佐之以丹皮。去瘀而疏其滯。以黃連 清熱 燥溼爲臣。佐之以當歸。入血而循其經。仍用升麻之辛涼。爲本經捷使。引諸藥直達血所。則一切壅熱諸旋。廓然俱清矣。然非實熱而爲虛上行。以及因脾胃氣虛剋伐。又宜用五味異功散（一用人參、白朮、茯苓、甘草、陳皮、各等分、剉散、清水煎服、以治小兒氣虛、氣滯、脾胃虛熱、口舌生瘡、或弄舌流涎、驚搐咳嗽、睡時露睛、手足並冷、飲食少思、吐瀉不止、即五味異功散也、若母有病、致小兒病者、宜母子同服）。不得妄投清胃散。

【清胃散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治骨槽風。牙腫疼。

藥品 薑黃、白芷、細辛、川芎、各等分。

制法及用法 研爲細末。先

以鹽湯漱口。擦牙痛處。

【細辛散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治風疔齒痛。

藥品 細辛、荊芥穗、各一錢。砂仁、歸靈、各五分。白芷、川椒、草烏、各二分。皂角、五錢。華撥、一錢五分。

制法及用法 爲末搗之。

【密陀僧散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治走馬疳。齒焦黑爛。

藥品 密陀僧、一兩。輕粉、五十帖。麝香、一字。

制法及用法 研爲細末。鉢內拌勻。每用五分。擦於患處。

【紫金散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治風熱積壅。一切牙痛。及口氣。

藥品 大黃、不拘多少。

制法及用法 瓶內燒存性。爲末。早晚擦漱。

十二筆

【雄黃丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒牙齒黑蛀。喘氣疼痛。

藥品 雄黃、二錢。麝香、五分。

制法及用法 研爲細末。饅飯和丸。如錢下。每用一丸。置於牙內。

【雄黃散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒牙齦生疳蝕瘡。

藥品 雄黃、一錢。銅綠、二錢。

制法及用法 同研極細。量瘡大小乾貼。

【黃連散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 療齒齦出血。不得飲食。

藥品 黃連、白龍骨、馬牙疳、各一兩。白礬、一分。龍腦、一錢。

制法及用法 研爲細末。每用少許。敷牙根下。

【黃蘗散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治齒齦。

藥品 黃蘗、一兩。五倍子、二錢。密陀僧、甘草、各一錢。

制法及用法 除黃蘗外。餘研爲末。清水調敷於藥上。火炙三五次。將藥切成片子。隨腫貼之。天明即愈。

【無比散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治癰後牙疳腐爛。

藥品 黃牛糞、不拘多少。

制法及用法 煨灰存性。入龍腦少許。研細吹之。

十三筆

【補肌散】

發明 見沈金鰲沈氏厚生書。

功用 生肌。療傷齒。

藥品 點椒、五錢。天靈蓋、紅肉硝、白芷、各二錢。

制法及用法 爲末。每用少許。搽於患處。即安。或已落有血絲未斷。搽齒齦間。亦可復生。

十五筆

【蝦蟆散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治小兒齒痛風齩。連服微腫。

藥品 乾蝦蟆、一枚。青黛(細研)、柑子皮、細辛、白雞糞(炭黃)、各一分。麝香(用當門子者、細研)、乾薑(炮製、剉)、各五釐。

制法及用法 搗細羅爲散。令勻。每用少許。薄綿裹。納齩齒孔中。一日一換。

十六筆

【獨活方】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒攻注。齒斷腫痛。

藥品 獨活、羌活、防風、川芎、石膏、荆芥、升麻、乾葛、生地黃、細辛、白芷、赤芍藥、黃芩、甘草。

制法及用法 加薄荷。清水煎服。

【獨活散】

發明 見三肯堂證治準繩。

功用 治脾胃熱壅。唇生惡核。

藥品 獨活、升麻、桑寄生、犀角屑、沈香、連翹、漢防己、大黃(炒)、各七錢五分。甘草(炙)、五錢。

制法及用法 每服三錢。清水一鍾。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

【獨活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治風毒牙痛。或牙齦腫痛。

藥品 獨活、羌活、川芎、防風、各五分(一作各一錢六分)。細辛、荆芥、薄荷、生地黃、各二錢(一作各七分)。

制法及用法 爲散。每服三五錢。清水煎。食後漱嚥。一日三次。

十七筆

【薑黃散】

發明 見沈金鑑 少氏 尊生書。

功用 治風熱蟲牙痛。

藥品 薑黃、細辛、白芷。

制法及用法 研爲末。擦牙。須臾吐涎。鹽湯漱口。

十八筆

【藁本散】

發明 見張漢方。

功用 治卒齒痛。

藥品 藁本、白附子、川芎、莽草、各五錢。青黛、蘆薈、麝香、各一錢。

制法及用法 除青黛、蘆薈、麝香研細外。餘搗羅爲細末。和勻。每用一字。

二十一筆

【麝香散】

發明 見莊氏方。

功用 治小兒唇口臭爛。齒斷露。

藥品 麝香、雄黃、蘆薈、白龍骨、各一錢。密陀僧、二錢。石膽、五錢。乾蟾、一枚(重五錢者、入瓶燒存性)。

制法及用法 令研勻極細。先用綿經箸蘸上。以鹽漿水。

輕輕洗過。然後敷之。

【麝香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治熱多寒少。牙齦斷脫。齒動欲落。大作疼痛。

藥品 麝香、少許。升麻、一錢。黃連、草豆蔻、各一錢五分。熟地黃、麻黃、各一分。益智仁、二分五釐。羊脬骨灰、二錢。人參、生地黃、當歸、漢防己(酒製)、各三分。

制法及用法 研爲細末。每用少許。擦牙疼處嚙良久。有涎吐去。

二十九筆

【鬱金散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治齒出血。

藥品 鬱金、白芷、細辛、各等分。

制法及用法 研爲細末。擦牙。仍以竹葉、竹皮濃煎。入鹽少許。含口中。鹽敷亦可。

腰膝類

十筆

【神應丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎經不足。或因勞役。或寢溼地。或墜墮損傷。

風寒內乘。致腰痛如折。牽引背脊。俯仰艱難。

藥品 威靈仙、桂心、當歸、各二兩。

制法及用法 共研細末。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。食前溫酒或茴香湯送下。婦人桂心湯下。

十一筆

【速效散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腰痛不可忍。

藥品 川楝子(取肉、已豆五粒、去殼、同炒至赤、去已豆)、茴香(鹽炒香、去鹽)、破故紙(炒)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。每服三錢。空腹時熱酒調下。

十二筆

【開結導飲丸】

發明 見李東垣方。

功用 治溼熱。並諸濕相搏。腰膝重痛。足脛浮腫。

藥品 檳榔、甘遂、赤芍藥、威靈仙、澤瀉、草薢、乳香(研)、各二兩。沒藥(研)、一兩。牽牛、五錢。大戟(炒)、三兩。陳皮、四兩。

制法及用法 共研末。麪糊爲丸。如梧桐子大。每服五十

丸。加至七八十丸。食前熱湯送下。得愈止。後服。忌酒二日。忌麪及甘草三兩日。宜食溫淡粥補胃。

十三筆

【補骨脂丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腰痛不可忍。

藥品 補骨脂、二兩(酒浸一宿、炙炒)、杏仁(湯泡、去皮尖)、桃仁(泡、去皮尖)、各一兩。

制法及用法 研爲末。和勻。以浸藥酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空腹時鹽湯或鹽酒送下。

【補骨脂丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腰脚疼痛不止。

藥品 補骨脂(微炒)、牛膝(去苗)、各三兩。杜仲、一兩。桂心、一兩五錢。檳榔、安息香(入胡桃仁搗熟)、各二兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜入安息香和搗丸。如梧桐子大。每服十丸至二十丸。空腹時溫酒送下。

十五筆

【調肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治鬱怒傷肝。發爲脘痛。或小腹偏左結痞。

藥品 半夏(製)、三分。陳桂、宣木瓜、當歸、川芎、牛膝、細辛、各二分。石菖蒲、酸棗仁(燙、去皮、微炒)、甘草(炙)、各一分。

制法及用法 爲散。每服三四錢。加生薑五片。大棗二枚。清水煎。去滓熱服。

脾 胃 類

十二種

【黃白散】

發明 見太平惠民和劑局方。

功用 治溼滯脾胃。不能運化。積飲痞滿。不思飲食。心腹脹痛。口苦短氣。反胃惡心。噯氣吞酸。面黃體瘦。體痛嗜臥。壯熱自利。轉筋收斂。霍亂吐瀉。風泄水蠱。五噎八噎。胎死腹中等證。常服調氣。暖胃。化宿食。消痰飲。辟四時不正之氣。

藥品 厚朴、五兩(去皮、薑汁炒、一作三兩四錢、一作三兩)。陳皮(泡去浮白、一作五兩、一作三兩四錢、一作三兩)、甘草(剉炙、一作三兩、一作一兩八錢)、各一兩。蒼朮、八兩

(米泔浸七日、去皮、麻油拌、炒黃、一作四兩、一作五兩)。

制法及用法 研爲末。每服二錢至四五錢。加生薑三片。大棗二枚。清水煎。空腹時溫服。每日三次。或每服二錢。沸湯或薑湯點下亦可。如酒泄。飲後獨甚老。加丁香、縮砂、麥芽、神麴各五錢。研爲末。每服二錢。空腹時米飲調下。

【黑丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾胃怯弱。飲食過傷。而成下痢。

藥品 烏梅肉、杏仁(去皮尖、另研)、半夏(湯泡七次)、縮砂仁、各十四粒。百草霜、六錢。巴豆霜(去油)、五分。

制法及用法 共研細末。稀糊爲丸。如黍米大。每服十五丸。加至二十丸。熱湯送下。須斟酌病人虛實。受病深淺。增減丸數。俟逐盡積滯。乃徐徐補之。

【惺惺散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治久瀉脾困。不思乳食。恐作脾風。

藥品 明天麻、全蠍(炒)、各五分。木香(炮)、糯米(微炒)、人參(微炒)、茯苓(微炒)、白扁豆(炒)、淮山藥(焙)、甘草

(炙)、各一錢。

制法及用法 研爲細末。嬰孩每服一字。二三歲者五分。清水一藥注或半銀匙。加棗子八兩。煎十數沸服。

十三筆

【養肝散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人冷勞。脾胃虛乏。大腸轉洩。水穀不化。四肢痿痺。口內生瘡。不思飲食。虛乏無力。

藥品 北柴胡、縮砂仁、蒔蘿、藟撥、各三分。白朮、白芷、胡椒、白薑、陳皮、山茵陳、人參、蕪荑仁、木香、紫苑、白芍藥、北細辛、桂心、各五錢。

制法及用法 研爲細末。以鰾豬肝一具（去脂膜切如柳葉片、新汲水洗過）。葱白三寸（細切）。入藥末五錢於鰾內。以新汲水二大盞。入鹽時少許。以瓷碗合煮。令水盡。空腹隨意食之。食前飲下。食後良久飲暖酒一盞。晚食前熱服。

【萬靈丹】

發明 見張渙方。

功用 治小兒脾胃不和。久積乳癖。服溫熱藥皆不効者。

藥品 肉桂、川黃連、蓬莪朮、各一兩。肉豆蔻仁、檳榔、

陳橘皮（去白、焙乾）、木香、丁香、各五錢。

制法及用法 搗羅爲細末。用巴豆（去皮心膜）、苦杏仁（去皮尖、熬炒）、各二十七個。於燈上燒灰存性。再同搗拌勻。水泛丸。如黍米大。未周歲小兒每服一丸。二三歲二丸。四五歲三丸。六七歲五丸。十歲以上七丸。乳食前生薑湯放冷送下。

十四筆

【銀白散】

發明 見玉訣方。

功用 生胃氣。取積後調補。

藥品 人參、茯苓、甘草（炙）、白朮（麥麴炒）、白扁豆（去皮）、藜香葉、各等分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。紫蘇湯調下。

【銀白散】

發明 見毛彬方。

功用 治胃氣不和。吐瀉不止。痰逆不食。

藥品 半夏、一兩（洗七次、焙、薑製餅）。白扁豆（炒）、罌粟米、人參、白朮（焙）、白茯苓、山藥、各四錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。清水八分。加生薑二片。大棗一枚。煎至六分。

溫服。

【銀白散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胃虛吐瀉。

藥品 糯米(炙)、一兩五錢。扁豆(蒸)、二兩。麝香、丁香、各二錢。白朮(炒)、一兩。甘草(炙)、三錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。紫蘇米飲調下。

【銀白散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胃虛吐瀉。

藥品 乾山藥、白朮、白茯苓、各五錢。人參、白扁豆、知母、甘草(炙)、升麻、各等分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水一小盞。加大棗一枚。生薑二片。同煎。不拘時溫服。

【蒼朮丸】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治不能飲食。

藥品 蒼朮(製)、二斤。神麴、一斤。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。米湯送下。一日三次。大冷。加乾薑三兩。腹痛。加當歸三兩。羸弱。加甘草(炙)

二兩。

【槐花散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾胃不調。腹中脹滿。腸風下血。

藥品 槐花、二兩。枳殼、當歸、蒼朮、厚朴(製)、陳皮、各一兩。烏梅、甘草(炙)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服五錢。清水一盞。煎至七分。去滓。食前服。

十五筆

【調中丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治脾胃虛寒。

藥品 白朮、人參、甘草(炙)、各五錢。乾薑(炮)、四錢。一方無乾薑。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如綠豆大。每服五七丸至十五丸。食前熱湯送下。

【調中散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒冷熱不調。致脾胃不和。

藥品 木香(剉)、人參(去蘆頭)、青橘皮(湯浸、去白焙乾)、各一兩。丁香、白朮、大腹皮(剉)、甘草、白茯苓、各五錢。

制法及用法 搗羅爲細末。每服一錢。清水一小盞。加生

薑三片。煎至五分。去滓溫服。

十六筆

【醒脾散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 調理百病。

藥品 木香、白朮(並溼紙裏煨)、人參、茯苓、草果子、甘草(炙)、陳橘皮、厚朴(縮砂水煮)、紫蘇子、各等分。

制法及用法 研爲末。每服一錢。清水六分。加生薑一片。大棗半個。煎至四分。通口服。

【醒脾散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 醒脾。養胃。止吐痢。進飲食。治病後神昏日慢。食睡多困。脈弱微有痰涎。

藥品 人參(去蘆)、白茯苓(去皮)、藿香葉、白朮、甘草(炙)、各五錢。丁香、四十粒(不見火)。天南星、八錢(剉作小塊、紙裏水浸透、炮過)。縮砂仁、四十粒。

制法及用法 碎散。每服二錢。清水一大盞。加生薑三片。冬瓜子仁五十粒。梔碎。慢火煎至七分。空腹時緩緩服之。急必吐。

【醒脾散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 吐瀉後調脾胃。進飲食。治丁奚疳瘕。虛熱。腹滿。氣逆。惡心。

藥品 陳皮(去白)、縮砂仁、厚朴(去粗皮、剉碎、薑汁浸一宿、慢火焙乾)、麥芽(洗淨、焙乾)、烏梅(和核)、各五錢。良薑(剉、東壁土炒)、乾葛、烏藥、各二錢五分。草果子(炮)、二錢。甘草(炙)、三錢。

制法及用法 碎散。每服二錢。清水一盞。加生薑二片。大棗一枚。鹽少許。煎至七分。空腹時溫服。

十八筆

【檳榔散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人脾胃虛冷。心腹脹滿。不欲飲食。

藥品 檳榔、前胡、川芎、青皮、各七錢五分。芍藥、桂心、大黃、苦楝、木香、枳殼、各五錢。甘草、二錢五分。

制法及用法 咬明。每服四錢。加生薑三片。清水煎至七分。去滓溫服。

雜症及急救類

二 筆

【人參散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治腎氣遺精。

藥品 人參、肉豆蔻(炮)、胡黃連、杏仁(炒)、甘草(炙)、各等分。

制法及用法 爲末。每服一錢。小者五分。溫熱湯調下。

【人中白散】

發明 見沈金齋沈氏尊生書。

功用 治閃挫跌撲傷骨極重者。

藥品 人中白(酒淬)。

制法及用法 研爲末。每服五分。溫酒調下。

【人參平肺散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治癰疽喘急。恍惚驚臥。

藥品 人參、杏仁(去皮尖炒)、地骨皮、紫蘇、橘紅、半夏(鹽製)、茯苓、青皮、各一錢。桑白皮(炒)、知母(炒)、各七分。五味子、二十粒(炒碎)。甘草(炙)、五分。

制法及用法 清水二鍾。加

生薑三片。煎至八分。食遠服。

參考 此爲理氣清肺化痰之劑。肺虛共數無力者。宜之。

【七聖散】

發明 見莊學海書。

功用 治人牙反傷。

藥品 人參(煨存性)、三錢。大黃、花蕊石、鹽甘石、各二錢。輕粉、一錢。甘草、一錢五分。冰片、五分。

制法及用法 研爲極細末。麻油調搽。

【七寶丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治骨蒸傳尸邪氣屬陽病者。

藥品 黃連、四兩。

制法及用法 研爲細末。用豬肚一箇。洗淨。入藥末。線縫之。用童便五升。文火煮令乾爲度。以肚細切。同藥爛研。置風中吹乾。滴水爲丸。如梧桐子大。礞砂(無礞砂亦可)、麝香爲衣。空腹時麥門冬湯送下。或用陽病開胃散送下。

【二黃散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治遺毒。

藥品 午黃、七分。胡黃連、山慈菇、各二錢。生甘草、一錢五分。

制法及用法 研爲細末。每服三分。蜜湯調下。

三 筆

【大黃丸】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治飛尸。遁尸。癰疔。溫病不得大便。心腹脹滿痛。宿食不消。婦人月經不調。面目青黃。產後血結中奔。或絕產無子。走起上下。小兒寒熱。噎膈腹大。不欲食。食不生肌。淋瀝。

藥品 大黃、一兩(蒸於二斗米下)。肉桂心、乾薑(炮)、各二分。巴豆、五十粒(去皮心熬、搗如泥)。硝石、三分(熬、如無以芒硝代之)。

制法及用法 搗篩和勻。煉蜜爲丸。如梧桐子大(小兒如麻子大)。飛尸遁尸。每服半丸。漿水送下。每日一次。須臾即止。癰疾依發日清晨服一丸。壯者二丸。得吐下。忍飢。隔宿勿食。過發時乃食。心腹脹滿痛。每服一丸。婦人每服半丸。小兒三四歲每服一丸。六七歲二丸。白湯送下。每日一次。熱在膈上當吐。在膈下當利。預作粥。如服已吐下。丸法服藥。兩食頃不吐下。以熱飲動之。若不得吐下。可更

服一丸半。壯者可二丸。下多。噉冷粥解之。至三十日。心腹諸痛可愈。若有瘡綿挺如指。蜜和一丸。塗挺頭。且內瘡中。晚出之。不瘡更作。忌食野豬肉、蘆笋、生葱等物。

【大黃散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治婦人陰痒。

藥品 大黃(微炒)、黃芩、黃耆(炙)、各一兩。赤芍藥、玄參、丹參、山藥、蛇牀子、各五錢。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。食前溫酒調下。

【三聖膏】

發明 見必用方。

功用 治髮脫脫落。

藥品 黑附子、蔓荊子、柏子仁、各五錢。

制法及用法 研爲末。烏雞脂和勻。搗研。乾置瓦盆內。封固百日。塗之。三五日即能復生。

【山藥膏】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治兩脇小腹腫痛或癢。

藥品 山藥、不拘多少。

制法及用法 研爛。頻敷患處。乾則易之。

【小靈丹】

發明 見顧世澄醫大全。

功用 治中風口眼喎斜。痔漏。癰頭。

藥品 香木煎、不拘多少。

制法及用法 用麻油煎枯存性。取起爲末。麝糊爲丸。如蘿蔔子大。臨臥時用清漿調服一分六釐。蓋被出汗。切忌說話。其油加熊膽爲末。冰片少許和勻。搽痔上。如爲外痔。先以荊芥、防風、瓦松。煎湯薰洗。然後塗藥。日愈。此丹兼治中風口眼喎斜如神。此油搽梅瘰。三日即好。

四 筆

【五加皮散】

發明 見王肯堂六科準繩。

功用 治卽水毒、溪毒。狀如傷寒。

藥品 五加皮、不拘多少。

制法及用法 研爲細末。每服一錢匕。溫酒或粥飲調下。日二夜一次。或以五加皮根燒研爲末。水調下亦可。

【木瓜煎】

發明 見許叔微類證普濟本事方。

功用 治筋急。

藥品 木瓜、一個(取蓋去瓢)。沒藥(研)、乳香(研)、各二錢五分。一方無乳香。

制法及用法 以藥末納木瓜

中。蓋合。竹簽簽定。飯上蒸三四次。研成膏。每服三五匙。生地黄汁和無灰酒燉緩化下。

【天門冬丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治初得消中。食已如飢。手足煩熱。背膈疼悶。小便白濁。

藥品 天門冬(去心)、乾土瓜根、瓜蒌根、熟地黃、知母(焙)、肉蓯蓉(酒浸一宿切焙)、鹿茸(酒炙)、五味子、赤石脂、澤瀉、各一兩五錢。鷄內金、三具(微炙)。桑螵蛸、十枚(炙)。左牡蠣(煅)、二兩。苦參、一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前粟米飲送下。

【化毒丹】

發明 見張景岳方。

功用 治癰疽。

藥品 人參、三錢。甘草、一錢。硼砂、冰片、各一分。輕粉、五釐。

制法及用法 各爲細末。和勻搽上。即化爲水。

【牛黃清心丸】

發明 見萬氏方。

功用 治傷寒邪入心包。中風痰火祕結。癱瘓眩暈。語蹇神昏。小兒驚風痰涎。手足攣掣。痧痘煩躁。

藥品 牛黃、二錢五分。川連、五錢。黃芩、二錢五分。生梔子、三錢。鬱金、一錢(一作二錢)。辰砂、一錢五分。

制法及用法 共研細末。臘雪水調神麴糊爲丸(一作蒸餅爲丸)。每潮重四分五釐。每服一丸。燈心湯送下。

【水調膏】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治邪傳經絡。

藥品 杏仁泥、白麵、各等分。

制法及用法 新汲水調成膏。塗腫處。即消腫退熱。

【巴戟丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治胞痹虛寒。腹痛。遺尿。或小便不利。

藥品 巴戟(去心)、一兩五錢。桑螵蛸(切破鉄炒、一作炙)、杜仲(去粗皮、酥炙、一作三錢)、生地黄(酒焙、一作一兩五錢)、附子(炮去皮臍、一作五錢)、肉蓯蓉(酒浸、去皮、切焙)、川續斷(酒製)、山藥、各一兩。遠志(甘草湯泡、去骨、一作薑製、一作四錢、一作一兩)、三錢。金石斛(云根、一作八錢)、鹿茸(酥炙、一作一對)、菟絲子(酒浸一宿、另搗、一作酒

浸一兩)、山藥黃(去核、一作一兩)、五味子、龍骨、官桂(勿見火、一作肉桂、一作五錢)、各七錢五分(一作各三錢)。一方無杜仲、續斷、龍骨、五味子。

制法及用法 研爲細末。和勻。煉蜜爲丸。如梧子大。每服三五丸。至七十丸。空腹臨臥米飲或溫酒送下。若用羊腎或黃絲煎湯。尤妙。

參考 此證由於腎虛寒襲。陽氣不行。故方中以鹿茸、巴戟、附、桂溫元陽。杜仲、續斷、蓯蓉填肝腎。五味、龍骨、山藥補精氣。山藥健脾。遠志通心。稍兼生地、石斛。爲假熱之使。與八味地黃丸之意相類。而較爲貼切。

【火龍膏】

發明 見王冰方。

功用 療陰發背。

藥品 新火蘆(六月六日曬乾)。

制法及用法 研爲末。瓷瓶收貯。每用以鮮豬膽汁調敷周圍。皮紙遮蓋。乾則熱水潤之。知痛時黑水自出爲妙。如不知痛。雖出黑水難治。

五 筆

【白礬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肺風酒齕鼻。

藥品 生白礬、生硫黃、乳香、各等分。

制法及用法 研爲末。手微抓動患處。以藥擦之。

【白茯苓丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治消腎兩腿漸細。腰脚無力。

藥品 白茯苓、覆盆子、黃連、瓜蒌根、葶藶、人參、熟地黃、玄參、各一兩。石斛(去根)、蛇床子、各七錢五分。雞膽耆、三十具(微炒)。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前磁石湯送下。

【白膠香散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 療皮破筋斷。

藥品 白膠香、不拘多少。

制法及用法 研爲細末。敷之。或用金沸草根、搗汁塗筋。封口。二七日。便可相續止痛。一貼即愈。不愈再塗。

【四聖散】

發明 見錢乙方。

功用 治小兒痘出不快。黑陷倒靨不起。發不紅活。小便不利。

藥品 紫草茸、黃耆、各一錢。甘草、五分。木通、六分。

一方有黃耆。一方無黃耆加枳殼款炒。

制法及用法 研爲粗末。每服一錢。清水一杯。煎至八分。不拘時溫服。一日三次。熱甚色紫者。倍紫草茸。加黃芩、黃連、紅花。大便秘者。加枳殼。大便如常者。加糯米。氣虛少食者。加人參。

參考 此爲痘疹乾紫倒靨之專劑。其功盡在紫草茸一味。

【四寶丹】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治黃胖。

藥品 使君子肉、二兩。檳榔、南星(製)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。每服五十丸。空腹時砂糖湯送下。如食生米。加麥芽一斤。食茶葉。加紅茶一斤。食土。加聖土一斤。食炭。加黑炭一斤。

【石灰散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腎漏。

制法及用法 用五倍子同石灰炒黃色。去灰。攤地出火毒。置砂盆內研爲細末。勿犯銅鐵。乾搽。五七次可愈。

【必勝散】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 治瘰癧惡疾。癰疽俱病。上下齊發。

藥品 赤檳榔、皂角刺(炒)、各五錢。大黃(酒煨)、一兩。白鬚牛、六錢(生取頭末、以一半炒)、甘草、生炙各一錢。輕粉、二錢。

制法及用法 爲散。壯年者分五服。中年者分七服。每服入黑糖或白蜜二匙。將汁五匙調服。臨臥時腹中稍空。薑湯送下。至三更通身癢木如鍼刺。頭目齒縫俱痛。此藥尋病根。重者七日行一次。稍輕者十日半月行一次。以三五遍爲度。病退後眉髮漸生。肌肉如故。如齒縫中有血。以黃連、貫衆煎湯漱之。

六 筆

【守中丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治頭眩。目系急。卒然仆地。

藥品 人參、白朮、甘菊花、枸杞子、山藥、各二兩。白茯苓(去皮)、十兩。麥門冬(去心)、三兩。生地黄、十二斤(絞取汁)。

制法及用法 研爲細末。先用生地黄汁於銀器內。入酥三兩。白蜜三兩。同煎。逐漸掠

取汁上金花。令盡。得五升許。於銀器內拌炒前七味藥。漸漸令盡。候乾。入白蜜同搗數千杵和丸。如梧桐子大。須擇四季旺相日。或甲子日修合。每服五十丸。空腹時溫酒送下。服百日後。五臟充滿。肌膚滑潤。

【如聖膏】

發明 見顯世證醫醫大全。

功用 治鍼入肉。

藥品 車脂、蠟油、不拘多少。

制法及用法 研如膏。調磁石細末。攤紙上如錢許貼之。每日換二次。

【托裏消毒散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治大頭瘟。

藥品 金銀花、陳皮、各三錢。黃耆(鹽製)、天花粉、各二錢。防風、當歸、川芎、白芷、桔梗、厚朴、皂角刺(炒)、穿山甲(炙)、各一錢。

制法及用法 到散。清水煎服。

七 筆

【芍藥散】

發明 見太平聖惠方。

功用 治舌本無力語遲。

藥品 赤芍藥、一兩。黃耆、七錢五分。犀角(鎔)、檳榔、甘

草(炙微赤)、各五錢。

制法及用法 研爲末。每服一錢。化清水一小盞。煎至五分。去滓。不時溫服。最見大小加減。

八 筆

【卷柏丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治遺精。

藥品 卷柏(取枝、焙乾)、黃耆、各等分。

制法及用法 研爲細末。每服二錢。空腹時米飲調下。

【卷柏散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治遠年脚氣。

藥品 卷柏(東向者、先用鹽水煮半日、再用淡水煮半日、焙乾)、黑牽牛子頭末、甘遂、檳榔。

制法及用法 各爲末。不得相雜。每服各秤一錢(惟檳榔末、二錢)。五更初濃煎葱白湯調下。至辰巳時取下惡物如魚凍。虛人減半。隨吃淡物。更服湯藥。如清熱除溼湯調理之。

【乳香散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治炭疽。

藥品 乳香、古半兩錢、各五分。紫藤香、五錢。輕粉、麝香(常門子)、各少許。

制法及用法 研爲末。細絹羅過。每用少許。先以甘草湯洗患處。用舊絹搥乾。然後敷藥。即以燈草塞之。

【兒茶散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治白泡。

藥品 兒茶、不拘多少。

制法及用法 研爲末。加冰片少許吹之。

【返魂丹】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治尸厥及衝惡不語。

藥品 硃砂(水飛)、雄黃(另研、水飛)、生玳瑁屑、麝香(另研)、白芥子、各二錢五分。

制法及用法 同研如粉。於瓷器中。焙安息香和丸。如綠豆大。每服五丸。童便化下。小兒熱風。只服一丸。

【阿膠散】

發明 見錢乙方。

功用 治肺虛有火。嗽無津液。咳而喘氣者。

藥品 阿膠、一兩五錢(熬炒成珠、一作一兩)。牛蒡子(炒香、一作三錢)、甘草(炙、一作

五錢)、各二錢五分。馬兜鈴、五錢(焙、一作炒)。杏仁、七箇(去皮尖、鉄炒、一作七錢)。糯米、一兩(炒、一作一合)。

制法及用法 加生黃耆五錢。研爲末。每服一兩許。小兒一二錢。清水煎。食後溫服。未效。宜用五味異功散以補脾。

參考 肺臟呼吸成液。灌溉周身。一受火炎。則吸時徒引火升。呼時並無液出。久則肺竅俱閉。喉間或癢或痛。六葉遂漸焦枯。以致痰帶紅線。嗽有血點。而成損證。方中用阿膠爲君者。消竅癰也。用杏仁牛蒡子者。宣竅道也。馬兜鈴者。清竅熱也。輔以糯米。以補脾母。母氣一到。則肺自輕清無礙矣。但杏仁本瀉肺。非若人參二冬之補。白當以意消息之。

【抱龍丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治肝腎臟虛。風溼寒邪。流注腿膝。行步艱難。漸成脚氣。足心如火。上氣喘急。小腹不仁。全不進食。

藥品 赤小豆、四兩。白膠香(另研)、破故紙(炒)、狗脊、木鼈子(去殼、另研)、海桐皮、威靈仙、草烏(去蘆到、以鹽炒

熱、去鹽不用)、五蠶脂(炒)、地龍(去土炒)、各一兩。

制法及用法 研爲細末。酒煮米糊和丸。如梧桐子大。辰砂爲衣。每服五十丸。空腹時鹽湯或溫酒送下。臨晚食前再進一服。

九 筆

【紅散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治金瘡。箭頭不出。

藥品 草烏尖、麒麟竭、茄花、蔓陀羅子、蓖麻子(去殼)、各五錢。

制法及用法 研爲細末。好酒調如膏。每用少許。塗於患處。

【紅玉散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治酒刺、黑斑。

藥品 白芷、藿香葉、牙皂、各二錢。甘松、三柰子、木澤、白丁香、細辛、密陀僧、杏仁、各一錢。天花粉、白茯苓、各一錢五分。樟腦、五分。白芨、三分。

制法及用法 共爲細末。臨臥時津唾或乳汁調敷。明早用溫水洗去。其面如玉。

【胡粉散】

發明 見張漢方。

功用 治脾中出水。

藥品 胡粉、乾藍(燒灰)、白石膏(燒存性)、各等分。

制法及用法 研爲極細末。每局一錢至五分。散脾中。

【香鼓散】

發明 見張漢方。

功用 治白丹注痛虛腫。

藥品 香鼓、二兩(炒焦)。伏龍肝、一兩。

制法及用法 研爲末。生油調塗。

十 筆

【桃仁丸】

發明 見陳自明婦人大全。

功用 治婦人與鬼魅交通。

藥品 桃仁、辰砂、檳榔、當歸、各七錢五分。水銀、二錢五分(煮肉研令星盡)。麝香、阿膠(麝炙爛)、沉香、各五錢。

制法及用法 研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。空腹時桃仁湯送下。

【桃花散】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治血痢。

藥品 白石灰、五合。大黃片、一兩五錢。

制法及用法 先將白灰用水攪成末。與大黃同炒。以灰變

紅色爲度。去大黃。將石灰篩細。用涼水調敷。

【烏金丹】

發明 見張路玉張氏醫通。

功用 染髮黑。

藥品 清烟好墨、一塊。

制法及用法 炭大紅鳳仙梗中。仍將剝下者掩紮好。以泥塗之。有花摘去。勿令結子。候兩月餘。自壞取出。又將青柿去蒂。鑿空入墨。仍將柿蒂掩紮好。埋馬糞中七晝夜。收藏鉛盒中。以龜尿磨擦。則黑透鬚根。經月不白。且不傷髮。

【烏龍膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治傳尸勞。

藥品 烏梅(去核)、柴胡、紫菀、生乾地黃、木香、各一兩。秦艽(實好者)、貝母(麝炒、去心)、防風、各三錢。杏仁、五兩(麝炒、爲末)。皂角、六十片(二十片去黑皮、醋炙爲末、二十片燒灰存性、二十片湯浸去黑皮)。

制法及用法 用精豬肉剝爛如泥。同皂角一處。入水五升。細揉汁。入童便三升。無灰酒一升。併熬如膏。和前藥末爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹時麥門冬湯送下。甚者二十日效。

【茯苓散】

發明 見蔣武生治效。

功用 治心經實熱。口乾煩渴。心神恍惚。眠臥不安。

藥品 茯苓、麥門冬(去心)、各一兩五錢(一作各二兩五錢)。通草、片瀉、各一兩二錢五分。紫菀、桂心、各七錢五分。知母、一兩。大棗、十二枚。淡竹茹、五錢。赤石脂、一兩七錢五分。

制法及用法 研爲末。每服一兩。清水煎服。

【秦艽散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治陰黃不欲聞人言。小便不通。

藥品 秦艽(去苗土)、一兩。旋覆花、赤茯苓(去皮)、甘草(炙剉)、各五錢。

制法及用法 咬咀。每服四錢匕。牛乳汁一盞。煎至六分。去滓。不拘時溫服。

十一筆

【清涼膏】

發明 見醫宗金鑑。

功用 治湯火傷。

制法及用法 用水澆開石灰末一升。加水四碗。攪渾澄清汁一碗。加香油或桐油一碗。以筋脈攪數百轉。稠黏如糊。

每用少許。攤紙蘸掃傷處。

【麻黃散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治漏趾風。

藥品 麻黃根、乳香、沒藥、黃蘗、萬年灰、水龍骨、各等分。

制法及用法 爲末摻之。貼夾紙膏。收其毒水。

【密陀僧散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治腳丫瘻。

藥品 密陀僧、一兩。石膏、枯白礬、各二錢。輕粉、一錢。

制法及用法 共研細末。桐油調搽。溼則乾擦。

【通關散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治卒中風。口噤氣寒。不省人事。

藥品 細辛、皂角、薄荷、雄黃、各一錢。一方有南星、半夏。

制法及用法 研爲末。每用少許。吹入鼻中取嚏。無嚏難治。

十二筆

【訶子散】

發明 見沙圖穆蘇瑞竹堂經驗方。

功用 烏頭髮。

藥品 訶子、兩個(去核)。沒

食子、白藥煎、各三兩。金絲礬、一兩五錢(研)。鐵砂、三兩(好醋一碗、瓷器浸三日、炒七次)。

制法及用法 將鐵砂入鐵砂打糊。先一夜將鐵砂板抹在頭上。用荷葉包住。晨起時以溫漿水洗淨。次夜即將前藥末四味調入鐵砂糊內。用生薑一塊。搗碎。再加輕粉少許。調勻。抹在頭上。仍用荷葉包住。至次晨再用溫漿水加清油數點在內。洗淨。其髮黑且光。

【訶子散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治喉甲流膿。

藥品 訶子、二枚。降真香、青黛(另研)、各一錢。五倍子、五錢。

制法及用法 研爲末。次入青黛。研勻。先用葱鹽湯洗淨。剪去指甲。用藥乾貼縫內。或用麻油調敷。

【備急丸】

發明 見金匱要略。

功用 治中惡客忤。鬼擊鬼打。面青口噤。胸腹刺痛。脹滿氣急。卒死暴厥。以及寒氣冷食。稽留胃中。胸腹滿痛。便秘。

藥品 巴豆(去皮心膜油、研如脂)、一錢。乾薑(生泡、去

皮)、二錢。川大黃、三錢(溼紙裹煨、一作二錢)。

制法及用法 先以大黃、乾薑。搗爲細末。入巴豆霜。合搗千杵。和蜜爲丸。如小豆大。密器收貯勿洩氣。每服三四丸。溫酒或熱湯、米飲、苦酒送下。未醒。更服三丸。腹中鳴轉。得利即活。若中惡重證。如卒死者。捧頭起。灌令下咽。須臾當瘥。不瘥。更與三丸。當腹中鳴。即吐利便瘥。若口噤者。須化開。用草管從鼻孔吹入。自下於咽。

參考 腹痛便閉。當分陽結陰結。陽結有承氣更衣之劑。陰結則此方爲主。乾薑散中焦寒邪。巴豆逐腸胃冷積。大黃通地道。又能解巴豆毒。是有制之師也。白散治寒結在胸。故用桔梗佐巴豆。用吐下兩解法。此則治寒結腸胃。故用大黃佐薑巴。以直用下法。然傷寒熱傳胃腑。舌胎黃黑刺裂。唇口赤燥者。誤用必死。以巴豆大熱傷陰故也。婦人有孕者忌用。

【備急丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治腹痛。

藥品 木香、二錢五分。大黃、牽牛末、各五錢。

制法及用法 研爲細末。神

麴糊丸。如綠豆大。每服五七丸。食前山查煎湯送下。

【備急散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治小兒諸般骨哽。咽喉腫痛。

藥品 五倍子、一兩(研)。先春茶末、五錢。

制法及用法 和勻。每服一錢。溫湯半盞。不拘時少與嚥下。依法服餌。不過三五次。即效。如骨出。或刺破處血出者。用硼砂末六錢。水煎消毒散調服。

【黃芩散】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治陰挺脫出。

藥品 黃芩、蠟皮(炒微焦)、當歸、各五錢。赤芍藥、一兩。牡蠣、竹皮、各二兩。狐陰莖(一作狐皮)、一具。

制法及用法 治下篩。每服方寸匕。米飲調下。每日三次。或每服二錢。溫酒調下。禁舉重房事冷食。

【黃連散】

發明 見百一方。

功用 療嵌甲。

藥品 黃連、鉛粉、黃蘗、煨石膏(煨)、各等分。

制法及用法 研爲細末。用水洗瘡令淨。煨帛搥乾。新汲

水調塗瘡上。兩日一易。

【黃蘗散】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治湯火傷。

藥品 黃蘗、一大塊。

制法及用法 生燒灰燼。炙酥爲末。麻油調塗。

【黃蘗散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治湯火傷。

藥品 黃蘗、大黃、朴硝、雞子殼、寒水石、各等分。

制法及用法 研爲細末。清水調塗。

【黃蠟膏】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治冬月手足拆裂。

藥品 黃蠟、一塊。光粉、五倍子(研末)、各少許。一方無五倍子。

制法及用法 清油兩盞(一作五錢)。慢火煎沸。入黃蠟煎熔。再入光粉、五倍子末、熬令稠。以紫色爲度。先以熱湯洗患處。火上烘乾。即用藥敷。以紙貼之。其痛立止。入水亦不落。若合藥入粉多。則硬而成塊。以火炙動挑敷。便無妨礙。

【黑白散】

發明 見張潔古方。

功用 治大風病。

藥品 烏梢蛇、白花蛇(均去

頭尾、酒浸)各取淨肉二錢。明雄黃、二錢。川大黃(煨)、五錢。

制法及用法 研爲極細末。每服一二錢。不拘時熟湯調下。

【硝石散】

發明 見金匱要略。

功用 治女勞瘕黑瘰。

藥品 硝石(熬黃)、礬石(燒)、各等分。

制法及用法 爲散。大麥粥汁和服方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是其候也。

參考 硝能散虛鬱之熱。輕揚而寒不傷脾。礬能却水溼之積。其所到之處。邪不復侵。如紙既礬。即不受水滲也。以大麥粥調服。益土以勝水。合而用之。則散鬱熱。解腎毒。其於氣血陰陽汗下補瀉等法。毫不相涉。所以爲佳。

【勝金丹】

發明 見羅天益衛生寶鑑。

功用 治婦人吹乳。

藥品 百齒霜、不拘多少。

制法及用法 無根水爲丸。如梧桐子大。黃丹爲衣。每服三丸。倒流水送下。服後。左乳患者左臥。右乳患者右臥。溫覆汗出即愈。

【雄硃散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治鬼聚。

藥品 雄黃、一錢。硃砂、五分。牛黃、一錢。

制法及用法 研爲末。每用一錢。牀下燒之。再取一錢。酒調灌下。

十三筆

【萬病丸】

發明 見孫思邈千金要方。

功用 治瘡瘍。癰病。疔疔。飛尸。蟲毒。黃病。瘧疾。水病。大風。瘡疥。皮風邪入頭目昏暗。上氣咳嗽。喉中如水雞聲。不得眠臥。飲食不作肌膚。五臟滯氣。積聚壅閉。心腹脹滿。或連胸背鼓氣。咽結。流入四肢。或復又心膈氣滿。時定時發。下疳疔蟲。寸白諸蟲。上下冷熱。痰飲多睡。消瘦無力。痿入骨髓。便成患滯。身體氣腫。飲食嘔逆。腰脚酸疼。四肢沉重。行立不能久。婦人因產冷入子臟。臟中不淨。或閉塞不通。胞中瘀血冷滯。出流不盡。時時疼痛爲患。或因此斷產。小兒赤白下痢。及狐臭、耳聾、鼻淵等病。

藥品 牛黃、麝香、犀角(鎔)、桑白皮(剉炒)、赤茯苓、

乾薑(炮)、桂心、當歸、芎藭、芍藥、甘遂、黃芩、蜀椒(去目及閉口者、炒出汗)、細辛、桔梗、白豆(去皮心膜、炒)、前胡、紫菀(去蘆)、薩黃(微炒)、葶藶(炒)、防風、人參、礞砂、雄黃(油煎)、黃連(去鬚)、大戟(剉炒)、禹餘糧(醋煨研、水飛)、芫花(醋炒赤)、各一錢六分。蜈蚣、六節(去頭足、炙)、石蠅、一寸(去頭足、炙)、芫青、十四枚(入糯米同炒米色黃黑、去頭足翅)。一方無黃芩、桑白皮、桔梗、防風。

制法及用法 研爲細末。牛黃、麝香、犀角、礞砂、雄黃、禹餘糧、巴豆另研。餘均令搗。重絹下篩。白蜜和丸。如梧子大。每服三丸。破除日平旦空腹時溫酒或熱湯、生薑湯送下。取微下三升惡水爲良。若卒暴病。不拘平旦早晚皆可服。但以吐利爲度。若不吐利。更加一丸。或至三丸五丸。須吐利爲度。不得限以丸數。病強藥少。即不吐利。更非他故。若其發遲。以熱飲汁投之。若吐利不止。即以酢飯兩三口止之。忌食陳臭、生冷、酢、滑、黏食、大蒜、穢雞魚狗牛馬驢肉、白酒。戒行房。七日後始可。一日服二日補之。得食新

米韭根汁。作羹粥隨飲食之。三四頓大良。亦不得全飽。產婦多服。吐利後以常須閉口少語。於無風處溫牀暖室將息。若旅行卒暴無飲。以小便送之爲佳。若一歲以下小兒有疾者。令乳母服兩小豆。亦以吐利爲度。近病及卒病皆用多。積久疾病即少服。常取微瀉利爲度。

【萬應膏】

發明 見顧世澄瘍醫大全。

功用 治內外諸證。

藥品 松香、十斤。葱汁、生薑汁、各二斤。黃蘗、生大黃、甘草、苦參、各二兩。蒼朮、一兩。

制法及用法 同入鍋內。熬至水氣升盡。再入麻油、三斤。熬至入水不散。即是火候已到。須不時以竹片攪之。免其黏底。水用大缸一隻。貯水大半缸。隨用麻布一方。沉入水底。將膏傾入。再取起。復入淨鍋內熬化。加乳香(去油、研)、沒藥(去油、研)、各六兩。黃蠟、八兩。熬化。撤去火。再入百草霜(篩細)、四五兩。勻勻篩入。攪勻。另用麻布一方。濾入水內。扯坦成團。平時浸水內。臨用取起。如火候太老。可量加麻油少許。每用一團。

擬貼患處。

【萬病紫苑丸】

發明 見王好古醫壘元戎方。

功用 治各種時行病。十種水病。十種風病。黃病。瘧病。飲食不化。噁心。嘔吐。反胃。腹中痛。繞臍痛。積聚。疰癰。衝氣。癲狂。夢與鬼交。婦女月經久閉。蓄血。身熱如蟲行。經絡走痛。肢腫。頑痺。小兒驚風。瘰癧咬傷。

藥品 紫苑(去苗土)、柴胡、菖蒲(九節者、去毛)、吳茱萸(湯泡七次、焙乾)、川厚朴(薑製)、各一兩。桔梗(去鹽)、茯苓(去皮)、皂角(去皮弦子、炙)、黃連(去鬚、一作八錢)、桂枝、炮薑、各八分。川烏、七錢(炮、去皮臍、一作八錢)。人參、羌活、獨活、防風(均云瀝)、巴豆(去皮膜、出油、研)、蜀椒(去目及閉口者、微炒出汗)、各五錢。

制法及用法 共研細末。煉蜜爲丸。如梧櫚子大。每服三丸。漸加至五七丸。食後臨臥生薑湯送下。①痔漏腸風。清酒送下。②赤白痢。訶子湯送下。③膿血痢。米飲湯送下。④墮傷血悶。四肢不收。清酒送下。⑤蛔蟲咬心。檳榔湯送

下。⑥氣噎憂噎。荷葉湯送下。⑦打撲損傷。清酒送下。⑧中毒。蒂灰、甘草、煎湯送下。⑨一切風。升麻湯送下。⑩寸白蟲。檳榔湯送下。⑪霍亂。薑湯送下。⑫咳嗽。杏仁湯送下。⑬腰背痛。豆淋酒送下。⑭陰毒傷寒。溫酒送下。⑮吐逆。生薑湯送下。⑯飲食氣塊。麵湯送下。⑰時氣。井花水送下。⑱脾風。陳皮湯送下。⑲肚痛。薄荷茶送下。⑳心痛。溫酒送下。㉑大小便不通。燈草湯送下。㉒因物所傷。紫苑湯送下。㉓吐水。藜蘆湯送下。㉔氣病。乾薑湯送下。㉕小兒天風吊搐。防風湯送下。漢防己亦可。㉖小兒疳積。葱白湯送下。㉗小兒乳食傷。白湯送下。㉘婦人月信不通。煎紅花酒送下。㉙婦人腹痛。川芎湯送下。㉚懷孕半年後漏胎。艾湯送下。㉛有子氣衝心。酒送下。㉜產血暈。溫酒送下。㉝血氣痛。當歸煎酒送下。㉞產後心腹脹滿。豆淋湯送下。㉟難產。益智湯送下。㊱產後血痢。當歸湯送下。㊲赤白帶下。酒煎艾湯送下。㊳解內外傷寒。粥飲送下。㊴室女血氣不通。酒送下。㊵子死腹中。葵子湯送下。㊶初有孕者忌之。

【萬靈黑虎丹】

發明 見楊襲熊經驗祕方。

功用 治一切外證。

藥品 益母草、五兩(炒成炭、退火研、用三兩)。輕粉、四錢。青黛、六錢。血竭(另研)、乳香(炒、去油)、沒藥(炒、去油)、各五錢。麝香、梅片、各二分五釐。蜈蚣(炒研)、七條。

制法及用法 共研極細末。收入小口瓶內。勿令洩氣。每用少許。搽膏藥上貼之。初起即消。已成即潰。已潰即斂。

【萬靈黑虎丹】

發明 見馬氏方。

功用 提毒。拔膿。消腫。止痛。治癰疽、發背、對口。

藥品 蜈蚣(烘)、全蠍(烘)、煩蠶(炙)、各七條。穿山甲(炙)、七片。礞石(飛)、公丁香(炒)、母丁香(炒)、元寸香、冰片、各一錢。

制法及用法 共研細末。收入小口瓶內。勿令洩氣。每用少許。搽膏藥上貼之。初起即消。已成即潰。已潰即斂。

【當歸散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治陰下脫。

藥品 當歸、黃芩、各二兩。芍藥、一兩一錢五分。蟾皮(燒存性)、五錢。牡蠣(煅)、二兩

五錢。

制法及用法 研爲末。每服二錢。溫酒或米湯調下。忌登高舉重。

十四筆

【奪命散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治血汗。

藥品 硃砂、寒水石、麝香、各等分。

制法及用法 研爲末。每服五分。新汲水調下。

【蜘蛛散】

發明 見沈金鰲沈氏尊生書。

功用 治腋臭。

藥品 大蜘蛛、一個。

制法及用法 鹽泥包煨紅。放冷。去泥。研爲細末。入輕粉一字。醋調成膏。多敷腋下。明日登廁。必瀉下黑汁臭穢。於僻處埋之。

【綠礬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治竹木鍼刺入肉。注痛不止。

藥品 綠礬、五錢(小便燒熟、放礬於內、候冷取出、日乾)。丹砂、二錢五分。麝香、一字。馬兜鈴根、一錢五分。

制法及用法 研爲細末。先以漿水洗淨瘡口。每用少許。乾貼患處。

十六筆

【獨活散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治痘娘。因洗頭中風。身體強硬。牙關緊急。失音不語。

藥品 獨活(去蘆)、赤箭、麻黃(去節)、阿膠(炒)、各一兩。烏犀角屑、羌活(去蘆)、防風(去蘆)、木天蓼、白附子(炮)、各七錢五分。漢防己(去皮)、桂心、芎藭、白僵蠶(微炒)、各五錢。龍腦、二錢五分(紙研)。

制法及用法 研爲細末。令勻。每服二錢。不拘時薄荷湯調下。

十七筆

【膽礬散】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治瘰癧。

藥品 膽礬、一兩。麝香、一字。

制法及用法 研爲細末。先以葱鹽湯洗手患處。搗乾敷藥少許。

十八筆

【雞眼膏】

發明 見顧世澄醫大全。

功用 治雞眼。

藥品 葶藶、蟾酥(線穿陰乾)、火丹草(陰乾)、遠麻子、桃仁、穿山甲、三稜、紅花、莢朮、天南星、各二錢。鱸魚血、半杯(陰乾爲末)。雞臄皮(不見水)、十個。河豚眼(陰乾)、十枚。虎耳草(陰乾)、阿魏、各一錢五分。麝香、三分。麻油、六兩。黃丹(飛)、三兩。

制法及用法 熬膏。將雞眼修淨攤貼。

【雞眼膏】

發明 見顧世澄醫大全。

藥品 鮮白果(用外面綠皮)、不拘多少。

制法及用法 搗碎。桐油熬枯去渣。滴水成珠不滾爲度。加雄黃少許攪勻。收貯。先將雞眼水泡軟。貼上。一伏時揭下。內有紅絲拔出。

二十一筆

【麝香丸】

發明 見王肯堂證治準繩。

功用 治婦人血凝冷氣。及疔氣。心腹痛不可忍。

藥品 麝香、五錢(另研)、阿

麝、二錢五分(麝香浸、令麝熱)。五寶脂、桃仁、三棱、各七錢五分。芫花(醋炒)、檳榔、各一兩。蓬朮、桂心、沒藥、木香、當歸、各五錢。

制法及用法 共研細末。入麝香令勻。糯米糊飯爲丸。如梧桐子大。每服十丸。不拘時淡醋湯送下。

【麝香散】

發明 見陶弘景肘後百一方。

功用 治瘰癧肉不癢。

藥品 麝香、少許。染胭脂、五倍子(燒黑存性)、各等分。

制法及用法 研細搽之。

【鐵粉散】

發明 見沈金鑑沈氏等生書。

功用 治子宮不收。

藥品 鐵粉、三錢。當歸、磁石、各五錢。

制法及用法 研爲末。米湯調下。

索 引

本書爲便利檢查起見。特編索引一種。以首字筆畫多少爲次序。次列類別。下列頁碼。庶一查便得。

一 筆

- 一上散(消毒類)300
- 一上散(癰疽瘡瘍類)559
- 一上散(瘰癧疥癬類)666
- 一字散(祛風類)200
- 一字散(耳目口鼻類)699
- 一字散(咽喉類)761
- 一笑散(殺蟲類)303
- 一笑散(經產類)470
- 一笑散(癰疽疥癬類)667
- 一捻金(痘疹丹毒類)649
- 一捻金(耳目口鼻類)699
- 一捻金散(小兒類)523
- 一掃光(瘰癧疥癬類)667
- 一粒笑(唇齒類)775
- 一粒珠(癰疽瘡瘍類)560
- 一粒金丹(祛風類)201
- 一粒金丹(小兒類)523
- 一粒金丹(癰疽瘡瘍類)561
- 一粒金丹(痘疹丹毒類)649
- 一筆勾(癰疽瘡瘍類)560
- 一筆消(癰疽瘡瘍類)560
- 一醉膏(攻逐類)140
- 一醉膏(癰疽瘡瘍類)560

二 筆

- 二仙丹(癰疽瘡瘍類)561
- 二仙丹(癰疽疥癬類)667
- 二仙散(癰疽瘡瘍類)561
- 二母丸(咳嗽類)403
- 二冬膏(補養類)3
- 二冬膏(除痰類)410
- 二至丸(補養類)2
- 二妙丸(利溼類)265
- 二妙散(補養類)3
- 二妙散(利溼類)266
- 二妙散(癰疽瘡瘍類)561
- 二金散(癰疽瘡瘍類)561
- 二香散(消暑類)259
- 二香散(經產類)472
- 二神丸(經產類)472
- 二神丸(癰疽瘡瘍類)562
- 二神散(消導類)90
- 二神散(痘疹丹毒類)649
- 二陳丸(除痰類)410
- 二參丹(補養類)3
- 二黃散(經產類)472
- 二黃散(癰疽瘡瘍類)562
- 二黃散(耳目口鼻類)700

- 二黃散(雜症及急救類) …789
 二聖丸(殺蟲類) ……303
 二聖丸(小兒類) ……524
 二聖散(消導類) ……91
 二聖散(理氣類) ……163
 二聖散(痘疹丹毒類) ……649
 二聖散(耳目口鼻類) ……700
 二聖散(咽喉類) ……762
 二聖救苦丸(發散類) ……65
 二聖救苦丸(瀉火類) ……280
 丁香散(理氣類) ……163
 丁香散(經產類) ……472
 丁香散(小兒類) ……524
 丁香散(瘰癧疥癬類) ……667
 丁香養散(和解類) ……74
 丁香脾積丸(消導類) ……91
 丁香脾積丸(攻逐類) ……140
 丁香爛飯丸(祛寒類) ……246
 七味豆蔻丸(收瀉類) ……119
 七味都氣丸(補養類) ……4
 七宣丸(消導類) ……91
 七宣丸(攻逐類) ……140
 七香丸(祛寒類) ……216
 七珍散(補養類) ……4
 七珍散(經產類) ……472
 七聖丸(攻逐類) ……140
 七聖丸(小兒類) ……525
 七聖散(表裏類) ……150
 七聖散(祛風類) ……202
 七聖散(經產類) ……472
 七聖散(雜症及急救類) …789
 七製固脂丸(補養類) ……4
 七製香附丸(補養類) ……5
 七製香附丸(經產類) ……473
 七釐散(跌打損傷類) ……519
 七寶丸(殺蟲類) ……303
 七寶丸(耳目口鼻類) ……700
 七寶丸(雜症及急救類) …789
 七寶散(和解類) ……75
 七寶散(表裏類) ……150
 七寶散(經產類) ……472
 七寶散(癰疽瘡瘍類) ……562
 七寶散(耳目口鼻類) ……700
 七寶散(咽喉類) ……762
 七寶美聲丹(補養類) ……5
 九一丹(癰疽瘡瘍類) ……564
 九味蘆薈丸(小兒類) ……525
 九味蘆薈丸(癰疽瘡瘍類) 564
 九製大黃丸(攻逐類) ……141
 九製香附丸(經產類) ……474
 九製硫黃丸(補養類) ……7
 九製歸靈丸(祛風類) ……202
 九龍丹(收瀉類) ……119
 九龍丹(癰疽瘡瘍類) ……564
 九轉還砂丹(補養類) ……8
 人中白散(消導類) ……90
 人中白散(癰疽瘡瘍類) …565
 人中白散(耳目口鼻類) …700
 人中白散(咽喉類) ……762
 人中白散(雜症及急救類) 789
 人中黃散(理血類) ……180
 人中黃散(痧變類) ……165
 人牙散(痘疹丹毒類) ……649
 人牙散(瘰癧疥癬類) ……667

- 人馬平安散(痧疫類)165
 人參丸(補養類)1
 人參丸(耳血類)179
 人參丸(驚悸類)343
 人參丸(癰疽類)383
 人參丸(除痰類)409
 人參丸(經產類)470
 人參丸(小兒類)523
 人參散(補養類)1
 人參散(和解類)74
 人參散(消導類)90
 人參散(表裏類)149
 人參散(理氣類)163
 人參散(祛風類)202
 人參散(驚悸類)343
 人參散(痧疫類)465
 人參散(經產類)470
 人參散(小兒類)524
 人參散(癰疽瘡瘍類)565
 人參散(雜症及急救類)789
 人參丁香散(祛寒類)246
 人參丁香散(經產類)471
 人參平肺散(瀉火類)281
 人參平肺散(雜症及急救類)789
 人參半夏丸(除痰類)410
 人參半夏丸(經產類)471
 人參白朮散(痧疫類)466
 人參白朮散(經產類)471
 人參固本丸(補養類)1
 人參敗毒散(發散類)65
 人參荊芥散(表裏類)149
 人參荊芥散(經產類)471
 人參健脾丸(補養類)2
 人參黃耆散(補養類)1
 人參黃耆散(經產類)171
 人參黃耆丸(補養類)2
 八仙丹(補養類)5
 八仙散(理氣類)163
 八仙散(驚悸類)344
 八仙散(經產類)473
 八仙散(癰疽瘡瘍類)563
 八仙散(咽喉類)761
 八仙糕(補養類)6
 八仙糕(消導類)91
 八仙糕(收澀類)119
 八仙長壽丸(補養類)6
 八味丸(補養類)6
 八味丸(瀉火類)281
 八味地黃丸(補養類)7
 八味地黃丸(經產類)473
 八珍丸(補養類)6
 八珍丸(除痰類)410
 八珍益母丸(經產類)473
 八風散(祛風類)201
 八將丹(癰疽瘡瘍類)563
 八釐散(跌打損傷類)549
 八寶丹(癰疽瘡瘍類)563
 八寶眼藥(耳目口鼻類)700
 八寶珍珠散(咽喉類)761
 八寶紅靈丹(清暑類)259
 十全丹(消導類)91
 十全丹(利溼類)266
 十全散(痘疹丹毒類)650

十全大補丸(補養類)9
 十灰丸(理血類)179
 十灰散(理血類)179
 十香丸(祛寒類)246
 十寶丸(攻逐類)141
 十補丸(補養類)8
 十寶丹(癰疽疔瘡類)565
 十寶丹(咽喉類)762

三 筆

三才丸(補養類)11
 三才封髓丹(收瀉類)120
 三才絳雲錠子(癰疽疔瘡類)566
 三子養親丸(除痰類)411
 三仙丸(收瀉類)119
 三仙丸(除痰類)411
 三仙丹(利溼類)266
 三仙丹(癰疽疔瘡類)565
 三仙散(跌打損傷類)550
 三仙散(痘疹丹毒類)650
 三仙散(耳目口鼻類)701
 三白散(理氣類)164
 三白散(經產類)475
 三白散(癰疽疔瘡類)566
 三妙丸(利溼類)236
 三妙散(利溼類)236
 三物備急丸(攻逐類)141
 三香散(唇齒類)775
 三香靈露散(清暑類)259
 三神丸(經產類)475
 三神丸(癰疽疔瘡類)668

三黃丸(瀉火類)281
 三黃丸(癰疽疔瘡類)566
 三黃散(瀉火類)282
 三黃散(癰疽疔瘡類)566
 三黃散(痘疹丹毒類)650
 三黃散(耳目口鼻類)701
 三黃寶眼丸(跌打損傷類)550
 三聖丸(消導類)92
 三聖丸(遺精類)428
 三聖丸(癰疽疔瘡類)668
 三聖散(祛風類)204
 三聖散(除痰類)411
 三聖膏(消導類)92
 三聖膏(祛風類)204
 三聖膏(雜症及急救類)700
 三稜丸(經產類)476
 三稜丸(小兒類)525
 三稜散(消導類)92
 三稜散(理氣類)164
 三稜散(疝瘕類)322
 三稜散(小兒類)525
 三稜煎(攻逐類)141
 三稜煎丸(消導類)92
 三稜煎丸(小兒類)526
 三層茴香丸(祛寒類)246
 大金花丸(瀉火類)282
 大活絡丹(祛風類)204
 大同膠丸(理血類)180
 大陷胸丸(攻逐類)142
 大黃丸(消導類)93
 大黃丸(疝瘕類)361
 大黃丸(經產類)474

- 大黃丸(耳目口鼻類) ……701
 大黃丸(經症及急救類) ……790
 大黃散(小兒類) ……526
 大黃散(攻逐類) ……142
 大黃散(瀉火類) ……282
 大黃散(癰疽瘡瘍類) ……567
 大黃散(痘疹丹毒類) ……650
 大黃散(雜症及急救類) ……790
 大黃廔蟲丸(埋血類) ……180
 大溫中丸(利溼類) ……267
 大聖散(經產類) ……475
 大聖散(痘疹丹毒類) ……651
 大補陰丸(補養類) ……11
 大腹皮散(埋氣類) ……164
 大腹皮散(經產類) ……475
 大醒脾散(驚悸類) ……344
 大醒脾散(小兒類) ……527
 小安胃丸(埋氣類) ……164
 小安腎丸(補養類) ……10
 小兒化痰丸(小兒類) ……526
 小兒萬病回春丹(小兒類) 526
 小金丹(癰疽瘡瘍類) ……567
 小阿魏丸(消導類) ……32
 小胃丹(除痰類) ……411
 小胃丹(痔漏崩帶類) ……434
 小胃胸丸(攻逐類) ……142
 小菟絲子丸(補養類) ……10
 小溫中丸(消導類) ……33
 小溫中丸(利溼類) ……267
 小還丹(咽喉類) ……762
 小還丹(雜症及急救類) ……790
 女金丹(經產類) ……476
 女科八珍丸(經產類) ……477
 子苓散(和解類) ……75
 寸金丹(發散類) ……65
 寸金丹(表裏類) ……150
 寸金丹(癰疽瘡瘍類) ……567
 寸金散(埋血類) ……181
 寸金散(癰疽瘡瘍類) ……567
 山查糕(消導類) ……92
 山茱萸丸(祛風類) ……204
 山茱萸丸(耳目口鼻類) ……701
 山藥膏(雜症及急救類) ……790
 川芎丸(祛風類) ……202
 川芎丸(除痰類) ……411
 川芎散(祛風類) ……203
 川芎散(經產類) ……477
 川芎茶調散(發散類) ……66
 川芎茶調散(祛風類) ……203
 川芎茶調散(耳目口鼻類) 701
 上清散(發散類) ……66
 上清散(和解類) ……75
 千金丸(小兒類) ……527
 千金保孕丸(經產類) ……476
 千金保胎丸(經產類) ……476
 千槌膏(癰疽瘡瘍類) ……
 ……(方見神效千槌膏下)

四 筆

- 五子丸(補養類) ……11
 五子衍宗丸(補養類) ……12
 五仁丸(潤燥類) ……274
 五加皮酒(癰瘍類) ……384
 五加皮丸(利溼類) ……268

- 五加皮丸(經產類) 478
 五加皮酒(祛風類) 208
 五加皮散(祛風類) 208
 五加皮散(經產類) 479
 五加皮散(雜症及急救類) 791
 五生丸(祛風類) 208
 五生丸(癰疽類) 336
 五皮散(利溼類) 267
 五灰散(理血類) 181
 五灰散(癰疽瘡瘍類) 569
 五灰散(痘疹丹毒類) 651
 五色丸(癰疽類) 336
 五色丸(疳積類) 362
 五色丸(小兒類) 527
 五色兌金丸(小兒類) 528
 五味子散(收瀉類) 121
 五味子散(補養類) 11
 五味子散(小兒類) 528
 五香丸(理氣類) 166
 五香散(癰疽瘡瘍類) 569
 五香散(發散類) 66
 五香散(消導類) 95
 五香散(理氣類) 166
 五香散(小兒類) 527
 五香散(瘰癧疥癩類) 669
 五香散(咽喉類) 563
 五苓散(利溼類) 268
 五倍子散(痔漏崩帶類) 444
 五倍子散(小兒類) 528
 五倍子散(瘰癧疥癩類) 669
 五倍子散(骨節類) 776
 五疳丸(疳積類) 363
 五疳丸(小兒類) 527
 五退散(祛風類) 208
 五退散(耳目口鼻類) 703
 五淋散(利溼類) 268
 五淋散(淋濁類) 157
 五通丸(癰疽瘡瘍類) 569
 五黃散(瀉火類) 282
 五黃散(癰疽瘡瘍類) 569
 五福化毒丹(小兒類) 528
 五福化毒丹(癰疽瘡瘍類) 571
 五福化毒丹(痘疹丹毒類) 651
 五積散(表裏類) 151
 五疔丸(癰疽類) 337
 五疔丸(疳積類) 363
 五膽丸(耳目口鼻類) 703
 五寶丹(癰疽瘡瘍類) 570
 五寶散(癰疽瘡瘍類) 570
 不二散(收瀉類) 121
 不二散(癰疽瘡瘍類) 573
 不二散(痘疹丹毒類) 651
 六一散(清暑類) 260
 六一散(清熱類) 294
 六合定中丸(和解類) 75
 六君子丸(補養類) 12
 六味地黃丸(補養類) 12
 六神丸(疳積類) 363
 六神丸(咽喉類) 429
 六神丸(咽喉類) 763
 六神散(補養類) 12
 六神散(小兒類) 528
 化毒丹(攻逐類) 143

- 化毒丹(雜症及急救類) …791
 化痞膏(消導類) …94
 化痞膏(攻逐類) …143
 化痞膏(瘰癧疥癬類) …670
 化痰丸(除痰類) …412
 化癖丸(消導類) …95
 化癖丸(理氣類) …163
 化蟲丸(殺蟲類) …303
 化蟲丸(疳積類) …363
 分心氣飲(和解類) …76
 分心氣飲(理氣類) …167
 勾氣散(消導類) …95
 勾氣散(理氣類) …166
 勾氣散(小兒類) …532
 內傷膏(跌打損傷類) …550
 內托散(癰疽瘡瘍類) …571
 內托散(痘疹丹毒類) …651
 內消散(癰疽瘡瘍類) …571
 內消散(瘰癧疥癬類) …638
 內消散(耳目口鼻類) …703
 內消瘰癧丸(瘰癧疥癬類) 668
 中滿分消丸(利溼類) …269
 太乙膏(癰疽瘡瘍類) …568
 太乙神鍼方(祛風類) …209
 天王補心丹(補養類) …14
 天仙藤散(除痰類) …412
 天仙藤散(經產類) …478
 天花散(痘疹丹毒類) …353
 天竺黃散(瀉火類) …282
 天竺黃散(驚悸類) …344
 天竺黃散(小兒類) …530
 天門冬丸(消導類) …95
 天門冬丸(理氣類) …167
 天門冬丸(除痰類) …412
 天門冬丸(雜症及急救類) 791
 天南星丸(除痰類) …412
 天南星散(祛風類) …206
 天南星散(驚悸類) …344
 天南星散(經產類) …478
 天真丸(補養類) …13
 天麻丸(祛風類) …205
 天麻丸(咳嗽類) …403
 天麻丸(經產類) …477
 天麻丸(小兒類) …530
 天麻散(祛風類) …205
 天麻散(經產類) …478
 孔聖枕中丹(補養類) …14
 巴豆丸(攻逐類) …144
 巴豆丸(除痰類) …413
 巴豆膏(殺蟲類) …304
 巴戟丸(補養類) …15
 巴戟丸(雜症及急救類) …792
 心腎丸(補養類) …14
 斗門散(收瀉類) …121
 斗門散(癰疽類) …429
 H精月華光明膏(耳目口
 鼻類) …701
 月白珍珠散(癰疽瘡瘍類) 571
 木瓜丸(瘋癲類) …384
 木瓜丸(小兒類) …529
 木瓜散(祛風類) …209
 木瓜散(痧疫類) …466
 木瓜煎(經產類) …479
 木瓜煎(雜症及急救類) …791

- 木香丸(消導類).....93
 木香丸(祛風類).....209
 木香丸(驚悸類).....315
 木香丸(疳積類).....362
 木香丸(腹痛類).....428
 木香丸(小兒類).....529
 木香散(和解類).....76
 木香散(消導類).....94
 木香散(收瀉類).....120
 木香散(理氣類).....164
 木香散(痛脹類).....323
 木香散(瘰癧類).....428
 木香散(淋瀝類).....458
 木香散(小兒類).....529
 木香散(癰疽疔瘡類).....572
 木香散(痘疹丹毒類).....653
 木香散(瘰癧疥癬類).....669
 木香散(咽喉類).....763
 木香順氣丸(理氣類).....165
 木香順氣散(理氣類).....165
 木香場氣丸(消導類).....94
 木香場氣丸(理氣類).....165
 木香檳榔丸(消導類).....94
 木香檳榔丸(攻逐類).....113
 木通散(攻逐類).....143
 木通散(利溼類).....208
 木通散(經產類).....479
 木通散(癰疽疔瘡類).....572
 止汗散(收瀉類).....120
 止汗散(經產類).....479
 止痛散(發散類).....66
 止淚補肝散(耳目口鼻類) 703
 比金丸(驚悸類).....345
 水眼藥(耳目口鼻類).....703
 水陸二仙膏(收瀉類).....121
 水銀膏(癰疽疔瘡類).....572
 水銀膏(瘰癧疥癬類).....670
 水調膏(癰疽疔瘡類).....573
 水調膏(雜症及急救類).....792
 水澄膏(疳積類).....363
 水澄膏(癰疽疔瘡類).....573
 水澄膏(痘疹丹毒類).....654
 火龍膏(祛風類).....208
 火龍膏(雜症及急救類).....792
 牛黃丸(癰疽類).....335
 牛黃丸(疳積類).....363
 牛黃丸(小兒類).....531
 牛黃散(表裏類).....151
 牛黃散(祛風類).....206
 牛黃散(驚悸類).....344
 牛黃散(小兒類).....531
 牛黃散(癰疽疔瘡類).....574
 牛黃散(痘疹丹毒類).....653
 牛黃膏(癰疽類).....335
 牛黃膏(驚悸類).....344
 牛黃膏(小兒類).....531
 牛黃抱龍丸(祛風類).....206
 牛黃抱龍丸(小兒類).....531
 牛黃清心丸(祛風類).....207
 牛黃清心丸(瀉火類).....232
 牛黃清心丸(癰疽類).....335
 牛黃清心丸(痘疹丹毒類) 653
 牛黃清心丸(雜症及急救
 類).....791

牛勞散(去瘀類).....451
 牛勞子散(小兒類).....351
 牛膝丸(補養類).....15
 牛膝散(經產類).....479
 牛膝膏(淋濁類).....457
 牛膝茶(去瘀類).....153
 升麻散(經產類).....479
 升麻散(小兒類).....529
 升麻散(痘疹丹毒類).....652
 升麻散(咽喉類).....763
 升麻散(特齒類).....776
 升麻膏(小兒類).....529
 升麻膏(癰疽瘡瘍類).....574
 升麻膏(痘疹丹毒類).....652
 丹砂膏(殺蟲類).....101
 丹砂膏(癰疽瘡瘍類).....573
 丹參散(祛風類).....208
 丹參散(經產類).....479
 丹參散(痘疹丹毒類).....654

五 筆

玄參丸(瀉火類).....284
 玄參丸(痘疹丹毒類).....655
 玄參散(癰疽瘡瘍類).....583
 玄參散(骨齒類).....777
 仙半夏(除痰類).....114
 仙靈脾散(祛寒類).....248
 仙靈脾散(經產類).....485
 仙靈脾散(痘疹丹毒類).....655
 代木丸(利溼類).....270
 代抵當丸(理血類).....183
 加味太乙膏(癰疽瘡瘍類).....585

加味北黃丸(補養類).....15
 加減地黃丸(收瀉類).....123
 加減地黃丸(理血類).....182
 加味地黃丸(痔漏崩帶類).....445
 加味定志丸(除痰類).....415
 加味定志丸(耳目口鼻類).....706
 加味虎潛丸(補養類).....16
 加味清胃散(發散類).....67
 加味駐景丸(耳目口鼻類).....706
 右歸丸(補養類).....17
 史國公藥酒(祛風類).....215
 牛貝丸(除痰類).....413
 半夏丸(消導類).....96
 半夏丸(祛風類).....214
 半夏丸(癰腫類).....337
 半夏丸(除痰類).....413
 半夏丸(小兒類).....534
 牛黃丸(補養類).....19
 半夏散(消導類).....96
 半夏散(癰腫瘡瘍類).....672
 半夏散(咽喉類).....764
 半夏丸(除痰類).....413
 四生丸(理血類).....182
 四生丸(祛風類).....214
 四生丸(瀉火類).....283
 四生丸(中風類).....331
 四君子丸(補養類).....16
 四物益母丸(經產類).....482
 四紅丸(經產類).....481
 四消丸(消導類).....98
 四神丸(收瀉類).....122
 四神丸(理氣類).....167

- 四神丸(祛寒類)247
 四神丸(耳目口鼻類)707
 四神散(理血類)182
 四神散(祛風類)214
 四神散(瘡瘍類)430
 四聖丸(癰疽瘡瘍類)583
 四聖散(經產類)482
 四聖散(小兒類)534
 四聖散(癰疽瘡瘍類)584
 四聖散(瘰癧疥癬類)672
 四聖散(雜症及急救類) ...793
 四製香附丸(理氣類)168
 四製香附丸(經產類)482
 四寶丹(耳目口鼻類)708
 四寶丹(雜症及急救類) ...793
 外科蟾酥丸(癰疽瘡瘍類) 585
 左金丸(瀉火類)284
 左經丸(瘰癧類)384
 左龍丸(祛風類)214
 左歸丸(補養類)17
 平胃丸(消導類)96
 平氣散(理氣類)168
 平補鎮心丸(補養類)18
 平瘡養脾丸(消導類)98
 必效散(經產類)485
 必效散(瘰癧疥癬類)670
 必勝散(理血類)183
 必勝散(雜症及急救類) ...793
 戊己丸(瘰癧類)430
 打老兒丸(補養類)17
 正元丹(經產類)485
 正舌散(祛風類)214
 正舌散(驚悸類)345
 正氣散(和解類)77
 正氣散(理氣類)168
 正氣天香散(理氣類)168
 玉紅膏(癰疽瘡瘍類)578
 玉容丸(癰疽瘡瘍類)579
 玉容粉(癰疽瘡瘍類)579
 玉容散(癰疽瘡瘍類)579
 玉粉丸(除痰類)415
 玉粉散(祛寒類)247
 玉粉散(瘡瘍類)430
 玉粉散(小兒類)533
 玉真散(祛風類)213
 玉真散(跌打損傷類)551
 玉屏風散(補養類)18
 玉帶膏(唇齒類)776
 玉液金丹(經產類)483
 玉雪救苦丹(表裏類)152
 玉樞丹(祛風類)213
 玉樞丹(咽喉類)763
 玉鎖匙(耳目口鼻類)707
 玉鎖匙(咽喉類)763
 玉鑰匙(咽喉類)763
 玉露散(經產類)483
 玉露散(痘疹丹毒類)655
 玉泉散(唇齒類)776
 瓜蒂散(和解類)77
 瓜蒂散(小兒類)534
 瓜蒂散(癰疽瘡瘍類)584
 瓜蒂散(咽喉類)764
 瓜囊散(瘰癧類)430
 瓜囊散(癰疽瘡瘍類)584

- 甘草散(小兒類)582
 甘菊花露(補養類)13
 甘露漿(表裏類)152
 甘露散(補養類)16
 甘露飲(瀉火類)283
 甘露飲(骨節類)777
 甘露膏(清熱類)291
 甘露消導丹(瀉火類)283
 生地黄丸(表裏類)153
 生地黄散(理血類)181
 生地黄散(小兒類)533
 生地黄散(癰疽瘡瘍類)578
 生地黄散(耳目口鼻類)707
 生地黄飲(理血類)181
 生地黄飲(潤燥類)274
 生肌散(附生肌八寶丹)
 (癰疽瘡瘍類)575
 生肌散(痘疹丹毒類)654
 生肌散(骨節類)777
 生肌桃花散(癰疽瘡瘍類)578
 生肌乾膿散(瘰癧疥癬類)672
 生乾地黄丸(潤燥類)274
 生乾地黄散(經產類)485
 生乾地黄丸(小兒類)533
 生乾地黄散(小兒類)533
 生乾地黄散(癰疽瘡瘍類)578
 生犀角散(和解類)77
 生犀角散(除痰類)415
 生熟地黄丸(理血類)182
 生熟地黄丸(癰疽瘡瘍類)578
 生熟地黄丸(耳目口鼻類)707
 失笑散(經產類)484
 失笑散(骨節類)777
 石灰散(癰疽瘡瘍類)584
 石灰散(雜症及急救類)793
 石決明散(耳目口鼻類)704
 石刻安腎丸(補養類)19
 石南散(小兒類)534
 石南散(癰疽瘡瘍類)585
 石韋散(淋濁類)458
 石斛夜光丸(耳目口鼻類)705
 石蓮散(經產類)480
 石蓮散(癰疽類)430
 石燕丹(淋濁類)458
 石燕丹(耳目口鼻類)704
 石仔散(表裏類)153
 石膏散(祛風類)213
 白玉膏(癰疽瘡瘍類)579
 白朮丸(補養類)20
 白朮丸(消導類)95
 白朮丸(理氣類)167
 白朮丸(理血類)183
 白朮丸(除痰類)414
 白朮酒(祛風類)209
 白朮酒(利溼類)269
 白朮散(和解類)76
 白朮散(消導類)96
 白朮散(救瀉類)122
 白朮散(表裏類)153
 白朮散(理氣類)167
 白朮散(經產類)480
 白朮散(小兒類)533
 白芷丸(發散類)66
 白芷丸(祛風類)210

白芷散(祛風類)210
 白芷散(祛寒類)247
 白芷散(痔漏崩帶類)445
 白芷散(腎齒類)777
 白花蛇丸(祛風類)210
 白花蛇丸(癰疽瘡瘍類)583
 白花蛇丸(瘰癧疥癬類)671
 白花蛇酒(祛風類)211
 白花蛇酒(癰疽瘡瘍類)583
 白花蛇散(祛風類)212
 白花蛇散(痘疹丹毒類)654
 白花蛇散(瘰癧疥癬類)671
 白花蛇膏(和解類)77
 白花蛇膏(癰疽類)337
 白金丸(除痰類)414
 白金散(癰疽類)337
 白金散(痔漏崩帶類)444
 白金散(癰疽瘡瘍類)580
 白附子散(祛風類)212
 白附子散(瘰癧疥癬類)671
 白茯苓丸(驚悸類)345
 白茯苓丸(雜症及急救類) 793
 白荷花露(清暑類)260
 白降丹(癰疽瘡瘍類)581
 白蒺藜散(祛風類)212
 白蒺藜散(瀉火類)284
 白蒺藜散(瘰癧疥癬類)671
 白喉鳳衣散(咽喉類)761
 白鳳丸(經產類)480
 白膏藥(癰疽瘡瘍類)582
 白膠香散(癰疽瘡瘍類)583
 白膠香散(雜症及急救類) 793

白龍丸(消導類)96
 白龍丸(利溼類)269
 白龍丸(淋濁類)459
 白龍散(小兒類)533
 白龍散(耳目口鼻類)706
 白薇丸(經產類)481
 白薇散(經產類)481
 白薇散(癰疽瘡瘍類)582
 白芨散(祛風類)212
 白芨散(除痰類)414
 白芨散(耳目口鼻類)706
 白礬散(癰疽瘡瘍類)582
 白礬散(瘰癧疥癬類)670
 白礬散(雜症及急救類)792
 立消散(利溼類)270
 立消散(癰疽瘡瘍類)574
 立效散(理血類)183
 立效散(淋濁類)458
 立效散(經產類)483
 立效散(癰疽瘡瘍類)575
 立效散(瘰癧疥癬類)672
 立效散(耳目口鼻類)705
 立效散(咽喉類)761
 立馬回行丹(癰疽瘡瘍類) 375
 立聖散(經產類)483
 立應散(癰疽瘡瘍類)575
 立應散(瘰癧疥癬類)672
 立應散(耳目口鼻類)706

六 筆

交感丹(理氣類)169
 交感丹(耳目口鼻類)711

- 交加散(經產類)185
 伏龍肝散(風血類)185
 伏龍肝散(癰疽類)131
 伏龍肝散(痔漏崩帶類)145
 伏龍肝散(經產類)187
 全鹿丸(補養類)22
 全鹿散(祛風類)215
 全鹿散(驚悸類)346
 冰硼散(咽喉類)765
 再造散(表裏類)153
 再造散(祛風類)217
 吉祥丸(經產類)488
 回生丹(消導類)98
 回生丹(經產類)189
 回生丹(跌打損傷類)551
 回生丹(癰疽瘡瘍類)587
 回生丹(咽喉類)764
 回生散(和解類)78
 回生散(驚悸類)346
 回生再造丸(祛風類)217
 回生第一仙丹(跌打損傷類)551
 回陽玉龍膏(癰疽瘡瘍類)588
 地芝丸(耳目口鼻類)709
 地骨皮丸(瀉火類)284
 地骨皮丸(帶下類)64
 地骨皮散(潤燥類)275
 地黃丸(補養類)22
 地黃丸(祛風類)215
 地黃丸(潤燥類)275
 地黃丸(理氣類)138
 地黃丸(淋濁類)459
 地黃丸(經產類)487
 地黃丸(小兒類)534
 地黃丸(痘疹丹毒類)655
 地黃丸(耳目口鼻類)709
 地黃酒(經產類)488
 地黃散(理血類)184
 地黃散(經產類)488
 地黃散(耳目口鼻類)710
 地黃散(咽喉類)765
 地黃煎(和解類)77
 地黃煎(理血類)184
 地黃煎(潤燥類)275
 地黃煎(經產類)488
 地黃煎(癰疽瘡瘍類)586
 地黃飲(理血類)184
 地黃飲(瘋癲類)385
 地黃飲(小兒類)534
 地黃膏(小兒類)535
 地黃膏(癰疽瘡瘍類)586
 地黃膏(耳目口鼻類)710
 地黃煎丸(和解類)78
 地黃煎丸(瀉火類)284
 地榆散(收澀類)123
 地榆散(理血類)185
 地榆散(祛風類)215
 地榆散(癰疽類)131
 地榆散(痔漏崩帶類)145
 地龍散(癰疽類)337
 地龍散(跌打損傷類)552
 地龍散(痘疹丹毒類)656
 地龍散(耳目口鼻類)711
 安胎丸(經產類)487

安宮牛黃丸(瘧疾類)397
 安神丸(瀉火類)285
 安神丸(驚悸類)346
 安神丸(疳積類)364
 安神丸(經產類)487
 安神丸(痘疹丹毒類)656
 安神散(理氣類)168
 安神散(驚悸類)346
 安腎丸(補養類)21
 安腎丸(耳目口鼻類)711
 守中丸(瘋痺類)385
 守中丸(雜症及急救類) ...794
 如神散(理血類)184
 如神散(癰疽瘡瘍類)586
 如神散(瘰癧疥癬類)673
 如聖丸(疳積類)364
 如聖丸(咽喉類)765
 如聖散(和解類)78
 如聖散(理血類)184
 如聖散(祛風類)215
 如聖散(淋濁類)459
 如聖散(經產類)486
 如聖散(小兒類)535
 如聖散(耳目口鼻類)711
 如聖餅(祛風類)215
 如聖餅(癰疽瘡瘍類)586
 如聖餅(痘疹丹毒類)656
 如聖膏(疳積類)364
 如聖膏(經產類)487
 如聖膏(雜症及急救類) ...794
 托裏散(癰疽瘡瘍類)587
 托裏散(痘疹丹毒類)655

托裏消毒散(雜症及急救類)794
 百花膏(除痰類)415
 百花膏(痘疹丹毒類)656
 百效丸(癰疽瘡瘍類)590
 百效丸(瘰癧疥癬類)673
 百部膏(瘰癧疥癬類)673
 竹瀝達痰丸(除痰類)416
 羊肝丸(瘰癧類)433
 羊肝丸(耳目口鼻類)703
 羊腎丸(補養類)21
 羊腎丸(耳目口鼻類)709
 老奴丸(補養類)20
 耳聾左慈丸(耳目口鼻類) 711
 耳疳散(耳目口鼻類)712
 肉豆蔻散(癰疽類)431
 肉豆蔻散(痧疫類)466
 肉桂七味丸(補養類)20
 肉苁蓉丸(補養類)20
 肉苁蓉丸(收澀類)123
 肉苁蓉丸(淋濁類)159
 肉苁蓉丸(耳目口鼻類) ...711
 自然銅散(跌打損傷類) ...552
 至寶丹(祛風類)217
 至寶丹(癰疽瘡瘍類)590
 至寶丹(痘疹丹毒類)656
 至寶丹(辟瘴類)777
 舟車丸(利溼類)270
 艾煎丸(痔漏崩帶類)445
 艾煎丸(經產類)489
 艾附暖宮丸(經產類)489
 西洋參酒(補養類)22

西瓜霜(咽喉類)766

七 筆

何首烏丸(祛風類)221

何首烏丸(癰疽瘡瘍類) ...591

何首烏散(祛風類)221

何首烏散(瘋痹類)385

何首烏散(瘰癧類)132

何首烏散(瘰癧疥癬類) ...673

佛手露(消導類)99

含化丸(瀉火類)285

含化丸(瘰癧疥癬類)674

含化丹(潤燥類)275

含化丹(除痰類)476

利膈丸(消導類)100

利膈散(和解類)79

利驚丸(驚悸類)318

冷哮丸(祛寒類)249

冷哮丸(除痰類)416

吹鼻散(耳目口鼻類)713

吳茱萸丸(和解類)79

吳茱萸丸(理氣類)171

坎宮錠(癰疽瘡瘍類)593

坎離既濟丸(補養類)23

均藥(咽喉類)766

夾紵膏(癰疽瘡瘍類)590

妙香丸(發散類)67

妙香丸(消導類)98

妙香丸(攻逐類)144

妙香散(補養類)23

妙香散(收澀類)125

妙香散(驚悸類)347

妙應丸(消導類)99

妙應丸(殺蟲類)304

妙應散(理氣類)171

半牙散(唇齒類)778

完肌散(癰疽瘡瘍類)592

延胡索散(發散類)67

延胡索散(理氣類)172

延胡索散(經產類)492

延齡廣嗣丸(補養類)23

抑青丸(疏散類)107

抑青丸(瀉火類)285

更衣丸(潤燥類)276

杏仁煎(和解類)79

杏仁煎(小兒類)335

杏仁霜(除痰類)416

束胎丸(經產類)493

杞菊地黃丸(耳目口鼻類) 714

決明丸(耳目口鼻類)712

決明散(痘疹丹毒類)656

決明散(耳目口鼻類)712

決明子丸(疳積類)365

決明子丸(耳目口鼻類) ...712

決明子散(耳目口鼻類) ...713

決明雞肝散(疳積類)365

決明雞肝散(耳目口鼻類) 713

沒石子丸(瘰癧類)432

沒藥丸(理血類)186

沒藥丸(經產類)192

沒藥丸(跌打損傷類)552

沒藥散(疏散類)107

沒藥散(理氣類)171

沒藥散(理血類)186

- 沒藥散(祛風類)221
 沒藥散(癰疽類)386
 沒藥散(跌打損傷類)552
 沒藥散(癰疽瘡瘍類)591
 沉香丸(疳積類)335
 沉香散(和解類)78
 沉香散(厥逆類)107
 沉香散(理氣類)169
 沉香散(淋濁類)459
 沉香散(經止瘡瘍類)592
 沉香散(骨節類)778
 沉香散(和解類)78
 沉香散(理氣類)169
 沉香散(表裏類)153
 沉香化氣丸(理氣類)169
 沉香化滯丸(理氣類)170
 沉香降氣丸(理氣類)170
 沉香降氣散(理氣類)170
 沖和膏(經止瘡瘍類)593
 牡丹散(理血類)185
 牡丹散(經產類)491
 牡丹散(癰疽瘡瘍類)591
 牡蠣丸(收瀉類)123
 牡蠣丸(理血類)186
 牡蠣散(消導類)99
 牡蠣散(收瀉類)124
 牡蠣散(經產類)491
 牡蠣散(癰疽瘡瘍類)592
 阜角丸(祛風類)222
 阜角散(虛散類)107
 阜角散(攻逐類)144
 阜角煎丸(痔漏瘻帶類)446
 阜角煎丸(燥濕濟濟類)674
 阜莢丸(喘咳類)101
 阜莢丸(癰疽瘡瘍類)592
 阜莢丸(耳目口鼻類)714
 良附丸(理氣類)171
 芎芩丸(癰疽瘡瘍類)674
 芎藥散(攻逐類)144
 芎藥散(理氣類)171
 芎藥散(理血類)186
 芎藥散(雜症及急救類)794
 芎黃散(潤燥類)275
 芎黃散(骨節類)778
 芎藭散(理血類)187
 芎藭散(祛風類)220
 芎藭散(經產類)492
 芎藭散(耳目口鼻類)713
 見睨丸(祛寒類)248
 豆淋酒(理血類)187
 豆淋酒(祛風類)221
 豆蔻丸(祛寒類)249
 豆蔻丸(癰疽類)432
 豆蔻丸(痘疹丹毒類)657
 豆蔻散(和解類)79
 豆蔻散(疳積類)365
 赤丸(祛寒類)248
 赤石脂丸(和解類)79
 赤石脂散(嘔吐類)508
 赤石脂散(瘰癧類)132
 赤石脂散(癰疽瘡瘍類)591
 走馬散(祛風類)221
 走馬散(跌打損傷類)553
 車前散(瀉火類)285

車前散(耳目口鼻類)714
 車前子散(淋濁類)460
 車前子散(痧疫類)466
 車釐散(癰疽瘡瘍類)593
 辛夷散(疏散類)106
 辛夷散(祛寒類)249
 辰砂散(癰疽類)338
 辰砂散(痘疹丹毒類)657
 辰砂膏(祛寒類)248
 辰砂膏(驚悸類)347
 防己散(祛風類)218
 防己散(利溼類)270
 防風丸(祛風類)219
 防風丸(驚悸類)347
 防風丸(癰疽類)326
 防風散(和解類)79
 防風散(疏散類)107
 防風散(祛風類)219
 防風散(癰疽類)337
 防風散(癰疽類)386
 防風散(瘰癧類)398
 防風散(小兒類)535
 防風散(痘疹丹毒類)656
 防風散(咽喉類)766
 防風天麻丸(發散類)37
 防風天麻丸(癰疽類)386
 防風通聖散(表裏類)154

八 筆

乳香丸(疏散類)108
 乳香丸(祛風類)226
 乳香丸(驚悸類)350

乳香丸(疔積類)369
 乳香丸(癰疽瘡瘍類)594
 乳香散(癰疽類)433
 乳香散(痔漏崩帶類)446
 乳香散(跌打損傷類)553
 乳香散(癰疽瘡瘍類)594
 乳香散(耳目口鼻類)718
 乳香散(雜症及急救類)795
 乳香膏(跌打損傷類)553
 乳香膏(癰疽瘡瘍類)595
 乳香止痛散(癰疽瘡瘍類) 596
 乳香定痛散(跌打損傷類) 554
 乳香定痛散(癰疽瘡瘍類) 596
 夜光椒紅丸(耳目口鼻類) 717
 使君子丸(殺蟲類)305
 使君子丸(疔積類)368
 使君子丸(小兒類)537
 使君子散(疔積類)368
 兩儀膏(補養類)30
 兔腦丸(經產類)497
 兒茶散(癰疽瘡瘍類)596
 兒茶散(雜症及急救類)795
 卷柏丸(雜症及急救類)795
 卷柏丸(潤燥類)277
 卷柏丸(痔漏崩帶類)447
 卷柏散(痘疹丹毒類)658
 卷柏散(雜症及急救類)795
 知母丸(經產類)494
 知母散(表裏類)154
 知母散(清熱類)291
 知母散(疔積類)369
 知母散(除痰類)418

- 知柏地黃丸(補養類).....29
 固下丸(經產類).....194
 固本丸(補養類).....28
 固真散(補養類).....28
 固氣丸(收瀉類).....125
 固經丸(痔漏崩帶類).....147
 固經丸(經產類).....404
 固陽丸(收瀉類).....125
 固精丸(補養類).....28
 固精丸(收瀉類).....126
 固精丸(淋濁類).....160
 固齒白玉膏(髒瘻類).....778
 固齒擦牙散(髒齒類).....779
 奔豚丸(疝瘕類).....324
 定血散(癰疽瘡瘍類).....601
 定志丸(補養類).....29
 定志丸(驚悸類).....348
 定志丸(耳目口鼻類).....718
 定命散(疳積類).....369
 定命散(小兒類).....533
 定喘丸(除痰類).....419
 定痛丸(祛風類).....224
 定痛散(和解類).....80
 定痛散(理血類).....190
 定痛散(祛寒類).....251
 定痛散(疝瘕類).....325
 定痛散(跌打損傷類).....554
 定搐散(驚悸類).....318
 所以散丸(經產類).....196
 抱龍丸(疏散類).....108
 抱龍丸(雜症及急救類).....796
 抽刀散(理血類).....189
 抽刀散(祛寒類).....251
 抽刀散(經產類).....194
 抵當丸(理血類).....189
 抵聖散(經產類).....195
 抵聖散(耳目口鼻類).....719
 拔毒散(癰疽瘡瘍類).....590
 拔毒散(痘疹丹毒類).....657
 拔毒散(癰癰疥癬類).....675
 拔毒膏(癰疽瘡瘍類).....599
 拔毒膏(痘疹丹毒類).....658
 昆布丸(疝瘕類).....324
 昆布丸(咽喉類).....768
 昆布散(癰癰疥癬類).....674
 明目地黃丸(耳目口鼻類).....717
 明目疾黎丸(耳目口鼻類).....717
 明目黃連膏(耳目口鼻類).....718
 松花散(理血類).....189
 松花散(耳目口鼻類).....718
 枇杷膏(補養類).....30
 枇杷葉散(清暑類).....260
 枇杷葉散(除痰類).....419
 枇杷葉散(耳目口鼻類).....719
 枇杷葉膏(咳嗽類).....403
 枇杷葉露(咳嗽類).....104
 治濁固本丸(利溼類).....271
 河車丸(補養類).....25
 河車大造丸(補養類).....26
 法製半夏(除痰類).....416
 法製陳皮(除痰類).....417
 法製黑豆(耳目口鼻類).....719
 狗寶丸(和解類).....81
 狗寶丸(癰疽瘡瘍類).....601

金黃散(癰疽瘡瘍類)597
 金黃散(痘疹丹毒類)657
 金黃如意散(癰疽瘡瘍類)598
 金傷散(癰疽瘡瘍類)597
 金鈴散(疝瘕類)323
 金鈴子散(聖氣類)173
 金鈴子散(經產類)494
 金匱腎氣丸(補養類)25
 金箔丸(收瀉類)126
 金箔丸(癰疽類)338
 金箔鎮心丸(驚悸類)349
 金銀散(癰疽瘡瘍類)597
 金銀花露(癰疽瘡瘍類)598
 金鎖散(癰疽瘡瘍類)597
 金鎖匙(咽喉類)767
 金鎖匙散(咽喉類)767
 金鎖固精丸(收瀉類)123
 金蟾丸(小兒類)537
 金櫻膏(收瀉類)126
 阿膠(補養類)30
 阿膠丸(癰疽類)433
 阿膠丸(經產類)493
 阿膠散(經產類)493
 阿膠散(耳目口鼻類)719
 阿膠散(緩症及急救類)795
 阿魏丸(消導類)100
 阿魏丸(祛寒類)251
 阿魏丸(疝瘕類)325
 阿魏丸(疳積類)369
 阿魏膏(消導類)100
 阿魏化堅膏(癰疽瘡瘍類)602
 附子丸(癰疽類)387

附子丸(耳目口鼻類)719
 附子散(祛風類)225
 附子散(祛寒類)250
 附子散(疝瘕類)387
 附子散(癰疽類)432
 附子散(經產類)495
 附子散(癰疽瘡瘍類)601
 附子七味丸(補養類)28
 附子都氣丸(補養類)28
 附桂存(祛風類)325
 青州白丸子(除痰類)418
 青金丸(聖氣類)173
 青金丸(驚悸類)349
 青金丸(除痰類)417
 青金丸(耳目口鼻類)716
 青金丹(嘔吐類)399
 青金丹(疳積類)367
 青金散(瘰癧疥癬類)674
 青金錠(除痰類)417
 青金錠(癰疽瘡瘍類)602
 青娥丸(補養類)27
 青和子丸(耳目口鼻類)716
 青蒿丸(和解類)81
 青蒿丸(疳積類)367
 青蒿散(潤燥類)276
 青黛丸(攻逐類)141
 青黛丸(驚悸類)349
 青黛丸(疳積類)367
 青黛散(疳積類)368
 青黛散(痘疹丹毒類)658
 青黛散(瘰癧疥癬類)675
 青黛散(耳目口鼻類)716

青黛散(咽喉類)767
 青礞石丸(除痰類)417
 青礞丸(瀉火類)285
 青鹽凍皮(除痰類)418

九 筆

保安丸(泄瀉類)312
 保安丸(癰疽類)340
 保安萬應丹(癰疽疔瘡類) 607
 保命丸(祛風類)227
 保命丸(驚悸類)350
 保和丸(消導類)102
 厚朴散(收瀉類)127
 厚朴散(泄瀉類)311
 厚朴散(癰疽類)434
 前胡散(和解類)82
 前胡散(疝瘕類)325
 前胡散(疝積類)371
 前胡散(除痰類)419
 南星散(祛風類)229
 南星散(驚悸類)350
 南星散(痘疹丹毒類)658
 南星散(瘰癧疥癬類)678
 宣風散(疏瀉類)109
 宣風散(祛風類)228
 封臍散(祛風類)227
 封臍散(利溼類)271
 封臍散(發散類)69
 封臍丹(補養類)33
 封臍丹(收瀉類)127
 建神麴(表裏類)156
 急風散(祛風類)226

威喜丸(收瀉類)127
 威靈仙丸(潤燥類)277
 威靈仙丸(痔漏崩帶類) ...448
 福壽玉靈丸(祛寒類)251
 春雪膏(耳目口鼻類)722
 胡粉散(癰疽瘡瘍類)604
 胡粉散(瘰癧疥癬類)677
 胡粉散(雜症及急救類) ...796
 胡麻丸(祛風類)228
 胡麻丸(瘰癧疥癬類)678
 胡黃連丸(和解類)81
 胡黃連丸(疝積類)370
 胡黃連散(和解類)82
 胡黃連散(疝積類)371
 胡黃連散(癰疽類)435
 胡黃連散(經產類)499
 胡蘆巴丸(祛寒類)252
 胡蘆巴丸(疝瘕類)325
 胡蘆巴散(理氣類)173
 枳朮丸(消導類)101
 枳朮導滯丸(攻逐類)145
 枳殼丸(攻逐類)145
 枳殼丸(表裏類)156
 枳殼丸(癰疽疥癬類)677
 枳殼散(發散類)69
 枳殼散(理氣類)173
 枳殼散(瘰癧疥癬類)677
 枳實散(和解類)82
 枳實散(消導類)101
 枳實散(瘋癲類)388
 枳實消痞丸(消導類)101
 柏子仁丸(收瀉類)127

- 柏子仁丸(經產類)197
 柏子仁散(經產類)498
 柏子仁散(小兒類)538
 柏子養心丸(補養類).....32
 柏子養心丸(經產類)498
 柴胡散(表裏類)155
 柴胡散(疳積類)371
 柴胡散(瘧痢類)131
 柴胡散(耳目口鼻類)721
 枯痔散(痔漏崩帶類)447
 活血丹(理血類)191
 活血丹(跌打損傷類)554
 活血散(跌打損傷類)555
 活血散(痘疹丹毒類)659
 活血潤腸丸(潤燥類)277
 活命金丹(風痺類)388
 活絡丹(祛風類)228
 洗心散(表裏類)156
 洗心散(瀉火類)287
 洗心散(疳積類)372
 洗心散(小兒類)538
 洗肝散(耳目口鼻類)719
 洞天救苦丹(癰疽瘡瘍類) 608
 珍珠丸(補養類).....32
 珍珠散(癰疽瘡瘍類)302
 珍珠散(痘疹丹毒類)659
 珍珠散(耳目口鼻類)721
 珍珠子丸(小兒類)538
 珍珠生肌散(癰疽瘡瘍類) 602
 禹餘糧丸(利溼類)71
 禹餘糧丸(經產類)498
 禹餘糧丸(耳目口鼻類) ...722
 紅丸(攻逐類)146
 紅丸(疳積類)372
 紅升丹(癰疽瘡瘍類)603
 紅玉散(癰疽瘡瘍類)603
 紅玉散(耳目口鼻類)720
 紅玉散(雜症及急救類) ...796
 紅玉膏(癰疽瘡瘍類)603
 紅花散(理血類)190
 紅花散(經產類)497
 紅花散(耳目口鼻類)720
 紅散(痘疹丹毒類)659
 紅散(雜症及急救類)796
 紅棉散(耳目口鼻類)720
 紅膏藥(風痺類)388
 紅膏藥(癰疽瘡瘍類)604
 紅綿散(發散類).....68
 紅綿散(祛風類)228
 紅綿散(驚悸類)350
 紅藍花散(經產類)197
 紅藍花散(耳目口鼻類) ...721
 胃痛散(理氣類)174
 胃苓丸(理血類)190
 胎產金丹(經產類)499
 范志麴(表裏類)156
 苦參丸(絞收類)108
 苦參丸(祛風類)226
 苦參丸(瘰癧疥癬類)675
 芩參散(祛風類)227
 芩參散(瘰癧疥癬類)677
 赴筵散(耳目口鼻類)721
 飛龍奪命丹(清暑類)262
 飛龍奪命丹(痧疫類)467

飛龍奪命丹(經產瘡瘍類) 605

飛龍接骨還元水火仙丹

(癰疽瘡瘍類)606

香甲丸(和解類).....82

香甲丸(增積類)371

香朴丸(理氣類)173

香朴丸(泄瀉類)312

香附散(理氣類)173

香附散(理血類)191

香附散(疝瘕類)325

香附散(耳目口鼻類)721

香附餅(癰疽瘡瘍類)608

香附餅(瘰癧疥癬類)678

香砂枳朮丸(消導類)102

香砂養胃丸(消導類)102

香砂六君子丸(補養類).....32

香桂散(經產類)409

香薷丸(補養類).....31

香薷丸(泄瀉類)312

香薷丸(瘧疾類)433

香參丸(瀉火類)286

香參丸(瘧疾類)434

香鼓散(痧瘧類)436

香鼓散(雜症及急救類) ...797

香連丸(瀉火類)287

香連丸(泄瀉類)312

香連丸(瘧疾類)433

香椨丸(消導類)102

香椨丸(攻逐類)145

香橘餅(消導類)102

香橘餅(增積類)371

香薷丸(清暑類)261

香薷散(清暑類)262

香蘇散(發散類).....68

香蘇散(利溼類)271

十 筆

凌霄花散(經產類)500

凌霄花散(瘰癧疥癬類) ...681

凌霄花散(耳目口鼻類) ...722

射干散(除痰類)419

射干散(癰疽瘡瘍類)616

射干散(咽喉類)768

夏枯草膏(瘰癧疥癬類) ...681

桑麻丸(耳目口鼻類)726

桑白皮散(理氣類)174

桑白皮散(理血類)191

桑白皮散(咽喉類)768

桑寄生散(痔漏崩帶類) ...449

桑寄生散(經產類)503

桑螵蛸散(補養類).....33

桑螵蛸散(收澀類)128

桑螵蛸散(癰疽瘡瘍類) ...615

桑椨膏(補養類).....33

桃仁丸(和解類).....84

桃仁丸(雜症及急救類) ...797

桃仁散(理血類)192

桃仁散(疝瘕類)326

桃仁散(經產類)504

桃仁煎(疝瘕類)326

桃仁煎(經產類)504

桃花丸(增積類)372

桃花丸(瘧疾類)435

桃花散(攻逐類)146

- 桃花散(溫直瘡瘍類)613
 桃花散(耳目口鼻類)720
 桃花散(雜症及急救類)797
 桃紅散(疳積類)372
 桃紅散(癰疽瘡瘍類)613
 桃紅散(耳目口鼻類)725
 桃紅散(咽喉類)709
 桃符丸(攻逐類)146
 桂香丸(祛寒類)252
 桂香丸(疳積類)371
 桂香散(祛寒類)252
 桂香散(經產類)503
 桂苓丸(利溼類)272
 桂附丸(祛寒類)252
 桂附丸(癰疽瘡瘍類)611
 桂附地黄丸(補益類)34
 桔梗丸(瘰癧類)435
 桔梗丸(耳目口鼻類)723
 桔梗散(經產類)500
 桔梗根散(瀉火類)287
 桔梗散(痘疹丹毒類)659
 酒黃當歸丸(疳積類)328
 酒黃當歸丸(癰疽類)340
 消乳丸(消導類)103
 消毒散(癰疽瘡瘍類)612
 消毒散(痘疹丹毒類)659
 消毒散(瘰癧疥癬類)680
 消毒散(耳目口鼻類)722
 消風散(祛風類)280
 消核散(瘰癧疥癬類)680
 消疳丸(小兒類)533
 消疳無價散(小兒類)539
 消食丸(小兒類)538
 消痔丸(痔漏類)263
 消痞狗皮膏(消導類)104
 消痞阿魏丸(消導類)104
 消腫散(癰疽瘡瘍類)613
 消管丸(痔漏附帶類)448
 消積丸(消導類)103
 消積丸(疳積類)374
 消翳散(耳目口鼻類)722
 消翳復明膏(耳目口鼻類) 723
 浮萍散(瘰癧疥癬類)680
 浮萍散(耳目口鼻類)727
 海金沙散(淋瀝類)461
 海桐皮散(癰疽類)389
 海參丸(補養類)35
 海蛤丸(疳積類)326
 海蛤丸(除痰類)420
 海蛤散(理氣類)175
 海蛤散(理血類)192
 海藻丸(疳積類)327
 海藻丸(瘰癧疥癬類)680
 烏金丸(經產類)500
 烏金丹(耳目口鼻類)724
 烏金丹(雜症及急救類)797
 烏金散(收瀉類)128
 烏金散(理血類)191
 烏金散(潤燥類)277
 烏金散(瀉火類)288
 烏金散(癰疽類)340
 烏金散(經產類)500
 烏金散(癰疽瘡瘍類)611
 烏金膏(疳積類)373

- 烏金膏(疳瘡類)501
 烏金膏(癰疽疔毒類)311
 烏金膏(遠年丹毒類)359
 烏金膏(耳目口鼻類)721
 烏金膏(疔齒類)779
 烏骨雞丸(經產類)501
 烏梅丸(收瀉類)128
 烏梅丸(殺蟲類)305
 烏梅丸(經產類)501
 烏梅散(疳積類)323
 烏梅散(遠年類)435
 烏犀丸(殺蟲類)305
 烏犀丸(疳積類)373
 烏犀丸(耳目口鼻類)725
 烏蛇丸(祛風類)232
 烏蛇丸(瘰癧疥癬類)678
 烏蛇散(祛風類)232
 烏蛇散(瘋痺類)389
 烏蛇散(瘰癧疥癬類)678
 烏蛇散(除痰類)420
 烏頭丸(祛寒類)253
 烏頭丸(瘋痺類)390
 烏頭丸(瘰癧疥癬類)379
 烏龍丸(疏瀉類)110
 烏龍丸(理氣類)175
 烏龍膏(跌打損傷類)555
 烏龍膏(癰疽疔毒類)312
 烏龍膏(咽喉類)769
 烏龍膏(雜症及急救類)797
 烏雞丸(經產類)501
 烏雞白鳳丸(經產類)502
 烏頭骨丸(經產類)503
 珠貴散(咽喉類)769
 疳積散(小兒類)540
 益元散(清暑類)262
 益母丸(經產類)504
 益母膏(經產類)506
 益氣聰明丸(耳目口鼻類) 727
 真武丸(祛寒類)253
 真珠丸(收瀉類)128
 真珠丸(驚悸類)351
 真珠丸(疳積類)373
 真珠散(理氣類)175
 真珠散(驚悸類)351
 真珠散(疳積類)373
 真珠散(耳目口鼻類)723
 真珠膏(耳目口鼻類)721
 破積散(攻逐類)147
 破積散(癰疽疔毒類)615
 秘旨安神丸(補養類)34
 神朮丸(發汗類)69
 神朮丸(嘔吐類)309
 神功丸(理血類)192
 神功丸(瀉熱類)278
 神功散(癰疽疔毒類)308
 神功散(遠年丹毒類)359
 神功散(耳目口鼻類)726
 神萆散(疏瀉類)109
 神效方(理血類)192
 神效方(疔漏崩帶類)119
 神效方(癰疽疔毒類)308
 神效方(瘰癧疥癬類)679
 神效散(瘰癧類)335
 神效散(跌打損傷類)555

- 神效散(腎齒類)779
 神效膏(祛風類)233
 神效膏(經產類)506
 神效千槌膏 [附]千槌膏
 (雜症瘡瘍類)609
 神效瓜蔓散(瘰癧疥癬類) 679
 神效虎肚丸(補養類)35
 神效消癰丸(瘰癧疥癬類) 680
 神犀丹(清熱類)295
 神異膏(癰疽瘡瘍類)608
 神異膏(瘰癧疥癬類)679
 神聖丸(理血類)192
 神應丸(腰膝類)783
 神應丸(祛寒類)253
 神應散(痔漏崩帶類)449
 神應散(經產類)506
 神應散(癰疽瘡瘍類)609
 神應膏(痔漏崩帶類)449
 神應膏(耳目口鼻類)726
 神應養真丹(祛風類)233
 神趨(消導類)101
 祛風丸(祛風類)233
 祛風丸(瘰癧疥癬類)681
 祛風散(經產類)506
 祛風至寶丹(祛風類)233
 祛痰丸(除痰類)120
 秦芫丸(和解類)84
 秦芫丸(瘰癧疥癬類)680
 秦芫散(和解類)84
 秦芫散(經產類)506
 秦芫散(雜症及急救類) ...798
 秦芫口朮丸(痔漏崩帶類) 449
 純陽正氣丸(和解類)84
 茸桂百補丸(補養類)35
 茵陳酒(祛風類)234
 茵陳五苓散(利溼類)272
 茶調散(祛風類)234
 茶調散(經產類)506
 茯苓丸(和解類)83
 茯苓丸(疳積類)372
 茯苓丸(除痰類)120
 茯苓丸(淋濁類)461
 茯苓丸(經產類)504
 茯苓丸(小兒類)539
 茯苓丸(癰疽瘡瘍類)614
 茯苓散(疳積類)372
 茯苓散(淋濁類)461
 茯苓散(經產類)504
 茯苓散(雜症及急救類) ...798
 茯神散(和解類)33
 茯神散(鎮攝類)133
 茯神散(祛風類)229
 茯神散(殺蟲類)306
 茯神散(耳目口鼻類)726
 茯菟丸(收瀉類)129
 茯菟丸(鎮攝類)134
 草豆蔻丸(疏散類)110
 草豆蔻散(和解類)82
 草豆蔻散(理氣類)175
 草豆蔻散(嘔吐類)309
 草豆蔻散(腎齒類)779
 草靈丹(補養類)33
 草靈丹(耳目口鼻類)727
 茜根散(理血類)191

荆芥散(理血類)198
 荆芥散(祛風類)231
 荆芥散(經產類)507
 荆芥散(痘疹丹毒類)659
 荆芥散(瘰癧疥癬類)681
 茱萸內消丸(疝瘕類)327
 追毒丸(痔漏崩帶類)450
 追毒丸(癰疽瘡瘍類)614
 追風散(疏散類)110
 追風散(祛風類)229
 追風散(咽喉類)769
 追蟲丸(殺蟲類)306
 退赤散(耳目口鼻類)725
 退毒散(發散類)70
 退毒散(癰疽瘡瘍類)615
 退管丸(痔漏崩帶類)450
 退翳丸(耳目口鼻類)726
 除溼丹(攻逐類)146
 除溼丹(利溼類)272
 馬齒莧散(癰疽瘡瘍類)615
 馬齒莧散(痘疹丹毒類)660
 骨碎補丸(疏散類)109
 骨碎補丸(痔漏崩帶類)450
 骨科破瘀膏(跌打損傷類) 556
 鬼箭羽散(祛風類)234
 鬼箭羽散(小兒類)539

十一筆

乾眼藥(耳目口鼻類)736
 乾蟾丸(驚悸類)352
 健脾丸(和解類)86
 參朮散(補養類)37

參朮散(收澀類)130
 參朮膏(補養類)37
 參乳丸(補養類)38
 參香散(補養類)38
 參香散(習氣類)175
 參苓散(驚悸類)353
 參苓散(疳積類)375
 參苓白朮散(補養類)38
 參桂鹿茸丸(補養類)39
 參茸衛生丸(補養類)39
 參桂百補丸(補養類)39
 參茸固本丸(補養類)39
 參麥六味丸(補養類)40
 婦寶勝金丹(經產類)510
 密陀僧散(祛風類)237
 密陀僧散(癰癤類)341
 密陀僧散(癰疽瘡瘍類)616
 密陀僧散(骨齒類)781
 密陀僧散(雜症及急救類) 498
 密蒙花散(耳目口鼻類)727
 救苦散(經產類)509
 救苦散(耳目口鼻類)730
 救睛丸(耳目口鼻類)730
 敗毒散(發散類)70
 敗毒散(瀉火類)290
 啓宮丸(經產類)509
 啓脾丸(和解類)88
 啓脾丸(疳積類)375
 接骨丹(跌打損傷類)556
 接骨散(跌打損傷類)557
 控涎丹(除痰類)422
 排風散(祛風類)237

- 排風散(耳目口鼻類)736
 排膿散(癰疽瘡瘍類)618
 既濟丸(收瀉類)130
 既濟丸(祛寒類)255
 梅花點舌丹(癰疽瘡瘍類) 621
 梅蘇丸(潤燥類)279
 梔子仁散(瘡瘍類)436
 梔子仁散(痘疹丹毒類) ...662
 殺疳散(疳積類)374
 涼膈散(瀉火類)288
 清六丸(清暑類)264
 清心丸(鎮攝類)135
 清心丸(清熱類)295
 清心丸(驚悸類)352
 清心丸(癰疽瘡瘍類)617
 清心散(清熱類)295
 清心散(耳目口鼻類)728
 清心牛黃丸(祛風類)236
 清心導痰丸(祛風類)237
 清心導痰丸(除痰類)421
 清肺散(利溼類)273
 清肺散(痘疹丹毒類)662
 清肺散(耳目口鼻類)728
 清咽太平丸(瀉火類)289
 清音丸(潤燥類)279
 清音丸(咽喉類)770
 清胃散(清熱類)296
 清胃散(泄瀉類)313
 清胃散(耳目口鼻類)728
 清胃散(咽喉類)770
 清胃散(骨齒類)780
 清神散(疏散類)112
 清神散(祛風類)236
 清神散(驚悸類)352
 清神散(癰疽瘡瘍類)617
 清氣化痰丸(除痰類)421
 清涼膏(瀉火類)289
 清涼膏(癰疽瘡瘍類)617
 清涼膏(耳目口鼻類)728
 清肝保腦丸(耳目口鼻類) 729
 清涼膏(絞症及急救類) ...798
 清涼拈痛膏(癰疽瘡瘍類) 618
 清涼拔毒膏(癰疽瘡瘍類) 618
 清膏藥肉(癰疽瘡瘍類) ...618
 清暑益氣丸(清暑類)264
 清熱解毒丸(清熱類)296
 牽牛丸(祛寒類)255
 牽牛丸(殺蟲類)306
 牽正散(中風類)332
 犀角丸(疏散類)110
 犀角丸(攻逐類)147
 犀角丸(祛風類)235
 犀角丸(瀉火類)289
 犀角丸(癰疽類)610
 犀角丸(瘡瘍類)436
 犀角丸(痘疹丹毒類)661
 犀角丸(瘰癧疥癬類)682
 犀角丸(耳目口鼻類)729
 犀角散(疏散類)111
 犀角散(鎮攝類)135
 犀角散(祛風類)235
 犀角散(瀉火類)289
 犀角散(清熱類)296
 犀角散(驚悸類)353

- 犀角散(痘疹類)436
犀角散(小兒類)540
犀角散(痘疹丹毒類)661
犀角散(耳目口鼻類)729
犀角消毒散(痘疹丹毒類) 661
犀角解毒丸(痘疹丹毒類) 662
犀角解毒丸(疏風類)112
犀角解毒丸(小兒類)541
犀角飲(腫脹類)616
犀角飲(黃疸類)400
犀角飲(經產類)500
犀角飲(小兒類)511
犀角飲(耳目口鼻類)730
犀角丸(癰疽瘡瘍類)622
理中丸(祛寒類)254
理中化痰丸(除痰類)422
痔漏丸(痔漏崩帶類)450
硃砂丸(發散類)72
硃砂丸(鎮攝類)134
硃砂丸(祛風類)237
硃砂丸(疳積類)374
硃砂丸(小兒類)542
硃砂膏(驚悸類)551
硃砂膏(小兒類)542
硃砂安神丸(補養類)40
硃砂安神丸(怔忡類)396
硃砂膏(癰疽瘡瘍類)616
細辛散(祛風類)237
細辛散(瘋癲類)390
細辛散(耳目口鼻類)730
細辛散(唇齒類)781
細辛膏(祛寒類)254
細辛膏(耳目口鼻類)731
紫石英丸(經產類)508
紫金丸(積滯類)320
紫金丸(經產類)507
紫金丹(補養類)41
紫金丹(喘咳類)402
紫金丹(經產類)507
紫金丹(咽喉類)769
紫金丹(癰疽瘡瘍類)620
紫金散(咳嗽類)404
紫金散(經產類)507
紫金散(唇齒類)781
紫金散(痘疹丹毒類)660
紫金散(走馬牙疳類)687
紫金膏(風溼類)627
紫金膏(火毒類)690
紫金膏(耳目口鼻類)731
紫金錠(痧脹類)467
紫金錠子(耳目口鼻類)731
紫金錠(癰疽瘡瘍類)620
紫金錠(火毒類)690
紫草散(痘疹丹毒類)660
紫草飲(痘疹丹毒類)661
紫雪(火毒類)689
紫雪(瀉火類)290
紫霜丸(理血類)193
紫霜丸(積滯類)320
紫霜丸(疳積類)375
紫霞丹(癰疽類)437
紫霞丹(火毒類)691
紫霞膏(癰疽瘡瘍類)621
紫霞膏(癰疽瘡瘍類)682

- 羚羊角丸(補養類).....42
 羚羊角丸(耳目口鼻類) ...732
 羚羊角散(和解類).....86
 羚羊角散(理血類)193
 羚羊角散(祛風類)234
 羚羊角散(癰腫類)398
 羚羊角散(經產類)508
 羚羊角散(瘰癧疥癰類) ...682
 羚羊角散(火毒類)692
 羚羊角散(熱脹類)698
 羚羊角散(耳目口鼻類) ...732
 羚羊角散(淋濁類)462
 羚羊角散(經產類)508
 羚羊角散(耳目口鼻類) ...734
 蛇黃丸(癰腫類)341
 蚯蚓散(疳積類)328
 蚯蚓散(癰疽瘡瘍類)622
 貫衆散(火毒類)692
 貫衆散(熱脹類)698
 連翹散(發散類).....71
 連翹散(痰飲類)401
 連翹散(經產類)509
 連翹散(癰疽瘡瘍類)619
 連翹散(疳積丹毒類)662
 連翹散(瘰癧疥癰類)682
 連翹散(發散類).....71
 連翹散(癰疽瘡瘍類)619
 連翹散(耳目口鼻類)735
 透肌散(疳積丹毒類)662
 透骨丹(跌打損傷類)557
 透骨丹(火毒類)692
 逍遙丸(和解類).....84
 逍遙丸(經產類)510
 逍遙散(補養類).....40
 逍遙散(和解類).....85
 逍遙散(積滯類)320
 逍遙散(疳積類)396
 逍遙散(和解類).....88
 連效散(腰膝類)784
 通耳丹(耳目口鼻類)734
 通神丸(驚悸類)352
 通神丸(疳積類)437
 通神散(攻逐類)147
 通神散(耳目口鼻類)734
 通氣散(和解類).....86
 通氣散(理氣類)175
 通氣散(經產類)509
 通氣散(耳目口鼻類)735
 通氣散(咽喉類)770
 通氣散(耳目口鼻類)735
 通聖散(和解類).....87
 通陽丸(瀉痢類)279
 通陽丸(疳積類)322
 通經丸(疳積類)328
 通經丸(經產類)509
 通關散(通利類)115
 通關散(祛風類)236
 通關散(雜症及急救類) ...798
 通關散(驚悸類)352
 通關散(痧度類)467
 陳橘皮散(咳嗽類)404
 雪梨膏(瀉火類)290
 魚鱗種子丸(補養類).....42
 鹿角散(補養類).....35

鹿角散(發散類).....71
 鹿角膠(補養類).....36
 鹿角霜丸(收澀類).....129
 鹿角霜丸(痔漏崩帶類).....452
 鹿角霜丸(淋濁類).....162
 鹿茸丸(補養類).....36
 鹿茸丸(痔漏崩帶類).....451
 鹿茸丸(淋濁類).....461
 鹿茸丸(癰疽瘡瘍類).....622
 鹿茸散(補養類).....36
 鹿茸散(收澀類).....129
 鹿茸散(理血類).....193
 鹿茸散(痔漏崩帶類).....451
 麥門冬丸(清熱類).....296
 麥門冬丸(小兒類).....542
 麥門冬散(清熱類).....296
 麥門冬散(嘔吐類).....309
 麥門冬散(瘰癧類).....398
 麥門冬散(淋濁類).....462
 麥門冬散(經產類).....509
 麥門冬飲(理血類).....193
 麥門冬飲(噎膈類).....322
 麥煎散(和解類).....88
 麥煎散(驚悸類).....353
 麻仁丸(潤燥類).....278
 麻黃散(發散類).....72
 麻黃散(疏散類).....112
 麻黃散(痘疹丹毒類).....663
 麻黃散(雜症及急救類).....798
 麻黃根散(收澀類).....129
 麻藥(麻醉類).....699

十二筆

備急丸(雜症及急救類).....799
 備急散(雜症及急救類).....800
 勝金丸(理血類).....195
 勝金丸(中風類).....332
 勝金丸(癰癧類).....341
 勝金丸(痲痺類).....391
 勝金丹(補養類).....45
 勝金丹(瘰癧類).....441
 勝金丹(經產類).....514
 勝金丹(癰疽瘡瘍類).....623
 勝金丹(雜症及急救類).....801
 勝金散(消導類).....105
 勝金散(癰癧類).....341
 勝金散(經產類).....515
 勝金散(癰疽瘡瘍類).....623
 喚痔散(痔漏崩帶類).....452
 圍藥(腫痛類).....694
 圍瘡藥(腫痛類).....695
 雷志丸(鎮攝類).....135
 雷志膏(瀉瀉類).....342
 雷神膏(驚悸類).....356
 屠蘇酒(表裏類).....157
 復原通氣散(理氣類).....176
 復原通氣散(火毒類).....692
 復原通氣散(腫痛類).....695
 惺惺散(清熱類).....298
 惺惺散(驚悸類).....356
 惺惺散(脾胃類).....785
 換骨丹(通利類).....115
 換骨丹(中風類).....333

- 換骨丹(極痺類)390
 散血膏(跌打損傷類)558
 散血膏(耳目口鼻類)740
 替鍼丸(癰疽瘡瘍類)628
 椒目丸(攻逐類)148
 椒目丸(理血類)195
 桑螵丸(黃疸類)100
 湧泉散(經產類)514
 湧泉膏(補養類)47
 無比散(痘疹丹毒類)663
 無比散(走馬牙疳類)687
 無比散(骨節類)781
 無比山藥丸(補養類)44
 無價散(疝風類)239
 無價散(痘疹丹毒類)663
 無價保真丸(補養類)44
 無憂散(經產類)515
 無憂散(痘疹丹毒類)663
 猴棗散(咳嗽類)405
 猴皮散(耳血類)195
 猴皮散(痔漏腐帶類)453
 斑龍丸(補養類)45
 斑龍之至百補丸(補養類)45
 琥珀丸(理血類)194
 琥珀丸(經產類)512
 琥珀散(和解類)89
 琥珀散(通利類)115
 琥珀散(理血類)195
 琥珀散(中風類)332
 琥珀散(癰疽類)342
 琥珀散(驚悸類)353
 琥珀散(痔漏腐帶類)453
 琥珀散(淋瀝類)462
 琥珀散(經產類)512
 琥珀散(癰疽瘡瘍類)624
 琥珀散(耳目口鼻類)738
 琥珀散(耳目口鼻類)738
 琥珀膏(積滯類)320
 琥珀膏(癰疽瘡瘍類)624
 琥珀膏(凍瘡疥癬類)682
 琥珀多寐丸(補養類)46
 琥珀抱龍丸(驚悸類)354
 琥珀抱龍丸(小兒類)513
 琥珀黑龍丹(經產類)514
 琥珀黑龍丹(癰疽疥癬類)683
 琥珀青星丸(除痰類)423
 琥珀蟾蜍丸(癰疽瘡瘍類)625
 異功散(感冒類)255
 異功散(咳嗽類)405
 異功散(癰疽瘡瘍類)628
 異功散(咽喉類)771
 痞氣丸(理氣類)176
 痧藥蟾酥丸(消暑類)264
 發聲散(咽喉類)771
 硝石散(痘疹丹毒類)663
 硝石散(雜症及急救類)801
 硫黃丸(感冒類)238
 硫黃丸(凍瘡疥癬類)684
 硫黃散(瘰癧類)399
 硫黃散(經產類)516
 硫黃散(凍瘡疥癬類)684
 硫黃散(耳目口鼻類)710
 硫黃膏(祛風類)238
 硫黃膏(癰疽瘡瘍類)628

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 稀涎散(中風類) ·····333 | 訶子散(祛寒類) ·····256 |
| 稀涎散(咽喉類) ·····772 | 訶子散(雜症及急救類) ···733 |
| 疏風散(疏散類) ·····112 | 訶黎勒丸(泄瀉類) ·····313 |
| 疏風散(祛風類) ·····239 | 訶黎勒丸(疝積類) ·····376 |
| 疏風散(驚悸類) ·····355 | 訶黎勒丸(咳嗽類) ·····405 |
| 舒筋活絡膏(癰疽瘡瘍類) 627 | 訶黎勒丸(遠年類) ·····441 |
| 脾腎雙補丸(補養類) ·····46 | 訶黎勒散(理氣類) ·····176 |
| 腎氣丸(補養類) ·····47 | 訶黎勒散(嘔吐類) ·····310 |
| 腎氣丸(通利類) ·····116 | 訶黎勒散(泄瀉類) ·····313 |
| 腎氣丸(痔漏崩帶類) ·····453 | 訶黎勒散(疝積類) ·····377 |
| 萆薢丸(理血類) ·····195 | 越鞠丸(理氣類) ·····176 |
| 萆薢丸(瘰癧類) ·····399 | 趁痛散(疏散類) ·····113 |
| 萆薢酒(痔漏崩帶類) ·····453 | 趁痛散(瘋癲類) ·····392 |
| 萆薢散(經產類) ·····516 | 鉤藤散(疏散類) ·····113 |
| 萆薢散(耳目口鼻類) ·····740 | 鉤藤散(驚悸類) ·····351 |
| 菩提救苦丸(表裏類) ·····157 | 鉤藤散(耳目口鼻類) ·····740 |
| 萆薢丸(收瀉類) ·····131 | 鉤藤飲(驚悸類) ·····355 |
| 萆薢丸(瘋癲類) ·····392 | 鉤藤飲(小兒類) ·····543 |
| 萆薢散(祛風類) ·····238 | 鉤藤膏(驚悸類) ·····355 |
| 萆薢散(癰疽瘡瘍類) ·····627 | 陽和解凝膏(癰疽瘡瘍類) 629 |
| 萆薢分清丸(利溼類) ·····273 | 陽起石丸(補養類) ·····49 |
| 菟絲子丸(補養類) ·····48 | 雄珠丸(祛風類) ·····239 |
| 菟絲子丸(收瀉類) ·····130 | 雄珠丸(殺蟲類) ·····306 |
| 菟絲子散(補養類) ·····48 | 雄珠散(疏散類) ·····112 |
| 菊花丸(耳目口鼻類) ·····739 | 雄珠散(癰疽類) ·····440 |
| 菊花散(發散類) ·····72 | 雄珠散(經產及急救類) ···801 |
| 菊花散(祛風類) ·····238 | 雄黃丸(殺蟲類) ·····307 |
| 菊花散(耳目口鼻類) ·····739 | 雄黃丸(癰疽瘡瘍類) ·····625 |
| 蛤蚧丸(咳嗽類) ·····405 | 雄黃丸(骨齒類) ·····781 |
| 蛤粉散(火毒類) ·····692 | 雄黃散(消毒類) ·····300 |
| 蛤粉散(耳目口鼻類) ·····740 | 雄黃散(驚悸類) ·····356 |
| 訶子散(收瀉類) ·····130 | 雄黃散(癰疽類) ·····440 |

- 雄黃散(癰疽瘡瘍類)625
 雄黃散(痘疹丹毒類)664
 雄黃散(走馬牙疳類)687
 雄黃散(耳目口鼻類)740
 雄黃散(唇齒類)781
 開胃散(嘔吐類)310
 開胃散(瘧疾類)441
 開骨膏(經產類)514
 開結導飲丸(消導類)105
 開結導飲丸(腰膝類)781
 開關散(疏散類)113
 開關散(祛風類)238
 開關散(中風類)334
 開關散(癰疽類)468
 開關散(耳目口鼻類)740
 開關散(咽喉類)772
 順氣丸(中風類)332
 順氣散(攻逐類)148
 順氣散(除痰類)423
 順氣消食化痰丸(消導類) 105
 黍米寸金丹(癰疽瘡瘍類)629
 黑丸(補養類)43
 黑丸(風溼類)427
 黑丸(痔漏崩帶類)453
 黑丸(脾胃類)785
 黑木子(跌打損傷類)557
 黑木子(癰疽瘡瘍類)626
 黑白散(經產類)511
 黑白散(雜症及急救類) ...800
 黑地黃丸(補養類)43
 黑神丸(疝瘕類)829
 黑神散(經產類)511
 黑神散(癰疽瘡瘍類)626
 黑散(表裏類)157
 黑龍丹(經產類)511
 黑龍丹(癰疽瘡瘍類)627
 黑龍丹(癰疽瘡瘍類)627
 黑錫丹(補養類)43
 黑錫丹(鎮攝類)136
 黑歸脾丸(理血類)196
 黃白散(耳目口鼻類)736
 黃白散(脾胃類)785
 黃瓜霜(瀉火類)291
 黃瓜霜(咽喉類)771
 黃明膠(補養類)44
 黃芩丸(理血類)194
 黃芩丸(瘧疾類)437
 黃芩散(泄瀉類)313
 黃芩散(咳嗽類)405
 黃芩散(經產類)515
 黃芩散(雜症及急救類) ...309
 黃金膏(跌打損傷類)558
 黃金膏(癰疽瘡瘍類)623
 黃病絳礬丸(利溼類)273
 黃耆丸(清熱類)397
 黃耆丸(疳積類)376
 黃耆丸(風寒類)392
 黃耆丸(經產類)515
 黃耆丸(小兒類)512
 黃耆丸(癰疽瘡瘍類)623
 黃耆丸(耳目口鼻類)736
 黃耆散(補養類)14
 黃耆散(收澀類)131

黃耆散(理血類)194
 黃耆散(清熱類)297
 黃耆散(疳積類)376
 黃耆散(瘰癧類)437
 黃耆散(小兒類)543
 黃耆散(癰疽疔瘍類)623
 黃耆散(咽喉類)771
 黃耆膏(補養類)45
 黃耆內托散(癰疽疔瘍類) 624
 黃耆內托散(腫痛類)694
 黃連丸(理血類)194
 黃連丸(清熱類)297
 黃連丸(疳積類)376
 黃連丸(泄瀉類)313
 黃連丸(濕痢類)438
 黃連散(補養類)45
 黃連散(消疳類)301
 黃連散(黃疸類)400
 黃連散(癰疽類)439
 黃連散(瘰癧疥癬類)683
 黃連散(腫痛類)694
 黃連散(耳目口鼻類)736
 黃連散(咽喉類)772
 黃連散(痔瘡類)781
 黃連散(雜症及急救類) ...800
 黃連膏(理血類)194
 黃連膏(喘咳類)102
 黃連膏(瘰癧疥癬類)683
 黃連膏(耳目口鼻類)737
 黃連上清丸(瀉火類)291
 黃連安神丸(驚悸類)355
 黃連安神丸(痘疹丹毒類) 664

黃連阿膠丸(瀉火類)291
 黃連阿膠丸(瘰癧類)440
 黃連消痞丸(痞滿類)318
 黃連解毒丸(瀉火類)292
 黃蘗丸(清熱類)298
 黃蘗丸(癰疽類)439
 黃蘗散(癰疽瘡瘍類)624
 黃蘗散(瘰癧疥癬類)684
 黃蘗散(管齒類)781
 黃蘗散(雜症及急救類) ...800
 黃蠟膏(經產類)515
 黃蠟膏(癰疽疔瘍類)623
 黃蠟膏(雜症及急救類) ...800

十三筆

催生如聖散(經產類)517
 塌氣丸(腫脹類)316
 塌氣丸(疳積類)378
 塌氣散(理氣類)177
 塌氣散(腫脹類)316
 感應丸(祛寒類)257
 息風丹(祛風類)239
 息風丹(風溼類)127
 搜風丸(攻逐類)148
 搜風丸(祛風類)240
 搜風驅氣丸(祛風類)240
 椿皮丸(痔漏崩帶類)453
 滑石散(通利類)116
 滑石散(黃痢類)401
 綠痰丸(中風類)334
 滋陰丸(除痰類)423
 滋陰百補丸(補養類)53

- 滋陰地黃丸(補養類).....54
 滋陰地黃丸(耳目口鼻類) 745
 滋陰清化丸(咳嗽類)406
 滋陰清化丸(除痰類)423
 滋陰清化丸(癰疽瘡瘍類) 633
 滋腎丸(補養類).....53
 滋補大力丸(補養類).....51
 溫六丸(祛寒類)257
 溫中丸(補養類).....55
 溫中丸(泄瀉類)313
 溫中丸(腫脹類)316
 溫白丸(泄瀉類)314
 溫白丸(痞滿類)318
 養肝散(耳目口鼻類)743
 養肝散(脾胃類)786
 照水丸(耳目口鼻類)743
 媛臍膏(祛寒類)257
 當歸丸(通利類)117
 當歸丸(理血類)196
 當歸丸(疳積類)378
 當歸散(和解類).....89
 當歸散(表裏類)159
 當歸散(理血類)196
 當歸散(祛風類)241
 當歸散(祛寒類)256
 當歸散(泄瀉類)314
 當歸散(腫脹類)317
 當歸散(積滯類)320
 當歸散(疳積類)329
 當歸散(中風類)334
 當歸散(癰疽類)441
 當歸散(經產類)516
 當歸散(小兒類)545
 當歸散(癰疽瘡瘍類)633
 當歸散(耳目口鼻類)744
 當歸散(雜症及急救類) ...804
 當歸煎(理血類)197
 當歸煎(痔漏崩帶類)151
 當歸飲(理血類)196
 當歸飲(瘰癧疥癬類)685
 當歸飲(耳目口鼻類)744
 當歸和血散(腫痛類)695
 當歸養血丸(經產類)517
 當歸龍薈丸(瀉火類)292
 當歸龍薈丸(耳目口鼻類) 744
 睡驚丸(鎮驚類)137
 砂散(腫痛類)696
 砂散(咽喉類)772
 聖效散(瘡癤類)441
 聖效散(癰疽瘡瘍類)632
 聖散子(發散類).....72
 聖散子(積滯類)321
 聖散子(走馬牙疳類)687
 聖靈丹(跌打損傷類)558
 聖靈丹(癰疽瘡瘍類)632
 聖靈解毒丸(癰疽瘡瘍類) 633
 胡蘆巴丸(祛寒類)256
 葱白丸(祛寒類)256
 葱白丸(經產類)518
 葱涎膏(小兒類)545
 葱涎膏(耳目口鼻類)745
 葶蘆丸(通利類)116
 葶蘆丸(利濕類)273
 葶蘆丸(痞滿類)319

- 葶藶丸(喘咳類)402
 葶藶丸(咳嗽類)406
 葶藶散(咳嗽類)406
 葶藶子散(通利類)117
 葶藶丸(補養類)55
 葛花解酲丸(消導類)105
 葛根散(清熱類)298
 葛根散(火毒類)693
 萬金散(泄瀉類)314
 萬金散(小兒類)544
 萬金散(癰疽瘡瘍類)630
 萬病丸(經產類)513
 萬病丸(雜症及急救類) ...801
 萬病紫苑丸(雜症及急救
 類)803
 萬病解毒丸(癰疽瘡瘍類) 631
 萬病解毒丸(火毒類)693
 萬應丸(殺蟲類)307
 萬應丸(疳積類)377
 萬應錠(小兒類)544
 萬應膏(癰疽瘡瘍類)630
 萬應膏(雜症及急救類) ...802
 萬應神麴糕(表裏類)157
 萬應寶珍膏(表裏類)158
 萬應丹(癰疽瘡瘍類)631
 萬應丹(脾胃類)786
 萬應黑虎丹(癰疽瘡瘍類) 631
 萬應黑虎丹(雜症及急救
 類)801
 萬應保赤丹(癰疽瘡瘍類) 632
 萬應保赤丹(小兒類)544
 葶子散(淋濁類)462
 蜈蚣散(祛風類)240
 補中益氣丸(理氣類)177
 補天丸(補養類)49
 補天大造丸(補養類)52
 補火丸(補養類)49
 補心丸(補養類)50
 補心丹(補養類)50
 補心丹(驚悸類)356
 補肌散(骨節類)782
 補肝丸(補養類)50
 補肝丸(耳目口鼻類)741
 補肝散(補養類)50
 補肝散(耳目口鼻類)741
 補肺散(咳嗽類)407
 補肺散(癰疽瘡瘍類)633
 補宮丸(補養類)51
 補宮丸(痔漏崩帶類)454
 補腎脂丸(腰膝類)784
 補陰丸(補養類)51
 補腎丸(補養類)51
 補腎丸(耳目口鼻類)742
 資生丸(補養類)56
 解毒丸(消毒類)301
 解毒散(消毒類)302
 辟瘟丹(發散類)73
 辟瘟丹(表裏類)160
 辟瘟丹(痧疫類)168
 遇仙丹(攻逐類)148
 遇仙丹(積滯類)321
 隔紙膏(癰疽瘡瘍類)629
 雌黃丸(癰疽類)342
 雌黃丸(咳嗽類)407

雷擊散(痧疫類)469
雷公散(祛寒類)257

十四筆

團參丸(理血類)197
壽星丸(痰飲類)401
壽星丸(除痰類)424
奪天造化丸(理氣類)173
奪命丹(疝氣類)330
奪命丹(驚悸類)357
奪命丹(經產類)518
奪命丹(癰疽瘡瘍類)634
奪命丹(痘疹丹毒類)664
奪命散(驚悸類)357
奪命散(經產類)518
奪命散(跌打損傷類)558
奪命散(癰疽瘡瘍類)634
奪命散(雜症及急救類) ...804
奪魂散(癲癇類)342
奪魂散(喘嗽類)402
寧坤丸(經產類)519
寧嗽丸(咳嗽類)407
對金飲(癰疽類)441
槐子丸(經產類)518
槐子丸(耳目口鼻類)747
槐角丸(理血類)197
槐角丸(痔漏崩帶類)454
槐花散(理血類)197
槐花散(清熱類)298
槐花散(嘔吐類)310
槐花散(痔漏崩帶類)454
槐花散(脾胃類)787

漏蘆丸(疳積類)373
漏蘆丸(風溼類)438
漏蘆丸(癰疽瘡瘍類)636
漏蘆散(通利類)118
漏蘆散(祛風類)241
漏蘆散(疳積類)373
漏蘆散(痧疫類)469
漏蘆散(癰疽瘡瘍類)637
漢防己散(疏散類)113
熊膽丸(清熱類)298
熊膽丸(殺蟲類)307
熊膽丸(耳目口鼻類)746
熊膽散(痔漏崩帶類)455
熊膽散(走馬牙疳類)687
熊膽膏(癰疽瘡瘍類)636
熊膽膏(耳目口鼻類)746
碧玉散(清暑類)265
碧玉散(癰疽瘡瘍類)637
碧玉散(瘰癧疥癬類)685
碧玉散(耳目口鼻類)747
碧玉散(咽喉類)772
碧雪丹(瀉火類)292
碧雪散(疏散類)114
碧雪散(祛風類)241
碧雪散(咽喉類)773
碧霞丹(中風類)334
碧霞丹(癰疽類)442
礞砂丸(疝氣類)329
礞砂丸(痰飲類)401
礞砂煎丸(積滯類)321
礞砂煎丸(疝氣類)330
毓麟丸(補養類)57

毓麟珠(經產類)519
 綠袍散(癰疽瘡瘍類)635
 綠袍散(火毒類)693
 綠袍散(耳目口鼻類)746
 綠雲散(消毒類)303
 綠雲散(癰疽瘡瘍類)636
 綠雲散(耳目口鼻類)746
 綠雲散(咽喉類)773
 綠雲膏(瘰癧疥癬類)685
 綠雲膏(腫痛類)696
 綠攀散(癰疽瘡瘍類)636
 綠攀散(雜症及急救類) ...804
 翠玉膏(癰疽瘡瘍類)633
 聚精丸(收瀉類)131
 蒼朮丸(利溼類)274
 蒼朮丸(瘋痹類)393
 蒼朮丸(耳目口鼻類)747
 蒼朮丸(脾胃類)787
 蒼耳散(耳目口鼻類)748
 葵藜丸(癰疽瘡瘍類)637
 葵藜丸(瘰癧疥癬類)685
 葵藜散(痘疹丹毒類)664
 葵藜散(瘰癧疥癬類)685
 蒲黃酒(經產類)518
 蒲黃酒(瘕厥類)399
 蒲黃散(通利類)117
 蒲黃散(理血類)198
 蒲黃散(癰疽類)442
 蒲黃散(痔漏崩帶類)454
 蒲黃散(淋濁類)463
 蒲黃散(小兒類)545
 蒲黃散(癰疽瘡瘍類)637

蒲黃散(耳目口鼻類)747
 龍腦子丸(耳目口鼻類) ...746
 龍腦子膏(痔漏崩帶類) ...455
 龍腦子膏(耳目口鼻類) ...747
 夢龍丸(耳目口鼻類)748
 蜘蛛散(疝瘕類)330
 蛇蛻散(雜症及急救類) ...804
 稀莖散(瘋痹類)394
 稀莖散(癰疽瘡瘍類)637
 稀莖膏(祛風類)242
 鳳衣散(癰疽瘡瘍類)638
 遠志丸(補養類)57
 遠志丸(鎮攝類)137
 遠志丸(淋濁類)463
 遠志丸(耳目口鼻類)745
 酸棗仁丸(驚悸類)357
 酸棗仁丸(瘋痹類)393
 酸棗仁散(瘋痹類)393
 銀白散(嘔吐類)310
 銀白散(脾胃類)786
 銀粉散(癰疽瘡瘍類)635
 銀粉散(瘰癧疥癬類)686
 銀粉膏(癰疽瘡瘍類)635
 銀黃散(祛寒類)258
 銀黃散(痘疹丹毒類)664

十五筆

寬氣飲(通利類)118
 寬氣飲(小兒類)546
 摩風膏(祛風類)242
 摩風膏(癰疽瘡瘍類)638
 摩風膏(耳目口鼻類)749

- 摩風膏(咽喉類)774
 摩頂膏(耳目口鼻類)750
 撥雲散(耳目口鼻類)748
 撥雲退翳丸(耳目口鼻類) 749
 熟地黃丸(補養類).....57
 熟地黃散(鑲攝類)138
 熟地黃散(癰厥類)399
 癰母丸(瘡毒類)442
 磁石丸(表裏類)160
 磁石丸(嘔吐類)311
 磁石丸(淋濁類)463
 磁石丸(耳目口鼻類)750
 磁石散(收瀉類)131
 磁石散(痔漏崩帶類)455
 磁石六味丸(耳目口鼻類) 751
 磁珠丸(耳目口鼻類)..... 750
 翳紅丸(殺蟲類)397
 蔓荊子散(疏散類)114
 蔓荊子散(耳目口鼻類) ...751
 薤蓉丸(鑲攝類)138
 薤蓉丸(耳目口鼻類)751
 薤蓉散(補養類).....58
 蠟皮丸(痔漏崩帶類)455
 蝦蟆丸(疳積類)273
 蝦蟆丸(小兒類)546
 蝦蟆散(癰疽瘰癧類)638
 蝦蟆散(腫痛類)493
 蝦蟆散(唇齒類)732
 秘銀丸(小兒類)545
 蛄丸干(脰脹類)317
 蛄丸干(壅脹類)398
 調中丸(小兒類)546
 調中丸(脾胃類)787
 調中散(泄瀉類)314
 調中散(脾胃類)787
 調肝散(腰膝類)734
 調氣散(驚悸類)358
 調氣散(除痰類)424
 調經散(經產類)520
 調經散(跌打損傷類)559
 調經養血膏(經產類)521
 調經益母丸(經產類)521
 調經種子丸(經產類)521
 鋪濟藥餅(腫脹類)317
 震靈丹(補養類).....58
 養正丹(鑲攝類)138
 養肝丸(跌打損傷類)559
 養肝丸(耳目口鼻類)751
 養陰清肺膏(咽喉類)773
 駐車丸(和解類).....89
 駐景丸(耳目口鼻類)752
 潤下丸(攻逐類)149
 潤下丸(除痰類)424
 潤腸丸(潤燥類)279
 潤肺百花香(咳嗽類)408

十六筆

- 噲化丸(喘咳類)402
 噲化丸(咳嗽類)408
 噲化上清丸(疏散類)114
 噲化上清丸(瀉火類)293
 噲化上清丸(咽喉類)77
 導赤散(清熱類)299
 導赤散(淋濁類)463

- | | |
|-------------------|------------------|
| 導氣丸(消導類) ……106 | 獨聖散(痘疹丹毒類) ……665 |
| 導氣丸(痞滿類) ……319 | 磨積丸(理氣類) ……173 |
| 導痰小胃丹(除痰類) ……424 | 磨積丸(積滯類) ……322 |
| 橘皮散(發散類) ……73 | 瘰癧丸(癰疽瘡瘍類) ……639 |
| 橘皮散(瘡痢類) ……443 | 燕黃丸(痼疾類) ……443 |
| 橘半枳朮丸(消導類) ……106 | 雲臺散(經產類) ……522 |
| 橘核丸(祛寒類) ……258 | 葵仁丸(耳目口鼻類) ……752 |
| 樺皮散(癰疽瘡瘍類) ……640 | 葵仁膏(耳目口鼻類) ……752 |
| 樺皮散(痘疹丹毒類) ……665 | 諸葛行軍散(清暑類) ……265 |
| 橄欖露(咽喉類) ……774 | 豬肚丸(補養類) ……59 |
| 澤瀉散(通利類) ……118 | 豬肚丸(收澀類) ……131 |
| 澤瀉散(淋濁類) ……464 | 豬肚丸(疳積類) ……379 |
| 澤瀉散(耳目口鼻類) ……755 | 豬苓散(嘔吐類) ……311 |
| 燒鹽散(走馬牙疳類) ……688 | 豬苓散(耳目口鼻類) ……754 |
| 燒鹽散(耳目口鼻類) ……755 | 豬藏丸(理血類) ……198 |
| 獨行散(經產類) ……521 | 豬藏丸(痔漏崩帶類) ……456 |
| 獨活方(髒腑類) ……782 | 醒消丸(癰疽瘡瘍類) ……639 |
| 獨活散(發散類) ……73 | 醒脾散(驚悸類) ……358 |
| 獨活散(疏散類) ……115 | 醒脾散(脾胃類) ……788 |
| 獨活散(祛風類) ……243 | 醢醢散(疏散類) ……115 |
| 獨活散(痲痹類) ……394 | 醢醢散(脾胃類) ……788 |
| 獨活散(癰疽類) ……460 | 錫類散(咽喉類) ……774 |
| 獨活散(髒腑類) ……782 | 頭風膏(祛風類) ……243 |
| 獨活散(雜症及急救類) ……805 | 龍骨丸(泄瀉類) ……315 |
| 獨勝散(癰疽瘡瘍類) ……640 | 龍骨丸(癰疽類) ……443 |
| 獨勝散(痘疹丹毒類) ……664 | 龍骨丸(淋濁類) ……464 |
| 獨聖散(通利類) ……118 | 龍骨散(收澀類) ……132 |
| 獨聖散(祛風類) ……243 | 龍骨散(泄瀉類) ……315 |
| 獨聖散(咳嗽類) ……408 | 龍骨散(癰疽類) ……443 |
| 獨聖散(痔漏崩帶類) ……455 | 龍骨散(經產類) ……522 |
| 獨聖散(淋濁類) ……464 | 龍骨散(癰疽瘡瘍類) ……639 |
| 獨聖散(經產類) ……522 | 龍骨散(走馬牙疳類) ……688 |

龍骨散(耳目口鼻類)753
 龍齒丸(收瀉類)132
 龍齒丸(驚悸類)358
 龍齒丹(怔忡類)397
 龍芎散(小兒類)546
 龍齒散(耳目口鼻類)754
 龍腦散(痔漏崩帶類)155
 龍腦散(耳目口鼻類)753
 龍腦膏(耳目口鼻類)753
 龍腦丸(疳積類)379
 龍腦丸(小兒類)546
 龍腦丸(癰疽瘡瘍類)639
 龍腦丸(耳目口鼻類)754
 龍腦散(收瀉類)132
 龍腦散(耳目口鼻類)754
 龍腦散(耳目口鼻類)754
 龜版膠(補養類)59
 龜鹿二仙膠(補養類)59

十七筆

檀香油(理氣類)179
 濟陰丸(補養類)60
 濟陰丸(耳目口鼻類)755
 濟陰丹(理血類)198
 應痛丸(腫痛類)697
 癰症鎮心丸(除痰類)425
 縮泉丸(收瀉類)132
 縮砂散(嘔吐類)311
 縮砂散(痔漏崩帶類)456
 腦礬丸(疳積類)379
 腦礬散(走馬牙疳類)688
 腦礬散(雜症及急救類)305

慈苡仁酒(瘋癲類)394
 慈苡仁散(理血類)199
 慈苡仁散(瘋癲類)394
 慈苡仁散(小兒類)547
 慈苡附子散(瘋癲類)395
 慈苡附子散(癰疽瘡瘍類)641
 薄荷油(發散類)73
 薄荷散(癰疽瘡瘍類)641
 薄荷葉露(發散類)73
 薑桂丸(祛寒類)258
 薑桂丸(咳嗽類)409
 薑黃散(經產類)322
 薑黃散(唇齒類)783
 螺蛸散(癰疽瘡瘍類)640
 還少丹(補養類)60
 還睛丸(耳目口鼻類)755
 霞天麴(消導類)106
 霞天膏(除痰類)425
 黛蛤散(咳嗽類)409

十八筆

喉峒丸(癰疽瘡瘍類)643
 斷紅丸(理血類)199
 橫榔丸(消導類)106
 橫榔丸(通利類)118
 橫榔丸(疳積類)380
 橫榔丸(腫痛類)697
 橫榔散(攻逐類)149
 橫榔散(痔漏類)319
 橫榔散(痔漏崩帶類)456
 橫榔散(癰疽瘡瘍類)643
 橫榔散(瘰癧疥癬類)636

橫歸散(脾胃類)788
 歸芍六君丸(補養類)61
 歸芍地黃丸(補養類)61
 歸腎丸(補養類)61
 歸脾丸(理血類)200
 瀉肝散(瀉火類)293
 瀉肝散(耳目口鼻類)756
 瀉青丸(驚悸類)359
 瀉黃散(清熱類)299
 薯蕷丸(補養類)61
 蕞本散(祛風類)243
 蕞本散(骨齒類)783
 藍葉散(小兒類)547
 藍葉散(癰疽瘡瘍類)642
 藍葉散(痘疹丹毒類)665
 藍根散(痘疹丹毒類)665
 藍根散(火毒類)693
 蟬花散(癰疽瘡瘍類)642
 蟬花散(痘疹丹毒類)665
 蟬花散(耳目口鼻類)757
 蟬花散(咽喉類)774
 蟬花無比散(耳目口鼻類) 758
 蟬殼散(咳嗽類)109
 蟬殼散(耳目口鼻類)757
 鎮心丸(鎮攝類)139
 鎮肝丸(驚悸類)359
 鎮肝丸(耳目口鼻類)757
 鎮驚丸(驚悸類)359
 鎮驚丸(小兒類)547
 雙解散(清熱類)299
 雙解散(咽喉類)775
 雞內金散(經產類)522

雞內金散(癰疽瘡瘍類)642
 雞血藤膠(補養類)62
 雞肝散(殺蟲類)308
 雞肝散(疳積類)380
 雞肝散(小兒類)548
 雞眼膏(癰疽瘡瘍類)641
 雞眼膏(雜症及急救類)805
 雞腸散(收瀉類)132
 雞腸散(祛寒類)258
 雞鳴散(跌打損傷類)559
 雞鳴散(痘疹丹毒類)665
 雞鳴散(火毒類)694
 雞鳴散(腫痛類)697
 雞蘇散(理血類)199
 雞蘇散(淋濁類)465
 雞蘇散(咽喉類)774
 程麥散(淋濁類)465
 星麥散(癰疽瘡瘍類)642
 鵝黃散(癰疽瘡瘍類)641

十九筆

癰肝丸(補養類)63
 癰肝丸(疳積類)331
 瓊玉膏(補養類)62
 瓊玉膏(咳嗽類)109
 礞石滾痰丸(除痰類)426
 藜蘆膏(癰疽瘡瘍類)644
 蟾酥丸(癰疽瘡瘍類)643
 蟾酥餅(癰疽瘡瘍類)644
 蟾酥膏(瘰癧疥癬類)686
 鵝附散(中風類)334
 鵝附散(瘋癲類)395

蠟附散(耳目口鼻類) ……758

離宮錠(癰疽瘡瘍類) ……645

二十筆

爐甘石散(耳目口鼻類) ……759

礬石散(中風類) ……335

礬石散(耳目口鼻類) ……759

糯米膏(跌打損傷類) ……559

糯米膏(腫痛類) ……698

蘇合香丸(祛風類) ……243

薑香散(嘔吐類) ……311

薑香露(消暑類) ……265

薑香正氣丸(和解類) ……90

蘆薈丸(殺蟲類) ……308

蘆薈丸(泄瀉類) ……315

蘆薈丸(驚悸類) ……360

蘆薈丸(疳積類) ……380

蘆薈丸(耳目口鼻類) ……759

蘆薈散(癰疽瘡瘍類) ……645

蘆薈散(走馬牙疳類) ……688

蘆薈散(耳目口鼻類) ……759

鯽魚膏(癰疽瘡瘍類) ……645

鯽魚膏(瘰癧疥癬類) ……686

蕪參膏(補養類) ……63

二十一筆

續斷丸(補養類) ……63

續斷丸(瘋癲類) ……395

續斷丸(經產類) ……522

護心丹(癰疽瘡瘍類) ……646

護心散(癰疽瘡瘍類) ……646

關香散(走馬牙疳類) ……688

關香散(耳目口鼻類) ……760

鐵扇散(癰疽瘡瘍類) ……343

鐵粉丸(鎮攝類) ……139

鐵粉散(驚悸類) ……360

鐵粉散(除痰類) ……426

鐵粉散(癰疽瘡瘍類) ……647

鐵粉散(雜症及急救類) ……806

鐵衝丸(咽喉類) ……775

鐵精丸(鎮攝類) ……140

鐵錘散(癰疽瘡瘍類) ……647

鐵錘散(痘疹丹毒類) ……666

驅風膏(驚悸類) ……361

驅風膏(瘋癲類) ……396

辟瘟散(祛風類) ……244

辟瘟散(驚悸類) ……361

辟瘟散(祛寒類) ……259

麝香丸(疳積類) ……381

麝香丸(疳積類) ……382

麝香丸(瘋癲類) ……396

麝香丸(雜症及急救類) ……805

麝香散(疳積類) ……383

麝香散(痔漏崩帶類) ……456

麝香散(癰疽瘡瘍類) ……648

麝香散(走馬牙疳類) ……688

麝香散(耳目口鼻類) ……760

麝香散(疳積類) ……383

麝香散(雜症及急救類) ……806

蠟礬丸(癰疽瘡瘍類) ……648

蠟礬丸(咽喉類) ……775

二十二筆

臘連丸(瀉火類) ……293

𪚩連丸(痔漏崩帶類)466

二十三筆

𪚪膚丸(祛風類)214

𪚪痛丸(疝瘕類)331

二十四筆

𪚫砂寧志丸(補養類).....64

𪚫寶如意丹(祛風類)245

𪚫寶如意丹(癰疽瘡瘍類) 648

𪚬甲丸(補養類).....63

𪚬甲丸(表裏類)161

𪚬甲丸(痞滿類)319

𪚬甲丸(退痢類)443

𪚬甲丸(痔漏崩帶類)457

𪚬甲丸(耳目口鼻類)760

𪚬甲散(補養類).....64

𪚬甲散(腫脹類)317

𪚬甲散(疳積類)383

𪚬甲散(痔漏崩帶類)457

𪚬甲膠(補養類).....64

𪚬早煎丸(表裏類)161

二十五筆

𪚭音丸(火毒類)594

𪚭音丸(耳目口鼻類)761

𪚭音全嗽散(驚悸類)361

𪚭音救苦膏(表裏類)162

二十七筆

𪚮驚涎丸(小兒類)549

二十九筆

𪚯金丸(除痰類)126

𪚯金丸(痧疫類)469

𪚯金散(疏散類)115

𪚯金散(理血類)200

𪚯金散(瘡癤類)444

𪚯金散(小兒類)548

𪚯金散(痘疹丹毒類)666

𪚯金散(腫痛類)698

𪚯金散(骨齒類)783

一般市售丸散膏丹備查表

本表將市面上同來所有的丸散膏丹。分別簡述其效用，以便查購。但是這些品種。可能在某一時某一地。亦難齊備。可以各隨需要。臨時配製。

一、關於補氣血助元陽納腎氣等藥

人參養營丸.....	保命集金剛丸.....
補氣血，較十全大補丸易見效	溫腎、治骨痿
十全大補丸.....	青娥丸.....
效用同人參養營丸而能溫補	治腎虛腰痛、助陽壯力
七味都氣丸.....	魚鱉種子丸.....
納腎氣、固腎精	溫補腎臟、益精種子
七寶美髯丹.....	濟生腎氣丸.....
補氣血、溫腎陽	治陽虛而腎氣不化、小便澀數、或至腹腫
桂附地黃丸.....	黃耆膏.....
溫補腎陽	補中益氣、治表虛自汗
五子衍宗丸.....	斑龍二至百補丸.....
壯陽益氣	補腎陽、益腎陰
補中益氣丸.....	龜鹿二仙膠.....
治氣虛下陷、補中益氣	大益精髓
四君子丸.....	八珍丸.....
治氣短食少、脾胃虛弱、	治氣血兩虧、體倦面黃
右歸丸.....	參茸衛生丸.....
效用大致同桂附地黃丸	治陽虛、滑精、陽痿等症
還少丹.....	參桂鹿茸丸.....
溫補精血、斂澀精氣、藥味同	治陽虛畏寒、便溏等症
打老兒丸	黨參膏.....
全鹿丸.....	治貧血痿黃、病後衰弱、一切慢性虛症
補腎、益精、壯陽	

二、關於滋陰制陽等藥

大補陰丸·····	治陰虛陽亢
大補陰而降火潛陽	鱉甲膠·····
六味地黃丸·····	補肝、清熱、治骨蒸
補腎益陰	坎離既濟丸·····
知柏地黃丸·····	治盜汗遺精、腰膝軟弱、陰虛
補陰制火、治虛煩等症	內熱、滋陰之力更強、又能回
歸芍地黃丸·····	潛精氣
補肝腎之陰、治頭眩、耳鳴、	固本丸·····
潮熱	治精血虛虧、上消下消、咳逆
參麥六味丸·····	便秘
治陰虛勞熱、火擾氣喘等症	河車大造丸·····
左歸丸·····	治虛損潮熱、陰虛水虧
效用大致同六味地黃丸	八仙長壽丸·····
虎潛丸·····	治陰虛火旺、咳嗽氣喘、補肺
治勞熱骨痿、行步乏力	腎之陰、兼納腎氣
兩儀膏·····	桑椹膏·····
治氣血兩虧、陰虛尤宜	治貧血心悸、兼能潤腸
龜板膠·····	

三、關於補血安神等藥

天王補心丹·····	補血安神、調氣開胃
補血安神	柏子仁丸·····
孔聖枕中丹·····	治陰虛火旺、盜汗、能養心安
治健忘少寐、心營不足	神、和衛固陽
硃砂安神丸·····	柏子養心丸·····
治陰虛火旺、心神不安	治血虛內熱、失眠心悸、並治
琥珀多寐丸·····	經少潮熱
治寤寐不安、能鎮靜心神	黑歸脾丸·····
歸脾丸·····	治血虛心悸、失眠盜汗等症

四、關於補脾胃助消化等藥

人參健脾丸·····	參苓白朮散·····
治脾虛氣弱、食入不化	溫運脾胃、輔助消化
六君子丸·····	養生丸·····
補脾健胃	健脾開胃
香砂六君子丸·····	歸芍六君子丸·····
治氣虛氣滯、痰滯內阻、胸中 滿悶、食難消化	助消化、補氣血

五、關於理氣等藥

橘核丸·····	治寒疝腹痛
治疝氣疼痛	九製香附丸·····
疝氣散·····	治胸悶腹脹、及痛經

六、關於理血等藥

螻蛄煎丸·····	雞血藤膠·····
治瘰癧及積聚症	活血通絡、亦補氣血

七、關於祛風等藥

玉屏風散·····	打損傷、瘀血停滯
祛風固表、治自汗	人參再造丸·····
川芎茶調散·····	治中風癱瘓、肌膚麻木、關節 疼痛
治感冒風寒、頭目昏重、頭痛 等症、不適於因內熱所致者	清心牛黃丸·····
玉真散·····	治風火內閉、痰塞心包、暴中 不語、神昏流涎、此爲治內熱 熾盛而外受風邪者之藥、與 萬氏及安宮牛黃丸等之治純 爲內熱熾盛、引起昏迷症狀 者不同、不得彼此混投
治破傷風初起、角弓反張、牙 關緊急、能鎮靜定痛	牽正散·····
大活絡丹·····	
治中風癱瘓、痿痹拘攣	
小活絡丹·····	
治寒溼侵襲、肢節疼痛、及跌	

治中風頭暈、目眼喎斜
通關散·····

治中風口噤、不省人事

八、關於祛寒等藥

四神丸·····

治脾胃虛寒、五更腎瀉

理中丸·····

治脾胃虛寒、消化不良、及久瀉

附子理中丸·····

效用同理中丸、乃力較大、而

兼溫腎、能興舊以扶陽

暖濟膏·····

治受寒腹痛泄瀉、又習用於小兒

辟瘟散·····

治寒凝腹痛、與開竅的蘇合散不同、用者審之

九、關於解表清裏等藥

藿香正氣丸·····

治外感風寒、內有濕熱

午時茶·····

治外感風寒、內有停食

建神麩·····

治外感風寒、內消諸積

純陽正氣丸·····

治寒濕時邪、腹痛吐瀉、較藿香正氣丸爲燥熱、感寒重者爲宜、須分輕重用

防風通聖散·····

治內蘊濕熱、外感風寒、大便秘結、汗下並行、有瀉有利、體虛表症不重者勿用

玉雪救苦丹·····

治時行瘟疫、寒熱頭痛、神昏譫語、胸膈痰阻

甘露消毒丹·····

治感受暑濕時疫、胸膈痞脹、而病在氣分者

十、關於暑濕等症之開閉逐穢藥

諸葛行軍散·····

治暑熱痧變穢惡、干犯心包、頭暈神昏、不省人事、或口瘡喉痛、與人馬平安散大致相同

飛龍奪命丹·····

治瘟疫穢濁、肢厥神昏危急

等症、亦能開竅、此係痧氣飛龍奪命丹、與外科飛龍奪命丹有別

蘇合香丸·····

治中惡昏迷、寒疝氣閉、與牛黃丸之治熱閉有別

臥龍丹·····

治癰瘻卒倒、不省人事、內容大致與開關散同	治夏月貪涼、暑溼內閉、頭昏暈仆、有興奮作用
八寶紅靈丹……………	雷公散……………
治暑熱穢濁癰脹、肢厥、並喉痹牙舌等症	治霍亂吐瀉、及暑令受寒而引起之急性胃腸病
靈寶如意丹……………	辟瘟散……………
治暑溼內伏、穢濁鬱結、胸腹絞痛、欲吐不吐	爲治各種痧症等之開竅藥
痧藥蟾酥丸……………	雷擊散……………
	亦治諸痧內閉藥

十一、關於利水除溼熱等藥

通關滋腎丸(即滋腎丸)……………	治黃病腿足浮腫、腹脹痞塊、便血、脫力、勞傷等症
治下焦陰虛、熱在血分、小便澀痛	六一散……………
二妙丸……………	治煩躁而熱、小便不利
治下體溼熱、筋骨疼痛軟弱	益元散……………
三妙丸……………	利溼熱、降心火、安神明
治溼熱下注、脚麻痿或如火烙	五苓散……………
黃病絳礬丸……………	化氣行水、除溼熱

十二、關於潤燥清肺等藥

二冬膏……………	潤肺止咳
治肺胃燥熱、痰涎咳嗽	養陰清肺膏……………
枇杷葉膏……………	治陰虛咳嗽、口乾咽痛、白喉等症
治肺陰虛損、降火止咳	潤肺白花香……………
瓊玉膏……………	治肺弱咳嗽、痰中帶血
治肺虛液枯、乾咳無痰	
雪梨膏……………	

十三、關於瀉火等藥

左金丸……………	治吞酸嘔吐、脇痛、腕痛
----------	-------------

當歸龍薈丸·····	治下痢赤白、裏急後重、並治久暫泄瀉
治頭暈目眩、神志不寧、躁擾狂越、爲肝經實火之重劑	
青麟丸·····	治上焦積熱、目赤便秘、咽痛、口舌生瘡
治臟腑實熱壅塞、便秘溺赤	
臟連丸·····	搜風順氣丸·····
治大便下血、肛門墜痛、痔瘡痔漏	治血熱、皮膚癢、大便秘結等症
戊己丸·····	槐角丸·····
治腸胃實熱、吞酸嘔吐、腹痛下利	治大腸火盛、痔瘡便血
三黃丸·····	潤腸丸·····
治目赤頭痛、口舌生瘡、胸膈煩熱、溲赤便秘、肛門腫痛、瘡癰等症	治血燥挾熱、大便秘結、瀉而兼下
香連丸·····	涼膈散·····
	治膈熱煩躁、大便秘結

十四、關於溫熱等病之開閉解熱藥

紫雪丹·····	治痰熱閉結、神昏瘧疾、小兒驚厥
治高熱犯腦、神昏譫語、狂越躁亂等症	
安宮牛黃丸·····	神犀丹·····
治瘧疾之因於熱者、功效略同萬氏牛黃丸	治熱邪內熾、瘧疾神昏、譫語發斑
萬氏牛黃清心丸·····	至寶丹·····
	治溫熱神昏譫語

十五、關於祛痰治咳等藥

半夏麴·····	二陳丸·····
治一切痰症、溼痰尤宜	治溼痰咳嗽及胃腸消化不良
礞石滾痰丸·····	控涎丹（一名子龍丸又名妙應丸）
治溼熱老痰之峻劑、降氣攻下、掃蕩不留	治痰滯在筋絡、頸項、胸肋、

腹背、筋骨、牽引流走不定、 皮色不變、氣脈不通	堅、較二陳爲得力、比礞石爲 緩和
半貝丸……………	清氣化痰丸……………
治風痰暑溼、咳嗽痰多	治喘嗽胸悶、一切熱痰
竹瀝達痰丸……………	猴棗散……………
治痰火喘急、厥逆驚嘔	治痰多咳嗽
指迷茯苓丸……………	黛蛤散……………
治痰飲內停、手臂痠掣、筋脈 攣痛、能化痰滌飲、利氣軟	治內熱乾咳、痰粘不爽、痰內 帶血

十六、關於消導殺蟲等藥

木香檳榔丸……………	胃痛、腹脹、腹痛
治溼熱氣滯、胸腹飽脹、大便 祕結	中滿分消丸……………
枳實導滯丸……………	治胸腹熱脹、溼熱阻滯
治脾胃溼熱、積滯不化、胸悶 腹痛	枳實消痞丸……………
東垣木香順氣丸……………	治因溼阻而引起之胸膈痞 滿
治寒溼氣滯、胸腹痞悶	枳朮丸……………
統旨木香順氣丸……………	治胸悶溼阻、健脾強胃
功用同東垣木香順氣丸、而較 爲和平	香砂枳朮丸……………
驗方沈香化氣丸……………	效用同枳朮丸、而更能利滯 氣、健脾胃
治痰食氣滯、胸腹痞塞作痛	橘半枳朮丸……………
驗方良附丸……………	效用同香砂枳朮丸、而更能 化痰
治氣滯胃痛、胸脇脹滿、口吐 清水	胃痛散……………
保和丸……………	治胃脘作痛
治積食痰飲、噯氣吞酸、胸腹 脹痛	阿魏丸……………
越鞠丸……………	治胸腹痞塊積聚等症
治溼痰食火氣血諸鬱、胸悶	烏梅丸……………
	治吐衄久痢

十七、關於祛風溼等藥

史國公藥酒.....	祛風溼、壯筋骨
治寒溼風氣、癱瘓頑痺、骨節酸疼	九製稀莖丸.....
五加皮酒.....	治中風喎僻、及風溼筋骨痛
治腎氣虛寒、腰膝常痛	狗皮膏.....
虎骨木瓜酒.....	治風溼性筋骨痠痛、亦治跌打傷痛
治風寒溼氣、舒筋活絡、定痛止麻	桑枝膏.....
虎骨膠.....	治骨節疼痛、筋絡牽強

十八、關於瀉利等藥

麻仁丸.....	備急丸.....
治陽盛陰傷、液枯便秘	治寒氣冷食傷胃、胸腹滿痛、大便祕結、此與麻仁更衣丸製大黃等丸、爲治陽結便秘者不同、又與半硫丸爲治陰結之輕劑不同、乃治陰結之峻劑、非體質者勿輕投
更衣丸.....	
治腸熱便秘、惟痔瘡不宜	
九製大黃丸.....	
治溼熱下痢、留飲宿食等症	
半硫丸.....	
治寒凝虛秘	

十九、關於攻血逐水等藥

大黃蟪蟲丸.....	爲治水腫痰飲之峻瀉劑、體弱者勿輕進、瀉後須進糜粥
治乾血癆症、肌膚甲錯	
十棗丸.....	

二十、關於鎮固等藥

黑錫丹.....	治腎虛火升、耳鳴耳聾
爲崑陽暴脫之鎮固藥、治上盛下虛、寒氣逆衝	磁珠丸.....
耳聾左磁丸.....	治目昏眼花、神水色淡綠或淡白、或起翳膜、內障或外

障、及耳聾耳鳴癰癤等症

二十一、關於收瀉等藥

三才封髓丹·····	夜菟丸·····
治陰虛氣弱、內熱遺洩	溫補腎臟、治陽虛遺精、溺有餘瀝、並慢性淋濁
水陸二仙膏·····	萆薢分清丸·····
治慢性帶濁、重在固瀉	治真元不固、小便頻數、或下白濁
金鎖固精丸·····	縮泉丸·····
補腎固精	治陽氣不足、小便頻數
金櫻子膏·····	
專主固精	

二十二、關於耳鼻口齒等症應用藥

紅棉散·····	治鼻淵、鼻流濁涕
治肝經火鬱、耳內腫痛、生瘡流膿	清肝保腦丸·····
耳疳散·····	治腦漏、涕濁
治耳流膿水	玉泉散·····
蒼耳散·····	治口腔發炎、齦腫齒痛

二十三、關於眼科應用藥

明目地黃丸·····	杞菊地黃丸·····
治肝腎俱虛、兼感風邪、熱氣上攻、多淚起翳	治肝腎陰虛、目難久視、赤痛、流淚等症
石斛夜光丸·····	撥雲退翳丸·····
治目光不斂、色淡綠或淡白、視物昏糊、及內障等目疾	治迎風流淚、羞明畏光、及鞏膜充血、外障等目疾
羊肝丸·····	八寶眼藥·····
養肝除障、治虛性目疾	治目赤腫痛、迎風流淚、新久風火眼疾
桑葉丸·····	明目黃連膏·····
祛風涼血、補肝腎之陰、治頭昏眼花	治火眼暴赤

二十四、關於喉科應用藥

六神丸·····	冰硼散·····
治時疫熱毒諸瘡、在上部者 爲宜、尤適用於咽喉口舌等 處、具消炎制菌鎮痛之功	治咽喉腫痛、口舌生瘡
白喉鳳衣散·····	清咽太平丸·····
爲白喉外吹藥	治胸膈鬱熱、兩頰常赤、咽喉 紅痛不利、或長間咯血
錫類散·····	珠黃散·····
治疫喉乳蛾、紅腫白腐	治咽喉腫痛腐爛、牙疳口疳、 有解毒去腐清熱生肌之功
喉症異功散·····	金鎖玉匙散·····
治爛喉乳蛾	治咽喉腫痛、或癰疽瘡毒

二十五、關於婦科應用藥

固經丸·····	益母膏·····
益陰清熱、治經水不止、紫黑 成塊、崩漏等症	治經水不調、挾有瘀血、並治 折傷
當歸益血丸·····	玉液金丹·····
治月經不調、赤白帶下、子宮 寒冷	治月經不調、赤白帶下
調經益母丸·····	調經養血膏·····
調經補血、治經來挾瘀、腹痛 腹脹	治婦女血虧、行經腹痛
失笑散·····	烏雞白鳳丸·····
治經水不調、經痛、血暈、心 腹絞痛	治貧血體弱、月經不調、經痛 帶下等症
	逍遙散·····
	和血、舒鬱、調經

二十六、關於兒科應用藥

牛黃抱龍丸·····	治小兒急驚、風熱痰壅
治小兒急驚、中風痰迷、內熱 狂亂	萬應錠·····
小兒萬病回春丹·····	治疔毒攻心、瘟疫血熱、喉閉 乳蛾牙疳等症、俗名金老鼠

矢	品、不宜於營養不良體質瘦弱者
綠袍散·····	犀角解毒丸·····
治口疳口瘡、口舌發炎、小兒多用之、大人亦可用	治小兒熱癰疽毒、面赤狂躁
青州白丸子·····	五福化毒丹·····
治小兒風痰壅盛、嘔吐涎沫、顏面麻痺等症、但性過燥、熱盛者不宜	清熱除熱、治上焦壅熱、齒牙出血、口鼻唇舌生瘡等症、雖多用於小兒、大人亦可用
小兒化痰丸·····	萬應保赤丹·····
治小兒積熱傷風、痰癰咳嗽、性尚和平、較青州白丸子爲善	治小兒寒溼痰滯、急慢驚風、爲峻瀉劑、忌多投
肥兒丸·····	雞肝散·····
多爲消導殺蟲苦寒除熱之藥配合而成、積去熱退、推陳出新、肌肉自肥、並非補養之	治小兒疳積、爲殺蟲劑
	鷓鴣涎丸·····
	治小兒百日咳

二十七、關於瘍科應用藥

紫金錠·····	自降丹·····
一般多用以磨敷瘡癰、能通關節、解諸毒、又於溫疫痰滯阻胃之嘔惡、亦可內服少許	治癰疽瘡瘍疔毒等症、有化腐拔毒之功、腐蝕力強、不可濫用
梅花點舌丹·····	瘰癧丸·····
治癰疽紅腫、疔瘡熱毒、牙痛喉蛾、口舌諸瘡	治頸項等處結核腫脹
九龍丹·····	外科黃連膏·····
治懸癰橫痃等症、初起尙未成膿者、以此較爲	治濕瘡及皮膚膿瘡
九一丹·····	舒筋活絡膏·····
治潰瘍膿水不淨、去腐殺毒	治跌打損傷、筋骨腫痛
八將散·····	黑虎丹·····
治癰疽不起、將潰不潰	治癰疽腫痛
	白玉膏·····
	治癰疽腐爛、久不收口

- 金黃如意散……………
治癰毒紅腫、兼跌撲損傷
- 夾紙膏……………
治癰瘡腐臭、痛癢不時
- 白膏藥……………
治一切皮膚病、黃水濕瘡
- 玉紅膏……………
治一切癰疽、長肉生肌
- 三仙丹……………
提膿長肉
- 生肌散……………
治癰疽瘡瘍、潰後不斂
- 月白珍珠散……………
治潰瘍腐痛、新肉將生、能生肌止痛
- 外科蟾酥丸……………
治疔瘡和腫、發背乳癰等症
- 生肌八寶丹……………
治瘡毒潰後不斂
- 醒消丸……………
爲消散諸癰癰
- 西黃醒消丸……………
治乳岩、瘰癧等、能化毒軟堅、陰症與陽和湯相輔而行
- 芋莖丸……………
治一切瘰癧、不論已潰未潰
- 夏枯草膏……………
治肝旺血燥、瘰癧堅硬、具有消炎作用
- 一粒珠……………
治癰疽發背、及一切無名腫毒、內服最好
- 珍珠散……………
治瘡癰潰爛、久不長肉生肌
- 桃花散……………
治瘡癰潰瘍、久不收口、膿水淋漓、爲外科專用藥、與其他桃花散有別
- 千槌膏……………
治癰疽瘡癰初起未潰者、可以使其消腫
- 立馬回行丹……………
治疔瘡走黃、以提膿拔毒爲目的
- 太乙膏……………
爲一切癰疽已潰未潰之掩護藥
- 清膏藥肉……………
治一切癰疽之皮肉掩護藥
- 清涼膏……………
治癰疽瘡癰
- 紅膏藥……………
爲治熱癰疔腫之消散藥
- 回瘡藥……………
治腫瘍瘡癰、圍其四週
- 小金丹……………
治腫瘍乳岩、瘰癧、流注、痰核、橫痃、貼骨疽等症
- 陽和解凝膏……………
治諸陰症、或潰或硬、有核

二十八、關於跌打損傷應用藥

三黃寶蠟丸·····	治跌打身痛、瘀血停滯
治跌打瘀血奔心、用此峻下	骨科破瘀膏·····
螺蛳丸·····	治跌打損傷、腫脹疼痛
作用亦似三黃寶蠟丸、而主	內傷膏·····
下瀉行瘀	治閃腰岔氣、跌撲損傷
七厘散·····	