

起死回生秘訣

全卷

周易、符咒、中医交流群，资料分享群加微mqsnq55522

男女欲保身體者不可不看

最新
實驗
起死回生秘訣

上海
廣雅
啟新
圖書局印行

民國拾壹年初版

版權
所有
不許
翻印

（最新實驗起死回生秘訣）

（全書壹冊定價洋二角）

著作者 蜀南梅東閣

印刷者 廣雅書局

分售處 各省大書局

總發行所

上海啟新圖書局

序

天地有好生之德人亦莫不好生而惡死乃竟有死於非命者或被人害或係自誤如係被害而死害之者例當償命是救一命可以全兩命也如死者係其家仰望之人死後何所託命是救一人之命並可救其全家之命也語云救人一命勝造七級浮屠人之好善誰不如我見死不救斷無此情但恐有救之心而無救之之法且有命在俄頃延醫亦不及待者言念及此惻然憫之爰編輯起死回生一冊以備急救救治得法必有奇效即使萬無生理亦當盡人事以聽天命茲冊方論易知易能依法而行人可操救人之術庶可躋斯世於仁壽也夫

蜀南怡養山人梅光鼎東閣甫自叙

願死

起死回生秘訣目錄

氣亡猝死

中惡猝死

刀傷流血垂死

金瘡流血垂死

跌打損傷垂死

打傷垂死

跌傷垂死

自縊死

夜卧魘死

痰厥卒死

中暑毒死

水溺卒死

鬼擊猝死

脫陽欲死

驚怖卒死

解救砒毒垂死

毒疔垂死

無故卒死

小兒無故卒死者以葱白納入下部及兩鼻孔內氣通或嚏即生

卒然忤死不能言者用雄雞冠血和真珠丸小豆大納三四丸入口中效

方用后

人卒暴死搗女青屑一錢安咽中以水或酒送下立活

南岳魏夫人內傳

忽然胡言亂語昏迷跌倒而死此症不省人事切勿挪動動則難治急

用大爆竹放頭脚兩處

頭頂邊一箇脚底一箇

一齊點放其人自醒無恙大小皆

治屢治如神

暴厥卒死凡人卒然倒仆急扶入暖室扶住正坐用火炭沃醋使醋氣

冲入鼻中良久自醒或搗韭菜汁灌鼻或用皂角末吹鼻得噴嚏即醒

如倉猝無藥急於人中穴及兩足大拇指離甲一韭葉許各用艾火灸

三五次即活

尸厥死由入廟吊喪問病而得者用附子

七錢重者泡熟去皮臍為末

分二服每

服酒三盞煎一盞如無附子生薑汁半盞和酒同煎百滾連灌二服即醒此痰厥治亦可

尸厥死腹響如雷硫黃一兩焰硝五分研細分作三服好酒煎至烟起則止溫灌下片時再服即安驗方

中惡卒死

中惡卒死者急取葱心黃刺入鼻中男左女右入七八寸血出即愈並以葱刺入耳者五寸亦治自縊垂死者又方斷猪尾血飲之並縛脉枕之即活此乃長桑君授扁鵲法也又方或先病痛或卧而忽絕並速取雄鴨向死人口斷其頭瀝血入口外以竹筒吹其下部極則易人氣通即活也

猝死寢死者皆中惡也用雄雞冠血塗面上乾則再上仍吹入鼻中並以

灰營死人一周

肘后方

中忤中惡鬼氣此症或暮夜登廁或出郊外驚然倒地厥冷握拳口鼻

出清血。須臾不救。似乎尸厥。但腹不鳴。心腹暖耳。切勿移動。令人圍繞。燒火打鼓。或燒蘇合香。安息香。麝香之類。候醒。乃移動。用犀角五錢。麝香。硃砂各二錢。五分為末。每水調服二錢。即效。華佗方

卒然中惡

用韭汁灌鼻中便甦

食醫心鏡

卒中惡死

用猪尾血一匙。調龍腦少許。新汲水服之。

時珍方

又斷猪尾取

血飲

卒中惡死

吐利不止。不知是何病。

不拘大人小兒。用馬糞一丸。絞汁灌

之。乾者水煮汁亦可。此扁鵲法也。

中惡不醒

令人尿其面上。即甦。此扁鵲法也。

卒中惡死

卒死或先病。或平居寢卧。奄忽而死。皆是中惡也。以薤汁灌

鼻便省。

卒死壯熱

礬石半斤。水一斗半。煮湯浸脚及踝。即得甦也。肘後方

刀傷流血垂死

刀傷流血垂死

刀傷流血名曰創血與吐衄不同乃平人被傷出血既無偏陰偏陽之病故專以止血為要止得一分血便保得一分命當其初受傷時急救之際止血不必分陰陽有以涼藥敷上而血止者桃花散是也有以熱藥敷上而血止者黑薑灰是也不似吐衄出於偏陰偏陽之病氣吐衄家止血必以治病氣為主病氣退斯吐衄亦退與此刀傷流血迥不同也刀傷二三日後則亦與吐衄略同有瘀血腫痛者宜消瘀血刀口敷花蕊石散腫處用乳香沒藥麝香三七蔥白搗敷瘀血消散則腫痛自除內服黎洞丸治之

刀傷去血過多傷其陰分症見心煩發熱口渴渴法宜補氣以生血血足津生則不渴矣聖愈湯加棗仁花粉兒茶乳香沒藥甘草此在吐衄家則宜補血而抑氣以內症係血分之氣不可使氣乘血也刀傷則是氣分之血故宜補氣以生血氣達患處乃能生肌氣充肌膚乃能行血與治內症者不同如有氣虛不能統血氣寒不能生血者則宜八珍養榮湯

參附湯等。以固氣者固血。吐血家亦間用此等藥物者。

刀傷之血在氣分。皮膚尤衛氣所統。破其皮膚。氣先漏洩。故以補氣為主。醫者須分別內外。而知其同中之異。異中之同。則得之矣。

客問刀傷何以善於冒風。答曰。人之所以衛外者。全賴衛氣。衛氣生於膀胱。達於三焦。外循肌肉。充於皮毛。如室之有壁。宅之有牆。室之有壁。外邪不得而入也。今既破其皮膚。是猶牆之有竇。壁之有穴。揖盜而招之入也。是以刀傷更易外感。病見發熱頭痛。牙關緊閉。吐痰抽掣。角弓反張。皆是衛氣為病。所不同者。多出血症而已。但治法亦分寒熱。分詳於下。

無汗者為風中挾寒。寒閉皮毛。宜用小柴胡湯。加荊芥防風紫蘇。蓋小柴胡乃治熱入血室之方。凡外邪入血分者。小柴胡湯皆能疏理而和解之。加宣助衛氣之藥。則偏治衛氣。而主發汗矣。破傷風治法如是。臨笑血家虛人感傷。以及產後傷寒治法。皆可參考。若刀傷去血過多。不可再發汗者。宜當歸地黃湯。或四物湯。加去風之藥。以補血而驅

邪也。失血家去血過多，與產後去血過多而復得感冒之症者，與此治法無異，皆宜先滋其血，以裕汗源，後宣其氣，以解外邪。

有汗者為風中挾熱，熱沸肌肉，法宜清散其熱，當歸芍黃湯加殭蠶、蟬蛻。若兼便秘者，加大黃治之。此即傷寒論發熱汗出，用白虎湯燥結者，用承氣湯之意。醫者得其意而變化之，有許多法門。

夫刀傷者，氣分之血病也。故邪在表者，從氣分以發之；邪在裡者，從氣分以奪之。邪在半表半裏者，從氣分以和之。兼用血藥，斡旋其間，血調而氣亦調，氣調而血愈治矣。若失血家，乃血中之氣病也，故有感冒則但取調血而兼用氣分之藥以從治之，與此同而不同。

凡刀傷冒風，總宜殭蠶、蟬蛻、搗和葱白敷之，力能拔風消腫，神效。凡刀傷潰爛，與瘡同治。此即瘀血變化成膿之說也。血凝不散為氣所蒸，則化而成膿。血者陰也，氣者陽也，陰從陽化，故膿似水，以氣之所化即為水也。而又非水者，則以其為血所化，方不失血之本質，故稠濁似

水實則水與血交并而成形者也。故凡去膿之藥，即是去水之藥。而提膿之藥，又即是乾水之藥。內服八珍湯，加苡仁、木通、六君子湯，加當歸、赤豆、芽治之。外敷化腐生肌散，提膿加龍骨、生肌加珍珠。

金刀瘡傷

新桑白皮燒灰，和馬糞塗瘡上，數易之，亦可煮汁服之。廣利方

刀斧金瘡

端午午時，取晚蠶蛾石灰、芽花，搗成團，草蓋令發熱，過收貯。

每用刮下末搽之。

刀斧傷創，血出如箭者。

用晚蠶蛾炒為末，傅之即止，甚效。勝金方

刀斧損傷

白芨、石膏煨等分為末，搽之亦可收口。濟急方

刀斧傷瘡

荷葉燒研搽之。集簡方

外科刀傷

刀傷破損，出血多少不止者，忌風並忌水也。宜止血封肌丹。

刀傷亡血，口渴心煩，氣喘者，陰亡而陽越也。宜滋陰養陽湯。

刀傷冒風，發腫發癰，發抽者，血陰筋失養也。宜滋血養肝湯。

17

金瘡中風角弓反張者 用杏仁杵碎蒸令氣溜絞脂服一小升兼摩瘡

上良。必效方

金瘡出血者 用榴花半斤。石灰一升。搗和陰乾。再用少許敷之立止。崔元亮方

折傷金瘡 乾梅燒存性傳之。又方 白綿花及布。治血崩金瘡。燒灰

用。時珍

金瘡不合者 象皮燒灰和油敷之。

金瘡悶絕不識人者 用琥珀研粉童便調一錢三服瘥。鬼遺方

金瘡出血者 用牡蠣粉敷之。肘后 又方用白薇治之。

金瘡出血 不可以藥速合。恐內潰傷肉。只以黃丹滑石等分為末敷之。

集元方

刀月金瘡 用石灰裹之。定痛止血。又速愈瘡深不宜速合者。入少許滑

石敷之。肘后

金瘡瘀血在腹中 用大麻仁三升。葱白十四枚。搗熟水煮服。血出不盡。

再服。千金方

金瘡癰腫及竹木簽刺等毒 用糯米三升於端午前四十九日以冷水

浸之一日兩換水輕淘轉勿令攪碎至端午日取出陰乾絹袋盛掛通

風處每用旋取炒黑為末冷水調如膏藥隨瘡大小裹定瘡口外以布

包定勿動直候瘡瘥 若金瘡犯生水作膿腫甚者急裹一二食久即

不作膿腫也 若癰初發纔覺焮腫急貼之一夜便消靈苑方此時宜預

備

金瘡出血不止 血見愁草研爛塗之危氏得效方 又方 用生麝乾傳五

七日即愈蘭氏經方

金瘡內漏 牡丹皮為末水服三指撮立尿出血也千金方

金瘡作痛 生牛膝搗敷即止梅師方

金瘡出血 牡蠣粉傅之

金瘡悶絕不識人 琥珀研粉童便調一錢三服瘥鬼遺方

金瘡犯內血出不止 取所交婦人中衣帶三寸燒末水服千金

金刀所傷未透膜者 用乳香沒藥各一錢童便與酒各半盞溫化服之
為末亦可

治金瘡消腫毒 宜用紫檀鹹寒血分之藥以和營氣 時珍

金瘡流血且痛者 用紫檀刮末傅之即止血止痛 陶弘景方

金瘡出血 降真香五倍子銅花等分為末傅之 醫林集要

折傷金瘡 用降真香療之能止血定痛消腫生肌 時珍

金瘡出血甚多 若血冷則殺人宜炒鹽三撮酒調服之 梅師方

金瘡中風 煎鹽令熱以匙抄漉却水熱瀉瘡上冷更着一日勿住取瘡

大效 肘后方

金瘡出血 雲母粉傅之絕妙 事林廣記

金瘡出血 白殭蠶炒黃研末傅之立愈 斗門方

金瘡出血不止者 五倍子末貼之若閉氣者以五倍子末一錢入龍骨

少許湯服立效 談楚翁方

一切金瘡 五倍子降真香等分炒研末傅之皮肉自痊名喙合山拔萃方

金瘡中風 自取小便日洗二三次不妨入水聖惠

金瘡出血不止 飲人尿五升千金

金瘡內漏 取瘡中所出血以水和服之千金

金瘡出血不止 取葱炙熟接汁塗之即止梅師方

金瘡血出 柳絮封之即止外臺

金瘡出血 薑汁和風化石灰日乾每用為末傅之效瀕湖集方

刺傷中水腫痛 煮薑熟搗之千金

金瘡傷重被驚者 以女人中衣舊者炙襠熨之李奎太白經註

跌打損傷垂死

四肢頭面跌打損傷疼痛者經絡有死血也宜通瘀達滯湯
腰腹胸背跌打損傷疼痛者膜內有死血也宜化瘀逐血湯
跌打損傷無論何處腫痛者當散血使消也宜火煨酒調散

打傷瘀血 用薑葉一升當歸三兩為末溫酒服方寸七日三

跌打損傷 玫瑰花能治之少林寺拳經金雀花根亦能治之搗汁和酒服花

亦可

王阮亭居易錄云四川提督吳英言昔得撲打損傷秘方雖重傷瀕死但

一絲未絕灌下立甦其方以十一月採菊花連枝葉陰乾用時加童便

無灰酒同煎熱服

墜馬拗傷 桑根白皮五斤為末一升煎膏敷之便止已後亦無宿血終不發

動經方

破傷中風 桑瀝好酒對和溫服以醉為度醒服消氣散或因症製方

打傷青腫 淫羊皮卧之能散

凡跌打杖傷金瘡挫胸流注走痛筋骨痹疼腦破血流癰毒初起均以葱白杵爛

和蜂蜜厚傳之

跌撲傷損扭閃出骨竅等症 用蠶沙四兩炒綠豆粉四兩炒枯礬二兩

走死回生秘訣

四錢為末醋調傳之絹包縛定換三四次即愈忌產婦近之邵真人經驗良方

打撲損傷 寒食日浸糯米逐日易水至小滿取出日乾為末水調塗之

便民圖纂集

跌打損傷

取蠅虎研爛好酒下之

蠅虎形似蜘蛛善捕蠅身黑嘴有雙肉撮蠅而食兩目似虎炯然生光

損傷青腫

用新羊肉貼之

千金方

又方

用炙猪肉搗之

千金方

折傷墮墜瘀血在腹氣短者

用黑大豆煮汁服甚者不過三服

千金方

打撲損傷

用綠豆粉新銚炒紫新汲水調傳以杉木皮縛定其效如神

澹寮方

凡打撲傷損不食至三五日水食不入口者

用生猪肉二大錢打爛溫

水洗去血水再搗爛以陰陽打和以半錢用雞毛送入咽內再以陰陽

湯灌下之其食蟲聞香竇開瘀血而上胸中自然開解此乃損血凝聚

心間蟲食血飽其他物自不來探故也此謂之騙通之法

邵氏方

損傷瘀血在腹者

用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸匕日三夜一血化

為水。

劉滑子鬼遺方

折傷閃胸

用土牛膝搗罨之。

衛生易簡方

杖痛腫痛

未毛鼠同桑椹子入麻油中浸釀卧時取塗甚效。

西湖志

打撲損傷骨碎及筋傷爛

用生地黄熬膏裹之以竹簡編夾急縛勿令

轉動一日一夕可十易之則瘥。

類說云許元公過橋墮馬右臂白脫

左右急接入白中昏迷不知痛苦急召田錄事視之曰尚可救乃以藥

封腫處中夜方甦達旦痛止痛處已白日日換貼且瘀腫移至肩背乃

以藥下去黑血三升而愈即上方也。

肘后方中

損傷打撲瘀血在腹者

用生地黄汁三升酒一升半煮二升半分三服。

千金方

跌破出血 用烏賊骨末傅之。

直指方

凡跌折傷筋骨痛不可忍者

用生地黄一斤藏瓜薑糟一斤生薑四兩

都炒熟布裹罨傷處冷即易之。

曾有人傷折醫令捕一生龜將殺用

之夜夢龜傳此方服之而愈也 又類編所載只用藏瓜薑糟一物入

赤小豆末和勻。罨於斷傷處。以杉片或白桐片夾之。不過三日即痊。

跣

音宛體曲也申足也入猶屈也

杖瘡青腫 用溼綿紙鋪傷處。以燒過酒糟搗爛厚鋪紙上良久。痛處如

蟻行熱氣上升即散。

簡便方

從高墜下有瘀血在內 刮琥珀屑酒服。或加蒲黃日服四五次。

外臺

墜馬撲傷 用稻稈燒灰以新熟酒連糟入鹽和淋取汁。淋痛處立瘥。

壓撲損傷 胡桃仁搗和溫酒頓服便瘥。

圖經本草

墜馬血瘀積在胸腹唾血無數者 乾藕根為末酒服方寸匕。日二次。

金針

杖瘡腫痛 五倍子去穰米醋浸一日。漫火炒黃研末乾摻之。不破者醋

調塗。

易簡方

杖瘡腫痛 新石灰。蘇油調搽甚妙。

集簡方

傷損內痛 或兵杖所加。或木石所造。血在胸背。脅下刺痛者。用青竹

如亂髮各一團。炭火炙焦為末。酒一升。煮三沸服之。三服愈。千金

打撲血聚皮不破者。用蘿蔔或葉搗封之。邵氏方

折傷瘀血傷損筋骨疼痛。鼠屎燒末。猪脂和傅。急裹。不過半日痛止。梅師方

方

鬼擊吐血胸腹刺痛。鼠屎燒末。水服方寸匕。不省者灌之。肘後方

打傷瘀血攻心者。人尿煎服一升。日一服。蘇恭本草

折傷跌撲。童便入少酒飲之。推陳致新。其功甚大。薛己云。余在居庸。

見覆車被傷七人。仆地呻吟。俱令灌此。皆得無事。凡一切損傷。不問壯

弱。及有無瘀血。俱宜服此。若血脹或作痛。或發熱煩躁。口渴。惟服此一

甌。功勝他藥。他藥雖效。恐無瘀血。反致誤人。童便不動臟腑。不傷氣血。

萬無一失。軍中多用此。屢試屢驗。外科發揮

治杖破傷。玉簪花手排。熟貼傷處。

折傷腫痛。梔子白麪同搗塗之。甚效。集簡方

跌打損傷垂死。打傷垂死。

杖瘡青腫 豆腐切片貼之頗易。一法以燒酒煮豆腐貼之色紅即易不

紅乃止。

方拔萃

打擊青腫

炙豬肝貼之。千金

打撲損傷惡血攻心悶亂疼痛者 以乾荷葉五片燒存性為末用童子

熱尿一盞食前調下。日三服利下惡物為度。

方聖惠

打傷垂死

打傷垂死者 其人飲食不進前後不通乃瘀血在心命在旦夕急用虎

膽五分去外皮用老黃酒在碗內研細為末白茯苓二錢為末用熱陳

酒調灌下出可不死矣。

打碎頭骨蓋者 用虎脂一兩浸好熱酒內俟化勻服之汗出為度。如

患處青者不治。

打傷顛撲 及牛馬觸動心腹破血四肢摧折者速用烏雞一隻連毛杵

一千二百下黃酒三升和勻以新布搗患處將膏塗布上覺寒振欲出

徐徐取下。須臾再上一雞少頃再作以愈為度。方肘後

凡打撲傷損三五日水食不入口。用生豬肉二大錢打爛。溫水洗去血水。再搗爛。以陰陽湯打和。以半錢用雞毛送入咽內。即以陰陽湯灌下之。其食蟲聞香竇開。瘀血而上。胸中自然開解。此乃損血凝聚心間。蟲食血飽。他物蟲不來探故也。謂之騙通之法。方鄒氏

打撲傷腫。熟麻油和酒飲之。以火燒熱地卧之。覺即疼腫俱消。且無痕迹。趙養行營雜錄

跌傷垂死

凡跌撲死者。未絕氣。用山羊血一分調酒飲之。遂甦。神效立見。山羊生平樂山崖間。蹻捷若飛。生得最難。惟布網草間能生得之。刺其心血。待乾結成塊。可以携遠。凡血皆患凝滯。山羊踰高陟險。旦夕不休。則其血活。苗人取血法。以麋竹通節削鋒利。活刺心血。收乾者良。宰取者不堪用。山羊喜食三七苗。其血主治損傷極妙。輕者服數釐。重者服二

三分以心血為上身血次之色黑有光而質輕者為真又以久凝臭難
血一塊投入山羊血過宿反變成鮮血者真又收得乾血成塊者必用
糯米養之云可久留不枯為和傷散血之神藥酒服又能續骨每用不
過分許雖不耗傷元氣但力能走散陰血

凡顛撲欲死及一切傷損從高墜下及木石所迫落馬撲車氣絕欲死者
此皆瘀血凝滯也用淨土五升蒸熟以故布重裹作二包更互熨之
勿大熱恐破肉取痛止則已神效

千金方

折傷筋骨者烏古瓦治之秘傳神效散治跌撲傷損骨折骨碎筋斷
痛不可忍者此物極能理傷續斷屢用屢效法用路上牆脚下往來人
便溺處久碎瓦片一塊洗淨火煨醋淬五次黃色為度刀刮細末每服
三錢好酒調下在上食前在下食後不可以輕易而賤之真神方也

正真人
經驗方

從高墜下有瘀血在內者琥珀治之刮琥珀末酒服或入蒲黃日服四

五次 外臺秘要

打跌骨折 酒調白芨末二錢服 其功不減自然銅古銖錢也 方永類

折傷筋骨 急取雄雞一隻刺血。量患人酒量。或一碗或半碗和飲。痛立

止。神效。 方青囊

打撲傷損 龜血和酒飲之。仍搗生龜肉塗之。 時珍

跌壓傷死 凡跌壓傷重之人口耳出血。昏暈不醒。只要身體尚軟。皆可

救治。切忌人多嘈雜。只令親人呼而扶之。且就坐於地。緊為抱住。曲其

手足。如和尚打坐樣。隨以熱童便灌之。馬尿更妙。或用白糖沖熱酒灌

之。 用水調尤為神妙。但當強灌一二杯下。唯便好。然後輕移於懷中。抱

入室內。如前坐法。更以足緊抵糞門。若係婦人。連陰戶一并抵住。恐其

氣下洩。以致不救。并將窗櫺遮住。令房中黑暗為佳。傷重者瘀血必多。

用前當歸湯。白糖飲最妙。其餘簡便之方。不妨兼用。切記不可令出大

便。恐其氣脫而死。必俟其腹中動而有聲。上下往來數遍。急不能待。方

可使解所下盡是紫血毒已解下方可令睡倘瘀血未盡當歸白糖飲尤宜多服

自縊垂死

卒縊垂死心口猶溫者勿斷繩刺雞冠血滴口中安心神

縊死未絕者用雞血塗喉下一方用葱心刺耳鼻中有血出即甦

卒自縊死者勿斷繩急取梁上塵如豆大各納一筒中四人同時極力

吹兩耳及兩鼻中即活

外臺秘要

自縊將死者皂莢末吹鼻中即活

外臺方

卒自縊死者用藍汁灌之

千金方

縊死未絕氣者用雞屎白如棗大酒半盞和灌口鼻中

肘後方

自縊垂死用葱心刺耳鼻中有血出即甦

縊死用回生丹灌之立活回生第一仙丹

活土鼈蟲

又名地鼈又名鼈形

扁不能飛大小不等色黑而亮背有橫楞輪前窄後寬以大如大指頭為佳小者功緩雄者更妙用刀切為兩節放地上以棗蓋住過夜其蟲

自接而活方是雄的隨處皆有生米店有糠之處及確白下倉底窰
腳冬天窰脚更多或生麪鋪或榨油房并空屋乾燥之處總在縣土內
尋覓取活的去足放瓦上小火焙黃研細用淨末五自然銅炭火內燒
錢死的不效假的更不效藥店有乾的賣一看便知
紅入好醋內淬半刻取出再燒再淬連製九次研末
要親身自製藥店內多製不透不致用淨末三錢
巴豆去殼研用淨末二錢真珠砂飛淨二錢真麝香三分要子以上各藥揀
選明淨研極細末收入小口磁瓶用蠟封口不可洩氣大人每用七分
五釐小兒用七釐酒冲服牙關不開打開一齒灌之必活活後宜調養

夜卧魘死

夜卧魘死 勿用火照急取梁上塵納鼻中即活瑣碎錄

尸厥魘死 尸厥之病卒死脈猶動聽其耳目中如微語聲股間暖者是
也魘死之病卧忽不寤勿以火照但痛齧其踵及足拇指甲際唾其面
即甦仍以菖蒲末吹鼻中桂末納舌下并以菖蒲根汁灌之肘後方

魘寐猝死 鍋底墨水灌二錢并吹鼻醫說

尸厥不醒脈動如故 窰突墨彈丸漿水和飲仍針百會足大指中指甲側千金方

起死回生秘訣

痰厥卒死 中暑猝死

夢魘猝死

大塊明雄

珠砂更妙

戴頭上并繫左腋下自能免鬼魅并解惡夢

自無魘死之患

發花風死

此症多死於床上見腎俞穴

背脊下腰眼處

有一紅扁者可治若黑

者不治急用麝香填於臍眼加薑一片蓋麝上艾火灸之可生

痰厥卒死

痰厥氣絕心頭尚溫者

用千年石灰一合水一盞煎滾去清水再用一

盞煎極滾澄清灌之少頃痰下自甦

集方

痰厥死

用巴豆搗爛綿紙包裹取板油作燃燒烟薰鼻中片刻吐出痰

血即愈或用生半夏末如豆大吹兩鼻中即醒

中暑猝死

中暑毒死

救生散用新胡麻一升炒令黑雖冷為末或丸服

經驗方

夏月暈死

用道中熱土圍臍旁令人尿淋臍仍用熱土大蒜等分搗水

去渾灌之即活

又方 用屋上兩畔古瓦熱熨心頭冷即易之。千金方

夏月渴死 濃煎麥汁一杯服。外臺方

夏天道路中暑忽然昏死 切不可誤用冷水噴灌一受寒冷則不可救。急用稻草節結為長帶曲盤肚臍外用熱土搓碎圍之使人撒尿其中。令溫氣入腹久之自愈。

又方 草紙捲成筒點火向口鼻間熏之即活神效。

水溺卒死

水溺卒死 一宿者尚可活用。紙裹皂莢末納下部須臾出水即活。秘要方

人落水死 裹石灰納下部中水出盡即活。千金方

凡溺水死者 用鴨血灌之即活。

人溺水死 白沙即河沙炒覆死人面上下。惟露七孔冷溼即易。千金方

墮水凍死只有微氣者 勿以火炙用布袋盛熱灰放在心頭冷即換待。

眼開以溫酒與之。普濟方

人溺水死 用竈中灰一石埋之從頭至足惟露七孔良久即甦 凡蠅

溺水死試以灰埋之少頃即活甚驗蓋灰性暖而能拔水也 古方竈中

灰宜用冬灰乃冬月所燒柴薪之灰也 冬灰詳綱目卷七土部

溺水猝死 撈起時急將口撬開橫啣筷子一根使可出水以竹管吹其

兩耳殭生半夏末如豆大吹其鼻孔又用皂角末置管中吹其穀道如

條夏月將溺人肚腹橫覆牛背之上兩邊使人扶之牽牛緩緩而行腹

中之水自然從口中並大小便流出再用生薑湯調蘇合丸灌之或生

薑汁灌之並用生薑擦牙若無牛用一人覆卧躬腰令溺人如前將肚

腹橫覆於活人身上令活人微微搖動水亦可出或用大鍋一口覆寬

橈上將溺人覆於鍋上亦可要將溺人臍對鍋臍俯卧手托其頭如係

冬月即將溼衣更換一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取竈內草

灰多多鋪於被褥之上臍下墊以棉枕一個乃以草灰將渾身厚蓋之

灰上再加被褥不可使灰迷於眼內其撬口啣筷灌蘇合丸生薑湯吹

耳鼻穀道等事俱照夏天法。冬天甦醒後宜少飲湯。夏天宜少飲粥湯。按灰性煖而能拔水。凡蒼蠅溺水死者。以灰埋之。少頃即活。此明驗也。溺人倘或微笑。急掩其口鼻。如不掩住。則笑不可止。不能救矣。溺人不可急於見火。一見必大笑而死。

初救起時。尚有微氣。或胸前尚緩。速令生人脫貼身熱衣。為之更換。抱擔身上。將屍微微倒側之。令其腹內水流出。若水往外流。即有生機。一面用粗紙燒燃。取烟薰其鼻竅。稍薰片時。即用皂角研細末。吹入鼻孔。但得微有噴嚏。即可得生。又灌酒湯。不可太熱。恐傷齒盡落。

鬼擊卒死

鬼擊卒死者。用烏雞冠血。漉口中。令嚥。仍破雞搗心下。冷乃棄之。道邊

妙方
肘後

鬼排卒死者。用烏雄雞血塗心下。更甦。此白毛烏骨雄雞也。

鬼擊者。卒然着人如刀刺狀。胸脇腹內切痛。不可抑按。或吐血鼻血下

血一名鬼排以醇酒吹兩鼻內

肘後方

鬼擊卒死者 吹米醋少許入鼻中

千金方

鬼魔不寤者 皂莢末刀圭吹之能起死人

千金方

鬼擊中惡 用鹽一盞水二盞和服以冷水嚥之即甦

救急方

鬼打死 凡睡魔死中邪死俱可用此方 用白毛烏骨雞血搽心前并將雞煮湯灌之極效 或用雞冠血滴口中仍破此雞榻心下冷即將雞埋之甚效

中邪死 用菰菜心於男左女右鼻內刺入六寸許令目開血出即活或搗菰汁灌鼻更視上唇內有粟米粒者以針挑破取出 又方用皂角末或生半夏末如豆大各吹兩鼻中燒炭一爐以陳醋潑炭上使患者聞得醋氣即活湏捉其兩手勿令驚或灌醋於鼻內或用樟木燒烟薰之亦可

鬼打及絕鬼排突人中惡猝死者 用鐵椎柄和桃奴鬼箭等作丸服之

自活

藏器方

脫陽欲死

脫陽危症 凡人大吐大瀉之後四肢厥冷不省人事或與女子交後小腹腎痛外腎搐縮冷汗出厥逆須臾不救 先以葱白炒熱熨臍後以葱白三七莖搗爛用酒煮灌之陽氣即回

此華佗救卒病方也

驚怖卒死

驚怖卒死者 溫酒灌之即醒

解救砒毒垂死

解砒石毒 用糯稻草燒灰淋汁調青黛三錢服之

醫方摘要

解砒石毒 用麻油一碗灌之

衛生方

中砒霜毒者 用白扁豆生研以水絞汁飲之

解砒毒 用綠豆粉寒水石等分以藍根汁調服三五錢

中砒石毒 用米醋最驗者飲之得吐即愈不可飲水

廣記

解礬砒毒 大豆煮汁飲之。方肘後

解砒霜毒 用防風一兩研末冷水調服或用四兩冷水搗汁灌服亦可。

屢試神驗萬無一失。

解砒霜毒 殺白鴨取血對口急速灌下即活遲則血冷如已服防風必能回生可以不必服此以免雜亂反致不救。

毒疔垂死

疔瘡初起即腫者 用麪圍住以針亂刺瘡上銅器煎醋沸傾入圍中令容一盞冷即易三度根即出。

疔腫惡瘡 用胡麻燒灰針砂等分為末醋和傅之日三。方普濟

赤根疔腫 用白米粉和蜜傅之。方千金

數種疔瘡 用馬蹄草。一名萐菜一名水葵一名露葵一名馬蹄草一名缺盆草大青草臭紫草各

等分搗爛以酒一碗浸之去滓溫服三服立愈。方經驗良方

拔疔根方 用臭蟲同米飯搗勻搽疔上能拔疔根外出。方楊氏經驗

疔腫傷風立腫

以馬屎炒熨瘡上五十遍極效

聖惠方

又普濟方用驢屎

其同

拔諸疔之根

用荔枝肉白梅肉各三個搗餅貼之其根自出

又方

用鬼螺螄一個荔枝核三個煨存性白梅肉六個共搗爛成膏

貼之取出疔根後用八寶丹收功

鬼螺螄即石上螺師而小秋冬在

墻脚石隙中夏月在溼地青苔上取用洗去土

疔毒腫痛

用馬齒莧二分石灰三分為末雞子白和塗之

疔腫惡毒

用門白灰一撮羅細以獨頭蒜或新蒜臺染灰擦瘡口候瘡

自然出微汗再擦少頃即消散也

發背瘡毒亦可擦之

紅絲疔

治法以白菊花葉加雄黃錢許蛭蚰二條共搗極爛從頭敷至

絲盡處為止用絹裹緊隔夜即消真神方也

凡疔腫毒瘡

取細長小鬼螺螄連殼敷患處露頂出膿次日即可消

黃氏

醫抄

疔腫諸毒

用荊芥一握切以水五升煮取一升分二服冷飲

簡易方

疔腫垂死 用菊花一握搗汁一升入口即活此神驗方也冬月採根後附

疔瘡惡腫 用臘月猪膽風乾和生葱搗敷普濟方

疔瘡腫毒 用白芨末半錢以水澄清去水攤於厚紙上貼之袖珍方

馬疔腫毒 用穿山甲燒存性貝母等分為末酒調服三四次乃用下藥

利去惡物即愈

拔取疔毒 用蟾酥以白麝黃丹搜作劑每丸麥粒大以指爬動瘡上插

入重者挑破納之仍以水澄膏貼之危氏方

疔瘡惡腫 用蟾酥一錢巴豆四個搗爛飯丸錠子如綠豆大每服一丸

姜湯下良久以扁蓄根黃荊子研酒半碗服取行四五次以粥補之乾坤

秘製

拔取疔黃 用蟾酥以麝丸梧子大每用一丸安舌下即令黃出也青囊雜纂

疔瘡惡腫 用田螺入冰片化水點瘡上普濟方

疔腫惡毒 用門白灰一撮羅細以獨蒜或新蒜臺染灰擦瘡口候瘡自

然出少汁再擦少頃即消散也。雖發背癰腫亦可擦之。

疔瘡惡腫 先刺出血以海螵蛸末搽之其疔自出。普濟方

水疔暗疔 水疔色黃麻木不痛 暗疔瘡凸色紅使人昏狂并先刺四

畔。後用銀杏白果也去殼浸油終年久者搗膏之。普濟方

疔腫拔毒 取戶邊蜘蛛杵爛醋和先挑四畔血出根稍露傅之乾即易

一日夜根拔出大有神效。千金方

魚臍疔瘡 四面赤中央黑者 用銀硃水和丸每服一丸溫酒下名走

馬丹。普濟方

疔腫 取鼠壤土以小兒尿和塗之自消。孫真人方 土柔而無塊曰壤

疔瘡惡腫 胡桃一個平破取仁嚼爛安殼內合在瘡上頻換甚效。普濟方

疔瘡惡腫 石灰半夏等分為末傅之。普濟方

疔腫有根 用此拔之 用大針刺作孔削蕪菁根如針大染鐵生衣刺

入孔中再以蕪菁根鐵生衣等分塗於上有膿出即易須臾根出立瘥。

忌油膩生冷五辛粘滑陳臭等食物

肘後方

疔瘡惡腫

雄鼠屎亂髮等分燒灰針瘡頭納入最良

良青濟

疔疽惡瘡

生人腦

即耳垢

鹽泥等分研勻以蒲公英汁和作小餅封之大

效

聖惠方

十三種疔

春三月上建日採枸杞葉名天精夏三月上建日採枝名枸

杞秋三月上建日採子名却老冬三月上建日採根名地骨並曝乾為

末如不得依法採但得一種亦可用緋繒一片裹藥牛黃一梧子大

乃鈎棘針三七枚赤小豆七粒為末於繒上鋪亂髮一雞子大乃鋪牛

黃等末捲作團以髮束定熨斗中炒令沸定刮搗為末以一方寸匕合

前枸杞末二匕空心酒服二錢半日再服

千金

疔毒初起

不拘已成未成

用翻白草十科酒煮服出汗愈

疔瘡疔毒

蒲公英搗爛貼之

救急方

魚臍疔瘡

寒食錫塗之良乾者燒灰

千金方

終