

**ANEXO 6**

**CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN**

**DIA “PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SALAMANCA”**

## CONTENIDOS

|       |                                                                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN .....                                                                                  | 5  |
| 2     | OBJETIVOS .....                                                                                     | 5  |
| 2.1   | Objetivo General .....                                                                              | 5  |
| 2.2   | Objetivo Específicos para Vegetación .....                                                          | 5  |
| 2.3   | Objetivos Específicos para Flora.....                                                               | 6  |
| 3     | ÁREA de INFLUENCIA.....                                                                             | 6  |
| 4     | METODOLOGÍA.....                                                                                    | 8  |
| 4.1   | Antecedentes Bibliográficos.....                                                                    | 8  |
| 4.1.1 | Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia .....                    | 8  |
| 4.2   | Antecedentes de Terreno.....                                                                        | 9  |
| 4.3   | Vegetación.....                                                                                     | 11 |
| 4.4   | Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....  | 15 |
| 4.5   | Singularidad Ambiental .....                                                                        | 17 |
| 4.6   | Flora.....                                                                                          | 18 |
| 4.6.1 | Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica .....                                                  | 19 |
| 4.6.2 | Abundancia.....                                                                                     | 19 |
| 4.6.3 | Tipos Biológicos.....                                                                               | 19 |
| 4.6.4 | Origen Geográfico .....                                                                             | 20 |
| 4.6.5 | Especies arbóreas o arbustivas originarias del país .....                                           | 20 |
| 4.6.6 | Estado de Conservación de las especies de Flora .....                                               | 20 |
| 5     | RESULTADOS .....                                                                                    | 22 |
| 5.1   | Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia .....                    | 22 |
| 5.1.1 | Pisos Vegetacionales .....                                                                          | 22 |
| 5.2   | Resultado de la Prospección .....                                                                   | 23 |
| 5.2.1 | Vegetación.....                                                                                     | 23 |
| 5.2.2 | Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal ..... | 27 |

|       |                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2.3 | Singularidad Ambiental .....                                               | 28 |
| 5.2.4 | Flora.....                                                                 | 28 |
| 6     | CONCLUSIONES .....                                                         | 36 |
| 7     | BIBLIOGRAFÍA.....                                                          | 37 |
| 8     | APÉNDICE .....                                                             | 40 |
| 8.1   | LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA..... | 40 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|           |                                                                                                           |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1.  | Vértices Área de influencia del Proyecto, coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S) y superficie total (ha).....   | 7  |
| Tabla 2   | Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera .....                                                  | 10 |
| Tabla 3   | Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico. ....                                               | 12 |
| Tabla 4   | Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.....                              | 13 |
| Tabla 5   | Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....                                                             | 16 |
| Tabla 6   | Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia .....                                     | 17 |
| Tabla 7   | Escala de Coberturas de Braun-Blanquet. ....                                                              | 19 |
| Tabla 8   | Origen Geográfico de la Flora Registrada.....                                                             | 20 |
| Tabla 9.  | Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....                        | 23 |
| Tabla 10. | Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.....                                             | 28 |
| Tabla 11  | Familias de las Especies Prospectadas. ....                                                               | 31 |
| Tabla 12  | Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%..... | 33 |
| Tabla 13  | Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....                                 | 34 |
| Tabla 14  | Origen geográfico de la Flora registrada .....                                                            | 34 |
| Tabla 15  | Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....                                                  | 35 |
| Tabla 16. | Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....                                | 41 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto Salamanca. ....                                                                                          | 8  |
| Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.....                                                                           | 11 |
| Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN. ....                                                                          | 21 |
| Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno... ..                                                     | 24 |
| Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Plantación abierta de Eucalyptus globulus” identificada en el AI del Proyecto. .... | 25 |
| Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Matorral arborescente mixto” identificada en el AI del Proyecto. ....               | 26 |
| Figura 7. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera agrícola” identificada en el AI del Proyecto. ....                          | 27 |

## 1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la caracterización ambiental del componente flora y vegetación para el proyecto “Planta solar fotovoltaica Salamanca”, en adelante el “Proyecto”. Dicha caracterización se realizó de acuerdo a la información bibliográfica disponible y la información técnica recopilada en terreno durante la ejecución de una campaña de terreno realizada en época de primavera 2019, ejecutada el día 15 de diciembre de 2019. El proyecto se ubica en la comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule, aproximadamente a 10 Km al Este del centro urbano de dicha comuna.

En base a los resultados, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

### 2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

## 2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

## 3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. Es decir, corresponde al área que debe ser descrita para identificar o descartar adecuadamente los posibles impactos, en este caso, del componente flora y vegetación.

Conforme a esto, el Área de Influencia del Proyecto (en adelante AI) se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

En este sentido, el AI corresponde a aquella superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales del Proyecto, cuyo tamaño total es de 19,06 ha aproximadamente.

En la Tabla 1 se informan los vértices del AI del Proyecto y sus coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S), mientras que en la Figura 1 se muestra su ubicación geográfica.

**Tabla 1. Vértices Área de influencia del Proyecto, coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S) y superficie total (ha)**

| VÉRTICE | COORDENADA UTM (WGS84 HUSO 19S) |         | SUPERFICIE (HA) |
|---------|---------------------------------|---------|-----------------|
|         | ESTE                            | NORTE   |                 |
| V1      | 267936                          | 6074466 | 19,06           |
| V2      | 267859                          | 6074339 |                 |
| V3      | 267952                          | 6073936 |                 |
| V4      | 268167                          | 6073624 |                 |
| V5      | 268380                          | 6073667 |                 |
| V6      | 268369                          | 6073744 |                 |
| V7      | 268151                          | 6073981 |                 |
| V8      | 268149                          | 6074071 |                 |
| V9      | 268177                          | 6074130 |                 |
| V10     | 268161                          | 6074218 |                 |
| V11     | 268046                          | 6074364 |                 |
| V12     | 268046                          | 6074439 |                 |

Fuente: Elaboración propia.




Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto Salamanca.

Fuente: Elaboración Propia mediante Google Earth. Datum WGS84, Huso 19 S.

## 4 METODOLOGÍA

### 4.1 Antecedentes Bibliográficos

#### 4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el AI, se determinaron mediante una recopilación de



antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

## **4.2 Antecedentes de Terreno**

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (Figura 2), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de 11 puntos de muestreo en una campaña de primavera realizada el día 15 de diciembre del 2019. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (Tabla 2).

**Tabla 2 Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera**

| PUNTOS DE MUESTREO | COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S |         |
|--------------------|-----------------------------------|---------|
|                    | ESTE                              | NORTE   |
| E1                 | 268110                            | 6074027 |
| E2                 | 268281                            | 6073770 |
| E3                 | 267884                            | 6074368 |
| E4                 | 267925                            | 6074197 |
| E5                 | 268237                            | 6073909 |
| E6                 | 268223                            | 6073791 |
| E7                 | 268187                            | 6073638 |
| E8                 | 268136                            | 6073887 |
| E9                 | 267979                            | 6073933 |
| E10                | 268121                            | 6074204 |
| E11                | 268012                            | 6074342 |

Fuente: Elaboración Propia, 2019



**Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.**

Fuente: Elaboración Propia mediante Google Earth. Datum WGS84, Huso 19 S

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento, considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

### 4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS<sup>1</sup>), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es

<sup>1</sup> Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La tabla 3 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

**Tabla 3 Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.**

| TIPO BIOLÓGICO    |                                | COBERTURA (N) |          |             |
|-------------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------|
| LA <sub>n</sub> : | Leñoso alto, con cubrimiento n | 1:00          | 5 – 10%  | Ralo        |
| LB <sub>n</sub> : | Leñoso bajo, con cubrimiento n | 2:00          | 10 – 25% | Muy abierto |
| H <sub>n</sub> :  | Herbáceo, con cubrimiento n    | 3:00          | 25 – 50% | Abierto     |
| S <sub>n</sub> :  | Suculento, con cubrimiento n   | 4:00          | 50 – 75% | Semidenso   |
| n =               | Cobertura (%)                  | 5:00          | > 75     | Denso       |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

De esta forma, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente, sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación (Tabla 4):

**Tabla 4 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales**

| FORMACIÓN VEGETAL                                                     | % COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO |           |          |           |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------|
|                                                                       | COBERTURA                      | ARBOLES   | ARBUSTOS | HERBACEAS | SUCULENTAS | NO VASCULARES |
| PRADERA<br>C/Suculentas                                               | Densa                          | <5        | <5       | >75       |            | <5            |
|                                                                       | Semidensa                      | <5        | <5       | 50-75     |            | <5            |
|                                                                       | Abierta                        | <5        | <5       | 25-50     | 1-5        | <5            |
|                                                                       | Muy Abierta                    | <5        | <5       | 10-25     | <5         |               |
|                                                                       | Rala                           | <5        | <5       | 5-10      |            | <5            |
| PRADERA CON<br>ARBUSTOS<br>C/suculentas                               | Densa                          | <5        | 10-25    | >75       |            | <5            |
|                                                                       | Semidensa                      | <5        | 10-25    | 50-75     |            | <5            |
|                                                                       | Abierta                        | <5        | 10-25    | 25-50     | 1-5        | <5            |
|                                                                       | Muy Abierta                    | <5        | 5-10     | 10-25     |            | <5            |
|                                                                       | Rala                           | No existe |          |           |            |               |
| MATORRAL<br>C/suculentas                                              | Densa                          | <10       | >75      | 0-100     |            | <5            |
|                                                                       | Semidensa                      | <10       | 50-75    | 0-100     |            | <5            |
|                                                                       | Abierta                        | <10       | 25-50    | 0-100     | 1-5        | <5            |
|                                                                       | Muy Abierta                    | <10       | 10-25    | <25       |            | <5            |
|                                                                       | Rala                           | <5        | 5-10     | 5-10      |            | <5            |
| MATORRAL<br>ARBORESCENTE<br>(Matorral con<br>árboles)<br>C/suculentas | Densa                          | 10-25     | >75      | 0-100     |            | <5            |
|                                                                       | Semidensa                      | 10-25     | 50-75    | 0-100     |            | <5            |
|                                                                       | Abierta                        | 10-25     | 25-50    | 0-100     | 1-5        | <5            |
|                                                                       | Muy Abierta                    | No existe |          |           |            |               |
|                                                                       | Rala                           | No existe |          |           |            |               |
| FORMACION DE<br>SUCULENTAS<br>(Presencia de<br>suculentas<br>> 5%)    | Densa                          | <5        | <5       | <5        | >25        | <5            |
|                                                                       | Semidensa                      | <5        | <5       | <5        | 10-25      | <5            |
|                                                                       | Abierta                        | <5        | <5       | <5        | 5-10       | <5            |
| BOSQUE                                                                | Densa                          | >75       | 0-100    | 0-100     |            | <10           |

| FORMACIÓN VEGETAL                                   | % COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO |           |          |           |            |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------|
|                                                     | COBERTURA                      | ARBOLES   | ARBUSTOS | HERBACEAS | SUCULENTAS | NO VASCULARES |
| (Arboles potencial > 5 m de altura)<br>C/suculentas | Semidensa                      | 50-75     | 0-100    | 0-100     |            | <10           |
|                                                     | Abierta                        | 25-50     | 0-100    | 0-100     |            | <10           |
|                                                     | Muy Abierta                    | 10-25     | <25      | <25       | 1-5        | <10           |
|                                                     | Rala                           | 5-10      | <10      | <10       |            | <10           |
| PRADERA CON ARBOLES                                 | Densa                          | 10-25     | <5       | >75       |            | <5            |
|                                                     | Semidensa                      | 10-25     | <5       | 50-75     |            | <5            |
|                                                     | Abierta                        | 10-25     | <5       | 25-50     | 1-5        | <5            |
|                                                     | Muy Abierta                    | No existe |          |           |            |               |
|                                                     | Rala                           | No existe |          |           |            |               |
| ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA<br>(< sin vegetación)    |                                | <5        | <5       | <5        | <5         | <5            |

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

#### 4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

**Tabla 5 Condiciones para Formaciones Xerofíticas**

| UBICACIÓN GEOGRÁFICA                                                                                            | SUPERFICIE<br>MÍNIMA (ha) | ANCHO<br>MÍNIMO (m) | ESPECIES<br>NATIVAS | DENISIDAD<br>MÍNIMA (ind./ha) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Norte del río Elqui hasta el límite norte del país                                                              | 1                         | 20                  | carácter xerofítico | No aplica                     |
| Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso                                                | 1                         | 40                  | carácter xerofítico | 300                           |
| Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago | 1                         | 40                  | carácter xerofítico | 500                           |

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.



En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.

Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.

Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.

Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

## 4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado (Tabla 6).

**Tabla 6 Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia**

| SINGULARIDADES AMBIENTALES                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional                                                                                                          |  |
| Presencia de formaciones vegetales relictuales                                                                                                                                          |  |
| Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                          |  |
| Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo   |  |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300. |  |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                                                      |  |

| SINGULARIDADES AMBIENTALES                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.                                                |
| Presencia de especies endémicas.                                                                                                                                                 |
| Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                                                                                 |
| Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).                              |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.                                                          |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.                                                                                           |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.                                                                                                 |
| Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378. |
| Presencia de un ecosistema amenazado.                                                                                                                                            |
| Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.                                                                                                                       |

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

## 4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x1 m<sup>2</sup> utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x10 m<sup>2</sup>, donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

#### 4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

#### 4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

**Tabla 7 Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.**

| COBERTURA | DESCRIPCIÓN                                   |
|-----------|-----------------------------------------------|
| R         | Individuo solitario, cobertura insignificante |
| +         | Pocos individuos, cobertura insignificante    |
| 1         | Varios individuos, pero con cobertura <5%     |
| 2         | 5-15%                                         |
| 3         | 15-25%                                        |
| 4         | 25-50%                                        |
| 5         | 50-75%                                        |
| 6         | 75-100%                                       |

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

#### 4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

#### 4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

**Tabla 8 Origen Geográfico de la Flora Registrada**

| ORIGEN               | DESCRIPCIÓN                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Endémico             | Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional                |
| Nativo (no endémico) | Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes          |
| Alóctona             | Taxón con distribución natural en otros países                                    |
| Indeterminado        | Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico. |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

#### 4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país


Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

#### 4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011 del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las

especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). La Figura 3, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:



**Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.**

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de "Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012).

## 5 RESULTADOS

### 5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

#### 5.1.1 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se inserta dentro del piso vegetal "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*", siendo éste un bosque esclerófilo cuyo dosel superior es dominado por *A. caven* y *L. caustica*. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

En cuanto a la composición florística presente en este piso vegetal, está conformada por *Acacia caven*, *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros*.

Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre, mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.

En relación a la distribución, este ecosistema se distribuye en planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunos sectores el ombrotipo húmedo inferior.

## 5.2 Resultado de la Prospección

### 5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron dos Formaciones en el área de influencia: Bosque, matorral arborescente y Pradera. Dichas Formaciones vegetacionales comprenden los siguientes tipos vegetacionales:

- Plantación abierta de *Eucalyptus globulus*
- Matorral arborescente mixto
- Pradera agrícola

En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (Figura 4).


**Tabla 9. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.**

| PUNTO        | RECUBRIAMIENTO DE SUELO                          | SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA) | PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%) |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1            | Plantación abierta de <i>Eucalyptus globulus</i> | 0,13                                     | 0,68                                    |
| 2            | Matorral arborescente mixto                      | 0,43                                     | 2,26                                    |
| 3            | Pradera agrícola                                 | 18,5                                     | 97,06                                   |
| <b>Total</b> |                                                  | <b>19,06</b>                             | <b>100%</b>                             |

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Es posible apreciar la dominancia de las áreas con formación de **Pradera**, la cual se compone casi en su totalidad por cultivos agrícolas.

El detalle de las unidades de vegetación existentes en el área de influencia del proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Figura 4).



**Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno**

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Plantación abierta de *Eucalyptus globulus***


Está representado sólo por un parche en el AI. Presenta un 35% de cobertura de *Eucalyptus globulus*, con alturas entre 10 y 12 metros. No posee más especies en el estrato arbóreo.

En el estrato arbustivo se presenta un sotobosque de *Acacia caven*, con una cobertura de 20% y alturas entre 2 y 4 metros. También se presentan individuos aislados de *Aristotelia chilensis*, con una cobertura de 0,1%.



En el estrato herbáceo dominan *Dactylis glomerata* y *Convolvulus arvensis*, con coberturas de 25% y 7 % respectivamente. En menor proporción se registró *Daucus Carota* y *Rapistrum rugosum*, cada uno con 3% de cobertura.

Esta formación posee una superficie de 0,13 ha, lo que representa el 0,68%.



**Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Plantación abierta de Eucalyptus globulus” identificada en el AI del Proyecto.**

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Matorral arborescente mixto**

La vegetación de este ambiente está compuesta principalmente por árboles exóticos y arbustos, tanto nativos como exóticos.

El estrato arbóreo se compone de *Eucalyptus globulus*, con cobertura promedio de 7,8% y alturas entre 4 y 6 metros, y *Salix babylonica*, con una cobertura de 2,8% y alturas entre 4 y 6 metros.

El estrato arbustivo tiende a formar cortinas de vegetación en el AI, teniendo una estrecha relación con el ecosistema de pradera, con coberturas sobre 10% de algunas especies herbáceas. Este estrato se compone de *Rubus ulmifolius*, con una cobertura promedio de 25% y alturas entre 1 y 2 metros, *Acacia caven*, con cobertura promedio de 2,5% y alturas entre 2 y 4 metros, y en una menor proporción, *Aristotelia chilensis*, con una cobertura promedio de 1,5% y alturas entre 2 y 4 metros. También está presente la especie epífita *Tristerix corymbosus*.

El estrato herbáceo es dominado por *Dactylis glomerata*, *Galega officinalis*, *Lolium multiflorum*, *Rapistrum rugosum* y *Convolvulus arvensis*, entre otros, con coberturas de 5%, 2,5%, 7,5%, 2% y 2,5% respectivamente.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 0,43 ha, lo que representa el 2,26% del área de influencia.



**Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Matorral arborescente mixto” identificada en el AI del Proyecto.**

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2019.

- **Pradera agrícola**

Constituye el ambiente predominante en el AI. Se compone principalmente de praderas cultivadas con maíz, cebolla y poroto, principalmente. En el caso del tabaco (*Nicotiana tabacum*), forma una pradera abierta, con coberturas inferiores al 10%, mientras que el maíz y la cebolla forman desde pradera abierta a pradera densa, con coberturas entre 5% a 90% cada especie. El cultivo abierto, a su vez, presenta individuos codominantes de *Lolium multiflorum*, *Polygonum aviculare*, *Convolvulus arvensis* y *Daucus carota*, con coberturas promedio entre 3% y 20%. En el caso la pradera semidensa, presenta codominancia de *Bidens aurea*, *Calystegia sepium* y *Lolium multiflorum*, con coberturas entre 5% y 35%. La pradera densa presenta codominancia de *Phragmites australis*, con un 5% de cobertura. Las alturas de los cultivos dependen de la especie, siendo la más alta *Zea mays*, con alturas promedio de 1 a 2 metros, mientras que *Nicotiana tabacum* y *Allium cepa* presentan alturas promedio inferiores a 50 centímetros.

En algunos sectores del AI, existen cortinas de vegetación, principalmente de *Rubus ulmifolius*.

Esta formación presenta una superficie de 18,5 ha, lo que representa el 97,6% del AI.



**Figura 7. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera agrícola” identificada en el AI del Proyecto.**

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

## **5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal**

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas en el área de influencia del proyecto, sin embargo, estas formaciones son dominadas por especies alóctonas (*S. babylonica* y *E. globulus*). También se registró presencia de *A. caven*, sin embargo, éste se encuentra formando un ambiente mixto con especies exóticas, en donde éstas son dominantes (*R. ulmifolius*).

El resto del AI se compone principalmente de especies herbáceas y arbustivas exóticas, por lo que no existe presencia de formaciones xerofíticas.

Dicho lo anterior y de acuerdo al análisis de la normativa legal se ha determinado que:

No existe en el AI la presencia de **Bosque Nativo de Preservación**, debido a que las formaciones vegetales existente presenta las siguientes características:

- a) No presenta o constituye actualmente especies vegetales protegidas legalmente;
- b) No presenta o constituye actualmente hábitat de especies vegetales clasificadas en las categorías de conservación, de acuerdo a las definiciones establecidas en la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- c) No corresponde a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, donde cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

- d) No corresponde aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

### 5.2.3 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, no se registraron singularidades vegetacionales y florísticas en el AI del proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

### 5.2.4 Flora

#### 5.2.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de ocho puntos de muestreo, anteriormente señalados, dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida sólo por la división *Magnoliophyta*. Ésta se encuentra conformada por 48 especies, de las cuales 35 pertenecen a la clase *Magnoliopsida* y 13 a la clase *Liliopsida*. En la tabla 10 se detalla el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división registradas en el área de influencia.

Tabla 10. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

| DIVISIÓN      | CLASE         | NOMBRE CIENTÍFICO            | NOMBRE COMÚN     |
|---------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | <i>Acacia caven</i>          | Espino           |
|               |               | <i>Amaranthus hybridus</i>   | Quelite          |
|               |               | <i>Anoda cristata</i>        | Malva cimarrona  |
|               |               | <i>Aristotelia chilensis</i> | Maqui            |
|               |               | <i>Bidens aurea</i>          | Falso té         |
|               |               | <i>Calystegia sepium</i>     | Correhuela mayor |
|               |               | <i>Chenopodium album</i>     | Cenizo           |
|               |               | <i>Cichorium intybus</i>     | Achicoria        |
|               |               | <i>Cirsium vulgare</i>       | Cardo negro      |



| DIVISIÓN | CLASE | NOMBRE CIENTÍFICO            | NOMBRE COMÚN       |
|----------|-------|------------------------------|--------------------|
|          |       | <i>Convolvulus arvensis</i>  | Correhuela         |
|          |       | <i>Cristaria gracilis</i>    | Malvilla           |
|          |       | <i>Datura stramonium</i>     | Estramonio         |
|          |       | <i>Daucus carota</i>         | Zanahoria          |
|          |       | <i>Eucalyptus globulus</i>   | Eucalipto          |
|          |       | <i>Galega officinalis</i>    | Galega             |
|          |       | <i>Lactuca serriola</i>      | Serrallones        |
|          |       | <i>Leontodon saxatilis</i>   | Halcón menor       |
|          |       | <i>Ludwigia peploides</i>    | Duraznillo de agua |
|          |       | <i>Malva nicaeensis</i>      | Malva              |
|          |       | <i>Nicotiana tabacum</i>     | Tabaco             |
|          |       | <i>Phaseolus vulgaris</i>    | Poroto             |
|          |       | <i>Plantago lanceolata</i>   | Siete venas        |
|          |       | <i>Polygonum aviculare</i>   | Sanguinaria        |
|          |       | <i>Polygonum persicaria</i>  | Duraznillo común   |
|          |       | <i>Portulaca oleracea</i>    | Verdolaga          |
|          |       | <i>Raphanus sativus</i>      | Rábano             |
|          |       | <i>Rapistrum rugosum</i>     | Mostacilla         |
|          |       | <i>Rubus ulmifolius</i>      | Zarzamora          |
|          |       | <i>Rumex conglomeratus</i>   | Vinagrera          |
|          |       | <i>Salix babylonica</i>      | Sauce              |
|          |       | <i>Solanum tuberosum</i>     | Papa               |
|          |       | <i>Sonchus sp.</i>           | Cerraja            |
|          |       | <i>Tristerix corymbosus</i>  | Quintral           |
|          |       | <i>Xanthium cavanillesii</i> | Clonqui            |

| DIVISIÓN | CLASE                       | NOMBRE CIENTÍFICO            | NOMBRE COMÚN     |
|----------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
|          |                             | <i>Xanthium spinosum</i>     | Arrancamoños     |
|          | <b><i>Magnoliopsida</i></b> | <i>Agrostis capillaris</i>   | Chépica          |
|          |                             | <i>Allium cepa</i>           | Cebolla          |
|          |                             | <i>Arrhenatherum elatius</i> | Pasto cebolla    |
|          |                             | <i>Bromus hordeaceus</i>     | Triguillo        |
|          |                             | <i>Cynodon dactylon</i>      | Gramilla         |
|          |                             | <i>Cyperus rotundus</i>      | Junco            |
|          |                             | <i>Dactylis glomerata</i>    | Pasto ovillo     |
|          |                             | <i>Hordeum murinum</i>       | Cebadilla        |
|          |                             | <i>Lolium multiflorum</i>    | Ballica italiana |
|          |                             | <i>Panicum capillare</i>     | Paja voladora    |
|          |                             | <i>Paspalum dilatatum</i>    | Pasto chato      |
|          |                             | <i>Phragmites australis</i>  | Carrizo          |
|          |                             | <i>Zea mays</i>              | Maíz             |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de 18 familias. De estas, se destaca a la familia *Asteraceae* por presentar la mayor cantidad de especies, con ocho representantes.

Con respecto a la clase *Liliopsida*, ésta se encuentra representada por dos familias, destacándose a la familia *Poaceae* por presentar la mayor cantidad de especies, con 11 representantes.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

**Tabla 11 Familias de las Especies Prospectadas.**

| FAMILIA        | NOMBRE CIENTÍFICO            | NOMBRE COMÚN     |
|----------------|------------------------------|------------------|
| Amaranthaceae  | <i>Amaranthus hybridus</i>   | Quelite          |
| Amaryllidaceae | <i>Allium cepa</i>           | Cebolla          |
| Apiaceae       | <i>Daucus carota</i>         | Zanahoria        |
| Asteraceae     | <i>Bidens aurea</i>          | Falso té         |
| Asteraceae     | <i>Cichorium intybus</i>     | Achicoria        |
| Asteraceae     | <i>Cirsium vulgare</i>       | Cardo negro      |
| Asteraceae     | <i>Lactuca serriola</i>      | Serrallones      |
| Asteraceae     | <i>Leontodon saxatilis</i>   | Halcón menor     |
| Asteraceae     | <i>Sonchus sp.</i>           | Cerraja          |
| Asteraceae     | <i>Xanthium cavanillesii</i> | Clonqui          |
| Asteraceae     | <i>Xanthium spinosum</i>     | Arrancamoños     |
| Chenopodiaceae | <i>Chenopodium album</i>     | Cenizo           |
| Convolvulaceae | <i>Calystegia sepium</i>     | Correhuela mayor |
| Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i>  | Correhuela       |
| Cyperaceae     | <i>Cyperus rotundus</i>      | Junco            |
| Elaeocarpaceae | <i>Aristotelia chilensis</i> | Maqui            |
| Fabaceae       | <i>Acacia caven</i>          | Espino           |
| Fabaceae       | <i>Galega officinalis</i>    | Galega           |
| Fabaceae       | <i>Phaseolus vulgaris</i>    | Poroto           |
| Fabaceae       | <i>Raphanus sativus</i>      | Rábano           |
| Fabaceae       | <i>Rapistrum rugosum</i>     | Mostacilla       |
| Loranthaceae   | <i>Tristerix corymbosus</i>  | Quintral         |
| Malvaceae      | <i>Anoda cristata</i>        | Malva cimarrona  |
| Malvaceae      | <i>Cristaria gracilis</i>    | Malvilla         |

| FAMILIA        | NOMBRE CIENTÍFICO            | NOMBRE COMÚN       |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| Malvaceae      | <i>Malva nicaeensis</i>      | Malva              |
| Myrtaceae      | <i>Eucalyptus globulus</i>   | Eucalipto          |
| Onagraceae     | <i>Ludwigia peploides</i>    | Duraznillo de agua |
| Plantaginaceae | <i>Plantago lanceolata</i>   | Siete venas        |
| Poaceae        | <i>Agrostis capillaris</i>   | Chépica            |
| Poaceae        | <i>Arrhenatherum elatius</i> | Pasto cebolla      |
| Poaceae        | <i>Bromus hordeaceus</i>     | Triguillo          |
| Poaceae        | <i>Cynodon dactylon</i>      | Gramilla           |
| Poaceae        | <i>Dactylis glomerata</i>    | Pasto ovillo       |
| Poaceae        | <i>Hordeum murinum</i>       | Cebadilla          |
| Poaceae        | <i>Lolium multiflorum</i>    | Ballica italiana   |
| Poaceae        | <i>Panicum capillare</i>     | Paja voladora      |
| Poaceae        | <i>Paspalum dilatatum</i>    | Pasto chato        |
| Poaceae        | <i>Phragmites australis</i>  | Carrizo            |
| Poaceae        | <i>Zea mays</i>              | Maíz               |
| Polygonaceae   | <i>Polygonum aviculare</i>   | Sanguinaria        |
| Polygonaceae   | <i>Polygonum persicaria</i>  | Duraznillo común   |
| Polygonaceae   | <i>Rumex conglomeratus</i>   | Vinagrera          |
| Portulacaceae  | <i>Portulaca oleracea</i>    | Verdolaga          |
| Rosaceae       | <i>Rubus ulmifolius</i>      | Zarzamora          |
| Salicaceae     | <i>Salix babylonica</i>      | Sauce              |
| Solanaceae     | <i>Datura stramonium</i>     | Estramonio         |
| Solanaceae     | <i>Nicotiana tabacum</i>     | Tabaco             |
| Solanaceae     | <i>Solanum tuberosum</i>     | Papa               |

Fuente: Elaboración Propia, 2019



#### 5.2.4.2 Abundancia

De las 48 especies registradas en el área de estudio, se calculó la cobertura de cada una de éstas. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados.

Las especies de mayor abundancia son de origen Adventicio, y corresponden a *Allium cepa* y *Zea mays*, con coberturas de 17,7% y 6,4% respectivamente. Le sigue en menor proporción *Acacia caven*, *Bidens aurea*, *Dactylis glomerata*, *Daucus carota*, *Eucalyptus globulus*, *Lolium multiflorum*, *Nicotiana tabacum* y *Rubus ulmifolius*, las cuales presentan coberturas entre un 2,5% y un 5%. En la Tabla 12 se presenta el índice de abundancia según Braun-Blanquet (1979), con la lista de especies que registraron una cobertura igual o mayor a 1%. Las especies que no se listan en esta tabla obtuvieron un índice de abundancia menor a 1% (+).

**Tabla 12 Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.**

| ESPECIE                     | COBERTURA (%) | COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979) |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|
| <i>Acacia caven</i>         | 2,9           | 1                                |
| <i>Allium cepa</i>          | 17,7          | 3                                |
| <i>Bidens aurea</i>         | 3,6           | 1                                |
| <i>Calystegia sepium</i>    | 1,9           | 1                                |
| <i>Convolvulus arvensis</i> | 2,0           | 1                                |
| <i>Dactylis glomerata</i>   | 3,4           | 1                                |
| <i>Daucus carota</i>        | 2,6           | 1                                |
| <i>Eucalyptus globulus</i>  | 4,7           | 1                                |
| <i>Galega officinalis</i>   | 1,2           | 1                                |
| <i>Lolium multiflorum</i>   | 5,0           | 2                                |
| <i>Nicotiana tabacum</i>    | 3,6           | 1                                |
| <i>Rapistrum rugosum</i>    | 1,4           | 1                                |
| <i>Rubus ulmifolius</i>     | 4,7           | 1                                |
| <i>Salix babylonica</i>     | 1,4           | 1                                |
| <i>Zea mays</i>             | 6,4           | 2                                |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

### 5.2.4.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 87,5%, seguido por el tipo Arbustivo, con 8,3%, y el tipo Arbóreo, con un 4,2%. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia.

**Tabla 13 Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.**

| TIPO BIOLÓGICO | Nº ESPECIES | PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Arbóreo        | 2           | 4,2                                     |
| Arbustivo      | 4           | 8,3                                     |
| Herbáceo       | 42          | 87,5                                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>48</b>   | <b>100</b>                              |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

### 5.2.4.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 91,7% es de origen Alóctono, un 8,3% de origen Nativo, mientras que no se registraron especies endémicas. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

**Tabla 14 Origen geográfico de la Flora registrada**

| ORIGEN       | Nº ESPECIES | PORCENTAJE (%) DE ESPECIES |
|--------------|-------------|----------------------------|
| Alóctona     | 44          | 91,7                       |
| Endémica     | 0           | 0                          |
| Nativo       | 4           | 8,3                        |
| <b>TOTAL</b> | <b>52</b>   | <b>100</b>                 |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

### 5.2.4.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, dos se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), correspondientes a *Acacia caven* y *Aristotelia chilensis*.

**Tabla 15 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.**

| ESPECIES                                     |
|----------------------------------------------|
| <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina          |
| <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

#### **5.2.4.6 Estado de Conservación de las especies de Flora**

Tras rodalizar el área de influencia del Proyecto, no se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación.

## 6 CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto se presentan tres formaciones vegetales: Plantación abierta de *Eucalyptus globulus*, Matorral arborescente mixto y Pradera agrícola, en donde esta última presenta la mayor cobertura y se compone principalmente de cultivos de cebolla, maíz y tabaco.

El proyecto no afectará bosque nativo ni formaciones tipificadas en la legislación vigente. El área de estudio tampoco presenta las formaciones vegetales descritas por Luebert y Pliscoff. No existen en el Área de influencia singularidades ambientales relacionadas con el componente flora y vegetación.

El área de estudio presenta una vegetación predominantemente herbácea, en donde la gran mayoría de la especies de este tipo biológico corresponden a invasoras (malezas). Dentro del estrato arbustivo y arbóreo, también hay una alta presencia de especies exóticas, lo que demuestra el uso actual del suelo (agrícola).

En términos generales de la flora presente en el AI, la gran mayoría de las especies son exóticas (91,7%).

Se identificaron dos especies incluidas en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven* y *Aristotelia chilensis*. Ninguna de estas especies se encuentra en alguna categoría de conservación.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró en el área de influencia del proyecto, ninguna especie bajo Categoría de Conservación y tampoco especies que conformaran una formación de carácter xerofítico.

## 7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.

- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

## **8 APÉNDICE**

### **8.1 LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA**



Tabla 16. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

| NOMBRE CIENTÍFICO            | NOMBRE COMÚN     | DIVISIÓN      | CLASE         | FAMILIA        | ORIGEN FITOGEOGRÁFICO | HÁBITO DE CRECIMIENTO |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Acacia caven</i>          | Espino           | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabaceae       | Nativa                | Arbustiva             |
| <i>Agrostis capillaris</i>   | Chépica          | Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae        | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Allium cepa</i>           | Cebolla          | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Amaryllidaceae | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Amaranthus hybridus</i>   | Quelite          | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Amaranthaceae  | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Anoda cristata</i>        | Malva cimarrona  | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Malvaceae      | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Aristotelia chilensis</i> | Maqui            | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Elaeocarpaceae | Nativa                | Arbustiva             |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Pasto cebolla    | Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae        | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Bidens aurea</i>          | Falso té         | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae     | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Bromus hordeaceus</i>     | Triguillo        | Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae        | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Calystegia sepium</i>     | Correhuela mayor | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Convolvulaceae | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Chenopodium album</i>     | Cenizo           | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Chenopodiaceae | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Cichorium intybus</i>     | Achicoria        | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae     | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Cirsium vulgare</i>       | Cardo negro      | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae     | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Convolvulus arvensis</i>  | Correhuela       | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Convolvulaceae | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Cristaria gracilis</i>    | Malvilla         | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Malvaceae      | Nativa                | Herbácea              |
| <i>Cynodon dactylon</i>      | Gramilla         | Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae        | Introducida           | Herbácea              |

| NOMBRE CIENTÍFICO           | NOMBRE COMÚN       | DIVISIÓN      | CLASE         | FAMILIA    | ORIGEN FITOGEOGRÁFICO | HÁBITO DE CRECIMIENTO |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Cyperus rotundus</i>     | Junco              | Magnoliophyta | Liliopsida    | Cyperaceae | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Dactylis glomerata</i>   | Pasto ovillo       | Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae    | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Datura stramonium</i>    | Estramonio         | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanaceae | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Daucus carota</i>        | Zanahoria          | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Apiaceae   | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Eucalyptus globulus</i>  | Eucalipto          | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Myrtaceae  | Introducida           | Arbórea               |
| <i>Galega officinalis</i>   | Galega             | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabaceae   | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Hordeum murinum</i>      | Cebadilla          | Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae    | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Lactuca serriola</i>     | Serrallones        | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Leontodon saxatilis</i>  | Halcón menor       | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Lolium multiflorum</i>   | Ballica italiana   | Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae    | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Ludwigia peploides</i>   | Duraznillo de agua | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Onagraceae | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Malva nicaeensis</i>     | Malva              | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Malvaceae  | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Nicotiana tabacum</i>    | Tabaco             | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanaceae | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Panicum capillare</i>    | Paja voladora      | Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae    | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Paspalum dilatatum</i>   | Pasto chato        | Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae    | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Phaseolus vulgaris</i>   | Poroto             | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabaceae   | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Phragmites australis</i> | Carrizo            | Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae    | Introducida           | Herbácea              |

| NOMBRE CIENTÍFICO            | NOMBRE COMÚN     | DIVISIÓN      | CLASE         | FAMILIA        | ORIGEN FITOGEOGRÁFICO | HÁBITO DE CRECIMIENTO |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Plantago lanceolata</i>   | Siete venas      | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Plantaginaceae | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Polygonum aviculare</i>   | Sanguinaria      | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Polygonaceae   | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Polygonum persicaria</i>  | Duraznillo común | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Polygonaceae   | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Portulaca oleracea</i>    | Verdolaga        | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Portulacaceae  | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Raphanus sativus</i>      | Rábano           | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabaceae       | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Rapistrum rugosum</i>     | Mostacilla       | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabaceae       | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Rubus ulmifolius</i>      | Zarzamora        | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Rosaceae       | Introducida           | Arbustiva             |
| <i>Rumex conglomeratus</i>   | Vinagrera        | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Polygonaceae   | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Salix babylonica</i>      | Sauce            | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Salicaceae     | Introducida           | Arbórea               |
| <i>Solanum tuberosum</i>     | Papa             | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanaceae     | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Sonchus sp.</i>           | Cerraja          | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae     | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Tristerix corymbosus</i>  | Quintral         | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Loranthaceae   | Nativa                | Arbustiva             |
| <i>Xanthium cavanillesii</i> | Clonqui          | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae     | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Xanthium spinosum</i>     | Arrancamoños     | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae     | Introducida           | Herbácea              |
| <i>Zea mays</i>              | Maíz             | Magnoliophyta | Liliopsida    | Poaceae        | Introducida           | Herbácea              |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.