

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Doñihue”	
	Fecha: Julio - 2017	

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

“PLANTA FOTOVOLTAICA DOÑIHUE”

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	2
ÍNDICE DE TABLAS	4
ÍNDICE DE IMÁGENES.....	5
1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO.....	6
1.1 Descripción del Proyecto	6
2 INTRODUCCIÓN.....	9
3 OBJETIVOS.....	10
3.1 Objetivo general.....	10
3.2 Objetivos específicos	10
4 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	11
4.1 Determinación y justificación del área de influencia.....	11
5 METODOLOGÍA	13
5.1 Vegetación potencial del área de estudio	13
5.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales.....	13
5.2.1 Antecedentes de la metodología COT	13
5.3 Cartografía del componente vegetacional	15
5.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio	15
5.4.1 Determinación de la composición y riqueza florística	15
5.4.2 Origen fitogeográfico	17
5.4.3 Tipos biológicos.....	17
5.4.4 Distribución en Chile	18

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

5.4.5	Especies en categoría de conservación.....	18
5.5	Cumplimiento de la Ley 20.283	18
5.6	Singularidades ambientales	19
6	RESULTADOS	21
6.1	Vegetación potencial en el área de estudio.....	21
6.2	Vegetación presente en el área de estudio	24
6.2.1	Identificación de las unidades vegetacionales.....	24
6.2.2	Caracterización de las unidades vegetacionales.....	24
•	Uso agrícola.....	24
•	Camino o huellas	25
•	Pradera arborescente de <i>Populus deltoides</i> y <i>Foeniculum vulgare</i>	26
•	Cartografía de unidades vegetacionales.....	27
6.3	Catastro de la flora presente en el área de estudio	28
6.3.1	Composición y riqueza florística	32
6.3.2	Origen fitogeográfico	32
6.3.3	Tipo biológico.....	33
6.3.4	Distribución en Chile	34
6.3.5	Especies en categoría de conservación.....	34
6.4	Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	35
6.5	Singularidades ambientales	35
6.5.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	35
6.5.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	36
6.5.3	Presencia de formaciones vegetales remanentes	37
6.5.4	Presencia de formaciones vegetales frágiles.....	37

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

6.5.5	Presencia de bosques de preservación.....	37
6.5.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	37
6.5.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	38
6.5.8	Presencia de especies endémicas.....	38
6.5.9	Presencia de especies de distribución restringida.....	38
6.5.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.....	38
6.5.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	38
6.5.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	39
6.5.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	39
6.5.14	Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)	40
6.5.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	40
6.5.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.....	40
7	CONCLUSIONES.....	41
8	BIBLIOGRAFÍA.....	42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas.....	15
Tabla 2.	Codificación "abundancia relativa de flora" según criterio de BRAUN & BLANQUET.....	16
Tabla 3.	Origen fitogeográfico de la flora.....	17
Tabla 4.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular	17
Tabla 5.	Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto	24
Tabla 6:	Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto.....	29
Tabla 7:	Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica	32
Tabla 8.	Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.....	32

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

Tabla 9. Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio 35

Tabla 10. Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile 36

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Vista aérea del Área de Estudio	7
Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto.....	8
Imagen 3. Área de influencia del proyecto	12
Imagen 4. Formación vegetacional del Área de Estudio según Gajardo (1994).	22
Imagen 5. Piso vegetacional del área de estudio según Luebert y Pliscoff (2006).	23
Imagen 6. Vista general de la formación Uso Agrícola.	25
Imagen 7. Vista general formación Caminos o Huellas.....	26
Imagen 8. Vista general formación vegetacional Pradera arborescente de <i>Populus deltoides</i> y <i>Foeniculum vulgare</i>	27
Imagen 9: Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.	28
Imagen 10: Origen fitogeográfico	33
Imagen 11: Tipo biológico	33
Imagen 12: Distribución de especies en Chile.....	34
Imagen 13. Sitio prioritario distante al área de influencia del proyecto.	39

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto consistirá en la construcción y operación de una planta fotovoltaica (PFV) productora de energía eléctrica, a través de la transformación de la energía solar en energía eléctrica por medio de 27.702 paneles fotovoltaicos móviles de 330 W cada uno. La energía generada será evacuada a la red de distribución existente mediante una línea de evacuación de 15 kV, la que contará con 23 postes de hormigón armado más 4 de empalme. Esta línea tendrá una longitud de 740 m, aproximadamente.

La PFV tendrá una potencia de 7,5 MW y será construida en una superficie de 29,31 ha. La planta se construirá en una etapa dentro de un periodo de 6 meses, para tener 30 años de vida útil, finalizando con una fase de cierre que tendrá una duración de 4 meses.

El proyecto estará ubicado administrativamente en la Comuna de Coinco, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. El acceso se efectuará por la ruta H-38.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	



Imagen 1: Vista aérea del Área de Estudio

En la Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto se indican los vértices del polígono que demarcan el área de impacto directo del Proyecto sobre una superficie de 29,31 ha.




Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

2 INTRODUCCIÓN

Una línea de base de flora y vegetación debe contener la información suficiente para identificar posibles efectos sobre elementos vegetales presentes en el sitio del proyecto o actividad que se está evaluando. En este contexto, para el proyecto se realiza una línea de base de flora y vegetación que considera un área de influencia específica en este componente.

Se realizaron observaciones y levantamiento de información de campo los días 10 y 11 de junio del año 2017, las que fueron ejecutadas por un profesional de las Ciencias Forestales, utilizando un conjunto de metodologías validadas en el ámbito científico para los efectos del levantamiento de líneas de base de vegetación y las guías o instrumentos regulatorios de la Corporación Nacional Forestal y el Servicio de Evaluación Ambiental.

A continuación, se presenta la línea de base de flora y vegetación en virtud de lo señalado en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice relación con la presentación en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley.

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Doñihue”	
	Fecha: Julio - 2017	

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Realizar el levantamiento de la Línea de Base de Flora y Vegetación para el proyecto “Planta Fotovoltaica Doñihue” 7,5MW, Comuna de Coinco, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

3.2 Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de estudio.
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Definir las bases para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto.
- Realizar el catastro de flora presente en el área del Proyecto.
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes.
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283.
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

4 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

4.1 Determinación y justificación del área de influencia

Para determinar el área de influencia del proyecto se procede según lo recomendado por la "Guía para la descripción del Área de Influencia SFF", del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015), documento que establece los criterios y contenidos mínimos, los que se basan en la identificación de impactos y las interacciones entre los componentes Suelo, Flora y Fauna.

Para esto fue realizada una visita al polígono del área del proyecto y al territorio circundante con la finalidad de evaluar el tipo y condiciones del ecosistema en donde se inserta el proyecto, posterior a esta visita se dispuso el trabajo en gabinete evaluando las partes, obras y acciones físicas que comprenden al proyecto en las etapas de construcción, operación y cierre. Con estos antecedentes y en conjunto al equipo consultor se evaluó la presencia de singularidades ambientales presentes en el proyecto y los posibles impactos sobre estas.

Con la información recopilada se determina que el área de influencia del proyecto para el componente flora y vegetación es de 29,94 ha en las cuales se desarrollan las obras y acciones del proyecto (imagen 3). Estas obras se agruparon en dos áreas, según las características propias de cada una:

- **Área Planta Fotovoltaica:** Área destinada la construcción y operación de los paneles fotovoltaicos transformadores de energía solar en eléctrica. Tiene una superficie de 29,19 ha lo que equivale al 97,49% del área de influencia del proyecto.
- **Área Línea de Evacuación:** En esta área se realizará la línea de conexión. El tendido tiene aproximadamente 740 m de largo y dado la formación vegetal de su alrededor se estimó un buffer de 5 m para cada lado del eje. Esto otorga una superficie de área de influencia de 0,75 ha, lo que representa el 2,51% del área de influencia.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	



Imagen 3. Área de influencia del proyecto

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

5 METODOLOGÍA

5.1 Vegetación potencial del área de estudio

Se realizó una caracterización vegetal al contexto biogeográfico donde se inserta el proyecto a partir de la recopilación bibliográfica de los tipos vegetacionales para el área de estudio descritos en la Vegetación Nativa de Chile (GAJARDO R 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (LUEBERT F & L PLISCOFF 2006).

5.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

Para definir las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio se realizó una campaña de terreno en otoño los días 10 y 11 de junio del año 2017.

El levantamiento de información de la vegetación se efectuó a escala 1: 10.000 para toda el área analizada, por lo tanto, la cartografía presentada también se adecuó a dicha escala.

La vegetación presente en el Área de Estudio se agrupó en unidades homogéneas, en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM. Para ello se utilizó datum WGS 1984 y Huso 19S.

Cada formación identificada se describió, además, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas. La información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por ETIENNE & PRADO (1982).

5.2.1 Antecedentes de la metodología COT

El estudio de la vegetación, se realizó por medio de la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por ETIENNE & CONTRERAS (1981), la cual es descrita en detalle por ETIENNE & PRADO (1982).

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (2016) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología COT permite:

- Determinar unidades de vegetación en el área de estudio.
- Conocer la composición florística de las unidades descritas.

Es factible, por tanto, clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.

Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece

coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

Se utilizaron los criterios descritos en ETIENNE & PRADO (1982), para clasificar la densidad relativa de una formación vegetal en zonas semi áridas y sub húmedas como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas

Herbáceas (H)	Leñosas Bajas (Lb)	10 - 25%	25% - 50%	50 – 75%	75% - 100%
	Índice	3	4	5	6
10-25%	3	Mc	C	Pd	Pd
25-50%	4	C	Pd	Pd	D
50-75%	5	Pd	Pd	D	D
75-100%	6	Pd	D	D	Md

C: clara; Pd: poco densa; D: densa; Md: muy densa; Mc: muy clara

Fuente: ETIENNE M & C PRADO (1982).

5.3 Cartografía del componente vegetacional

Para la realización de la cartografía de las distintas unidades, se considera como base el polígono de emplazamiento del proyecto.

Además, se utilizaron ortofotos para la digitalización de las unidades. La cartografía se presenta en Datum WGS 84, Huso 19 S.

5.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio

5.4.1 Determinación de la composición y riqueza florística

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó mediante parcelas de muestreo. Para complementar esta información se realizaron colectas y muestreo intensivo del total de las plantas vasculares con sistema aéreo visible entre parcelas analizadas, en toda la extensión del área de estudio.

Para cada formación vegetal, se realizaron parcelas de muestreo de flora circulares de 16 m de radio (803 m²), en puntos representativos de las formaciones vegetacionales observadas. En cada

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

parcela se registraron todas las especies vasculares presentes, junto con sus rangos de cobertura, para los cuales se usó la tabulación propuesta por BRAUN-BLANQUET (1979) (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación "abundancia relativa de flora" según criterio de BRAUN & BLANQUET.

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Fuente: BRAUN – BLANQUET J (1987).

Cada parcela fue georreferenciada en coordenadas UTM, datum WGS 1984.

La identificación de las especies se realizó en terreno, sin embargo, se herborizaron aquellos ejemplares que no fue posible determinar en el lugar, para su posterior identificación a partir de literatura especializada.

La determinación taxonómica de las especies registradas se llevó a cabo según MARTICORENA & QUEZADA (1985), MARTICORENA & RODRIGUEZ (2001, 2003 y 2005) y RIEDEMANN *et al.* (2006). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies, la familia y origen fitogeográfico se basó en el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La riqueza florística del área de estudio se determinó con base en el número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (MARTICORENA C 1990). A nivel de familia se analizó la proporción respecto a la flora de O'Higgins. Luego se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

5.4.2 Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie fue determinado con base en su distribución geográfica natural, según ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 3).

Tabla 3. Origen fitogeográfico de la flora.

Origen fitogeográfico	Descripción
Endémico	Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
Nativo	Taxón con distribución natural en territorio nacional
Introducido	Taxón con distribución natural en otros países

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

5.4.3 Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó según tipos biológicos, es decir, según el hábito de crecimiento establecido por ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 4).

Tabla 4. Tipos Biológicos de la Flora Vascular

Tipo Biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensas del huésped.

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

5.4.4 Distribución en Chile

Para establecer la distribución de las especies, el análisis se basó en el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

5.4.5 Especies en categoría de conservación

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías señaladas en el Decreto 29 del año 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Las categorías reconocidas son: "Extinta" (EX), "Extinta en Estado Silvestre" (EW), "En Peligro Crítico de Extinción" (CR), "En Peligro de Extinción" (EN), "Vulnerable" (VU), "Casi Amenazada" (NT), "Preocupación Menor" (LC) y "Datos insuficientes" (IC).

Se verificó la lista de especies contenidas en los Decretos Supremos números 151/ 2007, 50/2008, 51/2008, 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 33/2012, 41/2012, 42/2012, 13/ 2013, 19/2013, 52/2014, 38/2015, 16/2016, 7/2017 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

Además, se revisó las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (BENOIT I 1989) y "Libro Rojo de la Región de O'Higgins (SEREY I *et al.* 2007).

Finalmente se procedió a confeccionar un listado florístico indicando: Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Estado de conservación, Origen Fitogeográfico, Tipo Biológico y Distribución en Chile.

5.5 Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el Decreto 68 del año 2009 del Ministerio de Agricultura,

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio.

5.6 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio. Para ello se utilizaron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF 2014):

- Sobre las singularidades de Vegetación:

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de Formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4.- Presencia de Formaciones vegetales remanentes.
- 5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.
- 6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

Fue necesario consultar información contenida en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile para la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y la Ley 20.283.

- Mientras que para las singularidades sobre Flora:

- 7.-Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- 8.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 9.- Presencia de especies endémicas.
- 10.- Presencia de especies de distribución restringida.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

11.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

12.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Fue necesario consultar información contenida sobre categorías de conservación en el listado oficial del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio de Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Las especies protegidas por regulaciones especiales fueron consultadas en los Decretos Supremos números 366/1944, 129/1972, 1427/1941, 13/1995 y 490/1976. Mientras que para la distribución se consultó el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

- Para las singularidades ambientales sobre Sitios Protegidos:

13.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

14.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

15.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

16.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).

17.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Fue necesario consultar en la base cartográfica de escala 1:250.000 de Sitios Prioritarios del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente, además del Instructivo de Sitios Prioritarios, el artículo 8 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las áreas protegidas privadas determinadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, áreas protegidas estipuladas en la Ley 18.378 y la base cartográfica de escala 1:250.000 de humedales del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

6 RESULTADOS

6.1 Vegetación potencial en el área de estudio

Según la tipología de GAJARDO, R (1994), en "La Vegetación Natural de Chile", la vegetación presente en el sector norte de la línea de evacuación del área de influencia se clasifica como la Región "Del Matorral y del Bosque Esclerófilo", Sub-región "Del Bosque Esclerófilo", formación "Bosque Esclerófilo Costero" con presencia de cultivos de riego en localidades aledañas. En términos generales, el tipo de esta formación vegetacional corresponde a bosque esclerófilo que se encuentra muy alterado respecto a su formación inicial. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde en la zona central del país, a condiciones ambientales de cultivo muy favorables (imagen 4).

Esta clasificación presenta siete subtipos llamados *Beischmiedia miersii* – *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis* – *Lithrea caustica*, *Drimys winteri* – *Luma chequen*, *Lithrea caustica* – *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba* – *Luma chequen* y *Blepharocalix cruckshanksii* – *Crinodendron patagua*, de los cuales el que mayor se adecúa a las condiciones fisiográficas del área de estudio es el subtipo *Lithrea caustica* – *Peumus boldus*. Esta comunidad corresponde al monte bajo del bosque esclerófilo original. Tiene la fisionomía de un matorral de densidad variable, alcanzando en algunos puntos el estado arbóreo (GAJARDO R 1994). Sin embargo, el lugar se presenta alterado y modificado en relación a los atributos originales recién mencionados.

Mientras que, el sector sur de la línea de evacuación y el área de impacto de la planta fotovoltaica se clasifica como la Región "Del Matorral y del Bosque Esclerófilo", Sub-región "Del Matorral y del Bosque Espinoso", formación "Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa", que se caracteriza por ser una formación de probable origen secundario, que se ha desarrollado en el territorio de un bosque esclerófilo de mayor complejidad. Predominando matorrales cerrados espinosos de alta densidad, entre los que se presentan generalmente algunos individuos arbóreos esparcidos. En las quebradas y en ciertas laderas de exposición sur, predomina la forma de vida arbórea (imagen 4).

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

Esta clasificación presenta cuatro subtipos llamados *Trevoa trinervis* – *Colliguaja odorifera*, *Peumus boldus* – *Trevoa trinervis*, *Puya berteroniana* – *Trichocereus chiloensis* y *Acacia caven* – *Lithrea caustica*, de los cuales el que mayor se adecúa a las condiciones fisiográficas del área de estudio es el subtipo *Trevoa trinervis* – *Colliguaja odorifera*. Esta comunidad es dominante en el paisaje vegetal de la formación vegetal. Tiene un aspecto de un matorral, que puede ser muy denso, con una estrata herbácea rica en hierbas anuales y perennes (GAJARDO R 1994). Sin embargo, el lugar se presenta alterado y modificado en relación a los atributos originales recién mencionados.




Imagen 4. Formación vegetacional del Área de Estudio según Gajardo (1994).

Por otra parte, según la "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile" de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el área de estudio corresponde al piso vegetal "Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*" el que se caracteriza por

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

ser un bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*. *Cryptocaria alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Satureja gilliesi* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas como *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis* con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithrea caustica*. En algunas zonas costeras este bosque se encuentra asociado con *Jubaea chilensis* (imagen 5).




Imagen 5. Piso vegetal del área de estudio según Luebert y Pliscoff (2006).

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

6.2 Vegetación presente en el área de estudio

6.2.1 Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia del proyecto comprende una superficie total de 29,94 ha. El polígono corresponde principalmente en su extensión a Uso Agrícola con 29,08 ha.

Tabla 5. Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto

Formación vegetacional	Área de Estudio (Ha)	% Representación AE
Pradera arborescente de <i>Populus deltoides</i> y <i>Foeniculum vulgare</i>	0,1	0,33
Caminos o huellas	0,76	2,54
Uso agrícola	29,08	97,13
TOTAL	29,94	100

6.2.2 Caracterización de las unidades vegetacionales

- **Uso agrícola**

Esta formación es la de mayor extensión en el área de estudio, abarcando 29,08ha y se encuentra asociada a la planta fotovoltaica donde se ubicarán los paneles

Se trata de un terreno para uso agrícola en donde se presenta barbecho (imagen 6) con presencia de algunos árboles de durazno y herbáceas anuales y bianuales principalmente. De modo que el 97,13% del área de influencia está cubierta por especies herbáceas, de altura inferior a 1 m.

Las especies herbáceas representativas son *Solanum tuberosum* y *Amaranthus hybridus* (Bledo). Mientras que las especies acompañantes son *Foeniculum vulgare* (Hinojo), *Taraxum officinale* (Diente de león) y *Sonchus oleraceus* (Cerraja), entre otras.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	



Imagen 6. Vista general de la formación Uso Agrícola.

- **Caminos o huellas**

Esta formación se encuentra en el sector Norte y abarca 0,76 ha equivalentes a 2,54% del área de influencia del proyecto. Se encuentra asociada a la línea de evacuación de la planta fotovoltaica (imagen 7).

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	



Imagen 7. Vista general formación Caminos o Huellas.

- **Pradera arborecente de *Populus deltoides* y *Foeniculum vulgare***

Esta formación se caracteriza por la presencia de especies arbóreas entre los 8 y 10 m de altura que se sitúa en la sección Sur Oeste del polígono. Abarca una superficie de 0,1 ha, equivalentes al 0,33% del área de estudio.

Se define por la presencia de un dosel arbóreo superior dominado por *Populus deltoides* (Álamo), pudiendo encontrarse individuos con alturas superiores a los 8 m, un dosel herbáceo de

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

Foeniculum vulgare (Hinojo). La formación es de cobertura Alta alcanzando un promedio de 50%. Esta formación se encuentra asociada al área de la Planta Fotovoltaica.



Imagen 8. Vista general formación vegetal Pradera arborescente de *Populus deltoides* y *Foeniculum vulgare*.

- **Cartografía de unidades vegetacionales**

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar 3 tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente verificadas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:10.000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (imagen 9).

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	




Imagen 9: Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.

6.3 Catastro de la flora presente en el área de estudio

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico, Distribución en Chile, Presencia en D.S 68 y Abundancia Relativa (Braun – Blanquet) se detallan en la tabla 6.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

Tabla 6: Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación			Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S 68
				RCE	L. Rojo de la Flora Terrestre de Chile	L. Rojo Regional				
Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i>	Sorgo de alepo	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, IP, RM	-
Magnoliopsida	Altingiaceae	<i>Liquidambar styraciflua L.</i>	Liquidambar	-	-	-	Árbol	Adventicia	V, VI, VII, VIII, IX, RM	-
Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus L.</i>	Bledo	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, JF, RM	-
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum L.</i>	Cicuta	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, JF, RM	-
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>	Hinojo	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	V, VI, VII, VIII, IX, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>	Cardo	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	La hierba del chanco	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM, JF, IP	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris scorzonerae (DC.) F. Muell.</i>	La hierba del chanco	-	-	-	Hierba perenne	Endémica	IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM, JF, IP	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Picris echioides L.</i>	Pega pega	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,	-



	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación			Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S 68
				RCE	L. Rojo de la Flora Terrestre de Chile	L. Rojo Regional				
									X, RM	
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Cerraja	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, X, JF, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, X, JF, RM	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	-	-	-	hierba anual	Adventicia	II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, RM	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsa de pastor	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM, IP	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla alta	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	III, IV, V, VI, VII, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia	-	-	-	Árbol	Adventicia	V, VI, VIII, RM	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L.	Alverja	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix tetandrus</i> (Miers ex DC.) Tiegh.	Quintral	-	-	-	Parásito	Nativa	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	-	-	-	Árbol	Adventicia	IV, V, VI, VII,	-

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación			Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S 68
				RCE	L. Rojo de la Flora Terrestre de Chile	L. Rojo Regional				
		<i>Labill.</i>							VIII, IX, X, RM	
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Durazno	-	-	-	Árbol	Adventicia	V, VI, VII, RM	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	-	-	-	Arbusto	Nativa	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Acer negundo</i> L.	Arce	-	-	-	Árbol	Adventicia	V, VI, VII, VIII, RM	-
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Higuera loca	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, JF, RM	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Populus deltoides</i> Marshall	Álamo	-	-	-	Árbol	Adventicia	V, VI, VII, RM	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Papa	-	-	-	Hierba perenne	Nativa	II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, RM	-

Gestión Ambiental y Manejo de Recursos Naturales en Zonas Áridas



	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

6.3.1 Composición y riqueza florística

La flora vascular del área del proyecto alcanza un total de 25 especies. Las especies registradas forman parte de 14 familias y 24 géneros.

De las 25 especies de plantas vasculares registradas, 1 corresponden a la Clase Liliopsida y 24 a la Clase Magnoliopsida.

Tabla 7: Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica

Clase	N.º especies área de estudio	N.º especies Chile Continental (Marticorena, 1990)	% Área total de estudio	% del total de Chile Continental
Filicopsida	-	-	-	-
Liliopsida	1	1.069	4	0,02
Magnoliopsida	24	3.906	96	0,47
Polypodiopsida	-	114	-	-
Total	25	5.105	100	0,49

De acuerdo con la Tabla 7, la categoría taxonómica con mayor relevancia en cuanto a diversidad corresponde a la Clase Magnoliopsida con el 96% del total de especies registradas, mientras que la Clase Liliopsida representa el 4% de la flora del área de estudio.

Por otra parte, de las 16 familias registradas en el área de estudio (Tabla 6 Listado Florístico), las familias que registran la mayor diversidad de especies corresponden a Asteraceae (6 especies), Solanaceae (3 especies) y Brassicaceae (3 especies), mientras que el resto abarca entre una y dos.

Tabla 8. Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.

Familia	Nº especies área de estudio
Asteraceae	6
Solanaceae	3
Brassicaceae	3

6.3.2 Origen fitogeográfico

De las 25 especies, se determinó que 21 especies son introducidas (84%), 3 especies son nativas de Chile (12%) y 1 especie es endémica de Chile (4%).




Imagen 10: Origen fitogeográfico

6.3.3 Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área del proyecto las hierbas anuales son las más comunes, representando un 44% (11 especies), le siguen los tipos biológicos hierba perenne y árbol con el 24% (6 especies), mientras que el tipo parásito y arbusto son representados con el 4% conformado por 1 especie.




Imagen 11: Tipo biológico

6.3.4 Distribución en Chile

La Imagen 12 expone la distribución por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área del Proyecto (según Catálogo de la Flora del Cono Sur).




Imagen 12: Distribución de especies en Chile

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de las especies crece en un amplio rango de distribución, concentrándose entre las regiones de Coquimbo y de los Lagos. Esta amplitud se atribuye a la plasticidad de las especies para adecuarse a ambientes degradados y alterados por la actividad agrícola y su capacidad invasora como especie exótica, como es el caso del área de estudio y otros territorios, principalmente de Chile central.

En lo referente a la región, no se observaron especies con distribución restringida.

6.3.5 Especies en categoría de conservación

De acuerdo a listados oficiales (Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres de Chile) y no oficiales (Libro Rojo de la Flora Terrestre y Libro Rojo Regional) no se encontraron especies en categoría de conservación.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

6.4 Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

De las especies identificadas y según el DS 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias, no se encontraron especies originarias de Chile.

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de estudio no presenta formación de bosque.

Con respecto a las Formaciones Xerofíticas, el Artículo 2° de la Ley 20.283 las define como: "Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbutivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII". Por lo que, debido a los anterior, el área de estudio no presenta formaciones xerofíticas.

6.5 Singularidades ambientales

De acuerdo a lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de estudio del proyecto:

6.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las 3 formaciones vegetacionales descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2016), para la Región de O'Higgins.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:10.000), presenta una referencia general de la vegetación de la Región (tabla 9).

Tabla 9. Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio

Uso actual del Suelo	Superficie Regional (ha)
Áreas urbanas - industriales	33.704,1
Terrenos agrícolas	405.304,3
Praderas y Matorrales	326.241,9

Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 2016.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

Para el análisis de las formaciones vegetales se incluyeron las categorías Áreas urbanas e industriales, Matorral arborescente muy denso y Terrenos agrícolas. Los criterios utilizados para establecer la equivalencia se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10. Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile

Formación Vegetacional	Equivalencia del Catastro
Uso agrícola	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado Terrenos agrícolas que para la Región de O'Higgins se definen con una superficie de 405.304,3 ha
Matorral arborescente de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> , Matorral arborescente de <i>Salix babylonica</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> y Matorral arborescente de <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado Matorrales arborescentes densos que para la Región de O'Higgins se definen con una superficie de 4.159,3 ha
Huellas y Caminos	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado Áreas Urbanas – Industriales que para la Región de O'Higgins se definen con una superficie de 33.704,1 ha

El catastro vegetacional señala que los usos Terrenos agrícolas, Matorrales arborescentes y áreas urbanas – industriales cubren 765.250,3 ha de la Región de O'Higgins, de las cuales 29,94 ha se encuentran en el área de estudio, equivalentes al 0,003% de la superficie regional. Por lo tanto, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

6.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

6.5.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

6.5.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

6.5.5 Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, bosque nativo de preservación es "aquél, cualquiera sea sus superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad". A la vez Bosque nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

De acuerdo a las formaciones vegetales presentes el área del proyecto corresponde a matorrales, es decir formaciones dominadas por formas de vida arbustivas, no hay presencia de Bosque nativo de Preservación.

6.5.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de estudio no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos, Libro Rojo de la Flora Nativa y Libro Rojo Regional.

6.5.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes D.S 366/1944, D.S 129/1972, D.S 1427/1941, D.S 13/1995 y D.S 490/1976 y según los resultados obtenidos, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

6.5.8 Presencia de especies endémicas

En el área de estudio se identificó solo una especie endémica de Chile, *Hypochaeris scorzonerae* se encuentra ampliamente distribuida en el país desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Magallanes.

6.5.9 Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

6.5.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 6), no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

6.5.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo al listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

6.5.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

El área del proyecto se encuentra cercana en 99,99 m de distancia al Sitio Prioritario Cerros Islas Coinco (imagen 13), sin embargo, no se encuentra en o colindante a algún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad.




Imagen 13. Sitio prioritario distante al área de influencia del proyecto.

6.5.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, corresponden a áreas protegidas "cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental". Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Por lo tanto, el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

6.5.14 Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de estudio no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

6.5.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas", así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

6.5.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

7 CONCLUSIONES

- Según la "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile" de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso vegetacional "Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*", mientras que Según la tipología de GAJARDO R (1994), en "La Vegetación Natural de Chile", la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como "Bosque Esclerófilo Costero".
- En el área de estudio se identificaron tres formaciones vegetales, que corresponden a "Uso Agrícola" y "Pradera arborescente de *Populus deltoides* y *Foeniculum vulgare*" y "Caminos o Huellas".
- En total se registraron 25 especies vasculares, de las cuales 21 especies (84%) son introducidas y 3 (12%) son nativas y 1 es endémica de Chile (4%).
- No se identificó ninguna especie registrada en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medioambiente y en ningún listado nacional.
- En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, no se encontraron formaciones de Bosque Nativo ni formaciones xerofíticas. Por lo que no es necesario la presentación de Permisos Ambientales Sectoriales para el Proyecto.
- Solo se detectó la singularidad ambiental de endemismo para la especie *Hypochaeris scorzonerae*.
- De acuerdo con los antecedentes recopilados y el análisis de la campaña en terreno, se concluye que las obras y acciones físicas del proyecto no ejercen efectos negativos significativos sobre el componente flora y vegetación descritos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y/o en el DS 40 entre los artículos 5 al 11.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

8 BIBLIOGRAFÍA

BENOIT I (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago.

BRAUN – BLANQUET J (1987). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.

BRAUN – BLANQUET J (1979). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.

CONAF (2012). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile.

CONAF (2016). Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Región Metropolitana. [en línea] < <http://sit.conaf.cl/exp/ficha.php> >. [consulta: Septiembre, 2016].

CONAMA (1996). Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

D.S 7 (2017). Treceavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 13 (2013). Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 16 (2016). Doceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 19 (2012). Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 23 (2009). Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

D.S. 29 (2011). Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

D.S. 33 (2012). Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 38 (2015). Undécimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 41 (2012). Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 42 (2012). Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 50 (2008). Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 51 (2008). Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 52 (2014). Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 151 (2007). Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

ETIENNE, M & CONTRERAS D. (1981). Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27p. 10 cartas.

ETIENNE M & C PRADO (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Doñihue"	
	Fecha: Julio - 2017	

GAJARDO R (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT F & P PLISCOFF (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2001). Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2003). Flora de Chile. Vol 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2005). Flora de Chile. Vol 2(3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA C (1990). Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

MARTICORENA C & M QUEZADA (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015). Guía para la descripción del área de influencia. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile.

RIEDEMANN P, G ALDUNATE & S TEILLIER (2006). Flora Nativa de Valor Ornamental; Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Edición 1, Chile. 405 pp.

SEREY I, M RICCI & C SMITH – RAMÍREZ (2007). Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile. 222 pp.

ZULOAGA F, O MORRONE & M BELGRANO (2008). Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).