

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO “PARQUE RESIDENCIAL QUILACOYA”

ANEXO 7: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:



DICIEMBRE 2019

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS	5
2.1.	Objetivo general	5
2.2.	Objetivos específicos	5
3.	ÁREA DE ESTUDIO	6
4.	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	9
5.	METODOLOGÍA.....	10
5.1.	Recopilación de Antecedentes Bibliográficos	10
5.2.	Levantamiento de información en terreno.....	10
5.3.	Descripción de la Flora Terrestre.....	13
5.4.	Origen y Endemismo	15
5.5.	Estado de conservación	15
5.6.	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08	16
5.7.	Singularidades ambientales	17
6.	RESULTADOS.....	19
6.1.	Área de influencia (AI).....	19
6.2.	Antecedentes bibliográficos	20
6.3.	Levantamiento de información en terreno.....	23
6.3.1.	Caracterización general del terreno	23
6.3.2.	Vegetación.....	25
6.3.3.	Flora	31
7.	CONCLUSIONES.....	34
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37
9.	ANEXO FOTOGRAFICO	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del proyecto	8
Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies	11
Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.....	12
Tabla 4. Codificación de las especies dominante	12
Tabla 5. Grado de artificialización	12
Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile	20
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras	25
Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT	25
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.....	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región de la Araucanía	6
Figura 2. Área del proyecto	7
Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).	19
Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2014.....	24
Figura 5. Resultados COT.....	26
Figura 6. Características del área de estudio	27
Figura 7. Características del área de estudio	28
Figura 8. Características del área de estudio	29
Figura 9. Características del área de estudio	30
Figura 10. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio.	32
Figura 11. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio.	33
Figura 12. Ficha <i>Blechnum hastatum</i>	33
Figura 13. Ficha <i>Lapageria rosea</i>	34
Figura 14. Registro de <i>Luma apiculata</i> (Arrayán).	38
Figura 15. Registro de <i>Blechnum hastatum</i> (Palmilla).	39
Figura 16. Registro de <i>Lapageria rosea</i> (Copihue).	40
Figura 17. Registro de <i>Chusquea quila</i> (Quila).	41
Figura 18. Registro de <i>Baccharis rhomboidalis</i> (Chilca).	42
Figura 19. Registro de <i>Baccharis linearis</i> (Romerillo).	43
Figura 20. Registro de <i>Festuca sp.</i> (Festuca).	44

Figura 21. Registro de <i>Cissus striata</i> (Voqui colorado).	45
Figura 22. Registro de <i>Aristotelia chilensis</i> (Maqui).	46
Figura 23. Registro de <i>Nothofagus obliqua</i> (Roble).	47
Figura 24. Registro de <i>Maytenus boaria</i> (Maitén).	48
Figura 25. Registro de <i>Acacia dealbata</i> (Aromo australiano).	49

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los resultados obtenidos de la caracterización de la flora y vegetación del área de influencia del proyecto **“Parque Residencial Quilacoya”**, ubicado al noroeste de la comuna de Temuco, Región de la Araucanía.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Dado lo anterior, es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto **“Parque Residencial Quilacoya”**, en la comuna de Temuco, región de La Araucanía.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en al área de influencia del proyecto **“Parque Residencial Quilacoya”**.


2.2. Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. ÁREA DE ESTUDIO


El proyecto “**Parque Residencial Quilacoya**” se emplaza a al noroeste de la comuna de Temuco, Región de la Araucanía (Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región de la Araucanía



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del proyecto.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 18H	
	Este (m)	Norte (m)
A	705.146	5.712.767
B	705.284	5.712.619
C	705.376	5.712.573
D	705.467	5.712.535
E	705.593	5.712.655
F	705.608	5.712.634
G	705.455	5.712.486
H	705.360	5.712.523
I	705.322	5.712.408
J	705.160	5.712.478
K	705.097	5.712.480
L	705.001	5.712.506
M	705.028	5.712.551
N	705.045	5.712.653
Ñ	705.080	5.712.623
O	705.108	5.712.715

Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”* Así, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (A) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro - Sur de Chile.

5.2. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron durante dos campañas realizadas el mes de mayo de 2019 y, donde se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales. Posteriormente, en noviembre de 2019 se realizó otra campaña de muestreo para identificar cambios en los patrones de vegetación debido a la fenología de las especies.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

b) Tipología: La segunda variable se trabajó con las especies dominantes. La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4. Codificación de las especies dominante

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

c) Grado de alteración: La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
	7.2 Vivero ornamental
	7.3 Cultivos bajo plástico
	8. Invernaderos y Parques
	8.0 Invernaderos
	8.1 Parques y plantaciones ornamentales

3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado	9. Zonas edificadas 9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado	
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secano 5.7 Arboricultura de secano	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características de la cobertura vegetal se definieron transectos de largo variable x 4 m de ancho c/u, en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales. Cabe mencionar que, dado que se trata de un área con un alto nivel de impacto antrópico, con una gran parte de la superficie trasformada en praderas degradadas, se puso mayor énfasis en recorrer aquellas áreas que presentan matorral y especies arbóreas.

5.3. Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- e) Listado completo de especies presentes

f) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)

g) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4. Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5. Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N°52/2014, del cual se desprenden los Decretos

Supremos: D.S. N°151 de 2007; D.S. N50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N°387/2008 (CONAMA).

5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08

En la Ley N°20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. *Bosque*: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: la Ley N°20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.

- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación*: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección*: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple*: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

6.2. Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, sub-región del Bosque Caducifolio del Llano. Representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud Sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altura; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

Dentro de esta región vegetacional, el área de estudio se emplaza en la formación del Bosque Caducifolio del Sur, la cual se extiende al sur de la Región de la Araucanía, ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras.

Dentro de la región ecológica respectiva, se encuentra en una situación más favorable en cuanto a precipitaciones, motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose solo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias. Se compone por las siguientes comunidades:

- *Nothofagus obliqua* – *Laurelia serpenirens* (Roble-Laurel). Comunidad más típica de esta formación. Se encuentra ampliamente repartido especialmente sobre los lomajes de origen morrenico donde forma pequeños bosquetes. Sus especies dominantes en el dosel han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados.
- *Nothofagus obliqua* – *Podocarpus saligna* (Roble-Mañío de hojas largas): Comunidad de distribución local pero frecuente dentro del territorio de la formación. La frecuencia de mañío de hojas largas (*Podocarpus saligna*) se manifiesta en la existencia de bosquecillos densos casi puros.
- *Aextoxicon punctatum* – *Laurelia serpenirens* (Olivillo-Laurel): Comunidad casi típicamente laurifolia que en el pasado debió encontrarse mucho más repartida, se ubica en las laderas sombrías y en el fondo de las quebradas.
- *Rubus ulmifolius* - *Ulex europaeus* (Murra- Espinillo): Comunidad de arbustos espinosos invasores que en los últimos decenios ha incrementado mucho su distribución. Representa a una comunidad ruderal desarrollándose con vigor en sectores sometidos a roces y quemas.
- *Holcus lanatus* - *Agrostis tenuis* (Pasto miel-Piojillo): Comunidad pratense muy rica en especies y ampliamente repartida.

- *Sysymbrium officinale* - *Dactylis glomerata* (Mostacilla-Pasto Ovillo): Comunidad pratense ruderalizada frecuente en sectores bajos y húmedos.
- *Plantago major* – *Poa annua* (Llanten-Piojillo): Comunidad pratense ruderal.
- *Gratiola peruviana* - *Plagiobothrys pratense* (Contrayerba-Plagiobotris): Comunidad herbácea, palustre, frecuente en el borde de pequeñas lagunas y charcos.
- *Juncus procerus* - *Lotus corniculatus* (Unquillo–Lotería): Comunidad frecuente en los sectores húmedos de las praderas.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del Bosque Caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*; formación boscosa de amplia extensión dominada por *Nothofagus obliqua*. En situaciones de mayor regularidad y cantidad de precipitación se favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*.

La comunidad típica es la de *Nothofagus obliqua* - *Laurelia sempervirens*. La vegetación azonal está compuesta por bosques pantanosos de *Myrceugenia exsucca*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Drimys winteri* y por matorrales higrófilos de la comunidad *Fuchsia magellanica*-*Aristotelia chilensis*. Gran parte de su extensión está profundamente alterada, con presencia gran cantidad de comunidades asociadas a cultivos agrícola y praderas (*Holcus lanatus*-*Agrostis tenuis*, *Sisymbrium officinale*-*Dactylis glomerata*, *Plantago major*-*Poa annua*, *Avena fatua*-*Rumex acetosella*) (Luebert y Pliscoff, 2004).

Algunos estudios sugieren que la regeneración natural de *Nothofagus obliqua* requiere de algún tipo de perturbación masiva que genere claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios acompañantes sólo pueden regenerar bajo dosel. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de reemplazo dominados por *Chusquea quila* cuando no hay alteración profunda del suelo y por *Rubus constrictus*-*Ulex europaeus* o *Aristotelia chilensis*-*constrictus* cuando si la hay. Los sectores higromórficos son reemplazados por comunidades de *Gratiola peruviana*-*Plagiobothrys pratense* y *Juncus procerus*-*Lotus corniculatus*.

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2017), del total de la superficie nacional de bosque (17,6 millones de hectáreas) en la Región de la Araucanía se encuentran 1.644.081,3 ha, representando el 9,3% del territorio nacional. Del total de la superficie de bosque de la región, el 58,64% corresponde a bosque nativo, 38,46% a plantaciones y 2,9% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue con 470.859,7 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo (tratamiento de corta por la base del árbol cada pocos años). Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, terrenos para la construcción industrial, empresarial y gran cantidad de asentamientos humanos.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Rotación Cultivo-Pradera, la cual se caracteriza por presentar una pendiente entre 0 y 15% de exposición plano, y una altitud de entre 0 y 200 metros.

De esta forma y de acuerdo los antecedentes mencionados, en la actualidad el área de estudio presenta principalmente áreas urbanizadas y de uso agrícola, siendo un lugar altamente intervenido por actividad humana.


6.3. Levantamiento de información en terreno

6.3.1. Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Temuco corresponden en total a 46.478,1 ha, de las cuales 27.119,3 ha son ocupadas como Terrenos agrícolas, 13.789,4 ha corresponde a Bosques, 3.662,9 ha son utilizadas como Áreas Urbanas Industriales, 1.395,2 ha a Praderas y Matorrales, 337,1 ha corresponden a Cuerpos de agua, mientras que 34,5 ha corresponden a Áreas sin vegetación, finalmente 139,7 ha pertenecen a Humedales.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo correspondiente a Terrenos Agrícolas y Áreas Urbanas-Industriales; no obstante, al momento de la visita se observó principalmente una pradera y matorrales degradados en desuso, con presencia de malezas de tipo herbáceas especies exóticas y pequeñas zonas con mayor presentación de carácter arbustivo. Cabe indicar además la presencia de una zona de renoval de especies nativas, la cual se encuentra en los sectores de menor accesibilidad.

Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2014



Fuente: Elaboración propia

6.3.2. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron 3 unidades ambientales (Figura 5), la primera unidad identificada corresponde a Pradera arbustiva, donde predominan especies como *Echium vulgare* y *Cynodon dactylon*. Cabe indicar que en dicha unidad también es posible encontrar regeneración de especies como *Rubus ulmifolius* y *Lupinus arboreus*. La segunda unidad ambiental corresponde a Matorral, compuesta de especies arbustivas y arbóreas de origen introducido como *Acacia dealbata*, *Ulex europaeus* y *Rubus ulmifolius*. Destaca además la presencia de la especie nativas *Aristotelia chilensis*. La tercera unidad ambiental corresponde a Renoval, unidad compuesta de por regeneración de especies nativas, predominando la especie *Maytenus boaria*.

Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Pradera arbustiva	H, <u>H</u> , LB	cd, ev, Ru, La, BI	3.1. Pradera natural degradada o matorral abierto con basto degradado y arbustos no ramoneados.	d, d, c, c, c
Matorral arborescente	<u>LB</u> , <u>LB</u> , LA	AD, Ac, Ue, Ru	3.1. Pradera natural degradada o matorral abierto con basto degradado y arbustos no ramoneados.	d, pd, md, d
Renoval	LA, <u>LA</u>	MB, NO, Cq	4.2. Bosque artificial abandonado	d, c, c


Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Herbácea	<i>Cynodon dactylon</i>	cd
Herbácea	<i>Echium vulgare</i>	ev
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Leñoso bajo	<i>Lupinus arboreus</i>	La
Leñoso bajo	<i>Baccharis linearis</i>	BI
Leñoso alto	<i>Acacia dealbata</i>	AD
Leñoso bajo	<i>Aristotelia chilensis</i>	Ac
Leñoso bajo	<i>Ulex europaeus</i>	Ue
Leñoso alto	<i>Maytenus boaria</i>	MB
Leñoso alto	<i>Nothofagus obliqua</i>	NO
Leñoso bajo	<i>Chusquea quila</i>	Cq

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 5. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Características del área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 7. Características del área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 8. Características del área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Características del área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Cabe mencionar que dentro del área de emplazamiento del proyecto la unidad correspondiente a renoval posee una superficie y ancho cercano a lo determinado por el artículo 2) de la Ley N°20.283 en su definición de bosque, por lo que es importante determinar si, más allá de los límites del proyecto, esta corresponde a una formación boscosa susceptible de afectación, para lo cual se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal que autorice su intervención.

6.3.3. Flora

6.3.3.1. Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 40 especies de plantas pertenecientes a 20 familias (Tabla 9). De las especies registradas 26 corresponden a especies de origen exótico, y 13 especies corresponden a especies nativas. Cabe indicar que una especie no fue identificada en su totalidad, por lo que no es posible definir el origen de esta.


Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo Australiano	Arbóreo	Exótico
	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo Chileno	Arbóreo	Exótico
	<i>Cytisus striatus</i>	Retamo	Arbustivo	Exótico
	<i>Ulex europaeus</i>	Espinillo	Arbustivo	Exótico
	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Arbustivo	Exótico
	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Arbustivo	Exótico
	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Herbáceo	Exótico
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Nativo
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativo
Rosaceae	<i>Acaena argétea</i>	Cadillo	Herbáceo	Nativo
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Exótico
	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa de mosqueta	Arbustivo	Exótico
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Exótico
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Herbáceo	Exótico
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Flor del paño	Herbáceo	Exótico
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbáceo	Exótico
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Exótico
	<i>Achillea millefolium</i>	Mil hojas	Herbáceo	Exótico
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbáceo	Exótico
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Exótico
	<i>Baccharis sp.</i>	Baccharis	Arbustivo	Nativo
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo
	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Chilca	Arbustivo	Nativo
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	Exótico
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	Exótico
	<i>Plantago major</i>	Llantén	Herbáceo	Exótico
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Herbáceo	Exótico
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Herbáceo	Exótico

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Romacilla	Herbáceo	Exótico
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto común	Herbáceo	Exótico
	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Arbustivo	Nativo
	<i>Festuca sp.</i>	Festuca	Herbáceo	-
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbáceo	Exótico
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Herbáceo	Nativo
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativo
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Arbóreo	Nativo
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	Herbáceo	Nativo
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	Herbáceo	Nativo
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Arbóreo	Nativo
Umbelliferae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Exótico


Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2. Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, la única especie registrada en el área del proyecto que se encuentra clasificada en categoría de conservación corresponde a *Blechnum hastatum*, la cual se encuentra en categoría de Preocupación Menor (LC), de acuerdo al D.S. N°19/2012 del MMA.

Figura 12. Ficha *Blechnum hastatum*.

Palmilla (<i>Blechnum hastatum</i>)	
Categoría de conservación	Preocupación Menor (LC)
Fuente de Categoría	D.S. N°19/12 MMA
Justificación de la conservación	La especie NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable) y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios.
Distribución	Nativo de Chile y Argentina. En Chile crece desde Fray Jorge (provincia de Limarí) hasta la provincia de Chiloé (30°40'-43°06'S), también se encuentra en el Archipiélago de Juan Fernández (Rodríguez 1995; Rodríguez et al. 2009).
Amenazas	Amenazada por pérdida y degradación de hábitat por causas antrópicas; cosecha y especies exóticas invasoras.

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Por otro lado, es importante indicar que la especie Copihue (*Lapageria rosea*), fue declarada flor nacional mediante D.S. N°62/1977 del Ministerio del Interior, y se encuentra protegida mediante D.S. N°129/1971 del MINAGRI, modificado por el D.S. N°121/1985 del MINAGRI. Dicho decreto establece la prohibición en todo el territorio nacional de corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de Copihue; cuya falta será sancionada.

Figura 13. Ficha *Lapageria rosea*.

Copihue, copiu (<i>Lapageria rosea</i>)	
Categoría de conservación	Sin categorías vigentes. Declarada “En grave peligro de extinción” D.S N°129/1971
Fuente de Protección	D.S. N°129/1971 MINAGRI mod. D.S. N°121/1985 MINAGRI
Justificación de la conservación	Especie protegida por ley, estando prohibida su corta en poblaciones naturales. Declarada Flor Nacional de Chile en 1971 Y COMO “En grave peligro de extinción” debido a la extracción indiscriminada de que fue objeto.
Distribución	Endémica de Chile. Su distribución natural es entre las regiones de Valparaíso y de Los Lagos, frecuente de los bosques nativos del Maule, Biobío, Araucanía y Los Ríos (MARTICORENA <i>et al.</i> 2010). En Peligro en la Región de O’Higgins desde 2012 según “Reglamento para la Clasificación de especies silvestres según estado de conservación” (llamado “Libro Rojo” Conaf).
Amenazas	Amenazada por pérdida y degradación de hábitat por causas antrópicas (cambio de uso suelo, pérdida de bosque nativo, fragmentación); sequía en regiones de Valparaíso, RM, O’Higgins y del Maule

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

7. CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto “**Parque Residencial Quilacoya**”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de la Araucanía.

Al corresponder a una matriz de pradera degradada, la flora y vegetación del sector está compuesta principalmente por presencia de especies introducidas, las cuales son consideradas plantas invasoras y/u ornamentales.

Las características vegetacionales generales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica, facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales limitan el crecimiento de flora nativa. No obstante, fue posible observar la presencia de un remanente compuesto de especies nativas ubicado en una zona de pendiente del predio, lo cual coincide con la distribución actual de los bosques nativos de la zona centro sur de Chile, que se encuentran restringidos principalmente en zonas de menor acceso. Dicho remanente se encuentra compuesto principalmente por especies como *Maytenus boaria* y *Nothofagus obliqua*. Cabe mencionar que dentro del área de emplazamiento del proyecto esta unidad posee una superficie y ancho cercano a lo determinado por el artículo 2) de la Ley N°20.283 en su definición de bosque, por lo que es importante determinar si, más allá de los límites del proyecto, esta corresponde a una formación boscosa susceptible de afectación, para lo cual se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal que autorice su intervención.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, obteniendo 3 unidades ambientales, la primera unidad identificada corresponde a una pradera arbustiva, unidad dominante en el área de estudio, que se compone de especies de origen introducido como *Cynodon dactylon*, *Echium vulgare*, *Rubus ulmifolius*, *Lupinus arboreus* y *Baccharis linearis*. La segunda unidad ambiental corresponde a la de Matorral arborescente, donde dominan especie arbustivas como *Rubus ulmifolius*, *Ulex europaeus*, *Acacia dealbata*; y la especie nativa *Aristotelia chilensis*. Finalmente se identificó la unidad ambiental correspondiente a Renoval, compuesta por especies arbóreas como *Maytenus boaria*, *Nothofagus obliqua*, *Chusquea quila*.

En relación a las especies nativas presentes, es posible indicar que la única especie registrada en el área del proyecto que se encuentra clasificada en categoría de conservación corresponde a *Blechnum hastatum*, la cual se encuentra en categoría de Preocupación Menor (LC), de acuerdo al D.S. N°19/2012 del MMA. No obstante, dicha especie posee una amplia distribución, lo cual indica que no está próxima a satisfacer los criterios de peligro. Por otro lado, se registró la presencia de Copihue (*Lapageria rosea*), la cual se encuentra protegida mediante D.S. N°129/1971 del MINAGRI, modificado por el D.S. N°121/1984 del MINAGRI, el que establece la prohibición en todo el territorio nacional de corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de Copihue.

Al respecto, es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” (D.L. N°20.283/2009 del MINAGRI).

Pese a la escasa información, los investigadores estiman que *Lapageria rosea* hoy se encuentra “en peligro de extinción”, a pesar del resguardo del D.S. N°129/1971 que no ha impedido el declive de la especie, la cual es difícil de reconocer cuando no es flor y, por ende, es arrasada indiscriminadamente, destruyendo poblaciones completas. Por lo que, con el fin de contribuir a la protección y conservación de la especie, se recomienda generar un Plan de Relocalización de Flora para la especie *Lapageria rosea*. Para dar cumplimiento a este plan, debe realizarse previamente, una evaluación de las condiciones actuales de las plantas, conocer su distribución en el terreno, la cobertura que alcanza dentro de éste y definir el terreno para su relocalización, así como estimar los plazos que aseguren el éxito de la propuesta, considerando que la época post floración sería adecuada para realizar estas actividades de rescate (meses de mayo- junio).

Finalmente, y considerando las condiciones generales del área de emplazamiento del proyecto, se concluye que con las medidas de mitigación adecuadas, el proyecto no generará efectos negativos significativos en el recurso estudiado.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHAR, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9. ANEXO FOTOGRAFICO

Figura 14. Registro de *Luma apiculata* (Arrayán).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 15. Registro de *Blechnum hastatum* (Palmilla).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 16. Registro de *Lapageria rosea* (Copihue).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 17. Registro de *Chusquea quila* (Quila).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 18. Registro de *Baccharis rhomboidalis* (Chilca).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 19. Registro de *Baccharis linearis* (Romerillo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 20. Registro de *Festuca sp.* (*Festuca*).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 21. Registro de *Cissus striata* (Voqui colorado).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 22. Registro de *Aristotelia chilensis* (Maqui).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 23. Registro de *Nothofagus obliqua* (Roble).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 24. Registro de *Maytenus boaria* (Maitén).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 25. Registro de *Acacia dealbata* (Aromo australiano).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia