

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN LA FÁBRICA PATIO OUTLET	

ANEXO 2-6

FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN LA FÁBRICA PATIO OUTLET	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	1
4	METODOLOGÍA	3
4.1	Análisis Bibliográfico.....	3
5	RESULTADOS.....	3
5.1	Flora Vascular	3
5.2	Vegetación.....	3
6	CONCLUSIONES	8
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Área de Influencia	2
-----------	--------------------------	---

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1.	Flora y Vegetación vista por <i>Street View</i> – Av. Carlos Valdovinos.....	5
Fotografía 2.	Flora y Vegetación vista por <i>Street View</i> – Esquina Av. Carlos Valdovinos con Salomón Sumar.	6
Fotografía 3.	Flora y Vegetación vista por <i>Street View</i> – Calle Salomón Sumar.	7

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN LA FÁBRICA PATIO OUTLET	

1 INTRODUCCIÓN

Este informe reúne los antecedentes bibliográficos para caracterizar la flora y vegetación en el área de influencia (AI) del Proyecto Ampliación La Fábrica Patio Outlet, ubicado en la ciudad de Santiago, comuna de San Joaquín, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.

Para efectos de la DIA y su caracterización, se definió un AI que corresponde a la superficie de emplazamiento del Proyecto (8,56 há), superficie que considera todas las obras del Proyecto.

2 OBJETIVOS

El objetivo del presente apartado es describir la flora y vegetación mediante una revisión bibliográfica del área de influencia del Proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia corresponde a las instalaciones del Proyecto, lo que corresponde a la superficie de las obras del proyecto, correspondiente a 8,56 há (ver Figura 1).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN LA FÁBRICA PATIO OUTLET	

Figura 1. Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN LA FÁBRICA PATIO OUTLET	

4 METODOLOGÍA

4.1 Análisis Bibliográfico

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área del Proyecto en términos biogeográficos, la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el área de Proyecto.

A su vez, se realizó un análisis de la vegetación existente a través del programa *Google Earth*, específicamente con *Street View*.

5 RESULTADOS

5.1 Flora Vascular

Los ecosistemas entre los ríos Choapa y Biobío, integran la ecorregión de tipo mediterráneo de Chile Central. Estas ecorregiones son de alta diversidad relativa de especies pues reúnen a cerca de un 20% de la flora vascular mundial, en un área que equivale al 5% de la superficie de la Tierra.

La ecorregión mediterránea chilena, en particular, ha sido calificada como un hotspot para conservar la biodiversidad del mundo (Arroyo et al., 1999 y Arroyo & Cavieres 1997). Las razones para esto son:

- Se trata de una región con una alta riqueza de especies, unas 2500 plantas vasculares y, al mismo tiempo, existe un alto grado de endemismo el que llega a un 23,4% al nivel regional y a un 47% al nivel nacional.
- Es la zona del país que alberga la mayor cantidad de población y actividad humana lo que se refleja, entre otras cosas, en que un 30% de la flora vascular de la cuenca de Santiago - formada por 980 especies de plantas vasculares- es introducida, con proveniencia principal de Eurasia (Navas (1973-1979). Buena parte de las especies alóctonas que se han asilvestrado estaban mejor adaptadas que las nativas a las perturbaciones asociadas al hombre, por lo que han tenido mayor éxito en colonizar los sectores que presentan una intensa destrucción y sustitución de los ecosistemas naturales.

5.2 Vegetación

En relación con la vegetación, Gajardo (1994), incluye al área de estudio en su Región fitoecológica del Bosque y del Matorral Esclerófilo; la vegetación se incluye en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso. La formación que propone para el área de proyecto corresponde al Bosque Espinoso Abierto, que se describe como un tipo de vegetación dominado por árboles espinosos y arbustos altos que se ubica en los valles áridos al norte de la ciudad de Santiago. Existiendo aun sitios en los que no ha sido reemplazado por la agricultura o la fruticultura. En términos de apariencia fisionómica el paisaje es similar al de una sábana. El autor propone varias asociaciones, entre ellas la de *Prosopis chilensis*-*Acacia caven*, la que sería la comunidad típica de los "algarrobales" donde además de las especies dominantes se encuentran el árbol *Porlieria chilensis* (guayacán), arbusto como *Baccharis paniculata*, *Proustia cuneifolia* (huañil) y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo); la comunidad tiene un estrato herbáceo estacional donde destacan *Avena barbata* (teatina), *Bromus berterianus* (pasto largo) y *Cynara cardunculus* (cardo penquero). En las laderas bajas y con poca pendiente se ubica la asociación de *Acacia caven* y *Proustia cuneifolia*, donde además de las especies nombradas, crecen arbustos como *Solanum ligustrinum* (tomatillo) y *Baccharis linearis* (romerillo); además de hierbas como *Avena*

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN LA FÁBRICA PATIO OUTLET	

barbata, *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Vulpia myurus* (pasto sedilla) y *Rostraria cristata*. Como estados de degradación registra a la asociación de *Avena barbata* y *Erodium botrys* (alfilerillo), una pradera estacional con una alta cobertura.



Luebert y Pliscoff (2006), proponen que el área del estudio se encontraría en el piso del bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Este piso contiene vegetación de tipo arbóreo, con presencia de *Prosopis chilensis* (algarrobo) y *Acacia caven* (espino); los que son acompañados por arbustos como *Cestrum parqui* (palqui), *Solanum ligustrinum* (tomatillo) y *Proustia cuneifolia* (huañil). En el piso es frecuente encontrar estados de degradación caracterizados por dominancia de arbustos como palqui y tomatillo, hasta llegar a praderas dominadas por especies exóticas como *Avena barbata* (teatina). El piso se distribuye entre las Regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins, entre los 200 y los 800 m de altitud. Los autores le asignan 3425 km², de los que existían a la fecha de la publicación unos 1316 km², lo que representa un 38,5%.

La flora y la vegetación en el área de influencia, es en su mayoría compuesta de especies exóticas, plantadas en zonas ajardinadas e insertas dentro de una matriz de carácter habitacional e industrial.

En un análisis remoto del lugar a través de *Street View*, no se aprecian especies nativas silvestres tal como se muestra en las fotografías a continuación.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN LA FÁBRICA PATIO OUTLET	

Fotografía 1. Flora y Vegetación vista por *Street View* – Av. Carlos Valdovinos.




	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN LA FÁBRICA PATIO OUTLET	

Fotografía 2. Flora y Vegetación vista por *Street View* – Esquina Av. Carlos Valdovinos con Salomón Sumar.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN LA FÁBRICA PATIO OUTLET	

Fotografía 3. Flora y Vegetación vista por *Street View* – Calle Salomón Sumar.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	AMPLIACIÓN LA FÁBRICA PATIO OUTLET	

6 CONCLUSIONES

El Proyecto Ampliación La Fábrica Patio Outlet se emplaza en una zona de carácter industrial y habitacional dentro de la ciudad de Santiago. Tiene áreas ajardinadas con especies exóticas y existe mantención regular de los jardines, por lo que la vegetación natural descrita para la región es inexistente y la colonización de especies no ocurre en lugares con este tipo de uso intensivo.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARROYO, M.T.K. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile-What do we know and how can assure its protection? In: Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.
- ARROYO, M.T.K., R. ROZZI, J.A. SIMONETTI, P. MARQUET & M. SALABERRY. 1999. In: Mittermeir, R.; Myers, N. & C. Goettsch Eds. Hotspots Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. CEMEX-Conservation International. 161-174.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución geográfica. CONAF- Editorial Universitaria. Santiago de Chile.
- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria. 307 pp.
- NAVAS L.E 1973-79. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Editorial Universitaria. Santiago (3 vols.).