

ANEXO 4.1.

INFORME DE LINEA BASE VEGETACIONAL Y FLORA

PROYECTO

“HABILITACION DE BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE PRODUCTOS QUIMICOS”

Mandante: Edgardo Arredondo Chavo.

Dr. (c) Matías Sánchez Monje
Ingeniero Agrónomo

Iquique- octubre 2018

INDICE

1. INTRODUCCION	1
1.1 Objetivo General	1
1.2 Específicos.....	1
2. ANTECEDENTES GENERALES	2
2.1 Características generales del piso ecológico del emplazamiento del proyecto	2
3. METODOLOGIA.....	5
3.1 Flora terrestre.....	7
4. RESULTADOS	8
4.1 Vegetacional y flora.....	8
5. BIBLIOGRAFIA	9

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Región de Tarapacá delimitada por sus diferentes pisos ecológicos	2
Figura 2. Corte transversal del relieve de la Región de Tarapacá	3
Figura 3. Sitios prioritarios vegetacionales en la Región de Tarapacá	4
Figura 4. Vista aérea de la zona de prospección. Línea roja muestra el recorrido de la prospección.	5
Figura 5. Área de prospección florística	7

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Clasificación morfológica.	6
Cuadro 2. Categorías de cubrimiento.	6

1. INTRODUCCION

Este informe muestra la línea base de vegetación y flora en el proyecto denominado “Habilitación de Bodegas para Almacenamiento Temporal de Productos Químicos”, ubicado en la comuna de Pozo Almonte, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá, el cual se hizo en tres etapas: revisión bibliográfica de vegetación y flora existente en el sector, campaña de terreno y análisis.

1.1 Objetivo General

- Caracterización de la vegetación y flora presente en el área de influencia del proyecto.

1.2 Específicos

- Determinar la vegetación y flora presente en el área del proyecto, con su clasificación taxonómica, características, y categoría de conservación.
- Describir las formaciones de vegetaciones y de flora del área del proyecto.
- Describir categoría de conservación identificadas en el área del proyecto.

2. ANTECEDENTES GENERALES

2.1 Características generales del piso ecológico del emplazamiento del proyecto

El proyecto se presenta administrativamente en la región de Tarapacá, provincia del Tamarugal, comuna de Pozo Almonte (Figura1).




Figura 1. Región de Tarapacá delimitada por sus diferentes pisos ecológicos

Se ubica en un clima desértico interior en el sector denominado Pampa del Tamarugal, sobre los 1.000 metros de altura y sin influencia oceánica costera (Figura 2). Este subtipo se caracteriza por ser de extrema aridez, donde las precipitaciones anuales son de 0 mm, y las temperaturas medias alcanzan a 25,8° C, y máximas y mínimas de 32,0°C y 15,8°C respectivamente. Característicos de este clima son los días con cielos despejados y mucha luminosidad, y más seco que el clima del desértico costero, la humedad relativa en promedio es de 18,8% y máximas y mínimas de 62,5 % y 18,8 % respectivamente.




Figura 2. Corte transversal del relieve de la Región de Tarapacá

En el ámbito vegetacional, el proyecto está inserto en el ecosistema xeromórfico, relacionado con ambientes donde existe escasez o déficit de precipitaciones, o escasa presencia de humedad. Se extienden desde el límite norte de Chile, hasta aproximadamente los 30° o 31° de latitud sur. Especies representativas de esta división son las cactáceas como el *Trichosereus Atacamensis*, o la especie arbórea más característica, como lo es el tamarugo (*Prosopis Tamarugo*).

El plan de manejo de CONAF de 1997 subclasifica estas zonas en zona de desierto absoluto donde está el desierto interior, desierto del Tamarugal y desierto de los salares y pampas.

Dentro de las especies que se encuentran en estos territorios están *Tessaria absinthioides*, *Distichlis spicata*, *Prosopis tamarugo*, *Prosopis alba*, *Atriplex atacamensis*, *Prosopis strombulifera* y *Euphorbia tarapacana*,




Figura 3. Sitios prioritarios vegetacionales en la Región de Tarapacá

Según la clasificación de vegetación de Luebert y Pliscoff, para los sitios prioritarios de la región de Tarapacá (Figura 3), la zona donde se desarrolla el proyecto corresponde al bosque espinoso tropical interior de *Prosopis tamarugo* y *Prosopis strobilifera*, donde el dosel superior puede alcanzar alturas entre 15-20m, la vegetación arbustiva está compuesta principalmente por *Tessaria absinthioides* y *Atriplex atacamensis*, mientras que la estrata herbácea está casi completamente dominada por *Distichlis spicata*. No es posible diferenciar entre comunidades

zonales y azonales dentro de este piso de vegetación, ya que toda es de carácter freatófilo.

3. METODOLOGIA

Para la metodología de muestreo en terreno y producto de la escasa frecuencia vegetacional, se realizó un recorrido libre por el sector verificando la presencia o ausencia de individuos vegetales. De igual forma se realizó un recorrido por el perímetro del proyecto. La prospección se realizó el día 30 de septiembre de 2018.

El muestreo en terreno se complementó con la revisión del listado de conservación de flora y vegetación según estado de conservación DS N°29 de 2011 del Ministerio de Medioambiente.




Figura 4. Vista aérea de la zona de prospección. Línea roja muestra el recorrido de la prospección.

La clasificación morfológica usada de acuerdo con el libro rojo de la flora terrestre de Chile, bajo la adaptación de criterio de Hoffman (1978)

Cuadro 1. Clasificación morfológica.

Categoría	Descripción
Árbol	Vegetal de más de 2 metros de altura y con un tallo leñoso único o troco que se ramifica en forma de copa.
Arbusto	Vegetal que no presenta un tronco preponderante, pues el tallo leñoso se ramifica desde la base.
Enredadera	Vegetal leñoso que trepa sobre otros árboles o arbustos por medio de zarcillos, o simplemente apoyándose en ellos.
Arbustiva en roseta radical	Vegetal cuyas hojas salen de la base muy juntas y se abren luego hacia afuera.
Arbustiva suculenta	Vegetal con troco muy grueso y carnoso, con abundantes jugos, como en los cactus.
Herbácea	Vegetal de tamaño mediano o pequeño que no presenta tallos leñosos.

Cuadro 2. Categorías de cubrimiento.

Cubrimiento (%)	Densidad
1-5	Muy escasa
5-10	Escasa
10-25	Muy clara
25-50	Clara
50-75	Poca densa
75-90	Densa
90-100	Muy densa

3.1 Flora terrestre

Se ocupó la misma metodología que en el levantamiento vegetal, mediante un recorrido libre por el sector, visualizando la presencia o usencia de especies florísticas.



Figura 5. Área de prospección florística

4. RESULTADOS

4.1 Vegetacional y flora

Para efectos de resultado se consolidaron los resultados obtenidos para los levantamientos vegetacional y florístico.

El proyecto como se mencionó anteriormente se encuentra ubicado en una zona de desierto absoluto, característico por casi nulas precipitaciones y por ende escasa presencia vegetacional y florística, concordando con los resultados obtenidos donde no hubo presencia alguna de manera individual o en grupos vegetacionales y florísticos.

5. BIBLIOGRAFIA

- Benoit, Iván. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal.
- Espinoza, Jorge y Galleguillo Roxana. 2008. Estrategia para la conservación de la Biodiversidad, región de Tarapacá. CONAMA Región de Tarapacá.
- Hernández, Jaime. 2000. Manuel de métodos y criterios para la evaluación y monitoreo de la flora y la vegetación. Universidad de Chile.
- Luebert F. y P. Pliscoff. 2004. Pisos de vegetación de la zona norte de Chile.

ANEXO FOTOGRAFICO

