



ANEXO 8.2

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL “FLORA Y VEGETACIÓN”

INDICE GENERAL

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVO	2
2.1	Flora y Vegetación	2
3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
3.1	Definición del área de influencia.....	2
3.2	Determinación y justificación del Área de influencia.....	2
4	METODOLOGÍA	4
4.1	Revisión Antecedentes Bibliográficos	4
4.1.1	Marco Biogeográfico	4
4.2	Análisis Cartográfico	5
4.2.1	Definición y Delimitación de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el Área de Influencia.....	5
4.3	Caracterización flora y vegetación	10
4.3.1	Caracterización Florística	10
4.3.2	Vegetación.....	14
4.4	aplicación de métodos de muestreo para determinación de formaciones afectas a la ley 20.283.	18
4.4.1	Esfuerzo de Muestreo	19
4.5	Trabajo Gabinete Post Terreno	23
4.5.1	Análisis de la Flora.....	23
4.5.2	Singularidad Ambiental	26
4.5.3	Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales.....	28
5	RESULTADOS	32
5.1	Marco biogeográfico.....	32
5.2	Trabajo en Terreno	36
5.3	Flora Vascular	36
5.3.1	Riqueza florística	36
5.3.2	Origen geográfico.....	40
5.3.3	Tipos biológicos	40
5.3.4	Especies en categorías de conservación	41
5.3.5	Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular.....	41
5.4	Vegetación	43
5.4.1	Descripción de las unidades homogéneas (formación de vegetación).....	45
5.5	DETERMINACIÓN DE APLICABILIDAD DE PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES.....	63
5.5.1	DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFITICAS (PAS 151)	63
5.5.2	DETERMINACIÓN DE PLANTACIONES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL	64
5.5.3	DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	66
5.6	Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación	70

6	CONCLUSIONES	74
7	BIBLIOGRAFÍA.....	76
8	Apéndices.....	83
8.1	APÉNDICE A. LISTADO FLORISTICO PROYECTO	83
8.2	APÉNDICE B. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS	98
8.3	APÉNDICE C INVENTARIO FORESTAL/FLORA SEGÚN METODO DE MUESTREO	99
8.4	APÉNDICE D LISTADO DE FLORA POTENCIAL	158

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Tipos de recubrimiento de suelos y formaciones vegetales	6
Tabla 2.	Codificación de Tipos Biológicos	11
Tabla 3.	Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun- Blanquet (1979)	11
Tabla 4.	Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT	15
Tabla 5.	Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	15
Tabla 6.	Códigos de especies dominantes según metodología COT	16
Tabla 7.	Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional	17
Tabla 8.	Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional	17
Tabla 9.	Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas	29
Tabla 10.	Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto	36
Tabla 11.	Resumen taxonómico de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto.....	38
Tabla 12.	Origen geográfico de flora vascular identificada en área de estudio del proyecto .	40
Tabla 13.	Tipos biológicos de flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto	40
Tabla 14.	Especies en Categoría de conservación identificada en el área de influencia del proyecto.....	41

Tabla 15. Especies Originarias identificadas en el área de influencia del proyecto	41
Tabla 16. Singularidades de la flora vascular identificada.....	42
Tabla 17. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT).....	43
Tabla 18. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Bosque nativo	48
Tabla 19. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Nativo	49
Tabla 20. Abundancia relativa asociada a la formación Plantación forestal.....	51
Tabla 21. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Matorral arborescente	54
Tabla 22. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente	55
Tabla 23. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Matorral	56
Tabla 24. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral	57
Tabla 25. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Pradera con árboles	59
Tabla 26. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera con árboles	59
Tabla 27. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Pradera	62
Tabla 28. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera	62
Tabla 29. Inventario de especies listadas en el DS N°68 de 2008 del Ministerio de Agricultura	63
Tabla 30. Resumen de superficies del área de influencia afectas por las obras.....	68
Tabla 31. Análisis de singularidades	71
Tabla 32. Distancias de Áreas de Protección Oficial en relación con el área de influencia ...	73

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del proyecto, para componente Flora y Vegetación	3
Figura 2 . Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación.....	5

Figura 3. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de.....	21
Figura 4. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de.....	22
Figura 5. Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN	26
Figura 6. Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017)	35
Figura 7. Representación gráfica de N° de especies por Clase de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto.....	39
Figura 8. Ubicación espacial de las unidades de Plantaciones forestales a intervenir en el Área de Influencia del Proyecto	65
Figura 9. Ubicación espacial de las unidades de bosque nativo a intervenir en el Área de Influencia del Proyecto	67
Figura 10. Ubicación de Sitios Prioritarios en relación con el Área de Influencia del Proyecto	73

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Bosques Nativos	47
Fotografía 2. Plantación Forestal.....	51
Fotografía 3. Matorral arborescente	53
Fotografía 4. Matorral	56
Fotografía 5. Praderas con árboles	58
Fotografía 6. Pradera.....	61

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta la caracterización del componente Flora y Vegetación como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Sol de Caone” (en adelante, el Proyecto), el cual corresponde a un nuevo parque fotovoltaico que se emplazará administrativamente en la Región del Maule, provincia de Curicó, comuna de Hualañé.

Las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a la superficie de emplazamiento de los paneles solares y la Línea de Alta Tensión (en adelante LAT) del proyecto.

De acuerdo con los términos referenciales expuestos, la Flora y Vegetación natural constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación de proyectos de distinta índole sobre el medio natural. Por ello, se deben considerar los análisis que correspondan, con el fin de verificar o descartar eventuales afectaciones de los componentes florísticos y vegetacionales existentes en un área en particular. Es necesario mencionar que se entenderá como “flora” al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área emplazamiento del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

En el contexto recién expuesto, el presente documento describe las características y singularidades del componente flora y vegetación respecto del área referencial de emplazamiento del Proyecto, detallando el método utilizado para el desarrollo del estudio, los principales resultados del análisis bibliográfico y de la campaña de terreno, y las respectivas conclusiones y recomendaciones relevantes asociadas al componente. Lo anterior, conforme a lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

2 OBJETIVO

2.1 FLORA Y VEGETACIÓN

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual de la componente ambiental flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular del área de influencia del proyecto, en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación y/o singularidad.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras, partes y acciones asociadas al Proyecto.
- Identificar, delimitar, posicionar y caracterizar sitios de singularidad vegetacional y/o florística presentes en el área de influencia del proyecto.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N°20.283 para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras del Proyecto.

3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

3.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA


Conforme con lo establecido por el D.S. N°40/2012, y para efectos de este componente ambiental, se definió que el área de influencia corresponde a los límites naturales definidos para las diferentes unidades de vegetación homogéneas determinadas y que permiten contener el emplazamiento completo de las futuras instalaciones del Proyecto. En este sentido, es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto corresponderán finalmente a las áreas que serán intervenidas por la construcción y operación de éste, y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre la componente Flora y Vegetación.

3.2 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

A continuación, se indica la superficie del área de influencia definida para el componente Flora y Vegetación del Proyecto, las que abarcan 1.103,3 ha.

El área de influencia para plantas vasculares fue establecida considerando los potenciales impactos ambientales sobre ellos, así como el espacio biogeográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto. Estas corresponden a las áreas en donde se proyecta la instalación de los paneles y la Línea de Alta Tensión, junto con un buffer de 100 metros a cada lado de ésta, lo que se indica en la Figura 1.

Figura 1. Área de Influencia del proyecto, para componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2022.

4 METODOLOGÍA

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de estudio se basó en las siguientes etapas:

- Revisión de antecedentes bibliográficos, descripción de la vegetación en el contexto local del área de estudio y su flora potencial.
- Análisis cartográfico para la delimitación del recubrimiento de suelo en gabinete para la delimitación de unidades homogéneas de vegetación (fotointerpretación), y generación de productos cartográficos para el trabajo en terreno.
- Revisión de antecedentes y trabajo orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, para la aplicación de métodos de muestreo para determinación de formaciones afectas a la ley 20.283.
- Trabajo de terreno, orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, y a la aplicación de los métodos de campo para el muestreo y caracterización de la vegetación y flora.
- Trabajo de gabinete, consistente en el procesamiento y análisis de los datos, elaboración del informe técnico de línea de base y elaboración de la cartografía de vegetación.

4.1 REVISIÓN ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

4.1.1 Marco Biogeográfico

Con el objeto de establecer un marco referencial que permita obtener antecedentes acerca de las características de diversidad y distribución geográfica de las comunidades vegetales y florísticas existentes en el área de influencia, se revisó la literatura especializada actualmente disponible. Este marco biogeográfico referencial se presenta bajo una macro escala de análisis basado en clasificaciones a escala continental propuestas por Morrone (2001) y por Cabrera y Willink (1973). De igual forma, y en una escala nacional, se estableció un contexto referencial fundado en el “Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile” desarrollada por Gajardo (1994), y según la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” establecida por Luebert y Pliscoff (2017).

Para la clasificación y descripción de la vegetación, Gajardo (1994) propone en su análisis “La Vegetación Natural de Chile”, una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

En la clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017), que corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, se determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.


Finalmente, los parámetros metodológicos a utilizar se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2014, CONAF 2020) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

4.2 ANÁLISIS CARTOGRAFICO

4.2.1 Definición y Delimitación de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el Área de Influencia

Para la fotointerpretación del área del Proyecto, y específicamente para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV), se obtuvieron imágenes satelitales desde el software Google Earth Pro, postprocesamiento y Figura 2.

Figura 2 . Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Por último, se verificaron y atribuyeron de acuerdo con la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT; Etienne y Prado, 1982).

Así, estas unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron trabajadas usando lo expuesto en el Sistema de Información Territorial de CONAF (2019), CONAMA Y BIRF (1999),

Gajardo (1994) y FAO (2010), elaboradas para la Región del Maule, Comuna de Hualañé. Estas categorías se detallan a continuación (Tabla 1):

Tabla 1. Tipos de recubrimiento de suelos y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto
		5.2 Bosque Renoval
		5.3 Bosque Adulto Renoval
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia en Base a CONAF (2019) y a Etienne y Prado (1982).

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

- Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- Terrenos Agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
- Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:

- **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.

5. Bosque nativo¹: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo:

- **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

6. Bosque Mixto²: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas nativas y exóticas. Estas últimas pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas. En esta formación se pueden presentar dos situaciones:

- 1) Corresponde a una mezcla de bosque nativo (adulto o renoval) y especies plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33% y el 66% de cubrimiento.³
- 2) Bosque nativo con exóticas asilvestradas: Corresponde a una mezcla de Bosque nativo (adulto o renoval) y especies exóticas que se han regenerado en forma natural en proporciones que fluctúan entre 25% y 75% de cubrimiento para cada una de las categorías que la constituyen.

7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo)⁴. Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.

¹ De acuerdo con lo estipulado en la Ley 20.283

² Para efectos de discriminar la aplicabilidad de PAS 148 y 149 en las unidades de Bosque mixto identificadas, se procederá a mencionar las coberturas de copas de las especies dominantes en dichas formaciones.

³ De acuerdo a Catastro de recursos vegetacionales, CONAF, 2017.

⁴ De acuerdo a la localidad de estudio.

8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas⁵. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.

9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.

10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
- **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum*, y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatía*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

⁵ Para efectos del presente informe, se asignarán reforestaciones identificadas en el área de influencia como recubrimiento Plantación Forestal.

12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

4.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

En un inicio, y de manera previa a la prospección del área de influencia, se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcaron los puntos de levantamiento.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada, para así poder corregir posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández et al., 2000).

4.3.1 Caracterización Florística

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de parcelas circulares de 12,62 m de radio (500 m²) y transectos de tipo lineal, con una longitud de 300 m vía pedestre, mientras que el ancho fue de 5 metros tomando como referencia el campo visual en terreno, los cuales fueron distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de Influencia.

Para cada una de estas unidades vegetación, se tomó registro de las especies de plantas vasculares presentes al interior de estas, detallando su tipo biológico, fenología y porcentaje de cubrimiento. Se registraron los puntos de muestreo en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19S, y se tomaron fotografías tanto de las especies registradas como de las unidades muestreadas.

Cabe señalar que, para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas *Polypodiophyta* (helechos y afines), *Pinophyta* (coníferas) y *Magnoliophyta* (plantas con flor).

4.3.1.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para

la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez et al., 2018) y en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina⁶. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”⁷ disponible como página web.

4.3.1.2 Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c) (ej. Enredadera Perenne).

Tabla 2. Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia

Para la identificación de las muestras, en cada formación vegetal se registró el nombre científico de las plantas y su abundancia por medio de la metodología de Braun-Blanquet (Tabla 3). De acuerdo con esta metodología, se dividió en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Tabla 3. Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun-Blanquet (1979)

Rango de abundancia relativa	Código
Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p
1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.	R
Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.	+

⁶ <http://www2.darwin.edu.ar/>

⁷ <http://www.theplantlist.org/>

Rango de abundancia relativa	Código
Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.	1
Cobertura del 5 al 25%	2
Cobertura del 25 al 50%	3
Cobertura del 50 al 75%	4
Cobertura mayor al 75%	5

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).

Para determinar la riqueza y composición de especies, la identificación de la mayoría de los taxones se realizó en terreno, a partir de la experiencia y conocimiento de cada profesional. Los nombres científicos asignados en terreno se consideraron provisorios. Cada registro fue asociado a un número de fotografía y código de colecta único (código de herbario), de modo que se realizó la confirmación en gabinete y la inclusión de correcciones.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados de acuerdo con la definición de flora en terreno para determinar la estratificación fueron:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco (5) metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley N° 20.283).
- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Etienne & Prado, 1982).
- Hierbas perennes: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen -como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo-, a partir de los cuales rebrotan (Raven, Evert & Eichhorn, 1992, modificado).
- Hierbas anuales: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante semillas en latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven et al. 1992, modificado).
- Parásitas: Especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena, Alarcón, Abello & Atala, 2010, modificado).
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Sus hojas, tallos y/o

raíces son más carnosas de lo habitual, debido al desarrollo de tejidos de almacenamiento de agua, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado).

4.3.1.3 Origen geográfico

La flora vascular detectada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

4.3.1.4 Estados de conservación de las especies de flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N.º 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N.º 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50/2008, D.S. N.º 51/2008 y D.S. N.º 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41/2011, D.S. N.º 42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015, D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018, D.S. N.º 23/2019, D.S. N.º 16/2020 y D.S. N.º 44/2021 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N.º 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

4.3.1.5 Revisión de otros antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ello, la Ley de Bosque Nativo⁸ y su reglamento⁹, y el Decreto N.º 68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del país y que tiene directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”. Además, se revisó la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) en lo referente a los contenidos que deben incluirse en las caracterizaciones de flora vascular que se presenten en el contexto de evaluación ambiental de un Proyecto, y que determinen alguna singularidad ambiental.

4.3.2 Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹⁰), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982), conforme a lo expuesto para el levantamiento de flora y vegetación en el territorio nacional (SEA 2015). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo con el porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: Se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

4.3.2.1 Descripción de los tipos biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza en base a la siguiente estructura.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 4).

⁸ Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”. Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁹ Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

¹⁰ Centre d’Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

Tabla 4. Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT

Tipo biológico		Índice (n)	Cubrimiento (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 5).

Tabla 5. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de especies dominantes: las especies dominantes de cada formación de vegetación se codificaron según lo señalado en el Tabla 6.

Tabla 6. Códigos de especies dominantes según metodología COT

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Herbáceo	minúscula	minúscula	Galega officinalis	go
Leñoso bajo	mayúscula	inúscula	Rubus ulmifolius	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Salix viminalis	SV
Suculento	minúscula	mayúscula	Cumulopunthia sphaerica	cS

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Etienne y Prado (1982).

Cabe indicar que, los parámetros metodológicos utilizados, se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2020) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

4.3.2.2 Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas asociadas al relieve y sustrato, es necesario determinar el grado de inclinación de estas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje.

4.3.2.3 Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 7.

Tabla 7. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional

Estado sanitario	Características	Código
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.3.2.4 Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 8.

Tabla 8. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional

Grado de artificialización	Características	Código
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Rasgos evidentes de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de	3

Grado de artificialización	Características	Código
	tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.3.2.5 Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como son aquellas afectas a la Ley 20.283/2008 del MINAGRI, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región del Maule (CONAMA, 2002) y sus actualizaciones (COREMA, 2009), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR¹¹, y la descripción de las Reservas de la Biósfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental concerniente a la vegetación natural.

4.4 APLICACIÓN DE MÉTODOS DE MUESTREO PARA DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283.

Con objeto de realizar un inventario de individuos afectados a corta, se establecieron sectores representativos aledaños a estos, efectuándose parcelas de 500 m² para el Área de Influencia, de acuerdo con experiencias con este tipo de vegetación (Hernández et al., 2000, los cuales plantean superficies entre 200-500m²; Steubing et al, 2002, los cuales plantean parcelas entre 200-400 m², dependiendo de las condiciones locales). En este caso, la metodología se aplica bajo la justificación de las características propias de un bosque esclerófilo, provisto de vastas áreas de claros sin vegetación, para lo cual se necesita disminuir tanto el efecto borde de la parcela como también evitar subestimar la superficie de bosque como tal.

La extrapolación del número de individuos por hectárea se realizó utilizando el factor de expansión:

$$FE= 10000 / (n \times Sn)$$

¹¹ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Donde,

FE= factor de expansión;

n= número de individuos identificados en la parcela de control;

Sn= superficie parcela (m²).

Cada parcela de control fue referenciada mediante un GPS navegador, en datum WGS/1984 Huso 19S, como así también, demarcada en terreno.

4.4.1 Esfuerzo de Muestreo

a) Determinación de número máximo de parcelas por Área.

Para determinar el número de parcelas máximas que se pueden muestrear en cada área, se utilizó el software Qgis 3.4 Madeira, con el que se calculó la superficie total.

$$N = \frac{S}{S_p}$$

Donde,

N: Número máximo de parcelas posibles

S : Superficie total de área en metros cuadrados

S_p : Superficie de la parcela (500 m²)

b) Cálculo de Tamaño de Muestras

Los tamaños de las muestras que deben realizar en cada una de las áreas fueron calculados para diferentes niveles de error estadístico (5, 7, 10, 12 y 15%), obteniéndose de acuerdo con la siguiente ecuación (Cochran, 1980):

$$n = \frac{Z^2 pqN}{NE^2 + Z^2 pq}$$

Donde,

n : Número de parcelas a muestrear

N: Número máximo de parcelas posibles

p : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

q : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

Z : Estadístico normal estándar correspondiente a un nivel de confianza 95%

c) Estratificación de la muestra

Para estratificar la muestra se consideró como el tipo de formación (“Arbórea”, “Herbazal” y “Matorral”) como atributo, de manera que cada uno de estos grupos quedará bien representado. La distribución por estrato del tamaño muestral de cada clase dentro del área se calculó de la siguiente manera (Cochran, 1980):

$$n_h = n * \frac{y_h}{a_t}$$

Donde,

n_h : Tamaño de la clase h


n : Número de parcelas a muestreas

y_h : Área de cada clase h

a_t : Área total del área de influencia.


Una vez definido el número de parcelas en cada estrato, estos fueron repartidos aleatoriamente dentro de los polígonos correspondientes, separándolos por al menos 100 metros. Se consideró un límite de 25 m con el borde del polígono para evitar el efecto borde, además de verificar la pendiente del terreno. Este procesamiento cartográfico se realizó mediante el programa “QGIS 3.4 Madeira”.

Figura 3. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de influencia. (Imagen 1 de 2)



Fuente: Elaboración propia, 2022

Figura 4. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de influencia. (Imagen 2 de 2)



4.5 TRABAJO GABINETE POST TERRENO

4.5.1 Análisis de la Flora

La identificación florística se realizó mediante la revisión de las muestras botánicas colectadas y fotografiadas en terreno para su identificación taxonómica. De esta manera, se estableció un valor de riqueza por punto de muestreo. Para cada especie de esta base de datos florística se determinó:

a) Origen geográfico

La flora vascular detectada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

La asignación del origen geográfico se basó principalmente en aquel descrito por Marticorena y Quezada (1985), el que incluye las siguientes categorías:

- Nativas: especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
- Endémicas: especies nativas con una distribución natural restringida al territorio nacional (Chile), pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país (SEA, 2015).
- Alóctonas: las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivos, (Marticorena & Quezada, 1985; Zuloaga *et al.* 2008)
- No determinadas: son no determinadas, las especies que se identifiquen a nivel de género, ya que en las condiciones en que se encuentran no presentan los caracteres morfológicos necesarios para la identificación a nivel de especie, por lo que no es posible asegurar su origen geográfico.

Las categorías asignadas por estos autores fueron actualizadas con la información del Instituto de Botánica Darwinion (www2.darwin.edu.ar; Zuloaga *et al.*, 2008) y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)

b) Rangos de distribución

Para la determinación de los rangos de distribución en el territorio nacional de las especies registradas, se consultaron como fuentes bibliográficas el Instituto de Botánica Darwinion, el catálogo de la flora vascular y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) definiéndose las siguientes categorías:

- Restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presentes sólo en la Región del Maule.
- Moderadamente restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presente sólo en el Sur del país.
- No restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, y que presentan un amplio rango de distribución en el país (presente en más de cuatro regiones).
- Fuera de rango de distribución: especies cuya distribución no considera la Región del Maule casos en los que, por tanto, podría tratarse de una ampliación de su rango de distribución.
- No determinada: especies cuyos orígenes geográficos no han sido determinados. Considera los taxa que no han podido ser identificados a nivel de especie: identificado a nivel de género, afín a otro ("aff."), identificación por confirmar ("cf.") (ejemplo: *Acacia* sp. *Acacia* aff. *caven*)
- No aplica: especies de origen alóctono.

c) Tipos biológicos

Para determinar el tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio se utilizó la metodología antes descrita en la caracterización de la flora donde se incluyen las categorías de árbol, arbusto, hierba perenne, hierba anual, parásitas y suculentas, de acuerdo con los autores respectivos.

d) Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N.º 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N.º 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.


Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50/2008, D.S. N.º 51/2008 y D.S. N.º 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41/2011, D.S. N.º 42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015, D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018, D.S. N.º 23/2019, D.S. N.º 16/2020 y D.S. N.º 44/2021 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 5 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF 2009).

Figura 5. Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN



Fuente: Adaptado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N.º 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

4.5.2 Singularidad Ambiental

En relación a los resultados obtenidos respecto a vegetación y flora vascular, se identificaron como singulares aquellas unidades cartográficas correspondientes a formaciones vegetales o a otros recubrimientos de suelo (áreas desprovistas de vegetación o áreas industriales) que presentan singularidades ambientales en base a una adaptación de los criterios mencionados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014, 2020), la Guía para la descripción del área de estudio (SEA, 2015), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE). Las singularidades ambientales consideradas de acuerdo con el área de estudio son las siguientes:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

- Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.
- Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
- Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
- Presencia de un ecosistema amenazado
- Otras singularidades ambientales.

Adicionalmente, se evaluaron las competencias ambientales de CONAF (2020), en el marco del SEIA con el proyecto, las competencias ambientales de CONAF son las siguientes:

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
- Cortinas cortavientos bonificadas
- Bosques naturales de especies exóticas
- Bosque Nativo
- Bosque Nativo de Preservación
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
- Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay.) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern)
- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
- Formaciones Xerofíticas
- Matorral en Terrenos APF
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
- Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a vegetación y flora vascular en cada uno de los sectores del área de estudio, se identificaron las unidades ambientalmente singulares, en consideración con los criterios previamente mencionados y para fines del presente estudio, catalogándose como singular las unidades que cumpliesen al menos alguno de estos criterios

mencionados y en consideración además con el contexto vegetal de cada sector del área de estudio.

4.5.3 Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales

A) Determinación de Formaciones Xerofíticas (Pas 151)

Formación xerofítica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, en base a lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” según lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 9):

Tabla 9. Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: CONAF, 2020. En base a Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

b) Determinación de Bosques en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal

La determinación de bosques en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal¹² que sea objeto de presentación del PAS 149, se funda en el artículo 21 del D.L. N° 701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N° 2.625, de 1979, (D.L. N° 701) que dispone: "Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación registrará para las plantaciones¹³ existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal. No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

c) Determinación de Formaciones Afectas a la Ley 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y en relación con el área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

¹² "Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva". (Artículo 2° del D.L. N° 701).

¹³ Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies nativas y/o exóticas.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N°20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S. 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

5 RESULTADOS

5.1 MARCO BIOGEOGRÁFICO

En el contexto biogeográfico continental de Cabrera & Willink (1973) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región Neotropical, Dominio Andino-patagónico el que se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile y la estepa patagónica desde Neuquén oeste de Río Negro y Chubut, y Santa Cruz. En las regiones tropicales y subtropicales, el Dominio Andino- Patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3200 m de altitud, pero al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las cordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar. También llega al nivel del mar en las costas de Perú y Chile. Específicamente el área de influencia del proyecto se encuentra en la Provincia Chilena Central, la que ocupa el centro de Chile (con excepción de la Alta Cordillera) entre los paralelos 32 y 38 aproximadamente. Predomina la vegetación arbustiva que forma matorrales y alterna con bosquecillos de poca altura. Los elementos dominantes son de origen muy heterogéneo. Hay numerosas especies endémicas, otras están relacionadas con el Dominio Chaqueño, pero, en su mayoría, pertenecen al Alto-Patagónico.

Entre las comunidades más típicas se hallan los bosques esclerófilos de *Beilschmiedia miersii*, *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus*, *Myrceugenia pitra*, *Crinodendron patagua*, *Schinus latifolius*, *Kageneckia oblonga*, entre otras, sobre las laderas de los cerros.

En los valles llanos crecen espinares de *Acacia caven*, *Prosopis chilensis*, *Retanilla trinervia*, *Schinus polygamus* y muchas otras especies. Otras veces, hay matorrales de *Retanilla trinervia*, *Quillaja saponaria* y *Chusquea quila*.

En una actualización Morrone (2001) presenta el Área de Influencia en la Región Andina, Subregión Subantártica, Provincia del Maule que se ubica en sur de Chile y Argentina, entre los 34-37° de latitud sur, la vegetación que predomina son bosques templados transicionales, con algunos elementos bióticos de la subregión chilena central. Entre las especies dominantes se encuentran *Acaena pinnatifida*, *Alstroemeria aurea*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis concava*, *Berberis microphylla*, *Boquila trifoliata*, *Chusquea quila*, *Cortaderia egmontiana*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia virgata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Amomyrtus luma*, *Nothofagus alessandri*, *Persea lingue*, *N. dombeyi*, *N. leoni*, *Nothofagus oblicua*, *N. pumilio*, *Gaultheria mucronata*.

Según Gajardo (1994) el área del proyecto se desenvuelve en la región del “Matorral y del Bosque esclerófilo”. Se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. En una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos

bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura

A su vez, la formación se ubica en la sub-región del “Bosque esclerófilo”, la cual corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espinoso (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

Finalmente, el área del proyecto se desenvuelve en la formación del “Bosque Esclerófilo Maulino” ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetacional más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar. Por falta de referencias, no ha sido posible definir comunidades típicas.

Según Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se ubica en el piso vegetacional Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* (Figura 6), este bosque es dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Saturaje gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hytrix* y *Retanilla trinervia*, Gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.


Composición florística: *Teucrium bicolor*, *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Clinopodium gilliesii*, *Sophora macrocarpa*.

Dinámica: la corta reiterada y la quema de vegetación producen un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del bosque espinoso de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo.

Distribución: laderas orientadas de la Cordillera de la Costa y depresión intermedia de regiones de O'Higgins, del Maule y norte de la del Biobío, entre 0 y 600 m, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

En el **Apéndice 8.4** se muestra el Listado de flora potencial para el proyecto según Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

Figura 6. Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017)



Fuente: Elaboración propia, 2022

5.2 TRABAJO EN TERRENO

Las campañas para la prospección y obtención de la información necesaria para realizar la caracterización del componente flora y vegetación del Área de Influencia del Proyecto, se realizaron entre los días 15 al 20 de noviembre, 16 al 21 de diciembre, 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2021 y del 25 al 27 de febrero de 2022.

Se levantaron 118 puntos de muestreo estos fueron tipo COT/Flora, junto con esto, se realizaron también parcelas de inventario forestal de 500 m². Por otro lado se realizaron 35 puntos tipo COT, para corroborar las especies dominantes de las formaciones vegetacionales.

5.3 FLORA VASCULAR

5.3.1 Riqueza florística

La diversidad florística presente en las áreas de estudios se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) y transectos distribuidos en las unidades homogéneas de vegetación reconocibles en terreno. Como resultado de ello, se realizaron un total de 130 puntos de muestreo en el área de influencia del proyecto, y cuyas referencias geográficas se aprecian en la Tabla 10. Cabe señalar que, los transectos ejecutados, se llevaron a cabo en torno y entre cada punto de inventario considerando para ello distancias relativas para cada unidad en particular.

Tabla 10. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto

ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S		ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S		ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S	
	UTM N	UTM E		UTM N	UTM E		UTM N	UTM E
PM001	254.606	6.119.435	PM053	260.609	6.129.797	PM104	264.485	6.133.872
PM002	254.480	6.119.193	PM053	260.609	6.129.797	PM105	264.840	6.133.849
PM003	254.325	6.118.947	PM055	260.639	6.130.040	PM106	264.783	6.134.218
PM004	255.390	6.119.185	PM056	260.712	6.130.088	PM107	264.674	6.134.361
PM005	255.941	6.119.196	PM057	260.854	6.130.169	PM108	264.471	6.134.274
PM006	256.280	6.119.521	PM058	260.787	6.130.230	PM109	264.480	6.134.246
PM007	256.549	6.119.775	PM059	261.121	6.130.486	PM110	264.455	6.134.169
PM008	256.626	6.119.902	PM060	261.197	6.130.733	PM111	263.794	6.129.651
PM009	256.763	6.120.118	PM061	261.354	6.130.770	PM112	263.980	6.129.691
PM010	256.868	6.120.294	PM062	261.581	6.130.602	PM113	264.408	6.129.918
PM011	256.805	6.120.386	PM063	261.677	6.130.586	PM114	264.179	6.130.046
PM012	256.944	6.120.439	PM064	261.826	6.130.815	PM115	264.583	6.130.168
PM013	257.045	6.120.497	PM065	262.061	6.130.539	PM116	264.622	6.130.303
PM014	257.130	6.120.529	PM066	261.946	6.130.214	PM117	264.578	6.130.296
PM015	257.260	6.120.707	PM067	261.638	6.130.231	PM118	264.484	6.130.369

ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S		ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S		ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S	
	UTM N	UTM E		UTM N	UTM E		UTM N	UTM E
PM016	257.479	6.120.811	PM068	262.223	6.130.080	PM119	264.745	6.130.491
PM017	257.618	6.120.851	PM069	261.722	6.129.959	PM120	264.756	6.130.612
PM018	257.735	6.120.943	PM070	261.906	6.129.884	PM121	264.575	6.130.552
PM019	257.741	6.121.013	PM071	261.999	6.129.962	PM122	264.339	6.130.589
PM020	257.784	6.121.293	PM072	262.480	6.130.628	PM123	264.474	6.130.707
PM021	257.876	6.121.385	PM073	262.420	6.129.890	PM124	262.759	6.129.246
PM022	258.090	6.121.505	PM074	262.403	6.129.929	PM125	262.700	6.128.951
PM023	258.039	6.121.615	PM075	262.688	6.129.985	PM126	262.506	6.128.802
PM024	258.154	6.121.977	PM076	262.904	6.130.329	PM127	262.299	6.129.029
PM025	258.268	6.122.173	PM077	263.045	6.130.556	PM128	262.048	6.128.806
PM026	259.190	6.125.590	PM078	263.478	6.130.685	PM129	264.912	6.133.878
PM027	259.118	6.125.343	PM079	262.993	6.130.673	PM130	261.825	6.128.753
PM028	259.053	6.125.446	PM080	263.149	6.131.232	PM131	263.850	6.133.957
PM029	258.385	6.122.557	PM081	263.706	6.131.830	PM132	263.974	6.134.109
PM030	259.056	6.124.780	PM082	263.152	6.132.158	PM133	263.993	6.133.853
PM031	259.317	6.125.199	PM083	264.131	6.132.190	PM134	264.988	6.133.569
PM032	259.053	6.124.960	PM084	263.979	6.132.280	PM135	264.652	6.133.031
PM033	259.073	6.125.176	PM085	264.104	6.132.304	PM136	262.908	6.131.535
PM034	259.349	6.125.780	PM086	263.962	6.132.596	PM137	263.086	6.131.048
PM035	259.078	6.125.841	PM087	264.400	6.132.773	PM138	263.184	6.131.515
PM037	262.816	6.130.697	PM088	263.640	6.132.745	PM139	263.611	6.131.114
PM038	259.076	6.126.512	PM089	263.858	6.132.841	PM140	263.222	6.130.779
PM039	259.120	6.126.768	PM090	263.446	6.132.933	PM141	263.285	6.129.518
PM040	259.149	6.126.962	PM091	264.283	6.132.938	PM142	262.832	6.129.674
PM041	258.972	6.127.382	PM092	264.271	6.132.941	PM143	259.052	6.124.428
PM042	259.161	6.127.630	PM093	263.949	6.133.024	PM144	258.858	6.123.916
PM043	259.282	6.128.083	PM094	263.565	6.133.230	PM145	258.664	6.123.655
PM044	259.396	6.128.334	PM095	263.567	6.133.231	PM146	258.723	6.123.183
PM045	259.639	6.128.483	PM096	263.624	6.133.340	PM147	258.441	6.122.850
PM046	259.857	6.128.716	PM097	264.209	6.133.347	PM148	258.137	6.122.379
PM047	260.004	6.129.099	PM098	264.536	6.133.364	PM149	257.121	6.120.189
PM048	260.204	6.129.347	PM099	264.083	6.133.681	PM150	257.304	6.120.203
PM049	260.296	6.129.301	PM100	263.733	6.133.858	PM151	256.151	6.119.252

ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S		ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S		ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S	
	UTM N	UTM E		UTM N	UTM E		UTM N	UTM E
PM050	260.345	6.129.532	PM101	264.438	6.133.627	PM152	255.955	6.119.018
PM051	260.491	6.129.692	PM102	263.903	6.134.039	PM153	263.571	6.132.583
PM052	260.494	6.129.794	PM103	264.267	6.133.941			

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Como resultado de las campañas de terreno en base a los inventarios y transectos ejecutados, se constató que la flora vascular para las áreas de influencia del Proyecto está determinada por 157 especies vasculares. El detalle de las especies identificadas para el área de influencia del proyecto se presenta en el catálogo taxonómico adjunto en el **Apéndice A** del presente estudio.

Respecto de los antecedentes taxonómicos de la diversidad florística registrada (Tabla 11), es posible indicar que, para el área de influencia del proyecto, se encuentran representadas tres (3) divisiones generales de clasificación, Magnoliophyta, Pinophyta y Pteritophyta. La primera división taxonómica (Magnoliophyta) está conformada por dos (2) clases, Magnoliopsida y Liliopsida, donde la mayor parte de las especies identificadas se concentra en la clase Magnoliopsida (109 taxa), mientras que la clase Liliopsida solo tiene 41 taxas. En lo que respecta al División Pinophyta, esta se compone de una familia y una sola especie (*Pinus radiata* D. Don), la cual corresponde a una especie introducida al país.

A nivel de familias, solo destaca dentro de la división Magnoliophyta, la familia Asteraceae con 27 taxas, le sigue la familia Poaceae con 23 taxas.

El detalle del catálogo taxonómico definido para el área en estudio se adjunta en el **Apéndice A** del presente documento, donde se aprecian otras referencias de las especies registradas.


Tabla 11. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto

<i>División</i>	N.º Familias	N.º Géneros	N.º Especies
<i>Clase</i>			
Magnoliophyta			
Liliopsida	8	25	41
Magnoliopsida	37	93	109
Subtotal	45	118	150
Pinophyta			
Pinopsida	1	1	1

<i>División</i>	N.º Familias	N.º Géneros	N.º Especies
<i>Clase</i>			
Subtotal	1	1	1
Pteridophyta			
Polypodiopsida	1	2	6
Subtotal	1	2	6
TOTAL	47	121	157

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 7. Representación gráfica de N° de especies por Clase de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.3.2 Origen geográfico

La flora vascular registrada para el Área de influencia del proyecto está compuesta en gran parte por especies introducidas al país (48,4%) (Rodríguez *et al* 2018; Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), lo que indica que el área en general presenta un alto grado de intervención. (Tabla 12). Las especies nativas detectadas representan el 31,2% de la riqueza identificada, las cuales se hacen presente de forma aislada (especies arbóreas) y formando parte del mosaico de los herbazales en el área (arbustivas y herbáceas).

Tabla 12. Origen geográfico de flora vascular identificada en área de estudio del proyecto

Origen	N.º Taxas	% Total Área de Influencia
Endémica	32	20,4
Introducida	76	48,4
Nativa	49	31,2
TOTAL	157	100

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Rodríguez et al 2018 y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

5.3.3 Tipos biológicos

Referente a los tipos biológicos identificados en el área de influencia, es posible señalar que la composición florística observada define esencialmente que la fisionomía existente en los ambientes del área de influencia esté estructurada principalmente por especies herbáceas (anuales y perennes, 132 en total) y arbustivas (17). El resto de los tipos biológicos se presentan de forma parcial en superficie. A modo de síntesis, en la Tabla 13 se observa la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia.

Tabla 13. Tipos biológicos de flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto

Tipo Biológico	N.º Taxones	% Total Área De Influencia
Arbóreo	8	5,1%
Arbustivo/Arbustivo suculento	17	10,8%
Herbáceo anual / bianual	71	45,2%
Herbáceo perenne	61	38,9%
TOTAL	157	100%

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Rodríguez et al 2018 y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

5.3.4 Especies en categorías de conservación

Referente a la categoría de conservación, cabe señalar que, de acuerdo con las categorías expuestas en las referencias legales señaladas previamente y conforme a puntos de muestreo utilizados, en el área de influencia del Proyecto se identificaron las siguientes especies expuestas en la Tabla 14 las que se encuentran incluidas en alguna de las categorías de conservación.

Tabla 14. Especies en Categoría de conservación identificada en el área de influencia del proyecto

ID	Nombre científico	Categoría vigente de conservación MMA
1	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense	Preocupación Menor (LC) Chile continental DS 19/2012 MMA
2	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
3	<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
4	<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf. var. sulphureum	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
5	<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr. Bayer subsp. diluta	En Peligro (EN) [Alstroemeria diluta var. diluta] DS 13/2013 MMA
6	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
7	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA
8	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. chiloensis	Preocupación menor (LC) DS 41/2011 MMA
9	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla)	Preocupación Menor (LC) DS 41/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Rodríguez et al 2018 y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

5.3.5 Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

En consideración a la actual legislación referente a la Ley de Bosque Nativo y su reglamento, y de acuerdo con la definición de singularidades ambientales dentro del área en estudio, cabe indicar que se constató la presencia de 14 especies catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI. Las especies corresponden a las listadas en la Tabla 15.

Tabla 15. Especies Originarias identificadas en el área de influencia del proyecto

ID	Nombre científico
1	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
2	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. Linearis

ID	Nombre científico
3	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.
4	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. var. Chilensis
5	<i>Berberis darwinii</i> Hook.
6	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. Chiloensis
7	<i>Eriogyne curvispina</i> (Bertero ex Colla)
8	<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
9	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.
10	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.
11	<i>Maytenus boaria</i> Molina
12	<i>Peumus boldus</i> Molina
13	<i>Quillaja saponaria</i> Molina

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Rodríguez et al 2018 y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

En lo que respecta de los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) sobre singularidades florísticas, en la Tabla 16 se hace mención que, dada la composición identificada (riqueza) determinada para el área en análisis, que no se identifican singularidades para las especies detectadas.

Tabla 16. Singularidades de la flora vascular identificada

Id	Singularidad	Observación
1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.	En el área de influencia del Proyecto se registraron nueve (9) especies que estén incluidas en alguna de las categorías de conservación según la normativa vigente.
2	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	En el área de influencia del Proyecto no se registró especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
3	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia del Proyecto se registraron la presencia de 32 especies endémicas.
4	Presencia de especies de distribución restringida.	<i>Alstroemeria diluta</i> subsp. Diluta: Rango de Distribución restringida entre La Estrella (34°15' S) Región de O'Higgins, hasta Cauquenes (36°00') en

Id	Singularidad	Observación
		la Región del Maule, por la costa y la depresión central, entre 0 y 300 m (Muñoz & Moreira, 2003).
5	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	En el área de influencia del Proyecto no se existieron registros de especies en o próxima al límite de distribución geográfica.
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	En el área de influencia del Proyecto no se registró especies en o próxima al límite altitudinal de distribución.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.4 VEGETACIÓN

En términos vegetacionales, una gran parte del área de influencia está determinada por la presencia de una estructura de vegetación secundaria establecida luego de la intervención e influencia de las actividades humanas desarrolladas en el sector (pastoreo, cultivos agrícolas, otros), que en su conjunto incrementaron la fragmentación de la matriz de vegetación nativa en gran parte de esta zona geográfica en estudio.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la prospección realizada y la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área de influencia del Proyecto presenta una variedad de cuadros de vegetación, identificándose cinco (5) usos de suelo y 21 formaciones vegetales a través del área de Influencia del Proyecto en la Tabla 17 se aprecian las tipologías para los usos de suelo discriminados para el área de influencia.

Tabla 17. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)

ID	Uso de Suelo	Sup. (ha)	ID	Formación vegetal	Sup. (ha)	Porcentaje (%)
1	Área Urbana o Industrial	4,29	1	-	4,29	0,4
2	Bosque nativo	295,80	2	Bosque nativo <i>Acacia caven</i>	235,63	21,5
			3	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	19,01	1,7
			4	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	1,59	0,1

ID	Uso de Suelo	Sup. (ha)	ID	Formación vegetal	Sup. (ha)	Porcentaje (%)
			5	Bosque Nativo de <i>Peumus boldus</i>	2,44	0,2
			6	Bosque Nativo de <i>Peumus boldus</i> y <i>Acacia caven</i>	37,14	3,4
3	Cuerpos de agua	1,75	7	-	1,75	0,2
4	Plantación	38,25	8	Plantación forestal <i>Pinus radiata</i>	38,25	3,5
5	Praderas y Matorrales	758,29	9	Matorral arborescente <i>Baccharis salicifolia</i> y <i>Acacia caven</i>	10,63	1,0
			10	Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Acacia caven</i>	35,25	3,2
			11	Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Trevoa quinquenervia</i> y <i>Acacia caven</i>	7,74	0,7
			12	Matorral arborescente <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Acacia caven</i>	16,15	1,5
			13	Matorral arborescente <i>Trevoa quinquenervia</i> y <i>Acacia caven</i>	3,92	0,4
			14	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i>	0,15	0,0
			15	Matorral de <i>Trevoa quinquenervia</i>	8,65	0,8
			16	Matorral de <i>Trevoa quinquenervia</i> y <i>Retanilla trinervia</i>	1,54	0,1

ID	Uso de Suelo	Sup. (ha)	ID	Formación vegetal	Sup. (ha)	Porcentaje (%)
			17	Pradera con árboles de <i>Avena barbata</i> y <i>Acacia caven</i>	521,03	47,4
			18	Pradera con árboles de <i>Bromus hordeaceus</i> y <i>Acacia caven</i>	34,78	3,2
			19	Pradera de <i>Avena barbata</i> y <i>Hypochaeris glabra</i>	9,97	0,9
			20	Pradera de <i>Bromus Hordaceum</i>	103,49	9,4
			21	Pradera de <i>Hypochaeris radicata</i>	5,00	0,5
	TOTAL	1098,38		TOTAL	1098,38	100,0

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

En términos cartográficos, las unidades homogéneas de vegetación permitieron segregar el área de influencia en cinco (5) unidades cartográficas (usos de suelo) las cuales se describen en síntesis a continuación, en función de la tipología definida para cada unidad, las formaciones de vegetación respectivas a las cuales representan, y su estructura y composición. Complementariamente, en el Apéndice B se exponen mayores antecedentes de las 21 unidades homogéneas. Es importante indicar que tanto los cuerpos de agua (correspondiente a Estero Los Coipos) como áreas descritas como Áreas urbanas e industriales (correspondientes a caminos y algunos galpones de acumulación agrícola) no se presentan en detalle a continuación dada la ausencia de estructuras vegetacionales naturales que requieran de un mayor análisis en términos de evaluación ambiental.

5.4.1 Descripción de las unidades homogéneas (formación de vegetación)

Bosque nativo

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies arbóreas que según la ubicación dominan unas especies sobre otras formando un mosaico homogéneo. El estrato Leñoso alto de este tipo de ambiente está constituido en su mayoría por árboles *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus*. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 25-50%, encontrándose generalmente uno (1) a dos (2) estratos 2-4 y 4-8 m, dependiendo del grado de las unidades que se observaron.

En lo que respecta al estrato arbustivo, éste solo se hace presente en forma de conglomerados o manchones en algunos sectores de las unidades donde las entidades de mayor relevancia son *Retanilla trinervia*, *Trevoa quinquenervia*, *Baccharis chilensis*, entre otros, los porcentajes de cobertura no sobrepasan el 10% en las mejores situaciones, las alturas del estrato se encuentran entre 1-2 m.

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por *Avena barbata*, *Hypochaeris radicata*, *Lolium perenne*, *Briza minor*, entre otros. Los porcentajes de coberturas se encuentran entre 25-50% promedio habiendo sectores con mayores coberturas y otros con menor cobertura.

En términos generales, las unidades de Bosque descritas se sitúan en espacios con terrenos planos y lomajes 0-30%, mostrando un mosaico de especies en estado fitosanitario intermedio a sano.

De acuerdo con su definición cartográfica, estas zonas están representadas en las unidades N°2 (Bosque Nativo de *Acacia caven*), N°3 (Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*), N°4 (Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*), N°5 (Bosque nativo de *Peumus boldus*) y N°6 (Bosque Nativo de *Peumus boldus* y *Acacia caven*) de la COT (Apéndice B). Es importante mencionar que en este tipo de estructura de vegetación será una de las áreas de mayor utilización después de las áreas cubiertas por Praderas y Matorrales para el emplazamiento de las obras y partes del Proyecto. En la Fotografía 1 se puede apreciar las distintas unidades de bosques definidas para el área de influencia

A continuación, se describen las unidades identificadas en el proyecto.

- **Bosque Nativo de *Acacia caven*:** formación dominante del área de influencia, tiene una superficie de 235.63 ha. y la formación está dominada por *Acacia caven*, con una densidad que fluctúa entre 220 y 1540 ind/ha, siendo la densidad promedio 571 ind/ha. La cobertura absoluta de esta formación es del 40% en promedio. Los puntos de muestreo asociados a esta formación vegetal son: PM009, PM016, PM019, PM041, PM043, PM045, PM048, PM049, PM050, PM051, PM053, PM055, PM057, PM058, PM061, PM062, PM065, PM068, PM069, PM071, PM073, PM081, PM082, PM084, PM087, PM113, PM117, PM119, PM121, PM122, PM123, PM124, PM125, PM126, PM128, PM129, PM130, PM131, PM142, PM143, PM146 y PM148.
- **Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*:** formación con una superficie de 19,01 ha. cuyas especies dominantes son *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. Su densidad promedio es de 560 ind/ha y tiene una cobertura absoluta promedio de 26,2%. Los puntos asociados a esta formación son PM138 y PM152.
- **Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*:** unidad dominada por *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*, con una superficie de 1,59 ha. esta formación tiene una densidad de 240 ind/ha y una cobertura absoluta de 44,3%. Se encuentra representada por el punto de muestreo el PM110.
- **Bosque Nativo de *Peumus boldus*:** esta formación tiene 2,44 há de superficie dominada principalmente por *Peumus boldus*. Tiene una densidad que varía entre 160

y 300 ind/ha, siendo el promedio de la densidad 230 ind/ha. Su obertura absoluta es de 43.6% y los puntos de muestreo de esta formación corresponden a PM020 y PM022.

- **Bosque Nativo de *Peumus boldus* y *Acacia caven*:** formación vegetacional con una superficie de 37,14 ha. con *Peumus boldus* y *Acacia caven* como especies dominante de la unidad. La densidad fluctúa entre 420 y 740 ind/ha, y el promedio es de 580 ind/ha. La cobertura absoluta corresponde a 42,6%. Esta unidad se encuentra representada por los puntos de muestreo PM042, PM044, PM046, PM047, PM066, PM095, PM140, PM145 y PM147.

Fotografía 1. Bosques Nativos





Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021

En términos de singularidad, en estas unidades se identificaron cinco (5) especies en Categoría de Conservación Oficial, lo que se muestra en la Tabla 18.

Tabla 18. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Bosque nativo

Nombre científico	MMA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense	Preocupación Menor (LC) Chile continental DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA

Nombre científico	MMA
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	Preocupación menor (LC) DS 41/2011 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2022

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla:

Tabla 19. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Nativo

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	3	<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Nasella sp.</i>	1
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	p	<i>Conanthera parvula</i>	+	<i>Petrorhagia dubia</i>	+
<i>Adiantum excisum</i>	+	<i>Conanthera trimaculata</i>	+	<i>Peumus boldus</i>	2
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>	+	<i>Convolvulus arvensis</i>	3	<i>Piptochaetium bicolor</i>	+
<i>Agrostis capillaris</i>	+	<i>Daucus carota</i>	+	<i>Plantago hispidula</i>	+
<i>Aira caryophyllea</i>	+	<i>Dichondra sericea</i>	+	<i>Poa annua</i>	1
<i>Alstroemeria diluta</i> subsp. <i>diluta</i>	p	<i>Echinopsis chiloensis</i>	+	<i>Proustia cuneifolia</i>	2
<i>Anthemis cotula</i>	+	<i>Echium vulgare</i>	1	<i>Puya sp.</i>	+
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	+	<i>Erodium cicutarium</i>	+	<i>Quillaja saponaria</i>	3
<i>Anthoxanthum utriculatum</i>	+	<i>Euphorbia peplus</i>	+	<i>Raphanus sativus</i>	+
<i>Anthriscus caucalis</i>	+	<i>Galega officinalis</i>	+	<i>Retanilla trinervia</i>	1
<i>Avena barbata</i>	3	<i>Galium aparine</i>	+	<i>Rosa rubiginosa</i>	+
<i>Baccharis salicifolia</i>	1	<i>Hirschfeldia incana</i>	+	<i>Rostraria cristata</i>	+
<i>Berberis actinacantha</i>	+	<i>Hordeum murinum</i>	2	<i>Rostraria cristata</i>	+
<i>Berberis chilensis</i>	+	<i>Hypochaeris radicata</i>	3	<i>Rubus ulmifolius</i>	1
<i>Brassica rappa</i>	+	<i>Juncus sp.</i>	+	<i>Rumex crispus</i>	+
<i>Briza minor</i>	+	<i>Juncus tenuis</i> Willd. var. <i>Tenuis</i>	+	<i>Sanicula crassicaulis</i>	+

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Bromus berterioanus</i>	+	<i>Lectuca serriola</i>	+	<i>Schizanthus pinnatus</i>	+
<i>Bromus hordaceum</i>	3	<i>Leontodon saxatilis</i>	1	<i>Sisyrinchium chilense</i>	+
<i>Bromus hordeaceus</i>	2	<i>Lepidium sp.</i>	+	<i>Solanum chenopodioides</i>	+
<i>Bromus sp.</i>	1	<i>Lithraea caustica</i>	1	<i>Taraxacum officinale</i>	1
<i>Calceolaria sp</i>	+	<i>Loasa placei</i>	+	<i>Tenandrium dulce</i>	+
<i>Cardionema ramosissima</i>	+	<i>Loasa sp.</i>	+	<i>Trevoa quinquenervia</i>	2
<i>Carduus pycnocephalus</i>	1	<i>Lolium multiflorum</i>	1	<i>Trevoa quinquenervia</i>	1
<i>Carthamus lanatus</i>	1	<i>Lolium perenne</i>	1	<i>Trifolium campestre</i>	1
<i>Centaurium cachanlahuen</i>	+	<i>Marrubium vulgare</i>	+	<i>Triptilion spinosus</i>	+
<i>Cestrum parqui</i>	1	<i>Matricaria camomilla</i>	+	<i>Vicia sativa</i>	+
<i>Chaetanthera ciliata</i>	1	<i>Matricaria chamomilla</i>	1	<i>Vulpia bromoides</i>	1
<i>Cirsium vulgare</i>	+	<i>Maytenus boaria</i>	1	<i>Vulpia myuros</i>	+
<i>Clarkia tenella</i>	+	<i>Medicago sp</i>	1	<i>Wahlenbergia linarioides</i>	+
<i>Conanthera bifolia</i>	+	<i>Medicago sp.</i>	+		

Fuente: Elaboración Propia, 2022.


Plantación Forestal

Las unidades descritas como Plantaciones forestales se basan principalmente en sectores donde está establecido el monocultivo de *Pinus radiata*, existiendo algunos individuos distintos que acompañan, pero de manera aislada o con muy baja participación de cobertura.

Estos ambientes se desarrollan en terrenos con pendientes 10-30%, exhibiendo por lo general un estado fitosanitario intermedio a sano (Fotografía 2). En cuanto a las singularidades de estas unidades, es posible indicar que estos ambientes no representan áreas de importancia vegetal ni tampoco determinan áreas de alta naturalidad dado la estructura que presentan. Finalmente, en esta unidad no se identificaron especies de plantas en categoría de conservación y la tipología está representada en la unidad N°8 (Plantación forestal *Pinus radiata*) de la COT (Apéndice B).

Esta formación vegetal esta dominada por *Pinus radiata* y tiene una superficie de 38,25 ha. Tiene una densidad de fluctúa entre 760 y 4700¹⁴ ind/ha, siendo la densidad estándar de una plantación manejada 750 ind/ha, con una cobertura absoluta de 52%. Los puntos asociados a esta formación son: PM027, PM028, PM029, PM031, PM032, PM033, PM034, PM035, PM036 y PM150.

Fotografía 2. Plantación Forestal



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla 20:

Tabla 20. Abundancia relativa asociada a la formación Plantación forestal

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	+	<i>Hypochaeris radicata</i>	1

¹⁴ En casos donde se idéntica incendios forestales, donde se genera un rebrote de plantación. Nose observa manejo forestal

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Aira caryophyllea</i>	+	<i>Lapsana communis</i>	+
<i>Avena barbata</i>	2	<i>Lithraea caustica</i>	+
<i>Berberis chilensis</i>	p	<i>Logfia gallica</i>	+
<i>Briza minor</i>	+	<i>Maytenus boaria</i>	p
<i>Bromus hordaceum</i>	1	<i>Oxalis micrantha</i>	+
<i>Calceolaria sp</i>	+	<i>Peumus boldus</i>	p
<i>Conanthera bifolia</i>	+	<i>Pinus radiata</i>	5
<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Pseudonaphallium cheiranthifolium</i>	+
<i>Conanthera parvula</i>	+	<i>Schizanthus pinnatus</i>	+
<i>Epilobium sp.</i>	+	<i>Solanum sp.</i>	+
<i>Erygeron sp.</i>	+	<i>Sonchus asper</i>	1
<i>Escallonia reboluta</i>	p	<i>Spergularia rubra</i>	+
<i>Gamochaeta sp.</i>	+	<i>Vulpia bromoides</i>	1
<i>Gamochaeta subfalcata</i>	+		

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Matorral arborescente

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies arbustivas que en su conjunto forman un mosaico homogéneo. El estrato Leñoso bajo se encuentra compuesto principalmente por las siguientes especies arbustivas *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa*, *Baccharis salicifolia*, *Retanilla trinervia*, *Trevoa quinquenervia*, entre otros. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 25-50%, encontrándose generalmente en un (1) estrato 1-2 m.

En lo que respecta al estrato arbóreo, éste solo se hace presente en forma de conglomerados o manchones en algunos sectores de las unidades donde las entidades de mayor relevancia son *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, los porcentajes de cobertura se encuentran entre 10-25%, las alturas del estrato se encuentran entre 2-4 y 4-8 m.

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por *Avena barbata*, *Hypochaeris radicata*, *Lolium multiflorum*, *Briza minor*, entre otros. Los porcentajes de coberturas se encuentran entre 50-75% promedio habiendo sectores con mayores coberturas y otros menos.

En términos generales, las unidades de Matorral arborescente descritas se sitúan en espacios con terrenos de lomajes que van 0-15%.

Como resultado de la prospección realizada, se pueden definir las siguientes formaciones asociadas a este recubrimiento:

- Matorral Arborescente de *Baccharis salicifolia* y *Acacia caven* con una superficie de 10,63ha. Los puntos asociados a esta formación son PM013, PM149 y PM151.
- Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia* y *Acacia caven* con una superficie de 35,2h ha. Los puntos asociados a esta formación son PM037, PM063 y PM067.
- Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia*, *Trevoa quinquinervia* y *Acacia caven* con una superficie de 7,74 ha. Los puntos asociados a esta formación son PM093, PM 132 y PM134.
- Matorral Arborescente de *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y *Acacia caven* con una superficie de 16,15 ha. Los puntos asociados a esta formación son PM008 y PM136.
- Matorral Arborescente de *Trevoa quinquinervia* y *Acacia caven* con una superficie de 3,92 ha. El punto asociado a esta formación es PM153.

Fotografía 3. Matorral arborescente





Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021.

En términos de singularidad, en estas unidades se identificaron dos (2) especies en Categoría de Conservación Oficial, lo que se muestra en la Tabla 21.

En lo que respecta a su definición cartográfica, estas zonas están representadas en las unidades N°9 (Matorral arborescente *Baccharis salicifolia* y *Acacia caven*), N°10 (Matorral arborescente *Retanilla trinervia* y *Acacia caven*), N°11 (Matorral arborescente *Retanilla trinervia*, *Trevoa quinquenervia* y *Acacia caven*), N°12 (Matorral arborescente *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y *Acacia caven*) y N°13 (Matorral arborescente *Trevoa quinquenervia* y *Acacia caven*) de la COT (Apéndice B). En la Fotografía 3 se puede apreciar las distintas unidades de Matorrales arborescentes definidas para el área de influencia.

Tabla 21. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Matorral arborescente

Nombre científico	MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	Preocupación menor (LC) DS 41/2011 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla 22.

Tabla 22. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	1	<i>Hordeum murinum</i>	+
<i>Aira caryophyllea</i>	+	<i>Hypochaeris radicata</i>	1
<i>Alstroemeria ligtu</i>	r	<i>Lolium multiflorum</i>	+
<i>Avena barbata</i>	3	<i>Matricaria chamomilla</i>	2
<i>Baccharis linearis</i>	+	<i>Maytenus boaria</i>	p
<i>Baccharis salicifolia</i>	1	<i>Nasella sp.</i>	+
<i>Berberis chilensis</i>	+	<i>Peumus boldus</i>	1
<i>Briza minor</i>	+	<i>Plantago hispidula</i>	+
<i>Bromus hordaceum</i>	2	<i>Quillaja saponaria</i>	2
<i>Caetantheta ciliata</i>	+	<i>Retanilla trinervia</i>	2
<i>Carthamus lanatus</i>	1	<i>Rosa rubiginosa</i>	2
<i>Centaurium cachinalen</i>	+	<i>Rubus ulmifolius</i>	2
<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Dichondra sericea</i>	+	<i>Taraxacum officinale</i>	+
<i>Dioscorea sp.</i>	+	<i>Trevoa quinquinervia</i>	2
<i>Echinopsis chiloensis</i>	+	<i>Verbascum thapsus</i>	+
<i>Echium vulgare</i>	2		

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Matorral

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies arbustivas que según la ubicación dominan unas especies sobre otras formando un mosaico homogéneo. El estrato Leñoso bajo de este tipo de ambientes está constituido en

su mayoría por árboles *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa*, *Proustia cuneifolia*, *Retanilla trinervia*, *Trevoa quinquenervia*, entre otros. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 25-50%, encontrándose generalmente en un (1) estrato 2-4 m.

En lo que respecta al estrato arbóreo, el cubrimiento es escaso (<5%) presentando individuos aislados a través de las formaciones, las especies que destacan son *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*, las alturas del estrato se encuentran entre 2-4 m.

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por *Avena barbata* e *Hypochaeris radicata*, entre otros. Los porcentajes de coberturas se encuentran entre 50-75% promedio habiendo sectores con mayores coberturas y otros menos.

Fotografía 4. Matorral



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021.

En términos de singularidad, en estas unidades se identificó una (1) especie en Categoría de Conservación Oficial, lo que se muestra en la Tabla 23.

En lo que respecta a su definición cartográfica, estas zonas están representadas en las unidades N° 14 (Matorral de *Proustia cuneifolia*), N° 15 (Matorral de *Trevoa quinquenervia*) y N° 16 (Pradera con árboles de *Avena barbata* y *Acacia caven*) de la COT (Apéndice B). En la Fotografía 4 se puede apreciar las distintas unidades de Matorrales arborecentes definidas para el área de influencia.

Tabla 23. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Matorral

Nombre científico	MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla:

Tabla 24. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	1	<i>Juncus sp.</i>	+
<i>Adesmia sp.</i>	+	<i>Leontodon saxatilis</i>	1
<i>Alstroemeria sp.</i>	+	<i>Melica sp.</i>	+
<i>Avena barbata</i>	3	<i>Petrorhagia dubia</i>	+
<i>Chaetanthera ciliata</i>	+	<i>Proustia cuneifolia</i>	2
<i>Chaetanthera sp</i>	1	<i>Quillaja saponaria</i>	p
<i>Cirsium vulgare</i>	+	<i>Retanilla trinervia</i>	3
<i>Conanthera bifolia</i>	+	<i>Rosa rubiginosa</i>	p
<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Rubus ulmifolius</i>	p
<i>Conanthera trimaculata</i>	+	<i>Stenandrium dulce</i>	+
<i>Cryptantha sp.</i>	+	<i>Taraxacum officinale</i>	1
<i>Erodium cicutarium</i>	+	<i>Trevoa quinquenervia</i>	2
<i>Hypochaeris radicata</i>	4	<i>Triptilion spinosum</i>	+

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Pradera con árboles

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies herbáceas que según la ubicación dominan unas especies sobre otras formando un mosaico homogéneo. El estrato herbáceo de este tipo de ambientes está constituido en su mayoría por especies como *Avena barbata*, *Hypochaeris radicata*, entre otros. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 50-75%, encontrándose generalmente en un (1) estrato 0,5-1 m.

En lo que respecta al estrato arbóreo, el cubrimiento es muy claro 10-25% donde destacan especies como *Acacia caven*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*, las alturas del estrato se encuentran entre 2-4 m.

El estrato leñoso bajo está compuesto por individuos aislados principalmente por *Baccharis linearis*, *Berberis actinacantha*, *Berberis darwinii*, *CEstrum parqui*, *Trevoa quinquenervia*, entre otros. Los porcentajes de coberturas se encuentran entre 1-5% promedio.

Fotografía 5. Praderas con árboles



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021.

En términos de singularidad, en estas unidades se identificaron cinco (5) especies en Categoría de Conservación Oficial, lo que se muestra en la Tabla 25

En lo que respecta a su definición cartográfica, estas zonas están representadas en las unidades N° 17 (Pradera con árboles de *Avena barbata* y *Acacia caven*) y N° 18 (Pradera con árboles de *Bromus hordeaceus* y *Acacia caven*) de la COT (Apéndice B). En la Fotografía 5 se puede apreciar las distintas unidades de Praderas con árboles definidas para el área de influencia.

Tabla 25. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Pradera con árboles

Nombre científico	MMA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr. Bayer subsp. <i>diluta</i>	En Peligro (EN) [<i>Alstroemeria diluta</i> var. <i>diluta</i>] DS 13/2013 MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	Preocupación menor (LC) DS 41/2011 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la Tabla 26:

Tabla 26. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera con árboles

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	1	<i>Echium plantagineum</i>	+
<i>Adiantum excisum</i>	p	<i>Erodium cicutarium</i>	+
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>	p	<i>Hordeum murinum</i>	+
<i>Aira caryophyllea</i>	2	<i>Hypochaeris radicata</i>	2
<i>Alstroemeria diluta</i> subsp. <i>diluta</i>	p	<i>Juncus</i> sp.	+
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	+	<i>Leontodon saxatilis</i>	1
<i>Avena barbata</i>	4	<i>Loasa</i> sp.	+
<i>Baccharis linearis</i>	+	<i>Lolium multiflorum</i>	2
<i>Berberis actinacantha</i>	p	<i>Lolium perenne</i>	1
<i>Berberis darwinii</i>	+	<i>Marrubium vulgare</i>	+

Espece	Abundancia relativa	Espece	Abundancia relativa
<i>Bromus hordeaceus</i>	2	<i>Matricaria camomilla</i>	+
<i>Caetantheta ciliata</i>	+	<i>Oenothera acaulis</i>	p
<i>Caetantheta microphylla</i>	+	<i>Petrorhagia dubia</i>	+
<i>Calceolaria sp</i>	+	<i>Peumus boldus</i>	1
<i>Carduus pycnocephalus</i>	+	<i>Quillaja saponaria</i>	p
<i>Carthamus lanatus</i>	+	<i>Retanilla trinervia</i>	p
<i>Centaurium cachanlahuen</i>	+	<i>Rosa rubiginosa</i>	+
<i>Cestrum parqui</i>	+	<i>Rubus ulmifolius</i>	+
<i>Chaetanthera ciliata</i>	+	<i>Sanicula crassicaulis</i>	p
<i>Chaetanthera liniaris</i>	+	<i>Silene gallica</i>	+
<i>Cheilanthes sp</i>	+	<i>Silybum marianum</i>	+
<i>Cirsium vulgare</i>	+	<i>Solanum chenopodioides</i>	+
<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Stenandrium dulce</i>	+
<i>Conanthera trimaculata</i>	+	<i>Taraxacum officinale</i>	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	+	<i>Trevoa quinquenervia</i>	1
<i>Croton setiger</i>	+	<i>Triptilion spinosus</i>	+
<i>Echinopsis chiloensis</i>	p		

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Pradera

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies herbáceas que según la ubicación dominan unas especies sobre otras formando un mosaico homogéneo. El estrato herbáceo de este tipo de ambientes está constituido en su mayoría por especies como *Avena barbata*, *Bromus hordaceum*, *Bromus rigidus*, *Hypochaeris radicata*, entre otros. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 50-75%, encontrándose generalmente en un (1) estrato 0,5-1 m.

Esta tipología se determinó para un ambiente en el cual existe cobertura escasa (<5%) para el estrato Leñoso alto destacando *Acacia caven* y el estrato leñoso bajo se encuentra ausente.

Fotografía 6. Pradera



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021.

En términos de singularidad, en estas unidades se identificó una (1) especie en Categoría de Conservación Oficial, lo que se muestra en la Tabla 27.

En lo que respecta a su definición cartográfica, estas zonas están representadas en las unidades N° 19 (Pradera de *Avena barbata* y *Hypochaeris glabra*), N° 20 (Pradera de *Bromus Hordaceum*)y N° 21 (Pradera de *Hypochaeris radicata*) de la COT (Apéndice B). En la

Fotografía 6 se puede apreciar las distintas unidades de Praderas con árboles definidas para el área de influencia.

Tabla 27. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Pradera

Nombre científico	MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla 28:

Tabla 28. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	1	<i>Juncus sp.</i>	+
<i>Aira caryophyllea</i>	2	<i>Leontodon saxatilis</i>	1
<i>Amsimckia calycina</i>	+	<i>Lepidium sp.</i>	+
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	+	<i>Lithraea caustica</i>	1
<i>Avena barbata</i>	1	<i>Loasa placei</i>	+
<i>Brassica rappa</i>	+	<i>Lolium multiflorum</i>	2
<i>Briza minor</i>	+	<i>Lolium perenne</i>	+
<i>Bromus hordaceum</i>	4	<i>Malva sp.</i>	1
<i>Bromus rigidus</i>	3	<i>Matricaria camomilla</i>	+
<i>Bromus sp.</i>	1	<i>Matricaria chamomilla</i>	+
<i>Carduus pycnocephalus</i>	+	<i>Maytenus boaria</i>	1
<i>Carthamus lanatus</i>	1	<i>Medicago sp.</i>	+
<i>Centaurea melitensis</i>	+	<i>Peumus boldus</i>	1
<i>Cestrum parqui</i>	+	<i>Pinus radiata</i>	+
<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Retanilla trinervia</i>	+

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Convolvulus arvensis</i>	4	<i>Rostraria cristata</i>	+
<i>Dactylis glomerata</i>	+	<i>Sylibum marianum</i>	+
<i>Echium vulgare</i>	+	<i>Taraxacum officinale</i>	1
<i>Erodium cicutarium</i>	+	<i>Trifolium sp.</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	+	<i>Vicia sativa</i>	+
<i>Hordeum murinum</i>	+	<i>Vulpia bromoides</i>	1
<i>Hypochaeris radicata</i>	3	<i>Vulpia myuros</i>	+

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

5.5 DETERMINACIÓN DE APLICABILIDAD DE PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

5.5.1 DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFITICAS (PAS 151)

De acuerdo, con estipulado en el artículo 2°, numeral 14 de la Ley N°20.283 descrito anteriormente en la metodología y acorde a la ubicación geográfica del Área de Influencia del Proyecto, ninguna de las formaciones vegetales encontradas y descritas correspondería a formaciones xerofíticas, dado que no cumple con el número mínimo de densidad de individuos arbustivos o suculentos por hectárea, se puede observar en la Tabla 29 el resumen de las parcelas efectuadas en las formaciones de Matorral arborescente y Matorral con el registro de las especies listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

Tabla 29. Inventario de especies listadas en el DS N°68 de 2008 del Ministerio de Agricultura

Especies	Parcelas								
	PM008	PM013	PM037	PM080	PM093	PM099	PM100	PM114	PM127
<i>Acacia caven</i>	1	1	1	2	5	1	1	1	1
<i>Baccharis linearis</i>	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<i>Berberis chilensis</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Echinopsis chiloensis</i>	-	-	1	-	1	-	-	-	-
<i>Lithraea caustica</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Especies	Parcelas								
	PM008	PM013	PM037	PM080	PM093	PM099	PM100	PM114	PM127
<i>Maytenus boaria</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Peumus boldus</i>	-	1	1	-	-	-	-	-	-
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Total general	3	3	5	3	7	1	1	1	2
ind/ha	60	60	100	60	140	20	20	20	40


Fuente: Elaboración Propia, 2022.

5.5.2 DETERMINACIÓN DE PLANTACIONES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL

En el área de Influencia del proyecto se identificó el recubrimiento de suelo asociado a plantaciones forestales, específicamente, (1) formación vegetal dominada por una Plantación de *Pinus radita*. Dicha formación vegetal abarca una superficie de 38,25 ha correspondiente al 3,5% del Área de influencia del Proyecto (Figura 8).

De este recubrimiento, y de acuerdo con las obras y partes del Proyecto, 0,86 hectáreas serán afectas a corta, por lo que será necesario la presentación del permiso ambiental sectorial (PAS)149, para plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal.

Figura 8. Ubicación espacial de las unidades de Plantaciones forestales a intervenir en el Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia, 2022.

5.5.3 DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL


En el Área de Influencia del proyecto se identifican cinco (5) formaciones vegetales

Figura 9 ,correspondientes a Bosque nativo de *Acacia caven* (234,54 ha; 21,3%), Bosque nativo de *Acacia caven* y *Maytenus boaria* (19,01 ha; 1,7%), Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria* (1,59 ha; 0,1%), Bosque Nativo de *Peumus boldus* (2,43 ha; 0,2%) y Bosque nativo de *Peumus boldus* y *Acacia caven* (37,11 ha; 3,4%) que juntos suma una superficie de 294,69 ha que corresponde al 26,7% del Área de Influencia del Proyecto, cuyas unidades cartográficas son N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6 respectivamente.

De estas formaciones, 167,78 hectareas se encuentran afectas al permiso ambiental sectorial “Plan de manejo corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles (Para efectos del Art. 21°, Ley N° 20.283)”. Esto, a través de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N° 148 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Complementando la información de las superficies a intervenir, el Proyecto se puede dividir en área de generación, en donde irán los Paneles Fotovoltaicos, y la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE). Se consideran Obras asociadas al área de generación los Centros de Transformación, la Interconexión de Polígonos (eléctrica y de caminos), Seguidores, Zona de Acopio Materiales, Instalaciones de Faenas y la Zona de Subestación Elevadora. Mientras que, para la Línea de Transmisión Eléctrica las obras asociadas son los Caminos de Acceso a las Torres y la Servidumbre de cada Torre. Las superficies a intervenir por tipo de Obra se detallan en la Tabla 30 y Apéndice B asociado al formulario del Plan de Manejo Forestal asociado a obras civiles de acuerdo a lo estipulado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Figura 9. Ubicación espacial de las unidades de bosque nativo a intervenir en el Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Tabla 30. Resumen de superficies del área de influencia afectas por las obras

Obras	Sup (ha)	Uso de Suelo	Sup. (ha)	Formaciones vegetacionales	Sup. (ha)
Áreas de generación, Interconexión Polígonos, Zona Faenas, Zona Subestación Elevadora	515,5	Área Urbana o Industrial	1,56	-	1,56
		Bosque nativo	163,81	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	147,11
				Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	12,91
				Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	1,58
				Bosque Nativo de <i>Peumus boldus</i> y <i>Acacia caven</i>	2,21
		Cuerpo de agua	0,53	-	0,53
		Praderas y Matorrales	510,05	Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Acacia caven</i>	27,46
				Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Trevoa quinquenervia</i> y <i>Acacia caven</i>	7,74
				Matorral arborescente <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Acacia caven</i>	11,71
				Matorral arborescente <i>Trevoa quinquenervia</i> y <i>Acacia caven</i>	3,92
				Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i>	0,15

Obras	Sup (ha)	Uso de Suelo	Sup. (ha)	Formaciones vegetacionales	Sup. (ha)
				Matorral de <i>Trevoa quinquenervia</i>	8,65
				Matorral de <i>Trevoa quinquenervia</i> y <i>Retanilla trinervia</i>	1,54
				Pradera con árboles de <i>Avena barbata</i> y <i>Acacia caven</i>	440,08
				Pradera de <i>Avena barbata</i> y <i>Hypochaeris glabra</i>	8,8
Subtotal	515,5	Subtotal	675,95	Subtotal	675,95
Accesos y Servidumbre Torres	13,97	Área Urbana o Industrial	0,08	-	0,08
		Bosque nativo	3,98	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	2,86
				Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	0,05
				Bosque Nativo de <i>Peumus boldus</i>	0,12
				Bosque Nativo de <i>Peumus boldus</i> y <i>Acacia caven</i>	0,95
		Plantación Forestal	0,86	Plantación Forestal <i>Pinus radiata</i>	0,86
		Praderas y matorrales	9,19	Matorral arborescente <i>Baccharis salicifolia</i> y <i>Acacia caven</i>	0,14

Obras	Sup (ha)	Uso de Suelo	Sup. (ha)	Formaciones vegetacionales	Sup. (ha)
				Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Acacia caven</i>	0,22
				Matorral arborescente <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Acacia caven</i>	0,02
				Pradera con árboles de <i>Avena barbata</i> y <i>Acacia caven</i>	3,22
				Pradera con árboles de <i>Bromus hordeaceus</i> y <i>Acacia caven</i>	1,27
				Pradera de <i>Bromus Hordaceum</i>	4,26
				Pradera de <i>Hypochaeris radicata</i>	0,06
Subtotal	13,97	Subtotal	14,11	Subtotal	14,11
Total	529,47	Total	690,06	Total	690,06

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

5.6 ANTECEDENTES RELATIVOS A LA SINGULARIDAD DE LA VEGETACIÓN

De acuerdo con los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020), en lo que respecta a las características intrínsecas que presenta la vegetación nativa presente en el área de influencia, y que, por consecuencia, determina un grado de singularidad ambiental a un área en particular, es posible señalar que no existen aspectos y valores específicos de acuerdo con la estructura vegetal existente a destacar, lo cual se ve reflejado en la Tabla 31.

Tabla 31. Análisis de singularidades

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales naturales únicas o de baja representatividad.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales relictuales. Conforme a lo anterior, el proyecto no intervendrá formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales remanentes.
4	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
5	Presencia de formaciones vegetales reliquias, únicas, escasas o de baja representatividad nacional, o bien, presencia de bosques nativos de preservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.	Si bien se identifican especies listadas en el D.S 68/2009, estas no se encuentran constituyendo formaciones xerófitas. Adicionalmente, la especie <i>Alstroemeria diluta</i> var. <i>diluta</i> que se encuentra en En Peligro DS 13/2013 MMA se encontró en la formación de pradera con árboles de <i>Avena barbata</i> con <i>Acacia caven</i> , por lo tanto, esta no conforman Bosque nativo de preservación.
6	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales; en o colindante con áreas bajo protección oficial; en o colindante con áreas protegidas privadas; en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	El Proyecto se ubica cercano dos (2) sitios prioritarios Matorral Esclerófilo de Villa Prat y Altos de Lolol y Chépica que se encuentran a 2,2 y 3,1 km de distancia respectivamente. (Tabla 32; Figura 10 10).

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
7	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
8	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área protegida privada.
9	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	El Proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
10	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	El Proyecto no se localiza en o colindante a glaciares.
11	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	El Proyecto no se localiza en áreas de humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
12	Presencia de un ecosistema amenazado.	El Proyecto no se localiza en áreas cercanas de ecosistemas amenazados.
13	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	El Proyecto se ubica en áreas con alta degradación y fragmentación de los bosques naturales presentando un alto nivel de intervención antrópica.


Fuente: Elaboración propia, 2022.

Tabla 32. Distancias de Áreas de Protección Oficial en relación con el área de influencia

Tipo	Nombre	Distancia hacia proyecto (km)
Sitio prioritario	ALTOS DE LOLOL Y CHÉPICA	3,1
Sitio prioritario	BOSQUES DE RAUIL Y HUALO DE CUREPTO	16,4
Sitio prioritario	MATORRAL ESCLERÓFILO DE VILLA PRAT	2,2
Sitio prioritario	HUAQUÉN	12,5

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 10. Ubicación de Sitios Prioritarios en relación con el Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2022.

6 CONCLUSIONES

Luego de la prospección dentro del área de influencia, se identificaron 5 tipos de uso de suelos, los que corresponden a Área urbana e industrial (4,29 ha; 0,4%), Bosques Nativos (294,68 ha; 26,7%), Cuerpos de agua (1,74 ha; 0,2%), Plantación forestal (38,26 ha; 3,5%) Praderas y Matorrales (764,32 ha; 69,3%) las que se subdividen en 21 formaciones vegetales, siendo las formaciones asociadas al recubrimiento Praderas las más abundantes en superficie cubierta, con un 61,6% del Área de influencia.

En relación con la riqueza de la flora vascular registrada en el área de influencia, se identificaron 157 tasas de plantas vasculares. De estas, nueve (9) se encuentran en Categoría de Conservación Oficial, ocho (8) de ellas en categoría de Preocupación menor (LC) y una En Peligro (EN). Respecto al origen geográfico, un 48,4% de las especies son introducidas, seguidos de las especies nativas con un 31,2% y endémicas con un 20,4%. Esto, concurda con el grado de antropización identificada en el área, al quedar sistemas silvopastoriles rodeando cultivos agrícolas y áreas urbanas e industriales.

En virtud de las singularidades ambientales para el Área de Influencia del Proyecto, se determinó que no existen formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales remanentes; formaciones vegetales frágiles. Sí, se presenta dentro del área de influencia del Proyecto especies de distribución restringida o especies nativas cercanas a sus límites de distribución geográfica como el caso de *Alstroemeria diluta* subsp. *Diluta*.¹⁵

En virtud de las competencias de la CONAF en el marco de SEIA para el Área de Influencia del Proyecto, se determinó la presencia de Plantaciones forestales en terrenos APF y Bosque nativo. En el caso del recubrimiento plantación, y de acuerdo con las obras y partes del proyecto, 0,86 hectareas serán afectas a corta, por lo que será necesario la presentación del permiso ambiental sectorial PAS149, para plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal.

En el caso del recubrimiento de Bosque Nativo, 167,78 hectareas se encuentran afectas al permiso ambiental sectorial “Plan de manejo corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles (Para efectos del Art. 21º, Ley N° 20.283)”. Esto, a través de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N° 148 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Por otro lado, no existen cortinas cortaviento bonificadas, Bosques naturales de especies exóticas, Bosque nativo de preservación, Especies declaradas monumentos nacionales, árboles y/o arbustos aislados ubicados en zonas de protección, Formaciones xerófitas, Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283 ni Ecosistemas representados en el SNASPE, incluyendo sitios Ramsar.

¹⁵ Especie no afecta por las obras del Proyecto

Finalmente, el Área de Influencia del Proyecto se localiza o colinda con dos (2) sitios prioritarios Matorral Esclerófilo de Villa Prat y Altos de Lolol y Chépica que se ubican a 2,2 y 3,1 km de distancia respectivamente.

7 BIBLIOGRAFÍA

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.

Brady, N.C. & Weil, R.R. 2008. The nature and properties of soil, 14 ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

CONAF, 2021. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile al año 2020. Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales. 76 p.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 pp.

Etienne M. & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 117 p.

FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 p.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 165 p.

Godron M., Daget P., Emberger L., Long G., LE Floc'h E., Poissonet J., Sauvage C., Wacquant J.P., 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 1968. 293 p.

Luebert F. & Plischoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

Marticorena, C & Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. Vol. 42. Números 1-2. 157p.

Muñoz, M., Núñez, C., Hernán, N y Yáñez, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

MUÑOZ M & A MOREIRA (2003) Alstroemerias de Chile. Diversidad, distribución y conservación. Taller La Era, Santiago de Chile. 140 pp.

Plischoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Plischoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

Ramírez, C. & H. Figueroa 1985. Delimitación ecosociológica del bosque valdiviano (Chile) mediante análisis estadísticos multivariados. Studia Oecologica 6: 105-124.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez & O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre. 23 pp.

SAG, 2011. Pauta para estudios de suelo. 26 pp.

SEIA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

Teillier, S, Marticorena, A. Macaya, J. Bonnemaison C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen I. División Pteridophyta - Angiospermatophyta. 473 pp.

Teillier, S, Marticorena, A. Macaya, J. Bonnemaison C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen II. División Angiospermatophyta. 373 pp.

Teillier, S, Marticorena, A. Macaya, J. Bonnemaison C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen III. División Pteridophyta -Angiospermatophyta. 373 pp.

UICN 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

Zuloaga, 2009. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea: <http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>

SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENCIONES, LEYES Y DECRETOS

Decreto Supremo N°44/2021. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimo septimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2021. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N°16/2020. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2020. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N°29/2019. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, julio 2020. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2018. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

Decreto Supremo N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

Decreto Supremo N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.

Decreto Supremo N° 95/2002 del Ministerio secretaria general de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.

Decreto Supremo N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008.Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

8 APÉNDICES

8.1 APÉNDICE A. LISTADO FLORISTICO PROYECTO

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Acacia caven (Molina) Molina	Árbol	Nativa	-	Originaria
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	Adesmia sp	Arbusto	Nativa	-	-
3	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum	Adiantum chilense Kaulf. var. chilense	Hierba Perenne	Nativa	Preocupación Menor (LC) Chile continental DS 19/2012 MMA	-
4	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum	Adiantum chilense Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken	Hierba Perenne	Nativa	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA	-
5	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum	Adiantum excisum Kunze	Hierba Perenne	Endémica	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA	-
6	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum	Adiantum sulphureum Kaulf. var. sulphureum	Hierba Perenne	Nativa	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA	-
7	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Agrostis	Agrostis capillaris L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-

ANEXO 8.2 • FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO SOL DE CANOE

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
8	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Aira	Aira caryophyllea L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
9	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp. diluta	Hierba Perenne	Endémica	En Peligro (EN) [Alstroemeria diluta var. diluta] DS 13/2013 MMA	-
10	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria ligtu L. subsp. simsii (Spreng.) Ehr. Bayer	Hierba Perenne	Endémica	-	-
11	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria sp.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis	Anthemis arvensis L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis	Anthemis cotula L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
14	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Anthoxanthum	Anthoxanthum odoratum L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
15	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Anthoxanthum	Anthoxanthum utriculatum (Ruiz & Pav.) Y. Schouten & Veldkamp	Hierba Perenne	Nativa	-	-
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Anthriscus	Anthriscus caucalis M. Bieb.	Hierba Anual	Introducida	-	-

ANEXO 8.2 • FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO SOL DE CANOE

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
17	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Avena barbata Pott ex Link	Hierba Anual	Introducida	-	-
18	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Avena sp.	Hierba Anual	Introducida	-	-
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. linearis	Arbusto	Nativa	-	Originaria
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativa	-	-
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	Berberis actinacantha Mart.	Arbusto	Endémica	-	Originaria
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn. var. chilensis	Arbusto	Endémica	-	Originaria
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	Berberis darwinii Hook.	Arbusto	Nativa	-	Originaria
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	Brassica rapa L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
25	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Briza minor L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
26	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Bromus berterianus Colla	Hierba Anual	Nativa	-	-
27	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Bromus hordeaceus L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
28	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Bromus rigidus Roth	Hierba Anual	Introducida	-	-

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
29	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Bromus sp.	Hierba Anual	Introducida	-	-
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria sp	Hierba Perenne	Nativa	-	-
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Cardamine	Cardamine hirsuta L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Cardionema	Cardionema ramosissima (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carduus	Carduus pycnocephalus L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carthamus	Carthamus lanatus L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Centaurea	Centaurea melitensis L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
37	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianaceae	Centaurium	Centaurium cachanlahuen (Molina) B.L. Rob.	Hierba Anual	Nativa	-	-
38	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Cerastium	Cerastium arvense L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
39	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	Cestrum parqui L'Hér.	Arbusto	Nativa	-	-

ANEXO 8.2 • FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO SOL DE CANOE

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
40	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. chilensis	Hierba Perenne	Nativa	-	-
41	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera ciliata Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémica	-	-
42	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera linearis Poepp. ex Less.	Hierba Anual	Endémica	-	-
43	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera microphylla (Cass.) Hook. & Arn.	Hierba Anual	Nativa	-	-
44	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Cheilanthes	Cheilanthes hypoleuca (Kunze) Mett.	Hierba Perenne	Nativa	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA	-
45	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Cheilanthes	Cheilanthes sp	Hierba Perenne	Nativa	-	-
46	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
47	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe arenaria (Cham.) Carolin ex Hershkovitz	Hierba Anual	Nativa	-	-
48	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Clarkia	Clarkia tenella (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis subsp. tenella	Hierba Anual	Nativa	-	-

ANEXO 8.2 • FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO SOL DE CANOE

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
49	Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera	Conanthera bifolia Ruiz & Pav.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
50	Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera	Conanthera campanulata Lindl.	Hierba Perenne	Endémica	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA	-
51	Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera	Conanthera parvula (Phil.) Muñoz-Schick	Hierba Perenne	Endémica	-	-
52	Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera	Conanthera trimaculata (D. Don) F. Meigen	Hierba Perenne	Endémica	-	-
53	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Convolvulus arvensis L.	Hierba trepadora Perenne	Introducida	-	-
54	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Croton	Croton setiger Hook	Hierba Anual	Introducida	-	-
55	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Cynoglossum	Cynoglossum creticum Mill.	Hierba Bienal	Introducida	-	-
56	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Cyperus eragrostis Lam. var. eragrostis	Hierba Perenne	Nativa	-	-
57	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Cyperus reflexus Vahl	Hierba Perenne	Nativa	-	-
58	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Dactylis	Dactylis glomerata L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
59	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Danthonia	Danthonia sp	Hierba Perenne	Nativa	-	-

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
60	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	Daucus carota L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
61	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Dichondra	Dichondra sericea Sw. var. sericea	Hierba Perenne	Nativa	-	-
62	Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea sp	Hierba Perenne	Nativa	-	-
63	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. chiloensis	Arbusto suculento	Endémica	Preocupación menor (LC) DS 41/2011 MMA	Originaria
64	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium	Echium plantagineum L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
65	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium	Echium vulgare L.	Hierba Bienal	Introducida	-	-
66	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis pachycarpa E. Desv.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
67	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Epilobium	Epilobium sp.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
68	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis radicans (Poir.) Kunth	Hierba Perenne	Nativa	-	-
69	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
70	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium	Eryngium depressum Hook. & Arn.	Hierba Perenne	Endémica	-	-

ANEXO 8.2 • FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO SOL DE CANOE

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
71	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium	Eryngium rostratum Cav.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
72	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eriosyce	Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla)	Arbusto suculento	Endémica	Preocupación Menor (LC) DS 41/2011 MMA	Originaria
73	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia revoluta (Ruiz & Pav.) Pers.	Árbol	Endémica	-	Originaria
74	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia peplus L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
75	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Fumaria	Fumaria agraria Lag.	Hierba Anual	Introducida	-	-
76	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	Galium parisiense L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
77	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera	Hierba Perenne	Nativa	-	-
78	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia	Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
79	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Hordeum	Hordeum murinum L. subsp. murinum	Hierba Anual	Introducida	-	-
80	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris glabra L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
81	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris radicata L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
82	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Juncus	Juncus bufonius L.	Hierba Anual	Nativa	-	-

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
83	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Juncus	Juncus sp.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
84	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Juncus	Juncus tenuis Willd. var. tenuis	Hierba Perenne	Nativa	-	-
85	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Kageneckia	Kageneckia oblonga Ruiz & Pav.	Árbol	Endémica	-	Originaria
86	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	Lactuca serriola L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
87	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lapsana	Lapsana communis L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
88	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leontodon	Leontodon saxatilis Lam.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
89	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Lepidium	Lepidium sp.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
90	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leucheria	Leucheria senecioides Hook. & Arn.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
91	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithrea	Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.	Árbol	Endémica	-	Originaria
92	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa	Loasa placei Lindl.	Hierba Anual	Endémica	-	-
93	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Logfia	Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.	Hierba Anual	Introducida	-	-
94	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	Lolium multiflorum Lam.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-

ANEXO 8.2 • FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO SOL DE CANOE

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
95	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	Lolium perenne L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
96	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lythraceae	Lythrum	Lythrum hyssopifolia L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
97	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Malva sp.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
98	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Margyricarpus	Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze	Arbusto o Subarbusto	Nativa	-	-
99	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Marrubium	Marrubium vulgare L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
100	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria	Matricaria chamomilla L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
101	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Maytenus boaria Molina	Árbol	Nativa	-	Originaria
102	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Medicago sp	Hierba Anual	Introducida	-	-
103	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Mentha	Mentha pulegium L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
104	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Melica	Melica sp	Hierba Perenne	Endémica	-	-
105	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. hastulata	Arbusto	Nativa	-	-

ANEXO 8.2 • FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO SOL DE CANOE

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
106	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Nassella	Nassella chilensis (Trin.) E. Desv. var. chilensis	Hierba Perenne	Nativa	-	-
107	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera	Oenothera acaulis Cav.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
108	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Olsynium	Olsynium sp.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
109	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis laxa Hook. & Arn. var. laxa	Hierba Anual	Nativa	-	-
110	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis micrantha Bertero ex Colla	Hierba Anual	Nativa	-	-
111	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis rosea Jacq.	Hierba Anual	Endémica	-	-
112	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Orobanchaceae	Parentucellia	Parentucellia latifolia Caruel	Hierba Anual	Introducida	-	-
113	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Persicaria	Persicaria maculosa Gay	Hierba Anual	Introducida	-	-
114	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Petrorhagia	Petrorhagia dubia (Raf.) G. López & Romo	Hierba Anual	Introducida	-	-
115	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus	Peumus boldus Molina	Árbol	Endémica	-	Originaria
116	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	Pinus radiata D. Don	Árbol	Introducida	-	-
117	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Piptochaetium	Piptochaetium bicolor (Vahl) E. Desv.	Hierba Perenne	Nativa	-	-

ANEXO 8.2 • FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO SOL DE CANOE

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
118	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys sp.	Hierba Anual	Endémica	-	-
119	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Plantago hispidula Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémica	-	-
120	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Poa	Poa annua L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
121	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	Proustia cuneifolia D. Don subsp. cuneifolia	Arbusto	Nativa	-	-
122	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard & B.L. Burt	Hierba Perenne	Nativa	-	-
123	Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	Puya	Puya sp	Hierba Perenne	Endémica	-	-
124	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	Quillaja saponaria Molina	Árbol	Nativa	-	Originaria
125	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus sp.	Hierba Anual	Nativa	-	-
126	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	Raphanus sativus L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
127	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla	Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Arbusto	Endémica	-	-
128	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rosa	Rosa rubiginosa L.	Arbusto	Introducida	-	-
129	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Rostraria	Rostraria cristata (L.) Tzvelev	Hierba Anual	Introducida	-	-

ANEXO 8.2 • FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO SOL DE CANOE

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
130	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Rubus ulmifolius Schott	Arbusto	Introducida	-	-
131	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Rumex sp	Hierba Perenne	Introducida	-	-
132	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Rumex crispus L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
133	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Sanicula	Sanicula crassicaulis Poepp. ex DC.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
134	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémica	-	-
135	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Silene	Silene gallica L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
136	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Silybum	Silybum marianum (L.) Gaertn.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
137	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Sisymbrium	Sisymbrium officinale (L.) Scop.	Hierba Anual	Introducida	-	-
138	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium chilense Hook.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
139	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	Solanum chenopodium	Hierba perenne	Introducida	-	-
140	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	Solanum nigrum L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
141	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Sonchus	Sonchus asper (L.) Hill	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-


ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
142	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Spergula	Spergula rubra (L.) D. Dietr.	Hierba Anual o Perenne	Introducida	-	-
143	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Stachys	Stachys grandidentata Lindl.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
144	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Stellaria	Stellaria media (L.) Vill.	Hierba Anual	Introducida	-	-
145	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Acanthaceae	Stenandrium	Stenandrium dulce (Cav.) Nees	Hierba Perenne	Nativa	-	-
146	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	Taraxacum officinale F.H. Wigg.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
147	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Teline	Teline monspessulana (L.) K. Koch	Arbusto	Introducida	-	-
148	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Trevoa	Trevoa quinquenervia Gillies & Hook.	Arbusto	Endémica	-	-
149	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Trifolium campestre Schreb.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
150	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Trifolium sp	Hierba anual	Introducida	-	-
151	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Triptilion	Triptilion spinosum Ruiz & Pav.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
152	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	Verbascum virgatum Stokes	Hierba Bienal	Introducida	-	-
153	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	Verbascum thapsus L.	Hierba Anual	Introducida	-	-

ANEXO 8.2 • FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO SOL DE CANOE

ID	División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
154	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia	Vicia sativa L. subsp. sativa	Hierba Anual	Introducida	-	-
155	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	Vulpia bromoides (L.) Gray	Hierba Anual	Introducida	-	-
156	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. fma. myuros	Hierba Anual	Introducida	-	-
157	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Campanulaceae	Wahlenbergia	Wahlenbergia linarioides (Lam.) A. DC.	Hierba Perenne	Nativa	-	-

Fuente: Elaboración propia, 2022.-

8.2 APÉNDICE B. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS



Fuente: Elaboración propia, 2022.

8.3 APÉNDICE C INVENTARIO FORESTAL/FLORA SEGÚN METODO DE MUESTREO

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM001	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	2	2	1,7	1	2,2	80
PM001	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	1,5	1	1	+	0,6	80
PM001	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM001	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-	-
PM001	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM002	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	2	2	1,8	1	2,3	80
PM002	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	1,5	1	1,3	+	0,4	40
PM002	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM002	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-	-
PM002	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM003	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	2,5	3	2,5	1	3,6	60
PM003	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	1,5	1,5	1,3	1	1,8	120
PM003	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM003	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-	-
PM003	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM005	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	1	0,5	0,8	1	0,5	140
PM005	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	19	1,8	1,2	1,4	2	5,0	380
PM005	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM005	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM005	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM005	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM005	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM005	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM005	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM005	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM005	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM006	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	13	1,8	1,5	1,6	1	4,9	260
PM006	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	1,6	1,5	1	1	1,2	100
PM006	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	2,5	2,5	2,3	2	5,4	120
PM006	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM006	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM006	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM006	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM006	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM006	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM008	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	12	2,5	2,5	2	2	9,5	240
PM008	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM008	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM008	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	<i>Baccharis linearis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM008	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM008	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM008	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM008	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM008	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM009	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	1,5	1	1	1	1,1	140

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM009	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	17	2,5	3	3	2	24,0	340
PM009	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM009	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM010	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	2,3	1,8	2	1	4,0	140
PM010	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	1,5	1	1	1	1,1	140
PM010	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM010	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM010	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM010	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM010	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM010	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Amsimckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM011	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	2	1,5	1,5	1	1,4	80
PM011	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	14	1,5	1	0,8	1	1,8	280
PM011	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	1	4	4	3	1	1,9	20
PM011	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Lithraea caustica</i>	Arbóreo	1	1,5	1,5	1	1	0,2	20
PM011	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM011	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM011	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM011	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM011	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM011	Pradera de Hypochaeris radicata	<i>Amsimckia calycina</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM012	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	14	1	1	0,8	1	1,8	280
PM012	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	28	2	1,5	1,2	2	8,0	560

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM012	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM012	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM012	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Aira caryophylla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM012	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM012	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM012	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM013	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM013	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	2,5	2	2	1	4,4	140
PM013	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	1	5	4	4,5	1	2,8	20
PM013	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM013	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM013	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	<i>Echium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM013	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM013	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	<i>Verbascum thapsus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM013	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	<i>Rumex acetosella</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM013	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	<i>Alstroemeria ligtu</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-
PM013	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM014	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	4	4	4,5	2	14,2	100
PM014	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	3	3,5	2,5	2	8,5	120
PM014	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	2	2	1,8	1	2,8	100
PM014	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM014	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM014	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM014	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM014	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Loasa sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM014	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM014	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	2	4,5	4	5	2	6,4	40
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	28	1,5	1	1,2	2	5,3	560
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	2	1,5	1,8	1	1,3	60
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	12	1	0,5	0,5	1	0,5	240
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Loasa sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM015	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM016	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	9	2	2	2,2	2	6,2	180
PM016	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	4	5	6	5	2	19,0	80
PM016	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM016	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM016	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM016	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM016	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM016	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM016	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM016	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM017	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	2,5	2	2,2	1	4,2	120
PM017	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	9	1,7	1,5	1,3	1	2,8	180
PM017	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	0,5	0,4	0,3	1	0,1	140
PM017	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM017	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM017	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Juncus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM018	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	2	2	2,2	1	4,8	140
PM018	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	1	0,5	0,3	1	0,2	160
PM018	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM018	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM018	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM018	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Juncus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM018	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM019	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	15	2,5	3,7	3	3	26,4	300
PM019	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM019	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	13	1	1	0,6	1	1,3	260
PM019	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM019	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM019	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM019	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM019	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM019	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	6	5,5	5	6	3	28,5	120
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	4	2,5	2	2,5	1	3,2	80
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	2	1,6	2	1	2,5	100
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Conanthera parvula</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM020	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Bromus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	1	6	5,5	6,5	2	5,7	20
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	2,5	2,5	3	1	1,2	20
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	0,5	0,5	0,4	1	0,2	140
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Croton setiger</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM021	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	5	7	7,5	8	3	47,2	100
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	3	4	3	4	2	5,8	60
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Juncus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Conanthera parvula</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM022	Bosque Nativo de Peumus boldus	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	1	2,5	1,2	1,5	+	0,3	20
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Lithraea caustica</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	2,5	2	2,5	1	4,0	100

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1,7	2	1,8	2	1	1,0	34
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	14	0,5	0,2	0,5	1	0,3	280
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Juncus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM023	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	28	1,5	1	1,2	2	5,3	560
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	2	2,5	1,2	1,5	+	0,6	40
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Lithraea caustica</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	2	1,7	1,4	1	1,5	80
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM024	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM025	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	9	2	1,8	2,2	2	5,7	180
PM025	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	1	0,5	0,3	1	0,1	80
PM025	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM025	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM025	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM025	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Juncus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM025	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM026	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	0,5	0,8	0,5	+	0,2	60
PM026	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	3	1	0,1	0,3	+	0,0	60
PM026	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM026	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM026	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM026	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM026	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM026	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Vulpia myuros</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM026	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Rostraria cristata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM026	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM027	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	2100	1,5	0,4	0,5	4	66,8	42000
PM027	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM027	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM028	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	2500	1,5	0,4	0,5	5	79,5	50000
PM028	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	2200	1,5	0,4	0,6	5	86,4	44000

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM028	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM028	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM028	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM028	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM029	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	2600	1,5	0,4	0,5	5	82,7	52000
PM029	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM029	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM031	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	2200	1,5	0,4	0,5	4	70,0	44000
PM031	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM032	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	2400	1,5	0,4	0,5	5	76,3	48000
PM032	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	28	1	0,4	0,2	+	0,4	560
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	9	1,2	0,5	0,4	+	0,3	180
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Lithraea caustica</i>	Arbóreo	1	0,6	1	0,8	+	0,1	20
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Bromus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Sonchus asper</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Erygeron sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Oxalis micrantha</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Logfia gallica</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Gamochaeta sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Conanthera parvula</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Epilobium sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Solanum sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Conanthera bifolia</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM033	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Spergularia rubra</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM034	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	55	2	1,5	1,5	2	19,4	1100
PM034	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	1,5	1	0,8	+	1,0	160
PM034	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM034	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM034	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Baccharis linearis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM034	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Juncus tenuis Willd. var. Tenuis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM034	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Vulpia bromoides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM034	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Calceolaria sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM034	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Schizanthus pinnatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM034	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM034	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Nassella chilensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	45	2	1,5	1,5	2	15,9	900
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Escallonia revoluta</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Vulpia bromoides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Calceolaria sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Schizanthus pinnatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Pseudonaphallium cheiranthifolium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Gamochaeta subfalcata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM035	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Lapsana communis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM036	Plantación Forestal Pinus radiata	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	5	3	3	2	9,9	140
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	4	4	3	3	2	5,7	80
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Lithraea caustica</i>	Arbóreo	1	3	2	1	+	0,4	20
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Baccharis linearis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	4	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Vulpia bromoides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Dioscorea sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Calceolaria sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Pseudonaphallium cheiranthifolium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Oxalis sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Adiantum scabrum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Adiantum chilense var chilense</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Euphorbia peplus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Alstroemeria ligtu L. subsp. Simsii</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Schizanthus pinnatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Leucheria senecioides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Cistanthe arenaria</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Stachys grandidentata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Leucheria senecioides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM037	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	1	4	0,5	0,8	+	0,1	20
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	2	2	2	1	3,8	120
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	3,5	4	4	2	15,1	120
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Caetantheta ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Calceolaria sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Silene gallica</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Stenandrium dulce</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Petrorhagia dubia</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Triptilion spinosus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM038	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Centaurium cachanlahuen</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	2	2	1	1	1,1	60
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	3,5	5	4	2	19,1	120
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Berberis darwinii</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Caetantheta microphylla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Calceolaria sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Silene gallica</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Stenandrium dulce</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Petrorragia dubia</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Triptilion spinosus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Centaurium cachanlahuen</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Chaetanthera liniaris</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM039	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Cheilanthes sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	2	2	2	1	2,5	80
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	1	4	4	4	1	2,5	20
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	3,5	3	3	2	14,1	200
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Baccharis linearis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Solanum chenopodioides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Caetantheta ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Calceolaria sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM040	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	6	6	5	3	28,5	120
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	4	3	2	2	6,9	140
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	1	8	7	8	2	8,8	20
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	2	6	4	4	2	5,0	40
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Berberis actinacantha</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Solanum chenopodioides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Adiantum scabrum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Adiantum excisum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Euphorbia peplus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM041	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	1	0,4	0,3	0,3	+	0,0	20
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	5	6	4	4	2	12,6	100
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	23	2,5	2	3	2	22,6	460
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	1,5	1	1	+	1,3	160
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Berberis actinacantha</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Berberis actinacantha</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Solanum chenopodioides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Adiantum scabrum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Adiantum excisum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Petrorhagia dubia</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM042	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Juncus tenuis Willd. var. Tenuis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM043	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	2	4	2	3	1	2,0	40

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM043	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	22	3,5	3,5	3	3	36,5	440
PM043	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM043	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM043	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM043	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM043	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	1	2	0,3	0,5	+	0,0	20
PM044	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	4	7	6	6	2	22,6	80
PM044	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	3	3	2,5	2	9,5	160
PM044	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	1,5	0,5	1	+	0,9	200
PM044	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	1	0,5	0,5	+	0,3	160
PM044	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM044	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM045	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	16	4	3	4	3	30,8	320
PM045	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	2	2	3	2	6,9	140
PM045	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM045	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM045	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM045	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Calceolaria sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM045	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Wahlenbergia linarioides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM045	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Puya sp</i>	Suculento	-	-	-	-	+	-	-
PM045	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	-	-	-	-	p	-	-
PM046	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	2	2	2	1	4,4	140
PM046	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	3	6	5	4	2	9,5	60

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM046	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	3	4	3	2	15,4	160
PM046	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	1,5	0,5	1	+	0,5	120
PM046	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM046	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Berberis actinacantha</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM046	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM046	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM046	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM046	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	-	-	-	-	p	-	-
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	2	2	1	1	2,8	160
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	1	5	5	4	1	3,2	20
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	17	4	3	3	3	24,0	340
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	1	6	8	7	2	8,8	20
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Juncus tenuis Willd. var. Tenuis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM047	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	1	6	0,3	0,3	+	0,0	20
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	18	1	0,5	0,6	1	0,9	360
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	13	1,8	2	2	2	8,2	260
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	2,5	4	3	2	15,4	160

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbustivo	3	1			+	0,0	60
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Poa anua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Piptochaetium bicolor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Vulpia myuros</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Rostraria cristata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Anthoxanthum utriculatum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Plantago hispidula</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM048	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus berterianus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	1	5	3	3	1	1,4	20
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	19	6,5	5	6	5	90,3	380
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	1,8	1	1	+	0,8	100
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Berberis actinacantha</i>	Arbustivo	-	-	-	-	r	-	-
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Medicago sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Trifolium campestre</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Vulpia bromoides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Juncus tenuis Willd. var. Tenuis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Poa sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM049	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Dichondra sericea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	29	1,2	1	1	1	4,6	580
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	4	4	5	2	15,9	100
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	6	7	6	3	33,2	100
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	9	2	2	2	2	5,7	180
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Vulpia bromoides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Brassica rappa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM050	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Agrostis capillaris</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	5	5	6	1	4,8	20
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	4	3	4	1	3,8	40
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	6	5	5	2	7,9	40
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	5	4	4	2	10,1	80
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	6	5	6	2	9,5	40
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Vulpia bromoides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Brassica rappa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM051	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Vulpia bromoides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus rigidus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Brassica rappa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM052	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Dactylis glomerata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	8	6	7	2	6,6	20
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	6	5	4	2	9,5	60
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	3	4	3	2	9,6	100

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	1	0,5	1	+	0,4	100
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Brassica rappa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM053	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	1	1	1	1	1,6	200
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	4	4	4	1	2,5	20
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	9	2	2,5	2	2	7,2	180
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Silybum marianum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Echium plantagineum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM054	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Marrubium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	4,4	4	5	2	6,4	40
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	11	3,8	3	3,5	2	18,3	220
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	2	1,5	1	1	2,5	200
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Raphanus sativus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Echium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM055	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	14	4,2	4	3,5	3	30,9	280
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	11	2,5	2	1	1	3,9	220
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Raphanus sativus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Echium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM057	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	4	5	4	2	22,3	140
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	3,5	3	3,5	2	11,6	140
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lepidium sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Medicago sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Vicia sativa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Rumex crispus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Anthriscus caucalis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Echium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM058	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	3,5	3	3	2	7,1	100
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	1,5	1	0,6	+	0,6	120
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Echium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Centaurea melitensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Trifolium sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Sylibum marianum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Lepidium sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Medicago sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM059	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Malva sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	2	1	1,5	1	1,5	120
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Echium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Centaurea melitensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Trifolium sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Sylibum marianum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Lepidium sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Medicago sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Vicia sativa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Bromus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM060	Pradera de Bromus Hordaceum	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	14	3,8	3	4	3	26,9	280
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	16	1,5	1,3	1	1	3,3	320
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lepidium sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Medicago sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Vicia sativa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Echium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM061	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM062	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	4,5	5,5	4,8	3	41,7	200
PM062	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	2	1	1,5	+	0,7	60
PM062	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM062	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM062	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM062	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM062	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM062	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM063	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	4	4,1	3,8	2	12,3	100
PM063	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	2,5	2	2,5	2	2,4	60
PM063	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	1	4	5	5,5	1	4,3	20
PM063	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM063	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM063	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM063	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM063	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Bromus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM063	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM063	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM063	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	2	2	3	2	7,9	160
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	2,5	4	4	2	5,0	40
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Berberis actinacantha</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Centaureum cachanlahuen</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Alstroemeria diluta subsp. diluta</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Sanicula crassicaulis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Adiantum scabrum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Oenothera acaulis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM064	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Adiantum excisum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	27	8	3	4	4	52,0	540
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	6	5	4	2	19,1	120
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Poa annua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Aira caryophylla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Sanicula crassicaulis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Euphorbia peplus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Anthemis cotula</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Solanum chenopodioides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM065	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	-	-	-	-	p	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	5	5	6	1	4,8	20
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	6	5	4	5	2	19,1	120
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	3	3	3	2	7,1	100
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	8	6	5	5	3	31,4	160
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	6	2	2	+	0,6	20
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Adiantum scabrum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Adiantum excisum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Poa anua</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Solanum chenopodioides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Euphorbia peplus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Dichondra sericea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM066	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Sanicula crassicaulis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	4	4	3,3	2	10,5	100
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	1	6	6	5,8	2	5,5	20

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	2	1	2	1	0,7	40
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	1	4,5	5	4	1	3,2	20
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Berberis chilensis</i>	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Bromus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM067	Matorral arborescente Retanilla trinervia y Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	5	6	5,8	2	16,4	60
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	3,5	3,5	4	2	8,8	80
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	21	0,4	0,5	0,5	+	0,8	420
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	1,5	1,2	1,3	1	1,7	140
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Centaureum cachanlahuen</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Conanthera trimaculata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM068	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM069	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	4,5	5	4,3	3	34,0	200
PM069	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	2	1	2	1	1,1	60
PM069	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM069	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM069	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM069	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM069	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM069	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM071	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	9	5,5	6	5	3	42,8	180
PM071	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	3,2	3	2,7	2	5,1	80
PM071	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Nasella sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM071	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM071	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM071	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM071	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Marrubium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM071	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM071	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	1	5	5	5	1	3,9	20
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	12	5	6	4	3	47,1	240
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	3	4	4	4	2	7,5	60
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	3	3	3	2	11,3	160

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Adiantum chilense var chilense</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Alstroemeria diluta subsp. diluta</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Brassica rappa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Calceolaria sp</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM073	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Triptilion spinosus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	1	8	6	7,5	2	7,2	20
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	1,2	1	0,8	+	0,6	100
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	2,5	2	2,5	1	4,8	120
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Nasella sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Plantago hispidula</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Centaurium cachelal</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Dioscorea sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Dichondra sericea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM080	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	5,5	6,2	5	3	29,6	120
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	3,8	3,5	4	2	6,6	60
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	2,5	2	1	+	0,7	40
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	5	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Echium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Sisyrinchium chilense</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Conanthera trimaculata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Juncus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM081	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM082	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	5,3	5	5,5	3	26,0	120
PM082	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	3,5	3	3,8	2	12,7	140
PM082	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	1	0,6	0,5	+	0,5	200
PM082	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	2	1,3	1,5	1	1,8	120

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM082	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM082	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM082	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM082	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM082	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Echium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM084	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	5,8	6,5	6,4	3	32,7	100
PM084	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	9	4	3,5	4,2	2	21,0	180
PM084	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	2,5	2	1	1	1,1	60
PM084	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM084	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM084	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM084	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM084	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Conanthera trimaculata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM084	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM087	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	18	4	3	3	3	25,4	360
PM087	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	9	1,8	3	1	2	5,7	180
PM087	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	1	0,5	1	+	0,5	120
PM087	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbustivo	3	2,5	2	2	1	1,9	60
PM087	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbustivo	1	1	0,5	0,8	+	0,1	20
PM087	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM087	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM087	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM087	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM087	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	3	2	2	1	2,5	80
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	2	4	2	1	1,4	20
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	1,5	1,5	1,5	1	1,4	80
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	2	3	2	2	9,8	200
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	1	0,5	0,5	+	0,0	20
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Caetantheta ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM093	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	1	7	0,4	0,4	+	0,0	20
PM094	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	2	1	1	1	1,1	140
PM094	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	4	4	3	2	5,8	60
PM094	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	4	2	3	2	9,8	200
PM094	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM094	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM094	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM094	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM094	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	3	4	2	1	2,8	40
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	16	5	4	3	3	30,8	320
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Peumus boldus</i>	Arbóreo	2	6	6	4	2	7,9	40
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	1,7	1	1	+	0,9	120
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Berberis actinacantha</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Vulpia bromoides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Loasa placei</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Solanum chenopodioides</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Schizanthus pinnatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	5	8	1	0,8	+	0,6	100
PM095	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	5	4	0,4	0,4	+	0,1	100
PM098	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	2,5	2,5	2	1	4,0	100

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM098	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM098	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM098	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM098	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM098	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Conanthera trimaculata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM098	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	-	-	-	-	p	-	-
PM099	Matorral de Trevoa quinquenervia	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	4	2,5	2	1	3,2	80
PM099	Matorral de Trevoa quinquenervia	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM099	Matorral de Trevoa quinquenervia	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM099	Matorral de Trevoa quinquenervia	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM099	Matorral de Trevoa quinquenervia	<i>Juncus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM099	Matorral de Trevoa quinquenervia	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM099	Matorral de Trevoa quinquenervia	<i>Conanthera trimaculata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM100	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	2,5	2	2	1	1,9	60
PM100	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM100	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM100	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM100	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Juncus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM110	Bosque Nativo de Acacia caven y Quillaja saponaria	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	5	5	5,5	3	34,6	160
PM110	Bosque Nativo de Acacia caven y Quillaja saponaria	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	3,5	3	4	2	5,8	60
PM110	Bosque Nativo de Acacia caven y Quillaja saponaria	<i>Lithraea caustica</i>	Arbóreo	1	5,5	4	6	1	3,9	20
PM110	Bosque Nativo de Acacia caven y Quillaja saponaria	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM110	Bosque Nativo de Acacia caven y Quillaja saponaria	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM110	Bosque Nativo de Acacia caven y Quillaja saponaria	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM110	Bosque Nativo de Acacia caven y Quillaja saponaria	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM110	Bosque Nativo de Acacia caven y Quillaja saponaria	<i>Conanthera bifolia</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM110	Bosque Nativo de Acacia caven y Quillaja saponaria	<i>Centaureum cachanlahuen</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM110	Bosque Nativo de Acacia caven y Quillaja saponaria	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM111	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	36	1,3	1,2	0,8	2	5,7	720
PM111	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	21	0,5	0,5	0,4	+	0,7	420
PM111	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM111	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM111	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM113	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	25	2,5	2,5	2,3	2	22,6	500
PM113	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	12	1	0,5	0,5	+	0,5	240
PM113	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	1,5	1,4	1,5	1	2,0	120
PM113	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM113	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM113	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Juncus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM113	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Adiantum cabrum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	1,8	2	1,9	1	1,2	40
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Adesmia sp.</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Chaetanthera sp2</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Triptilion spinosum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Conanthera bifolia</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Alstroemeria sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Melica sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Cryptantha sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Stenandrium dulce</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Petrorhagia dubia</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM114	Matorral de Proustia cuneifolia	<i>Chaetanthera sp1</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM115	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	12	2,3	2	2,2	2	8,3	240
PM115	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	1	0,5	0,8	+	0,4	120
PM115	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	1,5	1	1,5	1	2,5	200
PM117	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	21	3,5	3	2,9	3	28,7	420
PM117	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	1,8	1	1,5	1	2,0	160
PM117	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM117	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM117	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cardionema ramosissima</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM117	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Clarckia tenella</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM117	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM117	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM117	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM117	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM119	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	20	3,5	3	2,9	3	27,3	400
PM119	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	1,8	1	1,5	1	2,0	160
PM119	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM119	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM119	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Aira caryophyllea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	15	4,5	3,8	4,4	3	39,6	300
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	-	-	-	-	+	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	-	-	-	-	+	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	2	2,2	2,3	1	3,2	80
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Matricaria chamomilla</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Dichondra sericea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Tenandrium dulce</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Euphorbia peplus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Nasella sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM121	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	4	4	4,3	2	13,5	100
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	14	2,3	2,2	2	2	9,7	280
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	1	0,5	0,3	+	0,2	140
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	16	1,8	1	1,3	1	3,3	320
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Rostraria cristata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Dichondra sericea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Galium aparine</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Tenandrium dulce</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM122	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Nasella sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM123	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	7	3,5	3	3,5	2	11,6	140
PM123	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	12	2,5	3	2,5	2	14,3	240

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM123	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	9	1,2	1	1	1	1,4	180
PM123	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	1	5	3,5	4	1	2,2	20
PM123	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM123	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM123	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM123	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM123	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM123	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM123	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM124	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	26	2,5	1,8	2,5	2	18,9	520
PM124	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	24	1,8	1,5	1,2	2	6,9	480
PM124	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	27	1,2	1	0,6	1	2,7	540
PM124	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM124	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM124	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM124	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM124	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Rostraria cristata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM124	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Dichondra sericea</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM124	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM125	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	4	5	6	2	23,8	100
PM125	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	6	6	6	2	5,7	20
PM125	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	8	2	2	2	2	5,0	160
PM125	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	27	1,7	1	1,5	2	6,6	540

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM125	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM125	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM125	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM125	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM125	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM125	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM125	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM126	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	7	5	5	2	15,7	80
PM126	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	11	5	3	3	2	15,6	220
PM126	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	6	3	4	2	11,5	120
PM126	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	5	3	2	1	4,9	100
PM126	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	3	2	2	1	3,1	100
PM126	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	3	2	1	1	1,4	80
PM126	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM126	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM126	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM126	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM126	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	3	-	-
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM127	Matorral de Trevoa quinquenervia y Retanilla trinervia	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	5	6	7	2	6,6	20
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	4	4	5	2	15,9	100
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	3	4	3	2	11,5	120
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	2	2	1	1	1,4	80
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	4	2	2	1	2,5	80
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	5	2	1	1	1,1	60
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbustivo	-	-	-	-	r	-	-
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Briza minor</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM128	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	6	5	6	2	9,5	40
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	12	4,5	4	4	3	30,2	240

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	4	5	4	2	15,9	100
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	6	7	8	2	8,8	20
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	3	3	2	2	5,9	120
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	21	1	1	0,5	1	1,9	420
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	2	2,5	3	2	+	2,0	40
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM129	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	3,8	4	3,5	2	11,0	100
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Lithraea caustica</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	5	3,8	4	3,5	2	11,0	100
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	12	4	4	4,8	3	36,5	240
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	3	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	3	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochaeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hypochoeris radicata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM130	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	13	2,5	2	2	2	8,2	260
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	6	3	3	2	2	5,9	120
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	3,5	4	3	1	3,8	40
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	2	2	1,5	1	4,8	200
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	22	1	1	0,5	1	1,9	440
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	1,5	4	2	1	1,4	20
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM131	Bosque Nativo de Acacia caven	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	3	3	2	2	1	1,9	60
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	2	4	2	1	2,8	40
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	4	1,5	1,5	1,5	1	1,4	80
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Quillaja saponaria	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	2	3	2	2	9,8	200
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	1	0,5	0,5	+	0,0	20

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Trevoa quinquenervia	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Retanilla trinervia	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Conanthera campanulata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Caetantheta ciliata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Hypochaeris radicata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Bromus hordeaceus	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Briza minor	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Lolium multiflorum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Taraxacum officinale	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Hordeum murinum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM132	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Echinopsis chiloensis	Suculento	1	7	0,4	0,4	+	0,0	20
PM133	Matorral de Trevoa quinquenervia	Acacia caven	Arbóreo	4	4	2,5	2	1	3,2	80
PM133	Matorral de Trevoa quinquenervia	Trevoa quinquenervia	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM133	Matorral de Trevoa quinquenervia	Hypochaeris radicata	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM133	Matorral de Trevoa quinquenervia	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM133	Matorral de Trevoa quinquenervia	Juncus sp.	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM133	Matorral de Trevoa quinquenervia	Chaetanthera ciliata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM133	Matorral de Trevoa quinquenervia	Conanthera trimaculata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	4	3	2	2	1	2,5	80
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	1	2	4	2	1	1,4	20
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	4	1,5	1,5	1,5	1	1,4	80
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Quillaja saponaria	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	10	2	3	2	2	9,8	200
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	1	1	0,5	0,5	+	0,0	20
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Trevoa quinquenervia	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Retanilla trinervia	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Conanthera campanulata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Caetantheta ciliata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Hypochaeris radicata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Bromus hordeaceus	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Briza minor	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Lolium multiflorum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Taraxacum officinale	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM134	Matorral arborescente Retanilla trinervia, Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Hordeum murinum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM135	Matorral de Trevoa quinquenervia	Acacia caven	Arbóreo	4	4	2,5	2	1	3,2	80
PM135	Matorral de Trevoa quinquenervia	Trevoa quinquenervia	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM135	Matorral de Trevoa quinquenervia	Hypochaeris radicata	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM135	Matorral de Trevoa quinquenervia	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM135	Matorral de Trevoa quinquenervia	Chaetanthera ciliata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM136	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	12	2,5	2,5	2	2	9,5	240
PM136	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	Retanilla trinervia	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM136	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	Berberis chilensis	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM136	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	Baccharis linearis	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM136	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	Rosa rubiginosa	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM136	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	Rubus ulmifolius	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM136	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	Bromus hordeaceus	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM136	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	Hypochaeris radicata	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM136	Matorral arborescente Rubus ulmifolius, Rosa rubiginosa y Acacia caven	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	6	2	2	2	1	3,8	120
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	5	3,5	4	4	2	12,6	100
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Peumus boldus	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Hypochaeris radicata	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Caetantheta ciliata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Conanthera campanulata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Hordeum murinum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Silene gallica	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Stenandrium dulce	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Petrorhagia dubia	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Triptilion spinosus	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM137	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Centaurium cachanlahuen	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM138	Bosque Nativo de Acacia caven y Maytenus boaria	Acacia caven	Arbóreo	21	5	3	2		20,6	420
PM138	Bosque Nativo de Acacia caven y Maytenus boaria	Maytenus boaria	Arbóreo	7	4,5	2,5	2		5,6	140
PM138	Bosque Nativo de Acacia caven y Maytenus boaria	Retanilla trinervia	Arbustivo	-	-	-	-		-	-
PM138	Bosque Nativo de Acacia caven y Maytenus boaria	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-		-	-
PM139	Pradera de Avena barbata y Hypochaeris glabra	Acacia caven	Arbóreo	4	2	2	1,8	1	2,3	80
PM139	Pradera de Avena barbata y Hypochaeris glabra	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM139	Pradera de Avena barbata y Hypochaeris glabra	Hypochaeris glabra	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM139	Pradera de Avena barbata y Hypochaeris glabra	Bromus hordeaceus	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Peumus boldus	Arbóreo	5	6	4	4	2	12,6	100
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	23	2,5	2	3	2	22,6	460
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	8	1,5	1	1	+	1,3	160
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Cestrum parqui	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Berberis actinacantha	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Berberis actinacantha	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Berberis chilensis	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Bromus hordeaceus	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Daucus carota	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Solanum chenopodioides	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Cirsium vulgare	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Hypochaeris radicata	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Briza minor	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Adiantum scabrum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Adiantum excisum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Loasa placei	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM140	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Juncus tenuis Willd. var. Tenuis	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	5	2	2	2	1	3,1	100
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Peumus boldus	Arbóreo	1	4	4	4	1	2,5	20
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	8	3,5	3	3	2	11,3	160

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Baccharis linearis	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Cestrum parqui	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Hypochaeris radicata	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Solanum chenopodioides	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Carduus pycnocephalus	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Caetantheta ciliata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Conanthera campanulata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Calceolaria sp	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Hordeum murinum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM141	Pradera con Árboles de Avena barbata y Acacia caven	Leontodon saxatilis	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	29	1,2	1	1	1	4,6	580
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	5	4	4	5	2	15,9	100
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	5	6	7	6	3	33,2	100
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	9	2	2	2	2	5,7	180
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Vulpia bromoides	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Anthoxanthum odoratum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Carduus pycnocephalus	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Brassica rappa	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Galega officinalis	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Matricaria chamomilla	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Lolium multiflorum	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM142	Bosque Nativo de Acacia caven	Aira caryophyllea	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	14	3,8	3	4	3	26,9	280
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	16	1,5	1,3	1	1	3,3	320
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Bromus hordeaceus	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Convolvulus arvensis	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Hordeum murinum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Matricaria chamomilla	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Lepidium sp.	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Medicago sp.	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Vicia sativa	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Erodium cicutarium	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Lolium multiflorum	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Carthamus lanatus	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Echium vulgare	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Hypochaeris radicata	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM143	Bosque Nativo de Acacia caven	Lolium perenne	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM144	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	6	2,5	2	2,2	1	4,2	120
PM144	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	9	1,7	1,5	1,3	1	2,8	180
PM144	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	7	0,5	0,4	0,3	1	0,1	140
PM144	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	Bromus hordeaceus	Herbáceo	-	-	-	-	p	-	-
PM144	Pradera con Árboles de Bromus hordeaceus y Acacia caven	Hypochaeris radicata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	7	2	2	1	1	2,5	140
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Peumus boldus	Arbóreo	1	5	5	4	1	3,2	20

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	18	4	3	3	3	25,4	360
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Peumus boldus	Arbóreo	1	6	8	7	2	8,8	20
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Berberis chilensis	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Cestrum parqui	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Hordeum murinum	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Hypochaeris radicata	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Bromus hordeaceus	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Juncus tenuis Willd. var. Tenuis	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM145	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Echinopsis chiloensis	Suculento	1	6	0,3	0,3	+	0,0	20
PM146	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	15	2,5	3,7	3	3	26,4	300
PM146	Bosque Nativo de Acacia caven	Peumus boldus	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM146	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	13	1	1	0,6	1	1,3	260
PM146	Bosque Nativo de Acacia caven	Cestrum parqui	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM146	Bosque Nativo de Acacia caven	Aira caryophyllea	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM146	Bosque Nativo de Acacia caven	Loasa placei	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM146	Bosque Nativo de Acacia caven	Carthamus lanatus	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM146	Bosque Nativo de Acacia caven	Bromus sp.	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	1	5	5	6	1	4,8	20
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Peumus boldus	Arbóreo	6	5	4	5	2	19,1	120
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	5	3	3	3	2	7,1	100
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Peumus boldus	Arbóreo	8	6	5	5	3	31,4	160
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	1	6	2	2	+	0,6	20

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Cestrum parqui	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Adiantum scabrum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Adiantum excisum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Loasa placei	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Conanthera campanulata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Poa anua	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Aira caryophyllea	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Leontodon saxatilis	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Solanum chenopodioides	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Dichondra sericea	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Daucus carota	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM147	Bosque Nativo de Peumus boldus y Acacia caven	Sanicula crassicaulis	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	1	8	6	7	2	6,6	20
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	3	6	5	4	2	9,5	60
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	6	3	4	3	2	11,5	120
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	5	1	0,5	1	+	0,4	100
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Leontodon saxatilis	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Taraxacum officinale	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Cirsium vulgare	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Erodium cicutarium	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Lolium multiflorum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Anthoxanthum odoratum	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Carduus pycnocephalus	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Brassica rappa	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Galega officinalis	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM148	Bosque Nativo de Acacia caven	Matricaria chamomilla	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM149	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	7	2,5	2	2	1	4,4	140
PM149	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Peumus boldus	Arbóreo	1	5	4	4,5	1	2,8	20
PM149	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Baccharis salicifolia	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM149	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Rosa rubiginosa	Arbustivo	-	-	-	-	1	-	-
PM149	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Echium vulgare	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM149	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Matricaria chamomilla	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM149	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Verbascum thapsus	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM149	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Rumex acetosella	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM149	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Alstroemeria ligtu	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-
PM149	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Carthamus lanatus	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM150	Plantación Forestal Pinus radiata	Pinus radiata	Arbóreo	57	2	1,5	1,5	2	20,1	1140
PM150	Plantación Forestal Pinus radiata	Acacia caven	Arbóreo	8	1,5	1	0,8	+	1,0	160
PM150	Plantación Forestal Pinus radiata	Retanilla trinervia	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM150	Plantación Forestal Pinus radiata	Muehlenbeckia hastulata	Arbustivo	-	-	-	-	+	-	-
PM150	Plantación Forestal Pinus radiata	Baccharis linearis	Arbustivo	-	-	-	-	p	-	-
PM150	Plantación Forestal Pinus radiata	Juncus tenuis Willd. var. Tenuis	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM150	Plantación Forestal Pinus radiata	Vulpia bromoides	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM150	Plantación Forestal Pinus radiata	Schizanthus pinnatus	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM150	Plantación Forestal Pinus radiata	Conanthera campanulata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM150	Plantación Forestal Pinus radiata	Nassella chilensis	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	N° Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM151	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Maytenus boaria	Arbóreo	-	-	-	-	p	-	-
PM151	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	8	2,5	2	2	1	5,0	160
PM151	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Peumus boldus	Arbóreo	1	5	4	4,5	1	2,8	20
PM151	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Baccharis salicifolia	Arbustivo	-				1	-	-
PM151	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Rosa rubiginosa	Arbustivo	-				1	-	-
PM151	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Echium vulgare	Herbáceo	-	-	-	-	2	-	-
PM151	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Verbascum thapsus	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM151	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Rumex acetosella	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM151	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Alstroemeria ligtu	Herbáceo	-	-	-	-	r	-	-
PM151	Matorral arborescente Baccharis salicifolia y Acacia caven	Carthamus lanatus	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM152	Bosque Nativo de Acacia caven y Maytenus boaria	Acacia caven	Arbóreo	21	5	3	2		20,6	420
PM152	Bosque Nativo de Acacia caven y Maytenus boaria	Maytenus boaria	Arbóreo	7	4,5	2,5	2		5,6	140
PM152	Bosque Nativo de Acacia caven y Maytenus boaria	Retanilla trinervia	Arbustivo	-	-	-	-		-	-
PM152	Bosque Nativo de Acacia caven y Maytenus boaria	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-		-	-
PM152	Bosque Nativo de Acacia caven y Maytenus boaria	Carduus pycnocephalus	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM152	Bosque Nativo de Acacia caven y Maytenus boaria	Brassica rappa	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM153	Matorral arborescente Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	7	2	1	1	1	1,1	140
PM153	Matorral arborescente Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	3	4	4	3	2	5,8	60
PM153	Matorral arborescente Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Acacia caven	Arbóreo	10	4	2	3	2	9,8	200
PM153	Matorral arborescente Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Trevoa quinquenervia	Arbustivo	-	-	-	-	2	-	-
PM153	Matorral arborescente Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Hordeum murinum	Herbáceo	-	-	-	-	1	-	-
PM153	Matorral arborescente Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Avena barbata	Herbáceo	-	-	-	-	4	-	-
PM153	Matorral arborescente Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Taraxacum officinale	Herbáceo	-	-	-	-	3	-	-

Pto Informe	Formación Vegetacional	Especie	Hábito	Nº Ind	Altura	Dcop1	Dcop2	Cob bb	Cob abs	N ind/ha
PM153	Matorral arborescente Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Conanthera campanulata	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-
PM153	Matorral arborescente Trevoa quinquenervia y Acacia caven	Bromus hordeaceus	Herbáceo	-	-	-	-	+	-	-

Fuente: Elaboración propia, 2022.

8.4 APÉNDICE D LISTADO DE FLORA POTENCIAL

Familia	Especie	Nombre común	Luebert y Pliscoff	Gajardo
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i>			X
	<i>Alstroemeria pelegrina</i>			X
	<i>Alstroemeria revoluta</i>		X	
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	X	X
	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán		X
Apiaceae	<i>Azorella ulicina</i>			X
	<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo	X	
Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i>	Palma Chilena.		X
Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i>			X
	<i>Baccharis glutinosa</i>	Chilca		X
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	X	X
	<i>Baccharis rhomboidalis</i>		X	
	<i>Cotula coronopifolia</i>			X
	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira- mira	X	
	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	X	X
	<i>Polyachyrus gayi</i>			X
	<i>Proustia cuneifolia</i>	Palo de yegua.		X
	<i>Proustia pyrifolia</i>	Tola blanca	X	
	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea		X
	<i>Triptilion spinosum</i>	Siempreviva		X
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Puya		X

Familia	Especie	Nombre común	Luebert y Pliscoff	Gajardo
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>			X
	<i>Eriosyce chilensis</i>			X
	<i>Eriosyce subgibbosa</i>			X
Calceolariaceae	<i>Calceolaria dentata</i>		X	
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	X	X
	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua		X
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	X	
	<i>Escallonia revoluta</i>	Siete camisas.	X	X
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	X	X
Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i>	Espinillo		X
	<i>Otholobium glandulosum</i>			X
	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayu	X	
Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i>			X
Goodeniaceae	<i>Selliera radicans</i>			X
Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i>	Zarzaparrilla	X	
Lamiaceae	<i>Gardoquia gilliesii</i>	Oreganillo		X
	<i>Micromeria gilliesii</i>	Muña	X	
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	X	X
	<i>Persea lingue</i>	Lingue		X
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	X	X
Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i>	Pata de guanaco		X
Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temu		X

Familia	Especie	Nombre común	Luebert y Pliscoff	Gajardo
Orchidaceae	<i>Chloraea disoides</i>			X
Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i>	Coligüe	X	X
	<i>Distichlis spicata</i>			X
	<i>Nassella chilensis</i>	Coirón	X	X
	<i>Vulpia megalura</i>			X
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	X	X
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	X	X
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	X	
	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	X	X
	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	X	X
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora		X
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce amargo, sauce chileno		X
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui		X
	<i>Nolana filifolia</i>			X
	<i>Nolana paradoxa</i>	Suspiro del campo		X
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Pilpilvoqui		X
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	Canelo		X