

ANEXO 2-5
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLANTA FOTOVOLTAICA RENGÓ 7 MW

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	4
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	5
3	Área de INFLUENCIA.....	5
4	METODOLOGÍA.....	8
4.1	Antecedentes Bibliográficos	8
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	8
4.2	Antecedentes de Terreno.....	8
4.3	Vegetación.....	10
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	13
4.5	Singularidad Ambiental	15
4.6	Flora.....	16
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	17
4.6.2	Abundancia.....	17
4.6.3	Tipos Biológicos.....	17
4.6.4	Origen Geográfico	18
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	18
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	18
5.	RESULTADOS	20
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	20
5.1.1	Pisos Vegetacionales	20
5.2	Resultado de la Prospección	20
5.2.1	Vegetación.....	20

5.2.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	25
5.2.3. Singularidad Ambiental	25
5.2.4. Flora.....	26
6 CONCLUSIONES	30
7 BIBLIOGRAFÍA.....	31
8. APÉNDICES.....	35
8.1 LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Puntos de Muestreo (parcelas) realizados en Campaña de Primavera.	9
Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	10
Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.	11
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	14
Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.	15
Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	17
Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada.	18
Tabla 8. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	21
Tabla 9. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.	27
Tabla 10. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.	28
Tabla 11. Origen geográfico de la Flora registrada.....	28
Tabla 12. Especies vegetales en estado de conservación de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente.....	29
Tabla 13. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto sobre el componente Flora y vegetación terrestre.	7
Figura 2. Puntos de muestreo de Flora (parcelas, “P”) en el AI del Proyecto.	9
Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	19
Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno.	22
Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Cortinas de árboles exóticos” identificada en el AI del Proyecto.	23
Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Cultivos agrícolas” identificada en el AI del Proyecto.	24
Figura 7. Familias registradas en el AI del Proyecto.	26

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la caracterización del componente flora y vegetación para el proyecto Planta Fotovoltaica Rengo 7 MW, en adelante el “Proyecto”. Dicha caracterización se realizó de acuerdo con la información bibliográfica disponible y a la información técnica recopilada durante la ejecución de una campaña de terreno realizada en época de primavera, el día 11 de diciembre de 2020. El Proyecto se ubica en la comuna de Rengo, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, aproximadamente a 4,5 al oeste del centro urbano de dicha ciudad.

En el actual documento se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la Res. Ex. N°1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo con el listado del D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo con los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. Es decir, corresponde al área que debe ser descrita para identificar o descartar adecuadamente los posibles impactos, en este caso, del componente flora y vegetación.

Conforme a esto, el Área de Influencia del Proyecto (en adelante AI) se determinó por medio de las partes, obras y acciones que generará el Proyecto y el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de lo que se presupuesta como las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto, más un área de transición considerada (buffer), la que se justifica debido a las características ecosistémicas de la matriz circundante al área de emplazamiento del Proyecto y su valor biológico.

En este sentido, el AI corresponde a aquella superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales del Proyecto, más un área buffer de 20 metros alrededor de las obras perimetrales (cierre perimetral y líneas de evacuación eléctrica aérea, con su respectiva servidumbre), cuyo tamaño total es de 20,6 ha aproximadamente. De esta forma, el AI incluye la ubicación de los

paneles fotovoltaicos, caminos y la línea de media tensión. En la




Figura 1 se muestra la ubicación geográfica del AI (UTM DATUM WGS-84, Huso 19S).




Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto sobre el componente Flora y vegetación terrestre.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el Proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el AI se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “*piso vegetal*”, definido como “*espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica*”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (Figura 2), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de 6 puntos de muestreo (parcelas) en la campaña realizada. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (Tabla 1).

Tabla 1. Puntos de Muestreo (parcelas) realizados en Campaña de Primavera.

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
P1	324722	6192468
P2	325017	6192075
P3	324810	6192040
P4	324943	6192194
P5	324896	6192613
P6	324865	6192429

Fuente: Elaboración Propia, 2021.




Figura 2. Puntos de muestreo de Flora (parcelas, "P") en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

El trabajo de campo estuvo a cargo de dos profesionales especialistas en flora y vegetación, con un esfuerzo de muestreo diario de 8 horas/hombre, totalizando 16 horas de trabajo. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000. Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

De esta forma, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente, sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo con el siguiente sistema de clasificación (Tabla 3):

Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles)	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
C/suculentas	Rala	No existe				
FORMACIÓN DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N°20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las condiciones expuestas en la Tabla 4.

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENISIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

Con relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo con lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con la información bibliográfica existente y en base a lo observado (Tabla 5).

Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	
Presencia de formaciones vegetales relictuales	
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.	
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.6 Flora

Como ya se indicó, la Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de 6 puntos de muestreo (parcelas), los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x1 m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x10 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018). También se consultó el sitio WEB Flora del Cono Sur del Instituto de Botánica Darwinion.

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. La Tabla 6 detalla la clasificación de cobertura utilizada.

Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2021; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 7).

Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, DS N°23/2019 del MMA y el DS N°16/2020 del MMA que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo con ello, se

consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). La Figura 3, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:




Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de "Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se inserta dentro del piso vegetal "Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*", siendo éste un bosque esclerófilo dominado por *Q. saponaria*, *L. caustica* y *Kageneckia oblonga*. También es abundante localmente *Cryptocarya alba*, pero en sectores con más humedad.

En cuanto a su composición florística, está formado por *Alstroemeria haemantha*, *Azara petiolaris*, *Baccharis paniculata*, *B. rhomboidalis*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eccremocarpus scaber*, *Escallonia pulvurulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Kageneckia oblonga*, *Lithrea caustica*, *Nassella chilensis*, *Pasithea coerulea*, *Podanthus mitiqui*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja odorífera*, *Satureja gilliessi*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrum*, *Solenomelus pedunculatus*, *Teucrium bicolor*, *Trevoa quinquenervia*, *Tristerix corymbosus*.

En relación con su distribución geográfica, este ecosistema se encuentra en laderas bajas de la cordillera de Los Andes y de la vertiente oriental de la cordillera de La Costa de la región de O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, entre los 200 y 1.700 m.s.n.m, específicamente en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco y subhúmedo inferior oceánico.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron dos Formaciones vegetacionales, correspondientes a:

- Cortinas de árboles exóticos
- Cultivos agrícolas

Adicionalmente, se identificaron "otros usos de suelo", correspondientes caminos. En la Tabla 8 se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (Figura 4).

Tabla 8. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIAMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Cortinas de árboles exóticos	1,1	5,3
2	Cultivos agrícolas	18,5	89,8
4	Otros usos de suelo	1,0	4,9
TOTAL		20,6	100

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Es posible apreciar la dominancia de las áreas con formación de **Cultivos agrícolas**.




Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2021.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Cortinas de árboles exóticos**

Esta unidad se encuentra en el borde norte y este del AI, así como también en el centro, delimitando cultivos. (Figura 5), formando cortinas arbóreas

El estrato arbóreo se compone de *Acacia dealbata*, *Salix babylonica*, *Populus nigra* y *Robinia pseudoacacia*, los que presentan mayor o menor cobertura dependiendo de la ubicación exacta de la cortina vegetal en el AI.

En P1, la estrata arbórea está formada principalmente por *A. dealbata*, cuya cobertura alcanza un 70%, y la mayoría de los individuos presentan alturas superiores a 10 metros. Se registró igualmente *S. babylonica*, que registró una cobertura de 10%. Dicha estación de muestreo también registra una estrata arbustiva formada por *Rubus ulmifolius* (10% de cobertura) y la especie nativa *Cestrum parqui* (5% de cobertura). El estrato herbáceo en dicho punto se compone principalmente por *Galium aparine*, con una cobertura de un 5%.

En P5 se presenta una cortina más delgada, formada por *P. nigra* con una cobertura de 20%, y *S. babylonica*, *R. pseudoacacia* y *A. dealbata*, cada una con una cobertura de 10%. Las alturas de los árboles en dicha estación variaron entre 4 metros y algunos individuos de más de 12 metros. El estrato arbustivo estaba dominado por *Rubus ulmifolius*, con una cobertura de 30%. También se registró la especie nativa *Tessaria absinthoides*, con una cobertura de 5%. En cuanto al estrato herbáceo, registraba una dominancia de 7 especies exóticas que presentaron una cobertura de 5% cada una.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 1,1 ha, que equivale al 5,3% del AI.



Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Cortinas de árboles exóticos” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2020.

- **Cultivos agrícolas**

Formación dominante en el AI del Proyecto. Corresponde a cultivos de producción agrícola de *Zea mays*, *Prunus persica* y *Prunus domestica* (Figura 6).

En los sectores donde se registra cultivo de *Zea mays*, la especie en cuestión presenta una cobertura entre 70% y 80%. También se registra la especie nativa *Cyperus eragrostis*, con pocos individuos (menos de un 1% de cobertura).

En los cultivos de *Prunus persica*, la especie registra coberturas de 70%, y es acompañada (como estrato herbáceo) por la especie *Lolium perenne*, cuya cobertura fue de 40%.

En el caso de los cultivos de *Prunus domestica*, dicha especie presentó cobertura de un 70%. Se encontraba acompañada por una estrata de sotobosque de *Rubus ulmifolius* (5% de cobertura) y por la especie nativa *Equisetum giganteum* (5% de cobertura). También registró una estrata herbácea dominada por *Sorghum halepense*, *Galium aparine* y *Lolium perenne*, cuyas coberturas fueron de 25%, 20% y 20% respectivamente.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 18,5 ha, que equivale al 89,8% del AI.



Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Cultivos agrícolas” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2020.

- **Otros usos de suelo**

Esta unidad está conformada por caminos y edificaciones. Presenta una superficie de 1,0 ha, lo que representa el 4,9% del AI.

5.2.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas en el AI del Proyecto, sin embargo, estas formaciones son dominadas por especies alóctonas (*A. dealbata*, *P. nigra*, *R. pseudoacacia*, *S. babylonica*) y especies de producción agrícola arbóreas). Tampoco se registraron especies de árboles nativos, por lo que no existe en el AI formaciones boscosas nativas.

El resto del AI se compone principalmente de especies herbáceas y arbustivas exóticas asilvestradas, por lo que no existe presencia de formaciones xerofíticas. Dicho lo anterior y de acuerdo con el análisis de la normativa legal se ha determinado que:

No existe en el AI la presencia de **Bosque Nativo de Preservación**, debido a que las formaciones vegetales existentes presentan las siguientes características:

- a) No presenta o constituye actualmente especies vegetales protegidas legalmente;
- b) No presenta o constituye actualmente hábitat de especies vegetales clasificadas en las categorías de conservación, de acuerdo con las definiciones establecidas en la Ley N°20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- c) No corresponde a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, donde cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- d) No corresponde aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

5.2.3. Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, no se registraron singularidades vegetacionales y florísticas en el AI del Proyecto, de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

5.2.4. Flora

5.2.4.1. Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza Florística registrada en el AI fue de 43 especies, pertenecientes a 20 familias (ver Tabla 13 en acápite apéndices).

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por las divisiones *Magnoliophyta*, con 42 especies, y *Pteridophyta*, con una especie. La primera registró 36 especies pertenecientes a la clase *Magnoliopsida* y 6 pertenecientes a la clase *Liliopsida*, mientras que la especie de la segunda división mencionada pertenece a la clase *Sphenopsida*.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies de 18 familias. De estas, destaca la familia *Asteraceae*, por presentar la mayor cantidad de especies, con 8 representantes.

Con respecto a la clase *Liliopsida*, ésta se encuentra representada por 2 familias, de las que destaca *Poaceae*, con 5 especies. La Figura 7 indica la composición de familias registradas en el AI del Proyecto.




Figura 7. Familias registradas en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.2.4.2. Abundancia

Se calculó la cobertura de cada especie registrada en función del promedio de cobertura por especie en el total de las 6 parcelas prospectadas.

Las especies de mayor abundancia son de origen Adventicio, y ninguna especie nativa presentó una cobertura total superior a un 1%. La especie con mayor cobertura fue *Zea mays*, con un 25%. Le sigue *Acacia dealbata*, con una cobertura de 13,3%, y *Prunus domestica* y *Prunus persica* (especies de producción agrícola), con 11,7% de cobertura cada una. Esto coincide con lo establecido en la COT, cuyos resultados indicaron dominancia de la formación “Cultivos agrícolas”, y tres de las cuatro especies dominantes son especies de producción agrícola. El resto de las especies registraron coberturas inferiores a 10%.

En la Tabla 9 se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979), con la lista de especies que registraron una cobertura igual o mayor a 1%. Las especies que no se listan en esta tabla obtuvieron un índice de abundancia menor a 1% (“+” o “r”).

Tabla 9. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Acacia dealbata</i> Link	13,3%	2
<i>Chenopodium album</i> L.	1,7%	1
<i>Galium aparine</i> L.	1,5%	1
<i>Lolium perenne</i> L.	4,2%	1
<i>Lolium</i> sp.	7,5%	2
<i>Portulaca oleracea</i> L.	1,3%	1
<i>Prunus domestica</i> L.	11,7%	2
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	11,7%	2
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	1,7%	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	7,5%	2
<i>Salix babylonica</i> L.	3,3%	1
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	6,2%	2
<i>Zea mays</i> L.	25,0%	4

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.4.3. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo, con el 74,4%, seguido por el tipo Arbóreo, con 14,0%, y Arbustivo, con 11,6%. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (

Tabla 10).

Tabla 10. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	6	14,0
Arbustivo	5	11,6
Herbáceo	32	74,4
TOTAL	43	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.4.4. Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 88,4% es de origen Alóctono, un 9,3% de origen Nativo, mientras que no se registraron especies endémicas. La Tabla 11 entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 11. Origen geográfico de la Flora registrada.

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	38	88,4
Endémica	0	0
Nativo	4	9,3
Indeterminado	1	2,3
TOTAL	43	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.4.5. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, una se encuentra en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), correspondiente a la cola de caballo (*Equisetum giganteum* L.).

5.2.4.6. Estado de Conservación de las especies de Flora

Tras rodalizar el área de influencia del Proyecto, se identificó una especie bajo alguna Categoría de Conservación (Tabla 12), correspondiente a la especie endémica *Equisetum giganteum*, que se encuentra en la categoría “Preocupación menor” (LC).

Tabla 12. Especies vegetales en estado de conservación de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	FUENTE
<i>Equisetum giganteum</i>	Cola de caballo	LC	DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2021. LC: Preocupación menor, MMA: Ministerio de medio ambiente.

6 CONCLUSIONES

En el área de influencia del Proyecto se presentan tres formaciones vegetales: Cortinas de árboles exóticos, Cultivos agrícolas y Área con otros usos de suelo, en donde la segunda formación, dominada por especies exóticas de producción agrícola, presentó la mayor cobertura (89,8% del AI del Proyecto), lo que demuestra que el AI se encuentra fuertemente intervenida y el ecosistema natural ha sido sustituido.

El Proyecto no afectará bosque nativo, pues las únicas formaciones boscosas presentes en el AI contienen únicamente especies arbóreas exóticas. Asimismo, el AI no presenta la comunidad florística descrita por Luebert y Pliscoff (Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*). No se registró ninguna de las singularidades descritas por la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA.

El área de estudio presenta una vegetación predominantemente herbácea (más del 74,0% de las especies registradas), lo que se rectifica con la COT, en donde los ecosistemas dominantes son cultivos agrícolas, de los cuáles la mayoría se conforman por especies herbáceas.

En términos generales de la flora presente en el AI, la mayoría de las especies son exóticas (88,4%). Esto demuestra que en el área existen ecosistemas antropizados, en donde el paisaje natural fue sustituido por especies de producción, lo que dio a su vez la posibilidad del establecimiento de malezas, limitando el desarrollo de especies nativas. De las especies nativas registradas, una es herbácea y tres son arbustivas, no registrándose especies nativas arbórea. No se registraron especies endémicas en el AI del Proyecto.

Se identificó una especie incluida en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), correspondientes a *Equisetum giganteum*.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, se registró una especie bajo Categoría de Conservación en el AI del Proyecto, siendo ésta la especie anteriormente mencionada, *E. giganteum*, la que se encuentra en estado de conservación “Preocupación menor” (LC).

Finalmente, el Proyecto afectará principalmente en las áreas en donde se construirán los paneles y las áreas en donde existirá servidumbre eléctrica, las que no registran una vegetación singular ni un ecosistema natural. Por el contrario, el ecosistema predominante es un ambiente antropizado y con una proporción muy baja de especies nativas, las cuales no son endémicas ni se encuentran bajo protección oficial.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N°151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N°29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.

- Decreto Supremo N°23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso.
- Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.

- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

8. APÉNDICES

8.1 LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 13. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo europeo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Arbóreo	Sin clasificar
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Bledo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Anoda cristata</i> (L.) Schlecht	Malva cimarrona	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Falso té	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nativa	Arbustivo	Sin clasificar
<i>Chenopodium album</i> L.	Quinhuilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Nativa	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Equisetum giganteum</i> L.	Cola de caballo	Pteridophyta	Sphenopsida	Equisetaceae	Nativa	Arbustivo	LC
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav	Pacoyuyo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Cebadilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuga silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuga silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica inglesa	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Lolium sp.</i>	Ballica	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Malva parviflora</i> L.	Malva	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Carretilla mansa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Pila pila	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Lechuguilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Sanguinaria	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Introducida	Arbóreo	Sin clasificar
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Portulacaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Prunus domestica</i> L.	Ciruelo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbóreo	Sin clasificar
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Durazno	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbóreo	Sin clasificar
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Rabaniza	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falso acacio	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Arbóreo	Sin clasificar
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbustivo	Sin clasificar
<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Introducida	Arbóreo	Sin clasificar
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Solanum nigrum</i> L.	Tomatillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Introducida	Arbustivo	Sin clasificar
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Maicillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Sysymbrium</i> sp.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Indeterminado	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg	Diente de león	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC	Brea	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Nativa	Arbustivo	Sin clasificar
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verbena	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Veronica arvensis</i> L.	Verónica	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar
<i>Zea mays</i> L.	Maíz	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo	Sin clasificar

Fuente: Elaboración Propia, 2021. LC: Preocupación menor.