

ANEXO N°2.3
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO
PARQUE FOTOVOLTAICO TERRUÑO

ANEXO N°2.3
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA

SOLAR TI VEINTISÉIS SPA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

CL-MA-20-0180-001-C02-A2.3-00
DICIEMBRE DE 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.2. OBJETIVOS	1
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
2. METODOLOGÍA.....	3
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	3
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	5
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	6
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes bibliográficos</i>	7
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	7
2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	10
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	16
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....	17
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY N°20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	19
3. RESULTADOS.....	20
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	20
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	23
3.2.1. <i>Flora</i>	23
3.2.2. <i>Vegetación</i>	25
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	31
4. CONCLUSIONES.....	35
5. BIBLIOGRAFÍA.....	37
5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....	37
5.2. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES.....	38
6. APÉNDICES.....	39

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 2.1.1. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET.....	4
CUADRO N° 2.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO.....	7
CUADRO N° 2.2.2. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES	9
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	12
CUADRO N° 2.2.4. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT.....	13
CUADRO N° 2.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	13
CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT.....	14
CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	14
CUADRO N° 2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	15
CUADRO N° 2.2.9. CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	15
CUADRO N° 2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	16
CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO ...	16
CUADRO N° 2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	18
CUADRO N° 3.1.1. ASOCIACIONES VEGETALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO .	20
CUADRO N° 3.1.2. COMUNIDADES VEGETALES POTENCIALES DEL ÁREA DE PROYECTO.....	21
CUADRO N° 3.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN	23
CUADRO N° 3.2.2. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	23
CUADRO N° 3.2.3. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA	24
CUADRO N° 3.2.4. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA.....	24
CUADRO N° 3.2.5 CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO REGISTRADAS EN TERRENO, ÁREA PROYECTO Y ENTORNO.	25
CUADRO N° 3.3.1. ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	32

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N°1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO TERRUÑO	2
FIGURA N°2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012.....	6
FIGURA N° 3.1.1. PISOS VEGETACIONALES SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF, EN EL ÁREA DEL PROYECTO.....	22
FIGURA N° 3.2.1. FISIONOMÍA DE ÁREAS URBANAS E INDUSTRIALES	26
FIGURA N° 3.2.2. FISIONOMÍA DE BOSQUE NATIVO DE <i>MAYTENUS BOARIA</i> , <i>SCHINUS LATIFOLIUS</i> Y <i>ACACIA CAVEN</i>	26
FIGURA N° 3.2.3. FISIONOMÍA DE BOSQUE NATIVO DE <i>ACACIA CAVEN</i>	27
FIGURA N° 3.2.4. FISIONOMÍA DE PLANTACIÓN DE <i>EUCALYPTUS GLOBULUS</i>	28
FIGURA N° 3.2.5. FISIONOMÍA DE CORTINAS ARBÓREAS.....	28
FIGURA N° 3.2.6. FISIONOMÍA DE MATORRAL ARBORESCENTE DE <i>RUBUS ULMIFOLIUS</i> , <i>ACACIA CAVEN</i>	29
FIGURA N° 3.2.7.FISIONOMÍA DE HERBAZAL <i>BRASSICA CAMPESTRIS</i> , <i>RAPHANUS RAPHANISTRUM</i> , <i>AVENA BARBATA</i>	30
FIGURA N° 3.2.8.FISIONOMÍA DE HERBAZAL DE <i>AVENA FATUA</i> Y <i>TRITICUM SP.</i>	30
FIGURA N° 3.2.9. FISIONOMÍA DE ÁRBOLES AISLADOS DE <i>ACACIA CAVEN</i> Y <i>MAYTENUS BOARIA</i>	31

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El Proyecto “Parque Fotovoltaico Terruño” (en adelante “Proyecto”), corresponde a la construcción y operación de una nueva Central Solar Fotovoltaica (CSF), enmarcado dentro de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) destinado a la generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar por medio del uso de paneles fotovoltaicos, cuya potencia instalada será hasta 10,89 MWp y una potencia nominal de 9 MW. La evacuación de la energía generada será por medio de una línea de transmisión eléctrica (LTE) de 12 kV, de un longitud aproximadamente de 2,43 km.

El Proyecto se emplaza en un entorno rural a aproximadamente 2,5 kilómetros de la localidad de Casablanca, cuya principal vía de acceso es por la ruta F-830, comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso.

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la flora y vegetación asociada al Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012.

En este sentido, el componente ambiental flora y vegetación, constituye elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia del Proyecto objeto de la evaluación ambiental.

1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.
- Identificar sensibilidades ambientales con respecto al componente Flora y Vegetación.

1.3. Área de Influencia

El RSEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se proyectan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

De acuerdo a la descripción precedente, el área de influencia corresponde a una superficie de aproximadamente 20,24 [ha], relacionada con el desarrollo del Proyecto de forma directa, dentro de la que se encuentra el área de paneles fotovoltaicos, más el trazado asociado a la implementación de la línea transmisión eléctrica, que considera en su mayor proporción (40 de los 47 postes que componen la línea) una intervención puntual asociada a la instalación de cada poste (cuadrado de 4 m² por cada poste).

Adicionalmente, en el primer tramo de línea, saliendo desde el área paneles (desde el vértice del deslinde sur del cerco perimetral entre los postes P2 y P3, hasta los postes P6 y P7, en una longitud en torno a 177 m, se consideró una faja de seguridad de 5 m de ancho aproximado, dado que existe una plantación forestal, la cual será cortada como medida de prevención de incendios. En el segmento final (extremo oriente) de la línea, existe un tramo en que esta va soterrada, por lo que también se presenta como un área de afectación continua, en un tramo de aproximadamente 300 m, destinado a la confección de una zanja.

Figura N°1.3.1 Área de influencia Proyecto Parque Fotovoltaico Terruño



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Sin perjuicio de lo anterior, a objeto de definir adecuadamente las unidades de vegetación presentes tanto en el área de influencia del proyecto, como también en zonas aledañas, se caracterizó un área mayor (36,98 ha), consistente en una faja continua de aproximadamente 20 m de ancho en todo el trazado de la línea, además de la totalidad del área de paneles y zonas aledañas.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, a modo de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno (estación primavera), durante los días 4 y 5 de noviembre 2020, en la cual la información fue levantada por dos profesionales del área. Durante la campaña de terreno se recorrió el área de influencia, identificando y caracterizando el polígono clasificado mediante fotointerpretación. El levantamiento de información general de vegetación está enfocado en capturar variables cualitativas y cuantitativas. Entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras, mientras que las variables cuantitativas corresponden fundamentalmente al número de individuos presentes de alguna especie que se desarrollan sobre una unidad vegetacional (abundancia).

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida anteriormente y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base para la componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2014).

2.1. Caracterización de la Flora

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de recorridos pedestres y puntos de registro de flora, los cuales fueron distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia.

En cada uno de estos tramos recorridos se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento, fenología, y se tomaron fotografías tanto de las entidades

registradas como de las unidades muestreadas a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área. Según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificados son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita.
- Riqueza y abundancia.
- Tipos biológicos.
- Grado de endemismo (origen geográfico).

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó conforme a la clasificación de Rodríguez *et al.* (2018) correspondiente al Catálogo de las plantas vasculares de Chile y, secundariamente, a Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y abundancia

La abundancia se describe por medio de la metodología de Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N°2.1.1). Conforme a ella, la abundancia para las especies menos abundantes se segregó en tres rangos o clases, incorporando el valor “p” para individuos de aquellas especies observadas fuera de la unidad o punto de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico, ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal. Los niveles de abundancia restantes han sido clasificados en 5 rangos o clases.

Cuadro N° 2.1.1.Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno sobre la base de lo indicado por Rodríguez *et al.* (2018) o, secundariamente, conforme a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

d) Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora


Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N°387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018 y D.S. N°16/2020 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), del año 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. La Figura N°2.1.1 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Figura N°2.1.1 Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como “el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado” Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la

descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:2.500.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetacional del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre flora y vegetación presente en marcos biogeográficos de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2017) y definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo *et al.* (2008).

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetacional, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

A su vez, las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016), junto con estudios de líneas de base previos aplicados al sector donde se emplazará el Proyecto. La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se llevó a cabo preliminarmente, a partir de la interpretación de un mosaico a través de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth), las que se segregaron, de acuerdo a sus características en diferentes áreas y unidades reconocibles. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N° 2.2.1 y Cuadro N° 2.2.2):

Cuadro N° 2.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1	Centros Poblados
	1.2	Suelos Removidos
2	Terrenos Agrícolas	
3	Praderas y Estepas	

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Pradera perenne - Parque
	3.3	Pradera perenne de altura
	3.4	Estepa
	3.5	Estepa altoandina
4	Matorrales	
	4.1	Matorral
	4.2	Matorral arborescente
5	Bosque Nativo	
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto
	5.10	Bosque achaparrado denso
	5.11	Bosque achaparrado semi denso
	5.12	Bosque achaparrado abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.2	Mallín
	8.3	Marismas
	8.4	Vega
	8.5	Turbera
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1	Lagos, lagunas, embalses
	9.2	Océano
	9.3	Ríos
10	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	10.1	Borde costero
	10.2	Cajas de río
	10.3	Cumbres, afloramientos rocosos

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Cuadro N° 2.2.2. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales

CATEGORÍAS DE FORMACIÓN	DEFINICIÓN
Bosque adulto	Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
Bosque renoval	Corresponde a un bosque nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general, son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
Pradera	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pradera con suculentas	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante, tipo biológico suculento tiene cobertura > 5% y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pajonal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%. Se ubica en sectores cordilleranos altoandinos sobre los 3.000 m.s.n.m., diferenciándose de los herbazales por la dominancia de gramíneas cespitosas, como las del género <i>Pappostipa</i> , <i>Festuca</i> o <i>Deyeuxia</i> .
Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral ribereño	Formación vegetal asociado a un curso de agua (río), donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral con suculentas	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% y la cobertura del tipo biológico arbustivo puede estar entre 5 y 100%.
Humedales	Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Domina el tipo biológico herbáceo con coberturas que pueden alcanzar el 100%. Se incluyen vegas, bofedales, pajonal hídrico y vegetación ribereña, según la clasificación de los humedales altoandinos de Ahumada y Faúndez (2009).

CATEGORÍAS DE FORMACIÓN	DEFINICIÓN
Cuerpos de Agua	Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficiales, móviles o estancadas. Que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría se encuentran lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
Área desprovista de vegetación	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o con la presencia de individuos aislados que no superan el 1% de cobertura. Se encuentran en esta categoría; cumbres y/o afloramientos rocosos, salares y áreas denudadas por efecto de erosión natural.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento).
- Cobertura de cada estrato.
- Especies dominantes.
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad.
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica.
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas

(PAS 151) , Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) *Tipos biológicos o estratos.*

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Ésta información, se detalla en el Cuadro N°2.2.3.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

Cuadro N° 2.2.3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

De acuerdo a dicha metodología, el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.

- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N° 2.2.4 y Cuadro N° 2.2.5.):

Cuadro N° 2.2.4. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT

CATEGORÍA DE COBERTURA	% DE COBERTURA	CÓDIGO COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.2.5. Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento. Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes.

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.2.6.).

Cuadro N° 2.2.6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO
	GÉNERO	ESPECIE	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frigida</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación.*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.2.7).

Cuadro N° 2.2.7. Categorías de Posición Topográfica

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2019; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar la categoría de posición topográfica asociada al relieve y sustrato, es necesario determinar el nivel o magnitud de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal (pendiente), en porcentaje. La pendiente, en conjunto a la posición del paisaje, definen lo que se conoce como configuración topográfica.

Para la determinación de la pendiente o rango de pendiente, se deberá considerar, además del gradiente (inclinación), la complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), forma, exposición y longitud. Las clases o rangos serán aquellos definidos en la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011), descritos en el Cuadro N°2.2.8.

Cuadro N°2.2.8. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2020; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación.

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual) , los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N° 2.2.9.

Cuadro N°2.2.9.Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Grado de Artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N° 2.2.10.

Cuadro N°2.2.10. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativas para realizar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades en el Cuadro N°2.3.1:

Cuadro N° 2.3.1. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Estudio

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983

por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N°2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *“a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas”*.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es *“todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de Peligro”*; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) “CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10º de la Ley N° 19.300 y artículo 3º del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies “en peligro de extinción” (equivalente a categorías “en peligro crítico” y “en peligro”, de acuerdo a clasificación UICN)60, “vulnerables” (equivalente a categoría “vulnerable”, de acuerdo a clasificación UICN), “raras”, “insuficientemente conocidas”, “casi amenazada” o “preocupación menor”. Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserto en la Región del Matorral y Del Bosque Esclerófilo, sub región del Bosque Esclerófilo, formación Bosque Esclerófilo Costero que corresponde a una formación vegetal muy alterada, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de a Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy desaparecido.

De acuerdo a la ubicación del proyecto la formación más probable sería *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius*.

Cuadro N° 3.1.1. Asociaciones vegetales características del área del Proyecto

FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)		
<i>Cryptocarya alba</i> – <i>Schinus latifolius</i> (PEUMO - MOLLE)		
CATEGORÍAS	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Especies representativas	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo
	<i>Peumus boldus</i>	Boldo
	<i>Schinus latifolius</i>	Molle
Especies acompañantes	<i>Lithraea caustica</i>	Litre
	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
Especies comunes	<i>Adenopeltis serrata</i>	Colliguay macho
	<i>Azara celsastrina</i>	Lilen
	<i>Chusquea cumingii</i>	Quila
	<i>Escallonia revoluta</i>	Corontillo
	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán
	<i>Podanthus mitique</i>	Mitique

FORMACIÓN VEGETAL (GAJARDO, 1994)		
<i>Cryptocarya alba</i> – <i>Schinus latifolius</i> (PEUMO - MOLLE)		
CATEGORÍAS	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
	<i>Proustia pyrifolia</i>	Parrilla blanca
	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú
	<i>Stellaria cuspidata</i>	Quilloiquilloi
	<i>Retanilla quinquenervia</i>	Trevo

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Gajardo, 1994.

De acuerdo a lo indicado por Gajardo (1994) también existen otras asociaciones vegetales tales como *Beilschmiedia miersii* – *Crinodendron patagua* (Belloto – Patagua), *Jubaea chilensis* – *Lithraea casutica* (Palma – Litre), *Drimys winteri* – *Luma chequen* (Canelo - Chequén), etc.

Por otra parte, de acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017), el área de influencia se desarrolla en el piso vegetal denominado Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* – *Cryptocarya alba*, bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* a la que generalmente se asocian las especies *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia*, y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myrus*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven*.

En cuanto a la dinámica la degradación antrópica produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones, donde la presencia de plantas nodrizas cumple la función importante en el establecimiento de las especies vegetales nativas.

Cuadro N° 3.1.2. Comunidades vegetales potenciales del área de Proyecto


FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
Bosque espinoso	Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Lithraea caustica</i> – <i>Cryptocarya alba</i>	<i>Aristotelia chilensis</i>
		<i>Azara celastrina</i>
		<i>Baccharis linearis</i>
		<i>Cardionema ramosissima</i>
		<i>Cestrum parqui</i>
		<i>Colliguaja odorífera</i>
		<i>Cryptocarya alba</i>
		<i>Escallonia pulverulenta</i>
		<i>Eupatorium glechonophyllum</i>

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
		<i>Lithraea caustica</i>
		<i>Lobelia excelsa</i>
		<i>Muelhenbeckia hastulata</i>
		<i>Nasella chilensis</i>
		<i>Peumus boldus</i>
		<i>Podanthus mitique</i>
		<i>Pseudognaphalium robustum</i>
		<i>Quillaja saponaria</i>
		<i>Retanilla trinervia</i>
		<i>Schinus latifolia</i>
		<i>Schinus polígama</i>
		<i>Solenomelus pedunculatus</i>
		<i>Vulpia myuros</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Luebert & Pliscoff, 2017.

A continuación, se presenta la representación gráfica de pisos vegetacionales según Luebert & Pliscoff (2017) en relación al área del Proyecto.

Figura N° 3.1.1. Pisos Vegetacionales según Luebert y Pliscoff, en el área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, sobre base Luebert y Pliscoff (2017), 2020.

Donde:

P39: Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* – *Peumus boldus*

P40: Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* – *Cryptocarya alba*

3.2. Resultado de la Prospección

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Área urbana
2	Bosque nativo <i>Maytenus boaria</i> , <i>Schinus latifolius</i> , <i>Acacia caven</i>
	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>
3	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>
	Cortinas arbóreas de especies exóticas
4	Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Acacia caven</i>
5	Herbazal <i>Brassica campestris</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Avena barbata</i>
	Herbazal <i>Avena fatua</i> y <i>Triticum sp.</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Riqueza Taxonómica en el Área del Proyecto

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de recorridos pedestres por toda el área de emplazamiento del Proyecto, trabajo realizado por dos (2) profesionales del área, que revisaron el área tanto de paneles y obras asociadas, como la superficie destinada para la línea de transmisión eléctrica (LTE).

De acuerdo a la información recopilada en terreno, se determinó que la flora vascular del área de influencia alcanza 33 especies vasculares. El resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta en el Apéndice A. Catálogo Taxonómico, entregando detalles cada una de las especies registradas.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, está definida por la división *Magnoliophyta*, la que está compuesta por las clases taxonómicas *Magnoliopsida* y *Liliopsida*, también se encuentra la división *Pinophyta*, compuesta solo por la clase *Pinopsida*. Mientras tanto, la clase *Magnoliopsida*, presenta un total de 24 individuos dentro del listado florístico, en donde, la familia más representativa corresponde a Poaceae y Asteraceae con seis (7) y cinco (5) individuos respectivamente.

Cuadro N° 3.2.2. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISION	CLASE	N° FAMILIAS	N° GÉNERO	N° ESPECIES
Magnoliophyta	<i>Liliopsida</i>	7	7	7
	<i>Magnoliopsida</i>	24	24	24
Pinophyta	<i>Pinopsida</i>	2	2	2
TOTAL GENERAL		33	33	33

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.2. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define principalmente por especies del tipo Herbáceas con un porcentaje equivalente al 56,2%, con una representatividad de 18 individuos, lo sigue el tipo biológico arbóreo, con el porcentaje de 37,5%, con un representatividad de 12 individuos, por último se encuentra el tipo biológico correspondiente a arbustos que cuenta con dos (2) individuos representando un 6,3%. En el cuadro a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Cuadro N°3.2.3. Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	N° ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL (%)
Arbustivo	2	6,1
Arbóreo	12	36,4
Suculento	0	0,0
Herbáceo	19	57,5
TOTAL	33	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.3. Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, de la flora vascular total, este listado posee especies tanto de origen nativo, endémico e alcotanas o introducidas en el área de emplazamiento del Proyecto.

En el Cuadro a continuación, se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Cuadro N°3.2.4. Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	N.º TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES (%)
Nativa	5	15,2
Endémico	1	3,0
Alóctona	27	81,8
TOTAL	33	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.4. Estados de Conservación

En función de la revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial en el área de estudio del proyecto.

3.2.2. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el contexto general de las formaciones próximas al Proyecto está formada por seis (6) usos de suelo, de acuerdo a sus características, grado de estratificación, cobertura y especies dominantes. Estas clasificaciones se describen a continuación, siendo importante mencionar que las unidades descritas en el siguiente cuadro corresponden al área de estudio general del Proyecto.

Para el caso de la superficie de emplazamiento de las obras del Proyecto, la formación dominante corresponde a Herbazal de *Brassica campestris*, *Raphanus raphanistrum* y *Avena barbata*, y para el área destinada para la LTE, se encuentra inserta en el uso de suelo área urbana e industriales y Plantaciones (correspondientes a cortinas arbóreas con especies exóticas).

Cuadro N° 3.2.5 Categorías de Recubrimiento del Suelo registradas en Terreno, Área Proyecto y Entorno.

ID	Uso de suelo	Sub Formación	Superficie (ha)
1	Área Urbanas e industriales	-	2,29
2	Bosque	2.1 Bosque de <i>Maytenus boaria</i> , <i>Schinus latifolius</i> y <i>Acacia caven</i>	0,97
		2.2 Bosque de <i>Acacia caven</i>	0,75
3	Plantación	3.1 Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	0,69
		3.2 Cortinas arbóreas	4,00
4	Matorral	Matorral arborescente <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Acacia caven</i>	0,57
5	Herbazal	5.1 Herbazal <i>Brassica campestris</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Avena barbata</i>	24,68
		5.2 Herbazal <i>Avena fatua</i> y <i>Triticum sp</i>	2,45
6	Otras Arborescentes	6.1 Árboles aislados de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	0,58
TOTAL			36,98

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se presenta las definiciones de cada formación registrada en terreno:

3.2.2.1. Áreas urbanas e industriales

Hace referencia a sitios donde la vegetación natural ha sido completamente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, lo que se entiende también como una eliminación de la producción natural de dicha superficie. Dentro de esta

clasificación, se encuentran aquellas áreas ocupadas por sectores industriales, caminos pavimentados, o rurales, carreteras, líneas férreas, entre otras.

Con respecto a lo presentado en el Proyecto, el espacio con tales características, dentro del área de influencia, abarca una superficie aproximada de 2,29 ha, lo que corresponde a los sectores donde se emplazarán los postes que serán utilizados para la LTE del proyecto.

Figura N° 3.2.1. Fisionomía de Áreas urbanas e industriales



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, como tampoco la presencia de especies endémicas restringidas al área de influencia.

3.2.2.2. Bosque nativo de *Maytenus boaria*, *Schinus latifolius* y *Acacia caven*

La presente formación vegetal, se encuentra en el sector sur del área de influencia es un sector bastante acotado que abarca una superficie de 0,97 ha. En él destacan especies de hábito arbóreo como *Maytenus boaria* con cobertura entre 25 - 30 %, *Schinus latifolius* entre 10 – 20% y *Acacia caven* con coberturas de alrededor de 5 - 10%. Dicho estrato arbóreo presenta altura entre los 4 y 8 m. Acompañan especies arbustivas y herbáceas, destacando las herbáceas *Brassica campestris* y *Rhaphanus raphanistrum* con coberturas entre 10-25%.

Figura N° 3.2.2. Fisionomía de Bosque nativo de *Maytenus boaria*, *Schinus latifolius* y *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial. Con respecto a su origen, *Schinus latifolius* corresponde a especie endémica así como *Maytenus boaria* y *Acacia caven* que corresponden a especies autóctonas.

3.2.2.3. Bosque Nativo de *Acacia caven*

La presente formación vegetal, se encuentra en el sector noroeste del área de influencia, es un sector bastante acotado que abarca una superficie de 0,75 ha. En él destaca la presencia de la especie arbórea *Acacia caven* con coberturas de alrededor de 50 - 75%, presentando alturas que se encuentran entre los 2 y 4 m. Acompañan especies arbustivas y herbáceas, destacando entre ellas las especies herbáceas *Brassica campestris* cobertura entre 25-50% y *Rhaphanus raphanistrum* y *Avena barbata* con coberturas entre 5-25%.

Figura N° 3.2.3. Fisionomía de Bosque nativo de *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, pero si se registran especies de origen geográfico endémico *Schinus latifolius* y autóctono *Acacia caven* y *Maytenus boaria* dentro del área de influencia.

3.2.2.4. Plantación de *Eucalyptus globulus*

La presente formación vegetal, se encuentra en el sector sureste del área de influencia abarcando una superficie de 0,69 ha. En esta destaca la presencia de la especie *Eucalyptus globulus* con coberturas de alrededor de 50 - 75%, este estrato presenta alturas que se encuentran entre los 8 y 16 m. Existe una ausencia del estrato arbustivo y destaca en el estrato herbáceo la presencia de *Avena barbata* y *Brassica campestris* con coberturas de 25-50%.

Figura N° 3.2.4. Fisionomía de Plantación de *Eucalyptus globulus*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, como tampoco la presencia de especies endémicas restringidas al área de influencia.

3.2.2.5. Cortinas arbóreas

La presente formación vegetal, se encuentra en varios sectores del área de influencia la mayor parte de ellas se encuentra en sector de LTE y corresponden a cortinas arbóreas de especies exóticas como *Pinus radiata*, *Cupresus macrocarpa*, *Eucalytus sp* y *Acacia dealbata*, en total estas cortinas abarcan una superficie de 1,89 ha. Las alturas de estas cortinas con especies alóctonas se encuentran entre los 8-16 m. También se registraron tres cortinas arbóreas con individuos nativos de *Acacia caven* y *Maytenus boaria* estas suman una superficie de 2,11 ha. Las alturas de las cortinas se encuentran entre 2-4 m.

Figura N° 3.2.5. Fisionomía de Cortinas arbóreas



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, pero si se registran especies de origen geográfico nativo dentro del área de influencia, las cuales corresponden a *Acacia caven*, *Maytenus boaria*.

3.2.2.6. Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius*, *Acacia caven*

La presente formación vegetal, se encuentra en el sector NE del área de influencia y su superficie abarca 0,57 ha. En el destaca la presencia de la especie arbustiva *Rubus ulmifolius* con coberturas 50-75% y alturas que varían entre 1 y 2 m. en el estrato arbóreo acompaña *Acacia caven* con coberturas de 5-25% en menor media acompaña la especie *Maytenus boaria* con varios individuos pero con cobertura menor al 5%, el estrato arbóreo presenta alturas entre 2 y 4 m. El estrato herbáceo destacan las especies *Rhaphanus raphanistrum*, *Brassica campestris*, *Cynara cardunculus* y *Avena barbata* con coberturas entre 5-25%. Se destaca que la presente formación conforma parte de la vegetación ribereña asociada al estero Casablanca, el cual limita en la zona norte con el área de emplazamiento del Proyecto.

Figura N° 3.2.6. Fisionomía de Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius*, *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, pero si se registran especies de origen geográfico autóctono como *Acacia caven* y *Maytenus boaria*.

3.2.2.7. Herbazal de *Brassica campestris*, *Raphanus raphanistrum*, *Avena barbata*

La presente formación se ubica en la superficie directa de emplazamiento del Proyecto, destinado para la instalación de los paneles fotovoltaicos, con pendientes 0-5% siendo plano a moderadamente inclinado, dicha superficie abarca 24,68 ha y se su estrato herbáceo se compone principalmente de especies como *Brassica campestris* que tiene una cobertura de mayor al 75%, acompañan *Raphanus raphanistrum*, *Avena barbata*, *Lolium perenne* y *Triticum sp.* con coberturas entre 50-75%.

Figura N° 3.2.7. Fisonomía de Herbazal *Brassica campestris*, *Raphanus raphanistrum*, *Avena barbata*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, como tampoco la presencia de especies endémicas restringidas al área de influencia.

3.2.2.8. Herbazal de *Avena fatua* y *Triticum sp.*

La presente formación vegetal, se encuentra en el sector Este del área de influencia y su superficie abarca 2,45 ha. Dicho sector presenta características de cultivo pero no se observa manejo de este, también se encuentra en el lugar de emplazamiento de los paneles fotovoltaicos, las especies dominante presentes son herbáceas destacando *Avena Fatua* y *Triticum sp* con coberturas mayor al 75%, acompañan individuos aislados de *Acacia caven* con cobertura menor al 5%.

Figura N° 3.2.8. Fisonomía de Herbazal de *Avena fatua* y *Triticum sp.*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, pero si se registran especies de origen geográfico autóctono dentro del área de influencia correspondiente a *Acacia caven*.

3.2.2.9. Árboles aislados de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*

La presente formación vegetacional, se encuentra en el sector sur del área de influencia es un sector bastante acotado que abarca una superficie de 0,58 ha. En él destacan especies de hábito arbóreo como *Acacia caven* y *Maytenus boaria* con cobertura que en conjunto no alcanzan valores superiores a 10 %. Dicho estrato presenta altura entre los 2 y 4 m. Acompañan las herbáceas *Brassica campestris* y *Rhaphanus raphanistrum* con coberturas entre 25-50%.

Figura N° 3.2.9. Fisionomía de Árboles aislados de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial. Con respecto a su origen, *Maytenus boaria* y *Acacia caven* corresponden a especies autóctonas.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, cuya misión es impulsar la conservación de la biodiversidad chilena, en todos sus niveles, en un marco de buena gobernabilidad territorial, que garantice el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, y fomente las capacidades del país para resguardar, restaurar y usar sustentablemente este patrimonio y legado natural.

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción de la biodiversidad en la Región de Valparaíso, Gobierno de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente, y las actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N°103.008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N.°100.143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y sobre la base de la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto Parque Fotovoltaico Terruño no se encuentra en o próximo de las áreas

protegidas señaladas en los Oficios Ordinarios N° 130.844 de 2013 y N° 161.081 de 2016, ambos del SEA.

Respecto de los Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad que tienen aplicabilidad para el SEIA, el sitio prioritario El Roble se encuentra a 24 km lineales en dirección Este, de todas maneras se debe señalar que el Proyecto en cuestión no afecta y/o interactúa con ninguno de ellos.

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biósfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biósfera. La unidad bajo protección más próxima al terreno es la Reserva Nacional Lago Peñuelas a una distancia lineal aproximada de 11,5 km dirección Norte, mientras que el Parque nacional La Campana se encuentra a 44,7 km lineales en dirección NE.

b) Singularidades Ambientales

A continuación se presenta el análisis de las singularidades ambientales que presenta el área de influencia definida para el componente de flora y vegetación.

Cuadro N°3.3.1. Análisis de Singularidades Ambientales

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300	En el área de influencia no se definieron formaciones de bosque nativo de preservación, ni formaciones xerofíticas que contengan especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial	En el área de influencia no se registraron especies bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”	En el área de influencia no se registraron especies bajo ninguna categoría de conservación
Presencia de especies endémicas	En el área de influencia se registró la especie endémica <i>Schinus latifolius</i> .

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	En el área de influencia no se encuentran especies que presentan poblaciones reducidas o bajas en número.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378	La formación de matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Acacia caven</i> , comprende parte de la vegetación ribereña del estero Casablanca.

c) Formaciones Xerofíticas

Respecto a la presencia de especies de carácter xerofítico, en el área de influencia del Proyecto, se registraron especies arbóreas listadas en el Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de agricultura, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Pero estas especies se encuentran en formaciones de bosques o como individuos aislados, según los criterios técnicos mencionados en el título 2.4 Determinación de Formaciones Xerofíticas, estas especies no presentan requisito de densidad, en función de esto, no se requiere la presentación de Permiso Ambiental Sectorial PAS N°151, regulado por la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

d) Bosque nativo

Existe la presencia de formaciones boscosas que cumplen con lo expuesto en el título 2.5 Determinación de Formaciones Afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento forestal, por lo tanto según el artículo 5° del Título II de la misma ley 20.283 que dicta "Toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación". El requisito para poder realizar este tipo de corta o intervención, consiste en reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, con especies del mismo tipo forestal (D.S N°40/12 (MMA), artículo: 148°; artículo 5° Ley 20.283.

El proyecto no contempla la corta de bosques nativos, por lo que el PAS148 no es aplicable al caso en estudio.

e) Plantaciones forestales

Dada la existencia de la formación vegetal "Plantación de *Eucalyptus globulus*" y a la posible intervención por el emplazamiento de los paneles fotovoltaicos y obras asociadas es que según el artículo 21 del D.L. N° 701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N° 2.625, de 1979, (D.L. N° 701) que dispone: "Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal". No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región V de Valparaíso hasta la Región X de

Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento. La legislación forestal y las normas impartidas por CONAF indican que es posible calificar de aptitud preferentemente forestal las clases de uso V, VI, VII y VIII, de esta manera el proyecto se emplaza en suelos de Clase IVs, lo que podría entenderse como de aptitud preferentemente forestal, debido a restricciones de suelo, lo que haría aplicable el PAS 149 para una superficie de 0,69 [ha].

4. CONCLUSIONES

En el área de estudio se detectaron seis (06) usos de suelo, correspondientes a Área urbana e industriales, Bosque que contiene la sub formación de Bosque nativo de *Maytenus boaria*, *Schinus latifolius* y *Acacia caven*, el uso de suelo Plantación que contiene la sub formación de Plantación de *Eucalyptus globulus* y Cortinas arbóreas, el uso de suelo Matorral con sub formación Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Acacia caven*, el uso de suelo Herbazal, con sub formación de Herbazal *Brassica campestris*, *Raphanus raphanistrum*, *Avena barbata* y Herbazal de *Avena fatua* y *Triticum sp.*, y el uso de suelo Árboles aislados de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. Las superficies de cada unidad respectivamente son 2,29 ha, 0,97 ha, 0,75 ha, 0,69 ha, 4,00 ha, 0,57 ha, 24,68 ha, 2,45 ha y 0,58 ha, con un total de área de estudio de 36,98 ha. Con respecto a los usos de suelo relacionados al diseño del Proyecto y al emplazamiento de obras, se encuentra principalmente asociado a la unidad de Herbazal. Se destaca que parte de la formación de matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Acacia caven*, comprende parte de la vegetación ribereña asociada al estero Casablanca, el cual limita hacia el norte con el área del Proyecto.

En total se registró la presencia de 33 especies dentro de los usos de suelo mencionados anteriormente. Con respecto al origen geográfico, una (01) especies es de origen endémico correspondiente a *Schinus latifolius*; y cinco (05) autóctonas correspondiente a *Amsinckia calycina*, *Maytenus boaria*, *Acacia caven*, *Quillaja saponaria* y *Cestrum parqui*.

Dentro del área de influencia no se registraron especies en categoría de conservación clasificada en los listados nacionales de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

En el área de estudio se registraron tres (3) especies presentes en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, estas especies son arbóreas y corresponde a *Maytenus boaria*, *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*. Tras registrar la presencia de estas especies, se evaluaron los parámetros xerofíticos para dicha formación, no cumpliendo con los requisitos para determinar una unidad como formación xerofítica, por lo que no es necesario presentar el PAS N°151, sobre corta, destrucción y/o descepa de Formaciones Xerofíticas.

En el área de estudio existe la presencia de formaciones boscosas que cumplen con lo expuesto en el título 2.5 Determinación de Formaciones Afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento forestal, por lo tanto según el artículo 5° del Título II de la misma ley 20.283 que dicta "Toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación". Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto se ha ajustado de tal forma de no afectar dichas unidades vegetacionales, por lo que no requiere la presentación de Permiso Ambiental Sectorial PAS 148.

En el área de estudio también existe la presencia de la formación vegetal "Plantación de *Eucalyptus globulus*" que acorde al artículo 21 del D.L. N° 701 de 1974, para la intervención de bosque nativo o plantaciones forestales que se encuentren en terrenos calificados como preferentemente forestales corresponde presentación de PAS 149. Debido a las limitantes que presentan los suelos en el área (tanto hídricas como de las propiedades del suelo) es posible considerarlos como de aptitud preferentemente forestal, por lo que se

requiere la presentación de dicho Permiso Ambiental Sectorial para una superficie de 0,69 [ha].

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. 2006. Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 pp.

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 2a. ed. 381 pp.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P. Y MARTICORENA, A. 2018 Catalogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1), 1-430 p.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea : <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

5.2. Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 16/2020 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el Decimosexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 03 de agosto de 2020. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD. N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

6. APÉNDICES

APÉNDICE A.	CATÁLOGO TAXONÓMICO.
APÉNDICE B.	CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.
APÉNDICE C.	FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Cuadro N°1. Catálogo Taxonómico

ID	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN OFICIAL	DS N°68 DE 2008
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Endémica	Árbol	-	X
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducida	Hierba anual	-	-
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Introducida	Hierba perenne	-	-
4	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	Introducida	Hierba anual	-	-
5	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducida	Hierba anual	-	-
6	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carduus	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	Introducida	Hierba anual	-	-
7	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis	<i>Anthemis cotula</i>		Introducida	Hierba anual	-	-
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Amsinckia	<i>Amsinckia calycina</i>		Nativa	Hierba anual	-	-
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Introducida	Hierba anual	-	-
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsita de pastor	Introducida	Hierba anual	-	-
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	Introducida	Hierba anual	-	-
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Nativa	Árbol	-	X
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducida	Hierba perenne	-	-
14	Pinophyta	Pinopsida	Cupressaceae	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipres	Introducida	Árbol	-	-
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	Árbol	-	X
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia	Introducida	Árbol	-	-
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducida	Árbol	-	-
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagaceae	Quercus	<i>Quercus robur</i>	Roble	Introducida	Árbol	-	-
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Introducida	Hierba anual	-	-
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducida	Árbol	-	-
21	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Introducida	Árbol	-	-
22	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Introducida	Hierba anual	-	-
23	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Hordeum	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Introducida	Hierba anual	-	-
24	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus hordeaceus</i>		Introducida	Hierba anual	-	-

ID	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN OFICIAL	DS N°68 DE 2008
25	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena fatua</i>	Avena	Introducida	Hierba anual	-	-
26	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	<i>Briza minor</i>	Tembladera	Introducida	Hierba anual	-	-
27	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Introducida	Hierba perenne	-	-
28	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Triticum	<i>Triticum sp</i>	Trigo	Introducida	Hierba anual	-	-
29	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Nativa	Árbol	-	X
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducida	Arbusto	-	-
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Crataegus	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo extranjero	Introducida	Árbol	-	-
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	<i>Populus alba</i>	Alamo	Introducida	Árbol	-	-
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	<i>Cestrum parqui</i>	Parqui	Nativa	Arbusto	-	-

Fuente: Elaboración propia, 2020

APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Cuadro N°1. Carta de Ocupación de Tierras.

ID	FORMACION VEGETACIONAL	ESPECIES DOMINANTES	SIMBOLOGÍA (COT)	SUPERFICIE [HA]
1	Matorral arborescente de Rubus ulmifolius y Acacia caven	AC ; Ru	LA ₁ ; LB ₄	0,57
2	Cortina de Acacia caven y Robinia pseudoacacia	RP-AC	LA ₂	0,55
3	Area urbana e industrial	-	ZI	2,29
4	Cortina de Cupressus macrocarpa	CM	LA ₂	0,05
5	Cortina de Maytenus boaria	MB	LA ₂	0,21
6	Cortina Eucalyptus sp.	EG	LA ₂	0,07
7	Cortina Acacia dealbata	AD	LA ₂	0,07
8	Cortina Cupressus macrocarpa	CM	LA ₂	0,11
9	Herbazal de Avena fatua y Triticum sp.	af-tsp	H ₅	2,45
10	BN Maytenus boaria, Schinus latifolius y Acacia caven	AC-MB-SL	LA ₄ ; H ₂	0,97
11	Herbazal de Brassica campestris, Raphanus raphanistrum, Avena barbata	bc-rr-ab	H ₅	24,25
12	BN Acacia caven	AC	LA ₅ ; H ₂	0,78
13	Bosque Eucalyptus sp.	EG	LA ₂	0,69
14	Herbazal de Brassica campestris, Raphanus raphanistrum, Avena barbata	bc-rr-ab	H ₅	0,39


ID	FORMACION VEGETACIONAL	ESPECIES DOMINANTES	SIMBOLOGÍA (COT)	SUPERFICIE [HA]
15	Cortina de Pinus radiata y Cupressus macrocarpa	CM-PR	 LA ₂	0,47
16	Cortina Acacia caven	AC	LA ₂	0,26
17	Cortina de Eucaliptus sp.	EG	 LA ₂	0,68
18	Cortina Eucaliptus sp	EG	 LA ₂	0,44
19	Cortina Acacia caven	AC	LA ₂	1,09
20	Arboles aislados de Acacia caven y Maytenus boaria	AC-MB	LA ₂	0,58

Fuente: Elaboración propia, 2020

ESPECIES DOMINANTES	
TAXÓN	CÓDIGO ESPECIE
ARBÓREA	
<i>Mayetnus boaria</i>	MB
<i>Schinus latifolius</i>	SL
<i>Acacia caven</i>	AC
<i>Eucalyptus globulus</i>	EG
<i>Pinus radiata</i>	PR
<i>Cupressus macrocarpa</i>	CM
<i>Eucalyptus sp.</i>	ESP
<i>Acacia dealbata</i>	AD
ARBUSTIVAS	
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
HERBÁCEAS	
<i>Brassica campestris</i>	bc
<i>Raphanus raphanistrum</i>	rr
<i>Avena barbata</i>	ab
<i>Avena fatua</i>	af
<i>Triticum sp</i>	tsp

Fuente: Elaboración propia, 2020

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)



FORMACIONES VEGETACIONALES			
Id	Formacion Vegetacional	Especies Dominantes	Superficie [ha]
1	Matorral arborescente de Rubus ulmifolius y Acacia caven	AC ; Ru	0,57
2	Cortina de Acacia caven y Robinia pseudoacacia	RP-AC	0,55
3	Area urbana e industrial	-	2,29
4	Cortina de Cupressus macrocarpa	CM	0,05
5	Cortina de Maytenus boaria	MB	0,21
6	Cortina Eucalyptus sp.	EG	0,07
7	Cortina Acacia dealbata	AD	0,07
8	Cortina Cupressus macrocarpa	CM	0,11
9	Herbazal de Avena fatua y Triticum sp.	af-tsp	2,45
10	BN Maytenus boaria, Schinus latifolius y Acacia caven	AC-MB-SL	0,97
11	Herbazal de Brassica campestris, Raphanus raphanistrum, Avena barbata	bc-rr-ab	24,29
12	BN Acacia caven	AC	0,75
13	Bosque Eucaliptus sp.	EG	0,69
14	Herbazal de Brassica campestris, Raphanus raphanistrum, Avena barbata	bc-rr-ab	0,39
15	Cortina de Pinus radiata y Cupressus macrocarpa	CM-PR	0,47
16	Cortina Acacia caven	AC	0,26
17	Cortina de Eucaliptus sp.	EG	0,68
18	Cortina Eucaliptus sp	EG	0,44
19	Cortina Acacia caven	AC	1,09
20	Arboles aislados de Acacia caven y Maytenus boaria	AC-MB	0,58

ESPECIES DOMINANTES	
TAXÓN	CÓDIGO ESPECIE
ARBÓREA	
Maytenus boaria	MB
Schinus latifolius	SL
Acacia caven	AC
Eucalyptus globulus	EG
Pinus radiata	PR
Cupressus macrocarpa	CM
Eucalyptus sp.	ESP
Acacia dealbata	AD

ESPECIES DOMINANTES	
TAXÓN	CÓDIGO ESPECIE
ARBUSTIVAS	
Rubus ulmifolius	Ru
HERBÁCEAS	
Brassica campestris	bc
Raphanus raphanistrum	rr
Avena barbata	ab
Avena fatua	af
Triticum sp	tsp

