

ANEXO VII. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE SOLAR LA PEÑA

ANDINA SOLAR 13 SPA

Enero 2021



Caracterización de Flora Proyecto “Parque Solar La Peña”.



enero de 2021

Índice de contenidos

2. Objetivo	4
2.1. Objetivo General	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Área de influencia y estudio	5
4. Metodología	6
5. Resultados	7
5.1. Características generales del piso vegetal en la zona de estudio	7
5.2. Formaciones vegetacionales	8
5.3. Categoría de Conservación	9
5.4. Legislación aplicable	9
5.4.1. Formación de bosque	9
5.4.2. Formación xerofítica	10
5.4.3. Bosque Nativo de Preservación	11
5.5. Trabajo en terreno	12
5.5.1. Metodología aplicada	12
5.5.2. Especies identificadas	13
5.5.3. Formaciones vegetacionales	14
5.6. Resultados en terreno	20
5.6.1. Especies en categoría de conservación	20
5.6.2. Formación vegetal aplicable a la ley	20
5.6.3. Hongos y Líquenes	20
6. Conclusión	21
7. Bibliografía	22

Índice de ilustraciones.

Ilustración 1 Área de influencia del Proyecto	5
Ilustración 2 Piso vegetal	7
Ilustración 3 Formaciones vegetacionales	8
Ilustración 4 Recorrido y parcelas realizadas en terreno	12
Ilustración 5 Formaciones vegetacionales	14
Ilustración 6 Bosque Nativo de Preservación	16
Ilustración 7 Bosque nativo de Acacia caven	17
Ilustración 8 Bosque de pino	19

Índice de tablas.

Tabla 1 Formaciones xerofíticas	11
Tabla 2 Especies identificadas al interior del Proyecto	13
Tabla 3 BNP	14
Tabla 4 Imágenes del sector	15
Tabla 5 Bosque Nativo	16
Tabla 6 Imágenes de la formación	17
Tabla 7 Formación de bosque introducido	18
Tabla 8 Imágenes del sector	18

1. Introducción

El Proyecto Parque Solar La Peña corresponde a un proyecto del tipo PMGD de Energía Renovable No Convencional de 8 MW nominal que inyectará su energía por medio de una línea de media tensión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), aportando energía limpia a la matriz energética nacional. Este Proyecto se ubica en la comuna de Nogales, perteneciente a la provincia de Quillota, región de Valparaíso.

El Proyecto al ser una central generadora de energía mayor a 3 MW, debe ingresar al SEIA según el Literal c) del Artículo 3 del D.S. 40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación del SEIA” y según lo especificado en el Literal c) del Art. 11 de la Ley 19.300, actualizada bajo la Ley 20.417 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El Presente informe se realiza en base a los antecedentes solicitados por la normativa vigente, realizando tanto un trabajo en gabinete como en terreno.

2. Objetivo

2.1. Objetivo General

Caracterizar e Identificar la flora y vegetación de la zona de emplazamiento del sector.

2.2. Objetivos específicos.

- Definir y describir las principales formaciones vegetacionales presentes en el área de la línea de transmisión eléctrica.
- Determinar la flora presente en el área de influencia de la línea de transmisión eléctrica, con su respectiva clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.
- Definir el estado de conservación de las especies de flora presentes en el área de estudio.

3. Área de influencia y estudio


El área de influencia según el D.S. 40/21 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, define como área de influencia la siguiente:

El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Para este caso, se definió como área de influencia el área del Proyecto más un buffer de 30 metros para la identificación de flora (por individuo).

Para el área de estudio, y para el caso de las formaciones vegetacionales, se considera un área mucho mayor con el motivo de poder determinar los límites de estas y las posibles afectaciones que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto. En la siguiente imagen se presenta el área de influencia determinada para el Proyecto, para el caso de las formaciones vegetacionales, se presenta en el punto 5.4.2 la identificación y los límites de tales formaciones.

Ilustración 1 Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el titular y análisis de afectación realizados por el consultor

4. Metodología

Para la caracterización de flora en el área de emplazamiento del proyecto se utilizó la siguiente metodología:

- I. Investigación bibliográfica: se realizó una investigación bibliográfica con el fin de determinar el tipo de formación vegetacional y las características del piso vegetacional de la zona. Adicionalmente se consultó la legislación vigente, con el fin de determinar las especies en estado de conservación que se ubican en la zona, los tipos de formaciones vegetacionales que se encuentran en estado de protección y las medidas que correspondan oportunidad para su conservación.
- II. Evaluación de la zona mediante sistemas GIS e información satelital: Previo al trabajo en terreno se realiza una revisión mediante información satelital, con el fin de poder determinar el esfuerzo de muestro que se considera para el terreno. En el caso de que se divise una alta presencia arbórea se procederá a realizar el método de parcelas con el fin de determinar si corresponde a una formación de bosque (según los términos de la ley y el reglamento, que se indican en el punto 5.4.1.), caso contrario, se realizará el método de transectas con el objetivo de poder divisar los individuos aislados y determinar el tipo de formación existente.
- III. Visita a terreno: Una vez completado los puntos anteriores, se realizó una visita a terreno el día 23 y 24 de noviembre (primavera), cuyo fin fue realizar un reconocimiento de especies, diversidad y abundancia. Cabe indicar que la fecha en que se realizó corresponde a la época con mayor abundancia de especies.

Con la información obtenida, se determinará la existencia de una posible afección al componente flora en el área de emplazamiento del Proyecto.

Sobre la identificación de las especies, se utilizó como referencia el libro Flora silvestre de Chile, Zona Central de Adriana Hoffman y reseña de la vegetación de Chile, Servicio Agrícola Ganadero. Además de la información proporcionada por proyectos con Resolución de Calificación Ambiental aprobada en sectores cercanos al área de emplazamiento.

Adicionalmente se realizó una búsqueda de líquenes y hongos en el área de influencia del Proyecto.


5. Resultados

5.1. Características generales del piso vegetal en la zona de estudio

El área de estudio para la presente caracterización es el área correspondiente al sitio donde se instalará el Proyecto. Respecto al piso vegetal de la zona, según Luebert y Pliscoff corresponden a Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*.

En la siguiente imagen se presenta el área de estudio en relación con los pisos vegetacionales.

Ilustración 2 Piso vegetal



El área del Proyecto se encuentra mayormente en la formación “Bosque esclerófilo” inserto en el piso vegetal Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*, este piso se encuentra dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocia *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*,

Escallonia pulverulenta, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. La degradación antrópica ha producido una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerofíticas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones.

5.2. Formaciones vegetacionales

La formación vegetal definida por Gajardo y que se encuentra inmersa en el área de estudio corresponde a “*Matorral Estepario Costero del Desierto del Pacífico*” común de la zona costera de Coquimbo y La Serena, donde se encuentran especies en categoría de conservación tales como *Porlieria chilensis* y especies de cactáceas y suculentas.

Ilustración 3 Formaciones vegetacionales



La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres

primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica.

5.3. Categoría de Conservación

Considerando el DS. 29 de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN expresa en su artículo 4 que La clasificación de especies silvestres según su estado de conservación considerará la situación de las mismas a nivel nacional. No obstante, en caso de estimarse necesario y a propuesta del Comité de Clasificación, se podrá establecer una clasificación distinta para una o más zonas o regiones del país, o aplicar el procedimiento de clasificación a niveles taxonómicos distintos del de especie. Por otra parte, en su Título II, artículo 5, expone que: Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes, las que son definidas en detalle en dicho Decreto.

Dado lo anterior, el estado de conservación de determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies: Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009) D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016), D.S. N°6 (MMA, 2017) que oficializan del primer al decimotercer proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA).

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

5.4. Legislación aplicable

5.4.1. Formación de bosque

Para todas las unidades con presencia de estratos arbóreos, se realizará una evaluación de acuerdo a los criterios definidos en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo o Bosque de Preservación. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Bosque se define como una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima,
- presentar por lo menos 40 m de ancho,
- y un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

En consecuencia, se evaluará si las formaciones vegetacionales identificadas cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservación que tal como dice la Ley 20.283/2008 se definirá como Bosque nativo de preservación: "aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

5.4.2. Formación xerofítica

Las formaciones xerofíticas son identificadas por la legislación vigente (Ley N°20.283 y su D.S. N°93) bajo los siguientes puntos:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N°17.336.
- El estrado predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo al inciso 3 del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la

totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 1 Formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha).
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	Carácter xerofítico	500

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda.
- Para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica.
- Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 metro.

5.4.3. Bosque Nativo de Preservación

Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca. Los trabajos más recientes que


abordan la descripción de la vegetación chilena son “La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica” de Rodolfo Gajardo publicado en 1993 y una publicación más reciente desarrollada por Federico Luebert y Patricio Pliscoff en su libro “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” publicado en el año 2006.

5.5. Trabajo en terreno

5.5.1. Metodología aplicada

Con fecha 23 y 24 de noviembre, se realizó una visita a terreno con el objetivo de identificar tanto las formaciones vegetacionales como los individuos de flora al interior del área de estudio. Para dicha visita se utilizó el método de transectas para el área del Proyecto y el método de parcelas para el sector colindante.

Ilustración 4 Recorrido y parcelas realizadas en terreno



5.5.2. Especies identificadas

El trabajo fue realizado por dos especialistas por medio del método de transectas y de parcelas, al respecto, se identificaron las siguientes especies:

Tabla 2 Especies identificadas al interior del Proyecto


Especie	Nombre común	Tipo de formación	Origen	Categoría de conservación
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria	Herbácea	Introducido	N/A
<i>Acacia melanoxyton</i>	Aromo	Arbórea	Introducido	N/A
<i>Solanum yuberosum</i>	Papa	Herbácea	Introducido	N/A
<i>Raphanus satibus</i>	Rábano silvestre	Herbácea	Introducido	N/A
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Herbácea	Introducido	N/A
<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Herbácea	Introducido	N/A
<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbácea	Introducido	N/A
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Herbácea	Introducido	N/A
<i>Anthriscus caucalis</i>	Cicuta	Herbácea	Introducido	N/A
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Herbácea	Introducido	N/A
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbórea	Nativo	N/A
<i>Juglans regia</i>	Nogales	Arbórea	Introducido	N/A
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinias	Arbórea	Introducido	N/A
<i>Pinu strobus</i>	Pino	Arbórea	Introducido	N/A
<i>Porlieria chilensis</i> *	Guayacán	Arbórea	Nativo	Vulnerable
<i>Baccharis linearis</i> *	Romerillo	Matorral	Endémico	N/A

*Especie presente fuera del área del Proyecto

5.5.3. Formaciones vegetacionales

Respecto a las unidades vegetacionales homogéneas (UHV), se presenta en la siguiente imagen las formaciones presentes en el área de estudio.

Ilustración 5 Formaciones vegetacionales



A continuación se presenta una caracterización de las formaciones vegetacionales colindantes al Proyecto y reguladas por la normativa vigente:

- I) Bosque Nativo de preservación de Acacia caven y Porlieria chilensis: Bosque nativo con especies en categoría de conservación, específicamente Porlieria chilensis, sus características se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3 BNP

Tipo de bosque	Renoval
Composición	Bosque nativo de Acacia caven y Porlieria chilensis, con una leve presencia de especies introducidas
Superficie	5,39 hectáreas dividido en dos sectores
Listado florístico	Acacia caven, Porlieria chilensis, Eucalyptus sp y Opuntia ficus-indica.
Categorías de conservación	Porlieria chilensis en estado vulnerable


Estado del sector	Corresponde a un botadero de residuos ilegal.
-------------------	---

Cabe indicar que complementariamente se realizó un censo de especies vulnerables en un área de 100 metros desde el Proyecto, constatando que el individuo más cercano se encuentra a 55 metros del límite norte.

Tabla 4 Imágenes del sector



Ilustración 6 Bosque Nativo de Preservación



- II) Bosque Nativo de Acacia caven: Formación presente en el sector nororiente del Proyecto, el cual actualmente se encuentra en un proceso de reforestación:

Tabla 5 Bosque Nativo

Tipo de bosque	Renoval
Composición	Bosque nativo de Acacia caven
Superficie	3,1 hectáreas.
Listado florístico	Acacia caven
Categorías de conservación	Sin especies en estado vulnerable.
Estado del sector	En buen estado, sector cercado y en proceso de reforestación.

Tabla 6 Imágenes de la formación



Ilustración 7 Bosque nativo de Acacia caven



- III) Bosque de Eucalyptus Sp y Acacia melanoxylon: Formación de especies introducidas con una baja presencia de especies de acacia caven (menos de 4 individuos).


Tabla 7 Formación de bosque introducido

Tipo de bosque	-
Composición	Bosque de Eucalyptus Sp. Y Acacia melanoxylon.
Superficie	0,8 hectáreas.
Listado florístico	Eucalyptus Sp. Y Acacia melanoxylon
Categorías de conservación	Sin especies en estado vulnerable.
Estado del sector	Vertedero ilegal.

Tabla 8 Imágenes del sector



Ilustración 8 Bosque de pino



Adicionalmente, y en relación a los hongos y líquenes, no se constató la presencia de estas especies en los sectores estudiados.

5.6. Resultados en terreno

5.6.1. Especies en categoría de conservación

En relación con lo visto en terreno, no se constató la presencia de especies en categoría de conservación al interior del predio, dada la intervención producto de la actividad agrícola. Sin embargo, en el área colindante a este, se constató la presencia de un bosque nativo de preservación de *Porlieria chilensis*.

5.6.2. Formación vegetal aplicable a la ley

En referencia a la ley 20.283, el sector no corresponde a bosque debido a que no se encuentran especies arbóreas en una densidad mayor al 10%, con cobertura sobre los 5000 m² y un ancho de 40 metros, por lo que no requiere de realizar un plan de manejo forestal. Complementariamente, no existen especies en categorías de conservación que aludan a la presencia de un bosque nativo de preservación. Por otro lado, y referente a las formaciones xerofíticas, no se encontraron especies indicadas en el decreto 68/2009 "Nómina de especies Arbóreas y Nativas del País".

5.6.3. Hongos y Líquenes

En relación a la visita en terreno, no se constató la presencia de Hongos y Líquenes, esto debido a la baja presencia de especies arbóreas (sitios donde suelen habitar los líquenes) y el uso de elementos químicos para evitar externalidades en los cultivos (uso de fungicidas).

6. Conclusión

El proyecto “Parque Solar La Peña” corresponde a un proyecto PMGD del tipo ERNC de 8 MW, que se ubicará en la comuna de Nogales, región de Valparaíso. La zona cuenta con una alta actividad agrícola y ganadera que genera una alta intervención a flora nativa y endémica de la zona, dado que se requieren grandes extensiones de terreno para realizar monocultivos destinados a la producción antes indicada.

Por ende y dado que la zona en donde se instalará el Proyecto es una zona altamente intervenida por actividad agrícola, la afectación del Proyecto a la flora nativa y endémica de la zona y del país es nula.

Por otro lado, la identificación de flora realizada en terreno los días 23 y 24 de noviembre confirmó la ausencia de especies en categoría de conservación y formaciones vegetacionales reguladas por la normativa forestal vigente.

Por último, es importante destacar que el proyecto considerando el área de intervención y de influencia, no afectará a la flora nativa ni a formaciones vegetacionales en categoría de conservación, dado que en la zona solo existen monocultivos o plantaciones con fines agrícolas, referente a la afectación por incendios u otra emergencia, se tiene considerado un plan de contingencias para prevenir cualquier evento y uno de emergencia para poder actuar oportunamente y evitar cualquier impacto al medio ambiente.

En relación a la afectación producto del levantamiento de emisiones, se puede determinar que el Proyecto aportará menos de un 4% de lo que indica la normativa de calidad de aire (según los datos de la modelación de emisiones) en MPS (PM 10 y 2.5) es importante indicar, que la modelación de emisiones, no considera las barreras naturales generadas por las cortinas de especies que se encuentran entre el Proyecto y el bosque nativo de preservación, por lo que el porcentaje del 4% es un valor conservador frente a la realidad.



Gustavo Muñoz A.
Ingeniero Ambiental

7. Bibliografía

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CONAMA. 2002. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 21 pp.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 112 pp.

MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p. RAVENNA, P., S. TEILLER, J.

MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.

THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.
UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.