

ANEXO Nº 8

LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN



PARQUE FOTOVOLTAICO CANTILLANA

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |

ALTOYA LTDA |

REV. 1 |



SEPTIEMBRE 2020

PAW CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES.
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4050 Of. 605 | Santiago
FONO: +56 232450307/ +56 9 89440115
E-MAIL: jcfernan@pawambiental.cl
WEB: www.pawambiental.cl

Contenido

1	Introducción	5
2	Objetivos	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos Específicos.....	6
3	Definición del área de Influencia.....	7
4	Metodología	9
4.1	Metodología vegetación	9
4.1.1	Revisión bibliográfica	9
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	9
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	12
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	12
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	13
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	13
4.2	Metodología flora.....	14
4.2.1	Revisión bibliográfica	14
4.2.2	Inventario de Flora	14
4.2.3	Análisis de Flora.....	14
4.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	16
4.3.1	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	16
4.3.1	Identificación de unidades de Bosque Nativo.....	17
5	RESULTADOS	17
5.1	Resultados a Escala Regional.....	17
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	17
5.1.2	Flora a Escala Regional	21
5.2	Resultados a Escala Local (Área de influencia).....	24
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	24
5.2.2	Vegetación a Escala Local.....	27
5.2.3	Flora a escala local.....	29
5.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	31
5.4	Análisis de Singularidades Ambientales.....	31

5.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..	31
5.4.2	Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....	31
5.4.3	Presencia de Formaciones vegetales remanentes.....	31
5.4.4	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	31
5.4.5	Presencia de Bosque nativo de preservación.....	32
5.4.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	32
5.4.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	32
5.4.8	Presencia de especies endémicas	32
5.4.9	Presencia de especies de distribución restringida	32
5.4.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	32
5.4.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	32
5.4.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales.....	32
5.4.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	33
5.4.14	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	33
5.4.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	33
5.4.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	33
6	CONCLUSIONES	34
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35

Índice de figuras

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia.....	8
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia	18
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia	19
Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001	21
Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....	26

Índice de tablas

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno	10
Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	12
Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	13
Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	13
Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	14
Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	20
Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto	22
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	24
Tabla 5-4: Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia.....	27
Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen	30

Índice de gráficos

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia	30
---	----

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia	37
Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación	39

1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto **“Parque Fotovoltaico Cantillana”**.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo con lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada el día 24 de septiembre de 2020 en temporada de primavera.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto Parque Fotovoltaico Cantillana

2.2 Objetivos Específicos

- Definir el área de influencia para componente flora y vegetación para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación, para el área de influencia del proyecto.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA


De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto las cuales corresponden al emplazamiento del parque fotovoltaico y sus obras asociadas.

El área a caracterizar permitió identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir. La superficie total del área de influencia corresponde a 17,6 ha. La siguiente figura muestra las proporciones y ubicación general del área de influencia.

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación

La caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Paine donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2).

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Nueva Forestal	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Adulta Forestal		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Cosechada Forestal		0-100 %	N/A	N/A	N/A
	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales, agrícolas o forestales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10%

con una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200 metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con documentos oficiales).

- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala fue definida en función de los elementos a identificar, de modo que, durante los muestreos, los puntos levantados pudieran ser identificados fácilmente en los mapas, para la realización de correcciones pertinentes a las definiciones realizadas en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de primavera el día 24 de septiembre de 2020. El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar (en base a metodología COT) las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, triangulando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo con metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete, y registrando los ajustes necesarios.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver

Tabla 4-2).

Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Colliguaja odorifera</i> : Co
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i> : QS
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Eulychnia acida</i> : eA

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo con los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
< 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
> 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 10 x 10 m (100 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 20 x 10 m (200 m²); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usaron parcelas de 20 x 25 m (500 m²). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con

su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se utilizó lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018)

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea introducido, nativo o endémico.

Finalmente, las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018 y D.S. N° 23/2020.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.3.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.

3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley N° 20.283.

4.3.1 Identificación de unidades de Bosque Nativo

Corresponde a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley de Bosque Nativo N°20.283 se define Bosque como sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables

Por lo cual, debido a que el proyecto se emplaza en la Región Metropolitana, para cumplir la condición de bosque, la cobertura de copa debe ser superior al 10% ya que corresponde a una zona semiárida.

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional


5.1.1 Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del bosque esclerófilo, específicamente en la Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la Formación del Bosque Esclerófilo costero, la cual se caracteriza por una vegetación muy heterogénea y modificada por la acción humana. Las formas de vida dominantes son arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio en verano.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia




FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta Luebert & Pliscoff (2006), el área del proyecto se encuentra emplazada en el piso de vegetación Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*. Este corresponde a un bosque esclerófilo típicamente dominado por *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*, *Satureja gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitos, como *Alstromeria haemantha*,

Pasitea coerulea y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis* con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithraea caustica*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de influencia.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Pliscoff (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia


Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
33 ° S	Formación Vegetal del Bosque Esclerófilo Costero	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y <i>Lithraea caustica</i>

FUENTE: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"² (CONAF-CONAMA-BIRF, 2001); define como praderas y áreas urbanas el uso actual presente en el área de influencia (Figura 5-3).

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 2001

5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región Metropolitana, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas corresponde a La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Gajardo, 1994 y la segunda corresponde a la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Pliscoff, 2006.

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos

bibliográficos pueden ser considerados como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Pliscoff, 2006)
	Bosque esclerófilo costero	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>
<i>Alstromeria haemantha</i>		x
<i>Acacia caven</i>	x	
<i>Adenopeltis serrata</i>	x	
<i>Adesmia arborea</i>	x	
<i>Adiantum chilense</i>	x	
<i>Ageratina glechonophylla</i>	x	
<i>Alstroemeria angustifolia</i>	x	
<i>Alstroemeria ligtu</i>	x	
<i>Ambrosia chamissonis</i>	x	
<i>Aristeguietia salvia</i>	x	
<i>Aristotelia chilensis</i>	x	
<i>Azara celastrina</i>	x	
<i>Baccharis confertifolia</i>	x	
<i>Baccharis linearis</i>	x	
<i>Baccharis pingraea</i>	x	
<i>Bahia ambrosioides</i>	x	
<i>Beilschmiedia miersii</i>	x	
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	x	
<i>Cestrum parqui</i>	x	
<i>Chusquea cumingii</i>	x	
<i>Cissus striata</i>	x	
<i>Citronella mucronata</i>	x	
<i>Colliguaja odorifera</i>	x	x
<i>Crinodendron patagua</i>	x	
<i>Cryptocarya alba</i>	x	x
<i>Dasyphyllum excelsum</i>	x	
<i>Distichlis spicata</i>	x	
<i>Drimys winteri</i>	x	
<i>Echinopsis chiloensis</i>	x	x

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Pliscoff, 2006)
	Bosque esclerófilo costero	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>
<i>Erioseyca chilensis</i>	x	
<i>Escallonia illinita</i>	x	
<i>Escallonia pulverulenta</i>		x
<i>Escallonia revoluta</i>	x	
<i>Fumaria agraria</i>	x	
<i>Galuim aparine</i>	x	
<i>Geranium robertianum</i>	x	
<i>Gnaphalium robustum</i>		
<i>Jubaea chilensis</i>	x	
<i>Kageneckia oblonga</i>		x
<i>Lardizabala biternata</i>	x	
<i>Lepechinia salviae</i>	x	
<i>Lithraea caustica</i>	x	x
<i>Loasa triloba</i>	x	
<i>Luma chequen</i>	x	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	x	
<i>Myrceugenia obtusa</i>	x	
<i>Nassella chilensis</i>	x	
<i>Nolana paradoxa</i>	x	
<i>Pasitea coerulea</i>		x
<i>Persea lingue</i>	x	
<i>Peumus boldus</i>	x	
<i>Podanthus mitiqui</i>	x	
<i>Pouteria splendens</i>	x	
<i>Proustia cuneifolia</i>	x	x
<i>Proustia pyrifolia</i>	x	
<i>Puya berteroniana</i>	x	x
<i>Puya chilensis</i>	x	
<i>Quillaja saponaria</i>	x	x
<i>Retanilla trinervia</i>	x	
<i>Satureja gilliesii</i>	x	x
<i>Schinus latifolius</i>	x	
<i>Schinus polygamus</i>	x	

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Pliscoff, 2006)
	Bosque esclerófilo costero	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>
<i>Solenomelus pedunculatus</i>		x
<i>Stellaria cuspidata</i>	x	
<i>Stellaria media</i>	x	
<i>Tessaria absinthioides</i>	x	
<i>Teucrium bicolor</i>		x
<i>Tillandsia usneoides</i>	x	
<i>Vulpia megalura</i>	x	

Fuente: Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2 Resultados a Escala Local (Área de influencia)

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 13 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación que se representa.


Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE	NORTE	
P01	331.255	6.254.671	Herbazal alóctono
P02	331.099	6.254.594	Herbazal alóctono
P03	330.956	6.254.673	Herbazal alóctono
P04	331.112	6.254.714	Herbazal alóctono
P05	331.125	6.254.801	Herbazal alóctono
P06	331.178	6.254.897	Herbazal alóctono
P07	331.276	6.254.894	Herbazal alóctono
P08	331.303	6.254.799	Herbazal alóctono
P09	331.261	6.254.645	Herbazal alóctono
P10	331.049	6.254.835	Herbazal alóctono
P11	331.252	6.255.039	Herbazal alóctono
P12	331.312	6.254.673	Áreas Urbanas e Industriales
P13	331.371	6.254.603	Herbazal alóctono

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la Tabla 5-3.

El área de influencia comprende una superficie de 17,6 ha, de las cuales el 14,5% (2,56 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación, el 85,5% (15,14 ha) se encuentra cubierto por ambientes intervenidos del tipo Herbazal Alóctono.

Conforme a la Ley N° 20.283, no se presentan formaciones bajo disposición legal.

La siguiente tabla resume las categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia.

Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia

Ambiente	Uso	Formación	Especies Dominantes	Área de Influencia	
				Superficie (ha)	Superficie (%)
Modificado Sin Vegetación	Áreas Desprovistas de Vegetación	Áreas Desprovistas de Vegetación	-	2,56	14,5%
Intervenido	Herbazal alóctono	Herbazal alóctono	<i>Brassica rapa</i> , <i>Hordeum murinum</i> y <i>Vulpia myuros</i>	15,14	85,5%
Total				17,7	100,00%

FUENTE: Elaboración Propia

A continuación, se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia:

5.2.2.1 Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 2,56 ha lo que equivale al 14,5%.

En esta condición, en el área de influencia se encuentran áreas urbanas con presencia de vegetación ornamental donde destaca *Phoenix canariensis*, *Washingtonia filifera*, *Prunus cerasifera*, *Prunus armeniaca*, *Citrus reticulata* y *Araucaria angustifolia*.

La siguiente fotografía muestra la fisionomía de la formación

Fotografía 5-1. Fisionomía Ambientes Modificados



5.2.2.1 Ambientes Intervenidos

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada en este caso, para el uso agrícola, sin embargo, al estar abandonado se ha convertido en un herbazal alóctono con dominancia de *Brassica rapa*, *Hordeum murinum* y *Vulpia myuros*.


El estrato arbóreo presenta un bajo desarrollo con presencia aislada de *Ficus carica*, *Robinia pseudoacacia*, *Persea americana* y *Malus domestica*

El estrato arbustivo, también presenta un bajo desarrollo con la presencia aislada de *Baccharis salicifolia*, *Tessaria absinthioides*, *Calystegia sepium*, *Rubus ulmifolius* y *Cestrum parqui*.

Por su parte el estrato herbáceo presenta un buen desarrollo donde se puede observar la dominancia de *Brassica rapa*, *Hordeum murinum* y *Vulpia myuros* acompañadas de *Hypochaeris radicata*, *Convolvulus arvensis*, *Bromus catharticus*, *Erodium moschatum*, entre otras.

La siguiente fotografía muestra la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 5-2. Fisionomía Plantación Forestal



A, B y C: Fisionomía herbazal alóctono

FUENTE: Campaña de Terreno


5.2.3 Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 14 inventarios florísticos donde se encontraron 54 especies pertenecientes a 24 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación,

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 24 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son: Asteraceae (9 especies), Poaceae (7 especies) y Brassicaceae, Fabaceae y Rosaceae (4 especies cada una) que en conjunto agrupan el 52% de la flora total registrada (ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia (54), 8 son de origen nativo, 2 de origen endémico y 44 introducidas (Tabla 5-5).

Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	0	0	10	10	18,5%
Leñoso bajo	3	0	2	5	9,3%
Herbáceo	5	2	32	39	72,2%
Suculento	0	0	0	0	0,0%
Total	8	2	44	54	100%

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.3.3 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.

- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018 y D.S. N° 23/2020.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, no se presentan especies en categoría de conservación.

5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetaciones identificados en el área del proyecto, no se reconocieron formaciones bajo disposición legal.

5.4 Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

5.4.2 Presencia de Formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes expuestos la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la región metropolitana. En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a regiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

5.4.3 Presencia de Formaciones vegetales remanentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.4.4 Presencia de Formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

5.4.5 Presencia de Bosque nativo de preservación

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

5.4.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información presentada, en el área de influencia, no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE)

5.4.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales con crecimiento natural declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.4.8 Presencia de especies endémicas

En el área de estudio se identificaron 2 especies endémicas correspondientes a *Equisetum pyramidale* y *Rumex maricola* que representan el 3% de la flora total registrada.

5.4.9 Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

5.4.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

5.4.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

5.4.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte de ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del

artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

5.4.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

5.4.14 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo con la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.4.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.4.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6 CONCLUSIONES

El área de influencia descrita presenta formaciones de Áreas Urbanas e Industriales, así como Herbazal Alóctono.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, se determinó una riqueza florística de 54 especies, de las cuales, 8 son nativas, 2 endémica y 44 alóctonas. En términos de origen, se observa un considerable porcentaje de especies introducidas alcanzando el 82% del total de especies, en contrapunto, las especies nativas corresponden al 15% y las especies endémicas al 3% del total.

Tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, no se determinaron especies listadas en alguna categoría de conservación oficial

Para el área destinada para construcción del proyecto, no se identificaron formaciones de Bosque Nativo ni Formaciones xerofíticas.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa la Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa la Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa la Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa la Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa la Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2011. Decreto Supremo N°29, Modifica y reemplaza el DS N°75/05 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012b. Decreto Supremo N°41 Aprueba y Oficializa la Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012c. Decreto Supremo N°42 Aprueba y Oficializa la Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013a. Decreto Supremo N°19 Aprueba y Oficializa la Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013b. Decreto Supremo N°13 Aprueba y Oficializa la Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N°52 Aprueba y Oficializa la Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N°38 Aprueba y Oficializa la Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N°16 Aprueba y Oficializa la Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N°06 Aprueba y Oficializa la Treceava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo N°79 Aprueba y Oficializa la décima cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

<i>Especie</i>	<i>Nombre Común</i>	<i>Familia</i>	<i>Origen</i>	<i>Habito</i>
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Apiaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	Pino del Paraná	Araucariaceae	Alóctona	Árbol
<i>Phoenix canariensis</i> Wildpret	Palma fénix	Arecaceae	Alóctona	Árbol
<i>Washingtonia filifera</i> (Linden ex André) H. Wendl.	Washingtonia de California	Arecaceae	Alóctona	Árbol
<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Asteraceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Asteraceae	Nativa	Arbusto
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Asteraceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker.	Rama negra	Asteraceae	Nativa	Herbáceo
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	Asteraceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio común	Asteraceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Asteraceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Cerraja	Asteraceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	Asteraceae	Nativa	Arbusto
<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Brassicaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.).	Bolsita del pastor	Brassicaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Lepidium auriculatum</i> Regel & Körn.	s/n	Brassicaceae	Nativa	Herbáceo
<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Brassicaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Chenopodiaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Carricillo	Convolvulaceae	Alóctona	Arbusto
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Corrihuela	Convolvulaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Equisetum pyramidale</i> Goldm.	Cola de caballo	Equisetaceae	Endémica	Herbáceo
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Lecherula	Euphorbiaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Ficus carica</i> L.	Higuera	Euphorbiaceae	Alóctona	Árbol
<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Fabaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Carretón	Fabaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falso acacio	Fabaceae	Alóctona	Árbol
<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Fabaceae	Alóctona	Herbáceo

Especie	Nombre Común	Familia	Origen	Habito
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Almizclera	Geraniaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Zapatitos	Lamiaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Persea americana</i> Mill.	Palto	Lauraceae	Alóctona	Árbol
<i>Malva nicaeensis</i> All.	s/n	Malvaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Malva loca	Malvaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Oxalis laxa</i> Hook. & Arn.	Vinagrillo	Oxalidaceae	Nativa	Herbáceo
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Papaveraceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Palomilla	Papaveraceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Veronica persica</i> Poir.	Verónica	Plantaginaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Arundo donax</i> L.	Caña común	Poaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Bromus catharticus</i> Vahl.	Lanco	Poaceae	Nativa	Herbáceo
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo	Poaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla ratonera	Poaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Poa annua</i> L.	Pastito de invierno	Poaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Toroko	Poaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Pasto largo	Poaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Centinodia	Polygonaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	Polygonaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Rumex maricola</i> J. Remy	s/n	Polygonaceae	Endémica	Herbáceo
<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh.	Manzano	Rosaceae	Alóctona	Árbol
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Ciruelo	Rosaceae	Alóctona	Árbol
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Damasco	Rosaceae	Alóctona	Árbol
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Rosaceae	Alóctona	Arbusto
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Mandarino	Rutaceae	Alóctona	Árbol
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Solanaceae	Nativa	Arbusto
<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga menor	Urticaceae	Alóctona	Herbáceo
<i>Verbena bonariensis</i> L.	Verbena	Verbenaceae	Nativa	Herbáceo

Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación

