



Anexo 4. Actualización
Caracterización Complementaria Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental
Parque Fotovoltaico Andino Las Pataguas



Julio, 2021

Contenido

1.	Introducción	6
2.	Objetivo.	7
2.1.	Objetivos específicos.	7
3.	Área de Influencia.....	8
4.	Metodología.	10
4.1.	Caracterización bibliográfica.....	10
4.2.	Campaña de terreno.....	10
4.2.1.	Flora.....	10
4.2.2.	Vegetación.....	12
4.3.	Elaboración de cartografía.....	14
4.4.	Identificación de formaciones específicas de acuerdo con la Ley N° 20.283.....	15
5.	Resultados.	18
5.1.	Marco Biogeográfico.....	18
5.2.	Campaña de Terreno.	18
5.2.1.	Esfuerzo de muestreo.	18
5.2.2.	Vegetación del Área del Proyecto.....	20
5.2.3	Flora.....	46
5.3.	Singularidades Ambientales.....	56
6.	Recomendaciones	63
7.	Conclusiones.....	64
8.	Bibliografía.....	66

Figuras

Figura 1 Área de Influencia.....	9
Figura 2. <i>Categorización para la descripción de especies dominantes de acuerdo a la metodología COT.</i> Según el tipo biológico al que pertenece la especie, se utiliza el código en (A) utilizando las iniciales de su nombre científico: siendo “A”/”a”, el género; y “B”/”b”, la especie. En (B), un ejemplo según tipo biológico y especie.	14
Figura 3. Ubicación parcelas de muestreo.....	19
Figura 4. Distribución espacial de las unidades cartográficas definidas en el área de la planta fotovoltaica	21
Figura 5. Vista general de la formación bosque mixto.....	26
Figura 6. Vista general de la unidad Matorral con Acacia caven	27
Figura 7. Vista general de la formación matorral de Baccharis	28
Figura 8. Vista general de la formación matorral pradera	29
Figura 9. Vista general de la formación pradera con malezas	30
Figura 10. Vista general de la formación paraderas con gramíneas	31
Figura 11. Vista general de plantación de Eucalyptus	31
Figura 12. Vista general de una plantación de frutillas.....	32
Figura 13. Vista general del área de cultivo de olivos.....	33
Figura 14. Vista general de plantación de Quillay.....	33
Figura 15. Vista general de un sector recién arado sin vegetación	34
Figura 16. Vista general de un sector Sin vegetación	35
Figura 17. Vista general de un cuerpo de agua	35

Figura 18. Distribución espacial de cada una de las formaciones vegetacionales registradas en la línea de Transmisión.	37
Figura 19. Vista general de áreas de vegetación nativa. En cuadro: <i>Peumus boldus</i> , <i>Acacia caven</i> , <i>Trevoa trinervis</i> y <i>Baccharis Linearis</i> , acompañado de una estrata herbácea muy densa de gramíneas y cardos.	40
Figura 20. Vista general de un matorral de espino	41
Figura 21. Vista general del matorral de Tevo	41
Figura 22. Vista general de la formación pradera	42
Figura 23. Vista general del cultivo de frutillas	43
Figura 24. Vista general de plantación de Eucaliptus	44
Figura 25. Vista panorámica de COTJM17b, sector de arado.	45
Figura 26. Localización especies en categoría de conservación	60
Figura 27. Muestra de algunas de las especies en categoría de conservación registradas en el área del proyecto	62

Tablas

Tabla 1. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987)	11
Tabla 2. Tipo biológico e índice de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.....	13
Tabla 3. Correspondencia entre la clasificación de Étienne y Prado y la adaptación de este trabajo.	14
Tabla 4. Condiciones para la presentación de un plan de trabajo	17
Tabla 5. Resumen de las formaciones vegetacionales registradas en el Sector Planta fotovoltaica	22
Tabla 6. Caracterización de las unidades de vegetación en sector planta fotovoltaica	23
Tabla 7. Resumen de las formaciones vegetacionales registradas en el Sector Línea de Transmisión.....	36
Tabla 8. Caracterización de las unidades de vegetación en sector Línea de Transmisión	38
Tabla 9. Riqueza de plantas vasculares catastradas en la campaña de terreno dentro del sector. Se especifica la Familia taxonómica, nombre científico y vernáculo, hábito de crecimiento y origen.	46

Tabla 10. Caracterización del hábito de las especies- sector planta fotovoltaica.....	51
Tabla 11. Caracterización del origen de las especies – sector planta fotovoltaica.	52
Tabla 12. Riqueza de plantas vasculares catastradas en la campaña de terreno dentro del sector. Se especifica la Familia taxonómica, nombre científico y vernáculo, hábito de crecimiento y origen.	52
Tabla 13. Caracterización del hábito de crecimiento de las especies- sector Línea de transmisión.....	56
Tabla 14. Caracterización del origen de las especies- sector Línea de transmisión.....	56
Tabla 15. Especies en categoría de conservación dentro de la zona del Proyecto.	57
Tabla 16. Georreferenciación de especies en categoría de conservación.	57
Tabla 17. Posición dentro de las formaciones vegetacionales de las especies en categoría de conservación	61

1. Introducción

En el marco de elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Parque Fotovoltaico Andino Las Pataguas (en adelante el Proyecto), ubicado en la comuna de San Pedro, región Metropolitana, Rol N° 29-421. El titular del proyecto ha solicitado una actualización de la caracterización ambiental del componente flora y vegetación para un área de influencia (AI) correspondientes a los sectores identificados como 471 hectáreas correspondientes a los sectores identificados como planta fotovoltaica y línea eléctrica de alta tensión (LAT) estableciendo la ruta final, con su respectiva AI, para la cual se han considerado 100 metros a cada lado del eje de la LAT.

El Proyecto, consiste en captar y transformar energía solar en energía eléctrica, para ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a partir de la ejecución y construcción y posterior operación de una planta fotovoltaica de 152,6 MWp de potencia instalada. Adicionalmente, el Proyecto considera una línea de transmisión eléctrica de 1x110 kV, de aproximadamente 10 km de longitud que conectará el Proyecto a la subestación eléctrica, existente, Las Arañas (110 kV).

El estudio y levantamiento de información a partir de la presencia de flora y vegetación terrestre antes del inicio de cualquier actividad constructiva, se ha convertido en una guía sobre una componente biótica altamente sensible, por lo que la identificación y confección de un inventario floral y una caracterización de la vegetación del área de influencia será de apoyo para el reconocimiento y levantamiento de una línea base sobre las especies presentes en el proyecto, para la identificación de posibles impactos sobre especies singulares dentro de la zona, como también el caracterizar la riqueza vegetativa para interpretaciones futura del área.

El presente informe contiene todos los pasos técnicos y metodológicos utilizados para caracterizar el componente ambiental, con el objetivo de descartar o afirmar la generación de posibles impactos por la instalación y operación del proyecto. La campaña de terreno se realizó por parte de un equipo conformado por dos especialistas entre los días 4 al 11 de noviembre del 2020 para el desarrollo de la DIA y 5, 6 y 28 de abril de 2021, para las campañas de Adenda.

2. Objetivo.

El objetivo del documento es caracterizar la flora y vegetación en el área de influencia del proyecto.

2.1. Objetivos específicos.


- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad vegetal presentes en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar la flora que se encuentra asociada al área de influencia del proyecto.
- Evaluar la existencia de especies que presenten problemas de conservación, como también aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el área de influencia.

3. Área de Influencia

De acuerdo con la definición que establece artículo 2, letra a), del Reglamento del SEIA, el área de influencia es el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Para efectos del presente análisis se definió un área de influencia (AI) de 464 hectáreas. El AI corresponde a la totalidad del proyecto, que considera la planta fotovoltaica 271 hectáreas y la línea de transmisión junto con una franja de protección de 100 m a cada lado de la línea de transmisión, lo que conlleva aproximadamente 193 hectáreas. Esta se justifica por la posible pérdida y modificación de individuos o ejemplares de flora que pueda causar el Proyecto.

Figura 1 Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

4. Metodología.

La metodología adoptada, se ha definido conforme a los protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente indica en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996). A ésta, se suma lo establecido en la Guía para la Descripción del Área de Influencia, “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” en el SEIA (SEA, 2015), a fin de identificar singularidades e impactos de las obras sobre el componente flora y vegetación, en concordancia con la R.E. 1534/2015.

4.1. Caracterización bibliográfica.

Las fuentes bibliográficas consideradas en la presente línea de base, dada su pertinencia y precisión, corresponden a:

- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989) de Iván Benoit.
- Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (2017) de Federico Luebert y Patricio Pliscoff.
- Catastro y evaluación de recursos vegetacionales y nativos de Chile, de CONAF¹.
- Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile (1996) de Mélica Muñoz, Hernán Núñez y José Yáñez.
- Formaciones vegetacionales de Chile de Gajardo (1194).

4.2. Campaña de terreno

Este documento presenta los resultados obtenidos durante la campaña de terreno realizada durante el desarrollo de la DIA en el AI del Proyecto efectuada los días 4 al 11 de noviembre del 2020, como también, los resultados que provienen de la modificación del trazado de la LAT en la presente adenda, campañas que fueron efectuadas los días 5, 6 y 28 de abril de 2021, con el fin de determinar las diferentes unidades vegetacionales y la flora presente en el AI. Las coordenadas se encuentran dadas en WGS 84, huso 19S.

4.2.1. Flora.

En conjunto con la descripción vegetacional, se procedió a la confección del inventario florístico mediante la observación directa e identificación *in situ* de las especies de plantas vasculares presentes.

La composición florística de las formaciones vegetales se realizó por medio de parcelas de muestreo de 50 m², para cualquier parcela realizada en el área de influencia. Además, se realizaron recorridos pedestres por la unidad vegetal para incorporar el mayor número de especies en la descripción de la riqueza florística de ésta. Cada especie registrada fue colectada y fotografiada para su posterior verificación taxonómica en

gabinete. La cobertura o densidad de cada especie fue registrada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la siguiente Tabla 1.

Tabla 1. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987)

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La nomenclatura para la flora registrada, así como su forma de vida y origen seguirá la clasificación de Rodríguez *et al.* (2018), mientras que el estado de conservación fue determinado a partir de las directrices de los decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente en el marco del “Proceso de clasificación de Especies” según su última revisión efectuada en julio del 2020, que oficializan del primer al decimocuarto proceso de especies, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA). Específicamente, los decretos aludidos son:

- Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaria General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaria General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaria General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaria General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

-
- Decreto Supremo Nº 41/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
 - Decreto Supremo Nº 42/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
 - Decreto Supremo Nº 33/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
 - Decreto Supremo Nº 29/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.
 - Decreto Supremo Nº 19/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.
 - Decreto Supremo Nº 13/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.
 - Decreto Supremo Nº 52/2014 del Ministerio de Medio Ambiente.
 - Decreto Supremo Nº 38/2015 del Ministerio de Medio Ambiente.
 - Decreto Supremo Nº 52/2014 del Ministerio de Medio Ambiente.
 - Decreto Supremo Nº 16/2016 del Ministerio de Medio Ambiente.
 - Decreto Supremo Nº 06/2017 del Ministerio de Medio Ambiente.
 - Decreto Supremo Nº 79/2018 del Ministerio de Medio Ambiente.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución Nº 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

4.2.2. Vegetación.

4.2.2.1. Descripción en terreno.

La descripción de la vegetación asociada al área de proyecto se realizó mediante parcelas de muestreo representativas del área, además se hizo un recorrido pedestre, cubriendo la totalidad de las áreas que componen el Proyecto. Adicionalmente, se definieron parcelas de caracterización de la vegetación identificando rasgos dendométricos para aquellas especies de carácter arbóreo.

La vegetación ha sido descrita a partir de la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida (Figura 2). Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica fitosociológica establecida por Etienne y Prado (1982). Estas variables son:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento)
- Cobertura de cada estrato
- Especies dominantes

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permite distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas.

Las especies dominantes corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 2).

Tabla 2. Tipo biológico e índice de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

Tipo Biológico	Índice de Cubrimiento (n)
LA _n : Leñoso alto, con cubrimiento n	1: 1 – 5% Muy Escaso
LB _n : Leñoso bajo, con cubrimiento n	2: 5 – 10% Escaso
H _n : Herbáceo, con cubrimiento n	3: 10 – 25% Muy Claro
S _n : Suculento con cubrimiento n	4: 25 – 50% Claro
	5: 50 – 75% Poco Denso
n = Índice de cubrimiento	6: 75 – 90% Denso
	7: 90 – 100% Muy Denso

Fuente: Étienne y Prado (1982).

Figura 2. *Categorización para la descripción de especies dominantes de acuerdo a la metodología COT.* Según el tipo biológico al que pertenece la especie, se utiliza el código en (A) utilizando las iniciales de su nombre científico: siendo "A"/"a", el género; y "B"/"b", la especie. En (B), un ejemplo según tipo biológico y especie.

(A)

Código COT	"A"	"a"
"B"	Leñoso Alto ("AB")	Suculentas ("aB")
"b"	Leñoso Bajo ("Ab")	Herbáceo ("ab")

(B)

Tipo Biológico	Ejemplo Especie	Código COT
Leñoso Alto	<i>Kageneckia angustifolia</i>	KA
Leñoso Bajo	<i>Proustia cuneifolia</i>	Pc
Suculentas	<i>Pozoa coriacea</i>	pC
Herbáceo	<i>Pymhocactus curvspinus</i>	pc

Fuente: Modificado de Étienne y Prado (1982).

4.2.2.2. Clasificación de la vegetación.

A partir de la información obtenida en terreno, se clasificará las unidades de vegetación según tipo biológico, cobertura y altura. El nombre genérico de cada formación fue determinado adaptando lo señalado por Étienne y Prado (1982). Esta adaptación y su correspondencia a la clasificación de Étienne y Prado (1982) se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Correspondencia entre la clasificación de Étienne y Prado y la adaptación de este trabajo.

Clasificación de Étienne y Prado (1982)	Nombre genérico adaptado de la formación
Herbáceo	Pradera
Herbáceo-leñoso bajo	Pradera matorral
Leñoso bajo	Matorral
Leñoso alto-leñoso bajo	Bosque
Leñoso alto-leñoso bajo- herbáceo	
Leñoso alto	

Fuente: Modificado de Étienne y Prado (1982).

4.3. Elaboración de cartografía.

Luego de la clasificación de las unidades cartográficas, según formaciones vegetacionales, se elaboró un mapa que contenga la siguiente información para cada unidad:

-
- Tipos biológicos presentes y su cobertura.
 - Nombre de la formación según la clasificación de Étienne y Prado.
 - Nombre genérico de la formación.
 - Especies dominantes.
 - Superficie (Ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos) horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies con problemas de conservación.

4.4. Identificación de formaciones específicas de acuerdo con la Ley N° 20.283.

Además, se contemplará La Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°1, establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- Bosque Nativo;
- Bosque Nativo de Preservación;
- Bosque Nativo de Conservación y Protección;
- Bosque Nativo de uso Múltiple; y
- Formaciones Xerofíticas.

a) Formaciones de bosque

Para las unidades con presencia de estratos arbóreos, se realizará una evaluación de acuerdo con los criterios definidos en la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo o Bosque de Preservación. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Bosque se define como una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Presentar por lo menos 40 m de ancho.
- Un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

En consecuencia, se evaluará si las formaciones vegetacionales identificadas cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservación que según la Ley N° 20.283, se definirá como bosque nativo de preservación: *"aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.*

b) Formaciones xerofíticas

Para el área de emplazamiento del Proyecto, se verificará la eventual existencia de unidades clasificadas como formación xerofítica; para ella, el cuerpo legal citado establece en sus puntos 13 y 14 las siguientes definiciones a considerar:

- Especie nativa o autóctona: especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura.
- Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

El decreto a que se hace mención corresponde al Decreto N°68/09 del MINAGRI que “Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País”.

Para esta formación, la Ley 20.283 establece una serie de medidas destinadas a su resguardo, estableciendo la necesidad de desarrollar un plan de trabajo para las formaciones xerofíticas, según se establece en el artículo 60°: *“Artículo 60°. - La corta, destrucción o despejado de formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el Título III de esta ley.”*

Adicionalmente se consideró lo estipulado en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la evaluación de proyectos ingresados al SEIA” (CONAF 2014) oficializada en la resolución N°158/2012. De acuerdo a estos cuerpos normativos, una formación xerofítica debe cumplir con los siguientes requisitos:

Se regula la corta, destrucción o despejado de Formaciones Xerofíticas, que se ejecuten en los proyectos o actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Para efectos de identificar a estas formaciones, se considerarán los siguientes criterios, que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y su D.S. N° 93/2008, ambos del Ministerio de Agricultura:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.

4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68/2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo al inciso 3 del artículo 3° del D.S. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para la presentación de un plan de trabajo

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad Mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite norte de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	Carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En relación a la Tabla 4 y considerando el área de estudio del Proyecto, para definir la existencia de una formación xerofítica, se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepa) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda.
2. Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 m.

5. Resultados.

5.1. Marco Biogeográfico.


Según Luebert & Pliscoff (2017) el área de estudio se emplaza sobre un único piso vegetal identificado como “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* – *Maytenus boaria*”, la cual es principalmente representada por un matorral espinoso arborescente abierto dominado dentro de su estrata arbórea por las especies de espino (*Acacia caven*) y maitén (*Maytenus boaria*), en su estrata arbustiva por huañil (*Proustia cuneifolia*), palqui (*Cestrum parqui*) y quilo (*Muehlenbeckia hastulata*); y, finalmente en una estrata de herbáceas, tanto de hierbas con estacionalidad perenne y anual, endémicas, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de barba de macho (*Bromus berterianus*) y pasto sedilla (*Vulpia myuros*).

5.2. Campaña de Terreno.

5.2.1. Esfuerzo de muestreo.

Se recorrió la totalidad del área de proyecto de manera pedestre, dividiéndose los sectores en dos grandes áreas siendo la primera la zona de planta fotovoltaica con 92 parcelas de muestreo y la zona de línea de transmisión con 35 parcelas de muestreo todas identificadas con punto de georreferenciación bajo sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 19 Sur (Figura 3).

Figura 3. Ubicación parcelas de muestreo.




Fuente: Elaboración propia.

5.2.2. Vegetación del Área del Proyecto

5.2.2.1. *Vegetación Sector Planta Fotovoltaica*

El área de la planta fotovoltaica se encuentra compuesta por 92 polígonos que comprenden un total de 5 formaciones vegetaciones diferentes las que incluyen sectores de bosque, matorral, praderas, plantaciones y zonas sin vegetación. Estas formaciones a su vez se dividen en unidades vegetacionales que se diferencian considerando las especies que las componen y la cobertura de estas. La Figura 4 muestra la distribución espacial de cada una de estas unidades.

Figura 4. Distribución espacial de las unidades cartográficas definidas en el área de la planta fotovoltaica



Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 5 muestra un resumen de las diferentes formaciones registradas en el área del proyecto, tipo vegetal, descripción y el área total de cada una de ellas.

Es interesante mencionar que la superficie ocupada por formaciones nativas ya sea bosque o matorral, corresponde a un 58,41% del área total de la planta fotovoltaica, es decir 157,29 ha. Esto nos lleva a que el 41,59% del área se encuentra cubierto por zonas de cultivos o plantaciones (nativos o exóticos) y zonas sin vegetación.

Tabla 5. Resumen de las formaciones vegetacionales registradas en el Sector Planta fotovoltaica

Formación	Tipo Vegetacional	Descripción	Ha
Bosque	Bosque Esclerófilo	Bosque de quebrada	64,47
Matorral	Matorral esclerófilo	Matorral de espino	49,61
		Matorral de Baccharis	12,10
		Matorral pradera con malezas	31,10
Pradera	Praderas de uso de cultivo	Praderas con malezas	21,74
		Praderas con gramíneas	36,05
Plantaciones	Plantaciones Exóticas	Plantación de Eucaliptus	1,98
	Plantaciones de cultivo	Plantación de frutillas	20,10
		Plantación de olivos	8,97
	Plantaciones de compensación	Plantación de quillay	3,58
Zonas denudadas	Zonas sin vegetación	Arado preparado para cultivo	12,11

Formación	Tipo Vegetacional	Descripción	Ha
		Zona sin vegetación	0,58
		Cuerpo de agua	6,89

Fuente: Elaboración propia, 2021.

La Tabla 6 muestra las características de cada uno de los polígonos (unidades cartográficas = UC) en cuanto a su tipo biológico (TB), nombre de la formación (NF), especies dominantes (ED), descripción general y superficie de cada uno de ellos. A continuación, se describen cada uno de ellos, descritos de acuerdo a la clasificación realizada en la Tabla 1.

Tabla 6. Caracterización de las unidades de vegetación en sector planta fotovoltaica

UC	TB	NF	ED	Descripción	ha
1	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	3,38
2	LA5LB3H4	Leñosa alta poco densa	VC, PB, Es, Mh, fc, to	Bosque Esclerófilo	46,53
3	H6	herbácea densa	fc	Cultivo activo de frutillas	1,05
4	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	1,47
5	H6	herbácea densa	fc	Cultivo activo de frutillas	2,67
6	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	2,53
7	LA4LB3H4	Leñosa alta claro, herbáceo claro	QS, Bl, ac, cc	Plantaciones de Quillay	2,21
8	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	1,43
9	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	0,58
10	LA5LB3H4	Leñosa alta poco densa	VC, PB, Es, Mh, fc, to	Bosque Esclerófilo	1,89
11	LA1LB3H4	Leñoso escaso, herbáceo claro	VC, Bl, cp, lm	Matorral de Baccharis	2,05
12	LA4LB3H4	Leñosa alta claro, herbáceo claro	QS, Bl, ac, cc	Plantaciones de Quillay	1,34
13	H6	herbácea densa	fc	Cultivo activo de frutillas	0,62
14	LA5LB3H4	Leñosa alta poco densa	VC, PB, Es, Mh, fc, to	Bosque Esclerófilo	1,28
15	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	1,60
16	H6	herbácea densa	fc	Cultivo activo de frutillas	1,30
17	ZD	ZD	ZD	Sin Vegetación	1,54
18	H6	herbácea densa	fc	Cultivo activo de frutillas	0,90
19	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, Bl, ac, ab	Pradera con malezas	0,58
20	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, Bl, ac, ab	Pradera con malezas	0,76

UC	TB	NF	ED	Descripción	ha
21	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	1,21
22	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	0,91
23	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, Bl, ac, ab	Pradera con malezas	0,76
24	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	3,12
25	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	1,05
26	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	1,85
27	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	0,42
28	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	2,08
29	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	3,23
30	LA5LB3H4	Leñosa alta poco densa	VC, PB, Es, Mh, fc, to	Bosque Esclerófilo	2,94
31	ZD	ZD	ZD	Sin Vegetación	4,82
32	H6	Herbácea densa	fc	Cultivo activo de frutillas	10,11
33	LA5LB3H4	Leñosa alta poco densa	VC, PB, Es, Mh, fc, to	Bosque Esclerófilo	0,67
34	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, Bl, ac, ab	Pradera con malezas	1,03
35	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, Bl, ac, ab	Pradera con malezas	10,95
36	LA1LB3H4	Leñoso escaso, herbáceo claro	VC, Bl, cp, lm	Matorral de Baccharis	1,31
37	ZD	ZD	ZD	Sin Vegetación	0,58
38	ZD	ZD	ZD	Sin Vegetación	6,89
39	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, Bl, ac, ab	Pradera con malezas	5,59
40	LA5LB3H4	Leñosa alta poco densa	VC, PB, Es, Mh, fc, to	Bosque Esclerófilo	4,66
41	ZD	ZD	ZD	Sin Vegetación	2,95
42	ZD	ZD	ZD	Sin Vegetación	0,92
43	LA3LB2H3	Leñosa alta muy clara, herbácea muy clara	EG, VC, Ru, lp	Plantación de Eucalyptus	0,39
44	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	0,27
45	LA3LB2H4	Leñoso muy claro, herbáceo claro	VC, PB, Mh, Ru, Bl, cp, cc	Matorral de Espino	3,20
46	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	7,56
47	LA5LB3H4	Leñosa alta poco densa	VC, PB, Es, Mh, fc, to	Bosque Esclerófilo	0,13
48	LA5LB3H4	Leñosa alta poco densa	VC, PB, Es, Mh, fc, to	Bosque Esclerófilo	0,69
49	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	0,45
50	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	1,04
51	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	0,57
52	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, Bl, ac, ab	Pradera con malezas	2,07
53	LA5LB3H4	Leñosa alta poco densa	VC, PB, Es, Mh, fc, to	Bosque Esclerófilo	5,06

UC	TB	NF	ED	Descripción	ha
54	LA3LB2H4	Leñoso muy claro, herbáceo claro	VC, PB, Mh, Ru, Bl, cp, cc	Matorral de Espino	4,56
55	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	3,58
56	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	1,16
57	LA3LB2H4	Leñoso muy claro, herbáceo claro	VC, PB, Mh, Ru, Bl, cp, cc	Matorral de Espino	20,88
58	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	6,47
59	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	2,84
60	LA3LB2H3	Leñosa alta muy clara, herbácea muy clara	EG, VC, Ru, lp	Plantación de Eucalyptus	1,60
61	H6	Herbácea densa	fc	Cultivo activo de frutillas	0,59
62	ZD	ZD	ZD	Sin Vegetación	1,20
63	LA5LB2H5	Leñosa poco densa, herbácea poco densa	OE, Bl, to	Plantación de olivos	8,97
64	LA1LB3H4	Leñoso escaso, herbáceo claro	VC, Bl, cp, lm	Matorral de Baccharis	2,00
65	LA1LB3H4	Leñoso escaso, herbáceo claro	VC, Bl, cp, lm	Matorral de Baccharis	0,33
66	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	1,51
67	LA1LB3H4	Leñoso escaso, herbáceo claro	VC, Bl, cp, lm	Matorral de Baccharis	1,05
68	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	2,30
69	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	0,66
70	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	2,51
71	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	2,54
72	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	4,20
73	LA1LB3H4	Leñoso escaso, herbáceo claro	VC, Bl, cp, lm	Matorral de Baccharis	1,26
74	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	2,58
75	LA3LB2H4	Leñoso muy claro, herbáceo claro	VC, PB, Mh, Ru, Bl, cp, cc	Matorral de Espino	4,76
76	H6	Herbácea densa	fc	Cultivo activo de frutillas	0,40
77	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	0,61
78	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Mh, Bl, ec, vv	Matorral pradera con malezas	0,50
79	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	0,27
80	LA1LB3H4	Leñoso escaso, herbáceo claro	VC, Bl, cp, lm	Matorral de Baccharis	4,09
81	LA3LB2H4	Leñoso muy claro, herbáceo claro	VC, PB, Mh, Ru, Bl, cp, cc	Matorral de Espino	2,95
82	LA3LB2H4	Leñoso muy claro, herbáceo claro	VC, PB, Mh, Ru, Bl, cp, cc	Matorral de Espino	10,62
83	ZD	ZD	ZD	Sin Vegetación	0,56
84	LA3LB2H4	Leñoso muy claro, herbáceo claro	VC, PB, Mh, Ru, Bl, cp, cc	Matorral de Espino	1,22
85	H6	Herbácea densa	fc	Cultivo activo de frutillas	1,83

UC	TB	NF	ED	Descripción	ha
86	ZD	ZD	ZD	Sin Vegetación	0,12
87	H6	Herbácea densa	fc	Cultivo activo de frutillas	0,28
88	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	0,59
89	H6	Herbácea densa	fc	Cultivo activo de frutillas	0,36
90	H6	Herbácea densa	fm, lp	Pradera con gramíneas	0,10
91	LA3LB2H4	Leñoso muy claro, herbáceo claro	VC, PB, Mh, Ru, Bl, cp, cc	Matorral de Espino	1,41
92	LA5LB3H4	Leñosa alta poco densa	VC, PB, Es, Mh, fc, to	Bosque Esclerófilo	0,63

Especies dominantes (AC= Acacia caven, ab= Avena barbata, ac= Anthemis cotula, Bl= Baccharis linearis, Bc=Berberis chilensis, cc= Convolvulus chilensis, cp= Carduus pycnocephalus, cv= Cirsium vulgare, ec= Erodium cicutarium, EG= Eucalyptus globulus, Es= Eupatorium salivum, fc= Fumaria capreolata, frc= Fragaria chiloensis, fm= Festuca myuros, lm= Lolium multiflorum, lp= Lolium perenne, Mh= Muehlenbeckia hastulata, PB= Peumus boldus, QS= Quillaja saponaria, Ru= Rubus ulmifolius, to = Taraxacum officinale, vv= Verbascum virgatum)

5.2.2.1.1. Bosque

- 1) **Bosque Esclerófilo:** Corresponde a un área con vegetación poco densa (50 – 75% de cobertura), cuyo tipo biológico corresponde a LA5LB3H4, es decir, el estrato arbóreo y el herbáceo son los dominantes. Se encuentra representado por las UC 2, 10, 14, 30, 33, 40, 47, 48, 53 y 92. Es la formación vegetacional que presenta la mayor diversidad de especies del tipo arbóreo, representados por especies como *Acacia caven*, *Peumus boldus*, *Crinodendron patagua*, entre otras, no siendo ninguna de ellas de carácter dominante. Para el estrato arbustivo la dominancia corresponde a *Eupatorium salvia*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Berberis chilensis*, entre otras. El estrato herbáceo está compuesto principalmente por especies introducidas como *Fumaria capreolata*, *Taraxacum officinale*, etc.

Figura 5. Vista general de la formación bosque mixto.



5.2.2.1.2. Matorral

Formación que presenta elementos leñosos dentro de su composición, con una cobertura muy clara (10 – 25%) insertos en una pradera principalmente de gramíneas cuya cobertura alcanza entre un 25 – 50%. La superficie total de la formación corresponde 94,82 ha, es decir, 34,5% del área total de la planta fotovoltaica. Considerando los elementos florísticos que la componen se realizó la siguiente clasificación:

- 1) **Matorral con *Acacia caven*:** Corresponde a áreas donde el principal componente arbóreo es la especie *Acacia caven* (individuos de pequeño tamaño y un DAP no superior a los 5 cm), con una cobertura inferior al 20% (tipo biológico LA3LB2H4). En algunos casos coincidieron con sectores que antiguamente fueron cultivos de frutillas y que actualmente se encuentran abandonados. A esta unidad vegetacional corresponden las UC 45, 54, 57, 75, 81, 82, 84 y 91. Especies acompañantes en el estrato arbóreo, aunque en muy baja cobertura son *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* principalmente en el borde de la formación. En el estrato arbustivo dominan *Muehlenbeckia hastulata*, *Rubus ulmifolius* y *Baccharis linearis*. Dentro del estrato herbáceo abundan las especies de gramíneas y otras especies introducidas como *Carduus pycnocephalus*, *Cirsium vulgare*, *Convolvulus chilensis*, etc. La Figura 6 muestra una visión general de esta formación.

Figura 6. Vista general de la unidad Matorral con *Acacia caven*



- 2) **Matorral de *Baccharis*:** Representado por las UC 11, 36, 64, 65, 67, 73 y 80. Formación vegetal del tipo biológico LA1LB3H4, cuya especie dominante en el estrato arbóreo corresponde a individuos aislados de *Acacia caven*, para el estrato arbustivo el dominante es *Baccharis linearis* que no sobrepasan el 20% de cobertura. En el estrato herbáceo dominan especies introducidas del tipo gramíneas. La Figura 7 muestra una visión general de esta unidad. Esta unidad correspondía antiguamente a cultivos de frutillas lo que con el tiempo quedaron abandonados y dieron lugar al crecimiento y desarrollo de nuevas especies.

Figura 7. Vista general de la formación matorral de Baccharis



- 3) **Matorral pradera con malezas.** Corresponde a las UC 1, 6, 8, 9, 21, 24, 25, 46, 51, 56, 69, 71, 72, 77 y 78. Son sectores que antiguamente se utilizaban para el cultivo de frutillas donde la cobertura del piso herbáceo es de aproximadamente un 80% y se encuentra entremezclada tanto con elementos arbustivos como arbóreos. El tipo biológico corresponde a LA1LB2H5. En el estrato arbóreo domina la especie *Acacia caven* un porcentaje de cobertura que no alcanza el 5% constituida por individuos muy jóvenes de baja altura. Para el estrato arbustivo las especies dominantes que también son escasas corresponden a *Muehlenbeckia hastulata*, *Baccharis linearis* y *Rubus ulmifolius*. En el estrato herbáceo las especies dominantes son *Erodium cicutarium*, *Verbascum virgatum*, especies de la familia Poaceae, entre otras. La Figura 8 muestra una visión general de esta formación. En algunos de los polígonos desaparece tanto el estrato arbóreo como el arbustivo y dominan especies como *Verbascum virgatum* o especies de cardos. El área total de los polígonos que representan esta formación vegetal es de 31,1 ha, lo que equivale al 11,6% del área total de la planta fotovoltaica.

Figura 8. Vista general de la formación matorral pradera



5.2.2.1.3. Praderas

Corresponde a áreas que fueron utilizadas previamente como sectores de cultivo de frutillas, mismas que fueron abandonadas con el tiempo. En algunas de ellas se desarrollaron principalmente especies de la Familia Poaceae y en otras una diversidad de especies introducidas, no necesariamente gramíneas. Dado esto, estas áreas se dividirán en aquellas en que crecieron malezas de diversas especies y otras en que se desarrolló solo un tipo de gramínea. La superficie total de esta formación alcanza a 57,79 ha, equivalente al 21,5% del área total de la planta fotovoltaica.

- 1) **Pradera con malezas:** Corresponde a áreas donde es factible que se haya estado preparando para el cultivo de frutillas pero que en estos momentos se encuentra abandonado. Se encuentra representado por las UC 19, 20, 23, 34, 35, 39 y 52. Corresponde a un tipo de vegetación del tipo LA1LB1H4, donde claramente los elementos leñosos son escasos. De forma ocasional se puede encontrar algún individuo aislado de *Acacia caven*, mismos que presentan un pequeño tamaño. Dentro del estrato arbustivo se presenta ocasionalmente algunos ejemplares de *Baccharis linearis*, pero la forma de vida predominante corresponde a especies herbáceas introducidas. La Figura 9 muestra una vista general de esta unidad vegetal. El área total de estas 7 UC es de 21,74 ha, representando el 8,1% del área total de la planta fotovoltaica.

Figura 9. Vista general de la formación pradera con malezas



- 2) **Praderas con gramíneas:** Corresponde a áreas que antiguamente correspondieron a cultivos de frutillas y que se encuentran abandonadas y por tanto dio lugar principalmente a especies herbáceas introducidas de la familia de las Poaceae. Corresponde al tipo Biológico H6 cuyas especies dominantes son *Carduus pycnocephalus*, *Convolvulus arvensis*, *Festuca myuros*, *Lolium perenne*, etc. Ocasionalmente se encuentran individuos arbóreos como *Acacia caven* y algunos arbustos como *Baccharis linearis*, pero estos suelen ser de pequeño tamaño. La Figura 10 muestra una visión general de esta formación. Las UC asociadas a esta formación son la 4, 15, 22, 26, 28, 29, 44, 49, 50, 55, 58, 59, 66, 68, 70, 74, 79, 88 y 90. La suma total de los polígonos es de 36,1 ha, lo que equivale al 13,4% del área de la planta fotovoltaica.

Figura 10. Vista general de la formación paraderas con gramíneas



5.2.2.1.4. Plantaciones

- 1) **Plantación de Eucalyptus:** Representados por las UC 43 y 60 y correspondiente a una unidad del tipo LA3LB2H3. La especie dominante corresponde a *Eucalyptus sp.*, acompañada ocasionalmente por individuos de pequeño tamaño de *Acacia caven*. Para el estrato arbustivo se presentan especies como *Rubus ulmifolius*. El estrato herbáceo compuesto principalmente por especies de la Poaceae, todas ellas introducidas. La Figura 11 muestra una visión general de esta unidad.

Figura 11. Vista general de plantación de Eucalyptus



5.2.2.1.5. Cultivos y Plantaciones

Corresponde a áreas de monocultivos, como por ejemplo cultivo de frutillas y plantación de olivos, en las cuales aparecen esporádicamente algunas especies introducidas y se incluye una plantación de *Quillaja saponaria* producto de una compensación de especies.

- 1) **Cultivo de frutillas:** corresponde a las UC 3, 5, 13, 16, 18, 32, 61, 76, 85, 87 y 89 y representan el 7,5% del área de la planta fotovoltaica (20,1 ha). Corresponde a un sector con vegetación del tipo H6 donde la mayor parte del área corresponde a cultivo de frutillas. En algunos sectores, principalmente en el borde de la formación se encuentran algunas especies con coberturas inferiores al 5%, de especies como *Anagallis arvensis*, *Convolvulus arvensis*, *Cyperus sp.*, etc, todas ellas de origen introducido y herbáceas. La Figura 12 muestra una visión general de este tipo vegetacional.

Figura 12. Vista general de una plantación de frutillas



- 2) **Plantación de olivos:** Representado por la UC 63 y que presenta un área de 8,97 ha lo que equivale al 3,3% del área total y corresponde a un cultivo de olivos, con un tipo vegetacional del tipo LA5LB2H5. Dentro del estrato arbustivo la especie dominante corresponde a *Baccharis linearis* y en el estrato herbáceo dominan las especies introducidas *Taraxacum officinale* y *Tolpis barbata*. La Figura 13 muestra una visión general de este.

Figura 13. Vista general del área de cultivo de olivos



- 3) **Plantación de *Quillaja saponaria*.** Representado por las UC 7 y 12 y corresponde a plantaciones efectuadas como método de compensación y presenta un área total de 3,58 ha. El terreno original era de plantaciones de cultivo de frutillas. El tipo biológico corresponde a LA4LB3H4, donde claramente domina el estrato arbóreo y el herbáceo. El estrato arbóreo obviamente compuesto por *Quillaja saponaria*, el arbustivo por *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata* y el estrato herbáceo por especies principalmente introducidas. La Figura 14 muestra una visión general de esa unidad.

Figura 14. Vista general de plantación de Quillay



5.2.2.1.4 **Sectores sin vegetación:** Son áreas que no presentan vegetación y cuya superficie total es de 19,57 ha, lo que equivale al 7,3% del área de la planta fotovoltaica. Comprende los siguientes tipos de unidades:

- 1) **Sectores recién arados y preparados para el cultivo de frutillas.** No presentan ningún tipo de vegetación por lo que corresponde a una zona denudada (ZN). La Figura 15 muestra una vista general de estos sectores. Estas áreas corresponden a las UC 17, 31, 41, 42, 62, 83, 86.

Figura 15. Vista general de un sector recién arado sin vegetación



- 2) **Sector que no presenta vegetación en forma natural** y corresponde la UC 37. La Figura 16 muestra este sector que también corresponde a una ZD.

Figura 16. Vista general de un sector Sin vegetación



- 3) **Sector que corresponde a un cuerpo de agua** que se presenta en el área de la planta fotovoltaica y corresponde a la UC 38. La Figura 17 muestra una vista general de ella.

Figura 17. Vista general de un cuerpo de agua



5.2.2.2. *Vegetación Línea de transmisión*

El trazados de la línea de transmisión (contemplando la modificación de cierto tramo en la presente Adenda) se encuentran compuestos por 31 polígonos que comprenden un total de 5 formaciones vegetaciones diferentes las que incluyen sectores de bosque, matorral, praderas, sectores de cultivo y zonas denudadas.


La Tabla 7 muestra un resumen de las diferentes formaciones registradas en el área de la Línea de transmisión, incluyendo el tipo vegetacional al cual corresponde y la superficie ocupada por cada uno de ellos. En ella podemos observar que más del 78% de la superficie es ocupada por formaciones nativas, ya sean de bosque esclerófilo o matorrales tanto de Tevo como de Espino.

Tabla 7. Resumen de las formaciones vegetacionales registradas en el Sector Línea de Transmisión

Formación	Tipo Vegetacional	Descripción	Ha
Bosque	Bosque Esclerófilo	Bosque de quebrada	3,75
	Bosque mixto	Bosque mixto de quebrada	
Matorral	Matorral esclerófilo	Matorral de espino	146,07
		Matorral de Baccharis	
		Matorral pradera con malezas	
Pradera	Praderas de uso agrícola	Praderas con malezas	13,04
Plantaciones	Plantación Forestal	Plantación de Eucaliptus	15,14
	Plantaciones de cultivo	Plantación de frutillas	
Zonas denudadas	Zonas sin vegetación	Zona sin vegetación	14,67

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 18. Distribución espacial de cada una de las formaciones vegetacionales registradas en la línea de Transmisión.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Finalmente, la Tabla 8 muestra las características de cada uno de los polígonos (unidades cartográficas = UC) en cuanto a su tipo biológico (TB), nombre de la formación (NF), especies dominantes (ED), descripción general y superficie de cada uno de ellos. A continuación, se describen cada uno de ellos.

Tabla 8. Caracterización de las unidades de vegetación en sector Línea de Transmisión

UC	TB	NF	ED	Descripción	Ha
1	LA3LB2H5	Leñoso muy claro, herbáceo poco denso	VC, Tt, ac, to	Matorral de espino	7,74
2	H6	Herbácea densa	fc	Plantacion de Cultivo	8,21
3	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, Bl, ac, ab	Pradera con maleza	1,26
4	LA5LB3H4	Leñosa alta poco densa	VC, PB, Es, Mh, fc, to	Bosque mixto de quebrada	0,81
5	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, Bl, ac, ab	Pradera con maleza	3,52
6	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, Bl, ac, ab	Pradera con maleza	1,60
7	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, Bl, ac, ab	Pradera con maleza	2,19
8	LA1LB5H4	Leñosa baja poco densa, herbáceo claro	VA, Tt, to	Matorral de tevo	3,63
9	LA3LB2H5	Leñoso muy claro, herbáceo poco denso	VC, Tt, ac, to	Matorral de espino	18,98
10	LA1LB5H4	Leñosa baja poco densa, herbáceo claro	VA, Tt, to	Matorral de tevo	6,88
11	LA3LB2H5	Leñoso muy claro, herbáceo poco denso	VC, Tt, ac, to	Matorral de espino	6,84
12	LA1LB5H4	Leñosa baja poco densa, herbáceo claro	VA, Tt, to	Matorral de tevo	13,03
13	LA3LB2H5	Leñoso muy claro, herbáceo poco denso	VC, Tt, ac, to	Matorral de espino	7,51
14	LA1LB5H4	Leñosa baja poco densa, herbáceo claro	VA, Tt, to	Matorral de tevo	5,05
15	LA3LB2H5	Leñoso muy claro, herbáceo poco denso	VC, Tt, ac, to	Matorral de espino	6,88
20	LA3LB2H5	Leñoso muy claro, herbáceo poco denso	VC, Tt, ac, to	Matorral de espino	2,36
21	LA1LB5H4	Leñosa baja poco densa, herbáceo claro	VA, Tt, to	Matorral de tevo	16,15
22	LA3LB2H5	Leñoso muy claro, herbáceo poco denso	VC, Tt, ac, to	Matorral de espino	17,51
23	ZD	ZD	ZD	Sin vegetación	12,20
24	LA3LB2H5	Leñoso muy claro, herbáceo poco denso	VC, Tt, ac, to	Matorral de espino	6,44

UC	TB	NF	ED	Descripción	Ha
COTJM01	LA1LB1H4	Leñoso muy escaso, herbáceo claro	VC, vv, lm, lp, ta	Pradera con maleza	4,47
COTJM02	LA3LB2H3	Leñosa alta muy clara, herbáceo muy clara	EG, Bl	Plantación forestal	0,81
COTJM03	H6	Herbácea densa	fc	Cultivo de frutilla	3,08
COTJM04	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Bl, ac	Matorral pradera con malezas	7,65
COTJM05	H6	Herbácea densa	fc	Cultivo de frutilla	3,03
COTJM06	LA1LB2H3	Leñoso escaso, herbácea muy clara	VC, Tt, to	Matorral de tevo	6,41
COTJM07	ZD	ZD	ZD	Sin vegetación	2,47
COTJM13	LA2LB2H4	Leñoso bajo muy escaso, herbáceo claro	VC, Tt, ac, to	Matorral de espino	6,94
COTJM13 b	LA1LB2H3	Leñoso escaso, herbácea muy clara	VC, Tt, to	Matorral de tevo	3,39
COTJM14	LA1LB2H5	Leñoso escaso, herbáceo poco denso	VC, Bl, ac, cp	Matorral pradera con malezas	2,68
COTJM18	LA3LB2H3	Leñosa alta muy clara, herbácea muy clara	Eg, Bp, SL, lm, lp	Bosque mixto de quebrada	2,94

Simbología: UC = unidad cartográfica; TB = tipo biológico; NF = Nombre de la formación; ED = Especies dominantes (VC= *Vachellia caven*, ac= *Anthemis cotula*, Bl= *Baccharis linearis*, cp= *Carduus pycnocephalus*, cv= *Cirsium vulgare*, ec= *Erodium cicutarium*, Es= *Eupatorium salvia*, lm= *Lolium multiflorum*, lp= *Lolium perenne*, Mh= *Muehlenbeckia hastulata*, PB= *Peumus boldus*, Ru= *Rubus ulmifolius*, to = *Taraxacum officinale*, ta= *Trifolium arvense*, Tt= *Trevoa trinervia*, vv= *Verbascum virgatum*) Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.2.2.2.1. Bosques

- 1) Bosque Esclerófilo:** Corresponde a un área con vegetación poco densa, cuyo tipo biológico corresponde a LA5LB3H4 y está representado por la UC COTJM08 y 4|. La superficie total ocupada por esta formación es solo de 3,75 ha, equivalente al 2% de la superficie total de la línea de transmisión. En términos concretos corresponde al área que presenta mayor número de individuos de tipo arbóreo, El estrato arbóreo se encuentra dominado por especies como *Acacia caven*, acompañado de *Peumus boldus*, *Schinus latifolius* (entre otros). Para el estrato arbustivo la dominancia corresponde a *Trevoa trinervis* acompañada de *Muehlenbeckia hastulata*, entre otras. El estrato herbáceo está compuesto principalmente por especies introducidas como *Convolvulus arvensis*, *Taraxacum officinale*, etc. La Figura 19 muestra una visión general de esta formación.

Figura 19. Vista general de áreas de vegetación nativa. En cuadro: *Peumus boldus*, *Acacia caven*, *Trevoa trinervis* y *Baccharis Linearis*, acompañado de una estrata herbácea muy densa de gramíneas y cardos.



5.2.2.2.2. Matorral:

Corresponde a polígonos donde existe una especie arbórea o arbustiva dominante inserta en una pradera básicamente de gramíneas y/o especies introducidas. La superficie total de esta formación es de 146,1 ha, equivalente al 75,8% de la superficie total de la línea de transmisión. Considerando la especie dominante, se caracterizaron de la siguiente manera:

- 1) **Matorral de espino:** Corresponde a áreas donde el principal componente arbóreo es la especie *Vachellia caven*, con una cobertura inferior al 20%. En 2 instancias se detectó que corresponde a sectores que antiguamente tuvieron agrícola de cultivo, precisamente de frutillas los que claramente fueron abandonados. A esta unidad vegetacional corresponden las UC: COTJM13, 1|, 9|, 11|, 13|, 15|, 20|, 22| y 24|. El tipo biológico corresponde a LA2LB2H4 y LA3LB2H4, donde las formas de vida dominante corresponden a los estratos arbóreos y herbáceos. Especies acompañantes en el estrato arbóreo, aunque en muy baja cobertura son *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* principalmente en el borde de algunas formaciones y usualmente próximos a esteros o cursos de agua. En el estrato arbustivo dominan *Muehlenbeckia hastulata*, *Rubus ulmifolius* y *Baccharis linearis*. Dentro del estrato herbáceo abundan las especies de gramíneas y otras especies introducidas como *Carduus pycnocephalus* y gramíneas varias. La Figura 20 muestra una visión general de esta formación.

Figura 20. Vista general de un matorral de espino



- 2) **Matorral de Tevo:** Formación vegetal representada por las UC COTJM06, COTJM13b, 8|, 10|, 12|, 14| Y 21|. Corresponde a sectores cuya cobertura va de claro a denso, con *Trevoa trinervis* (Retanilla trinervia) como especie dominante. El estrato arbóreo se encuentra compuesto básicamente por la especie *Acacia caven*, la que se presenta de forma muy esporádica y por lo general, no alcanza alturas superiores, presentando individuos de pequeño tamaño y por debajo del 5% de cobertura.

Figura 21. Vista general del matorral de Tevo



5.2.2.2.2.1. Praderas

- 1) **Pradera con malezas:** Corresponde a áreas que antiguamente correspondieron a cultivos de frutillas y que se encuentran abandonadas y por tanto dio lugar principalmente a especies herbáceas introducidas principalmente de la familia de las Poaceae. Las UC: COTJM01, 3|, 5|, 6| Y 7|, son los que representan este tipo de formación vegetal. Principalmente corresponden a una unidad LA1LB1H4 cuyas especies dominantes corresponden al piso herbáceo y entre se encuentran *Carduus pycnocephalus*, *Convolvulus arvensis*, *Lolium*

perenne, etc. Ocasionalmente se encuentran individuos arbóreos como *Vachellia caven* y algunos arbustivos como *Baccharis lineraris* y *Trevoa trinervis*, pero con una cobertura despreciable. La Figura 22 muestra una visión general de esta formación.

Figura 22. Vista general de la formación pradera



5.2.2.2.3. Cultivos

- 1) **Cultivo de frutillas:** Corresponde a un sector con vegetación del tipo H5 donde la mayor parte del área corresponde a cultivo de frutillas y se encuentra representado por las UC: COTJM03, COTJM05 y 2|. En algunos sectores es acompañada, con coberturas inferiores al 5%, por cercos arbustivos de especies de origen introducido (*Populus sp.*, *Eucalyptus sp.*, etc) y herbáceas. La Figura 23 muestra una visión general de este tipo vegetacional.

Figura 23. Vista general del cultivo de frutillas



- 2) **Plantación de Eucalyptus:** Representados por la UC COTJM02, correspondiente a una unidad del tipo LA3LB2H3. La especie dominante corresponde a *Eucalyptus sp.*, acompañada ocasionalmente por individuos de pequeño tamaño de *Acacia caven*. Para el estrato arbustivo se presentan especies como *Baccharis linearis*. El estrato herbáceo compuesto principalmente por especies de la familia Poaceae, todas introducidas. La Figura 24 muestra una visión general de esta unidad.

Figura 24. Vista general de plantación de Eucaliptus



5.2.2.2.4. Sectores sin vegetación.

- 1) Corresponde a sectores recién arados y preparados para el cultivo de frutillas. No presentan ningún tipo de vegetación por lo que corresponde a una zona denudada (ZN). La Figura 25 muestra una vista general de estos sectores. Estas áreas corresponden a la UC COTJM07 y 23|.

Figura 25. Vista panorámica de COTJM17b, sector de arado.



5.2.3 Flora

5.2.2.3. Sector planta fotovoltaica.

Se catastraron 92 especies de plantas vasculares representadas en 44 familias taxonómicas La Tabla 9 presenta el nombre científico, nombre común, hábito y origen de cada una de ellas. Las familias más representadas corresponden a las Asteraceae (17,39%) representada por 16 especies, Poaceae (14,13%) representada por 13 especies, seguidas de las familias Fabaceae, Geraniaceae y Solanaceae, todas ellas con 4 representantes, equivalentes al 4,34%, cada una de ellas.

Tabla 9. Riqueza de plantas vasculares catastradas en la campaña de terreno dentro del sector. Se especifica la Familia taxonómica, nombre científico y vernáculo, hábito de crecimiento y origen.

DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
		Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen
POLYPODIOPHYTA					
POLIPODIOPSIDA					
PTERIDACEAE					
		<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Hierba perenne	Nativo
MAGNOLIOPHYTA					
LILIOPSIDA					
ASPARAGACEAE					
		<i>Oziroë arida</i> (Poepp.) Speta	Cebolleta	Hierba perenne	Endémico
ALSTROEMERIACEAE					
		<i>Alstroemeria</i> sp.	Alstromeria	Hierba perenne	Nativo
CYPERACEAE					
		<i>Cyperus eragrostis</i> Lam	-	Hierba perenne	Nativa
IRIDACEAE					
		<i>Calydorea xiphioides</i> (Poepp.) Espinosa	Violeta	Hierba perenne	Endémico
LILIACEAE					
		<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	Hierba perenne	Nativo
POACEAE					
		<i>Agrostis capillaris</i> L.	Hierba fina	Hierba perenne	Introducido
		<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Hierba anual	Introducido
		<i>Briza minor</i> L.	Tembladera	Hierba anual	Introducido
		<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Barba de macho	Hierba anual	Introducido

DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
		Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen
		<i>Festuca bromoides</i> L.	Pasto sedilla	Hierba anual	Introducido
		<i>Festuca myuros</i> L.	Pasto largo	Hierba anual	Introducido
		<i>Holcus lanatus</i> L.	Heno blanco	Hierba anual	Introducido
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Espigadilla	Hierba anual	Introducido
		<i>Hordeum vulgare</i> L.	Cebada	Hierba anual	Introducido
		<i>Lagurus ovatus</i> L.	Cola de conejo	Hierba anual	Introducido
		<i>Lolium multiflorum</i> Lam	Raigrás	Hierba anual	Introducido
		<i>Lolium perenne</i> L.	Raigrás	Hierba perenne	Introducido
		<i>Poa annua</i> L.	Poa	Hierba anual	Introducido
TECOPHILACEAE					
		<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Papita del campo	Hierba perenne	Endémico
		<i>Conanthera trimaculata</i> (D. Don) F. Meigen	Pajarito del campo	Hierba perenne	Endémico
MAGNOLIOPSIDA					
ACANTHACEAE					
		<i>Stenandrium dulce</i> (Cav.) Nees		Hierba perenne	Nativa
ANACARDIACEAE					
		<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lind.) Engl.	Molle	Árbol	Endémico
APIACEAE					
		<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Hierba anual	Introducido
ASTERACEAE					
		<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Hierba anual	Introducido
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Arbusto	Nativo
		<i>Baccharis salicifolia</i>	Azumiate	Arbusto	Nativo
		<i>Baccharis</i> sp.		Arbusto	Nativo
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo	Hierba anual	Introducido
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Hierba anual	Introducido
		<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Hierba del chancho	Hierba anual	Introducido

DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
		Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen
		<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo	Arbusto	Nativo
		<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Salvia macho	Arbusto	Endémico
		<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuga espinosa	Hierba anual	Introducido
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don ssp. <i>cuneifolia</i>		Arbusto	Nativo
		<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Viravira	Hierba anual	Nativo
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio	Hierba anual	Introducido
		<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Ñilhue	Hierba anual	Introducido
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Hierba perenne	Introducido
		<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn	Lechuguilla	Hierba anual	Introducido
BERBERIDACEAE					
		<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Michay	Arbusto	Endémico
BRASSICACEAE					
		<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Hierba anual	Introducido
		<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Hierba anual	Introducido
CACTACEAE					
		<i>Echinopsis chiloensis</i> Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Suculento	Endémico
CARYOPHYLLACEAE					
		<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Alfombras de arena	Hierba perenne	Nativo
		<i>Silene gallica</i> L.	Calabacillo	Hierba anual	Introducido
		<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo	Quilloi-quilloi	Hierba anual	Introducido
CELASTRACEAE					
		<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativo
CHENOPODIACEAE					
		<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Paico	Hierba perenne	Nativo
CONVOLVULACEAE					
		<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correvuela	Hierba perenne	Introducido
		<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Correhuela rosada	Hierba perenne	Endémico
		<i>Cuscuta chilensis</i> Kerr Gawl.	Cabello del ángel	Hierba anual	Nativo

DIVISIÓN				
CLASE				
FAMILIA				
	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen
DIOSCOREACEAE				
	<i>Dioscorea sp.</i>	Ñame	Hierba perenne	Nativa
ELAEOCARPACEAE				
	<i>Aristolelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Árbol	Nativo
	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	Árbol	Endémico
EUPHORBIACEAE				
	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoa	Hierba anual	Introducido
FABACEAE				
	<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	Lupino azul	Hierba anual	Nativo
	<i>Trifolium arvense</i> L.	Trébol blanco	Hierba anual	Introducido
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trébol amarillo	Hierba anual	Introducido
	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativo
FUMARIACEAE				
	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Flor de la culebra	Hierba anual	Introducido
GERANIACEAE				
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton	Alfilerillo	Hierba anual	Introducido
	<i>Geranium bertereanum</i> Colla	Core-core	Hierba perenne	Nativo
	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Hierba perenne	Nativo
	<i>Geranium robertianum</i> L.	Geranio	Hierba anual	Introducido
HYPERICACEAE				
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan	Hierba perenne	Introducido
LINACEAE				
	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	Hierba anual	Introducido
LOASACEAE				
	<i>Caiophora sp.</i>	Ortiga	Hierba perenne	Nativo
MONIMIACEAE				
	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Árbol	Endémico
MONTIACEAE				

DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	
	<i>Calandrinia sp.</i>	Calandrinia	Hierba perenne	Nativo	
MYRTACEAE					
	<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucalypto	Árbol	Introducido	
OLEACEAE					
	<i>Olea europea L.</i>	Olivo	Árbol	Introducido	
ONAGRACEAE					
	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F. H. & M. R. Lewis	Huasita	Hierba anual	Endémico	
	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Don Diego de la noche	Hierba perenne	Endémico	
OROBANCHACEAE					
	<i>Belardia trixago</i> (L.) All.	Belardia	Hierba anual	Introducido	
PAPAVERACEAE					
	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Hierba perenne	Introducido	
POLYGONACEAE					
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Arbusto	Nativo	
	<i>Polygonum persicaria L.</i>	Duraznillo	Hierba anual	Introducido	
	<i>Rumex acetocella L.</i>	Vinagrillo	Hierba perenne	Introducido	
PRIMULACEAE					
	<i>Anagallis arvensis L.</i>	Pimpinela rosada	Hierba anual	Introducido	
RANUNCULACEAE					
	<i>Ranunculus repens L.</i>	Botón de oro	Hierba perenne	Introducido	
RHAMNACEAE					
	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tevo	Arbusto	Endémico	
ROSACEAE					
	<i>Potentilla chilensis</i> (L.) Mabb.	Frutilla silvestre	Hierba perenne	Nativo	
	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Árbol	Endémico	
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbusto	Introducido	
RUBIACEAE					
	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. Ex Griseb.	Relbún	Hierba perenne	Nativo	
SALICACEAE					

DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
		Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen
		<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Árbol	Introducido
SCROPHULARIACEAE					
		<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Hierba anual	Introducido
SOLANACEAE					
		<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Arbusto	Nativo
		<i>Datura stramonium</i> L.	Estramonio	Hierba anual	Introducido
		<i>Nicotiana acuminata</i> (Graham) Hook. var. <i>acuminata</i>		Hierba perenne	Endémico
		<i>Solanum tuberosum</i> L.	Papa	Hierba perenne	Nativo

Considerando el hábito de las especies presentes, el mayor porcentaje de representatividad corresponde a las especies de hábito herbáceo con un total de 76,1% si consideramos tanto las anuales como las perennes (Tabla 10). Las especies de hábito arbóreo representan solo el 10,87%, siendo representadas mayoritariamente en la formación vegetacional de bosque.

Tabla 10. Caracterización del hábito de las especies- sector planta fotovoltaica.

Hábito de crecimiento	Cantidad de especies según hábito	Presencia (%)
Árbol	10	10,87
Arbusto	11	11,96
Hierba anual	40	43,48
Hierba perenne	30	32,61
Suculento	1	1,09
Total	92	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La Tabla 11 muestra el origen de las especies presentes en el área y se observa que el 52,17% (48 especies) son de origen introducido, y solo el 17,39% de ellas son de origen endémico. Esta distribución en el origen de las

especies se basa en que gran parte del área del proyecto corresponde a plantaciones, las que cuando se dejan de usar, dan origen inmediato a la entrada de las especies de este tipo.

Tabla 11. Caracterización del origen de las especies – sector planta fotovoltaica.

Origen de las especies	Número	%
Endémico	16	17,39
Introducido	48	52,17
Nativo	28	30,43
Total	92	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.2.4. Sector línea de transmisión

Se catastraron 47 especies de plantas vasculares (Tabla12) representadas a través de 28 familias taxonómicas. Las familias mejor representadas en el área corresponden a las Asteraceae (23,4%) representada por 11 especies, Poaceae (12,8%) representada por 6 especies, Fabaceae (6,4%) representada por 3 especies, y finalmente Rosaceae (6,4%) representada por 3 especies.

Tabla 12. Riqueza de plantas vasculares catastradas en la campaña de terreno dentro del sector. Se especifica la Familia taxonómica, nombre científico y vernáculo, hábito de crecimiento y origen.

12 Familia taxonómica, nombre científico y vernáculo, hábito de crecimiento y origen.						
DIVISIÓN						
CLASE						
		FAMILIA				
			Nombre Científico	Nombre común	Hábito	Origen
MAGNOLIOPHYTA						
		LILIOPSIDA				
		ALSTROEMERIACEAE				
			Alstroemeria sp.	Alstromeria	Hierba perenne	Nativa
		BROMELIACEAE				
			Puya chilensis Molina	Chagual	Hierba perenne	Endémico
		IRIDACEAE				
			Sisyrinchium striatum Sm	Huilmo amarillo	Hierba perenne	Nativa
		LILIACEAE				

DIVISIÓN						
CLASE						
		FAMILIA				
			Nombre Científico	Nombre común	Hábito	Origen
			<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	Hierba perenne	Nativa
		POACEAE				
			<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Hierba anual	Introducido
			<i>Festuca myuros</i> L.	Pasto largo	Hierba anual	Introducido
			<i>Hordeum murinum</i> L.	Espigadilla	Hierba anual	Introducido
			<i>Lolium multiflorum</i> Lam	Raigrás	Hierba anual	Introducido
			<i>Lolium perenne</i> L.	Raigrás	Hierba perenne	Introducido
		<i>Poa annua</i> L.		Poa	Hierba anual	Introducido
		TECOPHILACEAE				
			<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Papita del campo	Hierba perenne	Endémico
		MAGNOLIOPSIDA				
		ACANTHACEAE				
			<i>Stenandrium dulce</i> (Cav.) Nees		Hierba perenne	Nativa
		ANACARDIACEAE				
			<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lind.) Engl.	Molle	Árbol	Endémico
		APIACEAE				
			<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Hierba anual	Introducido
		APOCYNACEAE				
			<i>Diplolepis boerhaviifolia</i> (Hook. & Arn.) Liede & Rapini	Pahuedum	Sub-arbusto	Endémico
		ASTERACEAE				
			<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Hierba anual	Introducido
			<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Arbusto	Nativa
			<i>Baccharis largo</i>	Azumiate	Hierba anual	Nativa
			<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo	Hierba anual	Introducido
			<i>Chaetanthera ciliata</i> Ruiz & Pav.	Chinita	Hierba anual	Endémico
			<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Hierba anual	Introducido

DIVISIÓN						
CLASE						
		FAMILIA				
			Nombre Científico	Nombre común	Hábito	Origen
			<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo	Hierba perenne	Introducido
			<i>Eupatorium salivum Colla</i>	Salvia macho	Arbusto	Endémico
			<i>Sonchus asper (L.) Hill</i>	Ñilhue	Hierba anual	Introducido
			<i>Taraxacum officinale F.H. Wigg.</i>	Diente de león	Hierba perenne	Introducido
			<i>Triptilion spinosum Ruiz & Pav.</i>	Siempreviva	Hierba perenne	Endémico
		BRASSICACEAE				
			<i>Sisymbrium officinale (L.) Scop.</i>	Mostacilla	Hierba anual	Introducido
		CACTACEAE				
			<i>Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt.</i>	Quisquito	Suculento	Endémico
		CELASTRACEAE				
			<i>Maytenus boaria Molina</i>	Maitén	Árbol	Nativa
		CONVOLVULACEAE				
			<i>Convolvulus arvensis L.</i>	Correvuela	Hierba perenne	Introducido
		DIOSCOREACEAE				
			<i>Dioscorea sp.</i>	Ñame	Hierba perenne	Introducido
		FABACEAE				
			<i>Trifolium arvense L.</i>	Trébol blanco	Hierba anual	Introducido
			<i>Trifolium campestre Schreb.</i>	Trébol amarillo	Hierba anual	Introducido
			<i>Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger</i>	Espino	Árbol	Nativa
		HYPERICACEAE				
			<i>Hypericum perforatum L.</i>	Hierba de San Juan	Hierba perenne	Introducido
		MONIMIACEAE				
			<i>Peumus boldus Molina</i>	Boldo	Árbol	Endémico
		MYRTACEAE				

DIVISIÓN						
CLASE						
		FAMILIA				
			Nombre Científico	Nombre común	Hábito	Origen
			<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalypto	Árbol	Introducido
		ONAGRACEAE				
			<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F. H. & M. R. Lewis	Huasita	Hierba anual	Endémico
		POLEMONIACEAE				
			<i>Collomia biflora</i> (Ruiz & Pav.) Brand	Colomia roja	Hierba anual	Nativa
		POLYGONACEAE				
			<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Arbusto	Nativa
		RHAMNACEAE				
			<i>Trevoa trinervis</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tevo	Arbusto	Endémico
		ROSACEAE				
			<i>Potentilla chilensis</i> (L.) Mabb.	Frutilla silvestre	Hierba perenne	Nativa
			<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Árbol	Endémico
			<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbusto	Introducido
		SALICACEAE				
			<i>Populus sp.</i>	Álamo	Árbol	Introducido
		SCROPHULARIACEAE				
			<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Hierba anual	Introducido
		SOLANACEAE				
			<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Arbusto	Nativa

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En términos de la forma de vida, la más representada corresponde a la forma de vida herbácea (anuales más perennes) con un 68,1% (32 especies) (Tabla 13), seguido por los arbustos y árboles, con 6 (12,8%) y 7 (15%) especies respectivamente y representando en total el 27,7%.

Tabla 13. Caracterización del hábito de crecimiento de las especies- sector Línea de transmisión.

Hábito de crecimiento	Cantidad de especies según hábito	Presencia (%)
Anual	18	38,30
perenne	14	29,79
Árbol	7	14,89
Arbusto	6	12,77
Sub-arbusto	1	2,13
Suculento	1	2,13
TOTAL	47	100

Fuente: Elaboración propia, 2021.

De acuerdo con el origen de las especies, el 48,9% (23 especies) corresponde a especies introducidas y solo el 25,5% de ellas son de origen endémico (Tabla 14).

Tabla 14. Caracterización del origen de las especies- sector Línea de transmisión.

Origen	Especies	Presencia (%)
<i>Endémico</i>	12	25,53
<i>Introducido</i>	23	48,94
<i>Nativo</i>	12	25,53
Total	47	100

Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.3. Singularidades Ambientales

De acuerdo a los antecedentes bibliográficos revisados, respecto a la caracterización del contexto vegetal y florístico del área donde se desarrollará el Proyecto, en conjunto con los hallazgos del trabajo de terreno, es posible señalar que existen singularidades ambientales para el componente flora y vegetación, que pudiesen verse afectados por la instalación del proyecto debido a su cercanía a las zonas de construcción.

A partir de la información levantada en terreno, se registró la presencia de seis especies (Tabla 15) en categoría de conservación según el D.S 50/2008 MINSEGPRES, D.S. 19/2012 MMA, D.S. 13/2013 MMA, D.S 41/2011 MMA y D.S 42/2011 MMA presentes dentro de las áreas de intervención o bien aledañas al Proyecto. Se señala que las seis especies registradas se registraron con un estado fisiológico sano, presentando una fenología de crecimiento vegetativo y en algunos casos como la puya, quisco y tahay con un estado de floración avanzada (Figura 27).

Tabla 15. Especies en categoría de conservación dentro de la zona del Proyecto.

Familia	Especie	Forma de vida	Estado de conservación	Referencia o Decreto	Sector
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculento	Casi Amenazada	D.S 41/2011 MMA	Planta fotovoltaica
Cactaceae	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Suculento	Preocupación Menor	D.S 41/2011 MMA	Línea de transmisión
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Arbusto	Preocupación Menor	D.S 42/2011 MMA	Línea de transmisión
Iridaceae	<i>Calydorea xiphioides</i>	Geófita	Vulnerable - Rara	D.S 50/2008 MINSEGPRES	Planta fotovoltaica
Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i>	Geófita	Preocupación Menor	DS 13/ 2013 MMA	Planta fotovoltaica y línea de transmisión
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Hierba perenne	Casi Amenazada	DS 19/2012 MMA	Planta fotovoltaica

Fuente: Elaboración propia, 2021.

La Tabla 16 muestra la ubicación de cada uno de los individuos que presentan alguna categoría de conservación, tanto en sus coordenadas como en el sector específico del proyecto y el número de individuos registrados. Por otra parte, la Tabla 17 muestra cuales son los polígonos en que se encuentran estos individuos y por tanto dan cuenta de la formación a la que pertenecen. La Figura 27 muestra un ejemplar de cada una de las especies. La Figura 26 muestra la distribución espacial en la cual se encuentran distribuidas estos individuos.

Tabla 16. Georreferenciación de especies en categoría de conservación.


Coordenadas UTM Datum WGS 84 19 Sur		Nombre científico	Nombre común	Sector	N° Individuos
Este	Norte				
271.724	6.252.819	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Planta fotovoltaica	1
271.569	6.252.477	<i>Calydorea xiphioides</i>	Tahay	Planta fotovoltaica	1
271.580	6.252.514	<i>Calydorea xiphioides</i>	Tahay	Planta fotovoltaica	1
271.732	6.251.875	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1

Coordenadas UTM Datum WGS 84 19 Sur		Nombre científico	Nombre común	Sector	N° Individuos
Este	Norte				
271.747	6.252.644	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
270.186	6.251.959	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
269.756	6.251.719	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
270.137	6.251.968	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
270.078	6.251.981	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
270.729	6.252.956	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
270.110	6.252.433	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
270.833	6.251.570	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
271.374	6.250.245	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Línea de transmisión	1
272.321	6.249.364	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Línea de transmisión	1
271.363	6.252.829	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1
271.332	6.252.808	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1
270.717	6.252.968	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	4
270.704	6.252.957	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1

Coordenadas UTM Datum WGS 84 19 Sur		Nombre científico	Nombre común	Sector	N° Individuos
Este	Norte				
270.563	6.252.930	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1
270.570	6.251.320	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1
270.467	6.252.852	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1
271.556	6.250.086	<i>Eriogyne subgibbosa</i>	Quisquito	Línea de transmisión	3
271.464	6.250.156	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1
271.512	6.250.135	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1
271.556	6.250.086	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1
271.569	6.250.081	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1
271.659	6.249.992	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1
271.666	6.249.988	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 26. Localización especies en categoría de conservación



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Por otra parte, la Tabla 17 muestra cuales son las unidades cartográficas en que se encuentran estos individuos y por tanto dan cuenta de la formación a la que pertenecen.


Tabla 17. Posición dentro de las formaciones vegetacionales de las especies en categoría de conservación

UC	Especie	Formación vegetal
10	<i>Adiantum chilense</i>	Bosque Esclerófilo
14	<i>Calydorea xiphioides</i>	Matorral de espino
3	<i>Conanthera campanulata</i>	Cultivo activo de frutillas
8	<i>Conanthera campanulata</i>	Matorral pradera con malezas
36	<i>Conanthera campanulata</i>	Matorral de Baccharis
40	<i>Conanthera campanulata</i>	Bosque Esclerófilo
45	<i>Conanthera campanulata</i>	Matorral de espino
46	<i>Conanthera campanulata</i>	Matorral pradera con malezas
48	<i>Conanthera campanulata</i>	Bosque Esclerófilo
60	<i>Conanthera campanulata</i>	Plantación de Eucalyptus
90	<i>Conanthera campanulata</i>	Pradera con gramíneas
9I	<i>Conanthera campanulata</i>	Matorral de espino
11I	<i>Conanthera campanulata</i>	Matorral de espino
40	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Bosque Esclerófilo

UC	Especie	Formación vegetal
48	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Bosque Esclerófilo
57	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Matorral de espino
92	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Bosque Esclerófilo
9l	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Matorral de espino
9l	<i>Puya chilensis</i>	Matorral de espino

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 27. Muestra de algunas de las especies en categoría de conservación registradas en el área del proyecto



6. Recomendaciones

En atención a lo señalado anteriormente, existen 6 especies en alguna categoría de conservación. Con respecto a estas especies se deben tomar medidas de protección en caso de que estas sean afectadas por algunas de las obras del proyecto. Estas medidas se describen a continuación de acuerdo con cada especie:

Conanthera campanulata y *Calydorea xiphioides*: Rescatar todos los bulbos presentes en el área y trasplantarlos en un área que cumpla con las mismas condiciones de piso vegetal en las que se encontraba originalmente. La medida se encuentra en el Anexo 21 de la presente ADENDA.

Echinopsis chiloensis, *Eriosyce subgibbosa* y *Puya chilensis*: Traslado de los individuos completos, en primera instancia y por esquejes si esto no fuese posible. La medida se encuentra en el Anexo 21 de la presente ADENDA.

Con respecto a las especies xerofíticas, es aplicable un Plan de Trabajo de formaciones xerofíticas en aquellos UC en los cuales se encuentra en particular la especie *Baccharis linearis*, las cuales serían en la formación Matorral Pradera sería aplicable para la UC 21, el resto de UC o no presentan individuos de la especie, se encuentran en un número muy bajo y/o presentan una superficie inferior a 1 ha. Con respecto a la formación de Matorral de *Baccharis*, se considerarían las UC 64, 67, 80, 11, 36 y 73 solo la UC 65 no aplicaría dado que esta presenta una superficie inferior a 1 ha. Para la Línea de transmisión sería aplicable para la COTJM13 ya que su superficie cumple con las características de cobertura sobre el 10% pero su área no supera las 0,92ha con especies constituyentes de una formación como tal. Similar ocurre con otras donde se dan las condiciones de superficie, pero no de densidad de individuos reglamentaria. Por esto y todo lo anterior se define que las UC de la línea de transmisión eléctrica no estarían sujetas a la normativa en cuestión.

7. Conclusiones

El área de la planta fotovoltaica se encuentra compuesto por 92 polígonos que comprenden un total de 5 formaciones vegetaciones diferentes, las que incluyen sectores de bosque, matorral, praderas, plantaciones y zonas sin vegetación. Estas formaciones a su vez se dividen en unidades vegetacionales que se diferencian considerando las especies que las componen y la cobertura de estas.

La superficie ocupada por formaciones nativas ya sea bosque o matorral, corresponde a un 58,56% del área total de la planta fotovoltaica, es decir 159,85 ha. Esto lleva a que el 41,44% del área se encuentra cubierto por zonas de cultivos o plantaciones (nativos o exóticos) y zonas sin vegetación.

El área de la línea de transmisión se encuentra compuesto por 31 polígonos que comprenden un total de 5 formaciones vegetaciones diferentes las que incluyen sectores de bosque, matorral, praderas, sectores de cultivo y zonas sin vegetación. En este sector el 77,7% de la superficie es ocupada por formaciones nativas, ya sean de bosque esclerófilo o matorrales tanto de tevo como de espino.

Para la planta fotovoltaica se catastraron 92 especies de plantas vasculares representadas en 44 familias taxonómicas. Considerando el hábito de las especies presentes, el mayor porcentaje de representatividad corresponde a las especies de hábito herbáceo con un total de 76,09% al considerar tanto las anuales como las perennes, 10,87% árbol, 11,96% para los arbustos y 1,09 % son suculentas

De acuerdo al origen de las especies se observa que el 52,17% (48 especies) son de origen introducido, y solo el 17,39% de ellas son de origen endémico. Esta distribución en el origen de las especies se basa en que gran parte del área del proyecto corresponde a plantaciones, las que cuando se dejan de usar, dan origen inmediato a la entrada de las especies de este tipo.

Para la línea de transmisión se catastraron 47 especies de plantas vasculares representadas a través de 28 familias taxonómicas. En términos de la forma de vida, la más representada corresponde a la forma de vida herbácea con un 68,09% (32 especies) seguido por los arbustos (12,8%) y posteriormente por la forma de vida arbórea (15%). La forma de vida suculento está representada por solo una especie, y esta corresponde a la familia Cactaceae.

Considerando el origen de las especies, el 48,9% (23 especies) corresponde a especies introducidas y solo el 25,5% de ellas son de origen endémico.

Dentro de las singularidades ambientales, se registró la presencia de 6 especies en alguna categoría de conservación. Cuatro de ellas presentes en el área de la planta fotovoltaica siendo estas, *Calydorea xiphioides* catalogada como Vulnerable VU-R según D.S 50/2008 MINSEGPRES, *Echinopsis chiloensis* catalogada como Casi Amenazada según listado del D.S 41/2011 MMA, *Adiantum chilense* catalogada como Casi Amenazada según listado del D.S 19/2012 MMA y *Conanthera campanulata* especie que se encuentra dentro de la línea de transmisión y planta fotovoltaica, se encuentra catalogada en Preocupación menor según listado del D.S 13/2013 MMA. Las dos restantes se registraron en el área de la línea de transmisión correspondiendo a *Puya chilensis* y *Eriosyce subgibbosa*, ambas catalogadas

como Preocupación Menor de acuerdo con los decretos D.S 42/2011 MMA y D.S 41/2011 MMA, respectivamente.

Para las especies *C. xiphioides* y *C. campanulata* se llevará a cabo un plan de rescate y relocalización de geófitas, para evitar la pérdida de individuos y su genética, es aplicable a aquellas especies que han demostrado la capacidad de adaptación cuando son replantadas y/o con sistemas radiculares relativamente superficiales. Para el caso de las especies *Echinopsis chiloensis*, *Puya chilensis* y *Erioseye subgibbosa* las cuales son xerofitas, también se realizará rescate y relocalización, ambos planes se encuentran descritos en el Anexo 21 de la ADENDA y se adjuntan como Compromiso Ambiental Voluntario en el Capítulo VI.

Para la aplicabilidad de formaciones de bosque se analizaron las UC que presentan formaciones vegetacionales de Bosque Esclerófilo y Matorral de Espino en el caso de la planta fotovoltaica y Matorral de Espino en el caso de la línea de transmisión. En términos concretos el área total de bosque a ser afectado corresponde a 18,78 ha dentro del predio de la planta fotovoltaica que serán posteriormente reforestadas en un nuevo sitio, los detalles pueden encontrarse en el Permiso Ambiental Sectorial N° 148 (15.5 de la ADENDA).

Finalmente, considerando las formaciones vegetacionales de la planta fotovoltaica, Matorral de Baccharis y Matorral pradera son aplicables para un Plan de trabajo de Formaciones Xerofíticas, dado que la densidad de individuos es superior a 500 individuos por hectárea. En términos concretos el área total de formación xerofítica a ser afectada por el proyecto implica solo a la planta fotovoltaica y corresponde a 12,41 ha, los detalles se encuentran en el Permiso Ambiental Sectorial N°151 (Anexo 15.6 de la DIA).

8. Bibliografía

- Braun-Blanquet, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.
- CONAF, 2016. Catastro de los Recursos Vegetacionales de Chile. Chilean Forest Service, Santiago, Chile.
- Etienne, M. & C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Ciencias Agrícolas N° 10. 120 p.
- Luebert, F. & P. Plischoff, 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N° 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el diario Oficial el 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N° 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el diario Oficial el 04 de diciembre de 2015.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N° 16 del 03 de junio de 2016; publicado en el diario Oficial el 30 de septiembre de 2016.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N° 6 del 16 de marzo de 2017; publicado en el diario Oficial el 02 de junio de 2017.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N° 79 del 4 de diciembre de 2018; publicado en el diario Oficial el 19 de diciembre del 2018.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley N° 20.417: Crea

el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.

- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchards, A., Ruiz, E., Sánchez, P. & A Marticorena. 2018. Catálogo de Plantas Vasculares. Gayana Bot. 75(1): 1-430.