




Parque Kimal Solar

Caracterización Ambiental Flora Vascular y Vegetación



an **NTT DATA** Company

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Letizzia Vecchi Benedetti.

Letizzia Vecchi Benedetti
Biólogo



an NTT DATA Company

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA.....	8
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	8
4.2	TRABAJO DE GABINETE	8
4.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	8
4.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	9
4.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	9
4.3	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	10
4.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	13
4.5	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	13
4.5.1	TOMA DE DATOS	13
4.5.2	CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.....	15
4.5.2.1	Formación Vegetal (FV)	16
4.5.2.2	Especies dominantes (ED)	18
4.5.2.3	Grado de artificialización.....	19
4.5.2.4	Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras	20
4.6	ESTUDIO DE FLORA.....	21
5	RESULTADOS	21
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	21
5.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	23
5.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	23
5.2.2	CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.....	25
5.3	CATASTRO DE ESPECIES.....	27
6	CONCLUSIONES	27
7	BIBLIOGRAFÍA.....	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los vértices del polígono del Parque Fotovoltaico.	4
Tabla N° 2: Coordenadas ubicación de estructuras Línea de Transmisión Eléctrica.....	5
Tabla N° 3: Coordenadas de las parcelas de muestreo.....	15
Tabla N° 4: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	17
Tabla N° 5: Categorías de coberturas y su codificación.	18
Tabla N° 6: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.....	2
Figura N° 2: Visión general del Proyecto.....	3
Figura N° 3: Área de influencia componentes flora y vegetación.....	7
Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.	13
Figura N° 5: Puntos de muestreo de Flora y Vegetación.	14
Figura N° 6: Esquema de grados de artificialización.	20
Figura N° 7: Cartografía de Ocupación de Tierras.....	26

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS


Fotografía N° 1: Vista general del ambiente (1).....	23
Fotografía N° 2: Vista general del ambiente (2).....	24
Fotografía N° 3: Vista general del ambiente (3).....	25

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Parque Kimal Solar”, el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto, considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA). Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (2015), y la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2014) y, la “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto se ubica aproximadamente a 20 kilómetros, al este-noreste, de la localidad de María Elena (ver Figura N° 1), comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta, y corresponde a la construcción de un Parque fotovoltaico. En la Figura N° 2, se observa el polígono de color rojo, que correspondería a la superficie donde se instalarán los paneles fotovoltaicos y, en color amarillo, la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) proyectada.


Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Visión general del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

El proyecto “Parque Kimal Solar” (en adelante, “el Proyecto”) corresponde a la instalación de una planta fotovoltaica con estructura seguidora a un eje de 251,37 MWp. La energía generada será traspasada a la subestación elevadora de la planta, la que se encontrará emplazada al costado oeste de la parcela. Toda la energía generada por esta planta será enviada a través de una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) de circuito simple en 220 kV, que tendrá una extensión aproximadamente de 1.204,35 m hasta la Nueva Subestación Kimal, y contará con una franja de seguridad de 40 m de ancho; 20 m hacia cada lado desde el eje de la línea en todo el recorrido. La planta solar fotovoltaica se construirá en un terreno de aproximadamente 363,19 hectáreas, y se considera aproximadamente 350 ha de instalaciones. En resumen, el proyecto en evaluación se

compone de tres partes principales: Planta fotovoltaica, Subestación elevadora y Línea de Transmisión Eléctrica (LTE). Adicionalmente, el proyecto contará con camino de acceso, caminos interiores y un cerco perimetral.

Tabla N° 1: Coordenadas de los vértices del polígono del Parque Fotovoltaico.

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m)	Norte (m)
V1	451.214	7.533.648
V2	452.793	7.533.648
V3	452.793	7.534.124
V4	452.615	7.534.124
V5	452.615	7.535.124
V6	452.793	7.535.124
V7	452.793	7.536.309
V8	451.052	7.536.309
V9	451.051	7.535.539
V10	451.794	7.535.539
V11	451.794	7.534.608
V12	451.192	7.534.607
V13	451.171	7.534.573
V14	451.172	7.534.103
V15	451.202	7.534.104

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Capítulo de Descripción de Proyecto de la DIA.

Tabla N° 2: Coordenadas ubicación de estructuras Línea de Transmisión Eléctrica.

Estructura	Coordenadas Geográficas	
	Este (m)	Norte (m)
E1	451.282	7.533.666
E2	451.282	7.533.608
E3	451.149	7.533.476
E4	450.877	7.533.476
E5	450.751	7.533.476
E6	450.577	7.533.476
E7	450.424	7.533.476
E8	450.424	7.533.578

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Capítulo de Descripción de Proyecto de la DIA.

Los resultados del presente informe de caracterización ambiental de la flora vascular y vegetación incluyen un listado de todas las especies de flora presentes dentro del área de influencia (en adelante, “el AI”) definida, la información referente a las especies en categoría de conservación y una descripción detallada de la vegetación presente en el área mencionada.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de Influencia del proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.


- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (2015) y su actualización, “*Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el Decreto N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el área de influencia está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por sus fases de construcción, operación y cierre del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, partes y acciones temporales y permanentes, más una franja aledaña (buffer), de 20 metros, desde el límite de las obras, y hacia cada lado del eje central de la línea de transmisión. El AI tiene una superficie total de 388,41 hectáreas. En la Figura N° 3 se puede ver el área de influencia del Proyecto y los puntos donde se desarrollarán las obras.

Figura N° 3: Área de influencia componentes flora y vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región de Antofagasta, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la Provincia de Tocopilla, Comuna de María Elena. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

4.2 TRABAJO DE GABINETE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación existente en el sitio de estudio, la identificación de las especies vegetales y su estado conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizan los datos e interpretan los resultados.

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realiza *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y

la información se corrobora en base al listado de Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), de Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), la Guía de flora silvestre de Chile Cuando el desierto florece (Hoffmann *et al.* 2015), La Guía de flora nativa con valor ornamental, Zona Norte (Riedemann *et al.* 2016), la Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo (Teillier *et al.* 2005) y la Flora Andina de Santiago (Teillier *et al.* 2011).

4.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

4.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y

jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile de la Corporación Nacional Forestal (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de la CONAF (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del MNHN (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.


Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 4). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

4.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación del área de influencia del Proyecto, se realizó una campaña de terreno, efectuada en verano, desde la tarde del día 02 hasta el mediodía del día 07 de enero de 2019. Este trabajo fue realizado por dos profesionales biólogos especialistas en botánica.


4.5 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

4.5.1 TOMA DE DATOS

Para el análisis de vegetación se establecieron 21 puntos de muestreo, dentro del AI, en cada uno de los cuales se estableció una parcela de 10x10 metros (*"Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA"* SEA 2015). Estos puntos coinciden con los establecidos para el estudio de flora. Los puntos se distribuyeron lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental. Se utilizó muestreo dirigido, debido a que en este caso es necesario considerar todos los ambientes que estén dentro del AI, puesto que el objetivo es hacer una descripción de la vegetación lo más acertada posible.

La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 5 y Tabla N° 3.

Figura N° 5: Puntos de muestreo de Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 3: Coordenadas de las parcelas de muestreo.

Parcelas de muestreo	Coordenadas Geográficas	
	Este (m)	Norte (m)
K-01	452.207	7.535.605
K-02	452.503	7.535.762
K-03	452.721	7.535.759
K-04	452.787	7.535.463
K-05	452.333	7.535.378
K-06	451.816	7.535.409
K-07	451.800	7.535.059
K-08	451.811	7.534.676
K-09	451.197	7.534.600
K-10	451.180	7.534.120
K-11	451.587	7.534.044
K-12	451.935	7.534.096
K-13	452.488	7.534.188
K-14	452.577	7.535.092
K-15	451.219	7.533.581
K-16	450.994	7.533.475
K-17	451.519	7.536.230
K-18	451.149	7.536.170
K-19	451.177	7.535.622
K-20	451.734	7.535.845
K-21	451.806	7.536.234

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia.

4.5.2 CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras o COT (*“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”*; Ficha VE-02, SEA 2015),

desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹) de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones de Chile por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Esta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

El método está orientado a la descripción cartográfica (Carta de Ocupación de Tierras) de la vegetación presente en un área determinada, y en la descripción de la vegetación mediante este método se evaluaron dos variables principales:

- Formación vegetal
- Especies dominantes

De esta manera, se describió cualitativa y semicuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de cartografía una imagen de la vegetación actual.

4.5.2.1 Formación Vegetal (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de Formación Vegetal (FV) que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* 2000: *“Corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”*, De esta forma la FV se define en base a la descripción de los **tipos biológicos**, su **estratificación** vertical y su **cobertura in situ**.

De acuerdo a lo anterior, los cuatro **tipos biológicos** (fisonómicos) fundamentales, son:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

- **Leñoso alto (LA):** Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Leñoso bajo (LB):** Se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.
- **Herbáceo (H):** Especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Suculentos (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de **estratificación** se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla N° 4).

Tabla N° 4: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Altura (cm) para S, H y LB.	Altura (m) para LA
0-25	2-4
25-50	4-8
50-100	8-16
100-200	16-31
Más de 200	Más de 32

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Por su parte, la **cobertura** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla N° 5.

Tabla N° 5: Categorías de coberturas y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código
1-5	Muy escasa	me
5-10	Escasa	e
10-25	Muy clara	mc
25-50	Clara	c
50-75	Poco densa	pd
75-90	Densa	d
90-100	Muy densa	md

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Para este informe, considerando la zona geográfica, se llama **Zona denudada** a cualquier zona que tenga una cobertura vegetal de 0%.

4.5.2.2 Especies dominantes (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes para una unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados. En la Tabla N° 6 se entrega la codificación para las especies dominantes de cada tipo biológico. En general, tales especies deben poseer una cobertura mínima del 10%, salvo las suculentas, que deben tener un 5% de cobertura mínimo. Esto último no es absoluto, pues variará de acuerdo a la zona ecológica donde se realice el estudio. Para las **zonas desérticas**, se toman en cuenta todos los tipos biológicos presentes, cualquiera sea su cobertura (Etienne y Prado 1982).

Tabla N° 6: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.


Tipo biológico	Código		
	Género	Especie	Ejemplo
Suculento (S)	minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> = tC
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula	<i>Nertera granadensis</i> = ng
Leñoso bajo (LB)	Mayúscula	minúscula	<i>Baccharis sphaerocephala</i> = Bs
Leñoso alto (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus macrocarpa</i> = NM

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

4.5.2.3 Grado de artificialización

La artificialización constituye el proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro se realiza a través de escalas confeccionadas a priori, para cada zona ecológica. Estas permiten distribuir en orden creciente las diversas situaciones de alteración del ecosistema. El valor menor corresponde a condiciones donde la intervención ha sido nula (vegetación climática), y el mayor, donde el efecto antrópico es máximo (ciudades). Por otra parte, cada grado se subdivide en diferentes subgrados que indican el tipo de manejo de cada situación. La clave completa consta de 9 grados y 39 subgrados (ver Figura N° 6).

Figura N° 6: Esquema de grados de artificialización.



Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

4.5.2.4 Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al(los) tipo(s) biológico(s) más representativo(s), es decir, de mayor cobertura. Además, dependiendo de la cobertura de éste, la vegetación es clasificada como muy clara (mc), clara (c), poco densa (pd) o densa (d). Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguidas de la categoría de densidad en minúscula (c, pd, d o md). También le es asignada una simbología a cada una de las unidades vegetacionales, para que sea más fácil la comprensión de la carta.

Además de esto, en cada tipo vegetacional van indicadas las especies dominantes para cada tipo biológico. Esto se hace de acuerdo a la notación descrita anteriormente en la Tabla N° 6.

4.6 ESTUDIO DE FLORA

Para el análisis de la flora se establecieron 21 puntos de muestreo, los mismos que para el estudio de vegetación, y se utilizó la misma metodología. En cada parcela de muestreo se reconocen todas las especies vegetales presentes. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 5 y Tabla N° 3.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-región del Desierto Absoluto, y en el piso Desierto Interior. Esta sub-región corresponde a aquella parte del desierto en donde las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. La vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

El Desierto Interior se encuentra en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama (actualizado a la división política y administrativa vigente de Chile), desde el límite con Perú hasta los 25° de latitud sur. La comunidad vegetal principal que se allí se encuentra es la de *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*, la cual se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Tropical y, dentro de éste, al Bioclima Tropical Hiperdesértico.

De acuerdo a este mismo autor, el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro del Matorral desértico tropical-mediterráneo costero de *Ephedra breana* / *Eulychnia iquiquensis*. Este piso corresponde a un matorral abierto extremadamente xeromórfico, con suculentas columnares, dominado por *Ephedra breana*, *Solanum brachyantherum* y *Eulychnia iquiquensis*, que marca la fisonomía de la vegetación, con participación de los arbustos *Frankenia chilensis*, *Nolana balsamiflua*, *N. clivicola* y *Solanum chilense*. Gran parte del territorio de este piso se desarrolla en condiciones de relieve que favorecen la condensación de las neblinas.

La composición florística de la zona de Tocopilla – Cobija corresponde, principalmente, a *Alstroemeria violácea*, *Argylia radiata*, *Cleone chilensis*, *Copiapoa humilis*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Ephedra breana*, *E. iquiquensis*, *Frankenia chilensis*, *Heliotropium jaffuelii*, *Leucocoryne coronata*, *Nolana balsamiflua*, *N. clivicola*, *N. jaffuelii*, *N. peruviana*, *N. stenophylla*, *N. tocopillensis*, *Ophryosporus triangularis*, *Oxalis bulbocastanum*, *O. ornithopus*, *Oziroë biflora*, *Solanum brachyantherum*, *S. chilense*, *Tetragonia angustifolia*.

Las precipitaciones ocurren en esta zona cada 4 a 7 años. Durante los períodos secos algunos arbustos y las cactáceas se mantienen gracias a la influencia de las neblinas y se van secando con los años debido al déficit hídrico permanente, pero las plantas herbáceas desaparecen totalmente. Durante los años lluviosos las plantas renuevan sus tejidos y florecen, para pasar nuevamente a un largo período de sequía (Luebert & Pliscoff, 2017). Durante estos eventos hay un aumento considerable de la diversidad vegetal. Estos eventos están determinados por el fenómeno climático de “El Niño – Oscilación Sur (ENOS)”, el cual sucede cada ciertos años, en casos extremos incluso puede espaciarse por períodos de más de 10 años (Hoffmann *et al.* 2015). Durante estos largos períodos de sequía muchas especies simplemente no aparecen.

Este piso se distribuye en los cerros costeros de la Región de Antofagasta, entre 300 y 1.300 metros de altitud, en el piso bioclimático mesotropical ultrahiperárido, mesomediterráneo ultrahiperárido y, marginalmente, en el termomediterráneo superior ultrahiperárido hiperoceánico (Luebert & Pliscoff 2017).

5.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

5.2.1 RESULTADOS GENERALES

De la revisión en terreno del AI del Proyecto, se ha encontrado que en todas las parcelas de muestreo hay ausencia completa de vegetación en el área. Esto debido a que el sector pertenece a la zona de desierto absoluto.

En la Fotografía N° 1, Fotografía N° 2 y Fotografía N° 3, se observa el aspecto general del área en estudio, donde se puede apreciar que es un terreno desprovisto completamente de vegetación.

Fotografía N° 1: Vista general del ambiente (1).



Fuente: Registro fotográfico P&A, Enero 2019.

Fotografía N° 2: Vista general del ambiente (2).



Fuente: Registro fotográfico P&A, Enero 2019.

Fotografía N° 3: Vista general del ambiente (3).




Fuente: Registro fotográfico P&A, Enero 2019.

5.2.2 CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

De acuerdo a la prospección en terreno, tal como se menciona en los resultados generales de vegetación, no se encontró especies vegetales en el AI del Proyecto. Por lo tanto, según la metodología de COT, la totalidad de esta área es clasificada como Zona desnuda (ver Figura N° 7). A partir de esto, se obtiene que no hay formaciones vegetales y, por ende, tampoco especies dominantes.

Figura N° 7: Cartografía de Ocupación de Tierras.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

5.3 CATASTRO DE ESPECIES

Durante la prospección en terreno, y al igual como se menciona en el estudio de vegetación, no se halló individuos de ninguna especie vegetal dentro del AI del Proyecto.

6 CONCLUSIONES

Luego de realizar los recorridos a través del polígono y la línea de transmisión, no se encontró ningún tipo de vegetación ni de especies de flora en el área de influencia. Las condiciones ambientales de extrema aridez explicarían la ausencia de plantas vasculares en la zona.

Por lo tanto, se puede concluir que, según lo que se puede observar a simple vista, el Área de Influencia del Proyecto no posee vegetación alguna y, por lo tanto, no hay presencia de ninguna formación vegetacional con características particulares o que amerite su protección y, del mismo modo, tampoco se encuentran especies de flora vascular clasificadas en alguna categoría de conservación.

7 BIBLIOGRAFÍA

Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

Chile. Ministerio de Agricultura. 2008. Ley 20.283 Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 30 de julio de 2008.

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Etienne, M & Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Técn. N° 46 Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 27 p. 10 cartas.

Etienne, M. & C, Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras, conceptos y manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas Cs Agrícolas. N°10. Facultad de Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 120 p.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Hechenleitner, P., M. Gardner, P. Thomas, C. Echeverría, B. Escobar, P. Brownless & C. Martínez (2005) Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188 p.

- Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.
- Hoffmann A, Watson J & AR Flores. 2015. Flora silvestre de Chile, Cuando el desierto florece, Vol. 1: Monocotiledóneas y otros taxones. Editorial Fundación Claudio Gay, Chile. 263 p.
- Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.
- Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 381 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm>

Riedemann MP, Aldunate G & S Teillier. 2016. Flora nativa de valor ornamental, Chile, Zona Norte. Ediciones Jardín Botánico Chagual, Chile. 441 p.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Teillier S, Marticorena A & Niemeyer, H. 2011. Flora Andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Universidad de Chile. 478 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en enero de 2019).