



Chirurgische Osteotomie

Behandler:	Assistenz:
Allgemeines:	
Patient ist beschwerdefrei Schmerzen an Zahn: Patient über das heutige Procedere und Risiken aufgeklärt Patient ist mit der Behandlung einverstanden Röntgenbild liegt vor	
Patienten mit CHX-Lösung ca. 1 Minute spülen lassen Intraorale Oberflächenanästhesie	
Zahn/Regio: Anä	isthesie + I/L1
Schnittführung vonbis Mukoperiostlappen gebildet, Krone abgetrennt,	_,
Wurzel separiert, Knochen osteotomiert □ mesial/ □ vestibulär/ □ distal oder □ interradikulär	
mit □ Hebel □ Zange entfernt,	
Knochenkante geglättet, Alveole kürettiert	
MAV negativ,	
Anzahl der Nähte: Nahtmaterial:	
Histologische Untersuchung, Pat informiert, dass Probe an Labor geschickt wird	
Patienten über Verhalten Post OP aufgeklärt und sterile Tupfer & Info - Merkblatt über Verhaltensmaßnahmen mitgegeben	
RP Filmtabletten un AU bis ausgestellt und mito	d ausgestellt und mitgegeben gegeben
Gründe für eine Faktorerhöhung:	
Besonderheiten:	
Next:	