LA DROITE TANGENTE EN UN POINT MARQUÉ, NOTE DE LECTURE

MICHEL HUA

Résumé. Michel Planat a renvoyé le 13 novembre 2026 une version remaniée de l'article *The tangent line at a marked point on $M_{0,n}/\mathfrak{S}_{n-1}$, after a table of Grothendieck*, avec une section de topologie qui n'y était pas. D'où cette note : les définitions de l'article reprises depuis le début, sans supposer connus les schémas ni les champs, puis ce qu'ont apporté Dan Edidin et lui. Rien n'y est démontré ; en cas de désaccord, l'article fait foi.

1. Le résultat, en une page

On se donne $n \geq 3$ points distincts sur une sphère, numérotés de 1 à n. Deux configurations qui se déduisent l'une de l'autre par une transformation de la sphère sont tenues pour la même. L'ensemble de ces configurations s'appelle $M_{0,n}$.

En chaque point marqué, la sphère a une droite tangente. Quand la configuration bouge, cette droite bouge avec elle : on obtient une famille de droites au-dessus de $M_{0,n}$, notée L_i pour le i-ème point. On note $L = L_1 \otimes \cdots \otimes L_n$ la famille obtenue en les multipliant toutes.

Une telle famille est dite *triviale* lorsqu'on peut choisir, dans chaque droite, un vecteur non nul qui dépende continûment de la configuration. Les L_i ne le sont pas ; en revanche une puissance $L_i^{\otimes e}$ finit par l'être. La question est : à partir de quel exposant e ?

Reste une condition, sans laquelle la réponse ne serait pas celle-là : le choix doit être compatible avec la renumérotation des points, c'est-à-dire que si l'on permute les points, le vecteur choisi suit la permutation. C'est ce que signifie l'indice $\mathfrak{S}_{n-1}$ ou $\mathfrak{S}_n$ du titre.

Théorème 1 (article, théorème 1)**.** *Pour tout $n \geq 3$:*

(1) le plus petit exposant qui trivialise L_n, de façon compatible avec les renumérotations des $n-1$ autres points, est $(n-1)(n-2)$;

(2) le plus petit exposant qui trivialise L, de façon compatible avec toutes les renumérotations, est $n-1$.

Pour $n = 4, 5, 6$ cela donne $6, 12, 20$ d'une part, $3, 4, 5$ de l'autre. La page 70 de la cote 146 porte ces nombres pour $n = 4$ et, pour $n = 5$ et 6, des valeurs suivies d'un point d'interrogation : 12 ? et 12 ?, puis 20 ? et 60 ?. Deux d'entre elles sont fausses. L'ordre de L vaut 4 et non 12 pour $n = 5$, et 5 et non 20 pour $n = 6$.

2. Les objets, un par un

2.1. **La droite projective.** $\mathbb{P}^1$ est l'ensemble des droites vectorielles de k^2, où k est un corps de caractéristique nulle : par exemple $\mathbb{C}$, et alors $\mathbb{P}^1$ est la sphère de Riemann. Un point s'écrit $\langle v \rangle$ pour $v \in k^2$ non nul, et deux vecteurs proportionnels donnent le même point. En posant $x = v_1/v_2$ on retrouve la droite affine, plus un point à l'infini.

Le groupe PGL_2 est celui des matrices 2×2 inversibles modulo les scalaires. Il agit sur $\mathbb{P}^1$ par homographies, $x \mapsto (ax+b)/(cx+d)$. Un fait qui sert partout : cette action est simplement 3-transitive, c'est-à-dire qu'on peut envoyer trois points distincts donnés sur trois points distincts donnés, et d'une seule manière.

Date : 14 novembre 2026.

2.2. **L'espace des configurations.**

Définition 1. $M_{0,n}$ est l'ensemble des n-uplets $(x_1, \dots, x_n)$ de points deux à deux distincts de $\mathbb{P}^1$, modulo l'action diagonale de PGL_2.

La 3-transitivité permet d'envoyer x_{n-2}, x_{n-1}, x_n sur $0, 1, \infty$: il reste $n-3$ points libres, donc $M_{0,n}$ est de dimension $n-3$. Pour $n=4$, c'est la droite moins trois points, et la coordonnée est le birapport. Pour $n=3$, c'est un point.

2.3. **Fibré en droites, section, trivialité.**

Définition 2. Un *fibré en droites* sur un espace X est la donnée, pour chaque point p de X, d'une droite vectorielle E_p, variant algébriquement avec p : localement, E ressemble à $U \times k$.

Une *section* associe à chaque p un vecteur $s(p) \in E_p$. Le fibré est *trivial* s'il admet une section qui ne s'annule nulle part : un tel s identifie E_p à k en chaque point, donc E au produit $X \times k$.

Deux fibrés se multiplient, $E \otimes F$, en prenant le produit tensoriel droite par droite ; l'inverse est le fibré dual. Le fibré trivial est l'élément neutre.

2.4. **Les droites tangentes.** En un point x de $\mathbb{P}^1$, la droite tangente $T_x\mathbb{P}^1$ est une droite vectorielle. En faisant varier la configuration, on obtient le fibré L_i dont la fibre au-dessus de $(x_1, \dots, x_n)$ est $T_{x_i}\mathbb{P}^1$, et le produit $L = L_1 \otimes \cdots \otimes L_n$.

Un calcul qui revient deux fois dans l'article : si v engendre la droite $\langle v \rangle$, alors

$$T_{\langle v \rangle}\mathbb{P}^1 \;\cong\; \mathrm{Hom}(\langle v \rangle,\; k^2/\langle v \rangle).$$

Une direction voisine de $\langle v \rangle$ est en effet le graphe d'une application linéaire de $\langle v \rangle$ dans un supplémentaire. On en tire que remplacer v par tv multiplie l'identification par t^{-2}, d'où les degrés $2e$ qui apparaissent plus loin. C'est le seul endroit de la note où il faut un crayon.

2.5. **L'action du groupe symétrique.** Le groupe $\mathfrak{S}_n$ agit sur $M_{0,n}$ en renumérotant les points, et agit en même temps sur L, en permutant les facteurs. Le sous-groupe $\mathfrak{S}_{n-1}$ qui fixe le dernier point agit sur L_n.

Définition 3. Une trivialisation *équivariante* de $E^{\otimes e}$ est une section partout non nulle s telle que $s(\sigma \cdot p) = \sigma \cdot s(p)$ pour tout σ dans le groupe.

Sans cette condition, les deux fibrés seraient triviaux dès que n est assez grand, et la question tomberait.

2.6. **Le groupe de Picard.**

Définition 4. $\mathrm{Pic}\, X$ est l'ensemble des classes d'isomorphisme de fibrés en droites sur X, muni du produit tensoriel. C'est un groupe abélien, d'élément neutre le fibré trivial.

L'ordre d'une classe $[E]$ est le plus petit $e \geq 1$ tel que $E^{\otimes e}$ soit trivial, et l'infini si aucun ne l'est. Le théorème calcule donc deux ordres, dans deux groupes de Picard.

2.7. **Le quotient $[X/G]$, et ce qu'il faut en retenir.** L'action de $\mathfrak{S}_n$ sur $M_{0,n}$ n'est pas libre : certaines configurations sont préservées par une permutation non triviale. Le quotient ensembliste perd cette information, et son groupe de Picard donne une réponse fausse à notre question. La parade s'appelle le *champ quotient*, noté $[X/G]$; sa théorie générale est lourde, mais une seule phrase en sert ici.

Définition 5. Un fibré en droites sur $[X/G]$ est un fibré en droites sur X muni d'une action de G au-dessus de l'action sur X. Il est trivial exactement quand il admet une trivialisation équivariante.

Autrement dit, $\mathrm{Pic}[X/G]$ est le groupe des fibrés G-équivariants. On peut lire tout l'article avec cette définition et oublier les champs.

3. La démonstration, en cinq temps

3.1. **La tranche.** Envoyons le dernier point à l'infini : c'est permis, puisque PGL_2 est transitif. Ce qui reste du groupe est le stabilisateur de l'infini, c'est-à-dire le groupe affine Aff des $x \mapsto ax + b$. Les $m = n - 1$ autres points, non numérotés, sont les racines d'un polynôme unitaire de degré m sans racine double. D'où

$$[M_{0,n}/\mathfrak{S}_{n-1}] \;\cong\; [U_m/\mathrm{Aff}],$$

où U_m est l'ouvert des polynômes unitaires de degré m sans facteur carré, et Aff agit par substitution.

On a remplacé un espace de configurations par un ouvert d'un espace affine, dont la géométrie est connue. C'est tout le gain du passage.

3.2. **Centrer les racines.** Les translations $x \mapsto x+b$ agissent librement et déplacent le coefficient c_1 sans contrainte. Comme m est inversible, chaque orbite rencontre une fois exactement l'hyperplan $c_1 = 0$: il suffit de remplacer $f(x)$ par $f(x - c_1/m)$, ce qui revient à mettre le centre de gravité des racines à l'origine. Il reste les homothéties :

$$[U_m/\mathrm{Aff}] \;\cong\; [V_m/\mathbb{G}_m],$$

où V_m est l'ouvert des polynômes unitaires centrés sans facteur carré, et $t \in \mathbb{G}_m$ agit par $x \mapsto tx$, donc sur le coefficient c_j avec le poids j.

3.3. **Caractères et poids.** V_m est un ouvert d'un espace affine, donc son groupe de Picard est nul : tout fibré y est trivial. Un fibré $\mathbb{G}_m$-équivariant est alors le fibré trivial muni d'une action, et une telle action est donnée par un caractère $t \mapsto t^a$. On appelle a le *poids*.

Deux poids a et b donnent le même fibré équivariant exactement quand il existe une fonction inversible u sur V_m avec $u(t \cdot x) = t^{b-a}u(x)$. Le groupe de Picard est donc

$$\mathrm{Pic}[V_m/\mathbb{G}_m] \;\cong\; \mathbb{Z} \,/\, \{\text{poids des fonctions inversibles}\}.$$

3.4. **Le discriminant.** Reste à connaître les fonctions inversibles de V_m. Le complémentaire de V_m dans l'espace affine est l'hypersurface d'équation $\mathrm{disc} = 0$, où

$$\mathrm{disc} \;=\; \prod_{i<j} (r_i - r_j)^2$$

est le discriminant, exprimé en les racines. Comme cette hypersurface est irréductible, les fonctions inversibles sur V_m sont les $c\,\mathrm{disc}^j$, $c \in k^\times$.

Le poids du discriminant se lit sur la formule : remplacer chaque racine r_i par tr_i multiplie chacun des $\binom{m}{2}$ facteurs $(r_i - r_j)^2$ par t^2, donc multiplie disc par $t^{m(m-1)}$. D'où

$$\mathrm{Pic}[V_m/\mathbb{G}_m] \;\cong\; \mathbb{Z}/m(m-1),$$

engendré par le poids 1. Avec $m = n - 1$, l'ordre du groupe est $(n-1)(n-2)$.

3.5. **Les poids de L_n et de L.** Deux poids suffisent.

En l'infini, prenons la coordonnée $u = 1/x$. L'homothétie $x \mapsto tx$ s'y écrit $u \mapsto u/t$, de dérivée t^{-1} en $u = 0$: la droite tangente à l'infini a le poids -1. Comme -1 engendre $\mathbb{Z}/(n-1)(n-2)$, la classe de L_n engendre le groupe de Picard, et son ordre est $(n-1)(n-2)$. C'est le point (1).

En une racine finie, la dérivée de $x \mapsto tx$ vaut t : chaque droite tangente en un point fini a le poids $+1$. Le produit L a donc le poids $m \cdot (+1) + (-1) = m - 1 = n - 2$. L'ordre de $n-2$ dans $\mathbb{Z}/(n-1)(n-2)$ est $n-1$: l'ordre de L est donc un multiple de $n-1$. Pour conclure qu'il vaut exactement $n-1$, l'article exhibe une trivialisation explicite de $L^{\otimes(n-1)}$, écrite au paragraphe suivant.

4. La version élémentaire, sans champs

Le même calcul se dit sans aucun langage géométrique, et c'est cette version qui est formalisée en Lean.

Écrivons chaque point comme un vecteur $v_i \in k^2 \smallsetminus \{0\}$, et posons $[v_i v_j] = \det(v_i, v_j)$, qui s'annule exactement quand les deux points coïncident. Une trivialisation équivariante de $L^{\otimes e}$ revient alors à une fonction $F(v_1, \dots, v_n)$:

— qui ne s'annule jamais tant que les points sont distincts ;
— homogène de degré $2e$ en chaque v_i (le 2 vient du calcul de $T_{\langle v\rangle}\mathbb{P}^1$) ;
— qui se transforme par $\det(g)^{ne}$ sous $g \in \mathrm{GL}_2$;
— symétrique en les v_i.

La majoration. La fonction $\prod_{i\neq j}[v_i v_j]$ convient pour $e = n-1$: chaque v_i y figure dans $2(n-1)$ crochets, elle ne s'annule pas sur $M_{0,n}$, et elle est symétrique puisqu'elle vaut $(-1)^{n(n-1)/2}\prod_{i<j}[v_i v_j]^2$.

La minoration, pour L_n, est l'argument le plus parlant de l'article. On fait tourner une configuration sur elle-même et on compare ce que la trivialisation devrait faire avec ce qu'elle fait. Prenons ω une racine primitive $(n-1)$-ème de l'unité, et la configuration formée du dernier point en 0 et des $n-1$ autres aux racines $(n-1)$-èmes de l'unité. La matrice $\mathrm{diag}(\omega, 1)$ fixe 0 et permute circulairement les autres points. Une trivialisation symétrique doit donc prendre la même valeur avant et après la rotation ; mais la règle de transformation la multiplie par ω^e. D'où $\omega^e = 1$, c'est-à-dire $(n-1) \mid e$. La même manuvre avec les racines $(n-2)$-èmes, en ajoutant le point à l'infini à la configuration, donne $(n-2) \mid e$. Comme $n-1$ et $n-2$ sont premiers entre eux, $(n-1)(n-2)$ divise e. Pour $n = 6$: la première configuration donne $5 \mid e$, la seconde $4 \mid e$, donc $20 \mid e$.

5. Ce qu'apporte Dan Edidin

Le travail de Dan Edidin et Zhengning Hu sur l'anneau de Chow entier de la pile des points de Weierstrass hyperelliptiques donne le même groupe, mais seulement pour n pair et $n \geq 6$: ils présentent la pile comme des formes binaires avec une racine marquée, ce qui est exactement notre $[M_{0,n}/\mathfrak{S}_{n-1}]$, et trouvent $\mathbb{Z}[l]/(2g(2g+1)l)$ avec $n = 2g+2$, soit un groupe cyclique d'ordre $(n-1)(n-2)$.

Deux différences avec l'article :

— leur générateur est écrit en termes de caractères d'un tore, et son identification avec la droite tangente L_n n'est pas énoncée ;
— le cas impair n'est pas traité.

Interrogé par courriel le 28 octobre 2026, Edidin a confirmé que leur article ne traite que le cas pair et qu'il ne connaît pas de référence pour le cas impair. Cette réponse est ce qui autorise l'article à écrire que le cas impair ne semble pas être imprimé ; sans elle, on aurait seulement une recherche bibliographique infructueuse, ce qui n'est pas la même chose. Leur calcul d'anneau de Chow n'a pas été refait ici : la comparaison repose sur l'énoncé de leur théorème 1.3. La question avait d'abord été posée sur MathOverflow, sous le numéro 516243.

6. Ce que propose Michel Planat

Michel Planat a remanié l'article en vue d'un numéro spécial de l'*International Journal of Topology*, dont il est le rédacteur en chef. Rien n'est décidé, et il décline la cosignature. Son apport vient d'un autre côté des mathématiques et donne une seconde lecture des mêmes entiers.

6.1. **Le point de vue topologique.** Sur $\mathbb{C}$, l'espace $M_{0,n}$ est le complémentaire des diagonales, et le champ $[M_{0,n}/\mathfrak{S}_{n-1}]$ a un groupe fondamental, au sens des orbifolds : le *groupe modulaire* de la sphère à n trous dont un est distingué, c'est-à-dire le groupe des homéomorphismes de la sphère privée de n points, à isotopie près. Comme l'espace de Teichmüller est

contractile, le champ a le type d'homotopie de l'espace classifiant de ce groupe, et ses fibrés en droites topologiques sont classés par H^2 du groupe.

6.2. **Le tore et la tresse.** Ôtons la section nulle du fibré L_n ; l'espace qui reste s'identifie à l'espace des configurations de $n-1$ points du plan à translation près, dont le groupe fondamental est le groupe de tresses B_{n-1}. La suite exacte d'homotopie de la fibration donne alors

$$1 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow B_{n-1} \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1,$$

où $\mathbb{Z}$ est engendré par le *twist complet* Δ^2, la tresse qui fait tourner toutes les cordes d'un tour. Or la classe de Chern de L_n est précisément la classe de cette extension centrale, et son ordre se lit sur la somme des exposants de Δ^2 dans l'abélianisé de B_{n-1}, qui vaut $(n-1)(n-2)$.

Le même entier se lit donc de deux façons : comme le poids du discriminant, et comme le nombre de croisements d'un tour complet de $n-1$ brins. Le corollaire du texte remanié en tire que la classe de Chern identifie le groupe de Picard algébrique à la torsion de H^2.

6.3. **Un troisième énoncé.** Il ajoute aussi au théorème le calcul du groupe de Picard entier du quotient complètement non numéroté : $\mathrm{Pic}[M_{0,n}/\mathfrak{S}_n]$ est cyclique d'ordre $(n-1)\,\mathrm{pgcd}(2,n)$. L'article d'origine ne donnait que l'ordre de la classe de L dans ce groupe. Pour n pair, le résultat est déjà dans Gorchinskiy et Viviani ; pour n impair, il se démontre par la méthode du paragraphe 3, étendue des polynômes unitaires aux formes binaires.

6.4. **Ce qu'il faut savoir avant d'accepter.** Trois réserves.

D'abord, la section topologique n'est pas de l'auteur de l'article, et la déclaration d'usage d'outils qui l'accompagne indique qu'elle a été développée avec ChatGPT lors de discussions avec Planat. Sa démonstration a été vérifiée pas à pas pour cette note, pour les deux énoncés nouveaux, et elle paraît juste ; cela ne dispense pas de la comprendre avant de la signer.

Ensuite, deux citations topologiques, celle de Bigelow et Budney pour l'extension centrale et celle de Farb et Margalit pour la formule de parité, n'ont pas été ouvertes à la page citée.

Enfin, la revue n'est indexée ni dans zbMATH ni dans MathSciNet, et son rédacteur en chef est celui qui apporte la section nouvelle ; un autre éditeur devrait suivre le manuscrit.

7. Petit lexique

Terme	Ce qu'il faut en retenir ici
$\mathbb{P}^1$	la sphère de Riemann, ou les droites de k^2
PGL_2	les homographies ; transitif sur les triplets de points distincts
$M_{0,n}$	les configurations de n points distincts, à homographie près
fibré en droites	une droite vectorielle au-dessus de chaque point, variant algébriquement
trivial	admet une section qui ne s'annule nulle part
Pic	les fibrés en droites modulo isomorphisme, sous le produit tensoriel
$[X/G]$	lire : fibrés sur X munis d'une action de G
poids	l'entier a du caractère $t \mapsto t^a$ qui décrit l'action
discriminant	$\prod_{i<j}(r_i - r_j)^2$, de poids $m(m-1)$
groupe modulaire	les homéomorphismes de la sphère à n trous, à isotopie près
groupe de tresses	le groupe fondamental des configurations de points du plan
classe de Chern	l'invariant topologique d'un fibré, ici dans H^2 du groupe modulaire

Sur la rédaction de cette note

Note de travail écrite par Claude (Opus 5, Anthropic) sous la direction de l'auteur, à partir de `docs/tangent/article.tex` et du fichier remanié reçu de Michel Planat le 13 novembre 2026. Elle ne contient aucun résultat nouveau ; en cas de désaccord, l'article fait foi.

Commutator, Paris
Email address : `michel@commutator.io`