# Annexe. Énoncés des lectures modernisées démontrés

Michel Hua
Chercheur indépendant, Paris
michel@commutator.io

Octobre 2026

**Résumé**

Les lectures modernisées du fonds Grothendieck de Montpellier reformulent les notes de travail en langage actuel. Elles dérivent de la transcription et peuvent se tromper. Cette annexe démontre des énoncés de ces lectures dans quarante cotes, en algèbre commutative, géométrie algébrique, géométrie affine plane, topologie modérée, théorie des catégories et des groupes, algèbre homotopique, théorie des ordres, algèbre et combinatoire finie. Chaque démonstration suit une preuve vérifiée dans l'assistant de preuve Lean 4 [20], avec sa bibliothèque mathlib [36]. Pour chaque énoncé, l'annexe donne le contexte du feuillet, la démonstration, les hypothèses superflues ou nécessaires et les corrections apportées à la lecture ou à la page. Elle se clôt sur la liste des énoncés de ces cotes qui ne sont pas démontrés.

## Table des matières

**Introduction** **5**

**I Cycles algébriques et conjectures standard** **8**

**1 Cote 16 : le pseudo-inverse de l'opérateur de Lefschetz et la normalisation de sl(2)** **8**

**II Motifs** **15**

**III Théorie de Hodge** **16**

**IV Cohomologie étale et $\ell$-adique** **17**

**V Groupes $p$-divisibles et groupes formels** **18**

**VI Algèbre universelle et théories** **19**

**2 Cote 161-2 : monadicité, descente, caractérisation de Gabriel–Ulmer** **19**

**VII Analyse fonctionnelle** **22**

**3 Cote 1 : le système d'inégalités des valeurs singulières, cas $m \leq 2$** **22**

**4 Cote 113 : l'enveloppe de Karoubi et l'invariance de Morita** **27**

**VIII Théorie de la dualité** **30**

**5 Cote 125 : la carte des équivalences et le lemme du feuillet III-18** **30**

**IX Descente** **35**

**X Topos et sites** **37**

**6 Cote 37 : le contre-exemple à EGA I 10.10.5** **37**

**XI Variétés abéliennes et schémas de Picard** **41**

**7 Cote 44 : l'intégralité des nombres de Cartan à partir des axiomes** **41**

**XII Catégories tensorielles et dualité tannakienne** **47**

**XIII Algèbre commutative** **48**

**8 Cote 21 : injectifs de $I$-torsion (proposition 2.15 et corollaire 2.16)** **48**

**9 Cote 22 : produits de modules plats (lemme 3.3, corollaires 3.4 et 3.5), et l'obstruction sur k[[t** **50**

**10 Cote 67 : modules à involution et triples (P, Q, m)** **54**

**XIV Catégories et foncteurs** **57**

**11 Cote 19 : le théorème de comonadicité 1.12, la comonade sur une base produit et le théorème de Gabriel–Popescu** **57**

**12 Cote 133 : le centre et le groupe dérivé vus par deux modules croisés** **62**

**13 Cote 161-1 : la partie fixe d'une adjonction, les adjonctions idempotentes, les objets locaux** **65**

**XV Géométrie formelle, modules et représentabilité** **72**

**14 Cote 39 : le théorème de préparation « formel », cas adique et cas discret** **72**

15 Cote 41 : continuité de la section générique et ouverture (proposition 1) 74

16 Cote 42 : familles cohérentes de germes, le lemme 1 et le lemme 2 76

XVI K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch 82

17 Cote 153 : polynômes à valeurs entières, co-opérations, analyseurs 82

XVII Cohomologie cristalline et de de Rham 89

XVIII Schémas en groupes et groupes algébriques 91

18 Cote 40 : la régularité des torseurs sous α_p ne passe pas à la somme 91

19 Cote 78 : le critère de fermeture des polygones réguliers sur un anneau, et les 2p-gones en bande 93

20 Cote 84 : le produit des algèbres quadratiques, en coordonnées 96

XIX Surfaces de Riemann, uniformisation et modules des courbes 108

21 Cote 93 : la différence schwarzienne en dérivées divisées 108

XX Champs, gerbes et catégories fibrées 115

XXI Topologie combinatoire, surfaces et cartes 116

22 Cote 152 : le dictionnaire des graphes circularisés et des contours 116

23 Cote 88 : l'ordre $2\nu$ et la trichotomie des cartes standard 117

24 Cote 73 : les aires des oreilles d'un polygone plan 120

25 Cote 74 : complexes cubiques généralisés, la réduction à un carré latin et à ses revêtements doubles 123

26 Cote 76 : drapeaux de type H d'un ensemble à opérateurs, le lemme de surjectivité 128

27 Cote 77 : le discriminant universel modulo 2 et modulo 4, la symétrie canonique 130

28 Cote 79 : graphes à homothéties, commutant et étoiles sur $(\mathbf{Z}/n)^2$ 135

29 Cote 85 : représentations de $G_2$ dans $\mathrm{PGL}_2$, rotation d'ordre 5 141

XXII Jeux et combinatoire 151

30 Cote 68 : les théories de l'orientation et leurs applications de Stokes 151

XXIII Groupes fondamentaux et théorie de Galois 154

XXIV Polyèdres et géométrie convexe 157

31 Cote 70 : l'icosaèdre en coordonnées universelles, fidèle en toute caractéristique, et sa conique modulo 5 157

32 Cote 86 : les cinq trièdres de l'icosaèdre et l'icosaèdre gauche 160

XXV Théorie de l'homotopie et catégories tests 164

33 Cote 136 : le lemme binomial des ombres 164

34 Cote 106 : catégories à cofibrations, factorisation de Brown et critère $(\star\star)$ 166

35 Cote 114 : les localisateurs fondamentaux et la proposition 4 170

36 Cote 158 : la proposition 1 sur les monoïdes finis 173

37 Cote 104 : catégories de modèles, trois exemples, un complexe globulaire 175

XXVI Topologie modérée et espaces stratifiés 182

38 Cote 120 : écraser une partie modérée sur un corps 182

XXVII Géométrie anabélienne et dessins 185

XXVIII Ordres et géométrie des formes 186

39 Cote 156-1 : le modèle-segment est un biordre 186

40 Cote 156-3 : l'intermédiarité se lit sur les découpages 189

Bilan 192

41 Erreurs, pistes et énoncés restants 192

Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle 193

# Introduction

Les énoncés qui suivent sont ceux des lectures modernisées, qui restituent en notation actuelle le contenu de la transcription. Chaque démonstration suit une preuve vérifiée mécaniquement en Lean 4, citée en note au titre de la section. Elle établit que l'énoncé tient sous les hypothèses écrites. Elle ne dit pas que la lecture est fidèle à la page.

Ces preuves sont modestes à côté d'autres travaux récents. Le 6 octobre 2026, OpenAI a publié 719 manuscrits produits par un modèle interne, non relus par des pairs, dont une partie s'accompagne de formalisations en Lean 4[1]. Quatre familles de ces manuscrits annoncent des énoncés issus du programme de Grothendieck : l'hypothèse d'homotopie ; la conjecture des sections, $p$-adique locale, et sur $\mathbb{Q}$ pour les courbes modulaires $X_0(N)$ et $X_1(N)$ de genre au moins deux ; la conjecture de Deligne–Drinfeld sur l'algèbre de Lie de Grothendieck–Teichmüller ; la conjecture de Hodge pour les variétés abéliennes à multiplication complexe et, par des théorèmes de Milne, la conjecture standard de type Hodge pour les variétés abéliennes. Deux seulement sont formalisées, en partie. Pour Deligne–Drinfeld, la formalisation établit la liberté de l'algèbre de Lie des solutions rationnelles de l'antisymétrie, de la relation à trois termes et du pentagone à quatre brins, munie du crochet d'Ihara, avec un générateur en chaque poids impair au moins égal à 3, et l'isomorphisme continu après complétion par le poids. Le transport régularisé et les conséquences pour le complexe des graphes n'y sont pas. Pour l'hypothèse d'homotopie, elle se borne à un théorème intermédiaire, rappelé dans la partie sur l'homotopie. Le projet n'a ni compilé ni vérifié ce code ; ce qui en est dit vient de ses pages de description. Les énoncés de l'annexe sont élémentaires, le plus souvent classiques, et aucun n'est une conjecture de Grothendieck.

Les quarante cotes sont celles où une lecture énonce un résultat net dans un domaine élémentaire. Pour vingt-deux d'entre elles (1, 37, 40, 44, 67, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 93, 120, 133, 136, 156-1 et 156-3), cet énoncé est une piste de l'onglet Findings. Pour cinq autres (19, 161-2, 16, 106 et 114), il se détache d'une théorie plus vaste (comonades et topos, catégories localement présentables, conjectures standard, localisation homotopique), et seul l'énoncé détaché est démontré. Motifs, catégories tannakiennes, schémas abéliens, dérivateurs et cohomologie étale sont exclus.

Chaque cote a sa section, et les sections suivent l'ordre chronologique des thèmes. Les thèmes sont ceux de la carte des mathématiques du fonds que publie le site (« A map of the mathematics in the fonds »), qui classe les mots-clés des lectures sous une trentaine de sujets. Une cote est rangée sous le sujet qui porte le plus de ses mots-clés et, à égalité, sous celui dont relève l'énoncé démontré. La date d'un thème est celle de la carte : la moyenne, sur ses cotes, du milieu de leur datation par l'inventaire. Cette moyenne indique une tendance. Dans un thème, les cotes suivent leur propre datation, et les cotes non datées viennent en dernier.

On trouve ainsi, en parties successives : cycles algébriques et conjectures standard (vers 1966), la cote 16 (§ 1) ; algèbre universelle et théories (vers 1968), la cote 161-2 (§ 2) ; analyse fonctionnelle (vers 1968), les cotes 1 (§ 3) et 113 (§ 4) ; théorie de la dualité (vers 1969), la cote 125 (§ 5) ; topos et sites (vers 1970), la cote 37 (§ 6) ; algèbre commutative (vers 1970), les cotes 21 (§ 8), 22 (§ 9) et 67 (§ 10) ; catégories et foncteurs (vers 1970), les cotes 19 (§ 11), 133 (§ 12) et 161-1 (§ 13) ; géométrie formelle, modules et représentabilité (vers 1970), les cotes 39 (§ 14), 41 (§ 15) et 42 (§ 16) ; K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch (vers

[1] `https://github.com/openai/math`, consulté le 10 octobre 2026. La portée des formalisations citées ici est celle que décrivent ses pages `lean/docs/008.md` et `lean/docs/312.md`.

1970), la cote 153 (§ 17) ; schémas en groupes et groupes algébriques (vers 1972), les cotes 40 (§ 18), 78 (§ 19) et 84 (§ 20) ; surfaces de Riemann, uniformisation et modules des courbes (vers 1973), la cote 93 (§ 21) ; topologie combinatoire, surfaces et cartes (vers 1973), les cotes 152 (§ 22), 88 (§ 23), 73 (§ 24), 74 (§ 25), 76 (§ 26), 77 (§ 27), 79 (§ 28) et 85 (§ 29) ; jeux et combinatoire (vers 1974), la cote 68 (§ 30) ; polyèdres et géométrie convexe (vers 1976), les cotes 70 (§ 31) et 86 (§ 32) ; théorie de l'homotopie et catégories tests (vers 1976), les cotes 136 (§ 33), 106 (§ 34), 114 (§ 35), 158 (§ 36) et 104 (§ 37) ; topologie modérée et espaces stratifiés (vers 1977), la cote 120 (§ 38) ; ordres et géométrie des formes (1986), les cotes 156-1 (§ 39) et 156-3 (§ 40). Le rangement suit le vocabulaire de la carte : l'invariance de Morita de la cote 113 relève ainsi de l'analyse fonctionnelle, par le produit tensoriel des catégories linéaires.

Dix thèmes de la carte n'ont aucun énoncé vérifié ici : une partie vide, à sa place chronologique, le dit, nomme ce qui manque à la bibliothèque, donne les cotes du thème et la liste de leurs pistes ouvertes.

Chaque section donne le contexte du feuillet, les définitions que la lecture laisse implicites, l'énoncé tel que la lecture le donne, sa démonstration et des remarques : hypothèses superflues ou nécessaires, contre-exemples, corrections de la lecture ou de la page. Elle se termine par les énoncés de la cote qui ne sont pas démontrés ici. La section 41 fait le bilan des erreurs trouvées et des pistes démontrées.

Le losange ♦$n$ marque un énoncé lié au théorème numéroté $n$ de la frise des œuvres du site (« The works, on the same years »), qui place ses principaux théorèmes à l'année de l'article ou de l'exposé qui les démontre. Trois énoncés le portent. Le feuillet 2 de la cote 125 enchaîne cohomologie locale, complétion formelle et dualité. Il relève de la dualité cohérente et de la géométrie formelle (théorème 6, Séminaire Bourbaki n° 149 et 195, EGA $\mathrm{III}_1$) et des théorèmes de Lefschetz par la cohomologie locale (SGA 2, théorème 9). La proposition 2.15 de la cote 21 invoque le critère de Baer sous le nom de « Tohoku », et l'énoncé des pages 14 et 15 de la cote 19 porte sur une catégorie de Grothendieck à générateur ; tous deux relèvent de l'article de Tôhoku (théorème 4). Le lien porte sur le sujet ; aucun de ces énoncés n'est un théorème de la frise.

Le losange rouge ♦ marque les énoncés, démontrés ou non, que l'onglet Findings du site retient comme pistes. Ce sont des énoncés du dossier qui pourraient manquer à la littérature publiée, soit que la recherche n'en ait rien trouvé dans les sources lues (« candidate »), soit qu'elle reste à faire (« unsearched »). Une piste n'est ni un résultat établi ni une affirmation de priorité. Le losange renvoie à sa fiche, qui dit ce qui a été cherché et ce qui trancherait. Vingt-quatre pistes sont démontrées ici, dans les cotes 16, 19, 40, 44, 67, 68, 70, 78, 86 (deux pistes), 77 (trois pistes), 79 (quatre pistes), 84 (deux pistes, la seconde en coordonnées scindées), 106, 133, 158, 156-1 et 156-3. Seize autres ne le sont qu'en partie : celle de la cote 22, pour la topologie discrète seulement ; celle de la cote 136, sur les coefficients seulement, sans les modules gradués sur $k\{T\}$ ; celle de la cote 153, pour $K_0$ plat sur $k_0$ ; deux pistes de la cote 16, l'une pour les seuls projecteurs de la graduation, l'autre parce que l'anneau $\Phi_0$ de la lecture n'existe pas sur $\mathbb{Z}$ ; deux pistes de la cote 84, la classification par triplets pour les algèbres libres et le produit des extensions $\chi$-scindées en coordonnées ; les deux pistes de la cote 85, dont la représentabilité n'est pas démontrée ; celle de la cote 74, sous une forme reconstruite de la condition (Ka), dont la fin est illisible ; celle de la cote 1, en dimension finie et pour $m \leq 2$ ; la fidélité entière de la cote 70, pour les incidences seulement ; deux pistes de la cote 79, les polygones étoilés dans le modèle seulement, et la distance trois, démontrée dans le modèle

et, hors le cas de l'octaèdre, dans le cadre abstrait ; celle de la cote 93, dont la rigidité n'est démontrée que pour $\alpha = 0$ ; celle des $2p$-gones en bande de la cote 78, pour leur existence seulement. Une preuve établit que l'énoncé tient tel qu'il est écrit. Elle ne dit pas qu'il manque à la littérature, et la piste reste ouverte sur ce point. Les autres énoncés démontrés sont des résultats classiques, des lemmes ou des corrections de la lecture.

Les résultats principaux sont encadrés. Un énoncé démontré par piste de l'onglet Findings entièrement démontrée y est appelé théorème, et porte le nom de Grothendieck, dont il vient des feuillets ; quand la démonstration établit davantage que la page, la remarque qui suit le dit ; un énoncé qui établit qu'une affirmation de la page ou de la lecture est fausse y est appelé contre-exemple. Les autres énoncés de la lecture gardent le nom d'énoncé.

Une piste restante que les feuillets énoncent sans la démontrer est encadrée comme une conjecture de Grothendieck. Une piste restante que les feuillets démontrent est encadrée aussi, comme un théorème de Grothendieck, avec en marge la mention ◊ *non vérifié en Lean* : l'énoncé est rapporté, sa démonstration n'est pas vérifiée.

Le carré bleu ■ marque les énoncés dont un lemme général est proposé à la bibliothèque mathlib ; il renvoie à la demande d'intégration (*pull request*) correspondante. Seul le lemme général y est proposé, sans référence aux feuillets, sauf pour la proposition 1 de la cote 158, qui y est citée comme énoncé d'un manuscrit inédit. Une remarque à la fin de chaque section concernée donne le numéro de la demande, et dit ce que mathlib contenait déjà.

Sous le titre de chaque partie, quand le fonds en conserve, un paragraphe donne les lettres datées qui situent la partie dans le temps, chacune avec sa cote, son lot et sa page, d'après les registres du site. Dans deux parties, une ligne *Ailleurs* signale des formalisations extérieures au projet qui touchent leur thème. L'annexe laisse au lecteur trois questions. La première est de savoir si l'énoncé démontré est juste tel qu'il est écrit, puisque Lean n'établit que sa validité sous les hypothèses écrites. La deuxième est de savoir s'il lui manque une hypothèse ou s'il en porte une de trop. La troisième est de savoir s'il figure déjà dans la littérature, et où. Pour les pistes, seule la troisième se pose. La fidélité de la lecture au feuillet demande le fac-similé et relève d'un autre travail.

**Partie 1**

# Cycles algébriques et conjectures standard

Le 27 août 1965, il énonce pour Serre les conjectures standard A, A′, A″ et B (14, lot 3, p. 43). La cote 16 garde deux lettres à John Coates, datées de sa main du 6.1.1966 et du 4.1.1967 (16, lot 3, p. 47, 16, lot 3, p. 43). La première donne des formes équivalentes de la conjecture C ; la seconde situe la conjecture de l'indice et l'indépendance des conjectures à l'égard de la polarisation. Les anneaux gradués étudiés ici sont rangés dans le même dossier.

*Ailleurs* : le dépôt d'OpenAI cité dans l'introduction annonce la conjecture de Hodge rationnelle pour les variétés abéliennes à multiplication complexe. Il en tire, par des théorèmes de Milne, la conjecture standard de type Hodge pour les variétés abéliennes en toute caractéristique, qui est la conjecture B de la lettre à Serre, celle de positivité (14, lot 3, p. 44). Ces énoncés ne sont pas relus et ne sont pas formalisés ; trois manuscrits voisins, sur les classes de Weil et les surfaces K3, ont été retirés le 7 octobre 2026. La cote 16 ne donne lieu ici qu'à des identités d'algèbre sur l'opérateur $\Lambda$, sans lien de démonstration avec ces conjectures.

## 1 Cote 16 : le pseudo-inverse de l'opérateur de Lefschetz et la normalisation de $\mathfrak{sl}_2$[2]

La cote 16, *Formalisme algébrique des correspondances et algèbres de Poincaré-Hodge (cf conjectures standard) : notes manuscrites (s.d.), tapuscrit annoté (s.d.), lettres (1966-1967)*, compte cinquante-cinq pages datées « 1966-1967 ». Elle s'ouvre sur un cahier, « Sur certains anneaux gradués » (pages 2 à 17), qui cherche à quelles conditions l'opérateur $\Lambda$ et les projecteurs de la décomposition primitive appartiennent à un anneau gradué $\mathcal{E}$ muni d'un $L$ de degré $2$. La page 9 fixe $\Lambda$ par les relations (6.7) (16, lot 1, p. 9), que la page 13 reprend sous le numéro (6.15). La même page pose sur une algèbre extérieure le modèle $L_0 x = \xi_0 x$, $\Lambda_0 x = \xi_0^* \lrcorner\, x$, et écrit que « $\Lambda_0$ est l'opérateur associé défini par (6.15) » (16, lot 1, p. 13). Le dossier ne mentionne jamais $\mathfrak{sl}_2$. La lecture compare les deux normalisations de $\Lambda$ ; cette comparaison, purement algébrique, est démontrée ici.
*Conventions.* Les relations (6.7) sont

$$L\Lambda = 1 - \sum_{0 \leqslant i \leqslant n} \pi_{i,0}, \qquad \Lambda L = 1 - \sum_{n \leqslant i \leqslant 2n} \pi_{i,0},$$

où $\pi_{i,0}$ est la projection de $M^i$ sur sa partie primitive (pour $i \leqslant n$) ou sur le sommet de chaîne correspondant (pour $i \geqslant n$). Pour la normalisation de Hodge, on se donne un anneau commutatif $R$, une algèbre de Lie sur $R$ contenant un triplet $(H, \Lambda, L)$ tel que $[H, \Lambda] = 2\Lambda$, $[H, L] = -2L$ et $[\Lambda, L] = H$, et une représentation $M$ ; on note $\Lambda y$, $Ly$, $Hy$ l'action. Un vecteur $x \neq 0$ est *primitif de poids* $\mu$ si $\Lambda x = 0$ et $Hx = \mu x$. Avec la convention $[L, \Lambda] = H$ de la lecture, une classe de degré $i$ a pour poids $i - n$ ; on a pris ici l'opposé, de sorte qu'une classe primitive de degré $i$ a pour poids $\mu = n - i$.

[2] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder16.lean`.

**Énoncé** (Page 9, la comparaison de la lecture). *Le $\Lambda$ de (6.7) n'est pas celui de la théorie de Hodge, qui agit sur $L^k P^i$ par des scalaires entiers non triviaux : sur une classe primitive $x$ de degré $i$, on a $\Lambda L x = (n-i)\,x$, et non $x$.*

**Énoncé** (Page 16, le commutateur). *Avec un $\Lambda$ normalisé en pseudo-inverse par (6.7), le commutateur vaut*

$$[L,\Lambda] = \sum_{n\leqslant i\leqslant 2n} \pi_{i,0} - \sum_{0\leqslant i\leqslant n} \pi_{i,0}$$

*et ne retient que les extrémités des chaînes.*

**Énoncé** (Page 13, le modèle extérieur). *Soient $M_0$ libre de base $e_1,\dots,e_{2n}$ sur $R$, $\xi_0 = \sum_{j=1}^n e_{2j-1}\wedge e_{2j}$ et $\xi_0^* = \sum_{j=1}^n e_{2j-1}^*\wedge e_{2j}^*$. Sur l'algèbre extérieure $\Lambda M_0$, $\Lambda_0 L_0(1) = \langle \xi_0^*, \xi_0\rangle = n$, alors que (6.15) exige $1$ ; l'identification des deux $\Lambda_0$ ne vaut donc que pour $n=1$.*

**Lemme 1.1.** *Soit $x$ un vecteur primitif de poids $\mu$ et $x_k = L^k x$. Pour tout $k\geqslant 0$,*

$$Hx_k = (\mu-2k)\,x_k, \qquad \Lambda x_{k+1} = (k+1)(\mu-k)\,x_k;$$

*en particulier $\Lambda L x = \mu x$.*

*Démonstration.* La relation $[H,L] = -2L$ donne $H(Ly) = L(Hy) - 2Ly$ pour tout $y$, d'où la première formule par récurrence sur $k$, à partir de $Hx = \mu x$. La relation $[\Lambda, L] = H$ donne $\Lambda(Ly) = L(\Lambda y) + Hy$. Montrons par récurrence que $\Lambda x_k = k(\mu-k+1)\,x_{k-1}$ pour $k\geqslant 1$, et $\Lambda x_0 = 0$. C'est vrai pour $k=0$ par primitivité. Si c'est vrai pour $k$, alors

$$\Lambda x_{k+1} = L(\Lambda x_k) + Hx_k = \big(k(\mu-k+1) + \mu - 2k\big)\,x_k = (k+1)(\mu-k)\,x_k.$$

Pour $k=0$, c'est $\Lambda L x = \mu x$. □

*Démonstration de la comparaison de la page 9.* Pour une classe primitive $x$ de degré $i$, de poids $\mu = n-i$, le lemme 1.1 donne $\Lambda L x = (n-i)\,x$ et, plus généralement, $\Lambda$ agit sur $L^{k+1}x$ par l'entier $(k+1)(n-i-k)$. Supposons de plus $R$ intègre, $M$ sans torsion, et $\Lambda L x = x$, comme (6.7) le demande au bas d'une chaîne. Alors $(\mu-1)\,x = \Lambda L x - x = 0$ avec $x\neq 0$, donc $\mu = 1$, c'est-à-dire $i = n-1$. □

*Démonstration de la formule du commutateur.* Dans tout anneau où $L$ et $\Lambda$ vérifient (6.7), on soustrait les deux relations : $L\Lambda - \Lambda L = \sum_{n\leqslant i\leqslant 2n}\pi_{i,0} - \sum_{0\leqslant i\leqslant n}\pi_{i,0}$. □

*Démonstration de la formule du modèle extérieur.* Notons $\iota_\alpha$ la contraction par une forme linéaire $\alpha$, antidérivation de $\Lambda M_0$ telle que $\iota_\alpha(v) = \alpha(v)$ pour $v\in M_0$, et convenons que la contraction par $\alpha\wedge\beta$ est $\iota_\beta\circ\iota_\alpha$. Alors $L_0(1) = \xi_0$ et

$$\Lambda_0 L_0(1) = \sum_{j,l=1}^{n} \iota_{e_{2j}^*}\,\iota_{e_{2j-1}^*}\big(e_{2l-1}\wedge e_{2l}\big).$$

On a $\iota_{e_{2j-1}^*}(e_{2l-1}\wedge e_{2l}) = e_{2j-1}^*(e_{2l-1})\,e_{2l} - e_{2j-1}^*(e_{2l})\,e_{2l-1} = \delta_{jl}\,e_{2l}$, puis $\iota_{e_{2j}^*}(\delta_{jl}\,e_{2l}) = \delta_{jl}$. La somme vaut donc $n$, c'est-à-dire $n\cdot 1\in\Lambda^0 M_0 = R$. Si $R$ est de caractéristique nulle et $n\neq 1$, $n\cdot 1\neq 1$, et $\Lambda_0 L_0(1)\neq 1$. □

*Remarque.* Le $\Lambda$ de $\mathfrak{sl}_2$ ne vérifie la relation $\Lambda L x = x$ de (6.7) que sur les classes primitives de degré $n-1$ ; ailleurs les deux normalisations diffèrent d'un facteur entier, que le pseudo-inverse évite, ce qui permet au dossier de rester sur $\mathbb{Z}$.

*Remarque.* Le calcul confirme la correction que la lecture apporte à la page 13 : la contraction $\xi_0^* \lrcorner -$ n'est pas l'opérateur que caractérisent les relations (6.15) dès que $n \geqslant 2$. L'erreur est sur la page ; elle est sans effet sur la Proposition qui suit, qui n'utilise que (6.15).

Le n° 4 remplace les conditions sur le module par la condition interne $(4.4)_i$ (16, lot 1, p. 6) ; le n° 5, écrit sur un feuillet « 5 bis », en tire que les $\pi_i$ sont dans $\mathcal{E}$ (16, lot 1, p. 7) ; la page 8 spécialise à $v_i = L^{n-i}$ sous le numéro $(6.3)_i$ (16, lot 1, p. 8).

*Conventions.* On se donne un anneau $E$ (le sur-anneau $\mathcal{F}$ de la lecture), une famille $(\pi_a)_{a\in\mathbb{Z}}$ d'idempotents orthogonaux de $E$, nuls hors de $[0, 2n]$, de somme 1, et un sous-anneau $\mathcal{E} \subset E$. Un élément $x$ est *homogène de degré* $d$ si $\pi_b\, x\, \pi_a = 0$ dès que $b \neq a + d$. Aucun module n'intervient, et $\mathcal{E}$ n'est qu'un anneau : tout se passe sur $\mathbb{Z}$.

**Énoncé** (Pages 6 à 8, les projecteurs de la graduation ♦). *Supposons que, pour tout $i \leqslant n$, il existe $v_i \in \mathcal{E}$ homogène de degré $2n - 2i$ et $w_i \in \mathcal{E}$ homogène de degré $-(2n - 2i)$ tels que $(w_i v_i - 1)\,\pi_i = 0$ et $(v_i w_i - 1)\,\pi_{2n-i} = 0$. Alors tous les $\pi_a$ sont dans $\mathcal{E}$. En particulier, si $L \in \mathcal{E}$ est homogène de degré 2 et si $L^{n-i}$ admet dans $\mathcal{E}$ des inverses $w_i$ au sens de $(6.3)_i$, les $\pi_a$ sont dans $\mathcal{E}$.*

**Lemme 1.2.** *Si $x$ est homogène de degré $d$, alors $x\,\pi_a = \pi_{a+d}\,x\,\pi_a$ pour tout $a$. Si $A$ et $B$ sont des parties finies de $\mathbb{Z}$, $a_0 \in A$, $a_0 + d \in B$, et si $a_0$ est le seul $a \in A$ tel que $a + d \in B$, alors*

$$\Big(\sum_{b\in B} \pi_b\Big)\, x \Big(\sum_{a\in A} \pi_a\Big) = \pi_{a_0+d}\, x\, \pi_{a_0}.$$

*Un produit d'homogènes de degrés $d$ et $e$ est homogène de degré $d + e$, et $L^k$ est de degré $2k$ si $L$ est de degré 2.*

*Démonstration.* On écrit $x\,\pi_a = \big(\sum_b \pi_b\big) x\,\pi_a = \sum_b \pi_b\, x\, \pi_a$, où seul le terme $b = a + d$ subsiste (s'il sort de $[0, 2n]$, $\pi_{a+d} = 0$ et les deux membres sont nuls). Le second énoncé se développe en une double somme dont seul le terme $(a_0 + d, a_0)$ subsiste. Pour le produit, $\pi_b\, xy\, \pi_a = \pi_b\, x\, \pi_{a+e}\, y\, \pi_a$, nul si $b \neq a + e + d$ ; 1 est de degré 0 par orthogonalité, d'où les puissances par récurrence. □

*Démonstration.* Montrons par récurrence sur $i \leqslant n+1$ que $\pi_a \in \mathcal{E}$ dès que $a < i$ ou $a > 2n - i$. Pour $i = 0$, ces $\pi_a$ sont nuls. Supposons-le pour un $i \leqslant n$. Alors

$$\varphi_i = \sum_{i\leqslant a\leqslant 2n} \pi_a = 1 - \sum_{0\leqslant a<i} \pi_a, \qquad \psi_{2n-i} = \sum_{0\leqslant a\leqslant 2n-i} \pi_a = 1 - \sum_{2n-i<a\leqslant 2n} \pi_a$$

sont dans $\mathcal{E}$. Le lemme 1.2, appliqué à $v_i$ (le seul $a \geqslant i$ tel que $a + 2n - 2i \leqslant 2n - i$ est $a = i$) puis à $w_i$, donne

$$v_i' = \psi_{2n-i}\, v_i\, \varphi_i = \pi_{2n-i}\, v_i\, \pi_i \in \mathcal{E}, \qquad w_i' = \varphi_i\, w_i\, \psi_{2n-i} = \pi_i\, w_i\, \pi_{2n-i} \in \mathcal{E}.$$

Comme $\pi_{2n-i}\, v_i\, \pi_i = v_i\, \pi_i$ et $\pi_i\, w_i\, \pi_{2n-i} = w_i\, \pi_{2n-i}$ (même lemme),

$$w_i' v_i' = \pi_i\, w_i\, \pi_{2n-i}^2\, v_i\, \pi_i = \pi_i\, (w_i v_i \pi_i) = \pi_i^2 = \pi_i, \qquad v_i' w_i' = \pi_{2n-i}\, (v_i w_i \pi_{2n-i}) = \pi_{2n-i},$$

donc $\pi_i$ et $\pi_{2n-i}$ sont dans $\mathcal{E}$, ce qui est l'hypothèse au rang $i + 1$. Au rang $n + 1$, tout $a$ vérifie $a < n + 1$ ou $a > n - 1$. Le cas $v_i = L^{n-i}$ suit, $L^{n-i}$ étant dans $\mathcal{E}$ et de degré $2n - 2i$. □

*Remarque.* L'argument de la page 7 vaut tel qu'il est écrit, sans hypothèse de réalisation : il suffit que $\mathcal{E}$ soit un sous-anneau et que les $\pi_i$ existent dans le sur-anneau. Cela démontre la première partie de la piste, l'appartenance des projecteurs de la graduation. Celle de $\Lambda$ et des projecteurs primitifs $\pi_{i,\alpha}$ n'est pas démontrée ici. Les formules des pages 10 à 12 les écrivent comme produits d'éléments de $\mathcal{E}$, et leur appartenance est immédiate ; il resterait à vérifier qu'elles satisfont (6.7) et donnent les projecteurs de la décomposition primitive, ce qui demande la décomposition elle-même.

La lecture garde $\Phi_0 = \mathbb{Z}[L_0, \Lambda_0] \subset \mathrm{End}(\Lambda M_0)$, avec $M_0$ un $\mathbb{Z}$-module libre et $\Lambda_0$ *au sens de (6.15)*, pour réparer l'identification de la page 13. Sur $\mathbb{Z}$, ce $\Lambda_0$ n'existe pas.

**Contre-exemple 1.3** (Page 13, sur $\mathbb{Z}$ ♦). *Soient $M_0 = \mathbb{Z}^{2n}$, $n \geqslant 2$, $\xi_0 = \sum_{k=1}^{n} e_{2k-1} \wedge e_{2k}$ et* vol $= e_1 \wedge \cdots \wedge e_{2n}$. *Il n'existe aucun $y \in \Lambda M_0$ tel que $\xi_0^n \wedge y =$* vol. *En particulier, pour toute application $w$ de $\Lambda M_0$ dans lui-même, $L_0^n\big(w(\text{vol})\big) \neq$* vol *: la condition $(6.3)_0$ est fausse dans le modèle extérieur sur $\mathbb{Z}$.*

*Démonstration.* Posons $a_k = e_{2k-1} \wedge e_{2k}$. Deux produits de deux vecteurs commutent dans $\Lambda M_0$ (chaque vecteur traverse l'autre paire avec deux changements de signe), et $a_k \wedge a_k = 0$. Par récurrence sur le nombre de termes, $\xi_0 \wedge \xi_0 = c + c$ pour un $c \in \Lambda M_0$ : si $S$ est une somme partielle avec $S \wedge S = c + c$, alors $(a+S)^2 = a^2 + aS + Sa + S^2 = (aS + c) + (aS + c)$. Donc $\xi_0^n \wedge y = \xi_0^{n-2} \wedge (c + c) \wedge y = z + z$ avec $z = \xi_0^{n-2} c\, y$. Soit $\phi$ la forme linéaire sur $\Lambda M_0$ qui prend la composante de degré $2n$ et la lit sur la base vol de $\Lambda^{2n} M_0$ ; $\phi(\text{vol}) = 1$. Si $\xi_0^n \wedge y =$ vol, alors $1 = \phi(z + z) = 2\,\phi(z)$ dans $\mathbb{Z}$, ce qui est impossible. Enfin $L_0^n(x) = \xi_0^n \wedge x$, et l'on prend $y = w(\text{vol})$. □

*Remarque.* En fait $\xi_0^n = n!\,$vol, et $L_0^n \colon \Lambda^0 M_0 \to \Lambda^{2n} M_0$ est la multiplication par $n!$ ; seule la parité est démontrée ici, et elle suffit. D'après la Remarque de la page 12, un $\Lambda_0$ vérifiant (6.15) donne $(L_0^n \Lambda_0^n - 1)\,\pi_{2n} = 0$, c'est-à-dire $L_0^n(\Lambda_0^n\,\text{vol}) =$ vol, ce que l'énoncé exclut. Pour $n \geqslant 2$, l'anneau $\Phi_0 = \mathbb{Z}[L_0, \Lambda_0]$ de la lecture ne peut donc pas être pris dans $\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(\Lambda M_0)$, et la décomposition primitive y fait défaut. Pour $n = 2$, $e_1 \wedge e_2 \wedge \xi_0 =$ vol et $\xi_0 \wedge \xi_0 = 2\,$vol, de sorte que la composante de $e_1 \wedge e_2$ sur $\mathbb{Q}\,\xi_0$ le long de $P^2$ vaut $\frac{1}{2}\,\xi_0$ (calcul fait à la main). L'obstacle disparaît sur $\mathbb{Q}$. La correction de la page 13 par la lecture vaut donc pour l'identification des deux $\Lambda_0$ ; le choix de $\mathbb{Z}$ comme anneau de base du modèle ne convient pas.

**Lemme 1.4** (Pages 14 et 15, l'étape algébrique de l'unicité). *Dans un anneau, si $\Lambda L \Lambda = \Lambda$, $\Lambda' L \Lambda' = \Lambda'$, $\Lambda L = \Lambda' L$ et $L\Lambda = L\Lambda'$, alors $\Lambda = \Lambda'$.*

*Démonstration.* $\Lambda = (\Lambda L)\Lambda = \Lambda'(L\Lambda) = \Lambda'(L\Lambda') = \Lambda'$. □

Le lemme 1.4 dit qu'un pseudo-inverse est déterminé par les deux idempotents $\Lambda L$ et $L\Lambda$ ; ni l'existence de l'homomorphisme $\Phi_0 \to \mathcal{E}$ ni son unicité ne sont démontrées ici.

La lettre du 6 janvier 1967 montre que $C(X)$ suit de $D(X)$ et de l'existence d'isomorphismes algébriques $H^{2n-i}(X) \to H^i(X)$ quelconques (16, lot 3, p. 47).
*Conventions.* Soient $K$ un corps ($\mathbb{Q}_\ell$), $F \subset K$ un sous-corps ($\mathbb{Q}$), $V = H^i(X)$ et $W = H^{2n-i}(X)$ des $K$-espaces, $V$ de dimension finie. « Algébrique » est lu comme l'appartenance à des ensembles donnés d'applications : un sous-anneau $\mathcal{A}_V$ de $\mathrm{End}_K(V)$, stable par multiplication par les éléments de $F$, et des parties $\mathcal{A}_{WV}$ de $\mathrm{Hom}(W, V)$ et $\mathcal{A}_{VW}$ de $\mathrm{Hom}(V, W)$, telles que $g \circ h \in \mathcal{A}_{WV}$ pour $g \in \mathcal{A}_V$, $h \in \mathcal{A}_{WV}$, et $h \circ k \in \mathcal{A}_V$ pour $h \in \mathcal{A}_{WV}$, $k \in \mathcal{A}_{VW}$. L'hypothèse $D(X)$ est lue comme : les coefficients du polynôme caractéristique de tout $g \in \mathcal{A}_V$ sont dans $F$.

**Théorème 1.5** (Grothendieck, pages 47 et 48, *proposition*, b) ⇒ $C$ ♦ ■). *Si $u \in \mathcal{A}_{WV}$ est un isomorphisme quelconque et si $v \in \mathcal{A}_{VW}$ (l'application induite par $L^{n-i}$) est un isomorphisme, alors il existe $v' \in \mathcal{A}_{WV}$ avec $v' \circ v = \mathrm{id}_V$ et $v \circ v' = \mathrm{id}_W$ : l'inverse de $L^{n-i}$ est algébrique.*

**Lemme 1.6** (Cayley–Hamilton). *Si $w \in \mathcal{A}_V$ est inversible, son inverse est dans $\mathcal{A}_V$.*

*Démonstration.* Soit $p = \sum_j c_j X^j$ le polynôme caractéristique de $w$ ; ses coefficients sont dans $F$. Écrivons $p = qX + c_0$. Par Cayley–Hamilton, $q(w)\, w = -c_0$, et $c_0 = \pm \det w \neq 0$ puisque $w$ est inversible. Donc $g = -c_0^{-1} q(w)$ vérifie $gw = 1$, et $wg = 1$ puisque $q(w)$ commute à $w$. Enfin $q(w) = \sum_j c_{j+1}\, w^j$ est une somme de multiples par des éléments de $F$ de puissances de $w$, donc $g \in \mathcal{A}_V$. □

*Démonstration.* $w = u \circ v$ est dans $\mathcal{A}_V$, et inversible comme composé de deux bijections. Le lemme 1.6 donne $g \in \mathcal{A}_V$ avec $g \circ w = \mathrm{id}_V$ ; on pose $v' = g \circ u \in \mathcal{A}_{WV}$. Alors $v' \circ v = g \circ w = \mathrm{id}_V$, et pour $y = v(x)$, $v(v'(y)) = v\big((v' \circ v)(x)\big) = y$ : $v'$ est aussi inverse à droite, $v$ étant surjective. □

*Remarque.* L'argument de la lettre vaut tel quel, avec la relation de Cayley–Hamilton écrite en $w = uv$, comme la lecture la rétablit ; le tapuscrit l'écrit en $u$ avec les coefficients de $w$. L'hypothèse que $u$ soit un isomorphisme sert seulement à rendre $w$ inversible. Que $v$, induit par $L^{n-i}$, en soit un aussi est l'axiome de Lefschetz de la cohomologie, que la lettre suppose.

*Remarque.* Le lemme 1.6 est proposé à mathlib sous une forme plus générale : sur un anneau artinien $R$, un élément d'une sous-$R$-algèbre $B \subseteq A$, entier sur $R$ et inversible dans $A$, est inversible dans $B$ (PR mathlib4 #44708). Le lemme s'en déduit par Cayley–Hamilton.

Ne sont pas démontrés ici : le théorème de Lefschetz difficile par $\mathfrak{sl}_2$ et la représentation de $\mathfrak{sl}_2$ engendrée par $(L_0, \Lambda_0)$ ; dans le théorème du n° 6, $\Lambda$ et les projecteurs primitifs (pages 9 à 12) ; l'existence et l'unicité de l'homomorphisme $\Phi_0 \to \mathcal{E}$ et le corollaire de la page 16 ♦ ; le contre-exemple de la page 21 ; les pages 2 à 5, 24 à 46 et 48 à 54, dont les algèbres de Hodge, les sections hyperplanes, le corollaire de la page 48, les variantes de la page 49 et le lemme.

**Définition** (Grothendieck, pages 24 à 28, algèbres de Hodge ♦). Une algèbre de Hodge est une algèbre graduée anticommutative de composantes $k$, $V$, $k\xi \oplus W$, $\check{V}$, $k\xi^2$, donnée par une forme alternée $\varphi$ sur $V$, une application $\psi : \Lambda^2 V \to W$ et une forme symétrique $Q$ sur $W$. La page ramène l'associativité à une identité quadrilinéaire et montre que la condition de Lefschetz et la condition de Poincaré équivalent chacune à la non-dégénérescence de l'une exactement des formes $\varphi$ et $Q$ ; une seconde formulation fait de la polarisation $\xi$ un paramètre de la structure.

**Théorème 1.7** (Grothendieck, pages 4 à 17, critère de Lefschetz dans un anneau gradué ♦). *Soient $\mathcal{E}$ un anneau gradué et $L \in \mathcal{E}$ de degré 2. S'il existe dans $\mathcal{E}$ des inverses d'un côté $w_i$ des $L^{n-i}$, les projecteurs de la graduation, le pseudo-inverse $\Lambda$ et tous les projecteurs de la décomposition primitive appartiennent à $\mathcal{E}$, sans module sous-jacent et sur* **Z**.

◊ *non vérifié en Lean*

**Conjecture 1.8** (Grothendieck, page 49, variantes en dimension critique ♦). *Les deux variantes $A'^0$ et $A''^0$ de la condition $A^0$ en dimension critique, qui portent sur les classes devenant algébriques sur une section hyperplane, entraînent ensemble $A^0$. Ainsi $C(X)$ équivaut à $C(Y) + A'^0(X \times X) + A''^0(X \times X)$ et, par descente le long d'une chaîne de sections hyperplanes $Y$, $Z$, et ainsi de suite, à ces deux seules conditions sur $X \times X$, $Y \times Y$, $Z \times Z$.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (page 49). Elle écrit les deux factorisations de l'opérateur par la section

Autres pistes de l'onglet Findings pour ce thème, dans des cotes qui n'ont pas de section ici :

**Conjecture** (Grothendieck, pages 37 et 41, algèbres bivariantes simpliciales et algèbres de Poincaré ♦). *L'évaluation en un ensemble à un élément est une équivalence entre les algèbres bivariantes simpliciales, foncteurs contravariants des ensembles finis non vides vers les algèbres graduées bivariantes de la page 33, dont la valeur en un point est une algèbre de Poincaré, et les algèbres de Poincaré. Le foncteur $A(\cdot) \mapsto (A(\mathrm{pt}), \Delta)$, avec $\Delta = \delta_*(1)$ de degré $d(A)$, est pleinement fidèle vers les algèbres jaugées munies d'un tel $\Delta$.*

La page laisse « à préciser » les axiomes sur $\Delta$. L'édition restreint l'équivalence aux objets « spéciaux », sans quoi rien ne lie $A(I)$ à $A(\mathrm{pt})$ pour $\operatorname{card} I \geq 2$. Mathlib n'a pas ces théories bivariantes. On se reportera aux notes de Grothendieck (11, lot 2, p. 37).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 9 à 16, théorème de Griffiths par voie $\ell$-adique ♦). *En toute caractéristique, soient $X$ projective lisse de dimension $2n$ et un pinceau de Lefschetz, de section hyperplane générique $Y$. Supposons a) un scindage de type Lefschetz de l'inclusion de $Y$ par une correspondance algébrique, et b) qu'aucune pièce de* $\operatorname{Coker}(H^{2n-1}(X) \to H^{2n-1}(Y))$ *ne soit de coniveau $n-1$. Alors un cycle de $X$ dont la restriction à $Y$ est algébriquement équivalente à zéro est homologiquement nul à torsion près, et* $\mathrm{Grif}(Y) \otimes \mathbf{Q}$ *a un sous-quotient qui s'envoie sur les classes algébriques primitives de $X$.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 9 à 15) : le n° 4 renvoie à des « calculs explicites essentiellement triviaux », et l'argument est de la lecture. La page dit « sous-espace » là où l'argument ne donne qu'un sous-quotient. L'hypothèse a) est un cas des conjectures standard, et b) n'est démontrée qu'en caractéristique nulle. Mathlib n'a pas la cohomologie $\ell$-adique ni l'application d'Abel–Jacobi. On se reportera aux notes de Grothendieck (36, lot 1, p. 9).

**Théorème** (Grothendieck, pages 60 à 70, défaut des cycles invariants en $H^1$ ♦). *Soient $X$ projectif et régulier sur un trait strictement hensélien $S$, avec $\mathcal{O}_S \simeq f_*\mathcal{O}_X$, et $n$ premier à $p$. On a une suite exacte $0 \to {}_n\Gamma \to H^1(X, \mu_n) \to H^1(X_{\bar\eta}, \mu_n)^I \to \mathrm{Ker}(w_n) \to 0$, où $\Gamma$ est le groupe des diviseurs portés par la fibre spéciale modulo $X_0$ et $w : \Gamma \to \mathrm{NS}(X_0)$. À la limite, $H^1(X, \mathbf{Z}_\ell(1)) \to H^1(X_{\bar\eta}, \mathbf{Z}_\ell(1))^I$ est injectif de conoyau $R \otimes \mathbf{Z}_\ell$, où $R = \operatorname{Ker} w$ est cyclique d'ordre divisant le pgcd des multiplicités $d_i$ des composantes de $X_0$, et c'est un isomorphisme quand $X_\eta$ a un 0-cycle de degré 1.*

◊ *non vérifié en Lean*

Le tapuscrit des pages 60 à 63 l'énonce ; le manuscrit des pages 64 à 70 le démontre, la torsion de $\operatorname{Ker} w$ étant renvoyée à Raynaud et tenue « au moins modulo résolution des singularités ». Celle-ci est démontrée en caractéristique nulle (Hironaka) et en dimension au plus trois en toute caractéristique (Cossart–Piltant), et reste ouverte en caractéristique positive à partir de la dimension quatre ; ces trois énoncés sont formalisés dans le dépôt Formal Conjectures [27]. Mathlib n'a pas la cohomologie étale ni le groupe de Néron–Severi. On se reportera aux notes de Grothendieck (36, lot 3, p. 60).

**Théorème** (Grothendieck, pages 73 à 76, orthogonalité sur une base adique régulière ♦). *Soient $X = \operatorname{Spec} A$ une base noethérienne régulière complète pour la topologie $J$-adique, $Y = V(J)$ et $U = X - Y$. Soient $G$, $G'$ des schémas en groupes commutatifs plats sur $X$ dont les restrictions $A_U$, $A'_U$ à $U$ sont des schémas abéliens, $\xi$ une correspondance divisorielle sur $A_U \times A'_U$, $H \subset G_Y$ un sous-groupe plat à torsion $\ell^\nu$ finie et $T' \subset G'_Y$ un tore. Alors*

◊ *non vérifié en Lean*

$\varphi_\xi(T_\ell(\tilde{H})|_U, T_\ell(\tilde{T}')|_U) = 0$ *en tout point de* $U$ *: l'orthogonalité de la partie torique et de la partie de torsion finie pour l'accouplement de Weil ne demande pas un anneau de valuation discrète.*

La réduction à un anneau de valuation discrète à corps résiduel fini et l'argument des poids de Frobenius (pages 74 à 76) sont lus en grande partie à travers des mots incertains ou illisibles, et l'équivariance galoisienne du lemme sur les corps finis est ajoutée par l'édition. SGA 7, IX, donne l'orthogonal exact sur un trait. Mathlib n'a pas les schémas abéliens ni l'accouplement de Weil. On se reportera aux notes de Grothendieck (36, lot 4, p. 73).

**Partie 2**

# Motifs

*Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici.* Les cotes de ce thème supposent les correspondances algébriques et une catégorie de motifs, que mathlib ne définit pas.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 12, 162-6.

**Conjecture** (Grothendieck, pages 115 à 119, poids et niveau d'une immersion ♦)**.** *Soient $f : X \to Y$ une immersion de source régulière et $n$ la dimension de l'adhérence de $f(X)$. Les constituants de $R^i f_* \mathbb{Q}_\ell$ sont de poids $\leq 2\inf(i, n)$ et de niveau $\leq \inf(i, n-1)$. Le dossier tient l'énoncé sous réserve de la résolution, de la pureté et des conjectures de Weil.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 115, 117 et 119). Mathlib n'a pas les poids des faisceaux $\ell$-adiques. On se reportera aux notes de Grothendieck (12, lot 6, p. 115).

**Partie 3**

# Théorie de Hodge

*Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici.* Les cotes de ce thème supposent la cohomologie des variétés kählériennes et les structures de Hodge, absentes de mathlib.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 13, 18.

Pistes de l'onglet Findings pour ces cotes, hors de portée de Lean pour l'instant :

- Cote 18 : pour un motif sur $k \simeq \mathbb{C}$ défini sur un corps de type fini $k_0$, la comparaison des réseaux de Betti entiers en différentes places archimédiennes donne un 1-cocycle de $\mathrm{Gal}(k/k_0)$ dans $G(k)$, dont la classe ne dépend pas de la place. La lecture de la page est à vérifier sur le fac-similé. Mathlib n'a pas les motifs, les réseaux de Betti ni la cohomologie galoisienne non abélienne. On se reportera aux notes de Grothendieck (18, lot 3, p. 46). ♦

**Conjecture** (Grothendieck, pages 33 et 34, invariants d'un double réseau ♦)**.** *Soient une catégorie tensorielle munie d'un foncteur fibre $T$ sur $k$, d'un foncteur fibre $T'$ sur une extension $K$ et d'un $\otimes$-isomorphisme $\varphi$ entre eux sur une extension commune $L$. Les éléments de $V$ qui sont dans la $K$-structure $T'(V)$ sont exactement les invariants $V^H$ du sous-groupe $k$-algébrique $H$ de $G = \mathrm{Aut}^{\otimes}(T)$ engendré par l'image dans $G$ de l'image fermée $R \subset G_K$ de $\mathrm{Spec}(L \otimes_K L) \to P \times_k P \to G_K$, $(s,u) \mapsto s^{-1}u$, sans point base sur le torseur $P = \mathrm{Isom}^{\otimes}(T_K, T')$.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 33 et 34). Mathlib n'a pas les catégories tannakiennes ni les torseurs de foncteurs fibres. On se reportera aux notes de Grothendieck (13, lot 2, p. 33).

**Partie 4**

# Cohomologie étale et $\ell$-adique

*Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici.* Les cotes de ce thème supposent le site étale d'un schéma et sa cohomologie, que mathlib ne contient pas.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 31, 33, 60.

**Exemple** (Grothendieck, pages 38 à 58, moyenne sur l'inertie et dualité ♦). Soit $E_\eta$ un faisceau $\ell$-adique au point générique d'une courbe sur $\mathbf{F}_p$. En remplaçant chaque fibre ramifiée $E^{I_x}$ par la moyenne de $E$ sur l'inertie modulo un sous-groupe ouvert qui agit de façon unipotente, on obtient un faisceau virtuel $E_\eta^\natural$ dont la fonction $L$ est additive et locale en $(E, x)$. Son dual de Verdier est $\check{E}_\eta^\natural(1)[2]$ augmenté des termes locaux $\mu_x(E) = \alpha_x(E_\eta)^\vee - \alpha_x(\check{E}_\eta)(1)$ ; la page 52 demande si $\delta^\natural(E_\eta)^2 = q^{\chi^\natural(E_\eta)}$ pour $E_\eta$ autodual de poids $\rho$.

◊ non vérifié en Lean

Mathlib n'a pas les faisceaux $\ell$-adiques, leurs fonctions $L$ ni la dualité de Verdier. On se reportera aux notes de Grothendieck (60, lot 2, p. 38).

**Théorème** (Grothendieck, pages 64 à 70, majoration de la dimension cohomologique ♦). *Soit $\varphi$ une fonction sur les points d'un schéma noethérien $X$ telle que $\varphi(x) \geq \mathrm{cd}_\ell(k(x))$ en tout point et $\varphi(y) < \varphi(x) - \mathrm{cd}_\ell(\mathcal{O}_{X,\bar{y}} \otimes k(x))$ pour toute spécialisation stricte $y$ de $x$. Alors $H^i(X, F) = 0$ pour tout faisceau de $\ell$-torsion $F$ et tout $i$ supérieur au supremum de $\varphi$ sur le support de $F$.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Conjecture** (Grothendieck, page 84, dimension cohomologique et degré d'imperfection ♦). *En la caractéristique résiduelle $\ell$, la borne de la dimension cohomologique d'un schéma affine est gouvernée par le degré d'imperfection $\nu(k)$, défini par $\ell^{\nu(k)} = [k : k^\ell]$, plutôt que par la dimension : $\mathrm{cd}_\ell(X) \leq \sup(\mathrm{cd}_\ell\, k(x), \nu(V(\ell)) + 3)$, et $\mathrm{cd}_\ell(U) \leq \dim A + \nu(k) + \mathrm{cd}_\ell(k)$ pour $U$ ouvert du spectre d'un anneau local hensélien intègre $A$ de caractéristique résiduelle $\ell$ dont le corps des fractions est de caractéristique $0$.*

Mathlib n'a pas la dimension cohomologique étale. On se reportera aux notes de Grothendieck (31, lot 5, p. 84).

**Conjecture** (Grothendieck, page 22, minoration de la dimension cohomologique ♦). *Soit $A$ un anneau local noethérien intègre, de corps des fractions $K$ et de corps résiduel $k$. Pour tout premier $r$, $\mathrm{cd}_r(K) \geq \mathrm{cd}_r(k) + \dim A$, sauf peut-être si $r$ est la caractéristique de $K$, ou si $r = 2$ et qu'un point $x$ de $\mathrm{Spec}\, A$ a un corps résiduel ordonnable avec $\mathrm{cd}_2\, k(x)(\sqrt{-1})$ fini ; la seconde exception disparaît quand $A$ est régulier.*

Mathlib n'a pas la dimension cohomologique galoisienne. On se reportera aux notes de Grothendieck (31, lot 2, p. 22).

**Partie 5**

# Groupes $p$-divisibles et groupes formels

*Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici.* Les cotes de ce thème supposent les groupes de Barsotti–Tate et la théorie de Dieudonné, absents de mathlib.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 129.

**Conjecture** (Grothendieck, page 95, annulation de $\mathrm{Ext}^2$ ♦). *Si $2$ est inversible, le faisceau $\mathcal{E}\mathrm{xt}^2_{\mathbf{Z}}(G, M)$ est nul pour tout schéma en groupes commutatif fini localement libre $G$ et tout module quasi-cohérent $M$, ce qui simplifie la théorie des déformations des groupes de Barsotti–Tate pour $p \neq 2$.*

Mathlib n'a pas les Ext de schémas en groupes finis localement libres. On se reportera aux notes de Grothendieck (129, lot 5, p. 95).

**Partie 6**

# Algèbre universelle et théories

## 2 Cote 161-2 : monadicité, descente, caractérisation de Gabriel–Ulmer[3]

La cote 161-2, *Algèbre universelle [ou catégories] : notes manuscrites (s.d.)*, cent onze pages que l'inventaire date « [vers 1963-1973] », cherche ce qu'est une espèce de structure algébrique dans une catégorie et comment les modèles déterminent la théorie. Deux feuilles de travail, pages 33 et 34, notent le critère de reconnaissance d'un foncteur « tripleable », avec trois noms que la transcription lit avec doute, « Beck, Barr, Linton » (161-2, lot 2, p. 33), puis le critère de descente pour un morphisme de topos, conclu par « $B_\pi \xrightarrow{\simeq} B$ (th) » (161-2, lot 2, p. 34). La page 60 énonce un corollaire sur les catégories cocomplètes, « Ce sont ces $E$ qu'il faudrait appeler « accessibles » » (161-2, lot 3, p. 60), que la page 61 démontre (161-2, lot 4, p. 61). La page 77 établit, pour les théories définies par limites finies, le lemme $\mathrm{Ind}(\Sigma) \simeq S$ (161-2, lot 4, p. 77).
*Conventions.* Les notations de la section 11 valent ici : pour une adjonction $f \dashv g$, $f : A \to B$, $h : A \to \varphi$-**Coalg** est le foncteur de comparaison vers les coalgèbres de $\varphi = fg$ ; dualement, pour $F \dashv U$, $U : A \to B$, le foncteur de comparaison va de $A$ dans les algèbres de la monade $\mathbb{T} = UF$. Une double flèche est *réflexive* si ses deux flèches ont une section commune, *coréflexive* si elles ont une rétraction commune.

**Énoncé** (Théorème de monadicité, page 33 ; théorème de Beck)**.** *Un foncteur $U : A \to B$ admettant un adjoint à gauche $F$ est monadique ($A \simeq \mathrm{Alg}(\mathbb{T})$, $\mathbb{T} = UF$) si $U$ est conservatif et si $A$ a et $U$ préserve les coégalisateurs des paires réflexives.*

**Énoncé** (Critère de descente, page 34)**.** *Soit $f$ un morphisme de topos, d'image inverse $f^* : B' \to B$, et $\pi = f^* f_*$. Si $f^*$ est conservatif, le foncteur de comparaison $B' \to B_\pi$, $X \mapsto f^* X$, vers la catégorie des $\pi$-coalgèbres, est une équivalence.*

**Lemme 2.1.** *Soit $f \dashv g$ une adjonction, $f : A \to B$. Si $f$ est conservatif, si $A$ a les noyaux des doubles flèches coréflexives et si $f$ y commute, le foncteur de comparaison $h$ est une équivalence.*

*Démonstration.* Pour toute coalgèbre $(X, a)$, la double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ est coréflexive (lemme 11.2) ; elle a donc un noyau, auquel $f$ commute. Le lemme 11.3 (3) conclut. C'est le dual du théorème de monadicité « grossier » de Beck, dans sa thèse de 1967 [7]. □

*Démonstration du théorème de monadicité.* C'est l'énoncé dual. Le foncteur $U^\circ : A^\circ \to B^\circ$ est adjoint à gauche de $F^\circ$ ; la monade $UF$ sur $B$ devient la comonade $U^\circ F^\circ$ sur $B^\circ$, dont les coalgèbres sont les opposées des $\mathbb{T}$-algèbres, et le foncteur de comparaison devient celui du lemme 2.1. Les coégalisateurs de paires réflexives de $A$ sont les noyaux de paires coréflexives de $A^\circ$, et $U^\circ$ est conservatif. Le lemme 2.1 s'applique. □

[3] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder161_2.lean`.

*Démonstration du critère de descente.* On démontre davantage : soit $f^* \dashv f_*$ une adjonction quelconque, $f^* : B' \to B$, où $B'$ a les limites finies et $f^*$ est exact à gauche et conservatif. Alors $B'$ a les noyaux de toutes les doubles flèches, en particulier des coréflexives, et $f^*$, exact à gauche, y commute. Le lemme 2.1 donne l'équivalence $B' \simeq B_\pi$. Pour un morphisme de topos, $B'$ a les limites finies et $f^*$ est exact à gauche par définition. □

**Définition.** Soient $E$ une catégorie localement petite et $\kappa$ un cardinal régulier. Un objet $X$ de $E$ est *$\kappa$-présentable* si $\mathrm{Hom}_E(X, -)$ commute aux limites inductives $\kappa$-filtrantes, et *présentable* s'il l'est pour un $\kappa$ ; c'est l'« accessible » de la page. Une sous-catégorie pleine $\mathcal{C}$ de $E$ est *dense* si, pour tout $X$, la flèche canonique $\varinjlim_{\mathcal{C}_{/X}} Y \to X$ est un isomorphisme ; c'est la condition a) par laquelle la page 56 définit une sous-catégorie « strictement génératrice ». La catégorie $E$ est *localement présentable* si elle est cocomplète et s'il existe un cardinal régulier $\kappa$ et un petit ensemble d'objets $\kappa$-présentables dont tout objet est limite inductive $\kappa$-filtrante ; c'est ce que dit « $E$ est équivalente à un $\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{C})$, $\mathcal{C}$ petite ».

**Énoncé** (Corollaire, pages 60 et 61 ; théorème de Gabriel–Ulmer)**.** *Une catégorie localement petite et cocomplète $E$ est localement présentable si et seulement si elle admet une petite sous-catégorie pleine dense formée d'objets présentables.*

*Démonstration.* Supposons $E$ localement $\kappa$-présentable. La sous-catégorie pleine $P$ des objets $\kappa$-présentables est essentiellement petite et dense : c'est classique (Gabriel et Ulmer [24] ; Adámek et Rosický [1]). Soit $Q \subseteq P$ une petite sous-catégorie pleine contenant un représentant de chaque classe d'isomorphisme ; l'inclusion $Q \to P$ est une équivalence, et le composé d'une équivalence et d'un foncteur dense est dense, donc $Q$ est dense dans $E$. Ses objets sont $\kappa$-présentables, donc présentables.

Réciproquement, soit $P$ une petite sous-catégorie pleine dense dont chaque objet $X$ est $\kappa_X$-présentable pour un cardinal régulier $\kappa_X$. Comme $P$ est petite, la famille des $\kappa_X$ est majorée par un cardinal $c$. Soit $\kappa_0$ le successeur de $\max(c, \aleph_0)$ ; c'est un cardinal régulier, comme tout successeur d'un cardinal infini. Toute limite inductive $\kappa_0$-filtrante étant $\kappa_X$-filtrante, chaque $X \in P$ est $\kappa_0$-présentable. Une sous-catégorie dense est fortement génératrice (classique). Or une catégorie cocomplète qui admet un petit ensemble fortement générateur d'objets $\kappa_0$-présentables est localement $\kappa_0$-présentable : c'est le théorème 1.20 d'Adámek et Rosický [1]. Donc $E$ est localement présentable. □

**Énoncé** (Lemme, page 77)**.** *Soient $R$ une petite catégorie à limites finies, $S = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{lex}}(R, \mathrm{Ens})$ et $\Sigma \simeq R^\circ \subset S$ la sous-catégorie pleine des structures représentables. Le foncteur d'inclusion $\Sigma \to S$ induit une équivalence* $\mathrm{Ind}(\Sigma) \simeq S$.

*Démonstration.* On identifie $S$ aux préfaisceaux $X : \Sigma^\circ \to \mathrm{Ens}$ exacts à gauche, la catégorie $\Sigma = R^\circ$ ayant les limites inductives finies, et $\mathrm{Ind}(\Sigma)$ à la sous-catégorie pleine des préfaisceaux sur $\Sigma$ qui sont limites inductives filtrantes de représentables. Il suffit de montrer que ces deux sous-catégories pleines ont les mêmes objets. Un représentable est exact à gauche, et les limites inductives filtrantes commutent aux limites projectives finies dans Ens ; tout ind-objet est donc exact à gauche. Réciproquement, soit $X$ exact à gauche. Tout préfaisceau est la limite inductive des représentables sur sa catégorie des éléments $\Sigma_{/X}$, et celle-ci est filtrante : elle est non vide, car $X$ envoie l'objet initial de $\Sigma$ sur un point ; deux éléments $x \in X(a)$, $y \in X(b)$ proviennent de $X(a \sqcup b) = X(a) \times X(b)$ ; deux flèches $u, v : (a, x) \rightrightarrows (b, y)$ sont égalisées par la flèche vers le coégalisateur $c$ de $u, v$, puisque $X(c)$ est le noyau de $X(u), X(v) : X(b) \rightrightarrows X(a)$, qui

contient $y$. C'est le fait classique que les ind-objets d'une petite catégorie à limites inductives finies sont ses préfaisceaux exacts à gauche (Grothendieck et Verdier, SGA 4, exposé I, § 8 [2]), que la preuve vérifiée invoque. □

*Remarque.* Le critère de descente n'utilise pas la structure de topos. Il vaut pour tout foncteur adjoint à gauche, exact à gauche et conservatif, défini sur une catégorie à limites finies. L'équivalence a pour source $B'$, alors que la page écrit $B$ ; la lecture l'a corrigé. La traduction de la descente en termes de monades a été publiée par Bénabou et Roubaud en 1970 [8] ; l'inventaire date la cote « [vers 1963-1973] ».

*Remarque.* Le corollaire est le théorème de caractérisation des catégories localement présentables de Gabriel et Ulmer, publié en 1971 [24] ; l'inventaire date la cote « [vers 1963-1973] ». Il est démontré ici pour la notion moderne ; le $\mathrm{Ind}_\pi(\mathcal{C})$ de SGA 4 que la page emploie n'est pas formalisé. Le lemme de la page 77 est le cas des limites finies de la dualité de Gabriel–Ulmer.

*Remarque.* Le théorème de descente pour $f^* \dashv f_*$, avec $f^*$ exact à gauche et conservatif, figure déjà dans mathlib comme cas du critère de comonadicité.

Ne sont pas démontrés ici : l'adjonction entre théories de Lawvere et monades (page 33) ; le théorème de la page 54 et le corollaire de la page 55 ; le lemme de la page 59, sur $\mathrm{Ind}_\pi$ et les filtrations cardinales ; le corollaire de la page 77 ; la liste de la page 56 ; la $\Delta$-enveloppe (pages 3 à 31) ; les topos classifiants (pages 17 à 24 et 36 à 52) ; les pages 62 à 76 et 78 à 111, dont le corps universel (pages 92 à 95).

**Conjecture 2.2** (Grothendieck, pages 39, 41 et 42, deux topos classifiants non cohérents ♦)**.** *Les sous-topos classifiants des anneaux à spectre irréductible (nilradical premier) et des anneaux à spectre de dimension zéro ne sont pas cohérents : les topologies qui les présentent sur les schémas affines de type fini sur* $\mathbf{Z}$ *ne sont pas quasi-compactes, bien que chacun soit un sous-topos du topos classifiant cohérent des anneaux. La page demande s'ils ont assez de points.*

**Conjecture 2.3** (Grothendieck, pages 47 à 49, anneaux de caractéristique définie ♦)**.** *Les anneaux localement de caractéristique $p$ pour un nombre premier $p$ ou de caractéristique $0$ sont classifiés par un sous-topos du topos classifiant des anneaux qui n'est pas cohérent et n'est pas défini par une condition ouverte : c'est la réunion du sous-topos ouvert $X_{\mathrm{car}>0} = \bigcup_p X_{\mathbf{Z}/p}$ et du sous-topos non ouvert $X_{\mathbf{Q}} = \bigcap_n X_{\mathbf{Z}[1/n]}$. La réunion de deux sous-topos $V$, $W$ d'un topos s'obtient par recollement le long d'un ouvert dès qu'il existe des ouverts $Z'$ de $V$ et $Z''$ de $W$ tels que $Z'' \wedge V$ soit ouvert dans $V$, $Z' \wedge W$ ouvert dans $W$, $V = \sup(Z', Z'' \wedge V)$ et $W = \sup(Z'', Z' \wedge W)$.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 47 et 48). Le critère de recollement y est un brouillon, mis en forme par l'édition

**Conjecture 2.4** (Grothendieck, pages 92 à 95, le corps universel ♦)**.** *Le topos classifiant des corps est le topos des faisceaux sur l'opposée de la catégorie des anneaux commutatifs absolument plats de présentation finie, pour la topologie engendrée par les recouvrements* $\operatorname{Spec} A_f \sqcup \operatorname{Spec} A/f \to \operatorname{Spec} A$*, le faisceau structural étant le corps générique.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 41, 42 et 92 à 95). L'identification des pseudo-corps aux anneaux absolument plats est de l'édition

**Partie 7**

# Analyse fonctionnelle

## 3 Cote 1 : le système d'inégalités des valeurs singulières, cas $m \leq 2$[4]

La cote 1, *Analyse fonctionnelle : notes manuscrites (s.d.), lettre (1953)*, compte cent quarante-neuf pages, que l'inventaire date de 1953. Les pages 70 à 73 sont une mise au net sur les puissances extérieures des opérateurs à trace. La page 71 démontre, pour $u$, $v$ à trace, l'inégalité $\alpha_n(|u+v|) \leq \sum_p \alpha_p(|u|)\,\alpha_{n-p}(|v|)$ (corollaire 2, formule (14), encadrée), par le développement de $\Lambda^n(u+v)$ en produits $(\Lambda^p u) \wedge (\Lambda^{n-p} v)$. Elle énonce ensuite le théorème 2 pour $u$, $v$ compacts : la forme produit (15), encadrée, et « plus précisément » le système (16), encadré lui aussi,

$$\sigma_n^m(u+v) \leq \sum_{p=0}^{m} \sigma_n^p(u)\,\sigma_n^{m-p}(v), \qquad 0 \leq m \leq n,$$

où $\sigma_n^m(w)$ est la fonction symétrique élémentaire de degré $m$ des $n$ premières valeurs singulières de $w$ (formule (17)). La marge gauche porte « à réviser » le long du théorème (1, lot 4, p. 71). La page 72 démontre (16) par la proposition 3, $\sigma_n^m(u) = \sup |\alpha_m(v_n u)|$ sur les contractions $v_n$ de rang $\leq n$, et par (14) appliquée à $wu$ et $wv$ (1, lot 4, p. 72). La page 73 juge le système, en mots lus avec doute, « les plus fortes possibles » des inégalités qui majorent les $\rho_i(u+v)$ en fonction des $\rho_i(u)$ et des $\rho_i(v)$ (1, lot 4, p. 73).

La piste porte sur le système (16) tout entier. Elle est démontrée ici en dimension finie pour $m \leq 2$ et pour tout $n$ : pour $m = 0$ les deux membres valent $1$, pour $m = 1$ c'est l'inégalité de Ky Fan, et le cas $m = 2$ suit la voie de la page par $\Lambda^2$, écrite avec des mineurs d'ordre $2$. On démontre aussi que le système, s'il vaut pour tous les $m \leq n$, entraîne la forme produit (15), d'où (15) pour $n \leq 2$.

*Conventions.* Les espaces $E$ et $F$ sont des espaces préhilbertiens de dimension finie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $d = \dim E$. Pour $T : E \to F$ linéaire, les valeurs singulières $s_0(T) \geq s_1(T) \geq \cdots$ sont les racines carrées des valeurs propres de $T^*T$, rangées par ordre décroissant et répétées selon leur multiplicité, prolongées par $0$ au-delà de l'indice $d-1$. C'est la définition de la bibliothèque, qui indexe à partir de $0$ ; les $\rho_1, \ldots, \rho_n$ de la page sont $s_0, \ldots, s_{n-1}$. On note $(e_j)_{j<d}$ une base orthonormée de vecteurs propres de $T^*T$, rangée dans le même ordre, de sorte que $T^*Te_j = s_j(T)^2 e_j$, et l'on pose $f_j = s_j(T)^{-1}\,Te_j$, avec $f_j = 0$ lorsque $s_j(T) = 0$. Enfin

$$\sigma_n^m(T) = \sum_{\substack{t \subseteq \{0,\ldots,n-1\} \\ |t| = m}} \prod_{i \in t} s_i(T).$$

**Énoncé** (Pages 71 et 72, le système (16) pour $m \leq 1$ ♦). *Soient $u, v : E \to F$ linéaires et $n \geq 0$.*

1. *(Ky Fan)* $\displaystyle\sum_{j<n} s_j(u+v) \leq \sum_{j<n} s_j(u) + \sum_{j<n} s_j(v)$.

[4] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder1.lean`.

*2. Pour $m \in \{0,1\}$, $\sigma_n^m(u+v) \le \sum_{p=0}^m \sigma_n^p(u)\,\sigma_n^{m-p}(v)$.*

**Énoncé** (Page 71, du système (16) à la forme produit (15)). *Soient $u, v : E \to F$ linéaires et $n \ge 0$. Si $\sigma_n^m(u+v) \le \sum_{p=0}^m \sigma_n^p(u)\,\sigma_n^{m-p}(v)$ pour tout $m \le n$, alors pour tout $r \ge 0$*

$$\prod_{i<n}\bigl(1 + r\,s_i(u+v)\bigr) \le \prod_{i<n}\bigl(1 + r\,s_i(u)\bigr)\prod_{i<n}\bigl(1 + r\,s_i(v)\bigr).$$

*En particulier $1 + r\,s_0(u+v) \le (1 + r\,s_0(u))(1 + r\,s_0(v))$.*

**Lemme 3.1.** *Soient $(y_i)_{i\in I}$ une famille finie de vecteurs deux à deux orthogonaux, de normes $\le 1$, et $z$ un vecteur. Alors $\sum_i |\langle y_i, z\rangle|^2 \le \|z\|^2$.*

*Démonstration.* Posons $c_i = \langle y_i, z\rangle$, $p = \sum_i c_i y_i$ et $S = \sum_i |c_i|^2$. On a $\langle p, z\rangle = \sum_i \bar{c}_i c_i = S$. Par l'orthogonalité, $\langle y_i, p\rangle = c_i \|y_i\|^2$, d'où $\|p\|^2 = \sum_i |c_i|^2 \|y_i\|^2 \le S$. L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne $S \le \|p\|\,\|z\|$, donc $S^2 \le \|p\|^2\|z\|^2 \le S\,\|z\|^2$. Si $S > 0$, on divise par $S$ ; si $S = 0$, il n'y a rien à démontrer. □

**Lemme 3.2.** *Soient $(s_j)_{j\ge 0}$ une suite réelle positive et décroissante, et $c_0, \dots, c_{d-1}$ des réels de $[0,1]$ de somme $\le n$. Alors $\sum_{j<d} s_j c_j \le \sum_{j<n} s_j$.*

*Démonstration.* Posons $\varepsilon_j = 1$ si $j < n$ et $\varepsilon_j = 0$ sinon. Pour tout $j < d$, on a $s_j c_j \le \varepsilon_j s_j + s_n(c_j - \varepsilon_j)$. Si $j < n$, cela s'écrit $s_j(c_j - 1) \le s_n(c_j - 1)$, qui vient de $s_j \ge s_n$ et $c_j \le 1$ ; si $j \ge n$, cela s'écrit $s_j c_j \le s_n c_j$, qui vient de $s_j \le s_n$ et $c_j \ge 0$. En sommant, $\sum_j s_j c_j \le \sum_{j<\min(n,d)} s_j + s_n\bigl(\sum_j c_j - \min(n,d)\bigr)$. La somme des $c_j$ est $\le n$ par hypothèse et $\le d$ puisque chaque $c_j$ est $\le 1$ ; le second terme est donc $\le 0$, et le premier est $\le \sum_{j<n} s_j$ puisque les $s_j$ sont positifs. □

**Lemme 3.3.** *Soit $T : E \to F$ linéaire. Pour tous $j$, $k < d$, $\langle Te_j, Te_k\rangle = s_k(T)^2\langle e_j, e_k\rangle$. En conséquence $\|Te_j\| = s_j(T)$, $Te_j = s_j(T)\,f_j$, les $f_j$ sont deux à deux orthogonaux et de normes $\le 1$, et $\langle f_j, Te_j\rangle = s_j(T)$.*

*Démonstration.* On a $\langle Te_j, Te_k\rangle = \langle e_j, T^*Te_k\rangle = s_k(T)^2\langle e_j, e_k\rangle$. Pour $j = k$, cela donne $\|Te_j\|^2 = s_j(T)^2$. Si $s_j(T) = 0$, alors $Te_j = 0 = s_j(T)f_j$ ; sinon $s_j(T)f_j = Te_j$ par définition. Pour $j \ne k$, $\langle f_j, f_k\rangle$ est un multiple de $\langle Te_j, Te_k\rangle = 0$. La norme de $f_j$ vaut $s_j(T)^{-1}s_j(T)$, c'est-à-dire 1, ou 0 si $s_j(T) = 0$. Enfin $\langle f_j, Te_j\rangle = s_j(T)^{-1}\|Te_j\|^2 = s_j(T)$, les deux membres étant nuls si $s_j(T) = 0$. □

**Lemme 3.4** (principe de Ky Fan, majoration). *Soient $T : E \to F$ linéaire, $I$ un ensemble fini à au plus $n$ éléments, $(x_i)_{i\in I}$ dans $E$ et $(y_i)_{i\in I}$ dans $F$ deux familles chacune formée de vecteurs deux à deux orthogonaux de normes $\le 1$. Alors*

$$\Bigl|\sum_{i\in I}\langle y_i, Tx_i\rangle\Bigr| \le \sum_{j<n} s_j(T).$$

*Démonstration.* Écrivons $s_j = s_j(T)$. En développant $x_i = \sum_j \langle e_j, x_i\rangle e_j$ et en utilisant $Te_j = s_j f_j$ (lemme 3.3),

$$\sum_i \langle y_i, Tx_i\rangle = \sum_{j<d}\sum_i \langle e_j, x_i\rangle\, s_j\, \langle y_i, f_j\rangle.$$

Posons $a_j = \sum_i |\langle x_i, e_j\rangle|^2$ et $b_j = \sum_i |\langle y_i, f_j\rangle|^2$. Par l'inégalité $\alpha\beta \le (\alpha^2 + \beta^2)/2$, le module du membre de droite est au plus $\sum_j s_j c_j$, où $c_j = (a_j + b_j)/2$. Le lemme 3.1, appliqué à la

famille $(x_i)$ et à $z = e_j$, donne $a_j \le 1$, et appliqué à $(y_i)$ et à $z = f_j$, donne $b_j \le \|f_j\|^2 \le 1$. Appliqué à la famille orthonormée $(e_j)$ et à $z = x_i$, il donne $\sum_j |\langle e_j, x_i\rangle|^2 \le \|x_i\|^2 \le 1$, d'où $\sum_j a_j \le |I| \le n$ ; appliqué à la famille $(f_j)$ et à $z = y_i$, il donne de même $\sum_j b_j \le n$. Les $c_j$ sont donc dans $[0,1]$, de somme $\le n$, et le lemme 3.2 conclut, la suite $(s_j)$ étant positive et décroissante. □

*Démonstration du premier énoncé.* (1) Appliquons le lemme 3.3 à $w = u+v$, et soit $I$ l'ensemble des $j < d$ tels que $j < n$ ; il a $\min(n,d)$ éléments. Comme $s_j(w) = 0$ pour $j \ge d$, $\sum_{j<n} s_j(w) = \sum_{j\in I} s_j(w) = \sum_{j\in I}\langle f_j, we_j\rangle$, et cette somme est égale à

$$\sum_{j\in I}\langle f_j, ue_j\rangle + \sum_{j\in I}\langle f_j, ve_j\rangle.$$

Les familles $(e_j)$ et $(f_j)$, indexées par $I$, vérifient les hypothèses du lemme 3.4. Appliqué à $T = u$ puis à $T = v$, il majore les deux sommes en module par $\sum_{j<n} s_j(u)$ et $\sum_{j<n} s_j(v)$.

(2) On a $\sigma_n^0 = 1$, la seule partie à 0 élément étant vide, et $\sigma_n^1(T) = \sum_{j<n} s_j(T)$. Pour $m = 0$, l'inégalité est $1 \le 1$. Pour $m = 1$, son second membre est $\sigma_n^1(v) + \sigma_n^1(u)$, et c'est (1). □

*Démonstration du second énoncé.* En développant le produit,

$$\textstyle\prod_{i<n}(1 + ra_i) = \sum_{m=0}^{n} r^m e_m(a_0, \dots, a_{n-1}),$$

où $e_m$ est la fonction symétrique élémentaire de degré $m$ ; appliqué aux valeurs singulières, cela donne $\prod_{i<n}(1 + rs_i(T)) = \sum_{m\le n} r^m \sigma_n^m(T)$. Posons $A_m = \sigma_n^m(u)$, $B_m = \sigma_n^m(v)$ et $C_m = \sigma_n^m(u+v)$, tous positifs. L'hypothèse donne

$$\sum_{m\le n} r^m C_m \le \sum_{m\le n}\sum_{p\le m} r^p A_p\, r^{m-p} B_{m-p}.$$

En échangeant les sommations et en posant $k = m - p$, le second membre est la somme des $r^p A_p\, r^k B_k$ sur les couples $(p,k)$ tels que $p + k \le n$. Les termes étant positifs, elle est au plus la somme sur tous les couples $p, k \le n$, qui vaut $\big(\sum_{p\le n} r^p A_p\big)\big(\sum_{k\le n} r^k B_k\big)$. Pour $n = 1$, l'hypothèse porte sur $m \in \{0,1\}$ et c'est le premier énoncé. □

*Remarque.* Pour $m = 1$, le système (16) est l'inégalité de Ky Fan, publiée en 1951 [22] ; l'inventaire date la cote de 1953. Sa démonstration suit ici la voie classique par le principe du maximum. La bibliothèque utilisée définit les valeurs singulières d'une application linéaire entre espaces de dimension finie et en démontre la décroissance, mais elle ne contient ni le principe de Ky Fan ni son inégalité. Le lemme 3.4 ne demande pas que les familles soient orthonormées : il suffit qu'elles soient orthogonales et de normes $\le 1$, ce qui permet d'y mettre la famille $(f_j)$, dont certains termes peuvent être nuls. La démonstration ne suit pas celle des pages 71 et 72, qui passe par les puissances extérieures, le corollaire 2 et la proposition 3. Pour $m = 1$, celle de la page revient au même principe : $\alpha_1(|wu|) = \operatorname{Tr}|wu|$ avec $w$ de rang $\le n$ et de norme $\le 1$.

*Remarque.* Le second énoncé est l'implication que la page énonce par « et plus précisément » : le système (16) donne (15) coefficient par coefficient, sans autre hypothèse que la positivité des valeurs singulières. La réciproque n'est pas démontrée ici ; la piste affirme que le système est strictement plus fort que (15), et ce point n'est pas vérifié. Pour $n = 1$, (15) se réduit à

$s_0(u+v) \le s_0(u) + s_0(v)$, qui est l'inégalité triangulaire pour la norme d'opérateur. La ligne coupée au bas de la page 71 mentionne (16) et $n = 1$ ; le reste de la ligne est illisible.

**Théorème 3.5** (Grothendieck, pages 71 et 72, le système (16) pour $m = 2$ ♦■■). *Soient $u, v : E \to F$ linéaires et $n \ge 0$. Alors*

$$\sigma_n^2(u+v) \le \sigma_n^2(u) + \sigma_n^1(u)\,\sigma_n^1(v) + \sigma_n^2(v).$$

*Le système (16) vaut donc pour $m \le 2$ et tout $n$, et la forme produit (15) pour $n \le 2$.*

*Notations.* Pour une partie finie $I$, des familles $(x_i)_{i\in I}$ dans $E$, $(y_i)_{i\in I}$ dans $F$ et $T, T' : E \to F$, on pose

$$B(T,T') = \sum_{i,j\in I} \big(\langle y_i, Tx_i\rangle\langle y_j, T'x_j\rangle - \langle y_i, Tx_j\rangle\langle y_j, T'x_i\rangle\big),$$

somme des mineurs principaux mixtes d'ordre 2 des matrices $(\langle y_i, Tx_j\rangle)$ et $(\langle y_i, T'x_j\rangle)$, prise sur les couples ordonnés. Pour des familles $(g_k)$, $(g'_l)$, $(h_i)$ d'un même espace, on pose $M_{kl,ij} = \langle g_k, h_i\rangle\langle g'_l, h_j\rangle - \langle g_k, h_j\rangle\langle g'_l, h_i\rangle$, qui est $\langle g_k \wedge g'_l, h_i \wedge h_j\rangle$ au sens de $\Lambda^2$, puis $\Lambda_{kl} = \sum_{i,j\in I} |M_{kl,ij}|^2$ et $p_k = \sum_{i\in I} |\langle g_k, h_i\rangle|^2$.

**Lemme 3.6** (Lagrange). *Pour des scalaires $a_i$, $b_i$ indexés par un ensemble fini $I$, $\sum_{i,j\in I} |a_i b_j - a_j b_i|^2 \le 2\sum_i |a_i|^2 \sum_i |b_i|^2$. En particulier $\Lambda_{kl} \le 2\, p_k\, p'_l$, où $p'_l$ est formé avec $(g'_l)$.*

*Démonstration.* On développe $|a_i b_j - a_j b_i|^2 = |a_i|^2|b_j|^2 + |a_j|^2|b_i|^2 - 2\,\mathrm{Re}(z_i \bar z_j)$ avec $z_i = \bar a_i b_i$. En sommant, le terme croisé donne $2\,\mathrm{Re}\big(\sum_i z_i \cdot \overline{\sum_j z_j}\big) = 2\,|\sum_i z_i|^2 \ge 0$. □

**Lemme 3.7** (poids pour $\sigma^2$). *Soient $K$ un ensemble fini, $G \subseteq K$, des réels $s_k \ge 0$ et $\theta \ge 0$ avec $s_k \ge \theta$ pour $k \in G$ et $s_k \le \theta$ pour $k \notin G$. Soient $(\alpha_{kl})$ symétrique, à coefficients dans $[0,1]$, de diagonale nulle, et $p_k \in [0,1]$ avec $\sum_k p_k \le |G|$ et $\sum_l \alpha_{kl} \le (|G|-1)\,p_k$ pour tout $k$. Alors*

$$\sum_{k,l} \alpha_{kl}\, s_k s_l \le \Big(\sum_{k\in G} s_k\Big)^2 - \sum_{k\in G} s_k^2.$$

*Démonstration.* Posons $g = |G|$, $m_k = \min(s_k, \theta)$ et $d_k = s_k - m_k$. On a $0 \le m_k \le \theta$, $d_k \ge 0$, $m_k = \theta$ sur $G$ et $d_k = 0$ hors de $G$ ; soit $D = \sum_{k\in G} d_k$. On développe $s_k s_l = m_k m_l + m_k d_l + d_k m_l + d_k d_l$ et l'on majore les quatre sommes. D'abord $\sum \alpha_{kl} m_k m_l \le \theta^2 \sum_k (g-1) p_k \le \theta^2 (g-1) g$ ; si $g = 0$, la somme des $p_k$ est nulle. Ensuite $\sum \alpha_{kl} m_k d_l \le \theta \sum_l d_l \sum_k \alpha_{lk} \le \theta \sum_l d_l (g-1) p_l \le \theta (g-1) D$, car $d_l = 0$ hors de $G$ et $g \ge 1$ dès que $G$ a un élément ; de même pour $\sum \alpha_{kl} d_k m_l$. Enfin $\sum \alpha_{kl} d_k d_l \le \sum_{k\ne l} d_k d_l = D^2 - \sum_{k\in G} d_k^2$. Le total vaut $g(g-1)\theta^2 + 2(g-1)\theta D + D^2 - \sum_G d_k^2$, et c'est $(g\theta + D)^2 - \sum_G (\theta + d_k)^2$, le second membre. □

**Lemme 3.8** (Cauchy–Binet pour les mineurs d'ordre 2). *Dans un anneau commutatif, si $A_{ij} = \sum_k s_k P_{ik} Q_{kj}$ et $C_{ij} = \sum_l t_l P'_{il} Q'_{lj}$, alors*

$$2\sum_{i,j} (A_{ii}C_{jj} - A_{ij}C_{ji}) = \sum_{k,l} s_k t_l \sum_{i,j} (P_{ik}P'_{jl} - P_{jk}P'_{il})(Q_{ki}Q'_{lj} - Q_{kj}Q'_{li}).$$

*Démonstration.* On développe le produit de droite en quatre termes ; l'échange de $i$ et $j$ identifie le quatrième au premier et le troisième au deuxième. Le membre de gauche, développé par bilinéarité, donne les mêmes termes. □

*Démonstration du troisième énoncé.* Si $n = 0$, les deux membres sont nuls. Sinon, soient $w = u + v$, $I$ l'ensemble des $j < d$ tels que $j < n$, $x_i = e_i(w)$ et $y_i = f_i(w)$ pour $i \in I$ ; ces familles sont orthogonales et de normes $\leq 1$ (lemme 3.3), et $|I| \leq n$.

*Le cas $T = T' = w$.* On a $\langle f_i(w), we_j(w)\rangle = s_i(w)$ si $i = j$ et 0 sinon. Donc $B(w,w) = \sum_{i,j\in I} s_i s_j - \sum_{i\in I} s_i^2 = (\sum_I s_i)^2 - \sum_I s_i^2$, avec $s_i = s_i(w)$. Comme $s_i(w) = 0$ pour $i \geq d$, cette quantité est $(\sum_{i<n} s_i)^2 - \sum_{i<n} s_i^2 = 2\sigma_n^2(w)$.

*Bilinéarité.* $B(w,w) = B(u,u) + B(u,v) + B(v,u) + B(v,v)$.

*Majoration générale.* Pour $T$, écrivons $s_k = s_k(T)$, $e_k = e_k(T)$, $f_k = f_k(T)$, et de même $t_l$, $e'_l$, $f'_l$ pour $T'$. Le développement de $x$ sur $(e_k)$ donne $\langle y, Tx\rangle = \sum_k s_k \overline{\langle f_k, y\rangle}\, \langle e_k, x\rangle$. Le lemme 3.8, avec $P_{ik} = \overline{\langle f_k, y_i\rangle}$ et $Q_{kj} = \langle e_k, x_j\rangle$, donne

$$2B(T,T') = \sum_{k,l} s_k t_l \sum_{i,j\in I} \overline{M^f_{kl,ij}}\, M^e_{kl,ij},$$

où $M^f$ est formé avec $(f_k)$, $(f'_l)$, $(y_i)$ et $M^e$ avec $(e_k)$, $(e'_l)$, $(x_i)$. Par $|ab| \leq (|a|^2 + |b|^2)/2$, on obtient $|B(T,T')| \leq \frac{1}{4}\sum_{k,l} s_k t_l (\Lambda^f_{kl} + \Lambda^e_{kl})$.

*Le terme mixte.* Le lemme 3.6 donne $\Lambda^f_{kl} \leq 2q_k q'_l$ et $\Lambda^e_{kl} \leq 2p_k p'_l$, où $q_k$, $q'_l$, $p_k$, $p'_l$ sont formés avec les familles correspondantes. D'où $|B(T,T')| \leq \frac{1}{2}\big[(\sum_k s_k q_k)(\sum_l t_l q'_l) + (\sum_k s_k p_k)(\sum_l t_l p'_l)\big]$. Comme dans la démonstration du lemme 3.4, les poids $p_k$, $q_k$ sont dans $[0,1]$ et de somme $\leq |I| \leq n$, et le lemme 3.2 donne $\sum_k s_k p_k \leq \sigma_n^1(T)$, et de même pour les trois autres sommes. Donc $|B(T,T')| \leq \sigma_n^1(T)\,\sigma_n^1(T')$.

*Le terme pur.* Prenons $T' = T$ et $\alpha_{kl} = \Lambda^e_{kl}/2$. La matrice $(\alpha_{kl})$ est symétrique ($M^e_{lk,ij} = -M^e_{kl,ij}$), de diagonale nulle ($M^e_{kk,ij} = 0$) et à coefficients dans $[0,1]$ par le lemme 3.6. Pour ses lignes, on écrit $M^e_{kl,ij} = \langle e_l, z\rangle$ avec $z = \langle e_k, x_i\rangle x_j - \langle e_k, x_j\rangle x_i$ ; le lemme 3.1 appliqué à la famille $(e_l)$ donne $\sum_l |M^e_{kl,ij}|^2 \leq \|z\|^2$, et $\|z\|^2 \leq |\langle e_k, x_i\rangle|^2 + |\langle e_k, x_j\rangle|^2$ si $i \neq j$, tandis que $z = 0$ si $i = j$. En sommant sur $i \neq j$, $\sum_l \alpha_{kl} \leq (|I|-1)\,p_k$. Le lemme 3.7, appliqué avec $G = I$ et $\theta = s_{n-1}(T)$ (la suite est décroissante, donc $s_k \geq \theta$ pour $k < n$ et $s_k \leq \theta$ pour $k \geq n$), donne $\sum_{k,l} \alpha_{kl} s_k s_l \leq (\sum_I s_k)^2 - \sum_I s_k^2 = 2\sigma_n^2(T)$. Le même raisonnement vaut pour $\Lambda^f/2$, avec la famille $(f_l)$ dans le lemme 3.1. Donc $|B(T,T)| \leq \frac{1}{2}(2\sigma_n^2(T) + 2\sigma_n^2(T)) = 2\sigma_n^2(T)$.

*Conclusion.* $2\sigma_n^2(w) = |B(w,w)| \leq 2\sigma_n^2(u) + 2\sigma_n^1(u)\sigma_n^1(v) + 2\sigma_n^2(v)$. Avec le premier énoncé, cela donne (16) pour $m \leq 2$, et le second énoncé donne (15) pour $n \leq 2$, l'hypothèse portant sur $m \leq n \leq 2$. □

*Remarque.* La démonstration suit la voie de la page 71 par $\Lambda^2$ sans construire l'espace hilbertien $\Lambda^2 E$ : le produit scalaire $\langle a \wedge b, c \wedge d\rangle = \langle a,c\rangle\langle b,d\rangle - \langle a,d\rangle\langle b,c\rangle$ y est remplacé par les mineurs $M_{kl,ij}$, et la formule de Cauchy–Binet et l'identité de Lagrange tiennent lieu de structure hilbertienne. Le terme mixte $B(u,v) + B(v,u)$ correspond à $u \wedge v + v \wedge u$, et sa borne $2\,\sigma_n^1(u)\sigma_n^1(v)$ est celle que donne la constante $p!\,q!/(p+q)! = 1/2$ de la page pour $p = q = 1$. Le terme pur $|B(T,T)| \leq 2\sigma_n^2(T)$ est la majoration de la proposition 3 pour $m = 2$, restreinte aux contractions de la forme $\sum_i x_i\langle y_i, \cdot\rangle$ à familles orthogonales. L'inégalité de Ky Fan appliquée à $\Lambda^2 T$ n'y suffirait pas : elle majore par la somme des $\binom{n}{2}$ plus grands produits $s_i s_j$, qui peut dépasser $\sigma_n^2(T)$ (pour $n = 3$ et $s = (2,1,1,1)$, elle vaut 6 et $\sigma_3^2 = 5$). C'est la majoration des lignes $\sum_l \alpha_{kl} \leq (|I|-1)\,p_k$, propre aux vecteurs décomposables, qui permet le lemme 3.7. L'énoncé vaut tel que la page l'écrit pour $m = 2$, sans hypothèse supplémentaire.

Ne sont pas démontrés ici : le système (16) pour $3 \leq m \leq n$, qui demanderait les mineurs d'ordre $m$ et la borne $p!\,q!/(p+q)!$ générale (proposition 2 et corollaire 2 de la page 71) ; la proposition 3 en général (la minoration, et les contractions de rang $\leq n$ quelconques) ; la

forme produit (15) pour $n \geq 3$ ; le passage de la dimension finie aux opérateurs compacts entre espaces de Hilbert ; l'assertion de la page 73 sur l'optimalité du système ; la proposition 4 ; les pages 74 et 75, sur la sous-additivité des fonctions concaves des valeurs singulières.

**Théorème 3.9** (Grothendieck, pages 71 à 73, le système (16) ♦). *Soient $u, v$ des opérateurs compacts entre espaces de Hilbert. Pour $0 \leq m \leq n$, $\sigma_n^m(u+v) \leq \sum_{p=0}^{m} \sigma_n^p(u)\,\sigma_n^{m-p}(v)$, coefficient par coefficient ; ce système entraîne $\prod_{i\leq n}(1+rs_i(u+v)) \leq \prod_{i\leq n}(1+rs_i(u)) \prod_{i\leq n}(1+rs_i(v))$ pour tout $r \geq 0$.*

◊ *non vérifié en Lean*

*Remarque.* L'inégalité de Ky Fan [22] est absente de mathlib. Voir aussi [9].

*Remarque.* Deux outils de la démonstration du cas $m = 2$ sont proposés à mathlib : l'inégalité de Lagrange (PR mathlib4 #44759, avec l'identité de Binet–Cauchy), et la formule de Cauchy–Binet, que la preuve emploie pour les mineurs $2 \times 2$, sous sa forme générale, démontrée par les puissances extérieures et placée avec les bases de celles-ci (#44757).

## 4 Cote 113 : l'enveloppe de Karoubi et l'invariance de Morita[5]

La cote 113, *Abelianization : notes manuscrites (s.d.)*, douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », construit sous le titre « $\otimes$ dans Cat » le produit tensoriel de petites catégories $k$-linéaires, et montre qu'il calcule celui de leurs catégories de modules. La page 3 pose les fondations. Pour $P$ petite catégorie $k$-additive, $P^k$ est *défini* comme $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, Ab)$, identifié à $\mathrm{Hom}_k(P^\circ, Ab_k)$ avec la parenthèse « ne dépend pas du choix de la str. $k$-additive ». Le plongement $P \hookrightarrow P^k$ est une « inclusion additive pl. fid. », d'où « $\mathrm{Kar}\, P \approx \mathrm{Ul}\,\mathrm{Proj}(P^k)$ », les deux lettres devant « Proj » n'étant pas identifiées. Une note en marge ajoute « $P \to \mathrm{Kar}\, P$ induit $(\mathrm{Kar}\, P)^k \xrightarrow{\sim} P^k$ » (113, lot 1, p. 3). La lecture lit la première équivalence comme $\mathrm{Kar}(P) \simeq \mathrm{Proj}_{\mathrm{tf}}(P^k)$, les projectifs de type fini, et nomme l'ensemble invariance de Morita.


**Définition.** Soit $P$ une catégorie. Son *enveloppe de Karoubi* $\mathrm{Kar}\, P$ a pour objets les couples $(X, e)$ formés d'un objet $X$ de $P$ et d'un idempotent $e = e^2$ de $\mathrm{End}(X)$, et pour flèches $(X, e) \to (Y, e')$ les $f : X \to Y$ tels que $e'f = f = fe$ ; la composition est celle de $P$, et l'identité de $(X, e)$ est $e$. Le foncteur $\iota : P \to \mathrm{Kar}\, P$ envoie $X$ sur $(X, \mathrm{id}_X)$. Une catégorie est *karoubienne* si tout idempotent s'y scinde. Si $P$ est préadditive, $\mathrm{Kar}\, P$ l'est aussi, ses groupes de flèches étant des sous-groupes de ceux de $P$.

**Énoncé** (Page 3, la note marginale ■). *Soient $P$ une catégorie préadditive et $\mathcal{D}$ une catégorie préadditive karoubienne — par exemple $Ab$, ou la catégorie des $k$-modules. La restriction le long de $\iota^\circ : P^\circ \to (\mathrm{Kar}\, P)^\circ$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs additifs $(\mathrm{Kar}\, P)^\circ \to \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs additifs $P^\circ \to \mathcal{D}$. Pour $\mathcal{D} = Ab$, c'est l'équivalence $(\mathrm{Kar}\, P)^k \simeq P^k$, avec la définition $P^k = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, Ab)$ de la page.*

**Lemme 4.1.** *Soient $P$ une catégorie et $\mathcal{D}$ une catégorie karoubienne. La restriction le long de $\iota : P \to \mathrm{Kar}\, P$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs $\mathrm{Kar}\, P \to \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs $P \to \mathcal{D}$.*

*Démonstration.* C'est la propriété universelle classique de l'enveloppe de Karoubi, complétion libre par les rétractes : un foncteur $G : P \to \mathcal{D}$ se prolonge en envoyant $(X, e)$ sur l'objet par lequel se scinde l'idempotent $G(e)$, et ce prolongement est unique à isomorphisme unique près. On ne la redémontre pas ici. □

[5] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder113.lean`.




$\overline{G} \circ \iota \simeq G$, $\quad \overline{G}(X, e) =$ l'objet par lequel se scinde $G(e)$.

**Lemme 4.2.** *Il existe un isomorphisme de catégories* $\mathrm{Kar}(P^\circ) \to (\mathrm{Kar}\, P)^\circ$*, bijectif sur les objets, qui fait commuter les plongements : le composé* $P^\circ \xrightarrow{\iota_{P^\circ}} \mathrm{Kar}(P^\circ) \to (\mathrm{Kar}\, P)^\circ$ *est* $\iota_P^\circ$*.*

*Démonstration.* Un objet de $\mathrm{Kar}(P^\circ)$ est un couple $(X, e)$ où $e$ est un idempotent de $\mathrm{End}_{P^\circ}(X) = \mathrm{End}_P(X)$ ; on l'envoie sur l'objet $(X, e)$ de $(\mathrm{Kar}\, P)^\circ$. Une flèche $(X, e) \to (Y, e')$ de $\mathrm{Kar}(P^\circ)$ est une flèche $f : Y \to X$ de $P$ telle que $fe' = f = ef$, c'est-à-dire exactement une flèche $(Y, e') \to (X, e)$ de $\mathrm{Kar}\, P$, ou encore une flèche $(X, e) \to (Y, e')$ de $(\mathrm{Kar}\, P)^\circ$ ; on l'envoie sur elle-même. Ce foncteur respecte identités et compositions, il est bijectif sur les objets et sur chaque ensemble de flèches. Sur $X \in P$, les deux composés donnent $(X, \mathrm{id}_X)$, et sur les flèches l'identité. □

**Lemme 4.3.** *Pour* $\mathcal{D}$ *karoubienne, la restriction le long de* $\iota_P^\circ : P^\circ \to (\mathrm{Kar}\, P)^\circ$ *est une équivalence de la catégorie des foncteurs* $(\mathrm{Kar}\, P)^\circ \to \mathcal{D}$ *sur celle des foncteurs* $P^\circ \to \mathcal{D}$*.*

*Démonstration.* Par le lemme 4.2, cette restriction est la composée de la restriction le long de l'isomorphisme $\mathrm{Kar}(P^\circ) \to (\mathrm{Kar}\, P)^\circ$, qui est une équivalence, et de la restriction le long de $\iota_{P^\circ}$, qui en est une par le lemme 4.1 appliqué à $P^\circ$. □

**Lemme 4.4.** *Toute flèche* $f : (X, e) \to (Y, e')$ *de* $\mathrm{Kar}\, P$ *s'écrit* $f = p' \circ \iota(f) \circ j$*, où* $j : (X, e) \to (X, \mathrm{id})$ *et* $p' : (Y, \mathrm{id}) \to (Y, e')$ *sont les flèches données par* $e$ *et par* $e'$*.*

*Démonstration.* Ce sont bien des flèches de $\mathrm{Kar}\, P$, puisque $\mathrm{id} \cdot e = e = e \cdot e$ et $e' \cdot e' = e' = e' \cdot \mathrm{id}$ ; et le composé est $e' f e = f$. □

**Lemme 4.5.** *Soient* $P$ *et* $\mathcal{D}$ *préadditives et* $F : (\mathrm{Kar}\, P)^\circ \to \mathcal{D}$ *un foncteur. Si* $F \circ \iota^\circ$ *est additif,* $F$ *l'est.*

*Démonstration.* Par le lemme 4.4, pour toute flèche $h : (X, e) \to (Y, e')$ de $\mathrm{Kar}\, P$, on a $F(h) = F(j) \circ (F \circ \iota^\circ)(h) \circ F(p')$, les flèches $j$ et $p'$ ne dépendant que de la source et du but de $h$, et $h$ étant regardée à droite comme une flèche $Y \to X$ de $P^\circ$. Pour deux flèches $h_1, h_2$ de même source et de même but, la somme dans $\mathrm{Kar}\, P$ est la somme dans $P$ ; l'additivité de $F \circ \iota^\circ$ et la bilinéarité de la composition dans $\mathcal{D}$ donnent alors $F(h_1 + h_2) = F(h_1) + F(h_2)$. □

*Démonstration de l'énoncé.* Les foncteurs additifs forment une sous-catégorie pleine de celle de tous les foncteurs. La restriction le long de $\iota^\circ$ étant pleinement fidèle sur tous les foncteurs par le lemme 4.3, elle l'est sur les foncteurs additifs, et elle envoie un foncteur additif sur un foncteur additif. Elle est essentiellement surjective : soit $G : P^\circ \to \mathcal{D}$ additif ; par le lemme 4.3, il existe $F : (\mathrm{Kar}\, P)^\circ \to \mathcal{D}$ et un isomorphisme $F \circ \iota^\circ \simeq G$ ; un foncteur isomorphe à un foncteur additif est additif, donc $F \circ \iota^\circ$ l'est, et $F$ est additif par le lemme 4.5. Les catégories $Ab$ et des $k$-modules sont préadditives et karoubiennes, tout idempotent y ayant une image. □

*Remarque.* L'énoncé ne demande ni que $P$ soit petite, ni que le but soit abélien. Il suffit que $P$ soit préadditive et $\mathcal{D}$ préadditive et karoubienne ; l'énoncé vaut en particulier pour les foncteurs additifs à valeurs dans les $k$-modules.

*Remarque.* L'enveloppe porte le nom de Karoubi, qui l'emploie en K-théorie en 1968 [32]. L'énoncé est l'invariance de la catégorie des modules par passage à cette enveloppe, déduite de sa propriété universelle. Le nom d'invariance de Morita renvoie à la caractérisation par Morita, en 1958, des anneaux dont les catégories de modules sont équivalentes [37]. L'inventaire date la cote « [à partir de 1982] ».

*Remarque.* L'équivalence entre foncteurs additifs sur $P$ et sur son enveloppe de Karoubi, à valeurs dans une catégorie additive karoubienne, est proposée à mathlib (PR mathlib4 #44726).

Ne sont pas démontrés ici : la forme $k$-linéaire de l'invariance de Morita ; l'indépendance de la structure $k$-additive ; l'équivalence $\mathrm{Kar}\, P \simeq \mathrm{Proj}_{\mathrm{tf}}(P^k)$ ; le théorème de Freyd–Mitchell ; l'énoncé 2-fonctoriel ; les pages 5 à 12 (produit tensoriel, contre-exemple ($\circledast$), produit dérivé).

Partie 8

# Théorie de la dualité

Aucune lettre du fonds ne porte sur la cote 125, que l'inventaire date « [avant 1970] ». Deux lettres situent la dualité dans ces années. Le 10 décembre 1965, il envoie à Deligne une démonstration plus simple de la dualité en cohomologie $p$-adique et sa forme relative (5, lot 3, p. 49). Le 4 août 1969, Hartshorne lui écrit sur les notes de Jouanolou destinées à SGA 5 (37, lot 3, p. 53).

## 5 Cote 125 : la carte des équivalences et le lemme du feuillet III-18[6]

La cote 125, *Dualité projective : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [avant 1970] », compte huit feuillets, dont une chemise titrée de sa main « Dualité locale et dualité … projective ». Le feuillet 2 est une carte : six énoncés encadrés, reliés par des doubles flèches verticales, pour $\mathbf{P}^n \supset X^r \supset Y^m$, $r > m > 0$. Le premier énoncé est la suite exacte de cohomologie locale, marquée d'une astérisque ; la flèche du deuxième encadré au troisième porte le seul mot du feuillet, « dualité », entouré (125, lot 1, p. 2). Le feuillet 3 est une page de tapuscrit numérotée III-18, annotée d'une autre main. Elle établit qu'un homomorphisme $u : A^n \to B$ bijectif sur les germes en un point l'est sur un voisinage, avec en marge la justification « puisque $Y$ est noethérien et $B$ de type fini par hypothèse » (125, lot 1, p. 3). La lecture modernisée donne les trois premiers étages de la carte et ce lemme. Ce sont les seules parties du dossier qui ne dépendent ni de la dualité de Serre ni du complété formel, et elles sont démontrées ici.

**Énoncé** (Feuillet 2, trois premiers étages ♦6 ♦9)**.** *Soient $X$ une variété projective de dimension $r$, $Y \subset X$ un fermé de dimension $m$, $F$ un faisceau cohérent sur $X$. Les énoncés suivants sont équivalents :*

1. *(premier étage) $H^p(X - Y, F) = 0$ pour $p \geqslant m$ ;*
2. *(deuxième étage) $H^p_Y(X, F) \to H^p(X, F)$ est bijectif pour $p > m$ et surjectif pour $p = m$ ;*
3. *(troisième étage) $\mathrm{Ext}^q_{\mathcal{O}_X}(F, \Omega^r_{X/k}) \to \mathrm{Ext}^q_{\mathcal{O}_{\widehat{X}}}(\widehat{F}, \widehat{\Omega}^r_{X/k})$ est bijectif pour $q < r - m$ et injectif pour $q = r - m$.*

*Le deuxième étage est « le premier étage lu à travers la suite exacte » ; le troisième lui est équivalent par la dualité, qui met $H^p$ et $\mathrm{Ext}^{r-p}(-, \Omega^r)$ en accouplement parfait, et « les bornes se répondent comme il faut : $p \geqslant m$ d'un côté, $q < r - m$ de l'autre, et $p + q = r$ ».*

On démontre ici la forme abstraite de ces deux passages. Pour le premier, on se donne une suite exacte longue quelconque indexée par les entiers naturels,

$$\cdots \to L^p \xrightarrow{a_p} G^p \xrightarrow{b_p} C^p \xrightarrow{\delta_p} L^{p+1} \xrightarrow{a_{p+1}} \cdots$$

[6] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder125.lean`.

de groupes abéliens, exacte en chaque terme ; $L^p$ tient lieu de $H^p_Y(X,F)$, $G^p$ de $H^p(X,F)$, $C^p$ de $H^p(X-Y,F)$. Pour le second, la dualité de Serre n'est pas démontrée : elle est prise pour donnée sous la forme que lui prête la lecture, à savoir que, sur le corps $k$, la flèche de comparaison des Ext en degré $q=r-p$ s'identifie à la transposée ${}^t a_p : (G^p)^\vee \to (L^p)^\vee$ de $a_p$.

**Lemme 5.1.** *Soit $m \in \mathbb{N}$. On a $C^p = 0$ pour tout $p \geqslant m$ si et seulement si $a_p$ est bijectif pour tout $p > m$ et $a_m$ est surjectif.*

*Démonstration.* Supposons $C^p = 0$ pour $p \geqslant m$. Pour $p \geqslant m$, $b_p$ est nul, donc son noyau, qui est l'image de $a_p$ par exactitude en $G^p$, est $G^p$ tout entier : $a_p$ est surjectif, en particulier pour $p = m$. Soit $p > m$ ; écrivons $p = q+1$ avec $q \geqslant m$. Par exactitude en $L^{q+1}$, le noyau de $a_{q+1}$ est l'image de $\delta_q$, qui est nulle puisque $C^q = 0$ : $a_p$ est injectif, donc bijectif.

Réciproquement, supposons $a_p$ bijectif pour $p > m$ et $a_m$ surjectif, et soient $p \geqslant m$ et $c \in C^p$. D'abord $a_p$ est surjectif : si $p > m$ parce qu'il est bijectif, si $p = m$ par hypothèse. Par exactitude en $L^{p+1}$, $a_{p+1}(\delta_p(c)) = 0$ ; comme $p+1 > m$, $a_{p+1}$ est injectif et $\delta_p(c) = 0$. Par exactitude en $C^p$, il existe $y \in G^p$ avec $c = b_p(y)$, puis, $a_p$ étant surjectif, $x \in L^p$ avec $y = a_p(x)$. Alors $c = b_p(a_p(x)) = 0$ par exactitude en $G^p$. □

**Lemme 5.2.** *Soient $k$ un corps, $(a_p : L^p \to G^p)_{p\in\mathbb{N}}$ des applications $k$-linéaires, et $m \leqslant r$ des entiers. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

1. *$a_p$ est bijectif pour $m < p \leqslant r$ et $a_m$ est surjectif ;*
2. *${}^t a_{r-q}$ est bijectif pour $q < r-m$ et ${}^t a_m$ est injectif.*

*De plus, si $p+q=r$, on a $p \geqslant m \Leftrightarrow q \leqslant r-m$ et $p > m \Leftrightarrow q < r-m$.*

*Démonstration.* On utilise deux faits classiques d'algèbre linéaire sur un corps, valables en dimension quelconque : une application linéaire $a$ est surjective si et seulement si sa transposée ${}^t a$ est injective, et elle est bijective si et seulement si ${}^t a$ l'est. (Le premier est immédiat dans un sens, et dans l'autre repose sur le fait qu'un sous-espace strict est contenu dans le noyau d'une forme linéaire non nulle ; le second en découle, avec l'énoncé dual : $a$ injective si et seulement si ${}^t a$ surjective, par prolongement des formes linéaires à partir d'un sous-espace.)

Les deux conditions sur $a_m$ se correspondent donc. Pour les autres : si $q < r-m$, l'entier $p = r-q$ vérifie $m < p \leqslant r$, et ${}^t a_{r-q}$ est bijectif puisque $a_p$ l'est ; si inversement $m < p \leqslant r$, l'entier $q = r-p$ vérifie $q < r-m$ et $r-q = p$, et $a_p$ est bijectif puisque ${}^t a_p$ l'est. L'assertion sur les bornes est de l'arithmétique : sous $p+q=r$, $p \geqslant m$ équivaut à $r-q \geqslant m$, soit $q \leqslant r-m$, et de même avec des inégalités strictes. □

Le lemme du feuillet 3 est démontré ici sous sa forme affine : $Y = \operatorname{Spec} R$ et le voisinage cherché est un ouvert $D(f)$.

**Énoncé** (Feuillet 3, III-18, forme affine)**.** *Soient $R$ un anneau noethérien, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de $R$, $B$ un $R$-module de type fini et $u : R^n \to B$ une application $R$-linéaire telle que $u_\mathfrak{p} : R^n_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{p}$ soit bijective. Il existe $f \in R \setminus \mathfrak{p}$ tel que $u_f : R^n_f \to B_f$ soit bijective.*

*Démonstration.* Le module $B$, de type fini sur un anneau noethérien, est de présentation finie : le noyau d'une surjection $R^s \to B$ est un sous-module de $R^s$, donc de type fini. Il suffit alors de démontrer l'énoncé classique suivant, où l'anneau commutatif $R$ est quelconque : *si $M$ est de type fini, $B$ de présentation finie et $u : M \to B$ bijective en $\mathfrak{p}$, alors $u_f$ est bijective pour un $f \notin \mathfrak{p}$.*

Le conoyau $Q$ de $u$ est de type fini, quotient de $B$, et $Q_{\mathfrak{p}} = 0$ puisque la localisation est exacte. Chacun de ses générateurs $y_1, \dots, y_t$ est donc annulé par un $g_i \notin \mathfrak{p}$, et $g = g_1 \cdots g_t \notin \mathfrak{p}$ annule $Q$ : $Q_g = 0$, c'est-à-dire que $u_g : M_g \to B_g$ est surjective. Son noyau $K$ est de type fini : $M_g$ est de type fini sur $R_g$, $B_g$ de présentation finie, et le noyau d'une surjection d'un module de type fini sur un module de présentation finie est de type fini (fait classique : si $0 \to K \to M' \xrightarrow{\pi'} B' \to 0$ est exacte, avec $M'$ de type fini et $B'$ de présentation finie, choisissons une surjection $\pi : R^s \to B'$ de noyau $N$ de type fini et relevons-la en $\varphi : R^s \to M'$ avec $\pi'\varphi = \pi$ ; chaque générateur de $M'$ s'écrit $\varphi(x_j) + k_j$ avec $k_j \in K$, et tout $k \in K$ s'écrit $\varphi(x) + \sum c_j k_j$ où $\pi(x) = \pi'(k) = 0$, de sorte que $K = \varphi(N) + \sum_j Rk_j$). Comme $K_{\mathfrak{p}}$ est le noyau de $u_{\mathfrak{p}}$, il est nul ; le même argument fournit $h \notin \mathfrak{p}$ tel que $K_h = 0$. Avec $f = gh \notin \mathfrak{p}$, $u_f$ est surjective et injective. □

*Remarque.* Le passage du premier au deuxième étage vaut pour toute suite exacte longue, avec les bornes du feuillet ; il n'utilise rien de $X$, de $Y$ ni de $F$. La dualité étant admise sous la forme d'une transposition, les trois étages encadrés sont cohérents entre eux. La comparaison, sous une borne sur la dimension cohomologique de $X - Y$, de la cohomologie de $X$ à celle de son complété formel le long de $Y$, qui fait la suite de la carte, a été publiée par Hartshorne en 1970, au chapitre III d'*Ample Subvarieties of Algebraic Varieties* [28] ; l'inventaire date le dossier « [avant 1970] ».

*Remarque.* Le commentaire de la lecture apparie $p \geqslant m$ avec $q < r - m$. Sous $p + q = r$, $p \geqslant m$ équivaut à $q \leqslant r - m$, de sorte que la plage $p \geqslant m$ répond à toute celle du troisième étage, cas limite injectif compris. L'écart est dans le commentaire ; la carte est juste.

*Remarque.* Le lemme III-18 est un fait classique : il vaut sur tout anneau commutatif pour une source de type fini et un but de présentation finie. La noethérianité de $Y$ et la finitude de $B$ qu'invoque la marge servent seulement à rendre $B$ de présentation finie.

*Remarque.* Les équivalences entre bijectivité d'une flèche et nullité d'un terme voisin dans une suite exacte figurent déjà dans mathlib, terme à terme.

Ne sont pas démontrés ici : la profondeur le long d'un fermé et le prolongement de type Hartogs ; la dualité de Serre, admise ; les étages 4 et 5 de la carte, qui passent par la complétion formelle ; les annulations pour $\mathcal{O}(n)$ ; la dimension cohomologique de $P - X$ ; les Ext des pages 4 et 5 ; le feuillet III-5 (Koszul) ; le lemme III-18 pour les faisceaux.

**Conjecture 5.3** (Grothendieck, pages 2, 4 et 7, dimension cohomologique du complémentaire ; voir aussi Hartshorne [28] ♦). *Soient $P \supset X \supset Y$ de dimensions $n$, $r$ et $m$, avec $r > m > 0$. L'annulation de $H^p(X - Y, F)$ pour $p \geq m$ et tout $F$ cohérent équivaut, par une dualité avec* $\mathrm{Ext}^q(-, \Omega^r)$ *sur $X$ et sur son complété formel $\hat{X}$ le long de $Y$, à ce que $H^q(X, F) \to H^q(\hat{X}, \hat{F})$ soit bijectif pour $q < r - m$ et injectif pour $q = r - m$, pour tout $F$ localement libre.*

Autres pistes de l'onglet Findings pour ce thème, dans des cotes qui n'ont pas de section ici :

**Théorème** (Grothendieck, pages 10 et 11, dualité locale en dimension un pour tous les modules ♦). *Sur $X = \operatorname{Spec} A$, où $A$ est un anneau de valuation discrète complet de corps des fractions $K$, les applications de dualité locale* $\mathrm{Ext}^{1-i}(X; F, \mathcal{O}_X) \to \mathrm{Hom}_A(H^i_x(F), K/A)$ *sont des isomorphismes pour tout $\mathcal{O}_X$-module $F$, quasi-cohérent ou non. La démonstration utilise la complétude de $A$ par* $\mathrm{Ext}^1_A(K, A) = 0$.

◊ *non vérifié en Lean*

La fin de l'argument d'injectivité de $\varphi^1$ n'est lisible qu'en partie, et la lecture le restitue. Mathlib n'a pas la cohomologie locale des faisceaux de modules non quasi-cohérents. On se reportera aux notes de Grothendieck (101, lot 1, p. 10).

**Contre-exemple** (pages 10, 14 et 15, dualité locale en dimension deux ♦). *La première phrase de la page 10 affirme les isomorphismes de dualité locale en toute dimension ; ils tombent en défaut en dimension 2. Soient $A$ un anneau local régulier complet de dimension 2, $f \in \mathfrak{m}$ non nul, $U = X_f$ et $F = j_!\mathcal{O}_U$ sur $X = \operatorname{Spec} A$. L'application $A_f = \operatorname{Ext}^0(X; F, \mathcal{O}_X) \to \operatorname{Hom}_A(H^2_x(F), E(k))$ est injective et non surjective : la dualité locale à duaux de Matlis algébriques ne vaut pas pour les $\mathcal{O}_X$-modules non quasi-cohérents.*

◊ *non vérifié en Lean*

La page 14 conclut « $\varphi$ n'est pas surjective », souligné deux fois, sans démonstration, et la page 15 dit qu'il faut des duaux topologiques. Mathlib n'a pas la cohomologie locale ni la dualité de Matlis. On se reportera aux notes de Grothendieck (101, lot 1, p. 10).

**Théorème** (Grothendieck, pages 10 et 11, noyau de l'image réciproque et indice ♦). *Soient $f : X \to Y$ propre sur un corps $k$, $Y$ irréductible et lisse de point générique $\eta$, $X_\eta$ non vide, et $N$ le pgcd des degrés des 0-cycles de $X_\eta$. Il existe une application $H^*(X, G_X) \to H^*(Y, G)$, fonctorielle en le complexe de coefficients étale $G$, dont le composé avec $f^*$ est $N \cdot \mathrm{id}$. Le noyau de $f^*$ est donc tué par l'indice de la fibre générique, sans hypothèse sur la dimension relative.*

◊ *non vérifié en Lean*

Le calcul de la page 10 suppose le formalisme de Gysin du § 4 pour des $Z_i$ éventuellement singuliers, que le dossier énonce sans le démontrer. Mathlib n'a pas la cohomologie étale. On se reportera aux notes de Grothendieck (32, lot 1, p. 10).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 165 à 169, $\operatorname{Ext}^1(\mathbf{G}_a, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$ et perfection ♦). *Sur une base quelconque $S$ de caractéristique $p$, $\operatorname{Ext}^1_{S\text{-}gr}(\mathbf{G}_a, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \simeq \Gamma(S, \mathcal{O}^{p^{-\infty}})$, sections globales de la perfection $\varinjlim(\mathcal{O} \to \mathcal{O} \to \cdots)$ pour $x \mapsto x^p$. Le foncteur $\operatorname{Ext}^1(\mathbf{G}_a, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$ est donc représentable parmi les pro-schémas parfaits sur $S$.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 166 à 168) : ils démontrent le lemme qui identifie $\operatorname{Ext}^1$ aux classes primitives de $H^1(G, \Gamma)$ et son invariance par homéomorphisme universel, mais pas la formule elle-même, et le mot « parfaits » est incertain. Mathlib n'a pas les Ext de schémas en groupes. On se reportera aux notes de Grothendieck (43, lot 9, p. 165).

**Théorème** (Grothendieck, pages 70 à 74, concentration de la cohomologie locale ♦). *Soient $A$ un anneau local régulier de dimension $d$ contenant un corps algébriquement clos $k$, et $G$ un groupe algébrique commutatif sur $k$. La cohomologie locale de Zariski $H^i_{\mathfrak{a}}(\operatorname{Spec} A, G)$ au point fermé est nulle pour $i \neq d$ ; elle vaut $G(K)/G(A)$ pour $d = 1$ et $H^{d-1}(\operatorname{Spec} A - \mathfrak{a}, U)$ pour $d \geq 2$, où $U$ est la partie unipotente de $G$. Le foncteur $G \mapsto H^d_{\mathfrak{a}}(G)$ est donc exact sur les suites localement triviales, ce qui sert à définir la jacobienne locale $J_{A/k}$ de la page 74.*

◊ *non vérifié en Lean*

La clôture algébrique de $k$ est ajoutée par l'édition, et presque tous les mots de la prose sont de lecture incertaine. Mathlib n'a pas la cohomologie locale à valeurs dans un groupe algébrique. On se reportera aux notes de Grothendieck (43, lot 4, p. 70).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 40 à 43, permanence de la condition de Lefschetz ♦). *Soient $X$ quasi-projectif sur un anneau noethérien et $Y$ un fermé de $X$ tels que la paire $(X, Y)$ vérifie $(\mathrm{LG})_n$ : $H^i(X, F) \to H^i(X_{/Y}, F_{/Y})$ est bijectif pour $i \leq n$ et injectif pour $i = n + 1$ pour tout $F$ localement libre. Alors pour tout $f : W \to X$ projectif et plat, la paire*

$(W, f^{-1}(Y))$ *vérifie* $(\mathrm{LG})_n$*; de même pour la condition* Lef *de SGA 2, X. Rien n'est demandé aux fibres de* $f$.

Démonstration donnée par l'édition, non vérifiée en Lean.

SGA 2 (exposés X et XII) obtient ces conditions par des hypothèses de profondeur sur les fibres. Mathlib n'a pas les complétions formelles ni leur cohomologie. On se reportera aux notes de Grothendieck (58, lot 2, p. 40).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 45 à 51, comparaison des Hom hors de $Y$ ♦)**.** *Soient* $A$ *un anneau local noethérien, quotient d'un anneau régulier et* $t$*-adiquement complet,* $X'$ *son spectre épointé et* $Y' = V(t) \cap X'$*. Pour* $F$ *et* $G$ *cohérents sur* $X'$*,* $\mathrm{Hom}(F, G) \simeq \mathrm{Hom}(\hat{F}, \hat{G})$ *le long de* $Y'$ *dès que* $G$ *est de profondeur* $\geq 2$ *aux points fermés de* $X' - Y'$*. Aucune profondeur n'est demandée aux points de* $Y'$*, alors que SGA 2, X, exemple 2.1 (i), la demande en tout point fermé de* $X'$.

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 45 à 51) : la page 47 marque d'un « ? » le pas $t$-régulier et s'arrête. Mathlib n'a pas les faisceaux cohérents sur un spectre épointé ni leur complétion formelle. On se reportera aux notes de Grothendieck (58, lot 3, p. 45).

Partie 9

# Descente

*Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici.* Les cotes de ce thème supposent la descente fidèlement plate pour les schémas, que mathlib ne développe pas.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 126, 128.

**Théorème** (Grothendieck, pages 17 à 23, factorisation radicielle-étale ♦). *Soit $f : X \to Y$ fini et universellement ouvert, $Y$ localement noethérien, dont toutes les fibres ont le même nombre de points géométriques. Alors $f$ se factorise en un morphisme radiciel fini surjectif $X \to X^{ét}$ suivi d'un revêtement étale fini $X^{ét} \to Y$, universel parmi les $Y$-morphismes de $X$ vers les $Y$-schémas étales.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 4 à 7, quotient d'une déformation nilpotente ♦). *Soit $R \rightrightarrows X$ une relation d'équivalence plate dont la réduction $R_0 \rightrightarrows X_0$ modulo un idéal nilpotent est effective, de quotient fpqc quasi-séparé $X_0 \to Y_0$. Alors $R$ est effective, son quotient $Y$ est un épaississement nilpotent de $Y_0$ et $X \to Y$ est plat.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 26 à 29, descente générique ♦). *Soient $S$ noethérien, $T \to S$ plat de type fini et $F$ une catégorie fibrée sur les $S$-schémas de type fini pour laquelle les morphismes plats surjectifs sont de $F$-descente (pleine fidélité seulement). Un isomorphisme $\varphi : p_1^* X \simeq p_2^* X$ défini sur un ouvert dense de $T \times_S T$ et vérifiant la condition de cocycle sur un ouvert dense de $T \times_S T \times_S T$ se prolonge, après restriction de $T$ à un ouvert dense, en une donnée de descente qui coïncide avec $\varphi$ là où les deux sont définies.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 4 à 9, descente plate dans un carré de Milnor ♦). *Soit $I$ un idéal nilpotent de $A$ qui s'envoie isomorphiquement sur un idéal de $A'$. Si* Spec $A'/IA' \to$ Spec $A/I$ *est un morphisme de descente effective pour les modules plats,* Spec $A' \to$ Spec $A$ *l'est aussi, et le reste après changement de base plat.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 12 à 18, colongueur un ♦). *Soient $A$ local artinien et $A'$ une $A$-algèbre finie à extensions résiduelles triviales. Si un idéal d'équivalence $J$ rend exacte $A \to A' \rightrightarrows (A' \otimes_A A')/J$ et si $\delta(x') = p_2(x') - p_1(x')$ engendre l'idéal $\Delta$ pour tout $x' \notin A$, alors* long$(A'/A) \leq 1$*; si $A'/A \simeq A/\mathfrak{m}$,* Spec $A'$ *porte exactement deux relations d'équivalence sur* Spec $A$.

◊ *non vérifié en Lean*

**Conjecture** (Grothendieck, pages 19 à 29, descente infinitésimale ♦). *Soient $A$ un anneau semi-local noethérien de radical $\mathfrak{m}$, $A'$ une $A$-algèbre finie, $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$ et $A'_n = A' \otimes_A A_n$. Les trois conditions suivantes, imposées pour tout $n$, sont équivalentes : $H^1(A'_n/A_n) = 0$; $H^1(A'_n/A_n, \mathrm{GL}_r)$ est trivial; la descente des modules quasi-cohérents plats le long de* Spec $A'_n \to$ Spec $H^0(A'_n/A_n)$ *est effective. Elles entraînent la descente effective des modules plats de type fini le long de* Spec $A' \to$ Spec $H^0(A'/A)$.

Mathlib n'a pas la descente ni $H^1(A'/A, \mathrm{GL}_r)$. On se reportera aux notes de Grothendieck (128, lot 1, p. 19).

Partie 10

# Topos et sites

## 6 Cote 37 : le contre-exemple à EGA I 10.10.5[7]

La cote 37, *Rééditions SGA, EGA [SGA 4 à SGA 7, EGA I et EGA II]*, quatre-vingt-dix-neuf pages de tapuscrits, de lettres et de notes, dont l'inventaire date les lettres « (1967-1971, s.d.) », est un dossier de travail éditorial : les rééditions de SGA 1, 4, 5, 6 et 7 et d'EGA I et II, avec les lettres échangées et quelques morceaux de mathématiques inédits. La page 92 est une lettre dactylographiée à Dieudonné, datée à la main du 27.8.1967. Dieudonné avait tiqué sur la généralisation proposée d'EGA I 10.10.5 hors du cas noethérien ; la lettre admet que les conditions a) et c) « ne son[t] pas impliquées par b) » et le montre sur $A = B[[T]]$, $A_n = B[T]/(T^{n+1})$, $M_n = A_n/J_n$ avec $J_n = (X_0, X_1T, \dots, X_nT^n)$ et $B = k[(X_i)_{i\geq 0}]$, pour lequel les générateurs écrits de $J_n$ sont « en nombre minimal » (37, lot 5, p. 92). La lettre affirme pour cela que ces générateurs sont linéairement indépendants sur $B$ dans $J_n/TJ_n$, ce qui est faux : $X_0 \cdot X_1T = T \cdot X_1X_0 \in TJ_n$. Sa réduction modulo les $X_j$, $j \neq i$, montre seulement que chaque coefficient est dans l'idéal $(X_j)_{j\geq 0}$, et c'est ce qui suffit. La lecture rédige ainsi la minimalité et ajoute l'étape de Schanuel, que la lettre laisse implicite.
*Conventions.* $k$ est un corps, $B = k[X_0, X_1, \dots]$, $P = B[T]$, $A_n = P/(T^{n+1})$ et $J_n \subset A_n$ l'idéal engendré par les classes de $X_lT^l$, $0 \leq l \leq n$. Pour $f \in P$, on note $\lambda_i(f) \in k$ le coefficient du monôme $X_iT^i$ et $\varepsilon(f) \in k$ le terme constant ; $\varepsilon$ est un homomorphisme d'anneaux, $\lambda_i$ est $k$-linéaire.

**Lemme 6.1.** *Pour $a \in P$ et $i, l \geq 0$, $\lambda_i(a \cdot X_lT^l)$ vaut $\varepsilon(a)$ si $l = i$ et $0$ sinon. Pour $i \leq n$, $\lambda_i(a\,T^{n+1}) = 0$.*

*Démonstration.* Tout monôme de $a\,X_lT^l$ est divisible par $X_lT^l$. Le monôme $X_iT^i$ ne l'est que si $l = i$, et le coefficient de $X_iT^i$ dans $a\,X_iT^i$ est alors celui du monôme $1$ dans $a$. Tout monôme de $a\,T^{n+1}$ a un degré en $T$ au moins $n + 1 > i$. □

**Théorème 6.2** (Grothendieck, page 92, minimalité des générateurs ♦). *L'idéal $J_n$ de $A_n$ est engendré par $n + 1$ éléments et ne l'est par aucune famille de moins de $n + 1$ éléments.*

*Démonstration.* Soient $g_1, \dots, g_m$ des générateurs de $J_n$. On écrit chaque $X_jT^j$, $0 \leq j \leq n$, comme combinaison $\sum_r a_{jr}g_r$, et chaque $g_r$ comme combinaison $\sum_l b_{rl}X_lT^l$, puis on relève tout dans $P$ : les égalités y valent à un multiple de $T^{n+1}$ près. Appliquons $\lambda_i$, $i \leq n$, à la première. Par le lemme 6.1, le membre de gauche donne $\delta_{ij}$, le multiple de $T^{n+1}$ ne contribue pas, et chaque $a_{jr}g_r$ donne $\sum_l \lambda_i(a_{jr}b_{rl}X_lT^l) = \varepsilon(a_{jr})\,\varepsilon(b_{ri})$. Les matrices $E = (\varepsilon(a_{jr}))$, de taille $(n + 1) \times m$, et $L = (\varepsilon(b_{ri}))$, de taille $m \times (n + 1)$, à coefficients dans $k$, vérifient donc $EL = 1$. Le rang de l'identité, $n + 1$, est au plus celui de $E$, lui-même au plus $m$. □

**Énoncé** (Page 92, compatibilité). *Le $A_n$-module $M_n = A_n/J_n$ est de présentation finie, et la réduction $A_{n+1} \to A_n$ envoie $J_{n+1}$ sur $J_n$ : les $M_n$ forment un système compatible.*

[7] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder37.lean`.

*Démonstration.* $M_n$ est le quotient de $A_n$ par un idéal de type fini. L'image de $J_{n+1}$ est engendrée par les classes de $X_l T^l$, $l \leq n+1$, et $X_{n+1}T^{n+1}$ est nul dans $A_n$. □

**Lemme 6.3** (l'étape de Schanuel)**.** *Soient $S$ un anneau commutatif, $J$ un idéal de $S$, $F$ un $S$-module projectif, $\varphi : F \to N$ surjective et $\gamma : K \to F$ d'image le noyau de $\varphi$, où $K$ est engendré par $p$ éléments. Si $N \simeq S/J$, alors $J$ est engendré par $p+1$ éléments.*

*Démonstration.* Soit $\varphi' : F \to S/J$ le composé de $\varphi$ et de l'isomorphisme. Comme $F$ est projectif, $\varphi'$ se relève en $\psi : F \to S$ ; comme $\varphi'$ est surjective, il existe $x_0 \in F$ d'image la classe de 1, et l'on pose $\chi(s) = sx_0$. Alors $c = 1 - \psi(x_0)$ est dans $J$, et les $\psi(\gamma(v_r))$, pour des générateurs $v_1, \ldots, v_p$ de $K$, aussi, puisque $\varphi \circ \gamma = 0$. Réciproquement, pour $x \in J$, $\varphi'(\chi(x))$ est la classe de $x$, nulle, donc $\chi(x) = \gamma(y)$ pour un $y \in K$, et $x = xc + x\,\psi(x_0) = xc + \psi(\gamma(y))$ est dans l'idéal engendré par $c$ et les $\psi(\gamma(v_r))$. □

**Théorème 6.4** (Grothendieck, page 92, contre-exemple à EGA I 10.10.5 ♦)**.** *Soient $A$ un anneau commutatif quelconque et, pour tout $n$, un homomorphisme d'anneaux quelconque $A \to A_n$. Il n'existe pas de $A$-module de présentation finie $M$ tel que $A_n \otimes_A M \simeq M_n$ comme $A_n$-modules pour tout $n$. En particulier, pour $A = B[[T]]$ et ses réductions, le système compatible $(M_n)$ de modules de présentation finie ne vient d'aucun $A$-module de présentation finie : la condition b) d'EGA I 10.10.5 n'entraîne pas a) et c) sans hypothèse noethérienne.*

*Démonstration.* Soit $A^p \xrightarrow{\gamma_0} A^q \xrightarrow{\varphi_0} M \to 0$ une présentation. Le produit tensoriel par $A_n$ est exact à droite : $A_n \otimes_A A^p \to A_n \otimes_A A^q \to A_n \otimes_A M \to 0$ est exact, le module du milieu est libre, et celui de gauche est engendré par $p$ éléments. Si $A_n \otimes_A M \simeq A_n/J_n$, le lemme 6.3 engendre $J_n$ par $p+1$ éléments, et le théorème 6.2 donne $n+1 \leq p+1$ pour tout $n$, ce qui est absurde pour $n = p+1$. □

*Remarque.* Le contre-exemple tient tel que la lettre l'énonce, et plus généralement. Ni la complétude de $A$, ni la surjectivité des $A \to A_n$, ni la compatibilité des isomorphismes ne servent : une présentation de $M$ par $q$ générateurs et $p$ relations borne uniformément, par $p+1$, le nombre de générateurs de chaque $J_n$. La borne de la lecture, $p+q$, est remplacée par $p+1$. La minimalité est démontrée comme la lecture la rédige, par l'indépendance des $n+1$ générateurs dans $J_n/(TJ_n + \mathfrak{m}J_n)$, $\mathfrak{m} = (X_j)_{j\geq 0}$, mise en équations : les formes $\lambda_i$ sont nulles sur $TJ_n + \mathfrak{m}J_n$ et valent $\delta_{il}$ sur $X_l T^l$. L'indépendance sur $B$ dans $J_n/TJ_n$ qu'affirme la lettre est fausse et ne sert pas.

Ne sont pas démontrés ici : les schémas formels et les conditions a), b), c) d'EGA I 10.10.5 elles-mêmes, que la page ne rappelle pas ; l'implication a) ⇒ c) sans hypothèse noethérienne, que les deux correspondants laissent ouverte ; le « canular » d'EGA IV 17.1.6 (i) que signale la page 93. Autres pistes de l'onglet Findings pour ce thème, dans des cotes qui n'ont pas de section ici :

**Méthode** (Grothendieck, pages 9 à 14, spatialité du locale produit ♦)**.** Pour identifier $\mathrm{Top}(X \times Y)$ et $\mathrm{Top}(X) \times_{\mathrm{top}} \mathrm{Top}(Y)$, on les voit comme faisceaux sur le même site $O_X \times O_Y$ pour deux topologies : la topologie produit $\pi$, dont les faisceaux sont les bifaisceaux, et la topologie $\pi'$ induite par $X \times Y$. On comble l'écart entre elles par trois passages à la borne supérieure dans le treillis des sous-objets, $X \times Y$ étant borne supérieure de rectangles ; la spatialité du locale produit en résulte.

Mathlib n'a pas les produits de locales. On se reportera aux notes de Grothendieck (161-3, lot 1, p. 9).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 13 à 23, sous-modules équivariants sur une base quelconque ⧫). *Soient $S$ un schéma et $G$ un $S$-schéma en groupes plat et affine, dont l'algèbre est réunion filtrante de sous-cogèbres localement libres de rang fini à quotients plats, opérant sur un $S$-schéma $X$ quasi-compact et quasi-séparé muni d'un faisceau ample relatif $G$-linéarisé. Tout sous-module quasi-cohérent d'un $G$-module quasi-cohérent $E$ sur $X$ est contenu dans un plus petit sous-module quasi-cohérent $G$-stable, compatible au changement de base plat sur $S$ et de type fini quand le premier l'est.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 19 à 23). L'argument s'arrête sur « Rédiger mieux ce début ». Mathlib n'a pas les modules quasi-cohérents équivariants. On se reportera aux notes de Grothendieck (90, lot 1, p. 13).

**Théorème** (Grothendieck, pages 86 à 88, finitude de la normalisation ⧫). *Soit $A$ un anneau noethérien intègre quotient d'un anneau régulier. La clôture intégrale de $A$ est finie sur $A$ si et seulement si les premiers $\mathfrak{p}$ de hauteur un tels que $A_\mathfrak{p}$ n'est pas régulier sont en nombre fini et que, pour chacun, la normalisée de $A_\mathfrak{p}$ est finie sur $A_\mathfrak{p}$.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 10 et 11, topos d'un produit ⧫). *Si toute partie localement fermée non vide de $X$ a un point qui y possède un voisinage relativement quasi-compact, $\mathrm{Top}(X \times Y) \to \mathrm{Top}(X) \times \mathrm{Top}(Y)$ est une équivalence.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 11 et 12, topos d'un produit infini ⧫). *Pour une famille quelconque d'espaces $(X_i)$, $\mathrm{Top}(\prod X_i) \to \prod \mathrm{Top}(X_i)$ est une équivalence quand tous les facteurs sauf un au plus ont des systèmes fondamentaux de voisinages quasi-compacts et que tous sauf un au plus sont quasi-compacts.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 3 à 8 ; voir aussi Artin, Grothendieck et Verdier 1972 [2], 2-produit de topos ⧫). *Le 2-produit des topos $\tilde{C}$ et $\tilde{D}$ existe : c'est l'intersection, dans le topos des préfaisceaux sur $C \times D$, des images réciproques des sous-topos $\tilde{C} \subset \hat{C}$ et $\tilde{D} \subset \hat{D}$. Les familles quelconques de topos ont de même un 2-produit.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Conjecture** (Grothendieck, page 22, quand $\mathrm{Ind}(C)$ est un topos ⧫). *Pour une petite catégorie $C$ d'enveloppe de Karoubi $C'$, $\mathrm{Ind}(C)$ est un topos si et seulement si $C'$ a les limites inductives finies et que son foncteur canonique vers les faisceaux pour la topologie finitaire les respecte ; ce topos est alors parfait exactement quand $C'$ a les limites projectives finies.*

Mathlib n'a pas les conditions de SGA 4 pour que $\mathrm{Ind}(C)$ soit un topos. On se reportera aux notes de Grothendieck (37, lot 2, p. 22).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 1 à 4, Dold–Kan hors de $\Delta$ ⧫). *Pour une petite catégorie $A$, la restriction aux préfaisceaux abéliens « lisses », ceux le long desquels la linéarisation ne varie pas, donne une correspondance de type Dold–Kan avec une catégorie dérivée de complexes localement constants. La page pose la question sous plusieurs formes et relève que $L_b$ porte des coefficients tordus et non constants.*

Mathlib n'a pas les catégories dérivées de complexes localement constants. On se reportera aux

notes de Grothendieck (112, lot 1, p. 1).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 6 et 7, recollement de topos de préfaisceaux ♦)**.** *Un topos recollé d'un sous-topos ouvert $X_0$ et de son fermé complémentaire $X_1$ le long d'un foncteur exact à gauche $\varphi$ est un topos de préfaisceaux exactement quand $X_0$ et $X_1$ sont de la forme* $\mathrm{Top}(\mathcal{X}_0)$ *et* $\mathrm{Top}(\mathcal{X}_1)$ *et que $\varphi$ commute aux limites projectives quelconques ; la donnée de recollement est alors un bifoncteur $\mathcal{X}_0^{\mathrm{op}} \times \mathcal{X}_1 \to (\mathrm{Ens})$.*

Mathlib n'a pas le recollement des topos. On se reportera aux notes de Grothendieck (116, lot 1, p. 6).

Partie 11

# Variétés abéliennes et schémas de Picard

## 7 Cote 44 : l'intégralité des nombres de Cartan à partir des axiomes[8]

La cote 44, *Jacobiennes intermédiaires : notes manuscrites (s.d.), lettre (1964)*, compte huit pages. Trois feuillets d'un programme sur les jacobiennes intermédiaires y entourent la lettre à Serre du 12 août 1964. La page 4 est étrangère au programme : c'est un feuillet barré d'une longue diagonale, qui énumère deux structures axiomatiques, un système de racines réduit et ce qu'on appelle aujourd'hui une donnée radicielle. La première est un couple $(P, \Delta)$, $P$ abélien libre de rang fini et $\Delta \subset P$ finie, soumis à trois conditions : a) $\Delta$ engendre $P$ ; b) si $a \in \Delta$, alors $-a \in \Delta$, « mais $na \notin \Delta$ si $n \neq 1, -1$, $n \in \mathbb{Q}$ » ; c) pour tout $a \in \Delta$, il existe une « symétrie » $S_a$ qui envoie $a$ sur $-a$ et vérifie $S_a(\Delta) \subset \Delta$. Une note réalise toutes les symétries par la forme invariante $\sum_{a \in \Delta} \langle x, a\rangle \langle y, a\rangle$, écrit $S_\alpha x = x - \langle \gamma_\alpha, x\rangle\, \alpha$ avec $\gamma_\alpha \in P'^{\mathbb{Q}}$, puis, après un mot illisible, « que l'on a en fait $\gamma_\alpha \in P'$ », c'est-à-dire que les nombres de Cartan $c_{\alpha\beta} = \langle \gamma_\alpha, \beta\rangle$ sont entiers. Un crochet en donne la raison : chaque $\alpha$ serait indivisible dans $P$, parce qu'il peut faire partie d'un « système fondamental de racines » (44, lot 1, p. 4). Le mot qui gouverne l'assertion et une bonne part du crochet sont illisibles. La lecture modernisée y voit l'intégralité tirée des axiomes comme une conséquence ; la piste de l'onglet Findings fait la réserve que les trois axiomes seuls ne la donnent pas.

*Conventions.* Soient $V$ un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$ et $P$ un sous-groupe de $V$. Un élément $\alpha \in P$ est *indivisible dans $P$* si, chaque fois que $\alpha = my$ avec $m \in \mathbb{Z}$ et $y \in P$, on a $m = \pm 1$. Dans l'exemple, $P = \mathbb{Z}^2$, de base $(e_1, e_2)$, et les symétries sont calculées dans $\mathbb{Q}^2$.

**Énoncé** (Page 4, de l'indivisibilité à l'intégralité ♦). *Soient $\alpha \in P$ indivisible dans $P$ et $f : V \to \mathbb{Q}$ une application telle que $x - f(x)\,\alpha \in P$ pour tout $x \in P$. Alors $f(x) \in \mathbb{Z}$ pour tout $x \in P$. En particulier, si la symétrie $S_\alpha x = x - \langle \gamma_\alpha, x\rangle\, \alpha$ envoie $P$ dans $P$ et si $\alpha$ est indivisible dans $P$, les nombres $\langle \gamma_\alpha, \beta\rangle$, $\beta \in P$, sont entiers.*

*Démonstration.* Soient $x \in P$ et $q = f(x)$ ; on a $q\alpha = x - (x - q\alpha) \in P$. Écrivons $q = a/b$ avec $b \geq 1$ et $a$, $b$ premiers entre eux, et choisissons $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $ua + vb = 1$. L'élément $y = u\,(q\alpha) + v\,\alpha$ est dans $P$, et $by = ua\,\alpha + vb\,\alpha = \alpha$. Par indivisibilité, $b = \pm 1$, donc $b = 1$ et $q = a \in \mathbb{Z}$. □

*Remarque.* L'argument n'utilise ni la liberté de $P$, ni la finitude de $\Delta$, ni la forme invariante : il suffit que $S_\alpha$ préserve $P$ et soit de la forme $x \mapsto x - f(x)\,\alpha$. C'est le pas que le crochet attribue à l'indivisibilité.

**Contre-exemple 7.1** (Page 4, les trois axiomes seuls ♦). *Dans $P = \mathbb{Z}^2$, soit*

$$\Delta = \{\pm 3e_1, \pm 3e_2, \pm(e_1 + e_2), \pm(e_1 - e_2)\}.$$

1. *$\Delta$ engendre $\mathbb{Z}^2$ (axiome a).*

[8] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder44.lean`.

2. *$\Delta = -\Delta$, et aucune racine n'est un multiple rationnel $qa$ d'une racine $a$ avec $q \neq \pm 1$ (axiome b, avec $n \in \mathbb{Q}$ comme sur la page).*

3. *Pour chaque $a \in \Delta$, il existe un automorphisme $S$ de $\mathbb{Z}^2$ tel que $Sa = -a$ et $S(\Delta) \subset \Delta$ (axiome c).*

4. *Soit $f : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Q}$ additive, avec $f(3e_1) = 2$, telle que $x \mapsto x - f(x) \cdot 3e_1$ envoie $\Delta$ dans $\Delta$. Alors $f(e_1 + e_2) = 2/3$. Une telle $f$ existe : $f(x_1, x_2) = 2x_1/3$.*

*Le nombre de Cartan $\langle \gamma_{3e_1}, e_1 + e_2 \rangle$ vaut donc $2/3$, qui n'est pas entier, et $3e_1 = 3 \cdot e_1$ est divisible dans $P$.*

*Démonstration.* On a $e_1 = 3e_1 - (e_1 + e_2) - (e_1 - e_2)$ et $e_2 = (e_1 + e_2) - e_1$, d'où l'axiome a). Pour b), deux racines proportionnelles sont sur une même droite par l'origine, et chacune des quatre droites $\mathbb{Q}e_1$, $\mathbb{Q}e_2$, $\mathbb{Q}(e_1+e_2)$, $\mathbb{Q}(e_1-e_2)$ ne contient que deux racines opposées ; on vérifie les soixante-quatre couples. Pour c), les quatre réflexions du groupe de Weyl de type $B_2$, $(x_1, x_2) \mapsto (-x_1, x_2)$, $(x_1, -x_2)$, $(-x_2, -x_1)$ et $(x_2, x_1)$, permutent $\Delta$ et changent en leur opposé respectivement $\pm 3e_1$, $\pm 3e_2$, $\pm(e_1 + e_2)$ et $\pm(e_1 - e_2)$.

Pour 4), l'additivité donne $3f(2e_1) = 2f(3e_1) = 4$, donc $f(e_1+e_2)+f(e_1-e_2) = f(2e_1) = 4/3$. L'image de $e_1+e_2$ est $(1-3f(e_1+e_2),\ 1)$ ; c'est une racine de seconde coordonnée $1$, donc $e_1+e_2$ ou $-e_1+e_2$, et $f(e_1+e_2) \in \{0, 2/3\}$. De même l'image $(1-3f(e_1-e_2),\ -1)$ de $e_1-e_2$ donne $f(e_1-e_2) \in \{0, 2/3\}$. La somme valant $4/3$, les deux valent $2/3$. Pour $f(x_1, x_2) = 2x_1/3$, l'application $x \mapsto x - f(x) \cdot 3e_1$ est la première réflexion. Enfin $3e_1 = 3 \cdot e_1$ avec $e_1 \in P$ et $3 \neq \pm 1$. □

*Remarque.* La réserve de la piste se confirme : les axiomes a) à c), même avec $n \in \mathbb{Q}$ dans b), ne donnent pas l'intégralité, et la symétrie de $3e_1$ y est unique, de sorte que le nombre $2/3$ ne dépend d'aucun choix. Les longueurs des racines sont dans le rapport $3/\sqrt{2}$ au lieu de $\sqrt{2}$ : le groupe engendré par les symétries est celui de $B_2$, mais $\Delta$ n'est pas cristallographique. La fiche ajoutait que $3e_1$ appartient encore au système simple $\{3e_1, e_2 - e_1\}$ ; c'est vrai au sens des groupes de réflexions, à coefficients rationnels positifs, mais pas au sens entier, car $e_1 + e_2 = \frac{2}{3} \cdot 3e_1 + (e_2 - e_1)$ n'est pas combinaison entière de $3e_1$ et $e_2 - e_1$ (vérifié dans le fichier). Un élément d'un système fondamental au sens entier fait partie d'une base de $P$, donc il est indivisible. Le crochet de la page n'est donc pas réfuté : les trois axiomes ne fournissent pas l'existence d'un tel système. Reste à lire sur le fac-similé le mot qui gouverne l'assertion, pour savoir si la page affirme, se propose de démontrer ou demande.

Ne sont pas démontrés ici : l'unicité des symétries par la forme invariante $\sum_a \langle x, a\rangle\langle y, a\rangle$ dans le cas général ; l'énoncé qu'un élément d'un système fondamental au sens entier est indivisible ; les axiomes de la donnée radicielle $(P, P', \Delta, \Delta', \varphi)$ de la seconde moitié du feuillet. Autres pistes de l'onglet Findings pour ce thème, dans des cotes qui n'ont pas de section ici :

**Conjecture** (Grothendieck, pages 93 et 94, amplitude par la caractéristique d'Euler ♦). *Un faisceau inversible $L$ sur un schéma projectif est ample dès que $\chi(\mathcal{O}_Z \otimes L^{\otimes n}) \to +\infty$ pour tout sous-schéma fermé intègre $Z$ de dimension $\geq 1$, et de même avec* dim $H^0$ *à la place de $\chi$. La page attribue l'énoncé à Mumford et Nakai.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (page 94). Ses deux lemmes y sont renvoyés à une « lettre de Mumford ». Mathlib n'a pas la caractéristique d'Euler des faisceaux cohérents ni l'amplitude. On se reportera aux notes de Grothendieck (14, lot 5, p. 93).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 1 à 22, section canonique par le déterminant ⧫). *Soient $X/S$ propre et plat, avec $\mathrm{Pic}^0_{X/S} = B$ schéma abélien de dual $A$, et $\delta$ une section de $\mathrm{NS}_{X/S}$. Le déterminant de la cohomologie du faisceau de Poincaré donne une trivialisation canonique du $A$-torseur $\mathrm{Alb}^{\chi(\delta)}_{X/S} \times^A \mathrm{Pic}^{\varphi(\delta)}_{B/S} \times^A (\widetilde{\varphi(\delta)})_*\mathrm{Pic}^{\delta}_{X/S})^{(-1)}$, où $\varphi : \mathrm{NS}_{X/S} \to \mathrm{NS}_{B/S}$ est une application polynomiale de degré $n-1$, non additive.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 1 à 4 et 16 à 19). La descente y est marquée « détailler », la propriété universelle de $\mathrm{Alb}^1$ annoncée page 22 sans preuve, et l'inverse sur le torseur poussé est de l'édition. Mathlib n'a pas le déterminant de la cohomologie ni le faisceau de Poincaré. On se reportera aux notes de Grothendieck (59, lot 1, p. 1).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 2, 3 et 20, pleine fidélité et composantes connexes ⧫). *Soient $S$ un schéma localement noethérien et $U \subset S$ un ouvert tel que toutes les caractéristiques résiduelles de $S - U$ soient égales à $p$. Le foncteur $A \mapsto (A_U, A[p^\infty], \mathrm{id})$ des schémas abéliens sur $S$ vers les triplets est pleinement fidèle dès que $U$ rencontre chaque composante connexe de $S$, sans hypothèse de normalité, de réduction ni de densité schématique.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (page 3). Le lemme d'existence de $S_v$ y renvoie à « Invariants 1.2 ». Mathlib n'a pas les schémas abéliens ni les groupes $p$-divisibles. On se reportera aux notes de Grothendieck (100, lot 1, p. 2).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 22 à 24, descente des morphismes le long d'un épimorphisme propre ⧫). *Soit $f : S' \to S$ un morphisme propre de schémas localement noethériens tel que $\mathcal{O}_S \to f_*\mathcal{O}_{S'}$ soit injectif, sans hypothèse de platitude, et soit $S'' = S' \times_S S'$. Pour tout $S$-schéma $X$ non ramifié et localement de type fini, la suite $\mathrm{Hom}_S(S, X) \to \mathrm{Hom}_S(S', X) \rightrightarrows \mathrm{Hom}_S(S'', X)$ est exacte ; le changement de base le long de $f$ est donc pleinement fidèle sur les schémas abéliens.*

Démonstration donnée par l'édition, non vérifiée en Lean. Mathlib n'a pas la descente des morphismes le long d'un morphisme propre. On se reportera aux notes de Grothendieck (100, lot 2, p. 22).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 30 à 38, algébrisation par les courbes ⧫). *Soit $R$ un anneau local noethérien complet. Un schéma abélien formel sur $\mathrm{Spf}\, R$ est algébrisable si et seulement si son changement de base à $\mathrm{Spf}\, B'$ l'est pour tout quotient intègre $B$ de dimension un de $R$, de normalisé $B'$, ou encore s'il le devient après un morphisme propre surjectif $S' \to \mathrm{Spec}\, R$.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 32 à 38). Mathlib n'a pas l'algébrisation des schémas formels. On se reportera aux notes de Grothendieck (100, lot 2, p. 30).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 39 à 48, faisceau des quasi-fonctions ⧫). *Les fonctions de Weil forment un faisceau de Zariski $QF_X$, somme amalgamée du faisceau $\Phi_X$ des fonctions admissibles et de $\mathcal{R}^*_X$ au-dessus de $\mathcal{O}^*_X$, dans une suite exacte $0 \to \Phi_X \to QF_X \to \mathrm{Div}_X \to 0$. Pour $X$ quasi-projectif, tout diviseur de Cartier est le diviseur d'une quasi-fonction globale.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 41 à 48). La page s'arrête avant le cas de $\mathbf{P}^r$. Mathlib n'a pas les fonctions de Weil ni les diviseurs de Cartier. On se reportera aux notes de Grothendieck (130, lot 2, p. 39).

**Théorème** (Grothendieck, pages 22 à 28, déterminants des parties étales ♦). *Pour un schéma abélien $A$ ordinaire localement polarisable sur une base connexe de caractéristique $p$, $\alpha_A = \det T_p(\tilde{\varphi})_{ét} / \sqrt{\deg \tilde{\varphi}}$ ne dépend pas de la polarisation $\varphi$ et est un isomorphisme de réseaux $\det T_p(A)_{ét} \simeq \det T_p(A^*)_{ét}$, compatible au changement de base ; pour une isogénie $u$, on a seulement $\det T_p(u)_{ét} \cdot \det T_p(u^*)_{ét} = \deg u$.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 24 et 26, déterminant et racine du degré ♦). *Pour une variété abélienne ordinaire polarisée $A$ et $u \in \mathrm{End}(A) \otimes \mathbf{Q}$ symétrique et positif pour l'involution de Rosati, le déterminant de $u$ sur la partie étale du module de Tate $p$-adique vaut $+\sqrt{\deg u}$.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 23 à 29 et 33, équivalence d'Albanese ♦). *Sur les cycles de toute codimension, posons $z \sim 0$ quand $z = Z_*(t)$ pour un cycle $Z$ sur $X \times T$, $T$ projective lisse connexe, et un $0$-cycle $t$ de degré $0$ sur $T$ tel que $\mathrm{alb}_T(t) = 0$. Cette relation est comprise entre les équivalences rationnelle et algébrique, passe aux produits, aux images réciproques et aux images directes propres, coïncide avec l'équivalence rationnelle sur les diviseurs et avec le degré et la somme d'Albanese sur les $0$-cycles ; dans l'anneau quotient, le produit de deux classes algébriquement triviales est nul.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 9 et 10, Riemann–Roch et transformation de Fourier sur une base ♦). *Sur une base $S$, Grothendieck–Riemann–Roch pour $m_A$ et $\mathrm{pr}_2$ donne $\mathrm{ch}(x * y) = (\mathrm{ch}\, x * \mathrm{ch}\, y) \cdot \mathrm{Todd}(t_A)$ sur un schéma abélien $A$ et, pour $\Psi_D = \mathrm{pr}_{2*}(\mathrm{pr}_1^*(-) \cdot \exp D)$, $\Psi_D(a * b) = \Psi_D(a)\, \Psi_D(b)$ sans correction ; la formule qui échange cup-produit et produit de Pontrjagin prend un facteur venu de $S$.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 16, 17 et 20, bonne réduction de l'Albanese ♦). *Si $X$ est projectif et plat sur un anneau de valuation discrète $V$, à fibres lisses hors d'un fermé de codimension $\geq 2$, de fibre générique géométriquement intègre et normale, $\mathrm{Alb}(X_K)$ et $(\mathrm{Pic}^0_{X_K})_{\mathrm{red}}$ ont bonne réduction.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 98 et 99, section hyperplane générique ♦). *Soient $X \subset \mathbf{P}^r$ normal intègre de dimension $\geq 2$ sur un corps algébriquement clos et $Y_{\bar{K}}$ sa section hyperplane générique sur la clôture algébrique de $k(t_1, \ldots, t_r)$. Alors $H^1(X, G) \to H^1(Y_{\bar{K}}, G)$ est injectif pour $G = \mathbf{G}_a$ et pour $G$ fini commutatif, $\mu_p$ et $\alpha_p$ compris ; le noyau de $\mathrm{Pic}^\tau_{X_{\bar{K}}} \to \mathrm{Pic}^\tau_{Y_{\bar{K}}}$ est un $p$-groupe unipotent fini.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 226 à 228 et 247 à 271, Picard analytique et complété ♦). *Soient $f : X \to Y$ un morphisme propre d'espaces analytiques complexes et $y \in Y$. L'application $(R^1 f_* \mathcal{O}_X^*)_y \to \varprojlim \mathrm{Pic}(X_n)$ est un isomorphisme si et seulement si $(R^1 f_* \mathcal{O}_X)_y$ est de longueur finie ; le système $(\mathrm{Pic}(X_n))$ est de Mittag-Leffler ; $X$ est projectif au voisinage de $y$ si et seulement si tous les $X_n$ sont projectifs.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 11 à 13, torseur de Picard en dimension 2 ♦). *Pour un schéma abélien $A/S$ de dimension relative $2$ et une section $\delta$ de $\mathrm{NS}_{A/S}$ avec $\chi(\delta)$ pair, le torseur $\mathrm{Pic}^\delta_{A/S}$ sous le dual est trivial.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 36 à 38, points de dimension un ⧫). *Dans le spectre d'un anneau local noethérien complet, une famille dénombrable de fermés dont la réunion contient tous les points $x$ tels que* $\dim \overline{\{x\}} \leq 1$ *a une sous-famille finie qui recouvre le spectre.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 47 à 52, prolongement vers un modèle de Néron ⧫). *Sur un trait $S$, pour tout modèle de Néron $G$ et tout groupe $p$-divisible $M$ sur $S$, tout homomorphisme $M_K \to G_K$ des fibres génériques se prolonge de façon unique en $M \to G$, le théorème de pleine fidélité de Tate pour les groupes $p$-divisibles sur $S$ étant admis.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Conjecture** (Grothendieck, pages 7 et 8, intégralité sur une variété abélienne ⧫). *Sur une variété abélienne, pour un fibré en droites $L$ de classe de Néron–Severi $\delta$ avec $\chi = \chi(\delta) \neq 0$ et $\delta'$ la classe déterminée par* $\det \Phi_L(L)$*, les classes $\binom{\chi}{k}\delta'^k/\chi^m$ sont entières, comme conséquences de $c(\Phi_L(\mathrm{cl}\, L)) = (1 - D'/\chi)^\chi$.*

Mathlib n'a pas les classes de Chern sur les variétés abéliennes. On se reportera aux notes de Grothendieck (47, lot 1, p. 7).

**Conjecture** (Grothendieck, page 3, critère de platitude ⧫). *Soient $S$ localement noethérien, $\varphi : X \to Y$ un morphisme de $S$-schémas de type fini, $F$ quasi-cohérent sur $X$ et plat sur $S$, $G$ cohérent sur $Y$ et $G \to \varphi_* F$. Si $G \to \varphi_* F$ est injectif sur la fibre en $s$ aux points au-dessus de $y$, $G$ est plat sur $S$ en $y$.*

Mathlib n'a pas la platitude des faisceaux cohérents sur les schémas. On se reportera aux notes de Grothendieck (49, lot 1, p. 3).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 6 à 10, cadre axiomatique de la formule des traces ⧫). *Dans une catégorie additive munie d'une dualité $D$, d'un sous-groupe $N(A)$ d'éléments antisymétriques de* $\mathrm{Hom}(A, D(A))$*, de deux cônes $N^+ \subset N$ et $N^>$ qui engendrent $N$ et d'une forme d'intersection $I$ $r$-linéaire à valeurs entières, positive sur $N^>$, le degré $\nu(\alpha)$, les coefficients $\sigma_i(\alpha)$ de $\nu(\alpha + n)$ et la formule des traces* $\mathrm{tr}(\alpha) = r\, I(\xi^{r-1}, D_\xi(\alpha))/I(\xi^r)$ *se déduisent des axiomes, sans points, corps de base ni diviseurs.*

Accessible une fois les axiomes posés ; les arguments de positivité allongent la preuve.

**Conjecture** (Grothendieck, pages 42 à 49, rigidité des sous-groupes ⧫). *Soient $S$ localement noethérien connexe et $G$ un schéma en groupes de type fini sur $S$. Deux sous-schémas en groupes fermés « rigides » de $G$, c'est-à-dire commutatifs, plats, et dont chaque fibre géométrique est l'adhérence schématique de sa torsion d'ordre premier à la caractéristique résiduelle, qui coïncident sur une fibre, sont égaux.*

Mathlib n'a pas les schémas en groupes sur une base noethérienne. On se reportera aux notes de Grothendieck (57, lot 3, p. 42).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 3 à 5, symbole local de Néron ⧫). *Pour une variété abélienne $A$ sur le corps des fractions $K$ d'un anneau de valuation discrète, le symbole local de Néron $(X, a)_v$ est la somme d'un nombre d'intersection $i(\bar{X}, \bar{a})$ sur le modèle de Néron et d'une correction $v(X, a)$ caractérisée par quatre axiomes (bilinéarité, invariance par translation, normalisation par la partie verticale de* $\mathrm{div}\, \bar{f}$*, bornitude), avec $m\, v(X, a) \in \mathbf{Z}$ pour $m$ l'ordre du groupe des composantes ; d'où un accouplement $A^\vee(K) \times A(K) \to \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$.*

Mathlib n'a pas les modèles de Néron ni les symboles locaux. On se reportera aux notes de Grothendieck (130, lot 1, p. 3).

**Partie 12**

# Catégories tensorielles et dualité tannakienne

*Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici.* Mathlib contient les catégories monoïdales et rigides, mais pas la reconstruction tannakienne que ces cotes emploient.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 155, 161-5.

**Définition** (Grothendieck, page 1, idéalisateur de Takeuchi ♦)**.** Soient $A$ un algébroïde de Hopf sur une base non centrale $k'$, $J = \mathrm{Ker}(k' \otimes_k k' \to k')$ et $\mathcal{J} = J \cdot (A \hat{\otimes}_k A)$, idéal à droite. L'anneau où la comultiplication prend ses valeurs est le quotient idéalisateur $\tilde{\mathcal{J}}/\mathcal{J}$, avec $\tilde{\mathcal{J}} = \{\lambda \mid \lambda \mathcal{J} \subset \mathcal{J}\}$, et la comultiplication est un homomorphisme d'anneaux $A \to \tilde{\mathcal{J}}/\mathcal{J}$.

Accessible sans complétion ; mathlib n'a pas les produits tensoriels complétés. On se reportera aux notes de Grothendieck (155, lot 1, p. 1).

Partie 13

# Algèbre commutative

Ces cotes sont contemporaines de la rédaction d'EGA avec Dieudonné. Le 29 septembre 1965, il lui envoie le plan des paragraphes 20 à 27 du chapitre IV (25, lot 7, p. 134). Le 27 août 1967, il lui envoie un contre-exemple à EGA I 10.10.5 sans hypothèse noethérienne ; Dieudonné répond le 11 septembre qu'il n'est pas convaincu pour les modules de présentation finie (37, lot 5, p. 92, 37, lot 5, p. 95). La cote 22 est elle-même un tapuscrit de travail pour EGA IV.

## 8 Cote 21 : injectifs de $I$-torsion (proposition 2.15 et corollaire 2.16)[9]

La cote 21, *[Chapitre] 0 III : tapuscrit et copies de tapuscrit annotés (s.d.), notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [vers 1960-1967] », s'ouvre sur un tapuscrit corrigé à la main. Pour un anneau noethérien $A$ et un idéal $I$, il étudie les foncteurs contravariants sur la catégorie $\underline{C}$ des $A$-modules de type fini annulés par une puissance de $I$, et les représente par des modules $H$ dont tout élément est annulé par une puissance de $I$ (2.9 à 2.14). La proposition 2.15, énoncée page 11, caractérise ceux de ces modules qui sont injectifs. Sa démonstration, page 13, invoque le critère de Baer sous le nom de « Tohoku ». Pour l'étape décisive, elle écrit « En vertu de *Krull*, $I^n N$ contient une intersection $N \cap I^m N$ », avec $N$ là où la ligne suivante et l'argument demandent $M$ (21, lot 1, p. 13). Le corollaire 2.16 suit, puis une ligne biffée à la machine : « Si on rejette tout ce numéro (comme il me semble raisonnable) ».

On explicite deux notions que la lecture prend dans les numéros précédents.

**Définition.** Un $A$-module $H$ est *de $I$-torsion* si tout élément de $H$ est annulé par une puissance de $I$. Le foncteur $\mathrm{Hom}(-, H)$ est *exact à droite sur $\underline{C}$* si, pour tout $M \in \underline{C}$ et tout sous-module $N \subseteq M$, tout homomorphisme $N \to H$ se prolonge en un homomorphisme $M \to H$. Pour un $A$-module $K$, on note $H^0_I(K)$ le sous-module des éléments de $K$ annulés par une puissance de $I$.

**Énoncé** (Proposition 2.15 ♦ 4 ■). *Soient $A$ un anneau noethérien, $I$ un idéal de $A$ et $H$ un $A$-module de $I$-torsion. Pour que $H$ soit un $A$-module injectif, il faut et il suffit que le foncteur $T_H(M) = \mathrm{Hom}(M, H)$ sur la catégorie $\underline{C}$ des $A$-modules de type fini annulés par une puissance de $I$ soit exact à droite, donc exact.*

**Énoncé** (Corollaire 2.16). *Soit $K$ un $A$-module. Si $K$ est injectif, $H^0_I(K)$ l'est aussi.*

**Lemme 8.1.** *Soient $H$ un module de $I$-torsion, $M$ un module de type fini et $g : M \to H$ un homomorphisme. Il existe $n$ tel que $a\, g(x) = 0$ pour tout $a \in I^n$ et tout $x \in M$.*

*Démonstration.* Soient $s_1, \ldots, s_k$ des générateurs de $M$, et $e_i$ tel que $I^{e_i}$ annule $g(s_i)$. Posons $n = \max_i e_i$ ; comme $I^n \subseteq I^{e_i}$, $I^n$ annule chaque $g(s_i)$. L'ensemble des $x \in M$ tels que $I^n$ annule $g(x)$ est un sous-module (il contient $0$, est stable par somme, et par multiplication par $c \in A$ puisque $a\, g(cx) = c\,(a\, g(x))$) ; il contient les générateurs, donc c'est $M$. C'est la phrase

[9] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder21.lean`.

du feuillet : l'image de $u$ est « un sous-module de type fini de $H$, donc annulé par une puissance de $I$ ». □

*Démonstration de la proposition 2.15. Nécessité.* Si $H$ est injectif, tout homomorphisme d'un sous-module $N$ de $M$ vers $H$ se prolonge à $M$, pour tout $M$, a fortiori pour $M \in \underline{C}$.

*Suffisance.* Supposons $\mathrm{Hom}(-, H)$ exact à droite sur $\underline{C}$. Par le critère de Baer [3], il suffit de montrer que, pour tout idéal $J$ de $A$, tout homomorphisme $g : J \to H$ se prolonge à $A$. L'idéal $J$ est de type fini ($A$ est noethérien) ; par le lemme 8.1, il existe $n$ tel que $I^n$ annule $g(J)$, et donc $g$ est nul sur $I^n J$, qui est engendré par les produits $ay$ avec $a \in I^n$, $y \in J$, et sur lesquels $g(ay) = a\, g(y) = 0$.

Par le lemme d'Artin–Rees, établi indépendamment par E. Artin et par D. Rees, qui l'a publié en 1956 [40], appliqué au module $A$, à son sous-module $J$ et à l'idéal $I$, il existe $k$ tel que $J \cap I^p = I^{p-k}(J \cap I^k)$ pour tout $p \geqslant k$. Posons $m = n + k$ ; alors

$$J \cap I^m = I^n(J \cap I^k) \subseteq I^n J.$$

C'est l'inclusion $N \cap I^m M \subseteq I^n N$ de la lecture, pour $M = A$ et $N = J$.

Soit $\varphi : J \to A/I^m$ la composée de l'inclusion et de la projection. Son noyau est $J \cap I^m$, contenu dans $I^n J$, sur lequel $g$ est nul. Donc $g$ se factorise par l'image de $\varphi$ : il existe $u' : \varphi(J) \to H$ avec $u'(\varphi(x)) = g(x)$ pour $x \in J$. Le module $A/I^m$ est de type fini et annulé par $I^m$, donc dans $\underline{C}$, et $\varphi(J) \simeq J/(J \cap I^m)$ en est un sous-module. Par hypothèse, $u'$ se prolonge en $w : A/I^m \to H$. La composée de la projection $A \to A/I^m$ et de $w$ prolonge $g$ : pour $x \in J$, elle envoie $x$ sur $w(\varphi(x)) = u'(\varphi(x)) = g(x)$. □

*Démonstration du corollaire 2.16.* Le module $H^0_I(K)$ est de $I$-torsion par définition. Vérifions que $\mathrm{Hom}(-, H^0_I(K))$ est exact à droite sur $\underline{C}$. Soient $M \in \underline{C}$, annulé par $I^n$, $N \subseteq M$ et $f : N \to H^0_I(K)$. Comme $K$ est injectif, la composée de $f$ et de l'inclusion $H^0_I(K) \subseteq K$ se prolonge en $v : M \to K$. Pour $x \in M$ et $a \in I^n$, $a\, v(x) = v(ax) = v(0) = 0$ : $v$ prend ses valeurs dans $H^0_I(K)$, et fournit le prolongement cherché. La proposition 2.15 conclut. □

*Remarque.* La démonstration a besoin de l'inclusion d'Artin–Rees $N \cap I^m M \subseteq I^n N$, avec le module ambiant dans l'intersection, comme la lecture le rétablit. Celle de la page, $N \cap I^m N \subseteq I^n N$, est triviale pour $m \geqslant n$ et ne sert pas. L'inclusion utile résulte du lemme d'Artin–Rees ; le théorème d'intersection de Krull (1938) qu'invoque la page ne la donne pas.

*Remarque.* Dans 2.15, la finitude des objets de $\underline{C}$ n'intervient qu'à travers les modules monogènes $A/I^m$ : pour l'injectivité, il suffit que les homomorphismes vers $H$ se prolongent le long des inclusions $J/(J \cap I^m) \hookrightarrow A/I^m$.

*Remarque.* La démonstration de 2.16 n'emploie aucune finitude de $M$, seulement qu'il est annulé par une puissance de $I$ ; la noethérianité n'y sert qu'à travers 2.15.

*Remarque.* L'énoncé selon lequel la composante $I$-primaire d'un module injectif sur un anneau noethérien est injective est proposé à mathlib (PR mathlib4 #44724) ; c'est le lemme 08XW de [43].

Ne sont pas démontrés ici : la profondeur le long d'un fermé et le prolongement de type Hartogs ; les numéros 2.1 à 2.14 (Eilenberg–Watts, module représentant, premiers associés) ; la proposition 2.15 comme équivalence de catégories ; le numéro 2.17 ; les pages 15 à 28 (faisceaux, catégories fibrées, torseurs).

**Théorème 8.2** (Grothendieck, pages 21 à 26, critère ponctuel pour une catégorie fibrée ♦). *Soient $X$ un espace spectral noethérien, $Y$ une partie de $X$ et $F$ une catégorie fibrée sur les ouverts de $X$. La restriction de $F$ à $X - Y$ est une équivalence sur tout ouvert si et seulement si, en tout point $x \in Y$, le foncteur induit de $X_{(x)}$ vers $X_{(x)} - \{x\}$ est une équivalence, $X_{(x)}$ désignant le localisé de Zariski en $x$.*

◊ *non vérifié en Lean*

# 9 ]

]Cote 22 : produits de modules plats (lemme 3.3, corollaires 3.4 et 3.5), et l'obstruction sur $k[[t]]$[10]

La cote 22, *[EGA IV]. [Chapitre] 0 IV. Cohen, différentielles, algèbres formellement simples (Compléments)*, datée par l'inventaire « 1963-[vers 1967] », réunit des tirés à part, un tapuscrit annoté et des notes manuscrites. Les pages 9 à 17 sont un tapuscrit paginé de sa main 24 à 32 et corrigé à l'encre : le numéro 3 d'un chapitre adressé à un correspondant qu'il tutoie. Avant le théorème central du numéro, la page 10 (sa page 25) place trois énoncés et en donne la fonction : « il nous sera commode d'avoir un critère permettant de déduire de la propriété P une propriété de platitude » (22, lot 1, p. 10). Dans la démonstration du lemme 3.3, les mots « de type fini », qui qualifient les modules libres de la présentation, sont une addition manuscrite. Dans l'énoncé du corollaire 3.5, un passage biffé portait « de $A$-modules projectifs de type fini ». Les pages manuscrites 22 et 24 prennent $k = \mathbf{Q}((x_i))$ et $A = k[[t]]$, écrivent $\Omega_k \otimes_k A \simeq A^{(I)} \subsetneq \prod_i A\,dx_i$ et cherchent une dérivation $D : A \to \Omega_k \otimes_k A$ qui prolonge $d_k$ ; la page 22 présume que $A$ « n'est jamais formellement lisse sur $k$ pour la topologie discrète » (22, lot 2, p. 22). La page 24 choisit des indices $i_0, i_1, \ldots$, commence la série $\sum_n a_n t^n$ et s'arrête.

**Énoncé** (Lemme 3.3 ■). *Soient $A$ un anneau, $(P_i)_{i\in I}$ une famille de $A$-modules, $P = \prod_i P_i$ leur produit, et $M$ un $A$-module de présentation finie. Alors l'homomorphisme canonique $M \otimes_A P \to \prod_i (M \otimes_A P_i)$ est un isomorphisme.*

**Énoncé** (Corollaire 3.4 ; cas noethérien du théorème de Chase ■). *Supposons que tout $A$-module de type fini soit de présentation finie — par exemple $A$ noethérien. Alors tout produit de $A$-modules plats est plat.*

**Énoncé** (Corollaire 3.5 ■). *Supposons $A$ comme en 3.4, par exemple noethérien. Soit $P$ un $A$-module isomorphe à la limite projective d'un système projectif strict, admettant un système cofinal dénombrable, de $A$-modules projectifs. Alors $P$ est un $A$-module plat.*

Le corollaire 3.5 est démontré ici sous la forme à laquelle la lecture le ramène : un système $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dont les applications de transition $\pi_n : P_{n+1} \to P_n$ sont surjectives, sa limite étant le sous-module de $\prod_n P_n$ formé des suites $(x_n)$ telles que $\pi_n(x_{n+1}) = x_n$ pour tout $n$.

Pour un homomorphisme $g : M \to N$, notons $c_M : M \otimes P \to \prod_i (M \otimes P_i)$ l'homomorphisme canonique, $m \otimes (p_i)_i \mapsto (m \otimes p_i)_i$. Il est naturel en $M$ : $c_N \circ (g \otimes P) = \left(\prod_i (g \otimes P_i)\right) \circ c_M$, comme on le voit sur les tenseurs purs.

**Lemme 9.1.** *Pour tout entier $n$, $c_{A^n}$ est bijectif.*

*Démonstration.* Pour tout module $N$, on a l'isomorphisme $\psi_N : A^n \otimes N \to N^n$, $f \otimes x \mapsto (f_j x)_j$. Montrons que, pour $z \in A^n \otimes P$ et $i \in I$, la $j$-ième composante de $\psi_{P_i}(c_{A^n}(z)_i)$ est la $i$-ième

[10] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder22.lean`.

composante de la $j$-ième composante de $\psi_P(z)$. Les deux membres sont additifs en $z$ ; sur un tenseur pur $f \otimes (p_i)_i$, ils valent tous deux $f_j p_i$. Ainsi, à travers les isomorphismes $\psi$, l'application $c_{A^n}$ devient l'identification évidente de $(\prod_i P_i)^n$ avec $\prod_i P_i^n$, qui est bijective. □

*Démonstration du lemme 3.3.* C'est celle du feuillet. Le module $M$ étant de présentation finie, il existe une suite exacte $A^m \xrightarrow{f} A^n \xrightarrow{g} M \to 0$ de modules libres *de type fini*. Le produit tensoriel étant exact à droite, on obtient deux suites exactes

$$\begin{array}{ccccccc} A^m \otimes P & \longrightarrow & A^n \otimes P & \longrightarrow & M \otimes P & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle c_{A^m}} & & \downarrow{\scriptstyle c_{A^n}} & & \downarrow{\scriptstyle c_M} & & \\ \prod_i (A^m \otimes P_i) & \longrightarrow & \prod_i (A^n \otimes P_i) & \longrightarrow & \prod_i (M \otimes P_i) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

la seconde parce qu'un produit de suites exactes est exact (on choisit un antécédent composante par composante). Les homomorphismes $c_{A^m}$, $c_{A^n}$, $c_M$ forment un morphisme de la première suite dans la seconde, par naturalité de $c$. Les deux premiers sont bijectifs par le lemme 9.1. Le lemme des cinq, sous sa forme pour des suites exactes à droite (surjectivité à gauche, bijectivité au milieu), montre que $c_M$ est bijectif. □

*Démonstration du corollaire 3.4.* On démontre en fait davantage : il suffit que tout idéal de type fini de $A$ soit de présentation finie. Soient $(P_i)$ des modules plats et $P = \prod_i P_i$. Par le critère classique de platitude par les idéaux, il suffit de voir que, pour tout idéal $J$ de type fini de $A$, l'application $J \otimes P \to A \otimes P$ induite par l'inclusion $\iota : J \to A$ est injective. Par naturalité,

$$\Big(\prod_i (\iota \otimes P_i)\Big) \circ c_J = c_A \circ (\iota \otimes P).$$

Le membre de gauche est injectif : $c_J$ l'est par le lemme 3.3, $J$ étant de présentation finie, et chaque $\iota \otimes P_i$ l'est parce que $P_i$ est plat. Donc $\iota \otimes P$ est injectif. Sous l'hypothèse de 3.4, tout idéal de type fini, module de type fini, est de présentation finie, et l'on conclut. □

**Lemme 9.2.** *Tout $A$-module de type fini est de présentation finie si et seulement si $A$ est noethérien.*

*Démonstration.* Si $A$ est noethérien, le noyau d'une surjection $A^n \to N$ est un sous-module de $A^n$, donc de type fini. Réciproquement, soit $J$ un idéal de $A$. Le module $A/J$ est de type fini, donc de présentation finie par hypothèse, et le noyau $J$ de la surjection $A \to A/J$, d'un module de type fini sur un module de présentation finie, est de type fini (fait classique). Tout idéal de $A$ est donc de type fini. □

**Lemme 9.3.** *Le produit de deux modules plats est plat.*

*Démonstration.* Pour un idéal $J$, l'isomorphisme $J \otimes (M \times N) \simeq (J \otimes M) \times (J \otimes N)$, naturel en $J$, identifie $J \otimes (M \times N) \to A \otimes (M \times N)$ au produit des deux applications injectives $J \otimes M \to M$ et $J \otimes N \to N$. □

*Démonstration du corollaire 3.5, pour un système indexé par $\mathbb{N}$.* Chaque $\pi_n : P_{n+1} \to P_n$ est surjective et $P_n$ est projectif, donc $\pi_n$ admet une section $s_n : P_n \to P_{n+1}$, $\pi_n \circ s_n = \mathrm{id}$. Le

noyau $K_n$ de $\pi_n$ est un facteur direct de $P_{n+1}$, un projecteur sur $K_n$ étant $\mathrm{id} - s_n \circ \pi_n$ ; il est donc projectif, en particulier plat. Soit $\Phi : \varprojlim_n P_n \to P_0 \times \prod_n K_n$ l'application

$$(x_n)_n \longmapsto \big(x_0,\ (x_{n+1} - s_n(x_n))_n\big),$$

bien définie car $\pi_n(x_{n+1} - s_n(x_n)) = x_n - x_n = 0$, et linéaire. Elle est injective : si deux suites ont même image, elles ont même terme d'indice 0, et par récurrence, $x_{n+1} = s_n(x_n) + k_n$ déterminant $x_{n+1}$ à partir de $x_n$, mêmes termes à tout indice. Elle est surjective : étant donnés $y \in P_0$ et $(k_n) \in \prod_n K_n$, la suite définie par $x_0 = y$ et $x_{n+1} = s_n(x_n) + k_n$ vérifie $\pi_n(x_{n+1}) = x_n + 0$, est donc dans la limite, et a pour image $(y, (k_n))$. Ainsi $\varprojlim P_n \simeq P_0 \times \prod_n K_n$. Par le corollaire 3.4, $\prod_n K_n$ est plat ; par le lemme 9.3, $P_0 \times \prod_n K_n$ l'est, et la platitude passe à un module isomorphe. □

*Remarque.* Le lemme 3.3 vaut sur tout anneau commutatif. Sa réciproque, qu'un module pour lequel ces flèches sont bijectives pour toute famille $(P_i)$ est de présentation finie, est due à Lenzing (1969) [33]. L'addition manuscrite « de type fini » permet à la démonstration du feuillet de se ramener aux modules $A^n$.

*Remarque.* L'hypothèse de 3.4, que tout module de type fini soit de présentation finie, équivaut à la noethérianité (lemme 9.2). Le « par exemple $A$ noethérien » de la page ne désigne donc pas une classe plus large.

*Remarque.* Le corollaire 3.4 est un cas du théorème de Chase, publié en 1960 [14] : sur un anneau cohérent, tout produit de modules plats est plat. L'inventaire date le dossier « 1963-[vers 1967] ». La démonstration ci-dessus n'applique le lemme 3.3 qu'aux idéaux de type fini.

*Remarque.* Trois lemmes généraux de cette section sont proposés à mathlib : un produit de modules plats est plat (PR mathlib4 #44714), le produit tensoriel par un module de présentation finie commute aux produits (#44715), et un anneau est noethérien si et seulement si tout module de type fini y est de présentation finie (#44716).

*L'obstruction des pages 22 et 24.* On note $A = k[[t]]$ et, pour un $k$-module $M$, $A \otimes_k M$ le $A$-module obtenu par extension des scalaires. Une dérivation est prise sur une base quelconque $R$ (pour la page, $R = \mathbf{Q}$) ; seules servent l'additivité et la règle de Leibniz. « Formellement lisse pour la topologie discrète » est la lissité formelle de mathlib, `Algebra.FormallySmooth` : $\Omega_{A/k}$ projectif et $H_1(L_{A/k}) = 0$, ce qui équivaut au relèvement des morphismes à travers les idéaux de carré nul.

**Lemme 9.4.** *Soient $k$ un anneau commutatif non nul, $M$ un $k$-module libre de base $(b_i)_{i\in I}$, $(i_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite injective d'indices et $(a_n)$ une suite d'éléments de $k$. Il n'existe pas de dérivation $D : A \to A \otimes_k M$ telle que $D(a_n) = 1 \otimes b_{i_n}$ pour tout $n$.*

*Démonstration.* Pour $j \in I$, soit $p_j : A \otimes_k M \to A$ l'application $A$-linéaire $f \otimes m \mapsto b_j^*(m)\, f$, où $b_j^*$ est la coordonnée d'indice $j$. Un élément de $A \otimes_k M$ est une somme finie de tenseurs purs, donc n'a qu'un nombre fini de coordonnées $p_j$ non nulles. Soit $f = \sum_n a_n t^n$. Il existe donc $n$ tel que $p_{i_n}(D(f)) = 0$ et $p_{i_n}(D(t)) = 0$. L'application $E = p_{i_n} \circ D : A \to A$ est une dérivation, puisque $p_{i_n}$ est $A$-linéaire ; elle vérifie $E(t) = 0$, donc $E(t^m) = 0$ et $E(t^m g) = t^m E(g)$ pour tout $m$ et tout $g \in A$, et $E(a_m) = b_{i_n}^*(b_{i_m}) = \delta_{mn}$, l'application $m \mapsto i_m$ étant injective. Écrivons $f = \sum_{m\le n} a_m t^m + t^{n+1} g$. Alors

$$E(f) = \sum_{m\le n} \delta_{mn}\, t^m + t^{n+1} E(g),$$

dont le coefficient de $t^n$ est 1. Or $E(f) = 0$, et $1 \neq 0$ dans $k$. □

**Théorème 9.5** (Grothendieck, pages 22 et 24, obstruction différentielle sur $k[[t]]$, topologie discrète ♦). *Soient $k = \mathbf{Q}(x_i : i \in I)$, avec $I$ infini, et $A = k[[t]]$. Les $dx_i$ forment une base de $\Omega_{k/\mathbf{Q}}$, si bien que $A \otimes_k \Omega_{k/\mathbf{Q}} \simeq A^{(I)}$ ; aucune dérivation $D : A \to A \otimes_k \Omega_{k/\mathbf{Q}}$ ne vérifie $D(c) = 1 \otimes dc$ pour tout $c \in k$, et $A$ n'est pas formellement lisse sur $k$ pour la topologie discrète.*

*Démonstration.* Les $dx_i$ forment une base de $\Omega_{P/\mathbf{Q}}$, pour $P = \mathbf{Q}[x_i : i \in I]$. Le corps $k$ est un localisé de $P$, donc formellement étale sur $P$, et $k \otimes_P \Omega_{P/\mathbf{Q}} \to \Omega_{k/\mathbf{Q}}$ est un isomorphisme ; les $dx_i$ forment donc une base de $\Omega_{k/\mathbf{Q}}$. Si $D$ existait, on choisirait une suite injective $(i_n)$ dans $I$ et $a_n = x_{i_n}$ : le lemme 9.4 interdit $D(x_{i_n}) = 1 \otimes dx_{i_n}$.

Supposons $A$ formellement lisse sur $k$. La suite de Jacobi–Zariski

$$H_1(L_{A/k}) \xrightarrow{\delta} A \otimes_k \Omega_{k/\mathbf{Q}} \xrightarrow{\iota} \Omega_{A/\mathbf{Q}} \longrightarrow \Omega_{A/k} \longrightarrow 0$$

est exacte. Comme $H_1(L_{A/k}) = 0$, $\iota$ est injective, et comme $\Omega_{A/k}$ est projectif, la surjection $\Omega_{A/\mathbf{Q}} \to \Omega_{A/k}$ a une section ; la suite est donc scindée et $\iota$ a une rétraction $A$-linéaire $r$. Alors $D = r \circ d_A$ est une dérivation de $A$ dans $A \otimes_k \Omega_{k/\mathbf{Q}}$, et $D(c) = r(\iota(1 \otimes dc)) = 1 \otimes dc$ pour $c \in k$, ce qui vient d'être exclu. □

**Corollaire 9.6.** *Soient $R$ un anneau commutatif et $K$ un corps qui est une $R$-algèbre, avec $\Omega_{K/R}$ de dimension infinie sur $K$. Alors $K[[t]]$ n'est pas formellement lisse sur $K$ pour la topologie discrète.*

*Démonstration.* Les $da$, $a \in K$, engendrent $\Omega_{K/R}$ ; on en extrait une base, infinie par hypothèse, et une suite injective $da_0, da_1, \ldots$ de vecteurs de cette base. La seconde moitié de la démonstration précédente, avec le lemme 9.4, s'applique telle quelle. □

*Remarque.* La moitié discrète de l'énoncé tient telle que la lecture la donne. La réduction à $D(t) = 0$, que les pages 22 et 23 font dans une prose en grande partie illisible en passant par un sous-corps de type fini $k_0$, n'est pas nécessaire : il suffit de prendre $n$ assez grand pour que la coordonnée d'indice $i_n$ de $D(t)$ soit déjà nulle. La caractéristique 0 ne sert pas non plus : le corollaire 9.6 vaut pour tout corps dont le module des différentielles absolues est de dimension infinie, en particulier en caractéristique $p$ pour $\mathbb{F}_p(x_i : i \in I)$, $I$ infini. La piste demande si l'exemple figure dans EGA $0_{\text{IV}}$ ou chez Matsumura ; le projet Stacks n'énonce la lissité formelle de $K[[x]]$ que pour la topologie $(x)$-adique [43, tags 07EL et 07EM].

Ne sont pas démontrés ici : la lissité, la non-ramification et l'étalitude formelles pour des topologies préadiques, et leurs critères de relèvement ; en particulier la moitié $t$-adique de l'obstruction ; dans le corollaire 3.5, la réduction à un système indexé par $\mathbb{N}$ ; les numéros 3.2 et 3.6 à 3.13 (algèbres de Cohen, homomorphismes réguliers) ; la proposition de la page 23 ; le contre-exemple sur les différentielles (pages 26 et 28) ; les pages 1 à 8, 18 à 21, 23 et 25 à 28.

**Théorème 9.7** (Grothendieck, pages 26 et 28, noyau des différentielles ♦). *Pour une extension de corps $K/k$ de caractéristique $p > 0$, l'application $\Omega^1_{k/(k\cap K^p)} \otimes_k K \to \Omega^1_K$ n'est pas toujours injective : le noyau de $\Omega^1_k \otimes_k K \to \Omega^1_K$ n'est pas toujours engendré par les différentielles des éléments de $k \cap K^p$. Contre-exemple : $\mathbb{F}$ un corps de caractéristique $p$, $k = \mathbb{F}(x, y) \subset K = \mathbb{F}(x, a_0^{1/p}, \ldots, a_{p-1}^{1/p})$, où $y = \sum_i a_i x^i$ et $x, y, a_1, \ldots, a_{p-1}$ sont algébriquement indépendants.*

◊ *non vérifié en Lean*

## 10 Cote 67 : modules à involution et triples $(P, Q, m)$[11]

La cote 67, *Chirurgie des surfaces conformes : notes manuscrites (s.d., 1983-1984), lettres (1984)*, compte cent pages. Elle s'achève sur des notes consacrées aux courbes elliptiques réelles (pages 90 à 100). Une courbe elliptique réelle y revient à un réseau $\Pi$ de rang 2 muni d'une involution qui renverse l'orientation (page 92). Pour classer ces involutions, la page 90, datée « Déc 83 », fait un détour d'algèbre linéaire sur un anneau quelconque, « par exemple » commutatif, le mot étant lu avec doute (67, lot 5, p. 90). Elle considère les $k$-modules $M$ munis d'un automorphisme $\sigma$ tel que $\sigma^2 = \mathrm{id}$ et sur lesquels la multiplication par 2 est injective, et leur associe les triples $(P, Q, m)$. Elle établit $M_+ \cap M_- = 0$, $2M \subset M_+ \oplus M_-$, $M' \cap P = 2P$ et $M' \cap Q = 2Q$ pour $M' = 2M$, reconstitue $(M, \sigma)$ à partir du triple par l'isomorphisme $2\,\mathrm{id}_M : M \to M'$, et énonce la proposition. La page 91 en est le brouillon ; la page 99 en tire le cas du rang 2 sur un anneau principal (67, lot 5, p. 99).

*Conventions.* Soit $k$ un anneau, non nécessairement commutatif. Un $k$-module $M$ est 2-*régulier* si $2x = 0$ entraîne $x = 0$ dans $M$ ; on note $2M$ l'image de la multiplication par 2, qui est un sous-module puisque 2 est central. La catégorie $\mathcal{I}$ a pour objets les couples $(M, \sigma)$ d'un $k$-module 2-régulier et d'un endomorphisme $k$-linéaire $\sigma$ tel que $\sigma^2 = \mathrm{id}$, et pour morphismes $(M, \sigma) \to (M', \sigma')$ les applications $k$-linéaires $f$ telles que $f\sigma = \sigma' f$. On pose $M_+ = \mathrm{Ker}(1 - \sigma)$ et $M_- = \mathrm{Ker}(1 + \sigma)$. La catégorie $\mathcal{T}$ a pour objets les triples $(P, Q, m)$ de deux $k$-modules 2-réguliers et d'un sous-module $m$ de $P/2P \times Q/2Q$ tel que $(p, 0) \in m$ entraîne $p = 0$ et $(0, q) \in m$ entraîne $q = 0$ ; ses morphismes $(P, Q, m) \to (P', Q', m')$ sont les couples $(f, g)$ d'applications linéaires $P \to P'$, $Q \to Q'$ telles que $(\bar{f} \times \bar{g})(m) \subset m'$, où $\bar{f}$, $\bar{g}$ sont les applications induites, qui existent puisque $f(2P) \subset 2P'$. Un sous-$k$-module de $P/2P \times Q/2Q$ est la même chose qu'un sous-$k/2k$-module, 2 annulant ce produit. Pour un triple $T = (P, Q, m)$, on note $N_T \subset P \times Q$ l'image réciproque de $m$ : $(p, q) \in N_T$ si et seulement si $(\bar{p}, \bar{q}) \in m$.

**Théorème 10.1** (Grothendieck, page 90, *proposition* ♦). *Soit $(M, \sigma)$ un objet de $\mathcal{I}$, et $P = M_+$, $Q = M_-$.*

1. *$P \cap Q = 0$ ; $x + \sigma x \in P$ et $x - \sigma x \in Q$ pour tout $x \in M$ ; $P \cap 2M = 2P$ et $Q \cap 2M = 2Q$.*
2. *Soit $m$ l'image dans $P/2P \times Q/2Q$ de $\{(p, q) \in P \times Q \mid p + q \in 2M\}$. Pour $p \in P$, $q \in Q$, on a $(\bar{p}, \bar{q}) \in m$ si et seulement si $p + q \in 2M$, et $(P, Q, m)$ est un objet de $\mathcal{T}$.*
3. *Le foncteur $B : \mathcal{T} \to \mathcal{I}$, $(P, Q, m) \mapsto (N_T, \mathrm{id}_P \times (-\mathrm{id}_Q))$, est une équivalence de catégories. L'application $x \mapsto (x + \sigma x, x - \sigma x)$ est un isomorphisme de $(M, \sigma)$ sur $B(P, Q, m)$ ; un quasi-inverse de $B$ envoie donc $(M, \sigma)$ sur un triple isomorphe à $(M_+, M_-, m)$, et le foncteur $(M, \sigma) \mapsto (P, Q, m)$ de la page est une équivalence.*

*Aucune hypothèse de finitude ni de projectivité n'est faite sur $M$, $P$ ou $Q$.*

*Démonstration de (1).* Si $x \in P \cap Q$, on a $\sigma x = x$ et $\sigma x = -x$, donc $2x = x + x = x - x = 0$, et $x = 0$ par 2-régularité. Comme $\sigma^2 = \mathrm{id}$, $\sigma(x + \sigma x) = \sigma x + x$ et $\sigma(x - \sigma x) = -(x - \sigma x)$. Soit $p \in P$ avec $p = 2y$, $y \in M$ : alors $2\sigma y = \sigma(2y) = \sigma p = p = 2y$, donc $\sigma y = y$ par 2-régularité, et $y \in P$, d'où $p \in 2P$. De même, si $q \in Q$ et $q = 2y$, alors $2\sigma y = -q = 2(-y)$, donc $\sigma y = -y$ et $y \in Q$. Les inclusions inverses $2P \subset P \cap 2M$, $2Q \subset Q \cap 2M$ sont claires. □

[11] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder67.lean`.

*Démonstration de (2).* Si $(\bar{p},\bar{q}) \in m$, il existe $(p',q')$ avec $p'+q' \in 2M$, $p'-p \in 2P$ et $q'-q \in 2Q$ ; comme $2P$ et $2Q$ sont contenus dans $2M$, $p+q = (p'+q') - (p'-p) - (q'-q)$ est dans $2M$. La réciproque est la définition de $m$. Les modules $P$ et $Q$ sont 2-réguliers comme sous-modules de $M$. Si $(\bar{p},0) \in m$, alors $(\bar{p},\bar{0}) \in m$, donc $p = p+0 \in 2M$, donc $p \in 2P$ par (1), c'est-à-dire $\bar{p} = 0$ ; de même pour $Q$. □

*Démonstration de (3). Le foncteur.* Pour $T = (P,Q,m)$, l'application $\tau = \mathrm{id}_P \times (-\mathrm{id}_Q)$ conserve $N_T$, car $-\bar{q} = \bar{q}$ dans $Q/2Q$ (puisque $-q-q = 2(-q)$) ; on a $\tau^2 = \mathrm{id}$, et $N_T$ est 2-régulier comme sous-module de $P \times Q$. Un morphisme $(f,g)$ envoie $N_T$ dans $N_{T'}$ par la condition $(\bar{f} \times \bar{g})(m) \subset m'$, et $f \times g$ commute à $\tau$ ; c'est le foncteur $B$. Pour $p \in P$ et $q \in Q$, $(2p,0)$ et $(0,2q)$ sont dans $N_T$, leurs classes étant nulles.

*Fidélité.* Si $B(f,g) = B(f',g')$, on évalue en $(2p,0)$ : $2f(p) = 2f'(p)$, donc $f(p) = f'(p)$ par 2-régularité de $P'$ ; de même $g = g'$ en évaluant en $(0,2q)$.

*Plénitude.* Soit $h : B(T) \to B(T')$ un morphisme de $\mathcal{I}$, $T' = (P',Q',m')$. Pour $p \in P$, posons $h(2p,0) = (a,b)$. Comme $(2p,0)$ est fixe par $\tau$, $(a,-b) = \tau h(2p,0) = h(2p,0) = (a,b)$, donc $2b = b+b = b-b = 0$ et $b = 0$. Comme $(a,0) \in N_{T'}$, $(\bar{a},0) \in m'$, donc $\bar{a} = 0$ et $a \in 2P'$. La multiplication par 2 étant un isomorphisme linéaire de $P'$ sur $2P'$, on pose $f(p) = a/2$ ; $f$ est linéaire, comme composé de $p \mapsto h(2p,0)$, de la première projection et de cet inverse. De même, $(0,2q)$ étant changé de signe par $\tau$, $h(0,2q) = (0,c)$ avec $c \in 2Q'$, et l'on pose $g(q) = c/2$. Pour $(p,q) \in N_T$, on a $2(p,q) = (2p,0) + (0,2q)$ dans $N_T$, donc

$$2\,h(p,q) = h(2p,0) + h(0,2q) = (2f(p),0) + (0,2g(q)) = 2\,(f(p),g(q)),$$

et $h(p,q) = (f(p),g(q))$ par 2-régularité de $P' \times Q'$. En particulier, si $(\bar{p},\bar{q}) \in m$, alors $(p,q) \in N_T$ et $(f(p),g(q)) = h(p,q) \in N_{T'}$, c'est-à-dire $(\overline{f(p)},\overline{g(q)}) \in m'$ : $(f,g)$ est un morphisme de $\mathcal{T}$, et $B(f,g) = h$.

*Essentielle surjectivité.* Soit $(M,\sigma)$ un objet de $\mathcal{I}$ et $T = (M_+,M_-,m)$ le triple de (2). L'application $\varphi(x) = (x+\sigma x, x-\sigma x)$ est linéaire de $M$ dans $M_+ \times M_-$ par (1), à valeurs dans $N_T$ par (2), puisque $(x+\sigma x)+(x-\sigma x) = 2x$. Elle commute aux involutions : $\varphi(\sigma x) = (\sigma x + x, \sigma x - x) = \tau\varphi(x)$. Elle est injective : si $\varphi(x) = \varphi(y)$, alors $2x = (x+\sigma x)+(x-\sigma x) = 2y$, et $x = y$. Elle est surjective : si $(p,q) \in N_T$, alors $p+q \in 2M$ par (2), soit $p+q = 2x$ ; on a $2\sigma x = \sigma p + \sigma q = p - q$, donc $2(x+\sigma x) = 2p$ et $2(x-\sigma x) = 2q$, d'où $\varphi(x) = (p,q)$. Un morphisme de $\mathcal{I}$ dont l'application sous-jacente est bijective est un isomorphisme, son inverse commutant encore aux involutions ; donc $(M,\sigma) \simeq B(T)$.

Un foncteur fidèle, plein et essentiellement surjectif est une équivalence. Si $C$ en est un quasi-inverse, $B(C(M,\sigma)) \simeq (M,\sigma) \simeq B(M_+,M_-,m)$, et $B$ étant pleinement fidèle, $C(M,\sigma) \simeq (M_+,M_-,m)$. □

*Remarque.* L'énoncé tient tel que la piste le formule, pour un anneau quelconque, commutatif ou non, sans hypothèse de finitude ni de projectivité. Seule la 2-régularité sert, à trois endroits : pour $P \cap Q = 0$ ; pour $P \cap 2M = 2P$ et $Q \cap 2M = 2Q$, qui font que $m$ rencontre trivialement chaque facteur ; et pour la plénitude, où un morphisme $h$ est déterminé par sa restriction à $2P \times 2Q$, parce que $2N_T \subset 2P \times 2Q$ et que le but est 2-régulier. La démonstration suit la page. La reconstruction de $(M,\sigma)$ y est l'isomorphisme $\varphi$, multiplication par 2 de $M$ sur $M' = 2M$ lue dans $P \oplus Q$.

*Remarque.* La vérification énonce l'équivalence dans le sens $B : \mathcal{T} \to \mathcal{I}$ de la reconstruction. Elle en déduit le foncteur de la page, $(M,\sigma) \mapsto (P,Q,m)$, comme quasi-inverse, à isomor-

phisme près sur chaque objet. La page ne définit pas les morphismes de triples. On a pris les couples $(f, g)$ tels que $(\bar{f} \times \bar{g})(m) \subset m'$, c'est-à-dire ceux pour lesquels $f \times g$ envoie $M'$ dans $M'$. La condition sur $m$, que la page écrit $m \cap P/2P = 0$, $m \cap Q/2Q = 0$, est prise telle quelle ; sa traduction en graphe d'un isomorphisme entre un sous-module de $P/2P$ et un sous-module de $Q/2Q$ n'est pas formalisée.

Ne sont pas démontrés ici : la description de $m$ comme graphe d'un isomorphisme $p' \simeq q'$ ; le corollaire de la page 90 ($M$ projectif de rang $2$, $k$ connexe), en partie illisible ; le corollaire de la page 99 (deux classes d'involutions $\neq \pm 1$ dans $\mathrm{GL}_2(k)$, pour $k$ principal et $k/2k$ un corps) et les deux types de réseaux de la page 92 ; le reste du dossier (chirurgie et métriques canoniques des surfaces conformes).

**Partie 14**

# Catégories et foncteurs

Les lettres du fonds sur les catégories monoïdales sont postérieures à la datation de la cote 19. Le 27 août 1974, il transpose pour Deligne les Gr-catégories de la thèse de Hoàng Xuân Sính dans le langage des champs (103, lot 1, p. 8). Le 5 février 1975, il écrit à Lawrence Breen sur les 2-catégories de Picard strictes, les gerbes et les liens (134-2, lot 3, p. 38).

## 11 Cote 19 : le théorème de comonadicité 1.12, la comonade sur une base produit et le théorème de Gabriel–Popescu[12]

La cote 19, *Topos : notes manuscrites (s.d.)*, quatre-vingt-quinze pages que l'inventaire date « [à partir de 1958-1973] », est un dossier de travail en neuf liasses. La première, « Tapis cartésiens » (pages 3 à 11), étudie la comonade d'une adjonction et ses coalgèbres. La page 4 énonce le « Théorème 1.12 », suivi d'un nom propre que la transcription lit « Beck » avec doute. Elle écrit « il faut et il suffit » pour b), et porte en marge la restriction « il suffit de regarder les doubles flèches $u, v$ de $A$ telles que Ker$(f(u), f(v))$ existe (condition C) » (19, lot 1, p. 4). La deuxième liasse, « Cohomologie relative », s'ouvre pages 14 et 15 sur la représentabilité. Pour une catégorie à générateur $U$, elle affirme une équivalence avec les modules sur End$(U)$, « [détails laissés au lecteur] » (19, lot 1, p. 15).
*Conventions.* On note, comme la lecture, $f : A \to B$ l'adjoint à gauche de $g : B \to A$, $\eta : \mathrm{id}_A \to gf$ l'unité, $\varepsilon : fg \to \mathrm{id}_B$ la coünité, et $\varphi = fg$ la comonade, de comultiplication $\delta_X = f(\eta_{gX})$. Une $\varphi$-coalgèbre est un couple $(X, a)$, $a : X \to \varphi X$, tel que $\varepsilon_X \circ a = 1_X$ et $\delta_X \circ a = \varphi(a) \circ a$ ; un morphisme $(X, a) \to (X', a')$ est une flèche $t : X \to X'$ telle que $a' \circ t = \varphi(t) \circ a$. Le foncteur de comparaison $h : A \to \varphi$-**Coalg** envoie $Y$ sur $(fY, f(\eta_Y))$ et $\psi$ sur $f(\psi)$. Le *noyau* Ker$(u, v)$ d'une double flèche est son égalisateur, et *$f$ y commute* s'il envoie un noyau de $(u, v)$ sur un noyau de $(fu, fv)$. On utilise les identités triangulaires $\varepsilon_{fY} \circ f(\eta_Y) = 1$ et $g(\varepsilon_X) \circ \eta_{gX} = 1$, et la bijection d'adjonction $t \mapsto t^\flat = g(t) \circ \eta_Y$, de $\mathrm{Hom}_B(fY, X)$ sur $\mathrm{Hom}_A(Y, gX)$, d'inverse $s \mapsto \varepsilon_X \circ f(s)$.

**Définition.** Le foncteur $f$ vérifie la *condition C* si, pour toute double flèche $(u, v)$ de $A$ telle que Ker$(fu, fv)$ existe, Ker$(u, v)$ existe et $f$ y commute. Un triplet $(e, s, t)$ formé de $e : E \to Y$, $s : Y \to E$ et $t : Z \to Y$ est un *noyau scindé* de $u, v : Y \rightrightarrows Z$ si $ue = ve$, $se = 1_E$, $tu = 1_Y$ et $tv = es$. Une double flèche $(u, v)$ de $A$ est *$f$-scindée* si $(fu, fv)$ admet un noyau scindé.

**Énoncé** (Théorème 1.12, page 4)**.** *Soit $f \dashv g$ une adjonction, $\varphi = fg$, et $h$ le foncteur de comparaison.*

*a) Si les noyaux de doubles flèches existent dans $A$ et si $f$ y commute, alors $h$ est essentiellement surjectif.*

*b) $h$ est une équivalence si et seulement si $f$ est conservatif et si, pour toute double flèche $(u, v)$ de $A$ telle que* Ker$(fu, fv)$ *existe,* Ker$(u, v)$ *existe et $f$ y commute.*

[12] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder19.lean`.

*La restriction portée en marge — il suffit de considérer les doubles flèches $(u, v)$ dont l'image par $f$ a un noyau — est la condition C.*

**Lemme 11.1.** *Si $(e, s, t)$ est un noyau scindé de $(u, v)$, alors $e$ est un noyau de $(u, v)$, et l'image de $(e, s, t)$ par tout foncteur est un noyau scindé de l'image de $(u, v)$.*

*Démonstration.* Soit $z : T \to Y$ avec $uz = vz$. Alors $z = tuz = tvz = e(sz)$, donc $z$ se factorise par $e$, et de façon unique, puisque $ez' = ez''$ entraîne $z' = sez' = sez'' = z''$. Les quatre conditions sont des égalités entre composés, qu'un foncteur conserve. □

**Lemme 11.2.** *Pour toute coalgèbre $(X, a)$, la double flèche $(\eta_{gX}, g(a)) : gX \rightrightarrows gfgX$ est $f$-scindée : $(a, \varepsilon_X, \varepsilon_{fgX})$ est un noyau scindé de $(f(\eta_{gX}), fg(a))$. Elle est de plus coréflexive : $g(\varepsilon_X)$ est une rétraction commune de $\eta_{gX}$ et de $g(a)$.*

*Démonstration.* On a $f(\eta_{gX}) \circ a = \delta_X \circ a = \varphi(a) \circ a = fg(a) \circ a$ par coassociativité ; $\varepsilon_X \circ a = 1_X$ par l'axiome de coünité ; $\varepsilon_{fgX} \circ f(\eta_{gX}) = 1$ par l'identité triangulaire en $gX$ ; et $\varepsilon_{fgX} \circ fg(a) = a \circ \varepsilon_X$ par naturalité de $\varepsilon$. Enfin $g(\varepsilon_X) \circ g(a) = g(\varepsilon_X \circ a) = 1$ et $g(\varepsilon_X) \circ \eta_{gX} = 1$. □

**Lemme 11.3.** *Supposons que, pour toute coalgèbre $(X, a)$, la double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ ait un noyau $e_X : R(X, a) \to gX$ et que $f$ y commute.*

1. *Pour tout $Y \in A$, $t \mapsto t^\flat$ induit une bijection entre les morphismes de coalgèbres $hY \to (X, a)$ et les flèches $k : Y \to R(X, a)$, par $t^\flat = e_X \circ k$.*
2. *Pour toute coalgèbre $(X, a)$, la flèche $\theta = \varepsilon_X \circ f(e_X)$ est un isomorphisme de coalgèbres de $h(R(X, a))$ sur $(X, a)$ ; en particulier $h$ est essentiellement surjectif.*
3. *Si de plus $f$ est conservatif, $h$ est une équivalence.*

*Démonstration.* (1) Soit $t : fY \to X$. Les transposées des deux membres de $a \circ t = \varphi(t) \circ f(\eta_Y)$ sont $g(a) \circ t^\flat$ et, puisque $\varphi(t) \circ f(\eta_Y) = f(t^\flat)$, $gf(t^\flat) \circ \eta_Y = \eta_{gX} \circ t^\flat$ par naturalité de $\eta$. La transposition étant bijective, $t$ est un morphisme de coalgèbres si et seulement si $t^\flat$ égalise $(\eta_{gX}, g(a))$, c'est-à-dire se factorise, de façon unique, par $e_X$.

(2) Posons $E = R(X, a)$. Par (1) appliqué à $k = 1_E$, la flèche $\theta$, de transposée $e_X$, est un morphisme de coalgèbres $hE \to (X, a)$, et $a \circ \theta = \varphi(\theta) \circ f(\eta_E) = f(\theta^\flat) = f(e_X)$. Or $a$ est un noyau de $(f(\eta_{gX}), fg(a))$ par les lemmes 11.1 et 11.2, et $f(e_X)$ en est un par hypothèse ; donc $\theta$ est un isomorphisme. Son inverse est un morphisme de coalgèbres :

$$\varphi(\theta^{-1}) \circ a = \varphi(\theta^{-1}) \circ a \circ \theta \circ \theta^{-1} = \varphi(\theta^{-1}) \circ \varphi(\theta) \circ f(\eta_E) \circ \theta^{-1} = f(\eta_E) \circ \theta^{-1}.$$

(3) Soit $Y' \in A$. La flèche $\eta_{Y'}$ égalise $(\eta_{gfY'}, gf(\eta_{Y'}))$, par naturalité de $\eta$ ; c'est la double flèche attachée à la coalgèbre $hY' = (fY', f(\eta_{Y'}))$, et l'on a donc $\eta_{Y'} = e_{hY'} \circ k_{Y'}$ pour une flèche $k_{Y'} : Y' \to R(hY')$. Appliquons $f$ : $f(\eta_{Y'})$ est un noyau de l'image de cette double flèche (lemmes 11.1 et 11.2, avec $a = f(\eta_{Y'})$), $f(e_{hY'})$ aussi par hypothèse, et $f(e_{hY'}) \circ f(k_{Y'}) = f(\eta_{Y'})$ ; donc $f(k_{Y'})$ est un isomorphisme, et $k_{Y'}$ aussi, $f$ étant conservatif. Pour $\psi : Y \to Y'$, la transposée de $h(\psi) = f(\psi)$ est $gf(\psi) \circ \eta_Y = \eta_{Y'} \circ \psi = e_{hY'} \circ (k_{Y'} \circ \psi)$ : dans la bijection (1), $h(\psi)$ correspond à $k_{Y'} \circ \psi$. Comme $\psi \mapsto k_{Y'} \circ \psi$ est bijective, $h$ est pleinement fidèle ; il est essentiellement surjectif par (2), c'est donc une équivalence. □

*Démonstration de a) et de la suffisance de b).* Si $f$ vérifie la condition C, chaque double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ a un noyau auquel $f$ commute, puisque son image a un noyau (lemmes 11.2 et 11.1). Le lemme 11.3 (2) donne alors a) sous la forme de la marge, et la forme du texte s'en déduit, car si tous les noyaux existent dans $A$ et que $f$ y commute, la condition C est vérifiée. Si de plus $f$ est conservatif, $h$ est une équivalence par le lemme 11.3 (3). □

*La nécessité de b) est fausse.* Soit $B$ la catégorie des couples d'ensembles $(X, Y)$, et $A$ la sous-catégorie pleine des couples tels que $Y \neq \varnothing$ entraîne $X \neq \varnothing$ ; $f$ est l'inclusion. Posons $g(X, Y) = (X, Y)$ si $X \neq \varnothing$ et $g(X, Y) = (\varnothing, \varnothing)$ sinon ; $g(X, Y)$ est dans $A$. Pour $(X', Y') \in A$, une flèche $(p, q) : (X', Y') \to (X, Y)$ de $B$ se factorise de façon unique par $g(X, Y) \to (X, Y)$ : si $Y' \neq \varnothing$, alors $X' \neq \varnothing$, donc $X \neq \varnothing$ ; si $Y' = \varnothing$, $q$ est l'application vide. Ainsi $f \dashv g$, et $f$ est une inclusion coréflexive. Une telle inclusion est pleinement fidèle, donc conservative, et comonadique : c'est classique — la comonade est idempotente, et ses coalgèbres sont, à isomorphisme près, les objets de $A$. Le foncteur $h$ est donc une équivalence.

Mais $f$ ne vérifie pas la condition C. Soient $u, v : (*, *) \rightrightarrows (\{0, 1\}, *)$ les flèches de $A$ qui envoient le point de la première composante sur $0$ et sur $1$ et sont l'identité sur la seconde. Leur noyau dans $B$ existe, c'est $(\varnothing, *)$. Si $K \to (*, *)$ était un noyau de $(u, v)$ dans $A$ auquel $f$ commute, $K$ serait isomorphe à $(\varnothing, *)$, de seconde composante non vide ; étant dans $A$, il aurait un point $x$ dans sa première composante, et $u$ et $v$ l'enverraient sur le même élément, c'est-à-dire $0 = 1$ : c'est absurde. Le noyau de $(u, v)$ dans $A$ est $(\varnothing, \varnothing)$, et $f$ n'y commute pas. □

**Énoncé** (Théorème de Beck, forme exacte ■). *Le foncteur $h$ est une équivalence si et seulement si $f$ est conservatif et si, pour toute double flèche $f$-scindée $(u, v)$ de $A$,* Ker$(u, v)$ *existe et $f$ y commute.*

*Démonstration.* La condition est suffisante par les lemmes 11.2 et 11.3 (3), qui n'utilisent que des doubles flèches $f$-scindées. Elle est nécessaire. Si $f(\psi)$ est inversible, $h(\psi)$ est un morphisme de coalgèbres dont la flèche sous-jacente est inversible, donc un isomorphisme de coalgèbres (le calcul de (2) ci-dessus), et $\psi$ est inversible parce que $h$, pleinement fidèle, reflète les isomorphismes. Que le foncteur d'oubli des coalgèbres, donc $f$, crée les noyaux des doubles flèches $f$-scindées est la partie classique du théorème de Beck, que la preuve vérifiée invoque. □

*Une base produit.* Les pages 7 à 11 reprennent la comonade d'une adjonction quand la base est un produit $B = \prod_{i \in I} B_i$ : $f$ est une famille $f_i : A \to B_i$, $g$ envoie $(X_i)$ sur $\prod_i g_i(X_i)$, et la page pose $\varphi_{ji} = f_j g_i$ en supposant « que les $f_j$ commutent aux produits de type $I$ (p. ex. $f_j$ exacts ; ou $I$ fini) » (19, lot 1, p. 7). Les données de la comonade y deviennent (3.9) $\bar{\alpha}_k = \alpha_k(X_k) \circ \mathrm{pr}_k$ et $\bar{\lambda}_{kji} = \lambda_{kji}(X_i) \circ \mathrm{pr}_i$, avec $\lambda_{kji} : \varphi_{ki} \to \varphi_{kj}\varphi_{ji}$ venu de l'unité id $\to g_j f_j$ ; la marge note que $\lambda_{iii}$ est $\lambda_i$, et le cas de deux facteurs, $g'$, $g''$ pleinement fidèles, ne laisse que $\varphi'$, $\varphi''$, $\lambda'$, $\lambda''$ (19, lot 1, p. 9). On se donne ici des adjonctions $f_i \dashv g_i$, $f_i : A \to B_i$, et l'on suppose que $A$ a les produits indexés par $I$ ; on note $\eta_i$, $\varepsilon_i$ leurs unités et coünités, $\mathrm{pr}_i$ les projections de $\prod_i g_i(X_i)$, et $\lambda_{kji}(X) = f_k(\eta_{j, g_i X}) : f_k g_i X \to f_k g_j f_j g_i X$.

**Énoncé** (Pages 7 et 8, la matrice de la comonade ♦). *1. Le foncteur $f = (f_i) : A \to \prod_i B_i$ est adjoint à gauche de $g$, $g((X_i)) = \prod_i g_i(X_i)$ ; l'unité a pour composantes les $\eta_i$, et la coünité en $(X_i)$ a pour composante $j$ la flèche $\varepsilon_{j, X_j} \circ f_j(\mathrm{pr}_j)$.*

2. *Si $f_j$ commute aux produits indexés par $I$, la composante $j$ de $\varphi((X_i))$ est un produit des $\varphi_{ji}(X_i)$, de projections les $f_j(\mathrm{pr}_i)$.*

3. *Sans autre hypothèse, la coünité de $\varphi$ a pour composante $k$ la flèche $\varepsilon_{k,X_k} \circ f_k(\mathrm{pr}_k)$, et la composante $k$ de la comultiplication $\delta$ vérifie, pour tous $j$ et $i$,*

$$f_k g_j f_j(\mathrm{pr}_i) \circ f_k(\mathrm{pr}_j) \circ \delta_k = \lambda_{kji}(X_i) \circ f_k(\mathrm{pr}_i) :$$

*c'est (3.9). Si tous les $f_j$ commutent aux produits indexés par $I$, ces égalités caractérisent $\delta_k$.*

4. *Pour $i = j = k$, $\lambda_{iii}$ est la comultiplication de la comonade $\varphi_i = f_i g_i$.*

L'adjonction du point 1, et la comonade vue comme une matrice de foncteurs $\varphi_{ji} = f_j g_i : B_i \to B_j$ (ici pour $I = \{1, 2\}$) :

$$A \underset{g=\prod_i g_i}{\overset{f=(f_i)}{\rightleftarrows}} \prod_i B_i \qquad \varphi \leftrightarrow \begin{pmatrix} f_1 g_1 & f_1 g_2 \\ f_2 g_1 & f_2 g_2 \end{pmatrix}.$$

*Démonstration.* (1) La bijection $\mathrm{Hom}(fY, (X_i)) = \prod_i \mathrm{Hom}(f_i Y, X_i) \simeq \prod_i \mathrm{Hom}(Y, g_i X_i) \simeq \mathrm{Hom}(Y, \prod_i g_i X_i)$ est naturelle en $Y$ et en $(X_i)$, composante par composante ; l'unité est l'image de l'identité, c'est-à-dire la flèche de composantes $\eta_{i,Y}$, et la coünité l'image réciproque de l'identité, de composante $j$ la transposée de $\mathrm{pr}_j$, soit $\varepsilon_{j,X_j} \circ f_j(\mathrm{pr}_j)$.

(2) Le cône $(\mathrm{pr}_i)$ est un produit dans $A$, et $f_j$ envoie un produit sur un produit : le cône $(f_j(\mathrm{pr}_i))$ de sommet $f_j(\prod_i g_i X_i)$ est un produit de la famille $f_j g_i(X_i)$.

(3) La coünité de $\varphi$ est celle de l'adjonction, calculée en (1). La composante $k$ de $\delta$ est $f_k(\eta_{gX})$, où $\eta$ est l'unité de (1), dont la composante $j$ est $\eta_j$. Donc $\delta_k$ suivie de $f_k(\mathrm{pr}_j)$ puis de $f_k g_j f_j(\mathrm{pr}_i)$ vaut $f_k\big(g_j f_j(\mathrm{pr}_i) \circ \eta_{j,gX}\big) = f_k\big(\eta_{j,g_i X_i} \circ \mathrm{pr}_i\big)$, par naturalité de $\eta_j$, c'est-à-dire $\lambda_{kji}(X_i) \circ f_k(\mathrm{pr}_i)$. Si les $f_j$ commutent aux produits indexés par $I$, $f_k(\prod_j g_j f_j g X)$ est un produit de projections $f_k(\mathrm{pr}_j)$ ; $g_j$, adjoint à droite, commute aux produits, si bien que $f_k g_j f_j(\prod_i g_i X_i)$ est un produit de projections $f_k g_j f_j(\mathrm{pr}_i)$. Deux flèches qui ont les mêmes composées avec toutes ces projections sont égales.

(4) $\lambda_{iii}(X) = f_i(\eta_{i,g_i X})$ est, par définition, la comultiplication de $f_i g_i$. □

**Énoncé** (Pages 7 à 9, les cas dégénérés et les deux facteurs ♦). *Supposons les $g_i$ pleinement fidèles.*

1. *$\varepsilon_i : \varphi_{ii} \to \mathrm{id}_{B_i}$ est un isomorphisme ; $\lambda_{kki}$ et $\lambda_{kjj}$ sont des isomorphismes pour tous $i, j, k$.*

2. *Pour $i \neq j$, $\lambda_{iji} = \lambda' \circ \varepsilon_i$, où $\lambda' = \lambda_{iji} \circ \varepsilon_i^{-1} : \mathrm{id}_{B_i} \to \varphi_{ij}\varphi_{ji}$.*

3. *Pour deux facteurs, $B = B' \times B''$, $\varphi' = f'g''$, $\varphi'' = f''g'$ : si $f'$ commute aux produits binaires, la composante $B'$ de $\varphi(X', X'')$ est un produit de $X'$ et de $\varphi'(X'')$, de projections $\varepsilon'_{X'} \circ f'(\mathrm{pr}')$ et $f'(\mathrm{pr}'')$ ; de même, si $f''$ y commute, la composante $B''$ est un produit de $\varphi''(X')$ et de $X''$.*

*Démonstration.* (1) Un adjoint à droite pleinement fidèle a une coünité inversible. L'identité triangulaire $\varepsilon_{k,f_k Y} \circ f_k(\eta_{k,Y}) = 1$ montre alors que $f_k(\eta_{k,Y})$ est l'inverse de $\varepsilon_{k,f_k Y}$ ; avec $Y = g_i X$, c'est $\lambda_{kki}(X)$. L'autre identité, $g_j(\varepsilon_{j,X}) \circ \eta_{j,g_j X} = 1$, montre que $\eta_{j,g_j X}$ est l'inverse de $g_j(\varepsilon_{j,X})$, et $\lambda_{kjj}(X) = f_k(\eta_{j,g_j X})$ est inversible.

(2) C'est la définition de $\lambda'$.

(3) Par (2) de l'énoncé précédent, la composante $B'$ de $\varphi(X', X'')$ est un produit de $f'g'(X')$ et de $f'g''(X'')$ ; remplacer la première projection par sa composée avec l'isomorphisme $\varepsilon'_{X'}$ donne encore un produit, de facteurs $X'$ et $\varphi'(X'')$. De même pour $B''$. □

**Contre-exemple 11.4** (Page 7, « ou $I$ fini » ♦). *Il existe des adjonctions $f_i \dashv g_i$, avec $I$ à deux éléments, pour lesquelles la composante $j$ de $\varphi((X_i))$ n'est isomorphe au produit des $\varphi_{ji}(X_i)$ pour aucun choix d'isomorphisme.*

*Démonstration.* Prenons $I = \{0, 1\}$, $A = B_0 = B_1$ la catégorie des ensembles, $f_i(Y) = \{0, 1\} \times Y$ et $g_i(X) = X^{\{0,1\}}$, l'adjonction étant la curryfication, et $X_0 = X_1 = *$. Alors $g_i(*) = *$, $\prod_i g_i(X_i) = *$ et la composante $j$ de $\varphi(X)$ est $\{0, 1\} \times *$, à deux éléments, tandis que $\prod_i \varphi_{ji}(X_i) = (\{0, 1\} \times *)^2$ en a quatre. □

*Remarque.* L'hypothèse de la page, que les $f_j$ commutent aux produits indexés par $I$, est celle qui sert, et elle suffit. Elle en donne deux exemples. Le premier est juste, un foncteur exact à gauche commutant aux produits finis. Le second est faux : un adjoint à gauche ne commute pas en général aux produits finis, et l'exemple ci-dessus est un cas où la formule $\mathrm{pr}_j \varphi((X_i)) = \prod_i \varphi_{ji}(X_i)$ est fausse avec $I$ fini. La lecture reprend la parenthèse de la page (« ce qui est automatique si $I$ est fini, ou si les $f_j$ sont exacts »). Il faut l'exactitude, ou directement la commutation aux produits.

*Remarque.* Les formules (3.9) ne demandent aucune hypothèse : elles décrivent les composées de la coünité et de la comultiplication avec les projections. La commutation des $f_j$ aux produits sert seulement à en déduire que ces données forment une matrice, c'est-à-dire qu'elles déterminent $\varphi$ et $\delta$. Les cas « dégénérés » de la page 8, $i = j$ ou $j = k$, sont, pour des $g_i$ pleinement fidèles, ceux où $\lambda_{kji}$ est un isomorphisme ; il ne reste donc, pour deux facteurs, que $\lambda'$ et $\lambda''$. La formule $\varphi(X', X'') = (X' \times \varphi'(X''), \varphi''(X') \times X'')$ demande encore que $f'$ et $f''$ commutent aux produits binaires, ce que la page tient de son hypothèse générale.

**Énoncé** (Pages 14 et 15 ; théorème de Gabriel–Popescu ♦ 4). *Soient $C$ une catégorie de Grothendieck, $U$ un générateur de $C$ et $R = \mathrm{End}_C(U)$. Le foncteur $\mathrm{Hom}_C(U, -) : C \to \mathbf{Mod}_R$, à valeurs dans les $R$-modules à droite, est pleinement fidèle, et son adjoint à gauche $- \otimes_R U$ est exact.*

*Démonstration.* La fidélité de $\mathrm{Hom}_C(U, -)$ est la définition d'un générateur. La pleine fidélité et l'exactitude à gauche de $- \otimes_R U$ sont le théorème de Gabriel–Popescu, publié par Popescu et Gabriel en 1964 [39], que la preuve vérifiée invoque ; l'exactitude à droite vient de ce que $- \otimes_R U$ est un adjoint à gauche. □

*Remarque.* Sous la forme de la marge, a) n'utilise que la condition C, et non la conservativité ; la suffisance de b) est le théorème de comonadicité de Beck, dual du théorème de monadicité de sa thèse de 1967 [7] ; l'inventaire date la cote « [à partir de 1958-1973] ».

*Remarque.* La nécessité de b), que la page affirme par « il faut et il suffit », est fausse : l'exemple ci-dessus est une adjonction comonadique dont l'adjoint à gauche ne vérifie pas la condition C. L'erreur est sur la page. La condition b) ne coïncide pas avec le théorème de Beck sous sa forme précise, qui caractérise les adjonctions comonadiques par une condition nécessaire et suffisante.

*Remarque.* Toute double flèche $f$-scindée est une double flèche dont l'image a un noyau (lemme 11.1), et la réciproque est fausse. La condition C est donc plus forte que celle de Beck : suffisante, elle n'est pas nécessaire.

*Remarque.* Pour un générateur seul, la page affirme une équivalence $C \simeq \mathbf{Mod}_R$. Seul le plongement pleinement fidèle est acquis, et la lecture retient cette forme.

*Remarque.* Le théorème de comonadicité de Beck, sous forme d'équivalence, est proposé à mathlib (PR mathlib4 #44727) ; ses deux implications y figuraient déjà séparément.

Ne sont pas démontrés ici : l'énoncé de Morita (équivalence si et seulement si $U$ est petit et projectif) ; la Conclusion des pages 4 à 6 (adjonctions et comonades) ; la reconstruction de l'adjonction ; les topos de coalgèbres (page 6) ; les relations de coünité et de coassociativité entre les $\lambda_{kji}$ et la description de la catégorie par les quadruplets $(X', X'', u', u'')$ (pages 9 et 10) ; les chaînes de $n$ adjoints (pages 79 et 80) ; les pages 7 à 95 (résolutions standard, cohomologie relative, SGA 4, localisation, recollement, catégories fibrées).

**Théorème 11.5** (Grothendieck, pages 7 à 11, comonade sur une base produit ♦). *Pour une adjonction sur une base produit $B = \prod_i B_i$, les transformations $\lambda_{kji} : \varphi_{ki} \to \varphi_{kj}\varphi_{ji}$ vérifient les relations de coünité et de coassociativité d'une comonade écrite en matrice $(\varphi_{ji})$. Pour deux facteurs, avec $g'$ et $g''$ pleinement fidèles, la catégorie se décrit par les quadruplets $(X', X'', u', u'')$, au moyen des seuls foncteurs croisés $\varphi'$, $\varphi''$ et des unités $\lambda'$, $\lambda''$ (pages 9 et 10).*

◊ *non vérifié en Lean*

**Conjecture 11.6** (Grothendieck, pages 79 et 80, chaînes d'adjoints ♦). *Pour tout $n$, il existe des topos de préfaisceaux portant une chaîne de $n$ foncteurs adjoints successifs dont aucun n'est pleinement fidèle. La page laisse ouverte la question d'une chaîne prolongeable indéfiniment dans les deux sens.*

## 12 Cote 133 : le centre et le groupe dérivé vus par deux modules croisés[13]

La cote 133, *[Groupes de Witt et formes quadratiques, groupes formels] : notes manuscrites (s.d.), tirés à part (1974)*, que l'inventaire date « 1974-[à partir de 1975] », réunit sept suites distinctes. La dernière, sous une chemise titrée « Fourbis auxiliaires cohomologiques pour groupes formels » (page 44), occupe les pages 45 à 53, qu'il pagine de 1 à 7 ; les pages 47 et 49 ne sont pas de sa main. Elle traite en général le problème que la « Solution » des pages 35 et 36 pose pour un groupe formel : décrire un groupe $G$ par son centre et son groupe dérivé. La page 45 se donne deux modules croisés $\mathcal{C} = (N \to M)$ et $\mathcal{C}' = (N' \to M')$ de mêmes invariants $\pi_0$, $\pi_1$, et note $K = G/\pi_1$ (133, lot 3, p. 45). La page 46 définit $\mathfrak{Z} = [\mathrm{Cent}(K)/(N'/\pi_1)] \cap \mathrm{Ker}\,\Theta$, construit $\varphi_G$ puis $\Psi_G$, et encadre « $\Psi_G$ injectif » comme équivalent à $N' = \mathrm{Cent}(G)$ (133, lot 3, p. 46). La page 48 définit l'accouplement $c_E$ d'une extension centrale $E$ de $\pi_0$ par $\pi_1$ et écrit « On doit trouver, au signe près » $\Psi_{G_1} = \Psi_G + \tilde{c}_E\,\alpha$ (133, lot 3, p. 48). Les pages 51 et 52 définissent $\mathcal{D} = (N_{\mathrm{ab}})_M$ et $\lambda_G$, et écrivent $N/DG \simeq \mathcal{D}/\lambda_G(\pi_0 \otimes \pi_0)$ et $\lambda_{G_1} = \lambda_G + \beta c_E$ (133, lot 3, p. 51, 133, lot 3, p. 52). Malgré le titre, rien n'y est propre aux groupes formels, et les énoncés sont démontrés ici pour des groupes abstraits.

*Conventions.* Le commutateur est $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. Dans tout ce qui suit, $G$ est un groupe, $N$ et $N'$ deux sous-groupes distingués, avec $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$ ; alors $[N, N'] = 1$, $\pi_1 = N \cap N'$ est

[13] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder133.lean`.

central, $\pi_0 = G/NN'$, $K = G/\pi_1$, $M = G/N'$ agit sur $N$ par conjugaison, et $\Theta : M \to \mathrm{Aut}(N)$ est cette action. Le groupe $\mathfrak{Z}$ est pris par son image inverse $\overline{N'}$ dans $G$ : les $z \in G$ dont l'image dans $K$ est centrale et qui commutent à tout élément de $N$, c'est-à-dire tels que $[g,z] \in \pi_1$ pour tout $g \in G$ et $nz = zn$ pour tout $n \in N$. On a $N' \subset \overline{N'}$ et $\mathfrak{Z} = \overline{N'}/N'$.

**Lemme 12.1.** *Si $c$ est central dans un groupe, $[g,zc] = [g,z]$ et $[gc,z] = [g,z]$.*

*Démonstration.* $[g,zc] = gzcg^{-1}c^{-1}z^{-1} = gzg^{-1}cc^{-1}z^{-1} = [g,z]$, en faisant passer $c$ devant $g^{-1}$. La seconde s'en déduit par $[x,y]^{-1} = [y,x]$. □

**Théorème 12.2** (Grothendieck, page 46, l'injectivité de $\Psi_G$ ♦). *Pour $z \in \overline{N'}$, l'application $g \mapsto [g,z]$ définit un homomorphisme $\varphi_G(z) : \pi_0 \to \pi_1$, qui ne dépend que de la classe de $z$ dans $\mathfrak{Z}$ ; l'application $\Psi_G : \mathfrak{Z} \to \mathrm{Hom}(\pi_0,\pi_1)$ ainsi définie est un homomorphisme, et*

$$N' = \mathrm{Cent}(G) \iff \Psi_G \text{ est injectif.}$$

*Démonstration.* Soit $z \in \overline{N'}$. Par définition $[g,z] \in \pi_1$, donc $[g,z]$ est central. On a $[gh,z] = g\,[h,z]\,zg^{-1}z^{-1}$ ; comme $[h,z]$ est central, c'est $[h,z]\,[g,z] = [g,z]\,[h,z]$, et $g \mapsto [g,z]$ est un homomorphisme $G \to \pi_1$. Il est trivial sur $N$, puisque $z$ commute à $N$, et sur $N'$, qui est central ; il se factorise donc par $\pi_0 = G/NN'$, ce qui définit $\varphi_G(z)$. Si $z$ et $w$ ont même classe modulo $N'$, $w = zc$ avec $c \in N'$ central, et $[g,w] = [g,z]$ par le lemme 12.1 : d'où $\Psi_G$ sur $\mathfrak{Z}$. Il est multiplicatif : $[g,zw] = gzg^{-1}\,[g,w]\,z^{-1} = [g,z]\,[g,w]$, puisque $[g,w]$ est central.

Supposons $\Psi_G$ injectif et soit $c \in \mathrm{Cent}(G)$. Alors $c \in \overline{N'}$, et $\Psi_G(\bar c)$ est trivial, comme $\Psi_G(1)$ : donc $\bar c = 1$ dans $\mathfrak{Z}$, c'est-à-dire $c \in N'$. Ainsi $\mathrm{Cent}(G) \subset N'$, et l'égalité vient de $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$.

Réciproquement, supposons $N' = \mathrm{Cent}(G)$, et soient $z,w \in \overline{N'}$ avec $\Psi_G(\bar z) = \Psi_G(\bar w)$, c'est-à-dire $[g,z] = [g,w]$ pour tout $g$. Appliquée à $g^{-1}$, l'égalité donne $zgz^{-1} = wgw^{-1}$, d'où $g\,z^{-1}w = z^{-1}(zgz^{-1})w = z^{-1}(wgw^{-1})w = z^{-1}w\,g$ : $z^{-1}w$ est central, donc dans $N'$, et $\bar z = \bar w$. □

*Remarque.* Seule l'hypothèse $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$ sert. L'hypothèse $[N,N'] = 1$ que la lecture ajoute en découle, et $N \supset D(G)$ n'intervient pas ici. La vérification confirme les contrôles d'additivité et de nullité que la lecture fournit et que la page résume par « triviale sur $N'$ et sur $\mathfrak{Z}$ ». Elle établit en chemin que $\mathrm{Cent}(G)$ est l'image inverse de $\mathrm{Ker}\,\Psi_G$, ce que la page dit « clair ».

On suppose maintenant de plus $D(G) \subset N$. Soit $\mathcal{D} = (N_{\mathrm{ab}})_M$ ; c'est le quotient $N/[G,N]$, le sous-groupe $[G,N]$ engendré par les $[g,n]$ contenant les $[n,n']$. On note $\bar n$ la classe dans $\mathcal{D}$ d'un $n \in N$.

**Lemme 12.3.** *Le groupe $\mathcal{D}$ est commutatif, $G$ y agit trivialement, et $\pi_0$ est commutatif.*

*Démonstration.* Pour $a,b \in N$, $(ab)^{-1}(ba) = [b^{-1},a^{-1}] \in [G,N]$, donc $\bar a\bar b = \bar b\bar a$. Pour $c \in N$ et $x \in G$, $(xcx^{-1})^{-1}c = [x,c^{-1}] \in [G,N]$, donc $\overline{xcx^{-1}} = \bar c$. Pour $x,y \in G$, $(xy)^{-1}(yx) = [y^{-1},x^{-1}] \in D(G) \subset N \subset NN'$, donc $xy$ et $yx$ ont même image dans $\pi_0$. □

**Énoncé** (Pages 51 et 52, la surjectivité de $\lambda_G$ ♦). *Supposons $D(G) \subset N$ et $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$. L'application $(x,y) \mapsto \overline{[x,y]}$ définit une forme $\lambda_G : \pi_0 \times \pi_0 \to \mathcal{D}$, multiplicative en chaque variable et alternée, et*

$$N = D(G) \iff \lambda_G \text{ est surjectif,}$$

*c'est-à-dire si et seulement si les valeurs de $\lambda_G$ engendrent $\mathcal{D}$.*

*Démonstration.* Pour $y$ fixé, $x \mapsto \overline{[x,y]}$ est un homomorphisme $G \to \mathcal{D}$ : $[xx',y] = (x[x',y]x^{-1})[x,y]$, et le lemme 12.3 donne $\overline{[xx',y]} = \overline{[x',y]}\ \overline{[x,y]} = \overline{[x,y]}\ \overline{[x',y]}$. Il est trivial sur $N$, car $[n,y] = [y,n]^{-1} \in [G,N]$, et sur $N'$, car $[n',y] = 1$ pour $n'$ central ; il se factorise donc par $\pi_0$. Comme $\overline{[x,y]} = \overline{[y,x]}^{-1}$, la même chose vaut pour la seconde variable, et $\lambda_G$ est bien défini sur $\pi_0 \times \pi_0$, multiplicatif en chaque variable ; $[x,x] = 1$ le rend alterné.

Si $N = D(G)$, tout $n \in N$ est produit de commutateurs et de leurs inverses ; sa classe $\bar{n}$ est le produit correspondant de valeurs de $\lambda_G$ et de leurs inverses, et ces valeurs engendrent $\mathcal{D}$. Réciproquement, les valeurs de $\lambda_G$ sont des classes d'éléments de $D(G)$, donc le sous-groupe qu'elles engendrent est contenu dans l'image de $D(G)$ dans $\mathcal{D}$. S'il est égal à $\mathcal{D}$, tout $n \in N$ s'écrit $n = m\,(m^{-1}n)$ avec $m \in D(G)$ et $m^{-1}n \in [G,N] \subset D(G)$ ; donc $N \subset D(G)$, et $N = D(G)$. □

*Remarque.* Comme $\mathcal{D}$ est commutatif et $\lambda_G$ bimultiplicatif, $\lambda_G$ définit une application linéaire $\pi_0 \otimes \pi_0 \to \mathcal{D}$, dont l'image est le sous-groupe engendré par les valeurs de $\lambda_G$ ; c'est la surjectivité de la page. L'hypothèse $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$ est nécessaire à la définition même de $\lambda_G$ sur $\pi_0$, et la lecture la cite (« puisque $N'$ est central »). L'hypothèse plus faible $[N,N'] = 1$ ne suffit pas à l'équivalence. Dans le groupe des quaternions $Q_8$, avec $N = D(Q_8) = \mathrm{Cent}(Q_8)$, d'ordre 2, et $N' = Q_8$, on a $[N,N'] = 1$ et $\pi_0 = 1$, donc toute forme sur $\pi_0$ est nulle, alors que $\mathcal{D} = N/[G,N] = N$ n'est pas trivial (exemple non vérifié en Lean). La commutativité de $\pi_0$ découle de $D(G) \subset N$ (lemme 12.3) et n'est pas une hypothèse de plus. L'isomorphisme $N/D(G) \simeq \mathcal{D}/\lambda_G(\pi_0 \otimes \pi_0)$ de la page n'est démontré ici que sous la forme de l'équivalence.

Soient enfin $E$ un groupe, $\iota : \pi_1 \to E$ un homomorphisme injectif d'image centrale, et $q : E \to \pi_0$ un homomorphisme de noyau $\iota(\pi_1)$ : une extension centrale de $\pi_0$ par $\pi_1$, si $q$ est surjectif, ce dont on ne se sert pas. Soit $G \times_{\pi_0} E$ le produit fibré et $G_1$ son quotient par l'image antidiagonale $\{(a, \iota(a)^{-1})\}$ de $\pi_1$, centrale, prise en Lean par son sous-groupe distingué engendré.

**Énoncé** (Pages 48 et 52, le changement de $G$ en $G_1$ ♦). *Supposons $D(G) \subset N$ et $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$.*

1. *Pour $e, f \in E$, $[e,f] = \iota(c_E(e,f))$ pour un unique $c_E(e,f) \in \pi_1$, qui ne dépend que des images de $e$ et $f$ dans $\pi_0$.*
2. *Dans $G_1$, le commutateur des classes de $(g,e)$ et $(z,f)$ est la classe de $([g,z]\,c_E(e,f), 1)$.*
3. *En particulier, si $z \in \overline{N'}$, ce commutateur est l'image de $\Psi_G(\bar{z})(\bar{g})\,c_E(e,f) \in \pi_1$ ; et la classe dans $\mathcal{D}$ de $[x,y]\,c$, pour $c \in \pi_1$, est $\lambda_G(\bar{x},\bar{y})\,\beta(c)$, où $\beta : \pi_1 \to \mathcal{D}$ est le passage au quotient.*

*Démonstration.* (1) L'image de $[e,f]$ dans $\pi_0$ est le commutateur des images, trivial puisque $\pi_0$ est commutatif ; $[e,f]$ est donc dans $\mathrm{Ker}\, q = \iota(\pi_1)$, et $\iota$ est injectif. Si $e$ et $e'$ ont même image, $e' = e\,\iota(a)$, et de même $f' = f\,\iota(b)$ ; comme $\iota(a)$ et $\iota(b)$ sont centraux, le lemme 12.1 donne $[e',f'] = [e,f]$.

(2) Le commutateur de $(g,e)$ et $(z,f)$ dans le produit fibré est $([g,z],[e,f]) = ([g,z],\iota(c))$, $c = c_E(e,f)$, et

$$([g,z],\iota(c))^{-1}\,([g,z]\,c,1) = (c,\iota(c)^{-1})$$

est dans l'image antidiagonale de $\pi_1$ ; les deux éléments ont donc même classe dans $G_1$. L'élément $([g,z]\,c,1)$ est bien dans le produit fibré, $[g,z]\,c$ étant dans $N$.

(3) Si $z \in \overline{N'}$, $[g,z] = \Psi_G(\bar{z})(\bar{g})$ par définition. La seconde assertion est $\overline{[x,y]\,c} = \overline{[x,y]}\ \bar{c}$. □

*Remarque.* Ce calcul porte les deux formules de la page, $\Psi_{G_1} = \Psi_G + \tilde{c}_E\,\alpha$ et $\lambda_{G_1} = \lambda_G + \beta c_E$, écrites additivement : dans $G_1$, un commutateur est le produit du commutateur dans $G$ et de la valeur de $c_E$. L'ordre des facteurs fixe le signe que la page laisse ouvert (« au signe près »). Avec $[x,y] = xyx^{-1}y^{-1}$ et $\Psi_G(\bar{z})(\bar{g}) = [g,z]$, le terme correctif est $c_E(\bar{g},\bar{z})$, c'est-à-dire $\tilde{c}_E(\alpha(\bar{z}))$ évalué en $\bar{g}$, au signe près selon le côté où l'on curryfie. L'identification des deux modules croisés de $G_1$ avec ceux de $G$ n'est pas formalisée ; elle ferait de cette égalité d'éléments une égalité d'applications $\Psi_{G_1} = \Psi_G \cdot \tilde{c}_E\,\alpha$ sur un même $\mathfrak{Z}$.

Ne sont pas démontrés ici : l'identification des modules croisés de $G_1$ avec ceux de $G$ ; l'isomorphisme $N/D(G) \simeq \mathcal{D}/\lambda_G(\pi_0 \otimes \pi_0)$ au-delà de l'équivalence ; l'obstruction dans $H^3$ et l'indétermination dans $H^2$ (page 45) ; les conditions b) et c) des pages 50 à 53 ; la réduction aux formes alternées ; les suites de Witt, les $\lambda$-anneaux et les groupes formels (pages 34 à 39), les pages 41 à 43 sur Chevalley.

**Exemple 12.4** (Grothendieck, pages 42 et 43, quotient affine non constructible ♦). Sur une base de caractéristique mixte, soit $G$ une extension d'un schéma abélien $A$ par $\mathbb{G}_a$, non triviale en un point $y$ de caractéristique $0$ et triviale en une spécialisation $s$ de caractéristique $p$. Alors $(G_y)_{\text{aff}} = 1$ et $(G_s)_{\text{aff}} \simeq \mathbb{G}_a$ : le plus grand quotient affine des fibres d'un schéma en groupes lisse à fibres connexes ne varie pas de façon constructible.

◊ non vérifié en Lean

# 13 Cote 161-1 : la partie fixe d'une adjonction, les adjonctions idempotentes, les objets locaux[14]

La cote 161-1, *Catégories : notes manuscrites (s.d.)*, dix-neuf pages sans date, appartient au groupe des dossiers rassemblés par Grothendieck sur différentes thématiques, que l'inventaire date « [après 1961-vers 1977] ». Les pages 3 à 7 étudient ce qu'un couple de foncteurs adjoints $E \rightleftarrows F$ induit entre les deux catégories. La page 3 s'ouvre sur « Foncteurs adjoints [demander Schanuel] » et écrit le critère (1) de pleine fidélité sur une sous-catégorie pleine. Elle porte en marge « donner un exemple montrant que cette condition n'est pas surabondante, avec $E'$ réduit à un élément » (161-1, lot 1, p. 3). La page 5 dresse la liste des conditions équivalentes qui définissent aujourd'hui une adjonction idempotente (161-1, lot 1, p. 5). La page 7 se demande si une sous-catégorie réflexive est le lieu des objets locaux pour les flèches que le réflecteur inverse, et conclut « Or c'est vrai sauf erreur… » (161-1, lot 1, p. 7). On note, comme la lecture, $u$ l'adjoint à gauche de $v$, $\eta : \mathrm{id}_E \to vu$ l'unité et $\varepsilon : uv \to \mathrm{id}_F$ la coünité (le manuscrit écrit $i$ et $j$).

**Énoncé** ((1), page 3). *Soient $E' \subset E$ une sous-catégorie pleine et $\overline{E}'$ sa clôture par isomorphie. Alors*

$$u|E' \text{ est pleinement fidèle et } vu(E') \subset \overline{E}'$$
$$\iff \text{pour tout } Y \in E',\ \eta_Y : Y \to vu(Y) \text{ est un isomorphisme.}$$

*La seconde condition du membre de gauche n'est pas surabondante : la pleine fidélité de $u|E'$ ne force pas $vu$ à ramener $E'$ dans $\overline{E}'$.*

**Énoncé** (Adjonctions idempotentes, page 5 ■). *Les conditions « $\eta v : v \to vuv$ est un isomorphisme » et « $\varepsilon u : uvu \to u$ est un isomorphisme » de la condition 2 du manuscrit sont redondantes : chacune des quatre conditions ($\eta v$, $v\varepsilon$, $\varepsilon u$, $u\eta$ inversible) implique les trois autres.*

[14] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder161_1.lean`.

Les identités triangulaires disent que les deux composés suivants sont des identités ; dans chaque ligne, une flèche est donc inversible si et seulement si l'autre l'est. Ce que l'énoncé ajoute est le passage d'une ligne à l'autre.




**Énoncé** (Objets locaux, pages 6 et 7)**.** *Soient $\alpha : E_1 \to E$ un foncteur pleinement fidèle admettant un adjoint à gauche $\alpha'$, et $\Sigma$ la classe des flèches de $E$ que $\alpha'$ rend inversibles. Une flèche $f : X \to Y$ est dans $\Sigma$ si et seulement si* $\mathrm{Hom}_E(Y, \alpha Z_1) \to \mathrm{Hom}_E(X, \alpha Z_1)$ *est bijective pour tout $Z_1 \in E_1$ ; et un objet $\xi$ de $E$ tel que* $\mathrm{Hom}_E(-, \xi)$ *transforme les flèches de $\Sigma$ en bijections (un objet $\Sigma$-local) est dans l'image essentielle de $\alpha$.*

On rappelle que la bijection d'adjonction $\mathrm{Hom}_F(uX, P) \simeq \mathrm{Hom}_E(X, vP)$ envoie $g$ sur $\eta_X \circ v(g)$ (on compose de gauche à droite : $\eta_X$, puis $v(g)$), et qu'on a les identités triangulaires $\eta_{vP} ; v(\varepsilon_P) = \mathrm{id}_{vP}$ et $u(\eta_X) ; \varepsilon_{uX} = \mathrm{id}_{uX}$. Dans les démonstrations qui suivent, on écrit $f ; g$ pour « $f$ puis $g$ ».

**Lemme 13.1.** *Pour $X, Y \in E$, l'application* $\mathrm{Hom}_E(X, Y) \to \mathrm{Hom}_F(uX, uY)$, *$f \mapsto u(f)$, est bijective si et seulement si l'application $f \mapsto f ; \eta_Y$, de* $\mathrm{Hom}_E(X, Y)$ *dans* $\mathrm{Hom}_E(X, vuY)$, *l'est.*

*Démonstration.* La seconde application est la composée de la première et de la bijection d'adjonction : celle-ci envoie $u(f)$ sur $\eta_X ; vu(f)$, qui vaut $f ; \eta_Y$ par naturalité de $\eta$. C'est la phrase de la page 3 : l'application « se déduit de l'application $i(Y) : Y \to vu(Y)$ au moyen de $\mathrm{Hom}(X, i(Y))$ ». □

*Démonstration de (1).* Supposons que $\eta_Y$ soit un isomorphisme pour tout $Y \in E'$. Pour $X, Y \in E'$, la composition avec $\eta_Y$ est alors bijective, et $u|E'$ est pleinement fidèle par le lemme 13.1 ; et $vu(Y)$, isomorphe à $Y$, est dans $\overline{E}'$.

Réciproquement, soit $Y \in E'$ ; par hypothèse il existe $Z \in E'$ et un isomorphisme $e : vu(Y) \to Z$. Le lemme 13.1, appliqué aux couples $(Z, Y)$ et $(Y, Y)$ d'objets de $E'$, dit que $f \mapsto f ; \eta_Y$ est bijective de $\mathrm{Hom}(Z, Y)$ sur $\mathrm{Hom}(Z, vuY)$ et de $\mathrm{Hom}(Y, Y)$ sur $\mathrm{Hom}(Y, vuY)$. Par la surjectivité de la première, il existe $g : Z \to Y$ avec $g ; \eta_Y = e^{-1}$. Posons $s = e ; g : vu(Y) \to Y$. D'une part $s ; \eta_Y = e ; e^{-1} = \mathrm{id}_{vuY}$. D'autre part $(\eta_Y ; s) ; \eta_Y = \eta_Y ; (s ; \eta_Y) = \eta_Y = \mathrm{id}_Y ; \eta_Y$, et l'injectivité de la seconde bijection donne $\eta_Y ; s = \mathrm{id}_Y$. Donc $\eta_Y$ est un isomorphisme, d'inverse $s$. □

*L'exemple demandé en marge.* Prenons pour $E$ la catégorie des ensembles, pour $F$ la catégorie ponctuelle, pour $u$ l'unique foncteur $E \to F$ et pour $v$ le foncteur qui pointe un ensemble à un élément $\{*\}$ ; on a $u \dashv v$ parce que $\{*\}$ est final. Soit $E' = \{\varnothing\}$, réduite à un objet. Alors $u|E'$ est pleinement fidèle, puisque $\mathrm{Hom}(\varnothing, \varnothing)$ et $\mathrm{Hom}(u\varnothing, u\varnothing)$ ont chacun un seul élément ; mais $vu(\varnothing) = \{*\}$ n'est pas isomorphe à $\varnothing$, et $\eta_\varnothing : \varnothing \to \{*\}$ n'est pas un isomorphisme. La condition $vu(E') \subset \overline{E}'$ est donc nécessaire à l'équivalence (1). □

*Démonstration de l'énoncé sur les adjonctions idempotentes.* On note (a) $\eta_{vP}$ inversible pour tout $P$, (b) $v(\varepsilon_P)$ inversible pour tout $P$, (c) $\varepsilon_{uX}$ inversible pour tout $X$, (d) $u(\eta_X)$ inversible pour tout $X$. On utilise que si $f ; g$ est une identité et que l'une de $f$, $g$ est un isomorphisme, l'autre en est un, inverse de la première.

(a) $\Leftrightarrow$ (b) et (c) $\Leftrightarrow$ (d) résultent de là et des identités triangulaires $\eta_{vP}\,;v(\varepsilon_P) = \mathrm{id}$ et $u(\eta_X)\,;\varepsilon_{uX} = \mathrm{id}$.

(a) $\Rightarrow$ (c). Soit $X \in E$. Par (a) $\Rightarrow$ (b) en $P = uX$, $v(\varepsilon_{uX})$ est inversible. Or $vu(\eta_X)$ et $\eta_{vuX}$ en sont deux sections : $vu(\eta_X)\,;v(\varepsilon_{uX}) = v\big(u(\eta_X)\,;\varepsilon_{uX}\big) = \mathrm{id}$, et $\eta_{vuX}\,;v(\varepsilon_{uX}) = \mathrm{id}$ par l'identité triangulaire ; elles sont donc égales. Montrons que $u(\eta_X)$ est inverse de $\varepsilon_{uX}$. On a déjà $u(\eta_X)\,;\varepsilon_{uX} = \mathrm{id}$. La naturalité de $\varepsilon$ appliquée à $u(\eta_X) : uX \to uvuX$ donne

$$\varepsilon_{uX}\,;u(\eta_X) = uv\big(u(\eta_X)\big)\,;\varepsilon_{uvuX} = u(\eta_{vuX})\,;\varepsilon_{uvuX} = \mathrm{id},$$

la deuxième égalité par ce qui précède, la troisième par l'identité triangulaire en $vuX$.

(c) $\Rightarrow$ (a) est l'énoncé dual. Soit $P \in F$. Par (c) $\Rightarrow$ (d) en $X = vP$, $u(\eta_{vP})$ est inversible ; $uv(\varepsilon_P)$ et $\varepsilon_{uvP}$ en sont deux rétractions ($u(\eta_{vP})\,;uv(\varepsilon_P) = u(\eta_{vP}\,;v(\varepsilon_P)) = \mathrm{id}$, et l'identité triangulaire), donc sont égales. Alors $\eta_{vP}\,;v(\varepsilon_P) = \mathrm{id}$, et la naturalité de $\eta$ appliquée à $v(\varepsilon_P)$ donne $v(\varepsilon_P)\,;\eta_{vP} = \eta_{vuvP}\,;vuv(\varepsilon_P) = \eta_{vuvP}\,;v(\varepsilon_{uvP}) = \mathrm{id}$.

Les quatre conditions sont donc équivalentes ; en particulier la condition 2 du manuscrit, *$\eta v$ et $\varepsilon u$ inversibles*, équivaut à sa première moitié. □

*Démonstration de l'énoncé sur les objets locaux. Caractérisation de $\Sigma$.* C'est un fait classique de la théorie des sous-catégories réflexives. Par l'adjonction $\alpha' \dashv \alpha$, $\mathrm{Hom}_E(Y, \alpha Z_1) \simeq \mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha' Y, Z_1)$ naturellement en $Y$, de sorte que la composition avec $f$ à la source correspond à la composition avec $\alpha'(f)$. Par le lemme de Yoneda, $\alpha'(f)$ est un isomorphisme si et seulement si $\mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha' Y, Z_1) \to \mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha' X, Z_1)$ est bijective pour tout $Z_1$. En particulier tout objet $\alpha Z_1$, et tout objet qui lui est isomorphe, est $\Sigma$-local.

*Un objet local est dans l'image essentielle.* Soit $\xi$ un objet $\Sigma$-local et $\eta = \eta_\xi : \xi \to \alpha\alpha'\xi$ l'unité. Pour tout $Z_1$, la composition avec $\eta$, de $\mathrm{Hom}_E(\alpha\alpha'\xi, \alpha Z_1)$ dans $\mathrm{Hom}_E(\xi, \alpha Z_1)$, est bijective : c'est la bijection d'adjonction $\mathrm{Hom}_{E_1}(\alpha'\xi, Z_1) \simeq \mathrm{Hom}_E(\xi, \alpha Z_1)$ lue à travers la pleine fidélité de $\alpha$. Par la caractérisation qui précède, $\eta \in \Sigma$. Comme $\xi$ est local, la composition avec $\eta$, de $\mathrm{Hom}(\alpha\alpha'\xi, \xi)$ dans $\mathrm{Hom}(\xi, \xi)$, est bijective ; il existe donc $r : \alpha\alpha'\xi \to \xi$ avec $\eta\,;r = \mathrm{id}_\xi$. Alors $\eta\,;(r\,;\eta) = \eta = \eta\,;\mathrm{id}$, et comme la composition avec $\eta$ est injective sur les flèches à valeurs dans l'objet local $\alpha\alpha'\xi$, $r\,;\eta = \mathrm{id}$. Ainsi $\xi \simeq \alpha(\alpha'\xi)$. Avec la dernière phrase du paragraphe précédent, on obtient que les objets $\Sigma$-locaux sont exactement ceux de l'image essentielle de $\alpha$. □

**Énoncé** ((2), page 3). *Soient $F' \subset F$ une sous-catégorie pleine et $\overline{F}'$ sa clôture par isomorphie. Alors*

$$v|F' \text{ est pleinement fidèle et } uv(F') \subset \overline{F}'$$
$$\iff \text{pour tout } P \in F',\ \varepsilon_P : uv(P) \to P \text{ est un isomorphisme.}$$

*Démonstration.* C'est la démonstration de (1) retournée. Pour $P, Q \in F$, l'application $g \mapsto v(g)$, de $\mathrm{Hom}_F(P, Q)$ dans $\mathrm{Hom}_E(vP, vQ)$, suivie de la bijection d'adjonction réciproque $h \mapsto u(h)\,;\varepsilon_Q$, donne $g \mapsto uv(g)\,;\varepsilon_Q = \varepsilon_P\,;g$ par naturalité de $\varepsilon$ : c'est le « $\mathrm{Hom}(j(P), Q)$ » de la page, et $v$ est bijective sur $\mathrm{Hom}(P, Q)$ si et seulement si $g \mapsto \varepsilon_P\,;g$ l'est. Si $\varepsilon_P$ est inversible pour tout $P \in F'$, la composition avec $\varepsilon_P$ est bijective, et $uv(P) \simeq P$. Réciproquement, soient $P \in F'$, $Z \in F'$ et $e : uv(P) \to Z$ un isomorphisme ; la surjectivité de $g \mapsto \varepsilon_P\,;g$ sur $\mathrm{Hom}(P, Z)$ donne $g$ avec $\varepsilon_P\,;g = e$. Posons $s = g\,;e^{-1}$. Alors $\varepsilon_P\,;s = \mathrm{id}$, et $\varepsilon_P\,;(s\,;\varepsilon_P) = \varepsilon_P = \varepsilon_P\,;\mathrm{id}$ ; l'injectivité sur $\mathrm{Hom}(P, P)$ donne $s\,;\varepsilon_P = \mathrm{id}$. □

**Énoncé** (Les cinq conditions, page 3). *Soient $E' \subset E$ et $F' \subset F$ des sous-catégories strictement*

*pleines ; on note $u' : E' \to F'$ et $v' : F' \to E'$ les foncteurs induits quand $u(E') \subset F'$ et $v(F') \subset E'$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

1. *$E'$ vérifie (1), $F'$ vérifie (2), et $F' = \overline{u(E')}$, $E' = \overline{v(F')}$ ;*
2. *$u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et $u'$, $v'$ sont pleinement fidèles ;*
3. *$u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et $u'$ est une équivalence ;*
4. *$u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et $v'$ est une équivalence.*

*De plus, si $E'$ strictement pleine vérifie (1), $\alpha(E') = \overline{u(E')}$ vérifie (2) et $\beta(\alpha(E')) = E'$ ; dualement pour $F'$.*

*Démonstration.* On lit « $u'$ est une équivalence » comme « $u'$ est pleinement fidèle et tout objet de $F'$ est isomorphe à un $u(Y)$, $Y \in E'$ ». On utilise deux faits : si $\eta_Y$ est inversible, $\varepsilon_{uY}$ l'est, puisque $u(\eta_Y)\,;\varepsilon_{uY} = \mathrm{id}$ ; et si $\varepsilon_P$ l'est, $\eta_{vP}$ l'est, par l'autre identité triangulaire. Les objets où $\eta$ (resp. $\varepsilon$) est inversible forment une sous-catégorie strictement pleine, par naturalité.

Si $u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, $\eta$ est inversible sur $E'$ et $\varepsilon$ sur $F'$, alors 1. vaut : un $P \in F'$ est isomorphe, par $\varepsilon_P$, à $u(vP)$ avec $vP \in E'$, et tout objet isomorphe à un $u(Y)$, $Y \in E'$, est dans $F'$, strictement pleine ; de même pour $E'$, par $\eta_Y^{-1}$. Réciproquement 1. donne $u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et, par (1) et (2), la pleine fidélité de $u'$ et $v'$ et l'essentielle surjectivité de $u'$ et de $v'$ ; donc 1. entraîne 2., 3. et 4.

Sous 2., $vu(E') \subset v(F') \subset E'$, et (1) donne $\eta$ inversible sur $E'$ ; de même (2) donne $\varepsilon$ inversible sur $F'$ ; d'où 1. Sous 3., (1) donne de même $\eta$ inversible sur $E'$ ; un $P \in F'$ est isomorphe à un $u(Y)$, $Y \in E'$, où $\varepsilon$ est inversible par le premier fait ; donc $\varepsilon_P$ l'est, d'où 1. Le cas 4. est symétrique.

Pour la bijection : si $Y \in E'$, $Y \simeq vu(Y)$ par $\eta_Y$ et $uY \in \alpha(E')$ ; si $Y \simeq v(P)$ avec $P \simeq u(Y')$, $Y' \in E'$, alors $Y \simeq vu(Y') \simeq Y'$ et $Y \in E'$. Et $\varepsilon$ est inversible sur $\alpha(E')$ par le premier fait. □

**Énoncé** (Les points fixes, page 4 ■). *Soient $E_0 \subset E$ la sous-catégorie pleine des $Y$ où $\eta_Y$ est inversible et $F_0 \subset F$ celle des $P$ où $\varepsilon_P$ l'est. Ce sont les plus grandes sous-catégories vérifiant (1) et (2) ; on a $F_0 = \overline{u(E_0)}$, $E_0 = \overline{v(F_0)}$, et $u$, $v$ induisent des équivalences quasi-inverses $E_0 \simeq F_0$.*

*Démonstration.* La maximalité est la forme de (1) et (2) démontrée plus haut : $E'$ vérifie (1) si et seulement si $E' \subset E_0$. Par les deux faits de la démonstration précédente, $u(E_0) \subset F_0$ et $v(F_0) \subset E_0$ ; les égalités $F_0 = \overline{u(E_0)}$ et $E_0 = \overline{v(F_0)}$ en résultent comme dans le cas 1. ci-dessus. Les foncteurs induits $u_0 : E_0 \to F_0$ et $v_0 : F_0 \to E_0$ sont quasi-inverses, par les isomorphismes naturels $\eta_Y : Y \to v_0u_0(Y)$ et $\varepsilon_P : u_0v_0(P) \to P$. □

**Énoncé** (Conditions 1), 3) et 4), page 5 ; la préservation des colimites). *La condition 1), $\mathrm{Im}\, v \subset E_0$ et $\mathrm{Im}\, u \subset F_0$, est l'idempotence, et chacune de ses moitiés suffit. Si $\mathrm{Im}\, u \subset F_0$, l'inclusion $E_0 \subset E$ admet pour adjoint à gauche $v_0 \circ u'$, $X \mapsto vu(X)$ ; si $\mathrm{Im}\, v \subset E_0$, l'inclusion $F_0 \subset F$ admet pour adjoint à droite $u_0 \circ v'$, $P \mapsto uv(P)$. Ce réflecteur $E \to E_0$ commute aux limites inductives et l'inclusion $E_0 \subset E$ aux limites projectives ; $E_0$ a les limites inductives qu'a $E$ ; dualement, le coréflecteur $F \to F_0$ commute aux limites projectives, l'inclusion $F_0 \subset F$ aux limites inductives, et $F_0$ a les limites projectives qu'a $F$. Enfin, pour une adjonction idempotente, $u \simeq \beta\, u_0\, \alpha'$ et $v \simeq \alpha\, v_0\, \beta'$, avec $\alpha'$ le réflecteur, qui est un passage à la catégorie des fractions, $\beta'$ le coréflecteur, et $\alpha$, $\beta$ les inclusions ; $\beta\, u_0 : E_0 \to F$ est pleinement fidèle (condition 4)).*

*Démonstration. Condition 1).* $Y = vP$ est dans $E_0$ si et seulement si $\eta_{vP}$ est inversible, et $uX \in F_0$ si et seulement si $\varepsilon_{uX}$ l'est : c'est l'énoncé sur les adjonctions idempotentes.

*Le réflecteur.* Si $\operatorname{Im} u \subset F_0$, alors $vu(X) \in E_0$ pour tout $X$, par le second fait ; le foncteur $X \mapsto vu(X)$ arrive dans $E_0$. On prend pour unité $\eta_X : X \to vu(X)$ et pour coünité, en $Y \in E_0$, $\eta_Y^{-1} : vu(Y) \to Y$, naturelle parce que $\eta$ l'est. L'identité triangulaire du côté de $E_0$ est $\eta_Y \,;\eta_Y^{-1} = \mathrm{id}$. Celle du côté de $E$ demande $vu(\eta_X) \,;\eta_{vuX}^{-1} = \mathrm{id}$, c'est-à-dire $vu(\eta_X) = \eta_{vuX}$ ; c'est l'égalité établie dans la démonstration de (a) $\Rightarrow$ (c), l'adjonction étant idempotente par cet énoncé. C'est le calcul de Hom de la page 5. Le coréflecteur se traite de même, avec la coünité $\varepsilon_P$, l'unité $\varepsilon_Q^{-1}$ en $Q \in F_0$, et l'égalité $uv(\varepsilon_P) = \varepsilon_{uvP}$ ; c'est le calcul entre crochets de la page 4.

*Limites.* Un adjoint à gauche commute aux limites inductives, un adjoint à droite aux limites projectives. Une sous-catégorie réflexive a les limites inductives de la catégorie ambiante : on réfléchit la limite inductive calculée dans $E$.

*Condition 4).* Pour $X \in E$, $u_0(vu(X)) = uvu(X)$, et $\varepsilon_{uX} : uvu(X) \to u(X)$ est inversible et naturel en $X$ : d'où $\beta\, u_0\, \alpha' \simeq u$. De même $\eta_{vP}^{-1} : vuv(P) \to v(P)$ donne $\alpha\, v_0\, \beta' \simeq v$. Le foncteur $\beta\, u_0$ est pleinement fidèle comme composé d'une équivalence et d'une inclusion pleine. Enfin, un adjoint à gauche dont l'adjoint à droite est pleinement fidèle est une localisation en les flèches qu'il inverse ; c'est le cas de $\alpha'$. □

**Énoncé** (La descente d'adjoints, page 6)**.** *Soient $\alpha : E_1 \to E$ pleinement fidèle d'adjoint à gauche $\alpha'$, et $\psi : E_1^\circ \to$ Ens tel que $\psi \circ \alpha'$ soit représentable. Alors $\psi$ est représentable. Par suite, si $\beta : E_1 \to F$ est un foncteur tel que $u = \beta\alpha'$ admette un adjoint à droite, $\beta$ admet un adjoint à droite.*

*Démonstration.* Soit $\xi \in E$ représentant $\psi \circ \alpha' : \mathrm{Hom}_E(X, \xi) \simeq \psi(\alpha' X)$, naturellement en $X$. Si $f : X \to Y$ est dans $\Sigma$, la composition avec $f$, de $\mathrm{Hom}(Y, \xi)$ dans $\mathrm{Hom}(X, \xi)$, correspond à $\psi(\alpha' f)$, qui est bijective puisque $\alpha'(f)$ est inversible ; $\xi$ est donc $\Sigma$-local, et, par l'énoncé sur les objets locaux, il existe $\xi_1 \in E_1$ et un isomorphisme $\alpha\xi_1 \simeq \xi$. Pour $Z \in E_1$, on compose alors les bijections

$$\mathrm{Hom}_{E_1}(Z, \xi_1) \simeq \mathrm{Hom}_E(\alpha Z, \alpha\xi_1) \simeq \mathrm{Hom}_E(\alpha Z, \xi) \simeq \psi(\alpha'\alpha Z) \simeq \psi(Z),$$

la première par la pleine fidélité de $\alpha$, la dernière par $\psi$ appliqué à la coünité $\alpha'\alpha Z \to Z$, inversible puisque $\alpha$ est pleinement fidèle. La naturalité en $Z$ résulte de celle de la coünité. Donc $\psi$ est représenté par $\xi_1$.

Pour la seconde assertion, $\beta$ admet un adjoint à droite si et seulement si, pour tout $P \in F$, le préfaisceau $Z \mapsto \mathrm{Hom}_F(\beta Z, P)$ sur $E_1$ est représentable. Composé avec $\alpha'$, c'est $X \mapsto \mathrm{Hom}_F(\beta\alpha' X, P)$, représentable puisque $\beta\alpha'$ a un adjoint à droite. La première assertion conclut. □

*Remarque.* L'exemple ci-dessus répond à la question de la marge de la page 3, avec $E'$ réduit à un objet ; la réponse de la lecture, « Elle l'est », est juste.

*Remarque.* L'énoncé des pages 6 et 7 vaut pour toute sous-catégorie réflexive. La caractérisation de $\Sigma$ est classique : l'adjoint à gauche d'un foncteur pleinement fidèle est la localisation par les flèches qu'il rend inversibles, ce qu'établissent Gabriel et Zisman au chapitre I de leur livre de 1967 [25]. L'identification des objets $\Sigma$-locaux à l'image essentielle, le « Or c'est vrai » de la page 7, est un lemme de base de la théorie des localisations.

*Remarque.* La cinquième condition de la page 3, « —— et $u'$ et $v'$ pl. fid. », répète mot pour mot la deuxième ; l'énoncé ci-dessus en retient quatre.

*Remarque.* La descente de la page 6 tient sans l'hypothèse que $\beta$ soit pleinement fidèle, dont la démonstration ne se sert pas. Pour une catégorie $F$ quelconque, la réduction de la page au cas $\mathrm{Ob}\, F = \mathrm{Ob}\, E_1 \cup \{a\}$ revient à traiter un objet $P$ de $F$ à la fois, comme on l'a fait. La vérification suppose que les ensembles de flèches de $E$, $E_1$ et $F$ vivent dans le même univers, ce que demande la notion de foncteur représentable.

*Remarque.* La page 5 construit le réflecteur de $E_0$ sous la seule hypothèse $\mathrm{Im}\, u \subset F_0$, et le coréflecteur de $F_0$ sous $\mathrm{Im}\, v \subset E_0$. Ces deux hypothèses sont équivalentes par l'énoncé sur les adjonctions idempotentes, et l'identité triangulaire du réflecteur passe par cette équivalence.

*Remarque.* Les conditions équivalentes qui définissent une adjonction idempotente et l'équivalence entre les parties fixes sont exposées par Borceux (1994, §§ 3.4 et 4.2) [10] ; l'inventaire date la cote « [après 1961-vers 1977] ».

*Remarque.* Les énoncés sur les adjonctions idempotentes (conditions équivalentes, équivalence des parties fixes, réflexivité) sont proposés à mathlib (PR mathlib4 #44723). La préservation des colimites par le réflecteur y figurait déjà : c'est celle de tout adjoint à gauche.

Ne sont pas démontrés ici : la reconstruction d'une adjonction idempotente à partir de $(E_0, F_0, E_0 \simeq F_0)$ (page 5) ; les pages 9 à 19, dont les contractions des pages 11 et 12.

**Définition** (Grothendieck, pages 11 et 12, contractions ♦). La catégorie monoïdale symétrique libre $\Phi(A)$ sur $A$ est étendue par des contractions, accouplements $L'_j \otimes L''_j \to \mathbf{1}$ qui évaluent chaque facteur apparié contre son partenaire. On obtient un calcul diagrammatique pour les catégories monoïdales à duaux ; les ficelles dessinées en marge de la page 12 notent quel facteur est apparié à quel autre.

Autres pistes de l'onglet Findings pour ce thème, dans des cotes qui n'ont pas de section ici :

**Conjecture** (Grothendieck, pages 43 à 45, universalité des correspondances de bordisme ♦). *Sur les variétés fermées et les classes d'homotopie d'applications, la catégorie* **B** *dont les morphismes $X \to Y$ sont les classes de bordisme non orienté de variétés au-dessus de $X \times Y$ est universelle parmi les catégories munies d'un foncteur covariant et d'un foncteur contravariant qui coïncident sur les objets et vérifient le changement de base pour les carrés cartésiens transverses. Tout tel couple $(F'_\bullet, F'^\bullet)$ identifie les correspondances bordantes, une correspondance $Z \to X \times Y$ de composantes $p$, $q$ allant sur $F'_\bullet(q) \circ F'^\bullet(p)$. La page attribue l'énoncé à Quillen.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 43 à 45). L'esquisse finit par « Le reste est sans doute l'AQT », sans rien sur la composition ni sur l'unicité, et le mot « fermées » est de l'édition. Mathlib n'a pas le bordisme des variétés. On se reportera aux notes de Grothendieck (162-5, lot 3, p. 43).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 27 à 30, de Rham et Hochschild pour une catégorie formelle ♦). *Soient $X_0$ un schéma de caractéristique nulle et $\mathcal{C}$ une catégorie formelle sur $X_0$ de conormal $\Omega$ plat. Les données de descente sur un $\mathcal{O}$-module $M$ relativement à $\mathcal{C}$ correspondent aux $\Omega$-connexions intégrables sur $M$, et le complexe de de Rham $\Lambda^\bullet\Omega \otimes M$ est canoniquement quasi-isomorphe, dans la catégorie dérivée, au complexe de Hochschild $C^\bullet(\mathcal{C}, M)$.*

La page 30 l'énonce sans démonstration, « sous les conditions du th. de Quillen » ; le mot « intégrables » et la définition de $C^\bullet(\mathcal{C}, M)$ sont de la lecture. Mathlib n'a pas les catégories formelles ni les complexes de de Rham sur un schéma. On se reportera aux notes de Grothendieck (162-5, lot 2, p. 27).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 21 à 26, catégories formelles à conormal plat ⧫). *Sur un schéma $X_0$ de caractéristique nulle, le foncteur qui envoie une catégorie formelle $I$-adique sur $X_0$ (un pro-anneau complet augmenté muni d'un $\Delta$ coassociatif et counitaire, sans inverse supposé) sur l'algèbre différentielle graduée $(\Lambda^\bullet\Omega, \delta)$ de son conormal $\Omega = I/I^2$ est une équivalence entre les catégories formelles de $\Omega$ plat et les complexes de de Rham sur $\Lambda^\bullet\Omega$ de $\Omega$ plat, sans hypothèse de finitude sur $\Omega$ ni de lissité sur $X_0$.*

La page 26 l'énonce comme « Th. de Quillen », sans démonstration ni référence, et dit qu'il contient le théorème de Cartan sur les groupes formels en caractéristique nulle. Mathlib n'a pas les catégories formelles $I$-adiques. On se reportera aux notes de Grothendieck (162-5, lot 2, p. 21).

**Partie 15**

# Géométrie formelle, modules et représentabilité

Le 11 septembre 1967, une lettre dactylographiée systématise le pas essentiel de la preuve de Matsumura de la représentabilité du schéma des automorphismes d'un schéma propre (91, lot 2, p. 30). Le 21 octobre 1968, Deligne lui écrit qu'un espace analytique compact est un schéma si et seulement si sa réduction l'est (37, lot 4, p. 74). Le 30 avril 1969, il envoie à Jacob Murre les notes préliminaires sur les revêtements formels modérément ramifiés (29, lot 4, p. 78).

## 14 Cote 39 : le théorème de préparation « formel », cas adique et cas discret[15]

La cote 39, *Fonctions et structures « élémentaires » [Schémas formels, théorème de préparation] : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [vers 1960-1970] », compte dix-neuf pages en trois ensembles séparés par des intercalaires vierges. Les deux premiers sont deux rédactions successives d'une axiomatique des classes de séries formelles (pages 2 à 7, puis 9 à 16). Le troisième, pages 18 et 19, énonce et démontre un théorème sous un titre souligné de sa main, « Th. de préparation “formel” » (39, lot 1, p. 18). La démonstration commence par une réduction, « Comme $A$ est séparé et complet pour sa top. linéaire, on est ramené au cas où $A$ est discret », puis précise que (i) « **signifie** que les $a_i$ $(0 \leq i \leq N-1)$ sont nilpotents ». Un premier argument, par Nakayama et le gradué associé, est encadré et barré. Le second considère l'application $\varphi : ((b_i), Q) \mapsto \sum b_i Z^i + QF$ et conclut, par le gradué de la filtration $\mathfrak{m}$-adique, « finie », que $\varphi$ est bijective (39, lot 1, p. 19).

**Énoncé** (Théorème de préparation « formel » ■)**.** *Soient $A$ un anneau linéairement topologisé, séparé et complet, $Z$ une indéterminée, $F = \sum_{i \geqslant 0} a_i Z^i \in A[[Z]]$, et $N \in \mathbb{N}$ tel que*

*(i) $a_i$ est topologiquement nilpotent pour $0 \leqslant i \leqslant N-1$ ;*

*(ii) $a_N$ est inversible.*

*Alors $F$ est un élément régulier de $A[[Z]]$, et $A[[Z]]/FA[[Z]]$ est un $A$-module libre de base les images des $Z^i$, $0 \leqslant i \leqslant N-1$ : tout $G \in A[[Z]]$ s'écrit de façon unique $G = QF + \sum_{0 \leqslant i \leqslant N-1} b_i Z^i$, avec $Q \in A[[Z]]$ et $b_i \in A$.*

On ne démontre ici que deux cas particuliers de cet énoncé : le cas d'un anneau complet pour une topologie $I$-adique, avec $a_i \in I$ pour $i < N$ ; et le cas discret auquel la démonstration du feuillet se ramène, avec $a_0, \dots, a_{N-1}$ nilpotents. Dans les deux cas, on écrit le reste $\sum_{i<N} b_i Z^i$ comme un polynôme $r \in A[Z]$ de degré $< N$.

On s'appuie sur le théorème classique de division de Weierstrass, sous la forme suivante : *soient $A$ un anneau séparé et complet pour la topologie $I$-adique et $F \in A[[Z]]$ ; si l'image $\bar{F}$ de $F$ dans $(A/I)[[Z]]$ est d'ordre $N$ et si le coefficient $a_N$ de $F$ est inversible dans $A$, alors pour*

[15] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder39.lean`.

*tout $G \in A[[Z]]$ il existe un unique couple $(Q, r)$, $Q \in A[[Z]]$, $r \in A[Z]$ de degré $< N$, tel que $G = QF + r$ ; et si $QF = r$ avec $\deg r < N$, alors $Q = 0$ et $r = 0$.*

**Lemme 14.1.** *Soient $I$ un idéal de $A$, $A$ séparé et complet pour la topologie $I$-adique, et $F = \sum a_i Z^i$ avec $a_i \in I$ pour $i < N$ et $a_N$ inversible. Alors $F$ est régulier dans $A[[Z]]$, et tout $G \in A[[Z]]$ s'écrit de façon unique $G = QF + r$ avec $Q \in A[[Z]]$ et $r \in A[Z]$ de degré $< N$.*

*Démonstration.* Si $I = A$, l'anneau $A$, séparé pour la topologie $A$-adique, est nul, et tout est trivial. Supposons $I \neq A$, de sorte que $A/I$ n'est pas nul. Les coefficients de $\bar{F}$ d'indice $< N$ sont nuls, puisque $a_i \in I$ ; celui d'indice $N$ est l'image de l'inversible $a_N$, donc est inversible dans l'anneau non nul $A/I$, et en particulier non nul. Ainsi $\bar{F}$ est d'ordre exactement $N$, et, $a_N$ étant inversible, le théorème de division s'applique. Il donne l'existence et l'unicité de l'écriture $G = QF + r$. Si $FH = 0$, on a $HF = 0$ avec le reste $r = 0$ de degré $< N$, donc $H = 0$ : $F$ est régulier. □

**Lemme 14.2.** *Soit $\mathfrak{m}$ un idéal nilpotent de $A$. Alors $A$ est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$-adique. Si $a_0, \ldots, a_{N-1}$ sont nilpotents, l'idéal qu'ils engendrent est nilpotent.*

*Démonstration.* Soit $k$ tel que $\mathfrak{m}^k = 0$ ; alors $\mathfrak{m}^n = 0$ pour $n \geqslant k$. Un élément qui appartient à tous les $\mathfrak{m}^n$ est dans $\mathfrak{m}^k = 0$ : $A$ est séparé. Si $(x_n)$ est une suite telle que $x_n \equiv x_p \pmod{\mathfrak{m}^n}$ pour $n \leqslant p$, alors $x_k$ en est une limite : pour $n \leqslant k$, $x_n \equiv x_k \pmod{\mathfrak{m}^n}$, et pour $n \geqslant k$, $x_n \equiv x_k \pmod{\mathfrak{m}^k}$, c'est-à-dire $x_n = x_k$. Pour la seconde assertion : l'idéal $\mathfrak{m} = (a_0, \ldots, a_{N-1})$ est contenu dans le nilradical et engendré par un nombre fini d'éléments ; c'est un fait classique qu'un tel idéal est nilpotent (si $a_i^e = 0$ pour tout $i$, un produit de $N(e-1)+1$ éléments de $\mathfrak{m}$ est combinaison de monômes en les $a_i$ dont l'un au moins des exposants atteint $e$). C'est la phrase de la lecture : « il est de type fini et engendré par des nilpotents, donc nilpotent ». □

*Démonstration du cas discret.* Soit $A$ un anneau commutatif quelconque. Supposons que les coefficients $a_i$ d'indice $i < N$ soient nilpotents et que $a_N$ soit inversible. Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal engendré par $a_0, \ldots, a_{N-1}$. Par le lemme 14.2, $\mathfrak{m}$ est nilpotent et $A$ est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$-adique. Comme $a_i \in \mathfrak{m}$ pour $i < N$, le lemme 14.1, appliqué à $I = \mathfrak{m}$, donne la régularité de $F$ et l'écriture unique. □

*Remarque.* Dans le cas adique, l'idéal n'a pas à être de type fini. La lecture n'emploie cette hypothèse que pour obtenir $\mathfrak{m}^j A[[Z]] = \mathfrak{m}^j[[Z]]$ dans sa démonstration par le gradué associé.

*Remarque.* La démonstration ci-dessus passe par la division de Weierstrass, admise comme théorème classique ; le nom renvoie au théorème de préparation de Weierstrass pour les fonctions analytiques, dont l'énoncé est l'analogue formel. La page passe par le gradué associé.

*Remarque.* Pour la topologie $I$-adique, « topologiquement nilpotent » signifie $a_i \in \sqrt{I}$, condition plus faible que l'hypothèse $a_i \in I$ du lemme 14.1.

*Remarque.* La division de Weierstrass sur un anneau complet pour la topologie $I$-adique figure déjà dans mathlib, qui couvre le cas adique du lemme. Pour le cas discret, il manquait la complétude pour un idéal nilpotent, proposée à mathlib (PR mathlib4 #44725).

Ne sont pas démontrés ici : la préparation (unité × polynôme distingué) ; les paires henséliennes ; les séries algébriques ; le cas d'une topologie linéaire quelconque ; le cas $I$-adique sous l'hypothèse $a_i \in \sqrt{I}$ ; l'axiomatique des pages 2 à 16.

**Conjecture 14.3** (Grothendieck, pages 9 à 14, axiomatique des fonctions implicites ♦). *Soient $k$ un anneau commutatif et, pour tout $n$, $A_n \subset k[[t_1, \dots, t_n]]$ un sous-anneau unitaire contenant les coordonnées, la famille étant stable par substitution d'arguments topologiquement nilpotents, par inversion des automorphismes formels de $X_n$ (H) et par extraction des coefficients de Hasse (D). Alors la famille est stable par le théorème des fonctions implicites, $(A_n, A_n \cap \mathfrak{m}_n)$ est une paire hensélienne zariskienne, et $A_n \subset k_0[[t]]$ avec $k_0 = A_0$. La page tire la paire hensélienne de (H) sans (D), par une substitution $t_{n+1} = 1$ que la stabilité par substitution interdit.*

Démonstration donnée par l'édition, non vérifiée en Lean.

# 15 Cote 41 : continuité de la section générique et ouverture (proposition 1)[16]

La cote 41, *Construction de morphismes étales (Chap. V) : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [années 1960-1970] », est une seule section de rédaction en treize pages. Page 3, elle pose la notion de section *monogène*, qui choisit continûment le point générique d'une composante géométriquement irréductible de chaque fibre, et la question de la représentabilité du foncteur qu'elles forment. Elle construit ensuite, sous des conditions de spécialisation, un revêtement étale séparé qui la représente (pages 4 à 10). Page 11, elle revient au cas où les fibres elles-mêmes sont irréductibles, et écrit une « Prop. 1° » en trois conditions, à laquelle s'ajoute, encadrée, une condition « (iii bis) ». L'hypothèse de finitude porte sur la condition (ii), « $f$ soit ouvert […] si $Y$ est loc. noeth., $f$ de type fini », et la seule formule lisible de la démonstration est $\varphi^{-1}(U) = f(U)$ (41, lot 1, p. 11).

**Énoncé** (Proposition 1). *Soit $f : X \to Y$ un morphisme de type fini dont les fibres sont irréductibles et non vides, et soit $\varphi(y)$ le point générique de $X_y$. On considère les conditions :*

*(i)* $\varphi : Y \to X$ *est continue ;*

*(ii)* $f$ *est ouvert ;*

*(iii)* $y \in \overline{\{y'\}} \Rightarrow \varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$ *;*

*(iii bis) pour tous $y \in \overline{\{y'\}}$ et $x$ au-dessus de $y$, il existe $x'$ au-dessus de $y'$ tel que $x \in \overline{\{x'\}}$.*

*Alors (i) ⇔ (ii) sans autre hypothèse, et (ii) ⇒ (iii) ⇔ (iii bis) ; si $f$ est localement de présentation finie — par exemple $Y$ localement noethérien —, les quatre conditions sont équivalentes.*

On précise ce que veut dire, sur les espaces sous-jacents, que $\varphi(y)$ est le point générique de la fibre.

**Définition.** Soient $X$, $Y$ des espaces topologiques et $f : X \to Y$ une application quelconque. On dit que $\varphi : Y \to X$ est une *section générique* de $f$ si, pour tout $y \in Y$, on a $f(\varphi(y)) = y$ et $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$ pour tout $x \in f^{-1}(y)$.

Cela revient à dire que $\varphi(y)$ est un point générique de la fibre $f^{-1}(y)$ munie de la topologie induite, puisque l'adhérence de $\{\varphi(y)\}$ dans $f^{-1}(y)$ est la trace sur $f^{-1}(y)$ de son adhérence

[16] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder41.lean`.

dans $X$ ; une fibre qui a un point générique est irréductible et non vide. Pour un morphisme de schémas, la fibre schématique $X_y$ est homéomorphe au sous-espace $f^{-1}(y)$ ; ce fait classique n'est pas démontré ici. Dans les lemmes qui suivent, $f$ est une application quelconque entre espaces topologiques, qu'on ne suppose même pas continue, et $\varphi$ une section générique de $f$.

**Lemme 15.1.** *Pour tout ouvert $U$ de $X$, $\varphi^{-1}(U) = f(U)$.*

*Démonstration.* Si $\varphi(y) \in U$, alors $y = f(\varphi(y)) \in f(U)$. Inversement, soient $x \in U$ et $y = f(x)$ ; alors $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$, et l'ouvert $U$, qui contient un point de l'adhérence de $\{\varphi(y)\}$, contient $\varphi(y)$ : $y \in \varphi^{-1}(U)$. □

**Lemme 15.2.** *On a (i) ⇔ (ii), (i) ⇒ (iii), et (iii) ⇔ (iii bis).*

*Démonstration.* (i) ⇔ (ii). Par le lemme 15.1, pour tout ouvert $U$ de $X$, l'ensemble $\varphi^{-1}(U)$ est ouvert si et seulement si $f(U)$ l'est ; or $\varphi$ est continue si et seulement si le premier l'est pour tout $U$, et $f$ est ouverte si et seulement si le second l'est pour tout $U$.

(i) ⇒ (iii). Une application continue $\varphi$ envoie l'adhérence de $\{y'\}$ dans l'adhérence de $\{\varphi(y')\}$.

(iii) ⇒ (iii bis). Soient $y \in \overline{\{y'\}}$ et $x$ au-dessus de $y$. Alors $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$ par définition de $\varphi$, et $\varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$ par (iii), donc $x \in \overline{\{\varphi(y')\}}$ ; et $x' = \varphi(y')$ est au-dessus de $y'$.

(iii bis) ⇒ (iii). Soit $y \in \overline{\{y'\}}$. Appliquons (iii bis) à $x = \varphi(y)$, qui est au-dessus de $y$ : il existe $x'$ au-dessus de $y'$ avec $\varphi(y) \in \overline{\{x'\}}$. Comme $x'$ est dans la fibre de $y'$, $x' \in \overline{\{\varphi(y')\}}$, et donc $\varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$. □

*Démonstration de la proposition 1.* Les implications (i) ⇔ (ii), (ii) ⇒ (iii) ⇔ (iii bis) sont celles du lemme 15.2, (ii) ⇒ (iii) passant par (i). Il reste, pour $f$ un morphisme de schémas localement de présentation finie, à déduire (ii) de (iii bis). Or (iii bis) dit exactement que les générisations se relèvent le long de $f$, et un morphisme localement de présentation finie qui relève les générisations est ouvert : c'est un théorème de Grothendieck et Dieudonné (EGA IV, 1.10.4 [26]), qui repose sur le théorème de Chevalley sur les parties constructibles. Les quatre conditions sont donc équivalentes. □

*Remarque.* L'implication (iii bis) ⇒ (ii) ne s'obtient pas par la seule topologie. Soient $X = \mathbb{N}$ muni de la topologie discrète, $Y = \mathbb{N}$ muni de la topologie cofinie, et $f : X \to Y$ l'identité, qui est continue. Les fibres sont des points, et $\varphi = f^{-1}$ est une section générique. Les deux espaces étant séparés au sens $T_1$, $y \in \overline{\{y'\}}$ entraîne $y = y'$, et (iii bis) est triviale. Mais $f$ n'est pas ouverte : $f(\{0\}) = \{0\}$ n'est pas ouvert dans $Y$, puisque son complémentaire est infini. L'application $f$ n'est pas un morphisme de schémas, et l'exemple montre seulement qu'une hypothèse, de finitude ou autre, est indispensable à cette implication, et à elle seule.

*Remarque.* Les implications (i) ⇔ (ii) et (i) ⇒ (iii) ⇔ (iii bis) valent pour toute application entre espaces topologiques munie d'une section générique, sans que $f$ soit de type fini, ni même continue.

*Remarque.* Seule l'implication (iii bis) ⇒ (ii) emploie l'hypothèse de finitude, sous la forme de la présentation finie locale, par le critère d'ouverture par relèvement des générisations (EGA IV, 1.10.4), admis ici comme théorème classique.

Ne sont pas démontrés ici : la constructibilité ; l'ouverture universelle ; l'irréductibilité géométrique des fibres ; le cas « $Y$ localement noethérien » ; la fibre schématique comme $f^{-1}(y)$ ; les définitions 2 et 3 ; la représentabilité des sections monogènes ; le théorème des pages 8 et 9.

**Conjecture 15.3** (Grothendieck, pages 3 et 8 à 10, composantes irréductibles des fibres ♦). *Soit $f : X \to Y$ de type fini qui, en chaque point générique d'une composante d'une fibre, est localement universellement ouvert et quasi-fini sur un espace affine $Y[t_1, \dots, t_{n-1}]$, sans platitude ni réduction géométrique des fibres. Un $Y$-schéma étale séparé $M$ dont les points géométriques au-dessus de $y$ indexent les composantes géométriquement irréductibles de $X_{\bar{y}}$ existe si et seulement si, au-dessus de tout trait, aucune composante de la fibre générique ne se spécialise en deux composantes distinctes de la fibre spéciale et deux composantes distinctes ne se rencontrent pas dans une spécialisation ; $M$ est fini si et seulement si toute composante générique se spécialise en une composante spéciale.*

# 16 Cote 42 : familles cohérentes de germes, le lemme 1 et le lemme 2[17]

La cote 42, *Réseaux d'anneaux locaux : notes manuscrites (s.d.)*, six pages que l'inventaire date « [années 1960-1970] », demande si une application entre préschémas localement noethériens est déterminée, et peut être construite, point par point, à partir des anneaux locaux reliés par les générisations. La page 3 ramène la question à une proposition sur les faisceaux : sous une condition (H) d'injectivité des flèches de générisation entre fibres, les sections globales sont les familles cohérentes de germes. Le lemme 1 en porte le contenu, et la page le démontre en une ligne. Le lieu considéré est stable par générisation, et « il suffit de montrer qu'il est *constructible*, donc que s'il contient $x$, il contient les pts d'un ouvert non vide de $\bar{x}$ » (42, lot 1, p. 3). Pour le faisceau structural, la page 4 enchaîne : « Il reste à vérifier que les conditions de la prop. sont vérifiées ». Elle isole un fait d'algèbre commutative, le lemme 2, dont la démonstration occupe le bas de la page 4 et le haut de la page 5 (42, lot 1, p. 4). La page glose le noyau de $A \to A_{\mathfrak{p}}$ comme « l'annulateur de $A - p$ », le premier mot étant lu avec doute. Elle traite la seconde assertion en se ramenant au cas $f = 1$, « car $A_p = (A_f)_{pA_f}$ » (42, lot 1, p. 5).

**Énoncé** (Proposition et lemme 1, page 3 ■). *Soient $X$ un espace topologique noethérien et sobre, et $F$ un faisceau d'ensembles sur $X$ vérifiant*

*(H) pour tout $x \in X$, il existe un ouvert $W \ni x$ tel que $\rho_{yx} : F_y \to F_x$ soit injective pour tout $y \in W \cap \overline{\{x\}}$.*

1. *(Lemme 1) Pour toute famille cohérente $(\xi_x)$ et toute section $s \in F(U)$ sur un ouvert $U$, l'ensemble $E = \{x \in U : s_x = \xi_x\}$ est ouvert.*
2. *(Proposition) L'application $\Gamma(X, F) \to \varprojlim_x F_x$, qui envoie une section sur la famille de ses germes, est bijective.*

**Énoncé** (Lemme 2, pages 4 et 5). *Soient $A$ un anneau noethérien et $\mathfrak{p}$ un idéal premier de $A$.*

1. *Il existe $f \in A \setminus \mathfrak{p}$ tel que $A_f \to A_{\mathfrak{p}}$ soit injectif.*
2. *Si de plus $A \to A_{\mathfrak{p}}$ est injectif, alors $A_{\mathfrak{q}} \to A_{\mathfrak{p}}$ est injectif pour tout idéal premier $\mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p}$.*
3. *(Forme de la page) Il existe $f \in A \setminus \mathfrak{p}$ tel que, pour tout idéal premier $\mathfrak{Q}$ de $A_f$ dont la trace sur $A$ contient $\mathfrak{p}$, $(A_f)_{\mathfrak{Q}} \to A_{\mathfrak{p}}$ soit injectif.*

[17] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder42.lean`.

**Énoncé** (Lemme 1 et corollaire 1, pages 3 et 4, cas affine)**.** *Soit $A$ un anneau noethérien. Appelons famille cohérente une famille $(\xi_\mathfrak{p})$, $\xi_\mathfrak{p} \in A_\mathfrak{p}$, indexée par les idéaux premiers, telle que $\xi_\mathfrak{q} \mapsto \xi_\mathfrak{p}$ par $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ chaque fois que $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$.*

1. *(Lemme 1) Pour toute famille cohérente $(\xi_\mathfrak{p})$ et tous $a, s \in A$, l'ensemble des $\mathfrak{p}$ tels que $s \notin \mathfrak{p}$ et $\xi_\mathfrak{p} = a/s$ est ouvert dans* Spec $A$.
2. *(Corollaire 1) L'application $a \mapsto (a/1)_\mathfrak{p}$ est une bijection de $A = \Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O})$ sur l'ensemble des familles cohérentes.*

*Conventions.* Pour $x, y \in X$, on écrit $x \rightsquigarrow y$ lorsque $y \in \overline{\{x\}}$ : $y$ est une spécialisation de $x$, $x$ une générisation de $y$. Tout ouvert contenant $y$ contient alors $x$, d'où une application $\rho_{yx} : F_y \to F_x$, compatible aux germes : $\rho_{yx}(s_y) = s_x$ pour toute section $s$ définie au voisinage de $y$. Une famille $(\xi_x)$, $\xi_x \in F_x$, est cohérente si $\rho_{yx}(\xi_y) = \xi_x$ chaque fois que $x \rightsquigarrow y$. Dans Spec $A$, $\mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q}$ équivaut à $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. Un ouvert non vide de l'irréductible $\overline{\{x\}}$ contient son point générique $x$ ; la condition (H) dit donc la même chose que la page, « un ouvert non vide » de $\overline{\{x\}}$ sur lequel les $F_y \to F_x$ sont injectives. Pour une partie multiplicative $S$ de $A$, on note $a \mapsto a/1$ le morphisme $A \to S^{-1}A$ ; on rappelle que $a/1 = 0$ si et seulement s'il existe $s \in S$ avec $sa = 0$, que tout $z \in S^{-1}A$ vérifie $z \cdot (s/1) = a/1$ pour un $a \in A$ et un $s \in S$, et que si $g : A \to B$ envoie $S$ dans les inversibles de $B$, il existe un unique $\bar{g} : S^{-1}A \to B$ avec $\bar{g}(a/1) = g(a)$. Les flèches $A_f \to A_\mathfrak{p}$ et $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ sont de cette forme, $g$ étant le morphisme canonique $A \to A_\mathfrak{p}$.

**Lemme 16.1.** *Soient $X$ un espace noethérien et sobre et $E \subseteq X$ une partie stable par générisation telle que, pour tout $x \in E$, il existe un ouvert $W \ni x$ avec $W \cap \overline{\{x\}} \subseteq E$. Alors $E$ est ouvert.*

*Démonstration.* Montrons d'abord, par récurrence noethérienne sur les fermés, que tout fermé $Z$ tel que $Z \subseteq \overline{Z \setminus E}$ ne rencontre pas $E$. Soit $Z$ un tel fermé, et supposons l'assertion vraie pour les fermés strictement contenus dans $Z$. Si $Z$ est irréductible, soit $z$ son point générique. Si $Z$ rencontrait $E$ en un point $y$, on aurait $z \rightsquigarrow y$, donc $z \in E$ par stabilité ; l'hypothèse donne un ouvert $W \ni z$ avec $W \cap Z \subseteq E$. Mais $z \in Z \subseteq \overline{Z \setminus E}$, donc $W$ rencontre $Z \setminus E$, en un point de $W \cap Z$ qui n'est pas dans $E$ : contradiction. Si $Z$ n'est pas irréductible (et n'est pas vide), il existe deux fermés $z_1, z_2$ avec $Z \subseteq z_1 \cup z_2$ et $Z \not\subseteq z_i$. Posons $Z_i = \overline{Z \cap z_i \setminus E}$ ; c'est un fermé contenu dans $Z \cap z_i$, donc strictement contenu dans $Z$, et $Z_i \subseteq \overline{Z_i \setminus E}$ puisque $Z \cap z_i \setminus E \subseteq Z_i \setminus E$. Par hypothèse de récurrence, $Z_i \cap E = \varnothing$. Or $Z \setminus E \subseteq (Z \cap z_1 \setminus E) \cup (Z \cap z_2 \setminus E)$, d'où $Z \subseteq \overline{Z \setminus E} \subseteq Z_1 \cup Z_2$, et $Z \cap E = \varnothing$.

Appliquons cela à $T = \overline{X \setminus E}$, qui vérifie $T \setminus E = X \setminus E$, donc $T \subseteq \overline{T \setminus E}$ : il vient $T \cap E = \varnothing$, c'est-à-dire que $X \setminus E$ est fermé. □

*Démonstration du lemme 1 de la page 3. $E$ est stable par générisation.* Soient $x \in E$ et $y \rightsquigarrow x$. Comme $U$ est ouvert et contient $x$, il contient $y$, et $s_y = \rho_{xy}(s_x) = \rho_{xy}(\xi_x) = \xi_y$ par cohérence ; donc $y \in E$.

*Condition locale.* Soit $x \in E$, et soit $W$ l'ouvert que fournit (H) en $x$. L'ouvert $W \cap U$ contient $x$. Pour $y \in W \cap U \cap \overline{\{x\}}$, on a $x \rightsquigarrow y$, et $\rho_{yx}(s_y) = s_x = \xi_x = \rho_{yx}(\xi_y)$ ; l'injectivité de $\rho_{yx}$ donne $s_y = \xi_y$, donc $y \in E$. Le lemme 16.1 conclut. □

*Démonstration de la proposition.* L'injectivité est l'axiome de séparation des faisceaux : deux sections globales qui ont les mêmes germes en tout point sont égales. Soit $(\xi_x)$ une famille cohérente. Pour chaque $x$, le germe $\xi_x$ provient d'une section $s^x$ sur un ouvert $U_x \ni x$ ; par le

lemme 1, $V_x = \{y \in U_x : s^x_y = \xi_y\}$ est un ouvert, qui contient $x$. Les restrictions $s^x|_{V_x}$ ont, sur $V_x \cap V_{x'}$, les mêmes germes $\xi_y$ en tout point ; elles y coïncident donc, et se recollent, les $V_x$ recouvrant $X$, en une section globale $s$. Pour tout $x$, $s_x = (s^x|_{V_x})_x = \xi_x$. □

**Lemme 16.2.** *Soient $S \subseteq A$ une partie multiplicative et $g : A \to B$ un morphisme d'anneaux envoyant $S$ dans les inversibles de $B$. Si, pour tout $a \in A$, $g(a) = 0$ entraîne $a/1 = 0$ dans $S^{-1}A$, alors $\bar{g} : S^{-1}A \to B$ est injectif.*

*Démonstration.* Comme $\bar{g}$ est additif, il suffit de montrer que son noyau est nul. Soit $z \in S^{-1}A$ avec $\bar{g}(z) = 0$, et écrivons $z \cdot (s/1) = a/1$ avec $a \in A$ et $s \in S$. En appliquant $\bar{g}$, on obtient $g(a) = \bar{g}(z)\, g(s) = 0$, donc $a/1 = 0$ par hypothèse, c'est-à-dire $z \cdot (s/1) = 0$. Comme $s/1$ est inversible dans $S^{-1}A$, $z = 0$. □

**Lemme 16.3.** *Soient $A$ un anneau noethérien et $\mathfrak{p}$ un idéal premier. Il existe $f \notin \mathfrak{p}$ tel que $fy = 0$ pour tout $y$ du noyau $J$ de $A \to A_\mathfrak{p}$.*

*Démonstration.* Le noyau $J$ est l'ensemble des $a \in A$ tels que $sa = 0$ pour *au moins un* $s \notin \mathfrak{p}$. L'anneau $A$ étant noethérien, l'idéal $J$ est engendré par un nombre fini d'éléments $x_1, \dots, x_n$. Pour chaque $i$, l'appartenance $x_i \in J$ fournit un $s_i \notin \mathfrak{p}$ tel que $s_i x_i = 0$. Posons $f = s_1 \cdots s_n$ ; comme $\mathfrak{p}$ est premier, son complémentaire est stable par produit, et $f \notin \mathfrak{p}$. L'ensemble des $y \in A$ tels que $fy = 0$ est un idéal de $A$ ; il contient chaque $x_i$, car $f = s_i c_i$ avec $c_i = \prod_{j \neq i} s_j$, donc $fx_i = c_i(s_i x_i) = 0$ ; il contient donc l'idéal engendré par les $x_i$, qui est $J$. □

*Démonstration du lemme 2.* (1) Soit $f$ donné par le lemme 16.3. Appliquons le lemme 16.2 à $S = \{f^n\}$ et au morphisme canonique $g : A \to A_\mathfrak{p}$. Si $g(a) = 0$, alors $a \in J$, donc $fa = 0$ ; comme $f \in S$, cela signifie $a/1 = 0$ dans $A_f$. Le morphisme $A_f \to A_\mathfrak{p}$ est donc injectif.

(2) Appliquons le lemme 16.2 à $S = A \setminus \mathfrak{q}$ et au morphisme canonique $g : A \to A_\mathfrak{p}$, qui inverse $S$ puisque $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. Si $g(a) = 0$, alors $a = 0$ par l'injectivité supposée de $g$, et a fortiori $a/1 = 0$ dans $A_\mathfrak{q}$.

(3) Prenons $f$ comme en (1), et soit $\mathfrak{Q}$ un idéal premier de $A_f$ dont la trace $\mathfrak{q}$ sur $A$ contient $\mathfrak{p}$. Le morphisme $h : A_f \to A_\mathfrak{p}$ envoie $A_f \setminus \mathfrak{Q}$ dans les inversibles : écrivons $y \in A_f \setminus \mathfrak{Q}$ sous la forme $y \cdot (f^n/1) = a/1$ ; si $a$ était dans $\mathfrak{p}$, donc dans $\mathfrak{q}$, $a/1 = y \cdot (f^n/1)$ serait dans $\mathfrak{Q}$, ce qui est exclu puisque $y \notin \mathfrak{Q}$ et que $f^n/1$, inversible, n'est pas dans $\mathfrak{Q}$. Donc $a \notin \mathfrak{p}$, $h(y)\, h(f^n/1) = a/1$ est inversible dans $A_\mathfrak{p}$, et $h(y)$ l'est aussi. Le morphisme $(A_f)_\mathfrak{Q} \to A_\mathfrak{p}$ est donc défini, et il est injectif par le lemme 16.2 appliqué à $h$, qui est injectif par (1) : c'est l'argument de (2) pour l'anneau $A_f$. □

*Démonstration du lemme 1 et du corollaire 1, cas affine.* Pour le lemme 1, soit $E$ l'ensemble des $\mathfrak{p}$ tels que $s \notin \mathfrak{p}$ et $\xi_\mathfrak{p} \cdot (s/1) = a/1$. Il est stable par générisation : si $\mathfrak{q} \in E$ et $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$, alors $s \notin \mathfrak{p}$, et l'image par $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ de l'égalité $\xi_\mathfrak{q} \cdot (s/1) = a/1$ est $\xi_\mathfrak{p} \cdot (s/1) = a/1$. Soit $\mathfrak{p} \in E$, et $f$ donné par le lemme 16.3. L'ouvert $D(f) \cap D(s)$ contient $\mathfrak{p}$. Soit $\mathfrak{q}$ un premier de cet ouvert qui contient $\mathfrak{p}$ ; le lemme 16.2, appliqué à $S = A \setminus \mathfrak{q}$, montre que $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ est injectif : si $a'/1 = 0$ dans $A_\mathfrak{p}$, alors $fa' = 0$ avec $f \notin \mathfrak{q}$, donc $a'/1 = 0$ dans $A_\mathfrak{q}$. Or $\xi_\mathfrak{q} \cdot (s/1) - a/1$ a pour image $\xi_\mathfrak{p} \cdot (s/1) - a/1 = 0$ ; il est donc nul, et $\mathfrak{q} \in E$. Le lemme 16.1 s'applique, Spec $A$ étant noethérien et sobre.

Pour le corollaire 1, on utilise la description du faisceau structural comme faisceau des familles $(\sigma_\mathfrak{p}) \in \prod_{\mathfrak{p} \in U} A_\mathfrak{p}$ qui sont localement des fractions — pour tout $\mathfrak{p} \in U$, il existe un voisinage $V$ de $\mathfrak{p}$ et $a, s \in A$ avec $s \notin \mathfrak{q}$ et $\sigma_\mathfrak{q} = a/s$ pour tout $\mathfrak{q} \in V$ — et le fait que $a \mapsto (a/1)_\mathfrak{p}$ est une bijection de $A$ sur les sections globales de ce faisceau. L'injectivité de l'application du

corollaire en découle. Soit $(\xi_\mathfrak{p})$ une famille cohérente. Pour chaque $\mathfrak{p}$, écrivons $\xi_\mathfrak{p} \cdot (s/1) = a/1$ avec $s \notin \mathfrak{p}$ ; l'ensemble $E$ du lemme 1 pour ces $a$ et $s$ est un voisinage ouvert de $\mathfrak{p}$, sur lequel $\xi_\mathfrak{q} = a/s$. La famille $(\xi_\mathfrak{p})$ est donc localement une fraction, c'est une section globale du faisceau structural, et elle provient d'un $a \in A$. □

*Remarque.* Le corollaire 1, dans le cas affine, est un cas d'un énoncé de D. Ferrand sur les modules qui sont limite projective de leurs localisés, annoncé sans démonstration en 1966 [23] et démontré dans une note de février 2004 (proposition 3). L'inventaire date la cote « [années 1960-1970] ».

*Remarque.* Le lemme 16.1 est le « donc » de la page 3. De la constructibilité, la page passe aussitôt à la propriété « s'il contient $x$, il contient les points d'un ouvert non vide de $\bar{x}$ ». Le lemme prend pour hypothèse cette propriété, jointe à la stabilité par générisation, et la constructibilité n'intervient pas dans la démonstration. La bibliothèque utilisée contient l'énoncé « constructible et stable par générisation, donc ouvert » pour les spectres d'anneaux. Elle ne contient pas le critère de constructibilité des espaces noethériens par lequel la page y arrive, et le lemme fait les deux pas à la fois.

*Remarque.* Les énoncés sont démontrés pour un espace noethérien, et le corollaire 1 pour $X = \operatorname{Spec} A$ affine. C'est le cas auquel la page se ramène (« La question est locale. On peut donc supposer $X$ noethérien »). La page 3 écrit « un voisinage $U$ de $\bar{x}$ tel que pour tt $y \in \bar{x} \cap U$ ». Un ouvert contenant tout $\overline{\{x\}}$ donnerait une condition plus forte que (H), qui l'entraîne. La démonstration de la page, comme celle-ci, n'emploie que la forme faible, « un ouvert non vide $U$ de $\bar{x}$ ». L'injectivité de $\Gamma(X, F) \to \varprojlim F_x$ ne demande ni (H) ni l'hypothèse noethérienne, et celle de $A \to \varprojlim A_\mathfrak{p}$ vaut pour tout anneau commutatif.

*Remarque.* L'hypothèse noethérienne n'intervient pas dans (2) du lemme 2, qui vaut pour tout anneau commutatif. Dans (1), elle sert seulement à rendre de type fini le noyau $J$ de $A \to A_\mathfrak{p}$. Ce noyau est formé des éléments annulés par *un* élément de $A \setminus \mathfrak{p}$. L'annulateur de $A \setminus \mathfrak{p}$, que glose la page, est en général plus petit et ne convient pas. La démonstration de la page prend un annulateur par générateur, et suit donc la bonne description.

*Remarque.* Les deux premiers énoncés du lemme 2 sont déjà dans mathlib sous une autre forme. Le lemme 16.3 découle en quelques lignes de `Module.mem_support_iff_of_finite` et `Module.notMem_support_iff'`, appliqués au noyau de $A \to A_\mathfrak{p}$, qui est un $A$-module de type fini. Le lemme 16.2 et le point (2) découlent de `IsLocalization.injective_of_map_algebraMap_zero`. Le lemme 16.1, qui n'y figure que pour les spectres et sous l'hypothèse de constructibilité, est proposé à mathlib sans cette hypothèse (PR mathlib4 #44707).

*Remarque.* Dans la forme (3) du lemme 2, l'hypothèse que la trace de $\mathfrak{Q}$ contienne $\mathfrak{p}$ est celle de la page, « provenant d'un idéal $q' \supset p$ ne rencontrant pas $f$ » ; elle rend la flèche $(A_f)_\mathfrak{Q} \to A_\mathfrak{p}$ définie. La démonstration n'a pas besoin de l'identification $A_\mathfrak{p} = (A_f)_{\mathfrak{p}A_f}$ par laquelle la page se ramène au cas $f = 1$. Le corollaire 1 n'utilise du lemme 2 que le lemme 16.3. Un même $f$ tue le noyau de $A \to A_\mathfrak{p}$ et rend injectives toutes les flèches $A_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ pour $\mathfrak{q} \in D(f) \cap V(\mathfrak{p})$, ce qui est (H) pour le faisceau structural. Dans la démonstration du lemme 1, l'argument donne l'égalité $s_y = \xi_y$, là où la page écrit « d'où $s_x = \xi_y$ ».

Ne sont pas démontrés ici : le corollaire 1 pour un préschéma localement noethérien non affine ; le lemme 3 et les corollaires 2 et 3 (pleine fidélité) ; les deux contre-exemples.

**Conjecture 16.4** (Grothendieck, pages 1 à 6, réseaux d'anneaux locaux ♦). *Soient $S$ un préschéma localement noethérien, $X$ et $Y$ des $S$-préschémas localement de type fini, $Y$ séparé sur $S$. Les $S$-morphismes $X \to Y$ correspondent bijectivement aux homomorphismes de réseaux d'anneaux locaux $p(X) \to p(Y)$ au-dessus de $p(S)$ : applications croissantes des ensembles ordonnés de spécialisation, munies d'homomorphismes locaux compatibles $\mathcal{O}_{Y,\varphi(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$. L'hypothèse « $Y$ séparé » est celle de l'édition.*

Démonstration donnée par l'édition, non vérifiée en Lean.

Autres pistes de l'onglet Findings pour ce thème, dans des cotes qui n'ont pas de section ici :

**Conjecture** (Grothendieck, page 12, critère d'immersion ouverte ♦). *Sur une base localement noethérienne $S$, un monomorphisme formellement étale $u : G \to F$ de foncteurs sur les $S$-schémas est une immersion ouverte dès que $F$ et $G$ sont des faisceaux fpqc qui commutent aux limites inductives filtrantes d'anneaux et aux limites adiques d'anneaux artiniens.*

Démonstration donnée par l'édition, non vérifiée en Lean.

La page dit « infinitésimalement étale », et le mot « adiques » y est incertain. Mathlib n'a pas la descente fpqc des foncteurs sur les schémas. On se reportera aux notes de Grothendieck (102, lot 1, p. 12).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 2 à 4, 15 et 19, critère valuatif de platitude d'une adhérence ♦). *Soient $X \to Y$ localement noethérien, $F$ cohérent sur $X$, $U$ un ouvert rétrocompact et $G_U$ un quotient cohérent de $F|_U$, plat sur $Y$. Si les anneaux locaux de $X$ aux points de $X - U$ ont des fibres formelles géométriquement normales, alors $G = \mathrm{Im}(F \to i_* G_U)$ est plat sur $Y$, avec $U$ universellement $G$-dense relativement à $Y$, si et seulement s'il en est ainsi après tout changement de base $Y' \to Y$ où $Y'$ est artinien ou un trait.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 3 et 4). La page 4 est en grande partie illisible, le « vrai théorème » de la page 15 est sans démonstration, et le mot « artinien », dont dépend l'énoncé, y est incertain. Mathlib n'a pas la densité schématique universelle ni les fibres formelles. On se reportera aux notes de Grothendieck (127, lot 1, p. 2).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 7, 9, 10 et 12, ouverture de Hironaka sur une base réduite ; voir aussi Kollár 2011 ♦). *Soient $f : X \to Y$ de type fini, $Y$ noethérien, et $\mathcal{O}_{Y,y}$ réduit à fibres formelles géométriquement normales. Supposons $f$ universellement ouvert en $x$, à fibres équidimensionnelles de même dimension près de $x$, $X_y$ réduit aux générisations maximales de $x$ et $(X_y)_{\mathrm{red}}$ géométriquement normal. Alors $x$ a un voisinage ouvert $U$ tel que $U_{\mathrm{red}} \to Y$ soit plat à fibres géométriquement normales.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 9 à 12), avec un « lemme à dégager » jamais écrit. D'après le résumé de l'article de Kollár, Hironaka traite le cas d'une base régulière. Mathlib n'a pas les fibres formelles ni les morphismes universellement ouverts. On se reportera aux notes de Grothendieck (127, lot 1, p. 7).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 2 et 3, descente non plate sur une base artinienne ♦). *Sur une base artinienne $Y$, le problème d'un quotient plat $G$ de $F$ qui prolonge $G_U$, avec $G \to i_* G_U$ universellement injectif relativement à $Y$, descend le long de tout épimorphisme de schémas $Y' \to Y$, plat ou non, pourvu que $Y' \to Y$ soit fini, ou que $f$ et la solution soient de présentation finie. La solution, si elle existe, est unique.*

Le lemme 1.3 n'est pas démontré, et l'alternative « fini ou de présentation finie » vient d'une note au crayon. Mathlib n'a pas la descente le long des épimorphismes de schémas. On se reportera aux notes de Grothendieck (127, lot 1, p. 2).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 1 à 5, 13 et 15, représentabilité par un schéma localement quasi-fini ; voir aussi Murre 1965 ♦). *Un foncteur $F$ sur les schémas au-dessus d'un $S$ localement noethérien est représentable par un $S$-schéma séparé localement quasi-fini si et seulement s'il vérifie la descente fpqc, testée sur $B \to \hat{B}$, la présentation finie locale, l'effectivité sur $\hat{B} = \varprojlim B_n$, la pro-représentabilité sur les anneaux artiniens par des anneaux finis sur eux, le critère valuatif de séparation, et deux conditions de « modularité », l'une locale sur les bases locales complètes, l'autre générique.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 1 à 5) : la dernière étape s'arrête à la condition de constructibilité, et deux propositions formelles ne sont pas démontrées. Murre traite le cas non ramifié et dit seulement que le cas localement quasi-fini est possible. Mathlib n'a pas les critères de représentabilité de type Artin. On se reportera aux notes de Grothendieck (131, lot 1, p. 1).

**Théorème** (Grothendieck, pages 8, 9 et 19, Tor génériques et suites régulières ♦). *Soient $S = \operatorname{Spec} A$ noethérien, non nécessairement réduit, et $R$ un faisceau cohérent sur un $S$-schéma $X$ de type fini. Il existe un ouvert dense $U \subset S$ tel que $\operatorname{Tor}_i^A(R, A_\mathfrak{p}/(t)) = 0$ pour tout $i > 0$, tout $\mathfrak{p} \in U$ et toute suite $A_\mathfrak{p}$-régulière $t$. C'est un substitut de la platitude générique, qui tombe en défaut sur une base non réduite.*

◊ *non vérifié en Lean*

Le pas de récurrence du lemme 6, que la page dit « bien standard », est de l'édition, et la page écrit $\operatorname{gr}_J(\mathcal{O}_X)$ là où l'argument demande $\operatorname{gr}_J(R)$. Mathlib n'a pas la platitude générique. On se reportera aux notes de Grothendieck (94, lot 1, p. 8).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 15 et 16, critère de représentabilité sur $\operatorname{Mod}(A)$ ; voir aussi Hall 2013 ♦). *Soit $A$ un anneau noethérien quotient d'un anneau régulier. Un foncteur $F : \operatorname{Mod}(A) \to \operatorname{Ens}$ est de la forme $\operatorname{Hom}_A(P, -)$ avec $P$ fini si et seulement s'il est exact à gauche, commute aux limites inductives filtrantes, vérifie une condition de complétion $\mathfrak{m}_\mathfrak{p}$-adique et une $g$-adique sur les modules finis, envoie les modules finis sur des modules finis, a une fonction $\mathfrak{p} \mapsto \dim F(k(\mathfrak{p}))$ constructible et, pour tout quotient $B$ et tout $B$-module fini $\Omega$, commute génériquement à la réduction de $\Omega$ modulo les systèmes de paramètres. La conservation des produits n'en fait pas partie.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 15 et 16) : plusieurs liens sont de l'édition, et la démonstration telle qu'elle est écrite n'est sûre que pour $A$ excellent. Hall énonce un autre critère, par la conservation des produits. Mathlib n'a pas ces conditions de complétion sur les foncteurs de modules. On se reportera aux notes de Grothendieck (94, lot 1, p. 15).

Piste dont l'énoncé dépend d'une lecture à vérifier :

- Cote 94 : pour $A$ noethérien dont tout quotient intègre est génériquement normal, et $F$ exact à gauche, commutant aux limites inductives filtrantes et vérifiant la condition de complétion locale et la finitude locale, la représentabilité de $F$ par un module fini sur un ouvert non vide de chaque $V(\mathfrak{p})$ équivaut à la constructibilité de $\mathfrak{p} \mapsto \dim_{k(\mathfrak{p})} F(k(\mathfrak{p}))$. La réciproque repose sur le milieu de la page 7, en grande partie illisible, et l'hypothèse de normalité sur une lecture incertaine. La lecture de la page est à vérifier sur le fac-similé. Mathlib n'a pas la constructibilité de ces fonctions de rang. On se reportera aux notes de Grothendieck (94, lot 1, p. 7). ♦

Partie 16

# K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch

Le 3 novembre 1970, il demande à Daniel Ferrand s'il peut compter sur l'exposé XI de SGA 6 avant la fin de décembre, ou si le volume doit paraître sans lui (37, lot 4, p. 73). La cote 153, datée « [à partir de 1982] », reprend les $\lambda$-anneaux plus de dix ans après.

## 17 Cote 153 : polynômes à valeurs entières, co-opérations, analyseurs[18]

La cote 153, *Analyseurs : notes manuscrites (s.d.)*, dix pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », cherche la structure abstraite d'un anneau d'opérations muni d'une composition, ce qu'on appelle aujourd'hui une pléthorie, notion étudiée par Tall et Wraith en 1970 [44] et nommée ainsi par Borger et Wieland en 2005 [11]. Elle y arrive par les polynômes à valeurs entières. La page 3 fixe une inclusion d'anneaux commutatifs $k_0 \subset K_0$ et l'anneau $\Omega = \{F \in K_0[T] \mid F(\lambda) \in k_0 \ \forall \lambda \in k_0\}$. Les co-opérations $F(x+y) = \sum_i G_i(x)H_i(y)$ et $F(xy) = \sum_\alpha J_\alpha(x)K_\alpha(y)$ doivent être des éléments « bien déterminés » de $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$. Pour cela, la page énonce un lemme, le mot « Lemme » étant lu sans certitude : le sous-ensemble des $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$ tels que $F(x) \in M$ pour tout $x \in k_0$ « s'identifie à $\Omega \otimes_{k_0} M$ » (153, lot 1, p. 3). La lecture précise : coordonnée par coordonnée dans une base de $M$.

La page 2 écrit les polynômes binomiaux $F_n = \binom{T}{n} \in \mathbf{Q}[T]$, affirme que $\bigoplus_n \mathbf{Z}F_n$ est une $\mathbf{Z}$-algèbre, et écrit la co-addition sous la forme générale $F_m(P+Q) = \sum \gamma_{ij}^m F_i(P)F_j(Q)$ ; la co-multiplication reste inachevée (153, lot 1, p. 2). La page 5 définit l'analyseur, puis les constantes, et écrit sans justification $\Omega = \Omega_0 \oplus \Omega^0$ (153, lot 1, p. 5). La page 7 donne les exemples $\mathrm{Appl}(A, A)$, $k[T]$ et $k[[T]]^+$, et l'application $\Omega \to \mathrm{Appl}(\Omega_0, \Omega_0) = \Omega_{\Omega_0}$, avec le souhait « que $\Omega \to \Omega_{\Omega_0}$ soit injectif ! » (153, lot 1, p. 7). La page 9 donne l'exemple relatif et l'analyseur binomial de $\mathbf{Z} \subset \mathbf{Q}$ (153, lot 1, p. 9).

**Définition.** Soit $K_0$ une $k_0$-algèbre commutative ; on note $\iota : k_0 \to K_0$ le morphisme structural. On pose $\Omega = \{F \in K_0[T] \mid F(\iota(\lambda)) \in \iota(k_0) \ \forall \lambda \in k_0\}$ ; c'est une sous-$k_0$-algèbre de $K_0[T]$, les valeurs d'une somme et d'un produit étant la somme et le produit des valeurs, et un polynôme constant $\iota(c)$ y appartenant. Pour un $k_0$-module $M$, $x \in k_0$ et $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$, on note $F(x) \in K_0 \otimes_{k_0} M$ l'image de $F$ par $\mathrm{ev}_x \otimes \mathrm{id}_M$, où $\mathrm{ev}_x : K_0[T] \to K_0$ est l'évaluation en $\iota(x)$, et l'on dit que $F(x) \in M$ lorsque $F(x)$ est dans l'image de $M \to K_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$. On note $\Omega_M$ l'ensemble des $F$ tels que $F(x) \in M$ pour tout $x \in k_0$. Enfin « $\Omega_M$ s'identifie à $\Omega \otimes_{k_0} M$ » est lu : l'application canonique $\Omega \otimes_{k_0} M \to K_0[T] \otimes_{k_0} M$ est injective, et son image est $\Omega_M$.

**Énoncé** (Lemme, page 3 ■). *Soit $M$ un $k_0$-module libre, de base $(e_i)_{i \in I}$, et écrivons tout $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$ sous la forme $\sum_i F_i \otimes e_i$, les $F_i \in K_0[T]$ étant presque tous nuls.*

1. *$F \in \Omega_M$ si et seulement si $F_i \in \Omega$ pour tout $i$.*
2. *L'application canonique $\Omega \otimes_{k_0} M \to K_0[T] \otimes_{k_0} M$ est injective.*

[18] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder153.lean`.

*3. Son image est exactement $\Omega_M$.*

Dans ce qui suit, $N$ et $P$ désignent des $k_0$-modules et $f : N \to P$ une application $k_0$-linéaire. La base $(e_i)$ donne, pour tout $N$, un isomorphisme $c_N : N \otimes_{k_0} M \to N^{(I)}$ sur les familles presque nulles d'éléments de $N$, qui envoie $n \otimes m$ sur $(m_i\, n)_i$, où les $m_i$ sont les coordonnées de $m$ ; c'est l'isomorphisme $N \otimes_{k_0} k_0^{(I)} \simeq N^{(I)}$. On appelle $c_N(t)_i$ la $i$-ième coordonnée de $t$.

**Lemme 17.1.** *Les coordonnées sont naturelles : pour $t \in N \otimes_{k_0} M$, la $i$-ième coordonnée de $(f \otimes \mathrm{id}_M)(t)$ est $f(c_N(t)_i)$.*

*Démonstration.* Les deux membres sont additifs en $t$, et il suffit de le vérifier sur un tenseur pur $n \otimes m$ : la $i$-ième coordonnée de $f(n) \otimes m$ est $m_i f(n) = f(m_i n)$. □

**Lemme 17.2.** *Un élément $t$ de $P \otimes_{k_0} M$ est dans l'image de $f \otimes \mathrm{id}_M$ si et seulement si chacune de ses coordonnées est dans l'image de $f$.*

*Démonstration.* Si $t = (f \otimes \mathrm{id})(s)$, ses coordonnées sont les $f(c_N(s)_i)$ par le lemme 17.1. Réciproquement, supposons $c_P(t)_i = f(g_i)$ pour tout $i$, et prenons $g_i = 0$ hors du support, fini, de $c_P(t)$ ; la famille $(g_i)$ est presque nulle, et soit $s = c_N^{-1}\big((g_i)_i\big)$. Par le lemme 17.1, les coordonnées de $(f \otimes \mathrm{id})(s)$ sont les $f(g_i)$, qui valent $c_P(t)_i$ sur le support et $0 = c_P(t)_i$ ailleurs ; $c_P$ étant injectif, $(f \otimes \mathrm{id})(s) = t$. □

**Lemme 17.3.** *L'image de $M \to K_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$, est l'image de $\iota \otimes \mathrm{id}_M : k_0 \otimes_{k_0} M \to K_0 \otimes_{k_0} M$.*

*Démonstration.* La première application est la composée de l'isomorphisme $M \simeq k_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$, et de $\iota \otimes \mathrm{id}_M$. □

*Démonstration du lemme de la page 3.* (1) Soit $x \in k_0$. Par le lemme 17.3, $F(x) \in M$ signifie que $(\mathrm{ev}_x \otimes \mathrm{id})(F)$ est dans l'image de $\iota \otimes \mathrm{id}$, c'est-à-dire, par le lemme 17.2, que chacune de ses coordonnées est dans $\iota(k_0)$. Par le lemme 17.1, sa $i$-ième coordonnée est $\mathrm{ev}_x(F_i) = F_i(\iota(x))$. Ainsi $F \in \Omega_M$ si et seulement si $F_i(\iota(x)) \in \iota(k_0)$ pour tout $x$ et tout $i$, c'est-à-dire si et seulement si $F_i \in \Omega$ pour tout $i$.

(2) Un module libre est plat, fait classique ; le produit tensoriel par $M$ conserve donc l'injectivité de l'inclusion $\Omega \hookrightarrow K_0[T]$.

(3) Par le lemme 17.2 appliqué à l'inclusion $\Omega \hookrightarrow K_0[T]$, $F$ est dans l'image de $\Omega \otimes_{k_0} M$ si et seulement si chaque $F_i$ est dans $\Omega$, c'est-à-dire, par (1), si et seulement si $F \in \Omega_M$. □

*Remarque.* L'hypothèse de la page que $k_0 \to K_0$ soit une inclusion ne sert pas. Le lemme vaut pour toute $k_0$-algèbre commutative $K_0$, $\Omega$ étant l'ensemble des polynômes qui envoient $k_0$ dans l'image de $k_0$.

*Stabilité par composition et co-opérations (page 3).* On garde les notations de la définition ; on écrit $K_0[X, Y]$ pour l'anneau des polynômes en deux variables sur $K_0$, et, pour $F \in K_0[T]$, $\Delta_a F = F(X+Y)$ et $\Delta_m F = F(XY)$. On note $\Phi : \Omega \otimes_{k_0} \Omega \to K_0[X, Y]$ l'application $k_0$-linéaire qui envoie $G \otimes H$ sur $G(X)H(Y)$.

**Énoncé** (Page 3, stabilité)**.** *Si $F, G \in \Omega$, alors $F \circ G \in \Omega$.*

*Démonstration.* Pour $x \in k_0$, $G(\iota(x)) = \iota(y)$ pour un $y \in k_0$, et $(F \circ G)(\iota(x)) = F(\iota(y)) \in \iota(k_0)$. □

**Énoncé** (Page 3, les co-opérations). *Supposons que $K_0$ soit un localisé $S^{-1}k_0$ de $k_0$, et que $\Omega$ soit un $k_0$-module libre.*

1. *L'application $\Phi$ est injective.*
2. *Son image est l'ensemble des $P \in K_0[X,Y]$ tels que $P(\iota(x),\iota(y)) \in \iota(k_0)$ pour tous $x, y \in k_0$.*
3. *Pour $F \in \Omega$, il existe un unique $t \in \Omega \otimes_{k_0} \Omega$ tel que $\Phi(t) = F(X+Y)$, et un unique $t'$ tel que $\Phi(t') = F(XY)$.*
4. *Si $\Phi\big(\sum_i G_i \otimes H_i\big) = F(X+Y)$, alors $F \circ (P+Q) = \sum_i (G_i \circ P)(H_i \circ Q)$ pour tous $P, Q \in K_0[T]$; si $\Phi\big(\sum_\alpha J_\alpha \otimes K_\alpha\big) = F(XY)$, alors $F \circ (PQ) = \sum_\alpha (J_\alpha \circ P)(K_\alpha \circ Q)$.*

Soit $(e_j)_{j\in I}$ une base du $k_0$-module $\Omega$. Deux lemmes traduisent l'hypothèse sur $K_0$ : toute famille finie d'éléments de $K_0$ admet un dénominateur commun $s \in S$, c'est-à-dire que les $\iota(s)a$ sont dans $\iota(k_0)$, et $\iota(s)$ est inversible dans $K_0$.

**Lemme 17.4.** *Les $e_j$, vus dans $K_0[T]$, sont linéairement indépendants sur $K_0$.*

*Démonstration.* Soit $\sum_j a_j e_j = 0$, les $a_j \in K_0$ presque tous nuls, et $s \in S$ un dénominateur commun : $\iota(s)a_j = \iota(d_j)$, $d_j \in k_0$. Alors $\sum_j d_j e_j = \iota(s)\sum_j a_j e_j = 0$ dans $\Omega$, donc les $d_j$ sont nuls, puis $\iota(s)a_j = 0$ et $a_j = 0$, $\iota(s)$ étant inversible. □

**Lemme 17.5.** *Les $e_j$ engendrent $K_0[T]$ comme $K_0$-module.*

*Démonstration.* Soit $p \in K_0[T]$. On chasse les dénominateurs des coefficients : il existe $s \in S$ et $q \in k_0[T]$ tels que $\iota(s)p$ soit l'image de $q$. Cette image envoie $\iota(x)$ sur $\iota(q(x))$, elle est donc dans $\Omega$, combinaison $k_0$-linéaire des $e_j$, et $p = \iota(s)^{-1} \cdot \iota(s)p$ est combinaison $K_0$-linéaire des $e_j$. □

*Démonstration des co-opérations.* (1) Tout $t \in \Omega \otimes_{k_0} \Omega$ s'écrit $\sum_j G_j \otimes e_j$, les $G_j \in \Omega$ étant les coordonnées de $t$ dans la base $(e_j)$ du second facteur, et $\Phi(t) = \sum_j G_j(X)e_j(Y)$. Le coefficient de $X^m$ dans $\Phi(t)$ est $\sum_j c_m(G_j)\, e_j(Y)$, où $c_m(G_j) \in K_0$ est le coefficient de $T^m$ dans $G_j$. Si $\Phi(t) = \Phi(t')$, le lemme 17.4 donne $c_m(G_j) = c_m(G'_j)$ pour tous $j$ et $m$, donc $G_j = G'_j$ et $t = t'$.

(2) Les valeurs de $G(X)H(Y)$ en $(\iota(x),\iota(y))$ sont les produits $G(\iota(x))H(\iota(y)) \in \iota(k_0)$, et la condition passe aux sommes. Réciproquement, soit $P$ à valeurs dans $\iota(k_0)$. Le lemme 17.5, appliqué aux coefficients de chaque monôme $X^n$, écrit $P = \sum_j G_j(X)\, e_j(Y)$ avec des $G_j \in K_0[T]$. Pour $x \in k_0$, le polynôme $P(\iota(x),T) = \sum_j G_j(\iota(x))\, e_j$ est dans $\Omega$, donc égal à $\sum_j \iota(\beta_j)e_j$ pour des $\beta_j \in k_0$ ; le lemme 17.4 donne $G_j(\iota(x)) = \iota(\beta_j)$. Ainsi chaque $G_j$ est dans $\Omega$, et $P = \Phi\big(\sum_j G_j \otimes e_j\big)$.

(3) Pour $F \in \Omega$, $(\Delta_a F)(\iota(x),\iota(y)) = F(\iota(x+y))$ et $(\Delta_m F)(\iota(x),\iota(y)) = F(\iota(xy))$ sont dans $\iota(k_0)$ : l'existence vient de (2), l'unicité de (1).

(4) Soit $\mathrm{ev}_{P,Q} : K_0[X,Y] \to K_0[T]$ le morphisme d'anneaux qui fixe $K_0$ et envoie $X$ sur $P$, $Y$ sur $Q$. Il envoie $G(X)H(Y)$ sur $(G\circ P)(H\circ Q)$, $F(X+Y)$ sur $F\circ(P+Q)$ et $F(XY)$ sur $F\circ(PQ)$ ; on l'applique à l'égalité supposée. □

*Remarque.* L'hypothèse employée est que $K_0$ soit un localisé de $k_0$, ce que la lecture donne comme exemple de son hypothèse $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$. La démonstration ne passe pas par l'identification $K_0[X] \otimes_{k_0} K_0[Y] = K_0[X,Y]$, l'application $\Phi$ arrivant directement dans $K_0[X,Y]$. La liberté de $\Omega$, que demande la marge de la page, sert aux deux lemmes et à l'écriture

$t = \sum_j G_j \otimes e_j$. L'inclusion $k_0 \subset K_0$ n'est pas supposée. Elle découle de la liberté de $\Omega$ dès que $K_0 \neq 0$, un $c \in k_0$ tel que $\iota(c) = 0$ annulant tous les $e_j$. Les règles de (4) valent pour n'importe quel représentant et ne demandent pas l'unicité ; l'unicité fait des co-opérations des éléments « bien déterminés » de $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$. La formule $F \circ \lambda T = \sum_\alpha J_\alpha(\lambda) K_\alpha$ de la page en est le cas $P = \lambda$, $Q = T$.

L'hypothèse de localisation ne sert qu'aux deux lemmes, et le second n'en a pas besoin. On le voit sur l'application $K_0$-linéaire $\beta : K_0 \otimes_{k_0} \Omega \to K_0[T]$, $a \otimes F \mapsto aF$.

**Énoncé** (Page 3, les co-opérations sans localisation ♦). *Soit $K_0$ une $k_0$-algèbre commutative quelconque.*

1. *L'application $\beta$ est surjective.*
2. *Si $\beta$ est injective et que $\Omega$ est un $k_0$-module libre, les conclusions (1) à (3) de l'énoncé précédent valent : $\Phi$ est injective, son image est l'ensemble des $P$ à valeurs dans $\iota(k_0)$ sur $k_0 \times k_0$, et $F(X+Y)$, $F(XY)$ sont, pour $F \in \Omega$, les images d'éléments uniques de $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$.*
3. *L'application $\beta$ est injective lorsque $K_0$ est un localisé de $k_0$ et que $\Omega$ est libre, et lorsque $K_0$ est plat sur $k_0$ et que la multiplication $K_0 \otimes_{k_0} K_0 \to K_0$ est injective, c'est-à-dire $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$.*

*Démonstration.* (1) Les monômes $T^n$ sont dans $\Omega$, puisqu'ils envoient $\iota(x)$ sur $\iota(x^n)$, et $\beta(a \otimes T^n) = aT^n$ ; ces polynômes engendrent $K_0[T]$.

(2) Soit $(e_j)$ une base de $\Omega$. Les $1 \otimes e_j$ forment une base du $K_0$-module $K_0 \otimes_{k_0} \Omega$, et $\beta\big(\sum_j a_j \otimes e_j\big) = \sum_j a_j e_j$. La surjectivité de $\beta$ donne donc la conclusion du lemme 17.5, son injectivité celle du lemme 17.4, et la démonstration des co-opérations n'utilise rien d'autre de l'hypothèse sur $K_0$.

(3) Pour un localisé, l'injectivité est le lemme 17.4, lu dans la base $(1 \otimes e_j)$. Dans le cas plat, $\beta$ est la composée de $\mathrm{id}_{K_0} \otimes (\Omega \hookrightarrow K_0[T])$, injective par platitude, et de $\mu : K_0 \otimes_{k_0} K_0[T] \to K_0[T]$, $a \otimes p \mapsto ap$. Comme $k_0$-module, $K_0[T]$ est isomorphe à $K_0^{(\mathbf{N})}$ par les coefficients, donc $K_0 \otimes_{k_0} K_0[T]$ à $(K_0 \otimes_{k_0} K_0)^{(\mathbf{N})}$, et $\mu$ devient la multiplication $K_0 \otimes_{k_0} K_0 \to K_0$ coefficient par coefficient, injective par hypothèse. □

*Remarque.* L'hypothèse de la lecture, $K_0[X] \otimes_{k_0} K_0[Y] = K_0[X,Y]$, revient à $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$, le premier membre étant $(K_0 \otimes_{k_0} K_0)[X,Y]$. Elle suffit ici avec la platitude de $K_0$, qui couvre les localisés. Sans platitude, la démonstration demande l'injectivité de $\beta$, et l'on ne sait pas ici si $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$ et la liberté de $\Omega$ la donnent. Ni l'inclusion $k_0 \subset K_0$ ni le passage par $K_0[X] \otimes_{k_0} K_0[Y]$ ne servent.

*Pólya et Vandermonde (page 2).* Pour $k_0 = \mathbf{Z} \subset K_0 = \mathbf{Q}$, $\Omega = \mathrm{Int}(\mathbf{Z})$ ; on pose $F_n = \binom{T}{n} = T(T-1)\cdots(T-n+1)/n!$, et l'on note $\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$ la différence finie.

**Énoncé** (Page 2, théorème de Pólya ■). *Les $F_n$ sont dans* $\mathrm{Int}(\mathbf{Z})$ *et linéairement indépendants sur* $\mathbf{Z}$. *Tout $P \in \mathrm{Int}(\mathbf{Z})$ de degré $d$ s'écrit $P = \sum_{k \leq d} c_k F_k$ avec $c_k = (\Delta^k P)(0) \in \mathbf{Z}$. Ainsi $(F_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est une base du* $\mathbf{Z}$*-module* $\mathrm{Int}(\mathbf{Z})$.

*Démonstration.* La valeur de $F_n$ en un entier $m$ est le coefficient binomial généralisé $\binom{m}{n}$, entier. Si $\sum_{k \in s} g_k F_k = 0$, la fonction $f(m) = \sum_k g_k \binom{m}{k}$ est nulle sur $\mathbf{N}$ ; or $\Delta^i \binom{\cdot}{k}$ vaut en 0 le symbole de Kronecker $\delta_{ik}$, donc $g_i = (\Delta^i f)(0) = 0$. Soit maintenant $P \in \mathrm{Int}(\mathbf{Z})$ et $f(m) = P(m) \in \mathbf{Z}$ pour $m \in \mathbf{N}$. Les $c_k = (\Delta^k f)(0) = \sum_{j \leq k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} f(j)$ sont entiers, et ce sont

aussi les $(\Delta^k P)(0)$ ; ils sont nuls pour $k > d$, la $k$-ième différence d'un polynôme de degré $< k$ étant nulle. La formule de Newton $f(m) = \sum_{k \le m} \binom{m}{k} (\Delta^k f)(0)$ montre que $P$ et $\sum_{k \le d} c_k F_k$ coïncident sur **N**, partie infinie de **Q** ; ils sont égaux. □

**Énoncé** (Page 2, Vandermonde, et les co-opérations de Int(**Z**))**.** *Dans* $\mathbf{Q}[X, Y]$*,* $F_m(X + Y) = \sum_{i+j=m} F_i(X) F_j(Y)$*. Par suite l'unique élément de* $\mathrm{Int}(\mathbf{Z}) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{Int}(\mathbf{Z})$ *qui représente* $F_m(X + Y)$ *est* $\sum_{i+j=m} F_i \otimes F_j$ *: les* $\gamma_{ij}^m$ *de la page valent* $1$ *si* $i + j = m$ *et* $0$ *sinon. De même* $F_m(XY) = \sum_{i,j} \delta_{ij}^m F_i(X) F_j(Y)$ *pour des entiers* $\delta_{ij}^m$ *uniquement déterminés.*

*Démonstration.* L'identité est la formule de Chu–Vandermonde (Zhu Shijie, 1303 ; Vandermonde, 1772) dans un anneau binomial, $\binom{r+s}{m} = \sum_{i+j=m} \binom{r}{i}\binom{s}{j}$, que mathlib démontre (`Ring.add_choose_eq`) et qu'on applique dans $\mathbf{Q}[X, Y]$ à $r = X$, $s = Y$ ; les morphismes d'anneaux commutent aux coefficients binomiaux généralisés, ce qui identifie $\binom{X}{i}$ à $F_i(X)$. Par le théorème de Pólya, Int(**Z**) est libre, **Q** est le localisé de **Z** en les entiers non nuls, et l'énoncé des co-opérations s'applique : il donne l'unicité, et, pour $F_m(XY)$, l'existence ; les coefficients dans la base $(F_i \otimes F_j)$ sont les $\delta_{ij}^m$. □

*Remarque.* Les entiers $c_{m,n}^p$ et $d_{m,n}^p$ de la page s'en déduisent. $F_m F_n$ et $F_m \circ F_n$ sont dans Int(**Z**), sous-anneau stable par composition, donc sont des combinaisons entières des $F_p$, de degré au plus $m + n$ et $mn$ ; cette conséquence n'a pas d'énoncé Lean séparé. La lecture attribue le théorème à G. Pólya, dont l'article de 1919 étudie les bases de ce type pour les polynômes à valeurs entières sur l'anneau des entiers d'un corps de nombres [38] ; voir aussi [13]. La structure de biring de Int(**Z**) que définissent ces co-opérations, et sa structure de pléthorie, sont étudiées par Elliott [21]. L'inventaire date la cote « [à partir de 1982] ». La démonstration suivie ici est celle des différences finies.

*Constantes et décomposition (page 5).* Soit $\Omega$ un pseudo-anneau commutatif muni d'une loi $\circ$ associative, d'unité $T$, telle que $F \mapsto F \circ G$ soit un morphisme de pseudo-anneaux pour tout $G$ : ce sont les conditions 1) et 2). On note $\Omega_0 = \{\lambda \mid \lambda \circ F = \lambda \ \forall F\}$ et $\Omega^0 = \{F \mid F \circ 0 = 0\}$.

**Énoncé** (Page 5, $\Omega = \Omega_0 \oplus \Omega^0$)**.** $\Omega_0$ *est un sous-pseudo-anneau de* $\Omega$*; pour* $F \in \Omega$ *et* $\lambda \in \Omega_0$*,* $F \circ \lambda \in \Omega_0$*, et en particulier* $F \circ 0 \in \Omega_0$*;* $\Omega^0$ *est un sous-groupe et un idéal; et* $\Omega$ *est somme directe des sous-groupes* $\Omega_0$ *et* $\Omega^0$*, par* $F = F \circ 0 + (F - F \circ 0)$*. L'application* $F \mapsto (\lambda \mapsto F \circ \lambda)$ *de* $\Omega$ *dans* $\mathrm{Appl}(\Omega_0, \Omega_0)$ *respecte la somme, le produit et la composition, envoie* $T$ *sur l'identité, et envoie une constante* $\lambda$ *sur l'application constante de valeur* $\lambda$*.*

*Démonstration.* Comme $F \mapsto F \circ G$ est additif, $0 \circ G = 0$ et $(-F) \circ G = -(F \circ G)$ ; additivité et multiplicativité montrent que $\Omega_0$ est stable par somme, opposé et produit. Si $\lambda \in \Omega_0$, $(F \circ \lambda) \circ G = F \circ (\lambda \circ G) = F \circ \lambda$, et $0 \in \Omega_0$. Si $F \in \Omega^0$, $(GF) \circ 0 = (G \circ 0)(F \circ 0) = 0$. Une constante $\lambda$ de $\Omega^0$ vérifie $\lambda = \lambda \circ 0 = 0$ : l'intersection est nulle. Enfin $(F - F \circ 0) \circ 0 = F \circ 0 - (F \circ 0) \circ 0 = 0$, $F \circ 0$ étant une constante, ce qui donne la somme. Les propriétés de $F \mapsto (\lambda \mapsto F \circ \lambda)$ sont les conditions 2), l'associativité, $T \circ \lambda = \lambda$ et la définition des constantes. □

*Remarque.* Les conditions 3) n'interviennent pas, ni l'unité $T$ sauf pour l'image de $T$. La décomposition n'utilise que l'associativité et l'additivité de $F \mapsto F \circ G$. La multiplicativité sert seulement à faire de $\Omega_0$ un sous-pseudo-anneau et de $\Omega^0$ un idéal. La somme directe est une somme de groupes abéliens, $\Omega_0$ n'étant pas un idéal en général.

*Exemples et contre-exemples (page 7).*

**Énoncé** (Page 7, l'exemple Appl$(A,A)$)**.** *Soit $A$ un pseudo-anneau commutatif et $\Omega_A = \mathrm{Appl}(A,A)$, avec les lois ponctuelles et la composition des applications. Il vérifie 1) et 2) ; ses constantes sont les applications constantes, et $(\Omega_A)_0 \simeq A$ comme pseudo-anneaux. Si $A$ est un anneau commutatif unitaire non nul et infini, $\Omega_A$ ne vérifie pas 3a) : l'indicatrice $\delta$ de $0$ n'admet aucune famille finie $(F'_i, F''_i)_{i<n}$ telle que $\delta \circ (G' + G'') = \sum_i (F'_i \circ G')(F''_i \circ G'')$ pour tous $G'$, $G''$.*

*Démonstration.* Une constante $\lambda$ vérifie $\lambda = \lambda \circ c_0$, où $c_0$ est l'application constante de valeur $0$, donc $\lambda(x) = \lambda(0)$ pour tout $x$ ; l'isomorphisme est $\lambda \mapsto \lambda(0)$. Pour 3a), prenons $G'$ et $G''$ constantes de valeurs $x$ et $y$ : on obtiendrait $\delta(x+y) = \sum_{i<n} F'_i(x) F''_i(y)$ pour tous $x, y \in A$. Choisissons $n+1$ éléments distincts $a_0, \ldots, a_n$ de $A$ et posons $U_{ji} = F'_i(a_j)$, $V_{ik} = F''_i(-a_k)$. Alors $(UV)_{jk} = \delta(a_j - a_k)$ est la matrice identité d'ordre $n+1$, de rang $n+1$ sur l'anneau commutatif non nul $A$, alors que le rang de $UV$ est au plus celui de $U$, qui a $n$ colonnes. □

**Énoncé** (Page 7, l'analyseur des polynômes et l'application $\Omega \to \Omega_{\Omega_0}$)**.** *Soit $k$ un anneau commutatif et $\Omega = k[T]$ avec la composition des polynômes. Il vérifie 1) et 2), et ses constantes sont les polynômes constants. Si $k$ est un corps fini à $q$ éléments, $T^q - T$ est non nul et $(T^q - T) \circ \lambda = 0$ pour toute constante $\lambda$ : l'application $\Omega \to \mathrm{Appl}(\Omega_0, \Omega_0)$ n'est pas injective. Si $k$ est un anneau intègre infini, elle l'est. Pour* Int(**Z**)*, deux polynômes $F, G \in \mathbf{Q}[T]$ tels que $F \circ n = G \circ n$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$ sont égaux.*

*Démonstration.* Pour une constante $\lambda$, $\lambda = \lambda \circ 0$ est le polynôme constant $\lambda(0)$ ; réciproquement un polynôme constant est une constante. Sur un corps fini, $a^q = a$ pour tout $a$, d'où $(T^q - T) \circ a = a^q - a = 0$, et $T^q - T$ est de degré $q \geq 2$. Sur un anneau intègre infini, comme sur **Q** avec la partie infinie **Z**, un polynôme est déterminé par ses valeurs, et $F \circ a$ est le polynôme constant $F(a)$. □

**Énoncé** (Page 7, $k[[T]]^+$ ne vérifie pas 3a))**.** *Soit $k$ un anneau commutatif non nul et $F = \sum_{m \geq 1} T^m$. Les coefficients de $X^p Y^q$ dans $F(X+Y) = \sum_{m \geq 1} (X+Y)^m$, qui valent $\binom{p+q}{p}$ hors de $(p,q) = (0,0)$ et $0$ en $(0,0)$, ne sont ceux d'aucune somme finie $\sum_{i<n} a_i(X) b_i(Y)$ de séries formelles : il n'existe pas de suites $(a_{i,p})$, $(b_{i,q})$ telles que ce coefficient soit $\sum_{i<n} a_{i,p} b_{i,q}$ pour tous $p, q$.*

*Démonstration.* La matrice de Pascal $P_N = \left(\binom{p+q}{p}\right)_{p,q<N}$ est de déterminant $1$ : elle vaut $LL^{\mathsf{T}}$ avec $L = \left(\binom{p}{j}\right)_{p,j<N}$, par l'identité $\binom{p+q}{p} = \sum_j \binom{p}{j}\binom{q}{j}$, conséquence de Vandermonde, et $L$ est triangulaire à diagonale unité. Si les coefficients étaient $\sum_{i<n} a_{i,p} b_{i,q}$, ceux de $P_{n+2}$ seraient $\sum_{i<n} a_{i,p} b_{i,q} + [p=0][q=0]$, et $P_{n+2}$ serait le produit d'une matrice à $n+1$ colonnes par une matrice à $n+1$ lignes, de rang au plus $n+1$, alors qu'elle est inversible, de rang $n+2$. □

*Remarque.* Le contre-exemple de 3a) pour Appl$(A,A)$ est établi pour $A$ unitaire, commutatif, non nul et infini. La page ne parle pas de 3), et la lecture dit « pour $A$ infini ». Pour $k[[T]]^+$, la matrice des coefficients de $F(X+Y)$ diffère de la matrice de Pascal, que nomme la note de la lecture, par le coefficient $(0,0)$, nul puisque $F$ n'a pas de terme constant ; l'argument coûte donc un rang de plus. Le déterminant de la matrice de Pascal valant $1$ sur **Z**, le contre-exemple vaut en toute caractéristique. L'énoncé Lean porte sur les coefficients. Le passage aux séries, où le coefficient de $X^p Y^q$ d'un produit $a(X)b(Y)$ est $a_p b_q$, est celui de la note.

*Remarque.* Le théorème de Pólya (la base des polynômes binomiaux de l'anneau des polynômes à valeurs entières) est proposé à mathlib (PR mathlib4 #44722 ; voir [13, chap. I]), ainsi que le

critère d'appartenance à l'image de $N \otimes M$ par les coordonnées dans une base de $M$ (#44717). L'écriture d'un élément de $P \otimes M$ par ses coordonnées y figurait déjà.

Ne sont pas démontrés ici : l'isomorphisme $(\Omega_A)_0 \simeq \Gamma A$ pour un anneau d'un topos et l'exemple $\mathrm{End}(W_k(A))$ ; les constantes de $k[[T]]^+$ et les séries à terme constant nilpotent ; les co-opérations sous la seule hypothèse $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$, sans platitude ; le contre-exemple de 3a) pour $\mathrm{Appl}(A, A)$, $A$ pseudo-anneau infini quelconque ; les analyseurs des puissances divisées et des $\lambda$-anneaux.

**Théorème 17.6** (Grothendieck, pages 3 et 9, co-opérations de Int relatif ♦). *Soit $K_0$ une $k_0$-algèbre commutative telle que $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$, et soit $\Omega = \{F \in K_0[T] \mid F(k_0) \subset k_0\}$, supposé libre comme $k_0$-module. Alors $F(X+Y)$ et $F(XY)$ sont, pour tout $F \in \Omega$, les images d'éléments uniques de $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$, et $\Omega$ porte ainsi une co-addition et une co-multiplication, lois de composition d'un analyseur.*

◊ *non vérifié en Lean*

Autre piste de l'onglet Findings pour ce thème, dans une cote qui n'a pas de section ici :

- Cote 2 : si $i : X \to X \times \mathbf{P}^r$ est une section constante et $Y \subset X$ un diviseur dont la classe $x' \in A^1(X)$ est non nulle mais tuée par $(r-1)!$, alors $i_!(\mathcal{O}_Y)$ est une classe non nulle de $K(X \times \mathbf{P}^r)$ de classe de Chern totale $1$, ce qui n'est possible que pour $r \geq 3$. Le « 0 » final et les mots qui entourent la conclusion de la page 13 sont incertains ou illisibles, et la page nomme la classe $[\mathcal{O}_{Y \times \mathbf{P}^r}]$ là où le calcul porte sur $Y \times \{\text{point}\}$. La lecture de la page est à vérifier sur le fac-similé. Mathlib n'a pas le groupe $K$ des faisceaux cohérents ni les classes de Chern. On se reportera aux notes de Grothendieck (2, lot 1, p. 9). ♦

Partie 17

# Cohomologie cristalline et de de Rham

*Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici.* Mathlib contient les puissances divisées sur un anneau, mais pas le site cristallin ni la cohomologie de de Rham des schémas.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 4, 5, 6, 7, 8, 54, 137, 156-4.

Pistes de l'onglet Findings pour ces cotes, non démontrées ici :

- Cote 8 : quand $\pi A$ a des puissances divisées, le relèvement de Lubin–Tate existe et est unique par la seule théorie des déformations cristallines ; sans puissances divisées, l'argument donne l'unicité à isogénie près. La lecture de la page est à vérifier sur le fac-similé. Mathlib n'a pas la théorie des déformations cristallines. On se reportera aux notes de Grothendieck (8, lot 3, p. 43). ♦
- Cote 8 : deux groupes de Barsotti–Tate de dimension un et de hauteur $[K : \mathbf{Q}_p]$ sur $\mathbf{F}_q$, munis d'une action de $A$, sont isogènes si et seulement si $\varpi = \varpi'$, et $\mathrm{Hom}_A(G_0, G_0')$ est alors explicite. La lecture de la page est à vérifier sur le fac-similé. Mathlib n'a pas les groupes de Barsotti–Tate. On se reportera aux notes de Grothendieck (8, lot 2, p. 39). ♦

**Conjecture** (Grothendieck, pages 1 et 4 à 7, valeurs propres unités de la cohomologie évanescente ♦). *On admet le théorème de Lefschetz faible cristallin avec torsion. Pour une section hyperplane lisse $Y$ d'une variété projective lisse $X$ de dimension $n$ sur un corps parfait de caractéristique $p$, le nombre de valeurs propres du Frobenius qui sont des unités $p$-adiques sur la cohomologie cristalline évanescente est au moins le rang $F$-semi-simple de la cohomologie cohérente évanescente* $\mathrm{Coker}(H^{n-1}(X, \mathcal{O}_X) \to H^{n-1}(Y, \mathcal{O}_Y))$*, le défaut étant mesuré par la $p$-torsion de $H^n_{\mathrm{cris}}(X)$.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 1 et 4 à 6). Le titre dit l'estimation « heuristique », et l'énoncé 8.4.4 a) de la page 1 y est sans argument. Mathlib n'a pas la cohomologie cristalline. On se reportera aux notes de Grothendieck (4, lot 1, p. 1).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 4 à 8, algèbre artinienne universelle à puissances divisées ♦). *La $W(k)$-algèbre locale artinienne universelle dont l'idéal maximal porte des puissances divisées nulles en degrés $\geq p^{\nu+1}$ est $W[\Lambda_0, \ldots, \Lambda_\nu]/(\Lambda_i^p - q_i\Lambda_{i+1}, \Lambda_\nu^p, \Lambda_0 - p)$, avec $q_i = (p^{i+1})!/((p^i)!)^p$. Dans les coordonnées $\Theta_i = \Lambda_i - p^{p^i}/(p^i)!$, elle a une forme normale explicite : le coefficient de $\Theta^a$ est pris modulo $p^i$, où $a_i$ est le premier exposant non nul, et le terme constant modulo $p^{c(\nu)}$, avec $c(\nu) = \nu + p\,[p^\nu - (p^{\nu-1} + \cdots + 1)]$.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 4 à 7). La nécessité y est « laissée au lecteur ». Accessible en partie : l'intégralité des $q_i$ et leur valuation $p$-adique ; la forme normale demande des calculs dans les vecteurs de Witt.

**Théorème** (Grothendieck, pages 52 à 56, modules des variétés abéliennes ordinaires ♦). *Pour une polarisation de degré quelconque, divisible par $p$ compris, l'anneau local en un point du schéma de modules des variétés abéliennes ordinaires polarisées en caractéristique $p$ (degré de polarisation fixé, structure de niveau de Jacobi) est d'intersection complète et localement irréductible, et le schéma réduit est lisse : les modules formels des couples d'extensions compatibles forment le noyau d'un homomorphisme $\alpha - \beta$ de tores formels.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 49 et 50, un groupe formel hors des variétés abéliennes ⧫). *Soient $k$ un corps fini et $E$ une courbe elliptique supersingulière sur $k$ dont tous les endomorphismes sont définis sur $k$. La torsion du groupe formel de $E$ par une unité $\theta$ de $\mathrm{End}(E) \otimes \mathbf{Z}_p$ de norme réduite transcendante donne une forme de $G_{1,1}$ qui ne se plonge dans le groupe formel d'aucune variété abélienne sur $k$ ni sur aucune extension finie de $k$.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 47 et 48, même groupe formel, non isogènes ⧫). *Sur un corps algébriquement clos de caractéristique $p$, il existe des surfaces abéliennes simples de même groupe formel $\hat{\mathbf{G}}_m \times G_{1,1}$ qui ne sont pas isogènes.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 39 à 44 et 48 à 56, propriété universelle des complexes libres ⧫). *Soient $\mathcal{P}$ la catégorie $k$-linéaire des complexes bornés de $k$-modules libres de type fini, $\Sigma$ les suites exactes courtes scindées degré par degré et $\mathbb{C}^\bullet$ le complexe des disques. Pour toute catégorie $\mathcal{B}$ $k$-additive karoubienne munie d'une classe $\Sigma$ de suites exactes où tout morphisme a un $\Sigma$-noyau, $F \mapsto F(\mathbb{C}^\bullet)$ est une équivalence entre les foncteurs $k$-linéaires $\mathcal{P} \to \mathcal{B}$ qui envoient $\Sigma$ sur des suites exactes à gauche et les complexes de cochaînes de $\mathcal{B}$ ; les foncteurs $\Sigma$-exacts y correspondent aux $\Sigma$-résolutions.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Conjecture** (Grothendieck, pages 49 et 50, dualité étale pour les sites annelés ⧫). *Soient $f : (X, B) \to (Y, A)$ un morphisme lisse compactifiable de sites annelés, $A$ un faisceau d'anneaux sur $Y$ tué par un entier $n$ premier aux caractéristiques résiduelles, et $B$ un faisceau d'anneaux muni de $f^{-1}(A) \to B$. La dualité étale vaut pour $f$, avec $f^!(K) = R\mathrm{Hom}_{f^{-1}(A)}(B, f^{-1}(K) \otimes T_{X/Y}[2d])$, et se ramène aux cas $f^{-1}(A) \simeq B$ et $f = \mathrm{id}$. La lettre du 10 décembre 1965 l'énonce sans démonstration.*

Mathlib n'a pas la dualité étale. On se reportera aux notes de Grothendieck (5, lot 3, p. 49).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 16 à 18, un site $p$-adique sans puissances divisées ⧫). *Soit $X_0$ un schéma sur un corps parfait $k$ de caractéristique $p$. La cohomologie du site des $W$-schémas formels affines $p$-adiquement complets $\mathrm{Spf}\, B$ munis d'une surjection $B \to A_0$ sur l'anneau d'un ouvert affine de $X_0$, de noyau nilpotent modulo $p$, sans puissances divisées ni surconvergence, est une cohomologie $p$-adique : elle redonne la cohomologie de Washnitzer–Monsky pour $X_0$ lisse affine, et $H_{\mathrm{DR}}(X/W)$ modulo la torsion quand $X_0$ a un relèvement propre et lisse $X$.*

Mathlib n'a pas de cohomologie $p$-adique des schémas. On se reportera aux notes de Grothendieck (7, lot 1, p. 16).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 74 à 83, catégories polynomiales ⧫). *Les catégories polynomiales strictes, catégories à produits finis munies d'une sous-catégorie additive de flèches de degré un et d'une graduation des* Hom *par l'homogénéité sous les scalaires, sont équivalentes aux $\otimes$-pd-catégories, catégories monoïdales symétriques additives munies d'un foncteur gradué exponentiel $\Gamma^*$ et de flèches $\alpha_{p,q} : \Gamma^{pq} \to \Gamma^p\Gamma^q$ ; le passage inverse est $\mathbf{P}_p(X, Y) = \mathrm{Hom}(\Gamma^p X, Y)$.*

Mathlib n'a aucune des deux notions. On se reportera aux notes de Grothendieck (137, lot 4, p. 74).

**Partie 18**

# Schémas en groupes et groupes algébriques

## 18 Cote 40 : la régularité des torseurs sous $\alpha_p$ ne passe pas à la somme[19]

La cote 40, *Calculs [affines sur des] fibrés principaux affines : notes manuscrites (s.d.)*, que l'inventaire date « [années 1960-1970] », compte vingt-sept pages de notes rapides, toutes de sa main. Elle traite des schémas en groupes affines comme algèbres de Hopf commutatives, de leurs actions et des espaces principaux homogènes (pages 1 à 15), puis du noyau $\alpha_p$ du Frobenius en caractéristique $p$ (pages 16 à 18), de la classification $H^1(A, \alpha_p) = A/A^p$ (pages 18 à 23) et d'une version globale par la suite de Frobenius (pages 24 à 27). La remarque des pages 26 et 27 prend $A = k[[X]]$, $k$ algébriquement clos, et les revêtements obtenus en extrayant une racine $p$-ième : au changement d'uniformisante près, ce sont les $A[T]/(T^p - X^n)$, et « si $n = 1$, c'est un anneau local régulier. Sinon, il ne l'est pas, comme on voit facilement » (40, lot 2, p. 26). Pour $p = 3$ et $n = 2$, la page décrit le cusp. La page 27 ajoute que, pour la structure de revêtement sous $\alpha_p$, ce revêtement est la somme de deux revêtements réguliers, ceux des racines $p$-ièmes de $X$ et de $-X + X^2$, et que le produit fibré de ces deux anneaux $C_1$, $C_2$ sur $A$ est « déjà un anneau non régulier [car isomorphe à $C_1[T]/(T^p)$, qui a des éléments nilpotents] » (40, lot 2, p. 27). La phrase de la page 26 qui introduit la somme comporte des mots illisibles ou incertains ; l'énoncé de la page 27 est lu.
*Conventions.* Un anneau local noethérien de dimension un est régulier si et seulement s'il est de valuation discrète ; c'est ce dernier énoncé qui est démontré. Un anneau local régulier est intègre, donc un anneau non intègre n'est pas régulier. Pour un polynôme unitaire $g$ sur un anneau $R$, $R[T]/(g)$ est libre de base $1, T, \dots, T^{\deg g - 1}$ ; en particulier la classe d'un polynôme non nul de degré $< \deg g$ n'y est pas nulle.

**Lemme 18.1.** *Soient $A$ un anneau de valuation discrète, $\varpi$ une uniformisante, $u \in A^\times$ et $n \geq 1$. L'anneau $C = A[T]/(T^n - \varpi u)$ est de valuation discrète, d'idéal maximal $(t)$, où $t$ est la classe de $T$.*

*Démonstration.* Le polynôme $T^n - \varpi u$ est unitaire et d'Eisenstein pour l'idéal $(\varpi)$ : ses coefficients non dominants sont dans $(\varpi)$, et son terme constant $-\varpi u$ n'est pas dans $(\varpi^2)$. Il est donc irréductible dans $A[T]$, qui est factoriel, donc premier, et $C$ est intègre. L'anneau $C$ est fini sur $A$, donc entier, et tout idéal maximal $M$ de $C$ se contracte en un idéal maximal de $A$, c'est-à-dire en $(\varpi)$. Alors $\varpi \in M$, puis $t^n = \varpi u \in M$ et $t \in M$, puisque $M$ est premier. Inversement, tout $x \in M$ s'écrit $x = a + ty$ avec $a \in A$ et $y \in C$ ; comme $a = x - ty \in M \cap A = (\varpi)$ et $\varpi = t^n u^{-1}$, on a $x \in (t)$. Ainsi $M = (t)$ pour tout idéal maximal $M$ : $C$ est local d'idéal maximal $(t)$. Il est noethérien comme quotient de $A[T]$, et $t \neq 0$, puisque $t^n = \varpi u \neq 0$ et que $A \to C$ est injective. Un anneau local noethérien intègre dont l'idéal maximal est principal et non nul est de valuation discrète. □

[19] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder40.lean`.

**Énoncé** (Page 26, le cusp $T^n = X^2$). *Soient $k$ un corps quelconque, $n \geq 2$, $S = k[[X]][T]/(T^n - X^2)$ et $y$ la classe de $T$.*

1. *Si $n$ est impair, ni $X$ ne divise $y$, ni $y$ ne divise $X$ dans $S$ ; $S$ n'est donc pas un anneau de valuation, ni a fortiori de valuation discrète.*
2. *Si $n = 2m$ est pair, $(y^m - X)(y^m + X) = 0$ et les deux facteurs sont non nuls ; $S$ n'est pas intègre.*
3. *Si $n = 2$ et si $k$ est de caractéristique 2, $(y - X)^2 = 0$ et $y - X \neq 0$.*

*Démonstration.* 1) L'homomorphisme $A = k[[X]] \to k[[Z]]$, $f(X) \mapsto f(Z^n)$, se prolonge en $\varphi : S \to k[[Z]]$ par $y \mapsto Z^2$, puisque $(Z^2)^n = (Z^n)^2$. Soit $B \subset k[[Z]]$ l'ensemble des séries dont les coefficients d'exposant impair $< n$ sont nuls. C'est un sous-anneau : dans le coefficient d'exposant $m$ impair $< n$ d'un produit, chaque terme $a_i b_{m-i}$ a un indice impair $< n$. Il contient $f(Z^n)$, qui n'a que des exposants multiples de $n$, et $Z^2$ ; il contient donc $\varphi(S)$. Si $Xc = y$, alors $Z^n\varphi(c) = Z^2$, donc $Z^{n-2}\varphi(c) = 1$, ce que le terme constant interdit, puisque $n \geq 3$. Si $yc = X$, alors $Z^2\varphi(c) = Z^n$ et $\varphi(c) = Z^{n-2}$, qui n'est pas dans $B$ puisque $n - 2$ est impair et $< n$. Or, dans un anneau de valuation, de deux éléments l'un divise l'autre.

2) Le produit des polynômes unitaires $T^m - X$ et $T^m + X$ est $T^{2m} - X^2$, et leurs classes sont non nulles, étant de degré $m < 2m$.

3) $(T - X)^2 - (T^2 - X^2) = 2X(X - T)$ est nul en caractéristique 2, et $T - X$ est de degré $1 < 2$. □

**Théorème 18.2** (Grothendieck, pages 26 et 27, la régularité ne passe pas à la somme des torseurs sous $\alpha_p$ ♦). *Soient $k$ un corps de caractéristique $p > 0$, $A = k[[X]]$, $C_1 = A[T]/(T^p - X)$ et $C_2 = A[T]/(T^p + X - X^2)$, de racines $s$ et $t$.*

1. *$C_1$ et $C_2$ sont des anneaux locaux réguliers.*
2. *Leur somme dans $H^1(A, \alpha_p) = A/A^p$, l'anneau $A[T]/(T^p - X^2)$ de la classe de $X + (-X + X^2) = X^2$, n'est pas régulière.*
3. *Le produit fibré $C_1 \otimes_A C_2$ n'est pas réduit : $z = 1 \otimes t + (s - s^2) \otimes 1$ est non nul et $z^p = 0$. Dans $C_1$, on a $-X + X^2 = (-s + s^2)^p$.*

*Démonstration.* 1) C'est le lemme 18.1 pour $\varpi = X$, avec $u = 1$, puis avec $u = X - 1$, qui est inversible de terme constant $-1$ et vérifie $-X + X^2 = X(X - 1)$.

2) Si $p$ est impair, c'est l'énoncé 18, 1). Si $p = 2$, l'anneau a un nilpotent non nul par l'énoncé 18, 3) ; il n'est donc pas intègre.

3) L'anneau $C_1$ est non nul et $p = 0$ dedans, donc de caractéristique $p$, et le Frobenius y est additif : $(-s + s^2)^p = (s^2 - s)^p = s^{2p} - s^p = X^2 - X$, puisque $s^p = X$. Le produit fibré est non nul (voir plus bas) et de caractéristique $p$ pour la même raison, et $z = 1 \otimes t - (-s + s^2) \otimes 1$. Donc

$$z^p = 1 \otimes t^p - (-s + s^2)^p \otimes 1 = 1 \otimes a - a \otimes 1 = 0, \qquad a = -X + X^2 \in A,$$

car $a \otimes 1 = 1 \otimes a$ pour $a \in A$. Pour voir que $z \neq 0$, soit $D = C_1[T]/(T^p + X - X^2)$, l'extension des scalaires de $C_2$ à $C_1$. L'homomorphisme de $A$-algèbres $C_2 \to D$, $t \mapsto T$, et l'inclusion $C_1 \to D$ définissent $\psi : C_1 \otimes_A C_2 \to D$, $x \otimes y \mapsto x\,\psi_2(y)$. Alors $\psi(z) = T - (-s + s^2)$ est la classe d'un polynôme unitaire de degré $1 < p$, donc non nulle. □

*Remarque.* Le théorème tient tel que la lecture l'énonce, et plus généralement. Le lemme 18.1 n'utilise ni la complétude de $A$, ni la caractéristique, ni $k$ algébriquement clos, et vaut pour tout $n \geq 1$. L'énoncé 18 vaut sur tout corps et pour tout $n \geq 2$. Le calcul de $\psi(z)$ est celui de la lecture : dans $D$, $T^p = -X + X^2 = (-s+s^2)^p$, donc $(T-(-s+s^2))^p = 0$, et le changement de variable $T \mapsto T-(-s+s^2)$ donne $D \simeq C_1[T]/(T^p)$, l'anneau de la page. La lecture en déduit $C_1 \otimes_A C_2 \simeq C_1[T]/(T^p)$, que le fichier ne démontre pas ; il ne démontre que la non-réduction du produit fibré lui-même. La piste demande si cet échec de la régularité sous la loi de groupe de $H^1(A, \alpha_p)$ est consigné dans la littérature sur les modèles de torseurs sous $\alpha_p$.

Ne sont pas démontrés ici : les algèbres de Hopf, les actions et les deux critères des pages 1 à 15 ; la classification $H^1(A, \alpha_p) = A/A^p$ (pages 18 à 23), et donc l'identification de la loi de groupe de $H^1$ avec l'addition de $A/A^p$, que la page 22 dit ne pas avoir prouvée ; la suite de Frobenius (pages 24 à 26) ; la réduction de tout torseur de $k[[X]]$ à $A[T]/(T^p - X^n)$ par changement d'uniformisante ; la non-régularité de $A[T]/(T^p - X^n)$ pour $n \geq 2$ autre que $n = 2$ ; l'isomorphisme $C_1 \otimes_A C_2 \simeq C_1[T]/(T^p)$.

# 19 Cote 78 : le critère de fermeture $u_\alpha^n = 1$ sur un anneau, et les $2p$-gones en bande[20]

La cote 78, *[Polygones réguliers et polynômes cyclotomiques] : notes manuscrites (s.d.)*, que l'inventaire date « [à partir de 1977] », compte cent vingt-neuf pages. Elle cherche ce qu'est un polygone régulier dans un plan affine sur un corps, ou un anneau, quelconque, sans longueurs ni angles : un $n$-gone dont chaque automorphisme combinatoire se prolonge d'une seule façon en une affinité. Dans le repère $(s_0, s_1, s_{-1})$ de trois sommets consécutifs, les pages 81 à 85 ramènent un tel polygone, quand il est « propre », à un seul paramètre $\alpha$, l'invariant numérique, et la rotation s'écrit $u_\alpha(x, y) = (1 - y + \alpha x, x)$ (78, lot 5, p. 81). Les pages 109 à 113, sous le titre « Polynômes cyclotomiques », définissent des polynômes $F_n \in \mathbb{Z}[U]$, prouvent une identité entre trois produits consécutifs, écrivent les sommets et la matrice de $u^n$ en fonction de $\alpha$ seul et énoncent, « soient $k$ un anneau », que $u_\alpha^n = 1$ si et seulement si $F_n(\alpha) = 0$ (78, lot 6, p. 109, 78, lot 6, p. 111, 78, lot 6, p. 112). La page 112 conclut « la relation $F_n(\alpha) = 1$ » et le premier coefficient de Bézout de la page 113 a un indice douteux ; la lecture modernisée lit $F_n(\alpha) = 0$ et corrige le coefficient. Les pages 84 et 85, puis 94 à 99, décrivent deux polygones de caractéristique $p$ dont les sommets sont alternativement sur deux droites parallèles : l'« impropre », et celui d'invariant $\alpha = -2$ (78, lot 5, p. 85, 78, lot 5, p. 95, 78, lot 5, p. 99).
*Conventions.* $k$ est un anneau commutatif, $\alpha \in k$, et $S_m \in \mathbb{Z}[U]$, $m \in \mathbb{Z}$, les polynômes de Tchebychev de seconde espèce renormalisés : $S_0 = 1$, $S_1 = U$, $S_{m+1} = US_m - S_{m-1}$, de sorte que $S_{-1} = 0$. On pose

$$F_{2m} = S_{m-1}, \qquad F_{2m+1} = S_m + S_{m-1} \qquad (m \in \mathbb{Z}),$$

d'où $F_0 = 0$, $F_1 = F_2 = 1$, $F_3 = U + 1$, $F_4 = U$, $F_5 = U^2 + U - 1$, $F_6 = U^2 - 1$. On note $u_\alpha$ la bijection $(x, y) \mapsto (1 - y + \alpha x, x)$ de $k^2$, d'inverse $(x, y) \mapsto (y, 1 - x + \alpha y)$, $s_n = u_\alpha^n(0, 0)$ pour $n \in \mathbb{Z}$, et $\sigma_1(x, y) = (y, x)$.

**Énoncé** (Page 109, les polynômes $F_n$)**.** *Les $F_n$ sont ceux de la page : $F_{-n} = -F_n$ et, pour tout*

[20] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder78.lean`.

*$t \in k$ inversible d'inverse $t'$ et tout entier $m \geq 0$,*

$$F_{2m+2}(t+t')\,(t^2-1)\,t^m = t^{2m+2}-1, \qquad F_{2m+1}(t+t')\,(t-1)\,t^m = t^{2m+1}-1.$$

*Démonstration.* L'égalité $F_{-n} = -F_n$ se lit sur $S_{-m-2} = -S_m$. Dans chaque classe de parité, la récurrence de $S$ donne $F_{n+4} = UF_{n+2} - F_n$. Les deux formules se vérifient pour $m = 0$ et $m = 1$ ; si $A_m$ désigne le membre de gauche de l'une d'elles, la récurrence donne $A_{m+2} = (t+t')\,t\,A_{m+1} - t^2 A_m$, et $(t^2+tt')(t^{j+2}-1) - t^2(t^j-1) = t^{j+4} - 1 + (tt'-1)(t^{j+2}-1)$. □

**Théorème 19.1** (Grothendieck, pages 109 à 113, le critère de fermeture sur un anneau ♦).

1. *Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a dans $\mathbb{Z}[U]$*

$$F_nF_{n+1} - UF_{n-1}F_n + F_{n-2}F_{n-1} = 1,$$

   *c'est-à-dire $A_nF_{n-1} + F_nF_{n+1} = 1$ avec $A_n = F_{n-2} - UF_n$ ; en particulier $F_{n-1}$ et $F_{n+1}$ sont étrangers.*

2. *Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et tout $(x,y) \in k^2$, avec $X_n = F_nF_{n+1}(\alpha)$,*

$$u_\alpha^n(x,y) = (1-x-y)\,s_n + x\,s_{n+1} + y\,s_{n-1},$$

   *où $s_n = (X_n, X_{n-1}) = \big(F_nF_{n+1}(\alpha), F_{n-1}F_n(\alpha)\big)$.*

3. *Pour $n \in \mathbb{Z}$, les conditions suivantes sont équivalentes : a) $u_\alpha^n = \mathrm{id}$ ; b) $s_n = s_0$ ; c) $u_\alpha^n(s_i) = s_i$, pour un $i \in \mathbb{Z}$ donné ; d) $F_n(\alpha) = 0$.*

*Démonstration.* 1) Si $n = 2m$, les quatre polynômes sont $S_{m-1}$, $S_m + S_{m-1}$, $S_{m-1} + S_{m-2}$ et $S_{m-2}$ ; en remplaçant $S_m$ par $US_{m-1} - S_{m-2}$, le membre de gauche devient $S_{m-1}^2 - US_{m-1}S_{m-2} + S_{m-2}^2$. Si $n = 2m+1$, il devient de même $S_m^2 - US_mS_{m-1} + S_{m-1}^2$. Or $Q_m = S_m^2 - US_mS_{m-1} + S_{m-1}^2$ ne dépend pas de $m$ : $Q_{m+1} = S_{m+1}(S_{m+1} - US_m) + S_m^2 = -S_{m+1}S_{m-1} + S_m^2 = Q_m$, et $Q_0 = 1$. C'est l'identité de Cassini des $S_m$. La relation de Bézout n'en est qu'une réécriture.

2) L'identité au rang $n+1$, évaluée en $\alpha$, donne $X_{n+1} = \alpha X_n - X_{n-1} + 1$ pour tout $n$. Notons $V_n(x,y)$ le membre de droite. On a $V_0(x,y) = (x,y)$, puisque $X_0 = X_{-1} = 0$ et $X_1 = X_{-2} = 1$. La récurrence donne $u_\alpha \circ V_n = V_{n+1}$ : la seconde coordonnée de $u_\alpha(V_n(x,y))$ est la première de $V_n(x,y)$, et la première est $1 - (\text{seconde}) + \alpha\,(\text{première})$, où l'on remplace chacun des trois termes $1 - X_{j-1} + \alpha X_j$ par $X_{j+1}$, pour $j = n$, $n+1$, $n-1$, les poids $1-x-y$, $x$, $y$ ayant pour somme 1. On conclut par récurrence vers le haut et, comme $u_\alpha$ est bijective, vers le bas.

3) a) ⇒ b) est clair. d) ⇒ a) : si $F_n(\alpha) = 0$, alors $X_n = X_{n-1} = 0$, puis $X_{n+1} = 1$ et $X_{n-2} = 1$ par la récurrence, et la formule de 2) se réduit à $u_\alpha^n(x,y) = (x,y)$. b) ⇒ d) : si $F_nF_{n+1}(\alpha) = F_{n-1}F_n(\alpha) = 0$, on multiplie l'identité évaluée en $\alpha$ par $F_n(\alpha)$ :

$$F_n(\alpha) = F_n(\alpha)\cdot F_nF_{n+1}(\alpha) + \big(F_{n-2}(\alpha) - \alpha F_n(\alpha)\big)\cdot F_{n-1}F_n(\alpha) = 0.$$

c) ⇔ b) : $u_\alpha^n$ et $u_\alpha^i$ commutent, donc $u_\alpha^n(s_i) = u_\alpha^i(s_n)$, et $u_\alpha^i$ est injective. □

*Remarque.* Le théorème tient tel que la lecture l'énonce, sur tout anneau commutatif et pour tout $n \in \mathbb{Z}$, diviseurs de zéro compris : la réciproque passe par la relation de Bézout et non par une factorisation. Les colonnes de la formule 2) sont $s_{n+1} - s_n$, $s_{n-1} - s_n$

et $s_n$, soit $\big(F_{n+1}(F_{n+2}-F_n), F_n(F_{n+1}-F_{n-1})\big)$, $\big(F_n(F_{n-1}-F_{n+1}), F_{n-1}(F_{n-2}-F_n)\big)$ et $(F_nF_{n+1}, F_{n-1}F_n)$ : c'est la première version de la matrice de la page 111, celle qui est barrée, que la lecture retient. La suite $X_n$ vérifie une récurrence linéaire d'ordre deux avec second membre, et, avec la suite de Lucas $U_m = U_m(\alpha, 1)$ ($U_0 = 0$, $U_1 = 1$, $U_{m+1} = \alpha U_m - U_{m-1}$) [34], on a $F_{2m}(\alpha) = U_m$ et $F_{2m+1}(\alpha) = U_{m+1} + U_m$ ; la piste demande si l'équivalence sur un anneau quelconque y figure déjà, sous un autre nom. Le fichier vérifie aussi que $\sigma_1 u_\alpha \sigma_1 = u_\alpha^{-1}$ et $\sigma_1(s_n) = s_{-n}$, de sorte que $u_\alpha$ et $\sigma_1$ font opérer le groupe diédral sur les sommets, et que la forme $f_\alpha(x, y) = x^2 - x + y^2 - y - \alpha xy$ de la page 96 est invariante par $u_\alpha$ et nulle en tous les sommets. Enfin une affinité de $k^2$ est déterminée par ses valeurs en $s_0 = (0, 0)$, $s_1 = (1, 0)$ et $s_{-1} = (0, 1)$ : un automorphisme du polygone combinatoire se prolonge au plus d'une façon.

**Contre-exemple 19.2** (Page 113, le coefficient de la page)**.** *Le couple $A_n = F_{n-2} - UF_{n-1}$, $B_n = F_n$ ne vérifie pas $A_nF_{n-1} + B_nF_{n+1} = 1$ pour $n = 4$.*

*Démonstration.* Pour $n = 4$, $(1 - U(U + 1))(U + 1) + U(U^2 + U - 1) = 1 - U - U^2$, qui vaut $-1$ en $U = 1$. □

*Les deux polygones en bande.* Pour $\alpha = -2$, $u_{-2}(x, y) = (1-y-2x, x)$ ; le polygone impropre de la page 85 a pour rotation $v(x, y) = (1 - y, -x)$, et l'on pose $t_n = v^n(0, 0)$. Une *caractéristique* $p$ est un entier $p \geq 0$ tel que, pour $m \in \mathbb{Z}$, l'image de $m$ dans $k$ soit nulle si et seulement si $p$ divise $m$ ; on suppose $k$ non nul.

**Énoncé** (Pages 84, 85 et 94 à 99, existence des $2p$-gones en bande ♦)**.** *Soit $k$ un anneau non nul de caractéristique $p$.*

1. *Pour $m \in \mathbb{Z}$, $s_{2m} = (-m, m)$ et $s_{2m+1} = (1+m, -m)$ : les sommets pairs sont sur la droite $x + y = 0$, les impairs sur la droite parallèle $x + y = 1$, et $f_{-2}(x, y) = (x + y)(x + y - 1)$.*

2. *$u_{-2}^n =$ id si et seulement si $2p$ divise $n$, ce qui équivaut à $F_n(-2) = 0$ ; $u_{-2}$ est d'ordre $2p$, et $s_n = s_m$ si et seulement si $2p$ divise $n - m$.*

3. *Trois sommets consécutifs ne sont jamais alignés : le déterminant de $(s_{n+1} - s_n, s_{n-1} - s_n)$ vaut $1$. La partie linéaire $(x, y) \mapsto (-2x - y, x)$ est de déterminant $1$.*

4. *Pour le polygone impropre, $v^{2m}$ est la translation de vecteur $m\,(1, -1)$, $t_{2m} = (m, -m)$ et $t_{2m+1} = (m + 1, -m)$, sur les deux mêmes droites ; $v^n =$ id si et seulement si $2p$ divise $n$, $v$ est d'ordre $2p$, $t_n = t_m$ si et seulement si $2p$ divise $n - m$, trois sommets consécutifs ne sont pas alignés (déterminant $\pm 1$), $\sigma_1 v \sigma_1 = v^{-1}$, et la partie linéaire $(x, y) \mapsto (-y, -x)$ est de déterminant $-1$.*

*Démonstration.* 1) Par récurrence sur $m$ dans les deux sens : $u_{-2}(-m, m) = (1 + m, -m)$ et $u_{-2}(1 + m, -m) = (-(m + 1), m + 1)$. La factorisation de $f_{-2}$ est immédiate.

2) Par 1), $s_{2m} = (0, 0)$ équivaut à $m = 0$ dans $k$, c'est-à-dire à $p \mid m$, ou encore à $2p \mid 2m$ ; et $s_{2m+1} = (0, 0)$ imposerait $m = 0$ et $1 + m = 0$, donc $1 = 0$. Le théorème ci-dessus (b ⇔ a ⇔ d) donne $u_{-2}^n =$ id $\iff 2p \mid n \iff F_n(-2) = 0$, d'où l'ordre. Enfin $s_n = s_m$ équivaut à $u_{-2}^{n-m}(s_m) = s_m$, donc à $2p \mid n - m$ par la condition c).

3) Pour $n = 2m$, les deux vecteurs sont $(1 + 2m, -2m)$ et $(2m, 1 - 2m)$, de déterminant $1 - 4m^2 + 4m^2 = 1$ ; le cas impair est analogue.

4) $v(1-y+m, -x-m) = (x+m+1, y-m-1)$ et $v(x+m, y-m) = (1-y+m, -x-m)$ donnent par récurrence $v^{2m}(x, y) = (x + m, y - m)$ et $v^{2m+1}(x, y) = (1 - y + m, -x - m)$. Les

sommets s'en déduisent, et l'on raisonne comme en 2) : $t_{2m} = (0,0)$ si et seulement si $p \mid m$, $t_{2m+1} \neq (0,0)$, et $v^{2m}$ est l'identité dès que $m = 0$ dans $k$. Les déterminants se calculent sur les sommets : les vecteurs sont $(1,0)$ et $(0,1)$ en un sommet pair, $(0,-1)$ et $(-1,0)$ en un sommet impair. □

*Remarque.* L'existence tient en toute caractéristique, sans supposer $p$ premier ni impair. Pour $p = 2$, $\alpha = -2 = 0$ et l'on retrouve le carré, d'ordre $4 = 2p$, comme le note la lecture ; pour $p = 0$, les deux rotations sont d'ordre infini et les sommets forment les deux $\infty$-polygones en escalier de la page 85. Le déterminant $-1$ ne sépare le polygone impropre des polygones unimodulaires que si $2 \neq 0$, c'est-à-dire pour $p$ impair. Les formules 1) et 4) montrent que les deux polygones ont le même ensemble de sommets : $s_{2m+1} = t_{2m+1}$ et $s_{2m} = t_{-2m}$. Le premier zigzague en parcourant les deux droites en sens contraires, $(0,0)$, $(1,0)$, $(-1,1)$, $(2,-1)$, et ainsi de suite ; le second monte en escalier en les parcourant dans le même sens, $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,-1)$, $(2,-1)$, et ainsi de suite. C'est l'ordre des sommets qui les distingue, et le déterminant de la rotation.

Ne sont pas démontrés ici : l'énoncé de la piste selon lequel le $2p$-gone impropre est le seul polygone régulier fini non unimodulaire, que la lecture ajoute et qui demande la classification des réalisations régulières ; la proposition de la page 83, qui met les réalisations épinglées en bijection avec les couples $(\alpha, \beta)$ vérifiant $\alpha\beta = 0$ et $\beta(\beta + 2) = 0$ ; la factorisation $F_n = \prod_{d|n,\, d\geq 3} \Psi_d$ et le polynôme semi-cyclotomique $\Psi_n$ des pages 114 à 120, avec la réduction $\Psi_p \equiv (U-2)^{(p-1)/2}$ modulo $p$ ; le $p$-gone de la parabole (pages 95 et 100), dont la piste est retrouvée dans la littérature ; les gerbes et la descente des pages 39 à 48.

## 20 Cote 84 : le produit des algèbres quadratiques, en coordonnées[21]

La cote 84, *[Formes quadratiques] : notes manuscrites (s.d.)*, cent quatre-vingt-douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982-vers 1986] », étudie les formes quadratiques binaires et les algèbres quadratiques au-dessus d'une base quelconque, sans diviser par 2. Sa deuxième partie construit le produit $A_1 * A_2$ de deux algèbres quadratiques. Page 47, la page encadre $T_0^2 \equiv \delta \pmod 4$ ; page 48, elle énonce, quand 2 est régulier, l'équivalence entre revêtements quadratiques et triplets $(L, \delta, T_0)$ (84, lot 3, p. 47, 84, lot 3, p. 48). Page 63, la page pose « sauf erreur » $b = b_1 b_2$ et en tire $c$ par $4c = b^2 - \delta$ ; l'encadré écrit « $4c_1c_1$ », le membre de droite et le calcul donnent $4c_1c_2$ (84, lot 4, p. 63). Page 64, elle vérifie par une identité polynomiale que l'élément $u_1b_2 + u_2b_1 + 2u_1u_2$ annule l'équation du produit quand $u_1$ et $u_2$ annulent les leurs (84, lot 4, p. 64). Page 84, elle calcule des générateurs de $\mathrm{Im}(\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \mathrm{id})$ ; page 85, elle énonce la proposition sur les coinvariants, avec un décompte de rangs au-dessus de $X_0 = V(2)$ ; page 86, le corollaire sur les invariants, « et inversement si on sait que ceci reste vrai après toute changement de base » (84, lot 5, p. 84, 84, lot 5, p. 85, 84, lot 5, p. 86). Page 89, le théorème donne $b = b_1b_2$, $c = c_1b_2^2 + c_2b_1^2 - 4c_1c_2$ et $\delta = \delta_1\delta_2$ (84, lot 5, p. 89) ; page 102, l'image $i(\mathcal{U}) = 2U_1U_2 + b_1U_2 + b_2U_1$ du générateur dans $A_1 \otimes A_2$ (84, lot 6, p. 102). Pages 65 à 79, elle introduit les extensions $\chi$-trivialisées et leur produit ; page 78, le cas scindé donne $b = b_1 \otimes b_2$, et une note marginale de la page 79, oblique et en partie illisible, donne le critère d'inversibilité (84, lot 4, p. 78, 84, lot 4, p. 79). Pages 125 à 131, elle refait le produit

[21] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder84.lean`.

en coordonnées pour un quotient $M$ quelconque et commence la relation de cocycle sans l'achever ; page 169, elle met en place les produits poussé et tiré (84, lot 7, p. 125, 84, lot 7, p. 129, 84, lot 7, p. 131, 84, lot 9, p. 169).

*Algèbres quadratiques libres.* Pour $b, c \in R$, on note $A(b,c) = R[U]/(U^2+bU+c)$, de base $(1, U)$, et $\delta(b,c) = b^2 - 4c$. Le changement de variable $V = \varepsilon U + t$, $\varepsilon \in R^\times$, $t \in R$, envoie l'équation de $U$ sur celle de $V$ avec

$$(b', c') = (\varepsilon b - 2t,\ \varepsilon^2 c - \varepsilon b t + t^2).$$

Dans le cas libre, $L = A/R$ est engendré par l'image de $U$, $T_0$ est la réduction de la trace $-b$ modulo 2, donc $T_0 \equiv b$ modulo 2, et changer de base de $L$ revient à multiplier par $\varepsilon$. Le triplet $(L, \delta, T_0)$ de la page 48 devient, à isomorphisme près, la classe de $(\delta, b \bmod 2)$ sous $(\delta, b) \mapsto (\varepsilon^2\delta, \varepsilon b)$.

**Énoncé** (Pages 47 à 53, *le théorème des triplets, cas libre* ♦). *Soit $R$ un anneau commutatif.*

1. *Les $R$-algèbres $A(b,c)$ et $A(b',c')$ sont isomorphes si et seulement si $(b',c')$ se déduit de $(b,c)$ par un changement de variable $V = \varepsilon U + t$.*
2. *(Page 47) Pour tous $b, c$, $b^2 - \delta(b,c) = 4c$. Si $\tau^2 - \delta \in 4R$, alors $(\tau + 2a)^2 - \delta \in 4R$ pour tout $a$. Si $\tau^2 - \delta \in 4R$, il existe $c$ avec $\delta(\tau, c) = \delta$.*
3. *(Page 48) Supposons que 2 ne divise pas zéro dans $R$. Alors $A(b,c) \simeq A(b',c')$ si et seulement s'il existe $\varepsilon \in R^\times$ avec $\delta(b',c') = \varepsilon^2\delta(b,c)$ et $b' \equiv \varepsilon b$ modulo $2R$. Avec $\varepsilon = 1$ (la base de $L$ fixée), il existe une translation $V = U + t$ de $(b,c)$ sur $(b',c')$ si et seulement si $\delta(b',c') = \delta(b,c)$ et $b' \equiv b$ modulo $2R$, et cette translation est unique.*
4. *(Page 53, sur $\mathbb{Z}$) Un entier $\delta$ est de la forme $b^2 - 4c$ si et seulement si $\delta \equiv 0$ ou $1$ modulo $4$, et $A(b,c) \simeq A(b',c')$ si et seulement si $\delta(b,c) = \delta(b',c')$.*
5. *Sur $\mathbb{F}_2$, $(1,0)$ et $(1,1)$ ont le même $\delta = 1$ et le même $b$, et $A(1,0) = \mathbb{F}_2[U]/(U^2+U)$ n'est pas isomorphe à $A(1,1) = \mathbb{F}_2[U]/(U^2+U+1)$.*

*Démonstration.* (1) Tout élément de $A(b,c)$ s'écrit $a + eU$, et $a + eU = 0$ entraîne $a = e = 0$ : le polynôme unitaire $U^2 + bU + c$ de degré 2 ne divise aucun polynôme non nul de degré au plus 1, et le reste de la division par lui donne l'écriture. Si $V = \varepsilon U + t$ convient, $\varepsilon U + t$ annule $V^2 + b'V + c'$ dans $A(b,c)$ : le calcul donne $\varepsilon^2(U^2 + bU + c)$. On obtient un morphisme $A(b',c') \to A(b,c)$, $V \mapsto \varepsilon U + t$ ; le changement inverse $U = \varepsilon^{-1}V - \varepsilon^{-1}t$ donne le morphisme réciproque, et les deux composés fixent les générateurs. Réciproquement, soit $\varphi : A(b,c) \to A(b',c')$ un isomorphisme. Écrivons $\varphi^{-1}(V) = t + \varepsilon U$ et $\varphi(U) = s + \eta V$. Alors $U = \varphi^{-1}(\varphi(U)) = (s + \eta t) + \eta\varepsilon U$, donc $\eta\varepsilon = 1$ et $\varepsilon$ est inversible. L'image par $\varphi^{-1}$ de l'équation de $V$, où l'on remplace $U^2$ par $-bU - c$, donne

$$(t^2 + b't + c' - \varepsilon^2 c) + (2t\varepsilon + b'\varepsilon - \varepsilon^2 b)\, U = 0,$$

d'où $b' = \varepsilon b - 2t$ après multiplication par $\eta$, puis $c' = \varepsilon^2 c - \varepsilon b t + t^2$.

(2) Ce sont des identités : $(\tau + 2a)^2 - \tau^2 = 4(a\tau + a^2)$, et si $\tau^2 - \delta = 4k$, on prend $c = k$.

(3) Un changement de variable donne $\delta(b',c') = \varepsilon^2\delta(b,c)$ en développant, et $b' = \varepsilon b + 2(-t)$ ; cela vaut sur tout anneau. Réciproquement, si $b' = \varepsilon b + 2s$ et $\delta(b',c') = \varepsilon^2\delta(b,c)$, posons $t = -s$. Alors $b' = \varepsilon b - 2t$, et l'égalité des discriminants s'écrit $4c' = 4(\varepsilon^2 c - \varepsilon b t + t^2)$. Comme 2 est régulier, 4 l'est, et $c' = \varepsilon^2 c - \varepsilon b t + t^2$. Le cas $\varepsilon = 1$ est le même calcul ; deux translations $t$, $t'$ vérifient $2t = 2t'$, donc $t = t'$.

(4) Si $b$ est pair, $b^2 - 4c \equiv 0$ ; s'il est impair, $b^2 - 4c \equiv 1$ modulo $4$. Inversement $\delta = 0^2 - 4(-\delta/4)$ ou $\delta = 1^2 - 4 \cdot \frac{1-\delta}{4}$. Les unités de $\mathbb{Z}$ sont $\pm 1$, donc $\varepsilon^2 = 1$ et l'énoncé (3) se réduit à $\delta = \delta'$ et $b' \equiv b$ modulo $2$. Cette congruence découle de $\delta = \delta'$ : $(b' - b)(b' + b) = 4(c' - c)$ est pair, donc l'un des facteurs l'est, et $b' - b$, $b' + b$ ont la même parité.

(5) Dans $\mathbb{F}_2$, la seule unité est $1$ et $t^2 = t$ pour tout $t$ ; un changement de variable envoie donc $(1, c)$ sur $(1, c - t + t^2) = (1, c)$. Par (1), $A(1,0) \not\simeq A(1,1)$. □

*Remarque.* Dans le cas libre, la classification des algèbres quadratiques par $(\delta, b \bmod 2)$ quand $2$ est régulier figure chez Voight (2016, proposition 3.11 et théorème 4.3) [45] ; l'inventaire date la cote « [à partir de 1982-vers 1986] ». Ce qui est démontré est le cas libre du théorème de la page 48 : $L$ trivial, l'algèbre donnée par une base $(1, U)$, et la correspondance sur les classes d'isomorphisme. L'équivalence de catégories fibrées, le cas $L$ localement libre non trivial et la reconstruction de $E$, $A$, de la trace, de la norme et du produit par divisions (pages 49 à 52) ne le sont pas. L'énoncé (1) vaut sur tout anneau et ne demande pas que $2$ soit régulier ; l'hypothèse sert à l'injectivité de $(b, c) \mapsto (\delta, b \bmod 2)$ sur les classes, et l'exemple de $\mathbb{F}_2$, où $\mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2$ et $\mathbb{F}_4$ ont les mêmes $\delta$ et $T_0$, montre qu'elle est nécessaire. La surjectivité, (2), vaut sur tout anneau. Sur $\mathbb{Z}$, on retrouve que les discriminants sont les entiers congrus à $0$ ou $1$ modulo $4$ et qu'un anneau quadratique est déterminé par son discriminant ; $T_0$ y est déterminé par $\delta$, comme la lecture le dit.

*Conventions.* $R$ est un anneau commutatif quelconque. Les algèbres $A_i$ ont pour bases $(1, U_i)$ avec $U_i^2 + b_i U_i + c_i = 0$, de sorte que $\mathrm{Tr}(U_i) = -b_i$ et que la conjugaison est $\sigma_i(1) = 1$, $\sigma_i(U_i) = -b_i - U_i$ ; on pose $\delta_i = b_i^2 - 4c_i$. C'est la convention de la lecture (pages 98 à 102). Du côté des extensions, $E_i$ a pour base $(e_i, x_i)$, où $e_i$ engendre $L_i$ et $x_i$ est le scindage ; $\psi(e_i) = 0$, $\psi(x_i) = 1$, $T_i = 2x_i - b_i e_i$ et $\sigma_i(x) = \psi(x) T_i - x$, donc $\sigma_i(e_i) = -e_i$ et $\sigma_i(x_i) = x_i - b_i e_i$ (page 84). On écrit $E_1 \otimes E_2 = R^4$ dans la base $(e_1 \otimes e_2, e_1 \otimes x_2, x_1 \otimes e_2, x_1 \otimes x_2)$, $\sigma_1 \otimes \sigma_2$ par le produit de Kronecker des deux matrices, et $E_1 * E_2 = R^2$ dans la base $(e_1 \otimes e_2, x_1 * x_2)$. L'application $E_1 \otimes E_2 \to E_1 * E_2$ est celle de la page 63, $(x_1 + u_1) * (x_2 + u_2) = x_1 * x_2 + u_1 b_2 + u_2 b_1 + 2u_1 u_2$ : elle envoie $(a, a', a'', a''')$ sur $(2a + b_2 a' + b_1 a'',\ a''')$. Du côté des algèbres, $A = A_1 * A_2$ a pour base $(1, \mathcal{U})$, $A_1 \otimes A_2$ la base $(1, U_1, U_2, U_1 U_2)$, et $i$ envoie $(\lambda, \mu)$ sur $(\lambda, \mu b_2, \mu b_1, 2\mu)$.

**Énoncé** (Pages 63, 64, 89 et 102, *la formule du produit* ♦). *Soient $A_1$, $A_2$ deux $R$-algèbres commutatives et $u_i \in A_i$ avec $u_i^2 + b_i u_i + c_i = 0$, $b_i, c_i \in R$. Posons $U_1 = u_1 \otimes 1$, $U_2 = 1 \otimes u_2$ dans $A_1 \otimes_R A_2$, $b = b_1 b_2$ et $c = c_1 b_2^2 + c_2 b_1^2 - 4c_1 c_2$.*

1. *(Page 64) Dans tout anneau commutatif, avec $Q_i = u_i^2 + b_i u_i + c_i$ et $u = 2u_1 u_2 + b_1 u_2 + b_2 u_1$,*
$$u^2 + bu + c = b_2^2 Q_1 + b_1^2 Q_2 + 4\big(Q_1 Q_2 - c_1 Q_2 - c_2 Q_1\big).$$
2. *(Page 102) L'élément $\mathcal{U} = 2U_1 U_2 + b_1 U_2 + b_2 U_1$ vérifie $\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c = 0$ dans $A_1 \otimes_R A_2$ ; il existe donc un unique morphisme de $R$-algèbres $R[\mathcal{U}]/(\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c) \to A_1 \otimes_R A_2$ envoyant $\mathcal{U}$ sur cet élément.*
3. *(Pages 63 et 89) $b^2 - 4c = \delta_1 \delta_2$, et $c_1 \delta_2 + c_2 \delta_1 + 4c_1 c_2 = c_1 b_2^2 + c_2 b_1^2 - 4c_1 c_2$.*

*Démonstration.* (1) et (3) sont des identités entre polynômes à coefficients entiers ; on les vérifie en développant. (2) Les inclusions $A_1 \to A_1 \otimes A_2$ et $A_2 \to A_1 \otimes A_2$ sont des morphismes de $R$-algèbres ; elles transportent les équations de $u_1$ et $u_2$ en $U_1^2 + b_1 U_1 + c_1 = 0$ et $U_2^2 + b_2 U_2 + c_2 = 0$. L'identité (1), appliquée dans l'anneau $A_1 \otimes A_2$ à $U_1$ et $U_2$, donne $\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c = 0$, puisque $Q_1 = Q_2 = 0$. La propriété universelle de $R[\mathcal{U}]/(\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c)$ donne le morphisme. □

*Remarque.* La formule du produit est publiée par Voight (2016, construction 3.12 et théorème 3.24) [45], qui l'attribue à A. Hahn (1994), le monoïde général à O. Loos (1996), et son existence à une lettre de P. Deligne à M. Rost et à M. Bhargava (2005). L'identité de la page 64 vaut sans hypothèse sur $u_1$, $u_2$, dans tout anneau commutatif, et la vérification ne divise jamais par 2 : le produit est défini sur $\mathbb{Z}$. La lecture de « $4c_1c_1$ » en $4c_1c_2$ est confirmée : avec $4c_1c_2$, l'identité (1) et la relation $b^2 - 4c = \delta_1\delta_2$ tiennent, et la première forme de l'encadré est égale à la seconde. Ce qui est démontré est la partie en coordonnées de la piste ; la construction intrinsèque de $X_1 * X_2$ et l'unicité de la forme quadratique de la page 89 ne le sont pas.

**Théorème 20.1** (Grothendieck, pages 84 et 85, *proposition* ♦). *Dans les coordonnées ci-dessus, l'application induite*

$$(E_1 \otimes E_2)/\operatorname{Im}(\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \mathrm{id}) \to E_1 * E_2$$

*est bien définie, et elle est bijective si et seulement si* $2R + b_1R + b_2R = R$.

*Démonstration.* On calcule $\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \mathrm{id}$ sur la base : $e_1 \otimes e_2 \mapsto 0$, $e_1 \otimes x_2 \mapsto (b_2, -2, 0, 0)$, $x_1 \otimes e_2 \mapsto (b_1, 0, -2, 0)$, $x_1 \otimes x_2 \mapsto (b_1b_2, -b_1, -b_2, 0)$ ; ce sont les générateurs de la page 84. L'application $(a, a', a'', a''') \mapsto (2a + b_2a' + b_1a'', a''')$ les annule, d'où l'application induite.

Elle a même image que $E_1 \otimes E_2 \to E_1 * E_2$. Si elle est surjective, $(1, 0)$ est atteint, donc $2a + b_2a' + b_1a'' = 1$ pour des $a, a', a'' \in R$, et $2R + b_1R + b_2R = R$. Réciproquement, si $2g_0 + b_1g_1 + b_2g_2 = 1$, l'image de $(y_0g_0, y_0g_2, y_0g_1, y_1)$ est $(y_0, y_1)$.

Sous la condition, montrons que le noyau est dans $\operatorname{Im}(\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \mathrm{id})$ ; l'injectivité de l'application induite en résulte. Écrivons $f = (2, b_2, b_1)$ et $g = (g_0, g_2, g_1)$, de sorte que $f \cdot g = 1$. Un élément du noyau est $(a_0, a_1, a_2, 0)$ avec $f \cdot a = 0$. Les relations de Koszul $\kappa_{jk} = f_k\varepsilon_j - f_j\varepsilon_k$ de $f$ dans $R^3$ sont $\kappa_{01} = (b_2, -2, 0)$, $\kappa_{02} = (b_1, 0, -2)$ et $\kappa_{12} = (0, b_1, -b_2)$ ; les deux premières sont les images de $e_1 \otimes x_2$ et $x_1 \otimes e_2$, la troisième celle de $x_1 \otimes x_2 - b_1\, e_1 \otimes x_2$. Or

$$a = \sum_{j<k} (g_ka_j - g_ja_k)\,\kappa_{jk},$$

car la $i$-ème coordonnée du second membre est $a_i(f \cdot g) - g_i(f \cdot a) = a_i$. L'élément $a$ est donc l'image d'une combinaison explicite des vecteurs de base. □

**Énoncé** (Page 86, *corollaire* ♦). *Dans les coordonnées ci-dessus, disons que* $A \to (A_1 \otimes A_2)^{\sigma_1 \otimes \sigma_2}$ *est un isomorphisme si* $i$ *est injectif et si son image est le sous-module des invariants de* $\sigma_1 \otimes \sigma_2$.

1. *Si* $2R + b_1R + b_2R = R$, *c'est un isomorphisme.*
2. *C'est un isomorphisme après tout changement de base* $R \to S$ *si et seulement si* $2R + b_1R + b_2R = R$.
3. *Sur* $R = \mathbb{Z}[X]$, *avec* $b_1 = X$ *et* $b_2 = 0$, *c'est un isomorphisme, alors que* $2$, $X$ *et* $0$ *engendrent un idéal propre.*

*Démonstration.* Un vecteur $(p, q, r, s)$ (coefficients de $1$, $U_1$, $U_2$, $U_1U_2$) est invariant si et seulement si $-b_1q - b_2r + b_1b_2s = 0$, $2q = b_2s$ et $2r = b_1s$. L'image $(\lambda, \mu b_2, \mu b_1, 2\mu)$ de $i$ vérifie ces relations.

(1) Soit $2g_0 + b_1g_1 + b_2g_2 = 1$. Si $i(\lambda, \mu) = 0$, alors $\lambda = 0$ et $\mu = \mu(2g_0 + b_1g_1 + b_2g_2) = 0$. Soit $(p, q, r, s)$ invariant. Des relations on tire $b_1q = b_2r$, car $b_1b_2s = 2b_1q$ (on multiplie $2q =$

$b_2 s$ par $b_1$). Posons $\mu = sg_0 + rg_1 + qg_2$. Alors $2\mu = s$, $b_1\mu = r$ et $b_2\mu = q$ ; par exemple $b_2\mu - q = g_0(b_2 s - 2q) + g_1(b_2 r - b_1 q) = 0$, en remplaçant $q$ par $q(2g_0 + b_1 g_1 + b_2 g_2)$. Donc $(p, q, r, s) = i(p, \mu)$.

(2) La condition passe à tout $S$ : l'image de $1 = 2g_0 + b_1 g_1 + b_2 g_2$ est une relation du même type, et (1) s'applique. Réciproquement, si l'idéal $I = (2, b_1, b_2)$ n'est pas $R$, prenons $S = R/I$, qui n'est pas nul. Dans $S$, $2 = b_1 = b_2 = 0$, et le vecteur $U_2 = (0, 0, 1, 0)$ est invariant. S'il était $i(\lambda, \mu)$, sa coordonnée sur $U_2$ serait $\mu b_1 = 0$, et l'on aurait $1 = 0$ dans $S$.

(3) Avec $b_1 = X$, $b_2 = 0$, les relations deviennent $2q = 0$, $2r = Xs$. L'anneau $\mathbb{Z}[X]$ est intègre, donc $q = 0$ et $i$ est injectif ($2\mu = 0$ entraîne $\mu = 0$). L'élément $2$ est premier dans $\mathbb{Z}[X]$ et ne divise pas $X$ ; de $2 \mid Xs$ on tire $s = 2\mu$, puis $r = X\mu$ en simplifiant par $2$, et $(p, q, r, s) = i(p, \mu)$. Enfin, si $2g_0 + Xg_1 = 1$, le coefficient constant donne $2\, g_0(0) = 1$ dans $\mathbb{Z}$, ce qui est impossible. □

*Remarque.* La proposition de la page 85 tient en coordonnées sur tout anneau commutatif, dans les deux sens, sans changement de base, sans hypothèse de rang et sans la réduction au cas $2 = 0$ que la page annonce. Le noyau est engendré par les relations de Koszul de la suite unimodulaire $(2, b_2, b_1)$. Lorsque les deux algèbres sont séparables, l'identification du produit aux invariants de $\sigma_1 \otimes \sigma_2$ est due à C. Small (1972), que cite Voight (théorème 3.24) [45]. Pour le corollaire de la page 86, la condition suffit sur $R$ lui-même, et la réciproque demande l'hypothèse de la page, « après toute changement de base » : l'exemple de $\mathbb{Z}[X]$ montre que l'isomorphisme sur $R$ seul n'entraîne pas la condition. Un changement de base vers $R/(2, b_1, b_2)$ suffit. La formulation ponctuelle (en tout point de $V(2)$, l'un des $T_{i,0}$ engendre $L_{i,0}$) n'est pas démontrée ; elle équivaut à la condition en coordonnées dès que $L_1$, $L_2$ sont triviaux et munis de scindages, ce que la page dit aussi. Le passage de l'énoncé sur les coinvariants à l'énoncé sur les invariants par dualité n'est pas formalisé : les deux sont démontrés séparément, en coordonnées.

*Extensions $\chi$-scindées en coordonnées.* Soit $\chi \in R$. On prend une extension scindée $0 \to L \to M \oplus L \to M \to 0$, $\alpha(\xi) = (0, \xi)$, $\psi(\eta, \xi) = \eta$, de $R$-modules quelconques. Un $\chi$-scindage est un couple $(\pi, \varpi)$, $\pi : M \oplus L \to L$, $\varpi : M \to M \oplus L$, avec $\pi\alpha = \chi$, $\psi\varpi = \chi$ et $\alpha\pi + \varpi\psi = \chi$ (page 169). Pour $b : M \to L$, on pose $\pi_b(\eta, \xi) = b(\eta) + \chi\xi$ et $\varpi_b(\eta) = (\chi\eta, -b(\eta))$. La transvection $T_w$, pour $w : M \to L$, est $(\eta, \xi) \mapsto (\eta, \xi + w(\eta))$. Le produit de deux objets $b_1 : M_1 \to L_1$ et $b_2 : M_2 \to L_2$ est $b_1 \otimes b_2 : M_1 \otimes M_2 \to L_1 \otimes L_2$ (page 78, « Il n'y a pas plus simple ! », et page 129). Pour $M = L = R$, un objet est un scalaire $b$, et l'objet unité est $b = 1$, $\pi(u, \lambda) = \lambda + \chi u$ (page 78).

**Énoncé** (Pages 77–79 et 123–131, extensions $\chi$-scindées ♦). 1. *Le couple $(\pi_b, \varpi_b)$ est un $\chi$-scindage. Réciproquement, tout $\chi$-scindage $(\pi, \varpi)$ de $M \oplus L$ est de cette forme, avec $b = \pi|_M$.*

2. *Il existe un endomorphisme $f$ de $M \oplus L$ induisant l'identité sur $L$ et sur $M$ et tel que $\pi_{b'} \circ f = \pi_b$ si et seulement si $b = b' + \chi w$ pour un $w : M \to L$ ; c'est alors $T_w$. On a aussi $T_w \circ \varpi_b = \varpi_{b'}$ et $T_w \circ T_{w'} = T_{w+w'}$.*

3. *(Page 129) Pour $u_i : M_i \to L_i$, $(b_1 + \chi u_1) \otimes (b_2 + \chi u_2) = b_1 \otimes b_2 + \chi u$ avec $u = b_1 \otimes u_2 + u_1 \otimes b_2 + \chi\, u_1 \otimes u_2$.*

4. *(Page 131) Si l'on change d'abord par $u_i$, puis par $u'_i$ en partant de $b'_i = b_i + \chi u_i$, la somme des deux données est celle du changement par $u_i + u'_i$ : $u'' = u + u'$.*

5. *(Page 78) Le produit est associatif, commutatif et unitaire : à travers les isomorphismes d'associativité et de commutativité des produits tensoriels,* $(b_1 \otimes b_2) \otimes b_3$ *correspond à* $b_1 \otimes (b_2 \otimes b_3)$ *et* $b_1 \otimes b_2$ *à* $b_2 \otimes b_1$ *; à travers* $R \otimes M \simeq M$ *et* $R \otimes L \simeq L$*,* $\mathrm{id}_R \otimes b$ *correspond à* $b$*.*

6. *(Page 79) Pour* $M = L = R$*, disons* $b \sim b'$ *s'il existe* $\varepsilon \in R^\times$ *et* $w \in R$ *avec* $\varepsilon b = b' + \chi w$ *(un isomorphisme qui agit par* $\varepsilon$ *sur* $L$*). La relation est compatible au produit, et la classe de* $b$ *est inversible, c'est-à-dire* $bb' \sim 1$ *pour un* $b'$*, si et seulement si* $bR + \chi R = R$*, si et seulement si* $b$ *est inversible dans* $R/\chi R$ *: la section* $T_0 = -b_0$ *engendre* $L_0$ *sur* $V(\chi)$*.*

*Démonstration.* (1) Les trois relations se vérifient sur $(\eta, 0)$ et $(0, \xi)$ ; par exemple $\alpha\pi_b(\eta, \xi) + \varpi_b(\eta) = (0, b\eta + \chi\xi) + (\chi\eta, -b\eta) = \chi(\eta, \xi)$. Si $(\pi, \varpi)$ est un $\chi$-scindage, $\pi(0, \xi) = \chi\xi$ donne $\pi = \pi_b$. La relation $\alpha\pi + \varpi\psi = \chi$ appliquée à $(\eta, 0)$ donne $\varpi(\eta) = \chi(\eta, 0) - (0, b\eta)$, et $\varpi = \varpi_b$.

(2) Si $f$ induit l'identité sur $L$ et sur $M$, alors $f(0, \xi) = (0, \xi)$ et la première coordonnée de $f(\eta, 0)$ est $\eta$, donc $f = T_w$ avec $w(\eta)$ la seconde coordonnée de $f(\eta, 0)$. On a $\pi_{b'}(T_w(\eta, \xi)) = b'\eta + \chi\xi + \chi w\eta = \pi_{b'+\chi w}(\eta, \xi)$, d'où la condition $b = b' + \chi w$, en évaluant en $(\eta, 0)$. Inversement $T_w$ convient. Le calcul de $T_w \circ \varpi_b$ et de $T_w \circ T_{w'}$ est direct.

(3) et (4) Le produit tensoriel d'applications linéaires est bilinéaire ; on développe. Pour (4), on compare $u + u'$, où $u' = (b_1 + \chi u_1) \otimes u'_2 + u'_1 \otimes (b_2 + \chi u_2) + \chi\, u'_1 \otimes u'_2$, avec $(b_1 \otimes (u_2 + u'_2)) + ((u_1 + u'_1) \otimes b_2) + \chi\,(u_1 + u'_1) \otimes (u_2 + u'_2)$ ; les deux développements ont les mêmes neuf termes.

(5) Ce sont la naturalité des isomorphismes d'associativité et de commutativité, qui sont dans mathlib, et un calcul sur les tenseurs purs pour l'unité.

(6) Si $\varepsilon_i b_i = b'_i + \chi w_i$, alors $\varepsilon_1\varepsilon_2 b_1 b_2 = b'_1 b'_2 + \chi(b'_1 w_2 + w_1 b'_2 + \chi w_1 w_2)$. Si $\varepsilon b b' = 1 + \chi w$, alors $b(\varepsilon b') + \chi(-w) = 1$. Si $bg + \chi h = 1$, alors $bg = 1 + \chi(-h)$, et $bg \sim 1$ avec $\varepsilon = 1$. Enfin $bR + \chi R = R$ équivaut à l'existence de $g$ avec $bg \equiv 1$ modulo $\chi R$. □

*Remarque.* Ce qui est démontré est la partie en coordonnées de la piste, pour une extension scindée de modules quelconques, sans diviser par $\chi$ ni par 2. Le recollement de ces coordonnées en un produit $E_1 * E_2$ sur une base quelconque, la propriété universelle des applications bi-affines (pages 75 et 76) et la compatibilité des contraintes entre elles (la quatrième compatibilité de la page 177 n'est pas écrite) ne le sont pas. La relation de cocycle de la page 131, que la page commence sans l'achever, est vraie avec les signes $b'_i = b_i + \chi u_i$. Le critère d'inversibilité de la note marginale de la page 79 est démontré dans le cas $L = M = R$ : l'inverse de la classe de $b$ est la classe de $g$ dès que $bg \equiv 1$ modulo $\chi$, et l'on n'a besoin d'aucune unité $\varepsilon$ autre que 1 pour le construire.

**Énoncé** (Pages 125, 127 et 169, *produit poussé et produit tiré* ♦). *En coordonnées, le produit poussé porte le* $\chi$*-scindage de* $b = b_1 \otimes b_2$ *et le produit tiré celui de* $-b$ *(page 125).*

1. *Si* $\gamma\chi = 2$*, la transvection* $T_{\gamma b}$ *envoie le* $\chi$*-scindage* $\pi_b$ *sur* $\pi_{-b}$ *:* $\pi_{-b} \circ T_{\gamma b} = \pi_b$*.*

2. *(Page 125, « commute ! ») Si* $\gamma\chi = 2$*, pour un changement de scindage qui remplace* $b$ *par* $b + \chi u$ *du côté poussé et* $-b$ *par* $-b - \chi u$ *du côté tiré,* $T_{\gamma b} \circ T_u = T_{-u} \circ T_{\gamma(b+\chi u)}$*.*

3. *Pour les objets unités (*$M = L = R$*,* $b_1 = b_2 = \mathrm{id}$*), il existe un endomorphisme de* $R \oplus R$ *qui induit l'identité sur* $L$ *et sur* $M$ *et envoie le scindage poussé sur le scindage tiré si et seulement s'il existe* $\gamma$ *avec* $\gamma\chi = 2$*. Sur* $\mathbb{Z}$*, avec* $\chi = 4$*, il n'en existe pas.*

*Démonstration.* (1) Par l'énoncé précédent, $\pi_{-b} \circ T_{\gamma b} = \pi_{-b+\chi\gamma b} = \pi_{-b+2b} = \pi_b$. (2) Les transvections se composent par addition : il faut $\gamma b + u = -u + \gamma b + \gamma\chi u$, ce qui est $\gamma\chi u = 2u$.

(3) Par l'énoncé précédent, un tel endomorphisme existe si et seulement si $\mathrm{id} = -\mathrm{id} + \chi w$ pour un $w : R \to R$ ; en 1, cela donne $w(1)\chi = 2$, et inversement $w = \gamma\,\mathrm{id}$ convient. Sur $\mathbb{Z}$, $4\gamma = 2$ n'a pas de solution. □

*Remarque.* L'hypothèse $\gamma\chi = 2$, que la lecture prend à la page 127 pour l'isomorphisme de la page 169, est suffisante, et elle est nécessaire dès les objets unités, parmi les isomorphismes qui induisent l'identité sur $L_1 \otimes L_2$ et $M_1 \otimes M_2$ : la comparaison demande que 2 soit multiple de $\chi$. Le signe $-b$ du produit tiré est pris de la page 125 ; la construction du produit tiré comme produit fibré (page 169) et l'identification de la flèche du milieu du diagramme de la page 167 avec l'opérateur $F_{11}$ ne sont pas formalisées.

Ne sont pas démontrés ici : l'équivalence de catégories fibrées du théorème de la page 48 et son cas $L$ non trivial, la reconstruction de $E$, $A$, de la trace, de la norme et du produit par divisions (pages 49 à 52), la construction intrinsèque du produit $X_1 * X_2$ et des extensions $\chi$-scindées sur une base quelconque (pages 65 à 79), la propriété universelle des applications bi-affines (pages 75 et 76), le critère d'inversibilité pour $L$ inversible non trivial, la construction du produit tiré comme produit fibré et l'opérateur $F_{11}$ (pages 141 à 169), l'unicité de la forme quadratique du théorème de la page 89, la formulation ponctuelle de la proposition de la page 85 et du corollaire de la page 86, l'énoncé du corollaire pour $\underline{\mathrm{Hom}}(-, M)$, le passage des coinvariants aux invariants par dualité, la trace et la norme de $A_1 \otimes A_2$ sur $A$ (pages 104 et 105), la quatrième partie du dossier et le reste de la troisième.

**Théorème 20.2** (Grothendieck, pages 45 à 53, classification par triplets ♦). *Sur une base où 2 n'est pas diviseur de zéro, la catégorie fibrée des revêtements quadratiques est équivalente à celle des triplets $(L, \delta, T_0)$, $L$ inversible, $\delta \in \Gamma L^{\otimes 2}$, $T_0 \in \Gamma(V(2), L_0)$ avec $T_0^2 \equiv \delta \bmod 4$, y compris quand $L$ n'est pas trivial.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème 20.3** (Grothendieck, pages 65 à 79, produit des extensions $\chi$-scindées ♦). *Soit $\chi \in \Gamma(\mathcal{O})$ sur une base quelconque. Les extensions $0 \to L \to E \to M \to 0$ munies d'un $\chi$-scindage forment une catégorie monoïdale symétrique pour un produit $X_1 * X_2$ construit intrinsèquement par somme amalgamée, sans division. Pour $M = \mathcal{O}$ et $L$ inversible quelconque, un objet est inversible si et seulement si sa section $T_0$ engendre $L$ sur $V(\chi)$.*

◊ *non vérifié en Lean*

Autres pistes de l'onglet Findings pour ce thème, dans des cotes qui n'ont pas de section ici :

**Conjecture** (Grothendieck, pages 11 à 16, polarisations hodgiennes ♦). *Soient $G$ un groupe algébrique réel muni d'homomorphismes $\mathbb{G}_m \xrightarrow{i} G \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{G}_m$, $\eta = i(-1)$ et $G' = \mathrm{Ker}\,\varepsilon$. Deux éléments $C, C'$ de $G'(\mathbb{R})$ de carré $\eta$ qui définissent des polarisations de $\mathrm{Rep}(G)$ sont, après conjugaison par $G'(\mathbb{R})^\circ$, liés par $C' = zC$ avec $z$ central d'ordre divisant 2, et $z \neq 1$ donne une autre polarisation : les polarisations hodgiennes forment un torseur sous un groupe d'éléments centraux de 2-torsion. Sur toute $\otimes$-catégorie graduée sur $K \subset \mathbb{R}$, les $\otimes$-automorphismes $z$ de l'identité tels que $z^2 = 1$, triviaux sur $K(1)$, opèrent librement sur les polarisations.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 15 et 16). La conjugaison de la page 15 tient en trois lignes abrégées où quatre mots sont illisibles, et le groupe qui opère, la 2-torsion de $Z \cap G'$, est le choix de l'édition. Mathlib n'a pas les catégories tannakiennes ni leurs polarisations. On se reportera aux notes de Grothendieck (10, lot 1, p. 11).

**Théorème** (Grothendieck, pages 62 à 65, caractère numérique et tore de rang un ♦). *Une catégorie tannakienne sur un corps $k$ dont le lien est un tore de dimension $1$ est déterminée à équivalence près par son caractère numérique : l'ensemble des classes d'objets simples, les constantes de structure de $K(\mathcal{M})$, les centres $Z_\sigma$ des algèbres d'endomorphismes avec leurs classes de Brauer, et le rang. Pour le tore $G$ des éléments de norme $1$ d'une extension quadratique $Z/k$, l'application $H^2(k,G) \to H^2(k, R_{Z/k}\mathbb{G}_m) = \mathrm{Br}(Z)$ est en effet injective, par Hilbert 90.*

◊ *non vérifié en Lean*

La page passe par « on vérifie aussitôt » l'équivalence entre le caractère numérique et les données $(G, u_\sigma(\xi))$. Mathlib n'a pas les catégories tannakiennes ni leurs gerbes. On se reportera aux notes de Grothendieck (10, lot 4, p. 62).

**Théorème** (Grothendieck, pages 10 à 12, groupe de Picard de l'espace de Grothendieck–Springer ♦). *Soient $S$ un schéma normal intègre, $G$ un $S$-schéma en groupes réductif dont le tore maximal abstrait $T$ n'est pas déployé, et $\Gamma$ l'image de $\pi_1(S)$ dans* Aut $X^*(T)$. *L'application* Pic(Bor) $\to$ Pic$(\tilde{G})$ *est injective, de conoyau contenu dans $H^1(\Gamma, X^*(T))$, et bijective quand ce $H^1$ est nul. Un fibré en droites sur* Bor *est ample si et seulement si son image réciproque sur $\tilde{G}$ l'est, sans hypothèse de normalité sur $S$.*

◊ *non vérifié en Lean*

La condition $H^1(\Gamma, X^*(T)) = 0$ vient d'une marge et de la page 12, lues avec plusieurs mots incertains ou illisibles ; la réciproque pour $S$ régulier, que la marge annonce, n'est pas reprise ici. Mathlib n'a pas les schémas en groupes réductifs ni leurs schémas de Borel. On se reportera aux notes de Grothendieck (123, lot 1, p. 10).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 21, 28, 30 et 34, rigidifications de Kostant ♦). *Soient $G$ un groupe simple adjoint de nombre de Coxeter $h$ premier à la caractéristique, et $z$ l'ordre du groupe $\mathfrak{z}$ tel que $N(T) \cap N(T')$ soit extension de $(\mathbf{Z}/h)^*$ par $\mathbf{Z}/h \times \mathfrak{z}$. Le groupe $G$ opère librement sur les quadruplets $(T, B, T', B')$ formés de tores maximaux $T, T'$ en apposition au sens de Kostant et de sous-groupes de Borel $B \supset T$, $B' \supset T'$. Le quotient est fini étale de rang* $\mathrm{card}(W)^2/(h\, z\, \varphi(h))$, *et de rang* $\mathrm{card}(W)^2/(h\, z)$ *quand on se donne aussi un générateur de $T \cap N(T') \simeq \mu_h$.*

La lettre à Kostant du 22 octobre 1969 (page 21) et la page 34 donnent ce compte sans démonstration ; l'édition vérifie qu'il est entier pour $A_1$, $A_2$, $B_2$ et $G_2$. Mathlib n'a pas les tores maximaux ni les sous-groupes de Borel des groupes algébriques. On se reportera aux notes de Grothendieck (123, lot 2, p. 21).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 10 à 13, pas de résolution de Steinberg sans changement de base ♦). *Sur une base $S$, il n'existe pas de résolution du morphisme de Steinberg $G \to T/W$ qui soit un isomorphisme au-dessus de $G^{\mathrm{reg}}$ et dont le lieu exceptionnel soit de codimension $\geq 2$ fibre par fibre : son groupe de Picard serait fini modulo* Pic$(S)$, *alors que celui de l'espace de Grothendieck–Springer $\tilde{G}$ contient le réseau des poids et son cône ample. Le changement de base $T \to T/W$ est ainsi rendu nécessaire par une comparaison de groupes de Picard, et non par la monodromie.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 10 à 13). La phrase de conclusion s'interrompt, et l'argument demande une résolution régulière et projective sur $G$, ce que la page ne dit pas. Mathlib n'a pas les schémas en groupes réductifs ni leurs groupes de Picard. On se reportera aux notes de Grothendieck (123, lot 1, p. 10).

**Théorème** (Grothendieck, pages 71 à 77, catégorie de Picard de Brandt ♦). *Soit $C$ une catégorie de Deuring sur un anneau de Dedekind, équivalente à celle des modules inversibles sur un ordre $\mathfrak{o}$ d'une algèbre $E$ dont tous les automorphismes sont intérieurs et dont les bimodules inversibles contenus dans $E$ commutent entre eux. Le 2-groupe* $\mathrm{Eqv}(C)$ *des autoéquivalences porte une structure symétrique strictement commutative, indépendante de l'objet choisi pour l'identifier aux bimodules. Les catégories de Deuring d'un même type sont donc des catégories-torseurs sous une même catégorie de Picard stricte, la catégorie de Picard de Brandt.*

◊ *non vérifié en Lean*

Que la condition de commutation vaille pour les ordres maximaux est dit par l'édition, d'après Auslander–Goldman et Reiner. Mathlib n'a pas les catégories de Picard ni les catégories-torseurs. On se reportera aux notes de Grothendieck (15, lot 4, p. 71).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 116 à 118, foncteurs fibres réels ♦). *Soit une catégorie motivique sur* $\mathbf{Q}$ *de lien commutatif $G$, de caractère de Tate $\varepsilon$ et de cocaractère des poids $j$ avec $\varepsilon j(\lambda) = \lambda^2$, et soit $U = \mathrm{Ker}(\varepsilon|_{G^\circ})$, où $U^\circ$ est un tore compact. La catégorie admet un foncteur fibre à valeurs dans les espaces vectoriels réels si et seulement si $U$ est connexe ; sinon $U \simeq U^\circ \times \mu_2$. Sa sous-catégorie de poids pairs, de groupe $G/j(\mu_2)$, en admet donc toujours un.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (page 116). La condition intermédiaire (ii) des deux propositions est en partie illisible, l'édition la rétablit, et l'implication qui y passe est la sienne. Mathlib n'a pas les catégories tannakiennes ni les foncteurs fibres. On se reportera aux notes de Grothendieck (15, lot 6, p. 116).

**Théorème** (Grothendieck, pages 27 à 36, semi-continuité des rangs ♦). *Pour un schéma en groupes lisse, séparé et de présentation finie sur une base quelconque, la dimension de la partie affine et les rangs nilpotent, affine-nilpotent et unipotent sont semi-continus supérieurement ; le rang abélien, le rang abélien plus réductif et le rang semi-simple sont semi-continus inférieurement.*

◊ *non vérifié en Lean*

SGA 3, X 8.7, énonce ces inégalités sans démonstration. La réduction à un trait suppose les invariants localement constructibles, ce que ni la page ni la lecture ne vérifient, et l'équivalence entre les inégalités (3) et (9) que la page affirme n'est pas justifiée. Mathlib n'a pas les schémas en groupes lisses ni leur décomposition de Chevalley. On se reportera aux notes de Grothendieck (27, lot 2, p. 27).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 10 à 14, liens sur un corps de Tsen ♦). *Sur un corps $C_1$, tout lien algébrique, lisse ou non, provient d'un $k$-schéma en groupes, et $H^2(k, L)$ se réduit alors à sa classe neutre.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 11 à 14), par deux principes de réduction pour les gerbes de réalisations. Le deuxième cas suppose une conjugaison des sous-groupes de Cartan infinitésimaux qui n'est pas établie, et le troisième n'est pas lu. Mathlib n'a pas les liens ni la cohomologie non abélienne de degré 2. On se reportera aux notes de Grothendieck (45, lot 1, p. 10).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 3 à 10, surjectivité en $H^1$ en dimension un ♦). *Soit $k$ un corps tel que $\mathrm{Br}(k') = 0$ pour toute extension finie séparable $k'/k$. Pour tout épimorphisme $G \to G'$ de schémas en groupes algébriques sur $k$, non nécessairement lisses ni linéaires, à noyau non nécessairement commutatif, l'application $H^1(k, G) \to H^1(k, G')$ de cohomologie plate est surjective.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 3 à 9). Le lemme 4 invoque une

conjugaison des sous-algèbres de Cartan qui n'est pas établie et qui tombe en défaut en général en caractéristique $p$, et la ligne d'énoncé de la page 9 est en partie illisible. Mathlib n'a pas la cohomologie plate des schémas en groupes. On se reportera aux notes de Grothendieck (45, lot 1, p. 3).

**Théorème** (Grothendieck, pages 84 à 89, Hilbert 90 semi-local et inertie ; voir aussi Lorenz 1998 ♦). *Soient $\mathcal{O}$ un anneau semi-local noethérien, $\Gamma$ un groupe fini qui opère fidèlement et transitivement sur ses idéaux maximaux, et $A$ une $\mathcal{O}$-algèbre finie, non nécessairement commutative, munie d'une action semi-linéaire de $\Gamma$. Les applications $H^1(\Gamma, A^*) \to H^1(\Gamma_d, A^*_{\mathfrak{m}}) \to H^1(\Gamma_i, A^*_{\mathfrak{m}})$ vers les groupes de décomposition et d'inertie sont injectives comme applications d'ensembles pointés, et non seulement de noyau trivial.*

◊ *non vérifié en Lean*

La finitude de $A$ sur $\mathcal{O}$ est ajoutée par l'édition, et un pas que la page admet (« on sait que ») peut demander une hypothèse de normalité. Lorenz considère ces applications pour un anneau commutatif et n'en donne que le noyau trivial. Mathlib n'a pas la cohomologie non abélienne $H^1(\Gamma, A^*)$. On se reportera aux notes de Grothendieck (46, lot 5, p. 84).

**Théorème** (Grothendieck, pages 90 à 92, réduction à un sous-groupe de Sylow ♦). *Soient $\mathcal{O}$ un anneau local de caractéristique résiduelle $p$, $\Gamma$ un groupe fini qui opère trivialement sur le corps résiduel, $\Lambda$ un $p$-sous-groupe de Sylow de $\Gamma$, et $A$ une $(\mathcal{O}, \Gamma)$-algèbre finie telle que $A^\Gamma \to A/\mathfrak{m}A$ soit surjectif. Une classe de $H^1(\Gamma, A^*)$ triviale dans $H^1(\Gamma, (A/\mathfrak{m}A)^*)$ et dans $H^1(\Lambda, A^*)$ est triviale ; en particulier la réduction modulo $\mathfrak{m}$ est de noyau trivial quand $p$ ne divise pas l'ordre de $\Gamma$.*

◊ *non vérifié en Lean*

L'hypothèse de surjectivité vient d'une marge en grande partie illisible. Seule la forme « noyau trivial » est retenue, la page ne vérifiant pas que l'hypothèse survit à la torsion. Mathlib n'a pas la cohomologie non abélienne à valeurs dans $A^*$. On se reportera aux notes de Grothendieck (46, lot 5, p. 90).

**Théorème** (Grothendieck, page 9, critère d'irréductibilité géométrique ♦). *Soit $X$ un schéma irréductible sur un corps $k$. Si un $k$-schéma géométriquement irréductible $Z$ s'envoie dans $X$ avec une image non contenue dans l'ensemble des points où passent plusieurs composantes irréductibles de $X_{\bar{k}}$, alors $X$ est géométriquement irréductible ; un point géométriquement normal de $X_{\mathrm{red}}$ dans l'image suffit. Sans la seconde hypothèse, $x^2 + y^2 = 0$ sur $\mathbf{R}$, avec pour $Z$ l'origine, est un contre-exemple.*

◊ *non vérifié en Lean*

La page n'écrit pas « $X$ irréductible » ; sa démonstration l'utilise et la lecture l'ajoute. Sans cette hypothèse l'énoncé est faux (deux droites disjointes et un point de l'une). Mathlib n'a pas l'irréductibilité géométrique des schémas sur un corps. On se reportera aux notes de Grothendieck (53, lot 1, p. 9).

**Conjecture** (Grothendieck, page 13, principe d'identité et lemme B ♦). *Soit $X$ un espace annelé quasi-compact, de faisceau structural cohérent et d'anneaux locaux noethériens, qui vérifie un principe d'identité : pour tout Idéal cohérent $J$ et tout point $y$ de $Y = \mathrm{Supp}(\mathcal{O}/J)$ où $\mathcal{O}_{Y,y}$ est intègre, il existe un voisinage ouvert $U$ de $y$ dans $Y$ sur lequel toute section nulle près de $y$ est nulle. Alors toute suite croissante de sous-faisceaux cohérents d'un faisceau cohérent est stationnaire, et $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est noethérien.*

La page énonce le lemme B et son corollaire sans démonstration, et propose les polycylindres analytiques compacts comme cas d'application ; le passage au corollaire par le lemme A est de la lecture. Mathlib n'a pas les faisceaux cohérents sur un espace annelé. On se reportera aux notes de Grothendieck (55, lot 1, p. 13).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 74 à 79 et 84 à 91, épinglages de Legendre ; voir aussi Antieau–Meier 2016 ♦). *Sur* $\mathbf{Z}[1/2]$*, les courbes elliptiques munies d'un épinglage de Jacobi de niveau* $2$ *et d'un épinglage de Legendre (un vecteur tangent à l'origine, tordu par un* $\mu_4$*-torseur fixé, dont le carré correspond à l'espace tangent de* $E/\pm 1$ *en l'image de l'origine) forment un groupoïde rigide représenté par* $U_{0,3} \times \mu_4^*$*. Le groupe* $\mu_4 \times \mathfrak{S}_3$ *opère sur ce schéma,* $\mathfrak{S}_3$ *tautologiquement sur* $U_{0,3}$ *et par la signature sur* $\mu_4^*$*.*

La représentabilité est affirmée sans démonstration (page 85). Antieau et Meier décrivent l'espace de Legendre au-dessus de $\mathcal{M}(2)$, sans l'épinglage tordu par $\mu_4^*$ ni d'action stricte de $\mu_4 \times \mathfrak{S}_3$. Mathlib n'a pas les espaces de modules de courbes elliptiques. On se reportera aux notes de Grothendieck (64, lot 4, p. 74).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 44 à 52, configurations octaédrales sur une base ; voir aussi Beauville [6] ♦). *Soit* $X$ *un fibré en droites projectives sur un schéma* $S$ *de caractéristiques résiduelles différentes de* $2$*. Se correspondent bijectivement : les sous-schémas en groupes de* $\mathrm{Aut}_S(X)$ *localement isomorphes à* $(\mathbf{Z}/2)^2$*, ceux localement isomorphes à* $\mathfrak{S}_4$*, et les configurations octaédrales régulières, diviseurs étales de degré* $6$ *munis d'une antipodie. Les couples* $(X, \Delta)$ *dont le torseur d'orientation est identifié à* $\mu_4^*$ *équivalent aux revêtements étales finis de degré* $4$ *de* $S$*.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 46 à 49). Le corollaire 2 n'est pas démontré, et l'hypothèse qui en fait une équivalence est une addition marginale de lecture incertaine. Là où la page identifie $\mathrm{Aut}_S(X, \Delta)$ au groupe des rotations de l'octaèdre, l'édition suppose $5$ inversible. Beauville traite le cas d'un corps, sans base. Mathlib n'a pas les formes de $\mathbf{P}^1$ sur une base. On se reportera aux notes de Grothendieck (64, lot 3, p. 44).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 20, 24 et 28, arrangements sans bigones ♦). *Tout arrangement de pseudo-droites du plan projectif réel sans pseudo-droite bigonale est l'arrangement simple de quatre pseudo-droites (*$\mathrm{II}_4$*), ou contient un sous-arrangement de l'un de trois types : cinq pseudo-droites en position générale (*$\mathrm{II}_5$*), un faisceau de trois et un faisceau de deux sans la droite qui joint leurs centres (*$\mathrm{II}'_{3,2}$*), ou le quadrilatère complet (*$\mathrm{III}_6$*).*

La page tire cet énoncé du théorème de la page 24, faux tel qu'il est écrit, et ne donne pour le lemme de la page 28 qu'une « idée » ; le nom $\mathrm{II}'_{3,2}$ est de la lecture. Mathlib n'a pas les arrangements de pseudo-droites. On se reportera aux notes de Grothendieck (80, lot 1, p. 20).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 24 et 26, cas latticiel ♦). *Pour un arrangement de pseudo-droites du plan projectif réel, les cellules fermées de la décomposition induite se coupent deux à deux suivant le vide ou une seule cellule fermée si et seulement si aucune pseudo-droite n'est bigonale et l'arrangement n'est pas l'arrangement simple de quatre pseudo-droites* $\mathrm{II}_4$*.*

La page 26 l'énonce sans démonstration. La nécessité de la première condition se voit sur trois droites ; la suffisance n'est pas vérifiée. Mathlib n'a pas les arrangements de pseudo-droites. On se reportera aux notes de Grothendieck (80, lot 2, p. 24).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 39 à 54, squelette d'un arrangement sans bigones ♦). *Un arrangement combinatoire de pseudo-droites du plan projectif réel sans pseudo-droite bigonale est déterminé par son* $1$*-squelette muni de la décomposition des arêtes en pseudo-droites, et cela fonctoriellement : le foncteur des arrangements sans bigones vers les arrangements de dimension* $1$ *sans bigones est pleinement fidèle, de sorte que tout automorphisme du squelette*

*décomposé vient de la carte.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 41 à 54). Les conditions (A1) à (A6) y sont dites satisfaites « bien entendu », sans démonstration, et l'indépendance des choix en (34) n'est pas vérifiée. Mathlib n'a pas les arrangements de pseudo-droites ni les cartes. On se reportera aux notes de Grothendieck (80, lot 2, p. 39).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 77 et 78, conique en caractéristique $2$ et Frobenius ♦)**.** *Pour une algèbre de quaternions sur une base de caractéristique $2$, l'application qui envoie un sous-groupe de Borel sur son algèbre de Lie définit un morphisme de la conique $X$ vers $\mathbf{P}(\tilde{\mathfrak{g}}/\mathcal{O}_S)$, canoniquement isomorphe à $X^{(2)}$, et ce morphisme est le Frobenius relatif $X \to X^{(2)}$ : il est fini, plat de rang $2$ et radiciel, et n'est pas un monomorphisme.*

La page 78 l'affirme sans démonstration ; l'édition ne le vérifie que dans le cas déployé. Sur un corps, la projection depuis le noyau de la conique est classique ; la forme relative et canonique ne l'est pas. Mathlib n'a pas les coniques sur une base ni le Frobenius relatif des schémas. On se reportera aux notes de Grothendieck (82, lot 4, p. 77).

Piste dont l'énoncé dépend d'une lecture à vérifier :

- Cote 53 : un schéma en monoïdes de présentation finie sur un anneau, dont les translations à gauche et à droite sont des monomorphismes, est un schéma en groupes ; c'est la raison que la page donne pour qu'un monoïde affine de type fini sur un corps se plonge dans $M_n$ et non dans $\mathrm{GL}_n$. Le mot qui qualifie les translations est illisible et la conclusion incertaine ; l'énoncé est une reconstruction de l'édition, qui le démontre par le théorème d'Ax–Grothendieck. Brion (2012) énonce qu'un monoïde algébrique sans idempotent non trivial est un groupe. La lecture de la page est à vérifier sur le fac-similé. Mathlib n'a pas les schémas en monoïdes. On se reportera aux notes de Grothendieck (53, lot 2, p. 21). ♦

Partie 19

# Surfaces de Riemann, uniformisation et modules des courbes

## 21 Cote 93 : la différence schwarzienne en dérivées divisées[22]

La cote 93, du groupe « Géométrie et topologie combinatoire », étudie la dérivée schwarzienne et les connexions projectives sur une courbe lisse $X$ au-dessus d'une base $S$. Pour deux uniformisantes $t$, $s$, la lecture note $G(t,s) = \left(-2\,s'''/s' + 3\,(s''/s')^2\right) dt^2$. Page 72, la page remplace les dérivées par les opérateurs $D_t^{(i)} = \frac{1}{i!}\frac{d^i}{dt^i}$ sur une base variable, les dérivées de Hasse (Hasse et Schmidt, 1937 [29]), observe que les coefficients $2$ et $3$ de $G$ l'interdisent, et prend $G_0 = \frac{1}{12}G$ ; elle fixe le signe par la valeur test $G_0(t,t^3) = \frac{2}{3t^2}\,dt^2$, après un premier essai sur $G_0(t,t^2)$ (93, lot 4, p. 72). Pages 115 à 117, la mise au net énonce l'invariance par les homographies (1) et la relation de cocycle (2) (93, lot 6, p. 115). Page 120, elle écrit $G(t,s) = 12\,G_0(t,s)$ avec $G_0(t,s) = -D_t^{(3)}s/D_t^{(1)}s + (D_t^{(2)}s/D_t^{(1)}s)^2$ (93, lot 6, p. 120). Une marge de la page 121, marquée « OK », dit que les fonctions annulées par $D^{(1)}$, $D^{(2)}$, $D^{(3)}$ forment $\mathcal{O}^{(p)}$ si $p \neq 2,3$ et $\mathcal{O}^{(p^2)}$ sinon ; la Proposition des pages 121 à 123 en tire la rigidité locale (93, lot 7, p. 121, 93, lot 7, p. 123). On démontre ici le noyau algébrique de ces pages dans le modèle local $R[X]$, sur un anneau commutatif quelconque : la formule $G = 12\,G_0$, la relation de cocycle, l'invariance par les homographies, les deux valeurs tests, la description de la marge de la page 121, le fait qu'en caractéristique $2$ et $3$ une translation par une puissance $p$-ième change $G_0$, et la rigidité de la Proposition des pages 121 à 123 dans l'anneau tronqué $A[T]/(T^n)$, c'est-à-dire pour $\alpha = 0$.

*Conventions.* $R$ est un anneau commutatif et $X$ joue le rôle de l'uniformisante $t$. Pour $f \in R[X]$, $D^{(k)}f$ est la dérivée de Hasse, définie sans division par $k!$ par $D^{(k)}X^n = \binom{n}{k}X^{n-k}$ ; on a $k!\,D^{(k)}f = f^{(k)}$. On pose

$$N(f) = (D^{(2)}f)^2 - D^{(3)}f \cdot D^{(1)}f, \qquad G_0(f) = N(f)\,(D^{(1)}f)^{-2},$$

où l'inverse est pris quand $D^{(1)}f$ est inversible (Lean utilise `Ring.inverse`, qui vaut $0$ sinon). Ainsi $G_0(f)$ est le coefficient de $dt^2$ dans $G_0(t,f)$, et $N(f)$ est ce coefficient débarrassé de son dénominateur. On note de même $N_{\mathrm{cl}}(f) = 3\,(f'')^2 - 2\,f'''f'$ et $G(f) = N_{\mathrm{cl}}(f)\,(f')^{-2}$. Pour $s,u \in R[X]$, $s \circ u$ est le polynôme composé. On dit que $f$ est *tué* si $D^{(1)}f = D^{(2)}f = D^{(3)}f = 0$. On note $f_i$ le coefficient de $X^i$ dans $f$.

**Énoncé** (Page 120, le facteur $12$ ♦). *Pour tout $f \in R[X]$, $N_{\mathrm{cl}}(f) = 12\,N(f)$ et $G(f) = 12\,G_0(f)$.*

*Démonstration.* On a $f' = D^{(1)}f$, $f'' = 2\,D^{(2)}f$ et $f''' = 6\,D^{(3)}f$ (par un lemme de mathlib sur les dérivées de Hasse). Donc $3\,(f'')^2 - 2\,f'''f' = 12\,(D^{(2)}f)^2 - 12\,D^{(3)}f\,D^{(1)}f$. La seconde égalité s'en déduit en multipliant par $(f')^{-2}$. □

[22] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder93.lean`.

**Lemme 21.1.** *Pour $s, u \in R[X]$, en notant $s_i = (D^{(i)}s) \circ u$ et $u_i = D^{(i)}u$ :*

$$D^{(1)}(s \circ u) = s_1 u_1, \quad D^{(2)}(s \circ u) = s_1 u_2 + s_2 u_1^2, \quad D^{(3)}(s \circ u) = s_1 u_3 + 2\, s_2 u_1 u_2 + s_3 u_1^3.$$

*Démonstration.* Les trois identités sont additives en $s$ et valent pour $s$ constant. On les démontre ensemble par récurrence sur les monômes, en passant de $s$ à $Xs$. On a $(Xs) \circ u = u \cdot (s \circ u)$, et la formule de Leibniz $D^{(k)}(fg) = \sum_{i+j=k} D^{(i)}f\, D^{(j)}g$ donne, avec $D^{(1)}X = 1$ et $D^{(2)}X = D^{(3)}X = 0$, $D^{(1)}(Xs) = s + XD^{(1)}s$, $D^{(2)}(Xs) = D^{(1)}s + XD^{(2)}s$, $D^{(3)}(Xs) = D^{(2)}s + XD^{(3)}s$. On développe les deux membres par Leibniz et l'hypothèse de récurrence ; ils coïncident comme polynômes en $u$, les $u_i$, $s \circ u$ et les $s_i$. □

**Énoncé** (Pages 115 à 117, la relation de cocycle ♦). *Pour $s, u \in R[X]$ :*

1. *$N(s \circ u) = N(s) \circ u \cdot (D^{(1)}u)^4 + \big((D^{(1)}s) \circ u\big)^2 N(u)$, sans hypothèse ;*
2. *si $D^{(1)}s$ et $D^{(1)}u$ sont inversibles, $G_0(s \circ u) = G_0(s) \circ u \cdot (D^{(1)}u)^2 + G_0(u)$.*

*De plus $N(X) = 0$, donc $G_0(X) = 0$.*

*Démonstration.* (1) On reporte les formules du lemme 21.1 dans $N(s \circ u)$. Avec les notations du lemme,

$$(s_1u_2 + s_2u_1^2)^2 - (s_1u_3 + 2s_2u_1u_2 + s_3u_1^3)\, s_1u_1 = u_1^4(s_2^2 - s_3s_1) + s_1^2(u_2^2 - u_3u_1),$$

les termes croisés $\pm 2s_1s_2u_1^2u_2$ se compensant. (2) On a $D^{(1)}(s \circ u) = s_1u_1$ ; $s_1$ est inversible comme image de l'inversible $D^{(1)}s$ par l'homomorphisme $f \mapsto f \circ u$, qui envoie l'inverse de $(D^{(1)}s)^2$ sur l'inverse de $s_1^2$. On divise (1) par $(s_1u_1)^2$. □

*Remarque.* Là où $6$ est inversible, la relation de cocycle et l'invariance par les homographies sont les propriétés classiques de la dérivée schwarzienne, qui porte le nom de H. A. Schwarz. Dans (2), $G_0(s) \circ u \cdot (D^{(1)}u)^2$ est le coefficient de $dt^2$ dans $G_0(u, s \circ u)$, puisque $du = D^{(1)}u\, dt$ ; l'énoncé est donc la relation $G_0(t, r) = G_0(t, u) + G_0(u, r)$ pour $r = s \circ u$. La forme (1) n'utilise aucune hypothèse d'inversibilité : la relation de cocycle est une identité entre polynômes des coefficients, valable sur $\mathbf{Z}$ et donc sur toute base, en caractéristique $2$ et $3$ comprises. L'inversibilité ne sert qu'à diviser.

**Énoncé** (Page 115, invariance par les homographies ♦). *Soient $s, p, q \in R[X]$ avec $s\,q = p$ et $D^{(2)}p = D^{(3)}p = D^{(2)}q = D^{(3)}q = 0$. Alors $q^2N(s) = 0$. En particulier, si $a, b, c, d \in R[X]$ sont tués, si $cX + d$ est inversible et si $s\,(cX + d) = aX + b$, alors $G_0(s) = 0$ ; c'est le cas pour $a, b, c, d \in R$.*

*Démonstration.* On applique $D^{(2)}$ et $D^{(3)}$ à $s\,q = p$ par Leibniz : $D^{(2)}s\,q + D^{(1)}s\,D^{(1)}q = 0$ et $D^{(3)}s\,q + D^{(2)}s\,D^{(1)}q = 0$. Alors

$$q^2N(s) = D^{(2)}s\,q\,\big(D^{(2)}s\,q + D^{(1)}s\,D^{(1)}q\big) - D^{(1)}s\,q\,\big(D^{(3)}s\,q + D^{(2)}s\,D^{(1)}q\big) = 0.$$

Si $a$ est tué, Leibniz donne $D^{(2)}(aX) = D^{(1)}a = 0$ et $D^{(3)}(aX) = D^{(2)}a = 0$ ; les hypothèses valent donc pour $p = aX + b$ et $q = cX + d$. Si $q$ est inversible, $N(s) = 0$, d'où $G_0(s) = 0$. Les constantes sont tuées. □

**Énoncé** (Page 72, les valeurs tests)**.** *Dans $R[X]$, $N(X^2) = 1$ et $D^{(1)}(X^2) = 2X$ ; $N(X^3) = 6X^2$ et $D^{(1)}(X^3) = 3X^2$. Donc $G_0(t, t^2) = \frac{1}{4t^2}\,dt^2$ là où $2$ est inversible, et $G_0(t, t^3) = \frac{2}{3t^2}\,dt^2$ là où $3$ est inversible.*

*Démonstration.* $D^{(k)}X^n = \binom{n}{k}X^{n-k}$. Pour $X^2$ : $D^{(2)} = 1$, $D^{(3)} = 0$. Pour $X^3$ : $D^{(1)} = 3X^2$, $D^{(2)} = 3X$, $D^{(3)} = 1$, et $9X^2 - 3X^2 = 6X^2$. □

**Énoncé** (Marge de la page 121, les fonctions tuées ♦■■)**.** *Soit $R$ de caractéristique $p$ première.*

1. *$f \in R[X]$ est tué si et seulement si, pour tout $n$ tel que le coefficient de $X^n$ dans $f$ soit non nul, $p$ divise $n$ si $p > 3$, $4$ divise $n$ si $p = 2$, $9$ divise $n$ si $p = 3$.*
2. *Si $u$ est tué, tout polynôme $f \circ u$ est tué ; c'est le cas des polynômes en $X^p$ ($p > 3$), en $X^4$ ($p = 2$), en $X^9$ ($p = 3$).*
3. *Si $p = 2$, $D^{(1)}(X^2) = 0$, $D^{(1)}(X + X^2) = 1$ et $G_0(X + X^2) = 1$.*
4. *Si $p = 3$, $D^{(1)}(X^3) = D^{(2)}(X^3) = 0$, $D^{(3)}(X^3) = 1$, $D^{(1)}(X + X^3) = 1$ et $G_0(X + X^3) = -1$.*

*Démonstration.* (1) Le coefficient de $X^n$ dans $D^{(k)}f$ est $\binom{n+k}{k}$ fois celui de $X^{n+k}$ dans $f$ ; donc $D^{(k)}f = 0$ si et seulement si $\binom{n}{k}a_n = 0$ pour tout $n$, où $a_n$ est le coefficient de $X^n$. Dans un anneau de caractéristique $p$, un entier $c$ non divisible par $p$ est inversible, car il l'est dans $\mathbf{F}_p$ ; donc $\binom{n}{k}a_n = 0$ équivaut à $p \mid \binom{n}{k}$ ou $a_n = 0$. Ainsi $f$ est tué si et seulement si $p$ divise $n$, $\binom{n}{2}$ et $\binom{n}{3}$ pour tout $n$ tel que $a_n \neq 0$. Le théorème de Lucas (`Choose.choose_modEq_choose_mod_mul_choose_div_nat` de Mathlib) donne $\binom{n}{k} \equiv \binom{n \bmod p}{k \bmod p}\binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \pmod p$. Si $p > 3$ et $p \mid n$, cela vaut $\binom{0}{k} = 0$ pour $k = 2, 3$ : la condition se réduit à $p \mid n$. Si $p = 2$ : $\binom{n}{2} \equiv \lfloor n/2 \rfloor$ quand $n$ est pair, donc $2 \mid n$ et $2 \mid \binom{n}{2}$ équivalent à $4 \mid n$, et alors $\binom{n}{3} \equiv \binom{0}{1}\lfloor n/2 \rfloor = 0$. Si $p = 3$ : $\binom{n}{3} \equiv \lfloor n/3 \rfloor$ quand $3 \mid n$, donc $3 \mid n$ et $3 \mid \binom{n}{3}$ équivalent à $9 \mid n$, et alors $\binom{n}{2} \equiv \binom{0}{2} = 0$. (2) Par le lemme 21.1, les trois dérivées de $f \circ u$ sont des combinaisons de $u_1$, $u_2$, $u_3$, nuls ; et $X^m$ est tué par (1). (3) et (4) sont des calculs de coefficients binomiaux : $N(X + X^2) = 1$ sur tout anneau et $D^{(1)}(X + X^2) = 1 + 2X$ ; $N(X + X^3) = 6X^2 - 1$ et $D^{(1)}(X + X^3) = 1 + 3X^2$. □

*Remarque.* La vérification confirme la page 120 sans hypothèse sur la base : $G = 12\,G_0$ est une identité sur $\mathbf{Z}$, et $G_0$ est défini partout, en caractéristique 2 et 3 comprises. La relation de cocycle vaut sous la forme (1), sans dénominateur ; l'invariance par les homographies ne demande que $D^{(2)}$ et $D^{(3)}$ nuls sur le numérateur et le dénominateur, ce qui couvre les homographies à coefficients dans $\mathcal{O}'$, les fonctions tuées, en toute caractéristique. La valeur test de la page 72 est confirmée, $G_0(t, t^3) = \frac{2}{3t^2}\,dt^2$, ainsi que la correction de la lecture pour le premier essai : $G_0(t, t^2) = \frac{1}{4t^2}\,dt^2$, là où la page écrit $\frac{1}{2t}\,dt^2$. Dans le modèle local, la marge de la page 121 est exacte : les fonctions tuées sont les polynômes en $X^p$ si $p > 3$, en $X^4$ si $p = 2$, en $X^9$ si $p = 3$. Les points (3) et (4) montrent que ce niveau $p^2$ est nécessaire pour l'invariance : en caractéristique 2, $t^2$ a une différentielle nulle mais la translation $t \mapsto t + t^2$ donne $G_0 = dt^2$ ; en caractéristique 3, $t \mapsto t + t^3$ donne $G_0 = -dt^2$. Le groupe qui laisse $G_0$ invariant n'est donc pas celui des homographies à coefficients dans $\mathcal{O}^{(p)}$ pour $p = 2, 3$. Ces énoncés portent sur l'invariance ; la rigidité réciproque est traitée plus bas dans l'anneau tronqué. Le cadre est $R[X]$ : les unités de $R[X]$ sont rares, et l'hypothèse « $D^{(1)}$ inversible » n'y est satisfaite que pour des $f$ particuliers ; les formes sans dénominateur, (1) du cocycle et $q^2N(s) = 0$, n'ont pas

cette limite. Le passage aux séries formelles, à $A[T]/(T^{p^N}-\alpha)$ pour $\alpha \neq 0$ ou à une courbe lisse n'est pas formalisé.

*Le modèle tronqué.* La Proposition des pages 121 à 123 porte sur $B = A[T]/(T^{p^N}-\alpha)$, et la page se ramène d'abord à $\alpha = 0$ (93, lot 7, p. 122). On travaille dans $B_n = A[T]/(T^n)$, en écrivant ses éléments comme classes de polynômes $s \in A[X]$. Comme $t$ est nilpotent dans $B_n$, un élément de $B_n$ est inversible si et seulement si son terme constant l'est ; $D^{(1)}s$ est donc inversible dans $B_n$ si et seulement si $s_1 \in A^*$. Le lemme suivant dit que, pour $n = p^N > 3$ en caractéristique $p$, la condition $G_0(t,s) = 0$ dans $B_n$ s'écrit $X^n \mid N(s)$. L'énoncé de rigidité est formulé dans $A[X]$ avec ces deux traductions.

**Lemme 21.2.** *Soit $A$ de caractéristique $p$ première et $n = p^N$. Pour $k < n$ et $g \in A[X]$, $D^{(k)}(X^n g) = X^n D^{(k)}g$. Si $n > 3$, $X^n$ divise $N(s + X^n g) - N(s)$ pour tous $s, g \in A[X]$.*

*Démonstration.* Par Leibniz, $D^{(k)}(X^n g) = \sum_{i+j=k} \binom{n}{i} X^{n-i} D^{(j)} g$. Pour $0 < i \leq k < p^N$, $p$ divise $\binom{p^N}{i}$ (`Nat.Prime.dvd_choose_pow` de Mathlib), et il ne reste que le terme $i = 0$. Si $n > 3$, on l'applique à $k = 1, 2, 3$ : $D^{(k)}(s + X^n g) = D^{(k)}s + X^n D^{(k)}g$, et en développant, $N(s+X^n g) - N(s)$ est $X^n$ fois $2\,D^{(2)}s\,D^{(2)}g + X^n (D^{(2)}g)^2 - D^{(3)}s\,D^{(1)}g - D^{(3)}g\,D^{(1)}s - X^n D^{(3)}g\,D^{(1)}g$. □

**Énoncé** (Page 122, le premier terme non affine ♦). *Soient $A$ un anneau commutatif, $s \in A[X]$, $a, b, c, d \in A$, $q = cX + d$ et $r = s\,q$.*

1. *$q\,N(s) = D^{(2)}s \cdot D^{(2)}r - D^{(1)}s \cdot D^{(3)}r$.*
2. *Si $X^{j+3}$ divise $r - (aX + b)$, le coefficient de $X^j$ dans $q\,N(s)$ est $-\binom{j+3}{3}\,s_1\,r_{j+3}$.*

*Démonstration.* (1) On a $D^{(1)}q = c$ et $D^{(2)}q = D^{(3)}q = 0$, donc par Leibniz $D^{(2)}r = D^{(2)}s\,q + c\,D^{(1)}s$ et $D^{(3)}r = D^{(3)}s\,q + c\,D^{(2)}s$. Alors $D^{(2)}s \cdot D^{(2)}r - D^{(1)}s \cdot D^{(3)}r = q\,\big((D^{(2)}s)^2 - D^{(3)}s\,D^{(1)}s\big)$, les termes en $c$ se compensant. (2) Soit $e = r - (aX + b)$. Les dérivées $D^{(2)}$ et $D^{(3)}$ tuent $aX + b$, donc $D^{(k)}r = D^{(k)}e$ pour $k = 2, 3$. Le coefficient de $X^i$ dans $D^{(k)}e$ est $\binom{i+k}{k} e_{i+k}$, nul si $i + k < j + 3$. Donc $X^{j+1}$ divise $D^{(2)}e$ et $X^j$ divise $D^{(3)}e$, dont le coefficient de $X^j$ est $\binom{j+3}{3} e_{j+3} = \binom{j+3}{3} r_{j+3}$, puisque $j + 3 \geq 2$. Dans (1), le premier produit n'a pas de terme en $X^j$, et le terme en $X^j$ du second est $(D^{(1)}s)_0 \binom{j+3}{3} r_{j+3} = s_1 \binom{j+3}{3} r_{j+3}$. □

**Énoncé** (Pages 121 à 123, la rigidité ♦■■). *Soient $A$ un anneau commutatif et $n$ un entier tel que $\binom{k}{3}$ soit inversible dans $A$ pour $3 \leq k < n$. Soit $s \in A[X]$ avec $s_1 \in A^*$, et supposons nuls les coefficients de $X^m$ dans $N(s)$ pour $m + 3 < n$ (c'est le cas si $X^n \mid N(s)$). Posons $c = -s_2/s_1$, $b = s_0$, $a = s_1 + c\,s_0$. Alors $a - bc = s_1$ et $X^n$ divise $s\,(cX + 1) - (aX + b)$ : dans $B_n$, $s = (at + b)/(ct + 1)$. En particulier :*

1. *si $A$ est de caractéristique $p$ première et $n = p$, sans autre hypothèse sur $A$ ; et si de plus $p > 3$, pour $s_1 \in A^*$, $X^p \mid N(s)$ équivaut à l'existence de $a, b, c \in A$ avec $X^p \mid s\,(cX+1) - (aX+b)$ ;*
2. *pour $n = 4$, sur tout anneau $A$ (niveau $p^2$ pour $p = 2$) ;*
3. *si $A$ est de caractéristique $3$ et $n = 9$ (niveau $p^2$ pour $p = 3$) ;*
4. *si $A$ est une $\mathbf{Q}$-algèbre, dans $A[X]$ même : $N(s) = 0$ et $s_1 \in A^*$ entraînent $s\,(cX + 1) = aX + b$.*

*Plus généralement, si $A$ est de caractéristique $p$, $n = p^N > 3$, $d \in A^*$ et $X^n \mid s\,(cX+d) - (aX+b)$, alors $X^n \mid N(s)$.*

*Démonstration.* Soit $r = s\,(cX+1)$, de coefficients $r_0 = s_0 = b$, $r_1 = s_1 + c\,s_0 = a$ et $r_2 = s_2 + c\,s_1 = 0$ ; on a $a - bc = s_1$. On montre par récurrence sur $i < n$ que le coefficient de $X^i$ dans $r - (aX+b)$ est nul. Pour $i \leq 2$ c'est le calcul précédent. Pour $i = j+3 < n$, l'hypothèse de récurrence dit que $X^{j+3}$ divise $r - (aX+b)$. Les coefficients de $N(s)$ de degré $\leq j$ sont nuls, donc aussi le coefficient de $X^j$ dans $(cX+1)\,N(s)$ ; par l'énoncé précédent, $\binom{j+3}{3} s_1 r_{j+3} = 0$, et $r_{j+3} = 0$ puisque $\binom{j+3}{3}$ et $s_1$ sont inversibles. (1) Pour $3 \leq k < p$, $p$ ne divise pas $\binom{k}{3}$ : sinon il diviserait $\binom{k}{3} \cdot 3!\,(k-3)! = k!$, d'où $p \leq k$. Un entier premier à $p$ est inversible dans $A$, car il l'est dans $\mathbf{F}_p$. (2) Seul $k = 3$ intervient, et $\binom{3}{3} = 1$. (3) Pour $k = 3, \ldots, 8$, $\binom{k}{3} = 1, 4, 10, 20, 35, 56$, premiers à 3. (4) $\binom{k}{3} \neq 0$ pour $k \geq 3$, donc inversible dans $\mathbf{Q}$ et dans $A$ ; les hypothèses valent pour tout $n$, et on prend $n$ plus grand que le degré de $f = s\,(cX+1) - (aX+b)$ : tous les coefficients de $f$ sont nuls. Pour la dernière assertion, écrivons $s\,q = aX + b + X^n g$ avec $q = cX + d$. Par l'énoncé précédent et le lemme 21.2, $q\,N(s) = D^{(2)}s \cdot X^n D^{(2)}g - D^{(1)}s \cdot X^n D^{(3)}g$, divisible par $X^n$. Si $X^n \mid q\,F$ avec $d$ inversible, alors $X^n \mid F$ : le coefficient de $X^i$ dans $q\,F$ est $c\,F_{i-1} + d\,F_i$, et l'on conclut par récurrence sur $i < n$. La réciproque de (1) en est le cas $N = 1$, $d = 1$. □

**Contre-exemple 21.3** (Page 121, le déterminant ♦). *Si $u \in A$ et si $X^3$ divise $uX\,(cX+d) - (aX+b)$ avec $ad - bc = 1$, alors $u$ est un carré dans $A$. En particulier, dans $\mathbf{F}_5[T]/(T^5)$, $s = 2t$ vérifie $N(s) = 0$ et $D^{(1)}s = 2 \in \mathbf{F}_5^*$, et $s = (2t+0)/(0 \cdot t + 1)$, mais $s$ n'est égal à aucune homographie $(at+b)/(ct+d)$ avec $a, b, c, d \in \mathbf{F}_5$ et $ad - bc = 1$.*

*Démonstration.* Les coefficients de $X^0$, $X^1$ donnent $b = 0$ et $a = ud$. Alors $u = u\,(ad - bc) = u^2 d^2 = (ud)^2$. Dans $\mathbf{F}_5$, 2 n'est pas un carré (les carrés sont 0, 1, 4), et $X^5 \mid \cdot$ entraîne $X^3 \mid \cdot$. $N(2X) = 0$ car $D^{(2)}$ et $D^{(3)}$ tuent $2X$. □

*Remarque.* Dans le modèle tronqué avec $\alpha = 0$, la Proposition des pages 121 à 123 est confirmée sur tout anneau de caractéristique $p$ : l'hypothèse « $A$ local, plus généralement $\mathrm{Pic}(A) = 0$ » ne sert pas, l'homographie se normalise par $d = 1$ et son déterminant est $s_1$. Cette hypothèse ne peut servir qu'au passage de $\alpha$ à 0, qui n'est pas formalisé. La démonstration suit la page, avec une différence : au lieu de normaliser $s$ en $t + at^d + \cdots$ en composant par des homographies, on multiplie $s$ par $cX+1$ et l'on suit les coefficients de $r = s\,(cX+1)$ ; l'égalité $q\,N(s) = D^{(2)}s\,D^{(2)}r - D^{(1)}s\,D^{(3)}r$ remplace la relation de cocycle, et le coefficient $a\binom{d}{3}$ de la page devient $s_1\binom{j+3}{3} r_{j+3}$ avec $d = j+3$. Seuls les coefficients de $N(s)$ de degré $< n-3$ servent. Pour $p = 2$ seul $\binom{3}{3} = 1$ intervient, comme le dit la page 123, et l'énoncé vaut alors sur tout anneau ; pour $p = 3$, les restes $\binom{k}{3}$ mod $3 = 1, 1, 1, 2, 2, 2$ pour $k = 3, \ldots, 8$ confirment la colonne de droite de la page 123. L'hypothèse $p > 3$ du point (1) ne sert pas à l'implication directe, vide pour $n = p \leq 3$ ; elle sert à ce que $D^{(3)}$ passe au quotient $B_p$, ce qui demande $p > 3$, d'où le niveau $p^2$ pour $p = 2, 3$. La normalisation « avec $ad - bc = 1$ », ajoutée sur la page 121, est fausse en général : le déterminant est une unité, carré seulement si $s_1$ l'est, et l'énoncé correct porte sur $\mathrm{PGL}_2(A)$. En caractéristique nulle, la conclusion dans $A[X]$ permet $c$ nilpotent : sur $A = \mathbf{Q}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, $s = X + \varepsilon X^2$ vérifie $s\,(1 - \varepsilon X) = X$ ; si $A$ est intègre, $c = 0$ et $s$ est affine.

Ne sont pas démontrés ici : la réduction de $A[T]/(T^{p^N} - \alpha)$ à $\alpha = 0$ dans la Proposition des pages 121 à 123 (elle passe par l'extension $A \to A[\beta]/(\beta^{p^N} - \alpha)$, où $T^{p^N} - \alpha = (T - \beta)^{p^N}$, et par une descente où $\mathrm{Pic}(A) = 0$ peut servir) ; l'unicité de l'homographie au scalaire près (« uniques … scalaire », page 121) ; la rigidité dans $A[X]$ ou dans les séries formelles en caractéristique $p$, avec des coefficients tués non constants, et sur une courbe lisse en caractéristique $p$ ; l'injectivité

espérée page 121 du quotient de $\mathcal{P}_{X/S}$ par les homographies à coefficients dans $\mathcal{O}'_X$ dans $\mathrm{Conn}^0_{X/S}$ ; la construction des torseurs $\mathrm{Conn}_{X/S}$ et $\mathrm{Conn}_{0,X/S}$ ; l'unicité de $G_0$ au signe près sur **Z** (page 72) et l'unicité en caractéristique $p$ de la remarque 3 (page 73) ; le morphisme dérivé défini par un torseur.

**Définition** (Grothendieck, pages 233 à 235, morphisme dérivé défini par un torseur ♦). Soient $\mathcal{P}$ un torseur sous un faisceau abélien $\mathcal{G}$, $u : \mathcal{P} \to \underline{\mathrm{Hom}}^0(K', K'')$ et $k : \mathcal{G} \to \underline{\mathrm{Hom}}^{-1}(K', K'')$ avec $u(p+g) - u(p) = dk(g) + k(g)d$. Soit $\bar{\mathcal{G}}$ l'extension de **Z** par $\mathcal{G}$ où $j^{-1}(1) = \mathcal{P}$, de sorte que $[\mathcal{G} \to \bar{\mathcal{G}}]$ est quasi-isomorphe à **Z**. Le morphisme $K' \to K''$ de la catégorie dérivée défini par $(\mathcal{P}, u, k)$ est celui que donne l'application $\varphi : [\mathcal{G} \to \bar{\mathcal{G}}] \to \underline{\mathrm{Hom}}^\bullet(K', K'')$, $\varphi^{-1} = k$, $\varphi^0|_{\mathcal{P}} = u$, sans choix de section ni de recouvrement.

**Théorème 21.4** (Grothendieck, pages 71 à 73 et 120 à 123, schwarzien à dérivées divisées ♦). *La différence schwarzienne écrite avec les dérivées divisées $D^{(i)} = \frac{1}{i!}\frac{d^i}{dt^i}$, $G_0(t,s) = -D^{(3)}s/D^{(1)}s + (D^{(2)}s/D^{(1)}s)^2 = G/12$, est un cocycle à valeurs dans $\omega^{\otimes 2}$ défini sur toute base, caractéristiques 2 et 3 comprises. Sur un anneau $A$ de caractéristique $p$ tel que* $\mathrm{Pic}(A) = 0$, *un $s \in A[T]/(T^{p^N} - \alpha)$ avec $D^{(1)}s$ inversible et $G_0(t,s) = 0$ s'écrit $(at+b)/(ct+d)$ avec $a, b, c, d \in A$, pour $N = 1$ si $p > 3$ et pour $N = 2$ si $p = 2$ ou 3.*

◊ *non vérifié en Lean*

*Remarque.* La caractérisation des polynômes tués par les dérivées de Hasse d'ordre $0 < k < p^e$ en caractéristique $p$ (ce sont les polynômes en $X^{p^e}$) est proposée à mathlib sous sa forme générale (PR mathlib4 #44736), avec le critère de divisibilité qu'elle utilise, tiré du théorème de Lucas (1878) [34] sur les coefficients binomiaux modulo $p$ (#44735). Pour $p = 3$ elle porte sur les ordres $k < 9$, quand la marge n'emploie que $D^{(1)}$, $D^{(2)}$, $D^{(3)}$.

*Remarque.* Deux lemmes de la démonstration de la rigidité sont proposés à mathlib : le passage des dérivées de Hasse d'ordre $< p^e$ à travers la multiplication par $X^{p^e}$ (PR mathlib4 #44755, sur #44736), et le critère selon lequel un polynôme $P$ est premier à $X - a$ si et seulement si $P(a)$ est inversible (#44756). Pour $a = 0$, il dit qu'un polynôme de terme constant inversible est premier à $X$, donc à $X^n$, ce qu'emploie la démonstration.

Autres pistes de l'onglet Findings pour ce thème, dans des cotes qui n'ont pas de section ici :

**Exemple** (Grothendieck, pages 30 à 32 et 35, carte des structures spéciales de $M_{0,5}$ ♦). Comme points de base et générateurs d'une présentation du groupoïde de Teichmüller de cinq points sur la sphère, construite à partir de pièces de dimension modulaire $\leq 1$, la cote propose une carte de 542 structures spéciales en neuf orbites sous $\mathfrak{S}_5$ sur trois niveaux (12 pentagonales, 20 bitétraédriques et 30 pyramidales ; $60+60+120$ ; $60+120+60$), reliées par 1620 flèches en quatorze orbites.

◊ non vérifié en Lean

Les relations sont annoncées et jamais écrites. Pour trois types de flèches, les sources et buts dessinés ne correspondent pas aux facteurs du décompte, que l'édition reproduit sans le vérifier, et « 1620 » surcharge un « 1580 » barré. Mathlib n'a pas le groupoïde de Teichmüller. On se reportera aux notes de Grothendieck (148, lot 2, p. 30).

**Définition** (Grothendieck, pages 40 et 49 à 60, groupoïde de Teichmüller multimarqué ♦). Dans le groupoïde de Teichmüller des surfaces découpées, chaque cercle de découpe ou de bord $a$ porte un nombre quelconque $r(a) \geq 0$ de points marqués, qui forment un torseur sous le groupe tordu $\mathbf{Z}_a/r(a)$. Les opérations élémentaires sont, outre le découpage et le

recollement, l'effacement partiel uniforme, restriction au sous-groupe d'ordre $r'$ divisant $r$, et le surmarquage uniforme, extension le long de $\mathbf{Z}/r \to \mathbf{Z}/dr$. Le recollement de deux cercles est défini à isomorphisme unique près dès qu'ils portent le même nombre de points et qu'on se donne un anti-isomorphisme de leurs torseurs.

La définition du surmarquage uniforme et la phrase qui ramène le recollement à $r(a) = r(a')$ contiennent des mots illisibles ; l'unicité du recollement est justifiée par la lecture. Mathlib n'a pas le groupoïde de Teichmüller des surfaces découpées. On se reportera aux notes de Grothendieck (148, lot 2, p. 40).

Partie 20

# Champs, gerbes et catégories fibrées

*Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici.* Les cotes de ce thème supposent les champs et les gerbes sur un site, que mathlib ne définit pas.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 62, 63, 103, 134-1, 134-2, 134-8.

Pistes de l'onglet Findings pour ces cotes, hors de portée de Lean pour l'instant :

- Cote 62 : sur une base où $6$ est inversible, les triplets $(X, X', s)$ formés d'une courbe de genre $0$, d'une trisection étale et d'une section disjointe ont trois descriptions équivalentes, dont un invariant $j$ qui détermine le triplet là où $j(j-1)$ est inversible. La lecture de la page est à vérifier sur le fac-similé. Mathlib n'a pas les courbes de genre $0$ sur une base ni leurs trisections étales. On se reportera aux notes de Grothendieck (62, lot 3, p. 41). ♦

**Conjecture** (Grothendieck, pages 14 et 15, Gr-champs épinglés et cohomologie relative ♦)**.** *Soient $G$ un Groupe sur un topos $X$, non nécessairement commutatif, et $N$ un $G$-Module. Les Gr-champs sur $X$ épinglés par $(G, N)$, qui sont pour l'essentiel des 2-gerbes sur le topos classifiant $B_G$ liées par $N$ et trivialisées sur $X$, correspondent au complexe tronqué $\tau_{\leq 2}(R\Gamma(B_G \bmod X, N)[1])$, cohomologie de $B_G$ relative à $q_G : X \to B_G$.*

Mathlib n'a pas les Gr-champs ni les topos classifiants. On se reportera aux notes de Grothendieck (103, lot 1, p. 14).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 3 à 5, suite exacte des champs de Picard épinglés ♦)**.** *Pour des faisceaux abéliens $M$, $N$ sur un topos, il existe une suite exacte de faisceaux $0 \to \mathrm{Ext}^2(M, N) \to P(M, N) \to \mathrm{Hom}(M, {}_2N) \to 0$, où $P(M, N)$ est le faisceau des champs de Picard épinglés par $M$, $N$ à équivalence près et où la dernière flèche est l'invariant de symétrie de $L \otimes L$. La page la tire, à titre heuristique, d'un triangle distingué.*

Mathlib n'a pas les champs de Picard sur un topos. On se reportera aux notes de Grothendieck (134-1, lot 1, p. 3).

**Conjecture** (Grothendieck, page 5, réalisation de l'invariant de symétrie ♦)**.** *Sur tout topos, tout homomorphisme $M \to {}_2N$ est l'invariant de symétrie d'un champ de Picard épinglé par $M$, $N$ : l'obstruction, a priori dans $\mathrm{Ext}^3(M, N)$, est tuée par un argument « universel », que la page annonce « sauf erreur » sans le donner.*

Mathlib n'a pas les champs de Picard ni leurs obstructions dans $\mathrm{Ext}^3$. On se reportera aux notes de Grothendieck (134-1, lot 1, p. 5).

**Partie 21**

# Topologie combinatoire, surfaces et cartes

Le 15 avril 1984, l'année de l'*Esquisse d'un programme*, il écrit à Lipman Bers sur l'espace de Teichmüller et l'espace de Thurston des surfaces à bord, avec des modèles en disques et en tranches d'orange (67, lot 1, p. 15). C'est la seule lettre datée du fonds sur les surfaces et leurs découpages.

## 22 Cote 152 : le dictionnaire des graphes circularisés et des contours[23]

La cote 152, *Catégorie des types de mots [dont arbres plans] : notes manuscrites (s.d.)*, douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », décrit un arbre plan de trois manières et montre qu'elles sont équivalentes. Les pages 4 à 12, sous sa pagination $1, 1', 2, 2', 3, 3'$, forment un texte suivi. On découpe la surface le long d'un graphe circularisé et l'on obtient un *contour*, réunion de polygones, un par face. Les pages 7 et 9 écrivent le dictionnaire entre les deux données, trois fois, et les trois formes ne s'accordent pas. La page 7 encadre des formules où seule la rotation intervient. La page 9 pose en tête « $\sigma_\Gamma = \sigma_C$, $\rho_\Gamma = \rho_C$ », puis dresse un tableau dont les deux dernières lignes associent $\rho_\Gamma\sigma_\Gamma$ à $\rho_C$ et $\rho_\Gamma$ à $\rho_C\sigma_C$. Elle encadre enfin un critère pour qu'un graphe soit un arbre, dont les deux derniers mots ne se lisent pas (152, lot 1, p. 9). La lecture retient la convention du tableau.

**Définition.** Soit $D$ un ensemble, celui des arcs — arêtes orientées, ou demi-arêtes. Un *graphe circularisé sans sommet isolé* sur $D$ est la donnée d'une involution sans point fixe $\sigma_\Gamma$ de $D$ (le renversement des arcs) et d'une permutation $\rho_\Gamma$ de $D$ (l'arc suivant autour de l'origine) ; ses sommets sont les orbites de $\rho_\Gamma$. Un *contour* sur $D$ est la donnée d'une permutation $\rho_C$ de $D$ (l'arête suivante sur le contour orienté) et d'une involution sans point fixe $\sigma_C$ de $D$ (le recollement) ; ses polygones, ou faces, sont les cycles de $\rho_C$. Le graphe est *connexe* si deux arcs quelconques sont reliés par une suite de pas $x \mapsto \rho_\Gamma x$ et $x \mapsto \sigma_\Gamma x$, parcourus dans un sens ou dans l'autre. Comme la lecture, on identifie l'ensemble $A(C)$ des arêtes du contour à celui des arcs par l'application « arête droite ».

**Énoncé** (Équivalence, pages 7 et 9, sur les objets)**.** *Sur un même ensemble $D$, les applications*

$$(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma) \longmapsto (\rho_C, \sigma_C) = (\rho_\Gamma\sigma_\Gamma,\ \sigma_\Gamma), \qquad (\rho_C, \sigma_C) \longmapsto (\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma) = (\sigma_C,\ \rho_C\sigma_C)$$

*sont des bijections réciproques entre graphes circularisés sans sommet isolé et contours munis d'une involution de recollement sans point fixe. Les trois formules $\sigma_C = \sigma_\Gamma$, $\rho_C = \rho_\Gamma\sigma_\Gamma$, $\rho_\Gamma = \rho_C\sigma_C$ valent ensemble, et les orbites de $\rho_C\sigma_C$ sont les sommets du graphe.*

**Énoncé** (Connexité, dans la démonstration du critère de la page 9)**.** *Si $D$ est fini et que $\rho_C$ n'a qu'un cycle, le graphe est connexe.*

*Remarque.* La tête de la page 9, $\rho_\Gamma = \rho_C$, est incompatible avec le tableau dès que $D$ n'est pas vide : jointe à $\rho_C = \rho_\Gamma\sigma_\Gamma$, elle forcerait $\sigma_\Gamma = \mathrm{id}$.

[23] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder152.lean`.

*Démonstration de l'équivalence.* Tout repose sur $\sigma^2 = \mathrm{id}$ pour une involution. Partant de $(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma)$, on obtient le contour $(\rho_\Gamma\sigma_\Gamma, \sigma_\Gamma)$, dont l'involution est sans point fixe puisque c'est $\sigma_\Gamma$, puis le graphe $(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma\sigma_\Gamma\sigma_\Gamma) = (\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma)$. Partant de $(\rho_C, \sigma_C)$, on obtient le graphe $(\sigma_C, \rho_C\sigma_C)$, puis le contour $(\rho_C\sigma_C\sigma_C, \sigma_C) = (\rho_C, \sigma_C)$. Les deux premières formules sont les définitions, et la troisième en résulte : $\rho_C\sigma_C = \rho_\Gamma\sigma_\Gamma\sigma_\Gamma = \rho_\Gamma$. Les permutations $\rho_C\sigma_C$ et $\rho_\Gamma$ étant égales, elles ont les mêmes orbites, qui sont les sommets. □

*Démonstration de la connexité.* Soient $a, b \in D$. Comme $\rho_C$ n'a qu'un cycle et que $D$ est fini, il existe un entier $k \geq 0$ tel que $b = \rho_C^k(a)$. Raisonnons par récurrence sur $k$. Pour $k = 0$, $b = a$. Si $\rho_C^k(a)$ est relié à $a$, alors $\rho_C^{k+1}(a) = \rho_\Gamma\big(\sigma_\Gamma(\rho_C^k(a))\big)$ l'est aussi, par un pas $\sigma_\Gamma$ suivi d'un pas $\rho_\Gamma$. □

*Démonstration de la remarque.* Si $\rho_\Gamma = \rho_\Gamma\sigma_\Gamma$, la composition à gauche par $\rho_\Gamma^{-1}$ donne $\sigma_\Gamma = \mathrm{id}$, et tout arc serait un point fixe de $\sigma_\Gamma$, ce qui est exclu dès qu'il y a un arc. □

*Remarque.* L'équivalence n'utilise que $\sigma_\Gamma^2 = \mathrm{id}$. C'est le dictionnaire classique des cartes combinatoires, où les faces sont les cycles du produit de la rotation et de l'involution. Il remonte aux systèmes de rotation d'Edmonds (1960) ; sa forme par une paire de permutations est celle de Jacques (1968) [30] et de Cori (1975) [17]. L'inventaire date la cote « [à partir de 1982] ».

*Remarque.* L'équivalence est établie sur les objets, les deux données vivant sur le même ensemble ; les morphismes ne sont examinés ni ici ni sur la page.

Ne sont pas démontrés ici : les plongements dans une surface orientée et les circularisations (page 4) ; le critère encadré des arbres (page 9) ; la fonctorialité ; les pages 2, 3 et 10 à 12.

## 23 Cote 88 : l'ordre $2\nu$ et la trichotomie des cartes standard[24]

La cote 88, *Cartes standards : notes manuscrites (s.d.)*, quinze pages sans date, appartient au groupe « Géométrie et topologie combinatoire » que l'inventaire date « 1976-[vers 1986] ». Elle contient deux textes. Le premier, sous le titre de chemise « Cartes associées aux syst. de Racines », remplace un système de racines par son groupe de Weyl, le torseur de ses bases et ses réflexions simples. Il fait opérer des involutions $\sigma_0, \dots, \sigma_{\ell-1}$ sur les drapeaux du complexe qu'il en tire, et calcule à la page 8 l'ordre du dernier produit : « ordre de $\pi = \sigma_{\ell-2}\,\sigma_{\ell-1} = 2\nu$ », $\nu$ étant « le ppcm des $n_{ij}$ » (88, lot 1, p. 8). Le second, intitulé de sa main « Théorème (à prouver) », énonce en sept articles la théorie des cartes régulières de type $(p, q)$. Son article (6), à la page 14, les répartit en sphériques, euclidiennes et hyperboliques par des listes de couples (88, lot 1, p. 14). Deux énoncés de la lecture sont démontrés ici : la proposition de la page 8, et l'arithmétique qui trie les cas de l'article (6).

**Définition.** Soient $W$ un groupe, $R$ un ensemble non vide sur lequel $W$ opère librement et transitivement, $I$ un ensemble fini de cardinal $\ell \geq 2$, et $\varphi : R \times I \to W$ une application telle que

$$\text{a)}\quad \varphi(wr, i) = w\,\varphi(r, i)\,w^{-1}, \qquad \varphi(r, i)^2 = 1 \qquad (w \in W,\ r \in R,\ i \in I).$$

Soit $\mathrm{Rep}'(I)$ l'ensemble des bijections $u : [1, \ell] \to I$, et $\tau$ la transposition de $\ell - 1$ et $\ell$. On définit sur $R \times \mathrm{Rep}'(I)$

$$\sigma_{\ell-2}(r, u) = (r,\ u \circ \tau), \qquad \sigma_{\ell-1}(r, u) = \big(\varphi(r, u(\ell))\,r,\ u\big).$$

[24] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder88.lean`.

Pour $g \in W$, on note $\mathrm{ord}(g)$ le générateur positif ou nul du sous-groupe $\{k \in \mathbf{Z} \mid g^k = 1\}$, qui est nul si $g$ est d'ordre infini, et de même pour une permutation. On pose $n_{ij} = \mathrm{ord}\big(\varphi(r,i)\varphi(r,j)\big)$ et $\nu = \mathrm{ppcm}\{n_{ij} \mid i \neq j\}$, un ppcm dont un terme est nul étant nul.

Dans la lecture, $W$ est le groupe de Weyl, $R$ l'ensemble des bases, $\varphi(r,i)$ la réflexion simple d'indice $i$ relative à la base $r$ ; seules sont retenues ici, des quatre conditions a) à d) que la lecture énonce, la condition a) et la moitié $\varphi(r,i)^2 = 1$ de c).

**Énoncé** (Proposition, page 8). *L'ordre de $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1}$ sur $R \times \mathrm{Rep}'(I)$ est $2\nu$, où $\nu$ est le plus petit commun multiple des $n_{ij}$, $i \neq j$.*

**Énoncé** (Article (6), page 14 : l'arithmétique). *Soient $p, q \geq 1$ des entiers, le type $(p,q)$ étant atteint au sens de l'article (2) : on exclut $(1,q)$ pour $q \neq 2$ et $(p,1)$ pour $p \neq 2$. Alors*

1. *$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$ si et seulement si $p = 2$, ou $q = 2$, ou $(p,q)$ est l'un de $(3,3)$, $(3,4)$, $(4,3)$, $(3,5)$, $(5,3)$ ;*
2. *$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2}$ si et seulement si $(p,q)$ est l'un de $(4,4)$, $(3,6)$, $(6,3)$ ;*
3. *pour $p, q \geq 3$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < \frac{1}{2}$ si et seulement si $p + q \geq 9$ et $(p,q) \neq (3,6), (6,3)$.*

On pose $\pi = \sigma_{\ell-1}\sigma_{\ell-2}$, le produit avec lequel calcule la page 6, et, pour $(r,u)$ donné, $a = \varphi(r, u(\ell-1))$ et $b = \varphi(r, u(\ell))$.

**Lemme 23.1.** *$\sigma_{\ell-2}$ et $\sigma_{\ell-1}$ sont des involutions ; par suite $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1} = \pi^{-1}$.*

*Démonstration.* Pour $\sigma_{\ell-2}$, c'est $\tau^2 = \mathrm{id}$. Pour $\sigma_{\ell-1}$, posons $s = \varphi(r,i)$ avec $i = u(\ell)$ ; par a), $\varphi(sr, i) = s\, s\, s^{-1} = s$, de sorte que $\sigma_{\ell-1}^2(r,u) = (s^2 r, u) = (r,u)$. Alors $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1} = \sigma_{\ell-2}^{-1}\sigma_{\ell-1}^{-1} = (\sigma_{\ell-1}\sigma_{\ell-2})^{-1}$. □

**Lemme 23.2.** *On a $\pi(r,u) = \big(a\, r,\ u \circ \tau\big)$ ; pour tout $g \in W$, $\pi^2(gr,u) = (g\, ab\, r, u)$ ; et, pour tout entier $m \geq 0$, $\pi^{2m}(r,u) = \big((ab)^m r,\ u\big)$ et la seconde composante de $\pi^{2m+1}(r,u)$ est différente de $u$.*

*Démonstration.* Comme $(u \circ \tau)(\ell) = u(\ell-1)$, $\pi(r,u) = \sigma_{\ell-1}(r, u\circ\tau) = (ar, u \circ \tau)$. Pour $g \in W$, a) donne $\varphi(gr, u(\ell-1)) = gag^{-1}$, d'où $\pi(gr,u) = (gar, u \circ \tau)$ ; puis, $(u\circ\tau)(\ell-1) = u(\ell)$ et $(u\circ\tau)\circ\tau = u$, et a) donne $\varphi(gar, u(\ell)) = (ga)\, b\, (ga)^{-1}$, d'où $\pi(gar, u\circ\tau) = (gabr, u)$. La formule pour $\pi^{2m}$ s'en déduit par récurrence, en appliquant la précédente à $g = (ab)^m$. Enfin $\pi^{2m+1}(r,u) = \pi\big((ab)^m r, u\big)$ a pour seconde composante $u \circ \tau$, et $(u\circ\tau)(\ell) = u(\ell-1) \neq u(\ell)$ puisque $u$ est injective. □

**Lemme 23.3.** *Pour tout entier $k \geq 0$, $\pi^k(r,u) = (r,u)$ si et seulement si $2\, n_{u(\ell-1),\, u(\ell)}$ divise $k$.*

*Démonstration.* Si $k = 2m$ est pair, $\pi^k(r,u) = ((ab)^m r, u)$ par le lemme 23.2 ; l'action étant libre, c'est $(r,u)$ si et seulement si $(ab)^m = 1$, c'est-à-dire si et seulement si $\mathrm{ord}(ab)$ divise $m$, soit $2\,\mathrm{ord}(ab)$ divise $k$. Si $k$ est impair, $\pi^k(r,u) \neq (r,u)$ par le même lemme, et $2\,\mathrm{ord}(ab)$ ne divise pas $k$. Enfin $ab = \varphi(r, u(\ell-1))\varphi(r, u(\ell))$ est d'ordre $n_{u(\ell-1),u(\ell)}$ par le lemme suivant, qui assure que cet ordre ne dépend pas de $r$. □

**Lemme 23.4.** *L'ordre de $\varphi(r,i)\varphi(r,j)$ ne dépend pas de $r \in R$. Et pour $i \neq j$ dans $I$, il existe $u \in \mathrm{Rep}'(I)$ avec $u(\ell-1) = i$ et $u(\ell) = j$.*

*Démonstration.* Soient $r, r' \in R$ ; par transitivité, $r' = wr$ pour un $w \in W$, et par a), $\varphi(r', i)\varphi(r', j) = w\,\varphi(r, i)\varphi(r, j)\,w^{-1}$, qui est conjugué de $\varphi(r, i)\varphi(r, j)$ et a donc le même ordre. Pour la seconde assertion, partons d'une bijection $e : [1, \ell] \to I$, qui existe puisque $I$ a $\ell$ éléments. On la compose à gauche par la transposition de $e(\ell - 1)$ et de $i$, pour obtenir $u_1$ avec $u_1(\ell - 1) = i$, puis par la transposition de $u_1(\ell)$ et de $j$. Comme $u_1(\ell) \neq i$ et $j \neq i$, cette seconde transposition fixe $i$, et la bijection obtenue envoie $\ell - 1$ sur $i$ et $\ell$ sur $j$. □

*Démonstration de la proposition.* Par le lemme 23.1, $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1}$ a le même ordre que $\pi$. Montrons que $\pi^k = \mathrm{id}$ si et seulement si $2n_{ij}$ divise $k$ pour tous $i \neq j$. Si $\pi^k = \mathrm{id}$ et $i \neq j$, prenons $u$ comme au lemme 23.4 et un $r$ quelconque de $R$, qui n'est pas vide : le lemme 23.3 en $(r, u)$ donne $2n_{ij} \mid k$. Réciproquement, pour tout $(r, u)$, les indices $u(\ell-1)$ et $u(\ell)$ sont distincts, et le lemme 23.3 donne $\pi^k(r, u) = (r, u)$. Or $2n_{ij} \mid k$ pour tous $i \neq j$ équivaut à $2\nu \mid k$ : si c'est le cas pour tous, $k$ est pair, puisqu'il existe au moins un couple $i \neq j$, et $k/2$ est un multiple commun des $n_{ij}$, donc de $\nu$ ; la réciproque vient de ce que chaque $n_{ij}$ divise $\nu$. Ainsi $\{k \mid \pi^k = \mathrm{id}\} = 2\nu\,\mathbf{Z}$, et l'ordre de $\pi$ est $2\nu$. □

*Démonstration de l'arithmétique de (6).* Pour $p, q \geq 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$, $= \frac{1}{2}$, $< \frac{1}{2}$ équivalent respectivement à $pq < 2(p + q)$, $pq = 2(p + q)$, $pq > 2(p + q)$, c'est-à-dire à $(p - 2)(q - 2) < 4$, $= 4$, $> 4$. Si $p \geq 7$, $pq < 2(p + q)$ entraîne $q \leq 2$, et symétriquement ; hors de ces cas, il reste un nombre fini de couples avec $p, q \leq 6$, qu'on examine un à un. Pour (1), $p = 2$ ou $q = 2$ donnent $0 < 4$ ; $p = 1$ n'est permis qu'avec $q = 2$, et $q = 1$ qu'avec $p = 2$ ; pour $p, q \geq 3$, $(p - 2)(q - 2) \in \{1, 2, 3\}$ laisse exactement $(3, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(3, 5)$, $(5, 3)$. Pour (2), $p$ ou $q$ égal à $1$ ou $2$ est exclu, puisque $(p - 2)(q - 2)$ vaut alors $0$, ou $2 - q$ ou $2 - p$, qui est au plus $1$ ; pour $p, q \geq 3$, $(p-2)(q-2) = 4$ donne $(3, 6)$, $(4, 4)$, $(6, 3)$. Pour (3), les couples $p, q \geq 3$ qui ne vérifient pas $(p - 2)(q - 2) > 4$ sont les huit couples obtenus en (1) et (2). Six d'entre eux, les cinq de (1) et $(4, 4)$, sont exactement les couples $p, q \geq 3$ de somme au plus $8$ ; les deux autres, $(3, 6)$ et $(6, 3)$, sont de somme $9$. Un couple $p, q \geq 3$ vérifie donc $(p - 2)(q - 2) > 4$ si et seulement si $p + q \geq 9$ et $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$. □

*Remarque.* La proposition demande seulement un groupe $W$ opérant librement et transitivement sur $R$ et une application $\varphi$ vérifiant a) et $\varphi(r, i)^2 = 1$. Que $W$ soit un groupe de Weyl, la condition b), la présentation c) et le graphe de Coxeter d) n'interviennent pas.

*Remarque.* La finitude de $W$ n'intervient pas : avec la convention adoptée pour l'ordre, la formule $2\nu$ vaut encore quand un $n_{ij}$ est infini.

*Remarque.* La page 14 écrit la condition $(c_2)$ « $p + q \geqslant 10$ ou $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$ » ; la forme juste, que la lecture rétablit et qui est démontrée en (3), est $p + q \geq 9$ *et* $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$.

*Remarque.* La répartition des types $(p, q)$ en sphériques, euclidiens et hyperboliques selon le signe de $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{2}$ figure au chapitre 8 de Coxeter et Moser (1957) [19]. La réalisation de toute carte de type $(p, q)$ comme quotient de la carte universelle par un sous-groupe du groupe triangulaire, régulière si et seulement si le sous-groupe est distingué, est due à Jones et Singerman (1978) [31]. L'inventaire date le groupe de cotes « 1976-[vers 1986] ».

*Remarque.* Dans la lecture, la présentation de Coxeter du groupe cartographique, $\widehat{\Gamma} = \langle \sigma_0, \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_i^2,\ (\sigma_0\sigma_2)^2 \rangle$, est une définition reprise de l'*Esquisse d'un programme*. Elle n'appelle pas de démonstration.

Ne sont pas démontrés ici : l'application $\mathrm{Aut}(\Sigma) \to \mathrm{Aut}(\Phi(\Sigma))$ (pages 3 et 4) ; les autres relations entre les $\sigma_i$ ; la triangulation de la sphère ; les articles (1) à (5) et (7) ; le contenu géométrique de (6).

# 24 Cote 73 : les aires des oreilles d'un polygone plan[25]

La cote 73, *Polygones : notes manuscrites (s.d.), lettre (s.d.)*, vingt-huit pages que l'inventaire date « [à partir de 1976] », étudie l'application qui envoie un polygone plan, donné par ses côtés $u_i = s_{i+1} - s_i$, sur les aires algébriques doublées de ses « oreilles », les triangles $s_{i-1}s_is_{i+1}$ : $\mu_i = u_{i-1} \wedge u_i$. La page 5 traite le quadrilatère fermé. Elle établit $\mu_0 + \mu_2 = \mu_1 + \mu_3$, écrit « $\mathbf{M}_4 \to \mathbf{P}^2_{\mathbf{Z}}$ mono », puis « épi ? », donne les formules inverses et conclut « $\mathbf{M}_4 \simeq \mathbf{P}^2_{\mathbf{Z}}$ » ; elle encadre $u_2 = 0 \Leftrightarrow \mu_2 = \mu_3 = 0$ (73, lot 1, p. 5). La page 6 parle de « l'enveloppe projective de $A$ », l'ensemble des arêtes (73, lot 1, p. 6). Les pages 14 et 15 écrivent la relation des multiplicateurs de Lagrange et encadrent la formule close $\lambda_i u_{i-1} u_i = -\lambda_0 u_{-1} u_{1i} + \lambda_1 u_1 u_{0i}$ (73, lot 1, p. 15). La page 18 pose $\lambda_0 = 0$ et dessine un ennéagone étoilé (73, lot 1, p. 18). Le bas de la page 28 énonce, pour le « cas spécial II », un critère : « a) $\sum u_i = 0$ ; b) $u_{i-1}, u_i \parallel u_1, u_{0i}$ », précédé d'un « il faut et il suffit » lu avec doute, et ajoute que les $i$ tels que $\lambda_i = 0$ sont ceux pour lesquels $s_i = s_0$ (73, lot 2, p. 28).

*Conventions.* $k$ est un corps et $V = k^2$, muni de la forme volume $a \wedge b = a_0 b_1 - a_1 b_0$. Une application affine agit sur les côtés par sa partie linéaire, une matrice $M$ d'ordre $2$. Pour un quadrilatère, les indices sont pris modulo $4$ ; il est fermé quand $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = 0$, et aligné quand tous les $u_i \wedge u_j$ sont nuls. Pour un $n$-gone, $n \geq 3$, les côtés sont indexés par $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ et $u_{0i} = u_0 + \cdots + u_{i-1} = s_i - s_0$. Comme la lecture, on lit la juxtaposition $u\,v$ de la page comme le produit $u \cdot v$ dans le carré symétrique $\mathrm{Sym}^2 V$, identifié à $k^3$ par $a \cdot b = (a_0 b_0,\ a_0 b_1 + a_1 b_0,\ a_1 b_1)$ : ce sont les coefficients de la forme quadratique $(a_0 X + a_1 Y)(b_0 X + b_1 Y)$. L'espace $N(u_*)$ des multiplicateurs est celui des $(\lambda_i) \in k^{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}$ tels que

$$(*) \qquad \lambda_i u_{i-1} - \lambda_{i+1}(u_i + u_{i+1}) + \lambda_{i+2} u_{i+2} = 0 \qquad \text{pour tout } i.$$

**Théorème 24.1** (Grothendieck, pages 5 et 6, les quadrilatères forment un plan projectif ♦). *Soient $u = (u_0, u_1, u_2, u_3)$ et $u'$ deux quadrilatères fermés de $V$.*

1. *On a $u_0 \wedge u_2 = \mu_0 - \mu_1 = \mu_3 - \mu_2$ et $u_1 \wedge u_3 = \mu_1 - \mu_2 = \mu_0 - \mu_3$ ; donc $\mu_0 + \mu_2 = \mu_1 + \mu_3$, et $u$ est aligné si et seulement si tous les $\mu_i$ sont nuls. Ces identités valent sur tout anneau commutatif.*

2. *Une matrice $M$ multiplie tous les $\mu_i$ par $\det M$. Si $u$ n'est pas aligné, les $\mu_i(u')$ sont proportionnels aux $\mu_i(u)$, de rapport non nul, si et seulement s'il existe $M$ inversible avec $u'_i = M u_i$ pour tout $i$ ; on peut prendre $\det M$ égal au rapport.*

3. *Tout $(m_0, m_1, m_2, m_3) \neq 0$ tel que $m_0 + m_2 = m_1 + m_3$ est le vecteur $(\mu_i)$ d'un quadrilatère fermé.*

4. *Si $u$ n'est pas aligné, $u_i = 0$ équivaut à $\mu_i = \mu_{i+1} = 0$, et alors $(\mu_j) = \mu_{i+2}\, p_i$ avec $\mu_{i+2} \neq 0$, où $p_0 = (0,0,1,1)$, $p_1 = (1,0,0,1)$, $p_2 = (1,1,0,0)$, $p_3 = (0,1,1,0)$.*

5. *La seule relation linéaire entre les $p_i$ est $p_0 - p_1 + p_2 - p_3 = 0$ : trois quelconques d'entre eux sont indépendants, et les quatre forment un repère projectif du plan $\Pi = \{m_0 + m_2 = m_1 + m_3\}$. L'application linéaire $e_i \mapsto (-1)^i p_i$ induit un isomorphisme $k^4/k \cdot (1,1,1,1) \simeq \Pi$.*

*Ainsi les quadrilatères fermés non alignés, à transformation affine près, sont en bijection avec les points du plan projectif $\mathbf{P}(\Pi) \simeq \mathbf{P}\big(k^A/k \cdot (1,1,1,1)\big)$, et la droite de l'arête $i$ y est le quadrilatère où cette arête est réduite à un point.*

[25] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder73.lean`.

*Démonstration.* 1. On remplace $u_3$ par $-(u_0+u_1+u_2)$ et l'on développe : les quatre identités sont polynomiales en les coordonnées. Elles expriment les six produits $u_i \wedge u_j$ par les $\mu_i$, qui sont les produits de côtés consécutifs ; si les $\mu_i$ sont nuls, tous les $u_i \wedge u_j$ le sont.

2. $Ma \wedge Mb = \det M\,(a \wedge b)$. Pour la réciproque, supposons d'abord $\mu_1(u) \neq 0$ : $u_0, u_1$ est une base de $V$. La formule de Cramer $(a \wedge b)\,x = (x \wedge b)\,a + (a \wedge x)\,b$, appliquée à $u_0, u_1, u_2$, donne avec la première identité la carte de la page 5 :

$$\mu_1 u_2 = -\mu_2 u_0 + (\mu_3 - \mu_2) u_1.$$

Soit $M$ l'endomorphisme qui envoie $u_0, u_1$ sur $u'_0, u'_1$. Si $\mu(u') = c\,\mu(u)$ avec $c \neq 0$, la carte de $u'$, divisée par $c$, s'écrit $\mu_1 u'_2 = -\mu_2 M u_0 + (\mu_3 - \mu_2) M u_1 = \mu_1 M u_2$, d'où $u'_2 = M u_2$, puis $u'_3 = M u_3$ par fermeture. Enfin $\det M \cdot \mu_1 = \mu_1(u') = c\,\mu_1$ donne $\det M = c$. Si c'est un autre $\mu_i$ qui est non nul, on se ramène à ce cas par permutation circulaire des indices, qui préserve la fermeture et décale les $\mu_i$.

3. Si $m_1 \neq 0$, le quadrilatère $u_0 = (m_1, 0)$, $u_1 = (0, 1)$, $u_2 = (-m_2, (m_3 - m_2)/m_1)$, $u_3 = -(u_0+u_1+u_2)$ a $\mu_1 = m_1$, $\mu_2 = m_2$, $\mu_3 = m_3$, et $\mu_0 = m_1 + m_3 - m_2 = m_0$ par la relation. Sinon on décale les indices.

4. Si $u_i = 0$, les deux oreilles qui contiennent $u_i$ sont plates, et la relation du point 1 donne $\mu_{i+2} = \mu_{i+3}$ ou son analogue, d'où $(\mu_j) = \mu_{i+2}\,p_i$ ; si $\mu_{i+2}$ était nul, tous les $\mu_j$ le seraient. Réciproquement, ramenons-nous par décalage à $i = 1$, et supposons $\mu_1 = \mu_2 = 0$ et $u_1 \neq 0$. La formule de Cramer pour $u_0, u_1, u_2$ se réduit à $(u_0 \wedge u_2)\,u_1 = 0$, donc $u_0 \wedge u_2 = 0$, et le point 1 donne $\mu_0 = \mu_1 = 0$ et $\mu_3 = \mu_2 = 0$ : le quadrilatère est aligné.

5. $\sum c_i p_i = (c_1 + c_2,\ c_2 + c_3,\ c_0 + c_3,\ c_0 + c_1)$, qui est nul si et seulement si $c$ est multiple de $(1, -1, 1, -1)$ ; un tel $c$ avec une composante nulle est nul. L'application $c \mapsto \sum (-1)^i c_i p_i = (c_2 - c_1,\ c_2 - c_3,\ c_0 - c_3,\ c_0 - c_1)$ a pour noyau les vecteurs constants, et pour image $\Pi$ : un point $m$ de $\Pi$ est l'image de $(m_2,\ m_2 - m_3,\ m_2 - m_3 + m_0,\ m_2 - m_3 + m_0 - m_1)$. □

*Remarque.* La deuxième ligne du tableau de la page 5, $u_1 \wedge u_3 = \mu_0 - \mu_2$, que la lecture reprend, est fausse : le quadrilatère $u = (e_1, e_2, e_2, -e_1 - 2e_2)$ a $u_1 \wedge u_3 = 1$ et $\mu_0 - \mu_2 = 2$. La valeur juste, $\mu_1 - \mu_2 = \mu_0 - \mu_3$, est celle que la quatrième ligne de la même page donne pour $u_3 \wedge u_1$ ; à la troisième ligne, la première valeur donnée pour $u_2 \wedge u_0$, $\mu_1 - \mu_3$, est fausse aussi (il faut $\mu_2 - \mu_3$), la seconde, $\mu_1 - \mu_0$, est juste. Le reste de la lecture n'en dépend pas : la relation $\mu_0 + \mu_2 = \mu_1 + \mu_3$ ne vient que de $u_0 \wedge u_2$. L'identification canonique du point 5 demande un signe : l'application $e_i \mapsto p_i$ a pour noyau $k \cdot (1, -1, 1, -1)$, et c'est $e_i \mapsto (-1)^i p_i$ qui a pour noyau $k \cdot (1, 1, 1, 1)$ ; les droites, donc les points du plan projectif, sont les mêmes. Le fichier démontre l'énoncé sur un corps, les identités sur tout anneau commutatif ; l'isomorphisme de schémas sur $\operatorname{Spec} \mathbf{Z}$ que suggère l'indice de $\mathbf{P}^2_{\mathbf{Z}}$ n'est pas formalisé.

**Lemme 24.2** (paire de directions)**.** *Soient $a, b, c, d$ des vecteurs non nuls de $V$. Le produit $c \cdot d$ est multiple de $a \cdot b$ dans $\operatorname{Sym}^2 V$ si et seulement si $\{[a], [b]\} = \{[c], [d]\}$ comme paires de droites, c'est-à-dire si $a \wedge c = b \wedge d = 0$ ou $a \wedge d = b \wedge c = 0$.*

*Démonstration.* Si $c \cdot d = t\,a \cdot b$, alors $t \neq 0$, car un produit de vecteurs non nuls n'est pas nul. Évaluons les formes quadratiques en $x = (y_1, -y_0)$, orthogonal à $y$ : $a \cdot b$ y vaut $(a \wedge y)(b \wedge y)$. Pour $y = a, b, c, d$ on obtient

$$(a \wedge c)(a \wedge d) = 0, \quad (b \wedge c)(b \wedge d) = 0, \quad (a \wedge c)(b \wedge c) = 0, \quad (a \wedge d)(b \wedge d) = 0.$$

Si $a \wedge c \neq 0$, la première et la troisième donnent $a \wedge d = b \wedge c = 0$. Si $a \wedge c = 0$ et $b \wedge d \neq 0$, la deuxième et la quatrième donnent encore $b \wedge c = a \wedge d = 0$. Réciproquement, $a \wedge c = 0$ avec $a \neq 0$ donne $c = \alpha a$, et de même pour les autres paires ; alors $c \cdot d = \alpha\beta\, a \cdot b$. □

**Théorème 24.3** (Grothendieck, pages 15, 18 et 28, critère du cas spécial II ♦). *Soient $n \geq 3$ et $u_* = (u_i)_{i \in \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}$ une suite de vecteurs non nuls de $V$. Il existe $\lambda \in N(u_*)$ avec $\lambda_0 = 0$ et $\lambda_1 = 1$ si et seulement si*

*a) $\sum u_i = 0$, et*

*b) pour $2 \leq i \leq n-1$, ou bien $s_i = s_0$, c'est-à-dire $u_{0i} = 0$, ou bien la paire de directions de $\{u_{i-1}, u_i\}$ est celle de $\{u_1, u_{0i}\}$.*

*Un tel $\lambda$ est alors unique, il vérifie $\lambda_i\, u_{i-1} \cdot u_i = u_1 \cdot u_{0i}$ pour tout $i \geq 1$, et $\lambda_i = 0$ si et seulement si $s_i = s_0$. Enfin un multiplicateur qui a deux composantes consécutives nulles est nul ; c'est ce qui permet de normaliser $\lambda_1 = 1$ dès que $\lambda_0 = 0$.*

*Démonstration.* Posons $L_i = \lambda_i u_{i-1} - \lambda_{i+1} u_{i+1}$. La relation $(*)$ en $i$ est $L_i - L_{i+1} = 0$ : $(*)$ pour tout $i$ dit que $L_i$ ne dépend pas de $i$, et, avec $\lambda_0 = 0$, $\lambda_1 = 1$, que $L_i = L_0 = -u_1$ pour tout $i$. Notons $(S_i)$ l'identité $\lambda_i\, u_{i-1} \cdot u_i = u_1 \cdot u_{0i}$, pour $i \geq 1$ entier, les indices de $u$ et $\lambda$ étant lus modulo $n$. $(S_1)$ est $u_0 \cdot u_1 = u_1 \cdot u_0$. Si $(S_i)$ a lieu et que $L_i = -u_1$, c'est-à-dire $\lambda_{i+1} u_{i+1} = \lambda_i u_{i-1} + u_1$, on multiplie par $u_i$ :

$$\lambda_{i+1}\, u_i \cdot u_{i+1} = \lambda_i\, u_{i-1} \cdot u_i + u_1 \cdot u_i = u_1 \cdot (u_{0i} + u_i) = u_1 \cdot u_{0,i+1},$$

qui est $(S_{i+1})$. Réciproquement, $(S_i)$ et $(S_{i+1})$ donnent $u_i \cdot (\lambda_i u_{i-1} - \lambda_{i+1} u_{i+1} + u_1) = 0$, d'où $L_i = -u_1$ puisque $u_i \neq 0$ et qu'un produit de deux vecteurs n'est nul que si l'un l'est. Ainsi $(*)$ équivaut à $(S_i)$ pour tout $i \geq 1$.

Si $\lambda$ existe, $(S_n)$ s'écrit $0 = \lambda_0\, u_{n-1} \cdot u_0 = u_1 \cdot \sum_j u_j$, d'où a) ; et pour $2 \leq i \leq n-1$ avec $u_{0i} \neq 0$, $(S_i)$ dit que $u_1 \cdot u_{0i}$ est multiple de $u_{i-1} \cdot u_i$, d'où b) par le lemme 24.2. Réciproquement, sous a) et b), le lemme donne pour chaque $2 \leq i \leq n-1$ un scalaire $\lambda_i$ avec $\lambda_i\, u_{i-1} \cdot u_i = u_1 \cdot u_{0i}$ ($\lambda_i = 0$ si $u_{0i} = 0$) ; avec $\lambda_0 = 0$ et $\lambda_1 = 1$, les identités $(S_1), \ldots, (S_n)$ ont lieu, $(S_n)$ par a). Comme $u_{0,i+n} = \sum_j u_j + u_{0i} = u_{0i}$, $(S_{i+n})$ équivaut à $(S_i)$, et toutes ont lieu : $\lambda \in N(u_*)$.

Pour $i \geq 1$, $(S_i)$ donne $\lambda_i = 0$ si et seulement si $u_1 \cdot u_{0i} = 0$, si et seulement si $u_{0i} = 0$, et détermine $\lambda_i$ puisque $u_{i-1} \cdot u_i \neq 0$ ; tout indice modulo $n$ est de la forme $i \geq 1$, d'où l'unicité. Enfin, si $\lambda_i = \lambda_{i+1} = 0$, $(*)$ en $i$ se réduit à $\lambda_{i+2} u_{i+2} = 0$, donc $\lambda_{i+2} = 0$, et de proche en proche $\lambda = 0$. □

*Remarque.* Le critère tient tel que la lecture l'énonce : le « il faut et il suffit » lu avec doute à la page 28 est juste. La démonstration est celle de la lecture, qui est de l'édition. Elle n'utilise aucune hypothèse sur le corps : l'hypothèse « $k$ infini » du théorème de la page 28 ne sert qu'à l'exhaustivité des quatre cas, qui n'est pas en jeu ici. La formule $\lambda_i\, u_{i-1} \cdot u_i = u_1 \cdot u_{0i}$ vaut pour tout $i \geq 1$ et pas seulement pour $2 \leq i \leq n-1$ ; c'est le cas $\lambda_0 = 0$, $\lambda_1 = 1$ de la formule close encadrée de la page 15. La paire de directions est la reformulation, par la lecture, du « $u_{i-1}, u_i \parallel u_1, u_{0i}$ » de la page ; le lemme 24.2 montre que c'est bien ce que dit la proportionnalité dans $\mathrm{Sym}^2 V$.

Ne sont pas démontrés ici : le théorème de la page 28 lui-même, avec $\dim N(u_*) \leq 2$, le cas hyperspécial ($n \equiv 0 \pmod 3$, triangle parcouru $n/3$ fois) et la dichotomie selon les hyperplans de coordonnées, qui est une autre piste de l'onglet Findings ; l'interprétation de $N(u_*)$ comme

espace conormal de l'application « aires des oreilles » sur les polygones fermés ; l'équation du second degré du pentagone (page 19) et la formule de Gauss ; l'ennéagone de la page 18, dont la lecture vérifie numériquement que $N(u_*)$ est une droite ; le foncteur $\mathrm{Polg}_n$ de la page 1 ; l'énoncé du plan projectif sur $\mathrm{Spec}\,\mathbf{Z}$.

## 25 Cote 74 : complexes cubiques généralisés, la réduction à un carré latin et à ses revêtements doubles[26]

La cote 74, *Complexes cubiques : notes manuscrites (s.d.)*, cent trente-cinq pages que l'inventaire date « [à partir de 1976] », tourne autour du graphe des vingt-sept droites d'une surface cubique. La liasse qui commence page 92 porte le titre « Complexes cubiques généralisés (complexes *triadiques* ou *trilatères* ?) ». Elle pose deux axiomes sur un graphe $S$ : toute arête est contenue dans un unique triangle (axiome 1), et tout sommet hors d'un triangle est lié à un sommet de ce triangle (axiome 2). Elle fixe un triangle $t_0 = \{a, b, c\}$ et décompose le graphe autour de lui (74, lot 5, p. 92). Les pages 93 à 96 établissent les propositions 1 à 4 et la « Scholie » : le graphe se résume à trois ensembles $\widetilde{E}_\alpha$ munis d'involutions sans point fixe et à une partie $\widetilde{T}$ de leur produit, soumise aux conditions (*) et (**). Une troisième condition, notée (***), est écrite en travers de la marge gauche, encadrée, tournée de 90°, et rattachée par une accolade à (*) et (**). La transcription en lit le début, « si $(s_\alpha)_{\alpha\in t_0} \in \prod \widetilde{E}_\alpha$ et $(t_\alpha)_{\alpha\in t_0} \in \widetilde{T}$ tels que $s_\beta = \varphi_\beta(t_\alpha)$ … $\forall\, \alpha, \beta,\ \alpha \neq \beta$ », et la fin est illisible (74, lot 5, p. 96). La page 97 affirme que des données vérifiant (*) donnent un graphe qui vérifie l'axiome 1 et l'axiome 2 pour $t_0$ (74, lot 5, p. 97). Les pages 98 à 100 traitent l'axiome 2 pour les autres triangles : proposition 5 pour les triangles verticaux, axiome 3 (les $\widetilde{E}_\alpha$ sont non vides), proposition 6, barrée mais lisible, pour les triangles supérieurs (74, lot 5, p. 100). La page 101 reprend la liste des données avec, en ($\gamma$), « l'axiome (Ka) plus haut ». Elle passe aux quotients $\Gamma = \widetilde{\Gamma}/\sigma$, $E_\alpha = \widetilde{E}_\alpha/\sigma_\alpha$ (74, lot 6, p. 101). La page 102 énonce l'axiome $\beta_\Gamma$, « $\Gamma \to E_\alpha \times E_\beta$ est *bijectif* », et partage la classification en deux questions, I) les systèmes de trois quotients vérifiant $\beta_\Gamma$, II) leurs revêtements d'ordre 2, puis ceux qui satisfont (Ka) (74, lot 6, p. 102, 74, lot 6, p. 103). La page 116 étudie, sur la relation $xyz = 1$ d'un groupe $G$, les applications $\varphi_a$ et conclut que tout élément est d'ordre 2 (74, lot 6, p. 116).

*Conventions.* Un graphe est sans boucle ni arête multiple ; un triangle est un ensemble de trois sommets deux à deux liés. On indexe $t_0$ par $\{0, 1, 2\}$, $t_0 = \{t_0(\alpha)\}$. Pour $\alpha \in t_0$, $\widetilde{E}_\alpha$ est l'ensemble des sommets hors de $t_0$ liés à $t_0(\alpha)$. Un triangle supérieur est un triplet $x = (x_\alpha)$ avec $x_\alpha \in \widetilde{E}_\alpha$ et les $x_\alpha$ deux à deux liés ; leur ensemble est $\widetilde{\Gamma}$ (le $\widetilde{T}$ de la page 96). Pour des données abstraites $(\widetilde{E}_\alpha, \sigma_\alpha, \widetilde{T})$, deux points $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$, $\alpha \neq \beta$, sont *liés* s'il existe $\tau \in \widetilde{T}$ avec $\tau_\alpha = s$ et $\tau_\beta = u$. Le graphe des données a pour sommets $t_0 \amalg \coprod_\alpha \widetilde{E}_\alpha$ et pour arêtes celles de 2°) $\alpha$) à $\delta$) de la page 96 : deux sommets de $t_0$, $t_0(\alpha)$ et les points de $\widetilde{E}_\alpha$, $s$ et $\sigma_\alpha s$, deux points liés. Les conditions sur les données sont :

(*) deux éléments de $\widetilde{T}$ qui ont deux coordonnées communes sont égaux ;

($\beta_{\widetilde{\Gamma}}$) pour $\alpha \neq \beta$, $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$, un et un seul des deux points $s$, $\sigma_\alpha s$ est lié à $u$ (c'est la forme de la page 101, qui contient (**)) ;

(Ka) pour $\{\alpha, \beta, \gamma\} = t_0$ et $\tau, \rho_1, \rho_2 \in \widetilde{T}$ tels que $\tau_\alpha = (\rho_1)_\alpha$, $\tau_\beta = (\rho_2)_\beta$ et $(\rho_1)_\gamma = (\rho_2)_\gamma$, on a $\tau = \rho_1$.

[26] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder74.lean`.

La condition (Ka) ainsi écrite est une restitution. Elle porte sur une famille $(s_\alpha)$ et trois triplets de $\widetilde{T}$, chacun contenant deux des $s_\alpha$, comme le début lisible de la marge. On note (Ka′) la forme qui garde la phrase de la marge et la complète par la conclusion $(s_\alpha) \in \widetilde{T}$ : si $(s_\alpha) \in \prod \widetilde{E}_\alpha$ et $(t_\alpha) \in \widetilde{T}^{t_0}$ vérifient $(t_\alpha)_\beta = s_\beta$ pour $\alpha \neq \beta$, alors $(s_\alpha) \in \widetilde{T}$.

**Énoncé** (Pages 92 à 99, autour d'un triangle ♦). *Soit $S$ un graphe vérifiant les axiomes 1 et 2, et $t_0$ un triangle de $S$.*

1. *(Page 92, (1)) Tout sommet hors de $t_0$ est lié à un et un seul sommet de $t_0$ ; les $\widetilde{E}_\alpha$ sont disjoints et recouvrent $S \smallsetminus t_0$.*
2. *(Prop. 1) Pour $s \in \widetilde{E}_\alpha$, le troisième sommet $\sigma_\alpha s$ du triangle de l'arête $\{t_0(\alpha), s\}$ est dans $\widetilde{E}_\alpha$, et c'est le seul point lié à la fois à $t_0(\alpha)$ et à $s$. L'application $\sigma_\alpha$ est une involution sans point fixe de $\widetilde{E}_\alpha$.*
3. *(Prop. 2 et 5) Pour $\beta \neq \alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$, $u$ est lié à un et un seul des points $s$, $\sigma_\alpha s$.*
4. *(Prop. 3 et 4) Si $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$, $\alpha \neq \beta$, sont liés, le troisième sommet du triangle de l'arête $\{s, u\}$ est dans $\widetilde{E}_\gamma$, $\gamma$ le troisième indice ; il existe donc un triangle supérieur $x$ avec $x_\alpha = s$, $x_\beta = u$, et il est unique.*
5. *(Page 98, corollaires) Si $s$ et $u$ sont liés, $\sigma_\alpha s$ et $\sigma_\beta u$ le sont ; $\widetilde{\Gamma}$ est stable par $\sigma = \prod_\alpha \sigma_\alpha$, qui y est sans point fixe.*

**Énoncé** (Pages 99, 101 et 102, le carré latin et les revêtements doubles ♦). *Sous les mêmes hypothèses, soient $E_\alpha = \widetilde{E}_\alpha/\sigma_\alpha$, $\Gamma = \widetilde{\Gamma}/\sigma$ et $\varphi_\alpha : \Gamma \to E_\alpha$ l'application induite par $x \mapsto x_\alpha$.*

1. *(Axiome $\beta_\Gamma$) Pour $\alpha \neq \beta$, l'application $(\varphi_\alpha, \varphi_\beta) : \Gamma \to E_\alpha \times E_\beta$ est bijective : $\Gamma$ est un carré latin sur les trois $E_\alpha$.*
2. *(Page 101) Pour tout $\alpha$, l'application $x \mapsto (\bar{x}, x_\alpha)$ est une bijection de $\widetilde{\Gamma}$ sur le produit fibré $\Gamma \times_{E_\alpha} \widetilde{E}_\alpha$ : $\widetilde{\Gamma}$ est l'image inverse du revêtement double $\widetilde{E}_\alpha \to E_\alpha$ par $\varphi_\alpha$.*
3. *(Page 102) Les composés $\psi_{\beta\alpha} : \Gamma \times_{E_\alpha} \widetilde{E}_\alpha \to \Gamma \times_{E_\beta} \widetilde{E}_\beta$ de ces bijections sont des isomorphismes au-dessus de $\Gamma$, et forment un système transitif : $\psi_{\gamma\beta} \circ \psi_{\beta\alpha} = \psi_{\gamma\alpha}$, $\psi_{\alpha\alpha} = \mathrm{id}$.*
4. *(Pages 99 et 104) $|\widetilde{E}_\alpha| = 2\,|E_\alpha|$, $|\widetilde{\Gamma}| = 2\,|\Gamma|$, et $|\Gamma| = |E_\alpha|\,|E_\beta|$ pour $\alpha \neq \beta$. Si $\widetilde{E}_\alpha$ est non vide, $E_\beta$ et $E_\gamma$ sont en bijection.*

**Théorème 25.1** (Grothendieck, pages 96–100, la Scholie et sa réciproque ♦). *1. (Scholie) Le graphe $S$ est isomorphe au graphe de ses données $(\widetilde{E}_\alpha, \sigma_\alpha, \widetilde{\Gamma})$, et ces données vérifient (*), $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$ et (Ka).*

2. *(Réciproque) Pour des données vérifiant $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$ et (Ka), le graphe des données vérifie les axiomes 1 et 2, et $t_0$ en est un triangle. Ses triangles supérieurs sont les éléments de $\widetilde{T}$ : trois points deux à deux liés hors de $t_0$ sont les trois coordonnées d'un $\tau \in \widetilde{T}$.*
3. *Pour des données vérifiant (*) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$, le graphe vérifie l'axiome 1 si et seulement si (Ka) est vraie.*
4. *(Ka) entraîne (*), et (Ka) équivaut à la conjonction de (*) et de (Ka′).*

**Énoncé** (Pages 101 à 103, problèmes I et II ♦). *Soient $\Gamma$ un ensemble, $\varphi_\alpha : \Gamma \to E_\alpha$ ($\alpha \in t_0$) trois applications vérifiant $\beta_\Gamma$, $p_\alpha : \widetilde{E}_\alpha \to E_\alpha$ trois revêtements doubles, c'est-à-dire des applications dont les fibres sont les orbites d'une involution sans point fixe $\sigma_\alpha$, et $\widetilde{\Gamma}$ un ensemble muni de $\pi : \widetilde{\Gamma} \to \Gamma$ et de $\psi_\alpha : \widetilde{\Gamma} \to \widetilde{E}_\alpha$ tels que $p_\alpha\psi_\alpha = \varphi_\alpha\pi$ et que $(\pi, \psi_\alpha) : \widetilde{\Gamma} \to \Gamma \times_{E_\alpha} \widetilde{E}_\alpha$ soit bijective pour tout $\alpha$. Alors les données $(\widetilde{E}_\alpha, \sigma_\alpha, \widetilde{T})$, $\widetilde{T}$ l'image de $(\psi_\alpha)_\alpha$, vérifient (*) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$. Si elles vérifient (Ka), leur graphe vérifie les axiomes 1 et 2 ; il vérifie l'axiome 1 si et seulement si elles vérifient (Ka). Un graphe muni d'un triangle $t_0$ fournit de telles données par l'énoncé précédent.*

**Énoncé** (Marge de la page 96, la condition (Ka) est nécessaire). *Soient $E_\alpha = \mathbb{Z}/2$, $\widetilde{E}_\alpha = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$, $\sigma_\alpha(u, e) = (u, e + 1)$, et $\widetilde{T}$ l'ensemble des triplets $((u, e), (v, e), (u + v, e))$. Ce sont les données du carré latin d'ordre 2, table de $\mathbb{Z}/2$, avec trois revêtements triviaux. Elles vérifient (*) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$, et ne vérifient pas (Ka). Leur graphe ne vérifie pas l'axiome 1 : l'arête qui joint $(0, 0) \in \widetilde{E}_a$ à $(0, 0) \in \widetilde{E}_b$ est contenue dans deux triangles, fermés par $(0, 0)$ et par $(1, 0) \in \widetilde{E}_c$.*

**Énoncé** (Page 116 ♦). *Soit $G$ un groupe. Les applications $\varphi_a : (x, y, z) \mapsto (x, a^{-1}z^{-1}, a^{-1}y^{-1})$ préservent la relation $xyz = 1$ pour tout $a \in G$ si et seulement si $g^2 = 1$ pour tout $g \in G$. Le groupe $G$ est alors commutatif.*

*Démonstration des pages 92 à 99.* (1) Soit $s$ hors de $t_0$. L'axiome 2 pour $t_0$ donne un sommet de $t_0$ lié à $s$. S'il y en avait deux, $t_0(\alpha)$ et $t_0(\beta)$, l'arête $\{t_0(\alpha), t_0(\beta)\}$ serait contenue dans le triangle $t_0$ et dans le triangle qu'elle forme avec $s$ ; l'axiome 1 donnerait $s = t_0(\gamma)$, contre l'hypothèse.

(2) Soit $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $z$ le troisième sommet du triangle de $\{t_0(\alpha), s\}$. Si $z$ était un sommet $t_0(\beta)$ de $t_0$, on aurait $\beta \neq \alpha$ et $s$ serait lié à $t_0(\alpha)$ et à $t_0(\beta)$, contrairement à (1) ; donc $z \in \widetilde{E}_\alpha$. Tout point lié à $t_0(\alpha)$ et à $s$ est égal à $z$ par l'axiome 1. Le point $s$ est lié à $t_0(\alpha)$ et à $\sigma_\alpha s$, donc $\sigma_\alpha\sigma_\alpha s = s$, et $\sigma_\alpha s \neq s$ puisque $s$ et $\sigma_\alpha s$ sont liés.

(3) Si $u$ était lié à $s$ et à $\sigma_\alpha s$, l'arête $\{s, \sigma_\alpha s\}$ serait contenue dans le triangle qu'elle forme avec $t_0(\alpha)$ et dans celui qu'elle forme avec $u$, d'où $u = t_0(\alpha)$, absurde (proposition 2 ; l'hypothèse $\beta \neq \alpha$ n'y sert pas). L'axiome 2 pour le triangle vertical $\{t_0(\alpha), s, \sigma_\alpha s\}$ lie $u$ à l'un de ses trois sommets ; ce n'est pas $t_0(\alpha)$ par (1), puisque $u$ est lié à $t_0(\beta)$ ; c'est donc $s$ ou $\sigma_\alpha s$ (proposition 5).

(4) Soit $z$ le troisième sommet du triangle de $\{s, u\}$. Si $z$ était un sommet $t_0(\delta)$, (1) donnerait $\delta = \alpha$ et $\delta = \beta$. Par (1), $z$ est dans un $\widetilde{E}_\delta$. Si $\delta = \alpha$, $z$ est lié à $t_0(\alpha)$ et à $s$, donc $z = \sigma_\alpha s$ par (2), et $u$ est lié à $s$ et à $\sigma_\alpha s$, contrairement à (3) ; de même $\delta \neq \beta$. Donc $\delta = \gamma$, et $(s, u, z)$, rangé selon les indices, est un triangle supérieur. Deux triangles supérieurs $x$, $y$ avec $x_\alpha = y_\alpha$ et $x_\beta = y_\beta$ ont $x_\gamma$ et $y_\gamma$ liés à $x_\alpha$ et à $x_\beta$, donc égaux par l'axiome 1.

(5) Si $s$ et $u$ sont liés, $\sigma_\beta u$ n'est pas lié à $s$ par (3) appliqué au triangle vertical de $u$ ; il est donc lié à $\sigma_\alpha s$ par (3) appliqué au triangle vertical de $s$. Les coordonnées de $\sigma x$ sont donc deux à deux liées, et $\sigma x \neq x$ puisque $\sigma_\alpha$ est sans point fixe. □

**Lemme 25.2.** *Soit $X$ un ensemble muni d'une involution sans point fixe $f$. Le choix d'un représentant dans chaque orbite donne une bijection $X \simeq X/f \times \{0, 1\}$ ; en particulier $|X| = 2\,|X/f|$.*

*Démonstration.* Soit $r(q)$ le représentant de l'orbite $q$. On envoie $x$ sur $(\bar{x}, 0)$ si $x = r(\bar{x})$ et sur $(\bar{x}, 1)$ sinon, et $(q, 0)$ sur $r(q)$, $(q, 1)$ sur $f(r(q))$. Comme l'orbite de $x$ est $\{r(\bar{x}), f(r(\bar{x}))\}$ et que $f$ est sans point fixe, ces deux applications sont réciproques. □

**Lemme 25.3.** *Soient $f : \Gamma \to A$, $g : \Gamma \to B$, $h : \Gamma \to D$ telles que $(f, g)$ et $(f, h)$ soient bijectives. Pour tout $a \in A$, l'application $b \mapsto h\big((f, g)^{-1}(a, b)\big)$ est une bijection de $B$ sur $D$.*

*Démonstration.* Si deux valeurs $b_1$, $b_2$ ont même image, les éléments $(f,g)^{-1}(a,b_i)$ ont même $f$ et même $h$ ; ils sont égaux par l'injectivité de $(f,h)$, d'où $b_1 = b_2$. Pour $d \in D$, soit $x = (f,h)^{-1}(a,d)$ ; alors $(f,g)^{-1}(a,g(x)) = x$, et $b = g(x)$ a pour image $d$. □

*Démonstration des pages 99, 101 et 102.* Les applications $\varphi_\alpha$ sont bien définies, car $(\sigma x)_\alpha = \sigma_\alpha(x_\alpha)$ a même classe que $x_\alpha$.

(1) *Injectivité.* Montrons d'abord que deux triangles supérieurs $x$, $y$ avec $y_\alpha = x_\alpha$ et $y_\beta \in \{x_\beta, \sigma_\beta x_\beta\}$ sont égaux. Si $y_\beta = \sigma_\beta x_\beta$, le point $x_\alpha = y_\alpha$ serait lié à $x_\beta$ et à $\sigma_\beta x_\beta$, contrairement à la proposition 2 ; donc $y_\beta = x_\beta$, et $y = x$ par l'unicité de (4). Soient alors $x$, $y$ de mêmes images dans $E_\alpha$ et $E_\beta$. Si $y_\alpha = x_\alpha$, on conclut. Si $y_\alpha = \sigma_\alpha x_\alpha$, on remplace $y$ par $\sigma y$, qui a même classe : $(\sigma y)_\alpha = x_\alpha$ et $(\sigma y)_\beta$ est dans l'orbite de $x_\beta$, donc $\sigma y = x$. *Surjectivité.* Soient $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$. Par la proposition 5, $u$ est lié à $s$ ou à $\sigma_\alpha s$, et (4) donne un triangle supérieur dont les coordonnées d'indices $\alpha$ et $\beta$ sont ce point et $u$ ; sa classe a pour images les classes de $s$ et de $u$.

(2) Si $\bar{x} = \bar{y}$ et $x_\alpha = y_\alpha$, alors $y = x$ ou $y = \sigma x$, et le second cas donnerait $\sigma_\alpha x_\alpha = x_\alpha$. Si $(g,s)$ est dans le produit fibré, avec $g = \bar{x}$, la classe de $x_\alpha$ est celle de $s$, donc $s = x_\alpha$ ou $s = (\sigma x)_\alpha$ ; dans les deux cas $(g,s)$ est l'image d'un triangle supérieur.

(3) Par construction, $\psi_{\beta\alpha}$ envoie l'image de $x$ dans le premier produit fibré sur l'image de $x$ dans le second ; les deux ont pour première composante $\bar{x}$, et les relations de transitivité se lisent sur cette description.

(4) Les deux premières égalités sont le lemme 25.2 pour $\sigma_\alpha$ et pour $\sigma$, la troisième est (1). Pour la dernière, on applique le lemme 25.3 à $f = \varphi_\alpha$, $g = \varphi_\beta$, $h = \varphi_\gamma$ et à la classe d'un point de $\widetilde{E}_\alpha$. □

*Démonstration de la Scholie et de sa réciproque.* (1) L'application qui envoie $\alpha \in t_0$ sur $t_0(\alpha)$ et $s \in \widetilde{E}_\alpha$ sur $s$ est bijective par (1) des pages 92 à 99. Elle respecte les arêtes : deux sommets de $t_0$ sont liés ; $t_0(\alpha)$ est lié à $s \in \widetilde{E}_\beta$ si et seulement si $\beta = \alpha$, par (1) ; deux points d'un même $\widetilde{E}_\alpha$ sont liés si et seulement si l'un est l'image de l'autre par $\sigma_\alpha$, par (2) ; deux points de $\widetilde{E}_\alpha$ et de $\widetilde{E}_\beta$, $\alpha \neq \beta$, sont liés dans $S$ si et seulement s'ils sont deux coordonnées d'un triangle supérieur, par (4). Les conditions (*) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$ sont (4) et (3). Pour (Ka), soient $x$, $y$, $z$ trois triangles supérieurs avec $x_\alpha = y_\alpha$, $x_\beta = z_\beta$, $y_\gamma = z_\gamma$. Le point $y_\gamma$ est lié à $y_\alpha = x_\alpha$, et, comme $z_\gamma$, à $z_\beta = x_\beta$. L'axiome 1 pour l'arête $\{x_\alpha, x_\beta\}$ donne $x_\gamma = y_\gamma$, et (*) donne $x = y$.

(2) *Axiome 1.* On examine les arêtes une à une. L'arête $\{t_0(\alpha), t_0(\beta)\}$ a pour seul troisième sommet $t_0(\gamma)$ : un point de $\widetilde{E}_\delta$ n'est lié qu'au sommet $t_0(\delta)$. L'arête $\{t_0(\alpha), s\}$ a pour seul troisième sommet $\sigma_\alpha s$ : un sommet lié à $t_0(\alpha)$ et à $s$ est dans $\widetilde{E}_\alpha$, et le seul point de $\widetilde{E}_\alpha$ lié à $s$ est $\sigma_\alpha s$. L'arête $\{s, \sigma_\alpha s\}$ a pour seul troisième sommet $t_0(\alpha)$ : un point $r$ lié à $s$ et à $\sigma_\alpha s$ qui ne serait pas dans $t_0$ ne pourrait être dans $\widetilde{E}_\alpha$, où il serait égal à $\sigma_\alpha s$ et à $s$, ni dans un autre $\widetilde{E}_\beta$, où $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$ l'interdit. Enfin, soient $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$ liés par $\tau \in \widetilde{T}$. Le point $\tau_\gamma$ est lié à $s$ et à $u$. Soit $r$ un autre sommet lié à $s$ et à $u$. Il n'est pas dans $t_0$, car il serait lié à $t_0(\alpha)$ et à $t_0(\beta)$. S'il était dans $\widetilde{E}_\alpha$, il serait égal à $\sigma_\alpha s$, et $u$ serait lié à $s$ et à $\sigma_\alpha s$, contre $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$ ; de même il n'est pas dans $\widetilde{E}_\beta$. Il est donc dans $\widetilde{E}_\gamma$, lié à $s$ par un $\rho_1 \in \widetilde{T}$ et à $u$ par un $\rho_2 \in \widetilde{T}$. Alors $\tau_\alpha = (\rho_1)_\alpha = s$, $\tau_\beta = (\rho_2)_\beta = u$ et $(\rho_1)_\gamma = (\rho_2)_\gamma = r$, et (Ka) donne $\tau = \rho_1$, d'où $r = \tau_\gamma$.

Ce dernier argument montre aussi que trois points deux à deux liés hors de $t_0$ sont les coordonnées d'un même $\tau$ : deux d'entre eux ne sont pas dans une même orbite, car un point lié à $s$ et à $\sigma_\alpha s$ est dans $t_0$, et le troisième est le troisième sommet de l'arête des deux premiers.

*Axiome 2.* Un triangle du graphe est de l'un des trois types suivants : $t_0$ ; un triangle vertical $\{t_0(\alpha), s, \sigma_\alpha s\}$ ; un triangle supérieur $\{\tau_\alpha\}$, $\tau \in \widetilde{T}$. Un triangle qui contient deux sommets de $t_0$

et un point de $\widetilde{E}_\alpha$ demanderait que ce point soit dans deux $\widetilde{E}$ ; un triangle formé de $t_0(\alpha)$ et de deux points est vertical, puisque ces points sont dans $\widetilde{E}_\alpha$ ; un triangle formé de trois points est supérieur par ce qui précède. Pour $t_0$, tout point de $\widetilde{E}_\alpha$ est lié à $t_0(\alpha)$. Pour un triangle vertical, un sommet de $t_0$ autre que $t_0(\alpha)$ est lié à $t_0(\alpha)$, ainsi qu'un point de $\widetilde{E}_\alpha$ ; un point $w \in \widetilde{E}_\beta$, $\beta \neq \alpha$, est lié à $s$ ou à $\sigma_\alpha s$ par $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$. Pour un triangle supérieur $\tau$, un sommet $t_0(\delta)$ est lié à $\tau_\delta$. Soit $w \in \widetilde{E}_\delta$. Si $w = \sigma_\delta \tau_\delta$, il est lié à $\tau_\delta$. Sinon, notons $\beta$, $\gamma$ les deux autres indices, et supposons $w$ lié ni à $\tau_\beta$ ni à $\tau_\gamma$. Par $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$, $\sigma_\delta w$ est lié à $\tau_\beta$ par un $\rho_1$ et à $\tau_\gamma$ par un $\rho_2$. La condition (Ka) pour les indices $(\beta, \gamma, \delta)$ et les triplets $\tau$, $\rho_1$, $\rho_2$ donne $\tau = \rho_1$, d'où $\tau_\delta = \sigma_\delta w$ et $w = \sigma_\delta \tau_\delta$, contre l'hypothèse. C'est l'argument de la proposition 6, où la page invoque la proposition 2.

(3) Le sens réciproque est (2). Supposons l'axiome 1, et soient $\tau$, $\rho_1$, $\rho_2$ comme dans (Ka). Les points $\tau_\gamma$ et $(\rho_1)_\gamma$ sont liés à $\tau_\alpha$ (par $\tau$ et par $\rho_1$) et à $\tau_\beta$ (par $\tau$ et par $\rho_2$). L'axiome 1 pour l'arête $\{\tau_\alpha, \tau_\beta\}$ donne $\tau_\gamma = (\rho_1)_\gamma$, et (*) pour les indices $\alpha$, $\gamma$ donne $\tau = \rho_1$.

(4) Si $\tau$ et $\rho$ ont mêmes coordonnées d'indices $\alpha$ et $\beta$, (Ka) pour les indices $(\alpha, \gamma, \beta)$ et les triplets $\tau$, $\rho$, $\tau$ donne $\tau = \rho$. (Ka) entraîne (Ka′) : pour $(s_\alpha)$ et $(t_\alpha)$ comme dans (Ka′), (Ka) appliquée à $t_c$, $t_b$, $t_a$ donne $t_c = t_b$, et $(s_\alpha)$ a les coordonnées de $t_c$. Inversement, sous (*) et (Ka′), soient $\tau$, $\rho_1$, $\rho_2$ comme dans (Ka). La famille $s$ égale à $\tau$ hors de $\gamma$ et à $(\rho_1)_\gamma$ en $\gamma$, avec $t_\gamma = \tau$, $t_\beta = \rho_1$, $t_\alpha = \rho_2$, vérifie les hypothèses de (Ka′) ; donc $s \in \widetilde{T}$, puis $s = \tau$ par (*), d'où $\tau_\gamma = (\rho_1)_\gamma$ et $\tau = \rho_1$ par (*). □

*Démonstration des problèmes I et II. (*).* Si $\psi_\alpha(x) = \psi_\alpha(y)$ et $\psi_\beta(x) = \psi_\beta(y)$, alors $\varphi_\alpha \pi(x) = p_\alpha \psi_\alpha(x) = \varphi_\alpha \pi(y)$, et de même pour $\beta$ ; $\beta_\Gamma$ donne $\pi(x) = \pi(y)$, et l'injectivité de $(\pi, \psi_\alpha)$ donne $x = y$.

$\beta_{\widetilde{\Gamma}}$. Soient $s \in \widetilde{E}_\alpha$ et $u \in \widetilde{E}_\beta$. Deux éléments $x$, $y$ de $\widetilde{\Gamma}$ avec $\psi_\beta(x) = \psi_\beta(y) = u$ et $p_\alpha \psi_\alpha(x) = p_\alpha \psi_\alpha(y) = p_\alpha(s)$ ont la même image dans $E_\alpha \times E_\beta$, donc la même image dans $\Gamma$ par $\beta_\Gamma$, et sont égaux par l'injectivité de $(\pi, \psi_\beta)$. Si $s$ et $\sigma_\alpha s$ étaient tous deux liés à $u$, par $x$ et par $y$, on aurait donc $x = y$ et $s = \sigma_\alpha s$. Pour l'existence, soit $g \in \Gamma$ d'image $(p_\alpha(s), p_\beta(u))$, et $x$ au-dessus de $g$ avec $\psi_\beta(x) = u$ ; alors $p_\alpha \psi_\alpha(x) = \varphi_\alpha(g) = p_\alpha(s)$, donc $\psi_\alpha(x) \in \{s, \sigma_\alpha s\}$.

La suite résulte de la réciproque de la Scholie. Pour un graphe, les données de l'énoncé sont $\Gamma$, les $E_\alpha$, les classes $\widetilde{E}_\alpha \to E_\alpha$, $\widetilde{\Gamma}$, $x \mapsto \bar{x}$ et $x \mapsto x_\alpha$ ; les hypothèses sont (1) et (2) de l'énoncé des pages 99, 101 et 102. □

*Démonstration de la nécessité de (Ka).* Les conditions (*) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$ portent sur un nombre fini de cas et sont vérifiées par énumération. Les triplets $\tau = ((0,0),(0,0),(0,0))$, $\rho_1 = ((0,0),(1,0),(1,0))$ et $\rho_2 = ((1,0),(0,0),(1,0))$ de $\widetilde{T}$ vérifient $\tau_a = (\rho_1)_a$, $\tau_b = (\rho_2)_b$ et $(\rho_1)_c = (\rho_2)_c$, et $\tau \neq \rho_1$. La condition (Ka) est donc fausse, et l'axiome 1 aussi par (3) de la Scholie. □

*Démonstration de la page 116.* Si les $\varphi_a$ préservent la relation, on l'applique à $(1,1,1)$ et à $a = g^{-1}$ : il vient $g \cdot g = 1$. Inversement, si $g^2 = 1$ pour tout $g$, alors $g^{-1} = g$, et $gk = (gk)^{-1} = k^{-1} g^{-1} = kg$ : le groupe est commutatif. Pour $xyz = 1$, on a $x \cdot a^{-1} z^{-1} \cdot a^{-1} y^{-1} = x \cdot az \cdot ay = a^2 \cdot xyz = 1$. □

*Remarque.* La direction directe n'emploie l'axiome 2 que pour $t_0$ et pour les triangles verticaux. Elle n'emploie pas l'axiome 3 de la page 100 ; celui-ci ne sert qu'aux dénombrements. Les cas exclus par l'axiome 3, un triangle seul ou une étoile de triangles en un sommet, ont $\widetilde{\Gamma} = \varnothing$, et leur $\Gamma$ vide vérifie $\beta_\Gamma$ puisque deux des $E_\alpha$ au moins sont vides. La page 101, qui demande $\widetilde{\Gamma} \neq \varnothing$, les écarte.

*Remarque.* La page 97 affirme que des données vérifiant (*) donnent un graphe qui vérifie l'axiome 1. Le contre-exemple de la nécessité de (Ka) vérifie (*), (**) et $\beta_{\widetilde{\Gamma}}$, et son graphe ne vérifie pas l'axiome 1. L'énoncé de la page 97 demande donc la condition de la marge, que l'accolade rattache à (*) et (**). Sous (*), l'axiome 1 du graphe des données équivaut à (Ka), et cette équivalence permet de restituer la condition. La conclusion de la marge est illisible : les formes (Ka) et (Ka′) sont les deux lectures, équivalentes sous (*), qui rendent la Scholie juste. La condition (*) n'est pas utilisée pour la réciproque ; elle découle de (Ka).

*Remarque.* Pour l'axiome 2 aux triangles supérieurs, la page 100 (proposition 6) invoque la proposition 2, qui vient de l'axiome 1 dans un graphe donné. Dans la réciproque, la démonstration utilise (Ka) à cet endroit.

*Remarque.* L'énoncé de la page 116 suppose dès le départ que le carré latin est la table d'un groupe. La lecture écrit qu'il explique pourquoi le carré latin du problème I « doit être la table d'un $\mathbb{F}_2$-espace vectoriel ». L'énoncé démontré ici est plus étroit : si $\Gamma$ est la table de $xyz = 1$ dans un groupe et si les $\varphi_a$ la préservent, le groupe est un 2-groupe abélien élémentaire. La page applique la relation à $y = z = 1$ ; la démonstration prend $x = y = z = 1$, ce qui revient au même puisque $x$ est déterminé par $y$ et $z$.

*Remarque.* Le groupe des autotopies de la table de Klein est d'ordre $96$. Soit $V = (\mathbb{Z}/2)^2$. Trois permutations $f, g, h$ de $V$ vérifient $f(x)+g(y) = h(x+y)$ pour tous $x, y$ si et seulement s'il existe un automorphisme $\varphi$ de $V$ et $c_f, c_g \in V$ tels que $f = \varphi+c_f$, $g = \varphi+c_g$ et $h = \varphi+c_f+c_g$. En effet, $y = 0$ et $x = 0$ donnent $h(z) = f(z) + g(0) = f(0) + g(z)$ : les normalisées $f + f(0)$, $g + g(0)$ et $h+f(0)+g(0)$ coïncident, et l'égalité de départ dit que cette application commune est additive. L'énoncé vaut pour tout groupe commutatif, avec $f-f(0)$. Comme $V$ a six automorphismes, les autotopies sont au nombre de $6 \cdot 4 \cdot 4 = 96$ ; une énumération des $24^3$ triplets de permutations le confirme. C'est le nombre qu'utilise la cote 69 pour le stabilisateur d'un triangle dans le graphe des vingt-sept droites : $96$ autotopies, deux relèvements chacune et les $6$ permutations du triangle donnent $1152 = |W(F_4)|$. Le relèvement n'est pas formalisé.

Ne sont pas démontrés ici : la classification des graphes vérifiant les axiomes 1 à 3 et leur identification aux quadrangles généralisés d'ordre $(2, c)$, la description des carrés latins du problème I et la classification des revêtements doubles du problème II, leur lien avec les extensions centrales des pages 32 à 39, l'affirmation de la lecture que le carré latin est en général la table d'un $\mathbb{F}_2$-espace vectoriel, et les nombres de la page 104 pour $|S|$, $|A|$ et $|T|$. L'identification des $\widetilde{E}_\alpha$ du graphe des données aux ensembles de départ, qui achèverait l'équivalence dans le sens réciproque, n'est démontrée que pour les triangles supérieurs. La fin de la marge (Ka) reste à lire sur le fac-similé.

## 26 Cote 76 : drapeaux de type $H$ d'un ensemble à opérateurs, le lemme de surjectivité[27]

La cote 76, *n-cartes cellulaires : notes manuscrites (s.d.)*, soixante-deux pages que l'inventaire date « [vers 1977] », cherche une description combinatoire des complexes cellulaires et des cartes de dimension $n$. Les pages 20 à 24 relient les ensembles semi-simpliciaux aux ensembles ordonnés munis d'un ordre sur les sommets ; la relation lue sur les arêtes, $x \prec y$, doit être transitive. La page 26 donne un second exemple (« Ex 2 ») : un groupe $G$, des éléments

[27] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder76.lean`.

$\sigma_0, \dots, \sigma_n$ tels que $\sigma_i$ et $\sigma_j$ commutent pour $j \geq i+2$, le sous-groupe $N_H$ engendré par les $\sigma_i$, $i \notin H$, un $G$-ensemble $X$ et ses « drapeaux de type $H$ », $D(H) = X/N_H$ (76, lot 2, p. 26). La page 27 pose $x_i \prec y_j$ si $i < j$ et si $x_i$, $y_j$ ont un majorant commun, ramène la transitivité à la surjectivité de $D(\{i,j,k\}) \to D(\{i,j\}) \times_{D(\{j\})} D(\{j,k\})$ et énonce un lemme plus général, sous l'hypothèse « $H \cap H'$ … segment final de l'ens tot. ordonné $H$, un segment initial de l'ens tot ordonné $H'$ » (76, lot 2, p. 27). La page 28 le démontre par la décomposition $G_{K \cup K'} \subset G_{K_0} \cdot G_{K'_0}$, et une note oblique dans la marge gauche dit n'avoir utilisé que « a) le dernier él. de $H$ est dans $H'$ ; b) $H \cap H'$ est un segment initial de $H'$ » (76, lot 2, p. 28). La lecture énonce le lemme sous ces deux hypothèses.
*Conventions.* On note $\Delta_n = \{0, \dots, n\}$, $G_K$ le sous-groupe de $G$ engendré par les $\sigma_i$, $i \in K$, pour $K \subset \Delta_n$, et $N_H = G_{\Delta_n \smallsetminus H}$. Pour $H \subset H'$, on a $N_{H'} \subset N_H$, d'où la restriction $D(H') \to D(H)$, $N_{H'}x \mapsto N_H x$ ; elle est transitive. Aucune autre hypothèse n'est faite sur les $\sigma_i$ : ce ne sont pas nécessairement des involutions.

**Lemme 26.1.** *Soient $K, K' \subset \Delta_n$ et $i \in \Delta_n \smallsetminus (K \cup K')$ tels que tout $j \in K \cup K'$ avec $j < i$ soit dans $K'$ et tout $j \in K \cup K'$ avec $j > i$ soit dans $K$. Alors tout élément de $G_{K \cup K'}$ s'écrit $k'k$ avec $k' \in G_{K'}$ et $k \in G_K$.*

*Démonstration.* Soient $A = G_{K'_0}$ et $B = G_{K_0}$, où $K'_0 = \{j \in K \cup K' : j < i\}$ et $K_0 = \{j \in K \cup K' : j > i\}$. Par hypothèse $A \subset G_{K'}$ et $B \subset G_K$. Un indice de $K'_0$ et un indice de $K_0$ diffèrent d'au moins 2, donc leurs générateurs commutent ; tout générateur de $B$ est alors dans le centralisateur de $A$, puis $B$ tout entier, et tout élément de $A$ commute à tout élément de $B$. L'ensemble $AB$ contient donc 1, les générateurs $\sigma_j$, $j \in K \cup K'$ (qui sont dans $K'_0$ ou $K_0$ puisque $i \notin K \cup K'$), et il est stable par produit, $(ab)(a'b') = (aa')(bb')$, et par inverse, $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$. Il contient le sous-groupe $G_{K \cup K'}$ qu'ils engendrent. □

**Théorème 26.2** (Grothendieck, pages 27 et 28, lemme ♦). *Soient $G$ un groupe, $\sigma_0, \dots, \sigma_n \in G$ tels que $\sigma_i$ et $\sigma_j$ commutent pour $j \geq i+2$, et $X$ un $G$-ensemble. Soient $H, H' \subset \Delta_n$ tels que le plus grand élément de $H$ soit dans $H'$ et que $H \cap H'$ soit un segment initial de $H'$. Alors l'application*

$$D(H \cup H') \longrightarrow D(H) \times_{D(H \cap H')} D(H')$$

*est surjective : deux drapeaux de types $H$ et $H'$ de même restriction à $H \cap H'$ sont les restrictions d'un même drapeau de type $H \cup H'$.*

*Démonstration.* Soient $a = N_H x$ et $b = N_{H'} y$ de même image dans $D(H \cap H')$ : il existe $g \in N_{H \cap H'}$ avec $gy = x$. Posons $K = \Delta_n \smallsetminus H$ et $K' = \Delta_n \smallsetminus H'$, de sorte que $N_{H \cap H'} = G_{K \cup K'}$, et soit $i$ le plus grand élément de $H$. Il est dans $H \cap H'$, donc hors de $K \cup K'$. Un $j > i$ n'est pas dans $H$, donc est dans $K$. Un $j < i$ de $K \cup K'$ n'est pas dans $H'$ : sinon, $j \leq i$ avec $i \in H \cap H'$ et le segment initial le mettraient dans $H$, donc dans $H \cap H'$, ce qui contredit $j \in K \cup K'$. Le lemme 26.1 écrit $g^{-1} = k'k$ avec $k' \in N_{H'}$ et $k \in N_H$. Le drapeau $c$, classe de $kx$ dans $D(H \cup H')$, a pour image $N_H kx = N_H x = a$ dans $D(H)$, et, puisque $y = g^{-1}x = k'(kx)$, pour image $N_{H'} kx = N_{H'} y = b$ dans $D(H')$. □

**Corollaire 26.3** (page 27). *Pour $x \in D(\{i\})$ et $y \in D(\{j\})$, posons $x \prec y$ si $i < j$ et si $x$ et $y$ sont les restrictions d'un même drapeau d'un type $H \supset \{i,j\}$. Cette relation est transitive, pour tout $G$-ensemble $X$. Un majorant commun peut toujours être pris dans $D(\{i,j\})$, les sommets $i < j$ d'un même drapeau vérifient $\prec$, et $x \prec y$ n'a jamais lieu pour $x$ et $y$ de même type.*

*Démonstration.* La restriction d'un majorant de type $H$ à $\{i,j\}$ est un majorant de type $\{i,j\}$. Soient $i<j<k$, $x \prec y$ par $u \in D(\{i,j\})$ et $y \prec w$ par $v \in D(\{j,k\})$. On a $\{i,j\}\cap\{j,k\}=\{j\}$, qui est le plus grand élément de $\{i,j\}$ et un segment initial de $\{j,k\}$. Les restrictions de $u$ et $v$ à $\{j\}$ valent $y$, et le théorème 26.2 donne $c \in D(\{i,j,k\})$ qui restreint à $u$ et à $v$, donc à $x$ et à $w$ : sa restriction à $\{i,k\}$ est un majorant commun de $x$ et $w$, et $i<k$. □

*Remarque.* Le lemme tient tel que la lecture l'énonce, sous les deux hypothèses de la note marginale, plus faibles que celles de l'énoncé de la page 27 : la non-vacuité de $H\cap H'$ découle de a), et le segment final de $H$ ne sert pas. La démonstration est celle de la page 28 ; la page écrit $G_{K\cup K'} = G_K \cdot G_{K'}$, le fichier en démontre l'inclusion sous la forme $G_{K'} \cdot G_K$, la seule dont la démonstration se sert. Les $\sigma_i$ ne sont pas supposés d'ordre 2, et le groupe, l'ensemble $X$ et l'action sont quelconques : la lecture le dit, et la page n'utilise en effet que la commutation des $\sigma_i$ éloignés. Le fichier formalise l'ordre des sommets sur $D_0 = \coprod_i D(\{i\})$ et sa transitivité, mais pas l'ensemble semi-simplicial qui en résulte. La piste demande si cette surjectivité, pour des $G$-ensembles quelconques, figure dans la théorie des géométries de classes de Tits ou des systèmes de chambres.

Ne sont pas démontrés ici : la condition (a) pour $D_* = \coprod_H D(H)$ et l'ensemble semi-simplicial qu'elle définit, avec $D_m = \coprod_{\operatorname{card} H=m+1} X/N_H$ ; la correspondance des pages 23 et 24 entre ensembles semi-simpliciaux à relation transitive sur les sommets et ensembles ordonnés munis d'un ordre sur les sommets, qui est une autre piste de l'onglet Findings ; le programme de la page 29.

## 27 Cote 77 : le discriminant universel modulo $2$ et modulo $4$, la symétrie canonique[28]

La cote 77, *Quadriques affines, extensions quadratiques : notes manuscrites (s.d.)*, compte cent cinquante-sept pages, que l'inventaire place après 1977. La partie IV, dont la couverture de la page 64 porte « discriminant des formes quadratiques », prend la forme quadratique universelle $\sum_i Y_i x_i^2 + \sum_{i<j} Y_{ij} x_i x_j$ sur l'anneau $\mathbf{Z}[Y]$ et le déterminant $\Delta$ de sa forme polaire, matrice qui porte $2Y_i$ sur la diagonale et $Y_{ij}$ ailleurs. Les pages 65 à 67 développent $\Delta$ en une somme sur des graphes : sommets isolés pour les points fixes, arêtes doubles pour les transpositions, polygones pour les autres cycles. La page 68 réduit cette somme modulo $2$ : il n'y reste que les involutions sans point fixe, et la page conclut « On voit donc que $\Delta \bmod 2 = 0$ si $\operatorname{card} I$ est impair » (77, lot 4, p. 68). En rang pair $m=2n$, elle pose $B$, somme sur les couplages parfaits de $I$ des produits des $Y_{ij}$, cherche $\varepsilon = \pm 1$ tel que $B^2 - \varepsilon\Delta \equiv 0 \pmod 4$, et « prévoit » $\varepsilon = (-1)^n$. Les pages 69 et 71 comparent $B^2$ et $\Delta$ modulo $4$ par les paires de couplages, avec une fausse alarme à l'encre brune corrigée deux lignes plus bas. La page 87, barrée, contrôle les coefficients du développement en rang $4$ (77, lot 5, p. 87). La page 127 prend le discriminant divisé $\delta' = \delta/2$ du rang impair comme critère de régularité (77, lot 7, p. 127). La partie V, aux pages 117 à 125, étudie les quadriques affines « birégulières », lisses et lisses à l'infini : elle les ramène à un triplet $(T,q,a)$ avec $q(a)=1$, pose $\pi = \varphi(a,\cdot)$ et, page 123, définit la symétrie canonique $\sigma = \mathrm{id} - \pi\otimes a$ ; une note en marge affirme qu'elle est la seule réflexion qui fixe l'hyperplan à l'infini et laisse la quadrique invariante (77, lot 7, p. 123). Le feuillet découpé de la page 124 traite l'exemple $T = M_2$, $q = \det$, $a = 1$.

[28] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder77.lean`.

*Conventions.* Pour $n \geq 0$, les indéterminées sont indexées par les parties $J \subset \{1, \ldots, n\}$ de cardinal 1 ou 2, notées $Y_i$ et $Y_{ij}$ ; on note $\mathbf{Z}[Y]$ l'anneau de polynômes correspondant. La matrice polaire universelle $P_n$ a pour coefficients $2Y_i$ en $(i,i)$ et $Y_{ij}$ en $(i,j)$ et $(j,i)$ pour $i \neq j$. Sur un anneau commutatif $R$, une famille $y = (y_i, y_{ij})$ d'éléments de $R$ définit la forme $\sum y_i x_i^2 + \sum_{i<j} y_{ij} x_i x_j$, de matrice polaire $P(y)$, image de $P_n$ par le morphisme $Y \mapsto y$.

**Énoncé** (Page 68, rang impair ♦). *Si $n$ est impair,* $\det P_n$ *est divisible par* 2 *dans* $\mathbf{Z}[Y]$. *Le quotient* $\delta'_n = \det P_n/2$ *est l'unique polynôme tel que* $\det P_n = 2\delta'_n$, *et pour tout anneau commutatif $R$ et toute famille $y$ d'éléments de $R$,* $\det P(y) = 2\,\delta'_n(y)$.

*Démonstration.* Soit $K_n$ la matrice de $\mathbf{Z}[Y]$ qui porte $Y_{ij}$ en $(i,j)$ pour $i < j$, $-Y_{ij}$ en $(i,j)$ pour $i > j$ et 0 sur la diagonale. Elle est antisymétrique : ${}^tK_n = -K_n$. On a donc $\det K_n = \det {}^tK_n = \det(-K_n) = (-1)^n \det K_n = -\det K_n$, d'où $2\det K_n = 0$ ; comme $\mathbf{Z}[Y]$ est intègre de caractéristique nulle, $\det K_n = 0$.

Soit $\rho : \mathbf{Z}[Y] \to \mathbf{F}_2[Y]$ la réduction des coefficients modulo 2. Les matrices $P_n$ et $K_n$ ont même image par $\rho$ : sur la diagonale, $\rho(2Y_i) = 0$ ; au-dessus, les coefficients sont égaux ; au-dessous, $\rho(-Y_{ij}) = \rho(Y_{ij})$ en caractéristique 2. Le déterminant commutant aux morphismes d'anneaux, $\rho(\det P_n) = \det \rho(P_n) = \det \rho(K_n) = \rho(\det K_n) = 0$. Le noyau de $\rho$ est formé des polynômes dont tous les coefficients sont pairs, c'est-à-dire de l'idéal engendré par 2 ; donc 2 divise $\det P_n$.

L'unicité du quotient vient de ce que 2 n'est pas diviseur de zéro dans $\mathbf{Z}[Y]$. Pour $R$ et $y$ donnés, le morphisme $Y \mapsto y$ envoie $P_n$ sur $P(y)$ et commute au déterminant ; il envoie $2\delta'_n$ sur $2\,\delta'_n(y)$. □

*Remarque.* Le discriminant divisé du rang impair figure chez Conrad (2014, proposition C.1.4) [16], qui le présente comme découvert indépendamment par M. Kneser et par Grothendieck ; l'inventaire place la cote après 1977. L'énoncé tient pour tout $n$ impair. La démonstration ne suit pas le développement en graphes de la page : elle remplace, modulo 2, la matrice symétrique par la matrice antisymétrique $K_n$, dont le déterminant est nul sur $\mathbf{Z}[Y]$ en taille impaire. Sur $\mathbf{F}_2[Y]$ l'argument $\det = -\det$ ne donne rien, et c'est pourquoi il faut relever $\rho(P_n)$ en une matrice antisymétrique sur $\mathbf{Z}[Y]$. La seconde partie de la piste, « $q$ est régulière si et seulement si $\delta'(q)$ est inversible », est la définition de la régularité que la lecture adopte (page 127). Les équivalences de la page 127 avec la lissité de $V(q)$ et l'isomorphie locale à la forme standard ne sont pas formalisées.

**Énoncé** (Pages 68 à 71 et 87, rangs 2 et 4 ♦). *Soit $R$ un anneau commutatif.*

1. *(Rang 2, $n = 1$.) Pour $a_1, a_2, b_{12} \in R$,* $-\det \begin{pmatrix} 2a_1 & b_{12} \\ b_{12} & 2a_2 \end{pmatrix} = B^2 - 4C$ *avec* $B = b_{12}$ *et* $C = a_1 a_2$.
2. *(Rang 4, $n = 2$.) Soit $P$ la matrice polaire de la forme* $\sum_{i\leq 4} a_i x_i^2 + \sum_{i<j} b_{ij} x_i x_j$ *et* $B = b_{12}b_{34} + b_{13}b_{24} + b_{14}b_{23}$, *somme sur les trois couplages parfaits de* $\{1,2,3,4\}$. *Alors* $\det P = B^2 - 4C$ *avec*

$$\begin{aligned} C = {} & -4a_1a_2a_3a_4 + a_1a_2b_{34}^2 + a_1a_3b_{24}^2 + a_1a_4b_{23}^2 + a_2a_3b_{14}^2 + a_2a_4b_{13}^2 + a_3a_4b_{12}^2 \\ & - a_1b_{23}b_{24}b_{34} - a_2b_{13}b_{14}b_{34} - a_3b_{12}b_{14}b_{24} - a_4b_{12}b_{13}b_{23} \\ & + b_{12}b_{13}b_{24}b_{34} + b_{12}b_{14}b_{23}b_{34} + b_{13}b_{14}b_{23}b_{24}. \end{aligned}$$

3. *Le signe $\varepsilon = -(-1)^n$ ne convient dans aucun des deux rangs : sur* $\mathbf{Z}$*, pour $a_1 = a_2 = 0$ et $b_{12} = 1$, $B^2 - \det P = 2$ ; pour $b_{12} = b_{34} = 1$ et les autres coefficients nuls, $B^2 + \det P = 2$. Aucun des deux n'est divisible par 4.*

*Démonstration.* En rang 2, $\det = 4a_1a_2 - b_{12}^2$. En rang 4, on développe $\det P$ selon la première ligne, puis chaque mineur d'ordre 3 par la règle de Sarrus. On obtient

$$\begin{aligned}\det P = {} & 16a_1a_2a_3a_4 - 4\,(a_1a_2b_{34}^2 + a_1a_3b_{24}^2 + a_1a_4b_{23}^2 + a_2a_3b_{14}^2 + a_2a_4b_{13}^2 + a_3a_4b_{12}^2)\\ & + 4\,(a_1b_{23}b_{24}b_{34} + a_2b_{13}b_{14}b_{34} + a_3b_{12}b_{14}b_{24} + a_4b_{12}b_{13}b_{23}) + b_{12}^2b_{34}^2 + b_{13}^2b_{24}^2 + b_{14}^2b_{23}^2\\ & - 2\,(b_{12}b_{13}b_{24}b_{34} + b_{12}b_{14}b_{23}b_{34} + b_{13}b_{14}b_{23}b_{24}).\end{aligned}$$

Ce sont les coefficients de la page 87 : $2^4$ pour les quatre sommets isolés, $-2^2$ pour une arête double et deux sommets isolés, $2^2$ pour un triangle et un sommet isolé, 1 pour deux arêtes doubles, $-2$ pour un carré. Le carré $B^2$ a pour termes carrés les $b_{12}^2b_{34}^2$, $b_{13}^2b_{24}^2$, $b_{14}^2b_{23}^2$ et pour termes croisés $2\,(b_{12}b_{13}b_{24}b_{34} + b_{12}b_{14}b_{23}b_{34} + b_{13}b_{14}b_{23}b_{24})$ ; la différence $B^2 - \det P$ est donc $4C$, terme à terme. Les deux contre-exemples se calculent sur ces formules : en rang 2, $B^2 - \det P = 1 - (-1)$ ; en rang 4, $\det P = b_{12}^2b_{34}^2 = 1$ et $B^2 + \det P = 2$. □

*Remarque.* L'identité est démontrée sur tout anneau commutatif, donc en particulier sur $\mathbf{Z}[Y]$, avec un $C$ écrit en entier. Elle confirme en rangs 2 et 4 le signe $(-1)^n$ que la page « prévoit », et le choix opposé échoue dans ces deux rangs, ce que la lecture avait contrôlé par machine pour $m = 2, 4, 6$. En rang 4, la vérification confirme les coefficients et les nombres de graphes de la page 87. Le rang pair quelconque fait l'objet de l'énoncé suivant, sans expression de $C$.

**Théorème 27.1** (Grothendieck, pages 68 à 71, rang pair quelconque ♦)**.** *Soient $n \geq 0$ et $B_{2n} = \sum_M \prod_{\{i,j\}\in M} Y_{ij}$, la somme portant sur les couplages parfaits $M$ de $\{1, \ldots, 2n\}$. Alors 4 divise $(-1)^n \det P_{2n} - B_{2n}^2$ dans $\mathbf{Z}[Y]$. Il existe donc $C_{2n} \in \mathbf{Z}[Y]$ tel que, pour tout anneau commutatif $R$ et toute famille $y$ d'éléments de $R$, $(-1)^n \det P(y) = B_{2n}(y)^2 - 4\,C_{2n}(y)$.*

*Démonstration.* Soit $U$ la matrice qui porte $Y_i$ en $(i,i)$, $Y_{ij}$ en $(i,j)$ pour $i < j$, et 0 sous la diagonale. Alors $P_{2n} = U + {}^tU$, et la matrice antisymétrique $K_{2n}$ de l'énoncé du rang impair est $U - {}^tU = P_{2n} - 2\,{}^tU$. On écrit $P$, $K$ et $B$ pour $P_{2n}$, $K_{2n}$ et $B_{2n}$.

*Premier pas :* $\det K \equiv (1-2n)\det P \pmod 4$. Soit $f(t) = \det(P - t\,{}^tU) \in \mathbf{Z}[Y][t]$, que l'on écrit $f(t) = f_0 + f_1t + t^2g(t)$. On a $f_0 = f(0) = \det P$ et $\det K = f(2) = \det P + 2f_1 + 4g(2)$ ; il reste à voir que $2f_1 = -2n \det P$. Le déterminant $\det P$ n'est pas nul : pour $Y_i = 1$ et $Y_{ij} = 0$ il vaut $2^{2n}$. La matrice $P$ est donc inversible sur le corps des fractions $L$ de $\mathbf{Z}[Y]$, et sur $L$, $f(t) = \det P \cdot \det(1 - t\,P^{-1}\,{}^tU)$, dont le coefficient de $t$ est $-\det P \cdot \operatorname{tr}(P^{-1}\,{}^tU)$. Comme $P$ est symétrique, $P^{-1}$ l'est aussi, et $\operatorname{tr}(P^{-1}\,{}^tU) = \operatorname{tr}\big({}^t(P^{-1}\,{}^tU)\big) = \operatorname{tr}(UP^{-1}) = \operatorname{tr}(P^{-1}U)$. La somme de ces deux traces est $\operatorname{tr}(P^{-1}(U + {}^tU)) = \operatorname{tr}(1) = 2n$. Donc $2f_1 = -2n \det P$ dans $L$, et dans $\mathbf{Z}[Y]$, qui s'injecte dans $L$.

*Deuxième pas :* $\det K$ *est un carré dans* $\mathbf{Z}[Y]$. Sur un corps $k$ de caractéristique différente de 2, une matrice antisymétrique $A$ de taille paire a pour déterminant un carré. On raisonne par récurrence sur la taille ; la diagonale de $A$ est nulle. Si la première ligne est nulle, $\det A = 0$. Sinon, soit $c = A_{1j} \neq 0$, avec $j \neq 1$ ; la permutation qui échange 2 et $j$, appliquée aux lignes et aux colonnes, ne change pas le déterminant et amène $c$ en position $(1,2)$. On découpe alors $A$ en blocs $\begin{pmatrix} E & F \\ G & D \end{pmatrix}$, avec $E = \begin{pmatrix} 0 & c \\ -c & 0 \end{pmatrix}$ inversible de déterminant $c^2$ ; on a $\det A =$

$c^2 \det S$ avec $S = D - GE^{-1}F$. Comme $G = -{}^tF$, ${}^tD = -D$ et ${}^t(E^{-1}) = -E^{-1}$, la matrice $S$ est antisymétrique, de taille deux de moins. Par récurrence $\det S = s^2$, d'où $\det A = (cs)^2$. Appliqué à l'image de $K$ sur $L$, cela donne $\det K = s^2$ avec $s \in L$. L'élément $s$ est racine du polynôme unitaire $T^2 - \det K$ de $\mathbf{Z}[Y][T]$ ; l'anneau $\mathbf{Z}[Y]$ est factoriel, donc intégralement clos, et $s$ est l'image d'un $r \in \mathbf{Z}[Y]$, avec $\det K = r^2$.

*Troisième pas : réduction modulo* 2. Soit $M$ une matrice symétrique à diagonale nulle sur un anneau de caractéristique 2. Dans $\det M = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_i M_{\sigma(i)i}$, les signes valent 1, et $\sigma$ et $\sigma^{-1}$ donnent le même produit, par symétrie de $M$. Les termes des $\sigma$ distinctes de $\sigma^{-1}$ s'annulent donc deux à deux ; ceux des involutions qui ont un point fixe sont nuls, car la diagonale est nulle. Il reste les involutions sans point fixe, c'est-à-dire les couplages parfaits, et pour un couplage le produit est le carré du produit des $M_{ij}$ sur ses arêtes. En caractéristique 2 une somme de carrés est le carré de la somme, d'où $\det M = \left(\sum_{M'} \prod_{\{i,j\} \in M'} M_{ij}\right)^2$. La matrice $\rho(K)$ est symétrique, car $-1 = 1$ dans $\mathbf{F}_2[Y]$, à diagonale nulle, et ses coefficients au-dessus de la diagonale sont les $\rho(Y_{ij})$ ; on obtient $\rho(r)^2 = \rho(\det K) = \rho(B)^2$. En caractéristique 2, $\rho(r - B)^2 = \rho(r)^2 - \rho(B)^2 = 0$, et comme $\mathbf{F}_2[Y]$ est intègre, $\rho(r - B) = 0$. Comme dans l'énoncé du rang impair, $r = B + 2h$ avec $h \in \mathbf{Z}[Y]$, et $\det K = r^2 = B^2 + 4(Bh + h^2)$.

*Conclusion.* Par récurrence sur $n$, $(-1)^n \equiv 1 - 2n \pmod 4$. Donc $(-1)^n \det P \equiv (1 - 2n) \det P \equiv \det K \equiv B^2 \pmod 4$. Si $(-1)^n \det P - B^2 = 4Q$, on prend $C_{2n} = -Q$ ; le morphisme $Y \mapsto y$ envoie $P_{2n}$ sur $P(y)$ et commute au déterminant. □

*Remarque.* L'énoncé tient en tout rang pair, avec le signe $(-1)^n$ que la page « prévoit ». La démonstration ne suit pas les pages 69 et 71, qui comparent $B^2$ et $\Delta$ par les paires de couplages. Elle passe par la matrice antisymétrique $K = U - {}^tU$. Le signe $(-1)^n$ vient du terme du premier ordre, $\det K \equiv (1 - 2n) \det P \pmod 4$ ; la congruence $\det K \equiv B^2$ vient de ce que $\det K$ est le carré d'un polynôme $r$ qui se réduit sur $B$ modulo 2. Ce polynôme $r$ est, au signe près, le pfaffien de $K$, qui manque à mathlib ; il n'est pas construit ici, son existence découle de la clôture intégrale de $\mathbf{Z}[Y]$. Le polynôme $C_{2n}$ n'est écrit qu'en rangs 2 et 4.

**Énoncé** (Pages 117 à 124, la symétrie canonique ♦). *Soient $R$ un anneau commutatif, $T$ un $R$-module, $q$ une forme quadratique sur $T$, $\varphi(x, y) = q(x + y) - q(x) - q(y)$ sa forme polaire, $a \in T$ avec $q(a) = 1$, $\pi = \varphi(a, \cdot)$, $V = \ker \pi$, $E = \pi^{-1}(1)$ et $\sigma(x) = x - \pi(x)\, a$.*

1. *On a $\pi(a) = 2$, $q \circ \sigma = q$ et $\sigma^2 = \mathrm{id}$, et $\sigma$ fixe $V$ point par point.*
2. *Supposons $\varphi$ non dégénérée, au sens où $\varphi(y, \cdot) = 0$ entraîne $y = 0$, et $\pi$ surjective. Une application linéaire $u : T \to T$ qui fixe $V$ point par point et vérifie $q \circ u = q$ est de la forme $u(x) = x - e\, \pi(x)\, a$ avec $e \in R$ idempotent. Réciproquement, pour tout idempotent $e$, cette application préserve $q$ et fixe $V$. Si 0 et 1 sont les seuls idempotents de $R$, alors $u = \mathrm{id}$ ou $u = \sigma$.*
3. *Si 2 est inversible dans $R$, alors $\pi(a/2) = 1$, et pour $x \in E$, $-\sigma(x) \in E$ et $-\sigma(x) - a/2 = -(x - a/2)$. Sur $E$, la transformation projective définie par $\sigma$ est la symétrie de centre $a/2$.*
4. *Si $2 = 0$ dans $R$, alors $\pi(a) = 0$, donc $a \in V$, $\pi \circ \sigma = \pi$, et $\sigma(x) = x - a$ pour $x \in E$ : $\sigma = \mathrm{id} - \pi \otimes a$ est une transvection.*
5. *(Page 124.) Pour $T = M_2(R)$, $q = \det$ et $a = 1$, $\varphi(x, 1) = \det(x + 1) - \det x - 1 = \mathrm{tr}\, x$.*

*Démonstration.* On a $\varphi(a,a) = 2q(a) = 2$. Pour $t \in R$, $q(x+ta) = q(x) + t\,\varphi(a,x) + t^2 q(a)$ ; avec $t = -\pi(x)$, $q(\sigma x) = q(x) - \pi(x)^2 + \pi(x)^2 = q(x)$. Ensuite $\pi(\sigma x) = \pi(x) - 2\pi(x) = -\pi(x)$, d'où $\sigma(\sigma x) = \sigma x + \pi(x)\,a = x$. Si $\pi(v) = 0$, $\sigma v = v$.

Pour le point 2, soient $b$ tel que $\pi(b) = 1$ et $c = u(b) - b$. Pour tout $x$, $x - \pi(x)b$ est dans $V$, donc $u(x) = x + \pi(x)\,c$. Alors $q(ux) = q(x) + \pi(x) f(x)$ avec $f(x) = \pi(x) q(c) + \varphi(x,c)$, forme linéaire, et l'hypothèse donne $\pi(x) f(x) = 0$ pour tout $x$. En $x = b$, $f(b) = 0$. En $x + b$, $0 = (\pi(x)+1)\big(f(x)+f(b)\big) = \pi(x)f(x) + f(x) = f(x)$. Donc $\varphi(c + q(c)\,a, \cdot) = f = 0$, et $c = -q(c)\,a$ par non-dégénérescence. Posons $e = q(c)$ ; alors $e = q(-ea) = e^2$, et $u(x) = x - e\,\pi(x)\,a$. Réciproquement, $q(x - e\,\pi(x)\,a) = q(x) - e\,\pi(x)^2 + e^2\pi(x)^2 = q(x)$. Si $e = 0$, $u = \mathrm{id}$ ; si $e = 1$, $u = \sigma$.

Pour le point 3, $\pi(a/2) = \pi(a)/2 = 1$ ; si $\pi(x) = 1$, $\sigma(x) = x - a$, $\pi(-\sigma x) = -(1-2) = 1$ et $-\sigma(x) - a/2 = a/2 - x$. Pour le point 4, $\pi(a) = 2 = 0$, $\pi(\sigma x) = \pi(x) - \pi(x)\,\pi(a) = \pi(x)$, et $\sigma(x) = x - a$ si $\pi(x) = 1$. Pour le point 5, $\det(x+1) = \det x + \operatorname{tr} x + 1$ pour une matrice $2 \times 2$. □

*Remarque.* La lecture adopte la normalisation $\pi = \varphi(a, \cdot)$, que la page 117 biffe. C'est elle qui donne $\pi(a) = 2$ et $\sigma^2 = \mathrm{id}$ ; la page justifie (21) par « $\pi(a) = 1$ », qui donnerait $\sigma^2 = \sigma$. L'unicité utilise deux hypothèses que la page tire de sa situation : $\varphi$ non dégénérée (« comme $\psi$ est iso ») et $\pi$ surjective, ce que donne la structure d'extension (1). Elle utilise aussi l'absence d'idempotent non trivial. La page conclut de $\lambda(\lambda+1) = 0$ que $\lambda = -1$ hors de l'identité ; sur un anneau quelconque les solutions sont les $\lambda = -e$, $e$ idempotent. Sur $R = R_1 \times R_2$ et pour $e = (1,0)$, le point 2 donne une isométrie qui fixe $V$ et qui vaut $\sigma$ au-dessus de la première composante et l'identité au-dessus de la seconde. La Proposition de la marge vaut donc sur une base connexe, ou fibre à fibre. L'énoncé formalisé traite l'invariance $q \circ u = q$ ; l'invariance à une unité près, $q \circ u = \lambda q$, dont la page déduit $\lambda = 1$ en rang au moins 3, n'est pas formalisée. Sur la page 124 la polaire de det est écrite avec le signe opposé, d'où $\pi = -\operatorname{tr}$ et la remarque « attention au signe ! » ; avec la convention $\varphi(x,y) = q(x+y) - q(x) - q(y)$, $\pi$ est la trace et $\pi(1) = 2$.

Ne sont pas démontrés ici : une expression de $C$ en rang pair $2n \geq 6$ ; le développement de $\Delta$ en graphes des pages 65 à 67 ; les équivalences de la page 127 entre l'inversibilité de $\delta'(q)$, la lissité de $V(q)$ et l'isomorphie locale à la forme standard ; l'invariance de $q$ à une unité près et $\lambda = 1$ en rang au moins 3 (page 123) ; l'équivalence du Scholie (page 120) entre les $(P,Q,H)$ et les $(T,q,a)$ ; la symétrie (22) du rang impair et la structure $G \simeq G^0 \times \mathbf{Z}/2$ annoncée page 125 ; les parties I à III et V du dossier : revêtements quadratiques, extension à travers 2, groupes orthogonaux.

**Contre-exemple 27.2** (page 85, extension à travers 2 ♦). *La proposition de la page 85 porte sur $A$ noethérien où 2 est régulier, $A/2A$ intègre et normal, $\Delta \notin 2A$ ; sa condition c) demande que $A_{2\Delta}[U]/(U^2 - \Delta)$ se prolonge en une extension finie de $A_\Delta$, le mot « étale » étant biffé. Ainsi écrite, c) n'entraîne pas a). Pour $A = \mathbf{Z}$ et $\Delta = 3$, l'algèbre $\mathbf{Z}[1/3][\sqrt{3}]$ est finie sur $\mathbf{Z}[1/3]$ et redonne $\mathbf{Z}[1/6][\sqrt{3}]$ quand on inverse 2, mais 3 n'est pas de la forme $b^2 - 4c$ avec $b, c \in \mathbf{Z}$, puisque $b^2 - 4c \equiv 0$ ou $1 \pmod 4$.*

◊ *non vérifié en Lean*

Avec « finie étale » dans c), comme le lit l'édition, la proposition et son corollaire 3 (page 63) ne sont pas démontrés ici.

# 28 Cote 79 : graphes à homothéties, commutant et étoiles sur $(\mathbf{Z}/n)^{229}$

La cote 79, *Géométrie et topologie combinatoire*, compte deux cent quatre-vingt-quinze pages. Elle part des triangles d'un module libre $M$ de rang $2$ sur un anneau commutatif $\Lambda$ : les sommets sont les éléments de $M^*$, vecteurs qui font partie d'une base, pris au signe près, et une arête de type $\pm e$ joint $\dot{x}$ et $\dot{y}$ quand $x \wedge y = \pm e$. Pour $\Lambda = \mathbf{Z}/n$ on obtient les polyèdres $P_{M,i}$, un par type $i \in \Lambda^*/\pm 1$. Page 19, la page relie deux sommets par $z = \lambda x + \lambda y$ quand $e = \lambda\, x \wedge y$ ; page 20, elle cite comme connu que deux éléments de $M^*$ ont sur un anneau semi-local un partenaire de base commun, et en tire la distance au plus $3$, « atteinte pour l'icosaèdre » (79, lot 1, p. 19, 79, lot 1, p. 20). Pages 92 à 95, elle calcule le commutant de $\mathrm{SL}(M)$ et de $\mathrm{SL}(M)/\pm 1$ par le normalisateur du stabilisateur d'un point ; elle trouve l'exception $2\Lambda = \{0, 2\} \neq \{0\}$, un élément $\sigma$ induit par la matrice de lignes $(1, 0)$ et $(2, 1)$, un produit « direct (pas seulement ½direct !) », et pour $\Lambda = \mathbf{Z}/4$ l'antipodie de l'octaèdre ; une formule biffée y donne $\sigma(\dot{x}) = (x + 2y)^{\cdot}$ (79, lot 5, p. 93, 79, lot 5, p. 94, 79, lot 5, p. 95). Pages 136 à 140, le « fait mirifique » : $(\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$ opère sur les structures de polygone d'un ensemble à $n$ éléments, et l'axiome To 6 demande qu'une homothétie redessine chaque étoile en polygone étoilé (79, lot 7, p. 138, 79, lot 7, p. 139). Pages 187 et 188, elle examine si une homothétie $\lambda$ d'un 2-polyèdre régulier tord la triangulation en une autre ; la condition (32) a″) demande que $\lambda^{-1}s$ soit à distance au plus $3$ de $s$, « et en fait, égale à 3 », sauf pour l'identité et pour l'antipodie de l'octaèdre (distance $2$) ; la distance $1$ est exclue par les stabilisateurs, et la distance $2$ donnerait deux sommets de même étoile. La phrase porte un mot illisible et deux lectures incertaines (79, lot 10, p. 188). Pages 242 à 247, la page traduit un graphe homogène muni d'un groupe d'homothéties en données de théorie des groupes $(H, U_0, \sigma, T_H)$ et énonce l'équivalence (88), avec en marge « [ ] résulte des autres » ; la réciproque, page 247, porte plusieurs mots illisibles (79, lot 13, p. 242, 79, lot 13, p. 245, 79, lot 13, p. 247). Pages 275 à 279, elle demande si un sommet est déterminé par son étoile, répond sur un anneau semi-local par la même exception, et construit l'involution $a$, de déterminant $-1$ (79, lot 14, p. 276, 79, lot 14, p. 277, 79, lot 14, p. 278).

*Conventions.* Pour un groupe $H$, un sous-groupe $U_0$ et $\sigma \in H$, le graphe de classes a pour sommets $S = H/U_0$, pour origine $s_0 = U_0$ et $t_0 = \sigma U_0$ ; les arcs sont les $(hs_0, ht_0)$, $h \in H$. On note $U_1 = \sigma U_0 \sigma^{-1}$, stabilisateur de $t_0$. Les hypothèses $\sigma^2 \in U_0$ (l'élément $\sigma$ échange $s_0$ et $t_0$) et $U_0 \cap U_1 = 1$ disent que $H$ est simplement transitif sur les arcs. Un *groupe d'homothéties* est un sous-groupe $Z$ du groupe des permutations de $S$ dont les éléments commutent à $H$, envoient chaque arc $(s, t)$ sur un arc $(\lambda s, \lambda^{-1} t)$, et vérifient la fidélité (72) : si $u \in H$ fixe $s_0$ et envoie $t_0$ sur $\lambda t_0$, alors $\lambda = 1$. Pour le rang $2$, $R$ est un anneau commutatif quelconque, $M = R^2$, $x \wedge y = x_0 y_1 - x_1 y_0$, et $S_M = M^*/\pm 1$, où $x \in M^*$ s'il existe $y$ avec $x \wedge y = 1$. Le groupe $\mathrm{SL}(2, R)$ opère sur $S_M$, et $c \in R^*$ par $\dot{x} \mapsto (cx)^{\cdot}$. On dit que $R$ est *exceptionnel* si $2s \in \{0, 2\}$ pour tout $s \in R$, c'est-à-dire $2R \subset \{0, 2\}$ ; avec $2 \neq 0$, c'est $2R = \{0, 2\} \neq \{0\}$.

**Énoncé** (Pages 242 à 247, (88) et (89) ♦). *Soient $H$, $U_0$, $\sigma$ comme ci-dessus, avec $\sigma^2 \in U_0$ et $U_0 \cap U_1 = 1$. Appelons tore un sous-groupe $T \subset H$ tel que (a) $\sigma t \sigma^{-1} = t^{-1}$ pour $t \in T$, (b) $T$ normalise $U_0$, (c) l'application $U_0 \times T \times U_1 \to H$, $(u_0, t, u_1) \mapsto u_0 t u_1$, est injective.*

1. *Pour un groupe d'homothéties $Z$, $T_H = \{u \in H \mid \exists \lambda \in Z,\ us_0 = \lambda s_0,\ ut_0 = \lambda^{-1} t_0\}$ est un sous-groupe, et c'est un tore.*

[29] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder79.lean`.

2. *Pour un tore $T$, les permutations $\lambda$ de $S$ qui commutent à $H$ et vérifient $\lambda s_0 = t s_0$ pour un $t \in T$, c'est-à-dire $hU_0 \mapsto htU_0$, forment un groupe d'homothéties $Z_T$.*

3. *Les applications $Z \mapsto T_H$ et $T \mapsto Z_T$ sont des bijections réciproques entre groupes d'homothéties et tores.*

4. *Un groupe d'homothéties est commutatif, et cela sans l'hypothèse $U_0 \cap U_1 = 1$.*

*Démonstration.* Une permutation qui commute à $H$ est déterminée par l'image de $s_0$, puisque $\lambda(hs_0) = h\lambda(s_0)$. Deux éléments de $H$ qui coïncident sur $s_0$ et sur $t_0$ sont égaux, puisque $U_0 \cap U_1 = 1$. Comme $\sigma^2$ est dans $U_0$ et dans $U_1$, $\sigma^2 = 1$.

Commutativité. Soient $\lambda, \mu \in Z$ et $u, v, w \in H$ tels que $u(s_0, t_0) = (\lambda s_0, \lambda^{-1} t_0)$, $v(s_0, t_0) = (\mu s_0, \mu^{-1} t_0)$, $w(s_0, t_0) = (\mu\lambda s_0, (\mu\lambda)^{-1} t_0)$ ; ils existent par la condition d'homothétie appliquée à l'arc $(s_0, t_0)$. L'élément $w^{-1}uv$ fixe $s_0$ et envoie $t_0$ sur $c\, t_0$, avec $c = \mu^{-1}\lambda^{-1}\mu\lambda$. La fidélité donne $c = 1$.

Point 1. Si $u$ correspond à $\lambda$ et $v$ à $\mu$, $uv$ correspond à $\mu\lambda$, grâce à la commutativité ; $u^{-1}$ correspond à $\lambda^{-1}$. Pour (a), $\sigma u \sigma^{-1}$ et $u^{-1}$ envoient tous deux $s_0$ sur $\lambda^{-1} s_0$ et $t_0$ sur $\lambda t_0$, donc sont égaux. Pour (b), si $u \in U_0$ et $t$ correspond à $\lambda$, $tut^{-1} s_0 = t\lambda^{-1} u s_0 = \lambda^{-1} t s_0 = s_0$. Pour (c), soit $atb = a't'b'$. On pose $c' = t'^{-1} a'^{-1} a t' \in U_0$, $r = t'^{-1} t \in T_H$ et $d = bb'^{-1} \in U_1$ ; alors $c' r d = 1$. Si $r$ correspond à $\lambda$, $c'^{-1} = rd$ fixe $s_0$ et envoie $t_0$ sur $r t_0 = \lambda^{-1} t_0$ ; la fidélité donne $\lambda = 1$, donc $r$ fixe $s_0$ et $t_0$ et $r = 1$. Il reste $c'd = 1$, avec $d \in U_0 \cap U_1$, d'où $d = 1$, $c' = 1$, et $(a, t, b) = (a', t', b')$.

Point 2. L'ensemble $Z_T$ est un sous-groupe : si $\lambda s_0 = t s_0$ et $\mu s_0 = t' s_0$, alors $\lambda\mu s_0 = t' t s_0$ et $\lambda^{-1} s_0 = t^{-1} s_0$. De (a) on tire $\sigma t^{-1} = t\sigma$, d'où $\lambda^{-1} t_0 = \sigma\lambda^{-1} s_0 = \sigma t^{-1} s_0 = t t_0$ : l'arc $(\lambda h s_0, \lambda^{-1} h t_0)$ est l'image par $ht$ de $(s_0, t_0)$. Pour la fidélité, soit $u \in U_0$ avec $u t_0 = \lambda t_0 = \sigma t s_0$. Alors $a = t^{-1}\sigma^{-1} u \sigma \in U_0$, et $b = \sigma^{-1} u \sigma$ est dans $U_1$ puisque $\sigma^{-1} b \sigma = u$. L'égalité $(tat^{-1})\, t \cdot 1 = 1 \cdot 1 \cdot b$ et l'injectivité (c) donnent $t = 1$, donc $\lambda s_0 = s_0$ et $\lambda = 1$.

Point 3. Si $\lambda \in Z$, un $u$ associé à $\lambda$ par la condition d'homothétie est dans $T_H$ et $\lambda s_0 = u s_0$, donc $\lambda \in Z_{T_H}$ ; réciproquement, si $\lambda \in Z_{T_H}$, $\lambda s_0 = t s_0 = \mu s_0$ pour un $\mu \in Z$, et $\lambda = \mu$. Si $t \in T$, la permutation $hU_0 \mapsto htU_0$, bien définie parce que $t$ et $t^{-1}$ normalisent $U_0$, est dans $Z_T$ et lui associe $t$, donc $t \in T_{Z_T}$ ; réciproquement, si $u$ est associé à $\lambda \in Z_T$ avec $\lambda s_0 = t s_0$, $u$ et $t$ coïncident sur $s_0$ et sur $t_0$, donc $u = t$. □

*Remarque.* Les deux sens de l'équivalence tiennent, y compris la réciproque que la page 247 vérifie sur des lignes en partie illisibles. La commutativité de $Z$, que la piste suppose et que la page met entre crochets, découle de la condition d'homothétie et de la fidélité (72), ce que dit la marge « [ ] résulte des autres » ; la démonstration n'utilise pas la simple transitivité. La fidélité de $H$ sur $H/U_0$, condition (77), n'intervient nulle part, ni $s_0 \neq t_0$. La condition d'homothétie est prise sous la forme corrigée par la lecture, $u(s_0, t_0) = (\lambda s_0, \lambda^{-1} t_0)$. L'isomorphisme $T_H \simeq Z$ de (81') n'est pas formalisé comme morphisme de groupes, seulement la bijection entre les deux familles.

**Théorème 28.1** (Grothendieck, pages 92 à 95, le commutant ♦). *Soit $R$ un anneau commutatif.*

1. *Si $R$ est exceptionnel, l'application $\sigma(\dot{x}) = (x + 2y)\dot{}$, pour un $y$ tel que $x \wedge y = 1$, est bien définie sur $S_M$. Elle commute à $\mathrm{SL}(2, R)$ et aux scalaires, et $\sigma^2 = 1$. Si de plus $2 \neq 0$, $\sigma(v) \neq cv$ pour tout $c \in R^*$ et tout $v$ ; en particulier $\sigma$ n'a pas de point fixe.*

2. *Les scalaires commutent à $\mathrm{SL}(2, R)$, et $c$, $c'$ agissent de même si et seulement si $c' = \pm c$.*

3. *Toute application $f : S_M \to S_M$ qui commute à* $\mathrm{SL}(2,R)$ *est un scalaire, ou bien $R$ est exceptionnel et $f = c\,\sigma$ pour un $c \in R^*$.*

4. *Sur $\mathbf{Z}/n$, $2R = \{0,2\} \neq \{0\}$ si et seulement si $n = 4$ ; pour $n \neq 4$ le commutant est formé des scalaires.*

5. *Sur $\mathbf{Z}/4$, si $x \wedge y = 1$, les $z \in M^*$ tels que $x \wedge z$ ne soit pas inversible sont $\pm x$ et $\pm(x+2y)$ : $\sigma(\dot{x})$ est le seul sommet autre que $\dot{x}$ qui ne lui soit pas adjacent, l'antipode sur l'octaèdre.*

*Démonstration.* Si $x \wedge y = 1$, tout $z$ s'écrit $z = (z \wedge y)\,x + (x \wedge z)\,y$. Dans un anneau exceptionnel, $4 = 0$ (car $2 \cdot 2 \in \{0,2\}$) et $2c = 2$ pour tout $c$ inversible.

Point 1. Deux partenaires de $x$ diffèrent d'un multiple $tx$ ; comme $2t \in \{0,2\}$ et $4 = 0$, $x + 2y' = x + 2y$ ou $x + 2y' = -(x+2y)$. Le passage de $x$ à $-x$ change $y$ en un partenaire de $-x$ et donne de même $\pm(x+2y)$ ; $\sigma$ est donc bien définie. Si $g \in \mathrm{SL}(2,R)$, $gy$ est un partenaire de $gx$, d'où $\sigma g = g\sigma$. Comme $(x+2y) \wedge y = 1$, $\sigma^2(\dot{x}) = (x+4y)^{\cdot} = \dot{x}$. Pour $c \in R^*$, $c^{-1}y$ est un partenaire de $cx$ et $2c^{-1} = 2c = 2$, d'où $\sigma(c\dot{x}) = c\,\sigma(\dot{x})$. Si $x + 2y = \pm cx$, on applique $x \wedge \cdot$ : $2 = 0$.

Point 3. Soit $v = (p,q)$ un représentant de $f(\dot{e}_1)$, avec $e_1 = (1,0)$. Les matrices de lignes $(1,t)$ et $(0,1)$ fixent $\dot{e}_1$, donc $(p+tq, q) = \pm(p,q)$ pour tout $t$. Pour $t = 1$ : ou bien $q = 0$, et $p$ est inversible puisque $v \in M^*$ ; ou bien $2q = 0$ et $q = -2p$. Dans ce second cas $p(s+2r) = 1$ si $v \wedge (r,s) = 1$, donc $p$ est inversible. Pour $a \in R$ et $t = ap^{-1}$, $tq = -2a$, et la condition donne $2a = 0$ ou $2a = 2p$. Avec $a = 1$, $2p = 2$ ; donc $2a \in \{0,2\}$ pour tout $a$, $R$ est exceptionnel, et $q = -2p = 2$. Pour $\dot{x}$ quelconque, soit $g$ la matrice de colonnes $x$ et $y$, avec $x \wedge y = 1$ ; alors $g\dot{e}_1 = \dot{x}$ et $f(\dot{x}) = gf(\dot{e}_1) = (px+qy)^{\cdot}$. Si $q = 0$, c'est $p\dot{x}$. Sinon c'est $(px+2y)^{\cdot} = (p(x+2y))^{\cdot} = p\,\sigma(\dot{x})$, puisque $2p = 2$.

Point 4. Si $2 \cdot 2 \in \{0,2\}$ dans $\mathbf{Z}/n$, $n$ divise $4$ ou $2$ ; on écarte $n = 1, 2$ par $2 \neq 0$ et l'on vérifie $n = 4$ par calcul. Si $R$ n'est pas exceptionnel, le point 3 donne un scalaire ; si $2 = 0$, $\sigma$ est l'identité. Point 5. On écrit $z = ax + by$ avec $b = x \wedge z$ non inversible, donc $b \in \{0,2\}$. Comme $z \in M^*$, $a$ est inversible, donc $a = \pm 1$, et $-x + 2y = -(x+2y)$. □

*Remarque.* L'énoncé tient sur tout anneau commutatif, sans l'hypothèse $2 \neq 0$ : quand $2 = 0$, $R$ est exceptionnel au sens adopté ici mais $\sigma$ est l'identité, et le commutant se réduit aux scalaires. L'application $f$ n'a pas à être supposée bijective. Le produit direct de la page est confirmé : $\sigma$ commute aux scalaires, $\sigma^2 = 1$, et $\sigma \neq c$ pour tout $c$, de sorte que le commutant est $R^*/\pm 1 \times \{1, \sigma\}$. La démonstration ne passe pas par le normalisateur $N_{G'}(H')$ : elle fixe l'image de $\dot{e}_1$, ce qui revient au même calcul. La formule biffée de la page 95, $\sigma(\dot{x}) = (x+2y)^{\cdot}$, est celle que l'on démontre ; l'élément $\sigma$ envoie $\dot{e}_1$ sur la classe de $(1,2)$, image de $e_1$ par la matrice de lignes $(1,0)$ et $(2,1)$.

**Énoncé** (Pages 275 à 279, un sommet et son étoile ♦). *Soient $R$ un anneau commutatif, $x, y \in M$ avec $x \wedge y = 1$, et $x' \in M$.*

1. *On a l'équivalence : pour tout $z$ tel que $x \wedge z$ soit inversible, $x' \wedge z = \pm\, x \wedge z$, si et seulement si $x' = \pm x$, ou bien $R$ est exceptionnel et $x' = \pm(x+2y)$, c'est-à-dire $\dot{x}' = \sigma(\dot{x})$.*

2. *Si $R$ est exceptionnel, la matrice $A$ de lignes $(1,2)$ et $(2,-1)$ vérifie $Ax = \pm(x+2y)$ ; elle a pour déterminant $-1$ et $A^2 = 1$.*

*Démonstration.* On écrit $x' = \alpha x + \beta y$, avec $\alpha = x' \wedge y$ et $\beta = x \wedge x'$. Pour $s \in R$, $z = y + sx$ vérifie $x \wedge z = 1$ et $x' \wedge z = \alpha - s\beta$. L'hypothèse donne $\alpha - s\beta = \pm 1$ pour tout $s$. Avec $s = 0$, $\alpha = \pm 1$. Si $\alpha = 1$, $s = 1$ donne $\beta = 0$, d'où $x' = x$, ou $\beta = 2$ ; dans ce dernier cas, $1 - 2s = \pm 1$ donne $2s \in \{0, 2\}$ pour tout $s$, et $x' = x + 2y$. Le cas $\alpha = -1$ donne de même $x' = -x$, ou $\beta = -2$ et $x' = -(x + 2y)$. Réciproquement, $(x + 2y) \wedge z = x \wedge z - 2(z \wedge y)$ ; si $2(z \wedge y) = 0$ c'est $x \wedge z$, et si $2(z \wedge y) = 2$ c'est $x \wedge z - 2 = -x \wedge z$, puisque $2(x \wedge z) = 2$ pour $x \wedge z$ inversible.

Pour le point 2, on note $x = (p, q)$, $y = (r, s)$, avec $ps - qr = 1$. Chacun de $2p, 2q, 2r, 2s$ vaut 0 ou 2, et $2(ps) = (2p)s$ vaut 0 si $2p = 0$, $2s$ si $2p = 2$. On examine les seize cas ; l'égalité $2(ps) - 2(qr) = 2$ en écarte une partie, et dans les autres on a $2q = 2r$ et $2p = 2q + 2s$, ce qui donne $Ax = x + 2y$, ou bien $2p + 2q + 2r = 0$ et $2p = 2s$, ce qui donne $Ax = -(x + 2y)$. Enfin $\det A = -1 - 4 = -1$ et $A^2 = 5 \cdot 1 = 1$. □

*Remarque.* L'hypothèse « semi-local » de la page n'est pas nécessaire : l'énoncé tient sur tout anneau commutatif, et la démonstration n'utilise ni les corps résiduels ni le lemme de colinéarité de la page 276. Il suffit des voisins $y + sx$ d'un seul type, ceux pour lesquels $x \wedge z = 1$. L'énoncé dit aussi que, dans le cas exceptionnel, le seul sommet autre que $\dot{x}$ qui ait la même étoile est $\sigma(\dot{x})$ : la question que la page laisse ouverte (« il n'est pas vrai nécessairement … ») est donc tranchée dans ce cadre algébrique, où l'étoile est prise type par type. La transcription signale à la page 277 la conclusion $\alpha - \beta \in \pm(\alpha - \beta)$, qui doit se lire $\alpha + \beta \in \pm(\alpha - \beta)$ ; la démonstration ci-dessus ne passe pas par elle. L'involution $a$ de la page 278 est l'élément $\sigma$ de l'énoncé précédent, et la matrice $A$ réalise le déterminant $-1$ annoncé, sur tout anneau exceptionnel ; pour $\mathbf{Z}/4$ c'est la matrice que la lecture vérifie. Le lemme combinatoire de la page 275 (deux sommets distincts de même étoile forment un double cône) n'est pas formalisé.

**Énoncé** (Pages 19 et 20, distance au plus 3 ♦ ■). *Soit $R$ un anneau commutatif qui n'a qu'un nombre fini d'idéaux maximaux.*

1. *Si $a_0 d + b_0 d' = 1$, il existe $a \in R$ tel que $ad + d'$ soit inversible.*
2. *Pour tout $e \in R^*$ et tous $x, y \in M^*$, il existe $z_1, z_2 \in M^*$ avec $x \wedge z_1 = z_1 \wedge z_2 = z_2 \wedge y = e$ : deux sommets de $SP_M$ sont à distance au plus 3.*

*Cela vaut en particulier pour un anneau local, un corps, et $\mathbf{Z}/n$ pour $n \geq 1$.*

Le point 2 donne un chemin de trois arêtes de type $e$ entre deux sommets quelconques :

$$\dot{x} \overset{e}{\text{———}} \dot{z}_1 \overset{e}{\text{———}} \dot{z}_2 \overset{e}{\text{———}} \dot{y} \qquad x \wedge z_1 = z_1 \wedge z_2 = z_2 \wedge y = e.$$

*Démonstration.* Point 1. Pour chaque idéal maximal $\mathfrak{m}$, on choisit $x_\mathfrak{m} = 0$ si $d \in \mathfrak{m}$, et sinon $x_\mathfrak{m} = c(1 - d')$ avec $cd \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$. Les idéaux maximaux distincts sont étrangers, et le théorème chinois donne $a$ avec $a \equiv x_\mathfrak{m} \pmod{\mathfrak{m}}$ pour tout $\mathfrak{m}$. Si $ad + d'$ était dans un idéal maximal $\mathfrak{m}$ : quand $d \in \mathfrak{m}$, $d' \in \mathfrak{m}$, et $1 = a_0 d + b_0 d' \in \mathfrak{m}$ ; quand $d \notin \mathfrak{m}$, $ad + d' \equiv c(1 - d')d + d' \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$. Les deux cas sont impossibles, donc $ad + d'$ est inversible.

Point 2. Soient $w$ et $y'$ avec $x \wedge w = 1$ et $y \wedge y' = 1$. L'identité $(x \wedge y)(w \wedge y') - (x \wedge y')(w \wedge y) = (x \wedge w)(y \wedge y')$ donne $(w \wedge y')\, d - (x \wedge y')\, d' = 1$ pour $d = x \wedge y$ et $d' = w \wedge y$. Par le point 1, $u = ad + d'$ est inversible pour un $a$. Le vecteur $z = ax + w$ vérifie $x \wedge z = 1$ et $z \wedge y = u$. On pose $z_1 = ez$, d'où $x \wedge z_1 = e$ et $z_1 \wedge y = eu$, puis, suivant la page 19, $z_2 = u^{-1}(z_1 + y)$ : $z_1 \wedge z_2 = u^{-1}eu = e$ et $z_2 \wedge y = e$. Les vecteurs $z_1$ et $z_2$ sont dans $M^*$, puisque $z_1 \wedge y$ et $z_2 \wedge y$ sont inversibles. Un anneau local n'a qu'un idéal maximal ; un anneau fini n'a qu'un nombre fini d'idéaux. □

*Remarque.* L'énoncé tient sur tout anneau semi-local, au sens où l'ensemble des idéaux maximaux est fini. Pour $\Lambda = \mathbf{Z}/n$ et $n \geq 5$, le diamètre 3 du graphe est le théorème 11 de Singerman et Strudwick, mis en ligne en 2018 et publié en 2020 [42] (numérotation de la version arXiv). Le fait que la page cite comme connu (« on sait que ») est le rang stable 1 des anneaux semi-locaux, dû à Bass (1964, § 4 et lemme 6.4) [4] ; il est démontré ici par le théorème chinois. La démonstration ne construit pas un partenaire commun dans chaque corps résiduel comme le propose la lecture : elle cherche ce partenaire sur la droite $ax + w$, où $x \wedge z = 1$ est automatique. La borne est atteinte sur $\mathbf{Z}/n$ dès que $(\mathbf{Z}/n)^*$ contient un $\mu \neq \pm 1$, c'est-à-dire pour $n \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, en particulier pour l'icosaèdre ($n = 5$) : c'est le point 4 de l'énoncé de la page 188 ci-dessous. Le cas $n = 6$, que couvre le théorème de Singerman et Strudwick pour $n \geq 5$, n'est pas formalisé. Le cas $\Lambda = \mathbf{Z}$, qui n'est pas semi-local, n'est pas traité.

**Énoncé** (Pages 96 à 101 et 136 à 140, la torsion dans le modèle ♦). *Soient $R$ un anneau commutatif, $e, \mu \in R^*$ et $x, y \in M$ avec $x \wedge y = e$.*

1. *(Torsion d'une extrémité.) $x \wedge \mu y = \pm \mu e$ si et seulement si $x \wedge y = \pm e$ : les arêtes $\{\dot{x}, \mu\dot{y}\}$, pour $\{\dot{x}, \dot{y}\}$ arête de type $\pm e$, sont les arêtes de type $\pm\mu e$. De même $\mu x \wedge z = \pm \mu e$ si et seulement si $x \wedge z = \pm e$ : l'étoile de $\dot{x}$ dans $P_{M,\pm e}$ est, comme partie de $S_M$, l'étoile de $\mu\dot{x}$ dans $P_{M,\pm\mu e}$.*
2. *(L'étoile est une droite.) Si $x \wedge z = e$, alors $z = y + kx$ avec $k = z \wedge e^{-1}y$.*
3. *(Formule (178), page 67, 79, lot 4, p. 67.) Si $x \wedge z = \pm e$ et $z \wedge y = \pm e$, alors $z = ax + by$ avec $a, b \in \{1, -1\}$.*
4. *(Le polygone étoilé.) Pour $k, k' \in R$, $(y + kx) \wedge (y + k'x) = (k - k')\, e$ ; ces deux points sont joints par une arête de type $\pm\mu e$ si et seulement si $k - k' = \pm\mu$.*
5. *(L'indice.) $\mu(y + kx) = \mu y + (\mu k)x$, et $x \wedge \mu y = \mu\,(x \wedge y)$.*

*Démonstration.* Les points 1 et 5 viennent de la bilinéarité : $x \wedge \mu y = \mu\, x \wedge y$, et l'on simplifie par $\mu$ inversible. Pour le point 2, $(x, e^{-1}y)$ est une base de déterminant 1 et $z = (z \wedge e^{-1}y)\, x + (x \wedge z)\, e^{-1}y$. Le point 3 se lit sur la même décomposition : les coefficients sont $e^{-1}(z \wedge y)$ et $(x \wedge z)e^{-1}$, égaux à $\pm 1$. Pour le point 4, $(y + kx) \wedge (y + k'x) = k'(y \wedge x) + k(x \wedge y) = (k - k')e$, et $(k - k')e = \pm\mu e$ équivaut à $k - k' = \pm\mu$. □

*Remarque.* Ces identités vérifient le calcul de la lecture dans le modèle, et non l'énoncé abstrait de la piste. Sur l'étoile de $\dot{x}$, indexée par $k \mapsto (y + kx)^{\cdot}$, le polyèdre $P_{M,\pm e}$ induit le polygone $k \sim k \pm 1$ et $P_{M,\pm\mu e}$ le polygone $k \sim k \pm \mu$, sa puissance $\mu$-ième. La multiplication par $\mu$ envoie l'indice $k$ sur $\mu k$ : l'exposant est $\mu$ lui-même, sans la puissance illisible des formules (65) et (66), ce que la lecture avait calculé. Les identités tiennent sur tout anneau commutatif, et pas seulement sur $\mathbf{Z}/n$. Ne sont pas formalisés : l'action fidèle de $(\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$ sur les structures de polygone d'un ensemble quelconque à $n$ éléments, l'axiome To 6 dans le cadre abstrait et l'injection $Z \hookrightarrow (\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$ qui en découle hors de l'octaèdre, et la comparaison avec les opérateurs de Wilson.

**Théorème 28.2** (Grothendieck, page 188, distance d'un sommet à son image ♦). *1. (Cadre abstrait.) Soient $H$, $U_0$, $\sigma$ comme ci-dessus, avec $\sigma^2 \in U_0$, et $\lambda \neq 1$ une permutation de $S = H/U_0$ qui commute à $H$. Alors $\lambda$ n'a pas de point fixe ; si $\lambda s$ est voisin de $s$, c'est le seul voisin de $s$ ; si $s$ et $\lambda s$ ont un voisin commun, ils ont les mêmes*

*voisins. En particulier, si $s$ a au moins deux voisins et si aucun autre sommet n'a les voisins de $s$, alors $\lambda s$ n'est ni $s$, ni un voisin de $s$, ni à distance $2$ de $s$ ; s'il est à distance au plus $3$, il est à distance $3$.*

2. *(Modèle, sur un anneau commutatif $R$ non nul.) Soient $e \in R^*$ et, sur $S_M$, le graphe des arêtes de type $\pm e$ : $\dot{x}$ et $\dot{z}$ sont adjacents si $x \wedge z = \pm e$. Soit $f \neq \mathrm{id}$ une application de $S_M$ dans lui-même qui commute à $\mathrm{SL}(2, R)$. Pour tout sommet $v$, $f(v) \neq v$, $f(v)$ n'est pas adjacent à $v$, et $v$ et $f(v)$ ont un voisin commun si et seulement si $R$ est exceptionnel et $f = \sigma$. Pour $f = \sigma$, un voisin commun de $\dot{x}$ et $\sigma(\dot{x})$ est $(ey)^{\cdot}$, si $x \wedge y = 1$.*

3. *Si de plus $R$ n'a qu'un nombre fini d'idéaux maximaux et si $f \neq \sigma$, chaque sommet $v$ est à distance $3$ de $f(v)$.*

4. *Sur $\mathbf{Z}/n$, $n \geq 2$, pour $\mu \in (\mathbf{Z}/n)^*$ avec $\mu \neq \pm 1$ et tout type $\pm e$, chaque sommet $\dot{x}$ est à distance $3$ de $\mu\dot{x}$.*

*Démonstration.* Point 1. Une permutation qui commute à $H$ et fixe un sommet $hs_0$ fixe $s_0$, donc est l'identité. Les arcs sont permutés par $H$, et $\sigma^2 \in U_0$ rend le graphe non orienté : $h\sigma$ envoie $(s_0, t_0)$ sur $(ht_0, hs_0)$. Si $(s, t)$ et $(s, t')$ sont des arcs, images de $(s_0, t_0)$ par $k$ et $k'$, alors $g = k'k^{-1}$ fixe $s$ et envoie $t$ sur $t'$ : le stabilisateur de $s$ est transitif sur les voisins de $s$. Il fixe aussi $\lambda s$, puisque $\lambda(gs) = g\lambda s$. Si $\lambda s$ est voisin de $s$ et $t'$ un autre voisin, on prend $g$ fixant $s$ avec $g\lambda s = t'$, d'où $t' = \lambda s$. Si $t$ est voisin de $s$ et de $\lambda s$, et $t'$ voisin de $s$, on prend $g$ fixant $s$ avec $gt = t'$ ; l'arête $\{t, \lambda s\}$ a pour image $\{t', \lambda s\}$. Dans l'autre sens, si $t'$ est voisin de $\lambda s$, on prend $g$ fixant $\lambda s$ avec $gt = t'$ ; alors $\lambda(gs) = \lambda s$, donc $gs = s$ par injectivité de $\lambda$, et l'arête $\{s, t\}$ a pour image $\{s, t'\}$. Les deux hypothèses du point 1 excluent alors les distances $0$, $1$ et $2$.

Point 2. Par l'énoncé du commutant, $f$ est un scalaire $c$, ou bien $R$ est exceptionnel et $f = c\sigma$. Si $f = c$, $f \neq \mathrm{id}$ donne $c \neq \pm 1$. Si $cx = \pm x$, on applique $\cdot \wedge y$ : $c = \pm 1$, exclu. On a $x \wedge cx = 0 \neq \pm e$, puisque $R$ est non nul. Si $x \wedge z = \varepsilon_1 e$ et $z \wedge cx = \varepsilon_2 e$, avec $\varepsilon_i = \pm 1$, alors $-c\varepsilon_1 e = \varepsilon_2 e$, et $c = \pm 1$ en simplifiant par $e$. Si $f = c\sigma$ et $2 = 0$, $\sigma$ est l'identité et l'on est dans le cas précédent. Supposons $2 \neq 0$, de sorte que $f(\dot{x}) = (c(x + 2y))^{\cdot}$ avec $2c = 2$. Si $c(x + 2y) = \pm x$, on applique $x \wedge \cdot : 2 = 0$, exclu. On a $x \wedge c(x + 2y) = 2c = 2$ ; si $2 = \pm e$, $2$ est inversible, et $2 \cdot 2^{-1} \in \{0, 2\}$ donne $1 = 0$ ou $1 = 2$, impossible dans un anneau non nul. Soit enfin $z$ voisin de $\dot{x}$ et de $f(\dot{x})$, avec $x \wedge z = \varepsilon_1 e$ et $b = z \wedge y$. Alors $z \wedge c(x + 2y) = c(-\varepsilon_1 e + 2b)$, avec $2b \in \{0, 2\}$ et $2 = 2e$ ; comme $4 = 0$, $-\varepsilon_1 e + 2b = \pm e$ dans tous les cas, et l'égalité $c(\pm e) = \varepsilon_2 e$ donne $c = \pm 1$, donc $f = \sigma$. Réciproquement, $x \wedge ey = e$ et $ey \wedge (x + 2y) = -e$.

Points 3 et 4. Sur un anneau semi-local, deux sommets quelconques sont joints par un chemin de longueur $3$ formé d'arêtes de type $e$ (énoncé des pages 19 et 20). Sur $\mathbf{Z}/n$, $n \geq 2$, l'anneau est fini et non nul, et l'on applique le point 2 aux scalaires. □

*Remarque.* La partie abstraite de la piste est démontrée dans le cadre du graphe de classes, sous la forme : pas de point fixe, pas de voisin, et un voisin commun force l'égalité des étoiles. Elle n'utilise que la transitivité de $H$ sur les arcs et la commutation de $\lambda$ à $H$ ; ni la simple transitivité, ni la condition d'homothétie, ni la structure de surface n'interviennent. L'exclusion de la distance $1$, que la page attribue aux stabilisateurs (lecture incertaine), demande que $s$ ait au moins deux voisins. Le passage de « même étoile » à « octaèdre » est le lemme du double cône de la page 275, qui n'est pas formalisé ; l'énoncé abstrait le remplace par l'hypothèse qu'aucun autre sommet n'a l'étoile de $s$. La page parle de $\lambda^{-1}s$ ; comme $\lambda^{-1}$ commute aussi à $H$, cela revient au même, et l'énoncé vaut pour un sommet comme pour tous (« c'est kif-kif »).

Dans le modèle, l'énoncé tient sur tout anneau commutatif non nul pour les distances $0$, $1$ et $2$, pour toute application qui commute à $\mathrm{SL}(2,R)$ et pour tout type $\pm e$ ; pour les scalaires le calcul est direct ($x \wedge \mu x = 0$, et $\mu e = \pm e$ force $\mu = \pm 1$), sans argument de stabilisateur. L'exception de la distance $2$ est $\sigma$, et elle seule. Sur $\mathbf{Z}/n$ elle ne se produit que pour $n = 4$, où $\sigma$ est l'antipodie de l'octaèdre et où les scalaires sont triviaux. Sur un autre anneau exceptionnel avec $2 \neq 0$, par exemple $\mathbf{Z}/4 \times \mathbf{F}_2$, $\sigma$ est aussi à distance $2$ ; un calcul hors de Lean, à partir du polygone de l'étoile $k \sim k \pm 1$ indexé par $R$, montre que l'étoile y est formée de deux cycles de longueur $4$, de sorte que le polyèdre n'est pas une surface, ce qui est compatible avec la page. La distance exactement $3$ est démontrée sur un anneau semi-local ; le cas $\Lambda = \mathbf{Z}$ n'est pas traité. Pour $e = 1$ et $n \geq 5$, le point 4 est le théorème 9 de Singerman et Strudwick sur les pôles de la carte de Farey modulo $n$ [42].

Ne sont pas démontrés ici : l'isomorphisme de groupes $T_H \simeq Z$ de (81') et le cas $\mathfrak{z}_H \neq 1$ de (88) ; le lemme combinatoire du double cône (page 275), qui ramènerait l'hypothèse « aucun autre sommet n'a la même étoile » de l'énoncé de la page 188 à l'exclusion de l'octaèdre dans un 2-polyèdre régulier abstrait ; l'optimalité de la borne $3$ pour $\mathbf{Z}/6$ et pour un anneau semi-local quelconque ; la connexité de $SP_M$ pour $\Lambda = \mathbf{Z}$ ; l'action de $(\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$ sur les structures de polygone, l'axiome To 6 abstrait et l'injection $Z \hookrightarrow Z'_n$ (pages 136 à 140) ; la question de la page 141 sur les triangulations dont les sommets sont d'ordre $7$ ; la distance exactement $3$ de la page 188 hors des anneaux semi-locaux.

**Théorème 28.3** (Grothendieck, pages 187 et 188, homothéties à distance trois ♦). *Dans un 2-polyèdre régulier triangulé abstrait, deux sommets distincts n'ont la même étoile que dans l'octaèdre (lemme du double cône, page 275). Une homothétie $\lambda \neq \mathrm{id}$ n'envoie donc aucun sommet à distance $1$ ou $2$, l'antipodie de l'octaèdre exceptée, et quand $\lambda^{-1}s$ est à distance au plus $3$ de $s$, cette distance vaut exactement $3$.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème 28.4** (Grothendieck, pages 136 à 140 et 184 à 187, polygones étoilés ♦). *Le groupe $(\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$ opère sur les structures de polygone d'un ensemble à $n$ éléments. Sous l'axiome To 6, une homothétie agit sur une triangulation en redessinant chaque étoile comme le polygone étoilé d'indice $\nu \in (\mathbf{Z}/n)^*/\pm 1$, recentré au sommet image, avec $\nu$ indépendant du sommet, et l'on a une injection $Z \hookrightarrow Z'_n$, sauf pour l'octaèdre.*

◊ *non vérifié en Lean*

*Remarque.* Le rang stable $1$ des anneaux n'ayant qu'un nombre fini d'idéaux maximaux, sur lequel repose la borne de la page 20, est proposé à mathlib (PR mathlib4 #44734) ; il est dû à Bass [4].

## 29 Cote 85 : représentations de $G_2$ dans $\mathrm{PGL}_2$, rotation d'ordre 5[30]

La cote 85, *2-polyèdres et 1-polygônes : notes manuscrites (s.d.)*, du groupe « Géométrie et topologie combinatoire », étudie les polygones et polyèdres réguliers réalisés dans une forme de $\mathrm{PGL}_2$ sur une base quelconque, au moyen d'un seul invariant $A$. Pour $\mathrm{PGL}_2$, la lecture le donne par $A(v) = (\operatorname{Tr} v)^2/\det v - 2$ pour un relèvement $v \in \mathrm{GL}_2$ (pages 23 et 27, 85, lot 2, p. 23, 85, lot 2, p. 27). La page 30 dit qu'un élément est d'ordre $5$ en tout point si et seulement si $\alpha^2 + \alpha - 1 = 0$, hors caractéristique $5$ (85, lot 2, p. 30). La page 10 énonce le cas de l'icosaèdre avec un facteur $\mathbf{Z}/2$ et la marge « laisser tomber $\mathbf{Z}/2$ dans l'énoncé » (85, lot 1, p. 10). La

[30] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder85.lean`.

page 40 énonce le théorème sans ce facteur : pour une forme $G$ de $\mathrm{PGL}_2$ sur un schéma $S$ et un monomorphisme $\varphi : \mathfrak{A}_5 \to G$, $\alpha(\varphi) = A(\varphi(\pi))$, $\pi$ un 5-cycle, satisfait $\alpha^2 + \alpha - 1 = 0$, la catégorie des $(G, \varphi)$ est rigide, et le foncteur des classes d'isomorphisme est « représentable par $M = \operatorname{Spec} \mathbf{Z}[T]/(T^2 + T - 1)$ » (85, lot 2, p. 40). Le calcul qui porte ce théorème est démontré ici, sur tout anneau commutatif, ainsi qu'un modèle explicite des relations de l'icosaèdre.

Le théorème de la page 4 (85, lot 1, p. 4) porte sur le groupe $G_2 = \langle \tau_0, \tau_1, \tau_2 \mid \tau_i^2, (\tau_0\tau_2)^2 \rangle$, avec $\rho_0 = \tau_0\tau_1$ et $\rho_1 = \tau_1\tau_2$. Pour un homomorphisme $\varphi$ de $G_2$ dans une forme de $\mathrm{PGL}_2$ sur $S$ tel qu'en tout point $\rho_0^2 \neq 1$, $\rho_1^2 \neq 1$ et $\rho_0\rho_1 \neq \rho_1\rho_0$, la page énonce trois choses : 1) les invariants $\alpha_0 = A(\varphi(\rho_0))$, $\alpha_1 = A(\varphi(\rho_1))$ sont tels que $(\alpha_0+2)(\alpha_1+2)(\alpha_0+\alpha_1)$ est inversible ; 2) le foncteur $\varphi \mapsto (\alpha_0, \alpha_1)$ est pleinement fidèle, c'est-à-dire que le centralisateur de l'image est trivial et que deux objets de mêmes invariants sont isomorphes ; 3) tout couple admissible provient d'un $\varphi$. La lecture en tire que l'espace de modules est l'ouvert de $\mathbb{A}^2_{\mathbf{Z}}$ complémentaire des trois droites $\alpha_0 = -2$, $\alpha_1 = -2$, $\alpha_0 + \alpha_1 = 0$. La démonstration des pages 5 et 6 renvoie à des « généralités » absentes du dossier (85, lot 1, p. 5, 85, lot 1, p. 6). Le corollaire des pages 6 et 7 prescrit les ordres de $\rho_0$ et $\rho_1$ par $\Psi_{\nu_i}(\alpha_i) = 0$, avec $\nu_i$ inversible si $\nu_i$ n'est pas premier (85, lot 1, p. 7). Les pages 8 à 10 traitent les trois cas finis (85, lot 1, p. 8). On démontre ici les calculs de traces sur tout anneau, la rigidité sur tout anneau, la conjugaison sur un corps qui contient une racine de $T^2 - \alpha_0 T + 1$, une forme normale explicite après adjonction d'une telle racine, et la traduction des ordres 3, 4, 5 et 6.

*Conventions.* $R$ est un anneau commutatif et $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de $M_2(R)$ de déterminant $\delta$ inversible ; on note $t = \operatorname{Tr} g$ et $A(g) = t^2\delta^{-1} - 2$. On dit que $g$ est *nulle part scalaire* si $b$, $c$ et $a-d$ engendrent l'idéal unité. Un idéal est l'idéal unité si et seulement s'il n'est contenu dans aucun idéal premier ; la condition dit donc que l'image de $g$ dans $\mathrm{PGL}_2(k(s))$ est différente de 1 en tout point $s$ de $\operatorname{Spec} R$. Comme 5 est premier, l'image de $g$ est alors d'ordre 5 en tout point si et seulement si $g^5$ est scalaire.

*Conventions pour $G_2$.* Un homomorphisme $G_2 \to \mathrm{PGL}_2(R)$ est donné par trois matrices $\tau_0, \tau_1, \tau_2$ de déterminants $d_0, d_1, d_2$ inversibles, telles que $\tau_0^2$, $\tau_1^2$, $\tau_2^2$ et $(\tau_0\tau_2)^2$ soient scalaires. On note $\rho_0 = \tau_0\tau_1$, $\rho_1 = \tau_1\tau_2$, $\alpha_0 = A(\rho_0)$, $\alpha_1 = A(\rho_1)$, $t_{01} = \operatorname{Tr}(\tau_0\tau_1)$, $t_{12} = \operatorname{Tr}(\tau_1\tau_2)$, $t_{02} = \operatorname{Tr}(\tau_0\tau_2)$, $T = \operatorname{Tr}(\tau_0\tau_1\tau_2)$ et $\Delta = (\alpha_0+2)(\alpha_1+2)(\alpha_0+\alpha_1)$. Sur un corps $k$, la condition $(*)$ de la page 4 s'écrit : $\rho_0^2$ et $\rho_1^2$ ne sont pas scalaires, et il n'existe pas de $\mu \in k$ tel que $\rho_0\rho_1 = \mu\,\rho_1\rho_0$. « $(*)$ en tout point » signifie que $(*)$ vaut pour les images des $\tau_i$ dans $M_2(R/\mathfrak{m})$, pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$. Pour $\nu \geq 2$, on dit que $g$ est d'ordre $\nu$ en tout point si $g^\nu$ est scalaire et si $g^m$ est nulle part scalaire pour tout diviseur $m$ de $\nu$ avec $1 \leq m < \nu$.

**Lemme 29.1.** *Soient $\tau_0, \tau_1, \tau_2 \in M_2(R)$ de trace nulle et de déterminants inversibles.*

1. $\alpha_0 + 2 = t_{01}^2(d_0d_1)^{-1}$ *et* $\alpha_1 + 2 = t_{12}^2(d_1d_2)^{-1}$.
2. $\rho_0\rho_1 - \rho_1\rho_0 = -T\,\tau_1$.
3. *Si* $t_{02} = 0$, *alors* $T^2 = 4d_0d_1d_2 - t_{01}^2 d_2 - t_{12}^2 d_0$, *donc* $\alpha_0 + \alpha_1 = -T^2(d_0d_1d_2)^{-1}$.
4. *Si* $t_{02} = 0$, $\Delta$ *est inversible si et seulement si* $t_{01}$, $t_{12}$ *et* $T$ *le sont.*

*Démonstration.* (1) $\det \rho_0 = d_0d_1$ et $A(\rho_0) = t_{01}^2(d_0d_1)^{-1} - 2$ par définition. (2) et (3) sont des identités polynomiales entre les coefficients, une fois $\tau_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i \\ c_i & -a_i \end{pmatrix}$ ; pour (3), la différence des deux membres est $t_{02}$ multiplié par un polynôme explicite, et c'est ainsi que Lean la vérifie.

Le membre de droite de (3) est, au signe près, le déterminant de Gram des $\tau_i$ pour la forme $\mathrm{Tr}(XY)$, avec $t_{02}=0$. En reportant (3) dans $\alpha_0+\alpha_1 = t_{01}^2(d_0d_1)^{-1}+t_{12}^2(d_1d_2)^{-1}-4$, on obtient $-T^2(d_0d_1d_2)^{-1}$. (4) Par (1) et (3), $\Delta = -t_{01}^2t_{12}^2T^2\cdot d_0^{-2}d_1^{-3}d_2^{-2}$, et un produit est inversible si et seulement si chaque facteur l'est. □

**Énoncé** (Page 4, partie 1), les invariants ♦). *Soient $\tau_0,\tau_1,\tau_2 \in M_2(R)$ de déterminants inversibles, avec $\tau_i^2$ et $(\tau_0\tau_2)^2$ scalaires.*

1. *Si $(*)$ vaut en tout point, alors $\tau_0$, $\tau_1$, $\tau_2$ et $\tau_0\tau_2$ sont de trace nulle, et $\Delta = (\alpha_0+2)(\alpha_1+2)(\alpha_0+\alpha_1)$ est inversible.*
2. *Réciproquement, si $\tau_0$, $\tau_1$, $\tau_2$ et $\tau_0\tau_2$ sont de trace nulle et $\Delta$ inversible, alors $(*)$ vaut en tout point.*

*Démonstration.* (1) Fixons un idéal maximal $\mathfrak{m}$ et travaillons dans $k = R/\mathfrak{m}$. Si $\tau_0$ y était scalaire, $\rho_0^2 = c^2\tau_1^2$ serait scalaire ; de même pour $\tau_1$ (avec $\tau_0^2$) et pour $\tau_2$ (avec $\rho_1^2 = c^2\tau_1^2$). Si $\tau_0\tau_2 = c$ était scalaire, $c$ serait non nul, $\tau_2\tau_0 = c$ aussi, et $\rho_0\rho_1 = \tau_0\tau_1^2\tau_2$ et $\rho_1\rho_0 = \tau_1(\tau_2\tau_0)\tau_1$ vaudraient tous deux $c\,s$, où $\tau_1^2 = s$ ; cela contredit $(*)$ avec $\mu = 1$. Les quatre matrices sont donc nulle part scalaires sur $R$, car un idéal qui n'est contenu dans aucun idéal maximal est l'idéal unité. Pour une matrice $g$ nulle part scalaire avec $g^2$ scalaire, Cayley–Hamilton donne $g^2 = (\mathrm{Tr}\,g)\,g - \det g$ ; les coefficients hors diagonale de $(\mathrm{Tr}\,g)\,g$ et la différence de ses coefficients diagonaux sont nuls, donc $\mathrm{Tr}\,g$ annule un idéal égal à l'idéal unité, et $\mathrm{Tr}\,g = 0$. Les quatre traces sont nulles. Revenons dans $k$. Si $t_{01} = 0$, $\rho_0$ est de trace nulle et $\rho_0^2 = -\det\rho_0$ est scalaire ; de même $t_{12} \neq 0$. Si $T = 0$, le lemme 29.1 (2) donne $\rho_0\rho_1 = \rho_1\rho_0$. Les images de $t_{01}$, $t_{12}$ et $T$ sont donc non nulles en tout point, ces trois éléments sont inversibles, et $\Delta$ l'est par le lemme 29.1 (4).

(2) Par le lemme 29.1 (4), $t_{01}$, $t_{12}$ et $T$ sont inversibles, et le restent dans chaque $R/\mathfrak{m}$. Il suffit donc de montrer $(*)$ sur un anneau non nul où ces trois éléments sont inversibles. On a $T = \mathrm{Tr}(\rho_0\tau_2) = (\rho_{0,00}-\rho_{0,11})\,\tau_{2,00} + \rho_{0,01}\,\tau_{2,10} + \rho_{0,10}\,\tau_{2,01}$, car $\tau_2$ est de trace nulle ; $T$ appartient donc à l'idéal engendré par les coefficients hors diagonale de $\rho_0$ et la différence de ses coefficients diagonaux, et $\rho_0$ est nulle part scalaire. Si $\rho_0^2$ était scalaire, on aurait $t_{01} = \mathrm{Tr}\,\rho_0 = 0$. Même raisonnement pour $\rho_1$, avec $T = \mathrm{Tr}(\rho_1\tau_0)$. Si enfin $\rho_0\rho_1 = \mu\,\rho_1\rho_0$, multiplions à gauche par $\tau_0$ et prenons la trace : $\mathrm{Tr}(\tau_0\rho_0\rho_1) = d_0d_1\mathrm{Tr}\,\tau_2 = 0$, et $\mathrm{Tr}(\tau_0\rho_1\rho_0) = t_{01}T$ (identité polynomiale pour des matrices de trace nulle). Donc $\mu\,t_{01}T = 0$, $\mu = 0$, et $\rho_0\rho_1 = 0$, ce qui contredit $\det(\rho_0\rho_1) = d_0d_1^2d_2$ inversible. □

*Remarque.* Chaque facteur de $\Delta$ répond à une condition de $(*)$ : $\alpha_0+2$ inversible équivaut à $t_{01}$ inversible, c'est-à-dire $\rho_0^2 \neq 1$ ; $\alpha_1+2$ à $\rho_1^2 \neq 1$ ; et $\alpha_0+\alpha_1$, au vu de $\rho_0\rho_1-\rho_1\rho_0 = -T\tau_1$, à la non-commutation. L'énoncé vaut sur tout anneau, sans hypothèse sur 2 : en caractéristique 2 les involutions sont unipotentes, et $\tau_0$, $\tau_2$ commutent au lieu d'anticommuter, sans que les calculs changent. L'hypothèse « $(\tau_0\tau_2)^2$ scalaire » sert à obtenir $t_{02} = 0$ ; sans elle, l'identité (3) du lemme a un terme en $t_{02}$.

**Lemme 29.2.** *Si $X \in M_2(R)$ est nulle part scalaire et $gX = Xg$, il existe $p,q \in R$ avec $g = p+qX$.*

*Démonstration.* Écrivons $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $g = \begin{pmatrix} e & f \\ h & k \end{pmatrix}$. La commutation donne $fc = bh$, $b(e-k) = f(a-d)$ et $h(a-d) = c(e-k)$ : les vecteurs $(f,h,e-k)$ et $(b,c,a-d)$ sont proportionnels

au sens où leurs mineurs d'ordre 2 sont nuls. Soit $r_1 b + r_2 c + r_3(a-d) = 1$. Posons $q = r_1 f + r_2 h + r_3(e-k)$ et $p = e - qa$. Alors $f = f(r_1 b + r_2 c + r_3(a-d)) = qb$ par les relations, de même $h = qc$ et $e - k = q(a-d)$, d'où $g = p + qX$. □

**Énoncé** (Page 4, partie 2), rigidité). *Soient $\tau_0, \tau_1, \tau_2 \in M_2(R)$ de déterminants inversibles, de trace nulle, avec $t_{02} = 0$ et $\Delta$ inversible. Si $g \in \mathrm{GL}_2(R)$ et $\mu_0, \mu_1, \mu_2 \in R$ vérifient $g\tau_i = \mu_i\, \tau_i g$ pour $i = 0, 1, 2$, alors $g$ est scalaire.*

*Démonstration.* On a $g\rho_0 = \mu_0\mu_1\, \rho_0 g$, d'où $t_{01} = \mathrm{Tr}(g^{-1}g\rho_0) = \mu_0\mu_1\, \mathrm{Tr}(g^{-1}\rho_0 g) = \mu_0\mu_1 t_{01}$, et $\mu_0\mu_1 = 1$ puisque $t_{01}$ est inversible. De même $\mu_1\mu_2 = 1$ : $g$ commute à $\rho_0$ et à $\rho_1$. Comme $T$ est inversible, $\rho_0$ est nulle part scalaire (démonstration de l'énoncé précédent), et le lemme 29.2 donne $g = p + q\rho_0$. La commutation avec $\rho_1$ donne $q(\rho_0\rho_1 - \rho_1\rho_0) = 0$, soit $qT\tau_1 = 0$ ; en multipliant par $\tau_1$, $qTd_1 = 0$, donc $q = 0$ et $g = p$. □

*La forme normale.* Pour $\ell, b \in R$, posons

$$\rho_0^\circ = \begin{pmatrix} \ell & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho_1^\circ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & b \end{pmatrix}, \quad \tau_1^\circ = \begin{pmatrix} b & 1-\ell-b \\ b(1-\ell) & -b \end{pmatrix}, \quad \tau_0^\circ = \rho_0^\circ\tau_1^\circ, \quad \tau_2^\circ = \tau_1^\circ\rho_1^\circ.$$

La matrice $\rho_0^\circ$ a pour trace $\ell + 1$ et pour déterminant $\ell$, et $A(\rho_0^\circ) = \ell + \ell^{-1}$ ; $\rho_1^\circ$ a pour trace et pour déterminant $b$, et $A(\rho_1^\circ) = b - 2$. La matrice $\tau_1^\circ$ est, à un scalaire près, l'unique matrice de trace nulle orthogonale à $\rho_0^\circ$ et à $\rho_1^\circ$ pour la forme $\mathrm{Tr}(XY)$.

**Énoncé** (Page 4, partie 3), une forme normale). *Soient $\alpha_0, \alpha_1 \in R$ avec $\Delta = (\alpha_0 + 2)(\alpha_1 + 2)(\alpha_0 + \alpha_1)$ inversible, $\ell \in R$ une racine de $T^2 - \alpha_0 T + 1$ et $b = \alpha_1 + 2$. Alors $\tau_0^\circ$, $\tau_1^\circ$, $\tau_2^\circ$ sont de déterminants inversibles, de trace nulle, avec $\mathrm{Tr}(\tau_0^\circ\tau_2^\circ) = 0$ (de sorte que $(\tau_i^\circ)^2$ et $(\tau_0^\circ\tau_2^\circ)^2$ sont scalaires), $A(\tau_0^\circ\tau_1^\circ) = \alpha_0$, $A(\tau_1^\circ\tau_2^\circ) = \alpha_1$, et $(*)$ vaut en tout point. Pour tout anneau $R$ et tout tel couple, cela s'applique sur $R[\ell] = R[T]/(T^2 - \alpha_0 T + 1)$, libre de rang 2 sur $R$.*

*Démonstration.* On a $\ell(\alpha_0 - \ell) = 1$, donc $\ell$ est inversible. Les traces de $\tau_1^\circ$, $\tau_0^\circ$, $\tau_2^\circ$ et $\tau_0^\circ\tau_2^\circ$ sont nulles par calcul direct. Ensuite $\det\tau_1^\circ = -b\big((1-\ell)^2 + \ell b\big)$ et, comme $\ell^2 + 1 = \alpha_0\ell$, $(1-\ell)^2 + \ell b = \ell(\alpha_0 + \alpha_1)$ ; ce déterminant est inversible, et $\det\tau_0^\circ = \ell\det\tau_1^\circ$, $\det\tau_2^\circ = b\det\tau_1^\circ$. Comme $\tau_1^\circ$ est de trace nulle, $(\tau_1^\circ)^2 = s$ avec $s = -\det\tau_1^\circ$ inversible, d'où $\tau_0^\circ\tau_1^\circ = s\rho_0^\circ$ et $\tau_1^\circ\tau_2^\circ = s\rho_1^\circ$. L'invariant ne dépend pas du relèvement : $A(\tau_0^\circ\tau_1^\circ) = (\ell+1)^2\ell^{-1} - 2 = \alpha_0$, car $(\ell+1)^2 = (\alpha_0 + 2)\ell$, et $A(\tau_1^\circ\tau_2^\circ) = b^2 b^{-1} - 2 = \alpha_1$. Enfin $\Delta$ est inversible, et la partie (2) de l'énoncé des invariants donne $(*)$ en tout point. Dans $R[T]/(T^2 - \alpha_0 T + 1)$, la classe de $T$ est racine par construction. □

*Remarque.* La forme normale demande une racine $\ell$ de $T^2 - \alpha_0 T + 1$. Sur $R$ lui-même, une réalisation dans le $\mathrm{PGL}_2$ déployé n'existe pas toujours : pour $R = \mathbf{R}$ et $(\alpha_0, \alpha_1) = (-1, c_5)$, elle donnerait un $\mathfrak{A}_5$ dans $\mathrm{PGL}_2(\mathbf{R})$, qui n'en contient pas (cas du critère de Beauville rappelé plus bas, non formalisé ici). C'est pourquoi la page 4 parle de formes de $\mathrm{PGL}_2$. Le passage de $R[\ell]$ à une forme sur $R$, par descente le long de $R \to R[\ell]$ en s'appuyant sur la rigidité, n'est pas formalisé.

**Énoncé** (Page 4, partie 2), conjugaison sur un corps). *Soient $K$ un corps et $\tau_0, \tau_1, \tau_2 \in \mathrm{GL}_2(K)$ de trace nulle, avec $t_{02} = 0$ et $\Delta \neq 0$. Soit $\ell \in K$ une racine de $T^2 - \alpha_0 T + 1$ et $b = \alpha_1 + 2$. Il existe $g \in \mathrm{GL}_2(K)$ et $c_0, c_1, c_2 \in K$ tels que $\tau_i g = c_i\, g\tau_i^\circ$ pour $i = 0, 1, 2$. En particulier, deux tels triplets de mêmes invariants $(\alpha_0, \alpha_1)$ sont conjugués dans $\mathrm{PGL}_2(K)$.*

*Démonstration.* Le lemme 29.1 donne $t_{01}$, $t_{12}$, $T$ non nuls. Posons $X = (\ell+1)t_{01}^{-1}\rho_0$ et $Y = b\,t_{12}^{-1}\rho_1$. On a $\ell \neq 0$, $\ell+1 \neq 0$ car $(\ell+1)^2 = (\alpha_0+2)\ell$, et $b \neq 0$. Alors $\operatorname{Tr} X = \ell+1$, $\det X = (\ell+1)^2 t_{01}^{-2} d_0 d_1 = \ell$, $\operatorname{Tr} Y = \det Y = b$, $\operatorname{Tr}(XY)$ est un multiple de $\operatorname{Tr}(\tau_0\tau_1^2\tau_2) = -d_1 t_{02} = 0$, et $\det(XY - YX)$ est un multiple non nul de $\det(T\tau_1) = T^2 d_1$.

Comme $\det(X-\ell) = \ell^2 - \ell(\ell+1) + \ell = 0$, il existe $v \neq 0$ avec $Xv = \ell v$. Posons $w = -b^{-1}Yv$ et soit $g$ la matrice de colonnes $v$, $w$. Par définition $Yv = -bw$ ; par Cayley–Hamilton, $Y^2 = bY - b$, d'où $Yw = v + bw$. L'identité $XY + YX = (\operatorname{Tr} X)Y + (\operatorname{Tr} Y)X + \operatorname{Tr}(XY) - \operatorname{Tr} X \operatorname{Tr} Y$ donne $XYv = Yv - bv$, soit $Xw = v + w$. Ces quatre égalités disent $Xg = g\rho_0^\circ$ et $Yg = g\rho_1^\circ$. Si $\det g = 0$, $w$ est proportionnel à $v$, qui est alors vecteur propre commun de $X$ et $Y$ ; $(XY - YX)v = 0$ et $\det(XY - YX) = 0$, ce qui est exclu. En Lean, cette étape passe par les identités $b\,v_i \left((XY - YX)v\right)_j \in (\det g)$ modulo les relations, et le choix d'une coordonnée $v_i \neq 0$.

Soit $M = g^{-1}\tau_1 g$. Sa trace est nulle ; $\operatorname{Tr}(M\rho_0^\circ) = \operatorname{Tr}(\tau_1 X)$ est un multiple de $\operatorname{Tr}(\tau_1\tau_0\tau_1) = -d_1 \operatorname{Tr}\tau_0 = 0$, et de même $\operatorname{Tr}(M\rho_1^\circ) = 0$. Ces trois équations linéaires imposent $M = M_{00} b^{-1}\,\tau_1^\circ$. Enfin $\tau_0 = (-d_1)^{-1}(\ell+1)^{-1} t_{01}\, X\tau_1$ et $\tau_2 = (-d_1)^{-1} b^{-1} t_{12}\,\tau_1 Y$, d'où $\tau_0 g \in K\,g\rho_0^\circ\tau_1^\circ = K\,g\tau_0^\circ$ et $\tau_2 g \in K\,g\tau_1^\circ\rho_1^\circ = K\,g\tau_2^\circ$. Pour deux triplets $\tau$, $\sigma$ de mêmes invariants, avec $g$, $g'$ ainsi obtenus, $h = gg'^{-1}$ vérifie $\tau_i h = c_i c_i'^{-1}\, h\sigma_i$. □

*Remarque.* La conjugaison est démontrée sur un corps qui contient $\ell$, par exemple algébriquement clos. Sur un corps quelconque, la rigidité et un argument de descente galoisienne la donneraient aussi ; ce passage n'est pas formalisé, ni la conjugaison sur un anneau local ou une base quelconque. La matrice $\rho_0^\circ$ couvre d'un seul coup le cas semi-simple ($\ell \neq 1$) et le cas unipotent ($\ell = 1$, $\alpha_0 = 2$, possible hors caractéristique 2).

**Énoncé** (Pages 6 et 7, 29 à 31, les ordres)**.** *Soit $g \in M_2(R)$ nulle part scalaire, de trace $t$ et de déterminant $d$ inversible, et $\alpha = A(g)$. Définissons $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_{n+2} = tx_{n+1} - dx_n$, et $P_0 = 0$, $P_1 = 1$, $P_{n+2} = P_{n+1} - P_n$ pour $n$ pair, $P_{n+2} = (\alpha+2)P_{n+1} - P_n$ pour $n$ impair.*

1. *$g^{n+1} = x_{n+1}\,g - d\,x_n$ ; $g^{n+1}$ est scalaire si et seulement si $x_{n+1} = 0$, et nulle part scalaire si et seulement si $x_{n+1}$ est inversible.*

2. *$x_{2k+1} = d^k P_{2k+1}(\alpha)$ et $x_{2k+2} = t\,d^k P_{2k+2}(\alpha)$. Donc $g^{2k+1}$ est scalaire si et seulement si $P_{2k+1}(\alpha) = 0$, et, si $t$ est inversible, $g^{2k+2}$ est scalaire si et seulement si $P_{2k+2}(\alpha) = 0$.*

3. *$P_3 = \alpha + 1$, $P_4 = \alpha$, $P_5 = \alpha^2 + \alpha - 1$, $P_6 = \alpha^2 - 1$, $P_7 = \alpha^3 + \alpha^2 - 2\alpha - 1$.*

4. *$g$ est d'ordre 3 en tout point si et seulement si $\alpha = -1$ ; d'ordre 4 en tout point si et seulement si $\alpha = 0$ et 2 est inversible ; d'ordre 6 en tout point si et seulement si $\alpha = 1$ et 6 est inversible.*

*Démonstration.* (1) Par récurrence, avec $g^2 = tg - d$ : $g^{n+2} = (x_{n+1}g - dx_n)g = (tx_{n+1} - dx_n)g - dx_{n+1}$. Pour $g$ nulle part scalaire, $xg + y$ est scalaire si et seulement si $x = 0$ (argument d'idéal), et nulle part scalaire si et seulement si $x$ est inversible : ses coefficients hors diagonale et la différence diagonale sont $x$ fois ceux de $g$, et un idéal maximal contient $xb$, $xc$, $x(a-d)$ si et seulement s'il contient $x$, ou $b$, $c$ et $a - d$. (2) Par récurrence sur $k$, avec $t^2 = (\alpha+2)d$ : $x_{2k+3} = t \cdot td^k P_{2k+2} - d \cdot d^k P_{2k+1} = d^{k+1}\big((\alpha+2)P_{2k+2} - P_{2k+1}\big)$ et $x_{2k+4} = td^{k+1}P_{2k+3} - d \cdot td^k P_{2k+2} = td^{k+1}(P_{2k+3} - P_{2k+2})$. (3) Calcul direct. (4) Ordre 3 : $g^3$ scalaire équivaut à $P_3(\alpha) = 0$. Ordre 4 : $g^2$ nulle part scalaire équivaut à $x_2 = t$ inversible, et $g^4$ scalaire à $t\,d\,\alpha = 0$, soit $\alpha = 0$ ; alors $t^2 = 2d$, donc 2 est inversible ; réciproquement $\alpha = 0$ et 2 inversible donnent $t^2 = 2d$ inversible. Ordre 6 : il faut $t$ inversible, $x_3 = d(\alpha+1)$ inversible et $td^2(\alpha-1)(\alpha+1) = 0$,

soit $\alpha = 1$ ; alors $2 = \alpha + 1$ est inversible et $t^2 = 3d$ donne 3 inversible ; la réciproque est le même calcul. □

*Remarque.* La suite $x_n$ est celle du lemme 29.3, et $P_5 = \Psi_5$ redonne le calcul de l'ordre 5. Les valeurs de (3) sont $\Psi_3$, $\Psi_4$, $\Psi_5$, $\Psi_3\Psi_6$ et $\Psi_7$ : ce sont les $F_n$ de la page 29 pour $n \leq 7$. L'identification $P_n = F_n = \prod_{d|n,\, d\geq 3} \Psi_d$ pour tout $n$ n'est pas formalisée. Le point (4) confirme la condition c) du corollaire des pages 6 et 7 pour $\nu = 4$ et $\nu = 6$ : dans $\mathrm{PGL}_2$, l'ordre 6 demande 6 inversible, alors que, dans $\mathrm{SL}_2$, le cas B) de la page 31 ne demande que 2 ; un élément de $\mathrm{PGL}_2(k)$ d'invariant 1 en caractéristique 3 a une trace nulle et est une involution. Pour les cas finis des pages 8 à 10, $\Delta(-1,-1) = -2$, $\Delta(0,-1) = -2$ et, si $\alpha^2 + \alpha - 1 = 0$, $\Delta(-1,\alpha) = -1$ : les deux premiers demandent 2 inversible, le troisième est inversible sur toute base, comme le dit la lecture.

**Énoncé** (Pages 10, 30 et 40, l'invariant d'une rotation d'ordre 5 ♦). *Soit $g \in M_2(R)$ de déterminant inversible.*

1. *$A(\mu g) = A(g)$ pour tout $\mu \in R^\times$ : $A$ ne dépend que de l'image de $g$ dans $\mathrm{PGL}_2(R)$.*
2. *Si $g$ est nulle part scalaire et $g^5$ scalaire, alors $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$.*
3. *Réciproquement, si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, alors $g^5$ est scalaire.*
4. *$A(g^2) = A(g)^2 - 2$ ; en particulier, si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, alors $A(g^2) = -1 - A(g)$ (corollaire de la page 40).*

**Lemme 29.3.** *Pour toute matrice $g \in M_2(R)$, $g^5 = x_5\, g + y_5$, avec $x_5 = t^4 - 3\delta t^2 + \delta^2$ et $y_5 = -\delta(t^3 - 2\delta t)$. Si $\delta$ est inversible, $x_5 = \delta^2\,(A(g)^2 + A(g) - 1)$.*

*Démonstration.* Par Cayley–Hamilton, $g^2 = tg - \delta$. Si $g^n = x_n g + y_n$, alors $g^{n+1} = (tx_n + y_n)g - \delta x_n$. Partant de $x_1 = 1$, $y_1 = 0$, on trouve $x_2 = t$, $x_3 = t^2 - \delta$, $x_4 = t^3 - 2\delta t$, $y_4 = -\delta(t^2 - \delta)$, puis $x_5 = t^4 - 3\delta t^2 + \delta^2$ et $y_5 = -\delta x_4$. La vérification en Lean se fait coefficient par coefficient. Posons $u = t^2\delta^{-1}$, de sorte que $A(g) = u - 2$. Alors $A(g)^2 + A(g) - 1 = u^2 - 3u + 1$, et $\delta^2(u^2 - 3u + 1) = t^4 - 3\delta t^2 + \delta^2$. □

*Démonstration de l'énoncé.* (1) $\mathrm{Tr}(\mu g) = \mu t$ et $\det(\mu g) = \mu^2\delta$, donc $(\mu t)^2(\mu^2\delta)^{-1} = t^2\delta^{-1}$.

(2) Écrivons $g^5 = \gamma \cdot 1$. Par le lemme 29.3, $x_5 g = (\gamma - y_5)\cdot 1$. En lisant les coefficients hors diagonale et la différence des coefficients diagonaux, $x_5 b = x_5 c = x_5(a - d) = 0$. L'ensemble des $r \in R$ tels que $x_5 r = 0$ est un idéal ; il contient $b$, $c$, $a - d$, donc l'idéal unité, et $x_5 = 0$. Comme $\delta^2$ est inversible, le lemme donne $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$.

(3) Si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, le lemme donne $x_5 = 0$ et $g^5 = y_5$.

(4) $\mathrm{Tr}(g^2) = t^2 - 2\delta$ et $\det(g^2) = \delta^2$, d'où $A(g^2) = (t^2 - 2\delta)^2\delta^{-2} - 2 = (u-2)^2 - 2 = A(g)^2 - 2$. Si $A(g)^2 = 1 - A(g)$, cela vaut $-1 - A(g)$. □

**Énoncé** (Page 40, un modèle des relations de l'icosaèdre). *Soit $\zeta \in R$ tel que $\zeta^4 + \zeta^3 + \zeta^2 + \zeta + 1 = 0$, et posons*

$$s = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad p = \begin{pmatrix} \zeta & 1 \\ 0 & \zeta^4 \end{pmatrix}.$$

*Alors $s^2 = -1$, $(sp)^3 = -1$ et $p^5$ est scalaire ; $s$, $p$ et $sp$ sont nulle part scalaires ;* $\det p = 1$ *et $A(p) = \zeta^2 + \zeta^3$ est racine de $T^2 + T - 1$. C'est le cas en particulier pour $R = \mathbf{Z}[\zeta_5] = \mathbf{Z}[X]/(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$ et $\zeta$ la classe de $X$.*

*Démonstration.* On a $\zeta^5 - 1 = (\zeta-1)(\zeta^4+\zeta^3+\zeta^2+\zeta+1) = 0$, donc $\zeta$ est inversible d'inverse $\zeta^4$, et $\det p = \zeta^5 = 1$. Le calcul direct donne $s^2 = -1$. Le produit $sp = \begin{pmatrix} 0 & -\zeta^4 \\ \zeta & 1 \end{pmatrix}$ a pour trace $1$ et pour déterminant $\zeta^5 = 1$, donc $(sp)^2 = sp - 1$, puis $(sp)^3 = sp(sp-1) = (sp-1) - sp = -1$. Ensuite $\operatorname{Tr} p = \zeta + \zeta^4$ et $A(p) = (\zeta+\zeta^4)^2 - 2 = \zeta^2 + 2\zeta^5 + \zeta^8 - 2 = \zeta^2 + \zeta^3$. On a $(\zeta^2+\zeta^3)^2 + \zeta^2 + \zeta^3 - 1 = \zeta^4 + 2\zeta^5 + \zeta^6 + \zeta^2 + \zeta^3 - 1 = \zeta^4+\zeta^3+\zeta^2+\zeta+1 = 0$, et le point (3) de l'énoncé précédent donne $p^5$ scalaire. Le coefficient $(0,1)$ vaut $-1$ pour $s$, $1$ pour $p$ et $-\zeta^4$ pour $sp$ ; c'est chaque fois un inversible, et les trois matrices sont nulle part scalaires. Dans $\mathbf{Z}[X]/(X^4+X^3+X^2+X+1)$, la classe de $X$ est racine du polynôme par construction. □

*Remarque.* Le point (2) vaut sur tout anneau commutatif, sans hypothèse sur $2$, $3$ ou $5$, ni de réduction. L'exclusion de la caractéristique $5$ à la page 30 concerne le sens réciproque, l'ordre exact $5$ : en caractéristique $5$, $T^2 + T - 1 = (T-2)^2$, et $A(g) = 2$ vaut aussi pour $g = 1$. Avec l'hypothèse « nulle part scalaire » et $5$ premier, les points (2) et (3) disent qu'un élément nulle part scalaire de déterminant inversible est d'ordre $5$ en tout point si et seulement si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, en toute caractéristique. Dans le modèle, en caractéristique $5$, $\zeta = 1$ convient, $p$ est unipotent et $A(p) = 2$ : c'est la rotation unipotente que la lecture signale pour $\mathfrak{A}_5 \simeq \mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_5)$.

*Remarque.* Les relations $s^2$, $(sp)^3$, $p^5$ scalaires sont celles du groupe triangulaire de type $(2,3,5)$, qui est $\mathfrak{A}_5$. En tout point, le sous-groupe de $\mathrm{PGL}_2(k(s))$ engendré par les images de $s$ et $p$ est un quotient de $\mathfrak{A}_5$ différent de $1$, donc isomorphe à $\mathfrak{A}_5$, ce groupe étant simple. Ce passage n'est pas formalisé. Le modèle est dans le $\mathrm{PGL}_2$ déployé sur $\mathbf{Z}[\zeta_5]$, et non sur $\mathbf{Z}[T]/(T^2+T-1)$. Sur $\mathbf{Q}(\sqrt{5})$, corps réel où $-1$ n'est pas somme de deux carrés, le $\mathrm{PGL}_2$ déployé ne contient pas $\mathfrak{A}_5$ d'après le critère de Beauville (2010) [6], que la lecture cite de mémoire (note des pages 36 et 37) : sur un corps $K$ de caractéristique première à l'ordre du groupe, $\mathrm{PGL}_2(K)$ contient $\mathfrak{A}_5$ si et seulement si $-1$ est somme de deux carrés et $5$ un carré dans $K$ ; un modèle sur $\mathbf{Z}[\varphi]$ demande donc une forme non déployée, et c'est pourquoi le théorème de la page 40 porte sur les formes de $\mathrm{PGL}_2$.

Ne sont pas démontrés ici : la rigidité de la catégorie des $(G,\varphi)$ et la représentabilité de son foncteur des classes d'isomorphisme par $\operatorname{Spec}\mathbf{Z}[T]/(T^2+T-1)$ (page 40), ni l'existence d'un plongement de $\mathfrak{A}_5$ dans une forme de $\mathrm{PGL}_2$ sur cette base ; pour le théorème de la page 4, le passage des formes de $\mathrm{PGL}_2$ aux matrices de $\mathrm{GL}_2$, qui n'a lieu que localement, la descente de la forme normale de $R[\ell]$ à une forme sur $R$, la conjugaison sur un corps qui ne contient pas $\ell$ et sur une base quelconque, et donc la représentabilité par l'ouvert de $\mathbb{A}^2_{\mathbf{Z}}$ ; l'identification $P_n = F_n$ pour tout $n$ et le théorème de la page 31 pour $n$ quelconque ; l'équivalence entre « nulle part scalaire » et « différent de $1$ en tout point » pour une forme quelconque, et la description de son invariant $A$ comme quotient adjoint (pages 23 à 26) ; l'homomorphisme $\mathfrak{A}_5 \to \mathrm{PGL}_2(\mathbf{Z}[\zeta_5])$ défini par le modèle et son injectivité sur les fibres ; les représentations de $\mathbb{D}_\infty$ (pages 12 à 21), les systèmes de Schwarz (pages 42 à 56), les hyperpolygônes (pages 58 à 73), les polyèdres de caractéristique $0$ (pages 75 à 80) et les pages 82 à 97.

**Théorème 29.4** (Grothendieck, pages 4 à 7, modules des représentations de $G_2$ ♦). *Sur un schéma quelconque, les homomorphismes de $G_2$ dans une forme de $\mathrm{PGL}_2$ qui vérifient $(*)$ en toute fibre sont rigides et classés par le couple $(\alpha_0, \alpha_1)$ : leur foncteur des classes d'isomorphisme est représentable par l'ouvert de $\mathbb{A}^2_{\mathbf{Z}}$ où $(\alpha_0+2)(\alpha_1+2)(\alpha_0+\alpha_1)$ est inversible, complément de trois droites. Imposer les ordres exacts $\nu_0$, $\nu_1$ le découpe par $\Psi_{\nu_i}(\alpha_i) = 0$.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Corollaire 29.5** (Grothendieck, pages 10 et 40, sous-groupes icosaédraux ♦). *Pour tout schéma $S$, le groupoïde des couples $(G, \varphi)$, $G$ forme de $\mathrm{PGL}_2$ sur $S$ et $\varphi : \mathfrak{A}_5 \to G$ un monomorphisme, est rigide, et $\varphi \mapsto A(\varphi(\pi))$, $\pi$ un 5-cycle standard, rend son foncteur des classes d'isomorphisme représentable par $\operatorname{Spec} \mathbf{Z}[T]/(T^2 + T - 1)$. Il se déduit du théorème de la page 4 pour $(\nu_0, \nu_1) = (3, 5)$, où le discriminant est inversible.*

◊ *non vérifié en Lean*

Autres pistes de l'onglet Findings pour ce thème, dans des cotes qui n'ont pas de section ici :

**Théorème** (Grothendieck, pages 1 à 3, groupoïde fondamental d'un produit fibré ♦). *Pour une fibration de Serre $f : X \to S$ et une application $g : Y \to S$, le foncteur $\Pi_1(X \times_S Y) \to \Pi_1(X) \times^2_{\Pi_1(S)} \Pi_1(Y)$ est bijectif sur $\pi_0$ et surjectif sur $\pi_1$, de noyau $\operatorname{Coker}(\pi_2 X \times \pi_2 Y \to \pi_2 S)$ en la composante de base. C'est donc une équivalence quand $X$, $Y$ et $S$ sont asphériques.*

◊ *non vérifié en Lean*

Le dernier mot de la page 3, « asphériques », est illisible et restitué par la lecture. Mathlib n'a pas les fibrations de Serre ni le groupe $\pi_2$ à ce niveau. On se reportera aux notes de Grothendieck (132, lot 1, p. 1).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 16 à 20, extensions d'un groupe non connexe ; voir aussi Brown–Mucuk 1994 ♦). *Soient $H$ un groupe topologique dont $\pi_0(H) = \mathfrak{G}$ est discret, et $\tilde{H}$ une extension de $H$ par $\pi = \pi_1(H^0)$ qui prolonge le revêtement universel de $H^0$. Pour tout groupe discret $N$, non nécessairement abélien, la catégorie des extensions de $H$ par $N$ est équivalente à celle des couples $(\tilde{G}_0, \varphi)$ formés d'une extension $\tilde{G}_0$ de $\mathfrak{G}$ par $N$ et d'un morphisme $\mathfrak{G}$-équivariant $\varphi : \pi \to \mathfrak{z}(N)$. L'extension $G$ s'obtient par produit contracté, et $\pi_0(G) \simeq \tilde{G}_0/\varphi(\pi)$.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 16 à 20) : seules les réductions et la construction explicite sont écrites, et les hypothèses de connexité locale sont de l'édition. Brown et Mucuk classent les revêtements des groupes topologiques non connexes par des modules croisés, non ces extensions. Mathlib n'a pas les revêtements universels des groupes topologiques. On se reportera aux notes de Grothendieck (132, lot 1, p. 16).

**Exemple** (Grothendieck, pages 5 à 8, Gr-catégorie périphérique d'une surface ♦). Pour une surface compacte orientable à $n \geq 1$ composantes de bord, le 2-groupe des autoéquivalences du modèle formé de $\pi_1$, des lacets de bord $\ell_i$ et de leurs attaches $\alpha(i)$ a pour $\pi_0$ le groupe des classes d'applications à bord libre, et pour $\pi_1$ zéro, sauf pour le disque (**Z**, canoniquement) et le cylindre (**Z**, non canoniquement). Sa version à bord fixé a pour $\pi_0$ le groupe des classes d'applications relatif au bord, et un $\pi_1$ toujours nul.

◊ non vérifié en Lean

La page calcule ces groupes sans les identifier aux groupes de classes d'applications. Cette identification, une forme de Dehn–Nielsen–Baer à plusieurs composantes de bord, est de la lecture, et n'est vérifiée que pour $n = 1$. Mathlib n'a pas les groupes de classes d'applications des surfaces. On se reportera aux notes de Grothendieck (132, lot 1, p. 5).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 148 à 151, voisinage épointé et codimension deux ♦). *Soient $X$ un espace analytique complexe lisse et $\Theta$ un diviseur à croisements normaux. Le voisinage tubulaire épointé $V^*_{\Theta,X}$ est la colimite homotopique du système semi-simplicial des voisinages tubulaires épointés des strates déployées. Son groupoïde fondamental est donc la somme amalgamée $\tilde{\Pi}_1 \leftarrow \tilde{\Pi}_{2,1} \to \tilde{\Pi}_2$ des groupoïdes des fibrés en tores multinormaux au-dessus des strates ouvertes de codimension 1 et 2. Il en va de même de $\Pi_1(X \setminus \Theta)$ quand $X \setminus \Theta$*

*et son bout ont des groupoïdes fondamentaux équivalents.*

La page 149 énonce le théorème de recollement comme une équivalence de topos et le corrige aussitôt en équivalence d'homotopie ; aucune démonstration n'est donnée. Mathlib n'a pas les voisinages tubulaires ni les colimites homotopiques d'espaces. On se reportera aux notes de Grothendieck (147, lot 8, p. 148).

**Exemple** (Grothendieck, pages 62 à 64, classe stratifiée de $M_{1,1}$ sur $\mathbf{Z}$ ♦). Dans l'invariant additif qui compte chaque pièce localement fermée d'un champ de Deligne–Mumford à groupe d'automorphismes constant $H$ comme la classe de son espace grossier divisée par $\operatorname{card} H$, le champ des courbes elliptiques sur $\operatorname{Spec}\mathbf{Z}$ a pour classe $\frac{1}{2}(L-1)-\frac{1}{12}+\frac{1}{8}\zeta_2+\frac{1}{6}\zeta_3$, où $\zeta_p=[\operatorname{Spec}\mathbf{F}_p]$, et sa compactification $\frac{1}{2}L-\frac{1}{12}+\frac{1}{8}\zeta_2+\frac{1}{6}\zeta_3$. Sur $\mathbf{Z}[1/6]$, ces classes se réduisent à $\frac{1}{2}(L-1)-\frac{1}{12}$ et $\frac{1}{2}(L-1)+\frac{5}{12}$.

◊ non vérifié en Lean

La page dit seulement « dans un groupe de Grothendieck convenable » ; la règle de l'invariant est reconstituée par la lecture, et l'arithmétique a été refaite. Mathlib n'a pas les champs de Deligne–Mumford. On se reportera aux notes de Grothendieck (147, lot 4, p. 62).

**Conjecture** (Grothendieck, page 18, l'ordre cyclique détermine la position ♦). *Une position relative d'une pseudo-droite ajoutée, autre que les $D_i$ eux-mêmes, est déterminée par l'ordre cyclique, compatible à l'antipodie, dans lequel son revêtement double rencontre les pseudo-droites orientées de $\Sigma$.*

La page écrit « il ne devrait pas être difficile de montrer » et ne le démontre pas. Mathlib n'a pas les arrangements de pseudo-droites. On se reportera aux notes de Grothendieck (154, lot 1, p. 18).

**Théorème** (Grothendieck, pages 55 à 63, 85 et 86, monodromie diédrale ♦). *Soit $\Sigma$ un système de $n$ pseudo-droites d'un plan projectif réel. Les $2n$-gones $\mathrm{Pol}(D)$ découpés sur le revêtement double d'une pseudo-droite ajoutée $D$ forment un système local sur la surface cellulaire des positions relatives. Le transport le long d'un demi-tour autour d'une position $D=D_i$ est la rotation $t\mapsto t-(n-1)$ de $\mathbf{Z}/2n\mathbf{Z}$, et la monodromie $\pi_1\to\mathbb{D}_{2n}$, à valeurs dans le groupe diédral d'ordre $4n$, est surjective sur la surface où la traversée des $D_i$ est permise.*

◊ *non vérifié en Lean*

L'édition corrige deux fois $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ en $\mathbf{Z}/2n\mathbf{Z}$ (pages 57 et 85), et note que pour $n$ impair la surjectivité demande une réflexion latérale. La surjectivité sans traversée des $D_i$ (pages 85 et 86) n'est pas reprise. Mathlib n'a pas les arrangements de pseudo-droites ni les systèmes locaux sur un complexe cellulaire. On se reportera aux notes de Grothendieck (154, lot 3, p. 55).

**Conjecture** (Grothendieck, page 153, cube des générisations ♦). *Pour une position $D$ d'une pseudo-droite ajoutée passant par $\nu\geq 2$ sommets de $\Sigma$, les générisations stables de $D$ sont les $2^\nu$ sommets d'un cube de dimension $\nu$, dont les $\nu\,2^{\nu-1}$ arêtes sont les générisations par un seul sommet, l'incidence étant la spécialisation.*

La page l'énonce en mots, sans justification ; celle que donne la lecture, le côté où $D$ se décolle de chaque sommet se choisissant indépendamment, est la sienne. Une droite qui passe par $\nu$ sommets d'un arrangement de droites n'a que $2\nu$ perturbations stables, et pour $\nu\geq 3$ le compte est en tension avec la page 150. Mathlib n'a pas les arrangements de pseudo-droites. On se reportera aux notes de Grothendieck (154, lot 8, p. 153).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 132 à 143 et 155 à 157, revêtement d'Arf par factorisation de Stein ; voir aussi Conrad [16] ♦). *Sur toute base, caractéristique 2 comprise, les sché-*

*mas de drapeaux isotropes $\Delta_H(E,q)$ d'un module quadratique régulier sont lisses et projectifs, à fibres géométriquement connexes sauf quand $N = 2n$ et $n \in H$. La factorisation de Stein de la grassmannienne isotrope maximale définit le revêtement double d'Arf, $\mathrm{Arf}' \simeq \mathrm{Arf}\wedge^{\mathbf{Z}/2}\mu_2$, et l'homomorphisme de Dickson est l'action de $O(q)$ sur ce revêtement, sans algèbres de Clifford.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 133 à 143) : la lissité et la connexité sont démontrées sur un corps, et le passage à une base quelconque « par spécialisation et factorisation de Stein » tient en une ligne. La section de la cote 77 ne traite pas cet énoncé. Conrad construit l'invariant de Dickson par l'algèbre de Clifford paire. Mathlib n'a pas les schémas de drapeaux isotropes ni la factorisation de Stein. On se reportera aux notes de Grothendieck (77, lot 7, p. 132).

**Partie 22**

# Jeux et combinatoire

## 30 Cote 68 : les théories de l'orientation et leurs applications de Stokes[31]

La cote 68 réunit des notes sur les jeux positionnels, les réarrangements, l'exponentielle et, aux pages 49 à 55, l'orientation des espaces vectoriels réels et les déterminants. La page 49 (68, lot 3, p. 49) énonce deux lemmes sur les ensembles à deux éléments, puis les données d'une « théorie de l'orientation » sur le groupoïde des espaces vectoriels réels de dimension finie : un foncteur $\Omega$ vers les ensembles à deux éléments, une identification $\Omega(0) \simeq \{\pm 1\}$, et pour tout hyperplan $W \subset V$ et tout demi-espace $V'$ bordé par $W$ une application de Stokes $\mathrm{St}_{V'} : \Omega(V) \to \Omega(W)$, naturelle en $(V, V')$, bijective, qui change par l'involution de $\Omega(W)$ quand on passe au demi-espace opposé. Le théorème de la page dit : a) tout morphisme de théories est un isomorphisme ; b) entre deux théories il existe un et un seul isomorphisme ; c) il existe une théorie. La page démontre a) et l'unicité dans b) par récurrence sur la dimension. La page 51 (68, lot 3, p. 51) ramène une théorie en dimension $n$ à un caractère $\varepsilon_n$ de $\mathrm{GL}(n, \mathbf{R})$ et à une bijection de Stokes $\omega_n \to \omega_{n-1}$ pour le demi-espace $\mathbf{R}^{n-1} \times \mathbf{R}_+$, écrit la compatibilité au stabilisateur $\varepsilon_n(u_n) = \mathrm{sg}(\lambda)\, \varepsilon_{n-1}(u_{n-1})$ et conclut « de proche en proche » $\varepsilon_n = \mathrm{sg} \circ \det$. On démontre ici a), b) et la valeur $\mathrm{sg} \circ \det$ de l'action, c'est-à-dire tout l'énoncé de la piste ; l'existence c) n'en fait pas partie.

*Conventions.* Les espaces sont les espaces vectoriels réels de dimension finie (dans l'univers `Type`) et leurs isomorphismes linéaires. Un demi-espace fermé bordé par $W$ est un ensemble $H = \{f \geq 0\}$, où $f$ est une forme linéaire non nulle de noyau $W$ ; le demi-espace opposé est $-H = \{f \leq 0\}$. Une théorie de l'orientation est la donnée d'un ensemble $\Omega(V)$ à deux éléments pour chaque $V$, d'une action fonctorielle des isomorphismes $e : V \to V_2$, d'une bijection $\Omega(\mathbf{R}^0) \simeq \{\pm 1\}$ et, pour chaque couple $(W, H)$, d'une application $\mathrm{St}_H : \Omega(V) \to \Omega(W)$, soumise aux conditions suivantes. Naturalité : si $e : V \to V_2$ envoie $W$ sur $W_2$ et $H$ sur $H_2$, alors $\mathrm{St}_{H_2} \circ e = e|_W \circ \mathrm{St}_H$. Bijectivité de $\mathrm{St}_H$. Opposé : $\mathrm{St}_{-H}(\omega) \neq \mathrm{St}_H(\omega)$ pour tout $\omega$, ce qui, dans un ensemble à deux éléments, revient à $\mathrm{St}_{-H} = \tau \circ \mathrm{St}_H$, où $\tau$ est l'involution sans point fixe. Un morphisme de théories est une transformation naturelle $\varphi_V : \Omega(V) \to \Omega'(V)$ compatible à l'identification de $\Omega(0)$ et aux applications de Stokes. On note $\mathbf{R}^n_+ = \mathbf{R}^{n-1} \times \mathbf{R}_+$ le demi-espace standard de $\mathbf{R}^n$, bordé par $\mathbf{R}^{n-1} \times 0$.

**Lemme 30.1.** *Soient $P$, $Q$ des ensembles à deux éléments. (1) Deux éléments distincts d'un même troisième sont égaux. (2) Deux applications injectives $P \to Q$ qui coïncident en un point sont égales. (3) Une bijection de $P$ fixe tous les points ou n'en fixe aucun ; la composée de deux bijections fixe tous les points si et seulement si les deux fixent tous les points ou aucune n'en fixe ; le carré d'une bijection fixe tous les points.*

*Démonstration.* (1) est la définition du cardinal $2$. Pour (2), si $y \neq x_0$, $f(y)$ et $g(y)$ sont distincts de $f(x_0) = g(x_0)$, donc égaux par (1). Pour (3), si $\sigma(x) \neq x$ et $\sigma(y) = y$, alors $x \neq y$ et

[31] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder68.lean`.

$\sigma(x) \neq \sigma(y) = y$, donc $\sigma(x) = x$ par (1), contradiction. Si ni $\sigma$ ni $\rho$ ne fixent de point, $\sigma(\rho x)$ et $x$ sont distincts de $\rho x$, donc égaux ; les autres cas sont immédiats. □

**Énoncé** (Page 51, l'action de $\mathrm{GL}(n, \mathbf{R})$ ♦). *Soit* $(\Omega, \mathrm{St})$ *une théorie de l'orientation et* $g \in \mathrm{GL}(n, \mathbf{R})$. *Pour tout* $\omega \in \Omega(\mathbf{R}^n)$, $g\omega = \omega$ *si* $\det g > 0$ *et* $g\omega = \tau\omega$ *si* $\det g < 0$ *: l'action de* $\mathrm{GL}(n, \mathbf{R})$ *sur* $\Omega(\mathbf{R}^n)$ *est* $\mathrm{sg} \circ \det$. *Il en est de même pour un automorphisme de tout espace* $V$.

*Démonstration.* Disons qu'une matrice inversible $M$ est *bonne* si l'automorphisme de matrice $M$ fixe $\Omega(\mathbf{R}^n)$ si et seulement si $\det M > 0$. Par le lemme 30.1 (3), un produit de deux matrices bonnes est bon, car $\det(AB) > 0$ si et seulement si $\det A$ et $\det B$ sont de même signe, et un carré $A^2$ est bon, car il fixe $\Omega(\mathbf{R}^n)$ et $\det A^2 > 0$. Une transvection $1 + c\,E_{ij}$ est le carré de $1 + \frac{c}{2}E_{ij}$ ; elle est bonne. Une matrice diagonale $\mathrm{diag}(1, \dots, d, \dots, 1)$ avec $d > 0$ est le carré de $\mathrm{diag}(1, \dots, \sqrt{d}, \dots, 1)$ ; elle est bonne.

Reste $r_i = \mathrm{diag}(1, \dots, -1, \dots, 1)$, avec $-1$ en place $i$, dont le déterminant est $-1$ : il faut voir qu'elle ne fixe pas $\Omega(\mathbf{R}^n)$. Pour $i = n$, $r_n$ fixe l'hyperplan $\mathbf{R}^{n-1} \times 0$ point par point et envoie $\mathbf{R}^n_+$ sur le demi-espace opposé. La naturalité donne $\mathrm{St}_{-\mathbf{R}^n_+}(r_n\omega) = \mathrm{St}_{\mathbf{R}^n_+}(\omega)$ ; si $r_n\omega = \omega$, cela contredit l'axiome de l'opposé. Pour $i$ quelconque, $r_i$ est conjuguée de $r_n$ par la matrice de la transposition de $i$ et $n$, et un conjugué fixe $\Omega$ si et seulement si l'élément conjugué le fait. Une matrice diagonale inversible est un produit de matrices $\mathrm{diag}(1, \dots, d_i, \dots, 1)$, et pour $d_i < 0$ on écrit $\mathrm{diag}(\dots, d_i, \dots) = \mathrm{diag}(\dots, -d_i, \dots)\, r_i$ : toute matrice diagonale inversible est bonne.

Toute matrice inversible est produit de matrices diagonales inversibles et de transvections (par un principe de récurrence de mathlib) ; elle est donc bonne. Si $g$ ne fixe pas $\Omega(\mathbf{R}^n)$, il n'en fixe aucun point (lemme 30.1 (3)), et $g\omega = \tau\omega$. Pour un espace $V$ et un isomorphisme $c : V \to \mathbf{R}^n$, $g$ fixe $\Omega(V)$ si et seulement si $cgc^{-1}$ fixe $\Omega(\mathbf{R}^n)$, et $\det(cgc^{-1}) = \det g$. □

**Théorème 30.2** (Grothendieck, page 49, théorème, a) et unicité dans b) ♦). *Soient* $(\Omega, \mathrm{St})$ *et* $(\Omega', \mathrm{St}')$ *deux théories de l'orientation. (1) Toutes les composantes d'un morphisme* $\varphi$ *sont bijectives, et* $\varphi$ *a un inverse qui est un morphisme de théories. (2) Deux morphismes* $\varphi, \psi : \Omega \to \Omega'$ *sont égaux.*

*Démonstration.* Par récurrence sur $n = \dim V$, on montre que $\varphi_V$ est injective et que $\varphi_V = \psi_V$. Si $n = 0$, on choisit un isomorphisme $c : V \to \mathbf{R}^0$. Par naturalité et compatibilité à $\Omega(0) \simeq \{\pm 1\}$, $\varphi_V$ et $\psi_V$ s'écrivent toutes deux $c^{-1} \circ \iota'^{-1} \circ \iota \circ c$, où $\iota$ et $\iota'$ sont les deux identifications ; elles sont égales et injectives. Si $n = m + 1$, on choisit une forme linéaire non nulle $f$ ; son noyau $W$ est de dimension $m$, et $H = \{f \geq 0\}$ est un demi-espace bordé par $W$. La compatibilité aux applications de Stokes donne $\mathrm{St}'_H \circ \varphi_V = \varphi_W \circ \mathrm{St}_H$, et de même pour $\psi$. Comme $\varphi_W = \psi_W$ est injective par hypothèse de récurrence et que $\mathrm{St}_H$ et $\mathrm{St}'_H$ sont bijectives, $\varphi_V$ est injective et $\mathrm{St}'_H \circ \varphi_V = \mathrm{St}'_H \circ \psi_V$, d'où $\varphi_V = \psi_V$. Une injection entre deux ensembles à deux éléments est bijective. Pour l'inverse, on prend le morphisme $\Omega' \to \Omega$ de l'énoncé suivant ; ses composées avec $\varphi$ sont des morphismes d'une théorie dans elle-même, donc égales à l'identité par (2). □

**Énoncé** (Page 49, théorème, existence dans b) ♦). *Entre deux théories de l'orientation* $(\Omega, \mathrm{St})$ *et* $(\Omega', \mathrm{St}')$, *il existe un morphisme ; c'est donc l'unique isomorphisme entre elles.*

*Démonstration.* On suit la réduction de la page 51. Notons $\omega_n = \Omega(\mathbf{R}^n)$ et $s_n : \omega_n \to \omega_{n-1}$ la bijection composée de $\mathrm{St}_{\mathbf{R}^n_+}$ et de l'identification $\mathbf{R}^{n-1} \times 0 \simeq \mathbf{R}^{n-1}$. On définit des éléments de référence $r_0 \in \omega_0$, image réciproque de 1, et $r_n = s_n^{-1}(r_{n-1})$ ; de même $r'_n \in \omega'_n$. Soit $\psi_n : \omega_n \to \omega'_n$ la bijection qui envoie $r_n$ sur $r'_n$ et l'autre élément sur l'autre. Elle commute à

l'action de $\mathrm{GL}(n,\mathbf{R})$ : par l'énoncé de la page 51, $g$ agit trivialement des deux côtés si $\det g > 0$, et par $\tau$ des deux côtés si $\det g < 0$, et une bijection commute à $\tau$ (lemme 30.1 (1)). Par le lemme 30.1 (2), elle vérifie $s'_n \circ \psi_n = \psi_{n-1} \circ s_n$, puisque les deux membres sont injectifs et envoient $r_n$ sur $r'_{n-1}$, et elle est compatible à l'identification de $\Omega(0)$.

Pour un espace $V$ de dimension $n$ et un isomorphisme $c : V \to \mathbf{R}^n$, on pose $\varphi_V = c^{-1} \circ \psi_n \circ c$. Cela ne dépend pas de $c$ : si $c_2 = gc$ avec $g \in \mathrm{GL}(n,\mathbf{R})$, $\psi_n$ commute à $g$. La naturalité de $\varphi$ s'en déduit, en calculant $\varphi_{V_2}$ avec la carte $c \circ e^{-1}$. Pour la compatibilité à $\mathrm{St}_H$, $H = \{f \geq 0\}$ bordé par $W$ dans $V$ de dimension $m+1$, on construit un isomorphisme $c : V \to \mathbf{R}^{m+1}$ dont la dernière coordonnée est $f$ : avec $v_0$ tel que $f(v_0) = 1$ et un isomorphisme $j : W \to \mathbf{R}^m$, l'application $u \mapsto j^{-1}(u_1, \ldots, u_m) + u_{m+1} v_0$ est injective entre espaces de même dimension, et $c$ est son inverse. Alors $c$ envoie $W$ sur $\mathbf{R}^m \times 0$ et $H$ sur $\mathbf{R}^{m+1}_+$. La naturalité des applications de Stokes pour $c$ et pour $c^{-1}$ ramène $\mathrm{St}'_H \circ \varphi_V = \varphi_W \circ \mathrm{St}_H$ à la relation $s'_{m+1} \circ \psi_{m+1} = \psi_m \circ s_{m+1}$, $\varphi_W$ étant calculé avec la carte $j' \circ c|_W$, où $j'$ identifie $\mathbf{R}^m \times 0$ à $\mathbf{R}^m$. □

*Remarque.* La vérification suit la lecture. La bijectivité des applications de Stokes est un axiome, comme le dit la lecture : l'argument de cardinal de la page 49 ne la donne pas, et elle sert à chaque pas de la récurrence. La partie a) et l'unicité dans b) n'utilisent ni l'axiome de l'opposé ni la naturalité des applications de Stokes : elles n'utilisent que leur bijectivité, la compatibilité des morphismes et l'identification de $\Omega(0)$. L'axiome de l'opposé ne sert qu'à l'existence, par l'action de $\mathrm{diag}(1, \ldots, 1, -1)$ ; sans lui, la théorie où $\Omega(V) = \{\pm 1\}$, avec action triviale et applications de Stokes identiques, satisferait aux autres axiomes sans être isomorphe aux orientations usuelles (observation non formalisée). Le passage « de proche en proche » de la page 51 est fourni, comme le dit la note de la lecture, par la factorisation de tout caractère de $\mathrm{GL}(n,\mathbf{R})$ à valeurs dans $\{\pm 1\}$ par le déterminant ; la démonstration l'obtient de la décomposition des matrices inversibles en transvections et matrices diagonales, et de ce que les transvections et les matrices diagonales positives sont des carrés. La forme « $\Omega(W,V) \wedge \Omega(V) \simeq \Omega(W)$ » des axiomes et le lemme 2 de la page 49 ne sont pas formalisés : on énonce directement l'axiome de l'opposé.

Ne sont pas démontrés ici : l'existence c) d'une théorie de l'orientation, c'est-à-dire la construction des applications de Stokes sur les orientations usuelles et la vérification des axiomes ; la reformulation par le produit contracté $D(W,V) \wedge \Omega(V) \simeq \Omega(W)$ et le lemme 2 de la page 49 ; la comparaison de la normalisation de la page (normale rentrante en dernier) avec celle des géomètres, au signe $(-1)^{\dim V}$ ; le produit, la règle de Koszul et la compatibilité de Stokes et des produits de la page 53 ; les déterminants de la page 55.

Partie 23

# Groupes fondamentaux et théorie de Galois

*Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici.* Mathlib contient le formalisme des catégories galoisiennes, mais pas le groupe fondamental étale des schémas auquel ces cotes l'appliquent.
Cotes rangées sous ce thème par la carte : 29, 34, 142, 143, 145, 149, 156-9.

**Définition** (Grothendieck, pages 2 à 16, catégorie de Teichmüller–Galois ♦). La catégorie de Teichmüller–Galois a pour objets les courbes anabéliennes de tous types $(g, \nu)$ et pour flèches les complétés profinis des classes d'isotopie d'applications étales finies ; elle est obtenue par une complétion profinie des catégories dont les groupes d'automorphismes vérifient la condition de finitude $(*)$, l'image du stabilisateur de chaque flèche $u : X \to Y$ étant d'indice fini dans $\mathrm{Aut}(Y)$. Chaque groupe d'automorphismes y est le groupe de Teichmüller profini ; la construction est algébrique, invariante par extension de corps algébriquement clos de caractéristique $0$, et $\mathrm{Aut}(k)$ y opère.

Mathlib n'a pas la complétion profinie des catégories ni les groupes de Teichmüller. On se reportera aux notes de Grothendieck (142, lot 1, p. 2).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 167 et 175 à 180, monodromie modérée à plusieurs paramètres ♦). *Soient $S$ un schéma strictement local de dimension quelconque et $\bar{X}$ un $S$-schéma projectif et plat, de fibre fermée à croisements normaux hors de la codimension $2$, lisse à bord à croisements normaux relatifs au-dessus d'un ouvert $U \subset S$. L'image de $\pi_1(U)$ dans $\mathrm{Out}(\pi_1^{(p')})$ d'une fibre géométrique est un groupe abélien d'ordre premier à $p$, de rang au plus le nombre $\nu$ de points doubles en dimension relative $1$.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 175 à 180). Le lemme 3.1, sur la courbe nodale verselle, n'y est pas démontré. Mathlib n'a pas la monodromie modérée. On se reportera aux notes de Grothendieck (34, lot 9, p. 167).

**Contre-exemple** (pages 36 à 39, le lemme du Complément ♦). *Le lemme de la page 36, qui omet l'hypothèse de $(*)$ sur les groupes fondamentaux, est faux pour les courbes hyperboliques de types $(1,1)$ et $(1,2)$, et réduire l'ouvert $V$ n'écarte pas le cas exceptionnel* $\operatorname{card} I = 1$. *L'extension que la page annonce aux polycourbes hyperboliques de toute dimension repose sur un plongement dans une variété semi-abélienne, qui manque en dimension $2$ : la courbe elliptique universelle privée de sa section nulle, au-dessus de $Y(N)$, n'en a pas.*

◊ *non vérifié en Lean*

Pour les courbes, l'énoncé de la piste, en caractéristique $0$ sur un corps algébriquement clos (deux morphismes $f, g : X \to Y$ vers une courbe hyperbolique, $f$ dominant, qui induisent le même homomorphisme extérieur des groupes fondamentaux étales profinis, sont égaux), n'est pas démontré ici ; l'édition ferme les types $(1,1)$ et $(1,2)$ par l'hypothèse de $(*)$. Mathlib n'a pas le groupe fondamental étale des courbes hyperboliques. On se reportera aux notes de Grothendieck (149, lot 2, p. 21).

**Théorème** (Grothendieck, pages 190 à 193, axiome R2 des domaines de ramification ♦). *Soit $(R, r)$ un domaine de ramification sur $S$ : un champ de catégories multigaloisiennes sur le site étale de $S$ muni d'une réalisation géométrique continue $r$ vers les schémas relatifs. Sous*

◊ *non vérifié en Lean*

*les axiomes R1, R3 et R4, l'axiome R2 (les sous-objets directs de $X$ correspondent bijectivement aux parties ouvertes et fermées de $r(X)$) équivaut à la fidélité de $r$.*

**Théorème** (Grothendieck, page 197, homomorphismes de domaines de ramification ♦). *Pour $(R, r)$ défini par un schéma $Z$ muni d'un groupe fini d'opérateurs $G$, $\mathrm{Hom}((R, r), (R', r'))$ est équivalente à la catégorie des couples $(P', \alpha)$, $P'$ objet galoisien de $R'_S$ de groupe $G$ et $\alpha$ un $G$-isomorphisme $r'(P') \simeq Z$. En particulier, dans tout homomorphisme $(\varphi, \lambda)$ de domaines de ramification, $\varphi$ est pleinement fidèle.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 212 et 214, le degré comme donnée primitive ♦). *Sur une catégorie, six conditions sur une classe de morphismes de degré $n$ (changement de base, additivité finie, isomorphismes de degré $1$, décomposition $Y = \coprod_n Y_n$ avec $X \times_Y Y_n \to Y_n$ de degré $n$, descente effective en degré $\geq 1$, vide en degré $0$) déterminent la notion de façon unique ; elle coïncide alors avec « trivialisé par un morphisme de descente effective universelle ».*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 87 à 97, $\pi_1$ modéré et auto-intersection ♦). *Soit $\mathfrak{X}$ un schéma formel régulier dont la fibre spéciale $X_o$ est une composante d'un diviseur à croisements normaux $D$. Le groupe fondamental modéré $\pi_1^t(\mathfrak{X}/D)$ est une extension centrale de $\pi_1^t(X_o/D'_o)$ par un quotient de $\mu^\infty$, dont la classe est la classe de Chern de l'auto-intersection de $X_o$ dans $\mathfrak{X}$ ; pour $X_o = \mathbf{P}^1_k$ et $D'_o$ vide, l'extension est $\mu_n(k)$, où $n$ est la partie première à $p$ du degré de $X_o \cdot X_o$.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Théorème** (Grothendieck, pages 153 à 155, 1-asphéricité locale ♦). *Soit $f : X \to S$ plat sur un trait strictement local, de fibre fermée $X_0$ localement d'intersection complète, dont le lieu non lisse est de codimension $\geq 2$ dans $X_0$. Alors $f$ est localement 1-asphérique pour les premiers $\neq p$ ; si $f$ est propre, la spécialisation $H^1(X_0, G) \to H^1(X_{\bar\eta}, G)$ est bijective pour tout groupe fini $G$ d'ordre premier à $p$.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Conjecture** (Grothendieck, pages 170 et 171, torseurs sous un groupe discret infini ♦). *Soit $G$ un groupe discret, éventuellement infini, et soient $C_1$ à $C_5$ les classes de familles couvrantes fppf quasi-compactes, de type fini, quasi-finies, principales finies et principales finies étales. On a $H^1_{C_3} \simeq H^1_{C_2}$ en général ; $H^1_{C_2} \simeq H^1_{C_1}$ sur un anneau de Dedekind ; $H^1_{C_i} \simeq H^1(\hat V/V, -)$ pour $i = 1, 2, 3$ sur un anneau de valuation discrète complet $V$ à corps résiduel algébriquement clos ; $H^1_{C_5} \simeq H^1_{C_4} \simeq H^1_{C_3}$ et $H^1_{C_i}(V, -) \simeq H^1_{C_i}(k, -)$ sur un anneau local complet $V$ de corps résiduel $k$.*

Mathlib n'a pas les torseurs fppf ni le $H^1$ pour ces topologies. On se reportera aux notes de Grothendieck (29, lot 9, p. 170).

**Conjecture** (Grothendieck, page 120, inertie modérée et matrice des multiplicités ♦). *Soit un morphisme entre schémas strictement locaux réguliers munis de diviseurs à croisements normaux, de branches indexées par $C$ et $C'$. L'application induite sur l'inertie modérée est donnée par la matrice $N = (n_{c,c'})$ des multiplicités, $f^*(\bar E_{c'}) = \sum_c n_{c,c'} \bar D_c$ ; c'est un isomorphisme si et seulement si $\mathrm{card}\, C = \mathrm{card}\, C'$ et l'entier $\det N$ est $\pm$ une puissance de la caractéristique résiduelle.*

Mathlib n'a pas l'inertie modérée des schémas réguliers. On se reportera aux notes de Grothendieck (29, lot 6, p. 120).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 94, 95 et 98 à 101, image de Galois sur une seule courbe ♦). *Soient $X$ une courbe algébrique anabélienne sur un corps $K$ de type fini sur* **Q** *et $\Theta$ un automorphisme du groupoïde fondamental profini $\hat{\Pi}_1(X, I)$ qui fixe les points base. Si $\Theta$ se relève à $\hat{\Pi}_1(X', I')$ pour tout revêtement étale fini $X'$ de $X$ défini sur $K$, respecte les noyaux de $\hat{\pi}_1(X', x') \to \hat{\pi}_1(Y, f(x'))$ pour tout $K$-morphisme $f : X' \to Y$, est compatible aux morphismes entre revêtements et vérifie la condition des lacets avec un seul multiplicateur, alors $\Theta$ provient de* $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$. *Ces conditions sont nécessaires.*

Mathlib n'a pas les groupoïdes fondamentaux profinis des courbes. On se reportera aux notes de Grothendieck (142, lot 5, p. 94).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 34 et 35, exposant unité dans le groupe profini libre ♦). *Dans le groupe profini libre sur $l_0$, $l_1$, avec $l_\infty l_1 l_0 = 1$, une unité $p \in \hat{\mathbf{Z}}^*$ ne vérifie $l_\infty^p l_1^p l_0^p = 1$ que pour $p = 1$ ; la page le laisse en exercice.*

Accessible en partie par des témoins finis ; mathlib n'a pas le groupe profini libre. On se reportera aux notes de Grothendieck (145, lot 2, p. 34).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 72 à 77 et 84 à 93, spécialisation vers une pointe ♦). *Soient $U = X \setminus T$ une courbe hyperbolique relative sur un trait et $f$ une section rationnelle qui rencontre la section de pointe $g_{i_0}$ dans la fibre spéciale avec la multiplicité $n$. L'inertie s'envoie sur $n$ fois le sous-groupe de lacet $L_{i_0}$ de cette pointe, et elle agit trivialement exactement quand $f$ se prolonge.*

Mathlib n'a pas la spécialisation des sections des courbes hyperboliques relatives. On se reportera aux notes de Grothendieck (149, lot 4, p. 72).

**Partie 24**

# Polyèdres et géométrie convexe

## 31 Cote 70 : l'icosaèdre sur $\mathbf{Z}[\alpha]$, fidèle en toute caractéristique, et sa conique modulo $5^{32}$

La cote 70, *Réalisations géométriques de structures combinatoires (vieilles rédactions)*, compte cent vingt-cinq pages. Sa section VII, sous la chemise de la page 73, écrit l'icosaèdre régulier sur l'anneau $\mathbf{Z}[\alpha] = \mathbf{Z}[x]/(x^2+x-1)$ par trois réflexions dans le repère des sommets $(s_0, s_1-s_0, s_2-s_0, s_3-s_0)$. Les pages 74 et 75 donnent les générateurs et les douze sommets (70, lot 4, p. 74, 70, lot 4, p. 75), les pages 89 à 92 le centre et l'antipodisme $\iota$, avec sa forme en caractéristique $2$ (70, lot 5, p. 91). Les pages 93 et 94 veulent établir, « sur un corps de base quelconque », que trois sommets distincts ne sont jamais alignés et qu'aucun sommet n'est dans le plan d'une face qui ne le contient pas ; elles traitent les droites issues de $s_0$ et le plan $z=0$ de la face $(s_0,s_1,s_2)$, et invoquent l'homogénéité pour le reste (70, lot 5, p. 93, 70, lot 5, p. 94). La page 95 donne la fonction quadratique invariante $q$, les pages 101 et 102 sa partie quadratique $q_0$ et ses discriminants (70, lot 6, p. 101). Le tableau « Directions remarquables » de la page 78 compte $6$ directions de sommets, $15$ d'arêtes et $10$ de plans de faces, $31 = 5^2+5+1$, dit que « les 6 directions de sommets correspondent à la conique » et écrit $125 = 1+24+60+40$, avec « deux icos. » (70, lot 4, p. 78). On démontre ici l'énoncé de la page 78 sur $\mathbf{F}_5$, et les incidences des pages 93 et 94 sur tout anneau non nul où $\alpha^2+\alpha=1$, donc en toute caractéristique, $2$ et $5$ comprises.

*Conventions.* $R$ est un anneau commutatif, $\alpha \in R$, $\alpha' = -1-\alpha$, et l'on écrit les points de $R^3$ en coordonnées $(x,y,z)$. Les générateurs sont

$$\sigma_0(x,y,z) = \big(1-(x+y+z),y,z\big), \quad \sigma_1(x,y,z) = (y+\alpha' z, x-\alpha' z, z), \quad \sigma_2(x,y,z) = (x,z,y),$$

et $\iota(x,y,z) = (\alpha'-x, 1-\alpha'-y, 1-\alpha'-z)$. Les douze sommets sont, dans cet ordre, $s_0=0$, $s_1=e_1$, $s_2=e_2$, $s_3=e_3$, $s_3' = (\alpha',-\alpha',1)$, $s_3'' = (0,-\alpha',1)$ et leurs images par $\iota$. On pose

$$q_0 = x^2+y^2+z^2-\alpha yz+zx+xy, \qquad q = q_0-(x+y+z),$$

et $\varphi$ la forme polaire de $q_0$, de matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -\alpha \\ 1 & -\alpha & 2 \end{pmatrix}$. Les trente arêtes sont les paires de sommets à distance $q_0=1$ sur $\mathbf{Q}(\sqrt{5})$, listées dans le fichier ; les vingt faces sont les triangles d'arêtes. Sur $R$, on dit que $p$ est sur la droite $(r,u)$ s'il existe $a\in R$ avec $p-r=a(u-r)$, et dans le plan $(r,u,w)$ s'il existe $s,t\in R$ avec $p-r=s(u-r)+t(w-r)$ ; sur un corps, et pour $r\neq u$, c'est l'alignement et la coplanarité usuels. Sur $\mathbf{F}_5$, la seule racine de $x^2+x-1$ est $2$, de sorte que la réduction modulo $5$ de la réalisation est celle de $\alpha=2$, $\alpha'=2$ ; on note alors $o=(1,2,2)$ et $\bar{s} = s-o$ pour un sommet $s$.

**Énoncé** (Pages 74, 75, 91, 94 et 101, sur un anneau quelconque)**.** *Supposons* $\alpha^2+\alpha-1=0$

[32] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder70.lean`.

*dans $R$.*

1. *Les douze sommets annulent $q$.*
2. *$\sigma_0$, $\sigma_1$, $\sigma_2$ permutent les douze sommets, par des permutations de $\{0,\dots,11\}$ qui ne dépendent pas de $R$.*
3. *Pour chacune des trente arêtes $\{s,s'\}$, $q_0(s'-s)=1$.*
4. *Les neuf sommets autres que $s_0$, $s_1$, $s_2$ ont une coordonnée $z$ inversible :* $1$, $1-\alpha'=2+\alpha$ *ou* $-\alpha'=1+\alpha$.
5. *Sans hypothèse sur $\alpha$, si $2=0$ dans $R$, $\iota$ est la translation de vecteur $(\alpha',\alpha,\alpha)$.*

*Démonstration.* Chaque point est une identité polynomiale en $\alpha$ et en les coordonnées, vraie modulo $\alpha^2+\alpha-1$ : on l'écrit comme combinaison de la relation $\alpha^2+\alpha-1=0$, de coefficient $-2-\alpha$ ou $-1-\alpha$ pour $q(\iota s_0)$, $q(\iota s_1)$, $q(\iota s_2)$, $q(\iota s_3)$, $\pm1$ pour $\sigma_1$, $-\alpha$ ou $1+\alpha$ pour quatre des arêtes, nul ailleurs. Pour le point 4, $(2+\alpha)(1-\alpha)=1$ et $(1+\alpha)\alpha=1$. Pour le point 5, la première coordonnée de $\iota(p)-p-(\alpha',\alpha,\alpha)$ vaut $-2x$, les deux autres $2(1-y)$ et $2(1-z)$. □

**Énoncé** (Pages 93 et 94, fidélité en toute caractéristique ♦). *Soit $R$ un anneau commutatif non nul où $\alpha^2+\alpha-1=0$. Alors*

1. *les douze sommets sont distincts ;*
2. *pour trois sommets distincts $s,s',s''$, le point $s''$ n'est pas sur la droite $(s,s')$ ;*
3. *pour une face $(a,b,c)$ et un sommet $m$ distinct de $a$, $b$, $c$, le point $m$ n'est pas dans le plan $(a,b,c)$.*

*Démonstration.* Les applications $\sigma_k$ sont affines : si $p-r=s(u-r)+t(w-r)$, alors $\sigma_k p-\sigma_k r=s(\sigma_k u-\sigma_k r)+t(\sigma_k w-\sigma_k r)$, coordonnée par coordonnée. D'après l'énoncé précédent, un mot $w$ en les $\sigma_k$ envoie le sommet d'indice $i$ sur le sommet d'indice $\pi_w(i)$, où $\pi_w$ est le mot correspondant en les trois permutations, qui est une permutation de $\{0,\dots,11\}$. Un mot transporte donc l'égalité de deux sommets, l'appartenance d'un sommet à la droite de deux autres, et à un plan de trois autres.

C'est l'homogénéité que la page invoque, rendue explicite par deux tables. Pour toute paire $(i,j)$ d'indices distincts, la table `pairWord` donne un mot $w$ tel que $\pi_w(i)=0$ et $\pi_w(j)\in\{1,5,6\}$, c'est-à-dire qui envoie $(s_i,s_j)$ sur $(s_0,s_1)$, $(s_0,s_3'')$ ou $(s_0,\iota s_0)$ ; pour toute face $(a,b,c)$, la table `faceWord` donne un mot qui l'envoie, dans l'ordre, sur $(s_0,s_1,s_2)$. Ces $132+20$ propriétés portent sur des permutations de $\{0,\dots,11\}$ et sont vérifiées par le noyau de Lean (`decide +kernel`).

Il reste les cas de base. Comme $s_0=0$, le sommet $s_k$ est sur la droite $(s_0,s_j)$ si et seulement si $s_k=a\,s_j$ pour un $a\in R$, ce qui annule les trois mineurs d'ordre $2$ de la matrice de colonnes $s_k$, $s_j$. Pour $j\in\{1,5,6\}$ et chacun des trente $k\neq0,j$, l'un de ces mineurs est une unité de $\mathbf{Z}[\alpha]$, à savoir $\pm1$, $\pm(1+\alpha)$, $\pm(2+\alpha)$ ou $\pm(3+2\alpha)$, d'inverses $\pm\alpha$, $\pm(1-\alpha)$ et $\pm(2\alpha-1)$. Pour chaque cas, une identité $1=u\,(m_{rs})+c\,(\alpha^2+\alpha-1)$, où $m_{rs}$ s'écrit à partir des égalités de coordonnées, donne $1=0$, ce qui est exclu dans un anneau non nul. Le point 2 s'en déduit : si $s''$ est sur la droite $(s,s')$, le mot de la paire $(s,s')$ amène $s''$ sur un sommet $s_k$ de la droite $(s_0,s_j)$, avec $k\neq0,j$ puisque $\pi_w$ est injective. Pour le point 1, le même mot ramène une égalité $s_i=s_j$ à $s_{j'}=0$ pour $j'\in\{1,5,6\}$ ; or $s_1$ a pour première coordonnée $1$, $s_3''$ pour troisième coordonnée $1$, et $\iota s_0$ pour troisième coordonnée l'unité $2+\alpha$. Pour le point 3, le mot de la face amène $m$

sur un sommet d'indice au moins 3 dans le plan $(s_0, s_1, s_2)$, c'est-à-dire de coordonnée $z$ nulle, contre le point 4 de l'énoncé précédent. □

**Théorème 31.1** (Grothendieck, page 78, la conique de $\mathbf{P}^2(\mathbf{F}_5)$ ♦). *Sur $\mathbf{F}_5$, avec $\alpha = 2$ :*

1. *$2o = (\alpha', 1-\alpha', 1-\alpha')$, $o$ est fixe par $\sigma_0$, $\sigma_1$, $\sigma_2$ et $\iota$, et $q(o) = 0$ ;*
2. *les douze sommets sont isotropes pour $q_0$ centrée en $o$ : $q_0(\bar{s}) = 0$ ;*
3. *les vecteurs non nuls isotropes de $q_0$ sont les douze $\bar{s}$ et leurs doubles $2\bar{s}$ ; ces vingt-quatre vecteurs sont distincts ;*
4. *un point de $\mathbf{P}^2(\mathbf{F}_5)$ est sur la conique $q_0 = 0$ si et seulement si c'est l'une des six directions $\bar{s}_0, \ldots, \bar{s}''_3$ ;*
5. *les six directions de sommets, les quinze directions $s' - s$ d'arêtes choisies et les dix directions $\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$ des faces $0$ à $9$ sont les trente et un points de $\mathbf{P}^2(\mathbf{F}_5)$, chacun une fois ; toute arête et toute face donne l'une de ces directions, tout sommet l'une des six ;*
6. *la direction $\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$ d'une face $(a, b, c)$ est $\varphi$-orthogonale à $b - a$ et à $c - a$, c'est-à-dire au plan de la face ;*
7. *par une direction d'arête passent exactement deux tangentes à la conique, par une direction de face aucune ; $q_0$ prend la valeur $1$ ou $4$ sur $60$ vecteurs, la valeur $2$ ou $3$ sur $40$.*

*Démonstration.* L'unicité de la racine 2 se vérifie sur les cinq éléments de $\mathbf{F}_5$. Le reste porte sur les $125$ vecteurs de $\mathbf{F}_5^3$ et sur des listes finies de sommets, d'arêtes et de faces, et chaque point est vérifié par le noyau de Lean. Pour le point 5, l'application qui envoie chacun des trente et un représentants sur son point de $\mathbf{P}^2(\mathbf{F}_5)$ est injective, car aucun représentant n'est multiple d'un autre, et surjective, car tout vecteur non nul est multiple de l'un d'eux ; on en tire aussi que $\mathbf{P}^2(\mathbf{F}_5)$ a $31$ points. Le point 4 est l'énoncé, vérifié sur les $124$ vecteurs non nuls, que $q_0(v) = 0$ si et seulement si $v$ est multiple d'un des six représentants de sommets. Au point 7, la tangente à la conique au point $\bar{s}$ est la droite $\varphi(\bar{s}, \cdot) = 0$, et l'on compte, pour chaque représentant, les six sommets dont la tangente le contient. □

*Remarque.* La vérification confirme le tableau de la page 78 et la lecture : la réduction modulo $5$ place les sommets sur le cône isotrope de sommet $o$, les six directions de sommets remplissent la conique, et les $6 + 15 + 10$ directions sont les $31$ points du plan. L'explication des quinze directions d'arêtes par les points extérieurs et des dix directions de faces par les points intérieurs, que la piste laissait à l'édition parce que les mots de la page y sont incertains, est démontrée au point 7, avec la définition par les tangentes ; les classes $\{1, 4\}$ et $\{2, 3\}$ des valeurs de $q_0$ en sont la forme arithmétique, et donnent le décompte $60 + 40$. Les vingt-quatre vecteurs isotropes non nuls sont les sommets de l'icosaèdre et de son homothétique de rapport $2$, ce que désignent les « deux icos. » de la page. Pour la fidélité, la démonstration n'utilise ni corps ni calcul de normes au-delà de trente mineurs inversibles : elle vaut sur tout anneau non nul où $\alpha^2 + \alpha = 1$, donc en caractéristique $2$ (sur une $\mathbf{F}_4$-algèbre) et $5$, et l'argument d'homogénéité de la page suffit, une fois les deux tables de mots vérifiées. La marge « c'est en fait faux en car. 2 ! » ne vise donc ni le non-alignement ni le plan de la face. Le vecteur de translation de $\iota$ en caractéristique $2$ est $(\alpha', \alpha, \alpha)$, et non le $(\alpha', 1, 1)$ lu sur la page 91.

Ne sont pas démontrés ici : que $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2$ engendrent un groupe d'ordre $120$ et que les trente paires listées sont l'orbite de l'arête $\{s_0, s_1\}$ (le fichier montre seulement que les générateurs permutent les sommets et que ces paires sont à distance $q_0 = 1$) ; l'unicité de la quadrique passant par les douze sommets (page 101), les valeurs $\delta'(q_0) = 1$ et $\det = -\alpha-3$ des pages 101 et 102, et la lissité de la quadrique hors de la caractéristique $5$ ; les relations $\Delta = \alpha\Delta'$ et $\Phi' = (2\alpha-1)\Phi$ de la page 76 ; la proposition « régulière $\Rightarrow$ fidèle » de la page 109 ; les formules universelles.

**Exemple 31.2** (Grothendieck, pages 101, 102 et 106, la quadrique de l'icosaèdre ♦). Sur $\mathbf{Z}[\alpha]/(\alpha^2+\alpha-1)$, une unique quadrique invariante passe par les douze sommets ; sa partie quadratique a pour demi-discriminant $\delta'(q_0) = 1$ et son discriminant complet vaut $-\alpha-3$, de norme $5$. Elle est lisse en toute caractéristique différente de $5$, où elle est un cône.

◊ non vérifié en Lean

**Conjecture 31.3** (Grothendieck, pages 9 à 25 et 64 à 69, formules universelles ♦). *Dans le repère des sommets, les réflexions $\sigma_i = \mathrm{id} + \ell_i \otimes (s_{i+1} - s_i)$ donnent une réalisation affine régulière du polytope $\{p_1, \dots, p_n\}$ à $n$ paramètres $\alpha_{i-1}$, qui doivent être racines du polynôme minimal de $2\cos(2\pi/p_i)$. Tétraèdre, cube et octaèdre s'écrivent ainsi sur $\mathbf{Z}$, icosaèdre et dodécaèdre sur $\mathbf{Z}[\alpha]/(\alpha^2+\alpha-1)$. La page énonce le critère d'ordre pour $n = 2$ seulement, sans démonstration.*

Démonstration donnée par l'édition, non vérifiée en Lean.

## 32 Cote 86 : les cinq trièdres de l'icosaèdre et l'icosaèdre gauche[33]

La cote 86, *[Polyèdres réguliers] : notes manuscrites (s.d.)*, trente-deux pages, reprend l'icosaèdre comme un objet purement combinatoire. Sous la chemise « Cours », la page 18 définit une permutation $\rho$ des quinze directions d'arêtes par le côté du pentagone d'un sommet opposé à l'arête, et la page 19 affirme $\rho^3 = \mathrm{id}$ (86, lot 1, p. 18, 86, lot 1, p. 19). Ses orbites sont les cinq « trièdres distingués ». La page 20 montre que deux arêtes orthogonales n'ont pas de sommet commun et que les cinq arêtes d'un sommet ont des trièdres distincts (86, lot 1, p. 20). Les pages 21 et 22 en tirent que le groupe $G$ des automorphismes opère sur les trièdres par permutations paires et munissent l'ensemble $T$ des trièdres d'une orientation canonique (86, lot 2, p. 21, 86, lot 2, p. 22). Les pages 23 à 25 concluent que $G \to \mathfrak{S}_T$ a pour image $\mathrm{Alt}_T$ et pour noyau le sous-groupe engendré par l'antipodisme (86, lot 2, p. 23, 86, lot 2, p. 25). Les pages 26 à 30 reconstruisent l'icosaèdre gauche $\bar{\Pi} = \Pi/\iota$, aujourd'hui l'hémi-icosaèdre, à partir de l'ensemble orienté $T$, et les pages 31 et 32, d'une autre encre, donnent le tableau des ensembles de drapeaux et les trois involutions sur les numérotations $(a_1, \dots, a_5)$ (86, lot 2, p. 26, 86, lot 2, p. 30, 86, lot 2, p. 31, 86, lot 2, p. 32).

*Conventions.* Les sommets sont $\{0, \dots, 11\}$ : $0$ et $11$ sont deux sommets opposés, $1, \dots, 5$ et $6, \dots, 10$ les deux pentagones de leurs voisins ; la liste des voisins est donnée une fois pour toutes, et tout le reste est calculé à partir de l'adjacence. Pour une face $\{x, y, z\}$, $\mathrm{o}(x, y, z)$ est le troisième sommet de l'autre face qui borde $\{x, y\}$ ; l'antipode $\iota x$ est l'unique sommet qui n'est ni $x$, ni un voisin de $x$, ni un voisin d'un voisin de $x$. $G$ est le groupe des bijections de l'ensemble des sommets qui conservent l'adjacence dans les deux sens. Un drapeau est un triangle orienté $(s, t, u)$ : le sommet $s$, l'arête $\{s, t\}$, la face $\{s, t, u\}$ ; il y en a $120$. Une

[33] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder86.lean`.

arête est un couple de sommets adjacents, considéré à l'ordre près ; deux arêtes ont même direction si elles sont égales ou antipodales. Pour une arête $\{s,t\}$ de faces $\{s,t,u\}$ et $\{s,t,v\}$, on pose $\rho_0(s,t) = \{\mathsf{o}(s,u,t), \mathsf{o}(s,v,t)\}$, le côté $\{\Pi_{s,u}, \Pi_{s,v}\}$ de la page 18. Les numérotations de $T$ sont les bijections $\{1,\dots,5\} \to T$, composées à droite par les permutations des places : $(a \circ \tau)(k) = a(\tau(k))$.

**Énoncé** (Pages 18 à 20 et 23, les trièdres distingués ♦). *1. $\rho_0(s,t)$ est une arête et ne dépend pas de celle des deux faces que l'on appelle $u$ ; $\rho_0(t,s)$ est l'antipode de $\rho_0(s,t)$ ; si deux arêtes ont même direction, leurs images aussi. On obtient une permutation $\rho$ des quinze directions, avec $\rho^3 = \mathrm{id}$, sans point fixe, et $\rho^2\overline{\{s,t\}} = \overline{\{u,\iota v\}}$.*

*2. Il y a cinq orbites, les trièdres ; deux arêtes de même trièdre et de directions différentes n'ont aucun sommet commun ; en chaque sommet, les cinq arêtes ont des trièdres deux à deux distincts, et chaque trièdre est représenté. Chaque trièdre est donc une partition des douze sommets en six arêtes.*

*3. (Page 23) Pour une face $\{u,v,w\}$, avec $u_1 = \mathsf{o}(v,w,u)$, $v_1 = \mathsf{o}(w,u,v)$, $w_1 = \mathsf{o}(u,v,w)$, les directions $\overline{\{u,v_1\}}$, $\overline{\{v,w_1\}}$, $\overline{\{w,u_1\}}$ sont dans un même trièdre, $\overline{\{u,w_1\}}$, $\overline{\{v,u_1\}}$, $\overline{\{w,v_1\}}$ dans un autre, et ces deux trièdres et ceux des trois côtés de la face sont les cinq trièdres. Les arêtes $\{u,v\}$ et $\{v,w_1\}$ ne sont jamais dans le même trièdre.*

*Démonstration.* Ce sont des énoncés finis sur l'icosaèdre, vérifiés par le noyau de Lean (`decide`), sans évaluation compilée. Pour (2), on étiquette les trente arêtes par $\{0,\dots,4\}$ et l'on vérifie que deux arêtes ont la même étiquette si et seulement si la direction de l'une est celle de l'autre, de son image par $\rho$ ou de son image par $\rho^2$ : les étiquettes sont alors les orbites, et l'étiquetage n'est qu'un nom donné à chacune. □

**Théorème 32.1** (Grothendieck, pages 20 à 25, l'action sur les trièdres ♦). *1. Un automorphisme est déterminé par l'image du drapeau $(0,1,2)$, et tout drapeau est l'image de $(0,1,2)$ par un automorphisme : $G$ a $120$ éléments.*

*2. Tout automorphisme $g$ commute à $\iota$ et à $\rho$, et l'application qui envoie le trièdre d'une arête $a$ sur celui de $g(a)$ définit un homomorphisme $G \to \mathfrak{S}_T$.*

*3. Son image est contenue dans $\mathrm{Alt}_T$ et lui est égale.*

*4. Son noyau est $\{1,\iota\}$.*

*Démonstration.* (1) Si $g$ conserve l'adjacence, $g(\mathsf{o}(x,y,z)) = \mathsf{o}(gx,gy,gz)$, car $\mathsf{o}(x,y,z)$ est l'unique voisin commun de $x$ et $y$ distinct de $z$. Les douze sommets s'obtiennent à partir de $0$, $1$, $2$ par neuf applications de o ; $g$ est donc déterminé par $(g0,g1,g2)$. Réciproquement, pour chaque drapeau $(x,y,z)$, la même suite d'applications de o définit une application dont on vérifie qu'elle est bijective et conserve l'adjacence. (2) $\iota x$ est caractérisé par l'adjacence, donc $g\iota = \iota g$. Comme $\rho_0(s,t)$ est formé de deux valeurs de o et ne dépend pas du choix de $u$, $g$ envoie $\rho_0(s,t)$ sur $\rho_0(gs,gt)$ ; $g$ conserve donc la relation « même trièdre », et l'action sur les cinq étiquettes est bien définie et multiplicative. (3) et (4) Par (1), tout $g$ est l'automorphisme associé à un drapeau, et la permutation de $T$ qu'il induit se calcule à partir de ce drapeau. On vérifie sur les $120$ drapeaux que ces permutations sont paires, qu'elles sont au nombre de $60$, ce qui est l'ordre de $\mathrm{Alt}_T$, et que seuls les drapeaux $(0,1,2)$ et $(\iota 0,\iota 1,\iota 2)$ donnent l'identité. □

*Remarque.* La démonstration de la page suit un autre chemin : la parité par les générateurs $\bar\sigma_0$, $\bar\sigma_1$, $\bar\sigma_2$ et le cas $n \equiv 1 \pmod 4$ du polygone, l'image par les ordres $6$, $10$ et $4$ des images des stabilisateurs d'une face, d'un sommet et d'une arête. Ici l'énoncé est établi par le décompte des drapeaux ; seul le fait que les symétries d'un pentagone sont des permutations paires de ses sommets est vérifié pour lui-même (énoncé suivant). La vérification confirme le calcul de $\rho^2$ et de $\rho^3$, que la page ne détaille pas, et la correction de la lecture à la page 23 : avec $\{u, v\}$, la page met dans un même triple deux arêtes de trièdres différents. Les deux choix de $u$ dans la définition de $\rho_0$ donnent la même arête, et le passage de $s$ à $t$ donne l'arête antipodale : $\rho$ est bien défini sur les directions, comme la page l'affirme.

**Théorème 32.2** (Grothendieck, pages 21 et 26 à 32, l'icosaèdre gauche par l'ensemble orienté $T$ ♦). *À un drapeau $(s, t, u)$, avec $v = \mathrm{o}(s, t, u)$, associons la numérotation $\nu(s, t, u)$ de $T$ formée des trièdres des arêtes $\{s, t\}$, $\{s, v\}$, $\{s, \Pi_{s,v}\}$, $\{s, \Pi_{s,u}\}$, $\{s, u\}$ : les cinq arêtes de $s$ dans l'ordre du pentagone, à partir de $t$, dans le sens qui s'éloigne de $u$ (page 30).*

1. *Pour $g \in G$, $\nu(gs, gt, gu)$ est $\nu(s, t, u)$ composée à gauche par la permutation de $T$ induite par $g$.*

2. *Toutes les numérotations $\nu(s, t, u)$ ont la même parité ; elles définissent donc une orientation $\varpi$ de $T$ qui ne dépend d'aucun choix. Toute numérotation compatible avec $\varpi$ est de la forme $\nu(s, t, u)$, et $\nu(s, t, u) = \nu(s', t', u')$ si et seulement si $(s', t', u')$ est $(s, t, u)$ ou $(\iota s, \iota t, \iota u)$. Les $60$ drapeaux de $\bar\Pi$ sont ainsi les $60$ numérotations compatibles avec $\varpi$.*

3. *Changer le sommet, l'arête ou la face d'un drapeau, c'est-à-dire $(s, t, u) \mapsto (t, s, u)$, $(s, u, t)$, $(s, t, v)$, revient à composer $\nu$ à droite par*

$$\tau_0 = (2\,4)(3\,5), \qquad \tau_1 = (1\,5)(2\,4), \qquad \tau_2 = (2\,5)(3\,4)$$

   *(permutations des places) : $\sigma_0(a) = (a_1, a_4, a_5, a_2, a_3)$, $\sigma_1(a) = (a_5, a_4, a_3, a_2, a_1)$, $\sigma_2(a) = (a_1, a_5, a_4, a_3, a_2)$.*

4. *Le $\sigma_1$ de la page 31, $(a_2, a_1, a_5, a_4, a_3)$, est $\tau_1' = (1\,2)(3\,5) = \tau_2\tau_1\tau_2$, et $\tau_2$ commute à $\tau_0$. Le triple de la page est donc l'action des trois mêmes changements sur la numérotation $(s, t, u) \mapsto \nu(s, t, v)$.*

5. *Avec le triple de la page, $\sigma_1\sigma_0 : a \mapsto (a_4, a_1, a_3, a_2, a_5)$, $\sigma_2\sigma_1 : a \mapsto (a_2, a_3, a_4, a_5, a_1)$ et $\sigma_0\sigma_2 : a \mapsto (a_1, a_3, a_2, a_5, a_4)$ sont d'ordres $3$, $5$ et $2$, et $\sigma_0\sigma_1$ est d'ordre $3$.*

6. *Deux drapeaux ont le même sommet dans $\bar\Pi$ si et seulement si leurs numérotations tracent le même pentagone sur $T$ ; la même arête si et seulement si elles donnent la même partition $\{a_1\} \sqcup \{a_2, a_3\} \sqcup \{a_4, a_5\}$ de type $(2, 2, 1)$ ; la même face si et seulement si elles donnent la même partie $\{a_1, a_3, a_5\}$.*

7. *Les symétries du pentagone $1\,2\,3\,4\,5$ sont des permutations paires des places. Par suite une numérotation de $T$ trace le pentagone d'un sommet de $\bar\Pi$ si et seulement si elle est compatible avec $\varpi$. On obtient $6$ pentagones, $15$ partitions de type $(2, 2, 1)$, c'est-à-dire toutes, et les $10$ parties à trois éléments.*

*Démonstration.* (1) Les cinq arêtes de $s$ s'écrivent avec o, que $g$ respecte, et $g$ opère sur les

trièdres par l'énoncé précédent. (2) Par (1), $\nu(g0, g1, g2)$ est la permutation de $T$ induite par $g$, composée avec $\nu(0,1,2)$ ; avec l'étiquetage choisi, $\nu(0,1,2)$ est la permutation des places $\tau_2 = (2\,5)(3\,4)$, qui est paire, et toute permutation paire s'obtient ainsi par la surjectivité sur $\mathrm{Alt}_T$. Deux drapeaux $g(0,1,2)$ et $h(0,1,2)$ ont la même numérotation si et seulement si $g^{-1}h$ est dans le noyau $\{1, \iota\}$, c'est-à-dire $h = g$ ou $h = g\iota$, et $g\iota(0,1,2) = \iota g(0,1,2)$. (3) Les changements de drapeau sont $g \mapsto gs_i$, où $s_0$, $s_1$, $s_2$ sont les automorphismes qui envoient $(0,1,2)$ sur $(1,0,2)$, $(0,2,1)$, $(0,1,5)$ ; par (2), il suffit de vérifier les trois égalités de permutations $\pi(s_i)\,\nu(0,1,2) = \nu(0,1,2)\,\tau_i$, où $\pi(s_i)$ est la permutation de $T$ induite. (4) et (5) sont des calculs de permutations ; par (3), $\nu(\sigma_2(\sigma_1 r)) = \nu(r)\tau_1\tau_2 = \nu(\sigma_2 r)\,\tau_2\tau_1\tau_2$, puisque $\tau_2^2 = 1$. (6) Par (1), en remplaçant les deux drapeaux par leurs images sous $g^{-1}$, où $g$ envoie $(0,1,2)$ sur le premier, on se ramène au cas où le premier est $(0,1,2)$ : les trois conditions sur les drapeaux sont conservées par $g$, et les trois conditions sur les numérotations par la composition à gauche avec une permutation de $T$. Le cas du drapeau $(0,1,2)$ se vérifie sur les $120$ drapeaux. (7) On vérifie que les numérotations qui tracent le pentagone $1\,2\,3\,4\,5$ sont les dix éléments du groupe diédral et que ces dix permutations sont paires ; si deux numérotations $a$, $b$ tracent le même pentagone, $a^{-1}b$ trace le pentagone standard, donc $a$ et $b$ ont même parité. Les trois décomptes sont des calculs sur les $120$ drapeaux. □

*Remarque.* L'orientation $\varpi$ est celle des pages 21 et 22 : la parité de $\nu(s,t,u)$ ne dépend ni du drapeau ni du sens de parcours, et c'est le cas $n \equiv 1 \pmod 4$ du pentagone qui le permet, puisque ses dix symétries sont paires ; pour un hexagone, la symétrie qui échange les extrémités de deux côtés opposés est un produit de trois transpositions, donc impaire. La vérification confirme ce que la lecture signale aux pages 31 et 32. Le $\sigma_1$ de la page n'est pas celui que donne le dictionnaire de la page 30 ; il s'en déduit par conjugaison par $\sigma_2$, et correspond au dictionnaire qui lit le pentagone de $s$ à partir de $t$ en direction de $u$. Les deux triples définissent donc des ensembles à opérateurs isomorphes. L'étiquette « $\sigma = \sigma_0\sigma_1$ » de la page 32 accompagne la valeur de $\sigma_0\sigma_2$, d'ordre $2$. L'étiquetage des trièdres a été choisi de sorte que $\varpi$ soit la classe des numérotations paires ; un autre étiquetage changerait la classe, non l'énoncé.

Ne sont pas démontrés ici : les axiomes des polyèdres combinatoires de la page 2 et le théorème de pleine fidélité des pages 10 à 16, l'icosaèdre étant donné par sa liste de voisins ; l'identification des trièdres aux repères orthogonaux et aux cinq octaèdres inscrits de l'icosaèdre régulier ; la décomposition $G = \{1, \iota\} \times G^+$ et l'isomorphisme $G^+ \simeq \mathrm{Alt}_T$ du corollaire de la page 26, faute d'une définition de l'orientation de $\Pi$ ; la description des arêtes par les triplets $(t, \gamma, \alpha)$ de la page 27 et les incidences a) à d) des pages 28 et 29 sous cette forme, que l'on a remplacées par les partitions et les parties à trois éléments de la page 31 ; les lignes $\vec{A}$, $A^{\uparrow}$, $A^{\wedge}$, $\tilde{S}$, $\tilde{A}$, $\tilde{F}$ du tableau de la page 31 ; le fait que $\tau_0$, $\tau_1$, $\tau_2$ engendrent $\mathrm{Alt}_5$ et opèrent simplement transitivement sur les $60$ numérotations, qui suivrait de la connexité du graphe des drapeaux, non vérifiée.

Partie 25

# Théorie de l'homotopie et catégories tests

La lettre à Daniel Quillen du 19 février 1983, continuée jusqu'au 23, ouvre *À la poursuite des champs* (134-2, lot 1, p. 14) ; la cote 114 est datée de cette année. La dernière lettre datée du fonds sur ces questions est la réponse de Ronald Brown du 16 avril 1991, sur les groupoïdes multiples et le groupoïde de Teichmüller (119, lot 15, p. 282), contemporaine de la cote 158.

*Ailleurs* : le dépôt d'OpenAI cité dans l'introduction annonce l'hypothèse d'homotopie pour les $\infty$-groupoïdes globulaires faibles de tout cohérateur de Grothendieck, dans la convention d'Ara et Henry, et la conjecture de Henry sur les sommes amalgamées. Le post-scriptum d'une lettre de 1975, rangée avec celles à Lawrence Breen, expose le « yoga » de cette hypothèse (134-2, lot 3, p. 42). Seul est formalisé le théorème des expansions élémentaires : pour tout cohérateur dans cette convention et tout modèle à bord cellulaire, attacher un $(n+1)$-disque le long de sa $n$-face source induit une équivalence faible. La structure de semi-modèles et la comparaison avec la théorie de l'homotopie des espaces ne le sont pas, et le projet n'a pas exécuté ce code. Les énoncés des cotes 136, 106, 114, 158 et 104 démontrés ci-dessous sont un lemme sur les coefficients binomiaux et des lemmes sur les catégories à cofibrations, les localisateurs fondamentaux, les monoïdes finis et les catégories de « modèles » ; ils ne touchent pas à l'hypothèse elle-même.

## 33 Cote 136 : le lemme binomial des ombres[34]

La cote 136, *Complexe de De Rham à puissance divisée [conférence de 1976 à l'IHÉS] : notes manuscrites (s.d.)*, que l'inventaire date « [à partir de 1975-1976] », est une liasse de notes autour d'une conférence : le complexe de De Rham à puissances divisées d'un ensemble simplicial, sa cohomologie, ses « ombres », la version duale et les automorphismes. L'algèbre des ombres est $S = k\{T\}$, l'algèbre des polynômes à puissances divisées sur un anneau commutatif $k$, de base les $T^{(i)}$, avec $T^{(i)}T^{(j)} = c_{i,j}\,T^{(i+j)}$, où $c_{i,j} = \binom{i+j}{i}$. Pour un $k$-module $M$ et $N \geq 0$, l'ombre $\omega_N(M) = M \otimes_k S^{+(N)}$, où $S^{+(N)} = \sum_{i \geq N} k\,T^{(i)}$, est un $S$-module gradué. Les pages 19 à 22 démontrent par le critère de Lucas un lemme sur les coefficients binomiaux, le théorème 1 (136, lot 2, p. 22). La page 22 en tire que $\omega_N$ est pleinement fidèle : un morphisme $\omega_N(M) \to \omega_N(M')$ est une famille $u_i : M \to M'$, $i \geq N$, telle que $c_{i,j}(u_{i+j} - u_i) = 0$, et le théorème 1 dans le groupe $\mathrm{Hom}(M, M')$ la rend constante. Les pages 26 à 31 étendent le théorème au degré $i$, sous la forme qu'en donne la lecture : l'homomorphisme $M \otimes_k S \to \varphi_N\tau_N(M \otimes_k S)$ est un isomorphisme, $\varphi_N$ adjoint à droite de la troncature, et cela revient à un énoncé sur des familles d'éléments d'un groupe abélien (136, lot 2, p. 26). Dans la démonstration du théorème 1, la phrase qui vérifie les hypothèses du lemme 2 finit sur un mot illisible. Les noms de Lucas et de Kummer sont de la lecture.

**Théorème 33.1** (Grothendieck, page 22, théorème 1 ♦). *Soient $E$ un groupe abélien, $N \in \mathbf{N}$ et $(x_i)_{i \in \mathbf{N}}$ une famille d'éléments de $E$ telle que $\binom{j}{i}(x_j - x_i) = 0$ pour $j > i \geq N$. Alors $x_i = x_N$ pour tout $i \geq N$.*

[34] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder136.lean`.

**Théorème 33.2** (Grothendieck, pages 26 à 31, la forme en degré $i$ ♦). *Soient $i, N \in \mathbf{N}$, $M$ un groupe abélien et $(\xi_k)_{k\geq N}$ une famille d'éléments de $M$ telle que $c_{l,k}\,\xi_k = c_{l,k-i}\,\xi_{k+l}$ pour tous $k \geq N$ et $l \geq 0$. Il existe un unique $\xi \in M$ tel que $\xi_k = \binom{k}{i}\xi$ pour tout $k \geq N$.*

La lecture suppose $i \leq N$, ce qui donne un sens à $c_{l,k-i}$ ; on lit ici $k-i$ comme une soustraction tronquée à 0, et l'énoncé vaut pour tout $i$. Pour $i = 0$, la relation s'écrit $c_{l,k}(\xi_{k+l} - \xi_k) = 0$, et le théorème 33.2 donne le théorème 33.1, puisque $\binom{k}{0} = 1$. On démontre donc le second. La démonstration n'est pas celle de la page : elle ne localise pas et ne passe pas par le décalage des chiffres $p$-adiques du lemme 2.

**Lemme 33.3.** *Soient $p$ premier, $r \geq 0$ et $0 \leq b \leq p^r - 1$. Alors $\binom{p^r-1}{b} \equiv (-1)^b \pmod p$ ; en particulier $p$ ne divise pas $\binom{p^r-1}{b}$.*

*Démonstration.* Par récurrence sur $b$, le cas $b = 0$ étant clair. Pour $0 < b+1 \leq p^r - 1$, $p$ divise $\binom{p^r}{b+1}$, et la relation de Pascal $\binom{p^r}{b+1} = \binom{p^r-1}{b} + \binom{p^r-1}{b+1}$ donne $\binom{p^r-1}{b+1} \equiv -\binom{p^r-1}{b} \equiv (-1)^{b+1}$. □

C'est le « lemme commun » de la page 31 : quand $\mu + \nu = p^r - 1$, aucune retenue n'est possible et $c_{\mu,\nu} \not\equiv 0 \pmod p$.

**Lemme 33.4.** *Pour tous $k, l, i \in \mathbf{N}$, $\binom{k+l}{l}\binom{k}{i} = \binom{k+l}{i}\binom{k+l-i}{l}$, la soustraction étant tronquée.*

*Démonstration.* Si $i \leq k$, les deux membres valent $(k+l)!/(l!\,i!\,(k-i)!)$. Si $i > k$, le premier membre est nul, et le second aussi : pour $l = 0$, $\binom{k}{i} = 0$ ; pour $l > 0$, $k + l - i < l$. □

**Lemme 33.5.** *Soit $z$ un élément d'un groupe abélien tel que, pour tout nombre premier $p$, un entier $c$ non divisible par $p$ vérifie $cz = 0$. Alors $z = 0$.*

*Démonstration.* Soit $d$ l'ordre de $z$, éventuellement nul. Si $d \neq 1$, soit $p$ le plus petit facteur premier de $d$ ($p = 2$ si $d = 0$). L'entier $c$ associé à $p$ vérifie $cz = 0$, donc $d \mid c$, et $p \mid c$, contradiction. Donc $d = 1$ et $z = 0$. □

**Lemme 33.6.** *Sous les hypothèses du théorème 33.2, $\binom{k}{i}\xi_{k'} = \binom{k'}{i}\xi_k$ pour tous $k, k' \geq N$.*

*Démonstration.* Soit $z = \binom{k}{i}\xi_{k'} - \binom{k'}{i}\xi_k$, et soit $p$ premier. Choisissons $r$ tel que $K = p^r - 1 \geq k + k'$. La relation pour $(k, K-k)$ et pour $(k', K-k')$ s'écrit $u\,\xi_k = a\,\xi_K$ et $u'\,\xi_{k'} = a'\,\xi_K$, avec $u = \binom{K}{K-k}$, $a = \binom{K-i}{K-k}$, $u' = \binom{K}{K-k'}$, $a' = \binom{K-i}{K-k'}$. Le lemme 33.4 donne $u\binom{k}{i} = \binom{K}{i}\,a$ et $u'\binom{k'}{i} = \binom{K}{i}\,a'$. Alors

$$uu'z = \tbinom{k}{i}u \cdot u'\xi_{k'} - \tbinom{k'}{i}u' \cdot u\xi_k = \tbinom{K}{i}\,aa'\,\xi_K - \tbinom{K}{i}\,a'a\,\xi_K = 0,$$

et $p$ ne divise pas $uu'$ par le lemme 33.3. Le lemme 33.5 conclut. □

*Démonstration du théorème 33.2.* Les $\binom{k}{i}$, $k \geq N$, engendrent l'idéal unité de $\mathbf{Z}$. En effet, cet idéal est principal, de générateur $g \geq 0$ ; si $g \neq 1$, soit $p$ un facteur premier de $g$ ($p = 2$ si $g = 0$) et $r$ tel que $p^r - 1 \geq N + i$. Alors $g$ divise $\binom{p^r-1}{i}$, que $p$ ne divise pas par le lemme 33.3, contradiction. Il existe donc des $k_1, \ldots, k_n \geq N$ et des entiers $m_1, \ldots, m_n$ tels que $\sum_\alpha m_\alpha\binom{k_\alpha}{i} = 1$. Posons $\xi = \sum_\alpha m_\alpha\,\xi_{k_\alpha}$. Pour $k \geq N$, le lemme 33.6 donne

$$\tbinom{k}{i}\xi = \sum_\alpha m_\alpha\tbinom{k}{i}\xi_{k_\alpha} = \sum_\alpha m_\alpha\tbinom{k_\alpha}{i}\xi_k = \xi_k.$$

Si $\eta$ vérifie aussi $\xi_k = \binom{k}{i}\eta$ pour tout $k \geq N$, alors $\eta = \sum_\alpha m_\alpha\binom{k_\alpha}{i}\eta = \sum_\alpha m_\alpha\xi_{k_\alpha} = \xi$. □

*Remarque.* Les deux énoncés tiennent tels que la lecture les donne, et le second sans l'hypothèse $i \leq N$. La combinaison de Bézout qui définit $\xi$ et en donne l'unicité est celle de la page 27. Le reste diffère. La page se ramène à un $\mathbf{Z}_{(p)}$-module, retranche la solution évidente et procède en deux lemmes sur les unités parmi les $c_{i,j}$. Ici, un seul indice $K = p^r - 1$ au-dessus de $k$ et $k'$ relie directement $\xi_k$ et $\xi_{k'}$, et le lemme 33.5 remplace la localisation. Le théorème 1 de la page 22 se ramène lui aussi au lemme 2, $\mathbf{Z}_{(p)}$-local et pour un ensemble fini d'indices ; il est obtenu ici comme le cas $i = 0$. La pleine fidélité de $\omega_N$ en est l'instance dans le groupe des homomorphismes $M \to M'$, que le fichier énonce sur les familles d'homomorphismes, sans les modules gradués. La piste demande si le lemme ou la pleine fidélité figurent dans la littérature sur les modules sur les algèbres à puissances divisées ; sa partie modulaire n'est démontrée ici que sur les coefficients.

Ne sont pas démontrés ici : le critère de Lucas et le lemme 2 sous leur forme $p$-adique (pages 19 à 22) ; la pleine fidélité de $\omega_N$ et l'isomorphisme $M \otimes_k S \to \varphi_N \tau_N (M \otimes_k S)$ comme énoncés sur les $S$-modules gradués ; le corollaire $\mathrm{Ext}^n(\tau_{N-i}(S)[-i], M \otimes_k S) = 0$ et la pleine fidélité dans la catégorie dérivée (pages 262 à 272) ; la cohomologie des formes à puissances divisées et le schéma en groupes des automorphismes, dont les pistes figurent à la fin de la partie.

## 34 Cote 106 : catégories à cofibrations, factorisation de Brown et critère $(\star\star)$[35]


La cote 106, *[Champs (stacks) 3] : notes manuscrites (s.d.)*, seize pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », est faite de huit feuillets de bloc entre lesquels sont intercalées des feuilles de listing ; certaines portent les dates d'impression des 24 et 25 août 1982. Elle s'ouvre sur « Soit $(\mathcal{C}, W, \mathrm{cof})$ une catégorie satisfaisant à C1 : C3 de Baues », construit le remplacement cofibrant et invoque le « weak lifting lemma » (106, lot 1, p. 1). La page 9 factorise une équivalence faible entre objets cofibrants et note en marge « On utilise $y \in \mathcal{C}_{\mathrm{cof}}$ ici » (106, lot 1, p. 9). La page 11 écrit : « Mais je doute qu'il ne suffise d'inverser les équiv. faibles *cofibrantes*, pour que les équiv. faibles deviennent inversibles ! » (106, lot 1, p. 11).

**Définition.** Une *catégorie à cofibrations* est une catégorie $\mathcal{C}$ à objet initial $\emptyset$, munie de deux classes de flèches, les équivalences faibles $W$ et les cofibrations cof, qui vérifient les axiomes C1 à C3 des catégories à cofibrations de Baues [5], tels que la lecture les rappelle : C1, les isomorphismes sont dans $W$ et dans cof, les composés de cofibrations sont des cofibrations, et $W$ satisfait au deux-sur-trois ; C2, pour une cofibration $c : b \to a$ et une flèche $u : b \to y$, la somme amalgamée $a \vee_b y$ existe, la flèche $y \to a \vee_b y$ est une cofibration, et une équivalence faible si $c$ en est une, et la flèche $a \to a \vee_b y$ est une équivalence faible si $u$ en est une ; C3, toute flèche se factorise en une cofibration suivie d'une équivalence faible. Un objet $x$ est *cofibrant* si $\emptyset \to x$ est une cofibration. On note $W_0 = W \cap \mathrm{cof}$.

**Énoncé** (Remplacement cofibrant et relèvement faible, page 1)**.** *Pour tout objet $x$, il existe $\alpha_x : \widetilde{x} \to x$ dans $W$ avec $\widetilde{x}$ cofibrant. Soient $f : x \to y$, et $\alpha_x : \widetilde{x} \to x$, $\alpha_y : \widetilde{y} \to y$ dans $W$ avec $\widetilde{x}$ et $\widetilde{y}$ cofibrants. Il existe $i : \widetilde{y} \to \widetilde{y}'$ dans $\mathrm{cof} \cap W$, $\alpha'_y : \widetilde{y}' \to y$ dans $W$ avec $\alpha_y = \alpha'_y\, i$, et $\widetilde{f} : \widetilde{x} \to \widetilde{y}'$ avec $\alpha'_y \widetilde{f} = f \alpha_x$.*

[35] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder106.lean`.

**Énoncé** (Factorisation, page 9). *Soient $x, y$ cofibrants et $f : x \to y$ dans $W$. En factorisant $(f, 1_y) : x \sqcup y \to y$ en une cofibration $x \sqcup y \to \bar{x}$ suivie d'une équivalence faible $\alpha : \bar{x} \to y$, et en notant $i$ et $g$ les composés de $x \to x \sqcup y$ et $y \to x \sqcup y$ avec $x \sqcup y \to \bar{x}$, on a $\alpha i = f$, $\alpha g = 1_y$ et $i, g \in \text{cof} \cap W$.*




$$\alpha i = f, \quad \alpha g = 1_y.$$

**Énoncé** (Le doute levé, page 11). *Si tous les objets de $\mathcal{C}$ sont cofibrants, le foncteur $W_0^{-1}\mathcal{C} \to W^{-1}\mathcal{C}$ est un isomorphisme de catégories.*

**Lemme 34.1.** *Si $x$ est cofibrant et $i : x \to z$ une cofibration, $z$ est cofibrant.*

*Démonstration.* Par initialité, $\emptyset \to z$ est le composé de $\emptyset \to x$ et de $i$, qui est une cofibration par C1. □

**Lemme 34.2.** *Soient $p : a \to y$ et $q : b \to y$, avec $b$ cofibrant. La somme $a \sqcup b$ existe ; factorisons $(p, q) : a \sqcup b \to y$ par C3 en une cofibration $c : a \sqcup b \to z$ suivie de $w : z \to y$ dans $W$, et notons $j_a$, $j_b$ les composés de $c$ avec les injections de $a$ et de $b$. Alors $wj_a = p$, $wj_b = q$, $j_a$ est une cofibration, et $j_b$ en est une si $a$ est cofibrant.*

*Démonstration.* La somme $a \sqcup b$ est la somme amalgamée de $\emptyset \to b$ et de $\emptyset \to a$ ; comme $\emptyset \to b$ est une cofibration, elle existe par C2, et l'injection $a \to a \sqcup b$ est une cofibration. Donc $j_a$ en est une par C1. Les égalités $wj_a = p$ et $wj_b = q$ résultent de $wc = (p, q)$. Si $a$ est cofibrant, le même carré, lu dans l'autre sens, fait de $b \to a \sqcup b$ une cofibration, et $j_b$ en est une. □

*Démonstration du remplacement cofibrant et du relèvement faible.* Par C3, $\emptyset \to x$ se factorise en une cofibration $\emptyset \to \widetilde{x}$ suivie de $\alpha_x : \widetilde{x} \to x$ dans $W$ ; par initialité, la cofibration est la flèche $\emptyset \to \widetilde{x}$, et $\widetilde{x}$ est cofibrant.

Pour le relèvement, appliquons le lemme 34.2 à $a = \widetilde{y}$, $b = \widetilde{x}$, $p = \alpha_y$ et $q = f\alpha_x$ ; c'est la factorisation de $(\alpha_y, f\alpha_x) : \widetilde{y} \vee \widetilde{x} \to y$ que propose la lecture. Posons $\widetilde{y}' = z$, $i = j_a$, $\alpha'_y = w$ et $\widetilde{f} = j_b$. Alors $i$ est une cofibration, parce que $\widetilde{x}$ est cofibrant ; $\alpha'_y \in W$ ; $\alpha'_y i = \alpha_y$ et $\alpha'_y \widetilde{f} = f\alpha_x$. Comme $\alpha'_y$ et $\alpha'_y i = \alpha_y$ sont dans $W$, $i$ y est par deux-sur-trois. Enfin $\widetilde{y}'$ est cofibrant par le lemme 34.1, puisque $\widetilde{y}$ l'est. □

*Démonstration de la factorisation.* Appliquons le lemme 34.2 à $a = x$, $b = y$, $p = f$ et $q = 1_y$, et posons $\bar{x} = z$, $\alpha = w$, $i = j_a$, $g = j_b$. Alors $\alpha i = f$ et $\alpha g = 1_y$ ; $i$ est une cofibration parce que $y$ est cofibrant, et $g$ en est une parce que $x$ l'est. Comme $\alpha$ et $\alpha g = 1_y$, isomorphisme, sont dans $W$, $g \in W$ par deux-sur-trois ; comme $\alpha$ et $\alpha i = f$ sont dans $W$, $i \in W$. □

*Démonstration de l'énoncé de la page 11.* Montrons d'abord que tout foncteur $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ qui rend inversibles les flèches de $W_0$ rend inversibles celles de $W$. Soit $f : x \to y$ dans $W$ ; $x$ et $y$ sont cofibrants, et la factorisation de la page 9 donne $f = \alpha i$ et $\alpha g = 1_y$ avec $i, g \in W_0$. Alors $F(g)$ est inversible et $F(\alpha)F(g) = 1$, donc $F(\alpha) = F(g)^{-1}$ est inversible, et $F(f) = F(\alpha)F(i)$ aussi.

Soient $Q_0 : \mathcal{C} \to W_0^{-1}\mathcal{C}$ et $Q : \mathcal{C} \to W^{-1}\mathcal{C}$ les foncteurs de localisation. Comme $W_0 \subseteq W$, $Q$ rend inversibles les flèches de $W_0$, et la propriété universelle de $Q_0$ donne un unique $\bar{F} : W_0^{-1}\mathcal{C} \to W^{-1}\mathcal{C}$ tel que $\bar{F}Q_0 = Q$. Par ce qui précède, $Q_0$ rend inversibles les flèches de $W$, d'où un unique $\bar{G} : W^{-1}\mathcal{C} \to W_0^{-1}\mathcal{C}$ tel que $\bar{G}Q = Q_0$. Alors $\bar{G}\bar{F}Q_0 = Q_0$ et $\bar{F}\bar{G}Q = Q$, et l'unicité dans les deux propriétés universelles donne $\bar{G}\bar{F} = \mathrm{id}$ et $\bar{F}\bar{G} = \mathrm{id}$. □

*Remarque.* Dans le relèvement faible, l'hypothèse $\alpha_x \in W$ ne sert pas. L'hypothèse $\widetilde{y}$ cofibrant sert seulement à rendre $\widetilde{y}'$ cofibrant, ce que la lecture utilise sans le dire en plaçant $[i]^{-1}[\widetilde{f}]$ dans $W_{\mathrm{cof}}^{-1}\mathcal{C}_{\mathrm{cof}}$.

*Remarque.* Dans la factorisation, $f \in W$ sert seulement à mettre $i$ dans $W$. Pour toute $f$ entre objets cofibrants, on obtient encore $i \in \mathrm{cof}$, $g \in \mathrm{cof} \cap W$ et $\alpha \in W$. C'est le lemme de factorisation de K. S. Brown, publié en 1973 [12].

*Remarque.* Pour ces trois énoncés, seules servent, dans C2, l'existence des sommes amalgamées le long d'une cofibration et la stabilité des cofibrations par changement de base. Les deux clauses de C2 sur les équivalences faibles, et la clause de C1 qui fait des isomorphismes des cofibrations, ne servent pas.

*Remarque.* Le doute de la page 11 n'est pas fondé lorsque tous les objets sont cofibrants, ce qui est le cadre de la page depuis la réduction de la page 5. L'argument est celui de la lecture, et tous ses éléments sont sur la page 9.

La page 11 rectifie la définition des diagrammes : la condition de cofibration passe de la flèche de retour à la flèche d'aller (106, lot 1, p. 11). Les pages 13 à 15 comparent deux factorisations d'une même flèche et posent la condition $(\star\star)$ sur deux sections d'une équivalence faible. Elles concluent : « Cette condition est (nec. et) suffis. pour que $\widetilde{\mathcal{C}} \to W^{-1}\mathcal{C}$ soit *fidèle* (donc un iso) » (106, lot 1, p. 15). La suffisance n'est pas écrite.

**Définition.** Soient $x, y$ deux objets. On note $\mathrm{Ch}'_0(x,y)$ la catégorie des diagrammes $x \xrightarrow{f} \widetilde{y} \xleftarrow{i} y$ avec $f \in \mathrm{cof}$ et $i \in W$, une flèche $(f,i) \to (f',i')$ étant une $u : \widetilde{y} \to \widetilde{y}'$ telle que $uf = f'$ et $ui = i'$ ; deux diagrammes sont dans la même *composante connexe* s'ils sont reliés par la relation d'équivalence qu'engendre l'existence d'une telle flèche. Pour $(f,i) \in \mathrm{Ch}'_0(x,y)$ et $(g,j) \in \mathrm{Ch}'_0(y,z)$, soit $P$ la somme amalgamée de $\widetilde{y} \xleftarrow{i} y \xrightarrow{g} \widetilde{z}$, qui existe par C2 puisque $g$ est une cofibration, et soient $g' : \widetilde{y} \to P$, $k : \widetilde{z} \to P$ ses flèches ; on pose $(g,j) \circ (f,i) = (g'f, kj)$. La catégorie $\widetilde{\mathcal{C}}'$ a pour objets ceux de $\mathcal{C}$ et pour flèches $x \to y$ les composantes connexes de $\mathrm{Ch}'_0(x,y)$, l'unité de $x$ étant la composante de $(1_x, 1_x)$. Le foncteur $q' : \widetilde{\mathcal{C}}' \to W^{-1}\mathcal{C}$ est l'identité sur les objets et envoie la composante de $(f,i)$ sur $[i]^{-1}[f]$. La condition $(\star\star)$ est la suivante : pour toute $f : x \to y$ dans $W$ et deux sections $i, i'$ de $f$ ($fi = fi' = 1_y$), les diagrammes $(1_x, i)$ et $(1_x, i')$ sont dans la même composante connexe de $\mathrm{Ch}'_0(x,y)$.

**Théorème 34.3** (Grothendieck, pages 11 à 15, le critère $(\star\star)$ ♦)**.** *Supposons tous les objets de $\mathcal{C}$ cofibrants. Alors $\widetilde{\mathcal{C}}'$ est une catégorie et $q'$ un foncteur, et $q'$ est fidèle si et seulement si $(\star\star)$ est vérifiée. Plus précisément : si $q'$ est fidèle, $(\star\star)$ est vérifiée ; et $q'$ est fidèle et plein, et c'est un isomorphisme de catégories, sans autre hypothèse. En particulier, $(\star\star)$ est toujours vérifiée.*

**Lemme 34.4.** *La composition de $\widetilde{\mathcal{C}}'$ est bien définie sur les composantes, associative, et admet les composantes des $(1_x, 1_x)$ pour unités ; $q'$ est bien défini et c'est un foncteur.*

*Démonstration.* La flèche $k$ est une équivalence faible par C2, comme somme amalgamée de l'équivalence faible $i$ le long de la cofibration $g$, donc $kj \in W$ ; $g'$ est une cofibration par C2, donc $g'f$ en est une. Si $u : (f,i) \to (f_1,i_1)$, la flèche $P \to P_1$ induite par $u$ sur $\widetilde{y}$ et l'identité sur $\widetilde{z}$ est une flèche entre les deux composés ; de même si $v : (g,j) \to (g_1,j_1)$, avec $v$ sur $\widetilde{z}$ et l'identité sur $\widetilde{y}$. La composition passe donc aux composantes. Pour trois diagrammes, la propriété universelle des sommes amalgamées fournit une flèche du sommet de $((h,l)\circ(g,j))\circ(f,i)$ vers celui de $(h,l)\circ((g,j)\circ(f,i))$ compatible aux deux diagrammes, d'où l'associativité. Pour les unités, $(1_y,1_y)\circ(f,i)$ a pour sommet la somme amalgamée de $i$ et de $1_y$, et la flèche $\widetilde{y} \to P$ relie $(f,i)$ à ce composé ; de même à gauche. Si $u : (f,i) \to (f',i')$, alors $u \in W$ par deux-sur-trois et $[i']^{-1}[f'] = [ui]^{-1}[uf] = [i]^{-1}[f]$. Enfin, le carré $g'i = kg$ donne, dans la localisation, $[k]^{-1}[g'] = [g][i]^{-1}$, d'où $q'((g,j)\circ(f,i)) = [kj]^{-1}[g'f] = [j]^{-1}[k]^{-1}[g'][f] = [j]^{-1}[g][i]^{-1}[f]$. □

**Lemme 34.5.** *Soit $F : x \to z$, et soient $x \sqcup z \xrightarrow{c} \bar{z} \xrightarrow{\alpha} z$ une factorisation de $(F,1_z)$ par C3, $c$ cofibration, $\alpha \in W$, et $(F_0,g)$ le diagramme $x \to \bar{z} \leftarrow z$ que forment les composés de $c$ avec les injections. Si $(f,i) \in \mathrm{Ch}'_0(x,z)$ admet $\psi : \widetilde{z} \to z$ avec $\psi i = 1_z$ et $\psi f = F$, alors $(f,i)$ et $(F_0,g)$ sont dans la même composante.*

*Démonstration.* Le diagramme $(F_0,g)$ est dans $\mathrm{Ch}'_0(x,z)$ : $F_0$ est une cofibration (lemme 34.2, $z$ étant cofibrant), et $g \in W$ par deux-sur-trois, puisque $\alpha g = 1_z$. Soit $h = (f,i) : x \sqcup z \to \widetilde{z}$, et soit $Q$ la somme amalgamée de $c$ et de $h$, qui existe puisque $c$ est une cofibration ; la flèche $\widetilde{z} \to Q$ est une cofibration. Les flèches $\alpha$ et $\psi$ coïncident sur $x \sqcup z$ après $c$ et $h$ (sur $x$, $\alpha F_0 = F = \psi f$ ; sur $z$, $\alpha g = 1_z = \psi i$) et induisent $\theta : Q \to z$. Factorisons $\theta$ par C3 en une cofibration $\kappa : Q \to R$ suivie de $\beta : R \to z$ dans $W$. Le diagramme $(f_R, i_R)$ obtenu en composant $(f,i)$ avec $\widetilde{z} \to Q \xrightarrow{\kappa} R$ est dans $\mathrm{Ch}'_0(x,z)$ : $f_R$ est un composé de cofibrations, et $\beta i_R = \psi i = 1_z$ met $i_R$ dans $W$ par deux-sur-trois. La flèche $\widetilde{z} \to R$ va de $(f,i)$ à $(f_R,i_R)$ ; la flèche $\bar{z} \to Q \to R$ va de $(F_0,g)$ à $(f_R,i_R)$, puisque le carré de la somme amalgamée identifie les composés de $c$ et de $h$. □

**Lemme 34.6.** *Choisissons pour toute $F$ une factorisation comme au lemme 34.5, et notons $\varphi(F)$ la composante de $(F_0,g)$, qui n'en dépend pas. Alors $\varphi : \mathcal{C} \to \widetilde{\mathcal{C}'}$ est un foncteur, $\varphi(f)$ est la composante de $(f,1)$ pour toute cofibration $f$, $\varphi$ rend inversibles les flèches de $W$, et pour $w : y \to \widetilde{y}$ dans $W$ la composante de $(1_{\widetilde{y}}, w)$ est l'inverse de $\varphi(w)$.*

*Démonstration.* Tout repose sur le lemme 34.5. Avec $\psi = 1_x$, $\varphi(1_x)$ est l'unité, et avec $\psi = 1$, $\varphi(f)$ est la composante de $(f,1)$ si $f$ est une cofibration. Pour $f : x \to y$ et $h : y \to z$, de diagrammes $(F_0,g)$, $\alpha$ et $(H_0,g')$, $\alpha'$, le composé de $(F_0,g)$ et de $(H_0,g')$ a pour sommet la somme amalgamée de $g$ et de $H_0$, et $\psi = (\alpha', h\alpha)$ y est bien défini ($\alpha' H_0 = h = h\alpha g$) et vérifie les deux conditions pour $hf$ : d'où $\varphi(hf) = \varphi(h)\varphi(f)$. Pour $w : y \to \widetilde{y}$ dans $W$, de diagramme $(W_0,g)$ et $\alpha$, le composé $\varphi(w)\circ(1_{\widetilde{y}},w)$, c'est-à-dire $(W_0,g)\circ(1_{\widetilde{y}},w)$, de sommet la somme amalgamée de $w$ et de $W_0$, admet $\psi = (1_{\widetilde{y}},\alpha)$ pour $F = 1_{\widetilde{y}}$ : la composante de $(1_{\widetilde{y}},w)$ est un inverse à droite de $\varphi(w)$. Si de plus $w \in \mathrm{cof}$, $\varphi(w)$ est la composante de $(w,1)$, et le composé $(1_{\widetilde{y}},w)\circ(w,1)$ est $(kw,k'w)$, de sommet la somme amalgamée de $1_{\widetilde{y}}$ et de $1_{\widetilde{y}}$, où $k = k'$ ; la flèche $kw$ le relie à $(1_y,1_y)$. Donc $\varphi$ rend inversibles les flèches de $W_0$, et par l'argument de la page 11 (démonstration de l'énoncé de la page 11) celles de $W$ ; l'inverse à droite est alors l'inverse. □

*Démonstration du critère. Nécessité.* Soient $f : x \to y$ dans $W$ et $i, i'$ deux sections de $f$. De

$fi = 1_y$ on tire $[i]^{-1} = [f]$, donc $q'(1_x, i) = [i]^{-1} = [f] = [i']^{-1} = q'(1_x, i')$ ; si $q'$ est fidèle, $(1_x, i)$ et $(1_x, i')$ sont dans la même composante. C'est l'argument de la lecture.

*$q'$ est un isomorphisme.* Pour toute $F$, le diagramme $(F_0, g)$ admet $\alpha$, avec $\alpha g = 1_z$, d'où $q'\varphi(F) = [g]^{-1}[F_0] = [\alpha][F_0] = [F]$ : $q'\varphi = Q$. Par le lemme 34.6 et la propriété universelle de $Q$, il existe un unique $\bar{\varphi} : W^{-1}\mathcal{C} \to \widetilde{\mathcal{C}}'$ avec $\bar{\varphi}Q = \varphi$. Alors $q'\bar{\varphi}Q = q'\varphi = Q$, donc $q'\bar{\varphi} = \mathrm{id}$ par unicité. D'autre part, la composante de $(f, i)$ est le composé $(1_{\widetilde{y}}, i) \circ (f, 1)$ — le sommet du composé est la somme amalgamée de $1_{\widetilde{y}}$ et de $1_{\widetilde{y}}$ —, c'est-à-dire $\varphi(i)^{-1}\varphi(f)$ par le lemme 34.6 ; donc $\bar{\varphi}q'(f, i) = \bar{\varphi}([i])^{-1}\bar{\varphi}([f]) = \varphi(i)^{-1}\varphi(f)$ est la composante de $(f, i)$, et $\bar{\varphi}q' = \mathrm{id}$. Ainsi $q'$ est un isomorphisme de catégories, d'inverse $\bar{\varphi}$ : il est fidèle et plein, et $(\star\star)$ suit de la nécessité. □

*Remarque.* L'énoncé de la piste tient tel qu'il est écrit, et ses deux membres sont vrais : sous C1–C3, tous les objets étant cofibrants, $q'$ est un isomorphisme et $(\star\star)$ est toujours vérifiée. La démonstration suit un autre chemin que les pages 13 à 15. Celles-ci factorisent $f$ seule et lui choisissent ensuite une section, ce qui oblige à comparer deux sections. La démonstration factorise $(F, 1_z)$ hors de $x \sqcup z$, comme la page 9 ; la section fait alors partie de la cofibration, et toute comparaison passe par le lemme 34.5. La preuve ne dit rien de la littérature, où une description des flèches de $W^{-1}\mathcal{C}$ par composantes de diagrammes de ce type peut figurer, et la question de la piste reste ouverte.

*Remarque.* La composition de $\widetilde{\mathcal{C}}'$ utilise la clause de C2 que la lecture signale : la somme amalgamée d'une équivalence faible le long d'une cofibration est une équivalence faible. L'autre clause de C2 sur les équivalences faibles ne sert nulle part. La clause de C1 qui fait des isomorphismes des cofibrations sert ici, car l'unité $(1_x, 1_x)$ et les diagrammes $(1_x, i)$ de $(\star\star)$ demandent $1_x \in \mathrm{cof}$. L'hypothèse que tous les objets sont cofibrants sert deux fois : pour que les injections de $x \sqcup z$ soient des cofibrations, et pour que $\varphi$ rende inversibles toutes les flèches de $W$.

Ne sont pas démontrés ici : l'équivalence $W_{\mathrm{cof}}^{-1}\mathcal{C}_{\mathrm{cof}} \simeq W^{-1}\mathcal{C}$ et la proposition de la page 5 ; $\mathrm{Ch}_0$, $\widetilde{\mathcal{C}}$ et la plénitude de $q$ (pages 5 à 9) ; la construction de la page 13 et la comparaison des factorisations (pages 13 à 15).

## 35 Cote 114 : les localisateurs fondamentaux et la proposition 4[36]

La cote 114, *Asphéricité : notes manuscrites (s.d.)*, cinq pages que l'inventaire date « [1983] », contient quatre feuillets manuscrits et une page dactylographiée de *À la poursuite des champs*, numérotée 350. La page 2 pose la question « $0$-connexité totale $\Rightarrow$ asphéricité totale ? » (114, lot 1, p. 2). La page 350 y répond par la proposition 4, précédée de l'aveu « After a minute's thought, I feel very silly ». La démonstration qui suit tient en trois lignes ; ses signes d'implication sont laissés en blanc, et elle s'interrompt sur « namely » (114, lot 1, p. 3). La page énonce la proposition pour « $W$ a basic localizer satisfying Loc 4) » et appelle $W_0$ « the coarsest basic localizer satisfying Loc 4) ».

**Définition.** On fixe un univers ; une petite catégorie est une catégorie dont les objets et les flèches forment des ensembles de cet univers, et $e$ désigne la catégorie ponctuelle. Pour des foncteurs $v : A \to B$ et $w : B \to C$ et un objet $c$ de $C$, on note $A_{/c}$ la catégorie des couples $(a, \gamma : wv(a) \to c)$, $B_{/c}$ celle des couples $(b, \beta : w(b) \to c)$, et $v_{/c} : A_{/c} \to B_{/c}$ le foncteur

[36] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder114.lean`.

$(a,\gamma) \mapsto (v(a),\gamma)$. Un *localisateur fondamental* est une classe $W$ de foncteurs entre petites catégories qui vérifie :

LA $W$ est faiblement saturée : elle contient les identités, vérifie le deux-sur-trois, et si $i : A \to B$ et $r : B \to A$ vérifient $ri = 1_A$ et $ir \in W$, alors $r \in W$ ;

LB si $A$ a un objet final, $A \to e$ est dans $W$ ;

LC si, pour $v : A \to B$ et $w : B \to C$, tous les $v_{/c}$ sont dans $W$, alors $v \in W$.

Ce sont les axiomes usuels ; la lecture n'en donne qu'une description, « faiblement saturée », « les foncteurs $A \to e$ pour toute $A$ ayant un objet final », « une condition du type « théorème A » de Quillen », qu'ils précisent. Une petite catégorie $A$ est *$W$-asphérique* si $A \to e$ est dans $W$, et *totalement $W$-asphérique* si de plus, pour tous objets $a, b$ de $A$, la catégorie $A_{/a\times b}$ des éléments du préfaisceau $a \times b$ — les couples $(c,(p,q))$ avec $p : c \to a$, $q : c \to b$ — est $W$-asphérique. Un préfaisceau $X$ est *0-connexe* si $A_{/X}$ est non vide et connexe. On note $\pi_0(A)$ l'ensemble des composantes connexes de $A$, $W_0$ la classe des foncteurs $u$ tels que $\pi_0(u)$ soit bijective, et $W_\infty$ la classe des foncteurs qui appartiennent à tout localisateur fondamental.

**Énoncé** (Proposition 4, page 3)**.** *Soient $A$ une petite catégorie, $W$ un localisateur fondamental, $W_\infty$ le localisateur fondamental le plus fin. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

*(i) $A$ est totalement $W_\infty$-asphérique ;*

*(ii) $A$ est totalement $W$-asphérique ;*

*(iii) $A$ est non vide et, pour tous objets $a, b$ de $A$, le produit $a \times b$ est 0-connexe dans $\hat{A}$.*

*La démonstration repose sur l'encadrement $W_\infty \subseteq W \subseteq W_0$, où $W_0$ est le localisateur fondamental le plus grossier, celui pour lequel un foncteur est une équivalence dès qu'il induit une bijection sur les composantes connexes.*

**Lemme 35.1.** *La classe $W_0$ est un localisateur fondamental.*

*Démonstration.* Comme $\pi_0$ est un foncteur, LA se ramène à des énoncés sur les bijections. Les identités sont bijectives, et si deux des applications $\pi_0(u)$, $\pi_0(u')$, $\pi_0(u'u)$ sont bijectives, la troisième l'est. Si $ri = 1_A$ et $\pi_0(i)\pi_0(r)$ est bijective, $\pi_0(r)$ est injective par la seconde relation et surjective par la première. Pour LB, une catégorie à objet final est non vide et connexe, et $\pi_0(A) \to \pi_0(e)$ est une bijection entre deux ensembles à un élément.

Pour LC, supposons tous les $\pi_0(v_{/c})$ bijectifs. Pour $b \in B$, choisissons, par surjectivité de $\pi_0(v_{/w(b)})$, un objet $(a_b,\gamma_b)$ de $A_{/w(b)}$ dont l'image est dans la composante de $(b, 1_{w(b)})$, et posons $s(b) = [a_b] \in \pi_0(A)$. D'abord, $s(v(a)) = [a]$ pour tout $a \in A$ : dans $A_{/wv(a)}$, les objets $(a_{v(a)},\gamma_{v(a)})$ et $(a,1)$ ont leurs images dans la composante de $(v(a),1)$ ; par injectivité, ils sont dans la même composante, et l'oubli $(a',\gamma) \mapsto a'$ envoie un zigzag de $A_{/wv(a)}$ sur un zigzag de $A$. Ensuite, $s(b) = s(b')$ pour toute flèche $\beta : b \to b'$. La composition avec $w(\beta)$ définit des foncteurs $A_{/w(b)} \to A_{/w(b')}$ et $B_{/w(b)} \to B_{/w(b')}$ compatibles à $v_{/.}$ ; l'image de $(a_b, w(\beta)\gamma_b)$ par $v_{/w(b')}$ est donc dans la composante de $(b, w(\beta))$, que la flèche $\beta : (b, w(\beta)) \to (b', 1)$ relie à celle de $(b', 1)$, où se trouve aussi l'image de $(a_{b'},\gamma_{b'})$. Par injectivité, $(a_b, w(\beta)\gamma_b)$ et $(a_{b'},\gamma_{b'})$ sont dans la même composante de $A_{/w(b')}$, d'où $[a_b] = [a_{b'}]$. Par suite $s$ est constante sur les zigzags de $B$ et induit $\bar{s} : \pi_0(B) \to \pi_0(A)$ avec $\bar{s} \circ \pi_0(v) = \mathrm{id} : \pi_0(v)$ est injective. Elle est surjective, car l'oubli envoie le zigzag de $B_{/w(b)}$ qui relie $(v(a_b),\gamma_b)$ à $(b,1)$ sur un zigzag de $v(a_b)$ à $b$ dans $B$. □

**Lemme 35.2.** *Une petite catégorie est $W_0$-asphérique si et seulement si elle est non vide et connexe. Elle est totalement $W_0$-asphérique si et seulement si elle vérifie (iii).*

*Démonstration.* L'application $\pi_0(A) \to \pi_0(e)$ va dans un ensemble à un élément ; elle est bijective si et seulement si $\pi_0(A)$ a exactement un élément, c'est-à-dire si $A$ est non vide et connexe. Pour la seconde assertion, être totalement $W_0$-asphérique, c'est donc être non vide et connexe, avec chaque $A_{/a\times b}$ non vide et connexe, ce qui entraîne (iii). Réciproquement, sous (iii), $A$ est non vide, et pour $a, b \in A$ un objet $(c,(p,q))$ de $A_{/a\times b}$ fournit le zigzag $a \overset{p}{\leftarrow} c \overset{q}{\rightarrow} b$ ; $A$ est donc connexe. C'est le « (iii) implies that $A$ is $0$-connected » de la page. □

**Lemme 35.3.** *La classe $W_\infty$ est un localisateur fondamental, contenu dans tout localisateur fondamental.*

*Démonstration.* La seconde assertion est la définition. Chacun des axiomes LA à LC dit que certains foncteurs sont dans $W$ dès que d'autres y sont ; si ces derniers sont dans $W_\infty$, ils sont dans chaque localisateur fondamental $W$, les premiers aussi, et donc dans $W_\infty$. □

*Démonstration de (i) ⇒ (ii), et de (ii) ⇒ (iii) si $W \subseteq W_0$.* L'asphéricité totale croît avec le localisateur : si $W \subseteq W'$, une catégorie totalement $W$-asphérique est totalement $W'$-asphérique, les foncteurs vers $e$ en jeu étant dans $W$, donc dans $W'$. Comme $W_\infty$ est contenu dans $W$ (lemme 35.3), (i) entraîne (ii). Si $W \subseteq W_0$, (ii) entraîne que $A$ est totalement $W_0$-asphérique, c'est-à-dire (iii) par le lemme 35.2. □

*Deux localisateurs fondamentaux non contenus dans $W_0$.* La classe de tous les foncteurs vérifie trivialement LA à LC. Soit $W_{-1}$ la classe des foncteurs $u : A \to B$ tels que $A$ soit vide si et seulement si $B$ l'est. Elle contient les identités, et le deux-sur-trois vaut, l'équivalence « $A$ vide $\iff$ $B$ vide » étant transitive. Si $ri = 1_A$, $A$ et $B$ sont vides ensemble, par $i$ et par $r$. Une catégorie à objet final n'est pas vide. Pour LC, si $A$ n'est pas vide, $B$ ne l'est pas ; si $b \in B$, $B_{/w(b)}$ contient $(b,1)$, donc $A_{/w(b)}$ n'est pas vide, et $A$ non plus. Le foncteur de la catégorie discrète à deux objets vers $e$ est dans ces deux classes et n'est pas dans $W_0$.

Pour $W = W_{-1}$, soit $A = B(\mathbb{Z}/2)$ la catégorie à un objet $*$ dont le monoïde d'endomorphismes est le groupe $G = \mathbb{Z}/2$. Elle est non vide, et $A_{/*\times *}$ contient $(*,(1,1))$ : $A$ est totalement $W_{-1}$-asphérique. Mais les objets de $A_{/*\times *}$ sont les couples $(p,q) \in G \times G$, et une flèche $g : (p',q') \to (p,q)$ vérifie $(p',q') = (pg, qg)$, de sorte que $p^{-1}q$ est constant sur chaque composante ; $(1,1)$ et $(1,\sigma)$, où $\sigma$ est l'élément non neutre, sont dans des composantes distinctes. Donc (iii) est en défaut, et (i) aussi : par les lemmes 35.1 et 35.3, $W_\infty \subseteq W_0$, et (i) entraînerait (iii) par ce qui précède. Pour la classe de tous les foncteurs, la catégorie vide est totalement asphérique et ne vérifie pas (iii). □

*Remarque.* L'inclusion $W \subseteq W_0$ est fausse pour les localisateurs fondamentaux définis par LA à LC seuls, et avec elle les implications (ii) ⇒ (iii) et (ii) ⇒ (i). Cisinski (2006, 9.3.1 et 9.3.2) [15] montre qu'un localisateur fondamental est contenu dans $W_0$ si et seulement s'il n'est pas grossier. La page impose la condition « satisfying Loc 4) », sans laquelle l'énoncé ne tient pas. Loc 4) est définie ailleurs dans *À la poursuite des champs*, hors de cette chemise, et l'on n'a pas vérifié si elle exclut les deux contre-exemples.

*Remarque.* La lecture identifie $W_0$ à la classe des foncteurs bijectifs sur $\pi_0$, que décrit Maltsiniotis (2005, 1.1.29 à 1.1.32) [35]. Cette classe est un localisateur fondamental (lemme 35.1) ; qu'elle soit le plus grossier de ceux qui vérifient Loc 4) n'est pas établi ici.

*Remarque.* L'implication (iii) $\Rightarrow$ (i), que la page affirme, est réfutée dans la littérature par la catégorie des cubes (Maltsiniotis 2005 [35], Cisinski 2006 [15]) ; l'inventaire date la cote « [1983] ».

Ne sont pas démontrés ici : la description de $W_\infty$ comme classe des équivalences faibles usuelles (Cisinski) ; l'implication (iii) $\Rightarrow$ (i), réfutée dans la littérature ; le fait que $W_0$ soit le plus grossier sous Loc 4) ; le début de la page 3 ; les pages 1 et 2 ; le NB et la dominance (page 4) ; les contre-exemples et la question des pages 4 et 5.

## 36 Cote 158 : la proposition 1 sur les monoïdes finis[37]

La cote 158, *[Autour des Dérivateurs] : notes manuscrites (s.d.)*, quatre-vingt-cinq pages que l'inventaire date « [vers 1990-1991] », étudie une seule question : une petite catégorie $X$ est-elle cofiltrante dès que tout objet $0$-connexe du topos des préfaisceaux sur $X$ est $1$-connexe ? Les pages 44 à 53, sous sa pagination 1 à 8, traitent le cas fini, en commençant par celui d'un monoïde, c'est-à-dire d'une catégorie à un objet. La proposition 1 est énoncée page 44 et démontrée jusqu'au haut de la page 46, qui conclut « cqfd » (158, lot 3, p. 44). Sous l'énoncé, un premier paragraphe, barré de deux longues diagonales, commence par « L'unicité de $p$ est claire ». La démonstration reprend ensuite par la pseudo-cofiltrance et réalise $M$ comme monoïde d'endomorphismes d'un ensemble $E$, le mot « fini » devant $E$ étant biffé. Elle écrit : « comme $E_0$ est fini, on en conclut que $u(E_0) = E_0$ » (158, lot 3, p. 45).

**Définition.** Un monoïde $M$ est *pseudo-cofiltrant* si, pour tous $u, v \in M$, il existe $u', v' \in M$ tels que $uu' = vv'$ ; il est *cofiltrant* s'il est pseudo-cofiltrant et si, pour tous $u, v \in M$, il existe $w \in M$ tel que $uw = vw$. Le *groupe enveloppant* de $M$ est *trivial* si tout morphisme de monoïdes de $M$ dans un groupe est trivial. La première définition est celle que la lecture tire de la page 55, où le manuscrit en donne l'équivalent ; la dernière est la propriété universelle du groupe enveloppant.

**Théorème 36.1** (Grothendieck, Proposition 1, pages 44 à 46 ♦ ■). *Soit $M$ un monoïde fini dont le groupe enveloppant est trivial et qui est pseudo-cofiltrant. Alors il existe $p \in M$ tel que $up = p$ pour tout $u \in M$ — en particulier $p^2 = p$ — et $M$ est cofiltrant.*

**Lemme 36.2.** *Dans un monoïde fini pseudo-cofiltrant $M$, il existe $p$ tel que, pour tout $u \in M$, on ait $p = uv$ pour un $v \in M$ : $p$ appartient à tous les idéaux à droite principaux $uM$.*

*Démonstration.* Montrons, par récurrence sur le cardinal d'une partie finie $F \subseteq M$, qu'il existe $p$ appartenant à $uM$ pour tout $u \in F$ ; appliqué à $F = M$, c'est l'énoncé. Pour $F$ vide, $p = 1$ convient. Supposons l'assertion vraie pour $F$, avec un élément $p$, et soit $a \in M$. Par pseudo-cofiltrance appliquée à $p$ et $a$, il existe $p', v'$ tels que $pp' = av'$. L'élément $pp'$ est dans $aM$ ; et pour $u \in F$, si $p = uv$, alors $pp' = u(vp')$ est dans $uM$. L'élément $pp'$ convient donc pour $F \cup \{a\}$. □

*Démonstration de la proposition 1.* Soit $p$ donné par le lemme 36.2, et $E_0 = pM$ l'ensemble des $py$, $y \in M$. C'est l'image de $p$ dans la représentation régulière gauche de $M$, où $u$ opère sur $M$ par $x \mapsto ux$, et $E_0$ est fini puisque $M$ l'est.

*Chaque $u$ envoie $E_0$ sur lui-même.* Soit $u \in M$. D'abord $E_0 \subseteq uE_0$ : le lemme appliqué à l'élément $up$ fournit $v$ tel que $p = upv$, et pour $y \in M$, $py = upvy = u\big(p(vy)\big)$ est dans $uE_0$.

[37] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder158.lean`.

Ensuite $uE_0$, image de $E_0$ par une application, a au plus autant d'éléments que $E_0$ ; une partie de l'ensemble fini $uE_0$ qui a au moins autant d'éléments que lui lui est égale, et donc $uE_0 = E_0$. L'application $x \mapsto ux$ est ainsi une surjection de l'ensemble fini $E_0$ sur lui-même, donc une bijection.

Les deux premiers pas se lisent sur le carré suivant : $E_0 = pM$ est stable par la multiplication à gauche par $u$, qui y induit une bijection.

$$\begin{array}{ccc} E_0 = pM & \xrightarrow[\sim]{x\mapsto ux} & E_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow[x\mapsto ux]{} & M \end{array}$$

*Le morphisme vers un groupe.* Notons $\varphi(u)$ la permutation $x \mapsto ux$ de $E_0$. On a $\varphi(1) = \mathrm{id}$ et, par associativité, $\varphi(uu') = \varphi(u) \circ \varphi(u')$ : $\varphi$ est un morphisme de monoïdes de $M$ dans le groupe des permutations de $E_0$. Le groupe enveloppant de $M$ étant trivial, $\varphi(u) = \mathrm{id}$ pour tout $u$. En l'appliquant à l'élément $p = p \cdot 1$ de $E_0$, on obtient $up = p$ pour tout $u \in M$.

*Conclusion.* Pour $u = p$, $p^2 = p$. Enfin $M$ est pseudo-cofiltrant par hypothèse, et pour $u, v \in M$, $w = p$ vérifie $uw = p = vw$ : $M$ est cofiltrant. □

*Remarque.* La finitude sert deux fois : au lemme 36.2, pour passer de deux idéaux $uM$ à tous, et pour changer l'inclusion $E_0 \subseteq uE_0$ en égalité. Le « comme $E_0$ est fini » de la page vaut parce que $E_0 = pM$ est contenu dans $M$. Il ne vaudrait pas pour un ensemble $E$ quelconque, devant lequel la page a biffé « fini ».

*Remarque.* Sans la pseudo-cofiltrance, l'énoncé est faux : le monoïde $\{1, a, b\}$ où $ax = a$ et $bx = b$ pour tout $x$ est fini, de groupe enveloppant trivial, et n'a pas d'élément $p$ tel que $ap = p = bp$. Sans la finitude, il est faux pour le monoïde $\mathrm{Ep}(E)$ des surjections d'un ensemble infini $E$, que la lecture étudie à sa section 6. (Non démontré ici.)

*Remarque.* L'élément $p$ n'est pas unique, et le noyau de Rees $MpM = pM$ n'est pas nécessairement réduit à un point. Soit $M = \{1, a, b\}$ avec $x \cdot 1 = x$, $x \cdot a = a$, $x \cdot b = b$ pour tout $x$ ; cette loi est associative, d'unité $1$, pseudo-cofiltrante ($ua = va$ pour tous $u, v$), de groupe enveloppant trivial ($g(a) = g(ba) = g(b)g(a)$ force $g(b) = 1$, et de même $g(a) = 1$) ; on a $ua = a$ et $ub = b$ pour tout $u$, aucun des deux n'est un zéro bilatère ($ab = b$), et l'intersection des idéaux $MxM$ est $\{a, b\}$.

*Remarque.* La relation $up = p$ pour tout $u$ fait de $p$ un zéro à droite, et l'idéal à gauche $Mp = \{p\}$ est minimal. Une glose qui dirait $p$ « zéro à gauche » et le noyau de Rees « ponctuel » serait fausse. Le paragraphe barré de la page 44 affirmait l'unicité de $p$, en identifiant $pp'$ à $p'p$ ; l'exemple précédent la réfute.

*Remarque.* La proposition 1, avec sa réciproque, est proposée à mathlib : pour un monoïde fini, l'existence d'un zéro à droite équivaut aux deux conditions de la page (PR mathlib4 #44702).

Ne sont pas démontrés ici : le groupe fondamental (pages 19 et 20) ; la catégorie $0$-connexe non $1$-connexe (pages 21 à 41) ; la proposition 2 « (??) » et le corollaire « Faux ! » ; les pages 50 à 53 ; $\mathrm{Ep}(E)$ et $\mathrm{Mon}(E)$ ; les pages 60 à 83.

**Conjecture 36.3** (Grothendieck, pages 21 à 41, monoïdes à élément minimal ♦). *Soit $M$ un monoïde possédant un élément $\psi$ tel que $\psi \in uM$ pour tout $u \in M$. Si tout $M$-ensemble à droite connexe a une catégorie d'éléments simplement connexe, $M$ est cofiltrant.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 22 à 41). Le théorème de la page 39 s'interrompt ; la page 41 achève le cas b)

**Conjecture 36.4** (Grothendieck, pages 50 à 53, catégories finies cofiltrantes ♦). *Une catégorie finie $X$ dont tout préfaisceau connexe a une catégorie d'éléments simplement connexe est cofiltrante.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 50 à 53). Le passage de l'hypothèse à la pseudo-cofiltrance est affirmé page 53 sans argument

# 37 Cote 104 : catégories de modèles, trois exemples, un complexe globulaire[38]

La cote 104, *[Champs (stacks) 1] : copies de notes manuscrites (s.d.)*, seize pages sans date, appartient au groupe « Autour de *Pursuing stacks* », que l'inventaire date « 1968-1984 ». Les pages 6 à 16, sous sa pagination 1 à 6, sont une rédaction suivie. Une catégorie $M$ de « modèles » y est remplacée par des ensembles ordonnés dont elle se reconstruit : l'ensemble $\mathbb{N}$ de ses classes d'isomorphisme, les ensembles $I_n$ de sous-objets, les applications type $\tau_n$. La page 6 pose les deux hypothèses (dans la seconde, « automorphisme » est biffé et remplacé par « end. ») et affirme que l'application $(*)$ ci-dessous « est injective par (i)(ii) » (104, lot 1, p. 6). La page 7 ajoute « On a donc (par (ii)) $\tau_n^{-1}(n) = \{d_n\}$ » (104, lot 1, p. 7). La page 10 affirme la réciproque et donne trois exemples, avec leurs dénombrements en marge (104, lot 1, p. 10). Parmi les feuillets d'essai qui précèdent, celui de la page 4 porte une suite $\mathbb{Z}[F_{n+1}] \to \mathbb{Z}[F_n] \xrightarrow{t_n - s_n} \mathbb{Z}[F_{n-1}]$ et, sous une accolade, le calcul $t_{n-1}(t_n y - s_n y) - s_{n-1}(t_n y - s_n y) = 0$ (104, lot 1, p. 4).

**Définition.** Soit $M$ une catégorie telle que (i) toute flèche de $M$ est un monomorphisme, et (ii) tout endomorphisme d'un objet de $M$ est l'identité. Pour un objet $D$, un sous-objet de $D$ est une classe de monomorphismes de but $D$, deux monomorphismes $u, v$ étant équivalents s'ils se factorisent l'un par l'autre ; les sous-objets sont ordonnés par factorisation, et l'on note $u(D')$ le sous-objet défini par $u : D' \to D$. Pour un sous-objet $x$, on note encore $x$ un objet qui le représente. Les classes d'isomorphisme d'objets de $M$ sont préordonnées par l'existence d'une flèche.

**Énoncé** (Pages 6 et 7). 1. *L'application $(*)$ : $\mathrm{Hom}_M(D', D) \to \widetilde{D}$, $u \mapsto u(D')$, est injective.*

2. *Si $f : D' \to D$ et $g : D \to D'$, alors $f$ est un isomorphisme d'inverse $g$ ; le préordre sur les classes est donc un ordre.*

3. *Si $x \leq y$ sont deux sous-objets de $D$ et s'il existe une flèche $y \to x$ — en particulier si $x$ et $y$ sont de même type —, alors $x = y$. Par suite $\tau_n^{-1}(n) = \{d_n\}$, et $\tau_n$ est strictement croissante.*

**Énoncé** (Page 10, la réciproque : un pas). *Soit $f$ une application bijective d'un ensemble dans lui-même telle que $f \circ f = f$. Alors $f = \mathrm{id}$. En particulier la loi de composition $u_{d_n} \circ u_{d_n} = u_{d_n}$ force $u_{d_n} = \mathrm{id}$.*

**Énoncé** (Page 10, les trois exemples ■). 1. *La catégorie des $\Delta_n = \{0, \ldots, n\}$ et des applications strictement croissantes vérifie (i) et (ii), et l'ensemble $\mathfrak{P}^*(\Delta_n)$ des parties non vides de $\Delta_n$ a $2^{n+1} - 1$ éléments.*

[38] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder104.lean`.

2. *Les faces de $[0,1]^n$, qui fixent certaines coordonnées à $0$ ou à $1$ et laissent les autres libres, sont au nombre de $\sum_k \binom{n}{k} 2^k = 3^n$.*

3. *Sur $I_n = (\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\}) \sqcup \{d_n\}$, la relation « $(k,\varepsilon) \leq (k',\varepsilon')$ si et seulement si $(k,\varepsilon) = (k',\varepsilon')$ ou $k < k'$, et $d_n$ plus grand élément » est un ordre ; $I_n$ a $2n+1$ éléments, dont exactement deux de type $k$ pour chaque $k < n$. Avec $\{\pm 1\}$ muni de l'ordre chaotique, le produit n'est qu'un préordre : $(k,+1)$ et $(k,-1)$, distincts, sont chacun inférieurs à l'autre.*

**Énoncé** (Page 4, le complexe globulaire)**.** *Soient des applications $s_n, t_n : F_n \to F_{n-1}$ et $s_{n-1}, t_{n-1} : F_{n-1} \to F_{n-2}$ telles que $s_{n-1}s_n = s_{n-1}t_n$ et $t_{n-1}s_n = t_{n-1}t_n$. Alors les morphismes $t_n - s_n : \mathbb{Z}[F_n] \to \mathbb{Z}[F_{n-1}]$ et $t_{n-1} - s_{n-1} : \mathbb{Z}[F_{n-1}] \to \mathbb{Z}[F_{n-2}]$ induits sur les groupes abéliens libres composent en zéro.*

$$F_n \underset{s_n}{\overset{t_n}{\rightrightarrows}} F_{n-1} \underset{s_{n-1}}{\overset{t_{n-1}}{\rightrightarrows}} F_{n-2} \qquad \begin{matrix} s_{n-1}s_n = s_{n-1}t_n, \\ t_{n-1}s_n = t_{n-1}t_n \end{matrix} \implies (t_{n-1} - s_{n-1})(t_n - s_n) = 0.$$

*Démonstration de l'énoncé des pages 6 et 7.* (1) Soient $u, v : D' \to D$ tels que $u(D') = v(D')$. Comme $u(D') \leq v(D')$, il existe $\theta : D' \to D'$ avec $v\theta = u$. Par (ii), $\theta = \mathrm{id}$, donc $u = v$. L'hypothèse (i) ne sert qu'à faire de $u$ et $v$ des monomorphismes, c'est-à-dire à donner un sens à $u(D')$.

(2) Le composé $gf$ est un endomorphisme de $D'$, et $fg$ un endomorphisme de $D$ ; par (ii), ce sont des identités.

(3) Écrivons $x \leq y$ sous la forme $a_x = a_y \circ j$, où $a_x, a_y$ sont les monomorphismes de but $D$ qui représentent $x$ et $y$ et $j : x \to y$. Soit $g : y \to x$. Le composé $j \circ g$ est un endomorphisme de $y$, donc l'identité par (ii), et $a_y = a_y \circ j \circ g = a_x \circ g : a_y$ se factorise par $a_x$, c'est-à-dire $y \leq x$, et $x = y$. Si $\tau_n(x) = n$, $x$ est isomorphe à $D_n$, qui représente le plus grand sous-objet $d_n$ ; on a $x \leq d_n$ et une flèche $d_n \to x$, donc $x = d_n$. Si $x < y$, il y a une flèche $x \to y$, donc $\tau_n(x) \leq \tau_n(y)$ ; l'égalité donnerait une flèche $y \to x$, donc $x = y$ ; ainsi $\tau_n(x) < \tau_n(y)$ dans l'ensemble ordonné des classes. □

*Démonstration du pas de la réciproque.* Pour tout $x$, $f(f(x)) = f(x)$, et l'injectivité de $f$ donne $f(x) = x$. □

*Démonstration des trois exemples.* (1) Une application strictement croissante est injective, donc simplifiable à gauche : si $fg = fh$, alors $g = h$ point par point. Une application strictement croissante de $\Delta_n$ dans lui-même est l'identité : c'est l'unique application strictement croissante de $\{0,\dots,n\}$ sur une partie à $n+1$ éléments de $\Delta_n$, à savoir $\Delta_n$ tout entier, et l'identité en est une. Les parties de $\Delta_n$ sont au nombre de $2^{n+1}$, dont une vide.

(2) Une face est la donnée, pour chaque coordonnée, de la valeur $0$, de la valeur $1$, ou de rien : c'est une application de $\{1,\dots,n\}$ dans un ensemble à trois éléments, et il y en a $3^n$ — ce que la marge appelle une section partielle de $\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\} \to \Delta_{n-1}$. En comptant les faces selon le nombre $k$ des coordonnées fixées, on obtient $\binom{n}{k}2^k$ faces pour chaque $k$, et $\sum_k \binom{n}{k}2^k = (2+1)^n$ par la formule du binôme ; c'est la formule de la page 5.

(3) La relation est réflexive. Elle est transitive : $d_n$ est au-dessus de tout et au-dessous de lui seul, et sur $\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\}$ la composée de deux relations « égal ou de premier indice strictement plus petit » en est une. Elle est antisymétrique : si $(k,\varepsilon) \leq (k',\varepsilon')$ et $(k',\varepsilon') \leq (k,\varepsilon)$ avec des éléments distincts, on aurait $k < k'$ et $k' < k$. Le cardinal est $2n+1$, et les éléments de type

$k$ sont $(k,+1)$ et $(k,-1)$. Pour l'ordre chaotique, $(k,\varepsilon) \leq (k',\varepsilon')$ équivaut à $k \leq k'$, et $(k,+1)$, $(k,-1)$ sont chacun inférieurs à l'autre. □

*Démonstration de l'énoncé de la page 4.* Le passage de $F$ à $\mathbb{Z}[F]$ est fonctoriel : l'application induite par un composé est le composé des applications induites. Le composé $(t_{n-1}-s_{n-1})(t_n-s_n)$ vaut donc $\mathbb{Z}[t_{n-1}t_n]-\mathbb{Z}[t_{n-1}s_n]-\mathbb{Z}[s_{n-1}t_n]+\mathbb{Z}[s_{n-1}s_n]$, et les identités globulaires annulent les termes deux à deux. □

*Remarque.* L'exemple 3 est démontré sous la forme que la lecture substitue à la page. Elle prend $\Delta_{n-1}$ au lieu de $\Delta_n$, qui donnerait $2n+3$ éléments au lieu des $2n+1$ de la marge. Elle prend l'ordre des cellules du disque au lieu du produit par un préordre chaotique, qui n'est pas antisymétrique.

*Remarque.* L'hypothèse (i) n'intervient ni dans l'ordre sur les classes ni dans $u_{d_n} = \mathrm{id}$, que (ii) donne seule. Dans $(*)$, que la page dit injective « par (i)(ii) », elle sert seulement à définir $u(D')$.

*Remarque.* L'exemple 1 montre que la catégorie des $\Delta_n$ et des injections croissantes n'a pas de dégénérescence. Pour les exemples, seul le calcul sur les ensembles $I_n$ est démontré. L'identification des sous-objets des catégories de cubes et de disques à ces ensembles est celle de la lecture et n'est pas démontrée ici.

**Énoncé** (Page 6, note de la lecture : la bonne fondation ■)**.** *Soit $M$ une catégorie vérifiant (ii). Pour deux objets $X, Y$, écrivons $X \prec Y$ s'il existe une flèche $X \to Y$ et aucune flèche $Y \to X$.*

1. *Toute flèche $X \to Y$ qui n'est pas un isomorphisme donne $X \prec Y$ ; si $M$ est squelettique, toute flèche qui n'est pas une identité le donne.*
2. *Si $M$ est squelettique et si $\prec$ est bien fondée, le rang ordinal* deg *pour $\prec$ est un degré que toute flèche autre qu'une identité augmente strictement, et $M$ est une catégorie directe : une structure de Reedy dont la classe descendante est formée des identités et la classe ascendante de toutes les flèches.*
3. *Réciproquement, s'il existe une application* deg *des objets dans un ensemble ordonné bien fondé que toute flèche autre qu'une identité augmente strictement, $\prec$ est bien fondée.*
4. *Les hypothèses (i) et (ii) ne suffisent pas : la catégorie définie par l'ensemble ordonné $\mathbb{Z}$ les vérifie, et $\prec$ n'y est pas bien fondée.*

*Démonstration.* (1) Si $g : Y \to X$, alors $gf$ et $fg$ sont des endomorphismes, donc des identités par (ii), et $f$ serait un isomorphisme. Si $M$ est squelettique et $f$ un isomorphisme, $X = Y$, et $f$, endomorphisme de $X$, est l'identité par (ii) ; une flèche qui n'est pas une identité n'est donc pas un isomorphisme.

(2) Le rang d'un objet $X$ est le plus petit ordinal strictement supérieur aux rangs des objets $Z \prec X$ ; il est défini par récurrence bien fondée, et $Z \prec X$ entraîne $\deg Z < \deg X$. Par (1), toute flèche $X \to Y$ autre qu'une identité donne $\deg X < \deg Y$. La condition sur la classe descendante est vide, puisqu'elle n'a que des identités. Enfin toute flèche $f$ s'écrit d'une seule façon comme une identité suivie d'une flèche : si $f = p \circ i$ avec $i$ une identité, l'objet intermédiaire est la source de $f$ et $p = f$.

(3) Si $X \prec Y$, une flèche $f : X \to Y$ n'est pas une identité, puisque $X = Y$ donnerait la flèche $\mathrm{id}_X$ de $Y$ vers $X$ ; donc $\deg X < \deg Y$, et $\prec$ est contenue dans l'image réciproque par deg d'un ordre bien fondé, qui est bien fondée.

(4) Entre deux objets de $\mathbb{Z}$ il y a au plus une flèche : (i) et (ii) sont immédiats. Pour tout $m$, $m-1 \prec m$, et $\mathbb{Z}$ n'a donc pas d'élément minimal pour $\prec$. □

*Remarque.* La lecture énonce qu'une catégorie vérifiant (i) et (ii) est directe au sens de Reedy « dès que » l'ordre de $\mathbb{N}$ est bien fondé. L'exemple de $\mathbb{Z}$ montre que cette condition est une hypothèse supplémentaire, qui ne découle pas de (i) et (ii). La structure de Reedy est celle que définit la bibliothèque mathlib. L'hypothèse (i) n'y sert pas ; elle dit seulement que la classe ascendante est formée de monomorphismes. La catégorie squelettique est celle que la page 9 appelle « rigide ». Sans elle, un isomorphisme entre deux objets distincts n'augmenterait aucun degré ; la bonne fondation porte donc sur l'ordre des classes d'isomorphisme.

**Énoncé** (Page 10, exemple 1 : les identités simpliciales)**.** *Notons $\delta_i : \Delta_n \to \Delta_{n+1}$, pour $0 \leq i \leq n+1$, l'application strictement croissante qui évite $i$.*

1. *Pour $i \leq j$, $\delta_{j+1} \circ \delta_i = \delta_i \circ \delta_j$.*
2. *Toute application strictement croissante $f : \Delta_m \to \Delta_{n+1}$ avec $m \leq n$ s'écrit $\delta_i \circ g$, avec $g : \Delta_m \to \Delta_n$ strictement croissante.*
3. *La catégorie des $\Delta_n$ et des applications strictement croissantes est squelettique, toute flèche autre qu'une identité y augmente strictement $n$, et c'est une catégorie directe au sens de l'énoncé précédent.*

*Démonstration.* (1) Les deux membres envoient $k \in \Delta_n$ sur $k$ si $k < i$, sur $k+1$ si $i \leq k < j$, et sur $k+2$ si $k \geq j$ : c'est une vérification cas par cas sur les inégalités entre $i$, $j$ et $k$. C'est la première identité simpliciale, que mathlib démontre dans la catégorie simpliciale ; elle est refaite ici dans la catégorie sans dégénérescences.

(2) Comme $f$ est injective, une surjection de $\Delta_m$, qui a $m+1 \leq n+1$ éléments, sur $\Delta_{n+1}$, qui en a $n+2$, est impossible : $f$ évite un $i$. Chaque $f(k)$, distinct de $i$, s'écrit $\delta_i(g(k))$ pour un unique $g(k)$, et $g$ est strictement croissante parce que $\delta_i$ l'est et reflète donc l'ordre.

(3) Une flèche $\Delta_m \to \Delta_n$ est injective, donc $m \leq n$. Si $\Delta_m \simeq \Delta_n$, on a $m \leq n$ et $n \leq m$. Si $m = n$, la flèche est un endomorphisme, donc l'identité (exemple 1 ci-dessus). Le degré $n$, à valeurs dans les entiers, vérifie donc l'hypothèse de la partie (3) de l'énoncé précédent, et la partie (2) s'applique. □

*Remarque.* Ni les identités simpliciales ni la factorisation par les faces ne sont sur la page. Elles justifient l'identification, faite par la lecture, des préfaisceaux sur cette catégorie aux ensembles semi-simpliciaux. Par (2) et une récurrence sur $n-m$, toute flèche est un composé de faces, et (1) donne, en passant aux préfaisceaux, les relations $d_i d_j = d_{j-1} d_i$ pour $i < j$. Seul le pas de la récurrence est formalisé ici. Dans cet exemple $\mathbb{N} = \mathbf{N}$, comme la page 10 le dit des « cas que j'ai en tête », et la bonne fondation est celle des entiers.

*Remarque.* La caractérisation des catégories directes par la bonne fondation est proposée à mathlib (PR mathlib4 #44731 ; pour les catégories de Reedy, voir [41, annexe C]), et, sur elle, la structure de Reedy directe de la catégorie semi-simpliciale $\Delta_{\text{inj}}$ (#44732).

Ne sont pas démontrés ici : la décomposition de toute flèche de l'exemple 1 en composé de faces, dont seul le pas est démontré ; l'isomorphisme $M \simeq M_0$ et la réciproque (pages 9 et 10) ; la sphéricité et la régularité de $|I_n^*|$ ; la page 11 ; les pages 12 à 16 (ensembles ordonnés épinglés) ; les conditions $(C_i)$ de la page 4 ; les sous-objets des exemples.

**Conjecture 37.1** (Grothendieck, pages 12 à 16, ensembles ordonnés épinglés ♦). *Soit $M$ une catégorie dont toutes les flèches sont des monomorphismes et dont les seuls endomorphismes sont les identités. Les préfaisceaux sur $M$ réunions de leurs sous-objets isomorphes à des objets de $M$ forment une catégorie équivalente à celle des ensembles ordonnés $M$-épinglés, munis d'une application de type strictement croissante et, pour chaque élément $\xi$ de type $n$, d'un isomorphisme $u_\xi : I_n \simeq K_{\leq \xi}$ compatible aux types et aux composés ; cette classe est stable par sommes et par sommes amalgamées.*

Autres pistes de l'onglet Findings pour ce thème, dans des cotes qui n'ont pas de section ici :

**Conjecture** (Grothendieck, pages 42 à 45, excision pour deux cribles ouverts ♦). *Soient $\mathbb{D}$ un dérivateur et $X$ une petite catégorie recouverte par deux cribles ouverts $U$ et $U'$. Si $U \cap U' \to U'$ est une $\mathbb{D}$-équivalence cohomologique, alors $U \to X$ en est une. C'est la moitié de l'axiome W7 pour $W_{\mathbb{D}}$, tirée des seuls axiomes des dérivateurs.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (page 45). L'identification de $\gamma(1,1)$ à $H^\bullet_{\mathbb{D}}(X,\xi)$ porte en marge « à vérifier (ou à mettre comme axiome sur les dérivateurs) », et l'édition fournit le pas qui manque. Mathlib n'a pas les dérivateurs. On se reportera aux notes de Grothendieck (105, lot 3, p. 42).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 20 et 22, rectification d'un carré relatif ♦). *Dans une catégorie de modèles, soit un carré $pg = g'i$ où $i$ est une cofibration entre objets cofibrants et $p$ une fibration entre objets fibrants. Une diagonale $\varphi$ qui rend les deux triangles commutatifs à des homotopies $k$ et $h$ près peut être remplacée par une diagonale homotope qui les rend strictement commutatifs si $k$ et $h$ peuvent être choisies compatibles avec $i$ et $p$. La marge de la page 20 ajoute que cette condition n'est « sans doute pas toujours satisfaite ».*

Démonstration donnée par l'édition, non vérifiée en Lean.

La réciproque et le contre-exemple (fibration des chemins sur $S^1$) sont aussi de l'édition. Mathlib n'a des catégories de modèles que les premières définitions. On se reportera aux notes de Grothendieck (107, lot 1, p. 20).

**Conjecture** (Grothendieck, page 2, $\Delta^\circ$ et les catégories test ♦). *La catégorie $\Delta^\circ$ n'est pas une catégorie test.*

La question 6 de la liste reçoit pour réponse un « non » souligné, sans argument ; la page ne définit ni modélisateur ni catégorie test, et l'édition ne reconstruit pas d'argument. Mathlib n'a pas les catégories test. On se reportera aux notes de Grothendieck (108, lot 1, p. 2).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 18 à 20, sommes amalgamées le long d'opfibrations ; voir aussi Cisinski [15] ♦). *Soient $\mathcal{W}$ un localisateur fondamental et, dans **Cat**, un carré cocartésien et cartésien formé de $i : Y \to X$, $g : Y \to Y'$, $f : X \to X'$ et $i' : Y' \to X'$, où $i'$ et $f$ sont des opfibrations de Grothendieck et où, au-dessus de chaque objet de $X'$, l'une des fibres de $f$ ou de $i'$ est équivalente au point. Ce carré est homotopiquement cocartésien : si $i \in \mathcal{W}$, alors $i' \in \mathcal{W}$, et si $g \in \mathcal{W}$, alors $f \in \mathcal{W}$.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 18 à 20). L'argument de cocartésianité s'interrompt, et l'hypothèse cartésienne est de la lecture. Cisinski conditionne ses énoncés voisins à des immersions, non à des opfibrations. Mathlib n'a pas les localisateurs fondamentaux. On se reportera aux notes de Grothendieck (118, lot 1, p. 18).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 161 à 179 et 189 à 199, schéma en groupes des automorphismes ♦). *Les homomorphismes d'anneaux simpliciaux entre algèbres de de Rham à puissances divisées $\mathcal{A}(S, S^+, t)_*$, sans graduation, filtration ni puissances divisées imposées, sont classés par des données $(\varphi_0, A'_1, (B'_i))$ soumises à trois conditions, la troisième étant $(2B'_i)J' = 0$. Le foncteur des automorphismes de l'algèbre complétée sur $k\{T\}$ est donc un schéma en groupes affine sur* **Z**, *produit semi-direct de* $\mathbf{G}_m$ *par un groupe unipotent dont les facteurs sont tués par 2. Quand 2 est inversible, tout automorphisme respecte la graduation extérieure et opère sur la cohomologie par* $\mathbf{G}_m$ *seul.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 173 à 179) : la condition 3) est affirmée sans raison, et la raison qu'en donne la lecture est la sienne. Mathlib n'a pas les algèbres simpliciales à puissances divisées. On se reportera aux notes de Grothendieck (136, lot 9, p. 161).

**Théorème** (Grothendieck, pages 5 à 10 et 226 à 232, ombres de la cohomologie entière ; voir aussi Kageyama 2022 ♦). *Soit $C^{p,q} = \Gamma^p\Phi \otimes \Lambda^q\Psi$ la $k\{T\}$-algèbre simpliciale des formes à puissances divisées sur le simplexe $\sum X_i = T$. Pour tout ensemble simplicial $X$, la cohomologie de ses sections sur $X$ est $H^q(X, k)$ en tout degré complémentaire $p \geq 0$ ; graduée par le degré total, $H^{\bullet,q}$ est la troncature $\tau_{\geq q}(H^q(X, k) \otimes_k k\{T\})$. La cohomologie entière n'est retrouvée que sous la forme de ces ombres.*

◊ *non vérifié en Lean*

L'exactitude de chaque ligne, que la page 8 affirme sans démonstration, est fournie par la lecture à partir du complexe de Koszul à puissances divisées ; les pages 226 à 232 refont le calcul. Kageyama construit la même algèbre sans en calculer la cohomologie. Mathlib n'a pas la cohomologie des ensembles simpliciaux à coefficients dans ces algèbres. On se reportera aux notes de Grothendieck (136, lot 1, p. 5).

**Théorème** (Grothendieck, pages 1 et 45 à 47, lissité des fibrations de drapeaux ♦). *Dans le déploiement d'une stratification équisingulière non singulière, présenté comme foncteur sur les drapeaux de $I$, soit $d = (i_1, \ldots, i_p)$ un segment initial de $d' = (i_1, \ldots, i_n)$. Le bord des fibres de $\Sigma_{d'} \to \Sigma_d$ est stratifié cylindriquement par les drapeaux non vides de la somme ordinale $I_{]i_p, i_{p+1}[} \sqcup \cdots \sqcup I_{]i_{n-1}, i_n[}$. La fibration est donc à fibres sans bord exactement quand $i_{k+1}$ couvre $i_k$ dans $I$ pour $p \leq k < n$, condition où $i_1, \ldots, i_{p-1}$ n'interviennent pas.*

◊ *non vérifié en Lean*

Le mot qui qualifie « successeur » à la page 47 est une addition incertaine ; le critère est fixé par la page 46, lisible. Mathlib n'a pas les stratifications équisingulières ni leurs déploiements. On se reportera aux notes de Grothendieck (150, lot 1, p. 1).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 47 à 66 et 70, le déploiement comme espace ordonné ♦). *Les données déployées d'une stratification équisingulière indexée par un ensemble ordonné fini $I$ (strates déployées $\Sigma_i$, tubes de raccord $\Sigma_{ij}$ fibrés sur $\Sigma_i$ et plongés de façon fermée, avec collier, dans $\Sigma_j$) équivalent à un seul espace topologique ordonné $\Sigma$, dont le graphe de l'ordre est la réunion des tubes. Cet espace est soumis à des conditions de propreté, de transversalité et de finitude, chaque $\Sigma_{<x}$ étant fini et totalement ordonné, et muni d'une application strictement croissante $\pi_0(\Sigma) \to I$, non nécessairement surjective.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 57 à 70). Seules la reconstitution de l'ordre et la condition b) y sont démontrées, et l'argument de dimension des pages 67 à 69 demande des hypothèses que l'édition ajoute. Mathlib n'a pas les stratifications équisingulières. On se reportera aux notes de Grothendieck (150, lot 3, p. 47).

**Théorème** (Grothendieck, pages 10 à 14 et 17, hyperrecouvrements indexés par une catégorie quelconque ⧫). *Un hyperrecouvrement d'un topos $X$ indexé par une petite catégorie quelconque $A$, et non par un objet simplicial, est caractérisé par un seul axiome : la flèche de comparaison $\varphi_!(\varprojlim_I F_i) \to \varprojlim_I \varphi_!(F_i)$ est un épimorphisme pour tout diagramme fini de $\hat{A}$. La version où elle est un isomorphisme équivaut à l'exactitude à gauche de $\varphi_!$, c'est-à-dire à un morphisme de topos $X \to \hat{A}$.*

◊ *non vérifié en Lean*

Les quatre axiomes des pages 10 à 13 se ramènent à celui-ci par $F = \varinjlim_{A/F} \alpha$ (pages 13, 14 et 17). Mathlib a les préfaisceaux et les extensions de Kan, mais pas les hyperrecouvrements d'un topos. On se reportera aux notes de Grothendieck (151, lot 1, p. 10).

**Définition** (Grothendieck, pages 59, 60 et 74, tubes mixtes ⧫). Pour $i \le j \le k$, le tube mixte $V^j_{i,k}$ s'obtient en retirant du tube de $X_i$ dans $X_k$ la réunion $R_{i,k} \cup S_{j,k}$ de deux parties complémentaires du bord de $X_k$. Ces tubes interpolent de façon monotone entre le tube épointé $V^*_{i,k}$, pour $j = i$, et le tube plein $V_{i,k}$, pour $j = k$.

La page écrit $R_{j,k} \cup S_{j,k}$, qui est le bord de $X_k$ pour tout $j$ : la famille serait constante, et l'indice $i$ est de l'édition. La page 74 commence une généralisation indexée par des cribles et s'interrompt. Mathlib n'a pas les espaces stratifiés ni leurs tubes. On se reportera aux notes de Grothendieck (151, lot 3, p. 59).

**Exemple** (Grothendieck, pages 61 à 63, $\Pi_1$ trop grossier pour la sphère ⧫). Sur $\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}} \simeq S^2$, stratifié par un point, un plan et un cercle, la somme amalgamée du diagramme des tubes au niveau du groupoïde fondamental est homotopiquement triviale, alors que la sphère ne l'est pas. En montant d'un niveau, aux gerbes, on retrouve $H^2(S^2, A) \simeq A$.

◊ non vérifié en Lean

Mathlib n'a pas la théorie de l'homotopie des espaces stratifiés ni les gerbes. On se reportera aux notes de Grothendieck (151, lot 4, p. 61).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 62 à 68, recollement par les paires de couverture ⧫). *Un espace stratifié est la limite inductive d'un diagramme indexé par les seules paires $(i, j)$ de l'ensemble ordonné des strates où $j$ couvre $i$, avec trois flèches par paire, $X^*_i \to V_{i,j} \leftarrow V^*_{i,j} \to X^*_j$ ; aucune comparaison entre strates non adjacentes n'est nécessaire.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 62 et 63) : ils établissent, sous trois hypothèses, que ces trois inclusions sont les seules entre les pièces élémentaires. Le théorème de recollement de la page 68 est sans démonstration, et le mot qui y nomme l'opération est illisible. Mathlib n'a pas les espaces stratifiés. On se reportera aux notes de Grothendieck (151, lot 4, p. 62).

**Partie 26**

# Topologie modérée et espaces stratifiés

## 38 Cote 120 : écraser une partie modérée sur un corps[39]

La cote 120, *Topologie modérée*, vingt-quatre pages que l'inventaire date « à partir de 1973 — à partir de 1978 », cherche des axiomes pour les parties « modérées » des puissances d'un ensemble $R$. La page 2 pose les axiomes (M1) à (M4) sur des familles $\mathcal{M}_n$ de parties de $R^n$, que la page 4 transcrit pour des ensembles d'indices finis quelconques ; la page 5 appelle modérée une application dont le graphe est une partie modérée. L'axiome (M6) de la page 12 demande que toute partie modérée $Y$ d'un espace modéré $X$ soit une fibre $\bigcap_\alpha f_\alpha^{-1}(e_\alpha)$ d'un nombre fini de fonctions modérées, les $e_\alpha$ étant des points modérés, « de plus, on peut supposer » que les $f_\alpha$ séparent les points de $X \smallsetminus Y$ : c'est dire que le quotient $X/Y$, où $Y$ est écrasé en un point, existe au sens strict. La section (VI) suppose $R$ un corps et ajoute l'axiome (M11) : $0$ et $1$ sont des points modérés, $x - y$ et $xy$ sont des fonctions modérées sur toute partie modérée de $R^2$, et les inverses d'une partie modérée de $R^*$ sont contenus dans une partie modérée (120, lot 1, p. 20). Les pages 22 et 23 en tirent que la seconde moitié de (M6) découle de la première. La page 22 se ramène à $e_\alpha = 0$ par translation et introduit les produits $f_\alpha g_\beta$. La page 23 vérifie la séparation et énonce la proposition « Si on a M1 : M7 et M11 … », dont la « Dém : » reste vide (120, lot 2, p. 22). La page écrit « $e_\alpha \in R$ » et « sépare les pts de $X$ » ; la lecture corrige en $e_\alpha \in R_0$ et en $X \smallsetminus Y$.

*Conventions.* Pour un ensemble fini $I$, $\mathcal{M}_I$ est un ensemble de parties de $R^I$ ; pour $u : I \to J$, $u^* : R^J \to R^I$ est $x \mapsto x \circ u$. Les axiomes, sous la forme (M′1) à (M′4) de la page 4, sont : (M′1) $u^*(A) \in \mathcal{M}_I$ pour $A \in \mathcal{M}_J$ ; (M′2) $(u^*)^{-1}(B) \in \mathcal{M}_J$ pour $u$ surjective et $B \in \mathcal{M}_I$ ; (M′3) $(u^*)^{-1}(B) \cap A \in \mathcal{M}_J$ ; (M′4) $A \times B \in \mathcal{M}_{I \sqcup J}$ pour $A \in \mathcal{M}_I$, $B \in \mathcal{M}_J$. Le graphe d'une famille $F : R^I \to R^K$ au-dessus de $X \subset R^I$ est $\Gamma_F = \{(x, F(x)) \mid x \in X\} \subset R^{I \sqcup K}$. Une fonction $f : X \to R$ est modérée si son graphe est dans $\mathcal{M}_{I \sqcup \{*\}}$, et $R_0$ est l'ensemble des $c \in R$ tels que $\{c\} \in \mathcal{M}_{\{*\}}$. Un espace modéré est ici une partie modérée $X \in \mathcal{M}_I$, et des fonctions modérées $g_\beta$ le plongent si $x \mapsto (g_\beta(x))_\beta$ est injective sur $X$.

**Lemme 38.1** (pages 5 et 20)**.** *Soient $X \in \mathcal{M}_I$ et $f$, $g$ des fonctions modérées sur $X$.*

1. *Le graphe de $(f, g) : X \to R^2$ est modéré, ainsi que son image.*
2. *Si $F : R^I \to R^K$ a un graphe modéré au-dessus de $X$ et si $h$ est une fonction modérée sur $F(X)$, alors $h \circ F$ est modérée sur $X$.*
3. *Si $R$ est un anneau commutatif vérifiant (M11) b), $f - g$ et $fg$ sont modérées. Les constantes $c \in R_0$ et les coordonnées $x \mapsto x_i$ sont modérées sur $X$.*

*Seuls servent (M′1), (M′2), (M′4) et (M11) b).*

*Démonstration.* 1. Soit $w : (I \sqcup \{*\}) \sqcup (I \sqcup \{*\}) \to I \sqcup \{0, 1\}$ l'application qui envoie les deux copies de $I$ sur $I$, la première étoile sur $0$ et la seconde sur $1$ ; elle est surjective. Un $y \in R^{I \sqcup \{0,1\}}$

[39] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder120.lean`.

a son image $w^*(y)$ dans $\Gamma_f \times \Gamma_g$ si et seulement si $y|_I \in X$, $y_0 = f(y|_I)$ et $y_1 = g(y|_I)$ : la préimage de $\Gamma_f \times \Gamma_g$, modérée par (M′4) puis (M′2), est le graphe de $(f, g)$. Plus généralement, l'image $F(X)$ d'une famille de graphe modéré est la projection de ce graphe sur $R^K$, modérée par (M′1).

2. On forme $\Gamma_F \times \Gamma_h \subset R^{(I \sqcup K) \sqcup (K \sqcup \{*\})}$, modéré par (M′4), et on le tire en arrière par la surjection $(I \sqcup K) \sqcup (K \sqcup \{*\}) \to (I \sqcup K) \sqcup \{*\}$ qui identifie les deux copies de $K$ : on obtient, par (M′2), l'ensemble des $(x, F(x), h(F(x)))$, $x \in X$. Sa projection sur $R^{I \sqcup \{*\}}$, modérée par (M′1), est le graphe de $h \circ F$.

3. On applique le point 2 à $F = (f, g)$, dont l'image est modérée par le point 1, et à $h$ égale à $(z_0, z_1) \mapsto z_0 - z_1$ ou $z_0 z_1$, modérée sur cette image par (M11) b). Le graphe de la constante $c$ est $X \times \{c\}$, modéré par (M′4) ; celui de la coordonnée $x_i$ est l'image de $X$ par $u^*$, où $u : I \sqcup \{*\} \to I$ est l'identité sur $I$ et envoie $*$ sur $i$, modérée par (M′1). □

**Lemme 38.2** (pages 22 et 23, l'argument)**.** *Soient $R$ un anneau sans diviseur de zéro, $X$ un ensemble, $(f_\alpha)_{\alpha \in A}$ et $(g_\beta)_{\beta \in B}$ des familles quelconques de fonctions $X \to R$. La famille formée des $f_\alpha$ et des $f_\alpha g_\beta$ a pour lieu des zéros communs celui des $f_\alpha$. Si $x$ n'est pas un zéro commun des $f_\alpha$ et si un $g_\beta$ sépare $x$ et $y$, cette famille sépare $x$ et $y$.*

*Démonstration.* Un zéro commun des $f_\alpha$ annule les $f_\alpha g_\beta$. Pour la séparation, si un $f_\alpha$ sépare $x$ et $y$, c'est fini. Sinon $f_\alpha(x) = f_\alpha(y)$ pour tout $\alpha$ ; on choisit $\alpha$ avec $\lambda = f_\alpha(x) \neq 0$ et $\beta$ avec $g_\beta(x) \neq g_\beta(y)$. Alors $f_\alpha g_\beta(x) - f_\alpha g_\beta(y) = \lambda\,(g_\beta(x) - g_\beta(y))$ n'est pas nul, puisque $R$ n'a pas de diviseur de zéro. □

**Théorème 38.3** (Grothendieck, pages 22 et 23, écrasement sur un corps ♦)**.** *Supposons (M′1) à (M′4) et (M11), $R$ étant un corps. Soient $X \in \mathcal{M}_I$, des fonctions modérées $f_\alpha$ sur $X$ en nombre fini, des $e_\alpha \in R_0$, $Y = \bigcap_\alpha f_\alpha^{-1}(e_\alpha)$, et des fonctions modérées $g_\beta$ qui plongent $X$. Les fonctions $f_\alpha - e_\alpha$ et $(f_\alpha - e_\alpha)\, g_\beta$ sont modérées, ont $Y$ pour lieu des zéros communs, et séparent les points de $X \smallsetminus Y$. En particulier $Y$ est le lieu des zéros communs d'une famille finie de fonctions modérées qui sépare les points de $X \smallsetminus Y$ : la seconde moitié de (M6) découle de la première, et $X/Y$ est un espace modéré au sens strict.*

*Démonstration.* Par le lemme 38.1, la constante $e_\alpha$ est modérée parce que $e_\alpha \in R_0$, donc $f_\alpha - e_\alpha$ aussi, et les produits $(f_\alpha - e_\alpha)\, g_\beta$ le sont. Les zéros communs des $f_\alpha - e_\alpha$ forment $Y$. Pour $x \neq y$ dans $X \smallsetminus Y$, un $f_\alpha - e_\alpha$ ne s'annule pas en $x$, et comme les $g_\beta$ plongent $X$, l'un d'eux sépare $x$ et $y$ : le lemme 38.2 conclut. Pour l'énoncé d'existence, les coordonnées, modérées par le lemme 38.1, plongent $X$, et la famille est indexée par $A \sqcup (A \times I)$, qui est fini. □

*Remarque.* L'énoncé tient tel que la lecture le donne, et plus généralement. Ni (M′3), ni (M5) à (M7), ni les parties a) et c) de (M11), ni la finitude des familles ne servent ; de (M11), seule sert la partie b), sur un anneau commutatif sans diviseur de zéro. L'hypothèse d'intégrité ne peut être omise : sur $\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$, avec $f = 2$ et $g = \mathrm{id}$, la famille $2,\ 2x$ ne sépare pas $0$ et $2$, bien que $f(0) \neq 0$ et $g(0) \neq g(2)$. Les deux corrections de la lecture sont nécessaires. Sans $e_\alpha \in R_0$, la constante $e_\alpha$ n'est pas modérée et la translation n'est pas permise. Et une famille qui s'annule sur $Y$ ne sépare aucun couple de points de $Y$ : « sépare les points de $X$ » ne peut s'entendre que de $X \smallsetminus Y$.

Ne sont pas démontrés ici : la catégorie $\Sigma$ des espaces modérés et ses limites finies (pages 5 à 7), l'existence des sommes amalgamées le long des plongements modérés sous (M5′), (M6)

et (M7) (pages 12 et 13 ♦), les ind-espaces et la topologie des pages 14 à 19, et le programme de trivialité de la page 24. Autres pistes de l'onglet Findings pour ce thème, dans des cotes qui n'ont pas de section ici :

**Conjecture** (Grothendieck, pages 3 à 16, partition la plus grossière ♦). *Soit $\mathcal{F}$ une algèbre de Boole de parties d'un espace topologique, stable par adhérence, dont chaque membre contient un ouvert dense de son adhérence, et dans laquelle toute suite décroissante de membres fermés, chacun rare dans le précédent, aboutit à $\varnothing$. Toute sous-famille finie $\mathcal{L} \subset \mathcal{F}$ admet une partition finie en membres de $\mathcal{F}$ qui vérifie la condition de frontière et dont chaque élément de $\mathcal{L}$ est réunion de pièces, et parmi ces partitions une plus grossière que toutes les autres.*

Les feuillets en esquissent une démonstration incomplète (pages 8 et 14). L'existence y est démontrée, non le fait que la partition soit la plus grossière. Accessible avec la topologie générale et les algèbres de Boole de mathlib ; la preuve est longue. On se reportera aux notes de Grothendieck (121, lot 1, p. 3).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 144 et 145, quotients des feuilletages ; voir aussi Kock–Moerdijk 1992 ♦). *La catégorie des couples $(X, R)$, où $X$ est un espace topologique et $R$ une relation d'équivalence locale sur $X$, localement ouverte et à fibres localement connexes, est équivalente à celle des triplets $(X, \mathcal{Y}, f)$, où $\mathcal{Y}$ est une « multiplicité topologique » et $f : \mathrm{Top}(X) \to \mathcal{Y}$ un morphisme localement ouvert à fibres localement connexes.*

Mathlib n'a pas les relations d'équivalence locales ni les multiplicités topologiques. On se reportera aux notes de Grothendieck (119, lot 8, p. 144).

Partie 27

# Géométrie anabélienne et dessins

*Aucun énoncé de ce thème n'est démontré ici.* Les cotes de ce thème supposent le groupe fondamental profini des courbes et l'action de Galois sur les dessins d'enfants, absents de mathlib.

Cotes rangées sous ce thème par la carte : 81, 138, 140-1, 144, 146.

Pistes de l'onglet Findings pour ces cotes, hors de portée de Lean pour l'instant :

- Cote 138 : critère pour qu'une partie $A$ de la sphère définisse par image réciproque une nouvelle structure de carte : $A$ connexe, et $A$ contient au plus un des points $0$, $1$, $\infty$ ; telle qu'elle est lue, la seconde condition est contredite par l'exemple $A = [0,1]$. La lecture de la page est à vérifier sur le fac-similé. Mathlib n'a pas les cartes sur les surfaces ; la question relève d'abord de la lecture. On se reportera aux notes de Grothendieck (138, lot 7, p. 122). ♦

**Théorème** (Grothendieck, pages 22, 24 et 29, Picard du champ $[U_{0,3}/\mathfrak{S}_3]$ ♦)**.** *Soit $S$ régulier intègre avec* $\mathrm{Pic}(S) = 0$*. Le groupe de Picard du champ quotient $[(\mathbf{P}^1 - \{0,1,\infty\})_S/\mathfrak{S}_3]$, $\mathfrak{S}_3$ agissant par les substitutions anharmoniques, est $\mathbf{Z}/6$, engendré par $\mathcal{O}(1)$ sur $\mathbf{P}(V_J)$, en caractéristique générique $\neq 2$, et $\mathbf{Z}/3$ en caractéristique générique $2$.*

◊ *non vérifié en Lean*

**Conjecture** (Grothendieck, pages 122 à 124 et 127, opérations sur les cartes ♦)**.** *Une opération sur les cartes orientées donnée par une partie $A$ de la sphère de référence, tirée en arrière le long du revêtement $f : X \to S$ de chaque carte, est, sauf un cas exceptionnel, la composition avec un revêtement $\varphi : S \to S$ ramifié seulement au-dessus de $0$, $1$, $\infty$, avec $\varphi^{-1}\{0,1,\infty\} \supset \{0,1,\infty\}$ et une ramification $2$ au-dessus de $1$, de sorte que $A = \varphi^{-1}([0,1])$. La page demande ce qu'il advient dans le cas exceptionnel.*

Mathlib n'a pas les revêtements de Belyi de la sphère. On se reportera aux notes de Grothendieck (138, lot 7, p. 122).

**Conjecture** (Grothendieck, pages 70, 72 et 73, exposants trivialisants sur $M_{0,I}$ ♦)**.** *Sur $M_{0,I}$, avec $n = \mathrm{card}\, I = 4$, le plus petit exposant qui rend trivial, de façon compatible au groupe symétrique, le fibré $L = \bigotimes L_i$ est $3$, et celui des fibrés tangents $L_i$ est $6$ ; pour $n = 5$ et $6$, la table propose les valeurs $12$, $20$ et $60$, suivies de points d'interrogation.*

Mathlib n'a pas les espaces de modules $M_{0,n}$. On se reportera aux notes de Grothendieck (146, lot 4, p. 70).

**Partie 28**

# Ordres et géométrie des formes

## 39 Cote 156-1 : le modèle-segment est un biordre[40]

La cote 156-1, *[Chapitre] I. Vers une géométrie des formes (topologiques) : notes manuscrites (05/06/1986)*, vingt-six pages datées du 5 au 7 juin 1986, propose une axiomatique combinatoire des formes de dimension $1$. Elle se donne un ensemble $\mathcal{L}$ de *lieux*, un ensemble $S$ de *segments*, et pour chaque segment $I$ l'ensemble $\widetilde{I} \subset \mathcal{L}$ de ses lieux et la paire $\partial I \subset \widetilde{I}$ de ses extrémités. La troisième mouture, à partir de la page 5, pose les axiomes F1 à F5 (156-1, lot 1, p. 5, 156-1, lot 1, p. 7). La page 10 appelle *modèle-segment* un modèle où $\mathcal{L}$ est lui-même un segment. La page 11 y définit, à partir d'une extrémité $x_0$, la relation $x \preccurlyeq y$ par $x \in [x_0, y]$, et affirme que c'est un ordre (156-1, lot 1, p. 11). La page 12 énonce : « Cette relation d'ordre a un plus petit élément, $x_0$, et un plus grand élément, $x_1$. Elle permet de reconstituer la structure de modèle de 1-forme ». Les segments y sont les $[x, y]$, $x < y$, et l'ordre est « infiniment divisible » et « localement filtrante décroissante » ; la clause « filtrante croissante » est ajoutée entre les lignes et lue en partie. La page esquisse la réciproque sur une ligne qui porte plusieurs mots illisibles (156-1, lot 1, p. 12). La page 13 conclut qu'« une structure de modèle de segment équivaut à une structure de *biordre* » (156-1, lot 1, p. 13). Aucune des deux directions n'est démontrée sur la page.

*Conventions.* On écrit les axiomes comme la lecture les énonce, en notant $I_{x,z}$ le sous-segment de $I$ d'extrémités $x, z$ donné par F1 : un segment $J$ avec $\widetilde{J} \subset \widetilde{I}$ et $\partial J = \{x, z\}$. On pose $I^\circ = \widetilde{I} \setminus \partial I$, et un lieu est *régulier* s'il est intérieur à un segment.

F1 Si $x \in \partial I$ et $z \in \widetilde{I} \setminus \{x\}$, il existe un unique $I_{x,z}$.

F2 $I^\circ \neq \emptyset$ ; si $\partial I = \{x, y\}$ et $z \in I^\circ$, alors $\widetilde{I}_{x,z} \cap \widetilde{I}_{y,z} = \{z\}$, et tout segment $J$ avec $\widetilde{J} \subset \widetilde{I}$ et $z \in \partial J$ vérifie $\widetilde{J} \subset \widetilde{I}_{x,z}$ ou $\widetilde{J} \subset \widetilde{I}_{y,z}$.


F3 Si $x \in \partial I \cap \partial J$, il existe $u \in \widetilde{I} \setminus \{x\}$ et $v \in \widetilde{J} \setminus \{x\}$ avec $I_{x,u} = J_{x,v}$ ou $\widetilde{I}_{x,u} \cap \widetilde{J}_{x,v} = \{x\}$ (la forme de la marge).

F′3 Si $x \in \partial I$ et $u, v \in I^\circ$, il existe $w \in I^\circ$ avec $\widetilde{I}_{x,w} \subset \widetilde{I}_{x,u} \cap \widetilde{I}_{x,v}$ (la reconstruction de la lecture, d'après la note du bas de la page 6).

F4 Si $z$ est régulier, $\widetilde{I'} \cap \widetilde{I''} = \{z\}$, $\partial I' = \{x, z\}$ et $\partial I'' = \{y, z\}$, il existe un unique $I$ avec $\widetilde{I} \supset \widetilde{I'} \cup \widetilde{I''}$ et $\partial I = \{x, y\}$.

F5 Un lieu régulier est d'ordre $2$ : il existe deux segments issus de lui qui ne définissent pas la même branche, et tout segment issu de lui définit la même branche que l'un d'eux.

[40] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder156_1.lean`.




F2 : pour $z$ intérieur à $I$, les sous-segments $I_{x,z}$ et $I_{y,z}$ ne se rencontrent qu'en $z$. F4 est le sens inverse : deux segments qui ne se rencontrent qu'en un lieu régulier $z$ se recollent en un unique segment d'extrémités $x, y$.

Dans un modèle-segment, $\mathcal{L} = \widetilde{I_0}$ avec $\partial I_0 = \{x_0, x_1\}$, on pose $a \leq b$ si $a = b$ ou s'il existe un segment $J$ avec $\partial J = \{x_0, b\}$ et $a \in \widetilde{J}$ ; par l'unicité dans F1, un tel $J$ est $I_{0\,x_0,b}$, et l'on note $[x_0, b] = \widetilde{J}$. Un ensemble ordonné est *localement filtrant décroissant* si $x < y_1$ et $x < y_2$ entraînent l'existence de $y$ avec $x < y \leq y_1, y_2$, *localement filtrant croissant* dans l'énoncé dual.

**Théorème 39.1** (Grothendieck, pages 10 à 13, *le modèle-segment est un biordre* ♦). *Soit un modèle satisfaisant F1, F2, F′3 et F4, dont l'ensemble des lieux est un segment $I_0$, $\partial I_0 = \{x_0, x_1\}$. La relation $\leq$ est un ordre sur $\mathcal{L}$, de plus petit élément $x_0$ et de plus grand élément $x_1$, distincts ; il est dense, localement filtrant décroissant et localement filtrant croissant ; les segments sont exactement les intervalles $[a, b] = \{z \mid a \leq z \leq b\}$, $a < b$, avec $\partial = \{a, b\}$, chacun porté par un seul segment. L'ordre défini à partir de $x_1$ est l'ordre opposé.*
*Réciproquement, soit $\mathcal{L}$ un ensemble ordonné ayant un plus petit et un plus grand élément distincts, dense et localement filtrant dans les deux sens. Les intervalles $[a, b]$, $a < b$, avec $\partial[a, b] = \{a, b\}$, satisfont F1 à F5 et F′3, $\mathcal{L}$ est un segment, et l'ordre relu à partir du plus petit élément est l'ordre donné.*

*Démonstration du sens direct. Deux unicités.* Un segment $J$ avec $\partial J = \{x_0, b\}$ est unique : c'est F1 dans $I_0$, puisque $\widetilde{J} \subset \mathcal{L} = \widetilde{I_0}$. Pour la même raison, deux segments qui ont une extrémité dans $\{x_0, x_1\}$ et les mêmes extrémités sont égaux. Si $u, v \notin \{x_0, x_1\}$ et $\partial J = \partial K = \{u, v\}$, alors $u \in I_0^\circ$ ; F2 dans $I_0$ en $u$ place $\widetilde{J}$, et de même $\widetilde{K}$, dans $[x_0, u]$ ou dans $\widetilde{I}_{0\,x_1,u}$. S'ils tombent dans des sous-segments différents, $v$ est dans leur intersection, qui est $\{u\}$, ce qui est exclu ; s'ils tombent dans le même, F1 dans ce sous-segment, en son extrémité $u$, donne $J = K$. Ainsi *un segment est déterminé par ses extrémités* (le corollaire 3 a de la page 5).

*C'est un ordre.* Si $b \in [x_0, c]$, $b \neq x_0$, F1 dans le segment $[x_0, c]$ fournit un sous-segment d'extrémités $x_0, b$, qui est $[x_0, b]$ ; donc $[x_0, b] \subset [x_0, c]$, d'où la transitivité. Pour l'antisymétrie, soient $a \neq b$ avec $a \in [x_0, b]$ et $b \in [x_0, a]$ ; alors $a \neq x_0$ (aucun segment n'a $\{x_0\}$ pour bord), $[x_0, a] = [x_0, b]$ par ce qui précède, et $a$ est intérieur à $[x_0, b]$. F2 dans $[x_0, b]$ en $a$ dit que $[x_0, a]$ et le sous-segment d'extrémités $b, a$ ne se rencontrent qu'en $a$ ; or $b$ est dans les deux. On a $x_0 \leq a$ puisque $x_0 \in [x_0, a]$, et $a \leq x_1$ puisque $[x_0, x_1] = \mathcal{L}$ ; $x_0 \neq x_1$ parce que $\partial I_0$ a deux éléments.

*Recollement.* Soient $a$ un lieu régulier, $[x_0, a]$, et $Q$ un segment d'extrémités $a, z$ tel que $[x_0, a] \cap \widetilde{Q} = \{a\}$. F4 fournit un segment $G$ d'extrémités $x_0, z$ contenant $[x_0, a]$ ; donc $a \in [x_0, z]$, c'est-à-dire $a \leq z$.

*Les extrémités d'un segment sont comparables.* Soit $\partial J = \{u, v\}$. Si l'une est $x_0$ ou $x_1$, c'est clair. Sinon $u \in I_0^\circ$ et F2 place $\widetilde{J}$ dans $[x_0, u]$, d'où $v \leq u$, ou dans $P = \widetilde{I}_{0\,x_1,u}$. Dans le second cas, le sous-segment $Q$ de $P$ d'extrémités $u, v$ ne rencontre $[x_0, u]$ qu'en $u$, puisque $[x_0, u] \cap P = \{u\}$, et le recollement donne $u \leq v$.

*Un segment d'extrémités $a < b$ est l'intervalle* $[a, b]$. Si $a = x_0$, c'est la définition. Sinon, soit $K$ ce segment ; il est le sous-segment de $[x_0, b]$ d'extrémités $b, a$, par l'unicité. Le lieu $a$ est intérieur à $[x_0, b]$, et régulier (il est intérieur à $I_0$, car $a \neq x_1$). F2 dans $[x_0, b]$ en $a$ donne $[x_0, a] \cap \widetilde{K} = \{a\}$, et place tout sous-segment de $[x_0, b]$ issu de $a$ dans $[x_0, a]$ ou dans $\widetilde{K}$. Si $z \in \widetilde{K}$, $z \neq a$, le sous-segment de $K$ d'extrémités $a, z$ ne rencontre $[x_0, a]$ qu'en $a$, et le recollement donne $a \leq z$ ; et $z \leq b$ puisque $\widetilde{K} \subset [x_0, b]$. Inversement, soit $a < z < b$ ; alors $[x_0, z] \subset [x_0, b]$ contient $a$, et le sous-segment de $[x_0, z]$ d'extrémités $z, a$ est un sous-segment de $[x_0, b]$ issu de $a$. S'il était dans $[x_0, a]$, on aurait $z \leq a$, donc $z = a$ ; il est donc dans $\widetilde{K}$, et $z \in \widetilde{K}$. Un tel segment existe toujours : F1 dans $[x_0, b]$ en $b$ fournit le sous-segment d'extrémités $b, a$. Avec l'unicité, chaque intervalle $[a, b]$, $a < b$, est porté par un seul segment, et tout segment est un tel intervalle.

*Densité, filtrations.* Si $a < b$, F2 donne un lieu intérieur au segment $[a, b]$, strictement entre $a$ et $b$. Si $a < y_1$ et $a < y_2$, et si aucun des deux n'est $x_1$ (sinon l'autre convient), $y_1$ et $y_2$ sont intérieurs au segment $[a, x_1]$ ; F′3 en son extrémité $a$ fournit $w$ intérieur avec $[a, w] \subset [a, y_1] \cap [a, y_2]$, donc $a < w \leq y_1, y_2$. Dualement, F′3 appliqué au segment $[x_0, a]$ en son extrémité $a$ donne la filtration croissante.

*Biordre.* Pour l'ordre défini à partir de $x_1$, $a \leq_1 b$ signifie $a = b$, ou $a$ dans le segment d'extrémités $x_1, b$, qui est l'intervalle $[b, x_1]$ de l'ordre défini à partir de $x_0$ : c'est $b \leq a$. □

*Démonstration de la réciproque.* Un segment est un couple $a < b$, de lieux $[a, b]$ et de bord $\{a, b\}$ ; il est déterminé par son bord, la condition $a < b$ fixant l'ordre de la paire. F1 : le sous-segment de $[a, b]$ issu de $a$ d'autre extrémité $z$ est $[a, z]$, celui issu de $b$ est $[z, b]$. F2 : $]a, b[$ est non vide par densité ; si $a < z < b$, $[a, z] \cap [z, b] = \{z\}$, et un intervalle contenu dans $[a, b]$ qui a $z$ pour extrémité est $[z, c] \subset [z, b]$ ou $[c, z] \subset [a, z]$. F3 : si deux segments partent de $x$ vers le haut, $[x, b]$ et $[x, d]$, la filtration décroissante donne $y$ avec $x < y \leq b, d$, et $[x, y]$ est un début commun ; vers le bas, de même par la filtration croissante ; si l'un monte et l'autre descend, $[x, b] \cap [c, x] = \{x\}$. F′3 : si $x$ est l'extrémité inférieure de $[x, b]$ et $u, v \in ]x, b[$, la filtration décroissante donne $w$ avec $x < w \leq u, v$, d'où $[x, w] \subset [x, u] \cap [x, v]$ ; dualement en l'extrémité supérieure. F4 : si $[x, z]$ et $[y, z]$ sont tous deux sous $z$, la filtration croissante donne $w$ avec $x, y \leq w < z$, qui est dans l'intersection, exclu ; de même s'ils sont tous deux au-dessus ; sinon $x < z < y$ (ou l'inverse) et $[x, y]$ est l'unique segment d'extrémités $x, y$, qui contient $[x, z] \cup [z, y]$. F5 : si $a < x < b$, les segments $[a, x]$ et $[x, b]$ n'ont aucun point intérieur commun, donc ne définissent pas la même branche ; un segment $[x, d]$ définit la même branche que $[x, b]$ : la filtration donne $y$ avec $x < y \leq d, b$, la densité $z$ avec $x < z < y$, et $[x, z]$ est le sous-segment commun ; dualement pour $[c, x]$ et $[a, x]$. Enfin $[\bot, \top] = \mathcal{L}$, et $a \in [\bot, b]$ équivaut à $a \leq b$. □

*Remarque.* Le sens direct n'utilise ni F3 ni F5 : il suffit de F1, F2, F′3 et F4. F′3 donne les deux filtrations b) et b′), comme le dit l'esquisse de la lecture. F4, en un lieu régulier, fait de chaque intervalle un segment ; il intervient dès la comparabilité des extrémités d'un segment. Dans la réciproque, F4 vaut sans son hypothèse de régularité, et la densité et les deux filtrations suffisent à F1–F5 et F′3. Les bornes servent seulement à faire de $\mathcal{L}$ lui-même un segment.

*Remarque.* L'ordre n'est pas total en général, comme la lecture le souligne. Soit, sur $\mathbb{Q}^2$, l'ordre du cône ouvert, $p \prec q$ si $|q_2 - p_2| < q_1 - p_1$, et soit $T$ l'ensemble des points compris, pour cet ordre, entre $(0, 0)$ et $(2, 0)$. C'est un ensemble ordonné borné et dense (le milieu de $p \prec q$ est strictement entre eux). Il est localement filtrant dans les deux sens : si $x \prec y_1, y_2$, le point $x + (\varepsilon, 0)$ convient pour $\varepsilon > 0$ assez petit, et dualement $x - (\varepsilon, 0)$. Les points $(1, \frac{1}{2})$ et $(1, -\frac{1}{2})$

y sont incomparables. Ses intervalles forment donc un modèle-segment dont l'ordre n'est pas total.

Ne sont pas démontrés ici : les corollaires de F1 et F2 hors du modèle-segment et la transitivité de « même branche » ; les corollaires 1 et 2 de F4 et l'équivalence F5 $\Leftrightarrow$ F′5 ; la restriction (pages 8 et 9) ; l'orientation (pages 14 à 17) ; le contre-exemple de la page 21 et F6 ; les réseaux (pages 23 et 24) ; les pages 24 à 26.


## 40 Cote 156-3 : l'intermédiarité se lit sur les découpages[41]

La cote 156-3, chapitre III de *Vers une géométrie des formes*, quarante pages datées des 8 et 9 juin 1986, intitulée de sa main « Réseaux via découpages », propose une troisième axiomatique des réseaux. Elle se donne des lieux, les paires de lieux en position relative modérée, et pour chaque partie finie modérée $T$ le découpage de son complémentaire modéré $C(T)$ en composantes. La page 8 définit le *tronçon ordonné*. C'est un ensemble ordonné où, pour tout $a$, $\mathcal{L}_{>a}$ est filtrant décroissant et $\mathcal{L}_{<a}$ filtrant croissant (a, a′), qui est filtrant croissant et décroissant (b), divisible (c) et de cardinal $> 1$ (d). Les 0-sphères y sont les paires comparables $\varepsilon = \{a, b\}$, $a < b$, et les composantes de $C(\varepsilon)$ sont $\mathcal{L}_{<a}$, $]a, b[$ et $\mathcal{L}_{>b}$ (156-3, lot 1, p. 8). Les pages 11 à 13 montrent que l'intermédiarité stricte $\mathcal{R}$ et la comparabilité déterminent l'ordre à l'opposé près (156-3, lot 1, p. 11, 156-3, lot 1, p. 13). La page 14 pose le problème : « la connaissance de $\mathrm{Drap}_2(\mathcal{L})$, et […] de la décomp. de $C(\varepsilon)$ […] en composantes connexes, implique la connaissance de la relation $\mathcal{R}(a, b, c)$ » (156-3, lot 1, p. 14). La page 15 calcule les trois composantes attachées à $a < b < c$, $X_{\{a,b\}} = \mathcal{L}_{>b}$, $X_{\{b,c\}} = \mathcal{L}_{<b}$, $X_{\{c,a\}} = ]a, c[$. Elle trouve la première intersection vide et les deux autres non vides, « divisibilité ! », et conclut « On gagne ! » (156-3, lot 1, p. 15).

*Conventions.* Pour $a, b, c$ on note $\mathcal{R}(a, b, c)$ si $a < b < c$ ou $c < b < a$, et $\overline{\mathcal{R}}(a, b, c)$ si $a \leq b \leq c$ ou $c \leq b \leq a$. Pour $a \neq b$ comparables, $C(\{a, b\})$ est l'ensemble des éléments distincts de $a$ et $b$ et comparables aux deux ; deux de ses éléments sont dans le même *morceau* s'ils sont tous deux au-dessous de $a$ et $b$, tous deux strictement entre eux, ou tous deux au-dessus : la relation ne dépend que de la paire. On note $X_{\{a,b\}}(t)$ le morceau de $C(\{a, b\})$ qui contient $t$. La donnée de la page 14 est celle de la comparabilité et, pour chaque paire comparable, de la partition de $C(\varepsilon)$ en morceaux, sans étiquette ; une bijection $e$ entre deux ensembles ordonnés *respecte les découpages* si elle respecte la comparabilité et si, pour toute paire comparable $\{a, b\}$ et tous $s, t \in C(\{a, b\})$, $s$ et $t$ sont dans le même morceau de $C(\{a, b\})$ si et seulement si $e(s)$ et $e(t)$ sont dans le même morceau de $C(\{e(a), e(b)\})$.

**Énoncé** (Page 15). *Soient $a < b < c$ dans un ensemble ordonné. Alors $X_{\{a,b\}}(c) = \mathcal{L}_{>b}$, $X_{\{b,c\}}(a) = \mathcal{L}_{<b}$ et $X_{\{c,a\}}(b) = ]a, c[$. Si l'ordre est dense et si $p, q, r$ sont deux à deux distincts et comparables, $\mathcal{R}(p, q, r)$ a lieu si et seulement si $X_{\{p,q\}}(r) \cap X_{\{q,r\}}(p) = \emptyset$.*

Sur une chaîne $a < b < c$, chaque paire découpe le reste de la chaîne en trois morceaux : au-dessous, entre, au-dessus. Le trait épais est le morceau qui contient le troisième point.




[41] Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder156_3.lean`.

Les cercles blancs sont les deux points de la paire, exclus de $C(\varepsilon)$.

*Démonstration.* Si $b < t$ et $a < b$, un élément $s$ est dans le même morceau que $t$ exactement quand il est au-dessus de $a$ et de $b$ : $t$ n'est ni sous $a$ ni strictement entre $a$ et $b$. Un tel $s$ est dans $C(\{a,b\})$, d'où $X_{\{a,b\}}(c) = \mathcal{L}_{>b}$ ; de même $X_{\{b,c\}}(a) = \mathcal{L}_{<b}$, et, la relation étant symétrique en la paire, $X_{\{c,a\}}(b) = ]a,c[$. Trois éléments deux à deux distincts et comparables forment une chaîne, et l'un des six ordres possibles a lieu. Si $q$ est au milieu, les deux morceaux sont $\mathcal{L}_{>q}$ et $\mathcal{L}_{<q}$, disjoints. Si le milieu est $p$, disons $q < p < r$, les morceaux sont $\mathcal{L}_{>p}$ et $]q,r[$, qui contiennent tous deux un point de $]p,r[$, non vide par densité ; les quatre autres cas sont semblables. □

**Énoncé** (Pages 11 à 13)**.** *Soient deux ensembles ordonnés filtrants croissants et décroissants, et $e$ une bijection de l'un sur l'autre qui respecte la comparabilité et l'intermédiarité stricte. Alors $e$ est un isomorphisme d'ordres ou un anti-isomorphisme. Plus précisément, si $a < b$, on a $u \leq v$ si et seulement s'il existe $x$ et $y$, avec $x = a$ ou $\mathcal{R}(b,a,x)$, $y = b$ ou $\mathcal{R}(a,b,y)$, tels que $\overline{\mathcal{R}}(x,u,y)$, $\overline{\mathcal{R}}(x,v,y)$ et $\overline{\mathcal{R}}(x,u,v)$. Enfin, $\overline{\mathcal{R}}(a,b,c)$ équivaut à : $\mathcal{R}(a,b,c)$, ou $b \in \{a,c\}$ avec $a$ et $c$ comparables.*

*Démonstration.* La condition sur $x$ dit $x \leq a$, celle sur $y$ dit $y \geq b$. Si $u \leq v$, la filtration b) donne $x \leq u, a$ et $y \geq v, b$, et $x \leq u \leq v \leq y$ donne les trois conditions. Inversement, $x \leq a < b \leq y$ donne $x < y$ ; $\overline{\mathcal{R}}(x,u,y)$ ne peut alors avoir lieu que sous la forme $x \leq u \leq y$, et de même pour $v$ ; si $\overline{\mathcal{R}}(x,u,v)$ a lieu sous la forme $v \leq u \leq x$, alors $u = x$ et $v \leq x \leq v$, donc $u = v$ ; dans tous les cas $u \leq v$. La forme exacte de $\overline{\mathcal{R}}$ se vérifie cas par cas. Ainsi $\leq$ s'écrit à partir de $a$, $b$, de $\mathcal{R}$ et de la comparabilité seuls. Si l'ordre de départ n'a aucun couple $a < b$, c'est l'égalité, et la comparabilité respectée force l'égalité à l'arrivée. Sinon, soit $a < b$ ; $e(a)$ et $e(b)$ sont comparables et distincts. Si $e(a) < e(b)$, la description précédente, transportée par $e$, donne $u \leq v \Leftrightarrow e(u) \leq e(v)$. Si $e(b) < e(a)$, on remplace l'ordre d'arrivée par l'ordre opposé, qui a la même intermédiarité, la même comparabilité, et reste filtrant dans les deux sens. □

**Théorème 40.1** (Grothendieck, pages 11 à 15, *l'ordre se lit sur les découpages* ♦)**.** *Une bijection entre deux tronçons ordonnés qui respecte la comparabilité et, pour chaque paire comparable $\varepsilon$, la partition de $C(\varepsilon)$ en morceaux, est un isomorphisme d'ordres ou un anti-isomorphisme. La comparabilité seule n'y suffit pas : sur le tronçon $\mathbb{Q}$, la transposition de $0$ et $1$ respecte la comparabilité sans être ni croissante ni décroissante.*

*Démonstration.* D'après l'énoncé de la page 15, appliqué dans les deux tronçons, et parce que $e$ envoie le morceau $X_{\{p,q\}}(r)$ sur le morceau $X_{\{e(p),e(q)\}}(e(r))$, la bijection $e$ respecte l'intermédiarité stricte ; on conclut par l'énoncé des pages 11 à 13. Pour $\mathbb{Q}$, les conditions a) à d) sont immédiates (minimum, maximum, milieu) ; tout couple y est comparable, et la transposition $\sigma$ de $0$ et $1$ vérifie $\sigma(1) = 0 < 1 = \sigma(0)$, alors que $\sigma(1) = 0 < 2 = \sigma(2)$. □

*Remarque.* Des conditions de la page 8, seules la divisibilité c) et la filtration b) servent ; a), a′) et d) n'interviennent pas. La divisibilité rend non vides les deux autres intersections de la page 15. La filtration b) sert seulement dans le lemme des pages 11 à 13. Il n'est pas nécessaire de déduire $\mathrm{Drap}_2$ de $\mathcal{R}$, puisque la comparabilité fait partie des données de la page 14. L'énoncé vaut donc pour tout ensemble ordonné dense et filtrant dans les deux sens.

*Remarque.* La version large de l'intermédiarité est $\mathcal{R}(a,b,c)$, ou $b \in \{a,c\}$ *avec $a$ et $c$ comparables*. La forme « $\mathcal{R}(a,b,c)$ ou $b \in \{a,c\}$ » que la lecture substitue à la marge de la page 11

est fausse pour $a$ et $c$ incomparables. Dans $\mathbb{N}^2$ ordonné produit, $\overline{\mathcal{R}}((0,1),(0,1),(1,0))$ n'a pas lieu. Le lemme de la page 13 ne rencontre pas ce cas, puisqu'il est appliqué avec $x < y$.

*Remarque.* La reconstruction d'un ordre partiel, à l'opposé près, à partir de son intermédiarité stricte, objet des pages 11 à 13, est étudiée par Courcelle (2020, § 1 et théorème 7) [18], qui cite pour l'axiomatisation J. Lihová (2000). Les feuillets sont datés des 8 et 9 juin 1986.

Ne sont pas démontrés ici : les axiomes des réseaux par découpages (pages 1 à 5) ; les remarques de la page 16 ; les parties modérées fermées (pages 17 à 21) ; la topologie (pages 21 à 24) ; le bord et les pseudo-tronçons (pages 24 à 28) ; l'algèbre des parties modérées (pages 29 à 39).

# Bilan

## 41 Erreurs, pistes et énoncés restants

Les énoncés de chaque cote qui ne sont pas démontrés ici sont donnés à la fin de sa section. Les dix parties sans énoncé vérifié donnent la liste des pistes ouvertes de leurs cotes, cinquante-neuf en tout, chacune avec son losange rouge ♦. Dix autres parties finissent par quatre-vingt-huit pistes que leurs sections ne traitent pas, toutes de cotes sans section ici sauf une de la cote 77 et deux de la cote 136.

Les erreurs trouvées portent surtout sur les gloses modernes des lectures. Dans la cote 158, la glose de la proposition 1 était fausse. Dans la cote 114, la lecture omettait une hypothèse de la page. Dans la cote 156-3, une note de la lecture sur la page 11 identifie l'intermédiarité large à la stricte augmentée des extrémités ; cela ne vaut que pour des extrémités comparables, et l'ordre produit sur $\mathbb{N}^2$ le dément. Dans la cote 16, l'anneau universel $\Phi_0 = \mathbb{Z}[L_0, \Lambda_0]$ de la lecture n'existe pas sur $\mathbb{Z}$ pour $n \geqslant 2$, car $\xi_0^n$ est divisible par $n!$ ; l'obstruction disparaît sur $\mathbb{Q}$.

Deux erreurs sont sur la page elle-même, toutes deux dans la cote 19 : la nécessité dans le théorème 1.12 b), et la réserve « ou $I$ fini » de la page 7, un adjoint à gauche ne commutant pas en général aux produits finis. Dans la cote 16, le calcul confirme une erreur de la page 13 que la lecture relevait déjà, et dans la cote 78 les deux corrections que la lecture apporte au critère de fermeture : la conclusion $F_n(\alpha) = 0$ là où la page 112 écrit $= 1$, et le coefficient de Bézout de la page 113, faux pour $n = 4$. La page 3 de la cote 161-1 répète mot pour mot une de ses conditions. Dans la cote 104, la bonne fondation est une hypothèse supplémentaire, et $\mathbb{Z}$ vu comme catégorie montre qu'elle est nécessaire.

Les vingt-quatre pistes démontrées tiennent telles qu'elles sont écrites, souvent sous des hypothèses plus faibles. La cote 67 vaut pour un anneau non commutatif, et la cote 133 n'utilise pour la page 46 que $N' \subset \mathrm{Cent}(G)$. Dans la cote 106, quand tout objet est cofibrant, le foncteur $q'$ est un isomorphisme sans condition ; le critère $(\star\star)$ est alors toujours vérifié, et les deux membres de l'équivalence sont vrais. Dans la cote 84, la réciproque du corollaire de la page 86 demande le changement de base que la page écrit : sur $\mathbb{Z}[X]$, avec $b_1 = X$ et $b_2 = 0$, l'application est un isomorphisme alors que l'idéal $(2, X)$ est propre. L'hypothèse « $2$ régulier » de la page 48 est nécessaire : sur $\mathbf{F}_2$, $\mathbf{F}_2 \times \mathbf{F}_2$ et $\mathbf{F}_4$ ont le même discriminant et le même $T_0$. Dans la cote 77, l'unicité de la symétrie canonique (p. 123) demande une base connexe : sur un produit $R_1 \times R_2$, une isométrie peut être $\sigma$ sur un facteur et l'identité sur l'autre. Dans la cote 74, la phrase de la page 97 est fausse sans la condition marginale (Ka) : un carré latin d'ordre $2$ à revêtements triviaux satisfait les autres conditions et viole l'axiome 1. Dans la cote 79, l'énoncé sur l'étoile d'un sommet vaut sur tout anneau commutatif, sans l'hypothèse semi-locale, et la commutativité du groupe d'homothéties découle des autres conditions. Dans la cote 93, la translation par $t^2$ en caractéristique $2$, par $t^3$ en caractéristique $3$, change $G_0$ : le niveau $p^2$ est nécessaire, et la valeur test de la page 72 est $1/(4t^2)$, non $1/(2t)$. Sa rigidité, pour $\alpha = 0$, ne demande ni $\mathrm{Pic}(A) = 0$ ni $A$ local, et l'homographie a pour déterminant une unité : la normalisation $ad - bc = 1$ ajoutée à la page 121 est fausse ($s = 2t$ sur $\mathbf{F}_5$). Dans la cote 68, la bijectivité des applications de Stokes doit être posée en axiome, et l'axiome du demi-espace opposé ne sert qu'à l'existence. Dans la cote 70, les incidences de l'icosaèdre valent aussi en

caractéristiques $2$ et $5$, et la translation de la page 91 en caractéristique $2$ est $(\alpha', \alpha, \alpha)$, non $(\alpha', 1, 1)$. Dans la cote 86, la page 23 écrit $\{u, v\}$ là où le trièdre demande $\{u, v_1\}$, et l'étiquette « $\sigma_0\sigma_1$ » de la page 32 porte la valeur de $\sigma_0\sigma_2$. Dans la cote 44, la réserve de la piste se confirme : les trois axiomes de la page 4 ne donnent pas l'intégralité des nombres de Cartan, comme le montre un contre-exemple dans $\mathbb{Z}^2$ de groupe de Weyl $B_2$, alors que l'indivisibilité des racines la donne ; le système simple que la fiche invoquait ne l'est qu'à coefficients rationnels. Dans la cote 78, le critère $u_\alpha^n = 1 \iff F_n(\alpha) = 0$ vaut sur tout anneau commutatif et pour tout $n \in \mathbb{Z}$, et l'existence des deux $2p$-gones en bande, seule démontrée de la seconde piste, vaut en toute caractéristique, $p = 2$ et $p = 0$ compris. Dans la cote 40, les deux torseurs réguliers sont des anneaux de valuation discrète sur tout anneau de valuation discrète, sans complétude ni caractéristique, et l'anneau $A[T]/(T^n - X^2)$ n'en est un pour aucun $n \geq 2$. Dans la cote 136, la forme en degré $i$ du lemme binomial vaut sans l'hypothèse $i \leq N$, et sa démonstration se passe de localisation. Dans la cote 76, le lemme de surjectivité des drapeaux de type $H$ vaut sous les deux hypothèses de la note marginale de la page 28, pour tout $G$-ensemble et sans que les $\sigma_i$ soient des involutions.

Les énoncés restants demandent pour la plupart des théories classiques absentes de la bibliothèque : surfaces, dualité de Serre, complétion formelle, groupe fondamental d'une catégorie, lissité formelle, catégories $\mathrm{Ind}_\pi$, équivalences faibles des petites catégories, géométrie des sections hyperplanes. Les pistes des parties vides demandent surtout les schémas abéliens et les variétés abéliennes, la cohomologie étale et cristalline, la descente, les champs et les topos ; sept d'entre elles sont accessibles en tout ou en partie avec la bibliothèque actuelle.

## Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle

Les énoncés démontrés ici sont tirés des lectures modernisées du fonds. Celles-ci dérivent de transcriptions produites par des modèles de langage (Claude Opus 5, Opus 5.5, Fable 5 et Fable 5.1, d'Anthropic) sous des règles éditoriales écrites par l'auteur ; ces transcriptions n'ont pas été relues en entier par une personne. Les preuves formelles ont été écrites en Lean 4 par Claude Opus 5.5, sous la direction de l'auteur, et Lean en vérifie mécaniquement la correction contre la bibliothèque mathlib. Le même modèle en a tiré les démonstrations rédigées de cette annexe. L'auteur a relu le choix des énoncés, les corrections apportées aux lectures et le texte, et en assume l'entière responsabilité. Lean garantit qu'un énoncé tient sous les hypothèses écrites. Il ne garantit ni que l'énoncé rend fidèlement le feuillet, ni qu'il est nouveau.

## Références


[1] J. Adámek et J. Rosický, *Locally Presentable and Accessible Categories*, London Mathematical Society Lecture Note Series 189, Cambridge University Press, 1994.

[2] M. Artin, A. Grothendieck et J.-L. Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas (SGA 4)*, tome 1, Lecture Notes in Mathematics 269, Springer, Berlin, 1972.

[3] R. Baer, « Abelian groups that are direct summands of every containing abelian group », *Bulletin of the American Mathematical Society* 46 (1940), 800–806.

[4] H. Bass, « $K$-theory and stable algebra », *Publications mathématiques de l'IHÉS* 22 (1964), 5–60.

[5] H. J. Baues, *Algebraic Homotopy*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 15, Cambridge University Press, 1989.

[6] A. Beauville, « Finite subgroups of $\mathrm{PGL}_2(K)$ », dans *Vector Bundles and Complex Geometry*, Contemporary Mathematics 522, American Mathematical Society, Providence, 2010, 23–29.

[7] J. Beck, *Triples, Algebras and Cohomology*, thèse, Columbia University, 1967 ; réimpression, *Reprints in Theory and Applications of Categories* 2 (2003), 1–59.

[8] J. Bénabou et J. Roubaud, « Monades et descente », *Comptes rendus de l'Académie des sciences, Paris, série A* 270 (1970), 96–98.

[9] R. Bhatia, *Matrix Analysis*, Graduate Texts in Mathematics 169, Springer, New York, 1997.

[10] F. Borceux, *Handbook of Categorical Algebra 1. Basic Category Theory*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications 50, Cambridge University Press, 1994.

[11] J. Borger et B. Wieland, « Plethystic algebra », *Advances in Mathematics* 194 (2005), 246–283.

[12] K. S. Brown, « Abstract homotopy theory and generalized sheaf cohomology », *Transactions of the American Mathematical Society* 186 (1973), 419–458.

[13] P.-J. Cahen et J.-L. Chabert, *Integer-Valued Polynomials*, Mathematical Surveys and Monographs 48, American Mathematical Society, Providence, 1997.

[14] S. U. Chase, « Direct products of modules », *Transactions of the American Mathematical Society* 97 (1960), 457–473.

[15] D.-C. Cisinski, *Les préfaisceaux comme modèles des types d'homotopie*, Astérisque 308, Société mathématique de France, 2006.

[16] B. Conrad, « Reductive group schemes », dans *Autour des schémas en groupes I*, Panoramas et Synthèses 42–43, Société mathématique de France, 2014, 93–444.

[17] R. Cori, *Un code pour les graphes planaires et ses applications*, Astérisque 27, Société mathématique de France, 1975.

[18] B. Courcelle, « Betweenness of partial orders », *RAIRO – Theoretical Informatics and Applications* 54 (2020), article 7 ; arXiv :2004.09777.

[19] H. S. M. Coxeter et W. O. J. Moser, *Generators and Relations for Discrete Groups*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 14, Springer, Berlin, 1957.

[20] L. de Moura et S. Ullrich, « The Lean 4 theorem prover and programming language », dans *Automated Deduction – CADE 28*, Lecture Notes in Computer Science 12699, Springer, 2021, 625–635.

[21] J. Elliott, « Birings and plethories of integer-valued polynomials », *Actes des rencontres du CIRM* 2 (2010), n° 2, 53–58 ; version développée, arXiv :1109.3848.

[22] K. Fan, « Maximum properties and inequalities for the eigenvalues of completely continuous operators », *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 37 (1951), 760–766.

[23] D. Ferrand, « Sur les modules qui sont limite projective de leurs localisés », *Comptes rendus de l'Académie des sciences, Paris, série A* 262 (1966), 609–611.

[24] P. Gabriel et F. Ulmer, *Lokal präsentierbare Kategorien*, Lecture Notes in Mathematics 221, Springer, Berlin, 1971.

[25] P. Gabriel et M. Zisman, *Calculus of Fractions and Homotopy Theory*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete 35, Springer, Berlin, 1967.

[26] A. Grothendieck, avec la collaboration de J. Dieudonné, « Éléments de géométrie algébrique IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas (première partie) », *Publications mathématiques de l'IHÉS* 20 (1964), 101–355.

[27] Google DeepMind, *Formal Conjectures*, dépôt GitHub, fichier `FormalConjectures/Wikipedia/ResolutionOfSingularities.lean`, consulté le 17 octobre 2026, `https://github.com/google-deepmind/formal-conjectures`.

[28] R. Hartshorne, *Ample Subvarieties of Algebraic Varieties*, Lecture Notes in Mathematics 156, Springer, Berlin, 1970.

[29] H. Hasse et F. K. Schmidt, « Noch eine Begründung der Theorie der höheren Differentialquotienten in einem algebraischen Funktionenkörper einer Unbestimmten », *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 177 (1937), 215–237.

[30] A. Jacques, « Sur le genre d'une paire de substitutions », *Comptes rendus de l'Académie des sciences, Paris, série A* 267 (1968), 625–627.

[31] G. A. Jones et D. Singerman, « Theory of maps on orientable surfaces », *Proceedings of the London Mathematical Society* (3) 37 (1978), 273–307.

[32] M. Karoubi, « Algèbres de Clifford et K-théorie », *Annales scientifiques de l'École normale supérieure* (4) 1 (1968), 161–270.

[33] H. Lenzing, « Endlich präsentierbare Moduln », *Archiv der Mathematik* 20 (1969), 262–266.

[34] É. Lucas, « Théorie des fonctions numériques simplement périodiques », *American Journal of Mathematics* 1 (1878), 184–240 et 289–321.

[35] G. Maltsiniotis, *La théorie de l'homotopie de Grothendieck*, Astérisque 301, Société mathématique de France, 2005.

[36] The mathlib Community, « The Lean mathematical library », dans *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, ACM, 2020, 367–381.

[37] K. Morita, « Duality for modules and its applications to the theory of rings with minimum condition », *Science Reports of the Tokyo Kyoiku Daigaku, Section A* 6 (1958), 83–142.

[38] G. Pólya, « Über ganzwertige Polynome in algebraischen Zahlkörpern », *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 149 (1919), 97–116.

[39] N. Popescu et P. Gabriel, « Caractérisation des catégories abéliennes avec générateurs et limites inductives exactes », *Comptes rendus de l'Académie des sciences, Paris* 258 (1964), 4188–4190.

[40] D. Rees, « Two classical theorems of ideal theory », *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 52 (1956), 155–157.

[41] E. Riehl et D. Verity, *Elements of $\infty$-Category Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 194, Cambridge University Press, 2022.

[42] D. Singerman et J. Strudwick, « The Farey maps modulo $N$ », *Acta Mathematica Universitatis Comenianae* 89 (2020), 39–52 ; arXiv :1803.08851.

[43] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, `https://stacks.math.columbia.edu`.

[44] D. O. Tall et G. C. Wraith, « Representable functors and operations on rings », *Proceedings of the London Mathematical Society* (3) 20 (1970), 619–643.

[45] J. Voight, « Discriminants and the monoid of quadratic rings », *Pacific Journal of Mathematics* 283 (2016), 483–510.