

Annexe. Énoncés des lectures modernisées démontrés

Michel Hua

Chercheur indépendant, Paris

michel@commutator.io

Octobre 2026

Résumé

Les lectures modernisées du fonds Grothendieck de Montpellier reformulent les notes de travail en langage actuel. Elles dérivent de la transcription et peuvent se tromper. Cette annexe démontre des énoncés de ces lectures dans vingt-cinq cotes, en algèbre commutative, géométrie algébrique, théorie des catégories et des groupes, algèbre homotopique, théorie des ordres, algèbre et combinatoire finie. Chaque démonstration suit une preuve vérifiée dans l'assistant de preuve Lean 4. Pour chaque énoncé, l'annexe donne le contexte du feuillet, la démonstration, les hypothèses superflues ou nécessaires et les corrections apportées à la lecture ou à la page. Elle se clôt sur la liste des énoncés de ces cotes qui ne sont pas démontrés.

Table des matières

Introduction	3
I Cycles algébriques et conjectures standard	5
1 Cote 16 : le pseudo-inverse de l'opérateur de Lefschetz et la normalisation de $\mathrm{sl}(2)$	5
II Algèbre universelle et théories	10
2 Cote 161-2 : monadicité, descente, caractérisation de Gabriel–Ulmer	10
III Analyse fonctionnelle	12
3 Cote 113 : l'enveloppe de Karoubi et l'invariance de Morita	12
IV Théorie de la dualité	14
4 Cote 125 : la carte des équivalences et le lemme du feuillet III-18	14
V Algèbre commutative	16

5	Cote 21 : injectifs de I -torsion (proposition 2.15 et corollaire 2.16)	17
6	Cote 22 : produits de modules plats (lemme 3.3, corollaires 3.4 et 3.5)	19
7	Cote 67 : modules à involution et triples (P, Q, m)	21
VI Catégories et foncteurs		23
8	Cote 19 : le théorème de comonadicité 1.12, la comonade sur une base produit et le théorème de Gabriel–Popescu	23
9	Cote 133 : le centre et le groupe dérivé vus par deux modules croisés	28
10	Cote 161-1 : la partie fixe d’une adjonction, les adjonctions idempotentes, les objets locaux	31
VII Géométrie formelle, modules et représentabilité		36
11	Cote 39 : le théorème de préparation «formel», cas adique et cas discret	37
12	Cote 41 : continuité de la section générique et ouverture (proposition 1)	38
13	Cote 42 : familles cohérentes de germes, le lemme 1 et le lemme 2	40
VIII K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch		44
14	Cote 153 : polynômes à valeurs entières, co-opérations, analyseurs	44
IX Schémas en groupes et groupes algébriques		49
15	Cote 84 : le produit des algèbres quadratiques, en coordonnées	50
X Topologie combinatoire, surfaces et cartes		52
16	Cote 152 : le dictionnaire des graphes circularisés et des contours	53
17	Cote 88 : l’ordre 2ν et la trichotomie des cartes standard	54
18	Cote 77 : le discriminant universel modulo 2 et modulo 4	56
19	Cote 85 : l’invariant d’une rotation d’ordre 5	59
XI Théorie de l’homotopie et catégories tests		61
20	Cote 106 : catégories à cofibrations, factorisation de Brown et critère $(\star\star)$	61

21 Cote 114 : les localisateurs fondamentaux et la proposition 4	65
22 Cote 158 : la proposition 1 sur les monoïdes finis	68
23 Cote 104 : catégories de modèles, trois exemples, un complexe globulaire	70
XII Ordres et géométrie des formes	73
24 Cote 156-1 : le modèle-segment est un biordre	74
25 Cote 156-3 : l'intermédiarité se lit sur les découpages	77
Bilan	79
26 Énoncés restant à démontrer	79
Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle	83

Introduction

Les énoncés qui suivent sont ceux des lectures modernisées, qui restituent en notation actuelle le contenu de la transcription. Chaque démonstration suit une preuve vérifiée mécaniquement en Lean 4, citée en note au titre de la section. Elle établit que l'énoncé tient sous les hypothèses écrites. Elle ne dit pas que la lecture est fidèle à la page.

Ces preuves sont modestes à côté d'autres travaux récents. Le 6 octobre 2026, OpenAI a publié 719 manuscrits produits par un modèle interne, non relus par des pairs, dont une partie s'accompagne de formalisations en Lean 4¹. Quatre familles de ces manuscrits annoncent des énoncés issus du programme de Grothendieck : l'hypothèse d'homotopie ; la conjecture des sections, p -adique locale, et sur $\mathbb{Q}$ pour les courbes modulaires $X_0(N)$ et $X_1(N)$ de genre au moins deux ; la conjecture de Deligne–Drinfeld sur l'algèbre de Lie de Grothendieck–Teichmüller ; la conjecture de Hodge pour les variétés abéliennes à multiplication complexe et, par des théorèmes de Milne, la conjecture standard de type Hodge pour les variétés abéliennes. Deux seulement sont formalisées, en partie. Pour Deligne–Drinfeld, la formalisation établit la liberté de l'algèbre de Lie des solutions rationnelles de l'antisymétrie, de la relation à trois termes et du pentagone à quatre brins, munie du crochet d'Ihara, avec un générateur en chaque poids impair au moins égal à 3, et l'isomorphisme continu après complétion par le poids. Le transport régularisé et les conséquences pour le complexe des graphes n'y sont pas. Pour l'hypothèse d'homotopie, elle se borne à un théorème intermédiaire, rappelé dans la partie sur l'homotopie. Le projet n'a ni compilé ni vérifié ce code ; ce qui en est dit vient de ses pages de description. Les énoncés de l'annexe sont élémentaires, le plus souvent classiques, et aucun n'est une conjecture de Grothendieck.

Les vingt-cinq cotes sont celles où une lecture énonce un résultat net dans un domaine élémentaire. Pour sept d'entre elles (67, 77, 84, 85, 133, 156-1 et 156-3), cet énoncé est une piste de l'onglet Findings. Pour cinq autres (19, 161-2, 16, 106 et 114), il se détache

¹<https://github.com/openai/math>, consulté le 10 octobre 2026. La portée des formalisations citées ici est celle que décrivent ses pages `lean/docs/008.md` et `lean/docs/312.md`.

d'une théorie plus vaste (comonades et topos, catégories localement présentables, conjectures standard, localisation homotopique), et seul l'énoncé détaché est démontré. Motifs, catégories tannakiennes, schémas abéliens, dérivateurs et cohomologie étale sont exclus.

Chaque cote a sa section, et les sections suivent l'ordre chronologique des thèmes. Les thèmes sont ceux de la carte des mathématiques du fonds que publie le site (« A map of the mathematics in the fonds »), qui classe les mots-clés des lectures sous une trentaine de sujets. Une cote est rangée sous le sujet qui porte le plus de ses mots-clés et, à égalité, sous celui dont relève l'énoncé démontré. La date d'un thème est celle de la carte : la moyenne, sur ses cotes, du milieu de leur datation par l'inventaire. Cette moyenne indique une tendance. Dans un thème, les cotes suivent leur propre datation, et les cotes non datées viennent en dernier.

On trouve ainsi, en parties successives : cycles algébriques et conjectures standard (vers 1966), la cote 16 (§ 1) ; algèbre universelle et théories (vers 1968), la cote 161-2 (§ 2) ; analyse fonctionnelle (vers 1968), la cote 113 (§ 3) ; théorie de la dualité (vers 1969), la cote 125 (§ 4) ; algèbre commutative (vers 1970), les cotes 21 (§ 5), 22 (§ 6) et 67 (§ 7) ; catégories et foncteurs (vers 1970), les cotes 19 (§ 8), 133 (§ 9) et 161-1 (§ 10) ; géométrie formelle, modules et représentabilité (vers 1970), les cotes 39 (§ 11), 41 (§ 12) et 42 (§ 13) ; K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch (vers 1970), la cote 153 (§ 14) ; schémas en groupes et groupes algébriques (vers 1972), la cote 84 (§ 15) ; topologie combinatoire, surfaces et cartes (vers 1973), les cotes 152 (§ 16), 88 (§ 17), 77 (§ 18) et 85 (§ 19) ; théorie de l'homotopie et catégories tests (vers 1976), les cotes 106 (§ 20), 114 (§ 21), 158 (§ 22) et 104 (§ 23) ; ordres et géométrie des formes (1986), les cotes 156-1 (§ 24) et 156-3 (§ 25). Le rangement suit le vocabulaire de la carte : l'invariance de Morita de la cote 113 relève ainsi de l'analyse fonctionnelle, par le produit tensoriel des catégories linéaires.

Chaque section donne le contexte du feuillet, les définitions que la lecture laisse implicites, l'énoncé tel que la lecture le donne, sa démonstration et des remarques : hypothèses superflues ou nécessaires, contre-exemples, corrections de la lecture ou de la page. Les énoncés des cotes qui ne sont pas démontrés ici sont rassemblés dans le tableau de la section 26.

Le losange $\blacklozenge$ n marque un énoncé lié au théorème numéroté n de la frise des œuvres du site (« The works, on the same years »), qui place ses principaux théorèmes à l'année de l'article ou de l'exposé qui les démontre. Trois énoncés le portent. Le feuillet 2 de la cote 125 enchaîne cohomologie locale, complétion formelle et dualité. Il relève de la dualité cohérente et de la géométrie formelle (théorème 6, Séminaire Bourbaki n° 149 et 195, EGA III₁) et des théorèmes de Lefschetz par la cohomologie locale (SGA 2, théorème 9). La proposition 2.15 de la cote 21 invoque le critère de Baer sous le nom de « Tohoku », et l'énoncé des pages 14 et 15 de la cote 19 porte sur une catégorie de Grothendieck à générateur ; tous deux relèvent de l'article de Tôhoku (théorème 4). Le lien porte sur le sujet ; aucun de ces énoncés n'est un théorème de la frise.

Le losange rouge $\color{red}\blacklozenge$ marque les énoncés, démontrés ou non, que l'onglet Findings du site retient comme pistes. Ce sont des énoncés du dossier qui pourraient manquer à la littérature publiée, soit que la recherche n'en ait rien trouvé dans les sources lues (« candidate »), soit qu'elle reste à faire (« unsearched »). Une piste n'est ni un résultat établi ni une affirmation de priorité. Le losange renvoie à sa fiche, qui dit ce qui a été cherché et ce qui trancherait. Onze pistes sont démontrées ici, dans les cotes 16, 19, 67, 77, 84 (deux pistes, la seconde en coordonnées scindées), 106, 133, 158, 156-1 et 156-3. Quatre autres ne le sont qu'en partie : deux pistes de la cote 16, l'une pour les seuls projecteurs de la graduation, l'autre parce que l'anneau Φ_0 de la lecture n'existe pas sur $\mathbb{Z}$; l'identité de la cote 77 en rang pair, démontrée en

rangs 2 et 4 ; le classement de la cote 85, dont seul le calcul de l'invariant est démontré. Une preuve établit que l'énoncé tient tel qu'il est écrit. Elle ne dit pas qu'il manque à la littérature, et la piste reste ouverte sur ce point. Les autres énoncés démontrés sont des résultats classiques, des lemmes ou des corrections de la lecture.

Sous le titre de chaque partie, quand le fonds en conserve, un paragraphe donne les lettres datées qui situent la partie dans le temps, chacune avec sa cote, son lot et sa page, d'après les registres du site. Dans deux parties, une ligne *Ailleurs* signale des formalisations extérieures au projet qui touchent leur thème. L'annexe laisse au lecteur trois questions. La première est de savoir si l'énoncé démontré est juste tel qu'il est écrit, puisque Lean n'établit que sa validité sous les hypothèses écrites. La deuxième est de savoir s'il lui manque une hypothèse ou s'il en porte une de trop. La troisième est de savoir s'il figure déjà dans la littérature, et où. Pour les pistes, seule la troisième se pose. La fidélité de la lecture au feuillet demande le fac-similé et relève d'un autre travail.

Première partie

Cycles algébriques et conjectures standard

Le 27 août 1965, il énonce pour Serre les conjectures standard A, A', A'' et B (14, lot 3, p. 43). La cote 16 garde deux lettres à John Coates, datées de sa main du 6.1.1966 et du 4.1.1967 (16, lot 3, p. 47, 16, lot 3, p. 43). La première donne des formes équivalentes de la conjecture C ; la seconde situe la conjecture de l'indice et l'indépendance des conjectures à l'égard de la polarisation. Les anneaux gradués étudiés ici sont rangés dans le même dossier.

Ailleurs : le dépôt d'OpenAI cité dans l'introduction annonce la conjecture de Hodge rationnelle pour les variétés abéliennes à multiplication complexe. Il en tire, par des théorèmes de Milne, la conjecture standard de type Hodge pour les variétés abéliennes en toute caractéristique, qui est la conjecture B de la lettre à Serre, celle de positivité (14, lot 3, p. 44). Ces énoncés ne sont pas relus et ne sont pas formalisés ; trois manuscrits voisins, sur les classes de Weil et les surfaces K3, ont été retirés le 7 octobre 2026. La cote 16 ne donne lieu ici qu'à des identités d'algèbre sur l'opérateur Λ , sans lien de démonstration avec ces conjectures.

1 Cote 16 : le pseudo-inverse de l'opérateur de Lefschetz et la normalisation de $\mathfrak{sl}_2^2$

La cote 16, *Formalisme algébrique des correspondances et algèbres de Poincaré-Hodge (cf conjectures standard) : notes manuscrites (s.d.), tapuscrit annoté (s.d.), lettres (1966-1967)*, compte cinquante-cinq pages datées « 1966-1967 ». Elle s'ouvre sur un cahier, « Sur certains anneaux gradués » (pages 2 à 17), qui cherche à quelles conditions l'opérateur Λ et les projecteurs de la décomposition primitive appartiennent à un anneau gradué $\mathcal{E}$ muni d'un L de degré 2. La page 9 fixe Λ par les relations (6.7) (16, lot 1, p. 9), que la page 13 reprend sous le numéro (6.15). La même page pose sur une algèbre extérieure le modèle $L_0x = \xi_0x$, $\Lambda_0x = \xi_0^* \lrcorner x$, et écrit que « Λ_0 est l'opérateur associé défini par (6.15) » (16, lot 1, p. 13).

²Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder16.lean.

Le dossier ne mentionne jamais $\mathfrak{sl}_2$. La lecture compare les deux normalisations de Λ ; cette comparaison, purement algébrique, est démontrée ici.

Conventions. Les relations (6.7) sont

$$L\Lambda = 1 - \sum_{0 \leq i \leq n} \pi_{i,0}, \quad \Lambda L = 1 - \sum_{n \leq i \leq 2n} \pi_{i,0},$$

où $\pi_{i,0}$ est la projection de M^i sur sa partie primitive (pour $i \leq n$) ou sur le sommet de chaîne correspondant (pour $i \geq n$). Pour la normalisation de Hodge, on se donne un anneau commutatif R , une algèbre de Lie sur R contenant un triplet (H, Λ, L) tel que $[H, \Lambda] = 2\Lambda$, $[H, L] = -2L$ et $[\Lambda, L] = H$, et une représentation M ; on note $\Lambda y, Ly, Hy$ l'action. Un vecteur $x \neq 0$ est *primitif de poids* μ si $\Lambda x = 0$ et $Hx = \mu x$. Avec la convention $[L, \Lambda] = H$ de la lecture, une classe de degré i a pour poids $i - n$; on a pris ici l'opposé, de sorte qu'une classe primitive de degré i a pour poids $\mu = n - i$.

Énoncé (Page 9, la comparaison de la lecture). *Le Λ de (6.7) n'est pas celui de la théorie de Hodge, qui agit sur $L^k P^i$ par des scalaires entiers non triviaux : sur une classe primitive x de degré i , on a $\Lambda Lx = (n - i)x$, et non x .*

Énoncé (Page 16, le commutateur). *Avec un Λ normalisé en pseudo-inverse par (6.7), le commutateur vaut*

$$[L, \Lambda] = \sum_{n \leq i \leq 2n} \pi_{i,0} - \sum_{0 \leq i \leq n} \pi_{i,0}$$

et ne retient que les extrémités des chaînes.

Énoncé (Page 13, le modèle extérieur). *Soient M_0 libre de base $e_1, \dots, e_{2n}$ sur R , $\xi_0 = \sum_{j=1}^n e_{2j-1} \wedge e_{2j}$ et $\xi_0^* = \sum_{j=1}^n e_{2j-1}^* \wedge e_{2j}^*$. Sur l'algèbre extérieure ΛM_0 , $\Lambda_0 L_0(1) = \langle \xi_0^*, \xi_0 \rangle = n$, alors que (6.15) exige 1 ; l'identification des deux Λ_0 ne vaut donc que pour $n = 1$.*

Lemme 1.1. *Soit x un vecteur primitif de poids μ et $x_k = L^k x$. Pour tout $k \geq 0$,*

$$Hx_k = (\mu - 2k)x_k, \quad \Lambda x_{k+1} = (k+1)(\mu - k)x_k;$$

en particulier $\Lambda Lx = \mu x$.

Démonstration. La relation $[H, L] = -2L$ donne $H(Ly) = L(Hy) - 2Ly$ pour tout y , d'où la première formule par récurrence sur k , à partir de $Hx = \mu x$. La relation $[\Lambda, L] = H$ donne $\Lambda(Ly) = L(\Lambda y) + Hy$. Montrons par récurrence que $\Lambda x_k = k(\mu - k + 1)x_{k-1}$ pour $k \geq 1$, et $\Lambda x_0 = 0$. C'est vrai pour $k = 0$ par primitivité. Si c'est vrai pour k , alors

$$\Lambda x_{k+1} = L(\Lambda x_k) + Hx_k = (k(\mu - k + 1) + \mu - 2k)x_k = (k+1)(\mu - k)x_k.$$

Pour $k = 0$, c'est $\Lambda Lx = \mu x$. □

Démonstration de la comparaison de la page 9. Pour une classe primitive x de degré i , de poids $\mu = n - i$, le lemme 1.1 donne $\Lambda Lx = (n - i)x$ et, plus généralement, Λ agit sur $L^{k+1}x$

par l'entier $(k+1)(n-i-k)$. Supposons de plus R intègre, M sans torsion, et $\Lambda Lx = x$, comme (6.7) le demande au bas d'une chaîne. Alors $(\mu-1)x = \Lambda Lx - x = 0$ avec $x \neq 0$, donc $\mu = 1$, c'est-à-dire $i = n-1$. $\square$

Démonstration de la formule du commutateur. Dans tout anneau où L et Λ vérifient (6.7), on soustrait les deux relations : $L\Lambda - \Lambda L = \sum_{n \leq i \leq 2n} \pi_{i,0} - \sum_{0 \leq i \leq n} \pi_{i,0}$. $\square$

Démonstration de la formule du modèle extérieur. Notons ι_α la contraction par une forme linéaire α , antidérivation de ΛM_0 telle que $\iota_\alpha(v) = \alpha(v)$ pour $v \in M_0$, et convenons que la contraction par $\alpha \wedge \beta$ est $\iota_\beta \circ \iota_\alpha$. Alors $L_0(1) = \xi_0$ et

$$\Lambda_0 L_0(1) = \sum_{j,l=1}^n \iota_{e_{2j}}^* \iota_{e_{2j-1}}^* (e_{2l-1} \wedge e_{2l}).$$

On a $\iota_{e_{2j-1}}^* (e_{2l-1} \wedge e_{2l}) = e_{2j-1}^* (e_{2l-1}) e_{2l} - e_{2j-1}^* (e_{2l}) e_{2l-1} = \delta_{jl} e_{2l}$, puis $\iota_{e_{2j}}^* (\delta_{jl} e_{2l}) = \delta_{jl}$. La somme vaut donc n , c'est-à-dire $n \cdot 1 \in \Lambda^0 M_0 = R$. Si R est de caractéristique nulle et $n \neq 1$, $n \cdot 1 \neq 1$, et $\Lambda_0 L_0(1) \neq 1$. $\square$

Remarque. Le Λ de $\mathfrak{sl}_2$ ne vérifie la relation $\Lambda Lx = x$ de (6.7) que sur les classes primitives de degré $n-1$; ailleurs les deux normalisations diffèrent d'un facteur entier, que le pseudo-inverse évite, ce qui permet au dossier de rester sur $\mathbb{Z}$.

Remarque. Le calcul confirme la correction que la lecture apporte à la page 13 : la contraction $\xi_0^* \lrcorner$ n'est pas l'opérateur que caractérisent les relations (6.15) dès que $n \geq 2$. L'erreur est sur la page ; elle est sans effet sur la Proposition qui suit, qui n'utilise que (6.15).

Le n° 4 remplace les conditions sur le module par la condition interne $(4.4)_i$ (16, lot 1, p. 6) ; le n° 5, écrit sur un feuillet « 5 bis », en tire que les π_i sont dans $\mathcal{E}$ (16, lot 1, p. 7) ; la page 8 spécialise à $v_i = L^{n-i}$ sous le numéro $(6.3)_i$ (16, lot 1, p. 8).

Conventions. On se donne un anneau E (le sur-anneau $\mathcal{F}$ de la lecture), une famille $(\pi_a)_{a \in \mathbb{Z}}$ d'idempotents orthogonaux de E , nuls hors de $[0, 2n]$, de somme 1, et un sous-anneau $\mathcal{E} \subset E$. Un élément x est *homogène de degré d* si $\pi_b x \pi_a = 0$ dès que $b \neq a + d$. Aucun module n'intervient, et $\mathcal{E}$ n'est qu'un anneau : tout se passe sur $\mathbb{Z}$.

Énoncé (Pages 6 à 8, les projecteurs de la graduation $\blacklozenge$). *Supposons que, pour tout $i \leq n$, il existe $v_i \in \mathcal{E}$ homogène de degré $2n - 2i$ et $w_i \in \mathcal{E}$ homogène de degré $-(2n - 2i)$ tels que $(w_i v_i - 1) \pi_i = 0$ et $(v_i w_i - 1) \pi_{2n-i} = 0$. Alors tous les π_a sont dans $\mathcal{E}$. En particulier, si $L \in \mathcal{E}$ est homogène de degré 2 et si L^{n-i} admet dans $\mathcal{E}$ des inverses w_i au sens de $(6.3)_i$, les π_a sont dans $\mathcal{E}$.*

Lemme 1.2. *Si x est homogène de degré d , alors $x \pi_a = \pi_{a+d} x \pi_a$ pour tout a . Si A et B sont des parties finies de $\mathbb{Z}$, $a_0 \in A$, $a_0 + d \in B$, et si a_0 est le seul $a \in A$ tel que $a + d \in B$, alors*

$$\left(\sum_{b \in B} \pi_b \right) x \left(\sum_{a \in A} \pi_a \right) = \pi_{a_0+d} x \pi_{a_0}.$$

Un produit d'homogènes de degrés d et e est homogène de degré $d + e$, et L^k est de degré $2k$ si L est de degré 2.

Démonstration. On écrit $x \pi_a = (\sum_b \pi_b) x \pi_a = \sum_b \pi_b x \pi_a$, où seul le terme $b = a + d$ subsiste (s'il sort de $[0, 2n]$, $\pi_{a+d} = 0$ et les deux membres sont nuls). Le second énoncé se développe en une double somme dont seul le terme $(a_0 + d, a_0)$ subsiste. Pour le produit, $\pi_b x y \pi_a = \pi_b x \pi_{a+e} y \pi_a$, nul si $b \neq a + e + d$; 1 est de degré 0 par orthogonalité, d'où les puissances par récurrence. $\square$

Démonstration. Montrons par récurrence sur $i \leq n + 1$ que $\pi_a \in \mathcal{E}$ dès que $a < i$ ou $a > 2n - i$. Pour $i = 0$, ces π_a sont nuls. Supposons-le pour un $i \leq n$. Alors

$$\varphi_i = \sum_{i \leq a \leq 2n} \pi_a = 1 - \sum_{0 \leq a < i} \pi_a, \quad \psi_{2n-i} = \sum_{0 \leq a \leq 2n-i} \pi_a = 1 - \sum_{2n-i < a \leq 2n} \pi_a$$

sont dans $\mathcal{E}$. Le lemme 1.2, appliqué à v_i (le seul $a \geq i$ tel que $a + 2n - 2i \leq 2n - i$ est $a = i$) puis à w_i , donne

$$v'_i = \psi_{2n-i} v_i \varphi_i = \pi_{2n-i} v_i \pi_i \in \mathcal{E}, \quad w'_i = \varphi_i w_i \psi_{2n-i} = \pi_i w_i \pi_{2n-i} \in \mathcal{E}.$$

Comme $\pi_{2n-i} v_i \pi_i = v_i \pi_i$ et $\pi_i w_i \pi_{2n-i} = w_i \pi_{2n-i}$ (même lemme),

$$w'_i v'_i = \pi_i w_i \pi_{2n-i}^2 v_i \pi_i = \pi_i (w_i v_i \pi_i) = \pi_i^2 = \pi_i, \quad v'_i w'_i = \pi_{2n-i} (v_i w_i \pi_{2n-i}) = \pi_{2n-i},$$

donc π_i et π_{2n-i} sont dans $\mathcal{E}$, ce qui est l'hypothèse au rang $i + 1$. Au rang $n + 1$, tout a vérifie $a < n + 1$ ou $a > n - 1$. Le cas $v_i = L^{n-i}$ suit, L^{n-i} étant dans $\mathcal{E}$ et de degré $2n - 2i$. $\square$

Remarque. L'argument de la page 7 vaut tel qu'il est écrit, sans hypothèse de réalisation : il suffit que $\mathcal{E}$ soit un sous-anneau et que les π_i existent dans le sur-anneau. Cela démontre la première partie de la piste, l'appartenance des projecteurs de la graduation. Celle de Λ et des projecteurs primitifs $\pi_{i,\alpha}$ n'est pas démontrée ici. Les formules des pages 10 à 12 les écrivent comme produits d'éléments de $\mathcal{E}$, et leur appartenance est immédiate ; il resterait à vérifier qu'elles satisfont (6.7) et donnent les projecteurs de la décomposition primitive, ce qui demande la décomposition elle-même.

La lecture garde $\Phi_0 = \mathbb{Z}[L_0, \Lambda_0] \subset \text{End}(\Lambda M_0)$, avec M_0 un $\mathbb{Z}$ -module libre et Λ_0 au sens de (6.15), pour réparer l'identification de la page 13. Sur $\mathbb{Z}$, ce Λ_0 n'existe pas.

Énoncé (Page 13, sur $\mathbb{Z}$ $\blacklozenge$). Soient $M_0 = \mathbb{Z}^{2n}$, $n \geq 2$, $\xi_0 = \sum_{k=1}^n e_{2k-1} \wedge e_{2k}$ et $\text{vol} = e_1 \wedge \cdots \wedge e_{2n}$. Il n'existe aucun $y \in \Lambda M_0$ tel que $\xi_0^n \wedge y = \text{vol}$. En particulier, pour toute application w de ΛM_0 dans lui-même, $L_0^n(w(\text{vol})) \neq \text{vol}$: la condition (6.3)₀ est fausse dans le modèle extérieur sur $\mathbb{Z}$.

Démonstration. Posons $a_k = e_{2k-1} \wedge e_{2k}$. Deux produits de deux vecteurs commutent dans ΛM_0 (chaque vecteur traverse l'autre paire avec deux changements de signe), et $a_k \wedge a_k = 0$. Par récurrence sur le nombre de termes, $\xi_0 \wedge \xi_0 = c + c$ pour un $c \in \Lambda M_0$: si S est une somme partielle avec $S \wedge S = c + c$, alors $(a + S)^2 = a^2 + aS + Sa + S^2 = (aS + c) + (aS + c)$. Donc $\xi_0^n \wedge y = \xi_0^{n-2} \wedge (c + c) \wedge y = z + z$ avec $z = \xi_0^{n-2} c y$. Soit ϕ la forme linéaire sur ΛM_0 qui prend la composante de degré $2n$ et la lit sur la base vol de $\Lambda^{2n} M_0$; $\phi(\text{vol}) = 1$. Si $\xi_0^n \wedge y = \text{vol}$, alors $1 = \phi(z + z) = 2\phi(z)$ dans $\mathbb{Z}$, ce qui est impossible. Enfin $L_0^n(x) = \xi_0^n \wedge x$, et l'on prend $y = w(\text{vol})$. $\square$

Remarque. En fait $\xi_0^n = n! \text{vol}$, et $L_0^n : \Lambda^0 M_0 \rightarrow \Lambda^{2n} M_0$ est la multiplication par $n!$; seule la parité est démontrée ici, et elle suffit. D'après la Remarque de la page 12, un Λ_0 vérifiant (6.15) donne $(L_0^n \Lambda_0^n - 1) \pi_{2n} = 0$, c'est-à-dire $L_0^n (\Lambda_0^n \text{vol}) = \text{vol}$, ce que l'énoncé exclut. Pour $n \geq 2$, l'anneau $\Phi_0 = \mathbb{Z}[L_0, \Lambda_0]$ de la lecture ne peut donc pas être pris dans $\text{End}_{\mathbb{Z}}(\Lambda M_0)$, et la décomposition primitive y fait défaut. Pour $n = 2$, $e_1 \wedge e_2 \wedge \xi_0 = \text{vol}$ et $\xi_0 \wedge \xi_0 = 2 \text{vol}$, de sorte que la composante de $e_1 \wedge e_2$ sur $\mathbb{Q} \xi_0$ le long de P^2 vaut $\frac{1}{2} \xi_0$ (calcul fait à la main). L'obstacle disparaît sur $\mathbb{Q}$. La correction de la page 13 par la lecture vaut donc pour l'identification des deux Λ_0 ; le choix de $\mathbb{Z}$ comme anneau de base du modèle ne convient pas.

Lemme 1.3 (Pages 14 et 15, l'étape algébrique de l'unicité). *Dans un anneau, si $\Lambda L \Lambda = \Lambda$, $\Lambda' L \Lambda' = \Lambda'$, $\Lambda L = \Lambda' L$ et $L \Lambda = L \Lambda'$, alors $\Lambda = \Lambda'$.*

Démonstration. $\Lambda = (\Lambda L) \Lambda = \Lambda' (L \Lambda) = \Lambda' (L \Lambda') = \Lambda'$. □

Le lemme 1.3 dit qu'un pseudo-inverse est déterminé par les deux idempotents ΛL et $L \Lambda$; ni l'existence de l'homomorphisme $\Phi_0 \rightarrow \mathcal{E}$ ni son unicité ne sont démontrées ici.

La lettre du 6 janvier 1967 montre que $C(X)$ suit de $D(X)$ et de l'existence d'isomorphismes algébriques $H^{2n-i}(X) \rightarrow H^i(X)$ quelconques (16, lot 3, p. 47).

Conventions. Soient K un corps ($\mathbb{Q}_\ell$), $F \subset K$ un sous-corps ($\mathbb{Q}$), $V = H^i(X)$ et $W = H^{2n-i}(X)$ des K -espaces, V de dimension finie. « Algébrique » est lu comme l'appartenance à des ensembles donnés d'applications : un sous-anneau $\mathcal{A}_V$ de $\text{End}_K(V)$, stable par multiplication par les éléments de F , et des parties $\mathcal{A}_{WV}$ de $\text{Hom}(W, V)$ et $\mathcal{A}_{VW}$ de $\text{Hom}(V, W)$, telles que $g \circ h \in \mathcal{A}_{WV}$ pour $g \in \mathcal{A}_V$, $h \in \mathcal{A}_{WV}$, et $h \circ k \in \mathcal{A}_V$ pour $h \in \mathcal{A}_{WV}$, $k \in \mathcal{A}_{VW}$. L'hypothèse $D(X)$ est lue comme : les coefficients du polynôme caractéristique de tout $g \in \mathcal{A}_V$ sont dans F .

Énoncé (Pages 47 et 48, proposition, b) $\Rightarrow C \blacklozenge$. *Si $u \in \mathcal{A}_{WV}$ est un isomorphisme quelconque et si $v \in \mathcal{A}_{VW}$ (l'application induite par L^{n-i}) est un isomorphisme, alors il existe $v' \in \mathcal{A}_{WV}$ avec $v' \circ v = \text{id}_V$ et $v \circ v' = \text{id}_W$: l'inverse de L^{n-i} est algébrique.*

Lemme 1.4 (Cayley–Hamilton). *Si $w \in \mathcal{A}_V$ est inversible, son inverse est dans $\mathcal{A}_V$.*

Démonstration. Soit $p = \sum_j c_j X^j$ le polynôme caractéristique de w ; ses coefficients sont dans F . Écrivons $p = qX + c_0$. Par Cayley–Hamilton, $q(w)w = -c_0$, et $c_0 = \pm \det w \neq 0$ puisque w est inversible. Donc $g = -c_0^{-1}q(w)$ vérifie $gw = 1$, et $wg = 1$ puisque $q(w)$ commute à w . Enfin $q(w) = \sum_j c_{j+1} w^j$ est une somme de multiples par des éléments de F de puissances de w , donc $g \in \mathcal{A}_V$. □

Démonstration. $w = u \circ v$ est dans $\mathcal{A}_V$, et inversible comme composé de deux bijections. Le lemme 1.4 donne $g \in \mathcal{A}_V$ avec $g \circ w = \text{id}_V$; on pose $v' = g \circ u \in \mathcal{A}_{WV}$. Alors $v' \circ v = g \circ w = \text{id}_V$, et pour $y = v(x)$, $v(v'(y)) = v((v' \circ v)(x)) = y$: v' est aussi inverse à droite, v étant surjective. □

Remarque. L'argument de la lettre vaut tel quel, avec la relation de Cayley–Hamilton écrite en $w = uv$, comme la lecture la rétablit; le tapuscrit l'écrit en u avec les coefficients de w . L'hypothèse que u soit un isomorphisme sert seulement à rendre w inversible. Que v , induit par L^{n-i} , en soit un aussi est l'axiome de Lefschetz de la cohomologie, que la lettre suppose.

Deuxième partie

Algèbre universelle et théories

2 Cote 161-2 : monadicité, descente, caractérisation de Gabriel–Ulmer³

La cote 161-2, *Algèbre universelle [ou catégories] : notes manuscrites (s.d.)*, cent onze pages que l'inventaire date « [vers 1963-1973] », cherche ce qu'est une espèce de structure algébrique dans une catégorie et comment les modèles déterminent la théorie. Deux feuilles de travail, pages 33 et 34, notent le critère de reconnaissance d'un foncteur « tripleable », avec trois noms que la transcription lit avec doute, « Beck, Barr, Linton » (161-2, lot 2, p. 33), puis le critère de descente pour un morphisme de topos, conclu par « $B_\pi \xrightarrow{\simeq} B$ (th) » (161-2, lot 2, p. 34). La page 60 énonce un corollaire sur les catégories cocomplètes, « Ce sont ces E qu'il faudrait appeler « accessibles » » (161-2, lot 3, p. 60), que la page 61 démontre (161-2, lot 4, p. 61). La page 77 établit, pour les théories définies par limites finies, le lemme $\text{Ind}(\Sigma) \simeq S$ (161-2, lot 4, p. 77).

Conventions. Les notations de la section 8 valent ici : pour une adjonction $f \dashv g$, $f : A \rightarrow B$, $h : A \rightarrow \varphi$ -**Coalg** est le foncteur de comparaison vers les coalgèbres de $\varphi = fg$; dualement, pour $F \dashv U$, $U : A \rightarrow B$, le foncteur de comparaison va de A dans les algèbres de la monade $\mathbb{T} = UF$. Une double flèche est *réflexive* si ses deux flèches ont une section commune, *coréflexive* si elles ont une rétraction commune.

Énoncé (Théorème de monadicité, page 33). *Un foncteur $U : A \rightarrow B$ admettant un adjoint à gauche F est monadique ($A \simeq \text{Alg}(\mathbb{T})$, $\mathbb{T} = UF$) si U est conservatif et si A a et U préserve les coégalisateurs des paires réflexives.*

Énoncé (Critère de descente, page 34). *Soit f un morphisme de topos, d'image inverse $f^* : B' \rightarrow B$, et $\pi = f^* f_*$. Si f^* est conservatif, le foncteur de comparaison $B' \rightarrow B_\pi$, $X \mapsto f^* X$, vers la catégorie des π -coalgèbres, est une équivalence.*

Lemme 2.1. *Soit $f \dashv g$ une adjonction, $f : A \rightarrow B$. Si f est conservatif, si A a les noyaux des doubles flèches coréflexives et si f y commute, le foncteur de comparaison h est une équivalence.*

Démonstration. Pour toute coalgèbre (X, a) , la double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ est coréflexive (lemme 8.2) ; elle a donc un noyau, auquel f commute. Le lemme 8.3 (3) conclut. C'est le théorème de comonadicité « grossier » de Beck, classique. $\square$

Démonstration du théorème de monadicité. C'est l'énoncé dual. Le foncteur $U^\circ : A^\circ \rightarrow B^\circ$ est adjoint à gauche de F° ; la monade UF sur B devient la comonade $U^\circ F^\circ$ sur B° , dont les coalgèbres sont les opposées des $\mathbb{T}$ -algèbres, et le foncteur de comparaison devient celui du lemme 2.1. Les coégalisateurs de paires réflexives de A sont les noyaux de paires coréflexives de A° , et U° est conservatif. Le lemme 2.1 s'applique. $\square$

³Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder161_2.lean`.

Démonstration du critère de descente. On démontre davantage : soit $f^* \dashv f_*$ une adjonction quelconque, $f^* : B' \rightarrow B$, où B' a les limites finies et f^* est exact à gauche et conservatif. Alors B' a les noyaux de toutes les doubles flèches, en particulier des coréflexives, et f^* , exact à gauche, y commute. Le lemme 2.1 donne l'équivalence $B' \simeq B_\pi$. Pour un morphisme de topos, B' a les limites finies et f^* est exact à gauche par définition. $\square$

Définition. Soient E une catégorie localement petite et κ un cardinal régulier. Un objet X de E est κ -présentable si $\text{Hom}_E(X, -)$ commute aux limites inductives κ -filtrantes, et *présentable* s'il l'est pour un κ ; c'est l'« accessible » de la page. Une sous-catégorie pleine $\mathcal{C}$ de E est *dense* si, pour tout X , la flèche canonique $\varinjlim_{Y \in \mathcal{C}/X} Y \rightarrow X$ est un isomorphisme; c'est la condition a) par laquelle la page 56 définit une sous-catégorie « strictement génératrice ». La catégorie E est *localement présentable* si elle est cocomplète et s'il existe un cardinal régulier κ et un petit ensemble d'objets κ -présentables dont tout objet est limite inductive κ -filtrante; c'est ce que dit « E est équivalente à un $\text{Ind}_\pi(\mathcal{C})$, $\mathcal{C}$ petite ».

Énoncé (Corollaire, pages 60 et 61). *Une catégorie localement petite et cocomplète E est localement présentable si et seulement si elle admet une petite sous-catégorie pleine dense formée d'objets présentables.*

Démonstration. Supposons E localement κ -présentable. La sous-catégorie pleine P des objets κ -présentables est essentiellement petite et dense : c'est classique (Gabriel–Ulmer, Adámek–Rosický). Soit $Q \subseteq P$ une petite sous-catégorie pleine contenant un représentant de chaque classe d'isomorphisme; l'inclusion $Q \rightarrow P$ est une équivalence, et le composé d'une équivalence et d'un foncteur dense est dense, donc Q est dense dans E . Ses objets sont κ -présentables, donc présentables.

Réciproquement, soit P une petite sous-catégorie pleine dense dont chaque objet X est κ_X -présentable pour un cardinal régulier κ_X . Comme P est petite, la famille des κ_X est majorée par un cardinal c . Soit κ_0 le successeur de $\max(c, \aleph_0)$; c'est un cardinal régulier, comme tout successeur d'un cardinal infini. Toute limite inductive κ_0 -filtrante étant κ_X -filtrante, chaque $X \in P$ est κ_0 -présentable. Une sous-catégorie dense est fortement génératrice (classique). Or une catégorie cocomplète qui admet un petit ensemble fortement générateur d'objets κ_0 -présentables est localement κ_0 -présentable : c'est le théorème 1.20 d'Adámek et Rosický, classique. Donc E est localement présentable. $\square$

Énoncé (Lemme, page 77). *Soient R une petite catégorie à limites finies, $S = \underline{\text{Hom}}_{\text{lex}}(R, \text{Ens})$ et $\Sigma \simeq R^\circ \subset S$ la sous-catégorie pleine des structures représentables. Le foncteur d'inclusion $\Sigma \rightarrow S$ induit une équivalence $\text{Ind}(\Sigma) \simeq S$.*

Démonstration. On identifie S aux préfaisceaux $X : \Sigma^\circ \rightarrow \text{Ens}$ exacts à gauche, la catégorie $\Sigma = R^\circ$ ayant les limites inductives finies, et $\text{Ind}(\Sigma)$ à la sous-catégorie pleine des préfaisceaux sur Σ qui sont limites inductives filtrantes de représentables. Il suffit de montrer que ces deux sous-catégories pleines ont les mêmes objets. Un représentable est exact à gauche, et les limites inductives filtrantes commutent aux limites projectives finies dans Ens ; tout ind-objet est donc exact à gauche. Réciproquement, soit X exact à gauche. Tout préfaisceau est la limite inductive

des représentables sur sa catégorie des éléments Σ/X , et celle-ci est filtrante : elle est non vide, car X envoie l'objet initial de Σ sur un point ; deux éléments $x \in X(a)$, $y \in X(b)$ proviennent de $X(a \sqcup b) = X(a) \times X(b)$; deux flèches $u, v : (a, x) \rightrightarrows (b, y)$ sont égalisées par la flèche vers le coégalisateur c de u, v , puisque $X(c)$ est le noyau de $X(u), X(v) : X(b) \rightrightarrows X(a)$, qui contient y . C'est le fait classique que les ind-objets d'une petite catégorie à limites inductives finies sont ses préfaisceaux exacts à gauche (SGA 4, exposé I, § 8), que la preuve vérifiée invoque. $\square$

Remarque. Le critère de descente n'utilise pas la structure de topos. Il vaut pour tout foncteur adjoint à gauche, exact à gauche et conservatif, défini sur une catégorie à limites finies. L'équivalence a pour source B' , alors que la page écrit B ; la lecture l'a corrigé.

Remarque. Le corollaire est le théorème de caractérisation des catégories localement présentables de Gabriel et Ulmer. Il est démontré ici pour la notion moderne ; le $\text{Ind}_\pi(\mathcal{C})$ de SGA 4 que la page emploie n'est pas formalisé. Le lemme de la page 77 est le cas des limites finies de la dualité de Gabriel–Ulmer.

Troisième partie

Analyse fonctionnelle

3 Cote 113 : l'enveloppe de Karoubi et l'invariance de Morita⁴

La cote 113, *Abelianization : notes manuscrites (s.d.)*, douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », construit sous le titre « $\otimes$ dans Cat » le produit tensoriel de petites catégories k -linéaires, et montre qu'il calcule celui de leurs catégories de modules. La page 3 pose les fondations. Pour P petite catégorie k -additive, P^k est défini comme $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, Ab)$, identifié à $\text{Hom}_k(P^\circ, Ab_k)$ avec la parenthèse « ne dépend pas du choix de la str. k -additive ». Le plongement $P \hookrightarrow P^k$ est une « inclusion additive pl. fid. », d'où « $\text{Kar } P \approx \text{Ul Proj}(P^k)$ », les deux lettres devant « Proj » n'étant pas identifiées. Une note en marge ajoute « $P \rightarrow \text{Kar } P$ induit $(\text{Kar } P)^k \xrightarrow{\sim} P^k$ » (113, lot 1, p. 3). La lecture lit la première équivalence comme $\text{Kar}(P) \simeq \text{Proj}_{\text{ff}}(P^k)$, les projectifs de type fini, et nomme l'ensemble invariance de Morita.

Définition. Soit P une catégorie. Son *enveloppe de Karoubi* $\text{Kar } P$ a pour objets les couples (X, e) formés d'un objet X de P et d'un idempotent $e = e^2$ de $\text{End}(X)$, et pour flèches $(X, e) \rightarrow (Y, e')$ les $f : X \rightarrow Y$ tels que $e'f = f = fe$; la composition est celle de P , et l'identité de (X, e) est e . Le foncteur $\iota : P \rightarrow \text{Kar } P$ envoie X sur (X, id_X) . Une catégorie est *karoubienne* si tout idempotent s'y scinde. Si P est préadditive, $\text{Kar } P$ l'est aussi, ses groupes de flèches étant des sous-groupes de ceux de P .

Énoncé (Page 3, la note marginale). Soient P une catégorie préadditive et $\mathcal{D}$ une catégorie préadditive karoubienne — par exemple Ab , ou la catégorie des k -modules. La restriction le long de $\iota^\circ : P^\circ \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs additifs $(\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$

⁴Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder113.lean.

sur celle des foncteurs additifs $P^\circ \rightarrow \mathcal{D}$. Pour $\mathcal{D} = \text{Ab}$, c'est l'équivalence $(\text{Kar } P)^k \simeq P^k$, avec la définition $P^k = \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(P^\circ, \text{Ab})$ de la page.

Lemme 3.1. Soient P une catégorie et $\mathcal{D}$ une catégorie karoubienne. La restriction le long de $\iota : P \rightarrow \text{Kar } P$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs $\text{Kar } P \rightarrow \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs $P \rightarrow \mathcal{D}$.

Démonstration. C'est la propriété universelle classique de l'enveloppe de Karoubi, complétion libre par les rétractes : un foncteur $G : P \rightarrow \mathcal{D}$ se prolonge en envoyant (X, e) sur l'objet par lequel se scinde l'idempotent $G(e)$, et ce prolongement est unique à isomorphisme unique près. On ne la redémontre pas ici. $\square$

Lemme 3.2. Il existe un isomorphisme de catégories $\text{Kar}(P^\circ) \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$, bijectif sur les objets, qui fait commuter les plongements : le composé $P^\circ \xrightarrow{\iota_{P^\circ}} \text{Kar}(P^\circ) \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$ est ι_P° .

Démonstration. Un objet de $\text{Kar}(P^\circ)$ est un couple (X, e) où e est un idempotent de $\text{End}_{P^\circ}(X) = \text{End}_P(X)$; on l'envoie sur l'objet (X, e) de $(\text{Kar } P)^\circ$. Une flèche $(X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $\text{Kar}(P^\circ)$ est une flèche $f : Y \rightarrow X$ de P telle que $fe' = f = ef$, c'est-à-dire exactement une flèche $(Y, e') \rightarrow (X, e)$ de $\text{Kar } P$, ou encore une flèche $(X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $(\text{Kar } P)^\circ$; on l'envoie sur elle-même. Ce foncteur respecte identités et compositions, il est bijectif sur les objets et sur chaque ensemble de flèches. Sur $X \in P$, les deux composés donnent (X, id_X) , et sur les flèches l'identité. $\square$

Lemme 3.3. Pour $\mathcal{D}$ karoubienne, la restriction le long de $\iota_P^\circ : P^\circ \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$ est une équivalence de la catégorie des foncteurs $(\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ sur celle des foncteurs $P^\circ \rightarrow \mathcal{D}$.

Démonstration. Par le lemme 3.2, cette restriction est la composée de la restriction le long de l'isomorphisme $\text{Kar}(P^\circ) \rightarrow (\text{Kar } P)^\circ$, qui est une équivalence, et de la restriction le long de ι_{P° , qui en est une par le lemme 3.1 appliqué à P° . $\square$

Lemme 3.4. Toute flèche $f : (X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $\text{Kar } P$ s'écrit $f = p' \circ \iota(f) \circ j$, où $j : (X, e) \rightarrow (X, \text{id})$ et $p' : (Y, \text{id}) \rightarrow (Y, e')$ sont les flèches données par e et par e' .

Démonstration. Ce sont bien des flèches de $\text{Kar } P$, puisque $\text{id} \cdot e = e = e \cdot e$ et $e' \cdot e' = e' = e' \cdot \text{id}$; et le composé est $e'fe = f$. $\square$

Lemme 3.5. Soient P et $\mathcal{D}$ préadditives et $F : (\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur. Si $F \circ \iota^\circ$ est additif, F l'est.

Démonstration. Par le lemme 3.4, pour toute flèche $h : (X, e) \rightarrow (Y, e')$ de $\text{Kar } P$, on a $F(h) = F(j) \circ (F \circ \iota^\circ)(h) \circ F(p')$, les flèches j et p' ne dépendant que de la source et du but de h , et h étant regardée à droite comme une flèche $Y \rightarrow X$ de P° . Pour deux flèches h_1, h_2 de même source et de même but, la somme dans $\text{Kar } P$ est la somme dans P ; l'additivité de $F \circ \iota^\circ$ et la bilinéarité de la composition dans $\mathcal{D}$ donnent alors $F(h_1 + h_2) = F(h_1) + F(h_2)$. $\square$

Démonstration de l'énoncé. Les foncteurs additifs forment une sous-catégorie pleine de celle de tous les foncteurs. La restriction le long de ι° étant pleinement fidèle sur tous les foncteurs par le lemme 3.3, elle l'est sur les foncteurs additifs, et elle envoie un foncteur additif sur un foncteur additif. Elle est essentiellement surjective : soit $G : P^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ additif ; par le lemme 3.3, il existe $F : (\text{Kar } P)^\circ \rightarrow \mathcal{D}$ et un isomorphisme $F \circ \iota^\circ \simeq G$; un foncteur isomorphe à un foncteur additif est additif, donc $F \circ \iota^\circ$ l'est, et F est additif par le lemme 3.5. Les catégories Ab et des k -modules sont préadditives et karoubiennes, tout idempotent y ayant une image. $\square$

Remarque. L'énoncé ne demande ni que P soit petite, ni que le but soit abélien. Il suffit que P soit préadditive et $\mathcal{D}$ préadditive et karoubienne ; l'énoncé vaut en particulier pour les foncteurs additifs à valeurs dans les k -modules.

Remarque. L'énoncé est l'invariance classique de la catégorie des modules par passage à l'enveloppe de Karoubi, déduite de la propriété universelle de celle-ci.

Quatrième partie

Théorie de la dualité

Aucune lettre du fonds ne porte sur la cote 125, que l'inventaire date « [avant 1970] ». Deux lettres situent la dualité dans ces années. Le 10 décembre 1965, il envoie à Deligne une démonstration plus simple de la dualité en cohomologie p -adique et sa forme relative (5, lot 3, p. 49). Le 4 août 1969, Hartshorne lui écrit sur les notes de Jouanolou destinées à SGA 5 (37, lot 3, p. 53).

4 Cote 125 : la carte des équivalences et le lemme du feuillet III-18⁵

La cote 125, *Dualité projective : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [avant 1970] », compte huit feuillets, dont une chemise titrée de sa main « Dualité locale et dualité ... projective ». Le feuillet 2 est une carte : six énoncés encadrés, reliés par des doubles flèches verticales, pour $\mathbf{P}^n \supset X^r \supset Y^m$, $r > m > 0$. Le premier énoncé est la suite exacte de cohomologie locale, marquée d'une astérisque ; la flèche du deuxième encadré au troisième porte le seul mot du feuillet, « dualité », entouré (125, lot 1, p. 2). Le feuillet 3 est une page de tapuscrit numérotée III-18, annotée d'une autre main. Elle établit qu'un homomorphisme $u : A^n \rightarrow B$ bijectif sur les germes en un point l'est sur un voisinage, avec en marge la justification « puisque Y est noethérien et B de type fini par hypothèse » (125, lot 1, p. 3). La lecture modernisée donne les trois premiers étages de la carte et ce lemme. Ce sont les seules parties du dossier qui ne dépendent ni de la dualité de Serre ni du complété formel, et elles sont démontrées ici.

Énoncé (Feuillet 2, trois premiers étages $\blacklozenge 6 \blacklozenge 9$). Soient X une variété projective de dimension r , $Y \subset X$ un fermé de dimension m , F un faisceau cohérent sur X . Les énoncés suivants sont équivalents :

⁵Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder125.lean.

1. (premier étage) $H^p(X - Y, F) = 0$ pour $p \geq m$;
2. (deuxième étage) $H_Y^p(X, F) \rightarrow H^p(X, F)$ est bijectif pour $p > m$ et surjectif pour $p = m$;
3. (troisième étage) $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^q(F, \Omega_{X/k}^r) \rightarrow \text{Ext}_{\widehat{\mathcal{O}_X}}^q(\widehat{F}, \widehat{\Omega}_{X/k}^r)$ est bijectif pour $q < r - m$ et injectif pour $q = r - m$.

Le deuxième étage est « le premier étage lu à travers la suite exacte » ; le troisième lui est équivalent par la dualité, qui met H^p et $\text{Ext}^{r-p}(-, \Omega^r)$ en accouplement parfait, et « les bornes se répondent comme il faut : $p \geq m$ d'un côté, $q < r - m$ de l'autre, et $p + q = r$ ».

On démontre ici la forme abstraite de ces deux passages. Pour le premier, on se donne une suite exacte longue quelconque indexée par les entiers naturels,

$$\dots \rightarrow L^p \xrightarrow{a_p} G^p \xrightarrow{b_p} C^p \xrightarrow{\delta_p} L^{p+1} \xrightarrow{a_{p+1}} \dots$$

de groupes abéliens, exacte en chaque terme ; L^p tient lieu de $H_Y^p(X, F)$, G^p de $H^p(X, F)$, C^p de $H^p(X - Y, F)$. Pour le second, la dualité de Serre n'est pas démontrée : elle est prise pour donnée sous la forme que lui prête la lecture, à savoir que, sur le corps k , la flèche de comparaison des Ext en degré $q = r - p$ s'identifie à la transposée ${}^t a_p : (G^p)^\vee \rightarrow (L^p)^\vee$ de a_p .

Lemme 4.1. Soit $m \in \mathbb{N}$. On a $C^p = 0$ pour tout $p \geq m$ si et seulement si a_p est bijectif pour tout $p > m$ et a_m est surjectif.

Démonstration. Supposons $C^p = 0$ pour $p \geq m$. Pour $p \geq m$, b_p est nul, donc son noyau, qui est l'image de a_p par exactitude en G^p , est G^p tout entier : a_p est surjectif, en particulier pour $p = m$. Soit $p > m$; écrivons $p = q + 1$ avec $q \geq m$. Par exactitude en L^{q+1} , le noyau de a_{q+1} est l'image de δ_q , qui est nulle puisque $C^q = 0$: a_p est injectif, donc bijectif.

Réciproquement, supposons a_p bijectif pour $p > m$ et a_m surjectif, et soient $p \geq m$ et $c \in C^p$. D'abord a_p est surjectif : si $p > m$ parce qu'il est bijectif, si $p = m$ par hypothèse. Par exactitude en L^{p+1} , $a_{p+1}(\delta_p(c)) = 0$; comme $p + 1 > m$, a_{p+1} est injectif et $\delta_p(c) = 0$. Par exactitude en C^p , il existe $y \in G^p$ avec $c = b_p(y)$, puis, a_p étant surjectif, $x \in L^p$ avec $y = a_p(x)$. Alors $c = b_p(a_p(x)) = 0$ par exactitude en G^p . $\square$

Lemme 4.2. Soient k un corps, $(a_p : L^p \rightarrow G^p)_{p \in \mathbb{N}}$ des applications k -linéaires, et $m \leq r$ des entiers. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. a_p est bijectif pour $m < p \leq r$ et a_m est surjectif ;
2. ${}^t a_{r-q}$ est bijectif pour $q < r - m$ et ${}^t a_m$ est injectif.

De plus, si $p + q = r$, on a $p \geq m \Leftrightarrow q \leq r - m$ et $p > m \Leftrightarrow q < r - m$.

Démonstration. On utilise deux faits classiques d'algèbre linéaire sur un corps, valables en dimension quelconque : une application linéaire a est surjective si et seulement si sa transposée

${}^t a$ est injective, et elle est bijective si et seulement si ${}^t a$ l'est. (Le premier est immédiat dans un sens, et dans l'autre repose sur le fait qu'un sous-espace strict est contenu dans le noyau d'une forme linéaire non nulle ; le second en découle, avec l'énoncé dual : a injective si et seulement si ${}^t a$ surjective, par prolongement des formes linéaires à partir d'un sous-espace.)

Les deux conditions sur a_m se correspondent donc. Pour les autres : si $q < r - m$, l'entier $p = r - q$ vérifie $m < p \leq r$, et ${}^t a_{r-q}$ est bijectif puisque a_p l'est ; si inversement $m < p \leq r$, l'entier $q = r - p$ vérifie $q < r - m$ et $r - q = p$, et a_p est bijectif puisque ${}^t a_p$ l'est. L'assertion sur les bornes est de l'arithmétique : sous $p + q = r$, $p \geq m$ équivaut à $r - q \geq m$, soit $q \leq r - m$, et de même avec des inégalités strictes. $\square$

Le lemme du feuillet 3 est démontré ici sous sa forme affine : $Y = \text{Spec } R$ et le voisinage cherché est un ouvert $D(f)$.

Énoncé (Feuillet 3, III-18, forme affine). *Soient R un anneau noethérien, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de R , B un R -module de type fini et $u : R^n \rightarrow B$ une application R -linéaire telle que $u_{\mathfrak{p}} : R_{\mathfrak{p}}^n \rightarrow B_{\mathfrak{p}}$ soit bijective. Il existe $f \in R \setminus \mathfrak{p}$ tel que $u_f : R_f^n \rightarrow B_f$ soit bijective.*

Démonstration. Le module B , de type fini sur un anneau noethérien, est de présentation finie : le noyau d'une surjection $R^s \rightarrow B$ est un sous-module de R^s , donc de type fini. Il suffit alors de démontrer l'énoncé classique suivant, où l'anneau commutatif R est quelconque : si M est de type fini, B de présentation finie et $u : M \rightarrow B$ bijective en $\mathfrak{p}$, alors u_f est bijective pour un $f \notin \mathfrak{p}$.

Le conoyau Q de u est de type fini, quotient de B , et $Q_{\mathfrak{p}} = 0$ puisque la localisation est exacte. Chacun de ses générateurs $y_1, \dots, y_t$ est donc annulé par un $g_i \notin \mathfrak{p}$, et $g = g_1 \cdots g_t \notin \mathfrak{p}$ annule Q : $Q_g = 0$, c'est-à-dire que $u_g : M_g \rightarrow B_g$ est surjective. Son noyau K est de type fini : M_g est de type fini sur R_g , B_g de présentation finie, et le noyau d'une surjection d'un module de type fini sur un module de présentation finie est de type fini (fait classique : si $0 \rightarrow K \rightarrow M' \xrightarrow{\pi'} B' \rightarrow 0$ est exacte, avec M' de type fini et B' de présentation finie, choisissons une surjection $\pi : R^s \rightarrow B'$ de noyau N de type fini et relevons-la en $\varphi : R^s \rightarrow M'$ avec $\pi' \varphi = \pi$; chaque générateur de M' s'écrit $\varphi(x_j) + k_j$ avec $k_j \in K$, et tout $k \in K$ s'écrit $\varphi(x) + \sum c_j k_j$ où $\pi(x) = \pi'(k) = 0$, de sorte que $K = \varphi(N) + \sum_j R k_j$). Comme $K_{\mathfrak{p}}$ est le noyau de $u_{\mathfrak{p}}$, il est nul ; le même argument fournit $h \notin \mathfrak{p}$ tel que $K_h = 0$. Avec $f = gh \notin \mathfrak{p}$, u_f est surjective et injective. $\square$

Remarque. Le passage du premier au deuxième étage vaut pour toute suite exacte longue, avec les bornes du feuillet ; il n'utilise rien de X , de Y ni de F . La dualité étant admise sous la forme d'une transposition, les trois étages encadrés sont cohérents entre eux.

Remarque. Le commentaire de la lecture apparie $p \geq m$ avec $q < r - m$. Sous $p + q = r$, $p \geq m$ équivaut à $q \leq r - m$, de sorte que la plage $p \geq m$ répond à toute celle du troisième étage, cas limite injectif compris. L'écart est dans le commentaire ; la carte est juste.

Remarque. Le lemme III-18 est un fait classique : il vaut sur tout anneau commutatif pour une source de type fini et un but de présentation finie. La noethérianité de Y et la finitude de B qu'invoque la marge servent seulement à rendre B de présentation finie.

Cinquième partie

Algèbre commutative

Ces cotes sont contemporaines de la rédaction d'EGA avec Dieudonné. Le 29 septembre 1965, il lui envoie le plan des paragraphes 20 à 27 du chapitre IV (25, lot 7, p. 134). Le 27 août 1967, il lui envoie un contre-exemple à EGA I 10.10.5 sans hypothèse noethérienne ; Dieudonné répond le 11 septembre qu'il n'est pas convaincu pour les modules de présentation finie (37, lot 5, p. 92, 37, lot 5, p. 95). La cote 22 est elle-même un tapuscrit de travail pour EGA IV.

5 Cote 21 : injectifs de I -torsion (proposition 2.15 et corollaire 2.16)⁶

La cote 21, [Chapitre] 0 III : tapuscrit et copies de tapuscrit annotés (s.d.), notes manuscrites (s.d.), datée par l'inventaire « [vers 1960-1967] », s'ouvre sur un tapuscrit corrigé à la main. Pour un anneau noethérien A et un idéal I , il étudie les foncteurs contravariants sur la catégorie $\underline{C}$ des A -modules de type fini annulés par une puissance de I , et les représente par des modules H dont tout élément est annulé par une puissance de I (2.9 à 2.14). La proposition 2.15, énoncée page 11, caractérise ceux de ces modules qui sont injectifs. Sa démonstration, page 13, invoque le critère de Baer sous le nom de « Tohoku ». Pour l'étape décisive, elle écrit « En vertu de Krull, $I^n N$ contient une intersection $N \cap I^m N$ », avec N là où la ligne suivante et l'argument demandent M (21, lot 1, p. 13). Le corollaire 2.16 suit, puis une ligne biffée à la machine : « Si on rejette tout ce numéro (comme il me semble raisonnable) ».

On explicite deux notions que la lecture prend dans les numéros précédents.

Définition. Un A -module H est de I -torsion si tout élément de H est annulé par une puissance de I . Le foncteur $\text{Hom}(-, H)$ est exact à droite sur $\underline{C}$ si, pour tout $M \in \underline{C}$ et tout sous-module $N \subseteq M$, tout homomorphisme $N \rightarrow H$ se prolonge en un homomorphisme $M \rightarrow H$. Pour un A -module K , on note $H_I^0(K)$ le sous-module des éléments de K annulés par une puissance de I .

Énoncé (Proposition 2.15 ♦ 4). Soient A un anneau noethérien, I un idéal de A et H un A -module de I -torsion. Pour que H soit un A -module injectif, il faut et il suffit que le foncteur $T_H(M) = \text{Hom}(M, H)$ sur la catégorie $\underline{C}$ des A -modules de type fini annulés par une puissance de I soit exact à droite, donc exact.

Énoncé (Corollaire 2.16). Soit K un A -module. Si K est injectif, $H_I^0(K)$ l'est aussi.

Lemme 5.1. Soient H un module de I -torsion, M un module de type fini et $g : M \rightarrow H$ un homomorphisme. Il existe n tel que $ag(x) = 0$ pour tout $a \in I^n$ et tout $x \in M$.

Démonstration. Soient $s_1, \dots, s_k$ des générateurs de M , et e_i tel que I^{e_i} annule $g(s_i)$. Posons $n = \max_i e_i$; comme $I^n \subseteq I^{e_i}$, I^n annule chaque $g(s_i)$. L'ensemble des $x \in M$ tels que I^n

⁶Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder21.lean.

annule $g(x)$ est un sous-module (il contient 0, est stable par somme, et par multiplication par $c \in A$ puisque $a g(cx) = c(a g(x))$) ; il contient les générateurs, donc c'est M . C'est la phrase du feuillet : l'image de u est « un sous-module de type fini de H , donc annulé par une puissance de I ». $\square$

Démonstration de la proposition 2.15. Nécessité. Si H est injectif, tout homomorphisme d'un sous-module N de M vers H se prolonge à M , pour tout M , a fortiori pour $M \in \underline{\mathcal{C}}$.

Suffisance. Supposons $\text{Hom}(-, H)$ exact à droite sur $\underline{\mathcal{C}}$. Par le critère de Baer, il suffit de montrer que, pour tout idéal J de A , tout homomorphisme $g : J \rightarrow H$ se prolonge à A . L'idéal J est de type fini (A est noethérien) ; par le lemme 5.1, il existe n tel que I^n annule $g(J)$, et donc g est nul sur $I^n J$, qui est engendré par les produits ay avec $a \in I^n$, $y \in J$, et sur lesquels $g(ay) = a g(y) = 0$.

Par le lemme d'Artin-Rees, appliqué au module A , à son sous-module J et à l'idéal I , il existe k tel que $J \cap I^p = I^{p-k}(J \cap I^k)$ pour tout $p \geq k$. Posons $m = n + k$; alors

$$J \cap I^m = I^n(J \cap I^k) \subseteq I^n J.$$

C'est l'inclusion $N \cap I^m M \subseteq I^n N$ de la lecture, pour $M = A$ et $N = J$.

Soit $\varphi : J \rightarrow A/I^m$ la composée de l'inclusion et de la projection. Son noyau est $J \cap I^m$, contenu dans $I^n J$, sur lequel g est nul. Donc g se factorise par l'image de φ : il existe $u' : \varphi(J) \rightarrow H$ avec $u'(\varphi(x)) = g(x)$ pour $x \in J$. Le module A/I^m est de type fini et annulé par I^m , donc dans $\underline{\mathcal{C}}$, et $\varphi(J) \simeq J/(J \cap I^m)$ en est un sous-module. Par hypothèse, u' se prolonge en $w : A/I^m \rightarrow H$. La composée de la projection $A \rightarrow A/I^m$ et de w prolonge g : pour $x \in J$, elle envoie x sur $w(\varphi(x)) = u'(\varphi(x)) = g(x)$. $\square$

Démonstration du corollaire 2.16. Le module $H_I^0(K)$ est de I -torsion par définition. Vérifions que $\text{Hom}(-, H_I^0(K))$ est exact à droite sur $\underline{\mathcal{C}}$. Soient $M \in \underline{\mathcal{C}}$, annulé par I^n , $N \subseteq M$ et $f : N \rightarrow H_I^0(K)$. Comme K est injectif, la composée de f et de l'inclusion $H_I^0(K) \subseteq K$ se prolonge en $v : M \rightarrow K$. Pour $x \in M$ et $a \in I^n$, $av(x) = v(ax) = v(0) = 0$: v prend ses valeurs dans $H_I^0(K)$, et fournit le prolongement cherché. La proposition 2.15 conclut. $\square$

Remarque. La démonstration a besoin de l'inclusion d'Artin-Rees $N \cap I^m M \subseteq I^n N$, avec le module ambiant dans l'intersection, comme la lecture le rétablit. Celle de la page, $N \cap I^m N \subseteq I^n N$, est triviale pour $m \geq n$ et ne sert pas. L'inclusion utile résulte du lemme d'Artin-Rees ; le théorème d'intersection de Krull qu'invoque la page ne la donne pas.

Remarque. Dans 2.15, la finitude des objets de $\underline{\mathcal{C}}$ n'intervient qu'à travers les modules mono-gènes A/I^m : pour l'injectivité, il suffit que les homomorphismes vers H se prolongent le long des inclusions $J/(J \cap I^m) \hookrightarrow A/I^m$.

Remarque. La démonstration de 2.16 n'emploie aucune finitude de M , seulement qu'il est annulé par une puissance de I ; la noethérianité n'y sert qu'à travers 2.15.

6 Cote 22 : produits de modules plats (lemme 3.3, corollaires 3.4 et 3.5)⁷

La cote 22, [EGA IV]. [Chapitre] 0 IV. Cohen, différentielles, algèbres formellement simples (Compléments), datée par l'inventaire « 1963-[vers 1967] », réunit des tirés à part, un tapuscrit annoté et des notes manuscrites. Les pages 9 à 17 sont un tapuscrit paginé de sa main 24 à 32 et corrigé à l'encre : le numéro 3 d'un chapitre adressé à un correspondant qu'il tutoie. Avant le théorème central du numéro, la page 10 (sa page 25) place trois énoncés et en donne la fonction : « il nous sera commode d'avoir un critère permettant de déduire de la propriété P une propriété de platitude » (22, lot 1, p. 10). Dans la démonstration du lemme 3.3, les mots « de type fini », qui qualifient les modules libres de la présentation, sont une addition manuscrite. Dans l'énoncé du corollaire 3.5, un passage biffé portait « de A -modules projectifs de type fini ».

Énoncé (Lemme 3.3). Soient A un anneau, $(P_i)_{i \in I}$ une famille de A -modules, $P = \prod_i P_i$ leur produit, et M un A -module de présentation finie. Alors l'homomorphisme canonique $M \otimes_A P \rightarrow \prod_i (M \otimes_A P_i)$ est un isomorphisme.

Énoncé (Corollaire 3.4). Supposons que tout A -module de type fini soit de présentation finie — par exemple A noethérien. Alors tout produit de A -modules plats est plat.

Énoncé (Corollaire 3.5). Supposons A comme en 3.4, par exemple noethérien. Soit P un A -module isomorphe à la limite projective d'un système projectif strict, admettant un système cofinal dénombrable, de A -modules projectifs. Alors P est un A -module plat.

Le corollaire 3.5 est démontré ici sous la forme à laquelle la lecture le ramène : un système $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont les applications de transition $\pi_n : P_{n+1} \rightarrow P_n$ sont surjectives, sa limite étant le sous-module de $\prod_n P_n$ formé des suites (x_n) telles que $\pi_n(x_{n+1}) = x_n$ pour tout n .

Pour un homomorphisme $g : M \rightarrow N$, notons $c_M : M \otimes P \rightarrow \prod_i (M \otimes P_i)$ l'homomorphisme canonique, $m \otimes (p_i)_i \mapsto (m \otimes p_i)_i$. Il est naturel en $M : c_N \circ (g \otimes P) = (\prod_i (g \otimes P_i)) \circ c_M$, comme on le voit sur les tenseurs purs.

Lemme 6.1. Pour tout entier n , c_{A^n} est bijectif.

Démonstration. Pour tout module N , on a l'isomorphisme $\psi_N : A^n \otimes N \rightarrow N^n$, $f \otimes x \mapsto (f_j x)_j$. Montrons que, pour $z \in A^n \otimes P$ et $i \in I$, la j -ième composante de $\psi_{P_i}(c_{A^n}(z)_i)$ est la i -ième composante de la j -ième composante de $\psi_P(z)$. Les deux membres sont additifs en z ; sur un tenseur pur $f \otimes (p_i)_i$, ils valent tous deux $f_j p_i$. Ainsi, à travers les isomorphismes ψ , l'application c_{A^n} devient l'identification évidente de $(\prod_i P_i)^n$ avec $\prod_i P_i^n$, qui est bijective. $\square$

Démonstration du lemme 3.3. C'est celle du feuillet. Le module M étant de présentation finie, il existe une suite exacte $A^m \xrightarrow{f} A^n \xrightarrow{g} M \rightarrow 0$ de modules libres de type fini. Le produit

⁷Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder22.lean.

tensoriel étant exact à droite, on obtient deux suites exactes

$$A^m \otimes P \rightarrow A^n \otimes P \rightarrow M \otimes P \rightarrow 0, \quad \prod_i (A^m \otimes P_i) \rightarrow \prod_i (A^n \otimes P_i) \rightarrow \prod_i (M \otimes P_i) \rightarrow 0,$$

la seconde parce qu'un produit de suites exactes est exact (on choisit un antécédent composante par composante). Les homomorphismes c_{A^m}, c_{A^n}, c_M forment un morphisme de la première suite dans la seconde, par naturalité de c . Les deux premiers sont bijectifs par le lemme 6.1. Le lemme des cinq, sous sa forme pour des suites exactes à droite (surjectivité à gauche, bijectivité au milieu), montre que c_M est bijectif. $\square$

Démonstration du corollaire 3.4. On démontre en fait davantage : il suffit que tout idéal de type fini de A soit de présentation finie. Soient (P_i) des modules plats et $P = \prod_i P_i$. Par le critère classique de platitude par les idéaux, il suffit de voir que, pour tout idéal J de type fini de A , l'application $J \otimes P \rightarrow A \otimes P$ induite par l'inclusion $\iota : J \rightarrow A$ est injective. Par naturalité,

$$\left(\prod_i (\iota \otimes P_i) \right) \circ c_J = c_A \circ (\iota \otimes P).$$

Le membre de gauche est injectif : c_J l'est par le lemme 3.3, J étant de présentation finie, et chaque $\iota \otimes P_i$ l'est parce que P_i est plat. Donc $\iota \otimes P$ est injectif. Sous l'hypothèse de 3.4, tout idéal de type fini, module de type fini, est de présentation finie, et l'on conclut. $\square$

Lemme 6.2. *Tout A -module de type fini est de présentation finie si et seulement si A est noethérien.*

Démonstration. Si A est noethérien, le noyau d'une surjection $A^n \rightarrow N$ est un sous-module de A^n , donc de type fini. Réciproquement, soit J un idéal de A . Le module A/J est de type fini, donc de présentation finie par hypothèse, et le noyau J de la surjection $A \rightarrow A/J$, d'un module de type fini sur un module de présentation finie, est de type fini (fait classique). Tout idéal de A est donc de type fini. $\square$

Lemme 6.3. *Le produit de deux modules plats est plat.*

Démonstration. Pour un idéal J , l'isomorphisme $J \otimes (M \times N) \simeq (J \otimes M) \times (J \otimes N)$, naturel en J , identifie $J \otimes (M \times N) \rightarrow A \otimes (M \times N)$ au produit des deux applications injectives $J \otimes M \rightarrow M$ et $J \otimes N \rightarrow N$. $\square$

Démonstration du corollaire 3.5, pour un système indexé par $\mathbb{N}$. Chaque $\pi_n : P_{n+1} \rightarrow P_n$ est surjective et P_n est projectif, donc π_n admet une section $s_n : P_n \rightarrow P_{n+1}$, $\pi_n \circ s_n = \text{id}$. Le noyau K_n de π_n est un facteur direct de P_{n+1} , un projecteur sur K_n étant $\text{id} - s_n \circ \pi_n$; il est donc projectif, en particulier plat. Soit $\Phi : \varprojlim_n P_n \rightarrow P_0 \times \prod_n K_n$ l'application

$$(x_n)_n \mapsto (x_0, (x_{n+1} - s_n(x_n))_n),$$

bien définie car $\pi_n(x_{n+1} - s_n(x_n)) = x_n - x_n = 0$, et linéaire. Elle est injective : si deux suites ont même image, elles ont même terme d'indice 0, et par récurrence, $x_{n+1} = s_n(x_n) + k_n$ déterminant x_{n+1} à partir de x_n , mêmes termes à tout indice. Elle est surjective : étant donnés $y \in P_0$ et $(k_n) \in \prod_n K_n$, la suite définie par $x_0 = y$ et $x_{n+1} = s_n(x_n) + k_n$ vérifie $\pi_n(x_{n+1}) =$

$x_n + 0$, est donc dans la limite, et a pour image $(y, (k_n))$. Ainsi $\varprojlim P_n \simeq P_0 \times \prod_n K_n$. Par le corollaire 3.4, $\prod_n K_n$ est plat; par le lemme 6.3, $P_0 \times \prod_n K_n$ l'est, et la platitude passe à un module isomorphe. $\square$

Remarque. Le lemme 3.3 vaut sur tout anneau commutatif. L'addition manuscrite « de type fini » permet à la démonstration du feuillet de se ramener aux modules A^n .

Remarque. L'hypothèse de 3.4, que tout module de type fini soit de présentation finie, équivaut à la noéthérianité (lemme 6.2). Le « par exemple A noéthérien » de la page ne désigne donc pas une classe plus large.

Remarque. Le corollaire 3.4 est vrai pour tout anneau cohérent (Chase, 1960) : la démonstration ci-dessus n'applique le lemme 3.3 qu'aux idéaux de type fini.

7 Cote 67 : modules à involution et triples (P, Q, m) ⁸

La cote 67, *Chirurgie des surfaces conformes : notes manuscrites (s.d., 1983-1984)*, lettres (1984), compte cent pages. Elle s'achève sur des notes consacrées aux courbes elliptiques réelles (pages 90 à 100). Une courbe elliptique réelle y revient à un réseau Π de rang 2 muni d'une involution qui renverse l'orientation (page 92). Pour classer ces involutions, la page 90, datée « Déc 83 », fait un détour d'algèbre linéaire sur un anneau quelconque, « par exemple » commutatif, le mot étant lu avec doute (67, lot 5, p. 90). Elle considère les k -modules M munis d'un automorphisme σ tel que $\sigma^2 = \text{id}$ et sur lesquels la multiplication par 2 est injective, et leur associe les triples (P, Q, m) . Elle établit $M_+ \cap M_- = 0$, $2M \subset M_+ \oplus M_-$, $M' \cap P = 2P$ et $M' \cap Q = 2Q$ pour $M' = 2M$, reconstitue (M, σ) à partir du triple par l'isomorphisme $2\text{id}_M : M \rightarrow M'$, et énonce la proposition. La page 91 en est le brouillon; la page 99 en tire le cas du rang 2 sur un anneau principal (67, lot 5, p. 99).

Conventions. Soit k un anneau, non nécessairement commutatif. Un k -module M est 2-régulier si $2x = 0$ entraîne $x = 0$ dans M ; on note $2M$ l'image de la multiplication par 2, qui est un sous-module puisque 2 est central. La catégorie $\mathcal{I}$ a pour objets les couples (M, σ) d'un k -module 2-régulier et d'un endomorphisme k -linéaire σ tel que $\sigma^2 = \text{id}$, et pour morphismes $(M, \sigma) \rightarrow (M', \sigma')$ les applications k -linéaires f telles que $f\sigma = \sigma'f$. On pose $M_+ = \text{Ker}(1 - \sigma)$ et $M_- = \text{Ker}(1 + \sigma)$. La catégorie $\mathcal{T}$ a pour objets les triples (P, Q, m) de deux k -modules 2-réguliers et d'un sous-module m de $P/2P \times Q/2Q$ tel que $(p, 0) \in m$ entraîne $p = 0$ et $(0, q) \in m$ entraîne $q = 0$; ses morphismes $(P, Q, m) \rightarrow (P', Q', m')$ sont les couples (f, g) d'applications linéaires $P \rightarrow P'$, $Q \rightarrow Q'$ telles que $(\bar{f} \times \bar{g})(m) \subset m'$, où $\bar{f}, \bar{g}$ sont les applications induites, qui existent puisque $f(2P) \subset 2P'$. Un sous- k -module de $P/2P \times Q/2Q$ est la même chose qu'un sous- $k/2k$ -module, 2 annihilant ce produit. Pour un triple $T = (P, Q, m)$, on note $N_T \subset P \times Q$ l'image réciproque de m : $(p, q) \in N_T$ si et seulement si $(\bar{p}, \bar{q}) \in m$.

Énoncé (Page 90, proposition $\blacklozenge$). Soit (M, σ) un objet de $\mathcal{I}$, et $P = M_+$, $Q = M_-$.

1. $P \cap Q = 0$; $x + \sigma x \in P$ et $x - \sigma x \in Q$ pour tout $x \in M$; $P \cap 2M = 2P$ et $Q \cap 2M = 2Q$.
2. Soit m l'image dans $P/2P \times Q/2Q$ de $\{(p, q) \in P \times Q \mid p + q \in 2M\}$. Pour $p \in P$, $q \in Q$, on a $(\bar{p}, \bar{q}) \in m$ si et seulement si $p + q \in 2M$, et (P, Q, m) est un objet de $\mathcal{T}$.

⁸Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder67.lean.

3. Le foncteur $B : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{I}$, $(P, Q, m) \mapsto (N_T, \text{id}_P \times (-\text{id}_Q))$, est une équivalence de catégories.

L'application $x \mapsto (x + \sigma x, x - \sigma x)$ est un isomorphisme de (M, σ) sur $B(P, Q, m)$; un quasi-inverse de B envoie donc (M, σ) sur un triple isomorphe à (M_+, M_-, m) , et le foncteur $(M, \sigma) \mapsto (P, Q, m)$ de la page est une équivalence.

Aucune hypothèse de finitude ni de projectivité n'est faite sur M , P ou Q .

Démonstration de (1). Si $x \in P \cap Q$, on a $\sigma x = x$ et $\sigma x = -x$, donc $2x = x + x = x - x = 0$, et $x = 0$ par 2-régularité. Comme $\sigma^2 = \text{id}$, $\sigma(x + \sigma x) = \sigma x + x$ et $\sigma(x - \sigma x) = -(x - \sigma x)$. Soit $p \in P$ avec $p = 2y$, $y \in M$: alors $2\sigma y = \sigma(2y) = \sigma p = p = 2y$, donc $\sigma y = y$ par 2-régularité, et $y \in P$, d'où $p \in 2P$. De même, si $q \in Q$ et $q = 2y$, alors $2\sigma y = -q = 2(-y)$, donc $\sigma y = -y$ et $y \in Q$. Les inclusions inverses $2P \subset P \cap 2M$, $2Q \subset Q \cap 2M$ sont claires. $\square$

Démonstration de (2). Si $(\bar{p}, \bar{q}) \in m$, il existe (p', q') avec $p' + q' \in 2M$, $p' - p \in 2P$ et $q' - q \in 2Q$; comme $2P$ et $2Q$ sont contenus dans $2M$, $p + q = (p' + q') - (p' - p) - (q' - q)$ est dans $2M$. La réciproque est la définition de m . Les modules P et Q sont 2-réguliers comme sous-modules de M . Si $(\bar{p}, 0) \in m$, alors $(\bar{p}, \bar{0}) \in m$, donc $p = p + 0 \in 2M$, donc $p \in 2P$ par (1), c'est-à-dire $\bar{p} = 0$; de même pour Q . $\square$

Démonstration de (3). Le foncteur. Pour $T = (P, Q, m)$, l'application $\tau = \text{id}_P \times (-\text{id}_Q)$ conserve N_T , car $-\bar{q} = \bar{q}$ dans $Q/2Q$ (puisque $-q - q = 2(-q)$); on a $\tau^2 = \text{id}$, et N_T est 2-régulier comme sous-module de $P \times Q$. Un morphisme (f, g) envoie N_T dans $N_{T'}$ par la condition $(\bar{f} \times \bar{g})(m) \subset m'$, et $f \times g$ commute à τ ; c'est le foncteur B . Pour $p \in P$ et $q \in Q$, $(2p, 0)$ et $(0, 2q)$ sont dans N_T , leurs classes étant nulles.

Fidélité. Si $B(f, g) = B(f', g')$, on évalue en $(2p, 0) : 2f(p) = 2f'(p)$, donc $f(p) = f'(p)$ par 2-régularité de P' ; de même $g = g'$ en évaluant en $(0, 2q)$.

Plénitude. Soit $h : B(T) \rightarrow B(T')$ un morphisme de $\mathcal{I}$, $T' = (P', Q', m')$. Pour $p \in P$, posons $h(2p, 0) = (a, b)$. Comme $(2p, 0)$ est fixe par τ , $(a, -b) = \tau h(2p, 0) = h(2p, 0) = (a, b)$, donc $2b = b + b = b - b = 0$ et $b = 0$. Comme $(a, 0) \in N_{T'}$, $(\bar{a}, 0) \in m'$, donc $\bar{a} = 0$ et $a \in 2P'$. La multiplication par 2 étant un isomorphisme linéaire de P' sur $2P'$, on pose $f(p) = a/2$; f est linéaire, comme composé de $p \mapsto h(2p, 0)$, de la première projection et de cet inverse. De même, $(0, 2q)$ étant changé de signe par τ , $h(0, 2q) = (0, c)$ avec $c \in 2Q'$, et l'on pose $g(q) = c/2$. Pour $(p, q) \in N_T$, on a $2(p, q) = (2p, 0) + (0, 2q)$ dans N_T , donc

$$2h(p, q) = h(2p, 0) + h(0, 2q) = (2f(p), 0) + (0, 2g(q)) = 2(f(p), g(q)),$$

et $h(p, q) = (f(p), g(q))$ par 2-régularité de $P' \times Q'$. En particulier, si $(\bar{p}, \bar{q}) \in m$, alors $(p, q) \in N_T$ et $(f(p), g(q)) = h(p, q) \in N_{T'}$, c'est-à-dire $(\bar{f(p)}, \bar{g(q)}) \in m' : (f, g)$ est un morphisme de $\mathcal{T}$, et $B(f, g) = h$.

Essentielle surjectivité. Soit (M, σ) un objet de $\mathcal{I}$ et $T = (M_+, M_-, m)$ le triple de (2). L'application $\varphi(x) = (x + \sigma x, x - \sigma x)$ est linéaire de M dans $M_+ \times M_-$ par (1), à valeurs dans N_T par (2), puisque $(x + \sigma x) + (x - \sigma x) = 2x$. Elle commute aux involutions : $\varphi(\sigma x) = (\sigma x + x, \sigma x - x) = \tau \varphi(x)$. Elle est injective : si $\varphi(x) = \varphi(y)$, alors $2x = (x + \sigma x) + (x - \sigma x) = 2y$, et $x = y$. Elle est surjective : si $(p, q) \in N_T$, alors $p + q \in 2M$ par (2), soit $p + q = 2x$; on a $2\sigma x = \sigma p + \sigma q = p - q$, donc $2(x + \sigma x) = 2p$ et $2(x - \sigma x) = 2q$, d'où $\varphi(x) = (p, q)$. Un

morphisme de $\mathcal{I}$ dont l'application sous-jacente est bijective est un isomorphisme, son inverse commutant encore aux involutions ; donc $(M, \sigma) \simeq B(T)$.

Un foncteur fidèle, plein et essentiellement surjectif est une équivalence. Si C en est un quasi-inverse, $B(C(M, \sigma)) \simeq (M, \sigma) \simeq B(M_+, M_-, m)$, et B étant pleinement fidèle, $C(M, \sigma) \simeq (M_+, M_-, m)$. $\square$

Remarque. L'énoncé tient tel que la piste le formule, pour un anneau quelconque, commutatif ou non, sans hypothèse de finitude ni de projectivité. Seule la 2-régularité sert, à trois endroits : pour $P \cap Q = 0$; pour $P \cap 2M = 2P$ et $Q \cap 2M = 2Q$, qui font que m rencontre trivialement chaque facteur ; et pour la plénitude, où un morphisme h est déterminé par sa restriction à $2P \times 2Q$, parce que $2N_T \subset 2P \times 2Q$ et que le but est 2-régulier. La démonstration suit la page. La reconstruction de (M, σ) y est l'isomorphisme φ , multiplication par 2 de M sur $M' = 2M$ lue dans $P \oplus Q$.

Remarque. La vérification énonce l'équivalence dans le sens $B : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{I}$ de la reconstruction. Elle en déduit le foncteur de la page, $(M, \sigma) \mapsto (P, Q, m)$, comme quasi-inverse, à isomorphisme près sur chaque objet. La page ne définit pas les morphismes de triples. On a pris les couples (f, g) tels que $(\bar{f} \times \bar{g})(m) \subset m'$, c'est-à-dire ceux pour lesquels $f \times g$ envoie M' dans M' . La condition sur m , que la page écrit $m \cap P/2P = 0$, $m \cap Q/2Q = 0$, est prise telle quelle ; sa traduction en graphe d'un isomorphisme entre un sous-module de $P/2P$ et un sous-module de $Q/2Q$ n'est pas formalisée.

Sixième partie

Catégories et foncteurs

Les lettres du fonds sur les catégories monoidales sont postérieures à la datation de la cote 19. Le 27 août 1974, il transpose pour Deligne les Gr-catégories de la thèse de Hoàng Xuân Sính dans le langage des champs (103, lot 1, p. 8). Le 5 février 1975, il écrit à Lawrence Breen sur les 2-catégories de Picard strictes, les gerbes et les liens (134-2, lot 3, p. 38).

8 Cote 19 : le théorème de comonadicité 1.12, la comonade sur une base produit et le théorème de Gabriel–Popescu⁹

La cote 19, *Topos : notes manuscrites (s.d.)*, quatre-vingt-quinze pages que l'inventaire date « [à partir de 1958-1973] », est un dossier de travail en neuf liasses. La première, « Tapis cartésiens » (pages 3 à 11), étudie la comonade d'une adjonction et ses coalgèbres. La page 4 énonce le « Théorème 1.12 », suivi d'un nom propre que la transcription lit « Beck » avec doute. Elle écrit « il faut et il suffit » pour b), et porte en marge la restriction « il suffit de regarder les doubles flèches u, v de A telles que $\text{Ker}(f(u), f(v))$ existe (condition C) » (19, lot 1, p. 4). La deuxième liasse, « Cohomologie relative », s'ouvre pages 14 et 15 sur la représentabilité. Pour une catégorie à générateur U , elle affirme une équivalence avec les modules sur $\text{End}(U)$, « [détails laissés au lecteur] » (19, lot 1, p. 15).

⁹Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder19.lean.

Conventions. On note, comme la lecture, $f : A \rightarrow B$ l'adjoint à gauche de $g : B \rightarrow A$, $\eta : \text{id}_A \rightarrow gf$ l'unité, $\varepsilon : fg \rightarrow \text{id}_B$ la coïunité, et $\varphi = fg$ la comonade, de comultiplication $\delta_X = f(\eta_{gX})$. Une φ -coalgèbre est un couple (X, a) , $a : X \rightarrow \varphi X$, tel que $\varepsilon_X \circ a = 1_X$ et $\delta_X \circ a = \varphi(a) \circ a$; un morphisme $(X, a) \rightarrow (X', a')$ est une flèche $t : X \rightarrow X'$ telle que $a' \circ t = \varphi(t) \circ a$. Le foncteur de comparaison $h : A \rightarrow \varphi\text{-Coalg}$ envoie Y sur $(fY, f(\eta_Y))$ et ψ sur $f(\psi)$. Le noyau $\text{Ker}(u, v)$ d'une double flèche est son égalisateur, et f y commute s'il envoie un noyau de (u, v) sur un noyau de (fu, fv) . On utilise les identités triangulaires $\varepsilon_{fY} \circ f(\eta_Y) = 1$ et $g(\varepsilon_X) \circ \eta_{gX} = 1$, et la bijection d'adjonction $t \mapsto t^b = g(t) \circ \eta_Y$, de $\text{Hom}_B(fY, X)$ sur $\text{Hom}_A(Y, gX)$, d'inverse $s \mapsto \varepsilon_X \circ f(s)$.

Définition. Le foncteur f vérifie la condition C si, pour toute double flèche (u, v) de A telle que $\text{Ker}(fu, fv)$ existe, $\text{Ker}(u, v)$ existe et f y commute. Un triplet (e, s, t) formé de $e : E \rightarrow Y$, $s : Y \rightarrow E$ et $t : Z \rightarrow Y$ est un noyau scindé de $u, v : Y \rightrightarrows Z$ si $ue = ve$, $se = 1_E$, $tu = 1_Y$ et $tv = es$. Une double flèche (u, v) de A est f -scindée si (fu, fv) admet un noyau scindé.

Énoncé (Théorème 1.12, page 4). Soit $f \dashv g$ une adjonction, $\varphi = fg$, et h le foncteur de comparaison.

- a) Si les noyaux de doubles flèches existent dans A et si f y commute, alors h est essentiellement surjectif.
- b) h est une équivalence si et seulement si f est conservatif et si, pour toute double flèche (u, v) de A telle que $\text{Ker}(fu, fv)$ existe, $\text{Ker}(u, v)$ existe et f y commute.

La restriction portée en marge — il suffit de considérer les doubles flèches (u, v) dont l'image par f a un noyau — est la condition C.

Lemme 8.1. Si (e, s, t) est un noyau scindé de (u, v) , alors e est un noyau de (u, v) , et l'image de (e, s, t) par tout foncteur est un noyau scindé de l'image de (u, v) .

Démonstration. Soit $z : T \rightarrow Y$ avec $uz = vz$. Alors $z = tuz = tvz = e(sz)$, donc z se factorise par e , et de façon unique, puisque $ez' = ez''$ entraîne $z' = sez' = sez'' = z''$. Les quatre conditions sont des égalités entre composés, qu'un foncteur conserve. $\square$

Lemme 8.2. Pour toute coalgèbre (X, a) , la double flèche $(\eta_{gX}, g(a)) : gX \rightrightarrows gf gX$ est f -scindée : $(a, \varepsilon_X, \varepsilon_{fgX})$ est un noyau scindé de $(f(\eta_{gX}), fg(a))$. Elle est de plus coréflexive : $g(\varepsilon_X)$ est une rétraction commune de η_{gX} et de $g(a)$.

Démonstration. On a $f(\eta_{gX}) \circ a = \delta_X \circ a = \varphi(a) \circ a = fg(a) \circ a$ par coassociativité ; $\varepsilon_X \circ a = 1_X$ par l'axiome de coïunité ; $\varepsilon_{fgX} \circ f(\eta_{gX}) = 1$ par l'identité triangulaire en gX ; et $\varepsilon_{fgX} \circ fg(a) = a \circ \varepsilon_X$ par naturalité de ε . Enfin $g(\varepsilon_X) \circ g(a) = g(\varepsilon_X \circ a) = 1$ et $g(\varepsilon_X) \circ \eta_{gX} = 1$. $\square$

Lemme 8.3. Supposons que, pour toute coalgèbre (X, a) , la double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ ait un noyau $e_X : R(X, a) \rightarrow gX$ et que f y commute.

1. Pour tout $Y \in A$, $t \mapsto t^b$ induit une bijection entre les morphismes de coalgèbres $hY \rightarrow (X, a)$ et les flèches $k : Y \rightarrow R(X, a)$, par $t^b = e_X \circ k$.
2. Pour toute coalgèbre (X, a) , la flèche $\theta = \varepsilon_X \circ f(e_X)$ est un isomorphisme de coalgèbres de $h(R(X, a))$ sur (X, a) ; en particulier h est essentiellement surjectif.
3. Si de plus f est conservatif, h est une équivalence.

Démonstration. (1) Soit $t : fY \rightarrow X$. Les transposées des deux membres de $a \circ t = \varphi(t) \circ f(\eta_Y)$ sont $g(a) \circ t^b$ et, puisque $\varphi(t) \circ f(\eta_Y) = f(t^b)$, $gf(t^b) \circ \eta_Y = \eta_{gX} \circ t^b$ par naturalité de η . La transposition étant bijective, t est un morphisme de coalgèbres si et seulement si t^b égalise $(\eta_{gX}, g(a))$, c'est-à-dire se factorise, de façon unique, par e_X .

(2) Posons $E = R(X, a)$. Par (1) appliqué à $k = 1_E$, la flèche θ , de transposée e_X , est un morphisme de coalgèbres $hE \rightarrow (X, a)$, et $a \circ \theta = \varphi(\theta) \circ f(\eta_E) = f(\theta^b) = f(e_X)$. Or a est un noyau de $(f(\eta_{gX}), fg(a))$ par les lemmes 8.1 et 8.2, et $f(e_X)$ en est un par hypothèse; donc θ est un isomorphisme. Son inverse est un morphisme de coalgèbres :

$$\varphi(\theta^{-1}) \circ a = \varphi(\theta^{-1}) \circ a \circ \theta \circ \theta^{-1} = \varphi(\theta^{-1}) \circ \varphi(\theta) \circ f(\eta_E) \circ \theta^{-1} = f(\eta_E) \circ \theta^{-1}.$$

(3) Soit $Y' \in A$. La flèche $\eta_{Y'}$ égalise $(\eta_{gfY'}, gf(\eta_{Y'}))$, par naturalité de η ; c'est la double flèche attachée à la coalgèbre $hY' = (fY', f(\eta_{Y'}))$, et l'on a donc $\eta_{Y'} = e_{hY'} \circ k_{Y'}$ pour une flèche $k_{Y'} : Y' \rightarrow R(hY')$. Appliquons $f : f(\eta_{Y'})$ est un noyau de l'image de cette double flèche (lemmes 8.1 et 8.2, avec $a = f(\eta_{Y'})$), $f(e_{hY'})$ aussi par hypothèse, et $f(e_{hY'}) \circ f(k_{Y'}) = f(\eta_{Y'})$; donc $f(k_{Y'})$ est un isomorphisme, et $k_{Y'}$ aussi, f étant conservatif. Pour $\psi : Y \rightarrow Y'$, la transposée de $h(\psi) = f(\psi)$ est $gf(\psi) \circ \eta_Y = \eta_{Y'} \circ \psi = e_{hY'} \circ (k_{Y'} \circ \psi)$: dans la bijection (1), $h(\psi)$ correspond à $k_{Y'} \circ \psi$. Comme $\psi \mapsto k_{Y'} \circ \psi$ est bijective, h est pleinement fidèle; il est essentiellement surjectif par (2), c'est donc une équivalence. $\square$

Démonstration de a) et de la suffisance de b). Si f vérifie la condition C, chaque double flèche $(\eta_{gX}, g(a))$ a un noyau auquel f commute, puisque son image a un noyau (lemmes 8.2 et 8.1). Le lemme 8.3 (2) donne alors a) sous la forme de la marge, et la forme du texte s'en déduit, car si tous les noyaux existent dans A et que f y commute, la condition C est vérifiée. Si de plus f est conservatif, h est une équivalence par le lemme 8.3 (3). $\square$

La nécessité de b) est fausse. Soit B la catégorie des couples d'ensembles (X, Y) , et A la sous-catégorie pleine des couples tels que $Y \neq \emptyset$ entraîne $X \neq \emptyset$; f est l'inclusion. Posons $g(X, Y) = (X, Y)$ si $X \neq \emptyset$ et $g(X, Y) = (\emptyset, \emptyset)$ sinon; $g(X, Y)$ est dans A . Pour $(X', Y') \in A$, une flèche $(p, q) : (X', Y') \rightarrow (X, Y)$ de B se factorise de façon unique par $g(X, Y) \rightarrow (X, Y)$: si $Y' \neq \emptyset$, alors $X' \neq \emptyset$, donc $X \neq \emptyset$; si $Y' = \emptyset$, q est l'application vide. Ainsi $f \dashv g$, et f est une inclusion coréflexive. Une telle inclusion est pleinement fidèle, donc conservative, et comonadique : c'est classique — la comonade est idempotente, et ses coalgèbres sont, à isomorphisme près, les objets de A . Le foncteur h est donc une équivalence.

Mais f ne vérifie pas la condition C. Soient $u, v : (*, *) \rightrightarrows (\{0, 1\}, *)$ les flèches de A qui envoient le point de la première composante sur 0 et sur 1 et sont l'identité sur la seconde. Leur noyau dans B existe, c'est $(\emptyset, *)$. Si $K \rightarrow (*, *)$ était un noyau de (u, v) dans A auquel f commute, K serait isomorphe à $(\emptyset, *)$, de seconde composante non vide; étant dans A , il

aurait un point x dans sa première composante, et u et v l'enverraient sur le même élément, c'est-à-dire $0 = 1$: c'est absurde. Le noyau de (u, v) dans A est $(\emptyset, \emptyset)$, et f n'y commute pas. $\square$

Énoncé (Théorème de Beck, forme exacte). *Le foncteur h est une équivalence si et seulement si f est conservatif et si, pour toute double flèche f -scindée (u, v) de A , $\text{Ker}(u, v)$ existe et f y commute.*

Démonstration. La condition est suffisante par les lemmes 8.2 et 8.3 (3), qui n'utilisent que des doubles flèches f -scindées. Elle est nécessaire. Si $f(\psi)$ est inversible, $h(\psi)$ est un morphisme de coalgèbres dont la flèche sous-jacente est inversible, donc un isomorphisme de coalgèbres (le calcul de (2) ci-dessus), et ψ est inversible parce que h , pleinement fidèle, reflète les isomorphismes. Que le foncteur d'oubli des coalgèbres, donc f , crée les noyaux des doubles flèches f -scindées est la partie classique du théorème de Beck, que la preuve vérifiée invoque. $\square$

Une base produit. Les pages 7 à 11 reprennent la comonade d'une adjonction quand la base est un produit $B = \prod_{i \in I} B_i$: f est une famille $f_i : A \rightarrow B_i$, g envoie (X_i) sur $\prod_i g_i(X_i)$, et la page pose $\varphi_{ji} = f_j g_i$ en supposant « que les f_j commutent aux produits de type I (p. ex. f_j exacts ; ou I fini) » (19, lot 1, p. 7). Les données de la comonade y deviennent (3.9) $\bar{\alpha}_k = \alpha_k(X_k) \circ \text{pr}_k$ et $\bar{\lambda}_{kji} = \lambda_{kji}(X_i) \circ \text{pr}_i$, avec $\lambda_{kji} : \varphi_{ki} \rightarrow \varphi_{kj} \varphi_{ji}$ venu de l'unité $\text{id} \rightarrow g_j f_j$; la marge note que λ_{iii} est λ_i , et le cas de deux facteurs, g', g'' pleinement fidèles, ne laisse que $\varphi', \varphi'', \lambda', \lambda''$ (19, lot 1, p. 9). On se donne ici des adjonctions $f_i \dashv g_i$, $f_i : A \rightarrow B_i$, et l'on suppose que A a les produits indexés par I ; on note η_i, ε_i leurs unités et coïunités, pr_i les projections de $\prod_i g_i(X_i)$, et $\lambda_{kji}(X) = f_k(\eta_{j, g_i X}) : f_k g_i X \rightarrow f_k g_j f_j g_i X$.

Énoncé (Pages 7 et 8, la matrice de la comonade $\blacklozenge$). 1. *Le foncteur $f = (f_i) : A \rightarrow \prod_i B_i$*

est adjoint à gauche de g , $g((X_i)) = \prod_i g_i(X_i)$; l'unité a pour composantes les η_i , et la coïunité en (X_i) a pour composante j la flèche $\varepsilon_{j, X_j} \circ f_j(\text{pr}_j)$.

2. *Si f_j commute aux produits indexés par I , la composante j de $\varphi((X_i))$ est un produit des $\varphi_{ji}(X_i)$, de projections les $f_j(\text{pr}_i)$.*

3. *Sans autre hypothèse, la coïunité de φ a pour composante k la flèche $\varepsilon_{k, X_k} \circ f_k(\text{pr}_k)$, et la composante k de la comultiplication δ vérifie, pour tous j et i ,*

$$f_k g_j f_j(\text{pr}_i) \circ f_k(\text{pr}_j) \circ \delta_k = \lambda_{kji}(X_i) \circ f_k(\text{pr}_i) :$$

c'est (3.9). Si tous les f_j commutent aux produits indexés par I , ces égalités caractérisent δ_k .

4. *Pour $i = j = k$, λ_{iii} est la comultiplication de la comonade $\varphi_i = f_i g_i$.*

Démonstration. (1) La bijection $\text{Hom}(fY, (X_i)) = \prod_i \text{Hom}(f_i Y, X_i) \simeq \prod_i \text{Hom}(Y, g_i X_i) \simeq \text{Hom}(Y, \prod_i g_i X_i)$ est naturelle en Y et en (X_i) , composante par composante ; l'unité est l'image

de l'identité, c'est-à-dire la flèche de composantes $\eta_{i,Y}$, et la coïunité l'image réciproque de l'identité, de composante j la transposée de pr_j , soit $\varepsilon_{j,X_j} \circ f_j(\text{pr}_j)$.

(2) Le cône (pr_i) est un produit dans A , et f_j envoie un produit sur un produit : le cône $(f_j(\text{pr}_i))$ de sommet $f_j(\prod_i g_i X_i)$ est un produit de la famille $f_j g_i(X_i)$.

(3) La coïunité de φ est celle de l'adjonction, calculée en (1). La composante k de δ est $f_k(\eta_{gX})$, où η est l'unité de (1), dont la composante j est η_j . Donc δ_k suivie de $f_k(\text{pr}_j)$ puis de $f_k g_j f_j(\text{pr}_i)$ vaut $f_k(g_j f_j(\text{pr}_i) \circ \eta_{j,gX}) = f_k(\eta_{j,g_i X_i} \circ \text{pr}_i)$, par naturalité de η_j , c'est-à-dire $\lambda_{kji}(X_i) \circ f_k(\text{pr}_i)$. Si les f_j commutent aux produits indexés par I , $f_k(\prod_j g_j f_j gX)$ est un produit de projections $f_k(\text{pr}_j)$; g_j , adjoint à droite, commute aux produits, si bien que $f_k g_j f_j(\prod_i g_i X_i)$ est un produit de projections $f_k g_j f_j(\text{pr}_i)$. Deux flèches qui ont les mêmes composées avec toutes ces projections sont égales.

(4) $\lambda_{iii}(X) = f_i(\eta_{i,g_i X})$ est, par définition, la comultiplication de $f_i g_i$. $\square$

Énoncé (Pages 7 à 9, les cas dégénérés et les deux facteurs $\blacklozenge$). *Supposons les g_i pleinement fidèles.*

1. $\varepsilon_i : \varphi_{ii} \rightarrow \text{id}_{B_i}$ est un isomorphisme ; λ_{kki} et λ_{kjj} sont des isomorphismes pour tous i, j, k .
2. Pour $i \neq j$, $\lambda_{iji} = \lambda' \circ \varepsilon_i$, où $\lambda' = \lambda_{iji} \circ \varepsilon_i^{-1} : \text{id}_{B_i} \rightarrow \varphi_{ij} \varphi_{ji}$.
3. Pour deux facteurs, $B = B' \times B''$, $\varphi' = f' g''$, $\varphi'' = f'' g'$: si f' commute aux produits binaires, la composante B' de $\varphi(X', X'')$ est un produit de X' et de $\varphi'(X'')$, de projections $\varepsilon'_{X'} \circ f'(\text{pr}')$ et $f'(\text{pr}'')$; de même, si f'' y commute, la composante B'' est un produit de $\varphi''(X')$ et de X'' .

Démonstration. (1) Un adjoint à droite pleinement fidèle a une coïunité inversible. L'identité triangulaire $\varepsilon_{k,f_k Y} \circ f_k(\eta_{k,Y}) = 1$ montre alors que $f_k(\eta_{k,Y})$ est l'inverse de $\varepsilon_{k,f_k Y}$; avec $Y = g_i X$, c'est $\lambda_{kki}(X)$. L'autre identité, $g_j(\varepsilon_{j,X}) \circ \eta_{j,g_j X} = 1$, montre que $\eta_{j,g_j X}$ est l'inverse de $g_j(\varepsilon_{j,X})$, et $\lambda_{kjj}(X) = f_k(\eta_{j,g_j X})$ est inversible.

(2) C'est la définition de λ' .

(3) Par (2) de l'énoncé précédent, la composante B' de $\varphi(X', X'')$ est un produit de $f' g'(X')$ et de $f' g''(X'')$; remplacer la première projection par sa composée avec l'isomorphisme $\varepsilon'_{X'}$ donne encore un produit, de facteurs X' et $\varphi'(X'')$. De même pour B'' . $\square$

Énoncé (Page 7, «ou I fini» $\blacklozenge$). *Il existe des adjonctions $f_i \dashv g_i$, avec I à deux éléments, pour lesquelles la composante j de $\varphi((X_i))$ n'est isomorphe au produit des $\varphi_{ji}(X_i)$ pour aucun choix d'isomorphisme.*

Démonstration. Prenons $I = \{0, 1\}$, $A = B_0 = B_1$ la catégorie des ensembles, $f_i(Y) = \{0, 1\} \times Y$ et $g_i(X) = X^{\{0,1\}}$, l'adjonction étant la curryfication, et $X_0 = X_1 = *$. Alors $g_i(*) = *$, $\prod_i g_i(X_i) = *$ et la composante j de $\varphi(X)$ est $\{0, 1\} \times *$, à deux éléments, tandis que $\prod_i \varphi_{ji}(X_i) = (\{0, 1\} \times *)^2$ en a quatre. $\square$

Remarque. L'hypothèse de la page, que les f_j commutent aux produits indexés par I , est celle qui sert, et elle suffit. Elle en donne deux exemples. Le premier est juste, un foncteur exact à

gauche commutant aux produits finis. Le second est faux : un adjoint à gauche ne commute pas en général aux produits finis, et l'exemple ci-dessus est un cas où la formule $\text{pr}_j \varphi((X_i)) = \prod_i \varphi_{ji}(X_i)$ est fausse avec I fini. La lecture reprend la parenthèse de la page («ce qui est automatique si I est fini, ou si les f_j sont exacts»). Il faut l'exactitude, ou directement la commutation aux produits.

Remarque. Les formules (3.9) ne demandent aucune hypothèse : elles décrivent les composées de la coïunité et de la comultiplication avec les projections. La commutation des f_j aux produits sert seulement à en déduire que ces données forment une matrice, c'est-à-dire qu'elles déterminent φ et δ . Les cas « dégénérés » de la page 8, $i = j$ ou $j = k$, sont, pour des g_i pleinement fidèles, ceux où λ_{kji} est un isomorphisme ; il ne reste donc, pour deux facteurs, que λ' et λ'' . La formule $\varphi(X', X'') = (X' \times \varphi'(X''), \varphi''(X') \times X'')$ demande encore que f' et f'' commutent aux produits binaires, ce que la page tient de son hypothèse générale.

Énoncé (Pages 14 et 15 ♦ 4). Soient C une catégorie de Grothendieck, U un générateur de C et $R = \text{End}_C(U)$. Le foncteur $\text{Hom}_C(U, -) : C \rightarrow \mathbf{Mod}_R$, à valeurs dans les R -modules à droite, est pleinement fidèle, et son adjoint à gauche $- \otimes_R U$ est exact.

Démonstration. La fidélité de $\text{Hom}_C(U, -)$ est la définition d'un générateur. La pleine fidélité et l'exactitude à gauche de $- \otimes_R U$ sont le théorème de Gabriel–Popescu (1964), classique, que la preuve vérifiée invoque ; l'exactitude à droite vient de ce que $- \otimes_R U$ est un adjoint à gauche. $\square$

Remarque. Sous la forme de la marge, a) n'utilise que la condition C, et non la conservativité ; la suffisance de b) est le théorème de comonadicité de Beck.

Remarque. La nécessité de b), que la page affirme par « il faut et il suffit », est fausse : l'exemple ci-dessus est une adjonction comonadique dont l'adjoint à gauche ne vérifie pas la condition C. L'erreur est sur la page. La condition b) ne coïncide pas avec le théorème de Beck sous sa forme précise, qui caractérise les adjonctions comonadiques par une condition nécessaire et suffisante.

Remarque. Toute double flèche f -scindée est une double flèche dont l'image a un noyau (lemme 8.1), et la réciproque est fausse. La condition C est donc plus forte que celle de Beck : suffisante, elle n'est pas nécessaire.

Remarque. Pour un générateur seul, la page affirme une équivalence $C \simeq \mathbf{Mod}_R$. Seul le plongement pleinement fidèle est acquis, et la lecture retient cette forme.

9 Cote 133 : le centre et le groupe dérivé vus par deux modules croisés¹⁰

La cote 133, [*Groupes de Witt et formes quadratiques, groupes formels*] : notes manuscrites (s.d.), tirés à part (1974), que l'inventaire date « 1974-[à partir de 1975] », réunit sept suites distinctes. La dernière, sous une chemise titrée « Fourbis auxiliaires cohomologiques pour groupes formels » (page 44), occupe les pages 45 à 53, qu'il pagine de 1 à 7 ; les pages 47

¹⁰Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder133.lean.

et 49 ne sont pas de sa main. Elle traite en général le problème que la « Solution » des pages 35 et 36 pose pour un groupe formel : décrire un groupe G par son centre et son groupe dérivé. La page 45 se donne deux modules croisés $\mathcal{C} = (N \rightarrow M)$ et $\mathcal{C}' = (N' \rightarrow M')$ de mêmes invariants π_0, π_1 , et note $K = G/\pi_1$ (133, lot 3, p. 45). La page 46 définit $\mathfrak{Z} = [\text{Cent}(K)/(N'/\pi_1)] \cap \text{Ker } \Theta$, construit φ_G puis Ψ_G , et encadre « Ψ_G injectif » comme équivalent à $N' = \text{Cent}(G)$ (133, lot 3, p. 46). La page 48 définit l'accouplement c_E d'une extension centrale E de π_0 par π_1 et écrit « On doit trouver, au signe près » $\Psi_{G_1} = \Psi_G + \tilde{c}_E \alpha$ (133, lot 3, p. 48). Les pages 51 et 52 définissent $\mathcal{D} = (N_{\text{ab}})_M$ et λ_G , et écrivent $N/DG \simeq \mathcal{D}/\lambda_G(\pi_0 \otimes \pi_0)$ et $\lambda_{G_1} = \lambda_G + \beta c_E$ (133, lot 3, p. 51, 133, lot 3, p. 52). Malgré le titre, rien n'y est propre aux groupes formels, et les énoncés sont démontrés ici pour des groupes abstraits.

Conventions. Le commutateur est $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. Dans tout ce qui suit, G est un groupe, N et N' deux sous-groupes distingués, avec $N' \subset \text{Cent}(G)$; alors $[N, N'] = 1$, $\pi_1 = N \cap N'$ est central, $\pi_0 = G/NN'$, $K = G/\pi_1$, $M = G/N'$ agit sur N par conjugaison, et $\Theta : M \rightarrow \text{Aut}(N)$ est cette action. Le groupe $\mathfrak{Z}$ est pris par son image inverse $\overline{N'}$ dans G : les $z \in G$ dont l'image dans K est centrale et qui commutent à tout élément de N , c'est-à-dire tels que $[g, z] \in \pi_1$ pour tout $g \in G$ et $nz = zn$ pour tout $n \in N$. On a $N' \subset \overline{N'}$ et $\mathfrak{Z} = \overline{N'}/N'$.

Lemme 9.1. *Si c est central dans un groupe, $[g, zc] = [g, z]$ et $[gc, z] = [g, z]$.*

Démonstration. $[g, zc] = gzcg^{-1}c^{-1}z^{-1} = gzg^{-1}cc^{-1}z^{-1} = [g, z]$, en faisant passer c devant g^{-1} . La seconde s'en déduit par $[x, y]^{-1} = [y, x]$. $\square$

Énoncé (Page 46, l'injectivité de Ψ_G ♦). *Pour $z \in \overline{N'}$, l'application $g \mapsto [g, z]$ définit un homomorphisme $\varphi_G(z) : \pi_0 \rightarrow \pi_1$, qui ne dépend que de la classe de z dans $\mathfrak{Z}$; l'application $\Psi_G : \mathfrak{Z} \rightarrow \text{Hom}(\pi_0, \pi_1)$ ainsi définie est un homomorphisme, et*

$$N' = \text{Cent}(G) \iff \Psi_G \text{ est injectif.}$$

Démonstration. Soit $z \in \overline{N'}$. Par définition $[g, z] \in \pi_1$, donc $[g, z]$ est central. On a $[gh, z] = g[h, z]zg^{-1}z^{-1}$; comme $[h, z]$ est central, c'est $[h, z][g, z] = [g, z][h, z]$, et $g \mapsto [g, z]$ est un homomorphisme $G \rightarrow \pi_1$. Il est trivial sur N , puisque z commute à N , et sur N' , qui est central; il se factorise donc par $\pi_0 = G/NN'$, ce qui définit $\varphi_G(z)$. Si z et w ont même classe modulo N' , $w = zc$ avec $c \in N'$ central, et $[g, w] = [g, z]$ par le lemme 9.1 : d'où Ψ_G sur $\mathfrak{Z}$. Il est multiplicatif : $[g, zw] = gzg^{-1}[g, w]z^{-1} = [g, z][g, w]$, puisque $[g, w]$ est central.

Supposons Ψ_G injectif et soit $c \in \text{Cent}(G)$. Alors $c \in \overline{N'}$, et $\Psi_G(\bar{c})$ est trivial, comme $\Psi_G(1)$: donc $\bar{c} = 1$ dans $\mathfrak{Z}$, c'est-à-dire $c \in N'$. Ainsi $\text{Cent}(G) \subset N'$, et l'égalité vient de $N' \subset \text{Cent}(G)$.

Réciproquement, supposons $N' = \text{Cent}(G)$, et soient $z, w \in \overline{N'}$ avec $\Psi_G(\bar{z}) = \Psi_G(\bar{w})$, c'est-à-dire $[g, z] = [g, w]$ pour tout g . Appliquée à g^{-1} , l'égalité donne $zgz^{-1} = wgw^{-1}$, d'où $gz^{-1}w = z^{-1}(zgz^{-1})w = z^{-1}(wgw^{-1})w = z^{-1}wg : z^{-1}w$ est central, donc dans N' , et $\bar{z} = \bar{w}$. $\square$

Remarque. Seule l'hypothèse $N' \subset \text{Cent}(G)$ sert. L'hypothèse $[N, N'] = 1$ que la lecture ajoute en découle, et $N \supset D(G)$ n'intervient pas ici. La vérification confirme les contrôles d'additivité et de nullité que la lecture fournit et que la page résume par « triviale sur N' et sur $\mathfrak{Z}$ ». Elle établit en chemin que $\text{Cent}(G)$ est l'image inverse de $\text{Ker } \Psi_G$, ce que la page dit « clair ».

On suppose maintenant de plus $D(G) \subset N$. Soit $\mathcal{D} = (N_{\text{ab}})_M$; c'est le quotient $N/[G, N]$, le sous-groupe $[G, N]$ engendré par les $[g, n]$ contenant les $[n, n']$. On note $\bar{n}$ la classe dans $\mathcal{D}$ d'un $n \in N$.

Lemme 9.2. *Le groupe $\mathcal{D}$ est commutatif, G y agit trivialement, et π_0 est commutatif.*

Démonstration. Pour $a, b \in N$, $(ab)^{-1}(ba) = [b^{-1}, a^{-1}] \in [G, N]$, donc $\bar{a}\bar{b} = \bar{b}\bar{a}$. Pour $c \in N$ et $x \in G$, $(xcx^{-1})^{-1}c = [x, c^{-1}] \in [G, N]$, donc $\overline{xcx^{-1}} = \bar{c}$. Pour $x, y \in G$, $(xy)^{-1}(yx) = [y^{-1}, x^{-1}] \in D(G) \subset N \subset NN'$, donc xy et yx ont même image dans π_0 . $\square$

Énoncé (Pages 51 et 52, la surjectivité de λ_G ♦). *Supposons $D(G) \subset N$ et $N' \subset \text{Cent}(G)$. L'application $(x, y) \mapsto \overline{[x, y]}$ définit une forme $\lambda_G : \pi_0 \times \pi_0 \rightarrow \mathcal{D}$, multiplicative en chaque variable et alternée, et*

$$N = D(G) \iff \lambda_G \text{ est surjectif}$$

c'est-à-dire si et seulement si les valeurs de λ_G engendrent $\mathcal{D}$.

Démonstration. Pour y fixé, $x \mapsto \overline{[x, y]}$ est un homomorphisme $G \rightarrow \mathcal{D} : [xx', y] = (x[x', y]x^{-1})[x, y]$, et le lemme 9.2 donne $\overline{[xx', y]} = \overline{[x', y]} \overline{[x, y]} = \overline{[x, y]} \overline{[x', y]}$. Il est trivial sur N , car $[n, y] = [y, n]^{-1} \in [G, N]$, et sur N' , car $[n', y] = 1$ pour n' central ; il se factorise donc par π_0 . Comme $\overline{[x, y]} = \overline{[y, x]}^{-1}$, la même chose vaut pour la seconde variable, et λ_G est bien défini sur $\pi_0 \times \pi_0$, multiplicatif en chaque variable ; $[x, x] = 1$ le rend alterné.

Si $N = D(G)$, tout $n \in N$ est produit de commutateurs et de leurs inverses ; sa classe $\bar{n}$ est le produit correspondant de valeurs de λ_G et de leurs inverses, et ces valeurs engendrent $\mathcal{D}$. Réciproquement, les valeurs de λ_G sont des classes d'éléments de $D(G)$, donc le sous-groupe qu'elles engendrent est contenu dans l'image de $D(G)$ dans $\mathcal{D}$. S'il est égal à $\mathcal{D}$, tout $n \in N$ s'écrit $n = m(m^{-1}n)$ avec $m \in D(G)$ et $m^{-1}n \in [G, N] \subset D(G)$; donc $N \subset D(G)$, et $N = D(G)$. $\square$

Remarque. Comme $\mathcal{D}$ est commutatif et λ_G bimultiplicatif, λ_G définit une application linéaire $\pi_0 \otimes \pi_0 \rightarrow \mathcal{D}$, dont l'image est le sous-groupe engendré par les valeurs de λ_G ; c'est la surjectivité de la page. L'hypothèse $N' \subset \text{Cent}(G)$ est nécessaire à la définition même de λ_G sur π_0 , et la lecture la cite (« puisque N' est central »). L'hypothèse plus faible $[N, N'] = 1$ ne suffit pas à l'équivalence. Dans le groupe des quaternions Q_8 , avec $N = D(Q_8) = \text{Cent}(Q_8)$, d'ordre 2, et $N' = Q_8$, on a $[N, N'] = 1$ et $\pi_0 = 1$, donc toute forme sur π_0 est nulle, alors que $\mathcal{D} = N/[G, N] = N$ n'est pas trivial (exemple non vérifié en Lean). La commutativité de π_0 découle de $D(G) \subset N$ (lemme 9.2) et n'est pas une hypothèse de plus. L'isomorphisme $N/D(G) \simeq \mathcal{D}/\lambda_G(\pi_0 \otimes \pi_0)$ de la page n'est démontré ici que sous la forme de l'équivalence.

Soient enfin E un groupe, $\iota : \pi_1 \rightarrow E$ un homomorphisme injectif d'image centrale, et $q : E \rightarrow \pi_0$ un homomorphisme de noyau $\iota(\pi_1)$: une extension centrale de π_0 par π_1 , si q est surjectif, ce dont on ne se sert pas. Soit $G \times_{\pi_0} E$ le produit fibré et G_1 son quotient par l'image antidiagonale $\{(a, \iota(a)^{-1})\}$ de π_1 , centrale, prise en Lean par son sous-groupe distingué engendré.

Énoncé (Pages 48 et 52, le changement de G en G_1 ♦). *Supposons $D(G) \subset N$ et $N' \subset \text{Cent}(G)$.*

1. Pour $e, f \in E$, $[e, f] = \iota(c_E(e, f))$ pour un unique $c_E(e, f) \in \pi_1$, qui ne dépend que des images de e et f dans π_0 .
2. Dans G_1 , le commutateur des classes de (g, e) et (z, f) est la classe de $([g, z] c_E(e, f), 1)$.
3. En particulier, si $z \in \overline{N'}$, ce commutateur est l'image de $\Psi_G(\bar{z})(\bar{g}) c_E(e, f) \in \pi_1$; et la classe dans $\mathcal{D}$ de $[x, y] c$, pour $c \in \pi_1$, est $\lambda_G(\bar{x}, \bar{y}) \beta(c)$, où $\beta : \pi_1 \rightarrow \mathcal{D}$ est le passage au quotient.

Démonstration. (1) L'image de $[e, f]$ dans π_0 est le commutateur des images, trivial puisque π_0 est commutatif; $[e, f]$ est donc dans $\text{Ker } q = \iota(\pi_1)$, et ι est injectif. Si e et e' ont même image, $e' = e \iota(a)$, et de même $f' = f \iota(b)$; comme $\iota(a)$ et $\iota(b)$ sont centraux, le lemme 9.1 donne $[e', f'] = [e, f]$.

(2) Le commutateur de (g, e) et (z, f) dans le produit fibré est $([g, z], [e, f]) = ([g, z], \iota(c))$, $c = c_E(e, f)$, et

$$([g, z], \iota(c))^{-1} ([g, z] c, 1) = (c, \iota(c)^{-1})$$

est dans l'image antidiagonale de π_1 ; les deux éléments ont donc même classe dans G_1 . L'élément $([g, z] c, 1)$ est bien dans le produit fibré, $[g, z] c$ étant dans N .

(3) Si $z \in \overline{N'}$, $[g, z] = \Psi_G(\bar{z})(\bar{g})$ par définition. La seconde assertion est $\overline{[x, y] c} = \overline{[x, y]} \bar{c}$. $\square$

Remarque. Ce calcul porte les deux formules de la page, $\Psi_{G_1} = \Psi_G + \tilde{c}_E \alpha$ et $\lambda_{G_1} = \lambda_G + \beta c_E$, écrites additivement : dans G_1 , un commutateur est le produit du commutateur dans G et de la valeur de c_E . L'ordre des facteurs fixe le signe que la page laisse ouvert (« au signe près »). Avec $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ et $\Psi_G(\bar{z})(\bar{g}) = [g, z]$, le terme correctif est $c_E(\bar{g}, \bar{z})$, c'est-à-dire $\tilde{c}_E(\alpha(\bar{z}))$ évalué en $\bar{g}$, au signe près selon le côté où l'on curryfie. L'identification des deux modules croisés de G_1 avec ceux de G n'est pas formalisée; elle ferait de cette égalité d'éléments une égalité d'applications $\Psi_{G_1} = \Psi_G \cdot \tilde{c}_E \alpha$ sur un même $\mathfrak{J}$.

10 Cote 161-1 : la partie fixe d'une adjonction, les adjonctions idempotentes, les objets locaux¹¹

La cote 161-1, *Catégories : notes manuscrites (s.d.)*, dix-neuf pages sans date, appartient au groupe des dossiers rassemblés par Grothendieck sur différentes thématiques, que l'inventaire date « [après 1961-vers 1977] ». Les pages 3 à 7 étudient ce qu'un couple de foncteurs adjoints $E \rightleftarrows F$ induit entre les deux catégories. La page 3 s'ouvre sur « Foncteurs adjoints [demander Schanuel] » et écrit le critère (1) de pleine fidélité sur une sous-catégorie pleine. Elle porte en marge « donner un exemple montrant que cette condition n'est pas surabondante, avec E' réduit à un élément » (161-1, lot 1, p. 3). La page 5 dresse la liste des conditions équivalentes qui définissent aujourd'hui une adjonction idempotente (161-1, lot 1, p. 5). La page 7 se demande si une sous-catégorie réflexive est le lieu des objets locaux pour les flèches que le réflecteur inverse, et conclut « Or c'est vrai sauf erreur... » (161-1, lot 1, p. 7). On note, comme la lecture, u l'adjoint à gauche de v , $\eta : \text{id}_E \rightarrow vu$ l'unité et $\varepsilon : uv \rightarrow \text{id}_F$ la coïunité (le manuscrit écrit i et j).

¹¹Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder161_1.lean.

Énoncé ((1), page 3). Soient $E' \subset E$ une sous-catégorie pleine et $\overline{E'}$ sa clôture par isomorphie. Alors

$$u|_{E'} \text{ est pleinement fidèle et } vu(E') \subset \overline{E'}$$

$$\iff \text{ pour tout } Y \in E', \eta_Y : Y \rightarrow vu(Y) \text{ est un isomorphisme.}$$

La seconde condition du membre de gauche n'est pas surabondante : la pleine fidélité de $u|_{E'}$ ne force pas vu à ramener E' dans $\overline{E'}$.

Énoncé (Adjonctions idempotentes, page 5). Les conditions « $\eta v : v \rightarrow vu v$ est un isomorphisme » et « $\varepsilon u : uv u \rightarrow u$ est un isomorphisme » de la condition 2 du manuscrit sont redondantes : chacune des quatre conditions (ηv , $v\varepsilon$, εu , $u\eta$ inversible) implique les trois autres.

Énoncé (Objets locaux, pages 6 et 7). Soient $\alpha : E_1 \rightarrow E$ un foncteur pleinement fidèle admettant un adjoint à gauche α' , et Σ la classe des flèches de E que α' rend inversibles. Une flèche $f : X \rightarrow Y$ est dans Σ si et seulement si $\text{Hom}_E(Y, \alpha Z_1) \rightarrow \text{Hom}_E(X, \alpha Z_1)$ est bijective pour tout $Z_1 \in E_1$; et un objet ξ de E tel que $\text{Hom}_E(-, \xi)$ transforme les flèches de Σ en bijections (un objet Σ -local) est dans l'image essentielle de α .

On rappelle que la bijection d'adjonction $\text{Hom}_F(uX, P) \simeq \text{Hom}_E(X, vP)$ envoie g sur $\eta_X \circ v(g)$ (on compose de gauche à droite : η_X , puis $v(g)$), et qu'on a les identités triangulaires $\eta_{vP} ; v(\varepsilon_P) = \text{id}_{vP}$ et $u(\eta_X) ; \varepsilon_{uX} = \text{id}_{uX}$. Dans les démonstrations qui suivent, on écrit $f ; g$ pour « f puis g ».

Lemme 10.1. Pour $X, Y \in E$, l'application $\text{Hom}_E(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_F(uX, uY)$, $f \mapsto u(f)$, est bijective si et seulement si l'application $f \mapsto f ; \eta_Y$, de $\text{Hom}_E(X, Y)$ dans $\text{Hom}_E(X, vuY)$, l'est.

Démonstration. La seconde application est la composée de la première et de la bijection d'adjonction : celle-ci envoie $u(f)$ sur $\eta_X ; vu(f)$, qui vaut $f ; \eta_Y$ par naturalité de η . C'est la phrase de la page 3 : l'application « se déduit de l'application $i(Y) : Y \rightarrow vu(Y)$ au moyen de $\text{Hom}(X, i(Y))$ ». $\square$

Démonstration de (1). Supposons que η_Y soit un isomorphisme pour tout $Y \in E'$. Pour $X, Y \in E'$, la composition avec η_Y est alors bijective, et $u|_{E'}$ est pleinement fidèle par le lemme 10.1 ; et $vu(Y)$, isomorphe à Y , est dans $\overline{E'}$.

Réciproquement, soit $Y \in E'$; par hypothèse il existe $Z \in E'$ et un isomorphisme $e : vu(Y) \rightarrow Z$. Le lemme 10.1, appliqué aux couples (Z, Y) et (Y, Y) d'objets de E' , dit que $f \mapsto f ; \eta_Y$ est bijective de $\text{Hom}(Z, Y)$ sur $\text{Hom}(Z, vuY)$ et de $\text{Hom}(Y, Y)$ sur $\text{Hom}(Y, vuY)$. Par la surjectivité de la première, il existe $g : Z \rightarrow Y$ avec $g ; \eta_Y = e^{-1}$. Posons $s = e ; g : vu(Y) \rightarrow Y$. D'une part $s ; \eta_Y = e ; e^{-1} = \text{id}_{vuY}$. D'autre part $(\eta_Y ; s) ; \eta_Y = \eta_Y ; (s ; \eta_Y) = \eta_Y ; \eta_Y = \text{id}_Y ; \eta_Y$, et l'injectivité de la seconde bijection donne $\eta_Y ; s = \text{id}_Y$. Donc η_Y est un isomorphisme, d'inverse s . $\square$

L'exemple demandé en marge. Prenons pour E la catégorie des ensembles, pour F la catégorie ponctuelle, pour u l'unique foncteur $E \rightarrow F$ et pour v le foncteur qui pointe un ensemble à

un élément $\{*\}$; on a $u \dashv v$ parce que $\{*\}$ est final. Soit $E' = \{\emptyset\}$, réduite à un objet. Alors $u|_{E'}$ est pleinement fidèle, puisque $\text{Hom}(\emptyset, \emptyset)$ et $\text{Hom}(u\emptyset, u\emptyset)$ ont chacun un seul élément; mais $vu(\emptyset) = \{*\}$ n'est pas isomorphe à $\emptyset$, et $\eta_\emptyset : \emptyset \rightarrow \{*\}$ n'est pas un isomorphisme. La condition $vu(E') \subset \overline{E'}$ est donc nécessaire à l'équivalence (1). $\square$

Démonstration de l'énoncé sur les adjonctions idempotentes. On note (a) η_{vP} inversible pour tout P , (b) $v(\varepsilon_P)$ inversible pour tout P , (c) ε_{uX} inversible pour tout X , (d) $u(\eta_X)$ inversible pour tout X . On utilise que si $f;g$ est une identité et que l'une de f, g est un isomorphisme, l'autre en est un, inverse de la première.

(a) $\Leftrightarrow$ (b) et (c) $\Leftrightarrow$ (d) résultent de là et des identités triangulaires $\eta_{vP}; v(\varepsilon_P) = \text{id}$ et $u(\eta_X); \varepsilon_{uX} = \text{id}$.

(a) $\Rightarrow$ (c). Soit $X \in E$. Par (a) $\Rightarrow$ (b) en $P = uX$, $v(\varepsilon_{uX})$ est inversible. Or $vu(\eta_X)$ et η_{vuX} en sont deux sections : $vu(\eta_X); v(\varepsilon_{uX}) = v(u(\eta_X); \varepsilon_{uX}) = \text{id}$, et $\eta_{vuX}; v(\varepsilon_{uX}) = \text{id}$ par l'identité triangulaire; elles sont donc égales. Montrons que $u(\eta_X)$ est inverse de ε_{uX} . On a déjà $u(\eta_X); \varepsilon_{uX} = \text{id}$. La naturalité de ε appliquée à $u(\eta_X) : uX \rightarrow uvuX$ donne

$$\varepsilon_{uX}; u(\eta_X) = uv(u(\eta_X)); \varepsilon_{uvuX} = u(\eta_{vuX}); \varepsilon_{uvuX} = \text{id},$$

la deuxième égalité par ce qui précède, la troisième par l'identité triangulaire en vuX .

(c) $\Rightarrow$ (a) est l'énoncé dual. Soit $P \in F$. Par (c) $\Rightarrow$ (d) en $X = vP$, $u(\eta_{vP})$ est inversible; $uv(\varepsilon_P)$ et ε_{uvP} en sont deux rétractions ($u(\eta_{vP}); uv(\varepsilon_P) = u(\eta_{vP}; v(\varepsilon_P)) = \text{id}$, et l'identité triangulaire), donc sont égales. Alors $\eta_{vP}; v(\varepsilon_P) = \text{id}$, et la naturalité de η appliquée à $v(\varepsilon_P)$ donne $v(\varepsilon_P); \eta_{vP} = \eta_{vuvP}; vuv(\varepsilon_P) = \eta_{vuvP}; v(\varepsilon_{uvP}) = \text{id}$.

Les quatre conditions sont donc équivalentes; en particulier la condition 2 du manuscrit, ηv et εu inversibles, équivaut à sa première moitié. $\square$

Démonstration de l'énoncé sur les objets locaux. Caractérisation de Σ . C'est un fait classique de la théorie des sous-catégories réflexives. Par l'adjonction $\alpha' \dashv \alpha$, $\text{Hom}_E(Y, \alpha Z_1) \simeq \text{Hom}_{E_1}(\alpha' Y, Z_1)$ naturellement en Y , de sorte que la composition avec f à la source correspond à la composition avec $\alpha'(f)$. Par le lemme de Yoneda, $\alpha'(f)$ est un isomorphisme si et seulement si $\text{Hom}_{E_1}(\alpha' Y, Z_1) \rightarrow \text{Hom}_{E_1}(\alpha' X, Z_1)$ est bijective pour tout Z_1 . En particulier tout objet αZ_1 , et tout objet qui lui est isomorphe, est Σ -local.

Un objet local est dans l'image essentielle. Soit ξ un objet Σ -local et $\eta = \eta_\xi : \xi \rightarrow \alpha\alpha'\xi$ l'unité. Pour tout Z_1 , la composition avec η , de $\text{Hom}_E(\alpha\alpha'\xi, \alpha Z_1)$ dans $\text{Hom}_E(\xi, \alpha Z_1)$, est bijective : c'est la bijection d'adjonction $\text{Hom}_{E_1}(\alpha'\xi, Z_1) \simeq \text{Hom}_E(\xi, \alpha Z_1)$ lue à travers la pleine fidélité de α . Par la caractérisation qui précède, $\eta \in \Sigma$. Comme ξ est local, la composition avec η , de $\text{Hom}(\alpha\alpha'\xi, \xi)$ dans $\text{Hom}(\xi, \xi)$, est bijective; il existe donc $r : \alpha\alpha'\xi \rightarrow \xi$ avec $\eta; r = \text{id}_\xi$. Alors $\eta; (r; \eta) = \eta = \eta; \text{id}$, et comme la composition avec η est injective sur les flèches à valeurs dans l'objet local $\alpha\alpha'\xi$, $r; \eta = \text{id}$. Ainsi $\xi \simeq \alpha(\alpha'\xi)$. Avec la dernière phrase du paragraphe précédent, on obtient que les objets Σ -locaux sont exactement ceux de l'image essentielle de α . $\square$

Énoncé ((2), page 3). Soient $F' \subset F$ une sous-catégorie pleine et $\overline{F'}$ sa clôture par isomorphie. Alors

$$v|_{F'} \text{ est pleinement fidèle et } uv(F') \subset \overline{F'}$$

$$\Leftrightarrow \text{ pour tout } P \in F', \varepsilon_P : uv(P) \rightarrow P \text{ est un isomorphisme.}$$

Démonstration. C'est la démonstration de (1) retournée. Pour $P, Q \in F$, l'application $g \mapsto v(g)$, de $\text{Hom}_F(P, Q)$ dans $\text{Hom}_E(vP, vQ)$, suivie de la bijection d'adjonction réciproque $h \mapsto u(h); \varepsilon_Q$, donne $g \mapsto uv(g); \varepsilon_Q = \varepsilon_P; g$ par naturalité de ε : c'est le « $\text{Hom}(j(P), Q)$ » de la page, et v est bijective sur $\text{Hom}(P, Q)$ si et seulement si $g \mapsto \varepsilon_P; g$ l'est. Si ε_P est inversible pour tout $P \in F'$, la composition avec ε_P est bijective, et $uv(P) \simeq P$. Réciproquement, soient $P \in F'$, $Z \in F'$ et $e : uv(P) \rightarrow Z$ un isomorphisme ; la surjectivité de $g \mapsto \varepsilon_P; g$ sur $\text{Hom}(P, Z)$ donne g avec $\varepsilon_P; g = e$. Posons $s = g; e^{-1}$. Alors $\varepsilon_P; s = \text{id}$, et $\varepsilon_P; (s; \varepsilon_P) = \varepsilon_P = \varepsilon_P; \text{id}$; l'injectivité sur $\text{Hom}(P, P)$ donne $s; \varepsilon_P = \text{id}$. $\square$

Énoncé (Les cinq conditions, page 3). Soient $E' \subset E$ et $F' \subset F$ des sous-catégories strictement pleines ; on note $u' : E' \rightarrow F'$ et $v' : F' \rightarrow E'$ les foncteurs induits quand $u(E') \subset F'$ et $v(F') \subset E'$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. E' vérifie (1), F' vérifie (2), et $F' = \overline{u(E')}$, $E' = \overline{v(F')}$;
2. $u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et u' , v' sont pleinement fidèles ;
3. $u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et u' est une équivalence ;
4. $u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et v' est une équivalence.

De plus, si E' strictement pleine vérifie (1), $\alpha(E') = \overline{u(E')}$ vérifie (2) et $\beta(\alpha(E')) = E'$; duallement pour F' .

Démonstration. On lit « u' est une équivalence » comme « u' est pleinement fidèle et tout objet de F' est isomorphe à un $u(Y)$, $Y \in E'$ ». On utilise deux faits : si η_Y est inversible, ε_{uY} l'est, puisque $u(\eta_Y); \varepsilon_{uY} = \text{id}$; et si ε_P l'est, η_{vP} l'est, par l'autre identité triangulaire. Les objets où η (resp. ε) est inversible forment une sous-catégorie strictement pleine, par naturalité.

Si $u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, η est inversible sur E' et ε sur F' , alors 1. vaut : un $P \in F'$ est isomorphe, par ε_P , à $u(vP)$ avec $vP \in E'$, et tout objet isomorphe à un $u(Y)$, $Y \in E'$, est dans F' , strictement pleine ; de même pour E' , par η_Y^{-1} . Réciproquement 1. donne $u(E') \subset F'$, $v(F') \subset E'$, et, par (1) et (2), la pleine fidélité de u' et v' et l'essentielle surjectivité de u' et de v' ; donc 1. entraîne 2., 3. et 4.

Sous 2., $vu(E') \subset v(F') \subset E'$, et (1) donne η inversible sur E' ; de même (2) donne ε inversible sur F' ; d'où 1. Sous 3., (1) donne de même η inversible sur E' ; un $P \in F'$ est isomorphe à un $u(Y)$, $Y \in E'$, où ε est inversible par le premier fait ; donc ε_P l'est, d'où 1. Le cas 4. est symétrique.

Pour la bijection : si $Y \in E'$, $Y \simeq vu(Y)$ par η_Y et $uY \in \alpha(E')$; si $Y \simeq v(P)$ avec $P \simeq u(Y')$, $Y' \in E'$, alors $Y \simeq vu(Y') \simeq Y'$ et $Y \in E'$. Et ε est inversible sur $\alpha(E')$ par le premier fait. $\square$

Énoncé (Les points fixes, page 4). Soient $E_0 \subset E$ la sous-catégorie pleine des Y où η_Y est inversible et $F_0 \subset F$ celle des P où ε_P l'est. Ce sont les plus grandes sous-catégories vérifiant (1) et (2) ; on a $F_0 = \overline{u(E_0)}$, $E_0 = \overline{v(F_0)}$, et u , v induisent des équivalences quasi-inverses $E_0 \simeq F_0$.

Démonstration. La maximalité est la forme de (1) et (2) démontrée plus haut : E' vérifie (1) si et seulement si $E' \subset E_0$. Par les deux faits de la démonstration précédente, $u(E_0) \subset F_0$ et $v(F_0) \subset E_0$; les égalités $F_0 = \overline{u(E_0)}$ et $E_0 = \overline{v(F_0)}$ en résultent comme dans le cas 1. ci-dessus. Les foncteurs induits $u_0 : E_0 \rightarrow F_0$ et $v_0 : F_0 \rightarrow E_0$ sont quasi-inverses, par les isomorphismes naturels $\eta_Y : Y \rightarrow v_0 u_0(Y)$ et $\varepsilon_P : u_0 v_0(P) \rightarrow P$. $\square$

Énoncé (Conditions 1), 3) et 4), page 5 ; la préservation des colimites). *La condition 1), $\text{Im } v \subset E_0$ et $\text{Im } u \subset F_0$, est l'idempotence, et chacune de ses moitiés suffit. Si $\text{Im } u \subset F_0$, l'inclusion $E_0 \subset E$ admet pour adjoint à gauche $v_0 \circ u'$, $X \mapsto vu(X)$; si $\text{Im } v \subset E_0$, l'inclusion $F_0 \subset F$ admet pour adjoint à droite $u_0 \circ v'$, $P \mapsto uv(P)$. Ce réflecteur $E \rightarrow E_0$ commute aux limites inductives et l'inclusion $E_0 \subset E$ aux limites projectives ; E_0 a les limites inductives qu'a E ; dualement, le coréflecteur $F \rightarrow F_0$ commute aux limites projectives, l'inclusion $F_0 \subset F$ aux limites inductives, et F_0 a les limites projectives qu'a F . Enfin, pour une adjonction idempotente, $u \simeq \beta u_0 \alpha'$ et $v \simeq \alpha v_0 \beta'$, avec α' le réflecteur, qui est un passage à la catégorie des fractions, β' le coréflecteur, et α, β les inclusions ; $\beta u_0 : E_0 \rightarrow F$ est pleinement fidèle (condition 4)).*

Démonstration. Condition 1). $Y = vP$ est dans E_0 si et seulement si η_{vP} est inversible, et $uX \in F_0$ si et seulement si ε_{uX} l'est : c'est l'énoncé sur les adjonctions idempotentes.

Le réflecteur. Si $\text{Im } u \subset F_0$, alors $vu(X) \in E_0$ pour tout X , par le second fait ; le foncteur $X \mapsto vu(X)$ arrive dans E_0 . On prend pour unité $\eta_X : X \rightarrow vu(X)$ et pour coïunité, en $Y \in E_0$, $\eta_Y^{-1} : vu(Y) \rightarrow Y$, naturelle parce que η l'est. L'identité triangulaire du côté de E_0 est $\eta_Y ; \eta_Y^{-1} = \text{id}$. Celle du côté de E demande $vu(\eta_X) ; \eta_{vuX}^{-1} = \text{id}$, c'est-à-dire $vu(\eta_X) = \eta_{vuX}$; c'est l'égalité établie dans la démonstration de (a) $\Rightarrow$ (c), l'adjonction étant idempotente par cet énoncé. C'est le calcul de Hom de la page 5. Le coréflecteur se traite de même, avec la coïunité ε_P , l'unité ε_Q^{-1} en $Q \in F_0$, et l'égalité $uv(\varepsilon_P) = \varepsilon_{uvP}$; c'est le calcul entre crochets de la page 4.

Limites. Un adjoint à gauche commute aux limites inductives, un adjoint à droite aux limites projectives. Une sous-catégorie réflexive a les limites inductives de la catégorie ambiante : on réfléchit la limite inductive calculée dans E .

Condition 4). Pour $X \in E$, $u_0(vu(X)) = uvu(X)$, et $\varepsilon_{uX} : uvu(X) \rightarrow u(X)$ est inversible et naturel en X : d'où $\beta u_0 \alpha' \simeq u$. De même $\eta_{vP}^{-1} : vuv(P) \rightarrow v(P)$ donne $\alpha v_0 \beta' \simeq v$. Le foncteur βu_0 est pleinement fidèle comme composé d'une équivalence et d'une inclusion pleine. Enfin, un adjoint à gauche dont l'adjoint à droite est pleinement fidèle est une localisation en les flèches qu'il inverse ; c'est le cas de α' . $\square$

Énoncé (La descente d'adjoints, page 6). *Soient $\alpha : E_1 \rightarrow E$ pleinement fidèle d'adjoint à gauche α' , et $\psi : E_1^\circ \rightarrow \text{Ens}$ tel que $\psi \circ \alpha'$ soit représentable. Alors ψ est représentable. Par suite, si $\beta : E_1 \rightarrow F$ est un foncteur tel que $u = \beta \alpha'$ admette un adjoint à droite, β admet un adjoint à droite.*

Démonstration. Soit $\xi \in E$ représentant $\psi \circ \alpha' : \text{Hom}_E(X, \xi) \simeq \psi(\alpha' X)$, naturellement en X . Si $f : X \rightarrow Y$ est dans Σ , la composition avec f , de $\text{Hom}(Y, \xi)$ dans $\text{Hom}(X, \xi)$, correspond

à $\psi(\alpha'f)$, qui est bijective puisque $\alpha'(f)$ est inversible ; ξ est donc Σ -local, et, par l'énoncé sur les objets locaux, il existe $\xi_1 \in E_1$ et un isomorphisme $\alpha\xi_1 \simeq \xi$. Pour $Z \in E_1$, on compose alors les bijections

$$\mathrm{Hom}_{E_1}(Z, \xi_1) \simeq \mathrm{Hom}_E(\alpha Z, \alpha\xi_1) \simeq \mathrm{Hom}_E(\alpha Z, \xi) \simeq \psi(\alpha'\alpha Z) \simeq \psi(Z),$$

la première par la pleine fidélité de α , la dernière par ψ appliqué à la coïunité $\alpha'\alpha Z \rightarrow Z$, inversible puisque α est pleinement fidèle. La naturalité en Z résulte de celle de la coïunité. Donc ψ est représenté par ξ_1 .

Pour la seconde assertion, β admet un adjoint à droite si et seulement si, pour tout $P \in F$, le préfaisceau $Z \mapsto \mathrm{Hom}_F(\beta Z, P)$ sur E_1 est représentable. Composé avec α' , c'est $X \mapsto \mathrm{Hom}_F(\beta\alpha'X, P)$, représentable puisque $\beta\alpha'$ a un adjoint à droite. La première assertion conclut. $\square$

Remarque. L'exemple ci-dessus répond à la question de la marge de la page 3, avec E' réduit à un objet ; la réponse de la lecture, « Elle l'est », est juste.

Remarque. L'énoncé des pages 6 et 7 vaut pour toute sous-catégorie réflexive. La caractérisation de Σ est classique. L'identification des objets Σ -locaux à l'image essentielle, le « Or c'est vrai » de la page 7, est un lemme de base de la théorie des localisations.

Remarque. La cinquième condition de la page 3, « — et u' et v' pl. fid. », répète mot pour mot la deuxième ; l'énoncé ci-dessus en retient quatre.

Remarque. La descente de la page 6 tient sans l'hypothèse que β soit pleinement fidèle, dont la démonstration ne se sert pas. Pour une catégorie F quelconque, la réduction de la page au cas $\mathrm{Ob} F = \mathrm{Ob} E_1 \cup \{a\}$ revient à traiter un objet P de F à la fois, comme on l'a fait. La vérification suppose que les ensembles de flèches de E , E_1 et F vivent dans le même univers, ce que demande la notion de foncteur représentable.

Remarque. La page 5 construit le réflecteur de E_0 sous la seule hypothèse $\mathrm{Im} u \subset F_0$, et le coréflecteur de F_0 sous $\mathrm{Im} v \subset E_0$. Ces deux hypothèses sont équivalentes par l'énoncé sur les adjonctions idempotentes, et l'identité triangulaire du réflecteur passe par cette équivalence.

Septième partie

Géométrie formelle, modules et représentabilité

Le 11 septembre 1967, une lettre dactylographiée systématise le pas essentiel de la preuve de Matsumura de la représentabilité du schéma des automorphismes d'un schéma propre (91, lot 2, p. 30). Le 21 octobre 1968, Deligne lui écrit qu'un espace analytique compact est un schéma si et seulement si sa réduction l'est (37, lot 4, p. 74). Le 30 avril 1969, il envoie à Jacob Murre les notes préliminaires sur les revêtements formels modérément ramifiés (29, lot 4, p. 78).

11 Cote 39 : le théorème de préparation « formel », cas adique et cas discret¹²

La cote 39, *Fonctions et structures « élémentaires » [Schémas formels, théorème de préparation]* : notes manuscrites (s.d.), datée par l'inventaire « [vers 1960-1970] », compte dix-neuf pages en trois ensembles séparés par des intercalaires vierges. Les deux premiers sont deux rédactions successives d'une axiomatique des classes de séries formelles (pages 2 à 7, puis 9 à 16). Le troisième, pages 18 et 19, énonce et démontre un théorème sous un titre souligné de sa main, « Th. de préparation “formel” » (39, lot 1, p. 18). La démonstration commence par une réduction, « Comme A est séparé et complet pour sa top. linéaire, on est ramené au cas où A est discret », puis précise que (i) « signifie que les a_i ($0 \leq i \leq N-1$) sont nilpotents ». Un premier argument, par Nakayama et le gradué associé, est encadré et barré. Le second considère l'application $\varphi : ((b_i), Q) \mapsto \sum b_i Z^i + QF$ et conclut, par le gradué de la filtration m -adique, « finie », que φ est bijective (39, lot 1, p. 19).

Énoncé (Théorème de préparation « formel »). Soient A un anneau linéairement topologisé, séparé et complet, Z une indéterminée, $F = \sum_{i \geq 0} a_i Z^i \in A[[Z]]$, et $N \in \mathbb{N}$ tel que

(i) a_i est topologiquement nilpotent pour $0 \leq i \leq N-1$;

(ii) a_N est inversible.

Alors F est un élément régulier de $A[[Z]]$, et $A[[Z]]/FA[[Z]]$ est un A -module libre de base les images des Z^i , $0 \leq i \leq N-1$: tout $G \in A[[Z]]$ s'écrit de façon unique $G = QF + \sum_{0 \leq i \leq N-1} b_i Z^i$, avec $Q \in A[[Z]]$ et $b_i \in A$.

On ne démontre ici que deux cas particuliers de cet énoncé : le cas d'un anneau complet pour une topologie I -adique, avec $a_i \in I$ pour $i < N$; et le cas discret auquel la démonstration du feuillet se ramène, avec $a_0, \dots, a_{N-1}$ nilpotents. Dans les deux cas, on écrit le reste $\sum_{i < N} b_i Z^i$ comme un polynôme $r \in A[Z]$ de degré $< N$.

On s'appuie sur le théorème classique de division de Weierstrass, sous la forme suivante : soient A un anneau séparé et complet pour la topologie I -adique et $F \in A[[Z]]$; si l'image $\bar{F}$ de F dans $(A/I)[[Z]]$ est d'ordre N et si le coefficient a_N de F est inversible dans A , alors pour tout $G \in A[[Z]]$ il existe un unique couple (Q, r) , $Q \in A[[Z]]$, $r \in A[Z]$ de degré $< N$, tel que $G = QF + r$; et si $QF = r$ avec $\deg r < N$, alors $Q = 0$ et $r = 0$.

Lemme 11.1. Soient I un idéal de A , A séparé et complet pour la topologie I -adique, et $F = \sum a_i Z^i$ avec $a_i \in I$ pour $i < N$ et a_N inversible. Alors F est régulier dans $A[[Z]]$, et tout $G \in A[[Z]]$ s'écrit de façon unique $G = QF + r$ avec $Q \in A[[Z]]$ et $r \in A[Z]$ de degré $< N$.

Démonstration. Si $I = A$, l'anneau A , séparé pour la topologie A -adique, est nul, et tout est trivial. Supposons $I \neq A$, de sorte que A/I n'est pas nul. Les coefficients de $\bar{F}$ d'indice $< N$

¹²Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder39.lean.

sont nuls, puisque $a_i \in I$; celui d'indice N est l'image de l'inversible a_N , donc est inversible dans l'anneau non nul A/I , et en particulier non nul. Ainsi $\bar{F}$ est d'ordre exactement N , et, a_N étant inversible, le théorème de division s'applique. Il donne l'existence et l'unicité de l'écriture $G = QF + r$. Si $FH = 0$, on a $HF = 0$ avec le reste $r = 0$ de degré $< N$, donc $H = 0$: F est régulier. $\square$

Lemme 11.2. *Soit $\mathfrak{m}$ un idéal nilpotent de A . Alors A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique. Si $a_0, \dots, a_{N-1}$ sont nilpotents, l'idéal qu'ils engendrent est nilpotent.*

Démonstration. Soit k tel que $\mathfrak{m}^k = 0$; alors $\mathfrak{m}^n = 0$ pour $n \geq k$. Un élément qui appartient à tous les $\mathfrak{m}^n$ est dans $\mathfrak{m}^k = 0$: A est séparé. Si (x_n) est une suite telle que $x_n \equiv x_p \pmod{\mathfrak{m}^n}$ pour $n \leq p$, alors x_k en est une limite : pour $n \leq k$, $x_n \equiv x_k \pmod{\mathfrak{m}^n}$, et pour $n \geq k$, $x_n \equiv x_k \pmod{\mathfrak{m}^k}$, c'est-à-dire $x_n = x_k$. Pour la seconde assertion : l'idéal $\mathfrak{m} = (a_0, \dots, a_{N-1})$ est contenu dans le nilradical et engendré par un nombre fini d'éléments ; c'est un fait classique qu'un tel idéal est nilpotent (si $a_i^e = 0$ pour tout i , un produit de $N(e-1) + 1$ éléments de $\mathfrak{m}$ est combinaison de monômes en les a_i dont l'un au moins des exposants atteint e). C'est la phrase de la lecture : « il est de type fini et engendré par des nilpotents, donc nilpotent ». $\square$

Démonstration du cas discret. Soit A un anneau commutatif quelconque. Supposons que les coefficients a_i d'indice $i < N$ soient nilpotents et que a_N soit inversible. Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal engendré par $a_0, \dots, a_{N-1}$. Par le lemme 11.2, $\mathfrak{m}$ est nilpotent et A est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique. Comme $a_i \in \mathfrak{m}$ pour $i < N$, le lemme 11.1, appliqué à $I = \mathfrak{m}$, donne la régularité de F et l'écriture unique. $\square$

Remarque. Dans le cas adique, l'idéal n'a pas à être de type fini. La lecture n'emploie cette hypothèse que pour obtenir $\mathfrak{m}^j A[[Z]] = \mathfrak{m}^j [[Z]]$ dans sa démonstration par le gradué associé.

Remarque. La démonstration ci-dessus passe par la division de Weierstrass, admise comme théorème classique ; la page passe par le gradué associé.

Remarque. Pour la topologie I -adique, « topologiquement nilpotent » signifie $a_i \in \sqrt{I}$, condition plus faible que l'hypothèse $a_i \in I$ du lemme 11.1.

12 Cote 41 : continuité de la section générique et ouverture (proposition 1)¹³

La cote 41, *Construction de morphismes étales (Chap. V) : notes manuscrites (s.d.)*, datée par l'inventaire « [années 1960-1970] », est une seule section de rédaction en treize pages. Page 3, elle pose la notion de section *monogène*, qui choisit continûment le point générique d'une composante géométriquement irréductible de chaque fibre, et la question de la représentabilité du foncteur qu'elles forment. Elle construit ensuite, sous des conditions de spécialisation, un revêtement étale séparé qui la représente (pages 4 à 10). Page 11, elle revient au cas où les fibres elles-mêmes sont irréductibles, et écrit une « Prop. 1° » en trois conditions, à laquelle s'ajoute, encadrée, une condition « (iii bis) ». L'hypothèse de finitude porte sur la condition (ii), « f soit

¹³Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder41.lean.

ouvert [...] si Y est loc. noeth., f de type fini », et la seule formule lisible de la démonstration est $\varphi^{-1}(U) = f(U)$ (41, lot 1, p. 11).

Énoncé (Proposition 1). *Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini dont les fibres sont irréductibles et non vides, et soit $\varphi(y)$ le point générique de X_y . On considère les conditions :*

(i) $\varphi : Y \rightarrow X$ est continue ;

(ii) f est ouvert ;

(iii) $y \in \overline{\{y'\}} \Rightarrow \varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$;

(iii bis) pour tous $y \in \overline{\{y'\}}$ et x au-dessus de y , il existe x' au-dessus de y' tel que $x \in \overline{\{x'\}}$.

Alors (i) $\Leftrightarrow$ (ii) sans autre hypothèse, et (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis) ; si f est localement de présentation finie — par exemple Y localement noethérien —, les quatre conditions sont équivalentes.

On précise ce que veut dire, sur les espaces sous-jacents, que $\varphi(y)$ est le point générique de la fibre.

Définition. Soient X, Y des espaces topologiques et $f : X \rightarrow Y$ une application quelconque. On dit que $\varphi : Y \rightarrow X$ est une *section générique* de f si, pour tout $y \in Y$, on a $f(\varphi(y)) = y$ et $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$ pour tout $x \in f^{-1}(y)$.

Cela revient à dire que $\varphi(y)$ est un point générique de la fibre $f^{-1}(y)$ munie de la topologie induite, puisque l'adhérence de $\{\varphi(y)\}$ dans $f^{-1}(y)$ est la trace sur $f^{-1}(y)$ de son adhérence dans X ; une fibre qui a un point générique est irréductible et non vide. Pour un morphisme de schémas, la fibre schématique X_y est homéomorphe au sous-espace $f^{-1}(y)$; ce fait classique n'est pas démontré ici. Dans les lemmes qui suivent, f est une application quelconque entre espaces topologiques, qu'on ne suppose même pas continue, et φ une section générique de f .

Lemme 12.1. Pour tout ouvert U de X , $\varphi^{-1}(U) = f(U)$.

Démonstration. Si $\varphi(y) \in U$, alors $y = f(\varphi(y)) \in f(U)$. Inversement, soient $x \in U$ et $y = f(x)$; alors $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$, et l'ouvert U , qui contient un point de l'adhérence de $\{\varphi(y)\}$, contient $\varphi(y)$: $y \in \varphi^{-1}(U)$. $\square$

Lemme 12.2. On a (i) $\Leftrightarrow$ (ii), (i) $\Rightarrow$ (iii), et (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis).

Démonstration. (i) $\Leftrightarrow$ (ii). Par le lemme 12.1, pour tout ouvert U de X , l'ensemble $\varphi^{-1}(U)$ est ouvert si et seulement si $f(U)$ l'est ; or φ est continue si et seulement si le premier l'est pour tout U , et f est ouverte si et seulement si le second l'est pour tout U .

(i) $\Rightarrow$ (iii). Une application continue φ envoie l'adhérence de $\{y'\}$ dans l'adhérence de $\{\varphi(y')\}$.

(iii) $\Rightarrow$ (iii bis). Soient $y \in \overline{\{y'\}}$ et x au-dessus de y . Alors $x \in \overline{\{\varphi(y)\}}$ par définition de φ , et $\varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$ par (iii), donc $x \in \overline{\{\varphi(y')\}}$; et $x' = \varphi(y')$ est au-dessus de y' .

(iii bis) $\Rightarrow$ (iii). Soit $y \in \overline{\{y'\}}$. Appliquons (iii bis) à $x = \varphi(y)$, qui est au-dessus de y : il existe x' au-dessus de y' avec $\varphi(y) \in \overline{\{x'\}}$. Comme x' est dans la fibre de y' , $x' \in \overline{\{\varphi(y')\}}$, et donc $\varphi(y) \in \overline{\{\varphi(y')\}}$. $\square$

Démonstration de la proposition 1. Les implications (i) $\Leftrightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis) sont celles du lemme 12.2, (ii) $\Rightarrow$ (iii) passant par (i). Il reste, pour f un morphisme de schémas localement de présentation finie, à déduire (ii) de (iii bis). Or (iii bis) dit exactement que les générations se relèvent le long de f , et un morphisme localement de présentation finie qui relève les générations est ouvert : c'est un théorème classique (EGA IV, 1.10.4), qui repose sur le théorème de Chevalley sur les parties constructibles. Les quatre conditions sont donc équivalentes. $\square$

Remarque. L'implication (iii bis) $\Rightarrow$ (ii) ne s'obtient pas par la seule topologie. Soient $X = \mathbb{N}$ muni de la topologie discrète, $Y = \mathbb{N}$ muni de la topologie cofinie, et $f : X \rightarrow Y$ l'identité, qui est continue. Les fibres sont des points, et $\varphi = f^{-1}$ est une section générique. Les deux espaces étant séparés au sens T_1 , $y \in \overline{\{y'\}}$ entraîne $y = y'$, et (iii bis) est triviale. Mais f n'est pas ouverte : $f(\{0\}) = \{0\}$ n'est pas ouvert dans Y , puisque son complémentaire est infini. L'application f n'est pas un morphisme de schémas, et l'exemple montre seulement qu'une hypothèse, de finitude ou autre, est indispensable à cette implication, et à elle seule.

Remarque. Les implications (i) $\Leftrightarrow$ (ii) et (i) $\Rightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iii bis) valent pour toute application entre espaces topologiques munie d'une section générique, sans que f soit de type fini, ni même continue.

Remarque. Seule l'implication (iii bis) $\Rightarrow$ (ii) emploie l'hypothèse de finitude, sous la forme de la présentation finie locale, par le critère d'ouverture par relèvement des générations (EGA IV, 1.10.4), admis ici comme théorème classique.

13 Cote 42 : familles cohérentes de germes, le lemme 1 et le lemme 2¹⁴

La cote 42, *Réseaux d'anneaux locaux : notes manuscrites (s.d.)*, six pages que l'inventaire date « [années 1960-1970] », demande si une application entre préschémas localement noethériens est déterminée, et peut être construite, point par point, à partir des anneaux locaux reliés par les générations. La page 3 ramène la question à une proposition sur les faisceaux : sous une condition (H) d'injectivité des flèches de génération entre fibres, les sections globales sont les familles cohérentes de germes. Le lemme 1 en porte le contenu, et la page le démontre en une ligne. Le lieu considéré est stable par génération, et « il suffit de montrer qu'il est *constructible*, donc que s'il contient x , il contient les pts d'un ouvert non vide de $\bar{x}$ » (42, lot 1, p. 3). Pour le faisceau structural, la page 4 enchaîne : « Il reste à vérifier que les conditions de la prop. sont vérifiées ». Elle isole un fait d'algèbre commutative, le lemme 2, dont la démonstration occupe le bas de la page 4 et le haut de la page 5 (42, lot 1, p. 4). La page glose le noyau de $A \rightarrow A_p$ comme « l'annulateur de $A - p$ », le premier mot étant lu avec doute. Elle traite la seconde assertion en se ramenant au cas $f = 1$, « car $A_p = (A_f)_{pA_f}$ » (42, lot 1, p. 5).

Énoncé (Proposition et lemme 1, page 3). *Soient X un espace topologique noethérien et sobre, et F un faisceau d'ensembles sur X vérifiant*

¹⁴Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder42.lean.

(H) pour tout $x \in X$, il existe un ouvert $W \ni x$ tel que $\rho_{yx} : F_y \rightarrow F_x$ soit injective pour tout $y \in W \cap \overline{\{x\}}$.

1. (Lemme 1) Pour toute famille cohérente (ξ_x) et toute section $s \in F(U)$ sur un ouvert U , l'ensemble $E = \{x \in U : s_x = \xi_x\}$ est ouvert.
2. (Proposition) L'application $\Gamma(X, F) \rightarrow \varprojlim_x F_x$, qui envoie une section sur la famille de ses germes, est bijective.

Énoncé (Lemme 2, pages 4 et 5). Soient A un anneau noethérien et $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A .

1. Il existe $f \in A \setminus \mathfrak{p}$ tel que $A_f \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ soit injectif.
2. Si de plus $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est injectif, alors $A_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est injectif pour tout idéal premier $\mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p}$.
3. (Forme de la page) Il existe $f \in A \setminus \mathfrak{p}$ tel que, pour tout idéal premier $\mathfrak{Q}$ de A_f dont la trace sur A contient $\mathfrak{p}$, $(A_f)_{\mathfrak{Q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ soit injectif.

Énoncé (Lemme 1 et corollaire 1, pages 3 et 4, cas affine). Soit A un anneau noethérien. Appelons famille cohérente une famille $(\xi_{\mathfrak{p}})$, $\xi_{\mathfrak{p}} \in A_{\mathfrak{p}}$, indexée par les idéaux premiers, telle que $\xi_{\mathfrak{q}} \mapsto \xi_{\mathfrak{p}}$ par $A_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ chaque fois que $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$.

1. (Lemme 1) Pour toute famille cohérente $(\xi_{\mathfrak{p}})$ et tous $a, s \in A$, l'ensemble des $\mathfrak{p}$ tels que $s \notin \mathfrak{p}$ et $\xi_{\mathfrak{p}} = a/s$ est ouvert dans $\text{Spec } A$.
2. (Corollaire 1) L'application $a \mapsto (a/1)_{\mathfrak{p}}$ est une bijection de $A = \Gamma(\text{Spec } A, \mathcal{O})$ sur l'ensemble des familles cohérentes.

Conventions. Pour $x, y \in X$, on écrit $x \rightsquigarrow y$ lorsque $y \in \overline{\{x\}}$: y est une spécialisation de x , x une g n r sation de y . Tout ouvert contenant y contient alors x , d'o  une application $\rho_{yx} : F_y \rightarrow F_x$, compatible aux germes : $\rho_{yx}(s_y) = s_x$ pour toute section s d finie au voisinage de y . Une famille (ξ_x) , $\xi_x \in F_x$, est coh rente si $\rho_{yx}(\xi_y) = \xi_x$ chaque fois que $x \rightsquigarrow y$. Dans $\text{Spec } A$, $\mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q}$  quivaut   $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. Un ouvert non vide de l'irr ductible $\overline{\{x\}}$ contient son point g n rique x ; la condition (H) dit donc la m me chose que la page, « un ouvert non vide » de $\overline{\{x\}}$ sur lequel les $F_y \rightarrow F_x$ sont injectives. Pour une partie multiplicative S de A , on note $a \mapsto a/1$ le morphisme $A \rightarrow S^{-1}A$; on rappelle que $a/1 = 0$ si et seulement s'il existe $s \in S$ avec $sa = 0$, que tout $z \in S^{-1}A$ v rifie $z \cdot (s/1) = a/1$ pour un $a \in A$ et un $s \in S$, et que si $g : A \rightarrow B$ envoie S dans les inversibles de B , il existe un unique $\bar{g} : S^{-1}A \rightarrow B$ avec $\bar{g}(a/1) = g(a)$. Les fl ches $A_f \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ et $A_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ sont de cette forme, g  tant le morphisme canonique $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$.

Lemme 13.1. Soient X un espace noeth rien et sobre et $E \subseteq X$ une partie stable par g n r sation telle que, pour tout $x \in E$, il existe un ouvert $W \ni x$ avec $W \cap \overline{\{x\}} \subseteq E$. Alors E est ouvert.

Démonstration. Montrons d'abord, par récurrence noethérienne sur les fermés, que tout fermé Z tel que $Z \subseteq \overline{Z} \setminus \overline{E}$ ne rencontre pas E . Soit Z un tel fermé, et supposons l'assertion vraie pour les fermés strictement contenus dans Z . Si Z est irréductible, soit z son point générique. Si Z rencontrait E en un point y , on aurait $z \rightsquigarrow y$, donc $z \in E$ par stabilité; l'hypothèse donne un ouvert $W \ni z$ avec $W \cap Z \subseteq E$. Mais $z \in Z \subseteq \overline{Z} \setminus \overline{E}$, donc W rencontre $Z \setminus E$, en un point de $W \cap Z$ qui n'est pas dans E : contradiction. Si Z n'est pas irréductible (et n'est pas vide), il existe deux fermés z_1, z_2 avec $Z \subseteq z_1 \cup z_2$ et $Z \not\subseteq z_i$. Posons $Z_i = \overline{Z \cap z_i} \setminus \overline{E}$; c'est un fermé contenu dans $Z \cap z_i$, donc strictement contenu dans Z , et $Z_i \subseteq \overline{Z_i} \setminus \overline{E}$ puisque $Z \cap z_i \setminus E \subseteq Z_i \setminus E$. Par hypothèse de récurrence, $Z_i \cap E = \emptyset$. Or $Z \setminus E \subseteq (Z \cap z_1 \setminus E) \cup (Z \cap z_2 \setminus E)$, d'où $Z \subseteq \overline{Z} \setminus \overline{E} \subseteq Z_1 \cup Z_2$, et $Z \cap E = \emptyset$.

Appliquons cela à $T = \overline{X \setminus E}$, qui vérifie $T \setminus E = X \setminus E$, donc $T \subseteq \overline{T} \setminus \overline{E}$: il vient $T \cap E = \emptyset$, c'est-à-dire que $X \setminus E$ est fermé. $\square$

Démonstration du lemme 1 de la page 3. E est stable par générisation. Soient $x \in E$ et $y \rightsquigarrow x$. Comme U est ouvert et contient x , il contient y , et $s_y = \rho_{xy}(s_x) = \rho_{xy}(\xi_x) = \xi_y$ par cohérence; donc $y \in E$.

Condition locale. Soit $x \in E$, et soit W l'ouvert que fournit (H) en x . L'ouvert $W \cap U$ contient x . Pour $y \in W \cap U \cap \{x\}$, on a $x \rightsquigarrow y$, et $\rho_{yx}(s_y) = s_x = \xi_x = \rho_{yx}(\xi_y)$; l'injectivité de ρ_{yx} donne $s_y = \xi_y$, donc $y \in E$. Le lemme 13.1 conclut. $\square$

Démonstration de la proposition. L'injectivité est l'axiome de séparation des faisceaux : deux sections globales qui ont les mêmes germes en tout point sont égales. Soit (ξ_x) une famille cohérente. Pour chaque x , le germe ξ_x provient d'une section s^x sur un ouvert $U_x \ni x$; par le lemme 1, $V_x = \{y \in U_x : s_y^x = \xi_y\}$ est un ouvert, qui contient x . Les restrictions $s^x|_{V_x}$ ont, sur $V_x \cap V_{x'}$, les mêmes germes ξ_y en tout point; elles y coïncident donc, et se recollent, les V_x recouvrant X , en une section globale s . Pour tout x , $s_x = (s^x|_{V_x})_x = \xi_x$. $\square$

Lemme 13.2. Soient $S \subseteq A$ une partie multiplicative et $g : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux envoyant S dans les inversibles de B . Si, pour tout $a \in A$, $g(a) = 0$ entraîne $a/1 = 0$ dans $S^{-1}A$, alors $\bar{g} : S^{-1}A \rightarrow B$ est injectif.

Démonstration. Comme $\bar{g}$ est additif, il suffit de montrer que son noyau est nul. Soit $z \in S^{-1}A$ avec $\bar{g}(z) = 0$, et écrivons $z \cdot (s/1) = a/1$ avec $a \in A$ et $s \in S$. En appliquant $\bar{g}$, on obtient $g(a) = \bar{g}(z)g(s) = 0$, donc $a/1 = 0$ par hypothèse, c'est-à-dire $z \cdot (s/1) = 0$. Comme $s/1$ est inversible dans $S^{-1}A$, $z = 0$. $\square$

Lemme 13.3. Soient A un anneau noethérien et $\mathfrak{p}$ un idéal premier. Il existe $f \notin \mathfrak{p}$ tel que $fy = 0$ pour tout y du noyau J de $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$.

Démonstration. Le noyau J est l'ensemble des $a \in A$ tels que $sa = 0$ pour au moins un $s \notin \mathfrak{p}$. L'anneau A étant noethérien, l'idéal J est engendré par un nombre fini d'éléments $x_1, \dots, x_n$. Pour chaque i , l'appartenance $x_i \in J$ fournit un $s_i \notin \mathfrak{p}$ tel que $s_i x_i = 0$. Posons $f = s_1 \cdots s_n$; comme $\mathfrak{p}$ est premier, son complémentaire est stable par produit, et $f \notin \mathfrak{p}$. L'ensemble des $y \in A$ tels que $fy = 0$ est un idéal de A ; il contient chaque x_i , car $f = s_i c_i$ avec $c_i = \prod_{j \neq i} s_j$, donc $f x_i = c_i (s_i x_i) = 0$; il contient donc l'idéal engendré par les x_i , qui est J . $\square$

Démonstration du lemme 2. (1) Soit f donné par le lemme 13.3. Appliquons le lemme 13.2 à $S = \{f^n\}$ et au morphisme canonique $g : A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$. Si $g(a) = 0$, alors $a \in J$, donc $fa = 0$; comme $f \in S$, cela signifie $a/1 = 0$ dans A_f . Le morphisme $A_f \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est donc injectif.

(2) Appliquons le lemme 13.2 à $S = A \setminus \mathfrak{q}$ et au morphisme canonique $g : A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$, qui inverse S puisque $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. Si $g(a) = 0$, alors $a = 0$ par l'injectivité supposée de g , et a fortiori $a/1 = 0$ dans $A_{\mathfrak{q}}$.

(3) Prenons f comme en (1), et soit $\mathfrak{Q}$ un idéal premier de A_f dont la trace $\mathfrak{q}$ sur A contient $\mathfrak{p}$. Le morphisme $h : A_f \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ envoie $A_f \setminus \mathfrak{Q}$ dans les inversibles : écrivons $y \in A_f \setminus \mathfrak{Q}$ sous la forme $y \cdot (f^n/1) = a/1$; si a était dans $\mathfrak{p}$, donc dans $\mathfrak{q}$, $a/1 = y \cdot (f^n/1)$ serait dans $\mathfrak{Q}$, ce qui est exclu puisque $y \notin \mathfrak{Q}$ et que $f^n/1$, inversible, n'est pas dans $\mathfrak{Q}$. Donc $a \notin \mathfrak{p}$, $h(y)h(f^n/1) = a/1$ est inversible dans $A_{\mathfrak{p}}$, et $h(y)$ l'est aussi. Le morphisme $(A_f)_{\mathfrak{Q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est donc défini, et il est injectif par le lemme 13.2 appliqué à h , qui est injectif par (1) : c'est l'argument de (2) pour l'anneau A_f . $\square$

Démonstration du lemme 1 et du corollaire 1, cas affine. Pour le lemme 1, soit E l'ensemble des $\mathfrak{p}$ tels que $s \notin \mathfrak{p}$ et $\xi_{\mathfrak{p}} \cdot (s/1) = a/1$. Il est stable par généralisation : si $\mathfrak{q} \in E$ et $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$, alors $s \notin \mathfrak{p}$, et l'image par $A_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ de l'égalité $\xi_{\mathfrak{q}} \cdot (s/1) = a/1$ est $\xi_{\mathfrak{p}} \cdot (s/1) = a/1$. Soit $\mathfrak{p} \in E$, et f donné par le lemme 13.3. L'ouvert $D(f) \cap D(s)$ contient $\mathfrak{p}$. Soit $\mathfrak{q}$ un premier de cet ouvert qui contient $\mathfrak{p}$; le lemme 13.2, appliqué à $S = A \setminus \mathfrak{q}$, montre que $A_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ est injectif : si $a'/1 = 0$ dans $A_{\mathfrak{p}}$, alors $fa' = 0$ avec $f \notin \mathfrak{q}$, donc $a'/1 = 0$ dans $A_{\mathfrak{q}}$. Or $\xi_{\mathfrak{q}} \cdot (s/1) = a/1$ a pour image $\xi_{\mathfrak{p}} \cdot (s/1) = a/1 = 0$; il est donc nul, et $\mathfrak{q} \in E$. Le lemme 13.1 s'applique, $\text{Spec } A$ étant noethérien et sobre.

Pour le corollaire 1, on utilise la description du faisceau structural comme faisceau des familles $(\sigma_{\mathfrak{p}}) \in \prod_{\mathfrak{p} \in U} A_{\mathfrak{p}}$ qui sont localement des fractions — pour tout $\mathfrak{p} \in U$, il existe un voisinage V de $\mathfrak{p}$ et $a, s \in A$ avec $s \notin \mathfrak{q}$ et $\sigma_{\mathfrak{q}} = a/s$ pour tout $\mathfrak{q} \in V$ — et le fait que $a \mapsto (a/1)_{\mathfrak{p}}$ est une bijection de A sur les sections globales de ce faisceau. L'injectivité de l'application du corollaire en découle. Soit $(\xi_{\mathfrak{p}})$ une famille cohérente. Pour chaque $\mathfrak{p}$, écrivons $\xi_{\mathfrak{p}} \cdot (s/1) = a/1$ avec $s \notin \mathfrak{p}$; l'ensemble E du lemme 1 pour ces a et s est un voisinage ouvert de $\mathfrak{p}$, sur lequel $\xi_{\mathfrak{q}} = a/s$. La famille $(\xi_{\mathfrak{p}})$ est donc localement une fraction, c'est une section globale du faisceau structural, et elle provient d'un $a \in A$. $\square$

Remarque. Le lemme 13.1 est le « donc » de la page 3. De la constructibilité, la page passe aussitôt à la propriété « s'il contient x , il contient les points d'un ouvert non vide de $\bar{x}$ ». Le lemme prend pour hypothèse cette propriété, jointe à la stabilité par généralisation, et la constructibilité n'intervient pas dans la démonstration. La bibliothèque utilisée contient l'énoncé « constructible et stable par généralisation, donc ouvert » pour les spectres d'anneaux. Elle ne contient pas le critère de constructibilité des espaces noethériens par lequel la page y arrive, et le lemme fait les deux pas à la fois.

Remarque. Les énoncés sont démontrés pour un espace noethérien, et le corollaire 1 pour $X = \text{Spec } A$ affine. C'est le cas auquel la page se ramène (« La question est locale. On peut donc supposer X noethérien »). La page 3 écrit « un voisinage U de $\bar{x}$ tel que pour tout $y \in \bar{x} \cap U$ ». Un ouvert contenant tout $\overline{\{x\}}$ donnerait une condition plus forte que (H), qui l'entraîne. La démonstration de la page, comme celle-ci, n'emploie que la forme faible, « un ouvert non vide U de $\bar{x}$ ». L'injectivité de $\Gamma(X, F) \rightarrow \varprojlim F_x$ ne demande ni (H) ni l'hypothèse noethérienne, et celle de $A \rightarrow \varprojlim A_{\mathfrak{p}}$ vaut pour tout anneau commutatif.

Remarque. L'hypothèse noéthérienne n'intervient pas dans (2) du lemme 2, qui vaut pour tout anneau commutatif. Dans (1), elle sert seulement à rendre de type fini le noyau J de $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$. Ce noyau est formé des éléments annulés par un élément de $A \setminus \mathfrak{p}$. L'annulateur de $A \setminus \mathfrak{p}$, que glose la page, est en général plus petit et ne convient pas. La démonstration de la page prend un annulateur par générateur, et suit donc la bonne description.

Remarque. Dans la forme (3) du lemme 2, l'hypothèse que la trace de Ω contienne $\mathfrak{p}$ est celle de la page, « provenant d'un idéal $q' \supset p$ ne rencontrant pas f » ; elle rend la flèche $(A_f)_{\Omega} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ définie. La démonstration n'a pas besoin de l'identification $A_{\mathfrak{p}} = (A_f)_{\mathfrak{p}A_f}$ par laquelle la page se ramène au cas $f = 1$. Le corollaire 1 n'utilise du lemme 2 que le lemme 13.3. Un même f tue le noyau de $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ et rend injectives toutes les flèches $A_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ pour $\mathfrak{q} \in D(f) \cap V(\mathfrak{p})$, ce qui est (H) pour le faisceau structural. Dans la démonstration du lemme 1, l'argument donne l'égalité $s_y = \xi_y$, là où la page écrit « d'où $s_x = \xi_y$ ».

Huitième partie

K-théorie, classes de Chern et Riemann–Roch

Le 3 novembre 1970, il demande à Daniel Ferrand s'il peut compter sur l'exposé XI de SGA 6 avant la fin de décembre, ou si le volume doit paraître sans lui (37, lot 4, p. 73). La cote 153, datée « [à partir de 1982] », reprend les λ -anneaux plus de dix ans après.

14 Cote 153 : polynômes à valeurs entières, co-opérations, analyseurs¹⁵

La cote 153, *Analyseurs : notes manuscrites (s.d.)*, dix pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », cherche la structure abstraite d'un anneau d'opérations muni d'une composition, ce qu'on appelle aujourd'hui une pléthorie. Elle y arrive par les polynômes à valeurs entières. La page 3 fixe une inclusion d'anneaux commutatifs $k_0 \subset K_0$ et l'anneau $\Omega = \{F \in K_0[T] \mid F(\lambda) \in k_0 \forall \lambda \in k_0\}$. Les co-opérations $F(x+y) = \sum_i G_i(x)H_i(y)$ et $F(xy) = \sum_{\alpha} J_{\alpha}(x)K_{\alpha}(y)$ doivent être des éléments « bien déterminés » de $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$. Pour cela, la page énonce un lemme, le mot « Lemme » étant lu sans certitude : le sous-ensemble des $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$ tels que $F(x) \in M$ pour tout $x \in k_0$ « s'identifie à $\Omega \otimes_{k_0} M$ » (153, lot 1, p. 3). La lecture précise : coordonnée par coordonnée dans une base de M .

La page 2 écrit les polynômes binomiaux $F_n = \binom{T}{n} \in \mathbb{Q}[T]$, affirme que $\bigoplus_n \mathbb{Z}F_n$ est une $\mathbb{Z}$ -algèbre, et écrit la co-addition sous la forme générale $F_m(P+Q) = \sum \gamma_{ij}^m F_i(P)F_j(Q)$; la co-multiplication reste inachevée (153, lot 1, p. 2). La page 5 définit l'analyseur, puis les constantes, et écrit sans justification $\Omega = \Omega_0 \oplus \Omega^0$ (153, lot 1, p. 5). La page 7 donne les exemples $\text{Appl}(A, A)$, $k[[T]]$ et $k[[T]]^+$, et l'application $\Omega \rightarrow \text{Appl}(\Omega_0, \Omega_0) = \Omega_{\Omega_0}$, avec le souhait « que $\Omega \rightarrow \Omega_{\Omega_0}$ soit injectif ! » (153, lot 1, p. 7). La page 9 donne l'exemple relatif et l'analyseur binomial de $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ (153, lot 1, p. 9).

Définition. Soit K_0 une k_0 -algèbre commutative ; on note $\iota : k_0 \rightarrow K_0$ le morphisme structural. On pose $\Omega = \{F \in K_0[T] \mid F(\iota(\lambda)) \in \iota(k_0) \forall \lambda \in k_0\}$; c'est une sous- k_0 -algèbre de $K_0[T]$, les

¹⁵Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder153.lean.

valeurs d'une somme et d'un produit étant la somme et le produit des valeurs, et un polynôme constant $\iota(c)$ y appartenant. Pour un k_0 -module M , $x \in k_0$ et $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$, on note $F(x) \in K_0 \otimes_{k_0} M$ l'image de F par $\text{ev}_x \otimes \text{id}_M$, où $\text{ev}_x : K_0[T] \rightarrow K_0$ est l'évaluation en $\iota(x)$, et l'on dit que $F(x) \in M$ lorsque $F(x)$ est dans l'image de $M \rightarrow K_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$. On note Ω_M l'ensemble des F tels que $F(x) \in M$ pour tout $x \in k_0$. Enfin « Ω_M s'identifie à $\Omega \otimes_{k_0} M$ » est lu : l'application canonique $\Omega \otimes_{k_0} M \rightarrow K_0[T] \otimes_{k_0} M$ est injective, et son image est Ω_M .

Énoncé (Lemme, page 3). *Soit M un k_0 -module libre, de base $(e_i)_{i \in I}$, et écrivons tout $F \in K_0[T] \otimes_{k_0} M$ sous la forme $\sum_i F_i \otimes e_i$, les $F_i \in K_0[T]$ étant presque tous nuls.*

1. $F \in \Omega_M$ si et seulement si $F_i \in \Omega$ pour tout i .
2. L'application canonique $\Omega \otimes_{k_0} M \rightarrow K_0[T] \otimes_{k_0} M$ est injective.
3. Son image est exactement Ω_M .

Dans ce qui suit, N et P désignent des k_0 -modules et $f : N \rightarrow P$ une application k_0 -linéaire. La base (e_i) donne, pour tout N , un isomorphisme $c_N : N \otimes_{k_0} M \rightarrow N^{(I)}$ sur les familles presque nulles d'éléments de N , qui envoie $n \otimes m$ sur $(m_i n)_i$, où les m_i sont les coordonnées de m ; c'est l'isomorphisme $N \otimes_{k_0} k_0^{(I)} \simeq N^{(I)}$. On appelle $c_N(t)_i$ la i -ième coordonnée de t .

Lemme 14.1. *Les coordonnées sont naturelles : pour $t \in N \otimes_{k_0} M$, la i -ième coordonnée de $(f \otimes \text{id}_M)(t)$ est $f(c_N(t)_i)$.*

Démonstration. Les deux membres sont additifs en t , et il suffit de le vérifier sur un tenseur pur $n \otimes m$: la i -ième coordonnée de $f(n) \otimes m$ est $m_i f(n) = f(m_i n)$. $\square$

Lemme 14.2. *Un élément t de $P \otimes_{k_0} M$ est dans l'image de $f \otimes \text{id}_M$ si et seulement si chacune de ses coordonnées est dans l'image de f .*

Démonstration. Si $t = (f \otimes \text{id})(s)$, ses coordonnées sont les $f(c_N(s)_i)$ par le lemme 14.1. Réciproquement, supposons $c_P(t)_i = f(g_i)$ pour tout i , et prenons $g_i = 0$ hors du support, fini, de $c_P(t)$; la famille (g_i) est presque nulle, et soit $s = c_N^{-1}((g_i)_i)$. Par le lemme 14.1, les coordonnées de $(f \otimes \text{id})(s)$ sont les $f(g_i)$, qui valent $c_P(t)_i$ sur le support et $0 = c_P(t)_i$ ailleurs; c_P étant injectif, $(f \otimes \text{id})(s) = t$. $\square$

Lemme 14.3. *L'image de $M \rightarrow K_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$, est l'image de $\iota \otimes \text{id}_M : k_0 \otimes_{k_0} M \rightarrow K_0 \otimes_{k_0} M$.*

Démonstration. La première application est la composée de l'isomorphisme $M \simeq k_0 \otimes_{k_0} M$, $m \mapsto 1 \otimes m$, et de $\iota \otimes \text{id}_M$. $\square$

Démonstration du lemme de la page 3. (1) Soit $x \in k_0$. Par le lemme 14.3, $F(x) \in M$ signifie que $(\text{ev}_x \otimes \text{id})(F)$ est dans l'image de $\iota \otimes \text{id}$, c'est-à-dire, par le lemme 14.2, que chacune de ses coordonnées est dans $\iota(k_0)$. Par le lemme 14.1, sa i -ième coordonnée est $\text{ev}_x(F_i) = F_i(\iota(x))$. Ainsi $F \in \Omega_M$ si et seulement si $F_i(\iota(x)) \in \iota(k_0)$ pour tout x et tout i , c'est-à-dire si et seulement si $F_i \in \Omega$ pour tout i .

(2) Un module libre est plat, fait classique ; le produit tensoriel par M conserve donc l'injectivité de l'inclusion $\Omega \hookrightarrow K_0[T]$.

(3) Par le lemme 14.2 appliqué à l'inclusion $\Omega \hookrightarrow K_0[T]$, F est dans l'image de $\Omega \otimes_{k_0} M$ si et seulement si chaque F_i est dans Ω , c'est-à-dire, par (1), si et seulement si $F \in \Omega_M$. $\square$

Remarque. L'hypothèse de la page que $k_0 \rightarrow K_0$ soit une inclusion ne sert pas. Le lemme vaut pour toute k_0 -algèbre commutative K_0 , Ω étant l'ensemble des polynômes qui envoient k_0 dans l'image de k_0 .

Stabilité par composition et co-opérations (page 3). On garde les notations de la définition ; on écrit $K_0[X, Y]$ pour l'anneau des polynômes en deux variables sur K_0 , et, pour $F \in K_0[T]$, $\Delta_a F = F(X+Y)$ et $\Delta_m F = F(XY)$. On note $\Phi : \Omega \otimes_{k_0} \Omega \rightarrow K_0[X, Y]$ l'application k_0 -linéaire qui envoie $G \otimes H$ sur $G(X)H(Y)$.

Énoncé (Page 3, stabilité). *Si $F, G \in \Omega$, alors $F \circ G \in \Omega$.*

Démonstration. Pour $x \in k_0$, $G(\iota(x)) = \iota(y)$ pour un $y \in k_0$, et $(F \circ G)(\iota(x)) = F(\iota(y)) \in \iota(k_0)$. $\square$

Énoncé (Page 3, les co-opérations). *Supposons que K_0 soit un localisé $S^{-1}k_0$ de k_0 , et que Ω soit un k_0 -module libre.*

1. *L'application Φ est injective.*
2. *Son image est l'ensemble des $P \in K_0[X, Y]$ tels que $P(\iota(x), \iota(y)) \in \iota(k_0)$ pour tous $x, y \in k_0$.*
3. *Pour $F \in \Omega$, il existe un unique $t \in \Omega \otimes_{k_0} \Omega$ tel que $\Phi(t) = F(X+Y)$, et un unique t' tel que $\Phi(t') = F(XY)$.*
4. *Si $\Phi(\sum_i G_i \otimes H_i) = F(X+Y)$, alors $F \circ (P+Q) = \sum_i (G_i \circ P)(H_i \circ Q)$ pour tous $P, Q \in K_0[T]$; si $\Phi(\sum_\alpha J_\alpha \otimes K_\alpha) = F(XY)$, alors $F \circ (PQ) = \sum_\alpha (J_\alpha \circ P)(K_\alpha \circ Q)$.*

Soit $(e_j)_{j \in I}$ une base du k_0 -module Ω . Deux lemmes traduisent l'hypothèse sur K_0 : toute famille finie d'éléments de K_0 admet un dénominateur commun $s \in S$, c'est-à-dire que les $\iota(s)a$ sont dans $\iota(k_0)$, et $\iota(s)$ est inversible dans K_0 .

Lemme 14.4. *Les e_j , vus dans $K_0[T]$, sont linéairement indépendants sur K_0 .*

Démonstration. Soit $\sum_j a_j e_j = 0$, les $a_j \in K_0$ presque tous nuls, et $s \in S$ un dénominateur commun : $\iota(s)a_j = \iota(d_j)$, $d_j \in k_0$. Alors $\sum_j d_j e_j = \iota(s) \sum_j a_j e_j = 0$ dans Ω , donc les d_j sont nuls, puis $\iota(s)a_j = 0$ et $a_j = 0$, $\iota(s)$ étant inversible. $\square$

Lemme 14.5. *Les e_j engendrent $K_0[T]$ comme K_0 -module.*

Démonstration. Soit $p \in K_0[T]$. On chasse les dénominateurs des coefficients : il existe $s \in S$ et $q \in k_0[T]$ tels que $\iota(s)p$ soit l'image de q . Cette image envoie $\iota(x)$ sur $\iota(q(x))$, elle est donc dans Ω , combinaison k_0 -linéaire des e_j , et $p = \iota(s)^{-1} \cdot \iota(s)p$ est combinaison K_0 -linéaire des e_j . $\square$

Démonstration des co-opérations. (1) Tout $t \in \Omega \otimes_{k_0} \Omega$ s'écrit $\sum_j G_j \otimes e_j$, les $G_j \in \Omega$ étant les coordonnées de t dans la base (e_j) du second facteur, et $\Phi(t) = \sum_j G_j(X) e_j(Y)$. Le coefficient de X^m dans $\Phi(t)$ est $\sum_j c_m(G_j) e_j(Y)$, où $c_m(G_j) \in K_0$ est le coefficient de T^m dans G_j . Si $\Phi(t) = \Phi(t')$, le lemme 14.4 donne $c_m(G_j) = c_m(G'_j)$ pour tous j et m , donc $G_j = G'_j$ et $t = t'$.

(2) Les valeurs de $G(X)H(Y)$ en $(\iota(x), \iota(y))$ sont les produits $G(\iota(x))H(\iota(y)) \in \iota(k_0)$, et la condition passe aux sommes. Réciproquement, soit P à valeurs dans $\iota(k_0)$. Le lemme 14.5, appliqué aux coefficients de chaque monôme X^n , écrit $P = \sum_j G_j(X) e_j(Y)$ avec des $G_j \in K_0[T]$. Pour $x \in k_0$, le polynôme $P(\iota(x), T) = \sum_j G_j(\iota(x)) e_j$ est dans Ω , donc égal à $\sum_j \iota(\beta_j) e_j$ pour des $\beta_j \in k_0$; le lemme 14.4 donne $G_j(\iota(x)) = \iota(\beta_j)$. Ainsi chaque G_j est dans Ω , et $P = \Phi(\sum_j G_j \otimes e_j)$.

(3) Pour $F \in \Omega$, $(\Delta_a F)(\iota(x), \iota(y)) = F(\iota(x+y))$ et $(\Delta_m F)(\iota(x), \iota(y)) = F(\iota(xy))$ sont dans $\iota(k_0)$: l'existence vient de (2), l'unicité de (1).

(4) Soit $\text{ev}_{P,Q} : K_0[X, Y] \rightarrow K_0[T]$ le morphisme d'anneaux qui fixe K_0 et envoie X sur P , Y sur Q . Il envoie $G(X)H(Y)$ sur $(G \circ P)(H \circ Q)$, $F(X + Y)$ sur $F \circ (P + Q)$ et $F(XY)$ sur $F \circ (PQ)$; on l'applique à l'égalité supposée. $\square$

Remarque. L'hypothèse employée est que K_0 soit un localisé de k_0 , ce que la lecture donne comme exemple de son hypothèse $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$. La démonstration ne passe pas par l'identification $K_0[X] \otimes_{k_0} K_0[Y] = K_0[X, Y]$, l'application Φ arrivant directement dans $K_0[X, Y]$. La liberté de Ω , que demande la marge de la page, sert aux deux lemmes et à l'écriture $t = \sum_j G_j \otimes e_j$. L'inclusion $k_0 \subset K_0$ n'est pas supposée. Elle découle de la liberté de Ω dès que $K_0 \neq 0$, un $c \in k_0$ tel que $\iota(c) = 0$ annulant tous les e_j . Les règles de (4) valent pour n'importe quel représentant et ne demandent pas l'unicité; l'unicité fait des co-opérations des éléments « bien déterminés » de $\Omega \otimes_{k_0} \Omega$. La formule $F \circ \lambda T = \sum_\alpha J_\alpha(\lambda) K_\alpha$ de la page en est le cas $P = \lambda, Q = T$.

Pólya et Vandermonde (page 2). Pour $k_0 = \mathbf{Z} \subset K_0 = \mathbf{Q}$, $\Omega = \text{Int}(\mathbf{Z})$; on pose $F_n = \binom{T}{n} = T(T-1) \cdots (T-n+1)/n!$, et l'on note $\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$ la différence finie.

Énoncé (Page 2, théorème de Pólya). *Les F_n sont dans $\text{Int}(\mathbf{Z})$ et linéairement indépendants sur $\mathbf{Z}$. Tout $P \in \text{Int}(\mathbf{Z})$ de degré d s'écrit $P = \sum_{k \leq d} c_k F_k$ avec $c_k = (\Delta^k P)(0) \in \mathbf{Z}$. Ainsi $(F_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est une base du $\mathbf{Z}$ -module $\text{Int}(\mathbf{Z})$.*

Démonstration. La valeur de F_n en un entier m est le coefficient binomial généralisé $\binom{m}{n}$, entier. Si $\sum_{k \in s} g_k F_k = 0$, la fonction $f(m) = \sum_k g_k \binom{m}{k}$ est nulle sur $\mathbf{N}$; or $\Delta^i \binom{\cdot}{k}$ vaut en 0 le symbole de Kronecker δ_{ik} , donc $g_i = (\Delta^i f)(0) = 0$. Soit maintenant $P \in \text{Int}(\mathbf{Z})$ et $f(m) = P(m) \in \mathbf{Z}$ pour $m \in \mathbf{N}$. Les $c_k = (\Delta^k f)(0) = \sum_{j \leq k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} f(j)$ sont entiers, et ce sont aussi les $(\Delta^k P)(0)$; ils sont nuls pour $k > d$, la k -ième différence d'un polynôme de degré $< k$ étant nulle. La formule de Newton $f(m) = \sum_{k \leq m} \binom{m}{k} (\Delta^k f)(0)$ montre que P et $\sum_{k \leq d} c_k F_k$ coïncident sur $\mathbf{N}$, partie infinie de $\mathbf{Q}$; ils sont égaux. $\square$

Énoncé (Page 2, Vandermonde, et les co-opérations de $\text{Int}(\mathbf{Z})$). *Dans $\mathbf{Q}[X, Y]$, $F_m(X + Y) = \sum_{i+j=m} F_i(X) F_j(Y)$. Par suite l'unique élément de $\text{Int}(\mathbf{Z}) \otimes_{\mathbf{Z}} \text{Int}(\mathbf{Z})$ qui représente $F_m(X + Y)$ est $\sum_{i+j=m} F_i \otimes F_j$: les γ_{ij}^m de la page valent 1 si $i + j = m$ et 0 sinon. De même $F_m(XY) = \sum_{i,j} \delta_{ij}^m F_i(X) F_j(Y)$ pour des entiers δ_{ij}^m uniquement déterminés.*

Démonstration. L'identité est la formule de Chu-Vandermonde dans un anneau binomial, $\binom{r+s}{m} = \sum_{i+j=m} \binom{r}{i} \binom{s}{j}$, que mathlib démontre (Ring.add_choose_eq) et qu'on applique dans $\mathbf{Q}[X, Y]$ à $r = X$, $s = Y$; les morphismes d'anneaux commutent aux coefficients binomiaux généralisés, ce qui identifie $\binom{X}{i}$ à $F_i(X)$. Par le théorème de Pólya, $\text{Int}(\mathbf{Z})$ est libre, $\mathbf{Q}$ est le localisé de $\mathbf{Z}$ en les entiers non nuls, et l'énoncé des co-opérations s'applique : il donne l'unicité, et, pour $F_m(XY)$, l'existence; les coefficients dans la base $(F_i \otimes F_j)$ sont les δ_{ij}^m . $\square$

Remarque. Les entiers $c_{m,n}^p$ et $d_{m,n}^p$ de la page s'en déduisent. $F_m F_n$ et $F_m \circ F_n$ sont dans $\text{Int}(\mathbf{Z})$, sous-anneau stable par composition, donc sont des combinaisons entières des F_p , de degré au plus $m + n$ et mn ; cette conséquence n'a pas d'énoncé Lean séparé. La lecture attribue le théorème à G. Pólya (1919). La démonstration suivie ici est celle des différences finies.

Constantes et décomposition (page 5). Soit Ω un pseudo-anneau commutatif muni d'une loi $\circ$ associative, d'unité T , telle que $F \mapsto F \circ G$ soit un morphisme de pseudo-anneaux pour tout G : ce sont les conditions 1) et 2). On note $\Omega_0 = \{\lambda \mid \lambda \circ F = \lambda \forall F\}$ et $\Omega^0 = \{F \mid F \circ 0 = 0\}$.

Énoncé (Page 5, $\Omega = \Omega_0 \oplus \Omega^0$). Ω_0 est un sous-pseudo-anneau de Ω ; pour $F \in \Omega$ et $\lambda \in \Omega_0$, $F \circ \lambda \in \Omega_0$, et en particulier $F \circ 0 \in \Omega_0$; Ω^0 est un sous-groupe et un idéal; et Ω est somme directe des sous-groupes Ω_0 et Ω^0 , par $F = F \circ 0 + (F - F \circ 0)$. L'application $F \mapsto (\lambda \mapsto F \circ \lambda)$ de Ω dans $\text{Appl}(\Omega_0, \Omega_0)$ respecte la somme, le produit et la composition, envoie T sur l'identité, et envoie une constante λ sur l'application constante de valeur λ .

Démonstration. Comme $F \mapsto F \circ G$ est additif, $0 \circ G = 0$ et $(-F) \circ G = -(F \circ G)$; additivité et multiplicativité montrent que Ω_0 est stable par somme, opposé et produit. Si $\lambda \in \Omega_0$, $(F \circ \lambda) \circ G = F \circ (\lambda \circ G) = F \circ \lambda$, et $0 \in \Omega_0$. Si $F \in \Omega^0$, $(GF) \circ 0 = (G \circ 0)(F \circ 0) = 0$. Une constante λ de Ω^0 vérifie $\lambda = \lambda \circ 0 = 0$: l'intersection est nulle. Enfin $(F - F \circ 0) \circ 0 = F \circ 0 - (F \circ 0) \circ 0 = 0$, $F \circ 0$ étant une constante, ce qui donne la somme. Les propriétés de $F \mapsto (\lambda \mapsto F \circ \lambda)$ sont les conditions 2), l'associativité, $T \circ \lambda = \lambda$ et la définition des constantes. $\square$

Remarque. Les conditions 3) n'interviennent pas, ni l'unité T sauf pour l'image de T . La décomposition n'utilise que l'associativité et l'additivité de $F \mapsto F \circ G$. La multiplicativité sert seulement à faire de Ω_0 un sous-pseudo-anneau et de Ω^0 un idéal. La somme directe est une somme de groupes abéliens, Ω_0 n'étant pas un idéal en général.

Exemples et contre-exemples (page 7).

Énoncé (Page 7, l'exemple $\text{Appl}(A, A)$). Soit A un pseudo-anneau commutatif et $\Omega_A = \text{Appl}(A, A)$, avec les lois ponctuelles et la composition des applications. Il vérifie 1) et 2); ses constantes sont les applications constantes, et $(\Omega_A)_0 \simeq A$ comme pseudo-anneaux. Si A est un anneau commutatif unitaire non nul et infini, Ω_A ne vérifie pas 3a) : l'indicatrice δ de 0 n'admet aucune famille finie $(F'_i, F''_i)_{i < n}$ telle que $\delta \circ (G' + G'') = \sum_i (F'_i \circ G')(F''_i \circ G'')$ pour tous G', G'' .

Démonstration. Une constante λ vérifie $\lambda = \lambda \circ c_0$, où c_0 est l'application constante de valeur 0, donc $\lambda(x) = \lambda(0)$ pour tout x ; l'isomorphisme est $\lambda \mapsto \lambda(0)$. Pour 3a), prenons G' et G'' constantes de valeurs x et y : on obtiendrait $\delta(x + y) = \sum_{i < n} F'_i(x) F''_i(y)$ pour tous $x, y \in A$. Choisissons $n + 1$ éléments distincts $a_0, \dots, a_n$ de A et posons $U_{ji} = F'_i(a_j)$, $V_{ik} = F''_i(-a_k)$. Alors $(UV)_{jk} = \delta(a_j - a_k)$ est la matrice identité d'ordre $n + 1$, de rang $n + 1$ sur l'anneau commutatif non nul A , alors que le rang de UV est au plus celui de U , qui a n colonnes. $\square$

Énoncé (Page 7, l'analyseur des polynômes et l'application $\Omega \rightarrow \Omega_{\Omega_0}$). Soit k un anneau commutatif et $\Omega = k[T]$ avec la composition des polynômes. Il vérifie 1) et 2), et ses constantes sont les polynômes constants. Si k est un corps fini à q éléments, $T^q - T$ est non nul et $(T^q - T) \circ \lambda = 0$ pour toute constante λ : l'application $\Omega \rightarrow \text{Appl}(\Omega_0, \Omega_0)$ n'est pas injective. Si k est un anneau intègre infini, elle l'est. Pour $\text{Int}(\mathbf{Z})$, deux polynômes $F, G \in \mathbf{Q}[T]$ tels que $F \circ n = G \circ n$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$ sont égaux.

Démonstration. Pour une constante λ , $\lambda = \lambda \circ 0$ est le polynôme constant $\lambda(0)$; réciproquement un polynôme constant est une constante. Sur un corps fini, $a^q = a$ pour tout a , d'où $(T^q - T) \circ a = a^q - a = 0$, et $T^q - T$ est de degré $q \geq 2$. Sur un anneau intègre infini, comme sur $\mathbf{Q}$ avec la partie infinie $\mathbf{Z}$, un polynôme est déterminé par ses valeurs, et $F \circ a$ est le polynôme constant $F(a)$. $\square$

Énoncé (Page 7, $k[[T]]^+$ ne vérifie pas 3a)). Soit k un anneau commutatif non nul et $F = \sum_{m \geq 1} T^m$. Les coefficients de $X^p Y^q$ dans $F(X + Y) = \sum_{m \geq 1} (X + Y)^m$, qui valent $\binom{p+q}{p}$ hors de $(p, q) = (0, 0)$ et 0 en $(0, 0)$, ne sont ceux d'aucune somme finie $\sum_{i < n} a_i(X) b_i(Y)$ de séries formelles : il n'existe pas de suites $(a_{i,p})$, $(b_{i,q})$ telles que ce coefficient soit $\sum_{i < n} a_{i,p} b_{i,q}$ pour tous p, q .

Démonstration. La matrice de Pascal $P_N = \left(\binom{p+q}{p} \right)_{p,q < N}$ est de déterminant 1 : elle vaut LL^T avec $L = \left(\binom{p}{j} \right)_{p,j < N}$, par l'identité $\binom{p+q}{p} = \sum_j \binom{p}{j} \binom{q}{j}$, conséquence de Vandermonde, et L est triangulaire à diagonale unité. Si les coefficients étaient $\sum_{i < n} a_{i,p} b_{i,q}$, ceux de P_{n+2} seraient $\sum_{i < n} a_{i,p} b_{i,q} + [p = 0][q = 0]$, et P_{n+2} serait le produit d'une matrice à $n + 1$ colonnes par une matrice à $n + 1$ lignes, de rang au plus $n + 1$, alors qu'elle est inversible, de rang $n + 2$. $\square$

Remarque. Le contre-exemple de 3a) pour $\text{Appl}(A, A)$ est établi pour A unitaire, commutatif, non nul et infini. La page ne parle pas de 3), et la lecture dit « pour A infini ». Pour $k[[T]]^+$, la matrice des coefficients de $F(X + Y)$ diffère de la matrice de Pascal, que nomme la note de la lecture, par le coefficient $(0, 0)$, nul puisque F n'a pas de terme constant ; l'argument coûte donc un rang de plus. Le déterminant de la matrice de Pascal valant 1 sur $\mathbf{Z}$, le contre-exemple vaut en toute caractéristique. L'énoncé Lean porte sur les coefficients. Le passage aux séries, où le coefficient de $X^p Y^q$ d'un produit $a(X)b(Y)$ est $a_p b_q$, est celui de la note.

Neuvième partie

Schémas en groupes et groupes algébriques

15 Cote 84 : le produit des algèbres quadratiques, en coordonnées¹⁶

La cote 84, [Formes quadratiques] : notes manuscrites (s.d.), cent quatre-vingt-douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982-vers 1986] », étudie les formes quadratiques binaires et les algèbres quadratiques au-dessus d'une base quelconque, sans diviser par 2. Sa deuxième partie construit le produit $A_1 * A_2$ de deux algèbres quadratiques. Page 63, la page pose « sauf erreur » $b = b_1 b_2$ et en tire c par $4c = b^2 - \delta$; l'encadré écrit « $4c_1 c_1$ », le membre de droite et le calcul donnent $4c_1 c_2$ (84, lot 4, p. 63). Page 64, elle vérifie par une identité polynomiale que l'élément $u_1 b_2 + u_2 b_1 + 2u_1 u_2$ annule l'équation du produit quand u_1 et u_2 annulent les leurs (84, lot 4, p. 64). Page 84, elle calcule des générateurs de $\text{Im}(\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \text{id})$; page 85, elle énonce la proposition sur les coinvariants, avec un décompte de rangs au-dessus de $X_0 = V(2)$; page 86, le corollaire sur les invariants, « et inversement si on sait que ceci reste vrai après tout changement de base » (84, lot 5, p. 84, 84, lot 5, p. 85, 84, lot 5, p. 86). Page 89, le théorème donne $b = b_1 b_2$, $c = c_1 b_2^2 + c_2 b_1^2 - 4c_1 c_2$ et $\delta = \delta_1 \delta_2$ (84, lot 5, p. 89); page 102, l'image $i(\mathcal{U}) = 2U_1 U_2 + b_1 U_2 + b_2 U_1$ du générateur dans $A_1 \otimes A_2$ (84, lot 6, p. 102).

Conventions. R est un anneau commutatif quelconque. Les algèbres A_i ont pour bases $(1, U_i)$ avec $U_i^2 + b_i U_i + c_i = 0$, de sorte que $\text{Tr}(U_i) = -b_i$ et que la conjugaison est $\sigma_i(1) = 1$, $\sigma_i(U_i) = -b_i - U_i$; on pose $\delta_i = b_i^2 - 4c_i$. C'est la convention de la lecture (pages 98 à 102). Du côté des extensions, E_i a pour base (e_i, x_i) , où e_i engendre L_i et x_i est le scindage; $\psi(e_i) = 0$, $\psi(x_i) = 1$, $T_i = 2x_i - b_i e_i$ et $\sigma_i(x) = \psi(x)T_i - x$, donc $\sigma_i(e_i) = -e_i$ et $\sigma_i(x_i) = x_i - b_i e_i$ (page 84). On écrit $E_1 \otimes E_2 = R^4$ dans la base $(e_1 \otimes e_2, e_1 \otimes x_2, x_1 \otimes e_2, x_1 \otimes x_2)$, $\sigma_1 \otimes \sigma_2$ par le produit de Kronecker des deux matrices, et $E_1 * E_2 = R^2$ dans la base $(e_1 \otimes e_2, x_1 * x_2)$. L'application $E_1 \otimes E_2 \rightarrow E_1 * E_2$ est celle de la page 63, $(x_1 + u_1) * (x_2 + u_2) = x_1 * x_2 + u_1 b_2 + u_2 b_1 + 2u_1 u_2$: elle envoie (a, a', a'', a''') sur $(2a + b_2 a' + b_1 a'', a''')$. Du côté des algèbres, $A = A_1 * A_2$ a pour base $(1, \mathcal{U})$, $A_1 \otimes A_2$ la base $(1, U_1, U_2, U_1 U_2)$, et i envoie (λ, μ) sur $(\lambda, \mu b_2, \mu b_1, 2\mu)$.

Énoncé (Pages 63, 64, 89 et 102, la formule du produit $\blacklozenge$). Soient A_1, A_2 deux R -algèbres commutatives et $u_i \in A_i$ avec $u_i^2 + b_i u_i + c_i = 0$, $b_i, c_i \in R$. Posons $U_1 = u_1 \otimes 1$, $U_2 = 1 \otimes u_2$ dans $A_1 \otimes_R A_2$, $b = b_1 b_2$ et $c = c_1 b_2^2 + c_2 b_1^2 - 4c_1 c_2$.

1. (Page 64) Dans tout anneau commutatif, avec $Q_i = u_i^2 + b_i u_i + c_i$ et $u = 2u_1 u_2 + b_1 u_2 + b_2 u_1$,

$$u^2 + bu + c = b_2^2 Q_1 + b_1^2 Q_2 + 4(Q_1 Q_2 - c_1 Q_2 - c_2 Q_1).$$

2. (Page 102) L'élément $\mathcal{U} = 2U_1 U_2 + b_1 U_2 + b_2 U_1$ vérifie $\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c = 0$ dans $A_1 \otimes_R A_2$; il existe donc un unique morphisme de R -algèbres $R[\mathcal{U}]/(\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c) \rightarrow A_1 \otimes_R A_2$ envoyant $\mathcal{U}$ sur cet élément.

¹⁶Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder84.lean.

3. (Pages 63 et 89) $b^2 - 4c = \delta_1\delta_2$, et $c_1\delta_2 + c_2\delta_1 + 4c_1c_2 = c_1b_2^2 + c_2b_1^2 - 4c_1c_2$.

Démonstration. (1) et (3) sont des identités entre polynômes à coefficients entiers ; on les vérifie en développant. (2) Les inclusions $A_1 \rightarrow A_1 \otimes A_2$ et $A_2 \rightarrow A_1 \otimes A_2$ sont des morphismes de R -algèbres ; elles transportent les équations de u_1 et u_2 en $U_1^2 + b_1U_1 + c_1 = 0$ et $U_2^2 + b_2U_2 + c_2 = 0$. L'identité (1), appliquée dans l'anneau $A_1 \otimes A_2$ à U_1 et U_2 , donne $\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c = 0$, puisque $Q_1 = Q_2 = 0$. La propriété universelle de $R[\mathcal{U}]/(\mathcal{U}^2 + b\mathcal{U} + c)$ donne le morphisme. $\square$

Remarque. L'identité de la page 64 vaut sans hypothèse sur u_1, u_2 , dans tout anneau commutatif, et la vérification ne divise jamais par 2 : le produit est défini sur $\mathbb{Z}$. La lecture de « $4c_1c_1$ » en $4c_1c_2$ est confirmée : avec $4c_1c_2$, l'identité (1) et la relation $b^2 - 4c = \delta_1\delta_2$ tiennent, et la première forme de l'encadré est égale à la seconde. Ce qui est démontré est la partie en coordonnées de la piste ; la construction intrinsèque de $X_1 * X_2$ et l'unicité de la forme quadratique de la page 89 ne le sont pas.

Énoncé (Pages 84 et 85, proposition $\blacklozenge$). Dans les coordonnées ci-dessus, l'application induite

$$(E_1 \otimes E_2) / \text{Im}(\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \text{id}) \rightarrow E_1 * E_2$$

est bien définie, et elle est bijective si et seulement si $2R + b_1R + b_2R = R$.

Démonstration. On calcule $\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \text{id}$ sur la base : $e_1 \otimes e_2 \mapsto 0$, $e_1 \otimes x_2 \mapsto (b_2, -2, 0, 0)$, $x_1 \otimes e_2 \mapsto (b_1, 0, -2, 0)$, $x_1 \otimes x_2 \mapsto (b_1b_2, -b_1, -b_2, 0)$; ce sont les générateurs de la page 84. L'application $(a, a', a'', a''') \mapsto (2a + b_2a' + b_1a'', a''')$ les annule, d'où l'application induite.

Elle a même image que $E_1 \otimes E_2 \rightarrow E_1 * E_2$. Si elle est surjective, $(1, 0)$ est atteint, donc $2a + b_2a' + b_1a'' = 1$ pour des $a, a', a'' \in R$, et $2R + b_1R + b_2R = R$. Réciproquement, si $2g_0 + b_1g_1 + b_2g_2 = 1$, l'image de $(y_0g_0, y_0g_2, y_0g_1, y_1)$ est (y_0, y_1) .

Sous la condition, montrons que le noyau est dans $\text{Im}(\sigma_1 \otimes \sigma_2 - \text{id})$; l'injectivité de l'application induite en résulte. Écrivons $f = (2, b_2, b_1)$ et $g = (g_0, g_2, g_1)$, de sorte que $f \cdot g = 1$. Un élément du noyau est $(a_0, a_1, a_2, 0)$ avec $f \cdot a = 0$. Les relations de Koszul $\kappa_{jk} = f_k \varepsilon_j - f_j \varepsilon_k$ de f dans R^3 sont $\kappa_{01} = (b_2, -2, 0)$, $\kappa_{02} = (b_1, 0, -2)$ et $\kappa_{12} = (0, b_1, -b_2)$; les deux premières sont les images de $e_1 \otimes x_2$ et $x_1 \otimes e_2$, la troisième celle de $x_1 \otimes x_2 - b_1 e_1 \otimes x_2$. Or

$$a = \sum_{j < k} (g_k a_j - g_j a_k) \kappa_{jk},$$

car la i -ème coordonnée du second membre est $a_i(f \cdot g) - g_i(f \cdot a) = a_i$. L'élément a est donc l'image d'une combinaison explicite des vecteurs de base. $\square$

Énoncé (Page 86, corollaire $\blacklozenge$). Dans les coordonnées ci-dessus, disons que $A \rightarrow (A_1 \otimes A_2)^{\sigma_1 \otimes \sigma_2}$ est un isomorphisme si i est injectif et si son image est le sous-module des invariants de $\sigma_1 \otimes \sigma_2$.

1. Si $2R + b_1R + b_2R = R$, c'est un isomorphisme.
2. C'est un isomorphisme après tout changement de base $R \rightarrow S$ si et seulement si $2R + b_1R + b_2R = R$.

3. Sur $R = \mathbb{Z}[X]$, avec $b_1 = X$ et $b_2 = 0$, c'est un isomorphisme, alors que 2, X et 0 engendrent un idéal propre.

Démonstration. Un vecteur (p, q, r, s) (coefficients de 1, U_1 , U_2 , U_1U_2) est invariant si et seulement si $-b_1q - b_2r + b_1b_2s = 0$, $2q = b_2s$ et $2r = b_1s$. L'image $(\lambda, \mu b_2, \mu b_1, 2\mu)$ de i vérifie ces relations.

(1) Soit $2g_0 + b_1g_1 + b_2g_2 = 1$. Si $i(\lambda, \mu) = 0$, alors $\lambda = 0$ et $\mu = \mu(2g_0 + b_1g_1 + b_2g_2) = 0$. Soit (p, q, r, s) invariant. Des relations on tire $b_1q = b_2r$, car $b_1b_2s = 2b_1q$ (on multiplie $2q = b_2s$ par b_1). Posons $\mu = sg_0 + rg_1 + qg_2$. Alors $2\mu = s$, $b_1\mu = r$ et $b_2\mu = q$; par exemple $b_2\mu - q = g_0(b_2s - 2q) + g_1(b_2r - b_1q) = 0$, en remplaçant q par $q(2g_0 + b_1g_1 + b_2g_2)$. Donc $(p, q, r, s) = i(p, \mu)$.

(2) La condition passe à tout S : l'image de $1 = 2g_0 + b_1g_1 + b_2g_2$ est une relation du même type, et (1) s'applique. Réciproquement, si l'idéal $I = (2, b_1, b_2)$ n'est pas R , prenons $S = R/I$, qui n'est pas nul. Dans S , $2 = b_1 = b_2 = 0$, et le vecteur $U_2 = (0, 0, 1, 0)$ est invariant. S'il était $i(\lambda, \mu)$, sa coordonnée sur U_2 serait $\mu b_1 = 0$, et l'on aurait $1 = 0$ dans S .

(3) Avec $b_1 = X$, $b_2 = 0$, les relations deviennent $2q = 0$, $2r = Xs$. L'anneau $\mathbb{Z}[X]$ est intègre, donc $q = 0$ et i est injectif ($2\mu = 0$ entraîne $\mu = 0$). L'élément 2 est premier dans $\mathbb{Z}[X]$ et ne divise pas X ; de $2 \mid Xs$ on tire $s = 2\mu$, puis $r = X\mu$ en simplifiant par 2, et $(p, q, r, s) = i(p, \mu)$. Enfin, si $2g_0 + Xg_1 = 1$, le coefficient constant donne $2g_0(0) = 1$ dans $\mathbb{Z}$, ce qui est impossible. $\square$

Remarque. La proposition de la page 85 tient en coordonnées sur tout anneau commutatif, dans les deux sens, sans changement de base, sans hypothèse de rang et sans la réduction au cas $2 = 0$ que la page annonce. Le noyau est engendré par les relations de Koszul de la suite unimodulaire $(2, b_2, b_1)$. Pour le corollaire de la page 86, la condition suffit sur R lui-même, et la réciproque demande l'hypothèse de la page, « après toute changement de base » : l'exemple de $\mathbb{Z}[X]$ montre que l'isomorphisme sur R seul n'entraîne pas la condition. Un changement de base vers $R/(2, b_1, b_2)$ suffit. La formulation ponctuelle (en tout point de $V(2)$, l'un des $T_{i,0}$ engendre $L_{i,0}$) n'est pas démontrée; elle équivaut à la condition en coordonnées dès que L_1 , L_2 sont triviaux et munis de scindages, ce que la page dit aussi. Le passage de l'énoncé sur les coinvariants à l'énoncé sur les invariants par dualité n'est pas formalisé : les deux sont démontrés séparément, en coordonnées.

Ne sont pas démontrés ici : la construction intrinsèque du produit $X_1 * X_2$ (pages 65 à 79), l'unicité de la forme quadratique du théorème de la page 89, la formulation ponctuelle de la proposition de la page 85 et du corollaire de la page 86, l'énoncé du corollaire pour $\text{Hom}(-, M)$, la trace et la norme de $A_1 \otimes A_2$ sur A (pages 104 et 105), et les troisième et quatrième parties du dossier.

Dixième partie

Topologie combinatoire, surfaces et cartes

Le 15 avril 1984, l'année de l'*Esquisse d'un programme*, il écrit à Lipman Bers sur l'espace de Teichmüller et l'espace de Thurston des surfaces à bord, avec des modèles en disques et en tranches d'orange (67, lot 1, p. 15). C'est la seule lettre datée du fonds sur les surfaces et leurs découpages.

16 Cote 152 : le dictionnaire des graphes circularisés et des contours¹⁷

La cote 152, *Catégorie des types de mots [dont arbres plans] : notes manuscrites (s.d.)*, douze pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », décrit un arbre plan de trois manières et montre qu'elles sont équivalentes. Les pages 4 à 12, sous sa pagination 1, 1', 2, 2', 3, 3', forment un texte suivi. On découpe la surface le long d'un graphe circularisé et l'on obtient un *contour*, réunion de polygones, un par face. Les pages 7 et 9 écrivent le dictionnaire entre les deux données, trois fois, et les trois formes ne s'accordent pas. La page 7 encadre des formules où seule la rotation intervient. La page 9 pose en tête « $\sigma_\Gamma = \sigma_C$, $\rho_\Gamma = \rho_C$ », puis dresse un tableau dont les deux dernières lignes associent $\rho_\Gamma \sigma_\Gamma$ à ρ_C et ρ_Γ à $\rho_C \sigma_C$. Elle encadre enfin un critère pour qu'un graphe soit un arbre, dont les deux derniers mots ne se lisent pas (152, lot 1, p. 9). La lecture retient la convention du tableau.

Définition. Soit D un ensemble, celui des arcs — arêtes orientées, ou demi-arêtes. Un *graphe circularisé sans sommet isolé* sur D est la donnée d'une involution sans point fixe σ_Γ de D (le renversement des arcs) et d'une permutation ρ_Γ de D (l'arc suivant autour de l'origine) ; ses sommets sont les orbites de ρ_Γ . Un *contour* sur D est la donnée d'une permutation ρ_C de D (l'arête suivante sur le contour orienté) et d'une involution sans point fixe σ_C de D (le recollement) ; ses polygones, ou faces, sont les cycles de ρ_C . Le graphe est *connexe* si deux arcs quelconques sont reliés par une suite de pas $x \mapsto \rho_\Gamma x$ et $x \mapsto \sigma_\Gamma x$, parcourus dans un sens ou dans l'autre. Comme la lecture, on identifie l'ensemble $A(C)$ des arêtes du contour à celui des arcs par l'application « arête droite ».

Énoncé (Équivalence, pages 7 et 9, sur les objets). *Sur un même ensemble D , les applications*

$$(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma) \mapsto (\rho_C, \sigma_C) = (\rho_\Gamma \sigma_\Gamma, \sigma_\Gamma), \quad (\rho_C, \sigma_C) \mapsto (\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma) = (\sigma_C, \rho_C \sigma_C)$$

sont des bijections réciproques entre graphes circularisés sans sommet isolé et contours munis d'une involution de recollement sans point fixe. Les trois formules $\sigma_C = \sigma_\Gamma$, $\rho_C = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma$, $\rho_\Gamma = \rho_C \sigma_C$ valent ensemble, et les orbites de $\rho_C \sigma_C$ sont les sommets du graphe.

Énoncé (Connexité, dans la démonstration du critère de la page 9). *Si D est fini et que ρ_C n'a qu'un cycle, le graphe est connexe.*

Remarque. La tête de la page 9, $\rho_\Gamma = \rho_C$, est incompatible avec le tableau dès que D n'est pas vide : jointe à $\rho_C = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma$, elle forcerait $\sigma_\Gamma = \text{id}$.

Démonstration de l'équivalence. Tout repose sur $\sigma^2 = \text{id}$ pour une involution. Partant de $(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma)$, on obtient le contour $(\rho_\Gamma \sigma_\Gamma, \sigma_\Gamma)$, dont l'involution est sans point fixe puisque c'est σ_Γ , puis le graphe $(\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma \sigma_\Gamma \sigma_\Gamma) = (\sigma_\Gamma, \rho_\Gamma)$. Partant de (ρ_C, σ_C) , on obtient le graphe $(\sigma_C, \rho_C \sigma_C)$, puis le contour $(\rho_C \sigma_C \sigma_C, \sigma_C) = (\rho_C, \sigma_C)$. Les deux premières formules sont les définitions, et la troisième en résulte : $\rho_C \sigma_C = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma \sigma_\Gamma = \rho_\Gamma$. Les permutations $\rho_C \sigma_C$ et ρ_Γ étant égales, elles ont les mêmes orbites, qui sont les sommets. $\square$

¹⁷Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder152.lean.

Démonstration de la connexité. Soient $a, b \in D$. Comme ρ_C n'a qu'un cycle et que D est fini, il existe un entier $k \geq 0$ tel que $b = \rho_C^k(a)$. Raisonnons par récurrence sur k . Pour $k = 0$, $b = a$. Si $\rho_C^k(a)$ est relié à a , alors $\rho_C^{k+1}(a) = \rho_\Gamma(\sigma_\Gamma(\rho_C^k(a)))$ l'est aussi, par un pas σ_Γ suivi d'un pas ρ_Γ . $\square$

Démonstration de la remarque. Si $\rho_\Gamma = \rho_\Gamma \sigma_\Gamma$, la composition à gauche par ρ_Γ^{-1} donne $\sigma_\Gamma = \text{id}$, et tout arc serait un point fixe de σ_Γ , ce qui est exclu dès qu'il y a un arc. $\square$

Remarque. L'équivalence n'utilise que $\sigma_\Gamma^2 = \text{id}$. C'est le dictionnaire classique des cartes combinatoires, où les faces sont les cycles du produit de la rotation et de l'involution.

Remarque. L'équivalence est établie sur les objets, les deux données vivant sur le même ensemble ; les morphismes ne sont examinés ni ici ni sur la page.

17 Cote 88 : l'ordre 2ν et la trichotomie des cartes standard¹⁸

La cote 88, *Cartes standards : notes manuscrites (s.d.)*, quinze pages sans date, appartient au groupe « Géométrie et topologie combinatoire » que l'inventaire date « 1976-[vers 1986] ». Elle contient deux textes. Le premier, sous le titre de chemise « Cartes associées aux syst. de Racines », remplace un système de racines par son groupe de Weyl, le torseur de ses bases et ses réflexions simples. Il fait opérer des involutions $\sigma_0, \dots, \sigma_{\ell-1}$ sur les drapeaux du complexe qu'il en tire, et calcule à la page 8 l'ordre du dernier produit : « ordre de $\pi = \sigma_{\ell-2} \sigma_{\ell-1} = 2\nu$ », ν étant « le ppcm des n_{ij} » (88, lot 1, p. 8). Le second, intitulé de sa main « Théorème (à prouver) », énonce en sept articles la théorie des cartes régulières de type (p, q) . Son article (6), à la page 14, les répartit en sphériques, euclidiennes et hyperboliques par des listes de couples (88, lot 1, p. 14). Deux énoncés de la lecture sont démontrés ici : la proposition de la page 8, et l'arithmétique qui trie les cas de l'article (6).

Définition. Soient W un groupe, R un ensemble non vide sur lequel W opère librement et transitivement, I un ensemble fini de cardinal $\ell \geq 2$, et $\varphi : R \times I \rightarrow W$ une application telle que

$$\text{a) } \varphi(wr, i) = w \varphi(r, i) w^{-1}, \quad \varphi(r, i)^2 = 1 \quad (w \in W, r \in R, i \in I).$$

Soit $\text{Rep}'(I)$ l'ensemble des bijections $u : [1, \ell] \rightarrow I$, et τ la transposition de $\ell - 1$ et ℓ . On définit sur $R \times \text{Rep}'(I)$

$$\sigma_{\ell-2}(r, u) = (r, u \circ \tau), \quad \sigma_{\ell-1}(r, u) = (\varphi(r, u(\ell))r, u).$$

Pour $g \in W$, on note $\text{ord}(g)$ le générateur positif ou nul du sous-groupe $\{k \in \mathbf{Z} \mid g^k = 1\}$, qui est nul si g est d'ordre infini, et de même pour une permutation. On pose $n_{ij} = \text{ord}(\varphi(r, i)\varphi(r, j))$ et $\nu = \text{ppcm}\{n_{ij} \mid i \neq j\}$, un ppcm dont un terme est nul étant nul.

Dans la lecture, W est le groupe de Weyl, R l'ensemble des bases, $\varphi(r, i)$ la réflexion simple d'indice i relative à la base r ; seules sont retenues ici, des quatre conditions a) à d) que la lecture énonce, la condition a) et la moitié $\varphi(r, i)^2 = 1$ de c).

¹⁸Preuve vérifiée : `lean/Grothendieck/Folder88.lean`.

Énoncé (Proposition, page 8). L'ordre de $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1}$ sur $R \times \text{Rep}'(I)$ est 2ν , où ν est le plus petit commun multiple des n_{ij} , $i \neq j$.

Énoncé (Article (6), page 14 : l'arithmétique). Soient $p, q \geq 1$ des entiers, le type (p, q) étant atteint au sens de l'article (2) : on exclut $(1, q)$ pour $q \neq 2$ et $(p, 1)$ pour $p \neq 2$. Alors

1. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$ si et seulement si $p = 2$, ou $q = 2$, ou (p, q) est l'un de $(3, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(3, 5)$, $(5, 3)$;
2. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2}$ si et seulement si (p, q) est l'un de $(4, 4)$, $(3, 6)$, $(6, 3)$;
3. pour $p, q \geq 3$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < \frac{1}{2}$ si et seulement si $p + q \geq 9$ et $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$.

On pose $\pi = \sigma_{\ell-1}\sigma_{\ell-2}$, le produit avec lequel calcule la page 6, et, pour (r, u) donné, $a = \varphi(r, u(\ell-1))$ et $b = \varphi(r, u(\ell))$.

Lemme 17.1. $\sigma_{\ell-2}$ et $\sigma_{\ell-1}$ sont des involutions ; par suite $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1} = \pi^{-1}$.

Démonstration. Pour $\sigma_{\ell-2}$, c'est $\tau^2 = \text{id}$. Pour $\sigma_{\ell-1}$, posons $s = \varphi(r, i)$ avec $i = u(\ell)$; par a), $\varphi(sr, i) = s s s^{-1} = s$, de sorte que $\sigma_{\ell-1}^2(r, u) = (s^2 r, u) = (r, u)$. Alors $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1} = \sigma_{\ell-2}^{-1}\sigma_{\ell-1}^{-1} = (\sigma_{\ell-1}\sigma_{\ell-2})^{-1}$. $\square$

Lemme 17.2. On a $\pi(r, u) = (a r, u \circ \tau)$; pour tout $g \in W$, $\pi^2(gr, u) = (g a b r, u)$; et, pour tout entier $m \geq 0$, $\pi^{2m}(r, u) = ((ab)^m r, u)$ et la seconde composante de $\pi^{2m+1}(r, u)$ est différente de u .

Démonstration. Comme $(u \circ \tau)(\ell) = u(\ell-1)$, $\pi(r, u) = \sigma_{\ell-1}(r, u \circ \tau) = (a r, u \circ \tau)$. Pour $g \in W$, a) donne $\varphi(gr, u(\ell-1)) = g a g^{-1}$, d'où $\pi(gr, u) = (g a r, u \circ \tau)$; puis, $(u \circ \tau)(\ell-1) = u(\ell)$ et $(u \circ \tau) \circ \tau = u$, et a) donne $\varphi(g a r, u(\ell)) = (g a) b (g a)^{-1}$, d'où $\pi(g a r, u \circ \tau) = (g a b r, u)$. La formule pour π^{2m} s'en déduit par récurrence, en appliquant la précédente à $g = (ab)^m$. Enfin $\pi^{2m+1}(r, u) = \pi((ab)^m r, u)$ a pour seconde composante $u \circ \tau$, et $(u \circ \tau)(\ell) = u(\ell-1) \neq u(\ell)$ puisque u est injective. $\square$

Lemme 17.3. Pour tout entier $k \geq 0$, $\pi^k(r, u) = (r, u)$ si et seulement si $2 n_{u(\ell-1), u(\ell)}$ divise k .

Démonstration. Si $k = 2m$ est pair, $\pi^k(r, u) = ((ab)^m r, u)$ par le lemme 17.2 ; l'action étant libre, c'est (r, u) si et seulement si $(ab)^m = 1$, c'est-à-dire si et seulement si $\text{ord}(ab)$ divise m , soit $2 \text{ord}(ab)$ divise k . Si k est impair, $\pi^k(r, u) \neq (r, u)$ par le même lemme, et $2 \text{ord}(ab)$ ne divise pas k . Enfin $ab = \varphi(r, u(\ell-1))\varphi(r, u(\ell))$ est d'ordre $n_{u(\ell-1), u(\ell)}$ par le lemme suivant, qui assure que cet ordre ne dépend pas de r . $\square$

Lemme 17.4. L'ordre de $\varphi(r, i)\varphi(r, j)$ ne dépend pas de $r \in R$. Et pour $i \neq j$ dans I , il existe $u \in \text{Rep}'(I)$ avec $u(\ell-1) = i$ et $u(\ell) = j$.

Démonstration. Soient $r, r' \in R$; par transitivité, $r' = w r$ pour un $w \in W$, et par a), $\varphi(r', i)\varphi(r', j) = w \varphi(r, i)\varphi(r, j) w^{-1}$, qui est conjugué de $\varphi(r, i)\varphi(r, j)$ et a donc le même

ordre. Pour la seconde assertion, partons d'une bijection $e : [1, \ell] \rightarrow I$, qui existe puisque I a ℓ éléments. On la compose à gauche par la transposition de $e(\ell - 1)$ et de i , pour obtenir u_1 avec $u_1(\ell - 1) = i$, puis par la transposition de $u_1(\ell)$ et de j . Comme $u_1(\ell) \neq i$ et $j \neq i$, cette seconde transposition fixe i , et la bijection obtenue envoie $\ell - 1$ sur i et ℓ sur j . $\square$

Démonstration de la proposition. Par le lemme 17.1, $\sigma_{\ell-2}\sigma_{\ell-1}$ a le même ordre que π . Montrons que $\pi^k = \text{id}$ si et seulement si $2n_{ij}$ divise k pour tous $i \neq j$. Si $\pi^k = \text{id}$ et $i \neq j$, prenons u comme au lemme 17.4 et un r quelconque de R , qui n'est pas vide : le lemme 17.3 en (r, u) donne $2n_{ij} \mid k$. Réciproquement, pour tout (r, u) , les indices $u(\ell - 1)$ et $u(\ell)$ sont distincts, et le lemme 17.3 donne $\pi^k(r, u) = (r, u)$. Or $2n_{ij} \mid k$ pour tous $i \neq j$ équivaut à $2\nu \mid k$: si c'est le cas pour tous, k est pair, puisqu'il existe au moins un couple $i \neq j$, et $k/2$ est un multiple commun des n_{ij} , donc de ν ; la réciproque vient de ce que chaque n_{ij} divise ν . Ainsi $\{k \mid \pi^k = \text{id}\} = 2\nu\mathbf{Z}$, et l'ordre de π est 2ν . $\square$

Démonstration de l'arithmétique de (6). Pour $p, q \geq 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$, $= \frac{1}{2}$, $< \frac{1}{2}$ équivalent respectivement à $pq < 2(p + q)$, $pq = 2(p + q)$, $pq > 2(p + q)$, c'est-à-dire à $(p - 2)(q - 2) < 4$, $= 4$, > 4 . Si $p \geq 7$, $pq < 2(p + q)$ entraîne $q \leq 2$, et symétriquement ; hors de ces cas, il reste un nombre fini de couples avec $p, q \leq 6$, qu'on examine un à un. Pour (1), $p = 2$ ou $q = 2$ donnent $0 < 4$; $p = 1$ n'est permis qu'avec $q = 2$, et $q = 1$ qu'avec $p = 2$; pour $p, q \geq 3$, $(p - 2)(q - 2) \in \{1, 2, 3\}$ laisse exactement $(3, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(3, 5)$, $(5, 3)$. Pour (2), p ou q égal à 1 ou 2 est exclu, puisque $(p - 2)(q - 2)$ vaut alors 0, ou $2 - q$ ou $2 - p$, qui est au plus 1 ; pour $p, q \geq 3$, $(p - 2)(q - 2) = 4$ donne $(3, 6)$, $(4, 4)$, $(6, 3)$. Pour (3), les couples $p, q \geq 3$ qui ne vérifient pas $(p - 2)(q - 2) > 4$ sont les huit couples obtenus en (1) et (2). Six d'entre eux, les cinq de (1) et $(4, 4)$, sont exactement les couples $p, q \geq 3$ de somme au plus 8 ; les deux autres, $(3, 6)$ et $(6, 3)$, sont de somme 9. Un couple $p, q \geq 3$ vérifie donc $(p - 2)(q - 2) > 4$ si et seulement si $p + q \geq 9$ et $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$. $\square$

Remarque. La proposition demande seulement un groupe W opérant librement et transitivement sur R et une application φ vérifiant a) et $\varphi(r, i)^2 = 1$. Que W soit un groupe de Weyl, la condition b), la présentation c) et le graphe de Coxeter d) n'interviennent pas.

Remarque. La finitude de W n'intervient pas : avec la convention adoptée pour l'ordre, la formule 2ν vaut encore quand un n_{ij} est infini.

Remarque. La page 14 écrit la condition (c_2) « $p + q \geq 10$ ou $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$ » ; la forme juste, que la lecture rétablit et qui est démontrée en (3), est $p + q \geq 9$ et $(p, q) \neq (3, 6), (6, 3)$.

Remarque. Dans la lecture, la présentation de Coxeter du groupe cartographique, $\hat{\Gamma} = \langle \sigma_0, \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_i^2, (\sigma_0\sigma_2)^2 \rangle$, est une définition reprise de l'*Esquisse d'un programme*. Elle n'appelle pas de démonstration.

18 Cote 77 : le discriminant universel modulo 2 et modulo 4¹⁹

La cote 77, *Quadriques affines, extensions quadratiques : notes manuscrites (s.d.)*, compte cent cinquante-sept pages, que l'inventaire place après 1977. La partie IV, dont la couverture de la page 64 porte « discriminant des formes quadratiques », prend la forme quadratique

¹⁹Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder77.lean.

universelle $\sum_i Y_i x_i^2 + \sum_{i < j} Y_{ij} x_i x_j$ sur l'anneau $\mathbf{Z}[Y]$ et le déterminant Δ de sa forme polaire, matrice qui porte $2Y_i$ sur la diagonale et Y_{ij} ailleurs. Les pages 65 à 67 développent Δ en une somme sur des graphes : sommets isolés pour les points fixes, arêtes doubles pour les transpositions, polygones pour les autres cycles. La page 68 réduit cette somme modulo 2 : il n'y reste que les involutions sans point fixe, et la page conclut « On voit donc que $\Delta \bmod 2 = 0$ si $\text{card } I$ est impair » (77, lot 4, p. 68). En rang pair $m = 2n$, elle pose B , somme sur les couplages parfaits de I des produits des Y_{ij} , cherche $\varepsilon = \pm 1$ tel que $B^2 - \varepsilon \Delta \equiv 0 \pmod{4}$, et « prévoit » $\varepsilon = (-1)^n$. Les pages 69 et 71 comparent B^2 et Δ modulo 4 par les paires de couplages, avec une fausse alarme à l'encre brune corrigée deux lignes plus bas. La page 87, barrée, contrôle les coefficients du développement en rang 4 (77, lot 5, p. 87). La page 127 prend le discriminant divisé $\delta' = \delta/2$ du rang impair comme critère de régularité (77, lot 7, p. 127).

Conventions. Pour $n \geq 0$, les indéterminées sont indexées par les parties $J \subset \{1, \dots, n\}$ de cardinal 1 ou 2, notées Y_i et Y_{ij} ; on note $\mathbf{Z}[Y]$ l'anneau de polynômes correspondant. La matrice polaire universelle P_n a pour coefficients $2Y_i$ en (i, i) et Y_{ij} en (i, j) et (j, i) pour $i \neq j$. Sur un anneau commutatif R , une famille $y = (y_i, y_{ij})$ d'éléments de R définit la forme $\sum y_i x_i^2 + \sum_{i < j} y_{ij} x_i x_j$, de matrice polaire $P(y)$, image de P_n par le morphisme $Y \mapsto y$.

Énoncé (Page 68, rang impair $\blacklozenge$). *Si n est impair, $\det P_n$ est divisible par 2 dans $\mathbf{Z}[Y]$. Le quotient $\delta'_n = \det P_n / 2$ est l'unique polynôme tel que $\det P_n = 2\delta'_n$, et pour tout anneau commutatif R et toute famille y d'éléments de R , $\det P(y) = 2\delta'_n(y)$.*

Démonstration. Soit K_n la matrice de $\mathbf{Z}[Y]$ qui porte Y_{ij} en (i, j) pour $i < j$, $-Y_{ij}$ en (i, j) pour $i > j$ et 0 sur la diagonale. Elle est antisymétrique : ${}^t K_n = -K_n$. On a donc $\det K_n = \det {}^t K_n = \det(-K_n) = (-1)^n \det K_n = -\det K_n$, d'où $2 \det K_n = 0$; comme $\mathbf{Z}[Y]$ est intègre de caractéristique nulle, $\det K_n = 0$.

Soit $\rho : \mathbf{Z}[Y] \rightarrow \mathbf{F}_2[Y]$ la réduction des coefficients modulo 2. Les matrices P_n et K_n ont même image par ρ : sur la diagonale, $\rho(2Y_i) = 0$; au-dessus, les coefficients sont égaux ; au-dessous, $\rho(-Y_{ij}) = \rho(Y_{ij})$ en caractéristique 2. Le déterminant commutant aux morphismes d'anneaux, $\rho(\det P_n) = \det \rho(P_n) = \det \rho(K_n) = \rho(\det K_n) = 0$. Le noyau de ρ est formé des polynômes dont tous les coefficients sont pairs, c'est-à-dire de l'idéal engendré par 2 ; donc 2 divise $\det P_n$.

L'unicité du quotient vient de ce que 2 n'est pas diviseur de zéro dans $\mathbf{Z}[Y]$. Pour R et y donnés, le morphisme $Y \mapsto y$ envoie P_n sur $P(y)$ et commute au déterminant ; il envoie $2\delta'_n$ sur $2\delta'_n(y)$. $\square$

Remarque. L'énoncé tient pour tout n impair. La démonstration ne suit pas le développement en graphes de la page : elle remplace, modulo 2, la matrice symétrique par la matrice antisymétrique K_n , dont le déterminant est nul sur $\mathbf{Z}[Y]$ en taille impaire. Sur $\mathbf{F}_2[Y]$ l'argument $\det = -\det$ ne donne rien, et c'est pourquoi il faut relever $\rho(P_n)$ en une matrice antisymétrique sur $\mathbf{Z}[Y]$. La seconde partie de la piste, « q est régulière si et seulement si $\delta'(q)$ est inversible », est la définition de la régularité que la lecture adopte (page 127). Les équivalences de la page 127 avec la lissité de $V(q)$ et l'isomorphie locale à la forme standard ne sont pas formalisées.

Énoncé (Pages 68 à 71 et 87, rangs 2 et 4 $\blacklozenge$). *Soit R un anneau commutatif.*

1. (Rang 2, $n = 1$.) Pour $a_1, a_2, b_{12} \in R$, $-\det \begin{pmatrix} 2a_1 & b_{12} \\ b_{12} & 2a_2 \end{pmatrix} = B^2 - 4C$ avec $B = b_{12}$ et $C = a_1 a_2$.

2. (Rang 4, $n = 2$.) Soit P la matrice polaire de la forme $\sum_{i \leq 4} a_i x_i^2 + \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j$ et $B = b_{12} b_{34} + b_{13} b_{24} + b_{14} b_{23}$, somme sur les trois couplages parfaits de $\{1, 2, 3, 4\}$. Alors $\det P = B^2 - 4C$ avec

$$C = -4a_1 a_2 a_3 a_4 + a_1 a_2 b_{34}^2 + a_1 a_3 b_{24}^2 + a_1 a_4 b_{23}^2 + a_2 a_3 b_{14}^2 + a_2 a_4 b_{13}^2 + a_3 a_4 b_{12}^2 \\ - a_1 b_{23} b_{24} b_{34} - a_2 b_{13} b_{14} b_{34} - a_3 b_{12} b_{14} b_{24} - a_4 b_{12} b_{13} b_{23} \\ + b_{12} b_{13} b_{24} b_{34} + b_{12} b_{14} b_{23} b_{34} + b_{13} b_{14} b_{23} b_{24}.$$

3. Le signe $\varepsilon = -(-1)^n$ ne convient dans aucun des deux rangs : sur $\mathbf{Z}$, pour $a_1 = a_2 = 0$ et $b_{12} = 1$, $B^2 - \det P = 2$; pour $b_{12} = b_{34} = 1$ et les autres coefficients nuls, $B^2 + \det P = 2$. Aucun des deux n'est divisible par 4.

Démonstration. En rang 2, $\det = 4a_1 a_2 - b_{12}^2$. En rang 4, on développe $\det P$ selon la première ligne, puis chaque mineur d'ordre 3 par la règle de Sarrus. On obtient

$$\det P = 16a_1 a_2 a_3 a_4 - 4(a_1 a_2 b_{34}^2 + a_1 a_3 b_{24}^2 + a_1 a_4 b_{23}^2 + a_2 a_3 b_{14}^2 + a_2 a_4 b_{13}^2 + a_3 a_4 b_{12}^2) \\ + 4(a_1 b_{23} b_{24} b_{34} + a_2 b_{13} b_{14} b_{34} + a_3 b_{12} b_{14} b_{24} + a_4 b_{12} b_{13} b_{23}) + b_{12}^2 b_{34}^2 + b_{13}^2 b_{24}^2 + b_{14}^2 b_{23}^2 \\ - 2(b_{12} b_{13} b_{24} b_{34} + b_{12} b_{14} b_{23} b_{34} + b_{13} b_{14} b_{23} b_{24}).$$

Ce sont les coefficients de la page 87 : 2^4 pour les quatre sommets isolés, -2^2 pour une arête double et deux sommets isolés, 2^2 pour un triangle et un sommet isolé, 1 pour deux arêtes doubles, -2 pour un carré. Le carré B^2 a pour termes carrés les $b_{12}^2 b_{34}^2$, $b_{13}^2 b_{24}^2$, $b_{14}^2 b_{23}^2$ et pour termes croisés $2(b_{12} b_{13} b_{24} b_{34} + b_{12} b_{14} b_{23} b_{34} + b_{13} b_{14} b_{23} b_{24})$; la différence $B^2 - \det P$ est donc $4C$, terme à terme. Les deux contre-exemples se calculent sur ces formules : en rang 2, $B^2 - \det P = 1 - (-1)$; en rang 4, $\det P = b_{12}^2 b_{34}^2 = 1$ et $B^2 + \det P = 2$. $\square$

Remarque. L'identité est démontrée sur tout anneau commutatif, donc en particulier sur $\mathbf{Z}[Y]$, avec un C écrit en entier. Elle confirme en rangs 2 et 4 le signe $(-1)^n$ que la page « prévoit », et le choix opposé échoue dans ces deux rangs, ce que la lecture avait contrôlé par machine pour $m = 2, 4, 6$. En rang 4, la vérification confirme les coefficients et les nombres de graphes de la page 87. L'identité pour un rang pair quelconque n'est pas démontrée ici. L'argument des pages 69 et 71 compte les paires de couplages, et sa formalisation demanderait le développement de Δ en graphes et un pfaffien, qui manque à mathlib.

Ne sont pas démontrés ici : l'identité $(-1)^n \Delta = B^2 - 4C$ en rang pair $2n \geq 6$; le développement de Δ en graphes des pages 65 à 67; les équivalences de la page 127 entre l'inversibilité de $\delta'(q)$, la lissité de $V(q)$ et l'isomorphie locale à la forme standard.

19 Cote 85 : l'invariant d'une rotation d'ordre 5²⁰

La cote 85, *2-polyèdres et 1-polygones : notes manuscrites (s.d.)*, du groupe « Géométrie et topologie combinatoire », étudie les polygones et polyèdres réguliers réalisés dans une forme de PGL_2 sur une base quelconque, au moyen d'un seul invariant A . Pour PGL_2 , la lecture le donne par $A(v) = (\mathrm{Tr} v)^2 / \det v - 2$ pour un relèvement $v \in \mathrm{GL}_2$ (pages 23 et 27, 85, lot 2, p. 23, 85, lot 2, p. 27). La page 30 dit qu'un élément est d'ordre 5 en tout point si et seulement si $\alpha^2 + \alpha - 1 = 0$, hors caractéristique 5 (85, lot 2, p. 30). La page 10 énonce le cas de l'icosaèdre avec un facteur $\mathbf{Z}/2$ et la marge « laisser tomber $\mathbf{Z}/2$ dans l'énoncé » (85, lot 1, p. 10). La page 40 énonce le théorème sans ce facteur : pour une forme G de PGL_2 sur un schéma S et un monomorphisme $\varphi : \mathfrak{A}_5 \rightarrow G$, $\alpha(\varphi) = A(\varphi(\pi))$, π un 5-cycle, satisfait $\alpha^2 + \alpha - 1 = 0$, la catégorie des (G, φ) est rigide, et le foncteur des classes d'isomorphisme est « représentable par $M = \mathrm{Spec} \mathbf{Z}[T]/(T^2 + T - 1)$ » (85, lot 2, p. 40). Le calcul qui porte ce théorème est démontré ici, sur tout anneau commutatif, ainsi qu'un modèle explicite des relations de l'icosaèdre.

Conventions. R est un anneau commutatif et $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de $M_2(R)$ de détermi-

nant δ inversible ; on note $t = \mathrm{Tr} g$ et $A(g) = t^2 \delta^{-1} - 2$. On dit que g est *nulle part scalaire* si b, c et $a - d$ engendrent l'idéal unité. Un idéal est l'idéal unité si et seulement s'il n'est contenu dans aucun idéal premier ; la condition dit donc que l'image de g dans $\mathrm{PGL}_2(k(s))$ est différente de 1 en tout point s de $\mathrm{Spec} R$. Comme 5 est premier, l'image de g est alors d'ordre 5 en tout point si et seulement si g^5 est scalaire.

Énoncé (Pages 10, 30 et 40, l'invariant d'une rotation d'ordre 5 ♦). *Soit $g \in M_2(R)$ de déterminant inversible.*

1. $A(\mu g) = A(g)$ pour tout $\mu \in R^\times$: A ne dépend que de l'image de g dans $\mathrm{PGL}_2(R)$.
2. Si g est nulle part scalaire et g^5 scalaire, alors $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$.
3. Réciproquement, si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, alors g^5 est scalaire.
4. $A(g^2) = A(g)^2 - 2$; en particulier, si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, alors $A(g^2) = -1 - A(g)$ (corollaire de la page 40).

Lemme 19.1. *Pour toute matrice $g \in M_2(R)$, $g^5 = x_5 g + y_5$, avec $x_5 = t^4 - 3\delta t^2 + \delta^2$ et $y_5 = -\delta(t^3 - 2\delta t)$. Si δ est inversible, $x_5 = \delta^2 (A(g)^2 + A(g) - 1)$.*

Démonstration. Par Cayley–Hamilton, $g^2 = tg - \delta$. Si $g^n = x_n g + y_n$, alors $g^{n+1} = (tx_n + y_n)g - \delta x_n$. Partant de $x_1 = 1, y_1 = 0$, on trouve $x_2 = t, x_3 = t^2 - \delta, x_4 = t^3 - 2\delta t, y_4 = -\delta(t^2 - \delta)$, puis $x_5 = t^4 - 3\delta t^2 + \delta^2$ et $y_5 = -\delta x_4$. La vérification en Lean se fait coefficient par coefficient. Posons $u = t^2 \delta^{-1}$, de sorte que $A(g) = u - 2$. Alors $A(g)^2 + A(g) - 1 = u^2 - 3u + 1$, et $\delta^2(u^2 - 3u + 1) = t^4 - 3\delta t^2 + \delta^2$. $\square$

Démonstration de l'énoncé. (1) $\mathrm{Tr}(\mu g) = \mu t$ et $\det(\mu g) = \mu^2 \delta$, donc $(\mu t)^2 (\mu^2 \delta)^{-1} = t^2 \delta^{-1}$.

²⁰Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder85.lean.

(2) Écrivons $g^5 = \gamma \cdot 1$. Par le lemme 19.1, $x_5 g = (\gamma - y_5) \cdot 1$. En lisant les coefficients hors diagonale et la différence des coefficients diagonaux, $x_5 b = x_5 c = x_5(a - d) = 0$. L'ensemble des $r \in R$ tels que $x_5 r = 0$ est un idéal ; il contient $b, c, a - d$, donc l'idéal unité, et $x_5 = 0$. Comme δ^2 est inversible, le lemme donne $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$.

(3) Si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, le lemme donne $x_5 = 0$ et $g^5 = y_5$.

(4) $\text{Tr}(g^2) = t^2 - 2\delta$ et $\det(g^2) = \delta^2$, d'où $A(g^2) = (t^2 - 2\delta)^2 \delta^{-2} - 2 = (u - 2)^2 - 2 = A(g)^2 - 2$. Si $A(g)^2 = 1 - A(g)$, cela vaut $-1 - A(g)$. $\square$

Énoncé (Page 40, un modèle des relations de l'icosaèdre). Soit $\zeta \in R$ tel que $\zeta^4 + \zeta^3 + \zeta^2 + \zeta + 1 = 0$, et posons

$$s = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} \zeta & 1 \\ 0 & \zeta^4 \end{pmatrix}.$$

Alors $s^2 = -1$, $(sp)^3 = -1$ et p^5 est scalaire ; s, p et sp sont nulle part scalaires ; $\det p = 1$ et $A(p) = \zeta^2 + \zeta^3$ est racine de $T^2 + T - 1$. C'est le cas en particulier pour $R = \mathbf{Z}[\zeta_5] = \mathbf{Z}[X]/(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$ et ζ la classe de X .

Démonstration. On a $\zeta^5 - 1 = (\zeta - 1)(\zeta^4 + \zeta^3 + \zeta^2 + \zeta + 1) = 0$, donc ζ est inversible d'inverse ζ^4 , et $\det p = \zeta^5 = 1$. Le calcul direct donne $s^2 = -1$. Le produit $sp = \begin{pmatrix} 0 & -\zeta^4 \\ \zeta & 1 \end{pmatrix}$ a pour trace 1 et pour déterminant $\zeta^5 = 1$, donc $(sp)^2 = sp - 1$, puis $(sp)^3 = sp(sp - 1) = (sp - 1) - sp = -1$. Ensuite $\text{Tr } p = \zeta + \zeta^4$ et $A(p) = (\zeta + \zeta^4)^2 - 2 = \zeta^2 + 2\zeta^5 + \zeta^8 - 2 = \zeta^2 + \zeta^3$. On a $(\zeta^2 + \zeta^3)^2 + \zeta^2 + \zeta^3 - 1 = \zeta^4 + 2\zeta^5 + \zeta^6 + \zeta^2 + \zeta^3 - 1 = \zeta^4 + \zeta^3 + \zeta^2 + \zeta + 1 = 0$, et le point (3) de l'énoncé précédent donne p^5 scalaire. Le coefficient $(0, 1)$ vaut -1 pour s , 1 pour p et $-\zeta^4$ pour sp ; c'est chaque fois un inversible, et les trois matrices sont nulle part scalaires. Dans $\mathbf{Z}[X]/(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$, la classe de X est racine du polynôme par construction. $\square$

Remarque. Le point (2) vaut sur tout anneau commutatif, sans hypothèse sur 2, 3 ou 5, ni de réduction. L'exclusion de la caractéristique 5 à la page 30 concerne le sens réciproque, l'ordre exact 5 : en caractéristique 5, $T^2 + T - 1 = (T - 2)^2$, et $A(g) = 2$ vaut aussi pour $g = 1$. Avec l'hypothèse « nulle part scalaire » et 5 premier, les points (2) et (3) disent qu'un élément nulle part scalaire de déterminant inversible est d'ordre 5 en tout point si et seulement si $A(g)^2 + A(g) - 1 = 0$, en toute caractéristique. Dans le modèle, en caractéristique 5, $\zeta = 1$ convient, p est unipotent et $A(p) = 2$: c'est la rotation unipotente que la lecture signale pour $\mathfrak{A}_5 \simeq \text{PSL}_2(\mathbf{F}_5)$.

Remarque. Les relations $s^2, (sp)^3, p^5$ scalaires sont celles du groupe triangulaire de type $(2, 3, 5)$, qui est $\mathfrak{A}_5$. En tout point, le sous-groupe de $\text{PGL}_2(k(s))$ engendré par les images de s et p est un quotient de $\mathfrak{A}_5$ différent de 1, donc isomorphe à $\mathfrak{A}_5$, ce groupe étant simple. Ce passage n'est pas formalisé. Le modèle est dans le PGL_2 déployé sur $\mathbf{Z}[\zeta_5]$, et non sur $\mathbf{Z}[T]/(T^2 + T - 1)$. Sur $\mathbf{Q}(\sqrt{5})$, corps réel où -1 n'est pas somme de deux carrés, le PGL_2 déployé ne contient pas $\mathfrak{A}_5$ d'après le critère que la lecture cite de mémoire (note des pages 36 et 37) ; un modèle sur $\mathbf{Z}[\varphi]$ demande donc une forme non déployée, et c'est pourquoi le théorème de la page 40 porte sur les formes de PGL_2 .

Ne sont pas démontrés ici : la rigidité de la catégorie des (G, φ) et la représentabilité de son foncteur des classes d'isomorphisme par $\text{Spec } \mathbf{Z}[T]/(T^2 + T - 1)$ (page 40), ni l'exis-

tence d'un plongement de $\mathfrak{A}_5$ dans une forme de PGL_2 sur cette base ; le passage des formes de PGL_2 aux matrices de GL_2 , qui n'a lieu que localement ; l'équivalence entre « nulle part scalaire » et « différent de 1 en tout point » pour une forme quelconque ; l'homomorphisme $\mathfrak{A}_5 \rightarrow \mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z}[\zeta_5])$ défini par le modèle et son injectivité sur les fibres ; le théorème de la page 4 dont la lecture déduit celui de la page 10 ; les autres énoncés de la cote.

Onzième partie

Théorie de l'homotopie et catégories tests

La lettre à Daniel Quillen du 19 février 1983, continuée jusqu'au 23, ouvre *À la poursuite des champs* (134-2, lot 1, p. 14) ; la cote 114 est datée de cette année. La dernière lettre datée du fonds sur ces questions est la réponse de Ronald Brown du 16 avril 1991, sur les groupoïdes multiples et le groupoïde de Teichmüller (119, lot 15, p. 282), contemporaine de la cote 158.

Ailleurs : le dépôt d'OpenAI cité dans l'introduction annonce l'hypothèse d'homotopie pour les ∞ -groupoïdes globulaires faibles de tout cohérateur de Grothendieck, dans la convention d'Ara et Henry, et la conjecture de Henry sur les sommes amalgamées. Le post-scriptum d'une lettre de 1975, rangée avec celles à Lawrence Breen, expose le « yoga » de cette hypothèse (134-2, lot 3, p. 42). Seul est formalisé le théorème des expansions élémentaires : pour tout cohérateur dans cette convention et tout modèle à bord cellulaire, attacher un $(n+1)$ -disque le long de sa n -face source induit une équivalence faible. La structure de semi-modèles et la comparaison avec la théorie de l'homotopie des espaces ne le sont pas, et le projet n'a pas exécuté ce code. Les énoncés des cotes 106, 114, 158 et 104 démontrés ci-dessous sont des lemmes sur les catégories à cofibrations, les localisateurs fondamentaux, les monoïdes finis et les catégories de « modèles » ; ils ne touchent pas à l'hypothèse elle-même.

20 Cote 106 : catégories à cofibrations, factorisation de Brown et critère $(\star\star)^{21}$

La cote 106, [*Champs (stacks) 3*] : *notes manuscrites (s.d.)*, seize pages que l'inventaire date « [à partir de 1982] », est faite de huit feuillets de bloc entre lesquels sont intercalées des feuilles de listing ; certaines portent les dates d'impression des 24 et 25 août 1982. Elle s'ouvre sur « Soit $(\mathcal{C}, W, \mathrm{cof})$ une catégorie satisfaisant à C1 : C3 de Baues », construit le remplacement cofibrant et invoque le « weak lifting lemma » (106, lot 1, p. 1). La page 9 factorise une équivalence faible entre objets cofibrants et note en marge « On utilise $y \in \mathcal{C}_{\mathrm{cof}}$ ici » (106, lot 1, p. 9). La page 11 écrit : « Mais je doute qu'il ne suffise d'inverser les équiv. faibles *cofibrantes*, pour que les équiv. faibles deviennent inversibles ! » (106, lot 1, p. 11).

Définition. Une *catégorie à cofibrations* est une catégorie $\mathcal{C}$ à objet initial $\emptyset$, munie de deux classes de flèches, les équivalences faibles W et les cofibrations cof , qui vérifient les axiomes C1 à C3 tels que la lecture les rappelle : C1, les isomorphismes sont dans W et dans cof , les composés de cofibrations sont des cofibrations, et W satisfait au deux-sur-trois ; C2, pour une cofibration $c : b \rightarrow a$ et une flèche $u : b \rightarrow y$, la somme amalgamée $a \vee_b y$ existe, la flèche $y \rightarrow a \vee_b y$ est une cofibration, et une équivalence faible si c en est une, et la flèche $a \rightarrow a \vee_b y$ est une équivalence faible si u en est une ; C3, toute flèche se factorise en une cofibration

²¹Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder106.lean.

suivie d'une équivalence faible. Un objet x est *cofibrant* si $\emptyset \rightarrow x$ est une cofibration. On note $W_0 = W \cap \text{cof}$.

Énoncé (Remplacement cofibrant et relèvement faible, page 1). *Pour tout objet x , il existe $\alpha_x : \tilde{x} \rightarrow x$ dans W avec $\tilde{x}$ cofibrant. Soient $f : x \rightarrow y$, et $\alpha_x : \tilde{x} \rightarrow x$, $\alpha_y : \tilde{y} \rightarrow y$ dans W avec $\tilde{x}$ et $\tilde{y}$ cofibrants. Il existe $i : \tilde{y} \rightarrow \tilde{y}'$ dans $\text{cof} \cap W$, $\alpha'_y : \tilde{y}' \rightarrow y$ dans W avec $\alpha_y = \alpha'_y i$, et $\tilde{f} : \tilde{x} \rightarrow \tilde{y}'$ avec $\alpha'_y \tilde{f} = f \alpha_x$.*

Énoncé (Factorisation, page 9). *Soient x, y cofibrants et $f : x \rightarrow y$ dans W . En factorisant $(f, 1_y) : x \sqcup y \rightarrow y$ en une cofibration $x \sqcup y \rightarrow \bar{x}$ suivie d'une équivalence faible $\alpha : \bar{x} \rightarrow y$, et en notant i et g les composés de $x \rightarrow x \sqcup y$ et $y \rightarrow x \sqcup y$ avec $x \sqcup y \rightarrow \bar{x}$, on a $\alpha i = f$, $\alpha g = 1_y$ et $i, g \in \text{cof} \cap W$.*

Énoncé (Le doute levé, page 11). *Si tous les objets de $\mathcal{C}$ sont cofibrants, le foncteur $W_0^{-1}\mathcal{C} \rightarrow W^{-1}\mathcal{C}$ est un isomorphisme de catégories.*

Lemme 20.1. *Si x est cofibrant et $i : x \rightarrow z$ une cofibration, z est cofibrant.*

Démonstration. Par initialité, $\emptyset \rightarrow z$ est le composé de $\emptyset \rightarrow x$ et de i , qui est une cofibration par C1. □

Lemme 20.2. *Soient $p : a \rightarrow y$ et $q : b \rightarrow y$, avec b cofibrant. La somme $a \sqcup b$ existe ; factorisons $(p, q) : a \sqcup b \rightarrow y$ par C3 en une cofibration $c : a \sqcup b \rightarrow z$ suivie de $w : z \rightarrow y$ dans W , et notons j_a, j_b les composés de c avec les injections de a et de b . Alors $w j_a = p$, $w j_b = q$, j_a est une cofibration, et j_b en est une si a est cofibrant.*

Démonstration. La somme $a \sqcup b$ est la somme amalgamée de $\emptyset \rightarrow b$ et de $\emptyset \rightarrow a$; comme $\emptyset \rightarrow b$ est une cofibration, elle existe par C2, et l'injection $a \rightarrow a \sqcup b$ est une cofibration. Donc j_a en est une par C1. Les égalités $w j_a = p$ et $w j_b = q$ résultent de $w c = (p, q)$. Si a est cofibrant, le même carré, lu dans l'autre sens, fait de $b \rightarrow a \sqcup b$ une cofibration, et j_b en est une. □

Démonstration du remplacement cofibrant et du relèvement faible. Par C3, $\emptyset \rightarrow x$ se factorise en une cofibration $\emptyset \rightarrow \tilde{x}$ suivie de $\alpha_x : \tilde{x} \rightarrow x$ dans W ; par initialité, la cofibration est la flèche $\emptyset \rightarrow \tilde{x}$, et $\tilde{x}$ est cofibrant.

Pour le relèvement, appliquons le lemme 20.2 à $a = \tilde{y}$, $b = \tilde{x}$, $p = \alpha_y$ et $q = f \alpha_x$; c'est la factorisation de $(\alpha_y, f \alpha_x) : \tilde{y} \vee \tilde{x} \rightarrow y$ que propose la lecture. Posons $\tilde{y}' = z$, $i = j_a$, $\alpha'_y = w$ et $\tilde{f} = j_b$. Alors i est une cofibration, parce que $\tilde{x}$ est cofibrant ; $\alpha'_y \in W$; $\alpha'_y i = \alpha_y$ et $\alpha'_y \tilde{f} = f \alpha_x$. Comme α'_y et $\alpha'_y i = \alpha_y$ sont dans W , i y est par deux-sur-trois. Enfin $\tilde{y}'$ est cofibrant par le lemme 20.1, puisque $\tilde{y}$ l'est. □

Démonstration de la factorisation. Appliquons le lemme 20.2 à $a = x$, $b = y$, $p = f$ et $q = 1_y$, et posons $\bar{x} = z$, $\alpha = w$, $i = j_a$, $g = j_b$. Alors $\alpha i = f$ et $\alpha g = 1_y$; i est une cofibration parce que y est cofibrant, et g en est une parce que x l'est. Comme α et $\alpha g = 1_y$, isomorphisme, sont dans W , $g \in W$ par deux-sur-trois ; comme α et $\alpha i = f$ sont dans W , $i \in W$. □

Démonstration de l'énoncé de la page 11. Montrons d'abord que tout foncteur $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ qui rend inversibles les flèches de W_0 rend inversibles celles de W . Soit $f : x \rightarrow y$ dans W ; x et y sont cofibrants, et la factorisation de la page 9 donne $f = \alpha i$ et $\alpha g = 1_y$ avec $i, g \in W_0$. Alors $F(g)$ est inversible et $F(\alpha)F(g) = 1$, donc $F(\alpha) = F(g)^{-1}$ est inversible, et $F(f) = F(\alpha)F(i)$ aussi.

Soient $Q_0 : \mathcal{C} \rightarrow W_0^{-1}\mathcal{C}$ et $Q : \mathcal{C} \rightarrow W^{-1}\mathcal{C}$ les foncteurs de localisation. Comme $W_0 \subseteq W$, Q rend inversibles les flèches de W_0 , et la propriété universelle de Q_0 donne un unique $\bar{F} : W_0^{-1}\mathcal{C} \rightarrow W^{-1}\mathcal{C}$ tel que $\bar{F}Q_0 = Q$. Par ce qui précède, Q_0 rend inversibles les flèches de W , d'où un unique $\bar{G} : W^{-1}\mathcal{C} \rightarrow W_0^{-1}\mathcal{C}$ tel que $\bar{G}Q = Q_0$. Alors $\bar{G}\bar{F}Q_0 = Q_0$ et $\bar{F}\bar{G}Q = Q$, et l'unicité dans les deux propriétés universelles donne $\bar{G}\bar{F} = \text{id}$ et $\bar{F}\bar{G} = \text{id}$. $\square$

Remarque. Dans le relèvement faible, l'hypothèse $\alpha_x \in W$ ne sert pas. L'hypothèse $\tilde{y}$ cofibrant sert seulement à rendre $\tilde{y}'$ cofibrant, ce que la lecture utilise sans le dire en plaçant $[i]^{-1}[f]$ dans $W_{\text{cof}}^{-1}\mathcal{C}_{\text{cof}}$.

Remarque. Dans la factorisation, $f \in W$ sert seulement à mettre i dans W . Pour toute f entre objets cofibrants, on obtient encore $i \in \text{cof}$, $g \in \text{cof} \cap W$ et $\alpha \in W$. C'est le lemme de factorisation de K. S. Brown (1973), classique.

Remarque. Pour ces trois énoncés, seules servent, dans C2, l'existence des sommes amalgamées le long d'une cofibration et la stabilité des cofibrations par changement de base. Les deux clauses de C2 sur les équivalences faibles, et la clause de C1 qui fait des isomorphismes des cofibrations, ne servent pas.

Remarque. Le doute de la page 11 n'est pas fondé lorsque tous les objets sont cofibrants, ce qui est le cadre de la page depuis la réduction de la page 5. L'argument est celui de la lecture, et tous ses éléments sont sur la page 9.

La page 11 rectifie la définition des diagrammes : la condition de cofibration passe de la flèche de retour à la flèche d'aller (106, lot 1, p. 11). Les pages 13 à 15 comparent deux factorisations d'une même flèche et posent la condition $(\star\star)$ sur deux sections d'une équivalence faible. Elles concluent : « Cette condition est (nec. et) suffis. pour que $\tilde{C} \rightarrow W^{-1}\mathcal{C}$ soit fidèle (donc un iso) » (106, lot 1, p. 15). La suffisance n'est pas écrite.

Définition. Soient x, y deux objets. On note $\text{Ch}'_0(x, y)$ la catégorie des diagrammes $x \xrightarrow{f} \tilde{y} \xleftarrow{i} y$ avec $f \in \text{cof}$ et $i \in W$, une flèche $(f, i) \rightarrow (f', i')$ étant une $u : \tilde{y} \rightarrow \tilde{y}'$ telle que $uf = f'$ et $ui = i'$; deux diagrammes sont dans la même *composante connexe* s'ils sont reliés par la relation d'équivalence qu'engendre l'existence d'une telle flèche. Pour $(f, i) \in \text{Ch}'_0(x, y)$ et $(g, j) \in \text{Ch}'_0(y, z)$, soit P la somme amalgamée de $\tilde{y} \xleftarrow{i} y \xrightarrow{g} \tilde{z}$, qui existe par C2 puisque g est une cofibration, et soient $g' : \tilde{y} \rightarrow P$, $k : \tilde{z} \rightarrow P$ ses flèches; on pose $(g, j) \circ (f, i) = (g'f, kj)$. La catégorie $\tilde{C}'$ a pour objets ceux de $\mathcal{C}$ et pour flèches $x \rightarrow y$ les composantes connexes de $\text{Ch}'_0(x, y)$, l'unité de x étant la composante de $(1_x, 1_x)$. Le foncteur $q' : \tilde{C}' \rightarrow W^{-1}\mathcal{C}$ est l'identité sur les objets et envoie la composante de (f, i) sur $[i]^{-1}[f]$. La condition $(\star\star)$ est la suivante : pour toute $f : x \rightarrow y$ dans W et deux sections i, i' de f ($fi = fi' = 1_y$), les diagrammes $(1_x, i)$ et $(1_x, i')$ sont dans la même composante connexe de $\text{Ch}'_0(x, y)$.

Énoncé (Pages 11 à 15, le critère $(\star\star)$ $\blacklozenge$). *Supposons tous les objets de $\mathcal{C}$ cofibrants. Alors $\tilde{C}'$ est une catégorie et q' un foncteur, et q' est fidèle si et seulement si $(\star\star)$ est vérifiée. Plus précisément :*

si q' est fidèle, $(\star\star)$ est vérifiée ; et q' est fidèle et plein, et c'est un isomorphisme de catégories, sans autre hypothèse. En particulier, $(\star\star)$ est toujours vérifiée.

Lemme 20.3. *La composition de $\tilde{C}'$ est bien définie sur les composantes, associative, et admet les composantes des $(1_x, 1_x)$ pour unités ; q' est bien défini et c'est un foncteur.*

Démonstration. La flèche k est une équivalence faible par C2, comme somme amalgamée de l'équivalence faible i le long de la cofibration g , donc $kj \in W$; g' est une cofibration par C2, donc $g'f$ en est une. Si $u : (f, i) \rightarrow (f_1, i_1)$, la flèche $P \rightarrow P_1$ induite par u sur $\tilde{y}$ et l'identité sur $\tilde{z}$ est une flèche entre les deux composés ; de même si $v : (g, j) \rightarrow (g_1, j_1)$, avec v sur $\tilde{z}$ et l'identité sur $\tilde{y}$. La composition passe donc aux composantes. Pour trois diagrammes, la propriété universelle des sommes amalgamées fournit une flèche du sommet de $((h, l) \circ (g, j)) \circ (f, i)$ vers celui de $(h, l) \circ ((g, j) \circ (f, i))$ compatible aux deux diagrammes, d'où l'associativité. Pour les unités, $(1_y, 1_y) \circ (f, i)$ a pour sommet la somme amalgamée de i et de 1_y , et la flèche $\tilde{y} \rightarrow P$ relie (f, i) à ce composé ; de même à gauche. Si $u : (f, i) \rightarrow (f', i')$, alors $u \in W$ par deux-sur-trois et $[i']^{-1}[f'] = [ui]^{-1}[uf] = [i]^{-1}[f]$. Enfin, le carré $g'i = kg$ donne, dans la localisation, $[k]^{-1}[g'] = [g][i]^{-1}$, d'où $q'((g, j) \circ (f, i)) = [kj]^{-1}[g'f] = [j]^{-1}[k]^{-1}[g'][f] = [j]^{-1}[g][i]^{-1}[f]$. $\square$

Lemme 20.4. *Soit $F : x \rightarrow z$, et soient $x \sqcup z \xrightarrow{c} \tilde{z} \xrightarrow{\alpha} z$ une factorisation de $(F, 1_z)$ par C3, c cofibration, $\alpha \in W$, et (F_0, g) le diagramme $x \rightarrow \tilde{z} \leftarrow z$ que forment les composés de c avec les injections. Si $(f, i) \in \text{Ch}'_0(x, z)$ admet $\psi : \tilde{z} \rightarrow z$ avec $\psi i = 1_z$ et $\psi f = F$, alors (f, i) et (F_0, g) sont dans la même composante.*

Démonstration. Le diagramme (F_0, g) est dans $\text{Ch}'_0(x, z)$: F_0 est une cofibration (lemme 20.2, z étant cofibrant), et $g \in W$ par deux-sur-trois, puisque $\alpha g = 1_z$. Soit $h = (f, i) : x \sqcup z \rightarrow \tilde{z}$, et soit Q la somme amalgamée de c et de h , qui existe puisque c est une cofibration ; la flèche $\tilde{z} \rightarrow Q$ est une cofibration. Les flèches α et ψ coïncident sur $x \sqcup z$ après c et h (sur x , $\alpha F_0 = F = \psi f$; sur z , $\alpha g = 1_z = \psi i$) et induisent $\theta : Q \rightarrow z$. Factorisons θ par C3 en une cofibration $\kappa : Q \rightarrow R$ suivie de $\beta : R \rightarrow z$ dans W . Le diagramme (f_R, i_R) obtenu en composant (f, i) avec $\tilde{z} \rightarrow Q \xrightarrow{\kappa} R$ est dans $\text{Ch}'_0(x, z)$: f_R est un composé de cofibrations, et $\beta i_R = \psi i = 1_z$ met i_R dans W par deux-sur-trois. La flèche $\tilde{z} \rightarrow R$ va de (f, i) à (f_R, i_R) ; la flèche $\tilde{z} \rightarrow Q \rightarrow R$ va de (F_0, g) à (f_R, i_R) , puisque le carré de la somme amalgamée identifie les composés de c et de h . $\square$

Lemme 20.5. *Choisissons pour toute F une factorisation comme au lemme 20.4, et notons $\varphi(F)$ la composante de (F_0, g) , qui n'en dépend pas. Alors $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \tilde{C}'$ est un foncteur, $\varphi(f)$ est la composante de $(f, 1)$ pour toute cofibration f , φ rend inversibles les flèches de W , et pour $w : y \rightarrow \tilde{y}$ dans W la composante de $(1_{\tilde{y}}, w)$ est l'inverse de $\varphi(w)$.*

Démonstration. Tout repose sur le lemme 20.4. Avec $\psi = 1_x$, $\varphi(1_x)$ est l'unité, et avec $\psi = 1$, $\varphi(f)$ est la composante de $(f, 1)$ si f est une cofibration. Pour $f : x \rightarrow y$ et $h : y \rightarrow z$, de diagrammes (F_0, g) , α et (H_0, g') , α' , le composé de (F_0, g) et de (H_0, g') a pour sommet la

somme amalgamée de g et de H_0 , et $\psi = (\alpha', h\alpha)$ y est bien défini ($\alpha' H_0 = h = h\alpha g$) et vérifie les deux conditions pour hf : d'où $\varphi(hf) = \varphi(h)\varphi(f)$. Pour $w : y \rightarrow \tilde{y}$ dans W , de diagramme (W_0, g) et α , le composé $\varphi(w) \circ (1_{\tilde{y}}, w)$, c'est-à-dire $(W_0, g) \circ (1_{\tilde{y}}, w)$, de sommet la somme amalgamée de w et de W_0 , admet $\psi = (1_{\tilde{y}}, \alpha)$ pour $F = 1_{\tilde{y}}$: la composante de $(1_{\tilde{y}}, w)$ est un inverse à droite de $\varphi(w)$. Si de plus $w \in \text{cof}$, $\varphi(w)$ est la composante de $(w, 1)$, et le composé $(1_{\tilde{y}}, w) \circ (w, 1)$ est $(kw, k'w)$, de sommet la somme amalgamée de $1_{\tilde{y}}$ et de $1_{\tilde{y}}$, où $k = k'$; la flèche kw le relie à $(1_y, 1_y)$. Donc φ rend inversibles les flèches de W_0 , et par l'argument de la page 11 (démonstration de l'énoncé de la page 11) celles de W ; l'inverse à droite est alors l'inverse. $\square$

Démonstration du critère. Nécessité. Soient $f : x \rightarrow y$ dans W et i, i' deux sections de f . De $fi = 1_y$ on tire $[i]^{-1} = [f]$, donc $q'(1_x, i) = [i]^{-1} = [f] = [i']^{-1} = q'(1_x, i')$; si q' est fidèle, $(1_x, i)$ et $(1_x, i')$ sont dans la même composante. C'est l'argument de la lecture.

q' est un isomorphisme. Pour toute F , le diagramme (F_0, g) admet α , avec $\alpha g = 1_z$, d'où $q'\varphi(F) = [g]^{-1}[F_0] = [\alpha][F_0] = [F] : q'\varphi = Q$. Par le lemme 20.5 et la propriété universelle de Q , il existe un unique $\bar{\varphi} : W^{-1}\mathcal{C} \rightarrow \tilde{\mathcal{C}}'$ avec $\bar{\varphi}Q = \varphi$. Alors $q'\bar{\varphi}Q = q'\varphi = Q$, donc $q'\bar{\varphi} = \text{id}$ par unicité. D'autre part, la composante de (f, i) est le composé $(1_{\tilde{y}}, i) \circ (f, 1)$ — le sommet du composé est la somme amalgamée de $1_{\tilde{y}}$ et de $1_{\tilde{y}}$ —, c'est-à-dire $\varphi(i)^{-1}\varphi(f)$ par le lemme 20.5 ; donc $\bar{\varphi}q'(f, i) = \bar{\varphi}([i])^{-1}\bar{\varphi}([f]) = \varphi(i)^{-1}\varphi(f)$ est la composante de (f, i) , et $\bar{\varphi}q' = \text{id}$. Ainsi q' est un isomorphisme de catégories, d'inverse $\bar{\varphi}$: il est fidèle et plein, et $(\star\star)$ suit de la nécessité. $\square$

Remarque. L'énoncé de la piste tient tel qu'il est écrit, et ses deux membres sont vrais : sous C1–C3, tous les objets étant cofibrants, q' est un isomorphisme et $(\star\star)$ est toujours vérifiée. La démonstration suit un autre chemin que les pages 13 à 15. Celles-ci factorisent f seule et lui choisissent ensuite une section, ce qui oblige à comparer deux sections. La démonstration factorise $(F, 1_z)$ hors de $x \sqcup z$, comme la page 9 ; la section fait alors partie de la cofibration, et toute comparaison passe par le lemme 20.4. La preuve ne dit rien de la littérature, où une description des flèches de $W^{-1}\mathcal{C}$ par composantes de diagrammes de ce type peut figurer, et la question de la piste reste ouverte.

Remarque. La composition de $\tilde{\mathcal{C}}'$ utilise la clause de C2 que la lecture signale : la somme amalgamée d'une équivalence faible le long d'une cofibration est une équivalence faible. L'autre clause de C2 sur les équivalences faibles ne sert nulle part. La clause de C1 qui fait des isomorphismes des cofibrations sert ici, car l'unité $(1_x, 1_x)$ et les diagrammes $(1_x, i)$ de $(\star\star)$ demandent $1_x \in \text{cof}$. L'hypothèse que tous les objets sont cofibrants sert deux fois : pour que les injections de $x \sqcup z$ soient des cofibrations, et pour que φ rende inversibles toutes les flèches de W .

21 Cote 114 : les localisateurs fondamentaux et la proposition 4²²

La cote 114, *Asphéricité : notes manuscrites (s.d.)*, cinq pages que l'inventaire date « [1983] », contient quatre feuillets manuscrits et une page dactylographiée de *À la poursuite des champs*, numérotée 350. La page 2 pose la question « 0-connexité totale $\Rightarrow$ asphéricité totale ? » (114, lot 1, p. 2). La page 350 y répond par la proposition 4, précédée de l'aveu

²²Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder114.lean.

« After a minute's thought, I feel very silly ». La démonstration qui suit tient en trois lignes ; ses signes d'implication sont laissés en blanc, et elle s'interrompt sur « namely » (114, lot 1, p. 3). La page énonce la proposition pour « W a basic localizer satisfying Loc 4) » et appelle W_0 « the coarsest basic localizer satisfying Loc 4) ».

Définition. On fixe un univers ; une petite catégorie est une catégorie dont les objets et les flèches forment des ensembles de cet univers, et e désigne la catégorie ponctuelle. Pour des foncteurs $v : A \rightarrow B$ et $w : B \rightarrow C$ et un objet c de C , on note $A_{/c}$ la catégorie des couples $(a, \gamma : wv(a) \rightarrow c)$, $B_{/c}$ celle des couples $(b, \beta : w(b) \rightarrow c)$, et $v_{/c} : A_{/c} \rightarrow B_{/c}$ le foncteur $(a, \gamma) \mapsto (v(a), \gamma)$. Un *localisateur fondamental* est une classe W de foncteurs entre petites catégories qui vérifie :

LA W est faiblement saturée : elle contient les identités, vérifie le deux-sur-trois, et si $i : A \rightarrow B$ et $r : B \rightarrow A$ vérifient $ri = 1_A$ et $ir \in W$, alors $r \in W$;

LB si A a un objet final, $A \rightarrow e$ est dans W ;

LC si, pour $v : A \rightarrow B$ et $w : B \rightarrow C$, tous les $v_{/c}$ sont dans W , alors $v \in W$.

Ce sont les axiomes usuels ; la lecture n'en donne qu'une description, « faiblement saturée », « les foncteurs $A \rightarrow e$ pour toute A ayant un objet final », « une condition du type « théorème A » de Quillen », qu'ils précisent. Une petite catégorie A est *W -asphérique* si $A \rightarrow e$ est dans W , et *totalelement W -asphérique* si de plus, pour tous objets a, b de A , la catégorie $A_{/a \times b}$ des éléments du préfaisceau $a \times b$ — les couples $(c, (p, q))$ avec $p : c \rightarrow a$, $q : c \rightarrow b$ — est W -asphérique. Un préfaisceau X est *0-connexe* si $A_{/X}$ est non vide et connexe. On note $\pi_0(A)$ l'ensemble des composantes connexes de A , W_0 la classe des foncteurs u tels que $\pi_0(u)$ soit bijective, et W_∞ la classe des foncteurs qui appartiennent à tout localisateur fondamental.

Énoncé (Proposition 4, page 3). Soient A une petite catégorie, W un localisateur fondamental, W_∞ le localisateur fondamental le plus fin. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) A est totalelement W_∞ -asphérique ;
- (ii) A est totalelement W -asphérique ;
- (iii) A est non vide et, pour tous objets a, b de A , le produit $a \times b$ est 0-connexe dans $\hat{A}$.

La démonstration repose sur l'encadrement $W_\infty \subseteq W \subseteq W_0$, où W_0 est le localisateur fondamental le plus grossier, celui pour lequel un foncteur est une équivalence dès qu'il induit une bijection sur les composantes connexes.

Lemme 21.1. La classe W_0 est un localisateur fondamental.

Démonstration. Comme π_0 est un foncteur, LA se ramène à des énoncés sur les bijections. Les identités sont bijectives, et si deux des applications $\pi_0(u)$, $\pi_0(u')$, $\pi_0(u'u)$ sont bijectives, la troisième l'est. Si $ri = 1_A$ et $\pi_0(i)\pi_0(r)$ est bijective, $\pi_0(r)$ est injective par la seconde relation

et surjective par la première. Pour LB, une catégorie à objet final est non vide et connexe, et $\pi_0(A) \rightarrow \pi_0(e)$ est une bijection entre deux ensembles à un élément.

Pour LC, supposons tous les $\pi_0(v/c)$ bijectifs. Pour $b \in B$, choisissons, par surjectivité de $\pi_0(v/w(b))$, un objet (a_b, γ_b) de $A_{/w(b)}$ dont l'image est dans la composante de $(b, 1_{w(b)})$, et posons $s(b) = [a_b] \in \pi_0(A)$. D'abord, $s(v(a)) = [a]$ pour tout $a \in A$: dans $A_{/wv(a)}$, les objets $(a_{v(a)}, \gamma_{v(a)})$ et $(a, 1)$ ont leurs images dans la composante de $(v(a), 1)$; par injectivité, ils sont dans la même composante, et l'oubli $(a', \gamma) \mapsto a'$ envoie un zigzag de $A_{/wv(a)}$ sur un zigzag de A . Ensuite, $s(b) = s(b')$ pour toute flèche $\beta : b \rightarrow b'$. La composition avec $w(\beta)$ définit des foncteurs $A_{/w(b)} \rightarrow A_{/w(b')}$ et $B_{/w(b)} \rightarrow B_{/w(b')}$ compatibles à $v_{/}$; l'image de $(a_b, w(\beta)\gamma_b)$ par $v_{/w(b')}$ est donc dans la composante de $(b, w(\beta))$, que la flèche $\beta : (b, w(\beta)) \rightarrow (b', 1)$ relie à celle de $(b', 1)$, où se trouve aussi l'image de $(a_{b'}, \gamma_{b'})$. Par injectivité, $(a_b, w(\beta)\gamma_b)$ et $(a_{b'}, \gamma_{b'})$ sont dans la même composante de $A_{/w(b')}$, d'où $[a_b] = [a_{b'}]$. Par suite s est constante sur les zigzags de B et induit $\bar{s} : \pi_0(B) \rightarrow \pi_0(A)$ avec $\bar{s} \circ \pi_0(v) = \text{id} : \pi_0(v)$ est injective. Elle est surjective, car l'oubli envoie le zigzag de $B_{/w(b)}$ qui relie $(v(a_b), \gamma_b)$ à $(b, 1)$ sur un zigzag de $v(a_b)$ à b dans B . $\square$

Lemme 21.2. *Une petite catégorie est W_0 -asphérique si et seulement si elle est non vide et connexe. Elle est totalement W_0 -asphérique si et seulement si elle vérifie (iii).*

Démonstration. L'application $\pi_0(A) \rightarrow \pi_0(e)$ va dans un ensemble à un élément ; elle est bijective si et seulement si $\pi_0(A)$ a exactement un élément, c'est-à-dire si A est non vide et connexe. Pour la seconde assertion, être totalement W_0 -asphérique, c'est donc être non vide et connexe, avec chaque $A_{/a \times b}$ non vide et connexe, ce qui entraîne (iii). Réciproquement, sous (iii), A est non vide, et pour $a, b \in A$ un objet $(c, (p, q))$ de $A_{/a \times b}$ fournit le zigzag $a \xleftarrow{p} c \xrightarrow{q} b$; A est donc connexe. C'est le « (iii) implies that A is 0-connected » de la page. $\square$

Lemme 21.3. *La classe W_∞ est un localisateur fondamental, contenu dans tout localisateur fondamental.*

Démonstration. La seconde assertion est la définition. Chacun des axiomes LA à LC dit que certains foncteurs sont dans W dès que d'autres y sont ; si ces derniers sont dans W_∞ , ils sont dans chaque localisateur fondamental W , les premiers aussi, et donc dans W_∞ . $\square$

Démonstration de (i) $\Rightarrow$ (ii), et de (ii) $\Rightarrow$ (iii) si $W \subseteq W_0$. L'asphéricité totale croît avec le localisateur : si $W \subseteq W'$, une catégorie totalement W -asphérique est totalement W' -asphérique, les foncteurs vers e en jeu étant dans W , donc dans W' . Comme W_∞ est contenu dans W (lemme 21.3), (i) entraîne (ii). Si $W \subseteq W_0$, (ii) entraîne que A est totalement W_0 -asphérique, c'est-à-dire (iii) par le lemme 21.2. $\square$

Deux localisateurs fondamentaux non contenus dans W_0 . La classe de tous les foncteurs vérifie trivialement LA à LC. Soit W_{-1} la classe des foncteurs $u : A \rightarrow B$ tels que A soit vide si et seulement si B l'est. Elle contient les identités, et le deux-sur-trois vaut, l'équivalence « A vide $\iff B$ vide » étant transitive. Si $ri = 1_A$, A et B sont vides ensemble, par i et par r . Une catégorie à objet final n'est pas vide. Pour LC, si A n'est pas vide, B ne l'est pas ; si $b \in B$, $B_{/w(b)}$ contient $(b, 1)$, donc $A_{/w(b)}$ n'est pas vide, et A non plus. Le foncteur de la catégorie discrète à deux objets vers e est dans ces deux classes et n'est pas dans W_0 .

Pour $W = W_{-1}$, soit $A = B(\mathbb{Z}/2)$ la catégorie à un objet $*$ dont le monoïde d'endomorphismes est le groupe $G = \mathbb{Z}/2$. Elle est non vide, et $A_{/* \times *}$ contient $(*, (1, 1))$: A est totalement W_{-1} -asphérique. Mais les objets de $A_{/* \times *}$ sont les couples $(p, q) \in G \times G$, et une flèche $g : (p', q') \rightarrow (p, q)$ vérifie $(p', q') = (pg, qg)$, de sorte que $p^{-1}q$ est constant sur chaque composante ; $(1, 1)$ et $(1, \sigma)$, où σ est l'élément non neutre, sont dans des composantes distinctes. Donc (iii) est en défaut, et (i) aussi : par les lemmes 21.1 et 21.3, $W_\infty \subseteq W_0$, et (i) entraînerait (iii) par ce qui précède. Pour la classe de tous les foncteurs, la catégorie vide est totalement asphérique et ne vérifie pas (iii). $\square$

Remarque. L'inclusion $W \subseteq W_0$ est fausse pour les localisateurs fondamentaux définis par LA à LC seuls, et avec elle les implications (ii) $\Rightarrow$ (iii) et (ii) $\Rightarrow$ (i). La page impose la condition « satisfying Loc 4 », sans laquelle l'énoncé ne tient pas. Loc 4) est définie ailleurs dans *À la poursuite des champs*, hors de cette chemise, et l'on n'a pas vérifié si elle exclut les deux contre-exemples.

Remarque. La lecture identifie W_0 à la classe des foncteurs bijectifs sur π_0 . Cette classe est un localisateur fondamental (lemme 21.1) ; qu'elle soit le plus grossier de ceux qui vérifient Loc 4) n'est pas établi ici.

Remarque. L'implication (iii) $\Rightarrow$ (i), que la page affirme, est réfutée dans la littérature par la catégorie des cubes (Maltsiniotis 2005, Cisinski 2006).

22 Cote 158 : la proposition 1 sur les monoïdes finis²³

La cote 158, [*Autour des Dérivateurs*] : notes manuscrites (s.d.), quatre-vingt-cinq pages que l'inventaire date « [vers 1990-1991] », étudie une seule question : une petite catégorie X est-elle cofiltrante dès que tout objet 0-connexe du topos des préfaisceaux sur X est 1-connexe ? Les pages 44 à 53, sous sa pagination 1 à 8, traitent le cas fini, en commençant par celui d'un monoïde, c'est-à-dire d'une catégorie à un objet. La proposition 1 est énoncée page 44 et démontrée jusqu'au haut de la page 46, qui conclut « cqfd » (158, lot 3, p. 44). Sous l'énoncé, un premier paragraphe, barré de deux longues diagonales, commence par « L'unicité de p est claire ». La démonstration reprend ensuite par la pseudo-cofiltrance et réalise M comme monoïde d'endomorphismes d'un ensemble E , le mot « fini » devant E étant biffé. Elle écrit : « comme E_0 est fini, on en conclut que $u(E_0) = E_0$ » (158, lot 3, p. 45).

Définition. Un monoïde M est *pseudo-cofiltrant* si, pour tous $u, v \in M$, il existe $u', v' \in M$ tels que $uu' = vv'$; il est *cofiltrant* s'il est pseudo-cofiltrant et si, pour tous $u, v \in M$, il existe $w \in M$ tel que $uw = vw$. Le *groupe enveloppant* de M est *trivial* si tout morphisme de monoïdes de M dans un groupe est trivial. La première définition est celle que la lecture tire de la page 55, où le manuscrit en donne l'équivalent ; la dernière est la propriété universelle du groupe enveloppant.

Énoncé (Proposition 1, pages 44 à 46 $\blacklozenge$). *Soit M un monoïde fini dont le groupe enveloppant est trivial et qui est pseudo-cofiltrant. Alors il existe $p \in M$ tel que $up = p$ pour tout $u \in M$ — en particulier $p^2 = p$ — et M est cofiltrant.*

²³Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder158.lean.

Lemme 22.1. Dans un monoïde fini pseudo-cofiltrant M , il existe p tel que, pour tout $u \in M$, on ait $p = uv$ pour un $v \in M$: p appartient à tous les idéaux à droite principaux uM .

Démonstration. Montrons, par récurrence sur le cardinal d'une partie finie $F \subseteq M$, qu'il existe p appartenant à uM pour tout $u \in F$; appliqué à $F = M$, c'est l'énoncé. Pour F vide, $p = 1$ convient. Supposons l'assertion vraie pour F , avec un élément p , et soit $a \in M$. Par pseudo-cofiltrance appliquée à p et a , il existe p', v' tels que $pp' = av'$. L'élément pp' est dans aM ; et pour $u \in F$, si $p = uv$, alors $pp' = u(vp')$ est dans uM . L'élément pp' convient donc pour $F \cup \{a\}$. $\square$

Démonstration de la proposition 1. Soit p donné par le lemme 22.1, et $E_0 = pM$ l'ensemble des py , $y \in M$. C'est l'image de p dans la représentation régulière gauche de M , où u opère sur M par $x \mapsto ux$, et E_0 est fini puisque M l'est.

Chaque u envoie E_0 sur lui-même. Soit $u \in M$. D'abord $E_0 \subseteq uE_0$: le lemme appliqué à l'élément up fournit v tel que $p = upv$, et pour $y \in M$, $py = upvy = u(p(vy))$ est dans uE_0 . Ensuite uE_0 , image de E_0 par une application, a au plus autant d'éléments que E_0 ; une partie de l'ensemble fini uE_0 qui a au moins autant d'éléments que lui est égale, et donc $uE_0 = E_0$. L'application $x \mapsto ux$ est ainsi une surjection de l'ensemble fini E_0 sur lui-même, donc une bijection.

Le morphisme vers un groupe. Notons $\varphi(u)$ la permutation $x \mapsto ux$ de E_0 . On a $\varphi(1) = \text{id}$ et, par associativité, $\varphi(uu') = \varphi(u) \circ \varphi(u')$: φ est un morphisme de monoïdes de M dans le groupe des permutations de E_0 . Le groupe enveloppant de M étant trivial, $\varphi(u) = \text{id}$ pour tout u . En l'appliquant à l'élément $p = p \cdot 1$ de E_0 , on obtient $up = p$ pour tout $u \in M$.

Conclusion. Pour $u = p$, $p^2 = p$. Enfin M est pseudo-cofiltrant par hypothèse, et pour $u, v \in M$, $w = p$ vérifie $uw = p = vw$: M est cofiltrant. $\square$

Remarque. La finitude sert deux fois : au lemme 22.1, pour passer de deux idéaux uM à tous, et pour changer l'inclusion $E_0 \subseteq uE_0$ en égalité. Le « comme E_0 est fini » de la page vaut parce que $E_0 = pM$ est contenu dans M . Il ne vaudrait pas pour un ensemble E quelconque, devant lequel la page a biffé « fini ».

Remarque. Sans la pseudo-cofiltrance, l'énoncé est faux : le monoïde $\{1, a, b\}$ où $ax = a$ et $bx = b$ pour tout x est fini, de groupe enveloppant trivial, et n'a pas d'élément p tel que $ap = p = bp$. Sans la finitude, il est faux pour le monoïde $\text{Ep}(E)$ des surjections d'un ensemble infini E , que la lecture étudie à sa section 6. (Non démontré ici.)

Remarque. L'élément p n'est pas unique, et le noyau de Rees $MpM = pM$ n'est pas nécessairement réduit à un point. Soit $M = \{1, a, b\}$ avec $x \cdot 1 = x$, $x \cdot a = a$, $x \cdot b = b$ pour tout x ; cette loi est associative, d'unité 1, pseudo-cofiltrante ($ua = va$ pour tous u, v), de groupe enveloppant trivial ($g(a) = g(ba) = g(b)g(a)$ force $g(b) = 1$, et de même $g(a) = 1$) ; on a $ua = a$ et $ub = b$ pour tout u , aucun des deux n'est un zéro bilatère ($ab = b$), et l'intersection des idéaux MxM est $\{a, b\}$.

Remarque. La relation $up = p$ pour tout u fait de p un zéro à droite, et l'idéal à gauche $Mp = \{p\}$ est minimal. Une glose qui dirait p « zéro à gauche » et le noyau de Rees « ponctuel » serait fausse. Le paragraphe barré de la page 44 affirmait l'unicité de p , en identifiant pp' à $p'p$; l'exemple précédent la réfute.

23 Cote 104 : catégories de modèles, trois exemples, un complexe globulaire²⁴

La cote 104, [*Champs (stacks) 1*] : copies de notes manuscrites (s.d.), seize pages sans date, appartient au groupe « Autour de *Pursuing stacks* », que l'inventaire date « 1968-1984 ». Les pages 6 à 16, sous sa pagination 1 à 6, sont une rédaction suivie. Une catégorie M de « modèles » y est remplacée par des ensembles ordonnés dont elle se reconstruit : l'ensemble $\mathbb{N}$ de ses classes d'isomorphisme, les ensembles I_n de sous-objets, les applications type τ_n . La page 6 pose les deux hypothèses (dans la seconde, « automorphisme » est biffé et remplacé par « end. ») et affirme que l'application $(*)$ ci-dessous « est injective par (i)(ii) » (104, lot 1, p. 6). La page 7 ajoute « On a donc (par (ii)) $\tau_n^{-1}(n) = \{d_n\}$ » (104, lot 1, p. 7). La page 10 affirme la réciproque et donne trois exemples, avec leurs dénombrements en marge (104, lot 1, p. 10). Parmi les feuillets d'essai qui précèdent, celui de la page 4 porte une suite $\mathbb{Z}[F_{n+1}] \rightarrow \mathbb{Z}[F_n] \xrightarrow{t_n - s_n} \mathbb{Z}[F_{n-1}]$ et, sous une accolade, le calcul $t_{n-1}(t_n y - s_n y) - s_{n-1}(t_n y - s_n y) = 0$ (104, lot 1, p. 4).

Définition. Soit M une catégorie telle que (i) toute flèche de M est un monomorphisme, et (ii) tout endomorphisme d'un objet de M est l'identité. Pour un objet D , un sous-objet de D est une classe de monomorphismes de but D , deux monomorphismes u, v étant équivalents s'ils se factorisent l'un par l'autre ; les sous-objets sont ordonnés par factorisation, et l'on note $u(D')$ le sous-objet défini par $u : D' \rightarrow D$. Pour un sous-objet x , on note encore x un objet qui le représente. Les classes d'isomorphisme d'objets de M sont préordonnées par l'existence d'une flèche.

Énoncé (Pages 6 et 7). 1. L'application $(*) : \text{Hom}_M(D', D) \rightarrow \tilde{D}$, $u \mapsto u(D')$, est injective.

2. Si $f : D' \rightarrow D$ et $g : D \rightarrow D'$, alors f est un isomorphisme d'inverse g ; le préordre sur les classes est donc un ordre.

3. Si $x \leq y$ sont deux sous-objets de D et s'il existe une flèche $y \rightarrow x$ — en particulier si x et y sont de même type —, alors $x = y$. Par suite $\tau_n^{-1}(n) = \{d_n\}$, et τ_n est strictement croissante.

Énoncé (Page 10, la réciproque : un pas). Soit f une application bijective d'un ensemble dans lui-même telle que $f \circ f = f$. Alors $f = \text{id}$. En particulier la loi de composition $u_{d_n} \circ u_{d_n} = u_{d_n}$ force $u_{d_n} = \text{id}$.

Énoncé (Page 10, les trois exemples). 1. La catégorie des $\Delta_n = \{0, \dots, n\}$ et des applications strictement croissantes vérifie (i) et (ii), et l'ensemble $\mathfrak{P}^*(\Delta_n)$ des parties non vides de Δ_n a $2^{n+1} - 1$ éléments.

2. Les faces de $[0, 1]^n$, qui fixent certaines coordonnées à 0 ou à 1 et laissent les autres libres, sont au nombre de $\sum_k \binom{n}{k} 2^k = 3^n$.

²⁴Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder104.lean.

3. Sur $I_n = (\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\}) \sqcup \{d_n\}$, la relation « $(k, \varepsilon) \leq (k', \varepsilon')$ si et seulement si $(k, \varepsilon) = (k', \varepsilon')$ ou $k < k'$, et d_n plus grand élément » est un ordre; I_n a $2n + 1$ éléments, dont exactement deux de type k pour chaque $k < n$. Avec $\{\pm 1\}$ muni de l'ordre chaotique, le produit n'est qu'un préordre : $(k, +1)$ et $(k, -1)$, distincts, sont chacun inférieurs à l'autre.

Énoncé (Page 4, le complexe globulaire). Soient des applications $s_n, t_n : F_n \rightarrow F_{n-1}$ et $s_{n-1}, t_{n-1} : F_{n-1} \rightarrow F_{n-2}$ telles que $s_{n-1}s_n = s_{n-1}t_n$ et $t_{n-1}s_n = t_{n-1}t_n$. Alors les morphismes $t_n - s_n : \mathbb{Z}[F_n] \rightarrow \mathbb{Z}[F_{n-1}]$ et $t_{n-1} - s_{n-1} : \mathbb{Z}[F_{n-1}] \rightarrow \mathbb{Z}[F_{n-2}]$ induits sur les groupes abéliens libres composent en zéro.

Démonstration de l'énoncé des pages 6 et 7. (1) Soient $u, v : D' \rightarrow D$ tels que $u(D') = v(D')$. Comme $u(D') \leq v(D')$, il existe $\theta : D' \rightarrow D'$ avec $v\theta = u$. Par (ii), $\theta = \text{id}$, donc $u = v$. L'hypothèse (i) ne sert qu'à faire de u et v des monomorphismes, c'est-à-dire à donner un sens à $u(D')$.

(2) Le composé gf est un endomorphisme de D' , et fg un endomorphisme de D ; par (ii), ce sont des identités.

(3) Écrivons $x \leq y$ sous la forme $a_x = a_y \circ j$, où a_x, a_y sont les monomorphismes de but D qui représentent x et y et $j : x \rightarrow y$. Soit $g : y \rightarrow x$. Le composé $j \circ g$ est un endomorphisme de y , donc l'identité par (ii), et $a_y = a_y \circ j \circ g = a_x \circ g : a_y$ se factorise par a_x , c'est-à-dire $y \leq x$, et $x = y$. Si $\tau_n(x) = n$, x est isomorphe à D_n , qui représente le plus grand sous-objet d_n ; on a $x \leq d_n$ et une flèche $d_n \rightarrow x$, donc $x = d_n$. Si $x < y$, il y a une flèche $x \rightarrow y$, donc $\tau_n(x) \leq \tau_n(y)$; l'égalité donnerait une flèche $y \rightarrow x$, donc $x = y$; ainsi $\tau_n(x) < \tau_n(y)$ dans l'ensemble ordonné des classes. $\square$

Démonstration du pas de la réciproque. Pour tout x , $f(f(x)) = f(x)$, et l'injectivité de f donne $f(x) = x$. $\square$

Démonstration des trois exemples. (1) Une application strictement croissante est injective, donc simplifiable à gauche : si $fg = fh$, alors $g = h$ point par point. Une application strictement croissante de Δ_n dans lui-même est l'identité : c'est l'unique application strictement croissante de $\{0, \dots, n\}$ sur une partie à $n + 1$ éléments de Δ_n , à savoir Δ_n tout entier, et l'identité en est une. Les parties de Δ_n sont au nombre de 2^{n+1} , dont une vide.

(2) Une face est la donnée, pour chaque coordonnée, de la valeur 0, de la valeur 1, ou de rien : c'est une application de $\{1, \dots, n\}$ dans un ensemble à trois éléments, et il y en a 3^n — ce que la marge appelle une section partielle de $\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\} \rightarrow \Delta_{n-1}$. En comptant les faces selon le nombre k des coordonnées fixées, on obtient $\binom{n}{k} 2^k$ faces pour chaque k , et $\sum_k \binom{n}{k} 2^k = (2 + 1)^n$ par la formule du binôme; c'est la formule de la page 5.

(3) La relation est réflexive. Elle est transitive : d_n est au-dessus de tout et au-dessous de lui seul, et sur $\Delta_{n-1} \times \{\pm 1\}$ la composée de deux relations « égal ou de premier indice strictement plus petit » en est une. Elle est antisymétrique : si $(k, \varepsilon) \leq (k', \varepsilon')$ et $(k', \varepsilon') \leq (k, \varepsilon)$ avec des éléments distincts, on aurait $k < k'$ et $k' < k$. Le cardinal est $2n + 1$, et les éléments de type k sont $(k, +1)$ et $(k, -1)$. Pour l'ordre chaotique, $(k, \varepsilon) \leq (k', \varepsilon')$ équivaut à $k \leq k'$, et $(k, +1), (k, -1)$ sont chacun inférieurs à l'autre. $\square$

Démonstration de l'énoncé de la page 4. Le passage de F à $\mathbb{Z}[F]$ est fonctoriel : l'application induite par un composé est le composé des applications induites. Le composé $(t_{n-1} - s_{n-1})(t_n - s_n)$ vaut donc $\mathbb{Z}[t_{n-1}t_n] - \mathbb{Z}[t_{n-1}s_n] - \mathbb{Z}[s_{n-1}t_n] + \mathbb{Z}[s_{n-1}s_n]$, et les identités globulaires annulent les termes deux à deux. $\square$

Remarque. L'exemple 3 est démontré sous la forme que la lecture substitue à la page. Elle prend Δ_{n-1} au lieu de Δ_n , qui donnerait $2n + 3$ éléments au lieu des $2n + 1$ de la marge. Elle prend l'ordre des cellules du disque au lieu du produit par un préordre chaotique, qui n'est pas antisymétrique.

Remarque. L'hypothèse (i) n'intervient ni dans l'ordre sur les classes ni dans $u_{d_n} = \text{id}$, que (ii) donne seule. Dans (*), que la page dit injective « par (i)(ii) », elle sert seulement à définir $u(D')$.

Remarque. L'exemple 1 montre que la catégorie des Δ_n et des injections croissantes n'a pas de dégénérescence. Pour les exemples, seul le calcul sur les ensembles I_n est démontré. L'identification des sous-objets des catégories de cubes et de disques à ces ensembles est celle de la lecture et n'est pas démontrée ici.

Énoncé (Page 6, note de la lecture : la bonne fondation). *Soit M une catégorie vérifiant (ii). Pour deux objets X, Y , écrivons $X \prec Y$ s'il existe une flèche $X \rightarrow Y$ et aucune flèche $Y \rightarrow X$.*

1. *Toute flèche $X \rightarrow Y$ qui n'est pas un isomorphisme donne $X \prec Y$; si M est squelettique, toute flèche qui n'est pas une identité le donne.*
2. *Si M est squelettique et si $\prec$ est bien fondée, le rang ordinal $\deg$ pour $\prec$ est un degré que toute flèche autre qu'une identité augmente strictement, et M est une catégorie directe : une structure de Reedy dont la classe descendante est formée des identités et la classe ascendante de toutes les flèches.*
3. *Réciproquement, s'il existe une application $\deg$ des objets dans un ensemble ordonné bien fondé que toute flèche autre qu'une identité augmente strictement, $\prec$ est bien fondée.*
4. *Les hypothèses (i) et (ii) ne suffisent pas : la catégorie définie par l'ensemble ordonné $\mathbb{Z}$ les vérifie, et $\prec$ n'y est pas bien fondée.*

Démonstration. (1) Si $g : Y \rightarrow X$, alors gf et fg sont des endomorphismes, donc des identités par (ii), et f serait un isomorphisme. Si M est squelettique et f un isomorphisme, $X = Y$, et f , endomorphisme de X , est l'identité par (ii) ; une flèche qui n'est pas une identité n'est donc pas un isomorphisme.

(2) Le rang d'un objet X est le plus petit ordinal strictement supérieur aux rangs des objets $Z \prec X$; il est défini par récurrence bien fondée, et $Z \prec X$ entraîne $\deg Z < \deg X$. Par (1), toute flèche $X \rightarrow Y$ autre qu'une identité donne $\deg X < \deg Y$. La condition sur la classe descendante est vide, puisqu'elle n'a que des identités. Enfin toute flèche f s'écrit d'une seule façon comme une identité suivie d'une flèche : si $f = p \circ i$ avec i une identité, l'objet intermédiaire est la source de f et $p = f$.

(3) Si $X \prec Y$, une flèche $f : X \rightarrow Y$ n'est pas une identité, puisque $X = Y$ donnerait la flèche id_X de Y vers X ; donc $\deg X < \deg Y$, et $\prec$ est contenue dans l'image réciproque par $\deg$ d'un ordre bien fondé, qui est bien fondée.

(4) Entre deux objets de $\mathbb{Z}$ il y a au plus une flèche : (i) et (ii) sont immédiats. Pour tout m , $m - 1 \prec m$, et $\mathbb{Z}$ n'a donc pas d'élément minimal pour $\prec$. $\square$

Remarque. La lecture énonce qu'une catégorie vérifiant (i) et (ii) est directe au sens de Reedy « dès que » l'ordre de $\mathbb{N}$ est bien fondé. L'exemple de $\mathbb{Z}$ montre que cette condition est une hypothèse supplémentaire, qui ne découle pas de (i) et (ii). La structure de Reedy est celle que définit la bibliothèque mathlib. L'hypothèse (i) n'y sert pas ; elle dit seulement que la classe ascendante est formée de monomorphismes. La catégorie squelettique est celle que la page 9 appelle « rigide ». Sans elle, un isomorphisme entre deux objets distincts n'augmenterait aucun degré ; la bonne fondation porte donc sur l'ordre des classes d'isomorphisme.

Énoncé (Page 10, exemple 1 : les identités simpliciales). Notons $\delta_i : \Delta_n \rightarrow \Delta_{n+1}$, pour $0 \leq i \leq n + 1$, l'application strictement croissante qui évite i .

1. Pour $i \leq j$, $\delta_{j+1} \circ \delta_i = \delta_i \circ \delta_j$.
2. Toute application strictement croissante $f : \Delta_m \rightarrow \Delta_{n+1}$ avec $m \leq n$ s'écrit $\delta_i \circ g$, avec $g : \Delta_m \rightarrow \Delta_n$ strictement croissante.
3. La catégorie des Δ_n et des applications strictement croissantes est squelettique, toute flèche autre qu'une identité y augmente strictement n , et c'est une catégorie directe au sens de l'énoncé précédent.

Démonstration. (1) Les deux membres envoient $k \in \Delta_n$ sur k si $k < i$, sur $k + 1$ si $i \leq k < j$, et sur $k + 2$ si $k \geq j$: c'est une vérification cas par cas sur les inégalités entre i , j et k . C'est la première identité simpliciale, que mathlib démontre dans la catégorie simpliciale ; elle est refaite ici dans la catégorie sans dégénérescences.

(2) Comme f est injective, une surjection de Δ_m , qui a $m + 1 \leq n + 1$ éléments, sur Δ_{n+1} , qui en a $n + 2$, est impossible : f évite un i . Chaque $f(k)$, distinct de i , s'écrit $\delta_i(g(k))$ pour un unique $g(k)$, et g est strictement croissante parce que δ_i l'est et reflète donc l'ordre.

(3) Une flèche $\Delta_m \rightarrow \Delta_n$ est injective, donc $m \leq n$. Si $\Delta_m \simeq \Delta_n$, on a $m \leq n$ et $n \leq m$. Si $m = n$, la flèche est un endomorphisme, donc l'identité (exemple 1 ci-dessus). Le degré n , à valeurs dans les entiers, vérifie donc l'hypothèse de la partie (3) de l'énoncé précédent, et la partie (2) s'applique. $\square$

Remarque. Ni les identités simpliciales ni la factorisation par les faces ne sont sur la page. Elles justifient l'identification, faite par la lecture, des préfaisceaux sur cette catégorie aux ensembles semi-simpliciaux. Par (2) et une récurrence sur $n - m$, toute flèche est un composé de faces, et (1) donne, en passant aux préfaisceaux, les relations $d_i d_j = d_{j-1} d_i$ pour $i < j$. Seul le pas de la récurrence est formalisé ici. Dans cet exemple $\mathbb{N} = \mathbf{N}$, comme la page 10 le dit des « cas que j'ai en tête », et la bonne fondation est celle des entiers.

Douzième partie

Ordres et géométrie des formes

24 Cote 156-1 : le modèle-segment est un biordre²⁵

La cote 156-1, [Chapitre] I. Vers une géométrie des formes (topologiques) : notes manuscrites (05/06/1986), vingt-six pages datées du 5 au 7 juin 1986, propose une axiomatique combinatoire des formes de dimension 1. Elle se donne un ensemble $\mathcal{L}$ de lieux, un ensemble S de segments, et pour chaque segment I l'ensemble $\tilde{I} \subset \mathcal{L}$ de ses lieux et la paire $\partial I \subset \tilde{I}$ de ses extrémités. La troisième mouture, à partir de la page 5, pose les axiomes F1 à F5 (156-1, lot 1, p. 5, 156-1, lot 1, p. 7). La page 10 appelle *modèle-segment* un modèle où $\mathcal{L}$ est lui-même un segment. La page 11 y définit, à partir d'une extrémité x_0 , la relation $x \preccurlyeq y$ par $x \in [x_0, y]$, et affirme que c'est un ordre (156-1, lot 1, p. 11). La page 12 énonce : « Cette relation d'ordre a un plus petit élément, x_0 , et un plus grand élément, x_1 . Elle permet de reconstituer la structure de modèle de 1-forme ». Les segments y sont les $[x, y]$, $x < y$, et l'ordre est « infiniment divisible » et « localement filtrante décroissante » ; la clause « filtrante croissante » est ajoutée entre les lignes et lue en partie. La page esquisse la réciproque sur une ligne qui porte plusieurs mots illisibles (156-1, lot 1, p. 12). La page 13 conclut qu'« une structure de modèle de segment équivaut à une structure de biordre » (156-1, lot 1, p. 13). Aucune des deux directions n'est démontrée sur la page.

Conventions. On écrit les axiomes comme la lecture les énonce, en notant $I_{x,z}$ le sous-segment de I d'extrémités x, z donné par F1 : un segment J avec $\tilde{J} \subset \tilde{I}$ et $\partial J = \{x, z\}$. On pose $I^\circ = \tilde{I} \setminus \partial I$, et un lieu est *régulier* s'il est intérieur à un segment.

F1 Si $x \in \partial I$ et $z \in \tilde{I} \setminus \{x\}$, il existe un unique $I_{x,z}$.

F2 $I^\circ \neq \emptyset$; si $\partial I = \{x, y\}$ et $z \in I^\circ$, alors $\tilde{I}_{x,z} \cap \tilde{I}_{y,z} = \{z\}$, et tout segment J avec $\tilde{J} \subset \tilde{I}$ et $z \in \partial J$ vérifie $\tilde{J} \subset \tilde{I}_{x,z}$ ou $\tilde{J} \subset \tilde{I}_{y,z}$.

F3 Si $x \in \partial I \cap \partial J$, il existe $u \in \tilde{I} \setminus \{x\}$ et $v \in \tilde{J} \setminus \{x\}$ avec $I_{x,u} = J_{x,v}$ ou $\tilde{I}_{x,u} \cap \tilde{J}_{x,v} = \{x\}$ (la forme de la marge).

F'3 Si $x \in \partial I$ et $u, v \in I^\circ$, il existe $w \in I^\circ$ avec $\tilde{I}_{x,w} \subset \tilde{I}_{x,u} \cap \tilde{I}_{x,v}$ (la reconstruction de la lecture, d'après la note du bas de la page 6).

F4 Si z est régulier, $\tilde{I}' \cap \tilde{I}'' = \{z\}$, $\partial I' = \{x, z\}$ et $\partial I'' = \{y, z\}$, il existe un unique I avec $\tilde{I} \supset \tilde{I}' \cup \tilde{I}''$ et $\partial I = \{x, y\}$.

F5 Un lieu régulier est d'ordre 2 : il existe deux segments issus de lui qui ne définissent pas la même branche, et tout segment issu de lui définit la même branche que l'un d'eux.

Dans un modèle-segment, $\mathcal{L} = \tilde{I}_0$ avec $\partial I_0 = \{x_0, x_1\}$, on pose $a \leq b$ si $a = b$ ou s'il existe un segment J avec $\partial J = \{x_0, b\}$ et $a \in \tilde{J}$; par l'unicité dans F1, un tel J est $I_{0,x_0,b}$, et l'on note $[x_0, b] = \tilde{J}$. Un ensemble ordonné est *localement filtrant décroissant* si $x < y_1$ et $x < y_2$ entraînent l'existence de y avec $x < y \leq y_1, y_2$, *localement filtrant croissant* dans l'énoncé dual.

²⁵Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder156_1.lean.

Énoncé (Pages 10 à 13, le modèle-segment est un biordre $\blacklozenge$). Soit un modèle satisfaisant F1, F2, F'3 et F4, dont l'ensemble des lieux est un segment I_0 , $\partial I_0 = \{x_0, x_1\}$. La relation $\leq$ est un ordre sur $\mathcal{L}$, de plus petit élément x_0 et de plus grand élément x_1 , distincts; il est dense, localement filtrant décroissant et localement filtrant croissant; les segments sont exactement les intervalles $[a, b] = \{z \mid a \leq z \leq b\}$, $a < b$, avec $\partial = \{a, b\}$, chacun porté par un seul segment. L'ordre défini à partir de x_1 est l'ordre opposé.

Réciproquement, soit $\mathcal{L}$ un ensemble ordonné ayant un plus petit et un plus grand élément distincts, dense et localement filtrant dans les deux sens. Les intervalles $[a, b]$, $a < b$, avec $\partial[a, b] = \{a, b\}$, satisfont F1 à F5 et F'3, $\mathcal{L}$ est un segment, et l'ordre relu à partir du plus petit élément est l'ordre donné.

Démonstration du sens direct. Deux unicités. Un segment J avec $\partial J = \{x_0, b\}$ est unique : c'est F1 dans I_0 , puisque $\tilde{J} \subset \mathcal{L} = \tilde{I}_0$. Pour la même raison, deux segments qui ont une extrémité dans $\{x_0, x_1\}$ et les mêmes extrémités sont égaux. Si $u, v \notin \{x_0, x_1\}$ et $\partial J = \partial K = \{u, v\}$, alors $u \in I_0^\circ$; F2 dans I_0 en u place $\tilde{J}$, et de même $\tilde{K}$, dans $[x_0, u]$ ou dans $\tilde{I}_{0, x_1, u}$. S'ils tombent dans des sous-segments différents, v est dans leur intersection, qui est $\{u\}$, ce qui est exclu; s'ils tombent dans le même, F1 dans ce sous-segment, en son extrémité u , donne $J = K$. Ainsi un segment est déterminé par ses extrémités (le corollaire 3 a de la page 5).

C'est un ordre. Si $b \in [x_0, c]$, $b \neq x_0$, F1 dans le segment $[x_0, c]$ fournit un sous-segment d'extrémités x_0, b , qui est $[x_0, b]$; donc $[x_0, b] \subset [x_0, c]$, d'où la transitivité. Pour l'antisymétrie, soient $a \neq b$ avec $a \in [x_0, b]$ et $b \in [x_0, a]$; alors $a \neq x_0$ (aucun segment n'a $\{x_0\}$ pour bord), $[x_0, a] = [x_0, b]$ par ce qui précède, et a est intérieur à $[x_0, b]$. F2 dans $[x_0, b]$ en a dit que $[x_0, a]$ et le sous-segment d'extrémités b, a ne se rencontrent qu'en a ; or b est dans les deux. On a $x_0 \leq a$ puisque $x_0 \in [x_0, a]$, et $a \leq x_1$ puisque $[x_0, x_1] = \mathcal{L}$; $x_0 \neq x_1$ parce que ∂I_0 a deux éléments.

Recollement. Soient a un lieu régulier, $[x_0, a]$, et Q un segment d'extrémités a, z tel que $[x_0, a] \cap Q = \{a\}$. F4 fournit un segment G d'extrémités x_0, z contenant $[x_0, a]$; donc $a \in [x_0, z]$, c'est-à-dire $a \leq z$.

Les extrémités d'un segment sont comparables. Soit $\partial J = \{u, v\}$. Si l'une est x_0 ou x_1 , c'est clair. Sinon $u \in I_0^\circ$ et F2 place $\tilde{J}$ dans $[x_0, u]$, d'où $v \leq u$, ou dans $P = \tilde{I}_{0, x_1, u}$. Dans le second cas, le sous-segment Q de P d'extrémités u, v ne rencontre $[x_0, u]$ qu'en u , puisque $[x_0, u] \cap P = \{u\}$, et le recollement donne $u \leq v$.

Un segment d'extrémités $a < b$ est l'intervalle $[a, b]$. Si $a = x_0$, c'est la définition. Sinon, soit K ce segment; il est le sous-segment de $[x_0, b]$ d'extrémités b, a , par l'unicité. Le lieu a est intérieur à $[x_0, b]$, et régulier (il est intérieur à I_0 , car $a \neq x_1$). F2 dans $[x_0, b]$ en a donne $[x_0, a] \cap \tilde{K} = \{a\}$, et place tout sous-segment de $[x_0, b]$ issu de a dans $[x_0, a]$ ou dans $\tilde{K}$. Si $z \in \tilde{K}$, $z \neq a$, le sous-segment de K d'extrémités a, z ne rencontre $[x_0, a]$ qu'en a , et le recollement donne $a \leq z$; et $z \leq b$ puisque $\tilde{K} \subset [x_0, b]$. Inversement, soit $a < z < b$; alors $[x_0, z] \subset [x_0, b]$ contient a , et le sous-segment de $[x_0, z]$ d'extrémités z, a est un sous-segment de $[x_0, b]$ issu de a . S'il était dans $[x_0, a]$, on aurait $z \leq a$, donc $z = a$; il est donc dans $\tilde{K}$, et $z \in \tilde{K}$. Un tel segment existe toujours : F1 dans $[x_0, b]$ en b fournit le sous-segment d'extrémités b, a . Avec

l'unicité, chaque intervalle $[a, b]$, $a < b$, est porté par un seul segment, et tout segment est un tel intervalle.

Densité, filtrations. Si $a < b$, F2 donne un lieu intérieur au segment $[a, b]$, strictement entre a et b . Si $a < y_1$ et $a < y_2$, et si aucun des deux n'est x_1 (sinon l'autre convient), y_1 et y_2 sont intérieurs au segment $[a, x_1]$; F'3 en son extrémité a fournit w intérieur avec $[a, w] \subset [a, y_1] \cap [a, y_2]$, donc $a < w \leq y_1, y_2$. Duale, F'3 appliqué au segment $[x_0, a]$ en son extrémité a donne la filtration croissante.

Biordre. Pour l'ordre défini à partir de x_1 , $a \leq_1 b$ signifie $a = b$, ou a dans le segment d'extrémités x_1, b , qui est l'intervalle $[b, x_1]$ de l'ordre défini à partir de x_0 : c'est $b \leq a$. $\square$

Démonstration de la réciproque. Un segment est un couple $a < b$, de lieux $[a, b]$ et de bord $\{a, b\}$; il est déterminé par son bord, la condition $a < b$ fixant l'ordre de la paire. F1 : le sous-segment de $[a, b]$ issu de a d'autre extrémité z est $[a, z]$, celui issu de b est $[z, b]$. F2 : $]a, b[$ est non vide par densité; si $a < z < b$, $[a, z] \cap [z, b] = \{z\}$, et un intervalle contenu dans $[a, b]$ qui a z pour extrémité est $[z, c] \subset [z, b]$ ou $[c, z] \subset [a, z]$. F3 : si deux segments partent de x vers le haut, $[x, b]$ et $[x, d]$, la filtration décroissante donne y avec $x < y \leq b, d$, et $[x, y]$ est un début commun; vers le bas, de même par la filtration croissante; si l'un monte et l'autre descend, $[x, b] \cap [c, x] = \{x\}$. F'3 : si x est l'extrémité inférieure de $[x, b]$ et $u, v \in]x, b[$, la filtration décroissante donne w avec $x < w \leq u, v$, d'où $[x, w] \subset [x, u] \cap [x, v]$; dualement en l'extrémité supérieure. F4 : si $[x, z]$ et $[y, z]$ sont tous deux sous z , la filtration croissante donne w avec $x, y \leq w < z$, qui est dans l'intersection, exclu; de même s'ils sont tous deux au-dessus; sinon $x < z < y$ (ou l'inverse) et $[x, y]$ est l'unique segment d'extrémités x, y , qui contient $[x, z] \cup [z, y]$. F5 : si $a < x < b$, les segments $[a, x]$ et $[x, b]$ n'ont aucun point intérieur commun, donc ne définissent pas la même branche; un segment $[x, d]$ définit la même branche que $[x, b]$: la filtration donne y avec $x < y \leq d, b$, la densité z avec $x < z < y$, et $[x, z]$ est le sous-segment commun; dualement pour $[c, x]$ et $[a, x]$. Enfin $[\perp, \top] = \mathcal{L}$, et $a \in [\perp, b]$ équivaut à $a \leq b$. $\square$

Remarque. Le sens direct n'utilise ni F3 ni F5 : il suffit de F1, F2, F'3 et F4. F'3 donne les deux filtrations b) et b'), comme le dit l'esquisse de la lecture. F4, en un lieu régulier, fait de chaque intervalle un segment; il intervient dès la comparabilité des extrémités d'un segment. Dans la réciproque, F4 vaut sans son hypothèse de régularité, et la densité et les deux filtrations suffisent à F1–F5 et F'3. Les bornes servent seulement à faire de $\mathcal{L}$ lui-même un segment.

Remarque. L'ordre n'est pas total en général, comme la lecture le souligne. Soit, sur $\mathbb{Q}^2$, l'ordre du cône ouvert, $p \prec q$ si $|q_2 - p_2| < q_1 - p_1$, et soit T l'ensemble des points compris, pour cet ordre, entre $(0, 0)$ et $(2, 0)$. C'est un ensemble ordonné borné et dense (le milieu de $p \prec q$ est strictement entre eux). Il est localement filtrant dans les deux sens : si $x \prec y_1, y_2$, le point $x + (\varepsilon, 0)$ convient pour $\varepsilon > 0$ assez petit, et dualement $x - (\varepsilon, 0)$. Les points $(1, \frac{1}{2})$ et $(1, -\frac{1}{2})$ y sont incomparables. Ses intervalles forment donc un modèle-segment dont l'ordre n'est pas total.

25 Cote 156-3 : l'intermédiarité se lit sur les découpages²⁶

La cote 156-3, chapitre III de *Vers une géométrie des formes*, quarante pages datées des 8 et 9 juin 1986, intitulée de sa main « Réseaux via découpages », propose une troisième axiomatique des réseaux. Elle se donne des lieux, les paires de lieux en position relative modérée, et pour chaque partie finie modérée T le découpage de son complémentaire modéré $C(T)$ en composantes. La page 8 définit le *tronçon ordonné*. C'est un ensemble ordonné où, pour tout a , $\mathcal{L}_{>a}$ est filtrant décroissant et $\mathcal{L}_{<a}$ filtrant croissant (a, a'), qui est filtrant croissant et décroissant (b), divisible (c) et de cardinal > 1 (d). Les 0-sphères y sont les paires comparables $\varepsilon = \{a, b\}$, $a < b$, et les composantes de $C(\varepsilon)$ sont $\mathcal{L}_{<a}$, $]a, b[$ et $\mathcal{L}_{>b}$ (156-3, lot 1, p. 8). Les pages 11 à 13 montrent que l'intermédiarité stricte $\mathcal{R}$ et la comparabilité déterminent l'ordre à l'opposé près (156-3, lot 1, p. 11, 156-3, lot 1, p. 13). La page 14 pose le problème : « la connaissance de $\text{Drap}_2(\mathcal{L})$, et [...] de la décomp. de $C(\varepsilon)$ [...] en composantes connexes, implique la connaissance de la relation $\mathcal{R}(a, b, c)$ » (156-3, lot 1, p. 14). La page 15 calcule les trois composantes attachées à $a < b < c$, $X_{\{a,b\}} = \mathcal{L}_{>b}$, $X_{\{b,c\}} = \mathcal{L}_{<b}$, $X_{\{c,a\}} =]a, c[$. Elle trouve la première intersection vide et les deux autres non vides, « divisibilité ! », et conclut « On gagne ! » (156-3, lot 1, p. 15).

Conventions. Pour a, b, c on note $\mathcal{R}(a, b, c)$ si $a < b < c$ ou $c < b < a$, et $\overline{\mathcal{R}}(a, b, c)$ si $a \leq b \leq c$ ou $c \leq b \leq a$. Pour $a \neq b$ comparables, $C(\{a, b\})$ est l'ensemble des éléments distincts de a et b et comparables aux deux ; deux de ses éléments sont dans le même *morceau* s'ils sont tous deux au-dessous de a et b , tous deux strictement entre eux, ou tous deux au-dessus : la relation ne dépend que de la paire. On note $X_{\{a,b\}}(t)$ le morceau de $C(\{a, b\})$ qui contient t . La donnée de la page 14 est celle de la comparabilité et, pour chaque paire comparable, de la partition de $C(\varepsilon)$ en morceaux, sans étiquette ; une bijection e entre deux ensembles ordonnés *respecte les découpages* si elle respecte la comparabilité et si, pour toute paire comparable $\{a, b\}$ et tous $s, t \in C(\{a, b\})$, s et t sont dans le même morceau de $C(\{a, b\})$ si et seulement si $e(s)$ et $e(t)$ sont dans le même morceau de $C(\{e(a), e(b)\})$.

Énoncé (Page 15). Soient $a < b < c$ dans un ensemble ordonné. Alors $X_{\{a,b\}}(c) = \mathcal{L}_{>b}$, $X_{\{b,c\}}(a) = \mathcal{L}_{<b}$ et $X_{\{c,a\}}(b) =]a, c[$. Si l'ordre est dense et si p, q, r sont deux à deux distincts et comparables, $\mathcal{R}(p, q, r)$ a lieu si et seulement si $X_{\{p,q\}}(r) \cap X_{\{q,r\}}(p) = \emptyset$.

Démonstration. Si $b < t$ et $a < b$, un élément s est dans le même morceau que t exactement quand il est au-dessus de a et de b : t n'est ni sous a ni strictement entre a et b . Un tel s est dans $C(\{a, b\})$, d'où $X_{\{a,b\}}(c) = \mathcal{L}_{>b}$; de même $X_{\{b,c\}}(a) = \mathcal{L}_{<b}$, et, la relation étant symétrique en la paire, $X_{\{c,a\}}(b) =]a, c[$. Trois éléments deux à deux distincts et comparables forment une chaîne, et l'un des six ordres possibles a lieu. Si q est au milieu, les deux morceaux sont $\mathcal{L}_{>q}$ et $\mathcal{L}_{<q}$, disjoints. Si le milieu est p , disons $q < p < r$, les morceaux sont $\mathcal{L}_{>p}$ et $]q, r[$, qui contiennent tous deux un point de $]p, r[$, non vide par densité ; les quatre autres cas sont semblables. $\square$

Énoncé (Pages 11 à 13). Soient deux ensembles ordonnés filtrants croissants et décroissants, et e une bijection de l'un sur l'autre qui respecte la comparabilité et l'intermédiarité stricte. Alors e

²⁶Preuve vérifiée : lean/Grothendieck/Folder156_3.lean.

est un isomorphisme d'ordres ou un anti-isomorphisme. Plus précisément, si $a < b$, on a $u \leq v$ si et seulement s'il existe x et y , avec $x = a$ ou $\mathcal{R}(b, a, x)$, $y = b$ ou $\mathcal{R}(a, b, y)$, tels que $\overline{\mathcal{R}}(x, u, y)$, $\overline{\mathcal{R}}(x, v, y)$ et $\overline{\mathcal{R}}(x, u, v)$. Enfin, $\overline{\mathcal{R}}(a, b, c)$ équivaut à : $\mathcal{R}(a, b, c)$, ou $b \in \{a, c\}$ avec a et c comparables.

Démonstration. La condition sur x dit $x \leq a$, celle sur y dit $y \geq b$. Si $u \leq v$, la filtration b) donne $x \leq u, a$ et $y \geq v, b$, et $x \leq u \leq v \leq y$ donne les trois conditions. Inversement, $x \leq a < b \leq y$ donne $x < y$; $\overline{\mathcal{R}}(x, u, y)$ ne peut alors avoir lieu que sous la forme $x \leq u \leq y$, et de même pour v ; si $\overline{\mathcal{R}}(x, u, v)$ a lieu sous la forme $v \leq u \leq x$, alors $u = x$ et $v \leq x \leq v$, donc $u = v$; dans tous les cas $u \leq v$. La forme exacte de $\overline{\mathcal{R}}$ se vérifie cas par cas. Ainsi $\leq$ s'écrit à partir de a, b , de $\mathcal{R}$ et de la comparabilité seuls. Si l'ordre de départ n'a aucun couple $a < b$, c'est l'égalité, et la comparabilité respectée force l'égalité à l'arrivée. Sinon, soit $a < b$; $e(a)$ et $e(b)$ sont comparables et distincts. Si $e(a) < e(b)$, la description précédente, transportée par e , donne $u \leq v \Leftrightarrow e(u) \leq e(v)$. Si $e(b) < e(a)$, on remplace l'ordre d'arrivée par l'ordre opposé, qui a la même intermédiarité, la même comparabilité, et reste filtrant dans les deux sens. $\square$

Énoncé (Pages 11 à 15, l'ordre se lit sur les découpages $\blacklozenge$). Une bijection entre deux tronçons ordonnés qui respecte la comparabilité et, pour chaque paire comparable ε , la partition de $C(\varepsilon)$ en morceaux, est un isomorphisme d'ordres ou un anti-isomorphisme. La comparabilité seule n'y suffit pas : sur le tronçon $\mathbb{Q}$, la transposition de 0 et 1 respecte la comparabilité sans être ni croissante ni décroissante.

Démonstration. D'après l'énoncé de la page 15, appliqué dans les deux tronçons, et parce que e envoie le morceau $X_{\{p,q\}}(r)$ sur le morceau $X_{\{e(p),e(q)\}}(e(r))$, la bijection e respecte l'intermédiarité stricte ; on conclut par l'énoncé des pages 11 à 13. Pour $\mathbb{Q}$, les conditions a) à d) sont immédiates (minimum, maximum, milieu) ; tout couple y est comparable, et la transposition σ de 0 et 1 vérifie $\sigma(1) = 0 < 1 = \sigma(0)$, alors que $\sigma(1) = 0 < 2 = \sigma(2)$. $\square$

Remarque. Des conditions de la page 8, seules la divisibilité c) et la filtration b) servent ; a), a') et d) n'interviennent pas. La divisibilité rend non vides les deux autres intersections de la page 15. La filtration b) sert seulement dans le lemme des pages 11 à 13. Il n'est pas nécessaire de déduire Drap_2 de $\mathcal{R}$, puisque la comparabilité fait partie des données de la page 14. L'énoncé vaut donc pour tout ensemble ordonné dense et filtrant dans les deux sens.

Remarque. La version large de l'intermédiarité est $\mathcal{R}(a, b, c)$, ou $b \in \{a, c\}$ avec a et c comparables. La forme « $\mathcal{R}(a, b, c)$ ou $b \in \{a, c\}$ » que la lecture substitue à la marge de la page 11 est fautive pour a et c incomparables. Dans $\mathbb{N}^2$ ordonné produit, $\overline{\mathcal{R}}((0, 1), (0, 1), (1, 0))$ n'a pas lieu. Le lemme de la page 13 ne rencontre pas ce cas, puisqu'il est appliqué avec $x < y$.

Bilan

26 Énoncés restant à démontrer

Le tableau 1 donne, pour chaque cote, les énoncés non démontrés ici : ceux que visait le choix de la cote, puis les autres énoncés de la lecture. Le losange rouge $\blacklozenge$ y marque les pistes de l'onglet Findings qui portent sur ces énoncés (voir l'introduction).

Tab. 1 : Énoncés des vingt-cinq cotes non démontrés ici.

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
16	Le théorème de Lefschetz difficile par $\mathfrak{sl}_2$; la représentation de $\mathfrak{sl}_2$ engendrée par (L_0, Λ_0) .	Dans le théorème du n° 6, Λ et les projecteurs primitifs (pp. 9–12) $\blacklozenge$; l'existence et l'unicité de $\Phi_0 \rightarrow \mathcal{E}$, le corollaire de la p. 16 $\blacklozenge$; le contre-exemple de la p. 21 ; pp. 2–5, 24–46, 48–54 (algèbres de Hodge $\blacklozenge$, sections hyperplanes, le corollaire de la p. 48, variantes de la p. 49 $\blacklozenge$, le lemme).
161-2	L'adjonction théorie de Lawvere–monade (p. 33) ; le théorème de la p. 54 et le corollaire de la p. 55 ; le lemme de la p. 59 (Ind_π , filtrations cardinales) ; le corollaire de la p. 77.	La liste de la p. 56 ; la Δ -enveloppe (pp. 3–31) ; les topos classifiants (pp. 17–24, 36–52) $\blacklozenge\blacklozenge$; pp. 62–76 et 78–111, dont le corps universel (pp. 92–95) $\blacklozenge$.
113	La forme k -linéaire de l'invariance de Morita.	L'indépendance de la structure k -additive ; $\text{Kar } P \simeq \text{Proj}_{\text{tf}}(P^k)$; Freyd–Mitchell ; l'énoncé 2-fonctoriel ; pp. 5–12 (produit tensoriel, contre-exemple $(\otimes)$, produit dérivé).
125	Profondeur le long d'un fermé ; prolongement de type Hartogs.	La dualité de Serre (admise) ; les étages 4 et 5 (complétion formelle) $\blacklozenge$; les annulations pour $\mathcal{O}(n)$; la dimension cohomologique de $P - X$; les Ext des pp. 4–5 ; III-5 (Koszul) ; III-18 pour les faisceaux.
21	Profondeur le long d'un fermé ; prolongement de type Hartogs.	2.1–2.14 (Eilenberg–Watts, module représentant, premiers associés) ; 2.15 comme équivalence de catégories ; 2.17 ; pp. 15–28 (faisceaux, catégories fibrées, toseurs) $\blacklozenge$.
22	Lissité, non-ramification et étalitude formelles, et leurs critères de relèvement.	Dans 3.5, la réduction à un système indexé par $\mathbb{N}$; 3.2 et 3.6–3.13 (algèbres de Cohen, homomorphismes réguliers) ; l'obstruction différentielle sur $k[[t]]$ (pp. 22, 24) $\blacklozenge$; le contre-exemple sur les différentielles (pp. 26, 28) $\blacklozenge$; pp. 1–8 et 18–28.

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
19	L'énoncé de Morita (équivalence si et seulement si U est petit et projectif) ; la Conclusion des pp. 4–6 (adjonctions et comonades).	La reconstruction de l'adjonction ; les topos de coalgèbres (p. 6) ; les relations de coïunité et de coassociativité entre les λ_{kji} et la description de la catégorie par les quadruplets (X', X'', u', u'') (pp. 9–10) ♦ ; les chaînes de n adjoints (pp. 79–80) ♦ ; pp. 7–95 (résolutions standard, cohomologie relative, SGA 4, localisation, recollement, catégories fibrées).
161-1	—	La reconstruction d'une adjonction idempotente à partir de $(E_0, F_0, E_0 \simeq F_0)$ (p. 5) ; pp. 9–19, dont les contractions (pp. 11–12) ♦.
39	La préparation (unité $\times$ polynôme distingué) ; paires henséliennes ; séries algébriques.	Le cas d'une topologie linéaire quelconque ; le cas I -adique sous $a_i \in \sqrt{I}$; l'axiomatique des pp. 2–16 ♦.
41	Constructibilité ; ouverture universelle ; irréductibilité géométrique des fibres.	Le cas « Y localement noethérien » ; la fibre schématique comme $f^{-1}(y)$; les définitions 2 et 3 ; la représentabilité des sections monogènes ; le théorème des pp. 8–9 ♦.
42	—	Corollaire 1 pour un préschéma localement noethérien non affine ; le lemme 3 et les corollaires 2 et 3 (pleine fidélité) ♦ ; les deux contre-exemples.
153	—	$(\Omega_A)_0 \simeq \Gamma A$ pour un anneau d'un topos et l'exemple $\text{End}(W_k(A))$; les constantes de $k[[T]]^+$ et les séries à terme constant nilpotent ; les co-opérations sous la seule hypothèse $K_0 \otimes_{k_0} K_0 = K_0$ ♦ ; le contre-exemple de 3a) pour $\text{Appl}(A, A)$, A pseudo-anneau infini quelconque ; les analyseurs des puissances divisées et des λ -anneaux.
84	La formulation ponctuelle de la proposition de la p. 85 et du corollaire de la p. 86 (en tout point de $V(2)$, $T_{1,0}$ ou $T_{2,0}$ engendre $L_{i,0}$) ; l'unicité de la forme quadratique du théorème de la p. 89 ; la construction intrinsèque de $X_1 * X_2$ (pp. 65–79).	Le corollaire de la p. 86 pour $\text{Hom}(-, M)$; le passage des coinvariants aux invariants par dualité ; trace et norme de $A_1 \otimes A_2$ sur A (pp. 104–105) ; les troisième et quatrième parties.
152	Plongements dans une surface orientée et circularisations (p. 4).	Le critère encadré des arbres (p. 9) ; la fonctorialité ; pp. 2, 3, 10–12.
88	— (la présentation de Coxeter est une définition).	$\text{Aut}(\Sigma) \rightarrow \text{Aut}(\Phi(\Sigma))$ (pp. 3–4) ; les autres relations entre les σ_i ; la triangulation de la sphère ; les articles (1)–(5) et (7) ; le contenu géométrique de (6).

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
77	Élémentarité $(-1)^n \Delta = B^2 - 4C$ en rang pair $2n \geq 6$ ♦.	Le développement de Δ en graphes (pp. 65–67) ; les équivalences de la p. 127 (régularité, lissité de $V(q)$, isomorphie locale à q_n) ; les parties I–III et V du dossier (revêtements quadratiques, extension à travers 2 ♦, groupes orthogonaux).
85	La rigidité du groupoïde des (G, φ) , $\varphi : \mathfrak{A}_5 \hookrightarrow G$, et la représentabilité par $\text{Spec } \mathbf{Z}[T]/(T^2 + T - 1)$ (p. 40) ♦ ; l'existence d'un plongement de $\mathfrak{A}_5$ dans une forme de PGL_2 sur cette base ; l'homomorphisme $\mathfrak{A}_5 \rightarrow \text{PGL}_2(\mathbf{Z}[\zeta_5])$ du modèle et son injectivité sur les fibres.	Le théorème de la p. 4 sur les représentations de G_2 et les cas finis des pp. 8–10 ; l'invariant A comme quotient adjoint d'une forme quelconque (pp. 23–26) ; le théorème de la p. 31 ; les représentations de $\mathbb{D}_\infty$ (pp. 12–21) ; les systèmes de Schwarz (pp. 42–56), les hyperpolygônes (pp. 58–73), les polyèdres de caractéristique 0 (pp. 75–80), pp. 82–97.
106	—	$W_{\text{cof}}^{-1} C_{\text{cof}} \simeq W^{-1} C$ et la proposition de la p. 5 ; $\text{Ch}_0, \tilde{C}$, la plénitude de q (pp. 5–9) ; la construction de la p. 13 et la comparaison des factorisations (pp. 13–15).
114	W_∞ comme classe des équivalences faibles usuelles (Cisinski) ; (iii) $\Rightarrow$ (i), réfutée dans la littérature.	W_0 le plus grossier sous Loc 4) ; le début de la p. 3 ; pp. 1–2 ; le NB et la dominance (p. 4) ; les contre-exemples et la question (pp. 4–5).
158	—	Le groupe fondamental (pp. 19–20) ; la catégorie 0-connexe non 1-connexe (pp. 21–41) ♦ ; la proposition 2 « (??) » et le corollaire « Faux ! » ; pp. 50–53 ♦ ; $\text{Ep}(E)$ et $\text{Mon}(E)$; pp. 60–83.
104	La décomposition de toute flèche de l'exemple 1 en composé de faces (seul le pas est démontré).	$M \simeq M_0$ et la réciproque (pp. 9–10) ; sphéricité et régularité de $ I_n^* $; la p. 11 ; pp. 12–16 (ensembles ordonnés épinglés) ♦ ; les conditions (C_i) de la p. 4 ; les sous-objets des exemples.
67	—	m comme graphe d'un isomorphisme $p' \simeq q'$; le corollaire de la p. 90 (M projectif de rang 2, k connexe ; en partie illisible) ; le corollaire de la p. 99 (deux classes d'involutions $\neq \pm 1$ dans $\text{GL}_2(k)$, k principal, $k/2k$ corps) et les deux types de réseaux de la p. 92 ; le reste du dossier (chirurgie et métriques canoniques des surfaces conformes).

Cote	Énoncés visés, non démontrés	Autres énoncés de la lecture
156-1	—	Les corollaires de F1–F2 hors du modèle-segment et la transitivité de «même branche»; les corollaires 1–2 de F4 et F5 $\Leftrightarrow$ F'5; la restriction (pp. 8–9); l'orientation (pp. 14–17); le contre-exemple de la p. 21 et F6; les réseaux (pp. 23–24); pp. 24–26.
156-3	—	Les axiomes des réseaux par découpages (pp. 1–5); les remarques de la p. 16; parties modérées fermées (pp. 17–21); topologie (pp. 21–24); bord et pseudo-tronçons (pp. 24–28); l'algèbre des parties modérées (pp. 29–39).
133	L'identification des modules croisés de G_1 avec ceux de G (les formules $\Psi_{G_1} = \Psi_G + \tilde{c}_E \alpha$, $\lambda_{G_1} = \lambda_G + \beta c_E$ ne sont démontrées que comme identité de commutateurs dans G_1); l'isomorphisme $N/D(G) \simeq \mathcal{D}/\lambda_G(\pi_0 \otimes \pi_0)$ au-delà de l'équivalence.	L'obstruction H^3 et l'indétermination H^2 (p. 45); les conditions b) et c) des pp. 50–53; la réduction aux formes alternées; les suites Witt, λ -anneaux, groupes formels (pp. 34–39), Chevalley (pp. 41–43) ♦.

Les erreurs trouvées portent surtout sur les gloses modernes des lectures. Dans la cote 158, la glose de la proposition 1 était fausse. Dans la cote 114, la lecture omettait une hypothèse de la page. Dans la cote 156-3, une note de la lecture sur la page 11 identifie l'intermédiarité large à la stricte augmentée des extrémités; cela ne vaut que pour des extrémités comparables, et l'ordre produit sur $\mathbb{N}^2$ le dément. Dans la cote 16, l'anneau universel $\Phi_0 = \mathbb{Z}[L_0, \Lambda_0]$ de la lecture n'existe pas sur $\mathbb{Z}$ pour $n \geq 2$, car ξ_0^n est divisible par $n!$; l'obstruction disparaît sur $\mathbb{Q}$.

Deux erreurs sont sur la page elle-même, toutes deux dans la cote 19 : la nécessité dans le théorème 1.12 b), et la réserve «ou I fini» de la page 7, un adjoint à gauche ne commutant pas en général aux produits finis. Dans la cote 16, le calcul confirme une erreur de la page 13 que la lecture relevait déjà. La page 3 de la cote 161-1 répète mot pour mot une de ses conditions. Dans la cote 104, la bonne fondation est une hypothèse supplémentaire, et $\mathbb{Z}$ vu comme catégorie montre qu'elle est nécessaire.

Les onze pistes démontrées tiennent telles qu'elles sont écrites, souvent sous des hypothèses plus faibles. La cote 67 vaut pour un anneau non commutatif, et la cote 133 n'utilise pour la page 46 que $N' \subset \text{Cent}(G)$. Dans la cote 106, quand tout objet est cofibrant, le foncteur q' est un isomorphisme sans condition; le critère $(\star\star)$ est alors toujours vérifié, et les deux membres de l'équivalence sont vrais. Dans la cote 84, la réciproque du corollaire de la page 86 demande le changement de base que la page écrit : sur $\mathbb{Z}[X]$, avec $b_1 = X$ et $b_2 = 0$, l'application est un isomorphisme alors que l'idéal $(2, X)$ est propre.

Les énoncés restants demandent pour la plupart des théories classiques absentes de la bibliothèque : surfaces, dualité de Serre, complétion formelle, groupe fondamental d'une catégorie, lissité formelle, catégories Ind_π , équivalences faibles des petites catégories, géométrie des sections hyperplanes.

Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle

Les énoncés démontrés ici sont tirés des lectures modernisées du fonds. Celles-ci dérivent de transcriptions produites par des modèles de langage (Claude Opus 5, Opus 5.5, Fable 5 et Fable 5.1, d'Anthropic) sous des règles éditoriales écrites par l'auteur ; ces transcriptions n'ont pas été relues en entier par une personne. Les preuves formelles ont été écrites en Lean 4 par Claude Opus 5.5, sous la direction de l'auteur, et Lean en vérifie mécaniquement la correction contre la bibliothèque mathlib. Le même modèle en a tiré les démonstrations rédigées de cette annexe. L'auteur a relu le choix des énoncés, les corrections apportées aux lectures et le texte, et en assume l'entière responsabilité. Lean garantit qu'un énoncé tient sous les hypothèses écrites. Il ne garantit ni que l'énoncé rend fidèlement le feuillet, ni qu'il est nouveau.