

Интегрирование

Собственные интегралы

Цыбулин Иван (tsybulin@crec.mipt.ru)

Задача численного интегрирования

Требуется вычислить определенный интеграл

$$\int_a^b f(x)dx$$

Интеграл предполагается собственным, то есть $a, b \neq \infty$, $|f(x)| < \infty$.

Приближение подынтегральной функции

Для вычисления интеграла, подынтегральную функцию приближают интегрируемой аналитически. Самый простой вариант — приблизить функцию интерполяционным многочленом:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b P(x)dx$$

Формулы численного интегрирования называются также *квадратурными формулами* или *квадратурами*.

Формулы для равномерной сетки

Будем приближать функцию на отрезке $[a, b]$ интерполяционным многочленом на равномерной сетке:

- $P_0(x) = f(a)$. Получится формула прямоугольников: $\int_a^b f(x)dx \approx (b - a)f(a)$
- $P_1(x) = f(a) + f(a, b)(x - a)$. Получится формула трапеций:
$$\int_a^b f(x)dx \approx (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

Общий случай

Интерполянт в форме Лагранжа $P_p(x) = \sum_{k=0}^p f(x_k) \ell_k(x)$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \int_a^b P_p(x) dx = \sum_{k=0}^p f(x_k) \int_a^b \ell_k(x) dx = \\ &= (b-a) \sum_{k=0}^p w_k f(x_k), \quad w_k = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \tilde{\ell}_k(t) dt \end{aligned}$$

Здесь $\tilde{\ell}_k$ построены уже на отрезке $[-1, 1]$.

Формула Симпсона

Для случая $p = 2$ получаем формулу Симпсона

$$\int_a^b f(x)dx = (b - a) \left[f(a)w_0 + f\left(\frac{a+b}{2}\right)w_1 + f(b)w_2 \right],$$

$$w_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{x(x-1)}{2} dx = \frac{1}{6}$$

$$w_1 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-x^2) dx = \frac{2}{3}$$

$$w_2 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{x(x+1)}{2} dx = \frac{1}{6}$$

Формулы Ньютона-Котеса

p	Название	Формула	Остаточный член
0	Прямоугольников	$(b - a) f(x_1)$	$\frac{(b-a)^2}{2} f'(\xi)$
1	Трапеций	$(b - a) \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$	$-\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi)$
2	Симпсона	$(b - a) \frac{f(x_1) + 4f(x_2) + f(x_3)}{6}$	$-\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$
3	Формула 3/8	$(b - a) \frac{f(x_1) + 3f(x_2) + 3f(x_3) + f(x_4)}{8}$	$-\frac{(b-a)^5}{6480} f^{(4)}(\xi)$

Здесь x_1, \dots, x_p — равномерная сетка на $[a, b]$.

Составные формулы

Разобьем отрезок $[a, b]$ на равные интервалы длины $h = \frac{b-a}{n}$. Применим к каждому отдельному интервалу формулу прямоугольников

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \approx h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}).$$

Применив к каждому формулу трапеций, получаем

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \approx h \sum_{i=1}^n \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} = \\ &= \frac{h}{2}(f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n))\end{aligned}$$

Объединив интервалы по два и применив к каждой паре формулу Сипсона, получаем

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \sum_{i=1}^{n/2} \int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} f(x)dx \approx 2h \sum_{i=1}^{n/2} \frac{f(x_{2i-2}) + 4f(x_{2i-1}) + f(x_{2i})}{6} = \\ &= \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + \\ &\quad + 4f(x_{n-3}) + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n))\end{aligned}$$

Погрешность составных формул

Пусть элементарная квадратурная формула на одном интервале имеет остаточный член вида

$$R_1 = C(b - a)^{k+1} f^{(k)}(\xi).$$

Тогда суммарная ошибка на всех интервалах

$$R_{\text{сост}} = Ch^{k+1} \sum_{i=1}^n f^{(k)}(\xi_i),$$

$$|R_{\text{сост}}| \leq Ch^{k+1} \sum_{i=1}^n |f^{(k)}(\xi_i)| \leq C(b - a)h^k \max_{x \in [a, b]} |f^{(k)}(x)|$$

Для формулы Симпсона требуется оценить ошибку немного иначе, так как она интегрирует пары интервалов:

$$R = \frac{(2h)^5}{2880} \sum_{i=1}^{n/2} f^{(4)}(\xi_i),$$

$$|R| \leq 32 \frac{h^5}{2880} \sum_{i=1}^{n/2} |f^{(4)}(\xi_i)| \leq \frac{(b-a)h^4}{180} \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

Погрешности составных формул

p	n	Название	Погрешность
0	\forall	Прямоугольников	$\frac{(b-a)h}{2} M_1$
1	\forall	Трапеций	$\frac{(b-a)h^2}{12} M_2$
2	$n = 2m$	Симпсона	$\frac{(b-a)h^4}{180} M_4$
3	$n = 3m$	Формула 3/8	$\frac{(b-a)h^4}{80} M_4$

Точность квадратурных формул

Алгебраической степенью точности квадратурной формулы называют такое число d , что квадратурная формула точна для всех многочленов степени d , но для некоторых многочленов степени $d + 1$ уже не точна. Из вида остаточного члена заключаем, что метод прямоугольников имеет $d = 0$, метод трапеций — $d = 1$, методы Симпсона и 3/8 — $d = 3$.

Можно видеть, что порядок метода (степень h в оценке ошибки) совпадает с $d + 1$.

```
def rectangle(f, h):
```

```
    return h * sum(f[:-1])
```

```
def trapezoid(f, h):
```

```
    return 0.5 * h * (f[0] + 2 * sum(f[1:-1]) + f[-1])
```

```
def simpson(f, h):
```

```
    assert (len(f)-1) % 2 == 0
```


```
    return h/3. * (f[0] + 4 * sum(f[1:-1:2]) + \
        2 * sum(f[2:-2:2]) + f[-1])
```

```
def threeeights(f, h):
```

```
    assert (len(f)-1) % 3 == 0
```

```
    return 3*h/8. * (f[0] + 3 * sum(f[1:-1:3]) + \
        3 * sum(f[2:-1:3]) + 2 * sum(f[3:-3:3]) + f[-1])
```

Show code



Формулы с произвольным расположением узлов

Расположим на отрезке $[a, b]$ узлы $\{x_i\}_{i=1}^m$ произвольно. Тогда проводя по этим узлам интерполяцию, получим квадратурную формулу в том же виде

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) \sum_{k=1}^m w_k f(x_k), \quad w_k = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \tilde{\ell}_k(t) dt$$

Очевидно, что такая формула точная для всех многочленов степени $m-1$, то есть алгебраическая точность такой формулы не ниже $m-1$. Как мы видели выше, это означает, что порядок формулы не ниже m .

Формула средней точки

Рассмотрим случай $m = 1$ (один узел). Располагая точку по центру

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b - a) f\left(\frac{a + b}{2}\right),$$

получаем формулу первой степени точности (то есть второго порядка). Соответствующая составная формула имеет вид

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right),$$

Уравнения для узлов и весов

Запишем условия точности формулы для многочленов $1, x, x^2, \dots, x^d$

$$\sum_{k=0}^p w_k x_k^j = \int_a^b x^j dx, \quad j = 0, 1, \dots, d$$

Это система из $d + 1$ нелинейного уравнения с $2m$ неизвестными x_k, w_k — потенциально может иметь решение при $d = 2m - 1$.

Оказывается, решение этой системы выражаются через корни ортогональных многочленов.

Узлы квадратуры x_k должны быть выбраны в корнях многочлена $L_{p+1}(x)$. Многочлены $L_j(x)$ образуют ортогональное семейство

$$\int_a^b L_i(x)L_j(x)dx = 0, \quad i \neq j, \quad \deg L_j(x) = j, \quad L_j(x) = x^j + \dots$$

Веса могут быть найдены либо из линейной системы (после определения x_k система становится линейной), либо по стандартной формуле $w_k = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \tilde{\ell}_k(t)dt$

Более того, этот результат сохраняется и для интегралов вида

$$\int_a^b f(x)\omega(x)dx,$$

где $\omega(x) \geq 0$ — известная весовая функция.

В этом случае необходимо узлы взять в корнях многочленов $H_j(x)$, ортогональных с этим весом:

$$\int_a^b H_i(x)H_j(x)\omega(x)dx = 0, \quad i \neq j, \quad \deg H_j(x) = j, \quad H_j(x) = x^j + \dots$$

Веса определяются по формуле $w_k = \int_a^b \ell_k(x)\omega(x)dx$.

Гауссовы квадратуры

Эти квадратурные формулы называются Гауссовыми квадратурами. Для формул с весовой функцией $\omega(x)$ иногда используют название квадратуры Гаусса-Кристоффеля. Также формулы для конкретного веса $\omega(x)$ часто называют по семейству ортогональных многочленов (квадратура Гаусса-Лежандра, Гаусса-Чебышева, Гаусса-Эрмита и т.п.)

Общее свойство данных квадратур — они имеют алгебраический порядок точности $2m - 1$ имея всего m узлов на отрезке $[a, b]$. При этом порядок составной квадратурной формулы равен $2m$.

Построим квадратурную формулу для случая $\omega(x) \equiv 1$ для $m = 2$ узлов на отрезке $[-1, 1]$. Для этого необходимо сначала построить соответствующее семейство многочленов вплоть до многочлена $L_2(x)$:

$$L_0(x) \equiv 1$$

$$L_1(x) = x + \alpha$$

$$L_2(x) = x^2 + \beta x + \gamma$$

Многочлен $L_1(x)$ должен быть ортогонален $L_0(x)$:

$$0 = \int_{-1}^1 L_0(x)L_1(x)dx = \int_{-1}^1 (x + \alpha)dx = 2\alpha \implies L_1(x) = x.$$

Многочлен $L_2(x)$ должен быть ортогонален $L_0(x)$ и $L_1(x)$:

$$0 = \int_{-1}^1 L_0(x)L_2(x)dx = \int_{-1}^1 (x^2 + \beta x + \gamma)dx = \frac{2}{3} + 2\gamma$$

$$0 = \int_{-1}^1 L_1(x)L_2(x)dx = \int_{-1}^1 x(x^2 + \beta x + \gamma)dx = \frac{2}{3}\beta$$

$$L_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}$$

Корни многочлена $L_2(x) = x^2 - \frac{1}{3} = 0$ равны $x_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. Эти корни будут узлами квадратуры.

$$w_1 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} dx = \frac{2x_2}{x_2 - x_1} = 1$$

$$w_2 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} dx = \frac{2x_1}{x_1 - x_2} = 1.$$

Полученная квадратура имеет вид

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

Интегрировать $f(x)$ на отрезке $[a,b]$ используя n вычислений $f(x)$

def gauss2(f, a, b, n):

assert n % 2 == 0

 h = (b - a) / n

 s = 0

for i **in** range(n // 2):


 x1 = (2*i+1) * h - h / np.sqrt(3)

 x2 = (2*i+1) * h + h / np.sqrt(3)

 s += h * (f(x1) + f(x2))

return s

Show code



Практическая оценка погрешности

Не всегда на практике удастся воспользоваться априорной оценкой вида

$$\varepsilon \leqslant CM_p h^p,$$

так как не всегда удастся оценить M_p для подынтегральной функции. В этом случае, обычно, пользуются правилом Рунге для определения подходящего шага h .

Правило Рунге

Предположим, что нам известен порядок метода, которым мы хотим найти значение интеграла с заданной точностью ε . Тогда результат, вычисленный этим методом с шагом h будет иметь вид

$$I_h = I^* + \underbrace{C_1 h^p + C_2 h^{p+1} + \dots}_{\text{ошибка интегрирования}}$$

Здесь I^* — точное значение интеграла. Для достаточно малых h можно записать

$$I_h = I^* + C_h h^p,$$

где C_h — почти константа, то есть слабо зависит от h .

Вычислим интеграл с шагом h и с шагом $h/2$:

$$I_h = I^* + C_1 h^p + C_2 h^{p+1} + \dots$$

$$I_{h/2} = I^* + C_1 \left(\frac{h}{2}\right)^p + C_2 \left(\frac{h}{2}\right)^{p+1} + \dots$$

Тогда

$$I_h - I_{h/2} = C_h h^p - C_{h/2} \left(\frac{h}{2}\right)^p \approx (2^p - 1) C_{h/2} \left(\frac{h}{2}\right)^p = (2^p - 1)(I_{h/2} - I^*)$$

$$\frac{2^p I_{h/2} - I_h}{2^p - 1} = I^* + O(h^{p+1})$$

Таким образом, погрешность интегрирования на сетке $h/2$ может быть оценена как

$$I_{h/2} - I^* \approx \frac{I_h - I_{h/2}}{2^p - 1}.$$

Величина

$$\frac{2^p I_{h/2} - I_h}{2^p - 1} = I_{h/2} - \frac{I_h - I_{h/2}}{2^p - 1},$$

называется экстраполяцией результата по Ричардсону и характеризуется тем, что приближает ответ I^* с большим порядком $O(h^{p+1})$, чем исходный метод $O(h^p)$

Использование правила Рунге

Алгоритм применения правила Рунге следующий:

1. Задать небольшое число интервалов, скажем $n = 10$

2. Вычислить $I_h, I_{h/2}$ и оценить ошибку

$$\Delta_{h/2} = \frac{I_h - I_{h/2}}{2^p - 1}.$$

3. Если $|\Delta_{h/2}| < \varepsilon$, прекратить вычисления. Иначе измельчить сетку вдвое $h := h/2$ и перейти к шагу 2.

4. Ответом служит либо $I_{h/2}$, либо экстраполированное по Рундсону значение $I_{h/2} - \Delta_{h/2}$.


```
def runge(f, a, b, eps=1e-12, richardson=False):
    n = 4
    lh = simpson(f(np.linspace(a, b, n+1)), (b-a) / n)
    while True:
        lh_2 = simpson(f(np.linspace(a, b, 2*n+1)), (b-a) / (2*n))
        Dh_2 = (lh - lh_2) / (2**4 - 1) # p = 4 для Симпсона
        print('l(h) = %.16f, err(h) = %.6e' % (lh_2, Dh_2))
        if abs(Dh_2) < eps:
            break
        n *= 2; lh = lh_2
        if n > 10000: print('Too large n'); break
    return lh_2 - Dh_2 if richardson else lh_2
```

```
def f(x): return 1 / (1 + x**2)
a = 0; b = 0.5; exact = np.arctan(b)

runge(f, a, b) - exact
```

$I(h) = 0.4636479223346336$, $err(h) = 3.157185e-07$

$I(h) = 0.4636476285453064$, $err(h) = 1.958596e-08$

$I(h) = 0.4636476102217171$, $err(h) = 1.221573e-09$

$I(h) = 0.4636476090771032$, $err(h) = 7.630759e-11$

$I(h) = 0.4636476090055746$, $err(h) = 4.768578e-12$

$I(h) = 0.4636476090011042$, $err(h) = 2.980246e-13$

$2.9809488211185453e-13$

Возможные проблемы

Правилом Рунге и экстраполяцией Ричардсона можно пользоваться лишь в том случае, когда вы можете гарантировать, что используемый численный метод интегрирования действительно имеет порядок p .

```
def f(x): return np.sqrt(x)
a = 0; b = 4; exact = 2 / 3 * b**1.5

runge(f, a, b, eps=1e-4) - exact
```

$I(h) = 5.3046342406801887$, $err(h) = -3.494941e-03$

$I(h) = 5.3231855090252225$, $err(h) = -1.236751e-03$

$I(h) = 5.3297454619694369$, $err(h) = -4.373302e-04$

$I(h) = 5.3320648246268956$, $err(h) = -1.546242e-04$

$I(h) = 5.3328848474901243$, $err(h) = -5.466819e-05$

-0.00044848584320877904

Дополнительные проверки

Для проверки корректности использования правила Рунге достаточно проверять условия

- что метод фактически сходится с порядком p ,

$$\frac{\Delta_h}{\Delta_{h/2}} \approx 2^p$$

- что константа C_h слабо зависит от h :

$$C_h = \frac{\Delta_h}{h^p} \rightarrow C = \text{const}$$

```

def runge_checks(f, a, b, eps=1e-12, richardson=False):
    n = 4
    lh = simpson(f(np.linspace(a, b, n+1)), (b-a) / n)
    Dh = None;
    while True:
        h_2 = (b-a) / (2*n)
        lh_2 = simpson(f(np.linspace(a, b, 2*n+1)), h_2)
        Dh_2 = (lh - lh_2) / (2**4 - 1) # p = 4 для Симпсона
        Ch_2 = Dh_2 / h_2**4; ps = np.log2(Dh / Dh_2) if Dh != None else np.nan
        print('l(h) = %.16f, err(h) = %.6e, p* = %4.2f, C = %.6e' % \
              (lh_2, Dh_2, ps, Ch_2))
        if abs(Dh_2) < eps:
            break
        n *= 2; lh = lh_2; Dh = Dh_2
        if n > 10000: print('Too large n'); break
    return lh_2 - Dh_2 if richardson else lh_2

```

```
def f(x): return 1 / (1 + x**2)
a = 0; b = 0.5; exact = np.arctan(b)

runge_checks(f, a, b) - exact
```

$I(h) = 0.4636479223346336$, $err(h) = 3.157185e-07$, $p^* = \text{nan}$, $C = 2.069093e-02$

$I(h) = 0.4636476285453064$, $err(h) = 1.958596e-08$, $p^* = 4.01$, $C = 2.053736e-02$

$I(h) = 0.4636476102217171$, $err(h) = 1.221573e-09$, $p^* = 4.00$, $C = 2.049459e-02$

$I(h) = 0.4636476090771032$, $err(h) = 7.630759e-11$, $p^* = 4.00$, $C = 2.048366e-02$

$I(h) = 0.4636476090055746$, $err(h) = 4.768578e-12$, $p^* = 4.00$, $C = 2.048089e-02$

$I(h) = 0.4636476090011042$, $err(h) = 2.980246e-13$, $p^* = 4.00$, $C = 2.048009e-02$

$2.9809488211185453e-13$

```
def f(x): return np.sqrt(x)
```

```
a = 0; b = 4; exact = 2 / 3 * b**1.5
```

```
runge_checks(f, a, b, eps=1e-4) - exact
```

$I(h) = 5.3046342406801887$, $err(h) = -3.494941e-03$, $p^* = \text{nan}$, $C = -5.591906e-02$

$I(h) = 5.3231855090252225$, $err(h) = -1.236751e-03$, $p^* = 1.50$, $C = -3.166083e-01$

$I(h) = 5.3297454619694369$, $err(h) = -4.373302e-04$, $p^* = 1.50$, $C = -1.791304e+00$

$I(h) = 5.3320648246268956$, $err(h) = -1.546242e-04$, $p^* = 1.50$, $C = -1.013345e+01$

$I(h) = 5.3328848474901243$, $err(h) = -5.466819e-05$, $p^* = 1.50$, $C = -5.732375e+01$

-0.00044848584320877904

Несобственные интегралы

Рассмотрим случай несобственного интеграла

$$\int_a^b f(x)dx,$$

у которого в точке a функция обращается в бесконечность. При этом отрезок $[a, b]$ остается конечным, и других особых точек у $f(x)$ нет. Любой несобственный интеграл можно свести к такой постановке заменой переменных и разбиением отрезка на участки с одной особенностью.

Регуляризация

Разобъем подынтегральную функцию $f(x)$, на часть $\varphi(x)$, содержащую особенность, и часть $R(x) = f(x) - \varphi(x)$, в которой особенности нет.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \varphi(x)dx + \int_a^b R(x)dx$$

Выберем простую функцию $\varphi(x)$, так, чтобы первый интеграл вычислялся аналитически. Ко второму применим правило Рунге. Рассмотрим на примере

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin \sqrt{x}} \approx 2.75314193394808172860366757084$$

```
def f(x): return np.sqrt(x) / np.sin(x)
def R(x): return np.append([0], f(x[1:]) - x[1:]**(-0.5))
a = 0; b = np.pi / 2; exact = 2.75314193394808172860366757084 - np.sqrt(2*np.pi)

runge_checks(R, a, b, eps=1e-14) - exact
```

$I(h) = 0.2465669562957238$, $err(h) = 2.423191e-05$, $p^* = \text{nan}$, $C = 1.630302e-02$

$I(h) = 0.2465215993654357$, $err(h) = 3.023795e-06$, $p^* = 3.00$, $C = 3.255014e-02$

$I(h) = 0.2465149658115324$, $err(h) = 4.422369e-07$, $p^* = 2.77$, $C = 7.616850e-02$

$I(h) = 0.2465138841057180$, $err(h) = 7.211372e-08$, $p^* = 2.62$, $C = 1.987276e-01$

$I(h) = 0.2465136986662544$, $err(h) = 1.236263e-08$, $p^* = 2.54$, $C = 5.450938e-01$

$I(h) = 0.2465136662487450$, $err(h) = 2.161167e-09$, $p^* = 2.52$, $C = 1.524645e+00$

$I(h) = 0.2465136605409121$, $err(h) = 3.805222e-10$, $p^* = 2.51$, $C = 4.295170e+00$

$I(h) = 0.2465136595333304$, $err(h) = 6.717212e-11$, $p^* = 2.50$, $C = 1.213136e+01$

$I(h) = 0.2465136593553030$, $err(h) = 1.186850e-11$, $p^* = 2.50$, $C = 3.429541e+01$

$I(h) = 0.2465136593238377$, $err(h) = 2.097687e-12$, $p^* = 2.50$, $C = 9.698419e+01$

$I(h) = 0.2465136593182757$, $err(h) = 3.707997e-13$, $p^* = 2.50$, $C = 2.742961e+02$

$I(h) = 0.2465136593172924$, $err(h) = 6.555127e-14$, $p^* = 2.50$, $C = 7.758564e+02$

Too large n

$2.1083135237631723e-13$

Недостаточное выделение особенности

Хотя $R(x)$ теперь и не содержит особенности, она еще недостаточно регулярна для применения к ней метода Симпсона. Для него требуется, чтобы $R(x)$ имела ограниченную четвертую производную.

$$\frac{\sqrt{x}}{\sin x} = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x^{3/2}}{6} + \frac{7x^{7/2}}{360} + \frac{31x^{11/2}}{15120} + O\left(x^{15/2}\right)$$

Все слагаемые, отмеченные красным, имеют неограниченную вторую производную, и все они должны быть вынесены в $\varphi(x)$.

```
def f(x): return np.sqrt(x) / np.sin(x)
def phi(x): return x**(-0.5) + x**1.5/6. + (7*x**3.5)/360.
exphi = 2.7457604543273544586 # Вычисляется аналитически

def R(x): return np.append([0], f(x[1:]) - phi(x[1:]))
a = 0; b = np.pi / 2; exact = 2.75314193394808172860366757084 - exphi

runge_checks(R, a, b, eps=1e-14) - exact
```

$I(h) = 0.0073926725777687$, $err(h) = 9.908375e-06$, $p^* = \text{nan}$, $C = 6.666270e-03$

$I(h) = 0.0073822021936242$, $err(h) = 6.980256e-07$, $p^* = 3.83$, $C = 7.514010e-03$

$I(h) = 0.0073815251641254$, $err(h) = 4.513530e-08$, $p^* = 3.95$, $C = 7.773860e-03$

$I(h) = 0.0073814824732734$, $err(h) = 2.846057e-09$, $p^* = 3.99$, $C = 7.843031e-03$

$I(h) = 0.0073814797991069$, $err(h) = 1.782778e-10$, $p^* = 4.00$, $C = 7.860634e-03$

$I(h) = 0.0073814796318775$, $err(h) = 1.114863e-11$, $p^* = 4.00$, $C = 7.865056e-03$

$I(h) = 0.0073814796214242$, $err(h) = 6.968866e-13$, $p^* = 4.00$, $C = 7.866155e-03$

$I(h) = 0.0073814796207708$, $err(h) = 4.355775e-14$, $p^* = 4.00$, $C = 7.866576e-03$

$I(h) = 0.0073814796207300$, $err(h) = 2.721897e-15$, $p^* = 4.00$, $C = 7.865240e-03$

2.787700625894729e-15