

# Тренировочная к/р по вычислительной математике.

## Осенний семестр, 1 задание

Цыбулин Иван

13 октября 2016 г.

### 1. Условия

Первый пункт в контрольной — контрольный вопрос. Это теоретический вопрос, который *рассматривался на лекциях*. Оценка за это задание может быть от 0 до 1 и служит множителем к оценке за все остальные задачи. Очень важно хоть что-нибудь написать в ответе на этот вопрос, иначе оценка за всю контрольную автоматически обнулится.

#### 1.1. Контрольные вопросы

**Погрешности.** Абсолютная и относительная погрешность. Погрешность хранения чисел в вычислительной технике. Погрешности при суммировании рядов. Ошибка метода и ошибка вычислений.

**Численное дифференцирование.** Формулы дифференцирования первого и второго порядка. Оптимальный шаг дифференцирования.

**Нормы и обусловленность.** Определение согласованной и подчиненной нормы. Стандартные подчиненные матричные нормы ( $\|\cdot\|_\infty$ ,  $\|\cdot\|_{\ell_1}$ ,  $\|\cdot\|_E$ ). Число обусловленности для линейной системы и для матрицы, связь с относительной погрешностью решения системы.

**СЛАУ.** Что такое прямые и итерационные методы решения СЛАУ. Метод прогонки. Метод простой итерации, достаточное условие и критерий сходимости.

**Итерационные методы решения СЛАУ.** Метод простой итерации с параметром  $\tau$ , условия сходимости. Методы Якоби, Зейделя — достаточные условия и критерии сходимости.

**Метод наименьших квадратов.** Решение переопределенной СЛАУ в смысле МНК. Явный вид многочлена наилучшего приближения в норме  $L_2$  через многочлены Лежандра.

## 1.2. Задачи

1. Оценить относительную погрешность в определении корней  $x_{1,2}$  уравнения  $ax^2 + bx + c = 0$ , если известно, что величины  $a = 10, b = -21, c = 2$  заданы с абсолютными погрешностями  $|\Delta a| \leq 10^{-3}, |\Delta b| \leq 10^{-3}, |\Delta c| \leq 10^{-4}$ .

2. Для вычисления первой производной функции  $f(x)$  в точке  $x_0 = x + h$  используется формула

$$f'(x + h) \approx \frac{f(x + 2h) - f(x - 2h)}{4h}.$$

Сама функция  $f(x)$  вычисляется с погрешностью  $\Delta f$ .

- Каков порядок данной формулы дифференцирования?
- Найти оптимальный шаг дифференцирования по этой формуле в произвольной точке  $x_0$  для четырежды дифференцируемой функции.
- Оценить его численное значение для функции  $f(x) = \cos(x + \pi/4)$  в случае использования арифметики одинарной и двойной точности (относительная погрешность округления чисел в одинарной точности  $\delta = 6.0 \cdot 10^{-8}$ , в двойной точности —  $\delta = 1.1 \cdot 10^{-16}$ ).

3. Для системы линейных алгебраических уравнений  $\mathbf{Ax} = \mathbf{f}$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} 4 \\ -11 \end{pmatrix}$$

- Вычислить число обусловленности системы в нормах, подчиненных векторным нормам  $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$ ,  $\|\mathbf{x}\|_{\ell_1} = \sum_i |x_i|$ ,  $\|\mathbf{x}\|_E = \sqrt{\sum_i x_i^2}$ .
- Найти оптимальный итерационный параметр  $\tau$  для итерационного метода

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \tau(\mathbf{f} - \mathbf{Ax}_n)$$

- Определить число итераций, достаточное для уменьшения погрешности в  $10^6$  раз при параметре  $\tau$  из предыдущего пункта.
- Выполнить одну итерацию методом Якоби и одну итерацию методом Зейделя, используя в качестве начального приближения  $\mathbf{x}_0 = (2, 0)^\top$ .

4. Решить переопределенную систему линейных уравнений в смысле МНК:

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ 2x + y = 15 \\ x + 2y = 20 \end{cases}$$

5. Построить на отрезке  $[-1, 1]$  квадратичный многочлен наилучшего приближения  $P_2(x)$  в норме  $L_2$  для функции  $f(x) = \cos \pi x$ .

## 2. Решения

1. Для начала найдем корни уравнения

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{21 \pm 19}{20} = \begin{cases} x_1 = 0.1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

Пусть коэффициенты уравнения  $a, b, c$  изменены на  $\Delta a, \Delta b, \Delta c$  соответственно. Тогда решение изменится на некоторый  $\Delta x$ :

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ (a + \Delta a)(x + \Delta x)^2 + (b + \Delta b)(x + \Delta x) + (c + \Delta c) &= 0 \end{aligned}$$

Раскроем во втором уравнении скобки и пренебрежем всеми слагаемыми содержащими произведения возмущений (оставим только линейные слагаемые по  $\Delta a, \Delta b, \Delta c, \Delta x$ ):

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ ax^2 + 2ax\Delta x + x^2\Delta a + bx + b\Delta x + x\Delta b + c + \Delta c &\approx 0 \end{aligned}$$

Вычтем из второго первое:

$$(2ax + b)\Delta x + x^2\Delta a + x\Delta b + \Delta c \approx 0 \quad (1)$$

$$\Delta x \approx -\frac{x^2\Delta a + x\Delta b + \Delta c}{2ax + b}. \quad (2)$$

Отметим, что уравнение (1) можно было выписать сразу, если записать уравнение в виде

$$f(a, b, c, x) = 0, \quad f(a, b, c, x) = ax^2 + bx + c$$

Уравнение (1) получается, если записать  $df = 0$

$$df = \frac{\partial f}{\partial a} da + \frac{\partial f}{\partial b} db + \frac{\partial f}{\partial c} dc + \frac{\partial f}{\partial x} dx = x^2 da + x db + dc + (2ax + b) dx$$

и заменить в нем дифференциалы на изменения  $\Delta$ :

$$x^2 da + x db + dc + (2ax + b) dx = 0 \longrightarrow x^2 \Delta a + x \Delta b + \Delta c + (2ax + b) \Delta x \approx 0.$$

Итак,

$$\Delta x = -\frac{x^2 \Delta a + x \Delta b + \Delta c}{2ax + b}.$$

Для корня  $x = x_1 = 0.1$

$$\begin{aligned} \Delta x_1 &= -\frac{0.01\Delta a + 0.1\Delta b + \Delta c}{2 \cdot 10 \cdot 0.1 - 21} = \frac{0.01\Delta a + 0.1\Delta b + \Delta c}{19} \\ |\Delta x_1| &\leq \frac{0.01|\Delta a| + 0.1|\Delta b| + |\Delta c|}{19} \leq \frac{10^{-5} + 10^{-4} + 10^{-4}}{19} \approx 1.1 \cdot 10^{-5}. \end{aligned}$$

Для корня  $x = x_2 = 2$

$$\begin{aligned} \Delta x_2 &= -\frac{4\Delta a + 2\Delta b + \Delta c}{20 \cdot 10 \cdot 2 - 21} = -\frac{4\Delta a + 2\Delta b + \Delta c}{19} \\ |\Delta x_2| &\leq \frac{4|\Delta a| + 2|\Delta b| + |\Delta c|}{19} \leq 4 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3} + 10^{-4} \approx 3.2 \cdot 10^{-4}. \end{aligned}$$

2. Пусть  $x_0 = x + h$  — та точка, в которой мы вычисляем производную. Тогда формула дифференцирования может быть записана в виде

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - 3h)}{4h}.$$

Разложим правую часть в окрестности точки  $x_0$ , используя остаточный член в форме Лагранжа:

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - 3h)}{4h} &= \\ &= \frac{1}{4h} \left[ \left( f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + O(h^3) \right) - \right. \\ &\quad \left. - \left( f(x_0) - 3hf'(x_0) + \frac{9h^2}{2}f''(x_0) + O(h^3) \right) \right] = \\ &= f'(x_0) - hf''(x_0) + O(h^2). \end{aligned}$$

Таким образом, отличие левой и правой частей приближенного равенства

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - 3h)}{4h}.$$

составляет

$$|-hf''(x_0) + O(h^2)| \lesssim M_2h = \varepsilon_{\text{метода}}$$

где  $M_2$  — максимум модуля второй производной  $f(x)$ . Так как  $\varepsilon_{\text{метода}} = O(h)$ , метод имеет первый порядок.

Для определения оптимального шага оценим ошибку вычислений по данной формуле:

$$\Delta \left( \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - 3h)}{4h} \right) \leq \frac{\Delta f + \Delta f}{4h} = \frac{\Delta f}{2h} = \varepsilon_{\text{вычисл}}.$$

Найдем минимум полной ошибки  $\varepsilon_{\text{полн}} = \varepsilon_{\text{метода}} + \varepsilon_{\text{вычисл}}$ :

$$\frac{\partial \varepsilon_{\text{полн}}}{\partial h} = M_2 - \frac{\Delta f}{2h^2} = 0 \implies h_{\text{опт}} = \sqrt{\frac{\Delta f}{2M_2}}.$$

Для функции  $f(x) = \cos(x + \pi/4)$  максимум всех производных равен 1. Оценим абсолютную погрешность  $f(x)$ :

$$\Delta f \leq \delta \max_x |f(x)| = \delta \max_x |\cos(x + \pi/4)| = \delta.$$

Для одинарной точности  $\Delta f = \delta = 6 \cdot 10^{-8}$ :

$$h_{\text{опт}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 10^{-8}}{2 \cdot 1}} \approx 1.7 \cdot 10^{-4}.$$

Для двойной точности  $\Delta f = \delta = 1.1 \cdot 10^{-16}$ :

$$h_{\text{опт}} = \sqrt{\frac{1.1 \cdot 10^{-16}}{2 \cdot 1}} \approx 7.4 \cdot 10^{-9}.$$

3. Заметим, что  $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$ , значит  $\|\mathbf{A}\|_\infty = \|\mathbf{A}\|_{\ell_1}$ , а также  $\|\mathbf{A}\|_E = \max |\lambda(\mathbf{A})|$ . Аналогично справедливо для обратной матрицы  $\mathbf{A}^{-1}$ . Найдём обратную матрицу:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{\text{adj } \mathbf{A}}{\det \mathbf{A}} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Также, найдём решение системы:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{f} = \begin{pmatrix} 9/5 \\ -16/5 \end{pmatrix}$$

Число обусловленности системы

$$\nu(\mathbf{A}, \mathbf{f}) = \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\|\|\mathbf{f}\|}{\|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{f}\|} = \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\|\|\mathbf{f}\|}{\|\mathbf{x}\|}$$

- Для  $\|\cdot\|_\infty$ :

$$\begin{aligned} \|\mathbf{A}^{-1}\|_\infty &= \frac{4+1}{15} = \frac{1}{3} \\ \|\mathbf{x}\|_\infty &= \frac{16}{5} \\ \|\mathbf{f}\|_\infty &= 11 \\ \nu_\infty &= \frac{1/3 \cdot 11}{16/5} = \frac{55}{48} \approx 1.146. \end{aligned}$$

- Для  $\|\cdot\|_{\ell_1}$ :

$$\begin{aligned} \|\mathbf{A}^{-1}\|_{\ell_1} &= \frac{4+1}{15} = \frac{1}{3} \\ \|\mathbf{x}\|_{\ell_1} &= \frac{25}{5} = 5 \\ \|\mathbf{f}\|_{\ell_1} &= 15 \\ \nu_{\ell_1} &= \frac{1/3 \cdot 15}{5} = 1. \end{aligned}$$

- Для  $\|\cdot\|_E$ :

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}^{-1} - \lambda \mathbf{E}) &= \begin{vmatrix} 4/15 - \lambda & -1/15 \\ -1/15 & 4/15 - \lambda \end{vmatrix} = (4/15 - \lambda)^2 - 1/15^2 = 0 \\ \lambda_{1,2} &= \frac{4 \pm 1}{15} \\ \|\mathbf{A}^{-1}\|_E &= \frac{5}{15} = \frac{1}{3} \\ \|\mathbf{x}\|_E &= \frac{\sqrt{9^2 + 16^2}}{5} = \frac{\sqrt{337}}{5} \\ \|\mathbf{f}\|_E &= \sqrt{137} \\ \nu_E &= \frac{1/3 \cdot \sqrt{137}}{\sqrt{337}/5} \approx 1.063. \end{aligned}$$

Для итерационного метода  $\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \tau(\mathbf{f} - \mathbf{A}\mathbf{x}_n)$  в случае симметричной положительно определенной матрицы  $\mathbf{A}$  оптимальный параметр дается выражением

$$\tau_{\text{опт}} = \frac{2}{\lambda_{\max}(\mathbf{A}) + \lambda_{\min}(\mathbf{A})}.$$

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E}) &= \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -1 \\ -1 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)^2 - 1 = 0 \\ \lambda_{1,2} &= 4 \pm 1 \\ \tau_{\text{опт}} &= \frac{2}{3 + 5} = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

При этом параметре скорость сходимости  $\|\mathbf{B}\|_E = q_{\text{опт}} = \frac{\lambda_{\max}(\mathbf{A}) - \lambda_{\min}(\mathbf{A})}{\lambda_{\max}(\mathbf{A}) + \lambda_{\min}(\mathbf{A})} = \frac{5-3}{5+3} = \frac{1}{4}$ . Учтем, что

$$\|\mathbf{e}_n\|_E \leq q^n \|\mathbf{e}_0\|_E$$

и для уменьшения ошибки в  $10^6$  раз достаточно взять такое  $n$ , что

$$q^n \leq 10^{-6} \implies n \geq \frac{\ln 10^{-6}}{\ln q} \approx 9.96.$$

Достаточно сделать 10 итераций данным методом.

Сделаем одну итерацию методом Якоби. Найдем текущую невязку:

$$\mathbf{r}_0 = \mathbf{f} - \mathbf{A}\mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 4 \\ -11 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -13 \end{pmatrix}$$

Запишем метод Якоби в канонической форме

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1 &= \mathbf{x}_0 + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{r}_0 \\ \mathbf{x}_1 &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -4 \\ -13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -13/4 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Прделаем то же для метода Зейделя Запишем метод Якоби в канонической форме

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1 &= \mathbf{x}_0 + (\mathbf{L} + \mathbf{D})^{-1}\mathbf{r}_0 \\ \mathbf{x}_1 &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -4 \\ -13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

4. Запишем систему в форме

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 8 \\ 15 \\ 20 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} 8 \\ 15 \\ 20 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Для того, чтобы решить систему методом наименьших квадратов, умножим ее слева на  $\mathbf{A}^\top$ :

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} &= \mathbf{A}^\top \mathbf{f} \\ \mathbf{A}^\top \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A}^\top \mathbf{f} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 15 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 \\ 63 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Решая полученную систему  $2 \times 2$ , получаем

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

**5.** Будем строить многочлен в форме разложения по  $1, x, x^2$ :

$$P_2(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2.$$

Тогда коэффициенты  $c_0, c_1, c_2$  удовлетворяют системе

$$\begin{pmatrix} (1, 1) & (1, x) & (1, x^2) \\ (x, 1) & (x, x) & (x, x^2) \\ (x^2, 1) & (x^2, x) & (x^2, x^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\cos \pi x, 1) \\ (\cos \pi x, x) \\ (\cos \pi x, x^2) \end{pmatrix}$$

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

Найдем элементы матрицы системы

$$\Gamma_{ik} = \int_{-1}^1 x^{i+k} dx = \frac{1 - (-1)^{i+k+1}}{i+k+1}$$

$$\mathbf{\Gamma} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$g_0 = \int_{-1}^1 \cos \pi x dx = 0$$

$$g_1 = \int_{-1}^1 x \cos \pi x dx = 0$$

$$\begin{aligned} g_2 &= \int_{-1}^1 x^2 \cos \pi x dx = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 x^2 d(\sin \pi x) = -\frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 x \sin \pi x dx = \\ &= \frac{2}{\pi^2} \int_{-1}^1 x d(\cos \pi x) = \frac{2}{\pi^2} (\cos \pi + \cos(-\pi)) - \frac{2}{\pi^2} \int_{-1}^1 \cos \pi x dx = -\frac{4}{\pi^2} \end{aligned}$$

$$\mathbf{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{4}{\pi^2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{\Gamma} \mathbf{c} = \mathbf{g}$$

Из системы видно, что  $c_1 = 0$ , а для  $c_0, c_2$  имеем

$$\begin{pmatrix} 2 & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_2 \end{pmatrix} = -\frac{4}{\pi^2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Имеем  $c_2 = -3c_0$ , а для  $c_0$ :

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}c_0 - \frac{6}{5}c_0 &= -\frac{4}{\pi^2} \\ c_0 &= \frac{15}{2\pi^2} \\ P_2(x) &= \frac{15 - 45x^2}{2\pi^2}. \end{aligned}$$