

Погрешности вычислений

Численное дифференцирование

Скалько Юрий Иванович
Цыбулин Иван

Материалы по курсу вычислительной математики

- Материалы курса (методички, лекции, учебники и др.) можно найти на сайте кафедры вычислительной математики <http://crec.mipt.ru/study/materials/compmath/>
- Любые вопросы по курсу (и не только) можно присылать на почтовый ящик tsybulin@crec.mipt.ru

Если про величину X известно, что $X \in [\bar{X} - \frac{\Delta X}{2}, \bar{X} + \frac{\Delta X}{2}]$, то

- *абсолютной погрешностью* X называется величина ΔX
- *относительной погрешностью* — отношение $\frac{\Delta X}{|\bar{X}|}$

Задача

Как вычислить сложную функцию (например, $f(x) = \sin x$) в некоторой заданной точке?

Задача

Как вычислить сложную функцию (например, $f(x) = \sin x$) в некоторой заданной точке?

- Воспользоваться большой таблицей заранее посчитанных значений функций

Задача

Как вычислить сложную функцию (например, $f(x) = \sin x$) в некоторой заданной точке?

- Воспользоваться большой таблицей заранее посчитанных значений функций

Но ведь эту таблицу необходимо еще составить! Не ясно, как искать значения, которые в таблице отсутствуют

Задача

Как вычислить сложную функцию (например, $f(x) = \sin x$) в некоторой заданной точке?

- Воспользоваться большой таблицей заранее посчитанных значений функций
Но ведь эту таблицу необходимо еще составить! Не ясно, как искать значения, которые в таблице отсутствуют
- Численно решить дифференциальное уравнение
$$y''(x) + y(x) = 0$$

Задача

Как вычислить сложную функцию (например, $f(x) = \sin x$) в некоторой заданной точке?

- Воспользоваться большой таблицей заранее посчитанных значений функций

Но ведь эту таблицу необходимо еще составить! Не ясно, как искать значения, которые в таблице отсутствуют

- Численно решить дифференциальное уравнение

$$y''(x) + y(x) = 0$$

Пока совершенно не ясно, как это сделать (но это только пока!)

Задача

Как вычислить сложную функцию (например, $f(x) = \sin x$) в некоторой заданной точке?

- Воспользоваться большой таблицей заранее посчитанных значений функций
Но ведь эту таблицу необходимо еще составить! Не ясно, как искать значения, которые в таблице отсутствуют
- Численно решить дифференциальное уравнение
 $y''(x) + y(x) = 0$
Пока совершенно не ясно, как это сделать (но это только пока!)
- Воспользоваться представлением в виде рядов
Простейший вариант — воспользоваться рядом Тейлора

Для функции $\sin x$ ряд Тейлора в окрестности точки $x = 0$ выглядит следующим образом

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Для функции $\sin x$ ряд Тейлора в окрестности точки $x = 0$ выглядит следующим образом

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Вопрос

Какой радиус сходимости этого ряда?

Для функции $\sin x$ ряд Тейлора в окрестности точки $x = 0$ выглядит следующим образом

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Вопрос

Какой радиус сходимости этого ряда?

$R = \infty$, Ряд сходится при любом x

Для функции $\sin x$ ряд Тейлора в окрестности точки $x = 0$ выглядит следующим образом

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Вопрос

Какой радиус сходимости этого ряда?

$R = \infty$, Ряд сходится при любом x

- Но как суммировать бесконечный ряд на практике?

Для функции $\sin x$ ряд Тейлора в окрестности точки $x = 0$ выглядит следующим образом

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Вопрос

Какой радиус сходимости этого ряда?

$R = \infty$, Ряд сходится при любом x

- Но как суммировать бесконечный ряд на практике?
- Ограничимся только несколькими членами этого ряда

Для функции $\sin x$ ряд Тейлора в окрестности точки $x = 0$ выглядит следующим образом

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Вопрос

Какой радиус сходимости этого ряда?

$R = \infty$, Ряд сходится при любом x

- Но как суммировать бесконечный ряд на практике?
- Ограничимся только несколькими членами этого ряда
- Необходимо оценить ошибку, допущенную при этом

Итак, для приближенного вычисления $\sin x$ можно просуммировать несколько первых членов ряда Тейлора. Для оценки ошибки воспользуемся формулой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

$$\sin x = \underbrace{\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}}_{S_n} + \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \sin^{(2n+2)} \xi, \quad \xi \in [0, x]$$

Итак, для приближенного вычисления $\sin x$ можно просуммировать несколько первых членов ряда Тейлора. Для оценки ошибки воспользуемся формулой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

$$\sin x = \underbrace{\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}}_{S_n} + \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \sin^{(2n+2)} \xi, \quad \xi \in [0, x]$$

Отбросив остаточный член, мы тем самым допускаем ошибку

$$\left| \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \sin^{(2n+2)} \xi \right| \leq \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} M_{2n+2} \equiv \varepsilon_{\text{метод}}$$

Здесь для максимума модуля $2n+2$ -й производной использовано стандартное в вычислительной математике обозначение M_{2n+2} .

Ошибка $\varepsilon_{\text{метод}}$ обусловлена тем, что метод, который мы применяем для вычисления значения функции является *неточным*. Данная ошибка является *ошибкой метода* (или *погрешностью метода*)


Ошибка $\varepsilon_{\text{метод}}$ обусловлена тем, что метод, который мы применяем для вычисления значения функции является *неточным*. Данная ошибка является *ошибкой метода* (или *погрешностью метода*)

Так как все производные функции $\sin x$ ограничены по модулю единицей, $M_{2n+2} = 1$ и

$$\varepsilon_{\text{метод}} = \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!}$$

При стремлении $n \rightarrow \infty$ ошибка метода начиная с $n = n_0 > x/2$ монотонно стремится к нулю.

Для проверки посчитаем $\sin \frac{\pi}{2}$ суммируя до 50 членов ряда.




После сложения 10 членов ряда фактическая ошибка составила 10^{-16} и перестала уменьшаться. Такое поведение говорит про наличие еще какой-то погрешности, кроме ошибки метода.

Но ведь 10^{-16} это же совсем немного? Или нет?

Погрешности

Проверка №2

Прделаем аналогичные вычисления, но уже для $\sin \frac{17\pi}{2}$ *



Теперь ошибка перестает уменьшаться после 40 слагаемого и составляет уже 10^{-6} . Определенно, данная ошибка может стать серьезной проблемой.

* $x = \frac{17\pi}{2} \approx 26.7$

До сих пор все вычисления мы рассматривали в *идеальной арифметике*, где все математические операции производятся *абсолютно точно*. На практике, приходится иметь дело с машинной арифметикой, которая оперирует с *приближенными* значениями чисел. Чаще всего, числа представлены в вычислительной технике в виде *чисел с плавающей запятой* (floating-point values). Каждое число хранится в виде

$$x = s \cdot 2^e,$$

где $1 \leq s < 2$ - мантисса, число с фиксированным количеством знаков после запятой, e - экспонента или показатель степени, целое число. Поскольку целая часть мантиссы всегда равна 1, число значащих цифр в машинном представлении x всегда совпадает с количеством знаков в мантиссе.

На практике, хранение чисел в форме с плавающей запятой приводит к хранению каждого числа с фиксированной относительной погрешностью. Например, в десятичной системе, если в мантиссе числа 5 значащих цифр (не считая первой единицы), то относительная погрешность хранения данного числа составляет 10^{-5}

$$1.23456 \cdot 10^{78} = (1.23456 \pm 0.000005) \cdot 10^{78}$$

$$\bar{X} = 1.23456 \cdot 10^{78}, \Delta X = 0.00001 \cdot 10^{78},$$

$$\frac{\Delta X}{|\bar{X}|} = \frac{0.00001 \cdot 10^{78}}{1.23456 \cdot 10^{78}} = \frac{0.00001}{1.23456} < 10^{-5}$$

Машинная арифметика в вычислениях

Аналогично, только с использованием двоичной, а не десятичной системы счисления, определяются относительные погрешности хранения стандартных чисел с плавающей запятой

- тип single или float (32 бита) - мантисса имеет 23 значащих бита, относительная погрешность составляет $2^{-23} \approx 1.2 \cdot 10^{-7}$
- тип double (64 бита) - мантисса имеет 53 значащих бита, относительная погрешность составляет $2^{-53} \approx 1.1 \cdot 10^{-16}$

Машинная арифметика в вычислениях

Аналогично, только с использованием двоичной, а не десятичной системы счисления, определяются относительные погрешности хранения стандартных чисел с плавающей запятой

- тип single или float (32 бита) - мантисса имеет 23 значащих бита, относительная погрешность составляет $2^{-23} \approx 1.2 \cdot 10^{-7}$
- тип double (64 бита) - мантисса имеет 53 значащих бита, относительная погрешность составляет $2^{-53} \approx 1.1 \cdot 10^{-16}$

Теперь понятно, что ошибка 10^{-16} , которую мы получили при вычислении $\sin \frac{\pi}{2}$ есть просто погрешность вычислений, обусловленная неточным представлением чисел в вычислительной технике.

Машинная арифметика в вычислениях

Аналогично, только с использованием двоичной, а не десятичной системы счисления, определяются относительные погрешности хранения стандартных чисел с плавающей запятой

- тип single или float (32 бита) - мантисса имеет 23 значащих бита, относительная погрешность составляет $2^{-23} \approx 1.2 \cdot 10^{-7}$
- тип double (64 бита) - мантисса имеет 53 значащих бита, относительная погрешность составляет $2^{-53} \approx 1.1 \cdot 10^{-16}$

Теперь понятно, что ошибка 10^{-16} , которую мы получили при вычислении $\sin \frac{\pi}{2}$ есть просто погрешность вычислений, обусловленная неточным представлением чисел в вычислительной технике.

Но как объяснить ошибку 10^{-6} , которую мы получили, вычисляя $\sin \frac{17\pi}{2}$?

Так как округление до 16 значащих цифр[†] происходит при *каждой* операции, необходимо подсчитать суммарную ошибку округления всех слагаемых. Поскольку заранее неизвестно, в какую сторону происходит округление, необходимо сложить погрешности округления по модулю.

[†] подразумеваем операции с double

Так как округление до 16 значащих цифр[†] происходит при каждой операции, необходимо подсчитать суммарную ошибку округления всех слагаемых. Поскольку заранее неизвестно, в какую сторону происходит округление, необходимо сложить погрешности округления по модулю.

Ошибка округления числа X не превосходит $2^{-K}|X|$, где K - число значащих бит в мантиссе (в нашем случае 53). Оценим ошибку округления S_n .

$$S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\varepsilon_{\text{округ}} = \sum_{k=0}^n \left| 2^{-K} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \right| = 2^{-K} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \approx 2^{-K} \operatorname{sh} x$$

[†] подразумеваем операции с double

Итак, хотя исходный ряд был знакопеременным, и по модулю сумма ряда не превосходила единицы, отдельные слагаемые могли достигать весьма существенных значений по модулю.

$$\max_k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \approx \frac{x^x}{x!} \approx \frac{x^x}{\sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x} = \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}}$$

Итак, хотя исходный ряд был знакопеременным, и по модулю сумма ряда не превосходила единицы, отдельные слагаемые могли достигать весьма существенных значений по модулю.

$$\max_k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \approx \frac{x^x}{x!} \approx \frac{x^x}{\sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x} = \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}}$$

Возвращаясь к случаю $\sin \frac{17\pi}{2}$, $x \approx 26.7$

$$\frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}} = 3 \cdot 10^{10}.$$

Погрешность округления только этого слагаемого

$\varepsilon_{\text{округ}} = 2^{-53} \times 3 \cdot 10^{10} \approx 3.3 \cdot 10^{-6}$, что вполне соответствует фактической ошибке при вычислении $\sin \frac{17\pi}{2}$.

Практически все прикладные задачи, которые приходится решать в рамках вычислительной математики, невозможно решить точно. Этому препятствует два основных источника погрешности — неточные (приближенные) методы и неидеальная (машинная) арифметика. Ошибке метода соответствует погрешность решения задачи в идеальной арифметике (в которой все действия выполняются точно). В ошибку округления входят погрешности всех вычислений при реализации данного метода.

Численное дифференцирование

Производная

Задача

Допустим, задана функция $f(x)$, то есть мы можем вычислить ее значение в любой точке x . Как вычислить ее производную в заданной точке x_0 ?

Задача

Допустим, задана функция $f(x)$, то есть мы можем вычислить ее значение в любой точке x . Как вычислить ее производную в заданной точке x_0 ?

Вспомним определение производной

$$f'(x_0) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \delta) - f(x_0)}{\delta}$$

Вопрос

Какие еще определения производной Вы знаете?

Численное дифференцирование

Численный метод

$$f'(x_0) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \delta) - f(x_0)}{\delta}$$

Поиск предела, так же как и суммирование бесконечной суммы, является нетривиальной операцией.

Численное дифференцирование

Численный метод

$$f'(x_0) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \delta) - f(x_0)}{\delta}$$

Поиск предела, так же как и суммирование бесконечной суммы, является нетривиальной операцией.

Заменим предел значением отношения при некотором маленьком значении $\delta = h > 0$.

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x)}{h}$$

В первую очередь, нас интересует ошибка метода, которая возникает в результате замены предела фиксированной разностью. Здесь нам снова поможет формула Тейлора. Разложим $f(x)$ в окрестности точки $x = x_0$.

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2}f''(\xi), \quad \xi \in [x_0, x]$$

В первую очередь, нас интересует ошибка метода, которая возникает в результате замены предела фиксированной разностью. Здесь нам снова поможет формула Тейлора. Разложим $f(x)$ в окрестности точки $x = x_0$.

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2}f''(\xi), \quad \xi \in [x_0, x]$$

Подставляя $x = x_0 + h$

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(\xi), \quad \xi \in [x_0, x_0 + h]$$

Численное дифференцирование

Ошибка метода

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(\xi), \quad \xi \in [x_0, x_0 + h]$$

Группируем и делим на h

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) = \frac{h}{2}f''(\xi)$$

$$\varepsilon_{\text{метод}} = \left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right| = \left| \frac{h}{2}f''(\xi) \right| \leq \frac{M_2 h}{2}$$

Чем меньше h , тем меньшим оказывается погрешность метода.
Погрешность метода линейно зависит от h .

Численное дифференцирование

Метод неопределенных коэффициентов

Будем искать другие способы вычисления производной. Допустим, мы хотим построить наиболее точный метод для вычисления производной, который бы использовал значения функции в трех точках — в x_0 , $x_0 + h$ и $x_0 - h$. Некоторые соображения о том, в каком виде следует искать требуемый метод дают свойства оператора дифференцирования. Известно, что операция дифференцирования линейна, т.е.

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$$

Вполне логично искать *линейную* формулу дифференцирования, т.е. такую, в которую значения дифференцируемой функции входят *линейно*

Численное дифференцирование

Метод неопределенных коэффициентов

Запишем линейную функцию от $f(x_0)$, $f(x_0 + h)$, $f(x_0 - h)$ в виде линейной комбинации с неопределенными коэффициентами

$$f'(x_0) \approx \alpha f(x_0 - h) + \beta f(x_0) + \gamma f(x_0 + h)$$

За счет надлежащего выбора α, β, γ добьемся максимального совпадения левой и правой части равенства.

Численное дифференцирование

Метод неопределенных коэффициентов

Запишем линейную функцию от $f(x_0)$, $f(x_0 + h)$, $f(x_0 - h)$ в виде линейной комбинации с неопределенными коэффициентами

$$f'(x_0) \approx \alpha f(x_0 - h) + \beta f(x_0) + \gamma f(x_0 + h)$$

За счет надлежащего выбора α, β, γ добьемся максимального совпадения левой и правой части равенства.

Потребуем совпадения максимального количества членов в представлении в виде формулы Тейлора в точке x_0 левой и правой частей.

Замечание

Здесь делается предположение, что у функции $f(x)$ существует достаточное количество производных в точке x_0 . Необходимо иметь в виду, что если функция $f(x)$ не имеет всех необходимых производных, погрешность метода может увеличиваться.

Численное дифференцирование

Метод неопределенных коэффициентов. Формула Тейлора

$$f'(x_0) \approx \alpha f(x_0 - h) + \beta f(x_0) + \gamma f(x_0 + h)$$

Представляя значения в крайних точках с помощью формулы Тейлора

$$f(x_0 \pm h) = f(x_0) \pm hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) \pm \frac{h^3}{6}f'''(\xi_{1,2})$$

$$\xi_1 \in [x_0 - h, x_0], \xi_2 \in [x_0, x_0 + h]$$

$$f'(x_0) \approx (\alpha + \beta + \gamma)f(x_0) + (\gamma - \alpha)hf'(x_0) + (\alpha + \gamma)\frac{h^2}{2}f''(x_0) + R$$

$$R = \frac{h^3}{6}(\gamma f'''(\xi_2) - \alpha f'''(\xi_1))$$

Численное дифференцирование

Метод неопределенных коэффициентов. Формула Тейлора

После исключения значений функции в крайних точках, приближенное равенство приобретает вид

$$f'(x_0) \approx (\alpha + \beta + \gamma)f(x_0) + (\gamma - \alpha)hf'(x_0) + (\alpha + \gamma)\frac{h^2}{2}f''(x_0) + R$$

$$R = \frac{h^3}{6}(\gamma f'''(\xi_2) - \alpha f'''(\xi_1))$$

Потребуем, чтобы $\alpha + \beta + \gamma = 0$, $(\gamma - \alpha)h = 1$, $(\alpha + \gamma)\frac{h^2}{2} = 0$. Искомые значения $\gamma = -\alpha = \frac{1}{2h}$, $\beta = 0$. При этом равенство превратится в

$$f'(x_0) \approx f'(x_0) + R$$

Добавка R как раз будет ошибкой метода.

$$\varepsilon_{\text{метод}} = |R| = \frac{h^3}{6} \frac{1}{2h} |f'''(\xi_2) + f'''(\xi_1)| \leq \frac{h^2}{6} M_3$$

Численное дифференцирование

Формулы дифференцирования 1-го и 2-го порядков

Формула $f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ называется формулой односторонней разности, а $f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$ — формулой центральной разности. Важное различие этих формул заключается в разной зависимости ошибки метода от h . Для односторонней разности эта зависимость линейная $\varepsilon_{\text{метод}} \leq \frac{M_2 h}{2}$, в то время как для центральной — квадратичная $\varepsilon_{\text{метод}} \leq \frac{M_3 h^2}{6}$.

Численное дифференцирование

Формулы дифференцирования 1-го и 2-го порядков

Формула $f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ называется формулой односторонней разности, а $f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$ — формулой центральной разности. Важное различие этих формул заключается в разной зависимости ошибки метода от h . Для односторонней разности эта зависимость линейная


$$\varepsilon_{\text{метод}} \leq \frac{M_2 h}{2}, \text{ в то время как для центральной — квадратичная}$$
$$\varepsilon_{\text{метод}} \leq \frac{M_3 h^2}{6}.$$

Говорят, что формула односторонней разности имеет *первый порядок аппроксимации*, а центральной — *второй порядок аппроксимации*

Численное дифференцирование

Проверка

Проверим, действительно ли зависимость ошибки имеет такой характер для каждой из формул. Рассчитаем $\sin' 1 = \cos 1$



Оказывается, поведение ошибки имеет такой характер только при сравнительно больших h . Для односторонней разности при $h > 10^{-8}$, а для центральной — при $h > 10^{-5}$.

Проще всего объяснить постоянное значение ошибки при использовании $h < 10^{-16}$. При данном значении величины $x_0 + h = 1 + h$ и $x_0 - h = 1 - h$ округляются до 1, при этом в числителе обеих формул стоит тождественный ноль (вычитаются строго совпадающие значения), хотя реальное значение производной ненулевое.

Численное дифференцирование

Погрешности округления

Проще всего объяснить постоянное значение ошибки при использовании $h < 10^{-16}$. При данном значении величины $x_0 + h = 1 + h$ и $x_0 - h = 1 - h$ округляются до 1, при этом в числителе обеих формул стоит тождественный ноль (вычитаются строго совпадающие значения), хотя реальное значение производной ненулевое.

Рассмотрим, какие ошибки округления возникают при вычислении по формуле односторонней разности.

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$\varepsilon_{\text{округ}} = \frac{2^{-K}|f(x_0)| + 2^{-K}|f(x_0 + h)|}{h} \approx 2^{-K} \frac{2|f(x_0)|}{h}$$

Аналогично для центральной разности

$$\varepsilon_{\text{округ}} = \frac{2^{-K}|f(x_0 - h)| + 2^{-K}|f(x_0 + h)|}{2h} \approx 2^{-K} \frac{|f(x_0)|}{h}$$

Численное дифференцирование

Оптимальное значение h

Итак, при слишком маленьких значениях h основной вклад в ошибку дает именно погрешность округления, которая растет с уменьшением h , а при слишком больших становится значительной ошибка метода. Найдем оптимальное значение h , при котором обе ошибки имеют одинаковую величину.

Численное дифференцирование

Оптимальное значение h

Итак, при слишком маленьких значениях h основной вклад в ошибку дает именно погрешность округления, которая растет с уменьшением h , а при слишком больших становится значительной ошибка метода. Найдем оптимальное значение h , при котором обе ошибки имеют одинаковую величину.

Для односторонней разности

$$2^{-K} \frac{2|f(x_0)|}{h} = \varepsilon_{\text{округ}} = \varepsilon_{\text{метод}} = \frac{M_2 h}{2}$$

$$h = \sqrt{2^{-K} \frac{4|f(x_0)|}{M_2}}, \quad \varepsilon_{\text{сумм}} = 2\sqrt{2^{-K} M_2 |f(x_0)|}$$

Для проверки подставим $M_2 = |f(x_0)| = 1$, $K = 53$, тогда

$$h = 2 \cdot 10^{-8}, \quad \varepsilon_{\text{сумм}} = 2 \cdot 10^{-8}$$

Для центральной разности

$$2^{-K} \frac{|f(x_0)|}{h} = \varepsilon_{\text{округ}} = \varepsilon_{\text{метод}} = \frac{M_3 h^2}{6}$$

$$h = \sqrt[3]{2^{-K} \frac{6|f(x_0)|}{M_3}}, \quad \varepsilon_{\text{сумм}} = 2\sqrt[3]{2^{-2K} \frac{M_3 |f(x_0)|^2}{6}}$$

Для проверки подставим $M_2 = |f(x_0)| = 1$, $K = 53$, тогда

$$h = 9 \cdot 10^{-6}, \quad \varepsilon_{\text{сумм}} = 2.5 \cdot 10^{-11}$$

Важно отметить, что при использовании формулы второго порядка удалось получить меньшую суммарную погрешность не выходя за пределы той же машинной точности что и в формуле первого порядка, то есть только за счет выбора более качественного метода.

Важно отметить, что при использовании формулы второго порядка удалось получить меньшую суммарную погрешность не выходя за пределы той же машинной точности что и в формуле первого порядка, то есть только за счет выбора более качественного метода.

Однако, не стоит забывать что функция, которую мы дифференцировали была достаточное число раз (а именно 3 раза) непрерывно дифференцируема. Если формулу второго порядка применять к функции, у которой, например, $M_3 = \infty$, но $M_2 < \infty$, то оценка ошибки метода имела бы такой же вид, как у формулы односторонней разности 1го порядка. В этом случае выигрыш был бы совсем незначительным.

Спасибо за внимание!

tsybulin@crec.mipt.ru