

---

COMPILANDO CONOCIMIENTO

# Álgebra Lineal

MATEMÁTICAS DISCRETAS

Oscar Andrés Rosas Hernandez

Enero 2018

# Índice general

<b>I</b>	<b>Introducción A Matrices</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Conozcamos las Matrices</b>	<b>6</b>
1.1.	Definición . . . . .	7
1.1.1.	Notación de Matrices mediante Función . . . . .	8
1.2.	Simbología y Notación . . . . .	8
1.3.	Delta de Kronecker . . . . .	8
1.4.	Clasificación y Matrices Famosas . . . . .	9
1.4.1.	Matrices Cuadradas . . . . .	9
1.4.2.	Matriz Identidad: $I_n$ . . . . .	10
1.4.3.	Matriz Cero: $0_{m \times n}$ . . . . .	10
1.5.	Matrices Diagonales . . . . .	11
1.5.1.	Definición . . . . .	11
1.5.2.	Propiedades . . . . .	12
1.5.3.	Matrices Triangulares Superiores . . . . .	13
<b>2.</b>	<b>Álgebra Matricial</b>	<b>15</b>
2.1.	Suma de Matrices . . . . .	16
2.1.1.	Propiedades de Suma . . . . .	16
2.2.	Producto de Escalar por Matriz . . . . .	17
2.2.1.	Propiedades del Producto Escalar . . . . .	17
2.3.	Producto de Matrices . . . . .	18
2.3.1.	Propiedades . . . . .	18
2.3.2.	Matriz $\times$ Vector: $A\vec{v}$ . . . . .	20

2.4.	Traza de una Matriz . . . . .	21
2.4.1.	Propiedades . . . . .	21
2.5.	Transpuesta de una Matriz . . . . .	22
2.5.1.	Definición . . . . .	22
2.5.2.	Propiedades . . . . .	22
2.5.3.	Matrices Simétricas . . . . .	24
2.5.4.	Matrices Antisimétricas . . . . .	24
2.5.5.	Propiedades de Simetría y AntiSimetría . . . . .	25
<b>II</b>	<b>Ecuaciones Lineales, Gauss-Jordan y sus Amigos</b>	<b>27</b>
<b>3.</b>	<b>Sistemas de Ecuaciones Lineales</b>	<b>28</b>
3.1.	Generalidades . . . . .	29
3.1.1.	Definición: Ecuaciones Lineales . . . . .	29
3.1.2.	Matriz Ampliada . . . . .	30
3.1.3.	Sistema Ecuaciones como Multiplicación de Matrices . . . . .	31
3.2.	Sistemas Inconsistentes . . . . .	32
3.3.	Sistemas Consistentes . . . . .	33
3.3.1.	Variables Principales y Libres . . . . .	34
3.3.2.	Sistemas Consistentes Independientes . . . . .	35
3.3.3.	Sistemas Consistentes Dependientes . . . . .	35
<b>4.</b>	<b>Gauss-Jordan y sus Amigos</b>	<b>36</b>
4.1.	Operaciones Elementales . . . . .	37
4.1.1.	Swap: Intercambiar Filas ó Columnas . . . . .	37
4.1.2.	Pivot: Filas ó Columnas más múltiplo de otras . . . . .	38
4.1.3.	Scale: Escalar Filas ó Columnas . . . . .	39
4.2.	Eliminación Gaussiana . . . . .	40
4.2.1.	Matriz Escalonada por Filas . . . . .	40
4.2.2.	Algoritmo . . . . .	41
4.3.	Gauss-Jordan . . . . .	42

4.3.1. Matriz Escalonada Reducida por Filas . . . . .	42
4.3.2. Ejemplos . . . . .	43
4.4. Inversa de una Matriz . . . . .	44
4.4.1. Propiedades . . . . .	45
<b>III Espacios Vectoriales</b>	<b>47</b>
<b>5. Definición y Características</b>	<b>48</b>
5.1. Definición . . . . .	49
5.1.1. Condiciones de Espacio Vectorial . . . . .	49
5.2. Consecuencias y Propiedades . . . . .	50
5.3. Ejercicios . . . . .	52
<b>6. Subespacios Vectoriales</b>	<b>53</b>
6.1. Definición . . . . .	54
6.2. Demostrar que $\mathbb{W}$ es un Subespacio de $\mathbb{V}$ . . . . .	55
6.3. Propiedades de los Subespacios . . . . .	56
6.4. Suma de Subespacios Vectoriales . . . . .	57
6.4.1. Propiedades . . . . .	57
6.4.2. Suma Directa de Subespacios Vectoriales . . . . .	58
6.5. Ejercicios . . . . .	59
<b>7. Combinaciones Lineales</b>	<b>62</b>
7.1. Definición . . . . .	63
7.1.1. Definición . . . . .	63
7.1.2. Vectores Linealmente Dependiente . . . . .	63
7.1.3. Vectores Linealmente Independiente . . . . .	63
7.2. Generadores . . . . .	64
7.2.1. Definición . . . . .	64
7.2.2. Propiedades . . . . .	64
7.3. Propiedades de Dependencia Lineal . . . . .	65

---

7.4. Bases . . . . .	67
7.4.1. Definición . . . . .	67
7.4.2. Base Canónica . . . . .	67
7.4.3. Propiedades . . . . .	68
<b>8. Transformaciones Lineales</b>	<b>73</b>
8.1. Definiciones y Características . . . . .	74
8.1.1. Propiedades . . . . .	74
8.1.2. Ejemplos . . . . .	75
8.2. Proyecciones . . . . .	77
8.3. Kernel y Rango . . . . .	78
8.3.1. Definición del Kernel . . . . .	79
8.3.2. Definición del Rango . . . . .	79
8.3.3. Propiedades . . . . .	80

# Parte I

## Introducción A Matrices

# Capítulo 1

## Conozcamos las Matrices

## 1.1. Definición

Siendo formales una Matriz es un arreglo rectangular de  $m \times n$  elementos (donde  $m, n \in \mathbb{N}$ ), es decir es un objeto matemático de  $m$  filas y de  $n$  columnas. **Repito es un objeto de  $m$  filas y de  $n$  columnas.** Las entradas de matrices pueden ser números u objetos más complicados.

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}$$

Sea  $\mathbb{F}$  un conjunto (ya se que en mate, tecnicamente todo el un conjunto), entonces decimos que  $M_{m \times n}(\mathbb{F})$  denota al conjunto de todas las matrices de tamaños  $m \times n$  cuyas entradas pertenecen a  $\mathbb{F}$ .

### Definición más Formal

Una matriz de tamaño  $m \times n$  con elementos en el conjunto  $\mathbb{F}$  se puede definir también como una función que toma un par ordenado (las coordenadas) y regresa un elemento de  $\mathbb{F}$ :

$$\{ 1, \dots, m \} \times \{ 1, \dots, n \} \longrightarrow \mathbb{F}$$



### 1.1.1. Notación de Matrices mediante Función

La notación más rara y al mismo tiempo más increíble es:

$$A = \left[ f(i, j) \right]_{i,j=1}^{m,n} = \begin{bmatrix} f(1, 1) & \cdots & f(1, n) \\ \cdots & & \cdots \\ f(m, 1) & \cdots & f(m, n) \end{bmatrix}$$

Esta notación nos dice que  $A$  es una matriz de tamaño  $m \times n$  tal que su entrada ubicada en la fila número  $i$  y en la columna  $j$  es igual a la función:

$$f : \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{F}$$

Aquí  $f(i, j)$  es una función de dos argumentos.

## 1.2. Simbología y Notación

Solemos denotar con letras mayúsculas a las matrices y con letras minúsculas a cada uno de los elementos.

Para hablar de un elemento en específico usamos  $a_{i,j}$  donde  $i$  es el número de fila y  $j$  es el número de columnas, o bien podemos escribir  $[A]_{i,j}$

**Recuerda que soy computólogo, así que mis índices pueden empezar en 0**

### Ejemplo

Por ejemplo, una matriz sería:

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$$

y  $a_{1,3}$  ó  $[A]_{1,3}$  es el elemento  $c$ .

## 1.3. Delta de Kronecker

Esta es una función demasiado sencilla  $\delta(i, j) : \mathbb{N}^2 \rightarrow \{0, 1\}$  pero muy importante a lo largo de Álgebra Lineal, podemos definirla como:

$$\delta(i, j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

## 1.4. Clasificación y Matrices Famosas

### 1.4.1. Matrices Cuadradas

Son aquellas matrices de  $m \times n$  donde  $m = n$ . Solemos decir que el orden de estas matrices es  $n$ .

Por ejemplo:

$$A_{n \times n} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Solemos decir que cualquier matriz que no sea cuadrada es rectangular, es decir son aquellas matrices de  $m \times n$  si es que  $m \neq n$ .

Es importante hablar de las matrices cuadradas porque hay muchas características que solo funcionan si tu matriz es cuadrada.

**1.4.2. Matriz Identidad:  $I_n$** 

Son todas las matrices cuadradas donde cada elemento cumple que:

$$[I]_{i,j} = \delta(i, j)$$

O más formalmente podemos definir a la Matriz identidad de orden  $n$  como:

$$\left[ \delta(i, j) \right]_{i,j=1}^{n,n}$$

Se ve algo así:

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

**1.4.3. Matriz Cero:  $0_{m \times n}$** 

Son todas aquellas matrices  $m \times n$  que cumplen que para cada elemento:

$$[0]_{i,j} = 0$$

O más formalmente podemos definir a la Matriz de Ceros de orden  $n$  como:

$$\left[ 0 \right]_{i,j=1}^{n,n}$$

Se ven algo así:

$$0_{m \times n} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

## 1.5. Matrices Diagonales

### 1.5.1. Definición

Son todas las matrices cuadradas donde cada elemento cumple que:

$$[A]_{i,j} = [A]_{i,j} \cdot \delta(i, j)$$

O más formalmente como cualquier matriz que cumple con que:

$$\left[ f(i, j) \right]_{i,j=1}^{m,n} = \left[ f(i, j) \cdot \delta(i, j) \right]_{i,j=1}^{m,n}$$

**Es decir es una matriz en la que a cualquier elemento lo puedes multiplicar por la Delta de Kronecker correspondiente y no se vera afectado.**

Una matriz diagonal tiene el siguiente aspecto:

$$A_n = \begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

Notemos que las entradas diagonales de una matriz diagonal pueden ser iguales o cero. Por ejemplo, la matriz cuadrada nula  $0_{n,n}$  es una matriz diagonal. Es un error común pensar que las entradas diagonales de una matriz diagonal deben ser distintas de cero.

### 1.5.2. Propiedades

Sea  $\text{diag}(a_1, \dots, a_n)$  una forma en la que representamos a una matriz diagonal, despues de todo,  $\text{diag}$  tendrá  $n$  entradas, por lo tanto representará a una matriz de  $n \times n$  donde  $a_1, \dots, a_n$  son las entradas de la diagonal, mientras que todas las demas entradas son cero.

- $\text{diag}(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$
- $\text{diag}(a_1, \dots, a_n)(b_1, \dots, b_n) = (a_1 b_1, \dots, a_n b_n)$
- La matriz  $\text{diag}(a_1, \dots, a_n)$  es invertible si y solo si todas las entradas, es decir  $a_1, \dots, a_n$  son diferentes de cero.

### 1.5.3. Matrices Triangulares Superiores

Son aquellas matrices de  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$  donde se cumple que:

$$\left[ f(i, j) \right]_{i,j=1}^{n,n} = \left[ \begin{cases} f(i, j) & \text{si } i \leq j \\ 0 & \text{si } i > j \end{cases} \right]_{i,j=1}^{m,n}$$

Es decir  $\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad i > j \implies [A]_{i,j}$

Notemos que en una matriz triangular superior algunos (hasta todos) de los elementos por encima de la diagonal principal o en la diagonal principal pueden ser iguales a cero.

Por ejemplo, la matriz nula  $0_{n,n}$  es triangular superior. La condición que define matrices triangulares superiores solo nos dice que todos los elementos por debajo de la diagonal principal deben ser iguales a cero.

Una matriz triangular superior tiene el siguiente aspecto:

$$A_n = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

## Propiedades

- Sea  $A, B$  matrices triangulares superiores, entonces  $AB$  es también una matriz triangular superior, donde se tiene que:

$$[AB]_{i,i} = [A]_{i,i}[B]_{i,i}$$

### Demostración:

Empecemos por ver que es una matriz diagonal, sea  $i > j$  entonces vamos a demostrar que esa entrada es cero.

$$\begin{aligned}
 [AB]_{i,j} &= \sum_{k=1}^n [A]_{i,k}[B]_{k,j} && \text{Definición} \\
 &= \sum_{k=1}^j [A]_{i,k}[B]_{k,j} + \sum_{k=j+1}^{i-1} [A]_{i,k}[B]_{k,j} + \sum_{k=i}^n [A]_{i,k}[B]_{k,j} && \text{Separamos en 3 sumas} \\
 &= \sum_{k=1}^j (0)[B]_{k,j} + \sum_{k=j+1}^{i-1} (0)[B]_{k,j} + \sum_{k=i}^n [A]_{i,k}[B]_{k,j} && \text{Siempre } i > k, \text{ por eso } [A]_{i,k}=0 \\
 &= \sum_{k=1}^j (0)[B]_{k,j} + \sum_{k=j+1}^{i-1} (0)(0) + \sum_{k=i}^n [A]_{i,k}(0) && \text{Siempre } k > j, \text{ por eso } [B]_{k,j}=0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Ahora veamos que  $[AB]_{i,i} = [A]_{i,i}[B]_{i,i}$ :

$$\begin{aligned}
 [AB]_{i,i} &= \sum_{k=1}^n [A]_{i,k}[B]_{k,i} && \text{Definición} \\
 &= \sum_{k=1}^{i-1} [A]_{i,k}[B]_{k,i} + [A]_{i,i}[B]_{i,i} + \sum_{k=i+1}^n [A]_{i,k}[B]_{k,i} && \text{Separamos en 3 sumas} \\
 &= \sum_{k=1}^{i-1} (0)[B]_{k,i} + [A]_{i,i}[B]_{i,i} + \sum_{k=i+1}^n [A]_{i,k}[B]_{k,i} && \text{Ve que } i > k \\
 &= \sum_{k=1}^{i-1} (0)[B]_{k,i} + [A]_{i,i}[B]_{i,i} + \sum_{k=i+1}^n [A]_{i,k}(0) && \text{Ve que } k > i \\
 &= [A]_{i,i}[B]_{i,i} && \text{Mira que bonita fórmula}
 \end{aligned}$$

- Si  $A$  es una matriz triangular es invertible entonces  $A^{-1}$  también será invertible.

## Capítulo 2

# Álgebra Matricial



## 2.1. Suma de Matrices

Definimos la suma de dos Matrices  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  como una relación:

$$+ : (M_{m \times n} \times M_{m \times n}) \longrightarrow M_{m \times n}$$

Entonces definimos la suma de dos matrices  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  como:

$$A + B := \left[ A_{i,j} + B_{i,j} \right]_{i,j=1}^{m,n}$$

O visto de otra manera  $A + B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y cumple que:

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}, \quad [A + B]_{i,j} = [A]_{i,j} + [B]_{i,j}$$

### 2.1.1. Propiedades de Suma

Sea  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$  y con la suma y producto por escalar previamente definido tenemos que:

- **Cerradura Aditiva:**

Si  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  entonces  $(A + B) \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$

- **Ley Conmutativa:**

Si  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  entonces  $A + B = B + A$

- **Ley Asociativa para la Suma:**

Si  $A, B, C \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  entonces  $A + (B + C) = (A + B) + C$

- **Existencia del Neutro Aditivo:**

Existe una matriz  $0_{m \times n} \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  tal que  $\forall A \in M_{m \times n}(\mathbb{F}), A + 0_{m \times n} = A$

- **Existencia del Inverso Aditivo:**

Existe una matriz  $-A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  para toda  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  tal que  $A + (-A) = 0_{m \times n}$

## 2.2. Producto de Escalar por Matriz

Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $\alpha \in \mathbb{F}$  entonces definimos a  $\alpha A$  como:

$$A\alpha = \alpha A = \left[ \alpha[A]_{i,j} \right]_{i,j=1}^{m,n}$$

O visto de otra manera  $\alpha A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y cumple que:

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}, \quad [\alpha A]_{i,j} = \alpha[A]_{i,j} \quad (2.1)$$

### 2.2.1. Propiedades del Producto Escalar

Sea  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$  y con la suma y producto por escalar previamente definido tenemos que:

- **Cerradura Escalar:**

Si  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $\alpha \in \mathbb{F}$  entonces  $(\alpha A) \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$

- **Ley Asociativa para la Multiplicación Escalar:**

Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$  entonces  $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$

- **Ley Distributiva en la Suma y Producto Escalar:**

Sea  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $\alpha \in \mathbb{F}$  entonces  $\alpha(A + B) = (\alpha A) + (\alpha B)$

- **Ley Distributiva en los Escalares:**

Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$  entonces  $(\alpha + \beta)A = (\alpha A) + (\beta A)$

- **Existencia del Neutro Multiplicativo Escalar:**

Existe un elemento  $1 \in \mathbb{F}$  tal que para toda  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  tenemos que  $1A = A$

## 2.3. Producto de Matrices

Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $B \in M_{n \times p}(\mathbb{F})$  entonces definimos a  $AB \in M_{m \times p}(\mathbb{F})$  como:

$$AB = \left[ \sum_{k=1}^n [A]_{i,k} [B]_{k,j} \right]_{i,j=1}^{m,p}$$

O visto de otra manera  $AB \in M_{m \times p}(\mathbb{F})$  y cumple que:

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}, \quad [AB]_{i,j} = \sum_{k=1}^n [A]_{i,k} [B]_{k,j}$$

### 2.3.1. Propiedades

- Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $B, C \in M_{n \times p}(\mathbb{F})$  entonces tenemos que:  $A(B+C) = AB+AC$

**Demostración:**

Empecemos por ver que tienen el mismo tamaño: La matriz  $(B+C) \in M_{n \times p}(\mathbb{F})$ , por lo que  $A(B+C) \in M_{m \times p}(\mathbb{F})$ . También tenemos que  $AB, AC \in M_{m \times p}(\mathbb{F})$  Por lo tanto tienen el mismo tamaño.

Ahora veamos que un cualquier elemento arbitrario de ambas matrices es igual:

$$\begin{aligned} [A(B+C)]_{i,j} &= \sum_{k=1}^n [A]_{i,k} ([B]_{k,j} + [C]_{k,j}) \\ &= \sum_{k=1}^n ([A]_{i,k} [B]_{k,j}) + ([A]_{i,k} [C]_{k,j}) \\ &= \sum_{k=1}^n ([A]_{i,k} [B]_{k,j}) + \sum_{k=1}^n ([A]_{i,k} [C]_{k,j}) \\ &= [AB]_{i,j} + [AC]_{i,j} \\ &= [AB+AC]_{i,j} \end{aligned}$$

- Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $B \in M_{n \times p}(\mathbb{F})$  entonces tenemos que:  $\alpha(AB) = A(\alpha B)$

**Demostración:**

Creo que es más que obvio que tienen el mismo tamaño, así que deja al lector :p. Ahora veamos que un cualquier elemento arbitrario de ambas matrices es igual:

$$[\alpha(AB)]_{i,j} = \alpha \sum_{k=1}^n [A]_{i,k} [B]_{k,j} = \sum_{k=1}^n [A]_{i,k} (\alpha [B]_{k,j}) = [A(\alpha B)]_{i,j}$$

- Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ,  $B \in M_{n \times p}(\mathbb{F})$  y  $C \in M_{p \times q}(\mathbb{F})$  entonces tenemos que:  
 $A(BC) = (AB)C$

**Demostración:**

Empecemos por ver que tienen el mismo tamaño: La matriz  $(BC) \in M_{n \times q}(\mathbb{F})$ , por lo que  $A(BC) \in M_{m \times q}(\mathbb{F})$ . También tenemos que  $(AB) \in M_{m \times p}(\mathbb{F})$ , por lo que tenemos que  $(AB)C \in M_{m \times q}(\mathbb{F})$ . Por lo tanto tienen el mismo tamaño.

Ahora veamos que un cualquier elemento arbitrario de ambas matrices es igual:

$$\begin{aligned}
 [A(BC)]_{i,j} &= \sum_{k=1}^n [A]_{i,k} [BC]_{k,j} \\
 &= \sum_{k=1}^n [A]_{i,k} \left( \sum_{k'=1}^p [B]_{k,k'} [C]_{k',j} \right) \\
 &= \sum_{k'=1}^p [A]_{i,k'} \left( \sum_{k=1}^n [B]_{k',k} [C]_{k,j} \right) \\
 &= \sum_{k'=1}^p \left( \sum_{k=1}^n [A]_{i,k'} [B]_{k',k} [C]_{k,j} \right) \\
 &= \sum_{k=1}^p \left( \sum_{k'=1}^n [A]_{i,k'} [B]_{k',k} \right) [C]_{k,j} \\
 &= \sum_{k=1}^p [AB]_{i,k} [C]_{k,j} \\
 &= [(AB)C]_{i,j}
 \end{aligned}$$

**2.3.2. Matriz  $\times$  Vector:  $A\vec{v}$** 

Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  entonces digamos que  $A_1, A_2, \dots, A_n$  como los vectores columna y sea  $\vec{v}$  un vector donde  $\vec{v} \in M_{n \times 1}$  entonces tenemos que:

$$A\vec{v} = [\vec{v}]_1 A_1 + [\vec{v}]_2 A_2 + \dots + [\vec{v}]_n A_n$$

$$A\vec{v} = \left[ \sum_{k=1}^n [A]_{i,k} [\vec{v}]_k \right]_{i,j=1}^{n,1}$$

Por lo tanto  $A\vec{v} \in M_{n \times 1}(\mathbb{F})$

## 2.4. Traza de una Matriz

Sea  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ , es decir una matriz cuadrada entonces definimos a *traza*( $A$ ) como:

$$\text{traza}(A) = \text{tr}(A) := \sum_{k=1}^n [A]_{k,k}$$

### 2.4.1. Propiedades

- Si  $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$  entonces  $\text{traza}(AB) = \text{traza}(BA)$

**Demostración:**

Veamos como sale esto:

$$\begin{aligned} \text{traza}(AB) &= \sum_{k=1}^n [AB]_{k,k} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{k'=1}^n [A]_{k,k'} [B]_{k',k} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{k'=1}^n [B]_{k',k} [A]_{k,k'} \\ &= \sum_{k'=1}^n \sum_{k=1}^n [B]_{k',k} [A]_{k,k'} \\ &= \sum_{k'=1}^n [BA]_{k',k'} \\ &= \text{traza}(BA) \end{aligned}$$

## 2.5. Transpuesta de una Matriz

### 2.5.1. Definición

Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  entonces definimos a *transpuesta*( $A$ ) como:

$$A^T = \left[ [A]_{j,i} \right]_{i,j=1}^{n,m} \quad (2.2)$$

Es decir  $A^T \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$

O visto de otra manera  $A^T \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$  y cumple que:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\}, \quad [A^T]_{i,j} = [A]_{j,i} \quad (2.3)$$

### 2.5.2. Propiedades

- Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  entonces  $(A^T)^T = A$

**Demostración:**

Empecemos por ver que tienen el mismo tamaño: La matriz  $(A^T) \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ , por lo que  $(A^T)^T \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ . Por lo tanto tienen el mismo tamaño.

Ahora veamos que un cualquier elemento arbitrario de ambas matrices es igual:

$$[(A^T)^T]_{i,j} = [A^T]_{j,i} = [A]_{i,j}$$

- Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $B \in M_{n \times p}(\mathbb{F})$  entonces tenemos que:  $(AB)^T = B^T A^T$

**Demostración:**

Veamos que ambas matrices tienen el mismo tamaño: La matriz  $AB \in M_{m \times p}(\mathbb{F})$ , por lo tanto la matriz  $(AB)^T \in M_{p \times m}(\mathbb{F})$ , mientras que la matriz  $B^T \in M_{p \times n}(\mathbb{F})$  y  $A^T \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$  por lo tanto  $B^T A^T \in M_{p \times m}(\mathbb{F})$ , así que si te das cuenta: ¡Tienen el mismo tamaño!

Ahora veamos que un cualquier elemento arbitrario de ambas matrices es igual:

$$[(AB)^T]_{i,j} = [AB]_{j,i} = \sum_{k=1}^n [A]_{j,k} [B]_{k,i} = \sum_{k=1}^n [B]_{k,i} [A]_{j,k} = \sum_{k=1}^n [B^T]_{i,k} [A^T]_{k,j} = [B^T A^T]_{i,j}$$

- Sea  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  entonces  $(A + B)^T = A^T + B^T$

**Demostración:**

*Empecemos por ver que tienen el mismo tamaño:*

La matriz  $(A + B)$  (por como la definimos a la suma) siguen estando en  $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ , por lo tanto tenemos que la transpuesta de la matriz anteriormente dicha, es decir  $(A + B)^T$  esta en  $M_{n \times m}(\mathbb{F})$ .

Ahora por otro lado tenemos que  $A^T, B^T \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$  por la definición de transpuesta, ahora como definimos la suma tenemos que  $(A^T + B^T) \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ . Por lo tanto tienen el mismo tamaño.

*Ahora veamos que un cualquier elemento arbitrario de ambas matrices es igual:*

$$[(A + B)^T]_{i,j} = [A + B]_{j,i} = [A]_{j,i} + [B]_{j,i} = [A^T]_{i,j} + [B^T]_{i,j} = [A^T + B^T]_{i,j}$$

- Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $\alpha \in \mathbb{F}$  entonces:  $(\alpha A)^T = \alpha A^T$

**Demostración:**

Es (creo) más que obvio que tendrán el mismo tamaño, por como definimos el producto por un escalar.

Ahora veamos que un cualquier elemento arbitrario de ambas matrices es igual:

$$[(\alpha A)^T]_{i,j} = [\alpha A]_{j,i} = \alpha [A]_{j,i} = \alpha [A^T]_{i,j}$$

- Por los dos teoremas anteriores podemos decir que la transpuesta se parece mucho a un operador lineal, me refiero a que:

Sea  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y  $\alpha \in \mathbb{F}$  entonces  $(\alpha A + \beta B)^T = \alpha(A^T) + \beta(B^T)$

**Demostración:**

Es sencillo, mira:

$$\begin{aligned} (\alpha A + \beta B)^T &= (\alpha A)^T + (\beta B)^T && \text{Por teorema anterior} \\ &= \alpha(A^T) + \beta(B^T) && \text{Por teorema anterior} \end{aligned}$$



### 2.5.3. Matrices Simétricas

Una matriz  $A \in M_n(\mathbb{F})$  se dice simétrica si cumple la propiedad:

$$A = A^T$$

### 2.5.4. Matrices Antisimétricas

Una matriz  $A \in M_n(\mathbb{F})$  se dice antisimétrica si cumple la propiedad:

$$A = -A^T$$

O siendo más formal que:

$$A + A^T = 0_n$$

### 2.5.5. Propiedades de Simetría y AntiSimetría

- Si  $A \in M_n(\mathbb{F})$  y  $A = A^T$  entonces  $A$  tiene máximo  $\frac{n(n+1)}{2}$  elementos diferentes.

**Ideas de la Demostración:**

Esto es mas curioso que útil, veamos que si es simétrica entonces toda entrada tiene que cumplir que  $[A]_{i,j} = [A]_{j,i}$

Por lo tanto para las matrices de grado 1 hay 1 elemento diferente, para las de orden 2 hay 3 elementos diferentes, para las de orden 4 hay 6 elementos, y el patrón sigue, por lo tanto si te das cuenta para una matriz de orden  $n$  tenemos que:

Número de Elementos Diferentes( $n$ ) es  $1 + 2 + \dots + n = \sum_{i=1}^n i$  que según el gran Gauss tiene que ser igual a  $\frac{n(n+1)}{2}$

- Si  $A \in M_n(\mathbb{F})$  entonces  $A + A^T$  es una matriz simétrica.

**Demostración:**

$$\begin{aligned} [A + A^T]_{i,j} &= [A]_{i,j} + [A^T]_{i,j} \\ &= [A]_{i,j} + [A]_{j,i} \\ &= [A^T]_{j,i} + [A]_{j,i} \\ &= [A]_{j,i} + [A^T]_{j,i} \\ &= [A + A^T]_{j,i} \end{aligned}$$

- Si  $A \in M_n(\mathbb{F})$  entonces  $A - A^T$  es una matriz antesimétrica.

**Demostración:**

$$\begin{aligned} [A - A^T]_{i,j} &= [A]_{i,j} - [A^T]_{i,j} \\ &= [A]_{i,j} - [A]_{j,i} \\ &= [A^T]_{j,i} - [A]_{j,i} \\ &= [-A + A^T]_{j,i} \\ &= -[A - A^T]_{j,i} \end{aligned}$$

- Si  $A \in M_n(\mathbb{F})$  entonces existe un único par de matrices  $B, C$  tal que  $A = B + C$ ,  $B$  es simétrica y  $C$  es antisimétrica. En otras palabras, cada matriz cuadrada se puede representar de manera única como suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica.

**Idea de la Demostración:**

Si  $\mathbb{F} \neq \mathbb{F}_2$  entonces podremos escribir  $A$  como  $A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$ .

Ahora algo genial que  $\frac{1}{2}(A + A^T) = \frac{1}{2}(A + A^T)^T$  es decir, es simétrica. También  $\frac{1}{2}(A - A^T) = -\frac{1}{2}(A - A^T)^T$  es decir, es antisimétrica.

Demostrar que no existe otra combinación de  $B, C$  es un poco más complejo así que confiaré en Oscar del futuro para eso.

- Si  $A \in M_n(\mathbb{F})$  y  $k \in \mathbb{F}$  es simétrica entonces  $KA$  también es simétrica.

**Demostración:**

Esta es sencilla, mira:

$$\begin{aligned}
 [KA]_{i,j} &= K[A]_{i,j} && \text{por la definición de producto escalar} \\
 &= K[A]_{j,i} && \text{Porque } A \text{ es simétrica} \\
 &= [KA]_{j,i} && \text{Porque definición de producto escalar}
 \end{aligned}$$

- Si  $A \in M_n(\mathbb{F})$  y  $k \in \mathbb{F}$  es antisimétrica entonces  $KA$  también es antisimétrica.

**Demostración:**

Esta es sencilla, mira:

$$\begin{aligned}
 [KA]_{i,j} &= K[A]_{i,j} && \text{por la definición de producto escalar} \\
 &= (K)(-[A]_{j,i}) && \text{Porque } A \text{ es antisimétrica} \\
 &= -[KA]_{j,i} && \text{Porque definición de producto escalar}
 \end{aligned}$$

- Si  $A \in M_n(\mathbb{F})$  y  $A$  es antisimétrica entonces  $[A]_{i,i} = 0_{\mathbb{F}}$ .

**Demostración:**

Antes que nada, ignora al campo de 2 elementos, en ese caso no funciona.

Si tenemos que  $A + A^T = 0_n$  entonces tenemos que para cada elemento arbitrario que  $[A]_{i,j} + [A^T]_{i,j} = 0_{\mathbb{F}}$  por lo tanto  $[A]_{i,i} + [A]_{i,i} = 0_{\mathbb{F}}$  por lo tanto  $[A]_{i,i} = 0_{\mathbb{F}}$ .

- $A \in M_n(\mathbb{F})$  y  $A$  es simétrica y antisimétrica al mismo tiempo si y solo si  $A = 0_n$

**Demostración:**

Creo que es más que obvio que tienen el mismo tamaño

Por otro lado sabemos que cualquier elemento de  $A$  tiene que cumplir que  $[A]_{i,j} = -[A]_{j,i} = [A]_{j,i}$  es decir  $-[A]_{j,i} = [A]_{j,i}$  es decir  $0 = 2[A]_{i,j}$  por lo tanto  $[A]_{i,j} = 0$

Y creo que es más que obvio que si  $A = 0_n$  entonces  $A$  es simétrica y antisimétrica.

## Parte II

# Ecuaciones Lineales, Gauss-Jordan y sus Amigos

## Capítulo 3

### Sistemas de Ecuaciones Lineales

### 3.1. Generalidades

Podemos usar las matrices y álgebra lineal para encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales dentro de cualquier campo (eso quiere decir que podemos ocuparla incluso para resolver sistemas en el campo de los complejos o el campo enteros módulo  $n$ ).

#### 3.1.1. Definición: Ecuaciones Lineales

Este es muy obvio pero mejor lo digo, TODAS las ecuaciones debe ser lineales, es decir estar escritas de la forma:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = b$$

Por lo tanto podemos definir un sistema de  $m \times n$  (es decir  $m$  ecuaciones con  $n$  incognitas, repito  $m$  ecuaciones, donde cada una de las ecuaciones tendrá  $n$  variables.) ecuaciones lineales como:

$$m \text{ ecuaciones} \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 + \cdots + a_{1,n}x_n & = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + a_{2,3}x_3 + \cdots + a_{2,n}x_n & = b_2 \\ \cdots & \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + a_{m,3}x_3 + \cdots + a_{m,n}x_n & = b_m \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + a_{2,3}x_3 + \cdots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\ &\cdots \\ \underbrace{a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + a_{m,3}x_3 + \cdots + a_{m,n}x_n}_{n \text{ incognitas}} &= b_m \end{aligned}$$

Donde tenemos que:

- $a_{i,j}$  es una constante, específicamente es la constante relacionada con la  $j$  variable y la  $i$  ecuación.
- $x_i$  es la  $i$ -ésima variable

### 3.1.2. Matriz Ampliada

La forma en la que Álgebra Lineal nos ayuda a resolver nuestro sistema de ecuaciones es mediante una matriz ampliada, que no es más que convertir nuestro sistema de ecuaciones de esta manera:

Desde algo así:

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + a_{2,3}x_3 + \cdots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + a_{m,3}x_3 + \cdots + a_{m,n}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Hasta algo así:

$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & a_{m,3} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{array} \right]$$

#### Ejemplo

Supongamos que tenengamos este sistema:

$$\begin{aligned} (2)x_1 + (3)x_2 + (-1)x_3 &= 0 \\ (-1)x_1 + (2)x_2 + (-3)x_3 &= -3 \\ (3)x_1 + (5)x_2 + (7)x_3 &= 5 \end{aligned}$$

Entonces la Matriz Ampliada es:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & -3 \\ 3 & 5 & 7 & 5 \end{array} \right]$$

### 3.1.3. Sistema Ecuaciones como Multiplicación de Matrices

Puedes escribir tu sistema de ecuaciones lineales como dos matrices:

- $A \in M_{m \times n}$  Es la Matriz de los coeficientes de las incognitas.
- $b \in M_{m \times 1}$  Es la Matriz Columna (o vector  $\vec{b}$ ) con las variables independientes de cada ecuación.

Entonces podemos decir que  $A\vec{x} = \vec{b}$  donde  $\vec{x} \in M_{m \times 1}$  es un vector columna que contiene todas las soluciones que buscamos a nuestro sistema de ecuaciones.




## 3.2. Sistemas Inconsistentes

Estos son los feos. Ocurren cuando llegamos una contradicción, como este estilo:

$$\begin{aligned}a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + a_{2,3}x_3 + \cdots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + \cdots + 0x_n &= b_p \\&\vdots \\a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + a_{m,3}x_3 + \cdots + a_{m,n}x_n &= b_m\end{aligned}$$

Esto nos indica que no tienen solución.

**Sistemas NO  
Consistentes**




### 3.3. Sistemas Consistentes

Podemos tener primeramente sistemas consistentes, es decir que tienen **mínimo** una solución.

Es decir que las  $n$  rectas (o lo que sea que sea el análogo en  $n$ -dimensiones) se interesectan MÍNIMO en un punto.

Además algo muy interesante es que todo sistema homogéneo, osea que sus coeficientes independientes valgan cero es consistente. Donde la solución mas obvia es que todas las variables  $x_i$  valgan CERO.

## Sistemas Consistentes



### 3.3.1. Variables Principales y Libres

Si una matriz aumentada de un sistema de ecuaciones se lleva a su forma escalonada reducida por filas entonces decimos que:

- **Variables Principales:** Son aquellas variables que estan relacionadas con un pivote
- **Variables Libres:** Son aquellas variables que estan relacionadas con filas llenas de ceros.

**Ejemplo:** Considera esta matriz escalonada reducida por filas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces podemos ver que llegamos a estas ecuaciones:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 + \frac{1}{4}x_4 - \frac{3}{4}x_5 &= -\frac{3}{4} \\ x_3 + \frac{3}{4}x_4 - \frac{1}{4}x_5 &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Por lo tanto vamos a llegar a que:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 &= -\frac{1}{4}r + \frac{3}{4}s - \frac{3}{4} \\ x_3 &= -\frac{3}{4}r + \frac{1}{4}s + \frac{1}{4} \\ x_4 &= r \\ x_5 &= s \end{aligned}$$

Es decir llegamos a que el sistema tiene una solución muy bonita para cada  $r, s$ , **por eso las llamamos variables libres**

### 3.3.2. Sistemas Consistentes Independientes

Que es lo esperado y a lo que yo llamaría normal. Por lo tanto si tocan en un punto entonces solo habrá una única solución.

Esto pasa si es que no hay variables libres en el sistema.

### 3.3.3. Sistemas Consistentes Dependientes

Este caso es muy especial, pues nos dice que el sistema esta dado por ecuaciones que son múltiplos de la otra o otra forma de verlo es que esta dado por vectores linealmente dependientes.

Podemos despejar las variables principales en términos de las variables libres para obtener las soluciones, así que, debido a la presencia de variables libres el sistema tiene infinitas soluciones.

## Capítulo 4

### Gauss-Jordan y sus Amigos

## 4.1. Operaciones Elementales

### 4.1.1. Swap: Intercambiar Filas ó Columnas

La primera operación elemental es la de hacer Swap, es decir intercambiar una fila o columna en la matriz.

$$\begin{array}{c} F_i \Leftrightarrow F_j \\ \longrightarrow \\ C_i \Leftrightarrow C_j \\ \longrightarrow \end{array}$$

**Ejemplo de Cambio de Fila:**

$$\begin{bmatrix} (1) & (2) & (3) \\ (4) & (5) & (6) \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1 \Leftrightarrow F_2} \begin{bmatrix} (4) & (5) & (6) \\ (1) & (2) & (3) \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

**Ejemplo de Cambio de Columna:**

$$\begin{bmatrix} (1) & 2 & (3) \\ (4) & 5 & (6) \\ (7) & 8 & (9) \end{bmatrix} \xrightarrow{C_1 \Leftrightarrow F_3} \begin{bmatrix} (3) & 2 & (1) \\ (6) & 5 & (4) \\ (9) & 8 & (7) \end{bmatrix}$$

### Matriz Elemental

Podemos si queremos expresar esta operación como una “Matriz Elemental” que la verdad es que no es muy útil pero la verdad es que es una forma de verlo muy bonito.

Vamos a llamarla  $SwapFilas_{a,b}$  a la matriz que es la matriz identidad pero con la fila  $a$  y  $b$  intercambiada y  $SwapColumnas_{a,b}$  a la matriz que es la matriz identidad pero con la columna  $a$  y  $b$  intercambiada.

Por lo tanto para lograr el efecto de intercambiar las filas y columna haremos esto:

- Matriz con Cambio de Fila =  $SwapFilas_{a,b} * A$
- Matriz con Cambio de Columna =  $A * SwapColumna_{a,b}$

Ahora, recuerda que cambiar una columna se parece mucho a intercambiar una fila y hacer una transpuesta. Solo recuerda que  $B^T A^T = (AB)^T$ .

**Ejemplo de Cambio de Fila:**

$$\begin{bmatrix} (1) & (2) & (3) \\ (4) & (5) & (6) \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1 \Leftrightarrow F_2} \begin{bmatrix} (4) & (5) & (6) \\ (1) & (2) & (3) \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0) & (1) & (0) \\ (1) & (0) & (0) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

**Ejemplo de Cambio de Columna:**

$$\begin{bmatrix} (1) & 2 & (3) \\ (4) & 5 & (6) \\ (7) & 8 & (9) \end{bmatrix} \xrightarrow{C_1 \Leftrightarrow F_3} \begin{bmatrix} (3) & 2 & (1) \\ (6) & 5 & (4) \\ (9) & 8 & (7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} (0) & 0 & (1) \\ (0) & 1 & (0) \\ (1) & 0 & (0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{bmatrix}$$

### 4.1.2. Pivot: Filas ó Columnas más múltiplo de otras

La segunda operación elemental es la de hacer Pivot, es decir a una columna sumarle un múltiplo de otra.

$$F_i \Leftrightarrow F_i + nF_j$$

$$C_i \Leftrightarrow C_i + nC_j$$

**Ejemplo con Fila:**

$$\begin{bmatrix} (1) & (2) & (3) \\ (4) & (5) & (6) \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1 \Leftrightarrow F_1 + 2F_2} \begin{bmatrix} (9) & (12) & (15) \\ (4) & (5) & (6) \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

**Ejemplo con Columna:**

$$\begin{bmatrix} (1) & 2 & (3) \\ (4) & 5 & (6) \\ (7) & 8 & (9) \end{bmatrix} \xrightarrow{C_1 \Leftrightarrow C_1 + 1F_3} \begin{bmatrix} (4) & 2 & (3) \\ (10) & 5 & (6) \\ (16) & 8 & (9) \end{bmatrix}$$

### Matriz Elemental

Podemos si queremos expresar esta operación como una “Matriz Elemental”, pero esta vez, será más raro que lo normal.

En general  $Pivot_{a,b}(k)$  es aquella matriz que nos permitirá cambiar una matriz haciendo que la fila o columna  $a$  sea igual a si misma más  $k$  veces la fila o columna  $b$ .

Vamos a llamarla  $PivotFilas_{a,b}(k)$  a la matriz que es la matriz identidad pero en el elemento  $[PivotFilas]_{a,b}$  será igual a  $k$ , mientras que  $PivotColumnas_{a,b}(k)$  es la matriz identidad pero el elemento  $[PivotColumnas]_{b,a}$  es igual a  $k$ .

Por lo tanto para lograr el efecto deseado haremos esto:

- Matriz con Pivot de Fila =  $PivotFilas_{a,b}(k) * A$
- Matriz con Pivot en Columna =  $A * PivotColumnas_{a,b}(k)$

**Ejemplo de Cambio de Fila:**

$$\begin{bmatrix} (1) & (2) & (3) \\ (4) & (5) & (6) \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1 \Leftrightarrow F_1 + 2F_2} \begin{bmatrix} (9) & (12) & (15) \\ (4) & (5) & (6) \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & (2) & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (9) & (12) & (15) \\ (4) & (5) & (6) \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

**Ejemplo de Cambio de Columna:**

$$\begin{bmatrix} (1) & 2 & (3) \\ (4) & 5 & (6) \\ (7) & 8 & (9) \end{bmatrix} \xrightarrow{C_1 \Leftrightarrow C_1 + 1F_3} \begin{bmatrix} (4) & 2 & (3) \\ (10) & 5 & (6) \\ (16) & 8 & (9) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ (1) & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (4) & 2 & (3) \\ (10) & 5 & (6) \\ (16) & 8 & (9) \end{bmatrix}$$

### 4.1.3. Scale: Escalar Filas ó Columnas

La tercera operación elemental es ... Ok, ok, espera, lo que pasa es que siendo estricto, Scale es un caso particular de Pivot donde la fila o columna de origen y de la destino es la misma, es decir a efectos practicos es lo mismo que escalar una fila o columna k veces.

$$F_i \xrightarrow{\Leftrightarrow} nF_i$$

$$C_i \xrightarrow{\Leftrightarrow} nC_i$$

**Ejemplo con Fila:**

$$\begin{bmatrix} (1) & (2) & (3) \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1 \Leftrightarrow 3F_1} \begin{bmatrix} (3) & (6) & (9) \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

**Ejemplo con Columna:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & (3) \\ 4 & 5 & (6) \\ 7 & 8 & (9) \end{bmatrix} \xrightarrow{C_3 \Leftrightarrow 2C_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & (6) \\ 4 & 5 & (12) \\ 7 & 8 & (18) \end{bmatrix}$$

### Matriz Elemental

Podemos si queremos expresar esta operación como una “Matriz Elemental”, pero esta vez, será más raro que lo normal.

Vamos a llamarla  $ScaleFilas_i(k)$  a la matriz que es la matriz identidad pero en el elemento  $[ScaleFilas]_{i,i}$  será igual a  $k$ , mientras que  $ScaleColumnas_j(k)$  es la matriz identidad pero el elemento  $[ScaleColumnas]_{j,j}$  es igual a  $k$ .

Por lo tanto para lograr el efecto deseado haremos esto:

- Matriz con Scale de Fila =  $ScaleFilas_i(k) * A$
- Matriz con Scale en Columna =  $A * ScaleColumnas_j(k)$

**Ejemplo de Cambio de Fila:**

$$\begin{bmatrix} (1) & (2) & (3) \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1 \Leftrightarrow 3F_1} \begin{bmatrix} (3) & (6) & (9) \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3) & (6) & (9) \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

**Ejemplo de Cambio de Columna:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & (3) \\ 4 & 5 & (6) \\ 7 & 8 & (9) \end{bmatrix} \xrightarrow{C_3 \Leftrightarrow 2C_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & (6) \\ 4 & 5 & (12) \\ 7 & 8 & (18) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & (6) \\ 4 & 5 & (12) \\ 7 & 8 & (18) \end{bmatrix}$$



## 4.2. Eliminación Gaussiana

### 4.2.1. Matriz Escalonada por Filas

Nuestro objetivo es usando las operaciones elementales encontrar una forma de pasar nuestra matriz ampliada a esta forma:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right]$$

Ok, esto no es una definición muy matemática, estas no tienen porque ser matrices cuadradas, pero tienen que cumplir con las siguientes características:

- Para toda fila, **si** existe un elemento distinto de cero en la fila (**al que llamaremos pivote**), entonces para todos los elementos anteriores de la fila deben ser cero y este elemento (**pivote**) **debe ser uno, la unidad**.
- Los pivotes deben aparecer de forma escalonada (excepto si es que la fila es nula).
- Si una fila no tiene pivotes entonces toda esa fila debe ser nula.
- Si una fila no tiene pivotes (osea que sea nula) entonces todas las filas de abajo no pueden tener pivotes.

**Ejemplo de Cosas que NO son:**

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

**Ejemplo de Cosas que SI son:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

### 4.2.2. Algoritmo

1. Inicias en el primer elemento, es decir  $[Matriz]_{1,1}$
2. Convierte ese elemento a uno (usando la operación escalar)
3. Usas ese uno que acabas de crear (usando la operación pivot) para hacer a toda a parte de abajo de la columna sea cero
4. Te mueves a la siguiente columna y bajas un elemento el columna y repites desde el paso uno.

## 4.3. Gauss-Jordan

### 4.3.1. Matriz Escalonada Reducida por Filas

Nuestro objetivo es usando las operaciones elementales encontrar una forma de pasar nuestra matriz ampliada a esta forma:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right]$$

Ok, esto no es una definición muy matemática, estas no tienen porque ser matrices cuadradas, pero tienen que cumplir con las siguientes características:

- Para toda fila, **si** existe un elemento distinto de cero en la fila (**al que llamaremos pivote**), entonces para todos los elementos anteriores de la fila deben ser cero y este elemento (**pivote**) **debe ser uno, la unidad**.
- Los pivotes deben aparecer de forma escalonada (excepto si es que la fila es nula).
- Si una fila no tiene pivotes entonces toda esa fila debe ser nula
- Si una fila no tiene pivotes (osea que sea nula) entonces todas las filas de abajo no pueden tener pivotes.

**Ejemplo de Cosas que SI son:**

$$\left[ \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \left[ \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \left[ \begin{array}{ccccc} 1 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

### 4.3.2. Ejemplos

#### Ejemplo 1:

Nota este sistema de ecuaciones:

$$2x_1 - x_2 + 4x_3 = -3$$

$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1$$

$$5x_1 + 3x_2 + x_3 = -2$$

Ahora, ve esto:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \\ 5 & 3 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

Ahora, apliquemos Gauss-Jordan:

$$\begin{array}{lll} \left[ \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \\ 5 & 3 & 1 & -2 \end{array} \right] & F_1 \xleftrightarrow{\leftrightarrow} F_2 & \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 4 & -3 \\ 5 & 3 & 1 & -2 \end{array} \right] & F_2 \xrightarrow{F_2 - 2F_1} & \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -5 & 10 & -5 \\ 5 & 3 & 1 & -2 \end{array} \right] \\ \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -5 & 10 & -5 \\ 5 & 3 & 1 & -2 \end{array} \right] & F_3 \xrightarrow{F_3 - 5F_1} & \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -5 & 10 & -5 \\ 0 & -7 & 16 & -7 \end{array} \right] & F_2 \xrightarrow{-\frac{1}{5}F_2} & \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & 16 & -7 \end{array} \right] \\ \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & 16 & -7 \end{array} \right] & F_1 \xrightarrow{F_1 - 2F_2} & \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & 16 & -7 \end{array} \right] & F_1 \xrightarrow{F_1 - 2F_2} & \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & 16 & -7 \end{array} \right] \\ \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & 16 & -7 \end{array} \right] & F_3 \xrightarrow{F_3 + 7F_2} & \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] & F_3 \xrightarrow{\frac{1}{2}F_3} & \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \\ \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] & F_1 \xrightarrow{F_1 - F_3} & \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] & F_2 \xrightarrow{F_2 + 2F_3} & \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

Ahora si, creo que ahora es más que obvio que:

$$x_1 = -1$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = 0$$

## 4.4. Inversa de una Matriz

Sea  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$  y entonces definimos a  $A^{-1}$  de forma informal como aquella matriz que cumple con que  $A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$  nota que no para todas las matrices  $M_{n \times n}(\mathbb{F})$  existe una matriz inversa.

### El Problema de la Notación $A^{-1}$

El problema con esta notación es que existen matrices no invertibles, para las cuales la notación  $A^{-1}$  no tiene sentido.

La notación  $A^{-1}$  se puede usar solamente después de demostrar que  $A$  es invertible.

### 4.4.1. Propiedades

- La Matriz Inversa de  $A$  ( $A^{-1}$ ) es única.

**Demostración:**

Lo que hay que ver que si  $A, B, C \in M_n(\mathbb{F})$  tales que  $AB = BA = I_n$  y  $AC = CA = I_n$ . Entonces  $B = C$ .

Usando la Ley asociativa de la Multiplicación de Matrices ( $A(BC) = (AB)C$ ) tenemos que:  
 $B = B(I_n) = B(AC) = (BA)C = I_n C = C$

- Es necesario aunque no suficiente que todas las columnas y filas de una matriz  $A \in M_{n \times n}$  sea diferentes de cero para que  $A$  sea invertible.

**Demostración:**

Renglones Nulos:

Sea  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ . Supongamos que (por lo menos) un renglón de  $A$  es nulo, es decir:  $[A]_{p,*} = 0_{1,n}$  donde  $0 < p \leq n$  esto es lo mismo que decir que  $\forall j \in \{1, \dots, n\} [A]_{p,j} = 0$ .

Ahora supongamos que  $A$  es invertible, entonces, en particular, la entrada  $(p, p)$  del producto  $AA^{-1}$  debe coincidir con la entrada  $(p, p)$  de la matriz identidad  $I_n$ . Podemos calcular esa entrada como  $[AA^{-1}]_{p,p} = \sum_{k=1}^n [A]_{p,k} [A^{-1}]_{k,p}$  esto debería ser  $[I_n]_{p,p} = 1$  pero ya vimos que  $[A]_{p,k} = 0$ , es decir  $0 = 1$ . Contradicción.

Columnas Nulas: Sea  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ . Supongamos que (por lo menos) una columna de  $A$  es nula, es decir:  $[A]_{*,p} = 0_{n,1}$  donde  $0 < p \leq n$  esto es lo mismo que decir que  $\forall j \in \{1, \dots, n\} [A]_{p,j} = 0$ .

Ahora supongamos que  $A$  es invertible, entonces, en particular, la entrada  $(p, p)$  del producto  $A^{-1}A$  debe coincidir con la entrada  $(p, p)$  de la matriz identidad  $I_n$ .

Podemos calcular esa entrada como  $[A^{-1}A]_{p,p} = \sum_{k=1}^n [A^{-1}]_{p,k} [A]_{k,p}$  esto debería ser  $[I_n]_{p,p} = 1$  pero ya vimos que  $[A]_{k,p} = 0$ , es decir  $0 = 1$ . Contradicción.

- Sea  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y sean invertibles, entonces tenemos que  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

**Demostración:**

Si  $(AB)$  es invertible entonces tenemos que probar que:

$$\begin{aligned}
 (AB)(B^{-1}A^{-1}) &= \\
 &= (((AB)B^{-1})A^{-1}) = ((A(BB^{-1}))A^{-1}) = ((A(I_n))A^{-1}) = (AA^{-1}) \\
 &= I_n
 \end{aligned}
 \tag{4.1}$$

- Una Matriz Diagonal es invertible si y solo si los elementos de la diagonal son distintos de cero.
- Una Matriz Diagonal es invertible si y solo si los elementos de la diagonal son distintos de cero.
- Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y sea invertible, entonces tenemos que  $(A^{-1})^{-1} = A$
- Sea  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  y sea invertible, entonces tenemos que  $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

# Parte III

## Espacios Vectoriales



## Capítulo 5

### Definición y Características

## 5.1. Definición

Los espacios vectoriales es la forma en que en matemáticas se abstraen conceptos clásicos como las fuerzas que operan en física o los polinomios con coeficientes en los reales, vamos a ver más a detalle esta abstracción.

Siendo formales un Espacio Vectorial (O Espacio Lineal) es una tupla  $(\mathbb{V}, \mathbb{F}, +, \cdot)$ , solemos llamar entonces a este espacio vectorial, el Espacio Vectorial de  $\mathbb{V}$  sobre  $\mathbb{F}$  donde tenemos que:

- **Conjunto de Vectores:**  $\mathbb{V}$   
Es un grupo de vectores que no puede estar vacío ... y ya --
- **Campo:**  $\mathbb{F}$   
Es un Campo que cumple con sus propiedades normales, le solemos llamar un campo escalar.
- **"Suma de Vectores":**  $+: (\mathbb{V} \times \mathbb{V}) \rightarrow \mathbb{V}$   
Una Función  $+: (\mathbb{V} \times \mathbb{V}) \rightarrow \mathbb{V}$ , es decir, es una Función que recibe dos elementos de  $\mathbb{V}$  (o más específico un par ordenado de vectores) y te regresa un nuevo elemento de  $\mathbb{V}$ .  
Gracias a esto podemos decir que es cerrado en esta operación, es decir:  
 $\forall \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{V}, (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) \in \mathbb{V}$
- **"Producto Escalar":**  $\cdot: (\mathbb{F} \times \mathbb{V}) \rightarrow \mathbb{V}$   
Una Función  $\cdot: (\mathbb{F} \times \mathbb{V}) \rightarrow \mathbb{V}$ , es decir, es una Función que recibe un elementos de  $\mathbb{F}$  y un elemento de  $\mathbb{V}$  (o más específico un par ordenado) y te regresa un nuevo elemento de  $\mathbb{V}$ .  
Gracias a esto podemos decir que es cerrado en esta operación, es decir:  
 $\forall \vec{v} \in \mathbb{V}, \forall \alpha \in \mathbb{F}, (\alpha \cdot \vec{v}) \in \mathbb{V}$

Solemos simplificar la notación de  $\mathbb{V}$  sobre el Campo  $\mathbb{F}$  como  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ .

### 5.1.1. Condiciones de Espacio Vectorial

Donde esta tupla  $(\mathbb{V}, \mathbb{F}, +, \cdot)$  tiene que cumplir los siguientes 8 propiedades para que se puedan considerar un espacio vectorial:

1. **Ley Aditiva Asociativa:**  $\forall \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 \in \mathbb{V}, (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) + \vec{v}_3 = \vec{v}_1 + (\vec{v}_2 + \vec{v}_3)$
2. **Ley Aditiva Conmutativa:**  $\forall \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{V}, \vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \vec{v}_2 + \vec{v}_1$
3. **Elemento Identidad Aditivo:**  $\exists \vec{0} \in \mathbb{V}, \forall \vec{v} \in \mathbb{V}, \vec{0} + \vec{v} = \vec{v}$
4. **Existen Inversos Aditivos:**  $\forall \vec{v} \in \mathbb{V}, \exists -\vec{v} \in \mathbb{V}, \vec{v} + (-\vec{v}) = (-\vec{v}) + \vec{v} = \vec{0}$
5. **Ley Aditiva Distributiva:**  $\forall \alpha \in \mathbb{F} \forall \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{V} \alpha \cdot (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = (\alpha \cdot \vec{v}_1) + (\alpha \cdot \vec{v}_2)$
6. **Ley Multiplicativa Asociativa:**  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall \vec{v} \in \mathbb{V}, \alpha \cdot (\beta \cdot \vec{v}) = (\alpha\beta) \cdot \vec{v}$
7. **Ley Multiplicativa Distributiva:**  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall \vec{v} \in \mathbb{V}, (\alpha + \beta) \cdot \vec{v} = (\alpha \cdot \vec{v}) + (\beta \cdot \vec{v})$
8. **Elemento Identidad Multiplicativo:**  $\exists 1 \in \mathbb{F}, \forall \vec{v} \in \mathbb{V}, 1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$

## 5.2. Consecuencias y Propiedades

Veamos algunas de las Propiedades de esto que acabamos de definir, son consecuencias de los axiomas.

- **Cancelación de la Suma Vectorial:**

Si  $x, y, z \in \mathbb{V}$  tal que  $x + z = y + z$ , entonces  $x = y$

**Demostración:**

Esto es algo bastante natural e intuitivo, pero aun así hay que demostrarlo,

$$\begin{aligned}x + z &= y + z \\x + z + (-z) &= y + z + (-z) \\x + 0 &= y + 0 \\x &= y\end{aligned}$$

- El  $\vec{0}$  es único.

**Demostración:**

Si te das cuenta, nunca dije que tenía que existir solo un  $\vec{0}$  pues no es necesario, ya que podemos decir que si tenemos otro  $\vec{0}_2$  entonces pasará que  $\exists \vec{0}_2 \in \mathbb{V}, \forall \vec{v} \in \mathbb{V}, \vec{0}_2 + \vec{v} = \vec{v} + \vec{0}_2 = \vec{v}$

Podemos decir entonces que  $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}_2$  pero también sabemos como funciona el  $\vec{0}$ , así que  $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}_2 = \vec{0}_2$ .

Es decir, si algo cumple con querer ser nuestro cero vector, veremos que es de hecho el mismo elemento.

- El inverso aditivo de  $\vec{v}$  es único.

**Demostración:**

Podemos entonces suponer que hay dos vectores  $\vec{x}, \vec{y}$  que hacen el trabajo de un inverso de  $\vec{v}$ , es decir  $\vec{v} + \vec{x} = \vec{x} + \vec{v} = \vec{0}$  y que  $\vec{v} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{v} = \vec{0}$ .

De ser así vemos entonces que podemos decir que:

$\vec{x} = \vec{x} + \vec{0}$	Suma de cero
$= \vec{x} + (\vec{v} + \vec{y})$	Hipotesis
$= (\vec{x} + \vec{v}) + \vec{y}$	Asociativa
$= \vec{0} + \vec{y}$	Suma de Cero
$= \vec{y}$	Hipotesis

- $\forall \alpha \in \mathbb{F}, \alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

**Demostración:**

Esto es algo bastante natural e intuitivo, pero aun así hay que demostrarlo, veamos que  $\alpha \cdot \vec{0}$  es un vector, vamos a denotar su inverso aditivo como  $-(\alpha \cdot \vec{0})$

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{0} &= (\alpha \cdot \vec{0}) + \vec{0} \\ &= \alpha \cdot \vec{0} + [(\alpha \vec{0}) - (\alpha \vec{0})] \\ &= [\alpha \cdot \vec{0} + (\alpha \vec{0})] - (\alpha \vec{0}) \\ &= [\alpha(\vec{0} + \vec{0})] - (\alpha \vec{0}) \\ &= \alpha \vec{0} - (\alpha \vec{0}) \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

- $\forall \vec{v} \in \mathbb{V}, 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$
- $\forall \vec{v} \in \mathbb{V}, -\alpha(\vec{v}) = -(\alpha \vec{v}) = \alpha(-\vec{v})$
- Si  $\mathbb{F}^n$  es un espacio vectorial sobre  $\mathbb{F}$ , entonces  $\mathbb{F}^n$  será un espacio vectorial sobre cualquier campo que subconjunto de  $\mathbb{F}$

**Ejemplo:**

- $\mathbb{R}_{\mathbb{R}}^n$  es un espacio vectorial
- $\mathbb{R}_{\mathbb{C}}^n$  NO es un espacio vectorial
- $\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}^n$  es un espacio vectorial

## 5.3. Ejercicios

■ Sea  $\mathbb{R}^2$  un espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$  con:

- $(a, b) + (c, d) := (a + c, bd)$
- $k(a, b) := (ka, b)$

¿Es un espacio vectorial?

**Demostración:**

- La suma es cerrada
- El producto por escalar es cerrada
- Es asociativa
- Es conmutativa
- Existe un neutro aditivo, pero es especial, mira:  
 Considera, a  $(a_0, b_0) + (x, y) = (a_0, b_0)$   
 Por lo tanto  $a_0 + x = a_0$  y  $b_0 y = b_0$ , por lo tanto tenemos que  $\vec{0} := (0, 1)$ .
- Pero pasa algo raro con los inversos:  
 Considera, a  $(a_0, b_0) + (x, y) = (0, 1)$   
 Por lo tanto  $a_0 + x = 0$  y  $b_0 y = 1$ , por lo tanto tenemos que el inverso de  $(a_0, b_0)$  es  $(-a_0, \frac{1}{b})$   
 Y todo sería felicidad si nos quedamos así pero... ¿Qué pasa si es que  $b = 0$ , entonces dividimos entre cero, por lo tanto para vectores como  $(a_0, 0)$  no existe un inverso, y eso esta feo...muy feo.  
 Por lo tanto no es un espacio vectorial.

No.

## Capítulo 6

# Subespacios Vectoriales

## 6.1. Definición

Suele ser muy interesante ver si es que los subconjuntos de cierta estructura algebraica tienen las mismas características, por lo tanto veamos si es que podemos encontrar un subconjunto de un espacio vectorial.

Un Subespacio Vectorial es un Espacio Vectorial.

La única razón por la que le decimos Subespacio es porque esta contenido dentro de otro Espacio Vectorial.

### Definición Formal

Sea  $\mathbb{W}$  y  $\mathbb{V}$  dos Espacios Vectoriales donde con identidas operaciones  $+, \cdot$  sobre un mismo campo  $\mathbb{F}$  entonces decimos que  $\mathbb{W}$  es un Subespacio Vectorial de  $\mathbb{V}$  si y solo si:

- $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$
- $\mathbb{W}$  es un Espacio Vectorial por si mismo

## 6.2. Demostrar que $\mathbb{W}$ es un Subespacio de $\mathbb{V}$

Afortunadamente no tenemos que demostrar todas las 8 propiedades de un espacio vectorial, porque después de todo es un subconjunto de  $\mathbb{V}$ . Por lo tanto solo basta probar algunas menos.

Pero ¿Porqué? Porque si te das cuenta de las 8 propiedades que necesita cumplir para ser un espacio vectorial 6 son un para todo ( $\forall x \in \mathbb{V}$ ) por lo que si se cumplen para cualquier elemento de  $\mathbb{V}$  entonces lo harán para cualquier elemento de  $\mathbb{W}$ , después de todo  $\mathbb{W}$  es un subconjunto de  $\mathbb{V}$ . La última propiedad habla de un elemento del campo, y ya que  $\mathbb{W}$  esta dado sobre el mismo campo de  $\mathbb{V}$  entonces también la cumplirá.

**Por lo tanto, gracias a que  $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{V}$  solo queda por probar que el cero vector pertenece a  $\mathbb{W}$ , eso y que las operaciones que definimos sean cerradas en  $\mathbb{W}$ .**

Lo anterior lo podemos poner como un teorema:

### Teorema 6.2.1

*Podemos decir que  $\mathbb{W}$  es un Subespacio de  $\mathbb{V}$  si y solo si:*

*$\mathbb{W}$  contiene al vector cero del Espacio  $\mathbb{V}$  y es cerrado con respecto a las operaciones lineales del Espacio  $\mathbb{V}$ , (osea con expresiones matemáticas):*

- $\vec{0} \in \mathbb{W}$
- $\forall \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{W}, \vec{v}_1 + \vec{v}_2 \in \mathbb{W}$
- $\forall \vec{v} \in \mathbb{W}, \forall \alpha \in \mathbb{F}, \alpha \vec{v} \in \mathbb{W}$

A veces hay gente que le gusta poner una 4 condición, la de que  $\forall \vec{v} \in \mathbb{W}, -\vec{v} \in \mathbb{W}$ , pero la verdad es que podemos probar que esta cuarta condición se puede probar usando las 3 anteriores.



### 6.3. Propiedades de los Subespacios

- $\{\vec{0}\}$  es un Subespacio Vectorial para cualquier  $\mathbb{V}$
- Cualquier intersección de Subespacios Vectoriales de  $\mathbb{V}$  es también un Subespacio Vectorial de  $\mathbb{V}$

**Demostración:**

Sea  $\mathbb{W}$  la intersección de 2 subespacios vectoriales  $A$  y  $B$  cualquiera entonces:

- Es obvio que  $\mathbb{W}$  contiene al  $\vec{0}$ , porque estaba tanto en  $A$  como en  $B$  por ser subespacios.
- Sea  $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{W}$  entonces estos 2 elementos existen en cada subespacio y como son subespacios entonces  $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 \in \mathbb{W}$
- Sea  $\vec{v} \in \mathbb{W}$  entonces  $\vec{v}$  existe en ambos subespacios y como son subespacios entonces  $\forall \alpha \in \mathbb{F}, \alpha \vec{v} \in \mathbb{W}$

Por lo tanto, es un subespacio vectorial.

- Cualquier unión de Subespacios Vectoriales de  $\mathbb{V}$  es también un Subespacio Vectorial de  $\mathbb{V}$  si y solo si uno de los subespacios es un subconjunto de otro

## 6.4. Suma de Subespacios Vectoriales

Si  $S_1$  y  $S_2$  son subespacios vectoriales (que no son vacíos) de un Espacio Vectorial  $\mathbb{V}$ , entonces definimos a  $S_1 + S_2$  de la siguiente manera:

$$S_1 + S_2 := \left\{ \vec{x} \mid \vec{x} = \vec{a} + \vec{b} \quad \text{donde} \quad \vec{a} \in S_1 \text{ y } \vec{b} \in S_2 \right\} \quad (6.1)$$

### 6.4.1. Propiedades

- Si  $\mathbb{W}_1$  y  $\mathbb{W}_2$  son subespacios de un espacio vectorial de  $\mathbb{V}$  entonces  $\mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2$  es un Subespacio Vectorial

**Demostración:**

- Por un lado como  $\mathbb{W}_1$  y  $\mathbb{W}_2$  son subespacios entonces  $\vec{0} + \vec{0}$  está en la suma, por lo tanto el  $\vec{0}$  está.
- Sea  $a, b \in \mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2$ , además podemos proponer elementos tales que  $x_1, y_1 \in \mathbb{W}_1$  y  $x_2, y_2 \in \mathbb{W}_2$  tales que  $a = x_1 + x_2$  y  $b = y_1 + y_2$  entonces:

$$\begin{aligned} a + b &= (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \\ &= (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \end{aligned}$$

Es decir  $a + b$  es un elemento de  $\mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2$

- $ax = a(x_1 + x_2) = ax_1 + ax_2$  es un elemento de  $\mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2$

### 6.4.2. Suma Directa de Subespacios Vectoriales

Se dice que  $\mathbb{V}$  es la suma directa de  $\mathbb{W}_1$  y  $\mathbb{W}_2$  expresada como  $\mathbb{V} = \mathbb{W}_1 \oplus \mathbb{W}_2$  si y solo si:

- $\mathbb{W}_1, \mathbb{W}_2$  son subespacios vectoriales de  $\mathbb{V}$
- $\mathbb{W}_1 \cap \mathbb{W}_2 = \{ \vec{0} \}$
- $\mathbb{V} = \mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2$

#### Propiedades

- $\mathbb{V}$  es la suma directa de  $\mathbb{W}_1$  y  $\mathbb{W}_2$  si y solo si cada elemento  $x$  de  $\mathbb{V}$  puede ser escrito de una sola manera como  $x = a + b$  donde  $a \in \mathbb{W}_1$  y  $b \in \mathbb{W}_2$

## 6.5. Ejercicios

- Prueba que  $\mathbb{F}$  es la suma directa de los siguientes conjuntos:

- $\mathbb{W}_1 = \{ (a_1, \dots, a_n) \mid a_n = 0 \}$
- $\mathbb{W}_2 = \{ (a_1, \dots, a_n) \mid a_1 = a_2 = a_{n-1} = 0 \}$

**Solución:**

Ok, antes que nada demostremos que ambos son subespacios vectoriales:

- $\vec{0} \in \mathbb{W}_1$  pues es de la forma  $(a_1, \dots, a_n)$  donde  $a_n = 0$
- Es cerrado bajo la suma pues  $(a_1, \dots, a_{n-1}, 0) + (b_1, \dots, b_{n-1}, 0) = (a_1 + b_1, \dots, a_{n-1} + b_{n-1}, 0) \in \mathbb{W}_1$
- Es cerrado bajo el producto pues  $k(a_1, \dots, a_{n-1}, 0) = (ka_1, \dots, ka_{n-1}, 0) \in \mathbb{W}_1$

Por lo tanto  $\mathbb{W}_1$  es un subespacio vectorial y de la misma manera  $\mathbb{W}_2$  es también un subespacio vectorial.

Ahora, ve que su intersección es  $\{ \vec{0} \}$ , esto se puede hacer con doble contención, por un lado ambos por ser espacios vectoriales por lo tanto  $\vec{0}$  está en la intersección.

Ahora, si tenemos un elemento cualquiera en la intersección de ambos por construcción del primero  $a_n = 0$  y por construcción del segundo todos los demás son ceros, el único vector que cumple con eso es  $\vec{0}$ .

Magia.

Ahora finalmente veamos que podemos escribir a un elemento arbitrario como la suma de dos elementos, cada uno de  $\mathbb{W}_1$  y  $\mathbb{W}_2$

Creo que esos elementos son más que obvios por lo que queda demostrado.

- Prueba que  $X = \{ (a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a + 3b = 0 \}$ , con  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}} = \mathbb{R}^2$  y  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$

**Solución:**

Ok, veamos:

- Probemos que  $\vec{0} \in X$   
Esta porque  $(0, 0)$ , es decir cuando  $a = b = 0$  cumple que  $0 + 3(0) = 0$ , por lo tanto  $\vec{0} \in X$
- Veamos que sea cerrada bajo la suma:  
Tomemos  $\vec{x}, \vec{y} \in X$  donde  $\vec{x} = (x_a, x_b)$  y  $\vec{y} = (y_a, y_b)$  y como estan en  $X$  tenemos que  $x_a + 3x_b = 0$  y  $y_a + 3y_b = 0$  entonces tenemos que  $\vec{y} = (y_a, y_b)$  entonces vemos que  $\vec{x} + \vec{y} = (x_a + y_a, y_a + y_b)$   
Y ve que:

$$\begin{aligned} x_a + y_a + 3(x_b + y_b) &= (x_a + 3x_b) + (y_a + 3y_b) \\ &= 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto  $\vec{x} + \vec{y} \in X$ , por lo tanto es cerrado bajo la suma

- Veamos que sea cerrada bajo el producto por escalar:  
Tomemos  $\vec{x} \in X$  y  $\alpha \in \mathbb{R}$  donde  $\vec{x} = (x_a, x_b)$  y como esta en  $X$  tenemos que  $x_a + 3x_b = 0$  entonces tenemos que:  $\alpha\vec{x} = (\alpha x_a + \alpha x_b)$   
Y ve que:

$$\begin{aligned} \alpha x_a + 3(\alpha x_b) &= \alpha(x_a + 3x_b) \\ &= \alpha(0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto  $\alpha\vec{x} \in X$ , por lo tanto es cerrado bajo el producto escalar

- Prueba que  $X = \{ (a, b) \in \mathbb{C}^2 \mid a - b = 0 \}$ , con  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}} = \mathbb{C}^2$  y  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$

**Solución:**

Ok, veamos:

- Probemos que  $\vec{0} \in X$   
Esta porque  $(0, 0)$ , es decir cuando  $a = b = 0$  cumple que  $0 - (0) = 0$ , por lo tanto  $\vec{0} \in X$
- Veamos que sea cerrada bajo la suma:  
Tomemos  $\vec{x}, \vec{y} \in X$  donde  $\vec{x} = (x_a, x_b)$  y  $\vec{y} = (y_a, y_b)$  y como estan en  $X$  tenemos que  $x_a - x_b = 0$  y  $y_a - y_b = 0$  entonces tenemos que  $\vec{y} = (y_a, y_b)$  entonces vemos que  $\vec{x} + \vec{y} = (x_a + y_a, y_a + y_b)$   
Y ve que:

$$\begin{aligned} x_a + y_a - (x_b + y_b) &= (x_a - x_b) + (y_a - y_b) \\ &= 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto  $\vec{x} + \vec{y} \in X$ , por lo tanto es cerrado bajo la suma

- Veamos que sea cerrada bajo el producto por escalar:  
Tomemos  $\vec{x} \in X$  y  $\alpha \in \mathbb{R}$  donde  $\vec{x} = (x_a, x_b)$  y como esta en  $X$  tenemos que  $x_a - x_b = 0$   
entonces tenemos que:  $\alpha\vec{x} = (\alpha x_a + \alpha x_b)$   
Y ve que:

$$\begin{aligned}\alpha x_a - (\alpha x_b) &= \alpha(x_a - x_b) \\ &= \alpha(0) \\ &= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto  $\alpha\vec{x} \in X$ , por lo tanto es cerrado bajo el producto escalar

## Capítulo 7

# Combinaciones Lineales

## 7.1. Definición

### 7.1.1. Definición

Dado un vector  $\vec{v}$  es una combinación lineal un conjunto de vectores  $S = \{ \vec{s}_1, \dots, \vec{s}_n \}$  si y solo si podemos expresar como:

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^n a_i \vec{s}_i \quad \text{todas las } a_i \text{ son constantes del campo}$$

### 7.1.2. Vectores Linealmente Dependiente

Sea  $S$  un conjunto de vectores, denotado sin perdida de generalidad sea  $S = \{ \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \}$   $S$  es linealmente dependiente si existe una combinación lineal no trivial tal que diga combinación lineal sea  $\vec{0}$ .

### 7.1.3. Vectores Linealmente Independiente

Sea  $S$  un conjunto de vectores, son linealmente independientes si la única combinación lineal que da el  $\vec{0}$  es solo la combinación lineal trivial.



## 7.2. Generadores

### 7.2.1. Definición

Dado un conjunto de vectores  $S$ , donde  $S \neq \emptyset$  el generado de  $S$  se denomina  $\langle S \rangle$  y es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos de  $S$ .

### 7.2.2. Propiedades

- Sea  $S$  un subconjunto de vectores de un espacio vectorial  $\mathbb{V}$  entonces decimos que  $\langle S \rangle$  es un subespacio vectorial.

**Demostración:**

Sea  $S$  un conjunto de vectores, denotado sin pérdida de generalidad sea  $S = \{ \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \}$

- Ahora, el cero vector esta en  $\langle S \rangle$  simplemente por la combinación trivial, es decir:

$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n 0\vec{v}_i \quad \text{entonces } \vec{0} \in \langle S \rangle$$

- Dado dos elementos de  $\vec{a}, \vec{b}$  arbitrarios, entonces tenemos que:

$$\vec{a} + \vec{b} = \sum_{i=1}^n r_i \vec{v}_i + \sum_{i=1}^n s_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^n (r_i + s_i) \vec{v}_i \quad \text{entonces } \vec{a} + \vec{b} \in \langle S \rangle$$

- Tenemos que:

$$k\vec{a} = k \sum_{i=1}^n r_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^n (kr_i) \vec{v}_i \in \langle S \rangle \quad \text{entonces } k\vec{a} \in \langle S \rangle$$

Por lo tanto todo  $\langle S \rangle$  es un subespacio vectorial.

- Por convención tenemos que  $\langle \emptyset \rangle = \vec{0}$
- Dado un espacio vectorial cualquiera,  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ , y  $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  entonces:  
 $\langle \{ \vec{u}, \vec{v} \} \rangle = \langle \{ \vec{u} \} \rangle \oplus \langle \{ \vec{v} \} \rangle$

**Demostración:**

## 7.3. Propiedades de Dependencia Lineal

- Si  $\vec{0} \in S$  entonces  $S$  es linealmente dependiente

**Demostración:**

Esta es muy fácil, considera el conjunto  $\{\vec{0}\}$  entonces lo puedes escribir como  $\vec{0} = a\vec{0}$  con  $a \neq 0$  entonces ya encontraste una combinación lineal no trivial, y como demostraré en los siguientes temas veré que sin importar que le añada a un conjunto linealmente dependiente este seguirá siendo linealmente dependiente.

- Sin importar que le añada a un conjunto linealmente dependiente este seguirá siendo linealmente dependiente.

Es decir: Si  $S_1 \subseteq S_2$  y  $S_1$  es linealmente dependiente entonces  $S_2$  también es linealmente dependiente

**Idea de la Demostración:**

Considera que como  $S_1$  sin pérdida de generalidad decimos que  $S_1 = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$  es l. d. Entonces existe una combinación lineal tal que  $\vec{0} = \sum_{i=1}^n a_i \vec{v}_i$ , donde mínimo un  $a_i$  no es cero.

Decimos que  $S_2 - S_1 = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$

Entonces decimos que:  $\vec{0} = \sum_{i=1}^n a_i \vec{v}_i + \sum_{i=1}^k 0 \vec{u}_i$ , bingo, una combinación no trivial, es un conjunto linealmente dependiente.

- Sin importar que le elimine a un conjunto linealmente independiente este seguirá siendo linealmente independiente.

Es decir: Si  $S_1 \subseteq S_2$  y  $S_2$  es linealmente independiente entonces  $S_1$  también es linealmente independiente

**Idea Demostración:**

Considera que como  $S_2$  sin pérdida de generalidad decimos que  $S_2 = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$  es l. i.

Ahora pensemos en un subconjunto propio de  $S_2$  llamado  $S_1$ . Vamos a suponer que ese subconjunto es linealmente dependiente, entonces por el teorema pasado: “ Si  $S_1 \subseteq S_2$  y  $S_1$  es linealmente dependiente entonces  $S_2$  también es linealmente dependiente ” pero espera, sabemos por hipótesis que  $S_2$  es linealmente independiente por lo tanto llegamos a una contradicción si suponemos que  $S_1$  es linealmente dependiente, por lo tanto solo le queda una opción, ser linealmente independiente

- Si  $S$  es linealmente independiente entonces:

$S \cup \{ \vec{v} \}$  es linealmente dependiente si y solo si  $\vec{v} \in \langle S \rangle$

**Demostración:**

Esta esta buena, si  $S$  es linealmente independiente si y solo si  $\vec{0} = \sum_{i=0}^n a_i \vec{v}_i$  implica que todas las  $a_i$  es cero.

Ahora si  $S \cup \{ \vec{v} \}$  es dependiente entonces podemos decir que  $\vec{0} = \sum_{i=0}^n a_i \vec{v}_i + k \vec{v}$  con  $k \neq 0$ .

Por lo tanto podemos dividir todo entre  $k$  y despejar y decir que:  $\vec{v} = \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{k} \vec{v}_i$  entonces ya vimos que podemos escribir a  $\vec{v}$  como combinación lineal de elementos de  $S$  entonces pertenece al generado de  $S$ .

Y bueno, el regreso es lo mismo n.n

- Si  $\{ \vec{u}, \vec{v} \}$  es linealmente dependiente si y solo si  $\{ \vec{v} + \vec{u}, \vec{v} - \vec{u} \}$  es linealmente dependiente
- Si  $\{ \vec{u}, \vec{v} \}$  es linealmente dependiente entonces tenemos que  $\exists \alpha \in \mathbb{F} \mid \vec{u} = \alpha \vec{v}$
- $\{ \vec{v} \}$  donde  $\vec{v} \in \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  es linealmente independiente si y solo si  $\vec{v} \neq \vec{0}$

## 7.4. Bases

### 7.4.1. Definición

Dado una base  $\beta$  para un espacio vectorial,  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  es un conjunto de vectores linealmente independiente tal que  $\langle \beta \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ .

Nota que  $\langle \emptyset \rangle = \{ \vec{0} \}$  Por lo que  $\emptyset$  es una base de  $\{ \vec{0} \}$

Decimos que un espacio vectorial  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  sea de dimensión finita si es que existe una base de cardinalidad finita

Llamamos a la cardinalidad de un base de un espacio vectorial su dimensión

### 7.4.2. Base Canónica

- Nota que para  $\mathbb{F}^n$  la base canónica es  $\{ e_1, \dots, e_n \}$  donde  $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$  donde 1 es el énesimo lugar.
- En  $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ , la base canónica es  $\{ E^{1,1}, \dots, E^{i,j}, \dots, E^{r,s} \}$  donde tenemos que:

$$\forall a_{i,j} \in E^{r,s} \begin{cases} a_{i,j} = 0 & \text{si } r \neq i \text{ y } j \neq s \\ a_{i,j} = 1 & \text{si } r = i \text{ y } j = s \end{cases}$$

- En  $\mathbb{P}^n[\mathbb{F}]$  la base canónica es:  $\{ 1, x, x^2, \dots, x^n \}$
- En  $\mathbb{P}[\mathbb{F}]$  la base canónica es:  $\{ 1, x, x^2, \dots \}$

### 7.4.3. Propiedades

- Dado  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  y  $\beta \subset \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  tenemos que  $\beta$  es base de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  si y solo si existe una única combinación lineal de los elementos de  $\beta$  que da a cada elemento del espacio vectorial.

**Demostración:**

Primero la ida:

Supongo que  $\beta$  es base de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ , sin pérdida de generalidad decimos que  $\beta = \{ \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \}$  entonces para cualquier elemento arbitrario tenemos que  $\vec{v} = \sum_{i=1}^n a_i \vec{u}_i$ , ahora supón que existe otra forma de escribirlo, es decir:

$$\sum_{i=1}^n a_i \vec{u}_i = \sum_{i=1}^n b_i \vec{u}_i \quad \text{con algun } a_i \text{ diferente de } b_i$$

Pero si despejamos tenemos que:

$$\vec{0} = \sum_{i=1}^n (a_i - b_i) \vec{u}_i \quad \text{como algun } a_i \text{ diferente de } b_i \neq \sum_{i=1}^n 0 \vec{u}_i$$

Pero  $\beta$  es base, por lo tanto es linealmente independiente por lo que eso es una contradicción, por lo que no existe mas que una forma de escribirlo.

Por otro lado tenemos:

Supon que  $\forall \vec{v} \in \mathbb{V}_{\mathbb{F}} \exists! \{ a_1, \dots, a_n \} \mid \vec{v} = \sum_{i=1}^n a_i \vec{u}_i$

Por hipotesis tenemos que  $\langle \beta \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ .

Ahora, basta con ver que  $\beta$  es linealmente independiente pero mira  $\vec{0} = \sum_{i=1}^n 0 \vec{u}_i$  esa es una combinación lineal en  $\beta$ , pero es unica por lo tanto es linealmente independiente.

- $\langle \langle A \rangle \rangle = \langle A \rangle$

- Si  $S \subseteq \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ , y con  $S$  finito y tenemos  $\langle S \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  entonces existe una base  $\beta$  del espacio vectorial tal que  $\beta$  es subconjunto de  $S$

**Demostración:**

Si  $S = \emptyset$  entonces  $S$  es la base el Espacio  $\{ \vec{0} \}$ . Y este espacio cumple todo lo que necesitamos pues su base es el vacío.

Ahora, podemos decir que  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}} \neq \{ \vec{0} \}$  por lo que su base no está vacía.

Ahora, tomemos entonces uno a uno elementos de  $S$ , por ejemplo a  $\vec{v}$ , entonces  $\{ \vec{v} \}$  es linealmente independiente, ahora sigamos añadiendo elementos a este conjunto de tal manera que creemos al máximo conjunto con elementos de  $S$  que sea linealmente independiente, llamémosle  $\beta$  a ese conjunto entonces por construcción  $\beta$  es linealmente independiente.

Ahora veamos que cualquier elemento de  $S$  se puede escribir como combinación lineal de  $\beta$ .

Ahora, no puede haber un elemento en  $S$ , llamémos  $\vec{x}$  que no pueda encontrar en el generado de  $\beta$ , porque así fuera entonces  $\beta \cup \{ \vec{x} \}$  sería linealmente independiente, pero por construcción  $\beta$  es el mayor subconjunto linealmente independiente de  $S$ .

Por lo tanto  $S \subseteq \langle \beta \rangle$ , es decir, si algo está en  $S$  se puede escribir como combinación lineal de elementos de  $\beta$ .

Ahora, como  $\langle S \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  eso quiere decir que cualquier vector del espacio se puede escribir como combinación lineal de  $S$ , donde cada elemento de  $S$  se puede escribir como combinación lineal de  $\beta$  por lo tanto tenemos que si  $\vec{x} \in \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  entonces  $x \in \langle \beta \rangle$  por doble contención entonces:  $\langle \beta \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$

- Dado  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}} = \langle G \rangle$  donde  $G = \{ \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \}$  donde  $G$  es base. Además, dado a  $L$  como subconjunto linealmente independiente de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  tal que  $|L| = m$ , y  $m \leq n$ , entonces existe otro conjunto  $H$  tal que  $|H| = n - m$  tal que  $\langle L \cup H \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$

**Demostración:**

Esta sale por inducción sobre  $m$ , si, quizá este algo aburrido, pero ahí va:

- **Caso Base:**

Probemos con  $m = 0$ , entonces  $L = \emptyset$ , por lo tanto piensa que  $\langle \emptyset \cup G \rangle = \langle G \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$

- Ahora suponemos el teorema cierto para alguna  $m$  mayor que cero

- Ahora probemos para  $m + 1$ :

Sea  $L = \{ \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m, \vec{v}_{m+1} \}$  linealmente independiente entonces  $L' = \{ \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m \}$  también lo es.

Por hipótesis de inducción del paso 2, tenemos que existe un  $H \subseteq G$  tal que  $|H| = n - m$ , sabemos que dicho  $H$  cumple que  $\langle H \cup L' \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$

Sin pérdida de generalidad digamos que  $H = \{ \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{n-m} \}$

Ahora  $\vec{v}_{m+1}$  pertenece a  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ , entonces se tiene que expresar como combinación lineal de elementos de  $H$  y de  $L'$ , ahora alguno de los elementos de  $H$  (digamos  $\vec{u}_i$ ) tiene que ser diferente de cero, porque sino todos fueran cero podríamos expresar a  $\vec{v}_{m+1}$  como combinación lineal de  $L'$ , por lo que  $L$  no sería linealmente independiente, pero por construcción lo es. Así que no. -.-

Ahora usemos a ese elemento que no es cero y despejemos a  $\vec{v}_{m+1}$ , entonces podemos expresarlo como combinación lineal de  $L'$  y de  $H'$  donde  $H' = H - \{ \vec{u}_i \}$  entonces mira que  $\langle L \cup H' \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ .

Y queda demostrado.

- Dado  $S$  una base de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  cualquier otro conjunto linealmente independiente de  $n$  elementos es una base de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ .

**Demostración:**

Usemos el teorema que dice que “ Dado  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}} = \langle G \rangle$  donde  $G = \{ \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \}$  donde  $G$  es base. Además, dado a  $L$  como subconjunto linealmente independiente de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  tal que  $|L| = m$ , y  $m \leq n$ , entonces existe otro conjunto  $H$  tal que  $|H| = n - m$  tal que  $\langle L \cup H \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  ”

Entonces, supongamos un conjunto  $S = \{ \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \}$ , entonces por ese teorema existe otro conjunto de  $n - n$  elementos que al unirlo con  $S$  puede generar a  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ , pero un conjunto de 0 elementos es el vacío, por lo tanto  $\langle S \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ , por lo tanto por definición es base.

- Todas las bases de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  tiene la misma cardinalidad

**Demostración:**

Ok, este esta bueno, sea  $S$  un conjunto de más de  $n$  elementos.

Ahora vamos a pensar que es linealmente independiente, veamos que pasa:

Suponte un subconjunto de  $S$ , llamada *miniS* que tenga ahora si  $n$  elementos, además como supusimos que  $S$  es linealmente independiente, entonces todos sus subconjuntos en especial *miniS* también es linealmente independiente. Ahora bien por el teorema anterior tenemos que cualquier conjunto linealmente independiente de  $n$  elementos es una base, por lo tanto *miniS* es base. Entonces recuerda que podremos escribir a todos los elementos de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  como combinación lineal de *miniS*, eso incluye a todos los elementos de  $S - \text{miniS}$ , por lo tanto  $S$  no puede ser linealmente independiente, pero dijimos que si, es decir contradicción.

Si algun subconjunto del espacio vectorial tiene mas de  $n$  elementos entonces no puede ser linealmente independiente y por lo tanto no puede ser base.

Ahora bien si  $S$  tiene menos de  $n$  elementos, digamos que tiene  $m$  elementos, entonces tampoco puede ser base pues por el teorema: “ Dado  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}} = \langle G \rangle$  donde  $G = \{ \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \}$  donde  $G$  es base. Además, dado a  $L$  como subconjunto linealmente independiente de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  tal que  $|L| = m$ , y  $m \leq n$ , entonces existe otro conjunto  $H$  tal que  $|H| = n - m$  tal que  $\langle L \cup H \rangle = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  ” necesitamos agregarle otro conjunto de  $n - m$  elementos para que pueda generar a  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  entonces tampoco puede ser base.

- Cualquier conjunto de  $n+1$  vectores en un espacio de dimensión  $n$  es linealmente dependiente.

**Demostración:**

Suponte que no, que encontramos un conjunto  $S \subseteq \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  que tenga  $n + 1$  elementos donde  $\dim(\mathbb{V}_{\mathbb{F}}) = n$ .

Suponte un subconjunto de  $S$ , llamada *miniS* que tenga ahora si  $n$  elementos, además como supusimos que  $S$  es linealmente independiente, entonces todos sus subconjuntos en especial *miniS* también es linealmente independiente.

Ahora bien por el teorema anterior tenemos que cualquier conjunto linealmente independiente de  $n$  elementos es una base, por lo tanto *miniS* es base. Entonces recuerda que podremos escribir a todos los elementos de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  como combinación lineal de *miniS*, eso incluye a todos los elementos de  $S - \text{miniS}$ , por lo tanto  $S$  no puede ser linealmente independiente, pero dijimos que si, es decir contradicción.

Si algun subconjunto del espacio vectorial tiene mas de  $n$  elementos entonces no puede ser linealmente independiente

- Todo subconjunto  $\beta$  de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  linealmente independiente con  $|\beta| < n$  y  $n = \dim(\mathbb{V}_{\mathbb{F}})$  entonces puede ser completada hasta que  $\beta$  sea base.
- Dado  $\mathbb{W}$  subespacio vectorial de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  donde  $\dim(\mathbb{V}_{\mathbb{F}}) = n$  entonces  $\dim(\mathbb{W}) \leq n$ . Y si  $\dim(\mathbb{W}) = n$ , entonces tenemos que  $\mathbb{W} = \mathbb{V}$
- Si  $\mathbb{W}_1, \mathbb{W}_2, \mathbb{W}_3$  es subespacio vectorial de  $\mathbb{V}$  entonces  $\mathbb{W}_1 \cup \mathbb{W}_2 \subseteq \mathbb{W}_3$  entonces  $\mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2 \subseteq \mathbb{W}_3$

**Demostración:**

Sea  $\vec{x} \in \mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2$ , entonces lo podemos dividir en  $\vec{x}_1 + \vec{x}_2$ , por lo tanto como  $\vec{x}_1 \in \mathbb{W}_1$  también esta en  $\mathbb{W}_3$ , de manera analoga con  $\vec{x}_2$ , y como  $\mathbb{W}_3$  es en si un espacio, es cerrado bajo la suma y estan en  $\mathbb{W}_3$

- $\mathbb{W}_1 \cup \mathbb{W}_2$  es un espacio vectorial si y solo si uno es un subconjunto del otro
- Dado un subespacio vectorial  $\mathbb{W}$  de  $\mathbb{V}$  y  $\vec{v} \in \mathbb{V}$  entonces tenemos que:  
 $\{ \vec{v} \} + \mathbb{W}$  es un subespacio si y solo si  $\vec{v} \in \mathbb{W}$

**Demostración:**

Por un lado supongamos que  $\{ \vec{v} \} + \mathbb{W}$  es un subespacio por lo tanto contiene al  $\vec{0}$ .

Ahora, si  $\vec{v} = \vec{0}$ , entonces como  $\mathbb{W}$  es espacio, también lo contiene y ya acabamos.

Por otro lado si no es el cero vector tenemos que  $\vec{0} \in \{ \vec{v} \} + \mathbb{W}$  se tiene que expresar como  $\vec{0} = \vec{v} + \vec{x}$ , y como los inversos son unicos en  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  entonces  $\vec{x} = -\vec{v}$ , con  $\vec{x} \in \mathbb{W}$ , pero como es un espacio entonces es cerrado bajo el producto y tenemos que  $-\vec{v} \in \mathbb{W}$  por lo tanto  $(-1) - \vec{v} = \vec{v} \in \mathbb{W}$

Por otro lado si  $\vec{v} \in \mathbb{W}$  entonces  $\{ \vec{v} \} + \mathbb{W} = \mathbb{W}$  porque como  $\mathbb{W}$  es cerrado bajo la suma podemos ver que  $\forall \vec{x} \in \mathbb{W}$ ,  $\vec{v} + \vec{x} \in \mathbb{W}$ , es decir,  $\{ \vec{v} \} + \mathbb{W}$  y  $\mathbb{W}$  son la misma cosa --



- Dados  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  y  $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}$ . Demuestre que si  $\{\vec{u}, \vec{v}\}$  es base de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ , entonces para cada  $a, b \in \mathbb{F} - \{0\}$ ,  $\{a\vec{u}, b\vec{v}\}$  también lo es.

**Demostración:**

Ok, sabemos que  $\{\vec{u}, \vec{v}\}$  es base de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ , por lo tanto, ese pequeño conjunto cumple que  $\{\vec{u}, \vec{v}\}$  es linealmente independiente y que genera a  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ .

Ahora veamos que pasa para algunas  $a, b$  arbitrarias (pero que no sean cero) con este conjunto:  $\{a\vec{u}, b\vec{v}\}$ , veamos si es linealmente dependiente, es decir existe una combinación lineal no trivial que te da el cero vector. Es decir si existe  $k_1, k_2$  con alguno mínimo diferente de cero para los cuales la ecuación  $\vec{0} = k_1 a\vec{u} + k_2 b\vec{v}$  tiene solución.

Ahora, sabemos que  $\{\vec{u}, \vec{v}\}$  es linealmente independiente por hipótesis, por lo tanto podemos decir que la ecuación  $\vec{0} = q_1 \vec{u} + q_2 \vec{v}$  implica que  $q_1 = q_2 = 0$ .

Entonces ve que por lo anterior  $\vec{0} = (k_1 a)\vec{u} + (k_2 b)\vec{v}$  nos obliga a que  $k_1 a$  y  $k_2 b$  sean cero, pero es que  $a, b$  no pueden ser cero por hipótesis, por lo tanto tenemos que ve que  $k_1, k_2$  son cero.

Por lo tanto  $\{a\vec{u}, b\vec{v}\}$  es linealmente independiente.

Ahora, veamos que sigue generando a  $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ .

A ver, por un lado tenemos que  $\{\vec{u}, \vec{v}\}$  genera a  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ , es decir  $\forall \vec{x} \in \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  podemos decir que  $\vec{x} = k_1 \vec{u} + k_2 \vec{v}$

Ahora hagamos magia:

$$\begin{aligned} \vec{x} &= k_1 \vec{u} + k_2 \vec{v} && \text{por lo de arriba} \\ &= \frac{k_1}{a} a\vec{u} + \frac{k_2}{b} b\vec{v} && \text{Podemos dividir porque ni a ni b son cero} \\ &= k'_1 a\vec{u} + k'_2 b\vec{v} && \text{Mira, lo pude escribir como combinacion lineal de } a\vec{u}, b\vec{v} \end{aligned}$$

Mira, como aun puedo escribir cualquier elemento de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  como combinación lineal de los elementos de  $\{a\vec{u}, b\vec{v}\}$ . Por lo tanto sigue generando a  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ .

Por lo tanto  $\{a\vec{u}, b\vec{v}\}$  es base.

- Sean  $B_1, B_2$  dos bases ajenas de dos subespacios vectoriales  $\mathbb{W}_1, \mathbb{W}_2$  de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$ , entonces si  $B_1 \cup B_2$  es base de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  entonces  $\mathbb{W}_1 \oplus \mathbb{W}_2 = \mathbb{V}_{\mathbb{F}}$

**Demostración:**

Ok, este teorema parece tener mucho sentido, veamos porque: Por un lado si  $B_1 \cup B_2$  es base de  $\mathbb{V}_{\mathbb{F}}$  entonces vemos que  $B_1 \cup B_2$  es linealmente independiente. Ahora por ser bases ellas tienen que ser linealmente independientes, ahora, además nos dicen que son bases ajenas, es decir que no tienen elementos en común.

Ahora probemos las 3 propiedades para ver que ambos subespacios son una suma directa:

•

## Capítulo 8

# Transformaciones Lineales

## 8.1. Definiciones y Características

Sean  $\mathbb{V}$  y  $\mathbb{W}$  espacios vectoriales sobre  $\mathbb{F}$ .

Una función  $\mathcal{T} : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$  se le llama una transformación lineal de  $\mathbb{V}$  a  $\mathbb{W}$  si y solo si  $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{V}$  y  $c \in \mathbb{F}$  tenemos que:

- $\mathcal{T}(\vec{x} +_{\mathbb{V}} \vec{y}) = \mathcal{T}(\vec{x}) +_{\mathbb{W}} \mathcal{T}(\vec{y})$
- $\mathcal{T}(c\vec{x}) = c\mathcal{T}(\vec{x})$

### 8.1.1. Propiedades

- $\mathcal{T}(\vec{0}_{\mathbb{V}}) = \vec{0}_{\mathbb{W}}$

**Demostración:**

Esta esta muy facil:

$$\begin{aligned}\mathcal{T}(\vec{0}_{\mathbb{V}}) &= \mathcal{T}(\vec{x} - \vec{x}) \\ &= \mathcal{T}(\vec{x}) - \mathcal{T}(\vec{x}) \\ &= \vec{0}_{\mathbb{W}}\end{aligned}$$

### 8.1.2. Ejemplos

#### Ejemplo 1:

Sea  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  tal que:

$$\mathcal{T} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - z \\ y + z \end{pmatrix}$$

Probemos que esta  $\mathcal{T}$  es una Transformación Lineal:

Probemos la primera propiedad como:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(v_1 + v_2) &= \mathcal{T} \left( \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \right) &&= \mathcal{T} \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (x_1 + x_2) - (z_1 + z_2) \\ (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) \end{pmatrix} &&= \begin{pmatrix} x_1 + x_2 - z_1 - z_2 \\ y_1 + y_2 + z_1 + z_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (x_1 - z_1) + (x_2 - z_2) \\ (y_1 + z_1) + (y_2 + z_2) \end{pmatrix} &&= \begin{pmatrix} x_1 - z_1 \\ y_1 + z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 - z_2 \\ y_2 + z_2 \end{pmatrix} \\ &= \mathcal{T} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + \mathcal{T} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \\ &= \mathcal{T}(v_1) + \mathcal{T}(v_2) \end{aligned}$$

Probemos la segunda propiedad:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\alpha v_1) &= \mathcal{T} \left( \alpha \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \mathcal{T} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \\ \alpha z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha x - \alpha z \\ \alpha y + \alpha z \end{pmatrix} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} x - z \\ y + z \end{pmatrix} = \alpha \cdot \mathcal{T} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ &= \alpha \cdot \mathcal{T}(v_1) \end{aligned}$$

Por lo tanto las 2 propiedades se cumplen así que si que es una transformación lineal.

**Ejemplo 2:**

Ve que falla con el siguiente intento de Transformación Lineal:

Sea  $\mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$  tal que:

$$\mathcal{T}(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (3 + a_0x + a_1x^2 + a_2x^3)$$

Esta muere de una manera muy estúpida, pues no lleva el cero vector al nuevo cero vector XD.

## 8.2. Proyecciones

Sean  $\mathbb{V}$  un espacio vectorial y  $\mathbb{W}$  un subespacio vectorial sobre  $\mathbb{F}$ .

Una función  $\mathcal{T} : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$  se le llama una proyección si y solo si:

- Existe otro subespacio de  $\mathbb{W}_2$  tal que  $\mathbb{W} \oplus \mathbb{W}_2 = \mathbb{V}$
- Para  $\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$  donde  $x_1 \in \mathbb{W}$  y  $x_2 \in \mathbb{W}_2$  tenemos que  $\mathcal{T}(\vec{x}) = \vec{x}_1$

### 8.3. Kernel y Rango

### 8.3.1. Definición del Kernel

Sean  $\mathbb{V}$  y  $\mathbb{W}$  espacios vectoriales sobre  $\mathbb{F}$ . Y sea  $\mathcal{T}$  una transformación lineal de  $\mathbb{V}$  a  $\mathbb{W}$

**El Kernel** de la Transformación Lineal  $\mathcal{T}$  o **Núcleo** es el conjunto de todos los vectores originales (osea  $\vec{v} \in \mathbb{V}$ ) tales que al momento de aplicarles la transformación estos son llevados al origen (osea  $\vec{0}_{\mathbb{W}}$ )

O dicho con el bello lenguaje de matemáticas:

$$\text{Kernel}(\mathcal{T}) = N(\mathcal{T}) = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{V} \mid \mathcal{T}(\vec{x}) = \vec{0}_{\mathbb{W}} \right\}$$

Recuerda que un Kernel siempre siempre sera un Subespacio Vectorial y solemos llamar a su dimensión la **Nulidad**.

### 8.3.2. Definición del Rango

Sean  $\mathbb{V}$  y  $\mathbb{W}$  espacios vectoriales sobre  $\mathbb{F}$ . Y sea  $\mathcal{T}$  una transformación lineal de  $\mathbb{V}$  a  $\mathbb{W}$

Tambien tenemos a la hermana perdida del Kernel, la llamamos la **Imágen**, la cual la definimos así:

La **Imágen** de una Transformación Lineal  $\mathcal{T}$  es el conjunto de todos los vectores nuevos (osea  $\vec{w} \in \mathbb{W}$ ) que podemos 'crear' desde los vectores originales (osea  $\vec{v} \in \mathbb{V}$ ) usando la Transformación Lineal.

O dicho con el bello lenguaje de matemáticas:

$$\text{Rango}(\mathcal{T}) = R(\mathcal{T}) = \text{Imagen}(\mathcal{T}) = \left\{ \vec{T}(\vec{x}) \in \mathbb{W} \mid \vec{x} \in \mathbb{V} \right\}$$

Recuerda que una Imagen siempre siempre sera un Espacio Vectorial y solemos llamar a su dimensión **Rango**.



### 8.3.3. Propiedades

- $K[\mathcal{T}]$  es un espacio vectorial

**Demostración:**

Dados  $\mathbb{V}$  y  $\mathbb{W}$  y una transformada lineal que va de  $\mathbb{V}$  a  $\mathbb{W}$ . Entonces tenemos que:

- El cero esta.  
Como  $\mathcal{T}(\vec{0}_{\mathbb{V}}) = \vec{0}_{\mathbb{W}}$   
Entonces mapea el cero a cero y más aún, ahora sabemos que el Kernel nunca será un conjunto vacío.
- Conserva las operaciones  
Dados  $\vec{a}, \vec{b} \in K[\mathcal{T}]$  tenemos que:

$$\begin{aligned}\mathcal{T}(d\vec{a} + \vec{b}) &= \mathcal{T}(d\vec{a}) + \mathcal{T}(\vec{b}) \\ &= \mathcal{T}(d\vec{a}) + \vec{0}_{\mathbb{W}} \\ &= d\mathcal{T}(\vec{a}) + \vec{0}_{\mathbb{W}} \\ &= d\vec{0}_{\mathbb{W}} + \vec{0}_{\mathbb{W}} \\ &= \vec{0}_{\mathbb{W}} + \vec{0}_{\mathbb{W}} \\ &= \vec{0}_{\mathbb{W}}\end{aligned}$$

- $R[\mathcal{T}]$  es un espacio vectorial

**Demostración:**

Dados  $\mathbb{V}$  y  $\mathbb{W}$  y una transformada lineal que va de  $\mathbb{V}$  a  $\mathbb{W}$ . Entonces tenemos que:

- El cero esta.  
Como  $\mathcal{T}(\vec{0}_{\mathbb{V}}) = \vec{0}_{\mathbb{W}}$   
Entonces el  $\vec{0}_{\mathbb{W}} \in R[\mathcal{T}]$  porque existe un vector en  $\mathbb{V}$  al que la transformación lineal lo manda.
- Conserva las operaciones  
Dados  $\vec{a}, \vec{b} \in R[\mathcal{T}]$ , es decir existen vectores tales que  $\mathcal{T}(\vec{v}) = \vec{a}$  y  $\mathcal{T}(\vec{u}) = \vec{b}$  tenemos que:

$$\begin{aligned}\mathcal{T}(d\vec{v} + \vec{u}) &= \mathcal{T}(d\vec{v}) + \mathcal{T}(\vec{u}) \\ &= \mathcal{T}(d\vec{v}) + \vec{b} \\ &= d\mathcal{T}(\vec{v}) + \vec{b} \\ &= d\vec{a} + \vec{b}\end{aligned}$$

- Sea  $B$  una base de  $\mathbb{V}$  entonces  $R[\mathcal{T}] = \langle \mathcal{T}[B] \rangle$

**Demostración:**

A fin de cuentas es la igualdad entre 2 conjuntos, así que vamos por doble contención para hacerlo. Sea  $B = \{ \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \}$ , entonces:

- Por un lado, sea  $\vec{u} \in R[\mathcal{T}]$  entonces tenemos que existe un  $\vec{x} \in \mathbb{V}$  que al  $\mathcal{T}(\vec{x}) = \vec{u}$  donde tenemos que  $\vec{x} = \sum_{i=1}^n a_i \vec{v}_i$ , entonces:

$$\mathcal{T}(\vec{x}) = \mathcal{T}\left(\sum_{i=1}^n a_i \vec{v}_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathcal{T}(a_i \vec{v}_i) = \sum_{i=1}^n a_i \mathcal{T}(\vec{v}_i)$$

Y nota que  $\sum_{i=1}^n a_i \mathcal{T}(\vec{v}_i) \in \langle \mathcal{T}[B] \rangle$

- La otra contención es .... es básicamente lo mismo