

PROYECTO COMPILANDO CONOCIMIENTO

ECUACIONES DIFERENCIALES

---

# La Transformada de Laplace

---

Introducción

**AUTOR:**

Rosas Hernandez Oscar Andres

# Índice general

# Capítulo 1

## La Transformada de Laplace

## 1.1. Definición

Dada una función  $f(t)$  definida para toda  $t \geq 0$  la transformada de Laplace de  $f$  es la función  $F(s)$  definida de la siguiente manera:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \quad (1.1)$$

en todos los valores de  $s$  para los cuales la Integral Impropia converge. Recuerda que una Integral Impropia:

$$\int_0^{\infty} g(t) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b g(t) dt$$

## 1.2. Tabla de Transformación

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
$k$	$\frac{k}{s}$
$e^{at}$	$\frac{1}{s-a}$
$\text{sen}(kt)$	$\frac{k}{s^2 + k^2}$
$\cos(kt)$	$\frac{s}{s^2 + k^2}$
$\text{senh}(kt)$	$\frac{k}{s^2 - k^2}$
$\cosh(kt)$	$\frac{s}{s^2 - k^2}$
$g'(t)$	$s\mathcal{L}\{g(t)\} - f(0)$

### 1.3. Demostraciones de la Tabla

#### 1.3.1. $f(t) = k$

Calcule la Transformada de Laplace cuando  $f(t) = k$

Recuerda que podemos hacer que:  $\mathcal{L}\{k\} = k \cdot \mathcal{L}\{1\}$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{1\} = F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} 1 dt \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-st} dt \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{s} - \frac{e^{-sb}}{s} \right] \\ &= \frac{1}{s}\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{L}\{k\} = \frac{k}{s} \tag{1.2}$$

#### 1.3.2. $f(t) = e^{at}$

Calcule la Transformada de Laplace cuando  $f(t) = e^{at}$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{at}\} = F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot e^{at} dt \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-st+at} dt \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-(s-a)t} dt \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left. \frac{e^{-(s-a)t}}{-(s-a)} \right|_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \frac{e^{-(s-a)b}}{-(s-a)} - \frac{e^{-(s-a)0}}{-(s-a)} \right] \\ &= \frac{1}{s-a}\end{aligned}$$

**1.3.3.**  $f(t) = \text{sen}(kt)$ 

Calcule la Transformada de Laplace cuando  $f(t) = \text{sen}(kt)$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\text{sen}(kt)\} = F(s) &= \mathcal{L}\left\{\frac{e^{kti} - e^{-kti}}{2i}\right\} \\&= \frac{1}{2i} (\mathcal{L}\{e^{kti}\} - \mathcal{L}\{e^{-kti}\}) \\&= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - ki} - \frac{1}{s + ki}\right) \\&= \frac{1}{2i} \left(\frac{s + ki - (s - ki)}{s^2 + k^2}\right) \\&= \frac{1}{2i} \left(\frac{2ki}{s^2 + k^2}\right) \\&= \frac{k}{s^2 + k^2}\end{aligned}$$

**1.3.4.**  $f(t) = \cos(kt)$ 

Calcule la Transformada de Laplace cuando  $f(t) = \cos(kt)$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = F(s) &= \mathcal{L}\left\{\frac{e^{kti} + e^{-kti}}{2i}\right\} \\&= \frac{1}{2i} (\mathcal{L}\{e^{kti}\} + \mathcal{L}\{e^{-kti}\}) \\&= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - ki} + \frac{1}{s + ki}\right) \\&= \frac{1}{2i} \left(\frac{s - ki + s + ki}{s^2 + k^2}\right) \\&= \frac{1}{2i} \left(\frac{2si}{s^2 + k^2}\right) \\&= \frac{s}{s^2 + k^2}\end{aligned}$$

**1.3.5.**  $f(t) = \sinh(kt)$ 

Calcule la Transformada de Laplace cuando  $f(t) = \sinh(kt)$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = F(s) &= \mathcal{L}\left\{\frac{e^{kt} - e^{-kt}}{2i}\right\} \\
 &= \frac{1}{2} (\mathcal{L}\{e^{kt}\} - \mathcal{L}\{e^{-kt}\}) \\
 &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{s-k} - \frac{1}{s+k} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left( \frac{s+k - (s-k)}{s^2 - k^2} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left( \frac{2k}{s^2 - k^2} \right) \\
 &= \frac{k}{s^2 - k^2}
 \end{aligned}$$

**1.3.6.**  $f(t) = \cosh(kt)$ 

Calcule la Transformada de Laplace cuando  $f(t) = \cosh(kt)$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = F(s) &= \mathcal{L}\left\{\frac{e^{kt} + e^{-kt}}{2i}\right\} \\
 &= \frac{1}{2} (\mathcal{L}\{e^{kt}\} + \mathcal{L}\{e^{-kt}\}) \\
 &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{s-k} + \frac{1}{s+k} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left( \frac{s+k + s-k}{s^2 - k^2} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left( \frac{2s}{s^2 - k^2} \right) \\
 &= \frac{s}{s^2 - k^2}
 \end{aligned}$$



**1.3.7.**  $f(t) = g'(t)$ 

Calcule la Transformada de Laplace cuando  $f(t) = \cosh(kt)$

Recuerda que vamos a usar este cambio de variable:

$$\blacksquare \quad u = e^{-st} \quad \rightarrow \quad du = -se^{-st}dt$$

$$\blacksquare \quad dv = g'(t) \quad \rightarrow \quad v = g(t)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{g'(t)\} &= F(s) = \int_0^\infty e^{-st}g'(t)dt \\ &\stackrel{\text{Aplicando Cambios}}{=} e^{-st}f(t)|_0^\infty - \int_0^\infty -se^{-st}g(t)dt \\ &= e^{-st}f(t)|_0^\infty + s \int_0^\infty e^{-st}g(t)dt \\ &= e^{-st}f(t)|_0^\infty + s\mathcal{L}\{g(t)\} \\ &= (e^{-s\infty}f(\infty)) - (e^{-s0}f(0)) + s\mathcal{L}\{g(t)\} \\ &= -f(0) + s\mathcal{L}\{g(t)\} \\ &= s\mathcal{L}\{g(t)\} - f(0)\end{aligned}$$

## 1.4. Ejemplos Útiles

$$f(t) = e^{t+7}$$

Calcule la Transformada de Laplace cuando  $f(t) = e^{t+7}$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{t+7}\} &= \\ &= \mathcal{L}\{e^t \cdot e^7\} \\ &= e^7 \cdot \mathcal{L}\{e^t\} \\ &= e^7 \frac{1}{s-1} \\ &= \frac{e^7}{s-1}\end{aligned}$$

## Capítulo 2

### Ecuaciones con Laplace

## 2.1. Ecuaciones de 2do Grado

$$y' + ay = 0$$

Usando la Transformada de Laplace:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y' - ay\} &= L\{0\} \\ \mathcal{L}\{y'\} - a\mathcal{L}\{y\} &= L\{0\} \\ s\mathcal{L}\{y\} - y(0) - a\mathcal{L}\{y\} &= 0 \\ (s - a)\mathcal{L}\{y\} &= y(0) \\ \mathcal{L}\{y\} &= \frac{y(0)}{s - a} \\ \mathcal{L}\{y\} &= y(0)\mathcal{L}\{e^{ax}\} \\ \mathcal{L}\{y\} &= \mathcal{L}\{y(0) \cdot e^{ax}\} \\ y &= y(0) \cdot e^{ax}\end{aligned}$$

# Bibliografía

- [1] ProbRob  
Youtube.com