

RESULTATS

Repartition selon les classes d'âges

Repartition selon le sexe

| SEXE | n | Percent |
|---------------|-----|---------|
| (Non précisé) | 8 | 4.44 |
| F | 20 | 11.11 |
| M | 152 | 84.44 |
| All | 180 | 100.00 |

Repartition selon la profession

| PROFESSION | n | Percent |
|-------------------|-----|---------|
| (Autres) | 98 | 54.444 |
| (Non précisé) | 30 | 16.667 |
| Agent de sécurité | 1 | 0.556 |
| Commerçant | 7 | 3.889 |
| Conducteur | 1 | 0.556 |
| Cultivateur | 17 | 9.444 |
| Electricien | 1 | 0.556 |
| Fonctionnaire | 18 | 10.000 |
| Informaticien | 1 | 0.556 |
| Ménagère | 3 | 1.667 |
| Plombier | 1 | 0.556 |
| Policier | 1 | 0.556 |
| Soudeur | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

Repartition selon les motifs de consultation

| ERECTION CONTINUE | n | Percent |
|-------------------|-----|---------|
| FALSE | 172 | 95.56 |
| TRUE | 8 | 4.44 |
| All | 180 | 100.00 |

| IMPOSSIBILITÉ TOTALE D'URINER | n | Percent |
|-------------------------------|-----|---------|
| FALSE | 112 | 62.2 |
| TRUE | 68 | 37.8 |
| All | 180 | 100.0 |

| URINES ROUGES OU FONCEES | n | Percent |
|--------------------------|-----|---------|
| FALSE | 93 | 51.7 |
| TRUE | 87 | 48.3 |
| All | 180 | 100.0 |

| ANURIE | n | Percent |
|--------|-----|---------|
| FALSE | 179 | 99.444 |
| TRUE | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

| | n | Percent |
|-------|-----|---------|
| FALSE | 180 | 100 |
| All | 180 | 100 |

| | n | Percent |
|-------|-----|---------|
| FALSE | 180 | 100 |
| All | 180 | 100 |

| | n | Percent |
|-------|-----|---------|
| FALSE | 180 | 100 |
| All | 180 | 100 |

| DOULEURS PELVI-PERINEALES | n | Percent |
|---------------------------|-----|---------|
| FALSE | 179 | 99.444 |
| TRUE | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

| ERECTION INCURVEE | n | Percent |
|-------------------|-----|---------|
| FALSE | 179 | 99.444 |
| TRUE | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

| FIEVRE OU AEG | n | Percent |
|---------------|-----|---------|
| FALSE | 171 | 95 |
| TRUE | 9 | 5 |
| All | 180 | 100 |

| DOULEURS LOMBO-ABDOMINALES | n | Percent |
|----------------------------|-----|---------|
| FALSE | 175 | 97.22 |
| TRUE | 5 | 2.78 |
| All | 180 | 100.00 |

| | n | Percent |
|-------|-----|---------|
| FALSE | 180 | 100 |
| All | 180 | 100 |

| DOULEURS TESTICULAIRES | n | Percent |
|------------------------|-----|---------|
| FALSE | 179 | 99.444 |
| TRUE | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

| IRO | n | Percent |
|-------|-----|---------|
| FALSE | 179 | 99.444 |
| TRUE | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

| MASSE LOMBAIRE | n | Percent |
|----------------|-----|---------|
| FALSE | 179 | 99.444 |
| TRUE | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

| | n | Percent |
|-------|-----|---------|
| FALSE | 180 | 100 |
| All | 180 | 100 |

| TUMEFACCTION SCROTAL | n | Percent |
|----------------------|-----|---------|
| FALSE | 175 | 97.22 |
| TRUE | 5 | 2.78 |
| All | 180 | 100.00 |

| PLAIES DES OGE | n | Percent |
|----------------|-----|---------|
| FALSE | 179 | 99.444 |
| TRUE | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

| | n | Percent |
|-------|-----|---------|
| FALSE | 180 | 100 |
| All | 180 | 100 |

| DYSURIE | n | Percent |
|---------|-----|---------|
| FALSE | 179 | 99.444 |
| TRUE | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

| PLAIE PENETRANTE LOMBAIRE | n | Percent |
|---------------------------|-----|---------|
| FALSE | 179 | 99.444 |
| TRUE | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

| SUPPURATION POST-APPENDICULAIRE | n | Percent |
|---------------------------------|-----|---------|
| FALSE | 179 | 99.444 |
| TRUE | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

| ERECTION DOULOUREUSE | n | Percent |
|----------------------|-----|---------|
| FALSE | 179 | 99.444 |
| TRUE | 1 | 0.556 |
| All | 180 | 100.000 |

| AUTRES MOTIFS DE CONSULTATION | n | Percent |
|-------------------------------|-----|---------|
| FALSE | 176 | 97.78 |
| TRUE | 4 | 2.22 |
| All | 180 | 100.00 |