

# 第3章 解线性方程组的直接法

主讲：纪庆革副教授

中山大学数据科学与计算机学院


E-Mail: 1024180018@qq.com



在实践中存在大量的解线性方程组的问题。

很多数值方法到最后也会涉及到线性方程组的求解问题：

如样条插值，曲线拟合，方程组的Newton迭代等问题。



对线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

或者:  $Ax = b$

我们有**Gram**法则: 当且仅当  $\det(A) \neq 0$  时, 有唯一的解, 而且解为:

$$x_i = \frac{D_i}{D}, D = \det(A), D_i = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i-1} & b_1 & a_{1i+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni-1} & b_n & a_{ni+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

但 **Gram** 法则不能用于计算方程组的解，如  $n=100$ ， $10^{33}$ 次/秒的计算机要算 $10^{120}$ 年

解线性方程组的方法可以分为2类：

①**直接法**：准确，可靠，理论上得到的解是精确的

②**迭代法**：速度快，但有误差

本部分讲解直接法

# 主要内容

- 3.1 高斯消元法
- 3.2 高斯主元素消元法
- 3.3 直接分解法
- 3.3 矩阵范数和条件数
- 3.4 条件数和病态矩阵



## 3.1 高斯消元法

我们知道，下面有3种方程的解我们可以直接求出：

①

$$A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}) \Rightarrow x_i = \frac{b_i}{a_{ii}}, i = 1, \dots, n$$

$n$ 次运算

②

$$A = \begin{pmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{pmatrix} \Rightarrow x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} x_j}{l_{ii}}, i = 1, \dots, n$$

$(n+1) n/2$ 次运算

③

$$A = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{pmatrix} \Rightarrow x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j}{u_{ii}}, i = n, \cdots, 1$$

$(n+1) n/2$ 次运算

对方程组，作如下的变换，解不变

①交换两个方程的次序

②一个方程的两边同时乘以一个非0的数

③一个方程的两边同时乘以一个非0数，加到另一个方程

因此，对应的对增广矩阵 $(A, b)$ ，作如下的变换，解不变：

①交换矩阵的两行

②某一行乘以一个非0的数

③某一个乘以一个非0数，加到另一行

**消元法**就是对增广矩阵作上述行的变换，变为我们已知的3种类型之一，而后求根




## ➤ 高斯消元法:



思路

首先将A化为上三角阵，再回代求解。



$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n)} & b_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

步骤如下：

第一步：第1行  $\times \frac{-a_{i1}}{a_{11}} +$  第*i*行,  $i = 2, \dots, n$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{pmatrix}$$

运算量：  $(n-1)*(1+n)$

第二步： 第2行  $\times \frac{-a_{i2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} + \text{第}i\text{行}, i = 3, \dots, n$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n3}^{(3)} & \cdots & a_{nn}^{(3)} & b_n^{(3)} \end{pmatrix}$$

运算量：  $(n-2)*(1+n-1)=(n-2)n$

类似的做下去，我们有：

第 $k$ 步：第 $k$ 行  $\times \frac{-a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} +$  第 $i$ 行,  $i = k + 1, \dots, n$

运算量：  $(n - k) * (1 + n - k + 1) = (n - k)(n - k + 2)$

$n - 1$ 步以后，我们可以得到变换后的矩阵为：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n)} & b_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

因此，总的运算量为：

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n-k)(n-k+2)$$

加上 解上述上三角阵的运算量 $(n+1)n/2$ ，总共为：

$$\frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3} = O(n^3)$$



注意到，计算过程中 $a_{kk}^{(k)}$ 处在被除的位置，因此整个计算过程要保证它不为0

所以，**Gauss**消元法的可行条件为： $a_{kk}^{(k)} \neq 0$

就是要求A的所有顺序主子式均不为0，即

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \end{pmatrix} \neq 0, i = 1, \dots, n$$

因此，有些有解的问题，不能用**Gauss**消元求解

另外，如果某个 $a_{kk}^{(k)}$ 很小的话，会引入大的误差

例：单精度解方程组 
$$\begin{cases} 10^{-9}x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

/\* 精确解为  $x_1 = \frac{1}{1-10^{-9}} = \overbrace{1.00 \dots 0100 \dots}^{8\uparrow}$  和  $x_2 = 2 - x_1 = \overbrace{0.99 \dots 9899 \dots}^{8\uparrow}$  \*/

用Gaussian 消元法计算：

$$m_{21} = a_{21} / a_{11} = \underbrace{10^9}_{8\uparrow}$$

$$a_{22} = 1 - m_{21} \times 1 = \underbrace{0.0 \dots 01}_{8\uparrow} \times 10^9 - 10^9 \doteq -10^9$$

$$b_2 = 2 - m_{21} \times 1 \doteq -10^9$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \underbrace{10^{-9}}_{\text{小主元}} & 1 & 1 \\ 0 & -10^9 & -10^9 \end{bmatrix}$$

小主元可能导致计算失败。

$$\Rightarrow x_2 = 1, \quad x_1 = \underbrace{0}_{\text{错误}}$$

## 3.2 高斯主元素消元法

### 1、问题的提出

在高斯消元过程中，如果出现  $a_{kk}^{(k-1)} = 0$  的情况，这时消元法将无法进行；

即使主元素  $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ ，但当其值很小时，用其作除数，会导致不可靠结果。

例1：P40

## 2、完全主元素消元法

在A中选取绝对值最大的元素作为主元素，如

$$|a_{i_1 j_1}| = \max_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} |a_{ij}|$$

然后交换 $\tilde{A}^{(0)}$ 中的第1行与第 $i_1$ 行，第1列与第 $j_1$ 列，经第1次消元计算，得

$$\tilde{A}^{(0)} \rightarrow \tilde{A}^{(1)}$$

$$\tilde{A}^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & a_{1(n+1)} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} & a_{2(n+1)} \\ & & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & a_{n(n+1)} \end{bmatrix}$$



其次，在 $\tilde{A}^{(1)}$ 中的第2行至第n行及第2列至第n列选取绝对值最大的元素作为主元素，如

$$|a_{i_2 j_2}| = \max_{\substack{2 \leq i \leq n \\ 2 \leq j \leq n}} |a_{ij}|$$

然后交换 $\tilde{A}^{(1)}$ 中的第2行与第 $i_2$ 行，第2列与第 $j_2$ 列，经第2次消元计算，得

$$\tilde{A}^{(1)} \rightarrow \tilde{A}^{(2)}$$

$$\tilde{A}^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & a_{1(n+1)} \\ & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & a_{2(n+1)} \\ & & a_{33} & \cdots & a_{3n} & \\ & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & a_{n3} & \cdots & a_{nn} & a_{n(n+1)} \end{bmatrix}$$



重复上述过程，假设已完成了第 $k-1$ 次消元，则在 $\tilde{A}^{(k-1)}$ 的第 $k$ 行到第 $n$ 行，第 $k$ 列到第 $n$ 列中选取绝对值最大的元素作为主元素，如

$$|a_{i_k j_k}| = \max_{\substack{k \leq i \leq n \\ k \leq j \leq n}} |a_{ij}|$$

然后交换 $\tilde{A}^{(1)}$ 中的第 $k$ 行与第 $i_k$ 行，第 $k$ 列与第 $j_k$ 列，进行第 $k$ 次消元计算。最后得

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1(n+1)} \\ a_{2(n+1)} \\ \vdots \\ a_{n(n+1)} \end{bmatrix}$$

通过回代求得原方程组的解。该方法称为高斯完全主元素消元法

如何节省存储空间？

在消元过程中，可用约化后新的 $a_{ij}$ 冲掉约化前旧的 $a_{ij}$ ，在回代过程中，同样可用代入后新的常数项冲掉代入前旧的常数项，并以此表示未知量。

这种做法与普通消元法相同。

## 2、列主元消元法

在 **Gauss** 消元第  $k$  步之前，做如下的事情：

若  $\max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}| = |a_{jk}^{(k)}|$  交换  $k$  行和  $j$  行

行的交换，不改变方程组的解，同时又有效地克服了 **Gauss** 消元的缺陷

例：

$$\begin{bmatrix} 10^{-9} & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 10^{-9} & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\Rightarrow x_2 = 1, \quad x_1 = 1 \quad \checkmark$$

全主元消去法与列主元消去法的优缺点？

### 3、Gauss-Jordan消元法

将在**Gauss**消元第 $k$ 步，变为

第 $k$ 行  $\times \frac{-a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} +$  第 $i$ 行,  $i = 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n$

最后变为一个对角阵。

将该行上三角地部分也变为0

它的运算次数比**Gauss**消元多。使用于计算多个系数一样的方程组，如

$$AX = B$$

其中  $X, B$  均为矩阵



### 3.3 直接分解法

**Gauss**消元法的第 $k$ 步:

$$\text{第}k\text{行} \times \frac{-a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} + \text{第}i\text{行}, i = k + 1, \dots, n$$

从矩阵理论来看, 相当于左乘矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & 1 & & \\ & & l_{k+1k}^{(k)} & 1 & \\ & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ & & l_{nk}^{(k)} & & & 1 \end{pmatrix}, l_{ik}^{(k)} = \frac{-a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}, i = k + 1, \dots, n$$



因此，整个 **Gauss** 消元法相当于左乘了一个单位下三角阵

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ l_{21} & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ \vdots & & l_{k+1k}^{(k)} & 1 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & \cdots & l_{nk}^{(k)} & \cdots & l_{nn-1}^{(n)} & 1 \end{pmatrix}$$

所以有  $\exists L \quad s.t. \quad LA = U$ ,  $L$  为单位下三角阵, 其中  $L = L_{n-1} \cdots L_2 L_1$ 。

$U$  为上三角阵  $\Rightarrow \exists L \quad s.t. \quad A = LU$ , 其中  $L = L_1^{-1} L_2^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1}$

$$\text{因此 } Ax = b \Rightarrow LUx = b \Rightarrow \begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

我们可以通过2次反代过程求解方程组

定义3.1 设 $A$  为 $n$  阶矩阵 ( $n \geq 2$ )。称 $A=LU$ 为矩阵 $A$ 的三角分解, 其中 $L$ 是下三角矩阵,  $U$ 是上三角矩阵。

定义3.2 如果 $L$ 是单位下三角矩阵,  $U$ 是上三角矩阵, 则称 $A=LU$ 为 Doolittle 分解; 如果 $L$ 是下三角矩阵,  $U$ 是单位上三角矩阵, 则称 $A=LU$ 为 Crout 分解。

定理3.1 如果 $n$ 阶 ( $n \geq 2$ ) 矩阵 $A$ 的前 $n-1$ 个顺序主子式不为零, 则 $A$ 有惟一 Doolittle 分解和惟一的 Crout 分解。

例1: 求矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

的LU分解。(p49)

解: 由高斯消元法

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = 0, l_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = 2$$

且  $A = A^{(0)} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & -4 & -3 \end{bmatrix} = A^{(1)}$

接下来有  $l_{32} = \frac{a_{32}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}} = \frac{-4}{4} = -1$ , 且

$$A^{(1)} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} = A^{(2)}$$

**注意:**

分解的理论由 **Gauss** 消元得出, 因此分解能够进行的条件与 **Gauss** 消元一样

### 1、Doolittle (杜利特尔) 分解

L 为单位下三角, U 为上三角

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

比较第1行:  $a_{1j} = u_{1j} \quad j = 1, \cdots, n \Rightarrow u_{1j} = a_{1j}$

比较第1列:  $a_{i1} = l_{i1} u_{11} \quad i = 2, \cdots, n \Rightarrow l_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}}$



比较第2行:  $a_{2j} = l_{21}u_{1j} + u_{2j} \quad j = 2, \dots, n \Rightarrow u_{2j} = a_{2j} - l_{21}u_{1j}$

比较第2列:  $a_{i2} = l_{i1}u_{12} + l_{i2}u_{22} \quad i = 3, \dots, n \Rightarrow l_{i2} = \frac{a_{i2} - l_{i1}u_{12}}{u_{22}}$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

比较第k行:  $a_{kj} = \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj} + u_{kj} \quad j = k, \dots, n \Rightarrow u_{kj} = a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj}$

比较第k列:

$$a_{ik} = \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk} + l_{ik} u_{kk} \quad i = k+1, \dots, n \Rightarrow l_{ik} = \frac{a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk}}{u_{kk}}$$

K-1次

K-1+1次

分解过程完毕，加上两次反代过程

$$y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j \quad , \quad i = 1, \dots, n$$

$$x_i = \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j}{u_{ii}} \quad , \quad i = n, \dots, 1$$

总运算量为：

$$\sum_{k=1}^{n-1} ((n-k+1)(k-1) + (n-k)k) + \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3}$$

存储在矩阵的原来位置，且不影响计算

$$\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ l_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}$$

## 2、Crout（克洛脱）分解

L为下三角，U为单位上三角

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & 1 & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$



比较第k列:  $a_{ik} = \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk} + l_{ik} \quad i = k, \dots, n \quad \Rightarrow l_{ik} = a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk}$

比较第k行:

$$a_{kj} = \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj} + l_{kk} u_{kj} \quad j = k+1, \dots, n \quad \Rightarrow u_{kj} = \frac{a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj}}{l_{kk}}$$

两次反代过程

$$y_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j}{l_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$

$$x_i = y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j, \quad i = n, \dots, 1$$

下面，我们对一下特殊矩阵，提出一些特定的分解法

### 3. 三对角阵的追赶法

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & \\ c_2 & a_2 & & \\ & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ & & c_n & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & & \\ \gamma_2 & \alpha_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \gamma_n & \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta_1 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & \beta_{n-1} \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \gamma_i = c_i, & i = 2, \dots, n \\ \alpha_i = a_i - c_i \beta_{i-1}, & i = 1, \dots, n, \quad c_1 = 0 \\ \beta_i = b_i / \alpha_i, & i = 1, \dots, n \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_i = (f_i - c_i y_{i-1}) / \alpha_i, & i = 1, \dots, n \\ x_i = y_i - \beta_i x_{i+1}, & i = n, \dots, 1 \quad (\beta_n = 0) \end{cases}$$

所以，有计算过程如下：

$$\begin{cases} \alpha_i = a_i - c_i \beta_{i-1} \\ \beta_i = b_i / \alpha_i \\ y_i = (f_i - c_i y_{i-1}) / \alpha_i \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

$$x_k = y_k - \beta_k x_{k+1}, \quad k = n, \dots, 1$$

### 3. 对称正定阵的 $\mathbf{LDL}^T$ 分解 (平方根法, 也称Cholesky分解法)

若 $\mathbf{A}$ 对称正定, 则有以下三角阵 $\mathbf{L}$ , 使得

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$$


$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} & \cdots & l_{n1} \\ & l_{22} & \cdots & l_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & l_{nn} \end{pmatrix}$$


所以有:

$$\begin{cases} l_{kk} = (a_{kk} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr}^2)^{1/2} \\ l_{ik} = (a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ik} l_{kr}) / l_{kk}, i = k+1, \dots, n \end{cases}$$

称为平方根法,  
因为带了开方运算,  
因此不常用

$$\text{又} \begin{pmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l'_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l'_{n1} & l'_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & & & \\ & l_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & l_{nn} \end{pmatrix}$$


 $\tilde{L}$


 $\tilde{D}$

则有

$$A = \tilde{L} \tilde{D} \tilde{D}^T \tilde{L}^T = L D L^T \quad L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & d_1 l_{21} & \cdots & d_1 l_{n1} \\ & d_2 & \cdots & d_2 l_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$$

比较等号两边后，有

$$\begin{cases} d_k = a_{kk} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr}^2 d_r \\ l_{ik} = \frac{(a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ik} l_{kr} d_r)}{d_k}, i = k+1, \cdots, n \end{cases}$$

改进的平方根法，

$$A = \begin{pmatrix} -6 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ l_{21} & 1 & \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & d_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & l_{21} & l_{31} \\ & 1 & l_{32} \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

$$d_1 = a_{11} = -6 \quad l_{21} = a_{21} / d_1 = -1/2 \quad l_{31} = a_{31} / d_1 = -1/3$$

$$d_2 = a_{22} - l_{21}d_1l_{21} = 13/2 \quad l_{32} = (a_{32} - d_1l_{31}l_{21}) / d_2 = 4/13$$

$$d_3 = a_{33} - l_{31}d_1l_{31} - l_{32}d_2l_{32} = 6\frac{2}{39}$$

为了提高数值稳定性，可考虑列主元三角分解法，设已完成  $A=LU$  的  $k-1$  步分解计算，矩阵分解成

$$\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1k} & \cdots & u_{1n} \\ l_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2k} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ l_{k-11} & l_{k-12} & \cdots & u_{k-1k} & \cdots & u_{k-1n} \\ l_{k1} & l_{k2} & \cdots & a_{kk} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & a_{nk} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\text{设 } a_{ik} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{ij} u_{jk} = \max_{k \leq t \leq n} (a_{tk} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{tj} u_{jk}) \quad \text{令 } r_k \leftrightarrow r_i$$

相当于取  $u_{kk} = a_{ik} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{ij} u_{jk}$  为第  $k$  步分解的主元素。

但要注意方程组的常数项也要相应变换。

### 3.3' 向量的范数

定义1 设  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in R^n$ ,

$$\text{记 } (x, y) = x^T \cdot y = y^T \cdot x = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (3.5.1)$$

为向量x与y的内积。记非负实数

$$\|x\|_2 = \sqrt{(x, x)} = \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3.5.2)$$

称为向量x的欧氏范数。

设  $x, y \in R^n, k$  为实数。

(1) 非负性  $\|x\|_2 \geq 0$  且  $\|x\|_2 = 0$  当且仅当  $x=0$  时成立。

(2) 齐次性  $\|k \cdot x\|_2 = |k| \cdot \|x\|_2$

(3) 柯西-施瓦茨不等式  $|(x, y)| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$

等式当且仅当  $x$  与  $y$  线性相关时成立

(4) 三角不等式  $\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2$



定义2 设 $\|x\|$  是 $R^n$  上定义的一个实值函数, 如果对任意的 $x, y \in R^n$ ,  $k \in R$ , 满足

(1) 非负性  $\|x\| \geq 0$  且  $\|x\| = 0$  当且仅当 $x=0$ 时成立。

(2) 齐次性  $\|k \cdot x\| = |k| \cdot \|x\|$

(3) 三角不等式  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

则称 $\|x\|$  是向量 $x$ 的一个范数 (或模)。

由(3)可推出  $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$

几种常用范数:

(1)  $\infty$ -范数, 也称为最大范数或切比雪夫范数

$$\|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

(2) 1-范数, 也称为绝对范数

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

(3) 2-范数, 也称为欧几里得范数

$$\|x\|_2 = \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

(4)  $p$ -范数  $\|x\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ , 其中  $p \in [1, +\infty)$

上述前三种范数都是p-范数的特殊情况，  
并且满足下列关系：

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_{\infty}$$

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_{\infty}$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$$

引理（向量范数的连续性） 设非负函数 $\|x\|$ 为 $R^n$ 上的任一向量范数，则 $\|x\|$ 是 $x$ 的分量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的连续函数。

定理1（向量范数的等价性定理）

设 $\|x\|_s, \|x\|_t$  为 $R^n$ 上的任意两个向量范数，则存在常数

$C_1, C_2 > 0$ ，使得对一切 $x \in R^n$  的分量恒有

$$C_1 \|x\|_s \leq \|x\|_t \leq C_2 \|x\|_s$$

注1：此定理不能推广到无穷维空间

注2：对于某一个向量 $x$ 来说，如果它的某一种范数小（或大），那么它的任一种范数也不会很大（或很小）



定义3 设  $\{x^{(k)}\}$  为  $R^n$  中一向量序列,  $x^* \in R^n$ , 如果

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{(k)} - x^*\| = 0$$

则称  $x^k$  依范数  $\|\cdot\|$  收敛于  $x^*$ 。

注2: 如果在某种范数意义下向量序列收敛, 则在任何一种范数意义下该向量序列也收敛。

注2: 一般按计算的需要采用不同的范数, 把向量序列  $\{x^{(k)}\}$  收敛于向量  $x^k$  记为  $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$

而不强调是在哪种范数意义下收敛。



定理2 设 $A$ 为 $m \times n$ 阶矩阵，其列向量为线性无关的，如果 $\|\cdot\|$ 是 $R^m$ 中范数，则

$$N(x) = \|Ax\|, x \in R^n$$

是 $R^n$ 中的一种范数。

### 3.3 矩阵范数和条件数

定义 设  $\|\bullet\|$  是以  $n$  阶方阵为变量的实值函数, 且满足条件:

(1) 非负性:  $\|\mathbf{A}\| \geq 0$ , 且  $\|\mathbf{A}\| = 0$  当且仅当  $\mathbf{A} = \mathbf{0}$

(2) 齐次性:  $\|\alpha\mathbf{A}\| = |\alpha| \|\mathbf{A}\|, \alpha \in \mathbb{R}$

(3) 三角不等式:  $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$

(4) 相容性:  $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|$

则称  $\|\mathbf{A}\|$  为矩阵  $\mathbf{A}$  的范数.

定义: 设  $\|\bullet\|$  是  $\mathbb{R}^n$  一种向量范数,  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  记

$$\|\mathbf{A}\| = \max_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|\mathbf{A}x\|}{\|x\|} = \max_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|=1} \|\mathbf{A}x\|$$

称之为由向量范数派生的矩阵算子范数.

对应于3种常见的向量范数，有3种矩阵范数

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \quad \text{列和的最大值}$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad \text{行和的最大值}$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1} \quad \lambda_1 \text{ 是 } A^T A \text{ 的最大特征值, 也称为谱范数}$$

矩阵范数的一些性质:

- ①  $\|A\| \geq 0, \&, \|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$
- ②  $\|\lambda A\| = |\lambda| \cdot \|A\|, \forall \lambda \in R$
- ③  $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|, \quad \forall A, B \in R^n$
- ④  $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|, \quad \forall A, B \in R^n$
- ⑤  $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|, \forall x \in R^n$

定理： 若  $\lambda$  为  $A$  的特征值，则  $|\lambda| \leq \|A\|$

证：  $\lambda \cdot x = A \cdot x$   $x$  为  $A$  的特征值

$$\|\lambda \cdot x\| = \|A \cdot x\|$$

$$\|\lambda \cdot x\| = |\lambda| \cdot \|x\| = \|A \cdot x\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

$$\|A\| \geq \frac{\|A \cdot x\|}{\|x\|} = |\lambda| \quad \text{证毕}$$

定义5.2： 谱半径  $\rho(A) = \max_{1 \leq r \leq n} |\lambda_r|$

易知：  $\rho(A) \leq \|A\|$



### 3.4 条件数和病态矩阵

定义5.3: (条件数)  $Cond_p(A) = \|A\|_p \cdot \|A^{-1}\|_p$   $\|\bullet\|_p$  表示某种范数

设  $Ax = b$  ,  $A$  引入误差  $\delta A$  后 , 解引入误差  $\delta x$  , 则

$$(A + \delta A)(x + \delta x) = b$$

$$\therefore (A + \delta A)\delta x = b - Ax - \delta A \cdot x = -\delta A \cdot x$$

$$\delta x = -(A + \delta A)^{-1} \delta A \cdot x$$

$$\begin{aligned} \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} &\leq \|(A + \delta A)^{-1} \delta A\| \\ &= \|(I + A^{-1} \delta A)^{-1} A^{-1} \delta A\| \end{aligned}$$

$$(A(I + A^{-1} \delta A))^{-1} = (A + \delta A)^{-1}$$



$$\leq \|(I + A^{-1}\delta A)^{-1}\| \cdot \|A^{-1}\delta A\|$$

$$\leq \|(I + A^{-1}\delta A)^{-1}\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \|\delta A\|$$

**注意到**  $\|(I + B)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|}$

因为:  $D = (I + B)^{-1} \Rightarrow 1 = \|I\| = \|(I + B)D\| = \|D + BD\|$

$$\geq \|D\| - \|B\| \cdot \|D\| = \|D\|(1 - \|B\|)$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} &\leq \|A^{-1}\| \cdot \|\delta A\| \cdot \frac{1}{1 - \|A^{-1} \delta A\|} \\
 &\leq \frac{\|A^{-1}\| \cdot \|\delta A\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|\delta A\|} = \frac{\|A^{-1}\| \cdot \|A\| \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|A\| \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \approx \frac{\|A^{-1}\| \cdot \|A\| \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}{\text{很小}}
 \end{aligned}$$

条件数

条件数表示了对误差的放大率

同样，类似有

$$A(x + \delta x) = b + \delta b$$

$$\Rightarrow A \delta x = \delta b$$

$$\Rightarrow \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A^{-1}\| \cdot \|A\| \cdot \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

注：一般判断矩阵是否病态，并不计算 $A^{-1}$ ，而由经验得出。

- ☞ 行列式很大或很小（如某些行、列近似相关）；
- ☞ 元素间相差大数量级，且无规则；
- ☞ 主元消去过程中出现小主元；
- ☞ 特征值相差大数量级。

例  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.99 \\ 0.99 & 0.98 \end{pmatrix}$ ,  $\bar{b} = \begin{pmatrix} 1.99 \\ 1.97 \end{pmatrix}$  精确解为  $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

计算 $\text{cond}(A)_2$ 。

$A^{-1} = \begin{pmatrix} -9800 & 9900 \\ 9900 & -10000 \end{pmatrix}$

解：考察  $A$  的特征根

$$\det(\lambda I - A) = 0 \Rightarrow \begin{aligned} \lambda_1 &= 1.980050504 \\ \lambda_2 &= -0.000050504 \end{aligned}$$

$$\text{cond}(A)_2 = \left| \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right| \approx 39206 \gg 1$$

为对称矩阵




测试病态程度：

给  $\bar{b}$  一个扰动  $\delta \bar{b} = \begin{pmatrix} -0.97 \times 10^{-4} \\ 0.106 \times 10^{-3} \end{pmatrix}$ ，其相对误差为

$$\frac{\|\delta \bar{b}\|_2}{\|\bar{b}\|_2} \approx 0.513 \times 10^{-4} < 0.01\% \quad \text{此时精确解为 } \bar{x}^* = \begin{pmatrix} 3 \\ -1.0203 \end{pmatrix}$$

$$\delta \bar{x} = \bar{x}^* - \bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2.0203 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{\|\delta \bar{x}\|_2}{\|\bar{x}\|_2} \approx 2.0102 > 200\%$$





❖ 本课件是在中国科技大学张瑞老师课件基础上修改而成的，在此表示感谢！