

# 实数

## 1 实数公理

集合  $\mathbb{R}$  为实数集, 若 I-VI 条件成立。

### (I) 加法公理

定义加法运算

$$+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (1)$$

使  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists x + y \in \mathbb{R}$ , 且有:

(1) 中性元素 0:

$$\exists 0 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x + 0 = 0 + x = x$$

(2) 逆元素  $-x$ :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists -x \in \mathbb{R} \Rightarrow x + (-x) = (-x) + x = 0$$

(3) 结合律:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R} \Rightarrow x + (y + z) = (x + y) + z$$

(4) 交换律:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \Rightarrow x + y = y + x$$

14

### (II) 乘法公理

定义乘法运算

$$\bullet : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (2)$$

使  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists x \bullet y \in \mathbb{R}$ , 且有:

(1) 中性元素 1:

$$\exists 1 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x \bullet 1 = 1 \bullet x = x$$

(2) 逆元素  $x^{-1}$ :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists x^{-1} \in \mathbb{R} \Rightarrow x \bullet x^{-1} = x^{-1} \bullet x = 1$$

(3) 结合律:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R} \Rightarrow x \bullet (y \bullet z) = (x \bullet y) \bullet z$$

24 (4) 交换律:

25  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \Rightarrow x \bullet y = y \bullet x$

26

27 (I,II) 加法公理与乘法公理

28  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R} \Rightarrow (x + y) \bullet z = x \bullet z + y \bullet z$

29

30 (III) 序公理

31  $\mathbb{R}$  中元素存在关系  $\leq$ 。对  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}$ , 可判断关系  $x \leq y$  是否成立。且有:

32 (1)  $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x \leq x$

33 (2)  $(x \leq y) \wedge (y \leq x) \Rightarrow x = y$

34 (3)  $(x \leq y) \wedge (y \leq z) \Rightarrow x \leq z$

35 (4)  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \Rightarrow x \leq y \vee y \leq x$

36

37 (I,III) 加法公理与序公理

38  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$

39

40 (II,III) 乘法公理与序公理

41  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x \geq 0) \wedge (y \geq 0) \Rightarrow x \bullet y \geq 0$

42

43 (VI) 连续性 (完备性) 公理

44  $X, Y$  为  $\mathbb{R}$  的非空子集, 且  $\forall x \in X, \forall y \in Y \Rightarrow x \leq y$  则  $\exists c \in \mathbb{R}$ , 使

45  $\forall x \in X, \forall y \in Y \Rightarrow x \leq c \leq y$

46

## 47 2 实数公理之推论

48 加法公理 (I) 之推论

49 (1) 中性元素 0 唯一

50 假设有  $0_1, 0_2$  为  $\mathbb{R}$  中两个不同的零元素, 则  $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2$

51 (2) 任意实数  $x$  有且仅有一个逆元素  $-x$

52 假设  $x_1, x_2$  为  $x \in \mathbb{R}$  的两个不同的逆元素, 则  $x_1 = x_1 + 0 = x_1 + x + x_2 = 0 + x_2 = x_2$

53 (3) 关于  $x$  的方程  $a + x = b$  在  $\mathbb{R}$  中有唯一解  $x = b + (-a)$

54  $a$  有唯一逆元素  $-a$ , 使得  $a + (-a) = 0$ , 故  $b + (-a)$  唯一。且有  $x = x + 0 = a + x + (-a) = b + (-a)$

55

## 乘法公理 (II) 之推论

(1) 中性元素 1 唯一

(2) 任意实数  $x$  有且仅有一个逆元素  $x^{-1}$

(3)  $a \neq 0$  时, 关于  $x$  的方程  $a \bullet x = b$  在  $\mathbb{R}$  中有唯一解  $x = b \bullet a^{-1}$

## (I,II) 之推论

(1)  $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x \bullet 0 = 0 \bullet x = 0$

$x \bullet 0 = x \bullet (0 + 0) = x \bullet 0 + x \bullet 0 \Rightarrow -(x \bullet 0) + x \bullet 0 = x \bullet 0 = 0$

(2)  $x \bullet y = 0 \Rightarrow x = 0 \vee y = 0$

假设  $x \neq 0$ , 方程  $x \bullet y = 0$  有唯一解  $y = 0 \bullet x^{-1} = 0$ ; 假设  $y \neq 0$  同理

(3)  $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow (-1) \bullet x = -x$

给定  $x \in \mathbb{R}$ ,  $-x$  唯一, 且  $x + (-1) \bullet x = x \bullet (1 + (-1)) = x \bullet 0 = 0$

(4)  $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow (-1) \bullet (-x) = x$

(5)  $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow (-x) \bullet (-x) = x \bullet x$

## 序公理之推论

(1)  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \Rightarrow x < y \vee x = y \vee x > y$

(2)  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}$

$x < y \wedge y \leq z \Rightarrow x < z$

$x \leq y \wedge y < z \Rightarrow x < z$

## (I,III), (II,III) 之推论

(1)  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}, \forall w \in \mathbb{R}$

$x < y \Rightarrow x + z < y + z$

$x > 0 \Rightarrow -x < 0$

$x \leq y \wedge z \leq w \Rightarrow x + z \leq y + w$

$x \leq y \wedge z < w \Rightarrow x + z < y + w$

(2)  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}$

$x > 0 \wedge y > 0 \Rightarrow xy > 0$

$x < 0 \wedge y < 0 \Rightarrow xy > 0$

$x > 0 \wedge y < 0 \Rightarrow xy < 0$

$x < y \wedge z > 0 \Rightarrow xz > yz$

$x < y \wedge z < 0 \Rightarrow xz < yz$

89 (3)  $0 < 1$

90 (4)  $\forall x \in \mathbb{R}, x > 0 \Rightarrow x^{-1} > 0$

91 (5)  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x > 0 \wedge x < y \Rightarrow 0 < y^{-1} < x^{-1}$

92

93 **界**

94 集合  $X \subset \mathbb{R}$ , 若  $\exists c \in \mathbb{R}$ , 使得  $\forall x \in X, x \leq c (x \geq c)$ , 则  $c$  为  $X$  之上 (下) 界

95

96 **有界集**

97 既有上确界又有下确界的集合为有界集

98

99 **最值**

100 集合  $X \subset \mathbb{R}$ , 数  $a \in X$ , 若  $\forall x \in X, x \leq a (x \geq a)$ , 则  $a$  为  $X$  之最大值 (最小值), 记作  $\max_{x \in X} x (\min_{x \in X} x)$

101

102 **确界**

103 集合  $X \subset \mathbb{R}$ , 其最小上界为上确界, 记作  $\sup_{x \in X} x$ ; 其最大下界为下确界, 记作  $\inf_{x \in X} x$

104

105 **确界定理**

106 实数集任何有上 (下) 界的子集有唯一上 (下) 确界

107 记上有界集  $X \in \mathbb{R}$ , 其上界集合  $Y = \{y \in \mathbb{R} : \forall x \in X, x \leq y\}$

108 则根据连续性公理,  $\exists c, \forall x \in X, \forall y \in Y, x \leq c \leq y$

109 所以  $c$  为  $X$  之上界, 亦为  $Y$  之下界, 且  $c \in Y$

110 所以  $c = \min Y$

111 所以  $c$  唯一, 且  $c = \sup X$

## 112 3 实数类

113 **自然数  $\mathbb{N}$**

114  $\mathbb{N} = 1, 2, 3, \dots$

115

116 **归纳集**

117 集  $X \subset \mathbb{R}$  为归纳集, 若  $\forall x \in X \Rightarrow x + 1 \in X$

118

119 **自然数集**

120 包含 1 的一切归纳集之交集为自然数集  $\mathbb{N}$

121

## 122 数学归纳原理

123  $E \subset \mathbb{N}, 1 \in E$ , 且有  $x \in E \Rightarrow x + 1 \in E$ , 则  $E = \mathbb{N}$

124

## 125 数学归纳原理之推论

126 (1) 两自然数之和与积为自然数

127 任取  $n \in \mathbb{N}$ , 则  $n + 1 \in \mathbb{N}$

128 假设  $n + m \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}$ , 则  $n + m + 1 \in \mathbb{N}$

129 所以两自然数之和与积为自然数

130 对自然数  $n$ , 有  $n \bullet 1 \in \mathbb{N}$

131 假设  $n \bullet m \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}$ , 则  $n \bullet (m + 1) = n \bullet m + n \in \mathbb{N}$

132 所以两自然数之积为自然数

133 (2)  $n \in \mathbb{N} - \{1\} \Rightarrow n - 1 \in \mathbb{N}$

134 记  $E = \{n - 1 : n \in \mathbb{N} - 1\}$

135 所以  $1 = 2 - 1 \in E$

136 任取  $m \in E, m = n - 1$ , 则  $m + 1 = n = (n + 1) - 1 \in E$

137 所以  $E = \mathbb{N}$

138 (3)  $\forall n \in \mathbb{N}, \{x \in \mathbb{N} : x > n\}$  有最小元素  $n + 1$

139  $n = 1$  时

140 记  $M = \{x \in \mathbb{N} : x = 1 \vee x \geq 2\}$

141 假设  $x \in M$ , 则  $x = 1 \in M \Rightarrow x + 1 = 2 \in M$  或  $x \geq 2 \Rightarrow x + 1 \geq 2 \Rightarrow x + 1 \in M$

142 所以  $M = \mathbb{N}$

143 所以  $x \neq 1 \wedge x \in \mathbb{N} \Rightarrow x \geq 2$

144 所以  $n = 1$  时,  $\min\{x \in \mathbb{N} : n < x\} = n + 1 = 2$

145 假设自然数  $n$  使得命题成立, 即  $\min\{y \in \mathbb{N} : n < y\} = n + 1$

146 取  $x \in \{x \in \mathbb{N} : x > n + 1\}$

147 有  $x - 1 > n$

148 所以  $x - 1 \geq n + 1 \Rightarrow x \geq n + 2$

149 所以  $n + 1$  使得命题成立

150 (4)  $m \in \mathbb{N} \wedge m \in \mathbb{N} \wedge n < m \Rightarrow n + 1 \leq m$

151 (5) 自然数  $n$ , 不存在自然数  $x \in (n, n + 1)$

152 (6) 自然数  $n, n \neq 1$ , 不存在自然数  $x \in (n - 1, n)$

153 (7) 自然数集之非空子集有最小元素

154 记  $M \subset \mathbb{N}, M \neq \emptyset$   
 155 若  $1 \in M$ , 则  $\min M = 1$   
 156 若  $1 \notin M$ , 则  $1 \in \mathbb{N} - M$   
 157 则有自然数  $n$ , 使得所有小于等于  $n$  的自然数属于  $\mathbb{N} - M$ , 且  $n + 1 \in M$   
 158 否则  $1 \in \mathbb{N} - M$  且  $\forall n \in \mathbb{N}, n \in M \wedge n + 1 \in M \Rightarrow M = \mathbb{N}$   
 159 所以  $\min M = n + 1$

160

## 161 整数集

162 自然数集、自然数的相反数集、0 的并集为整数集  $\mathbb{Z}$

163

## 164 算术基本定理

165 自然数可唯一地（不计相乘顺序）表示为有限个素数之积

166

## 167 有理数

168 形如  $m \bullet n^{-1}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}$  的数为有理数

169 有理数集记为  $\mathbb{Q}$

170

## 171 无理数

172 不属于有理数集的实数为无理数

# 173 4 Archimedes 原理

174 (1) 自然数集的任何非空上有界子集有最大值

175 任意  $E \subset \mathbb{N}, E \neq \emptyset$  有唯一上确界  $s = \sup E$

176 所以  $\exists n \in E, s - 1 < n \leq s$

177 所以  $n + 1 > s \Rightarrow n + 1 \notin E$

178 所以  $n = \max E$

179 (2) 自然数集无上界

180 (3) 整数集的任何非空上有界子集有最大值

181 (4) 整数集的任何非空下有界子集有最小值

182 (5) 整数集无上下界

183

## 184 Archimedes 原理

185 任意固定正数  $h$ , 则  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists! k \in \mathbb{Z}, (k - 1)h \leq x < kh$

186 考虑下有界集合  $\{n \in \mathbb{Z} : n > \frac{x}{h}\}$ , 其唯一最小值记为  $k$

187 所以  $k - 1 \leq \frac{x}{h} < k$

188 所以  $(k - 1)h \leq x < kh$

189

190 (1)  $\forall \epsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, 0 < \frac{1}{n} < \epsilon$

191 任意固定正数  $\epsilon$ , 则  $x = 1$  时,  $\exists n \in \mathbb{N}, 0 < 1 < n\epsilon$

192 所以  $0 < \frac{1}{n} < \epsilon$

193 (2) 非负实数  $x$ , 且  $\forall n \in \mathbb{N}, x < \frac{1}{n}$ , 则  $x = 0$

194 若  $x > 0$ , 则  $\exists n \in \mathbb{N}, x > \frac{1}{n}$

195 (3)  $\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, a < b \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Q}, a < r < b$

196 取  $n \in \mathbb{N}$ , 使得  $b - a > \frac{1}{n}$

197 另取  $m \in \mathbb{Z}$ , 使得  $(m - 1)\frac{1}{n} \leq a < m\frac{1}{n}$

198 假设  $b \leq \frac{m}{n}$ , 则  $(m - 1)\frac{1}{n} \leq a < b \leq \frac{m}{n} \Rightarrow b - a \leq \frac{m}{n} - (m - 1)\frac{1}{n} = \frac{1}{n}$

199 所以  $b > \frac{m}{n}$

200 所以  $\exists r = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}, a < r < b$

201 (4)  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists! k \in \mathbb{Z}, k \leq x < k + 1$

202

## 203 5 误差

### 204 绝对误差和相对误差

205 某量有精确值  $x$ , 近似值  $\tilde{x}$

206 近似值之绝对误差  $\Delta(\tilde{x}) = |x - \tilde{x}|$

207 相对误差  $\delta(\tilde{x}) = \frac{\Delta(\tilde{x})}{|\tilde{x}|}$

208

### 209 绝对误差的估计

210 精确值  $x, y$  分别有估计值  $\tilde{x}, \tilde{y}$ , 绝对误差  $\Delta(\tilde{x}) = |x - \tilde{x}|, \Delta(\tilde{y}) = |y - \tilde{y}|$

211 (1)  $\Delta(\tilde{x} + \tilde{y}) = |(x + y) - (\tilde{x} + \tilde{y})| \leq \Delta(\tilde{x}) + \Delta(\tilde{y})$

212 (2)  $\Delta(\tilde{x}\tilde{y}) = |xy - \tilde{x}\tilde{y}| \leq |\tilde{x}|\Delta(\tilde{y}) + |\tilde{y}|\Delta(\tilde{x}) + \Delta(\tilde{x})\Delta(\tilde{y})$

213 (3) 若  $y \neq 0, \tilde{y} \neq 0, \delta(\tilde{y}) = \frac{\Delta(\tilde{y})}{|\tilde{y}|} < 1$ , 则

214  $\Delta(\frac{\tilde{x}}{\tilde{y}}) = |\frac{x}{y} - \frac{\tilde{x}}{\tilde{y}}| \leq \frac{|\tilde{x}|\Delta(\tilde{y}) + |\tilde{y}|\Delta(\tilde{x})}{\tilde{y}^2} \frac{1}{1 - \delta(\tilde{y})}$

215 记  $x = \tilde{x} + \alpha, y = \tilde{y} + \beta$

216 (1)  $\Delta(\tilde{x} + \tilde{y}) = |(x + y) - (\tilde{x} + \tilde{y})| = |(x - \tilde{x}) + (y - \tilde{y})| \leq |x - \tilde{x}| + |y - \tilde{y}| = \Delta(\tilde{x}) + \Delta(\tilde{y})$

217 (2)  $\Delta(\tilde{x}\tilde{y}) = |(\tilde{x} + \alpha)(\tilde{y} + \beta) - \tilde{x}\tilde{y}| = |\tilde{x}\beta + \tilde{y}\alpha + \alpha\beta| \leq |\tilde{x}|\Delta(\tilde{y}) + |\tilde{y}|\Delta(\tilde{x}) + \Delta(\tilde{x})\Delta(\tilde{y})$

$$(3)\Delta(\frac{\tilde{x}}{\tilde{y}}) = |\frac{x}{y} - \frac{\tilde{x}}{\tilde{y}}| = |\frac{x\tilde{y}-y\tilde{x}}{y\tilde{y}}| = |\frac{(\tilde{x}+\alpha)\tilde{y}-(\tilde{y}+\beta)\tilde{x}}{\tilde{y}^2}| \leq \frac{|\tilde{x}||\beta|+|\tilde{y}||\alpha|}{\tilde{y}^2} \frac{1}{1-\delta(\tilde{y})} = \frac{|\tilde{x}|\Delta(\tilde{y})+|\tilde{y}|\Delta(\tilde{x})}{\tilde{y}^2} \frac{1}{1-\delta(\tilde{y})}$$

219

## 220 相对误差的估计

$$221 (1)\delta(\tilde{x} + \tilde{y}) \leq \frac{\Delta(\tilde{x})+\Delta(\tilde{y})}{|\tilde{x}+\tilde{y}|}$$

$$222 (2)\delta(\tilde{x}\tilde{y}) \leq \delta(\tilde{x}) + \delta(\tilde{y}) + \delta(\tilde{x})\delta(\tilde{y})$$

$$223 (3)\delta(\frac{\tilde{x}}{\tilde{y}}) \leq \frac{\delta(\tilde{x})+\delta(\tilde{y})}{1-\delta(\tilde{y})}$$

224 近似值足够精确时, 有

$$225 \Delta(\tilde{x})\Delta(\tilde{y}) \approx 0, \delta(\tilde{x})\delta(\tilde{y}) \approx 0, 1 - \delta(\tilde{y}) \approx 1$$

226 所以

$$227 \Delta(\tilde{x}\tilde{y}) \leq |\tilde{x}|\Delta(\tilde{y}) + |\tilde{y}|\Delta(\tilde{x})$$

$$228 \Delta(\frac{\tilde{x}}{\tilde{y}}) \leq \frac{|\tilde{x}|\Delta(\tilde{y})+|\tilde{y}|\Delta(\tilde{x})}{\tilde{y}^2}$$

$$229 \delta(\tilde{x}\tilde{y}) \leq \delta(\tilde{x}) + \delta(\tilde{y})$$

$$230 \delta(\frac{\tilde{x}}{\tilde{y}}) \leq \delta(\tilde{x}) + \delta(\tilde{y})$$

231

## 232 6 几个定理

### 233 区间套引理

234  $\mathbb{R}$  中闭区间套  $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$ , 必有点  $c$  属于所有这些闭区间

235 若  $\forall \epsilon > 0 \exists I_k, |I_k| < \epsilon$ , 则  $c$  为闭区间套唯一公共点

$$236 \forall m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, I_m = [a_m, b_m], I_n = [a_n, b_n] \Rightarrow a_m < b_n$$

$$237 \forall a_m \in \{a_m : m \in \mathbb{N}\}, \forall b_n \in \{b_n : n \in \mathbb{N}\}, \exists c \in \mathbb{R}, a_m < c < b_n$$

$$238 \text{ 所以 } \forall n \in \mathbb{N}, \exists c, a_n < c < b_n \Rightarrow c \in I_n$$

239 若  $\forall \epsilon > 0 \exists I_k, |I_k| < \epsilon$ , 假设  $c_1, c_2$  为闭区间套的两个不同公共点且  $c_1 < c_2$

$$240 \text{ 所以 } \forall n \in \mathbb{N}, c_1 \in I_n, c_2 \in I_n \Rightarrow a_n \leq c_1 < c_2 \leq b_n$$

$$241 \text{ 所以 } |I_n| = b_n - a_n > c_2 - c_1, \text{ 与 } |I_n| < \epsilon \text{ 矛盾}$$

242

### 243 覆盖

244 集合族  $S = \{X\}$ , 若  $Y \subset \sum_{X \in S} X$ , 则集合族  $S$  覆盖  $Y$

245

### 246 有限覆盖引理

247 覆盖闭区间的开区间族总有覆盖该闭区间的有限子族

248 记开区间族  $S = \{U\}$  覆盖闭区间  $I_1 = [a, b]$

249 假设  $S$  无覆盖  $I_1$  的有限子族



250 所以将  $I_1$  等分为两个闭区间，其中至少有一个不能被任何  $S$  的有限子族覆盖，记为  $I_2$   
 251 继续均分  $I_2$ ，取其中不能被任何  $S$  的有限子族覆盖者，记为  $I_3$   
 252 重复此操作，得闭区间套  $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots$   
 253 且  $|I_n| = \frac{|I_1|}{2^{n-1}}$   
 254 所以闭区间套  $\{I_n, n \in \mathbb{N}\}$  有唯一公共点  $c$   
 255 所以  $\exists U = (\alpha, \beta) \in S, c \in U$   
 256 取  $I_n$ ，使得  $|I_n| < \min\{c - \alpha, \beta - c\}$   
 257 又因为  $c \in I_n$   
 258 所以  $I_n \subset U$ ，与  $I_n$  不能被任何  $S$  的有限子族覆盖矛盾

259

## 260 极限点

261 (1) 若点  $p \in \mathbb{R}$  的任何邻域与集  $X$  的交集均有不等于  $p$  的元素，则  $p$  为  $X$  之极限点

262 (2) 若点  $p \in \mathbb{R}$  的任何邻域与集  $X$  的交集为无穷集，则  $p$  为  $X$  之极限点

263  $1 \longleftrightarrow 2$

264 若点  $p \in \mathbb{R}$  的任何邻域与集  $X$  的交集为无穷集，则此交集中必有不等于  $p$  的元素 (2 $\rightarrow$ 1)

265 若点  $p \in \mathbb{R}$  的任何邻域与集  $X$  的交集均有不等于  $p$  的元素

266 任取  $p$  的  $\Delta$  邻域  $U(p, \Delta) = (p - \Delta, p + \Delta), \Delta > 0$

267 假设  $U(p, \Delta) \cap X = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$  为有限集

268 则集合  $\{|p - a_1|, |p - a_2|, |p - a_3|, \dots, |p - a_n|\}$  有最小值  $m$

269 则取  $\delta < m$ ，邻域  $U(p, \delta)$  与集  $X$  的交集没有不等于  $p$  的元素

270 所以  $1 \rightarrow 2$

271

## 272 极限点引理

273 无穷有界数集至少有一个极限点

274 记  $X \subset \mathbb{R}$  为无穷有界集

275 取闭区间  $I = [a, b]$  覆盖  $X$

276 假设  $I$  中无  $X$  的极限点

277 对每个  $x \in I$ ，取其邻域  $U(x)$ ，使  $U(x)$  与  $X$  之交集为空集或非空有限集

278 由此得开区间族  $\{U(x)\}$  覆盖  $I$

279 所以可选出有限个开区间  $U(x_1), U(x_2), U(x_3), \dots, U(x_n)$  覆盖  $I$ ，亦覆盖  $X \subset I$

280 所以  $\sum_{i=1}^n U(x_i)$  为空集或有限集，与包含无穷集  $X$  矛盾