

## 鸟纲 (Aves)

1 鸟类具有恒定的体温，称为恒温动物。恒温动物有良好的体温调节机制，使动物体温相对恒定且通常  
2 略高于环境温度，促进体内化学反应的进行，提高并稳定新陈代谢的效率，减少对环境的依赖，扩大其生  
3 态位。

4 鸟类身体纺锤型，体表被羽 (feather)，头端有角质喙 (bill)。前肢变为翼 (wing)，不便之处由长而  
5 灵活的颈弥补。躯干坚实，尾部退化，利于飞行的稳定。眼发达，有瞬膜，避免飞行时遭气流和异物的伤  
6 害。鼓膜位于耳孔底部，耳孔周围生耳羽，利于收集声波。后肢发达，四趾。

7 皮肤薄而松弛，便于肌肉剧烈运动。皮肤腺仅有尾脂腺 (oil gland)，分泌油脂，保护羽毛。水禽尾脂  
8 腺尤其发达。皮肤衍生物包括羽、喙、爪和鳞。羽有不同的构造和功能。正羽 (countour feather) 由羽轴  
9 和羽片组成。羽轴下端插入皮肤深处，上端密生平行排列的羽，构成羽片。羽枝多次分支枝为羽小枝，羽  
10 小枝上有钩状突起，可互相钩接。正羽较大，一般位于翼和尾，司飞行。绒羽 (plumule) 羽轴纤弱，羽小  
11 枝上的钩状突起不发达，呈棉花状，司保温。纤羽 (filoplume) 杂生于正羽和绒羽之间，形如毛发，司触  
12 觉。鸟类口、眼附近多生具须 (bristle)，司触觉，为变形的羽毛。

13 羽毛着生于鸟类体表的特定区域，称为羽区 (pteryla)；不生羽毛处为裸区 (apteria)。这种着生方式  
14 利于剧烈的飞行运动和孵卵。鸟类羽毛定期更换，称为换羽 (molt)，受甲状腺控制。鸟类换羽利于迁徙、  
15 越冬和繁殖。

16 鸟类骨骼轻而坚固，内多腔隙。头骨薄轻，骨块愈合，颌骨前伸，形成鸟喙。无齿，咀嚼肌萎缩，以减  
17 轻体重，便于飞行。颅腔膨大，头骨顶部呈圆拱形。眼眶膨大，颅腔后移。颈椎及头部异常灵活。胸椎肋骨  
18 和胸骨连接，形成坚固的胸廓，使得胸肌得以剧烈运动并完成呼吸。胸骨中线多有高耸的龙骨突 (keel)，  
19 增大胸肌的固着面，适应飞行。部分胸椎和腰荐椎、部分尾椎愈合为综荐骨 (synsacrum)，又与腰带愈合，  
20 以在步行时支持体重，又使躯体重心集中于中央，利于飞行时保持平衡。前肢特化为翼，手部骨骼愈合或  
21 消失，使翼的骨骼构成一个整体，扇动方能有力。

22 鸟类背部肌肉萎缩，颈部肌肉和胸肌发达。支配肢体的肌肉集中于躯体中心，通过肌腱控制肢体运动，  
23 使躯体重心集中于中央。后肢有适应于树栖的肌肉，使鸟类栖于树枝时，体重压迫和腿骨关节弯曲使肌肉  
24 拉紧，足趾弯曲。有特殊的鸣管肌肉，可使鸣管改变形状，发出多变的聲音。

25 鸟类有角质喙，颌骨轻便，牙齿退化，咀嚼肌萎缩。口腔内有唾液腺，大多无口腔消化。部分物种食  
26 管的一部分特化为嗉囊 (crop)，可储藏、软化食物。胃分为腺胃 (glandular stomach) 和肌胃 (muscular  
27 stomach)。腺胃壁富腺体，分泌消化液；肌胃肌肉层发达，内壁革质，可磨碎食物。小肠和大肠交界处有

28 一对盲肠，可吸收水分、消化植物纤维。大肠短，不贮存粪便。大肠通泄殖腔。消化腺主要有肝和胰，分  
29 泌胆汁和胰液，注入十二指肠。总的来说，鸟类消化能力强，消化过程迅速，适应于高效的新陈代谢和飞  
30 行。

31 鸟类呼吸系统特化明显，有发达的气囊 (air sac) 与气管相连。肺体积较小，无弹性。鸟类栖止时通过  
32 胸廓运动呼吸；飞行时胸骨为胸肌支持点，胸廓趋于稳定，通过两翼扇动引起气囊扩张和收缩交换气体。  
33 扬翼时，气囊扩大，吸入空气；[E]翼时，气囊收缩，呼出空气。吸气时，空气经支气管，一部分直接进入  
34 后气囊，一部分经肺入前气囊；呼气时，前气囊气体经支气管排出，后气囊气体入肺后经支气管排出。鸟  
35 类呼气和吸气时皆能进行气体交换，称为双重呼吸 (dual respiration)，效率较高。此外，气囊亦可减少  
36 肌肉、内脏间的摩擦并参与散热。

37 鸟类有完全的双循环，动静脉血严格分开，心脏两心房两心室，无静脉窦。来自体静脉的血液经右心  
38 房、右心室、肺动脉入肺；再经肺静脉、左心房、左心室入体动脉。鸟类心脏重量与体重之比奇高，心脏  
39 容量大，心跳快，动脉血压高，血液循环迅速，适应于较高的代谢水平。左侧体动脉弓消失，肾门静脉退  
40 化。内脏血液经尾肠系膜静脉进入肝门静脉。

41 鸟类的排泄器官为后肾，肾单位数目较多。肾经输尿管开口于泄殖腔。鸟类的尿主要为难溶于水的尿  
42 酸，可减少水分散失。无膀胱，尿粪直接排出体外，以减轻体重。海鸟眼眶上部有开口于鼻间隔的盐腺，  
43 排出多余盐分。

44 鸟类的脑类似爬行类，伸出十二对脑神经，但司运动协调和平衡的小脑发达。眼尤为发达。眼球最外  
45 的巩膜前端附生骨片，称为巩膜骨 (sclerotic ring)，起支持作用，避免飞行时气流压力导致眼球变形。可  
46 通过改变晶状体形状和位置、改变角膜形状调节视力。听觉器官与爬行类类似，嗅觉大多退化。

47 鸟类雄性有成对的睾丸和输精管，开口于泄殖腔，一般无交配器官，通过雌雄鸟泄殖腔口接合受精。  
48 雌性一般仅左侧卵巢有功能，输卵管口喇叭状，开于腹腔。受精发生于输卵管上端。卵壳石灰质。

49 鸟类繁殖有明显的季节性和多种复杂行为。鸟类再繁殖期常各自占有一定的领域 (territory)，不允许  
50 其它鸟类进入，称为占区。占区保证在巢附近有充足的食物供应；调节营巢地鸟类密度和分布，利于充分  
51 利用资源并减少传染病；减少其它鸟类对生殖活动的干扰。雄性鸟类多有求偶炫耀 (countship display)，  
52 可激发异性的性活动，帮助辨认同种鸟类和性别。大部分鸟类有筑巢 (nest-building) 行为，便于孵卵，亦  
53 司保护。卵产于巢内并需孵化 (incubation)。有育雏行为。此外，部分鸟类在春秋两季，沿固定路线来往  
54 于繁殖地和越冬地，称为候鸟 (migrant)；其余终年留在繁殖地，称为留鸟 (resident)。

## 55 1 平胸总目 (Ratitae)

56 适应于奔走生活，翼退化，胸骨无龙骨突起，无尾综骨和尾脂腺；无羽区和裸区之分，羽毛分布均匀，  
57 无羽小钩。足趾趋于减少，雄性交配器官发达。

## 58 1.1 鸵鸟目 (Struthioniformes)

59 擅奔走，腿裸露，二趾。如鸵鸟 (*Struthio camelus*)。

## 60 1.2 美洲鸵鸟目 (Rheiformes)

61 三趾，无尾羽和副羽。不飞，但翼发达。如美洲鸵鸟 (*Rhea americana*)。

## 62 1.3 鹤鸵目 (Casuariiformes)

63 三趾超前。翅退化。副羽发达。如鸸鹋 (*Dromaus novachollandae*)。

## 64 1.4 无翼目 (Apterygiformes)

65 颈短，翅退化。无尾。喙极长，向下弯曲。鼻孔位于喙尖端。如几维鸟 (*Apteryx oweni*)。

## 66 1.5 䎇形目 (Tinamiformes)

67 翼短圆，有硬而弯曲短初级飞羽。胸骨有龙骨突。四趾，后趾高位或缺，尾短。如红翅䎇 (*Rhynchotus*  
68 *rufescens*)。

## 69 2 企鹅总目 (Impennes)

70 仅企鹅目 (Sphenisciformes) 一目，适应于潜水。前肢鳍状。羽毛鳞状，羽轴宽短，羽片狭窄，均匀  
71 分布。尾短。腿短，位于躯体后方，趾间有蹼。陆上行走时躯体直立。龙骨突发达，骨骼沉重不充气。皮  
72 下脂肪发达。如王企鹅 (*Aptenodytes patagonicus*)。

## 73 3 突胸总目 (Carinatae)

74 翼发达，善飞，龙骨突起发达，有尾综骨。骨骼内有空腔，正羽发达，体表区分羽区和裸区。雄性多  
75 无交配器官。可大致分为六类生态类群：游禽、涉禽、猛禽、攀禽、陆禽、鸣禽。

## 76 3.1 潜鸟目 (Gaviiformes)

77 行走笨拙，擅潜水，能飞。喙尖直，翅短小，尾短，腿粗。脚在躯干后部，前三趾间有蹼。如红喉潜  
78 鸟 (*Gavia stellata*)。

## 79 3.2 䴙䴘目 (Podicipediformes)

80 游禽，善潜水。趾有分离的瓣状蹼。喙短钝。尾羽几乎全部为绒羽。如小䴙䴘 (*Tachybaptus ruficollis*)。

### 81 3.3 信天翁目 (Procellariiformes)

82 大型海洋鸟类。体粗壮。喙大而有钩，被角质片。鼻孔管状，趾间有蹼。翼长而尖，飞行能力强。如  
83 短尾信天翁 (*Diomedea albatrus*)。

### 84 3.4 鹈形目 (Pelecaniformes)

85 大型游禽。四趾间有蹼膜相连。喙大，有钩。喉囊发达。如斑嘴鹈鹕 (*Pelecanus philippensis*)、鸕鶿  
86 (*Phalacrocorax carbo*)。

### 87 3.5 鹳形目 (Ciconiiformes)

88 水栖涉禽。喙、颈、腿长。胫裸露。趾细长，四趾在同一平面。如黑鹳 (*Ciconia nigra*)、东方白鹳  
89 (*Ciconia boyciana*)、苍鹭 (*Ardea cinerea*)、大白鹭 (*Egretta alba*)。

### 90 3.6 雁形目 (Anseriformes)

91 游禽。喙扁，边缘有梳状栉板，司滤食。喙端加厚。腿后移，前三趾间有蹼。气管基部有膨大的骨质囊，  
92 司发声共鸣。雄鸟有交配器官。尾脂腺发达。如绿头鸭 (*Anas platyrhynchos*)、鸿雁 (*Anser cygnoides*)、  
93 天鹅 (*Cygnus cygnus*)。

### 94 3.7 隼形目 (Falconiformes)

95 肉食猛禽。喙端有利钩。足强健，钩爪发达。善飞，视力发达。如红脚隼 (*Falco vespertinus*)、鸢  
96 (*Milvus migrans*)、鵟 (*Pandion haliaetus*)、秃鹫 (*Aegypius monachus*)。

### 97 3.8 鸡形目 (Galliformes)

98 陆生，腿脚强健，爪钝。喙弓形，嗉囊发达，翼短圆。如鹌鹑 (*Coturnix coturnix*)、鹧鸪 (*Francolinus*  
99 *pintadeanus*)、石鸡 (*Alectoris chukar*)。

### 100 3.9 鹤形目 (Gruiformes)

101 涉禽。喙、颈、腿长，胫裸露。四趾不在同一平面。如丹顶鹤 (*Grus japonensis*)、大鸨 (*Otis tarda*)。

### 102 3.10 鸻形目 (Charadriiformes)

103 鸻体多沙土色或灰色，翼尖。擅奔，擅飞。如金眶鸻 (*Charadrius dubius*)、燕鸻 (*Glareola maldivarum*)。

### 104 3.11 鸥形目 (Lariformes)

105 海洋性鸟类，常于水边捕食。前三趾有蹼。翼尖长，擅飞。如红嘴鸥 (*Larus ridibundus*)、燕鸥 (*Sterna*  
106 *hirundo*)。

### 107 3.12 鸽形目 (Columbiformes)

108 陆禽。喙短，鼻孔外有蜡膜 (cere)。腿脚健壮，四趾位于同一平面。嗉囊发达，在育雏期间能分泌鸽  
109 乳喂雏。如原鸽 (*Columba livia*)、山斑鸠 (*Streptopelia orientalis*)。

### 110 3.13 鹦形目 (Psittaciformes)

111 攀禽。第四趾朝后，成对趾型。喙坚硬有钩，上喙可上抬。如绯胸鹦鹉 (*Psittacula alexandri*)、虎皮  
112 鹦鹉 (*Melopsittacus undulatus*)。

### 113 3.14 鹃形目 (Cuculiformes)

114 攀禽。对趾型。外形似隼，但喙爪无钩。多寄生性繁殖，将卵产在其他鸟巢中。如大杜鹃 (*Cuculus*  
115 *canorus*)。

### 116 3.15 鵩形目 (Strigiformes)

117 俗称猫头鹰。夜行性猛禽。趾能后转，形成对趾。两眼大而向前。眼周有放射状细羽，构成脸盘。耳  
118 孔大，周围有褶皱或耳羽，听觉发达。羽片柔软，飞行时无声。如长耳鵩 (*Asio otus*)。

### 119 3.16 夜鹰目 (Caprimulgiformes)

120 夜行性攀禽。前趾基部合并，成并趾型。中爪有栉状缘。羽片柔软，飞行时无声。口宽，边缘有成排  
121 硬毛。体色近枯枝。如夜鹰 (*Caprimulgus indicus*)。

### 122 3.17 雨燕目 (Apodiformes)

123 小型攀禽。后趾向前，成前趾型。羽毛有光泽。如雨燕 (*Apus apus*)、金丝燕 (*Collocalia spp*)。

### 124 3.18 咬鹃目 (Trogoniformes)

125 攀禽。喙宽短，喙尖稍弯曲。翅短而有力，尾长而宽阔。足短弱。第一二趾向后，第三四趾向前，成  
126 异型足。羽毛有金属光泽。如红头咬鹃 (*Harpactes erythrocephalus*)。

127 **3.19 蜂鸟目 (Trochiliformes)**

128 攀禽，体型小。食花蜜，管状长舌，翅灵活快。蜜源不足时有短期休眠行为。如蓝胸蜂鸟 (*Polyerata*  
129 *amabilis*)。

130 **3.20 佛法僧目 (Coraciiformes)**

131 攀禽。前趾基部合并，营洞巢。如翠鸟 (*Alcedo atthis*)、戴胜 (*Upupa epops*)、双角犀鸟 (*Buceros*  
132 *bicornis*)。

133 **3.21 䴺形目 (Piciformes)**

134 攀禽，对趾型。喙似凿，食树皮昆虫。尾羽羽轴坚硬有弹性。如斑啄木鸟 (*Picoides major*)。

135 **3.22 雀形目 (Passeriformes)**

136 鸣禽。鸣管和鸣管肌复杂。喙角质，基部无蜡膜。腿细短。趾分离，三前一后，后趾中趾等长，成离  
137 趾型。跗跖后部鳞片愈合为一块鳞板。如百灵 (*Melanocorypha mongolica*)、家燕 (*Hirundo rustica*)、喜  
138 鹊 (*Pica pica*)、画眉 (*Garrulax conorus*)、麻雀 (*Passer montanus*)。