

Getallenleer

Welke soorten getallen er zijn, hoe je ermee rekent, en in welke volgorde.

1 Drie soorten getallen

Je begon met tellen: 0, 1, 2, 3 ... Dat zijn de **natuurlijke getallen**. Maar zodra je $3 - 7$ wil uitrekenen, kom je onder nul, en dan heb je meer nodig.



Elke soort zit in de volgende, en elke uitbreiding laat alles wat er al was overeen. Een natuurlijk getal is dus óók een geheel én een rationaal getal.

De **gehele getallen** voegen de negatieve getallen toe. De **rationale getallen** voegen daar alles bij wat je als breuk van twee gehele getallen kan schrijven — en dus ook elk kommagetal dat stopt of zich herhaalt.

Let op de valkuil: 7 is een natuurlijk getal, maar het is tegelijk een geheel en een rationaal getal ($7 = 7/1$). De vraag is nooit welk hokje het enige juiste is, wel welk het kleinste hokje is waar het getal in past.

2 Breuken

In de breuk $\frac{3}{4}$ is 4 de **noemer**: in hoeveel gelijke stukken het geheel verdeeld is. De 3 is de **teller**: hoeveel van die stukken je neemt.



Elke strook is de vorige gehalveerd. Hoe groter de noemer, hoe kleiner elk stuk: $\frac{1}{8}$ is kleiner dan $\frac{1}{4}$, ook al is 8 groter dan 4.


Een **stambreuk** heeft 1 als teller: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{8}$. Twee breuken zijn **gelijknamig** als ze dezelfde noemer hebben. Optellen kan pas als ze gelijknamig zijn: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ wordt $\frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$.

Een breuk is **onvereenvoudigbaar** als teller en noemer geen gemeenschappelijke deler meer hebben buiten 1. Zo kan $\frac{6}{8}$ nog: deel allebei door 2 en je krijgt $\frac{3}{4}$.

3 Drie dingen die op elkaar lijken

Deze drie worden vaak verward, terwijl ze iets heel anders doen.

Het **tegengestelde** draait het teken om: dat van -5 is 5. Samen geven ze **0**. Het **omgekeerde** wisselt teller en noemer: dat van $\frac{2}{3}$ is $\frac{3}{2}$. Samen geven ze **1**. De **absolute waarde** is de afstand tot nul, en die is nooit negatief: $|-7| = 7$.



-7 en 7 liggen allebei zeven stappen van nul. Hun absolute waarde is dus dezelfde.

4 De namen bij de bewerkingen

Op het examen staan deze woorden in de vraag zelf, dus je moet ze herkennen.


Optellen: **termen** geven een **som**. Aftrekken: **afgetal** min **aftrekker** geeft het **verschil**. Vermenigvuldigen: **factoren** geven een **product**. Delen: **deeltal** gedeeld door **deler** geeft een **quotiënt**, en soms een **rest**.

Blijft er niets over, dan heet het een **opgaande** deling. Bij $20 : 3$ is het quotiënt 6 en de rest 2, dus die is **niet-opgaand**.

Bij machten: in 5^3 is 5 het **grondtal** en 3 de **exponent**. $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$. Een tweede macht heet een **kwadraat**. Worteltrekken is het omgekeerde: $\sqrt{49} = 7$, want $7 \times 7 = 49$.

5 Volgorde van de bewerkingen

$2 + 3 \times 4$ is niet 20. Er is een vaste volgorde, en die is niet van links naar rechts.



Van links naar rechts werk je deze vier af. Binnen dezelfde stap reken je wél van links naar rechts.

Dus: eerst $3 \times 4 = 12$, dan $2 + 12 = \mathbf{14}$. Wil je toch eerst optellen, dan moet je haakjes zetten: $(2 + 3) \times 4 = 20$.

6 Eigenschappen en rekenregels

Commutatief: de volgorde mag wisselen, $a + b = b + a$. **Associatief:** de haakjes mogen anders, $(a + b) + c = a + (b + c)$. **Distributief:** $3 \times (4 + 5) = 3 \times 4 + 3 \times 5$.

Commutatief en associatief gelden bij optellen en vermenigvuldigen, maar **niet** bij aftrekken en delen. $5 - 3$ is niet hetzelfde als $3 - 5$.

Het **neutraal element** verandert niets: 0 bij optellen, 1 bij vermenigvuldigen. Het **opslopend element** slokt alles op: 0 bij vermenigvuldigen, want $a \times 0 = 0$.

Voor machten met **hetzelfde grondtal**: bij vermenigvuldigen tel je de exponenten op ($2^3 \times 2^4 = 2^7$), bij delen trek je ze af, en bij een macht van een macht vermenigvuldig je ze ($(2^3)^2 = 2^6$). Een negatieve exponent betekent het omgekeerde: $2^{-2} = 1/2^2 = 1/4$.

7 Priemgetallen, ggd en kgv


Een **priemgetal** heeft precies twee delers: 1 en zichzelf. 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... 1 hoort er niet bij, want dat heeft er maar één.

Splits je een getal in priemfactoren, dan vallen ggd en kgv er zo uit. $12 = 2 \times 2 \times 3$ en $18 = 2 \times 3 \times 3$.

De **grootste gemeenschappelijke deler** is wat ze allebei hebben: $2 \times 3 = 6$. Die gebruik je om breuken te vereenvoudigen. Het **kleinste gemeenschappelijk veelvoud** van 4 en 6 is **12**: het eerste getal dat in beide rijtjes veelvouden voorkomt. Dat gebruik je om breuken gelijknamig te maken.

8 Procent, verhouding en schaal

Procent betekent 'per honderd'. Van breuk naar procent: deel de teller door de noemer en maal honderd. $3/8 = 0,375 = \mathbf{37,5\%}$.



Vijfentwintig van de honderd vakjes: 25 %, ofwel $1/4$, ofwel 0,25. Drie schrijfwijzen voor hetzelfde.

Een trui van € 40 met 25 % korting: de korting is 10 euro, dus je betaalt € 30. Sneller gaat het in één keer: je betaalt 75 %, en $0,75 \times 40 = 30$.

aantal	1	4	10
prijs	€ 1,50	€ 6	€ 15

Vier broden voor € 6. Ga eerst naar één brood, dan kan je naar elk aantal. Wat je met de ene rij doet, doe je met de andere ook.

Schaal 1 : 100 wil zeggen dat één centimeter op het plan honderd centimeter in het echt is. Een muur van 3 cm op het plan is dus 300 cm, ofwel 3 meter.

9 Afronden en schatten

Bij afronden kijk je naar het **eerste cijfer dat wegvalt**. Is dat 5 of meer, dan gaat het cijfer ervoor één omhoog; is het minder, dan blijft het staan.

3,247 tot op twee decimalen: het derde decimaal is 7, dus naar boven: **3,25**. Tot op één decimaal wordt het 3,2, want dan kijk je naar de 4.

Rond pas op het **einde** af, niet tussendoor. Wie halverwege afrondt en dan verder rekent, sleept die fout mee en komt er soms ver naast uit.

Schatten is iets anders dan afronden: je maakt de som expres makkelijker om te zien of je uitkomst kán kloppen. 19×21 ligt rond $20 \times 20 = 400$. Krijg je 4 000 op je rekenmachine, dan weet je meteen dat er iets fout ging.

Onthoud dit

- $\mathbb{N}$ zit in $\mathbb{Z}$ zit in $\mathbb{Q}$: elke uitbreiding voegt iets toe en laat de rest overeind.
- Breuk: teller boven, noemer onder. Gelijksnamig = dezelfde noemer; optellen kan pas dan.
- Tegengestelde geeft samen 0, omgekeerde geeft samen 1, absolute waarde is de afstand tot nul.
- Termen/som, aftrektal/aftrekker/verschil, factoren/product, deeltal/deler/quotiënt/rest.
- Volgorde: haakjes, machten en wortels, maal en gedeeld, plus en min.
- Commutatief en associatief gelden niet bij aftrekken en delen.
- Machten met hetzelfde grondtal: maal $\rightarrow$ exponenten optellen, macht van macht $\rightarrow$ vermenigvuldigen.
- Priemgetal heeft precies twee delers. ggd om te vereenvoudigen, kgv om gelijknamig te maken.
- Procent is per honderd. $3/8 = 0,375 = 37,5\%$. Schaal 1 : 100 $\rightarrow$ 3 cm op plan = 3 m echt.
- Afronden: kijk naar het eerste cijfer dat wegvalt, en rond pas op het einde af.