

---

## Table of Contents

.....	1
Problem 1 .....	1
Problem 2 .....	2
Problem 3 .....	3
Problem 4 .....	4
Problem 5 .....	6
Problem 5 (poly part) .....	7
Problem 6 .....	8
Problem 7 .....	10
Problem 8 .....	11
Problem 8 (poly part) .....	13
Problem 9 .....	14

% Konstantin Zelmanovich  
% Jayden Chen

## Problem 1

```
clc
clear all
i = [0.25, 0.75, 1.25, 1.5, 2.0];
V = [-0.45, -0.6, 0.70, 1.88, 6.0];
z = [i;V]';
[a, r2] = cf_polyfit(z,3)

best_fit = a(1)*i.^3+a(2)*i.^2+a(3)*i+a(4)
figure
plot(i,V)
hold on
plot(i,best_fit)

a =


    0.5663
    1.4536
   -2.1693
   -0.0113

r2 =

    0.7850

best_fit =

   -0.4539   -0.5817    0.6543    1.9165    5.9948
```



## Problem 2

```
clc
clear all
x = [1, 2, 4, 6, 8, 10];
y = [5.5, 12.5, 17.5, 32, 38, 49];
z = [x;y]';
[a, r2] = cf_polyfit(z,3)

best_fit = a(1)*x.^3+a(2)*x.^2+a(3)*x+a(4)
figure
plot(x,y)
hold on
plot(x,best_fit)

a =

-0.0035
0.0719
4.3233
1.8099
```


---

`r2 =`

`0.9873`

`best_fit =`

`6.2017    10.7162    20.0305    29.5857    39.2149    48.7511`



## Problem 3

```
clc
clear all
t = [0, 5, 10, 15, 20];
p = [100, 200, 450, 950, 2000];
z = [t;p]';
[a, r2] = cf_polyfit(z,3)

best_fit = a(1)*t.^3+a(2)*t.^2+a(3)*t+a(4)
figure
plot(t,p)
hold on
plot(t,best_fit)
```

---

`a =`

```
0.2667  
-1.8571  
25.4762  
97.1429
```


`r2 =`

```
0.8565
```

`best_fit =`

```
1.0e+03 *
```

```
0.0971    0.2114    0.4329    0.9614    1.9971
```



## Problem 4

```
clc  
clear all  
x = [ 0, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 19];  
y = [5, 6, 7, 6, 9, 8, 7, 10, 12, 12];
```

---

```
z = [x;y]';  
[a, r2] = cf_polyfit(z,3)  
  
best_fit = a(1)*x.^3+a(2)*x.^2+a(3)*x+a(4)  
figure  
plot(x,y)  
hold on  
plot(x,best_fit)
```

```
a =
```

```
    0.0015  
   -0.0305  
    0.4245  
    5.1584
```

```
r2 =
```

```
    0.8368
```


```
best_fit =
```

```
Columns 1 through 7
```

```
    5.1584    5.8976    6.4654    6.9343    7.6105    8.1489    8.4715
```

```
Columns 8 through 10
```

```
    9.7615   10.9806   12.5713
```



## Problem 5


```
clear all
clc
clf
ord = [.75 1.2;
       2 1.95;
       3 2;
       4 2.4;
       6 2.4;
       8 2.7;
       8.5 2.6];
hold on
x = 0:.5:10;
plot(ord(:, 1), ord(:, 2), 'o');
[a0, a1, r2] = cf_linear_lsr(ord, 'power');
y = 10.^(log10(a0) + a1*log10(x));
plot(x, y)
[a0, a1, r2] = cf_linear_lsr(ord, 'saturation')
y = 1./((1./a0) + a1./(a0*x));
plot(x, y)
```

```
a0 =

    2.9279
```

---

```
a1 =  
    1.0813  
  
r2 =  
   -0.9974
```




## Problem 5 (poly part)

```
clear all  
clc  
x = [0.75, 2, 3, 4, 6, 8, 8.5];  
y = [1.2, 1.95, 2, 2.4, 2.4, 2.7, 2.6];  
z = [x;y]';  
[a, r2] = cf_polyfit(z,3);  
  
best_fit = a(1)*x.^3+a(2)*x.^2+a(3)*x+a(4)  
figure  
plot(x,y)  
hold on  
plot(x,best_fit)
```

---

*best\_fit* =

1.2282    1.8416    2.1411    2.3157    2.4566    2.5965    2.6703



## Problem 6

```
clear all
clc
clf
ord = [2.5, 13;
      3.5, 11;
      5, 8.5;
      6, 8.2;
      7.5, 7;
      10, 6.2;
      12.5, 5.2;
      15, 4.8;
      17.5, 4.6;
      20, 4.3];
[a0, a1, r2] = cf_linear_lsr(ord, 'power')
hold on
plot(ord(:, 1), ord(:, 2), 'o');
x = 1:20;
y = 10.^(log10(a0) + a1*log10(x));
```



---

```
plot(x, y);

x = 9
y = 10.^(log10(a0) + a1*log10(x))
xlabel('x')
ylabel('y')
hold off

a0 =

    21.1458

a1 =

   -0.5403

r2 =


   -0.9999

x =

     9

y =

    6.4515
```



## Problem 7

```
clear all
clc
clf
ord = [0.4 800;
       0.8 975;
       1.2 1500;
       1.6 1950;
       2 2900;
       2.3 3600];
[a0, a1, r2] = cf_linear_lsr(ord, 'exponential')
hold on
plot(ord(:, 1), ord(:, 2), 'o');
x = 0:.1:3;
y = exp(log(a0) + a1*x);
plot(x, y);

xlabel('x')
ylabel('y')
legend('data', 'line of best fit')
hold off

a0 =
```

---


546.5909

a1 =

0.8187

r2 =

-1.0000



## Problem 8

```
clear all
clc
clf
ord = [5 17;
      10 24;
      15 31;
      20 33;
      25 37;
      30 37;
      35 40;
      40 40;
```

---

```
45 42;
50 41];
hold on
x = 0:5:60;
plot(ord(:, 1),ord(:, 2), 'o');
[a0, a1, r2] = cf_linear_lsr(ord, 'linear');
y = a0 + a1*x;
plot(x, y)
[a0, a1, r2] = cf_linear_lsr(ord, 'power');
y = 10.^(log10(a0) + a1*log10(x));
plot(x, y)
[a0, a1, r2] = cf_linear_lsr(ord, 'saturation')
y = 1./((1./a0) + a1./(a0*x));
plot(x, y)

legend('data', 'linear', 'power', 'saturation')

a0 =


50.0921

a1 =

9.8914

r2 =

-1.0000
```



## Problem 8 (poly part)

```
clear all
clc
x = [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50];
y = [17, 24, 31, 33, 37, 37, 40, 40, 42, 41];
z = [x;y]';
[a, r2] = cf_polyfit(z,3);
```

```
best_fit = a(1)*x.^3+a(2)*x.^2+a(3)*x+a(4)
figure
plot(x,y)
hold on
plot(x,best_fit)
```


```
best_fit =
```

```
Columns 1 through 7
```

```
17.1580    24.3049    29.7350    33.7093    36.4890    38.3352    39.5089
```

```
Columns 8 through 10
```

```
40.2711    40.8830    41.6056
```



## Problem 9

```
clear all
clc
clf
ord = [5 17;
       10 24;
       15 31;
       20 33;
       25 37;
       30 37;
       35 40;
       40 40;
       45 42;
       50 41];
fa0 = @(a0, a1, x) x / (a1 + x);
fa1 = @(a0, a1, x) (-a0*x)/((a1+x)^2);
fx = @(a0, a1, x) a0 * (x ./ (a1 + x));
[a0, a1, r2] = cf_nonlinfit(ord, fx, {fa0 fa1})
hold on
plot(ord(:, 1), ord(:, 2), 'o');
x = 0:5:60
y = a0 * (x ./ (a1 + x))
plot(x, y)
```

---

$a_0 =$

50.5173

$a_1 =$

10.1022

$r_2 =$

-1.0000

$x =$

0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
55	60									


$y =$

*Columns 1 through 7*

0	16.7251	25.1302	30.1870	33.5638	35.9787	37.7914
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

*Columns 8 through 13*

39.2022	40.3314	41.2557	42.0262	42.6783	43.2374
---------	---------	---------	---------	---------	---------



*Published with MATLAB® R2015b*