

LES PAPILLONS DE L'ÎLE

Ils sont beaux... et en plus ils sont utiles ! Les papillons arrivent immédiatement après les abeilles et les bourdons au classement des insectes pollinisateurs.

On leur pardonnera les dégâts occasionnés par les chenilles de certaines espèces.
La présence de papillons, à plus forte raison d'espèces rares protégées, est le signe d'un bon état des habitats naturels.



La pollinisation, comment ça marche ?

En prélevant le nectar des fleurs pour se nourrir, les insectes transportent involontairement des grains de pollen d'une fleur à l'autre, collés à leur corps et à leurs pattes. Il s'agit de l'élément mâle « mobile », qui va permettre la fécondation de la plante... et de produire graines et fruits. Sans insectes pollinisateurs une grande partie des végétaux ne pourrait pas se reproduire, l'équilibre naturel serait rompu et les conséquences pour la planète dramatiques. Dans nos assiettes bien sûr, mais surtout avec la disparition en chaîne de nombreuses espèces. Éviter une extinction de masse (la 6e...) dépend de la survie des insectes ! Inquiétant, avec des populations qui ont chuté de 75 % au cours des dernières décennies.

Les papillons ont la particularité d'utiliser leur longue trompe, pour prélever le nectar des fleurs. Cela leur permet d'explorer les fleurs plus en profondeur, inaccessibles à d'autres pollinisateurs. Indispensable pour la biodiversité !


Il y a papillon... et papillon. Je t'explique ?

Les papillons de jour (Rhopalocères). C'est ceux que tu vois dans les prairies, sur les haies... Ils sont actifs en journée, très colorés et possèdent des antennes en forme de « massue ».

Les papillons de nuit (Hétérocères)... sont parfois actifs en journée. Ils sont de couleur neutre, sombre, pour passer inaperçus la nuit et possèdent des antennes plumeuses, en forme de peigne, qui leur permettent de se diriger dans l'obscurité. Avec leur corps « velu », souvent de grande taille, ce sont des pollinisateurs méconnus, mais extrêmement efficaces.

Les papillons en chiffres

Environ 150 000 espèces dans le monde
Plus de 10 200 en Europe
5 371 en France métropolitaine (dont 258 espèces de papillons de jour et 5 113 de papillons de nuit)



Azuré du serpolet

Des hôtes de marque



Deux espèces de papillons, reconnues d'intérêt communautaire par la directive européenne « habitats-faune-flore », sont observables sur l'île de Raymond. Elles sont strictement protégées.

L'Azuré du serpolet (*Cupido minimus*)

Observation de l'adulte de fin mai à août, rarement septembre. Pond sur des plans de Serpolet, toujours à proximité de fourmis du genre *Myrmeca* (les fourmis se nourrissent du miellat produit par la chenille, l'emportent dans la fourmilière, où elle se nourrit en retour des larves de fourmis).

Le Cuivré des marais (*Lycaena dispa*)

Observation de l'adulte de mai à mi-septembre.
La chenille se nourrit des feuilles de l'Oseille sauvage. L'adulte butine les fleurs de menthes, de Salicaire...



Cuivré des marais

