



Alb $\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 9.09, p = 0.01, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.76, \text{CI}_{95\%} [0.64, 1.00], n_{\text{pairs}} = 6$ 

ALP

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 3.22$, $p = 0.20$, $\widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.27$, $\text{CI}_{95\%} [0.12, 1.00]$, $n_{\text{pairs}} = 6$



ALT

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 6.38, p = 0.04, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.53, \text{CI}_{95\%} [0.38, 1.00], n_{\text{pairs}} = 6$

$p_{\text{Holm-adj.}} = 0.02$

Values

160

120

80

40

Pre-PCI
(n = 6)

2 Hours
(n = 6)

24 Hours
(n = 6)


Instance


$\hat{\mu}_{\text{median}} = 25.50$

$\hat{\mu}_{\text{median}} = 37.00$

$\hat{\mu}_{\text{median}} = 42.00$

Pairwise test: **Durbin-Conover**, Bars shown: **significant**




BA $\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 1.00, p = 0.61, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.05, \text{CI}_{95\%} [0.05, 1.00], n_{\text{pairs}} = 10$ 

Bili


$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 0.40, p = 0.82, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.03, \text{CI}_{95\%} [0.00, 1.00], n_{\text{pairs}} = 6$

Values




Creat


$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 6.79$, $p = 0.03$, $\widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.34$, $\text{CI}_{95\%} [0.17, 1.00]$, $n_{\text{pairs}} = 10$




eGFR

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 3.71, p = 0.16, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.21, \text{CI}_{95\%} [0.11, 1.00], n_{\text{pairs}} = 9$





EO $\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 5.69, p = 0.06, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.28, \text{CI}_{95\%} [0.14, 1.00], n_{\text{pairs}} = 10$ 

Hb $\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 3.80, p = 0.15, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.19, \text{CI}_{95\%} [0.03, 1.00], n_{\text{pairs}} = 10$ 

HCT


$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 2.40$, $p = 0.30$, $\widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.12$, $\text{CI}_{95\%} [0.01, 1.00]$, $n_{\text{pairs}} = 10$



K $\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 0.70, p = 0.70, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.04, \text{CI}_{95\%} [0.01, 1.00], n_{\text{pairs}} = 10$ 


LY

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 2.10, p = 0.35, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.10, \text{CI}_{95\%} [0.01, 1.00], n_{\text{pairs}} = 11$




MCH

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 0.67, p = 0.72, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.03, \text{CI}_{95\%} [0.01, 1.00], n_{\text{pairs}} = 10$




MCHC

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 2.60$, $p = 0.27$, $\widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.13$, $\text{CI}_{95\%} [0.03, 1.00]$, $n_{\text{pairs}} = 10$




MCV

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 1.32$, $p = 0.52$, $\widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.07$, $\text{CI}_{95\%} [0.01, 1.00]$, $n_{\text{pairs}} = 10$



MO


$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 11.56, p = 3.10\text{e-}03, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.58, \text{CI}_{95\%} [0.32, 1.00], n_{\text{pairs}} = 10$




Na

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 0.17$, $p = 0.92$, $\widehat{W}_{\text{Kendall}} = 8.57\text{e-}03$, $\text{CI}_{95\%} [7.89\text{e-}03, 1.00]$, $n_{\text{pairs}} = 10$

Values




Pairwise test: Durbin-Conover, Bars shown: significant

NE $\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 7.40, p = 0.02, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.37, \text{CI}_{95\%} [0.19, 1.00], n_{\text{pairs}} = 10$ 


PLT

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 7.20, p = 0.03, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.36, \text{CI}_{95\%} [0.16, 1.00], n_{\text{pairs}} = 10$




RBC

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 2.60, p = 0.27, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.13, \text{CI}_{95\%} [0.03, 1.00], n_{\text{pairs}} = 10$



Urea

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 0.67, p = 0.72, \widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.04, \text{CI}_{95\%} [0.01, 1.00], n_{\text{pairs}} = 9$



WBC

$\chi^2_{\text{Friedman}}(2) = 5.60$, $p = 0.06$, $\widehat{W}_{\text{Kendall}} = 0.28$, $\text{CI}_{95\%} [0.13, 1.00]$, $n_{\text{pairs}} = 10$

