

調整時・希釈時に注意を要する注射剤

塩酸バンコマイシン点滴静注用	0.5g(1バイアル)に注射用水10mlを加えて溶解し、更に0.5gに対し100ml以上の割合で生食液又は、5%ブドウ糖注射液などの輸液に加えて希釈する。1時間以上かけて点滴静注する。
注射用フサン10mg ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg	10mgあたり1ml以上の5%ブドウ糖注射液又は注射用水を加えて溶解した後、輸液に加える。
ゾビラックス点滴静注用250mg	1バイアル(250mg)注射用水または生食10mlに溶解し、投与量に相当する量を1バイアルあたり100ml以上の補液で希釈する。1時間以上かけて点滴静注する。
ハンプ注射用1000	1バイアルを注射用水 5mlに溶解し、必要に応じて生食液又は5%ブドウ糖注射液で希釈する。
ホスミシンS静注用2g	溶解には日局注射用水又は日局ブドウ糖注射液を用い、本剤1～2g(力価)を20mLに溶解する。その後、補液に溶解して、1～2時間かけて静脈内に点滴注射する。
フェジン静注	希釈はブドウ糖注射液を用いる。
タケプロン静注用30mg	溶解は生食液又は5%ブドウ糖注射液のみを使用する。
ジスロマック点滴静注用500mg	1V(500mg)を注射用水4.8mlで溶解後、500ml以上の輸液に混入する。 (配合変化を起こさないことが確認されている輸液) 生食 500ml、5%TZ 500ml、 アクチット 500ml、ラクテック 500ml、 ソリタT1 500ml
リコモジュリン点滴静注用12800mg	1V(12800u)を生食液2mlで溶解し、必要量を生食100mlで希釈する。
ダプトマイシン静注用350mg	1Vにつき7mLの生理食塩液をゆっくりと加えて溶解し、50mg/mLの溶液とする。泡立ちを抑えるため、溶解時又は溶解後のバイアルは激しく振とうせずに、バイアルに添付されている調製手順にしたがって調製する。