

抗血小板薬・抗凝固薬（抗血小板作用を有する薬剤を含む）の手術前休薬期間の目安

※ 現在薬価収載されている薬の一覧です。当院採用薬以外の薬も記載していい

長崎百合野病院 薬局

2024年4月10日改訂

	品名	半減期	手術前休薬日数
抗血小板薬	アスピリン	0.4hr	7日前
	アンプラーグ錠50mg・100mg 後発品：サルボグレラート塩酸塩	0.7hr	1日前
	エパデールcap300mg・S300mg・S600mg・S900mg 後発品：イコサペント酸エチル	—	7日前
	エフィエント錠2.5mg・3.75mg・5mg・20mg	0.9±0.4hr	14日前
	オパルモン錠5μg 後発品：リマプロストアルファデクス	0.8hr	1日前
	ケアロードLA錠60μg ベラサスLA錠60μg (プロサイリン、ドルナーの徐放剤)	3.9±1.1hr	1日前
	バイアスピリン錠100mg 後発品、アスピリン腸溶錠	0.4hr	7日前
	パナルジン錠100mg・細粒10% 後発品：チクロピジン塩酸塩	1.6hr	7日前 (大手術10～14日前)
	バスサミン配合錠A81mg(バファリンの後発) 他後発品：ニトギス、ファモター	0.4hr	7日前
	プラビックス錠25mg・75mg 後発品：クロピドグレル	6.9±0.9hr	14日前
	ブリリント錠60mg・90mg	8.7hr	5日以上前
	プレタールOD錠50mg・100mg・散20% 後発品：シロスタゾール	α相：2.2hr β相：18hr	3日前
	プロサイリン錠20μg ドルナー錠20μg 後発品：ベラプロストNa	1.1hr	1日前
	ペルサンチン錠12.5mg・25mg・100mg 後発品：ジピリダモール	1.7hr	1～2日前
	キャブピリン配合錠 (アスピリン100mg + タケキャブ10mg)	0.4±0.1hr	7日前
	コンプラビン配合錠 (プラビックス75mg+アスピリン100mg) 後発品：ロレアス	—	14日前
	タケルダ配合錠 (アスピリン100mg+ランソプラゾール15mg)	0.5±0.2hr	7日前