

感染性胃腸炎 嘔吐物の処理の方法

必要物品：

嘔吐物処理セット、泡ハイター1000、ペーパータオル、手袋(箱ごと)、手指消毒用アルコール

1	嘔吐している人を発見したら、発見者はまず以下の準備をする。
	①別のスタッフにマスクとエプロンをさせ嘔吐した人の介抱を指示
	②上記必要物品を準備する
	③換気を指示し、嘔吐物周辺に人が近づかないようにする
2	嘔吐物処理セットが準備できたら、直ちに、セット内のマスクと手袋をつけ、リバースクリーンに嘔吐物に振り掛ける。嘔吐物が多く、足りない場合は、もう一袋準備し振り掛ける。
3	嘔吐物が固まる間に、手袋を外し、手指消毒をし、ウエストポーチ等、身に着けているものを外して、セット内の長袖エプロンや手袋を装着する。
4	嘔吐物の外縁から1.5m離れたところに、セット内の青いビニール袋を広げ、その中に黒いビニール袋を広げる。
5	処理後の靴底消毒の準備として、ペーパータオルを、広げたビニール袋の近くに4-5枚重ねておき、泡ハイターを振り掛けておく。
6	セット内のちり取りセットを用いて、固まった嘔吐物を集めて、黒いビニール袋に、ちり取りセットごと破棄し、口を閉じて密封する。
7	手袋を外し、手指消毒後、新しく手袋をつけて、嘔吐物があった床面に、泡ハイターを振り掛け、ペーパータオルで拭きあげ、青いビニール袋に破棄する。
8	もう一度、手袋を外し、手指消毒後、新しく手袋をつけて、嘔吐物がとんだ床面に、泡ハイターを振り掛け、ペーパータオルで拭きあげ、青いビニール袋に破棄する。
9	あらかじめ用意していた、靴底消毒用のペーパータオルを踏みつけて、靴底を消毒し、ペーパータオルを青いビニール袋に破棄する。
10	手袋を外し青いビニール袋に破棄し、手指消毒を行い、エプロンを外して青いビニール袋に破棄した後、青いビニール袋の口をしっかりと閉じハザードボックスに捨てる。再度手指消毒を行ってマスクを外しハザードボックスに捨てる。
11	石鹸と流水で手洗いを行う。

●嘔吐物処理セットの保管場所

総合案内、外来受付、外来、検査室、レントゲン室、CT室、リハビリ室、OT室、各病棟