

針刺し事故発生

速やかに行動しなければ感染率が高くなる

原因機材の血液の汚染

なし

傷処置後、上司へ報告

あり

直ちに傷口より血液を絞り出し、流水で洗い流す
上司へ報告

報告：針刺し事故報告書を被事故者が記載し所属長へ提出

ICTへ

被事故者は、**速やかに、外来受診し**（カルテには「針刺し」と記入、事務受付にもその旨、伝えておく）
早急に、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体、セット2の採血を実施する
被事故者のHBs抗原、HBs抗体の結果が出なければ、グロブリン等の薬剤使用ができない

針刺しの患者の特定

不可

「不明」として対処

可能

患者の感染症に関する情報を入手

* 1年以内の結果は有効とする

HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体、HIV抗体を確認

HBs抗原(+)時

HIV抗体(+)又は、医師が、HIV抗体陽性を強く疑う場合

ICDへ報告、指示を受ける

不明なもの

なし

全ての検査
陰性

陰性編

あり

HBs抗原
陽性

HBV編

HCV抗体
陽性

HCV編

HIV抗体
陽性

HIV編

患者本人より検査の同意書に署名をもらう
(主治医または師長)

患者本人の署名

署名
不可

家族に署名を依頼

署名拒否又は不可
家族との連絡不可

署名あり

署名あり

採血 HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体
指示があれば、HIV抗体

被事故者と相談
ICDの判断

*被事故者及び患者の感染症データが出た後

針刺し事故報告書に追加記載し上司へ提出 ⇒ ICT ⇒ 看護部長と医療安全管理室へ