

手術時に休薬の検討が必要な女性ホルモン関連製剤

分類		薬剤名	術前休薬期間	術後再開の目安	添付文書上の周術期に関する記載箇所			
S E R M	閉経後骨粗鬆症薬	エビスタ錠、ラロキシフェン塩酸塩錠	術後長期安静が必要な場合 3日間	完全に歩行可能となってから	禁忌			
		ビビアント錠、バゼドキシフェン錠						
高用量黄体ホルモン製剤		ヒスロンH錠、メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	医師の指示	術後1週間				
卵胞ホルモン製剤		プレマリン錠	4週間 ※期間確保のための手術延期は不要	術後2週間 または 完全に歩行可能となってから	特定の背景を有する患者に関する注意			
		エストリール錠、エストリオール錠、エストリール膣錠、 ホーリン錠、ホーリンV膣用錠						
		ジュリナ錠、エストラジオール錠、ル・エストロジェル、 ディピゲル、エストラーナテープ						
卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	閉経後骨粗鬆症	ウェールナラ配合錠						
	血管運動神経症状	メノエイドコンビパッチ						
	月経困難症	ルナベル配合錠LD/ULD、フリウエル配合錠LD/ULD	4週間	術後2週間	禁忌			
		ヤーズ配合錠、ドロエチ配合錠、ヤーズフレックス配合錠						
		ジェミーナ配合錠						
		アリッサ配合錠						
	低用量ピル	シンフェーズT28錠						
		アンジュ21,28錠、トリキュラー錠28、ラベルフィーユ21,28錠						
		マーベロン21,28、ファボワール21,28						
	中用量ピル	プラノバル配合錠						重要な基本的注意

※休薬期間に関しては、OC・LEPガイドライン、HRTガイドライン、各薬剤の添付文書上の術前休薬に関する記載を参考とした日数としています。患者ごとに血栓リスクを考慮して、休薬の有無とその期間を決定する必要があります。